

Beiträge

zur

Beurtheilung des Nutzens der Schutzpockenimpfung

nebst

Mittheilungen über Maßregeln zur Beschaffung
untadeliger Thierlymphe.

Bearbeitet

im

Kaiserlichen Gesundheitsamte.

Mit 6 Tafeln.



Springer-Verlag
Berlin Heidelberg GmbH
1888.

Im unterzeichneten Verlage erscheinen die

Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes

wöchentlich jeden Dienstag und enthalten im Wesentlichen:

Nachrichten über den Gesundheitszustand und den Gang der Seuchen, sowie über zeitweilige Maßregeln zur Abwehr und Unterdrückung von Seuchen. — Meteorologische Notizen. — Medizinal-Gesetzgebung und allgemeine Verwaltungsanordnungen auf dem Gebiete des Sanitäts- und Veterinärwesens. — Rechtsprechung. — Notizen über Kongresse, Verhandlungen gelehrter Körperschaften zc. — Vermischtes. — Verzeichnis der für die Bibliothek des Kaiserlichen Gesundheitsamtes eingegangenen Geschenke.

Abonnements werden zum Preise von M. 5,— halbjährlich von allen Postanstalten (Post-Zeitungs-Preisliste 5910) und Buchhandlungen, sowie von der Verlagshandlung ausgeführt.

Inserate über Gegenstände für die Zwecke der Gesundheitspflege werden von allen Annoncen-Expeditionen, sowie von der Verlagshandlung zum Preise von 30 Pf. für die dreigespaltene Petitzeile entgegengenommen.

Die größeren wissenschaftlichen Arbeiten zc. aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte erscheinen unter dem Titel:

Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte

in zwanglosen Heften, welche zu Bänden von 30—40 Bogen Stärke vereinigt werden.

Es sind bis jetzt erschienen:

Band I. Mit 13 Tafeln und in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis M. 26.—.
(Heft 1/2 M. 6.—; Heft 3/5 M. 20.—.)

Band II. Mit 6 Tafeln und in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis M. 22.—.
(Heft 1/2 M. 8.—; Heft 3/5 M. 14.—.)

Band III. Bericht über die Thätigkeit der zur Erforschung der Cholera im Jahre 1883 nach Egypten und Indien entsandten Kommission, unter Mitwirkung von Prof. Dr. Robert Koch, bearbeitet vom Kaiserlichen Regierungs-Rath Dr. Georg Gaffky. Mit Abbildungen im Text, 30 Tafeln und einem Titelbilde. Preis M. 30.—.

Ferner sind erschienen:

Jahresbericht

über die

Verbreitung von Thierseuchen

im

Deutschen Reiche.

Bearbeitet im Kaiserlichen Gesundheitsamte zu Berlin.

Erster Jahrgang.

Das Jahr 1886.

Mit acht Heberlichtskarten.

Preis M. 10.—.

Das

Kaiserliche Gesundheitsamt.

Rückblick

auf den Ursprung sowie auf die Entwicklung und Thätigkeit des Amtes in den ersten zehn Jahren seines Bestehens.

Zusammengestellt

im

Kaiserlichen Gesundheitsamte.

Preis kart. M. 3.—.

Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH

Beiträge

zur

Beurtheilung des Nutzens der Schutzpockenimpfung

nebst

Mittheilungen über Maßregeln zur Beschaffung
untadeliger Thierlymphe.

Bearbeitet

im

Kaiserlichen Gesundheitsamte.

Mit 6 Tafeln.



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 1888

Additional material to this book can be downloaded from <http://extras.springer.com>

ISBN 978-3-662-39229-4

ISBN 978-3-662-40243-6 (eBook)

DOI 10.1007/978-3-662-40243-6

Inhalts-Verzeichniß.

| | Seite |
|---|-------|
| Einleitung | I |
| Abchnitt 1. Tafeln zur Veranschaulichung der Wirkung des Impfgesetzes in Deutschland | 1 |
| Abchnitt 2. Ergebnisse einer Statistik der Pockentodesfälle im Deutschen Reiche für das Jahr 1886 | 27 |
| Abchnitt 3. Die während des Jahres 1886 in mehreren Staaten des Deutschen Reiches vorgekommenen Erkrankungen an den Pocken. Nebst einem Anhange, betreffend Pockenerkrankungen im Jahre 1885 | 39 |
| Abchnitt 4. Der Einfluß der Schutzpockenimpfung auf die Pockensterblichkeit in Schweden | 75 |
| Abchnitt 5. Die Regelung des Impfwesens in den neun älteren Provinzen Preußens bis zum Jahre 1874, nebst einem Anhange: Die Entwicklung des Impfwesens in der königlich preussischen Armee | 100 |
| Abchnitt 6. Die Ergebnisse der Bearbeitung sogenannter „Ur-Pockenlisten“ | 120 |
| Abchnitt 7. Mittheilungen über die Maßregeln, welche zur Beschaffung untadeliger Thierlymphe ergriffen worden sind, sowie über die Zunahme der Verwendung von Thierlymphe bei den im Deutschen Reiche ausgeführten öffentlichen Impfungen | 180 |

Verzeichniß der Tafeln.

- Tafel 1. Pockensterblichkeit in Preußen und Oesterreich in den Jahren 1816—1886.
- Tafel 2. Pockensterblichkeit in einer Anzahl größerer Städte des In- und Auslandes.
- Tafel 3. Pockensterblichkeit in Bayern und Belgien.
- Tafel 4. Erkrankungen und Todesfälle an Pocken in verschiedenen Armeen in den Jahren 1867—1886.
- Tafel 5. Pockensterblichkeit der Civil- und Militärbevölkerung in Preußen in den Jahren 1825—1886.
- Tafel 6. Pockensterblichkeit in Schweden in den Jahren 1774—1883.

Einleitung.

Die Petitionskommission des Reichstages hat in ihrer Sitzung vom 23. März 1886 gelegentlich der Berathungen über die Petitionen zum Impfgesetz folgenden Beschluß gefaßt (Reichstagsdruckfache Nr. 313, II. Session (1885/86), 6. Legislaturperiode):

„Der Reichstag wolle beschließen: über die Petitionen II. Nr. 51, 52, 53, 54, 55a—y, 74, 81, 431, 465, 466, 499, 526, 611, 692, 857, 995, 1439, 1944, 1967, 3663, 4603, 5467, 6125, 13 279 zur Tagesordnung überzugehen, jedoch mit Rücksicht auf die Erklärung des Herrn Regierungskommissars, daß im Anschluß an die Verhandlungen der Sachverständigen-Kommission im Reichsgesundheitsamt statistische Ermittlungen über den Nutzen der Schutzpockenimpfung stattfinden, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, von dem Ergebnis dieser Ermittlungen, insbesondere der Bearbeitung von Urpockenlisten, ebenso über die Maßregeln, welche zur Beschaffung untadeliger animaler Lymphe ergriffen sind, dem Reichstag bis zur nächsten Session Mittheilung zu machen.“

Wenn der vorstehende Beschluß der Petitionskommission auch nicht mehr zur Berathung im Plenum des Reichstages gelangt ist, so hat die Reichsverwaltung sich doch veranlaßt gesehen, das Kaiserliche Gesundheitsamt mit der Ausarbeitung einer Denkschrift zu beauftragen, in welcher die Ergebnisse der beregten Ermittlungen niederzulegen seien, um dieselben sowohl dem Reichstage als auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen.

Den sichersten Maßstab für die Schädigungen, welche ein Volk durch die Pocken erleidet, gewähren die Zahlen der Pockentodesfälle. Es wurden daher, um einen Ueberblick über die durch das Reichs-Impfgesetz in Deutschland erzielten Erfolge zu geben, bereits im Jahre 1883 im Kaiserlichen Gesundheitsamte Tafeln zur Veranschaulichung der Wirkung des genannten Gesetzes zusammengestellt und am 6. Juni 1883 den Mitgliedern des Reichstages vorgelegt. Auf den Tafeln waren die Pockentodesfälle in Preußen vor und nach dem Inkrafttreten des Gesetzes mit den Pockentodesfällen in Oesterreich, sowie die Pockentodesfälle einer Anzahl größerer Städte des Inlandes mit denjenigen ausländischer Städte in Vergleich gestellt. Da zuverlässige Angaben über Pockenerkrankungen nur den Armee-Statistiken zu entnehmen waren, so wurden

in den Tafeln außerdem die Pockenkrankungen der preußischen Armee, in welcher die Wiederimpfung streng durchgeführt ist, und welcher außerdem der relative Schutz einer gut geimpften Bevölkerung zu Gute kommt, mit den Pockenkrankungen der österreichischen sowie der französischen Armee verglichen, in welchen die Wiederimpfung in mangelhafter Weise durchgeführt wurde, und welche außerdem von einer mangelhaft geimpften Bevölkerung umgeben sind.

Die Tafeln ließen, soweit der Statistik ein Urtheil zu entnehmen war, das Impfgesetz als eine außerordentlich nützliche und segensreiche Institution erscheinen.

Nachdem inzwischen die den Tafeln zu Grunde liegenden statistischen Angaben für einige weitere Jahre haben ergänzt werden können, schien es angezeigt, den Nachweis zu führen, daß die damals gezogenen Schlußfolgerungen auch für die späteren Jahre als zutreffend sich erwiesen haben. Es sind daher die Tafeln in dieser Denkschrift von neuem mitgetheilt und zwar nicht nur ergänzt für diejenigen Jahre, für welche neuerdings statistische Angaben beschafft werden konnten, sondern auch vervollständigt durch zwei neue Tafeln. Die den graphischen Darstellungen zu Grunde liegenden Zahlen haben überdies einige später noch zu erläuternde Aenderungen erfahren und sind nebst Angabe der Quellen, aus welchen sie entnommen, in Tabellenform beigelegt.

Eine erneute Vorlage und Erörterung der Tafeln erschien umsomehr angezeigt, als sie sowohl seitens eines Mitgliedes des Reichstages (in der Sitzung vom 12. Juni 1883), als auch in der Kommission zur Berathung der Impffrage, welche auf Anregung des Reichstages im Jahre 1884 von dem Herrn Reichskanzler berufen war, seitens der impf- bzw. impfzwanggegnerischen Minorität dieser Kommission Angriffe erfahren haben. Bezüglich dieser Angriffe und ihrer Zurückweisung kann hier auf die den Tafeln in Abschnitt 1 beigegebenen Ausführungen Bezug genommen werden.

Wie bei ihrer ersten Vorlage, so berechtigen die Tafeln auch heute noch zu dem am Schlusse der 1883er Druckfache ausgesprochenen Urtheile:

„Soweit der Statistik ein Urtheil zu entnehmen ist, muß also das Impfgesetz als eine außerordentlich nützliche und segensreiche Institution angesehen werden.“

Als die Tafeln zur Veranschaulichung der Wirkung des Impfgesetzes zum ersten Male aufgestellt wurden, waren die erforderlichen Unterlagen für eine Statistik der Todesfälle an Pocken für das gesammte Deutsche Reich noch nicht vorhanden. Durch die unter dem 18. Juni 1885 vom Bundesrathe genehmigten Beschlüsse der Kommission zur Berathung der Impffrage ist diesem Uebelstande abgeholfen worden, indem durch die Beschlüsse unter Nr. 9 (s. Seite XIV) die Herstellung einer solchen Statistik für das Reich gesichert wurde. Die Bearbeitung der Statistik ist dem Kaiserlichen Gesundheitsamte übertragen worden und hat zum ersten Male für das Jahr 1886 stattgefunden. Ihre Ergebnisse sind in Abschnitt 2 dieser Denkschrift ausführlich mitgetheilt.*)

*) Vgl. auch Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte II. Bd., Seite 223.

Bei einer Durchsicht der Bearbeitung erhält man den Eindruck, als ob die Pocken zur Zeit überhaupt kaum noch zu den in Deutschland endemischen Krankheiten gehören; denn wenn man die durch einen regen Schiffsverkehr mit dem Auslande in naher Beziehung stehenden Stadtbezirke von Bremen, Hamburg, Königsberg und Danzig den Grenzbezirken des Deutschen Reiches zurechnet, so sind etwa zwei Drittheile sämmtlicher Pockentodesfälle in den Grenzbezirken des Reiches vorgekommen und nur etwa ein Drittheil im Binnenlande. In Berlin ist im Jahre 1886 nur eine einzige Person als an den Pocken gestorben gemeldet, in Breslau, Dresden, Köln und Frankfurt a. M. überhaupt keine, in München nur zwei, in Leipzig drei u. s. w.

Einen wie wenig günstigen Boden die Bevölkerung des Deutschen Reiches im Jahre 1886 für die Pocken abgegeben hat, erhellt u. a. auch daraus, daß unter 86 von Pockentodesfällen betroffenen Gemeinden des Reiches in 54 nur je ein Todesfall vorgekommen ist, in 19 anderen nur je zwei Todesfälle; daß ferner nur aus 4 der überhaupt betroffenen Gemeinden fünf und mehr Todesfälle gemeldet worden sind (nämlich aus Hamburg 17, aus Königsberg 5, aus dem ober-schlesischen Dorfe Balenze 5 und aus Salbke, Kreis Wanzleben, 7).

Daß die Pockensterblichkeit in Deutschland gegenüber derjenigen des Auslandes im Jahre 1886 sehr gering gewesen ist, ergibt sich aus einem Vergleiche, bezüglich dessen Einzelheiten auf den Abschnitt 2 verwiesen werden muß. Hiernach hatten im Jahre 1886 die in Vergleich gestellten

| | | |
|---------------------|------|---------|
| Städte Oesterreichs | eine | 81 mal, |
| " Ungarns | " | 607 " |
| " der Schweiz | " | 54 " |
| " Belgiens | " | 48 " |

größere Pockensterblichkeit als die Städte des Deutschen Reiches.

Bemerkt werden muß hierzu, daß in den genannten Ländern ein allgemeiner gesetzlicher Impfwang wie in Deutschland nicht bestand.

Die Städte Englands, wo die Impfung der Kinder im jugendlichen Alter obligatorisch ist, standen entsprechend dieser gesetzlichen Regelung des Impfwesens auch bezüglich ihrer Pockensterblichkeit den deutschen Städten weit näher, als die Städte jener anderen Länder; immerhin hat auch in den englischen Städten die Pockensterblichkeit noch das doppelte von derjenigen in den deutschen Städten betragen. Es steht diese Thatsache in Einklang damit, daß eine obligatorische Wiederimpfung, wie sie das deutsche Impfgesetz vorschreibt, in England nicht eingeführt ist.

Auch die Pockentodesfallsstatistik des Jahres 1886 spricht, wie schon aus diesen kurzen Mittheilungen sich ergibt, in überzeugender Weise für den segensreichen Einfluß des deutschen Impfgesetzes.

In Uebereinstimmung mit den Beschlüssen der Kommission zur Berathung der Impffrage hat der Bundesrath davon Abstand genommen, eine Statistik über Erkrankungen an Pocken für das Deutsche Reich zu veranlassen, vielmehr auf die Herstellung

der vorerwähnten Pockentodesfallsstatistik sich beschränkt. Mit Rücksicht auf die während der Verhandlungen der genannten Kommission von mehreren Seiten ausgesprochenen Wünsche hat indeß in der Folge der Herr Reichskanzler sich veranlaßt gesehen, bei den Bundesregierungen und dem Kaiserlichen Statthalter von Elsaß-Lothringen eine Verständigung dahin anzuregen, daß etwaige statistische Erhebungen über Pockenkrankungen ebenfalls nach einem einheitlichen Plane stattfinden, und daß die Bearbeitung des Materials unbeschadet der Verwerthung seitens der einzelnen Bundesregierungen durch das Kaiserliche Gesundheitsamt bewirkt werden möchte.

Eine Anzahl von Bundesregierungen hat dieser Anregung bereitwilligst Folge gegeben; es ist dadurch ermöglicht worden, bereits für das Jahr 1886 für einen nicht unbeträchtlichen Theil des Deutschen Reiches neben der allgemeinen Statistik der Pockentodesfälle auch eine solche über Pockenkrankungen aufzustellen. Die Ergebnisse sind in Abschnitt 3 mitgetheilt. Als Anhang ist dajelbst auch das verhältnißmäßig wenig umfangreiche Material zusammengestellt, welches für das Jahr 1885 vorliegt.

Schon jetzt läßt sich erkennen, daß von dieser auf breiter Grundlage angelegten Erkrankungsstatistik werthvolle Bereicherungen unserer Kenntnisse über den Nutzen der Schutzpocken-Impfung zu erwarten sind. Jedoch zeigt auch die Bearbeitung in Abschnitt 3 deutlich, daß Angaben über den Impfzustand der Erkrankten nur dann statistisch sich verwerthen lassen, wenn der Erfolg und der Zeitpunkt der geschehenen Impfung zuverlässig ermittelt worden sind. Die Durchsicht der Erkrankungsstatistik bildet daher eine lehrreiche Vorbereitung für das Studium der in Abschnitt 6 mitgetheilten Bearbeitung sogenannter „Ur-Pockenlisten“.

In dem Gutachten, welches die Königlich preußische wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen auf Anregung des Reichstages des Norddeutschen Bundes (Beschluß vom 6. April 1870) am 28. Februar 1872 über die Schutzpockenimpfung erstattet hat, ist zum Beweise dafür, daß mit der im Anfange dieses Jahrhunderts erfolgten Einführung der Schutzpockenimpfung die Pockensterblichkeit eine beträchtliche Abnahme erfahren hat, u. a. auch eine statistische Zusammenstellung über die Pockensterblichkeit im Königreiche Schweden mitgetheilt worden. Dieselbe war dem Berichte einer englischen Parlamentskommission, dem sogenannten Blaubuche*), entnommen.

So überzeugend nun die schwedische Statistik auch für den Nutzen der Schutzpockenimpfung zu sprechen schien, so hat diese Auffassung doch andererseits in impfgegnerischen Schriften und Flugblättern heftige Angriffe erfahren. Die Reichsverwaltung hat daher Veranlassung genommen, durch Vermittelung der Königlich schwedischen Regierung das bezügliche amtliche Material sich zugänglich zu machen und dasselbe nochmals einer eingehenden Prüfung mit Bezug auf diejenige Frage zu unterwerfen, ob die in Schweden seit Anfang dieses Jahrhunderts eingetretene Abnahme der Pockensterblichkeit der Einführung der Schutzpockenimpfung zugeschrieben werden muß oder nicht.

*) Report from the select committee on the Vaccination Act (1867); together with the proceedings of the committee. Ordered by the house of Commons, to be printed. 23. May 1871.

Die Ergebnisse dieser Prüfung sind im Abschnitt 4 ausführlich mitgetheilt. Es hat sich gezeigt, daß die beregten Einwände als begründet nicht angesehen werden können, und daß in der That die bedeutende Abnahme der Pockensterblichkeit in Schweden seit Anfang dieses Jahrhunderts nur durch die Einführung der Schutzpockenimpfung genügend sich erklären läßt. — Wie hier nebenbei bemerkt sei, enthält das von der Königlich schwedischen Regierung überlieferte, in Abschnitt 4 bearbeitete Material auch sonst einige werthvolle Beiträge zur Beurtheilung des Nutzens der Schutzpockenimpfung.

In impfgegnerischen Veröffentlichungen begegnet man nicht selten der Behauptung, daß in Preußen schon lange vor dem Inkrafttreten des Reichs=Impfgesetzes die Zwangs=impfung bestanden habe, daß durch das genannte Gesetz in dem Impfstande der Bevölkerung in Preußen nichts Wesentliches geändert worden sei u. dgl. m. Auch von einem Mitgliede des Reichstages ist in der Sitzung vom 12. Juni 1883 geäußert worden, daß in Preußen der Impfwang seit 1835 bestanden habe.

Da nun, wie in Abschnitt 1 dieser Denkschrift nachgewiesen, die Pockensterblichkeit in Preußen seit dem Inkrafttreten des Reichs=Impfgesetzes in ganz auffallender Weise abgenommen hat, diese Abnahme auch durch nichts anderes erklärt werden kann, als eben durch die Wirkung des genannten Gesetzes, so erschien es zweckmäßig, die gesetzliche Regelung, welche das Impfwesen in den neun älteren Provinzen Preußens bis zum Jahre 1874 erfahren hatte, einer näheren Erörterung zu unterziehen, um damit auch für weitere Kreise klarzustellen, daß ein allgemeiner direkter Impfwang in Preußen thatsächlich erst durch das Reichs=Impfgesetz eingeführt ist.

Demgemäß werden in Abschnitt 5 dieser Denkschrift die bezüglichen Bestimmungen eingehend besprochen. Einige der älteren unter ihnen bieten noch insofern ein besonderes Interesse, als aus ihnen erhellt, daß, wie in anderen Ländern, so auch in Preußen die Schutzpockenimpfung im Anfange dieses Jahrhunderts einer sorgfältigen experimentellen Prüfung unterzogen worden ist, bevor die Behörden begonnen haben, ihrer Verbreitung förderlich zu sein. Letzteres geschah nämlich erst, nachdem in sehr zahlreichen Fällen festgestellt war, daß die geimpften Kinder allen Versuchen, sie mit dem echten Pockengift zu infiziren, erfolgreich Widerstand zu leisten vermochten (vgl. Seite 103).

Wie schwer die Bevölkerung Preußens vor Einführung der Kuhpockenimpfung von den Menschenpocken heimgesucht gewesen ist, ergiebt sich u. a. aus dem am 31. October 1803 vom Könige erlassenen „Reglement, nach welchem sich die Obrigkeit, Medicinal- und andere Personen bei der Impfung der Schutzblattern richten sollen“. In diesem Reglement wird nämlich darauf hingewiesen, daß das menschliche Pockenübel im Durchschnitt jährlich mehr als 40 000 Menschen in den preußischen Landen weggerafft habe (vgl. Seite 103).

Als Anhang zu den in Abschnitt 5 enthaltenen Erörterungen über die Regelung des Impfwesens für die Civilbevölkerung der älteren preußischen Provinzen sind ausführlichere Mittheilungen über die Entwicklung des Impfwesens in der preußischen Armee gemacht worden. Dieselben dienen zugleich zur näheren Erläuterung der im Abschnitte 1 besprochenen Tafel 5.

Im Anschluß an die Verhandlungen der Kommission zur Berathung der Impfrage ist eine größere Zahl von sogenannten „Ur-Pockenlisten“, d. h. polizeiamtlichen namentlichen Listen der an den Pocken erkrankten und gestorbenen Personen aus preußischen Städten und Ortschaften im Kaiserlichen Gesundheitsamte einer Bearbeitung unterzogen worden, deren Ergebnisse in Abschnitt 6 zusammengestellt sind. Das Material stammt aus den königlich preußischen Regierungsbezirken Magdeburg, Merseburg, Erfurt, Düsseldorf, Köln und Aachen, sowie aus den Städten Berlin und Liegnitz und enthält unter anderem auch diejenigen Aufzeichnungen aus der Stadt Aachen, auf deren Prüfung seitens der Minorität der oben genannten Kommission besonderer Werth gelegt war, da sich aus ihnen ergeben sollte, daß eine zweimalige Erkrankung einer und derselben Person an den Pocken innerhalb einer und derselben Epidemie zu den keineswegs seltenen Vorkommnissen gehöre.

Der große Umfang der beregten Arbeit erhellt schon daraus, daß mehr als 55 000 Zählkarten aus den dem Gesundheitsamte zugänglich gemachten Listen ausgeschrieben worden sind, von denen allerdings ein nicht geringer Theil wegen Unvollständigkeit der Angaben schließlich nicht hat verwerthet werden können.

Die Kommission zur Berathung der Impfrage hatte entgegen einem bezüglichen Antrage der Minorität es abgelehnt, ihrerseits in eine Prüfung des in den Ur-Pockenlisten enthaltenen Materials einzutreten, und zwar abgesehen von formellen Bedenken aus dem Grunde, weil die in diesen Listen enthaltenen Aufzeichnungen der erforderlichen Zuverlässigkeit entbehrten, und weil vor Allem die Angaben über den Impfzustand der Erkrankten statistisch nicht verwerthbar seien. Diese Bedenken haben auch bei der im Gesundheitsamte vorgenommenen Bearbeitung der Listen sich als begründet erwiesen. Es unterliegt danach keinem Zweifel, daß in den Ur-Pockenlisten zahlreiche Personen als „geimpft“ aufgeführt sind, welche thatsächlich ohne Erfolg oder zu spät, d. h. nachdem sie bereits mit dem Krankheitsgift der echten Pocken sich infizirt hatten, geimpft waren. Alle diese Personen, deren Zahl auch nicht annähernd festzustellen ist, können als durch die Impfung geschützt nicht gelten; denn die Impfung vermag nicht die bereits vorhandene Pockenkrankheit zu heilen.

Unter solchen Umständen kann der statistischen Bearbeitung der sogenannten Ur-Pockenlisten nur ein verhältnißmäßig geringer Werth beigelegt werden. Insbesondere ist zu berücksichtigen, daß die beregten Fehlerquellen den Impfschutz in den Ur-Pockenlisten geringer erscheinen lassen, als er thatsächlich gewesen ist. Im Uebrigen lassen sich die Ergebnisse der Bearbeitung folgendermaßen zusammenfassen:

Die Ur-Pockenlisten sind nicht geeignet, die auf Erfahrung und Wissenschaft begründete Ueberzeugung, daß die Impfung einen beträchtlichen Schutz gegen das Erkranken und Sterben an Pocken gewährt, zu erschüttern, dienen vielmehr zur Bestärkung derselben; sie bestätigen ferner den Erfahrungssatz, daß das einmalige Ueberstehen der Pocken mit seltenen Ausnahmen gegen eine neue Erkrankung an denselben schützt.

Entsprechend dem im Beginne dieser Einleitung erwähnten Beschlusse der Petitionskommission des Reichstages ist in Abschnitt 7 der Denkschrift über diejenigen Maßregeln, welche seitens der Reichsverwaltung, sowie in den einzelnen Bundesstaaten zur Beschaffung untadeliger Thierlymphe ergriffen worden sind, Mittheilung gemacht worden. Um zugleich einen Ueberblick darüber zu gewähren, in welcher Ausdehnung die Thierlymphe bei den öffentlichen Impfungen im Deutschen Reiche zur Zeit bereits Anwendung findet, ist in dem genannten Abschnitte zugleich eine Zusammenstellung gegeben, welche ersichtlich macht, wie viel von je 100 überhaupt geimpften und wiedergeimpften Kindern in den einzelnen Bundesstaaten in den Jahren 1885 und 1886 mit Thierlymphe geimpft worden sind.

Im Vorstehenden ist bereits mehrfach auf die Beschlüsse der vom 30. October bis 5. November 1884 im Kaiserlichen Gesundheitsamte versammelt gewesenen Sachverständigen-Kommission zur Berathung der Impffrage Bezug genommen worden. Da diese Beschlüsse für die Gestaltung des Impfwesens im Deutschen Reiche von der größten Bedeutung sind, so mögen sie hierunter im Zusammenhange mitgetheilt sein und zwar in derjenigen Fassung, in welcher sie vom Bundesrath unter dem 18. Juni 1885 genehmigt und den Bundesregierungen mit dem Ersuchen mitgetheilt worden sind, die danach erforderlichen Anordnungen auf Grund des § 18 Absatz 2 des Impfgesetzes zu treffen:

1. Beschlüsse, betreffend den physiologischen und pathologischen Stand der Impffrage.

1. Das einmalige Ueberstehen der Pockenkrankheit verleiht mit seltenen Ausnahmen Schutz gegen ein nochmaliges Befallenwerden von derselben.
2. Die Impfung mit Vaccine ist im Stande, einen ähnlichen Schutz zu bewirken.
3. Die Dauer des durch Impfung erzielten Schutzes gegen Pocken schwankt innerhalb weiter Grenzen, beträgt aber im Durchschnitt zehn Jahre.
4. Um einen ausreichenden Impfschutz zu erzielen, sind mindestens zwei gut entwickelte Impfpocken erforderlich.
5. Es bedarf einer Wiederimpfung nach Ablauf von zehn Jahren nach der ersten Impfung.
6. Das Geimpftsein der Umgebung erhöht den relativen Schutz, welchen der Einzelne gegen die Pockenkrankheit erworben hat, und die Impfung gewährt demnach nicht nur einen individuellen, sondern auch einen allgemeinen Nutzen in Bezug auf Pockengefahr.
7. Die Impfung kann unter Umständen mit Gefahr für den Impfling verbunden sein.

Bei der Impfung mit Menschen-Lymphe ist die Gefahr der Uebertragung von Syphilis, obwohl außerordentlich gering, doch nicht gänzlich ausgeschlossen.

Von anderen Impfschädigungen kommen nachweisbar nur accidentelle Wundkrankheiten vor.

Alle diese Gefahren können durch sorgfältige Ausführung der Impfung auf einen so geringen Umfang beschränkt werden, daß der Nutzen der Impfung den eventuellen Schaden derselben unendlich überwiegt.

8. Seit Einführung der Impfung hat sich keine wissenschaftlich nachweisbare Zunahme bestimmter Krankheiten oder der Sterblichkeit im Allgemeinen geltend gemacht, welche als eine Folge der Impfung anzusehen wäre.

2. Beschlüsse, betreffend die allgemeine Einführung der Impfung mit Thier-Lymphe.

1. Da die mit der Impfung mit Menschen-Lymphe unter Umständen verbundenen Gefahren für Gesundheit und Leben der Impflinge (Impfsyphilis, Impfsyphilis u. s. w.) durch die Impfung mit Thier-Lymphe, soweit es sich um direkte Uebertragung der Syphilis oder der accidentellen Wundkrankheiten handelt, vermieden werden können, und da die Impfung mit Thier-Lymphe in der Neuzeit soweit vervollkommen ist, daß sie der Impfung mit Menschen-Lymphe fast gleichzustellen ist, so hat die Impfung mit Thier-Lymphe thunlichst an Stelle der mit Menschen-Lymphe zu treten.
2. Die allgemeine Einführung der Impfung mit Thier-Lymphe ist allmählich durchzuführen, und zwar sind unter Zuhilfenahme der bisher gewonnenen Erfahrungen Anstalten zur Gewinnung von Thier-Lymphe in einer dem voraussichtlichen Bedarfe entsprechenden Anzahl zu errichten.

Sobald der Bedarf an Thier-Lymphe seitens einer solchen Anstalt gesichert ist, sind die öffentlichen Impfungen in dem betreffenden Bezirke mit Thier-Lymphe auszuführen.

3. Für die Einrichtung und den Betrieb der Anstalten sind folgende allgemeine Bestimmungen maßgebend:

- a) Die Anstalt ist der Leitung eines Arztes zu unterstellen.
 - b) Die Lymphe wird den Impfarzten kosten- und portofrei überlassen.
 - c) Es ist gestattet, an Stelle der sogenannten genuinen Vaccine die Retrovaccine zu benutzen.
 - d) Die Lymphe ist nicht eher an die Impfarzte abzugeben, als bis die Untersuchung der geschlachteten Thiere, welche die Lymphe lieferten, deren Gesundheit erwiesen hat.
 - e) Ueber Alter, Pflege und Wartung der Kälber, Zeit und Art der Lympheabnahme, Methode der Konservierung, der Aufbewahrung, des Versandts u. s. w. werden durch eine Kommission von Sachverständigen spezielle Instruktionen ausgearbeitet.
-

3. Entwurf von Vorschriften, welche von den Aerzten bei der Ausführung des Impfgeschäftes zu befolgen sind.

A. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. An Orten, an welchen ansteckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern, Diphtheritis, Croup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige Entzündungen, in größerer Verbreitung auftreten, ist die Impfung während der Dauer der Epidemie nicht vorzunehmen.

Erhält der Impfarzt erst nach Beginn des Impfgeschäftes davon Kenntniß, daß derartige Krankheiten in dem betreffenden Orte herrschen, oder zeigen sich dort auch nur einzelne Fälle von Impfrothlauf, so hat er die Impfung an diesem Orte sofort zu unterbrechen und der zuständigen Behörde davon Anzeige zu machen.

Hat der Impfarzt einzelne Fälle ansteckender Krankheiten in Behandlung, so hat er in zweckentsprechender Weise deren Verbreitung bei dem Impfgeschäft durch seine Person zu verhüten.

§ 2. Bereits bei der Bekanntmachung des Impftermines ist dafür Sorge zu tragen, daß die Angehörigen der Impflinge gedruckte Verhaltensvorschriften für die öffentlichen Impfungen und über die Behandlung der Impflinge während der Entwicklung der Impfblattern erhalten.

§ 3. Im Impftermine hat der Impfarzt im Einvernehmen mit der Ortspolizeibehörde für die nöthige Ordnung zu sorgen, Ueberfüllung der für die Impfung bestimmten Räume zu verhüten und ausreichende Lüftung derselben zu veranlassen.

Die gleichzeitige Anwesenheit der Erstimpflinge und der Wiederimpflinge ist thunlichst zu vermeiden.

B. Gewinnung der Lymphe.

I. Bei Verwendung von Menschen-Lymphe.

§ 4. So lange die Impfung mit Thier-Lymphe für die öffentlichen Impfungen nicht zur Ausführung gelangt, beziehen die Impfarzte die zum Einleiten der Impfung erforderliche Lymphe aus den Landes-Impfinstituten. Für ein ausreichendes Material zum Fortführen der Impfung, beziehungsweise zur Abgabe von Lymphe an andere Aerzte haben die Impfarzte durch Entnahme von Lymphe von geeigneten Impflingen selbst zu sorgen.

§ 5. Die Impflinge, von welchen Lymphe zum Weiterimpfen entnommen werden soll (Ab-, Stamm-, Mutterimpflinge), müssen zuvor am ganzen Körper untersucht und als vollkommen gesund und gut genährt befunden werden. Sie müssen von Eltern stammen, welche an vererbaren Krankheiten nicht leiden; insbesondere dürfen Kinder, deren Mütter mehrmals abortirt oder Frühgeburten überstanden haben, als Abimpflinge nicht benutzt werden.

Der Abimpfling soll wenigstens 6 Monat alt, ehelich geboren und nicht das erste Kind seiner Eltern sein. Von diesen Anforderungen darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, wenn über die Gesundheit der Eltern nicht der geringste Zweifel obwaltet.

Der Abimpfling soll frei sein von Geschwüren, Schründen und Ausschlägen jeder Art, von Kondylomen an den Gefäßtheilen, an den Lippen, unter den Armen und am Nabel, von Drüsenanschwellungen, chronischen Affektionen der Nase, der Augen und Ohren, wie von Anschwellungen und Verbiegungen der Knochen; er darf demnach kein Zeichen von Syphilis, Skrophulosis, Rhachitis oder irgend einer anderen konstitutionellen Krankheit an sich haben.

§ 6. Lymphe von Wiedergeimpften darf nur im Nothfalle und nie zum Impfen von Erstimpflingen zur Anwendung kommen.

Die Prüfung des Gesundheitszustandes eines wiedergeimpften Abimpflings muß mit besonderer Sorgfalt nach Maßgabe der im § 5 angegebenen Gesichtspunkte geschehen.

§ 7. Jeder Impfarzt hat aufzuzeichnen, von wo und wann er seine Lymphe erhalten hat. Insbesondere hat er, wenn er Lymphe zur späteren eigenen Verwendung oder zur Abgabe an andere Aerzte aufbewahren will, den Namen der Impflinge, von denen die Lymphe abgenommen worden ist, und den Tag der erfolgten Abnahme aufzuzeichnen. Die Lymphe selbst ist derart zu bezeichnen, daß später über die Abstammung derselben ein Zweifel nicht entstehen kann.

Die Aufzeichnungen sind bis zum Schlusse des nachfolgenden Kalenderjahres aufzubewahren.

§ 8. Die Abnahme der Lymphe darf nicht später als am gleichnamigen Tage der auf die Impfung folgenden Woche stattfinden.

Die Blattern, welche zur Entnahme der Lymphe dienen sollen, müssen reif und unverletzt sein und auf einem nur mäßig entzündeten Boden stehen.

Blattern, welche den Ausgangspunkt für Rothlauf gebildet haben, dürfen in keinem Falle zum Abimpfen benutzt werden.

Mindestens zwei Blattern müssen am Impfling uneröffnet bleiben.

§ 9. Die Eröffnung der Blattern geschieht durch Stiche oder Schnittchen.

Das Quetschen der Blattern oder das Drücken ihrer Umgebung zur Vermehrung der Lymphmenge ist zu vermeiden.

§ 10. Nur solche Lymphe darf benutzt werden, welche freiwillig austritt und, mit bloßem Auge betrachtet, weder Blut noch Eiter enthält.

Uebelriechende oder sehr dünnflüssige Lymphe ist zu verwerfen.

§ 11. Nur reines Glycerin darf mit der Lymphe vermischt werden. Die Mischung soll mittels eines reinen Glasstabes geschehen.

II. Bei Verwendung von Thier-Lymphe.

§ 12. Sobald die Impfung mit Thier-Lymphe eingeführt ist, erhalten die Impfärzte ihren Gesamtbedarf an Lymphe aus den Landes-Impfinstituten.

§ 13. Die Vorschriften im § 7, § 10 Absatz 2 und § 11 finden auch für Thier-Lymphe sinngemäße Anwendung.

Inwiefern andere Vorschriften des Abschnittes I bei der Gewinnung der Thier-Lymphe Anwendung zu finden haben, bleibt besonderer Regelung vorbehalten.

C. Aufbewahrung der Lymphe.

§ 14. Die Aufbewahrung der Lymphe in flüssigem Zustande hat in reinen, gut verschlossenen Kapillarröhren oder Glasgefäßen von 1 bis 2 ccm Inhalt zu geschehen.

Zur Aufbewahrung in trockenem Zustande sind Matten oder Gefäße aus Glas oder Stäbchen aus Elfenbein, Fischbein oder Horn zu benutzen.

Alle zur Aufbewahrung dienenden Gegenstände dürfen erst nach gründlicher Reinigung und Desinfektion (am besten durch Auskochen mit Wasser) zum zweiten Male benutzt werden.

§ 15. Die Lymphe ist vor einer Abkühlung bis auf den Gefrierpunkt und vor einer Erwärmung auf mehr als 50° C. zu schützen.

D. Ausführung der Impfung und Wiederimpfung.

§ 16. Es empfiehlt sich, die Kinder nicht früher zu impfen, als bis sie das Alter von 3 Monaten überschritten haben.

Kinder, welche an schweren akuten oder chronischen, die Ernährung stark beeinträchtigenden oder die Säfte verändernden Krankheiten leiden, sollen in der Regel nicht geimpft und nicht wieder geimpft werden.

Ausnahmen sind (namentlich beim Auftreten der natürlichen Pocken) gestattet und werden dem Ermessen des Impfarztes anheimgegeben.

§ 17. Die zur Impfung bestimmten Instrumente müssen rein sein und vor jeder Impfung eines neuen Impflings mittels Wassers und Abtrocknung gereinigt werden.

Zur Abtrocknung dürfen jedoch nicht Handtücher und dergleichen, sondern nur Karbol- oder Salicylwatte verwendet werden. Instrumente, welche eine gründliche Reinigung nicht gestatten, dürfen nicht gebraucht werden.

Die Instrumente zu anderen Operationen als zum Impfen zu verwenden, ist verboten.

§ 18. Zum Anfeuchten der trockenen Lymphe ist reines Wasser oder Glycerin oder eine Mischung von beiden zu verwenden.

§ 19. Die Impfung wird der Regel nach an den Oberarmen vorgenommen. Bei Erstimpfungen genügen 3 bis 5 leichte Schnitte von höchstens 1 cm Länge oder ebenso viele oberflächliche Stiche an jedem Arme; bei Wiederimpfungen 5 bis 8 leichte Schnitte oder Stiche an einem Arme.

Stärkere Blutungen sind beim Impfen zu vermeiden.

Das Auftragen der Lymphe mit dem Pinsel ist verboten.

§ 20. Die Erstimpfung hat als erfolgreich zu gelten, wenn mindestens zwei Blattern zur regelmäßigen Entwicklung gekommen sind. In Fällen, in welchen nur eine Blatter zur regelmäßigen Entwicklung gekommen ist, hat sofort Autorevaccination oder nochmalige Impfung stattzufinden. Jedoch ist gleichzeitig der Impfschein (Formular I) auszustellen.

Bei der Wiederimpfung genügt für den Erfolg schon die Bildung von Knötchen bezw. Bläschen an den Impfstellen.

E. Privat=Impfung.

§ 21. Alle Vorschriften dieser Instruktion mit Ausnahme der nur auf öffentliche Impfungen sich beziehenden §§ 1, 2, 3 und 4 gelten auch für die Ausführung von Privat=Impfungen.

4. Entwurf von Verhaltensvorschriften für die Angehörigen der Impflinge.

§ 1. Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krankheiten wie Scharlach, Masern, Diphtheritis, Croup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige Entzündungen oder die natürlichen Pocken herrschen, dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termine nicht gebracht werden.

§ 2. Die Kinder müssen zum Impftermine mit rein gewaschenem Körper und mit reinen Kleidern gebracht werden.

§ 3. Auch nach dem Impfen ist möglichst große Reinhaltung des Impfings die wichtigste Pflicht.

§ 4. Wenn das tägliche Baden des Impfinges nicht ausführbar ist, so versäume man wenigstens die sorgfältige Abwaschung nicht.

§ 5. Die Nahrung des Kindes bleibe unverändert.

§ 6. Bei günstigem Wetter darf dasselbe ins Freie gebracht werden. Man vermeide im Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und die direkte Sonneneinstrahlung.

§ 7. Die Impfstellen sind mit der größten Sorgfalt vor dem Aufreiben, Zerkratzen und vor Beschmutzung zu bewahren. Die Hemdärmel müssen hinreichend weit sein, damit sie nicht durch Scheuern die Impfstellen reizen.

§ 8. Nach der erfolgreichen Impfung zeigen sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen, welche sich in der Regel bis zum neunten Tage unter mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen, von einem rothen Entzündungshofe umgebenen Schutzpocken entwickeln. Dieselben enthalten eine klare Flüssigkeit, welche sich am achten Tage zu trüben beginnt. Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen die Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen, der nach 3 bis 4 Wochen von selbst abfällt.

Die Entnahme der Lymphe zum Zwecke weiterer Impfung ist schmerzlos und bringt dem Kinde keinen Nachtheil.

Wird sie unterlassen, so pflügen sich die Pocken von selbst zu öffnen.

§ 9. Bei regelmäßigem Verlaufe der Impfpocken ist ein Verband überflüssig, falls aber in der nächsten Umgebung derselben eine starke, breite Rötze entstehen sollte, oder wenn die Pocken sich öffnen, so umwickelt man den Oberarm mit einem in Baumöl getauchten oder noch besser mit Vaseline bestrichenen kleinen Leinwandläppchen.

Bei jeder erheblichen nach der Impfung entstehenden Erkrankung ist ein Arzt zuzuziehen.

§ 10. An einem im Impftermine bekannt zu gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nachschau. Dieselben erhalten, wenn die Impfung Erfolg hatte, an diesem Tage den Impfschein. Der letztere ist sorgfältig zu verwahren.

§ 11. Kann ein Kind am Tage der Nachschau wegen erheblicher Erkrankung, oder weil in dem Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (§ 1), nicht in das Impflokal gebracht werden, so haben die Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am Terminstage dem Impfarzte anzuzeigen.

5. Entwurf von Vorschriften, welche von den Ortspolizeibehörden bei der Ausführung des Impfgeschäftes zu befolgen sind.

§ 1. Treten an einem Orte ansteckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern, Diphtheritis, Group, Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige Entzündungen in größerer Verbreitung auf, so wird die Impfung ausgesetzt.

Aus einem Hause, in welchem Fälle der genannten Krankheiten zur Impfzeit vorgekommen sind, dürfen Kinder zum öffentlichen Termin nicht gebracht werden; auch haben sich Erwachsene aus solchen Häusern vom Impftermin fern zu halten.

Impfung und Nachschau an Kindern aus solchen Häusern müssen getrennt von den übrigen Impfungen vorgenommen werden.

Ebenso ist zu verfahren, wenn in einem Hause die natürlichen Pocken aufgetreten sind.

§ 2. Für die öffentliche Impfung sind helle, heizbare, genügend große, gehörig gereinigte und gelüftete Räume bereit zu stellen, welche womöglich auch eine Trennung des Warteraumes vom Operationszimmer gestatten.

Bei kühler Witterung sind die Räume zu heizen.

§ 3. Ein Beauftragter der Ortspolizeibehörde sei im Impftermine zur Stelle, um im Einvernehmen mit dem Impfarzte für Aufrechterhaltung der Ordnung zu sorgen.

Entsprechende Schreibhülfe ist bereit zu stellen.

Bei der Wiederimpfung und der darauf folgenden Nachschau sei ein Lehrer anwesend.

§ 4. Eine Ueberfüllung der Impfräume, namentlich des Operationszimmers, werde vermieden.

Die Zahl der vorzuladenden Impflinge richte sich nach der Größe der Impfräume.

§ 5. Man verhüte thunlichst, daß die Impfung mit der Nachschau bereits früher Geimpfter zusammenfällt.

Jedenfalls sind Erstimpflinge und Wiederimpflinge (Revaccinanden, Schulkinder) möglichst von einander zu trennen.

§ 6. Es ist darauf hinzuwirken, daß die Impflinge mit rein gewaschenem Körper und reinen Kleidern zum Impftermine kommen.

Kinder mit unreinem Körper und schmutzigen Kleidern können vom Termin zurückgewiesen werden.

6. Beschlüsse betreffend die Sicherung einer zweckmäßigen Auswahl der Impfarzte.

1. Die Bestellung der Impfarzte hat durch die Staatsbehörde zu erfolgen.

2. Das öffentliche Impfgeschäft ist vorzugsweise den beamteten Ärzten zu übertragen.

3. Eine ausdrückliche Inpflichtnahme der Impfarzte hat bei Uebernahme des Impfgeschäftes stattzufinden.
4. Die Remuneration der Impfarzte bedarf der Bestätigung der Staatsbehörde.

7. Beschlüsse, betreffend die technische Vorbildung der Aerzte für
das Impfgeschäft.

1. Hinsichtlich der technischen Vorbildung für die Ausübung des Impfgeschäftes sind folgende Anforderungen zu stellen:
 - a) Während des klinischen Unterrichtes ist den Studirenden eine Unterweisung in der Impftechnik zu ertheilen.
 - b) Außerdem hat jeder Arzt, welcher das Impfgeschäft privatim oder öffentlich ausüben will, den Nachweis darüber zu bringen, daß er mindestens zwei öffentlichen Vaccinations- und ebenso vielen Revaccinationsterminen beigewohnt und sich die erforderlichen Kenntnisse über Gewinnung und Konservirung der Lymphe erworben hat.
2. Bei der ärztlichen Prüfung ist die Kenntniß der Impftechnik und des Impfgeschäftes zu verlangen.

8. Beschlüsse, betreffend die Anordnung einer ständigen technischen Ueberwachung des Impfgeschäftes durch Medizinalbeamte.

1. Die Beaufsichtigung der Impfarzte ist dem nächsten Vorgesetzten der Kreismedizinalbeamten zu übertragen (unter der Voraussetzung, daß die Impfarzte zum größten Theile selbst Medizinalbeamte sind).
2. Die Beaufsichtigung bestehe in einer an Ort und Stelle auszuführenden Revision eines oder mehrerer Impftermine.
3. Die Geschäftsführung der Impfarzte ist alle 3 Jahre einer Revision zu unterziehen.
4. Die Revision hat sich in erster Linie auf die Impftechnik, sodann auf die Listenföhrung, Auswahl des Impflokals, Zahl der Impflinge u. s. w. zu erstrecken.
5. Auch die Impfungen der Privatärzte sind der Revision zu unterwerfen, soweit sie nicht von denselben als Hausärzte in den Familien ausgeföhrt werden.
6. Ebenso ist eine technische Ueberwachung der Impfinstitute, insbesondere auch der öffentlichen sowohl als privaten Institute für Impfung mit Thierlymphe, durch in entsprechenden Zeiträumen wiederkehrende Revisionen erforderlich.
7. Die Aufmerksamkeit der die Impfung beaufsichtigenden Organe hat sich auch auf den Handel mit Lymphe zu erstrecken.

9. Beschlüsse, betreffend die Herstellung einer Statistik der Todesfälle an
Pocken.

1. Innerhalb 8 Tagen nach jedem Todesfall an Pocken ist von dem durch die Landesregierung zu bestimmenden Medizinalbeamten eine Meldeskarte auszufüllen, welche die in der Anlage bezeichneten Rubriken enthalten muß.

Es wird empfohlen, behufs Sicherung der Vollständigkeit der Nachweise, ein entsprechendes Zusammenwirken des Medizinalbeamten und der Landesbeamten des betreffenden Bezirks herbeizuführen.

Innerhalb einer weiteren von der Landesregierung anzuordnenden Frist ist die Meldekarte an die statistische Zentralstelle des Staats bezw. eine andere von der Landesregierung zu bestimmende Stelle behufs Sammlung, Prüfung und etwaiger Verarbeitung für Landeszwecke zu übermitteln.

2. Bis zum 1. März jeden Jahres sind die auf das Vorjahr bezüglichen Karten aus den einzelnen Staaten an das Kaiserliche Gesundheits-Amt einzusenden.

Diesem ist gleichzeitig eine Uebersicht mitzutheilen, welche die auf den Anfang des betreffenden Jahres berechnete Bevölkerung derjenigen Städte, die nach der letzten Volkszählung 20 000 und mehr Einwohner hatten, nach zehnjährigen Altersklassen für beide Geschlechter getrennt, ersichtlich macht. Sofern für diese Berechnung bestimmtere Daten nicht vorliegen, ist sie so vorzunehmen, daß die aus der letzten Volkszählungsperiode zu ermittelnde durchschnittliche jährliche Bevölkerungszu- oder Abnahme der betreffenden Stadt auch für die Jahre nach der letzten Volkszählung, sowohl bezüglich der ganzen Stadtbevölkerung, als auch bezüglich der beiden Geschlechter und einzelnen Altersklassen derselben, angenommen wird.

Meldekarte für Todesfälle an Pocken.

Gemeinde:

Verwaltungsbezirk: (Preußen: Kreis, Bayern: Bezirksamt u.):

Staat:

Straße: Nr. des Sterbehauses (event. Bezeichnung des Krankenhauses):

Vor- und Familienname ^{des} _{der} Gestorbenen:

Geschlecht: männlich, weiblich. (Zutreffendes zu unterstreichen.)

Tag, Monat, Jahr der Geburt:

Beruf (bei nicht erwerbsthätigen bezw. nicht selbstständigen Personen — Ehefrauen ohne eigenen Beruf, Kindern u. — Beruf des Haushaltungsvorstandes):

Bemerkung darüber, ob ^{der} _{die} Verstorbene regelmäßig außerhäuslich, etwa in einer Fabrik, Werkstatt u. — und welcher Art (z. B. Papierfabrik) — beschäftigt war, oder eine Schule besuchte:

Tag, Monat, Jahr des Todes:

Ort und Datum:

Unterschrift des meldenden Medizinalbeamten

.....

Tafeln zur Veranschaulichung der Wirkung des Impfgesetzes in Deutschland.

Wie bereits erwähnt ist, wurden im Jahre 1883 den Mitgliedern des Reichstages im Kaiserlichen Gesundheitsamte zusammengestellte „Tafeln zur Veranschaulichung der Wirkung des Impfgesetzes in Deutschland“ vorgelegt, welche in entschiedener Weise für die nützliche Wirkung des Impfgesetzes sprachen. Das Ergebnis der statistischen Zusammenstellungen wurde damals in folgenden Worten zusammengefaßt:

„Die Pocken haben seit dem Inkrafttreten des Impfgesetzes in Deutschland in „einer früher nie gekannten Weise abgenommen. In den Nachbarstaaten, welche bisher „die Zwangsimpfung nicht eingeführt haben, herrschen die Pocken dagegen nach wie vor „in erheblichem Maße.

„Die deutschen Großstädte haben von der Pockenkrankheit fast gar nicht mehr zu „leiden, während in den großen Städten des Auslandes die Pocken noch immer zahlreiche „Opfer fordern.

„Die deutsche Armee ist fast frei von Pocken, die österreichische und französische „Armee leiden dagegen noch sehr von dieser Krankheit.

„Soweit der Statistik ein Urtheil zu entnehmen ist, muß also das Impfgesetz als „eine außerordentlich nützliche und segensreiche Institution angesehen werden.“

Die Tafeln wurden, mit nachträglichen Ergänzungen versehen, später nochmals dem Reichstage vorgelegt und zwar als Anlage 3 der Protokolle der Kommission zur Berathung der Impffrage (Reichstagsdruckache Nr. 287 I. Session (1884/85) der 6. Legislaturperiode). Von mehreren Seiten sind sie indeß als auf unrichtigen Voraussetzungen beruhend und demnach als nicht beweiskräftig bezeichnet worden, und es ist dies insbesondere auch gelegentlich der Verhandlungen des Reichstages am 12. Juni 1883 von einem Mitgliede des Hauses geschehen, so daß es erforderlich erscheint, nochmals auf sie zurückzukommen und jene Einwände zu erörtern.

Es ist gesagt worden*), in den Tafeln figurire als große Stadt des Auslandes, wo kein Impfwang eingeführt sei, und deswegen die Pocken fort und fort grassiren,

*) Vgl. Stenograph. Berichte über die Verhandl. des Reichstages, 102. Sitzung am 12. Juni 1883, Seite 3014.

London. Es sei aber allbekannt, daß nirgends der Impfwang in solcher Strenge durchgeführt werde wie gerade in London. Wenn also von segensreichen Wirkungen des Impfwanges geredet werden solle, so müßte in den graphischen Tabellen London als jene fremde große Stadt angeführt werden, wo der Impfwang am segensreichsten wirke, aber nicht umgekehrt, wie es in der graphischen Tabelle geschehe. Dann beruhe die ganze graphische Darstellung auf der Annahme, daß, seit bei uns im Jahre 1874 das Impfwangsgesetz bestehe, die Pocken vor dem Reichsimpfgesetze eine solche fürchterliche Scheu bekommen hätten, daß sie ausgewandert seien und nicht mehr über unsere Grenze zurückzukehren wagten. Nun habe aber in deutschen Staaten bereits lange vor Einführung des Reichsimpfgesetzes der Impfwang bestanden, so in Bayern seit dem Jahre 1807, in Sachsen seit 1835, in Württemberg auch seit den ersten dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts. Auch in Preußen habe der Impfwang seit 1835 bestanden. Trotzdem habe die große Pockenepidemie, welche im Jahre 1871 über ganz Europa dahingezogen sei, vor diesen Ländern nicht Halt gemacht, sondern vielmehr gerade in denjenigen Ländern, wo der Impfwang am strengsten durchgeführt sei, insbesondere in England und Schweden am stärksten gehaust. Es sei demnach auch nicht anzunehmen, daß die Pocken das deutsche Reichsimpfgesetz so sehr respektirten.

Was zunächst die Behauptung betrifft, daß die Pocken im Anfange der siebziger Jahre in denjenigen Ländern am stärksten gehaust hätten, in welchen der Impfwang am strengsten durchgeführt sei, insbesondere in England und Schweden, so ist dieselbe leicht durch Zahlen zu widerlegen, wie die nachstehende Uebersicht zeigt, in welcher eine Pockensterblichkeit von mehr als 150 auf 100 000 Einwohner und ein Jahr durch fetten Druck der Zahlen kenntlich gemacht ist:

Von je 100 000 Einwohnern starben an Pocken:

| Im Jahre | | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 |
|---|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Länder mit allgemeinem di- rektem Impf- zwang (ohne Revaccinations- zwang) | England | 12 | 102 | 84 | 10 | 10 | 4 |
| | Schweden | 18 | 8 | 8 | 26 | 94 | 46 |
| | Bayern | 8*) 19**) | 105 | 61 | 18 | 5 | 2 |
| Länder mit fakultativer Impfung bezw. indirektem Impf- zwange | Preußen | 18 | 243 | 262 | 36 | 10 | 4 |
| | Oesterreich | 30 | 39 | 190 | 315 | 174 | 58 |
| | Belgien | 82 | 417 | 156 | 33 | 37 | 31 |

Wenn in der erwähnten Reichstagsverhandlung gesagt wurde, daß in Preußen bereits seit 1835 der Impfwang bestanden habe, so beruht das, sofern hier unter Impfwang ein allgemeiner direkter Zwang verstanden ist, ebenfalls auf einem Irrthum, wie in Abschnitt 5 auf Grund der bezüglichen Verordnungen und Bestimmungen nachgewiesen wird. Im Königreich Sachsen ferner hat bis zum Erlaß des Reichs-Impfgesetzes ein Zwang zur Impfung überhaupt nicht bestanden. Schon in den Motiven

*) In dem Jahre vom 1/10. 1869 bis 1/10. 1870.

***) Nach dem IV. Quartal 1870 auf das ganze Jahr berechnet.

zu dem „Entwurf eines Gesetzes über den Impfwang“, welcher am 5. Februar 1874 dem Reichstage*) zur Beschlußfassung vorgelegt wurde, heißt es mit Bezug auf die zuletzt genannten beiden Staaten:

„Einen abweichenden Standpunkt hat die Gesetzgebung bis jetzt im Königreich Sachsen und in Preußen behauptet. In dem ersteren Staate ist der Impfwang der Gesetzgebung fremd; in Preußen gilt Gleiches wenigstens für den Umfang des vor dem Jahre 1866 vorhandenen Staatsgebietes, während in den seitdem hinzugetretenen Landes- theilen, so namentlich in Hannover, Schleswig-Holstein, Hessen-Nassau, ein gesetzlicher Impfwang, in Nassau selbst ein beschränkter Revaccinationszwang, für die Kinder besteht. Doch ist im Königreich Sachsen, wie in den älteren Theilen des preußischen Staates, die Verwaltung seit längerer Zeit nicht ohne Erfolg bemüht gewesen, der regelmäßigen Anwendung der Impfung in der Bevölkerung Eingang zu verschaffen.“

Auch der Vorwurf, London sei in den Tafeln als eine große Stadt des Auslandes genannt, in welcher Impfwang nicht eingeführt sei, und deswegen die Pocken fort und fort grassirten, ist auf eine irrthümliche Auffassung und Verallgemeinerung des Begriffes „Impfwang“, wie solcher den nur vom Standpunkte des deutschen Gesetzes ausgearbeiteten Tafeln zu Grunde liegt, zurückzuführen. Jener Einwand ist auch gelegentlich der Verhandlungen der Kommission zur Berathung der Impffrage im Jahre 1884 zur Sprache gekommen, und es möge daher die bezügliche Entgegnung eines dieser Kommission angehörnden Vertreters der Reichsverwaltung**) hier wiederholt sein. Dieselbe lautete:

„Man hat z. B. gesagt, es seien auf den Tafeln irrthümlicherweise Städte mit Zwangsimpfung als solche angegeben, welche keine Zwangsimpfung hätten. Dieser Irrthum gelte ganz besonders von London, einer Stadt, welche schon seit langer Zeit Zwangsimpfung habe. Gegen diesen Einwand muß ich doch bemerken, daß der den Tafeln beigegebene Text keinen Zweifel darüber lassen kann, um was es sich hier handelt. Durch die Tafeln soll nämlich die Wirkung des Impfgesetzes vom Jahre 1874 illustriert werden, und da kann ich doch bei jedem Leser voraussetzen, daß, wenn von Impfwang die Rede ist, darunter derjenige Zwang zu verstehen ist, welchen das deutsche Impfgesetz vorschreibt, also der Zwang zur Vaccination und Revaccination. Und dieser Zwang besteht ausschließlich in Deutschland; alle anderen Länder haben keinen derartigen Impfwang. Dort kennt man und so namentlich auch in London nur den Zwang zur Vaccination. Also wenn in Bezug auf diese Tafeln vom Impfwang die Rede ist, so kann immer nur der in Deutschland oder in deutschen Städten geltende Impfwang gemeint sein. Insofern also kann man dieser Zusammenstellung auch nicht den geringsten Vorwurf machen, und man muß mit den überaus wichtigen und schlagenden Thatfachen, die sich daraus ergeben, rechnen.“

Da in der That die im Jahre 1883 den Reichstagsmitgliedern vorgelegten Tafeln am besten geeignet sind, die Wirkung des Impfgesetzes zu veranschaulichen, so sind sie, zumal inzwischen ihre Ergänzung für einige weitere bezw. frühere Jahre hat erfolgen

*) Reichstags-Drucksache Nr. 7, I. Session (1874) der 2. Legislaturperiode. Seite 7.

**) Reichstags-Drucksache Nr. 287, I. Session (1884/85) der 6. Legislaturperiode. Seite 50.

können, auch dieser Denkschrift wieder beigegeben worden. Die den Tafeln zu Grunde gelegten Zahlen weichen von denjenigen, welche im Jahre 1883 benutzt worden sind, mehrfach ab. Es erklärt sich dieser Umstand zum Theil dadurch, daß jetzt, wo es angängig war, bei der Ermittlung der Verhältnißzahlen die für die einzelnen Jahre berechneten Bevölkerungsziffern (statt der unveränderten Ziffern der letzten Volkszählungen) zu Grunde gelegt worden sind. Zum Theil haben auch die früheren Angaben durch erst neuerdings zugänglich gewordene berichtigte bezw. zuverlässigere ersetzt werden können.

Tafel 1 giebt einen Vergleich der Pockensterblichkeit Preußens mit derjenigen Oesterreichs. *)

Wie die Tafel zeigt, ist die Pockensterblichkeit in Preußen seit Inkrafttreten des Impfgesetzes dauernd eine bis dahin ganz ungekannt niedrige gewesen, während sie in Oesterreich gegen früher geradezu eine steigende Tendenz erkennen läßt.

Um die Tragweite dieser Verhältnisse zu veranschaulichen, möge die Pockensterblichkeit der beiden Länder in den letzten 25 Jahren vor Inkrafttreten des deutschen Impfgesetzes (1850 bis 1874) einerseits mit derjenigen in den 10 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes (1875 bis 1884) andererseits verglichen werden.

Von je 100 000 Einwohnern starben durchschnittlich jährlich an Pocken:

| | Von 1850 bis 1874 (25 jähriger Zeitraum) | Von 1875 bis 1884 (10 jähriger Zeitraum) |
|--------------------------|---|---|
| in Preußen. | 49 | 2 |
| in Oesterreich | 53 | 62 |

Hiernach war von 1850 bis 1874 die durchschnittliche jährliche Pockensterblichkeit in Preußen nur wenig geringer als diejenige in Oesterreich. Auch darin stimmen beide Länder überein, daß sie im Anfange der 70er Jahre von einer schweren Pockenepidemie heimgesucht worden sind, welche, von Frankreich ausgehend, ganz Europa überzogen hat. Dieser Epidemie erlagen in Preußen in den drei Jahren 1871 bis 1873 ca. 134 000 Personen (180 von je 100 000 Einwohnern), in Oesterreich, wo sie ein Jahr später begann, in den drei Jahren 1872 bis 1874 ca. 141 000 Personen (226 von je 100 000 Einwohnern). Eine allgemein obligatorische Impfung bestand in beiden Ländern nicht.

Im Jahre 1875 trat in Preußen das deutsche Impfgesetz in Kraft, während in Oesterreich keine Aenderung des Impfwesens erfolgte. Seitdem hat sich das Verhältniß der Pockensterblichkeit der beiden Länder so sehr verschoben, daß in den 10 Jahren von 1875 bis 1884 in Preußen durchschnittlich nur ca. 2 (genauer 2,23) von je 100 000 Einwohnern an den Pocken starben, in Oesterreich dagegen ca. 62 (genauer 61,77).

*) Die hier für Oesterreich mitgetheilten Zahlen weichen ebenfalls von denjenigen ab, welche den Tafeln vom Jahre 1883 zu Grunde gelegt waren. Auch die früheren Angaben beruhten auf amtlichen Veröffentlichungen. Nach Mittheilung des Direktors des Statistischen Büreaus in Budapest, Herrn Körösi, können die jetzt benutzten Zahlen als die richtigeren betrachtet werden.

Noch deutlicher lassen die nachstehenden Berechnungen den gegenreichen Einfluß des deutschen Impfgesetzes erkennen:*)

1. Wenn die Pockensterblichkeit in Preußen nach Einführung des Impfgesetzes dieselbe geblieben wäre, wie im Durchschnitte der 25 Jahre vor Einführung des Gesetzes, so würden von 1875 bis 1886, d. h. innerhalb 12 Jahre, nicht, wie es der Fall gewesen ist, 6551, sondern gegen 160 000 Personen an den Pocken gestorben sein, d. h. über 150 000 mehr.

Man könnte hiergegen einwenden, daß in jenem 25jährigen Zeitraume auch die große Epidemie im Anfange der 70er Jahre mit enthalten, eine so verheerende Epidemie aber ein ganz außergewöhnliches Vorkommniß gewesen sei.

Um diesem Einwande zu begegnen, sei noch folgende Berechnung angestellt:

2. Wäre die Pockensterblichkeit in Preußen nach Einführung des Impfgesetzes dieselbe geblieben, wie im Durchschnitte der 25 Jahre von 1845 bis 1869 (24,8 auf je 100 000 Einwohner durchschnittlich jährlich), so würden von 1875 bis 1886 d. h. innerhalb 12 Jahre nicht, wie es der Fall gewesen ist, 6551, sondern gegen 81 000 Personen an den Pocken gestorben sein d. h. ca. 74 000 mehr.

3. Legt man dem Vergleiche die Pockensterblichkeit Oesterreichs von 1875 bis 1884 zu Grunde und nimmt an, daß in diesen 10 Jahren Preußen von den Pocken in demselben Verhältniß zu Oesterreich heimgesucht worden wäre, wie in den 25 Jahren vor Inkrafttreten des Impfgesetzes d. h. im Verhältniß von 12:13, so würden in den 10 Jahren nicht 6551, sondern ca. 186 000 Menschen in Preußen an den Pocken gestorben sein, d. h. ca. 180 000 Menschen mehr, als thatächlich gestorben sind.

Da nun abgesehen von dem deutschen Impfgesetze kein Grund ersichtlich ist, weshalb das Verhältniß der Pockensterblichkeit der beiden Länder mit dem Jahre 1875 so plötzlich, so andauernd und in so außerordentlich hohem Maße zu Gunsten Preußens sich verändert haben sollte, so kann man mit voller Berechtigung sagen, daß allein in Preußen das deutsche Impfgesetz schon in den ersten zwölf Jahren seines Bestehens viele Tausende von Menschen vor dem Tode an Pocken bewahrt hat.

Für die Jahre 1885 und 1886 stehen die auf Oesterreich bezüglichen Uebersichten noch aus. So viel läßt sich indeß schon jetzt sagen, daß das Verhältniß der Pockensterblichkeit der beiden Länder auch in jenen zwei Jahren ziemlich dasselbe geblieben ist, wie in den Jahren 1875 bis 1884.

Die dauernden Gesundheitschädigungen, die zahlreichen Erblindungen und sonstigen Leiden im Gefolge überstandener Pocken sind in Vorstehendem, wo es sich ausschließlich um Todesfälle handelte, noch gar nicht in Anschlag gebracht. Das Gleiche gilt von den unübersehbaren wirthschaftlichen Folgen, welche sich an die vielen hunderttausende von — wenn auch mit voller Genesung endigenden — Erkrankungen geknüpft haben würden.

Die zweite der im Jahre 1883 vorgelegten Tafeln verglich die Pockensterblichkeit in fünf größeren Städten des Inlandes (Berlin, Hamburg, Breslau, München und

*) Bei diesen Berechnungen sind die Unterschiede des Impfwesens in den älteren preußischen Provinzen einerseits und in den im Jahre 1866 hinzugekommenen Gebieten andererseits unberücksichtigt geblieben.

Dresden) mit derjenigen in ebensoviel größeren Städten des Auslandes (London, Paris, Wien, Petersburg und Prag).

Zu dieser Tafel, welche hier ebenfalls wieder mitgetheilt ist (vgl. Tafel 2) — und zwar ergänzt durch eine Anzahl früherer Jahre und diejenigen neueren Jahre, für welche die betreffenden Zahlen bereits zugänglich waren, — lautete der erklärende Text bei der ersten Veröffentlichung folgendermaßen:

„Sowohl die deutschen als die fremden Städte haben im Anfange der siebziger Jahre bedeutende Pockenepidemien zu überstehen gehabt. Trotzdem ist die Pockensterblichkeit in allen Städten ohne Impfwang nach einer vorübergehenden Abnahme sehr bald wieder auf bedeutende Höhen gestiegen, während sie in allen deutschen Städten, ebenso wie es in der Gesamtbewölkerung der Fall ist, seit 1874 andauernd auf sehr geringe Zahlen herabgegangen ist. Es läßt sich wohl kaum eine bessere Illustration der Wirkung des Impfgesetzes denken, als der Vergleich zwischen Städten wie Breslau und Wien, Dresden und Prag, Berlin und London u. s. w.“

Wie hier, um Mißverständnisse zu vermeiden, nochmals ausdrücklich betont sei, handelt es sich bei dieser Darstellung nur darum, die Wirkung des deutschen Impfgesetzes, welches nicht nur eine einmalige Impfung in der ersten Jugend, sondern auch eine Wiederimpfung der Kinder im schulpflichtigen Alter obligatorisch macht, zu veranschaulichen.

Eine besondere Erwähnung verdienen die beiden Städte München und London. Schon bei dem ersten Blick auf die beiden betreffenden graphischen Darstellungen erkennt man, daß diese beiden Städte vor den sämtlichen übrigen durch eine verhältnißmäßig sehr geringe Pockensterblichkeit zur Zeit des großen Seuchenzuges im Anfange der siebziger Jahre sich auszeichnen (für Petersburg fehlen die Angaben für die genannten Jahre). Eine Erklärung für diese Thatsache zu geben, ist nicht schwer. Von den in Frage stehenden Städten waren eben München und London die beiden einzigen, in welchen auch schon vor dem Jahre 1875 durch gesetzlichen Zwang die allgemeine Impfung der Kinder im jugendlichen Alter durchgeführt worden ist, ohne daß indeß eine allgemeine Revaccination vorgeschrieben war.

Stellt man ferner die Pockensterblichkeit Münchens derjenigen Londons gegenüber, so fällt der Vergleich auch für die Zeit vor 1875 und insbesondere für die Epidemie im Anfange der siebziger Jahre zu Gunsten Münchens aus. Auch dieser Unterschied ist wiederum im Einklange mit dem Verhältnisse des Impfzustandes der Bevölkerung in den beiden Städten. Denn in Bayern ist schon im Jahre 1807 der Impfwang eingeführt, in England aber erst im Jahre 1853 (in wirksamere Weise erst im Jahre 1867)*), und überdies ist die Durchführung der betreffenden gesetzlichen Bestimmungen in München eine vollkommenerer gewesen als in London.

Diese Unterschiede zwischen London und München einerseits und den übrigen Städten andererseits, sowie zwischen London einerseits und München andererseits sind indeß Thatsachen, welche nur nebenbei erörtert sein mögen. Was die Tafeln, als sie 1883

*) Vgl. Report from the Select Committee etc. Nr. 3246—3251.

vorgelegt wurden, zeigen sollten und auch in der That aufs deutlichste zeigen, das ist der Umstand, daß in den außerdeutschen Städten auf die Epidemie im Anfange der siebziger Jahre zwar auch ein Abfall der Pockensterblichkeit gefolgt ist, daß die letztere dann aber sich sehr bald wieder auf die frühere Höhe erhoben hat, während in den deutschen Städten unter dem Einflusse des Reichsimpfgesetzes ein Wiederanstiegen ausgeblieben, und die Pockensterblichkeit dauernd eine außerordentlich niedrige ist.

Da Bayern derjenige deutsche Staat ist, in welchem die zwangsweise Impfung der Kinder im jugendlichen Alter zuerst (nämlich schon im Jahre 1807) eingeführt und ohne Frage auch seit langer Zeit sorgfältig ausgeübt ist, so hat es ein besonderes Interesse wie für München, so auch für ganz Bayern die Wirkung des Reichsimpfgesetzes, soweit die Pockensterblichkeit darüber Aufschluß giebt, sich zu vergegenwärtigen. Es ist daher dieser Denkschrift eine bezügliche graphische Darstellung beigegeben, und zum Vergleich die Pockensterblichkeit eines etwa gleichgroßen Staates ohne Impfzwang, nämlich Belgiens, derjenigen Bayerns gegenüberstellt (siehe Tafel 3). Die Tafel zeigt, daß in Bayern die Pockensterblichkeit unter dem Einflusse der gesetzlich vorgeschriebenen einmaligen Impfung zwar vor 1875 schon verhältnißmäßig gering gewesen, und daß das Land auch im Anfang der siebziger Jahre im Zusammenhalt mit Belgien von einer verhältnißmäßig milden Epidemie heimgesucht ist, daß ferner aber mit Einführung der durch das Reichsimpfgesetz vorgeschriebenen zwangsweisen Wiederimpfung der Schulkinder die Pockensterblichkeit in Bayern noch weiter und zwar dauernd und beträchtlich herabgedrückt ist, während sie in Belgien auch nach der erwähnten schweren Epidemie Jahr für Jahr eine erhebliche Höhe innehält.

Die dritte und letzte der im Jahre 1883 vorgelegten Tafeln verglich die Erkrankungen und Todesfälle an Pocken in der preußischen mit denjenigen in der österreichischen und französischen Armee. Zu dieser Tafel war damals die nachstehende Erläuterung gegeben:

„Ebenso wie die Gesamtbevölkerungen der betreffenden Länder, haben auch die „Armeen im Beginn der siebziger Jahre eine Pockenepidemie zu überstehen gehabt. „Bezüglich der französischen Armee fehlen sichere Zahlenangaben, doch steht fest, daß die „Verluste derselben ganz bedeutende gewesen sind.

„Die bei weitem geringsten Verluste hat die preußische Armee während der Kriegsjahre gehabt, obwohl dieselbe in Frankreich beständig mit der von Pocken in erheblichem „Maße befallenen Bevölkerung in Berührung kam.

„Der Krieg an und für sich mit seinen Strapazen, Entbehrungen u. s. w. kann die „Zunahme der Pockentodesfälle in der Armee nicht bewirkt haben, denn die österreichische „Armee hat in derselben Epidemie sehr viel größere Verluste an Pocken gehabt.

„Der einzige Unterschied in Betreff der Pockenverhältnisse in den drei Armeen ist „darin zu suchen, daß die österreichische und französische Armee, wie zugestanden ist, „mangelhaft revaccinirt wurden und sich innerhalb mangelhaft geimpfter und deswegen „von den Pocken stärker heimgesuchter Bevölkerungen befinden, während die preußische „Armee den Vortheil einer sorgfältig ausgeführten Revaccination und den relativen „Schutz genießt, welchen eine fast pockenfreie Umgebung gewährt.

„Der nachtheilige Einfluß einer mit Pocken behafteten und der relative Schutz einer „pockenfreien Umgebung ist aus der Tabelle der Pockenerkrankungen in der preußischen „Armee sofort ersichtlich. Denn es ist wohl anzunehmen, daß die Revaccination schon „seit mehreren Jahrzehnten mit gleichmäßiger Sorgfalt in der Armee gehandhabt wird. „Trotzdem sind die Pockenerkrankungen in den Jahren 1867 bis 1869, also vor der Zeit „des Impfgesetzes, zahlreicher als nach dem Jahre 1874.

„Hierfür giebt es wohl keine andere Erklärung, als daß in gleicher Weise, wie sich „die Pocken in der Armee in Folge der massenhaften Berührung mit Pockenkranken in „Frankreich erheblich steigerten, so auch früher häufiger unter dem Militär sein mußten, „als noch die Civilbevölkerung mehr Pockenranke hatte als jetzt.

„Bemerkenswerth ist noch, daß in der preußischen Armee seit dem Jahre 1874 über- „haupt kein Todesfall an Pocken mehr vorgekommen ist, während die beiden anderen „zum Vergleich herangezogenen Armeen noch ganz erhebliche Mortalitätszahlen für Pocken „aufweisen.

„Sorgend einen anderen Grund, als die Wirkung einer streng durchgeführten Impfung „und Wiederimpfung, kann man für diese so überaus auffallenden Unterschiede der Pocken- „erkrankungen in den drei Armeen nicht geltend machen.“

Wie sehr diese Ausführungen auch heute noch zutreffen, zeigt ein Blick auf die für die neueren Jahre ergänzte Tafel (siehe Tafel 4). Der Umstand, daß in dem Berichtsjahre 1884/85 auch in der preußischen Armee einmal wieder ein Pockentodesfall vorgekommen ist, ändert daran nichts. Es ist das in der langen Reihe von Jahren seit 1874 der erste und einzige gewesen. Ueberdies betraf derselbe einen zur Uebung eingezogenen Reservisten, welcher ausweislich der Impflisten im Jahre 1877 bei seiner Einstellung als Rekrut zweimal ohne Erfolg geimpft worden war.

Im Mai 1886 ist für das österreichisch-ungarische Heer, in welchem, wie erwähnt, die Impfung bezw. Wiederimpfung bisher nur unvollständig durchgeführt war, das Impf- wesen neu geregelt und zwar im Sinne einer strengen Durchführung des allgemeinen Impfwanges. Vor allem sollen in Zukunft sämmtliche Rekruten sofort nach ihrem Einrücken geimpft bezw. der Wiederimpfung unterzogen werden, wie es in der preußischen Armee in ähnlicher Weise schon seit dem Jahre 1834 der Fall ist. Von welchem Erfolge diese Maßregel begleitet sein wird, werden die kommenden Jahre lehren.

Der günstige Einfluß, welchen das deutsche Impfgesetz mittelbar auch auf die Pockensterblichkeit der preußischen Armee gehabt hat und zwar dadurch, daß die Civil- bevölkerung besser geschützt wurde, tritt besonders deutlich auf Tafel 5 hervor, auf welcher auch der Zeitpunkt ersichtlich gemacht ist, von welchem an in der Armee die Impfung bezw. Wiederimpfung der neu Eingestellten obligatorisch war.

Eingehendere Mittheilungen über die Entwicklung des Impfwesens in den neun älteren Provinzen Preußens und in der preußischen Armee finden sich in Abschnitt 5.

Die graphischen Darstellungen der Tafeln sind in nachstehenden Tabellen durch Angabe der den Berechnungen zu Grunde liegenden Zahlen und Quellen näher erläutert; auch sind noch einige weitere Vergleichsmaterialien angefügt.

Tabellen

zu den

„Tafeln zur Veranschaulichung der Wirkung des Impfgesetzes“.

Pockensterblichkeit in Preußen

in den Jahren 1816—1886.

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100 000 Ein- wohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|------------|-----------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1816 | 10 349 031 | 4 690 | 45,32 | Zeitschrift des kgl. preuß. statist. Büreaus, Jahrg. 1873. | Wie nebenstehend |
| 7 | 10 572 795 | 2 940 | 27,81 | | „ |
| 8 | 10 796 874 | 3 186 | 29,51 | | „ |
| 9 | 10 981 934 | 2 279 | 20,75 | | „ |
| 1820 | 11 272 482 | 1 190 | 10,56 | | „ |
| 1 | 11 480 815 | 1 953 | 17,01 | | „ |
| 2 | 11 664 133 | 2 388 | 20,47 | | „ |
| 3 | 11 843 870 | 2 354 | 19,88 | | „ |
| 4 | 12 031 694 | 1 750 | 14,54 | | „ |
| 5 | 12 256 725 | 1 893 | 15,44 | „ | |
| 6 | 12 427 216 | 1 793 | 14,43 | „ | |
| 7 | 12 556 502 | 3 194 | 25,44 | „ | |
| 8 | 12 728 110 | 2 419 | 19,01 | „ | |
| 9 | 12 857 438 | 2 475 | 19,25 | „ | |
| 1830 | 12 988 178 | 3 134 | 24,13 | „ | |
| 1 | 13 088 960 | 1 546 | 11,86 | „ | |
| 2 | 13 138 683 | 3 985 | 30,33 | „ | |
| 3 | 13 303 160 | 7 996 | 60,11 | „ | |
| 4 | 13 507 999 | 6 625 | 49,05 | „ | |
| 5 | 13 708 195 | 3 716 | 27,11 | „ | |
| 6 | 13 931 103 | 2 618 | 18,79 | „ | |
| 7 | 14 098 125 | 2 195 | 15,57 | „ | |
| 8 | 14 385 679 | 2 419 | 16,82 | „ | |
| 9 | 14 645 599 | 2 128 | 14,53 | „ | |
| 1840 | 14 928 501 | 2 410 | 16,14 | „ | |
| 1 | 15 110 721 | 2 195 | 14,53 | „ | |
| 2 | 15 305 213 | 3 425 | 22,38 | „ | |
| 3 | 15 571 084 | 4 408 | 28,31 | „ | |
| 4 | 15 708 742 | 4 241 | 27,00 | „ | |
| 5 | 15 941 155 | 2 527 | 15,85 | „ | |
| 6 | 16 112 938 | 2 462 | 15,28 | „ | |

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100000 Ein- wohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1847 | 16 157 121 | 1 539 | 9,53 | Zeitschrift des Königl. Preuß. statist. Büreaus, Jahrg. 1873 | Wie nebenstehend |
| 8 | 16 165 387 | 2 213 | 13,69 | | " |
| 9 | 16 331 187 | 1 760 | 10,78 | | " |
| 1850 | 16 608 039 | 2 606 | 15,69 | | " |
| 1 | 16 828 440 | 2 179 | 12,95 | | " |
| 2 | 16 935 420 | 3 208 | 18,94 | | " |
| 3 | 17 044 676 | 6 734 | 39,51 | | " |
| 4 | 17 164 145 | 7 490 | 43,64 | | " |
| 5 | 17 202 831 | 1 664 | 9,67 | | " |
| 6 | 17 349 645 | 1 270 | 7,32 | " | |
| 7 | 17 530 353 | 2 330 | 13,29 | " | |
| 8 | 17 739 913 | 4 691 | 26,44 | " | |
| 9 | 17 993 188 | 3 530 | 19,62 | " | |
| 1860 | 18 262 623 | 3 461 | 18,95 | " | |
| 1 | 18 491 220 | 5 578 | 30,17 | " | |
| 2 | . | 3 894 | 21,06 | " | |
| 3 | . | 6 250 | 33,80 | " | |
| 4 | 19 252 139 | 8 904 | 46,25 | " | |
| 5 | . | 8 430 | 43,79 | " | |
| 6 | . | 11 937 | 62,00 | " | |
| 7 | 19 690 582 | 8 500 | 43,17 | " | |
| 8 | 23 971 337 | 4 510 | 18,81 | " | |
| 9 | . | 4 655 | 19,42 | " | |
| 1870 | . | 4 200 | 17,52 | " | |
| 1 | 24 603 761 | 59 839 | 243,21 | " | |
| 2 | 24 816 068 | 65 109 | 262,37 | Preussische Statistik | Wie nebenstehend |
| 3 | 25 044 627 | 8 929 | 35,65 | " | " |
| 4 | 25 376 541 | 2 417 | 9,52 | " | " |
| 5 | 25 742 404 | 926 | 3,60 | " | " |
| 6 | 25 773 397 | 810 | 3,14 | " | " |
| 7 | 26 169 335 | 88 | 0,34 | " | " |
| 8 | 26 545 058 | 188 | 0,71 | " | " |
| 9 | 26 890 432 | 339 | 1,26 | " | " |
| 1880 | 27 278 911 | 710 | 2,60 | " | " |
| 1 | 27 310 876 | 990 | 3,62 | " | " |
| 2 | 27 641 301 | 1 007 | 3,64 | " | " |
| 3 | 27 976 777 | 547 | 1,96 | " | " |
| 4 | 28 584 015 | 413 | 1,44 | " | " |
| 5 | 28 231 857 | 395 | 1,40 | } Auf Grund der Ergebnisse der Volkszählungen auf die Mitte der Jahre berechnet | Nach den dem Kaiserl. Gesundh. Amt eingereichten Meldefarten (vgl. Abschnitt 2.) |
| 6 | 28 439 729 | 138 ¹⁾ | 0,49 | | |

¹⁾ Davon 41 nachträglich gemeldet (vergl. Abschnitt 2).

Pockensterblichkeit in den im Reichsrathe vertretenen Ländern Oesterreichs

in den Jahren 1847—1884.

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100 000 Ein- wohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|--------------------------|-----------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1847 | 19 461 293 | 3 113 | 16,00 | } Tafeln zur Statistik der öster- reichischen Monarchie für 1847 u. 1848 Taf. 2 | } Wie nebenstehend Taf. 3 |
| 8 | 19 336 523 | 4 157 | 21,50 | | |
| 9 | 18 493 827 | 5 416 | 29,29 | } Desgl. für 1849—51 | } Desgl. für 1849—51 |
| 1850 | 18 493 827 | 2 974 | 16,08 | | |
| 1 | 18 661 942 | 2 064 | 11,06 | Desgl. für 1852—54 Heft I | } Desgl. für 1852—1854 |
| 2 | 18 792 239 | 2 179 | 11,60 | " " 1852—54 " | |
| 3 | 18 886 770 | 4 496 | 23,81 | " " 1852—54 " | " " 1852—1854 |
| 4 | 18 470 261 ¹⁾ | 5 245 | 28,40 | " " 1855—57 " | " " 1852—1854 |
| 5 | 18 689 659 | 8 890 | 47,57 | " " 1855—57 " | " " 1855—1857 |
| 6 | 18 810 428 | 3 093 | 16,44 | " " 1855—57 " | " " 1855—1857 |
| 7 | 19 327 892 | 2 369 | 12,26 | Statist. Jahrbuch für 1867 Heft I | " " 1855—1857 |
| 8 | 19 534 575 | 4 255 | 21,78 | " " " 1867 " | " " 1858—1859 |
| 9 | 19 759 160 | 5 173 | 26,18 | " " " 1867 " | " " 1858—1859 |
| 1860 | 19 973 807 | 5 363 | 26,85 | " " " 1867 " | Stat. Jahrb. f. 1861 u. 1862 Heft I |
| 1 | 20 120 476 | 4 895 | 24,33 | " " " 1867 " | " " " 1861 " 1862 " |
| 2 | 20 294 008 | 6 751 | 33,27 | " " " 1867 " | " " " 1863 Heft I |
| 3 | 20 509 065 | 7 209 | 35,15 | " " " 1867 " | " " " 1864 " |
| 4 | 20 721 856 | 7 545 | 36,41 | " " " 1867 " | " " " 1865 " |
| 5 | 20 881 820 | 4 767 | 22,83 | " " " 1867 " | " " " 1866 " |
| 6 | 20 835 008 | 7 484 | 35,92 | " " " 1867 " | " " " 1867 " |
| 7 | 20 989 925 | 9 840 | 46,88 | " " " 1868 " | " " " 1868 " |
| 8 | 21 185 021 | 7 519 | 35,49 | " " " 1869 " | " " " 1869 " |
| 9 | 20 217 531 | 7 112 | 35,18 | " " " 1870 " | " " " 1870 " |
| 1870 | 20 421 737 | 6 177 | 30,25 | Oesterreich. Statistif V. Bd. 1. Heft | " " " 1871 " |
| 1 | 20 601 118 | 8 074 | 39,19 | " " " " " | " " " 1872 " |
| 2 | 20 728 929 | 39 368 | 189,92 | " " " " " | " " " 1873 " |
| 3 | 20 740 588 | 65 274 ²⁾ | 314,72 | " " " " " | " " " 1873 Heft X ²⁾ |
| 4 | 20 902 239 | 36 442 ²⁾ | 174,34 | " " " " " | " " " 1874 " ²⁾ |
| 5 | 21 105 317 | 12 151 ²⁾ | 57,57 | " " " " " | " " " 1875 " ²⁾ |
| 6 | 21 319 544 | 8 564 | 40,17 | " " " " " | " " " 1876 " |
| 7 | 21 467 718 | 11 706 | 54,53 | " " " " " | " " " 1877 " |
| 8 | 21 614 206 | 13 313 | 61,59 | " " " " " | " " " 1878 " |
| 9 | 21 812 654 | 11 273 | 51,68 | " " " " " | " " " 1879 " |
| 1880 | 21 981 821 | 14 232 | 64,74 | " " " " " | " " " 1880 " |

¹⁾ Da die Bevölkerungszahl für das Ende des Jahres 1854 nicht angegeben ist, wurde dieselbe durch Abzug des Ueberschusses der Verstorbenen über die Geborenen des Jahres 1855 von der Bevölkerungszahl am Ende des Jahres 1855 gewonnen.

²⁾ Für Dalmatien sind die Pockentodesfälle aus Heft I des Statistischen Jahrbuches für die betreffenden Jahre entnommen. (1873 = 425, 1874 = 266, 1875 = 162).

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100 000 Ein- wohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|------------|-----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1881 | 22 134 454 | 18 019 | 81,41 | Statist. Jahrbuch f. 1881 Heft I | Statist. Jahrbuch für 1881 Heft X |
| 2 | 22 316 567 | 21 154 | 94,79 | " " " 1882 " | Oesterreich. Statist. für 1882 |
| 3 | 22 494 021 | 13 310 | 59,17 | Oester. Statist. VIII. Bd. 2. Heft | " " " 1883 |
| 4 | 22 701 688 | 11 521 | 50,75 | " " XII. " " | " " " 1884 |

Bemerkungen: Bis zum Jahre 1855 einschließlich ist nach Verwaltungsjahren gerechnet und zwar vom 1. November bis ult. Oktober (im November und Dezember 1855 sind 602 Todesfälle vorgekommen); 1847 und 1848 ist das Militär mit eingerechnet.

Die Angaben beziehen sich auf die jetzt im Reichsrathe vertretenen Länder; bis zum Jahre 1868 einschließlich ist die 1869 zu Ungarn geschlagene Militärgrenze mit darin enthalten.

Für frühere Jahre sind offizielle Angaben nicht vorhanden.

Pockensterblichkeit in England

in den Jahren 1839—1884.

| | | | | |
|------|---|--------|------|---|
| 1839 | . | 9 131 | 58,9 | Report from the select committee on the vaccination act (1867). Ordered, by The House of Commons, to be Printed, 23. May 1871 ¹⁾ |
| 1840 | . | 10 434 | 66,4 | |
| 1 | . | 6 368 | 40,0 | |
| 2 | . | 2 715 | 16,9 | |
| 3 | . | . | . | |
| 4 | . | . | . | |
| 5 | . | . | . | |
| 6 | . | . | . | |
| 7 | . | 4 227 | 24,7 | |
| 8 | . | 6 903 | 40,0 | |
| 9 | . | 4 644 | 26,7 | |
| 1850 | . | 4 666 | 26,3 | |
| 1 | . | 6 997 | 39,6 | |
| 2 | . | 7 320 | 40,9 | |
| 3 | . | 3 151 | 17,4 | |
| 4 | . | 2 808 | 15,3 | |
| 5 | . | 2 525 | 13,6 | |
| 6 | . | 2 277 | 12,1 | |
| 7 | . | 3 936 | 20,6 | |
| 8 | . | 6 460 | 33,5 | |
| 9 | . | 3 848 | 19,7 | |
| 1860 | . | 2 749 | 14,0 | |
| 1 | . | 1 320 | 6,6 | |
| 2 | . | 1 628 | 8,1 | |
| 3 | . | 5 964 | 29,3 | |
| 4 | . | 7 684 | 37,3 | |
| 5 | . | 6 411 | 30,9 | |
| 6 | . | 3 029 | 14,4 | |

¹⁾ Die Verhältniszahlen sind derselben Quelle entnommen.

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100 000 Ein- wohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1867 | . | 2 513 | 11,8 | | Wie oben |
| 8 | . | 2 052 | 9,6 | | " |
| 9 | 20 066 224 | 1 565 | 7,8 | Annual report of the registrar- general of births, deaths and marriages in England | Wie nebenstehend |
| 1870 | 22 704 108 | 2 620 | 11,5 | | " |
| 1 | 22 712 266 | 23 126 | 101,8 | " | " |
| 2 | . | 19 094 | 84,1 | " | " |
| 3 | . | 2 364 | 10,4 | " | " |
| 4 | . | 2 162 | 9,5 | " | " |
| 5 | . | 950 | 4,2 | " | " |
| 6 | . | 2 408 | 10,6 | " | " |
| 7 | . | 4 278 | 18,8 | " | " |
| 8 | . | 1 856 | 8,2 | " | " |
| 9 | . | 536 | 2,4 | " | " |
| 1880 | 25 968 286 | 648 | 2,5 | " | " |
| 1 | . | 3 098 | 11,9 | " | " |
| 2 | . | 1 317 | 5,1 | " | " |
| 3 | . | 953 | 3,7 | " | } Quarterly returns of marriages, } births, and deaths in England |
| 4 | . | 2 262 | 8,7 | " | |

Pockensterblichkeit in Berlin

in den Jahren 1861—1886.

| | | | | | |
|------|-----------|-------|--------|-------------------------------------|------------------|
| 1861 | 547 200 | 9 | 1,64 | Städt. statist. Jahrbuch. 4. Jahrg. | Wie nebenstehend |
| 2 | 567 570 | 27 | 4,76 | " " " " | " |
| 3 | 596 390 | 227 | 38,06 | " " " " | " |
| 4 | 632 500 | 620 | 98,02 | " " " " | " |
| 5 | 657 690 | 247 | 37,56 | " " " " | " |
| 6 | 665 710 | 215 | 32,30 | " " " " | " |
| 7 | 703 120 | 149 | 21,19 | " " " " | " |
| 8 | 728 590 | 128 | 17,57 | " " " " | " |
| 9 | 762 450 | 230 | 30,17 | " " " " | " |
| 1870 | 760 000 | 170 | 22,37 | " " " " | " |
| 1 | 824 580 | 5 216 | 632,56 | " " " " | " |
| 2 | 864 300 | 1 198 | 138,61 | " " " " | " |
| 3 | 900 620 | 101 | 11,21 | " " " " | " |
| 4 | 932 760 | 23 | 2,47 | " " " " | " |
| 5 | 964 240 | 50 | 5,19 | " " " " | " |
| 6 | 995 470 | 18 | 1,81 | " " " " | " |
| 7 | 1 006 974 | 4 | 0,40 | Veröffentl. des R. Gesundh.-Amtes | Wie nebenstehend |
| 8 | 1 032 034 | 8 | 0,78 | " " " " | " |
| 9 | 1 065 440 | 8 | 0,75 | " " " " | " |

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100000 Ein- wohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|-----------|-----------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1880 | 1 107 100 | 9 | 0,81 | Veröffentl. des K. Gesundheits-Amtes | Wie nebenstehend |
| 1 | 1 138 700 | 54 | 4,74 | " " " | " |
| 2 | 1 174 293 | 5 | 0,43 | " " " | " |
| 3 | 1 207 114 | 4 | 0,33 | " " " | " |
| 4 | 1 225 065 | 20 | 1,63 | " " " | " |
| 5 | 1 299 207 | 5 | 0,38 | " " " | " |
| 6 | 1 337 798 | 1 | 0,07 | " " " | Statistik der Pockentodesfälle im Deutschen Reich. (vergl. Abschnitt 2.) |

Pockensterblichkeit in London

in den Jahren 1838—1886.

| | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|--|------------------|
| 1838 | 1 766 169 | 3 817 | 216,1 | Quarterly returns of marriages, births, and deaths in England (annual-summary-London and other great towns 1835). | Wie nebenstehend |
| 9 | 1 802 751 | 634 | 35,2 | " | " |
| 1840 | 1 840 091 | 1 235 | 67,1 | " | " |
| 1 | 1 878 205 | 1 053 | 56,1 | " | " |
| 2 | 1 917 108 | 360 | 18,8 | " | " |
| 3 | 1 954 041 | 438 | 22,4 | " | " |
| 4 | 2 033 816 | 1 804 | 88,7 | " | " |
| 5 | 2 073 298 | 909 | 43,8 | " | " |
| 6 | 2 113 535 | 257 | 12,2 | " | " |
| 7 | 2 202 673 | 955 | 43,4 | " | " |
| 8 | 2 244 837 | 1 620 | 72,2 | " | " |
| 9 | 2 287 302 | 521 | 22,8 | " | " |
| 1850 | 2 330 054 | 499 | 21,4 | " | " |
| 1 | 2 373 081 | 1 062 | 44,8 | " | " |
| 2 | 2 416 367 | 1 159 | 48,0 | " | " |
| 3 | 2 459 899 | 211 | 8,6 | " | " |
| 4 | 2 503 662 | 694 | 27,7 | " | " |
| 5 | 2 547 639 | 1 039 | 40,8 | " | " |
| 6 | 2 591 815 | 531 | 20,5 | " | " |
| 7 | 2 636 174 | 156 | 5,9 | " | " |
| 8 | 2 680 700 | 242 | 9,0 | " | " |
| 9 | 2 725 374 | 1 158 | 42,5 | " | " |
| 1860 | 2 770 181 | 898 | 32,4 | " | " |
| 1 | 2 815 101 | 217 | 7,7 | " | " |
| 2 | 2 860 117 | 366 | 12,8 | " | " |
| 3 | 2 905 210 | 1 996 | 68,7 | " | " |
| 4 | 2 950 361 | 547 | 18,5 | " | " |
| 5 | 2 995 551 | 640 | 21,4 | " | " |
| 6 | 3 040 761 | 1 391 | 45,7 | " | " |
| 7 | 3 085 971 | 1 345 | 43,6 | " | " |
| 8 | 3 131 160 | 597 | 19,1 | " | " |

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100000 Ein- wohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|-----------|-----------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1869 | 3 176 308 | 275 | 8,7 | Quarterly returns of mariages, births, and deaths in England (annual-summary-London and other great towns 1885). | Wie nebenstehend |
| 1870 | 3 221 394 | 973 | 30,2 | | " |
| 1 | 3 267 251 | 7 912 | 242,2 | | " |
| 2 | 3 319 736 | 1 786 | 53,8 | | " |
| 3 | 3 373 065 | 113 | 3,4 | | " |
| 4 | 3 427 250 | 57 | 1,7 | | " |
| 5 | 3 482 306 | 46 | 1,3 | | " |
| 6 | 3 538 246 | 736 | 20,8 | | " |
| 7 | 3 595 085 | 2 551 | 71,0 | | " |
| 8 | 3 652 837 | 1 417 | 38,8 | | " |
| 9 | 3 711 517 | 450 | 12,1 | | " |
| 1880 | 3 771 139 | 471 | 12,5 | | " |
| 1 | 3 831 719 | 2 367 | 61,8 | | " |
| 2 | 3 893 272 | 430 | 11,0 | | " |
| 3 | 3 955 814 | 136 | 3,4 | | " |
| 4 | 4 019 361 | 898 | 22,3 | | " |
| 5 | 4 083 928 | 899 | 22,0 | " | |
| 6 | 4 149 533 | 24 | 0,6 | Desgl. 1886 | Wie nebenstehend |

Pockensterblichkeit in Hamburg

in den Jahren 1860—1886.

| | | | | | |
|------|---------|-----|---------|---|--|
| 1860 | . | . | 60,.. | Bericht des Medizinal-Inspektors über die medizinische Sta- tistik des Hamburgischen Staates für das Jahr 1872 ¹⁾ | Wie nebenstehend |
| 1 | . | . | — | | " |
| 2 | . | . | — | | " |
| 3 | . | . | — | | " |
| 4 | . | . | 210,.. | | " |
| 5 | . | . | 60,.. | | " |
| 6 | . | . | 9,.. | | " |
| 7 | . | . | 7,.. | | " |
| 8 | . | . | — | | " |
| 9 | . | . | 6,.. | " | |
| 1870 | . | . | 25,.. | " | " |
| 1 | . | . | 1075,.. | " | " |
| 2 | 338 974 | 323 | 95,29 | " | " |
| 3 | 348 127 | 3 | 0,86 | Desgl. für 1873 | Wie nebenstehend |
| 4 | 357 453 | 2 | 0,56 | " " 1874 | Wie nebenstehend |
| 5 | — | — | 0 | | Bericht des Med.-Inspekt. zc. für das Jahr 1875 |
| 6 | 388 618 | 7 | 1,80 | Veröffentl. des k. Gesundh.-Amtes | Wie nebenstehend |
| 7 | 393 588 | 5 | 1,27 | " | " |
| 8 | 406 014 | 1 | 0,25 | " | " |

¹⁾ Von 1860—71 sind nur Verhältniszahlen angegeben.

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100 000 Ein- wohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|-----------|-----------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1879 | — | — | 0 | Veröffentl. des R. Gesundh.-Amtes | Wie nebenstehend |
| 1880 | — | — | 0 | " | " |
| 1 | 453 869 | 10 | 2,20 | " | " |
| 2 | 423 050 | 2 | 0,47 | " | " |
| 3 | 435 964 | — | 0 | " | " |
| 4 | 449 414 | — | 0 | " | " |
| 5 | 462 278 | 4 | 0,87 | " | " |
| 6 | 474 370 | 17 | 3,58 | " | Statistik der Pockentodesfälle im Deutschen Reich. (vgl. Abschnitt 2) |

Anmerkung: Die Ziffern der Jahre 1860—1871 sind der angeführten Quelle zufolge wohl nur approximativ richtig und beziehen sich bis 1870 nur auf die Stadt Hamburg, von 1871 auf das ganze Gebiet.

Pockensterblichkeit in Paris

in den Jahren 1866—1886.

| | | | | | |
|------|-------------------------|--------|-------|---|------------------|
| 1866 | 1 825 274 | 581 | 31,8 | Annuaire statistique de la ville de Paris 1883 | Wie nebenstehend |
| 7 | 1 935 000 | 324 | 16,7 | | " |
| 8 | 1 919 000 | 638 | 33,2 | | " |
| 9 | 1 982 000 | 711 | 35,9 | | " |
| 1870 | 1 982 000 ¹⁾ | 10 331 | 521,2 | | " |
| 1 | 1 851 792 ¹⁾ | 2 765 | 149,3 | | " |
| 2 | 1 851 792 | 104 | 5,6 | | " |
| 3 | 1 837 000 | 17 | 0,9 | | " |
| 4 | 1 911 000 | 46 | 2,4 | | " |
| 5 | 1 994 000 | 253 | 12,7 | | " |
| 6 | 1 988 806 | 373 | 18,8 | " | |
| 7 | 1 973 000 | 136 | 6,9 | " | |
| 8 | 2 148 000 | 89 | 4,1 | " | |
| 9 | 2 113 000 | 911 | 43,1 | " | |
| 1880 | 2 183 000 | 2 260 | 103,5 | " | |
| 1 | 2 239 928 | 1 041 | 46,5 | " | |
| 2 | 2 246 000 | 661 | 29,4 | " | |
| 3 | 2 125 000 | 453 | 21,3 | " | |
| 4 | 2 239 928 | 80 | 3,6 | Bull. hebdomadaires de statis- tique démographique et médi- cale de la ville de Bruxelles | Wie nebenstehend |
| 5 | 2 239 928 | 175 | 7,8 | | " |
| 6 | 2 239 928 | 202 | 9,0 | | " |
| | | | | | " |

¹⁾ Nach einer Note im annuaire statistique 1883 ist für das Jahr 1871 die Einwohnerzahl von 1872 und für das Jahr 1870 diejenige von 1869 angenommen.

Pockensterblichkeit in Breslau in den Jahren 1862—1886.

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100 000 Ein- wohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|-----------|-----------------------|---|---|---|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1862 | 149 053 | 4 | 2,68 | Die Einwohnerzahlen sind auf Grund der Ergebnisse der Volkszählungen auf die Mitte der betreffenden Jahre berechnet worden. | Preussische Statistik Breslauer Stat., X. Ser. Heft 1 u. 2 |
| 3 | 155 263 | 190 | 122,37 | | |
| 4 | 160 805 | 225 | 139,92 | | |
| 5 | 168 280 | 13 | 7,73 | | |
| 6 | 175 754 | 5 | 2,84 | | |
| 7 | 184 137 | 10 | 5,43 | | |
| 8 | 189 551 | 105 | 55,39 | | |
| 9 | 194 964 | 191 | 97,97 | | |
| 1870 | 200 378 | 25 | 12,48 | | |
| 1 | 204 762 | 752 | 367,26 | | |
| 2 | 212 526 | 597 | 280,91 | | |
| 3 | 220 289 | 30 | 13,62 | | |
| 4 | 228 052 | 2 | 0,88 | | |
| 5 | 236 228 | — | 0 | | |
| 6 | 243 000 | — | 0 | | |
| 7 | 249 773 | 2 | 0,80 | | |
| 8 | 256 545 | 4 | 1,56 | | |
| 9 | 263 318 | 1 | 0,38 | | |
| 1880 | 270 685 | 2 | 0,74 | | |
| 1 | 276 030 | 3 | 1,09 | | |
| 2 | 281 376 | 9 | 3,20 | | |
| 3 | 286 722 | 24 | 8,37 | | |
| 4 | 292 067 | — | 0 | | |
| 5 | 297 413 | — | 0 | | |
| 6 | 302 759 | — | 0 | | |

Pockensterblichkeit in Wien ¹⁾ in den Jahren 1865—1886.

| | | | | | |
|------|---------|-------|--------|------------------------------------|---|
| 1865 | 561 246 | 124 | 22,09 | Statist. Jahrb. d. Stadt Wien 1884 | Statistique internationale des grandes villes, I. Sect. Tom. I. par J. Körösi. 1876 |
| 6 | 572 472 | 359 | 62,71 | " | |
| 7 | 583 922 | 276 | 47,27 | " | |
| 8 | 595 601 | 294 | 49,36 | " | |
| 9 | 607 514 | 328 | 53,99 | " | |
| 1870 | 615 820 | 295 | 47,90 | " | |
| 1 | 624 240 | 473 | 75,77 | " | |
| 2 | 632 775 | 3 334 | 526,89 | " | |
| 3 | 641 426 | 1 410 | 219,82 | " | |

¹⁾ Bis 1876 einschließlich beziehen sich die Angaben nur auf die Civilbevölkerung (ausschl. Militär); von 1877 einschl. an ist das Militär mit eingerechnet.

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100 000 Ein- wohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|-----------|-----------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1874 | 650 196 | 928 | 142,73 | Statist. Jahrb. d. Stadt Wien 1884 | Statist. Jahrbuch der Stadt Wien |
| 5 | 659 086 | 791 | 120,01 | " | " |
| 6 | 668 097 | 1 200 | 179,61 | " | " |
| 7 | 694 994 | 606 | 87,19 | Jahresbericht des Wiener Stadt- physikats 1883/84 | Wie nebenstehend |
| 8 | 704 129 | 556 | 78,96 | " | " |
| 9 | 713 388 | 349 | 48,92 | " | " |
| 1880 | 722 773 | 534 | 73,88 | " | " |
| 1 | 730 911 | 906 | 123,95 | " | " |
| 2 | 740 622 | 808 | 109,10 | " | " |
| 3 | 749 762 | 73 | 9,74 | " | " |
| 4 | 759 849 | 94 | 12,37 | Mittheil. des statistischen Departe- ments des Wiener Magistrats | Wie nebenstehend |
| 5 | 769 889 | 875 | 113,65 | " | " |
| 6 | 780 066 | 204 | 26,15 | " | " |

Pockensterblichkeit in München

in den Jahren 1867/68—1886.

| | | | | | |
|-------------------|---------|-----|---------------------|--|--|
| 1867/8 | 170 600 | 23 | 13,48 | Beiträge zur Statistik des König- reichs Bayern | Wie nebenstehend |
| 68/69 | 170 373 | 2 | 1,17 | " | " |
| 69/70 | 170 146 | 1 | 0,59 | " | " |
| 1870 4. Quart. | 169 919 | 7 | 16,48 ¹⁾ | " | " |
| 1871 | 169 693 | 151 | 88,98 | " | " |
| 2 | 175 525 | 108 | 61,53 | " | " |
| 3 | 181 358 | 5 | 2,76 | " | " |
| 4 | 187 191 | 2 | 1,07 | " | " |
| 5 | 193 024 | — | 0 | " | " |
| 6 | 198 000 | 2 | 1,01 | Veröffentl. des k. Gesundh.-Amtes | Wie nebenstehend |
| 7 | 215 000 | — | 0 | " | " |
| 8 | 222 000 | 2 | 0,90 | " | " |
| 9 | 230 000 | — | 0 | " | " |
| 1880 | 228 000 | — | 0 | " | " |
| 1 | 233 000 | 24 | 10,30 | " | " |
| 2 | 238 000 | 7 | 2,94 | " | " |
| 3 | 240 000 | — | 0 | " | " |
| 4 | 240 000 | — | 0 | " | " |
| 5 | 259 318 | 14 | 5,40 | " | " |
| 6 | 265 710 | 2 | 0,75 | " | Statistik der Pockentodesfälle im Deutschen Reich (vgl. Abschnitt 2) |

¹⁾ Auf's Jahr berechnet.

Pockensterblichkeit in Petersburg in den Jahren 1878—1886.

| Jahr | Einwohner | Pockentodesfälle | Auf 100 000 Einwohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|-----------|------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1878 | 808 800 | 1 172 | 144,91 | Bull. hebdomadaires de statist. démographique et médicale de la ville de Bruxelles | Wie nebenstehend |
| 9 | 826 200 | 1 180 | 142,82 | | " |
| 1880 | 843 700 | 182 | 21,57 | | " |
| 1 | 861 920 | 243 | 28,19 | | " |
| 2 | 927 467 | 716 | 77,20 | | " |
| 3 | 929 525 | 434 | 46,69 | | " |
| 4 | 928 016 | 141 | 15,19 | " | " |
| 5 | 928 016 | 108 | 11,64 | " | " |
| 6 | 928 016 | 142 | 15,30 | " | Beim k. Gesundh.-Amte eingeg. Wochenachweise |

Pockensterblichkeit in Dresden in den Jahren 1859—1886.

| | | | | | |
|------|---------|-----|--------|---|---|
| 1859 | 119 772 | 3 | 2,50 | Die Einwohnerzahlen für 1859 bis 1877 sind auf Grund der Ergebnisse der Volkszählungen auf die Mitte der betreffenden Jahre berechnet | Jahresber. des Landes-Medizinal-Kolleg. über das Medizinalwesen im Königr. Sachsen für 1867 |
| 1860 | 123 239 | 1 | 0,81 | | " |
| 1 | 125 711 | 1 | 0,80 | | " |
| 2 | 131 570 | — | 0 | | " |
| 3 | 137 429 | 93 | 67,67 | | " |
| 4 | 144 298 | 213 | 147,61 | | " |
| 5 | 147 730 | 3 | 2,04 | | " |
| 6 | 151 162 | 12 | 7,94 | | " |
| 7 | 154 308 | 44 | 28,51 | | " |
| 8 | 157 740 | 60 | 38,04 | | Desgl. für 1868 |
| 9 | 163 923 | 3 | 1,83 | " " 1869 | |
| 1870 | 169 469 | 15 | 8,85 | Nach schriftlicher Mittheilung der Direktion des Königl. sächsischen statistischen Büreaus | |
| 1 | 174 549 | 570 | 326,56 | " | |
| 2 | 179 629 | 151 | 84,06 | " | |
| 3 | 185 087 | 24 | 12,97 | " | |
| 4 | 190 138 | 8 | 4,21 | Jahresber. des Landes-Medizinal-Kolleg. über das Medizinalwesen im Königr. Sachsen für 1874 | |
| 5 | 195 190 | 5 | 2,56 | Desgl. für 1875 | |
| 6 | 200 242 | 1 | 0,50 | " " 1876 | |
| 7 | 205 294 | 2 | 0,97 | Veröffentl. des k. Gesundh.-Amtes | |
| 8 | 210 377 | — | 0 | Veröffentl. des k. Gesundh.-Amtes | |
| 9 | 215 440 | 4 | 1,86 | " | |
| 1880 | 220 216 | 8 | 3,63 | " | |
| 1 | 223 100 | 6 | 2,69 | " | |
| 2 | 225 000 | 3 | 1,33 | " | |
| 3 | 233 600 | 2 | 0,86 | " | |
| 4 | 236 000 | 1 | 0,42 | " | |
| 5 | 243 980 | 3 | 1,23 | " | |
| 6 | 249 034 | — | 0 | " | Statistik der Pockentodesfälle im Deutschen Reich (vgl. Abschnitt 2). |

Pockensterblichkeit in Prag¹⁾ in den Jahren 1865—1886.

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100 000 Ein- wohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|-----------|-----------------------|---|--|---|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1865 | 152 311 | 32 | 21,01 | Statistique internationale des grandes villes, I. Sect. Tom. I par J. Körösi | Wie nebenstehend |
| 6 | 153 655 | 39 | 25,38 | | " |
| 7 | 155 010 | 130 | 83,87 | | " |
| 8 | 156 328 | 42 | 26,87 | | " |
| 9 | 157 713 | 30 | 19,02 | | Statist. Handbüchlein der Stadt Prag für 1872/73 |
| 1870 | 159 105 | 42 | 26,40 | | " |
| 1 | 160 509 | 24 | 14,95 | | " |
| 2 | 161 926 | 642 | 396,48 | | " |
| 3 | 163 355 | 460 | 281,60 | | " |
| 4 | 163 355 | 49 | 30,00 | Desgl. für das betr. Jahr | Wie nebenstehend |
| 5 | 164 797 | 18 | 10,92 | " | " |
| 6 | 163 246 | 128 | 78,41 | " | " |
| 7 | 166 252 | 658 | 395,78 | " | " |
| 8 | 169 258 | 147 | 86,85 | " | " |
| 9 | 170 718 | 144 | 84,35 | " | " |
| 1880 | 162 326 | 471 | 290,16 | " | " |
| 1 | 168 628 | 109 | 64,64 | Statist. Handbuch der Stadt Prag für das betr. Jahr | Wie nebenstehend |
| 2 | 263 081 | 152 | 57,78 | " | " |
| 3 | 271 807 | 613 | 225,53 | " | " |
| 4 | 272 333 | 980 | 359,85 | " | " |
| 5 | 272 333 | 156 | 57,28 | Bull. hebdomadaires de statist. démographique et médicale de la ville de Bruxelles | Wie nebenstehend |
| 6 | 288 317 | 160 | 55,49 | " | " |

¹⁾ Die Angaben beziehen sich nur auf die Civilbevölkerung.
Von 1882 Prag incl. Vororte.

Pockensterblichkeit in Bayern¹⁾ in den Jahren 1844/45—1886.

| | | | | | | |
|---------|-----------|-------|------|--|--|---|
| 1844/45 | 4 503 386 | 246 | 5,5 | Die Einwohnerzahlen sind auf Grund der Ergebnisse der Volks- zählungen für die einzelnen Jahre berechnet worden | Beiträge zur Statistik des König- reichs Bayern | |
| 45/46 | 4 504 874 | 146 | 3,2 | | | " |
| 46/47 | 4 506 362 | 124 | 2,8 | | | " |
| 47/48 | 4 507 851 | 227 | 5,0 | | | " |
| 48/49 | 4 520 751 | 593 | 13,1 | | | " |
| 1849/50 | 4 533 651 | 1 079 | 23,8 | | | " |
| 50/51 | 4 546 551 | 481 | 10,6 | | | " |
| 51/52 | 4 559 452 | 601 | 13,2 | | | " |
| 52/53 | 4 553 487 | 471 | 10,3 | | | " |
| 53/54 | 4 547 521 | 587 | 12,9 | | | " |
| 54/55 | 4 541 556 | 299 | 6,6 | | | " |
| 55/56 | 4 558 043 | 486 | 10,7 | | | " |

¹⁾ Von 1844/45—1869/70 wurde von Oktober bis Oktober gerechnet.

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100 000 Ein- wohner berechnet | Ausgabe der Quelle | |
|-------------------|-----------|-----------------------|---|---|---|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1856/57 | 4 574 531 | 156 | 3,4 | Die Einwohnerzahlen sind auf Grund der Ergebnisse der Volkszählungen für die einzelnen Jahre berechnet worden | Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern |
| 57/58 | 4 591 018 | 316 | 6,9 | | |
| 58/59 | 4 615 748 | 150 | 3,2 | | |
| 59/60 | 4 640 445 | 131 | 2,8 | | |
| 60/61 | 4 665 140 | 73 | 1,6 | | |
| 61/62 | 4 689 837 | 121 | 2,6 | | |
| 62/63 | 4 729 039 | 111 | 2,3 | | |
| 63/64 | 4 768 241 | 108 | 2,3 | | |
| 64/65 | 4 807 440 | 221 | 4,6 | | |
| 65/66 | 4 813 100 | 577 | 12,0 | | |
| 66/67 | 4 818 760 | 1 210 | 25,0 | | |
| 67/68 | 4 827 076 | 917 | 19,0 | | |
| 68/69 | 4 835 393 | 487 | 10,1 | | |
| 69/70 | 4 843 709 | 363 | 7,5 | | |
| 1870 4. Quart. | 4 843 709 | 224 | 18,5*) | | |
| 1871 | 4 852 026 | 5 070 | 104,5 | | |
| 2 | 4 894 617 | 2 992 | 61,1 | | |
| 3 | 4 937 208 | 869 | 17,6 | | |
| 4 | 4 979 799 | 236 | 4,7 | | |
| 5 | 5 022 390 | 87 | 1,7 | | |
| 6 | 5 074 868 | 67 | 1,3 | Generalberichte über die Sanitätsverwalt. im Königr. Bayern | |
| 7 | 5 127 345 | 88 | 1,7 | | |
| 8 | 5 179 823 | 69 | 1,3 | | |
| 9 | 5 232 300 | 26 | 0,5 | | |
| 1880 | 5 273 493 | 62 | 1,2 | | |
| 1 | 5 300 577 | 77 | 1,5 | | |
| 2 | 5 327 661 | 67 | 1,2 | | |
| 3 | 5 354 745 | 34 | 0,6 | | Veröffentl. des R. Gesundh.-Amtes |
| 4 | 5 381 829 | 8 | 0,1 | | |
| 5 | 5 408 914 | 17 | 0,3 | | |
| 6 | 5 435 998 | 7 | 0,1 | Statistik der Pockentodesfälle im Deutschen Reich (vgl. Abschnitt 2). | |

*) Auf's Jahr berechnet.

Pockensterblichkeit in Belgien

in den Jahren 1851—1884.

| | | | | | |
|------|-----------|-----|-------------------|--|-------------------------------------|
| 1851 | 4 473 261 | 700 | 15,6 | Annuaire statistique de la Belgique, Jahrg. 1880 | Annuaire statistique de la Belgique |
| 2 | 4 516 361 | | 519 ¹⁾ | | |
| 3 | 4 548 507 | | | | |
| 4 | 4 585 096 | | | | |

¹⁾ Mittel von 1852/54.

| Jahr | Einwohner | Pocken- todesfälle | Auf 100 000 Ein- wohner berechnet | Angabe der Quelle | |
|------|-----------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | für die Einwohnerzahl | für die Zahl der Pockentodesfälle |
| 1855 | 4 607 066 | 449 | 9,7 | Annuaire statistique de la Belgique, Jahrg. 1880 | Annuaire statistique de la Belgique |
| 6 | 4 529 461 | 1 116 ¹⁾ | 24,1 | | |
| 7 | 4 577 236 | | | | |
| 8 | 4 623 197 | | | | |
| 9 | 4 671 226 | | | | |
| 1860 | 4 731 996 | | | | |
| 1 | 4 782 255 | . | . | | |
| 2 | 4 836 566 | . | . | | |
| 3 | 4 893 021 | . | . | | |
| 4 | 4 940 579 | 2 470 | 50,0 | | |
| 5 | 4 984 351 | 5 809 | 116,5 | | |
| 6 | 4 827 833 | 1 024 | 21,2 | | |
| 7 | 4 897 794 | 546 | 11,1 | | |
| 8 | 4 961 644 | 843 | 17,0 | | |
| 9 | 5 021 336 | 1 651 | 32,9 | | |
| 1870 | 5 087 826 | 4 163 | 81,8 | Desgl. Jahrg. 1885 | |
| 1 | 5 113 680 | 21 315 | 416,8 | | |
| 2 | 5 175 037 | 8 074 | 156,0 | | |
| 3 | 5 253 794 | 1 749 | 33,3 | | |
| 4 | 5 336 634 | 1 968 | 36,9 | | |
| 5 | 5 402 938 | 1 691 | 31,3 | | |
| 6 | 5 336 185 | 1 448 | 27,1 | | |
| 7 | 5 412 731 | 3 651 | 67,5 | | |
| 8 | 5 476 939 | 3 743 | 68,3 | | |
| 9 | 5 536 654 | 2 394 | 43,2 | | |
| 1880 | 5 519 845 | 4 135 | 74,9 | | |
| 1 | 5 585 846 | 2 721 | 48,7 | | |
| 2 | 5 655 197 | 1 570 | 27,8 | | |
| 3 | 5 720 807 | 1 796 | 31,4 | | |
| 4 | 5 784 958 | 1 355 | 23,4 | | |

¹⁾ Mittel von 1856/60.

Erkrankungen und Todesfälle an Pocken in der preussischen Armee in den Jahren 1825—1886/87.

| Jahr | Kopfstärke der Armee | Es erkrankten an Pocken | | Es starben an Pocken | | Angabe der Quelle | |
|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | absolut | auf 100 000 berechnet | absolut | auf 100 000 berechnet | für die Kopfstärke | für die Zahl der Erkrankungs- und Todesfälle |
| 1825 | 121 760 | . ¹⁾ | . | 12 | 9,9 | Die Pocken bei den deutschen Heeren im Kriege gegen Frankreich 1870/71. (Her- ausgegeben von der Militär- Medizinal-Abtheilung des Königlichen Kriegs-Mini- steriums zc. Berlin 1885.) | Wie nebenstehend |
| 6 | 121 760 | . ¹⁾ | . | 16 | 13,1 | | |
| 7 | 122 113 | . ¹⁾ | . | 23 | 18,8 | | |
| 8 | 122 113 | . ¹⁾ | . | 35 | 28,7 | | |
| 9 | 122 113 | . ¹⁾ | . | 33 | 27,0 | | |
| 1830 | 122 113 | . ¹⁾ | . | 27 | 22,1 | | |
| 1 | 143 930 | . ¹⁾ | . | 108 | 75,0 | | |
| 2 | 143 930 | . ¹⁾ | . | 96 | 66,7 | | |
| 3 | 143 930 | . ¹⁾ | . | 108 | 75,0 | | |
| 4 | 135 362 | 619 | 457,3 | 38 | 28,1 | " | " |
| 5 | 135 362 | 259 | 191,3 | 5 | 3,7 | " | " |
| 6 | 130 306 | 130 | 99,8 | 9 | 6,9 | " | " |
| 7 | 126 291 | 94 | 74,4 | 3 | 2,4 | " | " |
| 8 | 126 293 | 111 | 87,9 | 7 | 5,5 | " | " |
| 9 | 129 024 | 89 | 69,0 | 2 | 1,6 | " | " |
| 1840 | 127 451 | 74 | 58,1 | 2 | 1,6 | " | " |
| 1 | 127 451 | 59 | 46,3 | 3 | 2,4 | " | " |
| 2 | 127 451 | 99 | 77,7 | 2 | 1,6 | " | " |
| 3 | 127 451 | 167 | 131,0 | 3 | 2,4 | " | " |
| 4 | 127 451 | 69 | 54,1 | 3 | 2,4 | " | " |
| 5 | 127 480 | 30 | 23,5 | 1 | 0,8 | " | " |
| 6 | 126 164 | 30 | 23,8 | 1 | 0,8 | " | " |
| 7 | 126 413 | 5 | 3,9 | — | 0 | " | " |
| 8 | 127 005 | 22 | 17,3 | 1 | 0,8 | " | " |
| 9 | 123 022 | 62 | 50,4 | 1 | 0,8 | " | " |
| 1850 | 123 022 | 176 | 143,1 | 1 | 0,8 | " | " |
| 1 | 130 623 | 246 | 188,3 | 3 | 2,3 | " | " |
| 2 | 130 623 | 87 | 66,6 | 1 | 0,8 | " | " |
| 3 | 131 492 | 138 | 104,9 | 1 | 0,8 | " | " |
| 4 | 131 642 | 121 | 91,9 | 3 | 2,3 | " | " |
| 5 | 131 642 | 12 | 9,1 | — | 0 | " | " |
| 6 | 131 708 | 21 | 15,9 | — | 0 | " | " |
| 7 | 142 345 | 35 | 24,6 | 1 | 0,7 | " | " |
| 8 | 142 345 | 64 | 45,0 | — | 0 | " | " |
| 9 | 142 412 | 58 | 40,7 | 2 | 1,4 | " | " |
| 1860 | . ²⁾ | 44 | . | 3 | . | " | " |

¹⁾ Zahlen über die gesammte Blatternmorbidityät des preussischen Heeres in der Zeit von 1825—1833 können nicht beigebracht werden, weil in den Krankenberichten die Blattern noch unter der Rubrik „Ausschlagstieber“ mit Scharlach und Masern gemeinsam verrechnet und nur die Pocken todtien durch besondere Erläuterungen ersichtlich gemacht sind.

²⁾ Für die Jahre 1860 u. 1861 (Heeresreorganisation) fehlen zuverlässige Kopfstärken.

| Jahr | Kopfstärke der Armee | Es erkrankten an Pocken | | Es starben an Pocken | | Angabe der Quelle | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | absolut | auf 100 000 berechnet | absolut | auf 100 000 berechnet | für die Kopfstärke | für die Zahl der Erkrankungs- und Todesfälle |
| 1861 | 1) | 56 | . | 4 | . | Die Pocken bei den deutschen Heeren im Kriege gegen Frankreich 1870/71 | Wie nebenstehend |
| 2 | 202 420 | 25 | 12,4 | 1 | 0,5 | | " |
| 3 | 202 200 | 90 | 44,5 | — | 0 | | " |
| 4 | 201 545 | 120 | 59,5 | 1 | 0,5 | | " |
| 5 | 202 615 | 69 | 34,1 | 1 | 0,5 | | " |
| 6 | 1) | 91 | 35,0 ¹⁾ | 8 | 3,08 ¹⁾ | | " |
| 7 | 253 230 | 188 | 74,2 | 2 | 0,8 | | " |
| 8 | 250 376 | 97 | 38,7 | 1 | 0,4 | | " |
| 9 | 248 746 | 108 | 43,4 | 1 | 0,4 | | " |
| 1870 ²⁾ | 267 873 | 41 | 30,6 ³⁾ | — | 0 | Statist. Sanitätsbericht über die kgl. preuß. Armee | Wie nebenstehend |
| 1870/71 ³⁾ | 590 262 ⁷⁾ | 2 879 | 487,7 | 164 | 27,8 | Die Pocken bei den deutschen Heeren im Kriege gegen Frankreich 1870/71 | Wie nebenstehend |
| 71 ⁴⁾ | 223 169 | 828 | 742,0 ⁸⁾ | 34 | 30,5 ⁸⁾ | Statist. Sanitätsbericht über die kgl. preuß. Armee | Wie nebenstehend |
| 72 | 222 234 | 389 | 175,0 | 12 | 5,4 | " | " |
| 73 ⁵⁾ | 234 662 | 26 | 44,3 ⁸⁾ | 2 | 3,4 ⁸⁾ | " | " |
| 73/74 ⁶⁾ | 284 972 | 22 | 7,7 | 1 | 0,4 | " | " |
| 74/75 | 270 815 | 26 | 9,6 | — | 0 | " | " |
| 75/76 | 284 653 | 20 | 7,0 | — | 0 | " | " |
| 76/77 | 286 376 | 19 | 6,6 | — | 0 | " | " |
| 77/78 | 289 423 | 12 | 4,1 | — | 0 | " | " |
| 78/79 | 269 616 | 15 | 5,6 | — | 0 | " | " |
| 79/80 | 270 577 | 7 | 2,6 | — | 0 | " | " |
| 80/81 | 270 024 | 23 | 8,5 | — | 0 | " | " |
| 81/82 | 291 156 | 16 | 5,5 | — | 0 | " | " |
| 82/83 | 339 224 [*]) | 9 | 2,7 | — | 0 | Nach Mittheilung aus dem kgl. preuß. Kriegs- ministerium | Wie nebenstehend |
| 83/84 | 340 089 [*]) | 7 | 2,1 | — | 0 | | " |
| 84/85 | 341 436 [*]) | 7 | 2,1 | 1 ⁹⁾ | 0,3 | | " |
| 85/86 | 341 308 [*]) | 6 | 1,8 | — | 0 | | " |
| 86/87 | 344 722 [*]) | 7 | 2,0 | — | 0 | | " |

1) Eine genaue Kopfstärke aus dem Kriegsjahr 1866 war nicht zu berechnen, jedenfalls war sie größer, als die des folgenden Jahres. Bei einer Heeresstärke von nur 260 000 Mann würde die Morbidität 35 000/0000, die Mortalität 3,08/0000 betragen haben. — Auch für die Jahre 1860 u. 1861 (Heeresreorganisation) fehlen zuverlässige Kopfstärken.

2) pro Januar bis Juni 1870.

3) pro Juli 1870 bis Juni 1871.

4) pro Juli bis Dezember 1871.

5) pro Januar bis März 1873.

6) Vom 1. April 1873 bis ult. März 1874.

7) Einschl. der kleineren norddeutschen Kontingente.

8) Auf's Jahr berechnet.

9) Der Todesfall betraf einen zur Übung eingezogenen Reservisten, der ausweislich der Zuttsliste i. J. 1877 bei seiner Einstellung als Rekrut 2 mal ohne Erfolg geimpft worden war.

* Durchschnittliche Kopfzahl, auf welche die Berichterstattung sich bezieht. Die Zahl umfaßt außer den Unteroffizieren und Mannschaften des stehenden Heeres noch die Kadetten, Unteroffiziervorschüler, Invaliden, Militär-Gefangenen und Arbeitssoldaten, sowie die zu Übungen eingezogenen Personen des Beurlaubtenstandes und Ersatzreservisten, nach Maßgabe der Dauer dieser Übungen. Die Zahl bezieht sich auf das Garde-Korps, 1. bis 11., 14. und 15. Armeekorps (einschl. der beim 15. Armeekorps befindlichen königl. Bayerischen, Württembergischen und Sächsischen Truppenteile).

Erkrankungen und Todesfälle an Pocken in der österreichischen Armee in den Jahren 1870—1886.

| Jahr | Kopfstärke (Verpflegungs- stärke) der Armee | Es erkrankten an Pocken | | Es starben an Pocken | | Angabe der Quelle | |
|------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | absolut | auf 100 000 berechnet | absolut | auf 100 000 berechnet | für die Kopfstärke | für die Zahl der Erkrankungs- und Todesfälle |
| 1870 | 254 639 | 1 829 | 718,3 | 47 | 18,5 | Militär-statist. Jahrbuch | Wie nebenstehend |
| 1 | 241 976 | 1 974 ¹⁾ | 815,8 | 97 | 40,1 | " | Die Pocken bei den deutschen Heeren im Kriege gegen Frankreich 1870/71 |
| 2 | 238 772 | 4 294 ¹⁾ | 1 798,4 | 242 | 101,4 | " | |
| 3 | 240 662 | 3 989 | 1 657,5 | 262 | 108,9 | " | |
| 4 | 252 586 | 2 533 | 1 002,8 | 169 | 66,9 | " | |
| 5 | 256 133 | 862 | 336,5 | 55 | 21,5 | " | |
| 6 | 258 435 | 710 | 274,7 | 27 | 10,4 | " | |
| 7 | 258 985 | 1 067 | 412,0 | 66 | 25,5 | " | " |
| 8 | 323 835 | 1 114 | 344,0 | 50 | 15,4 | " | " |
| 9 | 281 799 | 856 | 303,8 | 64 | 22,7 | " | Militär-statist. Jahrbuch |
| 1880 | 254 170 | 1 208 | 475,3 | 64 | 25,2 | " | " |
| 1 | 254 247 | 1 104 | 434,2 | 74 | 29,1 | " | " |
| 2 | 278 456 | 1 178 | 423,0 | 77 | 27,7 | " | " |
| 3 | 269 200 | 705 | 261,9 | 44 | 16,3 | " | " |
| 4 | 260 575 | 507 | 194,6 | 20 | 7,7 | " | " |
| 5 | 263 986 | 556 | 210,6 | 33 | 12,5 | " | " |
| 6 | 264 718 | 371 | 140,1 | 21 | 7,9 | " | " |

¹⁾ In den Jahren 1871 und 1872 enthält die Erkrankungsziffer eine nicht erhebliche Quote von Mannschaften, welche nicht zum unmittelbaren Truppenstande gehören; die Todtensziffer dagegen bezieht sich durchweg nur auf Angehörige des Heeres.

Erkrankungen und Todesfälle an Pocken in der französischen Armee in den Jahren 1866—1881.

| Jahr | Kopfstärke (Effectivstärke) der Armee | Es erkrankten an Pocken | | Es starben an Pocken | | Angabe der Quelle | |
|--------------------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| | | absolut | auf 100 000 berechnet | absolut | auf 100 000 berechnet | für die Kopfstärke | für die Zahl der Erkrankungs- und Todesfälle |
| 1866 | 336 233 | 753 | 224,0 | 46 | 13,7 | Statistique médicale de l'armée | Wie nebenstehend |
| 7 | 384 180 | 888 | 231,1 | 70 | 18,2 | " | " |
| 8 | 394 634 | 2 566 | 650,2 | 169 | 42,8 | " | " |
| 9 | 417 660 | 1 599 | 382,8 | 95 | 22,8 | " | " |
| 1870 ¹⁾ | . | . | . | . | . | | |
| 1871 ¹⁾ | . | . | . | . | . | | |
| 2 | 429 973 | 258 | 60,0 | 46 | 10,7 | Statistique médicale de l'armée | " |
| 3 | 480 139 | 132 | 27,5 | 19 | 4,0 | " | " |

¹⁾ Angaben fehlen.

| Jahr | Kopfstärke (Effectivstärke) der Armee | Es erkrankten an Pocken | | Es starben an Pocken | | Angabe der Quelle | |
|------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| | | absolut | auf 100 000 berechnet | absolut | auf 100 000 berechnet | für die Kopfstärke | für die Zahl der Erkrankungs- und Todesfälle |
| 1874 | 426 198 | 169 | 39,7 | 14 | 3,3 | Statistique médicale de l'armée | Wie nebenstehend |
| 5 | 432 218 | 613 | 141,8 | 77 | 17,8 | | " |
| 6 | 449 950 | 1 037 | 230,5 | 127 | 28,2 | " | " |
| 7 | 468 859 | 1 042 | 222,2 | 92 | 19,6 | " | " |
| 8 | 486 655 | 1 037 | 213,1 | 98 | 20,1 | " | " |
| 9 | 470 393 | 544 | 115,6 | 42 | 8,9 | " | " |
| 1880 | 490 949 | 754 | 153,6 | 73 | 14,9 | " | " |
| 1 | 519 852 | 578 | 111,2 | 41 | 7,9 | " | " |

Ergebnisse einer Statistik
der
Pockentodesfälle im Deutschen Reiche
für das Jahr 1886*).

Zufolge der Beschlüsse des Deutschen Bundesrathes vom 18. Juni 1885, betreffend die Herstellung einer Statistik der Todesfälle an den Pocken, sind für das Jahr 1886 aus sämmtlichen deutschen Bundesstaaten und aus Elsaß-Lothringen Meldefarten über Todesfälle an den Pocken, zumeist nach dem vom Bundesrathe festgesetzten Schema**), bezw. Fehl-Anzeigen dem Kaiserlichen Gesundheitsamte eingekandt worden.

Im Laufe des Jahres 1886 sind hiernach innerhalb des Deutschen Reiches im Ganzen 155 Todesfälle an den Pocken***) oder 3,3 auf eine Million Einwohner zur amtlichen Kenntniß gelangt, welche sich auf die einzelnen Monate des Jahres in folgender Weise vertheilen:

| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Septbr. | Oktober | Novbr. | Dezbr. |
|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 16 | 18 | 13 | 12 | 19 | 14 | 13 | 6 | 6 | 13 | 15 | 10 |

Auf die 3 Frühjahrsmonate und die 3 Wintermonate entfielen je 44, auf das Sommer- und Herbstvierteljahr 33 bezw. 34 Todesfälle.

Diese 155 Pockentodesfälle ereigneten sich in den Königreichen Preußen (97), Bayern (7), Sachsen (29), Württemberg (2), im Großherzogthum Baden (2) und in den freien Städten Bremen (1) und Hamburg (17); aus allen anderen deutschen Staaten und

*) Vgl. hierzu den Nachtrag auf S. 36 ff.

**) Das Formular der Meldefarte enthält folgenden Vordruck: Gemeinde: — Verwaltungsbezirk: — Staat: — Straße: — Nr. des Sterbehauses (event. Bezeichnung des Krankenhauses): — Vor- und Familienname ^{des} Gestorbenen: — Geschlecht: männlich, weiblich (Zutreffendes zu unterstreichen) — Tag, Monat, Jahr der Geburt: — Beruf (bei nicht erwerbsthätigen bezw. nicht selbstständigen Personen — Ehefrauen ohne eigenen Beruf, Kindern zc. — Beruf des Haushaltungsvorstandes): — Bemerkung darüber, ob ^{der} _{die} Verstorbene regelmäßig außerhäuslich, etwa in einer Fabrik, Werkstatt zc. — und welcher Art (z. B. Papierfabrik) beschäftigt war, oder eine Schule besuchte: — Tag, Monat, Jahr des Todes: — Ort und Datum: — Unterschrift des meldenden Medizinalbeamten.

***) Einschließlich eines ärztlich nicht konstatariten Pockentodesfalles in Sachsen, von dem der Bezirksarzt auf der Meldefarte erklärt, daß er nach Lage der Verhältnisse die stattgehabte Erkrankung an den Pocken für sehr unwahrscheinlich halte.

aus Elsaß-Lothringen sind Anzeigen eingegangen, daß Pockentodesfälle während des ganzen Jahres nicht zur Kenntniß der Behörden gelangt seien.

Die räumliche Vertheilung der Todesfälle auf die einzelnen Verwaltungsbezirke ergibt sich aus nachstehender Uebersicht, in welcher die an Rußland, Oesterreich und die Schweiz unmittelbar grenzenden Bezirke mit fetter Schrift besonders hervorgehoben sind. In den westlichen Grenzbezirken kamen Pockentodesfälle nicht vor.

Verbreitung

der Pockentodesfälle des Jahres 1886 auf die einzelnen Verwaltungsbezirke im Deutschen Reiche.

| Bundesstaat bezw. Provinz | Regierungsbezirk | Kreis bezw. Bezirksamt, Amtshauptmannschaft etc. | Zahl der betroffenen Orte | Zahl der Pockentodes- fälle | | |
|---------------------------|------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----|
| Preußen | Ostpreußen | Königsberg | Stadt Königsberg | 1 | 5 | |
| | | Gumbinnen | Darkehmen | 1 | 1 | |
| | | | Goldap | 2 | 4 | |
| | | Johannisburg | 5 | 10 | | |
| | | Loetzen | 1 | 2 | | |
| | | Lyda | 2 | 7 | | |
| | | Oletzko | 1 | 1 | | |
| | | Ragnit | 1 | 1 | | |
| | | Sensburg | 1 | 1 | | |
| | | Westpreußen | Danzig | Stadt Danzig | 1 | 1 |
| | Löbau | | | 1 | 2 | |
| | Marienwerder | | Marienwerder | 1 | 1 | |
| | | | Thorn | 3 | 4 | |
| | Stadtkreis | Berlin | Berlin | 1 | 1 | |
| | Brandenburg | Potsdam | Westhavelland | 1 | 1 | |
| | | | Frankfurt a. D. | 1 | 4 | |
| | | Soran | Soran | 1 | 2 | |
| | | | Spremberg | 1 | 1 | |
| | Pommern | Stettin | Pyritz | 1 | 3 | |
| | Posen | Posen | Fraustadt | 1 | 1 | |
| | | | Bromberg | 1 | 1 | |
| | | | Schubin | 1 | 1 | |
| | Schlesien | Breslau | Glaß | 3 | 4 | |
| | | | Landeshut | 1 | 2 | |
| | | Liegnitz | Lauban | 1 | 1 | |
| | | | Sagan | 1 | 2 | |
| | | | Sprottau | 1 | 1 | |
| | | | | Seite . . | 37 | 65 |

| Bundesstaat bezw. Provinz | Regierungsbezirk | Kreis bezw. Bezirksamt, Amtshauptmannschaft etc. | Zahl der betroffenen Orte | Zahl der Pockenodesfälle |
|---------------------------|------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| | | Uebertrag | 37 | 65 |
| | Doppeln | Beuthen | 1 | 1 |
| | | Rattowitz | 7 | 15 |
| | | Leobschütz | 1 | 2 |
| | | Neustadt | 1 | 1 |
| | Sachsen | Magdeburg | 1 | 7 |
| | | Merseburg | 1 | 1 |
| | Schleswig-Holstein | Schleswig | 1 | 1 |
| | Hannover | Dsnabrück | 1 | 2 |
| | Westfalen | Arnsberg | 1 | 1 |
| | Rheinprovinz | Köln | 1 | 1 |
| Bayern | Oberbayern | Stadt München | 1 | 2 |
| | Niederbayern | Griesbach | 1 | 1 |
| | | Pfarrkirchen | 1 | 1 |
| | | Regen | 1 | 1 |
| | Oberpfalz | Kemnath | 1 | 1 |
| | Mittelfranken | Erlangen | 1 | 1 |
| Sachsen | Baußen | Baußen | 3 | 5 |
| | | Söbäu | 5 | 6 |
| | | Zittau | 3 | 3 |
| | Dresden | Dippoldiswalde | 1 | 1 |
| | | Pirna | 1 | 2 |
| | Leipzig | Döbeln | 1 | 1 |
| | | Grimma | 1 | 1 |
| | | Stadt Leipzig | 1 | 3 |
| | | Rochlitz | 1 | 1 |
| | Zwickau | Muerbach | 1 | 1 |
| | | Annaberg | 1 | 1 |
| | | Zlöbha | 1 | 2 |
| | | Marienberg | 2 | 2 |
| Württemberg | Neckarreis | Stadt Stuttgart | 1 | 2 |
| Baden | Landkommissariat Konstanz | Waldshut | 1 | 1 |
| | | Billingen | 1 | 1 |
| Bremen | | Stadt Bremen | 1 | 1 |
| Hamburg | | Stadt Hamburg*) | 1 | 17 |
| | | Summa . . . | 86 | 155 |

*) Die Pockenodesfälle von Hamburg ereigneten sich theils in dem allgemeinen Krankenhause zu St. Georg, theils in dem neuen allgemeinen Krankenhause zu Eppendorf.

Wenn man die nahe dem Meeresufer gelegenen, durch einen regen Schiffsverkehr mit dem Auslande in besonders naher Beziehung stehenden Stadtbezirke von Bremen, Hamburg, Königsberg und Danzig den Grenzbezirken hinzurechnet, so sind zwei Drittheile sämmtlicher Pockentodesfälle in den Grenzbezirken des Deutschen Reiches vorgekommen. Es entfallen auf

1. die gedachten Seehandelsplätze 24 Pockentodesfälle
2. die unmittelbar an der russischen Grenze gelegenen Kreise 43 „
3. die unmittelbar an der österreichischen Grenze gelegenen Kreise, Bezirksämter bezw. Amtshauptmannschaften 34 „
4. einen hart an der schweizer Grenze gelegenen Ort 1 „

Fernere 8 Todesfälle an den Pocken sind aus den der russischen Grenze nahe gelegenen preussischen Kreisen Darkehmen, Löken, Sensburg, Löbau, Bromberg, Schubin, welche einen lebhaften Verkehr über die Grenze unterhalten, gemeldet. Unter Hinzurechnung dieser letzteren ergibt sich, daß 110 Pockentodesfälle an den Grenzen des Deutschen Reiches und nur 45 im Binnenlande festgestellt worden sind.

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle lagen die von Pockentodesfällen betroffenen Vertlichkeiten der Grenzbezirke unmittelbar an, bezw. sehr nahe der Grenze, so in den Kreisen Lyck, Johannsburg, Goldap, Necko, Landeshut, Lauban, Leobschütz, Rattowitz fast alle, und in den Amtshauptmannschaften Löbau, Bittau, Bauzen, Pirna, Dippoldiswalde, Auerbach die meisten betroffenen Ortlichkeiten.

Wie aus den Meldarten ersichtlich wird, ereignete es sich bisweilen, daß mehrere Pockentodesfälle nicht nur nebeneinander auf einem eng umschränkten Gebiete, sondern auch bald nacheinander innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes sich häuften, so daß auf ein zeitweiliges, epidemisches Herrschen der Pocken in einzelnen Bezirken geschlossen werden darf. Eine bemerkenswerthe Häufung mehrerer Pockentodesfälle fand in folgenden Bezirken statt:

1. In der Stadt Hamburg waren im September ein krank zugereister Musiker, demnächst 2 Angehörige des Dampfschiffes „Buenos Aires“ den Pocken erlegen; vom 1. Oktober bis 25. Dezember starben in Hamburg weitere 13 Personen an den Pocken, von denen 2 nach Inhalt der Meldarten im Krankenhause sich infizirt hatten, 2 andere im Krankenhause befindlich, bezw. beschäftigt gewesen waren.

2. In Salbke, einem ca. 1900 Einwohner zählenden Dorfe des Kreises Wanzleben im preussischen Regierungsbezirk Magdeburg, war am 17. Mai ein 4monatliches Kind den Blattern erlegen; vom 10. Juni bis 6. August starben darauf an demselben Orte und zwar in dem sog. Kupltzer Viertel, in welchem auch das erstverstorbene Kind gewohnt hatte, weitere 6 Personen an den Pocken.

3. Im Dorfe Prawdzisten des preussischen Kreises Lyck, unmittelbar an der russischen Grenze, starben vom 2. bis 27. März 4 Kinder an den Pocken, darunter 2 im ersten Lebensjahr stehende. Ihnen folgten Ende Mai und Anfangs Juli im benachbarten

Orte Burnien desselben Amtsbezirks 2 weitere Kinder des ersten Lebensjahres und ein etwa 50jähriger Losmann.

4. Im Amtsbezirke Gr. Rogallen bei Bialla (in den Ortschaften Skarzinnen und Wlosten) und in dem nahe der russischen Grenze gelegenen Städtchen Bialla selbst (preuß. Kreis Johannisburg) starben vom 27. November bis 31. Dezember 7 Personen an den Pocken. Zuerst war am 27. November ein 1½ Monate altes Kind den Pocken erlegen; ihm folgten während des Monats Dezember 4 Kinder des ersten Lebensjahres und 2 Erwachsene. Ende Mai waren in demselben Amtsbezirke in und bei Gutten 1 zehntonatliches Kind und 2 Schulkinder an den Pocken verstorben.

5. In der Stadt Königsberg in Ostpreußen starben vom 10. Oktober bis 11. Dezember 5 Personen, darunter 2 Schulkinder und ein ungeimpftes Kind von 2 Monaten.

6. Im Dorfe Balenze bei Kattowitz (preuß. Provinz Schlesien), in Kattowitz selbst und in 2 anderen dicht bei Kattowitz nahe der russischen Grenze gelegenen Ortschaften Bogutshüh und Siemianowitz starben vom 12. April bis 18. Juni 9 Personen an den Pocken. Die zuerst Verstorbenen waren 2 Kinder im Alter von 15 Monaten, bezw. 16 Tagen; außerdem war vorher in der nahe gelegenen Grenzstadt Myslowitz desselben Kreises am 21. März ein 4monatliches uneheliches Kind den Pocken erlegen. 4 weitere Todesfälle an den Pocken wurden vom 13. Mai bis 19. Juli aus Gemeinden desselben Kreises gemeldet, es hatten sich sonach im Kreise innerhalb 17 Wochen 14 Todesfälle an den Pocken gehäuft, denen sich nachträglich im Oktober ein gleicher bei einem halbjährigen Kinde angeschlossen.

7. In Müllrose, Kreis Lebus, im preußischen Regierungsbezirke Frankfurt a. D., war am 15. Januar ein 8monatliches Kind an den Pocken verstorben; ihm folgten an demselben Orte vom 19. Januar bis 22. Februar 3 Erwachsene.

8. Im Kreise Glatz der preußischen Provinz Schlesien war am 13. Februar eine 50jährige Tagelöhnerin an den Pocken gestorben; Anfangs März starb an demselben Orte ein dreiwöchentliches Kind und innerhalb weiterer 7 Wochen in 2 benachbarten Gemeinden noch ein Säugling und ein Erwachsener an den Pocken.

9. In dem an Böhmen grenzenden Theile der Amtshauptmannschaft Löbau in Sachsen, sowie in den benachbarten Theilen der Amtshauptmannschaften Zittau und Bautzen traten während der ersten vier Monate des Jahres 12 Pockentodesfälle auf. Diese Ausbreitung der Pocken scheint aus dem Vorjahre zu datiren, da nach dem Jahresberichte des Landes-Medizinalkollegiums des Königreichs Sachsen für das Jahr 1885 bereits damals in den entsprechenden Medizinalbezirken Pockentodesfälle beobachtet waren. Auch in den Kreishauptmannschaften Dresden und Leipzig sind während der ersten vier Monate des Jahres 3 bezw. 6 Todesfälle an den Pocken zur Anzeige gelangt; in der Kreishauptmannschaft Zwickau fielen 3 Todesfälle in das erste Vierteljahr, 3 weitere in die Monate Mai und Juni. Vielfach waren in den sächsischen Bezirken die unmittelbar an der böhmischen Grenze liegenden Orte von Pockentodesfällen betroffen; so ereigneten sich z. B. in der Kreishauptmannschaft Dresden alle 3 Todesfälle in den beiden Grenzgemeinden Sebnitz und Zinnwald.

10. Aus dem etwa 500 Einwohner zählenden Dorfe Babbín im Kreise Byritz der preußischen Provinz Pommern sind 3 Todesfälle an den Pocken innerhalb 1½ Monaten zur Anzeige gelangt. Zuerst starb daselbst ein im ersten Lebensmonate stehendes Kind eines Arbeiters, demnächst die Frau und das halbjährige Kind eines anderen Arbeiters.

Während in den 10 genannten Bezirken und Orten ein zeitliches und räumliches Zusammenfallen mehrerer Pockentodesfälle beobachtet wurde, sind in den weitaus meisten betroffenen Gemeinden des Deutschen Reiches die Pockentodesfälle ganz vereinzelt geblieben. Der eingeschleppte Ansteckungsstoff hat offenbar meistens eine für das Pockengift sehr unempfindliche Bevölkerung vorgefunden, und ist es daher in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle zu einer Ausbreitung der Pocken nicht gekommen, wenigstens sicherlich nicht zu einer nennenswerthen Ausbreitung der bössartigen, zum Tode führenden Pockenkrankheit.

Unter 86 im Jahre 1886 von Pockentodesfällen betroffenen Gemeinden des Deutschen Reiches kam in 54 nur je ein Todesfall an den Pocken vor, so in Berlin, Bremen, Danzig, Thorn, Weisensfels, Zittau und anderen kleineren Ortschaften; in 19 Gemeinden kamen nur je 2 Todesfälle während des ganzen Jahres vor, so in München (1 im Januar, 1 im November), in Stuttgart, Osnabrück, Forst. Je 3 Todesfälle an den Pocken sind in Leipzig, in fünf sehr nahe der östlichen Grenze gelegenen Orten und in Babbín (preuß. Kreis Byritz) festgestellt; je 4 in den zwei bereits erwähnten Ortschaften, dem ostpreußischen Grenzdorfe Prandziskan und in Müllrose (preuß. Kreis Lebus). In Hamburg, Königsberg i. Pr., dem oberchlesischen Dorfe Salenze nahe der Grenze und in Salbke (preuß. Kreis Wanzleben) sind 5 und mehr Pockentodesfälle vorgekommen.

Die Altersverhältnisse und das Geschlecht der 155 innerhalb Jahresfrist an den Pocken verstorbenen Personen sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich:

(Uebersicht A.)

| Es standen im | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.—10. | 11.—15. | 16.—20. | 21.—25. | 26.—30. | 31.—40. | 41.—50. | 51.—60. | 61.—70. | 71.—88. | Lebensjahre |
|---------------|----|----|----|----|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| männl. | 34 | 4 | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 79 |
| weibl. | 27 | 4 | 1 | 1 | — | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 76 |
| zusammen | 61 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | 9 | 10 | 6 | 155 |

Etwa 40% der an den Pocken verstorbenen Personen hatten sonach das erste Lebensjahr noch nicht vollendet, waren, wie anzunehmen ist, zum größten Theile noch nicht geimpft und standen daher auch nicht unter dem Einflusse des durch die Impfung gewährten Schutzes vor tödtlichen Pockenerkrankungen.

Die Meldedarten aus den außerpreußischen Bundesstaaten enthalten vielfach noch Notizen über die Herkunft oder über den Impfstand der verstorbenen Pockenkranken; es sind daher nachstehend die 58 außerhalb Preußens im Deutschen Reiche vorgekommenen Pockentodesfälle unter Berücksichtigung dieser Notizen nach dem Lebensalter der Verstorbenen besonders zusammengestellt.

(Uebersicht B.)

| Es standen im | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.—12. | 13. | 14.—19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26.—30. | 31.—40. | 41.—60. | 61.—80. | Lebensjahre |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | 17 | 2 ^{a)} | 2 ^{b)} | — | 2 ^{c)} | — | 1 ^{d)} | — | 2 ^{e)} | 1 ^{f)} | — | 2 ^{g)} | — | — | 2 | 5 | 16 | 6 | |

Anmerkungen zur Uebersicht B.

- a) 2 noch ungeimpfte Kinder im Alter von 12 Monaten.
- b) 1 aus Böhmen zugereistes Kind eines umherziehenden Erntearbeiters, gestorben in Postmünster im bayerischen Grenzkreise Pfarrkirchen;
1 Kind eines Hamburger Arbeiters.
- c) 1 Kind eines ungarischen Auswanderers, gestorben in Bremen;
1 aus Italien zugereistes Kind eines Modellstehers, gestorben in München.
- d) 1 noch nicht revaccinirtes Kind eines sächsischen Schuhmannes, gestorben in Leipzig.
- e) 1 am Erkrankungstage aus Böhmen zugereister ungeimpfter Maurergeselle, gestorben in Hartmannsdorf;
1 ungeimpfter böhmischer Schlossergeselle, gestorben im Grenzorte Ebersbach. (Infection in Böhmen.)
- f) 1 ungeimpfter böhmischer Schuhmachergeselle, gestorben in Schönfeld, nachdem er kurz vor seiner Erkrankung in einem von den Pocken heimgesuchten Orte Böhmens längere Zeit verweilt hatte.
- g) darunter 1 krank zugereister Musiker, gestorben in Hamburg.

Wie aus vorstehenden, den Meldekarten entnommenen Mittheilungen ersichtlich ist, findet die Thatfache, daß trotz des in Deutschland bestehenden Impf- und Wiederimpfzwanges in den außerpreussischen deutschen Staaten unter 58 Pockentodesfällen 12 auf das Lebensalter vom 2. bis 25. Lebensjahre gefallen sind, zum Theil ihre Erklärung darin, daß die Hälfte dieser 12 Todesfälle ungeimpfte Ausländer betroffen hat, und unter dem Reste 2 noch ungeimpfte Kinder im 13. Lebensmonate sich befunden haben.

Vom vollendeten 13. Lebensmonate bis zum vollendeten 12. Lebensjahre, d. h. in der Periode zwischen Impfung und Wiederimpfung ist an den Pocken nach der Uebersicht B nur ein einziges anscheinend im Deutschen Reiche geborenes Kind gestorben, und zwar ein 2 1/2-jähriges Arbeiterkind in Hamburg, über dessen Herkunft und Impfzustand die Meldekarte keine Angabe enthält. Vom vollendeten 12. bis zum vollendeten 22. Lebensjahre, d. h. innerhalb des auf die Wiederimpfung folgenden Dezenniums starb nach der Uebersicht B von den im Deutschen Reiche geborenen und daselbst wohnhaften Personen nur eine, und zwar ein 12-jähriges Kind, welches noch nicht wiedergeimpft worden war.

Der erhebliche Schutz vor tödtlichen Pockenerkrankungen, den die gesetzliche Impfung und Wiederimpfung für das Lebensalter bis zum 22. Lebensjahre gewähren, tritt in den vorstehenden Zahlen um so auffälliger hervor, wenn man in Erwägung zieht, daß fast die Hälfte aller Lebenden auf diese Altersklasse (von 0—22 Jahren) der Bevölkerung entfällt.

Auf den aus Preußen hierher gelangten 97 Meldekarten fehlen alle weiteren Angaben, aus denen sich die Herkunft oder das Impfverhältniß der Verstorbenen ersehen ließe, eine nähere Erörterung der das jugendliche Alter betreffenden Todesfälle aus Preußen ist daher ausgeschlossen.

Die auf den Meldekarten vorgedruckte Frage, ob der Verstorbene außerhäuslich regelmäßig beschäftigt war u. c., ist verhältnißmäßig so selten beantwortet, daß eine

Zusammenstellung der bezüglichen Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild über den muthmaßlichen Ort der Infektion ergibt; es seien daher nur einzelne bezügliche Mittheilungen erwähnt.

Die Berufsarten der verstorbenen Personen, bezw. bei Frauen und Kindern diejenigen des Haushaltungsvorstandes, waren sehr mannigfaltig. In den gewerbsthätigen Orten des Königreichs Sachsen überwogen die Handwerker, in den ländlichen Bezirken Ostpreußens die Feldarbeiter und Landwirthe, in den beiden oberschlesischen Kreisen Beuthen und Kattowitz bildeten Kinder von Bergwerks- und Hüttenarbeitern die Hälfte aller Verstorbenen. In einigen wenigen Fällen hatte der Beruf die verstorbene Person oder den Haushaltungsvorstand mit anderen Pockenkranken oder deren Provenienzen offenbar in Berührung gebracht. So starb in Stuttgart der um eine Pockenranke beschäftigt gewesene Krankenwärter, welcher 3 Wochen vor seinem Tode eine Schutzimpfung bestimmt abgelehnt hatte; in Salbke starb eine Leichenwäscherin, die sich, wie auf der Meldekarte verzeichnet ist, in Ausübung ihres Berufes infiziert hatte; in Hamburg starb ein Waschhausarbeiter des allgemeinen Krankenhauses, nachdem in letzterem mehrere Pockentodesfälle vorgekommen waren. In anderen Fällen liegt wenigstens die Muthmaßung nahe, daß die berufsmäßige Beschäftigung eine Ansteckung mit infiziertem Material vermittelt habe. So starb in Osnabrück eine in einem Bettfederngeschäft thätige Arbeiterin; in Seidau bei Bautzen starb allein die Frau eines Arbeiters aus einer Papierfabrik. In Königsahl, im preußischen Kreise Altena, hatte die mit dem Sortiren von Lumpen beschäftigte, an den Pocken erkrankte Schwester die Ansteckung der einzigen daselbst verstorbenen Person vermittelt. In einem Falle kann mit Wahrscheinlichkeit die Ansteckung auf den Schulbesuch zurückgeführt werden; das im ostpreußischen Flecken Woytellen verstorbene Kind hatte die Schule im benachbarten Dorfe Gutten besucht, woselbst im selben Monate auch ein Schulkind den Pocken erlag. Endlich sind einige Fälle bemerkenswerth, in denen wahrscheinlich der durch den Beruf bedingte Umgang mit Fremden die Gelegenheit zur Infektion herbeigeführt hatte. In Lauenburg betraf der Pockentodesfall einen Schiffsmann, der auf einem Kahne zwischen dem damals von Pockenfällen heimgeheuchten Hamburg und Lauenburg hin und her fuhr; der einzige Todesfall in Thorn betraf den Sohn des Eigenthümers eines Weichselkahns. Vier Mal sind Gastwirthe oder Angehörige von Gastwirthen an den Pocken verstorben, so in Hamburg ein Gastwirth, im Dorfe Wejeram (Kreis Westhavelland) ein Gasthofbesitzer (einziger Todesfall im ganzen Regierungsbezirke), in Leipzig der Sohn eines Restaurateurs; in Prandziskan, einem Grenzorte des Lycker Kreises, betraf der erste daselbst vorgekommene Pockentodesfall das einjährige Kind einer Gastwirthswittwe.

Ein Vergleich der Pockensterblichkeit im ganzen Deutschen Reiche mit der der benachbarten Gebiete ist zur Zeit nicht möglich, da aus den an Deutschland grenzenden Ländern die Zahlen der Pockentodesfälle vom Jahre 1886 noch nicht bekannt geworden sind; es liegen jedoch aus einer Reihe von größeren Städten des Auslandes summarische Sterblichkeitsnachweise für die Pocken vor, welche einen Vergleich mit der Mortalitätsziffer der Gesamtheit der größeren deutschen Städte gestatten. In der nachstehenden Tabelle sind für mehrere Städtegruppen die absoluten Zahlen der Pockentodesfälle aus

dem Jahre 1886 und die Verhältnißzahlen auf je 100 000 Einwohner zusammengestellt. Die Einwohnerzahlen für das Deutsche Reich und die deutschen Städte von 15 000 und mehr Einwohnern sind auf den 1. Juli 1886 berechnet, die Einwohnerzahl der belgischen und englischen Städtegruppe ist den betreffenden Jahresberichten (Anm. 5 und 6) entnommen, die Einwohnerzahlen für die Städtegruppen Oesterreichs, Ungarns und der Schweiz sind das arithmetische Mittel aus den beim Gesundheitsamte eingegangenen Wochenausweisen.

| An den Pocken starben in | dem Deutschen Reich | 194 Städten des Deutschen Reiches ¹⁾ | 49 Städten Oesterreichs ²⁾ | 12 Städten Ungarns ³⁾ | 15 Städten der Schweiz ⁴⁾ | 71 Städten Belgiens ⁵⁾ | 28 Städten Englands ⁶⁾ |
|--|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| bei einer Einwohnerzahl von | 47 044 882 | 10 019 481 | 2 688 973 | 843 248 | 472 280 | 1 895 857 | 9 093 817 |
| im Jahre 1886 insgesamt | 155 | 39 | 873 | 2047 | 103 | 368 | 70 |
| mithin von je 100 000 Einwohnern | 0,3 | 0,4 | 32,5 | 242,8 | 21,8 | 19,4 | 0,8 |

Wie aus der Tabelle hervorgeht, hatten die in derselben enthaltenen ausländischen Städte-Gruppen sämmtlich eine beträchtlich höhere Pockensterblichkeit als die Städte des Deutschen Reiches und zwar:

| | | |
|-------------------------|-------------|----------|
| die Städte Oesterreichs | das | 81fache, |
| " " | Ungarns | " 607 " |
| " " | der Schweiz | " 54 " |
| " " | Belgiens | " 48 " |
| " " | Englands | " 2 " |

der Pockensterblichkeit der deutschen Städte.

Nächst den letzteren weisen die Städte Englands die geringste Pockensterblichkeit auf. Sie verdanken dies ohne Zweifel dem seit einer Reihe von Jahren in England bestehenden Impfwange für das kindliche Lebensalter. Entsprechend dem Umstande, daß die Impfung der Kinder in England in einem früheren Lebensalter stattfindet als in Deutschland, ist die Sterblichkeit der Säuglinge an den Pocken in England sogar geringer als diejenige in Deutschland.⁷⁾ Wenn trotzdem die Gesamt-Pockensterblichkeit in England eine etwas größere ist als in Deutschland, so ist das dadurch zu erklären, daß eine obligatorische Wiederimpfung, wie sie das deutsche Impfgesetz vorschreibt, in England nicht stattfindet.

¹⁾ Alle Städte mit 15 000 und mehr Einwohnern ausschließlich der großen Vororte von Berlin und Leipzig.

²⁾ Nach den Wochenausweisen der k. k. statistischen Central-Kommission zusammengestellt.

³⁾ Nach den statistischen Nachweisen des statistischen Bureaus zu Budapest.

⁴⁾ Nach den Quartal-Bulletins des eidgenössischen statistischen Bureaus.

⁵⁾ Vergl. *Résumé annuel de statistique démographique et médicale, dressé d'après les documents officiels par le Dr. Janssens, inspecteur en chef du service d'hygiène de la ville de Bruxelles.*

⁶⁾ Vergl. *Annual summary of births, deaths and causes of death in London and other great towns. 1886.*

⁷⁾ Vergl. u. a.: Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 1886, S. 466 ff.

In Oesterreich, Ungarn, in der Schweiz und in Belgien besteht ein allgemeiner gesetzlicher Impfwang überhaupt nicht.

Für einzelne Großstädte des Auslandes sind ferner nach den beim Kaiserlichen Gesundheitsamte eingegangenen Wochen- bezw. Monatsausweisen die Sterblichkeitsziffern an den Pocken für das Jahr 1886 berechnet und mit denjenigen der 22 deutschen Städte über 100 000 Einwohnern in Vergleich gestellt worden. (Von den unten aufgeführten Städten haben nur Zürich und Reims weniger als 100 000 Einwohner.)

Es starben 1886 an den Pocken in:

| | mithin von je 100 000 Einwohnern | | mithin von je 100 000 Einwohnern | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------|---|-------|
| Berlin | 1 | 0,07 | Antwerpen ²⁾ 66 | 31,7 |
| Hamburg | 17 | 3,6 | Brüssel ²⁾ (ohne Vorstädte) 20 | 11,4 |
| Breslau | — | 0 | Budapest 1558 | 368,7 |
| München | 2 | 0,8 | Genua 275 | 153,8 |
| Dresden | — | 0 | Liverpool 29 | 4,9 |
| Leipzig | 3 | 1,7 | London ³⁾ 24 | 0,6 |
| Köln | — | 0 | Marseille ²⁾ 2051 | 545,3 |
| Frankfurt a. M. | — | 0 | Moskau 256 | 34,1 |
| Königsberg | 5 | 3,3 | Odeffa 49 | 25,2 |
| Bremen | 1 | 0,8 | Paris 202 | 9,0 |
| Danzig | 1 | 0,9 | Petersburg 142 | 15,3 |
| Stuttgart ¹⁾ | 2 | 1,7 | Frag 160 | 55,5 |
| | | | Rom ²⁾ 470 | 134,3 |
| | | | Venedig 75 | 51,6 |
| | | | Warschau 139 | 32,2 |
| | | | Wien 204 | 26,2 |
| | | | Zürich 86 | 98,1 |
| | | | Reims ²⁾ 114 | 121,3 |

N a c h t r a g.

In Gemäßheit der Beschlüsse des Bundesraths vom 18. Juni 1885 waren die Meldedarten über Pockentodesfälle im Jahre 1886 dem Kaiserlichen Gesundheitsamte terminmäßig zum 1. März 1887 überhandt worden, so daß die Bearbeitung derselben bereits im Juni 1887 abgeschlossen werden konnte.

Bald nach Beendigung der Arbeit wurde nachträglich ermittelt, daß am 15. Januar 1886

¹⁾ In 10 ferneren Städten des Deutschen Reiches mit mehr als 100 000 Einwohnern kam kein Todesfall an den Pocken vor.

²⁾ Die Zahl der Pockentodesfälle in den mit einer ²⁾ versehenen Städten ist dem *Résumé annuel de statistique démographique et médicale par Dr. Janssens (Bruxelles)* entnommen, bezw. für Rom den 4 *bulletins trimestriels*.

³⁾ Die Zahl der Pockentodesfälle von London ist dem „annual summary of births, deaths and causes of death in London and other great towns (1886)“ entnommen.

auch in Herbst eine Person und zwar ein fünfmonatliches, ungeimpftes Kind an den Pocken gestorben sei.

Die Zahl der Bundesstaaten, in denen Pockentodesfälle während des Jahres 1886 ermittelt worden sind, hat sich dadurch auf 8 erhöht.

Späterhin — Ende Juli 1887 — wurden aus dem Königreiche Preußen noch drei Meldkarten über Pockentodesfälle eingekandt, welche im Juli, September und Dezember 1886 in der Provinz Brandenburg, und zwar zu Potsdam, Slamen (im Kreise Spremberg) und Seifersdorf (im Kreise Sorau) vorgekommen waren.

Die Feststellung der Pocken als Todesursache durch den Medizinalbeamten war hier erst 6 Monate, 10 Monate bezw. 11 $\frac{1}{2}$ Monate nach dem Tode erfolgt. Die Meldkarten betrafen 2 Kinder im Alter von 12 bezw. 14 Monaten und einen 49 jährigen Postillon.

Mitte November 1887 wurden fernere 38 Meldkarten über nachträglich ermittelte Pockentodesfälle in 12 Kreisen des Königreichs Preußen dem Gesundheitsamte überkandt. Zwölf dieser nachträglich eingekandten Meldkarten waren 7 bis 12 Monate, die überwiegende Mehrzahl war erst 12 bis 20 Monate nach Eintritt des betreffenden Todesfalls ausgefertigt.

Diese 38 Meldkarten entsprechen also, ebenjowenig wie die vorher erwähnten 3 den Beschlüssen des Bundesraths, wonach innerhalb acht Tagen nach jedem Todesfall an den Pocken von dem Medizinalbeamten die Meldkarte auszufüllen ist.*) Eine innerhalb so kurzer Frist von dem beamteten Arzte vorzunehmende Kontrolle der standesamtlichen Eintragung der Todesursache ist deswegen vorgeschrieben worden, weil nur eine solche der von Reichswegen eingeführten Statistik die erforderliche Zuverlässigkeit verleiht, während diejenigen Erhebungen über die Todesursache, welche erst monatelang, bezw. ein Jahr und darüber nach dem Tode angestellt werden, Irrthümer bezüglich der Diagnose nicht ausschließen. Unter diesen Umständen erschien es geboten, diese nachträglich gemeldeten Todesfälle auch von den übrigen gesondert zu besprechen, zumal von den 38 zuletzt eingekandten Meldkarten 31 aus denjenigen östlichen Bezirken Preußens herrühren, in denen vorwiegend oder doch größtentheils eine polnisch redende Bevölkerung wohnt, nämlich

- 14 aus zehn kleinen Gemeinden des Kreises Kulm;
- 4 aus dem Kreise Olesko;
- 3 aus dem Kreise Beuthen;
- 8 aus den Kreisen Sensburg, Johannisburg, Schwez, Oppeln;
- 2 aus den Kreisen Heidenburg und Rattowitz.

Da in der polnischen Sprache ein und dasselbe Wort sowohl die Pocken wie andere Ausschlagskrankheiten bezeichnet, so bedarf in Gegenden mit polnisch redender Bevölkerung jede von Nichtärzten beim Standesbeamten gemachte Angabe über Pocken einer besonders sorgfältigen Kritik.

*) Vergl. Beschlüsse des Bundesraths vom 18. Juni 1885 (§ 372 der Protokolle) zu 9, Ziffer 1. Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 1885. II S. 48.

Außer den 31 vorgeannten, in Kreisen nahe der russischen Grenze vorgekommenen Todesfällen sind

3 aus Königsberg i. Pr.
3 aus Neustadt-Magdeburg
und 1 aus Calbe

nachträglich gemeldet. —

Dem Lebensalter nach vertheilen sich die 38 Fälle folgendermaßen:

| | |
|--------------------------------|--|
| 12 Kinder des 1. Lebensjahres, | 1 Person des 26. bis 30. Lebensjahres, |
| 3 " " 2. " " | 7 Personen " 31. " 40. " |
| 4 " " 5. " " | 4 " " 41. " 50. " |
| 4 " " 6. bis 10. Lebensjahres, | 2 " " 51. " 60. " |
| 1 Person " 21. " 25. " | |

Die in Calbe verstorbene Person war eine 37jährige Arbeiterin aus einer Papierfabrik, im Uebrigen bieten in den Nachträgen die Angaben über den Beruf der verstorbenen Person, bezw. des Haushaltungsvorstandes, nichts Bemerkenswerthes; die überwiegende Mehrzahl der Gestorbenen gehört der ländlichen Bevölkerung an.

Von allen 42 nachträglich bekannt gewordenen Pockentodesfällen des Jahres 1886 sind 8 in Städten von 15 000 und mehr Einwohnern vorgekommen, nämlich 3 in Königsberg i. Pr., 3 in Neustadt-Magdeburg, je einer in Potsdam und Zerbst.

Unter Einrechnung der Nachträge würden die am Schlusse des vorstehenden Berichtes gegebenen vergleichenden Tabellen nur unwesentliche Aenderungen erfahren. Sie würden nämlich folgendermaßen lauten:

| An den Pocken starben | im Deutschen Reiche | in 194 Städten des Deutschen Reiches mit mehr als 15 000 Bewohnern |
|---------------------------------------|---------------------|--|
| bei einer Einwohnerzahl von | 47 044 882 | 10 019 481 |
| im Jahre 1886 insgesamt | 197 | 47 |
| mithin von je 100 000 Einwohnern . . | 0,4 | 0,5 |

Es würden hiernach

| | |
|-------------------------|-----------------|
| die Städte Oesterreichs | das 65 fache, |
| " " Ungarns | " 486 " |
| " " der Schweiz | " 44 " |
| " " Belgiens | " 39 " |
| " " Englands | mehr als " 1½ " |

der Pockensterblichkeit der deutschen Städte gehabt haben.

Von den 22 Großstädten des Deutschen Reiches mit mehr als 100 000 Einwohnern sind unter Sinzurechnung der Nachträge nur 9 überhaupt von Pockentodesfällen betroffen gewesen und zwar abweichend von den oben mitgetheilten Zahlen

Königsberg mit 8 oder 5,3 von je 100 000 Einwohnern,
Magdeburg " 3 " 2,1 " " " " "

Die während des Jahres 1886 in mehreren Staaten des Deutschen Reiches
vorgekommenen

Erkrankungen an den Pocken.

Nebst einem Anhange, betr. Pockenerkrankungen im Jahre 1885.

Inhalts-Übersicht.

Vorwort.

- I. Die Pockenerkrankungen des Jahres 1886 im Verhältnisse zu der Bevölkerung der betreffenden Bundesstaaten.
 - II. Die örtliche Verbreitung der Pocken und die gruppenweise aufgetretenen Erkrankungen.
 - III. Die Einschleppungen aus dem Auslande und die Erkrankungen im Deutschen Reiche sich aufhaltender Ausländer.
 - IV. Die Art der Verbreitung der Pocken; der Einfluß des Berufs, der Beschäftigung und der sozialen Stellung.
 - V. Der Impfstoffzustand und die Altersverhältnisse der Erkrankten.
 - VI. Bemerkungen über den Krankheitsverlauf.
- Anhang. Uebersicht derjenigen Pockenerkrankungen des Jahres 1885, über welche Meldefarten aus Gebieten des Deutschen Reiches vorliegen.
- Schlußbemerkungen.

Die im Jahre 1884 auf Veranlassung des Reichskanzlers zu Berlin versammelt gewesene Kommission zur Berathung der Impffrage hat sich bei ihren Verhandlungen über die Vorlage Nr. 9 (Beschlüsse, betreffend die Herstellung einer Pockenstatistik) eingehend mit der Frage beschäftigt, ob die von Reichswegen zu veranstaltende Pockenstatistik auf die Todesfälle zu beschränken oder auch auf die Erkrankungen auszudehnen sei. In ihren unter dem 18. Juni 1885 vom Bundesrath genehmigten Beschlüssen hat sie sich zwar im ersteren Sinne entschieden, es ist jedoch gelegentlich der Verhandlungen mehrfach dem Wunsche Ausdruck gegeben worden, daß wie bisher so auch in Zukunft in den einzelnen Staaten die Pockenerkrankungsstatistik möglichst eingehende Berücksichtigung finden möchte. Unter Bezugnahme auf diese Verhandlungen hat der Reichskanzler am 16. Juli 1885 ein Schreiben an die Bundesregierungen gerichtet, in welchem die Sammlung eines möglichst vollständigen statistischen Materials auch über die Pockenerkrankungen, und die Bearbeitung desselben durch das Kaiserliche Gesundheitsamt in Anregung gebracht wurde. Dem Schreiben war die nachstehend abgedruckte, im Gesundheitsamte entworfene Meldefarte beigelegt, welche eventuell den Erhebungen zu Grunde gelegt werden sollte.

Meldefarte für Erkrankungen an Pocken.

Gemeinde:
Verwaltungsbezirk (Kreis, Bezirksamt u.):
Staat:
Wohnung des Erkrankten (Straße u. Nr.):

1. Vor- und Familienname des Erkrankten:
2. Geschlecht: männlich? weiblich?
3. Alter: geb. den 18..... (wenn der Tag der Geburt nicht bekannt
wie alt?)
4. Geburtsort: Verwaltungsbezirk (Kreis, Bezirksamt u.)
..... für außerhalb des Staates Geborene: Geburtsland:
5. Genaue Bezeichnung des Hauptberufes:
Stellung im Hauptberuf (z. B. selbstständig, Geselle u.)
Ort der Beschäftigung:
6. Für Zugereifte ist anzugeben: wann zugereist?
woher?
7. Datum der Erkrankung:
" " angefangenen ärztlichen Beobachtung:
" " etwaigen Aufnahme in ein Krankenhaus:
in welches?
8. Impfverhältniß: Mit Erfolg geimpft? wann?
a) Sind deutliche Impfnarben vorhanden? wie viele?
b) " undeutliche " " ? wie viele?
Ohne Erfolg geimpft? Durch welche Ermittlung festgestellt?
Revacciniert? in welchem Lebensalter zum letzten Male?
Mit Erfolg? Ohne Erfolg? Durch welche Ermittlung
festgestellt?
Ist der Erkrankte Soldat gewesen? wann?
Ist Patient bereits pockenkrank gewesen? wann?
Sind deutliche Pockennarben vorhanden? wo?
9. Verlauf und Dauer der Krankheit:
Diagnose: diskrete? confluirende? hämorrhagische?
Pocken schwer? leicht?
Wie lange ist Patient krank gewesen?
Sind Nachkrankheiten beobachtet? welche?
Gestorben: wann? wo? (in der Wohnung, im Krankenhaus? u.)
10. Ist Ansteckung nachgewiesen? Wie erfolgte dieselbe?
Wohnort: Datum: den

Unterschrift:
(des behandelnden Arztes).
Vermerk des zuständigen Medizinalbeamten:

Instruktion zur Ausfüllung der vorstehenden Karte.

Die Beantwortung der Fragen geschieht durch Worte bezw. Zahlen auf den vorgeschriebenen Linien.

Zur Ueberschrift, die Wohnung betreffend: Für etwaige weitergehende medizinalpolizeiliche Erhebungen in größeren Orten empfiehlt es sich, die Wohnung im Hause genau zu bezeichnen. V. = Vorderhaus, H. = Hinterhaus, St. = Stockwerk, K. = Keller.

- Zu Frage 5, Absatz 1: Für nicht erwerbsfähige, bezw. nicht selbstständige Personen (Chefrauen ohne eignen Beruf, Kinder u.), ist der Beruf des Haushaltungsvorstandes anzugeben.
- Zu Frage 5, Absatz 3: Die Eintragung über den Ort der Beschäftigung soll ersichtlich machen, ob der Erkrankte regelmäßig außerhäuslich, etwa in einer Fabrik, Werkstatt und dergl. (welcher Art — z. B. Papierfabrik — und wo gelegen?) beschäftigt war, oder ob er eine Schule besuchte und welche?
- Zu Frage 7, Absatz 1: Für die Feststellung des Datums der Erkrankung ist der im Beginn auftretende Schüttelfrost maßgebend. Fehlte derselbe, so ist ersichtlich zu machen, nach welchem Symptome der Beginn der Erkrankung datirt wurde.
- Zu Frage 8: Ueber das Impfverhältniß werden die Angaben, wenn die Aerzte sie durch eigene Untersuchung gewinnen, besonders werthvoll sein. Führt die Untersuchung zu keinem Ergebnisse, dann ist anzugeben, ob die Antworten auf Angaben des Patienten oder der Angehörigen beruhen, oder durch Einsicht in amtliche Bescheinigungen (Impfschein, Revaccinationschein, Impflisten) gewonnen sind.

Es wurde vorgeschlagen, die Karten von den behandelnden Aerzten ausfüllen und von den zuständigen Medizinalbeamten revidiren zu lassen. Ueber nicht ärztlich behandelte Krankheitsfälle wurde anheimgestellt durch den Gemeindevorsteher die Meldkarte ausfüllen, nachträglich aber ebenfalls eine Prüfung, event. Ergänzung und Berichtigung seitens des beamteten Arztes eintreten zu lassen.

In Gemäßheit dieser Anregung erließen eine größere Zahl deutscher Bundesregierungen und der Kaiserliche Statthalter von Elsaß-Lothringen Anordnungen, denen zufolge Meldkarten gleich dem vorgeschlagenen Entwurfe für alle Erkrankungen an den Pocken ausgefüllt, revidirt und alljährlich einmal durch die sammelnde Centralstelle des Landes dem Kaiserlichen Gesundheitsamte zugesandt werden sollten. *)

Von den größeren deutschen Bundesstaaten haben die Regierungen von Preußen und Württemberg es vorläufig abgelehnt, nach den auf der Meldkarte präzisirten Richtungen Feststellungen über sämtliche Pockenerkrankungen eintreten zu lassen. Aus dem Königreiche Bayern steht die Einsendung der Meldkarten zum ersten Male für das Jahr 1887 in Aussicht, da erst gegen Ende des Jahres 1886 die bezügliche bayerische Vorschrift erlassen ist.

I. Die Pockenerkrankungen im Jahre 1886 im Verhältniß zur Bevölkerung der betreffenden Bundesstaaten.

Für das Jahr 1886 sind aus 16 Staaten Meldkarten über alle festgestellten Erkrankungen an den Pocken, bezw. Fehlanzeigen beim Kaiserlichen Gesundheitsamte eingelaufen. Abgesehen von Preußen, Bayern und Württemberg haben sich an der Statistik noch nicht betheiliget: Hessen, Oldenburg, Braunschweig, die beiden Fürstenthümer Neuz und die freien Städte Lübeck und Hamburg. In einzelnen der letztgenannten Staaten sind jedoch, wie aus anderweitigen Mittheilungen hervorgeht, Erkrankungsfälle an den Pocken während des ganzen Jahres nicht vorgekommen. Insbesondere haben sich im Großherzogthum Oldenburg nach einem Begleit Schreiben des Großherzoglichen Staatsministeriums zur Impfübersicht des Jahres 1886 Menschen-

*) Vgl. Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 1885 II. S. 173, 243. — 1886 S. 11, 54, 96, 176, 268, 348, 588. — 1887. S. 113, 134, 146.

pocken während dieses Jahres nirgends gezeigt. Das Fürstenthum Neuß ä. L. war ebenfalls frei von Pocken, denn die allmonatlich beim Kaiserlichen Gesundheitsamte eingehenden Erkrankungsnachweise aus den Pfyffikatsbezirken Greiz, Zeulenroda und Burgf haben im Jahre 1886 keinen Pockenfall aufgeführt.

In dem Großherzogthum Hessen sind zufolge einer dem Gesundheitsamte zugegangenen Mittheilung nur 4 blatternverdächtige Erkrankungen während des Jahres 1886 zur Kenntniß der Medizinalbehörden gelangt. Die gegen Blattern vorge schriebenen sanitätspolizeilichen Maßnahmen, wie Isolirung der Kranken, Impfung der Hausbewohner, sind allerdings auch in diesen Fällen vorsorglich zur Anwendung gekommen, indessen war die Diagnose variola nicht in dem Maße gesichert, daß Meldarten ausgestellt werden konnten. Aus dem Fürstenthum Neuß j. L. ist f. Z. dem Reichsamte des Innern mitgetheilt worden, daß daselbst im Jahre 1886 kein Todesfall an den Pocken, aber 3 Erkrankungen in Folge der sogenannten Spitzblattern vorgekommen sind. Da man unter dem Namen Spitzblattern oder Varicellen eine von den eigentlichen Pocken durchaus zu trennende Kinderkrankheit versteht, so ist nach dieser Mittheilung auch Neuß j. L. im Jahre 1886 von den Pocken verschont geblieben.

Nach Inhalt besonderer Fehlanzeigen ist ferner kein Erkrankungsfall an den Pocken vorgekommen in den Großherzogthümern Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, den Herzogthümern Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha und den Fürstenthümern Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, Schaumburg-Lippe und Lippe. Aus Sachsen, Baden, Sachsen-Meiningen, Anhalt, Bremen und aus Elsaß-Lothringen sind 202 Meldarten über Pockenerkrankungen eingegangen.

Die Einwohnerzahl der hiernach für die Pockenerkrankungstatistik in Betracht kommenden 20 deutschen Bundesstaaten (einschließlich der Großherzogthümer Hessen und Oldenburg und beider Fürstenthümer Neuß) belief sich am 1. Dezember 1885 auf 10 163 120 Ortsanwesende, es entfielen also auf je 100 000 Einwohner nicht ganz 2 Pockenerkrankungen.

Diese Ziffer gestaltet sich noch günstiger, wenn man die 25 Ausländer, welche im Jahre 1886 in den vorgenannten Staaten des Deutschen Reiches von den Pocken befallen wurden, in Abzug bringt.

Nach einem mittlerweile anderweit veröffentlichten amtlichen Ausweise sind im Königreiche Bayern unter dessen 5 420 199 Einwohnern im Berichtsjahre 55 Pockenerkrankungen vorgekommen. (Amtsblatt des Königl. Bayerischen Staatsministerium des Innern 1887 S. 114.) Rechnet man diese 55 Erkrankungen hinzu, so fehlen Nachrichten über die Zahl der im Jahr 1886 innerhalb des Deutschen Reiches vorgekommenen Pockenerkrankungen nur noch aus Preußen, Württemberg, Braunschweig, Lübeck und Hamburg.

In den übrigen 21 deutschen Bundesstaaten sind einschließlich der Ausländer während des Jahres 1886 insgesammt 257 Personen von 15 583 319 Einwohnern an den Pocken erkrankt gewesen oder 1,6 von je 100 000 Bewohnern.

Von diesen 257 Pockenfällen endeten in Bayern 7, in den anderen Staaten nach Inhalt der Meldarten 33 tödtlich, was einer Sterblichkeit an Pocken von weniger als 0,3 auf 100 000 Einwohner entspricht. Da diese für 21 deutsche Staaten gewonnene

Verhältnißzahl der anderweitig für das ganze Deutsche Reich ermittelten, bezüglichen Sterbeziffer*) etwa gleichkommt, so läßt sich im Rückschlusse auf die Erkrankungsstatistik mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß, wie durchschnittlich in den genannten 21 Staaten, so auch im ganzen Deutschen Reiche während des Jahres 1886 nur 1,6 oder etwa 2 Pockenfälle unter je 100 000 Einwohnern sich ereignet haben.

Die Vertheilung der Pockenerkrankungen, über welche Meldedarten eingegangen sind, auf die einzelnen Staaten und deren Verwaltungsbezirke ergibt sich aus nachstehender Uebersicht:

Die räumliche Vertheilung der 202 Pockenerkrankungen, über welche Meldedarten vorliegen, auf die Verwaltungsbezirke (einschließl. 25 Erkrankungen von Ausländern).

| S t a a t | Regierungsbezirk | Amtshauptmannschaft zc. | Z a h l d e r | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------|---|
| | | | betroffenen Dörfschaften | Erkrankten | Gestorbenen | |
| Königreich Sachsen | Bauzen | Bauzen | 6 | 30 | 5 | |
| | | Kamenz | 2 | 2 | — | |
| | | Löbau | 12 | 42 | 6 | |
| | | Zittau | 5 | 11 | 3 | |
| | | Dresden | Stadt Dresden | 1 | 11 | — |
| | Dresden | Dippoldiswalde | 5 | 11 | 1 | |
| | | Freiberg | 1 | 8 | — | |
| | | Pirna | 3 | 7 | 2 | |
| | | Leipzig | Stadt Leipzig | 1 | 4 | 3 |
| | | Borna | 1 | 1 | — | |
| | Zwickau | Doebeln | 1 | 4 | 1 | |
| | | Grimma | 3 | 13 | 1 | |
| | | Landbezirk Leipzig | 1 | 1 | — | |
| | | Nischwitz | 1 | 2 | — | |
| | | Rochlitz | 1 | 1 | 1 | |
| | | Stadt Chemnitz | 1 | 4 | — | |
| | | Auerbach | 1 | 2 | 1 | |
| | | Annaberg | 3 | 3 | 1 | |
| | | Landbezirk Chemnitz | 1 | 1 | — | |
| | | Floeha | 1 | 5 | 2 | |
| | | Glauchau | 1 | 1 | — | |
| | | Marienberg | 4 | 5 | 2 | |
| | | Zwickau | 3 | 6 | — | |
| Summe | | | 59 | 175 | 29 | |
| Großherzogthum Baden | Kreis Konstanz | Bez.-Amt Ueberlingen | 1 | 1 | — | |
| | " Billingen | " " Eriberg | 1 | 5 | 1 | |
| | " Waldshut | " " Waldshut | 1 | 1 | 1 | |
| | " Freiburg | " " Freiburg | 1 | 1 | — | |
| | " Mannheim | " " Mannheim | 1 | 1 | — | |
| | " Karlsruhe | " " Pforzheim | 1 | 1 | — | |
| | Summe | | | 6 | 10 | 2 |

*) Vgl. Abschnitt 2 dieser Denkschrift.

| S t a a t | Regierungsbezirk | Amtshauptmannschaft zc. | Z a h l d e r | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|------------|-------------|
| | | | betroffenen Ortschaften | Erkrankten | Gestorbenen |
| Herzogth Sachsen-Meir. | | Kreis Sonneberg | 1 | 1 | — |
| | | Summe | 1 | 1 | — |
| Herzogthum Anhalt | | Kreis Zerbst | 1 | 4 | 1 |
| | | Summe | 1 | 4 | 1 |
| Freie Stadt Bremen | | Stadtbezirk Bremen | 1 | 5 | 1 |
| | | Summe | 1 | 5 | 1 |
| Reichslande Elsaß-Loth- ringen | Ober-Elsaß | Kreis Altkirch | 3 | 4 | — |
| | | „ Mühlhausen | 1 | 1 | — |
| | Unter-Elsaß Lothringen | „ Zabern | 1 | 1 | — |
| | | Stadt Metz | 1 | 1 | — |
| | Summe | | 6 | 7 | — |
| Gesamt-Summe: | | 36 Verw.-Bezirke (dar- unter 5 Stadtbezirke) | 74 | 202 | 33 |

Von den 202 Pockenerkrankungen (einschl. 25 Erkrankungen von Ausländern, welche meist innerhalb Jahresfrist zugereist waren) entfallen nach der Uebersicht 175 auf das Königreich Sachsen, dessen Bevölkerung am 1. Dezember 1885 sich auf 3 182 003 Köpfe belief, es sind somit in Sachsen 5,5 Personen von je 100 000 Einwohnern an den Pocken erkrankt. Die entsprechenden Verhältnisziffern sind für

| | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|
| Baden | 0,6 | auf je 100 000 Einw. |
| Sachsen-Meiningen | 0,5 | „ „ „ „ |
| Anhalt | 1,6 | „ „ „ „ |
| Bremen | 3,0 | „ „ „ „ |
| Elsaß-Lothringen | 0,4 | „ „ „ „ |

Die relativ hohe Erkrankungsziffer an den Pocken im Königreiche Sachsen findet zum Theil darin ihre Erklärung, daß aus dem benachbarten Auslande, dem von den Pocken stark heimgesuchten Böhmen, der Infektionsstoff zu wiederholten Malen in das Land eingeschleppt worden ist. Indessen kann dieser Umstand nicht allein als maßgebend angesehen werden.

Auch in Baden und in Elsaß-Lothringen haben Einschleppungen der Krankheit aus dem Auslande vielfach stattgefunden; während aber in diesen Staaten nur an je einem Orte weitere Pockenerkrankungen sich angeschlossen, haben im Königreiche Sachsen die eingeschleppten Fälle verhältnismäßig häufig zu Gruppen von Pockenerkrankungen unter der im Lande anjässigen Bevölkerung geführt.

Mit Bezug hierauf verdient die Thatfache bemerkt zu werden, daß in Sachsen alljährlich eine verhältnismäßig große Zahl impfpflichtiger Kinder ungeimpft bleibt, theils weil vorschriftswidrig der Impfung entzogen, theils auf Grund ärztlicher Atteste, theils weil die Kinder am Orte nicht aufzufinden waren. Die betreffenden Zahlen sind in der nachstehenden Tabelle aus den dem Kaiserlichen Gesundheitsamte zugegangenen Uebersichten der Ergebnisse des Impfgeschäfts im Deutschen Reiche—sowohl für Sachsen

als auch für einige andere Bundesstaaten ersichtlich gemacht und mit der Pocken-
erkrankungs- bezw. Sterblichkeitsziffer des Jahres 1886 zusammengestellt:

| Staat und Bevölkerungszahl | Prozentzahl der in den Jahren 1877—1882 1883—1885 durchschnittlich jährlich ungeimpft gebliebenen Zunpfspflichtigen (Erstimpflinge) | | Pocken- erkrankungsziffer d. J. 1886 auf 100 000 Einwohner berechnet | Pocken- sterblichkeitsziffer d. J. 1886 auf 100 000 Einwohner berechnet |
|--|---|-------|---|--|
| | | | | |
| Preußen (28 318 470) | 10,09 | 9,77 | . | 0,3—0,5 |
| Bayern (5 420 199) | 4,27 | 4,64 | 1,0 | 0,1 |
| Sachsen (3 182 003) | 20,86 | 19,44 | 5,5 | 0,9 |
| Württemberg (1 995 185) | 13,77 | 15,64 | . | 0,1 |
| Baden (1 601 255) | 5,71 | 6,28 | 0,6 | 0,1 |
| Bremen (165 628) | 20,92 | 25,63 | 3,0 | 0,6 |
| Hamburg (518 620) | 27,08 | 20,70 | . | 3,3 |
| Elfaß-Lothringen (1 564 355) | 8,99 | 7,20 | 0,4 | — |

Wenn nun auch die Mehrzahl der nach der Tabelle ungeimpft gebliebenen Kinder in einem der nächsten Jahre nachträglich geimpft worden ist, so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß Hinterziehungen um so häufiger vorgekommen sein werden, je größer die Zahl der im Laufe der einzelnen Jahre ungeimpft gebliebenen Zunpfspflichtigen war. Jedenfalls läßt sich bei einem Vergleiche der beiden ersten mit den beiden letzten Spalten der Uebersicht eine gewisse Uebereinstimmung zwischen Zunpfszustand und Pocken in dem Sinne nicht verkennen, daß diejenigen Staaten am wenigsten von den Pocken zu leiden gehabt haben, in welchen die Zunpfung am besten durchgeführt wird.

Was die Stellung Württembergs in der Tabelle betrifft, so hat dieser Staat den nicht zu unterschätzenden Vorzug, weder wie Sachsen an das von den Pocken heimge-
suchte Ausland zu grenzen, noch wie Hamburg und Bremen durch den Seeverkehr mit ausländischen Staaten in naher Verbindung zu stehen. Die Gefahr einer Einschleppung der Seuche war daher für Württemberg eine wesentlich geringere als für die anderen in der Tabelle genannten Bundesstaaten.

Zur Erklärung der relativ niedrigen Pockensterblichkeit in Bayern, Württemberg und Baden gegenüber Sachsen und Hamburg ist noch ein weiterer Umstand anzuführen. In den erstgenannten drei süddeutschen Staaten wurde bereits im Anfange dieses Jahr-
hunderts, nämlich 1807, bezw. 1818 und 1815, die einmalige Zunpfung aller Kinder im frühen Lebensalter vorgeschrieben und durch Androhung von Geldstrafen durchzu-
führen versucht, im Königreich Sachsen hatte dagegen bis zum Jahre 1874 nur eine gütliche Einwirkung der Kreisärzte auf das Publikum zu Gunsten der Zunpfung statt-
gehabt, neben welcher keinerlei direkte oder indirekte Zwangsmaßregeln gehandhabt waren. In Hamburg hatten gesetzliche Bestimmungen über Zunpfung und Wiederzunpfung bis zum Jahre 1871 gar nicht bestanden.*)

*) Vgl. u. a. Beilage 30 zu Band VI des Sanitätsberichts über die deutschen Heere im Kriege gegen Frankreich 1870/71. S. 122. 124.

II. Die örtliche Verbreitung der Pocken und die gruppenweise aufgetretenen Erkrankungen.

Nach den eingegangenen Meldedaten vertheilen sich die 202 Erkrankungen auf 74 verschiedene Ortschaften, darunter 59 im Königreich Sachsen, 6 im Großherzogthum Baden, 6 in Elsaß-Lothringen und je 1 in Sachsen-Meiningen, Anhalt und Bremen. Das Nähere ergibt sich aus nachstehender Uebersicht, in welcher die nicht zum Königreich Sachsen gehörigen Orte durch anderen Druck hervorgehoben sind:

| Es erkrankten an den Pocken | | in Ganzen |
|-----------------------------|--|--------------|
| je 11 Personen an | 2 Orten: Dresden und Neusalza | 22 |
| 9 " " | 1 Orte: Grimma | 9 |
| je 8 " " | 3 Orten: Wehrsdorf, Sohland, Brand | 24 |
| 7 " " | 1 Orte: Bauzen | 7 |
| 6 " " | 1 Orte: Dürhenersdorf | 6 |
| je 5 " " | 4 Orten: Bremen, Triberg, Dittersdorf, Sebnitz | 20 |
| je 4 " " | 10 Orten: Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Zittau, Meinitz, Zerbst, Spremberg, Taubenheim, Dypach, Ripsdorf | 40 |
| je 3 " " | 6 Orten: Seidau, Schellerhau, Oberneufkirch, Oberfriedersdorf, Oberweigsdorf, Weiersdorf | 18 |
| je 2 " " | 10 Orten: Löbau, Cunewalde, Ebersbach, Hainewalde, Klingenthal, Neu-Schönberg, Pockau, Cornzig, Zinnwald, Jung-Münsterol | 20 |
| je 1 Person | 36 Orten: 25 im Königreich Sachsen ¹⁾ , 5 in Baden ²⁾ , 5 in Elsaß-Lothringen ³⁾ , 1 in Sachsen-Meiningen ⁴⁾ | 36 |

Wie die Uebersicht zeigt, ist in etwa der Hälfte der von den Pocken betroffenen Gemeinden nur ein einziger Erkrankungsfall während des ganzen Jahres konstatiert, das eingeschleppte Pockenvirus hat demnach eine anscheinend sehr wenig empfängliche Bevölkerung vorgefunden.

Die wenigen zur amtlichen Kenntniß gelangten Fälle, in denen 3 und mehr Pockenerkrankungen in Abhängigkeit von einander oder in rascher zeitlicher Folge an benachbarten Stellen sich häuften, sind nachstehend zusammengestellt. Da es von Interesse ist, den Impfzustand der in diesen kleinen Epidemien zuerst Erkrankten zu kennen, so ist derselbe in die Uebersichten mit eingetragen.

- 1) in der Kreishauptmannschaft Bauzen:
Weißa, Kamenz, Oberlichtenau, Lauba, Niederfriedersdorf, Großschönuau, Waltersdorf;
in der Kreishauptmannschaft Dresden:
Dippoldiswalde, Baerenfels, Neustadt (Amtsh. Pirna), Krippen;
in der Kreishauptmannschaft Leipzig:
Borna, Reunitz, Reudnitz, Hartmannsdorf;
in der Kreishauptmannschaft Zwickau:
Buchholz, Ehrenfriedersdorf, Schönfeld, Kappel, Gersdorf, Marienberg, Mauersberg, Lauta, Werdau, Weißbach.
- 2) Mannheim, Freiburg, Pforzheim, Rheinheim, Ueberlingen.
3) Altkirch, Lühel, Dornach, Babern, Mez.
4) Judenbach (bei Sonneberg).

A. 13 Erkrankungen in Grimma und Meinitz (Amtsh. Grimma).

| Nr. | Datum der Erkrankung | Alter in Jahren | Beruf u. der Erkrankten | Impfzustand | Bemerkungen |
|-----|----------------------|-----------------|---|----------------------------|---|
| 1 | Dez. 1885 | 3/4 | Brauereiskind in Grimma | ungeimpft | † am 1. Januar |
| 2 | 10./1. 1886 | 32 | Buchhalter der Brauerei in Grimma | als Kind geimpft | arbeitete mit dem Vater von Nr. 1 zusammen |
| 3 | 16./1. | 35 | Maurergefelle in Grimma | do. | Hatte im Hause des Brauers den Ofen gefehrt. Ansteckung von Nr. 1 |
| 4 | 9./2. | 3/4 | Kind von Nr. 3 | ungeimpft | |
| 5 | 19./1. | 1 | Kind eines Kohlenarbeiters in Grimma | ungeimpft | |
| 6 | 3./2. | 25 | Kohlenarbeiter, Vater von Nr. 5 | angeblich als Kind geimpft | |
| 7 | 10./2. | 33 | Barbiersfrau in Grimma | do. | Ansteckung von Nr. 6 durch Vermittlung ihres Ehegatten |
| 8 | 18./2. | 68 | Wittwe in Grimma | als Kind geimpft | Ansteckung von Nr. 6 |
| 9 | 21./2. | 7 | Schulknabe in Grimma | do. | zog als Bettelkind von Haus zu Haus |
| 10 | 5./3. | 35 | Handarbeiter in Meinitz | do. | Ansteckung in Grimma |
| 11 | 12./3. | 1/4 | Kind von Nr. 10 | ungeimpft | |
| 12 | 10./3. | 11/12 | Kind in Meinitz, wohnte 3 Häuser von Nr. 10 | ungeimpft | Ansteckung von Nr. 10, † 21./3 |
| 13 | 17./3. | 26 | Zimmermannsfrau in Meinitz | als Kind geimpft | wohnte nachbarlich mit Nr. 10 |

B. 7 Erkrankungen in Wehrsdorf (Amtsh. Baugen).

| | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------------------|---|--|
| 1 | 5./2. | 45 | Pferdefnecht | ungeimpft | Ansteckung in Böhmen, † 10./2 |
| 2 | 19./2. | 1/4 | uneheliches Kind von Nr. 1 | 7 Tage vor Ausbruch des Exanthems geimpft | Ansteckung vom Vater |
| 3 | etwa 9./2. | 11/12 | Kind des Gemeindevorstehers | ungeimpft | † 15./2 |
| 4 | 8./2. | 8 | Schulkind, Weberstochter | geimpft | leicht erkrankt |
| 5 | 21./2. | 32 | Webersfrau | als Kind geimpft | Mutter von Nr. 4 |
| 6 | 22./2. | 8/12 | Weberskind | ungeimpft | Ansteckung durch die Mutter von Nr. 2 |
| 7 | 14./3. | 31 | Tochter eines Hausbesizers | als Kind geimpft | Im Hause des Vaters hatte Nr. 1 podenkrank gelegen |

C. 5 Erkrankungen in Dittersdorf (Amtsh. Flöha).

| | | | | | |
|---|--------|-------|--|------------------|-------------------------------|
| 1 | 25./4. | 5/12 | Kind eines Händlers | ungeimpft | † 5./5 |
| 2 | 27./4. | 28 | Bäckersfrau in demselben Hause wie Nr. 1 wohnend | ? | leicht erkrankt |
| 3 | 3./5. | 10/12 | Kind von Nr. 2 | ungeimpft | |
| 4 | 19./5. | 6/12 | Kind aus dem Nachbarhause | ungeimpft | † 6./6 |
| 5 | 14./6. | 58 | Hausirerin | als Kind geimpft | Ansteckung im Hause von Nr. 4 |

D. 5 Erkrankungen im Grenzdorfe Sebnitz (Amtsh. Pirna).
(Anscheinend auf vier verschiedene Einschleppungen zurückzuführen.)

| Nr. | Datum der Erkrankung | Alter in Jahren | Beruf u. der Erkrankten | Impfzustand | Bemerkungen |
|-----|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--|
| 1 | 3./1. | 17 | Schreiftöcherin | ungeimpft | Ansteckung in ihrer Heimath Böhmen |
| 2 | 24./1. | 59 | Weber | ungeimpft | † 8./2.; Ansteckung durch eine Böhmin |
| 3 | 9./2. | 5/4 | Enkelkind von Nr. 2 | ungeimpft | |
| 4 | 21./3. | 1 | Kind eines Blumenmachers | ungeimpft | † 1./4.; Ansteckung durch Verwandte aus Böhmen |
| 5 | 23./3. | 22 | Böhmischer Korbmacher | als Kind geimpft | (Zahl der Impfnarben nicht vermerkt) |

E. 9 untereinander in Zusammenhang stehende Erkrankungen in der Amtsh. Dippoldiswalde (zu Ripsdorf, Schellerhau, Baerenfels und Dippoldiswalde).

| | | | | | |
|---|--------|------|---|------------------|---|
| 1 | 16./4. | 38 | Frau des Gemeindevorsethers in Ripsdorf | als Kind geimpft | |
| 2 | 1./5. | 1/12 | Kind von Nr. 1 | ungeimpft | |
| 3 | 2./5. | 34 | Damenschneiderin, Schwägerin von Nr. 1 | als Kind geimpft | hatte Nr. 1 gepflegt |
| 4 | 14./5. | 46 | Schwager von Nr. 1 | do. | |
| 5 | 7./5. | 29 | Mädchen in Schellerhau | do. | hatte Nr. 3 besucht |
| 6 | 13./5. | 63 | Handarbeiter in Dippoldiswalde | do. | hatte die unter Nr. 1—4 erwähnten Kranken besucht |
| 7 | 6./6. | 42 | Schwester von Nr. 5 in Baerenfels | do. | hatte ihre pockenranke Schwester besucht |
| 8 | 10./6. | 40 | Bruder von Nr. 5 in Schellerhau | do. | |
| 9 | 26./6. | 32 | Gattin von Nr. 8 | ungeimpft | hatte ihren pockenranken Gatten gepflegt |

F. 5 Erkrankungen in einem Hause zu Neusalza (Amtsh. Leobau).

| | | | | | |
|---|--------|-------|------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 10./6. | 51 | Lumpenhändlerin | als Kind geimpft | kaufte Lumpen aus pockenverseuchten Orten Böhmens } wohnten in einem Hause mit Nr. 1 |
| 2 | 21./6. | 5/12 | Enkelkind von Nr. 1 | ungeimpft | |
| 3 | 21./6. | 28 | Tochter von Nr. 1 | als Kind geimpft | |
| 4 | 23./6. | 1 1/2 | Kind von Nr. 3 | 4 Tage vor der Erkrankung geimpft | |
| 5 | 21./6. | 36 | Hausgenossin von Nr. 1 | als Kind geimpft | |

G. 5 Erkrankungen aus einer Papierfabrik bei Baugen (Seidau*).

| | | | | | |
|---|--------|----|--|-----------------------------|---|
| 1 | 1./4. | 27 | Fabrikarbeiterin der Baugener Papierfabrik | vor 16 Jahren wiedergeimpft | war mit dem Sortiren von Lumpen beschäftigt gewesen (leicht erkrankt) |
| 2 | 6./4. | 7 | Kind des Kassirers der Baugener Papierfabrik | vor 4 Jahren geimpft | hatte nur undeutliche Impfnarben |
| 3 | 9./4. | 2 | Kind, Schwester von Nr. 2 | ungeimpft | |
| 4 | 14./4. | 34 | Fabrikarbeiterin (Lumpensortirerin) | ? | † 27./4 |
| 5 | 18./4. | 41 | Lumpensortirerin in der Papierfabrik | als Kind geimpft | schwer erkrankt |

*) Die Erkrankungen Nr. 1, 4, 5 sind aus Seidau, Nr. 2 und 3 aus Baugen gemeldet.

H. 6 Erkrankungen im Armenhause zu Dürhennersdorf (Amtsh. Voebau)
(im Zeitraum von 23 Tagen).

| Nr. | Datum der Erkrankung | Alter in Jahren | Beruf u. der Erkrankten | Impfzustand | Bemerkungen |
|-----|----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 1./1. | 44 | haufirender Weber | als Kind geimpft | } wohnten alle im Armenhause |
| 2 | 15./1. | 11 | Kind von Nr. 1 | vor 10 Jahren geimpft | |
| 3 | 20./1. | 39 | Webersfrau, Gattin von Nr. 1 | als Kind geimpft | |
| 4 | 21./1. | 27 | Webersfrau | do. | |
| 5 | 23./1. | 47 | Weber | hatte als Kind geblattert | |
| 6 | 23./1. | 62 | Wittwe | als Kind geimpft | |

J. 5 Erkrankungen im Krankenhaus zu Triberg (Großh. Baden).

| | | | | | |
|---|--------|----|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 7./2. | 35 | französischer Holzhändler | angeblich als Kind geimpft | } vom 10. bis 17. Februar im Krankenhaus zu Triberg |
| 2 | 13./4. | 31 | Geistesranke, seit 11./1. im Krankenhaus | do. | |
| 3 | 30./4. | 74 | Hautranke, seit 4./1. im Krankenhaus | 3 Tage vor der Erkrankung geimpft | } waren längere Zeit vor der Erkrankung Insassen des Krankenhauses zu Triberg |
| 4 | 16./5. | 63 | Pfiründerin | 4 Tage vor der Erkrankung geimpft | |
| 5 | 16./5. | 38 | Geistesranke | do. | |

K. 4 Erkrankungen in Bremen (Infektion in einer Herberge).

| | | | | | |
|---|--------|----|--------------------|----------------------------|--|
| 1 | 7./3. | 26 | Schuhmachergefelle | angeblich als Kind geimpft | wohnte Seemannsstraße 1 in einer Herberge; war eben von der Wanderschaft heimgekehrt |
| 2 | 18./3. | 28 | Schuhmachergefelle | do. | war in der Herberge mit Nr. 1 zusammen gewesen |
| 3 | 23./3. | 20 | Schuhmachergehülfe | do. | wohnte einige Tage vor der Erkrankung in der Seemannsstraße 1 |
| 4 | 29./3. | 23 | Schmiedegefelle | do. | wohnte Seemannsstraße 1 |

L. 4 Erkrankungen in einer Familie zu Zerbst.

| | | | | | |
|---|--------|------|------------------|------------------|---|
| 1 | 2./1. | 36 | Arbeitersfrau | als Kind geimpft | Ansteckung von der pockenkranken Mutter (vgl. Anhang) |
| 2 | 7./1. | 26 | Arbeitersfrau | do. | Ansteckung von der pockenkranken Mutter |
| 3 | 8./1. | 39 | Bruder von Nr. 2 | do. | |
| 4 | 12./1. | 5/12 | Kind von Nr. 2 | ungeimpft | † 15./1. |

M. 15 Erkrankungen in fünf nahe der böhmischen Grenze gelegenen Ortschaften der königlich sächsischen Amtshauptmannschaft Löbau.

| Nr. | Datum der Erkrankung | Alter in Jahren | Beruf u. der Erkrankten | Impfzustand | Bemerkungen |
|-----|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 3./1. | 5/4 | Weberskind in Taubenheim | ohne Erfolg geimpft | wohnten in einem und demselben Hause |
| 2 | 13./1. | 9 | Weberskind | geimpft | |
| 3 | 16./1. | 30 | Webersfrau | 3 Tage vor der Erkrankung wiedergeimpft | |
| 4 | Anfangs Januar | 37 | Webersfrau in Taubenheim | angeblich als Kind geimpft | Injektion datirt aus dem Vorjahre von einem pockenkranken Kinde |
| 5 | 16./1. | 45 | Steinschläger in Eumwalde | do. | war in Taubenheim beschäftigt und hatte sich dort angesteckt |
| 6 | 23./1. | 25 | Stieftochter von Nr. 5 | als Kind geimpft | wohnte bei Nr. 5 |
| 7 | ? | 46 | Handarbeiterfrau im nahen Spremberg | ? | † 1./1. |
| 8 | 3./1. | 24 | Schwiegerjohn von Nr. 7 | angeblich als Kind geimpft | wohnte bei Nr. 7 |
| 9 | 10./1. | 4/12 | Schuhmacherskind in Neusalza | ungeimpft | † 20./1. |
| 10 | 31./1. | 19 | Fabrikarbeiter in Neusalza | nur als Kind geimpft | wohnte 3 Häuser von Nr. 9 entfernt |
| 11 | 21./1. | 9/12 | Leineweberskind in Lauba | ungeimpft | † 30./1. |
| 12 | 29./1. | 40 | Müller in Oppach | als Kind geimpft | war von einem Arzte aus dem pockenverseuchten Zugau an Gift behandelt worden |
| 13 | Ende Jan. | 28 | Weber in Oppach | do. | |
| 14 | 17./2. | 9/12 | Nichte von Nr. 13 | ungeimpft | wohnte mit Nr. 13 in einer Stube |
| 15 | 25./2. | 80 | Wittwe in Oppach | angeblich als Kind geimpft | |

Die vorstehenden Zusammenstellungen zeigen u. a. deutlich, daß in den zur Beobachtung gekommenen kleinen Epidemien ungeimpfte bezw. durch die Impfung nicht mehr genügend geschützte Personen in der Regel den Ausgangspunkt abgegeben haben. Noch übersichtlicher tritt das hervor, wenn man, wie es nachstehend geschehen ist, das Alter und den Impfzustand des in jeder Gruppe zuerst Erkrankten ins Auge faßt.

Alter und Impfzustand der in jeder Gruppe zuerst erkrankten Personen.

| | G r u p p e | | | | | | | | | | | | M |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | | |
| Alter (in Jahren) | 3/4 | 45 | 5/12 | 17 | 38 | 51 | 27 | 44 | 35 | 26 | 36 | Nicht erheblich, wer zuerst erkrankt ist | |
| Impfzustand | ungeimpft | ungeimpft | ungeimpft | ungeimpft | als Kind geimpft | als Kind geimpft | wiedergeimpft | als Kind geimpft | angeblich als Kind geimpft | angeblich als Kind geimpft | als Kind geimpft | | |

Nur einmal hat demnach die erste Erkrankung eine wiedergeimpfte Person betroffen, und auch in diesem Falle waren bereits 16 Jahre seit der Wiederimpfung verfloßen.

III. Die Einschleppung der Pocken aus dem Auslande und die Erkrankungen von Ausländern im Deutschen Reiche.


Wie aus den Meldedarten ersichtlich ist, hat eine Einschleppung der Pocken aus dem Auslande (Böhmen, Frankreich und Schweiz) verhältnißmäßig sehr häufig sich nachweisen lassen. Theils haben die ersterkrankten Personen sich im Auslande direkt infizirt, theils haben Besucher aus dem Auslande den Krankheitskeim mitgebracht, theils ist durch Lumpen zc. von auswärts die Ansteckung vermittelt.

Die bemerkenswerthesten Fälle von Einschleppung, einschließlich der bereits bei den Erkrankungsgruppen erwähnten, sind in nachstehenden Uebersichten zusammengestellt:

1. Die im Königreiche Sachsen beobachteten Fälle von Einschleppung der Pocken.

| Nr. | Ort, aus welchem der Pocken- fall gemeldet ist | Beruf zc. der Erkrankten | Angabe, betreffend die Ansteckung. |
|-----|--|------------------------------------|---|
| 1 | Hartmannsdorf | böhmischer Maurergeselle | krank aus Böhmen zugereist. |
| 2 | Chemnitz | böhmischer Schneiderge- felle | 8 Tage vor der Erkrankung aus einem pocken- verseuchten Orte Böhmens zugereist. |
| 3 | Borna | böhmische Handarbeiterin | krank aus Böhmen zugereist. |
| 4 | Buchholz b. Anna- berg | 1½ jähriges Kind | krank mit der Mutter aus Karlsbad zugereist. |
| 5 | Gersdorf | 1 jähriges Bergarbeiters- kind | kurz vor der Erkrankung mit den Eltern aus Böhmen zugereist. |
| 6 | Marienberg | Schauspielerin | kurz vorher aus Komotau in Böhmen zugereist. |
| 7 | Zwickau | Verkäuferin | einige Tage vor der Erkrankung aus dem pocken- verseuchten böhmischen Orte Saaz zugereist. |
| 8 | Werdau b. Zittau | Handarbeiterin | vor 14 Tagen aus einem Distrikte Böhmens, in welchem die Pocken herrschten, zugereist. |
| 9 | Dresden | Händler | krank aus Teplitz zugereist. |
| 10 | Zwickau | Maurersfrau | 5 Tage vor der Erkrankung aus Mfattel bei Karls- bad zugezogen. |
| 11 | Dippach | Weber | hatte vor der Erkrankung im nahen Fugau in Böhmen verkehrt. |
| 12 | Schönfeld | Schuhmachergeselle | war bis 3 Tage vor der Erkrankung in einem pockenverseuchten Orte Böhmens gewesen. |
| 13 | Wehrsdorf | Webersfrau | war vor der Erkrankung in zwei von den Pocken heimgesuchten böhmischen Orten gewesen. |
| 14 | Wehrsdorf | Pferdeknecht | war vor der Erkrankung wiederholentlich in Böhmen gewesen. |
| 15 | Sebnitz | Schriftfegerin | hatte in ihrer böhmischen Heimath beim Besuch pockenkranker Geschwister sich angesteckt. |
| 16 | Dürhenersdorf | Weber und Hausirer | hatte in Böhmen vor der Erkrankung hausirt. |
| 17 | Zittau | ¾ jähriges Kind | war kurz vor der Erkrankung mit der Mutter in einem böhmischen Grenzorte gewesen. |
| 18 | Zittau | böhmischer Stellmacher- geselle | hatte 5 Tage vor der Erkrankung seine pockenkranken Geschwister in Böhmen besucht. |
| 19 | Dresden | Gendarm | hatte 11 Tage vor der Erkrankung Verwandte in Böhmen besucht. |
| 20 | Sohlund | Knecht | war mit Lohnfuhrn häufig in Böhmen gewesen. |
| 21 | Hainewalde | Fabrikarbeiter | arbeitete in einem pockenverseuchten Orte Böhmens. |
| 21a | Hainewalde | Kind von Nr. 21 | erkrankte bald nach dem Vater und starb an den Pocken. |

| Nr. | Ort, aus welchem der Pocken- fall gemeldet ist | Beruf u. der Erkrankten | Angabe, betreffend die Ansteckung. |
|-----|--|------------------------------|---|
| 22 | Oberfriedersdorf | Fabrikarbeiterin | arbeitete mit böhmischen Arbeitern aus verseuchten Orten in einer Fabrik. |
| 23 | Ebersbach | Fabriktschler | arbeitete mit Leuten aus Böhmen in einer Fabrik. |
| 24 | Ebersbach | Schlossergefelle | Mutter und Bruder waren bei einem an schwarzen Blattern verstorbenen Kinde in Böhmen gewesen. |
| 25 | Sebnitz | 1 jähriges Kind | Berwandte aus Böhmen, in deren Familie die Blattern herrschten, verkehrten viel bei den Eltern. |
| 26 | Sebnitz | Weber | eine böhmische Frau, in deren Familie die Blattern herrschten, verkehrte in seinem Hause. |
| 27 | Neustadt | Fabrikant künstlicher Blumen | hatte zwei pockenranke Kinder aus Böhmen zu Besuch gehabt. |
| 28 | Oppach | Müller | hatte vor seiner Erkrankung an den Pocken von einem böhmischen Arzte aus Fugau sich behandeln lassen. |
| 29 | Neusalza | Lumpenhändlerin | hatte Lumpen aus pockenverseuchten Orten Böhmens gekauft. |



Außer den in dieser Uebersicht erwähnten Fällen nachweislicher oder doch wahrscheinlicher Einschleppung der Pocken in das Königreich Sachsen sind muthmaßlich noch andere in sächsischen Grenzorten vorgekommene Erkrankungen, über deren Entstehungsursache nichts Näheres angegeben worden ist, auf Infektionen aus dem nahen Böhmen zurückzuführen. In dem unmittelbar an der böhmischen Grenze gelegenen Zinnwald erkrankten z. B. Ende April plötzlich Meister und Geselle einer Stellmacherwerkstätte, und in dem nahe bei Schandau gelegenen Krippen am 14. Februar ebenfalls ein Stellmachergefelle, ohne daß der Weg der Ansteckung aus Böhmen ermittelt werden konnte; jedenfalls hatte der Beruf die Erkrankten mit durchpassirenden Fremden vielfach in Berührung gebracht.

Daß in Böhmen während des Jahres 1886 die Pocken stark verbreitet waren, geht nicht nur aus den mitgetheilten Fällen erwiesener Einschleppung ins Deutsche Reich hervor, sondern ist auch auf mehreren Meldarten ärztlicherseits ausdrücklich verzeichnet. Beispielsweise hatten, wie wiederholentlich bemerkt worden ist, die böhmischen Gemeinden Jugau und Schluckenau, deren nahe Verbindung mit von den Pocken heimgesuchten sächsischen Ortschaften aus vorstehender Skizze erhellt, besonders schwer von der Seuche zu leiden. In sämtlichen in der Skizze verzeichneten sächsischen Ortschaften (Amtshauptmannschaften Löbau und Bautzen) sind Pockenfälle während des Jahres 1886 vorgekommen.

Weitere elf Fälle von Einschleppung der Pocken sind aus dem Großherzogthum Baden, dem Herzogthum Sachsen-Meiningen und aus Elsaß-Lothringen gemeldet worden, neun kamen aus Frankreich und der Schweiz, wo anscheinend während des Jahres 1886 die Pocken ebenfalls ziemlich verbreitet gewesen sind, zwei kamen wiederum aus Böhmen.

2. Fälle von Einschleppung der Pocken nach Baden, Sachsen-Meiningen, Elsaß-Lothringen.

| Nr. | Ort, aus welchem der Pockenfall gemeldet ist | Beruf u. der Erkrankten | Angabe betreffend die Ansteckung |
|-----|--|----------------------------|---|
| 1 | Freiburg | Maurergeselle | war krank aus Basel zugereist. |
| 2 | Rheinheim | Landwirth | hatte sich in Zurzach (Kanton Aargau) von einem pockenkranken schweizerischen Knaben infizirt. |
| 3 | Eriberg | französischer Holzhändler | war am Tage vor seiner Erkrankung aus Frankreich zugereist. |
| 4 | Jung-Münsterol (Kreis Altkirch) | Näherin | hatte zu Evette bei Belfort in einem Hause, wo Blattern herrschten, gearbeitet. |
| 5 | Lügel (Kreis Altkirch) | schweizerischer Viehwärter | war krank aus der Schweiz zugereist. |
| 6 | Altkirch | Restaurateur | war 14 Tage vor seiner Erkrankung in Besançon gewesen. |
| 7 | Dornach (bei Müllhausen) | Tagelöhnerin | hatte kurz vor der Erkrankung ihre von den Pocken eben genesene Schwester in Belfort besucht. |
| 8 | Zabern | belgischer Schiffer | traf pockenkrank aus Frankreich in Zabern ein. |
| 9 | Meß | holländische Athletenfrau | war 3 Tage vor der Erkrankung aus Keims zugereist. |
| 10 | Judenbach bei Sonneberg | Porzellanmaler | kam aus der Porzellanfabrik bei Karlsbad in Böhmen krank in seinem Heimathsorte Judenbach an. |
| 11 | Wforzheim | Wittwe | hatte mit Besuch aus Prag die Kleider eines in Prag an den Pocken verstorbenen Angehörigen empfangen. |

Die vereinzelt gebliebene Erkrankung eines ungeimpften Kindes im badischen Grenzorte Ueberlingen am Bodensee ist muthmaßlich auch auf eine Einschleppung aus dem benachbarten Auslande zurückzuführen; die Meldarte erwähnt keine Infektionsquelle.

Aus den mitgetheilten Uebersichten ist schon ersichtlich, daß eine nicht geringe Zahl der im Deutschen Reiche innerhalb Jahresfrist zur Anzeige gelangten Pockenerkrankungen nicht Reichsangehörige, sondern Ausländer betroffen hat. Soweit die vorliegenden Meldarten den Geburtsort der Erkrankten erkennen lassen, befanden sich unter den

202 gemeldeten Pockenkranken insgesamt 25 außerhalb der jetzigen Grenzen des Deutschen Reiches geborene Personen, darunter 8 ungeimpfte und 2 mit unbekanntem Impfstande. Nur zwei von diesen Personen waren, soweit die Angaben reichen, vor mehr als Jahresfrist zugereist, nämlich 2 Jahre bezw. „über ein Jahr“ vor der Erkrankung. (Auf 6 Ausländer betreffenden Meldekarten ist über die Dauer des Aufenthalts am Erkrankungsorte nichts eingetragen.)

Vier der im Auslande geborenen Kranken starben an den Pocken, 23 standen im Alter von mehr als 10 Jahren, darunter 3 Gestorbene, nur 10 Ausländer gehörten zu den Leichterkranken.

IV. Die Art der Verbreitung der Pocken. Der Einfluß des Berufes, der Beschäftigung und der sozialen Stellung.

Der Weg, auf welchem die Uebertragung des Ansteckungsstoffes der Pocken erfolgte, ist nur theilweise auf den Meldekarten ersichtlich gemacht. Häufig sind bald nacheinander Angehörige derselben Familie oder Bewohner desselben Hauses erkrankt, ohne daß die Meldekarten weitere Mittheilungen über die Art der Ansteckung enthalten.

Eine mittelbare Uebertragung durch gesund gebliebene Personen oder durch Provenienzen Pockenkranker ist in folgenden Fällen angegeben:

1. Am 21. Januar war in Schönfeld bei Annaberg i. S. ein böhmischer Schuhmachergeselle an den Pocken verstorben. Die beim Transport der Leiche beschäftigte Leichenfrau aus dem nahen Ehrenfriedersdorf wartete an demselben Tage ihr ungeimpftes Enkelkind, welches dann anfangs Februar an den Pocken erkrankte. Die Frau selbst blieb gesund.

2. Aus Wehrsdorf wird mitgetheilt, daß die außereheliche Mutter eines pockenkranken Kindes, ohne selbst zu erkranken, die Pocken auf ein anderes ungeimpftes Kind übertragen hat (vgl. Gruppe B).

3. Ein gichtkranker Müller zu Oppach hatte sich von dem böhmischen Wundarzte aus dem benachbarten, von den Pocken verheulten Fugau behandeln lassen. Nach Inhalt der Meldekarte hatte der Arzt muthmaßlich den Ansteckungsstoff mitgebracht, denn der Müller erkrankte als erster im Dorfe an den Pocken (vgl. Gruppe M).

4. Im Jakobspitale zu Leipzig erkrankte eine seit sechs Wochen daselbst befindliche Kindermuhme an den Pocken, bald nachdem eine andere Kranke in demselben Spital an den Pocken verstorben war. Der die Karte ausstellende Assistenzarzt giebt als nachgewiesenen Weg der Ansteckung „gleichzeitige Behandlung durch denselben Arzt“ an.

5. In Meinitz erkrankte ein Handarbeiter an den Pocken, nachdem er einige Tage zuvor im Krankenhause zu Grimma, woselbst Pockenranke lagen, an der Krätze behandelt worden war. Sein Krankenwärter hatte ihm gesagt, daß er auch einen Pockenkranken habe.

6. In Grimma hat der Barbier eines Pockenkranken, welcher diesen regelmäßig rasirt hatte, auf seine Frau die Pocken übertragen, ohne selbst zu erkranken.

Eine Uebertragung der Pocken durch Lumpen erfolgte theils nachweislich, theils muthmaßlich in folgenden Fällen:

1. In der Papierfabrik bei Baugen erkrankten bald nacheinander 3 beim Lumpenfortiren beschäftigte Arbeiterinnen.

2. Eine Lumpenhändlerin in Neusalza infizierte sich und ihre Angehörigen durch die aus pockenverseuchten Orten Böhmens angekauften Lumpen.

3. In Löbau wurde späterhin durch Lumpen aus der Gegend von Neusalza die Ansteckung eines mit dem An- und Verkauf von Lumpen beschäftigten Handelsmannes vermittelt.

4. Möglicherweise durch Lumpen ist in Leipzig die Ansteckung einer im 13. Lebensjahre an den Pocken verstorbenen Schützmanns-Tochter geschehen; denn betreffs der Art der Ansteckung findet sich auf der Karte verzeichnet, daß in der Nähe des Wohnhauses ein Lumpenhandel stattfindet.

5. Als Ursache der Erkrankung des ungeimpften, 1³/₄-jährigen Sohnes eines Restaurateurs in Leipzig ist der Umstand vermerkt, daß in demselben Hause eine Lumpenniederlage sich befindet. — In letzterem Falle ist daneben angegeben, daß in dem Restaurant des Vaters die Pfleglinge des nahen Asyls für Obdachlose verkehren. (Eine 36-jährige Person aus Reudnitz, welche in diesem Restaurant verkehrte, wurde 7 Tage nach dem Tode des Gastwirthskindes von den Pocken befallen.)

Ein Fall von Uebertragung der Pocken durch Kleider wird aus Pforzheim mitgetheilt. Hier erkrankte nämlich eine 64-jährige Wittve an den Pocken, bald nachdem sie die aus Prag ihr überbrachten Kleider eines dort an den Pocken verstorbenen Angehörigen in Empfang genommen hatte; ein anderer Pockenfall war in Pforzheim und Umgegend vorher nicht beobachtet.

Eine Uebertragung der Pocken durch die Schule von einem Kinde aufs andere oder vom Lehrer auf den Schüler bezw. umgekehrt, hat sich aus dem vorliegenden Beobachtungsmaterial nirgends ergeben.

Wie die berufsmäßige Beschäftigung mit Lumpen wiederholt die Infektion vermittelt hat, so gilt dies in einem Falle auch von derjenigen mit ungereinigten Federn. In einer Mannheimer „Federnfabrik“ mußte nämlich die schwere Erkrankung einer mit der Reinigung von Federn beschäftigten Fabrikarbeiterin an den Pocken auf diese ihre Thätigkeit zurückgeführt werden.

An eine Ansteckung im Berufe durch infizierte Kleiderstoffe muß man bei der vereinzelt gebliebenen Erkrankung einer 57-jährigen Näherin in Waltersdorf, einem Grenzorte der Zittauer Amtshauptmannschaft, denken; auch nach dem oberelsässischen Grenzorte Jung-Münsterol geschah die Einschleppung durch eine Näherin. Die Erkrankung eines Sattlers in Löbau wurde darauf zurückgeführt, daß derselbe in seinem Berufe mit der Matratze eines Pockenkranken in Berührung gekommen war.

Hausirer und Handelsleute haben in folgenden Fällen die Pockenkrankheit eingeschleppt, bezw. durch ihre Berufsart sich angesteckt: 1. Im Armenhause zu Dürhennersdorf ging eine Gruppe von Pockenfällen von einem Hausirer aus, welcher in Böhmen gewesen war. 2. Ein umherreisender Holzhändler schleppte die Pocken aus Frankreich in das Krankenhaus zu Triberg ein. 3. In der Amtshauptmannschaft Dschag erkrankte ein Ehepaar zu Cornzig an den Pocken, bald nachdem der Gatte vom Hausiren heim-

gekehrt war. 4. In Dittersdorf erkrankte eine mit Backwaaren haufirende Händlerin, nachdem in einigen Häusern Pockenfälle vorgekommen waren. 5. In Weifa bei Wehrsdorf betraf die einzige Pockenerkrankung eine Handelsfrau. 6. In Oberlichtenau bei Kamenz wurde die Erkrankung eines eben geimpften Kindes auf eine Einschleppung der Pocken durch Handelsleute aus Böhmen zurückgeführt.

Ein wandernder Handwerksbursche hat die Pocken nach Bremen eingeschleppt und dort eine Reihe von Erkrankungen aus seiner Herberge verursacht (vgl. Gruppe K.)

Eine reisende Schauspielerin hat die Pocken nach Marienberg in Sachsen, und die Frau eines Athleten die Pocken nach Meß gebracht.

Bemerkenswerth ist noch ein Fall in Wehrsdorf, wo nach der Meldebarte die Stellung des Vaters als Gemeindevorstand, bei dem „viele Menschen aus- und eingingen“, für das ungeimpfte Kind verhängnißvoll wurde (vgl. Gruppe B). Vielleicht hatte dem gleichen Umstand auch die Frau des Gemeindevorstands in Ripsdorf (vgl. Gruppe E) ihre und ihres ungeimpften Kindes Erkrankung an den Pocken zuzuschreiben. Beide Orte liegen nahe der böhmischen Grenze.

Als Beispiel einer zufällig durch die gewerbsmäßige Thätigkeit vermittelten Pockeninfektion ist die Erkrankung eines Maurergesellen zu erwähnen, welcher in einem von den Pocken betroffenen Hause den Ofen gereinigt hatte (vgl. Gruppe A).

Fabrikarbeiter sind in Neusalza, Hainewalde und Ebersbach dadurch erkrankt, daß ihre tägliche Beschäftigung sie mit Arbeitern aus böhmischen Orten zusammenführte.

Was die soziale Stellung der an den Pocken erkrankten Personen betrifft, so läßt sich schon aus den mitgetheilten Beispielen entnehmen, daß vorwiegend der wenig bemittelte, daher wahrscheinlich unter hygienisch ungünstigen Verhältnissen lebende Theil der Bevölkerung von den Erkrankungen betroffen gewesen ist.

Soweit aus den Meldebarten die sozialen Verhältnisse der Erkrankten oder des Familienoberhauptes sich erkennen lassen, ist dies fast durchweg der Fall gewesen.

In Sachsen ist die Zahl der Pockenkranken aus den Familien der Weber oder anderer Handarbeiter, ferner unter den Fabrikarbeitern, bezw. -arbeiterinnen verhältnißmäßig groß gewesen. Daß hier im Allgemeinen dürftige Verhältnisse herrschen, wird keinen Widerspruch finden und erhellt u. a. aus dem engen Zusammenwohnen der Familien. Nur selten läßt sich aus der allgemeinen Standesbezeichnung des Erkrankten, bezw. Familienoberhauptes (Kaufmann, Landwirth zc.) entnehmen, daß vielleicht eine größere Wohlhabenheit, welche in der Regel ja auch günstigere hygienische Lebensbedingungen mit sich bringt, bestanden habe, doch ist die gegentheilige Annahme auch in solchen Fällen nicht ausgeschlossen.

V. Der Impfstoffzustand und die Altersverhältnisse der an den Pocken erkrankten Personen.*)

Wenn auch das Verhältniß der an den Pocken erkrankten Geimpften und Ungeimpften zur Gesamtzahl aller im Deutschen Reich lebenden Geimpften und Un-

*) Wenn im Nachstehenden trotz der geringen Größe der absoluten Zahlen vielfach Prozentzahlen berechnet sind, so ist solches nur der leichteren Uebersicht wegen geschehen.

geimpften wegen Mangels der erforderlichen Unterlagen sich nicht berechnen läßt, so liefert das vorliegende Material doch werthvolle Beiträge zur Beurtheilung des durch Impfung und Wiederimpfung gewährten Schutzes.

Der Impfzustand der 202 an den Pocken erkrankten und der hieran verstorbenen 33 Personen ist, für 12 Altersklassen getrennt, in der folgenden Tabelle ersichtlich gemacht.

| im | Es erkrankten | | | Davon waren einmal geimpft | | | | | | | | | | Wiedergeimpft waren | | | | | | Angeimpft waren | | Der Impfstand war unbekannt bei | Bereits gebillett waren | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|---|
| | männlichen Geschlechts | weiblichen Geschlechts | zusammen | mit Erfolg | | | | | | als Kind ohne Erfolg | mit unbekanntem Erfolge | im Ganzen ein Mal geimpft davon erwiebenermaßen mit Erfolg *) | mit Erfolg | | ohne Erfolg | | mit unbekanntem Erfolge | im Ganzen wiedergeimpft | Angeimpft waren | Der Impfstand war unbekannt bei | | | | | | | | | |
| | | | | als Kind ohne Angabe der Zeit | mit deutlichen Impfnarben | | | Impfnarben | | | | | nicht bemerkt | vor 1 bis 8 Jahren | vor mehr als 10 Jahren | nicht rechtzeitig (vor 1 bis 8 Jahren) | | | | | vor mehr als 10 Jahren | | | mit unbekanntem Erfolge | im Ganzen wiedergeimpft | | | | |
| | | | | | 1 oder 2 | 3 oder 4 | 5 oder 6 | mehr als 6 ohne Angabe der Zeit | unbezüglich | | | | | | | | | | | | | | | | | keine | | | |
| 1. Lebensjahre | 12 | 14 | 26 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | | | | 20 | 3 | |
| 2.—5. " | 11 | 10 | 21 | 11 | | 3 | 7 | | 1 | | | | 1 | | | 12 | 10 | | | | | | | | | | 9 | | |
| 6.—10. " | 16 | 14 | 30 | 29 | | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | | | | | 29 | 28 | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| 11.—15. " | 1 | 5 | 6 | 5 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 16.—20. " | 8 | 4 | 12 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | 2 | | | | 4 | 5 | | |
| 21.—25. " | 8 | 4 | 12 | 8 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 8 | 4 | 3 | | | | | | | | 3 | 1 | | |
| 26.—30. " | 9 | 13 | 22 | 18 | | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 18 | 15 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 | 1 | | |
| 31.—40. " | 15 | 19 | 34 | 25 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 29 | 24 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | |
| 41.—50. " | 14 | 8 | 22 | 17 | | 7 | 5 | 2 | 2 | | 1 | | | | | 17 | 16 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 51.—60. " | 3 | 6 | 9 | 6 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 6 | 5 | | | | | | | | | 1 | 2 | | |
| 61.—70. " | 2 | 4 | 6 | 4 | | 2 | | | | 2 | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 71.—80. " | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Im Ganzen | 99 | 103 | 202 | 129 | 2 | 27 | 38 | 32 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 135 | 114 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 39 | 10 | 1 | |
| Von den 202 Erkrankten starben im | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Lebensjahre | 7 | 7 | 14 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 10 | 3 | |
| 2.—5. " | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 6.—10. " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.—15. " | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16.—20. " | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 21.—25. " | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 26.—30. " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.—40. " | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 41.—50. " | 3 | 2 | 5 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 51.—60. " | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 61.—70. " | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 71.—80. " | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Im Ganzen | 20 | 13 | 33 | 4 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 | 18 | | |

*) Die erfolgreiche Impfung gilt als sicher festgestellt, wenn unzweifelhafte Impfnarben vorhanden sind, oder wenn der bezügliche Impfvermerk nach Einsicht der Impfliste (bez. des Impfscheins), nach eigener Erinnerung des meldenden Arztes oder nach Angabe des Impfarztes eingetragen worden ist.

A. Die Erkrankungen einmal geimpfter Personen.

a. Mit Erfolg Geimpfte.

1. Die erkrankten Kinder unter 10 Jahren. Die Erstimpfung mit Schutzpocken, welcher im Deutschen Reiche jedes Kind vor dem Ablaufe des auf sein Geburtsjahr folgenden Kalenderjahres unterzogen werden soll, gewährt nach der maßgebend gewesenen Ueberzeugung der gesetzgebenden Faktoren des Deutschen Reiches für etwa die ersten zehn auf die Impfung folgenden Jahre den werthvollsten Schutz vor Erkrankungen an den Pocken. Zur Beurtheilung der Wirkungen des Impfgesetzes ist es daher von besonderem Interesse, die als „Pocken“ bezeichneten Krankheitsformen, an welchen die geimpften Kinder des ersten Lebensdezenniums gelitten haben, eingehend in Betracht zu ziehen.

Nach den Meldedarten sind während des Jahres 1886 unter 10 163 120 Bewohnern des Deutschen Reiches 42 mit Erfolg geimpfte Kinder der ersten zehn Lebensjahre von den Pocken betroffen gewesen. Von diesen 42 Kindern sind zuvörderst 3 in Abzug zu bringen, welche erst nach stattgehabter Infektion mit dem Pockengifte der Impfung unterzogen worden sind, nämlich: 1. ein uneheliches Kind von 3 $\frac{1}{2}$ Monaten in Wehrsdorf, 7 Tage vor Ausbruch des Exanthems geimpft, 2. ein Kind von 1 $\frac{1}{2}$ Jahren in Neusalza, 4 Tage vor der Erkrankung geimpft, und 3. ein Kind von 13 Monaten in Ober-Lichtenau, 11 Tage vor Ausbruch des Exanthems geimpft. Die beiden letzten Fälle endeten zwar in Genesung, verliefen aber schwer, der ersterwähnte verlief trotz sehr reichlichen Exanthems milde.

Es waren somit rechtzeitig nur 39 Kinder geimpft, welche sämmtlich in dem Königreiche Sachsen als pockenkrank gemeldet sind. Sie lassen sich in folgende Gruppen unterscheiden:

a) In dem Städtchen Brand (Amtsh. Freiberg) erkrankten vom 27. November bis 29. Dezember in fünf Häusern 8 Kinder von 1 bis 6 Jahren leicht an „Varioliden“, wie es auf den Karten heißt. Die betreffenden Meldedarten sind von dem Bürgermeister des Ortes ausgestellt. 7 Kinder wurden gar nicht ärztlich behandelt, und nur auf einer Karte findet sich auch die Unterschrift eines Bergarztes.

Die Fälle verliefen durchweg ganz leicht. Weder in dem Städtchen, noch in der ganzen Amtshauptmannschaft ist sonst im Verlaufe des Jahres ein Pockenfall beobachtet. Auch ist über die Ansteckung der ersterkrankten Kinder nichts ermittelt worden.

b) In Oberweigsdorf (Amtsh. Zittau) erkrankten unmittelbar vor und nach Weihnachten 3 Geschwister von 5 bis 9 Jahren (Kinder eines Webers) in leichter Weise; ein Arzt wurde nicht zugezogen; der Gemeindevorstand hat am 7. Januar 1887 die betreffenden Meldedarten ausgefüllt. Sonstige Pockenfälle sind am Orte nicht vorgekommen. Eine Ansteckung des ersterkrankten Kindes ist auch hier nicht festgestellt.

c) In Dresden erkrankten vom 25. November bis 21. Dezember in vier Familien 6 Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren leicht an „Varioliden“, die Krankheit dauerte zweimal 7 Tage, sonst 1 $\frac{1}{2}$ bis 3 Wochen. Keins der Kinder war, soweit ermittelt, mit einem Pockenkranken in Berührung gekommen. Der letzte vorhergegangene Pockenfall in Dresden war 3 Monate zuvor im August beobachtet. Während der letzten

4 Monate des Jahres trat außer diesen 6 leichten Kindererkrankungen weder im Stadt- noch im Landkreise Dresden ein Pockenfall auf.

d) Aus Bautzen hat ein Arzt in der Zeit vom 8. November bis 29. Dezember 4 Erkrankungen von Kindern im Alter von 2 bis 7 Jahren gemeldet, darunter zweier Geschwister. Die Erkrankungen dauerten alle nur „ca. 8 Tage.“ Von den beiden Geschwistern wird angegeben, daß sie „im Anschlusse an die Masern“ erkrankt seien. Weder in Bautzen noch in der Umgegend sind in den 5 letzten Monaten des Jahres sonstige Pockenfälle vorgekommen.

Ein weiterer ganz vereinzelt aufgetretener „Pockenfall“ in Bautzen betraf ein zehnmonatliches Kind mit „reichlichen“ Impfnarben; als Diagnose ist leichte Form diskreter Pocken eingetragen, die Karte ist auf Grund einer einmaligen Besichtigung ausgefüllt. (Als Geburtstag des am 3. August 1886 besichtigten Kindes ist der 1. Oktober 1886 seitens des Arztes eingetragen.)

e) In Chemnitz erkrankten Ende Oktober zwei Geschwister von 5 bzw. 8 Jahren leicht an diskreten Pocken. Die Dauer der Krankheit betrug „ca. 2 Wochen“. Eine Ansteckungsquelle ist nicht angegeben. In der zweiten Hälfte des Jahres (seit Juni) ist sonst kein Pockenfall aus Chemnitz gemeldet.

f) g) Aus 2 kleinen Gemeinden sind folgende, im Orte ganz vereinzelt aufgetretene Fälle gemeldet. In Weißbach (Amtsh. Zwickau) war im März ein 7jähriges Kind 10 Tage lang leicht an „Varioliden“ krank. Dasselbe hatte keine Impfnarben, ist aber am 15. Juli 1880 geimpft worden. Eine nach der Impfung entstandene Pustel verheilte nach Inhalt der Meldekarte schnell. In Niederfriedersdorf (Amtsh. Löbau) erkrankte im April das 4 $\frac{1}{2}$ jährige Kind eines Gutsbesitzers „ganz leicht“.

h) Aus dem Dorfe Beiersdorf (Amtsh. Grimma) sind vom 28. Februar bis 16. März 3 Fälle leichter, diskreter Pocken bei drei Geschwistern von 4 $\frac{1}{2}$ bis 8 $\frac{3}{4}$ Jahren (Kindern eines Gutsbesitzers) gemeldet. Die Dauer der Krankheit betrug bei zwei Kindern 6 bzw. 8 Tage, im dritten Falle, der sich mit zahlreichen Furunkeln komplizierte, 3 Wochen.

i) Im nahen (ca. 5 km entfernten) Dorfe Neunitz hatte um dieselbe Zeit (am 24. Februar) der in Beiersdorf zugezogene Arzt bei dem sonst nicht weiter behandelten 5jährigen Kinde eines Kohlenarbeiters „zahlreiche, vereinzelt stehende Varioliden“ konstatiert. — Sonstige Pockenfälle sind während des Jahres weder in Beiersdorf noch in Neunitz vorgekommen.

k) In Oberneufirch (Amtsh. Bautzen) erkrankten am 9. März zwei Geschwister von 3 und 9 Jahren und waren 8 Tage lang leicht krank. Hier war kurz vorher auch ein 39jähriger Weber aus Niederneufirch 8 Tage lang an diskreten Pocken leicht erkrankt gewesen. Weitere Pockenfälle sind in Ober- und Niederneufirch nicht beobachtet.

Alle diese 32 als Pocken gemeldeten Krankheitsfälle von Kindern unter 10 Jahren verliefen leicht bzw. sehr leicht; in 30 Fällen ließ sich keinerlei Zusammenhang mit anderen Pockenerkrankungen dem Orte und der Zeit nach erkennen. Nach dem Inhalte der Meldekarten ist die Vermuthung nicht von der Hand zu weisen, daß hier vielfach nicht Pocken, sondern

Varicellen vorgelegen haben. Die Annahme, daß Pocken und Varicellen bisweilen zusammengeworfen seien, wird dadurch unterstützt, daß die Varicellen nach einem in Deutschland vielverbreiteten Krankheitschema*) unter einer und derselben Nummer mit den echten Pocken rubrizirt werden, obgleich diese wohl ausschließlich bei Kindern vorkommende Krankheit nach der übereinstimmenden Ansicht fast aller Autoren in einem ursächlichen Zusammenhange mit den echten und modifizirten Pocken (Variola und Variolois) nicht steht.

1) Nur folgende 7 Erkrankungen geimpfter Kinder unter zehn Jahren ereigneten sich zu einer Zeit, als an denselben Orten auch andere unzweifelhafte Pockenfälle vorkamen.

| Nr. | Ort der gemeldeten Erkrankung | Alter | Bezeichnung des Kindes | Zahl der Impfnarben | Art und Dauer des Krankheitsverlaufs |
|-----|-------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | Wehrsdorf | 8 $\frac{1}{2}$ | Weberstochter | 2 | „leicht“ in 16 Tagen. |
| 2 | Neusalza | 8 | Weberstochter | 2 | „leicht“ in 3 Wochen. |
| 3 | Taubenheim | 9 | Webersohn | 4 | „ganz leicht“ in „kaum 8 Tagen“. |
| 4 | Oberfriedersdorf | 6 $\frac{1}{2}$ | Weberstochter | 4 | „leicht“ in „etwa 3 Wochen“. |
| 5 | Grimma | 7 | Schulknabe | 6 | „leicht“ in 18 Tagen. |
| 6 | Bauzen | 7 | Kassirerssohn | 6 undeutl. | „leicht“ in 18 Tagen. |
| 7 | Sohland | 8 $\frac{1}{2}$ | Webersohn | 2 | „schwer“; genas nach 23 Tagen. |

Es ist somit unter den 39 Erkrankungen erfolgreich geimpfter Kinder unter zehn Jahren nur ein einziger, wenn auch nicht tödtlich, so doch schwer verlaufender Fall beobachtet. Die Pocken waren jedoch auch hier diskret.

2. Die einmal mit Erfolg geimpften Pockenkranken vom 11. Lebensjahre ab.

Unter 125 Personen im Lebensalter von 10 Jahren und darüber, welche während des Jahres 1886 an den Pocken erkrankten, waren 89 (d. i. 71,2 %) nur einmal erfolgreich Geimpfte. Von diesen ließen jedoch nur 70 (= 56 % der Erkrankten) deutliche Impfnarben erkennen.

Von allen erfolgreich geimpften Pockenkranken des 11. bis 40. Lebensjahres ist nur eine Person gestorben: die im 13. Lebensjahre stehende — noch nicht wiedergeimpfte — Tochter eines sächsischen Schutzmannes. Dieselbe starb nach 18tägiger Krankheitsdauer im Spitale zu Leipzig, deutliche Impfnarben waren angeblich vorhanden, doch ist deren Zahl nicht vermerkt.

Im Alter von 40 Jahren und darüber starben von den einmal erfolgreich geimpften Pockenkranken 3.

Diese 3 Sterbefälle betrafen:

1. einen als Kind im Jahre 1841 mit Erfolg geimpften Grundstücksbesitzer von 44 Jahren in Neu-Schönberg (Amtsh. Löbau). Derselbe hatte 4 deutliche Impfnarben;

*) System der Todesursachen von Prof. Virchow, alljährlich abgedruckt in Boerner's Medizinalkalender, Hirschwald's preußischem Medizinalkalender etc., benutzt u. a. auch im statistischen Amte der Stadt Berlin.

2. eine im zweiten Lebensjahre mit Erfolg geimpfte Haus- und Feldbesitzersfrau von 47 Jahren in Mauersberg (Amtsh. Marienberg). Dieselbe hatte 6 Impfnarben;
3. einen nach 14tägiger Krankheit im Jakobsipital zu Leipzig verstorbenen Fuhrwerksbesitzer von 56 Jahren. Derselbe war als Kind mit Erfolg geimpft, die Zahl der deutlichen Impfnarben ist nicht angegeben.

b) Die ohne Erfolg oder mit unbekanntem Erfolge einmal geimpften Kranken.

Auf 3 Meldarten ist eine einmalige erfolglose Impfung der pockenkranken Person eingetragen:

1. In Pockau bei Marienberg erkrankte am 23. Januar ein Kohlenchuppenarbeiter an den Pocken. Am 31. Januar wurde dessen sieben Monate altes Kind ohne Erfolg geimpft; dasselbe erkrankte darauf am 8. Februar ebenfalls an den Pocken und starb am 17. desselben Monats.
2. Das Kind eines Webers in Taubenheim, 1¹/₄ Jahr alt, war laut Impfliste des Jahres 1885 und nach Angabe der Mutter ohne Erfolg geimpft. Dasselbe genas nach dem Ueberstehen einer mittelschweren Form zum Theil konfluirender Pocken.
3. Die 32jährige Ehefrau eines Wirthschaftsbesitzers in Schellerhau überstand, nachdem sie ihren pockenkranken Gatten gepflegt, eine schwere, konfluirende Form der Pocken. Impfnarben waren nicht vorhanden; nach Angabe ihrer Mutter war die Kranke einmal ohne Erfolg geimpft.

Die nach der Tabelle mit unbekanntem Erfolge einmal geimpfte Person, ein im badischen Bezirksamte Waldshut zu Rheinheim erkrankter und demnächst an den Pocken verstorbenen Landwirth, stand im 31. Lebensjahre. Impfnarben ließen sich nicht erkennen; der Vermerk auf der Meldarte lautet: „angeblich geimpft“.

B. Die Erkrankungen wiedergeimpfter Personen an den Pocken.

Unter der Gesamtzahl von 17 Pockenkranken, welche nach Inhalt der Meldarten wiedergeimpft waren, befinden sich 5, welche erst innerhalb der letzten acht Tage vor der Erkrankung, d. h. nach stattgehabter Infektion mit den Pocken wiedergeimpft worden sind. Drei dieser Fälle betrafen Insassen des Krankenhauses zu Triberg, von denen die eine Person mit Erfolg, die beiden anderen ohne Erfolg 3 bzw. 4 Tage vor Beginn der Pockenkrankheit wiedergeimpft worden waren. Die „mit Erfolg“ 3 Tage vor Ausbruch der Pocken wiedergeimpfte Person erlag der Krankheit; dieselbe war 74 Jahre alt und vor einigen Monaten als hochgradig kachektisch wegen chronischen Hautleidens in das Krankenhaus aufgenommen; Impfnarben von einer früheren Impfung waren nicht vorhanden. Der die Meldarte ausstellende Arzt hat dem Vermerk: „angeblich als Kind geimpft“ ein Fragezeichen beigefügt. Ferner sind im Inkubationsstadium der Pocken wiedergeimpft: eine 30jährige Webersfrau in Taubenheim 3 Tage vor der Erkrankung „mit Erfolg“, und ein 9¹/₂jähriges Mädchen in Jung-Münsterol 8 Tage vor der Erkrankung ebenfalls „mit Erfolg“.

Für die Beurtheilung des Werthes der Schutzimpfung können diese späten, offenbar nach der Infektion mit den Pocken erfolgten Wiederimpfungen nicht als vollgültig in Betracht kommen.

Der Erfolg der Wiederimpfungen bei den übrigen 12 Pockenkranken hat sich mit Sicherheit im Allgemeinen nicht feststellen lassen. Die bezüglichen Eintragungen, wonach 7 mit Erfolg, 4 ohne Erfolg, 1 mit unbekanntem Erfolge wiedergeimpft worden sind, basiren mit einer Ausnahme lediglich auf den Angaben der Erkrankten; eine Unterscheidung der Narben der Erstimpfung von denen der Wiederimpfung war nicht möglich. Die erfolglos Wiedergeimpften sind daher mit den erfolgreich Wiedergeimpften gemeinsam in nachstehender Tabelle aufgeführt.

Die 12 rechtzeitig wiedergeimpften Pockenkranken.

| Nr. | Der Erkrankten | | Zeitpunkt und angeblicher Erfolg der Wiederimpfung | Zahl der Impfnarben | Bemerkungen |
|-----|-----------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|
| | Alter in Jahren | Stand event. Nationalität | | | |
| 1 | 20 | belgischer Schiffer | vor 1 Jahr mit Erfolg | keine | genas nach schwerer Erkrank. |
| 2 | 19 | Porzellanmaler | vor 7 Jahren mit Erfolg | nicht ange- geben ¹⁾ | leichter Verlauf |
| 3 | 19 | Fabrikweber | vor 8 Jahren mit Erfolg | 4 deutl. | 8 Tage lang leicht krank |
| 4 | 20 | Fabrikarbeiter | vor 9 Jahren mit Erfolg | 2 deutl. | 10 Tage lang leicht krank |
| 5 | 24 | Schauspielerin | vor 10 Jahren mit Erfolg | 8 deutl. | leichte Erkrank. an „Varioloid“ |
| 6 | 35 | Fabrikarbeiter | vor 16 Jahren mit Erfolg (war damals Soldat) | 5 deutl. | 8 Tage lang leicht krank |
| 7 | 27 | Lumpensortirerin | vor 16 Jahren mit Erfolg | 4 deutl. | 3 Wochen lang leicht krank |
| 8 | 26 | Athletenfrau, Holländerin | vor 12 Jahren ohne Erfolg | keine | genas nach schwerer Erkrank. |
| 9 | 16 | Magd | vor ca. 5 Jahren ohne Erfolg | keine | leichte Form der Erkrankung |
| 10 | 16 | Fabrikarbeiterin | vor ca. 4 Jahren ohne Erfolg | 2 deutl. | 14 Tage lang leicht krank |
| 11 | 39 | Händler | vor ca. 8 Jahren ohne Erfolg (war Soldat) | 3 deutl. | „Varioloid“; leichte Erkrankung |
| 12 | 49 | sächf. Gendarm, aus Böhmen gebürtig | beim Militär mit unbekanntem Erfolge | 3 deutl. | 14 Tage lang leicht krank |

Von den rechtzeitig wiedergeimpften 12 Personen, welche unter den 10 163 120 Bewohnern deutscher Staaten im Laufe des Jahres von den Pocken befallen wurden, ist also Niemand an den Pocken verstorben. (Auch in Bayern ist von den 5 Pockenkranken des Jahres 1886, welche wiedergeimpft waren, Niemand gestorben.)

Alle rechtzeitig wiedergeimpften Pockenkranken, welche überhaupt Impfnarben erkennen ließen, haben eine nur leichte Erkrankung durchgemacht.

C. Die Erkrankungen ungeimpfter Personen.

Ungeimpft waren 39 an den Pocken erkrankte Personen, nämlich 20 Kinder des ersten Lebensjahres, 9 Kinder im zweiten bis fünften Lebensjahre, 1 elfjähriger Knabe und 9 Erwachsene von 16 bis 60 Jahren. Von den Pockenkranken des 11. bis 20. Lebensjahres waren 6 ungeimpft und 12 geimpft, in dieser Altersklasse kam also auf je 2 geimpfte Pockenranke 1 ungeimpfter.

Die Sterblichkeit der 39 ungeimpften Pockenkranken ergibt sich aus Folgendem:

| | | | |
|------------------------------|-----|---------|-------------|
| im 1. Lebensjahre erkrankten | 20, | starben | 10 (50 %), |
| „ 2.—15. „ „ | 10, | „ | 3 (30 %), |
| „ 16.—60. „ „ | 9, | „ | 5 (55,6 %). |

¹⁾ Dieser Kranke war am Tage der begonnenen ärztlichen Behandlung bereits außer Bett. Der Fall ist der einzige, in welchem nach Inhalt der Meldetarten die erfolgreiche Revaccination erwiesen ist, denn das Datum derselben ist verzeichnet mit dem Hinzufügen: „bei der Revision sind 2 Bl. in die Liste eingetragen.“

D. Die 10 Pockenkranken mit unbekanntem Impfzustande.

Bei 8 während des Jahres 1886 im Königreiche Sachsen an den Pocken erkrankten und verstorbenen Personen ist die Meldkarte nur nach dem für Pockentodesfälle gegebenen Schema ausgefüllt worden, es fehlt daher die Angabe des Impfzustandes. Unter diesen 8 befinden sich 3 Kinder des ersten Lebensjahres — von 3 bis 9 Monaten —, welche wahrscheinlich wie die meisten Kinder dieses Alters ungeimpft waren. (Unter Hinzurechnung dieser 3 Kinder würde sich die Mortalität der ungeimpften Säuglinge auf 56,5 % steigern.)

Bei einer 28jährigen, an den Pocken erkrankten und genesenen Frau in Dittersdorf konnte die Meldkarte erst nachträglich ausgestellt werden, und blieb die Frage betreffs des Impfzustandes unausgefüllt. Bei einer 58jährigen Frau aus Böhmen ist der Impfzustand als unbekannt eingetragen; dieselbe genas nach schwerer Erkrankung in Zwicau, Impfnarben waren nicht vorhanden.

E. Die zweimalige Erkrankung einer Person an den Pocken.

Unter den 202 Pockenkranken befand sich eine einzige Person, welche bereits früher die Pocken überstanden hatte; es war ein 47jähriger Weber im Armenhause zu Dürhennersdorf, welcher gleichzeitig mit mehreren anderen Insassen derselben Anstalt an den Pocken erkrankte, aber nur so leicht, daß er nach Inhalt der Meldkarte gar nicht zum Liegen kam. Derselbe hatte deutliche Pockennarben im Gesicht von der als Kind überstandenen ersten Erkrankung her. —

Die Erkrankungs- und Sterblichkeitsverhältnisse aller 202 Pockenkranken sind nachstehend nochmals unter Berechnung der Prozentzahl*) der Verstorbenen nach Altersklasse und Impfzustand zusammengestellt. Die nicht rechtzeitig Wiedergeimpften sind hier den einmal erfolgreich Geimpften hinzugezählt. Die 3 zu spät, d. h. erst im Inkubationsstadium der Pocken, der Erstimpfung unterzogenen Kinder sind den erfolglos Geimpften hinzugerechnet.

| Altersklasse | Einmal mit Erfolg rechtzeitig Geimpfte (einm. der zu spät Wiedergeimpften) | | | Einmal ohne Erfolg oder mit unbekanntem Erfolg oder nicht rechtzeitig Geimpfte | | | Rechtzeitig Wiedergeimpfte (theils mit, theils ohne Erfolg) | | | Ungeimpfte | | | Unbekanntem Impfzustandes | | | Bereits Geblatete | | |
|--------------|--|------------|------|--|------------|----|---|------------|---|------------|------------|------|---------------------------|------------|-----|-------------------|------------|---|
| | Erkrankt | Ge storben | % | Erkrankt | Ge storben | % | Erkrankt | Ge storben | % | Erkrankt | Ge storben | % | Erkrankt | Ge storben | % | Erkrankt | Ge storben | % |
| 0.—1. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | — | — | — | 20 | 10 | 50 | 3 | 3 | 100 | — | — | — |
| 2.—5. | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 3 | 33,3 | — | — | — | — | — | — |
| 6.—10. | 30 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11.—15. | 5 | 1 | 20 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 16.—20. | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | — | — | — | — | — | — |
| 21.—30. | 27 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 31.—40. | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | — | — | — |
| 41.—60. | 23 | 3 | 13 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 61.—80. | 7 | 1 | 14,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 100 | — | — | — |

*) Wie auch hier mit Bezug auf die Kleinheit der absoluten Zahlen ausdrücklich bemerkt sei, lediglich zum Zwecke der leichteren Uebersicht.

VI. Bemerkungen über den Krankheitsverlauf.

Zur Beurtheilung der Dauer des Inkubationsstadiums der Pocken können die nachstehenden, in den Meldedarten mitgetheilten Thatfachen einen Anhalt geben.

Ein Gendarm in Dresden erkrankte am 27. August, nachdem er am 16. desselben Monats Verwandte in Böhmen besucht hatte. Die Inkubationszeit hat bei ihm anscheinend mindestens 11 Tage betragen.

Ein Restaurateur in Altirch erkrankte am 8. Juni, nachdem er 14 Tage vorher in Besançon gewesen war, und eine Handarbeiterin in Werbau bei Zwickau, welche am 1. Mai aus einem von den Pocken heimgesuchten Distrikte Böhmens zugereist war, erkrankte am 15. Mai. In den letzten beiden Fällen scheint sonach die Dauer des Inkubationsstadiums auf 14 Tage sich erstreckt zu haben.

Die Schwierigkeit einer genauen Berechnung der Inkubationszeit aus solchen Angaben erhellt aus den Erkrankungsfällen in Triberg. Hier hatte der von den Pocken eben genesene französische Holzhändler am 17. Februar das Krankenhaus verlassen, und erst am 13. April trat der nächste, wahrscheinlich mit dem vorigen in Zusammenhang stehende Pockenfall in demselben Krankenhause auf. Da eine achtwöchentliche Inkubationsdauer allen wissenschaftlichen Erfahrungen widerspricht, liegt die Annahme nahe, daß der Infektionsstoff vom ersten Pockenkranken her an Wäsche-, Bett- oder Kleidungsstücken gehaftet hat, welche, ohne genügend desinfiziert zu sein, mit dem nächsterkrankten Insassen des Hauses in Berührung gekommen sind.

Was die Form der beobachteten Pocken betrifft, so ist dieselbe auf 179 Meldedarten angegeben. Danach ist 117 Mal (etwa in 65% dieser Fälle) die gutartigste Form der diskreten Pocken beobachtet, 48 Mal wurde die Form der konfluirenden Pocken verzeichnet, jedoch öfters nur als „theilweise konfluirend“, endlich in 14 Fällen, darunter 9 Mal bei älteren Personen über 30 Jahren, trat, soweit die Angaben reichen, die hämorrhagische Form auf.

Diese letztere, unter dem Namen der schwarzen Pocken besonders gefürchtete Form verlief stets schwer und führte 6 Mal zum Tode, darunter 4 Mal bei in der Kindheit ein Mal geimpften Personen von 30 bis 50 Jahren, ein Mal bei einem ungeimpften Kinde und ein Mal bei einem ungeimpften Manne aus Böhmen. Meistens war auch der Verlauf der konfluirenden Pocken schwer, nur 7 Mal unter den 48 Fällen ist bei im Uebrigen leicht verlaufender Krankheit die konfluirende Form beobachtet. Die diskreten Formen verliefen 14 Mal schwer, 102 Mal leicht, ein Mal ist die Art des Krankheitsverlaufes nicht eingetragen (vgl. auch die untenstehende Tabelle).

Von allen 202 Pockenerkrankungen des Jahres 1886, über welche Meldedarten vorliegen, verliefen 116 leicht und 84 (einschließlich der tödtlich endenden) schwer. In 2 Fällen — bei ungeimpften Kranken — fehlt die Angabe des Verlaufes, dieselben betreffen einen Säugling und einen 18jährigen Gefellen aus Böhmen und endeten mit Genesung.

Bei den einmal mit Erfolg geimpften Personen des 16. bis 20. Lebensjahres ist nur eine Erkrankung schwer, jedoch mit Genesung verlaufen. Im 21. bis 25. Lebensjahre sind geimpfte Personen mit deutlichen Impfnarben überhaupt nicht schwer erkrankt gewesen, dagegen 3 Personen ohne deutliche Impfnarben nach angeblich in frühester Kindheit erfolgreich geschehener Erstimpfung; zwei dieser Personen waren aus Böhmen zugereist. Der Verlauf war in allen 3 Fällen nicht tödlich.

Erst vom 26. Lebensjahre ab werden bei den nur einmal in der Kindheit geimpften Personen die schweren Pockenkrankungen häufiger und im Alter vom 41. bis 50. Lebensjahre verlief bei ihnen die Hälfte aller Erkrankungen schwer.

Von den 12 rechtzeitig wiedergeimpften Kranken überstanden 10 eine leichte, meist sehr rasch zur Genesung führende Form der Pocken, nur 2 waren schwer erkrankt, und diese beiden waren ohne jede Impfnarbe (vgl. oben).

Bei den 39 ungeimpften Pockenkranken war in allen Altersklassen die schwere Form der Erkrankung die häufigere, nur 8 Mal findet sich auf Meldefarten Ungeimpfter der Krankheitsverlauf als leicht bezeichnet.

Der 47jährige Mann, welcher, wie die Narben erkennen ließen, bereits als Kind die Pocken überstanden hatte, wurde in sehr leichter Form von derselben Krankheit ein zweites Mal befallen.

Betreffs eines Zusammenhanges zwischen der Schwere des Krankheitsverlaufes und der Zahl der deutlichen Impfnarben ist Folgendes hervorzuheben:

1. Vor Ablauf des 29. Lebensjahres ist keine Person schwer pockenkrank gewesen, welche mehr als 4 deutliche Impfnarben hatte. Das einzige im Alter bis zu 10 Jahren schwer pockenkrank gewesene Kind mit Impfnarben hatte deren nur 2.

2. Vom 29. bis zum 40. Lebensjahre war nur eine Person, die 29jährige Arbeiterin aus einer Federnfabrik zu Mannheim, trotz des Vorhandenseins von mehr als 4 unzweifelhaften Impfnarben, schwer an den Pocken erkrankt.

3. Abgesehen von den leichten eigenartigen Erkrankungen der rechtzeitig geimpften Kinder unter 10 Jahren waren bis zum 40. Lebensjahre:

| | |
|--------------------------|---|
| mit 1—4 Impfnarben . . . | 24 Personen leicht, 10 Personen schwer, |
| „ 5—6 „ . . . | 9 „ „ 1 „ „ |
| „ mehr als 6 Impfnarben | 1 „ „ 0 „ „ |

an den Pocken erkrankt.

Nachkrankheiten. Von den mit Genesung endenden 169 Pockenfällen ist nicht nur die überwiegende Mehrzahl (70 %) leicht verlaufen, sondern es sind auch nach Inhalt der Meldefarten Nachkrankheiten sehr selten beobachtet. Nur 8 Mal findet sich hinter dem bezüglichen Vordrucke eine Krankheit verzeichnet und dann mehrfach mit dem Zusätze „als Komplikation“.

Bei den geimpften Kindern unter 10 Jahren, deren Erkrankung fast durchweg eine leichte war, werden einmal Furunkel als Komplikation erwähnt, ein anderes Mal eine Anschwellung am Zahnfleisch (epulis), ein drittes Mal bei einer achttägigen, leichten Erkrankung Ausfluß aus dem rechten Ohre. Bei einem ungeimpften Kinde in Ehren-

friedersdorf ist Knochenhautentzündung am Schienbeine als Nachkrankheit aufgeführt. Bei einem 32jährigen, übrigens leicht erkrankten Kaufmann in Grimma Blutergrüsse in das Unterhautzellgewebe und in die Muskulatur. Die 29jährige, schwerkranke Arbeiterin in Mannheim hatte ein Ohrleiden (otitis externa) als Komplikation. In 2 Fällen endlich werden Augenleiden als Nachkrankheiten genannt, und zwar bei einem 44jährigen Tischler in Ebersbach eine Regenbogenhautentzündung (iritis serosa) und bei einer 42jährigen Frau in Bärenfels eine Entzündung der Hornhaut.

Die Aufnahme der Pockenkranken in ein Krankenhaus hat im Ganzen in 36 Fällen stattgefunden, hauptsächlich in den größeren Städten und, wie es scheint, unabhängig von der sozialen Stellung der Kranken.

So wurden in Leipzig alle 4 dort zur Anzeige gelangten Pockenfälle im Jakobshospital, in Zwickau alle 4 Pockenkranken im Stadtkrankenhaus behandelt. In Bremen wurden ebenfalls 4 Pockenranke ins Krankenhaus übergeführt, nur einer der in der gemeinschaftlichen Herberge erkrankten Handwerksgejellen (Gruppe K) scheint außerhalb des Krankenhauses behandelt worden zu sein. In Triberg sind alle 5 Pockenranke im dortigen Bezirkskrankenhaus behandelt; bei 4 Personen geschah die Infektion, wie erwähnt, im Krankenhaus. In Chemnitz, Dresden, Bautzen, Grimma und Sebnitz wurden nur je 2 Kranke, in Bittau nur ein Kranker ins Krankenhaus aufgenommen, obgleich die Zahl der dort angezeigten Pockenfälle eine viel höhere war. In Metz, Mannheim, Pforzheim, Freiburg, Borna, Buchholz, Weidau und Hartmannsdorf wurden die vereinzelt vorgekommenen Pockenfälle in einem Krankenhaus des Ortes behandelt.

In 27 Ortschaften blieb der Pockenfall vereinzelt, trotzdem eine Isolierung des Kranken durch Aufnahme desselben in ein Spital nicht stattfand.

Anhang. Uebersicht derjenigen Pockenerkrankungen des Jahres 1885, über welche Meldarten aus Theilen des Deutschen Reiches vorliegen.

Aus dem Jahre 1885 sind Meldarten über die zur Anzeige gelangten Pockenerkrankungen dem Kaiserlichen Gesundheitsamte nur aus 3 Bundesstaaten und aus Elsaß-Lothringen zugegangen, und zwar 2 aus Sachsen-Meiningen, 7 aus Anhalt, 1 aus Lippe und 28 aus Elsaß-Lothringen.*)

*) Nach amtlichen Mittheilungen sind ferner in Bayern 142, in Württemberg 10, in Oldenburg 2 Erkrankungen an den Pocken vorgekommen. (Vgl. Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamts 1886 S. 520 und 1887 S. 405.) Diese Gesamtzahl von 192 Pockenkranken ist, wenn man die Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 der Berechnung zu Grunde legt, unter 9 907 526 Bewohnern des Deutschen Reiches festgestellt, entspricht somit einer Erkrankungsziffer an den Pocken von kaum 2 (1,94) unter je 100 000 Einwohnern. Ueber die besonderen Umstände, welche in Oberbayern damals die verhältnismäßig auffallende Zahl von 110 Erkrankungen an den Pocken (10,9 auf 100 000 Bewohner) bedingt haben, ist bisher nichts Näheres bekannt geworden, im übrigen Bayern betrug die Erkrankungsziffer 0,7, in Württemberg 0,5, in Elsaß-Lothringen 1,8 auf 100 000 Bewohner.

Von den Pockenkranken starben in Bayern 17 (darunter 16 in Oberbayern), in Sachsen-Meiningen keiner, in Anhalt und Lippe je 1, in Elsaß-Lothringen 4, im Ganzen 23. Die Pocken-Sterblichkeitsziffer des Jahres 1885 für obige Bevölkerungsquote des Deutschen Reiches belief sich mithin auf 0,23 von je 100 000 Einwohnern.

Diese 38 Erkrankungen vertheilen sich auf nachstehende Verwaltungsbezirke:

| Staat | Verwaltungsbezirk | Zahl der Gemeinden | Zahl der Erkrankungen | Zahl der Gestorbenen |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Herzogthum Sachsen-Meiningen Herzogthum Anhalt | Kreis Hildburghausen | 1 | 2 | — |
| | „ Zerbst | 1 | 4 | — |
| Fürstenthum Lippe Reichslande Elsaß-Lothringen | „ Bernburg | 1 | 2 | 1 |
| | „ Dessau | 1 | 1 | — |
| | Amt Sternberg | 1 | 1 | 1 |
| | Ober-Elsaß: Kreis Mülhausen | 5 | 16 | 2 |
| | „ Altkirch | 3 | 3 | — |
| | „ Thann | 1 | 1 | 1 |
| | Unter-Elsaß: Stadtkreis Straßburg | 1 | 7 | 1 |
| | Kreis Hagenau | 1 | 1 | — |
| Summa | | 16 | 38 | 6 |

In 9 der von den Pocken betroffenen Ortschaften kam nur je eine Erkrankung während des Jahres zur Anzeige, in 3 Orten je 2; in Mülhausen erkrankten 4 Personen in 4 verschiedenen Monaten des Jahres.

Ein zeitlich zusammenfallendes Auftreten von mehr als 2 Pockenfällen an einem Orte ist nur drei Mal beobachtet; die betreffenden Erkrankungsgruppen sind nachstehend zusammengestellt:

Gruppe A. 8 Erkrankungen in 2 Familien des Dorfes Homburg, Kreis Mülhausen.

| Nr. | Der Erkrankten | | Datum der Erkrankung bezw. Beginn der ärztlichen Behandlung | Impfzustand | Bemerkungen |
|-----|-----------------|------------------------------|---|----------------------------|---|
| | Alter in Jahren | Beruf zc. | | | |
| 1 | 28 | Haushälterin | Ende Octbr. | einmal geimpft | Infection aus Frankreich; ärztlich nicht behandelt |
| 2 | 61 | Mutter von Nr. 1 | 2./11 | als Kind geimpft | † 5. November |
| 3 | 23 | Bruder von Nr. 1 | Anf. Novbr. | wiedergeimpft | ärztlich nicht behandelt |
| 4 | 33 | Schwester von Nr. 1 | 16./11. | als Kind geimpft | schwer erkrankt |
| 5 | 32 | Bruder von Nr. 1 | 16./11. | do. | mittelschwer erkrankt |
| 6 | 34 | Gattin von Nr. 5 | 18./11. | do. | leicht erkrankt |
| 7 | 46 | Holzauer | 25./11. | angeblich als Kind geimpft | hatte der verstorbenen Pockenkranken Nr. 2 ein Klystier verabfolgt. † 7./12. |
| 8 | 31 | Bruder von Nr. 7, Tagelöhner | 2./12. | wiedergeimpft | leicht krank |

Gruppe B. 5 Erkrankungen in Straßburg i. G.

| | | | | | |
|---|----|--|--------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 60 | Mit Reinigung von Bettfedern beschäftigte Frau | 16./8. | weiß nichts von Impfung | † 3./9. im Bürgerspital |
| 2 | 39 | Schneider | 4./9. | als Soldat wiedergeimpft | } in's Bürgerspital aufgenommen |
| 3 | 36 | Gattin von Nr. 2 | 18./9. | als Kind geimpft | |
| 4 | 46 | Krankenwärter im Bürgerspital | 17./9. | als Soldat wiedergeimpft | hatte die Pockenkranken gepflegt |
| 5 | 26 | Arzt | 20./9. | wiedergeimpft | hatte Nr. 2 ärztlich behandelt |

Gruppe C. 4 Erkrankungen in Zerbst, davon 3 in einer Straße.

| Nr. | Der Erkrankten | | Datum der Erkrankung bzw. Beginn der ärztlichen Behandlung | Impfzustand | Bemerkungen |
|-----|-----------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---|
| | Alter in Jahren | Beruf zc. | | | |
| 1 | 52 | Lumpenhändlerin | 1./12. | als Kind geimpft | war 3 Wochen lang leicht krank, wurde im Kreisfrankenhaus behandelt |
| 2 | 27 | Arbeiter | 17./12. | als Soldat wieder-geimpft | wohnte gegenüber von Nr. 1 in derselben Straße |
| 3 | 33 | Krankenwärterin im Kreisfrankenhaus | 21./12. | angeblich wieder-geimpft | Infektion durch Nr. 1 |
| 4 | 64 | Arbeitsfrau | 24./12. | angeblich als Kind geimpft | wohnte in derselben Straße mit Nr. 1 und 2, wenige Häuser entfernt |

Drei fernere Gruppen von je 2 Pockenkrankungen sind in Römheld (Sachsen-Meiningen), Güstern (Anhalt) und Neuweiler (Kr. Mühlhausen i. G.) vorgekommen.

Die beiden Erkrankungen in Römheld betrafen 2 Geschwister kindlichen Alters, die in Güstern Mutter und Tochter von 65 bzw. 37 Jahren, die in Neuweiler 2 Brüder von 26 und 28 Jahren.

Von den übrigen 15 Pockenkrankungen, welche einen Zusammenhang mit anderen Fällen nicht erkennen lassen, kommen: 2 weitere auf Straßburg, 4 auf Mühlhausen, je 1 auf Zeßnitz (Anhalt), Böfingfeld (Lippe), Altpfirt, Obersept, Ueberstraß (Kr. Altkirch), Hegenheim, St. Ludwig (Kr. Mühlhausen), Hagenau, Urbis (Kr. Thann).

Eine Einschleppung des Ansteckungsstoffes aus dem Auslande hat sich 11 Mal nachweisen lassen und zwar fand in den nachstehenden 7 Fällen eine direkte Infektion im Auslande (Frankreich bzw. der Schweiz) statt:

| Nr. | Ort der gemeldeten Erkrankung | Der Erkrankten | | Datum der Erkrankung | Art der Ansteckung |
|-----|-------------------------------|-----------------|--|----------------------|--|
| | | Alter in Jahren | Beruf zc. | | |
| 1 | Ueberstraß | 18 | Bäckergefelle | 4./12. | arbeitete in Belfort, wo in der Familie seines Meisters 2 Pockenfälle tödtlich verlaufen waren |
| 2 | Obersept | 34 | Bauerknecht | 20./3. | arbeitete in Delle (Frankreich); beim Nachbarn seines Dienstherrn waren 2 Söhne pockenkrank; kam 20./3. krank in Obersept an |
| 3 | Altpfirt | 8 | Tagelöhnerssohn | 20./3. | war am 10./3. aus Thiancourt bei Delle zugereist |
| 4 | Mühlhausen | 41 | Tagelöhnersfrau in einer Spinnerei beschäftigt | 3./6. | war vom 23./5. bis 26./5. in Besançon, wo damals die Pocken herrschten |
| 5 | Urbis | 60 | Holz Händler | 20./5. | soll kurz vor seiner Erkrankung in Saulgures gewesen sein, wo die Pocken herrschten |
| 6 | Neuweiler | 26 | Tagelöhner (Gypfer) | 20./1. | } waren bei Verwandten in Obermyll (Schweiz) gewesen, wo die Pocken herrschten |
| 7 | Neuweiler | 28 | Tagelöhner, Bruder von Nr. 6 | 20./1. | |

Eine mittelbare Uebertragung der Pocken durch Personen, welche im Auslande pockenkrank gewesen waren, ist in folgenden 4 Fällen nachgewiesen:

| Nr. | Ort der gemeldeten Erkrankung | Der Erkrankten | | Datum der Erkrankung | Art der Ansteckung | Bemerkungen |
|-----|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--|----------------|
| | | Alter | Stand | | | |
| 1 | Böfingfeld (Fürstenth.Lippe) | 40 J. | Frau eines Ziegelarbeiters | 20./10. | Der Ehemann hatte in Rußland die Pocken überstanden und war vor vollendeter Genesung heimgekommen | † 27./10. |
| 2 | Hegenheim (Kr.Mülhausen) | 11 M. | Kind | 28./5. | die 11 jährige Schwester bettelte im nahen Baselland und hatte dort Varioloïden überstanden | |
| 3 | St. Ludwig (Kr.Mülhausen) | 53 J. | Seidenbandstuhlschreiner | 20./1. | hatte den Besuch einer Frau empfangen, welche am selben Tage eine Pockenkrankte in Basel besucht hatte | |
| 4 | Homburg | 28 J. | Haushälterin | Octbr. | hat sich von einer eben genesenen Pockenkrankten aus Gironagny bei Belfort angesteckt | vgl. Gruppe A. |

Im Anschluß an die vorstehenden Uebersichten wäre noch ein in Mülhausen im September an den Pocken erkrankter italienischer Musikant unbekanntem Lebensalters zu erwähnen; derselbe war bereits im Juni von Frankreich zugereist.

Was die Art der Weiterverbreitung der Pocken betrifft, so ist die Pflege erkrankter Personen besonders häufig Veranlassung zur Ansteckung gewesen. Es kann in dieser Beziehung im einzelnen auf die den Erkrankungsgruppen beigefügten Bemerkungen verwiesen werden. Eine Ansteckung durch berufsmäßigen Umgang mit wahrscheinlich infizirtem Material erfolgte bei der Lumpenhändlerin in Zerbst, bei der 61jährigen Arbeiterin einer Bettfedern-Reinigungsanstalt zu Straßburg und muthmaßlich auch bei der 32jährigen Arbeiterin einer Wollwaarenfabrik zu Sebnitz im Herzogthum Anhalt.

Ueber den Impfstoffzustand und die Altersverhältnisse der 38 Erkrankten ist unter Berücksichtigung des Krankheitsverlaufes Folgendes zu bemerken:

I. Erkrankungen einmal mit Erfolg geimpfter Personen.

a) Kinder bis zum 15. Lebensjahre. Von den 4 Pockenerkrankungen erfolgreich geimpfter Kinder dürften zwei im Monat Juli im Armenhause zu Römhild (Sachsen-Meiningen) ganz isolirt vorgekommene leichte Erkrankungen von vierzehntägiger Dauer bei 2 Geschwistern, Arbeiterkindern von 5 und $6\frac{3}{4}$ Jahren, in Abzug zu bringen sein. Bei dem Mangel jedes nachweisbaren Zusammenhanges mit anderen Pockenkranken und bei dem vereinzelt Vorkommen dieser beiden Fälle im ganzen Herzogthum läßt sich das Bedenken nicht zurückweisen, daß es sich nicht um wirkliche Pocken, sondern um Windpocken (Varicellen) gehandelt hat. Ein drittes, angeblich mit Erfolg geimpftes Kind unter zehn Jahren, ein $7\frac{1}{2}$ jähriges Tagelöhnerskind in Altpfirt (Kreis Altkirch) hatte keine Impfnarben und war vor zehn Tagen aus Frankreich zugereist. Das vierte mit Erfolg einmal geimpfte Kind, welches an den Pocken erkrankte, war eine 13jährige Gastwirthstochter zu Straßburg, angeblich mit deutlichen Impfnarben, deren Zahl aber nicht vermerkt ist; sie erkrankte am 30. April, wurde selbigen Tages in das Spital auf-

genommen, aber schon nach 11 Tagen geheilt entlassen. Eine Ansteckungsquelle ist nicht nachgewiesen. Im Generalberichte über den Gesundheitszustand von Elsaß-Lothringen (1885) ist dieser Fall als Varicellen aufgeführt.

b) Einmal geimpfte Personen von mehr als 15 Jahren. Im Alter bis zum 25. Lebensjahre sind Pockenfälle einmal geimpfter Personen außer den vorstehend erwähnten nicht konstatiert. Von den 21 Erkrankungen älterer Personen desselben Impfzustandes, einschließlich des italienischen Musikanten, dessen Lebensalter nicht angegeben ist, führten 3 zum Tode. Diese letzteren betrafen eine 37jährige Frau in Gütten mit undeutlichen Impfnarben, einen 46jährigen Holzhauer ohne jede Impfnarbe und eine 61jährige Frau, deren Impfnarbenzahl nicht angegeben worden ist.

In der Altersklasse vom 26. bis zum 40. Lebensjahre sind 5 Fälle leicht und 5 Fälle schwer verlaufen.

Keine der schwer erkrankten Personen hatte mehr als 3 deutliche Impfnarben, zwei derselben hatten nur undeutliche Impfnarben.

II. Erkrankungen erfolglos oder mit unbekanntem Erfolge geimpfter Personen.

1. Die Pockenerkrankung einer 40jährigen Arbeiterfrau in Bisingfeld (Fürstenthum Lippe) endete tödtlich, nachdem die Frau entbunden und bald darauf auch von einer Lungenentzündung befallen war. Impfnarben sind nicht beachtet, die Meldekarte besagt, daß eine Impfung „wahrscheinlich“ im Jahre 1846 stattgefunden hat.

2. Nach einer in der Kindheit stattgehabten angeblich erfolglosen Impfung erkrankte an hämorrhagischen Pocken ein 60jähriger Holzhändler zu Urbis, im Kreise Thann. Der Fall verlief in wenigen Tagen tödtlich.

III. Erkrankungen wiedergeimpfter Personen.

Die größtentheils bereits bei den Gruppenerkrankungen erwähnten Fälle waren folgende:

| Nr. | Der Erkrankten | | Wann und mit welchem Erfolge wiedergeimpft | Bemerkungen |
|-----|-----------------|-----------------|--|--|
| | Alter in Jahren | Stand | | |
| 1 | 19 | Gymnasiast | vor 7 Jahren mit Erfolg (3 Impfnarben) | war 17 Tage lang leicht krank |
| 2 | 18 | Bäckergeselle | vor 6 Jahren angeblich mit Erfolg („mehrere“ Impfnarben) | war 14 Tage lang leicht krank |
| 3 | 23 | Landwirth | als Soldat angeblich ohne Erfolg (2 Impfnarben) | war nur „einige Tage“ leicht krank |
| 4 | 26 | Arzt | vor etwa 14 Jahren (Erfolg und Zahl der Impfnarben nicht angegeben) | war 3 Wochen lang leicht krank an „zerstreuten“ Pocken und Parotitis |
| 5 | 27 | Arbeiter | vor etwa 8 Jahren als Soldat angeblich mit Erfolg (3 undeutliche Impfnarben) | war an diskreten Pocken leicht erkrankt |
| 6 | 31 | Tagelöhner | „im 31. Lebensjahre mit Erfolg“ (2 Impfnarben) | war etwa 3 Tage „ganz leicht“ krank |
| 7 | 33 | Krankenwärterin | „nach eigener Aussage revaccinirt“ (5 Impfnarben) | war 20 Tage lang leicht krank |
| 8 | 39 | Schneider | als Soldat mit unbekanntem Erfolge (6 Impfnarben) | war 25 Tage lang leicht krank |
| 9 | 46 | Krankenwärter | angeblich als Soldat mit unbekanntem Erfolge (8 Impfnarben) | war an konfluirenden Pocken schwer erkrankt; genas nach 36 Tagen |

Von den 9 wiedergeimpften Pockenkranken ist Niemand gestorben. Schwer erkrankt war nur der vor etwa 26 Jahren als Soldat mit unbekanntem Erfolge wiedergeimpfte Krankenwärter. Die beiden innerhalb der letzten 5 Jahre wiedergeimpften Personen waren wenige Tage lang leicht krank (Nr. 3 und 6). Ueber Zeit und Erfolg der angeblichen Wiederimpfung der Krankenwärterin (Nr. 7) ist nichts ermittelt.

IV. Erkrankungen ungeimpfter Personen bzw. solcher mit unbekanntem Impfzustande.

Der bei einer zweifellos ungeimpften Person vorgekommene Pockenfall betraf ein elfmonatliches Kind in Hegenheim (Kr. Mühlhausen). Das Kind war an konfluierenden Pocken schwer erkrankt und genas.

Die einzige an den Pocken erkrankte Person, deren Impfzustand nicht ermittelt ist, eine 60jährige Frau in Straßburg, war höchstwahrscheinlich ungeimpft. Die Meldekarte enthält den Vermerk: Patientin weiß nichts von Impfung; keine Narben sichtbar. Die Kranke starb im Hospital nach 19 tägiger Krankheitsdauer.

Im Ganzen sind hiernach von den 38 Pockenkranken 6 gestorben. Die dem Lebensalter nach jüngste, den Pocken erlegene Person war die 37jährige Frau in Güsten, welche nach angeblich in der Kindheit erfolgter Impfung nur 2 undeutliche Impfnarben erkennen ließ. Die anderen Verstorbenen standen im Alter von 40, 46, 60, 60, 61 Jahren.

Die Form der beobachteten Pocken war 2 Mal die hämorrhagische (beide Fälle endeten tödtlich), 9 Mal die konfluierende (4 Fälle endeten tödtlich, die anderen verliefen schwer) und 27 Mal die diskrete. In letzterer Form verliefen nur 3 Erkrankungen schwer, die übrigen leicht.

Nachkrankheiten sind bei keinem der 38 Erkrankten gemeldet. Von Komplikationen wird eine Parotitis, eine Darmdiphtherie und eine Lungenentzündung, letztere bei der Wöchnerin in Böfingfeld, erwähnt.

In Krankenhäusern wurden 11 Pockenranke behandelt, und zwar 6 in Straßburg, 3 in Mühlhausen und 2 in Zerbst, an den 13 übrigen Orten fand eine Aufnahme der Pockenkranken ins Krankenhaus nicht statt.

Schlußbemerkungen.

Die wesentlichsten Ergebnisse der vorstehenden Mittheilungen über Pockenerkrankungen in den Jahren 1885 und 1886 lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

1. Kinder des ersten Lebensjahres erkrankten verhältnißmäßig häufig an den Pocken.

Das Verhältniß der im 1. Lebensjahre befindlichen Kinder zur Gesamtbevölkerung des Deutschen Reiches war nach der letzten bezüglichen Zählung (vom 1. Dezbr. 1880) = 3 : 100. Dementsprechend hätten bei gleicher Erkrankungshäufigkeit aller Altersklassen unter den 240 Pockenkranken, über welche Meldkarten vorliegen, etwa 7 Kinder des ersten Lebensjahres sich befinden müssen. Die Zahl der pockenkranken Kinder dieses Alters betrug jedoch 27, also war die Erkrankungshäufigkeit der Säuglinge etwa 4 Mal so groß als die der Gesamtbevölkerung.

2. Die in Staaten des Deutschen Reiches vorgekommenen Pockenkrankungen betrafen verhältnißmäßig viele im Auslande geborene Personen.

Von der ortsanwesenden Bevölkerung des Deutschen Reiches waren nach dem letzten Zählungsergebnisse (vom 1. Dezbr. 1885) 0,8 % Reichsausländer; es hätten also bei gleicher Erkrankungshäufigkeit unter 240 Pockenkranken 2 Ausländer sich befinden müssen. Die Zahl der letzteren betrug jedoch 26, die Erkrankungen der Ausländer sind somit 13 Mal häufiger gewesen, als ihrer Anzahl im Deutschen Reiche entspricht.

3. Die Bevölkerung der von den Pocken betroffenen deutschen Ortschaften zeigte sich meist sehr wenig empfänglich für den Ansteckungsstoff.

Von 90 Gemeinden, in welchen ein oder zwei Pockenfälle auftraten, blieben 58 von weiteren Erkrankungen verschont, obgleich nur in wenigen Orten die sofortige Aufnahme des Pockenkranken in ein Krankenhaus stattgefunden hat.

4. Im Alter vom 11. bis 25. Lebensjahre sind verhältnißmäßig viele Ungeimpfte an den Pocken erkrankt gewesen.

Von 34 Pockenkranken des bezeichneten Lebensalters (30 im Jahre 1886, 4 im Jahre 1885) waren 7, d. h. 20,6 %, ungeimpft, während zweifellos von der gesammten Bevölkerung dieser Altersklasse im Deutschen Reiche ein sehr viel geringerer Bruchtheil als ungeimpft gelten darf.

5. Die rechtzeitig geimpften Kinder des 1. bis 10. Lebensjahres überstanden, sofern sie mehr als 2 deutliche Impfnarben hatten, ausschließlich leichte Erkrankungen.

Von allen erfolgreich einmal geimpften Kindern unter 12 Jahren ist keins an den Pocken verstorben.

6. Die innerhalb der letzten 20 Jahre vor der Erkrankung rechtzeitig wiedergeimpften Personen überstanden, sofern sie überhaupt Impfnarben hatten, ausschließlich leichte Erkrankungen.

Von allen rechtzeitig wiedergeimpften Personen ist Niemand an den Pocken verstorben.

7. Von Personen des vollendeten 13. bis 44. Lebensjahres, welche zweifellos erfolgreich geimpft waren, d. h. deutliche Impfnarben hatten, ist Niemand an den Pocken verstorben.

Mit wie großer Vorsicht Mittheilungen über Pockenkrankungen und Angaben über den Impfstand der Erkrankten zu verwerthen sind, zeigen die folgenden aus den 240 Meldeskarten sich ergebenden Thatsachen:

- I. Etwa 15 % der Meldeskarten betreffen allem Anscheine nach nicht Erkrankungen an Pocken, sondern an Varicellen.
- II. Als „einmal geimpft“ waren 9 Erkrankte zu verzeichnen, welche offenbar nicht als unter vollem Impfschutze stehend betrachtet werden können, nämlich:
 - 4 erfolglos Geimpfte,
 - 3 erst im Inkubationsstadium der Pocken geimpfte Kinder,
 - 2 mit unbekanntem Erfolge Geimpfte.

III. Als „erfolgreich geimpft“ mußten 30 Personen bezeichnet werden, bei denen ein positiver Erfolg der Impfung sich nicht sicher feststellen ließ, nämlich:

10 Personen ohne jede Impfnarbe,

15 Personen mit undeutlichen Impfnarben,

5 Personen ohne Angabe betreffs etwaiger Impfnarben.

IV. Unter den „wiedergeimpften“ Personen befanden sich:

5 innerhalb der letzten acht Tage vor der Pockenerkrankung, d. h. innerhalb des Inkubationsstadiums der Krankheit zum zweiten Male geimpfte Personen,

3 Personen ohne jede Impfnarbe,

1 Person mit undeutlichen Impfnarben.

V. Die Angaben über den Erfolg der Wiederimpfung beruhen (bei den vor Jahr und Tag Wiedergeimpften) mit einer einzigen Ausnahme lediglich auf den Mittheilungen der Erkrankten.

Nähere Feststellungen in dieser Hinsicht sind im Allgemeinen nicht durchführbar, da andere zuverlässige Anhaltspunkte über den Erfolg der Wiederimpfung nur selten sich erbringen lassen.

Der Einfluß der Schutzpockenimpfung auf die Pockensterblichkeit in Schweden.

(Hierzu Tafel 6.)

Das Königreich Schweden gehört zu denjenigen Staaten, in welchen die vorhandenen Aufzeichnungen über die Zahl der jährlich vorgekommenen Pockentodesfälle weit in das vorige Jahrhundert zurückreichen. Es läßt sich daher ziffermäßig feststellen, ob die in den verschiedensten Ländern Europas gemachte Erfahrung, daß seit Anfang dieses Jahrhunderts die Pockensterblichkeit außerordentlich abgenommen hat, auch für Schweden zutrifft. Da überdies die Schutzpockenimpfung schon frühzeitig in Schweden Eingang gefunden hat, so ist es erklärlich, daß bei den Erörterungen über die ursächlichen Beziehungen zwischen Schutzpockenimpfung und Abnahme der Pockensterblichkeit gerade die schwedische Statistik besondere Berücksichtigung gefunden hat.

Das bezügliche, auf den Mittheilungen der schwedischen Gesundheitsbehörde beruhende und von dem englischen Statistiker Haile bearbeitete Zahlenmaterial ist bereits im Jahre 1857 von dem damaligen „Medical Officer of the General Board of Health“ Simon dem englischen Parlamente vorgelegt und hat auch in den Verhandlungen derjenigen englischen Parlamentskommission, welche im Jahre 1871 mit Bezug auf das in England bestehende Impfgesetz umfangreiche Erhebungen über die Impffrage veranstaltet hat, eingehende Berücksichtigung gefunden.*) In dem Gutachten, welches die Königlich preussische wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen zufolge einer vom Reichstage des Norddeutschen Bundes (Beschluß vom 6. April 1870) gegebenen Anregung unter dem 28. Februar 1872 über die Schutzpockenimpfung erstattet hat, wird die in dem Berichte jener englischen Kommission, dem sogenannten „Blaubuche“ veröffentlichte schwedische Statistik ebenfalls als ein Beweis dafür verworther, daß der Einführung der Schutzpockenimpfung eine beträchtliche Verminderung der Pockensterblichkeit zu danken ist. — Die dem englischen „Blaubuche“ entnommene Tabelle enthielt die Angaben über die Pockensterblichkeit nur für die Zeit bis einschließlich des Jahres 1855. Gelegentlich der Verhandlungen der Petitionskommission des Reichstages im Jahre 1879**) wurde seitens des Regierungskommissars eine diagraphische Ergänzungstabelle für die Jahre 1856 bis 1876 vorgelegt, deren Ergebnisse wesentlich übereinstimmten mit denjenigen der früheren Jahrgänge.

So überzeugend nun die in Frage stehenden Zahlen für den gegenwärtigen Einfluß der Schutzpockenimpfung zu sprechen schienen, so sind die aus ihnen gezogenen Schlußfolgerungen doch andererseits von Gegnern der Schutzpockenimpfung in ihrer Beweis-

*) Vgl.: „Report from the select committee on the Vaccination Act (1867); together with the proceedings of the committee. Ordered by the house of Commons, to be printed, 23. May 1871.“

**) Reichstagsdrucksachen Nr. 304 der II. Session (1879) der 4. Legislaturperiode.

kraft aufs heftigste bestritten worden, ja in einem mit der Zeitschrift „Der Impfgegner“ (Nr. 13 von 1883, herausgegeben von dem impfgegnerischen Arzt Dr. Didtmann) verbreiteten Flugblatte*), welches seiner Zeit auch dem Reichstage als Anlage einer Petition überreicht worden ist, wird die Simon'sche Tabelle als in allen Hauptpunkten gefälscht bezeichnet. „Die Engländer und die Deutschen“ — heißt es in dem Flugblatte — „haben in blindem Vertrauen 22 Jahre lang diesen Betrug gutgeheißen, und alle „Völker haben ihre Impfgesetze auf dieses Einen englischen Arztes leichtfertige und un- „wahre Angabe gebaut. Die ganze Arztwelt huldigt mit Begeisterung, ja mit Fana- „tismus diesem aus England importirten Betrug.“

Nun ergibt zwar, wie unten noch eingehender dargelegt werden wird, schon ein einfacher Vergleich dieser Behauptungen mit den in dem englischen Blaubuche gemachten Angaben, daß diese schweren Beschuldigungen unbegründet sind, immerhin erschien es jedoch bei der Bedeutung, welche der schwedischen Statistik bezüglich der Beurtheilung der Schutzkraft der Impfung beigelegt worden ist, erwünscht, möglichst eingehende Mittheilungen über dieselbe zu erhalten. Einem bezüglichlichen Ersuchen der deutschen Reichsverwaltung hat die Königlich schwedische Regierung aufs bereitwilligste entsprochen, und es ist dadurch die Möglichkeit gegeben, die Verhältnisse nachstehend auf Grund amtlicher Angaben ausführlich zu erörtern.

Die Einführung der Schutzpockenimpfung in Schweden nebst einem Ueberblick über die bezüglichlichen Verordnungen und Gesetze.

Ueber die Einführung der Schutzpockenimpfung in Schweden, sowie über die bezüglichlichen Verordnungen und Gesetze enthält das dem Kaiserlichen Gesundheitsamte zugegangene amtliche Material einen ausführlichen Bericht des beigeordneten Mitgliedes der Königlich schwedischen Medizinalverwaltung Herrn C. Thestrup, welchem folgendes zu entnehmen ist:

Die erste geglückte Impfung in Schweden wurde am 23. Oktober 1801 von dem Professor Munk af Rosenskiöld in Lund mit Lympe ausgeführt, welche er aus Kopenhagen bezogen hatte. Schon am 7. Dezember desselben Jahres erhielt der Genannte von dem Collegium medicum den Befehl, mit thunlichster Beschleunigung einen Bericht über seine die Impfung betreffenden Erfahrungen zu erstatten, welcher dem entsprechend noch gegen Ende des Jahres 1801 vorgelegt wurde und die Mittheilung enthielt, daß Rosenskiöld bereits mehrere hundert Personen geimpft, mehrere Küster in der Ausführung der Impfung unterrichtet habe, und daß das Publikum beginne, Vertrauen zu der Impfung zu zeigen. Bereits im nächsten Jahre (1802) erschien auch eine von Rosenskiöld herausgegebene Schrift, den Pastoren im Stifte Lund gewidmet, in welcher der Verfasser u. a. bekannt gab, daß er bereits über 200 Personen selbst glücklich geimpft und an mehr als 80 Aerzte Lympe abgegeben habe.

Inzwischen, nämlich gegen Mitte Dezember 1801, war die erste erfolgreiche Impfung auch in Stockholm ausgeführt, von wo aus sich in der Folge die Impfung sehr bald zu dem mittleren und dem nördlichen Schweden verbreitete.

*) „Das Fundament aller Impfgesetze und der Impfschutztheorie.“

Noch in demselben Monate (23. Dezember 1801) wurde dem Collegium medicum durch einen königlichen Brief der Befehl erteilt, eiligst ein Gutachten über die Impfung zu erstatten und Vorschläge über die Maßnahmen zu machen, welche bezüglich derselben für nützlich erachtet werden könnten. Dem entsprechend wurde seitens des Collegium medicum ein aus vier Ärzten bestehendes Komitee ernannt, welches während eines Zeitraumes von 9 Monaten Versuche mit der Impfung anstellte und auf Grund derselben am 4. Oktober 1802 sein Gutachten dahin abgab, daß die Impfung sehr wahrscheinlich geeignet sei, Pockenepidemien zu verhüten, daß es indeß noch weiterer Versuche bedürfe.

Unmittelbar darauf, am 13. Oktober 1802, wurde ein königlicher Brief erlassen, in welchem Se. Majestät sich geneigt erklärte, der Impfung als einer für die Menschheit nützlichen Erfindung seinen hohen Schutz angeheißen lassen zu wollen und dieselbe in Gnaden zu ermuntern.

Bald folgten der von Rosenfeld veröffentlichten Drucksache: „An das Publikum wegen der Kuhpocken“ andere von hervorragenden Ärzten des Landes über denselben Gegenstand verfaßte Schriften.

Am 20. Juni 1803 legte das Collegium medicum dem Könige einen Vorschlag, betreffend die allgemeine Einführung der Impfung im Reiche vor und am 3. April 1804 wurde ein königlicher Brief ausgefertigt, welcher folgende für das ganze Reich gültige Bestimmungen enthielt:

1. Die Landeshauptleute müssen, jeder in seinem Län, Mitbürger zu überreden suchen, auf Grund ihrer Bildung und aus Interesse für das allgemeine Wohl die Aufsicht über die Impfung zu übernehmen; die Pastoren aber müssen Küster oder andere fähige mit der Impfung vertraute Personen zur Ausführung derselben ausersehen.

2. Für die Impfung wird eine jährliche Kollekte in jeder Gemeinde befohlen.

3. Die Impfung muß gewöhnlich von Mitte Mai bis Ende Juni und während des Herbstes im September vorgenommen werden.

4. Die Vorsteher der Impfung müssen von dem Provinzialarzte mit zuverlässiger Lympe versehen werden, welche derselbe sich entweder im Orte und auf die von dem Collegium medicum vorgeschriebene Weise oder von dem letzteren selbst zu verschaffen hat.

5. Der Provinzialarzt muß nach der Eintheilung des Landeshauptmannes Reisen in die Distrikte machen, so abgepaßt, daß am 8., 9. oder 10. Tage die Geimpften, welche an einem Orte versammelt sein möchten, von ihm behufs Feststellung des Erfolges der Impfung besichtigt werden können. Die Kosten für diese Reisen in vorher eingetheilten Verhältnissen werden mittels des Fonds bestritten, der voraussichtlich durch die oben erwähnte Einsammlung zusammengebracht werden wird.

6. Der Vorsteher der Impfung muß dem Pastor ein Verzeichniß der Geimpften und Angaben über den Verlauf der Impfung einreichen, und der Pastor muß diese Angaben in margine in die Tabellen eintragen, welche der Tabellenkommission einzufenden sind.

7. In die Pastorzeugnisse für die aus den Gemeinden An- und Abziehenden muß eingetragen werden, ob die betreffende Person die Pocken gehabt hat, geimpft worden ist oder nicht.

Gleichzeitig wurde befohlen, daß das Collegium medicum alljährlich dem Könige zu berichten habe, welche Ärzte und Feldscherer sich durch Beförderung der Impfung besonders ausgezeichnet hätten. Der königliche Brief vom 3. April 1804 enthielt außerdem Bestimmungen bezüglich der Vertheilung einer auf Vorschlag der finnländischen Haushaltungsgesellschaft angewiesenen und aus ihrer Kasse gegebenen Summe von 2000 Rd. Bco. als Belohnungen für in Finnland ausgeführte Impfungen, sowie Vorschriften über die Führung ordentlicher Journale seitens der die Impfung ausübenden Personen.

Um den Bedarf an Impfstoff zu decken, befahl der königliche Brief, daß in Stockholm die Impfung in dem alten Pockenimpfhaus fortgesetzt werde, sowie daß für Norrland in Hernösand, für Götaland in Karlskrona, Lund und Gothenburg in derselben Weise verfahren werden solle. Anscheinend handelte es sich bei der letzteren Vorschrift darum, die aus dem 18. Jahrhundert noch vorhandenen Einrichtungen zur Beförderung der sogenannten „Inokulation“ (d. h. der absichtlichen Ueberimpfung echten Pockengiftes) für die neue Schutzimpfung zu verwerthen, wie denn auch im folgenden Jahre (19. Februar 1805) durch einen königlichen Brief dem Collegium medicum befohlen wurde, „ein Gutachten einzureichen; inwiefern einige Verordnungen hinsichtlich der allgemeinen Ermunterung für die Beförderung der „alten sogenannten Pockenimpfung“ im Reiche noch geltend seien, und in solchem Falle, wie und auf welche Weise dieselben zur Beförderung der Impfung mit größtem Nutzen angewendet werden könnten.“

Ein königlicher Brief vom 19. März 1805 traf auf Vorschlag des Collegium medicum weitere Anordnungen zur Beförderung der Impfung in der Hauptstadt. Durch einen Brief vom 4. Juni desselben Jahres genehmigte der König, daß 900 Rd. Bco., welche früher der Verwaltung des Collegium medicum zur Beförderung der „alten sogenannten Pockenimpfung“ zur Verfügung gestellt waren, jährlich bis auf weiteres zu Belohnungen für diejenigen Ärzte zu verwenden seien, welche die meisten Kinder der ländlichen Bevölkerung und der geringeren Einwohnerklassen in den Städten geimpft oder mit ausgezeichnetem Eifer die Ausbreitung der Impfung befördert hätten.

Am 13. Mai 1805 erstattete das Collegium medicum seinen ersten Bericht über die Impfung, aus welchem hervorging, daß gegen 25 000 Personen als geimpft angemeldet worden waren.

Schon am 10. März 1803 war für Finnland durch königlichen Brief die Verordnung erlassen, daß nur solche Küster angestellt werden sollten, welche im Besitz eines Zeugnisses über ihre Kenntnisse in der Impfkunst seien, eine Verordnung, welche durch königlichen Brief vom 19. Juni 1805 auf ganz Schweden ausgedehnt wurde.

Zugleich wurde die Beschränkung der Impfung auf bestimmte Monate des Jahres (königlicher Brief vom 3. April 1804) aufgehoben.

Der Bericht des Collegium medicum über die im Jahre 1805 ausgeführten Impfungen, welcher am 30. Oktober 1806 erstattet wurde, gab 23 000 Personen als

während des genannten Jahres geimpft an. — Wie sehr man damals bestrebt war die Ausbreitung der Impfung zu unterstützen, erhellt unter anderem daraus, daß abgesehen von anderen Belohnungen eine Person, welche die Impfung besonders eifrig befördert hatte, eine goldene Medaille im Werthe von 15 Dukaten erhielt.

Am 5. November 1807 legte das Collegium medicum wiederum einen Bericht vor, demzufolge 19 000 Personen als im Jahre 1806 geimpft angemeldet waren; am 22. Januar 1807 erließ das Kollegium eine Bekanntmachung über die Form, in welcher die einzuführenden Impflisten zu führen, und die Ergebnisse der zwischen dem 8. und 10. Tage abzuhaltenden Nachschau zu berichten seien. Der Umstand, daß in der ersten Kolonne dieser Listen der Taufname und das Alter des Kindes, in der zweiten der Name und der Stand des Vaters einzutragen waren, zeigt, daß es sich zunächst wohl ausschließlich um die Impfung von Kindern handelte.

Was die Zahl der in den folgenden Jahren geimpften Personen betrifft, so kann hier auf die später mitzutheilende tabellarische Uebersicht verwiesen werden.

Im Jahre 1810 gab das Collegium medicum „zur sicheren Beförderung der Impfung im Reiche anheim, Se. Majestät der König wolle verordnen, daß künftig kein Jüngling in eine öffentliche Schule oder in Dienst genommen, auch kein Aufgebot zur Verheirathung ausgefertigt werde, es sei denn, daß die Nachsuchenden ein Zeugniß darüber vorzeigen könnten, daß sie entweder mit Erfolg geimpft seien oder die Pockenkrankheit durchgemacht hätten.“ Gleichzeitig unterbreitete das Kollegium dem Könige den Entwurf zu einem Impfungsreglement. Da dieser Entwurf erkennen läßt, daß schon damals die oberste Medizinalbehörde sehr umfangreiche bezüglich der Erfahrungen gewonnen haben mußte, und daß sie von dem Werthe der Schutzpockenimpfung und der Nothwendigkeit ihrer allgemeinen Durchführung völlig überzeugt war, so möge sein Inhalt nachstehend mitgetheilt sein:

1. Niemand, der nicht Arzt ist, darf impfen, bevor er nicht ein Zeugniß vorzeigen kann über seine gutgeheißene Geschicklichkeit, sowohl den echten Impfstoff von dem falschen, sowie die Menschenpocken von den Wasser- und Schweinepocken zu unterscheiden.
2. Ein solches Zeugniß soll von einem gehörig autorisirten Arzte ausgefertigt sein.
3. Wenn ein solches Zeugniß von einem anderen gehörigen Arzte als dem Provinzialmedikus des Ortes ausgefertigt worden ist, muß das Zeugniß sofort in beglaubigter Abschrift dem letzteren eingesandt werden. Die Provinzialmedici sind verpflichtet, ein Verzeichniß über die Personen, welche auf diese Weise zu Vaccinateuren angenommen worden sind, dem Kollegium einzusenden.
4. Jeder, der impft, Arzt oder Vaccinateur, muß zwischen dem 7. bis 9. Tage der Impfung die Geimpften nachsehen, um sicher beurtheilen und bescheinigen zu können, ob die Pocken echt sind oder nicht.
5. Der Vaccinateur muß ohne Bezahlung ein Zeugniß darüber geben, daß die Person geimpft worden ist, über den Tag, wo die Befichtigung erfolgte, und über den Erfolg, oder ob dieser derartig befunden worden ist, daß der Vaccinateur die Person dadurch als sicher gegen Pockenkrankheit erachten kann.

6. Jeder Hausvater, der unter seiner Aufsicht Personen hat, welche die Pockenkrankheit nicht gehabt haben, oder die nicht durch die Impfung dagegen gesichert worden sind, muß den Namen und das Alter dieser Personen zu Anfang jeden Jahres dem Impfungsvorsteher anzeigen.
7. Der Impfungsvorsteher muß ein ordentliches Buch über solche gegen die Pockenkrankheit nicht gesicherte Personen führen und am Schlusse des Februar jeden Jahres ein Verzeichniß über dieselben anfertigen, das unverzüglich dem betreffenden Provinzialmedikus einzusenden ist.
8. Nachdem der Provinzialmedikus hiervon Kenntniß erhalten hat, muß er selbst oder durch einen gehörigen Vaccinateur die Impfung solcher Personen besorgen.
9. Die Provinzialmedici sind verpflichtet sich mit Impfstoff zu versehen, der nur von vollkommen gesunden Kindern am 7. oder 8. Tage und nicht später nach der ausgeführten Impfung genommen werden darf.
10. Im Falle des Mangels an Impfstoff wird dieser durch Abimpfung von Milchfühen erneuert.
11. Der Impfstoff wird zwischen Glascheiben u. s. w. aufbewahrt.
12. Jeder, der impft, ist verpflichtet darüber ein Journal zu führen.
13. Diese Journale sind während der beiden letzten Monate des Jahres für jedes Kirchspiel von den Vaccinateuren dem Impfungsvorsteher einzusenden, der alsdann in seinem Buch bezüglich jeder Person bemerkt, wann, von wem und mit welchem Erfolg dieselbe geimpft worden ist. Schließlich hat der Impfungsvorsteher das Journal jedes Vaccinateurs mit der Bescheinigung zu versehen, daß dasselbe vorgezeigt und gehörig registriert worden ist, worauf dasselbe dem Vaccinateur zurückgesandt wird.
14. Nur die auf diese Weise gehörig bescheinigten Journale werden von dem Collegium berücksichtigt.
Dieselben müssen vor Ende Mai des folgenden Jahres dem Collegium von dem betreffenden Provinzialmedikus eingesandt werden, der gleichzeitig ein Verzeichniß über die von ihm selbst Geimpften einzusenden hat.
15. Zu diesen Journalen, die immer mit Schnur zu durchziehen und mit einem Siegel zu versehen sind, muß der Provinzialmedikus einen Bericht an das Collegium hinzufügen, ob während des letzten Jahres in dem Distrikt die Pockenkrankheit geherrscht hat, ihre Beschaffenheit und das Verhältniß hinsichtlich der Anzahl der Krankheits- und Todesfälle, ob geimpfte Personen angesteckt worden sind, sowie im letzteren Falle eine Angabe darüber, von wem diese früher geimpft worden sind, über die Hindernisse, welche der Ausbreitung und der Ausführung der Impfung entgegengetreten, über die Mittel, welche als die sichersten zur Beseitigung solcher Hindernisse anzuwenden erachtet werden.
16. Bevor die Impfung in irgend einem Kirchspiel vorgenommen wird, muß mit dem betreffenden Impfungsvorsteher eine Uebereinkunft bezüglich der Maßnahmen getroffen werden, die mit Rücksicht auf die lokalen Verhältnisse für nöthig ge-

halten werden könnten, damit keine Person, welche der Impfung bedarf und sie erhalten muß, sich derselben entziehen kann, und damit die Besichtigung der Geimpften und die Einsammlung von Impfstoff zu rechter Zeit geschehen kann.

17. Erkrankt jemand an den Menschenpocken, dann muß der betreffende Familienvater dies sofort dem nächsten Vaccinateur anzeigen, der, wenn kein Arzt zu bekommen ist, unverzüglich den Kranken besuchen muß. Er muß sich davon überzeugen, ob die Krankheit wirklich Menschenpocken sind, sowie darüber, wann und von wem der Kranke früher geimpft worden ist, und hat er einen Bericht hierüber sofort dem Provinzialmedikus einzusenden.
18. Findet der Vaccinateur, daß die Krankheit Menschenpocken sind, so ertheilt er die Rathschläge, welche ihm am geeignetsten erscheinen, und ordnet sofort ohne Rücksicht auf die Jahreszeit, nach Berathung mit dem Impfungsvorsteher, solche Maßnahmen an, daß die Kinder geimpft werden können, welche der Gefahr, von der Pockenkrankheit angesteckt zu werden, ausgesetzt sind.
19. Solche an den Menschenpocken erkrankte Personen erhalten nach ihrer Genesung ohne Bezahlung ein Zeugniß von dem Arzt oder dem Vaccinateur ausgefertigt, der dieselben während der Krankheit besucht hat; dieses Zeugniß muß dem Impfungsvorsteher vorgezeigt und von ihm unterschrieben werden.
20. Jeder Provinzialmedikus ist verantwortlich für die von ihm angenommenen Vaccinateure und hat darauf zu sehen, daß ihre Impfjournale zu rechter Zeit dem Collegium eingesandt werden, und daß dieselben gemäß den Vorschriften in Abf. 12 und 13 abgefaßt sind. —

Durch Königlichen Brief vom 14. Juni 1810 wurde denn auch das Collegium medicum autorisirt, die in vorstehendem Entwurf enthaltenen Bestimmungen mit gewissen Einschränkungen öffentlich bekannt zu machen. Der Königliche Brief bemerkt nämlich, daß Punkt 10, betreffend die Abimpfung von Milchkühen, fortfallen müsse und nicht öffentlich bekannt zu machen sei, um nicht zu verwirren und vielleicht das Vorurtheil zu verstärken, das sich bei den Einfältigeren gegen die Impfung gezeigt habe, und welches Vorurtheil auch veranlaßt habe, anstatt Kuhpocken die Benennung Schutzpocken zu gebrauchen. Dagegen müsse über diesen Punkt nur den Provinzialmedicis Mittheilung gemacht werden, die ihrerseits wieder die ihnen unterstellten Vaccinateure darüber zu verständigen hätten. Der König erklärte außerdem das verordnete Komitee für die öffentliche Gesundheitspflege im Reiche beauftragen zu wollen, in seinen Berathungen auch alles, was die Impfung betreffe, aufzunehmen zu wollen, hielt es aber für bedenklich, demjenigen Antrage des Collegiums zuzustimmen, nach welchem das Recht in eine öffentliche Schule oder in den Dienst eintreten oder die Ehe eingehen zu können, von dem Beibringen eines Zeugnisses über erfolgreiche Impfung oder überstandene Pocken abhängig gemacht werden sollte, weil es ihm bedünke, daß die Impfung auf anderen Wegen geeigneter befördert werden könne. Dagegen hielt der König es für zweckmäßig, den Konsistorien zu befehlen, durch die Geistlichen Aufforderungen an das Volk zu richten, die Vortheile der Impfung sich zu Nutzen zu machen und zur Beförderung derselben mit ferneren Zuschüssen beizutragen. Gleichzeitig wurde gestattet, daß in den öffentlichen

Blättern diejenigen Gemeinden genannt würden, welche durch Sammlungen zu diesem Zweck sich ausgezeichnet hätten.

Die in Gemäßheit der vorerwähnten königlichen Vorschriften veränderte Bekanntmachung des königlichen Collegiums ist unter dem 14. Juli 1810 ausgefertigt worden.

Im Jahre 1811 erstattete das Consistorium ecclesiasticum zu Upsala an den König einen Bericht über die Fortschritte der Impfung in dem genannten Erzstifte und schlug gleichzeitig vor, daß die Eltern und Pflegeeltern durch gesetzliche Bestimmungen und bei Strafe verpflichtet werden sollten, ihre Kinder impfen zu lassen. Das Collegium medicum, zur Begutachtung dieses Vorschlages aufgefordert, erklärte sich mit demselben einverstanden; die königliche Entscheidung wurde indeß bis dahin vertagt, wo auch das Gesundheitspflege-Komitee eine Aeußerung zur Sache erstattet haben würde. Dieselbe, am 1. April 1812 dem Könige unterbreitet, befürwortete ebenfalls die allgemeine Durchführung der Impfung mittels Zwangsmaßregeln. Am 8. Juli desselben Jahres wurde dieses Gutachten vom Könige dem Collegium medicum mit dem Befehl überwiesen, den Entwurf zu einem neuen und vollständigen Impfungsreglement vorzulegen und sich u. a. auch über die Strafe für diejenigen zu äußern, welche veräümen würden sich impfen zu lassen oder auf andere Weise Veranlassung zur Verbreitung der Pockenkrankheit und dem daraus entstehenden Unglück geben möchten.

Zugleich wurden diejenigen Personen, welche nachweislich bereits mit Erfolg geimpft hätten oder von dem Pastor bezw. dem Impfungsvorsteher dazu für befähigt erklärt werden würden, von der Verpflichtung entbunden ein ärztliches Attest über ihre Befähigung beizubringen. Dem Collegium medicum wurde ferner aufgegeben, Impfdepots zu errichten und Voranschläge über die dazu nöthigen Gelder einzureichen. — Bereits am 16. November 1812 überreichte das Collegium medicum dem Könige den Entwurf zu einem Reglement für das Impfungswesen; ein königlicher Brief vom 9. Dezember desselben Jahres bestimmte jedoch, daß dieses Reglement nicht eher ausgefertigt werden solle, als bis die Reichsstände über die in dem Entwurf vorgeschlagenen Zwangsmaßregeln gehört worden seien. Die Vorschläge des Collegium, betreffend die Errichtung von Impfstoffdepots und die Anstellung von Ärzten bei denselben in Gothenburg, Lund, Karlskrona, Norrköping, Söndköping, Derebro, Gefle und Hernösand fanden dagegen alsbald die königliche Genehmigung, und zwar mit der Maßgabe, daß noch ein weiteres Impfstoffdepot in Umeå und daß an Stelle desjenigen in Gefle ein solches in Falun zu errichten sei.

Nachdem das Collegium medicum am 25. Januar 1813 eine Instruktion zur Sicherung der Beschaffung genügenden Impfstoffes für die Hauptstadt und die Provinzen 2c. erlassen hatte, erstattete es am 8. Februar 1813 die Meldung, daß die angeordnete Errichtung der Impfstoffdepots vollzogen sei. Der Vorschlag des Collegium, die Zinsen der im Betrage von 2500 Rd. Bco. bei dem Reichsschuldenkomtoir deponirten Kollektengelder zur Beschaffung von Medaillen für die Förderung der Impfung zu benutzen, fand am 3. März 1813 die königliche Genehmigung. Die Medaillen sollten auf der einen Seite das Brustbild des Königs zeigen, auf der anderen in einem Eichenlaubkranze die Inschrift „För befrämjad vaccination“ (für Beförderung der Impfung).

Königliche Briefe vom 26. Mai und 16. Juni 1813, sowie vom 12. Januar und 21. September 1814 bezweckten ebenfalls die Beförderung der Impfung. Durch einen derselben wurde fünf Ärzten je eine goldene Medaille im Werthe von 8 Dukaten für ihre Verdienste um die Impfung verliehen.

Die Erkenntniß, daß auf dem bis dahin eingeschlagenen Wege die allgemeine Durchführung der Impfung trotz aller Bemühungen nicht zu erreichen sein würde, kommt in dem Bericht des Collegium medicum über das Impfwesen im Jahre 1813 zum unverkennbaren Ausdruck, indem hier hervorgehoben ist, daß die Angaben über die Anzahl der Geimpften nach den Quellen, welche dem Collegium zu Gebote standen, besonders unvollständig gewesen seien, sowie daß viele Eltern zu den für die Impfung festgesetzten Zeiten und Orten mit ihren Kindern sich nicht eingefunden bezw. die geimpften Kinder nicht zur Besichtigung gebracht hätten. Ueber den im Jahre 1812 von dem Collegium dem Könige vorgelegten Entwurf eines neuen Impfungsreglements erfolgte indeß die Aeußerung der Reichsstände erst unter dem 11. Juli 1815; sie lautete zu Gunsten der Einführung obligatorischer Impfung (Geldstrafen für die Säumigen in gleichem Betrage wie die Personalsteuern zc.) und enthielt Vorschläge zur Verbesserung des Berichtswesens und zur Sicherstellung des erforderlichen Bedarfs an Lymph.

Nachdem das Collegium medicum in seinem bezüglichlichen Berichte für das Jahr 1814 nochmals die Mängel hervorgehoben hatte, welche dem Impfwesen noch anhafteten, wurden zunächst unter dem 1. November 1815 vom Könige die Regeln für eine strengere Kontrolle über das Impfwesen der Hauptstadt bestätigt bezw. am 15. Januar 1816 bekannt gemacht, und kurz darauf, nämlich durch Königlichen Brief vom 6. März 1816 das Reglement für die Impfung im Reiche festgestellt.

Durch den § 1 dieses Reglements wurde die Impfung für alle Bewohner des Reiches obligatorisch gemacht, sofern sie nicht die natürlichen oder geimpften Blattern gehabt hatten. Den Widerspänstigen und den Eltern oder Vormündern derjenigen Kinder, welche nicht während der beiden ersten Lebensjahre geimpft sein würden, wurde angedroht, daß sie nach zuvor erhaltener Verwarnung in den Gemeindeversammlungen und nach veräußerter Gestellung zur Impfung innerhalb einer gewissen Zeit, die ihnen angegeben worden, durch das Landeshauptmannsamt, an welches die Sache zu berichten, zu Strafen von 1 Rd. 32 fl. bis zu höheren Beträgen verurtheilt werden würden, wenn die aufs Neue anzugebende Zeit zur Gestellung zur Impfung veräußert werden würde.

Im Falle solcher Nachlässigkeit oder Widerspänstigkeit zur Zeit einer Pockenepidemie sollten die den Armen der Gemeinde zufallenden Strafen verdoppelt und bei Zahlungsunvermögen in Gefängnißstrafe umgewandelt werden.

Von den übrigen Bestimmungen des Reglements sei nur noch mitgetheilt, daß nach demselben der vom Pastor und der Gemeinde angestellte Impfungsvorsteher mit Hilfe des Vaccinateurs ein Verzeichniß der geimpften Kinder anfertigen, das von dem Vaccinateur geführte Journal revidiren und bescheinigen, sowie ein Verzeichniß der ungeimpften Kinder unter Angabe der Ursachen anfertigen mußte, wegen derer die Impfung

unterlassen wurde. Ueber die Anzahl der in der Gemeinde Geimpften war von dem Vorsteher zu Anfang jeden Jahres eine summarische Mittheilung durch den Pastor an das betreffende Konsistorium einzusenden und dabei zu bemerken, ob bei der Impfung etwas Ungewöhnliches vorgefallen sei, und ob die Pockenkrankheit geherrscht habe.

Mit dem Erlaß des Reglements vom 6. März 1816 war zwar die Impfung insbesondere für die Kinder bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres obligatorisch gemacht, die Durchführung dieser Bestimmungen ließ in der Folge jedoch immerhin manches zu wünschen übrig, wie verschiedene königliche Verordnungen sowohl, wie Klagen der Aufsichtsbehörde erkennen lassen. So erfolgte beispielsweise aus Anlaß bemerkter Nachlässigkeiten in der Beobachtung der bestehenden Impfvorschriften unter dem 19. Januar 1833 eine „königliche Bekanntmachung, betreffend eine sorgfältigere Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften wegen der Schutzpockenimpfung.“ In derselben wurden sämtliche Betreffende ermahnt, nicht nur selbst die bezüglichlichen gesetzlichen Bestimmungen genau zu befolgen, sondern auch diejenigen zur Erfüllung derselben anzuhalten, welche dieselben angingen. Um die Vorschriften noch ernsthafter dem Volke einzuschärfen, sollte von den Kanzeln das königliche Impfungsreglement vom 6. März 1816 und die königliche Bekanntmachung vom 27. Februar 1828 (betreffend Veränderung und Zusätze zu einem Theile der Medizinalgesetze) verlesen werden. Ferner wurde verordnet, daß die Verzeichnisse der Impfungsvorsteher über die geimpften Personen Angaben darüber enthalten sollten, inwieweit die Widerspänstigen oder Nachlässigen dem Pastor angezeigt worden, und welche Maßnahmen der Kirchenrath alsdann ergriffen habe; sowie daß die Küster und die gegen Entgelt angestellten Vaccinateure, welche widerwillig oder nachlässig ihre Pflicht erfüllten, vom Kirchenrath deswegen mit Geldstrafen bis 10 Rd. Bco. belegt werden könnten.

Im Jahre 1851 gab eine im Lande herrschende Pockenepidemie den Reichsständen Veranlassung, in einem Schreiben an den König die Aufmerksamkeit auf das Bedürfniß fernerweiter Schutzmaßnahmen zu lenken. In Folge dessen wurde auf Befehl des Königs von dem Gesundheitskollegium ein neues Reglement für die Schutzpockenimpfung im Reiche entworfen, welches in seinen wesentlichen Theilen an das Reglement vom Jahre 1816 sich angeschlossen, aber nach einem besseren Plane aufgestellt war. Dieses Reglement, nach einigen Abänderungen unter dem 29. September 1853 vom Könige bestätigt, ist in allen seinen hauptfächlichen Theilen noch heute in Kraft. Es verordnet Zwangsmaßnahmen zur Beförderung der Impfung in Gestalt erhöhter Geldstrafen und bestimmt außerdem in seinem § 2, daß keine Person in die öffentlichen Schulen, die Lehr- oder Erziehungsanstalten aufgenommen werden darf, ohne zuvor ordnungsmäßig nachgewiesen zu haben, daß sie entweder die Pocken gehabt oder mit Erfolg geimpft worden ist, oder daß nach der Impfung, welche von einer dazu qualifizirten Person vor höchstens fünf Jahren ausgeführt worden, die Schutzpocken nicht durch die Impfung aufgekommen seien. Das Reglement macht es ferner zwar jedem, der mit der Impfung zu thun hat, zur Pflicht, die Wiederimpfung möglichst zu befördern, enthält aber keine gesetzlichen Bestimmungen, welche dieselbe obligatorisch machen, obgleich das

Gesundheitskollegium bereits im Jahre 1839 in einem Circular an alle Aerzte des Reiches den Werth der Wiederimpfung hervorgehoben hatte, und durch Königlichen Brief vom 9. Januar 1849 die obligatorische Wiederimpfung für sämtliche Rekruten der Armee eingeführt war. Bemerkenswert wird ausdrücklich, daß die bei mehreren Gelegenheiten von dem Gesundheitskollegium erlassenen Circulare, in welchen das Publikum öffentlich zur Wiederimpfung aufgefordert wurde, verhältnißmäßig wenig Beachtung gefunden haben, in etwas größerer Ausdehnung nur in denjenigen Orten, wo die Blattern herrschten.

Spätere Verordnungen lassen erkennen, daß auch nach Erlaß des Reglements vom Jahre 1853 die allgemeine Durchführung der Impfung auf manche Schwierigkeiten stieß, und daß namentlich die Kontrolle eine unvollständige war. So hat das Königliche Gesundheitskollegium noch im Jahre 1874, weil ihm durch die Mängel der Impfungsjournale die Beaufsichtigung der Schutzpockenimpfung im Reiche in hohem Grade erschwert war, ein Circular an die Provinzial-, Stadt- und Distriktsärzte im Reiche erlassen, durch welches dieselben auf die durch das Reglement ihnen auferlegten Verpflichtungen bezüglich der Impfung hingewiesen wurden; und in demselben Jahre (1874) erinnert eine königliche Bekanntmachung einen jeden, soweit es ihn betrifft, daran, den Vorschriften des geltenden Impfungsreglements genau nachzukommen, bei der Strafe, welche nicht nur durch das Reglement selbst, sondern auch durch die allgemeinen Gesetze, betreffend die Verantwortlichkeit für Vernachlässigung der Dienstpflichten, vorgeschrieben sei. — Wie unzureichend insbesondere in der Hauptstadt die Impfung in den 60er und 70er Jahren durchgeführt worden ist, wird weiter unten noch zu erörtern sein.

Das zeitliche Zusammentreffen der Abnahme der Pockensterblichkeit mit der Einführung der Schutzpockenimpfung in Schweden.

Ueber die Pockentodesfälle in Schweden liegen ausweislich der dem Gesundheitsamte zugegangenen amtlichen Mittheilungen seit dem Jahre 1774 statistische Angaben vor, welche als zuverlässig bezeichnet werden. Für die Zeit vor 1774 sind die noch vorhandenen Aufzeichnungen dagegen nicht verwertbar und zwar aus dem Grunde, weil die aus jener Zeit vorhandenen Listen auch die Todesfälle an Masern umfassen und außerdem für Schweden und Finnland gemeinsam sind.

Die den nachstehenden Uebersichten zu Grunde gelegten, von der königlich schwedischen Regierung mitgetheilten Tabellen sind theils schon im Jahre 1852 auf Grund der Materialien im Archive des schwedischen Tabellenwerkes und des Gesundheitskollegiums als Quellen ausgearbeitet, theils bilden sie eine vor kurzem nach demselben Plane bearbeitete Fortsetzung, welcher gleichfalls amtliche statistische Daten zu Grunde gelegt worden sind. Eine Vergleichung der Zahlen mit den in dem englischen Blaubuche mitgetheilten, auf denselben Quellen beruhenden Angaben ergibt, wie nicht anders zu erwarten war, abgesehen von einigen unwesentlichen Abweichungen, Uebereinstimmung. Das dem Gesundheitsamte zugegangene Material ist allerdings, namentlich bezüglich der Entwicklung des Impfwesens, ein weit reichhaltigeres als das in dem Blaubuche enthaltene und umfaßt auch die neuere Zeit bis zum Jahre 1883 einschließlich, während die betreffenden Angaben des Blaubuches mit dem Jahre 1855 abschließen.

**Pocken und Impfung in Schweden
in den Jahren 1774—1883.**

| A. Absolute Zahlen | | | | | | | B. Verhältniszahlen | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------|--|------------------------------------|---|--------------|--|---|------|
| Jahr | Einwohnerzahl ¹⁾ | Gestorbene | | Lebend-Gebo- rene | Geimpft wurden ²⁾ | | Von je 100 000 Einwohnern starben | | Auf je 100 im Vorjahre lebend Geborene kommen (Geimpfte ³⁾) | Bemerkungen | Jahr |
| | | über- haupt | an Pocken | | Angabe des stat. Central- büreaus | Angabe des Impf- comtoirs | über- haupt | an Pocken | | | |
| 1774 | 2 001 360 | 43 609 | 2 065 | 67 648 | — | — | 2179,0 | 103,2 | — | Für die Zeit vor 1774 sind sichere Angaben über die Zahl der Pockentodesfälle nicht verfügbar, weil die aus jener Zeit vorhandenen Listen auch die Todesfälle an Masern umfassen und außerdem für Schweden und Finnland gemeinsam sind. | 1774 |
| 5 | 2 020 847 | 49 560 | 1 275 | 71 249 | — | — | 2452,4 | 63,1 | — | | 5 |
| 6 | 2 040 334 | 45 692 | 1 503 | 66 869 | — | — | 2239,4 | 73,7 | — | | 6 |
| 7 | 2 059 821 | 51 096 | 1 943 | 67 693 | — | — | 2480,6 | 94,3 | — | | 7 |
| 8 | 2 079 308 | 55 028 | 6 607 | 71 901 | — | — | 2646,5 | 317,7 | — | | 8 |
| 9 | 2 098 795 | 59 365 | 15 102 | 76 387 | — | — | 2828,5 | 719,6 | — | | 9 |
| 1780 | 2 118 281 | 45 731 | 3 374 | 75 122 | — | — | 2158,9 | 159,3 | — | | 1780 |
| 1 | 2 123 080 | 54 313 | 1 485 | 71 130 | — | — | 2558,2 | 69,9 | — | | 1 |
| 2 | 2 127 879 | 58 247 | 2 482 | 68 488 | — | — | 2737,3 | 116,6 | — | | 2 |
| 3 | 2 132 678 | 60 213 | 3 915 | 64 969 | — | — | 2823,4 | 183,6 | — | | 3 |
| 4 | 2 137 477 | 63 792 | 12 453 | 67 605 | — | — | 2984,5 | 582,6 | — | | 4 |
| 5 | 2 142 275 | 60 770 | 5 077 | 67 497 | — | — | 2836,7 | 237,0 | — | | 5 |
| 6 | 2 143 919 | 55 951 | 671 | 70 940 | — | — | 2609,8 | 31,3 | — | | 6 |
| 7 | 2 145 563 | 51 998 | 1 771 | 68 328 | — | — | 2423,5 | 82,5 | — | 7 | |
| 8 | 2 147 207 | 57 320 | 5 462 | 74 019 | — | — | 2669,5 | 254,4 | — | 8 | |
| 9 | 2 148 851 | 69 583 | 6 764 | 70 127 | — | — | 3238,1 | 314,8 | — | 9 | |
| 1790 | 2 150 493 | 63 598 | 5 893 | 66 710 | — | — | 2957,4 | 274,0 | — | 1790 | |
| 1 | 2 176 483 | 55 946 | 3 101 | 71 613 | — | — | 2570,5 | 142,5 | — | 1 | |
| 2 | 2 202 473 | 52 958 | 1 939 | 81 063 | — | — | 2404,5 | 88,0 | — | 2 | |
| 3 | 2 228 463 | 54 376 | 2 103 | 77 033 | — | — | 2440,1 | 94,4 | — | 3 | |
| 4 | 2 254 453 | 53 362 | 3 964 | 76 403 | — | — | 2367,0 | 175,8 | — | 4 | |
| 5 | 2 280 441 | 63 604 | 6 740 | 72 921 | — | — | 2789,1 | 295,6 | — | 5 | |
| 6 | 2 293 813 | 56 474 | 4 503 | 79 446 | — | — | 2462,0 | 196,3 | — | 6 | |
| 7 | 2 307 185 | 55 030 | 1 733 | 80 183 | — | — | 2385,2 | 75,1 | — | 7 | |
| 8 | 2 320 557 | 53 866 | 1 357 | 78 598 | — | — | 2321,3 | 58,5 | — | 8 | |
| 9 | 2 333 929 | 59 192 | 3 756 | 75 274 | — | — | 2536,2 | 160,9 | — | 9 | |

¹⁾ In den von der königlich schwedischen Regierung übermittelten Tabellen sind für den Zeitraum von 1775 bis 1825 (abgesehen von dem Jahre 1809) die Einwohnerzahlen nur von fünf zu fünf Jahren angegeben; für die dazwischen liegenden Jahre dieses Zeitraums sowie für das Jahr 1774 sind die Einwohnerzahlen danach im kaiserlichen Gesundheitsamte berechnet. Von 1825 einschl. an enthalten die von der königlich schwedischen Regierung übermittelten Tabellen die Einwohnerzahlen für jedes einzelne Jahr.

²⁾ Bezüglich der Angaben über die Zahl der Geimpften ist folgendes mitgeteilt: „Die Verschiedenheit zwischen den jährlichen Angaben über die Anzahl der Geimpften im Tabellenwerke (später statistisches Centralbüreau) und denen des Impfungscomtoirs kann dadurch erklärt werden, daß die Uebersichten des Impfungscomtoirs bis zu der Zeit, wo durch das erneuerte Reglement Sr. Majestät des Königs vom Jahre 1853 eine sichere Controle zu Stande gebracht wurde, fast nur die Thätigkeit der ordnungsmäßig angestellten Vaccinateure umfassen, wogegen die Summen des Tabellenwerkes, die sich auf die Eintragungen der Geistlichkeit in die Kirchenbücher gründen, auch diejenigen umfassen, welche von Ärzten und anderen Personen geimpft wurden.“

³⁾ Bis 1853 einschl. sind der Berechnung die Angaben des Tabellenwerkes bezw. des statistischen Centralbüreaus, von 1854 an diejenigen des Impfungscomtoirs über die Zahl der Geimpften zu Grunde gelegt. (Vgl. die vorhergehende Anmerkung.)

| A. Absolute Zahlen | | | | | | | B. Verhältniszahlen | | | | |
|--------------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---|------|
| Jahr | Einwohnerzahl | Gestorbene | | Lebendgeborene | Geimpft wurden | | Von je 100 000 Einwohnern starben | | Auf je 100 im Vorjahre Lebend Geborene kommen Geimpfte | Bemerkungen | Jahr |
| | | überhaupt | an Pocken | | Angabe des stat. Centralbüreaus | Angabe des Impfcomtoirs | überhaupt | an Pocken | | | |
| 1800 | 2 347 303 | 73 928 | 12 032 | 67 576 | — | — | 3149,5 | 512,6 | — | | 1800 |
| 1 | 2 360 397 | 61 323 | 6 057 | 70 629 | . | . | 2593,0 | 256,6 | . | Beginn der Impfungen. | 1 |
| 2 | 2 373 491 | 56 232 | 1 533 | 75 399 | . | . | 2369,2 | 64,6 | . | | 2 |
| 3 | 2 386 585 | 56 577 | 1 464 | 74 644 | . | . | 2370,6 | 61,3 | . | | 3 |
| 4 | 2 399 679 | 59 584 | 1 460 | 76 443 | 28 418 | 25 000 | 2483,0 | 60,8 | 38,1 | | 4 |
| 5 | 2 412 772 | 56 663 | 1 090 | 76 552 | 18 840 | 23 000 | 2348,5 | 45,2 | 24,7 | | 5 |
| 6 | 2 405 098 | 65 728 | 1 482 | 74 581 | 19 716 | 19 000 | 2732,9 | 61,6 | 25,8 | | 6 |
| 7 | 2 397 424 | 62 318 | 2 129 | 75 842 | 24 875 | 16 000 | 2599,4 | 88,8 | 33,4 | | 7 |
| 8 | 2 389 750 | 82 311 | 1 814 | 73 963 | 15 945 | 6 868 | 3444,3 | 75,9 | 21,0 | | 8 |
| 9 | 2 382 075 | 93 532 | 2 404 | 64 300 | 16 649 | 8 500 | 3926,5 | 100,9 | 22,5 | | 9 |
| 1810 | 2 377 851 | 75 607 | 824 | 78 916 | 16 410 | 8 000 | 3179,6 | 34,7 | 25,5 | Circular des Collegium medicum betr. Maßnahmen zur Beförderung der Impfung. | 1810 |
| 1 | 2 395 294 | 69 246 | 698 | 84 862 | 20 055 | 12 000 | 2890,9 | 29,1 | 25,4 | | 1 |
| 2 | 2 412 737 | 73 095 | 404 | 81 079 | 24 851 | . | 3029,5 | 16,7 | 29,3 | | 2 |
| 3 | 2 430 180 | 66 266 | 547 | 72 021 | 49 591 | . | 2726,8 | 22,5 | 61,2 | | 3 |
| 4 | 2 447 623 | 60 959 | 308 | 75 837 | 40 126 | . | 2490,5 | 12,6 | 55,7 | | 4 |
| 5 | 2 465 066 | 57 829 | 472 | 85 239 | 41 009 | . | 2345,9 | 19,1 | 54,1 | | 5 |
| 6 | 2 488 991 | 56 225 | 690 | 87 644 | 62 555 | . | 2258,9 | 27,7 | 73,4 | Einführung der obligatorischen Impfung. | 6 |
| 7 | 2 512 916 | 60 863 | 242 | 83 821 | 75 344 | 60 000 | 2422,0 | 9,6 | 86,0 | | 7 |
| 8 | 2 536 841 | 61 745 | 305 | 85 714 | 48 901 | 50 170 | 2433,9 | 12,0 | 58,3 | | 8 |
| 9 | 2 560 766 | 69 881 | 161 | 84 250 | 50 130 | 48 940 | 2728,9 | 6,3 | 58,5 | | 9 |
| 1820 | 2 584 690 | 62 930 | 143 | 84 841 | 52 867 | 53 272 | 2434,7 | 5,5 | 62,8 | | 1820 |
| 1 | 2 622 002 | 66 416 | 37 | 92 072 | 56 358 | 55 655 | 2533,0 | 1,4 | 66,4 | | 1 |
| 2 | 2 659 314 | 59 390 | 11 | 94 309 | 65 789 | 64 593 | 2233,3 | 0,4 | 71,5 | | 2 |
| 3 | 2 696 626 | 56 067 | 39 | 98 259 | 67 111 | 65 717 | 2079,2 | 1,4 | 71,2 | | 3 |
| 4 | 2 733 938 | 56 256 | 618 | 93 577 | 86 615 | 86 214 | 2057,7 | 22,6 | 88,1 | | 4 |
| 5 | 2 771 252 | 56 465 | 1 243 | 100 315 | 69 241 | 67 676 | 2037,5 | 44,9 | 74,0 | | 5 |
| 6 | 2 805 350 | 63 027 | 625 | 97 125 | 64 023 | 61 902 | 2246,7 | 22,3 | 63,8 | | 6 |
| 7 | 2 828 568 | 64 920 | 600 | 88 138 | 64 332 | 63 194 | 2295,2 | 21,2 | 66,2 | | 7 |
| 8 | 2 848 062 | 75 860 | 257 | 95 354 | 56 609 | 54 744 | 2663,6 | 9,0 | 64,2 | | 8 |
| 9 | 2 864 831 | 82 719 | 53 | 99 488 | 61 930 | 59 159 | 2887,4 | 1,9 | 64,9 | | 9 |
| 1830 | 2 888 082 | 69 251 | 104 | 94 626 | 67 966 | 68 057 | 2397,8 | 3,6 | 68,3 | | 1830 |
| 1 | 2 901 061 | 75 274 | 612 | 88 253 | 68 240 | 65 589 | 2594,7 | 21,1 | 72,1 | | 1 |
| 2 | 2 922 845 | 68 078 | 622 | 89 862 | 66 578 | 65 809 | 2329,2 | 21,3 | 75,4 | | 2 |
| 3 | 2 959 257 | 63 947 | 1 145 | 100 309 | 73 419 | 70 493 | 2160,9 | 38,7 | 81,7 | | 3 |
| 4 | 2 983 144 | 76 294 | 1 049 | 100 231 | 62 123 | 60 411 | 2557,5 | 35,2 | 61,9 | | 4 |
| 5 | 3 025 439 | 55 738 | 448 | 98 144 | 70 367 | 69 137 | 1842,3 | 14,8 | 70,2 | | 5 |
| 6 | 3 061 533 | 60 763 | 138 | 96 857 | 77 748 | 77 728 | 1984,7 | 4,5 | 79,2 | | 6 |
| 7 | 3 080 538 | 75 611 | 301 | 94 616 | 70 227 | 70 707 | 2454,5 | 9,8 | 72,5 | | 7 |
| 8 | 3 096 794 | 74 309 | 1 805 | 90 565 | 72 657 | 74 095 | 2399,5 | 58,3 | 76,8 | | 8 |

| A. Absolute Zahlen | | | | | | | B. Verhältniszahlen | | | | Bemerkungen | Jahr |
|--------------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---|-------------|------|
| Jahr | Einwohnerzahl | Gestorbene | | Lebendgeborene | Geimpft wurden | | Von je 100 000 Einwohnern starben | | Auf je 100 im Vorjahre lebend Geborene kommen Geimpfte | | | |
| | | überhaupt | an Pocken | | Angabe des stat. Centralbüreaus | Angabe des Impfcomtoirs | überhaupt | an Pocken | | | | |
| 1839 | 3 115 169 | 72 988 | 1 934 | 91 363 | 63 847 | 64 676 | 2343,0 | 62,1 | 70,5 | | 1839 | |
| 1840 | 3 138 887 | 63 555 | 650 | 98 160 | 69 313 | 69 943 | 2024,8 | 20,7 | 75,9 | | 1840 | |
| 1 | 3 173 342 | 61 279 | 237 | 95 734 | 66 255 | 67 700 | 1931,1 | 7,5 | 67,5 | | 1 | |
| 2 | 3 207 141 | 67 177 | 58 | 100 976 | 70 505 | 70 684 | 2094,6 | 1,8 | 73,6 | | 2 | |
| 3 | 3 237 180 | 69 115 | 9 | 99 154 | 73 571 | 73 431 | 2135,0 | 0,3 | 72,9 | | 3 | |
| 4 | 3 275 864 | 66 009 | 6 | 104 693 | 74 726 | 73 560 | 2015,0 | 0,2 | 75,4 | | 4 | |
| 5 | 3 316 536 | 62 074 | 6 | 103 660 | 78 119 | 76 058 | 1871,7 | 0,2 | 74,6 | | 5 | |
| 6 | 3 343 556 | 72 683 | 2 | 99 703 | 74 285 | 75 226 | 2173,8 | 0,06 | 71,7 | | 6 | |
| 7 | 3 363 330 | 79 405 | 13 | 99 179 | 70 934 | 68 680 | 2360,9 | 0,4 | 71,1 | | 7 | |
| 8 | 3 399 341 | 66 513 | 71 | 102 524 | 74 688 | 73 580 | 1956,6 | 2,1 | 75,3 | | 8 | |
| 9 | 3 443 803 | 67 842 | 341 | 112 304 | 88 906 | 86 154 | 1970,0 | 9,9 | 86,7 | | 9 | |
| 1850 | 3 482 541 | 68 514 | 1 376 | 110 399 | 104 632 | 94 489 | 1967,4 | 39,5 | 93,2 | | 1850 | |
| 1 | 3 516 889 | 72 506 | 2 488 | 111 065 | 97 277 | 92 733 | 2061,7 | 70,7 | 88,1 | | 1 | |
| 2 | 3 541 399 | 80 090 | 1 534 | 108 305 | 86 130 | 85 635 | 2261,5 | 43,3 | 77,5 | | 2 | |
| 3 | 3 562 462 | 84 047 | 279 | 111 407 | 83 258 | 82 196 | 2359,2 | 7,8 | 76,9 | Erneutes Reglement für die Impfung im Reiche. | 3 | |
| 4 | 3 606 987 | 70 846 | 204 | 120 107 | 95 498 | 97 107 | 1964,1 | 5,7 | 87,2 | | 4 | |
| 5 | 3 639 332 | 77 734 | 41 | 115 072 | 95 493 | 97 182 | 2135,9 | 1,1 | 80,9 | | 5 | |
| 6 | 3 672 988 | 79 618 | 52 | 115 082 | 91 386 | 92 310 | 2167,7 | 1,4 | 80,2 | | 6 | |
| 7 | 3 687 601 | 101 491 | 560 | 119 349 | 92 244 | 93 227 | 2752,2 | 15,2 | 81,0 | | 7 | |
| 8 | 3 734 240 | 80 498 | 1 289 | 129 039 | 103 051 | 100 633 | 2155,7 | 34,5 | 84,3 | | 8 | |
| 9 | 3 787 735 | 75 720 | 1 470 | 131 605 | 108 432 | 103 538 | 1999,1 | 38,8 | 80,2 | | 9 | |
| 1860 | 3 859 728 | 67 502 | 708 | 133 162 | 104 940 | 103 582 | 1748,9 | 18,3 | 78,7 | | 1860 | |
| 1 | 3 917 339 | 71 829 | 193 | 126 634 | — | 103 120 | 1833,6 | 4,9 | 77,4 | | 1 | |
| 2 | 3 965 899 | 84 350 | 148 | 131 584 | — | 93 749 | 2126,9 | 3,7 | 74,0 | 2 | | |
| 3 | 4 022 564 | 77 227 | 307 | 134 279 | — | 100 480 | 1919,8 | 7,6 | 76,4 | 3 | | |
| 4 | 4 070 061 | 81 937 | 741 | 136 004 | — | 101 361 | 2013,2 | 18,2 | 75,5 | 4 | | |
| 5 | 4 114 141 | 78 944 | 1 336 | 134 200 | — | 104 240 | 1918,8 | 32,5 | 76,6 | 5 | | |
| 6 | 4 160 677 | 82 666 | 1 217 | 136 989 | — | 104 490 | 1986,8 | 29,3 | 77,9 | 6 | | |
| 7 | 4 195 681 | 82 072 | 1 061 | 128 832 | — | 96 841 | 1956,1 | 25,3 | 70,7 | 7 | | |
| 8 | 4 173 080 | 87 792 | 1 429 | 114 947 | — | 85 884 | 2103,8 | 34,2 | 66,7 | 8 | | |
| 9 | 4 158 757 | 92 775 | 1 474 | 117 677 | — | 81 937 | 2230,8 | 35,4 | 71,3 | 9 | | |
| 1870 | 4 168 525 | 82 449 | 764 | 119 838 | — | 88 738 | 1977,9 | 18,3 | 75,4 | 1870 | | |
| 1 | 4 204 177 | 72 046 | 329 | 127 333 | — | 94 038 | 1713,7 | 7,8 | 78,5 | 1 | | |
| 2 | 4 250 412 | 68 802 | 346 | 126 983 | — | 95 692 | 1618,7 | 8,1 | 75,2 | 2 | | |
| 3 | 4 297 972 | 73 525 | 1 122 | 131 643 | — | 105 922 | 1710,7 | 26,1 | 83,4 | 3 | | |
| 4 | 4 341 559 | 87 760 | 4 063 | 133 249 | — | 107 636 | 2021,4 | 93,6 | 81,8 | 4 | | |
| 5 | 4 383 291 | 88 439 | 2 019 | 135 958 | — | 105 258 | 2017,6 | 46,1 | 79,0 | 5 | | |
| 6 | 4 429 713 | 86 334 | 604 | 135 890 | — | 106 660 | 1949,0 | 13,6 | 78,5 | 6 | | |
| 7 | 4 484 542 | 83 175 | 357 | 138 476 | — | 104 928 | 1854,7 | 8,0 | 77,2 | 7 | | |

| A. Absolute Zahlen | | | | | | | B. Verhältniszahlen | | | | |
|--------------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|--|-------------|------|
| Jahr | Einwohnerzahl | Gestorbene | | Lebendgeborene | Geimpft wurden | | Von je 100 000 Einwohnern starben | | Auf je 100 im Vorjahre lebend Geborene kommen Geimpfte | Bemerkungen | Jahr |
| | | überhaupt | an Pocken | | Angabe des stat. Centralbüreaus | Angabe des Impfcomtoirs | überhaupt | an Pocken | | | |
| 1878 | 4 531 863 | 81 418 | 202 | 134 464 | — | 108 100 | 1796,6 | 4,5 | 78,1 | | 1878 |
| 9 | 4 578 901 | 77 152 | 144 | 139 043 | — | 105 506 | 1684,9 | 3,1 | 78,5 | | 9 |
| 1880 | 4 565 668 | 82 753 | 175 | 134 262 | — | 110 075 | 1812,5 | 3,8 | 79,2 | | 1880 |
| 1 | 4 572 245 | 80 800 | 299 | 132 804 | — | 107 270 | 1767,2 | 6,5 | 79,9 | | 1 |
| 2 | 4 579 115 | 79 406 | 159 | 134 300 | — | 107 549 | 1734,1 | 3,5 | 81,0 | | 2 |
| 3 | 4 603 595 | 79 487 | 125 | 132 875 | — | 105 434 | 1726,6 | 2,7 | 78,5 | | 3 |

Wie Tabelle I zeigt, hat vom Jahre 1802 ab die Pockensterblichkeit in Schweden eine ganz außerordentliche dauernde Verminderung erfahren, und zwar nachdem im Jahre 1801 die ersten Impfungen ausgeführt waren, und in den folgenden Jahren die Impfung so schnell sich ausgebreitet hatte, daß bereits im Jahre 1804 mehr als ein Drittel der im Vorjahre lebend Geborenen geimpft wurde. Während vor 1802 nicht selten in einem Jahre von je 100 000 Einwohnern 200 und mehr, ja bis zu 700 an den Pocken starben, bleibt diese Ziffer von 1802 ab mit einer einzigen Ausnahme (1809) dauernd unter 100 und sinkt in einer großen Reihe von Jahren auf ein vor Einführung der Impfung unbekanntes niedriges Maß herunter.

Die auf Tafel 6 beigelegte graphische Darstellung läßt diesen Abfall der Pockensterblichkeit ebenfalls deutlich erkennen.

Zur leichteren Uebersicht sind die in Tabelle I enthaltenen Zahlen nachstehend noch einmal in der Weise bearbeitet, daß die jährliche allgemeine Sterblichkeit, ferner die jährliche Pockensterblichkeit und endlich der Prozentsatz der jährlich Geimpften für fünfjährige Perioden berechnet worden sind. Tabelle II, welche diese Verhältniszahlen umfaßt, läßt unschwer erkennen, daß in der That seit Anfang dieses Jahrhunderts die Pockensterblichkeit in Schweden in sehr hohem Maße abgenommen hat, und daß diese Abnahme zeitlich zusammenfällt mit der Einführung der Schutzpockenimpfung. Die Tabelle zeigt ferner, daß auch die allgemeine Sterblichkeit in Schweden im Laufe dieses Jahrhunderts eine fortschreitende beträchtliche Abnahme erfahren hat.

Die allgemeine Sterblichkeit und die Pockensterblichkeit in Schweden
mit Berücksichtigung der ausgeführten Impfungen in den Jahren 1776—1880
(im Jahresdurchschnitt 5jähriger Perioden).

| 5jährige Perioden | Von je 100 000 Einwohnern starben jährlich | | Auf je 100 Lebend- geborene kommen jährlich Geimpfte ¹⁾ | Bemerkungen |
|-------------------|---|--------------|--|---|
| | überhaupt | an Pocken | | |
| 1776—1780 | 2471,1 | 274,4 | — | |
| 1781—1785 | 2788,4 | 238,3 | — | |
| 1786—1790 | 2779,9 | 191,5 | — | |
| 1791—1795 | 2515,1 | 160,2 | — | |
| 1796—1800 | 2572,6 | 201,5 | — | |
| 1801—1805 | 2433,4 | 97,3 | ? | 1801 Beginn der Impfungen. |
| 1806—1810 | 3175,1 | 72,4 | 25,5 | 1810 Circular des Collegium medicum, betr. Maßregeln zur Beförderung der Impfung. |
| 1811—1815 | 2694,4 | 20,0 | 44,0 | |
| 1816—1820 | 2457,0 | 12,1 | 68,0 | 1816 Einführung der obligatorischen Impfung. |
| 1821—1825 | 2184,9 | 14,5 | 72,1 | |
| 1826—1830 | 2499,3 | 11,5 | 66,3 | |
| 1831—1835 | 2294,0 | 26,2 | 71,5 | |
| 1836—1840 | 2241,2 | 31,2 | 75,0 | |
| 1841—1845 | 2009,0 | 1,9 | 72,0 | |
| 1846—1850 | 2084,0 | 10,6 | 78,9 | |
| 1851—1855 | 2156,1 | 25,4 | 81,4 | 1853 Erneutes Reglement für die Impfung im Reiche. |
| 1856—1860 | 2160,0 | 21,8 | 78,5 | |
| 1861—1865 | 1962,6 | 13,6 | 75,9 | |
| 1866—1870 | 2050,9 | 28,5 | 74,1 | |
| 1871—1875 | 1818,5 | 36,7 | 77,6 | |
| 1876—1880 | 1818,6 | 6,6 | 78,5 | |

Da nun, abgesehen von der Einführung der Schutzpockenimpfung, ein ausreichender Grund dafür nicht erkennbar ist, daß die Pockensterblichkeit in Schweden seit Anfang dieses Jahrhunderts eine so beträchtlich geringere geworden ist, so sind wir unter Berücksichtigung unserer sonstigen Kenntnisse über die Schutzpockenimpfung durchaus berechtigt, eine ursächliche Beziehung zwischen jenen beiden Thatsachen anzunehmen.

Der wesentlichste Einwand, welcher gegen den Einfluß der Schutzpockenimpfung auf den Abfall der Pockensterblichkeit in Schweden erhoben wird, ist der, daß jene Abnahme schon sich bemerklich gemacht habe zu einer Zeit, wo die Zahl der Impfungen noch eine verschwindend geringe gewesen sei. Hauptächlich ist dieser Punkt in dem oben erwähnten, dem Reichstage vorgelegten Flugblatte und in anderen von dem Herausgeber desselben verfaßten Artikeln hervorgehoben worden. Auf einige

¹⁾ Bis 1853 einschließlich sind der Berechnung die Angaben des Tabellenwerkes bezw. des statistischen Centralbüreaus, von 1854 an diejenigen des Impfungscomtoirs über die Zahl der Geimpften zu Grunde gelegt (vgl. Anm. auf Seite 88).

wesentliche Unrichtigkeiten, welche sich in seinen Ausführungen finden, möge hier vorweg hingewiesen sein. In dem Flugblatte heißt es: „Aber die Tabelle „Schweden“ zc. von Dr. Simon war in allen Hauptpunkten gefälscht. Wir sehen hier in dem Jahre 1800: 5100 Pockentodte auf eine Million Einwohner. Dann sinkt in den darauf folgenden Jahren die Pockensterblichkeit, im Jahre 1801 auf 600 und 1802 auf 250, also in zwei Jahren auf ein Zwanzigstel.“ Vergleicht man nun mit diesen Angaben die von Simon an der citirten Stelle des Blaubuches (S. 416) mitgetheilten Zahlen, so findet man für das Jahr 1800: 5126, für 1801: 2563 (nicht wie das Flugblatt angiebt 600) und für 1802: 644 (nicht 250) Pockentodte für je eine Million Einwohner verzeichnet.

Weiter heißt es in dem Flugblatte:

„Blickt man in das Nachwerk Simon's hinein, dann findet man S. 327 in „einer unscheinbaren Anmerkung ein wichtiges Eingeständniß. Er schreibt nämlich — „man sollte es nicht für möglich halten, — bezüglich des Datums der sogenannten „allgemeinen Einführung der Vaccination in Schweden: die ersten erfolgreichen Impfversuche seien erst Ende 1801, also erst nach dem großen Sinken der Pockensterblichkeit, gemacht worden. Am 23. November 1801 wurde zuerst in Malmö und am 17. Dezember zum ersten Male in Stockholm ein Kind mit Kuhlymphe geimpft.

„Dr. Simon wird überführt, falsche Listen vorgelegt zu haben.

„Wenn Simon trotz diesem Geständniß, das Datum der allgemeinen Einführung „der Vaccination rückwärts dahin legt, wo es ihm paßte, also in das Jahr 1800 „dann ist hiermit erwiesen, daß er wider besseres Wissen gehandelt hat, bezw., daß der, „welcher ihm das Material geliefert, gefälscht hatte. Kann man plumper der Wahrheit „ins Gesicht schlagen, als wie es hier mit der Verlegung des Datums der allgemeinen „Einführung der Vaccination in die Jahre 1799 und 1800 geschehen ist? Und doch hat „man's fertig gebracht, daß selbst Prof. Virchow's Name unter diese Fälschung kam.“

Nimmt man, um diese heftigen Angriffe auf ihre Berechtigung zu prüfen, das Blaubuch zur Hand, so findet man, daß Simon und zwar auf Seite 357 (nicht 327) folgendes schreibt: „Man vergleiche z. B. in dem Falle Schwedens die 28 Jahre vor der Impfung mit 40 Jahren bald nach derselben, während der ersteren Periode starben durchschnittlich jährlich von je einer Million schwedischer Einwohner 2050 an den Pocken; während der letzteren Periode betrug dagegen die mittlere jährliche Sterblichkeitsziffer an Pocken 158 von je einer Million Einwohner.“

Die Zeitperioden, welche hier von Simon mit einander verglichen worden, sind einerseits die Jahre 1774 bis 1801 und andererseits die Jahre 1810 bis 1850. — In einer Anmerkung zu jenen Worten heißt es, die ersten erfolgreichen Impfungen in Schweden seien gegen Ende des Jahres 1801 ausgeführt, nämlich (in Malmö) am 23. November und (in Stockholm) am 17. Dezember. Gegen das Jahr 1810 hätten die Impfungen nahezu ein Viertel der Geborenen betragen.

Im Original lautet diese Stelle folgendermaßen:

„Compare, for instance, in the case of Sweden, the twenty-eight years

before vaccination*) with forty years soon afterwards: — during the earlier period there used to die of small-pox, out of each million of the Swedish population, 2050 victims annually; — during the later period, out of each million of population, the small-pox deaths have annually averaged 158.

| Terms of years respecting which Particulars are given | Territory | Approximate Average Annual Deathrate by Small-Pox per Million of Living Population | |
|---|-----------|--|-----------------------------------|
| | | Before Introduction of Vaccination | After Introduction of Vaccination |
| | | . . . | . . . |
| | | . . . | . . . |
| 1774—1801 and 1810—1850 | Sweden | 2050 | 158 |

In der graphischen Darstellung, welche Simon zur Veranschaulichung des Verhaltens der Pockensterblichkeit Schwedens gegeben hat, ist der ganze in Betracht kommende Zeitraum (1749 bis 1855) in zwei Theile getheilt. Der eine ist überschrieben: „Before Vaccination“ und umfaßt die Jahre 1749 bis 1801 einschließlich; der zweite, überschrieben: „After Vaccination“ umfaßt die Jahre 1802 bis 1855 einschließlich. Von einer allgemeinen Einführung der Vaccination ist hier entgegen der obigen Behauptung des impfgegnerischen Flugblattes nicht die Rede, noch viel weniger aber von einer „Verlegung des Datums der allgemeinen Einführung der Vaccination in die Jahre 1799 und 1800.“

Was die Verwerthung der schwedischen Pockenstatistik in dem Gutachten der Königlich preussischen wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen vom 28. Februar 1872 betrifft, so ist in demselben u. a. gesagt, die Kuhpockenimpfung sei schon 1802 in Schweden eingeführt, aber erst 1809 zur zwangsweisen Durchführung gebracht. Die letztere Zahl bedarf nach Einsicht des amtlichen dem Gesundheitsamte vorliegenden schwedischen Materials allerdings insofern einer Berichtigung, als Zwangsmaßregeln zur Durchführung der Impfung erst durch das Reglement vom 6. März 1816 angeordnet worden sind, nicht schon im Jahre 1809; jedenfalls aber ist auch in dem genannten Gutachten die Behauptung, daß eine allgemeine Einführung der Impfung in Schweden in den ersten beiden Jahren dieses Jahrhunderts stattgefunden habe, nicht zu finden. Im Uebrigen giebt das Gutachten bezüglich der schwedischen Statistik unter Anführung der Quelle nur die in dem Blaubuche enthaltenen Angaben wieder.

Wie oben eingehend nachgewiesen wurde, ist mit dem Jahre 1802 plötzlich eine beträchtliche Abnahme der Pockensterblichkeit in Schweden eingetreten, zu einer Zeit, wo die Zahl der Impfungen noch eine sehr geringe war. Ein derartiger Abfall hat aber, wie die Tabelle auf Seite 86 zeigt, auch im vorigen Jahrhundert keineswegs zu den Seltenheiten gehört. Es ist vielmehr die Regel gewesen, daß auf Jahre mit größeren

*) The first successful vaccinations in Sweden were performed at the end of 1801, namely (in Malmö) November 23., and (in Stockholm) December 17. About 1810 the vaccinations were amounting to nearly a quarter of the number of births.

Epidemieen einige Jahre mit ungewöhnlich niedriger Pockensterbeziffer folgten. Ihren Grund hat diese Thatsache darin, daß das einmalige Ueberstehen der Krankheit gegen eine spätere Infektion mit seltenen Ausnahmen schützt, daß also nach einer heftigen Epidemie, welche die größte Zahl der vorhandenen Pockenfähigen heimsuchte, die Bevölkerung einige Jahre lang keinen geeigneten Boden für die Seuche abgab.

Gerade in den Jahren 1800 und 1801 hatte nun eine der schwersten Epidemieen in Schweden geherrscht, welche über 18 000 Menschen das Leben kostete, und es ist daher schon hierdurch erklärlich, daß in den nächsten Jahren die Bevölkerung nur wenig von den Pocken zu leiden hatte.

Während aber im vorigen Jahrhundert nach einer Pause von einigen Jahren stets wieder neue Epidemieen hereinsbrechen, ist das nach dem Jahr 1802 nicht mehr der Fall. Die Pockensterblichkeit bleibt vielmehr dauernd eine im Vergleich zur früheren Zeit sehr niedrige.

Nicht in der Thatsache, daß die Pockensterblichkeit im Jahre 1802 plötzlich sinkt, sondern darin, daß sie nach diesem Jahre niemals wieder zu der früheren Höhe ansteigt, wird allgemein die segensreiche Wirkung der Einführung der Schutzpockenimpfung in Schweden gesehen.

Es ist dann weiter geltend gemacht worden, daß die Impfungen in Schweden im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts an Zahl viel zu gering gewesen seien, als daß sie eine derartige gewaltige Wirkung auf die Pockensterblichkeit hervorzubringen vermocht hätten. Nur ein verschwindend kleiner Bruchtheil der Bevölkerung sei geimpft gewesen, und die dauernde Abnahme der Pocken müsse sonach in etwas anderem ihren Grund haben.

Dieser Einwand verliert seine Bedeutung, wenn man sich vergegenwärtigt, daß es sich zur Zeit der Einführung der Impfung um eine bis dahin in kurzen Zwischenräumen von den heftigsten Epidemieen heimgesuchte Bevölkerung handelte, in welcher die Zahl der für die Krankheit überhaupt noch empfänglichen älteren Personen sehr gering war. Es genügte, um weiteren Epidemieen zunächst einen Niegel vorzuschieben, wenn nur die nach der letzten großen Epidemie geborenen Kinder geschützt wurden.

Wie heute noch die Masern, so waren im vorigen Jahrhundert auch die Pocken hauptsächlich eine Kinderkrankheit, und das Material für eine neue Epidemie bildeten bei weitem überwiegend diejenigen Kinder, welche noch keine größere Epidemie erlebt hatten. Unter solchen Umständen kam es also nicht darauf an, ein wie großer Prozentsatz der Bevölkerung, sondern wie viele pockenfähige Kinder durch die Impfung geschützt waren. In der That unterliegt es denn auch keinem Zweifel, daß zunächst wesentlich nur Kinder geimpft wurden. Wenn man nun aber erfährt, daß im Jahre 1804 auf je 1000 im Vorjahre lebend Geborene bereits 381 Impfungen entfallen, und daß diese Zahl in den folgenden Jahren 247, 258, 334, 210, 225, 255 u. s. w. betrug (vgl. Tabelle I. auf Seite 87), wenn man ferner berücksichtigt, daß von jenen 1000 Kindern ein beträchtlicher Theil an anderen Krankheiten gestorben ist, bevor die Impfung ausgeführt werden konnte, und endlich, daß eine nicht zu unterschätzende Zahl von Impfungen der Kontrolle entgangen sein wird, so ist es durchaus erklärlich, daß schon bald nach Einführung der Impfung dieselbe ihren segensreichen Einfluß in hohem Grade geltend

machen konnte. Mit der zunehmenden Verbreitung der Impfung in Folge der Bekanntmachung des Collegium medicum vom Jahre 1810 und der Einführung der obligatorischen Impfung im Jahre 1816 erfolgte dann eine unverkennbare weitere Abnahme der Pockensterblichkeit im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts (vgl. auch die graphische Darstellung auf Tafel 6). Von einem gänzlichen Verschwinden der Pocken kann allerdings auch dann nicht die Rede sein. Hin und wieder sind auch noch verhältnißmäßig große Epidemien vorgekommen, von denen namentlich diejenigen von 1838—1839, 1850—1852 und 1873—1875 bemerkenswerth sind. Auch die zweite Hälfte der sechziger Jahre zeichnet sich durch verhältnißmäßig große Verbreitung der Pocken aus. Stets aber bleibt, selbst in diesen Epidemiejahren, die Pockensterblichkeit weit unter derjenigen Höhe, welche in der Zeit vor Einführung der Impfung den Durchschnitt bildete. So starben in dem schwersten Epidemiejahre, welches seit Einführung der obligatorischen Impfung (1816) zu verzeichnen gewesen ist, nämlich im Jahre 1874, von je 100 000 Einwohnern 94, während beispielsweise im Jahre 1800 diese Ziffer 513 und im Jahre 1801 257 betrug. — Man könnte einwenden, daß seit Anfang dieses Jahrhunderts die hygienischen Verhältnisse sich beträchtlich gebessert haben, und daß es in Folge dessen nicht überraschend sei, wenn die Epidemien nicht mehr die frühere Höhe erreichten. Demgegenüber genügt es, darauf hinzuweisen, daß Länder, in welchen im Gegensatz zu Schweden der Impfwang nicht bestand, in den siebziger Jahren von verhältnißmäßig viel schwereren Epidemien heimgesucht worden sind. Von solchen Ländern sind Preußen, Oesterreich und Belgien zu nennen, während beispielsweise Bayern, wo schon im Jahre 1807 der Impfwang eingeführt worden ist, und England, wo in den 70er Jahren ebenfalls der Impfwang bereits seit längerer Zeit bestand, auch bezüglich der Pockensterblichkeit Schweden an die Seite gestellt werden können.

Die Tabelle auf Seite 2, in welcher eine Pockensterblichkeit von mehr als 150 auf 100 000 Einwohner durch fetten Druck gekennzeichnet ist, giebt einen Ueberblick über diese Verhältnisse.

Erzieht man aus jener Tabelle zwar, daß die Pockenepidemie, welche in der ersten Hälfte der 70er Jahre ganz Europa heimgesucht hat, in Schweden verhältnißmäßig wenig Opfer gefordert hat, so bleibt die Zahl der letzteren doch immer noch groß genug, um der Frage näher zu treten, in wie weit etwa mangelhafte Durchführung des Impfreglements für die Epidemie verantwortlich zu machen ist. In dieser Beziehung ist vor allem die Thatfache von großer Bedeutung, daß die Hauptstadt außerordentlich schwer von der Seuche heimgesucht ist. Von den 4063 Pockentodesfällen des Jahres 1874 entfallen nämlich nicht weniger als 1206, d. h. mehr als 29 Prozent auf Stockholm (150 446 Einwohner am Schlusse des Jahres 1874). Während in dem genannten Jahre die Pockensterblichkeit in ganz Schweden 93,6 auf 100 000 Einwohner betrug, erreicht diese Ziffer für die Hauptstadt die geradezu erschreckende Höhe von 802 auf 100 000 Einwohner.

Das dem Gesundheitsamte zugegangene amtliche Material enthält nun unter anderem auch Mittheilungen des ersten Stadtarztes in Stockholm Dr. Klas Linroth über die Impf- und Pockenverhältnisse der Stadt mit besonderer Rücksicht auf die

Pockenepidemie von 1873—1874, aus welchen sich ergibt, daß in der That zur Zeit des Ausbruches jener Epidemie eine sehr viel größere Zahl von ungeimpft Gebliebenen in Stockholm vorhanden gewesen ist, als im übrigen Schweden. Unter anderem wird folgende Tabelle mitgeteilt:

Auf je 100 im Vorjahre lebend Geborene entfielen Impfungen:

| im Jahre | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| in Schweden über- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| haupt | 77 | 74 | 76 | 73 | 78 | 76 | 70 | 67 | 71 | 75 | 79 | 75 | 83 | 81 | 78 | 78 | 76 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 78 | |
| in Stockholm . . . | 45 | 46 | 50 | 58 | 57 | 61 | 52 | 40 | 44 | 50 | 58 | 33 | 48 | 49 | 22 | 26 | 28 | 34 | 35 | 31 | 45 | 72 | 59 | |

Wenn man auch berücksichtigt, daß die Kindersterblichkeit in Stockholm beträchtlicher ist als im übrigen Schweden, daß also in Stockholm verhältnismäßig mehr Kinder sterben, bevor sie zur vorgeschriebenen Impfung gelangen als in Schweden überhaupt, wenn es auch ferner feststeht, daß in Stockholm verhältnismäßig zahlreiche Impfungen nicht zur Anmeldung gelangt sind, so sind doch, wie der genannte Stadtarzt hervorhebt, „Vernachlässigungen bezüglich der Impfung in sehr großem Maßstabe vorgekommen“. Genauere Untersuchungen über die thatfächliche Durchführung der Impfung in der Hauptstadt sind erst Anfangs der 80er Jahre begonnen. Ueber das Ergebnis derselben theilt Dr. Einroth u. a. folgendes mit:

| | | | |
|---|-----|-----------|----------|
| Im Jahre 1881 wurden von den i. J. 1878 geborenen Kindern | 596 | ungeimpft | befunden |
| „ „ 1882 | „ | „ | „ |
| „ „ 1883 | „ | „ | „ |
| „ „ 1884 | „ | „ | „ |
| „ „ 1879 | „ | „ | 738 |
| „ „ 1880 | „ | „ | 958 |
| „ „ 1881 | „ | „ | 1092 |

in vier Jahren somit 3384 Kinder, welche infolge des Einschreitens der Behörden geimpft wurden, aber ohne dasselbe sicher ungeimpft geblieben sein würden. Es unterliegt nach Dr. Einroth „keinem Zweifel, daß die Impfung in Stockholm vom Volke vor dem Jahre 1873 in ebenso hohem Grade vernachlässigt wurde, wie im Anfang der 80er Jahre, obwohl keine exakten Angaben für die frühere Zeit vorhanden sind“.

Dr. Einroth theilt außerdem folgendes mit: „Alle Distrikts- (Armen-) Aerzte der Stadt führen in ihren Berichten über die Epidemie in den Jahren 1873—1874 an, daß eine sehr hohe Prozentzahl ungeimpfter Kinder unter ihrer Klientel vorgekommen, und daß die Pocken unter diesen Kindern in besonders schweren Formen und mit großer Sterblichkeit aufgetreten sind. Beispielsweise wurden in einem Distrikte unter 355 in ihren Häusern verpflegten Pockenkranken 154 Ungeimpfte gezählt, in zwei anderen Distrikten wurden unter 822 Erkrankten 304 Ungeimpfte gefunden Ueberhaupt kann man sagen, daß 30 bis 40 Prozent von allen an den Pocken erkrankten Kindern ungeimpft waren“.

Unter solchen Verhältnissen wird es nicht der mangelnden Schutzkraft der Impfung zugeschrieben werden können, daß die Epidemie in Stockholm eine derartige Ausbreitung

angenommen hat. Andererseits wird übrigens nicht bestritten, daß die Uebervölkerung, welche damals in den Wohnungen der Armen herrschte, zur weiten Verbreitung der Krankheit ebenfalls beigetragen hat.

Wie sehr die Pockensterblichkeit Schwedens im Jahre 1874 durch diejenige Stockholms beeinflußt worden ist, möge noch nachstehende Zusammenstellung veranschaulichen:

| | | |
|---|---|--|
| Von je 100000 Einwohnern starben an Pocken im Jahre 1874 | $\left\{ \begin{array}{l} \text{In Stockholm} \dots\dots\dots 802 \\ \text{In Schweden überhaupt} \dots\dots\dots 94 \\ \text{In Schweden ausschließlich Stockholm} \dots\dots\dots 68 \end{array} \right.$ | |
| | | |
| | | |

Wenn die segensreichen Wirkungen des in Schweden bestehenden Impffreglements in den ersten Jahrzehnten nach seiner Einführung am unverkennbarsten hervorgetreten sind, und wenn in den späteren Jahrzehnten die Pocken in geringem Grade wieder aufgenommen haben, so hat das zum Theil auch darin seinen Grund, daß bei den Geimpften die Schutzkraft der Impfung um so mehr abnimmt, je längere Zeit seit ihrer Ausführung verstrichen ist, und daß in dieser Beziehung diejenigen, welche die echten Pocken überstanden haben, besser geschützt sind als einmal Geimpfte. Je mehr man sich von den großen und häufigen Pockenepidemien des vorigen Jahrhunderts entfernte, um so mehr nahm die Zahl derjenigen ab, welche durch Ueberstehen der Krankheit geschützt waren, und um so zahlreicher wurden diejenigen, bei welchen ein langer Zeitraum seit Ausführung der Impfung verfloßen war, ganz abgesehen von den gegen die gesetzliche Vorschrift ungeimpft Gebliebenen. Die Revaccination aber, welche den hieraus sich ergebenden Gefahren zu begegnen geeignet gewesen wäre, war gesetzlich nicht vorgeschrieben und hat nur zur Zeit von Epidemien etwas größere Ausdehnung gefunden.*)

Zumal von denjenigen, welche den segensreichen Einfluß der Schutzpockenimpfung bestreiten, wird hinsichtlich der seit Anfang dieses Jahrhunderts eingetretenen günstigen Gestaltung der Pockensterblichkeit in Schweden noch ein Umstand besonders hervorgehoben, der auch hier nicht unerörtert bleiben soll, nämlich das mit dem Anfange dieses Jahrhunderts zusammenfallende Aufhören der Impfung mit echtem Pockengifte der sogenannten „Inokulation“.

Wie in anderen europäischen Ländern so hatte auch in Schweden in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts ein aus dem Orient stammendes Verfahren zur Bekämpfung der Pocken Eingang gefunden, welches darin bestand, daß man das echte Pockengift den noch nicht durchseuchten Personen künstlich einimpfte. Die auf diese Weise erzeugte Krankheit verlief in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle weit weniger schwer und vor allem weit weniger tödtlich, als die durch natürliche Ansteckung erwor-

*) Dr. Klas Einroth schreibt in dieser Beziehung: Die Revaccination, welche in Schweden nur in der Armee obligatorisch ist, pflegt in Stockholm nur während herrschender oder drohender Pockenepidemien in etwas größerem Maßstabe in Anspruch genommen zu werden. Vollständige Listen über die Revaccinationen werden nicht geführt. Während der Jahre 1873—1874 hat man die Anzahl der Revaccinirten auf ca. 23 000 Personen geschätzt. Die wohlthätige Wirkung der Revaccination während dieser Epidemie war jedoch augenscheinlich. In dem officiellen Bericht darüber werden beispielsweise zwei Fabriken mit zahlreichem Personal angeführt, wo „diejenigen Arbeiter, welche sich der Impfung entzogen, der Krankheit zum Opfer fielen, von allen übrigen aber Keiner“. — Von dem revaccinirten Krankenpflegepersonal im Pockenkrankenhaus, 19 Personen ausmachend, erkrankte Keiner.

benen Pocken, gewährte andererseits aber denselben Schutz gegen ein nochmaliges Befallenwerden, wie das Ueberstehen der letzteren.

Das genannte Verfahren hatte nun, wenn es auch den Einzelnen mit verhältnißmäßig geringer Gefahr vor späterer Erkrankung zu schützen vermochte, den Nachtheil im Gefolge, daß es zur Verbreitung der Pocken in der Bevölkerung beitrug, zumal da man die geimpften (inokulirten) Personen, welche meist nur leicht erkrankten, in der Regel frei umhergehen ließ.

Da nun wie in anderen Ländern so auch in Schweden mit der Einführung der Jenner'schen Schutzpockenimpfung diese bis dahin geübte Pockeninokulation sehr bald aufhörte, so ist nicht zu verkennen, daß diesem Umstande bei der Beurtheilung der Ursachen, welche die Abnahme der Pockensterblichkeit seit Anfang dieses Jahrhunderts bedingt haben, Rechnung getragen werden muß. Bis zu welchem Grade dies zu geschehen hat, dafür können wenigstens annähernd die nachstehenden von Dr. Heberden angestellten Berechnungen einen Anhalt geben.*)

In London entfielen in den drei ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, zu einer Zeit, wo der Einfluß der Inokulation noch nicht in Betracht kam, auf je 1000 Todesfälle überhaupt 74 Todesfälle an Pocken, während für den gleichen Zeitraum am Ende des genannten Jahrhunderts, zu einer Zeit, als die Inokulation ihre größte Verbreitung gefunden hatte, diese Zahl 95 betrug. Selbst wenn man nun annimmt, daß diese Zunahme**) allein auf Rechnung der Inokulation zu setzen ist, so bleibt sie doch immer sehr gering im Verhältniß zu der außerordentlichen Abnahme, welche die Pockensterblichkeit Schwedens seit Anfang dieses Jahrhunderts im Vergleich mit den letzten Jahrzehnten des vorhergehenden erfahren hat. Ueberdies hat in Schweden die Inokulation keineswegs eine so große Verbreitung erreicht, wie in England, demjenigen Lande Europas, wohin das Verfahren zuerst aus dem Orient seinen Weg fand, oder gar wie in der Stadt London. Wenn man sich der Thatfache erinnert, daß auch vor dem Bekanntwerden bezw. der Ausübung der Inokulation die Pocken in allen Ländern Europas zu den am meisten gefürchteten und verbreiteten Seuchen gehörten, und daß nur in Folge dessen die Inokulation trotz der mit ihr verbundenen, immerhin nicht unbeträchtlichen Lebensgefahr hat überhaupt Eingang finden können, so wird man gewiß auch den günstigen Einfluß, welchen die Beseitigung dieser Maßregel gehabt hat, auf seinen richtigen Werth zurückführen. Die Abnahme der Pockensterblichkeit Schwedens seit Anfang dieses Jahrhunderts kann durch das Aufhören der Inokulation auch nicht annähernd erklärt werden.

In dem mehrfach erwähnten Flugblatte des „Impfgegners“ wird besonderes Gewicht darauf gelegt, daß die Beweisraft der schwedischen Statistik für den segensreichen Einfluß der Impfung gelegentlich der Verhandlungen des VII. deutschen Arztetages

*) Report from the select committee on the Vaccination Act (1867); together with the proceedings of the committee. Ordered by the house of Commons, to be printed 23. May 1871. S. 348.

**) Daß diese Zunahme möglicherweise nur eine scheinbare ist, da die Pockentodesfälle nicht zu je 1000 Lebenden, sondern zu je 1000 Todesfällen überhaupt in Beziehung gesetzt sind, sei hier nur nebenbei bemerkt.

(im Jahre 1879) von dem Medizinalrath Dr. Flinzer aus Chemnitz bestritten worden sei. Dies ist in der That der Fall gewesen. Dr. Flinzer sprach sich in dieser Beziehung folgendermaßen aus:*) „Weiter hat man als Erhebungsmodus die Sterblichkeit benutzt und es ist Ihnen bekannt, daß namentlich die große Darstellung von Rußmaul über das Vorkommen der Pocken in Schweden vielfach benutzt worden ist, den Einfluß der Impfung darzuthun. In statistischer Hinsicht glaube ich, daß Mortalitätsserhebungen allein den geringsten Werth einnehmen und das gilt namentlich auch von der schwedischen Darstellung. Wenn man die Tabellen ansieht, so überzeugt man sich einmal, daß die Zahl der Pockenkranken vor 1790 durchaus nicht bloß Pockenranke sind, sondern daß andere Hautaffectionen sich dabei befinden, und daß weiter die Abfallcurve viel früher eintritt, ehe die Vaccination von Erfolg gewesen sein kann, d. h. ehe sie in so großem Umfange eingeführt ist, daß man überhaupt von einem Erfolg in einem Lande wie Schweden, wo sie erst spät zur geordneten Durchführung gelangte, reden kann.“

Was den ersteren Einwand betrifft, so ist nicht zu ersehen, worauf derselbe sich stützt. Wie schon oben erwähnt ist, wird an maßgebender Stelle in Schweden die Pockensterblichkeitsstatistik im Reiche, wie sie vorstehend mitgetheilt ist, vom Jahre 1774 an als zuverlässig angesehen, und es liegt daher kein Grund zu der Annahme vor, daß die Erhebungen über Pockentodesfälle von 1774 bis 1790 weniger sorgfältig gemacht sein sollten als nach 1790.

Der zweite Einwand aber ist oben bereits so eingehend erörtert und als unbegründet nachgewiesen worden, daß ein Zurückkommen auf denselben hier nicht erforderlich sein dürfte. — Ueberdies ist, wie hier ausdrücklich hervorgehoben sei, Medizinalrath Dr. Flinzer insbesondere auch auf Grund der sorgfältigsten eigenen Untersuchungen von der Schutzkraft der Impfung völlig überzeugt, wie aus den Worten hervorgeht, mit welchen er seine Ausführungen gelegentlich der erwähnten Verhandlungen schloß. Dieselben lauteten:

„Ich für meine Person, so lange ich die Ehre habe, Medicinalbeamter zu sein, werde mit aller Entschiedenheit und aus tiefster Ueberzeugung, gestützt auf das Experiment, auf Erhebungen und Erfahrungen der Aerzte, an dem Grundsatz festhalten, daß wir in der Schutzimpfung bisher die einzige prophylactische Maaßregel besitzen, die von so großer Bedeutung für die Gesundheit ist, daß selbst dabei vorkommende kleine Schädigungen die Rückgängigmachung derselben ausschließen und daß wir in dem Reichsimpfgesetze eine hoch bedeutsame Maaßregel für die möglichst zweckmäßigste und umfangreichste Durchführung der Maaßregel besitzen.“

Der VII. deutsche Arztetag aber stellte durch Annahme einer besonderen These fest, daß im Verlaufe seiner eingehenden Verhandlungen gegen die Schutzkraft der sorgfältig geübten Vaccination nur von einer Seite**) ein persönlicher Zweifel constatirt war, dessen Begründung jedoch erst „für später in Aussicht gestellt worden“.

*) Ärztliches Vereinsblatt für Deutschland. Organ des deutschen Ärztevereinsbundes VI. Bd. Leipzig 1879.

**) Es war dies Dr. Beß, einer derjenigen Aerzte, welche später in der „Kommission zur Berathung der Impffrage“ (Reichstags-Drucksache Nr. 287, I. Session 1884/85, 6. Legislaturperiode) den impfgegnerischen Standpunkt vertreten haben.

Die Hauptergebnisse der vorstehenden Erörterungen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

1. Seit Einführung der Schutzpockenimpfung im Anfange dieses Jahrhunderts ist die Pockensterblichkeit Schwedens, verglichen mit derjenigen in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, dauernd eine außerordentlich geringe gewesen.

2. Es hat sich abgelesen von der Einführung der Schutzpockenimpfung kein Grund auffinden lassen, welcher jene ganz auffällige Abnahme der Pockensterblichkeit genügend zu erklären vermöchte.

3. Die von impfgegnerischer Seite aufgestellte Behauptung, das Datum der allgemeinen Einführung der Schutzpockenimpfung in Schweden in der Statistik des englischen Blaubuches sei gefälscht, hat sich als unbegründet erwiesen.

4. Die Pockenepidemie, von welcher Schweden in den 70er Jahren dieses Jahrhunderts heimgesucht wurde, ist bei näherer Betrachtung keineswegs geeignet, die Ueberzeugung von der Schutzkraft der Impfung zu erschüttern.

Die Regelung des Impfwesens in den neun älteren Provinzen Preußens bis zum Jahre 1874

nebst einem Anhange:

Die Entwicklung des Impfwesens in der Königlich preussischen Armee.

Die in Preußen seitens der Centralbehörde vom Anfange dieses Jahrhunderts an bis zum Jahre 1874 betreffs der Schutzpockenimpfung erlassenen generellen Bestimmungen und Verordnungen sind nach einer Mittheilung der Königlich preussischen Regierung sämmtlich in den Druckwerken*) von Augustin, Horn und Eulenberg über das preussische Medicinalwesen mitgetheilt und daher jedermann zugänglich. Unter diesen Umständen wird es genügen hier nur den Hauptinhalt jener Bestimmungen, soweit sie auf eine möglichst allgemeine Durchführung der Schutzpockenimpfung abzielen, kurz zu erörtern.

Schon unter dem 11. Juli 1801 wurde auf königlichen Spezialbefehl ein Circular, die Impfungsversuche mit Kuhpocken betreffend, an alle Collegia medica et Sanitatis erlassen.**) Dasselbe ist insofern von besonderer Bedeutung, als es erkennen läßt, daß die neue Entdeckung seitens der maßgebenden technischen Behörde keineswegs sofort und ohne Prüfung mit Enthusiasmus aufgenommen worden ist.

„Gleichwohl“, heißt es in dem Circular, „findet sich Unser Medicinaldepartement bis jetzt auf keine Weise veranlaßt, dieser oder jener Meinung über die Nützlichkeit oder Schädlichkeit des Einimpfens der Kuhpocken einen entschiedenen Vorzug zu geben. Nur einer unparteiisch geprüften Erfahrung mehrerer Jahre ist diese Entscheidung vorbehalten. Vorläufig hat daher Unser Medicinaldepartement sich mit einer genauen Beobachtung und Sammlung der, hiesigen Orts und in der Nähe stattgehabten Impfungsversuche beruhigen müssen, um daraus, und aus den nächsten Folgen zu beurtheilen, ob und in wiefern Versuche dieser Art, ohne anschauliche Gefahr für Unsere Lande zu dulden seyn mögten.“

Obgleich die bisherigen Versuche als günstig bezeichnet wurden, so bestimmte doch das Circular weiterhin, ganz dem obigen Standpunkte entsprechend, daß nur von Aerzten,

*) Augustin, die Königlich preussische Medicinalverfassung oder vollständige Darstellung aller, das Medicinalwesen und die medicinische Polizei in den Königlich preussischen Staaten betreffenden Gesetze, Verordnungen und Einrichtungen. Potsdam 1818/43.

Horn, das preussische Medicinalwesen. Aus amtlichen Quellen dargestellt. Berlin 1863.

Eulenberg, das Medicinalwesen in Preußen. Berlin 1874.

**) Augustin, Vb. II, S. 607.

bezw. unter Leitung solcher von approbirten Kreis-, Land- und Stadtchirurgen Versuche mit der Schutzpockenimpfung und zwar unter Beobachtung der größten Vorsicht an- gestellt werden dürften, sowie daß von den betreffenden Aerzten genaue Journale über die Impfungen zu führen und vorzulegen seien, in welchen insbesondere auch über die Folgen der Impfungen auf den Amtseid des Betreffenden Vermerke einzutragen seien. Kein Arzt aber solle sich unterfangen jemand zur Impfung zudringlich aufzufordern oder gar dergleichen Anerbieten öffentlich bekannt zu machen, „theils, weil es für jetzt noch nicht möglich ist, die Folgen dieser Impfung mit Gewißheit zu übersehen, theils weil überhaupt jeder Arzt bey solchen Versuchen äußerst behutsam zu Werke gehen muß, für deren Wirkung er selbst auf keine Weise Bürgschaft leisten kann.“ Nur beim Ausbruche natürlicher Pocken, und sofern die Einimpfung derselben (die sogenannte Inokulation) in Folge wichtiger Umstände bedenklich werden sollte, wurde empfohlen auch allenfalls die Einimpfung der Kuhpocken nicht zu versäumen, da durch die überwiegend größere Gefahr der bössartigen Pocken alle anderen Bedenklichkeiten aufgehoben würden. Ueber das Ergebniß etwa angestellter Versuche dem Publikum Mittheilung zu machen, wurde vorbehalten.

Schon im nächsten Jahre erfolgte die in Aussicht gestellte Mittheilung. Am 7. Juni 1802 erschien nämlich eine „Bekanntmachung des Resultats der, bisher bloß geduldeten, nachher aber unter der Direktion des Ober-Coll. med. et Sanitatis von allen Provinzial-Collegiis et Sanitatis geleiteten und controllirten Kuhpockenimpfungsversuche,“*) in welcher es heißt: Se. Majestät habe versprochen, das Resultat der bezüglichen Erfahrungen dem Publikum mitzutheilen und glaube „diesen Endzweck nicht sicherer zu erreichen, als wenn Sie den über diesen Gegenstand von Dero Ober-Coll. med. et Sanitatis erstatteten Bericht öffentlich, wie hiedurch geschieht, bekannt machen.“ In diesem unter dem 2. Juni 1802 erstatteten Berichte glaubt das Ober-Collegium medicum et Sanitatis als Ergebnisse der angestellten Versuche folgende mit dem höchsten Grade der Wahrscheinlichkeit Sr. Majestät vorlegen zu können:

„1. Die Kuhpocken-Impfung bewirkt nur eine leichte gefahrlose und selbst durch Complicationen mit andern Uebeln nicht zu befürchtende Krankheit.

2. Sie schützt gegen die Ansteckung der natürlichen Pocken wenigstens ebenso sicher, als es die Impfung mit natürlichen Pocken thut.

3. Sie gewährt also ein der größten Empfehlung werthes Mittel, um Millionen Menschen vor den schrecklichen Folgen der natürlichen Pocken zu sichern und diese am Ende ganz zu vertilgen.“

Wahrlich, es mußten entscheidende Versuche gewesen sein, welche die erfahrenen Mitglieder des Ober-Collegium medicum binnen eines Jahres aus ihrer kühlen Reserve herausgebracht und zu überzeugten Lobrednern der Schutzpockenimpfung gemacht hatten.

Ueber diese Versuche selbst spricht sich das Kollegium folgendermaßen aus:

„Obgleich in allem nur 71 Aerzte und 36 Regimentschirurgen ihre Erfahrungen unserm Collegio mitgetheilt haben, so sind wir doch dadurch hinlänglich in den Stand gesetzt worden, um über die Hauptfrage: ob die Impfung mit den Kuhpocken vor den

*) Augustin, Bd. II, S. 611.

gewöhnlichen Menschenblattern sichert, und ob sie keine sonstige, der Gesundheit nachtheilige Folgen veranlaßt? urtheilen zu können. Da es liegen 7445 einzelne Impfungsversuche vor uns, wobei an einer großen Menge der mit Kuhpocken geimpften Personen Versuche aller Art gemacht worden, um sich von dem Schutze Ueberzeugung zu verschaffen, welchen die Kuhpocken vor den Menschenpocken nach der problematischen Aufgabe gewähren sollten. Man hat nicht allein den mit Kuhpocken Geimpften die natürlichen ohne allen Erfolg der Ansteckung häufig nachgeimpft, sondern man hat auch die vaccinirten Kinder jeder anderen Art der Ansteckung, z. B. durch Anziehung der von natürlichem Pockenreiter besudelten Hemden, oder dadurch, daß sie in den Betten der natürlichen Pockenkranken schliefen u. s. w., ausgesetzt.“

Nur vier Fälle seien vorgekommen, in welchen es nicht hinlänglich habe aufgeklärt werden können, ob die Vaccination vor den menschlichen Blattern schützt.

Auf Grund des vorstehend kurz wiedergegebenen Berichtes des Ober-Collegium medicum wurde noch am 7. Juni 1802 auf Spezialbefehl des Königs ein Circular an alle Collegia medica et Sanitatis erlassen,*) in welchem es einer jeden zur Impfung der Pocken autorisirten Medizinalperson zur Pflicht gemacht wurde, den Eltern, Vormündern und Vorstehern öffentlicher Waisenhäuser und ähnlicher Institute die Impfung mit Kuhpocken zu empfehlen und, wenn Eltern oder Vormünder auf die Impfung mit menschlichen Pocken beständen, wenigstens alle Fürsorge anzuwenden, daß sich dadurch keine Ansteckung verbreite, indem sie für dergleichen Folgen verantwortlich gemacht werden würden.

Am 31. Oktober 1803 wurde vom Könige ein „Reglement, nach welchem sich die Obrigkeit, Medicinal- und andere Personen bei Impfung der Schutzblattern richten sollen“**) erlassen, dessen Eingangssätze hier ebenfalls im Wortlaut mitgetheilt sein mögen, da in denselben der derzeitige Stand der Impffrage aufs deutlichste zum Ausdruck kommt:

„Wir F. W. thun kund und zu wissen. In der festen Ueberzeugung, daß neue Entdeckungen in dem Gebiet der medicinischen Wissenschaften nicht gleich einen Gegenstand der Regierung abgeben müssen, haben wir bisher die Impfung der Schutzblattern, die in Unsern Staaten, sowie im Auslande, seit ihrer im Jahre 1795 erfolgten zufälligen Erfindung so große Fortschritte gemacht hat, blos der Leitung Unserer Medicinalbehörde überlassen und nur insofern mitgewirkt, daß Wir, um stets ächten Impfstoff vorrätzig zu haben, in Berlin, Königsberg und andern großen Städten Unserer Monarchie, besondere Impfungsinstitute auf Unsere Kosten haben etabliren lassen. Nachdem aber im Gefolge der aus Unserm Medicinaldepartement unterm 11. Juli 1801 und 7. Juni pr. ergangenen Circularien und Anweisungen für die Medicinalcollegien und die practischen Aerzte sich die Fragen:

1. schützt der ächte Kuhpockenstoff vor der Ansteckung der natürlichen Pocken?
2. ist die Impfung der erstern mit andern gefährlichen Folgen für die Gesundheit verbunden?

*) Augustin, Bd. II, S. 613.

**) Augustin, Bd. II, S. 614.

zum überwiegenden Ausschlag für die Vaccine entschieden haben, indem Unserm Ober-Coll. med. et Sanitatis innerhalb Jahr u. Tag von practischen Aerzten und Regimentschirurgen 17741 veranstaltete und sorgfältig beobachtete Impfungen einberichtet und dabei die erste Frage durch 8000 Ansteckungsversuche bestätigt, die zweite aber durch eine seit drei Jahren fortgesetzte pflichtmäßige Controlle zum Vortheil der Schutzblättern beseitigt worden; so finden Wir aus väterlicher Fürsorge für das Leben und die Gesundheit Unserer getreuen Unterthanen Uns veranlaßt, die Beförderung der Schutzblätternimpfung nunmehr zu einem besondern Augenmerk Unserer Staatsverwaltung in der Absicht zu machen, damit das menschliche Pockenübel, welches im Durchschnitt jährlich mehr als 40 000 Menschen in Unserm Landen wegraffte, sobald als möglich vertilgt und ausgerottet werde."

Dementsprechend wurde in dem Reglement den Ortsobrigkeiten, Magistraten u. zur Pflicht gemacht, der Beförderung der Schutzpockenimpfung auf alle Art und Weise die Hand zu bieten, indem gleichzeitig die Berechtigung zur Vornahme von Impfungen unter gewissen Vorbehalten auf die Chirurgen, die Landgeistlichen, Landschullehrer und Landhebebeamten ausgedehnt wurde. Andererseits wurde in dem Reglement die Erlaubniß, Impfungen mit dem Stoffe der natürlichen Pocken vornehmen zu dürfen, sehr beschränkt und an bestimmte genau festgesetzte Bedingungen geknüpft.

Am 13. Oktober 1804 erließ der König eine „Declaration und Erweiterung des Impfungsreglements vom 31. Oktober 1803.“*) In dieser Verordnung wurde darauf hingewiesen, daß mehr als 80 000 Impfungen in Preußen durch die Medizinalkollegien und Behörden kontrolirt seien, daß aber nicht ein Fall bemerkt worden sei, der an der schützenden Kraft der Kuhpocken und ihrer Unschädlichkeit zweifeln ließe. Mit Rücksicht hierauf wurden die Wundärzte ohne Vorbehalt zur Vornahme von Impfungen berechtigt erklärt, und die Geistlichen aufgefordert, bei schicklichen Gelegenheiten die Impfung den Gemeindegliedern als eine moralische Pflicht ans Herz zu legen und sonst gelegentlich in ihren Predigten auf dieselbe hinzuweisen.

Öffentliche Bekanntmachungen, durch welche auf den Nutzen der Schutzpockenimpfung aufmerksam gemacht wurde, erschienen auch in der Folge mehrfach. Unter dem 4. Februar 1809**) erging ein Befehl des königlichen Ministeriums des Innern an die Regierungen und Medizinalkollegien, welcher bestimmte, daß die Aerzte und Wundärzte zur unentgeltlichen Impfung der Schutzblättern an bestimmten Tagen jeder Woche und die Geistlichen zur Ermahnung des Volkes zu derselben aufzufordern seien.

Schon früh scheinen auch an denjenigen Orten, an welchen eine Pockenepidemie sich zu entwickeln begann, polizeilich Zwangsimpfungen angeordnet zu sein. In einem Ministerialreskript vom 13. August 1810***) heißt es nämlich unter anderem:

„Zugleich werdet Ihr angewiesen, bei vorkommenden Epidemieen natürlicher Pocken, d. h. wenn in einem Orte mehrere Pockenranke in 2 bis 3 Häusern, in mittlern und großen Städten aber in 4 bis 8 Häusern zugleich vorkommen, zur Unterdrückung der-

*) Augustin, Bd. II, S. 617.

**) Augustin, Bd. II, S. 620/1.

***) Augustin, Bd. II, S. 622/3.

selben alle die Maaßregeln zu ergreifen, welche der Polizei zur Tilgung gefährlicher ansteckender Krankheiten zustehen. Nur ist dahin zu sehen, daß wenn Häuser Sperre, Zwangsimpfungen und dergleichen verfügt werden müssen, unschuldige Einwohner mit den dadurch verursachten Kosten nicht belästigt, sondern daß solche nur lediglich und allein den Widerspenstigen und Nachlässigen zur Last gelegt werden."

Durch Ministerial-Verfügung vom 21. August 1819*) wurde ein neues Schema für die Schutzpocken-Impfungstabellen vorgegeschrieben, welche von den Impfärzten alljährlich an die Kreisphysiker und von diesen an die königlichen Regierungen einzureichen waren. Dieses Schema enthielt auch die Rubrik „Ob und wieviel von den mit Erfolg Geimpften, um Versuche anzustellen, zum 2. oder 3. Male nachgeimpft sind."

In demselben Jahre, nämlich am 24. September 1819**), erschien ein bemerkenswerthes „Publicandum des Königl. Ministerii der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten über die Schutzkraft der Kuhpocken gegen die Ansteckung der Menschenblattern“, welches durch den Umstand veranlaßt war, daß die Schutzkraft der Kuhpocken gegen Menschenblattern sich nicht mehr in allen Fällen bewährt hatte. Die Ursache dieser mehrfach beobachteten Mißerfolge wurde in dem Publicandum auf fehlerhafte Beschaffenheit der benutzten Lymphe und auf Störungen des Verlaufs der Schutzpocken durch vorzeitiges Öffnen, Abkraken zc. derselben zurückgeführt. Auch wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, daß mit der Impfung bei unvorsichtiger Vornahme andere Krankheiten übertragen werden könnten, und insbesondere ein in den Rheingegenden beobachteter Fall erwähnt, in welchem die durch einen unvorsichtigen Landwundarzt von einem infizirten Kinde entnommene unreine Lymphe zur Uebertragung von Syphilis auf mehrere Personen Veranlassung gegeben hatte. Solche Erfahrungen mußten, so heißt es in dem Publicandum, die Regierungen überall veranlassen, das Impfgeschäft ausschließlich wissenschaftlich gebildeten, vorsichtigen und gewissenhaften Ärzten und Wundärzten anzuvertrauen. —

Im Laufe der 20er Jahre tritt mehr und mehr das Bestreben der Behörden hervor, die als nothwendig erkannte Impfung aller noch für Pocken empfänglichen Kinder allgemein und nöthigenfalls unter Anwendung von Zwangsmaßregeln zur Durchführung zu bringen. Daß diese Bestrebungen bei der Centralbehörde rückhaltlose Unterstützung fanden, wenn dieselbe auch davon abjah, ein bezügliches einheitliches Gesetz zu befürworten, darüber läßt ein Reskript des königlichen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten an sämtliche königliche Regierungen vom 1. Mai 1825***) keinen Zweifel. Das Reskript sei daher in seinem wesentlichen Theile nachstehend wörtlich mitgetheilt:

„Zwar ist schon seit längerer Zeit von verschiedenen Seiten her der Vorschlag gemacht worden, gesetzlich die Verpflichtung der Eltern oder der ihre Stelle vertretenden Personen, den Kindern die Schutzpocken einimpfen zu lassen, auszusprechen. Die Erlassung eines solchen förmlichen Gesetzes unterliegt jedoch theils manchen Schwierigkeiten, theils aber auch manchen Bedenken, und das Ministerium hat sich daher beschränken müssen,

*) Augustin, Bd. III, S. 678/9.

**) Augustin, Bd. III, S. 645.

***) Augustin, Bd. IV, S. 760 ff.

im gewöhnlichen administrativen Wege auf die möglichst allgemeine Verbreitung der Schutzpockenimpfung, durch welche allein den Ausbrüchen verheerender Pocken-Epidemien vorgebeugt werden kann, hinzuwirken. Von mehreren Regierungen ist hierbei mit kräftigen, ja selbst mit mehr oder weniger directen Zwangsmaaßregeln gegen die etwaigen Widerspenstigen vorgeritten, und ebenso ist die Belohnung der Impfarzte entweder durch Diäten aus den hierzu geeigneten Communalfonds oder durch Zahlung einer kleinen Gebühr für jeden Impfling von den Eltern und eventualiter aus der Armenkasse, nicht weniger auch ist die Stellung der zu den Impfreisen nöthigen Fuhren angeordnet worden, ohne daß hierdurch auch nur Eine zur Kenntniß des Ministerii gekommene Reclamation veranlaßt worden wäre. Es läßt sich sonach auch mit Bestimmtheit voraussagen, daß die zur Ausführung der Schutzpockenimpfung getroffenen Einrichtungen nicht weiter als bloße polizeiliche, sondern vielmehr als solche Maaßregeln von den Unterthanen betrachtet werden, durch welche ihnen der Schutz ihrer Kinder gegen die natürlichen Pocken erleichtert wird.

Nach den vorliegenden Erfahrungen hat das Ministerium es daher für angemessen erachtet, nunmehr auf eine möglichst gleichmäßige Behandlung dieser Angelegenheit in der ganzen Monarchie hinzuwirken. Es wurde daher die Regierung zu Düsseldorf veranlaßt, durch ihren, unterdeß verstorbenen Reg. Med. Rath, den Dr. Ebermaier, welcher sich durch eine umsichtige Führung des Pockenimpfungs-Geschäfts besonders auszeichnete, ihre früher darüber erlassenen Vorschriften einer wiederholten Prüfung zu unterwerfen, und eine neue, diese ganze Angelegenheit vollständig umfassende Verordnung zu erlassen.

Dies ist nunmehr in der Beilage zu Nr. 93 des Amtsblattes für 1824 unterm 12. Novbr. v. J. geschehen, wovon ein Abdruck hierbei erfolgt. — Gegenwärtig kommt es darauf an, daß die Königl. Regierung die betreffenden, in Ihrem Bezirke erlassenen Vorschriften einer ähnlichen sorgfältigen Revision, mit Hinsicht auf die anliegende, recht zweckmäßige Verordnung, unterwerfe und hiernach näher erwäge, ob und welche Maaßregeln Ihrer Seits zu ergreifen sein werden, um den Zweck vollständig zu erreichen, oder doch sich dem Ziele möglichst zu nähern. Von dem, was hierunter von der Königl. Regierung geschehen, erwartet das Ministerium baldige Anzeige, wobei es vorläufig bemerkt, daß die etwa für nöthig zu erachtenden Veränderungen mit dem Jahre 1826 in das Leben treten müssen. —

Im Weiteren wird in dem Reskript die Frage erörtert, in welcher Weise die erforderlichen Geldmittel zu beschaffen, wie die Impfbezirke zu bilden und die Berichterstattung zu regeln seien. Zugleich wird verfügt, daß vom Jahre 1826 an eine Generalimpftabelle über die in jedem Regierungsbezirk vorgenommenen Impfungen nach umstehendem Schema einzureichen sei.

Daß die Vorschriften über die Vorkehrungen bei dem Ausbruche der natürlichen Menschenpocken durch den Inhalt des Reskripts nicht berührt werden sollen, wird ausdrücklich bemerkt und bekannt gegeben, daß dieser Gegenstand von dem Königlichen Ministerio des Innern und der Polizei ressortire.

Die „Bekanntmachung der Königl. Regierung zu Düsseldorf, die allgemeine Einführung der Schutzpockenimpfung betreffend“ vom 12. November 1824, welche dem

| Namen der Kreise | Es sind in die Impfliste für das Jahr 1826 aufgenommen | | | | Davon sind in Abzug zu bringen | | | |
|------------------------|--|-------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | aus der Impfliste für das vorher- gegangene Jahr übertragen | Neugeborene | neu angefielde Impflinge | Summe | die Lodt- geborenen | die vor der Impfung Gestorbenen | die aus dem Kreise weg- gezogenen | Summe |
| | | | | | | | | |

| Bleiben zu impfen | Es sind mit Erfolg geimpft worden | Es sind zum dritten Male ohne Erfolg geimpft worden | Es sind in die Impfliste für das Jahr 1827 übertragen worden | | | Von den Geimpften sind geimpft | | |
|-------------------------|--|---|---|---|-------|-----------------------------------|----------|-------|
| | | | ohne Erfolg oder mit unsicherm Erfolg Geimpfte | aus besonderen Ursachen ungeimpft Gebliebene | Summe | öffentlich | privatim | Summe |
| | | | | | | | | |

vorstehend auszugsweise mitgetheilten Ministerialreskript beigefügt ist, enthält im wesentlichen etwa folgende Bestimmungen:

1. Jährlich muß bis zum 1. Juli betreffs der im vorhergehenden Jahre geborenen Kinder von den Eltern zc. bei dem Bürgermeisteramte durch ärztliches Attest der Nachweis geführt werden, daß die Kinder mit oder ohne Erfolg geimpft worden sind oder wegen speziell anzugebender Kränklichkeit nicht haben geimpft werden können.

2. Für alle seit dem 1. Januar 1811 (also innerhalb der letzten 13 Jahre) geborenen Kinder muß der Nachweis der überstandenen Menschenblattern oder Schutzpocken, bezw. der dreimal zu verschiedenen Zeiten ohne Erfolg ausgeführten Schutzpockenimpfung in näher bezeichneter Weise nachträglich erbracht werden.

3. Sämmtliche nach dem 1. Januar 1811 geborenen, in öffentlichen oder Privatverforgungs-, Erziehungs-, Schul-, Fabrik- und Arbeitsanstalten, Werkstätten und Privatdienst aller Art befindlichen oder in Zukunft aufzunehmenden Personen müssen mit einem den Bestimmungen unter 1 und 2 versehenen Scheine versehen sein.

4. Personen, welche Unterstüßungen aus Staats- oder Gemeindefassen, Pensionen, Anstellungen zc. nachsuchen, sind abzuweisen, so lange ihre Kinder oder Pflegebefohlenen noch ungeimpft sind.

5. Die Polizeibeamten haben über die genaue Befolgung der vorstehenden Bestimmungen zu wachen, und sollen in den von ihnen gehörig konstatarnten Kontraventionsfällen die Schuldigen vor das gewöhnliche Polizeigericht gestellt und mit 1 bis 5 Thaler Geldstrafe oder nach Befinden der Umstände mit einer Gefängnißstrafe von 1 bis 5 Tagen belegt werden.

Im übrigen enthält die Bekanntmachung Vorschriften, welche eine sorgfältige Listenführung über alle öffentlichen und Privatimpfungen sicher zu stellen und eine leichte Kontrolle zu ermöglichen bestimmt waren. Alle Kinder, welche im Laufe des Jahres ihrer Impfpflicht noch nicht oder noch nicht völlig genügt hätten, sollten auf das folgende Jahr übertragen werden. Im Falle des Verziehens Ungeimpfter sollte die Lokalbehörde des neuen Wohnortes auf dieselben aufmerksam gemacht werden.

Wie aus Vorstehendem sich ergibt, unterliegt es keinem Zweifel, daß das Ministerialreskript vom 1. Mai 1825 thatsächlich auf die Herbeiführung der allgemeinen Impfung mittels Zwangsmaßregeln hinauslief. Der durch das Reskript geschaffene Rechtszustand hat indeß nur wenige Jahre bestanden und zwar aus dem Grunde, weil jene Maßregeln an Allerhöchster Stelle nicht gebilligt wurden. Unter dem 29. Januar 1829 erschien nämlich die nachstehende „Circularverfügung der Königl. Ministerien der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten, wie auch des Innern und der Polizei, an sämtliche Königl. Regierungen, die Zwangsmaßregeln zur Schutzpockenimpfung betreffend“:*)

„Des Königs Majestät haben bei einer neuern Veranlassung den direkten Impfungszwang wiederholt zu untersagen und namentlich in dieser Hinsicht die Wiederaufhebung der Verfügung der Regierung zu Düsseldorf vom 12. November 1824, so weit solche einen directen Impfwang involvirt, zu befehlen geruhet. Der Königl. Regierung wird solches zur Nachricht und Achtung hierdurch bekannt gemacht.

Berlin, den 29. Januar 1829.

(gez.) v. Altenstein.

(gez.) v. Schuckmann.“

War somit die allgemeine Zwangsimpfung wieder beseitigt, so blieb es fraglich, ob die Allerhöchste Willensmeinung auch auf diejenigen Zwangsimpfungen sich beziehe, welche bis dahin bei Ausbruch der Pocken an einem Orte von Fall zu Fall polizeilich angeordnet werden durften. Ein Reskript der beiden zuständigen Ministerien vom 13. Juli 1833**) an die Königliche Regierung zu Gumbinnen spricht sich hierüber folgendermaßen aus:

„Der Königl. Regierung wird in Bescheidung auf den Bericht vom 24. Januar c., die Kosten der Zwangs-Impfungen und bei dem Ausbruche einer Pocken-Epidemie betreffend, eröffnet, daß bei der durch die Verfügung des Ministerii des Innern vom 13. August 1810, als Mittel zur Unterdrückung einer bereits ausgebrochenen Menschenblattern-Epidemie angeordneten Zwangs-Impfung, — auf welche sich die Allerhöchste Cabinetsordre vom 30. Mai 1826 nicht bezieht, und bei welchen es daher bis zur Emanirung anderweiter Bestimmungen sein Bewenden haben kann, wenn solche gleich nur mit großer Vorsicht anzuwenden sind, — den Widerpenftigen nur die von ihnen selbst veranlaßten Kosten, wie Häuserperre und Zwangs-Impfungen, zur Last gelegt werden können, nicht aber die Kosten für solche Maßregeln, die dem allgemeinen Besten zu statten kommen, wohin namentlich die Reisekosten der Impfarzte zu rechnen, welche auf die Diäten und Fuhrkosten-Fonds der Königl. Regierungen zu übernehmen sind.“

In der Folge scheinen indeß betreffs der Zulässigkeit der in Frage stehenden von Fall zu Fall anzuordnenden Zwangsmaßregeln auch innerhalb der höchsten Behörden Zweifel entstanden zu sein; denn ein Reskript der beiden beteiligten Ministerien an die Königliche Regierung zu Gumbinnen vom 29. September 1834***) lautet folgendermaßen:

*) Augustin, Bd. V, S. 664/5.

**) Augustin, Bd. VI, S. 757.

***) Augustin, Bd. VI, S. 958.

„Der Königl. Regierung wird auf die in Ihrem Berichte vom 29. Juni c., in Betreff der Zwangs=Impfung der Schutzblattern beim Ausbruch der Menschenpocken gemachte Anfrage hierdurch eröffnet, daß des Königs Majestät sowohl in der frühern Allerhöchsten Cabinets=Ordre vom 30. Mai 1826, als auch in der spätern vom 13. December 1828, welche wegen des Verfahrens der Regierung zu Düsseldorf ergangen ist, sowie noch neuerdings sich einfach, und ohne irgend eine Ausnahme zu gestatten, dahin auszusprechen geruht haben, daß Allerhöchst Dieselben keinen directen Zwang bei der Impfung gestatten wollen. Ob daher zu Zeiten und an Orten, wo die Pocken als Seuche herrschen, Zwangs=Impfungen vorgenommen werden dürfen, ist in der That noch zweifelhaft, und nur von den Ministerien angenommen worden, daß der Allerhöchste Befehl sich auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge beziehe, und in polizeilichen Maßregeln zur Zeit der Seuche, wohin denn auch die Zwangs=Impfungen zu rechnen sind, nichts habe ändern sollen. Diese ungewisse Lage muß wenigstens zur äußersten Vorsicht in Anwendung des gedachten Zwanges und zur Beschränkung desselben auf die dringendsten Fälle auffordern.“

In einem Reskript, welches die beiden beteiligten Ministerien unter dem 7. November 1834 an die Königliche Regierung zu Trier erlassen haben, ist von diesen ausnahmsweise anzuordnenden Zwangsimpfungen überhaupt nicht die Rede, es wird vielmehr jeder direkte Impfwang als unzulässig bezeichnet. Das Reskript lautet:*)

„Die unterzeichneten Ministerien sind mit dem Verfahren der Königl. Regierung in sofern vollkommen einverstanden, als dieselbe zur Förderung der Schutzpocken=Impfung die Mittel der Vorstellung, der Ueberzeugung und des moralischen Zwanges in Anwendung gebracht, und hierbei die Mitwirkung der Ortsbehörden, Pfarrer u. s. w. in Anspruch genommen hat. Dagegen können dieselben die Anwendung der Geld- und Gefängnißstrafen, als dem directen Zwange angehörend . . . nicht genehmigen, da des Königs Majestät sich zu verschiedenen Zeiten darüber bestimmt auszusprechen geruht haben, daß bei der Impfung der Schutzblattern jeder directe Zwang vermieden werden soll. Der Königl. Regierung kann daher, um dennoch möglichst zum Ziele zu gelangen, nur die Anwendung eines indirecten Zwanges, namentlich durch polizeiliche Erinnerung und Verfügung der lästigen Maßregeln, die in Folge der vernachlässigten Impfung in den Erkrankungsfällen an den natürlichen Blattern eintreten müssen, überlassen bleiben. Dies wird der Königl. Regierung auf Ihre in dieser Angelegenheit gemachte Anfrage vom 12. September c. hierdurch eröffnet.“

Eine einheitliche Regelung des Impfwesens für den Bereich der Preussischen Monarchie erfolgte unter Aufhebung der bis dahin erlassenen bezüglichen Bestimmungen durch die „Sanitätspolizeilichen Vorschriften (Regulativ) bei ansteckenden Krankheiten“ vom 8. August 1835, und zwar, soweit die Civilbevölkerung in Betracht kommt, durch §§ 50 bis 56 und § 58 dieses Regulativs.**)

*) Augustin, Bd. VI, S. 959.

**) Gesetzsammlung für die königlich preussischen Staaten 1835, S. 239.

Da jene Bestimmungen bis zum Inkrafttreten des Reichs=Impfgesetzes vom 8. April 1874 zu Recht bestanden haben, so möge ihr Inhalt hier wörtlich mitgetheilt sein:

„Sanitätspolizeiliche Vorschriften bei ansteckenden Krankheiten.

(In der zugehörigen Allerhöchsten Kabinettsordre als „Regulativ“ bezeichnet.)

Einimpfung der Schutzpocken.

§ 50. Als das sicherste Schutzmittel gegen die Menschenpocken ist durch die Erfahrung die Einimpfung der Schutzpocken nachgewiesen.

Es ist daher einem Jeden dringend zu empfehlen, sich selbst, seine Kinder, Pflegebefohlenen und andere Angehörigen ohne zureichende, von Sachverständigen anerkannte Hinderungsgründe der Schutzpocken=Impfung nicht zu entziehen, vielmehr wird von allen Einsichtsvollen die Beförderung dieser Maaßregel durch Beispiel und Belehrung ihrer Mitbürger erwartet.

Die Beamten und insbesondere die Landräthe und Kreisphysiker, so wie alle mit der Verwaltung der Medizinalpolizei beauftragten Personen müssen es sich angelegen seyn lassen, bei jeder sich darbietenden Gelegenheit, der weiteren Verbreitung und allgemeinen Aufnahme dieses ebenso sicheren, als durchaus unschädlichen Schutzmittels förderlich zu seyn.

Ausübung des Impfgeschäfts.

§ 51. Das Schutzpocken=Impfgeschäft steht unter der Aufsicht und Kontrolle der betreffenden Polizeibehörde, und ist nur den zur bürgerlichen Praxis gehörig approbirten Aerzten und Wundärzten und zwar unter der Bedingung erlaubt, daß sie die in Betreff desselben erlassenen Vorschriften genau befolgen, wobei es ihnen insbesondere zur Pflicht gemacht wird, den Impfstoff nur von völlig gesunden Individuen zu entnehmen. Von den in ihrer Privatpraxis vorgenommenen Impfungen haben die Aerzte vierteljährlich genaue namentliche Listen an die Polizeibehörde einzusenden.

Öffentliche Gesamtimpfungen.

§ 52. Behufs der Vakzination der sich hiernach als noch ungeimpft ausweisenden Individuen sollen alljährlich oder, wenn die Umstände es erforderlich machen, öfter in den verschiedenen landrätthlichen Kreisen und überhaupt, wo solches nicht schon fortwährend geschieht, öffentliche Gesamt=Impfungen vorgenommen werden, wobei genau nach dem von den betreffenden Ministerien zu erlassenden Regulative zu verfahren ist.

Ausstellung von Impf=Scheinen.

§ 53. Ueber jede geschehene Impfung und deren Erfolg ist von dem Impfarzte ein Schein auszustellen.

Zwangsmaafregeln.

§ 54. Sind Kinder dessen ungeachtet bis zum Ablauf ihres ersten Lebensjahres ohne erweislichen Grund ungeimpft geblieben, und werden demnächst von den natürlichen Blattern befallen, so sind deren Ältern und resp. Vormünder wegen der veräumten Impfung in Hinsicht der dadurch hervorgerufenen Gefahr der Ansteckung in polizeiliche Strafe zu nehmen.

Schulvorsteher, Handwerksmeister, andere Gewerbtreibende und Dienst-Herrschaften werden wohl thun, sich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß die bei ihnen in Unterricht, Lehre oder Dienst tretenden Personen geimpft sind. Personen, welche für ihre Kinder oder Pflegebefohlenen die Aufnahme in öffentliche Anstalten des Staats, Stipendien oder andere Benefizien nachsuchen, sind abzuweisen, wenn sie den Nachweis über die geschehene Impfung nicht führen können. Vergl. auch § 56.

Beim Ausbruch von Pocken.

§ 55. Brechen in einem Hause die Pocken aus, so ist genau zu untersuchen, ob in demselben noch ansteckungsfähige Individuen vorhanden sind, deren Vakzination alsdann in der kürzesten Zeit vorgenommen werden muß.

Bei weiterer Verbreitung der Krankheit sind zugleich sämtliche übrige Einwohner auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen, und aufzufordern, ihre noch ansteckungsfähigen Angehörigen schleunigst vakziniren zu lassen; zu welchem Ende von Seiten der Medizinalpolizei die nöthigen Veranstaltungen getroffen und erforderlichen Falls Zwangs-Impfungen bewirkt werden müssen.

Revakzination.

§ 56. Auch ist, wie überhaupt, so unter den genannten Umständen insbesondere, den schon vor längerer Zeit, wenn auch mit Erfolg geimpften Individuen, eine Revakzination, wegen der dadurch bewirkten größeren Sicherheit, zu empfehlen.

Eine Aufnahme in Pensionsanstalten, welche mit öffentlichen Unterrichts-Instituten verbunden sind, darf nicht eher stattfinden, als bis der aufzunehmende Zögling seine Vakzination oder Revakzination, als innerhalb der letzten zwei Jahre wirksam an ihm vollzogen, nachgewiesen hat.

.
(Der § 57, Bestimmungen hinsichtlich des Militärs enthaltend, wird weiter unten mitgetheilt werden.)

Verbot des Einimpfens der Menschenpocken.

§ 58. Das Einimpfen der Menschenpocken ist bei dreimonatlicher Freiheitsstrafe verboten.“

Ein Vergleich dieser Bestimmungen mit denjenigen des Reichs-Impfgesetzes zeigt, daß die Behauptung, in den Impfverhältnissen Preußens sei durch das Inkrafttreten des Reichs-Impfgesetzes vom 8. April 1874 nichts Wesentliches geändert worden, durchaus hinfällig ist. Diese Behauptung ist von Impfgegnern ausgesprochen worden, um zu beweisen, daß angeblich auch früher, trotz Impf- und Wiederimpfzwang, heftige Pockenepidemieen (z. B. 1871/72) vorgekommen seien.

Es steht fest, daß — abgesehen von der Militärbevölkerung, von welcher später noch die Rede sein wird — nach dem Regulativ von 1835 in pockenfreien Zeiten Niemand gesetzlich gezwungen war, sich oder seine Kinder impfen zu lassen. Zwar wird in dem Regulativ die Impfung einem Jeden dringend empfohlen und ihre Beförderung durch Beispiel und Belehrung von allen Einsichtsvollen erwartet. Auch werden die zuständigen Beamten angewiesen, der weiteren Verbreitung und

allgemeinen Aufnahme der Impfung bei jeder sich darbietenden Gelegenheit förderlich zu sein (§ 50). Ein Zwang zur Impfung wird aber nur für den Fall vorgeesehen, daß die Pocken in einem Hause ausbrechen, und zwar zunächst ausschließlich für die noch ansteckungsfähigen Hausbewohner. Erst bei weiterer Verbreitung der Krankheit sollen erforderlichen Falls auch für die übrige Bevölkerung des betreffenden Ortes Zwangsimpfungen angeordnet werden (§ 55). In pockenfreien Zeiten ist keinerlei gesetzliche oder polizeiliche Strafe für das Unterlassen der Impfung vorgesehen; eine solche soll nur über diejenigen Eltern zc. verhängt werden, deren ohne erweislichen Grund ungeimpft gebliebene Kinder demnächst von den Pocken befallen werden. Ein indirekter Zwang zur Impfung ist daneben insofern verfügt, als die Aufnahme in öffentliche Staatsanstalten und die Gewährung gewisser Benefizien (§ 54), sowie die Aufnahme in Pensionsanstalten, welche mit öffentlichen Unterrichts-Instituten verbunden sind (§ 56), von dem Nachweise der geschehenen Impfung bezw. Wiederimpfung abhängig gemacht werden.

Auf die Schulen im allgemeinen erstreckt sich die letztere Bestimmung nicht; die Schulpflichter werden vielmehr nur darauf hingewiesen, daß sie wohl thun werden, sich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß die bei ihnen in Unterricht tretenden Personen geimpft sind (§ 50).*)

Was die Wiederimpfung betrifft, so beschränkt sich das Regulativ darauf, dieselbe den schon vor längerer Zeit, wenn auch mit Erfolg geimpften Individuen wegen der dadurch bewirkten größeren Sicherheit zu empfehlen (§ 56). —

Von generellen Bestimmungen bezüglich des Impfwesens, welche nach dem Inkrafttreten des „Regulativs“ vom 8. August 1835 ergangen sind, kommen hier zunächst zwei Circularverfügungen vom 9. Juli 1840**) und 28. Februar 1841***) in Betracht, welche

*) Eine Ministerialverfügung vom 13. August 1856 äußert sich über diesen Punkt folgendermaßen: „Namentlich ist es nicht statthaft, von dem Nachweis der Impfung die Aufnahme schulpflichtiger Kinder in die öffentliche Schule abhängig zu machen oder gar nicht geimpfte Kinder aus der Schule zu entfernen. Zwar sind die mit öffentlichen Unterrichts-Instituten verbundenen Pensions-Anstalten nach § 56 Alinea 2 des Regulativs vom 8. August 1835 verpflichtet, nur solche Zöglinge aufzunehmen, welche die innerhalb der letzten zwei Jahre wirksam an ihnen vollzogene Vakzination oder Revakzination nachgewiesen haben. Allein die von Alinea 2 des § 54 wesentlich verschiedene Fassung dieser Vorschrift zeigt deutlich die Absicht des Gesetzgebers, einen solchen Impfwang für gewöhnliche öffentliche Schulen nicht eintreten zu lassen zc.“ (Horn zc. S. 308)

Eine Erweiterung fand die in Frage stehende Bestimmung erst im Jahre 1871, indem damals die Aufnahme in öffentliche Schulen, deren Besuch nicht obligatorisch ist, allgemein von dem Nachweis der vollzogenen Impfung abhängig gemacht wurde. Die betreffende vom 31. Oktober 1871 datirte ministerielle Circularverfügung an sämtliche Provinzial-Schulkollegien und Regierungen lautet:

„Die große Ausdehnung der Pockenepidemie in neuerer Zeit nöthigt mich dazu, in dieser Beziehung auf schützende Maßregeln für die die öffentlichen Schulen besuchende Jugend Bedacht zu nehmen. Ich finde mich deshalb in Bezug auf § 54 und § 56 des durch die königliche Ordre vom 9. August 1835 bestätigten Regulativs, die sanitätspolizeilichen Vorschriften bei ansteckenden Krankheiten betreffend, veranlaßt, hiermit anzuordnen, daß von Seiten der Medizinal-Aufsichts-Behörden die Directoren und Rectoren der öffentlichen Schulen, deren Besuch nicht obligatorisch ist, angewiesen werden, hinfort die Aufnahme der Knaben, resp. Mädchen auch von der Beibringung eines Attestes über die stattgehabte Impfung, resp. Revakzination abhängig zu machen“ (Eulenberg, Seite 215).

**) Augustin, Bd. VII. S. 474.

***) Eulenberg, S. 201.

sich auf die Generalberichte über die Impfungen beziehen. Von der Anordnung einer vollkommenen Gleichmäßigkeit in der Führung der Impflisten wurde abgesehen, weil, wie es in der letztgenannten Verfügung heißt, der Zweck der Impfeinrichtungen, nämlich eine so allgemeine Ausbreitung und so vollständige Ausführung der Schutzpocken-Impfung, als ohne gesetzlichen Impfwang zu erlangen sei, bereits überall erreicht werde, das Ministerium auch von dem Erfolge und dem Zustande der Impfsache in den verschiedenen Provinzen regelmäßige und möglichst zuverlässige Nachrichten erhalte.

In einer Circularverfügung vom 28. Mai 1841*) hebt der Minister für 2c. Medizinal-Angelegenheiten hervor, daß die Regierungen mit Erfolg bemüht gewesen seien, durch Herbeiführung gut eingerichteter Gesamtimpfungen so viel als irgend möglich den Einzelnen der Zahlung für die Impfung zu überheben und so dieses hauptsächlichste Hinderniß des allgemeinen guten Fortganges der Impfungen zu beseitigen. Der Mangel einer strengen Verpflichtung zur Impfung würde auch kaum empfunden werden, wenn nicht in einzelnen Regierungsbezirken, in welchen das Impfwesen übrigens gut organisiert sei, einzelne Kreise, Bürgermeistereien oder andere Gemeinden sich fortwährend weigerten, die Impfung als eine Angelegenheit des Ganzen zu betrachten und durch Einigung mit bestimmten Impfarzten das Impfwesen mit dem Verfahren in den übrigen Bezirken übereinstimmend und den Anordnungen der Regierung entsprechend einzurichten. Die nachtheilige Folge davon sei gewesen, daß in solchen Bezirken wegen der großen Zahl der ungeimpft Gebliebenen in gleichem Maße echte Menschenblattern und durch Uebertragung auf Geimpfte Varioliden überhand genommen und in die benachbarten Kreise sich verbreitet hätten. Die Bemühungen der Regierungen, diese Schwierigkeiten zu überwinden, seien öfters erfolglos gewesen, weil kein gesetzlicher Zwang zur Impfung bestehe. Der Minister ersucht sodann um Rathhaftmachung der betreffenden Kreise 2c. und behält sich die Anordnung weiterer Maßnahmen vor.

In einer Ministerial-Verfügung vom 6. Juli 1842**) wird der Königlichen Regierung zu Königsberg eröffnet, daß die Kosten der beim Ausbruche von Pocken vorzunehmenden Zwangsimpfungen auf Staatsfonds zu übernehmen seien, da hier die Impfung den Charakter einer polizeilichen Maßregel trage, daß dagegen die Kosten der in den regelmäßigen Terminen erfolgenden Schutzblattern-Impfungen, welche als allgemeine Maßregeln zur Beförderung dieser Impfungen angeordnet seien, von den theiligten Privatpersonen und eventuell von den Kommunen zu tragen seien. —

Unter den generellen das Impfwesen betreffenden Bestimmungen möge hier auch eine Entscheidung aus dem Landtags-Abschied für die Provinzial-Stände der Provinz Sachsen, d. d. Berlin, den 30. Dezember 1843, erwähnt sein, wenn dieselbe vielleicht auch nur für die genannte Provinz in Betracht kommt. Sie ist in dem Landtags-

*) Horn, S. 305.

**) Augustin, Bb. VII. S. 473.

Abfchiede unter „II. Auf die ständischen Petitionen“ aufgeführt und lautet folgendermaßen:*)

„Einführung des Impfwanges.

6. Wir müssen Bedenken tragen, durch weiteren Zwang auf die Ausführung einer Anordnung im Allgemeinen hinzuwirken, welcher bereits unsere Unterthanen, nach der gewonnenen Ueberzeugung von der Nützlichkeit derselben, mit immer größerer Bereitwilligkeit entgegenkommen, und nehmen deshalb Anstand, dem von unseren getreuen Ständen gemachten Antrage, daß die Unterlassung der Schutzpocken-Impfung innerhalb des ersten Lebensjahres, von Seiten der Aeltern und Vormünder, mit einer Polizeistrafe belegt werde, im weiteren Umfange Folge zu geben.

Sollte sich wider Erwarten an einzelnen Orten ein auf Vorurtheilen oder äußeren Einflüssen beruhender hartnäckiger Widerstand in besorglichem Maaße kundgeben, so finden wir nichts dagegen zu erinnern, daß dort vorübergehend durch locale Verordnungen Coerzitiv-Maßregeln vermittelst Androhung von Polizei-Estrafen, die jedoch die Höhe von 1 bis 5 Thlr. nicht übersteigen dürfen, getroffen werden.

Dem Vorschlage, daß von Seiten der Regierung eine Veranstaltung getroffen werde, um stets und überall gute Kuhpocken-Lymphe zum Impfen zu haben, stellt sich die Schwierigkeit entgegen, daß erfahrungsmäßig die Gelegenheit zur Erlangung echter Kuhpocken-Lymphe nur höchst selten sich darbietet, indeß wir wollen, daß von Seiten der Verwaltung Alles geschehe, was zur Herbeischaffung echter Kuhpocken-Lymphe förderlich sein kann.“

Daß die in Preußen bestehenden allgemeinen Bestimmungen nicht geeignet waren, die Impfung in widerstrebenden Gemeinden durchzuführen, wird auch in der Ministerialverfügung vom 13. August 1856**), aus welcher ein die Impfung der Schüler betreffender Absatz bereits auf Seite 111 mitgetheilt ist, direkt ausgesprochen. In dieser Verfügung heißt es wörtlich:

„Auf die Berichte vom . . . erwidere ich der Königlichen Regierung, daß, so wünschenswerth es auch erscheinen mag, die Schutzpocken-Impfung in der Gemeinde N., woselbst dieselbe ein befriedigendes Resultat immer noch nicht gewährt, möglichst zu fördern, doch die bestehenden Bestimmungen hierzu, so lange keine Pocken-Epidemie ausgebrochen ist, ein ausreichendes Mittel an die Hand zu geben, nicht geeignet sind.“

Sollte aber in N. eine Pocken-Epidemie ausbrechen, so wird unnachlässiglich und mit Energie nach Maaßgabe der §§ 54 und 55 des Regulativs vom 8. August 1835 zu verfahren sein.“

Bemerkenswerth ist noch eine Circularverfügung vom 7. August 1863, welche folgenden Wortlaut hat:***)

„Um den regelmäßigen Gang des Impfgeschäftes und die Erfolge der Impfung selbst möglichst sicher zu stellen, ist Seitens einer Königlichen Regierung durch Polizei-

*) Gesetz-Sammlung für die Königlich preussischen Staaten 1843.

**) Horn, Seite 308.

***) Eulenberg, Seite 197.

Verordnung gegen diejenigen, welche die prompte Gestellung der Impflinge und Vaccinirten zur Revision ohne triftigen Grund ver säumen, eine Geldstrafe von 15 Sgr. bis 1 Thlr., event. eine Gefängnißstrafe für den Unvermögensfall angedroht worden. Diese Maßregel hat sich bewährt.

Indem ich den betreffenden § der Verordnung abschriftlich beifüge, überlasse ich es der näheren Erwägung der Königl. Regierung, ob die dortigen Verhältnisse den Erlaß einer ähnlichen Verordnung angemessen erscheinen lassen.“

Die in Frage stehende Maßregel schließt zwar ebenfalls keinen Zwang zur Impfung, sondern nur einen solchen zur Gestellung der Impflinge zu den Impfterminen ein, wo die Eltern zc. die Impfung der Kinder nach wie vor verweigern konnten, ohne in Strafe zu verfallen, sofern nicht etwa die Kinder später an den Pocken erkrankten, jedoch bot die Verpflichtung der Gestellung ein Mittel, um wenigstens den Folgen der in der Bevölkerung herrschenden Indolenz entgegen zu wirken. — Wie übrigens aus der mitgetheilten Circularverfügung hervorgeht, blieb es den Regierungen überlassen, ob sie jene Maßregel einführen wollten oder nicht.

Eine Circularverfügung vom 9. Februar 1871*) an sämtliche Regierungen und Landdrosteien wurde durch die Wahrnehmung veranlaßt, daß in der Generalimpftabelle mehrerer Regierungen eine große Zahl von ungeimpften Kindern figurirte, welche seit einer langen Reihe von Jahren fortgeführt war. Um dieser Belastung der Tabellen abzuhelpen, wurde bestimmt, daß in Zukunft die aus irgend einem Grunde ungeimpft gebliebenen Kinder nur bis zum Abchlusse ihres dritten Lebensjahres in den Tabellen geführt, dann aber nach bis dahin fruchtlos erfolgter Aufforderung der betreffenden Eltern zur Impfung aus den Listen gelöscht werden sollten.

Hierbei setzte indeß der Minister für zc. Medizinalangelegenheiten voraus, daß die Regierungen nicht unterlassen würden, die Gestellung der zu impfenden Kinder zum öffentlich angezeigten Impftermin mit Strenge zu befördern, um möglichst wenig Impfreste aufkommen zu lassen. Den Kreisphysikern wurde es zur Pflicht gemacht, die Führung der Spezial=Impflisten sorgfältig zu überwachen und für Abhülfe der etwaigen Mängel in denselben Sorge zu tragen.

Der Ministerialverfügung, durch welche anläßlich der epidemischen Verbreitung der Pocken im Anfange der 70er Jahre die Aufnahme von Kindern in öffentliche Schulen, deren Besuch nicht obligatorisch ist, von dem Nachweise der geschehenen Impfung bezw. Wiederimpfung abhängig gemacht wurde, ist oben bereits Erwähnung gethan. Im übrigen bleibt hier von generellen Verordnungen nur noch einer Circularverfügung vom 10. Mai 1871**) zu gedenken, durch welche die Verwendung der neuen, aber damals bereits bewährten Glycerinlymphe sowohl für die anläßlich der Epidemie auszuführenden Revaccinationen, wie für die öffentliche Vaccination angeordnet wurde, „deren mangelhafte Ausführung keine Entschuldigung mehr in der fehlenden Lympe finden kann.“

*) Eulenberg, Seite 208.

**) Eulenberg, Seite 209.

Aus dem vorstehenden Ueberblick ergibt sich, daß in den neun älteren Provinzen Preußens in der Zeit vor Erlass des Reichs-Impfgesetzes vom 8. April 1874 ein allgemeiner direkter Impfwang für die Civilbevölkerung nicht bestanden hat. So sehr auch die Behörden bestrebt gewesen sind die Impfung zur allgemeinen Durchführung zu bringen, so verfügten sie doch in pockenfreien Zeiten und Orten über keine gesetzlichen Maßregeln, welche gestattet hätten, auf nachlässige oder der Impfung abgeneigte Eltern einen Zwang auszuüben, ihre Kinder impfen zu lassen. Ein indirekter Zwang bestand allerdings insofern, als Eltern, welche die Impfung ihrer Kinder verjäumt hatten, in dem Falle, daß die letzteren demnächst von den natürlichen Pocken befallen wurden, „in Hinsicht auf die dadurch hervorgebrachte Gefahr der Ansteckung“ in polizeiliche Strafe zu nehmen waren. Erst beim Ausbruch der Pocken durfte und mußte nach den geltenden Bestimmungen zu Zwangsimpfungen geschritten werden.

Eine allgemeine Revaccinationspflicht der Kinder im schulpflichtigen Alter ist ebenfalls vor Erlass des Reichs-Impfgesetzes in den neun älteren Provinzen Preußens nicht eingeführt gewesen.

Um nun auch darüber ein Urtheil zu gewinnen, ob nicht etwa in einzelnen Theilen der Monarchie von den Behörden weitergehende, auf eine zwangsweise allgemeine Durchführung der Impfung abzielende Verordnungen erlassen worden seien, hat die Reichsverwaltung durch Vermittelung der Königlich preussischen Regierung die in den einzelnen Regierungsbezirken erlassenen bezüglichen Bestimmungen sich zugänglich zu machen gesucht. Eine Durchsicht der in Folge dessen eingegangenen Bestimmungen ergibt, daß dieselben, wie nicht anders zu erwarten war, sich in der That auf dem Boden der in den generellen Erlassen festgestellten Grundsätze bewegen. Jedoch schließt das nicht aus, daß die Behörden in den einzelnen Bezirken die möglichst allgemeine Durchführung der Impfung sich in mehr oder weniger hohem Grade haben angelegen sein lassen. Nirgends aber findet sich unter den in den verschiedenen Regierungsbezirken seit Erlass des Regulativs vom 8. August 1835 erschienenen Verordnungen eine solche, welche entgegen dem bestehenden Recht einen allgemeinen direkten Zwang zur Impfung vorgeschrieben hätte.

Wie sich der Impfzustand der Bevölkerung unter dem Einflusse der vorstehend erörterten Regelung des Impfwesens in den älteren Provinzen Preußens gestaltet hat, darüber geben die in Abschnitt 6 enthaltenen Mittheilungen manche Anhaltspunkte. Gerade die Unzulänglichkeit des in Preußen bestehenden Rechtszustandes und vor allem die Erkenntniß, daß zu einer wirksamen Bekämpfung der Pocken neben einer allgemein durchgeführten Impfung der Kinder in der ersten Jugend die obligatorische Wiederimpfung im schulpflichtigen Alter erforderlich sei, haben zum Erlass des Reichs-Impfgesetzes vom 8. April 1874 geführt. Erst durch dieses Gesetz ist in den neun älteren Provinzen Preußens der allgemeine direkte Zwang zur Impfung, sowie derjenige zur Wiederimpfung der Schulkinder eingeführt.

Anhang.

Die Entwicklung des Impfwesens in der Königlich preussischen Armee.

Im VI. Bande des Sanitätsberichtes über die Deutschen Heere im Kriege gegen Frankreich 1870/71,*) herausgegeben von der Militär-Medizinalabtheilung des Königlich preussischen Kriegsministeriums unter Mitwirkung der zuständigen Königlich bayerischen, Königlich sächsischen und Königlich württembergischen Behörden, findet sich u. a. auch eine eingehende Darstellung der Entwicklung des Impfwesens bei den einzelnen Kontingenten der deutschen Armee. Bezüglich des preussischen Kontingents ist dieser auf amtlichen Quellen beruhenden Darstellung auszugsweise Folgendes zu entnehmen:

Nachdem die Impfung in der Civilbevölkerung des Landes seit 1802 Eingang und seit 1810 allgemeinere Verbreitung gefunden hatte, scheint die Armee zunächst relativ frei von Blatternkrankungen gewesen zu sein. Im Jahre 1819 wurde in Folge des Todes zweier ungeimpfter Landwehrmänner an den Pocken die Ermittlung und nachträgliche Impfung derjenigen Mannschaften, welche bisher weder geimpft noch geblattet waren, angeordnet.

Die Verfügung des Generalstabsarztes der Armee vom 10. April 1820 machte diese einmalige Maßnahme zur dauernden Einrichtung, doch war ihre Durchführung zunächst fakultativ, und erst durch die Allerhöchste Kabinettsordre vom 30. Mai 1826 wurden diese bisher von der Einwilligung der Mannschaften abhängigen Erstimpfungen obligatorisch.**)

Trotz alledem nahmen die Blattern von Jahr zu Jahr zu, und zwar erkrankten auch Leute, welche unzweifelhafte Zeichen erfolgreicher Vaccination aus der Kindheit an sich trugen.

Der bis dahin unererschütterlich festgehaltene Glaube an die dauernde Schutzkraft der Impfung gerieth unter dem Drucke der sich mehrenden Pockenepidemien ins Wanken, doch sträubte man sich, das Vertrauen auf dieses Schutzmittel aufzugeben, suchte es

*) „Die Pocken bei den deutschen Heeren im Kriege gegen Frankreich 1870/71 unter Berücksichtigung der entsprechenden Verhältnisse bei den französischen Armeen, bei den kriegsgefangenen Franzosen und bei der Civilbevölkerung der kriegführenden Staaten.“ Berlin 1885.

**) Diejenigen zu kurzen Uebungen eingezogenen Landwehr- bezw. Kriegsrückreserve-Rekruten, welche bei ihrer Einstellung als weder geblattet noch geimpft und demnach noch pockensfähig befunden waren, wurden zufolge Verordnungen vom Jahre 1825 den Civilbehörden bezeichnet, um nach Beendigung der Uebung geimpft zu werden (vgl. Augustin, Bd. IV, Seite 758).

Die Allerhöchste Kabinettsordre vom 30. Mai 1826, die Zwangsimpfung der Kriegsrückreserve- und Landwehr-Rekruten betreffend, lautet:

„Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 12. d. M. setze Ich hierdurch fest: daß die Civilbehörden verpflichtet sein sollen, die Schutzblatternimpfung der zum Militärverbände gehörenden Leute, namentlich der Kriegsrückreserve und Landwehr-Rekruten, die ihnen von den Militärbehörden als noch nicht geimpft nachhaft gemacht werden, sofort, und nöthigenfalls durch Anwendung eines directen Zwanges, zu veranlassen. Ich trage Ihnen auf, diese Bestimmung öffentlich bekannt zu machen und die betreffenden Behörden mit näherer Anweisung zu versehen, auch Sorge zu tragen, daß demgemäß überall verfahren werde.

Berlin, den 30. Mai 1826.

(gez.) Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister Frhr. v. Altenstein, v. Schudmann und General der Infanterie v. Saxe.“
(Vgl. Augustin, Bd. IV, Seite 830.)

vielmehr zunächst noch durch die Annahme zu stützen, daß Fehlern in der Handhabung der Maßregel und ungünstigen äußeren Verhältnissen der Mißerfolg zuzuschreiben sei.

Der Generalstabsarzt der Armee selbst schrieb im Jahre 1831, es sei in der That besorgnißerregend, daß von allen Armeekorps Nachrichten über die Ausbreitung der Pockenkrankheit eingingen, welche, wie die Erfahrung längst gelehrt habe, sich beim Militär jedesmal mit Truppenbewegungen und der dadurch gebotenen Gelegenheit zur Infektion einstelle, auch durch die Einberufung der Rekruten unterhalten werde, von denen gewöhnlich Einige unterwegs in den Lazarethen an den Blattern liegen blieben.

Keine Maßregel steuerte der Verbreitung, trotzdem man es an Energie in der Handhabung der Sicherheitsvorrichtungen nicht fehlen ließ; hierfür möge als Beispiel der von einer Regierungsbehörde gemachte Vorschlag dienen, zur Unterdrückung der Verschleppung des Contagiums die Krankenstuben außer der gewöhnlichen Absperrung noch unter Siegel zu legen. Die Seuche fand den Weg zu ihren Opfern. In Berlin hatten die Truppen vom August 1831 bis September 1832 180 Pockenranke mit 9 Töden. Während die Krankheit aber hier wie anderwärts immer weitere Kreise zog, war das Werkzeug schon gefunden, welches ihr Halt gebieten sollte.

Die Thatfache, daß die Pocken allmählich wieder häufiger, wenn auch weniger bössartig als früher auftraten, und daß auch Vaccinirte gar nicht selten in den Bereich der Epidemien gezogen wurden, hatte zu der Anfangs der zwanziger Jahre auch experimentell begründeten Erkenntniß geführt, daß die Impfung nicht für die ganze Lebenszeit vor der Erkrankung an Pocken in gleicher Weise Schutz gewährt, sondern in ihrer Wirkung eine allmähliche Abnahme erfährt. Man hatte aber auch ferner erkannt, daß der Impfschutz durch Wiederholung der Vaccination der Erneuerung fähig und, um dauernd zu werden, auch bedürftig ist.

„Allmählich fand diese experimentell erwiesene Thatfache unter den Aerzten Verbreitung, zu einer praktischen und staatlich geregelten Verwerthung für größere Bevölkerungsschichten gab sie jedoch noch keine Veranlassung; nur die Militärverwaltungen sicherten sich ihren Einfluß zur Förderung der Gesundheitspflege in den Armeen.

Am 26. März 1831 empfahl der Generalstabsarzt der Preussischen Armee den Generalärzten, bei ihren Korpskommandos dahin vorstellig zu werden, daß alle Rekruten — gleichviel ob geimpft oder nicht — bald nach der Einstellung wieder geimpft würden. Hier und da angestellte Versuche nach dieser Richtung hatten ergeben, daß Leute mit deutlichen Impfnarben und mit Zeugnissen über erfolgreiche Kinderimpfung wieder empfänglich für die Vakzine seien, und zwar, daß bei einem Drittel der Revakzinirten und darüber echte Vakzinepusteln erzielt werden konnten. Im III. Armeekorps waren auf besondere Initiative seines Kommandeurs, des Prinzen Wilhelm von Preußen, welcher die Bedeutung der prophylaktischen Revakzination schon damals würdigte und 40 Jahre später als Allerhöchster Kriegsherr der im Kampfe mit Frankreich stehenden Heere unter den schwierigsten Verhältnissen bestätigt finden sollte, der allgemeinen Anwendung der Wiederimpfung auf die Truppen frühzeitig die Wege geebnet worden. Gerade die in diesem Armeekorps erzielten Resultate sollten bahnbrechend für die baldige obligatorische Einführung der Revakzination in der ganzen Armee werden; denn die

gelegentlich der Erfurter Epidemie gemachte Erfahrung, daß keiner von denjenigen Mannschaften des Füsilier-Bataillons Regiments 20 (III. Armeekorps), welche vor ihrem Ausrücken von Brandenburg nach Erfurt geimpft worden waren, erkrankte, hatte für das Heer den auf anderem Wege gewonnenen Satz zuerst praktisch bestätigt, daß eine wiederholte Revakzination das beste Mittel zur Abwendung um sich greifender Pocken-gefahr sei. Der Generalstabsarzt folgerte aus den Ergebnissen der Revakzinationen das Vorhandensein einer großen Anzahl pockenempfindlicher Leute in der Armee. Dieser Umstand aber und die Förderung, welche die Ausbreitung der Blattern durch das enge Zusammenleben der Soldaten finde, mache es klar, welche Verlegenheiten im Kriege, wo größere Massen zusammengedrängt seien, für die Kriegsoperationen entstehen könnten, wenn der Armee eine große Anzahl von Soldaten durch die Blattern entzogen würde (Verfügung vom 15. März 1833). Unter dieser dem militärischen Gesichtspunkt besonders Rechnung tragenden Motivierung wurde die Wiederimpfung aller neu Eingestellten nochmals empfohlen. Die Allerhöchste Kabinettsordre vom 16. Juni 1834*) erhob sie zum Gesetz und sanktionirte zugleich die bereits unter dem 6. April 1834 zusammengestellte „Vorschrift über die Maßregeln zur Verhütung der Menschenpocken in der Armee.“**) Weitere Ausführungsbestimmungen gab der Erlaß vom 3. August desselben Jahres. Wenn die vor der Hand getroffene Anordnung, für die Militär-impfungen im Allgemeinen nur Lymphe von zum ersten Male geimpften jugendlichen Individuen zu verwenden, der ausreichenden Beschaffung von Impfstoff Schwierigkeiten und der Durchführung des Impfgeschäfts zum Theil erhebliche Verzögerungen bereitete, so wurde diesem Uebelstande, der in wiederholten Blatternerkrankungen noch nicht revakzinirter Rekruten Ausdruck fand, in den nächsten beiden Jahren durch die immer mehr Platz greifende Benutzung der Revakzinationslymphe begegnet, deren vorzugsweisen Gebrauch die Cirkularverfügung vom 12. Mai 1837 gestattete. Die Revakzination wurde nunmehr regelmäßig und mit steter Vervollkommnung der Impftechnik durchgeführt, so daß die Zahl der Impferfolge von 39,5% im Jahre 1834 sich allmählich auf 70% und darüber in den sechziger Jahren steigerte.“

*) Dieselbe lautet: „Ich bin mit der Maßregel einverstanden, welche Sie nach der zurückfolgenden Vorschrift vom 6. April d. J. wegen Verhütung der Menschenpocken bei der Armee zu treffen beabsichtigen, da es im öffentlichen Interesse geboten wird, mit der Revaccination nicht allein fortzufahren, sondern selbige auch als eine durch sanitätspolizeiliche Gründe gebotene Zwangsmaßregel auf die ganze Armee in der vorgeschlagenen Art auszudehnen. Ich autorisire Sie daher, die Vorschrift vom 6. April d. J. nebst diesem Erlaß durch die Gesetz-Sammlung und die Amtsblätter der einzelnen Regierungen für die gesammte Monarchie bekannt zu machen.

Berlin, den 16. Juni 1834.

gez. Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister Frhr. v. Altenstein, v. Wigleben und v. Rochow.“ (Vgl. Gef. Samml. S. 119.)

**) In dieser Vorschrift heißt es unter III.: „Die sämmtlichen Rekruten müssen in den ersten sechs Monaten nach ihrer Einstellung bei den Truppen von den Militär-Ärzten, oder unter spezieller Aufsicht und Leitung derselben von den Chirurgen, durch wenigstens zehn Impfstiche auf jedem Arm revaccinirt werden.

Ausgenommen hiervon sind jedoch diejenigen, bei welchen unverkennbare Narben der schon überstandenen Menschenpocken vorhanden sind, oder welche durch Impf-Atteste darthun können, daß sie bereits vor ihrer Einstellung, jedoch nicht länger als zwei Jahre vor derselben, mit Erfolg revaccinirt worden sind.“ (Vgl. Gef.-Samml. S. 120, Augustin, Bd. VI, S. 945).

Der Vollständigkeit wegen mögen an dieser Stelle noch die bezüglichlichen Bestimmungen des Regulativs vom 8. August 1835, soweit dieselben das Militär betreffen, wörtlich mitgetheilt sein. Dieselben sind enthalten im § 57 des Regulativs und lauten folgendermaßen:

„Was das Militair betrifft, so müssen sowohl die Soldaten des stehenden Heeres als auch die zur Landwehr und Reserve gehörenden Personen, hinsichtlich der bei ihnen geschehenen Schutzpocken=Impfung bei ihrer Einstellung genau untersucht werden, und sollen diejenigen, welche sich als noch nicht geimpft und der Impfung bedürftig ausweisen, wenn sie in das stehende Heer eintreten, nach Allerhöchster Kabinetsorder vom 30^{ten} Mai 1826 — Gesesammlung pro 1826 Nr. 18 — sofort geimpft, die zur Landwehr und Reserve gehörenden aber den Zivilbehörden angezeigt werden, damit dieselben ungesäumt, und wenn das Individuum renitent seyn sollte, mit Anwendung von Zwangsmitteln die Impfung bewirken lassen. Bei der nächsten Einberufung haben sich dieselben durch einen Schein über die wirklich geschehene Impfung auszuweisen.

Diejenigen Rekruten, bei welchen unverkennbare Narben der schon überstandenen Menschenpocken nicht vorhanden sind, und welche, obchon früher geimpft, durch Impfs=Atteste nicht darthun können, daß sie bereits vor ihrer Einstellung, jedoch nicht länger als 2 Jahre vor derselben, mit Erfolg revakzinirt worden sind, sollen in den ersten 6 Monaten ihrer Einstellung, in Gemäßheit der durch die Kabinetsorder vom 16^{ten} Juni 1834 bestätigten Verordnung vom 6^{ten} April 1834 (Gesesammlung Seite 119) revakzinirt werden.“ —

In wie hohem Maße der erhoffte Erfolg der im Jahre 1834 in der Armee eingeführten obligatorischen Impfung und Wiederimpfung eingetreten ist, lassen die anliegenden Tafeln 4 und 5 und die zugehörige Tabelle auf Seite 23 und 24 erkennen. Vor allem aber hat sich auch der durch jene Maßregel gewährte Schutz gegen das Erkranken und Sterben an Pocken unter den schwierigen Verhältnissen des Feldzuges von 1870/71 aufs trefflichste bewährt, wie in dem oben citirten Bande des Kriegs=Sanitätsberichtes im Einzelnen in überzeugender Weise dargelegt wird. „Mitten in dem Seuchenherde aber stand“ — so äußert sich der Bericht (Seite 1) — „die Deutsche Armee, nur wenig berührt von der ringsum wüthenden Krankheit, wehrhaft auch diesem Feinde gegenüber, welchem das Heimatland leider ebenso wie Frankreich und dessen Heer unterlag.“

Die Ergebnisse der Bearbeitung sogenannter „Ur-Pockenlisten“.

Inhalt.

Vorwort.

1. Prüfung des Materials mit Rücksicht auf die Frage, ob das einmalige Ueberstehen der Pocken gegen eine neue Pockenerkrankung Schutz gewährt.
 2. Prüfung des Materials mit Rücksicht auf die Frage, ob die Schutzpockenimpfung gegen das Erkranken an Pocken Schutz gewährt.
 3. Prüfung des Materials mit Rücksicht auf die Frage, ob die Schutzpockenimpfung gegen das Sterben an Pocken Schutz gewährt.
- Schlußbemerkungen.

Vorwort.

Bereits im Jahre 1883 hat der Reichstag gelegentlich seiner Verhandlungen über die Petitionen zum Impfgesetz mit den sogenannten Ur-Pockenlisten sich beschäftigt, d. h. denjenigen namentlichen Listen, welche über die an den Pocken erkrankten bezw. gestorbenen Personen auf Grund der vorgeschriebenen Meldungen von Polizeibehörden geführt worden sind. Es war damals unter dem 7. April 1883 von den Abgeordneten Reiniger, Kutschbach, Dr. Papellier und Genossen zu dem siebenten Bericht der Kommission für die Petitionen — Nr. 164 der Drucksachen — folgender Abänderungsantrag gestellt (Reichstagsdrucksache Nr. 231 2. Session 1882/83 5. Legislaturperiode):

„Der Reichstag wolle beschließen: den Herrn Reichskanzler zu eruchen:

1. die ursprünglichen Motive des Reichsimpfgesetzes vom April 1874 durch eine gemischte Kommission von Verfechtern und Gegnern der Impfung, bestehend aus vom Referenten und Korreferenten gleichmäßig zum Vorschlage gebrachten Ärzten, Statistikern und Juristen, unter Berücksichtigung aller seit 1874 beigebrachten Thatsachen und Belege einer streng wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen;
2. dieser Kommission durch Vermittelung der Bundesregierungen die Ur-Pockenlisten einer größeren Anzahl deutscher Stadt- und Landgemeinden von den Polizeiamttern, resp. von den Gemeindeverwaltungen zustellen zu lassen;
3. die sämtlichen Verhandlungen dieser Kommission nach den stenographischen Aufnahmen in Druck zu geben und dieselben mit thunlichster Beschleunigung dem Reichstage vorzulegen.“

Dieser Antrag wurde indeß in der 97. Sitzung des Reichstages vom 6. Juni 1883 abgelehnt, nachdem im Verlaufe der Verhandlungen u. a. von dem Berichterstatter der

Kommission für die Petitionen bezüglich der Ur-Pockenlisten geltend gemacht war, sie entbehrten der genügenden Zuverlässigkeit und Vollständigkeit, die man verlangen müsse, wenn man unzweifelhaft begründete, wissenschaftliche Schlüsse darauf bauen wolle (Stenogr. Bericht 1882/83 Seite 2858).

Als im Jahre 1884 die Kommission zur Berathung der Impffrage ihre Verhandlungen begonnen hatte, traten diejenigen ärztlichen Mitglieder der Kommission, welche in der Absicht berufen waren, auch die Einwendungen der Impfgegner, soweit sie auf wissenschaftlicher Grundlage beruhen, zu entsprechender Würdigung gelangen zu lassen, alsbald von Neuem mit dem Verlangen nach Vorlegung sogenannter Ur-Pockenlisten hervor.

Schon bei der Berathung über die Frage, ob das einmalige Ueberstehen der Pockenkrankheit Schutz gegen ein nochmaliges Befallenwerden von derselben verleiht, wurde der Antrag gestellt: „es sei die Königliche Polizeidirektion in Aachen aufzufordern, die amtlichen Akten über die seit 1881 in Aachen und Burtscheid vorgekommenen Pockenfälle der Impfkommission schleunigst einzusenden.“ (Seite 33 Reichstagsdruckfache Nr. 287 1. Session 1884/85 6. Legislaturperiode.)

Aus diesen Akten sollte nämlich nach den Angaben eines der Minorität angehörnden Kommissionsmitgliedes entgegen der von den Ärzten ganz allgemein gehegten Ueberzeugung hervorgehen, daß das wiederholte Befallenwerden einer und derselben Person von den Pocken keineswegs zu den Seltenheiten gehöre, da während der Epidemie in Aachen von 215 Fällen im Beginne der Epidemie bereits dreizehn zum zweiten Male befallen worden seien.

Die Kommission lehnte indeß jenen Antrag ab, sprach sich vielmehr nach eingehenden Verhandlungen mit 12 gegen 3 Stimmen dahin aus, daß „das einmalige Ueberstehen der Pockenkrankheit mit seltenen Ausnahmen Schutz gegen ein nochmaliges Befallenwerden von derselben verleiht.“

Bei der Berathung über die Frage, ob die Impfung mit Vaccine im Stande sei, einen ähnlichen Schutz zu bewirken, äußerte sich einer derjenigen Ärzte, welche den impfgegnerischen Standpunkt in der Kommission vertraten, über die sogenannten Ur-Pockenlisten folgendermaßen (Dr. Weber, a. a. D. S. 42):

„Wir richten an dieser Stelle Ihre Aufmerksamkeit darauf, daß zur aktenmäßigen Kontrolle der bekannt gewordenen persönlichen Erfahrungen der Ärzte Deutschlands Urkunden vorliegen, in welchen die Thatsachen zu den Erfahrungen und Schlüssen, die die Ärzte für oder gegen den Impfschutz gewonnen haben, von Fall zu Fall niedergelegt sind. Meine Herren, wir haben 1870, 1871 und 1872 in Preußen eine dreijährige Epidemie gehabt, die im Jahre 1870 2000 Todte, im Jahre 1871 60 000 Todte und 1872 64 000 Todte für Preußen allein geliefert hat. Es entspricht diese Anzahl von Todten ungefähr einem Morbilitätszustande von etwa 800 000 Individuen. Diese Fälle sind registriert in den Urpockenlisten der Städte und Landgemeinden, und diese Urpockenlisten sind bis jetzt noch größtentheils ein unaufgeschlossenes Material. Diejenigen Pockenlisten nun, welche bis jetzt zur Kenntniß und zum Auszuge gekommen sind, und von denen wohl noch öfter die Rede sein soll, ergeben zur Evidenz, daß der

behauptete Schutz vor Erkranken und Sterben an den Blattern nicht vorhanden ist, wenigstens sich in sehr vielen Fällen nicht sogar nicht einmal auf ein einziges Jahr behaupten läßt."

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen wurde von einem Mitgliede der impfgegnerischen Minorität der Antrag gestellt (Dr. Böing, a. a. D. Seite 125):

"Vor der Entscheidung der Frage nach dem Impfschutze mögen die auf den Polizei- resp. Standesämtern vorhandenen Ur-Pockenlisten statistisch bearbeitet werden, insoweit sie Angaben über den Impfzustand und das Alter der Erkrankten und Gestorbenen enthalten."

Der Antrag wurde indeß von der Kommission ebenfalls abgelehnt und zwar mit 14 gegen 2 Stimmen.

Ueber die Gründe, welche die Majorität bestimmt haben, von einer statistischen Bearbeitung der Ur-Pockenlisten abzugehen, lassen die Verhandlungen keinen Zweifel. Das Material wurde als unzuverlässig bezeichnet, weil es meistens von Familienvorständen und denjenigen, welche sonst zur Anzeige verpflichtet sind, geliefert, und weil aus diesem Grunde die Angaben über den Impfzustand der Erkrankten nicht zu verwerthen seien. Es wurde hervorgehoben, daß in den Listen viele Personen als geimpft eingetragen wären, welche es höchst wahrscheinlich nicht gewesen seien, zumal in Preußen die Bestimmung bestanden habe, daß jeder, dessen Kind von den Blattern befallen werde, ohne geimpft zu sein, in Strafe zu nehmen sei. Aber auch in denjenigen Fällen, in welchen die in den Listen enthaltenen Angaben über den Impfzustand der Erkrankten von Ärzten herrühren sollten, erfahre man nichts darüber, wann und wie der Erkrankte geimpft sei. In vielen Fällen würden, wenn die Blattern ins Haus kämen, die Kinder schleunigst geimpft, und wenn sie nachher doch erkrankten, so würden sie als Geimpfte angegeben. Geimpft seien sie schon, aber nicht rechtzeitig. Die Impfung im Stadium der Inkubation (d. h. zu einer Zeit, wo das betreffende Individuum bereits das Pockengift in sich aufgenommen hat) sei etwas ganz außerordentlich häufiges. So wurde von einem Mitgliede der Kommission mitgetheilt, daß sich bei den bezüglichen Erhebungen in Hessen das merkwürdige Resultat herausgestellt habe, daß in der That selbst von den unterjährigen Kindern, welche die Blattern bekommen hätten, ein Drittel geimpft gewesen sei; es habe aber nachgewiesen werden können, wann sie geimpft worden wären, und daß das zu spät geschehen sei. Eine Bearbeitung der Ur-Pockenlisten sei demnach eine nutzlose Mühe, weil dieselben keine genügende Auskunft über den Impfzustand der Erkrankten zu geben vermöchten.

Die Berechtigung der vorstehend berührten Bedenken bedarf für den Sachverständigen keiner weiteren Erörterung. Auch der nicht ärztlich Gebildete wird bei einer Durchsicht des Abschnittes 3 dieser Denkschrift unschwer erkennen, daß in der That eine Pockenstatistik, welche den Impfzustand der Erkrankten und Gestorbenen in den Kreis der Betrachtung zieht, nur dann brauchbare Ergebnisse liefern kann, wenn auch über den zwischen Impfung und Erkrankung liegenden Zeitraum und über den Erfolg der Impfung zuverlässige Angaben vorliegen. Es kommt hinzu, daß in den Ur-Pockenlisten anscheinend unter der Bezeichnung Pocken nicht selten auch Erkrankungen

an Varicellen, d. h. den sogenannten Wasserpocken, Schafpocken und dgl. mit aufgeführt worden sind, einer fast ausschließlich bei Kindern vorkommenden Krankheit, welche ihrer Ursache und ihrem Wesen nach von den echten Pocken durchaus getrennt werden muß.

Wenn nun auch aus den bereits erörterten Gründen eine statistische Bearbeitung sogenannter Ur-Pockenlisten von der Kommission zur Berathung der Impffrage abgelehnt war, so schien es doch der Reichsverwaltung erwünscht, über die Beschaffenheit jener Listen selbst ein Urtheil sich zu bilden, und weiteren Kreisen eine Würdigung derselben zu ermöglichen. Der Herr Reichskanzler (Staatssekretär des Innern) richtete daher nach Abschluß der Kommissionsverhandlungen an die königlich preußische Regierung das Ersuchen, ihm eine Anzahl von Ur-Pockenlisten, namentlich aus solchen Städten, in welchen umfangreichere Pockenepidemien geherrscht hätten, zur Einsicht übersenden zu wollen. Das hierauf eingegangene Aktenmaterial zc. aus den preußischen Regierungsbezirken Magdeburg, Merseburg, Erfurt, Köln, Düsseldorf und Aachen wurde dem Kaiserlichen Gesundheitsamte zur Kenntnißnahme überwiesen, und später, einem von dem Direktor des genannten Amtes geäußerten Wunsche entsprechend, noch weiteres Material aus Berlin, Breslau, Lübeck und Liegnitz hinzugefügt.

Bevor in eine Besprechung der zur Bearbeitung gelangten Listen eingetreten wird, muß bemerkt werden, daß polizeilich geführte namentliche Verzeichnisse der an den Pocken erkrankten Personen mit Angabe des Alters und Impfzustandes der Erkrankten aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des Reichs-Impfgesetzes nicht in so großer Anzahl zur Verfügung stehen, wie nach den erwähnten Äußerungen in der Kommission zur Berathung der Impffrage angenommen werden konnte.

So theilt der Regierungspräsident zu Königsberg mit, daß daselbst nur summarische Angaben über Pockenerkrankungen ohne Angabe des Alters und Impfzustandes der Erkrankten vorhanden seien, ein Material, welches für die in Frage stehende statistische Bearbeitung nicht verwertbar ist. Der Regierungspräsident zu Danzig äußert sich dahin, daß amtliche Listen und Aufzeichnungen über das Vorkommen von Pockenerkrankungen aus der Zeit vor Inkrafttreten des Reichs-Impfgesetzes dort nicht vorhanden seien, und daß derartiges Aktenmaterial auch bei der königlichen Polizei-Direktion zu Danzig, bei der Polizeiverwaltung in Elbing und den Kreislandräthen nach den angestellten Ermittlungen nicht mehr habe aufgefunden werden können. Der Polizeipräsident von Berlin schreibt, daß über Pockenerkrankungen aus der Zeit vor Inkrafttreten des Impfgesetzes beim Polizeipräsidentium nur die Anzeigen vom Jahre 1841 bis 1865 ermittelt, andere polizeiamtliche Listen und Aufzeichnungen über das Vorkommen der Pockenerkrankungen in dieser und der Vorzeit trotz der sorgfältigsten Nachforschungen nicht mehr aufzufinden gewesen sind, übersendet aber gleichzeitig sechs Bände Pocken-journale von 1864—1874, welche im Bureau der Sanitätskommission verwahrt gewesen sind. Der Regierungspräsident zu Stettin hat ebenfalls dem Ersuchen um Uebersendung polizeiamtlicher Listen nicht entsprechen, sondern nur eine summarische Nachweisung der in der Zeit vom 1. Januar 1871 bis 6. August 1886 im Stettiner Polizeibezirk an den Pocken erkrankten bezw. gestorbenen Personen aus den Akten der Polizeidirektion übersenden können.

Nebenbei sei bemerkt, daß diesem Material zufolge seit dem Inkrafttreten des Reichs-Impfgesetzes in Stettin überhaupt nur noch acht Erkrankungen an Pocken vorgekommen sind. In der Stadt Breslau sind nach der Äußerung des dortigen Regierungspräsidenten nur vier vom Jahre 1872 ab geführte Listen des Polizeipräsidiums über Pockenerkrankungen vorhanden, aus denen das Alter und der Impfzustand der Erkrankten ersichtlich ist. Aus früherer Zeit sind im Regierungsbezirk Breslau Listen über Pockenerkrankte nicht ermittelt worden. Der Regierungspräsident zu Liegnitz übersendet die von dem dortigen Magistrat erforderten Listen über Pockenerkrankungen in der genannten Stadt vom Jahre 1855 bis zum Jahre 1885 mit dem Bemerkten, daß leider die Angabe über den Impfzustand der Erkrankten in den Listen fehle. Der Regierungspräsident zu Hannover schreibt, daß daselbst irgend welches Altenmaterial über Pockenerkrankungen, aus dem das Alter und der Impfzustand der Erkrankten ersehen werden könne, aus der Zeit vor Inkrafttreten des Reichs-Impfgesetzes nicht vorhanden sei. Der Regierungspräsident zu Wiesbaden hat auf das Ersuchen um Einreichung polizeiamtlicher Listen nur die von dem Polizeipräsidenten zu Frankfurt a. M. vorgelegten Privatnotizen des Chefarztes des dortigen städtischen Krankenhauses übersenden können. Auch das von dem Senate der freien und Hansestadt Lübeck übermittelte Material besteht ausschließlich aus dem Personenregister des Blatternhospitals zu St. Annen in Lübeck. Bezüglich des aus den Regierungsbezirken Magdeburg, Merseburg, Erfurt, Düsseldorf, Köln und Aachen eingefandten Materials ergibt sich das Weitere aus der nachstehenden Bearbeitung. Auch hier haben sich weit weniger zahlreiche sogenannte Ur-Pockenlisten auffinden lassen, als man nach den in der Kommission zur Berathung der Impffrage seitens der impfgegnerischen Minorität gemachten Äußerungen erwarten durfte; beispielsweise hat aus dem Regierungsbezirk Merseburg nur eine einzige (dreißig Erkrankungen enthaltende) Liste eingefandt werden können, aus welcher das Alter und der Impfzustand der Erkrankten zu ersehen sind.

Trotzdem ist immerhin das dem Gesundheitsamte zugänglich gemachte Material noch ein umfangreiches gewesen. Es sei gleich hier hervorgehoben, daß sich bei demselben auch die nachgelassenen Aufzeichnungen des verstorbenen Dr. Debey in Aachen, sowie die polizeiamtlichen Listen der Städte Duisburg und Offen befunden haben, und daß demnach die oben erwähnten, in der Kommission zur Berathung der Impffrage gemachten Angaben an der Hand der angeführten Quellen einer eingehenden Prüfung haben unterzogen werden können.

Schon bei der ersten Durchsicht des Materials stellte sich heraus, daß dasselbe ein in hohem Grade ungleichwerthiges war.

Die vollständigsten Listen enthielten folgende Rubriken: Laufende Nummer, Name, Alter, Stand, Wohnung und Impfzustand des Erkrankten (ob geimpft, ob revaccinirt), Name des behandelnden Arztes, Datum der Erkrankung, Datum der Meldung, Krankheitsform (Variola, Variolois etc.) und Datum der Genesung bezw. des Todes. Ferner fanden sich in manchen Listen Bemerkungen über muthmaßliche Art der Ansteckung, über etwa stattgehabte Desinfektion, über Aufnahme ins Krankenhaus, Anbringung der Pockentafel, Bestrafung wegen unterlassener Impfung u. dgl. m.

In zahlreichen Listen fehlten andererseits entweder durchweg oder bei einem großen Theil der aufgeführten Erkrankungen selbst diejenigen Angaben, ohne welche eine statistische Bearbeitung überhaupt nicht oder nur in beschränktem Maße möglich war, nämlich in erster Linie die Angaben über das Lebensalter und den Impfzustand der Erkrankten, in zweiter Linie über den Ausgang der Krankheit.

Wie mangelhaft vielfach die Listen geführt sind, mögen die in der nachstehenden Uebersicht aufgeführten Beispiele darthun. Von der Liste Liegnitz ist bereits oben erwähnt, daß überhaupt jede Angabe über den Impfzustand fehlt; hinzugefügt sei, daß in derselben bei 45 von 229 Pockenkranken, welche in den Jahren 1855 bis 1863 aufgeführt sind, auch die Altersangabe nicht eingetragen worden ist.

| Regierungs- Bezirk | Ort u. | Zeit | Zahl der Er- krankungen | Bemerkungen |
|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|--|
| Magdeburg | Magdeburg . . . | 1851—1874 | 1998 | Impfzustand überhaupt nicht, Lebensalter nur sehr vereinzelt angegeben. |
| " | Salzwedel . . . | 1871—1873 | 310 | Impfzustand nicht angegeben; nur einigen Namen ist ein g, r oder u beigefügt. Altersangabe fehlt für das Jahr 1871 ganz, für 1872/73 fast ganz. |
| " | Hornburg | 1871/1872 | 127 | Impfzustand gar nicht, das Lebensalter in 24 Fällen nicht angegeben. |
| " | Osternieck | 1871/1872 | 44 | Der Impfzustand ist zwar angegeben, bezüglich des Alters ist aber nur zwischen Kindern unter 15 Jahren und Erwachsenen unterschieden. |
| " | Neuhaldensleben | 1858—1872 | 240 | In 33 Fällen fehlt die Angabe über das Alter, in 58 Fällen über den Ausgang der Krankheit. Der Impfzustand ist nur in 3 Fällen angegeben. |
| Erfurt | Nordhausen . . . | 1869—1872 | 916 | Angabe des Impfzustandes fehlt in 637, des Alters in 9, des Ausgangs der Krankheit in 8 Fällen. |
| " | Langensalza . . . | 1869—1872 | 135 | Impfzustand 1869 und 1872 nur vereinzelt angegeben. Bezüglich des Alters ist nur zwischen Kindern unter 15 Jahren und Erwachsenen unterschieden. |
| " | Sömmerda . . . | 1871/1872 | 203 | In mehr als der Hälfte der Fälle fehlt die Altersangabe; Impfzustand nur vereinzelt angegeben. |
| Düsseldorf | Wesel | 1870—1873 | 523 | In 474 Fällen fehlt die Angabe über den Ausgang der Krankheit. |
| " | Hülse | 1871/1872 | 291 | Angabe über den Impfzustand fehlt in 281, über das Alter in 31 Fällen. |
| " | Süchteln | 1871/1872 | 77 | Alter und Impfzustand nicht ersichtlich. |
| " | Debt | 1872 | 154 | Alter und Impfzustand nicht ersichtlich. |
| Köln | Köln | 1849—1873 | 4721 | Angabe des Impfzustandes fehlt in 2191, Angabe des Ausgangs der Krankheit in 768 Fällen. |
| Aachen | Cörrenzig | 1871/1872 | 209 | Angaben über den Impfzustand fehlen. |
| " | Süllich | 1871 | 71 | Angabe des Alters fehlt in 7, des Impfzustandes in 68 Fällen. |

Angeichts der Unvollständigkeit zahlreicher Listen mußte die Frage in Erwägung gezogen werden, ob die Bearbeitung nicht auf diejenigen Pockenepidemien zu beschränken sei, bezüglich derer die amtlich geführten Listen für alle oder doch nahezu alle Erkrankten Angaben über das Alter und den Impfzustand enthielten. Dadurch wäre indeß, da nur

verhältnißmäßig wenige Listen dieser Anforderung entsprachen, die Zahl der Krankheitsfälle in den einzelnen Altersklassen für die statistische Verwerthung eine zu geringe geworden. Es blieb daher nur übrig so zu verfahren, daß bei den Erörterungen über das Lebensalter der Erkrankten auch solche Listen noch berücksichtigt wurden, in welchen die Angaben über den Impfzustand fehlten. Für diejenige Bearbeitung, bei welcher der Einfluß der Impfung auf das Sterben an Pocken in Betracht kam, mußten dagegen wieder manche sonst brauchbaren Listen aus dem Grunde ausgeschieden werden, weil sie keine oder ganz unzureichende Aufzeichnungen über den Ausgang der Krankheit enthielten. Daß die Arbeit durch diese Umstände sehr erschwert wurde, liegt auf der Hand. Es kam hinzu, daß die Listen vielfach auch äußerlich als wenig ordentlich geführt sich erwiesen, und daß viele Angaben in ihnen unleserlich waren.

Unter den geschilderten Verhältnissen war es erforderlich, zunächst aus den Listen Zählkarten auszuscheiden, weil sonst häufige Rechenfehler unvermeidlich gewesen wären. Es bot diese Art der Bearbeitung überdies den Vortheil, daß auch nach erfolgter Rückgabe des Aktenmaterials stets auf den einzelnen Fall zurückgegriffen werden konnte. Den Zählkarten wurde folgendes Schema zu Grunde gelegt:

Mr-Pockenliste von

Jahr

Nr. der Liste:

Vor- u. Zuname:

Geschlecht: männlich, weiblich.

Alter: Jahre Monate.

Nach der Liste geboren am

Datum der Erkrankung:

Impfzustand:

geimpft wiedergeimpft

ungeimpft, unleserlich, ohne Angabe

geblattet wann

Genesen: am

Gestorben: am

Behandelt: im Krankenhause, in der Familie.

Bemerkungen:

Im ganzen sind 55 279 Zählkarten ausgeschrieben worden, von denen allerdings ein großer Theil wegen unzureichender Angaben nachher nicht hat benutzt werden können.

Aus der Stadt Barmen war für die Jahre 1871 bis 1873 in 5 umfangreichen Aktenstücken des dortigen Oberbürgermeisteramtes dasjenige Material eingefandt, welches eventuell einer polizeilichen Pockenliste hätte zu Grunde gelegt werden können. Der Inhalt dieser Akten bestand aus ärztlichen Meldkarten theils über Pockenerkrankungen, theils über den Ausgang früher gemeldeter derartiger Erkrankungen, aus den Spitalsnachweisungen, aus Anzeigen der Standesbeamten über Pockentodesfälle u. dgl. m. Es ist der Versuch gemacht worden, auch dieses Material zu bearbeiten. Nachdem indeß die Zählkarten ausgeschrieben waren, stellte sich heraus, daß unter 2042 aus den Akten ermittelten Pockenkranken nur für 1793 das Alter verzeichnet war, und daß für mehr als 30% ein Vermerk über den Impfzustand fehlte. Von den 567 Pockentodten,

welche ausweislich der Akten während jener Epidemie auf den Begräbnisplätzen Barmens beigelegt sind, ließen sich nur für 474 Angaben über das Alter und für 383 solche über den Impfstoffzustand ermitteln. Es mußte daher von einer statistischen Verwerthung dieses Materials Abstand genommen werden.

Eine Bearbeitung der von dem Polizeipräsidenten zu Berlin eingesandten Pocken-Journale der dortigen Sanitätskommission hat stattgefunden, obgleich es sich in diesem Falle nicht eigentlich um polizeiamtlich geführte Listen handelte. Theils mit Rücksicht hierauf, theils wegen des Umstandes, daß, wie später noch nachgewiesen wird, ein großer Theil der Erkrankten in diesen Listen überhaupt nicht verzeichnet ist, sind sie getrennt von den übrigen amtlichen Listen verworfen.

Die aus Breslau eingesandte Liste hat im Nachstehenden keine Berücksichtigung gefunden, weil erst nach dem Ausschreiben der Zählkarten (3612) bemerkt wurde, daß zahlreiche Erkrankungen an Variellen in dieser Liste mit enthalten sind. Da in den Zählkarten, um sie nicht zu umfangreich zu machen, eine Rubrik für die Krankheitsdiagnose nicht vorgesehen war, so würde zunächst ihre Vervollständigung nach dieser Richtung hin erforderlich gewesen sein. Unter solchen Umständen schien es zweckmäßiger, um den Abschluß dieser Arbeit nicht zu verzögern, von einer Verwerthung jener Liste vorerst noch Abstand zu nehmen.

Im übrigen wird weiter unten bei der Besprechung der durch die statistische Bearbeitung gewonnenen Ergebnisse noch genauer angegeben werden, welche Listen den einzelnen Uebersichten zu Grunde gelegt sind.

1. Prüfung des Materials mit Rücksicht auf die Frage, ob das einmalige Ueberstehen der Pocken gegen eine neue Pockenerkrankung Schutz gewährt.

Die Thatsache, daß das einmalige Ueberstehen der Pocken gegen eine nochmalige Erkrankung an denselben Schutz gewährt, wird unter den Aerzten aller Länder als feststehend angesehen. Mit dieser Thatsache wurde bereits als mit einer regelmäßigen Erfahrung gerechnet zu einer Zeit, zu welcher von der Kuhpockenimpfung noch nicht die Rede war. Die Pocken waren damals eine außerordentlich verbreitete und in der Regel in Zwischenräumen von wenigen Jahren epidemisch auftretende Krankheit, welche überwiegend Kinder befiel, und welche daher vielfach mit dem Namen „Kinder-Blattern“ bezeichnet wurde. Man wußte, daß, wer die Krankheit als Kind glücklich überstanden hatte, für den Rest seines Lebens vor ihr fast sicher geschützt war. Dementsprechend begegnet man in älteren Schriften auch nicht selten der Mittheilung, daß nach einer Pockenepidemie so und so viele „pockenfähige“ Einwohner verblieben seien, welche dann zusammen mit den in den folgenden Jahren geborenen Kindern das Material für die nächste Epidemie lieferten. Daß in Ausnahmefällen eine und dieselbe für den Krankheitsstoff besonders empfängliche Person zweimal, ja selbst dreimal von den Pocken heimgesucht werden konnte, war gleichfalls bekannt.

Es verhielt sich in früheren Zeiten, d. h. bevor die Schutzpockenimpfung Eingang gefunden hatte, mit den Pocken ähnlich, wie es sich noch heute mit den allerdings bei

weitem weniger bösartigen Masern verhält. Die größere Mehrzahl der für die letztere Krankheit überhaupt Empfänglichen macht sie in der Jugend durch und ist dann für den Rest des Lebens gegen eine neue Infektion fast sicher geschützt. Nur da, wo die Masern überhaupt unbekannt sind, werden bei einer ersten Einschleppung des Krankheitsstoffes Erwachsene ebenso wie Kinder befallen.

Gelegentlich der Verhandlungen der Kommission zur Berathung der Impffrage ist nun, wie bereits erwähnt wurde, von einem, der impfgegnerischen Minorität angehörenden Arzte behauptet worden, das zweimalige Befallenwerden von Pocken sei keineswegs eine seltene Ausnahme. Er habe die Epidemie in Duisburg studirt und habe konstatiren können, daß viele Leute, die die Pocken gehabt hätten und revaccinirt gewesen seien, in der allergefährlichsten Weise von den Pocken wieder befallen wären. Er habe die Essener Pockenepidemie studirt und dort eben solche Beispiele gefunden. Ferner habe im Jahre 1882 in Aachen eine Epidemie geherrscht, wo von 215 Fällen im Beginne der Epidemie bereits dreizehn zum zweiten Male befallen worden seien. Diese Leute seien aus dem Krankenhause entlassen, desinfizirt, gewaschen, mit reinen Kleidern versehen und seien dann nach ca. 4 Wochen, aufs neue erkrankt, in das Krankenhaus zurückgekommen.*)

Bezüglich der erwähnten Vorkommnisse in Aachen sagte derselbe Arzt weiter:**)

„Das Material ist aber zusammengestellt worden von einem der eifrigsten Impf Freunde, von Dr. de Bey, einem außerordentlich exakten Manne, der Rubriken gemacht hat, an die ein Statistiker nicht einmal denkt, und nach diesem statistischen Material waren unter den 215 Erkrankten 13 sogenannte Recidive. Es ist in der Literatur Sitte, namentlich unter den Herren, die den Impfwang energisch vertreten, diese Recidiven nicht als neue Erkrankungen gelten zu lassen, sondern zu sagen, das sei gerade so, als wenn einer Typhus hat, und er kommt nach acht Tagen wieder ins Spital, so ist das kein zweiter Typhus, sondern eine Recidive. Ich halte das für verkehrt. Wenn die Leute aus dem Krankenhause einmal gesund entlassen sind und nach vier oder sechs Wochen zurückkommen, so haben sie sich einer neuen Infektion ausgesetzt und sind zum zweiten Male erkrankt.“

Bei der im Gesundheitsamte vorgenommenen Prüfung dieser Behauptungen an der Hand des aus Aachen eingesandten Materials hat sich nun folgendes ergeben:

Aus der von Dr. Debey in Aachen während der Pockenepidemie des Jahres 1881***) geführten Spitalliste, welche im Gesundheitsamte vorgelegen hat, erhellt, daß in der That in dem genannten Jahre 9 Personen und zwar ausschließlich Kinder mit der Diagnose Pocken dem Krankenhause zugegangen sind, nachdem sie kurz zuvor als von den Pocken geheilt aus demselben entlassen waren. Ein zehntes Kind war wegen Masern in Behandlung gewesen, dann geheilt entlassen und wurde 8 Tage später als an Pocken leidend wieder aufgenommen. Um einem Jeden die Möglichkeit zu ge-

*) Dr. Böing auf Seite 23 der Reichstagsdrucksache Nr. 287 I. Session (1884/85) 6. Legislaturperiode.

**) Seite 27 a. a. D.

***) Nicht 1882, wie an der angeführten Stelle Seite 23 von Dr. Böing wohl versehenlich angegeben ist. Daß das Jahr 1881 gemeint ist, erhellt unter anderem auch aus dem weiteren Verlauf der Kommissionsverhandlungen.

währen, über die Natur dieser zweimaligen Erkrankungen sich selbst ein Urtheil zu bilden, sind die in der Liste enthaltenen Angaben über die bezüglichen Kranken (einschl. des erst an den Masern und danach an den Pocken erkrankten Kindes) auf S. 130 u. 131 wörtlich wiedergegeben. Zur leichteren Uebersicht sind die denselben Kranken betreffenden, während der zweiten Krankenhausbehandlung gemachten Aufzeichnungen mit denjenigen zusammengestellt, welche bei der erstmaligen Behandlung gemacht sind. In der Liste vorgefundene Bleistiftnotizen sind durch kleineren Druck kenntlich gemacht.

Aus der Zusammenstellung ergibt sich, daß die Zeit, welche zwischen der Entlassung aus dem Spital und der Wiederaufnahme in dasselbe bei den neun zweimal als pockenkrank geführten Kindern verstrichen ist, zwischen fünf und fünfzehn Tagen geschwanzt hat. In der Mehrzahl der Fälle hat das Kind weniger als zehn Tage außerhalb des Spitals verbracht, je einmal zehn, elf, zwölf und fünfzehn Tage. Die in der Impfkommmission von Dr. Böing aufgestellten, oben wiedergegebenen Behauptungen, wonach in der Nacher Epidemie dreizehn Personen ca. vier oder gar sechs Wochen nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhause zum zweiten Male an den Pocken erkrankt in das Spital zurückgekommen sein sollen, werden somit durch das entscheidende Material, nämlich die Spitalsliste des Dr. Deben, widerlegt.

Wenn man die Annahme gelten läßt, daß Irrthümer in der Diagnose ausgeschlossen sind, und daß in der That die aufgeführten Kinder während der ersten sowohl, als auch während der zweiten Krankenhausbehandlung an den Pocken gelitten haben, so kann es sich bei der zweiten Aufnahme nur um ein sogenanntes Recidiv, d. h. um ein Wiederaufflackern des noch nicht erloschenen Krankheitsprozesses gehandelt haben. Besonders bemerkenswerth ist in dieser Beziehung noch, daß in dem Falle Erkens das Kind bereits am Tage der zweiten Aufnahme und in dem Falle Weingarts nur einen Tag nach der zweiten Aufnahme gestorben ist. — Bei der Annahme zweier selbstständiger Erkrankungen müßte ja die zweite Infektion bereits während der ersten Erkrankung erfolgt sein; denn zwischen der Infektion und dem Ausbruch der Krankheit vergeht ein Zeitraum von etwa 12 Tagen. Das Unzulässige einer derartigen Auffassung liegt auf der Hand.

Ob es sich in den fraglichen Fällen um sogenannte Recidive oder um irrthümliche Diagnosen bei der ersten oder zweiten Aufnahme gehandelt hat, kann füglich hier unerörtert bleiben. Daß die letztere Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, beweist der am Schlusse der Uebersicht mit aufgeführte Fall des Kindes Philipp Mörs.

Außer den vorerwähnten Kranken, welche ins Spital wieder aufgenommen worden sind, nachdem sie kurz zuvor aus demselben entlassen waren, sind im Jahre 1881 in der Spitalsliste des Dr. Deben noch neun Fälle aufgeführt, bei welchen sich der Vermerk Variola bezw. Variolois recidiva findet, welche also nach den Aufzeichnungen Dr. Deben's noch während ihres Aufenthaltes im Spital einen Rückfall der Krankheit durchgemacht haben. Ein weiteres Eingehen auf diese Fälle ist nach den vorstehenden Ausführungen nicht erforderlich.

| Kontroll- Nr. | Benennung der Armenbehörde, welche den Kranken zugewiesen hat | Vor- und Zuname des Kranken | Alter Jahre | Gewerbe | Wohnung und Nummer | Krankheit |
|------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 52 | Dr. Kaufmann | Erkens Karl (Nr. 88) | 1 | . | Zubengasse 7 | Varolois |
| 88 | Dr. Dreßen | Erkens Karl (f. 52) | 1 | . | Zubengasse 7 | Variola conf. petech. in agonia |
| 74 | Dr. Kaufmann | Winands Johann ^(Nr. 134) | 4 ¹⁰ / ₁₂ | Kind | Krugenofer 72 | Variola |
| 134 | Dr. Debey | Winands Johann ^(f. 74) | 4 ¹⁰ / ₁₂ | . | Krugenofer 72 | Variolois (f. Nr. 74) |
| 166 | Dr. Debey | Weingarts Engelbert ⁽¹⁸⁶⁾ | 14 Wochen | . | St. Paulusstr. 13 | Variolois |
| 186 | Dr. Debey | Weingarts Engelbert ⁽¹⁶⁶⁾ | 14 Wochen | . | St. Paulusstr. 13 | Variola |
| 172 | Dr. Debey | Roskopf Joseph (197) | 3 ¹ / ₁₂ | Wtr. Fabrikarb. | Franzstr. 95 | Variolois |
| 197 | Dr. Sträter | Roskopf Joseph (172) | 3 ¹ / ₁₂ | . | Franzstr. 95 | Variola confluens |
| 173 | Dr. Greve | Schmidt Peter (191) | 8 ¹ / ₁₂ | Vater Musiker | Rudolphstr. 11 | Variolois |
| 191 | Dr. Greve | Schmidt Peter (173) | 8 ¹ / ₁₂ | . | Rudolphstr. 11 | Variola |
| 238 | Dr. Didtmann | Roderburg Arnold ^(f. 263) | 7 | . | Sandfaul 70 | Variolois |
| 263 | Dr. Didtmann | Roderburg Arnold ^(f. 238) | 8 ? | . | Sandfaul 70 | Variola confluens |
| 31 | Dr. Kaufmann | Blum Robert (60) | 3 | ohne Gewerbe | Mühlenberg 9 | Variola (mitis) |
| 60 | Dr. Kaufmann | Blum Robert (f. 31) | 3 | . | Mühlenberg 9 | Variola conf. |
| 177 | Dr. Kaufmann | Wagemann Ludwig ^(f. 216) | 1 ⁴ / ₁₂ | . | Franzstr. 3 | Variolois stad. desic- cationis |
| 216 | Dr. Debey | Wagemann Ludwig | 1 ⁴ / ₁₂ | . | Franzstr. 3 | Variola |
| 299 | G. H. Dr. Scherbier | Rüngeler Theresia | 3 2 ¹ / ₂ | . | Büchel 8 | Variolois |
| 306 | Dr. Debey | Rüngeler Theresia | 3 | f. Nr. 299 | Büchel 8 | Variola recidiva |
| 83 | Dr. Debey | Mörs Philipp | 5 | . | Annuntiatenbach 13 | Morbilli |
| 106 | Dr. Dreßen | Mörs Philipp | 5 | Wtr. Tag- Löhnerin | Annuntiatenbach 13 | Variola |

Wie Dr. Debey über diese vermeintlichen zweimaligen Erkrankungen an den Pocken innerhalb derselben Epidemie gedacht hat, ergibt sich aus einer in seinem Nachlasse gefundenen schriftlichen Äußerung, welche folgendermaßen lautet:

„Es ist, wiederhole ich, unter meinen acuten Recidiven bei mir kein einziger Fall aufgezählt, der nicht unter etwa zwei Wochen recidiv befallen wurde. Bei den meisten war es noch vor Abheilung während des Aufenthaltes im Spital.“

| Schluß der Behandlung | | | Angaben über Impfung | Datum der Aufnahme | Bemerkungen |
|-----------------------|------------------|---------------------|--|--------------------|--|
| geheilt Datum | ungeheilt Datum | gestorben Datum | | | |
| III. 11. 18 | Tag — 8 Stnd. | — | 0 gi 0 gi | III. 2 März 20. | Am III. 11. von Variola geheilt entlassen. — Am III. 20. (nach 9 Tg.) mit heftgr. Var. confl. petechialis in Agonie wieder ins Spital gebracht. |
| IV. 3 20 | Tg — | — | ohne Erf. 1 gi | März 14 | |
| IV. 28. | 19 Tg — | — | ohne Erf. 1 gi | April 9 | |
| IV. 26. 6 | Tg — | — | Nicht geimpft | IV. 20 | |
| — | — | V. 4 N. 3 | nicht geimpft | V. 3. | |
| IV 27 5 | Tg — | — | nicht geimpft | IV. 22 | |
| — | — | 7 Tg. V 14 8 1/2 | nicht geimpft | Mai 7 | Am IV. 27 nach geheilt. Variolois entlassen. |
| IV. 30 8 | Tg — | — | nicht geimpft | IV. 22. | |
| V. 20. 14 | — | — | nicht geimpft | Mai 6. | |
| VI 2 3 | Tg — | — | nicht geimpft (i. 233 war 1 Mal ohne Erf. gi im Alter von 9 Monaten) | Mai 30 | Ausbr. V. 28. |
| VII 20. | — | — | Im Alter von 9 Monaten 1 mal ohne Erf. gi; bei der Impf. im Spital 4 Vacc. stark ausgebildet | Juni 14. | Ausbr. VI. 11. f. Nr. 238. |
| III. 1. 9 | Tg — | — | 1 gi | Febr. 20 | Ausbr. II. 16 mit Mundaffektion u. hohem Fieber. |
| — | — 6 Tg | III. 12 N. 6. | 1 gi | März 6. | |
| V. 4 7 | Tg — | — | Nicht geimpft | IV. 27 | |
| VI 2 14 | Tg — | — | | Mai 19 | |
| VIII 18 | 8 Tg | — | 1 mal geimpft | VIII 11 | |
| IX 24 | 27 Tg | — | 1 mal geimpft | Aug. 29 | |
| III. 21 | 4 Tg | — | im Alter von 4 Mon. ohne Erf. 1 gi. | März 17 | Ausbr. III. 16. Schwester seit III 14 mit Var. petech. im Spital — das Er. bei Philipp N. noch nicht deutlich entwickelt, aber Spitalaufnahme aus Vorsicht angeordnet. |
| V 25 | 57 Tg | — | 1 gi (f. Nr 33) (ohne Erfolg) | " 29 | |

Der vorstehend gegebene Auszug der Aachener Spitalsliste ist, wie nebenbei bemerkt sei, noch in anderer Beziehung lehrreich. Von den zehn Kranken sind fünf als ungeimpft aufgeführt, von den übrigen fünf sind zwei als einmal geimpft und drei als einmal ohne Erfolg geimpft bezeichnet. Die letzteren ohne weiteres als „geimpft“ zu zählen, wie das wohl mit seltenen Ausnahmen in den sogenannten Ur-Böckenlisten bezüglich der ohne Erfolg geimpften Personen geschehen ist, würde unrichtig sein.

Wie aus der Aachener Spitalsliste sich ergibt, sind auch während der Pockenepidemie, von welcher die Stadt in den Jahren 1866 und 1867 heimgesucht wurde, anscheinend einige Kinder von Neuem als an Pocken leidend zur Aufnahme gelangt, nachdem sie bereits vorher aus demselben Anlaß und während derselben Epidemie im Krankenhause behandelt waren. Auf eine wörtliche Wiedergabe dieser Fälle kann nach den vorstehend gegebenen Ausführungen indeß um so eher verzichtet werden, als die bezüglich der Rubriken der Liste zum Theil unvollständig ausgefüllt sind, ja über das Datum der Aufnahme der Kranken ins Spital mit einer einzigen Ausnahme überhaupt jeder Vermerk fehlt. Das Lebensalter, das „angebliche“ Datum der ersten und der zweiten Erkrankung und der Ausgang derselben, sowie der zwischen Genesung und Neuerkrankung verfloßene Zeitraum sind, soweit die Liste die Angaben enthält, nachstehend ersichtlich gemacht (vgl. hierzu außerdem noch den Fall Wassenberg aus dem Jahre 1866 in der Uebersicht auf Seite 140):

| Alter des Kranken in Jahren zur Zeit der ersten Erkrankung: | 3 | 9 | $\frac{9}{12}$ | 10 | 2 | 11 | $1\frac{6}{12}$ | 12 | 6 | $\frac{9}{12}$ ¹⁾ |
|---|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| „Angeblicher“ Beginn der ersten Erkrankung: | 25./7. 1866 | 11./12. 1866 | 9./4. 1866 | 20./8. 1866 | 16./1. 1867 | 5./11. 1866 | 14./9. 1866 | 12./1. 1867 | 16./1. 1867 | 10./4. 1867 |
| Ausgang der ersten Erkrankung: | Genesen 6./9. 1866 | ? | ? | Genesen 34. 8. ²⁾ 1866 | ? | Genesen 24./11. 1866 | ? | ? | ? | ? ^{58 Tage} |
| „Angeblicher“ Beginn der zweiten Erkrankung: | 13./9. 1866 | 23./2. 1867 | 30./4. 1866 | 18./2. 1867 | 24./2. 1867 | 26./11. 1866 | 13./1. 1867 | 6./2. 1867 | 28./1. 1867 | |
| Ausgang der zweiten Erkrankung: | Ge- storben 16./9. 1866 | Genesen 29./3. 1867 | ? | ? | Ge- storben 24./2. 1867 | ? | Ge- storben 18./1. 1867 | ? ^(19 Tage) | Genesen 15./2. 1867 | |
| Zeitraum zwischen Genesung und Neuerkrankung: | 7 Tage | ? | ? | ? $5\frac{1}{2}$ Monate | ? | 2 Tage | ? | ? | ? | |

¹⁾ In diesem Falle ist bemerkt: „Wurde vor 6 Wochen geimpft, ohne Erfolg. — Hatte eine mäßige Zahl von Pusteln und wurde am 4. Mai geheilt entlassen. Am 9. Mai kam er mit einem neuen Ausbruch von Pocken ins Spital zurück und wurde am 1. Juni geheilt entlassen.“

²⁾ Steht so in der Liste.

Als Diagnose ist in allen diesen Fällen theils Variola, theils Variolois angegeben. Auffällig ist es jedenfalls, daß es sich auch hier wieder ausschließlich um Kinder gehandelt hat. Es legt das den Verdacht nahe, daß Dr. Debey, wie es seitens mancher Aerzte noch heute geschieht, Varicellen und echte Pocken nicht genügend auseinander gehalten hat. Keinenfalls aber gestatten derartige unvollständige Aufzeichnungen irgend welche zuverlässige Schlüsse.

Es sind auch die dem Gesundheitsamte zugänglich gemachten polizeilichen Listen über die in der Stadt Essen in den Jahren 1881/82, sowie über die in der Stadt Duisburg in den Jahren 1871/72 und 1873/74 an den Pocken erkrankten Personen anläßlich der in der Impfkommision gemachten Mittheilungen (s. oben) daraufhin ge-

prüft, ob eine und dieselbe Person mehr als einmal aufgeführt ist.*) Wie bei der Aachener Spitalsliste**), so waren auch hier im Gesundheitsamte über alle Erkrankten Zählkarten ausgeschrieben, so daß etwaige zweimalige Erkrankungen leicht und mit Sicherheit ermittelt werden konnten. Das Ergebnis dieser Arbeit war folgendes:

In der Essener Liste, welche 436 an den Pocken erkrankte Personen umfaßt, ist überhaupt keine Person zweimal aufgeführt, und sonach den amtlichen Aufzeichnungen zufolge eine erneute Erkrankung derselben Person im Verlaufe der genannten Epidemie nicht vorgekommen.

Eine eingehendere Besprechung erfordert die Duisburger Epidemie von 1871/72, in welcher nach Ausweis der amtlichen Liste 3011 Personen an den Pocken erkrankt sind.

In dieser Liste finden sich 19 Personen zweimal aufgeführt, bei welchen die Angaben über Namen, Stand, Alter zc. entweder völlig übereinstimmen oder doch nur geringe Abweichungen zeigen, bei welchen aber die Angaben über die Erkrankungsdauer erkennen lassen, daß es sich entweder um zwei verschiedene Personen, oder um die zweimalige, auf verschiedenen Meldungen beruhende Aufführung einer und derselben Erkrankung handelt, da sonst das Datum der zweiten Erkrankung noch in die erste Krankheit hineinfallen würde. Da diese anscheinend doppelten Eintragungen zugleich für die Beurtheilung der Zuverlässigkeit der Listen überhaupt in Betracht kommen — die Duisburger Liste ist noch dazu eine der am sorgfältigsten geführten — so sind die sämtlichen Fälle in der Uebersicht A. auf S. 134 und 135 wörtlich aus der Liste abgedruckt einschließlich derjenigen, in welchen das Datum des Ausgangs der Krankheit bei beiden Eintragungen übereinstimmt. Auch hier sind wieder zur Erleichterung des Vergleichs die beiden Eintragungen neben einander gestellt worden.***)

*) Bemerkte sei, daß von Dr. Böing bestimmte Jahre, auf welche jene Mittheilungen sich beziehen, nicht angegeben sind.

**) In Aachen liegen nach einer Mittheilung des dortigen Polizeipräsidenten amtliche Listen über Pockenranke überhaupt nicht vor. Das noch vorhandene Material, welches vorstehend theilweise verwerthet ist, befindet sich ausschließlich in den nachgelassenen Papieren des Dr. Debeh, darunter auch eine von dem Polizeisekretär Dohlen offenbar ohne amtlichen Auftrag gefertigte unvollständige Liste über die Pockenranke des Jahres 1881.

***) Das Jahr der Erkrankung ist der besseren Uebersicht wegen jedem einzelnen Falle in Klammern beigelegt. Die durch kleineren Druck kenntlich gemachten Zahlen sind in der Originalliste mit rother Tinte oder mit Bleistift eingetragen.

Uebersicht A.

| Laufende No. | Vor- und Zunamen | Alter | Religion | Stand | W o h n u n g | Tag der Aufnahme ins Pöckenhaus | Angemeldet am |
|-------------------|---------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| 551 | Stinn Elise | 5 J. | kth | Kind | Hundsgasse V 68 | | 23/4 |
| 575 | Stinn, Louise | 5 J. | kth | Kind | Hundsgasse V 68 | | 24/4 |
| 555 | Geuer, Marg. | 2 . | kth | Kind | IX 136 | | 23/4 |
| 617 | Geuer, Gretchen | 1½ J. | kth. | Kind | IX 136 | | 26/4 |
| 698 | Weinhaus Bertha | 8 J. | kth. | Kind | IV 184 | | 30/4 |
| 710 | Weinhaus, Bertha | 8 J. | kth | Kind | Klosterstr. № 184 | | 1/5 |
| 1090 | Hellmann, Anna | 17 J. | kath. | ohne | X 23 | | 13/5 |
| 1097 | Hellmann, Anna | 16 J. | kath | ohne | X 23 | | 14/5 |
| 1154 | Klapdor, Marie | 1½ J. | ev | ohne | IV 134 | | 16/5 |
| 1553 | Klapdor, Marie | 2 J. | | Kind | IV 134 | | 28/5 |
| 1294 | Kreyenbruck, Elise | 1 J. | ev | Kind | IV 233 | | 21/5 |
| 1417 | Kreyenbruck Elise | 1 J. | ev | Kind | IV 280 ? 279 | | 24/5 |
| 1328 | Peters August | 3 J. | kath. | Kind | IX 161 | | 22/5 |
| 1925 | Peters, August | 3 J. | kath | Kind | IX 161 | | 8/6 |
| 1335 | Aldenhof, Henriette | 8 J. | kth. | Kind | I 143 | | 22/5 |
| 1552 | Aldenhof, Henriette | 8 J. | kth | Kind | I 143 | | 28/5 |
| 1353 | Wehling, Marie | 1 J. | kath | Kind | IV 233 | | 23/5 |
| 1461 cfr. 1855 | Weling, Marie | 6 M. | kath | Kind | IV ⁽²³³⁾ " | | 25/5 |
| 1373 | Ludwigs Ehefr. | 41 J. | Evgl. | ohne | X 46 | | 23/5 |
| 1595 | Ludwig Ehefr. | 40 " | luth. | ohne | X 46 | | 29/5 |
| 1669 | Halfmann, Heinrich | ¾ J. | kath | Kind | I 52 | | 31/5 |
| 1728 | Halfmann, Heinrich | ¾ J. | kath | Kind | I 52 | | 2/6 |
| 1798 | Meier, Jacob | 17 J. | kath. | Schneiderlehrl. | — 16 | 4/6 | 4/6 |
| 1894 | Meier, Jacob | 16 J. | kth. | Schneider-Lehrling | Buchholz | 4/6 | 7/6 |
| 1897 | Maas, Robert | 16 J. | kath | ohne | VI 214 | | 7/6 |
| 2113 | Maass, Robert | 16½ J. | ev | — | VI 214 | | 14/6 |
| 2016 | Kempkes Ehefr. | 21 J. | kath. | ohne | II 50 | | 11/6 |
| 2074 | Kempkes, Frau | 20 | kth. | ohne | X 15⅛ ? | | 13/6 |
| 1662 | Höffken, Theod. Ehefr. . . . | 42 J. | kath. | ohne | XVII 46 | 4/6 | 31/5 |
| 1794 | Höffken Ehefr. | 42 | kathl. | ohne | XVII 46 | 4/6 | 4/6 |
| 1663 | Höffken, Wilhelm | 3½ J. | kath | Kind | XVII 46 | 8/6 | 31/5 |
| 1954 | Höffken, Wilhelm | 3 J. | kath | Kind | XVII 46 | 8/6 | 8/6 |
| 2267 | Heinrichs, Hermann | 30 J. | ev. | Fab. Arb | XV 7 | 24/6 | 21/6 |
| 2387 | Heinrichs, Wilhelm | 30 J. | ev | Fab Arb | XV 7 | | 28/6 |
| 2572 | Ley J. | ¾ J. | kath | Kind | X 4⅓ | | 12/7 (71) |
| 2610 | Ley, Anna | ¾ J. | kth | — | X 4⅓ | | 15/7 (71) |
| 2432 | Winten, Math. cfr. 2493 | 40 J. | kath | ohne | XIII 36 | | 1/7 |
| 2493 ¹ | Winten, Mathias | 40 J. | kath | Fab Arb | XIII 36 | | 5/7 |

| Tag der Erkrankung | Krankheit | Namen des Arztes | Geneien am | Gestorben am | Sind | | Bemerkungen |
|--------------------|-------------|------------------|------------|--------------|---------|--------------|---|
| | | | | | geimpft | revacciniert | |
| 22/4 (71) | Varioloiden | Dr. Rönsberg | 4/5 | — | ja | — | |
| 21/4 (71) | Pocken | Dr. Rönsberg | 4/5 | — | ja | . | |
| 22/4 (71) | Varioloiden | Dr. Rönsberg | 1/5 | — | nein | | |
| 24/4 (71) | Varioloiden | Dr. Rönsberg | | 4/5 | nein | | |
| 30/4 (71) | Varioloidi | D. Nieten | 11/5 | — | ja | . | |
| 1/5 (71) | Varioloid | D Nieten | 11/5 | — | ja | . | |
| | (Pocken) | (Dr. Cossmann) | | | | | |
| 12/5 (71) | " | " | 19/5 | — | ja | — | |
| 14/5 (71) | " | Dr. Brockerhoff | 19/5 | — | ja | — | |
| 15/5 (71) | Pocken | | | 27/5 | ja | nein | |
| 27/5 (71) | " | Dr. Cossmann | 13/6 | — | nein | | |
| | Varioloiden | | | 27/5 | nein | | |
| 24/5 (71) | Pocken | Dr. Rönsberg | 10/6 | — | nein | | |
| 21/5 (71) | Pocken | Dr. Rönsberg | 8/6 | — | nein | | |
| 6/6 (71) | " | " | — | 9/6 | nein | | |
| 21/5 (71) | Pocken | Dr. Rönsberg | | 28/5 | ja | . | |
| | | | 13/6 | — | ja | . | |
| 22/5 (71) | Pocken | Dr Cossmann | 12/6 | | nein | | |
| 24/5 (71) | " | Dr Brockerhoff | 12/6 | | nein | | |
| 22/5 (71) | Pocken | Dr Rönsberg | 6/6 | — | ja | . | |
| 24/5 (71) | " | " | 15/6 | — | ja | — | |
| 30/5 (71) | Pocken | Dr. Rönsberg | 12/6 | — | nein | | |
| | " | " | 17/6 | — | nein | | |
| 28/5 (71) | Pocken | | 7/6 | — | ja | | |
| 5/6 (71) | " | Dr. Rönsberg | | — | ja | | |
| 5/6 (71) | Pocken | Dr Cossmann | — | 13/6 | nein | | |
| 13/6 (71) | " | " | | 13/6 | nein | | |
| 10/6 (71) | Pocken | Dr. Nieten | 25/6 | — | ja | (nein) | |
| 13/6 (71) | " | Dr. Nieten | 27/6 | — | ja | . | |
| 31/5 (71) | Pocken | Dr. Nieten | | | ja | nein | |
| 4/6 (71) | " | " | — | 22/6 | ja | . | starb an Darmtuberculose, nachdem die Blattern geheilt. |
| 31/5 (71) | Pocken | Dr Nieten | | | ja | — | |
| 7/6 (71) | " | Dr. Cossmann | 8/7 | — | ja | . | |
| 20/6 (71) | " | Dr. Cossmann | 10/7 | — | ja | — | |
| 26/6 (71) | " | " | 11/7 | — | ja | — | |
| | Pocken | Dr Rönsberg | 22/7 | — | nein | . | |
| | " | " | 22/7 | — | nein | — | |
| 30/6 (71) | " | " | 10/7 | — | ja | . | |
| 4/7 (71) | " | " | 11/7 | — | ja | — | |

In zweiter Linie sind diejenigen doppelt aufgeführten Personen in Betracht zu ziehen, bei welchen unter der Annahme, daß es sich um eine und dieselbe Person gehandelt haben kann, die zweite Erkrankung von der ersten nur durch wenige Tage

Uebersicht B.

| Laufende No. | Vor- und Zunamen | Alter | Religion | Stand | Wohnung | Tag der Aufnahme ins Bodenhaus | Angemeldet am |
|--------------|--------------------------|-------|----------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1045 | Derichs, Jacob | 21 J. | lth. | Sattler | III 44 | 12/5 | 12/5 |
| 896 | Derichs, Jacob | 21 J. | lth. | Sattler | III 44 | 17/5 | 17/5 |
| 653 | Krings | 8 M. | | | XIII 39 ¹ / ₄ | | 28/4 |
| 1233 | Krings, Johann | 8 M. | kath. | Kind | XIII 39 ¹ / ₄ | | 19/5 |
| 391 | Felder, Minna | 6 J. | ev. | Kind | Unterstr. IV 139 | | 15/4 |
| 773 | dto., Kind | 6 J. | dto | Kind | Dörrgasse IV 239 | | 3/5 |
| 1108 | Becker Ehefrau. | 36 | e | ohne | XIII 31 | | 14/5 |
| 1569 | Becker, Ludw. Ehefr. . . | 36 J. | ev | " | IX 91 | | 29/5 |

Uebersicht C.

| Laufende No. | Vor- und Zunamen | Alter | Religion | Stand | Wohnung | Tag der Aufnahme ins Bodenhaus | Angemeldet am |
|--------------|--------------------------|-------|----------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 287 | Brans Heinrich Ehefrau . | 32 | lth | Wirth | Oberstraße I | | 10/4 |
| 112 | (1872) | | | | | | |
| 2981 | Brans, Frau | 32 | Ev | ohne | I 64 ¹ / ₂ | | 18/5 |
| 288 | Becker Ehefrau Cath. . . | 26 | lth | Mann Arbeiter | Unterstraße IV 280 | | 10/4 |
| 1814 | Becker, Ehefr. | 26 J. | kath. | ohne | XI 170 ¹ / ₂ | 10/6 | 5/6 |
| 385 | Conrads, Johann | 22 | ev | Küfer | Unterm.str VI 246 | 15/4 | 15/4 |
| 1920 | Conrads, Johann | 22 | kath. | Arbeiter | XII 1* | | 8/6 |

Uebersicht D.

| Laufende No. | Vor- und Zunamen | Alter | Religion | Stand | Wohnung | Tag der Aufnahme ins Bodenhaus | Angemeldet am |
|--------------|--------------------------|-------|----------|-------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2226 | Lixenfeld, Franz | 1 J. | kath | Kind | XII 57 ¹ / ₇ | | 19/6 |
| 2682 | Lixenfeld, Franz | 14 M. | kath. | Kind | XII 57 ¹ / ₇ | | 25/7 |

Uebersicht E.

| Laufende No. | Vor- und Zunamen | Alter | Religion | Stand | Wohnung | Tag der Aufnahme ins Bodenhaus | Angemeldet am |
|--------------|-------------------------|--------|----------|-------|---------|--------------------------------|---------------|
| 34 | Kreienberg Johann . . . | 1/3 J. | lth | Kind | X 69 | — | 10/3 |
| 64 | Kreyenberg Johann . . . | 1/2 J. | lth | Kind | VI 16 | . | 5/6 |

(höchstens 10 Tage) getrennt gewesen sein würde, wo mit anderen Worten wohl ein Recidiv der Krankheit, nicht aber eine Neuerkrankung angenommen werden dürfte.

Es sind dies die in der nachstehenden Uebersicht B. zusammengestellten vier Fälle.

| Tag der Erkrankung | Krankheit | Namen des Arztes | Geneesen am | Gestorben am | S i n d | | B e m e r k u n g e n |
|--------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|---------|-------------|---------------------------|
| | | | | | geimpft | revaccinirt | |
| 10/5 (71) | Boöden | Dr. Nieten | 15/5 | — | ja | . | zum 2 ^{ten} Male |
| 16/5 (71) | — | | 31/5 | — | ja | . | |
| 28/4 (71) | Boöden | Dr Rönsberg | 8/5 | — | nein | | |
| 18/5 (71) | „ | Dr Rönsberg | | 22/5 | nein | | |
| 13/4 (71) | Varioloïd | D. Cossmann | 25/4 | — | nein | | |
| 2/5 (71) | Varioloïd | do | 15/5 | — | nein | | |
| 13/5 (71) | Boöden | Dr Rönsberg | 23/5 | — | ja | | |
| 27/5 (71) | „ | Dr Nieten | 10/6 | — | ja | nein | |

| Tag der Erkrankung | Krankheit | Namen des Arztes | Geneesen am | Gestorben am | S i n d | | B e m e r k u n g e n |
|--------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|---------|-------------|-----------------------|
| | | | | | geimpft | revaccinirt | |
| 8/4 (71) | Varioloïd | Dr Nieten | 21/4 | — | ja | — | |
| 18/5 (72) | Boöden | Dr. Lange | 5/6 | | ja | | |
| 8/4 (71) | Varioloïd | Dr. Nieten | 22/4 | — | ja | — | |
| 5/6 (71) | Boöden | Dr. Cossmann | — | 14/6 | ja | nein | |
| 15/4 (71) | Varioloïd | Dr. Nieten | 27/4 | — | ja | . | |
| 6/6 (71) | Boöden | Dr Weber | 14/6 | — | ja | . | |

| Tag der Erkrankung | Krankheit | Namen des Arztes | Geneesen am | Gestorben am | S i n d | | B e m e r k u n g e n |
|--------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--|
| | | | | | geimpft | revaccinirt | |
| 18/6 (71) | Boöden | Dr. Cossmann | 24/6 | — | nein | | vide Nr. 2226, zum 2. mal erkrankt mit Scharlach |
| 22/7 (71) | „ | Dr. Brockerhoff | — | 25/7 | nein | | |

| Tag der Erkrankung | Krankheit | Namen des Arztes | Geneesen am | Gestorben am | S i n d | | B e m e r k u n g e n |
|--------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|---------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | geimpft | revaccinirt | |
| 10/3 (74) | Boöden | ohne | 16/3 | | nein | | hatte bereits vor 3 Monat die Boöden. |
| 5/6 (74) | | Stratmann | | 6/6 | nein | | |

Wird nunmehr noch ein Fall abgezählt, in welchem es sich offenbar bei der zweiten Erkrankung gar nicht um Pocken, sondern um Scharlach gehandelt hat, so bleiben nur drei Fälle übrig, bei welchen die Möglichkeit einer zweimaligen Erkrankung innerhalb der Epidemie von 1870/71 vorliegt. Die Angaben, welche die Liste bezüglich dieser drei Fälle enthält, sind aus der Uebersicht C. (S. 136 und 137) ersichtlich.

Eine nähere Betrachtung ergibt aber, daß in keinem dieser Fälle die Angaben über die Person (Religion, Stand, Wohnung) völlig übereinstimmen. Es ist daher sehr wohl möglich, daß die zweite Eintragung sich auf eine andere Person desselben Namens bezieht.

Der bereits erwähnte Fall, in welchem es sich bei der zweiten Erkrankung um Scharlach gehandelt hat, ist nach den Angaben der Liste in der Uebersicht D. (S. 136 und 137) mitgetheilt.

Die Duisburger Liste von 1871/72 mit ihren 3011 an den Pocken erkrankten Personen kann demnach als eine Bestätigung für die Behauptung, daß innerhalb einer und derselben Epidemie Personen häufig zweimal an den Pocken erkranken, nicht angeführt werden; denn in der Liste ist nicht ein einziger einwandsfreier derartiger Fall zu finden.

Für die Duisburger Epidemie von 1873/74, welche in derselben Weise geprüft worden ist, wie diejenige von 1871/72, hat sich ergeben, daß unter 113 überhaupt Erkrankten allerdings ein Kind sich befunden hat, welches innerhalb der Epidemie und zwar 3 Monate nach der ersten Erkrankung zum zweiten Male erkrankt ist. Die bezüglichen Angaben der Liste sind in der Uebersicht E. (auf S. 136 und 137) ersichtlich gemacht. Bei näherer Betrachtung ergibt sich, daß in diesem Falle die erste angebliche Erkrankung an den Pocken schon nach sechs Tagen mit Genesung geendet hat. Es kann sonach wohl kaum bezweifelt werden, daß hier ein Irrthum in der Diagnose untergelaufen ist. Sonst findet sich in der Liste keine Person doppelt aufgeführt. —

Zur Ergänzung der vorstehend besprochenen Ermittlungen sind dann noch einige andere Epidemien an der Hand der amtlichen Listen darauf hin geprüft, ob ein und dieselbe Person als innerhalb einer und derselben Epidemie aufs neue an Pocken erkrankt aufgeführt ist. Was sich hierbei ergeben hat, ist in der Uebersicht auf Seite 139 zusammengefaßt.

Die beiden in der Uebersicht aufgeführten Fälle, in welchen möglicherweise eine zweimalige Erkrankung vorgelegen hat, sind folgende: 1) In der Liste von Hornburg ist unter Nr. 43 eine Ehefrau Borchers aufgeführt, über welche nur angegeben ist, daß sie am 29./1. 72 genesen sei, während bezüglich des Datums der Erkrankung die Eintragung fehlt. Auch Alter und Wohnung ist nicht angegeben. Unter Nr. 73 folgt dann eine 32 Jahre alte Ehefrau Borchers, welche am 20./2. 72 erkrankt und am 28./3. 72 genesen ist. Bei den unvollständigen Angaben über die zuerst erkrankte Ehefrau Borchers ist es nicht ausgeschlossen, daß es sich hier um zwei verschiedene Personen gehandelt hat. 2) Der Fall in der Liste von Erfurt betrifft ein Kind im ersten Lebensjahre, welches nach Ausweis der Liste (Nr. 431 und Nr. 851) vom

| Ort | Zeitdauer der Epidemie | Zahl der überhaupt in dem angegebenen Zeitraum Erkrankten | Zahl der innerhalb des betr. Zeitraums zweimal Erkrankten |
|---|------------------------|---|---|
| Liegnitz | 1865—1869 | 78 | Keine. |
| " | 1870—1872 | 912 | Keine |
| Arneburg | 1872/1873 | 12 | Keine. |
| Bregenstein | 1834 | 25 | Keine. |
| Salbe | 1834—1871 | 644 | Keine. |
| Hornburg | 1871/1872 | 127 | 1. |
| Neuhaldensleben | 1833—1872 | 291 | Keine. |
| Groß-Salze | 1834—1872 | 112 | Keine. |
| Groß-Santhersleben | 1834 | 14 | Keine. |
| Schönebeck | 1834—48, 1851 u. 1865. | 158 | Keine. |
| " | 1871—1873 | 262 | Keine. |
| Süplingen | 1833 | 25 | Keine. |
| Börbig | 1871 | 30 | Keine. |
| Erfurt | 1833—1872 | 2223 | 1. |
| Nordhausen | 1869—1872 | 916 | Keine. |
| Erfurt | 1856—1872 | 15 | Keine. |
| Bracht, Bürgermeisterei | 1857—1872 | 28 | Keine. |
| Brüggen, " | 1872 | 16 | Keine. |
| Effen, Stadt " | 1881/1882 | 436 | Keine. |
| Gerresheim, Stadt und Land, Bürgermeisterei | 1870—1872 | 302 | Keine. |
| Grefrath, Bürgermeisterei | 1858—1872 | 15 | Keine. |
| Kaiserswerth, Stadt und Land, Bürgermeisterei | 1865—1874 | 216 | Keine. |
| Kempen, Stadt | 1871/1872 | 38 | Keine. |
| Krefeld, Land | 1871/1872 | 118 | Keine. |
| Neuß, Stadt | 1871/1872 | 185 | Keine. |
| Wefel | 1870—1873 | 523 | Keine. |
| Ort ohne Angabe | 1871/1872 | 48 | Keine. |
| Bonn, Stadt | 1870—1872 | 117 | Keine. |
| Köln, " | 1858—1870 | 1212 | Keine. |
| " | 1871—1873 | 2361 | Keine. |
| Mülheim a. Rh., Stadt | 1871/72 | 183 | Keine. |
| Bäsweller, Bürgermeisterei | 1866—1872 | 41 | Keine. |
| Cörrenzig, " | 1871/1872 | 209 | Keine. |
| Montjoie, " | 1849—1851 | 78 | Keine. |
| Sträten, Ortschaft " | 1881 | 20 | Keine. |

1./4. 71 bis 26./4. 71 an Varioloiden und vom 24./6. 71 bis 16./7. 71 wiederum an Varioloiden gelitten hat. Bei der zweiten Eintragung ist in der Liste bemerkt „ist scheinbar identisch mit Nr. 431.“ Unberücksichtigt geblieben sind in dieser Zusammenstellung 3 Fälle, in welchen zwischen der ersten und zweiten Erkrankung 3 bzw. 5 bzw. 8 Tage verfloßen sind, in welchen es sich also, die Identität der Personen vorausgesetzt, nur um ein Recidiv der Krankheit gehandelt haben kann. Von diesen 3 Fällen ist je einer in den Listen von Liegnitz, Krefeld (Land) und Köln ermittelt.

Die Behauptung, daß sogar innerhalb einer und derselben Epidemie Personen nicht selten zum zweiten Male von den Pocken befallen würden, hat sonach in dem vorliegenden Material eine Stütze nicht gefunden. Die Bearbeitung desselben hat vielmehr ergeben, daß ein solches Vorkommniß selbst dann noch als ein außerordentlich seltenes bezeichnet werden muß, wenn man die nicht einwandfreien Fälle als thatsächlich nachgewiesene zweimalige Erkrankungen gelten läßt.

Es bleiben nun diejenigen Fälle zu erörtern, welche in der Liste über die betreffende Epidemie zwar nur einmal aufgeführt sind, bei welchen sich aber der Vermerk findet, daß die erkrankte Person bereits früher die Pocken überstanden hatte.

Was zunächst die Spitalsliste des Dr. Debeh in Aachen betrifft, so findet sich unter den 371 Pockenkranken des Jahres 1881 ein derartiger Fall überhaupt nicht. Aus der Liste des Jahres 1866 sind vier Fälle und des Jahres 1867 fünf Fälle ermittelt worden, bei welchen Notizen über frühere Erkrankungen an Pocken eingetragen sind, und zwar sollen zwei dieser Kranken sogar zum dritten Male von den Pocken befallen sein (1866: Fall Wassenberg und 1867: Fall Ehlen). Um auch hier eine objektive Prüfung darüber zu ermöglichen, ob und inwieweit diesen Aufzeichnungen Werth beizulegen ist, mögen sie hier ebenfalls wörtlich mitgetheilt sein:

Auszug aus der Spitalsliste des Dr. Debeh in Aachen.

1866.

| Angeblicher Tag der Erkrankung | Name und Vornamen | Alter | Verheir. ledig | Stand oder Gewerbe | Straße | Haus Nr. | Ge- nesen | Ge- storben | Todes- hunde | Vacci- nirt oder nicht | Spital | Diagnose und Bemerkungen |
|--------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|------------------------|--------|-----------------------------|
| III 15 | Breuer Maria ¹⁾ | 25 | — | | Burtscheit | — | | | | ? | " | Variolois. |
| VII 10 | Keller Leonard | 28 | | Weber | Franzstr. | 105 | VII 18 | | | 2 v | " | Variolois. 2 Mal Pocken. |
| V 17 | Baschet Hermann ²⁾ | 62 | | Tagl. | Reich | 12 | | | | 0 | " | Variola. |
| II 27 | Wassenberg Anna ³⁾ | 47 | | | St. Annastr. | 46 | | | | ? | " | Variolois. |

¹⁾ Schon ein Mal als Kind die Pocken gehabt, litt zugleich an Gehirntuberkulose und starb daran 1867.

²⁾ Leidet zum 2. Mal an Pocken.

³⁾ Hat schon früher ein Mal Pocken gehabt und wurde im Spital (im Mai) aufs Neue befallen.

1867.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|----|---|-----------------|------------|----|--------|--|--|---|----|--|
| IV 5 | Wachten Leonard | 10 | | | Rehmstr. | 4 | — | | | — | — | Va. j. v. 1865 u. B. 9 Jahr Varicella. |
| X 21 | Ehlen Maria ¹⁾ | 18 | I | Luch- arbtr. | Königstr. | 44 | 28 L. | | | 1 | D | Variola. |
| I 24 | Spierß Gertrud ²⁾ | 20 | | | Schildstr. | 6 | II. 11 | | | v | Mh | Variola. |
| III 10 | Kentmeister Gertrud ³⁾ | 24 | I | Magd | Coccarell | 21 | | | | 2 | D | Va. confluens |
| IV 30 | Pauls Peter ⁴⁾ | 42 | I | Drgler | Stollberg | | 37 L. | | | 3 | D | Variola confluens. |

¹⁾ Ist zum 3. Mal pockenkrank; die Narben der früheren Pusteln noch im Gesicht erkennbar.

²⁾ Hat im 7. Lebensjahr zuerst Pocken gehabt.

³⁾ Hat bereits in der Jugend ein Mal Pocken gehabt.

⁴⁾ Zu Aachen im Quartier Borgasse 45, schon 1 Mal Pocken gehabt, 3 Mal geimpft, zuletzt vor 20 Jahren.

Wie der vorstehende Auszug zeigt, fehlt unter den 9 Kranken bei 5 die Eintragung über den Ausgang der Krankheit, und es ist in diesen Fällen sonach nicht möglich, über die Dauer der Krankheit Aufschluß zu erhalten. Ueberdies ist in den meisten Fällen nicht ersichtlich, worauf die Angabe des früheren Ueberstehens der Pocken sich stützt. Der Umstand, daß nur in einem einzigen Falle, nämlich bei der im Jahre 1867 erkrankten Maria Ehlen, ausdrücklich bemerkt ist, die Narben der früheren Pusteln seien noch im Gesicht erkennbar gewesen, schließt jedenfalls die Annahme nicht aus, daß es sich bei einem Theile der Erkrankten lediglich um von diesen selbst herrührende Aussagen gehandelt hat. Ganz auszuschließen ist der im Jahre 1867 erkrankte Leonard Wachten,

da hier ausdrücklich vermerkt ist, daß die Erkrankung im Jahre 1865 Varicellen gewesen sind. Der Vollständigkeit wegen möge die bezügliche Eintragung aus dem Jahre 1865 hier ebenfalls mitgeteilt sein. Auch bei diesem Falle fehlt, wie nebenbei bemerkt sei, die Angabe über den Ausgang der Krankheit.

1865.

| Angebl. Tag der Erkrankung | Name und Vornamen | Alter | Vollständig Besch. | Stand oder Gewerbe | Estraße | Haus Nr. | | Ge- nesen | Ge- storben | Todes- stunde | Vacci- nirt oder nicht | Spital | Diagnose und Bemer- kungen |
|----------------------------|-------------------|-------|-----------------------|--------------------|----------|----------|---|--------------|----------------|------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| XII.14 | Wachten Leonard | 9 | | | Rehmstr. | | 4 | | | | | — | Varicella |

Wie viele Personen in den Jahren 1866 und 1867 zu Aachen überhaupt an den Pocken erkrankt sind, ist aus dem noch vorhandenen Aktenmaterial nicht festzustellen. Die Spitalsliste des Dr. Debey führt für 1866 439 und für 1867 865 an den Pocken behandelte Personen auf.

Was die übrigen im Gesundheitsamte bearbeiteten Listen betrifft, so ist unter den 28 903 Pockenkranken, welche in den Krankenjournalen der Berliner Sanitätskommission in den Jahren 1865 bis 1874 verzeichnet sind, nicht ein einziger gefunden worden, bei welchem ein Vermerk über eine frühere Erkrankung an Pocken eingetragen wäre.

Unter den 16 195 Erkrankten, welche in den übrigen bearbeiteten amtlichen Listen aufgeführt sind (s. die Uebersicht derselben auf Seite 155), haben sich im ganzen nur zehn derartige Fälle ermitteln lassen. Die bezüglich derselben hauptsächlich in Betracht kommenden Angaben der Listen sind folgende:

| Stadt bezw. Gemeinde, in welcher die Liste geführt ist | Alter der erkrankten Person | Datum der Erkrankung | Dauer der in der Liste aufgeführten Erkrankung | Ausgang der in der Liste aufgeführten Erkrankung | Vermerk der Liste über die frühere Erkrankung an Pocken |
|--|-----------------------------|----------------------|--|--|--|
| Süplingen | 36 Jahre | 23./11. 33 | ? | ? | „hat die natürlichen Pocken schon einmal gehabt.“ |
| Erfurt | 61 Jahre | 21./4. 55 | 12 Tage | genesen | „hat früher die natürlichen Pocken gehabt.“ |
| „ | 60 Jahre | 25./6. 55 | 21 Tage | genesen | „hat früher die natürlichen Pocken gehabt.“ |
| „ | 12 Jahre | 9./3. 58 | 14 Tage | genesen | „hat die wirklichen Blattern gehabt.“ |
| Nordhausen | 4 Jahre | 1./7. 71 | 18 Tage | genesen | „hat die natürlichen Blattern im 1. Lebensjahre gehabt.“ |
| „ | 4 1/2 Jahre | 11./9. 71 | 21 Tage | genesen | „hat die natürlichen Pocken gehabt.“ |
| Duisburg | 4 Jahre | 2./8. 74 | 24 Tage | genesen | „im Jahre 1871 Pocken gehabt.“ ¹⁾ |
| Offen | 38 Jahre | 19./4. 81 | ? | genesen | „war bereits vor 8 Jahren an den Pocken erkrankt gewesen“ |
| „ | 46 Jahre | 30./1. 82 | 16 Tage | genesen | „hat bereits 1 mal vor 25 Jahren die Pocken gehabt.“ |
| Krefeld (Land) | 56 Jahre | 27./11. 71 | 3 Tage | gestorben | „soll im Alter von 12 Jahren die natürlichen Pocken gehabt haben.“ |

¹⁾ Dieser Fall hat bei der im Gesundheitsamte stattgehabten Prüfung der amtlichen Liste für das Jahr 1871 in derselben nicht aufgefunden werden können.

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß in dem von der Stadt Barmen eingesandten Material, welches, wie im Eingange bemerkt ist, im übrigen wegen seiner großen Unvollständigkeit nicht hat bearbeitet werden können, unter 2042 an den Pocken erkrankten Personen 5 gefunden worden sind, bei welchen vermerkt ist, daß sie bereits früher die Pocken überstanden hätten. Die näheren Angaben betreffs dieser Personen ergeben sich aus folgendem:

| Alter der erkrankten Person | Datum der Erkrankung | Dauer der in der Meldefarte zc. aufgeführten Erkrankung | Ausgang der in der Meldefarte zc. aufgeführten Erkrankung | Vermerk in der Meldefarte zc. über die frühere Erkrankung an Pocken |
|-----------------------------|----------------------|---|---|---|
| ? | 7./6. 1871 | ? | Gestorben | „Geimpft und die ächten Pocken gehabt.“ |
| 70 Jahre | 26./4. 1872 | ? | ? | „Hat vor 20 Jahren die Pocken schon gehabt.“ |
| ? | 27./4. 1872 | ? | ? | „Erkrankte einmal beim Militär an Variola.“ |
| 7 $\frac{1}{2}$ Jahre | 20./6. 1872 | 4 Tage | Gestorben | „Vor 6 Jahren Variola überstanden.“ |
| 30 Jahre | 22./7. 1872 | ? | ? | „Soll als Kind Menschenpocken gehabt haben. Narben nicht sichtbar.“ |

Um über die verhältnißmäßige Häufigkeit des zweimaligen Erkrankens an den Pocken ziffermäßige Angaben machen zu können, müßte man vor allem wissen, wie viele bereits früher gepockte Personen zur Zeit der Epidemien an den betreffenden Orten überhaupt vorhanden gewesen sind. Da sich das nicht feststellen läßt, so muß man sich damit begnügen, die vorstehend mitgetheilten Fälle in Beziehung zu setzen zu den übrigen an den Pocken erkrankten Personen.

Nun hat sich ergeben, daß unter 28 903 Kranken der Berliner Listen kein einziger und unter 18 237*) Kranken der sonst darauf geprüften Listen (einschl. Barmen) nur 15 Kranke sich gefunden haben, bei welchen eine Angabe über eine frühere Erkrankung an Pocken gemacht ist. Wie groß die Zahl derjenigen gewesen ist, bei welchen die Eintragung eines bezüglichen Vermerks in die Listen unterlassen worden ist, entzieht sich, wie kaum erwähnt zu werden braucht, der Beurtheilung. Auf Grund der Prüfung der sogenannten Ur-Pockenlisten muß jedenfalls eine zweimalige Erkrankung einer und derselben Person an den Pocken in Uebereinstimmung mit den überall gemachten ärztlichen Erfahrungen als ein seltenes Vorkommniß bezeichnet werden.

2. Prüfung des Materials mit Rücksicht auf die Frage, ob die Schutzpockenimpfung gegen das Erkranken an Pocken Schutz gewährt.

Von impfgegenerischer Seite ist bereits eine Anzahl von sogenannten Ur-Pockenlisten veröffentlicht worden, aus welchen hervorgehen sollte, daß entgegen der allgemeinen Ansicht gerade die ungeimpften Individuen und in erster Linie die ungeimpften Säuglinge, in auffälliger Weise von den Pocken verschont blieben, während Geimpfte und Wiedergeimpfte in großer Zahl von der Krankheit befallen würden.

*) Von den Fällen der Aachener Spitalliste wird hier abgesehen, weil die Zahl der in den betreffenden Epidemien überhaupt erkrankten Personen nicht bekannt ist.

Eine derartige Liste, auf welche in impfgegnerischen Schriften mit besonderem Nachdruck hingewiesen wird, ist beispielsweise die „amtliche Pockenliste der Stadt Bonn“ aus den Jahren 1870, 1871 und 1872. Gerade auf diese Liste hier etwas näher einzugehen empfiehlt sich um so mehr, als das Original derselben bei dem im Gesundheitsamte bearbeiteten Material sich befunden hat, und demnach die Möglichkeit einer Kontrolle der impfgegnerischen Angaben vorliegt. Die genannte Liste eignet sich ferner deswegen besonders zu einer einleitenden Besprechung, weil sie einen sehr lehrreichen Beweis dafür abgibt, daß die einfache Angabe „geimpft“ oder „revaccinirt“ statistisch nicht verwertbar ist. — Ein von „Adolf Graf Bedtwich als Mitglied des Internationalen Impfgegner-Vereins“ unterzeichnetes Flugblatt*) „Zur Illustration der Impfschutzlehre. Amtliche Pockenliste der Stadt Bonn“ führt im Ganzen 116 in der Zeit vom 9. December 1870 bis 19. Juli 1872 in Bonn an den Pocken erkrankte Personen auf und zwar in einem Auszuge, welcher über das Alter der Erkrankten, den Zeitpunkt der Erkrankung, den Ausgang der Krankheit und den Impfzustand der Erkrankten Auskunft giebt. Bei der überwiegenden Zahl der Kranken (69) findet sich der Vermerk „geimpft und revaccinirt“, bei den meisten übrigen (42) der Vermerk „geimpft“, bei einem Kranken ist der Impfzustand nicht angegeben, und nur vier Erkrankte (2 Kinder im ersten und 2 Kinder im zweiten Lebensjahre) sind als nicht geimpft bezeichnet.

Nicht weniger als 41 geimpfte bezw. wiedergeimpfte Personen sind nach Ausweis dieser Liste an den Pocken erkrankt, bevor das erste ungeimpfte Kind befallen worden ist. — Die Bevölkerung Bonns wird am Kopfe der Liste auf „25 000 Einwohner, worunter über 1000 ungeimpfte Individuen!“ angegeben.

In der That muß eine derartige Liste zunächst den Eindruck erwecken, als blieben gerade die ungeimpften Individuen auffallend von den Pocken verschont. Bei näherer Betrachtung ergibt sich aber bald das Unberechtigte einer solchen Schlußfolgerung.

Vorweg muß bemerkt werden, daß nach Ausweis der Originalliste der erste Pockenfall einen am 8. November 1870 erkrankten französischen Premier-Lieutenant betroffen hat, über dessen Impfzustand jeder Vermerk fehlt. Dieser Kranke ist in der dem Impfwanggegner entnommenen Liste nicht mit aufgeführt. Der in der letzteren Liste unter Nr. 1 verzeichnete Kranke, welcher in der Originalliste unter Nr. 2 eingetragen ist, war ein 48jähriger, als Kind geimpfter**) Mann, bei welchem in der Originalliste als muthmaßliche Veranlassung der Krankheit angegeben ist: „Zusammenkommen mit einem kranken Soldaten auf der Eisenbahn“.

Der erste während der Epidemie Erkrankte ist demnach eine Person gewesen, über deren Impfzustand überhaupt nichts zu erfahren ist, der zweite eine ältere Person, bei welcher von einem genügenden Impfschutz wegen mangelnder Wiederimpfung kaum mehr die Rede sein konnte. Wenn unter den 117 Kranken nur 4 (ungeimpfte) Kinder im Alter bis zu zwei Jahren sich befunden haben, so erscheint dieser Umstand nicht gerade sehr

*) Am Kopfe des Flugblattes findet sich der Vermerk: „Aus dem Impfwanggegner“, herausgegeben und redigirt von Dr. R. Dittmann, Linnich, Rheinpreußen, viertelj. 75 Pf.“

**) Der Zusatz „als Kind“ ist in der dem Impfwanggegner entnommenen Liste bei diesem wie bei zwei anderen Kranken fortgelassen. Ferner ist unter Nr. 40 eine 32jährige Kranke als geimpft und revaccinirt aufgeführt, bei welcher in der Originalliste jeder Vermerk über den Impfzustand fehlt.

auffällig. Wie die Originalliste mittheilt, befanden sich unter den Kranken drei Zugewanderte (ein Schönfärber, ein Metzger und ein Orgeldreher) im Alter von 22 bis 25 Jahren, ferner eine zugereifte Dienstmagd, welche „bis vor einigen Tagen“ in Düsseldorf gewohnt hatte. Diese vier Personen werden vermuthlich ebensowenig wie vier im städtischen Roth- und Hülfshospital und eine in der medizinischen Klinik an den Pocken erkrankte Personen Gelegenheit gehabt haben Säuglinge zu infiziren. Erwägt man ferner, daß von den 117 Kranken nicht weniger als 70 im „Contagienhause“ behandelt worden sind, wie die Originalliste ausweist, so wird man in der Annahme nicht fehl gehen, daß Säuglinge verhältnißmäßig selten mit dem Infektionsstoff in Berührung gekommen sind und demgemäß überhaupt auch nicht erkranken konnten.

Die unter solchen Verhältnissen und in einer so unbedeutenden Epidemie gemachten Erfahrungen können uns kein Urtheil gestatten über die Empfänglichkeit der ungeimpften Säuglinge für die Pocken. Dazu bedarf es größerer Zahlen, welche denn auch in dieser Beziehung in der That etwas ganz anderes lehren, als die kleine Bonner Epidemie.

Was die als „geimpft“ bezw. als „geimpft und revaccinirt“ aufgeführten Personen betrifft, so ist in der dem Impfwanggegner entnommenen Liste eine oben schon angedeutete für die Beurtheilung des Werthes jener Angaben sehr lehrreiche aus der Originalliste sich ergebende Thatsache nicht berücksichtigt worden.

Am 4. Februar 1871 erkrankte in dem Hause „Sürstraße 2“ der 9jährige Knabe Lenger an den Pocken (Nr. 35 der Originalliste). Der Knabe wurde ins Contagienhaus gebracht, wo er am folgenden Tage verstarb. In demselben Hause „Sürstraße 2“ erkrankten dann am 16. Februar, also 12 Tage nach der Erkrankung jenes Kindes Lenger, gleichzeitig nicht weniger als dreizehn Personen an den Pocken (Nr. 44 bis 56 der Originalliste). Bei allen diesen dreizehn Personen findet sich in der Rubrik „Muthmaßliche Veranlassung der Krankheit“ eingetragen: „Erkrankung des Kindes Lenger in demselben Hause“; und in der Rubrik: „Ob geimpft und revaccinirt“ ist bei allen dreizehn Personen verzeichnet „geimpft und revaccinirt nach der Erkrankung des Kindes Lenger“.


Die dem Impfwanggegner entnommene Liste führt diese dreizehn Personen ohne weiteren Zusatz als „geimpft und revaccinirt“ auf. Da aber zwischen der Infektion und dem Ausbruch der Krankheit ein Zeitraum von etwa 12 Tagen vergeht, so ist es klar, daß jene dreizehn Personen bereits das Pockengift in sich aufgenommen hatten, als sie anläßlich der Erkrankung des Knaben L. geimpft bezw. wiedergeimpft wurden, und daß demgemäß diese Impfungen zu spät kamen, als daß sie die Erkrankungen hätten verhüten können. — Die vorstehende Mittheilung aus der Bonner Liste zeigt in überzeugender Weise, ein wie geringer Werth der einfachen Angabe „geimpft“, wie sie sich in den „Nr.-Pockenlisten“ fast ausnahmslos findet, schon allein aus dem Grunde beizulegen ist, weil man den Zeitpunkt der Impfung nicht kennt.

Wieviel geimpfte und wieviel ungeimpfte Personen Anfangs der 70er Jahre in Bonn überhaupt gelebt haben, ist nicht festzustellen; man wird indeß nicht fehl gehen, wenn man annimmt, daß die genannte Universitätsstadt zu denjenigen Orten in Preußen gehört, wo die Impfung auch vor Erlaß des Reichs-Impfgesetzes verhältnißmäßig gut

durchgeführt gewesen ist. Dem entspricht in der That auch der Verlauf der Epidemie. Es ist ja bekannt, daß der durch die Impfung bedingte Schutz mit den Jahren eine allmähliche Abnahme erfährt, und man wird daher, da die Impfung bezw. Wiederimpfung in pockenfreien Zeiten — abgesehen von der Armee — fast ausschließlich bei Kindern vorgenommen wurde und noch heute vorgenommen wird, vor Allem die Altersklasse bis etwa zum 20. Lebensjahre ins Auge fassen müssen, wenn man über den Impfschutz ein Urtheil gewinnen will. In dieser Altersklasse sind nun in Bonn bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 26 000 Personen in der Epidemie von 1870/72, welche sich länger als 20 Monate hingezogen hat, 22 geimpfte bezw. wiedergeimpfte Personen an den Pocken erkrankt, und es ist von diesen nur eine einzige Person an den Pocken gestorben. Erst nach dem 20. Lebensjahre, wo der Impfschutz mehr und mehr abzunehmen beginnt, sind die Erkrankungen etwas zahlreicher gewesen, und von den 14 an den Pocken gestorbenen geimpften bezw. wiedergeimpften Personen haben 10 oder 71,5 Procent im Alter von mehr als 32 Jahren gestanden.

Die nachstehende auf Grund der Originalliste angefertigte graphische Darstellung veranschaulicht diese Verhältnisse im Einzelnen.

Nach Ausweis der amtlichen Liste in Bonn in den Jahren 1870—72 an den Pocken_erkrankte bezw. gestorbene Personen.



Bei einer Bevölkerung von ca. 26 000 Personen sind in Bonn im Jahre 1870 nur eine Person, im Jahre 1871 (nach Abzug der beiden ungeimpften Säuglinge) elf und im Jahre 1872 zwei Personen an den Pocken gestorben, zu einer Zeit, wo die Krankheit fast überall mit ungewohnter Heftigkeit auftrat, und wo der Ansteckungsstoff ohne Zweifel in zahlreichen Fällen in die Stadt eingeschleppt wurde.


Wahrlich, die Bevölkerung Bonns konnte mit dem in erster Linie durch die Impfung ihr gewährten Schutze zufrieden sein.

Von einem impfgegnerischen Arzte*) ist unter anderen auch eine „Statistische Zusammenstellung der Zahlen aus der Pockenliste der Stadt Lübeck“ veröffentlicht worden, welche aus dem Jahre 1881, d. h. aus einer Zeit stammt, in der das Reichs-Impfgesetz bereits 6 Jahre hindurch in Kraft gewesen war. Von dieser Liste heißt es in dem Flugblatte: Sie

*) Dr. H. Didtmann (S. A. des internationalen Comité's der Impfgegner). Das bezügliche Flugblatt ist überschrieben: „XXV. Leumundszeugniß zur Freisprechung der ungeimpften Wickelkinder von der Beschuldigung, die Ursache der Pockenepidemien zu sein.“

„zeigt das Verschontbleiben der vom Gesetze verfolgten „nicht geimpften Individuen“ und der ganzen Altersklasse der noch nicht Geimpften (0—1½ Jahr) in Pockenepidemieen. Die Listen aller deutschen Städte und Dörfer lauten bezüglich des Verhaltens der Ungeimpften ähnlich wie die von Lübeck!!!“ — Es sind hier im Ganzen 48 Erkrankte aufgeführt, darunter (als Nr. 17) ein einziges ungeimpftes Kind; die übrigen 47 sind als „geimpft“ bezeichnet. — Da diese Liste in einer Petition vom 16. Juni 1881 auch dem Reichstage vorgelegt worden ist, so möge zur Klarlegung ihres Werthes eine graphische Darstellung hier beigelegt sein, aus welcher sich das Alter der Erkrankten bezw. Gestorbenen ergibt:

Ausweislich einer von impfgegnerischer Seite veröffentlichten Liste in Lübeck im Jahre 1881 an den Pocken erkrankte bezw. gestorbene Personen.



Die Darstellung zeigt in noch höherem Grade, als es 1870/72 in Bonn der Fall gewesen ist, das Verschontbleiben der jüngeren unter dem Impfschutze stehenden Bevölkerung. Bis zum 20. Lebensjahre sind nämlich nur zwei als geimpft angegebene Personen an den Pocken erkrankt, nicht eine einzige gestorben. Ueberhaupt entfallen die sämtlichen Todesfälle, sieben an der Zahl, auf Personen im 40. Lebensjahre und darüber. Wenn demnach die Schutzkraft der Impfung gegen das Erkranken und Sterben an Pocken hätte veranschaulicht werden sollen, so hätte sich kaum eine besser hierzu geeignete Liste finden lassen als gerade diejenige von Lübeck.

In der erwähnten Veröffentlichung wird auch bezüglich dieser Liste großes Gewicht darauf gelegt, daß unter den 48 Erkrankten nur ein einziges ungeimpftes Kind sich befunden habe, und daß demnach gerade die ungeimpften Kinder, deren Zahl in Lübeck einschl. der Vorstädte auf 1427 angegeben wird, auffällig verschont geblieben seien. In dieser Beziehung kann auf die bei der Bonner Liste gegebenen Ausführungen verwiesen werden. Es müßte doch erst nachgewiesen sein, daß abgesehen von dem erkrankten auch sonst noch ungeimpfte Säuglinge überhaupt mit dem Ansteckungsstoff in Berührung gekommen sind. Es ist das nicht gerade wahrscheinlich, wenn man bedenkt, daß die Zahl der erkrankten Personen bei einer Bevölkerung von ca. 51000 Einwohnern überhaupt nur eine sehr geringe gewesen ist. — Uebrigens wird die große Empfänglichkeit der ungeimpften Säuglinge für die Pocken noch zur Genüge an der Hand der sogenannten Ur-Pockenlisten nachgewiesen werden.

Inwieweit die Angaben über den Impfzustand der 48 in der erwähnten Lübecker Liste aufgeführten Kranken auf Zuverlässigkeit Anspruch machen können, ist nicht zu

entscheiden gewesen. Das Gesundheitsamt hat sich zwar bemüht, das Original der polizeilichen Liste zu erhalten, eine solche scheint aber nicht vorhanden zu sein. Denn auf ein bezügliches Ersuchen des Herrn Reichskanzlers ist von dem Senate der freien und Hansestadt Lübeck nur ein „Personenregister des Blattern-Hospitals zu St. Annen“ zur Einsichtnahme überandt worden. Nach diesem Register sind im Jahre 1881 im ganzen 65 Personen in jenem Hospitale behandelt worden, darunter anscheinend fast alle in der besprochenen Liste verzeichneten. Ueber den Impfzustand der Erkrankten enthält das Register indeß nur unvollständige Angaben.

In der vorerwähnten Petition an den Reichstag sind ferner über Pockenkrankungen in der Stadt Liegnitz aus den Jahren 1871 und 1872 auszugsweise Listen mitgetheilt, nach welchen daselbst fast ausschließlich geimpfte Personen erkrankt sein sollen. Auch diese Listen sprechen keineswegs zu Ungunsten der Impfung; auf ihre eingehendere Besprechung kann indeß um so eher verzichtet werden, als, wie bereits erwähnt wurde, die dem Gesundheitsamte vorliegenden Original-Listen über Pockenkrankungen in der Stadt Liegnitz vom Jahre 1855 bis zum Jahre 1885 überhaupt keinerlei Aufzeichnungen über den Impfzustand der Erkrankten enthalten, und somit jede Möglichkeit fehlt, die bezüglichlichen impfgegnerischen Angaben auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen.

Um nun zu zeigen, daß keineswegs, wie von impfgegnerischer Seite behauptet ist, die Listen aller deutschen Städte und Dörfer ähnlich lauten, wie die von Lübeck, sollen im Nachstehenden zunächst einige zu ganz anderen Ergebnissen führende amtliche Listen besprochen werden.

In Nordhausen sind in den Jahren 1869 bis 1872 bei einer Einwohnerzahl von ca. 21000*) Personen ausweislich der im Gesundheitsamte bearbeiteten amtlichen Liste im ganzen 916 Personen an den Pocken erkrankt, von denen 181 der Krankheit erlegen sind. Die Vertheilung dieser Fälle auf die verschiedenen Altersklassen ergibt sich aus der folgenden Zusammenstellung (der Vollständigkeit wegen sind hier die Gestorbenen mit aufgeführt):

| | G e s t a n d e n i m | | | | | | | | | | S u m m a |
|--------------------|-----------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-----------|
| | 1. | 2.-5. | 6.-10. | 11.-15. | 16.-20. | 21.-30. | 31.-40. | 41.-60. | 61.-80. | ? | |
| | L e b e n s j a h r e | | | | | | | | | | |
| Erkrankte | 90 | 192 | 24 | 29 | 35 | 133 | 185 | 172 | 47 | 9 | 916 |
| Gestorbene | 47 | 59 | 2 | — | 1 | 3 | 19 | 32 | 17 | 1 | 181 |

Demnach standen 90 oder nahezu der zehnte Theil sämmtlicher Erkrankten im ersten Lebensjahre. Auf die Altersklasse bis einschließlich des fünften Lebensjahres entfielen im Ganzen 282 Erkrankte und 106 Gestorbene, d. h. fast der dritte Theil sämmtlicher Erkrankten und weit über die Hälfte sämmtlicher Gestorbenen.

*) Nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1871: 21 254 Civilpersonen.

Für je ein Lebensjahr der verschiedenen Altersklassen ergeben sich durchschnittlich folgende Zahlen:

| 1. Lebensjahr 90 Erkrankte | | | |
|----------------------------|---|----|---|
| 2.—5. | " | 48 | " |
| 6.—10. | " | 5 | " |
| 11.—15. | " | 6 | " |
| 16.—20. | " | 7 | " |
| 21.—30. | " | 13 | " |
| 31.—40. | " | 19 | " |
| 41.—60. | " | 9 | " |
| 61.—80. | " | 2 | " |

Daß eine derartig hohe Betheiligung der im 1. bzw. 2.—5. Lebensjahre Stehenden nicht durch die größere Zahl der auf diese Altersklassen entfallenden überhaupt Lebenden zu erklären ist, liegt auf der Hand. Entweder müssen die Säuglinge und die jüngeren Kinder für die Pocken besonders empfänglich gewesen, oder die höheren Altersklassen müssen verhältnißmäßig unempfindlich gewesen sein.

Was den Impfzustand der Erkrankten betrifft, so sind von den 90 im ersten Lebensjahre Stehenden 46 als ungeimpft bezeichnet, während bei den übrigen 44 jede bezügliche Angabe fehlt. Von den 192 im 2.—5. Lebensjahre Stehenden sind 146 als ungeimpft und nur 32 als geimpft aufgeführt; bei 12 fehlt die Angabe über den Impfzustand. Die auffallend hohe Zahl der in dieser Altersklasse erkrankten Kinder mußte von vornherein den Verdacht erwecken, daß in den 60er Jahren in Nordhausen die Impfung höchst mangelhaft durchgeführt gewesen ist, und es haben daher weitere Ermittlungen hierüber stattgefunden. Dieselben haben ergeben, daß dort in den 60er Jahren eine ebenso eifrige wie erfolgreiche Agitation gegen die Impfung hervorgetreten ist. Wie amtlich mitgetheilt wird, haben sich damals die Impfgegner in Nordhausen von Jahr zu Jahr vermehrt und sogar in den gebildeten Kreisen immer mehr Anhang gewonnen, zumal das minder gebildete Publikum, in Folge des immer seltener vorkommenden Auftretens der Menschenpocken sorgloser gemacht, an eine Abschwächung dieser Krankheit überhaupt zu glauben begann. In Folge dessen wurden mehr und mehr Impflinge der öffentlichen und privaten Impfung entzogen. Bis zu welchem Grade dies und zwar vorzugsweise in den Jahren 1868—1874 im ganzen Kreise Nordhausen geschehen ist, darüber geben die nachstehenden, den Akten der Königl. Regierung entnommenen Zahlen Auskunft:

| Im Jahre | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| W i e b e n im Kreise Nordhausen aus dem Vorjahre zu impfen (nach Abzug der Gestorbenen, Weggezogenen und der bereits Gepockten) . . . | 2248 | 2163 | 2134 | 2258 | 2290 | 2243 | 2124 | 2230 | 2100 | 2302 | 2705 | 282 | 2355 | 2731 | 2693 |
| Davon wurden mit Erfolg geimpft | 2028 | 1899 | 1742 | 1744 | 1825 | 1995 | 1888 | 1991 | 1662 | 1485 | 1457 | 1792 | 1490 | 1984 | 1970 |
| In die Impfliste des nächsten Jahres waren als ungeimpft zu übertragen | 220 | 264 | 392 | 514 | 464 | 248 | 236 | 239 | 438 | 817 | 1248 | 1020 | 865 | 747 | 723 |
| Zahl der Restanten nach Prozent | 9,8 % | 12,2 % | 18,4 % | 23,2 % | 20,3 % | 11,1 % | 11,1 % | 10,7 % | 20,9 % | 35,5 % | 46,1 % | 36,3 % | 36,7 % | 27,4 % | 26,7 % |

Der größte Theil der Restanten fiel auf die Stadt Nordhausen, woselbst nach Mittheilung der Königlichen Regierung vom Jahre 1865—1874 = 11,6%, 16,3%, 14,7%, 32,0%, 67,4%, 81,8%, 61,2%, 56,6%, 54,0% und 49,1% der Smpflinge ungeimpft blieben. Der in diesen Zahlen genügend gekennzeichneten mangelhaften Durchführung der Smpfung konnte, wie seitens der Königlichen Regierung hervorgehoben wird, aus dem Grunde nicht abgeholfen werden, weil ein wirklicher direkter Zwang zur Smpfung nur bei einer progressiven Pockenepidemie in Folge des Regulativs von 1835 durchführbar war.

In der Stadt Nordhausen sind nun aber, wie bereits gezeigt wurde, während der Jahre 1869 bis 1872 Kinder im Alter bis zum 6. Lebensjahre in auffallend großer Zahl an den Pocken erkrankt, nämlich im 1. Lebensjahre 90, im 2. 45, im 3. 55, im 4. 61, im 5. 31 und im 6. 13, demnach zusammen 295, während vom 7. bis einschl. 30. Lebensjahre nur 208 Personen erkrankt sind. Diese Thatsache steht in vollem Einklange damit, daß von den seit der Mitte der sechziger Jahre geborenen Kindern in einzelnen Jahren mehr als die Hälfte ungeimpft geblieben war.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den von impfgegnerischer Seite an die Listen von Bonn und Lübeck geknüpften Behauptungen von der auffallend geringen Betheiligung der ungeimpften Kinder an den Pockenerkrankungen, so wird man jene Behauptungen keineswegs begründet finden.

Noch besser geeignet als die Liste von Nordhausen ist für eine derartige Betrachtung diejenige von Duisburg aus den Jahren 1871/72, weil es sich hier um eine sehr große Zahl von Erkrankungen (3011) handelt, und außerdem die Angaben über den Smpfzustand der Erkrankten nahezu vollständig eingetragen sind. Das Nähere ergibt die folgende Uebersicht (die Gestorbenen sind auch hier mit aufgeführt).

Auszug aus der Liste von Duisburg für die Jahre 1871/72.

| | 3 m | | | | | | | | | | Summe |
|-----------------------|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-------|
| | 1. | 2.—5. | 6.—10. | 11.—15. | 16. 20. | 21.—30. | 31.—40. | 41.—60. | 61.—80. | ? | |
| Lebensjahre | | | | | | | | | | | |
| erkrankten: | | | | | | | | | | | |
| Ueberhaupt | 192 | 430 | 265 | 257 | 300 | 559 | 482 | 461 | 62 | 3 | 3 011 |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| geimpft | 10 | 96 | 173 | 233 | 283 | 509 | 445 | 415 | 53 | — | 2 217 |
| rebaccinirt | — | — | 2 | 8 | 11 | 29 | 29 | 39 | 8 | — | 126 |
| ungeimpft | 182 | 333 | 90 | 16 | 6 | 20 | 7 | 7 | 1 | — | 662 |
| ft arben : *) | | | | | | | | | | | |
| Ueberhaupt | 93 | 150 | 51 | 16 | 13 | 51 | 67 | 108 | 23 | — | 572 |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| geimpft | 3 | 25 | 29 | 11 | 10 | 40 | 63 | 101 | 21 | — | 303 |
| rebaccinirt | — | — | — | 2 | — | 3 | 2 | 5 | 2 | — | 14 |
| ungeimpft | 90 | 124 | 22 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | — | — | 254 |

*) Bei 23 Erkrankten fehlt die Angabe über den Ausgang der Krankheit.

Die Uebersicht zeigt zunächst, daß weit mehr als der fünfte Theil der sämtlichen 3011 Kranken ungeimpft gewesen ist. In der Altersklasse vom 2. bis 5. Lebensjahre sind 333 ungeimpfte und nur 96 geimpfte Kinder erkrankt. Auch in der Altersklasse vom 6.—10. Lebensjahre betragen die ungeimpften Erkrankten noch mehr als ein Drittel der in dieser Altersklasse überhaupt Erkrankten.

Um die Betheiligung der ungeimpften Kinder an den Erkrankungen noch deutlicher hervortreten zu lassen, mögen die auf die ersten 10 Lebensjahre entfallenden Kranken besonders aufgeführt sein:

| Von den Erkrankten standen im | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-------------------------------|-------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | Lebensjahre | | | | | | | | | |
| Ueberhaupt | 192*) | 160 | 111 | 88 | 71 | 76 | 46 | 45 | 54 | 44 |
| Darunter Ungeimpfte | 182 | 140 | 88 | 66 | 39 | 38 | 18 | 11 | 14 | 9 |

Was die Geimpften betrifft, so nimmt, entsprechend der mit der Zeit eintretenden Abnahme des Impfschutzes, die Zahl der Erkrankten mit dem höheren Lebensalter zu. — Besonders bemerkenswerth ist noch, daß trotz der Heftigkeit der Epidemie im Alter bis zu 20 Jahren nur 21 Wiedergeimpfte erkrankt sind.

Im Uebrigen ist den Uebersichten kaum noch etwas hinzuzufügen; sie weisen auf den ersten Blick nach, in wie hohem Grade die ungeimpften Kinder der Ansteckung durch Pocken unterliegen.

Man vergleiche hiermit die folgenden Aeußerungen von impfgegnerischer Seite zu der oben besprochenen „Statistischen Zusammenstellung der Zahlen aus der Pockenliste der Stadt Lübeck von 1881“ (Diese Aeußerungen finden sich in dem Seite 145 bezeichneten Flugblatte.):

„Ähnlich wie in Lübeck liegen die Verhältnisse in anderen Städten und Dörfern. Ueberall waren es, sowohl in den Seuchenjahren 1870/73 wie in den Epidemien der neuesten Zeit, nicht die Ungeimpften, sondern stets die Geimpften und die Wiedergeimpften, welche zuerst, welche absolut und relativ am zahlreichsten und am schwersten von den Pocken heimgesucht wurden. Es ist unbegreiflich, wie die Aerzte und Gesetzgeber vor dieser statistischen Thatfache, welche ausnahmslos aus den Urpockenlisten aller Städte und Dörfer des Deutschen Reiches mit Lapidarschrift herauspricht, Aug' und Ohr verschließen konnten, als sie 1874 gegen die schuldlosen ungeimpften Kindchen, ohne Widerspruch zu dulden, die schwere Anklage erhoben, sie, die ungeimpften Kleinen seien es, die die Pockenepidemien verursachten und daraufhin den Impfzwang schufen.

„Von 30 Städten liegen bereits ähnlich lautende, zum Himmel schreiende amtliche Leumundszeugnisse für die absolute Unschuld der ungeimpften Kindchen an dem Zustandekommen der Pocken vor. Wenn von den vielen amtlichen Leumundslisten auch nur eine einzige umgekehrt lautete, als sie lauten, wenn z. B. in Lübeck, statt 47 Geimpfte 47 Ungeimpfte und nur ein Geimpfter erkrankt und dieser genesen wäre, dann

*) Darunter 56 im Alter bis zu 3 Monaten.

„würden alle ärztlichen Blätter einen solchen Ausnahmefall als „unanfechtbaren Beweis für den Segen der Impfung ausposaunen, und selbst die politischen Tagesblätter würden diesen Fund, — wenn irgend eine ärztliche „Autorität“ ihren Namen liehe, triumphirend weiter tragen. Nun aber, da alle amtlichen Pockenlisten ohne Ausnahme ein Hohu auf die allherrschende Impfschutztheorie sind und dieselbe als den dummfsten Aberglauben lächerlich machen, nun schweigt sowohl die bevormundende ärztliche Presse, wie die bevormundete Tagespresse die Leumundsatteste der verfolgten Kindchen todt und hilft so die Wahrheit unterdrücken. Und dies alles geschieht im Dienste der öffentlichen Volksverdummung. —

„Möchten alle Kinderfreunde, möchten aber namentlich die Mitglieder des Reichstages, denn diese werden bald über Pockenschuld oder Schuldlosigkeit der armen Kleinen, über Fortbestand oder Abschaffung des Impfwanges zu entscheiden haben — bei ihren Herren Bürgermeistern in Städten und Dörfern nach Schema Lübeck sich die Urpockenlisten aus früheren Pockenjahren, besonders aus den Jahren 1870—1872 wörtlich kopiren lassen. Jede solche Urpockenliste dient ja dazu, vor dem hohen deutschen Reichstage für die Wahrheit und gegen Aberglauben und Volksverdummung laut Zeugniß abzulegen; jede Liste ist ein sprechender Zeuge, daß die Zwangsverfolgung der ungeimpften Kindchen mit der vergifteten Impfnadel eine eben so sinnlose und abergläubische wie vor der Moral, der Religion und der Wissenschaft ungerechtfertigte Maaßregel ist. —“

Der Umstand, daß in Duisburg in den Jahren 1871/72 eine so große Zahl von ungeimpften Kindern erkrankt ist, ließ darauf schließen, daß auch hier die Impfung in den Jahren vor Ausbruch der Epidemie mangelhaft durchgeführt gewesen ist. In der That ist das (zum Theil in Folge von impfgegnerischer Agitation) der Fall gewesen, wie aus der nachstehenden auf amtlichen Mittheilungen beruhenden Uebersicht erhellt:

Nachweisung der in der Stadt Duisburg in den Jahren 1860—1874 geborenen und geimpften Kinder.

| Im Jahre | sind geboren | sind geimpft | Auf je 100 im Vorjahre geborene Kinder entfallen geimpfte |
|----------|--------------|--------------|---|
| 1861 | 760 | 772 | |
| 1862 | 843 | 802 | 106 |
| 1863 | 981 | 820 | 97 |
| 1864 | 1026 | 822 | 84 |
| 1865 | 1105 | 849 | 83 |
| 1866 | 1203 | 691 | 63 |
| 1867 | 1117 | 860 | 71 |
| 1868 | 1306 | 1033 | 92 |
| 1869 | 1354 | 846 | 65 |
| 1870 | 1492 | 359 | 27 |
| 1871 | 1366 | 1334 | 89 |
| 1872 | 1855 | 993 | 73 |
| 1873 | 1909 | 1332 | 72 |
| 1874 | 2080 | 1137 | 60 |

Im Anschluß an die Listen von Nordhausen und Duisburg möge hier noch ein Auszug aus einer anderen sehr umfangreichen Liste mitgeteilt werden, in welcher die Zahl der ungeimpften Erkrankten gegenüber derjenigen der geimpften Erkrankten eine sehr geringe, und demnach anzunehmen ist, daß es sich um eine Bevölkerung gehandelt hat, in welcher die Impfung ziemlich allgemein durchgeführt war. Es ist das die Liste von Köln, in welcher für die Jahre 1871 bis 1873 2361 Erkrankte aufgeführt sind. Unter diesen 2361 finden sich nur 34 als ungeimpft Bezeichnete. Das Weitere enthält die folgende Uebersicht, in welche wiederum die Gestorbenen mit aufgenommen sind:

Auszug aus der Liste von Köln für die Jahre 1871—1873.

| | J a h r | | | | | | | | | | | Summe |
|--|---------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|---|-------|
| | 1. | 2.—5. | 6.—10. | 11.—15. | 16.—20. | 21.—30. | 31.—40. | 41.—60. | 61.—80. | 81. und mehr | ? | |

e r k r a n k t e n :

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|----|------|
| Ueberhaupt . . | 44 | 34 | 62 | 79 | 201 | 743 | 515 | 576 | 91 | 1 | 15 | 2361 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | |
| geimpft . . | 15 | 26 | 56 | 67 | 169 | 678 | 478 | 530 | 83 | — | 5 | 2107 |
| revaccinirt . | — | — | 4 | 11 | 27 | 40 | 27 | 29 | 3 | — | — | 141 |
| ungeimpft . | 22 | 5 | 2 | — | — | 2 | — | 3 | — | — | — | 34 |

t a r b e n¹⁾:

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|---|---|---|----|----|-----|----|---|---|-----|
| Ueberhaupt . . | 27 | 12 | 5 | 4 | 4 | 58 | 74 | 151 | 39 | 1 | 2 | 377 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | |
| geimpft . . | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 52 | 70 | 142 | 37 | — | 1 | 328 |
| revaccinirt . | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 6 | — | — | — | 12 |
| ungeimpft . | 17 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 22 |

¹⁾ Bei 112 Erkrankten fehlt die Angabe über den Ausgang der Krankheit.

Eine eingehendere Besprechung der Uebersicht ist nach dem bereits Gefagten nicht erforderlich. Es genügt darauf hinzuweisen, daß unter den 2361 erkrankten Personen nur 164 geimpfte Kinder im Alter bis zu 15 Jahren und nur 42 wiedergeimpfte Personen im Alter bis zu 20 Jahren sich befunden haben. Nebenbei sei bemerkt, daß von den 377 Todesfällen nur 26 auf geimpfte Personen im Alter bis zu 20 Jahren und nur 2 auf wiedergeimpfte Personen im Alter bis zu 30 Jahren entfallen.

Da in dieser Epidemie sowohl die Thatsache, daß die Impfung einen beträchtlichen Schutz vor dem Erkranken an Pocken gewährt, wie andererseits auch die Erfahrung, daß dieser Schutz mit der Zeit eine Abnahme erfährt und daher der Erneuerung durch die Wiederimpfung bedarf, besonders deutlich hervortreten, so sollen die Zahlen der Erkrankten hier noch für die einzelnen Lebensjahre mitgeteilt werden:

Vertheilung der in den Jahren 1871—1873 in Köln an den Pocken erkrankten 2361 Personen auf die einzelnen Lebensjahre.

| Lebensjahr | Zahl der Erkrankten | Lebensjahr | Zahl der Erkrankten | Lebensjahr | Zahl der Erkrankten | Lebensjahr | Zahl der Erkrankten |
|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1. | 44 ¹⁾ | 18. | 54 | 35. | 49 | 52. | 25 |
| 2. | 7 | 19. | 54 | 36. | 60 | 53. | 19 |
| 3. | 9 | 20. | 47 | 37. | 49 | 54. | 25 |
| 4. | 9 | 21. | 74 | 38. | 48 | 55. | 24 |
| 5. | 9 | 22. | 79 | 39. | 39 | 56. | 16 |
| 6. | 11 | 23. | 76 | 40. | 38 | 57. | 21 |
| 7. | 8 | 24. | 58 | 41. | 53 | 58. | 14 |
| 8. | 14 | 25. | 79 | 42. | 41 | 59. | 14 |
| 9. | 11 | 26. | 91 | 43. | 33 | 60. | 7 |
| 10. | 18 | 27. | 96 | 44. | 31 | 61—70. | 78 |
| 11. | 23 | 28. | 68 | 45. | 40 | 71—80. | 13 |
| 12. | 21 | 29. | 61 | 46. | 37 | über 80 | 1 |
| 13. | 10 | 30. | 61 | 47. | 37 | ohne Angabe | 15 |
| 14. | 10 | 31. | 77 | 48. | 39 | Zusammen | 2361 |
| 15. | 15 | 32. | 42 | 49. | 27 | | |
| 16. | 25 | 33. | 63 | 50. | 31 | | |
| 17. | 21 | 34. | 50 | 51 | 42 | | |

¹⁾ Darunter 31 im Alter bis zu 3 Monaten.

Die verhältnißmäßig hohe Betheiligung des ersten Lebensjahres fällt auch hier ins Auge. Ob sie nicht noch mehr hervorgetreten sein würde, wenn nicht, wie es den Anschein hat, auch im ersten Lebensjahre schon zahlreiche Impfungen stattgefunden hätten, entzieht sich der Beurtheilung. Desgleichen ist nicht zu ermitteln, wie viele der als geimpft aufgeführten Kranken ohne Erfolg oder zu spät, d. h. im Inkubationsstadium geimpft worden sind. Jedenfalls spricht auch die Liste von Köln trotz der großen Zahl der in ihr aufgeführten Geimpften in überzeugender Weise dafür, daß in der That die Impfung einen beträchtlichen, wenn auch nicht für das ganze Leben anhaltenden Schutz gegen das Erkranken an Pocken gewährt.

Entsprechend dem besseren Impfzustande der Bevölkerung hat überdies Köln während der Epidemie im Anfange der 70er Jahre bei weitem weniger als Duisburg von den Pocken zu leiden gehabt, wie aus nachstehender Zusammenstellung erhellt:

| | Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 1. 12. 1871 | Zahl der | | Von je 10000 Einwohnern | |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Pocken-Erkrankungen | Pocken-Todesfälle | erkrankten an Pocken | starben an Pocken |
| Köln (1871—1873) | 129 233 | 2 361 | 377 | 183 | 29 |
| Duisburg ¹⁾ (1871—1872) | 30 533 | 3 011 | 572 | 986 | 187 |

¹⁾ In Duisburg sind außerdem in den Jahren 1873/74 noch 113 Personen an Pocken erkrankt und 18 an Pocken gestorben.

Zur weiteren Erläuterung der vorstehenden Ausführungen folgt im Nachstehenden noch eine Tabelle, in welcher die hier in Frage kommenden Angaben aus einer Anzahl

verschiedener Listen zusammengestellt sind. Die Liste von Köln ist hier noch einmal berücksichtigt und zwar für den ganzen Zeitraum von 1849 bis 1873 (4721 Erkrankte).

Vertheilung der an den Pocken erkrankten Personen auf die verschiedenen Altersklassen.

| | | E s t a n d e n i m | | | | | | | | | | | Anzahl der Erkrankten, bei welchen die Angabe fehlt | |
|---|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---------------------------------|
| | | L e b e n s j a h r e . | | | | | | | | | | | bezügl. des Lebensalters | bezügl. des Gesundheitszustand. |
| | | 1. | 2. | 3.-5. | 6.-10. | 11.-15. | 16.-20. | 21.-30. | 31.-40. | 41.-60. | 61.-80. | 81. u. darüber | | |
| Calbe 1834—1871 (644 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 23 2 20 | 7 — 7 | 9 1 1 | 20 1 4 | 45 — — | 97 1 — | 163 5 — | 118 — — | 110 — 7 | 9 — — | 1 — — | 42 | 595 |
| Hornburg 1871/72 (127 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 1 — — | — — — | — — — | 2 — — | 11 — — | 7 — — | 21 — — | 21 — — | 33 — — | 7 — — | — — — | 24 | 127 |
| Schönebeck 1834—1873 (507 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 21 — — | 13 — 4 | 4 — — | 10 — — | 29 — — | 66 — — | 109 — — | 87 — — | 90 — — | 20 — — | — — — | 58 | 503 |
| Erfurt 1833—1872 (2223 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 150 12 136 | 32 11 21 | 45 34 11 | 49 48 1 | 75 74 — | 175 174 — | 503 497 6 | 488 485 — | 595 590 — | 107 102 — | — — — | 4 | 6 |
| Essen 1831/82 (436 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 37 3 33 | 19 3 16 | 22 17 5 | 44 41 3 | 68 66 2 | 29 29 — | 66 66 — | 86 83 — | 52 50 — | 10 8 — | — — — | 3 | 3 |
| Bürgermeisterei Gerresheim (Stadt u. Land) 1865—1872 (332 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 16 5 11 | 8 3 5 | 12 7 5 | 24 21 3 | 18 18 — | 25 24 — | 56 56 — | 73 73 — | 69 66 — | 25 20 — | — — — | 6 | 7 |
| Bürgermeisterei Hülß 1871/72 (291 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 4 — — | — — — | 1 — — | 4 — — | 3 1 — | 24 — — | 80 — — | 44 — — | 81 — — | 19 — — | — — — | 31 | 281 |
| Bürgermeisterei Kaiserswerth (Stadt u. Land) 1865—1874 (216 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 3 2 1 | 2 — 1 | 2 — 1 | 8 7 — | 15 15 — | 26 24 — | 61 60 — | 37 35 — | 50 49 — | 12 8 — | — — — | — | 11 |
| Krefeld (Stadt) 1865—1867 (286 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 5 1 4 | 3 — 3 | 4 3 1 | 2 — — | 18 18 — | 63 58 — | 78 78 — | 43 42 — | 59 56 — | 3 3 — | — — — | 8 | 11 |
| Krefeld (Land) 1871/72 (118 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 1 — — | — — — | — — — | 1 1 — | 3 2 — | 10 10 — | 24 24 — | 23 23 — | 45 44 — | 11 11 — | — — — | — | 1 |
| Neuß 1865—1873 (248 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 4 — — | — — — | 1 — — | 8 8 — | 14 14 — | 24 24 — | 55 55 — | 53 53 — | 76 76 — | 12 12 — | — — — | 1 | — |
| Wesel 1870—1873 (523 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 6 2 4 | 3 — 3 | 6 5 1 | 20 20 — | 22 22 — | 63 63 — | 97 97 — | 101 101 — | 167 167 — | 34 34 — | 1 — — | 3 | 1 |
| Köln 1849—1873 (4721 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 77 15 26 | 21 6 1 | 63 22 5 | 139 60 3 | 235 87 1 | 552 221 — | 1420 772 — | 971 573 — | 939 606 — | 118 93 — | 1 — — | 185 | 2191 |
| Mülheim a. Rh. 1871/72 (183 Erkrankte) | Anzahl der Erkrankten darunter: Geimpfte (einschl. Revaccinirte) Ungeimpfte | 12 5 7 | — — — | — — — | 6 6 — | 8 8 — | 13 13 — | 53 53 — | 44 44 — | 42 42 — | 4 4 — | 1 — — | — | — |

Der leichteren Uebersicht wegen ist an dieser Stelle von einer Mittheilung der Zahl der Todesfälle ganz abgesehen. Es konnte dies um so eher geschehen, als der Impfschutz vor dem Sterben an Pocken später noch zu erörtern sein wird.

Es bleibt nunmehr zu ermitteln, wie sich die Erkrankten in den bearbeiteten Listen überhaupt auf die verschiedenen Altersklassen vertheilen. Die näheren Angaben über die in dieser Beziehung verwertheten Listen erhellen aus nachstehender Uebersicht.*):

| Regierungs- Bezirk | Ort u. | Zeitraum, über welchen die Angaben sich erstrecken | Zahl der Erkrankten | |
|-----------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------|
| | | | mit bekanntem Lebensalter | mit unbekanntem Lebensalter |
| | Berlin | 1865—74 | 28 814 | 89 |
| | Pegnitz | 1865—72 | 966 | 24 |
| Magdeburg | Arneburg | 1872/73 | 12 | — |
| " | Bregenstein | 1834 | 25 | — |
| " | Calbe | 1842/43 | 180 | — |
| " | Neuhaldensleben | 1865/66 | 319 | 4 |
| " | | 1833/34 | 51 | — |
| " | Groß-Salze | 1834—72 | 111 | 1 |
| " | Groß-Santersleben | 1834 | 14 | — |
| " | Schoenebeck | 1834-48, 1851 u. 1865 | 158 | — |
| " | | 1871—73 | 256 | 6 |
| " | Süplingen | 1833 | 25 | — |
| Merseburg | Zörbig | 1871 | 30 | — |
| Erfurt | Erfurt | 1833—72 | 2 219 | 4 |
| " | Nordhausen | 1869—72 | 907 | 9 |
| " | Treffurt | 1856, 64, 71, 72 | 15 | — |
| Düsseldorf | Bracht, Bürgermeisterei | 1857—72 | 27 | 1 |
| " | Brüggen, " | 1872 | 16 | — |
| " | Duisburg, Stadt | 1871/72 | 3 008 | 3 |
| " | | 1873/74 | 112 | 1 |
| " | Essen, " | 1881/82 | 433 | 3 |
| " | Gerresheim, Stadt und Land, Bürgermeisterei | 1865—72 | 326 | 6 |
| " | Kaiserswerth, Stadt und Land, Bürgermeisterei | 1865—74 | 216 | — |
| " | Kempen, Stadt | 1871/72 | 37 | 1 |
| " | Krefeld, Stadt | 1865—67 | 278 | 8 |
| " | Krefeld, Land | 1871/72 | 118 | — |
| " | Neuß, Stadt | 1865—73 | 247 | 1 |
| " | | 1880, 1882 | 11 | — |
| " | Stoppenberg, Bürgermeisterei | 1881/82 | 45 | 2 |
| " | Wesel, Stadt | 1870—73 | 520 | 3 |
| " | ohne Ortsangabe | 1871/72 | 48 | — |
| Röln | Bonn, Stadt | 1870—72 | 115 | 2 |
| " | Mülheim a. Rh., Stadt | 1871/72 | 183 | — |
| " | Röln | 1849—73 | 4 536 | 185 |
| Aachen | Bärsweiler, Bürgermeisterei | 1866—72 | 41 | — |
| " | Cörsrenzig, " | 1871/72 | 209 | — |
| " | Gangelt, Verwaltungs-Bezirk | 1872 | 19 | — |
| " | Montjoie, Bürgermeisterei | 1849—51 | 76 | 2 |
| " | Sträßen, Ortschaft | 1881 | 20 | — |
| Summe | | | 44 743 | 355 |

*) Listen, in welchen die Angabe des Lebensalters bei 5 Procent der Erkrankten und darüber fehlt, sind hier unberücksichtigt gelassen.

Die Vertheilung der Erkrankten, welche in den vorstehenden Listen enthalten sind, auf die einzelnen Altersklassen, ergibt sich aus den hier angefügten Uebersichten:

| Von den Erkrankten mit bekanntem Lebensalter standen: | Auf je ein Lebensjahr der verschiedenen Altersklassen entfallen sonach: | Setzt man die im ersten Lebensjahr Erkrankten = 1000 so entfallen auf je ein Lebensjahr der übrigen Altersklassen | |
|---|---|---|----------|
| A. Berlin: | | | |
| im 1. Lebensjahre | 1 966 | 1 966 | 1000 |
| darunter im Alter bis zu 3 Monaten | 441 | | |
| „ 2. Lebensjahre | 1 453 | 1 453 | 739 |
| „ 3.—5. „ | 2 507 | 836 | 425 |
| „ 6.—10. „ | 1 576 | 315 | 160 |
| „ 11.—15. „ | 938 | 188 | 96 |
| „ 16.—20. „ | 2 553 | 511 | 260 |
| „ 21.—30. „ | 7 362 | 736 | 374 |
| „ 31.—40. „ | 5 211 | 521 | 265 |
| „ 41.—60. „ | 4 458 | 223 | 113 |
| „ 61.—80. „ | 784 | 39 | 20 |
| „ 81. „ und darüber | 6 | . | . |
| Summe | 28 814 | . | . |
| B. Die übrigen Listen zusammen: | | | |
| im 1. Lebensjahre | 708 | 708 | 1000 |
| darunter im Alter bis zu 3 Monaten | 225 | | |
| „ 2. Lebensjahre | 337 | 337 | 476 |
| „ 3.—5. „ | 670 | 223 | 315 |
| „ 6.—10. „ | 725 | 145 | 205 |
| „ 11.—15. „ | 959 | 192 | 271 |
| „ 16.—20. „ | 1 631 | 326 | 460 |
| „ 21.—30. „ | 3 778 | 378 | 534 |
| „ 31.—40. „ | 3 165 | 317 | 448 |
| „ 41.—60. „ | 3 410 | 171 | 242 |
| „ 61.—80. „ | 542 | 27 | 38 |
| „ 81. „ und darüber | 4 | . | . |
| Summe | 15 929 | . | . |
| C. Zusammen: | | | |
| im 1. Lebensjahre | 2 674 | 2 674 | 1000 |
| darunter im Alter bis zu 3 Monaten | 666 | | |
| „ 2. Lebensjahre | 1 790 | 1 790 | 669 |
| „ 3.—5. „ | 3 177 | 1 059 | 396 |
| „ 6.—10. „ | 2 301 | 460 | 172 |
| „ 11.—15. „ | 1 897 | 379 | 142 |
| „ 16.—20. „ | 4 184 | 837 | 313 |
| „ 21.—30. „ | 11 140 | 1 114 | 417 |
| „ 31.—40. „ | 8 376 | 838 | 313 |
| „ 41.—60. „ | 7 868 | 393 | 147 |
| „ 61.—80. „ | 1 326 | 66 | 25 |
| „ 81. „ und darüber | 10 | . | . |
| Summe | 44 743 | . | . |

Wie die letzte Spalte der Tabellen erkennen läßt, ist nach Ausweis sämtlicher Listen das erste Lebensjahr, d. h. dasjenige Alter, in welchem die meisten Ungeimpften vorhanden sind, in auffallend hohem Maße an den Erkrankungen beteiligt. Läßt man die Listen der Berliner Sanitätskommission wegen ihrer später noch zu erörternden Unvollständigkeit außer Betracht, so tritt jener Umstand in den verbleibenden amtlichen Listen noch deutlicher hervor, wie aus der folgenden Zusammenstellung erhellt, in welcher zum Vergleich auch die Verteilung der überhaupt Lebenden auf die einzelnen Altersklassen ersichtlich gemacht worden ist:


| Setzt man die im ersten Lebensjahre an Pocken Erkrankten = 1000, so entfallen auf je ein Lebensjahr der verschiedenen Altersklassen an Pocken Erkrankte | | Die im ersten Lebensjahre überhaupt Lebenden = 1000 gesetzt, entfallen auf je ein Lebensjahr der verschiedenen Altersklassen überhaupt Lebende | |
|---|-------|--|---|
| | | nach der Volkszählung in Preußen v. 1./12. 1871 ¹⁾ | nach der Volkszählung in Preußen v. 1./12. 1880 ¹⁾ |
| 1. Lebensjahr | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2. " | 476 | 998 | 921 |
| 3.—5. " | 315 | 935 | 876 |
| 6.—10 " | 205 | 843 | 739 |
| 11.—15. " | 271 | 780 | 669 |
| 16.—20. " | 461 | 673 | 613 |
| 21.—30. " | 534 | 595 | 518 |
| 31.—40. " | 448 | 479 | 411 |
| 41.—60. " | 242 | 336 | 287 |
| 61.—80. " | 38 | 121 | 113 |

¹⁾ Bei der Berechnung der Zahl der im ersten Lebensjahre lebenden Kinder ist angenommen worden, daß im Monat December des Volkszählungsjahres ebenso viele Kinder geboren und gestorben seien, wie in dem vorhergehenden Jahre.

Die Unterschiede zwischen der Erkrankungshäufigkeit der unterjährigen Kinder an den Pocken einerseits und der Erkrankungshäufigkeit der in den übrigen Lebensjahren Lebenden andererseits, sind demnach so große, daß die auffallende Empfänglichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre für die Pocken unverkennbar ist.

Die graphische Darstellung auf Seite 158 möge die große Empfänglichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre und der in den höheren Altersklassen Lebenden gegenüber denjenigen Altersklassen, welche hauptsächlich unter der Wirkung des Impfschutzes stehen, noch weiter veranschaulichen.

Von den 15 929 an den Pocken erkrankten Personen mit bekanntem Lebensalter entfallen auf je ein Lebensjahr der verschiedenen Altersklassen (ohne Berücksichtigung des Impfzustandes):



Für eine Gesamt-Uebersicht der Kranken nach dem Lebensalter unter Berücksichtigung des Impfstandes sind die folgenden Listen verwerthet:*)

| Regierungs-Bezirk | Ort u. | Zeitraum über welchen die Angaben sich erstrecken | Zahl der Erkrankten | |
|-------------------|---|--|--|---|
| | | | mit bekanntem Lebens- alter und Impfstand | bei welchen die Angabe über das Lebensalter bzw. den Impfstand fehlt |
| | Berlin | 1865—74 | 28 531 | 372 |
| Magdeburg | Bregenstein | 1834 | 24 | 1 |
| " | Neuhaldensleben | 1833/34 | 49 | 2 |
| " | Groß-Santerleben | 1834 | 14 | — |
| " | Süplingen | 1833 | 25 | — |
| Merseburg | Zörbig | 1871 | 30 | — |
| Erfurt | Erfurt | 1833—72 | 2 212 | 11 |
| Düsseldorf | Brüggen, Bürgermeisterei | 1872 | 16 | — |
| " | Duisburg, Stadt | 1871/72 1873/74 | 3 007 108 | 4 5 |
| " | Essen, Stadt | 1881/82 | 430 | 6 |
| " | Gerresheim, Stadt und Land, Bürgermeisterei | 1865—72 | 320 | 12 |
| " | Kaiserswerth, Stadt u. Land, Bürgermeisterei | 1871 | 100 | 5 |
| " | Krefeld, Stadt | 1865—67 | 271 | 15 |
| " | " Land | 1871/72 | 117 | 1 |
| " | Neuß, Stadt | 1865—73 | 247 | 1 |
| " | Stoppenberg, Bürgermeisterei | 1881/82 | 43 | 4 |
| " | Wejel, Stadt | 1870—73 | 520 | 3 |
| " | ohne Ortsangabe | 1871/72 | 48 | — |
| Köln | Bonn, Stadt | 1870—72 | 113 | 4 |
| " | Köln, " | 1871—73 | 2 277 | 84 |
| " | Mülheim a. Rh., Stadt | 1871/72 | 183 | — |
| Aachen | Bäweiler, Bürgermeisterei | 1866—72 | 40 | 1 |
| Summa | | | 38 725 | 531 |

Wie ein Vergleich der vorstehenden Tabelle mit derjenigen auf Seite 155 ergibt, haben hier zahlreiche Listen bzw. Abschnitte von Listen ausgeschieden werden müssen, weil in ihnen zwar Angaben über das Lebensalter der Erkrankten, aber keine oder nur unvollständige Angaben über den Impfstand enthalten waren. Von den 39 256 Fällen, welche in den hiernach verbleibenden Listen verzeichnet sind, kamen dann weitere 531 einzelne Fälle mit nicht ersichtlich gemachtem Impfstande in Abzug, so daß den folgenden Uebersichten im Ganzen 38 725 Erkrankungen mit bekanntem Lebensalter und Impfstande haben zu Grunde gelegt werden können, davon 28 531 in den Listen der Berliner Sanitätskommission und 10 194 in den übrigen amtlichen Listen verzeichnete. In den Uebersichten sind die als geimpft und revaccinirt Bezeichneten (einschl. der zehn bereits früher geblatterten Kranken) den Ungeimpften gegenübergestellt.

*) Listen, in welchen die Angabe des Lebensalters bei 5 Prozent der Erkrankten und darüber bzw. die Angabe des Impfstandes bei 5 Prozent der Erkrankten und darüber fehlt, sind hier unberücksichtigt geblieben.

| Von den Erkrankten mit bekanntem Lebensalter und Impfzustande standen | Geimpfte incl. Revaccinirte | Ungeimpfte | Auf je 1000 Geimpfte (incl. Revaccinirte) einer Altersklasse entfallen Ungeimpfte derselben Altersklasse |
|---|-----------------------------|--------------|--|
| A. In d. Listen d. Berl. Sanitätskommission: | | | |
| im 1. Lebensjahre | 367 | 1 542 | 4 202 |
| „ 2. „ | 513 | 918 | 1 789 |
| „ 3.— 5. „ | 1 247 | 1 227 | 984 |
| „ 6.—10. „ | 1 150 | 413 | 359 |
| „ 11.—15. „ | 866 | 68 | 79 |
| „ 16.—20. „ | 2 410 | 122 | 51 |
| „ 21.—30. „ | 7 029 | 279 | 40 |
| „ 31.—40. „ | 5 001 | 177 | 35 |
| „ 41.—60. „ | 4 291 | 135 | 31 |
| „ 61.—80. „ | 729 | 41 | 56 |
| „ 81. „ und darüber . . . | 5 | 1 | 200 |
| Summe | 23 608 | 4 923 | 208 |
| B. In den übrigen Listen zusammen: | | | |
| im 1. Lebensjahre | 63 | 417 | 6 619 |
| „ 2. „ | 48 | 195 | 4 063 |
| „ 3.— 5. „ | 173 | 225 | 1 301 |
| „ 6.—10. „ | 409 | 101 | 247 |
| „ 11.—15. „ | 589 | 19 | 32 |
| „ 16.—20. „ | 956 | 8 | 8 |
| „ 21.— 30. „ | 2 347 | 38 | 16 |
| „ 31.—40. „ | 1 990 | 17 | 9 |
| „ 41.—60. „ | 2 210 | 16 | 7 |
| „ 61.—80. „ | 364 | 7 | 19 |
| „ 81. „ und darüber . . . | 2 | — | 0 |
| Summe | 9 151¹⁾ | 1 043 | 114 |
| C. In den sämtlichen Listen einschl. derjenigen der Berliner Sanitätskommission: | | | |
| im 1. Lebensjahre | 430 | 1 959 | 4 556 |
| „ 2. „ | 561 | 1 113 | 1 984 |
| „ 3.— 5. „ | 1 420 | 1 452 | 1 023 |
| „ 6.—10. „ | 1 559 | 514 | 330 |
| „ 11.—15. „ | 1 455 | 87 | 60 |
| „ 16.—20. „ | 3 366 | 130 | 39 |
| „ 21.—30. „ | 9 376 | 317 | 34 |
| „ 31.—40. „ | 6 991 | 194 | 28 |
| „ 41.—60. „ | 6 501 | 151 | 23 |
| „ 61.—80. „ | 1 093 | 48 | 44 |
| „ 81. „ und darüber . . . | 7 | 1 | 143 |
| Summe | 32 759¹⁾ | 5 966 | 182 |
| | 38 725 ¹⁾ | | |

¹⁾ Hierunter befinden sich 10 bereits früher Geblattete.

Wegen der Unvollständigkeit der Berliner Listen kann, wie auch hier hervorgehoben sei, der aus ihnen gewonnenen Zusammenstellung (s. unter A) nicht der gleiche Werth beigelegt werden, wie derjenigen, welche sich auf die übrigen amtlichen Listen (s. unter B) bezieht. Im Wesentlichen sind indeß, wie eine Durchsicht der Tabellen zeigt, die aus den Berliner Listen gewonnenen Ergebnisse in Uebereinstimmung mit denjenigen, welche aus den übrigen Listen hervorgegangen sind.

Was das hier zu erörternde Verhältniß der ungeimpften Erkrankten zu den geimpften Erkrankten betrifft, so muß besonders auf die letzte Rubrik der Tabellen verwiesen werden. Nach Ausweis derselben entfielen in Berlin auf je 1000 geimpfte Erkrankte 208, in den übrigen Städten zc. 114 und in sämtlichen Städten zc. einschl. Berlin 182 ungeimpfte Erkrankte.

Von sämtlichen Erkrankten, über welche Angaben hinsichtlich des Lebensalters und Impfzustandes vorliegen, waren

| | |
|---|----------------|
| in Berlin | ca. 17 Prozent |
| in den übrigen Städten zc. | ca. 10 „ |
| in sämtlichen Städten zc. (incl. Berlin) ca. 15 | „ |

als ungeimpft bezeichnet.

Schon aus diesen Verhältnißzahlen ergibt sich, daß entweder der Impfzustand der Bevölkerung ein mangelhafter, oder aber die Ungeimpften im Vergleich zu den Geimpften für die Pocken besonders empfänglich gewesen sein müssen, falls nicht beide Erklärungen zugleich zutreffen. Nun steht es aber fest, daß in Preußen die überwiegende Zahl sämtlicher Impfungen in der Zeit vor Einführung des Reichs-Impfgesetzes im ersten Kindesalter vorgenommen worden ist, und es ist daher, falls man ein Urtheil über den durch die Impfung gewährten Schutz gewinnen will, mit Rücksicht auf die allmähliche Abnahme dieses Schutzes nothwendig, vor allem die Altersklassen vom 2. bis 10. Lebensjahre ins Auge zu fassen. Da ergibt sich denn, daß noch in der Altersklasse vom 3. bis 5. Lebensjahre die Zahl der ungeimpften Erkrankten diejenige der geimpften Erkrankten überwiegt, obgleich schon in dieser Altersklasse unter den überhaupt Lebenden die ungeimpften Kinder einen weit kleineren Bruchtheil ausmachen, als die geimpften. Auch in der Altersklasse vom 6. bis 10. Lebensjahre sind die Ungeimpften noch mit weit höheren Zahlen unter den Pockenkranken vertreten, als es der Fall sein müßte, wenn Geimpfte und Ungeimpfte die gleiche Empfänglichkeit für Pocken besäßen.

Die nachstehende Tabelle möge dies noch weiter veranschaulichen:

| Von den an Pocken erkrankten Kindern mit bekanntem Lebensalter und Impfzustand waren ungeimpft | A. nach den Berliner Listen | B. nach den übrigen Listen | C. nach sämtlichen Listen |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| im 2. Lebensjahre | 64 % | 80 % | 66 % |
| im 3.—5. Lebensjahre | 50 % | 57 % | 51 % |
| im 6.—10. Lebensjahre | 26 % | 20 % | 25 % |

Diese Zahlen bringen die Schutzkraft der Impfung in der klarsten Weise zum Ausdruck. Denn so mangelhaft die Impfung in einzelnen Orten Preußens vor Inkraft-

treten des Reichs-Impfgesetzes auch durchgeführt sein mag, so kann doch nicht die Rede davon sein, daß beispielsweise in den zahlreichen Städten etc., auf welche sich die Zahlen der Rubrik B in vorstehender Uebersicht beziehen, von den im 3.—5. Lebensjahre überhaupt lebenden Kindern 57 pCt. ungeimpft gewesen sein sollten. — Es bestätigen sonach die sogenannten Ur-Pockenlisten nicht nur bei der Bearbeitung einzelner Epidemien, sondern auch bei dem Zusammenfassen zahlreicher Listen aus verschiedenen Gegenden Preußens in überzeugender Weise die Erfahrung, daß die Impfung vor dem Erkranken an Pocken einen beträchtlichen Schutz gewährt.

Zum besseren Verständniß der vorstehenden Erörterungen ist auf Seite 163 noch eine graphische Darstellung angefügt, in welcher von den ungeimpften Erkrankten ganz abgesehen, und die Vertheilung der geimpften Erkrankten auf die einzelnen Altersklassen, und zwar auf je ein Lebensjahr innerhalb derselben, ersichtlich gemacht ist. (Die Berliner Listen sind in der Darstellung unberücksichtigt geblieben. Zu bemerken ist ferner, daß wegen der geringeren Größe der Zahlen hier ein anderer Maßstab für die graphische Darstellung gewählt ist, als in derjenigen auf Seite 158).

Die graphische Darstellung läßt erkennen, daß die Zahl der geimpften Erkrankten in den jüngeren Altersklassen verhältnißmäßig gering ist und erst mit zunehmendem Lebensalter größer wird, entsprechend dem Umstande, daß die Schutzwirkung einer einmaligen Impfung nicht für das ganze Leben anhält, sondern mit den Jahren eine allmähliche Abnahme erfährt. Bei der graphischen Darstellung ist überdies noch zu berücksichtigen, daß in den jüngeren Altersklassen, beispielsweise vom dritten bis zehnten Lebensjahre, weit mehr geimpfte Individuen überhaupt vorhanden sind, als in den höheren Altersklassen, in welchen in Folge der allgemeinen Sterblichkeit die Zahl der Lebenden eine geringere wird.


Wenn mit zunehmendem Lebensalter die Zahl der geimpften Erkrankten gegenüber derjenigen der ungeimpften Erkrankten größer wird, so hat dies nicht nur seinen Grund in der allmählichen Abnahme der Schutzkraft der Impfung, sondern es kommt auch noch ein anderer Umstand zur Erklärung jener Thatsache in Betracht. Je weiter man sich von den jugendlichen Altersklassen entfernt, um so größer wird nämlich unter den Ungeimpften die Zahl derjenigen, welche die Pockenkrankheit selbst überstanden haben und welche daher, auch ohne geimpft zu sein, vor der Erkrankung geschützt sind.

Auf die mehrfach erörterten Fehlerquellen, welche bei der statistischen Verwerthung der in den Ur-Pockenlisten enthaltenen Angaben über den Impfzustand zu berücksichtigen sind, möge schließlich auch hier nochmals hingewiesen werden.

Es ist die Ansicht geäußert worden, daß, wenn die Schutzimpfung weiter keinen Nutzen habe, als daß sie das Erkranken an Pocken in ein späteres Lebensalter verschiebe, damit nur wenig gewonnen sei. Hierbei ist aber völlig übersehen, daß, falls erfolgreich geimpfte Personen in den mittleren und selbst hohen Altersklassen von den Pocken befallen werden, die Krankheit erfahrungsgemäß einen weit milderen Verlauf nimmt, als wenn es sich um ungeimpfte Personen handelt. Für die Beurtheilung des Einwandes

muß daher vor allem die Pockensterblichkeit der Gesamtbewölkerung ins Auge gefaßt werden. Wie sehr aber diese durch die Schutzpockenimpfung verringert wird, erhellt zur Genüge aus den Abschnitten 1 und 4 dieser Denkschrift.

Von den 9151 in den Listen (auschl. Berlin) aufgeführten geimpften Erkrankten entfallen durchschnittlich auf je ein Lebensjahr der verschiedenen Altersklassen:



In impfgegnerischen Schriften ist vielfach behauptet worden, daß nach Ausweis der Ur-Pockenlisten die in einem Orte zuerst erkrankten Personen stets Geimpfte gewesen seien, und daß erst von diesen Ungeimpfte angesteckt worden wären. Es könnten daher unmöglich die Ungeimpften eine Gefahr für die Geimpften bilden. Mit Rücksicht auf jene Behauptung ist nachstehend noch eine Uebersicht mitgeteilt, in welcher für eine

Anzahl beliebig herausgegriffener Epidemien bezüglich der ersten vier erkrankten Personen das Lebensalter und der Impfzustand verzeichnet sind, soweit die Listen solche Angaben überhaupt enthielten. Der erste Fall ist entweder der in der betreffenden Liste überhaupt zuerst aufgeführte, oder es ist wenigstens in dem vorhergehenden Vierteljahre ein Fall in der Liste nicht verzeichnet. Wie wenig geeignet die Ur-Böckenlisten zur Entscheidung jener Frage sind, erhellt zur Genüge aus der Zusammenstellung. In fast der Hälfte der Fälle erfährt man nämlich aus den Listen über den Impfzustand des ersten Erkrankten überhaupt nichts. Jedenfalls ist die Behauptung, daß stets Geimpfte zuerst erkrankten, schon durch die mitgetheilten Daten als unrichtig erwiesen. Sie erscheint völlig bedeutungslos, wenn man das bei weitem zuverlässigere Material der im Abschnitte 3 mitgetheilten Erkrankungsstatistik nach dieser Richtung hin prüft. Es ergibt sich da, daß unter den zuerst Erkrankten die Ungeimpften im Gegentheil auffällig häufig sind (vgl. S. 50). Ueberdies ist zu berücksichtigen, daß die Ungeimpften überwiegend einer Altersklasse angehören, welche zur außerhäuslichen Infektion weit weniger Gelegenheit hat, als die höheren Altersklassen.

Der Impfzustand derjenigen Personen, welche als zuerst erkrankt bei einzelnen Epidemien aufgeführt sind.

(g = geimpft, r = revaccinirt, u = nicht geimpft.)

Reg.-Bez. Siegnitz.

| Ort | Datum des Beginns der Epidemie | Die erkrankte Person stand im ten Lebensjahre | | | | Impfzustand der erkrankten Person | | | | Bemerkungen |
|--------------------|--------------------------------|---|----|----|----|-----------------------------------|----|----|----|-------------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Siegnitz | 19. 7. 1865 | 6 | 7 | 7 | 5 | ? | ? | ? | ? | |
| | 9. 11. 1866 | 26 | 33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| | 3. 4. 1869 | ? | 60 | 39 | 14 | ? | ? | ? | ? | |
| | 29. 9. 1870 | 21 | 59 | 4 | 8 | ? | ? | ? | ? | |

Reg.-Bez. Magdeburg.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|----|----|----|-----------------|---|---|---|---------------------------------------|
| Hornburg | 28. 8. 1871 | ? | 27 | 36 | 44 | ? | ? | ? | ? | 1) erkrankte 2 Tage nach der Impfung. |
| Neuhaldensleben | 4. 2. 1871 | 1 | 25 | 58 | 28 | g ¹⁾ | ? | ? | ? | |
| Schönebeck | 19. 12. 1870 | ? | 14 | 2 | 6 | ? | ? | u | ? | |

Reg.-Bez. Merseburg.

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----|----|----|----|---|---|---|-----------------|-------------------------|
| Börbig | 11. 4. 1871 | 29 | 47 | 18 | 14 | g | g | r | r ²⁾ | 2) zu spät revaccinirt. |
|------------------|-------------|----|----|----|----|---|---|---|-----------------|-------------------------|

Reg.-Bez. Erfurt.

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------------|----|----|----|---|---|---|---|------------------------|
| Erfurt | ? 12. 1870 | 43 | 48 | 18 | 28 | g | g | g | g | 3) franz. Infanterist. |
| Nordhausen | ? 12. 1870 | 29 ³⁾ | 35 | 33 | 5 | ? | ? | ? | ? | |

Reg.-Bez. Düsseldorf.

| Ort | Datum des Beginns der Epidemie | Die erkrankte Person stand im | | | | Impfzustand der erkrankten Person | | | | Bemerkungen |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------|----|----|---------|-----------------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Duisburg | ? 1. 1871 | 31 | 66 | 25 | 1 | g | g | g | u | 4) nachgeimpft. |
| | ? 12. 1873 | 51 | 30 | 1 | 2 | g | r | g | u | |
| | ? 3. 1882 | 35 | ? | 11 | 14 | r | r | g | u | |
| Essen | 7. 2. 1881 | 11 | 1 | 8 | 30 | u | g | r | r | |
| Gerresheim | 21. 12. 1870 | 42 | 33 | 36 | 21 | r | g | 4) | g | |
| St. Hubert | 20. 3. 1871 | 65 | 39 | 22 | 28 | g | g | g | g | |
| Hülz | ? 2. 1871 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Kaiserswerth | 15. 1. 1871 | 37 | 22 | 14 | 57 | g | g | g | g | |
| Kempen | 11. 2. 1871 | 44 | 47 | 33 | 41 | ? | ? | ? | ? | |
| Krefeld Stadt | 25. 3. 1865 | 24 | 21 | 17 | 17 | g | g | g | g | |
| „ Land | 13. 2. 1871 | 32 | 48 | 43 | 47 | g | g | g | g | |
| Neuß | 13. 1. 1871 | 55 | 31 | 24 | 19 | g | g | r | g | |
| | 25. 12. 1872 | 31 ⁵⁾ | 22 | 23 | 41 | r o. G. | r | g | g o. G. | |
| Stoppenberg | ? 4. 1881 | 25 | 39 | 1 | ? | g | g | u | g | |
| | ? 1. 1882 | 13 | 20 | 6 | 6 | r | r | g | g | |
| Wefel | 24. 12. 1870 | 68 | 19 | 33 | 49 | g | g | g | g | |
| | 16. 3. 1876 | 23 | 1 | 26 | 56 | g | u | g | g | |

Reg.-Bez. Köln

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|----|----|----|---|---|---|---------|---------------------|
| Bonn | 7. 2. 1867 | 24 | 37 | 30 | 51 | r | g | g | g | 6) franz. Offizier. |
| | 8. 11. 1870 | ? ⁶⁾ | 49 | 4 | 41 | ? | g | g | r | |
| Köln | ? 10. 1849 | 21 | 4 | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| | ? 12. 1855 | 46 | 11 | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | |
| | ? 2. 1858 | 39 | 18 | 12 | 26 | ? | ? | ? | ? | |
| Mülheim a. Rh. | ? 12. 1864 | ? ⁷⁾ | 27 | 43 | 59 | ? | ? | ? | ? | |
| | 4. 1. 1871 | 34 | 22 | 18 | 24 | g | g | r | r o. G. | |
| | 10. 8. 1882 | 57 | 17 | 19 | 13 | u | u | u | u | |

Reg.-Bez. Aachen.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|----|----|----|----|---|---|---|---|
| Cörrenzig | ? 1. 1871 | 25 | 3 | 24 | 24 | ? | ? | ? | ? |
| | ? 5. 1872 | 47 | 8 | 30 | 3 | ? | ? | ? | ? |
| Montjoie | ? 2. 1849 | 20 | 19 | 44 | 27 | ? | ? | ? | ? |

Bemerkt sei zu der Tabelle noch, daß die unter den ersten Erkrankten befindlichen Geimpften überwiegend einem Lebensalter angehörten, in welchem der Impfschutz bereits wieder abgenommen hatte.

Daß in der That eine mangelhaft geimpfte Umgebung beim Auftreten der Pocken auch für die Geimpften eine Gefahr bildet, das ergibt sich zur Genüge aus der Pockenstatistik des Jahres 1886, nach welcher $\frac{2}{3}$ sämmtlicher Pockentodesfälle im Deutschen Reiche an den Grenzen sich ereignet haben (vgl. Seite 30), sowie aus den Erfahrungen, welche in der preussischen Armee vor und nach dem Inkrafttreten des Reichs-Impfgesetzes gemacht worden sind (vgl. Seite 8 und Tafel 5).

3. Prüfung des Materials mit Rücksicht auf die Frage, ob die Schutzpocken- Impfung gegen das Sterben an Pocken Schutz gewährt.

Im Nachstehenden ist der Versuch gemacht zu ermitteln, wie sich in den verschiedenen Altersklassen*) das Sterblichkeitsprocent der als geimpft aufgeführten Erkrankten zu demjenigen der als ungeimpft bezeichneten verhält. Um den Berechnungen möglichst große Zahlen zu Grunde legen zu können, sind auch solche Listen benutzt worden, in welchen über den Ausgang der Krankheit in mehr oder weniger zahlreichen Fällen nichts vermerkt ist. Von den Erkrankungen überhaupt wurden demnach in den einzelnen Altersklassen zunächst diejenigen mit unbekanntem Ausgange in Abzug gebracht, und erst dann das Sterblichkeitsverhältniß der Geimpften, (einschließlich der Wiedergeimpften und der wenigen bereits früher Geblatterten), ferner der Ungeimpften und endlich der Erkrankten mit unbekanntem Impfzustande berechnet. — Auch hier sind die Journale der Berliner Sanitätskommission wegen ihrer großen Unvollständigkeit von den übrigen Listen getrennt bearbeitet und zwar sowohl für den Zeitraum von 1865 bis 1870, wie für die umfangreiche Epidemie von 1871/72 und endlich für den gesammten Zeitraum von 1865 bis 1874 (s. auf Seite 168 die Uebersichten A I - III). Im Anschlusse an eine aus den übrigen amtlichen Listen berechnete Zusammenstellung der Sterblichkeitsverhältnisse (Uebersicht B) ist dann noch eine Gesamtübersicht (C) gegeben, welche die Zahlen der Berliner Journale mit denjenigen der übrigen Listen vereinigt.

Ueber die Listen selbst, welche diesem Theile der Bearbeitung zu Grunde gelegt worden sind, giebt die nachstehende Zusammenstellung weitere Auskunft:

| Nr. | Ort u. | Jahre, auf welche die Listen sich beziehen | Erkrankungen mit bekanntem Aus- gange | Todesfälle | Erkrankungen mit unbekanntem Ausgange |
|-----------------------------|--|---|--|------------|--|
| 1 | Berlin (Journale der Sanitätskommission) | 1865—70 | 7 796 | 820 | 20 |
| | " " " | 1871/72 | 20 648 | 4 524 | 12 |
| | " " " | 1873/74 | 427 | 106 | — |
| | Zusammen | 1865—74 | 28 871 | 5 450 | 32 |
| Reg.-Bez. Siegnitz. | | | | | |
| 2 | Siegnitz | 1865—69 | 76 | 5 | 2 |
| | " | 1870—72 | 904 | 129 | 8 |
| Reg.-Bez. Magdeburg. | | | | | |
| 3 | Arneburg | 1872/73 | 12 | 2 | — |
| 4 | Bregenstein | 1834 | 25 | 2 | — |
| 5 | Salze | 1834—71 | 642 | 50 | 2 |
| 6 | Hornburg | 1871/72 | 123 | 23 | 4 |
| 7 | Neuhaldensleben | 1833—72 | 231 | 19 | 60 |
| 8 | Groß-Salze | 1834—72 | 111 | 15 | 1 |

*) Innerhalb des ersten Lebensjahres noch weitere Altersklassen zu unterscheiden, war in dem vorliegenden Falle ohne Werth; denn zweifellos wird ein großer Procentfag der in den ersten Lebensmonaten erkrankten als „geimpft“ aufgeführten Kinder nur deshalb geimpft worden sein, weil in ihrer Umgebung Pockenfälle vorgekommen waren. Es müssen demnach die im Inkubationsstadium geimpften Kinder in den ersten Lebensmonaten besonders häufig gewesen sein.

Reg.-Bez. Magdeburg.

| Nr. | Ort u. | Jahre, auf welche die Listen sich beziehen | Erkrankungen mit bekanntem Aus- gange | Todesfälle | Erkrankungen mit unbekanntem Ausgange |
|------------------------------|--|---|--|--------------|--|
| 9 | Groß-Santerleben | 1834 | 14 | 2 | — |
| 10 | Schönebeck ¹⁾ | 1834—73 | 483 | 85 | 24 |
| 11 | Süplingen | 1833 | 25 | 4 | — |
| Reg.-Bez. Merseburg. | | | | | |
| 12 | Börbig | 1871 | 30 | 1 | — |
| Reg.-Bez. Erfurt. | | | | | |
| 13 | Erfurt | 1833—72 | 2 168 | 273 | 55 |
| 14 | Nordhausen | 1869—72 | 908 | 181 | 8 |
| 15 | Treffurt | 1856—72 | 11 | — | 4 |
| Reg.-Bez. Düsseldorf. | | | | | |
| 16 | Bracht, Bürgermeisterei | 1857—72 | 28 | 7 | — |
| 17 | Brüggen, " | 1872 | 16 | 4 | — |
| 18 | Duisburg | 1871/72 | 2 988 | 572 | 23 |
| | " | 1873/74 | 112 | 18 | 1 |
| | " | 1882/83 | 19 | 2 | — |
| 19 | Effen | 1881/82 | 435 | 73 | 1 |
| 20 | Gerresheim, Land u. Stadt, Bürgermeisterei | 1865—72 | 304 | 49 | 28 |
| 21 | Grefrath, Bürgermeisterei | 1858—72 | 15 | — | — |
| 22 | Hülß, " | 1871/72 | 291 | 55 | — |
| 23 | Kaiferswerth, Land u. Stadt, Bürgermeisterei | 1865—74 | 162 | 20 | 54 |
| 24 | Kempen | 1871/72 | 32 | 11 | 6 |
| 25 | Krefeld, Stadt | 1865—67 | 273 | 10 | 13 |
| 26 | Krefeld, Land | 1871/72 | 118 | 19 | — |
| 27 | Neuß | 1865—73 | 248 | 25 | — |
| | " | 1880—82 | 10 | 1 | 1 |
| 28 | Stoppenberg, Bürgermeisterei | 1881/82 | 47 | 4 | — |
| 29 | Wesel | 1870—73 | 49 | 10 | 474 |
| 30 | Ort ohne Angabe | 1871/72 | 48 | 13 | — |
| Reg.-Bez. Köln. | | | | | |
| 31 | Bonn | 1870—72 | 115 | 16 | 2 |
| 32 | Köln | 1849—73 | 3 953 | 521 | 763 |
| 33 | Mülheim a. Rh. | 1871/72 | 183 | 42 | — |
| Reg.-Bez. Aachen. | | | | | |
| 34 | Baesweiler, Bürgermeisterei | 1866—72 | 41 | 4 | — |
| 35 | Coerrenzig " | 1871/72 | 209 | 34 | — |
| 36 | Gangel, Verwaltungs-Bezirk | 1872 | 19 | 9 | — |
| 37 | Jülich | 1871 | 71 | 17 | — |
| 38 | Montjoie, Bürgermeisterei | 1849—51 | 78 | 9 | — |
| 39 | Straelen, Ortschaft | 1881 | 20 | 2 | — |
| Summe | | | 44 518 | 7 788 | 1 571 |

¹⁾ In Schönebeck sind außerdem während des Jahres 1849 noch 154 Erkrankungen mit 4 Todesfällen vorgekommen. Da die Akten indeß ein namentliches Verzeichniß dieser Personen nicht enthielten, so haben sie hier nicht berücksichtigt werden können.

A. Die Sterblichkeit unter denjenigen an Pocken erkrankten Personen, welche in den Journalen der Berliner Sanitätskommission aufgeführt sind (unter Berücksichtigung des Impfstandes).

I. 1865 bis 1870.

| Alterstlasse | Geimpfte einchl. Wiedergeimpfte | | Ungeimpfte | | Impfstand unbekannt, bezw. nicht angegeben, unteserlich ic. | | S u m m a | | Sterblichkeits-Procent der | | | Sterblichkeits-Procent überhaupt |
|--|---------------------------------|------------|--------------|------------|---|-----------|--------------|------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | Erkrankt | Gestorben | Erkrankt | Gestorben | Erkrankt | Gestorben | Erkrankt | Gestorben | Geimpften ic. | Ungeimpften | mit unbekanntem Impfstand ic. | |
| im 1. Jahre . . . | 100 | 24 | 511 | 211 | — | — | 611 | 235 | 24,0 | 41,3 | — | 38,5 |
| „ 2.—5. „ . . . | 458 | 70 | 742 | 147 | — | — | 1 200 | 217 | 15,3 | 19,8 | — | 18,1 |
| „ 6.—10. „ . . . | 371 | 22 | 159 | 16 | — | — | 530 | 38 | 5,9 | 10,1 | — | 7,2 |
| „ 11.—15. „ . . . | 218 | 2 | 21 | 2 | 1 | — | 240 | 4 | 0,9 | 9,5 | 0,0 | 1,7 |
| „ 16.—20. „ . . . | 495 | 3 | 8 | 1 | 6 | — | 509 | 4 | 0,6 | 12,5 | 0,0 | 0,8 |
| „ 21.—30. „ . . . | 1 774 | 43 | 15 | 1 | 11 | — | 1 800 | 44 | 2,4 | 6,7 | 0,0 | 2,4 |
| „ 31.—40. „ . . . | 1 410 | 90 | 11 | 1 | 1 | — | 1 422 | 91 | 6,4 | 9,1 | 0,0 | 6,4 |
| „ 41.—60. „ . . . | 1 278 | 147 | 12 | 4 | — | — | 1 290 | 151 | 11,5 | 33,3 | — | 11,7 |
| „ 61.—80. „ . . . | 174 | 30 | 7 | 4 | 1 | — | 182 | 34 | 17,2 | 57,1 | 0,0 | 18,7 |
| „ 81. Jahre u. darüber ohne Angabe . . . | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 0,0 | — | — | 0,0 |
| | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 11 | 2 | 11,1 | 100,0 | 0,0 | 18,2 |
| Summa 1865—70 | 6 288 | 432 | 1 487 | 388 | 21 | — | 7 796 | 820 | | | | 10,5 |

II. 1871/72.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|-------|-------------|
| im 1. Jahre . . . | 259 | 136 | 977 | 570 | 56 | 56 | 1 292 | 762 | 52,5 | 58,3 | 100,0 | 59,0 |
| „ 2.—5. „ . . . | 1 244 | 437 | 1 359 | 564 | 55 | 55 | 2 658 | 1 056 | 35,1 | 41,5 | 100,0 | 39,7 |
| „ 6.—10. „ . . . | 737 | 163 | 251 | 77 | 12 | 12 | 1 000 | 252 | 22,1 | 30,7 | 100,0 | 25,2 |
| „ 11.—15. „ . . . | 633 | 44 | 46 | 3 | 3 | 3 | 682 | 50 | 7,0 | 6,5 | 100,0 | 7,3 |
| „ 16.—20. „ . . . | 1 891 | 90 | 114 | 9 | 14 | 14 | 2 019 | 113 | 4,8 | 7,9 | 100,0 | 5,6 |
| „ 21.—30. „ . . . | 5 150 | 466 | 260 | 45 | 40 | 40 | 5 450 | 551 | 9,0 | 17,3 | 100,0 | 10,1 |
| „ 31.—40. „ . . . | 3 538 | 528 | 165 | 47 | 32 | 32 | 3 735 | 607 | 14,9 | 28,5 | 100,0 | 16,3 |
| „ 41.—60. „ . . . | 2 984 | 809 | 122 | 48 | 31 | 31 | 3 137 | 888 | 27,1 | 39,3 | 100,0 | 28,3 |
| „ 61.—80. „ . . . | 551 | 200 | 34 | 12 | 13 | 13 | 598 | 225 | 36,3 | 35,3 | 100,0 | 37,6 |
| „ 81. Jahre u. darüber ohne Angabe . . . | 4 | 2 | 1 | — | — | — | 5 | 2 | 50,0 | 0,0 | — | 40,0 |
| | 47 | 9 | 24 | 8 | 1 | 1 | 72 | 18 | 19,1 | 33,3 | 100,0 | 25,0 |
| Summa 1871/72 | 17 038 | 2 884 | 3 353 | 1 383 | 257 | 257 | 20 648 | 4 524 | | | | 21,9 |

III. 1865 bis 1874.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|-------|-------------|
| im 1. Jahre . . . | 366 | 163 | 1 539 | 810 | 57 | 57 | 1 962 | 1 030 | 44,5 | 52,6 | 100,0 | 52,5 |
| „ 2.—5. „ . . . | 1 757 | 518 | 2 142 | 725 | 55 | 55 | 3 954 | 1 296 | 29,5 | 33,8 | 100,0 | 32,8 |
| „ 6.—10. „ . . . | 1 150 | 189 | 413 | 94 | 13 | 13 | 1 576 | 296 | 16,4 | 22,8 | 100,0 | 18,8 |
| „ 11.—15. „ . . . | 864 | 49 | 67 | 5 | 4 | 3 | 935 | 57 | 5,7 | 7,5 | 75,0 | 6,1 |
| „ 16.—20. „ . . . | 2 406 | 93 | 122 | 10 | 21 | 15 | 2 549 | 118 | 3,9 | 8,2 | 71,4 | 4,6 |
| „ 21.—30. „ . . . | 7 024 | 524 | 279 | 47 | 53 | 42 | 7 356 | 613 | 7,5 | 16,8 | 79,2 | 8,3 |
| „ 31.—40. „ . . . | 4 996 | 627 | 177 | 48 | 33 | 32 | 5 206 | 707 | 12,6 | 27,1 | 97,0 | 13,6 |
| „ 41.—60. „ . . . | 4 288 | 963 | 135 | 53 | 32 | 32 | 4 455 | 1 048 | 22,5 | 39,3 | 100,0 | 23,5 |
| „ 61.—80. „ . . . | 729 | 230 | 41 | 16 | 14 | 13 | 784 | 259 | 31,6 | 39,0 | 92,9 | 33,0 |
| „ 81. Jahre u. darüber ohne Angabe . . . | 5 | 2 | 1 | — | — | — | 6 | 2 | 40,0 | 0,0 | — | 33,3 |
| | 57 | 10 | 26 | 10 | 5 | 2 | 88 | 22 | 17,5 | 38,5 | 40,0 | 25,0 |
| Summa 1865—74 | 23 642 | 3 368 | 4 942 | 1 818 | 287 | 264 | 28 871 | 5 450 | | | | 18,9 |

B. Die Sterblichkeit unter denjenigen an Pocken erkrankten Personen, welche in den übrigen amtlichen Listen (ausschließl. Berlin) aufgeführt sind (unter Berücksichtigung des Impfstandes).

| Alterklasse | Geimpfte einschl. Wiedergeimpfte | | Ungeimpfte | | Impfstand unbekannt, bezw. nicht angegeben, unsterblich etc. | | S u m m a | | Sterblichkeits-Procent der | | | Sterblichkeits-Procent überhaupt |
|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|--|------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | Erkrankt | Gestorben | Erkrankt | Gestorben | Erkrankt | Gestorben | Erkrankt | Gestorben | Geimpften etc. | Ungeimpften | mit unbekanntem Impfstand etc. | |
| im 1. Jahre . . . | 59 | 27 | 490 | 261 | 156 | 79 | 705 | 367 | 45,8 | 53,3 | 50,6 | 52,1 |
| „ 2.—5. „ . . . | 248 | 54 | 574 | 209 | 177 | 34 | 999 | 297 | 21,8 | 36,4 | 19,2 | 29,7 |
| „ 6.—10. „ . . . | 410 | 49 | 112 | 25 | 182 | 18 | 704 | 92 | 12,0 | 22,3 | 9,9 | 13,1 |
| „ 11.—15. „ . . . | 605 | 33 | 23 | 6 | 327 | 10 | 955 | 49 | 5,5 | 26,1 | 3,1 | 5,1 |
| „ 16.—20. „ . . . | 914 | 20 | 6 | 4 | 639 | 10 | 1 559 | 34 | 2,2 | 66,7 | 1,6 | 2,2 |
| „ 21.—30. „ . . . | 2 273 | 154 | 37 | 10 | 1 299 | 72 | 3 609 | 236 | 6,8 | 27,0 | 5,5 | 6,5 |
| „ 31.—40. „ . . . | 1 913 | 221 | 19 | 4 | 1 040 | 112 | 2 972 | 337 | 11,6 | 21,1 | 10,8 | 11,3 |
| „ 41.—60. „ . . . | 2 071 | 459 | 26 | 10 | 1 122 | 236 | 3 219 | 705 | 22,2 | 38,5 | 21,0 | 21,9 |
| „ 61.—80. „ . . . | 335 | 116 | 10 | 4 | 176 | 63 | 521 | 183 | 34,6 | 40,0 | 35,8 | 35,1 |
| „ 81. Jahre u. darüber | 1 | — | — | — | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,0 | — | 33,3 | 25,0 |
| ohne Angabe . . . | 26 | 3 | 3 | 1 | 371 | 33 | 400 | 37 | 11,5 | 33,3 | 8,9 | 9,3 |
| Summa | 8 855 | 1 136 | 1 300 | 534 | 5 492 | 668 | 15 647 | 2 338 | | | | 14,9 |

C. Die Sterblichkeit unter sämmtlichen in den Uebersichten A. und B. aufgeführten Personen (unter Berücksichtigung des Impfstandes).

| Alterklasse | Geimpfte einschl. Wiedergeimpfte | | Ungeimpfte | | Impfstand unbekannt, bezw. nicht angegeben, unsterblich etc. | | S u m m a | | Sterblichkeits-Procent der | | | Sterblichkeits-Procent überhaupt |
|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | Erkrankt | Gestorben | Erkrankt | Gestorben | Erkrankt | Gestorben | Erkrankt | Gestorben | Geimpften etc. | Ungeimpften | mit unbekanntem Impfstand etc. | |
| im 1. Jahre . . . | 425 | 190 | 2 029 | 1 071 | 213 | 136 | 2 667 | 1 397 | 44,7 | 52,8 | 63,8 | 52,4 |
| „ 2.—5. „ . . . | 2 005 | 572 | 2 716 | 934 | 232 | 89 | 4 953 | 1 595 | 28,5 | 34,4 | 38,4 | 32,2 |
| „ 6.—10. „ . . . | 1 560 | 238 | 525 | 119 | 195 | 31 | 2 280 | 388 | 15,3 | 22,7 | 15,9 | 17,0 |
| „ 11.—15. „ . . . | 1 469 | 82 | 90 | 11 | 331 | 13 | 1 890 | 106 | 5,6 | 12,2 | 3,9 | 5,6 |
| „ 16.—20. „ . . . | 3 320 | 113 | 128 | 14 | 660 | 25 | 4 108 | 152 | 3,4 | 10,9 | 3,8 | 3,7 |
| „ 21.—30. „ . . . | 9 297 | 678 | 316 | 57 | 1 352 | 114 | 10 965 | 849 | 7,3 | 18,0 | 8,4 | 7,7 |
| „ 31.—40. „ . . . | 6 909 | 848 | 196 | 52 | 1 073 | 144 | 8 178 | 1 044 | 12,3 | 26,5 | 13,4 | 12,8 |
| „ 41.—60. „ . . . | 6 359 | 1 422 | 161 | 63 | 1 154 | 268 | 7 674 | 1 753 | 22,4 | 39,1 | 23,2 | 22,8 |
| „ 61.—80. „ . . . | 1 064 | 346 | 51 | 20 | 190 | 76 | 1 305 | 442 | 32,5 | 39,2 | 40,0 | 33,9 |
| „ 81. Jahre u. darüber | 6 | 2 | 1 | — | 3 | 1 | 10 | 3 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 30,0 |
| ohne Angabe . . . | 83 | 13 | 29 | 11 | 376 | 35 | 488 | 59 | 15,7 | 37,9 | 9,3 | 12,1 |
| Summa | 32 497 | 4 504 | 6 242 | 2 352 | 5 779 | 932 | 44 518 | 7 788 | | | | 17,5 |

In den vorstehenden Sterblichkeitsübersichten sind diejenigen Verhältniszahlen, welche auf weniger als hundert Erkrankungsfälle sich beziehen, durch kleineren Druck der Ziffern kenntlich gemacht.

Im übrigen ist zu den Tabellen noch folgendes zu bemerken:

In den Uebersichten unter A (Berlin) fällt zunächst auf, daß in der Epidemie von 1871/72 die Sterblichkeit eine ganz auffallend große gewesen ist. Nach der Liste

sind nämlich in diesen beiden Jahren 21,9 %, d. h. mehr als der fünfte Theil sämmtlicher Erkrankten gestorben, während in dem Zeitraum von 1865 bis 1870 das Sterblichkeitsprocent nur 10,5 betragen hat. Mag dieser Unterschied auch zum kleineren Theile darin begründet sein, daß die Seuche mit ihrer größeren Ausbreitung an Bösartigkeit zugenommen hat, so ist doch die eigentliche Erklärung ohne Zweifel darin zu suchen, daß während der großen Epidemie von 1871/72 die leichteren Erkrankungen sich der Kenntniß entzogen haben und in die Listen nicht mit aufgenommen worden sind.

Bis zu welchem Grade die Journale der Berliner Sanitätskommission unvollständig sind, erhellt zur Genüge daraus, daß in denselben für die Jahre 1871/72 4524 Todesfälle sich verzeichnet finden, während thatsächlich nach amtlichen Quellen allein in der Zeit vom 1. Januar 1871 bis Ende Juli 1872 nicht weniger als 6478 Todesfälle an Pocken in Berlin sich ereignet haben. *)

Daß unter solchen Umständen die Zahl der mit Genesung endenden Erkrankungen, welche in die Listen nicht eingetragen sind, eine außerordentlich große gewesen sein muß, liegt auf der Hand. Bemerkenswerth ist noch, daß in den Jahren 1871/72 (siehe Uebersicht A H) sämmtliche 257 Personen, bei welchen ein Vermerk über den Impfstand fehlt, gestorben sind. Diese Fälle finden sich mehrfach in langen Reihen hintereinander in der Liste aufgeführt mit der Bemerkung „laut Todtenschein“; sie sind offenbar erst dadurch zur Kenntniß der Sanitätskommission gelangt, daß sie einen tödtlichen Ausgang genommen haben. Auch der Umstand, daß abgesehen von jenen 257 Fällen unter den 20 648 in der Epidemie von 1871/72 aufgeführten pockenkranken Personen die Angabe des Impfstandes bei keiner einzigen Person unbekannt geblieben ist, ist nicht gerade geeignet, das Vertrauen zu der Zuverlässigkeit der Liste zu erhöhen. Auch dem Nicht-Sachverständigen muß sich der Verdacht aufdrängen, daß die Feststellung des Impfstandes hier in einer Weise stattgefunden hat, welche auf Zuverlässigkeit keinen Anspruch machen darf.

Wenn trotz aller dieser Fehlerquellen, welche eine statistische Verwerthung der Berliner Listen nahezu unmöglich machen, die Berechnung der Sterblichkeitsprocente für die in diesen Listen aufgeführten Erkrankten mitgetheilt worden ist, so soll dadurch nur der Nachweis erbracht werden, daß auch dieses Material noch in unverkennbarer Weise dafür spricht, daß die Sterblichkeit der an den Pocken erkrankten Geimpften eine geringere ist, als diejenige der Ungeimpften derselben Altersklassen. — Zu dem gleichen Ergebniß führt die Prüfung der übrigen amtlichen Listen; nur tritt hier der Schutz, welchen die Impfung vor dem Sterben an Pocken gewährt, in noch höherem Maße zu Tage (vgl. Uebersicht B). Das Letztere gilt auch von der Uebersicht C, in welcher die sämmtlichen 44 518 Erkrankungsfälle nach den angegebenen Gesichtspunkten zusammengestellt sind.

*) Guttstadt, die Pockenepidemie in Preußen, insbesondere in Berlin 1870/72. Zeitschrift des Königlich preussischen statistischen Bureau, 1873, XIII. Seite 116.

Es erübrigt noch, das Sterblichkeitsverhältniß der in den Listen als „revaccinirt“ aufgeführten Pockenkranken ins Auge zu fassen. Allerdings ist die Zahl dieser Kranken nur eine geringe; denn nach Abzug der Journale der Berliner Sanitätskommission, welche wegen ihrer genügend dargelegten Unvollständigkeit hier unberücksichtigt geblieben sind, finden sich in den sämtlichen bearbeiteten Listen unter 15 647 Erkrankungen mit bekanntem Ausgange (vgl. die Uebersicht B auf Seite 169) nur 737, welche nach Ausweis der Listen revaccinirte Personen betroffen haben. Das Nähere bezüglich dieser Fälle ergibt die nachstehende Uebersicht:

D. Sterblichkeit unter den als revaccinirt aufgeführten Pockenkranken, verglichen mit der Sterblichkeit der Geimpften, der Ungeimpften, der Kranken mit unbekanntem Impfzustande und der Kranken überhaupt.

| Altersklasse | Revaccinirte | | Sterblichkeits-Procent der | | | | |
|---|--------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| | erkrankt | gestorben | Revaccinirten | als „geimpft“ Aufgeführten | Ungeimpften | Kranken mit unbekanntem Impfzustande | sämtlichen Kranken |
| im 1. Jahre . . . | — | — | — | 45,8 | 53,3 | 50,6 | 52,1 |
| „ 2.—5. „ . . . | 2 | — | 0,0 | 22,0 | 36,4 | 19,2 | 29,7 |
| „ 6.—10. „ . . . | 18 | 1 | 5,6 | 12,2 | 22,3 | 9,9 | 13,1 |
| „ 11.—15. „ . . . | 70 | 3 | 4,3 | 5,6 | 26,1 | 3,1 | 5,1 |
| „ 16.—20. „ . . . | 110 | — | 0,0 | 2,5 | 66,7 | 1,6 | 2,2 |
| „ 21.—30. „ . . . | 202 | 12 | 5,9 | 6,9 | 27,0 | 5,5 | 6,5 |
| „ 31.—40. „ . . . | 154 | 11 | 7,1 | 11,9 | 21,1 | 10,8 | 11,3 |
| „ 41.—60. „ . . . | 152 | 29 | 19,1 | 22,4 | 38,5 | 21,0 | 21,9 |
| „ 61.—80. „ . . . | 25 | 8 | 32,0 | 34,8 | 40,0 | 35,8 | 35,1 |
| „ 81. Jahre und darüber ohne Altersangabe . . . | 4 | 1 | 25,0 | 9,1 | 33,3 | 8,9 | 9,3 |
| Summa | 737 | 65 | | | | | 14,9 |

Wie die Uebersicht zeigt, sind von 200 erkrankten Revaccinirten im Alter bis zu 20 Jahren nur 4, d. h. 2 Procent gestorben. Erst im Alter von mehr als 40 Jahren, wo vermuthlich bereits Jahrzehnte seit der Revaccination verstrichen waren und demnach der durch die Revaccination gewährte Schutz nicht mehr voll zur Geltung kommen konnte, beginnt die Sterblichkeit wieder anzusteigen. Durchweg ist sie aber bei den Revaccinirten geringer als bei den Geimpften und wiederum bei den Geimpften weit geringer als bei den Ungeimpften. —

Das bearbeitete Material spricht sonach in unverkennbarer Weise dafür, daß die Impfung thatsächlich einen beträchtlichen Schutz vor dem Sterben an Pocken gewährt.

Nun ist aber weiter zu berücksichtigen, daß, wenn man die ohne Erfolg und die zu spät Geimpften aus der Zahl der Geimpften auszuscheiden vermöchte, um sie, wie es billig wäre, den Ungeimpften zuzurechnen, das Verhältniß der Sterblichkeit dieser beiden Kategorien ganz außerordentlich zu Gunsten der Geimpften sich verändern würde. Noch mehr würde das Letztere der Fall sein, wenn die Zahl derjenigen zu er-

mitteln wäre, welche auf Grund ihrer eigenen Angaben bezw. derjenigen ihrer Angehörigen als „Geimpfte“ in die Listen eingetragen sind, ohne überhaupt je geimpft zu sein.

So wirken alle die Unrichtigkeiten, welche in den Listen bezüglich der Angabe des Impfstandes enthalten sind, in dem Sinne, daß das Sterblichkeitsprocent der Geimpften durch Einrechnung thatsächlich nicht oder wenigstens nicht wirksam Geimpfter ungünstig beeinflusst wird; trotzdem aber stellen sich, wie die Uebersichten zeigen, die Zahlen für die Geimpften im Vergleich zu den Ungeimpften sehr günstig.

Schlußbemerkungen.

Nachdem im Vorstehenden die Ergebnisse der Bearbeitung einer Anzahl sogenannter Ur-Pockenlisten mitgetheilt sind, erübrigt es hinsichtlich der Zuverlässigkeit der in ihnen enthaltenen Aufzeichnungen einige Bemerkungen hinzuzufügen. In vielen Fällen lassen schon das Aeußere der Listen, die flüchtige Schrift, die häufigen Korrekturen, doppelte Ausführung einer und derselben Erkrankung u. dgl. m. auf die geringe Sorgfalt schließen, mit welcher die Eintragungen wenigstens zum Theil gemacht worden sind. In zahlreichen Listen ist zwar der Name des behandelnden Arztes bei den Angaben über die einzelnen Kranken in einer besonderen Spalte vermerkt, es haben sich unter den bearbeiteten Listen aber nur zwei (diejenigen von Sömmerda und Kaiserswerth) gefunden, in welchen dies anscheinend von der Hand der betreffenden Aerzte selbst geschehen ist. Ob in den übrigen Fällen die Aufzeichnungen auf Grund von ärztlichen Meldarten gemacht worden sind, oder ob die Anzeigen über die Erkrankungen einschließlich der Angaben über die Namen der behandelnden Aerzte von Nichtärzten herrühren, ist aus den Verzeichnissen nicht zu ersehen. — Es liegt in der Natur der Sache, daß von den sämtlichen Angaben der Listen diejenigen über den Impfstand am wenigsten auf Zuverlässigkeit Anspruch machen können. Es ist anzunehmen, daß selbst die Aerzte, von welchen Meldungen über Pockenkrankungen gemacht sind, die Anzeige über den Impfstand nur zum Theil auf Grund des eingesehenen Impfscheines, bezw. des Vorhandenseins von Impfnarben erstattet haben; in den meisten Fällen wird vielmehr lediglich die Aussage des Kranken oder der Angehörigen desselben der Meldung zu Grunde gelegt sein. Es kommt hinzu, daß nach den früher in Preußen bestandenen gesetzlichen Vorschriften diejenigen Eltern (Vormünder 2c.), deren ohne Grund ungeimpft gebliebene Kinder (Mündel 2c.) von den Pocken befallen wurden, strafbar waren. Welche Rückwirkung diese Bestimmung auf die Zuverlässigkeit der Angaben über den Impfstand Pockenkranker hatte, geht aus folgendem Beispiel hervor: Ein Arzt, welcher gelegentlich der oben besprochenen Pockenepidemie in Nordhausen durch Herausgabe einer besonderen Druckschrift die in der Bevölkerung verbreiteten Vorurtheile gegen die Impfung zu zerstreuen suchte, sprach es in der Druckschrift ganz offen aus, daß er es nicht habe über sich gewinnen können, die Bestrafung von Eltern herbeizuführen, welche durch den Tod eines an den Pocken erkrankten ungeimpft gelassenen Kindes bereits hart genug ihren Irrthum hätten büßen müssen.

Lehrreich ist auch folgende Thatfache: Aus der Pockenepidemie, von welcher die Stadt Effen in den Jahren 1881/82 heimgefucht worden ist, liegen zwei Listen vor, nämlich 1. ein von der städtischen Behörde geführtes Verzeichniß und 2. ein Krankenregister des Pockenlazareths. Beide Listen enthalten Angaben über den Impfzustand der von den Pocken Befallenen. Ein im Gesundheitsamte angestellter Vergleich dieser Eintragungen hat nun ergeben, daß bei etwa 20 pCt. der in dem Krankenregister des Lazareths aufgeführten 236 Pockenkranken die Angabe über den Impfzustand von derjenigen abweicht, welche in der städtischen Liste sich findet. Manche Kranke sind in der einen Liste als geimpft, in der anderen als ungeimpft bezeichnet, bei anderen giebt die eine Liste eine einmalige, die andere eine mehrmalige Impfung an zc. Zur Ergänzung dieser Mittheilung möge hier noch eine Aeußerung aus einer Veröffentlichung des Dr. Wahl in Effen beigelegt sein, welche sich auf die drei letzten in der genannten Stadt beobachteten Pockenepidemien bezieht. Dr. Wahl schreibt:*)

„Die Vaccinationsfrage habe ich nicht berührt, weil mir das betreffende Material zu irgendwelchen Schlüssen nicht geeignet erschien. Aus der Epidemie von 1871/72 lagen mir 1199 Anmelde Scheine vor, auf denen Bemerkungen über angeblich stattgehabte Impfungen verzeichnet waren. Abgesehen davon, daß dieselben oft sehr unklar und zweifelhaft waren, ließ sich bezüglich der Zuerstgeimpften eine Controle durch die Stammimpflisten nicht ermöglichen, weil dieselben erst vom Jahre 1874 an in einer correcten und genauen Weise geführt sind. Anders bei der Epidemie von 1881/82. Da können die Impflisten bezüglich der Controle als sicherer Anhalt dienen. Es ergab sich indessen ein negatives Resultat. Bei einer im Verhältniß zu der kleinen Ziffer der Erkrankungen und Todesfälle in den ersten Lebensjahren nicht unbedeutenden Anzahl der in den Polizeilisten als geimpft aufgeführten Fälle fanden sich in den Stammimpflisten keine Notizen über wirklich stattgehabte Vaccination vor, so daß jene als geimpft angemeldeten Kinder in der That nicht geimpft waren. Diese falschen Angaben wurden seitens der Angehörigen entweder aus Unkenntniß oder aus Furcht vor Bestrafung wegen unterlassener Impfung gemacht. Es wäre demnach widerfönnig gewesen, aus einem so werthlosen und ohnedies sehr kleinen Material irgendwelche Schlüsse bezüglich der Impffrage formuliren zu wollen.“

Wenn sonach gewichtige Einwände gegen die Zuverlässigkeit der in den Listen enthaltenen Angaben über den Impfzustand der Erkrankten zu erheben sind, so trifft doch auch hier wieder zu, was bereits früher bezüglich der statistischen Verwerthbarkeit des Begriffes „geimpft“ ausgeführt wurde, daß nämlich die Mängel der Listen die Schutzkraft der Impfung geringer erscheinen lassen, als sie thatsächlich gewesen ist. Wohl werden viele Kranke als geimpft angemeldet sein, ohne eine Schutzimpfung erfahren zu haben, kaum je aber wird es vorgekommen sein, daß geimpfte Kranke als ungeimpft gemeldet worden sind. —

*) Statistische Mittheilungen über 3 Pockenepidemien in Effen (1866/67, 1871/72, 1881/82). Deutsche medicinische Wochenschrift 1883 Seite 704.

Zur Beurtheilung des Impfstandes der Bevölkerung in den älteren Provinzen Preußens vor dem Inkrafttreten des Reichsimpfgesetzes haben die vorstehenden Erörterungen bereits mehrfache Anhaltspunkte ergeben. Jedenfalls steht es fest, daß die Durchführung der Impfung an einer Anzahl von Orten und zwar besonders an solchen, welche von verhältnißmäßig schweren Pockenepidemieen heimgesucht worden sind, eine sehr mangelhafte gewesen ist (vgl. die Erörterungen über die Liste von Nordhausen auf Seite 148 u. 149 und diejenige von Duisburg auf Seite 151). Auch die große Zahl der in den bearbeiteten Listen als ungeimpft aufgeführten, an den Pocken erkrankten Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren läßt nach dieser Richtung keinen Zweifel (vgl. S. 161).

Zu denjenigen Städten, welche seit Anfang der 60er Jahre mehrfach von Pockenepidemieen heimgesucht worden sind, gehört auch Aachen. Es steht hiermit die Thatsache in Einklang, daß in Aachen die Impfung ebenfalls unvollkommen durchgeführt gewesen ist, wie das nachstehende von der Königlichen Regierung zu Aachen eingesandte Verzeichniß unschwer erkennen läßt:

Verzeichniß der in den Jahren 1860 bis 1874 geborenen, geimpften und wiedergeimpften Kinder in der Stadt Aachen.

| J a h r | Lebend geboren | G e i m p f t | | | | W i e d e r g e i m p f t | | | | |
|---------|-------------------|---------------|--|------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|
| | | mit Erfolg | ohne oder mit unsicherem Erfolg | zum dritten Male ohne Erfolg | Summa | mit Erfolg | mit unvoll- ständigem Erfolge | ohne Erfolg | mit un- bekanntem Erfolge | Summa |
| 1860 | 2 330 | 1 515 | 73 | — | 1 588 | — | — | — | — | — |
| 1861 | 2 204 | 1 501 | 93 | — | 1 594 | 130 | 119 | 12 | — | 261 |
| 1862 | 2 233 | 1 569 | 96 | — | 1 665 | 189 | 118 | 41 | 63 | 411 |
| 1863 | 2 338 | 1 742 | 25 | — | 1 767 | 68 | 124 | — | 163 | 375 |
| 1864 | 2 319 | 1 224 | — | — | 1 224 | 425 | 22 | 20 | — | 467 |
| 1865 | 2 505 | 1 531 | 13 | — | 1 544 | 636 | 51 | — | 160 | 847 |
| 1866 | 2 585 | 2 140 | — | — | 2 140 | 395 | — | 13 | — | 408 |
| 1867 | 2 406 | 1 864 | 10 | 10 | 1 884 | 3 573 | 2 167 | 93 | — | 5 833 |
| 1868 | 2 687 | 1 779 | 9 | — | 1 788 | 279 | — | — | — | 279 |
| 1869 | 2 747 | 1 967 | 119 | 5 | 2 091 | 331 | — | 15 | — | 346 |
| 1870 | 2 881 | 583 | 30 | — | 613 | 94 | 3 | 7 | — | 104 |
| 1871 | 2 565 | 2 146 | — | — | 2 146 | 780 | — | — | — | 780 |
| 1872 | 3 117 | 1 752 | 67 | — | 1 819 | 2 698 | 1 784 | 3 115 | — | 7 597 |
| 1873 | 3 134 | 1 301 | 57 | — | 1 358 | 103 | 4 | 12 | — | 119 |
| 1874 | 3 306 | 2 081 | 7 | — | 2 088 | 177 | — | — | — | 177 |

Die große Zahl der in der Uebersicht für die Jahre 1867 und 1872 aufgeführten Wiederimpfungen erklärt sich daraus, daß damals die Pocken in der Stadt herrschten.

Als ein weiteres Beispiel für die unzureichende Durchführung der Impfung möge noch die oben bereits erwähnte Stadt Effen genannt sein, für welche die Königliche Regierung zu Düsseldorf die nachstehende von dem Bürgermeisteramte aufgestellte Nachweisung eingesandt hat:

Nachweisung über die in den Jahren 1860 bis incl. 1875 in der Stadtgemeinde Effen geimpften Kinder.

| Jahrgang | Zahl der geborenen Kinder | Gesamtzahl der in der General-Impfliste aufgeführten Kinder | Von den in der Rubrik 3 aufgeführten Kindern sind | | | | Bemerkungen |
|----------|---------------------------|---|---|-----------|----------|---|--|
| | | | geimpft | gestorben | verzogen | ungeimpft geblieben wegen Krankheit und aus sonstigen unbekanntem Gründen | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1860 | 1 016 | 1 066 | 690 | 154 | 57 | 165 | Die General-Impfliste pro 1865 ist nicht mehr vorhanden. |
| 1861 | 1 064 | 1 182 | 788 | 175 | 70 | 149 | |
| 1862 | 1 068 | 1 183 | 873 | 140 | 39 | 131 | |
| 1863 | 1 437 | 1 345 | 825 | 137 | 222 | 161 | |
| 1864 | 1 567 | 1 461 | 1 154 | 111 | 118 | 78 | |
| 1865 | 1 885 | — | — | — | — | — | |
| 1866 | 2 297 | 1 919 | 1 294 | 264 | 91 | 270 | |
| 1867 | 2 361 | 2 312 | 1 806 | 285 | 158 | 63 | |
| 1868 | 2 411 | 2 411 | 1 593 | 309 | 236 | 273 | |
| 1869 | 2 441 | 2 653 | 1 825 | 319 | 287 | 222 | |
| 1870 | 2 631 | 2 768 | 1 628 | 446 | 233 | 461 | |
| 1871 | 2 473 | 3 082 | 2 088 | 460 | 120 | 414 | |
| 1872 | 3 115 | 2 631 | 1 357 | 402 | 169 | 703 | |
| 1873 | 2 982 | 3 316 | 2 177 | 497 | 516 | 126 | |
| 1874 | 2 910 | 3 240 | 2 071 | 455 | 546 | 168 | |
| 1875 | 3 131 | 2 455 | 1 579 | 256 | 304 | 316 | |

Auf Seite 176 und 177 ist ferner aus dem „Generalbericht über das Medicinal- und Sanitätswesen im Regierungsbezirk Erfurt für die Jahre 1875 bis 1880*)“ eine Uebersicht der in den 10 Jahren von 1865 bis 1874 in dem genannten Regierungsbezirk vorgenommenen Impfungen mitgetheilt. Obgleich, wie in dem citirten Berichte hervorgehoben wird, auch schon vor Erlass des Reichs-Impfgesetzes der Impfung der Schutzpocken sowie der Wiederimpfung seitens der Behörden möglichste Sorgfalt gewidmet wurde, so ist doch nach Ausweis der Tabellen die Durchführung der Impfung in den verschiedenen Kreisen des Regierungsbezirks eine sehr ungleichmäßige gewesen. (Der oben bereits besprochene Kreis Nordhausen ist hier nochmals mit aufgeführt.) Auch die verhältnißmäßig geringe Zahl der bis zum Jahre 1872 in die Listen aufgenommenen Wiederimpfungen ist bemerkenswerth.**)

*) Erstattet von Dr. G. D. Richter, Regierungs- und Medicinalrath, (Weimar, Druck von R. Wagner 1883).

**) Bezüglich der mit dem Jahre 1872 eingetretenen Zunahme der Wiederimpfungen vgl. die Circularverfügung vom 31. Oktober 1871 Abschnitt 5 Seite 111.

Tabelle der Resultate bei den in den 10 Jahren 1865 bis

| Kreise | Es waren zu impfen | Davon blieben Refraktanten | Zahl der Refraktanten nach % | Es waren zu impfen | Davon blieben Refraktanten | Zahl der Refraktanten nach % | Es waren zu impfen | Davon blieben Refraktanten | Zahl der Refraktanten nach % | Es waren zu impfen | Davon blieben Refraktanten | Zahl der Refraktanten nach % |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| | i m J a h r e | | | | | | | | | | | |
| | 1865 | | | 1866 | | | 1867 | | | 1868 | | |
| Erfurt (Stadtkreis) | 1 582 | 161 | 10,11 | 1 686 | 480 | 28,47 | 2 085 | 646 | 30,98 | 2 072 | 484 | 23,36 |
| dto. (Landkreis) | | | | | | | | | | | | |
| Heiligenstadt | 1 345 | 164 | 12,19 | 1 357 | 113 | 8,33 | 1 327 | 99 | 7,46 | 1 249 | 151 | 12,09 |
| Langensalza | 1 071 | 112 | 10,45 | 1 025 | 107 | 10,44 | 1 048 | 88 | 8,39 | 1 044 | 147 | 14,08 |
| Mühlhausen | 1 676 | 164 | 9,19 | 1 689 | 177 | 10,48 | 1 720 | 202 | 11,74 | 1 759 | 218 | 12,61 |
| Nordhausen | 2 243 | 248 | 11,06 | 2 124 | 236 | 11,11 | 2 230 | 239 | 10,71 | 2 100 | 438 | 20,86 |
| Schleusingen | 1 338 | 120 | 8,97 | 1 301 | 177 | 13,61 | 1 315 | 150 | 11,41 | 1 248 | 167 | 13,38 |
| Weißensee | 824 | 12 | 1,46 | 832 | 30 | 3,60 | 837 | 23 | 2,75 | 834 | 15 | 1,80 |
| Worbis | 1 461 | 59 | 4,04 | 1 437 | 55 | 3,83 | 1 435 | 63 | 4,39 | 1 359 | 62 | 4,56 |
| Biegenrück | 443 | 42 | 9,48 | 456 | 35 | 7,68 | 479 | 27 | 5,64 | 432 | 23 | 5,32 |
| Summa | 11 983 | 1 082 | 9,03 | 11 907 | 1 410 | 11,84 | 12 476 | 1 537 | 12,32 | 12 097 | 1 705 | 14,09 |

Tabelle der Resultate bei den in den 10 Jahren 1865 bis

| Kreise | Es waren wiedergutimpfen | Davon blieben Refraktanten | Prozentzahl der Refraktanten | Es waren wiedergutimpfen | Davon blieben Refraktanten | Prozentzahl der Refraktanten | Es waren wiedergutimpfen | Davon blieben Refraktanten | Prozentzahl der Refraktanten | Es waren wiedergutimpfen | Davon blieben Refraktanten | Prozentzahl der Refraktanten |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | i m J a h r e | | | | | | | | | | | |
| | 1865 | | | 1866 | | | 1867 | | | 1868 | | |
| Erfurt (Stadtkreis) | 379 | — | — | 398 | — | — | 499 | — | — | 655 | — | — |
| dto. (Landkreis) | | | | | | | | | | | | |
| Heiligenstadt | 715 | — | — | 1 071 | — | — | 878 | 121 | 13,78 | 773 | 176 | 7,85 |
| Langensalza | 573 | 19 | 3,32 | 530 | 5 | 0,94 | 667 | 7 | 1,05 | 625 | 4 | 1,06 |
| Mühlhausen | 945 | 48 | 5,08 | 964 | 84 | 8,71 | 973 | 13 | 1,34 | 891 | 13 | 11,08 |
| Nordhausen | 977 | 13 | 1,33 | 1 070 | 1 | 0,09 | 1 119 | 27 | 2,41 | 1 071 | 202 | 26,84 |
| Schleusingen | 541 | 28 | 5,18 | 528 | 13 | 2,46 | 521 | 15 | 2,88 | 540 | 29 | 2,65 |
| Weißensee | 591 | 1 | 0,17 | 550 | 5 | 0,91 | 591 | 7 | 1,18 | 562 | — | — |
| Worbis | 857 | — | — | 817 | — | — | 893 | 15 | 1,68 | 776 | 17 | 19,36 |
| Biegenrück | 305 | 75 | 2,46 | 289 | 56 | 19,03 | 318 | 73 | 22,96 | 304 | 54 | 25,32 |
| Summa | 6 243 | 184 | 2,95 | 6 217 | 164 | 2,64 | 6 459 | 273 | 4,30 | 6 197 | 495 | 7,99 |

1874 im Regierungsbezirk Erfurt vorgenommenen Impfungen.

| Es waren zu impfen | | | Davon blieben Refraktent | | | Zahl der Refraktent nach % | | | Es waren zu impfen | | | Davon blieben Refraktent | | | Zahl der Refraktent nach % | | | Es waren zu impfen | | | Davon blieben Refraktent | | | Zahl der Refraktent nach % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|------|--------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|--------------------|----|------|--------------------------|----|------|----------------------------|----|------|--------------------|----|-------|--------------------------|----|------|----------------------------|----|------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|----|------|-----|-----|-------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-------|----|------|-------|-----|-------|-------|-----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|
| im Jahre | | | | | | | | | 1869 | | | | | | | | | 1870 | | | | | | | | | 1871 | | | | | | | | | 1872 | | | | | | | | | 1873 | | | | | | | | | 1874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 073 | 93 | 4,49 | 1 717 | 221 | 12,87 | 1 764 | 211 | 11,96 | 1 193 | 59 | 4,95 | 1 509 | 93 | 6,16 | 1 362 | 71 | 5,21 | 1 495 | 50 | 10,10 | 703 | 44 | 6,25 | 632 | 37 | 5,85 | 1 331 | 172 | 12,92 | 1 348 | 258 | 19,14 | 1 403 | 92 | 6,56 | 1 099 | 75 | 6,82 | 1 249 | 69 | 5,52 | 1 223 | 40 | 3,27 | 1 079 | 236 | 21,87 | 1 138 | 219 | 19,24 | 1 056 | 189 | 17,90 | 923 | 170 | 18,42 | 1 077 | 249 | 23,12 | 1 048 | 233 | 22,23 | 1 728 | 238 | 13,77 | 1 794 | 230 | 12,82 | 1 768 | 201 | 11,37 | 1 530 | 214 | 14,00 | 1 947 | 219 | 11,24 | 1 784 | 263 | 14,74 | 2 302 | 817 | 35,49 | 2 705 | 1248 | 46,14 | 2 812 | 1020 | 36,27 | 2 355 | 865 | 36,73 | 2 731 | 747 | 27,35 | 2 693 | 723 | 26,68 | 1 356 | 125 | 9,22 | 1 421 | 169 | 11,89 | 1 349 | 143 | 10,37 | 1 147 | 223 | 19,44 | 1 510 | 162 | 10,72 | 1 489 | 180 | 12,08 | 872 | 25 | 2,87 | 938 | 122 | 13,01 | 891 | 41 | 4,60 | 733 | 26 | 3,54 | 913 | 38 | 4,15 | 905 | 40 | 4,42 | 1 351 | 90 | 6,66 | 1 439 | 158 | 10,98 | 1 469 | 131 | 8,92 | 1 255 | 95 | 7,57 | 1 340 | 42 | 3,13 | 1 370 | 49 | 3,57 | 442 | 28 | 6,33 | 461 | 40 | 8,68 | 412 | 26 | 6,31 | 398 | 31 | 7,79 | 545 | 37 | 6,78 | 438 | 20 | 4,56 | 12 534 | 1824 | 14,55 | 12 961 | 2665 | 20,56 | 12 954 | 2054 | 15,86 | 11 126 | 1808 | 16,25 | 13 524 | 1700 | 12,57 | 12 944 | 1656 | 12,79 |

1874 im Regierungsbezirk Erfurt vorgenommenen Revaccinationen.

| Es waren wiedergewimpft | | | Davon blieben Refraktent | | | Procentzahl der Refraktent | | | Es waren wiedergewimpft | | | Davon blieben Refraktent | | | Procentzahl der Refraktent | | | Es waren wiedergewimpft | | | Davon blieben Refraktent | | | Procentzahl der Refraktent | | | Es waren wiedergewimpft | | | Davon blieben Refraktent | | | Procentzahl der Refraktent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------|-----|-------|----------------------------|----|------|-------------------------|---|---|--------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-------------------------|---|---|--------------------------|----|------|----------------------------|----|------|-------------------------|----|------|--------------------------|----|------|----------------------------|---|------|-------|----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|------|---|------|-----|-----|-------|-----|---|------|------|----|------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|---|------|-------|---|------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-------|-----|-------|-------|-----|------|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-------|---|------|-------|----|------|-----|----|------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|----|------|-------|-----|------|-------|----|------|-----|----|-------|-----|----|-------|-----|---|---|-----|---|---|-------|----|------|-----|----|-------|-------|-----|------|-------|------|-------|-------|-----|------|--------|----|------|--------|------|-------|--------|------|-------|
| im Jahre | | | | | | | | | 1869 | | | | | | | | | 1870 | | | | | | | | | 1871 | | | | | | | | | 1872 | | | | | | | | | 1873 | | | | | | | | | 1874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 689 | — | — | 1 404 | 396 | 28,21 | 1 669 | 10 | 0,60 | 456 | — | — | 2 035 | 820 | 40,29 | 1 312 | 158 | 12,04 | 413 | — | — | 978 | 44 | 4,49 | 553 | 24 | 4,34 | 764 | 60 | 7,85 | 796 | 44 | 5,53 | 890 | 2 | 0,22 | 1 371 | 17 | 1,24 | 2 766 | 125 | 4,51 | 1 237 | 118 | 9,16 | 471 | 5 | 1,06 | 743 | 141 | 18,98 | 555 | 8 | 1,44 | 635 | 10 | 1,57 | 2 240 | 746 | 33,30 | 660 | 160 | 24,24 | 939 | 104 | 11,08 | 1 127 | 118 | 10,47 | 1 041 | 36 | 3,46 | 1 580 | 22 | 1,39 | 3 197 | 290 | 9,07 | 1 772 | 233 | 10,65 | 1 129 | 303 | 26,84 | 1 218 | 384 | 31,53 | 1 046 | 3 | 0,29 | 2 089 | 2 | 0,10 | 4 982 | 928 | 18,62 | 2 825 | 939 | 35,01 | 717 | 19 | 2,65 | 737 | 21 | 2,85 | 803 | 31 | 3,86 | 719 | 17 | 2,36 | 3 417 | 647 | 18,93 | 1 563 | 117 | 7,48 | 545 | — | — | 636 | — | — | 605 | — | — | 1 976 | 7 | 0,35 | 1 308 | 71 | 5,42 | 644 | 42 | 6,52 | 872 | 169 | 19,36 | 869 | 238 | 27,39 | 925 | 112 | 12,11 | 1 079 | 14 | 1,30 | 3 635 | 251 | 6,90 | 1 137 | 70 | 6,24 | 304 | 77 | 25,32 | 320 | 66 | 20,62 | 255 | — | — | 300 | — | — | 1 378 | 90 | 6,53 | 352 | 17 | 10,51 | 7 431 | 737 | 9,92 | 7 850 | 1480 | 17,94 | 7 789 | 202 | 2,59 | 10 618 | 89 | 0,84 | 25 936 | 4012 | 15,46 | 12 105 | 1928 | 15,92 |

Für Berlin ist bereits früher von Dr. Guttstadt auf Grund amtlicher Quellen der Nachweis erbracht, daß die Impfung und insbesondere die Wiederimpfung daselbst vor Ausbruch der Pockenepidemie im Jahre 1871 nur mangelhaft durchgeführt gewesen ist. *) Das Nähere ergibt die nachstehende von Dr. Guttstadt mitgetheilte Tabelle:

Das Verhältniß der Geimpften zu den Gebornen.
(Berlin 1840—1871).

| Jahr | Geboren | Geimpft | Revaccinirt | Von 100 Gebornen wurden geimpft |
|------|---------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 1840 | 10 509 | 8 774 | — | 83,49 |
| 1841 | 10 757 | 8 367 | — | 77,78 |
| 1842 | 12 177 | 9 067 | — | 74,46 |
| 1843 | 11 634 | 10 408 | — | 89,46 |
| 1844 | 12 993 | 9 935 | — | 76,46 |
| 1845 | 12 846 | 8 909 | — | 69,35 |
| 1846 | 14 222 | 9 513 | — | 66,89 |
| 1847 | 12 862 | 9 388 | — | 72,94 |
| 1848 | 13 055 | 7 384 | — | 56,56 |
| 1849 | 14 935 | 9 429 | — | 63,13 |
| 1850 | 15 009 | 11 583 | — | 77,17 |
| 1851 | 15 335 | 10 919 | — | 71,20 |
| 1852 | 15 525 | 11 254 | — | 72,49 |
| 1853 | 15 010 | 10 747 | — | 71,59 |
| 1854 | 15 469 | 10 276 | — | 66,43 |
| 1860 | 18 226 | 10 736 | 277 | 58,90 |
| 1861 | 20 777 | 10 581 | 963 | 50,92 |
| 1862 | 21 364 | 11 436 | 536 | 53,53 |
| 1863 | 23 301 | 15 728 | 2 222 | 67,49 |
| 1864 | 24 631 | 25 153 | 22 566 | 102,12 |
| 1865 | 26 061 | 9 405 | und mehr. 2 734 | Pocken-Epidemie. 36,08 |
| 1866 | 27 908 | 10 587 | 1 018 | 37,90 |
| 1867 | 27 313 | 14 377 | 1 000 | 52,64 |
| 1868 | 29 413 | 16 729 | 1 417 | 56,87 |
| 1869 | 37 668 | 17 682 | 1 344 | 57,65 |
| 1870 | 32 594 | 9 547 | 4 530 | 29,29 |
| 1871 | 29 530 | 37 206 | 102 965 und mehr. | |

Die vorstehenden Mittheilungen lassen zur Genüge erkennen, daß insbesondere vor Ausbruch der weitverbreiteten Pockenepidemie im Anfange der 70er Jahre die

*) „Die Pockenepidemie in Preußen, insbesondere in Berlin 1870/72 nebst Beiträgen zur Beurtheilung der Impffrage, nach amtlichen Quellen“ Zeitschr. des Königlich preussischen statistischen Bureau, 1873 XIII Seite 119.

Durchführung der Impfung in Preußen vielfach eine sehr lückenhafte gewesen ist, und daß dies noch in weit höherem Grade bezüglich der Wiederimpfung zutrifft. Eine entscheidende Aenderung wurde hierin erst durch das Reichs-Impfgesetz herbeigeführt,*) unter dessen Einfluß dementsprechend auch die Pockensterblichkeit in Preußen, wie in Abschnitt 1 nachgewiesen wurde, auf einen bis dahin nicht gekannten niedrigen Stand herabgesunken ist.

*) Vgl. hierzu auch die Veröffentlichung der Ergebnisse des Impfgeschäftes im Deutschen Reiche in den Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte Bd. I und II.

Mittheilungen
über die
**Maßregeln, welche zur Beschaffung untadeliger Thierlymphe ergriffen
worden sind,**
sowie über die
Zunahme der Verwendung von Thierlymphe bei den im Deutschen Reiche aus-
geführten öffentlichen Impfungen.

Die vom Bundesrathe unter dem 18. Juni 1885 genehmigten Beschlüsse der Sachverständigen-Kommission zur Berathung der Impffrage, betreffend die allgemeine Einführung der Impfung mit Thierlymphe (Nr. 2 der Beschlüsse), lauten folgendermaßen:

- „1. Da die mit der Impfung mit Menschenlymphe unter Umständen verbundenen Gefahren für Gesundheit und Leben der Impflinge (Impfphylis, Impferosipel u. s. w.) durch die Impfung mit Thierlymphe, soweit es sich um direkte Uebertragung der Syphilis oder der accidentellen Wundkrankheiten handelt, vermieden werden können, und da die Impfung mit Thierlymphe in der Neuzeit soweit vervollkommen ist, daß sie der Impfung mit Menschenlymphe fast gleichzustellen ist, so hat die Impfung mit Thierlymphe thunlichst an Stelle der mit Menschenlymphe zu treten.
2. Die allgemeine Einführung der Impfung mit Thierlymphe ist allmählich durchzuführen, und zwar sind unter Zuhilfenahme der bisher gewonnenen Erfahrungen Anstalten zur Gewinnung von Thierlymphe in einer dem voraussichtlichen Bedarfe entsprechenden Anzahl zu errichten.
Sobald der Bedarf an Thierlymphe seitens einer solchen Anstalt gesichert ist, sind die öffentlichen Impfungen in dem betreffenden Bezirke mit Thierlymphe auszuführen.
3. Für die Einrichtung und den Betrieb der Anstalten sind folgende allgemeine Bestimmungen maßgebend:
 - a) Die Anstalt ist der Leitung eines Arztes zu unterstellen.
 - b) Die Lymphhe wird den Impfärzten kosten- und portofrei überlassen.
 - c) Es ist gestattet, an Stelle der sogenannten genuinen Vaccine die Retrovaccine zu benutzen.
 - d) Die Lymphhe ist nicht eher an die Impfärzte abzugeben, als bis die Untersuchung der geschlachteten Thiere, welche die Lymphhe lieferten, deren Gesundheit erwiesen hat.

- e) Ueber Alter, Pflege und Wartung der Kälber, Zeit und Art der Lymphabnahme, Methode der Konservirung, der Aufbewahrung, des Versandts u. s. w. werden durch eine Kommission von Sachverständigen spezielle Instruktionen ausgearbeitet."

Ueber die Gewinnung der Thierlymphe enthält der vom Bundesrathe genehmigte „Entwurf von Vorschriften, welche von den Aerzten bei Ausführung des Impfgeschäfts zu befolgen sind" (Nr. 3 der Beschlüsse, Absatz B II), die nachstehenden Bestimmungen:

„§ 12. Sobald die Impfung mit Thierlymphe eingeführt ist, erhalten die Impfärzte ihren Gesamtbedarf an Lymphe aus den Landes-Impfinstituten.

§ 13. Die Vorschriften im § 7, § 10 Absatz 2 und § 11 finden auch für Thierlymphe sinngemäße Anwendung.

Inwieweit andere Vorschriften des Abschnittes I bei der Gewinnung der Thierlymphe Anwendung zu finden haben, bleibt besonderer Regelung vorbehalten."

Die angeführten Paragraphen lauten:

„§ 7. Jeder Impfarzt hat aufzuzeichnen, von wo und wann er seine Lymphe erhalten hat. Insbesondere hat er, wenn er Lymphe zur späteren eigenen Verwendung oder zur Abgabe an andere Aerzte aufbewahren will, den Namen der Impflinge, von denen die Lymphe abgenommen worden ist, und den Tag der erfolgten Abnahme aufzuzeichnen. Die Lymphe selbst ist derart zu bezeichnen, daß später über die Abstammung derselben ein Zweifel nicht entstehen kann.

Die Aufzeichnungen sind bis zum Schlusse des nachfolgenden Kalenderjahres aufzubewahren.

§ 10. Nur solche Lymphe darf benutzt werden, welche freiwillig austritt und, mit bloßem Auge betrachtet, weder Blut noch Eiter enthält.

Uebelriechende oder sehr dünnflüssige Lymphe ist zu verwerfen.

§ 11. Nur reinstes Glycerin darf mit der Lymphe vermischt werden. Die Mischung soll mittels eines reinen Glasstabes geschehen."

In Gemäßheit des oben erwähnten Beschlusses des Bundesraths wurde seitens des Herrn Reichskanzlers im Juni 1886 eine technische Kommission nach Berlin berufen, deren Berathungen unter dem Voritze des Direktors des Kaiserlichen Gesundheitsamtes und unter Betheiligung von Mitgliedern der genannten Behörde stattgefunden haben. Das Ergebniß dieser Berathungen war die Ausarbeitung der nachstehenden

Anweisung zur Gewinnung, Aufbewahrung und Versendung von Thierlymphe.

I. Auswahl und Untersuchung der Impftiere.

§ 1. Zur Gewinnung von Thierlymphe sind ausschließlich solche Thiere zu wählen, deren Gesundheitszustand nach dem der Abimpfung folgenden Schlachten durch Besichtigung der inneren Organe festgestellt werden kann.

§ 2. In der Regel sind Kälber zu benutzen. Nur in dem Falle, daß geeignete Kälber nicht beschafft werden können, dürfen ältere Rinder verwendet werden.

Die Kälber müssen ein Alter von mindestens drei Wochen und einen von Eiterung und Entzündung freien Nabel haben. Kälber im Alter von fünf Wochen und darüber sind den jüngeren vorzuziehen.

§ 3. Vor dem Impfen sind die Thiere von einem Thierarzte auf ihren Gesundheitszustand zu untersuchen. Nur solche Thiere, welche durchaus gesund befunden werden, sind zu benutzen. Die hiernach geeignet befundenen Thiere sind alsbald nach der Untersuchung mit der Nummer des Tagebuchs (§ 31a) zu versehen.

§ 4. Beim Impfen sowohl, wie bei der Abnahme des Impfstoffes ist die Körpertemperatur des Impftieres festzustellen. Beträgt dieselbe über 41° C., oder sind sonst Krankheitsercheinungen (mit Ausnahme von leichten Verdauungsstörungen) vorhanden, so ist das Thier von der Benutzung auszuschließen.

§ 5. Nach der Abnahme des Impfstoffes sind die Thiere zu schlachten und wiederum von einem Thierarzte zu untersuchen. Diese Untersuchung hat sich insbesondere auf den Nabel und die Nabelgefäße, das Bauch- und Brustfell, die Lunge, die Leber und die Milz zu erstrecken.

§ 6. Ueber das Ergebnis jeder Untersuchung ist von dem Thierarzte eine Bescheinigung auszustellen. Aus derselben muß mit Sicherheit zu entnehmen sein, auf welches einzelne Thier sie sich bezieht.

§ 7. Der gewonnene Impfstoff darf nur dann an die Impfarzte abgegeben werden, wenn die nach dem Schlachten des Tieres angestellte thierärztliche Untersuchung ergeben hat, daß das Thier gesund war.

II. Pflege und Ernährung der Impftiere.

§ 8. Der zur Unterbringung der Impftiere dienende Stall soll hell, trocken, leicht zu lüften, zu reinigen und zu desinfizieren sein; er muß, wo es sich um größere Impf-Anstalten handelt, mit Vorrichtungen versehen sein, welche zu jeder Jahreszeit die Herstellung einer mittleren Temperatur gestatten.

§ 9. Es ist Sorge zu tragen, daß die Pflege und Ernährung der Thiere durch besonders geeignete, gewissenhafte Personen bewirkt wird.

§ 10. Die für die Thiere bestimmte Streu soll frisch, unverdorben und anderweitig noch nicht benutzt sein. Die Impftiere selbst und ihre Stände sind mit größter Sorgfalt rein zu halten.

§ 11. Saugkälber sind mit guter, unverdünnter, erwärmter Milch, eventuell unter Zugabe von Eiern oder Mehlsuppe, zu ernähren.

III. Impfung der Thiere und Abnahme des Impfstoffes.

§ 12. Thiere, welche einen größeren Transport durchgemacht haben, sollen nicht vor Ablauf eines Tages nach ihrer Ankunft geimpft werden.

§ 13. Der für das Impfen der Thiere und der Abnahme des Impfstoffes bestimmte Raum soll hell, luftig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, in größeren Anstalten auch heizbar sein.

§ 14. Die sämtlichen bei dem Impfen und der Abnahme des Impfstoffes, sowie bei der weiteren Behandlung des letzteren in Gebrauch kommenden Instrumente,

Utenfilien zc. müssen nach Material und Gestalt gründliche Reinigung und Desinfektion leicht zulassen; sie sind von anderweitiger Benutzung ausgeschlossen, auch vor und nach jedesmaligem Gebrauche zu reinigen, beziehungsweise zu desinfizieren.

§ 15. Als Impfstelle ist zu benutzen: bei jungen Thieren die Hinterbauchgegend vom Damm bis in die Nähe des Nabels sammt dem Hodensack und der Innenfläche der Schenkel, bei älteren Thieren der Hodensack, das Euter, der Milchspiegel, sammt der Umgebung der Vulva.

§ 16. Die zur Impfung bestimmte Fläche ist zu rasiren und mit Seife und warmem Wasser gründlich zu reinigen. Danach ist sie mit einer eintausendstel Sublimatlösung oder 3% Karbolsäurelösung zu desinfizieren und schließlich mit abgekochtem Wasser abzuspülen.

§ 17. Die Impfung kann mit Stichen, kürzeren oder längeren Schnitten, sowie über kleinere oder größere Flächen ausgedehnten Skarifikationen ausgeführt werden. Größere Skarifikationsflächen sind mit isolirten Impfstellen zu umrahmen, um das Entwicklungsstadium besser beobachten zu können.

§ 18. Zur Impfung der Thiere kann benutzt werden:

- a) Menschenlymphe, und zwar aus den Schutzpocken von Erstimpflingen, unter Berücksichtigung der durch die Beschlüsse des Bundesraths vom 18. Juni 1885 für die Gewinnung dieser Lymphe erlassenen Vorschriften (Entwurf 3 §§ 5 ff.).

Lymphe von Wiedergeimpften darf nur im Nothfalle und nach sorgfältiger Prüfung des Gesundheitszustandes des Abimpflings benutzt werden, welche letztere gleichfalls gemäß den genannten Vorschriften zu erfolgen hat.

Die Menschenlymphe kann entweder

in unvermishtem Zustande, und zwar:

direkt vom Arm,

in sorgfältig verschlossenen Haarröhrchen flüssig aufbewahrt oder auf Stäbchen aufgetrocknet,

oder

gemischt mit reinstem Glycerin und auch in diesem Falle eventuell

in Haarröhrchen oder

gut verkorkten reinen Gläschen aufbewahrt,

auf das Thier übertragen werden.

- b) Thierlymphe in der gemäß dieser Instruktion zur Menschenimpfung zugelassenen Beschaffenheit.

- c) Die festen und flüssigen Bestandtheile der sogenannten natürlichen Kuhpocken.

§ 19. Die Abnahme des Impfstoffes vom Thiere soll vor dem Citrigwerden des Inhalts der Blattern und bevor sich eine erhebliche Röthe in der Umgebung derselben eingestellt hat, vorgenommen werden.

§ 20. Sorgfältige Reinigung der ganzen Impffläche mit Seife und warmem Wasser unter Entfernung aller den Blattern und ihrer Umgebung anhaftenden Borke ist der Abnahme des Impfstoffes voranzuschicken.

§ 21. Nur gut entwickelte Blattern sind zur Abnahme von Impfstoff geeignet.

Wiederholte Benutzung einer und derselben Blatter an verschiedenen Tagen ist nicht gestattet.

§ 22. Die Abnahme des Impfstoffes kann mit oder ohne Anwendung von Quetschvorrichtungen mittelst der Lancette, des scharfen Löffels oder des Spatels vorgenommen werden. Das Gewebe der Blatter ist dabei durch Schaben und Kratzen möglichst vollständig zu entfernen.

§ 23. Als Impfstoff sind sowohl die flüssigen, als auch die festen Bestandtheile der Blattern zu verwerthen, dagegen sind die Borfen ausgeschlossen.

IV. Aufbewahrung und Versendung des Impfstoffes.

§ 24. Die Versendung des aus den Blattern gewonnenen, nicht präparirten Rohmaterials zum Zwecke der Vornahme von Menschenimpfungen ist unterjagt.

§ 25. Der zur Aufbewahrung und Versendung bestimmte Impfstoff ist aus dem Gesamtmateriale der Blattern zu gewinnen.

Die Vermischung des verschiedenen Thieren an demselben Tage entnommenen Impfstoffes ist gestattet.

§ 26. Mit den zur Aufbewahrung des Impfstoffes erforderlichen Maßnahmen ist alsbald nach der Abnahme desselben vom Thiere zu beginnen.

§ 27. Der Impfstoff ist aufzubewahren:

- a) schnell getrocknet, in Form eines feinen Pulvers, oder
- b) nach sorgfältigem Verreiben in einem Mörser mit reinstem Glycerin (dessen Verdünnung mit destillirtem Wasser gestattet ist), in Form einer Masse von Extraktkonsistenz, beziehungsweise Syrupkonsistenz, oder
- c) nach Verreiben mit Glycerin und Abseihenlassen der festen Bestandtheile in Form der letzteren oder in Form der über ihnen stehenden mehr oder weniger klaren Flüssigkeit.

§ 28. Zur Aufbewahrung und Versendung des Impfstoffes sind nur reine, gut verschlossene Haarröhrchen oder sonstige Glasgefäße zu benutzen. Bei letzteren reicht der Verschluss mit einem guten Korke aus.

Alle zur Aufbewahrung dienenden Gegenstände dürfen erst nach gründlicher Reinigung und Desinfektion (am besten durch Auskochen mit Wasser) zum zweiten Male benutzt werden.

§ 29. Es empfiehlt sich, vor der Versendung des Impfstoffes behufs Prüfung seiner Wirksamkeit Probeimpfungen mit demselben vorzunehmen.

§ 30. Jeder Sendung von Impfstoff ist die Nummer des Versandtbuches (§ 32a) und eine Gebrauchsanweisung beizufügen; auch ist das Ersuchen um Berichterstattung über den Erfolg der damit vorgenommenen Impfungen auszusprechen.

Es wird anheimgegeben, sich eines der in der Anlage enthaltenen Entwürfe zu Gebrauchsanweisungen zu bedienen.

V. Listenführung.

§ 31. Ueber die Impfungen der Thiere ist ein Tagebuch zu führen, welches die nachstehenden Rubriken enthält:

- a) laufende Nummer,
- b) Rasse, Geschlecht, Farbe und Alter des Thieres,
- c) Tag der Einstellung des Thieres, der letzten Befichtigung, sowie der Abholung aus der Anstalt,
- d) Tag und Stunde des Impfens und der Abnahme des Impfstoffes,
- e) Art und Abstammung der verimpften Lymphe,
- f) Körperwärme (eventuell auch Körpergewicht) des Thieres beim Impfen und bei der Abnahme des Impfstoffes,
- g) Gesundheitszustand des Thieres bei der Einstellung und während der Entwicklung der Blattern,
- h) Beschaffenheit der inneren Organe nach dem Schlachten, soweit dieselbe durch den Thierarzt festgestellt wurde,
- i) Ergebnis der Impfung,
- k) Art der Aufbewahrung (§ 27) des gewonnenen Impfstoffes,
- l) Bemerkungen.

§ 32. Ueber den Versandt des Impfstoffes ist ein Versandtbuch zu führen, welches die nachstehenden Rubriken enthält:

- a) laufende Nummer,
- b) Name und Stand des Empfängers,
- c) Wohnort desselben,
- d) Datum des Einganges der Bestellung,
- e) Datum der Absendung,
- f) Ursprung und Alter des Impfstoffes,
- g) Art der Aufbewahrung (§ 27) des Impfstoffes,
- h) Menge des übersandten Impfstoffes,
- i) Bemerkungen (über den bei der Verimpfung seitens des Impfarztes erzielten Erfolg u. dergl.).

VI. Wissenschaftliche und praktische Untersuchungen über Thierlymphe.

§ 33. Den öffentlichen Impfanstalten liegt die Pflicht ob, wissenschaftlich und praktisch die Vaccination weiter zu fördern und dementsprechend auf dem Wege des Experiments, der klinischen Beobachtung zc. bezügliche Untersuchungen anzustellen.

Anlage zu § 30.

A. Gebrauchsanweisung für die Verimpfung der Glycerin-Thierlymphe.

Der Impfstoff ist an einem kühlen und dunkeln Orte aufzubewahren, woselbst er sich wochenlang wirksam erhält. Für den Gebrauch ist die jeweilig nöthige Menge aus den Haarröhrchen oder sonstigen Glasgefäßen auf einen reinen Objektträger oder unmittelbar auf das Impfinstrument zu entnehmen.

Die Impfung wird der Regel nach an den Oberarmen vorgenommen. Sie hat nie durch Stiche, sondern nur durch Schnitte zu geschehen, welche mindestens je 2 cm von einander entfernt angelegt werden. Bei Erstimpfungen genügen 3 bis 5 leichte

Schnitte von höchstens 1 cm Länge an jedem Arme; bei Wiederimpfungen 5 bis 8 leichte Schnitte an einem Arme.

Stärkere Blutungen sind beim Impfen zu vermeiden.

Der Impfstoff ist so, wie er vorliegt, zu verwenden, er ist sorgfältig und wiederholt in die Schnitte, welche durch Anspannen des Armes klaffend erhalten werden, einzureiben.

Das Auftragen des Impfstoffes mit dem Pinsel ist verboten.

Uebriggebliebene Mengen Impfstoff sollen nicht in das Gefäß zurückgefüllt werden.

B. Gebrauchsanweisung für die Verimpfung der pulverförmigen Thierlymphe.

Das Pulver ist in einem Exsiccator aufzubewahren. Behufs Anwendung wird es auf einer sorgfältig gereinigten Glasplatte mit chemisch reinem Glycerin oder mit reinem destillirten Wasser oder mit einer Mischung von beiden zu einem dicken Brei verrieben.

Die Impfung wird der Regel nach an den Oberarmen vorgenommen. Sie hat nie durch Stiche, sondern nur durch Schnitte zu geschehen, welche mindestens je 2 cm von einander entfernt angelegt werden. Bei Erstimpfungen genügen 3 bis 5 leichte Schnitte von höchstens 1 cm Länge an jedem Arme; bei Wiederimpfungen 5 bis 8 leichte Schnitte an einem Arme.

Stärkere Blutungen sind beim Impfen zu vermeiden.

Geringe Mengen des dickflüssigen Breies sind sorgfältig und wiederholt in die Schnitte, welche durch Anspannen des Armes klaffend erhalten werden, einzureiben.

Das Auftragen mit dem Pinsel ist verboten.

Uebriggebliebene Mengen des zu Brei verriebenen Pulvers sind zu vernichten.

Der Bundesrath erklärte sich in seiner Sitzung vom 28. April 1887 (§ 227 der Protokolle) mit dieser Anweisung einverstanden und beschloß, die Bundesregierungen zu eruchen:

1. hiernach die erforderlichen Anweisungen auf Grund des § 18 Absatz 2 des Impfgesetzes zu treffen;
2. a) zu veranlassen, daß über die Thätigkeit der Anstalten zur Gewinnung von Thierlymphe regelmäßige Jahresberichte unter hauptsächlichlicher Benutzung der im Vollzuge der §§ 31 bis 33 der Anweisung gewonnenen Materialien erstattet und dem Kaiserlichen Gesundheitsamt behufs einheitlicher Bearbeitung und zweckentsprechender Veröffentlichung mitgetheilt werden;
- b) den in den Apotheken stattfindenden Handel mit Thierlymphe einer sorgfältigen Ueberwachung unterstellen zu lassen.

Die unter 2a und 2b aufgeführten Beschlüsse sind vom Bundesrath in Folge von Anregungen gefaßt worden, welche seitens der erwähnten Sachverständigen-Kommission gegeben waren.

Damit bei Abfassung der unter 2a erwähnten Jahresberichte nach möglichst gleichmäßigen Grundätzen verfahren werde, hat der Reichskanzler am 3. October 1887 den Bundesregierungen anheimgestellt, dahin Fürsorge treffen zu wollen, daß, soweit thunlich, den Jahresberichten diejenige Anordnung des Stoffes zu Grunde gelegt werde, welche

in einer in den Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte (Bd. II S. 447) veröffentlichten Zusammenstellung: „Die Thätigkeit der Impfinstitute des Königreichs Sachsen im Jahre 1886“ benutzt worden war.

Mittlerweile sind die zur Durchführung der Impfung mit Thierlymphe erforderlichen öffentlichen Lympherzeugung-Anstalten in einer Anzahl von Bundesstaaten bereits errichtet worden, wenn auch noch nicht durchweg in einer dem Bedarf entsprechenden Zahl.

Im Königreiche Preußen bestanden zu Ende des Jahres 1887 zwar vorläufig erst 2 derartige Anstalten, nämlich je eine zu Berlin und Halle, indessen ist die Errichtung weiterer in Aussicht genommen, und zwar von einem solchen Betriebsumfange, daß jede derselben für eine oder zwei Provinzen dem vollen Bedürfnisse an thierischem Impfstoff zu genügen vermag. Bemerkenswert sei, daß nach einem Erlaß des Oberpräsidenten der Provinz Sachsen vom 1. Mai 1887 durch die Anstalt zu Halle den Bedürfnissen der genannten Provinz entsprochen ist. Der dem preussischen Landtage vorgelegte Etatsentwurf für das Jahr vom 1. April 1888/89 enthält u. a. Mehrforderungen für die Errichtung je eines Lympherzeugungs-Instituts in Königsberg i. Pr. und in Kassel. Ersteres ist bestimmt, die Provinzen Ost- und Westpreußen, letzteres, die Provinzen Hessen-Nassau und Westfalen zu versorgen. Zur Anlegung der hiernach noch fehlenden Institute sind die erforderlichen Vorbereitungen schon eingeleitet.

Im Königreiche Bayern liefert die Centralimpfanstalt zu München bereits einen großen Theil des Gesamtbedarfs an Thierlymphe für die öffentlichen Impfungen; daneben besteht eine Lokalanstalt zu Nürnberg, welche für etwa 3000 Impflinge Thierlymphe zu liefern hat.

Im Königreiche Sachsen bestehen vier große Impfinstitute zur Gewinnung des thierischen Impfstoffs, welche zusammen einen den Bedarf der Bevölkerung des Königreichs übersteigende Menge von Thierlymphe liefern und einen Theil derselben somit an Impfarzte außerhalb Sachsens abzugeben vermögen.

Im Königreiche Württemberg deckt die Stuttgarter Centralimpfanstalt den Hauptbedarf für das Land; daneben hatte das Impfinstitut zu Cannstatt bisher für 10 Oberamtsbezirke die erforderliche Thierlymphe zu liefern.

Die für das Großherzogthum Baden im Jahre 1882 gegründete Anstalt zur Gewinnung thierischen Impfstoffs, welche sich seit Februar 1887 zu Karlsruhe befindet, vermag den gesammten für die Bevölkerung des Großherzogthums erforderlichen Impfstoff abzugeben.

Im Großherzogthum Hessen hat das Impfinstitut zu Darmstadt schon seit Beginn des Jahres 1882 Kälberimpfstoff für die gesammten öffentlichen Impfungen und Wiederimpfungen des Landes geliefert.

Die Deckung des vollen Bedarfs an Thierlymphe für die Großherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz durch das Landesimpfinstitut zu Schwerin ist zum Jahre 1888 in Aussicht genommen.

Im Großherzogthum Sachsen-Weimar besteht ein staatliches Impfinstitut, welches thierischen Impfstoff nicht nur für den Bedarf im Großherzogthum liefert, sondern den-

selben auch in Gemäßheit besonderer Abkommen für die Impfungen im Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha und in den Fürstenthümern Schwarzburg-Sondershausen und Neuß ält. Linie abgiebt. Dieses Institut befindet sich in Weimar.

Im Herzogthum Anhalt besteht ein staatliches Impfinstitut zu Bernburg zur Beschaffung der erforderlichen Thierlymphe für alle im Herzogthum auszuführenden Impfungen und Wiederimpfungen; ebenso sind in den 3 freien Städten Lübeck, Bremen und Hamburg öffentliche Impfinstitute im Betriebe, welche allen in den betreffenden Staatsgebieten erforderlichen thierischen Impfstoff zu liefern vermögen.

In Elsaß-Lothringen bestehen zu Straßburg und Metz zwei Anstalten zur Erzeugung von Thierlymphe, welche den Bedarf an Impfstoff in den Reichslanden fast ausschließlich gedeckt haben.

Die im Vorstehenden nicht genannten deutschen Bundesstaaten besitzen bisher keine eigenen Anstalten zur Erzeugung thierischen Impfstoffs; den Bedarf für die öffentlichen Impfungen liefern zum Theil die Impfinstitute benachbarter deutscher Staaten. Im Besonderen beziehen die Impfarzte des Herzogthums Sachsen-Altenburg ihren Bedarf aus dem Impfinstitut zu Frankenberg im Königreiche Sachsen.

Die ausschließliche, bezw. thunlichst ausgedehnte Verwendung von Thierlymphe bei den öffentlichen Impfungen und Wiederimpfungen ist bereits in folgenden Bundesstaaten zc. angeordnet worden:

Im Großherzogthum Hessen wurden durch Ministerialverordnung vom 29. April 1882 die Impfarzte angewiesen, bei den Impfungen ausschließlich Kälberimpfstoff zu benutzen.

In Hamburg liefert seit 1884 die staatliche Impfanstalt für die öffentlichen Impfungen des Hamburger Gebiets ausschließlich animale Lympher.

In Elsaß-Lothringen wurden am 12. März 1885 die öffentlichen Impfarzte angewiesen, vom 1. April desselben Jahres an Thierlymphe aus den Landesimpfanstalten zu Straßburg und Metz zu beziehen.

Im Herzogthum Anhalt wurde unter dem 12. März 1885 die Anordnung erlassen, daß ausschließlich animale, aus dem Centralimpfinstitut zu Bernburg bezogene Lympher zur Ausführung der öffentlichen Impfungen und Wiederimpfungen zu benutzen sei.

Während des Jahres 1886 wurden entsprechende Anordnungen für das Großherzogthum Baden am 5. Februar, für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt am 29. April, für das Königreich Sachsen am 10. Mai, für das Herzogthum Sachsen-Altenburg am 14. Mai und für das Fürstenthum Neuß ält. Linie am 17. Juni erlassen. Im Königreich Sachsen und in Schwarzburg-Rudolstadt sollen die Impfarzte nach dem Wortlaute der Verordnungen, „soweit thunlich“ der Thierlymphe sich bedienen, in den übrigen genannten Staaten ist für alle öffentlichen Impfungen die Anwendung von Thierlymphe obligatorisch geworden.

In Bremen fand ebenfalls nach einer dem Gesundheitsamte zugegangenen Mittheilung im Jahre 1886 der Uebergang zum ausschließlichen Gebrauch der Thierlymphe bei den öffentlichen Impfterminen statt.

In Württemberg ist durch Ministerialerlaß vom 26. Februar 1886 die thunlichste Verwendung animaler Lympher den Impfarzten zur Pflicht gemacht worden; diese Vor-

schrift wurde in bestimmterer Form am 12. März 1887 für die Impfzeit des Jahres 1887 wiederholt.

In Bayern endlich ist die Königliche Centralimpfanstalt durch Erlaß des Königlichen Staatsministeriums des Innern vom 19. März 1886 beauftragt worden, den öffentlichen Impfarzten „behufs Einführung der Schutzpockenimpfung mit Thierlymphe“ solche unentgeltlich abzugeben. —

In welchem Umfange während des Jahres 1886 Thierlymphe bei den öffentlichen Impfungen im Deutschen Reiche zur Anwendung gekommen ist, ergibt sich aus den nachstehenden, den eingereichten Impfübersichten entnommenen Zahlen. Die betreffenden Angaben für das Jahr 1885 sind zum Vergleiche in Klammern beigefügt.

Von je 100 geimpften Kindern wurden mit Thierlymphe geimpft:

| | a) bei den Erstimpfungen | b) bei den Wiederimpfungen |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Königreich Preußen | 38,8 (23,17) | 38,0 (21,03) |
| „ Bayern | 59,9 (11,05) | 62,5 (10,21) |
| „ Sachsen | 99,0 (95,53) | 99,2 (95,43) |
| „ Württemberg*) | (47,05) | (40,39) |
| Großherzogthum Baden | 90,3 (51,84) | 99,9 (55,45) |
| „ Hessen | 96,7 (92,83) | 99,7 (98,59) |
| „ Mecklenburg-Schwerin*) | (32,19) | (29,75) |
| „ Sachsen-Weimar**) | 91,4 (44,84) | 90,6 (38,80) |
| „ Mecklenburg-Strelitz | 58,8 (37,82) | 52,3 (40,11) |
| „ Oldenburg | 53,1 (25,91) | 53,5 (17,16) |
| Herzogthum Braunschweig | 22,3 (13,68) | 19,2 (18,95) |
| „ Sachsen-Meiningen | 21,2 (5,53) | 13,7 (3,42) |
| „ Sachsen-Altenburg | 96,5 (36,69) | 97,9 (13,79) |
| „ Sachsen-Koburg-Gotha*) | (49,98) | (36,61) |
| „ Anhalt | 99,8 (98,74) | 100,0 (99,90) |
| Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen | 99,9 (38,06) | 99,9 (3,90) |
| „ Schwarzburg-Rudolstadt | 49,8 (18,78) | 35,6 (15,66) |
| „ Waldeck | 55,6 (43,07) | 57,5 (29,46) |
| „ Reuß ä. L. | 89,6 (62,69) | 100,0 (66,05) |
| „ Reuß j. L. | 47,4 (24,28) | 70,6 (15,45) |
| „ Schaumburg-Lippe | 20,3 (5,15) | 20,4 (4,12) |
| „ Lippe | 24,5 (15,99) | 10,7 (9,09) |
| Freie Stadt Lübeck | 99,6 (92,65) | 99,6 (91,93) |
| „ Bremen | 88,6 (42,80) | 97,6 (31,51) |
| „ Hamburg | 97,6 (93,75) | 95,8 (94,90) |
| Reichslande Elsaß-Lothringen | 86,1 (80,30) | 86,2 (81,87) |

*) Aus Württemberg, Mecklenburg-Schwerin und Sachsen-Koburg-Gotha sind die Berichte für das Jahr 1886 noch nicht eingegangen.

**) In 28 Impfbezirken des Großherzogthums Sachsen-Weimar wurde ausschließlich Thierlymphe verwendet, nur in 5 Impfbezirken des Landes war daneben Menschenlymphe in Gebrauch.

Die vorstehende Uebersicht läßt erkennen, daß die Impfung mit Thierlymphe in den deutschen Bundesstaaten bereits im Jahre 1886 eine beträchtliche Verbreitung gewonnen hatte.

In 11 Bundesstaaten, soweit die Angaben vorliegen, wurden im Jahre 1886 mehr als 90 % aller Impfungen mit Thierlymphe ausgeführt, in den Reichslanden etwa 86 %. Auch im Königreiche Preußen ist trotz der zur Zeit noch geringen Zahl staatlicher Anstalten zur Erzeugung thierischen Impfstoffs im Jahre 1886 bei mehr als 38 % aller Impfungen Thierlymphe verwendet worden.

Ob die oben mitgetheilten Maßregeln zur Erreichung ihres Zweckes, der Beschaffung „untadeliger“ Thierlymphe für die öffentlichen Impfungen, bereits in jeder Beziehung völlig genügen werden, läßt sich zwar im ganzen Umfange wegen der Kürze der inzwischen verstrichenen Zeit noch nicht übersehen; schon jetzt aber läßt sich erkennen, daß der Ersatz der Menschenlymphe durch die Thierlymphe schneller und mit geringeren Schwierigkeiten sich vollzieht und zum großen Theil bereits vollzogen hat, als früher vielfach angenommen wurde. Es darf in dieser Beziehung zugleich auf den oben mitgetheilten, vom Bundesrath genehmigten Beschluß der Kommission zur Berathung der Impffrage hingewiesen werden, nach welchem die allgemeine Einführung der Impfung mit Thierlymphe allmählich geschehen sollte. (Ziffer 2 der Beschlüsse, betreffend die allgemeine Einführung der Impfung mit Thierlymphe). Mit der zunehmenden Vervollkommnung der Technik in der Gewinnung der Thierlymphe und der größeren Uebung der Impfärzte in der Anwendung derselben machen sich die von manchen Seiten laut gewordenen Klagen, daß die Thierlymphe bezüglich ihrer Haltbarkeit und der Sicherheit ihrer Wirkung der Menschenlymphe nachstehe, bereits weniger bemerklich. Ueberdies ist zu berücksichtigen, daß auch bei der Verwendung von aufbewahrter Menschenlymphe bisweilen zahlreiche Impfungen erfolglos geblieben sind. Bemerkenswerth ist in Hinsicht auf den sich vollziehenden Uebergang zur Thierlymphe die Aeußerung des königlich bayerischen Central-Impfarztes Dr. Stumpf in München, am Schluß eines von demselben erstatteten Berichtes über die „Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1886“. Seine Aeußerung lautet:

„Wenn auch in Bezug auf die Durchführung der öffentlichen Schutzpockenimpfung mit Thierlymphe Manches noch zu wünschen übrig blieb, so kann doch auf das Berichtjahr, das erste Jahr der Aera der Impfung mit Thierlymphe, mit voller Befriedigung zurückgeblückt werden.“

Abgesehen von der Sicherheit der Wirkung und der genügenden Haltbarkeit muß an eine untadelige Thierlymphe die Anforderung gestellt werden, daß bei ihrer Verwendung die direkte Uebertragung anderer Krankheiten ausgeschlossen ist.

Besonderes Gewicht ist in den Verhandlungen der Kommission zur Berathung der Impffrage darauf gelegt worden, daß bei der Verwendung von Thierlymphe die Uebertragung der Syphilis mit Sicherheit auszuschließen sei. In der That ist denn auch nicht ein einziger Fall bekannt geworden, in welchem durch Thierlymphe Syphilis auf einen Impfling übertragen wäre, obgleich die mit der genannten Lymphe ausgeführten Impfungen bereits nach Millionen zählen. Unter den accidentellen Wund-

krankheiten kommt in erster Linie das Erysipelas, die sogenannte Wundrose oder der Rothlauf, in Betracht. Wie von jeder kleinen Wunde, so kann diese Krankheit, zumal bei unreinlichem oder sonst ungeeignetem Verhalten, mechanischen Reizungen der Impfstellen u. dgl., gelegentlich auch von einer Impfwunde ihren Ausgang nehmen, ohne daß deswegen die zur Impfung benutzte Lymphe ein Vorwurf trifft. Dasselbe gilt von anderen accidentellen Wundkrankheiten.

Betreffs der im Jahre 1886 mit der Thierlymphe in Bayern gemachten Erfahrungen schreibt der Central-Impfarzt Dr. Stumpf in dem bereits erwähnten Berichte: „Wo es zum wirklichen Impfrothlauf kam, da war es in einigen Fällen möglich, eine ganz bestimmte Ursache nachzuweisen. Unter den Ursachen von Impfrothlauf steht in erster Reihe die nachweisbare Uebertragung von einem anderen Erysipel. So wurde ein Impfling im Amtsbezirke Miesbach von Rothlauf befallen, welcher von einer Frau gepflegt wurde, die selbst an einem Fußgeschwüre und Rothlauf litt.“ — Nicht selten wird in den Berichten über die mit Thierlymphe ausgeführten Impfungen über stärkere Rötungen und entzündliche Erscheinungen in der Umgebung der Impfstellen berichtet, welche indeß mit dem Wunderysipel nichts gemein haben und als eine Theilercheinung der Impfwirkung betrachtet werden müssen. Bezüglich dieser Fälle heißt es in dem Berichte des Dr. Stumpf: „Alle diese Fälle von stärkerer Reaction bis zur entzündlichen Infiltration und erysipelatösen Form gingen bald unter den geeigneten Maaßnahmen, bald auch ohne diese in normaler Zeit zurück.“

Eine besondere Erwähnung erfordert an dieser Stelle ein aus dem Jahre 1887 bekannt gewordenes Vorkommniß, über welches in den „Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes“ Jahrgang 1888 S. 33 ff. ein eingehender Bericht erstattet worden ist. Während der vorjährigen Impfperiode (1887) sind nämlich in mehreren Theilen Preußens zahlreiche Kinder nach der Verimpfung von Thierlymphe in ähnlicher Weise an Hautausschlägen erkrankt, wie solche im Jahre 1885 nach der Verimpfung von Menschenlymphe auf der Insel Rügen beobachtet*) und auch gelegentlich der Verhandlungen der Petitionskommission des Reichstages am 23. März 1886 zur Sprache gekommen sind.***) In beiden Fällen haben sich die zunächst bei einer größeren Zahl von Impflingen aufgetretenen Hautausschläge durch Ansteckung auf nicht geimpfte Personen weiter verbreitet. Die Thierlymphe, durch welche die im Jahre 1887 beobachteten Erkrankungen verursacht worden sind, stammte aus dem Privat-Lymphgewinnungs-Institut des Dr. Frohe in Elberfeld. Auf welche Ursachen die abnorme Beschaffenheit der Lymphe zurückzuführen ist, hat nicht ermittelt werden können.

Aus dem Königreich Sachsen, wo im Jahre 1886 99% der ausgeführten Impfungen mit Thierlymphe vollzogen worden sind, wird über den Verlauf des öffentlichen Impfgeschäfts in dem genannten Jahre ausdrücklich mitgetheilt, daß krankhafte Störungen bei den Impflingen weniger häufig zu Tage getreten seien als in früheren Jahren. Auch sonst gewinnt man aus den seitens der Bundesregierungen zum großen Theil bereits

*) Vgl. Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 1885 II S. 272 ff. und S. 316 ff.

***) Reichstags-Drucksache Nr. 313 II. Session (1885/86) 6. Legislatur-Periode.

eingesandten Mittheilungen über den Verlauf des Impfgeschäftes im Jahre 1886 den Eindruck, daß Impfschädigungen bei der Verwendung von Thierlymphe in geringerem Maße hervorgetreten sind, als es früher bei Verwendung von Menschenlymphe der Fall gewesen ist. Wie an dieser Stelle bemerkt sei, wird übrigens über die in den einzelnen Bundesstaaten bekannt gewordenen Impfschädigungen gelegentlich der Mittheilungen über die Ergebnisse des Impfgeschäftes im Deutschen Reiche in den „Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte“ ausführlich berichtet.*)

*) Vgl. Bd. I S. 77 ff., sowie Bd. II S. 67 ff. und 298 ff.

Additional material from *Beiträge zur Beurteilung des Nutzens der Schutzpockenimpfung*, ISBN 978-3-662-39229-4, is available at <http://extras.springer.com>



Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Die
neueren Arzneimittel.

Für Apotheker, Aerzte und Drogisten

bearbeitet von

Dr. Bernhard Fischer,

Assistent am Pharmakologischen Institut der Universität Berlin.

Mit in den Text gedruckten Holzschnitten.

Zweite vermehrte Auflage.

Preis gebunden in Leinwand M. 5,—.

Die
Ohnmacht bei der Geburt
vom gerichtsarztlichen Standpunkt.

Eine Abhandlung für Aerzte und praktische Juristen

von

Dr. Moritz Freyer,

Kreisphysikus in Darkehmen.

Preis M. 7,—.

Generalbericht über das Medizinal- und Sanitäts-Wesen

des Regierungs-Bezirks Danzig

in den Jahren 1883—1885.

Von

Dr. Zeuschner,

Königl. Regierungs- und Medizinal-Rath.

Auf Anordnung Sr. Excellenz, des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zum Druck bestimmt.

Preis M. 2,—.

Die Mikrophotographie

auf Bromsilbergelatine bei natürlichem und künstlichem Lichte

unter ganz besonderer

Berücksichtigung des Kalklichtes.

Von

Dr. Paul Jeserich,

vereidigter Chemiker der Königl. Gerichte und der Königl. Haupt-Steuer-Ämter zu Berlin.

Mit 60 Holzschnitten und 4 Tafeln in Lichtdruck.

Preis eleg. geb. M. 7,—.

Die Verunreinigung der Gewässer,

deren schädliche Folgen, nebst Mitteln zur Reinigung der Schmutzwässer.

Mit dem Ehrenpreis Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen gekrönte Arbeit.

Von

Prof. Dr. J. König,

Vorsteher der agric.-chem. Versuchsstation Münster in Westf.

Mit zahlreichen Abbildungen im Text und 10 lithographirten Tafeln.

Preis M. 20,—.

Ueber die diätetisch-mechanische
Behandlung der Kreislaufs-Störungen.

Von

Dr. Max Oertel,

Professor an der Universität zu München.

Sonderabdruck aus „Therapeutische Monatshefte“ 1887.

Preis M. 1,—.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.