

**VERORDNUNGSBUCH UND
DIÄTETISCHER LEITFADEN
FÜR ZUCKERKRANKE**

VON

C. VON NOORDEN UND S. JSAAC

**VERORDNUNGSBUCH
UND DIÄTETISCHER LEITFADEN
FÜR ZUCKERKRANKE
MIT 149 KOCHVORSCHRIFTEN**

**ZUM GEBRAUCHE FÜR ÄRZTE
UND PATIENTEN**

VON

PROFESSOR DR. CARL VON NOORDEN

UND

PROFESSOR DR. S. ISAAC

IN FRANKFURT AM MAIN



SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG GMBH

1923

**ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER ÜBERSETZUNG
IN FREMDE SPRACHEN, VORBEHALTEN.
COPYRIGHT 1923 BY SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG
URSPRÜNGLICH ERSCIENEN BEI JULIUS SPRINGER IN BERLIN 1923**

ISBN 978-3-662-28007-2 ISBN 978-3-662-29515-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-29515-1

Vorwort.

Das vorliegende kleine Buch ist hervorgegangen aus einem Verordnungshefte, das C. v. Noorden und E. Lampé vor nahezu 30 Jahren als Manuskript drucken ließen und an die Patienten der im Jahre 1895 gegründeten und gemeinsam geführten Privatklinik zu verteilen pflegten. Die wesentlichen Stücke desselben waren schon in der früher erschienenen 1. Auflage der v. Noordenschen Monographie „Zuckerkrankheit und ihre Behandlung“ enthalten. Entsprechend den Veränderungen, welche die allgemeinen diätetischen Vorschriften in späteren 6 Auflagen dieser Monographie erfuhren, wurden auch in den späteren Auflagen des Verordnungsheftes Abänderungen vorgenommen.

Nachdem E. Lampé vor einem Jahre aus der ärztlichen Leitung der „Privatklinik für Zuckerkrankte und für diätetische Kuren, Frankfurt a. M., Schifferstraße 78 von Dr. E. Lampé und Professor C. v. Noorden, G. m. b. H.“ ausgetreten war, folgten die beiden jetzigen Leiter der Anstalt der sich stets erneuernden Bitte von Ärzten und Patienten, das Verordnungsbuch im Buchhandel erscheinen zu lassen. Dafür mußte das früher nur zu persönlichem Gebrauche der Verfasser bestimmte Buch gründlich umgearbeitet und erweitert werden. Wir erfüllen eine angenehme Pflicht, wenn wir dabei der fördernden Mitarbeit E. Lampés an den früheren Auflagen und, in bezug auf die Kochvorschriften der grundlegenden Mitarbeit Frau E. Lampés dankbar gedenken. Weiterhin gebührt unser Dank Frau Geheimrat Carl (Herta) v. Noorden, die in 13jähriger Tätigkeit als Oberschwester am Wiener Cottage-Sanatorium und in unserer Frankfurter Privatklinik, im regsten Verkehr mit den Patienten, die praktische Durchführbarkeit der ärztlichen Kostvorschriften kritisch erprobte, zu praktischen Änderungen allgemeiner und besonderer Vorschriften Anregung gab und so durch Rat

und Tat außerordentlich viel zur Entwicklung und zum Ausbau der Kostformen für Zuckerkrankte und andere Kranke beitrug.

Das vorliegende Buch beschäftigt sich ausschließlich mit der Kost der Zuckerkranken. Den grundlegenden Tabellen folgen Erläuterungen zu denselben und Ratschläge über ihre Verwendung. Wir nahmen ferner eine größere Zahl verschiedener „Kostformen“ auf, welche wir selbst verwenden und welche großenteils auf C. v. Noorden zurückzuführen sind, teils aber auch von anderen stammen. Es sei ausdrücklich betont, daß es keine Kostform gibt, die für alle Zuckerkranken paßt, und daß je nach Lage der Dinge auch im Einzelfalle bald zu dieser, bald zu jener Kostform gegriffen werden muß¹⁾. Eine Darstellung der einzelnen Kostformen stets zur Hand zu haben, ist für Arzt und Patient gleich wichtig. Es folgen dann zahlreiche Kochvorschriften (vgl. hierüber das auf S. 71 Gesagte).

Das Buch wendet sich an Ärzte und Patienten, eine immerhin ungewöhnliche Form. Sie ist aber hier berechtigt. Denn das Buch ist in keiner Weise so gedacht und abgefaßt, daß es ohne begleitende und ergänzende ärztliche Verordnung brauchbar wäre. Im Gegenteil müssen wir das für höchst bedenklich erklären. Nur der Arzt kann für den einzelnen Kranken und für den jeweiligen Zeitpunkt im Verlaufe des Einzelfalles die zutreffende Kostform auswählen und bestimmen. Wenn er dies aber getan hat, wird das vorliegende Buch ihm bei den Kostvorschriften, die er zu erteilen hat, eine große Hilfe sein; es wird Wesentliches zur Verständigung mit dem Patienten beitragen.

In dem ursprünglichen Ordnungshefte befanden sich am Schlusse einige leere Seiten, auf welche die Sonderverordnungen für den Einzelfall eingetragen wurden, und welche fast bei jedem Patienten — der Natur der Sache entsprechend — andere waren. Sie schrieben vor, wie der Einzelkranke die Nahrungsmittel auswählen und in welcher Menge er sie verwenden solle. Dies hat sich außerordentlich gut bewährt. Deshalb ist dies auch hier beibehalten worden.

¹⁾ Vergl. hierzu: C. v. Noorden, Die hausärztliche Behandlung der Zuckerkrankheit. Berlin 1923 (Verlag von Julius Springer) und „Jetziger Stand der Diabetestherapie“. Wiesbaden-München 1923 (Verlag von J. F. Bergmann).

Für die Angaben über die Zusammensetzung der Nahrungsmittel, insbesondere ihren Gehalt an Kohlenhydraten, benützten wir — wo nichts anderes vermerkt — die ausgezeichneten Tabellen von Schall-Heisler. Sie geben nicht die Zusammensetzung der Rohstoffe, sondern deren Gehalt an ausnützbarer Substanz an. Obwohl wir diese Form der Berechnung grundsätzlich nicht für richtig halten, weil die Ausnutzungsgröße keine konstante Größe ist, sondern stark von der Zubereitung der Speisen abhängt, ist sie doch für den vorliegenden Zweck sehr brauchbar. Denn gerade in bezug auf den wichtigsten Bestandteil, die Kohlenhydrate, fallen wirklicher Gehalt und Ausnutzungsgröße nahezu zusammen. (Vgl. S. 27.)

Wir hoffen, mit diesem kleinen Buche einem praktischen Bedürfnis entgegengekommen zu sein. Es stützt sich auf die Erfahrungen bei mehr als 20 000, im Laufe von 28 Jahren klinisch behandelten Zuckerkranken.

C. v. Noorden,

S. Isaac,

Frankfurt a. M., Privatklinik, Schifferstr. 78.

11. Mai 1923.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
I. Gruppierung der Nahrungsmittel	1
A. Tabelle I = Hauptkost A	2
Kohlenhydratfreie bzw. kohlenhydratarme Nah- rungsmittel	2
B. Tabelle II = Hauptkost B	8
Zusammenstellung einiger fettreicher Speisen aus der Hauptkost	8
C. Tabelle III = Nebenkost A	10
Äquivalententabelle der Kohlenhydratträger	10
D. Tabelle IV = Nebenkost B	16
Volumäquivalente einiger Nahrungsmittel und Gerichte	16
II. Ergänzungen und Erläuterungen zu den vorstehenden Tabellen	19
A. Fleisch	19
B. Innere Teile der Tiere	19
C. Wurstwaren	20
D. Fische, Schaltiere	21
E. Suppen	22
a) Fleischbrühe	22
b) Knochenbrühe	22
c) Gemüsebouillon	22
d) Mehlhaltige Suppen	23
F. Tunken	24
G. Gemüse	25
H. Salate	29
I. Obstfrüchte	29
a) Rohes Obst	29
b) Kochobst	30
c) Dörrobst	31
d) Eingemachtes Obst	31

	Seite
K. Käse	33
L. Mehl und Mehlersatz	33
M. Brot und Brotersatz	36
a) Gebäcke ohne Mehl	36
b) Gebäcke mit verhältnismäßig wenig Mehl	37
c) Luftbrote	39
N. Kartoffeln, Topinambur, Stachys	41
O. Milch und Rahm	43
1. Milch	43
2. Kefir	43
3. von Noordens Rahmgemenge	43
4. Boumas zuckerfreie Fettmilch	44
5. Soyama-Milch	44
6. Entzuckerte Milch	44
7. Milchkuren	44
8. Rahm	44
P. Verschiedene Getränke	45
1. Wasser	45
2. Kaffee und Tee	45
3. Reiner Kakao	45
4. Limonaden	46
5. Weine	46
6. Branntweine	46
7. Biere	46
Q. Tabak	48
R. Süßspeisen	48
III. Über die Anordnung der Mahlzeiten	49
A. Anordnung der strengen Diät (Hauptkost)	49
B. Über Verteilung der Nebenkost	50
IV. Über verschiedene Kostformen	52
A. Gewöhnliche strenge Diät	52
B. Halbe Fleischkost	54
C. Entfettungskost bei Zuckerkranken (Diabetiker- Banting-Kost)	56
D. Speisezettel bei Probekost, zugleich Beispiel für strenge Diät mit Zulagen	58
E. Gemüsetag mit Eiern	59
F. Eiertag mit Gemüsezulagen	60
G. Gemüsetag mit Eidottern (verschärfter Gemüsetag)	60
H. Petróns Gemüse-Fettkost	61
I. Fettarme, knappe Gemüsekost	61

VIII

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
K. Hungertage	62
L. Kohlenhydrattage	62
1. Normale Hafertage	62
2. Gemüsezulagen	63
3. Andere Mehle als Haferersatz	63
4. Mischung anderer Kohlenhydratträger	64
5. Obsttage und Reisobsttage	64
6. Milchtage	65
7. Anordnung der Haferkuren um ihrer Abarten	65
8. Die Faltasche Mehlfrüchtekost	66
M. Lakto-vegetabile Entfettungskost bei Zuckerkranken	68
V. Vorschriften für Sammlung des Urins	70
VI. Vergleichende Maße und Gewichte	70
VII. Kochvorschriften	71
A. Suppen	72
B. Tunken	76
C. Vorspeisen und andere kleine Gerichte	81
D. Süßspeisen ohne Mehl	90
E. Verschiedenes	101
F. Gerichte mit Kohlenhydraten	103
VIII. Bezugsquellen	111

I. Gruppierung der Nahrungsmittel.

Wir teilen die Nahrungsstoffe für die Zwecke des Diabetikers in folgende leicht übersichtliche Gruppen ein:

I. Hauptkost = kohlenhydratfreie bzw. kohlenhydratarme Nahrungsmittel.

Zu ihr rechnen wir alle Nahrungsmittel und die aus ihnen bereiteten Speisen und Getränke, die entweder gar keine Zucker- und Mehlstoffe enthalten oder nur sehr unbedeutende Mengen davon; ferner solche, die zwar prozentual reich an Kohlenhydraten sind, aber nur in geringen Mengen verzehrt zu werden pflegen. Praktisch genommen, sind sie daher nicht als Kohlenhydratträger zu betrachten. Von den Hauptnährstoffen enthalten sie vorwiegend Eiweißkörper und Fette. Diese Kost entspricht dem, was man als „strenge kohlenhydratfreie Diabetikerkost“ bezeichnet. Vielen Diabetikern kann man beliebige Mengen der als Hauptkost bezeichneten Nahrungsmittel gestatten. In vielen anderen Fällen ist aber auch die Beschränkung von Eiweißkörpern oder Fett oder gewisser Eiweißträger, z. B. des Fleisches, geboten. Dann ist auch die erlaubte Menge und Art der als Hauptkost bezeichneten Nahrungsmittel vom Arzte genau anzugeben.

II. Nebenkost = Kohlenhydratträger.

Wir rechnen dazu alle Nahrungsmittel, die Zucker oder Mehl in beachtenswerten Mengen enthalten. Menge und Art der Nebenkost wechseln von Fall zu Fall außerordentlich stark, und auch im einzelnen Falle ist bald mehr, bald weniger Nebenkost zu gestatten.

Unter Kohlenhydraten verstehen wir in diesem Buche nur Zucker und solche Stoffe, die im Körper in Zucker übergeführt werden wie Stärke, Glykogen, Inulin. Die im Körper keinen echten Zucker bildenden Stoffe wie Cellulose, Hemi-

cellulose, Pentosane sind — soweit die vorliegenden Analysen sie abzusondern gestatten — als belanglos nicht mitberechnet. Vgl. hierzu S. 25.

A. Tabelle I = Hauptkost A. Kohlenhydratfreie bzw. kohlenhydratarme Nahrungsmittel.

Diese Tabelle enthält das Verzeichnis von Speisen, die jeder Diabetiker essen darf, falls nicht besondere Vorschrift Einschränkungen verlangt. Solche Einschränkungen können sich z. B. beziehen auf Gesamtnahrungsstoffe (Caloriengehalt), Menge des Fettes, Menge des Fleisches und überhaupt aller eiweißreichen Nahrungsmittel, Gehalt der Nahrung an Gewürzstoffen, Menge der alkoholischen Getränke, Menge des Salzes, des Wassers usw.

Frisches Fleisch: Die Muskelteile aller der menschlichen Ernährung dienenden Säugetiere und Vögel, gebraten, gekocht, geröstet, mit eigenem Saft, mit Butter oder anderen Fetten, mit mehlfreier Mayonnaise und anderen Tunken ohne Mehl, warm oder kalt.

Innere Teile der Tiere: Zunge, Herz, Lunge, Gekröse, Hirn, Kalbsmilcher, Nieren, Knochenmark. — Leber von Kalb, Wild und Geflügel beschränkt (vgl. S. 19). Dagegen ist die aus der Leber von Mastgänsen bereitete Gänseleberpastete so gut wie kohlenhydratfrei.

Äußere Teile der Tiere: Füße, Ohren, Schnauze, Schwanz aller eßbaren Tiere.

Fleischkonserven: Getrocknetes Fleisch, Rauchfleisch, Schinken, geräucherte und gesalzene Zunge, Pökelfleisch, Corned beef, eingemachtes Fleischmus, brot- und mehlfreie Würste (vgl. S. 20), Sülze, Ochsenmaulsalat.

Bei Pökelfleisch aller Art ist zu beachten, daß die käufliche Ware häufig mit Zuckerzusatz zur Pökelbrühe hergestellt ist. Man geht daher sicherer, sich kleinere Fleischstücke, Kasseler Rippenspeer, Schweinshaxen u. dgl. im eigenen Haushalte zuckerfrei pökeln zu lassen. Bei größeren Fleischstücken, z. B. Schinken, ist diese Vorsicht unnötig.

Frische Fische: Sämtliche frischen Fische aus See- und Süßwasser; gekocht, gebraten, am Grill geröstet oder irgendwie mit mehlfreien Beigaben bereitet.

Fischkonserven: Getrocknete Fische (Stockfisch usw.), gepökelte Fische (wie Matjesheringe u. dgl.), geräucherte Fische (Bücklinge, Sprott, Flunder, Aal, Lachs, Stör u. dgl.), eingemachte Fische in Büchsen (wie Salm, marinierte Heringe, Sardellen, Anchovis, Neunauge u. dgl., Sardinen, kleine Makrelen, kleine Forellen, Tunfisch u. dgl.).

Fischprodukte: Kaviar, Rogen, Fischmilcher, Lebertran.

Muscheln und Krustentiere: Austern, Miesmuscheln und andere Muscheln, Hummer, Langusten, Krebse, Krevetten, Schildkröte, Krabben usw.

Gemästete Austern können prozentual ziemlich viel Glykogen enthalten. (Bis 8%, gewöhnlich nicht mehr als 5—6%.) Wenn nicht mehr als $\frac{1}{2}$ —2 Dutzend Austern mittlerer Größe verzehrt werden, so fällt dieser Glykogengehalt des Austernfleisches praktisch nicht ins Gewicht.

Tierische Eiweißpräparate: Eucasin, Casein, Nutrose, Plasmon, Sanatogen, Tropon und ähnliches.

Pflanzliche Eiweißpräparate: Aleuronat, Lecithineiweiß (Fabrik Dr. Klopfer in Dresden), auch Glidine genannt, Roborat. Ferner Nährhefe, Getreidekeime (Materna).

Sowohl Hefe wie Getreidekeimpulver (Materna) sind nicht frei von Kohlenhydraten. Ihre Menge kommt aber praktisch nicht in Betracht, angesichts der verhältnismäßig kleinen Mengen, die von diesen Stoffen genommen werden (von Hefe ca. 10 g, von Materna ca. 20 g am Tage), und angesichts ihres hohen Gehaltes an Eiweißbausteinen bzw. sogenannten Vitaminen. Die an Nucleoproteiden sehr reiche Hefe hat einen ziemlich starken, das Weizenkeimpulver Materna einen auffallend geringen Einfluß auf die Zuckerbildung. Bei Genuß größerer Mengen müßte ihr Kohlenhydratgehalt in Anrechnung kommen (S. 11).

Albumosen und Peptone: Riba, Somatose, Wittepepton, Merckpepton.

Tierische Fleischextrakte: In fester und flüssiger Form, Liebig's Fleischextrakt und ähnliches.

Von Fleischextrakten aller Art, ebenso von Albumosen und Peptonen tierischer Herkunft mache man möglichst geringen Gebrauch. Sie enthalten alle starke Reizkörper für die Zuckerbildung. Fleischextrakt wirkt in dieser Hinsicht ungleich stärker als gute frisch bereitete Fleischbrühe, die von den in Frage kommenden Reizkörpern nur wenig enthält.

Pflanzliche Extrakte: Maggi's Suppenwürze, Cenovisextrakt aus Hefe, Extrakte und Würzen der Fabrik Dr. L. Naumann in Dresden und ähnl.

Cenovisextrakt wird aus Hefe bereitet. Nach vielfachem Ausprobieren ziehen wir ihn für küchentechnische Zwecke an unserer Klinik allen anderen Extrakten vor: wir benützen ihn nicht etwa als „Fleischextraktersatz“,

sondern bewerten ihn für die Kost in Krankenanstalten und auch geschmacklich für Gesunde höher als Fleischextrakt.

Sülsen: Aus Fleisch, Kalbsfüßen, Fischen, Gelatine, Agar-Agar (die Kohlenhydrate des letzteren sind vorzugsweise Hemicellulosen ohne wesentlichen Einfluß auf die Zuckerbildung).

Präparierte Fleisch- und Fischtunken: Die bekannten englischen oder nach englischem Muster hergestellten pikanten Tunken: Beefsteak, Harvey, Worcester, Anchovis, Lobster, Shrimps, India Soy, China Soy usw. dürfen in üblichen kleinen Mengen zugesetzt werden, wenn dies nicht aus besonderen Gründen ausdrücklich verboten wird.

Eier: Von Vögeln, roh oder beliebig — aber ohne Mehlzusatz — zubereitet.

Fischeier: Rogen, Kaviar.

Fette: Tierischer oder pflanzlicher Herkunft, wie Butter, Speck, Schmalz, Bratenfett, Gänsefett, Olivenöl, Sesamöl, Salatöl, Margarine, Cocosbutter, Palmin, Laureol und Lebertran.

Rahm: Von gutem, fettreichem Rahm, süß oder sauer, ist im Sinne dieser Tabelle täglich $\frac{1}{8}$ l (125 g) bis $\frac{1}{5}$ l (200 g) gestattet, wenn nicht besondere ärztliche Vorschrift anderes festlegt. Über Rahm vgl. S. 44.

Milch: Es gibt einige, dem Bedarf von Zuckerkranken angepaßte Milchpräparate. Da der Milchzucker entfernt bzw. beim Aufbau des Präparates nicht beigelegt wurde, weicht der Geschmack natürlich von dem der Naturmilch ab, ist aber zufriedenstellend. (Vgl. S. 43 ff.)

Käse: Käse jeder Art, vor allem der sogenannte Rahmkäse, in der Regel jedoch nicht mehr als 50 g am Tage. Insbesondere sei auf die Bedeutung des zerriebenen Parmesankäses zum Binden von Suppen und Gemüsen hingewiesen. (Vgl. S. 34.) Auch jeder andere ältere Hartkäse ist zum Verreiben geeignet.

Frische Vegetabilien: Salate: Kopfsalat, krause und glatte Endivien, römischer Salat, Kresse, Löwenzahn, Portulak, Feldsalat, rote Rüben, Sellerie. (Vgl. S. 29.)

Gewürzkräuter: Petersilie, Estragon, Dill, Borratsch, Pimpinelle, Minzenkraut, Lauch, Sellerieblätter.

Gemüsefrüchte: Gurken, Speisekürbis, Tomaten, grüne Bohnen mit jungem Kern, Markfrucht (Vegetable Marrow),

Melanzane, Suchette, Eierfrucht (Aubergine), Bamié, Paprikaschoten.

Knollen: Zwiebel in kleinen Mengen, oberirdische Kohlrabis (solange sie noch grün sind), Radieschen, Rettich, Meerrettich — in leichten Fällen auch die inulinhaltigen Erdartischocken (Topinambur) und Stachys, Sellerie in mäßigen Mengen (S. 29).

Stengel: Weißer und grüner Spargel, Rübstiel, Hopfen spitzen, Brüsseler Cichorie, englischer Bleichsellerie (ohne die Knollen), junge Rhabarberstengel, Porree, Schnittlauch.

Blüten: Blumenkohl, Broccoli, Rosenkohl, Artischocken.

Blattgemüse: Spinat, Sauerampfer, Krauskohl, Wirsing, Weißkohl, Rotkohl, Butterkohl, Savoyer Kohl, Mangold.

Pilze: Frische Champignons, Steinpilze, Eierpilze u. dgl., Morcheln, Trüffeln, in der üblichen Menge.

Gemüsekonserven: Eingemachte Spargel, Haricots verts, eingemachte Schneide- und Prinzeßbohnen, junge Wachsbohnenschoten, Salzgurken, Mixed Pickles, Essiggurken, Pfeffergurken, Sauerkraut, eingelegte Oliven, Champignons und andere eingemachte Vegetabilien aus den oben erwähnten Gruppen.

Nüsse: In folgenden Mengen: 10 Walnüsse oder 20 Haselnüsse oder 20 Mandeln oder 10 Paranüsse oder 20 Erdnüsse oder eine Hand voll Pistazien (für einen Tag berechnet). Vgl. S. 14.

Obst: Von den zu Kompotts benutzten Vegetabilien sind Preiselbeeren, junge Rhabarberstengel, unreife Stachelbeeren mit Saccharin angerichtet höchst zuckerarm. Vergorene Obstsäfte ohne Zuckerzusatz sind fast zuckerfrei. Über Obst S. 29 ff. Rezepte S. 103.

Gewürze: Salz, weißer und schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Paprika, Zimt, Nelken, Muskat, englischer Senf, Safran, Anis, Kümmel, Lorbeer, Kapern, Essig, Citrone. — Gewürzextrakte, namentlich auch Gewürzessenzen, wie sie z. B. in reicher Auswahl von der Fabrik Dr. L. Naumann in Dresden-Plauen hergestellt werden. — Menge und Art der Gewürze sind oft mit Rücksicht auf die Nieren oder auf andere Organe wesentlich zu beschränken.

Suppen: Vgl. S. 22 ff.

Süße Speisen: Vgl. S. 48.

Getränke: 1. Allgemeines. In der Regel darf der Arzt es dem Zuckerkranken überlassen, wieviel Trinkwasser, gewöhnliches Mineraltafelwasser und andere hier zu erwähnende Getränke er nehmen will. In anderen Fällen muß der Arzt Menge und Auswahl der Getränke genau vorschreiben (z. B. bei gleichzeitigen Herz-, Gefäß-, Nierenleiden), häufiger im Sinne der Beschränkung als der Vermehrung. Bei eingeschränkter Flüssigkeitszufuhr muß die Kost kochsalzarm sein.

2. Von den Mineralwässern sind im allgemeinen solche mit sehr geringem Kochsalzgehalt vorzuziehen. Bei der Eigenart seiner Kost und seinem starken Bedürfnis nach Würzung der Speisen nimmt der Zuckerkranke ganz automatisch sehr viel (oft zu viel) Natrium und Chlor in den Körper auf; es ist unzweckmäßig, dies durch den Genuß kochsalzreicher Mineralwässer zu begünstigen.

Kochsalzarm (bis ca. 1 p. M.) sind u. a. folgende Quellwässer: Wernarzer, Großkarbener Selzer, Lippspringer, Teinacher Hirsch, Wildunger Georg-Viktor und Helenen, Apollinaris, Fachinger, Gerolsteiner, Gieshübler, Salzbrunn-Oberbrunner und Kronenquelle, Vichy Celestin, Crondorfer, Biliner.

Natriumbicarbonat findet sich im Gerolsteiner, Gieshübler, Crondorfer, Neuenahrer, Oberselters, Rhenser zwischen 1 und 1,3 p. M.; in Emser Kränchen, Namedy-Sprudel, Salzbrunner-Oberbrunnen zwischen 2 und 2,5 p. M.; im Fachinger Wasser 4—5 p. M.

Das wichtige Calciumbicarbonat herrscht vor (ca. 1 bis 1,4 p. M.) im Eyachsprudel, im Geismarer Wasser, im Göppinger Sauerbrunnen, im hessischen Römerbrunnen, in der Teinacher Hirschquelle, in der Wildunger Helenenquelle. Es ist auch im Fachinger, Gerolsteiner und Namedy-Wasser stark vertreten.

Leider gibt es kein natürliches chlor- und natriumfreies Mineralwasser und keines, das Kalisalze in brauchbaren Mengen enthält. Die Kost des Diabetikers ist oft allzu kaliumarm. Daher ließen wir in der Frankfurter Hirschapotheke ein künstliches, wohlschmeckendes Mineralwasser herstellen, das kein Chlor und neben je 1 p. M. Natrium bicarbonicum, Calcium carbonicum, Magnesia carbonica, 6 p. M. Kaliumbicarbonat enthält. Es ist unter dem Namen „Omalkan-

Wasser“ bereits seit etwa 10 Jahren im Gebrauch und hat sich gut bewährt.

3. Tee ohne Zucker (nach Belieben mit Saccharin gesüßt); vgl. S. 45.

4. Kaffee ohne Zucker (nach Belieben mit Saccharin gesüßt); vgl. S. 45.

5. Kakao, nur reines Kakaopulver (Van Houten, Stollwerck, Reichardt); vgl. S. 12; oder noch besser unentfettete Kakaomasse kommt in Frage. Im Sinne dieser Tabelle gestatten wir in der Regel von ersterem 15 g, von letzterer 20 g zu freiem Gebrauche bei strenger Kost. Näheres S. 46, Rezept Nr. 120.

6. Limonaden aus zuckerfreiem Material (vgl. S. 46).

7. Weine: Stille gut abgelagerte Flaschenweine, weiß und rot, oder offene Faßweine, ferner gut vergorene Obstweine (vgl. S. 46).

8. Schaumweine: Zuckerfreie Schaumweine, die vor dem Kriege reichlich erhältlich waren, sind zur Zeit nicht im Handel (S. 47).

9. Branntweine: Gute Sorten von Kirschwasser, Kornbranntwein, Steinhäger, Zwetschgengeist, gute deutsche Branntweine nach Kognakart. Von ausländischen Marken: Arrak, Kognak, Rum, Whisky, Wodki. Für alle alkoholischen Getränke ist die Menge vom Arzt vorzuschreiben. Liköre (gesüßte Branntweine) müssen ganz vermieden werden.

Süßstoffe: Saccharin oder besser Krystalsaccharin: Beide sind in den in Betracht kommenden Mengen unschädlich. Dies ist vielfach verbreiteter Meinung entgegen ausdrücklich zu betonen. Man soll Saccharin nie längere Zeit der Siedehitze aussetzen. Hierüber und über Gebrauchsvorschriften S. 71.

Immerhin ist es ratsam, daß der Diabetiker Speisen und Getränke so schwach wie möglich mit Saccharin süßt; stärkeres Süßen erzeugt fast immer beim einen früher, beim anderen später, wegen langdauernden süßen Nachgeschmackes Widerwillen gegen Saccharin, und das verstärkt die technischen Schwierigkeiten der Diabetikerküche.

Für Fruchtkonserven, Fruchtsäfte und Gebäcke eignet sich besser Dulcin. Die in Betracht kommenden Mengen sind ganz unschädlich. Leider ist Dulcin schwer erhältlich und bedauerlicherweise wird das Süßen von Handelsware mit Dulcin von der Gesetzgebung beanstandet.

B. Tabelle II = Hauptkost B.

Zusammenstellung einiger fettreicher Speisen aus der Hauptkost.

Diese Tabelle enthält ein Verzeichnis von Speisen, welche bei hohem Fettgehalt und Nährwert gänzlich oder annähernd frei von Kohlenhydraten sind. Sie sind empfehlenswert, wenn Zunahme des Gewichtes erwünscht ist. Ob und wann dies im Einzelfalle zutrifft, hat der Arzt zu entscheiden. Da einerseits der teilweise hohe Eiweißgehalt der Speisen, andererseits der Zustand der Verdauungsorgane gleichfalls Berücksichtigung heischen, unterstehen auch Auswahl und Menge dem Urteil des Arztes.

Fette: Butter, Speck, Schmalz, Gänsefett, Bratenfett, Öle aller Art, Lebertran.

Milchpräparate: Rahm guter Qualität, Käse aller Art, besonders die verschiedenen Sorten von Rahmkäse.

Fleischspeisen: Der Nährwert der Fleischspeisen steigt mit ihrem Fettgehalt. Fettdurchwachsenes Schweinefleisch und Hammelfleisch haben daher einen höheren Nährwert als mageres Ochsenfleisch und Kalbfleisch.

Wurst und Räucherware: Die aus Schweinefleisch hergestellten Waren stehen an Nährwert voran. Bei Fleischmischungen, z. B. bei Wurstwaren, ist der Nährwert um so höher, je mehr Schweinefleisch in der Mischung vorherrscht.

Fische: Unter den Fischen haben Flußaal und Salm, ferner Matjesheringe, Kieler Sprott, geräucherter Aal, Lachs und Makrele den höchsten Nährwert.

Eier: Alle Eier sind von hohem Nährwert, besonders das Eigelb, welches etwa siebenmal so nahrhaft ist, wie gleiche Gewichtsteile Eierklar.

Zu den nahrhaften Eiern ist auch der Kaviar zu rechnen.

Die folgende Tabelle erläutert Gehalt an Eiweiß, Fett und Calorienwert für je 100 g eßbarer, verdaulicher Substanz. Es sind hier die Zahlen der Schall-Heislerschen Tabellen wiedergegeben (vom Rahm eigne Analysen = *):

Tabelle II = Hauptkost B.

100 g enthalten	Eiweiß	Fett	Kohlen- hydrate	Calo- rien
Lebertran	—	97	—	920
Pflanzenöle	—	97	—	905
Schweineschmalz	0,2	95	—	885
Margarine	0,5	84,5	0,4	790
Kuhbutter	0,7	81,2	0,5	761
Knochenmark	2,8	83,6	—	791
Speck, gebraten	10,7	79	—	795
Speck, geräuchert und gesalzen . . .	8,7	69	—	686
Eidotter	15,5	29,5	0,3	351
Eidotter, getrocknet	32,3	49,0	5,6	634
Rahmkäse	19,5	31,5	0,7	606
Sehr fetter Rahm)	3,0	30	3,0	304
Mittel fetter Rahm)	3,5	20	3,5	215
Gervais	13,5	38,2	0,2	421
Emmentaler Käse	28,0	26,9	1,5	419
Holländer „	26,9	23,9	2,9	363
Tilsiter „	24,6	25,3	—	391
Schweizerkäse	22,3	29,5	5,0	403
Schweinefleisch (roh, im Mittel) . .	17,7	15,3	—	228
Schweinefleisch, roh, fett	14,1	35,4	—	398
Schweinefleisch, gebraten, im Mittel .	24,2	23,6	—	337
Schinken, geräuchert, fett	24,1	34,6	—	439
„ gekocht, im Mittel	23,6	16,4	—	266
„ „ fett	23,5	24,7	—	343
Hammelfleisch, gebraten, im Mittel .	24,2	10,5	—	215
„ fett	24,3	21,5	—	318
Rindfleisch, gekocht, im Mittel . .	30,8	12,3	—	282
„ „ sehr fett	25,4	33,2	—	532
Gänsefleisch, gebraten, mittel . . .	19,0	48,7	—	545
„ mäßig fett	15,8	34,4	—	396
„ fett	22,2	63,0	—	692
Gänsebrust (pommersche)	20,9	29,9	—	384
Frankfurter Würstchen	12,2	37,1	2,5	414
Leberwurst, beste Sorte	14,3	32,7	2,4	383
Mettwurst (weich)	18,5	38,8	—	450
Salamiwurst	27,1	46,0	—	559
Zerelatwurst	23,3	43,6	—	518
Gänseleberpastete	14,1	31,9	2,6	376
Pökelhering	18,3	15,4	1,5	238
Lachs, geräuchert	23,5	10,8	0,4	215
Makrele (frisch)	18,4	8,0	—	164
Kieler Sprott	22,0	14,5	—	245
Ölsardine	25,1	10,3	0,2	218
Aal	11,9	25,0	—	290

C. Tabelle III = Nebenkost A.

Äquivalententabelle der Kohlenhydratträger.

Diese Tabelle führt Nahrungsmittel auf, welche reich an Kohlenhydraten sind. Einige davon sind schon in Tabelle I erwähnt, weil sie in üblichen kleineren Mengen genossen, nicht als Kohlenhydratträger zu berechnen sind, wohl aber bei reichlichem Genusse. Da sehr häufig neben dem Kohlenhydratgehalte auch der Eiweiß-, Fett- und Calorigehalt berücksichtigt werden muß, sind diese Werte gleichfalls mitverzeichnet. Nur da, wo Eiweiß- und Fettgehalt ganz belanglos sind (z. B. bei Obstsaften), sind die betreffenden Zahlen fortgelassen.

Die letzte, wichtigste Säule der Tabelle verzeichnet, wieviel Gramm der Substanz ebensoviel Kohlenhydrat enthalten wie 20 g Normalweißbrötchen. Zugrunde gelegt ist der Gehalt scharfgebackener kleiner Brötchen nach Art der „Berliner Knüppel“. Ihr Gehalt an Kohlenhydrat betrug in Friedenszeit 60%, in 20 g Gebäck also = 12 g.

Der Tabelle liegt der Gedanke zugrunde, daß dem Diabetiker eine bestimmte Menge Weißbrötchen zugestanden wird, und daß er sich nun nach freier Wahl und um sich Abwechslung zu verschaffen, nach Maßgabe dieser Tabelle andere Kohlenhydratträger aussuchen darf; dies freilich nur unter der Voraussetzung, daß nicht ärztliches Gebot wegen zu hohen Eiweißgehaltes oder wegen Schonungsbedürftigkeit des Magens, des Darms, der Nieren und anderer Organe die Auswahl beschränkt.

Langjährige Erfahrung lehrte, daß es für den Diabetiker leicht ist, auf Grund einiger Wägungen, wozu jede bis ca. 300 g anzeigende Briefwaage genügt, sich darüber zu vergewissern, welches Volum Brot, Früchte, Milch u. a. dem erlaubten Gewichte entspricht. Bei einigem Verständnis für Maß und Gewicht sind Wägungen daher nur solange nötig, bis sich der Patient in die Kost eingelebt hat, oder wenn er zu solchen Nahrungsmitteln der Tabelle III greift, die er nur selten benützt und über deren Gewichts- und Maßverhältnisse er daher keine rechte Vorstellung hat.

Bei der Zubereitung von Speisen aus Rohmaterialien der Tabelle III muß natürlich die Küche verantwortlich das Abwägen und Abmessen übernehmen. Wir teilen später eine Anzahl Rezepte mit (S. 103), die auf ein bestimmtes Weißbrötchenäquivalent eingestellt sind.

Ein schematisches Beispiel für die Anwendung der Tabelle III findet sich auf S. 51.

In 100 g sind enthalten:	Eiweiß	Fett	Kohlenhydrate	Calorien	20 g Weißbrot entsprechen g
Mehle					
Weizenmehl, feinstes	8,6	0,8	73,6	344	16
Weizenmehl (im Mittel), Roggenmehl, Maismehl, Gerstengraupen, Gerstenmehl, Grünkernmehl, Buchweizengrütze u. -mehl (alle annähernd gleich) im Durchschnitt	7,6	1,2	70,0	326	17
Kochreis	5,9	0,3	74,7	330	16
Stärkemehle (Weizen, Reis, Mais, Kartoffel, Sago, Tapioka, Arrowroot), annähernd gleich, im Mittel.	0,8	—	81,0	328	15
Hafergrütze	11,6	3,5	63,4	342	19
Hafermehl	13,3	2,8	64,2	346	18
Haferflocken	12,7	2,8	58,0	320	21
Haferkakao (Cassel)	14,3	6,2	46,4	313	26
Materna (Getreidekeime)	34,5	9,0	47,2	440	25
Makkaroni, Nudeln	8,8	0,4	72,5	336	16
Kastanienmehl	2,4	1,4	72,0	312	16
Bananenmehl	3,0	1,4	76,0	321	16
Diabetikermehle S. 33					
Gebäcke					
Gewöhnliche Handelsgebäcke					
Berliner Knüppel	5,7	1,0	60,0	277	20
Wasserwecken	6,1	0,4	51,1	239	23
Milchbrötchen	7,0	0,4	56,5	265	21
Weißbrot, fein	5,5	0,4	55,6	253	21
Panierbrösel	7,2	0,5	69,8	319	17
Graham-Weizenbrot	5,8	0,4	44,0	208	27

In 100 g sind enthalten	Eiweiß	Fett	Kohlenhydrate	Calcien	20 g Weißbrot entsprechen g
Roggenbrot	4,7	0,6	47,9	220	25
Pumpernickel	4,3	0,6	41,8	194	29
Simonsbrot	6,0	0,9	50,0	238	24
Sanitasbrot	4,6	0,6	37,4	176	32
Steinmetzbrot.	9,5	0,4	42,9	221	28
Knäckebröt (schwedisch).	8,0	0,6	56,3	270	21
Weizenwieback (feiner)	10,1	3,3	70,5	362	17
Haferwieback	6,9	7,3	62,0	349	20
Diabetikergebäcke S. 36ff.					
Kakao					
Kakao, gewöhnlicher	8,5	26,7	32,8	423	37
Kakao, rein, schwach entfettet	22,5	27,0	15,9	423	77
Kakao, rein, stark entfettet	26,8	13,3	20,1	326	60
Kakaomasse, unentfettet	14,2	53,0	10,6	594	112
Milch (für Diabetiker S. 43 ff.)					
Kuhmilch	3,2	3,5	4,8	67	250
Dünnere Rahm (10% fett); cf. S. 44	3,4	10,0	4,8	130	250
Magermilch	3,0	0,8	4,8	41	250
Buttermilch	3,6	0,9	3,8	42	316
Saure Milch; cf. S. 43.	3,2	3,3	3,4	60	353
Saurer Rahm (mittelfett).	3,9	21,5	2,8	230	428
Ya-Urt (Joghurt) im Mittel	3,3	2,8	3,5	57	343
„ (eingedickt)	6,2	5,1	8,6	112	140
Kondensmilch (ungezuckert).	10,4	10,8	13,7	206	90
Trocken-Vollmilch (Krause)	26,3	25,9	36,7	500	35
Trocken-Magermilch (Krause)	36,1	1,5	49,8	366	24
Kartoffeln und ähnl.					
Kartoffeln, roh, cf. S. 41	1,5	0,1	20,0	88	60
„ gekocht	1,6	0,1	20,5	91	60
Topinambur, cf. S. 42					
Stachysknollen, cf. S. 42					
Hülsenfrüchte					
Erbsen, trocken.	17,0	0,6	45,8	271	26
Linsen, trocken	18,2	0,6	44,6	272	27
Weißer Bohnen, trocken	25,3	1,7	48,3	318	25

In 100 g sind enthalten	Eiweiß	Fett	Kohlenhydrate	Calorien	20 g Weißbrot entsprechen g
Gemüse					
Erbsen, frisch	4,7	0,3	10,4	68	115
„ eingemacht	2,6	0,1	7,1	42	170
Grüne Schnittbohnen, frisch	2,0	0,1	5,5	32	218
„ „ eingemacht	0,8	—	2,2	13	545
Salatbohnen, eingemacht . .	3,7	0,1	9,0	56	133
Puff- (Dicke) Bohnen, frisch	3,9	0,2	6,2	45	194
Schwarzwurzel, geschält . .	0,7	0,3	12,4	56	97
Gelbe Rüben, groß	0,9	0,2	8,7	41	138
Karotten, klein	0,8	0,1	6,9	32	174
Rote Rübe, frisch	1,1	0,1	7,0	34	170
„ „ als Salat S. 29					
Kohlrübe, weiß	1,0	0,1	6,3	32	192
Steckrübe	0,9	0,1	5,9	29	200
Kerbelrübe	3,0	0,2	26,7	123	42
Teltower Rübe	2,5	0,1	9,5	51	126
Kohlrabi, jung	2,1	0,1	6,9	39	174
Sellerieknollen (S. 29) . . .	1,1	0,2	9,9	47	120
Bleichsellerie	1,2	0,1	3,9	22	300

Frisches Obst, eßbare Teile¹⁾ (cf. von Noorden-Salomon, S. 569).

	Kohlenhydrat in 100 g	Calorien in 100 g	Es entsprechen 20 g Weißbrötchen g
Äpfel	8,9	52	135
Birnen	8,6	49	140
Mispel	10,6	67	115
Quitte	7,2	34	165
Orange	5,6	48	220
Zitrone	0,4	43	3000
Weintraube	15,0	72	80
Erdbeere	6,2	43	195
Heidelbeere	5,3	33	225
Himbeere	4,3	31	340
Brombeere	5,7	34	220

¹⁾ 100 g Äpfel, Birnen, Steinobst eßbare-Teile entsprechen etwa 115 g Vollfrucht. Wenn z. B. 40 g Weißbrötchen in Sauerkirschen angelegt werden sollen, sind nicht 300 g, sondern 345 g Vollfrucht abzuwiegen.

	Kohlenhydrate in 100 g	Calorien in 100 g	Es entsprechen 20 g Weißbrötchen g
Maulbeere	9,2	54	130
Stachelbeere	7,9	41	150
„ unreif	2,3	11	500
Johannisbeere	6,4	40	190
Preißelbeere	1,5	24	800
Feige, frisch	15,5	66	77
Banane (Fleisch)	16,2	71	75
Ananas	11,5	47	100
Zwetschge	7,8	49	155
Pflaume	8,8	57	135
Reineclaude	10,6	55	115
Mirabelle	9,4	53	125
Pfirsich	8,1	43	145
Aprikose	6,7	39	180
Süßkirsche	9,4	51	125
Sauerkirsche	8,0	46	150

In 100 g sind enthalten	Eiweiß	Fett	Kohlenhydrat	Calorien	20g Weißbrot entsprechen g
Trockenobst.					
Äpfel	1,1	—	56,5	231	21
Birnen	1,6	—	57,5	237	21
Aprikosen, entsteint	2,7	—	36,2	158	33
Zwetschgen, ganz	1,5	—	48,3	200	25
„ entsteint	1,8	—	57,7	240	21
Datteln, ganz	1,2	—	57,7	236	21
Feigen	2,7	—	56,3	238	21
Nüsse und ähnl.					
Erdnüsse, enthülst	19,3	40,0	13,2	518	90
Haselnüsse „	12,2	56,3	6,1	607	200
Kokosnußfleisch	6,2	60,3	10,5	633	110
Mandeln, enthülst	15,0	47,8	11,2	562	105
Paranüsse „	10,8	61,0	3,2	633	375
Walnüsse „	11,7	52,6	11,0	590	105
Maronen „	4,3	3,7	33,5	189	36

Reine Obstsäfte. (Mittelwerte; Zusammensetzung sehr wechselnd.)

	Gesamt- zucker %	Calorien in 100 g	Es entsprechen 20 g Weiß- brötchen ccm
Himbeeren, rot	6,0	29	200
Süßkirschen	11,4	50	105
Sauerkirschen	10,0	41	120
Preißelbeeren	7,2	34	165
Brombeeren	6,7	33	180
Äpfel	11,8	51	100
Erdbeeren	4,8	22	250
Heidelbeeren	5,3	25	225
Johannisbeeren	6,9	36	170

Biere.

	Alkohol	Zucker %	Calo- rien %	Es entsprechen 20 g Weiß- brötchen ccm
Schankbier	3,4	4,3	45	280
Lagerbier	3,7	4,2	48	280
Exportbier	4,3	5,0	56	240
Bockbier	4,6	6,9	66	170
Pilsener Urquell	3,6	4,6	46	260
Berliner Weißbier	2,8	4,0	41	300
Kwaß	1,6	1,5	24	800
Leipziger Gose	2,6	0,3	27	4000
Grätzer Bitterbier	3,4	2,5	25	460
Ale	5,0	2,6	61	460
Porter	4,9	5,2	74	230
Lichtenhainer	2,4	2,6	28	460

Zuckerhaltige Weine (von Noorden-Salomon, S. 739).

	Alkohol %	Zucker %	Ca- lorien in $\frac{1}{10}$ l	20 g Weiß- brot ent- halten
Pfälzer Auslesen	7,6	4,6	82	260
Rheingau Auslesen	8,6	6,3	97	190
Tokaier Essenz	6,5	25,6	163	45
„ Ausbruch	11,2	9,0	127	135
„ Herb	12,4	—	101	beliebig

	Alkohol %	Zucker %	Ca- lorien in $\frac{1}{10}$ l	20 g Weiß- brot ent- halten
Wermutwein	10,1	10,0	119	120
Malaga	12,6	18,3	172	65
Madeira	14,4	3,0	122	400
Sherry, herb	16,1	2,4	129	500
Portwein	16,2	6,0	146	200
Schaumwein, süß	9,5	11,0	116	110
„ mittelsüß	10,4	4,0	95	300
„ herb (trocken)	10,4	0,5	83	2400
Obstschaumweine	5,6	5,0	70	240
Stachelbeerwein, gesüßt	10,7	9,8	130	120
Heidelbeerwein, gesüßt	7,9	8,0	91	150

D. Tabelle IV = Nebenkost B. Volumäquivalente einiger Nahrungsmittel und Gerichte.

Während die zustehenden Mengen vieler Nahrungsmittel der Tabelle III, z. B. von Gebäcken, Obst, Milch u. a., bei einiger Übung leicht abzuschätzen sind (S. 10), ist dies bei den meisten von der Küche gelieferten, genußfertigen Gerichten auf Grund der dort gemachten Angaben über Zusammensetzung und Kohlenhydratwert nicht der Fall. Es ist auch nicht jedem Diabetiker möglich, sich kohlenhydrathaltige Extragerichte von abgemessenem Äquivalentwerte herstellen zu lassen. Er ist vielmehr oft genötigt, kohlenhydrathaltige Gerichte der häuslichen oder Gasthofsküche zu genießen. Daß er dies tut, ist sowohl aus psychischen wie aus wirtschaftlichen Gründen ratsam.

Dem praktischen Bedürfnis entsprechend lassen wir hier Angaben über Maß- und Gewichtsverhältnisse nebst Weißbrötchenwert einiger wichtiger, häufig wiederkehrender genußfertiger Gerichte folgen. Bei den Angaben über Eßlöffelwerte ist zu berücksichtigen, daß wir für einen Eßlöffel den Rauminhalt von 20 ccm (= 20 g) Wasser annehmen.

Ein gestrichener Eßlöffel entspricht dann ca. 20 g Speise
 „ flach gehäufter Eßlöffel „ „ ca. 30 g „
 „ gehäufter Eßlöffel „ „ ca. 50 g „

Natürlich sind dies nur Annäherungswerte; sie genügen aber dem praktischen Bedürfnis. Ein hochgetürmter Eßlöffel könnte bis zu 60 g Speise und mehr aufnehmen.

Wer über den Eßlöffelwert besonderer Gerichte, die er liebt und öfters nehmen will, genauen Aufschluß haben will, geht am besten in folgender Weise vor. Aus den sämtlichen Bestandteilen, die zur Herstellung des Gerichtes, z. B. eines Reis-Milchbreies, nötig sind, wird nach Tabelle III der Kohlenhydratgehalt (oder bequemer der Weißbrötchenwert) berechnet. Die Summe entspricht dem Weißbrötchenwert des Gesamtgerichtes. Es wird dann gemessen, wieviel Eßlöffel bestimmter Häufung das Gesamtgericht darstellt. Der Weißbrötchenwert des Gesamtgerichtes, dividiert durch die Zahl der Eßlöffel, ergibt dann den Weißbrötchenwert eines gleichgehäuften Eßlöffels der in gleicher Weise zubereiteten Gerichte.

Kartoffel. Eine Kartoffel (oder Kartoffelstück), gekochte (gekocht, geschmort, leicht angebraten)

von Nußgröße	25 g =	8 g Weißbrötchenwert (= WBW)
„ Hühnereigröße	60 g =	20 g „
„ Gänseeigröße	90 g =	30 g „

Zwei mäßig gehäuften Eßlöffel Kartoffelspeise (Brei, Salat, in kleinen Stücken oder Scheiben gebraten, französische Bratkartoffel) (60 g) = 20 g Weißbrötchenwert.

Bei den folgenden Wertangaben sind zur Kontrolle die Gewichte der von uns in Betracht gezogenen Volummengen (1, 2, 3 usw. Eßlöffel voll) mitangegeben. Bei der Berechnung sind ferner nur die — gemäß eigener Analysen — für den Zuckerhaushalt in Betracht kommenden Kohlenhydrate berücksichtigt (vgl. S. 25) und ferner die Verluste in Abzug gebracht, welche nach unseren küchenchemischen Experimenten bei der Zubereitung (Kochen) entstehen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist es erklärlich, daß die statthaften Gewichts- bzw. Volummengen größer sind, als sie bei Berechnung nach Tabelle III sein würden.

Im folgenden sind die Mengen (Eßlöffel) tischfertiger Speisen angegeben, welche statt 20 g Weißbrot genommen werden können.

Gemüse.

- 2 mäßig gehäuften Eßlöffel Kartoffelspeise (Brei, Salat, in kleinen Stücken oder Scheiben gebraten, französische Bratkartoffel) (60 g).
- 2 mäßig gehäuften Eßlöffel von Kastanien-(Maronen-)mus (60 g).
- 1 stark gehäufter Eßlöffel Gemüse aus trockenen Erbsen, Linsen, Bohnen (40 g).
- 5 mäßig gehäuften Eßlöffel Gemüse aus unreifen, grünen Puffbohnen (200 g).

- 5 mäßig gehäufte Eßlöffel Gemüse aus feinen grünen Erbsen (200 g).
 5 mäßig gehäufte Eßlöffel Gemüse aus Schwarzwurzel und Möhren (300 g).

Bei diesen Gemüsen wird vorausgesetzt, daß das Kochwasser entfernt ist.

Dünne Suppen

(ca. 15% Trockensubstanz, davon 5% Fett).

- 10 Eßlöffel Suppe aus trockenen oder grünen Erbsen (150 g).
 10 Eßlöffel dünne Suppe aus Linsen (150 g).
 10 Eßlöffel dünne Suppe aus Bohnen (150 g).
 8 Eßlöffel Suppe aus Haferflocken (120 g).
 7 Eßlöffel Suppe aus Gerste (140 g).
 5 Eßlöffel Suppe aus Grünkern (120 g).
 6 Eßlöffel Suppe aus Reis (120 g).
 10 Eßlöffel Suppe aus Weizengrieß (150 g).

Dicke Suppen

(ca. 30% Trockensubstanz, davon 10% Fett).

- 5 Eßlöffel Suppe aus trockenen oder grünen Erbsen (80 g).
 3 Eßlöffel Suppe aus Linsen (90 g).
 4 Eßlöffel Suppe aus Bohnen (70 g).
 4 Eßlöffel Suppe aus Haferflocken (60 g).
 4 Eßlöffel Suppe aus Gerste (70 g).
 3 Eßlöffel Suppe aus Grünkern (90 g).
 3 Eßlöffel Suppe aus Reis (60 g).
 5 Eßlöffel Suppe aus Weizengrieß (80 g).

Breie

(ca. 30% Trockensubstanz, ohne Fett bereitet).

- 1 gehäufter Eßlöffel Erbsenbrei (50 g).
 2 gestrichene Eßlöffel Linsenbrei (40 g).
 1 gestrichener Eßlöffel Bohnenbrei (25 g).
 1 gehäufter Eßlöffel Brei aus grünen Erbsen (50 g).
 1 gehäufter Eßlöffel Reisbrei (50 g).

Obst.

- Walderdbeeren 5 Eßlöffel.
 Himbeeren 8 Eßlöffel.
 Brombeeren 6 Eßlöffel.
 Johannisbeeren 5 Eßlöffel.
 Heidelbeeren 6 Eßlöffel.
 Gekochtes Obst (ohne Zucker zubereitet, Saft beiseite gelassen) 3 Eßlöffel
 (150 g).
 Diabetikerkompott von Otto Krumm 5 gehäufte Eßlöffel (250 g).

II. Ergänzungen und Erläuterungen zu den vorhergehenden Tabellen.

A. Fleisch (Allgemeines).

Wenn auch alle Fleischarten in beliebiger mehlfreier Zubereitung bei gewöhnlicher strenger Diät erlaubt sind, so ist es doch in zahlreichen Fällen nötig, die Fleischmenge zu begrenzen, entweder dauernd oder nur vorübergehend. Wir unterscheiden volle Fleischkost mit beliebigen Mengen und beschränkte Fleischkost (S. 54).

B. Innere Teile der Tiere.

Gewisse Komplikationen (Gicht und andere Formen der harnsauren Diathese, Nierenkrankheiten, Hautkrankheiten u. a.) können, wegen hohen Gehaltes an harnsäurebildenden Purinkörpern, den Ausschluß des Genusses von inneren Teilen der Tiere notwendig machen. Dies pflegt in entsprechendem Falle vom Arzt ausdrücklich angegeben zu werden. Unterscheidung von weißem und dunklem Fleische ist bei Zuckerkranken belanglos.

a) **Zunge** wird als Fleisch berechnet und kann in entsprechenden Mengen genossen werden, z. B. gesalzen, geräuchert, als Ragout mit mehlfreien Tunken zubereitet. Gute Büchsenzunge ist gleichwertig.

b) **Leber** der gewöhnlichen Schlachttiere ist nur in kleinen Mengen erlaubt, weil in der Leber Kohlenhydrate (Glykogen) vorkommen. Man rechne 70 g Leber statt 100 g Fleisch. Die fetten Lebern gemästeter Tiere enthalten fast gar kein Kohlenhydrat. Zubereitung der Leber: gedämpft, mit mehlfreien Tunken oder gebraten, oder als Zutat zu Fleischklößen.

c) **Nieren, Kalbsmilcher (Kalbsries), Hirn** werden wie Fleisch berechnet.

Zubereitung: gekocht, gebacken, als Ragout.

d) **Lunge** beliebig als Haschee mit mehlfreier Tunke.

e) **Füße** beliebig zur Bereitung von Aspik u. dgl. (auch käufliche Gelatine darf verwendet werden).

C. Wurstwaren.

Diese sind wegen ihres hohen Fettgehaltes sehr wertvolle Nahrungsmittel und bringen eine reiche Abwechslung in den Kostzettel. Früher war Wurst ein etwas bedenkliches Nahrungsmittel für Diabetiker, da den Wurstwaren unkontrollierbare Mengen von Mehl und Brot zugesetzt wurden. Das ist jetzt durch Gesetz in Deutschland verboten. Nur für einzelne, frisch zu verbrauchende Wurstarten, die aber nur lokalen Umsatz haben und als mehhlaltig besonders gekennzeichnet werden müssen, sind Ausnahmen zulässig.

Folgende Arten kommen für Zuckerkrankte hauptsächlich in Betracht: Zervelatwurst, Knackwurst, Frankfurter Siedewurstchen, Regensburger Bratwürstchen, Mettwurst, Schinken-, Zungen- und Blutspeckwurst.

Leberwürste sind in gleichem Umfange wie andere Fleischausdauerware erlaubt. Die fetten Lebern gemästeter Tiere, die bei guter Ware als Rohstoff dienen, sind sehr arm an zuckerbildenden Stoffen. In noch höherem Maße gilt dies von den Lebern der Fettgänse, woraus die teuren Gänseleber-, Trüffel-, Sardellenwürste und Pasteten hergestellt werden.

Vor dem Genusse käuflicher Pasteten wurden Zuckerkrankte früher stets gewarnt. Brot- und Mehlnzusatz kam sehr oft vor. Gesetzlicher Kontrolle, wie bei Wurstwaren, unterliegen Pasteten nach dieser Richtung nicht. Vor dem Kriege untersuchten wir zahlreiche, trefflich mundende, zum Brot- und Luftbrotbestrich gut geeignete Fleischpasteten deutscher und italienischer Herkunft, die sich als völlig mehlfrei erwiesen. Was aus der Nachkriegszeit untersucht wurde, war aber nicht mehlfrei, zum Teil sogar sehr mehlfreich. Angesichts dieser Unsicherheit werden Pasteten besser aus einwandfreiem Material (Fleisch beliebiger Tierarten mit etwa 20% Zusatz von Leber: Speck, Gewürzen) nach bekannten Vorschriften allgemeiner Kochbücher zu Hause hergestellt. In Büchsen oder Konservengläsern gut sterilisiert, werden sie zu handlicher Dauerware. Gute Gänseleberpastete ist stets mehlfrei.

Ein aus England stammendes Rezept für ausgezeichnete, streichbare Fleischpastete („Potted meat“), nach Sterilisieren dauernd haltbar, findet sich im Anhang (Rezept Nr. 59).

D. Fische, Schaltiere.

Starkes Heranziehen von Fischen statt Fleisch ist empfehlenswert. Wenn die Zufuhr eiweißreicher Nahrungsmittel beschränkt werden soll, berechne man 125 bis 150 Teile Fisch = 100 g Fleisch, beides zubereitet gewogen.

Ob kleine Fische (Sardinen, Sardellen, Sprotten, Anchovis), welche nur in kleinen Mengen verzehrt zu werden pflegen, als Fleisch mitberechnet werden sollen, entscheidet der Arzt.

Bei manchen Zuckerkranken ist aber die genaueste Einstellung der Eiweißzufuhr nötig, und dann ist auch der Fischfleischwert der kleinen Fische zu berücksichtigen. Nach J. König liefern 100 g ganzer Fische an eßbaren Teilen:

Aal, geräuchert	53 g
Hering (frisch geräuchert)	63 „
Kieler Sprott, geräuchert.	58 „
Makrele, geräuchert	65 „
Flunder „	48 „
Gesalzener Hering	68 „
Sardellen	82 „
Brathering in Essig	62 „
Neunaugen, gebraten, eingelegt	75 „
Sardinen in Öl	75—82 „
Aal in Gelee	52 „
Hering, geräuchert, Kopf abgeschnitten (eigene Wägung).	75 „

Die Zubereitung der Fische ist eine sehr mannigfaltige: entweder in Salzwasser abgekocht oder mit den üblichen Gewürzen (mit zerlassener Butter, mit brauner Butter, mit Sardellenbutter, Anchovisbutter, Krebsbutter, Rahmsauce) serviert oder in schwimmendem Fett gebraten oder am Grill geröstet oder gespickt oder gedämpft. Als Zutaten dienen außer Butter noch geröstete Petersilie mit Citronensaft, mehlfreie Mayonnaise, Rahmsauce, Tomatenpüree, präparierte englische Fischsaucen in kleinen Mengen. Fischreste werden, soweit sie sich dazu eignen, kalt mit gerührter oder gewürzter Butter genossen, oder mit Essig und Öl als Salat oder mit starker Fleischbrühe, Gewürz und Parmesankäse in Muscheln gebacken oder mit Butter, Speck, Sauerkraut und Parmesankäse im Ofen gebacken. An die Stelle von Fischen können auch Schaltiere wie Hummer, Langousten, Krebse, Krabben, Krevettes treten. Man kann sich sowohl der frischen, wie auch der in Büchsen käuflichen Konserven bedienen (Rezept 42).

E. Suppen.

Die Grundformen mehlfreier Suppen sind Fleisch- oder Knochenbrühe und, wenn man sich nur pflanzlichen Materials bedienen will, die Gemüsesuppen.

a) **Fleischbrühe** kann aus dem Fleisch der verschiedensten Tiere hergestellt werden; gewöhnlich dient dazu Ochsen-, Kalb-, Hammel- oder Hühnerfleisch. Wo der Preis keine Rolle spielt, kommen auch Ochsenchwanz, Schildkrötenfleisch, Krebse, Hummer u. ähnl. in Betracht. Schwache Brühen können nach Bedarf durch Fleischextrakt, Maggi's Suppenwürze, Cenovisextrakt (siehe unten) verstärkt und geschmacklich gehoben werden.

b) **Knochenbrühe** ist in vielen Fällen vorzuziehen, weil sie weniger Reizkörper enthält, deren Häufung man bei Zuckerkranken vermeiden sollte.

Teils um den Nährwert zu erhöhen, teils um dem Gaumen eine gewisse Abwechslung zu bieten, können der Fleisch- und Knochenbrühe die verschiedensten Einlagen beigegeben werden: Suppengrün wie Sellerieblätter, Petersilie, Kerbel; gekochte oder geröstete Zwiebel, einige Stückchen Sellerieknollen, Petersilienwurzel oder Porree. Auch Gemüse aus Tabelle I können beliebig als Einlage dienen, wie z. B. Blumenkohl, Spargel, geschnittene Blätter von Wirsing, Spinat, Salat, Sauerampfer, ferner Tomaten. Wenn das beizufügende Gemüse in der Fleischbrühe weich gekocht und dann mit ihr durch ein Sieb getrieben wird, entstehen gleichmäßig dicke, musartige Suppen, die eine willkommene Abwechslung ermöglichen. Sie vertragen reiches Beschicken mit Butter. Ferner können als Einlagen beigelegt werden: Eier in verschiedener Form, Fleischstückchen aller Art, kleingeschnittene Kalbsniere, Stückchen von Kalbs- oder Geflügelleber, Ochsenchwanz, Schildkrötenfleisch, Krebschwänze, Hummer, kleine Klößchen aus Kalbsleber, Mark und Parmesankäse. (Verschiedene Rezepte S. 72 ff.)

c) **Reine Gemüsesuppen (Gemüsebouillon)** werden am besten nicht aus einem einzigen, sondern aus einer Mischung verschiedener Gemüse hergestellt: Eine Blätterkohllart (Wirsing, Spinat, Weißkraut, Mangold, Rosenkohl), Salatblätter (Lattich oder Endivien), Zichorienstengel und -blätter, Spargelspitzen, Tomato. Von eigentlichen Gewürzgemüsen wird Lauch,

Porree, Petersilie, Pimpernelle, Sellerieblätter, Sauerampfer, Kerbelgrün hinzugefügt, entweder nur eines davon oder mehrere gemischt. Den Geschmack hebt man wesentlich durch Hinzufügen scharf mit Butter gerösteter Zwiebeln oder kleiner Stücke von Mohrrüben; das hierin enthaltene Kohlenhydrat wird durch die Rösthitze karamelisiert und dadurch unwirksam gemacht. Einen fleischbrüheähnlichen Geschmack erhält die Suppe durch Beigabe von Cenovisextrakt (aus Hefe gewonnen). Will man diesen Suppen eine gewisse Bindung geben, so kann man am Schlusse des Kochens Eidotter oder dicken sauren Rahm eintropfen und einrühren. Auch Käse (namentlich Parmesankäse, Nutrose, Caseinpräparat) und Klopfers Lecithineiweiß (Weizenkleber) haben eine gewisse bindende Kraft. **Rezept für Gemüsebouillon Nr. 18.**

Es ist unnötig, diese Gemüsesuppen durch ein Sieb zu schlagen. Auf die Dauer werden sie lieber undurchgeschlagen genommen. Schmelzende Fette vertragen sie nur in kleineren Mengen, weil sich das Fett schnell an der Oberfläche sammelt und dann oft Widerwillen erregt. Sehr geeignet sind dagegen Scheiben von rohem oder kurz gekochtem Knochenmark. **Rezept Nr. 18.**

Wenn die Gemüsebouillon häufig auf dem Tische des Zuckerkranken wiederkehren soll, nehme man auf möglichste Abwechslung bei Auswahl der Rohstoffe Bedacht. Im Gegensatz zur Fleischbrühe erzeugt das stete Einerlei gleichen Gemüsegeschmackes sehr leicht Widerwillen.

Die Gemüsebouillon soll mit möglichst wenig Wasser angesetzt werden und in bedecktem Topfe bei schwachem Feuer 3—4 Stunden lang kochen. Gesalzt wird entweder gar nicht, und man überläßt das Salzen dem Patienten oder man salzt erst am Schluß des Kochens. (Rezept Nr. 18).

d) Mehlhaltige Suppen: Über den Gebrauch und die Berechnung mehlhaltiger Suppen wurde schon kurz berichtet (S. 18). Es ist hier aber noch einiges hinzuzufügen.

Bei „dünnflüssigen“ Suppen ist vorausgesetzt, daß auf 1 Liter fertige Suppe verwendet sind:

Hafergrütze, Haferflocken, geschälte Gerstenkörner, Gerstengraupen, Grünkernkörner u. ähnl. ca. 120 g, und daß beim Ausschöpfen die zu Boden gesunkene Getreidesubstanz beiseite gelassen wird.

24 Ergänzungen und Erläuterungen zu den Tabellen.

Mehle aller Art, welche satzlos sich durch die ganze Suppenmasse verteilen, ca. 80 g.

Kochreis ca. 65 g. Der Reis soll vor dem Ausschöpfen durch Umrühren gleichmäßig in der Suppe verteilt werden.

Grieß ca. 70 g.

Kartoffel ca. 250 g (durchgeschlagen und gleichmäßig verteilt).

Mohrrüben, durchgeschlagen, 120 g.

Linzen und weiße Bohnen (Trockenware), wenn die zu Boden gesunkenen Fruchtkörner beiseite gelassen werden, 150 g.

Linzen-, Erbsen-, Bohnenmehl oder bei durchgeschlagenen Suppen aus ganzen Früchten dieser Art, 100 g.

In dieser Form entsprechen 250 g Suppe dem Stärkemehlgehalt von ca. 20 g Weißbrötchen.

Bei dickflüssigen Suppen ist die Berechnung viel schwieriger und unzuverlässiger, dies um so mehr als der Eindruck der Dickflüssigkeit oft viel mehr von Art der Zubereitung und Dauer des Kochens als von dem Gehalte an fester Substanz abhängt. Wenn dickflüssige Suppen gewünscht werden, sollten sie besser für den Zuckerkranken nach Berechnung und Abwägen des zu verkochenden Materials besonders hergestellt werden.

Über einige Suppenrezepte mit und ohne Mehl S. 72, 105.

F. Tunken.

Zum Herstellen der Tunken für Braten, Fische, Gemüse usw. benutze man niemals Mehlzusatz, weil die Menge des Mehls, die in der Küche hinzugefügt wird, sich jeglicher Kontrolle entzieht. Aus Fleischbrühe, Bratensaft, saurem und süßem Rahm, Eigelb, Butter unter Hinzufügen von mehlfreien Zutaten der verschiedensten Art: Gewürzen und Gewürzessenzen (siehe Tabelle I), gekochten oder gerösteten und dann zermörserten Zwiebeln, Tomatenmus, Thymian, Meerrettich, Citronen, gewürzigen grünen Blättern, eingemachtem Tunfisch, Fischrogen, zerriebenen Sardellen und vielen anderen Substanzen aus Tabelle I lassen sich zahlreiche schmackhafte Tunken bereiten, die den einfachsten und den weitestgehenden Ansprüchen genügen. Zum „Binden“ der Tunken kann, wenn nötig, Lecithineiweiß (Klopfer), Rahm oder

Parmesankäse genommen werden. Einige Rezepte für Tunken siehe Anhang S. 76. Es wurden auch einige Rezepte für mehlhaltige Tunken aufgenommen (Nr. 128, 133); in leichten Fällen ausnahmsweise verwendbar.

G. Gemüse.

Alle Gemüse in Tabelle I dürfen, falls sie nicht ganz oder teilweise in besonderen Fällen verboten werden, in beliebiger Menge genossen werden, am besten mit Salzwasser oder mit Fleischbrühe, Fleischextrakt, Cenovisextrakt und Salz abgekocht oder gedämpft und sodann reichlich mit Butter oder Gänsefett geschwenkt. Zusatz von süßem oder saurem Rahm und den üblichen Gewürzen ist erlaubt. Mehlzusatz ist zu meiden. Zum Binden diene Parmesankäse oder Nutrose. Wenn die Gemüse mager zubereitet sind, so muß Butter auf dem Teller zugefügt werden. Einige eignen sich besonders zum Füllen, z. B. Kohlkopf, Gurken, große Zwiebeln, Tomaten, Aubergine, Paprikaschoten. Davon soll zur Abwechslung Gebrauch gemacht werden. Als Füllsel diene ein Gemisch von verschiedenem Fleisch mit Leberwurstmasse, Knochenmark, pikantem Gewürz, Ei, evtl. unter Zusatz von Morcheln, Champignons, Trüffeln u. dgl. Andere Gemüse eignen sich zur Beigabe von Ei, z. B. Spinat, Grünkohl, Spargel.

In den bei uns üblichen Nahrungsmitteltabellen sind die sämtlichen Gemüse der Tabelle I mit einem teilweise recht hohen Gehalte an Kohlenhydraten verzeichnet, z. B. Wirsing, Rosenkohl, Rotkraut mit durchschnittlich 6%, grüner Krauskohl mit durchschnittlich 11,5%. Darin sind aber Hemicellulosen, Pentosane, Pentosen, oft auch Cellulose mit einbegriffen, welche teils keinen echten Zucker bilden können, teils im Darm derart vergären, daß sie den Zuckerhaushalt des Körpers nicht belasten. Wir finden daher in den amerikanischen Nahrungsmitteltabellen (Diabetic foods, Newhaven, Conn. 1913), welche nur die zuckerbildenden Kohlenhydrate berücksichtigen, Analysen, die durchschnittlich nur etwa ein Drittel des Gesamtkohlenhydratgehaltes verzeichnen, und die zwar nicht für den Energieinhalt der Gemüse, wohl aber für die unmittelbare Wirkung auf den Zuckerhaushalt die richtigeren sind. Vgl. S. 27 ff.

Selbst bei ansehnlichem Gemüseverzehr fallen die zuckerbildenden Kohlenhydrate der Gemüse (Tabelle I) für den Zuckerkranken nicht schwer ins Gewicht, und die etwaigen Nachteile werden durch andere Vorteile bei weitem ausgeglichen.

Beim Kochen wandert rund die Hälfte und mehr der

zuckerbildenden Kohlenhydrate in das Kochwasser. Die aus dem Brühwasser herausgehobenen Gemüse sind daher äußerst arm an solchen Substanzen. Wenn man nach halb-garkochen das Kochwasser abgießt und durch neues ersetzt, bleibt dem Gemüse kaum noch Kohlenhydrat erhalten. Unter besonderen Umständen könnte man hiervon Gebrauch machen. In der Regel soll dies nicht geschehen, da auch andere wichtige Nährstoffe, vor allem Mineralstoffe und Vitamine, gleichzeitig bis auf kleine Reste verloren gehen; es bleibt ein geschmackloses Gerüst übrig, das kaum mehr als Stroh wert besitzt.

In der Regel beschränke man sich auf ganz kurzes Abbrühen („Abwellen“, „Blanchieren“) der Gemüse. In der kurzen Zeit (1—2 Minuten) gehen freilich auch neben löslichem Zucker andere Nährstoffe verloren, aber der Verlust an diesen ist nicht allzu groß und wird bei reichlichem Gemüseverzehr sicher wieder ausgeglichen. Nach dem Abwellen bediene man sich des Dämpfens, wobei die Nährstoffe und voller Wohlgeschmack dem Gemüsegericht erhalten bleiben.

Ob die Gemüse in natürlicher Form oder nach Verarbeitung zu Mus verzehrt werden, soll sich nach Art der Gemüse, nach Geschmack des Patienten und nach dem Zustand seiner Verdauungsorgane richten.

Aus oben erwähnten Gründen haben wir, auf Grund reicher Erfahrung die Gruppe der unbedingt erlaubten Gemüse weiter gezogen, als dies gewöhnlich geschieht. Wenn keine besonderen Gründe entgegenstehen, soll der Zuckerkranke sich an sehr reichlichen Gemüseverzehr (Tabelle I) gewöhnen.

Die Gemüse sind unentbehrliche Hilfsmittel, um dem Zuckerkranken große Mengen von Fett einzuverleiben. Hier auf hat die Küche besonders Bedacht zu nehmen. Jedes Gemüse ist daher, falls der Ernährungszustand gefördert werden soll, mit reichlich Fett (am besten gute, zerlassene, vorher ausgewaschene Salzbutter) durchzuschwenken; es ist erstaunlich, wie viel Fett manche Gemüse, besonders Wirsing, Krauskohl, Sauerkraut, Rotkohl usw. aufnehmen, ohne daß durch Fettüberschuß Aussehen oder Geschmack benachteiligt werden.

Bei folgenden Mengenverhältnissen z. B. kann selbst der empfindlichste Gaumen sich nicht über allzu fette Zubereitung beklagen:

auf 125 g (Rohgewicht)	Rotkraut, Sauerkraut	50 g Butter
„ 125 „ „	zerblätterter Wirsing usw.	40 „ „
„ 125 „ „	Schneidebohnen	40 „ „
„ 125 „ „	grünen Salat, Bohnen	25 „ „
„ 125 „ „	Salatblätter	30 „ Öl.

Zum besseren Verschmelzen des Gemüses und Fettes ist es nützlich, vor dem Schwenken mit Butter usw. das Kochwasser sorgfältig zu entfernen (Ablaufenlassen, Ausschwenken, Abtrocknen zwischen Tüchern). Zugabe von etwas saurem Rahm (S. 144) sehr empfehlenswert; auch können zum „Binden“ Lecithineiweiß, Nutrose oder Parmesankäse herangezogen werden. Sie beeinflussen den Geschmack nicht, erhöhen den Nährwert und haben bindende Eigenschaften. Es genügen ca. 5 g pro Portion. An Stelle des mit dem Gemüse durch Kochen und Schwenken mechanisch verbundenen Fettes können auch fettreiche Beilagen treten, wie Speck, Schweinefleisch, fettes Hammelfleisch usw. Über Gemüsegerichte finden sich im Anhang zahlreiche Rezepte.

Anhang: Neue Gemüseanalysen.

Über einige wichtige Gemüse legen wir hier neue Analysen vor. Wir verzeichnen in dieser Tabelle vergleichshalber die Werte für stickstofffreie Extraktivstoffe (= Kohlenhydrate) nach der üblichen Berechnungsart (zitiert nach v. Noorden-Salomon: Allgemeine Diätetik), die gleichen Werte unter Berücksichtigung der Resorptionsgröße nach Schall-Heisler, die von uns selbst ermittelten Werte für mehlig und zuckerige, invertierbare Kohlenhydrate im Rohstoff und in genußfertiger Zubereitung. Nur diese letzteren Kohlenhydrate sind beim Zuckerkranken der Beachtung wert. Wir fügen weiters hinzu, wie das Rohmaterial behandelt wurde und berechneten in der letzten Säule der Tabelle, wieviel des fertigen Gerichtes 10 g Weißbrötchen entspricht. Dabei ist vorausgesetzt, daß der beim Kochen oder Dämpfen abfallende oder später austretende Saft (z. B. bei roten Rüben) nicht mitverzehrt wird. Für einzelne Substanzen können wir die Vergleichswerte nicht vollständig anführen, da uns zur Zeit der Analysen die Rohstoffe nicht zur Verfügung standen.

Das gekochte Material wurde analysiert, bevor es mit Butter geschwenkt oder sonstwie zum Anrichten weiterbehandelt war.

	Stickstofffreie Extraktivgruppe im Rohstoff		Invertierbare Kohlenhydrate (eigne Analyse)		10 g Weiß- brötchen entsprechen genuß- fertigem Material g
	übliche Berech- nung %	aus- nützlich %	Roh- stoff %	genuß- fertig %	
Rote Rüben	8,0	7,0	2,5	0,8	750
Rosenkohl	6,2	5,2	2,3	0,9	660
Winter(-Kraus)-Kohl	11,6	9,8	2,8	1,0	600
Sellerieknollen	11,8	10,0	6,4	2,6	230
Grüne Erbsen (ein- gemacht)	8,4	—	—	5,8	100
Mohrrüben mittlerer Größe (überwintert)	8,2	6,9	4,4	3,0	200
Schwarzwurz	14,8	12,4	5,5	1,6	375
Puffbohnen (eingemacht)	7,3	6,2	—	5,6	125
Rhein-, Prinzeß-, Salat- bohnen (eingemacht)	—	9,0	—	8,8	68
Winterporree	6,5	5,5	2,9	—	190
Wachsbohnen (ein- gemacht)	—	—	—	7,0	85
Grüne (mehlige) und Büchsenersben	—	—	—	14,0	42

Rote Rüben (ägyptische plattrunde, im Monat Februar) ungeschält als ganze Wurzel gar gekocht, dann geschält, in Scheiben geschnitten. Die Scheiben nach Rezept Nr. 122 vier Stunden in Essig usw. gelegt. Zur Analyse kamen die Scheiben nach Abtropfen des Saftes.

Rosenkohl (Erfurter Dreienbrunnen, im Februar frisch gepflückt), in üblicher Weise abgekocht. Die Knospen, nach Erkalten auf einem Siebe, kamen zur Analyse.

Winterkrauskohl (Mosbacher halbhoher, im Februar geerntet), in üblicher Weise abgekocht, dann auf ein Sieb gebracht und leicht abgepreßt.

Sellerieknollen (Erfurter, im Monat Februar). Die Knollen geschält, wie üblich abgekocht. Dann analysiert nach Abtropfen des Wassers.

Grüne Erbsen (Markerbse Telephon), im August 1922 roh in Weckgläser gefüllt, wie üblich im Wasserbad sterilisiert. Im Februar 1923 nach Abtropfen des ausgetretenen Saftes analysiert.

Mohrrüben (Braunschweiger lange, im Februar) geschält; 100 g in Scheiben geschnitten, in 500 Wasser gar gekocht. Das nach dem Kochen übriggebliebene Wasser betrug 85 ccm. Die herausgenommenen Mohrrüben wogen nach dem Abtropfen des Wassers 98,5 g und wurden analysiert.

Schwarzwurz (Einjährige Riesen-). Im März aus der Erde genommen, geschält, gar gekocht (behandelt wie Mohrrüben).

Puffbohnen (Erfurter), wie grüne Erbsen, vgl. oben.

Rheinische Prinzeß - Salatbohne (ohne Fäden). Zum Einmachen gepflückt August 1922. Die Kerne waren voll ausgewachsen; Kerne und Schalen noch saftig, aber kurz vor Beginn des Eintrocknens. Behandelt wie grüne Erbsen, vgl. oben.

Winterporree (Brabanter), 1922er Pflanzung; im März 1923 aus der Erde genommen. Analyse des gekochten Materials leider verunglückt.

Wachsbohnen, eingemachte gekaufte Ware mit ausgewachsenen Kernen.

Grüne Büchsenerbisen (Kerne), eingemachte gekaufte Ware. Kerne voll ausgewachsen, mehlig.

H. Salat.

Salate können mit Essig, Salz, Pfeffer, mit reichlich Öl oder mit mehlfreien Mayonnaisen zubereitet werden. Statt Essig kann auch Citronensaft benützt werden. Alle Küchenkräuter, ferner Ei in jeder Form, Senf, Speck, Fleischextrakt, ebenso süßer und saurer Rahm in den gebräuchlichen Mengen sind als Zutat erlaubt.

Außer den eigentlichen Salaten, wie Kopfsalat, römischer Salat, Endiviensalat, Lattich, Feldsalat können auch Kresse, Hopfensprossen, Spargel, junge grüne Bohnen, Zichorienstengel und -blätter, Löwenzahn, Rotkraut, Weißkraut, Sauerkraut, Gurken, Tomaten als Salat angerichtet werden. Ebenso Fischreste, Hummer, Krebse, kaltes Rindfleisch, Sülze, Hering; ferner sind Ochsenmaulsalat und italienischer Salat erlaubt. Sellerie, Radies- und Rettichscheiben dürfen den sogenannten Salaten in kleinen Mengen zugesetzt werden.

Im Gegensatz zu gewöhnlicher Annahme darf der sehr beliebte und erfrischende Rote-Rübensalat in kleineren Mengen (bis etwa 100 g) ebenso wie Lattichsalat frei benützt werden, vorausgesetzt, daß der ausgeflossene rote Saft, der fast allen Zucker entführt, nicht mitgenossen wird. Nach unseren Analysen finden sich in der rohen Roten Rübe 2,46%, in den genußfertigen Salatscheiben nur 0,78% Kohlenhydrat, welche für den Zuckerhaushalt in Betracht kommen (Rezept Nr. 122). Für Selleriesalat gilt ähnliches. Rezept Nr. 123.

I. Obstfrüchte.

a) **Bohes Obst:** Bei strenger Diät ist Obst in jeder Form natürlich verboten; sobald aber Kohlenhydrate, wenn auch nur in bescheidener Menge, zugelassen werden, erlauben wir

Obst, raten sogar dringend dazu. Denn es gibt nichts, was dem Diabetiker die gewissenhafte Durchführung der diätetischen Vorschriften mehr erleichtert, als die Gewähr von frischen Früchten und gekochtem Obst. Sie werden in leichteren Fällen im allgemeinen besser vertragen als entsprechende Gewichtsmengen von Brot, weil reichlich die Hälfte des Obstzuckers Lävulose zu sein pflegt. Auch die erlaubte Menge des Obstes ist vom Arzt von Fall zu Fall zu bestimmen; sobald größere Mengen gestattet werden, muß natürlich die Tabelle III zu Rate gezogen werden, d. h. es sind zugunsten des Obstes gewisse Mengen von Brot wegzulassen. Dabei sei bemerkt, daß die Tabelle III die Früchte etwas reichlicher zumißt als eigentlich dem Kohlenhydratgehalt entspricht; dies geschah mit Rücksicht auf den Lävulosegehalt der Früchte. Vgl. auch die Berechnungen der Tabelle IV.

b) **Kochobst:** Im allgemeinen werden bei Zuckerkranken rohe Früchte vorgezogen, weil ihre Menge leicht bestimmbar ist, weil sie wertvolle Nebenstoffe wie Mineralien und Vitamine enthalten, und weil sie der so häufigen Verstopfung besser entgegenarbeiten. Beim Kochen des Obstes ist selbstverständlich der Zusatz von Zucker streng verboten. An seine Stelle tritt auf Wunsch zum Süßen Saccharin; doch werde nur gerade soviel davon zugesetzt, um den faden Geschmack des zuckerlosen Obstes zu heben. Jedes Zuviel ist vom Übel da es den Geschmack verdirbt und den Genuß des Kochobstes verleidet. Für Obst ist geschmacklich Dulcin besser geeignet als Saccharin (S. 7). Die meisten Zuckerkranken gewöhnen sich schnell an ungesüßtes Kochobst. Solange die Jahreszeit es erlaubt, stellt sich die Küche des Diabetikers das Obstgericht am besten aus frischen Früchten dar. Die zum Gebrauche des Zuckerkranken bestimmten Früchte sollen ihre volle Reife noch nicht erlangt haben. Alle Früchte, insbesondere das Steinobst, enthalten einige Tage vor der völligen Reife um mehrere Prozent Kohlenhydrate weniger als in ausgereiftem Zustande; zum Kochen und Einmachen sind sie trotzdem sehr geeignet. Obstgerichte aus nicht völlig reifen Früchten bedürfen nur etwas mehr Saccharin; ihr Geschmack ist ebensogut wie bei Gerichten aus völlig reifen Früchten.

Beim Genuß der Obstgerichte fischen die Patienten am besten die Früchte heraus und lassen den Saft zurück, denn

dieser enthält den meisten Zucker. Wenn es in bestimmten Fällen erwünscht ist, lassen sich die Früchte weitgehend entzuckern, wenn man sie zunächst halbgar kocht, den Saft dann entfernt und mit neu zugesetztem Wasser vollends gar kocht. Solche entzuckerte Früchte schmecken jedoch so fade, daß unbedingt etwas Saccharin oder sogar Gewürze wie Vanille, Zimt, Nelken, Citronensaft oder Fruchtessenz (aus der Fabrik von Dr. L. Naumann, Dresden-Plauen) zugesetzt werden müssen. So lassen sich daraus noch sehr angenehm schmeckende und fast völlig zuckerfreie Gerichte herstellen.

Äußerst kohlenhydratarm ist das Rohmaterial bei jungen Rhabarberstengeln, unreifen Stachelbeeren, Preiselbeeren, so daß wir hieraus bereitetes mit Saccharin oder Dulcin gesüßtes Kompott in der Regel unbedenklich gestatten dürfen. Es ist daher in Tabelle I verzeichnet. Rezept Nr. 124.

c) **Dörrobst** enthält sehr bedeutende Mengen von Zucker und es läßt sich daher bei gewöhnlicher Zubereitung im allgemeinen kein Gebrauch davon machen. Wässert man aber das Dörrobst gründlich aus (6 Stunden bei zweifachem Wechsel des kalten Wassers) und kocht es dann erst, so erhält man nach schwachem Süßen mit Saccharin und Würzen mit etwas Zimt ein schmackhaftes und zuckerarmes Kompott. Ein gehäufte Eßlöffel gedörrter Pflaumen oder Apfelschnitzel enthält dann ungefähr 1,5—2,0 g Kohlenhydrat. Durch stärkeres Auswaschen mit heißem Wasser läßt sich der Zuckergehalt noch mehr herabdrücken, allerdings leidet dann auch der Geschmack.

d) **Eingemachtes Obst:** Im Haushalt werden die Früchte ohne Zuckerzusatz am besten nach kurzem Blanchieren (1—2 Minuten) in Büchsen oder Gläsern sterilisiert („Einwecken“). Die Gefäße sollen klein und auf den Verbrauch binnen 1—2 Tagen berechnet sein. Größere Gefäße sind unzweckmäßig, da die zuckerfreien Konserven, einmal geöffnet, leicht verderben. Um die Ware sicher haltbar zu machen, füge man bei häuslichem Einmachen ein wenig benzoesaures Natron (0,5 g auf ein Halbliterglas) hinzu. Manche lieben die im „eigenen Saft“ eingemachten Früchte ohne weiteren Zusatz, andere verlangen dazu Saccharin, das am besten erst nach Entleeren der Gläser dem Saft beigefügt wird. Läßt man die Früchte dann noch 2 Stunden in dem saccharingesüßten

Säfte stehen, so nehmen sie genügend Süßstoff auf. Man soll den Saft, der einen großen Teil des Fruchtezuckers aufgenommen hat, abgießen. Rezepte Nr. 108—113.

Handelsware von ungezuckerten Früchten („im eigenen Saft eingemacht“) enthält, wenn vollmundig schmeckend, fast immer 8—10% Zucker. Der einen großen Teil des Zuckers enthaltende Saft soll nicht mitverzehrt werden; dadurch steigt die statthafte Menge der Früchte selbst. Von den Früchten berechne man 120 g gleichwertig mit 20 g Weißbrötchen, bei steinhaltigem Obst 140 g, bei Sauerkirschen 160 g. Man trifft öfters im Handel „Früchte im eigenen Saft“, die ziemlich fade schmecken; ihnen ist offenbar ein Teil des Zuckers vor dem Einmachen durch vorheriges ungebührliches starkes Blanchieren entzogen worden. Sie enthalten im Durchschnitt 6% Zucker.

Handelsware von entzuckerten Früchten ist häufig auf den Markt gebracht, war aber zumeist nicht empfehlenswert, weil die Früchte doch allzu geschmacklos waren. Sie wurden nach dem vorher erwähnten Auskochverfahren hergestellt. Wirklich aromreiche Früchte, denen der Zucker freilich nicht völlig entzogen, bei denen er aber auf etwa 30—40% des Wertes, den gleich eingedicktes, nicht entzuckertes Material haben würde — unter gleichzeitiger Wahrung des natürlichen Aromas — zurückgeführt ist, wurden erst vor kurzem von der Nahrungsmittelfabrik Otto Krumm, diätetische Abteilung (Stuttgart), in den Handel gebracht. Das Ziel ist durch ein eigenes, bisher noch nicht veröffentlichtes Verfahren erreicht. Die Analysen der trefflichen Früchte ergaben:

	verzuckerbar	20 g Weißbrötchen entsprechen
Blutpflirsiche	5,5%	220 g
Aprikosen	3,8%	300 „
Mirabellen	2,8%	400 „
Erdbeeren	6,4%	190 „
Geschälte Pflaumen	3,2%	380 „
Birnen	3,0%	400 „
Erdbeer-Eismark . . .	4,8%	250 „
Himbeer-Eis-Mark . .	4,9%	250 „

Von völlig zuckerfreier Bitterorangenmarmelade sind treffliche Marken von Callard (London) und von Keiller im Handel.

K. Käse.

Wegen seines hohen Eiweißgehaltes, der von kaum einem anderen genußfertigen Nahrungsmittel übertroffen wird, bedarf der Käseverzehr ärztlicher Vorschrift. Man ist in Gewährung von Käse jetzt zurückhaltender geworden als früher. Bei völliger Freigabe von Käse verzehren Zuckerkrankte oft ganz erstaunliche Mengen davon. Der geringe Milchzuckergehalt mancher Käsesorten kommt in seiner Einwirkung auf den Zuckerhaushalt neben der des Eiweißes gar nicht in Betracht. Käse nach Schweizer, Edamer, Münsterer, Mainzer, Tilsiter Art, Roquefort-, Camembert-, Chester-, Gorgonzolakäse u. dgl., überhaupt alle verbreiteteren Dauerkäse sind entweder völlig oder so gut wie zuckerfrei. Die Süßrahmkäse (Neufchâtel u. ähnl.) enthalten frisch 2,5 bis 3% Milchzucker; ältere Ware etwa die Hälfte; dem entsprechende, unfermentierte Ware wird unter sehr verschiedenen, ortsüblichen Namen überall hergestellt.

In der Regel wird der Käse von den Zuckerkranken als Nachtisch genossen oder als Belag bei einem zwischengeschobenen zweiten Frühstück. Als Unterlage dient Luftbrötchen oder auch Brot, insoweit letzteres gestattet ist. Man gewöhnt sich schnell daran, den Käse auch ohne Brotunterlage, mit oder ohne Butter, zu verzehren; namentlich bei Käse etwas derber Konsistenz.

Sehr beliebt und empfehlenswert ist der frische, nichtfermentierte Sauermilchkäse (Quark, Topfen, Siebkäse). Bei gewöhnlicher Zubereitung enthält er allerdings oft bis zu 3% Milchzucker. Bei sorgsamem Auswaschen mit sehr kaltem Wasser gibt er $\frac{3}{4}$ und mehr davon ab. Es lassen sich aus ihm viele wertvolle und schmackhafte Gerichte für Zuckerkrankte herstellen.

Über Käsegerichte vgl. Rezepte Nr. 48, 49, 67.

L. Mehl und Mehlersatz.

Von gewöhnlichem Mehl kann nur in sehr leichten Fällen von Diabetes beim Backen, Kochen, Anrichten von Tunken usw. Gebrauch gemacht werden. In welchem Umfange, ist für jeden Einzelfall vom Arzt zu bestimmen. Das verbrauchte Mehl ist dann auf die erlaubte Tagesmenge der Kohlenhydrate

34 Ergänzungen und Erläuterungen zu den Tabellen.

anzurechnen und zwar nach dem Maßstabe 16 g Mehl = 20 g Weißbrötchen.

Zum Binden von Tunken, Suppen, Gemüsen dienen als kohlenhydratfreie oder nahezu freie Ware am besten: frisch hergestellter, ausgewaschener (S. oben), fein zerriebener Siebkäse; ferner Parmesankäse, Nutrose und von pflanzlichen Eiweißpräparaten Dr. Klopfers Lecithineiweiß. Letzteres muß vor der Verwendung mit wenig kaltem Wasser zum Aufquellen angesetzt werden.

Von den sog. Diabetikermehlen sind einige tatsächlich völlig oder nahezu kohlenhydratfrei, z. B. Callards Casoid Flour (London), Cereo Co.'s Soy Bean Gruel Flour (Tappan N. Y.), Barkers Gluten Flour (Sommerville, Mass.), Health Food Co.'s Almond Meal (New York). Aber alle diese Mehle sind wohl für die Nahrungsmitteltechnik, aber kaum für den häuslichen Gebrauch geeignet. Ihr beherrschender Bestandteil sind Eiweißkörper. Für die häusliche Küchentechnik bieten sie keinen Vorteil vor den vorher erwähnten Ersatzstoffen, die viel billiger sind.

Die übrigen „Diabetikermehle“ sind fast alles sog. „gestreckte Mehle“, d. h. Gemische von echtem Mehl und vegetabilischen oder Milch-Eiweißpräparaten. Mit ihnen sei man äußerst vorsichtig, da vielfach ein sehr verwerflicher Unfug mit jener Bezeichnung getrieben wird (in allen Ländern!) Der Name verführt zu dem Glauben, das Präparat sei kohlenhydratfrei oder mindestens höchst kohlenhydratarm. In überaus zahlreichen Fällen ist es aber nur um 8—12% ärmer daran, als die gewöhnlichen Mehle des Handels.

Man kann sich ein „gestrecktes Mehl“ im eigenen Haushalt bereiten durch Mischung von 2 Teilen guten Weizenmehls mit 1 Teil Klopfers Lecithineiweiß (Weizenkleber). Diese Mischung enthält 24% Stärke (Kohlenhydrat). 50 g davon sind gleichwertig mit 20 g Weißbrötchen. Ein schmackhaftes Brot läßt sich schwer daraus backen, wohl aber leidlich schmeckendes, flach ausgerolltes, fladenartiges Dauergebäck. Wenn z. B. 100 g des gestreckten Mehles, unter Zusatz von Wasser, Ei, Butter und Salz eine genußfertige Fladenmasse von 150 g liefern, so werden 75 g dieser Masse ebensoviel Stärkemehl enthalten wie 20 g Weißbrötchen. Man hat aber das Quantum des eßbaren Gebäckes wesentlich vermehrt.

Mit Käse lassen sich auch „Käsestangen“ daraus bereiten; ebenso Pfannkuchen und Gebäcke oder andere Gerichte aus Rührteig, in welchen zum Lockern und Aufgehen Eierklar-Schnee untergezogen ist.

Immerhin stellt das durch Lecithineiweiß gestreckte Weizenmehl hohe Anforderung an die Küchentechnik. Es ist ein recht sprödes Material, und daher haben sich diese einfachen gestreckten Mehle des Handels oder häuslicher Mischung niemals recht einbürgern können. Bekannte Firmen mußten, um ihre Ware anzubringen, mit dem Mehlnusatz allmählich höher und höher gehen, bis die Mischung den Namen „Diabetikermehl“ kaum noch verdiente.

Sehr empfehlenswert und bequem im Gebrauch ist das aus verschiedenen, mit Rücksicht auf Klebergehalt und Backfähigkeit ausgewählten Mehlen und aus Pflanzeneiweiß zusammengesetzte neue Otto Krummsche „Diabetikermehl“, für das ein Maximalgehalt von 33% Stärke garantiert wird (Eiweißgehalt = 52%). Sobald man mit dem Stärkegehalt wesentlich tiefer rückt, leidet die küchentechnische Verwendbarkeit, insbesondere für Backzwecke, außerordentlich. Rund 36 g dieses Mehles enthalten soviel Stärke wie 20 g Weißbrötchen.

Mit 36 g des Mehles (= 20 g Weißbrötchen) und erst recht mit der doppelten Menge (= 40 g Weißbrötchen) wird eine geschickte Köchin sehr weit kommen und eine Fülle abwechslungsreicher Speisen für den Diabetiker herstellen können.

Da das stärkearme Mehl schwer vergärt, setze man bei allen Hefeteigen auf 500 g Teig etwa 5 g Traubenzucker zu. Die Hefe wird dadurch stark wirksam gemacht, der Traubenzucker vergärt restlos. Man muß den Teig etwas länger gehen lassen als gewöhnliches Backmehl. Dem Mehl werden verschiedene Rezepte beigegeben.

Von schmackhaftem Backwerk, das nach beigegebenen Rezepten aus dem O. Krummschen Mehle hergestellt war, lagen uns bisher vor:

„Diabetiker - Mürbebrötchen“ (Gewicht 40 g, Wassergehalt = 26%). Kohlenhydrate = 23%. — 52 g des Gebäcks = 20 g WBW.

„Diabetiker-Gesundheitskuchen“ (Wassergehalt = 32%). Kohlenhydrate = 17%. — 70 g des Gebäcks = 20 g WBW.

„Diabetiker - Keks“ (Gewicht 7 g; Wassergehalt = 7.5%). Kohlenhydrate = 23%. — 52 g des Gebäcks = 20 g WBW.

„Diabetiker-Suppenklöße“ (Wassergehalt = 8%). Kohlenhydrate = 27%. — 45 g (eine sehr reichliche Portion) des Gebäcks = 20 g WBW.

„Diabetiker-Zwieback“ (Gewicht 11 g; Wassergehalt = 7,5%). Kohlenhydrate = 29%. — 30 g Zwieback = 20 g WBW.

Aus Hasel-, Wal-, Paranüssen und aus Mandeln läßt sich durch leichtes Auswaschen der zerstampften Masse fast alles Kohlenhydrat entfernen. Die nach Abpressen übrigbleibende Masse eignet sich zum Herstellen von makronenartigem Gebäck (Zusatz von Eierklar-Schnee, Eidotter, Butter, Gewürz, ein wenig Saccharin).

Im Anhang verschiedene Backrezepte.

M. Brot und Brotersatz.

Brot, brotähnliche Gebäcke, Kuchen, Zwieback, Biskuits u. dgl. werden auf die Dauer mehr als fast alle anderen Nahrungsmittel vom Zuckerkranken schmerzlich entbehrt. Man gab sich daher seit langem Mühe, mehlfreie und mehlarme Gebäcke herzustellen. Eine voll befriedigende Lösung der Aufgabe ist aber noch nicht gefunden. Man kann drei brauchbare Gruppen unterscheiden.

1. Gebäcke ohne Mehl.

Hierunter verstehen wir Gebäcke, die völlig oder nahezu kohlenhydratfrei sind. Als Ausgangsmaterial pflegen Mandeln, Weizenkleber, Casein und Caseinpräparate zu dienen.

Mandelbrot ist das älteste unter ihnen. Die Mandeln lassen sich auch durch Haselnüsse und (Brasil-) Paranüsse ersetzen. Um das aus dem fein zermörserten Brei gewonnene Mehl wirklich so kohlenhydratfrei zu machen, daß der Stärke- und Zuckergehalt unbedingt vernachlässigt werden kann, bedarf es einer gewissen Vorbereitung (beschrieben bei Rezept Nr. 107). Die aus nicht entsprechend vorbereitetem Mandel- und Nußmehl hergestellten Weich- und Hartgebäcke (sowohl häusliche Gebäcke wie käufliche Ware) gehören der folgenden Gruppe an.

Ein höchst mehlarmses Klebergebäck aus Dr. Klopfers Lecithineiweiß läßt sich im Haushalte herstellen (Rezept Nr. 117). Von käuflicher Ware — es ist viel kaum genießbare Ware im Handel — befriedigte am meisten:

Ch. Singers (Basel), Biskuits mit 57,6% Eiweiß, 32% Butterfett, 1,6% Kohlenhydrat.

Huntley und Palmers (London) „Akoll“-Biskuits mit 1,5% Kohlenhydrat.

Callard & Co.s (London, Regentstreet 74) Casoid Bread (27%), Prolacto Bread (37, %), Casoid Rusks (66%) ohne nachweisbaren Mehlgehalt; Casoid Biskuits (59%), mit 2,3%, Prolacto Biscuits (57%) mit 2% Kohlenhydrat. Die eingeklammerten Zahlen geben den Eiweißgehalt an.

Pokorny (Konditorei in Teplitz): Feuchte, gut haltbare braune Brotlaibchen mit 0,8% Kohlenhydrat.

2. Gebäcke mit verhältnismäßig wenig Mehl.

Die meisten käuflichen sog. Diabetikergebäcke, darunter auch die meisten Aleuronatbrote, enthalten nur 10—20% weniger Stärkemehl als gewöhnliche, ähnliche Gebäcke des Handels. Der Vorteil steht also durchaus nicht im richtigen Verhältnis zu dem meist sehr hohen Preise. Will man sich eines Brotes mit so geringer Kohlenhydratverminderung bedienen, so greife man zum gewöhnlichen Grahambrot aus Weizen oder dem Rheinischen grobem Schwarzbrot aus Roggen, deren resorbierbare Kohlenhydrate mit 44 bzw. 42% zu veranschlagen sind, und von denen daher etwas mehr genommen werden darf, als von feinemehligen Weizen- oder Roggenbrot (vgl. S. 12). Über verschiedene Mandelgebäcke Rezepte 95—106; vgl. die Bemerkungen bei Rezept 107!

Als brauchbare „Diabetikergebäcke“ dürfen nur solche gelten, die höchstens die Hälfte der in ähnlichen gewöhnlichen Gebäcken vorkommenden Kohlenhydrate enthalten. Von solchen kann sich jeder Haushalt nach gewöhnlichen Backrezepten Brot und ähnliches herstellen, wenn man das Mehl mit gleichen oder doppelten Mengen Lecithineiweiß mischt (S. 34). In ersterem Falle kann gute, kräftige Hefe zum Treiben benutzt werden, im letzteren Falle ist Backpulver vorzuziehen. Immerhin ist ziemlich große Übung beim Herstellen nötig. Bequemer und mit größerer Sicherheit schmackhaftes Gebäck liefernd ist das auf S. 35 erwähnte neue Diabetiker-Mehl von Otto Krumm A. G. mit 33% invertierbarem Kohlenhydrat. Mit Rücksicht auf seinen hohen Eiweißgehalt rechne man — abgerundet, daß ein Gebäck, welches mit 100 g dieses Mehles bereitet ist, 60 g Weißbrötchenwert hat.

Von erprobter Handelsware seien folgende erwähnt (S. bedeutet Analyse nach den Tabellen von Schall-Heisler; St. bedeutet Analyse nach J. Ph. Street; keine Bezeichnung bedeutet eigene Analyse).

		Stärke	20 g Weißbrötchen entsprechen g
Callard's (London)	Almond-Biskuits	4,2	280
" "	Almond-Shortbreads	4,2	280
Gumpert's (Berlin)	Ultrabrot	7,8 (S.)	150
Bresin's (Berlin)	Bresinbrot	10,0	120
Otto Krumm's (Stuttg.)	Soyapan-Teegebäck	11,0	110
Rademann's (Frankfurt a. M.)	Diabetikermakronen	11,1 (S.)	110
Kellog's (Battle Creek)	Alpha Diabetic Wafers	11,3 (St.)	110
Fromm's	Litonbrot	14,0 (S.)	85
Gericke's (Potsdam)	Sifarbrot	15,0 (St.)	80
O. Fritz' (Wien)	Litonbrot	15,1 (S.)	80
Rademann's	Diabetikerstangen	16,6 (S.)	72
Hundhausen's (Hamm)	Aleuronatzwieback	17,7 (St.)	70
Singer's (Basel)	Diabetiker-Zwieback	18,5	65
Bresin's (Berlin)	Grahambrot für Zucker- kranke	20,0	60
Fritz'	Mandelbrot	22,7 (S.)	53
Otto Krumm's	Soyapanbrot	23,0	53
Singer's (Basel)	Diabetikerbrot	24,8	50
Gericke's	3-fach Porterbrot	26,0 (St.)	46
Gumpert's	Doppel-Diabetiker- Zwieback	27,6 (St.)	45
Rademann's	Diabetiker-Weißbrot	30,0	40

Man wird in dieser Tabelle eine Anzahl als „Diabetikergebäcke“ bekannte Marken vermissen. Soweit darüber zuverlässige Analysen aus fremden Laboratorien vorliegen, oder soweit sie uns zwecks eigener Analyse zugänglich waren, enthielten sie aber alle mehr als 30% Stärke; solche Brote erkennen wir nicht als zweckmäßig an. In unserer Klinik benutzen wir jetzt nur die sehr schmackhaften Gebäcke von Otto Krumm. Die gleichfalls schönen Gebäcke von Ch. Singer in Basel sind für uns zur Zeit nicht greifbar.

3. Luftbrote.

Die sog. Luftbrote wurden zuerst von O. Rademann (Frankfurt a. M.) auf C. v. Noordens Veranlassung hergestellt. Zumeist sind sie aus einem Gemisch von Weizenkleber und -mehl hergestellt und enthalten gewichtsprozentisch zwischen 25 und 50% Kohlenhydrat. Infolge besonderer Backart haben sie aber vielporige Struktur und großes Volumen angenommen und sind im Verhältnis zu ihrer Größe federleicht. Gewöhnlich übersteigt der tägliche Verbrauch der lufttrockenen Handelsdauerware 30—40 g nicht. Größere Mengen sind unzweckmäßig, da sonst durch sie doch zuviel Stärke und gleichzeitig zuviel Eiweiß in den Körper gelangt (Eiweißgehalt = 40—70%! (Vgl. unten.) Niedriger Kohlenhydratgehalt wäre für vorliegenden Zweck an und für sich erwünscht. Doch zeigt sich immer aufs neue, daß Luftbrote mit weniger als 20% Stärke nur bei einer Minderzahl von Zuckerkranken sich durchsetzen. Wir möchten diesen Wert also für die praktisch richtige, untere Grenze halten. Der Arzt muß natürlich über den Kohlenhydratgehalt der Luftbrötchen unterrichtet sein und bestimmen, welches Gewicht im einzelnen Falle zulässig ist. Sie sind teils in Form kleiner Brötchen, teils in Form mannigfach gestalteter Brote im Handel. Ihr Zweck ist im wesentlichen, als Unterlage für Butter und sonstigen Belag zu dienen. Man muß sie mit sehr scharfem, dünnem Messer in Scheiben schneiden; sonst zerbröckeln sie. Der Geschmack wird wesentlich gebessert und gehoben, wenn man die in Scheiben zerlegte Ware hellbraun röstet.

In unserer Klinik benützten wir jetzt fast ausschließlich die Krumm-Luftbrötchen (Otto Krumm, Stuttgart) mit maximalem Gehalte von 25% Stärke. Es scheint aber möglich, gerade diesen Brötchen einen noch geringeren Gehalt an Stärke zu geben, ohne daß der Geschmack sich wesentlich ändert. Wir probierten solche mit 17,5% Stärke und sie befriedigten durchaus. Dem Teig dieser Brötchen wurde auf v. Noordens Veranlassung Extrakt der an Eiweißbausteinen, Phosphaten und Vitaminen reichen Getreidekeimlinge zugesetzt, um diese wertvollen Bestandteile des Getreides dem Diabetiker zugänglich zu machen. Beim Durchschnittsgewicht von 10 g enthält ein Luftbrötchen 2,5 g Stärke.

Neuerdings liefert Otto Krumm A. G. Luftbrote in Brikkettform von 20—22 g Gewicht. Sie sind technisch vollendet und übertreffen auch geschmacklich alle bisher von uns geprüften Luftgebäcke. In unserer Klinik sind wir im Begriffe,

von den früheren Luftbrötchen ganz zu diesen Luftbrot en überzugehen. Sie sind auch besser verwendbar und dem Bruch weniger ausgesetzt als die Brötchen.

Die Luftbrötchen der Diätei (Berlin) ergaben unserer Analyse zuerst den Gehalt von 40—46% Stärke; das ist entschieden zu hoch, da man immerhin auf den Verzehr von etwa 50 g (5 Brötchen) rechnen muß. Später wurde der Stärkegehalt herabgesetzt, und Analysen aus dem Monat Januar ergaben 30—35% Stärke.

Callard & Co. stellen ein Luftbrötchen unter dem Namen „Gluten Dinner Rolls“ her, die nur 3% Stärke enthalten (mit 82% Eiweiß). Sie zeugen für vollendete Technik. Zu vorübergehendem und gelegentlichem Gebrauche sind sie geeignet.

Das Luftbrot von Fromm & Co. in Kötzschenbroda - Dresden enthielt früher ca. 25% Stärke. In Luftbrötchen, die angeblich von dort bezogen waren, fanden wir (November 1922) 43% Stärke.

Die Luftbrötchen von G. Fritz in Wien ergaben uns früher einen Gehalt von 15% Stärke, Luftbrötchen aus neuerer Zeit ergaben 30%; es sollen jetzt aber wieder solche mit 10—15% Stärke geliefert werden.

Die Luftbrote Charasse (Biscottes Lucullus) enthalten 55—60% Stärke! Sie schmecken sehr gut. Ihren Zweck erfüllen sie aber nicht.

Die Luftbrote von Brusson-Jeune, Villemur, Frankreich, ergaben uns ziemlich schwankende Werte: 40—50% Stärke. Geschmack gut. Der Stärkegehalt ist zu hoch.

Das Luftbrot von Eugene Loeb, Newyork, (Gluten-Luft-Bread) enthält nach Angabe von J. Ph. Street 44% Stärke, gleichfalls zu viel.

Man sieht, daß man nicht alles, was als Luftbrötchen bezeichnet wird, als gleichwertig hinnehmen darf.

Im allgemeinen halten wir es, auf Grund langer Erfahrung, für zweckmäßig, daß der Zuckerkranke sich möglichst an den Gebrauch von Luftbrötchen und anderen sehr kohlenhydratarmen Gebäcken gewöhnt, auf das Normalgebäck aber möglichst ganz verzichtet. Er wird sich dann eine viel größere Menge anderer kohlenhydrathaltiger Nahrungsmittel gestatten dürfen, welche nicht wie Brot durch annehmbaren Ersatz vertretbar sind; er wird sich eine viel abwechslungsreichere Kost errichten können. Nur da, wo man mindestens den Kohlenhydratwert von 80—100 g Weißbrötchen erlauben darf und will, ist es ratsam, 30 bzw. 50 g davon in Normalbrot (am besten Grahambrot) anzulegen.

Die Meinung, daß Luftbrötchen ohne weiteres in jeder Menge gestattet seien, muß fallen. Es gingen uns ziemlich viele Diabetiker zu, die täglich bis zu 100 g Luftbrötchen und gar mehr verzehrten und damit etwa 45 g Mehl (entsprechend 75 g Normalweißbrötchen!) und 40 g Eiweiß (wenn auch pflanz-

lich, so doch immerhin entsprechend 200 g schierem Ochsenfleisch!) zu sich nahmen. Bei den von uns benützten Krumm-Luftgebäcken lassen wir 40 g täglich in der Regel nicht überschreiten. Bei den meisten anderen Formen müßte man die Grenze tiefer rücken.

N. Kartoffeln, Topinambur, Stachys.

Kartoffeln sind verhältnismäßig arm an Kohlenhydraten; sie enthalten in frischem Zustande nur 16—18% Kohlenhydrat (Sommerkartoffel), nach längerem Aufbewahren 18—22% (Winterkartoffel).

Die Kartoffel verdient in nachdrücklicher Weise als Vertreterin für einen Teil des erlaubten Brotes empfohlen zu werden. Wer z. B. auf eine Tagesmenge von 75—125 g Weißbrot gesetzt wird, lege etwa $\frac{1}{3}$ dieser Summe in Form von Kartoffeln an; es stehen ihm dann gemäß Tabelle III noch 50—90 g Brot zur Verfügung. Mit den Kartoffeln soll im Bedarfsfalle möglichst viel Fett einverleibt werden. Es ist erstaunlich, wieviel Fett beim Zubereiten von Kartoffelmus und Bratkartoffeln unterzubringen ist, und wieviel Butter und fette Tunken man den abgekochten Kartoffeln noch auf dem Teller zusetzen kann.

Bei Kartoffeln, die mit oder ohne Schale in Salzwasser oder Fleischbrühe abgekocht werden, ferner bei Kartoffeln, die in großen Stücken nach vorhergehendem Abkochen in Fett gebraten werden, bei Kartoffelsalat kann das Abwägen der zulässigen Menge sowohl in rohem wie in fertigem Zustande erfolgen; denn die Kartoffeln verändern bei diesen Zubereitungen ihr Gewicht und ihren Kohlenhydratgehalt sehr wenig. Bei allen anderen Zubereitungsweisen (Brei, Bratkartoffeln) erfolge das Abwiegen nach Entfernen der Schale lieber in rohem Zustande, weil sich sonst Fehler in die Berechnung des Brotwertes einschleichen können; oder — was bequemer ist — es werden die fertigen Kartoffelgerichte nach ärztlicher Anordnung eßlöffelweise abgemessen (S. 17).

Durch einfaches Auswaschverfahren kann man den Kartoffeln den größten Teil der Stärke entziehen.

Verfahren nach F. Wolfner: Die geschälten rohen zerriebenen Kartoffeln werden in ungestärkte Leinwand eingeschlagen und unter kaltem Wasser so lange wiederholt ausgepreßt, bis kein Mehl mehr aus-

42 Ergänzungen und Erläuterungen zu den Tabellen.

zurigen ist. Nach wenigen Minuten bereits besteht der Brei im Leinwandbeutel fast nur aus Kartoffelfaser und enthält nur noch 1—2% Stärkemehl. Aus diesem Faserbrei lassen sich aber schmackhafte Speisen nicht bereiten. Man muß einen Teil des ausgewaschenen Mehles wieder hinzufügen. Zu diesem Zwecke gießt man das Wasser von dem zu Boden gesunkenen Mehlbreie größtenteils ab, bringt den Rest des Wassers mit dem Mehlbrei im Trichter auf ein Filter, oder schüttet ihn auf eine mehrfache Schicht gut aufsaugender Leintücher, von denen das oberste möglichst engmaschig sei. Nach Abfließen des Wassers preßt man den Mehlbrei zwischen ungestärkten Leintüchern mäßig scharf aus und mischt nunmehr 1 Gewichtsteil Mehlbrei mit zwei Gewichtsteilen Faserbrei. Man erhält so ein Gemisch von ca. 6% Stärkegehalt, von dem 200 g gleichwertig sind mit 20 g Weißbrötchen. Hieraus lassen sich verschiedene sehr schmackhafte Gerichte bereiten (Rezepte No. 149; unter dem, was dort entmehlter Kartoffelbrei genannt wird, ist das hier beschriebene Gemisch verstanden).

Inulinhaltige Knollen. In Verwendung übereinstimmend mit Kartoffel, im Aussehen ihnen ähnelnd, sind hier die inulinhaltigen Knollen zu erwähnen: Helianthus- und Dahlienknollen und Topinambur (Erdartischocke). Von ihnen kommt praktisch nur die letztere in Betracht. Ihre Empfehlung verdanken sie dem Umstande, daß sie Inulin statt Stärke enthalten, und daß das mehlartige Inulin auf die Zuckerproduktion etwa halb so stark einwirkt wie Stärke. Dies hängt wahrscheinlich damit zusammen, daß der menschliche Darm das Inulin schlecht verdaut und resorbiert. Dennoch sind die Topinamburspeisen gut bekömmlich. Die Zusammensetzung ist: 2% Eiweiß, 16,3% Kohlenhydrat. Für den Zuckerhaushalt des Diabetikers sind 125 g geschälte Topinamburknollen 20 g Weißbrötchen gleichzusetzen. Wer den eigenartigen Geschmack liebt, kann davon öfters Gebrauch machen. Man darf die Knollen nicht zu lange kochen, weil sie sonst zu weich werden und an Schmackhaftigkeit einbüßen. Über drei Verwendungsformen in der Küche vgl. Rezept 145.

Auch die wohlschmeckenden Stachysknollen enthalten vorzugsweise Inulin. Ihre Zusammensetzung ist fast die gleiche wie die der Topinamburknollen. Es scheint, daß auch hier der verhältnismäßig geringe Einfluß auf die Zuckerproduktion auf schlechter Resorption beruht, trotz trefflicher Bekömmlichkeit. Stachys wirkt stuhlfördernd. 125 g Stachys (ungeschält; sehr schwer zu schälen!) sind wie 20 g Weißbrötchen zu bewerten. Über Verwendung in der Küche vgl. Rezept 146.

O. Milch und Rahm.

1. Milch. Wie aus den Zahlen der Tabelle III hervorgeht, ist es ein — freilich weitverbreiteter — Irrtum, daß saure Milch (Dickmilch) und Ya-Urt wesentlich weniger Milchzucker enthalten, als frische Milch. Der eingedickte Ya-Urt, wie er gewöhnlich nicht getrunken, sondern aus Schalen mit dem Löffel verspeist wird, enthält prozentual sehr viel mehr Zucker als die ursprüngliche Milch. Ob und in welchem Maße Milch und ihre Abarten zugelassen werden sollen, muß in jedem Falle vom Arzte erwogen und bestimmt werden. In manche Kostformen paßt Milch gut hinein, in andere nicht. Wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt, sollen Milch und ihre Abarten nur als Äquivalente für Weißbrot genommen werden (Tabelle III).

2. Kefir enthält nach 48stündiger Gärung etwa 2,8% Milchzucker und 0,7% Alkohol, nach 72stündiger Gärung 1,7 bis 1,9% Milchzucker und 1% Alkohol (600 ccm = 20 g Weißbrötchen). Von Kefir, der zu Hause leicht herstellbar ist, könnte man beim Diabetiker mehr Gebrauch machen, als gewöhnlich geschieht. Der Geschmack sagt aber nicht jedem zu. Der 3 tägige Kefir entwickelt bei manchen stopfende Eigenschaft. Dies läßt sich durch zweimalige Gabe von je 0,5 g Magnesium Perhydrol ausgleichen (um 6 Uhr und um 10 Uhr abends je 1 Tablette).

Über die Wertberechnung dieser Abarten der Milch vgl. Tab. III, S. 12.

3. C. v. Noordens Rahmgemenge. Man bedient sich hierzu guten Schlagrahms, der etwa 30% Fett enthält. Der Geschmack des Gemisches wird besser, wenn man den Rahm erst sauer werden läßt. Mangels zuverlässig guten und fettreichen Schlagrahms nimmt man am besten nicht gezuckerten sterilisierten Rahm. Wir benutzten, solange die Ware für uns greifbar war, meist die „Bärenmarke“ (s. unten, bei Rahm). 1 Teil Rahm wird, nach vorherigem Anwärmen, mit 4 Teilen Wasser (gewöhnliches Wasser, Emser Wasser, Selterswasser) oder Tee oder Kaffee gemischt. Der Geschmack wird durch Zugabe von geschlagenem Eidotter wesentlich gehoben; auch ein wenig Plasmonpulver, ferner nach Belieben Salz oder Saccharin können zugesetzt werden. Die Zusammensetzung des Rahm-Wassergemisches ist: 0,6% Milchzucker, 0,25%

Eiweiß, 6% Fett; 20 g Weißbrötchen enthalten ebensoviel Kohlenhydrat wie 2 l des Gemisches. Wo entsprechend guter Rahm erhältlich, wird dieses Getränk der künstlichen „Diabetikermilch“ meist vorgezogen.

4. Dr. Boumas zuckerfreie Fettmilch für Diabetiker, aus den einzelnen Milchbestandteilen, mit Ausschluß des Milchsuckers, künstlich zusammengesetzt, ist völlig zuckerfrei (2,6% Eiweiß, 5,7% Fett; Nährwert in 100 ccm = 64 Calorien). Die Milch war in Deutschland früher durch die Berliner Milchkuranstalt Hellersdorf, Friedrich-Wilhelmstr. 3, sterilisiert als Dauerware, zu beziehen.

5. Soyamamilch für Diabetiker, hergestellt aus Sojabohne unter Butterzusatz von den Soyamawerken in Frankfurt a. M., sehr wohlschmeckend, enthielt vor dem Kriege: 3,8% Eiweiß, 3,4% Fett, 1,2% Kohlenhydrat. 1 l hatte den Weißbrotwert von 20 g. Zur Zeit ist die Milch noch nicht erhältlich.

6. Entzuckerte Milch, von Müller & Kappert in Bad Neuenahr, ist jetzt erhältlich. Sie wird sehr gelobt. Ihr Gehalt ist: 3,1% Eiweiß, 3,2% Fett, 0,3% Milchzucker, 0,6% Mineralstoffe; Nährwert = 43 Calorien in 100 ccm. 4000 ccm davon haben den Kohlenhydratgehalt von 20 g Weißbrötchen. Die Milch soll alsbald auch in kondensierter Form, in Büchsen, in den Handel kommen.

7. Milchkuren. Sowohl bei akuten Magenkatarrhen, bei fieberhaften Zuständen, bei anderen zwischentretenden Krankheiten, wie auch bei überfütterten Zuckerkranken, bei Kreislaufstörungen bewährt sich oft das Einschieben mehrerer reiner Milchtage, wobei man der Karezellkur entsprechend, mit etwa 800 ccm Milch beginnt und allmählich auf 1500 ccm steigt. Für diese Zeit ist Bettruhe anzuraten. Besser als frische Milch ist für manche Fälle der weit zuckerärmere Kefir, von dem man die doppelte Menge reichen kann. Die k n a p p e Milchkost entzuckert die Kranken oft, selbst in schweren Fällen.

8. Rahm. Der gewöhnliche Rahm, wie man ihn in Deutschland jetzt hier und da erhält, wie er aber früher als „Rahm“ (oder „Sahne“) überhaupt nicht feilgeboten werden durfte, enthält nicht mehr als 10% Fett und ebensoviel Milchzucker wie Frischmilch. Als Mittelwert eines guten Rahms darf gelten der Gehalt von 20% Fett, 3,5% Eiweiß, 3,5% Milchzucker, mit einem Nährwert von 215 Calorien in 100 ccm. 300 ccm

davon haben den Kohlenhydratwert von 20 g Weißbrötchen. Schlagsahne — wenn sie nicht mit Gelatinezusatz verfälscht ist — bedarf eines Fettgehaltes von mindestens 25%; sonst läßt sie sich nicht zu steifem Schnee schlagen. Der Normalgehalt guten, dicken Rahmes, zum Bereiten guter Schlagsahne geeignet, ist 30% Fett, 3% Eiweiß, 3% Milchzucker; Nährwert von 100 ccm = 305 Kalorien. Hiervon haben 400 ccm den Kohlenhydratgehalt von 20 g Weißbrötchen. Für Zuckerkrankte sollte, wenn irgend möglich, nur solcher Rahm verwendet werden.

Ein steriler Rahm in Büchsen mit 30% Fett (als Minimum) wird geliefert von der Berner Alpenmilch-Genossenschaft in Stalden (Emmenthal, Schweiz), unter dem Zeichen „Bärenmarke“. Ein noch besserer Rahm mit 35% Fett wurde vor dem Kriege in Büchsen geliefert von Bosch & Co. in Waren (Mecklenburg).

In Ländern, wo Milch im Überflusse vorhanden, dürfte jetzt wohl überall frischer Rahm von mindestens 30% Fettgehalt leicht erhältlich sein. Zum Bereiten von saurem Rahm ist er viel besser geeignet als der sterilisierte. Über die küchentechnische Verwendung des Rahms geben im Anhange zahlreiche Rezepte Auskunft.

P. Verschiedene Getränke.

1. Wasser, Mineralwässer. Man beachte, daß zwar für den Zuckerhaushalt die Menge des in irgendeiner Form aufgenommenen Wassers ziemlich gleichgültig ist, nicht aber für den Gesamtorganismus. Unter Umständen ist daher die Getränkmenge ärztlich zu regeln. Dasselbe gilt für die Auswahl von Mineraltafelwässern (vgl. S. 16).

2. Kaffee und Tee sollen in der Regel nur in geringer oder mittlerer Konzentration genommen werden. Reichliche Aufnahme der darin enthaltenen Alkaloide verstärkt manchmal die Störung des Zuckerhaushaltes. Wichtiger ist, daß bei zahlreichen Zuckerkranken das gesamte Nervensystem sich im Zustande erhöhter Erregbarkeit befindet, und deshalb bringen Kaffee und Tee hier leichter Störung des Schlafes, Übererregung des Herzens und unerwünschte Reaktion des Blutgefäßsystems.

Die Überempfindlichkeit des Nervensystems macht es oft wünschenswert, zu koffeinfreiem Kaffee oder zu Ersatzpräparaten zu greifen (für Kaffee am besten gerösteter Spargelsamen; für Tee am besten getrocknete und ganz leicht angeröstete Hagebutten oder Blätter von Brombeeren unter Zusatz getrockneter Waldmeisterblätter).

3. Reiner Kakao ist so arm an zuckerbildender Substanz, daß 15 g bei den meisten Kostformen ohne weiteres statthaft sind. Die Kohlenhydratmenge wird auf ein Minimum zurückgeführt, wenn man die Masse, nach Anrühren mit ein wenig kaltem Wasser, mit siedendem Wasser übergießt, eine Minute lang verrührt und dann, nach dem Absetzen, das Brühwasser abgießt und das Getränk aus dem ausgelaugten Satz bereitet. So vorzugehen, ist aber nur selten nötig. Sehr empfehlenswert ist der meist in Blockform (seltener in Tafelform) erhältliche unentölte Kakao, der einen etwas kratzenden, aber nicht unangenehmen, leicht bitteren Geschmack hat.

Der Nährwert des Kakaogetränkes kann durch Einschlagen von Eidotter oder fettreichem Rahm wesentlich erhöht werden. Süßung mittels Saccharinpräparaten oder Dulcin. — Größere Mengen von Kakao gehen auf Kosten der zustehenden Brotmasse (Tab. III). Kakaogetränk S. 12, Rezept Nr. 120.

4. Limonaden. Mischung von Citronensaft mit einfachem oder gewöhnlich kohlensaurem Tafelwasser. Süßung mit Saccharinpräparaten oder Dulcin; auch mit Glycerin, dessen Tagesmenge 15 g aber nicht übersteigen sollte. Zugabe von etwas gebranntem Wasser (Kirschengeist usw.) nach Wunsch und Erlaubnis. Auch Zusatz völlig vergorener Fruchtsäfte (meist Himbeersaft) ist gestattet. Man kann diese im Haushalt nach bekannten Küchenvorschriften herstellen; zur Konservierung wird auf 1 Liter 1 g benzoesaures Natron zugefügt.

5. Weine. Zuckerfrei sind die vollkommen vergorenen, still gewordenen und geklärten leichten Faßweine, gleichgültig, ob aus Weintrauben oder aus Obstfrüchten bereitet. Auch die leichten weißen und roten Tischweine sind zuckerfrei, wenn sie auf Faß völlig ausgereift sind; selbst für mittelschwere Weine gilt dies noch. Bei roten Flaschenweinen kann man sich ziemlich sicher darauf verlassen, daß sie sich in voll vergorenem und zuckerfreiem Zustande befinden. Weißweine werden jetzt, nachdem „spritziige Beschaffenheit“ beliebt ge-

worden ist, oft viel zu früh auf Flasche gefüllt und können dann noch 1% Zucker und mehr enthalten. Man verlange Weißweine, die längeres Faßlager hinter sich haben, und halte sich möglichst an erprobte Firmen. Gut ausgegorene Weine liefert die diätetische Abteilung von Otto Krumm A.-G.

Hochgewächse und Südweine enthalten fast immer reichlich Zucker (vgl. S. 15). Der ganz herbe Tokayer Wein (magyarisch: Szamrodnu), weit edler im Geschmack als der süße (magyarisch: aszu), ist zuckerfrei; seine schwache Süße verdankt er natürlichem Glyceringehalte.

Der unter den Namen „Extra dry“ oder „brut“ im Handel befindliche Schaumwein ist, wie die Erfahrung lehrt, keineswegs immer zuckerfrei. Es gibt zuckerfreie Marken; aber wir fanden in manchen, unter jenen Namen verkauften Schaumweinen auch solche mit 1—2% Zucker und mehr.

6. Branntweine. Die wahren Branntweine sind als Destillate zuckerfrei; ebenso Branntweine, die aus Alkohol, Wasser unter Zusatz von Essenzen oder Einlage von aromareichen Gewürzen oder Gewürzblättern hergestellt sind. Bei Kognak und Rum kommt öfters ein kleiner Zuckerzusatz vor, der dem Getränk mehr „Körper“ geben soll (in Frankreich erlaubt, bei deutschem Weinbrand verboten). Für die kleinen Mengen, die genossen werden, fällt dies nicht ins Gewicht. Die Destillate aus Obstweinen (Kirsch, Zwetschen, Heidelbeeren, Aprikosen usw.) sind natürlich zuckerfrei, ebenso Kornbranntwein.

Liköre enthalten sämtlich sehr viel Zucker.

7. Bier. Bier soll stets nur auf Kosten der zustehenden Brotmenge genossen werden, wenn nicht ausdrücklich ärztlicherseits anders bestimmt ist. Es ist also die Tabelle III (S. 15) zu Rate zu ziehen. Man hüte sich vor schlecht ausgegorenen Bieren oder vor dem Genuß allzu kalten Bieres. Man halte sich an die leichten Lager- und Schankbiere. Daß das Pilsener Bier besonders arm an zuckerbildenden Stoffen sei, ist ein Vorurteil; das Pilsener Exportbier enthält mehr davon als die meisten einheimischen leichten hellen Biere.

Für sämtliche alkoholischen Getränke gilt, daß sowohl Menge wie Auswahl ärztlicher Vorschrift unterstellt sein sollen. Ohne Frage hat man früher, von einseitiger Betrachtung des Zuckerhaushaltes ausgehend, den Zuckerkranken viel zu viel alkoholisches Getränk gestattet oder gar empfohlen. Dies ge-

schieht leider vielfach noch jetzt. Es ist aber zu bedenken, daß die Gewebe des Zuckerkranken, namentlich die hier in Frage kommenden Organe des Blutkreislaufes, das zentrale und peripherische Nervensystem und die Nieren für Reizstoffe wie Alkohol, empfindlicher sind als die Gewebe des Gesunden.

Q. Tabak.

Sowohl Ärzte wie Kranke müssen berücksichtigen, daß die meisten Zuckerkranken, ebenso wie gegenüber Alkohol, auch für Nicotin überempfindlich sind. Wir begegnen bei Zuckerkranken außerordentlich oft Schäden am Herzen, am Gefäßapparat, am Nervensystem, an den Augen, welche zweifellos auf Nicotinmißbrauch zurückgeführt werden müssen oder unter dem gemeinsamen und gleichgerichteten Einflusse der Zuckerkrankheit und des Nicotins entstanden sind. Dies wird oft übersehen, namentlich bei Neuralgien und rheumatismusähnlichen Leiden. Es werden dann oft ganz nutzlose Badekuren verordnet. Gut geleitete Diätikuren helfen.

R. Süßspeisen als Nachtisch.

Süßspeisen als Nachtisch werden, namentlich von Kindern, von jungen Leuten und von Frauen ungern entbehrt. Aus dem Material der Tabelle I lassen sich ohne jegliche Verwendung von Mehl und Zucker zahlreiche Süßspeisen herstellen. Bewährte Vorschriften finden sich im Anhang (S. 90 ff). Man soll sich aber nicht darüber täuschen, daß sie durchgängig besonders große Sorgfalt von der Küche verlangen; sonst mißraten sie leicht und munden nicht. Die meisten Süßgerichte erfordern auch ziemlich bedeutenden Kostenaufwand.

Auch wenn die Süßspeisen nur aus Material der Tabelle I bereitet werden, spricht die Erfahrung dafür, daß sie doch mehr als angenehme Näscherei und nicht als sättigende Gerichte und ansehnliche Nährwertträger gelten dürfen. D. h. es sollen immer nur kleine Mengen davon verzehrt werden.

Man kann natürlich auch einen Teil der zustehenden Weißbrötchenwerte für Süßspeisen anlegen. Einige darauf eingestellte Rezepte finden als Beispiele sich gleichfalls im Anhang (S. 107).

III. Über die Anordnung der Mahlzeiten.

Die Einteilung der Mahlzeiten richtet sich teils nach Gewohnheit und allgemeiner Lebensweise, teils auch nach der jeweils gültigen Kostform. Z. B. vertragen die Patienten an Hafertagen u. dgl., an Gemüsetagen, oft auch an Gemüse-Mehl-Tagen (vgl. unten) keine langen Pausen zwischen den Einzelmahlzeiten. Bei gewöhnlicher strenger Diät, bei sog. halber Fleischkost, bei Mischkost muß man nur da auf häufigere Mahlzeiten bestehen, wo man durch reiche Fettgaben den Ernährungszustand heben will.

Wir gehen hier auf die Anordnung der oft verwendeten gewöhnlichen und strengen Diät (gleichzeitig gültig für „halbe Fleischkost“) und auf die Anordnung der Nebenkost (Tabelle III und IV) näher ein.

A. Anordnung der strengen Kost (Hauptkost).

I. Frühstück. Das erste Frühstück sei reichlich und führe dem Körper viel Nahrungsstoff zu. Daher wird es mit Eiern und Speck oder mit Schinken oder mehlfreien Wurstwaren ausgestattet. Dem Kaffee bzw. Tee dürfen (je nach Verordnung) im ganzen 2—3 Eßlöffel guter, fettreicher Rahm beigefügt werden. — Luftbrot, Butter.

II. Frühstück. Das zweite Frühstück als Zwischenmahlzeit (etwa 10¹/₂ Uhr) ist nur bei einem Teil der Patienten notwendig. Wenn es zu Hause genommen wird, genügt meist eine Tasse kräftiger Brühe mit Mus oder fein gehackten Stückchen von Gemüsen aus Tabelle I. Daneben können 1 Luftbrötchen mit Butter und 1 Sardine oder einige Kieler Sprotten oder Kaviar und dgl. gestattet werden. — Außerhalb des Hauses beschränkt man sich meist auf 1 gekochtes Ei (eventuell hart gesotten mitgenommen) oder auf geröstete Luftbrotschnitten mit Butter und Wurst- oder Pastetenbestrich (Rezept Nr. 59) oder Käsebelag. Das Luftbrot ist aber so zu verpacken, daß sein widerstandsloses Gewebe nicht zusammengedrückt wird.

Mittagessen. Im großen und ganzen machten wir die Erfahrung, daß Zucker Kranke die gleichen Nahrungsstoffe und -mengen besser vertragen, d. h. weniger leicht mit Zuckerausscheidung darauf reagieren, wenn sie sie zum Abendessen als zum Mittagessen nehmen. Es ist also im allgemeinen ratsam, nach Sitte fast aller nicht deutschen Länder die Abendmahlzeit auf Kosten der Mittagsmahlzeit stärker auszubauen. Hier richten wir uns aber nach den in Deutschland üblichen Gewohnheiten. Gegebenenfalls läßt sich die Anordnung der Mittagsmahlzeit mit der der Abendmahlzeit vertauschen.

Das **Normalmittagessen** bei strenger Kost setzt sich zusammen aus: Fleischbrühe, Knochenbrühe, Gemüsebouillon (S. 22) ohne oder mit Einlagen von Material aus Tabelle I. Einige besondere Rezepte für solche Einlagen finden sich im Anhang S. 72 ff.

(Vorspeise aus Material der Tabelle I; je nach Art derselben mit Luftbrot und Butter. Eine größere Zahl von Vorspeisengerichten im Anhang S. 81.)

Fisch- oder Fleischgericht mit Tunken aus Material von Tabelle I (s. auch entsprechende Rezepte S. 76) und anderen Beilagen aus der gleichen Tabelle. — Dazu reichliches Gericht von Gemüse aus Tabelle I (s. Bemerkungen auf S. 25) und von Salat (S. 29).

Luftbrot, Butter, Käse oder äußerst zuckerarmes Kompot (S. 32) oder einige Nüsse (S. 38) oder mehl- und zuckerfreie Diabetiker-Süßspeise (Rezepte S. 90).

Eine kleine Tasse Kaffee nach Wunsch.

Nachmittags. Die meisten Zuckerkranken beschränken sich Nachmittags auf 1—2 Tassen mittelstarken Kaffees oder Tees mit 1—2 Eßlöffel guten fetten Rahmes. Dazu Luftbrot oder äußerst mehlarmses Hartgebäck (S. 38) mit Butter. Statt Tee und Kaffee ist auch Kakao statthaft (S. 46).

Abendessen. (Vorspeise wie Mittags). Gekochte Eier, Eierspeise ohne Mehl, oder warmes oder kaltes Fleisch- oder Fischgericht. Nur eines dieser Gerichte ist statthaft.

Gemüse oder Salat wie Mittags.

Luftbrot, Butter, ein wenig Käse (20—30 g).

Sehr zweckmäßig ist auch ein Abendessen aus ca. 200 g gut ausgewaschenem Siebkäse (S. 33), mit einigen Eßlöffeln fettreichem Rahm angemischt. Dazu Luftbrot mit Butter, welcher anregenderen Geschmacks wegen Sardellen- oder Anchovispaste zugesetzt werden kann.

B. Über Verteilung der Nebenkost.

Was hier zu sagen ist, dient gleichzeitig als Beispiel für die Benutzung der Tabellen III und IV.

Im allgemeinen ist es nicht ratsam, Stücke aus der Nebenkost, die ja Stärkemehl und in den Früchten auch Zucker enthalten, auf das 1. Frühstück und überhaupt auf die Vormittagsstunden zu verlegen. Wenn wir zu dieser Tageszeit auf solche Nahrungsmittel verzichten, schaffen wir — täglich wiederkehrend — eine mindestens 18stündige Pause in der Kohlenhydratzufuhr (vom Abend- bis zum Mittagessen), und dies dient zur Erholung des zuckerbildenden Apparates. Wir können uns aber auch die gleiche Pause verschaffen, wenn wir die Kohlenhydratträger auf Morgen-, Vormittags- und Mittagsstunden verteilen, die Nachmittags- und Abendmahlzeit aber damit nicht belasten. Diese letztere Anordnung ist namentlich bei solchen Zuckerkranken empfehlenswert, die gewohnt sind, abends stark zu essen. Bei reichlicher Abendmahlzeit werden die Kohlenhydratträger von ihnen meist lieber entbehrt, als beim Frühstück.

Sowohl für den Arzt wie auch zum besseren Verstehen des ärztlichen Gedankenganges für die Patienten ist es zu wissen notwendig, daß man die Kohlenhydratträger lieber und reichlicher an solchen Tagen und in solchen Perioden gewähren soll, wo der Fleisch- und überhaupt der gesamte Eiweißverzehr beschränkt ist. Mit völlig oder nahezu völlig ungebundener Fleisch- und Eiweißkost pflegt man — von gewissen, allerdings nicht ganz seltenen Ausnahmen abgesehen — größere Mengen von Kohlenhydratträgern nur in solchen Fällen zu verbinden, die sich auf Grund längerer Beobachtung als harmlos und nicht zum Fortschreiten geneigt erwiesen haben. Dies im Einzelfalle zu beurteilen und zu ordnen, ist natürlich Sache des Arztes.

Wir verordnen die Nebenkost (Kohlenhydratträger) in Form von Weißbrötchen — in den folgenden Beispielen = 100 g Weißbrötchen — und überlassen es in der Regel dem Patienten, anstatt der gesamten Menge oder eines Teiles derselben anderes Material aus den Tabellen III und IV zu wählen. Gar nicht selten müssen wir freilich aus bestimmten Gründen die Auswahl beschränken (vgl. S. 10).

I. Beispiel. 100 g Weißbrot oder entsprechende Mengen anderes Brot sollen in Brotform nur über Mittag- und Abendessen verteilt werden.

Mittagszulage: 50 g Weißbrötchen

oder: 67 Graham-Weizenbrot (Tab. III, S. 11)

oder: 62 gewöhnliches Roggenbrot

Abendzulage: das gleiche wie mittags.

II. Beispiel. Da dem Patienten zur Unterlage für Butter und Belag die bei strenger Kost gestatteten Luftbrötchen und dgl. genügen, wünscht er mittags und abends statt des Brotes andere Gerichte zu genießen.

Er wählt als Mittagszulage: 120 g Kartoffeln = 40 g Weißbrötchenwert (WBW)

60 g Äpfel = 10 g WBW

Abendzulage: 36 g Reis = 40 g WBW

60 g Äpfel = 10 g WBW

III. Beispiel. Der Patient wünscht und erhält die Erlaubnis, die gestattete Weißbrotmenge in kleineren Portionen über den Tag zu verteilen und zwar in möglichst verschiedener Form:

I. Frühstück: 20 g Weißbrot = 20 g WBW

II. Frühstück: 18 g Hafer = 20 g WBW

Mittags: 60 g Kartoffeln = 20 g WBW

Nachmittags: 60 g Äpfel = 10 g WBW

Abends: 27 g Reis = 30 g WBW

oder:

- I. Frühstück: 30 g Schwarzbrot = 20 g WBW
- II. Frühstück: $\frac{1}{4}$ L. Milch = 20 g WBW
- Mittags: 60 g Kartoffeln = 20 g WBW
- Nachmittags: $\frac{1}{4}$ L. Milch = 20 g WBW
- Abends: 120 g Äpfel = 20 g WBW

oder:

- I. Frühstück: 20 g Weißbrot = 20 g WBW
- II. Frühstück: $\frac{1}{4}$ L. Milch = 20 g WBW
- Mittags: 120 g Kartoffeln = 40 g WBW
- Abends: 280 cc Lagerbier = 20 g WBW.

IV. Beispiel. Der Patient wünscht und erhält die Erlaubnis, die gestattete Weißbrotmenge in Form verschiedenen Materials auf die Morgen-, Vormittags- und Mittagstunden zu verteilen:

- I. Frühstück: 30 g Schwarzbrot = 20 g WBW
- II. Frühstück: 36 g Hafer = 40 g WBW
- Mittags: 60 g Kartoffeln = 20 g WBW
- 120 g Äpfel = 20 g WBW.

V. Beispiel. Falls die Abmessung der Zulagen nach Eßlöffelwerten (Vgl. S. 17) erfolgen soll, könnte sich folgendes ergeben:

- I. Frühstück: 20 g Weißbrot = 20 g WBW
- II. Frühstück: 18 g Hafer = 20 g WBW
- Mittags: Zwei mäßig stark gehäufte Eßlöffel Kartoffel-
speise = 20 g WBW
- Nachmittags: 3 gehäufte Eßlöffel gekochtes Obst = 20 g WBW
- Abends: 5 mäßig gehäufte Eßlöffel Schwarzwurzel-
gemüse 20 g WBW.

IV. Über verschiedene Kostformen.

Wir geben im folgenden eine Übersicht über verschiedene Kostformen, die für die Behandlung von Zuckerkranken in Betracht kommen. Die Angaben sollen nur ihre Grundform darlegen und Richtlinien vorzeichnen. Im einzelnen sind sie je nach Lage des Einzelfalles der Einschränkung oder Erweiterung fähig und bedürftig; ohne ihren Zweck zu verfehlen, gestatten sie mannigfachen Austausch einzelner Nahrungsmittel gegen andere, jeweiligem Bedarf und Wunsche entsprechend.

A. Gewöhnliche strenge Kost.

Hierunter verstehen wir eine Kost, bei der die Nahrungsmittel, Speisen und Getränke der **Hauptkost** (Tabelle I und II) freigegeben sind, und bei der als Gebäck nur Luftbrot ge-

stattet ist. Die Belehrungen auf S. 19 ff. sollten sorgfältig berücksichtigt werden. Einen Speisezettel für diese Kostform hier zu entwerfen, erübrigt sich, da wir auf früheres (S. 49) und ferner auf den weiter unten folgenden Speisezettel für „Probekost“ verweisen können (S. 58, die mit gewöhnlichen Kleinlettern gedruckten Gerichte!).

Die Erfahrung lehrt, daß bei dieser Kost die hauptsächlichsten Eiweißträger unserer Nahrung: Fleisch, Käse, Eier oft in übertriebener Menge verzehrt werden; von Männern hauptsächlich Fleisch und Käse, von Frauen hauptsächlich Eier. Daraus können Nachteile sowohl für den Zuckerhaushalt wie für manche Organe entstehen. Daher empfiehlt es sich, daß auch bei dieser Kost der Arzt für den Verzehr jener starken Eiweißträger die obere Grenze festlegt. Wenn keine Gegengründe vorliegen, soll, berechnet auf ein Körpergewicht von 70 kg, bei dieser Kostform 120 g Eiweiß die obere Grenze für den Tagesverzehr sein.

Für den Arzt ist es fast unmöglich, aus den Angaben der Patienten den wahren Eiweißverzehr zu berechnen. Guten Anhalt gibt aber der Stickstoffgehalt des Urins. Gewöhnlich entfallen auf 1 g Nahrungseiweiß 0,145 g Harnstickstoff. Bei Verzehr von 120 g Eiweiß dürfen also nicht mehr als 16—18 g Stickstoff im 24stündigen Harn erscheinen.

Man läßt häufig eiweißreichere und eiweißärmere Kost in kurzen oder längeren Perioden miteinander abwechseln. In solchen Fällen genügt es vollkommen, wenn der durchschnittliche Eiweißverzehr (Mittel aus den eiweißreichen und eiweißarmen Perioden) auf 70 kg Körpergewicht berechnet 70 bis höchstens 85 g beträgt (oder = 1,0 bis 1,2 g Eiweiß pro 1 kg Körpergewicht). Hierbei würden im Urin durchschnittlich erscheinen 10—12 g Stickstoff = 14 bis 16 g Stickstoff pro 1 kg Gewicht.

Beispiel: Körpergewicht = 80 kg.

Im Urin = 25 g Stickstoff in 24 Stunden,

„ „ = 31 cg Stickstoff pro 1 kg,

verzehrtes Eiweiß = 0,145: 1=0,31: x; x = 2,14 g pro 1 kg,

berechnet auf 70 kg Gewicht x = 1,87 g pro 1 kg,

verzehrtes Eiweiß insgesamt = ca. 172 g,

berechnet auf 70 kg Gewicht = ca. 150 g.

Es ergibt sich also ein ungewöhnlich und auf die Dauer unerträglich hoher Eiweißverzehr.

Die auf diese Weise gewonnenen Zahlen haben keine wissenschaftliche, wohl aber eine praktisch zureichende Genauigkeit. Um letztere zu gewährleisten, darf man sich allerdings nicht auf die Analyse von einem einzelnen herausgegriffenen Tage stützen, sondern man sollte über den Durchschnittswert mehrerer einander folgenden Tage verfügen.

B. Halbe Fleischkost.

Unter halber Fleischkost verstehen wir eine Abart der gewöhnlichen strengen Diät (S. 52), bei welcher auf 70 kg Körpergewicht berechnet, mit kleinen Schwankungen nach oben und unten, nicht mehr als durchschnittlich 10 g Stickstoff im 24stündigen Urin erscheinen. Dies entspricht einem Eiweißverzehr von ca. 70 g. Daß hier vornehmlich die Fleischzufuhr begrenzt werden muß, geht schon daraus hervor, daß 100 g mittelfettes Rohfleisch mindestens ca. 20 g, die gleiche Gewichtsmenge genußfertigen Fleisches im Mittel ca. 28 g Eiweiß enthalten. Der Beschränkung müssen aber gleichzeitig auch die anderen hauptsächlichlichen Eiweißträger: Eier und Käse unterliegen; denn es ist nicht im Sinne dieser, beschränkten Eiweißumsatz anstrebenden Kost, das Fleisch zu beschneiden und dafür Überfütterung mit anderen Eiweißträgern zuzulassen. Es gibt allerdings Fälle, wo gerade das Fleisch wegfallen muß, während es auf das Fernhalten und starke Beschränken anderer Eiweißträger weniger ankommt. In der Regel aber hat man es bei dieser Kost als gleichgültig zu betrachten, aus welchen besonderen Eiweißträgern das Eiweiß stammt, und es ist nur eine Frage der jeweiligen Umstände, ob überhaupt und in welchem Umfange man wirkliches Fleisch (Säugetiere, Vögel, Fische usw.) heranzieht, und in welchem Umfange man den Eiweißwert des Fleisches durch andere Eiweißträger ersetzt.

Die praktische Erfahrung lehrt, daß man bei längerem Bestande dieser Kost den berechtigten Wünschen der Patienten am besten entspricht, wenn man die Hälfte der zugebilligten Eiweißmenge in Fleisch anzulegen rät. Bei 70 g Eiweißverzehr sind das 35 g. Sie sind enthalten in 125 g genußfertigem gekochtem oder gebratenem Fleisch.

Die kleinen Abweichungen von mittlerer Zusammensetzung (28% Eiweiß) gleichen sich bei wechselnder Auswahl des Materials und der Zubereitung aus. Die Abwechslung erleichtern folgende Zahlen, die aus früheren Angaben ergänzt werden können.

100 g genußfertigem Fleisch mittleren Fettgehaltes sind in bezug auf Fleischwert (Eiweißgehalt) gleichwertig:

- 140 g gekochtes oder gebratenes Fischfleisch,
 110 „ Hartwurst (Salami, Zervelat),
 140 „ weiche Streichwurst (Mettwurst, Streichwurst),
 200 „ fette Schinkenwurst,
 220 „ Frankfurter Würstchen,
 180 „ Leberwurst,
 300 „ durchwachsender Speck (schierer Speck ist fast eiweißfrei!),
 120 „ roher Schinken und mittelfetter gekochter Schinken,
 140 „ gekochtes Kalbsbries,
 4 Hühnereier normaler Größe (in Gewicht zusammen = 200 g),
 90 g magere Käsearten,
 110 „ fettreiche Käsearten,
 130 „ Erbsen oder Linsen (Trockenware, roh),
 160 „ weiße Bohnen (Trockenware, roh).

Wie sich der Patient die Eiweißträger und zumal die zugebilligte Fleischmenge über den Tag verteile, hat der Arzt mit ihm zu besprechen. Bei dieser Kost mit beschränkter Eiweißzufuhr ist unter Umständen auch der Eiweißgehalt kleiner Räucherfische u. dgl. (S. 9), ferner der Eiweißgehalt der Gemüse, des Gebäckes und überhaupt aller Speisen zu beachten. Wir stellen hier einige Durchschnittswerte häufig wiederkehrender Speisen zusammen. Andere findet man in den früheren Tabellen.

In 100 Gramm	Eiweiß	Äquivalent dem Eiweißgehalte von
Milch	3,2 g	11 g zubereitetem Fleisch
Rahm	3,5 „	12 „ „ „
Weizenbrot	7,0 „	25 „ „ „
Roggenbrot	6,0 „	20 „ „ „
Haferflocken	12,0 „	40 „ „ „
Kakao	11,0 „	39 „ „ „
Erbsenbrei	12,5 „	46 „ „ „
Grüne Erbsen, gekocht	5,5 „	19 „ „ „
Kartoffelgerichte (Mittel)	2,2 „	8 „ „ „
Kohl- und Blattgemüse (genußfertig), im Mittel	2,2 „	8 „ „ „
Linsen- und Erbsensuppe, dünn	4,0 „	14 „ „ „
Gersten-, Reis-, Haferflockensuppe (dünn)	1,5 „	5 „ „ „
Kartoffelsuppe (mitteldick)	1,2 „	4 „ „ „
Luftbrötchen (O. Krumm, S. 39)		

Das folgende Beispiel stellt einen der strengen Kost mit beschränkter Eiweißzufuhr entsprechenden Speisezettel dar, der auf etwa 70 g tierisches Eiweiß berechnet ist. Fette sind reichlich eingestellt. Daß die Fettmenge sich nach Lage des Falles richten muß, ist selbstverständlich.

1. Frühstück: Tee oder Kaffee mit $\frac{1}{10}$ l Rahm, Butter, schierer Speck, 2 Luftbrötchen

1 Ei = 6 g Eiweiß.

2. Frühstück: Bouillon mit Mark oder Gemüsesuppe mit 50 g Speck.

Mittags: Suppe wie bei 2. Frühstück,

reichlich Gemüse und Salate,

125 g Fleisch oder 175 g Fisch (zubereitet gewogen)

= 35 g Eiweiß.

30 g Käse mit Butter

= 10 g Eiweiß.

1 Luftbrötchen.

Vesper: wie Frühstück ohne Ei.

Abends: nach Belieben Suppe wie bei 2. Frühstück. 1 Ei in irgend-einer Form oder 25 g Schinken

= 6 g Eiweiß.

Gemüse, Salat mit Fett zubereitet, 1 Luftbrötchen mit Butter

30 g Käse = 10 g Eiweiß.

Soll neben dem Eiweiß auch eine Beschränkung der Fette und der Gemüse stattfinden, so kann man folgende Verordnung geben; sie entspricht der Joslinschen Diätform PF 12 und hat bei einem Gehalt von 70 g Protein und 100 g Fett einen Nährwert von 1270 Calorien.

1. Frühstück: Tee oder Kaffee mit 25 g Butter und 2 Luftbrötchen, 1 Ei.

2. Frühstück: Bouillon mit Mark.

Mittags: Bouillon,

300 g Gemüse mit 15 g Speck,

125 „ Fleisch.

Nachmittags: wie bei 1., aber ohne Ei.

Abends: 300 g Gemüse mit 15 g Speck, 1 Ei.

Dies ist natürlich eine sehr knappe Kost, und auf die Dauer ist sie auch wegen ihrer Einförmigkeit unzulänglich.

C. Entfettungskost bei Zuckerkranken (Diabetiker-Banting-Kost).

Bei fettleibigen Diabetikern kann es wünschenswert sein, eine energische und schnell wirkende Entfettung anzustreben, ohne daß man gleichzeitig Kohlenhydrate, oder während man nur sehr wenig von letzteren geben will. Fett ist unter

allen Umständen in weitestgehendem Maße zu meiden. Wir machten immer aufs neue die Erfahrung, daß unter solchen Umständen von Zuckerkranken in der Regel eine sehr eiweißreiche Kost mit Zugabe inhaltsarmer Gemüse bei weitem am besten vertragen wird und mit einem erheblichen Gewinn an Frische und Leistungsfähigkeit und gleichzeitig mit günstigem Einfluß auf den Zuckerhaushalt abschließt. Da diese Kost starke Ähnlichkeit mit der schon sehr alten Bantingschen Entfettungskur hat, nannten wir sie „Diabetiker-Banting-Kost“. Man wird solche Kuren niemals länger als drei Wochen, und man sollte sie lieber unter klinischer Obhut durchführen. Für andere Fälle eignet sich besser eine rein vegetabile oder lakto-vegetabile Entfettungskost mit viel Kohlenhydrat (S. 68). Wir sahen aber ziemlich viele Zuckerkranken, die ein solches Verfahren in sog. Naturheilanstalten durchgemacht hatten und dadurch in bedauerndem Grade von Kräften gekommen waren.

Der Diabetiker-Banting-Kost fügen wir manchmal als „Nebenkost“ Kohlenhydratträger in Form mäßiger Mengen von Obst hinzu. Andere Male ist es vorteilhafter, die Kohlenhydratträger nach je 4, 5 oder 6 Bantingtagen auf einen einzigen Tag zusammenzuhäufen. Der hemmende Einfluß auf Bildung von Acetonkörpern ist in beiden Fällen ungefähr der gleiche.

Beispiel für strenge Diabetiker-Banting-Kost.

1. Frühstück: Kaffee, Tee (ohne Zutat), nach Wunsch mit Zitronensaft.

2 Eier, 1 Luftbrötchen, 5 g Butter.

2. Frühstück: 50 g mageres, salzarmes Fleisch oder 50 g Mainzer Handkäse oder 50 g frischer Topfenkäse (Gewicht nach gründlichem Auswaschen, siehe S. 33, und starkem Abpressen). — 1 Luftbrötchen.

Mittagessen: wenig klare, abgefettete Suppe mit Gemüse, 150 g mageres salzarmes Fleisch, am Rost gebraten, oder die gleiche Menge aus einem Braten (Krusten entfernen). Gemüse mit ganz wenig Fett zubereitet. Salat ohne Öl (Lattich, Gurken, Sellerie, rote Rüben, Radieschen, Rettich, Tomaten).

Vesper: Kaffee oder Tee, 1 Luftbrötchen, 5 g Butter.

Abends: 100 g mageres Fleisch, wie mittags, fettarm zubereitetes Gemüse, Salat ohne Öl, Radieschen, Luftbrot mit 5 g Butter. $\frac{1}{10}$ l leichter Wein ist je nach Umständen als Tagesmenge erlaubt.

Die in diesem Beispiel angeführte Kost enthält ungefähr 110 g Eiweiß, 25 g Fett, Spuren Kohlenhydrat; Nährwert ca. 750 Calorien.

Kohlenhydrat - Nebenkost (je nach Umständen zugefügt oder fortgelassen): zweimal 1 Apfel von ca. 200 g Gewicht (roh oder gebraten). Statt dessen auch eingeschobene Schalt- oder Entlastungstage mit viel Kohlenhydrat, sehr wenig Eiweiß und Kochsalz, kein Fett.

D. Speisezettel bei Probekost, zugleich Beispiel für strenge Diät (Hauptkost) mit Zulagen aus kohlenhydrathaltiger Nebenkost.

Es ist von praktischer Bedeutung, ebenso wie bei Magen-, Darm-, Nierenkranken u. a. über eine nach bestimmten Gesichtspunkten geordnete „Probekost“ zu verfügen. Mit Hilfe einer solchen kann man leicht den Stand der Dinge bei verschiedenen Zuckerkranken und den Wechsel der Stoffwechsellage bei ein und demselben Zuckerkranken miteinander vergleichen. Natürlich kann sich jeder Arzt seine eigene Probekost zusammensetzen. Besser wäre es, wenn man dies einheitlich regelte. Wir teilen hier eine Probekost mit, auf die wir bei Beginn klinischer Behandlung die Patienten gewöhnlich auf einige Tage einstellen, und von der wir nur abweichen, wenn die Lage des Falles dazu zwingt. Wir statten diese Kost mit reichlicher, aber nicht übertriebener Eiweißmenge (120 g) und mit mittleren Mengen Kohlenhydrat (100 g Weißbrötchenwert) aus. In der Tabelle findet man die Kohlenhydratträger **fett gedruckt**. Ferner findet man in *Kursivschrift* die Mengen einiger anderer Nahrungsmittel und Gerichte verzeichnet, welche den entsprechenden Brotmengen äquivalent sind. Von solchen Abarten der Kost machen wir aber, größerer Einheitlichkeit und Sicherheit halber, an den Probekosttagen selbst gewöhnlich keinen Gebrauch.

1. Frühstück: Kaffee, Tee, eventuell mit Zusatz von 2—3 Eßlöffel Rahm, 2 Eier, 2 Luftbrote mit reichlich Butter.
 2. Frühstück: Fleischbrühe mit Einlage von Knochenmark oder Eidotter, 2 Sardinen (50 g).
- Mittags: Suppe wie bei 2.,
 125 g Fleisch (zubereitet gewogen),
 reichlich Gemüse mit Butter, Speck oder Bratenfett zubereitet,

30 g Käse mit Butter,
 50 g Weißbrot
 oder 90 g Kartoffeln und 1 Apfel von 150 g Gewicht.

Nachmittags: Kaffee oder Tee mit 30 g Rahm, 1 Luftbrot mit Butter,
 1 Ei.

Abends: Vorspeise aus 50 g Sardinen oder Sprotten,
 100 g Fleisch (zubereitet gewogen),
 Gemüse mit Butter oder Fett zubereitet,
 30 g Käse mit Butter,
 50 g Weißbrot
 oder 25 g Schrotbrot und ein Pfannkuchen aus 25 g Buchweizen-
 mehl (mit Rahm, Fierschnee, Eigelb, Salz bereitet).

Der Gehalt dieser Kost an animalischem Eiweiß beträgt
 etwa 130 g; ihr Kohlenhydratgehalt 60 g.

E. Gemüsetag mit Eiern.

Die Gemüse-Eierkost wird bei Zuckerkranken sehr häufig
 angewandt, teils in Form einzelner Tage, teils in kurzdauernden
 Perioden von 2—4 Tagen, teils auch während längerer Zeit-
 räume; in letzterem Falle allerdings meist unterbrochen durch
 1—3 Kohlenhydrattage (Typus: Hafertage u. dgl.).

1. Frühstück: Tee oder Kaffee ohne Zutaten, Luitbrötchen (in
 natürlichem Zustande oder in Scheiben geschnitten und geröstet),
 Butter, 3 Eidotter in der Pfanne mit 50 g nicht durchwachsenem
 Speck gebraten.

2. Frühstück: Eine Tasse Gemüsesuppe (S. 22, Gemüse au Tabelle I)
 mit etwa 40 g Knochenmark (in Scheiben geschnitten).

Mittagessen: Fleischbrühe oder Brühe aus Cenovisextrakt (S. 3) mit
 1 Eidotter und mit Einlage von Gemüse aus Tabelle I.

2 Eier in beliebiger Form, ohne Mehl, zubereitet.

Reichlich Gemüse und Salat aus Tabelle I.

50 g nicht durchwachsener Speck (oder Butter oder Öl) zu Suppe,
 Gemüse, Salat, Eiern zu verwenden.

Kaffee ohne Zutat.

Nachmittags: Kaffee oder Tee ohne Zutat, Luftbrot und Butter.

Abends: wie Mittags.

Die Fettzufuhr setzt sich bei dieser Kost in der Regel
 zusammen aus 100 g nicht durchwachsenem Speck, 40 g
 Knochenmark, 80—100 g Butter, 20 g Salatöl, 35 g Eidotter-
 fett. Der Eiweißgehalt der Kost ist ungefähr 70 g. Kohlen-
 hydrate sind nur in sehr kleinen Mengen in den Luftbrötchen
 (im ganzen auf ca. 50 g zu beschränken!) vorhanden.
 Calorienwert der Kost ungefähr = 2200.

Die auf den Tag entfallende Gemüsemenge, in gekochtem Zustande, beträgt durchschnittlich 500 g (bei starkem Verzehr von Spargel etwa 800 g). Auf Salate sind weiterhin etwa 300 g zu rechnen. Die Gemüse sollen salzarm zubereitet werden; dagegen ist Beigabe von Gewürzen erlaubt. Essig (zum Salat) und Citronensaft nach Belieben.

Über Genuß von Wein oder Branntwein ist besonders zu bestimmen.

F. Eiertag mit Gemüsezulagen.

In mancher Beziehung übereinstimmend mit der vorstehend geschilderten Diät, unterscheidet sich diese, gewöhnlich nur für einzelne eingeschobene Tage benützte Kostform von jener durch das Überwiegen der Eier, durch verhältnismäßige Armut an Fett und durch Einschränkung der Gemüsemenge.

Wir gestatten an diesen Tagen 5(—6) Eier, die hart gesotten werden. Der Patient soll sie sich in Scheiben zerschneiden und diese oberflächlich mit Butter bestreichen. Von Gemüse stehen nur zur Verfügung: Sauerkraut, Kopf- und Endiviensalat, Tomaten, Gurken. Zum Salat darf Essig oder Citronensaft, aber nur wenig Öl benutzt werden. Für den Tag stehen (je nach ärztlicher Vorschrift) 50—60 g Butter zum Eierbestrich zur Verfügung. Ob Kochsalz erlaubt ist, muß der Arzt entscheiden. Tee, Kaffee und — je nach Umständen — etwas Wein und Branntwein erlaubt.

1. Frühstück: Kaffee, 1 Ei, Luftbrot, 15 g Butter.

2. Frühstück: klare Bouillon.

Mittags: klare Bouillon, 2 Eier, 1 Luftbrot, 15 g Butter, Sauerkraut, Salat, Gurken oder Tomaten mit wenig Fett zubereitet.

Vesper: Kaffee, 1 Luftbrot, 15 g Butter.

Abends: Bouillon, 2 Eier, 1 Luftbrot, 15 g Butter, Salat oder Gemüse wie mittags.

Diese Kost enthält, abgesehen vom Luftbrot, 35 g Eiweiß und 50 g Fett, mithin 700 Calorien.

G. Gemüsetag mit Eidottern (verschärfte Gemüsetage).

Diese Form stellt insofern eine Verschärfung der Form E dar, als durch Wegfall des Eierklars der Eiweißgehalt um ca. 15 g tiefer steht.

Die Anordnung der Kost ist die gleiche wie an „Gemüsetagen mit Eiern“, nur werden mittags und abends statt der 2 ganzen Eiern je 2 Eidotter verabfolgt.

Gehalt der Kost ungefähr 40 g Eiweiß (abgesehen vom Luftbrot), 250 g Fett, sehr kleine Mengen Kohlenhydrat, ca. 2000 Calorien.

H. Petrán's Gemüse-Fettkost.

Diese Kostform stellt nur eine besondere Form der seit langem gebräuchlichen verschärften Gemüsekost dar, indem sie auf möglichst geringe Eiweiß- und Kohlenhydratzufuhr bei sehr reichen Fettgaben ausgeht. Sie enthält ungefähr 2000 Calorien.

1. Frühstück: Tee oder Kaffee, 1 Eigelb mit etwas Kognak.

2. Frühstück: Gemüse mit 50 g Fett zubereitet (Butter oder Speck).
Mittags: Gemüse mit 100 g Fett zubereitet, Salat, Radieschen, Gurken, Rhabarber oder Preiselbeerkompott.

Vesper: Tee oder Kaffee, 2 Eigelb mit Kognak.

Abends: Gemüse und 100 g Fett, Kompott wie mittags. Nach Bedarf können auch 3—4 Luftbrote genommen werden. Ein Teil des Fettes kann durch guten Rahm ersetzt werden.

Neuerdings gibt K. Petrán über seine Kostform folgende Vorschriften:

Von Gemüsen: Grünkohl, Weißkohl, Spinat, Blumenkohl, Rhabarber, verschiedene Arten grüner Bohnen, Erbsenschoten, Gurken (jeden dritten Tag wenig Topinambur). Gewicht pro Tag 800—1000 g.

Von Obst: Apfel, Erdbeeren (Mengen nicht angegeben); Preiselbeeren bis zu 500 g.

Von Fett: 200—250 g in Form von Butter oder schierem Speck.

Von Sahne, mit 30% Fettgehalt, bis zu 150 ccm als Maximum.

Reine Fleischbrühe, Kaffee, Tee.

$\frac{1}{2}$ Flasche Bordeauxwein, gelegentlich.

I. Fettarme, knappe Gemüsekost.

Diese Kost steht den „Hungertagen“ (siehe unten) nahe. Bei sehr geringem Nährwert bietet sie immerhin die Annehmlichkeit einer gewissen Magenfüllung. Wir bevorzugen an diesen Tagen: Sauerkraut (gut ausgewaschen!), Spargel, Kopf- und Endiviensalat, Gurken, Tomaten, junge grüne Bohnen, die noch keine oder nur äußerst kleine Kerne angesetzt haben (Haricots verts), Blumenkohl in Wasser gekocht (nicht gedämpft). Die rohen Gemüse (Salate, Tomaten, Gurken, auch ungekochter Sauerkrautsalat) werden an solchen Tagen meist vorgezogen.

1. Frühstück: Kaffee, Tee, 15 g Butter, 1 Luftbrot.
 2. Frühstück: klare Bouillon.
 Mittags: klare Bouillon, 300 g Gemüse mit 15 g Butter oder Speck,
 1 Ei, Salat, Tomaten, Gurken mit wenig Öl.
 Vesper: wie 1. Frühstück.
 Abends: wie mittags.

K. Hungertage.

An diesen Tagen wird nichts gereicht außer Kaffee und Tee ohne Zutaten; 2—3 mal am Tage eine Tasse klarer, abgefetteter Fleisch- oder Hühnerbrühe; Mineralwasser mit Citronensaft; ferner 80—100 ccm Branntwein (Korn, Kirsch, Kognak, Whisky u. dgl.) mit Mineralwasser verdünnt.

An solchen Fasttagen doppelkohlensaures Natron zu geben, wie es oft geschieht, ist unzweckmäßig.

Es soll für äußerste körperliche und geistige Ruhe gesorgt werden. Daher gehören die Patienten an diesen Tagen ins Bett. Um Erregungen, u. a. das lästige Gefühl des Hungerns zu dämpfen, verordnen wir stets dreimal täglich eine Tablette Somnacetin oder 0,05 g Luminal oder 0,25 g Adalin.

Je nach Umständen dauert das Fasten vom Vorabend über den eigentlichen Hungertag bis zum nächsten Morgen (ca. 36 Stunden) oder bis zum nächsten Mittag (ca. 40 Stunden).

L. Kohlenhydrattage.

Alle hierhergehörigen Kostformen sind hervorgegangen aus den sog. „Hafer Tagen“, die in gewisser Form zu Gruppen vereinigt (siehe unten) die Hafer- und Kohlenhydratkuren bilden.

1. **Normale Haferstage:** Es sollen für den Tag verwendet werden 150—250 g bestes Hafermehl oder Haferflocken. Hieraus werden Suppen bereitet. Sie sollen bei Verwendung von Mehl etwa 1 Stunde, bei Verwendung von Flocken $1\frac{1}{2}$ —2 Stunden auf dem Feuer stehen, müssen daher wegen der Wasserverdunstung mit entsprechend reichlich Wasser angesetzt werden. Die Gesamtmenge ist auf 5—6 Mahlzeiten zu verteilen. Ob man die ganze Hafermenge auf einmal zur Suppe ansetzt und nachher die einzelnen Portionen wieder erhitzt, oder ob man jede einzelne Portion für sich kocht, ist gleichgültig. Um keinen Materialverlust zu erleiden, werden die Suppen nicht durchgeschlagen. Wenn glatte Suppen ge-

wünscht werden, greife man zum Hafermehl. Würzen mit Suppengrün und ein wenig Cenovisextrakt ist gestattet und um so empfehlenswerter, als man an den Hafertagen Salz möglichst meiden soll. In der Küche sollen die Suppen überhaupt nicht gesalzt werden. Dem Patienten sollen zum eigenen Salzen maximal 5 g Kochsalz zur Verfügung stehen.

Beim Anrichten wird den einzelnen Portionen, während sie siedend heiß sind, Butter eingerührt. Die Tagesmenge der Butter betrage ebensoviel wie die des Hafermaterials, also 150—250 g. Doch gibt es Fälle, wo man die Fettmenge erheblich tiefer einstellen muß, z. B. bei Magen- und Darmstörungen und bei komagefährdetem Zustande.

Außer dem Hafer sind erlaubt: Tee, Kaffee, klare Fleischbrühe, Rotwein, Branntwein (nach Verordnung), Saft frischer Zitronen zu Wasser oder Tee.

Doppelkohlen-saures Natron soll an diesen Tagen nicht genommen werden; auch Mineralwasser ist unzweckmäßig.

Ein Teil des Hafers wird oft gerne, namentlich zum 1. Frühstück und zum Abendessen in Form dicken Breies (Porridge) genommen. Das eigentliche Samenkorn des Hafers ist bei Hafergrütze in feine Stückchen zerschnitten. Am besten bewährte sich uns dafür die C. G. Bendersche Hafergrütze (Frankfurt a. Main, Kl. Sandgasse 4): 40 g werden mit ein wenig Butter auf der Pfanne leicht goldgelb geröstet, dann in einer Kasserolle mit $\frac{1}{4}$ l heißem Wasser innig vermengt. Die zugedeckte Kasserolle wird 30—40 Minuten lang in siedendem Wasserbade erhitzt. Das fertige Gericht wird mit etwa 20 g Butter verzehrt.

Hafergrütze ist für dieses Gericht geeigneter als Haferflocken.

2. Gemüsezulagen: Wo es wünschenswert ist, den Hafer durch gewisse andere Gerichte erfrischenden Geschmacks zu ergänzen, gestatten wir sehr oft mittags und abends Kopf- oder Endiviensalat, Tomaten, Gurken. Zubereitung in gewöhnlicher Weise mit Essig und Öl, aber möglichst ohne Salz. Diese Zulagen sind auch an anderen Mehlkosttagen erlaubt.

3. Andere Mehle als Haferersatz. Obwohl an Mehltagen Hafer als einziger Kohlenhydratträger sich im großen und ganzen am besten bewährt hat, kann man auch zu anderen Mehlsorten greifen und muß es tun, wenn der eigenartige Hafergeschmack widersteht. Seit langem haben sich als Ersatz bewährt: Grünkernmehl und -grütze, Weizenschrotmehl, Gerstenmehl, Buchweizenmehl und -grütze, Knorr-sches Linsen- und

Erbsenmehl. Obwohl sie unter sich nicht ganz gleichwertig sind, können sie doch ohne weiteres an Stelle des Hafers treten.

4. Mischung verschiedener Kohlenhydratträger. Die eigenartige Wirkung der Kohlenhydrattage macht sich im allgemeinen am besten geltend, wenn man sich auf einen einzigen Kohlenhydratträger beschränkt, z. B. auf Hafer oder auf Grünkern usw. Man kann aber auch verschiedene Kohlenhydratträger an ein und demselben Tage verwenden, z. B. verschiedene Mehle, Mehlspeisen, Gebäcke. Hierfür gelten folgende Austauschwerte:

20 g Hafer =	15 g feines Weizenmehl,
	= 20 „ Grünkern, Buchweizen, Reis, Linsenmehl, Erbsenmehl,
	= 25 „ Weizen-Schrotbrot (Grahambrot),
	= 60 „ Kartoffeln.

Diese Austauschwerte stimmen nicht ganz mit unserer Äquivalententabelle (S. 10 ff.) überein, da für die Kohlenhydrattage andere Gesichtspunkte gelten. Wenn es sich nur um einzelne oder wenige Kohlenhydrattage handelt, gestatten wir diese Austausch nie; sie sind dann unnötig, geben nur Anlaß zu Irrtümern und stellen sehr erhebliche Ansprüche an die Aufmerksamkeit der Küche. Notwendig aber ist der Austausch bei langgestreckten Kohlenhydratkuren, da einförmige Kost natürlich bald Widerwillen erregt.

5. Die Obsttage und die Reis-Obsttage sind eine besondere Abart der Hafertage. Sie haben gleichen Zweck und gleiche Wirkung wie die Hafertage, stehen manchmal in bezug auf letztere den Hafer- und sonstigen Mehltagen entschieden voran. Dies beruht offenbar auf der außerordentlichen Eiweißarmut der Kost. Neben den genannten Stoffen werden nur Tee oder Kaffee ohne Zutat und — je nach Bedarf — Rotwein und etwas Branntwein gestattet.

Für Obsttage bewährten sich uns am besten Bananen, von denen man vollreife, aber noch nicht erweichte Früchte auswähle. 10—12 mittelgroße Bananen (durchschnittliches Gewicht der Einzelfrucht inkl. Schale = 100 g) sind die Tagesgabe. Von Äpfeln sind 1200 g, von Erdbeeren 1500 g, von Sauerkirschen 1250 g erfahrungsgemäß die günstigsten Tagesgaben.

Am Reis-Obsttag geben wir 70, seltener 100 g Kochreis und 700 g Äpfel (Äpfelfleischgewicht!) oder 900 g Erdbeeren. Man kann die Äpfel roh oder gekocht verwenden; im letzteren Falle mit Saccharinpräparaten schwach gesüßt. Der Reis wird teils als Bouillonreis (ungesalzt) genossen, teils wird er mit Zusatz von etwas Wein, Apfelwein, Citronensaft und -schale gekocht und mit gekochten Äpfeln verzehrt.

Alle nicht ganz kräftigen Personen gehören an Obst- und an Obst-Reistagen ins Bett. Wegen ihres dürftigen Nährwertes eignen sich diese Tage nicht zu längeren Kohlenhydratkuren; sie leisten uns aber als eingeschobene Einzeltage treffliche Dienste.

6. **Milchtage**, wie sie bereits auf S. 44 erwähnt und geschildert wurden, gehören ihrer Wirkung nach in die gleiche Gruppe wie die Reis-Obsttage. Sie stellen auch eine knappe Kost dar; sie wirken entfettend und zugleich entlastend auf den Zuckerhaushalt. Von den Obst- bzw. Reis-Obsttagen unterscheiden sie sich durch höheren Eiweiß- und Fettgehalt und geringeren Kohlenhydratreichtum der Kost. Bei Kefirtagen (S. 43) tritt dies noch stärker hervor. Von der „fettarmen knappen Gemüsekost“ (Nr. J) unterscheiden sie sich durch eine gleichmäßigere Einschränkung von Eiweiß, Fetten und Kohlenhydraten. Wenn man bei Milchkost aus besonderen Gründen das Fett möglichst ausschalten will, so greift man zu Buttermilch statt Vollmilch oder Kefir.

7. **Anordnung der Haferkuren und ihrer Abarten**. Wenn nicht besondere Umstände zu anderem Verfahren zwingen, soll dem Kohlenhydrattag mindestens ein kohlenhydratfreier Tag vorausgehen (gewöhnliche strenge Diät, Diabetiker-Banting-Kost, Gemüsetag milder oder schärferer Ordnung, Fasttag). Ob man sich nun auf einen Kohlenhydrattag beschränkt oder mehrere sich folgen läßt, jedenfalls soll dieser Kostordnung ein Fasttag oder ein verschärfter oder ein fettarmer Gemüsetag folgen. Bei längerdauernder Hintereinanderschaltung von Kohlenhydrattagen (Kohlenhydratkuren) läßt man in der Regel nicht mehr als drei solcher Tage sich folgen, sondern man schaltet nach je drei Tagen immer einen, womöglich zwei Gemüsetage dieser oder jener Form (je nach Lage des Falles), von Zeit zu Zeit auch einen Fasttag ein. Diese, der Haferkur von vornherein mitgegebene Vorschrift ist un-

erläßlich und wurde auch von W. Falta für seine Mehlfrüchtekur übernommen.

8. Die Faltasche Mehlfrüchtekost. Die Faltaschen Vorschriften für Mehlfrüchtekost haben keine grundsätzlich neue Kostform geschaffen. Sie sind ein Ausbau der bereits alten Erfahrung, daß man sich an Kohlenhydrattagen nicht an den ursprünglich empfohlenen Hafer zu halten braucht, sondern auch anderes Material benutzen kann. Von diesem Austausch mußte Falta reichlichsten Gebrauch machen, da er die Kohlenhydratkuren, in dieser Form „Mehlfrüchtekuren“ genannt, über sehr lange Zeiträume ausdehnte. Ob dies für den Einzelfall zweckmäßig ist, unterliegt dem ärztlichen Urteil. Ein bei Diabetikern allgemein empfehlenswertes Verfahren sind die Mehlfrüchtekuren nicht, ebenso wenig wie dies für Haferkuren jemals behauptet wurde.

Im Sinne ihres Urhebers mit möglichster Abwechslung des Materials durchgeführt, stellen sämtliche Mehlfrüchte-Kostformen Faltas größere Ansprüche an äußerste Exaktheit beim Abwiegen und Zumessen und bei der küchentechnischen Herstellung der Einzelgerichte als alle anderen Kostformen. Es gibt Fälle, wo lange Perioden verhältnismäßig reichlicher Kohlenhydratgaben vollkommen berechtigt sind und von jeher verordnet wurden, wo man aber ziemlich liberale Vorschriften in dieser Beziehung geben kann und den engen Panzer der Mehlfrüchtekurevorschriften nicht braucht.

Für die Mehlfrüchtekuren stellte Falta vier verschiedene Formen auf, die wir hier zum Abdruck bringen. In bezug auf Anordnung der Gesamtkur und den Wechsel zwischen Kohlenhydrattagen, Gemüsetagen, strenger eiweißreicher Kost, Hungertagen usw. muß man sich ganz nach Lage des Einzelfalles richten. Nach dieser Richtung brachten die Faltaschen Vorschriften nichts Neues; sie haben aber leider oft zu allzu schematischer Durchführung der Gesamtkur geführt.

Abweichung der einzelnen Formen von früher üblichen beschränkt sich auf Form a und b (Bevorzugung starker Abwechslung statt möglichst einheitlichen Kohlenhydratträgers). Kostformen c und d haben mit den altüblichen „Gemüsetagen und Kohlenhydratzulagen“ den Namen ausgetauscht, sind eher eiweißärmer als man sie sonst zu geben pflegte.

a) Die Suppenkost.

7 Suppen von verschiedenen mehllhaltigen Stoffen und zwar je 30 g Weizenmehl, Hafermehl, Haferflocken, Grünkern, Reis, Grieß, Graupen, Erbsenmehl, Bohnenmehl, Linsenmehl, Maismehl, Hirse oder Tapioka oder 100 g Kartoffel. Alle Mehlstoffe werden roh gewogen. Sie werden in Fleischbrühe oder in Salzwasser (evtl. Zusatz von Fleischextrakt) weichgekocht, zum Schluß werden 15—30 g Butter eingelassen.

Butter im ganzen 220 g.

Reichlich Getränke: Wein, Kaffee, Tee, Fleischbrühe, Kognak usw.
30 g Luftbrot.

b) Mehlspeisenkost.

7 Portionen Mehlstoffe (davon 3 als Suppen, 4 in Form von Brei; Teig- oder Backwaren).

Als eine Portion Mehlstoff gilt

- = 30 g Weizenmehl, Hafermehl usw. wie bei a,
 - = 30 „ getrocknete Linsen, Erbsen usw. als Püree,
 - = 30 „ Reis für Reisbrei (mit einigen Pilzen und sehr wenig Parmesan),
 - = 30 „ Nudeln oder Makkaroni,
 - = 30 „ Mais für Polenta (Maisgrütze),
 - = 100 g Kartoffel gekocht oder als Püree oder Bratkartoffel,
 - = 40 g Semmel,
 - = 50 „ Schrotbrot,
- Butter im ganzen 220 g, reichlich Getränke wie bei a,
= 30 g Luftbrot.

Die Mehlstoffe werden zweckmäßig auf den ganzen Tag verteilt wie folgendes Beispiel zeigt:

1. Frühstück: Kaffee oder Tee (ohne Rahm) mit 25 g Schrotbrot u Butter.
 2. Frühstück: Eine Suppe von 30 g Mehl, Luftbrot und Butter, 1 Glas Wein.
- Mittagessen: Eine Tasse Fleischbrühe, eine halbe Stunde später eine Suppe von 30 g Mehl, ferner Reisbrei von 30 g Reis, 1 Glas Wein, Luftbrot und Butter, ein Täßchen schwarzen Kaffee.
- 4 Uhr nachmittags: Kaffee oder Tee mit 25 g Schrotbrot und Butter.
 - 6 „ abends: Eine Suppe von 30 g Mehl, 1 Gläschen Kognak.
 - 7 „ „ Ein Püree von 30 g Hülsenfrüchten.
 - 8 „ „ 100 g Bratkartoffel mit Butter, $\frac{1}{4}$ l Wein.

c) Mehlstoff-Gemüsekost.

5 Portionen Mehlstoffe (davon 2 als Suppen, 2 Portionen von Hülsenfrüchten). Größe der Einzelportion wie bei a und b.

Gemüse aus Tabelle I.

Butter im ganzen 220 g.

Getränke wie bei a.

30 g Luftbrot.

Folgende Verteilung hat sich als zweckmäßig erwiesen:

1. Frühstück: Kaffee oder Tee mit 25 g Schrotbrot und Butter.
2. Frühstück: Eine Suppe von 30 g Hülsenfrüchtenmehl, Luftbrot und Butter, ein Glas Wein.

Mittagessen: Eine Suppe mit 15 g Hülsenfrüchtenmehl, eine Gemüseplatte, Reisbrei von 30 g Reis, Luftbrot und Butter, ein Glas Wein, schwarzer Kaffee.

Nachmittags: Kaffee oder Tee mit 25 g Schrotbrot und Butter.

Abends: Eine Suppe mit 15 g Hülsenfrüchtenmehl, Gemüse mit 100 g Kartoffel, Luftbrot und Butter, 1 Gläschen Kognak, $\frac{1}{4}$ l Wein.

Es ist darauf zu achten, daß die Menge der Gemüse 600 g (roh) nicht übersteigt und daß nur wenig oder gar keine eiweißreichen Gemüsesorten verabreicht werden.

d) Mehlstoff-Gemüse-Rahm-Obstkost.

5 Portionen Amylaceen (davon 2 als Suppen).

Gemüse wie bei Kost c.

$\frac{1}{8}$ l Rahm.

200 g Preiselbeeren oder unreife Stachelbeeren.

150 g Obst, Äpfel, Erdbeeren, Pfirsiche).

125—150 g Butter.

30 g Luftbrot.

Getränke wie bei a.

M. Lakto-Vegetabile Entfettungskost bei Zuckerkranken.

Nicht für alle Fälle, wo entlastende Fettabnahme erwünscht ist, eignet sich die früher beschriebene Bantingkur (Kost C). Eine verhältnismäßig eiweißarme, gleichzeitig fettarme, dafür aber ziemlich kohlenhydratreiche Entfettungskost ist namentlich da am Platze, wo vorher übermäßiger Verzehr von Fett- und Eiweißträgern stattfand. Bei fortschreitender Gewichtsabnahme sieht man dann oft auch den Harnzucker sich stark vermindern oder ganz schwinden. Jedenfalls ist es, nach Eintritt einer gewissen Entfettung, verhältnismäßig leicht, die Störung des Zuckerhaushaltes nach den für Zuckerkrankheit gültigen Grundsätzen erfolgreich anzugehen. Wir schalten meistens nach je 3—5 Tagen der hier geschilderten Kost einen Banting-Tag (S. 56) oder einen Eiertag mit Gemüsezulagen (S. 60) ein. Gegen rein vegetabile Entfettungskuren haben wir bei Zuckerkranken, auf Grund sich immer wieder erneuernder Erfahrung, Bedenken. Auch die hier geschilderte, recht energische, aber bei geschickter Durchführung mit tadellosem Erfolge abschließende Entfettungskur sollte lieber nicht zu Hause, im Betriebe der beruflichen Tätigkeit, sondern unter klinischer Aufsicht vorgenommen werden.

Wir gestatten bei dieser Kost folgendes:

Kaffee ohne Zutat, Tee mit oder ohne Citronensaft, fettlose Gemüsebouillon (S. 22).

Zweimal am Tage je $\frac{3}{10}$ l Buttermilch oder Magermilch (Satten). Statt diese zu trinken, kann sie auch ganz oder teilweise zum Bereiten von Speisen verwendet werden.

Einmal am Tage 50 g gut ausgewaschener und dann abgepreßter frischer Sauermilchkäse (Quark).

120 g Grahambrot oder besser grobes rheinisches Schwarzbrot.

200 g Kartoffeln. Bei ihrer Zubereitung kann ein Teil der Milch verwendet werden.

250 g Äpfel oder Erdbeeren oder Birnen; oder 300 g Krummsches eingemachtes Obst für Diabetiker (S. 32).

400 g (zubereitet gewogen) fettfrei hergerichtetes Gemüse aus Tabelle I.

Salat von Kopf- und Endiviensalat, Rote Rüben, Sellerie, Gurken, Tomaten, zusammen bis 200 g. Angemacht mit Essig, Salz und Pfeffer und höchstens 1 Teelöffel Öl. Einige Rettiche oder Radieschen.

15 g Butter auf den Tag verteilt.

2 Luftbrötchen.

Getränk nach besonderer ärztlicher Vorschrift; im ganzen wenig Flüssigkeit, daher salzarme Bereitung der Speisen. Womöglich keinerlei Alkoholica.

V. Vorschriften für Sammlung des Urins.

Der **Urin** wird am Probetage gesammelt von morgens nach dem 1. Frühstück bis zum nächsten Morgen vor dem Frühstück.

Um die Zersetzung des Urins zu verhüten, wird in das Sammelgefäß ein gehäufter Kaffeelöffel pulverisierte Borsäure (aus der Apotheke oder Drogenhandlung) getan.

Die gesamte Urinmenge wird sorgfältig gemessen (nach Litermaß) und ein Teil derselben in ein Probefläschchen gefüllt; dieses ist als Muster ohne Wert am Vormittage zu senden an:

.....

Auf diesem Glase ist mittels aufgeklebten Zettels zu verzeichnen: Name, Datum, Menge des gesamten Tagesharns.

Beispiel für die Aufschriften:

Franz Müller.

Menge: $\frac{5}{4}$ Liter.

1. Juli 1897.

VI. Vergleichende Maße und Gewichte.

1 Grain = 0,0647 g.	1 Pud = 40 russ. \mathcal{Z}
1 Unze (ounce) = 40 grains	= 16,38 kg.
= 31,10 g	1 Pint engl. = 0,568 l.
1 \mathcal{Z} engl. = 453,6 g.	1 Pint amerik. = 0,476 l.
1 \mathcal{Z} russ. = 409,51 g.	1 Quart engl. = 1,15 l.
1 \mathcal{Z} deutsch = 500 g.	1 Quart amerik. = 0,946 l.
1 Stone = 14 engl. \mathcal{Z}	1 Gallon engl. = 4,543 l.
= 6,35 kg.	1 Gallon amerik. = 3,785 l.

VII. Kochvorschriften.

Wir teilen hier, der häufigen Bitte von Ärzten und von Patienten folgend, eine größere Auswahl von Rezepten mit, die zumeist lange Jahre hindurch in v. Noordens klinischer Praxis (Privatlinik in Frankfurt a. M. und im Wiener Cottage-Sanatorium) erprobt sind. Ein großer Teil davon wurde schon vor 15 Jahren von Frau E. Lampé zusammengestellt, als Manuskript gedruckt und den Patienten beim Austritt aus der Privatlinik mitgegeben. Viele von ihnen gingen inzwischen in „Kochbücher für Zuckerkrank“ dieses oder jenes Verfassers über. Eine wesentliche Ergänzung erhielt unsere Sammlung dadurch, daß es uns gestattet wurde, aus einem noch ungedruckten Manuskripte von Frau Hedwig Heß-Schreier in Brünn eine Anzahl sehr nützlicher Rezepte zu übernehmen. Diese tragen im Texte, am Schlusse des betreffenden Rezeptes, den Vermerk (H).

Wir finden in den meisten Sonderkochbüchern für Zuckerkrank eine große Menge von Gerichten (Suppen, Tunken, Fleisch-, Fisch-, Eier- und Gemüsespeisen, Vorspeisen) erwähnt, die eigentlich gar nicht dahin gehören, weil die Normalküche dazu nur Material aus Tabelle I benützt bzw. zu benutzen braucht. Man kann die häusliche Kost der Zuckerkranken ungemein abwechslungsreich machen, wenn man ein gutes allgemeines Kochbuch (besonders das alte Kochbuch der Henriette Davidis, in letzten Ausgaben von Mary Hahn, Verlag von Velhagen & Klasing, Leipzig) zur Hand nimmt und da, wo zum Binden der Gerichte (Suppen, Tunken, Gemüse, Ragouts usw.) Mehle angegeben ist, dicken Rahm, süß oder sauer, bei gelinder Hitze mit Eidotter vermischt einsetzt. Genauere Anweisung dazu findet sich in zahlreichen der folgenden Rezepte.

Von Süßstoff wurde in den Rezepten stets Saccharin erwähnt. Über den Gebrauch der Saccharin-tabletten gewinnt der Diabetiker selbst alsbald die nötige Erfahrung. In der Küche verwendet man am besten eine Lösung von 3 g Krystallsaccharin in 50 g Wasser in einem Tropfglas. Man bringt die Substanz mit kaltem Wasser in das Tropfglas, schüttelt häufig durch; vollkommene Lösung erfolgt meist erst nach 1—2 Tagen. 16 Tropfen hiervon haben die Süßkraft von 20—25 g Zucker.

Erwärmen und bei den meisten Gerichten auch ganz kurzes Kochen (1—2 Minuten) verträgt das Saccharin, ebenso die Backhitze; längeres Kochen aber macht den Geschmack widerwärtig (S. 7).

Um keine Unstimmigkeit zwischen unseren Werten und den Analysen der gebräuchlichen Nahrungsmitteltabellen und damit Zweifel aufkommen zu lassen, übernahmen wir in Tabelle III und IV S. 10—18) die üblichen Zahlen. Soweit die Diabetesküche in Betracht kommt, bedürfen aber manche der Korrektur, namentlich in bezug auf Gemüse. Hierauf war schon früher kurz hingewiesen (S. 25). Einige neue eigene Analysen ergaben so wichtiges, daß wir in Abschnitt „Verschiedenes“ die hierauf bezüglichen Erfahrungen und Folgerungen verwertet haben. — Darauf sei nachdrücklich verwiesen. Wir sind zur Zeit mit umfangreichen Arbeiten über die Chemie der Diabetesküche beschäftigt und beabsichtigen nach Abschluß derselben das Neue in kleinem Nachtrag zu veröffentlichen.

Der letzte Abschnitt der Rezepte (Speisen mit bestimmten Kohlenhydratgehalte) wird zur Anleitung von Sondergerichten für Diabetiker sehr willkommen sein.

A. Suppen.

1. Fleischbrühe mit Schinkenmarkklößen.

$\frac{1}{4}$ l Fleischbrühe, 20 g Knochenmark, 20 g Schinken, 1 Dotter, Salz.

Das gekochte Mark wird mit fein gehacktem Schinken gut vermischt, gesalzen. Dann rührt man den Dotter dazu und stellt die Masse kalt. Nachdem sie in der Kälte festgeworden, formt man daraus kleine Klöße, die man in heißem Fett bäckst und der Suppe beifügt. Die Suppe kann mit Parmesankäse verbessert werden. (H)

2. Fleischbrühe mit Einlage von Eierkuchen mit Mark.

$\frac{1}{4}$ l Fleischbrühe, 20 g Knochenmark, 1 Ei, Salz.

Das gekochte Mark wird warm mit Ei und Salz gut verrührt. Dann gibt man auf die Pfanne etwas frische Butter und schüttet, wenn die Butter heiß ist, die verrührte Masse darüber. Die Omelette wird auf beiden Seiten gebacken, bis

sie braun ist. Erkaltet, wird sie in kleine Würfel zerschnitten und klarer Fleischbrühe beigemischt. (H)

3. Fleischbrühe mit Spinat-Eierstich.

$\frac{1}{4}$ l Fleischbrühe, 30—40 g Spinat, 20 g Butter, 2 Eier, Salz und Pfeffer, 3 Eßlöffel saurer Rahm.

Der Spinat wird mit wenig Wasser und Butter gedämpft und dann durch ein Sieb getrieben. Die Butter wird mit den Dottern, Salz und Pfeffer flaumig gerührt. Der Spinatbrei und Rahm werden dazugemischt, das Gemenge im Wasserbad gekocht und dann der Suppe zugefügt. (H)

4. Fleischbrühe mit Leberreis.

$\frac{1}{4}$ l Rindsuppe, 30 g Leber, 20 g Butter, 1 Ei, Salz und Pfeffer.

Die Leber wird geschabt, mit flaumig gerührter Butter, Dotter, Salz, Pfeffer und festem Eierklarschnee verrührt, durch ein grobes Sieb in kochende Suppe gedrückt und mit ihr gar gekocht. (H)

5. Goulaschsuppe.

Zwiebel in Butter gelb rösten, Paprika, $\frac{1}{2}$ kg in Würfel geschnittenes Rindfleisch gut darin anrösten; Fleischbrühe darüber, 2 Stunden dünsten. Dann viel verschiedene Gemüse (aus Tabelle 1) hineinschneiden und 3 Luftbrötchen in kleine Stücke zerbrochen dazu tun, 1 Stunde kochen lassen; das Gemüse herausnehmen und die Suppe durch ein Sieb schütten, wobei ein Teil des Gemüses mit durchgedrückt wird; auch einige Fleischstückchen werden der Suppe zugefügt. — Man rechnet auf 10 Personen $\frac{1}{2}$ kg Fleisch.

6. Blumenkohlsuppe.

Ein kleiner Blumenkohl wird in leicht gesalzenem Wasser weich gekocht, dann bis auf einen kleinen Rest durch ein Sieb getrieben. 30 g Butter bei gelinder Wärme in einer Schale zergehen lassen, dann mit dem Blumenkohlbrei mischen, sehr stark durchrühren, bis die Butter im Brei verschwunden ist. Kurz vor dem Anrichten soviel Fleischbrühe wie gewünscht dazu angießen, kurz aufkochen lassen. Die Suppe ist nur gut, wenn sie unmittelbar vor dem Essen bereitet wird. — Wenn

ärztlich erlaubt, kann man vor dem Kochen der Suppe 25 g fein gehackten Schinken beifügen.

7. Schinken-Eierstich-Suppe.

20 g Butter werden mit 1 Eidotter flaumig gerührt, dann 25 g fein gehackter Schinken, Salz und Eierklarschnee dazu gemischt. Die Masse wird $\frac{1}{2}$ Stunde in siedendem Wasserbad erhitzt. Dann schneidet man sie in Würfel und gibt Fleischbrühe darüber. Statt Schinken läßt sich auch Hühnerfleisch, Kalbsbries oder Kalbshirn verwenden.

8. Pilzsuppe.

40 g Pilze, 20 g Butter, $\frac{1}{2}$ l Fleischbrühe, Petersilie, 1 Dotter.

Die Pilze werden geschnitten, mit Butter und Salz gedünstet. Dann kommen sie in klare Suppe, welche man bis zur Hälfte einkochen läßt; dann wird sie mit dem Dotter verrührt und mit feingehackter Petersilie beschickt. (H)

9. Schöberleinlage für Suppen.

Schnee von 2 Eiern schlagen; die Dotter, etwas Salz, etwas zerlassene Butter dazumischen. Auf eingefettetem Blech backen und in Stücke schneiden.

10. Leber-Schöberl-Einlage.

3 Stück Hühnerleber mit Zwiebel rösten, durch ein grobes Sieb drücken. 2 Dotter und 15 g Butter schaumig rühren, Leber, etwas Pfeffer, Muskatnuß, Salz und Eierklarschnee von 1 Ei dazu geben und auf geschmiertem Blech scharf backen.

11. Eierstichsuppe.

2 Eier geschlagen, etwas Muskatnuß, 2 Löffel Rahm daruntermischen (kein Salz). Die Masse in einem Porzellangefäß im kochenden Wasserbad erhitzen, bis sie dick wird. In Würfel geschnitten und der Fleischbrühe zugefügt.

12. Weinsuppe.

Weißwein, etwas mit Wasser verdünnt, mit Zimmt und Citronenschale bis kurz vor dem Kochen ziehen lassen, mit Eigelb verrühren; das Eierklar wird zu Schnee geschlagen, mit wenig Krystallose gesüßt und wie Klöße auf die Masse gesetzt.

13. Schinken-Gemüsesuppe.

In Streifen geschnittene grüne Bohnen, fein gehackter Lauch, Sellerie, Kerbel werden in Öl mit fettem, in Würfel geschnittenem Schinken etwas angeröstet. Dann füllt man die Gemüse mit genügend Fleischbrühe auf, gibt Salz, Pfeffer oder Paprika dazu, und läßt alles zusammen 2 Stunden in geschlossenem Topfe kochen.

14. Sauerampfer-Kerbelsuppe.

Sauerampfer oder Kerbel oder beides gemischt, sauber gewaschen, in einem Tuche abgetrocknet, dann durch die Passiermaschine getrieben. Dann läßt man das Gemüse mit Speckwürfeln oder Butter dämpfen, gibt nach und nach Fleischbrühe dazu, läßt alles $\frac{1}{2}$ Stunde kochen. Kurz vor dem Anrichten gibt man sauren Rahm dazu; Salz und Pfeffer nach Belieben. Man kann die Suppe auch mit einem Eigelb binden.

15. Tomatensuppe.

Reife Tomaten in Fleischbrühe zerkochen lassen, durch ein Sieb treiben. Dann gibt man sehr feine Brösel aus Luftbrot und etwas Paprika dazu, läßt die Masse noch ordentlich aufkochen. Vor dem Anrichten mischt man noch 2 Eßlöffel Rahm dazu. Verbessert wird die Suppe, wenn man fein geschnittene Speckstreifen darin verkocht. Einrühren von geriebenem Käse nach Belieben.

16. Einfache Gemüsesuppe.

Verschiedene Gemüse gemischt — oder auch nur einzelne derselben — wie Wirsing, Weißkraut, Kochsalat, Spinat, Rosenkohl, Sellerieblätter, junge grüne Bohnen, Tomaten, Blumenkohl, Zwiebel, nach Wunsch auch andere Gemüse der Tabelle I, alles fein geschnitten, werden mit Butter weich gedünstet. Dann wird mit Fleischbrühe aufgefüllt.

Nach Wunsch wird die Hälfte des Gemüses durchgeschlagen, die andere Hälfte bleibt als kleine Stücke in der Suppe.

17. Gemüse-Rahmsuppe.

Zu dieser Suppe werden meist verwendet: Endivien, Sauerampfer, Kerbel, Blumenkohl, Spargel, Cichorienstengel und -blätter, Zwiebel, Spinat, Kochsalat.

Das betreffende Gemüse oder ein Gemisch verschiedener wird mit Butter sehr weich gedämpft, dann durch ein Sieb gedrückt, mit Fleischbrühe (oder Lösung von Cenovisextrakt) aufgeschüttelt und noch einmal kurz aufgekocht. Vor dem Anrichten werden ein verrührtes Eigelb und dann auf je $\frac{1}{4}$ l Suppe 2 Eßlöffel dicker saurer Rahm beigefügt.

18. Gemüse-Bouillon.

Lattichsalat oder Endivien oder Spinat, Sellerieblätter und -stengel, Wirsing oder Weißkraut, Tomaten, dicker Porree, Spargel oder Blumenkohl, Zwiebel — diese 7 Zutaten in gleichen Gewichtsmengen — werden mit Wasser aufgesetzt. Eine große Zwiebel, eine Handvoll Petersilienblätter, eine fingerlange Karotte werden mit wenig Butter scharf geröstet, dann zerstoßen und der Suppe beigefügt. Das ganze soll in geschlossenem Topfe 2 Stunden lang langsam kochen. Dann öffnet man den Deckel und läßt einen Teil des Wassers verdampfen. Die Suppe wird von den Einlagen abgeseibt, nach Wunsch gesalzen und gepfeffert. Auf Wunsch kann man der sehr schmackhaften Suppe nach Ausschöpfen auf den Suppenteller, noch ein wenig Cenovisextrakt beimischen. Als Einlage eignen sich Knochenmarkscheiben (vgl. S. 23).

B. Tunken.

19. Heiße Senfbutter.

Man bringt Butter und die Hälfte ihres Gewichtes Senf in einen Kochtopf, dazu etwas Salz. Unter beständigem Rühren füllt man mit kräftiger, heißer Fleischbrühe die Tunke auf.

20. Holländische Tunke.

3 Eidotter, 3 Eßlöffel dicker Rahm (süß oder sauer), etwas Butter, Citronensaft, Salz und Pfeffer werden auf dem Feuer schäumig geschlagen (nicht kochen!).

Andere Art: Hartgesottene Eier werden fein gewiegt, dann mit heißer zerlassener Butter und etwas Salz innig gemischt; in heißer Tunkenform anrichten! Man rechnet auf 1 Ei 2—3 Eßlöffel heißer Butter (zu Spargel, Blumenkohl, Schwarzwurzel, auf geröstete Luftbrotschnitten).

21. Kalte Kräutertunke.

Kräuter werden feingehackt, 2 Eier hartgekocht. Nach dem Erkalten wird das Eigelb mit einer Gabel zerdrückt, das Weiße feinzerhackt, beides an die Kräuter gegeben und alles mit Salz, Pfeffer, Essig und Öl zu dicker Tunke verrührt.

22. Heiße Kräutertunke.

Kerbel, Dill, Pimpernell, Esdragon, Petersilie, Sellerieblätter werden fein gewiegt. Sardellenbutter wird mit Eidotter flaumig gerührt, dann langsam mit Rahm und Citronensaft unter ständigem Rühren versetzt. Alles wird sorgfältig zusammengemischt und im Wasserbade unter öfterem Rühren 20 Minuten lang erhitzt.

23. Gurkentunke.

Frische Gurken werden geschält, ausgekernt, in Würfel geschnitten, dann mit dickem saurem Rahm gedünstet. Eidotter und saurer Rahm werden zu einem Brei verrührt, mit den gedünsteten Gurken vermengt und erhitzt (nicht Kochen!).

Salz, Pfeffer, Thymian oder andere Gewürzkräuter (aus Tabelle I) können mit den Gurken zusammen gedünstet werden.

24. Sauce béarnaise I.

Ein Stück frischer Butter, das man langsam auf schwachem Feuer hat zergehen lassen, verrührt man, solange die Butter noch lauwarm, gut mit einigen Eidottern, gehackten Kräutern, (nach Belieben einer Spur Knoblauch) und 1 Eßlöffel Essig oder Citronensaft, bis sie sich verdickt.

25. Sauce béarnaise II.

In einem Glase Essig läßt man 10—12 Schalotten, ein wenig Esdragonessenz, etwas Muskatnuß und einen Teelöffel frisch gemahlener Pfeffers einkochen und gießt dann die Brühe durch ein Sieb. In einem kleinen Schmortopf verrührt man 1—2 gehäufte Eßlöffel Butter mit 3 Eidottern und 2 Teelöffeln der oben erwähnten Flüssigkeit auf schwachem Feuer, bis die Masse anfängt sich zu verdicken. Bei zu großer Hitze würde sie gerinnen.

Die oben erwähnte Flüssigkeit, einmal bereitet, läßt sich in gut gereinigter, verkorkter Flasche zu weiterem Gebrauch längere Zeit aufbewahren.

26. Maître d'hotel Tunke I (Kräutertunke).

Zwiebel mittlerer Größe, feingewiegt, wird mit 30 g Butter leicht geschwitzt, dann mit $\frac{1}{2}$ l kräftiger Fleischbrühe, 1 bis 2 Teelöffel Citronensaft, einer Prise weißen Pfeffers und wenig Salz kräftig verrührt. Die Masse wird dann mit feingehackten Küchenkräutern (2 Eßlöffel gehäuft) und 1 Eßlöffel feingewiegter Champignons unter weiterem Rühren erhitzt, ohne sie zum Sieden zu bringen. Ein (bis 2) Eßlöffel dicker süßer Sahne mit 1 Eidotter am Feuer vorsichtig verrührt, wird der ein wenig abgekühlten Masse zugemengt.

Statt einer Mischung feiner Küchenkräuter kann man auch Dill oder Esdragon oder Petersilie oder Schnittlauch allein verwenden.

Die Tunke paßt zu gekochtem oder gebratenem Fisch, zu gekochtem Rindfleisch, zu gekochtem Huhn, zu Brechspargeln und zu Hopfensprößlingen.

27. Maître d'hotel-Tunke II.

Petersilie, Kerbel, Esdragon, gleiche Teile, oder auch nur Petersilie werden roh durch die Maschine getrieben oder sehr feingehackt. Von dem Mus 40—50 g mit 30 g Butter leicht anrösten. Dann verrührt man $\frac{1}{5}$ l Fleischbrühe, einen Teelöffel Sardellenbutter und den Saft einer halben Citrone, läßt die Kräuter darin $\frac{1}{2}$ Stunde kochen, so daß die Fleischbrühe auf die Hälfte verdampft. Dann verrührt man 2 Eidotter mit dieser Masse und gibt noch einige Kapern hinzu. — Am besten zu grilliertem Fisch, Geflügel, Fleisch geeignet.

28. Einfache Mayonnaise I.

2 Eidotter gut verrühren, dabei tropfenweise 60 g Öl hinzugeben. Wenn die Masse anfängt steif zu werden, rührt man langsam Senf, Citronensaft, Salz, Paprika nach Geschmack zu.

29. Einfache Mayonnaise II.

30 g frische Butter, 2 Dotter hartgekochter Eier, 4 Eßlöffel feines Salatöl, 2 Eßlöffel Weinessig, 2 Messerspitzen feingestoßener weißer Pfeffer oder Paprika in gewünschter Menge, etwas Salz.

Die Butter wird schäumig gerieben und abwechselnd 1 Löffel Öl und 1 Löffel Essig dazu gerührt. Die Eidotter werden allein mit etwas Essig verrührt und nebst Pfeffer und Salz zuletzt zugefügt.

30. Gewürzte Mayonnaise.

3 hartgekochte Eidotter, 1 rohes Ei verrührt man mit 3 Teelöffel Senf, gibt nach und nach folgendes dazu: feingeschnittene Schalotten, Salz, Pfeffer, Saft einer Citrone, etwas Wein oder Essig. Unter fortgesetztem Rühren fügt man 60 ccm feines Öl, nach und nach $\frac{1}{2}$ Tasse kräftige Fleischbrühe, Sardellenbutter, feingehackte Essiggurke, Kapern, feingehackte Petersilie und andere Kräuter hinzu.

31. Remouladentunke.

Man rührt 2 rohe Eigelb mit 1 Eßlöffel Senf 10 Minuten, gibt dann feingehackte Zwiebel, Petersilie und Kapern dazu. Dann unter ständigem Rühren feines Öl, bis die Tunke dick ist. (30—40 ccm Öl.) Zuletzt noch 1 Eßlöffel Sahne daruntermischen.

32. Tartarische Tunke.

3 hartgekochte passierte Eigelb, 1 rohes Eigelb, etwas feingehackte Petersilie, Kerbel, Estragon, 2 Teelöffel Senf tüchtig verrühren. Dann unter ständigem Rühren 80 ccm feines Öl und nach Wunsch Salz und Paprika dazugeben. Damit die Tunke geschmeidig wird, streicht man sie durch ein feines Sieb.

33. Kalte Senftunke.

2 hartgekochte und 2 rohe Eigelb mit Öl und einigen Tropfen Essig zu einer dicken Mayonnaise rühren, unter stetem Rühren Senf, Salz, gehackte Petersilie und gehacktes Eiweiß zufügen und die Tunke kalt stellen.

34. Warme Sardellentunke.

Gut gewässerte Sardellen werden entgrätet und mit Champignons, Petersilie und einigen Kapern gehackt. Dann verrührt man ein Eigelb mit 1 Löffel Senf und etwas Rotwein, gibt das Gehackte dazu, gießt Fleischbrühe nach Bedarf zu und läßt die Tunke langsam am Feuer ziehen, nicht kochen.

35. Salzgurkentunke.

Man schält Salzgurken, schneidet sie in feine Scheiben, preßt das Salzwasser heraus und dämpft sie in süßem Rahm weich. Dann verkleppert man Eigelb mit süßem Rahm, gibt dies an die Tunke, würzt sie nach Geschmack mit Pfeffer und Salz und läßt sie noch einige Zeit bei gelinder Hitze ziehen (nicht Kochen!).

36. Weiße Zwiebeltunke.

Zwiebeln werden mit Wasser, etwas Butter, Salz und nach Wunsch Pfeffer ganz weich gedämpft; dann werden sie zerdrückt und als dicklicher Brei durch ein Sieb getrieben. Dem Brei mengt man 1 rohes Eidotter zu, ferner auf 100 ccm Zwiebelbrei 50 ccm dicken Rahm. Man bringt dies unter Rühren nochmals ans Feuer (nicht Kochen!) und füllt schließlich mit heißer Fleischbrühe bis zur gewünschten Konsistenz auf. Wenn dicke Tunke gewünscht wird, ist Fleischbrühe unnötig.

37. Braune Zwiebeltunke.

Speck wird in kleine Würfel geschnitten und langsam, unter öfterem Umrühren, gelbbraun gebraten. Dann wird eine reichliche Menge fein zerschnittener Zwiebeln zugefügt, die sich unter weiterem Braten bräunen. Nach Geschmack werden Essig, Salz, etwas Wasser zugefügt, das Ganze gut durchgekocht. Nach dem Abkühlen mischt man 1—2 Eidotter hinzu (dies nicht unbedingt nötig) und auf je 100 g Tunkenmasse 50 g dicken Rahm und 5 g Plasmon oder 10 g geriebenen Käse. Dann bringt man das Ganze, unter stetem Rühren, wieder ans Feuer, bis es gleichmäßig sämig geworden ist (nicht kochen!).

38. Tomatentunke.

4 reife, zerschnittene Tomaten mittlerer Größe werden mit wenig Wasser unter Beigabe eines zerdrückten Luftbrottes und 5 g Lecithin-Eiweiß gar gedämpft (bzw. gekocht). Die Masse wird durch ein Sieb getrieben und nach Wunsch mit Fleischbrühe oder Lösung von Cenovisextrakt verdünnt. Um die Tunke besser zu binden, kann man der Masse nach dem Durchsieben ein inniges Gemisch von 2 Eßlöffeln dickem Rahm und 1 Eidotter beigeben.

C. Vorspeisen und andere kleine Gerichte.

39. Einfaches Füllsel für Kohl, Gurken, Paprika u. a.

Fleischreste durch die Maschine treiben, ebenso etwas gekochten Kohl. Beides gut mit Eidotter und kleinen Speckwürfeln mischen und dann einfüllen.

40. Feines Füllsel für Kohl, Paprika und Gurken.

150 g zartes, mageres Ochsenfleisch, 2 Geflügellebern, 50 g frisches gepökeltes Schweinefleisch, 15 g Nierenfett, einige Champignons, Zwiebel, Schnittlauch, Thymian, Kerbel, 3 frische geschälte Tomaten.

Alles sehr feinhacken und mischen, Salz, Pfeffer, etwas Öl, 1 Glas Madeira, 3 Luftbrötchen, Knochenmark hinzu, langsam $\frac{3}{4}$ Stunden kochen.

Paprika, rote, gelbe oder grüne Schoten lege man auf eine Bratpfanne, öle sie leicht, setze sie auf lebhaftes Feuer und koche sie, bis die Haut sich lösen läßt. Schälen, abkühlen. In die Schoten einen Längsschnitt machen, die Masse entweder mit einer Papierdüte oder kleinem Löffel einfüllen, die gefüllten Schoten in einer Bratpfanne mit Öl einige Minuten braten. Nach Geschmack die Pfanne mit Knoblauch ausreiben.

Kohlblätter in Salzwasser 5 Minuten kochen, abtropfen lassen. Die dicke Rippe entfernen, die Blätter mit obiger Masse belegen, zusammenrollen und wie die Schoten braten.

Gurken halbieren, füllen, wieder zusammenbinden, dann dämpfen oder braten.

Bei Tomaten ein deckelförmiges Stück abschneiden, das Innere aushöhlen, die Früchte füllen, dann dämpfen oder braten.

41. Käse-Omelette.

2 Eierkuchen backen. 50 g geriebenen Käse mit zerlassener Butter, Salz und 1 Ei schaumig rühren. Damit die Eierkuchen füllen, diese in eine geschmierte Pfanne geben. 1 Ei mit etwas Salz sprudeln, darüber geben, das ganze im Backofen backen.

42. Fischreste-Ragout.

Das gekochte Fischfleisch in eine kleine Steingutform bringen, dazu 3 Eßlöffel, dicken Rahm (süß oder sauer), Salz und Pfeffer, 1 Eßlöffel zerpfückte Butter. Darüber Parmesan-

käse oder anderen geriebenen Käse. Das Ganze im Backofen 15—20 Minuten backen lassen. Hierzu eignen sich alle fleischreichen Fische, besonders gut Schellfisch.

43. Kalbsbries-Ragout.

Ein kleines Kalbsbries kochen, dann abhäuten, dann in kleinere Stücke schneiden. 1 Eßlöffel Butter zergehen lassen, darin kleine, zerriebene Zwiebel anrösten lassen. Dahinein das Bries. Salz, Pfeffer oder Paprika zugeben und das ganze 20 Minuten dünsten lassen. Dann gibt man gekochte Pilze, Spargelspitzen, Kapern, etwas Citronensaft dazu und läßt die Masse nochmals kurz dünsten. Kurz vor dem Anrichten verrührt man ein Eidotter mit dickem Rahm und 1 Eßlöffel Apfelwein (oder trockenen Sherry), vermischt dies mit dem Bries und erhitzt das ganze nochmals unter leichtem Rühren bis vors Kochen.

Die Speise kann auf Muschelschalen gereicht werden.

44. Croquettes aus Hirn oder Kalbsbries.

30—40 g Kalbshirn, 20 g Butter, Zwiebel und Petersilie, 1 Ei, Fett, Salz und Pfeffer.

Das Hirn wird in Salzwasser gekocht. In der Butter werden feingehackte Zwiebel, Petersilie und das Hirn angeröstet. Dieses Gemenge wird nach Abkühlen mit Ei, Salz und Pfeffer vermengt, aufs Eis gestellt. Dann formt man Croquettes, die man in heißem Fett bäckt. Dasselbe aus Kalbsbries; dieses wird nach dem Kochen durch die Maschine getrieben. (H)

45. Croquettes aus Wildfleisch, Schinken, Ochsenzunge oder Geflügel.

Die Zubereitung ist dieselbe wie bei Hirncroquettes, nur kommt statt des Hirnes, gebratenes, feingehacktes Wildfleisch oder Geflügel oder feingehackter Schinken oder Räucherzunge zur Verwendung. Am besten mischt man dem gehackten Fleisch feingehackte Pilze zu. (H)

46. Gebackene Spargel mit Rahmtunke.

Spargel gut kochen und ablaufen lassen, auf längliche Schüssel legen, reichlich dicken Rahm darüber gießen, so daß die Spargel bedeckt sind. Zerpflückte Butter, etwas Salz und

Brösel aus Luftbrot darüber streuen. Dann $\frac{1}{2}$ Stunde in nicht zu heißem Backofen backen lassen, bis sich die Tunke dickt und oben eine gelbe Haut und am Schlüsselrand eine bräunliche Kruste sich gebildet hat.

47. Spinatroulade.

125 g Spinat, 50 g Zunge, 2 Dotter, 2 Eierklar, $\frac{1}{16}$ l saurer Rahm, 50 g Butter. Eierspeise oder Hirn mit Parmesankäse.

Der in Salzwasser gekochte Spinat wird passiert. Butter mit Dottern flaumig verrührt, würfelig geschnittene Zunge, der Spinat und Rahm dazugemischt. Das Ganze wird auf befettetem Papier auf einer Pfanne im Backofen gebacken, mit Eierspeise oder geröstetem Hirn bestrichen, eingerollt, und mit Parmesankäse bestreut (für 2—3 Personen). (H)

48. Käseschnittchen.

Man bereitet aus 2 Eiern, 2 Eßlöffel Rahm und etwas Salz einen dünnen flachen Eierkuchen, zerschneidet ihn in vier gleichmäßige Stücke, bestreicht die Stücke mit Butter, häuft nun abwechselnd Eierkuchen und dünne Scheiben Käse aufeinander, gibt das Gericht dann zum Heißwerden in den Backofen und richtet es mit gerösteter Petersilie an (für 1—2 Personen). (H)

49. Käse-Toast.

Käse wird in Scheiben geschnitten und mit Rahm auf dem Feuer in einer Kasserole verrührt, bis er zergeht. Die Masse wird dann auf heiße geröstete Luftbrotscheiben verteilt. Heiß auf den Tisch bringen!

50. Mark-Toast.

Luftbrötchen werden mit dünnem scharfem Messer in dicke Scheiben geschnitten, dann geröstet, dann mit wenig weicher Butter bestrichen nochmals in einer Pfanne erhitzt. Die heißen Scheiben werden mit gekochten Knochenmarkscheiben belegt. Heiß auf den Tisch bringen. Nach Wunsch mit Salz und Pfeffer bestreuen.

51. Jüseeier 1.

Jüseeierform ausbuttern, das ganze Ei hineinschlagen, darauf 1 Eßlöffel dicke süße Sahne, darauf Petersilie, Kapern

oder Champignons, darauf geriebener Käse. In den Ofen, bis es sich setzt, nicht zu lang.

52. Jüseier 2.

In eine Jüsform füllt man eine heiße kräftige Jüs, die zu gelatinieren neigt, bis die Form $\frac{3}{4}$ gefüllt ist, fügt dazu ein rohes Eigelb.

Eine kräftige Kalbsbratentunke eignet sich auch dazu.

53. Mayonnaiseeier.

2 Dotter, $\frac{1}{16}$ 1 Öl, 1 Eßlöffel Essig oder Citronensaft, Salz und Pfeffer, 2 Eier (10 g Caviar).

Dotter werden gut verrührt, tropfenweise Öl dazugegeben. Wenn die Masse steif ist, kommt Essig, Salz und Pfeffer nach Geschmack dazu. Hartgekochte Eier halbiert man, vermischt die Dotter mit Mayonnaise (und Kaviar) und füllt die Eihälften damit. Der Boden der Schüssel wird mit Mayonnaise bedeckt, die Eier darauf gelegt und kalt vorgesetzt. (H)

54. Rahmeier.

In eine Gratinierschüssel gibt man Rahm, schlägt vorsichtig Eier hinein und läßt sie im Ofen etwas fest werden. Dann belegt man die Speise mit Sardellenstreifen und feingehackter Petersilie, stellt sie in den Backofen und richtet sie an, sobald sie eine braune Kruste hat.

55. Pochierte Eier mit holländischer Tunke.

Die Eier nach Zerschneiden der Schale vorsichtig in siedendes Essigwasser geben; etwa 3 Minuten kochen lassen, dann ins kalte Wasser bringen. Holländische oder Tomatentunke darüber geben.

56. Pochierte Eier garniert.

40 g Blumenkohl, 30 g Kohl, 50 g Schinken, 30 g Champignons, 4—5 pochierte Eier, 30 g Butter, 20 g Parmesankäse.

Blumenkohl, Kohl und Champignons werden abgebrüht, auf ein Sieb getan, Blumenkohl und Kohl in Salzwasser weichgekocht, die Champignons in Butter gedünstet. Pochierte Eier werden auf einer Schüssel angerichtet, mit dem Gemüse und den Champignons kranzartig umgeben, mit geriebenem Käse bestreut, mit heißer Butter betropft (für 3 Personen). (H)

57. Eiersoufflé.

2 Dotter, 2 Eierklar, 10 g Butter.

Dotter werden gut verrührt, mit dem festen Schnee leicht vermengt, auf einer befetteten Pfanne im Rohr gebacken. (H)

58. Fleischpastete.

125 g Schweinefleisch, 125 g Kalbfleisch, 30 g Fett, 60 g Speck, Pastetengewürz, 1 Dotter, Salz.

Die Hälfte des Fleisches wird gebraten, die andere Hälfte roh verwendet. Man hackt und passiert das Fleisch, vermengt es mit würflich geschnittenem Speck und Dotter und würzt es. Eine Form wird mit Speckscheiben ausgelegt, die Masse eingefüllt, eine dünne Scheibe Speck daraufgelegt, die Pastete 3 Stunden im Wasserbad gekocht. Völlig erkalten lassen. Die gut haltbare Pastete wird man in der Regel auf mehrere Tage verteilen. (Für 4 Personen.) (H)

59. Streichbare feine Fleischpastete (Potted meat).

Diese feine Pastete von Pomadekonsistenz eignet sich nicht nur für Kranke, sondern ist auch ein sehr schmackhafter Brotbestrich für Gesunde. Zuckerkrankte tragen sie auf Luftbrot-schnitten auf.

750 g mageres zartes Rindfleisch in kleine Stücke geschnitten, werden in einen irdenen Topf gebracht; dazu ein Markknochen, 1—2 Stück Nelken, eine geröstete Zwiebel mittlerer Größe, $\frac{1}{10}$ l Wasser. Der Topf wird gut verschlossen 2—3 Stunden im Backofen erhitzt, so daß die Masse durch und durch gar wird. Dann treibt man das Fleisch zweimal durch die Wurstmachine und fügt ihr die abgeseigte Brühe zu. Dem so entstandenen Fleischbreie mengt man 200—250 g Butter bei, ferner Salz nach Wunsch; auch ein wenig Worcestersunke, Anchovisbutter und andere Würzen, je nach Geschmack. Die ganze Masse wird dann mit einem Holzlöffel gut durchgeknetet, bis sie geschmeidig und wie Butter streichbar ist. Man preßt sie dann in kleine Töpfe und gießt erhitzte Butter zum Luftabschluß darüber.

Zugabe von etwas Kalb- oder Gänseleber zum Fleisch erhöht den Wohlgeschmack. Betreffs Auswahl und Menge der Würzstoffe richtet man sich natürlich nach dem Zweck. Statt Rindfleisch läßt sich auch jede andere Fleischart einsetzen,

z. B. von Reh, Hase, zahmem oder wildem Geflügel, so daß breite Abwechslung möglich ist.

Die kleinen Töpfe halten sich gut gekühlt 6—7 Tage. In Weckgläser oder dgl. gefüllt und dann sterilisiert wird die Pastete zur Dauerware. In diesem Falle deckt man mit Speckscheiben statt mit Butter.

60. Gratiniertes Blumenkohl.

Blumenkohl wird geputzt, in Salzwasser nicht zu weich gekocht und in eine mit Butter bestrichene Form gesetzt. Dann verrührt man Eigelb, sauren Rahm und geriebenen Käse zu einem dicken Brei, gießt diesen über den Blumenkohl und bäckt ihn im Backofen gelbbraun.

61. Gefüllte Tomaten.

Man höhlt Tomaten aus und streicht das herausgeschabte Mark durch ein Sieb. Hierauf treibt man Fleischreste durch die Maschine oder nimmt Bratwurstfüllsel und gibt mehrere Eigelb, Salz, Pfeffer und soviel von dem Tomatenmark daran, als die Masse erfordert, röstet diese in etwas Butter, füllt sie in die Tomaten und schmort sie etwa $\frac{1}{2}$ Stunde mit gesalzener Butter im Backofen (vgl. Nr. 40).

62. Gemüsepudding.

2 Eidotter mit 20 g Butter flaumig gerührt, 2 Löffel dicker Rahm, 1 gehäufter Löffel weichgedünstetes, feingeschnittenes Gemüse (aus Tabelle I), Salz werden innig verrührt und in einem mit Butter ausgeschmierten Metallgefäß $\frac{1}{2}$ Stunde langsam im Wasserbad gekocht. Als Gemüse eignen sich besonders Spinat, Kochsalat, Blumenkohl, Champignons, junge grüne Bohnen, Spargelspitzen. Man kann dem Gemüse etwas feingehacktes Hirn, Kalbsbries oder gekochten Schinken beimischen. Beim Anrichten gibt man ein wenig zerlassene Butter darüber und bestreut dieselbe mit geriebenem Käse.

63. Gemüseallerte.

In einer Abkochung von Kalbsfüßen (3—4 Stunden lang kochen) löst man Gelatine (15—20 Blatt). Man klärt sie mit Eierklarschnee, zu dem man die Flüssigkeit löffelweise zumischt. Um vollständig zu klären, bedarf man 4—5 Eierklar

auf 1 Liter. Dem Eierklar setzt man vor dem Schlagen $\frac{2}{10}$ l kaltes Wasser zu, damit der Schnee nicht zu steif wird und beim Erhitzen nicht so leicht gerinnt. Nach völligem Vermischen wird auf dem Feuer weiter geschlagen; es darf nicht bis zum Sieden erhitzt werden. Dann stellt man die Masse auf dem Herd beiseite und läßt noch $\frac{1}{2}$ Stunde ziehen. Dann durch ein feines Leintuch seihen, etwas Sherry, Portwein oder Madeira und Citronensaft nach Geschmack hinzufügen.

Mit dieser Flüssigkeit wird der Boden einer großen oder 6—8 kleinerer Formen ausgegossen; diese sodann auf Eis stellen. Nach dem Erstarren den Boden mit Stückchen oder Scheiben harter Eier und Essiggurken bedecken. Wieder etwas Flüssigkeit nachgießen und erstarren lassen. Dann füllt man die Form mit einem Gemisch verschiedener Gemüse (aus Tabelle I), namentlich Spargelspitzen, jungen grünen Bohnenschoten, Blumenkohl, zerhackten Pilzen und Morcheln, einigen jungen Erbsenkernen und einigen dünnen Scheiben Karotten und gießt zwischendurch immer wieder von der Flüssigkeit nach, die alle Lücken ausfüllen und namentlich die Wände und schließlich die Oberfläche decken soll. Die Gemüse sind vorher einzeln oder zusammen abgekocht und nach dem Erkalten mit Essig, Salz, Pfeffer und wenig Öl zu einem Gemüsesalat angemengt worden.

Nach Füllung der Formen werden dieselben zum Erstarren der Masse auf Eis gestellt. Als Beiguß wird tartarische oder Remouladen- oder kalte Kräutertunke benutzt (Rezepte Nr. 32, 31, 21).

Die hier angegebene Menge liefert 6—8 Portionen. (Sehr beliebte Vorspeise, auch für Gesunde.)

64. Sauerkrautauflauf.

Sauerkraut wird am Tage vorher gekocht. Am nächsten Tage legt man es auf ein Sieb, damit es abtropft. Dann wird eine Auflaufform ausgebuttert, eine Lage Sauerkraut hineingelegt, darauf eine Lage Bratwurstfüllsel, dann eine Lage Sauerkraut, hierauf eine Lage gebratene Speckscheiben, oben auf eine Lage Sauerkraut. Man kann auch nur Speckscheiben verwenden. Zwischen die einzelnen Schichten gießt man immer einige Löffel folgender Mischung; ganze Eier, Rahm, etwas Salz, Muskat (oder Pfeffer) gut geschlagen. Auf die

Oberfläche gießt man von dieser Mischung und bäckt dann den Auflauf im Backofen.

65. Irish stew.

Weißkraut oder Wirsing wird geputzt und gewaschen. Hammelfleisch von Brust und Schulter wird in Stücke geschnitten. Ein Dampfkochtopf wird mit einer Lage der Blätter belegt, dann kommt eine Lage Fleischstücke, Salz, Pfeffer, und in Scheiben geschnittene Zwiebeln darauf. Dann wieder Kohl usw.; den Abschluß bildet eine Lage Kraut. Über das ganze gießt man etwas Wasser oder Fleischbrühe und schraubt den Deckel auf den Dampfkochtopf. Kochdauer etwa $2\frac{1}{2}$ Stunden. Zwischendurch muß einmal vorsichtig nachgesehen werden, ob noch genügend Brühe an dem Gerichte ist.

66. Gurkengemüse.

Man schält frische Gurken, schabt die Kerne heraus, schneidet das Gurkenfleisch in große Würfel und dämpft es mit Salz und Pfeffer in Butter weich. Vor dem Anrichten gibt man feingehackte Sellerieblätter und geröstete Petersilienblätter, dann Eigelb mit Rahm verkleppert hinzu und läßt das Gericht nur noch kurz ziehen.

67. Parmesanpudding.

20 g Butter, 2 Dotter, 40 g Parmesankäse (oder anderer Hartkäse), $\frac{1}{10}$ l saurer Rahm, 2 Eierklar, 30 g Schinken, Salz.

Butter wird flaumig gerührt, mit Dottern, geriebenem Käse, saurem Rahm, etwas Salz und steifem Eierschnee vermischt. Die Masse wird in einer gut bestrichenen Puddingform $\frac{3}{4}$ Stunden im Wasserbad gekocht, gestürzt und mit gehacktem Schinken umgeben. Der Pudding kann auch mit verschiedenen einfach abgekochten Gemüsen (Tabelle I), verziert werden. (H)

68. Rahmpudding mit Schinken.

$\frac{1}{8}$ l saurer Rahm, 3 Dotter, 3 Eierklar, 20 g Schinken, 20 g Butter (Salz).

Saurer Rahm wird mit Dottern (und Salz) verquirlt, mit Eierschnee vermischt. Eine Puddingform wird mit kalter

Butter bestrichen, die Masse $\frac{1}{2}$ Stunde im Dampf gekocht, der Pudding gestürzt, und mit feingehacktem Schinken umgeben (für 2 Personen). (H)

69. Fleischpudding.

200 g Kalbfleisch braten und durch die Maschine geben. 40 g Butter schaumig rühren, 2 Dotter, den Fleischbrei, Salz und den geschlagenen Schnee dazu, in gut geschmierter Puddingform im Wasserbad 20—25 Minuten kochen (für 2—3 Personen).

70. Spinatpudding.

Etwa 200 g gekochter Spinat, passiert gewogen, 40 g Butter und 2 Dotter schaumig rühren. Etwas angeröstete feingehackte Zwiebel, Pfeffer, Muskatnuß darunterühren, dann den Spinat und den festgeschlagenen Schnee dazumischen und in einer mit Butter ausgestrichenen Form im Wasserbad 25 Minuten kochen (für 2—3 Personen).

71. Spinatpudding (eine andere Art).

Spinat wird abgebrüht, durch die Maschine passiert und mit Butter und etwas feingehackter Zwiebel gedünstet. Dann fügt man Muskat hinzu, gibt einige Eigelb und das zu Schnee geschlagene Weiße daran, füllt die Masse in eine mit Butter bestrichene Puddingform, die mit Luftbrotbrösel oder mit feingehacktem kaltem Kalbfleisch bestreut ist und kocht sie 1 Stunde im Wasserbade.

72. Krautpudding.

125 g Kraut, Salzwasser, Kümmel, 40 g Schweinefleisch, 1 Ei, Salz.

Die Krautblätter werden mit Kümmel in Salzwasser gekocht. Rohes, gehacktes Fleisch wird mit Ei und Salz verührt, die Krautblätter damit bestrichen. Man gibt das ganze in eine ausgefettete Form und kocht es 1 Stunde im Wasserbad. (H)

73. Leberpudding.

5 Hühnerlebern oder etwas Kalbsleber mit Zwiebel rösten, dazu Salz, Pfeffer, Muskatnuß geben. Dann passieren. 40 g Butter schaumig rühren, 2 Dotter und 2 Eierklarschnee darun-

ter mischen, dann das Ganze vorsichtig untereinander rühren, in mit Butter ausgeschmierter Form im Wasserbad kochen (für 2 Personen).

74. Tomatensoufflé.

Einige Tomaten passieren, mit etwas Salz, Pfeffer, Citronensaft und Eigelb vermischen, 2 zu Schnee geschlagene Eierklar unterziehen. Dann das ganze schnell bei gutem Feuer backen, vor dem Anrichten geriebenen Käse darüber geben.

75. Weißkraut- oder Wirsingauflauf.

Das Gemüse in Salzwasser weichgekocht, wenn gewiegt, mit feingeschnittenem Speck oder Mettwurst dünsten. Wenn erkaltet, gibt man 1 Ei, etwas Rahm und Eierschnee von 1 Ei dazu, vermischt alles gut. Dann streicht man eine feuerfeste Form gut mit Butter aus, füllt die Form mit der Masse und bäckt das ganze im Ofen ungefähr $\frac{3}{4}$ Stunde. Man kann eine Kapern- oder Tomatentunke dazu geben.

D. Süßspeisen ohne Mehl.

76. Schneebälle (Schneenockerl).

2 Eierklar mit ein wenig Saccharin versetzen und zu steifem Schnee schlagen, in siedendes Wasser (oder besser in siedendes Gemisch von 1 Teil dickem Rahm mit 4 Teilen Wasser) löffweise eintragen und nach völligem Ersteifen (einige Minuten!) herausschöpfen und auf einem Siebe abtropfen lassen. Beim Anrichten mit Rahmtunke (Rezept Nr. 78) übergießen.

77. Schneebälle (2. Rezept).

200 g dicker Rahm, Vanille lasse man kurz aufkochen und noch $\frac{1}{4}$ Stunde ziehen. Dann füge man den steifen Schnee von 2 Eierklar in den wieder zum Aufwallen erhitzten Rahm, lasse diesen mit dem Schnee einige Minuten kochen, schöpfe die geronnene Schneemasse auf ein Sieb, nehme den Rahm vom Feuer, sprudle 2 Eidotter hinein und erhitze unter ständigem Rühren bis vors Kochen. Dann süße man die Masse mit Saccharin.

Von dem Schnee werden mit dem Löffel kleine Bällchen abgestrichen; man lege sie in eine Schüssel und übergieße sie mit dem Rahm. Auf Eis kaltstellen (1—2 Portionen).

78. Rahmtunke.

2 Eidotter werden mit 100 g dickem Rahm, etwas Rum oder Kirschwasser, etwas Saccharin — nach Wunsch unter Zusatz von Vanille oder Vanillinlösung — auf dem Feuer, bei gelinder Hitze, dick geschlagen.

79. Kakaopudding.

20 g reines Kakaopulver und 20 g Butter lasse man in einem Kochtopf schwitzen, füge dann nach und nach ein heißes Gemisch von 150 g dickem Rahm und 150 g Wasser hinzu, und koche dann auf. Nach geringem Abkühlen füge man Gelatinelösung (2 Blatt in möglichst wenig heißem Wasser gelöst) zu. 1 Eierklar wird zu steifem Schnee geschlagen, das Eigelb dann zugemischt. Alles wird vereint, mit Saccharin schwach gesüßt, in eine Form gegeben, sehr kalt gestellt (1—2 Portionen).

Anrichten mit Schlagsahne oder Vanille-Rumtunke. (Rezept Nr. 78).

80. Citronen-Rahmspeise.

200 g dicker Süßrahm, 2 Eidotter, den Saft einer ganzen Citrone, etwas Saccharin schlage man tüchtig, bringe die Masse unter stetem Rühren ans Feuer (bis vors Kochen), füge nachher 2 Blatt Gelatine, in möglichst wenig heißem Wasser gelöst, dazu, lasse die Masse in einer Form erkalten und stürze sie nach dem Erstarren.

81. Caramel-Rahmspeise.

1 l dicker Rahm, 10 ganze Eier, Saccharin und etwas Vanille werden auf dem Feuer dick geschlagen (nicht kochen!) und dann durch ein Sieb in eine gebutterte Auflaufform gegeben. Hierauf — nicht zugedeckt — $\frac{3}{4}$ bis 1 Stunde im Wasserbade (!) braun backen; dann sehr kalt stellen. Am folgenden Tage wird die Masse gestürzt und angerichtet (8—10 Portionen).

82. Gestürzte Rahmspeise.

2 Dotter, 100 g Sahne mit Saccharin am Feuer dick schlagen, dazu 2 g aufgeweichte Gelatineblätter und je nach Geschmack Vanille oder 2 Eßlöffel stark konzentrierten Kaffee geben, in eine kalt ausgespülte Form schütten und bis zum Erstarren sehr kalt stellen.

83. Gefüllter Teekuchen.

Schnee von 3 Eiweiß steif schlagen, dann ein Gemenge von 3 Dottern und Saccharin locker dazumischen; die Masse auf gefettetes Papier streichen, hellgelb backen und noch warm, mit einem für Diabetiker geeigneten Fruchtmus oder Kompott bestreichen. Dann zusammenrollen.

84. Kaffee-Eis und anderes Gefrornes.

150 g dicken Rahm mit 2—3 Eidottern, 2 Eßlöffel stark konzentriertem Kaffee und Saccharin am Feuer dick schlagen (nicht kochen); die Masse nach dem Erkalten in die Gefrierbüchse stellen. Statt Kaffee kann man nach Geschmack Vanille, Rum, Kirschwasser, Mark von Früchten (S. 32), geriebene Nüsse oder reines Kakaopulver (S. 46) nehmen.

85. Agar-Weingallerte.

10 g Agar-Agar werden $\frac{1}{2}$ Stunde in kaltem Wasser geweicht und ausgewaschen, dann fest ausgedrückt, mit der Schere in kleine Stücke zerschnitten; dann mit $\frac{3}{10}$ l Wasser im siedenden Wasserbade erhitzen, bis es völlig zergangen ist. Nachdem man die Lösung sich etwa 10 Minuten hat abkühlen lassen, wird sie durch ein Sieb in eine Glasschale entleert und mit 1 Weinglas trockenem Sherry oder mit 2—3 Eßlöffel Kognak (oder Rum) vermischt und auf Eis gekühlt bis sie erstarrt ist.

Man kann die flüssige Masse nach dem Kochen mit etwas Saccharin süßen. Wenn die Gallerte steifer gewünscht wird, kann man 15 statt 10 g Agar-Agar verwenden.

86. Weingallerte.

1 Flasche Weißwein (oder schmackhafter guter Apfelwein), $\frac{1}{4}$ l starken Tee, den Saft einer Citrone und 3 Eßlöffel ungezuckerten Himbeersaft, ein Stückchen Zimt, etwas Saccharin mischen und bei leichter Hitze lauwarm werden lassen. 25 g weiße und 25 g rote Gelatine werden in heißem Wasser gelöst, durchgeseiht und mit der übrigen Masse vermischt. Das ganze wird nochmals durch ein Leinentuch gesiebt, in Glasschalen gefüllt und sehr kalt gestellt. (5—6 Portionen.)

87. Weingallerte (2. Form).

$\frac{1}{8}$ l Wasser, 3 Eidotter, $\frac{1}{2}$ Citrone, schlage man gut, bringe die Masse bis vors Kochen. Nach geringem Abkühlen möglichst konzentrierte Lösung von 2 Blatt Gelatine, 1 Weinglas zuckerfreien Sherry oder 2 Eßlöffel Kirschwasser (bzw. Kognak, Slibowitz, Rum, Arrak) hinzugeben; man süße mit Saccharin, schlage das ganze noch einige Minuten und kühle es auf Eis.

88. Rahmschnittchen.

4 Eidotter mit Saccharin gut verrühren, dazu den steifen Schnee von 4 Eierklar mischen, dann dünn auf ein gefettetes Blech streichen und bei starker Hitze schnell backen. Nach dem Abkühlen in Stücke von der Größe gewöhnlicher Rahmschnittchen zerlegen. Zwischen je zwei Scheiben wird folgende Masse gefüllt:

2 Eidotter, $\frac{1}{8}$ l Weißwein oder Apfelwein mit etwas Saccharin innig verrühren, am Feuer dick schlagen, auskühlen lassen. 80 g Butter gut flaumig schlagen und mit der erkalteten Masse innig verrühren. Um besseres Steifen der Masse zu erzielen, kann man den Weißwein mit möglichst konzentrierter Lösung eines Blattes Gelatine versetzen.

Die Gesamtmasse des Gerichtes reicht für 4 Portionen aus.

89. Vanille-Rahmspeise.

2 Eidotter und 50 g dicken Rahm, etwas Vanille und Saccharin am Feuer dick schlagen (nicht kochen!); wenn erkaltet mit 80 g Schlagsahne verrühren. Im Glas oder kleiner Glasschale anrichten. Nach Wunsch vor der Mahlzeit eiskalt stellen.

90. Chaudeau.

2 Eidotter, etwas Saccharin, $\frac{1}{8}$ l Weiß- oder Rotwein werden über Feuer bis zum Dickwerden geschlagen (nicht kochen!) Im Glas heiß anrichten.

91. Kirschegeist-Rahmspeise.

2 Eidotter, 50 g dicken Rahm, etwas Vanille und Saccharin über Feuer bis zum Dickwerden schlagen (nicht kochen!). Nach dem Abkühlen 2 Eßlöffel Kirschwasser (oder Slivovicz oder Kognak oder Rum) zumischen. Dann auf Eis kühlen oder in Kältemischung in Gefrorenes umwandeln.

92. Eierkognak.

Zu 2 Dottern rührt man 2 Eßlöffel Schlagsahne und 1(—2) Eßlöffel voll Kognak (oder Kirschgeist oder Rum) und Saccharin. Die 2 Eierklar werden zu festem Schnee geschlagen; hiermit die übrige Masse vermischt. Das ganze in ein Glas gegeben und auf Eis kalt stellen.

93. Omelette soufflée.

3 Eidotter mit ein wenig Saccharin dick schaumig rühren. Hierzu mischt man den steifen Schnee der 3 Eierklar und bäckt das ganze rasch in heißer Butter auf einer Pfanne über starkem Feuer oder in einer Blechform im heißen Ofen (2 Portionen).

94. Kaffee-Rahmspeise.

Man bereitet $\frac{3}{10}$ l starken Kaffee aus 90—125 g gebranntem Kaffee und läßt ihn erkalten. Man löst 50 g Gelatine in kochendem Wasser, siebt sie durch und fügt sie lauwarm zum Kaffee. 1 l dicker Rahm wird mit Saccharin versüßt und langsam mit der Kaffee-Gelatinelösung vermengt. Das ganze wird in eine mit Wasser gespülte Form gegossen. Nach dem Erkalten auf Eis stellen, nach dem Erstarren stürzen. Beim Anrichten gibt man zu jeder Portion 2 Eßlöffel dicke Schlagsahne (8—10 Portionen).

95. Teekuchen aus Nüssen.

$\frac{1}{4}$ kg geschälte Nüsse (oder Mandeln), 8 Eidotter, $\frac{1}{4}$ kg Butter, etwas Vanille, 100 g Plasmon (oder Dr. Klopfers Lecithineiweiß, S. 36), etwas Saccharin, 20 g Backpulver; das Eierklar der 8 Eier zu steifem Schnee geschlagen damit vermengt. In einer Form 1 Stunde lang backen (6—8 Portionen).

Backpulver = 10 g doppelkohlensaures Natron und 10 g Cremor tartari.

96. Mürbes Mandelgebäck.

70 g Butter, 100 g feingeriebene Mandeln, Nüsse oder Pistazien, 3 hartgekochte Eier sehr feingewiegt, 1 rohes Eidotter, etwas Citronen- oder Pomeranzenschale, Vanille. Alles gut gemischt und durch ein Sieb gedrückt. Der Teig wird ausgerollt, mit verschiedenen Formen ausgestochen, mit zer-

hackten Mandeln bestreut und auf einem Blech gebacken. (10—12 Portionen.)

Man kann der Masse auch Zimt, Nelken, Kalmus, Pulver von Ingwerwurzeln beimischen.

97. Mandelbrot.

Man nehme 100 g geschälte Mandeln oder Nüsse, vermische sie mit 40 g Butter, 2 ganzen Eiern, 3 Dottern und Salz. Hierauf nehme man etwas mehlfreies Backpulver und rühre die Masse $\frac{1}{2}$ Stunde. Zum Schluß gibt man den Schnee von 3 Eiweiß darunter, bringt den Teig in eine Form und lasse es bei gelindem Feuer 1 Stunde backen. (Einige Tage haltbar, 5—6 Portionen.) Dieses Gebäck ist kohlenhydratarm aber nicht kohlenhydratfrei. (S. Nr. 36.)

98. Mandelbrot (2. Art).

80 g Mandeln oder Nüsse werden heiß überbrüht, geschält und für kurze Zeit in kaltes Wasser gelegt, dann gut abtrocknen und zerreiben. 120 g Butter gut flaumig rühren, zu der man nach und nach 5 Dotter, etwas Salz und Saccharin gibt. Dann rühre man die geriebenen Mandeln oder Nüsse und zum Schluß den Schnee von 5 Eiweiß dazu. Die Masse wird in eine gefettete Biskuitform gegeben und bei mäßiger Hitze $\frac{3}{4}$ —1 Stunde gebacken (3—4 Portionen). Vgl. Nr. 97.

99. Nußkranz.

125 g Butter schaumig rühren, denn 5 Eidotter hineinrühren; 10 g mehlfreies Backpulver, 30 g Plasmon, etwas Saccharin, 250 g feinverriebene Haselnüsse (vorher schwach geröstet und dann abgehäutet) zufügen; zuletzt den Schnee von 5 Eierklar beimischen. Die Masse in eine mit Butter ausgestrichene Kreuzform füllen und 30—45 Minuten backen.

100. Nußroulade.

Von 3 Eiweiß festen Schnee schlagen; damit die 3 Dotter und 60 g geriebene Mandeln leicht verrühren, mit Saccharin süßen, diese Masse auf ein mit Butter bestrichenes Blech geben, in mittelmäßiger Hitze backen; wenn sie aus dem Backofen kommt, mit einem Messer ablösen und mit folgendem füllen: $\frac{1}{16}$ l (= 60 g) Schlagsahne zu sehr festem Schnee

schlagen, 60 g geriebene Nüsse und feingeschnittene Citronenschale dazugeben, mit Saccharin süßen. Wenn diese Fülle aufgestrichen, den Teig einrollen und die Roulade in Scheiben schneiden. — Den nichtverbrauchten Rest immer wegen der Schlagsahne in einem Eisschrank aufbewahren (2—3 Portionen).

101. Mandelkuchen.

12 Eidotter, 125 g frische Butter 10 Minuten lang innig verrühren; $\frac{1}{4}$ kg süße Mandeln (geschält) oder Nüsse oder Pistazien feingewiegt und etwas Saccharin nach Geschmack auch ein wenig Salz dazumischen und wieder $\frac{1}{2}$ Stunde lang rühren. Schließlich den steifen Schnee von 7 Eiern der Masse beimengen.

In einer reich mit Butter ausgestrichenen Brotform in nicht zu heißem Ofen 30—45 Minuten backen (12—15 Portionen).

Die Masse kann nach Belieben auch mit Vanille, Citronen- oder Pomeranzenschale, Kalmus oder ein wenig Pfeffer gewürzt werden. Vgl. Nr. 96.

102. Makronen.

$\frac{1}{2}$ kg feingeriebene Mandeln werden dem steifen Schnee von 6 Eierklar, 1 Eierbecher voll kaltem Schlagrahm, etwas Saccharin, nach Wunsch etwas Vanille oder Zimt vermisch. Kleine Häufchen der Masse werden auf gut gefettetes weißes Papier gesetzt und in mittelheißem Ofen gebacken (15 bis 20 Portionen). Vgl. Nr. 107.

103. Mandeltorte.

200 g feingeriebene Mandeln, 6 Eidotter, etwas Saccharin, 3 Eßlöffel Essig, steifer Schnee von 4 Eierklar werden gemischt. Die Masse wird auf angefettetem Papier dünn aufgestrichen und bei mäßiger Hitze gebacken. Dann schneidet man die Torte in Scheiben und weicht die Hälfte davon in folgender Flüssigkeit ein: Gemisch von je 4 gleichen Teilen Rum, Kognak und dickem Rahm.

Füllung hierzu: 20 g Butter flaumig rühren, dann 2 Eßlöffel geriebene Mandeln oder Nüsse, 3 Eßlöffel Schlagrahm und etwas Saccharin verrühren.

Dann häuft man zu unterst nicht geweichte Torte, dann eine Schicht Füllsel, dann eine Schicht geweichte Torte. Darauf

gibt man etwas geschlagenen Rahm, stellt das ganze eiskalt. Vor dem Anrichten werden die kleinen Torten nochmals mit geschlagenem Rahm bespritzt (6 Portionen).

104. Schokoladentortenschnitten.

6 Eiweiß zu Schnee geschlagen, 120 g feingeriebene Mandeln (Nüsse oder Pistazien), 50 g reines Kakaopulver etwas Saccharin zusammenrühren. Auf angefettetem Blech in 1 cm dicker Schicht ausbreiten, bei mäßiger Hitze backen. Solange noch heiß in gleichmäßige Scheiben schneiden. Zwischen je 2 Scheiben, aber erst beim Anrichten, dicke Lage steif geschlagenen Rahmes füllen (4—5 Portionen). Vgl. Nr. 88.

105. Nußtorte.

40 g Butter werden mit 40 g frischem Siebkäse (Quark) und etwas Saccharin innig verrührt. Nach und nach werden 4 Eidotter eingerührt, dann 70 g feingeriebene Nüsse und zuletzt der steif geschlagene Schnee von 4 Eierklar. In kleiner, gut ausgeschmierter Tortenform backen. Die Masse gibt 3—4 Portionen; sie ist einige Tage haltbar. Vgl. Nr. 103.

106. Haselnußtorte.

12 Eidotter gut verrühren, dann mit $\frac{3}{8}$ kg Haselnüssen, die mit der Haut fein vermahlen sind, mengen. Dazu 2 Eßlöffel Rum (Kirschwasser oder dgl.) und Saccharin geben und dann den steifen Schnee der 12 Eierklar vorsichtig mit der Masse mischen. Die Masse wird in eine mit Butter ausgestrichene Form gefüllt und bei mäßiger Hitze eine Stunde lang gebacken (8—10 Portionen). Vgl. Nr. 103.

107. Gerichte aus ausgewaschenen Mandeln und Nüssen.

Bei sämtlichen vorstehenden Rezepten (Nr. 95—106) war von Mandeln usw. gewöhnlicher Beschaffenheit die Rede. Dieselben sind aber nicht kohlenhydratfrei, wenn auch — wegen der reichlichen sonstigen Zusätze — der Kohlenhydratgehalt der fertigen Trockengebäcke auf 3—4% und der feuchten Gerichte auf 1—3% absinkt. Am zweckmäßigsten sind für alle genannten Gerichte Haselnüsse und Paranüsse; sie sind am kohlenhydratärmsten (S. 36).

Wo auch diese kleinen Mengen vermieden werden sollen,

müssen die Mandeln und Nüsse nach dem alten Verfahren von J. Seegen ausgewaschen werden. Die dann entstehende mehrlartige Substanz ist fast völlig kohlenhydratfrei und wird in gleichen Gewichtsmengen wie zerriebene gewöhnliche Mandeln zum Herstellen der Gerichte Nr. 95—106 verwendet. Da aber das Aroma Einbuße erlitten hat, ist in der Regel stärkeres Würzen mit Zimt, Nelken, Vanille, Kalmus, natürlicher Ingwerwurzel, Essenzen, bzw. bei nicht-süßem Gebäck mit Salz, Kümmel u. dgl. erforderlich.

Man gebe 125 fein geriebene Mandeln oder Nüsse in einen feinmaschigen Leinwandbeutel, hänge diesen 15 Minuten lang in siedendes Wasser, dem einige Tropfen Essigsäure beigemischt sind. Die Masse wird darauf im Leinwandbeutel oder zwischen Tüchern gut abgepreßt und wie geriebene Vollmandel verwendet.

Das treffliche Seegensche Mandelbrot erhält man daraus auf folgende Weise: Die Masse wird innig mit 100 g Butter und 2 rohen Eiern verrührt; später setzt man noch 3 Eidotter und etwas Salz oder Saccharin zu. Nach längerem Rühren wird noch ein feiner steifer Schnee von 3 Eierklar untergezogen. Der Teig wird in einer mit geschmolzener Butter bestrichenen Papierform bei gelindem Feuer gebacken. Bei einiger Übung erhält man auf diese Weise lockere, wohl-schmeckende und fast kohlenhydratfreie Gebäcke. Die mit Salz versehene Masse eignet sich besser für Brot, die mit Saccharin gesüßte Masse besser für Trockengebäcke (Ausstreichen in flache Scheiben von ca. 1 cm Dicke, in beliebige Formen schneiden, backen auf einer mit angefettetem Papier bedeckten Platte).

Will man das ausgewaschene Mandelmehl nicht sofort verwenden, so läßt man es nach schärfstem Abpressen bei gelinder Wärme trocknen und zerpulvert es dann im Mörser.

108. Apfelschnitten.

Den Schnee von 2 Eierklar, Saccharin und die 2 Dotter dazu, gut verrühren. Rund geschnittene Apfelscheiben hineintauchen und mit einem Löffel wieder herausfischen. Dann die Scheiben in siedendes Fett eintragen, bis sie gar sind.

Als Beigabe — wenn erlaubt — Fruchtmark oder mit etwas Saccharin gesüßte Fruchtsäfte (S. 15).

109. Früchte-Soufflé.

2 gehäufte Eßlöffel Fruchtemark für Diabetiker (Otto Krumm, A.-G.). — Weniger empfehlenswert 2 Eßlöffel durchgeseibtes, weichgedünstetes Obst (Pflirsich oder Aprikosen oder Erdbeeren nach Abgießen des freiwillig ausgelaufenen Saftes) werden mit ein wenig Saccharinlösung innig gemischt, und dann gibt man den steifen Schnee von 3 Eierklar hinzu. 10 Minuten im Ofen bei gelinder Hitze im Ofen backen. Heiß anrichten.

110. Fruchteis I.

Fruchtmark für Diabetiker zur Eisbereitung von Otto Krumm, A.-G. (S. 32); Mark verschiedener Früchte erhältlich. 500 g Fruchtmark, 100 g dicker Süßrahm, 50 g Wasser, etwas Saccharin; dies nach gründlichem Verrühren den steifen Schnee von 3 Eierklar unterziehen (für 5 Portionen).

111. Fruchteis 2.

Erdbeeren oder Himbeeren oder Himbeeren und Johannisbeeren gemischt, werden ausgepreßt. — Wenn man vergorenen Saft dieser Früchte benutzt, so sind die Gerichte ganz kohlenhydratfrei!

$\frac{1}{2}$ l Saft mit $\frac{1}{4}$ l Weißwein (oder Wasser) werden schnell bis zum Sieden aufgekocht, dann durch ein Leintuch gesiebt. Nach dem Abkühlen in entsprechende Form gefüllt und in die Gefrierbüchse gestellt (4—5 Portionen).

112. Fruchteis 3.

Aprikosen, Pflirsich, Erdbeeren ohne Zucker eingemacht werden nach Entfernen des Saftes durch ein feines Sieb gedrückt. Das Mus wird so behandelt, wie in Rezept Nr. 110 angegeben. 500 g Mus reichen für 5 Portionen.

113. Gentiner Apfelspeise.

Man kocht $2\frac{1}{2}$ kg Äpfel mit $\frac{4}{10}$ l Wasser ganz weich, so daß es sich zu Mus zerdrücken läßt, streicht das Mus durch ein Sieb und süßt es mit etwas Saccharin. Man mischt ihm bei die abgeriebene Schale einer kalten und den Saft einer ganzen Citrone, einige feingeriebene bittere Mandeln und 1—2 Eierklar. Man schlägt die Masse bis sie schäumig wird und rührt

20 g halb weiße, halb rote Gelatine, welche vorher aufgelöst ist, darunter. Die Speise wird auf Eis gestellt und nach Erkalten gestürzt (für 10 Portionen. — Eine Portion = $\frac{1}{10}$ der fertigen Masse, entspricht 250 Äpfel = 40 g (!) Weißbrötchenwert).

Als Beilage auf jede Portion je 2 Eßlöffel Schlagsahne mit Vanille gewürzt.

114. Rhabarberkompott.

Die geschälten und in Stücke von 5—6 cm geschnittenen Stengel werden im Wasserbad gekocht, bis sie weich geworden. Nachdem die Masse etwas abgekühlt, fügt man ihr etwas gelöstes Saccharin bei und wartet 3—4 Stunden lang, so daß es sich in die Stengel hineinzieht. Recht kalt anrichten.

Man kann das Kompott auch durch ein großes Sieb streichen und dann mit geschlagenem Rahm überdecken.

115. Rhabarber-Rahm-Gallerte.

Das im Wasserbad hergestellte Rhabarberkompott (Rezept Nr. 114) wird durch ein Sieb gestrichen. 20—25 g Gelatine werden in wenig warmem Wasser gelöst, durch ein feines Sieb oder Leintuch geseiht, dann mit $\frac{1}{5}$ l heißem und durch Saccharin versüßten Rahm vermischt. Der Rahm und $\frac{1}{10}$ l Rhabarbermus werden vermengt und nach dem Abkühlen in einer Form eiskalt gestellt. Nach dem Erstarren stürzen (für 2 Portionen). — Man kann den Rahm auch schlagen und als Schlagrahm dem Rhabarbermus beimischen.

116. Preiselbeerengallerte.

Preiselbeeren werden wie beim Einmachen im Wasserbade gut weichgekocht (Rezept Nr. 123). Dann wird der Saft ausgepreßt und $\frac{1}{4}$ l desselben werden 12—15 g Gelatine und Saccharin zugegeben. Man seiht den noch warmen Saft am besten nochmals durch ein Leintuch. Nach dem Abkühlen wird die Masse eiskalt gestellt, bis sie erstarrt ist (2 Portionen).

Anrichten mit Schlagsahne oder Vanillecrème (Rezept Nr. 89). (H)

Die aus Früchten bereiteten Gerichte Nr. 108—112 sind kohlenhydratarm; auf 1 Portion von 100 g fertigen Ge-

richtes entfallen etwa 4—5 g Kohlenhydrat. Muß man dies vermeiden, so halte man sich an die Rezepte 114—116 und an Rezept 111 aus vergorenem Saft.

Vgl. über Früchte Rezept Nr. 124 und S. 31.

E. Verschiedenes.

117. Kleberbrot.

50 g Dr. Klopfers Lecithineiweiß, 150 g frischer Rahm, 2 große Eier, 10 g Natriumbicarbonat, 8—10 g Salz, 5—10 g Kümmel.

Das Lecithineiweiß wird mit dem Rahm, dem gelben der Eier und mit den Zutaten in einen Porzellantopf eingerührt. Nach 10stündigem Stehen wird das steifgeschlagene Eiweiß der beiden Eier rasch und leicht damit vermengt und die Masse in einem mit ausgewaschener Butter bestrichenen Steinguttopf bei mäßiger Backofenhitze $\frac{3}{4}$ Stunde gebacken. Aus dem Teig von 338 g wird ein Brot von 200 g. In Prozenten berechnet, liefern 100 g Kleberbrot 355 Calorien in etwa 3 g Kohlenhydraten, etwa 31 g N-Substanzen und etwa 25 g Fetten.

Wenige Stunden nach der Fertigstellung können die Brote verwendet werden und sie halten sich in kühlen, mäßig feuchten Räumen mehrere Tage lang ohne Einbuße an Geschmack und Konsistenz (M. van Oordt).

118. Salzmandeln.

1 Pfund geschälte Mandeln abziehen, abwellen, in eine Pfanne werfen und 1 Minute in einen sehr heißen Ofen stellen, damit sie schnell trocknen. Die Pfanne herausnehmen, 30 g frische Butter über die Mandeln streichen. Wieder einige Minuten in den Ofen schieben, bis die Butter zergangen ist, die Pfanne öfters schütteln. In kurzen Zwischenräumen 3 Teelöffel feines Salz über die Mandeln streuen, sehr oft Schütteln. Das Verfahren von der Butter bis zum letzten Salz darf 8 Minuten dauern, dann läßt man sie noch im Ofen, bis sie dunkelgelb geworden sind.

119. Kleines Gebäck.

100g Butter flaumig rühren, nach und nach 5 Eidotter hinzugeben, ferner Salz nach Belieben, 60 g Plasmon oder Dr. Klop-

fers Lecithineiweiß und einen Eierbecher kaltes Wasser. Nach gründlichem Verrühren den Schnee von 5 Eierklar der Masse zumischen. Die Masse auf eingefettetem Blech bei mäßiger Hitze backen.

Sobald man das Blech aus dem Ofen nimmt, wird das Gebäck in beliebige Formen zerschnitten. Das Gebäck hält sich lange Zeit. (12—15 Portionen.)

120. Kakaogetränk.

30 g Butter lasse man in einem kleinen Kochtopf über dem Feuer schmelzen, füge dann 15—20 g reines Kakaopulver hinzu, erhitze beides zusammen unter ständigem Rühren einige Minuten und gieße dann langsam 125 g Wasser hinzu, koche ganz kurz auf; dann nach Belieben mit Saccharin süßen und 75 ccm geschlagenen Rahm teils dazumischen, teils auf den Kakao setzen (1 Portion.)

121. Trierer Punsch.

4 Eßlöffel Teeblätter und die abgeriebene Schale von 4 Citronen werden mit $\frac{1}{2}$ l siedendem Wasser aufgegossen; $\frac{1}{4}$ Stunde ziehen lassen. — 6 Flaschen leichter Weißwein oder guter Apfelwein (oder beides halb und halb), der Saft der 4 Citronen, Saccharin, 2 l kochendes Wasser werden bis vor dem Kochen rasch erhitzt. Hierzu gießt man den heißen Tee (durch ein Sieb) und dann $\frac{3}{4}$ l Arrac. Die Masse wird in gut gereinigte Flaschen gefüllt und fest verkorkt. Man lagert sie in kühlem Keller, verwendet sie aber frühestens nach $\frac{1}{2}$ Jahr. — Besser ist es, das Saccharin erst unmittelbar vor dem Gebrauche zuzufügen.

122. Rote-Rüben-Salat.

Die Rüben werden wie üblich gekocht, dann geschält. Nach dem Erkalten in Scheiben geschnitten, in einen Napf mit Weinessig (nach Wunsch verdünnt) übergossen, unter Zugabe von rohen Zwiebelscheiben, Pfefferkörnern, etwas Lorbeerblatt. Der rote Saft tritt aus, er enthält fast allen Zucker. Etwa 50 g herausgefischte Scheiben enthalten so wenig Zucker, daß sie als Kohlenhydratträger nicht in Betracht kommen und im Rahmen der Speisen von Tabelle I verwendet werden können. Der Saft wird nicht mitverzehrt.

123. Sellerie-Salat.

Der Sellerieknollen wird wie gewöhnlich gekocht, dann in Scheiben geschnitten. Die Scheiben werden mit wenig Wasser nochmals 20 Minuten lang gedämpft. Dabei geben sie soviel Kohlenhydrat ab, daß 120 g der herausgefischten und mit Essig, Öl usw. als Salat angerichteten Scheiben höchstens den Kohlenhydratwert von 10 g Weißbrötchen haben. Hiervon sollte man reichlich Gebrauch machen. — 50 g Selleriesalatscheiben sind, von ganz vereinzelt Diätformen abgesehen, stets erlaubt.

F. Gerichte mit Kohlenhydraten.

Wo nicht ausdrücklich anders vermerkt, haben die hier verzeichneten Gerichte einen Kohlenhydratwert von 20 g Weißbrötchen und sind mit diesem Werte auf die erlaubte Tagesmenge kohlenhydrathaltiger Nahrungsmittel (Nebenkost S. 10 ff) anzunehmen.

Wo von Mehl die Rede ist, ist Normalweizenmehl gemeint und zwar in Menge von 16 g = 20 g Weißbrötchen.

Um mehr Kohlenhydrate für andere Gerichte freizubekommen, ist es aber sehr empfehlenswert, statt der 16 g Mehl 18 g **Diabetikermehl** von Otto Krumm, A.-G., Stuttgart, zu benutzen. Es läßt sich dieses Mehl fast überall, ohne Nachteil für den Geschmack, für Normalweizenmehl einsetzen, und dann haben die Gerichte nur den Kohlenhydratwert von 10 g Weißbrötchen.

Oder man kann, um die Masse des Gerichtes zu vergrößern, 36 g des Krummschen Diabetikermehles benutzen. Dann hat das Gericht den Kohlenhydratwert von 20 g Weißbrötchen. Vgl. S. 35; besonders auch die Bemerkungen über den Gärungsprozeß.

124. Obstkonserven.

Preißelbeeren-Konserve. Ein Einkochtopf mit reifen, gut verlesenen Preißelbeeren wird in ein kaltes Wasserbad gesetzt. Das Wasser wird zum Kochen gebracht, bis die Früchte erweicht und mit ausgetretenem Saft bedeckt sind. Auf etwa 1 l Masse mischt man unter leichtem Rühren 1 g benzoesaures Natron bei. Dann füllt man sie in ausgekochte kleine Weckgläser und sterilisiert diese wie üblich $\frac{3}{4}$ —1 Stunde lang.

Erst vor dem Gebrauch versetzt man den Saft mit etwas Saccharin, mischt den Saft den Früchten wieder zu, läßt die Masse einige Stunden stehen, damit das Saccharin die Früchte gleichmäßig durchzieht.

Stachelbeeren-Konserve. Man benutzt die unreifen Stachelbeeren (S. 31) und verfährt im übrigen wie bei Preiselbeeren.

Rhabarber-Konserve. Die Rhabarberstengel werden geschält, in Stücke geschnitten und dann wie Preiselbeeren behandelt.

Früchtekonserven ohne Zucker für Diabetiker. Von Preiselbeeren, Stachelbeeren, Rhabarber abgesehen, enthält alles für Kompott verwendete Material soviel Zucker, daß es zweckmäßig ist, ihm einen Teil desselben zu entziehen. Beim Einmachen wird das Obst im Einmachkessel so lange vorerhitzt (am besten immer im Wasserbad), bis reichlich Saft ausgetreten ist. Dann wird etwa $\frac{3}{4}$ des Saftes zu anderer Verwendung (für Gesunde) abgegossen. Auf je 1 l der übrigbleibenden Masse fügt man 1 g benzoesaures Natron zu (vorher gelöst, gut verteilen unter sanftem Rühren der heißen Masse). Dann Abfüllen in kleine Weckgläser bis zu $\frac{4}{5}$ der Höhe. Kleine Gläser sind nötig, da sich die Obstmasse nach dem Öffnen des Glases nicht lange hält.

Das so bereitete Obst ist wohlschmeckend und enthält nur noch etwa $\frac{2}{3}$ des ursprünglichen Zuckers. Am besten geeignet: Weiße und rote Spätpfirsiche, nicht ganz reife Aprikosen und Reineclauden, Johannisbeeren, Sauerkirschen, Erdbeeren. Das Steinobst wird vorher entsteint.

So angenehm diese Konserven auch sind, den vollkommenen Wohlgeschmack der nach besonderem Verfahren hergestellten Früchtekonserven der Otto Krumm A.-G. (S. 32) erreichen sie doch nicht.

125. Gerichte mit Mehlschwitze,

auch „Einmach“ oder „Einbrenn“ genannt, wird aus 16 g Mehl und 10 g Butter oder anderem Fett bereitet. Man läßt das Fett heiß werden, gibt das Mehl hinein und rührt die Masse vorsichtig, bis sie hellbraun wird. Dann gießt man 1 Kaffeelöffel Wasser oder Fleischbrühe darauf, rührt tüchtig am Feuer bis die Masse ziemlich fest wird, gibt noch 1 Löffel Flüssigkeit hinzu und wiederholt dies, bis man eine genügend gebundene

Masse vor sich hat. Die Flüssigkeit wird stets kalt aufgegossen, dann wird kurz aufgeköcht. (H)

126. Hirnsuppe.

Mehlschwitze aus 16 g Mehl und 10 g Butter. Dazu Petersilie und 50—60 g kurz abgewelltes Kalbshirn. Die Masse wird gedünstet, dann mit $\frac{3}{4}$ l klarer Fleischbrühe aufgefüllt und auf $\frac{1}{4}$ l eingekocht. Vor dem Anrichten wird die Suppe durchgeseibt und mit dem Dotter abgesprudelt. Salz nach Belieben. (H)

127. Kümmelsuppe.

16 g Mehl und 10 g Butter oder anderes Fett zur Mehlschwitze. Hierzu 5—10 g Kümmel und $\frac{3}{4}$ l klare Suppe. $\frac{1}{2}$ Stunde lang in gedecktem Gefäß auf $\frac{1}{4}$ l einkochen. Salz nach Belieben. Einstreuen von geriebenem Käse verbessert die Suppe. (H)

128. Sardellentunke.

Mehlschwitze aus 16 g Mehl und 16 g Fett. Eine kleine fein gehackte Zwiebel, Petersilie, 3 fein gehackte Sardellen werden in die Mehlschwitze getan und in ihr wenig angeröstet. Dann mit Fleischbrühe auffüllen, kurz kochen; schließlich 1—2 Teelöffel Kapern zufügen. (H)

129. Sauerampfer oder Kerbeltunke.

Mehlschwitze aus 8 g Mehl und 10 g Fett; 100 g fein gehackter Sauerampfer mit 15 g Fett und etwas Wasser dünsten. Dann beides vereinen, mit Fleischbrühe auffüllen. Beim Anrichten 1 Eßlöffel dicken Rahm beimischen. — Diese Menge hat den Kohlenhydratwert von 10 g Weißbrötchen. (H)

130. Weiße und braune Ragouts

verschiedenster Art sollen in der Regel ohne Mehl hergestellt werden, wie dies — mit Ausnahme von Süddeutschland, Österreich und Böhmen — ja auch in der häuslichen Küche üblich ist. Ausnahmsweise kann eine weiße oder braune Mehlschwitze aus 16 g Mehl = 20 g Weißbrötchen oder aus 20 g O. Krummschem Diabetikermehl = 12 g Weißbrötchen benutzt werden. Dann ist dieser Zusatz entsprechend auf die erlaubten Kohlen-

hydrate zu verrechnen. Im übrigen Bereitung der Ragouts nach den gewöhnlichen Kochbüchern, unter Beschränkung auf Material von Tabelle I. (H)

131. Linsen-, gelbe und grüne Erbsensuppe.

25 g Linsen werden mit wenig kaltem Wasser 5—6 Stunden geweicht (bei hartem Wasser unter Zusatz einer Messerspitze doppelkohlensäuren Natrons). Dann mit kaltem Wasser aufgesetzt, langsam gekocht und nach völligem Erweichen durch ein Sieb getrieben. Nach Wunsch wird beim Kochen etwas geräucherter Speck zugefügt, den man vor dem Sieben herausfischt und später wieder zufügt. In das Durchgeseibte gibt man etwas Citronensaft (namentlich wenn man Natron verwendete!), Salz, Pfeffer, in 40 g Butter geröstete 5—10 g Zwiebel und bindet die Suppe durch Einsprudeln eines Eidotters.

Statt eines besonderen Fleischgerichtes kann man der Suppe Frankfurter Siedewürstchen beigegeben. (H)

132. Schinkensoufflée.

3 Eßlöffel dicker Rahm und 10 g Butter werden innig vermengt und unter Rühren mäßig erhitzt. Hierzu 16 g Mehl, Salz, Pfeffer, Gewürzkräuter. Alles am Feuer zusammenrühren bis es dick wird. Dann gibt man fein gewiegten Schinken, 1 Dotter und den festen Schnee von 1—2 Eierklar hinein. Man bäckt die Masse in befetteter Auflaufschüssel. Nach Wunsch bestreuen mit geriebenem Käse. (H)

133. Béchamel-Tunke.

Aus 16 g Mehl und 10 g Butter wird eine Mehlschwitze bereitet. Dazu fügt man 2 Eßlöffel dicken Rahm (süß oder sauer), 1—2 Teelöffel englischer Worcestersoße oder einer anderen ähnlichen Art, Salz, Pfeffer oder Paprika nach Geschmack, den Saft einer halben Citrone. Dies alles wird innig gemischt.

Am besten zu pochierten Eiern. Diese werden auf eine Bratpfanne gelegt, mit der Tunke übergossen, dann mit geriebenem Käse bestreut, mit Butter betropft und 5 Minuten in den heißen Backofen gestellt. — Die Tunke ist auch für kleine Fleisch-, Schinken- und Fischpasteten und Gemüsepudding geeignet. (H)

134. Mürber Teig.

40 g Mehl, 150 g Butter, 10 hartgekochte Dotter, 200 g feingeriebene Mandeln oder Nüsse innig gemischt und tüchtig geknetet. Er findet mannigfache Verwendung. In angegebenen Mengenverhältnissen hat er den Wert von 50 g Weißbrötchen. Für eine Einzelportion kommt man mit dem 5. Teile aus. Diese Menge ist — wenn nichts anderes vermerkt — als 1 Portion dem folgenden zugrunde gelegt. (H)

135. Mürbe Brezeln.

Mürber Teig aus 40 g Mehl (s. oben) wird zu kleinen Brezeln geformt. Diese werden mit zersprudeltem Ei bestrichen, mit grobgehackten, entschälten Mandeln oder feinerhackten Nüssen oder Pistazien bestreut. Die Brezeln werden im Ofen gebacken. — $\frac{1}{5}$ der Brezelmasse = 10 g Weißbrötchen. (H)

136. Mürbe Salzstangen.

Mürber Teig aus 40 g Mehl (s. oben). Man rollt ihn stark aus, schneidet ihn in Streifen, die man zu Stangen zusammenrollt (oder man sticht beliebige Formen aus), bestreicht sie mit gesprudeltem Ei, bestreut sie mit Kümmel und Salz und bäckt sie im Ofen. — $\frac{1}{5}$ der ganzen Gebäckmasse = 10 g Weißbrötchen. (H)

137. Mürber Obstkuchen.

100 g Apfelfleisch wird mit ein wenig Wasser, Rum und Saccharin weich gedünstet, der ausfließende Saft und damit ein großer Teil des Zuckers entfernt. 1 Portion „mürber Teig“ wird nach seiner Bereitung 2 Stunden lang kühlgestellt. Dann wird er ausgewalkt und in 2 Hälften geteilt. Man belegt die eine Hälfte mit dem Apfelmus, bestreut diese mit 10 g grobgehackten Mandeln, legt die zweite Hälfte Teig auf und bäckt die Speise im Ofen.

In gleicher Art lassen sich statt der Äpfel verwenden 100 g Erdbeeren oder 250 g unreife Stachelbeeren oder 125 g Aprikosen; noch besser und bequemer je 3 Eßlöffel „Diabetikerobst“ oder „Diabetikerobstmark“ von Otto Krumm A.-G. (S. 32). Das Mark wäre auf Wunsch vorher etwas mit Saccharin zu süßen. Dem Obstfüßel etwas Rum oder Kirschwasser beizugeben, empfiehlt sich sehr. (H)

138. Obstpastete.

Die im vorigen Rezept genannten Kompottmengen und -arten werden in eine kleine angefettete Pastetenform gebracht. Eine Portion „mürber Teig“ wird in entsprechender Größe ausgewalkt, über das Obst gelegt. Die Speise wird im Ofen gebacken und recht heiß vorgesetzt. (H)

139. Hefenteigspeisen.

3 Eßlöffel halb süßer Rahm halb Wasser werden lauwarm gemacht, mit einem nußgroßen Stück Hefe vermischt und zum Treiben warm gestellt. Nach 20 Minuten gibt man die gärende Hefe auf das Gemisch von 1 Eidotter, 16 g Mehl, etwas Salz oder Saccharin, verrührt die Masse und läßt den Teig aufgehen. Der fertige findet vielerlei Verwendung. (H)

140. Hefenteig mit Schinken.

Dem Hefenteig werden 40—50 g feingehackter Schinken, 20 g zerlassene Butter, 1 Ei (letzteres nicht nötig) eingerührt. Man bäckt das ganze in einer Form. — Statt Schinken auch gekochte Mettwurstmasse oder feingehacktes, gekochtes Kalbsbries. (H)

141. Hefenteig mit Nockerl.

Der Hefenteig wird mit 100 g ausgewaschenem, durchgeseibtem und dann gut abgepreßtem Topfen (Quarkkäse, S. 33), vermengt, nachdem dieser mit 1 Eidotter und etwas Zimt (oder Vanille) abgerührt worden ist. Man formt aus der Masse Nockerl, bäckt dieselben in Fett und bestreut sie beim Anrichten mit 25 g Topfenkäse. (H)

142. Hefenteigknödel.

Man bindet den fertigen Hefenteig in ein Leintuch und kocht ihn $\frac{1}{2}$ Stunde in Salzwasser. Dann wird er zerrissen mit zerlassener Butter betropft. Er kann dann mit feingehacktem, gekochtem Schinken oder mit zerriebenem hartem Eidotter bestreut werden. (H)

143. Hefenteig mit Früchten.

Man mische den Hefenteig, ehe man ihn zum Aufgehen hinstellt, mit 30 g kurz abgewellter Heidelbeeren oder mit

2 Eßlöffel Diabetikerfruchtmark (S. 32) von Erdbeeren, Himbeeren oder Aprikosen, läßt den Teig aufgehen, bestreut ihn mit feingehackten Mandeln und bäckt ihn im Ofen. (H)

144. Hefenteig mit Anis.

Man vermengt den Hefenteig, ehe man ihn zum Aufgehen hinstellt mit 1 Eidotter, 1—2 g Anis und mit dem festen Schnee von 1 Eierklar. Dann stellt man ihn zum Aufgehen in die Wärme und bäckt ihn nach dem Aufgehen im Ofen. (H)

145. Nudeln.

16 g Nudeln werden in wenig, leicht gesalztem Wasser gar gekocht, dann auf ein Sieb gebracht, nach Abfließen des Wassers zwischen Tüchern schnell abgetrocknet, dann mit 30 g Butter oder Speck über dem Feuer geschwenkt. Beim Anrichten wird zerriebener Käse darübergestreut. (H)

Wenn man sich aus dem Krummschen Diabetikermehl frische Nudeln bereitet, so könnte man dafür 36 g dieses Mehles benutzen, um den Kohlenhydratwert von 16 g gewöhnlicher Nudeln (= 20 g Weißbrötchen) zu erreichen und man erhielt eine viel größere, für ein Gericht völlig ausreichende Masse. (H)

146. Süße Nudeln.

Die Nudeln (s. Rezept Nr. 145) werden mit saccharingesüßtem Wasser anstatt mit Salzwasser gekocht.

Beim Anrichten wird vergorener, mit Saccharin schwachgesüßter Fruchtsaft (S. 15) oder es werden feingestoßene Nüsse darüber gegeben. (H)

147. Topinambur (Erdartischocken).

a) Von geschälten und dann mit Salzwasser mäßig weich gekochten Topinamburknollen werden 125 g in Scheiben geschnitten und mit Tomaten- oder holländischer Tunke angerichtet.

b) 125 g rohe, geschälte Topinambur werden in Scheiben geschnitten und wie Röstkartoffeln weiter behandelt.

c) 125 g geschälte Topinambur, in Scheiben oder Würfeln geschnitten, werden roh mit verschiedenen Gemüsen (aus Tabelle I) und mit Fleisch- oder Wurststücken langsam gedämpft. Zusatz von Gewürz und gewürzreichen Kräutern empfehlenswert.

d) 125 g geschälte Topinambur werden roh mit Fleisch-, Knochen- oder Cenovisextraktbrühe gekocht, nach dem Weichwerden herausgeschöpft, restlos durch ein grobes Sieb getrieben. Die durchgeseibte Masse wird wieder mit der Suppe vereinigt und das Ganze zu sämiger Beschaffenheit eingedampft. Es ist zweckmäßig, die Suppe reichlich mit Gewürzkräutern zu versehen (besonders Petersilie, Sellerieblätter, geröstete Zwiebel oder Kümmel).

Jedes dieser Gerichte hat den Kohlenhydratwert von 20 g Weißbrötchen.

148. Stachys.

125 g Stachys werden ungeschält mit Wasser, etwas Butter und etwas Cenovisextrakt langsam gedämpft, bis sie gar sind, dann unter Zusatz von Petersilienbutter heiß geschwenkt und angerichtet.

Wenn man das Stachysgericht für den Familientisch bereitet, werden nach dem Dämpfen 125 g Stachys abgesondert und dann mit Petersilienbutter weiterbehandelt. Weißbrötchenwert des Gerichtes = 20 g.

149. Gerichte aus entmehltem Kartoffelbrei.

Ausgangsmaterial sind 200 g des auf S. 41 beschriebenen Gemisches von Kartoffelfaser- und Kartoffelmehlbrei. Weißbrötchenwert = 20 g.

a) Marienbader „Götzen“. Die Masse wird mit 1 rohen Ei, 3 Eßlöffel dickem saurem Rahm, ein wenig Salz innig gemischt. Daraus werden flache Fladen geformt, die man mit Schweinefett oder Butter in der Pfanne ausbäckt (wie Pfannkuchen).

b) Kartoffelklöße. Die Masse wird mit 1 rohen Ei, ein wenig Salz, Muskatnußpulver, 20—30 g fein gewiegtem Knochenmark, fein gewiegter Petersilie, ein wenig Pfeffer innig gemischt, zu Klößen geformt, dann gar gedämpft.

c) Kartoffel-Käse-Pfannkuchen. Die Masse wird mit 3 Eßlöffel saurem Rahm, 1 rohen Eidotter, Salz, ein wenig Pfeffer, fein gehackter gerösteter Petersilie oder fein gehacktem Schnittlauch, 15 g Butter, 30 g geriebenem Käse innig gemischt; dann wird der steife Schnee von 2 Eierklar untergezogen. Die Masse wird in Form flacher Fladen ausgetrieben und mit Butter oder Schweineschmalz unter häu-

figem Wenden in der Pfanne gebacken (nach Pfannkuchenart). Auf dem Teller kann man zerriebenen Parmesankäse darüber streuen oder man richtet mit Tomatentunke an.

d) Kartoffel-Speck-Pfannkuchen. — Wie unter c); — statt Käse wird Speck, in kleine Würfel geschnitten, der Masse beigefügt.

VIII. Bezugsquellen für Diabetiker-Nahrungsmittel.

Mit dieser Aufstellung soll kein Werturteil abgegeben werden. Wir können hier nur solche Präparate und deren Bezugsquellen angeben, die wir selbst kennen oder von denen in der Literatur von zuverlässiger Seite berichtet ist. Der Bezeichnung „für Diabetiker“ u. dgl. gegenüber ist Vorsicht am Platze. Denn vieles, was — größtenteils aus Unkenntnis und in gutem Glauben — unter solchem Namen angeboten wird, verdient ihn in Wahrheit nicht. Im allgemeinen genügt für den einzelnen Arzt und den einzelnen Patienten eine sehr kleine Auswahl zuverlässiger Spezialwaren: ein gutes Luftbrot; einige gut und gleichmäßig zubereitete Dauergebäcke, die höchstens halb soviel Stärke enthalten, wie ähnliche Waren des allgemeinen Handels; ein gutes Mehl für Backzwecke u. dgl., das gleichfalls höchstens halb soviel Stärke wie gewöhnliches Mehl enthalten darf; zuckerarme Einmachfrüchte; zuckerarme oder zuckerfreie Milch. In unserer Klinik halten wir uns auch, dem entsprechend, nur an wenige bestimmte, von uns erprobte und oft kontrollierte Waren, da es sich als ganz unmöglich erwies, sich über alles, was angeboten wurde, dauernd mit den sehr notwendigen Kontrollanalysen auf dem Laufenden zu halten. Wenn wir im Texte dieses Buches über einzelne derselben berichteten, so geschah das nur, weil wir darüber Erfahrung besitzen und nicht in der Annahme, daß andere gleichwertige Ware nicht existiert.

- Berner Alpen-Milch-Genossenschaft in Stalden (Emmenthal):
Steriler Rahm in Büchsen (Bärenmarke); vgl. S. 45.
- Bosch & Co., Natura-Milch-Exportgesellschaft in Waren (Mecklenburg):
Steriler Rahm in Büchsen (S. 45).
- Bresin, Bäckerei in Berlin: Verschiedene Gebäcke, besonders „Bresinbrot“ und Grahambrot; vgl. S. 38.

112 Bezugsquellen für Diabetiker-Nahrungsmittel.

- Callard & Co. in London, 74 Regentstreet: Zahlreiche stärkearme Dauergebäcke; vgl. S. 38 und 40 (in New York bei Th. Leeming and Co., 99 Chambers Street).
- Diätei, Berlin C. 2, Probststr. 14—16: Luftbrötchen.
- O. Fritz, Bäckerei in Wien, Naglergasse 13: Luftbrötchen, Litenbrot Diabetiker-Weiß- und -Schwarzbrot; vgl. S. 38.
- Fromm & Co., Conglutin-Nährmittelwerke in Kötzchenbroda: Luftbrötchen, Litenbrot, verschiedene Gebäcke aus Conglutin-Weizenmehl-Gemenge.
- R. Gericke, Zwiebackfabrik in Potsdam: Sifarbrot, Porterbrot, verschiedene Gebäcke, sehr kohlenhydratarms Ultramehl (küchentechnisch sehr schwer verwendbar); vgl. S. 38.
- F. W. Gumpert, Konditorei, Berlin C., Königstraße 22—24: Ultrabrot-Diabetikerzwieback und verschiedene andere Gebäcke; vgl. S. 38
- Huntley and Palmers, Reading in England: Akoll Biscuits (S. 38); in New York bei A. Hazard and Co. 29, Broadway.
- Dr. V. Klopfer's Nährmittelwerke in Dresden-Leubnitz: Dr. Klopfer's Lezithineiweiß (Glidine); vgl. S. 36.
- Otto Krumm A. G., Diätetische Abteilung, Stuttgart, Kronenstraße 33: Luftbrötchen, Luftbrotlaibe (S. 39); Soyapanbrot und -teegebäck (S. 38); zuckerarme Fruchtkonserven (S. 32); Diabetikermehl (S. 35); zuckerfreie Weine verschiedener Art.
- Müller & Kappert, Nährmittelfabrik in Neuenahr: Zuckerarme Milch (S. 44); in Vorbereitung stärkearmes Mehl.
- O. Rademann, Frankfurt/Main, Goethestraße 30: Luftbrötchen, Diabetiker-Weiß- und -Schwarzbrot, Makronen, Stangen, Mandelbrot (S. 38); zuckerfreie Weine.
- „Nutricia“ (Zoetermeer) in Brüssel: Dr. Bouma's „zuckerfreie Fettmilch für Diabetiker“ (vgl. S. 44). Deutsche Vertretung: Berliner Milchkuranstalt Hellersdorf, Berlin W. 10 (z. Zt. dort nicht erhältlich).
- Ch. Singer, Bäckerei in Basel: Biskuits, Zwieback, Brot (vgl. S. 36).
- Soyama-Werke, Frankfurt/M., Kurfürstenstraße 60: Vegetabile Milch und Sahne (einstweilen nicht erhältlich); vgl. S. 44.

Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH

**Adolf Schmidt's
Klinik der Darmkrankheiten**

Zweite Auflage

Neubearbeitet und herausgegeben von

Professor Dr. C. von Noorden

Geh. Medizinalrat in Frankfurt a. M.

Unter Mitarbeit von **Dr. Horst Straßner** in Kiel

Mit zahlreichen, meist farbigen Abbildungen

1921. GZ. 30; gebunden GZ. 34

**Über den jetzigen Stand der
Diabetestherapie**

Erweiterte Form des auf der Tagung der Deutschen
Gesellschaft für innere Medizin in Wiesbaden 1921
erstatteten Referates

Von **Professor Dr. C. von Noorden**

1921. GZ. 1

**Über Durchfalls-
und Verstopfungskrankheiten und
die Grundsätze ihrer Behandlung**

Zwei Vorträge

Von **Professor Dr. Carl von Noorden**

Geheimer Medizinalrat in Frankfurt a. M.

1922. GZ. 1.5

Die Grundzahlen (GZ.) entsprechen den ungefähren Vorkriegspreisen und ergeben mit dem jeweiligen Entwertungsfaktor (Umrechnungsschlüssel) vielfacht den Verkaufspreis. Über den zur Zeit geltenden Umrechnungsschlüssel geben alle Buchhandlungen sowie der Verlag bereitwilligst Auskunft.