

# **KONSERVATIVE THERAPIE DER FRAUENKRANKHEITEN**

**ANZEIGEN, GRENZEN UND METHODEN  
EINSCHLIESSLICH DER REZEPTUR**

VON

**DR. HEINRICH KAHR**

**PRIVATDOZENT FÜR GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT,  
PROFESSOR FÜR GEBURTSHILFE AN DER BUNDES-HEBAMMENLEHRANSTALT UND  
VORSTAND DER GEB.-GYN. ABTEILUNG DES ALLGEMEINEN KRANKENHAUSES IN WIEN**



**SPRINGER-VERLAG WIEN GMBH**

ISBN 978-3-662-01791-3      ISBN 978-3-662-02086-9 (eBook)  
DOI 10.1007/978-3-662-02086-9

**ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER ÜBERSETZUNG  
IN FREMDE SPRACHEN, VORBEHALTEN**  
SOFTCOVER REPRINT OF THE HARDCOVER 1ST EDITION 1934

## Vorwort.

Mit der Abfassung dieses Buches bin ich einem in Ärztekursen immer wieder geäußerten Wunsche nach einer Therapie der Frauenkrankheiten für die Bedürfnisse des praktischen Arztes mit gynäkologischer Vorbildung und des Facharztes, der ohne dauernde Bindung an ein Spital in der Praxis steht, nachgekommen. Das Rückgrat einer solchen Therapie ist die konservative Behandlung. Sie allein ist, kleine Eingriffe ausgenommen, dem praktischen Arzt zugänglich, aber auch der Gynäkologe kann sie ebenso wenig entbehren, wie die Beherrschung der Operationstechnik. Ein für diesen Leserkreis bestimmtes Buch wäre aber unvollständig, wollte es nur über die konservativen Maßnahmen allein Aufschluß geben, die für die Behandlung der einzelnen Frauenkrankheiten anzuraten oder gangbar sind. Es mußten in demselben ebenso die Grenzen der konservativen Therapie, wie die Anzeigen zur operativen Behandlung wenigstens kurz besprochen werden, soll es ein brauchbarer Ratgeber für die bunten Fälle der Praxis sein. Der in dieser Hinsicht vertretene Standpunkt ist im wesentlichen jener, wie ich ihn in langjähriger Assistentendienstzeit von meinem unvergeßlichen, viel zu früh verewigten Lehrer HEINRICH VON PEHAM übernommen habe. Es ist dies ein solcher, der bei aller Hochhaltung des obersten Grundsatzes jedweder Heiltätigkeit — *Primum non nocere* — dennoch einem uferlosen Konservativismus und einer schädlichen Polypragmasie ablehnend gegenübersteht, wenn die Methoden der konservativen Therapie entweder von vornherein keinen Erfolg versprechen oder erschöpft sind.

Was die hier zusammengetragenen therapeutischen Methoden anlangt, so galt es vor allem, nur gesicherte Verfahren vorzuschlagen und auch diese mit der nötigen Kritik zu bringen. Jene Maßnahmen der konservativen Behandlung, die zunächst im Hause anwendbar sind, mußten in den Vordergrund gerückt werden. Darum wurde auf die allgemeine und die diätetische Behandlung ebenso wie auf die einfachen physikalischen Heilmethoden das Hauptgewicht gelegt, während jene Verfahren, welche bereits einer größeren Apparatur bedürfen, in ihrer Technik nicht ausführlich erörtert sind. Daß in einem solchen Buche die medikamentöse Behandlung besonders herausgearbeitet werden muß, ist selbstverständlich. Hiefür bedarf es nicht nur einer wirksamen, sondern in unseren heutigen Zeitläuften auch einer sparsamen Verschreibung. Beiden Forderungen wird für die größte Mehrzahl der Fälle die rezeptmäßige Verschreibung der officinellen Heilmittel der Pharmakopoen vollauf gerecht,

welche deswegen in den Vordergrund gestellt wurde, während die den Arzt scheinbar vielfach entbehrlich machenden Spezialpräparate weniger betont worden sind, ohne daß sie vernachlässigt worden wären.

Hinsichtlich der Anordnung des Stoffes glaubte ich mich an jene organische Gliederung anlehnen zu müssen, wie sie R. SCHRÖDER in seinem Lehrbuche und hinsichtlich der Menstruationsstörungen in seiner monumentalen Darstellung „Der Genitalzyklus des Weibes und seine Störungen“ im VERT-STOECKELschen Handbuch bringt. Da unsere therapeutischen Maßnahmen, wo immer es angeht, von ätiologischen Gesichtspunkten geleitet sein müssen, schien es mir unerläßlich, allenthalben die Ätiologie im Hinblick auf die Therapie besonders zu betonen. Aber auch die so mannigfachen „kleinen Leiden“, die uns in ihren Ursachen nicht immer klar sind, mußten volle Würdigung finden, sind sie doch so oft Gegenstand beweglicher Klagen in der Sprechstunde und erheischen ebenso Behebung wie die typischen Krankheitsbilder.

Bei der Abfassung des Buches wurde auch darauf geachtet, es nicht bloß für die zusammenhängende Lektüre, sondern ebenso als Nachschlagewerk für einzelne, augenblicklich wissenswerte therapeutische Fragen verwendbar zu machen. Deswegen ist das Sach- und Medikamentenverzeichnis besonders ausführlich gehalten und so gearbeitet, daß auch gesuchte Rezeptvorschriften sofort auffindbar sind.

Ich würde mich glücklich schätzen, wenn das Buch die praktizierenden Ärzte bei ihrer oft mühevollen Aufgabe, kranke Frauen erfolgreich gynäkologisch zu behandeln und zu beraten, unterstützen würde.

**Heinrich Kahr.**

Wien, im März 1934.

## Inhaltsverzeichnis.

	Seite
<b>Behandlung der Menstruationsstörungen</b> .....	1
1. Amenorrhoe .....	1
Vorkommen und Bedeutung der echten Amenorrhoe .....	1
Behandlung .....	7
Allgemeinbehandlung .....	7
Eierstockersatztherapie .....	8
Medikamentöse Therapie .....	12
Physikalische Behandlung .....	16
Örtliche Behandlung .....	19
Pseudoamenorrhoe .....	21
2. Hypomenorrhoe .....	21
3. Hypermenorrhoe .....	22
Ursachen der Hypermenorrhoe .....	22
Behandlung .....	24
Die Haemostyptica und ihre Verwendung .....	24
Richtlinien der ätiologischen Therapie .....	28
Lokalbehandlung .....	30
4. Dysmenorrhoe .....	31
Ursachen der Dysmenorrhoebereitschaft und ihre Behandlung .	31
Symptomatische Behandlung .....	36
Allgemeine und medikamentöse Maßnahmen .....	36
Mechanische und chirurgische Verfahren .....	42
5. Bedeutung und Behandlung der Verschiebung der Menstruations- phasen .....	44
6. Behandlung von unregelmäßigen Blutungen ovariellen Ursprungs	45
Vorkommen, Bedeutung und Erkennung der Metropathia haemorrhagica .....	45
Operative und Strahlenbehandlung der Metropathia haemor- rhagica bei Frauen im 4. und 5. Lebensjahrzehnt .....	46
Hormon- und medikamentöse Therapie der Metropathie ....	49
Blut- und Serumtherapie .....	55
Operative und Strahlenbehandlung der Metropathia haemor- rhagica juvenilis .....	56
Unregelmäßige Blutungen beim Follikelsprung, bei Follikel- und Corpus-Luteum-Zysten und nach Hemikastration .....	58

	Seite
Unregelmäßige Blutungen bei Granulosazellgeschwülsten . . . . .	59
Unregelmäßige Blutungen infolge Entzündungen der Adnexa und ihre Behandlung . . . . .	60
7. Zyklusstörungen infolge Entzündungen des Cavum uteri . . . . .	61
Die verschiedenen Formen der Endometritis . . . . .	61
Anhang. Submuköse Myome. Korpuspolypen . . . . .	63
<b>Behandlung unregelmäßiger Blutungen verschiedenen Ursprungs . . . . .</b>	<b>64</b>
Blutungen infolge aktiver und passiver Hyperämie der Gefäße und Veränderungen der Gefäßwände . . . . .	64
Mechanisch bedingte Blutungen . . . . .	66
<b>Behandlung der Begleiterscheinungen der Klimax . . . . .</b>	<b>67</b>
Natürliches Klimakterium . . . . .	67
Künstliches Klimakterium . . . . .	83
Ausfallerscheinungen nach Entfernung des Uterus . . . . .	85
<b>Behandlung der entzündlichen Krankheiten des Genitales . . . . .</b>	<b>86</b>
1. Gonorrhoe . . . . .	86
Vorbemerkungen . . . . .	86
Die Behandlung der Gonorrhoe der unteren Geschlechtswege . .	92
Urethritis und Vulvitis gonorrhoeica . . . . .	92
Cervicitis gonorrhoeica . . . . .	98
Mastdarmgonorrhoe . . . . .	100
Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum . . . . .	100
Die Behandlung der inneren Gonorrhoe . . . . .	101
Intrauterinbehandlung . . . . .	101
Die Behandlung der gonorrhoeischen Entzündung der Adnexa . .	102
Vakzinetherapie der Gonorrhoe . . . . .	106
Grenzen der konservativen Behandlung, Anzeigen zur operativen Therapie der Gonorrhoe . . . . .	111
Feststellung der Ausheilung . . . . .	113
Die physikalische Behandlung der Adnextumoren und der Pelveoperitonitis chronica nach Gonorrhoe und septischen Entzündungen . . . . .	114
Wärmeanwendung . . . . .	115
Bäderbehandlung . . . . .	117
Gynäkologische Massage . . . . .	123
Belastungstherapie . . . . .	125
2. Die Behandlung der entzündlichen (nicht gonorrhoeischen) Krank- heiten der äußeren Scham, der Scheide, Cervix und Portio . .	125
Vulvitis . . . . .	125
Pruritus vulvae . . . . .	129
Leukoplakia vulvae . . . . .	134
Craurosis vulvae . . . . .	134

	Seite
Vaginismus .....	135
Ursachen, Erkennung und Behandlung des Fluor .....	138
Fluor vaginalis .....	142
Kolpitis simplex .....	152
Kolpitis vetularum .....	154
Soor- und Trichomonadenkolpitis .....	155
Anhang. Scheidenstenosen und Atresien nach Kolpitis .....	156
Cervicitis und zervikaler Fluor .....	157
Erosion .....	158
3. Die Behandlung der septischen Entzündungen der oberen Geschlechtswege .....	161
Endometritis .....	162
Septische Salpingoophoritis, Pelveoperitonitis (Perimetritis), Douglasabszeß .....	164
Parametritis .....	168
4. Genitaltuberkulose .....	170
<b>Behandlung der Sterilität .....</b>	<b>175</b>
Sterilitätsursachen .....	175
Ihre Behandlung .....	182
Die künstliche Befruchtung .....	186
<b>Richtlinien zur Beratung geschwulstkranker Frauen .....</b>	<b>187</b>
Myoma uteri .....	187
Carcinoma uteri .....	193
Operables Uteruskarzinom .....	193
Inoperables Uteruskarzinom .....	199
Ovarialgeschwülste .....	202
Vaginal- und Vulvakarzinom .....	205
<b>Behandlung der Endometriosis .....</b>	<b>205</b>
<b>Grundsätze für die Behandlung der Lageanomalien .....</b>	<b>207</b>
1. Enteroptose .....	207
Ursachen, Bedeutung und Prophylaxe der Enteroptose .....	207
Behandlung der Enteroptose .....	210
Anhang. Hämorrhoiden und Fissura ani .....	216
2. Bedeutung der Lageveränderungen der Geschlechtsorgane und ihre Behandlung .....	218
Retroflexio uteri mobilis .....	218
Retroflexio uteri fixata .....	225
Descensus und Prolapsus uteri et vaginae .....	227

	Seite
<b>Behandlung der Kreuzschmerzen</b> .....	235
Kreuzschmerzen bei Krankheiten der Genital- und Harnorgane und ihre Behandlung .....	235
Kreuzschmerzen aus anderen Ursachen und ihre Behandlung ...	240
<b>Bauchdeckenhyperästhesie und ihre Behandlung</b> .....	247
<b>Behandlung der Obstipation</b> .....	248
<b>Richtlinien zur Behandlung der wichtigsten Krankheiten der Harnwege</b>	255
Die nicht gonorrhöische Urethritis und Cystitis .....	256
Pyelitis .....	260
Tuberkulose der Harnorgane .....	262
Incontinentia urinae .....	263
Steinbildung in den Harnwegen .....	264
Geschwülste der Harnwege .....	266
<b>Sachverzeichnis</b> .....	268
<b>Medikamentenverzeichnis</b> .....	291

### Berichtigung.

- S. 55, Rp. 65, lies: Ruhrwurz statt Reierwurz.  
 S. 104, Rp. 97, lies: Codeini statt Codeinae.  
 S. 133, Rp. 108, lies: Suppos. an. statt Suppos. ann.  
 S. 238, lies: Thigenol statt Thygenol.

## **Behandlung der Menstruationsstörungen.**

### **1. Amenorrhoe.**

Der Ausfall der Regel, die Amenorrhoe, kann entweder dadurch bedingt sein, daß der Ovarialzyklus darniederliegt — echte Amenorrhoe — oder die Periode bleibt deswegen aus, weil trotz regelrechter Arbeit des Eierstockes entweder das endometrane Reaktionsterrain, der Uterus, fehlt oder weil das Endometrium so schwer geschädigt ist, daß es eine wandlungsfähige Schleimhaut nicht aufbringt; schließlich auch deswegen, weil das gebildete Menstrualblut zufolge Verschlusses der Geschlechtswege am Hymen, in der Scheide oder im Gebärmutterhals den Ausweg nicht finden kann — Pseudoamenorrhoe. Endlich bleiben noch jene Fälle von Amenorrhoe, welche durch Kastration auf operativem Wege oder durch Strahlen entstehen. Jedes Ausbleiben der Periode vom Beginne derselben bis zum natürlichen Ende in den Wechseljahren ist krankhaft, wenn es nicht durch Schwangerschaft oder Stilltätigkeit bedingt ist.

### **Vorkommen und Bedeutung der echten Amenorrhoe.**

Die ungleich häufigere, auf dem Ausfall des Ovarialzyklus beruhende echte Amenorrhoe ist also das Symptom einer Funktionsstörung des Eierstockes und wird demnach mit Recht als funktionelle Amenorrhoe bezeichnet. Sie findet sich auf dem Boden von Umweltänderungen, auf dem endokriner Störungen, bei Blut- und Stoffwechselkrankheiten, Nahrungsschäden und Erschöpfung, bei Krankheiten des Herzens und Gefäßsystems, der Leber und Nieren und schließlich bei akuten und chronischen Infektionskrankheiten.

Der funktionellen Amenorrhoe als Ausdruck einer primären Ovarialschwäche begegnet man ungleich häufiger bei Frauen mit abwegiger Körperverfassung, als bei jenen, welche sich dem Idealtypus der Pyknika nähern. Zugleich sei aber darauf hingewiesen, daß sich genug solche Frauen finden, bei denen die Amenorrhoe auch ohne Zeichen abwegiger Konstitution auftritt. Diese primäre Schwäche des Keimplasmas muß grundsätzlich — und das ist therapeutisch von größter Wichtigkeit — in Fälle leichterer Art und solche tiefergreifender Natur geschieden werden. Bei jenen ist allein der Zyklus gestört, sei es im Sinne der völlig ausbleibenden Regel (Amenorrhoe) oder im Sinne der zu spärlichen Periode (Hypomenorrhoe) oder der zu seltenen Menstruation (Oligo-

menorrhoe). Wie wir uns mit R. SCHRÖDER ausdrücken, liegt in diesen Fällen nur die generative Funktion des im übrigen anatomisch grob intakten Ovars darnieder. Es bleibt die völlige Reifung der Follikel und deren weitere Umwandlung aus. Darum finden wir in solchen Ovarien zwar kleine Follikel, vermissen in ihnen aber ältere oder frische Granulosa-drüsen. In diesen Fällen ist die vegetative Funktion, die zweite Grundaufgabe des Eierstocks, der die richtige Durchblutung und Durchströmung des Uterus, der Adnexa und der Scheide obliegt, nicht gestört. Darum ist der Untersuchungsbefund an diesen Organen kein von der Norm abweichender. Anders bei der Amenorrhoe zweiten Grades, bei der generative und vegetative Funktion des Eierstocks stillstehen. Er gleicht vielfach dem der Greisin. Die Follikel sind klein oder können ganz fehlen. Gelegentlich ist das Ovarium, wie wir namentlich durch BARTEL und HERRMANN wissen, besonders groß, derb und an seiner Oberfläche auffallend glatt. Diesen Befunden an den Eierstöcken entspricht eine ausgesprochene Schrumpfung des Uterus. Wesentlich ist, daß die Scheide die Atrophie mitmacht. Dadurch gewinnt die Schleimhaut greisenähnliches Aussehen und neigt durch Störung im Chemismus infolge veringerter Glykogenbildung zum Flusse und zur Entzündung.

Während ein von Haus aus gesunder, regelrecht arbeitender Eierstock im allgemeinen erst durch schwere Schäden aus seiner gleichmäßigen Arbeit geworfen wird, vermögen bei der Schwäche des Keimplasmas schon die bloßen bekannten Änderungen der Umwelt, der Ernährung, des Klimawechsels, des Berufes, ebenso wie seelische Erlebnisse und Eindrücke den Anstoß zur Störung im Zyklusgeschehen geben. Sie verdienen deswegen besonders betont zu werden, weil sie in der Behandlung nicht gering geschätzt werden dürfen. Diese Einflüsse der Umwelt gelten in erhöhtem Maße für die Entstehung von Amenorrhoeen bei konstitutionell abwegig gebauten Frauen und ganz besonders bei jenen, die zu einer Störung des Gleichgewichtes im Zusammenspiel der Blutdrüsen neigen.

Gerade die Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, ganz besonders die Krankheiten der Schilddrüse sind es, welche zu Störungen der Ovarialtätigkeit Anlaß geben. Obenan steht der Morbus Basedow, der sowohl verstärkte, wie abgeschwächte und ganz fehlende Regelblutung verschulden kann. Aber auch die Hypothyreosen vermögen dieselben Symptome zu erzeugen. Von ihnen ist das allerdings seltene Myxödem in schweren Graden häufig von Amenorrhoe begleitet. Wie das echte Myxödem, sind auch die klassischen Formen der Hypophysenstörungen, die *Dystrophia adiposogenitalis*, die mit einer Amenorrhoe ausgesprochen zweiten Grades einhergeht, selten. Sie sind auch praktisch für die Behandlung von untergeordneter Bedeutung, denn es kann bei so schweren Störungen nicht wünschenswert sein, die Regel in Gang zu bringen oder gar den Boden für eine Schwangerschaft vorzubereiten. Die leichteren Formen, die sich freilich nicht immer rein herausarbeiten lassen, sind praktisch viel belangvoller. Hierher gehören die von DIETRICH als *Forme fruste der Dystrophia adiposogenitalis* beschriebenen Amenorrhoeen,

die sich bei jenen heranreifenden Mädchen bemerkbar machen, welche von früher Kindheit an auffallend dick gewesen sind. Bei ihnen steht die Unterfunktion der Hypophyse und nicht die der Ovarien im Vordergrund. Seltener wird man es mit einer Amenorrhoe auf dem Boden einer Akromegalie zu tun haben. Diese Krankheit kann übrigens längere Zeit mit normaler Regelblutung einhergehen, aber auch zu Regelstörungen führen, über die im Kapitel der unregelmäßigen Blutungen Näheres ausgeführt ist. Im übrigen sind Fälle von Akromegalie und Amenorrhoe, ebenso wie solche von Ausbleiben der Regel bei Tumoren der Nebenniere praktisch von geringer Bedeutung und kaum Gegenstand der Behandlung.

Von den Blutkrankheiten ist es die Chlorose, welche durch abwegige Tätigkeit des Eierstocks zur Störung der Blutbildung führt und sich in etwa  $\frac{1}{4}$  aller Fälle u. a. in Amenorrhoe äußert (v. NOORDEN, JAGIČ). Neben recht seltenen Fällen von zu häufiger Regelblutung werden auch Unregelmäßigkeiten beobachtet. Es kann aber auch bloß die Unterentwicklung des Uterus ohne Regelwidrigkeit der einzige Hinweis der genitalen Störung sein. Ohne Zweifel wird in der Praxis die Diagnose Chlorose weitaus zu oft gestellt; sicher ist sie in den letzten zwei Jahrzehnten, wenigstens unter unserem Himmelsstrich, immer seltener geworden.

Von den Stoffwechselkrankheiten stehen ursächlich Diabetes und Fettsucht mit Amenorrhoe in Zusammenhang, gesetzmäßige Beziehungen liegen aber nach R. SCHRÖDER beim Diabetes zwischen dem Grad der Krankheit und dem Verhalten der Regelblutung nicht vor. Immerhin zeigt sich, daß mit der Besserung der Grundkrankheit die Regel auch leichter in Gang kommt. Bei der Fettsucht werden die endogenen Formen, und zwar die hypophysäre und thyreogene Form gegenüber der exogenen, der Mastfettsucht, vielleicht über Gebühr in den Vordergrund gerückt. Häufig ist es so, mögen es die Frauen auch nicht wahr haben, daß es sich um eine auf übermäßiger Nahrungszufuhr beruhende Fettsucht handelt, die ihrerseits den Eierstock schädigt. Vererbung spielt, wie wir durch JULIUS BAUER wissen, gerade bei der Fettsucht eine bedeutungsvolle Rolle. Für eine ovariogene Fettsucht liegen Beweise nicht vor, ein Umstand, an dem die Therapie der Amenorrhoe, soll sie gerade bei Fällen von Fettsucht nicht scheitern, keinesfalls vorbegehen darf.

Wenn auch das Bild der sogenannten Kriegsamorrhoe heute viel von seiner seinerzeitigen Bedeutung eingebüßt hat, so muß es doch in diesem Zusammenhange als eine der Amenorrhoeformen erwähnt werden, weil die Umstände, die diese Kriegsamorrhoe ausgelöst haben, gelegentlich auch heute noch bei einzelnen Frauen wirksam werden und sogar zur dauernden Amenorrhoe führen können (NOVAK und v. GRAFF). Diese Krankheit war in erster Linie fraglos durch ungenügende und minderwertige Kost bedingt, wozu noch seelische Kümernisse und übermäßig schwere körperliche Arbeit das ihrige beigetragen haben.

Auch jene Formen von Amenorrhoe, welche im Anschluß an das physiologische Ausbleiben der Periode während des Stillgeschäftes sich

entwickeln, haben in einer gewissen Erschöpfung des Körpers ihre Grundlage. Tritt später als 4 Wochen nach Absetzen des Kindes die Menstruation nicht ein, dann liegt ein solcher an die Laktationsamenorrhoe sich anschließender Zustand vor. Frauen, die durch das Stillen schwer angegriffen werden und auch sonst das Hauswesen zu besorgen oder gar im Berufe nebenbei tätig zu sein haben, klagen oft über Kreuzschmerzen und trotz ausgesprochener Müdigkeit über eine quälende, unbeeinflussbare Schlaflosigkeit. Solche Frauen sind es besonders, welche zu einer Amenorrhoe im Anschluß an die Laktation neigen, die leichtere, aber auch höhere Grade annehmen kann.

Hinsichtlich der Krankheiten der Verdauungs- und Harnwege ist zu erwähnen, daß in schweren Fällen mit tiefreichender Stoffwechselstörung Amenorrhoen vorkommen, deren Behebung mit der Besserung und Ausheilung des Grundleidens steht und fällt.

Bekanntlich spielen bei Neurosen und Psychosen Regelstörungen eine große Rolle. Abgesehen von Epilepsie, Paralyse und Tabes, bei denen Amenorrhoe beobachtet wird, kommt bei der Dementia praecox die Amenorrhoe nebst ausgesprochener Unterentwicklung des Genitales vor (nach L. FRÄNKEL in 72% der Fälle). Auch bei katatonen Zuständen, bei periodisch zyklischem Irresein, besonders in der melancholischen Phase, weniger in der manischen, wird Amenorrhoe in rund 50 v. H. der Fälle beobachtet. Es ist hier nicht der Ort, auf die ursächlichen Zusammenhänge zwischen Amenorrhoe und Psychosen des Näheren einzugehen. Es verdient aber hervorgehoben zu werden, daß ASCHNER an die Amenorrhoe als dem Ausdruck einer tiefgreifenden Stoffwechselstörung den Hebel zur Heilung der Psychosen ansetzen will und auf beachtliche Erfolge hinweisen kann. Ob diese auch tatsächlich auf den erzielten Wiedereintritt der Menstruation zurückzuführen sind, muß im Einzelfalle fraglich bleiben, da bekanntlich weitgehende Besserungen gerade bei der Dementia praecox auch ohne jedwedes Zutun nicht selten vorkommen.

Die Krankheiten des Herz- und Gefäßsystems interessieren uns in diesem Zusammenhange nur insoweit, als wir nur bei schweren Fällen, insbesondere der Stenose der Valv. mitralis und Insuffizienz der Aorta Amenorrhoen bzw. Oligomenorrhoen erleben. Mit der Besserung der Zirkulationsverhältnisse pflegen zunächst verstärkte Regeln aufzutreten, wie sie den mittelschweren Fällen eigentümlich sind, die bei weiterer Erholung einer normalen Periode Platz machen können. Die Therapie kann in diesen Fällen natürlich nur am Herzen angreifen.

Bei den akuten Infektionskrankheiten sieht man häufig einen verfrühten Eintritt der Regel, dem dann während der ganzen Dauer der Krankheit und über diese hinaus eine von der Schwere des Zustandsbildes abhängige, selbst bis mehrere Monate dauernde Amenorrhoe folgen kann. War die Regel früher normal, so pflegt sie auch mit der völligen Gesundung wieder einzutreten, und es wäre verfehlt, ihren Eintritt beschleunigen zu wollen. Freilich kann es geschehen, daß nach derartigen Krankheiten, besonders nach der Mitte der Dreißigerjahre und später, die Regel überhaupt nicht wiederkehrt.

Von den chronischen Infektionskrankheiten verdient in diesem Zusammenhange die so verbreitete Lungentuberkulose unsere größte Aufmerksamkeit. Amenorrhoen kommen bei Spitzenkatarrhen nicht selten vor, werden aber im allgemeinen um so häufiger beobachtet, je weiter fortgeschritten die Phthise ist. Es bestehen also hier unmittelbare Zusammenhänge zwischen der Schwere des Krankheitsbildes und der Dauer der Amenorrhoe, so daß das Wiedereintreten der Regel gleichzeitig die Besserung des tuberkulösen Prozesses anzeigt. Über die Häufigkeit der Amenorrhoe bei Phthisen liegen recht verschiedene Angaben vor. Den überall angeführten, von MARGARETE FRIEDRICH, welche bei Tuberkulose ersten Grades nach der Einteilung von TURBAN-GERHART in 45 v. H., bei solchen zweiten Grades in 64% und bei Phthisen dritten Grades in 85% aller Fälle Amenorrhoen fand, steht die auf Veranlassung von R. SCHRÖDER vorgenommene Nachprüfung an 468 Fällen von HAESE in der Lungenheilstätte Sorge i. Harz gegenüber, der für das erste Stadium der Tuberkulose 3,2% Amenorrhoeische, im zweiten Stadium 2,8% und im dritten 11,1% fand. HOFSTÄTTER, wohl einer der besten Kenner der Amenorrhoe, hat in seinem 830 Fälle ausmachenden Material die Frage der Amenorrhoe bei Tuberkulose in der Weise geprüft, daß er nach Altersstufen geordnet, den Ursachen der Amenorrhoe nachging. Dabei fand er bei amenorrhoeischen Frauen zwischen 15 und 18 Jahren in 26%, bei solchen zwischen 18 und 24 Jahren in 19%, zwischen 24 und 30 in 12% und zwischen 33 und 40 Jahren in 8% Tuberkulose als Ursache der Amenorrhoe. Diese Aufstellung ist besonders wichtig, weil sie zeigt, daß jede Amenorrhoe, gar bei jungen Mädchen auf eine phthisische Grundlage geprüft werden muß. Dies ist um so bedeutungsvoller, als solche Mädchen nicht selten in der Annahme einer bestehenden Schwangerschaft den Arzt aufsuchen und sich mit der Diagnose einer Amenorrhoe aus innerer Ursache, die von selbst wieder einer normalen Regel Platz machen werde, nicht zufrieden geben, sondern energische Maßnahmen zum Wiedereintritt der Periode angewendet wissen wollen. Ihre Wiederkehr ist aber gar nicht erwünscht, weil ihr Ausbleiben säftesparend wirkt und damit im Heilplane der Natur liegt. Man hilft sich hier wohl am besten aus der zwiespältigen Lage, indem man einerseits das Vertrauen der Patientin zu gewinnen sucht und ihr den Tatsachen entsprechend versichert, daß eine Schwangerschaftsamenorrhoe nicht vorliegt, andererseits aber den Wunsch nach Wiedererlangung der Regel durch Verschreibung von solchen Arzneien befriedigt, die irgendwelche ausgesprochen emenagoge Wirkung nicht haben und somit gleichsam nur zur Beruhigung dienen. Man verordne in solchen Fällen kleine Dosen von Eisen oder Eisen-Arsen, allenfalls Tonika (s. S. 13ff.) und hüte sich vor allen eingreifenden physikalischen Maßnahmen. Mit der Abheilung des Lungenprozesses in der Freiluftliegekur und der Hebung des Allgemeinbefindens tritt, gar wenn die Patientin jünger ist, in etwa der Hälfte der Fälle die Regel wieder ein. Erwähnenswert ist es, daß nach Tuberkulininjektionen und nach der Petruschkyschen Einreibung die Periode sich oft überraschend schnell einstellt. Trotzdem warnt HOFSTÄTTER mit Recht davor, vielleicht aus

dem Bestreben, eine Periode rasch wieder erzeugen zu wollen, eine Tuberkulinkur dort auszuführen, wo sie nicht angezeigt ist.

Tuberkulose der Genitalorgane kann von Amenorrhoe begleitet sein, wie denn überhaupt Störungen des Zyklus, und zwar sowohl Verstärkung als auch Abschwächung und Unregelmäßigkeiten der Periode hiebei vorkommen. In einem Drittel der Fälle ist aber der Zyklus nicht verschoben. Die Anwesenheit der Tuberkel in der Uterusschleimhaut muß den Ablauf desselben durchaus nicht verändern. Dort, wo die Tuberkulose tief greift, wird freilich infolge Zerstörung des Endometriums und tiefer Vernarbung desselben mit Amenorrhoe, allenfalls auch einer nachfolgenden Pyometra gerechnet werden müssen. Die Erkennung solcher Zustände ist naturgemäß schwierig und häufig bloß eine zufällige anlässlich einer Abrasio wegen Amenorrhoe, welcher Eingriff natürlich niemals bei feststehender Diagnose Tuberkulose wegen seiner möglichen Gefahren am Platze ist (s. auch S. 172).

Bei schweren Eiterungen im Körper (Appendizitis, Sepsis, Pyämie), nach schweren Blutungen bei Magengeschwüren, bei lange unbehandelter Malaria, endlich bei Gelenkrheumatismus kann eine Amenorrhoe entstehen und in eine dauernde Schrumpfung des Genitales mit vorzeitiger Klimax übergehen.

Die funktionelle Amenorrhoe tritt bei den Krankheiten des Genitales gegenüber den genannten Ursachen ätiologisch in den Hintergrund. Es sei denn, daß man die Hypoplasie des Genitales mehr von örtlichen, denn von allgemeinen Gesichtspunkten betrachtet. Bei einer solchen Auffassung verdient natürlich die Hypoplasie des Genitales eine besondere Unterstreichung. Auf Grund einer großen Statistik von A. MAYER (2800 untersuchte Fälle) ergaben sich unter 60 Hypoplastinnen in mehr als der Hälfte der Fälle unregelmäßige Perioden, und unter diesen wieder in der Hälfte der Fälle sekundäre Amenorrhoen bei Eintritt der Regel durchschnittlich im 21. Lebensjahr.

Wenngleich selten, so doch wegen der geringen Aussicht auf erfolgreiche Behandlung bemerkenswert, sind jene Fälle von sog. primärer Amenorrhoe, bei denen das Keimplasma zwar dürftige sekundäre Geschlechtsmerkmale zur Entwicklung zu bringen, Follikelreifung und Granulosa-drüsenbildung aber niemals zu erzielen vermochte, so daß es überhaupt nicht zum Eintritt einer Regel kommt.

Von den Genitalkrankheiten ist die Amenorrhoe infolge von Gonorrhoe nicht unwichtig. Eine Infektion des frischgeplatzten Follikels und in schweren Fällen eine totale Zerstörung des Ovarialgewebes, nebstdem tiefgreifende Veränderungen des Endometriums im Bereiche der Basalschicht können sie verursachen. Praktisch wichtiger ist, wie G. A. WAGNER gezeigt hat, die Perioophoritis gonorrhoeica, durch die das Ovarium so innig in entzündliche Schwarten eingebettet werden kann, daß das Springen der Follikel unmöglich gemacht wird. Glücklicherweise sind diese Fälle, in denen es über kürzer oder länger doch wieder zur Blutung kommt, selten. Prognostisch ganz trostlos sind jene Gonorrhoen, die in den Pubertätsjahren aquiriert, während dieser Zeit der Reifung der Ge-

schlechtsteile aufsteigen und damit zur schwersten Atrophie und Stehenbleiben der Geschlechtsorgane auf kindlicher Stufe führen.

Die Geschwülste des Eierstocks spielen als Ursache der Amenorrhoe eine ganz untergeordnete Rolle. Erfahrungsgemäß bleibt auch bei weitestgehender Umwandlung der Eierstöcke in Geschwülste die Regel erhalten, da in solchen Fällen fast immer unversehrtes Ovarialparenchym, und sei es auch noch so unansehnlich, vorhanden ist. Von dieser Tatsache machen wir in Fällen beidseitiger, unbedingt gutartiger Geschwülste gelegentlich Gebrauch, indem wir die Entfernung der Tumoren (beispielsweise beidseitige Dermoide) so vornehmen, daß wir einen von der Geschwulstbildung nicht betroffenen Rest des Keimgewebes zurücklassen.

### Behandlung.

Nach diesen allgemeinen Ausführungen über das Vorkommen der Amenorrhoe bei den verschiedensten Krankheitszuständen sei in die eigentliche Behandlung derselben eingegangen. Es bedarf nach den obigen Ausführungen keiner besonderen Betonung mehr, daß bei schweren endokrinen Störungen und bei tiefgreifenden Krankheiten des Stoffwechsels, der Verdauungsorgane und des Herzens, ganz besonders aber bei den akuten und chronischen Infektionskrankheiten die Behandlung derartiger Amenorrhoen nicht nur nicht angezeigt ist, sondern sogar schädlich sein könnte. Um so mehr Augenmerk werden wir auf die Behandlung jener richten, in denen der Wiedereintritt der Regel als Ausdruck einer vollwertigen Funktion des Keimplasmas unbedingt erstrebenswert ist.

### Allgemeinbehandlung.

Die Behandlung der sekundären funktionellen Amenorrhoe als Ausdruck einer zeitweise sich äußernden Ovarialschwäche ist dort, wo sie hauptsächlich durch die Änderungen der Umwelt, Ernährungsstörungen, Aufenthaltswechsel und ähnliche Umstände bedingt ist, nicht undankbar. Aber auch schon unter diesen Amenorrhoen finden sich Fälle, in denen man nur mit den verschiedensten uns heute zugänglichen Behandlungsarten zum Ziele kommt. Jede Amenorrhoebehandlung strebt die Besserung der Eierstocktätigkeit auf mannigfaltigen Wegen an. In dieser Hinsicht ist zunächst einmal eine besonders sorgfältige Beachtung natürlicher Lebensbedingungen von großer Wichtigkeit. Alles was zur Schädigung des Körpers und damit zu der der Eierstocktätigkeit führen kann, ganz besonders ungenügender Schlaf, unzureichende oder einseitige Ernährung, körperliche und geistige Überanstrengung, mangelhafte Bewegung, Mißbrauch von Alkohol, Nikotin, Kaffee und Tee, wird streng zu vermeiden sein. G. VEIT hat bereits im Jahre 1905 mit Bedauern die Erziehung der jungen Mädchen in die Bahnen anstrengenden Studiums, gewerblicher und Fabriksarbeit sich entwickeln gesehen und vor der Überschätzung der Frauenberufe mit Recht und voraussehend gewarnt. Er hat damals bereits die Rückkehr der Frau in die Häuslichkeit, zu gesunden Lebensbedingungen gerade im Hinblick auf die Störungen

der Regeltätigkeit, insbesondere die Amenorrhoe, freilich vergeblich, gefordert. Daß diese Forderungen jetzt von neuem als vollberechtigt erkannt werden, kann nur gute Früchte tragen. Daneben wird man in einer in natürlichen Grenzen gelegenen gesunden Sportübung, besonders in Freiluftgymnastik, im Wandern, Schwimmen, Rudern und Tennisspielen, ebenso wie in mäßigem Radfahren unterstützende, den Körper zur harmonischen Arbeit zurückbringende Verfahren zu erblicken haben.

Diese allgemeinen Maßnahmen, die nicht gering geschätzt werden dürfen, führen freilich nur in der Minderzahl der Fälle ohne andere Hilfe zum Erfolge. Im Mittelpunkt unseres therapeutischen Interesses steht gegenwärtig die

#### Eierstockersatztherapie.

Seit den grundlegenden Forschungen von ALLEN und DOISY, ganz besonders aber seit den klassischen Untersuchungen von B. ZONDEK und S. ASCHHEIM hat die Hormontherapie gerade bei der Unterfunktion des Ovariums überragende Bedeutung gewonnen. Die schon seit 1889 durch CHROBAK in die Therapie eingeführten Ovarialpräparate sind seit der Entdeckung des Sexualhormons gegenüber den Hormonpräparaten in den Hintergrund getreten. Heute wissen wir, daß das Sexualhormon ein doppeltes ist, und zwar einerseits das Follikelhormon, welches die Proliferation der Uterusschleimhaut erzeugt, andererseits das Corpus-luteumhormon, welches die Sekretionsphase der Gebärmutter Schleimhaut hervorbringt. Beide Hormone sind wieder vom Hypophysenvorderlappen als dem Motor der Sexualfunktion in weitgehender Abhängigkeit. Dieser erzeugt seinerseits Hormone, welche den Eierstock zur Bildung des Follikelhormons (Prolan A) und zur Erzeugung des Corpus-luteumhormons (Prolan B) erst fähig machen. Da es heute gelungen ist, das Sexualhormon, und zwar das Follikelhormon fabrikmäßig in großen Mengen in erster Linie aus dem Harn von Stuten herzustellen, so ist dieses sehr zum Vorteile der Therapie und deren Ausbau auch wesentlich wohlfeiler geworden, während die Gewinnung des Corpus-luteumhormons an den Gelbkörper gebunden ist und demnach seine Herstellung in größeren Mengen auch heute noch kostspieliger und schwieriger ist. Die Tatsache, daß wir jetzt imstande sind, die Wertigkeit der Hormonpräparate nach internationalem Übereinkommen zu prüfen, und zwar bei Follikelhormon nach Mäuseeinheiten, beim Hypophysenvorderlappenhormon nach Ratteneinheiten und beim Corpus-luteumhormon nach Kanincheneinheiten, gestattet Erfolge und Mißerfolge, wie sie sich durch die verschiedene Art der Dosierung und Verabreichung sowie durch den verschiedenen Zeitpunkt ihrer Einverleibung ergeben können, ungleich kritischer zu prüfen als dies bei den Organ-Trockenpräparaten und den Ovarialauszügen der Fall ist, welche übrigens in ihren ursprünglichen Formen das Follikelhormon entweder gar nicht oder nur zufällig enthielten. Wenn die Organ-Trockenpräparate auch imstande sind, Ausfallserscheinungen, besonders solche vasomotorischer Art zu beseitigen und gelegentlich vielleicht auch die generative Funktion des Ovariums wieder in Gang bringen, so müssen

sie doch, insofern sie nicht Zusätze von Follikelhormon enthalten, gerade für die Behandlung der Amenorrhoe als überholt gelten. Ebenso ist es auch mit den Extrakten des Eierstocks, deren Bestandteile man weder qualitativ noch quantitativ kennt. Die neueren derartigen Präparate, wie der standardisierte *Ovosan* (zu 100 und 300 M. E.), das *Ovovop*, das *Oophorin*, das *Ovanorm* u. a. enthalten bereits größere und kleinere Mengen von Follikelhormon und haben dadurch die Nachteile der alten Präparate wettgemacht. Auch die Auszüge aus den Ovarien haben bestimmte Zusätze von Brunsthormon, wie das *Novarial* und das *Novarial* „*Stark*“ (10, bzw. 100 M. E. Follikelhormon), das *Panhormon* (50 bis 300 M. E. Follikelhormon). Die Extrakte enthalten auch die Begleitstoffe des Follikelhormons, deren Bedeutung uns heute noch keineswegs in jeder Richtung klar ist, und deren Wirkung vielleicht mit zum Erfolge der Behandlung beitragen kann. Hinsichtlich dieser befindet sich gegenwärtig alles noch im Flusse. Wesentlich ist, einiges über den Zeitpunkt, die Art der Einverleibung und die Dosierung auszuführen. Freilich leiten uns hierin in erster Linie klinische Erfahrungen, weniger die Erfolge des Tierexperiments und der Laboratoriumsforschung, die für das menschliche Weib nur bedingt angewendet werden können. Was zunächst den Zeitpunkt der Hormonzufuhr anlangt, so wird man wohl die erste Hälfte des Intervalls als den geeigneteren hierfür ansehen, da die Heranreifung des Follikels und der Neubau der Uterusschleimhaut in diesen Zeitpunkt fallen. Hiezu muß aber gleich bemerkt werden, daß wir in den meisten Fällen von Menstruationsstörungen gar nicht in der Lage sind, diesen Zeitpunkt zu bestimmen, weil eben die Regel gestört ist. Es erweist sich vorteilhaft, zwischen Wochen der Behandlung und solchen der Ruhe im Sinne von Hormonkuren abzuwechseln und diese Kuren auf einen etwa 14tägigen bis 3wöchentlichen Zeitraum zu erstrecken. Auch hinsichtlich der Art der Einverleibung sehen wir keineswegs völlig klar. Soviel scheint sicher, daß die intravenöse Hormoninjektion infolge der raschen Ausscheidung des einverleibten Stoffes nur geringe Wirkung hat. Die langsamere Resorption leistet mehr. Trotzdem scheint die subkutane und intramuskuläre Einverleibung trotz der rascheren Resorption gegenüber der enteralen zu bevorzugen zu sein. Bei der enteralen gehen denn doch zu große Mengen des Hormones infolge fermentativen Zerfalls zugrunde. Nach allem, was wir wissen, ist zur Erzielung desselben Ergebnisses im Tierexperiment bei der peroralen Zufuhr etwa das 25- bis 20fache, nach ZONDEK freilich nur das 10- bis 5fache der subkutanen Dosis notwendig. Die rektale Applikationsart, die O. O. FELLNER besonders empfiehlt, mag infolge der vollen Resorption und der langsamen Anreicherung des Blutes mit dem Stoffe so manches für sich haben. Besonders schwer ist die Frage der Einzelgaben und der Gesamtmenge des zu verabreichenden Hormons für eine wirksame Kur zu beantworten. Während SIEGERT der häufigen Zufuhr kleiner Hormondosen, besonders auf enteralem Wege, das Wort redet und dafür gute Gründe vorbringen kann, wissen andere Forscher, insbesondere G. A. WAGNER über Eintritt der Regel nach entsprechender Beobachtungszeit bei Verabreichung großer Hormonmengen zu berichten.

Vielleicht daß ein Mittelweg am ehesten gangbar ist, nicht zuletzt deswegen, weil die Dauer der Behandlung einerseits, andererseits der Preis der Hormonpräparate gerade in der Privatpraxis von ausschlaggebender Bedeutung ist. Wir müssen trachten, jene Hormonmengen zu ermitteln, die als minimale Gaben erfolversprechend sind. Hierfür kann man aber feste Regeln noch nicht aufstellen. Die Verhältnisse der Kliniken, denen die Präparate zu Versuchszwecken in beliebigen Mengen zur Verfügung gestellt werden, lassen sich auf die Praxis nicht übertragen. Schon wenn man im Tage 300 E. per os und dazu 300 bis 500 E. in Injektionen gibt, kommt man hinsichtlich des Kostenpunktes auch bei kurzdauernden Kuren zu kaum tragbaren Summen. Gerade diese Tatsache ist einer der wundesten Punkte für die Hormontherapie, wenngleich der Preis der Präparate wesentlich wohlfeiler geworden ist. Über 1000 E. pro Tag wird man in der Mehrzahl der Fälle nach G. A. WAGNER nicht zu gehen brauchen. In schweren Fällen aber empfiehlt man jüngstens wesentlich größere Mengen, bis zu 10.000 E. Follikelhormon pro dosi durch etwa 14 Tage.

Eine weitere, uns ernstlich berührende Frage ist die, ob wir es im Einzelfalle bei der Follikelhormonbehandlung bewenden lassen oder dieselbe mit der Vorderlappenhormonbehandlung verbinden sollen. Es liegt nahe, leichtere Fälle, also die eingangs hervorgehobene Amenorrhoe ersten Grades, die auf den Uterus noch nicht nachteilig abgefärbt hat, der Follikelhormonbehandlung allein, länger dauernde Amenorrhoen, besonders solche nach den Dreißigerjahren, gar dann, wenn sie mit einer Atrophie des Uterus einhergehen, der Vorderlappen- und Follikelhormonbehandlung zuzuführen. Ganz große Dosen, wie sie dermalen überhaupt nur den Kliniken zur Verfügung stehen, wird man als *Ultimum refugium* bei der primären Amenorrhoe geben. Die Erfolge, die CLAUBERG und LOESER durch Verabreichung von 300.000 M. E. Follikelhormon und 50 K. E. Corpus-luteumhormon in einschlägigen Fällen primärer Amenorrhoe erzielten, in denen eine histologisch sichergestellte Menstruation auftrat, sind vielversprechende. Ob durch die Ankurbelung einer Zyklustätigkeit durch solche Dosen dieselbe aber auch weiter fort dauert, wenn mit der Einverleibung der Hormone abgebrochen wird, bleibt mit KAUFMANN abzuwarten.

Ob man von den Organpräparaten, die aus der Gesamtsubstanz des Ovariums bestehen und nach den neueren Zusammensetzungen Follikelhormon als Zusatz enthalten, das *Ovosan*, das *Ovowop*, das *Ovanorm*, das *Oophorin* u. a. gibt oder ob man von den Auszügen, die nicht alle Bestandteile, aber einen Zusatz von Follikelhormon enthalten, das *Novarialpräparat* oder das *Ovarium-Panhormon* gibt, ist von untergeordneter Bedeutung. Von den Hormonpräparaten, die das Follikelhormon rein dargestellt enthalten, sind das *Hogival*, das *Folipex*, das *Follikulin-Menformon*, das *Progynon*, das *Uden*, das *Perlatan* (in flüssiger Form) u. a. im Handel, von den Vorderlappenpräparaten das *Präpitan*, das *Prolan*, die nach Ratteneinheiten dosiert sind. Für letztere kann die mittlere Dosis von 100 R. E. intramuskulär, allenfalls die von 400 R. E. peroral

als genügend angesehen werden. Freilich stehen die individuellen Schwankungen in der Empfindlichkeit einer verlässlichen Angabe der notwendigen Mengen hindernd im Wege.

Um für die Praxis die Dosierung zu erleichtern, seien einige von G. A. WAGNER angeführte Schemata der Hormonverabreichung nach ZONDEK, der holländischen Schule und R. SCHRÖDER hierhergesetzt. ZONDEK gibt bei Zyklusstörungen folgenden Dosierungsplan:

	oral	subkutan
1. bis 5. Tag	1 × 100 M. E.	40 M. E.
6. „ 10. „	2—3 × 100 M. E.	100—200 M. E.
11. „ 15. „	3—4 × 100 M. E.	200—300 M. E.

Sofort postmenstruell beginnend.

Die holländische Schule und R. SCHRÖDER:

	Menformontabletten à 500 M. E.		
	Morgen	Mittag	Abend
4 Tage . . . . .	—	—	1
3 „ . . . . .	1	—	1
2 „ . . . . .	1	—	2
1 Tag . . . . .	1	1	2

Dieses Schema kann man auch einer Hormonkur mit 1000 E. pro dosi zugrundelegen.

Bei der rektalen Hormonkur gibt man nach O. O. FELLNER 3 bis 4 *Ovosanzäpfchen* zu 300 M. E. täglich durch 3 Wochen oder *Folipex-suppositorien* zu 1000 M. E. Nach einer Woche Pause wird die Kur ein- bis zweimal wiederholt, sofern nicht früher ein Erfolg eintritt.

Fälle, in denen die Periode nur um wenige Tage nach Verabreichung kleiner Dosen von Hormonen verspätet eintritt, sind kein Beweis für die Wirksamkeit irgendeines der verwendeten Präparate und können daher auch nicht als Grundlage für ein Dosierungsschema gelten.

Gegenüber diesen Hormonpräparaten müssen alle anderen, welche kein Follikelhormon enthalten, aus den genannten Gesichtspunkten heraus als weniger erfolgversprechend gelten. Wenn es trotzdem oft und oft gelingt, mit der wasserlöslichen Ovarialsubstanz *Agomensin* die Menstruation zu erzeugen, und zwar nach Gebrauch 14tägiger Kuren (3mal täglich 3 Tabletten und etwa 3 intramuskuläre Injektionen von 1 bis 4 ccm), so zeigt dies nur, wie Theorie und Praxis gerade in diesem Kapitel noch vielfach auseinanderstreben.

Alles in allem kann man wohl behaupten, daß die Hormontherapie, besonders im Verein mit den übrigen Maßnahmen der Amenorrhoebehandlung imstande ist, den Eierstockersatz durch Homoiotransplantation der Ovarien überflüssig zu machen. Von grundsätzlicher Bedeutung ist es, daß man einer gesunden Frau niemals ohne deren Zustimmung Eierstocksgewebe entnehmen darf, es sei denn, daß man gezwungen war, den Eierstock zu entfernen, wie dies in Fällen von hochgradig aus-

gebluteten Extrauteringraviditäten notwendig ist. Wenn man ferner erwägt, daß die Erfolge dieser Transplantationen, welche in größeren Reihen von SIPPÉL, SIEGERT u. a. ausgeführt wurden, naturgemäß nur vorübergehende sind, weil das Implantat schließlich doch dem Schwunde anheimfallen muß, so kann man den Wert dieses Verfahrens, mag es auch ein schwaches Keimplasma für eine Zeitlang zu besserer Tätigkeit anregen, nicht über Gebühr einschätzen, ja man kommt eher zu einem ablehnenden Standpunkt.

An die reinen Hormonpräparate schließen sich jene an, welche neben dem Sexualhormon auch die Extrakte anderer Blutdrüsen und Beimischungen von Yohimbin und Calcium enthalten, wie das *Thelygan* (Dragees, Ampullen, Suppositorien) und das *Thelygan-Antepan* (letzteres obige Stoffe in Verbindung mit Ovarial- und Vorderlappenhormon enthaltend).

#### Medikamentöse Therapie.

Man darf bei aller Wertschätzung der Hormonpräparate die Tatsache nicht aus dem Auge verlieren, daß schon vor dem Aufkommen derselben, ja sogar vor dem der Organpräparate Amenorrhoeen auch geheilt worden sind. Zu diesem Zwecke bediente man sich neben den ausführlich zu erörternden physikalischen und örtlichen Maßnahmen der sogenannten *Emenagoga*, jener Mittel, welche aus alter Volkserfahrung heraus als menstruationsfördernd gelten. Sie der Vergessenheit entrissen zu haben, ist zweifellos ASCHNERS gebührendes Verdienst. Unumwunden sei zugegeben, daß auch ohne Anwendung von Organ- und Hormonpräparaten bei Verabreichung von sogenannten *Emenagogis*, mag auch so mancher Fall einer strengen Kritik nicht standhalten, Erstaunliches zu leisten ist. Namentlich die kürzer dauernden Fälle von Amenorrhoe bei jüngeren Frauen sind mit und ohne allgemeine und örtliche Maßnahmen bei Verwendung gewisser *Emenagoga* recht gut der Heilung zugänglich. Sie bieten gegenüber den Hormonpräparaten den unschätzbaren Vorteil größter Wohlfeilheit. Es genügt für die Fälle der Praxis, die wohl am wirksamsten befundene *Aloe* in erster Linie zu empfehlen. In Form der *Aloe-Eisenpillen* leistet sie oft und oft Ausgezeichnetes. Man verordnet

1. Ferr. sulfuric. sicc.  
    Aloes . . . . . aa 5,0  
    Spirit. sap. qu. s. ut. f.  
    pil. Nr. C
- D. S. 3mal täglich nach den Hauptmahlzeiten 1—2 Pillen.

Auch die *Massa pil. Ruffii* der öst. Pharmakopoe (eine Mischung von Aloes pulverat. 60,0, Myrrhae 30,0, Croci 10,0, M. f. pilulae) ist durch ihren Aloegehalt wirksam. Man verordnet von dieser Ruffischen Pillenmasse 3 bis 6 Pillen. Vor dem *Apiol* als *Emenagogum* sei mit Rücksicht auf die Möglichkeit schwerer Vergiftungen im Sinne einer toxischen Polyneuritis ernstlich gewarnt. Unschädlich sind dagegen das *Kalium hypermanganicum* und *Indigo*

- |   |   |
|---|---|
| <p>2. Kal. hypermangan. .... 10,0<br/> Pulv. rad. Rhei qu. s. ut. f.<br/> pil. Nr. C<br/> D. S. 4mal täglich 1 Pille.</p> | <p>3. Indigo ..... 60,0<br/> Magist. Bismuth. .... 50,0<br/> D. S. 3mal täglich ein Teelöffel in<br/> Wasser.</p> |
|---|---|

Wie gesagt, gelten seit alters her Eisen und Arsen als besonders wirksam in der Behandlung der Amenorrhoe. Namentlich bei der Chlorose, aber auch bei den Amenorrhoeen auf dem Boden der Erschöpfung, wie nach langdauerndem Stillgeschäft, im Anschluß an Infektionskrankheiten und infolge Unterernährung ist die Eisentherapie das Verfahren der Wahl. Man bedient sich entweder der angeführten Pill. aloet. ferrat. oder zweckmäßig der *Blaudischen Pillen* nach der Vorschrift:

4. Ferr. sulfuric. oxydul.  
Kalii carbonici ..... aa 10,0  
Pulveris traga-canthae  
Aqu. dest. aa qu. s.  
u. f. pilul. Nr. C recent. parat.  
S. Von 3mal täglich 1 Pille bis 4mal  
täglich 2 Pillen ansteigend.

Nach neueren Anschauungen bevorzugt man das Eisen in großen Tagesmengen und bedient sich dazu anorganischer Eisenpräparate, die man wegen ihrer Wirksamkeit auf den Magen nach dem Essen nehmen läßt oder mit der Verordnung von *Salzsäure-Pepsin* (Rp. 57, S. 53) verbindet. Eine Eisenkur soll 2 Monate betragen und kann nach einem zwei- bis dreimonatlichen Intervall wiederholt werden. Man verordnet beispielsweise

- |   |  |
|---|--|
| <p>5. Ferri hydrogen. reduct. .... 0,5<br/> ad capsul. gelatin. Nr. XXX<br/> D. S. 4 Pulver täglich nach dem Essen.</p>   | <p>7. Ferri carbon. sacch. .... 30,0<br/> D. S. 3mal täglich 1 Messerspitze<br/> nach dem Essen.</p> |
| <p>6. Ferri hydroxydat. dialysat.<br/> liquid. .... 30,0<br/> D. S. 2- bis 3mal täglich 5—10—20<br/> Tropfen (besser verträglich).</p>  | <p>8. Ferri lactic. .... 30,0<br/> D. S. 3mal täglich eine Messerspitze<br/> nach dem Essen.</p>     |
| <p>9. Ferri reducti ..... 6,0<br/> Radicis Gentianae pulv. .... 1,2<br/> Extract. Gentianae ..... 3,6<br/> M. f. pil. Nr. LX<br/> D. S. 3mal täglich 1—2 Pillen (frisch<br/> bereiten lassen!).</p> |  |

Neben dem Eisen wird bei Chlorose Arsen entweder allein oder in Verbindung mit Eisen gegeben:

- |  |   |
|--|---|
| <p>10. Solution. arsenical. Fowleri 20,0<br/> D. S. nach dem Mittag- u. Abendessen von je 2 Tropfen bis 15 Tropfen ansteigend und ebenso wieder abfallend.</p> | <p>11. Solution. arsenical. Fowleri<br/> (Liquor Kal. arsenicos.)<br/> Tct. pomi ferr. .... aa 15,0<br/> D. S. Nach dem Mittag- u. Abendessen von je 3—15 Tropfen ansteigend und ebenso wieder abfallend.</p> |
|--|---|

12. Ferr. reduct. .... 5,0  
 Acid. arsenicos. .... 0,2  
 Pulv. et extract. Liquirit.  
 qu. s. u. f.  
 Pil. Nr. C

D. S. Von 1—4 Pillen täglich ansteigend und wieder abfallend von Woche zu Woche (NOORDEN).

Großer Beliebtheit erfreuen sich die *Tinctura Ferri Athenstaedt* (3mal täglich 1 Eßlöffel) und das *Ferronovin*.

Von den leicht verträglichen organischen Eisenpräparaten ist das Ferratin gut eingeführt:

13. Ferratini ..... 25,0  
 Div. in dos. aequ. Nr. L

D. S. 3 Pulver täglich.

Nur selten wird man bei der Amenorrhoe Arsen in der Spritze verabreichen. Man wird *Natrium arsenicosum*, *Natrium kakodylicum* oder eines der bekannten Fabrikspräparate wie *Arsamon*, *Solarson* oder *Optarson* (organische Arsenverbindung Solarson mit Strychnin) geben. Von gut verträglichen Tabletten, die Eisen und Arsen enthalten, seien erwähnt für milde Arsen-Dauerkuren das *Arsen-Ferraeductin*, die *Arsen-Triferrin-tabletten*, das *Arsen-Ferratin*, die *Arsoferrintektolettes*, die *Arsen-Feometten* und viele andere. Will man die Eisentherapie mit Hormontherapie verbinden, kann man sich der *Ferrovarialpräparate* (Tabletten zu 100 M. E. 3mal täglich 2 bis 3 Tabletten) bedienen. Bei günstigen materiellen Verhältnissen wird die Chlorose und damit die Amenorrhoe durch Kurgebrauch beeinflusst. Sowohl die Stahlbäder Pyrmont, Kudowa, Schwalbach, St. Moritz, Szliacs in Ungarn, wie die alkalisch-salinischen Eisenwässer Pyrawarth, Tatzmannsdorf, Franzensbad, Elster und Tarasp erfreuen sich mit Recht auch in dieser Hinsicht eines guten Rufes. Neben den Trinkkuren gebraucht man auch die Badekuren, und zwar in den Stahlbädern mit dem Eisenwasser selbst, bei den alkalisch-salinischen Eisenwässern als Eisen-Moorbäder. Bei Erschöpfungszuständen, verbunden mit Abmagerung und reizbarer Nervenschwäche, ist eine Mast-Liegekur, der Gebrauch von Leber, welche sich in der verschiedensten Weise zubereiten läßt, allenfalls auch der von Nährpräparaten, wie sie S. 211 angeführt sind, vorteilhaft. Von den Tonicis sind besonders der *Hellsikolsyrup* (Chin. ferr., Strychnin. nitr., Natr. glycerinophosph., Extr. Colae fluid. enthaltend), dann die Fabriksmarken *Phosvitanon*, *Tonicum Roche*, *Recresal*, *Compretten Cola cum Lecithino* u. v. a. bekannt.

Die im vorangegangenen erwähnten Fälle von Amenorrhoe bei bestehender Fettsucht, mag es sich um eine exogene oder um eine pluriglanduläre (hypophysäre, thyreogene) Fettsucht handeln, sollen nicht mit Ovarialhormonpräparaten behandelt werden. Hier ist der Fettsucht beizukommen, mit deren Besserung auch das geschädigte Ovar leichter in regelrechte Tätigkeit kommt. Die Grundzüge der Behandlung der Fett-

sucht setzen bei der Diät, der physikalischen und der medikamentösen Therapie ein. Die Nahrungszufuhr muß verringert werden, ohne daß der Körper Stickstoff verliert, ein Hungergefühl darf nicht aufkommen, weil sonst die allbekanntesten Schwächezustände und hochgradige Neurasthenie eintreten. Demnach muß die Kost möglichst eiweißreich, aber fettarm sein und darf nur mäßige Mengen Kohlehydrate enthalten. Das Hungergefühl kann ausgezeichnet durch reichlich Obst bekämpft, allenfalls können auch einzelne Mahlzeiten durch Obst ersetzt werden. Frische Salate aller Arten, ohne Öl zubereitet, bieten eine willkommene Ergänzung der Diät, in der das magere Fleisch verschiedenster Sorten, Magerkäse, Eier, Aspik, grüne Gemüse, Tee und schwarzer Kaffee vorherrschen, während Butter, fettes Fleisch, Speck, Obers, süße und fette Mehlspeisen ganz einzuschränken sind. Um die Körperausgaben zu vermehren, ist die Muskelarbeit möglichst zu steigern, was vor allem durch lange Spaziergänge, Freigymnastik, Bäder, besonders Schwimmen erreicht wird. Auch der Schlaf sei nicht zu ausgedehnt. Die medikamentöse Beeinflussung durch Schilddrüsenpräparate darf nur mit der nötigen Vorsicht geschehen. Dreimal täglich 0,1 g *Thyreoidin* bei sorgfältigster Beachtung allfälliger thyreotoxischer Symptome kann verabreicht werden. Der beste Erfolg ist dort zu sehen, wo eine Unterfunktion der Schilddrüse deutlich im Vordergrunde steht. Fälle von Fettsucht mit auffallender Wasserspeicherung sprechen auch auf andere Diuretika — denn auch das Thyreoidin wirkt hauptsächlich diuretisch — an. Man verordnet:

14. Theocin. natr.-acetic. . . . . 0,3  
 Sacch. alb. . . . . 0,5  
 M. f. p.  
 D. S. 3mal täglich 1 Pulver.

und schränkt auch in solchen Fällen die Flüssigkeitszufuhr, ganz besonders aber die Kochsalzzufuhr ein. Wenn die Erfahrungen, welche neuerdings mit dem *Elityran* gewonnen wurden, weiter so befriedigende bleiben, wird in derartigen Fällen von Fettsucht mit Wasserretention das *Elityran* gegenüber dem Thyreoidin an Bedeutung gewinnen. Man verordnet 3- bis 4mal wöchentlich 3 mal 2 bis 4 mal 2 Tabletten *Elityran* bei gleichzeitiger Herabminderung der Getränke und des Kochsalzes. In derartigen Fällen kann man schon auf diese Maßnahmen das Wiedereinsetzen der Periode nach einem entsprechenden Gewichtsverlust beobachten oder man tut noch ein übriges, indem man nach HOFSTÄTTER durch etwa 10 Tage hindurch je eine Spritze *Pituitrin* verabreicht (3 bis 5 V. E. der gangbaren *Pituitrin*präparate). Es ist naheliegend, in Fällen von Adipositas unter Zugrundelegung der Annahme einer Hypophysenstörung das Hypophysenvorderlappenhormon, besonders in Verbindung mit Schilddrüsenpräparaten zu versuchen. Nach den bis jetzt vorliegenden, allerdings kleinen Erfahrungen scheint die Behandlung mit *Preloban* und *Elityran* erfolversprechend zu sein. Man beginnt mit 2mal täglich je einer *Elityran*- und *Preloban*tablette und steigert auf 3- bis 4mal *Elityran* und *Preloban* im Tage. Etwas eingreifender, aber zweifelsohne zu raschen

Gewichtsverlusten und damit leichter zur Wiederkehr der Periode führend, ist das Vorgehen ASCHNERS, der neben einer fettarmen Diät morgens nüchtern 10 g *Natrium sulfuricum* in  $\frac{1}{4}$  Liter warmen Wassers gelöst in Verbindung mit 1 bis 2 Schilddrüsentabletten à 0,3 g mittags vor dem Essen gibt und abends einen „emenagogen“ und „resolvierenden“ Tee nach folgender Zusammensetzung verordnet:

15. Fol. Sennae.  
 Rad. liquir.  
 Fruct. foenic. . . . . aa 30,0  
 D. S. 1 Eßlöffel auf 1 Tasse Tee.

An dieser Stelle sei auch des Aderlasses bei der Amenorrhoe, den ASCHNER in die Therapie von neuem eingeführt hat, gebührend Erwähnung getan. Seine Erfolge können nur bestätigt werden. Man entnimmt der Kubitalvene 100 bis 150 ccm Blut mit weiter Wassermannadel oder Aschnerscher Nadel unter Verwendung einer guten Staubbinde. Zweckmäßig richtet man sich einen Krug heißen Wassers zurecht, in den die Hand eingetaucht werden kann, wenn der Blutstrahl zu versiegen droht, worauf von neuem das Blut reichlicher fließt.

Auch bei Amenorrhoe auf dem Boden des Morbus Basedow erweist sich eine Serie von Pituitrininjektionen in jenen Stadien der Krankheit vorteilhaft, in denen das Allgemeinbefinden dank der üblichen, hier nicht näher zu erörternden Maßnahmen soweit gebessert ist, daß bereits die Amenorrhoe behandelt zu werden verdient.

#### Physikalische Behandlung.

Zunächst seien die einfacheren, ohne weiteres im Haus durchführbaren Verfahren besprochen. Heiße Scheidenspülungen werden mit Recht gerne verordnet. Da ihre Wirkung mit zunehmender Temperatur besser wird, soll man Spülungen von 40 bis 50° C machen, die äußeren Geschlechtsteile dabei aber zwecks Vermeidung von Verbrennung mit einer dicken Lage von Vaseline bestreichen oder sich einer der bekannten Spülbirnen (HASSE, PINKUS) oder eines schnabelförmigen Scheidenspiegels aus Hartgummi nach GUTHMANN bedienen. Noch vorteilhafter sind längerdauernde Scheidenspülungen. Sie werden aus einer Fallhöhe von 70 cm bis 1 m durch Nachgießen heißen Wassers in einen entsprechenden Behälter von 5 Minuten Dauer bis zu einer  $\frac{1}{2}$  Stunde ausgeführt, wobei man allmählich von Bad zu Bad die Dauer der Prozedur steigert. Dem heißen Wasser kann man nach STRASSMANN pro Liter 1 Eßlöffel *Seifenspiritus* zusetzen. Eine der ältesten Behandlungsmethoden ist das Sitzbad, welches in Form des heißen Sitzbades entschieden mehr Freunde hat als das kalte. Da die hyperämisierende Wirkung mit der Temperatur zunimmt, soll sie 38 bis 40° C betragen, kann aber bei den ersten Sitzbädern etwas niedriger sein und allmählich gesteigert werden. Die heißen Sitzbäder werden am besten vor dem Schlafengehen genommen und sogleich darnach das vorgewärmte Bett aufgesucht. Sie sollen nicht länger als 10 bis 15 Minuten dauern. Der Oberkörper ist

zu bekleiden, damit Erkältungen vermieden werden. Das kurze kalte Sitzbad ist namentlich in unseren Gegenden wenig beliebt, und seine Anempfehlung wird vielfach dadurch unterbunden, daß es als Ursache später auftretender rheumatischer Beschwerden angeschuldigt wird. Zweifellos aber vermag ein 2 bis 5 Minuten dauerndes kaltes Sitzbad in der Temperatur von 15 bis 13° C eine recht beträchtliche reaktive Hyperämie in den Bauchorganen nach anfänglichem Gefäßspasmus hervorzurufen und dadurch menstruationsfördernd zu wirken. Den peinlich empfundenen Reiz des kalten Wassers kann man einigermaßen dadurch vermindern, daß man in etwas höher temperiertem Wasser zu baden beginnt und rasch kaltes Wasser zufließen läßt. Auch Güsse mit brunnenkaltem Wasser, die auf ganz kurze Zeit, höchstens 2 Minuten, ausgedehnt werden, und durch den heftigen Temperaturreiz ohne mechanische Einwirkung die Blutmengen verschieben und die Zirkulationsverhältnisse bessern, sind im Hause ohne weiteres anwendbar. Der Unterguß, bei dem vom Fuß bis zum Nabel herauf der Körper während einer Minute berieselt wird (15 bis 10° C), hat sich bei amenorrhöischen Zuständen bewährt. Auch der Knieguß kann verwendet werden. Die eigentlichen Duschen erfordern bereits Anstaltsbetriebe. Sie üben durch den thermischen und den mechanischen Reiz eine beträchtliche Wirkung aus. Namentlich die kurzen kalten Fächerduschen können bei Anwendung auf den Bauch, die Lendengegend und die Innenfläche der Oberschenkel bei amenorrhöischen, sonst gesunden jugendlichen Personen empfohlen werden. Neurasthenische, chlorotische Individuen, hochgradig erschöpfte Frauen, eignen sich für diese Art der Amenorrhöebehandlung nicht.

Die Empfehlung von Badekuren, die namentlich bei infantilen, chlorotischen und pastösen Patientinnen so Gutes leisten, scheidert vielfach an der Ungunst der Verhältnisse. Ihre Wirkung steht aber außer Zweifel. Die besten Erfolge weisen in dieser Hinsicht die Moorbäder auf; die durch die Moorpackung erzeugte Hyperämie der Genitalorgane, der mechanische Reiz, verbunden mit der Wärmestauung, vermag gerade bei Amenorrhöe Erstaunliches zu leisten. Aber auch bei der pluriglandulären Fettsucht, die so oft mit Amenorrhöe einhergeht, sieht man nach solchen Kuren starke Gewichtsabnahmen und Wiederkehr der Periode, besonders wenn die Moorpackungen mit Trinkkuren von Glaubersalzquellen verbunden werden, wie dies beispielsweise in Franzensbad, Karlsbad, Marienbad und Mergentheim üblich ist. Auch die Verbindung der Moorbäder mit kohlen-sauren Stahlbädern, wie man sie in Tatzmannsdorf, Elster, Franzensbad, Langenschwalbach, Pyrmont verabreicht, tragen wesentlich zur Besserung des Allgemeinzustandes bei. Auch die Wirkung der Solbäder steht für Amenorrhöische außer Zweifel. Die Solbäder (Hall, Ischl, Aussee, Gmunden, Reichenhall, Kreuznach, Kösen) eignen sich vorsichtig dosiert für rekonvaleszente Amenorrhöische nach Erschöpfungszuständen und für hypoplastische Frauen. Die Solbäder werden als Solvollbäder und Sol-sitzbäder gegeben. Im ganzen genügen nach altem Brauch ihrer 21, die auf 4, besser auf 6 Wochen verteilt werden. Sie werden bei einer Temperatur von 34 bis 36° C in der Dauer von 10 bis 30 Minuten ver-

ordnet (R. MICHAELIS). Solbäderkuren lassen sich mit gutem Erfolg im Hause, in Form der Salzsitzbäder durchführen. Ihre Anwendungsweise siehe S. 118. Die offensichtlichen Erfolge solcher Solbadekuren bei Amenorrhoe beruhen neben den Einflüssen der thermischen Wirkung wohl auf der Stoffwechselerhöhung und der Anregung des vegetativen Nervensystems. Dort, wo Skrophulose mit im Spiel ist, sind die jodhaltigen Quellen von Hall in Oberösterreich, Tölz in Bayern und Wiessee sowie Wildeck in der Schweiz mit Recht berühmt. Hervorzuheben ist, daß die Solbäder bei anämischen und infantilen Patientinnen zu Reizerscheinungen am äußeren Genitale führen können, weshalb es in diesen Fällen besser ist, nach dem Solbad durch ein Reinigungsbad in warmem Wasser die anhaftenden Salzkristalle gründlichst zu entfernen.

Von den Anwendungsformen der Wärme erweist sich bei der Behandlung der Amenorrhoe der häufige Gebrauch des Thermophors mit und ohne Dunstumschlag, ebenso wie eine systematische Heißluftbehandlung vorteilhaft. Wird diese in Verbindung mit feuchten Kompressen, die während der Heißluftbehandlung auf den Unterleib gelegt werden, verwendet, so wird hiedurch die Wärmeabgabe durch Schweißverdunstung verhindert und eine gewünschte Wärmestauung erzeugt. Ausgezeichnetes leistet auch der FLATAUSche Pelvitherm. An den Arzt und gewisse Apparaturen gebunden sind die örtlichen Wärmeanwendungen in der Scheide und am Uterus in Form der Diathermie, ferner von Scheidenheizlampen, wie sie von SEITZ und WINTZ angegeben sind und bis zu  $\frac{1}{2}$ stündiger Dauer täglich verwendet werden. Die Diathermie wird am besten in einer Serie von etwa 15 Sitzungen als vaginale Diathermie verwendet, wobei man nach dem Vorschlag LAQUEURS 20 Minuten 3mal wöchentlich, und zwar bei anteflektiertem Uterus mit einer dem Unterleib aufliegenden, bei nach hinten geschlagenen Adnexen mit zwei Außenelektroden, allenfalls auch einer Kreuzbeinelektrode arbeitet. Die Diathermie wird meist im Verein mit anderen Behandlungsverfahren, namentlich der Hormontherapie verwendet. Bei schwerer Amenorrhoe II.<sup>o</sup> läßt sie naturgemäß auch oft im Stich. Die Diathermie der Hypophyse, welche in Wien von LIEBESNY und SZENES besonders bei der Dystrophia adiposogenitalis, aber auch bei Dysmenorrhoe und Klimakterium praecox empfohlen wird, kann ebenfalls versucht werden.

Die Verwendung des elektrischen Stroms hat nur bei vaginaler und besonders bei intrauteriner Anwendung Aussicht auf Erfolg. Schon die bloße Durchwärmung des Uteruscavum durch thermische Sonden, in denen die Wärme auf elektrischem Wege erzeugt wird, wie solche Instrumente von SCHÜCKING und SEITZ angegeben sind, wirkt günstig; noch mehr als die einfache Durchwärmung aber verspricht die Galvanisation des Uterus Erfolg. Man führt die Kathode in den Uterus ein und verwendet einen Strom von 30 bis 50 MA; im ganzen gibt man 12 derartige Galvanisationen, nicht mehr als 2- bis 3mal wöchentlich. Fehler in der Asepsis bei diesem Verfahren können sich bitter rächen, weshalb die Instrumente, ähnlich wie die Cystoskope in Gläsern aufbewahrt werden sollen, in denen sich Formaldehyddämpfe entwickeln. Vor ihrer An-

wendung ist die peinlichste Reinigung derselben mit Seifenspiritus und Alkohol durchzuführen. Einfacher ist die vaginale Faradisation bei Amenorrhoe, die man bei Virgines auf den Mons pubis und auf das Sacrum beschränkt. Die intrauterine bipolare Faradisation hat HOFSTÄTTER in einer erklecklichen Zahl hartnäckiger Amenorrhoen von mehr als halbjähriger Dauer in mehr als der Hälfte der Fälle Erfolg gebracht. Sie verdient in schwer ansprechbaren Fällen jedenfalls Verwendung. Die Bestrahlung mit der LANDEKER'schen Ultrasonne kann, wo sie zur Verfügung steht, ebenfalls zur Behandlung der Amenorrhoe herangezogen werden. Da sie verhältnismäßig wenig Licht-Wärmestrahlen gibt, ist die Erwärmung der Scheidenschleimhaut gering und da sie keine erythem-erzeugenden, kurzwelligen ultravioletten Strahlen enthält, so kann man die Bestrahlungsdauer auf 20 Minuten ausdehnen und jeden zweiten Tag durchführen.

Der Verabreichung kleiner Dosen von Röntgen auf die Ovarien Amenorrhöischer wagt Verfasser nicht das Wort zu reden. Solange auch nur die entfernte Möglichkeit einer Keimschädigung nicht ausgeschlossen ist, ist es ein Gebot der Vorsicht, sie nicht anzuwenden. Die Erfolge sind auch namentlich in den kritischen Jahren um 30 herum nicht immer prompte. Die Bestrahlung kann beim geringen Verfehlen der richtigen Dosis eine dauernde Amenorrhoe bewirken. Über die Hypophysenbestrahlung bei Amenorrhoe mit Röntgen liegen wohl noch zu wenig eindeutige Erfahrungen vor, um zu ihr Stellung nehmen zu können.

### Örtliche Behandlung.

Zu den örtlichen Maßnahmen zur Erzielung einer Periode bei Amenorrhoe gehört die einfache Sondierung des Cavum uteri mit vorsichtigem Hin- und Herbewegen der Sonde, ein Vorgehen, welches jüngstens von G. A. WAGNER wieder empfohlen worden ist. Auch hier ist gewissenhaftes, aseptisches und zartes Handhaben des Instrumentes dringend geboten. Es bedarf wohl keiner besonderen Betonung, daß das Verfahren nur dort in Frage kommt, wo eine Schwangerschaft sicher ausgeschlossen werden kann. Obwohl es unbestritten ist, daß RIECK mit der Einführung eines Intrauterinstiftes ins Cavum uteri hinsichtlich der Erzielung einer Regelblutung auch bei langdauernden Amenorrhoen ausgezeichnete Erfolge erzielt hat, ist trotzdem dieses Vorgehen nicht zu empfehlen. Die Einführung eines solchen Fremdkörpers ins Cavum uteri widerspricht denn doch unserem chirurgischen Gefühl. Es kann, mag der Stift auch so und so oft klaglos vertragen werden, schwere Entzündungen geben, die den Zustand schlechter machen als zuvor. Diesbezügliche Mitteilungen im Schrifttum sind denn doch sehr beherzigenswert. Von den lokal am Uterus angreifenden chirurgischen Methoden verdient ferner die Skarifikation der Portio Erwähnung. Man stellt sie im Spekulum ein und macht etwa 8 bis 10 oberflächliche, radiär zum Muttermund verlaufende Einschnitte ins Gewebe, aus denen sich etwa 1 bis 2 Eßlöffel Blut entleeren. Ein kleines scharfes Skalpell ersetzt vollkommen jene Instrumente, welche die alten Ärzte eigens zu diesem Zweck konstruiert

hatten. Der Reiz dieses Aderlasses im Erfolgsorgan des Ovariums ist kein geringer. Über die Saugglockenbehandlung der Portio nach PAYER mangeln Verfasser eigene Erfahrungen.

Schließlich sei gebührend auf die Abrasio mucosae als einem wichtigen Heilmittel im Kampfe gegen die Amenorrhoe hingewiesen. Abgesehen davon, daß sie auf den Uterus als Reiz wirkt, scheint sie auch die Ovarien vom Uterus her zu erhöhter Tätigkeit anzuregen. Sie kann nur bestens empfohlen werden.

Bei der Häufigkeit der Amenorrhoe — seit der SCHÄFFERSchen Statistik wissen wir, daß bei 58% jüngerer Frauen kürzere oder längere Amenorrhoe vorkommt — verdient auch die Prognose dieses Zustandes beleuchtet zu werden. Um sie richtig zu beurteilen, muß die Ursache der Amenorrhoe, auf die ja ausführlich hingewiesen worden ist, und nebst dieser die Dauer, das Alter der Betroffenen und folgerichtig der Zustand der Gebärmutter berücksichtigt werden. Ganz allgemein gilt der Satz, daß die Vorhersage um so schlechter ist, je schwerer das Grundleiden ist, welches die Amenorrhoe auslöst, wie wir dies von schweren endokrinen Störungen und chronischen Infektionskrankheiten her kennen. Hinsichtlich der Dauer einer Amenorrhoe gilt die Erfahrung, daß mit ihrem längeren Bestande die Heilungsaussichten sinken. Bis zu 4 und 5 Monaten sind sie recht gut, verschlechtern sich aber von nun ab, eine Tatsache, die sich am atrophisch werdenden Uterus durch Palpation nachweisen läßt. Allerdings kommen auch in dieser Hinsicht Ausnahmen vor, indem sogar in Fällen von 2jähriger Amenorrhoe die Regel wieder in Gang gebracht werden konnte. Jugendliche Frauen sind im allgemeinen besser daran, als solche von der Mitte der Dreißigerjahre. Es ist aber recht bemerkenswert, daß Amenorrhoen, die alsbald nach der Menarche auftreten, schwerer zu heilen sind als solche zwischen dem 18. und 33. Lebensjahr. HOFSTÄTTER macht auch darauf aufmerksam, daß es leichter ist, Amenorrhoen zu beseitigen, als Oligo- und Hypomenorrhoen zur regelten Menstruation zu bringen. Man kann die Betrachtung über die Prognose der Amenorrhoe nicht schließen, ohne HOFSTÄTTERS Erfahrungen über die Vorhersage dieses Leidens im Hinblick auf die verschiedenen Formen abwegiger Konstitution wenigstens zu streifen. Ihm ergab die Untersuchung von amenorrhöischen Asthenikerinnen mit Ptose bei länger dauernder Amenorrhoe trotz aller Maßnahmen einen ungünstigen Erfolg, dagegen gelang es ihm bei hypoplastischen Frauen bei kurzdauernder Amenorrhoe durch Organ- und Hormontherapie, Hitze und Aphrodisiaca leicht, bei länger dauernder Amenorrhoe unter Verwendung dieser Mittel und des Curettements sowie des Aderlasses noch in 75% der Fälle Ergebnisse zu erzielen. Bei Neurasthenikerinnen waren selbst bei halbjähriger Amenorrhöedauer durch Mastkur, Eisen- und Arsengaben die Erfolge befriedigend. Bei Intersexuellen waren sie, wenn die Amenorrhoe länger als 3 Monate dauerte, schlecht. Auch bei pyknischen Frauen ist die Prognose nach HOFSTÄTTER bei einer über 4 Monate dauernden Amenorrhoe, Zunahme des Fettpolsters und Auftreten abnormer Behaarung trotz aller Maßnahmen einschließlich des Thyroidins, wieder-

holter Aderlässe und Schwitzkuren schlecht. Bei der exogenen Fettsucht ist durch die erwähnten Behandlungsmethoden Gutes zu erzielen, schwerer bei endogener Fettsucht. Daß bei schweren endokrinen Störungen der Wiedereintritt der Periode nicht erwünscht und daher ebensowenig Ziel der Behandlung sein wird, wie bei schweren Infektionskrankheiten mit Erschöpfung des Körpers, ist bereits dargetan worden.

### Pseudoamenorrhoe.

Jene Form der Pseudoamenorrhoe, die durch die sogenannten Gynatresien (Verschluß des Hymens, der Scheide oder des Collum uteri) veranlaßt wird, kommt dem praktischen Arzt am häufigsten in Form der Atresia hymenalis unter. Wenn die Eröffnung des verschlossenen Hymens, hinter dem das in der Scheide angesammelte Blut blau durchschimmert, auch technisch zu den einfachsten Eingriffen gehört, so kann er doch deswegen gefährlich sein, weil infolge mächtiger Blutansammlung nicht bloß ein Haematokolpos, sondern auch eine Haematometra bestehen, ja sogar Haematosalpingen sich ausgebildet haben können, ein Zustand, der immer die Gefahr der Peritonitis in sich birgt. Darum ist die Operation für den praktischen Arzt weniger empfehlenswert und darf, wenn sie von ihm ausgeführt wird, keinesfalls ambulatorisch gemacht werden. Insbesondere ist jedes Drücken am Bauche während der Ablassung des Blutes unbedingt zu unterlassen. Über Pseudoamenorrhoe infolge Atresien der Scheide nach Infektionskrankheiten, Verbrennungen und Verätzungen ist bei den Stenosen der Scheide das Nötige angeführt. Pseudoamenorrhoe infolge Zerstörung des Endometriums, wie sie durch Tuberkulose, Verätzung und Verbrennung des Uterus durch Chemikalien, wie Chlorzink, Salpetersäure, Atmokausis, aber auch durch zu energische Abrasio mucosae entstehen kann, ist nur ganz ausnahmsweise einer solchen chirurgischen Behandlung zugänglich, welche die Wiederherstellung des Periodenblutflusses ermöglicht (STRASSMANN). Der praktisch so wichtige Regelausfall nach der operativen Entfernung des Uterus und die Amenorrhoe infolge Kastration finden bei den Beschwerden des künstlichen Klimakteriums ihre Darstellung (S. 83 ff).

## 2. Hypomenorrhoe.

Frauen mit regelmäßiger, aber auffallend schwacher Periode suchen den Arzt nicht selten deswegen auf, weil sie das Herannahen eines unverhältnismäßig frühen Klimakteriums oder das Zurückbleiben schädlicher Stoffe im Körper infolge der geringen Blutausscheidung fürchten. Während es bei einer Reihe von Fällen bei diesem Zustand bleibt, kommt es in anderen zur Amenorrhoe oder auch zu Unregelmäßigkeiten im Zyklusablauf, besonders im Sinne zu starker Blutung. Ist die zu schwache Regelblutung Ausdruck einer primären Ovarialinsuffizienz, so kommen neben den Hormonpräparaten ganz besonders allgemein kräftigende Maßnahmen und die ausführlich geschilderte physikalische Behandlung in Frage. Diese allgemeine Therapie ist um so mehr angezeigt, als zahlreiche

derartige Frauen die ausgesprochenen Zeichen asthenischer Körperveranlagung darbieten. Liegt eine sekundäre Ovarialschädigung der zu schwachen Regelblutung zugrunde, weil den Körper schwere Krankheiten, Stoffwechselstörungen oder Ernährungsschäden getroffen haben, so muß die Therapie bei den Grundkrankheiten einsetzen, wie dies bereits bei der Amenorrhoe geschildert wurde. Nicht zu vergessen ist, daß Entzündungen der Adnexa, besonders tuberkulöser Natur, mit einer solchen zu schwachen Regel, aber auch mit zu seltener Regel einhergehen können. Für solche Fälle sind gegen diesen Zustand gerichtete Maßnahmen nicht vonnöten, ja die schwache Regel wird bei tuberkulöser Adnexentzündung im Sinne der Ruhigstellung der Geschlechtsorgane nur erwünscht sein. Dort, wo jahrelang eine nur kurzdauernde, aber regelmäßige Periode besteht, liegt kein Grund einzugreifen vor.

### 3. Hypermenorrhoe.

Wenn es auch oft, namentlich bei einmaliger Untersuchung, nicht gelingt, einwandfrei die Ursachen einer zu starken Regelblutung auszuforschen, so soll doch nach ihrem Grunde geduldig gesucht werden, weil die Behandlung, die nicht leicht ist, dann eher Aussicht auf Erfolg bietet. Mit der Befragung nach den verschiedensten etwa in Betracht kommenden Umständen muß auch ein Urteil über die wahre Stärke der Regelblutung gewonnen werden, denn der Begriff der zu starken Regelblutung ist recht dehnbar. Richtig ist er nur zu fassen, wenn Wägungen des Menstrualblutes vorgenommen werden, was nur ausnahmsweise in eigens dazu angestellten Untersuchungen geschieht. Dabei zeigt sich, daß bei einer 3 bis 4 Tage dauernden normalen Regel 100 bis 120 g blutig-schleimiger Flüssigkeit, entsprechend etwa 50 bis 80 g reinen Blutes, abgehen (R. SCHRÖDER). In der Praxis muß man sich an die Angaben der Frauen über die Zahl der verbrauchten Binden und den Grad ihrer Durchtränkung halten. Man wird von einer zu starken Regelblutung sprechen, wenn nicht bloß am ersten und besonders am zweiten Tag der Menstruation 2 bis 3 Binden mit Blut sich vollsaugen, sondern wenn derselbe Zustand auch am 4. und 5. Tag unvermindert, gar in Form des Abganges von Blutklumpen, fort dauert. Auch dann wird man eine verstärkte Regelblutung feststellen, wenn zwar die Menstruation für den Tag genommen nicht übermäßig stark ist, die Blutung sich aber über 8 bis 9 bis 10 Tage hinzieht. Dadurch werden die Intervalle immer kürzer und die Möglichkeit der Erholung geringer.

#### Ursachen der Hypermenorrhoe.

Für die zu starken, aber im wesentlichen regelmäßigen Perioden muß die Tatsache unterstrichen werden, daß im Endometrium keine Abweichungen vom gewöhnlichen Typus seiner Phasen zu finden sind (R. SCHRÖDER). Möglich ist, daß die Inkrete des Ovariums, namentlich die eines stark blutüberfüllten Eierstocks, in Zusammenhang mit einer verstärkten Regelblutung stehen. Jedenfalls aber treten die Rollen des

Ovariums und Endometriums bei der zu starken Regelblutung gegenüber anderen ursächlichen Umständen in den Hintergrund. Diese liegen in Entzündung der Adnexa und des Beckenbauchfelles in rund einem Drittel der Fälle, dann in Myomen, weiter im retroflektierten und oft genug überdies deszendierten Uterus mit und ohne gleichzeitiger Senkung des Eingeweideblocks, ferner in Hypoplasie des Genitales. Zuletzt und durchaus nicht so selten findet sich die verstärkte Regelblutung beim normalen Genitale im 5. Lebensjahrzehnt, wobei die Angabe immer wiederkehrt, daß die Periode erst in den letzten Jahren oder Monaten Neigung zur Verstärkung und längeren Dauer zeigt. Dasselbe sieht man, wenn auch etwas seltener, bei Frauen unter 40 Jahren ebenfalls ohne krankhaften Genitalbefund. So naheliegend es ist, die Uterusmuskulatur infolge mangelhafter Ausbildung oder schlechter Rückbildung nach Geburt und Abort für derartige Fälle nach den Vierzigerjahren für die abnorme Dauer der Regelblutung verantwortlich zu machen, anatomische Veränderungen im Sinne eines Überwiegens des Bindegewebes sind trotzdem die Ausnahmen. Man muß sich mit R. SCHRÖDER mit der Annahme einer funktionellen Muskelschwäche helfen, wie sie bei Frauen jenseits der Vierzigerjahre, die sich dem Wechsel nähern, ebenso verständlich ist, wie bei Asthenischen mit Enteroptose und Descensus eines retroflektierten Uterus. Die Bedeutung der Retroflexion ist gerade bei dieser Abwegigkeit nicht zu unterschätzen. Beim hypoplastischen Uterus kann man mit SELLHEIM in der von Haus aus schwach angelegten Muskulatur die Ursache für eine funktionelle Schwäche und damit für die verlängerte Regelblutung erblicken. Anders ist es bei den entzündlichen Krankheiten der Adnexa und des Beckenbauchfelles, die mit verstärkter Regelblutung einhergehen. Hier liegt die Ursache für sie vor allem in Verwachsungen frischerer und älterer Natur, welche mechanisch die Zusammenziehung der Uterusmuskulatur im Zustande der Menstruation stören. Oft genug ist in akuten und subakuten Fällen die durch die Entzündung bedingte Blutüberfüllung des kleinen Beckens an der starken Regelblutung wesentlich mitbeteiligt. Beide Umstände müssen für die zu besprechende Behandlung in Rechnung gestellt werden. Die Verstärkung und Verlängerung der Regelblutung bei Myomen ist eine bekannte und auch diagnostisch in der Richtung des Myoms hinweisende Erscheinung, die namentlich um das 40. Lebensjahr herum und darüber hinaus, aber auch schon in den Dreißigerjahren sich bemerkbar macht. Ursächlich ist sie durch drei Umstände bedingt: in der Einsprengung der minderwertigen Muskelelemente der Myomknoten in die normale Muskulatur des Uterus, die damit in ihrer Architektur gestört ist, in der Vergrößerung der blutenden Flächen in jenen der Zahl nach überwiegenden Fällen, in denen das Cavum uteri vergrößert ist und schließlich, namentlich bei submukösen Myomen, in der bei ihnen so oft zu findenden Gefäßstauung und -erweiterung besonders jener Blutgefäße, welche über die Kuppe des Tumors ziehen. Praktisch von großer Wichtigkeit ist auch in diesem Belange die Adenomyosis interna, das Einwuchern der Drüsen-schläuche des Endometriums und des Stromas in die Muskulatur, eine

Erscheinung, die mechanisch die Herabminderung der Kontraktionskraft des Uterus erklären kann (siehe Endometriosis S. 205) Bekanntlich hat namentlich KÄHRER für die Entstehung verstärkter Regelblutungen und für Myomentwicklung eine abnorme sexuelle Betätigung, ebenso wie Frigidität und Dyspareunie ursächlich angeschuldigt. Daneben gilt der Coitus interruptus als nicht seltene Ursache der verstärkten Regelblutung nebst der Veränderung an den Sacrouterinligamenten, welche bei lange Zeit geübtem Coitus interruptus schmerzhaft und gespannt gefunden werden können, weshalb die Hebung des meist etwas vergrößerten, gestauten Uterus unangenehm empfunden wird. (Näheres siehe S. 235 ff.).

Nicht unterschätzt werden darf die Beckenhyperämie, wie sie bei vollaftigen, fettleibigen Frauen mit erschlafften Bauchdecken und Hängebauch, Hyperämie der deszendierten Scheidenwände, chronischer Stuhlverstopfung und Krampfadem so oft gefunden wird und nebst den Beschwerden aus den gestauten Venen, besonders des Plexus haemorrhoidalis, zur verstärkten Regelblutung Veranlassung gibt. Oft genug ist der Zustand auch noch mit einem Descensus des retrovertierten Uterus verbunden. Nicht immer ist es eine abwegige Körperveranlagung, vielfach vielmehr eine unrichtige Hygiene im Wochenbett, unzweckmäßige, zu reichliche Kost, ganz besonders der Mangel an Bewegung und körperlicher Betätigung überhaupt, der diese Beckenhyperämie verschuldet.

Da bei Frauen, namentlich nach den Vierzigerjahren, auch Nierenerkrankungen verstärkte Regelblutungen verursachen können, soll man gegebenenfalls in dieser Richtung durch Bestimmung des Blutdrucks und genaue Harnuntersuchung entsprechend forschen. Während bei schweren Herzfehlern die Ovarialtätigkeit darniederzuliegen pflegt, ist bei leichter Dekompensation nebst unregelmäßiger Menstruation die Verstärkung einer normalen Regel nicht ganz selten und deswegen nebst den übrigen Zeichen der kardialen Insuffizienz auch diagnostisch verwertbar und von diesem Punkte aus zu kurieren. Menorrhagien infolge Hypertonie bessern sich durch Liegekuren im Verein mit vegetabilischer, salzfreier Diät unter Einschaltung von Obst-, Kartoffel- und Zuckertagen.

### Behandlung.

#### Die Haemostyptica und ihre Verwendung.

Indem wir uns nach diesen einleitenden Bemerkungen der eigentlichen Behandlung der zu starken Regelblutung zuwenden, müssen wir hervorheben, daß wir nicht nur bei unklarer Ursache der Blutung, sondern in einer großen Reihe der Fälle, in denen sie uns wohl bekannt ist, zunächst einmal wenigstens die seit alters her gebräuchlichen blutstillenden Mittel anwenden. Die Berechtigung hierzu ergibt sich daraus, daß bösartige Leiden sie nicht verursachen und daß sie auch nur verhältnismäßig selten besonders bedrohliche Grade erreichen. Durch ihre Verwendung sollen aber die weiter unten angegebenen Richtlinien der ätiologischen Therapie nicht vernachlässigt werden. Die Auswahl der

zur Verfügung stehenden Medikamente ist geradezu verwirrend, und Tag für Tag werden neue angegeben. Trotzdem soll man u. E. n. an den durch die Erfahrung als wirksam erprobten Mitteln festhalten und wo es angeht, ihre Verschreibung magistraliter durchführen. Erst in zweiter Linie möge man auf die fertig abgepackten und mit Gebrauchsanweisung versehenen, den Arzt scheinbar vielfach entbehrlich machenden Spezialpräparate zurückgreifen. Am nächstliegenden ist immer der Gebrauch des Mutterkornes. Ebenso brauchbar wie wohlfeil ist das biologisch eingestellte *Ergostabil* (3mal täglich 20 Tropfen), *Ergotin-Merck-Neu* (3mal täglich 15 Tropfen) oder

- |                                    |       |                                     |      |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|
| 16. Ergostabil (Ergotin) . . . . . | 3,0   | 17. Extract. Secal. cornut. fluid.  | 20,0 |
| Syrup. simpl. . . . .              | 30,0  | D. S. 3mal täglich 10—30 Tropfen in |      |
| Aqu. fontis ad . . . . .           | 150,0 | Wasser.                             |      |
| D. S. 3 stdl. 1 Eßlöffel           |       |                                     |      |
| (ev. 1—2mal wiederholen)           |       |                                     |      |

oder *Extract. Cornutinum ergoticum Bombelon, Secoin. fluid.* (2- bis 3mal täglich 20 Tropfen), *Tinct. Haemostypt. Denzel* (3mal täglich 20 bis 30 Tropfen, FRITSCH). Sie schmeckt angenehm, was bei der Secaleverschreibung auch durch andere Korrigentien zu erreichen ist, beispielsweise

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 18. Extract. Secal. cornut. fluid. |         |
| Tinct. Cinnamomi . . . . .         | aa 15,0 |
| D. S. 3mal täglich 15—20 Tropfen.  |         |

In Pulverform führt man Secale zu

- |                                  |         |                                      |      |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------|------|
| 19. Secal. cornut. pulv. . . . . | 0,5—1,0 | 20. Pulv. Secal. cornut. . . . .     | 20,0 |
| D. tal. dos. Nr. VI              |         | D. S. 3mal täglich 1 Messerspitze in |      |
| D. S. 3 Pulver täglich.          |         | Kaffee.                              |      |

Fast alle Fabriken stellen die wohlfeilen Tabletten von Secale her, beispielsweise *Secointabletten, Cornutum-Ergoticum-Bombelon-Tabletten, Secamintabletten, Secacornintabletten* à 0,25 g (2 bis 4 Tabletten im Tage). PEHAM verordnete gerne Secalepillen nach folgender Zusammensetzung:

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 21. Pulv. et extract. Secal.         |        |
| cornut. . . . .                      | aa 3,0 |
| Pulv. rad. Rhei q. s. ut. f.         |        |
| pil. Nr. XXX                         |        |
| D. S. 3mal täglich 2 Pillen nach den |        |
| Mahlzeiten.                          |        |

Sie reichen für 5 Tage und werden zweckmäßig über mehrere Menstruationen hindurch wiederholt (die Pillen sind jedesmal frisch machen zu lassen). Ebenso zu empfehlen (auch bei Myomblutungen) ist nach BUCURA:

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 22. Extract. Secal. cornut.          |        |
| Chinin. hydrochlor. . . . .          | aa 1,0 |
| Calc. lact. . . . .                  | 4,0    |
| Ad pil. Nr. XXX                      |        |
| D. S. 2mal 2- bis 3mal 2 Pillen nach |        |
| den Mahlzeiten.                      |        |

(Auch unter dem Namen *Metrostyp* als haltbare Dragees im Handel.)  
Bei empfindlichem Magen macht man vorteilhaft von *Secalezüpfchen* (23)  
oder *Secaleexcludzüpfchen* (1 bis 3 im Tage) Gebrauch

23. Extract. Secal. cornut. .... 0,25  
But. cac. ad ..... 2,0  
M. f. supp. D. tal. supp.  
Nr. VI

S. 1—3 Züpfchen täglich in den Mast-  
darm einführen.

Altbewährt ist das Ergotinklysma nach der SCHAUTASCHEN Vorschrift

24. Ergotin. .... 5,0  
Aqu. dest. .... 35,0  
Acid. salicyl. .... 0,1  
Glycer. .... 10,0

D. S. 1 Kaffeelöffel mit 2 Eßlöffeln  
lauwarmen Wassers täglich nach der  
Stuhlentleerung in den Mastdarm  
einspritzen.

Viel und seit langem bewährt ist die *Hydrastis*. Wenn sie erfolgreich  
wirken soll, muß sie auf längere Sicht gegeben werden. Man fängt zu  
einem bestimmten Zeitpunkt vor der Periode an, gibt sie während der  
Dauer derselben und wiederholt in mehreren Menstruationszyklen die  
Hydrastisdarreichung nach folgender Vorschrift:

25. Extract. Hydrast. Canad.  
fluid. .... 30,0

D. S. 3mal täglich 20 Tropfen nach  
den Mahlzeiten während der Men-  
struation, 8 Tage vor dem Anfang der  
Periode beginnend.

Als guter Ersatz ist das billige, synthetisch hergestellte *Liquidrast* (2- bis  
3mal täglich 20 Tropfen in Zuckerwasser) sehr brauchbar. Andere  
Formen der Hydrastisdarreichung sind:

26. Extract. Hydrast. Can. fluid.  
Tinct. aromat. .... aa 20,0

D. S. 3mal täglich 40 Tropfen.

welche den üblen Geschmack einigermaßen decken. Bei gleichzeitiger  
Stuhlverstopfung kann man verordnen:

27. Extract. Hydrast. Can. fluid. 3,0  
Fol. Senn. pulv. .... 6,0  
M. f. pil. Nr. XXX

D. S. 3mal täglich je 2 Pillen.

In der Zusammensetzung verschiedener Haemostyptica mit und ohne  
Ergotin waren namentlich die älteren Ärzte erfolgreich. Bekannt ist die  
folgende Verschreibung:

28. Ergotin  
 Extract. Hydrast. Can. fluid.  
 Extract. Gossypii herb. spiss.  
 Extract. Hamamelid. virg. fl. aa 10,0  
 D. S. 3mal täglich 20—30 Tropfen.

Diese Verordnung eignet sich ebenso zu längerem Gebrauch wie die folgende:

29. Extract. Gossypii fluid. . . 30,0  
 Extract. Hamamelid. virg. fl. 30,0  
 Extract. Viburni prunifol.  
 ad ..... 100,0  
 M. D. S. 3mal täglich 1 Teelöffel.

welche durch den Zusatz von Viburnum gegen die Krampfbereitschaft des Uterus wirkt. Für längeren Gebrauch und stärkere Blutungen eignen sich auch folgende Pillen:

30. Extract. Hydrast. fluid. .... 5,0  
 Extract. Secal. cornut. .... 3,0  
 M. pil. qu. s. ut. f. pil. Nr. L  
 D. S. 3mal täglich 2 Pillen.

Bei der verstärkten Regelblutung ließ PEHAM die von seinem Lehrer CHROBAK übernommene altbewährte Brennesseltinktur durch mindestens 6 Wochen nach folgender Vorschrift geben:

31. Tinct. urtic. dioic. .... 50,0  
 D. S. 3mal täglich 20 Tropfen nach  
 den Mahlzeiten.

Bei nicht abundanter, aber immerhin zu starker Regelblutung kann man es mit den Extrakten des Hirtentäschelkrautes (*Capsella bursae pastoris*) versuchen. Man verordnet etwa: *Stypticin* à 0,05 g (3- bis 4mal täglich 2 Tabletten), *Styptural liq.* (3- bis 4mal täglich 30 bis 40 Tropfen), *Styptisatum* (Dialysat) (3mal täglich 20 bis 25 Tropfen, auch in Tabletten). Längerer Gebrauch dieser Mittel ist um so eher angezeigt, als ihre Wirkung vielfach unsicher ist. Erfolge werden ferner berichtet von

32. Styptol. pulveris. .... 1,0  
 Syr. Cinnamomi ..... 50,0  
 Aq. foenicul. ad ..... 100,0  
 D. S. 3mal täglich 2 Teelöffel.

oder *Styptol* (3mal täglich 2 Tabletten unzerkaut), welche Cotarnin ebenso wie die *Styptogentabletten* (3mal täglich 1 bis 3 Tabletten) enthalten. Dieses kann auch als *Cotarnin* in Pulvern, Tabletten zu 0,05 g 4- bis 6mal täglich verordnet werden. Beim Versagen anderer Mittel bewährt sich auch das *Tenosin* (3mal täglich 15 bis 20 Tropfen bzw. 3mal 1 Tablette à 0,1). Während das Tenosin synthetisch gewonnene Bestandteile der Mutterkorndroge enthält, hat das gleichfalls synthetisch gewonnene

Gravitol ohne diese Bestandteile ebenfalls eine secaleartige Wirkung. Man verordnet 4 *Gravitoltabletten* à 0,02 g im Tage.

Eine ganz wesentliche Bereicherung unseres Arzneischatzes bei Uterusblutungen stellt das *Gynergen* (weinsaures Ergotamin) dar. Sein Hauptvorteil ist seine anhaltende Wirkung, wodurch es anderen Stypticis überlegen ist. Andererseits aber muß man über den Erfolgen mit diesem Mittel immer im Auge behalten, daß es kein ganz gleichgültiges Präparat ist. Einzelne nachteilige Erfahrungen, die in der Geburtshilfe bei Überschreitung der mittleren Dosis gesammelt wurden, sollen auch in der gynäkologischen Therapie nicht außer acht gelassen werden. Gibt man von den *Gynergen-Tabletten* à 1,0 mg nicht mehr als 3 Tabletten täglich oder vielleicht noch besser bloß zwei und von der 1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>igen Lösung höchstens 3mal täglich 10 Tropfen und läßt man nach dreitägiger Darreichung überdies einen Tag pausieren, wird man nur Ausgezeichnetes, nie aber Nebenwirkungen sehen. Besonders beachtenswert ist die Wirkung des Gynergens bei basedowkranken Frauen, über die wir namentlich durch PORGES und ADLERSBERG Näheres wissen. In diesem Zusammenhang interessiert uns die Beseitigung verstärkter Regeln und die Überführung derselben in normale Grenzen bei basedowkranken Frauen. Sie gelingt durch das Gynergen in ganz ausgezeichneter Weise, daneben übt das Mittel einen beträchtlichen Effekt auf die Grundkrankheit selbst infolge der lähmenden Wirkung auf den Sympatikus aus. Merkwürdig ist, daß es in diesen Fällen in weit größeren Dosen auch durch längere Zeit klaglos vertragen wird.

Mit den genannten Präparaten wird man bei verstärkter Regelblutung in der Mehrzahl der Fälle schon durch Verabreichung per os das Auslangen finden. Die parenterale Zufuhr der Haemostyptica einschließlich der Hypophysenpräparate ist bei verstärkter Regelblutung nur ausnahmsweise notwendig. Ihr Hauptanwendungsgebiet sind die unregelmäßigen Uterusblutungen, bei deren Besprechung auch das übrige Rüstzeug zur Bekämpfung derselben (S. 49ff.) angegeben ist.

#### Richtlinien der ätiologischen Therapie.

Über dieser symptomatischen Blutstillung, über die man, mag man sich über die Ursache der verstärkten Regelblutung auch klar sein, so und so oft nicht hinwegkommt, besonders im Beginne der Behandlung, darf man die Grundzüge der Allgemeinbehandlung nicht vernachlässigen.

Wo eine Entzündung der Adnexa als Ursache der verstärkten Regelblutung aufzufinden ist, wird man bei noch nicht lange zurückliegender Entzündung auf Betruhe gerade während der Periode dringen und eines der obengenannten Styptica verabreichen müssen. Die Verstärkung der Regel, welche auch nach Besserung der Entzündungserscheinungen noch längere Zeit anhalten kann oder sogar dauernd fortbesteht, wird glücklich durch Badekuren, wie sie im Kapitel der Entzündungen erwähnt sind, mit beeinflußt.

Bei den Myomträgerinnen wird man einer beträchtliche Zeit verstärkten Regel nicht zu lange untätig zusehen und die symptomatische

Therapie nur in Fällen strenger Kontraindikation zur Operation und Nichteignung zur Strahlenbehandlung vorübergehend treiben, im übrigen aber das Myom bzw. den Uterus entfernen oder die Frau durch Röntgen kastrieren, um der den Körper schwächenden starken Regel Herr zu werden. In leichteren Fällen und bei kleineren Myomen wird man aber eine Abschwächung der Menorrhagien durch Solbadekuren in den genannten Bädern oder im Hause durch Solsitzbäder erzielen, deren Verabreichungsweise S. 118 näher angeführt ist, ebenso durch warme Seebäder in der Wanne. Dagegen sind Moorpackungen bei Myomen nicht angezeigt. Bettruhe, besonders in den ersten Tagen der Menses ist notwendig. Eine Feststellung des Hämoglobingehaltes wird vor übertrieben langem Zuwarten zu schützen wissen. Eisenpräparate, die so gern verordnet werden, können eher einen Circulus vitiosus schaffen, denn die Anämie bessern.

Allgemeine Maßnahmen zur Herabminderung einer besonders starken Regelblutung sind in Fällen fettleibiger Frauen mit Neigung zu venösen Stasen erfolgreich, besonders durch hydrotherapeutische Maßnahmen, entsprechende Diät und durch Ableitung auf den Darm. Regelmäßiger Gebrauch kühler Sitzbäder (Temperatur von 20° C) in der Dauer von 10 Minuten zwischen den Perioden und nachfolgender sofortiger Bettruhe, Ganzwaschungen, Güsse, besonders der Fuß- und Kniegüß (S. 17), Fächerduschen auf den Unterleib, das Gesäß und die Genitalgegend sowie die Innenseite der Oberschenkel können durch Änderung der Blutverteilung Gutes leisten. Voraussetzung ist, daß die Patientinnen nicht durch Blutungen zu sehr geschwächt sind, in welchen Fällen solche Maßnahmen mehr schaden als nützen, und daß bereits einige Tage vor der zu erwartenden Periode mit den Wasserprozeduren aufgehört wird. Auch tägliche Abwaschungen mit Wasser von 20° C helfen in dieser Hinsicht. Eine nicht übertriebene körperliche Betätigung, morgendliche Gymnastik und nicht anstrengende Sportausübung, leisten ebenfalls Gutes. Die Ableitung auf den Darm ist am besten durch die salinischen Abführmittel (Glaubersalz, natürliches und künstliches Karlsbadersalz) zu erzielen (s. S. 255).

Wo die Hyperämie in abwegiger sexueller Betätigung, besonders im Coitus interruptus begründet liegt, wird nur der freiwillige Verzicht darauf die verstärkte Regelblutung mildern, wozu vorteilhafterweise noch außerdem Solsitzbäder verordnet werden können.

Die abnorm starke Regelblutung bei retroflektiertem und deszenziertem Uterus wird am besten durch suspendierende Operationsmethoden — wir denken in erster Linie an die Methode von DOLERIS — mit Erfolg auf ein Normalmaß zurückgeführt. Eine gleichzeitige Beseitigung der Senkung der Scheidenwände durch entsprechende plastische Operation, welche in derselben Sitzung der Suspension des Uterus per laparotomiam vorausgeht, stellt auch im Bereiche des Genitales normale Verhältnisse wieder her. Wird die Laparotomie vom Pfannenstielschen Querschnitt aus gemacht, so vermeidet man eine entstellende Narbe und stört die Festigkeit der Bauchdecken nicht. Ist aber die Frau nahe dem

50. Jahr und besteht ein retroflektierter Uterus bei gleichzeitig abnorm starker Regelblutung, hört man überdies Klagen über Kreuzschmerzen, dann stellt die vaginale Totalexstirpation des Uterus mit Wiederherstellung einer schlußfähigen Scheide wohl das vorzuziehende Verfahren dar.

Aber auch bei Normallage der Gebärmutter und besonders starker Regelblutung infolge funktioneller Muskelschwäche kommt eine vaginale Entfernung derselben bei Frauen, die bereits Kinder haben, aber gleichzeitig für die Röntgenbestrahlung noch zu jung sind, sehr wohl in Frage. Zu ihr wird man sich um so leichter entschließen, wenn noch andere Zustände, etwa ein Ektropium der Muttermundlippen, tiefreichende Cervixrisse, immer wiederkehrende Erosionen, die Entfernung des Uterus um so wünschenswerter erscheinen lassen. Nur ganz ausnahmsweise wird es vorkommen, daß man bei Frauen vor dem 40. Lebensjahr eine enorm starke, aber regelmäßige Blutung auf dem Wege der supravaginalen Amputation des Uterus wird stillen müssen. In solchen seltenen Fällen käme die hohe supravaginale Amputation in Frage, die so mancher Frau das Gefühl der Minderwertigkeit erspart, weil doch regelmäßig von der zurückgelassenen schmalen Schleimhautzone einige Tropfen Menstrualblutes abgesondert werden. Über die Keilresektion des Uterus, wie sie von HENKEL und ASCHNER für derartige Fälle und für solche von hochgradigen Metrorrhagien vorgeschlagen wird, mangeln Verfasser eigene Erfahrungen, doch scheint es, daß man ohne sie durchwegs das Auslangen finden kann.

#### Lokalbehandlung.

Von den lokalen, weniger eingreifenden Maßnahmen sei als recht brauchbar auch zur Beseitigung schwererer Menorrhagien die öfter wiederholte Skarifikation der Portio in Form seichter radiärer Einschnitte um den Muttermund erwähnt, nach welcher man einen Jodoformgazetampon für 6 bis 12 Stunden vor die Portio legt. Dagegen ist die Abrasio mucosae, die bei starker Regelblutung oft geradezu automatisch angewendet wird, eigentlich ätiologisch fehl am Platze, denn es blutet nicht aus der Schleimhaut, die ja durch den Menstruationsprozeß bis auf die Basalis niedergebrochen ist, sondern aus den Gefäßen. Darum ist sie, wie R. SCHRÖDER mit Recht betont, bei regelmäßiger, aber verstärkter Regelblutung nicht angezeigt. Freilich läßt sich in praxi eine Endometritis, die so und so oft die Ursache einer verstärkten Menstruation, namentlich im Anschluß an einen Abort ist, nicht immer ausschließen. In solchen Fällen kann eine Abrasio mit nachfolgender Ätzbehandlung des Cavum uteri mit 4- bis 10%iger Formalinlösung nach Eröffnung des Cavum uteri bis Hegar 10 oder mit 10%iger Tinctura jodi Gutes stiften, bei älteren Frauen überdies auch dem Arzt die Beruhigung verschaffen, daß eine maligne Entartung der Corpusschleimhaut nicht vorliegt. Ein solches Kürettement wird dann bei den wechsellahnen Frauen bedenkenlos die Kastrationsbestrahlung anzuschließen gestatten, die nach dem 45. Lebensjahr das sicherste und einfachste Verfahren zur Beseitigung der Regelblutung darstellt.

Beruhet die abnorm starke Regelblutung nur auf einem hypoplastischen Genitale, so kann die Abrasio nach vergeblicher Allgemein- und Hormonbehandlung zwar nicht im Sinne der Entfernung einer krankhaften Schleimhaut, wohl aber in dem einer Reiztherapie der Ovarialtätigkeit überhaupt aufgefaßt und ausgeführt werden.

Zusammenfassend kann man demnach sagen, daß die größere Mehrzahl der Fälle verstärkter Regelblutung durch anatomisch faßbare Krankheiten, Entzündungen, Myome, abnorme Lagen und Unterentwicklung des Genitales bedingt und demnach von der Behandlungsfähigkeit dieser Krankheiten prognostisch abhängig ist. Für die älteren Frauen wird, ebenso für vereinzelte Fälle abnorm starker Regelblutung bei jugendlichen Individuen eine funktionelle Muskelschwäche meist erfolgreich symptomatisch behandelt werden können. Auch jenen Fällen von zu starker Regelblutung, die auf abnormer Blutverteilung infolge ungesunder Lebensweise beruhen, kann man durch die angeführten Maßnahmen gut beikommen. Demnach stellt die Behandlung der zu starken Regelblutung nach obigen Gesichtspunkten kein undankbares Feld der Betätigung dar.

#### 4. Dysmenorrhoe.

Von Dysmenorrhoe soll man erst dann sprechen, wenn die Periode so schmerzhaft ist, daß die Berufs- oder gar die Tätigkeit im Hauswesen ernstlich leidet. In solchen Fällen leiten heftige, krampfartige, wehenähnliche Schmerzen die Menstruation ein. Überdies können gleichzeitig unerträgliche Kopfschmerzen von der Art der Migräne, Schwindel und Übeligkeiten bestehen, welche sich gelegentlich bis zum Erbrechen steigern. Leider ist die Dysmenorrhoe nicht selten. Die Angaben über ihre Häufigkeit schwanken je nach der Einschätzung des Maßes der Beschwerden. Legt man der Beurteilung die genannten beträchtlichen Schmerzzustände zugrunde, so dürfte die Zahl der an ausgesprochener Dysmenorrhoe Leidenden mit 5 bis 10% anzugeben sein; dabei sieht man in der Sprechstunde dysmenorrhöische Zustände häufiger, als im Ambulatorium der Anstalten.

##### Ursachen der Dysmenorrhöebereitschaft und ihre Behandlung.

So schwierig es ist, die Ursachen der Dysmenorrhoe im Einzelfalle ausfindig zu machen, man muß sich doch darum nach Kräften bemühen, sonst bleibt die Behandlung für Arzt und Patientin unbefriedigend. Wie allbekannt, sind die Ursachen mannigfaltig. Man hat sie in der verschiedensten Weise gruppiert. Zweckmäßig scheint es, von dem Gesichtspunkte der Behandlung aus die Fälle zunächst in solche zu trennen, in denen die Dysmenorrhoe nur Ausdruck einer abwegigen Körperveranlagung, somit ein Genitalsymptom einer abnormen Persönlichkeit ist und in solche, in denen rein örtliche Krankheiten, wie Entzündungen und Geschwülste, Lageabweichungen und Mißbildungen des Genitales die schmerzhaftige Regel verursachen.

In den Fällen von Dysmenorrhoe auf dem Boden abwegiger Konsti-

tution pflegt mit dem schmerzhaften Einsetzen des Zyklus überhaupt dieser Zustand sich auch in der Folgezeit nicht zu ändern, weshalb gerade für diese Gruppe der Ausdruck der primären Dysmenorrhoe der Autoren vielfach Berechtigung hat. Die hypoplastischen Individuen sind in einem hohen Prozentsatz (nach MAX HIRSCH bis 60%) an der primären Dysmenorrhoe beteiligt. Sie zeigen oft die spitzwinkelige Anteflexion des Uterus und das Mißverhältnis zwischen langem Kollum und kurzem Korpus, überdies nicht selten mit Retroposition des ganzen Uterus. Auch wenn die Portio nicht konisch zugespitzt und verlängert ist, sondern auch dann, wenn sie einen ganz flachen Knopf darstellt, sieht man oft Dysmenorrhoe. Trotzdem kann einem langen und engen Cervikalkanal ebenso wie einem spitzen Knickungswinkel eine Bedeutung für die schmerzhafteste Gestaltung der Regel nicht abgesprochen werden, um so weniger, als sich mit diesen Zuständen auch eine mangelhafte Muskelkraft der unnachgiebigen Gebärmutter zufolge des besonders festen, dichten Bindegewebes verbindet, welche den Genitalorganen keine große Verschieblichkeit gestattet (MAX HIRSCH). Dabei steht der Uterus vielfach unter dem Einflusse eines keimschwachen Ovariums, dessen vegetative Funktion, die richtige Durchströmung des Uterus, eine ungenügende ist (ovarialsuffiziente Dysmenorrhoe, R. SCHRÖDER). Bei dieser Sachlage kann die örtliche Behandlung wenig, mehr die Allgemeinbehandlung leisten, welche die abwegige Konstitution zu beeinflussen trachtet. Hier ist eine oft grundlegende Änderung der Lebensweise notwendig. Eine vernünftige gesunde Lebensführung mit Aufenthalt in frischer Luft, Spaziergängen, eine nahrhafte und bekömmliche Hausmannskost tun hier oft Wunder. Diese Vorsorgen helfen mehr als Arzneien oder Bettruhe, welche eher bei hypoplastischen Frauen das Leiden vertiefen, zumal als sie auch seelisch die schmerzhafteste Regel im Bewußtsein verankern. Wenn die Verhältnisse es erlauben, ist rhythmische Gymnastik, leichter Sport, besonders das Schwimmen, künstliche Höhensonne und die tägliche Anwendung von Teil- oder Ganzabreibungen sehr empfehlenswert. In Fällen von Unterernährung ist eine Zunahme des Körpergewichtes zu erstreben, auch Nährpräparate können vorteilhaft sein (S. 211). Das gilt besonders für jene Asthenikerinnen, bei denen eine Ptose besteht, die freilich auch einer operativen Korrektur durch Wiederherstellung des Beckenbodens, Gymnastik und Stützieder (S. 211 ff.) bedarf. Nach der Einführung der ausgewerteten Hormonpräparate des Ovariums hat man sich bei Dysmenorrhoe infolge Hypoplasie der Eierstockstherapie zugewendet. Bei streng objektiver Kritik aber muß man wohl sagen, daß die Erfolge auch in Fällen ausgesprochener Hypoplasie und Dysmenorrhoe keineswegs immer befriedigend sind. Trotzdem wird man es dort, wo die Mittel es erlauben, mit dieser Art der Behandlung wohl versuchen; es können die bei der Amenorrhoe genannten Hormonpräparate auch hier sinngemäß Anwendung finden, allenfalls in Verbindung mit Eisen und Arsen, welches ebenfalls an dieser Stelle genannt ist (S. 12 ff.). Wer es sich leisten kann, wird von Aufhalten in Badeorten, besonders in den Moorbädern vielfach Gutes erleben (Franzensbad,

Tatzmannsdorf, Pyrmont), aber auch in den Solbädern Hall i. Tirol, Ischl, Aussee, Kreuznach, Münster a. Stein u. a. (S. 118ff.). Dort, wo die Anämie im Vordergrund steht, wird man Arsenquellen bevorzugen (Dürkheim, Levico, Rocegnò). Als Ersatz dient im Hause eine Trinkkur mit diesen Wässern. Nicht vergessen darf man, daß die Dysmenorrhoe der hypoplastischen Individuen schon deswegen kein Dauerzustand sein muß, weil Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, ja schon ein Abortus nach wenigen Monaten Schwangerschaftsdauer den Uterus in seine normale Größe und in sein richtiges Verhältniß zwischen Bindegewebe und Muskulatur hineinwachsen lassen. Darum ist auch schon ein Abortus, wie er ja bei der Hypoplastika nicht selten spontan eintritt, noch mehr aber eine Geburt, ein zuverlässiges Heilmittel dieser Art der Dysmenorrhoe. Freilich warten wir bei diesen Frauen leider oft vergebens auf die Schwangerschaft, stellen sie doch ein großes Kontingent der Unfruchtbaren dar.

Schwierigkeiten in der Erkennung, noch größere aber in der Behandlung, sind in jenen Fällen von Dysmenorrhoe zu gewärtigen, die seelisch verankert sind. Im übrigen haben diese Fälle fast immer gleichzeitig eine faßbare Grundlage in der asthenischen Konstitution, mag sie sich nun einmal mehr als Hypoplasie, das andere Mal als Spasmophilie oder als angeborene Schwäche des vegetativen Nervensystems im Sinne der Neurasthenie äußern. Die Bilder überschneiden sich nicht selten, so daß es schwer hält, diese Fälle in die genannten Gruppen scharf einzuordnen und mit Zahlen zu belegen. Bei den asthenischen Frauen ist die Vagotonie mit ihren mannigfaltigen Symptomen im Bereiche des Magen-darmtraktes, Herz-Gefäßsystems und Genitales eine häufige Erscheinung, welche sich zur Zeit der Periode und vor derselben zu erhöhen pflegt. SCHRÖDER weist mit Recht darauf hin, daß abwegiges Verhalten der Vasomotoren und dadurch eine abnorme Blutfülle im Genitale gleichlaufend geht mit örtlichen Spasmen des Uterus, der ja ebenfalls vom vegetativen Nervensystem und erst auf dem Umweg über dieses vom Gehirn beherrscht wird. Besonders die Fälle von Dysmenorrhoe, welche durch gleichzeitige Anfälle von Migräne gekennzeichnet sind, weisen auf die allgemeine Bereitschaft zu Krämpfen hin. Gelingt es, der Spasmophilie durch gute Lebensbedingungen, gesunde Kost, warme bis heiße Bäder im Verein mit der Elektrotherapie beizukommen, so leistet man dadurch mehr als durch Arzneimittel, von denen an dieser Stelle nur der Kalk, der die Übererregbarkeit des Nervensystems herabsetzt, und das Atropin gebührend hervorgehoben sei (s. S. 39ff.).

Neurasthenische Mädchen, die gelernt haben, sich genau zu beobachten, die von der Mutter oder Schwester her alle 4 Wochen die schier unerträgliche Belastung durch den Menstrualschmerz kennen, verfallen auch leicht in dasselbe Übel. Manchmal stecken dahinter die mannigfaltigsten, ohne weiteres durchaus nicht ersichtlichen Ursachen. WALTHARD, AUGUST MAYER u. a. haben uns treffende Beispiele für die verschiedensten Beweggründe einer seelisch bedingten Dysmenorrhoe geliefert. Während die erste Periode bei ganz unaufgeklärten Mädchen ein

Schreckerlebnis sein und darum als unästhetisch und ekelhaft abgewiesen und von Schmerzäußerungen begleitet wird, ist die Dysmenorrhoe in anderen Fällen wieder, wie erwähnt, durch Beeinflussung von der Umgebung heraufbeschworen. Sekundäre Dysmenorrhoeen sind in einzelnen Fällen als Ausflucht vor dem unerwünschten Schulzwang, vor Bevormundung durch die Eltern oder unangenehme Dienstgeber aufzufassen; manchmal wird der Anfall von gewissenstrengen Mädchen als verdiente Strafe für vorangegangene Masturbation oder Geschlechtsverkehr geradezu erwartet und auch hingenommen. Wichtig sind für den Angelpunkt der Therapie Fälle von Dysmenorrhoe verheirateter Frauen, die bei vollkommen normalem Genitalbefund aus zunächst unerklärlichen Gründen gleichsam angefliegen kommen. Manchmal steckt der vom Manne erzwungene Verzicht auf ein Kind dahinter, der von der Frau so tief empfunden wird, daß ihr das Erlebnis der Menstruation immer von neuem diesen Verzicht schmerzlich einprägt. Es würde zu weit führen, im einzelnen die mannigfaltigen seelischen Beweggründe dieser dysmenorrhoeischen Beschwerden aufzuzeigen. Sie werden um so verständlicher, wenn man hinzufügt, daß zu diesen seelischen Triebfedern noch neben den erwähnten dauernden Zuständen abwegiger Körperverfassung auch vorübergehende Schäden und Krankheiten hinzukommen, wie Unterernährung, Lungenspitzenkatarrh, Erschöpfung nach Infektionskrankheiten und Blutverlusten, harte Berufstätigkeit, besonders Nacharbeit, Mangel an frischer Luft u. ä. Wenn sehr gern zugegeben wird, daß die Zahl der Frauen, welche an einer Dysmenorrhoe auf dem Boden seelischer Veranlagung leiden, nicht gering ist, so soll man sie nicht überschätzen und demnach auch die Therapie nicht allein darauf einrichten. Wo seelische Wurzeln das Zustandsbild bedingen, ist allerdings, wie WALTHARD, A. MAYER, FLATAU, NOVAK u. HARNIK u. a. gezeigt haben, die Behandlung von diesem Punkte aus die beste. Die echte Psychoanalyse lehnen wir aber ab. Die Bloßlegung der seelischen Ursachen im Zwiegespräch mit besonders liebevollem, wirklich interessierten Eingehen auch auf kleine Einzelheiten tut im Verein mit der Feststellung gesunder Genitalorgane unter besonderer Betonung dieser Tatsache der Patientin gegenüber das ihre. Es genügt also die Psychoanamnese und die Persuasion, kurz das, was das Wesen des guten Arztes, der für seine Patientin Zeit hat, ausmacht und was so vielfach den Hausarzt zur Behandlung derartiger Zustände unvergleichlich tauglicher machte, als den vielbeschäftigten spezialistischen Techniker. Trotzdem ist es gut, die Therapie nicht auf die einzige Karte der seelischen Behandlung zu setzen, sondern auch weitere Maßnahmen zu verordnen, die im übrigen beim Hineinspielen körperlicher Momente in die seelische Bereitschaft durchaus begründet sind. Ein Medikament, und sei es auch in seiner Wirkung durchaus unsicher, verbunden mit einem energischen Zuspruch zu vernünftiger Lebensweise, vermag den Glauben dieser leicht beeinflussbaren Wesen, wie solche neurasthenische Dysmenorrhoeikerinnen sind, an die Unfehlbarkeit dieser Maßnahmen so zu heben, daß die Anfälle wegbleiben. Ärztliche Polypragmasie, insbesondere mechanisch-chirurg-

gische Behandlungsmethoden stiften jedenfalls in solchen Fällen nur Schaden.

Etwas leichter mit der Therapie hat man es bei den Dysmenorrhoeen auf der Grundlage entzündlicher Genitalveränderungen. Sie machen über 30 v. H. der Dysmenorrhoeefälle aus. Findet man bei der Untersuchung entzündliche Veränderungen an den Adnexen, Zeichen älterer oder frischerer Pelveoperitonitis, parametrane Schwarten und Schwielen oder gar große Adnextumoren, gelegentlich auch das Bild der Parametritis posterior, häufig verbunden mit einer übel aussehenden Erosion, so hat man die Ursache für die Regelschmerzen festgestellt. Bei seiner Muskeltätigkeit während der Periode ist der Uterus Schwankungen in seinem Volumen unterworfen, welche sich als schmerzhafter Zug an ihm und an seiner Umgebung bei krankhaften Prozessen daselbst äußern, wenngleich von weniger empfindlichen Frauen auch bedeutende Adhäsionen nicht immer so schmerzhaft während der Regel empfunden werden. Die durch die menstruelle Blutüberfüllung bedingte Spannungserhöhung in den Eileitern und im Ovarium vermehrt den Zug an etwa bestehenden Adhäsionen, welche übrigens auch auf den Darm, besonders das Sigmoid oder die Appendix übergreifend, so zu ganz typischer, schmerzhafter Mitbeteiligung des Darmes während der Periode führen können. Auch die Blase kann betroffen werden; ebenso kann eine versteckte chronische Appendizitis zum dysmenorrhoeischen Anfall führen. Die Therapie dieser entzündlichen Dysmenorrhoe steht und fällt mit der Besserung, bzw. Ausheilung des Leidens. Was im allgemeinen über die Behandlung der Entzündungen ausgeführt wird (siehe diese), gilt hier als Grundlage der Therapie der Dysmenorrhoe entzündlichen Ursprunges. Freilich ist man gerade bei diesen Formen der Dysmenorrhoe um so mehr zur symptomatischen Behandlung gezwungen, je frischer die Entzündung ist.

Gelegentlich sind es auch narbige Verengerungen des inneren Muttermundes nach schlecht verheilten Muttermunddiszissionen sub partu, nach gewaltsamen Einrissen bei künstlichen Aborten, die nach ungenügender Erweiterung des Halskanals mit scharfer Cürette erledigt wurden, hin und wieder Verätzungsfolgen nach zu energischer Behandlung eines Zervikalkatarrhs u. ä., welche zu Dysmenorrhoe Veranlassung geben. Hier müssen mechanische Behandlungsverfahren (siehe weiter unten) Platz greifen, soll der Zustand dauernd behoben werden.

Weitere organische Ursachen einer Dysmenorrhoe sind, wenn auch nicht häufig, in Myomen der Gebärmutter gelegen, die sich abzustielen beginnen und heftigen Wehenschmerz während der Periode erzeugen. Manchmal kann man durch die Untersuchung zu dieser Zeit die Ursache der Dysmenorrhoe in einem submukösen, gegen den geöffneten Muttermund vordringenden Myom feststellen, während nach der Periode der Befund unklar ist, weil der Muttermund sich wieder geschlossen hat. Hier ist die einzige Therapie die Aufschließung des Cavum uteri und die Entfernung des polypösen Myoms, wodurch mit einem Schlage diese heftigen, oft übrigens auch von schwerster Blutung begleiteten Schmerzanfälle schwinden.

Nicht abzuleugnen ist die Tatsache, daß nicht bloß fixierte, sondern auch mobile Rückwärtslagerungen der Gebärmutter aus rein mechanischen Gründen den Abfluß des Menstrualblutes erschweren und durch Blutstauung zu Schmerzen Veranlassung geben können. In diesen Fällen ist es die Aufrichtung der Gebärmutter und die Erhaltung derselben in der Normallage, welche den Zustand beseitigen kann. Sie wird besser nicht durch Pessarien, sondern durch operative Suspension des Uterus erzielt, gar dann, wenn es sich um ein hypoplastisches, spitzwinkelig antevvertiertes, in toto rekliniertes Organ handelt. Aber auch bei der einfachen Retroflexion eines normalen Uterus wird die operative Aufrichtung, besonders wenn auch die Regel, wie so häufig, verstärkt ist oder gar dumpfe Kreuzschmerzen bestehen, empfehlenswert sein. Dabei scheint die Ligamentverkürzung etwa nach der Art von *DOLERIS* fast sicher vor jedweden Rezidiven zu schützen.

Selten ist ein rudimentäres Uterushorn im Verein mit einer Hämato-salpinx Ursache der Dysmenorrhoe, nach dessen Abtragung die Regel schmerzfrei wird.

### Symptomatische Behandlung.

#### Allgemeine und medikamentöse Maßnahmen.

Oft genug bleibt es leider nur bei einer symptomatischen Therapie des dysmenorrhoeischen Anfalles. Ist in Fällen einer echten Neurose und einigermaßen erträglicher Beschwerden die Ablenkung vom Körperlichen durch Fortführen der Berufsarbeit eher von Vorteil, gar dann, wenn die Schmerzen durch leichtere, gleich zu besprechende Arzneimittel gemildert werden, so ist selbstverständlich in Fällen von Dysmenorrhoe auf entzündlicher Grundlage gerade das Gegenteil notwendig. Hier muß Betruhe eingehalten werden und jene Maßnahmen, welche auch in entzündlichen Fällen die Schmerzen zu beheben geeignet sind, greifen auch hier Platz. Vor allem ist es die Wärme, die als feuchte oder trockene Wärme, je nach Gewohnheit verordnet, immer schmerzlindernd empfunden wird. Bei Anwendung feuchter Wärme ist ein Wechsel des Umschlages nach vier Stunden und Abreiben des feuchten Bauches mit einem Frottier-tuch angezeigt. (Ein Kissen unter die Knie zwecks Entspannung der Bauchdecken wird schmerzlindernd empfunden.) Sehr empfehlenswert ist regelmäßige Anwendung des Heizbügels. Ein bis zwei Tassen heißen *Pfefferminztees* (*Herba menthae piperitae*), *Fliedertees* oder *Kamille* (ein gehäufter Teelöffel auf eine Tasse) sind gute alte Hausmittel. Wenn auch die Wirkungsweise so mancher Teesorten, die gelegentlich entschieden die Schmerzen für längere Zeit beeinflussen, unerforscht ist, so sieht man doch bei längerem Gebrauch von *Amasiratee* (aus *Alchem. vulg.*, *Foenic. capill.*, *Hb. Millef.*, *Aquil. vulg.*, *Paeon. off.*, *Ocim. basil.*, *Rad. Sars. hond.*, *Rhiz. Rhei* bestehend) gelegentlich Gutes. Zwei Tassen (1 Eß-löffel auf  $\frac{1}{4}$  Liter Wasser) täglich warm getrunken, werden für 4 bis 6 Wochen mindestens empfohlen, allerdings öfters wegen des widerlichen Geschmacks desselben abgelehnt. Auch ein aus *Radix Gossypii* durch  $\frac{1}{2}$ stündliches Kochen von einem gehäuften Teelöffel auf 1 Tasse Wasser

bereiteter Tee wird von LOMER als sehr wirksam angegeben, wenn er einige Tage vor der Periode und durch dieselbe hindurch 3mal täglich getrunken wird. Als gut wirksam gelten auch seit alters her lauwarme Sitzbäder in der Temperatur von 35 bis 36° C und warme von 36 bis 38° C. Sie wirken krampflösend und beruhigend auf das Nervensystem und bewirken bei hoher Temperatur eine vermehrte Durchblutung der Genitalorgane. Mit beiden sei man vorsichtig, gar in Fällen, in denen entzündliche Zustände nicht ausgeschlossen werden können. Die Möglichkeit, daß es bei dem während der Periode offenen Zervikalkanal zu einer Aszension von Keimen nach einem Sitzbad kommt, ist durchaus gegeben, besonders wenn, wie so oft, eine Erkältung nach dem Sitzbad entsteht. Nicht minder wichtig ist es, eine gleichzeitig bestehende Stuhlverhaltung zu beheben. Der gefüllte Darm vermehrt zweifelsohne die dysmenorrhöischen Beschwerden. Neben Einläufen mit Kamillentee ( $\frac{1}{2}$  Liter) und solchen mit Öl (250 g) ist die Ableitung auf den Darm bei gesundem Genitale günstig. 10 g *Natrium sulfuricum* oder 1 Kaffeelöffel künstliches *Karlsbadersalz* in einem Trinkglas (250 g) gelöst und warm, am besten auf nüchternem Magen getrunken, pflegen, ebenso wie ein Weinglas *Bitterwasser* (morgens und abends) rasch zu wirken. Mehrfach hört man Klagen über besonders heftig ziehende Schmerzen während des dysmenorrhöischen Anfalles in der Muskulatur der Oberschenkel, besonders der Adduktorengruppen und im Kreuz. Abreibung der schmerzhaften Partien mit Franzbranntwein, entweder pur oder zur Hälfte mit Wasser verdünnt, hilft ebenso wie Einreibungen mit *Mesotanvaseline* (25%ig).

Hat man mit diesen Maßnahmen schon einiges erreicht, so tun noch Arzneimittel das ihrige, um die Schmerzen abzukürzen oder zu beheben. Geradezu unentbehrlich ist auch heute noch die *Tinctura valerianae*.

33. Tinct. valerian. aether. . . . 30,0

D. S. 3—4mal täglich 20 Tropfen.

deren aufdringlicher Geruch und Geschmack besonders bei Trägerinnen der beschriebenen Seelenverfassung wertvoll ist. Natürlich kann man auch die Fabrikspräparate wie *Valyl*, *Valydol*, *Baldriandispert* oder das außerdem Kampfer enthaltende *Spasmyl* in den leicht zu nehmenden Perlen (3mal täglich 2 bis 4) oder in Form von Suppositorien benützen. Mehrfach bewährt sich auch durch Wochen hindurch täglich vor dem Schlafengehen eine Tasse *Baldriantee*. Bei echten Neurosen versucht man es nach alter Übung mit der widerlich schmeckenden Zusammensetzung von

34. Tinct. Strychni

Tinct. Castor. canad. . . aa 15,0

D. S. 3mal täglich 15—20 Tropfen.

Vielfach muß man schwereres Geschütz auffahren lassen. *Morphin* und *Heroin* darf man wegen der großen Gefahr der Gewöhnung gerade bei solchen Frauen niemals geben, aber auch nicht die Ersatzpräparate, wie *Dicodid*, *Dilaudid*; ebenso sei man mit *Opium* sehr vorsichtig, so verläßlich es in der Dosis von 0,02 bis 0,04 des Extract. opii besonders in

Suppositorien wirkt. Die Zahl der Analgetica, die wir zur Beseitigung des dysmenorrhoeischen Anfalles haben, ist enorm. Täglich wird ein neues Präparat auf den Markt geworfen. Die Mittel der Pharmakopoe genügen aber vollauf. Von ihnen seien erwähnt das einfache *Pyramidon*, allenfalls seine Ersatzpräparate *Amidopyrin* (Dimopyran) in der Dosis von 0,1 bis 0,3 g, das *Aspirin* (0,5 bis 1,0), das *Codein* (0,03) oder *Antipyryn* (0,5). Die kombinierten Mittel sind vielfach bei stärkerer Wirkung ohne nachteilige Folgen, freilich teurer. Recht gut brauchbar ist

- |  |   |
|--|---|
| <p>35. Acid. acetylosalicyl. . . . . 0,5<br/>Codein. hydrochlor. . . . . 0,03<br/>M. f. pul. D. tal. pulv.<br/>Nr. IV<br/>S. 1—3 Pulver täglich.</p>       | <p>37. Salipyryn. . . . . 0,5<br/>Codein. phosphor. . . . . 0,03<br/>M. f. p. D. tal. pulv. Nr. IV<br/>S. 1 Pulver in Glühwein (Straßmann).</p>                                   |
| <p>36. Acid. acetylosalicyl. . . . . 0,25<br/>Amidopyryn. . . . . 0,1<br/>Codein. phosphor. . . . . 0,02<br/>M. f. p.<br/>D. S. 3mal täglich 1 Pulver.</p> | <p>38. Antipyryn. pulv. . . . . 0,5—1,0<br/>Antipyryn. coffeinocitric. . . . 0,5<br/>D. S. 3mal täglich 1 Pulver (oder in Österreich billiger abgepackt als „Gewatabletten“).</p> |

Hier wird auch auf die Komponente des so häufig den Anfall begleitenden Kopfschmerzes gebührend Rücksicht genommen. Guten Erfolg sieht man auch von *Veramontabletten* à 0,4 (3mal täglich 1 Tablette).

Wo das Erbrechen im Vordergrund steht, sind Mastdarmzäpfchen etwa in folgender Zusammensetzung von Vorteil:

39. Amidopyryn. . . . . 0,25  
Coffein. natriobenz. . . . . 0,1  
But. cac. ad . . . . . 2,0  
M. f. suppos. D. tal. suppos.  
Nr. VI  
S. 1—2 Zäpfchen in den Mastdarm einführen.

Aber auch die *Tinctura pulsatillae* im Verein mit Chloroform wird gerühmt:

40. Tinct. pulsatill. . . . . 7,2  
Spir. chlorof. . . . . 3,6  
Aqu. chlorof. ad . . . . . 168,0  
D. S. 3stündig 1 Teelöffel voll (Burchhart).

Bei Dysmenorrhoe verbunden mit heftiger Migräne hat sich STRASSMANN folgende Rezeptur bewährt:

41. Antipyryn. coffeinocitr. . . . . 0,5  
Extr. Hyoseyam. . . . . 0,04  
Coffein. natriobenz. . . . . 0,1  
But. cac. ad . . . . . 2,0  
M. f. supp. D. tal. supp.  
Nr. IV  
S. 1 Zäpfchen in den Darm beim ersten Anzeichen der Migräne einführen, das zweite nach 12 Stunden.

Allbekannt ist die Wirkung des *Extractum Belladonnae*, den man in verschiedenster Form verordnen kann, beispielsweise:

- |  |  |
|--|--|
| 42. Extract. Belladonn. .... 0,3                     |  |
| Aqu. amygdal. amar. .... 30,0                        |  |
| D. S. 3mal täglich 15 Tropfen.                       |  |
| 43. Extract. Belladonn. .... 0,01                    | 44. Tinct. Opii                              |
| Codein. hydrochlor. .... 0,03                        | Tinct. Belladonn.                            |
| But. cac. ad ..... 2,0                               | Tinct. Hyoscyam.                             |
| M. f. supp. an.                                      | Tinct. Valerian.                             |
| D. tal. supp. Nr. IV                                 | Tinct. Stramonii ..... aa 5,0                |
| S. 2 Zäpfchen bei Schmerz in den Mastdarm einführen. | D. S. Mehrmals täglich 20 Tropfen (Fritsch). |

*Extractum Belladonnae* in Verbindung mit *Extractum Opii* ist zwar hochwirksam, aber schon weniger empfehlenswert, am ehesten bei sekundärer, durch Geschwülste oder akute Entzündung ausgelöster Dysmenorrhoe zu kurzem Gebrauche nach der Formel:

45. Extract. Belladonn.  
    Extract. Opii ..... aa 0,02  
    But. cac. ad ..... 2,0  
    M. f. supp. D. tal. supp.  
    Nr. IV  
S. Zäpfchen.

Weiters kann man Gebrauch machen von

46. Trigemin. .... 0,5  
    Eucain. hydrochlor. .... 0,025  
    But. cac. ad ..... 2,0  
    M. f. supp. D. tal. supp.  
    Nr. IV  
S. 1 Zäpfchen eingefettet in den Mastdarm einführen (Straßmann).

Von den pharmazeutischen Spezialitäten seien nur die aus Phenacetin, Codein, Acetylsalicylsäure bestehenden *Treupelschen Tabletten* à 0,5 oder 1,0 (2 Tabletten im Beginn der Menstruation in einem Abstand von  $\frac{1}{2}$  Stunde) oder die beliebten *Gelonida antineuralgica* (rasch resorbierbare Kombination von Codein, Phenacetin, Acid. acetylosalicyl., 3mal täglich 1 bis 2 Tabletten), ferner das *Neocratin*, *Compral*, à 0,5, *Gardan* à 0,5 (3- bis 4mal täglich 1 Tablette), *Cibalgin* und die *Ditonal-Stuhlzäpfchen* erwähnt.

Da es keinem Zweifel unterliegt, daß durch die Menstruation der Tonus des vegetativen Nervensystems erhöht wird und bei den neurotischen Individuen sich ins Krankhafte in Form spastischer Koliken und Schmerzanfälle steigert, liegt es nahe, *Atropin*, welches stärker wirksam ist als *Belladonna*, zu verwenden. Man gibt es in Pillenform etwa nach folgender Zusammensetzung:

47. Atropin. sulfur. . . . . 0,01  
 Aqu. dest.  
 Glyc. . . . . aa 2,0  
 Pulv. et Extr. Liqu. q. s. u. f.  
 pil. Nr. XX  
 D. S. 3 Pillen täglich.

Zweckmäßig verbindet man Atropin mit *Papaverin* in folgender Zusammensetzung:

48. Atropin. sulfur. . . . . 0,00025  
 Papaverin. hydrochlor. . 0,01  
 Sacch. . . . . 0,2  
 M. f. p. D. tal. dos. Nr. X  
 S. 2—3 Pulver täglich.

oder man bedient sich des nicht selten prompt wirkenden *Novatropins*

49. Novatropin. . . . . 0,0025  
 Sacch. . . . . 0,2  
 M. f. p. D. tal. dos. Nr. X  
 S. 2 Pulver täglich.

bzw. der *Troparin-Fortetabletten* (3mal täglich 1 bis 2 Tabletten), ebenso der *Atropapaverintabletten* (0,00025 g Atropin und 0,01 Papaverin enthaltend) (1 bis 2 Stück pro Tag).

Ebenfalls erschlaffend auf die glatte Muskulatur wirkt das *Oktin* (3mal täglich 20 Tropfen oder 3mal täglich 1 Tablette mit reichlich Wasser nach dem Essen).

Gleichfalls von guter Wirkung, aber durch Beeinflussung der Hemmungsfasern des Nervus hypogastricus und spermaticus dasselbe erzielend wie das Atropin durch seine lähmende Wirkung auf den Nervus pelvicus, ist die von Voer in die Therapie der Dysmenorrhoe eingeführte *Uzara* (3mal täglich 30 Tropfen oder 3 bis 4 Tabletten oder 3 Suppositorien täglich). Ein anderes, gleichfalls aus der Medizin der Urvölker stammendes, nicht selten von Erfolg begleitetes, gelegentlich aber auch im Stich lassendes Mittel ist das *Eumenol* (3mal täglich 1 Teelöffel oder 2 bis 4 Tabletten, am besten 3 Tage vor der Periode damit beginnend und durch dieselbe hindurch fortzusetzen). Nicht vermissen kann man in der Therapie der Dysmenorrhoe die *Hydrastis* (Rp. 25, 26, 27, 29). Sie hebt den Tonus der Muskulatur, so daß der stockende Blutfluß leichter von statten geht. Als krampflösend wirkt seit alters her das *Extractum viburni prunifolii fluidum*:

50. Extract. viburn. prunif.  
 Syrup. simpl. . . . . aa 20,0  
 D. S. 3mal täglich 1 Teelöffel in  
 Wasser, 5 Tage vor der Menstruation  
 beginnen und während der Menstrua-  
 tion weiternehmen.

Der Erfolg der elektiven Beeinflussung des Lendenmarks im Sinne seiner Hyperämisierung, wie er durch das *Yohimbin* geschieht, ist proble-

matisch. Immerhin kann man es mit Yohimbin im Verein mit Antidolorosis etwa nach folgender Zusammensetzung versuchen:

51. Yohimbin. hydrochlor. . . . . 0,005  
 Codein. hydrochlor. . . . . 0,03  
 Sacch. . . . . 0,3  
 M. f. p. D. tal. pulv. Nr. VI  
 S. 1—3 Pulver im Schmerzanfall  
 (unter dem Namen Menolysin auch als  
 Tabletten zu haben).

Die *Metyrintabletten* (3mal täglich 1 bis 2 Tabletten, 2 bis 3 Tage vor und während der Periode) enthalten neben Yohimbin noch Papaverin.

*Ovarial-* und *Hypophysenpräparate* sind nicht für den Anfall, aber wie erwähnt, im Verein mit den geschilderten Allgemeinmaßnahmen für die Umstimmung der Anfallsbereitschaft brauchbar, wenngleich man nur schwer ein verlässliches Urteil darüber fällen kann. Bei hypoplastischen und anämischen Mädchen kann man 3mal täglich 2 *Ovaradentriferrintabletten* oder die standardisierten *Ferrovarialtabletten* verordnen. Der schon besprochenen Übererregbarkeit des vegetativen Nervensystems begegnet man bei Spasmophilen gut mit *Calcium*, welches man am wirksamsten nach HIRSCH intravenös in der Menge von 2 bis 3, später 5 bis 8 ccm als 10%iges Chlorkalzium oder gebrauchsfertig in Ampullen zu 10 ccm als *Afenil* gibt. Auch die perorale Darreichung, welche S. 54 angegeben ist, kann versucht werden.

*Phosphorlebertran* kann ebenfalls erfolgreich sein:

52. Ol. phosphor. . . . . 20,0  
 Ol. Jecoris Aselli ad . . . . . 200,0  
 D. S. 3mal täglich 1 Kaffeelöffel.

Von der Vorstellung ausgehend, daß Anämie und Chlorose nicht selten die Grundlage einer Dysmenorrhoe ohne Befund bilden, hat man auch die Jodverabreichung versucht und berichtet über Erfolge mit Jod-Eiweißpräparaten wie *Jodtropontabletten* à 1 g (3mal täglich 1 Tablette). Es soll durch Erleichterung der Zirkulation in den kleinen Gefäßen und Senkung des arteriellen Druckes die Periode erleichtern (BURCKHARD).

Schließlich verdient die zweifellos feststehende Tatsache der Beeinflussbarkeit so mancher Dysmenorrhoe von der Nase her, die zuerst FLEISS erkannt hat, Betonung. Ihr wird so Gutes nachgerühmt, daß man sie in schweren Fällen immer versuchen kann. Mit dem Nasenspiegel wird ein kleiner Wattebausch, der in 20%ige *Kokainlösung* getaucht ist, fest an die untere Nasenmuschel gedrängt und 5 Minuten liegen gelassen. Wird, wie nicht selten, schlagartig der Schmerz beseitigt, dann überläßt man am besten dem Facharzt die Verätzung der auf die Pinselung ansprechenden Stelle der Nasenmuschel. Dauernde Heilungen sind beobachtet. Andere Ärzte haben dasselbe oder zumindestens ähnliche schlagartige Erfolge mit dem Ausdrücken eines in *Ather* getauchten Wattebausches nach WORMSER an die Nasenmuschel gesehen und ihren Patientinnen beim Schmerzanfall die Wiederholung des Verfahrens eigen-

händig überlassen. In unseren süchtigen Zeiten ist es wohl nicht ganz ohne Bedenken.

Wenn die angeführte Reihe der Arzneimittel keineswegs unseren Schatz an Medikamenten hiermit erschöpft, so zeigt dies nur, daß eben diese Mittel in dem einen Falle glänzend, in dem anderen nur mäßig, in einem dritten vielleicht gar nicht wirken, woraus nur erhellt, daß bei allen Krankheiten, bei denen uns so viele Medikamente zur Verfügung stehen, die Frage der wirksamen Therapie recht oft eine Sache des Zufalles oder Glückes ist. So ist es auch mit der örtlichen Anwendung des *galvanischen Stromes* und mit der *Faradisation*, welche ebenso oft im Stiche lassen, wie sie gelegentlich helfen. Bei der intrauterinen Galvanisation mit einer Stromstärke von 30 bis 50 M. A. durch 15 Minuten liegt der negative Pol im Uterus, der positive auf dem Kreuzbein. Bei Verwendung des faradischen Stromes (zirka 20 Unterbrechungen in der Minute) kommt die Uterussonde (Kathode) in den Uterus, die Anode auf den Muttermund (EBELER). Auch die Diathermie der Hypophyse, welche als Motor der Sexualfunktion auf das Ovarium und damit auf die Dysmenorrhoe günstig wirken soll, ist ein beachtenswerter Behelf, der natürlich auch seine Versager hat. Darum ist es kein Wunder, daß man immer und immer wieder zu rein operativ-technischen Maßnahmen zur Behebung der Dysmenorrhoe greift.

#### Mechanische und chirurgische Verfahren.

Wenn auch die Stenose des Os internum ursächlich an der Dysmenorrhoe nicht Schuld trägt, sondern das straffe, der Menstruationsauflockerung widerstrebende Gewebe des infantilen Uterus, Tatsache ist, daß die vorsichtige, unter allen Maßnahmen der Asepsis durchgeführte Sondierung des Halskanals (Verletzungen mit nachfolgender Infektion kommen immer wieder vor) die nächste Periode schmerzlos bereiten kann, gar dann, wenn dieser kleine Eingriff der Periode unmittelbar vorausgeht. Zuverlässiger scheint eine ebenfalls sehr vorsichtig auszuführende Erweiterung mit Hegarstiften zu sein, der immer nach sorgfältigster Desinfektion eine Sondierung zwecks Ermittlung des Verhaltens des Halskanals vorangehen muß. Sie wird am besten in Narkose gemacht, weil sie schmerzhaft ist, und soll im allgemeinen nicht über Hegarstift 8 bis 10 hinaus ausgedehnt werden, es sei denn, was auch vorkommt, daß in Narkose die Dilatation auch über diese Nummern hinaus auffallend leicht gelingt. Man kann auch einen Laminariastift einlegen, muß aber bedenken, daß Sekretstauung und Temperaturerhöhung, allenfalls sogar eine Infektion (Endometritis, Parametritis) sich anschließen kann, womit nicht nur das ganze Beginnen erfolglos geworden ist, sondern so und so oft auch der Wunsch, mit der Beseitigung der Dysmenorrhoe gleichzeitig die Aussichten auf eine Schwangerschaft zu bessern, unerfüllt bleibt. Die gelochten, 3 bis 6 Tage liegen bleibenden FEHLINGSchen Röhrchen und die BECKH-GÄNSBAUERSchen Glasstifte, welche im Kaliber Hegar 4 bis 6 entsprechen und nach Dilatation mit Hegar bis Nr. 13 im Uterus etwa 8 Tage liegen sollen, ermöglichen einen

anhaltenderen Erfolg. Sind sie schon nicht unbedenklich, wenn auch wirksam, so sind es erst recht Intrauterinstifte, die monatelang liegen bleiben sollen, um dauernd die Dysmenorrhoe zu beseitigen. Sie bieten denn doch zu sehr die Möglichkeit einer durch sie zu vermittelnden Infektion, weshalb sie bei einem Zustand, der, so schmerzvoll er auch sein mag, das Leben in keiner Weise bedroht, abzulehnen sind.

Einiges Aufsehen hat die MENGESche Behandlung jener Formen von Dysmenorrhoe gemacht, die bei Nulliparis mit hypoplastischem kleinen Uterus vorkommen. Der Grundsatz des Verfahrens besteht darin, daß nicht nur der Cervikalkanal, sondern auch die Korpushöhle möglichst ausgiebig und für längere Zeit erweitert wird. Dadurch soll der Hohlmuskel an Fassungsraum gewinnen und damit in kleinem Ausmaß dasselbe nachgeahmt werden, was durch die Schwangerschaft im Großen meist zur Heilung der Dysmenorrhoe führt: Erweiterung der ganzen Uterushöhle bis Hegar 10 unter Verschieben jedes Stiftes bis zum Fundus. Jeder Stift bleibt eine Minute lang liegen. Nun wird der innere Muttermund mit dem von EYMER angegebenen, geschlossen eingeführten, mit gedeckten Schneiden versehenen Metronom an 8 bis 10 Stellen seicht eingeschnitten. Hierauf gelingt es, ohne tiefere Zerreißen des inneren Muttermundes bis Hegar 16 zu dilatieren. Die so erweiterte Gebärmutterhöhle wird nun vollständig mit in Öl getränkter Xerophormgaze fest ausgestopft, die 8 bis 10 Tage liegen bleiben muß, wenn nicht eine beträchtliche Temperaturerhöhung, besonders mit steigendem Puls zur frühzeitiger Entfernung der infolge der Öltränkung schmerzlos ausziehbaren Gaze zwingt. Mit Rücksicht auf die ausgezeichneten Erfahrungen MENGES, welche nach seinem Urteil die Erfolge der Dilatation mit Hegar- und Quellstiften, ebenso wie die der Diszission des äußeren und inneren Muttermundes mit und ohne Abrasio mucosae übertreffen, muß man die MENGESche Behandlung für die genannten Fälle von Dysmenorrhoe wohl erwägen. Sie haben MENGE nur bei besonders übererregbaren Frauen oder bei später erhobenen organischen Veränderungen des Uterus (Myomen) enttäuscht.

Die Abrasio, welche gern mit einer Dilatationsbehandlung verbunden wird, kann durch den Reiz der Abschabung der Schleimhaut auf die Gebärmutter im Sinne des Wachstumsreizes und auf das Ovarium anregend wirken und stellt daher ein recht brauchbares Verfahren dar. Die Dysmenorrhoe bei hyperantevertiertem, vielfach in Retropositionsstellung liegenden kleinen Uterus wird, wie eingangs erwähnt, durch operative Antefixation mit gleichzeitiger Dilatation und Abrasio nach SCHRÖDER in  $\frac{2}{3}$  der Fälle geheilt; damit erhöhen sich auch die Aussichten für eine Befruchtung.

Während MENGE bei seiner Methode das Hauptgewicht auf die Erhöhung des Fassungsraumes des Korpus legt, begnügen sich die mechanischen und chirurgischen Dilatationsmethoden der Zervix mit der Erweiterung bloß dieser. Die einfache Diszission muß nicht mit einem gedeckten Messer gemacht werden, sie läßt sich auch mit einem schmalen Skalpell ausführen, mit dem man vorne, hinten, rechts und links seichte

#### 44 Bedeutung und Behandlung der Verschiebung der Menstruationsphasen.

Einschnitte macht, die durch einen am besten mit Öl getränkten Tampon an vorzeitiger Verklebung verhindert werden kann.

STOECKEL zieht die bilaterale Diszission des äußeren Muttermundes nach POZZI allen anderen Verfahren vor, indem er die durch die ausgiebige Diszission entstehenden horizontalen Wundflächen in vertikaler Richtung vernäht. Die Operation ist auch bei der Sterilität unter der Voraussetzung durchgängiger Tuben oft erfolgreich. Ein nicht unbeträchtlicher Nachteil der mannigfaltigen, im einzelnen nicht anzuführenden Diszissionsverfahren ist das im Gefolge derselben sich oft einstellende Ektropium der zervikalen Schleimhaut, welches zu sehr lästigen schleimigen und schleimig-eitrigen Ausflüssen führen kann. Darum ist es für die Patientin von Vorteil, wenn es gelingt, die Dysmenorrhoe ohne Anwendung dieser Methoden zu beseitigen.

### 5. Bedeutung und Behandlung der Verschiebung der Menstruationsphasen.

Abweichungen vom normalen Zyklustempo, häufig verbunden mit einer Verstärkung und Schmerzhaftigkeit, seltener mit einer Abschwächung der Regel, sind nichts Ungewöhnliches. In Ambulatorien großer Anstalten machen sie etwa  $\frac{1}{5}$  aller gynäkologischen Zugänge aus (R. SCHRÖDER). Die Zyklusphasen schwanken zwischen 3 Wochen und weniger und 5 Wochen und mehr. Gesunde Frauen zeigen solche Tempoverschiebungen ungleich seltener als kranke. Die Ursachen dieses Zustandes liegen entweder in einer Schwäche des Keimplasmas oder in Entzündungen, beginnender Klimax und Myomen.

Was über die Ursachen des Regelausfalles und der zu schwachen Regelblutung angeführt wurde, gilt auch für die Zyklusverschiebungen. Gerade bei jugendlichen Individuen ist die primäre Schwäche des Ovarialparenchyms an solchen Zyklusverschiebungen ebenso Schuld, wie an Amenorrhoen oder Hypomenorrhoen. Aber auch sekundäre Ovarialschwäche, wie sie Nährschäden und Vergiftungen, akute Infektionen, schwere körperliche Traumen mit Blutverlusten und seelische Erschütterungen sowie einschneidende Änderungen der Umwelt hervorbringen, können zu solchen Zyklusverschiebungen führen.

Die Behandlung dieser Fälle unregelmäßiger Blutungen auf dem Boden einer primären Eierstockschwäche wird sich im wesentlichen mit dem decken, was bei der Amenorrhoebehandlung ausgeführt, demnach in eine allgemeine Behandlung zerfallen, in der der entsprechenden Ernährung, dem Ruhebedürfnis ebenso wie der richtigen körperlichen Betätigung, einer vernünftigen Sportausübung das Wort zu reden ist, andererseits wird man über physikalische Maßnahmen, Bäderekuren, Hydrotherapie im engeren und weiteren Sinne ebenso wenig wie über die Hormonbehandlung hinwegkommen. In Fällen endokrin bedingter Störungen wird man sich auch der Extrakte der Hypophyse, der Schilddrüse und bei ausgesprochener Vagotonie mit Aussicht auf Erfolg auch der Kalziumbehandlung bedienen. Vielfach wird man die S. 24 ff. erwähnten Hämo-

styptica nicht umgehen können. Lokale Behandlungsverfahren, wie die Abrasio mucosae werden ebenso wie bei der Amenorrhoe auch bei der unregelmäßigen Periode auf konstitutioneller Basis Gutes leisten.

Über die Röntgenbehandlung im Sinne der Röntgenreiztherapie gilt dasselbe, was dort hinsichtlich ihrer Bedenken ausgeführt ist.

Die Entzündungen des Uterus und der Adnexa wirken sich recht häufig in Form einer verfrühten, dabei oft zu starken und schmerzhaften Regel aus. Der Reiz der dauernden Hyperämie muß dafür verantwortlich gemacht werden. Die Behandlung fällt mit der Behandlung der entzündlichen Adnexa und den Maßnahmen zur uterinen Blutstillung, wie sie S. 60 u. 110 angegeben sind, zusammen. Bekannt ist ferner, daß bei Myomen Tempoverschiebungen des Zyklus im Sinne der Verkürzung der Regelblutungen nichts Seltenes sind. Ob daran die Myome Schuld sind oder das so häufig klimaxnahe Alter, bleibe unentschieden. Die Behandlung fällt mit der Behandlung der Myome zusammen.

## **6. Behandlung von unregelmäßigen Blutungen ovariellen Ursprungs.**

Dem Verständnis nähergerückt als die Menstruationsstörungen bei anatomisch unverändertem Ovar sind jene Störungen ovariellen Ursprungs, welche morphologisch faßbar und heute bereits größtenteils bis in ihre Einzelheiten klargelegt sind. Hierher gehört vor allem das so wichtige Bild der Metropathia haemorrhagica. Nächst dem verdienen Erwähnung die kleinzystische Degeneration des Ovariums, die Zysten des atretischen und reifen Follikels und die des Corpus luteum sowie die Granulosazellgeschwülste mit ihren Folgen auf den Ablauf der Menstruation. Daran fügen sich ohne Zwang die unregelmäßigen Blutungen auf dem Boden von Krankheiten anderer endokriner Drüsen wie der Schilddrüse und der Hypophyse, die bei den untrennbaren Zusammenhängen der Blutdrüsen untereinander die Ovarialtätigkeit störend beeinflussen.

### **Vorkommen, Bedeutung und Erkennung der Metropathia haemorrhagica.**

Die Metropathia haemorrhagica beruht auf einer glandulärzystischen Hyperplasie der Endometriumschleimhaut, welche in dem abnorm persistierenden und nicht zum Sprunge kommenden reifenden Follikel begründet ist. Darum gehören bei dieser Fassung des Krankheitsbildes die Fälle mit regelrechter, wenn auch verstärkter Menstruation nicht mehr herein. Die Krankheit gehört praktisch zu den wichtigsten, die nicht bloß dem Facharzt, sondern zunächst fast immer dem praktischen Arzte unterkommt. Etwa 1 v. H. der klinischen Patientinnen leiden an dieser Krankheit. Bei jungen Mädchen, auf die noch zurückzugreifen sein wird, ist sie seltener, während sie mit Vorliebe in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre und dann besonders in den Vierzigerjahren in Erscheinung tritt. Fast  $\frac{9}{10}$  aller Fälle liegen nach R. SCHRÖDER jenseits des 37. Jahres. Bezeichnend für das Krankheitsbild und damit für seine Behandlung

sind die abnormen Blutungen. Sie können Wochen dauern, ja auf Monate sich erstrecken und nicht selten nach einer Amenorrhoe einsetzen. Hohe Grade von Blutarmut, ja sogar tödlicher Ausgang infolge Anämie können vorkommen. Blutungsfreie Zeiten fehlen meist, wenn einmal die Blutung begonnen hat. Der Tastbefund ist bekanntlich nicht eindeutig: sowohl ein größerer, weicher Uterus, der sich wie gestaut anfühlt, kommt ebenso vor wie eine harte Gebärmutter. Meistens ist sie größer als der Norm entspricht. Das zystische Ovar, welches vielfach als bezeichnend für das Krankheitsbild gilt, wird oft gefunden, kann aber auch fehlen. Zu betonen ist, daß man schon am Gesicht der Patientin oft den Grad der Anämie ablesen kann, noch mehr an den Schleimhäuten. Eine energische Therapie ist dann sehr am Platze, wenn bei Entfaltung der Nymphen die Schleimhaut des Introitus vaginae auffallend blaß erscheint. Mein Lehrer РЕХАМ hat in solchen Fällen immer radikalen Maßnahmen das Wort geredet, welche die Blutung dauernd ausschalten, was später weiter ausgeführt werden wird. Die Blutung ist durch lokale Zirkulationsstörungen im Endometrium und dem daraus erfolgenden Gewebszerfall bedingt. Dadurch, daß die Follikel im Ovarium persistieren, entsteht einerseits vermehrter Blutzuschuß zum Endometrium, andererseits ein besonders hoher hormonaler Anreiz. Vielleicht ist es so, daß die Eizelle der letzten Kraft ermangelt, völlig reif zu werden. Mag sie trotzdem zugrunde gehen, so springt für sie ein weiterer reifender Follikel ein, der auch nicht zum Platzen kommt, womit der Anreiz auf das Endometrium dauernd erhalten bleibt. Erst dann, wenn ein neuer Follikel an Stelle eines abgestorbenen nicht mehr tritt, kann von selbst die Heilung erfolgen, auf welche freilich in nicht mehr als der Hälfte der Fälle zu rechnen ist — mit der Einschränkung — daß von neuem das verderbliche Spiel sich wieder einstellen kann. Da man derartige Dinge nicht voraussehen und mit Rücksicht auf die oft gefährliche Höhe der Blutung auch nicht erwarten kann, muß man eingreifen.

Operative und Strahlenbehandlung der *Metropathia haemorrhagica* bei Frauen im 4. und 5. Lebensjahrzehnt.

Die Diagnose ist auch dem Erfahrenen durch die bloße Untersuchung und die Anamnese nicht von vornherein klar. Zu ihrer Erhärtung bedarf es unbedingt der Abrasio, welche zugleich unser wirksamstes Heilmittel ist. Sie gestattet den Ausschluß anderer Ursachen als Quelle der unregelmäßigen Blutung, besonders des inkompletten Abort, der so leicht mit der Metropathie deswegen zu verwechseln ist, weil ihm eine Menopause vorausgeht, wie sie auch bei dieser Krankheit, besonders nahe den Wechseljahren, gar nicht selten ist. Die Abrasio läßt uns aber auch mit Sicherheit ein Korpuskarzinom ausschließen, welches freilich mit Vorliebe erst im Matronenalter auftritt, wenngleich auch in jüngeren Jahren gelegentlich eines beobachtet wird. Schließlich sind es auch Polypen des Korpus, welche das Bild der Metropathie vortäuschen und erst durch die Abrasio als die Blutung verursachend, klargestellt werden können. Dagegen läßt die Abrasio als differentialdiagnostisches Hilfsmittel

zwischen Metropathie und Adenomyosis im Stich. Erst der Mißerfolg der Behandlung und die vaginale Totalexstirpation eines solchen Uterus klären den Fall. Wo aber der Uterus größer ist und wegen seiner unregelmäßigen Beschaffenheit den Verdacht eines Myoms nahelegt, ist der Probeabrasio die Aufschließung und die Austastung mit dem Finger vorzuziehen, weil mit der Kürette die Sicherung der Diagnose des Myoms schwieriger ist, ja oft nicht gelingt. Überdies kann eine zu energische Abschabung nicht bloß zur Entfernung der Schleimhaut führen, sondern auch ins Myom Keime verpflanzen, wenn die Kapsel zerrissen wird.

Die Abrasio muß gründlich gemacht werden, einerseits damit alle Schleimhaut entfernt werde, welche Quelle der Blutung ist, andererseits auch aus dem Grunde, damit namentlich ein in den Tubenecken etwa sich verbergendes Karzinom nicht übersehen werde. Man verwendet eine scharfe Kürette mittlerer Größe und streift die Schleimhaut so ab, daß alle Partien des Cavum regelrecht befahren werden. Ein kleines Fläschchen, am besten mit 95%igem Alkohol gefüllt, nimmt die Geschabsel auf, die jedesmal von einer pathologisch-anatomischen Anstalt untersucht werden sollen. Ist die Patientin nahe dem Klimakterium, so ist es weit aus das sicherste, sogleich an die Abrasio eine Kastrationsbestrahlung mit Röntgen anzuschließen, wenn die histologische Untersuchung der Geschabsel ein Karzinom ausschließen läßt.

Man kann auch heute noch aus äußeren Umständen gezwungen sein, auf dieses Verfahren verzichten zu müssen, weshalb man zur Ätzbehandlung greift, welche eigentlich die Methode der Therapie bei echter Endometritis ist. Nach Einhaken der vorderen Muttermundlippe und leichter Dilatation des Halskanals mit Hegarstiften wird das Ätzmittel am einfachsten auf einer Fischbeinsonde in das Cavum eingebracht. Als Ätzmittel dient das *Formalin* gut diesem Zwecke. Man stellt sich eine Lösung von 30 g des 40%igen Formalins auf 70 g destillierten Wassers her und taucht die Sonde, welche mit Watte bis auf eine Länge von 10 bis 12 cm (nicht kürzer) umwickelt sein soll in die Flüssigkeit ein und führt sie jetzt mit der rechten Hand durch den inneren Muttermund bis zum Fundus der Gebärmutter. Nach einer Minute wird die Sonde herausgezogen und die überschüssige Flüssigkeit vom Muttermunde abgetupft. Nochmals sei darauf hingewiesen, daß die Watteumhüllung des Medikamententrägers deswegen so lang sein soll, damit sie nicht im Cavum uteri zurückbleibt, wenn der Uterus über dem Reize des eingeführten Mittels sich straff zusammenzieht. Im übrigen gibt der Uterus auch einen zurückgebliebenen Wattepfropfen wieder her. SÄNGER hat die Silbersonde, MENGE die bekannte Hartgummisonde für die Zwecke der intrauterinen Ätzung angegeben. Nach längerer Vergessenheit ist die Behandlung des Uteruscavum zwecks Verätzung mit 50%iger *Chlorzinklösung* oder Chlorzink in Substanz (S. 201) wieder aufgenommen worden. Auch der *Liquor ferri sesquichlorati* wird gelegentlich wieder erwähnt. Benützt man den Liquor ferri sesquichlorati so, daß man in ein Uhrschälchen mit destilliertem Wasser nur wenige Tropfen des Liquor gibt, die Sonde damit benetzt, bis zum Fundus führt und rasch zurückzieht, so kann man dies auch ohne

Gefahr tiefgreifender Zerstörung der Gewebe selbst bei jugendlichen Individuen machen, während die Ätzung mit Chlorzink um den Preis schwerer Nekrosen mit teilweiser oder vollständiger Verödung des Cavum uteri mit nachfolgender unheilbarer Amenorrhoe, allenfalls Pyometra erkaufte werden kann. Da überdies die Ätzung mit Chlorzink bei ungenügender Übung zur Verätzung der Scheide führen kann, ist sie schon aus diesen Gründen nicht mehr angebracht. Darum muß man die Verwendung dieser Mittel, deren Wirksamkeit in bezug auf das Versiegen des Blutflusses gar nicht in Abrede gestellt werden soll, grundsätzlich als einen Rückschritt betrachten, seit uns in der Röntgenbehandlung ein souveränes Mittel zur Beherrschung dieser Blutung zur Verfügung steht. Dagegen kann das Auswischen des Cavum uteri bei jugendlichen Individuen mit einer auf die Hälfte mit destilliertem Wasser verdünnten *Jodtinktur*, bei älteren mit unverdünnter *Jodtinktur* vorteilhaft der Abrasio jedesmal angeschlossen werden.

Durch die Röntgenbehandlung kann man die Dauerkastration, welche durch Verabreichung von 34% der H. E. D. gegeben ist, bereits in einer, allenfalls in zwei Sitzungen erreichen. Man vergesse aber nicht darauf hinzuweisen, daß sich zunächst die Blutung noch ein- bis dreimal einstellen kann, wenn die Bestrahlung in die zweite Hälfte des Intervalls fällt. Nach WINTZ wird nur in 3,8% der Fälle bei Bestrahlung in der zweiten Hälfte des Menstruationsintervalls sofort Amenorrhoe erzielt. Eine Menstruation tritt noch in 79,7% der Fälle auf, zwei in 14 und eine dritte in 2,5%. Dagegen kann man in 95% der Fälle mit dauernder Amenorrhoe rechnen wenn 34% der H. E. D. in der ersten Intervallhälfte gegeben werden. Kommt es längere Zeit nach der Kastration wieder zu einer Blutung, dann ist eine neuerliche Röntgenbestrahlung ohne Kenntnis der anatomischen Vorgänge im Endometrium bedenklich, weshalb man in solchen nicht häufigen Fällen wiederum durch Abrasio sich über den Zustand der Schleimhaut — es könnte auch ein Korpuskarzinom inzwischen entstanden sein — Aufklärung verschaffen muß. Ist eine Patientin hochgradig blutarm und jenseits des 40. Lebensjahres, so erscheint es in so manchen Fällen ratsamer, auch mit der Abrasio und der nachfolgenden Röntgenkastration um so weniger Zeit zu verlieren, als, wie ausgeführt, die Blutungen nicht augenblicklich aufhören müssen.

In solchen Fällen halten wir die vaginale Totalexstirpation des Uterus ohne weiteres für angezeigt. Sie ist bei vaginalen Operateuren gerade in Fällen von Metropathie kaum mit einer Mortalität belastet und bringt, abgesehen von der schlagartigen Beseitigung aller Beschwerden, gewöhnlich auch eine sehr rasche Erholung und Besserung des Blutbildes zuwege, wie uns mit SELLEHEIM scheint prompter, als allgemein roborierende und medikamentöse Maßnahmen. Es ist nicht recht einzusehen, warum vielfach die vaginale Totalexstirpation des Uterus bei Metropathie schweren Grades so viele Gegner hat. Wer sich die Anschauungen von der periodischen Notwendigkeit der Entgiftung durch den Menstrualfluß nicht zu eigen macht, und das dürfte die Mehrzahl der Gynäkologen sein, anderseits aber bedenkt, daß in den unberührt bleibenden Ovarien nach Exstir-

pation der Gebärmutter die Quelle der Ovarialhormone erhalten bleibt, mag dieselbe auch allmählich gleich den Vorgängen des natürlichen Klimakteriums spärlicher fließen, wird auch heute noch bei Frauen zwischen 40 und 45, ganz gewiß aber in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre, die vaginale Totalexstirpation der gewiß segensreichen Röntgenkastration vorziehen. Operationsverfahren, welche die blutende Schleimhautfläche verkleinern sollen, wie die Keilresektion nach FREUND, ASCHNER, HENKEL, die Abkappung des Fundus, möchte Verfasser nicht das Wort reden. Ein Zustand wie der beschriebene muß, wenn er operativ angegangen wird, dauernd beseitigt werden und darf um den Preis der problematischen Wichtigkeit der Ausscheidung giftiger Stoffe bei Frauen vom 40. Lebensjahr an nicht die Gefahr des Rezidivs bergen.

#### Hormon- und medikamentöse Therapie der Metropathie.

Handelt es sich um das klassische Krankheitsbild der *Metropathia haemorrhagica*, entstanden auf dem Boden der Follikelpersistenz und Ausbleiben der *Corpus-luteum*-Bildung, dann ist es nur logisch, in der Verabreichung der bei der verstärkten Regelblutung ausführlich erwähnten *Uterostonica* kein Heilmittel zu erblicken; und in der Tat werden diesbezügliche Erwartungen meist enttäuscht. Gewöhnlich ist ja der Hergang so, daß die Trägerinnen dieser Krankheit besonders in den Vierzigerjahren und nahe dem Klimakterium nach langer, erfolgloser Arzneibehandlung mit einem hohen Grad von Anämie den Facharzt aufsuchen. Trotzdem muß, namentlich zu Beginn des Leidens, wo die Diagnose der echten *Metropathie* vielfach noch in Schwebelage ist, die medikamentöse Beeinflussung der Blutung wenigstens als unterstützende Maßnahme versucht werden, zumal so manche Patientin auf die Harmlosigkeit des Zustandes bauend, weder in die *Abrasio* einwilligt, noch energischere operative Verfahren gestattet und sich von ihrer Notwendigkeit erst dann überzeugen läßt, wenn die Müdigkeit, Schwäche und Arbeitsbeeinträchtigung infolge des langdauernden Blutverlustes bereits einen bedenklichen Grad erreicht haben.

Ohne die medikamentöse und ganz besonders ohne die Hormontherapie ist aber vor allem bei diesem Krankheitsbild der *Metropathie* nicht auszukommen, sofern es die *Metropathia haemorrhagica juvenilis* betrifft. Gewiß ist nicht jeder Fall, der unter dieser Bezeichnung läuft, auch tatsächlich eine echte juvenile *Metropathie*, ein Begriff, unter den wir nur jene Blutungen bis zum 20., allenfalls 25. Lebensjahr einordnen sollen, die weder auf dem Boden einer gestörten Schwangerschaft entstanden sind, noch irgendwie mit Infektionen des Genitales oder Geschwülsten desselben in Zusammenhang stehen. Leider kommt diese Krankheit — eine wahre *Crux* für die Betroffene und für den behandelnden Arzt — in rund 5 v. H. der Fälle vor dem 20. Lebensjahr vor. So und so oft beginnt der Zustand mit der ersten Periode oder bald darauf, ein Zeichen, daß der Eierstock von Haus aus abwegig arbeitet. Darum ist nichts näherliegend, als bei der abwegigen Eierstockfunktion therapeutisch einsetzen zu wollen. Wie wir aber schon aus den früheren Aus-

führungen wissen, haben wir trotz aller Fortschritte in der Hormontherapie sichere Mittel zur Überführung einer unrichtigen Eierstocktätigkeit in eine regelmäßige im Sinne der vollständigen Eireifung, Follikelberstung und Corpus-luteum-Bildung nicht in der Hand. Dabei soll nicht gelehrt werden, daß wir auch hierin auf Grund der neuen Hormonforschungen Fortschritte gemacht haben. Zunächst einmal ist es keineswegs für jeden Fall einer solchen als jugendliche Metropathie bezeichneten Blutung sicher, daß er hyperhormonal infolge Follikelpersistenz bedingt ist, vielmehr kann er ein ähnliches klinisches Bild vortäuschen, obwohl er auf Ovarialinsuffizienz bei hypoplastischem Genitale bedingt ist. So erklärt es sich, daß in einer Reihe von Fällen die Anwendung des *Brunst- (Follikel-) Hormons* Erfolg bringt, gleichviel welches der im Abschnitt der Amenorrhoe genannten Präparate zur Verwendung kommt, wobei anscheinend verhältnismäßig kleine Dosen genügen. So hat man es mit Erfolg mit der Stillung von solchen Blutungen durch Gaben von 40 M. E. Follikelhormon subkutan (3 Tage vor Beginn der Menstruation) oder sogar durch bloße Gabe von 1 bis 2 Dragees zu je 100 M. E. mit Erfolg versucht, derartige Blutungen zu stillen, bzw. durch Fortsetzung dieser Gaben während der Menstruation dieselbe auf ein erträgliches Maß herabzumindern. Bei der Kostspieligkeit der Hormontherapie und der Unsicherheit ihres Erfolges in derartigen Fällen, soll, wenn ein kürzer dauernder Versuch fehlschlägt, mit dieser Art des Vorgehens nicht Zeit verloren werden. Von vornherein erscheint es aussichtsreicher, den Mangel des Corpus luteum infolge Follikelpersistenz durch Inkrete des *Gelbkörpers* zu ersetzen. So richtig dieser auf den klassischen Forschungen L. FRÄNKELS fussende Gedankengang ist, weil dem Gelbkörper ein blutungshemmender Einfluß zukommt, so läßt er sich in die Tat umgesetzt, keineswegs regelmäßig verwirklichen. In dieser Hinsicht hat Verfasser bei ausgedehnter Anwendung von *Sistomensin*, welches in großen Dosen bis zu 8 Tabletten im Tage und 3- bis 5mal in der Woche überdies subkutan gegeben wurde, mehrfach Mißerfolge gesehen. Dagegen scheint neueren standardisierten Hormonpräparaten wie dem *Luteogan* (2 K. E. pro 2 ccm Ampulle) bei schweren Fällen hormonaler Blutungen ein langdauernder Erfolg auch nach vorangegangener vergeblicher und geduldiger Behandlung beschieden zu sein, wie einschlägige Mitteilungen aus der Klinik von G. A. WAGNER mit Beobachtungszeiten, die sich auf 4 Monate bis zu einem Jahr erstrecken, zeigen (KAUFMANN und BICKEL). Führen kleinere Dosen nicht zum Erfolg, so nützt nach den Erfahrungen dieser Autoren auch die Steigerung derselben nichts. Standardisierte Präparate sind das erwähnte Luteogan und das *Proluton* (zu 2 und 20 K. E.), das *Luteolipex*, während *Luteoglandol*, *Lutophorin*, *Luteototal* u. a. zwar frische Corpus-luteum-Substanz in wechselnder Menge enthalten, aber nicht standardisiert sind. Hervorgehoben verdient zu werden, daß so mancher Erfolg der Corpus-luteum-Präparate, wie WAGNER ausdrücklich betont, auch bei uterinen Blutungen zu verzeichnen ist, nicht bloß bei solchen, die ovareogenen Ursprungs sind. Gerade darin, daß auch schwere Blutungen schon auf kleine Dosen (15 bis

26 K. E. nach WAGNER) ansprechen, liegt der große Vorteil dieser Therapie, die sogar in einzelnen Fällen hochgradiger Anämie nicht nur, wie dies zum Wirkungsbild gehört, augenblicklich, sondern dauernd wirken kann. Ein weiterer, nicht gering zu schätzender Vorteil der Corpus-luteum-Therapie liegt auf dem Feld der Behandlung des habituellen Abortes. Durch Injektion von Luteogan (4 K. E. täglich) kann es gelingen, den drohenden Abortus zum Stillstand zu bringen und die Schwangerschaft zu erhalten. Diese Art der Behandlung wird gegenüber der bisher üblichen medikamentösen Therapie mit

53. Ferr. carbonic. sacchar.  
D. S. 3mal täglich 1 Messerspitze.

und den kleinen, durch Monate zu verabreichenden Joddosen

54. Kalii jodat. . . . . 0,05  
Aqu. dest. ad . . . . . 100,0  
D. S. 10—20 Tropfen täglich.

in den Vordergrund gerückt werden müssen.

Neben den neuen Corpus-luteum-Substanzen sind auch die Präparate der Hypophyse gut bewährt, wenngleich ihre Wirkungsweise keineswegs in diesen Fällen klar ist. Unter 10 Injektionen zu 3 V. E. wird man meist, will man einen deutlichen Erfolg sehen, nicht heruntergehen können. Bei abundanten Blutungen wird man auch die stärkeren zu 5, 6, 9 und 10 V. E. benützen, wie sie von den verschiedenen Fabriken unter dem Namen *Hypophysin*, *Pituisan*, *Pituglandol*, *Pituigan*, *Pituitrin*, *Physormon*, *Orasthin* in den Handel gebracht werden. In anderen Fällen wieder sieht man gute Erfolge von der Injektion mit *Adrenalin* oder *Adrenosan* (1:1000 à 1 ccm). Beim Adrenalin muß man es auch mit einer Serie von Injektionen versuchen.

In Fällen von ausgesprochener Unterwertigkeit der Schilddrüse wird man bei genauer Beobachtung des Allgemeinbefindens 3mal täglich 0,1 g *Thyreoidin* oder *Elityran* (3mal täglich bis höchstens 2 Tabletten) geben und wird nach 14 Tagen bis längstens 3 Wochen die Therapie unterbrechen. Auf die bekannten Zeichen nervöser Übererregbarkeit, besonders Zittern, vermehrte Pulszahl, Herzklopfen, Durchfälle, raschen Gewichtsverlust, wird man als Zeichen einer Überdosierung ebenso sorgfältig zu achten haben, wie auf das Auftreten von Zucker im Harn.

Es wäre ein großer Irrtum, wollte man glauben, daß man mit den genannten Hormonpräparaten und Extrakten der endokrinen Drüsen die Therapie dieser Blutungen auch jedesmal beherrscht. Im Gegenteil, die Erfahrung lehrt vielmehr, daß so und so oft, trotzdem alles auf die hormonale Genese der Blutungen hinweist, diese ätiologische Therapie im Stiche läßt. Darum muß man das gesamte Register aller Uterustonica bereit haben, ja es erweist sich oft vorteilhaft und für die Patientin weit wohlfeiler, es dem Rate G. A. WAGNERS gemäß zunächst einmal in all diesen Fällen mit den bewährten Stypticis zu versuchen. Sie sind im

Abschnitt „Hypermenorrhoe“ ausführlich besprochen, und hier gilt es nur darauf hinzuweisen, daß sich bei dieser Gruppe von Blutungen häufig nicht bloß die perorale Darreichung des Ergotins und der gleichsinnig wirkenden anderen Präparate als notwendig erweist, sondern auch von der subkutanen bzw. intramuskulären Injektion Gebrauch gemacht werden muß. Das *Ergotin* (Ergostabil) ist als solches ebenso injizierbar, wie das *Extractum cornutinum ergoticum Bombelon* oder das *Clavipurin*, das *Ergotin-Merck-Neu*, das *Secacornin* und das *Secalysatum*, die in Ampullen zu je 1 ccm überall erhältlich sind. Von *Gynergen* gibt man am besten nur  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Ampulle, um die erwähnten möglichen Zufälle auszuschalten. Gut bewährt hat sich uns ferner das *Stryphnon* (0,5%ig, 1 ccm subkutan). Wenn nach der Injektion gelegentlich Schwindel und Blässe auftreten, so ist dies eine ungefährliche und vorübergehende Erscheinung.

Die Erfolge, die von DEINHARDT und M. ROSSAK nach intravenöser Darreichung von Kongorot auch bei juvenilen Metropathien, ebenso wie bei Blutungen auf entzündlicher Grundlage berichtet worden sind, lassen es ratsam erscheinen, dieses ungefährliche Verfahren, welches von der internen Medizin und Chirurgie übernommen ist, auch in den angezogenen Fällen zu verwenden. Man verordnet

55. Kongorot Dr. Grübler . . . . 0,1  
 Aqu. dest. steril ad . . . . . 10,0  
 D. S. Steril zur intravenösen Injektion.

und injiziert die 1%ige wässrige Lösung bis zum Aufhören der Blutung 2- bis 3mal wöchentlich. Die intravenöse Injektion ist deswegen nicht ganz leicht, weil der Farbstoff in der Spritze nur schwer zu entscheiden gestattet, ob sich die Nadel in der Vene befindet, doch sind paravenöse Injektionen nicht nachteilig.

Bevor man sich zur Abrasio entschließt, die bei jungfräulichen Personen begreiflicherweise immer wieder hinausgeschoben wird, soll man es auch, wenn die bisherigen Maßnahmen versagt haben, mit der Verabreichung von großen Eisengaben versuchen. WEIBEL hat darauf hingewiesen, daß er zufolge einer Empfehlung von BIEDEL durch Eisen in großen Dosen auch bei verzweifelten Fällen noch Erfolge hinsichtlich der Blutstillung erzielen konnte. Man muß, will man einigermaßen Aussicht auf Erfolg haben, 4 bis 8 g Eisen geben, am besten in Form des Ferrum reductum

56. Ferr. reduct. pulv. . . . 0,5 (1,0)  
 D. tal. dos. Nr. XL  
 S. 4mal täglich 1 Pulver in Oblaten  
 vor dem Essen.

und läßt 8 (bzw. 4) Pulver im Tag nehmen. Freilich werden diese Pulver vom Magen nicht immer klaglos vertragen. Es ist daher vorteilhaft, ja geboten, der Unverträglichkeit längerer Eisendarreichung in so großen

Dosen durch Nachtrinken einer Salzsäure-Pepsinlösung vorzubeugen nach folgender Verordnung:

57. Acid. muriatic. dilut.  
 Pepsin. germanic. . . . .aa 10,0  
 Aqu. fontis ad . . . . . 200,0  
 D. S. Nach jeder Eiseneinnahme ein  
 Kaffeelöffel voll in  $\frac{1}{2}$  Glas Wasser.

In einzelnen Fällen hat sich Verfasser auch die Verordnung von *Lebertran* (2mal täglich 1 Eßlöffel) oder *Vigantol* (3mal täglich 8 Tropfen bzw. 3mal täglich 2 Dragees) in einer zirka 3wöchigen Kur bewährt.

Bei der juvenilen Metropathie virgineller Mädchen kann man rein symptomatische, die schwere Blutung augenblicklich beeinflussende örtliche Maßnahmen nicht oder nur ausnahmsweise anwenden, während bei deflorierten Frauen oder gar solchen, die geboren haben, mit Vorteil von eiskalten oder besser möglichst heißen Scheidenspülungen Gebrauch gemacht wird. Ihre Wirksamkeit zum Zwecke der Blutstillung wird durch Zusätze von Tannin oder Alaun nur noch erhöht. Man verordnet beispielsweise

58. Alumin. crud. . . . . 50,0	59. Acid. tannic. . . . . 50,0
D. S. 1 Eßlöffel auf 1 Liter heißen Wassers zur Scheidenspülung.	D. S. 1 Eßlöffel auf 1 Liter heißen Wassers zur Scheidenspülung.

Einfetten der äußeren Scham mit einer dicken Schicht Vaseline verhindert selbst bei Anwendung von Temperaturen zwischen 40 bis 50° C Verbrennungen. Eiskalte Spülungen, die ebenfalls blutstillend wirken, sind bei stark ausgebluteten Frauen weniger zu empfehlen. Auch heiße Mastdarmeinläufe können ebenso wie kalte Klysmen den Uterus augenblicklich zu Kontraktionen anregen. Scheidentamponade ist gelegentlich nicht zu umgehen und wird am besten mit der blutstillenden Stryphnongaze ausgeführt. Wirkungsvoller ist für die augenblickliche Blutstillung die Einführung eines Tamponstreifens in den Uterus, der in eine 0,5%ige *Stryphnonlösung*, *Adrenalin* 1:1000, *Clauden-* oder *Coagulenlösung*, aus gebrauchsfertigen Ampullen bereitet, eingetaucht wird.

Die Erfolge der Behandlung mit Tampospuman (u. a. Cotarnin, Suprarenin, Ferripyridin enthaltend) lassen die Verwendung dieses örtlichen Blutstillungsmittels in derartigen Fällen angezeigt erscheinen. Man verordnet *Tampospumantabletten* zu 2 g, welche in leichteren Fällen in die Scheide eingeführt werden (etwa 3mal täglich 1 Tablette), während man in schwereren zur zervikalen Applikation in Form der *Tampospuman Styli* zu 1 g greift. Bettruhe ist in schwereren Fällen nicht zu umgehen und in leichteren wenigstens nach der Einführung sehr erwünscht. Mit Rücksicht darauf, daß die Stäbchen nicht groß sind, kann selbst bei virginellem Genitale die Einführung geschehen, die freilich am besten durch den Arzt erfolgen wird.

Nicht mit Unrecht wird bei der Metropathie ausgedehnt von der Calciumtherapie Gebrauch gemacht, wobei der Gedanke führend ist,

54 Behandlung von unregelmäßigen Blutungen ovariellen Ursprungs.

durch Anreicherung der Gewebe mit Calcium den Calciumblutspiegel entsprechend hoch zu halten. Man verordnet für leichtere Blutungen Calcium per os:

60. Calc. lact. pur. . . . . 50,0  
D. S. 3 Messerspitzen täglich.

und gibt es am besten in Suppe, Milch, Fruchtsäften oder Gemüsen ver-  
rührt oder man verordnet die wohlfeilen *Calcium-lact.-Tabletten* à 0,5  
oder *Calcantabletten* (3mal 2 Tabletten täglich), *Calmedtabletten* oder von  
dem gut bekömmlichen *Calcium Egger* oder *Calcium-Gluconat* mit 9,3%  
Calcium 3mal täglich 1 Teelöffel oder auch die Brausetabletten (je 4 g  
Calcium-Gluconat), die mit Wasser oder Fruchtsaft eine Brauselimonade  
geben. Für längeren Gebrauch eignet sich auch die Anwendung einer  
Lösung etwa nach folgender Zusammensetzung, die man nach einer  
Woche Pause mehrmals wiederholen läßt:

61. Calcii chlorat. cristall. . . . . 20,0  
Syrup. rub. Id. . . . . 10,0  
Aqu. font. ad . . . . . 300,0  
D. S. 3stündlich 1 Eßlöffel in Milch  
oder Fruchtsäften.

Zur Verstärkung der Wirkung kann man *Calcium-Clavipurin* (3stündlich  
1 Tablette) verordnen (entsprechend Calcium-Resorpta 0,25 und Clavi-  
purin 0,0005) oder man verbindet das Calcium mit Ergotin und Chinin  
nach Rp. Nr. 22 S. 25. Vielfach greift man nach Versagen der internen  
Calciumtherapie gerne zur Injektion von

62. Calcii chlorat. cristall.  
10%ige Ampullen zu 10 cem.

oder *Afenil* oder *Calcium Sandoz*, Ampullen zu 8 cem (10%ig), zur intra-  
muskulären und intravenösen Injektion und in Ampullen zu 10 cem ent-  
sprechend einer 20%igen Lösung von Calcium-Gluconat, ebenfalls für  
intramuskuläre und intravenöse Injektionen geeignet. Die intramuskulären  
Injektionen gibt man am besten in die Gesäßmuskulatur, bei der  
intravenösen Verabreichung hüte man sich wegen der leicht entstehenden  
Infiltrate vor paravenösen Injektionen. Das gleiche gilt bei der Injektion von

63. Calcii chlorat. 10%ig  
Natrii chlorat. 10%ig aa 10,0  
D. S. Steril zur Injektion.

welche Mischung gelegentlich nicht schlechte Erfolge aufweist, doch  
keineswegs immer wirkt. Alle Calciumpräparate haben den Nachteil, den  
Stuhlgang ungünstig zu beeinflussen, weshalb man gerade in dieser Hin-  
sicht besonders durch schlackenreiche Kost mit und ohne Abführmittel  
vielfach nachhelfen muß.

Bei bedrohlichen Blutungen ist die intramuskuläre Injektion von  
Gelatine manchmal nicht zu umgehen. Das Präparat muß absolut

einwandfrei sein, am besten eignet sich *Gelatina sterilis*. 10%, Ampullen zu 40 ccm. Von diesen großen Ampullen, die vor der Injektion im Wasserbade erwärmt werden müssen, damit die Gelatine dünnflüssig ist, gibt man eine bis zwei subkutan in die Oberschenkel, was nicht schmerzlos ist. Angenehmer ist es für die Patientin, ihr die Gelatine in Form der *Kochgelatine* oder als *Gelatineklyisma* beizubringen. Man verschreibt 100 Blatt feine Kochgelatine und gibt täglich 5 bis 10 Blatt in Form der schmackhaft zu machenden Fleisch-, Milch-, Frucht-, Weingelees oder als Gelatinegrütze oder in heißer Suppe oder in Schokolade (STRASSMANN). Die Gelatineklismen werden in der Weise bereitet, daß die billigen Gelatine tafeln, und zwar ihrer 25 Stück in  $\frac{1}{4}$  Liter Wasser gekocht, dann auf 40 g eingedickt werden, worauf man sie in  $\frac{1}{4}$  Liter warmen Wassers nach Zusatz von 8 Tropfen Opiumtinktur rektal verabfolgt.

Gegen den Gebrauch von blutstillenden Teesorten, welche heute mehr denn je in weiten Kreisen beliebt sind, ist durchaus nichts einzuwenden, zumal man bei längerer Verabfolgung solcher Volksmittel tatsächlich wiederholt eine Einwirkung auf die Blutstillung sieht. Das *Zinnkraut*, der *Knöterich*, der *Wasserpfeffer*, der *Reiherschnabel* und verschiedene *Nesselarten* sowie das *Hirtentäschelkraut* sind neben der *Ruhrwurz* beliebte pflanzliche Styptica. Man verordnet nach ASCHNER

64. Hb. equiseti (Zinnkraut)  
 Hb. polygoni (Knöterich)  
 Hb. capsellae bursae  
 pastoris .....aa 30,0  
 D. S. 1 Eßlöffel auf 1 Tasse Tee  
 2—3mal täglich.

oder macht von der folgenden Mischung Gebrauch (nach KÖNIG):

65. Hb. equiseti  
 Hb. millefolii (Schafgarbe)  
 Hb. centaurii (Tausendgulden-  
 kraut)  
 Rad. ebuli (Attichwurz)  
 Rad. tormentillae (Reiherschnabel-  
 wurz) ..... aa 30,0  
 D. S. 2—3mal täglich 1 Schale Tee,  
 eine Stunde vor den Mahlzeiten.

welche Verordnung gleichzeitig einer etwa durch diese Mittel eintretenden Stuhlverstopfung entgegenwirkt oder man läßt täglich 2 Tassen folgenden Tees trinken:

66. Hb. erodii cicutariae (Reiherschnabel)  
 Fol. urticae dioicae .... aa 50,0

### Blut- und Serumtherapie.

Die Injektion von Pferdeserum, die vielfach versucht wurde, scheint weniger zu leisten als die von Menschenserum, bzw. von Eigenblut. Überdies besteht die Möglichkeit anaphylaktischen Schocks. Menschen-

serum läßt sich namentlich in Gebäranstalten von Wassermann negativen Schwangeren anlässlich einer Venae punctio leicht gewinnen, kann unter den Vorsichtsmaßregeln strenger Asepsis entsprechend abgesetzt und in der Menge von 10 bis 20 ccm, allenfalls wiederholt, in die Glutealmuskulatur oder in die des Oberschenkels eingespritzt werden. Einfacher ist die Injektion von Eigenblut, die in der Weise gemacht wird, daß man aus der sorgfältig gereinigten Ellenbeuge 3 ccm Blut in eine mit 7 ccm Aqua destillata beschickte Spritze aufsaugt, mischt und in den Gesäßmuskel injiziert. Wirksamer scheint nach den bisher vorliegenden Mitteilungen (ESCH, KRAUL u. a.) die Transfusion von 200 bis 300 ccm Blut von gruppengleichen Spendern zu sein. Mit Recht bemerkt HEYNEMANN, daß dieses Verfahren zugleich auch in wirksamer Weise die bestehende Blutarmut bekämpft. Es wird aber, da es einen größeren Apparat erfordert, wohl nur auf ganz schwere Fälle zu beschränken sein, während die Eigenbluteinspritzung des hämolysierten Blutes in der Rekordspritze ein Verfahren darstellt, welches bei seiner guten Wirksamkeit für den Praktiker jederzeit in Betracht kommt und unbedenklich wiederholt werden kann.

Wo die Mittel darnach sind, kann eine einschneidende Änderung der Lebensweise, ganz besonders brusker Klimawechsel und vollständige Änderung der Kost mit einem Schlag das Bild ins Gute wenden. Die körperliche Betätigung muß sich in mäßigen Grenzen halten, doch können leichte Freiluftgymnastik ebenso wie milde hydriatische Maßnahmen, besonders in Form der kühlen, feuchten Abreibungen von 26 bis 25° C, mit welchen man auf 20° heruntergehen kann, gestattet werden. Kaltwasserprozeduren eignen sich für derartige Fälle nicht. Sie steigern bei diesen heruntergekommenen Patientinnen nur den Erschöpfungszustand. Bade- und Trinkkuren in den Badeorten mit alkalischen Eisenwässern, ebenso wie in denen mit alkalisch-salinischen Quellen (S. 14, 118) wirken belebend auf den Gesamtorganismus, kräftigen die Kreislauforgane und können die Blutungsbereitschaft günstig beeinflussen. Pyrmont, Kudowa einerseits, Pyrawarth, Tatzmannsdorf, Franzensbad, Bad Elster u. a. andererseits sind in dieser Hinsicht mit Recht berühmt. Auch die Solbäder können für solche Zwecke herangezogen werden, wobei aber zu bedenken sein wird, daß namentlich der Beginn der Badekur sich für den geschwächten Körper ziemlich eingreifend bemerkbar macht.

#### Operative und Strahlenbehandlung der Metropathia juvenilis.

Beim Versagen der geschilderten konservativen Maßnahmen wird man auch um den Preis der Verletzung des Hymens zur Abrasio greifen müssen. An diese, die nach genügender Erweiterung des Halskanals besonders gründlich durchzuführen ist, kann unbedenklich eine Ätzung mit 4%igem Formalin oder auf die Hälfte verdünnter Jodtinktur, wie erwähnt, angeschlossen werden. Die Abrasio kann dauernd Heilung bringen. Ihr Erfolg ist aber so und so oft leider nur ein vorübergehender, so daß man gelegentlich zu einer zweiten und dritten Ausschabung gezwungen sein wird. Immerhin kann man dadurch Zeit gewinnen, um durch allgemeine

Maßnahmen die Eierstockstätigkeit im Sinne normaler Betätigung anzuregen.

Was die Strahlenbehandlung derartiger Fälle anlangt, so kommt für sie zunächst eine Leber- und Milzbestrahlung in Frage, und sodann allenfalls eine Röntgenbestrahlung zum Zwecke der Erzielung einer temporären Amenorrhoe. Die Leber-Milzbestrahlung kann jedenfalls unbedenklich versucht werden, wenngleich ihre Erfolge keineswegs sichere sind. Was nun die fraktionierte Ovarialbestrahlung anlangt, nämlich den Versuch, die reifenden Follikel zu vernichten, welche durch ihren Fortbestand die Ursache der Blutung sind, das übrige Eierstockgewebe aber, also die heranwachsenden und die Primordialfollikel nicht zu schädigen, so muß man sagen, daß es sich bei dieser Art der Bestrahlung doch um kein gleichgültiges Vorgehen handelt. Abgesehen von der Möglichkeit der Erzielung einer nicht gewollten dauernden Amenorrhoe, namentlich bei Frauen vom 30. Jahre an, besteht vielleicht doch auch die einer allfälligen Schädigung später etwa zu befruchtender Eizellen. Trotzdem wird man in verzweifelten Fällen unstillbarer Blutung auf dem Boden der Metropathie, namentlich in Kreisen der Intelligenz die Kranken objektiv vor die Wahl einer verstümmelnden Operation oder der temporären Kastration durch Bestrahlung stellen, ihnen die Vor- und Nachteile auseinandersetzen, ohne die entfernte Möglichkeit einer etwaigen Schädigung der Nachkommenschaft ganz zu verschweigen, sie aber auch nicht übertrieben darstellen. Eine derartige Entscheidung wird namentlich dann in Frage kommen, wenn nach vergeblichen, wiederholten Ausschabungen der Gebärmutter bereits von einem weiteren konservativ-chirurgischen Verfahren, nämlich der beiderseitigen Ovarialresektion Gebrauch gemacht worden ist. Auch dann, wenn man aus beiden Eierstöcken (aus kosmetischen Gründen von einem Pfannenstielschen Querschnitt aus) einen Keil von mindestens einem Drittel des oft großen und glatten Ovariums entfernt und die Wunde sorgfältig näht, kann man binnen kurzer Zeit Mißerfolge erleben, die nun entweder zu radikalen chirurgischen Maßnahmen (vaginale Totalexstirpation, bzw. supravaginale Amputation der Gebärmutter) oder zur temporären Kastration zwingen.

Im Zuge der Behandlung ganz schwerer Metropathien hat man auch die Hypophysenbestrahlung (HOFBAUER) vorgenommen, über die allerdings ausgedehnte Erfahrungen nicht vorliegen.

Seltener hier zu Lande, häufiger in überseeischen Ländern wird die intrauterine Radiumbehandlung bei Metropathie geübt. Wenn man 20 bis 30 mg Radiumelement für 24 Stunden in einem 1,5 mm dicken Messingfilter nach vorheriger Öffnung des Halskanals einbringt, so kann man die Blutung heilen. Steigt man mit der Dosis bis 50 mg, wird die Amenorrhoe dauernd; wahrscheinlich obliteriert das Cavum uteri ganz, und wir haben dieselben Nachteile, wie wir sie bei der Chlorzinkätzung finden. Bei kleineren Dosen aber sah GAL nach einer Zeit die Periode wiederkehren. Er berichtet sogar, daß Kranke später schwanger wurden und niederkamen. Zweifelsohne ist bei der geringen Reichweite des Radiums

und dem dicken Muskelmantel, mit dem es in utero liegend umgeben ist, eine Wirkung auf die Eierstöcke kaum zu erwarten. Es kann daher einige, wenn auch seltene Fälle von Metropathie geben, die sich für diese Radiumbehandlung eignen, am ehesten solche in den Dreißigerjahren.

Unregelmäßige Blutungen kommen außer bei Hyper- und Hypothyreosen bei normalem Tastbefund auch bei Akromegalie und bei Morbus Addison zur Beobachtung. Über die Menstruationsstörungen bei Akromegalie hat O. Hirsch ziemlich ausführliche Mitteilungen gemacht. In Fällen mit maligner Akromegalie, welche die Hypophyse vollständig zerstören und sich so verhalten wie Hypophysentumoren ohne Akromegalie, konnte er in 87% der Fälle Regelstörungen nachweisen, während sie bei der benignen Akromegalie, die durch kleine gutartige Tumoren bedingt ist, nur in 17% vorkommen. Die Therapie dieser Blutungen kann ebenso wie die der bei diesem Leiden häufiger beobachteten Amenorrhoe natürlich nur eine ätiologische, auf die Beseitigung des Tumors gerichtete sein.

#### **Unregelmäßige Blutungen beim Follikelsprung, bei Follikel- und Corpus-Luteum-Zysten und nach Hemikastration.**

Um die Mitte des Intervalls, zur Zeit des Follikelsprunges, also um den 14. Tag herum, beobachtet man bei einer Reihe von Frauen, besonders solchen mit krankhaft verändertem Genitale, neben dem sogenannten „Mittelschmerz“ und vermehrtem Ausfluß auch eine leichte Blutung aus der Scheide, welche sich auf Stunden, aber auch auf 2 bis 3 Tage erstrecken kann. Sie beunruhigt begreiflicherweise ihre Trägerinnen, ist aber in ihrem Wesen harmlos und durch die mit dem Follikelsprung einhergehende Hyperämie zu erklären. Mit der Besserung krankhafter Veränderungen am Genitale kann auch diese Blutung schwinden. Längere Darreichung von Calcium (S. 54) oder Gebrauch von Tinctura urticae dioicae (Rp. Nr. 31 S. 27) durch 6 Wochen hindurch können die Blutungsbereitschaft zur Zeit des Follikelsprunges beseitigen.

Der sogenannten kleinzystischen Degeneration des Ovariums wird hinsichtlich eines gestörten Ablaufes der Menstrualblutung mehr Gewicht beigelegt, als ihr zukommt. Die wahre kleinzystische Degeneration der Ovarien, die auf dem Durchschnitte wabenartig durchlöchert aussehen, zeigt nebst übermäßig vielen Follikeln auch die Stadien des Corpus luteum, und zwar sowohl frischere wie ältere. Es ist am natürlichsten, mit R. SCHRÖDER anzunehmen, daß die Vermehrung der Follikel durch Blutüberfüllung des Unterleibes, wie sie bei den entzündlichen Prozessen die Regel ist, bedingt wird. Da aber die Reifungsvorgänge selbst weder eine Beschleunigung noch eine Verkürzung erfahren, so spielt dieser Zustand für den Ablauf des Zyklus keine nennenswerte Rolle, im Gegensatz zur Follikelpersistenz beim Bilde der Metropathie, bei der wir im Ovarium Corpus-luteum-Bilder vollständig vermissen, wodurch eben das Krankheitsbild der Metropathie erzeugt ist.

Auch bei manchen Follikelzysten kann man unregelmäßige Blutungen, und zwar solche schwerster Art sehen. G. A. WAGNER weist

darauf hin, daß gegenüber derartigen pflaumen- bis kleinapfelgroßen Follikelzysten das gesamte Rüstzeug der Therapie vollständig versagen kann. Es gibt Fälle, in denen sogar die Bestrahlung der Ovarien mit der Kastrationsdosis die Blutung nicht zum Stehen zu bringen vermochte. Für diese Fälle ist die Entfernung der Follikelzyste der einzig gangbare Weg, der im Verlaufe von zwei Tagen dauernde Heilung ohne jede Operation am Uterus bringt.

Bisher ist es nicht möglich, morphologische Unterschiede zwischen solchen Follikelzysten, die Amenorrhoe und solchen, die Blutungen auslösen, zu finden. Offenbar kommt es, wie WAGNER ausführt, auf den histologischen Aufbau der Zyste, im besonderen auf die Funktion ihrer Epithelien an, ähnlich wie Corpus-luteum-Zysten je nach dem Verhalten ihrer Luteinzellen Amenorrhoe oder Blutungen erzeugen können (HALBAN, FRÄNKEL). Dabei bleibe aber unentschieden, ob diese Symptome tatsächlich als die eines selbständigen Krankheitsbildes gewertet werden dürfen oder ob sie nicht bloß Ausdruck einer Entzündung der Adnexa oder des differentialdiagnostisch so wichtigen intrauterinen oder tubaren Abortes sind (R. SCHRÖDER). Da solche Zysten auch der Spontanresorption zugänglich sind, ist die Entfernung derselben, wenn der Zustand unbedenklich ist, nicht dringlich.

Im Schrifttum nicht, oder doch kaum beachtet sind unregelmäßige Blutungen, die sich an die Hemikastration anschließen. Meist ist es so, daß nach einseitiger Resektion der Adnexa, wie sie am häufigsten wegen Extrauterin gravidität vorgenommen wird, der Regeltypus durch Monate und Jahre erhalten bleibt, bis er schließlich bei gleichzeitig vergrößertem Eierstock unregelmäßig wird und zu recht beträchtlichen Graden von Blutarmut zufolge der langdauernden und schweren Regelstörung führen kann. Diese Fälle sind konservativ häufig überhaupt nicht beeinflussbar und zwingen bei längerer Dauer zur Exstirpation des noch vorhandenen einzigen Ovars. Die richtige Therapie liegt nur in der Prophylaxe, indem man nach Möglichkeit die einseitige Entfernung eines Ovars unterläßt, wenn der Uterus nicht fortgenommen wird. Dies kann in Fällen von Tubarabort, die ja nicht so bedrohlich ausgeblutet sind, meist geschehen, wodurch die Frauen vor diesem Zustand bewahrt werden.

### **Unregelmäßige Blutungen bei Granulosazellgeschwülsten.**

Nicht unwichtig ist es, auch darauf hinzuweisen, daß die sogenannten Granulosazellgeschwülste der Eierstöcke ein klinisches Bild erzeugen, welches neben besonderer Entwicklung der sekundären Geschlechtscharaktere (Vergrößerung der Brust, Auftreten von Kolostrum in derselben, bei Kindern Erscheinungen von Pubertas praecox) in einem unregelmäßigen Wechsel zwischen Amenorrhoe und schweren, ja schwersten unregelmäßigen Blutungen besteht. Die Tumoren, welche von Apfelgröße bis zu besonderem Umfang sich entwickeln können und nach KLAFFEN zirka 4% der Ovarialgeschwülste ausmachen, also gar nicht so selten sind, setzen nicht häufig Metastasen. Sie sind daher prognostisch günstiger als die Eierstockskarzinome. Die Therapie dieser unregel-

mäßigen Blutungen bei solchen Granulosazellgeschwülsten besteht in der Entfernung derselben, worauf in der Mehrzahl der Fälle Heilung eintritt.

Bei bösartigen Ovarialgeschwülsten kommen auch unregelmäßige Blutungen aus dem Endometrium vor, die zum Teil auf Zirkulationsstörungen, zum Teil auf hormonaler Grundlage entstehen und natürlich einzig und allein durch Entfernung der Ovarialgeschwülste zu behandeln sind.

### Unregelmäßige Blutungen infolge Entzündungen der Adnexa und ihre Behandlung.

Über die Bedeutung der Entzündung für die Hypermenorrhoe ist bereits in dem entsprechenden Abschnitt geredet worden. Hier gilt es mit wenigen Worten auch auf die unregelmäßigen Blutungen infolge schwerer Adnexentzündungen hinzuweisen. Sie können sich aus verstärkten Regelblutungen entwickeln, aber auch von vornherein unregelmäßig werden. Die Hyperämie und die mit ihr einhergehende Atonie der Gebärmutterwand sind meist für die Verstärkung und Verlängerung verantwortlich zu machen, während das Befallen des Ovariums durch die Entzündung zum unregelmäßigen Einsetzen der Blutung und zu meist verfrühtem Eintritt führt. Wichtig ist der Hinweis G. A. WAGNERS, daß wir bei Entzündungen des Beckens, Parametritis, Appendicitis, Paraproktitis uterine Blutungen nicht sehen, wohl aber, wenn die Ovarien in den Bereich der Entzündungen mit einbezogen sind. Diese Tatsache kann sogar nach WAGNER differentialdiagnostisch bei Entzündungen verwertet werden und eine Mitbeteiligung der Adnexa ausschließen lassen, wenn der Regeltypus erhalten bleibt. Davon machen nur die seltenen Fälle isolierten Corpus-luteum-Abscesses eine Ausnahme. Wahrscheinlich werden sie auf dem Wege der Lymphbahnen erzeugt. Indem sie das Corpus luteum zerstören, bzw. vernichten, kommt es frühzeitig zum Niederbruch der Schleimhaut und damit zur vorzeitigen Regel.

Was nun die Therapie dieser entzündlichen Blutungen anbelangt, so ist in den Abschnitten „Hypermenorrhoe“ und „Gonorrhoe der oberen Geschlechtswege“ das Nötige ausgeführt. Ergänzend soll hier nur bemerkt werden, daß in allererster Linie strengste Bettruhe, absolute Fernhaltung jeglicher geschlechtlicher Reize (womöglich Anstaltsaufenthalt) und ausgiebige Sorge für täglichen Stuhlgang notwendig ist. Von lokalen Maßnahmen sind bei starken Blutungen die sehr heißen Scheidenspülungen (42 bis 45° C) mit und ohne Zusatz adstringierender Mittel wie des *Tannins*, ferner die vaginale Einführung der schon erwähnten *Tampospumanstäbchen* zu erwähnen, wogegen intrauterine Manipulationen zu unterbleiben haben. Nicht zu umgehen sind vielfach die Injektionen von *Hypophysenpräparaten*, welche wegen ihres Einflusses auf die Gefäße und die glatte Muskulatur des Uterus im Sinne der Kontraktion Gutes wirken. Auch nach *Kongorot-* und *Proteinkörperinjektionen* sieht man bei Blutung entzündlicher Art, die anderweitig nicht zu beeinflussen ist, manchmal auffallende Erfolge. Es scheint, als

ob besonders die Injektion von *Milch* hier das beste leistet. Man spritzt 5 ccm in einem Kölbchen aufgekochter Milch tief in die Gesäßmuskulatur und erlebt so und so oft im Anschlusse an eine hoch fieberhafte Reaktion gleichzeitig ein Aufhören der Blutung. Auch andere *Proteinkörper* wie *Caseosan* (Ampullen zu 1,5 und 10 ccm der 5%igen Lösung von Casein) werden in der Dosis von 1 bis 5 ccm intramuskulär zu diesem Zwecke verwendet. Vom *Aolan* (Ampullen zu 1,5 und 10 ccm einer toxinfreien Kuhmilch-Eiweißlösung) injiziert man 5 bis 10 ccm intramuskulär.

Nicht unerwähnt dürfen jene unregelmäßigen Blutungen bleiben, die im klinischen Bilde täuschend ähnlich einer entzündlichen Blutung, nicht auf einer solchen, sondern auf einer Tubargravidität beruhen. Mit Rücksicht auf den auch den Erfahrenen keineswegs immer einwandfreien und klaren Palpationsbefund, gewinnt eine diagnostisch-therapeutische Maßnahme gerade für den Praktiker um so mehr an Bedeutung, als er schwerer in der Lage ist, die auch für diese Fälle mit Nutzen verwertbare ZONDEK-ASCHEIMSche Reaktion ausführen zu lassen, als eine Anstalt. Dieses diagnostisch-therapeutische Hilfsmittel besteht in der Einspritzung von Hypophysenextrakten, welche aus den oben angeführten Gründen bei Adnexentzündung und uteriner Blutung zum Stillstand derselben zu führen pflegen, bei der Extrauterinravidität aber die Blutung unbeeinflusst lassen (G. A. WAGNER). Dieses Verhalten wird dem Praktiker die Entscheidung für oder gegen die Diagnose Extrauterinravidität erleichtern.

## 7. Zyklusstörungen infolge Entzündungen des Cavum uteri.

### Die verschiedenen Formen der Endometritis.

Das Bild der echten Endometritis, also der Entzündung der Gebärmutter Schleimhaut im streng pathologisch-anatomischen Sinne ist heute wesentlich eingeeengt, nachdem wir dank der berühmten Untersuchungen von HITSCHMANN und ADLER, SCHRÖDER u. a. sicher wissen, daß der größte Teil aller Blutungen, die als durch Endometritis verursacht angesehen wurden, nicht auf dem Boden der Entzündung entsteht und die Einreihung dieser Blutungen in solche entzündlicher Art auf der Verknennung der Zyklusphasen und der nicht entzündlichen Hyperplasie des Endometriums beruhte. Trotzdem kommen bakterielle Entzündungen des Endometriums nicht ganz selten vor. Frauen, die mit Intrauterinpressaren herumlaufen, die bei klaffendem Halskanal unreine Mutterspritzen gebrauchen, können sich eine Endometritis selbst beibringen, ebenso wie zweifelsohne das 28 Tage liegende und nur während der Periode gewechselte Okklusivpressar eine gar nicht seltene Quelle schleicher Endometritiden und Entzündungen der Adnexa ist. Leider sind auch ärztliche Eingriffe, wie die Sondierung, die Einbringung von Medikamenten ins Cavum uteri, Gelegenheit für Keimaszension, an welcher sich die septischen Keime, Kolibazillen und harmlose Saprophyten beteiligen können. Die so häufigen Zervixpolypen, die aus dem Muttermund ragen, können ebenfalls die Keimaszension vermitteln. Diese kann

klinisch durch einen leicht blutigen Ausfluß vor der Menstruation in Erscheinung treten, sie kann aber auch ganz übersehen werden. Besonders günstig werden die Bedingungen während der Periode, wo die Aufwanderung der Keime zufolge des offenen Halskanals und des fehlenden Schutzpfropfens des Zervikalkanals sehr leicht geschieht, wie uns leider tagtäglich die Aszension der Gonorrhoe während der Menstruation lehrt. Dasselbe gilt vom Wochenbett nach Fehlgeburt und Geburt am normalen Ende, welcher Zustand naturgemäß noch leichter als die Menstruation den gonorrhoeischen und septischen Keimen das Aufsteigen ermöglicht. Wenn nun die Keime die Wundfläche besiedeln, so sind Anhäufung von Rund- und Plasmazellen die Reaktion des Gewebes, welches aber mit Ausnahme der Gonorrhoe mit den Keimen fertig wird. Nur dort, wo die Störungen in der entzündeten Basalis weitergehende sind, kommen auch Störungen des Zyklus zustande. Es sind unregelmäßige Blutungen, die schwach, aber auch stärker sein können, und recht charakteristisch ist die Klage über blutigen Ausfluß vor und nach der Periode. Durch den Zykluswandel der Schleimhaut kommt es in der Mehrzahl der Fälle von selbst zur Heilung, ausgenommen jene Fälle von Endometritis, welche bei Gonorrhoe besonders besprochen werden und jene praktisch bedeutungslosen Fälle von Endometritis, die das Kollumkarzinom begleiten. Die Diagnose ist nicht leicht, gar wenn das Genitale normal ist, doch kann man in abnormen Blutungen vor und nach der Regel einen Fingerzeig hiefür erblicken. Auch gehäuftes Auftreten von zu starken Regelblutungen kann durch Endometritis bedingt sein. Immer muß man an die Möglichkeit der Endometritis post abortum denken, an einen Korpuspolyp und an submuköse Myome. Das Karzinom wird durch die Untersuchung erkannt. Die genannten anderen Zustände lassen sich durch Abrasio bzw. Aufschließung des Uterus ausschließen. Die Probeabrasio ist so und so oft auch gleichzeitig die beste Therapie. Hört trotzdem die Blutung nicht auf, so ist eine vorsichtige Ätzung mit 10% Chlorzink, Formalin oder Jodtinktur, wie sie im Vorangehenden beschrieben wurde, vorteilhaft. Im übrigen aber muß der Satz ADLERS besonders unterstrichen werden, daß die echte Endometritis weder die Ursache von ausgesprochenen Meno- noch von Metrorrhagien ist, weshalb die lokale Behandlung der Uterusschleimhaut wegen Blutungen zwecklos, wenn nicht schädlich ist. Davon macht nur die Endometritis post abortum eine Ausnahme. Aber auch bei der Endometritis post abortum ist ein zuwartendes Verhalten, solange Fieber vorliegt, durchaus ratsam, besonders wenn die Blutung so gering ist, daß sie nicht zum aktiven Vorgehen zwingt. Ergotin und die Hypophysenpräparate im Verein mit kleinen Chinindosen (0,25 4mal täglich) lassen so und so oft ein Kürettament umgehen. Wo eine starke Blutung oder längere Dauer derselben zum Eingreifen zwingen, muß man die Abrasio machen, die vorsichtig zu geschehen hat. Auch nach der Abrasio, an die eine Ätzbehandlung nicht angeschlossen zu werden braucht, wird man durch Secalegaben die Rückbildung des Uterus beschleunigen.

Hinsichtlich der Behandlung der tuberkulösen Endometritis

gilt im allgemeinen das, was im Abschnitt der Amenorrhoe (S. 6) und in dem über Genitaltuberkulose (S. 172) ausgeführt ist.

Ob es eine syphilitische Endometritis gibt, ist bis heute nicht erwiesen. Immerhin wird man es bei Lues und unregelmäßigen, den üblichen Behandlungsverfahren trotzensen Blutungen mit einer anti-luetischen Behandlung, auf die hier nicht eingegangen werden kann, versuchen müssen. Schließlich darf man nicht vergessen, daß bei der großen Verbreitung der Lues und der Häufigkeit der Metropathie oft nur ein zufälliges Zusammentreffen besteht.

### Anhang. Submuköse Myome. Korpuspolypen.

Über die Myome, soferne sie, wie so häufig, verstärkte und verlängerte Regelblutung verursachen, ist bei der Hypermenorrhoe (S. 22ff.) die Rede gewesen und die Behandlung dieser Menorrhagien erwähnt worden. Freilich werden diese Myomblutungen häufig unregelmäßig, indem submuköse Myome sich abzustielen beginnen und als Fremdkörper im Uterus sich zur Geburt anschicken. Ernährungsstörungen der Oberfläche des Tumors, Blutungen in der gestauten Kapsel durch Zerreißen von Venen, Andauung der Gefäße durch das tryptische Menstruationsferment und echte Endometritis durch Aufwandern von Scheidenkeimen durch den klaffenden Halskanal sind die Hauptursachen der unregelmäßigen Blutungen (H. RUNGÆ). Kann man in Fällen mäßig starker, aber regelrechter Periode, namentlich bei Frauen nahe der Menopause, die sich körperlich schonen, allenfalls auch Solbadekuren machen können, gelegentlich eine Operation oder Bestrahlung umgehen und die Frauen ins blutungsfreie Klimakterium überführen, so ist in den Fällen unregelmäßiger, schwerer Blutungen, wie sie submuköse Myome aus den genannten Gründen erzeugen, eine zuwartende medikamentöse Therapie ebensowenig am Platze, wie hydriatische Prozeduren. Hier ist einzig und allein die Operation angezeigt. Sie kann, soferne es sich um in die Scheide geborene polypöse Myome handelt, durch den praktischen Arzt in einfacher Weise ausgeführt werden, indem man das Myom anhakt und seinen Stiel abdreht. Damit ist schlagartig die Blutung beseitigt, mag sie auch später von einem Rezidiv gefolgt sein, indem bei der Multiplizität der Myome oft eine zweite oder eine dritte Geschwulst, ja mehrere, von neuem sich abstielten und der ganze Vorgang des Geborenwerdens des Myoms sich wiederholt. Daß solche Fälle dann später am ungefährlichsten im blutungsfreien Zustand der Operation unterzogen werden sollen, soll hier nicht weiter erörtert werden. Im übrigen wird auf die Indikationsstellung bei der Myombehandlung und auf die Abgrenzung der Operationstherapie gegenüber der Bestrahlung (S. 187 ff.) hingewiesen.

Korpuspolypen (Adenoma uteri). Bei Frauen in den Vierzigerjahren bis etwa in die Mitte des 6. Lebensdezenniums, aber auch darüber hinaus bis ins hohe Alter sind Blutungen unregelmäßiger Natur, die nicht auf dem Boden eines Korpuskarzinoms entstehen, sondern gutartige Adenome des Endometriums sind, keine ganz seltene Erscheinung. Wenn auch ihre Umwandlung in Karzinome bekannt ist, so ist sie doch

nicht häufig. Bei größeren, sich allmählich abstielenden polypös gewordenen Adenomen kann man es erleben, daß sie bis in den Muttermund herabreichen und auf diese Weise den Halskanal zum Klaffen bringen und dadurch das Aufsteigen von Keimen ins Cavum uteri begünstigen, wodurch eine Endometritis hervorgerufen werden kann. In etwa einem Drittel der Fälle verursachen sie nach R. SCHRÖDER sowohl vor als nach der Periode schwache Blutungen, auch Dauerblutungen kommen vor. Die Therapie besteht natürlich nur in der Abrasio, die, wenn sie gründlich ausgeführt wird, den Polypen beseitigt. Man muß wissen, daß die Krankheit zu Rezidiven neigt.

## **Behandlung unregelmäßiger Blutungen verschiedenen Ursprungs.**

### **Blutungen infolge aktiver und passiver Hyperämie der Gefäße und Veränderungen der Gefäßwände.**

Weitere Ursachen unregelmäßiger Blutungen können in abnormem Verhalten der Blutgefäße und der Gefäßwände gelegen sein. In dieser Hinsicht sind zunächst unregelmäßige Blutungen zu erwähnen, die sich unter dem Eindruck seelischer Erlebnisse hin ereignen. AUGUST MAYER hat treffende Beispiele hierfür in überzeugender Weise dargelegt. Die Erkennung dieser Blutungsursache ist nicht leicht, weil über dem Suchen nach einem pathologischen Palpationsbefund an die seelische Möglichkeit ihrer Auslösung nicht gedacht wird. Schmerz und Kummer haben im Kriege bei Frauen derartige hervorgebracht. Aber auch gegenwärtig sieht man gelegentlich derartige Fälle, die beispielsweise einer unbewußten Abkehr vom ungeliebten Mann, der Furcht vor Ansteckung oder ähnlichen Beweggründen entspringen. Auch auf der Hochzeitsreise beobachtet man gelegentlich unregelmäßige Blutungen, indem eine besonders heftige sexuelle Erregung zu einer arteriellen Erhöhung des Blutzufusses führen kann. Auch sehr heiße Spülungen können durch aktive Hyperämie der Gefäße blutungserzeugend wirken, weshalb sie seit alters her im Volk bei Bestehen unerwünschter Schwangerschaft angewendet werden. Die Therapie dieser Fälle ergibt sich aus dem Gesagten in der Abstellung der sie bewirkenden Schädlichkeiten, in Fällen rein psychogener Entstehung oft prompt durch Aufklärung der sich uns eröffnenden Frau, wenn es gelingt, ihre Bedenken zu zerstreuen.

Ungleich häufiger und darum von größerer Bedeutung sind die unregelmäßigen Blutungen auf dem Boden der passiven Beckenhyperämie. Oft genug schließen sie sich an zunächst regelmäßige, aber verstärkte Perioden an. Sie können Teilerscheinung einer allgemeinen Stauungshyperämie sein, welche in nicht völlig ausgeglichenen Herzfehlern und Herzfleischartung ihre Ursache hat und durch die Digitalisbehandlung des Herzens mit der Beseitigung der Stauung wieder ver-

schwindet. In solchen Fällen kann man Digitalis mit Secale mit Erfolg verordnen, z. B.:

67. Fol. digit. titr. . . . . 0,15  
 Pulv. Secal. cornut. . . . . 0,5  
 M. f. p. d. t. dos. Nr. X  
 S. 2mal täglich 1 Pulver.

Praktisch wichtiger aber sind jene häufigen Fälle von Metrorrhagien, wie sie bei dickleibigen Frauen, bei übermäßiger Ernährung und besonders bei sitzender Lebensweise verbunden mit chronischer Stuhlverstopfung vorkommen. Hier ist es die schon bei der verstärkten Regelblutung angegebene Therapie, die Anwendung hauptsächlich salinischer Abführmittel (s. S. 255) am besten nach gründlichster Entleerung durch den Enterocleaner, Entfettungsdiät, am erfolgreichsten eine richtige Entfettungskur in Marienbad oder Franzensbad. Ferner die bei der Amenorrhoe auf Basis der Fettleibigkeit angeführten Mittel und allenfalls ein Aderlaß (150 bis 200 ccm), wie ihn ASCHNER für diese Fälle als besonders wichtig hervorhebt, da er offenbar durch Änderung der Blutverteilung schlagartig einen Stillstand der Blutung bringen kann. Für derartige Menorrhagien bewährt sich auch die Hydrotherapie, besonders in Form von kühlen Teilwaschungen und Teilabreibungen (von 26 bis 20° C). Sie wirkt durch Tonisierung der peripheren Gefäße, beeinflußt günstig die Blutverteilung und läßt sich auch im Hause durchführen, muß allerdings durch längere Zeit geübt werden, soll sie erfolgreich sein. Kalte Sitzbäder in der Temperatur von 20 bis 15° C sind körperlich weit angreifender und werden auch, namentlich in unseren Gegenden, nur ungern von den Frauen genommen, können aber gut anämisierend auf den Uterus und damit blutstillend wirken.

Schließlich verdient Erwähnung, daß bei höheren Graden des Descensus des meist retrovertierten Uterus, ebenfalls unregelmäßige Blutungen vorkommen können, die man durch Stauung der Venen erklärt, welche durch den prolabierte Uterus gezerzt und in ihrem Lumen verengt werden, während die dickwandigen Arterien das Blut weiter in die Gebärmutter ungehindert schaffen. Auf diese mechanische Rolle der Blutstauung bei der Retroversion wurde schon bei der verstärkten Regelblutung (S. 29) hingewiesen. Was dort über die Behandlung gesagt wurde, gilt auch hier für die Beseitigung der unregelmäßigen Blutungen. Mit der Behebung des Prolapses bzw. der Retroversion kann die Blutung in normale Bahnen kommen. In manchen Fällen kann man auch mit konservativen Maßnahmen das Auslangen finden. Gymnastik mit besonderer Berücksichtigung der Beckenbodenmuskulatur (S. 230), Hydrotherapie (kalte Sitzbäder, Teilabreibungen) können im Verein mit systematischer Darreichung der genannten Uterustonica, wie *Hydrastis*, *Styptural*, *Cotarnin*, den erwähnten blutstillenden Teesorten genügen, die unregelmäßige Periode zu beheben.

Trotz der großen Bedeutung der Atherosklerose, welche das weibliche Geschlecht keineswegs verschont, spielt sie als Ursache der unregelmäßigen Blutung aus dem Uterus nur eine untergeordnete Rolle.

Man muß sie aber kennen, weil sie zur Verwechslung mit Korpuskarzinom Veranlassung geben kann, da sie ja meist nach der Menopause auftritt. Bezeichnend für sie ist ihre Heftigkeit, ihr unvermitteltes Kommen und ihr ebenso plötzliches Schwinden. Sie kann fast die ganze Uteruswand in Form einer hämorrhagischen Infarzierung betreffen. Die Therapie wird, sofern man den Fall erkennt, gegen die Atherosklerose gerichtet sein, also im wesentlichen in einer schonenden Lebensweise, Vermeidung von Nikotin und Alkohol, fleischarmer, kohlehydratreicher Kost, allenfalls Jodpräparaten und Kalzium bestehen.

### Mechanisch bedingte Blutungen.

Zunächst können es Verletzungen der äußeren Scham und der Scheide sein, welche als Maschinen- und Pfählungsverletzungen mit weitgehender Zerstörung der Gewebe einhergehen können und nach chirurgischen Regeln versorgt werden müssen. Der praktische Arzt tut gut, sie bei ausgedehnten Zerreißen, namentlich solchen mit unregelmäßigen Rißrändern, welche hinsichtlich der Zusammengehörigkeit der Wundränder gar nicht leicht übersehbar sind, nach Tamponade bei starker Blutung bzw. nach Abbinden spritzender Gefäße ehestens der Anstaltsbehandlung zu überantworten.

Weniger bedeutend pflegen Deflorationsverletzungen zu sein, doch kann man auch hier gelegentlich schwere Blutungen sehen, besonders wenn es sich um ein abwegig gebautes Genitale handelt, beispielsweise bei Hymen septus, Vagina septa, bei Rigidität der Teile, allenfalls bei Notzuchtsattentaten. Auch in diesen Fällen ist einzig und allein die chirurgische Versorgung größerer Wunden am Platze.

Dagegen machen die mechanisch bedingten Wunden, wie wir sie beim Prolapse sehen, an dessen Spitze das infolge mangelhafter Ernährung entstehende Dehnungsgeschwür auftritt, nur leichte Blutungen. Durch die Glycerinauflage solcher Prolapse mit blutenden Dehnungsgeschwüren, durch die Reposition und die Zurückhaltung derselben mit Tampons, die mit epithelanregenden Salben beschickt sind, wie der 2%igen *Lapis*-, 2%igen *Pellidol*-, *Desitin*salbe u. a., pflegt die Blutung aufzuhören, bis man so weit ist, die einzig ätiologisch richtige Therapie, nämlich die Operation auszuführen. Dauernd wird man sich mit diesen konservativen Maßnahmen nur in Ausnahmefällen absoluter Kontraindikation gegen die Operation begnügen, worüber beim Prolaps S. 227 ff. ausführlich gehandelt wird. Blutende Geschwüre bei Pessarträgerinnen, die den Wechsel des Ringes für längere Zeit verabsäumt haben oder ein zu großes Pessar tragen, sind hinsichtlich ihrer Behandlung ebenfalls beim Prolaps erwähnt.

Blutungen auf dem Boden einer Kolpitis vetularum sind gar nicht selten, aber manchmal schwierig zu deuten. Leider kann es geschehen, daß neben einer solchen im Spiegelbild blutenden Kolpitis vetularum auch eine uterine Blutung besteht, die, weil sie spärlich ist, lange übersehen wird und in einem Korpuskarzinom begründet sein

kann. Über die Behandlung der Kolpitis vetularum ist ausführlich auf S. 154 die Rede.

Über das Korpuskarzinom und die Richtlinien seiner Behandlung siehe S. 196.

Um nicht weitläufig zu werden, muß auch über die Erosion, die ebenfalls die Ursache unregelmäßiger Blutungen werden kann, und rein mechanisch bei der Behandlung ebenso wie bei der Berührung blutet, auf den Abschnitt Entzündungen verwiesen werden (S. 158).

Dasselbe gilt von den die Erosion so häufig begleitenden Cervixpolypen als Quelle unregelmäßiger Blutung (S. 158).

Die differentialdiagnostisch mit der Erosion konkurrierende Kontaktblutung auf dem Boden des beginnenden Kollumkarzinoms sei hier nur gestreift. Dieses selbst findet in den Richtlinien zur Beratung geschwulstkranker Frauen S. 193 gebührende Erwähnung. Selten wird eine Blutung bei tuberkulösen oder syphilitischen Geschwüren entstehen.

Bei älteren Frauen bedingen nicht selten Karunkeln der Urethra unregelmäßige Blutungen, mit deren Entfernung (S. 267) die Blutung auch wegfällt.

Großen Schrecken jagt so mancher Frau, die sich einer Totalexstirpation der Gebärmutter unterzogen hat, eine nach längst erlangter Gesundheit plötzlich auftretende Blutung aus der Scheide ein, die auch bei den Ärzten dann sehr gefürchtet ist, wenn es sich um Frauen handelt, bei denen eine Karzinomoperation vorgenommen wurde, weil sie ein Rezidiv vermuten. Meist handelt es sich um unschuldige Granulome, die sich um zurückgebliebene Seidenfäden entwickeln. Sie lassen sich durch Entfernung der Fäden und Verätzen des Granuloms mit dem Lapisstift, allenfalls nach vorheriger Abkratzung mit dem scharfen Löffel ohne weiteres beseitigen.

## Behandlung der Begleiterscheinungen der Klimax.

### Natürliches Klimakterium.

Wenn es richtig ist, daß Leib und Seele der Frau zu allen Zeiten vielfach in zwangsläufiger Abhängigkeit von der körperlichen Anlage stehen, so gilt dies in so hohem Maße von keinem anderen Zustand als von dem der Wechseljahre. Mit Fug und Recht kann man mit WIESEL sagen, daß die Frau das Klimakterium erlebt, das sie gewissermaßen verdient, dessen Ablauf also von der Anlage weitgehend abhängig ist. In der Tat sieht man beim Vollweibe, der Pyknika, im Sinne von MATHES die Wechseljahre mehr minder in äußerer und innerer Ruhe ablaufen und in ein Leben körperlichen und seelischen Gleichgewichtes nach nur unbedeutlichen Schwankungen vorübergehender Art hinübergleiten. Ganz anders die intersexuellen und die asthenischen Frauen, von denen MATHES gesagt hat, daß sie ihr Leben nicht leben, sondern leiden. Für sie bedeutet die Klimax eine schwere, manchmal nur mit Mühe durchzustehende Zeit; dazu trägt oft die Erwartung, daß es so kommen müsse, nicht wenig bei.

Wenn die Wechseljahre in ihren körperlichen und geistigen Äußerungen unter dem Gesichtswinkel des Fehlens der Inkrete des Eierstockes und des Mangels einer Menstruationsblutung betrachtet werden müssen, so wäre es falsch, das Ausbleiben der Menses der Klimax gleichzusetzen. Die Erscheinungen der Klimax brauchen, wie wir ja tagtäglich wissen, keineswegs an eine kürzere oder längere Menopause sich anzuschließen. Es gibt genug Fälle, wo auch lange Menopausen ohne klimakterische Erscheinungen verlaufen. Umgekehrt sehen wir, daß in den kritischen Jahren die Symptome des Klimakteriums in hohem Maße bereits bestehen können, trotzdem die Blutungen weiter bestehen, allerdings unregelmäßig und sogar in einer Weise, daß sie uns zum Eingreifen zwingen. Menopause und Klimakterium lassen sich daher nicht ohne weiteres gleichsetzen, wengleich der Ausklang des Klimakteriums eine dauernde Menopause bedeutet.

Nach dem Stand unseres heutigen Wissens kann es nicht zweifelhaft sein, daß das Versiegen des periodischen Keimbläschensprunges kein plötzliches, sondern ein allmähliches ist, ein Umstand, der ja das natürliche Klimakterium so wohlthätig vom künstlichen unterscheidet, besonders dann, wenn das künstliche in früheren Jahren gesetzt werden muß. Auch die Fälle von Wiedererwachen der Periode nach längerem Ausbleiben sind, wenn pathologische Ursachen ausgeschlossen werden können, nicht anders als dadurch zu erklären, daß eben nicht alle Ovula dem Schwunde anheimgefallen waren und daß aus irgendwelchen, uns nicht näher bekannten Ursachen das eine oder andere wieder heranreift. In unseren Breiten gilt bekanntlich die Zeit von rund 47 Jahren als mittlere Zeit der Menopause. Fälle, wo vor dem 40. und nach dem 55. Jahre die Periode ausbleibt, bzw. weiter besteht, sind Ausnahmen von der Regel. Ob es richtig ist, daß Frauen mit gut entwickelten Geschlechtsorganen, die bald in die Jahre der Reife kommen, auch verhältnismäßig lang menstruierten, indes solche, welche spät zur Menstruation kommen, auch früher mit derselben aufhören, bleibe dahingestellt. Fälle, in denen schon unverhältnismäßig bald die Klimax eintritt (vor dem 40. Jahr kommt es in zirka 4% der Fälle vor), sind Abwegigkeiten, welche bei der Amenorrhoe erwähnt wurden; sie sind meist in erschöpfenden Krankheiten, starken Blutverlusten, langem Wochenbettfieber, Entbindungen im vorgeschrittenen Alter, aber auch in geburtshilflichen Operationen wie manueller Plazentalösung (FIEBAG) bedingt. Sie stellen an unsere therapeutischen Bestrebungen die größten, leider oft unerfüllbaren Anforderungen. Dort, wo über das 50. Jahr hinaus die Periode regelmäßig weiterbesteht, oft genug ziemlich stark, liegen gar nicht selten, wie allgemein bekannt, Myome, aber auch Lageanomalien vor. Jenseits des 55. Jahres findet sich nach SCHÄFFER die Periode noch in 1,64% aller Fälle. Diese Tatsache ist es ja, die Myomträgerinnen, die begreiflicherweise dringlich die Menopause herbeiwünschen, oft ungebührlich lange darauf warten läßt, wodurch ein hoher Grad von Blutarmut herbeigeführt werden kann, der noch vor Eintritt der Klimax zu energischer Behandlung zwingt.

Wenn wir die Erscheinungen des Klimakteriums, besonders deren pathologische Auswirkungen hinsichtlich der Therapie besprechen, so kann dies nicht ohne einen kurzen Hinweis auf die diesem Zeitpunkt eigentümlichen Veränderungen geschehen. Bekanntlich bestehen dieselben im Bereiche der Genitalorgane in deren Schrumpfung, welche dieselben ausnahmslos in ihrer Gesamtheit betrifft. Im Eierstock schwinden die Eifollikel, mögen auch im Beginn des Klimakteriums die letzten noch heranreifen und durch ihren weiteren Bestand unregelmäßige Blutungen im Sinne der echten Metropathie erzeugen. Praktisch wichtig, weil einerseits zum Geschlechtsleben, andererseits zu krankhaften Erscheinungen in Beziehungen stehend, ist die Schrumpfung der Scheide, die Atrophie der Scheidenschleimhaut, die zu Entzündung neigt und leichter auch für Keime anfällig wird, die in den Jahren der Geschlechtsreife hier nicht Fuß fassen können (Tripper der Scheide bei alten Frauen). Bedeutungsvoll sind ferner die Schrumpfungsvorgänge an der Portio und besonders an den Scheidengewölben, welche auch gelegentlich ein daselbst sich entwickelndes Karzinom eine Zeitlang dem Tastbefunde und der Sicht entziehen können. Weniger gefährlich, aber die Frauen belästigend, ist der Tonusverlust und die Schrumpfung der Ligamente, welche das Gefühl des Verlierens der Genitalorgane erzeugen und dasselbe bei schon bestehenden Vorfällen vermehren. Nur zum Teil stehen Blasenbeschwerden, die im Klimakterium stärker werden, mit tatsächlicher Vergrößerung der Cystocele in Zusammenhang. Man sieht vielmehr häufiger, daß das Gefühl der Lockerung des Beckenbodens an sich bereits Erscheinungen, wie häufigen Harndrang, Schwäche des Schließmuskels und besondere Neigung zur Erkältungsblase mit sich bringt (s. S. 263, 259). Nächst den Veränderungen an den Geschlechtsteilen sind solche am übrigen Körper meist unverkennbar. WIESEL weist aber mit Recht darauf hin, daß die vollsaftige Pyknika auch im Klimakterium nur wenig ihr Äußeres ändert, indes andere Typen und besonders diejenigen, welche an der Grenze des Krankhaften stehen, solche sehr wohl aufweisen. Diese Veränderungen betreffen bekanntlich das Gesicht mit seiner vermehrten Runzel- und Faltenbildung, seiner Fettanhäufung an Wangen und Kinn, Verdichtung der Augenbrauen, Aufsprossen von dicken Haaren an Kinn und Oberlippe; sie betreffen die Brust, deren Drüsengewebe schwindet, während das Fett der Oberbrust zunimmt (ZACHERL) und die Warzen um so mehr hervorzutreten pflegen. Das Klimakterium führt weiter oft zu besonderer Lokalisation des Fettes am Bauch, an den Hüften und nicht selten auch in der Knöchelgegend, Zustände, die wieder ihrerseits auf die Beweglichkeit des Körpers, auf die Belastung der Wirbelsäule und den Eingeweideblock recht unangenehm abfärben; neben der Zunahme des Fettes, wie sie besonders hypothyreotischen Frauen eigentümlich ist, kommt auch Abmagerung vor, hauptsächlich in jenen Fällen, in denen die Schilddrüse abwegig im Sinne einer gesteigerten Tätigkeit (Hyperthyreose) arbeitet. Davon soll noch ausführlich die Rede sein.

Wenn es gilt, von frauenärztlicher Seite die klimakterischen Beschwerden und deren Behandlung darzustellen, so muß an erster Stelle

zufolge der Lebenswichtigkeit der Frage, die Therapie der sogenannten klimakterischen Blutungen berührt werden, sofern sie nicht bereits an anderen Stellen ausführlich besprochen ist. Erst dann soll die Schilderung der Behandlung der übrigen Beschwerden folgen.

Durchaus nicht jede Frau erlebt es, daß am Ausgange des geschlechtsreifen Alters die Blutungen sich häufen, aber in einer großen Zahl der Fälle geschieht es, daß durch überstürzte Follikelreifung und Bestehenbleiben dieser Follikel ohne Sprung derselben die Blutung zur Dauerblutung wird und schwere Anämien aufkommen. Es ist verhältnismäßig ein unschuldiges Krankheitsbild, welches sich hier ausbildet und welches wir an anderer Stelle (S. 45) unter der Metropathie ausführlich behandelt haben. Hier aber gewinnt es deswegen so sehr an Bedeutung, weil sich hinter diesen von den Frauen als Wechselblutung gedeuteten Störungen ein Karzinom verbergen kann. Es geht also immer darauf hinaus, daß jede in diesen gefährdeten Jahren blutende Frau dahin genau untersucht werde, ob sie nicht Karzinomträgerin ist. Das sind die Fälle, in denen der praktische Arzt mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Frau auch dahin bringen muß, sich trotz der bestehenden „Menstruation“ untersuchen zu lassen, weil eben diese Menstruation abnorm verläuft und gar keine Menstruation zu sein braucht. Es ist leicht oder verhältnismäßig leicht, durch die einfachen Mittel der gynäkologischen Untersuchung das Kollumkarzinom auszuschließen, aber es ist geradezu unmöglich, durch die Untersuchung auch ein Korpuskarzinom ausschließen zu wollen. Mag auch dasselbe mit Vorliebe erst längere Zeit nach längst erfolgtem Wechsel auftreten, so kann es auch von dieser Regel Ausnahmen geben, indem auch einmal eine sogenannte klimakterische Blutung ein Korpuskarzinom vortäuscht. Darum muß man auch in Fällen länger dauernder Blutung aus dem Uterus bei normalem Tastbefund an der Gebärmutter durch sorgfältige Probeabrasio nach genügender Erweiterung des Halskanals durch mikroskopische Untersuchung der Schleimhaut entscheiden, ob eine unschuldige Hyperplasie der Schleimhaut oder ein Korpuskarzinom vorliegt. Das ist um so notwendiger, als diese Abrasio zugleich in mehr als der Hälfte der Fälle der beste Weg der Therapie und die notwendige Vorbedingung für eine Kastrationsbestrahlung ist. Es ist durchaus verwerflich, die Blutung, wenn sie länger dauert und stärker wird, durch Medikamente beeinflussen zu wollen, ohne zu wissen, wessen Ursprungs sie ist, und noch schlechter ist es, ohne Probeabrasio zu bestrahlen. Mit der einwandfreien Feststellung der Blutungsursachen im Klimakterium und ihrer nicht symptomatischen, sondern ätiologischen Beeinflussung ist aber unsere Aufgabe keineswegs erschöpft.

Es gilt vielmehr, das ganze Heer der gelegentlich bei ein und derselben Frau entweder gleichzeitig oder nacheinander in wechselvollem Bilde auftretenden Beschwerden zu beeinflussen, eine Aufgabe, die keineswegs leicht ist. Die Richtlinien dafür lassen sich dann besser geben, wenn man sich bemüht, gewisse Typen herauszuarbeiten, denen wieder bestimmte Beschwerden mehr minder eigentümlich sind. Mit v. JASCHKE und WINTER erscheint es vorteilhaft, Fälle von sogenanntem hyper-

thyreotischen Typus von solchen abzusondern, in denen die Tätigkeit der Schilddrüse eher darniederliegt, hypothyreotische Formen und schließlich in einer dritten Gruppe, alle jene unterzubringen, bei denen die Beschwerden mehr minder vage und weniger an eine körperliche Form gebunden erscheinen. Man darf sich aber nicht verhehlen, daß schließlich alle Frauen, mögen sie welcher Körperverfassung immer angehören, von drei Punkten her ihre Beschwerden haben, nämlich von Stoffwechselstörungen, die gewiß mit dem Darniederliegen der Ovarialtätigkeit ursächlich in Beziehung stehen, von den Störungen der Nerven und schließlich von solchen der Blutzirkulation. In unserer jetzigen Zeit ist gerade die Neigung klimakterischer Frauen zum Fettansatz eine der unwillkommensten Erscheinungen, der man entgegenarbeiten muß. Es erscheint die Herausstellung der Tatsache, daß mit dem Fortfall des Säfte- und Kräfteverlustes durch Ausbleiben der Periode ein Hauptgrund für den vermehrten Fettansatz gegeben ist, nach den Ausführungen von SELLHEIM besonders wichtig, und es wird wohl so sein, daß in den Fällen, in denen keine Änderung in der Nahrungszufuhr erfolgt, die Überernährung angebahnt wird, nachdem der 4wöchentliche Blutverlust wegfällt. Man soll daher mit SELLHEIM bei der durch das Ausbleiben der Periode und den Mangel der inneren Sekretion des Eierstockes bereits im Sinne des Fettansatzes gefährdeten Frau die Kostmenge herabschrauben und ein Essen empfehlen, das aus etwa 100 g Eiweiß, 60 g Fett und 350 g Kohlehydraten besteht und einem Brennwert von 2100 bis 2400 Kalorien entspricht. Man wird noch weiter gehen müssen, wenn es sich um Frauen handelt, die schon mit Neigung zum Fettansatz oder starken Fettpolster in die kritischen Jahre eintreten. Hier wird man jene Kostformen geben, welche bei Adipositas und Amenorrhoe erwähnt wurden: man wird also, ohne ein ausgesprochenes Hungergefühl aufkommen zu lassen, die Nahrung einschränken und bei Aufrechterhaltung des Stoffwechselgleichgewichtes hinsichtlich der Eiweißkörper, mit Fett ebenso wie mit reichlichen Kohlehydraten sparsam sein müssen, also Fett nach Möglichkeit streichen, Zucker, Kartoffeln, Nudeln, Knödeln und die süßen Mehlspeisen tunlichst ausschalten, ebenso Weißgebäck, dagegen aber den Hunger durch viel Obst und fett- und kohlehydratarm zubereitete Gemüse (ohne Mehlsatz) stillen. Daneben ist ausgiebige körperliche Bewegung (weitere Spaziergänge, morgendliche Gymnastik) nicht zu entraten. Nicht nur daß sie Verbrennung vermehrt, sie ist gerade bei Klimakterischen durch bessere Blutverteilung ein heilsames Mittel gegen örtliche Wallungen, gegen Schwindel, Kopfschmerz und Magenbeschwerden. Sie arbeitet der Blutstauung in den unteren Gliedmaßen, ebenso wie in der Bauchhöhle entgegen und erleichtert die Ausleerung ektatischer Venen. Sie ist überdies bei Frauen, die Zeit haben, ein ausgezeichnetes Mittel gegen Langeweile und trübe Gedanken. Am besten eignen sich die Übungen der schwedischen Gymnastik, die dem Alter, der Beweglichkeit und dem Habitus der Frau angepaßt werden können, wobei besonderer Wert auf die Atemübungen zu legen ist. Nächstdem sind die Schwimmbäder von bestem Einfluß, und es ist erfreulich — mag es auch der Anblick nicht

immer sein — daß unsere Strandbäder nicht bloß von der Jugend, sondern auch von älteren Jahrgängen sehr zu deren Nutzen besetzt werden. Wer es sich leisten kann, wird in Seebädern, besonders an der Nord- und Ostsee, Ausgezeichnetes für die Übergangszeit finden, freilich unter der Voraussetzung, daß es sich nicht um Frauen handelt, die durch vorangegangene präklimakterische Blutungen stark geschwächt sind.

Wie erwähnt, kommen auch vollwertige Frauen über längere und kürzere Störungen der Zirkulation, ebenso über solche der seelischen Stimmung nicht ganz hinweg, doch dauern die Beschwerden oft nur Monate, seltener 1½ bis 2 Jahre. Für diese Fälle — die ausgesprochen pathologischen sollen später erörtert werden — bewähren sich hydriatische Maßnahmen ausgezeichnet. Lauwarme Vollbäder von 34 bis 36° C und ¼ Stunde Dauer, die namentlich am Abend von beruhigender Wirkung sind und die Schwelle der Reizbarkeit herabsetzen, wodurch das Einschlafen leichter ermöglicht wird, sind mit und ohne aromatische Zusätze von Fichtennadelextrakt, besonders wenn ihnen eine Abwaschung mit kühlerem Wasser folgt oder wenn die Patientin die Temperatur des Bades durch Zuließenlassen kälteren Wassers im ganzen um 2° herabmindert und nun in diesem wesentlich kühler empfundenen Bad noch 5 Minuten verbleibt, empfehlenswert. Strenge Kaltwasserkuren sollen nicht ohne Leitung des Arztes und ohne Vorschreibung bestimmter Prozeduren gemacht werden, weil sie auch Schaden anrichten können. Hyperthyreotische werden dadurch in einen schlechteren Zustand gebracht, dagegen sind milde Kaltwasserkuren nur von Vorteil. Kurze kalte Fußbäder in der Dauer von 5 Minuten und einer Temperatur von etwa 12 bis 15° C vermögen auch auf reflektorischem Wege Kongestionen zum Kopf und zum Unterleib zu beseitigen. Angenehmer werden aber wechselwarme Fußbäder empfunden. Während die eine Wanne mit Leitungswasser, die andere mit Wasser von 40 bis 42° C gefüllt ist, werden beide Füße für 2 Minuten in das warme und für 30 Sekunden in das kalte Wasser getaucht und der ganze Vorgang auf etwa 5 bis 10 Minuten erstreckt (LAQUEUR). Sie sind besonders für jene klimakterischen Frauen in bescheidenen Verhältnissen, die über kein Badezimmer verfügen, an Stelle der beruhigenden Vollbäder zur Bekämpfung der Schlaflosigkeit, ebenso wie zur Beseitigung von Wallungen nach dem Herzen und dem Kopfe sehr empfehlenswert. Sauerstoff- und Luftperlbäder eignen sich durch ihre Wirkung auf die Vasomotoren besonders für derartige Störungen, wozu deren blutdruckerniedrigende Wirkung beiträgt. Sauerstoffbäder von 35 bis 33° C, welche auf chemischem oder physikalischem Wege herstellbar sind, können auch für häusliche Kuren warm empfohlen werden. Von Badekuren sieht man bei klimakterischen Beschwerden Besserung durch kohlen saure Stahlbäder, besonders aber durch die Wildbäder (Akratothermen) wie Gastein, Badenweiler, Johannisbad, Schlangenbad, Teplitz, Ragaz u. a. Ihr wohltätiger Einfluß auf das vegetative Nervensystem einerseits, anderseits ihre Wirkung im Sinne der Blutdruckherabsetzung und Pulsverlangsamung machen ihren Gebrauch im Klimakterium besonders wertvoll. Solche Kuren bleiben aber proble-

matisch, wenn die Frauen den großen Feinden des Nervensystems, Alkohol, Kaffee, Tee und nicht zuletzt dem Nikotin huldigen und in den späten Abendstunden an üppigen Mahlzeiten teilnehmen. Gerade das Nachtmahl soll bescheiden, eher kärglich sein, am besten aus Vegetabilien bestehen und eher zu früh, als zu spät eingenommen werden. Die häusliche Beschäftigung soll, wenn nicht ausgesprochen schwere Störungen vorliegen, unbedingt, allenfalls sogar in erhöhtem Maß als seinerzeit, weiter getrieben werden, verhindert sie doch die Frauen über die „verlorene Jugend“ zu grübeln. Es ist SELLHEIM beizupflichten, wenn er für diejenigen Frauen, welche nicht in der häuslichen Arbeit voll beschäftigt sind, Wohltätigkeitsvereine, gemeinnützige Unternehmungen und literarische Betätigung für sehr vorteilhaft hält und jene Frauen glücklich preist, die an Stelle der körperlichen Reize, die ja doch vorüber sind, nun die geistigen pflegen. Gerade in dieser Hinsicht vermögen Ärzte, die ihre Patientinnen länger kennen und das war bei dem ausgestorbenen Hausarzt der Fall, Ausgezeichnetes durch guten Zuspruch zu leisten. Auch die Frauenärzte müssen sich selbst bei einmaliger Beratung bemühen, über der Untersuchung des Körpers nicht der Seele zu vergessen und bestimmte Regeln des Verhaltens den Frauen mitgeben. Unser Bestreben muß auch dahingehen, den Frauen das Törichte und Unsinnige des ewigen Klagens über die verlorenen Jahre auszureden. Man muß beweisen, daß das Gerede von der alten, ausgedienten überflüssigen Frau, die ins Greisenalter kommt, unrichtig ist, und das Klimakterium auf den wahren Kern zurückführen. In dieser Hinsicht ist besonders SELLHEIMS Schrift „Über Altern und Klimakterium“ sehr lesenswert. Aus ihr geht mit aller wünschenswerten Klarheit hervor, daß das Altern der Eierstöcke und Geschlechtsorgane, das Einstellen ihrer Funktion keineswegs auch einem ebenso weitgehenden Altern der übrigen Organe entspricht. Es ergibt sich vielmehr, daß die Jahre stillstehender Eierstocktätigkeit eine Zeit wohlverdienter Erholung und Rastens von der aufreibenden Tätigkeit der Mutterschaftsjahre sind, daß sie ein harmonisches Ausklingen der stürmischen Zeit in den Hafen ruhiger Gelassenheit bedeuten und daß diese Jahre für die Betreffende, ebenso wie für ihre Umgebung keineswegs wertlos genannt werden dürfen. Ist man so weit, daß man von dieser im übrigen einzig richtigen Auffassung die Frauen überzeugt hat — Verfasser hat intelligenten Frauen die Schrift von SELLHEIM wiederholt zur Lektüre mit bestem Erfolg übergeben — so sieht man, daß sie die Beschwerden, die sie nun drücken, ebenso wie die seelische Verstimmung, die auf ihnen lastet, bereits viel leichter nehmen. So manche mit allen Mitteln der Therapie nicht zu beseitigenden Symptome und Beschwerden können auf dem Boden eines vernünftigen Zuspruches gebessert und beseitigt werden. Das gilt ganz besonders von unbestimmten, flüchtigen, aber die Kranken ungemein tief berührenden seelischen Verstimmungen, während die körperlichen vielfach einer teils örtlichen, teils allgemeinen medikamentösen und physikalischen Behandlung bedürfen.

Für diese Zwecke erscheint es am vorteilhaftesten, den Anschauungen

WIESELS folgend, die Behandlung der klimakterischen Beschwerden unter den Gesichtspunkten vorzunehmen, welche eine Scheidung in hyperthyreotische und hypothyreotische ermöglichen. Freilich wird eine solche keineswegs immer reinlich möglich sein, doch wird sich bei genauerer Betrachtung mehr minder deutlich eine dieser Formen herauschälen lassen. Beim hyperthyreotischen Typus sind die vasomotorischen Erscheinungen, Wallungen, Herzklopfen, Schweiß und Diarrhoen und ganz besonders die Schwankungen des Blutdruckes im Vordergrund des Bildes. Abmagerung und Steigerung des Grundumsatzes sind häufiger als das Gegenteil, welches nur bei kleineren fetten Frauen beobachtet wird, während mageren, dem intersexuellen Typus entsprechenden Frauen der sympathikotonische Symptomenkomplex eignet. Auf Grund der von L. ADLER erstmalig erhobenen Tatsache der Verminderung des Blutkalkes durch die Kastration, die, wie experimentell festgestellt ist, das vegetative Nervensystem übererregbar macht, ist im allgemeinen bei solchen hyperthyreotischen Typen die Kalkzufuhr einerseits, andererseits die beruhigende Bromtherapie in den Vordergrund zu stellen. Man verordnet:

68. Calcii bromati . . . . . 10,0  
 Aqu. dest. ad . . . . . 300,0  
 D. S. 3 Eßlöffel pro Tag.

und gibt diese Kur durch 4 Wochen hindurch, wobei man einen Tag der Woche ausläßt, dabei das Mittel aber im ganzen 3 Monate geben kann. Man kann sogar nach WIESEL nach Darreichung durch ein Vierteljahr, nachdem man einige Monate ausgesetzt hat, wieder damit beginnen. Sehr Gutes hat Verfasser durch Verordnung der von v. JASCHKE angegebenen Pillen folgender Zusammensetzung gesehen:

69. Ferr. lact.  
 Pulv. rad. Valerian. . . . . 20,0  
 Extract. Chin. aquos. . . . . 12,0  
 Calc. glyc. phosphor. . . . . 15,0  
 Extract. Belladonn. 0,6—1,2  
 Acid. arsenicos. . . . . 0,12  
 Mass. pilul. q. s. ut fiant  
 pil. Nr. CCC

D. S. Beginnen mit 3 Pillen täglich, jeden 4. Tag eine Pille mehr nehmen bis zu 9 Pillen im Tage, dabei 8 Tage bleiben, dann wieder jeden 4. Tag eine Pille weniger nehmen.

Auch die Arsen-Bromtherapie ist nach WIESEL vorteilhaft und am ehesten geeignet, bei den intersexuellen Typen beruhigend zu wirken. Man verordnet etwa das genannte Brom-Calcium zusammen mit der *Solutio arsenical. Fowleri* (1% Acidum arsenicosum), die man in der bekannten Weise gibt, 3mal täglich mit je 1 Tropfen beginnend und bis zu 8 Tropfen steigend, daselbst 8 Tage verweilend und in derselben Weise zur Anfangsdosis allmählich zurückkehrend. Wie schon erwähnt wurde, sind bei Basedow und Menstruationsstörungen, aber auch bei Allgemeinbeschwerden die auffallenden Erfolge einer längeren Ergotaminbehand-

lung ebenso bemerkenswert, wie die gute Verträglichkeit. Diese hat sich Verfasser auch bei klimakterischen Frauen hyperthyreotischer Art auffallend bewährt. Je eine Tablette Gynergen am Abend durch 3 Tage hindurch, am 4. Tage eine Pause — diese Behandlung durch etwa 3 Wochen hindurch fortgesetzt — genügt, um die Symptome wesentlich zu bessern, ohne irgendwie schädlich zu wirken. Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, daß gerade in diesen Fällen auch das *Klimasan HALBANS*, welches durch die Herabsetzung der Erregbarkeit des Nervensystems durch Theobromin und Calcium und durch das die Blutgefäße des Kopfes und der Brust erweiternde Nitroglyzerin Ausgezeichnetes leistet. Man verordnet *Klimasan* à 0,5 und läßt bis zu 3 bis 6 Tabletten im Tage nehmen. Auch das *Papaverin*, dessen spasmolytische Wirkung bekannt ist, verdient in Form von Pulvern von 0,02 bis 0,04 g, von denen auch von der stärkeren Dosis (0,04) unbedenklich 3 pro Tag gegeben werden können, Anwendung:

70. Papaverini hydrochlor. 0,02—0,04  
 Sacch. albi ad . . . . . 1,0  
 M. f. pulv. D. tal. dos. Nr. X  
 S. bis 3 Pulver täglich.

oder das *Bellafolin* (Tabletten zu 0,25 mg). Trotz aller Geringschätzung, die zeitweise ungerechtfertigt die *Valeriana* erfahren hat, bleibt aber auch diese geradezu unentbehrlich, besonders zur Behebung der vasomotorischen Übererregbarkeit. Ein Fehler ist es, die *Valeriana* nur nach Bedarf zu geben und nicht für längere Dauer zu verordnen. Die wechselnde Verordnung von Brom-Calcium und *Valeriana* durch Monate hindurch gestattet auch recht schwer ansprechbare Fälle in einen leidlichen Zustand bis zum Abklingen der Erscheinungen hinüberzuführen. WIESEL bemerkt mit Recht, daß die Tinktur weniger genommen wird wie die wässerigen Auszüge, weshalb man mit Vorteil den Baldriantee trinken läßt, der bei der klimakterischen Frau als Abendgetränk, am besten kalt, überhaupt nicht fehlen soll. Er ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil der *Species nervinae*, die dann mit Vorteil Anwendung finden, wenn Magendarmbeschwerden vorhanden sind und der so häufige Meteorismus die Frauen quält. Man verordnet entweder den Baldriantee oder die *Species nervinae* in der beigesetzten Form:

71. Folior. Trifolii fibrini . . . . . 40,0  
 Folior. Menthae piperitae  
 Radicis Valerianae conc. aa 30,0  
 D. S. 1 Eßlöffel voll auf 1 Tasse Tee.

Die beliebte und zweifelsohne auf Erfolge zurückblickende Kombination von *Valeriana* mit *Tinctura Castorei* ist durch den nicht billigen Preis letzterer eingeschränkt, wird aber besonders in Fällen erotischer Reizbarkeit gelegentlich notwendig:

72. Tinct. Valerianae  
 Tinct. Castorei . . . . . aa 25,0  
 D. S. 3mal täglich 15 Tropfen.

Auch mit *Hovaletten* (4 bis 6 Tabletten) und *Castoreum Bromid* (Erlenmeyersches Bromsalzgemisch mit Castoreum und Valeriana, 3mal täglich 1 Teelöffel) dämpft man die geschlechtliche Übererregbarkeit herab.

Wenn man darauf achtet, so findet man gar nicht selten Gefäßschmerzen entlang der Aorta, entlang den großen Gefäßen, an der Carotis, an den oberen und unteren Gliedmaßen, die höchst quälend sein und bei Aortenschmerzen mit Angina pectoris verwechselt werden können. Ohne ins Gebiet dieses schwierigen Themas wechseln zu wollen, sei nur darauf hingewiesen, daß diese Vasalgien entgegen der Angina pectoris gewöhnlich mit Parästhesien an den Fingern der linken Hand beginnen und nach dem Herzen zu fortschreiten, im Gegensatz zur echten Angina pectoris, welche mit heftigerem Vernichtungsgefühl einhergehend, gerade den umgekehrten Ablauf der Erscheinungen nach den Fingerspitzen zu zeigt. Trotzdem muß man eingreifen, auch wenn es sich um unschuldige Vasalgien handelt, entweder durch Klimasangaben oder in Form der perlingualen *Nitroglyzerindarreichung*, wie sie sich WIESEL bewährt hat. Man verordnet:

73. Nitroglycerini . . . . . 0,05  
Tinct. Valerianae . . . . . 10,0

und läßt davon am ersten Tag 3 Tropfen auf der Zunge zergehen und steigt dann täglich um 1 Tropfen bis zu 8, um hierauf in derselben Weise fallend zur Anfangsdosis zurückzukehren. Wiederholung nach kurzen Pausen ist zulässig. Auch das Aufgießen von 3 bis 5 Tropfen *Amylnitrit* (Amyl. nitr. 10,0) auf ein Taschentuch und einatmen, bis das Gesicht trocken und warm wird, hat sich bewährt. Cardiacalasse man besser aus dem Spiel. So wie die Menschen mit Angina pectoris besonders im Winter und bei raschem Temperaturwechsel vom Warmen ins Kalte besonders leicht zu Anfällen neigen, so kommt auch dies bei diesen Vasalgien vor, weshalb diese schroffen Wechsel der Außentemperatur möglichst zu meiden sind. Auch örtliche Wärmeanwendung, Thermophor, warme und feuchte Umschläge leisten Gutes. Recht quälend sind ebenfalls die nicht seltenen Gefäßspasmen in den oberen und unteren Gliedmaßen, die auch mit heftigen Schmerzen einhergehen können. Am besten bewähren sich einfache Hausmittel, wie die schon erwähnten Wechselbäder mit und ohne Zusatz von *Senfmehl*. (Auf ein Senffußbad nimmt man 100 bis 150 g entöltes Senfpulver, rührt es mit kaltem Wasser zu einem Brei an, läßt es  $\frac{1}{4}$  Stunde stehen und fügt dann den Rest des Wassers hinzu, das nicht heißer als 30, höchstens 32° R [40° C] sein darf.)

An dieser Stelle muß eine Bemerkung über den Blutdruck im Klimakterium und dessen Bedeutung eingeschaltet werden. Bei der medizinischen Aufklärung, wie sie jetzt modern ist, glauben die Frauen über den Blutdruck manchmal mehr zu wissen, als die sie behandelnden Ärzte, und wer heute bei einer klimakterischen Frau nicht sofort den Blutdruck mißt, gilt als veraltet. Richtig ist, daß weit seltener die Erhöhung des Blutdruckes bei herz- und nierengesunden Frauen zum Bilde des Klimakteriums gehört, als vielmehr Schwankungen desselben (ZONDEK u. a.). Diese sind es ja auch, welche die Verschiebungen der

Blutmenge vom Zentrum zur Peripherie und umgekehrt und damit das Wallungsbild hervorrufen. Ohne leugnen zu wollen, daß natürlich eine Hypertonie vorhanden sein kann und als Ausdruck einer Organstörung auch oft vorhanden ist, möchte Verfasser doch ganz besonders den Satz WIESELS anführen, der sagt, daß er ein spezielles Vorgehen gegen die Hypertonie, wenn sie nicht auf dem Boden einer schweren Erkrankung besteht, für nicht gegeben erachtet und in diesem Zusammenhange auch auf gedankenlose Jodmedikation hinweist, die zum Jodbasedow führen kann, ganz besonders bei jenen klimakterischen Frauen, welche dem hyperthyreotischen Typus angehören. Man messe immerhin in einschlägigen Fällen den Blutdruck und halte sich an die alte Regel, daß die abgelesenen Zahlen, wenn sie soviel über 100 mm Quecksilber betragen als das Alter der Patientin ausmacht, durchaus zur Norm gehören, messe ihn aber nicht einmal und schon gar nicht zu Beginn der Untersuchung, weil er dann auf dem Boden seelischer Aufregung falsch gewertet wird oder vergleiche wenigstens einen anfangs gefundenen Wert mit einem später erhobenen, wenn sich die Patientin bereits in einem gewissen Gleichgewichte befindet. Es ist natürlich nichts näherliegend, als auf vasomotorische Störungen und gar auf Blutdrucksteigerung mit dem Aderlaß zu kommen. Wir wissen ja, daß ASCHNER in ihm eines der vorzüglichsten Mittel zur Behandlung ganz besonders der klimakterischen Störungen erblickt, und es wäre unrichtig zu bestreiten, daß dieses Verfahren ausgezeichnete Erfolge zeitigt. Wichtig ist, daß man nicht zu große Mengen Blutes abläßt, gar dann, wenn dieser Aderlaß nur das subjektive Gefühl der Überfüllung des Gefäßsystems beheben und nicht der Senkung eines erhöhten Blutdruckes dienen soll. Sein Nachteil ist nur, daß es in einer Reihe von Fällen nicht mit einem ein- oder zweimaligen Aderlaß getan ist, sondern daß er oft regelmäßige Wiederholungen verlangt und daß, ist eine gewisse Spanne Zeit vergangen, die Frauen sich besonders unwohl fühlen, bis von neuem zur Ader gelassen wird. Aderlassen und Purgieren waren zu einer Zeit, da man Organpräparate nicht kannte, die Säulen der Therapie klimakterischer Beschwerden. Sie sollten auch heute nicht in den Hintergrund treten. Auch in den klimakterischen Zuständen muß auf eine genaue Stuhlregelung ein strenges Augenmerk gerichtet werden. Nicht umsonst haben sich die *Species gynecologicae*

MARTIN

74. Corticis Frangulae conc.  
 Foliorum Sennae conc.  
 Herbae millefolii conc.  
 Rhizomatus graminis  
 conc. .... aa 25,0  
 D. S. 1 Eßlöffel voll auf 1 Tasse Tee.

bis heute durchaus bewährt und die Zahl der verschiedenen Teesorten, denen gerade bei klimakterischen Beschwerden wesentliche Erleichterung zugeschrieben wird, beruhen ja zum Großteil auf einer auf den Darm ableitenden Wirkung. Solche Tees sind in den verschiedensten Zusammensetzungen namentlich von ASCHNER geprüft und bewährt befunden

worden. Auch die Weinsteinpräparate, ganz besonders das alte *Seidlitzpulver*, wirken in dieser Hinsicht günstig (Pulvis aerophorus laxans Seidlitzensis der Pharmakopoe). Man löst den Inhalt der gefärbten Kapsel (Tart. natr. pulv. 7,5, Natr. bicarb. 2,5) in einem Glas Zuckerwasser, fügt die Weinsteinsäure (Acid. tart. 2 g) der anderen Kapsel hinzu und trinkt das Gemisch während des Aufbrausens. Dieses Mittel hat Verfasser oft genug mit recht gutem Erfolg nicht nur zur Behebung der Stuhlverstopfung, sondern auch zur Besserung des Allgemeinbefindens, besonders bei künstlich herbeigeführter Klimax jüngerer Frauen gegeben. Salinische Abführmittel in nicht zu großen Dosen sind ebenfalls oft nicht zu umgehen. Wo Meteorismus und Obstipation im Vordergrund stehen, wird der Gebrauch der salinischen Abführmittel (Bitterwässer, kleinere Dosen von *Karlsbader Salz* und *Glaubersalz* S. 255) mit und ohne *Papaverin* von Vorteil sein. Auch die *Tierkohle*, besonders in Form der *Eucarbon-tabletten* und das *Intestinol* leisten Gutes, nicht aber dort, wo atonische Form der Obstipation im Vordergrund steht. Immer kann man es mit der *Aqua carminativa* (enthält Kamillen, Orangen, Zitronen, Pfefferminz, Kümmel, Koriander und Fenchel, 3 Teelöffel täglich) versuchen. Wichtig ist, daß auch im Klimakterium die Obstipation überhaupt erst in letzter Linie medikamentös bekämpft werde. Ganz besonderes Gewicht ist auf körperliche Bewegung zu legen. Hydrotherapie, Strahl- und Fächerduschen, Selbstmassage, Faradisation, schwedische Gymnastik, besonders in der Art der MENSENDIECKSchen Methode leisten Ausgezeichnetes (s. S. 251).

Recht schwierig ist es, gegen die Vasalgien, die nicht nur die Arterien, sondern auch die Venen und besonders die erweiterten Venen befallen, schmerzstillend zu wirken. Die wiederholt erwähnten *Antineuralgica* und *Antidolorosa* (S. 38, 39) können dabei nicht entbehrt werden. Gutes wird auch dem *Eucodal* ( $\frac{1}{2}$  bis 1 Tablette) nachgerühmt. Auch dem *Extrakt* aus *Kastanien* (Extract. Aesculi hippocastani fluid., 3mal täglich 20 Tropfen) wird eine Art spezifische Wirkung nachgesagt. Die *Proveinase Midy* (3 bis 6 Tabletten im Tag) wird von den Patientinnen des öfteren als wirksam gelobt. Die recht lästigen Schweiße sind nicht leicht zu beeinflussen. Sie sind übrigens meist örtlicher Natur, befallen Kopf, Brust, Hände und betreffen weniger die unteren Körperabschnitte. Waschungen am Morgen und am Abend mit lauem Wasser von 1 bis 2 Minuten Dauer sind dann, wenn die Patientin sich nur oberflächlich abtrocknet und allenfalls in einer Woldecke liegen bleibt, erfahrungsgemäß von schweißhemmender Wirkung und eignen sich auch vor dem Schlafengehen verabreicht als gutes Schlafmittel. Auch laue Duschen von 35 bis 25° C und  $\frac{1}{2}$  bis 2 Minuten Dauer bewirken dasselbe. Trotzdem erwachen die Frauen wieder unter Wallungen und Schweißausbrüchen, und man muß gelegentlich medikamentös vorgehen. *Spirituöse Flüssigkeiten* (1- bis 2%iger Salizylspiritus, Franzbranntwein, Kölnisch Wasser) oder 1 Eßlöffel Essig auf 1 Liter Wasser in einen Schwamm gesogen, womit der Körper abgerieben wird, wirken schweißhemmend. Von den Medikamenten kommt allenfalls in Frage: *Kampfersäure*, die man als

Acidum camphoricum (1 g in Oblaten drei Stunden vor dem Schlafengehen) geben läßt oder vielleicht besser Tabletten von *Chlorcalcium* von 0,1 bis 0,3 (BACHEM), schließlich *Salvysatum* (3mal täglich 20 bis 30 Tropfen). Im allgemeinen aber wirken diese Mittel viel weniger bei den klimakterischen Schweißausbrüchen als vielmehr bei den Nachtschweißen der Phthisiker. Dort, wo man Gynergen geben kann, also bei hyperthyreotischen Formen, wird man gerade hinsichtlich der Schweißhemmung davon Ausgezeichnetes sehen.

Vasalgien, Schweißausbrüche und Kopfschmerzen sind neben den gerügten Diätfehlern und dem Genuß von Alkohol und Koffein häufig die Hauptursachen der im Klimakterium gar nicht seltenen Schlaflosigkeit. Die eingangs erwähnten wechselwarmen Fußbäder und die Senffußbäder, die lauwarmen Vollbäder sind wertvoller als die Schlafmittel, welche freilich nicht ganz entbehrt werden können. Als Einschlafmittel bewährt sich neuerdings das *Evipan* (1 bis 1½ Tabletten) allenfalls in Verbindung mit *Phanodorm* (½ Tablette Evipan + 1 Tablette Phanodorm) ausgezeichnet. Verteilung von kleinen Gaben von *Adalin* (3 halbe Tabletten über den Tag genommen), *Abasin* oder *Sedormid* in derselben Weise oder von *Luminaletten* (0,015 g 3 Stück) machen häufig die Verordnung eines eigentlichen Schlafmittels nicht mehr notwendig. Ebenso ist es, wenn die Patientin unter Bromwirkung steht, die durch Verordnung von Valeriana und durch Verbindung von Brom mit Eierstocksubstanz, wie dies beispielsweise im *Ovobrol* besonders geschieht, auch das Einschlafen erleichtert. Jedenfalls ist vor zu langem Gebrauch von Schlafmitteln nur zu warnen (*Veronal*, *Medinal* sind durchaus entbehrlich). Besteht gleichzeitig eine Neigung zu Hypertonie, bewährt sich *Luminal* in Kombination mit *Theobromin* sehr

75. Luminal ..... 0,15  
 Theobromin natr. salicyl. . 0,75  
 M. f. p. D. tal. dos. Nr. X  
 S. abends 1 Pulver.

Ist die Schlaflosigkeit durch Juckreiz verursacht, welcher besonders im Klimakterium vorkommt, so kann sie sehr schwer, ja manchmal kaum beeinflussbar sein. Abreibungen mit den *Unnaschen Juckspiritus* schaffen manchmal Wandel:

76. Acid. carbol. .... 1,0  
 Menthol. .... 0,5  
 Tetrachlorkohlenst. .... 5,0  
 Spir. dil. ad ..... 100,0  
 S. Juckspiritus.

In hartnäckigen Fällen wird neben Bäder- und Lichttherapie der Rat eines Dermatologen nicht zu umgehen sein. Über Autoseruminjektionen nach LUTTHLEN bei Juckreiz klimakterischer Frauen fehlen Verfasser Erfahrungen. Über den Pruritus vulvae, ebenso wie über die Kolpitis vetularum als typische gynäkologische Krankheitsbilder in den Jahren der Klimax ist S. 129 und 154 die Rede.

Galten die bisherigen therapeutischen Maßnahmen mehr jener Form der Beschwerden, wie sie hauptsächlich der hyperthyreotischen Form eignen, so sollen im folgenden jene beschrieben werden, deren Symptome mehr dem Bilde ähneln, wie es bei der Insuffizienz der Schilddrüse bekannt ist, im wesentlichen also in Neigung zur Fettsucht und zu Veränderungen besteht, welche mit dem Myxödem einiges gemeinsam haben. Es sind die Frauen, die vielfach schon vor der Klimax zu Fettansatz neigen, der nun einen bedenklichen Grad erreicht, eine trockene abschuppende Haut, eine leise, träge Herzaktion bei meist niedrigem Blutdruck aufweisen, schmerzhafte Fetteinlagerungen in der Haut, besonders um die Knöchel, Varizen und Hämorrhoiden zeigen, meist verstopft sind und geistig einen recht gleichgültigen, manchmal geradezu trägen Charakter darbieten. Sie sind es auch, die zu Sklerose der Hirngefäße einerseits und zu Myokardschädigungen andererseits hinneigen, weshalb ausgesprochene derartige Fälle nicht unterschätzt werden dürfen. Für sie eignet sich einzig und allein eine gut geleitete Schilddrüsentherapie (S. 14 ff.), die vor allem ein Fortschreiten des Prozesses und eine Zunahme der Fettsucht in Schranken hält. Gleichzeitig soll man zwar hinsichtlich der Nahrungsmittel eine gewisse, aber nicht eine allzu große Strenge walten lassen, unter keinen Umständen aber die Frauen in den Hungerzustand überführen. Rapide Abmagerung ist gerade in diesen Stadien der Übergangszeit sehr bedenklich und kann bei solchen Frauen binnen kürzestem den geistigen und körperlichen Zusammenbruch herbeiführen. Sparsamkeit mit Fett, ebenso mit Kohlehydraten ohne Übertreibung und Überspitzung, mit einem Wort ein guter Mittelweg, wird hier vieles erreichen. Neuerdings ist namentlich von NOORDEN das *Elityran* in der Therapie der Fettsucht in die vordere Reihe gerückt worden, von welchem schon bei der Amenorrhoe die Rede war. Indem man eine Stunde vor der Mahlzeit 2mal 2 Tabletten gibt, früh und abends oder 3mal eine und nach 14 Tagen eine Pause macht, erzielt man freilich auch bei entsprechender Diät gute Erfolge, merkwürdigerweise auch gerade bei Klimakterischen hinsichtlich von Gelenkschmerzen, Gliedersteifheit und Ungelenkigkeit. Dieses Mittel soll außerdem den natürlichen Appetit etwas herabsetzen. Auch dem *Inkretan* ist dasselbe nachzusagen. Wo der Hunger quälend ist, ist es möglich, außer durch Obst auch durch Verabreichung von *Decorpa*, einem Pflanzenschleim von stark quellenden Eigenschaften (1 Teelöffel  $\frac{1}{2}$  Stunde vor der Mahlzeit), ein Sättigungsgefühl hervorzurufen, weil dieser getrocknete Pflanzenschleim, ohne resorbiert zu werden, durch seine Quellung im Magen die Völle vortäuscht und damit den Hunger weniger leicht aufkommen läßt.

Bei Klimakterischen finden sich leider nicht selten chronisch deformierende Gelenkkrankheiten (*Arthropathia ovaripriva*, MENGE). Im Abschnitt über Kreuzschmerzen wird ausführlicher erwähnt werden, daß die Arthritis der Sacroiliacal- und kleinen Wirbelsäulengelenke gerade bei Klimakterischen häufig erstmalig in Erscheinung tritt, ebenso ist es mit der *Coccygodynie* und Schmerzen im Kniegelenk, aber auch die anderen Gelenke einschließlich der Fingergelenke (*HEBERDENsche*

Knötchen) werden befallen. Durch den vermehrten Fettansatz werden überdies statisch-dynamische Beschwerden um diese Zeit leicht ausgelöst. Offenbar desselben Ursprungs wie die *Arthropathia ovaripriva* ist auch die Neuralgie des Nervus ischiadicus, welche nach MENGE bei bestrahlten, amenorrhöisch gewordenen Frauen, aber auch bei Matronen in der natürlichen Klimax gelegentlich eintritt. Sie wird besonders durch Solbadekuren, freilich häufig nach vorübergehender Verschlimmerung, sehr gut beeinflusst. Die Behandlung der Gelenkkrankheiten ist besonders schwierig. Seit wir standardisierte Hormonpräparate haben, wird es auch damit besser. Auch das *Elityran* und *Inkretan* kann versucht werden, letzteres in Form von Kuren, die sich, allerdings mit Unterbrechungen, auf viele Wochen zu erstrecken haben. Daneben muß an *Antineuralgicis*, an physikalischen, besonders thermischen Maßnahmen alles aufgezogen werden, um einigermaßen erträgliche Zustände zu erzeugen. Das *Atophan* (Tabletten zu 0,5, Suppositorien zu 1 g und Salbe), die S. 245 erwähnten *Salizylpräparate*, Injektionen von *Schwefel*, nach WIESEL am besten in Form 1 $\frac{1}{100}$ iger Lösungen von *Sulfur depuratum* in sterilem Olivenöl, die man täglich verabreicht und in der Stärke bis zur 1 $\frac{1}{100}$ igen Lösung steigt, bessern die Schmerzen. Einreibungen mit den erwähnten *Antineuralgicis*, Tragenlassen warmer Flanellbinden, Pelze, Felle, alles muß versucht werden, bis schließlich gewöhnlich eine Trink- und Badekur nicht zu umgehen ist, wenn heiße Bäder, Heißluftbehandlung, Quarz- und Profunduslampe, Fangopackungen und Schlamm im Hause nicht geholfen haben. Die Pistyaner Bäder, die Bäder in Gastein, Schallerbach und St. Joachimsthal, in Ragaz usw. sind mit Recht ob ihrer Wirkungen berühmt.

Es mag vielleicht befremden, daß eine so große Reihe symptomatischer Maßnahmen für die verschiedensten Beschwerden des Klimakteriums vorgeführt wurde, ohne daß einer ätiologischen Therapie bis jetzt Erwähnung getan worden ist. Da das Klimakterium in seinen Erscheinungen hauptsächlich durch den Ausfall der Keimdrüse zu erklären ist, ist nichts natürlicher, als durch Ersatz derselben von Grund auf Besserung zu schaffen. Dies geschieht in unzähligen Fällen tagtäglich, und doch ist der Erfolg der Organotherapie kein durchaus befriedigender. Galt dies besonders für die nicht standardisierten Ovarial-Trockenpräparate, so gilt dies, wenn auch bedingt, für die Hormonpräparate, die freilich einen entschiedenen Fortschritt auch in der Therapie der klimakterischen Beschwerden bedeuten. Da aber die Beschwerden des Klimakteriums nicht nur durch den Ausfall der Keimdrüse, sondern durch das gestörte Zusammenspiel der endokrinen Drüsen überhaupt und die Übererregbarkeit des vegetativen Nervensystems erklärt werden müssen, ist die Industrie mit Recht daran gegangen, zu den Organ-, ebenso wie zu den Hormonpräparaten Zusätze in Form von Extrakten anderer endokriner Drüsen und Medikamente, welche die Erregbarkeit des Nervensystems herabsetzen, hinzuzufügen. Demnach machen wir heute weniger von den Organextrakten, mehr von den Hormonpräparaten mit und ohne die erwähnten Zusätze Gebrauch. Es sei aber zugegeben, daß auch die nicht

standardisierten Ovarialpräparate wie *Ovaria siccata*, ebenso wie die pluri-glandulären Präparate *Polyhormon fem.* u. ä. wenigstens vasomotorische Störungen günstig beeinflussen können, während intramuskuläre Injektionen mit *Onuclex* und *Oprotex* (Nukleinkörper des Gesamtovars, bzw. Gesamtproteine des Ovars enthaltend) nach den Erfahrungen GRAFFS die lästigen Blasenstörungen, besonders den Harndrang und das Gefühl des Verlierens der Blase gut beeinflussen. Die bei der Amenorrhoe (S. 9 ff.) angeführten Ovarial- und Hormonpräparate, von denen letztere nach M. E. standardisiert in verschiedenen Stärken im Handel sind, wie die *Novarial-* und *Novarial-Stark-Tabletten*, das *Progynon* (150 M. E.), das *Hogival* (12, 100 und 300 M. E.), das *Ovovop* (10 M. E.), das *Uden* (100 M. E.), das *Ovosan* (in Tabletten Schwach, Stark, Mittel und Suppositorien zu 100 und 300 M. E.), das *Follikulin-Menformon* (100 und 500 M. E., Suppositorien zu 1000 M. E.), finden auch hier sinngemäß Anwendung. Der Umstand, daß längere Verabreichung unbedingt notwendig ist, und daß diese Präparate bei der Schwierigkeit ihrer Herstellung naturgemäß nicht billig sind, schränkt ihre Verwendbarkeit weitgehend ein. Von den Präparaten, welche sowohl Eierstocksubstanz, wie antispasmodische und antineuralgische Stoffe nebst Drüsenextrakten enthalten, sind zahlreiche Typen im Handel und bewährt. Erwähnt seien das *Klimakton* auch *Klimakterin* genannt (Ovaraden, Thyraden, Bromural und Kalzium-Diuretin enthaltend), das *Klimova*, das *Prokliman* (Ovarialhormon), Peristaltin, Nitroglyzerin, Pyramidon und Koffein enthaltend), das neben der Ovarialsubstanz und Ichthyol noch Kalzium und Magnesium, Aloe und Salbei enthaltende *Ovotransannon*, das *Thelygan* und das *Thelygan-Antepan*, das *Eukliman*, welches durch seinen Gehalt an Nitroglyzerin und Agarizinsäure gegen die Wallungen und die Schweißausbrüche gut brauchbar ist, das *Mecessan*, das *Sedicyl*, besonders in Form des *Ovosedicyl*. Ob diese und andere Präparate — die Aufzählung ist keineswegs vollständig — die ihnen vielfach nachgerühmte spezifische Wirkung ausüben, muß mehr als fraglich bleiben.

Schließlich haben wir bei der Behandlung der klimakterischen Störungen einen nie zu vergessenden zuverlässigen Helfer und das ist die fortschreitende Zeit. Über kurz oder lang, leichter oder schwerer, werden die Frauen mit den Beschwerden fertig. So sehr auch die medikamentöse Therapie lindernd und erleichternd einspringt, soll sie doch, wie noch einmal betont sei, nicht im Vordergrund der Behandlung stehen. Die Allgemeinbehandlung, eine vernünftige Lebensweise, die nicht zu reichliche, mehr vegetabilische, reizlose Kost, die richtige Einteilung des Tages und der Beschäftigung wird neben den erwähnten physikalischen Maßnahmen das nächste und natürlichste Ziel der Therapie bleiben. Darum wird man nur ganz selten zu besonderen Verfahren, wie der Strahlenbehandlung gegenüber vasomotorischen Störungen, Kopfschmerzen und ähnlichen Erscheinungen greifen müssen. WERNER, BORAK u. a. haben durch Röntgenbestrahlung der Hypophyse, bzw. der Hypophyse und Thyreoidea, SZENES durch Diathermiebehandlung der Hypophyse, die Beschwerden schwinden gesehen.

Daß nach längst vollzogenem Wechsel jede Abwegigkeit im Bereiche der ruhenden Geschlechtsorgane unbedingt sofortige ärztliche Klärung erfordert, besonders daβ jeder Fluor und erst recht jedwede Blutung auf ihre letzten Ursachen genau geprüft werden muß, bedarf bei der bekannten Anfälligkeit der Matrone zum Karzinom keiner besonderen Begründung.

### Künstliches Klimakterium.

An die Schilderung der Behandlung des natürlichen Klimakteriums und seiner Beschwerden seien noch ergänzende Bemerkungen über das künstliche Klimakterium, wie es durch operative oder Strahlenkastration hervorgerufen wird, angeschlossen. Beide Arten der Kastration führen zu den bekannten Ausfallserscheinungen, welche sich im wesentlichen mit den Beschwerden des natürlichen Klimakteriums decken. Genaue Untersuchungen haben ergeben, daβ nach der Strahlenkastration einzelne Beschwerden und Erscheinungen deutlicher in den Vordergrund treten, wie z. B. vermehrter Scheidenfluß, Pruritus vulvae; ebenso scheint es, als würden die vasomotorischen Beschwerden nach Strahlenkastration stärkere sein, als nach der durch Operation gesetzten. Nach dieser wieder ist der Fettansatz häufiger als nach Strahlenkastration. ZACHERL gibt auch an, daβ die Beschwerden von Seite des Magendarmtraktes nach der operativen Kastration entschieden häufiger auftreten. Würden alle Fälle, in denen man zur Kastration, sei es durch Strahlenbehandlung, sei es durch Operation, bei Frauen in verhältnismäßig jungen Jahren gezwungen war, sich so verhalten, wie dies ASCHNER mehrfach geschildert hat, so müßte man im künstlichen Klimakterium auch der Vierzigerjahre und gar in früheren Zeitabschnitten eine geradezu untragbare und nicht zu verantwortende Verstümmelung sehen. Mag es auch richtig sein, daβ so manche der von uns namentlich in Anstalten kastrierten Frauen mit ihren klimakterischen Beschwerden sich von uns abwendet, weil sie in uns die Ursache ihres Übels erblickt, so kann es doch nicht so im Argen damit liegen, sehen wir doch viele Frauen wieder kommen, sei es gern und freiwillig, sei es nach Einberufung zu Kontrolluntersuchungen. Was wir da hören, entspricht nun in der größten Mehrzahl der Fälle jenen vorübergehenden, auf  $\frac{1}{2}$  bis 2 Jahre sich erstreckenden Symptomen und Erscheinungen, wie wir sie bei der natürlichen Klimax geschildert haben, und gerade hier bewahrheitet sich zur vollsten Klarheit der WIESELSche Satz, daβ das Klimakterium eine Angelegenheit der Konstitution ist. Auch hier sieht man die Pyknika, selbst wenn sie in den Vierzigerjahren kastriert ist, sich ganz anders verhalten als den intersexuellen Typ und die asthenische Frau. Es soll nicht geleugnet werden, daβ diese beiden letzteren Typen ganz gewiß, wenn vorzeitig oder gar besonders früh die Kastration gemacht wurde, schwerer leiden, als sie leiden würden, wenn sie ins natürliche Klimakterium kämen. Aber die Fälle, welche in schwere, ja unheilbare Krankheiten wie Atherosklerose, Nierenkrankheiten, Entartung des Herzens, schwerste Gelenkprozesse, Augenkrankheiten u. a. ausarten, sind denn

doch so selten, daß man in langen Jahren kaum einen solchen drastischen Fall sieht. Von diesem Gesichtspunkte aus muß man darum das künstliche Klimakterium betrachten. Trotzdem wäre es durchaus verfehlt, auch dann, wenn man in der Kastration so große Gefahren, wie sie ASCHNER schildert, nicht erblicken kann, die Anzeige zu derselben auch nur einigermaßen leichtsinnig zu stellen. Das ist zweifelsohne in vorangegangenen Jahrzehnten öfter geschehen; namentlich die nicht gefestigte Indikationsstellung bei Operation der entzündlichen Krankheiten der Adnexa hat dies verschuldet. Heute wissen wir, daß wir dieses kostbare Organ, den Eierstock, hoch zu respektieren haben und entschließen uns darum zur Kastration, auch wenn wir von ihr nicht jene furchtbaren Wirkungen erwarten wie andere, doch nur höchst ungern und nur dann, wenn ein anderer Ausweg nicht mehr besteht. Ist also in jungen Jahren, und man muß unter solchen füglich auch den Anfang des 5. Lebensjahrzehnts verstehen, die Kastration als ein Verfahren des Zwanges gerechtfertigt, so ist sie um das 50. Jahr, wenn operiert werden muß, beispielsweise bei Myomen, durchaus nicht mehr zu verwerfen, weil man damit ein für allemal die Frau vor jeden Weiterungen von Seite der inneren Genitalorgane schützt, und der Preis eines etwas schrofferen Wechsels diese Möglichkeiten späterer Gefährdung aufwiegt. Wir sind im übrigen heute operativ technisch so weit, daß wir bei einiger Bemühung die Opferung beider Eierstöcke, maligne Tumoren natürlich ausgenommen, vielfach umgehen und einen oder wenigstens einen Rest zurücklassen können, womit schon viel getan ist, indem auch ein solcher Rest, der schließlich der Atrophie anheimfallen mag, den Übergang in den Wechsel nicht so brüske bewirkt. Mit der Operation, der Totalexstirpation des Uterus und der Belassung der Adnexa kann man die Sympatikus-ausschaltung nach DOPPLER zur Erzielung einer arteriellen Hyperämie und damit zu lebhafter Tätigkeit des Eierstockes verbinden. Dieses Verfahren ist technisch einfach und besteht in der Pinselung mit *Isophenal*. Das Medikament wird mittels Tupfer, ohne daß der peritoneale Überzug über den Gefäßen entfernt zu werden braucht, auf das Ligament infundibulopelvicum und auf die Mesosalpinx aufgetragen. Die verwendete Menge kann für eine Seite 20 bis 25 ccm betragen. Da das Verfahren unschädlich ist — auch größere Mengen von *Isophenal* werden anstandslos vertragen — und da durch die Pinselung ein wesentlicher Zeitverlust bei der Operation kaum eintritt, kann von ihr um so mehr Gebrauch gemacht werden, als die Beseitigung der vasokonstriktorischen Nerven denn doch für die längerdauernde Hyperämie des Ovariums von Belang sein kann. Schließlich bleibt für diejenigen Fälle, in denen es technisch nicht möglich erscheint, das Ovarium in loco zu erhalten, noch die Möglichkeit, dasselbe zu transplantieren — Autotransplantation — sei es, daß man es in die vordere Bauchwand (Rectusscheide), sei es, daß man es zwischen die Blätter des Netzes bringt oder am Ligamentum latum befestigt. Nach solchen Autotransplantationen sieht man, daß wenigstens eine Zeitlang die Ausfallserscheinungen hinausgeschoben werden.

Im Schrifttum ist über eine große Zahl von Homoiotransplanta-

tionen, also Einpflanzung des Eierstockes einer anderen Frau auch bei Ausfallserscheinungen infolge vorzeitiger Kastration berichtet. Entschieden findet sie beim Klimakterium und bei klimakterischen Beschwerden viel seltener als beim Hypogonitismus Anwendung. In diesem Abschnitt (Amenorrhoe) ist über den Wert und die Anzeigen sowie die Bedenken gegen diese Art der Transplantation einiges ausgeführt. Hier sei darauf verwiesen und hinzugefügt, daß die Homoiotransplantation selbst dann, wenn sie keine Operation wäre, und wenn die Beschaffung des Gewebes nicht auf sehr bedenkliche Schwierigkeiten auch rechtlich ethischer Art stieße, für die Behandlung der klimakterischen Störungen von Frauen überhaupt nicht berechtigt erscheint und schon gar nicht bei einer natürlichen Klimax und mag sie noch so schwer sein. Es kann ja nicht Zweck der Therapie sein, die einmal nicht mehr arbeitenden oder fehlenden Eierstöcke neu einzupflanzen, vielmehr haben wir uns zu bestreben, den Boden für eine Lebenstätigkeit vorzubereiten, welche sich ohne die Inkrete des Eierstockes entsprechend diesem Lebensalter abzuspielen hat. Dagegen wird man im vorzeitigen, namentlich durch Operation oder Bestrahlung bedingten Klimakterium sich alle erdenkliche Mühe geben, das Heer der Erscheinungen und Beschwerden nach Tunlichkeit zu mildern. Dazu werden die bei der natürlichen Klimax angeführten Maßnahmen für die Mehrzahl der Fälle auch ohne Ovarialtransplantation, die nur vorübergehenden Effekt hat, genügen. In Fällen schwerer Ausfallserscheinungen, wie sie nach frühzeitig vorgenommener Kastration sich gelegentlich in Form starker Erregungszustände, schwerer Wallungen, Schwindelanfällen, Gefäßschmerzen usw. bemerkbar machen, ist die auch von SELLHEIM empfohlene Milchkur nach KISCH besonders wirksam. Sie erlaubt nur eine Mahlzeit zu Mittag und während des Tages 4 Gläser Milch in der Menge von 90 bis 180 bis 250 g. Wird durch Wochen hindurch eine solche Ernährung eingehalten — zweckmäßig können Pausen eingeschaltet werden — läßt sich damit vieles erreichen.

### **Ausfallserscheinungen nach Entfernung des Uterus.**

Was endlich die Ausfallserscheinungen nach der Entfernung des Uterus bei Belassung eines oder beider Eierstöcke anlangt, so können dieselben keinesfalls denen nach Entfernung der Ovarien oder Vernichtung durch die Strahlenbehandlung gleichgesetzt werden. Mögen auch die zurückgelassenen Eierstöcke nach Exstirpation des Uterus allmählich dem Schwund anheimfallen, so schicken sie doch noch geraume Zeit die entsprechenden Stoffe ins Blut, was sich als Menstruationswelle im Sinne MANDLS und BÜRGERS in Form der Molimina menstrualia zur Zeit der nicht mehr einsetzenden Periode äußern kann. Diese Molimina menstrualia bestehen in Kreuz- und Rückenschmerzen, ebenso wie in Allgemeinbeschwerden, wie sie von der Dysmenorrhoe her bekannt sind. Daß die zurückbleibenden Eierstöcke ihre Tätigkeit nach der Entfernung des Uterus nicht unmittelbar einstellen, beweisen jene seltenen Fälle, wo man anläßlich einer neuerlichen Öffnung der Bauchhöhle bei uterus-

beraubten Frauen ein Corpus luteum als Zeichen zyklischer Eierstockstätigkeit gesehen hat. Von großer Wichtigkeit ist es, daß nach der Exstirpation des Uterus allein höhere Grade von Fettsucht ebenso wenig wie Schrumpfung an der Scheide und äußeren Scham beobachtet werden. Alles in allem sind eben die Ausfallserscheinungen andere als nach der Entfernung des Uterus allein im Gegensatz zur Kastration. Das gilt nicht zuletzt auch für die seelische Stimmung derartiger Fälle. Die am leichtesten hinzunehmenden Wallungen finden sich freilich bei beiden Gruppen. Die im obigen ausgeführten Behandlungsgrundsätze für die klimakterischen Beschwerden können bei dieser leichteren Form der Ausfallserscheinungen sinngemäß Anwendung finden.

## Behandlung der entzündlichen Krankheiten des Genitales.

### 1. Gonorrhoe.

#### Vorbemerkungen.

Der Arzt, der eine Gonorrhoe bei einer Frau zu behandeln hat, darf weder gleichgültig noch mutlos an den Fall herantreten. Gleichgültigkeit oder gar Geringschätzung dieser Krankheit bedeuten eine schwere Fahrlässigkeit und können die Wurzel dauernden Siechtums für die Frau werden. Aber auch Mutlosigkeit, getragen von dem Gedanken, daß die Gonorrhoe trotz allen Bemühens doch nicht ausheile, ist fehl am Platze. Steht die Diagnose fest, und nur dann hat man der Patientin den Ernst der Lage zu offenbaren, so muß man wissen, daß es heute bei rechtzeitig begonnener, geduldiger und zweckmäßiger Behandlung gelingt, die Gonorrhoe nicht nur restlos auszuheilen, sondern auch so und so oft ihre Folgezustände ganz zu verhüten, zumindest aber sie weitgehend zu beseitigen.

Es liegt im Wesen dieser Krankheit, daß sie nach dem Sitze in den Geschlechtswegen ganz verschieden gewertet, behandelt und in ihrer Vorhersage beurteilt werden muß.

Wir trennen bekanntlich die Gonorrhoe der Urethra und ihrer Umgebung, der Bartholinischen Drüsen und der Cervix als Gonorrhoe der unteren Abschnitte von der der oberen Geschlechtswege, die bauchhöhlenwärts vom inneren Muttermund liegen. Ist die Gonorrhoe der unteren Geschlechtswege im allgemeinen eine örtliche, im wesentlichen auf die Oberfläche der Schleimhäute beschränkte Krankheit, so ist die innere Gonorrhoe nicht bloß eine Oberflächen-, sondern eine Tiefenkrankheit, bei der Blut und Lymphe mit befallen sind, ein Verhalten, welches durch den Ausfall der Komplementbindungsreaktion nach MÜLLER-OPPENHEIM sich erweisen läßt. Daß eine Gonorrhoe, welche die natürliche Grenze des inneren Muttermundes überschritten hat, demnach anders gewertet und anders behandelt werden muß, liegt auf der Hand und wird uns im Folgenden immer wieder begegnen.

Die Art der Infektionsvermittlung ist praktisch von großer Wichtigkeit. Die Nullipara oder die Virgo tragen beim Geschlechtsverkehr mit dem gonorrhöisch infizierten Mann meist immer eine Harnröhren-gonorrhoe davon, während der feste Schleimpfropf des Zervikalkanals die Ansiedlung der Gonokokken daselbst eher verhindert. Anders bei der Frau, die geboren hat. Bei ihr wird primär meist die Cervix infiziert, da der Scheidenvorhof dem vordringenden Glied kaum Hindernisse bietet, während besonders eine klaffende Cervix leicht die Gonokokken aufnimmt. Heutzutage verursacht eine akute Gonorrhoe seltener die Ansteckung. Meist sind es längst geheilt geglaubte „Katarre“ der Harnröhre der Männer, die vielfach schon den Ehekonsens erteilt bekommen haben oder beim außerehelichen Verkehr ärztlicherseits dazu die Erlaubnis hatten. Es kann nun sein, daß sich eine akute Urethritis oder Cervicitis entwickelt. Oft genug aber geschieht es, daß sich das Leiden ganz schleichend, vielleicht mit leichtem Brennen beim Wasserlassen und mit etwas Ausfluß einstellt und solange verkannt bleibt, bis nicht Regelstörungen auf dem Boden einer Endometritis corporis und Beschwerden der inneren Geschlechtsorgane, besonders von Seiten des Beckenbauchfelles, die Frau zum Arzt treiben, der eine aszendierte Gonorrhoe feststellt. Der praktische Arzt muß auch wissen, um Ehe- und Familienglück nicht zu zerstören, daß eine längst geheilt geglaubte Gonorrhoe aus Gründen, die nicht immer bekannt sein müssen, durch eine Art Passage durch die Ehepartner wieder an Virulenz gewinnen und bei dem einen oder anderen Teil den akuten Zustand von neuem anfachen kann. Ebenso wissen wir seit WERTHEIMS klassischen Untersuchungen, daß eine chronische, lang zurückliegende, der Frau vielleicht gar nicht bekannte Gonorrhoe auch ihrerseits beim Manne die akute Urethritis auslöst. Richtig ist, daß die Gonorrhoe des Weibes durch die Natur restlos ausgeheilt werden kann. Das gilt nicht nur für die Gonorrhoe der unteren Abschnitte, das gilt auch für die innere Gonorrhoe. Immerhin aber wäre es ein fahrlässiges Beginnen, auf diese Möglichkeiten allein zu bauen. Scheinheilungen sind häufig, aber es ist eine Eigenschaft des Gonokokkus, noch lange Zeit nach der Ansteckung und nach dem Schwinden akuter Symptome, Epithelinseln zu bevölkern, die versteckt gelegen, immer wieder Quellen neuer Ansteckung werden können. Das sind Inseln, die sowohl das äußere Genitale, die Urethra, die parauretralen Gänge und Krypten und ganz besonders die Ausführungsgänge der Bartholinischen Drüsen, als auch die Falten der Cervix betreffen können.

Urethra und Cervix stehen hinsichtlich der gegenseitigen Ansteckungsmöglichkeiten in einem wechselseitigen Verhältnis. Von der Urethra kann es durch Herabfließen des Sekretes über den Scheidenvorhof mit und ohne mechanische Förderung zur Infektion der Cervix kommen, wie andererseits durch den Zervikalschleim das gonokokkenhaltige Sekret in das Vestibulum vaginae vertragen und auf den genannten Stellen, aber auch im Rektum Fuß fassen kann. Daß dieses Sekret nicht bloß für die genannten Schleimhäute hoch pathogen ist, sondern auch der Augenbindehaut gefährlich werden kann, macht es jedem eine Gonorrhoe

behandelnden Arzt zur Pflicht, als ersten Punkt in der Beratschlagung sauberste Waschung der Hände der Kranken nach jeder Berührung des Genitales aufs schärfste anzuraten. Desgleichen muß man darauf verweisen, daß alle bei der Behandlung der Gonorrhoe gebrauchten Vorlagen, Wattestücke, Wäsche- und Bekleidungsgegenstände hoch infektiös sein können, solange sie feuchtes Sekret beherbergen. Verbrennung gebrauchter Vorlagen und Watte, sofortiges Einlegen verschmierter Wäsche in 2%ige Lysollösung muß besonders den Müttern zur Pflicht gemacht werden, damit nicht etwa Hausgenossen und besonders Kinder, die so sehr zur Gonorrhoe der Vulva und der Rektalschleimhaut neigen, angesteckt werden. Diese Ansteckung erfolgt durch die Übertragung des feuchten Eiters, während eingetrocknete Sekrete nicht mehr leicht anstecken, da der Gonokokkus nichts so schlecht verträgt als die Eintrocknung. Darum ist die Möglichkeit der Ansteckung durch die Benützung ungenügend gereinigter Badewannen nach dem Bad gonorrhöisch kranker Personen, durch die Verschmierung feuchten Sekretes ebenso gegeben, wie durch die gemeinsamen Liegestätten, die erwachsene Gonorrhöiker mit Kindern teilen, die gemeinsame Benützung von Handtüchern und feuchten Badeschwämmen, auf denen sich die Gonokokken 24 Stunden lebend erhalten können (JOACHIMOVITS).

Das bedeutungsvollste Ereignis im Verlaufe einer Gonorrhoe des Weibes ist ihr Aufsteigen in die inneren Geschlechtsabschnitte. Im Augenblick, da die Gonorrhoe die Barriere des inneren Muttermundes überschritten hat und zur inneren geworden ist, ist sie — das muß eindringlich betont werden — eine sehr ernst zu nehmende Krankheit geworden. Wenn sie auch nur ausnahmsweise das Leben verkürzt und auch als innere Gonorrhoe nicht unheilbar ist, wie man noch vielfach hört, weil sie durch eine rationelle und spezifische Behandlung ausgeheilt werden kann, so stellt sie doch eine die Gesundheit schwer beeinträchtigende, die Arbeitskraft und Lebensfreude stark schmälernde Krankheit dar. Sie macht die Frauen gerade in der besten Zeit des Lebens siech und krank und bringt sie oft genug um die schönsten Möglichkeiten, den Kindersegen — nur 10 bis 15% der Fälle beidseitig aszendierter Gonorrhoe bleiben konzeptionsfähig! — oder sie führt nach der Aszension im ersten Wochenbett durch entzündlichen Verschuß beider Eileiter zur berüchtigten Einkindersterilität. Wie geht nun die Aszension der Gonorrhoe vor sich? Man nimmt mit R. SCHRÖDER wohl richtig an, daß nach Überschreiten der Barriere des inneren Muttermundes bzw. des Isthmus uteri durch die Gonokokken das Corpus uteri und mit ihm gleichzeitig die Tuben befallen werden, ein Vorkommen, das in rund 20 bis 30% aller Gonorrhöefälle beobachtet wird. Die Ursachen für die Aszension liegen vor allem in Kontraktionen der Uterusmuskulatur, die mit Erschlaffung derselben abwechselnd eine Druck- und Saugwirkung ausüben (WAGNER). Dasselbe geschieht durch Druckschwankungen bei schwerer körperlicher Arbeit und übertriebener sportlicher Betätigung. In den meisten Krankengeschichten derartiger Fälle kann man der Aszension bestimmte Ereignisse vorausgehen sehen. Immer sind es solche, bei denen Uterus-

kontraktionen im Vordergrund stehen, vor allem die Menstruation, das Wochenbett nach Abort und Geburt, intrauterine ärztliche Eingriffe und Kohabitation. Warum in dem einen Fall alsbald nach der Infektion der Cervix das Aufsteigen der Gonokokken erfolgt, warum in einem anderen Monate und Jahre vergehen können, und, was das wichtigste ist, warum schließlich eine solche Aszension trotz erwiesener Gonorrhoe der Cervix ausbleiben kann, ist dermalen nicht bekannt. Soviel aber ist sicher, daß alle den Körper schwächenden Einflüsse und örtliche Unterentwicklung des Genitales die Aszension begünstigen können.

Schließlich verdient noch Erwähnung, daß der Gonokokkus im allgemeinen andere Erreger neben sich nicht aufkommen läßt, und daß demnach Mischinfektionen nur selten beobachtet werden. Immerhin wird er auch zusammen mit Staphylo- und Streptokokken sowie Koli-bazillen besonders in chronischen Fällen gefunden, wengleich sein alleiniges Vorkommen mit Ausnahme der Sekundärinfektion der befallenen Tuben vom Darm her die Regel ist. Aber auch bei der seltenen Endokarditis und bei der häufigen gonorrhoeischen Arthritis sind Staphylo- und Streptokokken zugleich mit dem Gonokokkus gefunden worden.

Wenn man beim Manne von einer Inkubationszeit von etwa 3 Tagen zu sprechen gewohnt ist, so soll das nur heißen, daß für den Patienten gewöhnlich nach dieser Zeit die ersten Erscheinungen des Harnröhrentrippers offenkundig werden. Eine echte Inkubation gibt es aber weder beim Mann noch bei der Frau. Vielmehr treten pathologisch-anatomisch unmittelbar nach der Einbringung der Keime auf die empfindliche Schleimhaut die ersten Erscheinungen im Sinne der Sekretion ein, die freilich erst am 2. oder 3. Tag sehr deutlich werden. Ferner ist noch wichtig zu wissen, daß es eine Immunität gegen die Gonorrhoe, wenn überhaupt, so nur in enorm seltenen Ausnahmefällen gibt, daß daher praktisch jede Frau als infektionsbereit angesehen werden muß, wengleich nicht geleugnet werden soll, daß die Empfänglichkeit der Menschen verschieden ist, wie man denn sieht, daß in dem einen Fall die Erscheinungen stürmisch und typisch, also gleich nach der Infektion, in dem anderen allmählich, langsam und leicht verkennbar, weil nur schleichend, beginnen.

Es kann nicht Aufgabe dieser Darstellung sein, die Pathogenese der Gonorrhoe zu erörtern. Hervorgehoben sei nur, daß die sich flächenhaft ausbreitenden Gonokokken, die besonders Zylinderepithel bevorzugen, eine mächtige seröse Ausschwitzung erzeugend, Leukozyten anlocken, weshalb nach der Vorstufe der heftigen Rötung und Schwellung der Schleimhaut alsbald infolge des Leukozytengehaltes das vorbrechende Sekret weiß, bzw. gelblich gefärbt ist. Dieses ist es, welches in den Leukozyten die in Semmel- oder Kaffeebohnenform meist in Gesellschaft beieinander liegenden Gonokokken beherbergt. Sie sprengen die Kapsel der Leukozyten, bringen ihre Kerne vielfach zum Zerfall und finden sich meist in und nicht außerhalb des Rahmens der weißen Blutkörperchen. Mit ihrem Nachweis steht und fällt die Diagnose der Gonorrhoe. Derselbe ist in akuten Fällen leicht, in chronischen, lang zurückliegenden oft

ungemein schwierig und nur nach wiederholter, so und so oft erst unter besonderen Maßnahmen auszuführender Untersuchung zu erbringen. Ist der Nachweis der Gonokokken für die Frage der Infektiosität eines Falles das Um und Auf, so sind bei negativem Ausfall der bakteriologischen Untersuchungen jene der Erfahrung nach auf Gonorrhoe verdächtigen Veränderungen, wie wir sie besonders an den Adnexen zu sehen gewöhnt sind, als auch spezifisch gonorrhöisch durch die Anstellung der Komplementbindungsreaktion zu erhärten. Dasselbe gilt auch von den tiefen periurethralen und den um den Ausführungsgang der Bartholinischen Drüse gelegenen Infiltraten sowie von der tiefen Cervixgonorrhoe mit Metritis colli. Die MÜLLER-OPPENHEIMSche Komplementbindungsreaktion stellt nicht nur diagnostisch, sondern auch hinsichtlich des therapeutischen Weges bei kritischer Deutung eine wichtige Bereicherung unseres Rüstzeuges dar. Fällt sie positiv aus, so beweist sie, daß in den erwähnten tieferen Gewebeschichten so gut wie immer gonorrhöische Herde vorhanden sind. Dagegen sagt sie uns nicht, ob gleichzeitig auch eine oberflächliche Schleimhautgonorrhoe besteht. Fällt sie negativ aus, so ist die Patientin entweder vollständig gesund, oder sie kann an einer Oberflächengonorrhoe leiden, demnach auch infektiös sein, was nur durch geduldige Sekretuntersuchung zu erweisen oder abzulehnen sein wird. Die Reaktion zeigt uns also auch in länger zurückliegenden Fällen, mag die Oberflächengonorrhoe längst ausgeheilt sein, die Grundnatur des Leidens an und gibt uns damit wertvolle Hinweise für den therapeutischen Weg. Während die Anstellung der Komplementbindungsreaktion selbstverständlich nur Sache eines entsprechend eingerichteten Laboratoriums sein kann, weshalb der Praktiker nichts anderes zu tun hat, als 5 bis 10 cem Blut aus der Armvene unter den üblichen Maßnahmen durch Venae punctio zu entnehmen und einzusenden, ist die Sekretuntersuchung ganz Sache des Arztes, wenn er einigermaßen damit vertraut ist. Mag für Erfahrene jene Übersicht über ein Sekretpräparat, wie sie die einfache Methylenblaufärbung liefert, genügen, so ist zweifelsohne die Anfertigung eines Grampräparates — der Gonokokkus ist gramnegativ — wegen der leichteren Deutbarkeit entschieden vorzuziehen. Grundsätzlich wichtig ist, daß alle Sekretpräparate in dünner Schicht auf den Objektträger verstrichen und erst nach Lufttrocknung oder vorsichtigem Durchziehen durch die Flamme gefärbt werden.

Was nun die Sekretentnahme anlangt, so genügt bei der akuten Harnröhrengonorrhoe ein leichter Druck auf die hintere Harnröhrenwand, um einen dicken Tropfen Eiter vorquellen zu lassen, oft schon das bloße Abwischen der hochrot geschwollenen, wie eine Papille vorragenden Harnröhrenöffnung. Man entnimmt das Sekret am einfachsten mit einem sterilen, mit Watte umwickelten Holzstäbchen oder der Platinöse oder mit den eigens für diesen Zweck hergestellten Löffelchen. In den Fällen chronischer Harnröhrengonorrhoe muß man aber von hinten her mit dem Zeigefinger die Urethra austreichen. Während die meisten Ärzte bei vermuteter chronischer Harnröhrengonorrhoe den Harn vor der Sekretentnahme längere Zeit zurückhalten lassen, geht BUCURA gerade umge-

kehrt vor. Hat nämlich die Patientin lange Zeit nicht uriniert, so kann der kräftige Harnstrahl, der sich bei gefüllter Blase ergießt, zuviel Sekret und mit ihm die Erreger abschwemmen. Darum ist es nach BUCURA besser, nach Reinigung der Harnröhrenmündung von den ersten Tropfen, die immer Bakterien der Scheide enthalten, erst nach Ausmassieren der Urethra von der Scheide her beim zweiten Auspressen das Sekret zu entnehmen. Auch für diese Fälle der Sekretentnahme eignen sich die dünnen Wattestäbchen oder stumpfe Sekretlöffel (wie der von WOLF) besser, wie die zu stark biegsame Platinöse. Ist man sich nach einer Methylenblaufärbung — nach Lufttrocknung des Ausstriches wird das Präparat einmal kurz in konzentrierte wässrige Methylenblaulösung eingetaucht und in reinem Wasser abgespült — nicht klar geworden, so kann man aus demselben Präparat ein Grampräparat ohne weiteres durch Umfärbung herstellen, wenn man vorher jede Spur von Zedernöl mit Xylol, dann mit Äther und schließlich mit Alkohol und Wasser entfernt hat.

Schwieriger ist schon die Sekretentnahme aus den Ausführungsgängen der Bartholinischen Drüse. Nach Reinigung der Ausmündungsstelle mit steriler Watte drückt man die Öffnung des Ganges aus und bringt diese minimale Sekretmenge auf den Objektträger. Aus den Skeneschen und parauretralen Gängen kann man Sekret nur nach Reinigung der Oberfläche mittels Einführen des Knopfes ganz feiner Haarsonden gewinnen, was technisch nicht ganz leicht ist.

Die Entnahme des Vaginalsekretes kommt für geschlechtsreife Frauen nicht, wohl aber für Kinder, Schwangere und Greisinnen in Frage, deren Schleimhaut für den Gonokokkus anfällig ist.

Für die Beurteilung und Therapie des Falles von grundlegender Bedeutung ist die Sekretentnahme aus der Cervix. Für die Mehrzahl aller Fälle genügt es, mit einem in 10%iges Natrium bicarbonicum oder 10%igem Sodaglyzerin getauchten Wattestäbchen den Schleimpfropf zu entfernen. Wo dies nicht gelingt, soll man sich der BUCURAschen Saugglocke bedienen, welche wohl gleichzeitig die beste örtliche Provokation darstellt. Macht man die Sekretentnahme überdies noch unmittelbar nach der Menstruation, nach der erfahrungsgemäß die Aussichten, etwa vorhandene Gonokokken aufzufinden, am größten sind, so wird man am leichtesten Gelegenheit haben, die Diagnose bakteriologisch zu erhärten. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß namentlich von Seite der Dermatologen die Provokation durch Einspritzung von Arthigon (siehe dieses) oder anderer Formen der Vakzine befürwortet wird, ohne daß dies jedoch auch immer notwendig wäre. Die Arthigoninjektion zu provokatorischen Zwecken wird bei Frauen intravenös mit 0,05 ccm Arthigon (entsprechend 5 Millionen Gonokokken) gemacht, am besten vormittags und die Patientin sofort ins Bett geschickt, das sie je nach der Reaktion vor 1 bis 2 Tagen nicht verläßt. Die Temperatur wird zweistündlich gemessen und zeigt häufig zwei kurz vorübergehende Temperaturanstiege in Form einer Doppelzacke. Beträgt die Temperaturdifferenz mehr als 1,5°, so spricht dies für Gonorrhoe mit großer Wahrscheinlichkeit, bei hohen

Temperaturzacken kann man mit Sicherheit darauf schließen. Wichtig ist auch die Beobachtung von Herdreaktionen, Schmerzen in den Adnexen, Vermehrung eines Sekretes aus der Urethra, vermehrter Zervixfluß. In diesen Sekreten, die man am ersten, allenfalls am zweiten oder dritten Tag nach der Injektion untersucht, lassen sich eher die Gonokokken nachweisen. Andere Arten der Provokation finden bei der Behandlung noch verschiedentlich Erörterung.

### Die Behandlung der Gonorrhoe der unteren Geschlechtswege.

#### Urethritis und Vulvitis gonorrhoeica.

Von der Tatsache ausgehend, daß eine Gonorrhoe der Urethra auch ohne jede Behandlung ausheilen kann, wozu die natürliche Durchspülung der kranken Harnröhre durch den Harn wesentlich beiträgt, während jede Manipulation im akuten Stadium nur geeignet scheint, die Gonokokken zu verbreiten, sollen wir in dieser Zeit jedwede Therapie unterlassen. Die Bettruhe ist besonders vorteilhaft. Ihre Durchführung scheidet freilich oft an der Ungunst der Verhältnisse. Die natürliche Spülung durch den abfließenden Harnstrahl soll durch möglichst reichlichen Flüssigkeitsgenuß erhöht werden. Hierzu ist die Aufnahme mehrerer Liter Flüssigkeit im Tage anzuraten; es ist ziemlich gleichgültig, ob es sich dabei um Wasser oder Tee handelt. Man wird die Desinfektionskraft des Harns dadurch erhöhen, daß man innerlich die bekannte Harndesinfizientia verbunden mit den krampflindernden Balsamica gibt. Diese Medikation wird solange eingehalten, bis die eitrige Sekretion im Abklingen begriffen ist. Man läßt neben dem Lindenblütentee den bekannten *Bärentraubentee* gemischt mit *Bruchkrauttee* trinken:

77. *Herbae herniarum*  
Foliae uvae ursi . . . . aa 50,0  
D. S. 1 Eßlöffel auf 1 Tasse Tee (bis  
4 Tassen im Tag).

78. Fol. uv. ursi  
Herb. herniarum  
Fol. Bucco  
Herb. Chenopodii . . . . aa 20,0  
D. S. 1 Eßlöffel auf 1 Tasse Tee  
3mal täglich.

Was die *Balsamica* anlangt, so verordnet man

79. Balsam. Copaiivae  
in capsulis gelatin. . . à 0,3—0,6  
D. S. 3 Kapseln täglich.

80. Balsam. Copaiivae  
Tinct. aromatica . . . . . aa 7,5  
D. S. 3mal täglich 15 Tropfen.

81. Balsamum Copaiivae  
Extract. Cubebarum . . . . aa 0,3  
in capsulis gelatin.  
D. tal. dos. Nr. X  
S. 3 Kapseln täglich.

Von den Harndesinfizientis, die nicht zu entbehren sind, gibt man die billigen *Hexamethylentetramin*-Tabletten oder -Kompretten (3- bis 5mal täglich à 0,5). Teurer ist schon das nicht mehr leistende *Hexal* à 0,5 (3mal 2 Ta-

bletten im Tage). Nicht nur als Desinfiziens, sondern auch infolge seiner Schmerzstillung wird das *Uromed* (3mal täglich 2 bis 3 Dragees unzerkaut) gern gegeben. Neuerdings hat man mit *Pyridium* à 0,5 bis 1,0 gute Erfolge erzielt (3mal täglich 1 Tablette). Billiger als die Verschreibung des *Salol* ist die unter dem chemischen Namen *Phenylum salicylicum* (à 1 g), das am besten in Milch (4mal täglich) genommen wird.

Das Aufsteigen der gonorrhoeischen Infektion in die Blase ist selten. Eine gonorrhoeische Cystitis bietet, wenn sie gelegentlich einmal vorkommt, nichts für diese Krankheit besonderes. Häufig ist dagegen der Blasenhals an der Infektion mitbeteiligt. Blasenkrämpfe können die Urethritis und Trigonitis begleiten und erfordern neben Bettruhe, warmen Tüchern und heißen Sitzbädern (2mal täglich von 40° C) eine entsprechende Kost: Vorteilhaft ist besonders reine Milchdiät, Fleisch und Kochsalz ist einzuschränken, Gewürze sind ganz zu verbieten. Sind die erwähnten Balsamica nicht imstande, den Blasenkrampf zu lindern, muß man mit Belladonna ankämpfen:

82. Extract. Belladonn. . . . . 0,02	83. Extract. Belladonn. . . . . 0,1
But. Cac. ad . . . . . 2,0	Natr. salicyl. . . . . 5,0
M. f. supp. an. D. tal. dos.	Syr. simpl. . . . . 10,0
Nr. X	Aqu. font. ad . . . . . 100,0
S. 2—3 Zäpfchen.	D. S. 3mal täglich 1 Eßlöffel (STRASSMANN).

Im übrigen gilt das, was für die Cystitis auf anderer Grundlage (S. 256 ff.) ausgeführt ist, insbesondere, daß bei derselben zu reichliches Trinken, namentlich am Abend, eher schädlich ist, weil es zu häufiger Blasenentleerung und damit zu Tenesmen Veranlassung gibt.

Bei der seit längerem bestehenden, sich des öfteren wieder neu-meldenden Entzündung des Blasenhalses empfiehlt sich das Auswischen des Blasenhalses nach KNORR. Diese Methode aber erfordert bereits spezielle gynäkologisch-urologische Kenntnisse.

Die Beseitigung des aus den infizierten Geschlechtswegen austretenden eitrigen Sekretes, welches über die Vulva herabfließend, daselbst die Erscheinungen der akuten Entzündung, Rötung, Schwellung, Schmerzen, Epitheldefekte und Intertigo auslöst, ist ein notwendiges Glied im Behandlungsplan der Gonorrhoe. Der Vulvitis gonorrhoeica kann man durch äußerste Sauberkeit beikommen, wobei sich die betreffende Kranke bewußt sein muß, daß hoch infektiöses Material in das Badewasser, in die Sitzbadewanne und in die Wäsche vertragen wird. Am besten ist, mindestens zweimal täglich für die Reinigung des äußeren Genitales durch ein örtliches Bad mit 2%iger Lysol- oder Hypermanganlösung zu sorgen. Gut bewährt ist der Zusatz von *Pastill. hydrorargyr. oxycyanat.* 0,5, davon eine Pastille auf etwa 2 Liter Wasser. Die Reinigung erfolgt mit Watte, die sofort nach Gebrauch verbrannt wird. Außerdem muß die Patientin, wie schon betont, streng darauf achten, die Augen nicht zu infizieren. Manchmal ist die Rötung und Schwellung des Genitales so stark, die akute Vulvitis so groß, daß man zunächst ohne Umschläge mit *essig-*

*saurer Tonerde, Bleiwasser, Borsäure* nicht auskommt. In einer Schale bereitet man sich die essigsaurer Tonerde (aus Burowsic oder Statim-patronen) oder gibt von

84. Alum. acet. solut.

D. S. 1 $\frac{1}{2}$  Eßlöffel auf 1 Liter Wasser.

oder bereitet sich aus

85. Liquor. plumb. subacet.

D. S. 1 Eßlöffel auf 1 Liter Wasser.

das Bleiwasser selbst, taucht in dasselbe einen Gazefleck oder eine Watte ein und gibt die kühlende Lösung vor die Vulva, die großen Labien dabei leicht entfaltend. Alle 3 Stunden wechselt man den sofort zu beseitigen-den Umschlag. Auch das 1- bis 3%ige Borwasser

86. Acid. boric. pulv. . . . 10,0 bis  
20,0—30,0

D. S. In 1 Liter heißen Wassers zu lösen und abkühlen lassen.

ist zweckdienlich. Für die Sprechstundenbehandlung ist die Pinselung der Vulva und des Vestibulum mit 2 bis 5%iger *Lapislösung* das leistungsfähigste Verfahren. Ist die Vulvitis infolge Vernachlässigung stärker geworden, so eignen sich im Hause zunächst *Kamillen-* und *Käspappelbäder* (*Malva silvestris*), dann *Eichenrindenbäder*. Letztere werden dann am besten so bereitet, daß  $\frac{1}{2}$  kg Eichenrinde auf 2 Liter Wasser gegeben und diese Menge auf 1 Liter eingekocht wird. Dieser Liter wird jetzt auf das Sitzbad geschüttet oder etwa  $\frac{1}{4}$  desselben für eine Bidetwaschung verwendet. Metallwannen sollen, da sie durch den Gerbstoff angegriffen werden, nicht benützt werden. Sorgfältige Trocknung, am besten wieder durch sanftes Aufdrücken von Wattebauschen und nachheriges Auftragen kühlender Puder ist erwünscht. Man verordnet als Puder

87. Zinc. oxydat. . . . . 20,0  
Talc. venet. . . . . 80,0

D. S. Äußerlich zum Einstauben.

Salbenbehandlung erscheint weniger angezeigt, weil die Sekrete dadurch eher kleben bleiben.

Die örtliche Behandlung der Urethritis gonorrhoeica soll, wie gesagt, erst nach Abklingen der stürmischen Erscheinungen beginnen und besteht am häufigsten in Injektions- und Stäbchenbehandlung und Auswischen der Urethra. Die Injektions- und Stäbchenbehandlung hat den Vorteil, daß sie von der Patientin selbst geübt, daher längere Zeit ohne Kosten durchgeführt werden kann, jedoch ist es zweifelsohne nötig, daß die Patientin vom Arzt über die Art und Weise, wie die Spritze zu hand-

haben ist, unterrichtet wird. Sie muß dabei im Anfang einen Taschenspiegel zu Hilfe nehmen. Am billigsten ist die männliche Tripperspritze nach NEISSER, die mit 2 bis 5 cm der gleich zu besprechenden verschiedenen Lösungen beschickt, nach Harnlassen mit ihrem Konus auf die Urethralmündung aufgesetzt und nach Niederdrücken des Spritzenstempels in dieser Stellung durch 3 Minuten belassen wird, damit die Flüssigkeit ohne zurückzufließen allseits mit der Schleimhaut in Berührung komme, dieselbe entfalte und auch auf einzelne Inseln stehengebliebener Gonokokken wirke.

In der Sprechstunde benützt man mit Vorliebe für Frauen die Spritze mit dem Ansatz von FRITSCH, der ungefähr 7 cm lang ist und hinter seiner olivenförmigen Anschwellung 7 kleine Öffnungen hat; die Spritze wird soweit eingeschoben, daß die Olive den Sphinkter internus berührt. Nach Niederdrücken des Spritzenstempels berieselt die aus den Augen austretende Spülflüssigkeit die Harnröhre von hinten nach vorne. Als Spülflüssigkeiten bzw. zur Einspritzungstherapie werden die bekannten Silberpräparate, in erster Linie das altbewährte *Argentum nitricum* — auch heute noch wohl das wirksamste Heilmittel — aber auch die Silber-Eiweißverbindungen benützt. Man verordnet 2%ige *Argentum-nitricum-Lösung*, 2‰ige *Argentaminlösung*, 2%ige *Ichthargan-* oder 3%ige *Protargollösung* in der Gesamtmenge von 100 g oder die ebenfalls 3%ige *Protargolglyzerinlösung*. Hinsichtlich des Protargols ist zu bemerken, daß es sehr vorteilhaft ist, das leicht lösliche Protargolgranulat (3 g des Granulat = 1 g des Protargol) vorrätig zu halten und sich frisch die Lösung in kaltem Wasser zu bereiten. Dadurch wird die Wirksamkeit derselben nur erhöht. Ferner bewähren sich *Albargin* und *Transargan* in 1- bis 2%iger Lösung. Es ist nach dem Rate G. A. WAGNERS immer empfehlenswert, mit den Medikamenten zu wechseln, weil die Gonokokken gegen ein und dieselbe Medikation leicht unempfindlich werden. Man kann diese Medikamente oder eine 5- bis 10%ige Lösung vom *Cuprum sulfuricum* auch mit feinen Tamponträgern entweder mit dem Sängerschen Silberstäbchen oder dem dünnen Chrobakschen Tamponträger auftragen (R. FRANZ). Die Tamponträger dürfen nicht dicker als eine mittlere Stricknadel sein und müssen zwecks sicherer Befestigung der Watte ein aufgerauhtes Ende haben. In der Zeit einer so weitgehenden Verarmung wie der unsrigen, können wir auf die Selbstbehandlung der Frau nicht verzichten. Dort, wo die Tripperspritze aus Ungeschick nicht verwendet werden kann, erweist sich die Selbsteinführung von Stäbchen in die Urethra, welche bei der Körperwärme gelöst werden und das Medikament auf der Schleimhaut zur Wirkung bringen, als unbedingt notwendig. Die Zahl dieser in den Handel gebrachten Stäbchen ist sehr groß. Am besten sind diejenigen, die wasserlöslich sind und keine Kakaobutter als Träger des Silberpräparates enthalten, weil die Kakaobutter, wenn sie bei der Körperwärme schmilzt, die Schleimhaut mit Fett überzieht und dadurch dem Eindringen des Silbers Schwierigkeiten bereitet. Sehr gut sind die von ASCH angegebenen Stäbchen von folgender Zusammensetzung:

88. Sacch. alb. sub. pulv.  
 Sacch. lactis  
 Gummi arabic. . . . . aa 3,0  
 Traganth. Glycerin qu. s.  
 Choleval 10%  
 M. f. bacill. urethr. Crassitu-  
 dine 4 mm, longitudine  
 70 mm.

Ferner die fertigen *Styli Spuman* à 0,5, cum argent. nitric. 0,15% oder *Protargolstäbchen* (5%ig, 24 mm lang, 4 mm dick) oder *Gonostyli Albargini* (0,2%, 10 cm lang). Sehr zu empfehlen ist die *Cholevalgleitmasse*, die aus kleinen Tuben, die 5 ccm enthalten, in die Harnröhre eingespritzt wird, also Spritzen- und Stäbchenwirkung verbindet. Ferner seien noch erwähnt die *Targesinstäbchen* (6- bis 10%) und die *Partagonstäbchen*, die 1,5% Argentum nitricum enthalten und vor der Einführung kurz in Wasser getaucht werden, damit sie leichter hingleiten. Wo es angeht, ist tunlichst Spül- und Stäbchenbehandlung auszuführen, am besten so, daß die Patientin sich ein Stäbchen einführt, nachdem sie etwa  $\frac{1}{4}$  Stunde nach der Spülung der Urethra ausuriert hat. Nach Einführung des Stäbchens soll 20 bis 30 Minuten der Harn zurückgehalten werden.

Die Behandlung der parauretralen Gänge, welche neben dem Ductus der gland. Bartholini (macula gonorrhoeica Sängeri!) leider nicht selten ungemein hartnäckige Schlupfwinkel der Gonokokken darstellen, wird vom praktischen Arzt, sofern er nicht besonders geschult ist, besser dem Facharzte überlassen. Man muß sie nach Ausdrücken mit einem Tropfen 3- bis 5- bis 10%iger Silbernitratlösung oder mit

89. Ammon. sulfoichthylol.  
 Glycerin . . . . . aa 10,0  
 D. S. Zum Auspinseln.

mit einer entsprechend kurzen Knopfnadel oder nach dem Vorgehen von ASCH mit einer Tränengangkanüle aus Silber behandeln. Die Amerikaner und die Venerologen ziehen die elektrokaustische Behandlung vor. In Ermanglung dieser Vorrichtungen kann man auch einen fein zugespitzten Lapisstift, allenfalls den dünnsten Paquelin verwenden. Für Gonokokkeninseln, wie sie sich auch in der Hinterwand der Urethra gelegentlich immer wieder halten, wird der Facharzt ebenfalls die galvanokaustische Verschorfung verwenden. Die seltenen parauretralen Abszesse erfordern chirurgisch-fachärztliche Behandlung.

Was die Bartholinitis selbst anlangt, so hat die Eigenblutumspritzung zu ihrer Behandlung viel von sich reden gemacht. Man entnimmt zu diesem Behufe aus der Ellenbeuge in einer 10 ccm fassenden Spritze, die zur Hälfte mit 5%iger Natrium-citr.-Lösung gefüllt ist, das Blut und bringt es in Depots zu je 2 ccm in Form eines Rhombus (nach Art der Anlegung einer Umspritzung zum Zwecke der Exstirpation der Drüse in Lokalanästhesie) rund um sie herum an. Die Schule BUCURAS übt die Umspritzung mit Vorliebe mit Vollmischvakzine, indem ein  $\frac{1}{4}$  ccm der Vollmischvakzine mit physiologischer Kochsalzlösung auf

1 cem aufgefüllt und damit die Drüse oberhalb und unterhalb des Ausführungsganges umspritzt wird. Das Verfahren ist weniger schmerzhaft, da kleinere Mengen zur Verwendung kommen, doch erzeugt es höhere Temperaturen. Damit kann man entzündliche Drüsen, wenn auch nicht immer, zum Rückgange bringen. Ist der Pseudoabszeß bereits ausgebildet, hat die Patientin hohes Fieber, kann sie infolge der schmerzhaften Schwellung nicht mehr gehen, dann inzidiere man mit einem Spitzmesser breit die Drüse, und zwar an der Stelle der größten Verdünnung, eine Operation, die der praktische Arzt unbedenklich machen kann. Man Sorge nur, daß die Schnittöffnung nicht zu klein ist, damit es nicht zur Sekretstauung komme. Wenn man die Höhle mit einem in Burow getauchten Streifen zart auslegt und durch einige Tage über die Vulva feuchte Umschläge gibt, kann man am 4. Tag das Auslegen bereits unterlassen, warme Sitzbäder mit Hypermanganlösung, später mit Eichenrinde nachschicken und rasch Heilung erzielen. Dort, wo aus der immer wieder rezidivierenden Entzündung bei verschlossenem Ausführungsgang eine Bartholinische Zyste geworden ist, ist namentlich dann, wenn sie beim Gehen und bei der Kohabitation sich störend bemerkbar macht, die chirurgische Ausschälung der einzige Weg zur Heilung. Eindringlich muß vor einer Ausführung dieser Operation, die technisch gar nicht so einfach ist, durch ungeschulte Hände gewarnt werden.

Noch einige Worte über die spitzen Kondylome und ihre Behandlung als häufige Begleiterscheinung einer Gonorrhoe. Bekanntlich werden sie für die Trägerin durch die Sekretion, durch die sie offenbar bedingt werden, die sie aber auch vermehren, recht quälend, zumal sie einen äußerst üblen Geruch zu verbreiten pflegen und zu Ekzemen in der Umgebung und Intertrigo hohen Grades Veranlassung geben. Während man ganz kleine, isoliert stehende Wärzchen mit *rauchender Salpetersäure* oder *konzentrierter Milchsäure* abätzen kann, hat Verfasser von der Pulver- und Pastenbehandlung mit *Sabina* und *Resorcin* von Seiten der Patientinnen meist nur Klagen gehört. Vielleicht, daß der Rat von JOACHIMOVITS, das *Sabinapulver* nach der Vorschrift:

90. Summitat. sabinæ	91. Summitat. sabinæ . . . . .	10,0
Alumin. crud. . . . . aa	Resorcin. albiss. . . . .	5,0
D. S. Äußerlich.	D. S. Äußerlich.	

gleichzeitig mit *Dermatol* der Patientin zu verordnen und dieses aufzutragen, wenn die Sabina Brennen verursacht, die Nachteile dieser Behandlung aufwiegt. Am einfachsten und sichersten ist die chirurgische Therapie, die in Narkose bei größeren, reichlich um den After, Damm und an der Vulva verstreut liegenden Kondylomen, bei kleineren am einfachsten unter Chloräthylspray gemacht werden kann. Die Warnung, während der Gravidität wegen der Gefahr des Abortus von diesen Operationen abzusehen, scheint mehr theoretisch. Jedenfalls hat Verfasser bei wiederholter Übung dieser Operation in der ersten Hälfte der Schwangerschaft keinen Abortus erlebt, wohl aber binnen kürzester Zeit völlige Beschwerdefreiheit, gleichzeitig damit aber, was das wesentliche ist, Be-

seitigung höchst gefährlicher Brutstellen von Bakterien in Hinsicht auf Geburt und Wochenbett. Andere ziehen in der Schwangerschaft die Radiumbehandlung der Operation vor. Die Röntgentherapie ist für Fälle breitbasig aufsitzender, rasch wachsender, blumenkohlähnlicher spitzer Kondylome von besonderer Größe sehr vorteilhaft und gibt kosmetisch ausgezeichnete Ergebnisse (R. STEIN u. a.).

#### Cervicitis gonorrhoeica.

Weit verantwortungsvoller als die Behandlung der Urethralgonorrhoe ist die der Cervixgonorrhoe. Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß bei der Behandlung der Cervixgonorrhoe an Aktivität viel zu viel geleistet und daß so manche Aszension der Gonorrhoe durch brüske und durch polypragmatische Behandlung des Arztes verschuldet wird. An dem natürlichen Schutzwall, wie ihn der innere Muttermund bietet, muß respektvollst Halt gemacht werden. Wird die Behandlung über den inneren Muttermund hinaus ausgedehnt, so werden die leidigen Uteruskontraktionen dadurch ausgelöst und die Erreger ins Korpus und in die Tuben geschaffen, womit die Salpingitis und all ihre Folgeerscheinungen unausbleiblich sind. Zunächst gilt auch hier der bei der Urethralbehandlung betonte Grundsatz, im akuten Stadium nicht sogleich mit örtlichen Maßnahmen zu beginnen, vollauf. Erst wenn die stürmischsten Erscheinungen vorübergegangen sind, tritt die lokale Behandlung in ihre Rechte. Was man bis dahin tut, soll nur symptomatische Behandlung des lästigen, zu Juckreiz, Rötung und Intertrigo führenden Fluors sein. Diesem begegnet man am besten durch (35° C) warme Sitzbäder, die 2mal täglich genommen werden und zu denen Hypermanganlösung zugesetzt wird. Mit Vaginalspülungen sei man vorsichtig und lasse sie nur aus nicht zu hoher Fallhöhe (etwa 50 cm) machen. Man verordnet Spülungen mit Irrigator und Mutterrohr (niemals sind Gummiballons erlaubt) mit

92. Zinci oder Cupr. sulfur. . . . . 50,0  
D. S. 1 Kaffeelöffel auf 1 Liter  
Wasser.

93. Zinci chlorati  
Aqu. fontis. . . . . aa 150,0  
D. S. 1 Eßlöffel auf 1 Liter Wasser.

Sind die Schmerzen dabei heftig, unterlasse man die Spülungen, die im übrigen nicht mehr als adstringierend wirken. Mehr als die einfachen Scheidenspülungen leisten zweifelsohne Spülungen von  $\frac{1}{2}$ - bis 1stündiger Spüldauer, wie sie durch den Apparat von JOACHIMOVITS und SCHWARZ ermöglicht werden.<sup>1</sup> Man spült anfänglich mit  $\frac{1}{2}$ °iger *Protargollösung* usw., später mit *Kamillen-* und *Salbeitee*.

Was nun die eigentliche Behandlung der Cervixgonorrhoe anlangt, die also nur bei subakuter und chronischer Cervicitis in Frage kommt,

<sup>1</sup> Genaue Beschreibung siehe bei JOACHIMOVITS, *Gonorrhoe der weiblichen Genitalorgane*, Verlag Wilhelm Maudrich, Wien 1933, und bei C. BUCURA, *Entzündliche Erkrankungen d. weibl. Geschlechtsorgane*, Verlag v. Julius Springer, Wien 1930.

so geschieht sie regelmäßig nur nach Entfernung des zähen gelbgrünen Schleims, den man zart mit einem in 10%ige *Natrium-Bicarbonatlösung* getauchten Wattestäbchen oder mit der Saugglocke beseitigt. Nun ätzt man den Halskanal mit 5- bis 10- bis 20%iger *Argentum-nitricum-Lösung* oder mit 10%iger *Chlor-Zink-Lösung* oder mit dem zur Hälfte verdünnten käuflichen 40%igen *Formalin* oder mit 20%igem *Protargol*, das man wohl noch wirksamer als *Protargolglycerin* nach folgender Vorschrift verordnet (WAGNER):

94. Argent. protein. . . . . 2,0  
 Tere cum glycerino  
 Adde aquae ad . . . . . 10,0  
 D. S. Äußerlich. (Die Lösung muß  
 stets frisch bereitet werden.)

Es erscheint sehr vorteilhaft, diese Ätzung nicht öfter als zweimal wöchentlich zu machen. Auch hier ist uns die Industrie in der Behandlung hilfreich an die Hand gegangen, indem sie Cervixstäbchen hergestellt hat, deren Auflösung längere Zeit in Anspruch nimmt, wodurch eine größere Tiefenwirkung verbürgt ist. Bewährt haben sich uns die *Cholevalstäbchen*, die *Protargol*-, *Partagon*- und *Transarganstäbchen* u. a. Für die Einführung solcher Stäbchen ist der LINDENFELDSche Stäbchenträger recht bequem. An die Einführung des Stäbchens schließt sich die Vorlage eines mit 10%igem *Ichthyol*- oder *Tanninglycerin* usw. getränkten Tampons an. Die von JOACHIMOVITS angegebene lokale Cervixbehandlung mit ätherischen Ölen gewährleistet womöglich noch eine bessere Tiefenwirkung. Sie hat auch den Vorteil, daß die Emulsion der ätherischen Öle unbegrenzt haltbar ist. Die Vorschrift von JOACHIMOVITS lautet:

95. Mastic. . . . . 10 g  
 Solve in alc. absol. . . . . 25 g  
 Adde Cineoli . . . . . 20 g  
 Aqu. dest. ad . . . . . 200 g  
 ut. f. emulsio  
 D. S. Vor Gebrauch zu schütteln.

Natürlich muß auch dieser Behandlung die sorgfältige Reinigung des Halskanals vorausgehen. Wichtig ist, daß man die mit ätherischem Öl beschickten Wattestäbchen nicht länger als 5 Minuten liegen läßt und zwecks Vermeidung der Verätzung der Scheide in dieselbe vorher einen Tuffer einführt.

Bei hartnäckiger Cervixgonorrhoe bewährt sich die Massage der Cervix nach BUCURA mit Metallstäbchen mit gerauhten Knopfenden, welche gleichzeitig ein ausgezeichnetes Provokationsverfahren ist. An die Absaugung des Schleims schließt sich das Abstreichen der Schleimhäute des Cervikalkanals in langen Zügen von innen nach außen an. Dadurch werden gonokokkenhaltiger Schleim und Erreger an die Oberfläche gebracht. Dort, wo aber nicht bloß die Cervikalschleimhaut ergriffen ist, sondern auch die tieferen Partien von Gonokokken besiedelt sind, gleich-

zeitig also neben der Cervicitis eine Metritis colli besteht, ist die Vakzinebehandlung (siehe S. 106 ff.) angezeigt.

Eine ungemein häufige Begleiterscheinung der Cervicitis ist die Erosion. Richtig ist, daß mit der Abheilung des Katarrhs der Cervix auch die Erosion sich meist zurückbildet. Darum sind wir bei einer Erosion als Begleiterscheinung einer gonorrhoidischen Cervicitis nicht häufig gezwungen, gegen sie allein therapeutisch vorzugehen. Ihre Behandlung deckt sich mit der der Erosion überhaupt, welche S. 158 beschrieben ist.

#### Mastdarmgonorrhoe.

Sie entsteht in der Mehrzahl der Fälle durch die über den Damm gegen den Mastdarm herabfließenden gonokokkenhaltigen Sekrete während der Stuhlentleerung. Da sie symptomarm verläuft und in ein chronisches Stadium übergeht, bleibt ihr Beginn häufig unerkannt. Schmerzhaftes Stuhlentleerung, schleimige Sekretion müssen nicht immer vorhanden sein, doch bieten sie einen Hinweis auf die Erkrankung des Rektums. Nur durch den bakteriologischen Befund kann die Diagnose erhärtet werden, indem die nach einer Irrigation mit 100 ccm lauwarmen Wassers aufgefangenen Eiterflocken nach GRAM gefärbt werden. Die Behandlung ist mühsam, die Feststellung der Ausheilung nicht leicht. Reinfektionen infolge schlechter und ungenügend behandelter Genitalgonorrhoe werden immer wieder beobachtet. Am wirksamsten sind Mastdarmspülungen mit *Protargol* 1:1000, *Argentum nitricum* 1:2000 oder *Kalium hypermanganicum* 1:5000, die ein- bis zweimal täglich mittels Irrigators gemacht werden. Auch die Salbenbehandlung (10%ige auf 45° erwärmte *Protargol-Vaseline*, 2%ige *Argentum-nitricum-* oder *Alumnol-Salbe* (2- bis 5%ig) oder Mastdarmzäpfchen, beispielsweise die 10%igen *Targesinzäpfchen*, oder die *Tampovagan-Suppositorien* (cum. argent. proteinico et Ichthyolo aa 3%) werden gebraucht.

#### Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum.

Die Mehrzahl aller Fälle von Vulvovaginitis infantum ist gonorrhoidischen Ursprungs, wenngleich auch andere Erreger dieses Symptombild auslösen können. Die Ansteckung der Kinder erfolgt fast immer durch gemeinsame Schlafstellen und gemeinsamen Gebrauch von Handtüchern, Nachtgeschirren usw. Epidemien in Kinderspitälern und Waisenhäusern sind ebenfalls beobachtet. Leider wird bei der Vulvovaginitis gonorrhoeica in der Mehrzahl der Fälle auch die Urethra und das Rektum miterkrankt angetroffen, hingegen ist die Aszension begreiflicherweise bei dem ruhenden und noch nicht entwickelten Genitale selten. Während die bakteriologische Untersuchung unschwer Klarheit verschafft, ist die Behandlung mühsam, langwierig und nicht immer von Erfolg begleitet. Entdeckt man eine frische Vulvovaginitis, müssen Bettruhe und zweimal täglich warme Sitzbäder mit *Käsepappel*, *Kamillentee*, *Kleie* (1 bis 1½ kg Weizenkleie werden in einem Beutel in das Badewasser hineingehängt, der von Zeit zu Zeit ausgedrückt wird) oder *Kalium hypermanganicum* verordnet werden. Bei besonders starker Verschwellung der äußeren Teile kann

man die Maßnahmen, wie sie bei der Vulvitis der Erwachsenen geschildert sind, nicht umgehen. Erst nach Ablauf der akuten Entzündungserscheinungen, worüber 1 bis 2 Wochen vergehen, beginnt man mit der örtlichen Behandlung, und zwar mit Scheidenspülungen. Am ungefährlichsten sind sie mit Netalon- oder Janetkatheter auszuführen. In Ermangelung eines solchen kann aber auch eine Tripperspritze auf den Vorhof aufgesetzt und als Spülflüssigkeit 1- bis 5%ige *Argentum nitricum*-, 1- bis 5%ige *Protargol*- oder *hellrote Hypermanganlösung* benützt werden. Die Spülungen müssen 1- bis 2mal im Tage wiederholt, die Kinder gut beaufsichtigt und mit geschlossenen Beinkleidern versehen werden. Auch mit der Bäderbehandlung (heiße Bäder von 41 bis 43° C und 1stündiger Dauer) hat man gute Erfolge erzielt (R. FRANZ). Überwachung im Bade ist wegen der Möglichkeit von Schwächezuständen notwendig. Von einer Heilung kann man erst nach der Untersuchung zahlreicher Abstriche reden. Sie zu erzielen, muß unbedingt unser Bestreben sein, da selbst Jahre nach einer solchen Kindergonorrhoe noch Gonokokken zurückbleiben können.

### Die Behandlung der inneren Gonorrhoe.

#### Intrauterinbehandlung.

Wenn es auch in der Hand eines erfahrenen, gerade auf die Behandlung der Gonorrhoe besonders eingestellten Gynäkologen in ausgewählten Fällen vorteilhaft sein kann, die erkrankte Schleimhaut des Corpus uteri zu behandeln, wie dies ja schon vor vielen Jahren in der ZWEIFELSchen Klinik gelehrt worden ist, so muß dieselbe als für den praktischen Arzt als nicht geeignet, um so mehr widerraten werden, als ein Fehler in dieser Behandlung nicht bloß zu schweren Störungen, nämlich neuerlichem, allenfalls sogar stürmischen Aufflammen der Symptome führen kann, sondern auch der Patientin, sehr zum Nachteil des Arztes, den ursächlichen Zusammenhang zwischen Behandlung und Verschlimmerung aufdecken muß.

Wie wir heute wohl mit Sicherheit annehmen können, ist die Gonorrhoe des Corpus uteri als selbständiges Krankheitsbild nur von untergeordneter Bedeutung, indem mit dem Wechsel der Schleimhaut auch die durch die Gonokokken bedingte Endometritis in der Mehrzahl der Fälle in wenigen Wochen zur Abheilung kommt, weshalb eine eigens auf sie gerichtete Behandlung außer allgemeinen Maßnahmen nicht vonnöten ist. Diese Tatsache muß immer als Leitgedanke der Therapie gelten, die, wenn sie das Korpus unangetastet läßt, mehr leistet, als wenn sie etwa durch direkte Einbringung von Ätzmitteln in die Korpushöhle restliche Infiltrate in der Basalis des Endometriums vernichten würde, die schließlich so gut wie immer von selbst ausheilen.

Was die vom Korpus fortgeleitete Adnexentzündung und deren örtliche Behandlung auf dem Wege über die Korpushöhle anlangt, so müssen jedenfalls auch in der Hand des geübten Fachmannes frisch entzündliche Veränderungen unbedingt eine Gegenanzeige für die Intrauterinbehand-

lung sein. Etwas anderes ist es schon bei chronischer Entzündung der Adnexa, wenn sie offenbar durch immer neue Schübe vom Korpus her aufflackert. Hier kann unter Vermeidung aller Umstände, die zu Uteruskontraktionen führen oder Verletzungen und Verstöße gegen die Asepsis bedingen können, eine vorsichtige Ätzung der Korpuschleimhaut mit 40%iger *Formalinlösung* nach MENGE mit den von ihm angegebenen Hartgummistäbchen gemacht werden. Auch die Verwendung von *Jodtinktur* oder 10%igem *Jodvasogen* mit der Playfairsonde ist gangbar. Die Behandlung erfolgt höchstens zweimal wöchentlich. Geschieht es, daß die Watte im Uterus zurückgehalten wird, so hat das nicht viel zu bedeuten, weil sie von selbst ausgestoßen wird. Besser ist es aber, dieses Ereignis, das Kontraktionen verursacht, zu vermeiden, indem man aus der Watte beim Aufwickeln auf das Stäbchen einen kleinen Knopf macht, der das Hineinschlüpfen derselben und das Herausziehen erleichtert (WAGNER). Erfordert diese Art der Behandlung meist ein Anhängen der Portio, allenfalls sogar eine Dilatation, so werden durch die Instillation weniger Tropfen einer 2%igen *Argentum-nitricum-* oder 2%igen *Protargol-Lösung* durch einen Ureterkatheter diese bedenklichen Prozeduren vermieden. Deshalb ist diesem von BUCURA inaugurierten, von WAGNER verbesserten Verfahren am ehesten das Wort zu reden. WAGNER verwendet, um den Rücklauf des etwa überschüssigen Medikamentes aus dem Uterus sicher zu erzielen, neben dem längeren in den Uterus führenden Ureterkatheter einen zweiten kürzeren, eben den Isthmus überragenden, der als Rücklaufrohr dient und mit ersterem durch einen aus alten Handschuhen zu schneidenden Gummistreifen durch Klebestoff verbunden wird. Alles in allem ist die Intrauterinbehandlung ein heikles, bei unvorsichtiger Handhabung geradezu gefährliches Verfahren, welches nur in ausgesuchten Fällen und nur bei besonderer Übung und Geschicklichkeit Erfolge, in der Hand Ungeübter aber eher Schäden zeitigt. Bei dieser Sachlage erscheint die Vakzinetherapie bei der Korpusgonorrhoe und der der Adnexa um so mehr angezeigt, als sie bei sicherer Wirkung auch in der Hand weniger Geübter unbedenklich ist.

### Die Behandlung der gonorrhoeischen Entzündung der Adnexa.

Das akute Stadium der inneren Gonorrhoe macht oft stürmische, ja geradezu besorgniserregende Symptome und bietet für diejenigen, welche wenige derartige Fälle gesehen haben, sehr leicht den Anschein einer zur allgemeinen Peritonitis sichtlich hinneigenden Krankheit von hoher Lebensgefahr. Wenn es auch richtig ist, daß die akute Appendizitis differentialdiagnostisch eine sehr große Rolle spielt und alle Umstände, die für und gegen dieselbe sprechen, ins Treffen geführt werden müssen, wobei namentlich der Nachweis einer Gonorrhoe nicht unterbleiben soll, wenn ferner stielgedrehte Ovarialtumoren, Tubarabort und in seltenen Fällen akute Sigmoiditis ein ähnliches Bild heraufbeschwören können, so läßt sich doch in der Mehrzahl der Fälle durch Erheben der Anamnese und Berücksichtigung des Gesamtbildes die Diagnose auf Aszension einer Gonorrhoe stellen. So unheimlich beim ersten Anblick das Bild sein mag,

besonders wenn neben den heftigen Schmerzen und Temperaturen bis 39° C und darüber, Meteorismus, Brechneigung, belegte Zunge bestehen, so zeigt sich doch, wenn man nur den Mut hat zuzuwarten und seiner Sache sicher ist, daß dieser so gefährlich scheinende Zustand im Verlaufe weniger Tage wesentlich sanfter zu werden beginnt. Üblichkeit und Brechneigung nehmen ab, das Fieber geht zurück und auch die Darmtätigkeit kommt mit und ohne Abführmittel in Gang. Wichtig ist, daß im Anschluß an die Regel, sehr häufig unter neuem Auftreten einer Blutung das Krankheitsbild sich entwickelt, also deutlich abhängig von der Periode ist, deren Gefahren wir für die Aszension der Gonorrhoe eingangs ausdrücklich hervorgehoben haben. Der Angelpunkt der Therapie in diesem Stadium liegt darin, vom Messer nicht Gebrauch zu machen. So unscheinbar dies klingt, es ist von ausschlaggebender Tragweite, weil eine in diesem Augenblick ausgeführte Laparotomie zur Katastrophe infolge Verbreitung der Bauchfellentzündung führen kann, zumindesten aber zu einer schweren Bauchdeckeneiterung und einer besonders bedrohlichen und lang währenden Pelveoperitonitis Veranlassung gibt. Ist es einmal geschehen, daß der Gynäkolog oder was häufiger vorkommt, der Chirurg in der Annahme einer akuten Appendizitis die Bauchhöhle geöffnet hat und nun düsterrote geschwollene Eileiter findet, aus deren Fransenende vielleicht rahmiger Eiter ausfließt, so soll er, will er die Sache nicht zum Schlimmen wenden, unangetastet die Bauchhöhle wieder schließen und jedweden Versuch einer Entfernung von Teilen des inneren Genitales unbedingt unterlassen. Demnach ist im allgemeinen die Indikation zum operativen Eingreifen im akuten Stadium nur äußerst selten tatsächlich unabweisbar. Mag es auch so scheinen, als ob das hohe Fieber und die Vorwölbung des Douglas wenigstens zur vaginalen Inzision zwingen müßten, so ist auch dieser Eingriff, wie G. A. WAGNER ausdrücklich hervorhebt, nur selten angezeigt, da es sich meist nicht um pelveoperitonitische Abszesse, sondern viel öfter um abgesackte Eiterungen in den Tuben handelt, deren restlose Entleerung nicht gelingt und die zu ständiger Eiterung Veranlassung geben. Auch die Punktion der Eitersäcke vom Douglas her ist wohl kein ganz unbedenkliches Verfahren. Man weiß nicht, bis wohin man mit der Nadel gelangt, kann Adhäsionen aufreißen und den Eiter in die freie Bauchhöhle vertragen.

Indem man der Patientin anschaulich vorstellt, daß zwar Veränderungen im Bauchfell vorhanden sind, die die Schmerzen erklären — der anatomisch allerdings unhaltbare Ausdruck der Bauchfell-„Reizung“ ist da üblich und für den Laien nicht schlecht — beruhigt man auch seelisch die meist schwer betroffene Frau, der man durch eine Reihe von wichtigen symptomatischen Maßnahmen wesentliche Erleichterung zu schaffen hat. Oberstes Gebot ist zunächst strengste Bettruhe, welche sich soweit zu erstrecken hat, daß auch Harn- und Stuhlentleerung im Bette zu erfolgen haben; um diese strenge Bettruhe dreht sich zunächst alles. Wer vermögend genug ist, um eine wochenlange Bettruhe einzuhalten und wer, wenn er arm ist, Gelegenheit hat, auf öffentliche Kosten in einem Spitale

unterzukommen, ist hinsichtlich der Vorhersage seines Zustandes im allgemeinen nicht so übel daran. Je länger er liegt und je genauer er das Gebot der Bettruhe befolgt, um so sicherer kann er sein, daß seine Gonorrhoe mehr minder gut ausheilen wird. Die lange Zeit streng eingehaltene Bettruhe aber ist auch weitaus die beste Vorbereitung für eine besonders gute Wirkung der in den späteren Stadien anzuwendenden Vakzinetherapie (siehe diese).

Daß mit der absoluten Bettruhe alles vermieden werden muß, was eine Vermehrung der Hyperämie des kleinen Beckens bewirkt, ist selbstverständlich, und unsere Vorsorge muß soweit gehen, daß nicht bloß, was nicht zu betonen ist, jedwede unmittelbare erotische Reizung des Genitales wegzufallen hat, sondern daß auch alles, was mittelbar durch Besuche, Lektüre usw. auf die Genitalsphäre hyperämisierend einwirkt, vollständig in Fortfall kommen muß. Darunter gehört absolutes Verbot von Alkohol, ein leichtes, dabei aber nahrhaftes Kostregime, bestehend aus Suppe, möglichst passierten Gemüsen, geschabtem, wenig gewürzten Fleisch, Mehlspeisen leichter Art, besonders solchen mit Fruchtmarmeladen, als Getränke Fruchtsäfte und nicht zuletzt Kamillentee, welcher auf die schmerzhaften Darmbewegungen einen entschieden lindernden Einfluß hat. Was nun die Ruhigstellung der Bauchorgane anlangt, kann man es einerseits mit der Kälte, andererseits mit der Wärme versuchen. Es klingt unverstänlich, daß zwei gerade entgegengesetzte thermische Verfahren schmerzlindernd wirken sollen. Richtig ist, daß die Kälte mehr zur Ruhigstellung des Darmes und zur Anämisierung desselben und des Uterus führt, daß aber nach ihrer Entfernung eine um so stärkere Hyperämie einsetzt. Merkwürdig, aber Tatsache ist es, daß bei verschiedenen Völkerschaften die Empfindungen verschieden liegen. In unseren Gegenden vertragen die Frauen entschieden besser die Hitze als die Kälte, in Amerika ist es gerade umgekehrt. Man hält sich am besten an den Ratsschlag G. A. WAGNERS, dasjenige zu geben, das im Einzelfalle die Schmerzen am besten lindert. In der Mehrzahl der Fälle kommt man aber ohne schmerzstillende Mittel nicht aus. So manche der bei der Dysmenorrhoe angeführten Antidolorosa (S. 39) tun auch hier gute Dienste. Besonders sei auf das *Papaverin* (Rp. 70, S. 75) und die *Belladonna* (Rp. 82, S. 93) hingewiesen. Kombinationen dieser beiden Mittel mit *Codein*

96. Extract. Belladonn. . . . .	0,02	97. Extract. Belladonn. . . . .	0,02
Papaverin. hydrochlor. . . . .	0,03	Codeinae hydrochlor. . . . .	0,02
But. Cacao ad. . . . .	2,0	But. Cacao ad. . . . .	2,0
M. f. suppos.		M. f. suppos.	
S. 1—2 Zäpfchen täglich.		S. 1—2 Zäpfchen täglich.	

sind manchmal nicht zu umgehen. In leichteren Fällen genügt Codein

98. Codein. phosphor. . . . .	0,3
Aqu. amygd. amar. . . . .	6,0
Aqu. fontis ad . . . . .	20,0
D. S. 3mal täglich 20 Tropfen.	

Wohlfeil und sehr gut wirksam sind MARBURGS Pulver (Rp. Nr. 131, S. 201) und die *Antipyrikklysmen*: Man löst in 3 Eßlöffeln Wasser 2 g Antipyryn und gibt es nach Reinigungsklyisma in einer kleinen Spritze 1- bis 2mal täglich. Bewährt haben sich von schmerzstillenden Fabrikmarken das Spezialpräparat *Eupaco* in Tabletten oder Zäpfchen, das *Veramon* à 0,4 mehrmals im Tage, die *Gelonida antineuralgica*, *Optalidon*, *Saridon*, *Treupelsche Tabletten*, die *Belladonna-Excludzäpfchen*, *Bellafollin* (1 bis 2 Tabletten à 0,25 mg oder 10 bis 20 Tropfen). Von *Morphin*, *Heroin* kann man so gut wie immer, von *Opium* und *Pantopon* auch vielfach absehen. Diese Medikamente im Verein mit Umschlägen machen auch heftigste Schmerzen durchaus erträglich. Entweder man macht echte Prießnitzumschläge, d. h. man nimmt eine in kaltes Wasser getauchte Kompreße (Handtuch), das man ausgerungen hat, deckt es mit einem trockenen Tuch zu und gibt darüber entweder Billrothbatist oder Flanellstoff oder ein Wolltuch und läßt diesen Umschlag mehrere Stunden liegen (etwa 2 bis 3 Stunden lang). Seine Wirkung besteht in einer langsam einsetzenden, daher angenehm empfundenen reaktiven Hyperämie, die schmerzstillend und krampflösend wirkt. Die Wirkung ist schwächer, als die jener Hyperämie, die dadurch erzeugt wird, daß wir von Haus aus warme oder heiße Kompressen auflegen und die Wärme durch einen Thermophor erhalten. Beider Methoden kann man sich bedienen, wobei man, wie noch einmal erwähnt sei, weitgehend dem Empfinden der Patientin entgegenkommen soll. Benützt man die Eisblase, so muß man dafür Sorge tragen, daß sie niemals der Haut unmittelbar anliegt, sondern durch mehrere Lagen von Tüchern von derselben getrennt bleibt und bei länger dauernder Verordnung am besten in einer Art Hängevorrichtung, die man leicht behelfsmäßig aus Tüchern oder Gurten herstellen kann, angebracht wird, damit sie nicht durch Druck störe. Wo ein recht unangenehmer ziehender Schmerz gegen den Mastdarm hin besteht, wo vielleicht ein Douglasexsudat sich einzustellen droht, machen wir von der Kälte mit Vorliebe Gebrauch, indem wir den Atzbergerschen Mastdarm-Kühlschlauch anwenden. Derselbe ist sehr einfach zu handhaben und stellt nichts anderes dar, als ein geschlossenes Mastdarmrohr mit Zu- und Ablaufvorrichtung, in der das Wasser von der gewünschten Temperatur kreist. Wir nehmen diesen Atzbergerschen Kühler, der auch in der Chirurgie bei paraproktalen und proktalen Erkrankungen gern verwendet wird, mindestens zweimal täglich durch etwa eine halbe Stunde in den Behandlungsplan auf. Ganz besondere Aufmerksamkeit muß dem Darne zugewendet werden. Eine etwa bestehende Stuhlverstopfung ist auf jeden Fall hintanzuhalten, nicht nur weil sie besonders in der Flexura sigmoidea zu Kottumoren führen, sondern weil sie auch die ohnehin schon bestehende Hyperämie nur noch vermehren kann. Am besten eignen sich Kamilleneinläufe oder solche mit Öl, außerdem die unschädlichen Gleitmittel, besonders das *Paraffinum liquidum* und *Paraffluid* (2mal täglich 1 Eßlöffel) oder (die teureren) Fabrikpräparate *Nujol*, *Paraffinal*, *Paraffinum aromaticum*, *Purgiolax*, *Rigalit* und *Agarol* (siehe auch bei Obstipation S. 248 ff.). Von salinischen Abführmitteln

macht man nur zeitweise Gebrauch. Das von ASCHNER zwecks Milderung des Ablaufes der Entzündung besonders empfohlene *Calomel* wird bei diesem Zustande nicht in der abführenden, sondern in kleinen Dosen entweder als solches (3mal täglich 0,01) oder in Verbindung mit Podophyllin in Form der *Chologentabletten* (Stärke I) verordnet.

Sind die Temperaturen zur Norm zurückgekehrt oder erreichen sie wenigstens nicht mehr höhere Werte als gegen Abend 37,5, sind die Schmerzen gelinde geworden, dann ist es an der Zeit, dem Leiden, das sich anschickt, subjektiv in Heilung oder zumindestens in eine weitgehende Besserung überzugehen, recht energisch an den Leib zu rücken, um es tatsächlich auszumerzen.

### Vakzinetherapie der Gonorrhoe.

Die auf den Forschungen der Pasteurschen Schule fußende, von WRIGHT begründete Vakzinetherapie ist in Deutschland wohl zuerst von BRUCK praktisch zur Anwendung gekommen und unter anderen von MUCH, BUSCHKE und LANGER verschiedentlich ausgebaut worden. Für die Vakzinebehandlung der weiblichen Gonorrhoe hat aber unbestreitbar BUCURA durch zahllose mühselige Untersuchungen das Verfahren so ausgebaut, daß es heute bei unvoreingenommener Beurteilung als das wertvollste Behandlungsverfahren der weiblichen Gonorrhoe genannt werden muß. BUCURA und seine Schüler haben uns zeigen können, daß die Vakzinebehandlung der Gonorrhoe denn doch eine spezifische ist. Damit ist aber von vornherein ausgedrückt, daß sie mehr leisten muß, als andere Arten der Behandlung, insbesondere besser ist als die Proteinkörpertherapie. Unter der Voraussetzung der Benützung einer wirksamen Vakzine — die nicht leicht zu gewinnen ist — leistet diese Therapie das, was sie zufolge ihrer Wesensart leisten kann. Sie beeinflußt in spezifischer Weise die tiefe Gonorrhoe, also jene Prozesse, bei denen die Gonokokken bereits in inniger Berührung mit dem Lymph- und Blutstrom des Körpers stehen. Sie ist aber wirkungslos bei der oberflächlichen Gonorrhoe, dort, wo die Gonokokken nur als Rasenbildner auf den Schleimhäuten auftreten, nicht in die Tiefe gedrungen sind und infolgedessen nicht in Kontakt mit dem Blut- und Lymphstrom stehen. Darum ist auch nur bei der Tiefengonorrhoe die Komplementbindungsreaktion positiv, während sie bei der oberflächlichen Gonorrhoe negativ ausfällt. Zuzufolge dieses Umstandes muß die oberflächliche Gonorrhoe örtlich behandelt werden, weil die Vakzine bei ihr unwirksam bleibt. Ist man sich dieser Tatsache bewußt, dann wird man nicht mehr von der Vakzinetherapie verlangen, als sie füglich leisten kann, wird aber bei geduldiger und richtig durchgeführter Behandlung ausgezeichnete Erfolge sehen, wovon sich Verfasser in den letzten Jahren durch eigenen Augenschein immer wieder überzeugen konnte. Die Vakzinetherapie stellt nichts anderes dar, als eine aktive Immunisierung des Körpers. Eine solche ist im akuten Zustand der Gonorrhoe weder notwendig noch angezeigt, im Gegenteil, zu diesem Zeitpunkt bringt der Körper genug Immunisierungstoffe durch die eben in ihn eingedrungene Krankheit auf, und es könnte gefährlich werden,

dieselben künstlich vermehren zu wollen. Die Vaccinierung darf erst einsetzen, wenn der Körper an seine eigenen Immunisierungstoffe gewöhnt ist und wenn ihrer nicht mehr genug aufgebracht werden, um mit den restlichen Herden der Krankheit fertig zu werden. Die Therapie darf also erst dann einsetzen, wenn klinisch gesprochen der Prozeß ein subakuter geworden ist oder beginnt, in den chronischen Zustand überzugehen. Erst dann, wenn die Temperatur unter  $37,5^{\circ}$  gesunken ist, wenn die Senkungsgeschwindigkeit nicht mehr auffallend kurze Werte aufweist, erst dann ist es Zeit, mit der Vakzinetherapie zu beginnen. Gerade das Erfassen des richtigen Augenblicks für den Anfang der Behandlung ist einer der wichtigsten Punkte für den Erfolg oder Mißerfolg. Daß sie nicht zu früh gegeben werden darf, wurde gesagt. Wo sie aber zu spät begonnen wird, und dies ist leider vielfach der Fall, dann kann sie, wenn einmal weitgehende anatomische Veränderungen bindegewebiger Natur an den Eileitern und im Beckenbauchfell entstanden sind, diese nicht mehr zur Norm zurückbringen, wie die einfache Überlegung lehren muß, derzufolge Schwarten und Bindegewebe als Endzustand einer abgelaufenen Entzündung nicht mehr verschwinden können, da sie längst nicht mehr bakterielle Herde darstellen, sondern ein anatomisch greifbarer Folgezustand der abgelaufenen Entzündung sind. Hält man sich dies vor Augen und beginnt man möglichst bald, aber nicht zu bald mit der Vakzinetherapie, dann wird es zur Entwicklung solcher Folgezustände, die nicht mehr beeinflussbar sind, weniger leicht kommen. Bevor auf die Technik der Vakzinetherapie eingegangen wird, sei daran ausdrücklich erinnert, daß beim Bestehen einer Lungentuberkulose oder einer Nephritis die Vakzinierung nicht in Angriff genommen werden darf, weil sie eine Verschlechterung dieser Leiden hervorrufen kann. Es ist auch ein Gebot der Vorsicht, bei heruntergekommenen oder von Haus aus anämischen Frauen die Therapie hinauszuschieben, wenn sie überhaupt in Erwägung gezogen wird, bis der Allgemeinzustand gebessert ist. Welche Prozesse sind es nun, so lautet die Frage, welche der Vakzinierung unterworfen werden sollen? Zunächst einmal bleibt das Hauptgebiet der Vakzinierung die Salpingoophoritis gonorrhoeica mit und ohne Beteiligung des Corpus uteri als echte Tiefenerkrankung der Gonorrhoe. Aber auch bei der sogenannten offenen Gonorrhoe sieht man durch die Lokalbehandlung so und so oft keine Heilung mehr, weil die Gonokokken nicht allein die Oberfläche der Schleimhaut besiedelt haben, sondern auch in die Tiefe der Umgebung eingedrungen sind. Darum gibt die Vakzinetherapie bei der Cervicitis mit Metritis colli infolge Eindringens der Gonokokken in die Tiefe, ebenso wie bei der Periurethritis und der Peribartholinitis ausgezeichnete Resultate. Bei den echten Metastasen der Gonorrhoe, der Arthritis gonorrhoeica und bei den glücklicherweise seltenen Fällen von Endocarditis, in denen die Komplementbindungsreaktion immer positiv ist, ist sie das Verfahren der Wahl.<sup>1)</sup> In Fällen, in denen der

---

<sup>1</sup> Besonders leistungsfähig ist nach den Erfahrungen WIEDMANNs an der KERLschen Universitäts-Klinik für Geschlechts- und Hautkrankheiten

Krankheitsbeginn lange zurückliegt, sieht man, trotzdem eine Gonorrhoe die Ursache der Krankheit war, die Serumreaktion so und so oft negativ ausfallen. Dann erlebt man es auch, daß die Gonokokkenvakzine nicht das leistet, was man erwartet hat. Darum ist es für diese Fälle besser, statt der Gonokokken-Vakzine die sogenannte Vollmischvakzine zu verwenden, welche neben den Gonokokken die abgetöteten Leiber der Wundkeime (Staphylokokken, Streptokokken, Kolibazillen) enthält. Dort, wo eine reine Infektion mit Wundkeimen vorliegt, ist die Anwendung der Mischvakzine angebracht, über welche bei den septischen Entzündungen noch einmal gesprochen wird. Es war ein glücklicher Einfall, die Gonokokken-Vakzine, wie sie im Wiener Serotherapeutischen Institut nach den Angaben BUCURAS hergestellt wird, Blenovakzine zu nennen und sie dadurch ihres verdächtigen Namens zu entkleiden, der bei Patienten und besonders deren Angehörigen zuviel verrät. Da die Blenovakzine BUCURAS eine polyvalente ist, also aus einer größeren Zahl verschiedener Gonokokkenstämme unter besonderer Berücksichtigung einer nicht zu langen Kultivierung hergestellt wird, sind Versager wenig zu befürchten. Die Blenovakzine BUCURAS, welche im Kühlen aufbewahrt und vor dem Gebrauch unbedingt geschüttelt werden muß, wird entweder als intramuskuläre (nicht intravenöse) Injektion oder als lokale Injektion in die Portio gegeben. Letzteres Verfahren ist bereits ausgesprochenes Arbeitsgebiet des Gynäkologen. Nach bakteriologischer und womöglich auch serologischer Feststellung der Gonorrhoe beginnt man die Behandlung folgendermaßen:

Die gut durchgeschüttelte Vakzine wird in einer 1 ccm fassenden, ausgekochten Spritze in der Menge von etwas mehr als  $\frac{1}{10}$  ccm aufgezogen und tief nach Art einer Quecksilberinjektion in die Gesäßgegend injiziert. Bei Klagen über Schmerzen daselbst wird sie das nächste Mal in den Oberschenkel und zwar in dessen Außenseite eingespritzt. Die Patientin wird angewiesen, mindestens zweimal täglich Temperatur zu messen und bei Steigerung derselben über  $37,2^{\circ}$  das Bett aufzusuchen. Diese kleine Dosis bewahrt uns als tastende Anfangsdosis vor zu stürmischen Reaktionen.

Die spezifische Reaktion äußert sich als allgemeine Reaktion mit Einsetzen von Schüttelfrost, Fieber und Krankheitsgefühl, als Herdreaktion durch Vermehrung der Schmerzen im Becken und des eitrigen Ausflusses und an der Stelle der Injektion durch Rötung und Schmerzhaftigkeit des Stichkanals.

Die Anfangsdosis besteht aus 300 Millionen Keimen, da 1 ccm 3000 Millionen Keime enthält. Diese Gabe wird bis zur Höchstgabe von 2 ccm, d. i. 6000 Millionen Keime gesteigert. Tritt auf die Injektion von  $\frac{1}{10}$  ccm keine Reaktion auf, so steigert man nach 3 Tagen die Gaben auf das

in Wien, die periartikuläre Umspritzung des erkrankten Gelenks in Form von 3 bis 4 subkutanen Depots einer durch  $\frac{1}{2}$ %iger Novocainlösung verdünnten Vakzine nach Vorbereitung des Körpers durch Vakzination in der steigenden Dosis von  $\frac{1}{4}$  bis 2 ccm. Die Dosierung der periartikulären Depots wird in derselben Weise wie bei der allgemeinen Vakzination gehalten.

Doppelte und nach weiteren 3 bis 4 Tagen auf das Dreifache der Anfangsdosis. Hat man bisher keine Reaktion erzielt, so gibt man nach BUCURA als nächste Gabe  $\frac{6}{10}$  ccm und bei weiterem Ausbleiben der Reaktion 1 ccm. Dann steigert man auf  $1\frac{1}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,  $1\frac{3}{4}$ , schließlich auf 2 ccm, welche Dosis man niemals überschreitet. War die Reaktion aber sehr stark ausgesprochen, so bleibt man auf der unveränderten Gabe solange stehen, bis die Reaktion ausbleibt. Erst dann steigert man nach BUCURAS Schema. Bei jungen und kräftigen Personen, denen man eine stärkere Reaktion zumuten darf, beginnt man mit  $\frac{1}{4}$  ccm und steigert bei Fehlen der Reaktion das nächste Mal auf das Doppelte, dann auf  $\frac{3}{4}$ , 1 ccm,  $1\frac{1}{2}$  und 2 ccm und verbleibt auf 2 ccm längere Zeit. Ist aber eine Reaktion bei den Einzelgaben aufgetreten, so wird auch bei kräftigen Frauen die nächste Gabe nicht gesteigert, vielmehr der Eintritt der Reaktionslosigkeit abgewartet.

Neben der intramuskulären Verabfolgung der Vakzine machen wir ausgiebig — aber nur bei liegenden Patientinnen — von der Injektion in die Portio Gebrauch. Da die Reaktion schon nach 10 Minuten bis zu einer  $\frac{1}{2}$  Stunde unter starkem Schüttelfrost und schwerem Krankheitsgefühl einsetzen kann, eignet sie sich für ambulatorische Behandlung nicht, gibt aber hinsichtlich der Reaktionsfähigkeit der tiefen Gonorrhoeherde ausgezeichnete Ergebnisse, so daß wir sie in der Spitalsbehandlung der Gonorrhoe nicht mehr missen möchten. Besonders dort, wo die intramuskuläre Injektion der Blenovakzine und auch die Vollmischvakzine versagt hat, erweist sich die Portioinjektion oft noch als wirksam, besonders dann, wenn nebst den Adnexveränderungen auch eine schwer zu behandelnde Cervicitis besteht. Man stellt die Portio im selbsthaltenden Spekulum ein, betupft die vordere und hintere Muttermundlippe, in deren Substanz die Vakzine zu verabreichen ist, mit Jodtinktur, fixiert sie mit einem Häkchen und spritzt nun  $\frac{1}{10}$  ccm in die Portio selbst ein. Man kann sich dazu vorteilhafterweise einer eigenen Spritze mit einer nicht ableitenden Nadel bedienen, kommt aber auch mit gewöhnlichen Injektionsspritzen zum Ziele. Mit der Steigerung der Dosis wartet man, bis die Reaktion vollständig abgeklungen ist, was bei heftiger Reaktion sogar bis eine Woche dauern kann. BUCURA bezeichnet die Maximaldosis, die gegeben werden soll, mit  $\frac{1}{2}$  ccm. Wir haben aber auch von der Verabreichung von 1 ccm keine üblen Zufälle gesehen und sind im allgemeinen über 4 bis 6 Portioinjektionen nicht hinausgegangen.

In Gonorrhoefällen, die infolge Mischinfektion mit den Wundkeimen auf die Blenovakzine nicht oder nicht genügend ansprechen, bedienen wir uns der Vollmischvakzine BUCURAS, die im Kubikzentimeter außer 3000 Millionen Gonokokken je 1000 Millionen Staphylo-, Streptokokken und Kolibazillen enthält. In der Dosierung halten wir uns im allgemeinen an die Vorschriften BUCURAS und beginnen mit 3 bis  $\frac{5}{10}$  ccm und steigen um 2 bis  $\frac{3}{10}$  bis zur Höchstmenge von 2 ccm.

Andere Vakzinepräparate sind das Arthigon nach BRUCK, welches im Gegensatz zur Blenovakzine BUCURAS am besten intravenös gegeben wird und, was vorteilhaft ist, in gebrauchsfertigen Ampullen zu 1 ccm

mit steigender Keimzahl von 200 Millionen bis 1000 Millionen Keimen in den Handel kommt. Man beginnt bei intravenöser Verabreichung mit 0,1 ccm = 10 Millionen Keime = Dosis I der fertigen Ampulle und steigt bis 1 ccm. In refraktären Fällen nimmt man das Arthigon „extrastark“, und zwar die halbe Dosis VII der Ampullenpackung. Mit Rücksicht auf die intravenöse Einspritzung ist die Reaktion bereits nach 2 bis 3 Stunden zu erwarten, so daß die Patientin bis dahin zu Hause in der Lage sein muß, das Bett aufzusuchen. Meist sieht man nach 4 bis 5 Injektionen entsprechende lokale und Allgemeinreaktion. Über andere Präparate, wie das Gonargin, das Gonoyatren und die polyvalente Gonokokkenvakzine von MERCK gilt die Regel, sie der Keimzahl entsprechend abgestuft zu dosieren, wobei auf weitere Einzelheiten nicht näher eingegangen werden kann und auf die Spezialwerke von R. FRANZ, BUČUBA, R. JOACHIMOVITS und G. DÖDERLEIN verwiesen werden muß. Über die anscheinend sehr leistungsfähige Vakzination mit lebenden Gonokokken nach LOESER mangeln Verfasser eigene Erfahrungen.

Aber auch nach fehlgeschlagenen Behandlungsversuchen mit Vakzine steht uns noch die unspezifische Reizkörperbehandlung ebenso wie die physikalische Therapie zur Verfügung. Man kann von der Reizkörpertherapie auch bei Adnexen gonorrhöischer Ätiologie Erfolge sehen. Die Technik der Proteinkörpertherapie und die physikalische Behandlung der chronisch entzündeten Adnexe und ihre Folgezustände wird, um Wiederholungen zu vermeiden, für die gonorrhöischen und septischen Adnexentzündungen S. 114 bzw. S. 167 abgehandelt, da die therapeutischen Maßnahmen die gleichen sind.

Über die Regelstörungen bei Gonorrhoe ist hinsichtlich der Amenorrhoe infolge Perioophoritis S. 6, hinsichtlich von Metrorrhagien S. 60 ff. die Rede gewesen. Für letztere müssen die Uterustonica, ferner das *Kalzium*, das gerade bei entzündlichen Blutungen vielversprechende Erfolge aufweist, ebenso Verwendung finden, wie *Hypophysenpräparate*, während von den *Hormonpräparaten* nicht viel zu erwarten ist, es sei denn, daß man in der Annahme eines Corpus luteum-Abszesses es begründetermaßen mit *Corpus-luteum-Substanz* versuchen wird. Daß eine Abrasio in solchen Fällen, weil sie den Zustand verschlimmert, nicht in Frage kommt, bedarf keiner besonderen Betonung, weshalb wir gelegentlich vor schweren Aufgaben in der Blutstillung stehen. Es ist daher kein Wunder, daß man gerade für derartige Fälle, aber auch für solche von gonorrhöisch entzündeten Adnexen, in denen zwar nicht die Blutung im Vordergrund steht, aber der Krankheitsfall als solcher besonders schwer ist, durch temporäre Unterbrechung des Menstruationszyklus den Zustand als solchen zu bessern sucht. In der Tat spielt ja, wie wiederholt ausgeführt, gerade die Wiederkehr der Menstruation hinsichtlich der Verschlechterung des Zustandes eine wesentliche Rolle. EYMER und MENGE haben die Strahlenbehandlung bei der aszendierten Gonorrhoe in das Rüstzeug der Therapie aufgenommen und damit gute Erfolge erzielt, welche G. A. WAGNER nicht nur hinsichtlich der schmerzstillenden und blutungbeherrschenden Wirkung, sondern

auch wegen des raschen Rückganges entzündlicher Tumoren sogar bei alten Entzündungsschwarten lobend hervorhebt. Sie ist um so unbedenklicher, als mit einer allfälligen Keimschädigung in derartigen schweren Fällen nicht zu rechnen ist, weil sie durch Krankheit steril geworden sind. Dagegen wird man die Dauerkastration schon mit Rücksicht auf das meist jugendliche Alter der Gonorrhoeträgerinnen nur für jene Fälle schwerster Entzündung bereitstellen, die eine Gegenanzeige gegen eine jede Operation überhaupt aufweisen.

### **Grenzen der konservativen Behandlung, Anzeigen zur operativen Therapie der Gonorrhoe.**

Wenn es auch richtig ist, daß die operative Behandlung der entzündeten Adnexa um die Jahrhundertwende herum und noch länger entschieden eine zu ausgedehnte gewesen ist, weil vielfach sogar bei ganz jugendlichen Individuen unnötig früh der gesamte innere Genitalapparat dem Messer zum Opfer gefallen ist, und bei unrichtiger Anzeigestellung sogar bei einwandfreier Operationstechnik genug Menschenleben an der Operation zugrunde gegangen sind (und noch zugrunde gehen), so will es gegenwärtig scheinen, als ob vielleicht doch, in einzelnen Fällen wenigstens, der Konservatismus zu weit getrieben würde. Frauen, die jahrelang von Spital zu Spital wandern und mit sämtlichen gebräuchlichen, hier erwähnten Heilmethoden andauernd Bekanntschaft machen, ohne wirklich ausgeheilt zu werden, sind keine Seltenheit. Solche Frauen sind aber für jedwede Tätigkeit geradezu verloren. Außerdem bilden sie in der gegenwärtigen schweren Zeit eine nicht gering zu achtende und bei der Verbreitung der Gonorrhoe besonders schwer ins Gewicht fallende Belastung der öffentlichen Fürsorge. Dieser Belastung wäre ohne weiteres das Wort zu reden, wenn in solchen Fällen letzten Endes vollkommene Beschwerdefreiheit erzielt werden könnte. Das ist aber, und das muß rund herausgesagt werden, so und so oft nicht möglich. Wenn auch die Vakzinetherapie viele Kranke vor diesem durch Jahre sich hinschleppenden Stadium bewahrt, so bleiben, gemessen an der weiten Verbreitung der Gonorrhoe noch eine große Reihe ungeheilte Fälle zurück, sei es, daß sie überhaupt nicht, ungenügend oder zu spät vakziniert wurden oder daß die Behandlung unwirksam gewesen ist. Die Beschwerden dieser Fälle aber weiter konservativ zu behandeln, ist vom rein pathologisch-anatomischen Standpunkt recht wenig aussichtsreich. Darüber muß man sich klar sein, daß dicke alte, verschlossene Tubensäcke, welche als anatomische Unterlage kein entzündliches Ödem und keine Hyperämie mehr, sondern derbes Bindegewebe aufweisen, den konservativen Behandlungsmethoden objektiv trotzen müssen und subjektiv trotz aller physikalischen Maßnahmen sich immer wieder rühren. Darum darf man wohl sagen, daß man nach einer entsprechenden Wartezeit bei äußerst gewissenhaft durchgeführter konservativer Behandlung, bei der keines der bewährten Verfahren, insbesondere die Vakzinetherapie unberücksichtigt geblieben ist, zum Messer greifen soll. Vor etwa Jahresfrist wird eine operative Behandlung nicht in Vorschlag zu kommen

brauchen, schon deswegen nicht, weil über dem Stadium der Bettruhe, der Vakzinierung und den verschiedenen physikalischen Behelfen Monate vorübergehen und sich noch manches im Befunde ändern kann. Ist aber frühestens nach Jahresfrist oder noch später der Befund ein schlechter, indem die Adnextumoren nach wie vor fortbestehen, die Beschwerden besonders zur Zeit der Periode subjektiv recht unangenehm sind und auch objektiv die Periode selbst Abweichungen vom Regeltypus zeigt, dann soll man sich doch zur Operation entschließen, es sei denn, daß es sich um Frauen handelt, die ihren ganzen Lebenszweck der weiteren Behandlung ihrer Krankheit widmen können und deren es nur sehr wenige gibt. Operiert man etwa nach Jahresfrist, so läuft man, wenigstens in der Regel nicht Gefahr, daß man infektiöse Fälle angeht, wovon einen übrigens die Prüfung der Temperatur, die Ermittlung der Leukozytenzahl und das einfache Verfahren der Senkungsgeschwindigkeit sowie das Verhalten der Komplementbindungsreaktion bewahren. Ist die Senkungsgeschwindigkeit kürzer als 75 Minuten, soll man derartige Fälle unbedingt weiter konservativ behandeln. Ist sie wesentlich länger als dieser Grenzwert (etwa 2 Stunden und mehr), wird man nicht nur ernste Gefahren vermeiden, sondern auch Bauchdeckeneiterungen nicht zu befürchten haben. Was nun die Operation selbst anlangt, so kann man bekanntlich zwischen konservativen Operationsmethoden und radikalen unterscheiden. Von den konservativen sind einige entschieden schlecht und abzulehnen. Das ist zunächst bei der Gonorrhoe der Adnexa die einseitige Resektion der Adnexa. Bei der erwiesenen Doppelseitigkeit des Prozesses pflegt in vielen Fällen bald nach der Operation der einen Seite die zweite sich zu melden, und die operierte Frau ist schlechter daran als ehemals. Konservative Verfahren müssen mindestens in der beidseitigen Entfernung der Eileiter bestehen. Das uterine Ende der Eileiter muß exzidiert, der Gebärmuttergrund kann dabei nach BEUTTNER gekappt werden, doch sei nicht verschwiegen, daß nach dieser Operation gar nicht so selten schmerzhaftes Stumpfxsudate auftreten, die auf lange Dauer physikalische Heilverfahren notwendig machen. Der große Vorteil des Verfahrens, welches den Uterus als menstruierendes Organ, wenn auch nicht als Fruchthälter im großen und ganzen erhält, soll nicht geleugnet werden. Derartige Frauen haben das Gefühl der Vollwertigkeit ihrer Geschlechtsorgane, wenn sie auch steril sind. Man darf aber nicht vergessen, daß die Periode weiter stark bleiben, daß sie Unregelmäßigkeiten nach wie vor darbieten kann und ganz besonders, daß von Seite der einmal krank gewesenen Cervix Erscheinungen allenfalls bestehen bleiben. Fluor, Erosion und Schmerzen beim Verkehr infolge alter narbiger Parametritis posterior können trotz der Entfernung der Tuben, defundiertem Uterus und belassenen Ovarien auch weiterhin den Zustand als keineswegs gut erscheinen lassen. Das muß man bedenken, so sehr man auch für junge Frauen wünschen möchte, ihnen die Geschlechtsorgane möglichst zu erhalten. Auch die supravaginale Amputation der Gebärmutter ist für die Behandlung chronisch entzündlicher Adnexe grundsätzlich nicht das richtige Verfahren. Sie beläßt nämlich die Cervix, das

Eintrittsorgan für die Krankheit, das, besteht auch längst Gonokokkenfreiheit, so und so oft an den genannten Folgeerscheinungen noch krankt. Außerdem gibt sie gar nicht so selten die Grundlage für langwierige, schwere Stumpfsudate ab. Wird der Bauchschnitt ausgeführt, und sind schwere anatomische Veränderungen da, so glaubt Verfasser dem radikalen Verfahren unbedingt das Wort reden zu sollen. Zur Zeit, wo es angezeigt ist, ist die Gefahr der Operation nur mehr gering und übertrifft in der Regel nicht die Gefahr einer Totalexstirpation überhaupt, wenn die Technik eine entsprechende ist. Dem Wunsch nach Erhaltung eines Ovarialrestes, womöglich eines Ovariums überhaupt, wird man, wo immer es angeht, nach Tunlichkeit nachkommen und auch von der Autotransplantation Gebrauch machen. Die Entfernung der Portio aber gehört folgerichtig mit in das Programm dieser Operation. Wenn der Weg per laparotomiam als der bevorzugte zuerst angeführt wird, so erscheint dies um so begreiflicher, als die meisten Fälle von Adnextumoren zufolge ihrer komplizierten anatomischen Verhältnisse ausgiebige Lösung von Adhäsionen erfordern, was durch die Laparotomie weit übersichtlicher geschieht. Trotzdem darf man auch den vaginalen Weg, namentlich für tiefsitzende, nicht allzu große und bereits etwas beweglich gewordene Adnextumoren keineswegs verwerfen. Er gibt in der Form der Spaltung des Uterus und der Luxierung der Adnexa erfahrenen vaginalen Operateuren ganz ausgezeichnete Ergebnisse und ist trotz aller Einwände bei entsprechender Technik durchaus nicht ungangbar, ja er gestattet sogar die Belassung eines oder beider Ovarien.

### Feststellung der Ausheilung.

Bekanntlich gehört die Fällung des Urteils „geheilt“ oder „ungeheilt“ zu den heikelsten und folgenschwersten Aufgaben des Arztes und kann reichlich undankbar sein. Das Urteil der Heilung, abgeleitet aus der Gonokokkenfreiheit, darf sich der Arzt durch einige wenige Sekretuntersuchungen nicht leicht machen. Außer der klinischen Heilung und der Beschwerdefreiheit müssen durch Monate hindurch die Sekretabstriche Gonokokkenfreiheit ergeben. Man darf nicht vergessen, daß man 5 und 10 und mehr Sekretabstriche machen kann und 10mal vergeblich nach Gonokokken sucht, während man sie beim 11. Mal doch findet. Darum kann man der Provokation nicht entraten. Wie schon erwähnt, ist die Menstruation als solche eine ausgezeichnete Provokation, weshalb wir unmittelbar nach der Regel Sekretabstriche untersuchen oder wir bedienen uns mechanischer oder chemischer Provokationsverfahren, welche zum Teil in den Vorbemerkungen erwähnt sind, so der intravenösen *Arthigininjektion*, nach welcher wir nach 2 bis 3 Tagen nach Gonokokken fahnden. Aber auch die mechanische Provokation bei Cervicitis durch Abstreichen des Zervikalkanals mit der Sonde (S. 99) sowie die chemische mit *schärferen Lapslösungen* und mit *Wasserstoffsperoxyd* wird herangezogen werden müssen. In dem nach der Befeuchtung der Cervix mit Wasserstoffsperoxyd hervorquellenden Schaum kann man nach ASCH oft noch in dem eingetrockneten Sekret

Gonokokken finden. Schließlich muß man in solchen Fällen auch das Verhalten gegenüber der *Vakzinetherapie* — Vakzineinjektion unmittelbar vor der Menstruation und Sekretuntersuchung darnach, allenfalls auch Portioinjektion — (Reaktion oder Reaktionslosigkeit) heranziehen. Es ist ein Gebot der Vorsicht, wenn schon nach zwei Menstruationen die Sekretprüfung gonokokkenfrei ausfiel, noch weiter während des nächsten halben Jahres nach der Periode nach Gonokokken zu forschen. Tauchen sie wieder auf, so muß die Behandlung von neuem in Angriff genommen werden. R. SCHRÖDER macht das Urteil über die erfolgte Heilung einerseits von der völligen Abwesenheit nicht nur von Leukozyten und Gonokokken in 6 bis 8 Sekretabstrichen, die in Zwischenräumen von mehreren Tagen vorgenommen werden, sondern auch von der völligen Abwesenheit von Gonokokken in 5 Abstrichen, die nach Provokation entnommen worden sind, abhängig. Da auch der wiederholte negative Ausfall nicht mit völliger Sicherheit unbedingt die Ausheilung gewährleistet, so soll man bei der schriftlichen Bescheinigung der Heilung immer vorsichtig sein. Geboten ist es, die Ausstellung eines Zeugnisses rundwegs abzulehnen, wenn der Ehemann nur ein oder zwei Wochen vor der Eheschließung sich vorstellt (G. A. WAGNER), weil für eine so folgenschwere Entschließung eine 2 bis 3 monatliche Beobachtungszeit notwendig ist. Ein solches Zeugnis soll lauten, daß trotz gewissenhafter und wiederholter Untersuchung, allenfalls unter Verwendung aller zu Gebote stehenden Mittel gegenwärtig keine Anhaltspunkte für eine Gonorrhoe vorhanden sind. Wichtig ist es für die Praxis, bei auch nur einigermaßen hinsichtlich der Ausheilung fraglichen Fällen unbedingt den Coitus condomnatus anzuempfehlen, der im übrigen ebenso wie körperliche Anstrengung ein Provokationsmittel ist.

Der wiederholte, bzw. ständig wiederholte negative Befund der Gonokokken enthebt uns natürlich nicht der Anwendung des gesamten Rüstzeuges der physikalischen Heilmethoden zwecks Beseitigung der etwa entstandenen Folgeerscheinungen, die im nachfolgenden besprochen werden. Die praktisch so unendlich wichtige und so oft nach Gonorrhoe unliebsam in Erscheinung tretende Sterilität wird in einem eigenen Abschnitt (siehe diesen, S. 175) abgehandelt.

### **Die physikalische Behandlung der Adnextumoren und der Pelveoperitonitis chronica nach Gonorrhoe und septischen Entzündungen.**

Schon in der Behandlung des akuten und subakuten Stadiums der Entzündung der Adnexa spielt die physikalische Therapie in Form von Kälte und Wärme — Eisbeutel, Prießnitzumschlag, Dunstwickel und Thermophor — eine unentbehrliche Rolle. Aber auch in späteren Stadien, gar bei solchen Entzündungen gonorrhöischer Natur, welche zu spät oder mangelhaft einer Vakzinetherapie unterzogen wurden und in so manchen hartnäckigen Fällen septischer Adnextumoren, wie sie durch die Wundkeime erzeugt werden, muß man immer und immer wieder physikalische Heilbehelfe heranziehen. Die im Nachfolgenden geschilderten Verfahren werden demnach nicht bloß bei den entzündlichen

Folgeständen nach Gonorrhoe, sondern auch bei solchen nach Adnex- und Bindegewebeentzündungen septischen Ursprungs verwendet.

#### Wärmeanwendung.

Was die Wärmebehandlung anlangt, so ist auch in den zum chronischen Zustand neigenden Fällen die tägliche Anwendung feuchter Wärme in Form des Dunstumschlages mit dem Thermophor oder trockener Wärme durch den Thermophor allein je nach dem Wunsche der Patientin immer angebracht. Höhere Wärmegrade können im Haus ohne Apparat in wirksamer Weise durch *Leinsamenumschläge* (Bereitung siehe S. 169) oder die Verwendung der *Antiphlogistine* erzielt werden. Dieses im wesentlichen aus Kaolin und Glycerin nebst ätherischen Ölen bestehende Gemisch wird so heiß als es vertragen wird, auf die Haut gebracht, nachdem es in seinem Blechbehälter im Wasserbad entsprechend erhitzt wurde. Darüber kommt eine möglichst dicke Schicht Verbandstoff. Die Masse bleibt solange liegen, bis sie leicht von der Haut abfällt (gewöhnlich nach 12 bis 24 Stunden). Sie ist übrigens nicht nur von den Bauchdecken, sondern auch von der Vagina her anwendbar. Man nimmt ein etwa nußgroßes Stück der erhitzten Antiphlogistine, umhüllt es mit mehreren Lagen von Gaze und bindet den so entstandenen Beutel mit einem längeren Faden zu, an welchem die Antiphlogistine nach 12- bis 24-stündigem Liegen im Scheidengewölbe leicht entfernt werden kann.

Nicht zu umgehen ist ferner die fast überall durchführbare Heißluftbehandlung POLANOS, deren einfache Apparatur auch in die Häuser verlichen wird. Wie weit die Heißluft geeignet ist, heilend, insbesondere resorptionsfördernd zu wirken, ist schwer zu entscheiden, jedenfalls ist sie nicht ohne Erfolg in subjektiver, aber auch in objektiver Hinsicht. Die erste Anwendung der Heißluft ist gleichzeitig ein brauchbarer Hinweis auf das Stadium des Prozesses, indem beim subakuten Fall die Heißluft schmerzhaft empfunden wird, und die Temperatur anzusteigen pflegt, ein Beweis, daß die Behandlung zu früh in Angriff genommen wurde, während in den späteren Stadien die Heißluft vertragen und von den Frauen immer gelobt wird. Die eigentliche Heißluftbehandlung wird durch die Heißluftkästen vermittelt, die durch eine Spiritus- oder Gasflamme erhitzt werden. Die Feuergefährlichkeit dieser Apparate hat bald dazu geführt, daß man an Stelle der eigentlichen Heißluftbäder Lichtkasten- oder Lichtbügelbäder gibt, bei denen die Erwärmung durch Kohlenfadenlampen geschieht, weil die Kohlenfadenlampen mehr Wärme ausstrahlen als die Metallfadenlampen. Während bei den ursprünglichen Heißluftbädern nur die sogenannte geleitete Wärme zur Einwirkung kommt, wirken die Lichtbügelbäder durch Licht-Wärmestrahlung. Der Beginn der Behandlung sei möglichst vorsichtig, die Höhe der anzuwendenden Temperatur muß dem Empfinden des einzelnen angepaßt werden. Man beginne nicht mit Temperaturen über 70° C und steigere sie zunächst nicht höher als bis zu 80 bis 90° C (gemessen an der Decke des Apparates, wobei die Temperatur nahe der Haut um etwa 15° weniger beträgt). In der Regel soll man nicht öfter als 3mal wöchentlich in der ersten Woche,

und bei guter Verträglichkeit erst in der 2. Woche jeden Tag die Heißluftkur vornehmen. Die erste Sitzung dauere nicht länger als  $\frac{1}{4}$  Stunde. Auch bei lang fortgesetzter und gut vertragener Behandlung soll sie 30 bis 45 Minuten nicht überschreiten. Bei der Heißluftbehandlung des Beckens kommen Herzklopfen, Kopfschmerz, Schwäche und Müdigkeit nicht ganz selten vor, welche einigermaßen durch Auflegen kalter Tücher auf das Herz und den Kopf gelindert werden können. Wichtig ist, daß der erkrankte Körperteil bei empfindlichen Personen besser mit einem dünnen Stoff bekleidet der Heißluft ausgesetzt wird, und daß der Kasten nach außen hin gegen die Beine zu mit einer Decke abgedeckt werden soll, damit nicht zuviel der Wärme verloren gehe. Für Orte ohne elektrischen Lichtanschluß sind die billigen Luftschwitzapparate, von denen ein recht brauchbares Modell von HILZINGER-REINER als sogenannter Zirkulations-Heißluftapparat angegeben ist, zu empfehlen. Man kann mit diesem Apparat schon in einer  $\frac{1}{4}$  Stunde Temperaturen bis  $45^{\circ}$  erzielen und die Patientin  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{3}{4}$  Stunde darinnen lassen. Man Sorge, daß die Frauen nach der Behandlung jede Erkältung vermeiden und den Bauch mit einem Frottiertuch abreiben, das Zimmer nicht sofort verlassen und am besten auf einem Ruhebett einige Zeit ruhen. Auch eine kühle Abwaschung mit nachfolgender energischer Trocknung ist von großem Vorteil, weil die nach länger durchgeführter Heißluftbehandlung auftretenden Ermüdungserscheinungen durch Anwendung von Kaltreizen verhütet werden können.

Die vaginale Wärmeapplikation kann außer durch die wiederholt erwähnten heißen Scheidenspülungen und die Antiphlogistinebehandlung auch durch verhältnismäßig einfache Apparate erzielt werden, wie den Gynotherm und Pelvitherm. Während der Gynotherm ein geschlossenes, sondenförmiges Instrument darstellt, in welchem heißes Wasser zirkuliert, geschieht die Erhitzung beim Pelvitherm durch die Elektrizität. Der resorptionsfördernde Einfluß dieser Apparate bei chronischen Entzündungen der Adnexa, Parametritis und Exsudatresten muß bestätigt werden. Der Pelvitherm nach FLATAU kann etwa 1 bis 2 Wochen nach völliger Entfieberung angewendet werden und 2 bis 3 Stunden liegen bleiben. Über die vaginale Heißluftbehandlung durch Föhnapparate und über die Scheidenheizlampen von SEITZ und die Scheidenbestrahlungslampe von WINTZ mangeln Verfasser eigene Erfahrungen. Zweifelsohne stellen sie im Programm der physikalischen Therapie eine Bereicherung dar.

Die Erzielung einer starken aktiven Hyperämie, die schmerzstillende Wirkung und die Förderung und Aufsaugung von Exsudaten ist zwar durch die bis jetzt genannten Verfahren erwiesen, wird aber durch die Diathermie in noch höherem Maße gewährleistet. Trotzdem ist es fehlerhaft, den Frauen mit der Diathermie, wie dies gar nicht so selten geschieht, völlige Heilung zu versprechen. So und so oft ist auch natürlich die Diathermie nicht instande, restlos die Krankheitserscheinungen zu beseitigen. Man erlebt es, daß Frauen, besonders vom Lande, die von der Diathermie gehört haben, alles daran setzen, um derselben teilhaftig zu

werden, weil sie ihnen als Allheilmittel geschildert worden ist. Nicht zu vergessen ist, daß eine zu früh begonnene Diathermiebehandlung schadet und zum neuerlichen Aufflackern des Prozesses führen kann. Ein guter Prüfstein dafür, ob die Diathermie bereits angezeigt ist, ist die klaglose Verträglichkeit der Heißluft. Gegenüber dieser bedeutet sie ein wirksameres Verfahren, erzeugt sie doch im Körper selbst infolge der Durchleitung eines elektrischen Hochfrequenzstromes Wärme und auch in der Tiefe Temperatursteigerungen. Dadurch wird die Resorption der chronischen Entzündungsprodukte besonders gefördert, und ein wohltätiger Einfluß auf die Schmerzen erzielt. Darum ist es kein Wunder, daß mit Diathermie behandelte Fälle von Adnextumoren, die trotzdem nicht schwinden, nach der Diathermiebehandlung für die Operation besser geeignet sind als früher, weil sie beweglich wurden. Man bedient sich sowohl der äußeren, wie der wirksameren inneren Diathermie. Die letztere soll man bei sexuell erregbaren Personen nach Tunlichkeit einschränken, allenfalls muß man sie ganz unterlassen. Sie ist aber für Douglasinfiltrate und Entzündungen der Sacrouterinligamente heute nicht mehr zu entbehren. Ein Diathermieplan ist mit 12 bis 15 Sitzungen zu veranschlagen, die man nicht mehr als bis auf höchstens 20 erhöhen soll. Es ist vorteilhaft, sich einschleichend diathermisch zu betätigen, und zwar zunächst nur wöchentlich zweimal und da nur äußerlich, in der dritten Woche kombiniert, einmal innerlich und zweimal äußerlich. Die Stromstärke, mit der man beginnt, beträgt 1 Ampere und steigert sich auf  $1\frac{1}{2}$  bis 2 bei äußerer, bei innerer auf  $\frac{1}{2}$  bis 1 Ampere. Die einzelne Sitzung wird im Anfang auf 15 Minuten, später bis auf 30 Minuten erstreckt. Für die bessere Stromverteilung im kleinen Becken eignet sich besonders die Gürtелеlektrode von KOWARSCHIK und KEITLER. Die Anwendung der Diathermie halten wir mit R. FRANZ im Gegensatz zu GIESECKE dann für nicht angezeigt, wenn gleichzeitig unregelmäßige Blutungen bestehen, welche denn doch durch dieselbe eine beträchtliche Verstärkung erfahren können. Schließlich sei bemerkt, daß die Diathermie nur von Ärzten mit guter Kenntnis der Apparatur unter Beobachtung der nötigen Vorsichtsmaßregeln gehandhabt werden darf, und daß die Patientin während der Sitzung ständig beobachtet bleiben muß. Nur so lassen sich üble Zufälle wie Verbrennungen, die zu Schadenersatzprozessen Anlaß geben, vermeiden. Klagen der diathermierten Frauen über das Gefühl des Elektriziertwerdens, über Hitzegefühl, Stechen und Brennen dürfen niemals gering geachtet, sondern müssen mit Stromausschaltung und Durchsicht des Apparates beantwortet werden. Bei Störungen der Wärmeleitung infolge Nervenleiden oder Durchschneidung der Hautnerven bei Laparotomien soll man nach dem Rate LAQUEURS die Diathermie entweder überhaupt nicht oder zumindestens nicht an diesen Stellen anwenden.

#### Bäderbehandlung.

Unentbehrlich im Behandlungsplane der Adnextzündung ist die Bäderbehandlung. Wenn auch die Vakzinetherapie in einer großen Reihe

von Fällen Ausgezeichnetes leistet, und bei vollem Erfolg dieser Behandlung eine Bädertherapie nicht notwendig zu werden braucht, so ist doch in einer großen Zahl aller Fälle ohne eine Bäderbehandlung nicht auszukommen. Die Zeitverhältnisse bringen es mit sich, daß ausgesprochene Badekuren in den mit Recht zu berühmtem Ruf gekommenen Badeorten nur von einer kleinen Schicht der Bevölkerung gemacht werden können, wengleich die soziale Fürsorge auch hierin bereits vielfach helfend eingegriffen hat. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Badebehandlung in Badeorten weit bessere Ergebnisse zeitigt als die Bäder zu Hause, selbst bei jenen Bädern, deren chemische Zusammensetzung und Wirkung im Hause von der in Kurorten sich nicht wesentlich unterscheidet. Die vollständige Entfernung aus der Umgebung, der nicht zu unterschätzende Klimawechsel, die Einstellung nur auf die Gesundheit, der Wegfall der täglichen Sorgen einerseits, andererseits eine ganz streng geregelte, auf die Eigentümlichkeit des Badegebrauches abgestimmte Lebensweise, eine angepaßte Diät, regelrechte Sorge für Stuhl, Einschaltung von Ruhepausen, alle diese Umstände sind es, die den Badegebrauch im Badeort selbst erfolgreicher zu gestalten pflegen, als daheim. Trotzdem muß auch der Bäderekur zu Hause als wichtigem Heilmittel gedacht werden. Für die Behandlung der entzündeten Adnexe, der Pelveoperitonitis chronica, der Douglas- und parametranen Infiltrate durch Bäder im Hause eignen sich zunächst als recht einfach herzustellen die Solbäder, besonders in Form der Solsitzbäder, die, abgesehen von ihrer thermischen Wirkung, den Stoffwechsel und die resorptiven Vorgänge, ebenso wie das vegetative Nervensystem günstig beeinflussen. Grundsätzlich muß man die Solsitzbäder so geben, daß sie den natürlichen Solbädern mit 1 bis 4% Kochsalzgehalt hinsichtlich desselben gleichkommen, d. h. mindestens 1 bis 2% Kochsalz enthalten müssen. Rechnet man ein Sitzbad mit mindestens 25 Liter Wasser, so braucht man für ein solches Sitzbad  $\frac{1}{2}$  kg bis 1 kg Salzzusatz. Man nimmt entweder das rohe Steinsalz (Viehsalz) oder das bekannte Halleiner, Ausseer, Ischler, Gmundner Salz, das Salz von Staßfurt, Reichenhall u. a. Es wird auch in Würfeln, die schon abgepaßt sind und die entsprechende Konzentration des Salzbadetes gewährleisten, in den Handel gebracht. Eine andere praktische Art des Salzbadetes ist die Bereitung mit der Sole (z. B. Kreuznach, Münster a. Stein, Aussee, Hall, Ischl, Hallein). Sie enthält 20 bis 30% Salz. Zu einem Sitzbad müssen etwa 5 bis 10 Liter der Sole zugesetzt werden. Konzentrierter sind die Mutterlaugen, die durch Einkochen der salzhaltigen Quellen, die auch andere Chloride enthalten, überdies öfter auch einen geringen Gehalt an Jod, Brom oder Arsen aufweisen, gewonnen werden. Da solche Mutterlaugen bis 40% Salzgehalt aufweisen, so genügen zu einem Sitzbad 1 bis 2 Liter der Mutterlauge. Es ist wichtig, die Bäder, die immer etwas angreifend wirken, nicht öfter als dreimal wöchentlich zu geben, immer vor dem Schlafengehen und nicht länger als auf 15 Minuten auszudehnen. Die am besten die Resorption fördernde Temperatur liegt zwischen 35 bis 40° C, doch werden auch höhere Temperaturen bis 43° empfohlen. Es sei noch hervorgehoben, daß die Temperatur im Sitzbad ziemlich rasch

absinkt, weshalb es wichtig ist, neben der Sitzwanne einen Krug, gefüllt mit möglichst heißem Wasser, bereit zu haben, um der Abkühlung begegnen zu können. Der Körper ist bis zum Nabel im Wasser, Brust und Rücken sollen vor Erkältung durch entsprechende Kleidungsstücke geschützt sein. Systematisch fortgesetzte Solbäder steigern die Stickstoffausscheidung und sind daher sowohl bei Kindern, wie bei Erwachsenen geeignet, Ermüdungserscheinungen auszulösen. Auch soll daran erinnert werden, daß bei infantilen Frauen die Bäder nicht zu heiß und der Salzzusatz nicht zu konzentriert sei, weil gelegentlich entzündliche Reizzustände an der äußeren Scham hervorgerufen werden können (STICKEL). Allgemein wird die gute Wirkung der Solbäder auf das vegetative Nervensystem im Sinne einer deutlichen Aktivierung desselben sowie die Steigerung der Diurese hervorgehoben. Im allgemeinen genügt es, eine Serie von 15 bis 20 derartigen Solbädern zu geben, wobei man gut tut, etwa 3 Tage vor der zu erwartenden Periode und ebenso lang darnach eine Pause einzuschalten (O. FRANKL).

Die Zahl der Solquellen, welche zum Kurgebrauch in Frage kommen, ist sehr groß. In Österreich sind es vor allem die Salzkammergutquellen, Gmunden, Aussee und Ischl, welche hochkonzentrierte Solquellen sind, weshalb sie zum Badegebrauch, ebenso wie die von Reichenhall, Traunstein, Frankenhausen verdünnt werden müssen. Bekannte Quellen mit geringerem Kochsalzgehalt, welche daher unverdünnt zu den Bädern gebraucht werden, sind Hall i. T., Pyrmont, Kreuznach, Solen, Harzburg, Kolberg u. a. Wichtig ist, daß zahlreiche dieser Quellen auch Jod enthalten, so Hall, Tölz, Kreuznach, Wiessee, ein Umstand, der zweifelsohne hinsichtlich der Resorption in Frage kommt. Auch der Kohlensäuregehalt so mancher dieser Bäder, wie Pyrmont, Kissingen, Nauheim und Oeynhausen ist eine erwünschte Beigabe. In allen Badeorten ist die Zahl 21 eine Art heilige Zahl. 21 Bäder kann man in 4 Wochen nehmen, wobei man gewöhnlich schematisch so vorgeht, daß man in der ersten 4, in der zweiten 5, und in der 3. und 4. Woche je 6 Bäder verabreicht, beginnend mit einer Dauer von 10 Minuten, die bis 30 steigt und mit einer Temperatur von 34 bis 36° C. Die einzelnen Badeärzte und die einzelnen Kurorte haben da ihre verschiedenen, durch den Gebrauch als praktisch erwiesenen Behandlungspläne, denen sich die Patientin ohne weiteres fügen soll. Es ist auch nicht vorteilhaft, bestimmte Vorschriften zu geben, die dann nicht eingehalten werden können. Auch gegen die Zwischenschaltung von Solsitzbädern, wie sie in zahlreichen Badeorten neben den Solvollbädern üblich ist, allenfalls gegen die Einführung von Spekula im Bade ist ebenfalls nichts einzuwenden, wohl aber gegen jede andersartige Lokalbehandlung bei allen Arten der Badekuren. Es will so scheinen, als würden hartnäckige Erosionen, schwerere Fälle von Fluor als Begleiterscheinung der Adnexentzündung dann besser ansprechen, wenn während des Bades ein je nach der Weite des Vaginalschlauches entsprechend großes Spekulum eingeführt wird, wodurch durch etwa 10 Minuten das Scheidengewölbe von der Salzlösung dauernd gespült ist. Hervorgehoben sei noch, daß für die chronischen Adnexentzündungen

gonorrhöischer Natur weniger die Salzbäder in Frage kommen, deren Hauptanwendungsgebiet mehr nach puerperalen Prozessen, bei Asthenie und Infantilismus, bei Sterilität sowie bei Myomen und endlich nach MENGE bei Ischias klimakterischer Frauen liegt, worüber in den einzelnen Abschnitten Hinweise erfolgen bzw. erfolgt sind. Wo die Kochsalzquellen zugleich jodhaltig sind, kann der innerliche Gebrauch infolge der Trinkkur auch bei geringem Jodgehalt resorptionsunterstützend wirken, wie man dies vom Jodbad Hall, Kreuznach und anderen Badeorten weiß.

Auch die Wildbäder (Akratothermen) Gastein, Badenweiler, Johannisbad, Teplitz üben bei leichteren Formen der Beckenzellgewebe- und Adnexentzündung nach den Erfahrungen KOBLANCKS, die durchaus bestätigt werden können, eine gute Wirkung, zumal sie auch das vegetative Nervensystem günstig beeinflussen. Ihr Hauptanwendungsgebiet liegt freilich in der Gynäkologie besonders bei klimakterischen Störungen.

Mit Recht erfreuen sich die Moorbäder in der konservativen Behandlung der Adnexentzündung, wie in der Gynäkologie aus den mannigfachsten Indikationen überhaupt, der größten Beliebtheit. War es bei den Solbädern verhältnismäßig leicht möglich, die Wirkung einer Hausbadekur der im Badeort ziemlich anzugleichen, so ist dies bei den Moorbädern nur in dazu eingerichteten Anstalten und nicht im Privathause möglich. Wenn auch Ersatzmitteln des Moors in Form von Extrakten und Laugen bei Hausbädern eine gewisse chemische Wirkung nicht abgesprochen werden kann, so fallen dabei die nicht minder wichtigen thermischen und mechanischen Umstände ganz weg (LAQUEUR). Darum ist dort, wo eine dringende Anzeige nach Moorbädern besteht, das Aufsuchen eines Badeortes kaum zu umgehen. Solche Badeorte sind die bekannten Frauenbäder Tatzmannsdorf, Franzensbad, Marienbad, Pyrmont, Elster, Spa, Landeck, Kudowa, Freienwalde u. a. (Es liegt in der Natur dieser Badeorte, daß sie gleichzeitig auch kohlen saure Stahlquellen aufweisen, deren Vorhandensein nur von Vorteil bei den Bädern ist.) Die halbfesten Moorbäder, aus den Mineralmooren bestehend, enthalten vegetabilische Substanzen, organische Säuren, deren chemische Wirkung von Belang ist. Entweder werden sie als Moorvollbäder gegeben mit einer Temperatur von 35 bis 42° und einer Dauer von 15 Minuten bis 1 Stunde. Die Wirkung des Moorbreies, dessen Herstellung und Füllung nicht weiter beschrieben werden soll, ist zunächst die der Wärmestauung, weil das Moor die Wärme sehr lange behält und nur langsam abgibt. Darum, und das ist wesentlich, kann das Moorbad höher temperiert sein als ein Wasserbad, wobei die Körpertemperatur bei  $\frac{1}{2}$ stündiger Dauer bereits um 1,5° und darüber steigt, ohne daß das Herz dadurch so alteriert wird wie bei einem Wasserbad der gleichen Temperatur. Hierzu kommt noch die mechanische Wirkung des Moorbreies, die im Sinne der Reibung durch die Bewegung der Patientin im Bade und im Sinne des Gewichtes, also der Belastung auf die Bauchorgane wirkt. Schließlich ist auch die stoffwechselfördernde Wirkung nicht zu vergessen. Da nach exakten Untersuchungen in der Tiefe der Entzündungsherde die Temperatur deutlich ansteigt, ist eine rasche Resorption solcher Herde außer Zweifel.

Die stoffwechselanregende Wirkung ist hauptsächlich durch die organischen und anorganischen Säuren und die Eisensalze gegeben, ferner ist die adstringierende Wirkung des Moorbreies für Fälle von Hypersekretion wertvoll. Neben den Vollbädern werden gerne auch Moorumschläge gegeben, wie sie für die Fango- und Schlamm packungen üblich sind. Dabei werden Temperaturen zwischen 40 und 55° C vertragen. Ohne diese Moorbäder, die seltener als Sitzbäder, meist, wie gesagt, als Vollbäder und Umschläge verwendet werden, kann man in schwereren Fällen von Adnextzündung chronischer Art nicht auskommen. Es ist erstaunlich, wie lang zurückliegende, anderweitig nicht mehr zu beeinflussende Entzündungsherde, seien es Adnextumoren, oder Douglasexsudate, seien es parametranne Schwielen, an Konsistenz verlieren, unempfindlich werden und weitgehend, ja vollständig der Resorption anheimfallen. Man hüte sich aber, subakute oder gar akute Fälle solchen Bädern zu unterwerfen, die zwangsläufig zu einer akuten Steigerung des Symptombildes führen würden. Es muß die Schmerzhaftigkeit weitgehend geschwunden sein, Temperatursteigerungen dürfen lange nicht mehr bestehen. Recht vorteilhaft ist es auch, die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen zu prüfen, welche das Abgeklungensein des akuten Stadiums anzeigen muß (mehr als 75 Minuten), bevor man diese Bädernkur verordnet (СУКОР). Man darf auch nicht vergessen, daß Frauen mit Tuberkulose, Emphysem, Herzfehlern und Atherosklerose sich für diese eingreifende Kur nicht eignen. Dort, wo neben der Entzündung auch die asthenische Konstitution günstig beeinflußt werden soll, ist die Moorbadekur nebst dem Gebrauch kohlen-saurer Stahlbäder, wie dies in Franzensbad, Elster, Pyrmont der Fall ist, beliebt oder wird mit einer Trinkkur verbunden. Bezüglich der anderen mannigfaltigen Indikationen der Moorbadekur wie bei Fluor, den Zyklusstörungen, besonders bei Amenorrhoe und Dysmenorrhoe und nicht zuletzt bei der Sterilität, aber auch bei der Fettsucht, ist an den betreffenden Stellen hingewiesen. Von den hauptsächlich chemisch wirksamen Moorextrakten, welche zu Hausbadekuren verwendet werden, ist das Salhumin allgemein bekannt. Es wird zu Sitzbädern in der Temperatur von 36 bis 42° C von etwa 15 Minuten Dauer am besten dreimal wöchentlich vor dem Schlafengehen verordnet. Es ist auch wohlfeil, da für ein Sitzbad nur  $\frac{1}{3}$  bis die Hälfte der Packung notwendig ist. Außer dem Salhumin sind auch noch andere Moorsalze und Laugen (Hermsen, Schmiedeberger, Sedlitzky und Mattoni) im Handel (vgl. S. 150).

Als recht wirksames Mittel zur Förderung der Resorption bei länger bestehenden, dem chronischen Stadium sich nähernden oder sich in diesem bereits befindlichen Adnextumoren müssen die Fangopackungen erwähnt werden, welche, wenn auch nicht im Hause, so doch in physikalischen Heilanstalten im Wohnsitz der Patientin leicht verabreicht werden können. Der Badeschlamm Fango, der aus vulkanischer Erde besteht und meist italienischen, aber auch deutschen Ursprungs ist, wirkt nicht chemisch, sondern durch feuchte Wärme, während beim Pistyaner Badeschlamm auch dessen Schwefelgehalt therapeutisch belangvoll ist.

Der pulverisierte Schlamm, der zu einem Brei angerührt wird, kommt in einer Temperatur von 40 bis 50° als Umschlag entweder um den ganzen Unterleib oder nur auf dessen Vorderseite in der Weise zur Anwendung, daß er auf ein Gummituch aufgestrichen wird, in das sich die Patientin hineinlegt. Zwecks Vermeidung eines größeren Wärmeverlustes wird während der  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{3}{4}$  Stunden dauernden Fangopackung eine Wolldecke über die Patientin gebreitet. So wie beim Moorumschlag muß auch nach dem Fangoumschlag ein Reinigungsbad der Prozedur folgen. Auch die Fangopackung gestattet ähnlich dem Moorumschlag die Anwendung höherer Temperaturen infolge der geringen spezifischen Wärme und hat den Vorteil, die Ausgangstemperatur infolge des schlechten Wärmeleitungsvermögens lange beizubehalten. Wie beim Moor erzeugt auch hier das Gewicht des Schlammes und die Reibung seiner feinsten Partikelchen auf der Hautoberfläche eine resorptionsfördernde Wirkung. Die Fangopackungen werden anfänglich 2mal, später 3mal wöchentlich gemacht. Jede Temperatursteigerung ist ein Zeichen einer zu frühen Anwendung des Verfahrens, welches dann ausgesetzt werden muß. 15 bis 20 Packungen bilden eine Kur.

In der Zeit einer ganz besonderen Hinneigung der Mehrzahl aller Frauen zu Luft- und Wassersport muß auch noch der See-, Fluß- und Meerbäder sowie der Sandbäder in ihrer Bedeutung für die Adnexerkrankungen gedacht werden. Darüber besteht wohl kein Zweifel, daß die vielfach übertriebene Anwendung der kalten Bäder auch bei gesundem Genitale nicht gleichgültig ist. Schädlich sind sie unmittelbar vor oder gar während der Menstruation. Zufolge des Klaffens des Halskanals und des Mangels des schützenden Schleimpfropfens der Cervix kann es unter dem Einfluß des Kältereizes zu Kontraktionen der Gebärmutter und damit zur Beförderung des Blutes in der Richtung nach den Eileitern kommen. Auf diese Weise können Scheidenkeime aufsteigen und sogar zu schweren Entzündungen, ja gelegentlich einmal zur Peritonitis führen. Was aber den Badegebrauch außerhalb der Periode bei Frauen mit Entzündungen der Adnexa anlangt, so muß gesagt werden, daß bei kalten Bädern in Flüssen, Seen, künstlichen Strandbädern, große Vorsicht am Platze ist, da scheinbar bereits abgeklungene Entzündungserscheinungen der Adnexa recht üble Verschlimmerungen zeigen können. Es ist daher notwendig, ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß Frauen, die eine Adnexentzündung hinter sich haben, auch dann, wenn sie geheilt erscheinen, in dem betreffenden Jahr mindestens der kalten Freibäder sich enthalten. Besonders schlecht ist es, und man kann im Anschluß daran Verschlimmerungen nachweisen, wenn die Frauen mit den nassen Badeanzügen stundenlang bei kühlem Wetter und bedecktem Himmel am Strand verweilen. Hinsichtlich der Meerbäder ist zu bemerken, daß warme bis heiße Wannens- und Sitzbäder mit Seewasser gleich den Solbädern nicht bloß bei Folgezuständen nach Entzündungen, sondern auch bei Amenorrhoe, Sterilität und Neigung zu Abortus Ausgezeichnetes leisten. Diese Seewasserbäder bilden auch eine gute Vorbereitung für Bäder im freien Meer, welche durch die klimatischen Faktoren, durch den Salzgehalt

des Meerwassers, seine thermische Wirkung und die mechanische durch den Wellenschlag von Belang sind. Für zarte Individuen eignen sich in erster Linie die Bäder an der Adria und die Ostseebäder, besonders als Nachkuren nach Moorbädern, während kräftigere Frauen auch solche in der Nordsee gebrauchen können. Das Bad soll nie länger als 12 Minuten in den südlichen und 6 Minuten in den nördlichen Meeren dauern (O. FRANKL).

Mit dem heutigen Badebetrieb in den sogenannten Strandbädern sind auch Sandbäder verbunden. Trockener heißer Sand kann bei chronisch entzündlichen Adnexerkrankungen einerseits durch das auf den Unterleib verteilte Gewicht, andererseits durch die Reibung des Sandes an der Hautoberfläche mechanisch und bei großer Hitze des Sandes auch thermisch von Wirkung sein. In Fällen, wo die Frauen des Aufenthaltes am Strande nicht entraten können, andererseits aber aus den obengenannten Gründen die Wasserbäder nicht gleichgültig sind, kann man diese heißen Sandbäder unter der Voraussetzung, daß der Sand vollständig trocken ist, ohne weiteres gelten lassen und wird durch den Aufenthalt in frischer Luft und die Aussetzung des Körpers an den Sonnenstrahlen auch allgemein stoffwechselfördernd und anregend wirken. Diese Art des Bädergebrauches erscheint dort, wo er unbedingt verlangt wird, noch der beste Ausweg.

Zur Therapie chronisch entzündeter Adnexa kann auch die Quarzlichtbestrahlung des Unterbauches unterstützend herangezogen werden. Entsprechend der Empfehlung von FROMME macht man eine Kur von etwa 15 bis 20 Sitzungen, beginnend mit einer Minute in 75 cm Entfernung bis 20 Minuten Dauer in 40 cm Entfernung. Es ist schwer, die Wirkungsweise der Behandlung festzustellen, doch kann ihr ein Wert als allgemeines Roborans nicht abgesprochen werden, weshalb sich eine solche Kur besonders in den Wintermonaten in Großstädten empfiehlt. Über die vaginalen Licht- und Wärmebestahlungsverfahren erfolgen Hinweise beim Fluor.

### Gynäkologische Massage.

Während die Generation vor uns in der gynäkologischen Massage nach THURE BRANDT eines der wichtigsten Behandlungsmittel zum Ausgleich der nach Entzündung der Adnexa und des Parametriums zurückgebliebenen Veränderungen gesehen hat, ist sie in der Gegenwart immer mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Sofern die gynäkologische Massage bei den Adnextumoren Anwendung finden soll, soll sie auch der Vergessenheit nicht entrissen werden. Es ist unnatürlich und falsch, Hohlorgane wie sie die Tuben sind, und überdies noch krankhafte Hohlorgane, welche durch bindegewebigen Verschluß unter einem gewissen Druck stehen, durch Massage heilen zu wollen. Sie kann daher bei entzündlichen Erkrankungen der Adnexa keinesfalls empfohlen werden. Anders ist es dort, wo es sich um die Förderung der Resorption parametraner Infiltrate und Schwielen handelt. Mit dieser berechtigten Einschränkung der Anwendungsbreite der Massage ist aber auch die schulmäßige Überlieferung der Methode in den meisten Anstalten verloren

gegangen, so daß es gegenwärtig nicht viele Gynäkologen gibt, die eine wirksame Massage treiben können. Es ist aber gar kein Zweifel, daß die zum richtigen Zeitpunkt angewandte, an ausgewählten Fällen erfolgende Massage sehr Gutes leisten kann, wenn die Technik derselben vom Arzte beherrscht wird. Die Fälle müssen, sollen sie durch die Massage gebessert und nicht verschlechtert werden, im Stadium der längst abgeheilten Entzündung sich befinden, mag auch dabei der Uterus verlagert und fixiert sein. Überdies verbieten kranke Nerven und großer Fettreichtum der Bauchdecken von vornherein die Massage oder machen sie im letzteren Falle ziemlich zwecklos. Diejenigen Handgriffe, welche zur Dehnung von Adhäsionen und zur Resorption von Exsudaten angewendet werden, lassen sich etwa folgendermaßen schildern: Die Patientin liegt auf einem niedrigen Sofa oder Untersuchungstisch mit gut erhöhtem Kopf und Schultern, der Arzt sitzt oder steht an ihrer Linken und benützt als inneren Finger den Zeigefinger der linken Hand, während die rechte äußere Hand der inneren entgegenarbeitet. SCHAUTA betont ausdrücklich, daß der Ellbogen der linken Hand auf dem gleichnamigen Oberschenkel des Arztes aufruht, damit die Bewegungen der Hand nur in Finger- und Handgelenk gemacht werden, also leicht und zart erfolgen. Die rechte äußere Hand macht nun mit vollkommen gestreckten Fingern unter sehr sanftem Druck kreisende Bewegungen und dringt dadurch immer mehr in die Tiefe, bis endlich das zu massierende Gewebe zwischen den Fingern der äußeren Hand und dem auf die Spitze des inneren Fingers aufgeladenen Infiltrat gefühlt wird. Man massiert womöglich nicht mit den Fingerspitzen, sondern mit der Volarfläche der dritten Fingerglieder des Zeige- und Mittelfingers oder des Mittel- und Ringfingers. Bei massigeren Exsudaten kann man nach THURE BRANDT zunächst als Einleitungsmassage in jeder Sitzung an der vorderen Kreuzbeinfläche und am Promotorium kreisförmige streichende Bewegungen in der Richtung nach aufwärts ausführen, um die retroperitonealen Lymphdrüsen zu entleeren und dieselben zur Aufnahme neuer Lymphe tauglich zu machen. Um gespannte oder verkürzte Ligamente auszuzerren oder um dem Uterus und den Ovarien wieder ihre Beweglichkeit zu verschaffen, geht man so vor, daß man die Hand in dem Sinne kreisförmig bewegt, in dem man die Adhäsionen auszudehnen beabsichtigt. Zum Beispiel beginnt man mit der Massage eines den Uterus an die Beckenwand heranziehenden Infiltrates in der Nähe der Beckenwand und zieht ihn allmählich nach der Mittellinie und sogar über dieselbe hinaus nach der entgegengesetzten Seite. Auch kleine zitternde Bewegungen zur Auszerrung des Ligamentes werden von SCHAUTA empfohlen. Wichtig ist, daß niemals bei der Massage von Seite der Patientin Äußerungen über Schmerzen fallen dürfen, weshalb dieselbe einschleichend beginnen muß und sich am Anfange nur auf 2 Minuten beschränken soll, während man in späteren Sitzungen die Dauer bis auf 15 Minuten ausdehnen und auch den Druck verstärken kann. Will man Erfolge sehen, muß man sie durch 1 bis 3 Monate etwa dreimal in der Woche betreiben. Bei dieser Art der Massage kann man mit Resorption der Exsudate durch Beförderung des

Blut- und Lymphstroms und mechanische Auszerrung der Adhäsionen rechnen, freilich muß man die Fälle aussuchen und darf auch nicht vergessen, daß sexuell besonders empfindsame Frauen sich für dieselbe durchaus nicht eignen. Vielfach kann sie durch die Vibrationsmassage ersetzt werden, die als äußerliche und vaginale mit einem entsprechenden Ansatzstück für letztere jeden zweiten Tag durch 1 bis 5 Minuten hinsichtlich der Dehnung von Narben und Verwachsungen dasselbe leistet. Dabei tritt entschieden das erotische Moment in den Hintergrund.

### Belastungstherapie.

Schließlich muß auch noch der Belastungstherapie zum Zwecke der Dehnung und Resorption von Exsudaten und parametranen Schwielen als einer brauchbaren, durch einen gleichmäßigen und durch längere Zeit anhaltenden Druck wirksam werdenden Behandlung Erwähnung getan werden. Sie hat sich in der von HALBAN-SCHAUTA angegebenen Methode bis heute gut bewährt. Der Druck von außen wird durch einen Schrotbeutel erzielt, der 1 bis 2 kg schwer ist, der Gegendruck von der Scheide her durch einen mit Quecksilber gefüllten Kolpeurynter. Die Patientin wird in mäßige Beckenhochlagerung gebracht, der Kolpeurynter zusammengerollt in die Scheide eingeführt und mittels Trichters  $\frac{1}{2}$  kg Quecksilber eingegossen. Dabei schmiegt sich das flüssige Quecksilber den Konturen des Scheidengewölbes, dasselbe ausdehnend und auf die Exsudate drückend, voll an. Man beginnt mit  $\frac{1}{2}$  kg Quecksilber, das man eine  $\frac{1}{2}$  Stunde einwirken läßt und kann bis  $1\frac{1}{2}$  kg mit der Quecksilberbelastung steigen und das Gewicht 2, ja 3 Stunden wirken lassen. Nach Beendigung der Sitzung läßt man das Quecksilber langsam abfließen, um nicht eine zu starke reaktive Hyperämie zu erzeugen. Man behandelt etwa 3mal wöchentlich und sieht meist nach 15 bis 20 Sitzungen bei parametranen Schwielen, besonders solchen am Beckenboden, ausgezeichnete Ergebnisse. Der fixierte, retrovertierte oder retroflektierte Uterus läßt sich ebenfalls durch dieses Verfahren allmählich beweglicher machen. Daß hinter Schwielen etwa liegende, entzündlich veränderte Adnexe nicht zum Schwinden kommen, liegt in der Natur des Verfahrens. Es kann aber auch mit SCHAUTA als eine Vorbereitung zu einem allenfalls noch notwendig werdenden konservativen Eingriff angesehen werden. Bei Retroflexio uteri läßt man die äußere Belastung weg. Selbstverständlich darf sie überhaupt nicht im akuten Stadium und auch nicht im subakuten angewendet werden. Auftreten von Schmerzen oder gar Temperatursteigerungen zwingen zur sofortigen Unterbrechung der Behandlung.

## 2. Die Behandlung der entzündlichen (nicht gonorrhöischen) Krankheiten der äußeren Scham, der Scheide, Cervix und Portio.

### Vulvitis.

So leicht die Diagnose der akuten Vulvitis ist, die durch Verschwellung, Rötung und Schmerzhaftigkeit der Scham schon, bei der bloßen Berührung durch Kleidungsstücke, reichliche Sekretion, Hitze und

quälenden Juckreiz ausgezeichnet ist, so schwer kann es im einzelnen Falle sein, ihre Ursache zu ergründen. Sie aber festzustellen, muß Aufgabe einer rationellen Behandlung sein. Obenan in der Häufigkeitsursache steht die akute Gonorrhoe. Die Behandlung der durch sie verursachten akuten Vulvitis ist in diesem Abschnitt beschrieben. Hier soll zunächst die Behandlung unspezifischer Vulvitiden angegeben und dann noch der selteneren, vielfach ein Grenzgebiet zwischen der Dermatologie und Gynäkologie bildenden Formen gedacht werden. Der Diabetes, manchmal vergesellschaftet mit Furunkulose, ist eine häufige Ursache der akuten Vulvitis, wobei ohne Behandlung des Grundleidens natürlich die symptomatische Therapie nur wenig Erfolg hat. Blasenkatarrhe, gar solche bei Frauen, welche infolge Senkung und Zystokele an Harnträufeln leiden, sind weiter eine häufige Ursache, die bei Blasen-Scheidenfisteln selbstverständlich ist und zu ganz schweren Vulvitisformen chronischer Art führt. Habituell geübte Onanie kann ebenfalls zur Vulvitis führen, weil durch die Onanie, wenn sie bis zum Orgasmus betrieben wird, das Sekret der Bartholinischen Drüsen und vielleicht auch das Cervixsekret ungebührlich oft austritt und reizend und mazerierend auf die Vulva-epithelien wirkt, besonders bei fettreicheren Individuen, wenn sie kein großes Reinlichkeitsbedürfnis haben. Derselbe Mangel ist bei dicken Frauen, besonders bei solchen mit starken Coxa vara, bei denen die Oberschenkel beim Gehen aneinanderstreifen, Ursache entzündlicher Veränderungen der Vulva und ihrer Umgebung. Diese sind recht schmerzhaft und können sogar bis zu tieferreichenden Geschwüren führen. Auch Filzläuse, ferner Oxyuren<sup>1</sup> können dasselbe machen und das schaumige Sekret der Trichomonas vaginalis pflegt in stärkeren Graden recht schwere Vulvitisformen hervorrufen. Bei Schwangeren sieht man auch Soor Vulvitis machen. Neben dem Fluor bei der Gonorrhoe kann aber auch ein unspezifischer Fluor, wenn er eitrigem Charakter hat und reichlich ergossen wird, dasselbe bewirken. Ebenso sieht man auch bei Frauen, welche an sehr schweren Regelblutungen und an atypischen Blutungen leiden, besonders wenn sie sich nicht rein halten und schlechte, scheuernde Binden tragen, Vulvitis entstehen. Bei den langdauernden Fällen ist die Diagnose auf den ersten Blick bei der in Steinschnittlage auf dem Untersuchungstisch liegenden Patientin zu stellen, indem sich die entzündete Vulva und beiderseits davon die entzündlich veränderte, hell- bis braunrote, manchmal wie gegerbte Haut der Umgebung in typischer Schmetterlingsform von der gesunden Haut abhebt. Die Vulvitis ist eine zwangsläufige Begleiterscheinung spitzer Kondylome. Sie erreicht in solchen Fällen meist besonders hohe Grade, die stärksten allerdings bei gleichzeitig bestehender Schwangerschaft, wo die mit den Schamhaaren verbackenen Sekrete nicht nur eine schwere Vulvitis bis über die Genitoglural-

<sup>1</sup> Man beseitigt sie durch *Knoblauchklistiere* und Wurmmittel wie *Butolan* und *Helminal*. 1 bis 3 Knoblauchzwiebeln werden  $\frac{1}{2}$  Stunde in 1 Liter Wasser gekocht und nach dem Erkalten als Klysma gegeben, das man mindestens 5 Minuten halten läßt. Dazu 3mal täglich 2 Tabletten Butolan à 0,5 oder 3mal täglich 2 Tabletten Helminal à 0,25.

fallen erzeugen, sondern auch zu einem durch die Kleider hindurch wahrzunehmenden widerlichen Geruch Veranlassung geben.

Was die Behandlung der akuten und der schon chronisch gewordenen Form der Vulvitis anlangt, so wird sie sich bei steter Richtung der Therapie auf die Grundursache in der Mehrzahl der Fälle nicht schwierig gestalten. Das oberste Gebot ist Reinlichkeit, deren Mangel ja vielfach die einzige Ursache der Vulvitis ist. Freilich ist sie nicht immer angeboren und sehr oft nicht anerzogen, weshalb man immer wieder bei manchen Frauen nach Zeiten der Besserung Rückfälle sieht. Besonders die fettleibigen Frauen müssen, abgesehen von den Zeiten der Periode, nicht nur täglich sorgfältige Waschungen der äußeren Scham und deren Umgebung machen, sondern auch durch peinliches Trockenhalten der Partien, am besten mit Pudern, und zwar mit Talkpudern in dünnem Aufstrich, die dem Reismehl, welches leichter verbäckt und krümelige Massen bildet, vorzuziehen sind. Gut bewährt ist das aus Zinkoxyd, Kampfer und Talk bestehende, gleichzeitig den Juckreiz mildernde Puder folgender Zusammensetzung:

99. Camph. trit. . . . .	0,5 (bis 1,0)
Zinc. oxyd. . . . .	2,5
Talc. venet. ad . . . . .	50,0
D. S. Puder. (STRASSMANN).	

Auch das *Vasenol-Körperpuder* (mit Formalinzusatz) und das *Lenicetpuder* (essigsäure Tonerde in fester Form enthaltend) werden gebraucht. Im akuten Stadium sind eingreifendere Maßnahmen nicht zu umgehen. Am sichersten wirken im Beginn der schmerzhaften Entzündung kühlende, reizlose Berieselungen und Sitzbäder mit *Kamillen-* und *Kaspappeltee* (15 bis 20 Minuten 2mal täglich) oder *Kleie* (Bereitung s. S. 100). Auch lauwarme Sitzbäder auf dem Bidet, denen man 1 Eßlöffel *Borax* oder ebensoviel *Speisesoda* anfügt, sind vorteilhaft. Bei heftigen Schmerzen und Brennen sind Vorlagen, die mit *Bleiwasser*, *Liquor Burowi* oder 1%igem *Resorcinwasser* getränkt sind, oft nicht zu umgehen, wie dies bei der gonorrhöischen Vulvitis S. 93 ff. beschrieben ist. In der Sprechstunde bedient man sich mit Vorteil einer zarten Betupfung der am meisten entzündeten Partien mit 2- bis 3- bis 5%iger *Argentum-nitricum-Lösung* oder einer adstringierenden Lösung nach BUCURA:

100. Alumin. . . . .	1,0
Plumb. acet. . . . .	10,0
Aqu. ad . . . . .	150,0

Nach Abklingen der stürmischen Erscheinungen ist das *Unguentum Diachylon Hebrae*, das zur Hälfte mit Olivenöl vermischt wird, oder *Pasta Zinci oxyd.* am Platze. Natürlich geht es auch hier ohne peinlichste Reinlichkeit, namentlich nach der Harn- und Stuhlentleerung nicht ab. Auch die Diät soll möglichst reizlos, hauptsächlich vegetabilisch und salzarm sein. Manchmal sind Schlafmittel wegen des Juckreizes nicht zu umgehen. Waschungen mit Wasser wirken verschlimmernd, ebenso jedes energische Abreiben der gereizten Partien. Auf weitere Einzelheiten kann

hier nicht eingegangen werden, zumal sie in das Gebiet der Dermatologie gehören. Bei Furunkulose wird manchmal neben der Lokalbehandlung eine Vakzinebehandlung rascher zum Ziele führen. Hier bewährt sich auch, wie übrigens in anderen Fällen der Vulvitis, sehr gut die Anwendung von Sitzbädern mit *Eichenrinde* (S.94). Die Erfolge in bezug auf das Abschwellen, das Verschwinden der Rötung und auch auf die Milderung des Juckreizes sind recht befriedigende. Kommt man mit diesen Maßnahmen nicht zum Ziel, kann man es immer noch mit der gerade bei der Vulvitis auf dem Boden von Furunkulose sehr wirksamen Röntgenbestrahlung versuchen, auf die man nicht vergessen soll und die man, wenn sie anfänglich nicht wirkt, unbedenklich wiederholen kann.

Von besonderen Vulvaerkrankungen sei die durch Soor erzeugte Vulvitis erwähnt, die fast nur bei Schwangeren im Verein mit gleichzeitiger Entzündung der Scheide beobachtet wird. Ihre Behandlung ist ebenso wie die der Trichomonadenulvitis bei den Entzündungen der Scheide S. 155 geschildert.

Von weiteren Erkrankungen sei noch das *Ulcus vulvae acutum* erwähnt, dessen Erkennung und sichere Feststellung keineswegs leicht ist. Von größter Wichtigkeit ist natürlich die Unterscheidung der Krankheit von dem *Ulcus molle* und *gangraenosum*. Auch der bakteriologische und histologische Aufschluß wird vielfach nicht zu umgehen sein. LIPSCHÜTZ und SCHERBER fordern den Nachweis des *Bacillus crassus*. Für den Gynäkologen ist eine Konsiliarbehandlung mit einem Dermatologen unbedingt anzuraten. Der Therapie erwachsen bei der Neigung zur Reinigung und Heilung des Prozesses von der Natur aus keine großen Schwierigkeiten. Trockenbehandlung mit *Dermatol*, *Xeroformpuder*, auch mit *Jodoform* und Reinigung durch Sitzbäder mit *Kamillen* und Berieselung des Geschwürs mit 3% *Hydrogenium hyperoxydatum* sind empfehlenswert. Weicher und harter Schanker fallen nicht mehr in unser Behandlungsgebiet. Eine beim ersten Auftreten manchmal die Frauen sehr erschreckende, nicht selten aber nach dem Geschlechtsverkehr immer wieder auftretende oder an die Periode regelmäßig gebundene Krankheitserscheinung ist der belanglose *Herpes vulvae*. Unter Verwendung von *Pasta zinci oxyd.* und *Zinkoxyd-Vasenol-Lenicetpuder* heilen die Bläschen in kurzer Zeit.

Über die durch Bartholinischen Abszeß verursachten Vulvitiden ist bei der Gonorrhoe S. 96 das Nötige ausgeführt. Nicht verfehlen möchte Verfasser, auch auf jene Vulvitiden hinzuweisen, die nicht durch Staphylo- und Streptokokken und auch nicht durch Gonokokken, sondern durch *Bacterium coli* erzeugt sind, mag es sich um Fälle von Vulvitis auf dem Boden einer Cystitis oder Pyelitis handeln oder um solche, welche durch Infektion vom Darne her entstanden sind. Es gibt auch heute noch Frauen und Mädchen, die sich bei der Stuhlentleerung und der Reinigung einer solchen Indolenz befleißigen, daß sie direkt die Kolierreger nach der Scheide zu wischen. Vielfach handelt es sich um rezidivierende Vulvitiden, die von der Kinderzeit her sich wieder rühren. Auch bei denen verheirateten Frauen beobachtet man gelegentlich derartige, durch die ersten ungeschickten Koitusversuche entstandenen Kolvulvitiden. Sie heilen

übrigens bei Anwendung der oben gezeigten Behandlung rasch ab. Anders ist es in solchen Fällen, wo Kolicystitis und Pyelitis die Ursache der immer wieder schubweise auftretenden Vulvitis ist (S. 256 ff.). Dann muß die Grundursache, allenfalls unter Zuhilfenahme der Vakzinetherapie beseitigt werden. Man kann sich der Mischvakzine in der Form, wie sie bei den entzündlichen Adnexerkrankungen S. 167 beschrieben ist, bedienen.

In der Diagnose und Behandlung der tuberkulösen Ulzerationen des äußeren Genitales sind die Dermatologen mehr erfahren als die Frauenärzte. Entsprechende Hinweise erfolgen im Abschnitt über Genitaltuberkulose S. 174.

Das seltene *Ulcus chronicum vulvae* (Esthiomène), dessen Ätiologie keine einheitliche ist und sich als ein langsam in die Tiefe wucherndes sklerotisches Ulcus findet, ist therapeutisch schwer zu behandeln. Arsen und Jod innerlich, Galvanokaustik und chirurgische Therapie lokal werden empfohlen. Bei der Elephantiasis vulvae ist die chirurgische Entfernung der verdickten Partien der äußeren Scham das einfachste und beste Verfahren.

#### Pruritus vulvae.

An die Entzündungen der äußeren Scham und der Scheide schließt sich ohne Zwang die Besprechung der Behandlung des Pruritus vulvae, der juckenden Entzündung der äußeren Scham an. Sie ist ein sehr häufiges, oft ungemein qualvolles Leiden, das zufolge seines besonders in der Nacht auftretenden Juckreizes bei längerer Dauer die Frauen geradezu zur Verzweiflung bringen kann. Der Juckreiz erstreckt sich oft nicht nur auf das gesamte äußere Genitale mit besonderer Beteiligung der Klitorisgegend, sondern herunter zum After und in die Scheide hinein. Eine gewisse Schwellung und Starrheit der Haut- und Schleimhautbedeckung des äußeren Genitales ist nebst zahlreichen Kratzwunden zu beobachten, welche Erscheinungen sekundärer Art sind und auf den verschiedensten Versuchen, das Jucken zu beseitigen, beruhen. Die Behandlung ist sehr schwierig und, wie gleich vorweggenommen sei, auch dann nicht immer erfolgreich, wenn man die Ursachen des Pruritus ermittelt hat. Nach ihnen muß man immer forschen, sonst bleibt die ganze Behandlung planlos. Jeder Klage über Pruritus muß zwangsläufig die Harnuntersuchung folgen, weil zuckerhaltiger Urin eine häufige Ursache des Pruritus ist, indem er zur Aufweichung der Epithelien und zu Geschwürsbildungen Veranlassung gibt, auf denen die Bakterien dann gut gedeihen. Aber auch Würmer, und zwar meist die recht verbreiteten Oxyuren, auch Spulwürmer, ferner entzündliche, beißende Scheidenflüsse, Soor, *Trichomonas vaginalis* und Ungeziefer oder ein Cervixfluor bei Erosion der Portio können zur Mazeration der Vorhofschleimhaut und der Haut des äußeren Genitales führen und den Juckreiz bewirken. Es sollen auch bestimmte Arzneien (nach SCHRÖDER Belladonna, Opium, Brom, Arsen, Phosphor, Aspirin, Quecksilber, Ichthyol, Lysol und Lysoform) gelegentlich Pruritus verschulden. Unrichtige, einseitige Ernährung, dauernder, übermäßiger Genuß scharfer Speisen, soll auch zum Pruritus

führen und wäre dann als Allergie aufzufassen. Auch ungeeignete Leibwäsche, rauhe Menstruationsbinden mögen ihn erzeugen. Die genannten Ursachen sind es, die mehr minder deutlich diese Art des Pruritus als einen symptomatischen anzusehen gestatten. In einer großen Zahl der Fälle aber ist die Ursache des Pruritus schlechterdings nicht auffindbar. Man spricht von einem essentiellen Pruritus, der nach neueren Auffassungen entweder eine Dysfunktion im Zusammenspiel der endokrinen Drüsen oder nur eine Folgeerscheinung einer psychosexuellen Funktionsstörung ist. Nach KEHRER, dem wir die letztere Feststellung der Hauptsache nach verdanken — auch WALTHARD spricht von einer Psycho-neurose — handelt es sich um eine seit längere Zeit bestehende Blut- und Lymphüberfüllung infolge abwegiger erotischer Erregung. Diese schaffe die Bereitschaft zum Pruritus. Demnach müßte man gerade dieser Ätiologie das Hauptaugenmerk zuwenden und das Symptom des Pruritus häufiger psychosexuell bedingt als biochemisch oder mechanisch gegeben auffassen. Wenn es richtig ist, daß psychosexuelle Ursachen die Krankheit verschulden, und zwar in der Mehrzahl der Fälle, dann muß der Hebel der Therapie dort ansetzen. Besprechung mit der Frau, taktvolles Erforschen ihrer Vita sexualis, allenfalls unter abgesonderter Heranziehung ihres Mannes, wird von Vorteil sein, besonders wenn man mit KEHRER auf die Notwendigkeit einer gleichzeitigen Entspannung der Sexualpartner bei der Kohabitation den größten Wert legt. Also Persvasion und Psychanamnese können hier helfen, so und so oft aber wird man, weil man die Verhältnisse nicht ändern kann, auch in solchen Fällen symptomatisch vorgehen müssen. Von Wichtigkeit wird es sein, alles was die Geschlechtsgehend hyperämisieren kann, abzuhalten. Sorge für guten Stuhl, allenfalls eine Abführkur, Aufenthalt in frischer Luft mit Märschen bis zur weitgehenden Ermüdung, der Wassersport in jeder Form, hydrotherapeutische Prozeduren, besonders Halbbäder von 34 bis 30° C und 5 Minuten Dauer, verbunden mit den üblichen Abreibungen und Übergießungen, kalte Sitzbäder (20 bis 15° C, 10 Minuten Dauer) können hier Gutes tun.

Was die symptomatischen Mittel anlangt, so ist ihre Zahl kaum übersehbar, Beweis genug, daß viele, manchmal sogar alle versagen. Man beginnt in allen Fällen am besten der Empfehlung LIEPMANN'S folgend mit einer Entfernung der Schamhaare, nachdem dieselben mit Wasser und Seife eingeseift wurden, trocknet durch Tupfen mit Watte gründlich ab und bepinselt nun das Pudendum externum bis zum Anus hinunter mit 10%iger Lösung von Argentum nitricum. Dieses wirkt dort, wo Fissuren bestehen, heftig brennend, doch läßt das Brennen sehr bald nach. Dieses alte Verfahren ist immer noch mehr erfolgverheißend als so manche andere Mittel, denen aber im Einzelfalle ihre Bedeutung nicht abgesprochen werden soll. Wichtig ist, daß bei dieser Therapie häufige Waschungen mit gewöhnlichem Wasser unterbleiben sollen und daß nur einmal im Tage eine zarte Reinigung mit Karbol- oder Teerseife stattfinden darf. Dabei ist jedes Reiben auch beim Trocknen zu vermeiden. Noch besser ist die Reinigung der äußeren Scham auf dem Bidet mit Kamillen- und Käsepappelbädern, welche eine kühlende, den Juckreiz

mildernde Wirkung meist nicht vermissen lassen. STRASSMANN empfiehlt bei Tage nach der Waschung mit Karbelseife die Haut einzupudern, und zwar mit dem erwähnten Puder (Rp. 99, S. 127). Der Juckreiz ist bekanntlich in der Nacht weit ärger als bei Tage. Viel trägt dazu die Bettwärme bei. In kühlen Zimmern und mit leichten Decken bei gut eingewickelten Füßen zu schlafen ist notwendig. Vielfach werden über die Nacht Salben empfohlen. Solche sind in den verschiedensten Zusammenstellungen angegeben. Man verordnet:

101. Menthol. .... 0,25 (bis 0,5)  
 Eucain. hydro-  
 chlor. .... 1,0 (bis 2,0)  
 Anaesthesin ..... 5,0  
 Salol  
 Ol. Olivar. .... aa 2,0  
 Lanolin ad ..... 50,0  
 M. f. ungt.

D. S. Zum Salben für die Nacht  
 (STRASSMANN).

102. Anaesthesin ..... 5,0  
 Vaseline ad ..... 50,0  
 M. f. ungt.

D. S. Zum Gebrauch beim Jucken  
 (STRASSMANN).

103. Tumenol ..... 2,0  
 Anaesthesin ..... 0,5  
 Acid. boric. .... 1,0  
 Zinc. oxyd. .... 6,0  
 Ungt. Lenientis ..... 30,0  
 M. f. ungt. sterilisat.

D. S. Morgens und abends auftragen  
 (KEHRER).

104. Bismut. subnitr. .... 0,5  
 Zinc. oxyd. .... 1,0  
 Ungt. lenientis  
 Vaseline ..... aa 25,0  
 (LITAUER).

105. Cocaini hydrochlor. .... 1,0  
 Menthol. .... 0,2  
 Ol. Olivar. .... 2,0  
 Lanolini  
 Vaseline ..... aa 10,0

S. Zum Gebrauch bei Juckreiz.

Mit Einreibungen der Vulva mit

106. Mesotan ..... 25%ig  
 Ol. Olivar. .... aa 25,0

kann man es, wenn nicht dadurch das Brennen verstärkt wird, versuchen. Nach SCHWABE soll auch das Auftragen einer *Vitrisolemulsion* mit weißem Quecksilberpräzipitat (O. P.) oder mit *Tumenol* Gutes leisten. Auch die *Naphthalanzinksalbe* O. P. mit 20% *Zinkoxyd* wird empfohlen. BAKOFEN hat sich ein Öl nach der Zusammensetzung von

107. Oleum cadini ..... 10,0  
 Oleum jecoris aselli ..... 20,0

bewährt, doch kann es gelegentlich so reizend wirken, daß man von seiner Verwendung Abstand nehmen muß. In einem verzweifelten Falle von senilem Pruritus kam Verfasser nach erfolgloser Erprobung fast sämtlicher gebräuchlichen Medikamente mit dem bloßen Bestreichen der

äußeren Scham mit *Salizyltalk* überraschend schnell zu einem vollen Erfolg. Vorsichtiger muß man schon mit der *Bromocollsalbe* sein, weil Brom keineswegs immer vertragen, ja sogar als ursächlich juckreizbedingend angesprochen wird. Man verordnet 20%ige Bromocollsalbe, die aus einer organischen Brom-Tanninverbindung besteht. Seit einiger Zeit haben wir von *Magnobrol* bei Pruritus ausgiebig Gebrauch gemacht und sehr gute Ergebnisse damit erzielt. Man injiziert durch 3 Tage hindurch intramuskulär 10 ccm Magnobrol und gibt gleichzeitig 3mal täglich 1 Teelöffel des *Magnobrol-Pulvers* in Wasser. Teerprodukte sind ebenfalls in Gebrauch, so die *Tumenol-Ammoniumsalbe* 10%ig, die ebenfalls in Tuben in den Handel kommt. Recht gut bewährt hat sich wiederholt die 1- bis 2%ige *Pantocainsalbe* und die *Percainalsalbe*, die auch beide bei Afterjucken auf dem Boden von Hämorrhoiden Gutes leisten (bei deutlichen Fissuren und Ulcera „ohne Menthol“ sonst „mit Menthol“ zu verschreiben). Dort, wo Oxyuren vorliegen und den Juckreiz bedingen, muß man zuerst diese durch die bekannten Wurmmittel austreiben (s. S. 126). Wo, was gar nicht so selten ist, Trichomonaden einen beißenden Fluor unterhalten und zum Pruritus Veranlassung geben, wird die bei der Fluortherapie geschilderte Trichomonasbehandlung, insbesondere die mit *Yatren-Pillen*, *Yatren-Pudern* und besonders mit *Devegantabletten* (S. 147) anzuwenden sein. Sorge für guten Stuhl im Anfang der Behandlung, allenfalls die Anwendung des Sudabades ist ebensowenig zu umgehen, wie Verbot von Alkohol, Kaffee und Tee. Auch einer salzfreien Kost wird von verschiedenen Seiten, neuerdings auch von NOORDEN das Beste nachgerühmt. In solchen Fällen muß man aber mindestens eine Woche eine vollständig salzfreie, hauptsächlich auf Obstdiät eingestellte Kost vorschreiben und nach einer Woche kann man mit der Zickzackkost nach NOORDEN beginnen, d. h. man gestaltet unter Einschaltung von 1 bis 2 Obsttagen wöchentlich die Nahrung kochsalzarm. Daß natürlich Fälle von Zuckerkrankheit und Pruritus lokal mehr nebenher, durch Diät aber im wesentlichen behandelt werden müssen, bedarf keiner Begründung. Vielfach herrscht die Anschauung, daß der Pruritus auf dem Boden der Ovarialinsuffizienz entsteht, weil er mit Vorliebe in den Jahren herabgerindeter oder fehlender Tätigkeit der Eierstöcke auftritt. Man hat daher versucht, durch *Ovarial-* (Ovosan, Ovaria siccata, Ovoglandol usw.) und *Hormonpräparate* den Zustand zu bessern. Die bei der Ovarialtherapie genannten Präparate einschließlich des Präpitan und Preloban, also des Hypophysenvorderlappens, werden in Form von Dragees und auch in Injektionen vielfach verabreicht. Ausgesprochene Erfolge hat Verfasser nicht gesehen. Auch Schilddrüsenpräparate sind versucht worden (0,1 g täglich), doch sind die Erfolge fraglich. Daß in Fällen von Dermatosen und Dermatomykosen, allenfalls unter Heranziehung eines Fachmannes der Dermatologie die Heilung erstrebt werden muß, ist klar. Trotzdem bleiben noch Fälle, die der weiteren Behandlung trotzen. In solchen hat man sich zu eingreifenden Maßnahmen entschlossen, von denen die subkutane Infiltration der Vulva mit etwa 60 ccm  $\frac{1}{2}$ %iger Novocain- oder  $\frac{1}{5}$ %iger Tutocainlösung einfach und oft wirkungsvoll ist (HALBAN).

Ferner ist die Pudendusanästhesie nach FRYGIESI, Durchschneidung des Nervus pudendus, sogar die Sympathektomie der Art. hypogastrica vorgenommen worden, die freilich weit einfacher durch die DOPPLERSche Phenolpinselung erreicht werden kann. HALBAN und MATHES haben durch tiefe Stichelungen mit dem Paquelin verzweifelte Fälle von Pruritus schwinden gesehen. Diesem Verfahren ist noch eher das Wort zu reden, als der Nervendurchschneidung, die doch wieder das Rezidiv nicht verhindern kann und dabei kein kleiner Eingriff ist. Es ist nicht zu wundern, daß man angesichts solcher unheilbarer Fälle mit Begeisterung zur Strahlenbehandlung gegriffen hat. Röntgenlicht und Radium, Quarzlampe und Hochfrequenz werden angewendet, ohne daß auch diese Verfahren immer zum Ziele führen. In Fällen, in denen das ganze Register der Therapie aufgezogen worden ist, soll man es wohl immer mit einer Röntgenbestrahlung versuchen. Besonders bei essentiellem Pruritus, also solchem, der weder in lokalen Veränderungen entzündlicher Natur, noch im Nervensystem gelegen zu sein scheint, werden immerhin gute Erfolge bis zu 50 und mehr v. H. der Fälle berichtet. GAL gibt an, daß bei Frauen, bei denen die Ovarien operativ entfernt wurden, ein Versuch der Schilddrüsenbestrahlung nach WERNER mit geringen Dosen ( $\frac{1}{2}$  der H. E. D.) versucht werden kann. So wie man durch Medikamente die Hypophyse beeinflussen will, hat man es auch mit Röntgen und mit Diathermie getan und mag in einzelnen Fällen auch dazu greifen. Die örtliche Diathermie wird am wirksamsten in der Art gebraucht, daß man die Vulva mit einer feuchten (nicht nassen) Gaze bedeckt und darüber eine Lage dicken Staniolpapiers gibt, welche als die eine Elektrode wirkt, während man die andere Elektrode auf den Bauch legt. Für die Nacht kann man vielfach, namentlich am Anfang Schlafmittel nicht entbehren. Die Verordnung von

108. Pyramidon.  
 Medinal. .... aa 0,3  
 But. cacao ad ..... 2,0  
 M. f. suppos. ann.  
 D. tal. dos. Nr. VI  
 S. Abends 1 Zäpfchen eingefettet in  
 den Mastdarm einführen.

ist altbewährt. Aber auch die leichteren Mittel *Somnacetin* (30 Tropfen, 2 Tabletten), *Adalin*, *Luminal* (0,15), *Abasin* (3mal täglich 1 bis 2 Tabletten), *Sedormid* (4 halbe Tabletten über den Tag verteilt), *Hovaletten*, *Valeriana*, besonders in Form einer Tasse Baldriantee wirken beruhigend, gar dann, wenn man vor dem Schlafengehen die juckenden Stellen mit

109. Acid. carbol. crystal. ... 2,0  
 Aqu. fontis ad ..... 100,0  
 D. S. Äußerlich.

mit einem Watteträger zart betupft.

Auch die verschiedenen Nervina müssen zur Milderung des Juckreizes erhalten. Ausgezeichnete Wirkung wurde dem *Gardan* (3- bis

4mal 1 Tablette zu 0,5) nachgesagt, die Verfasser aber nur teilweise bestätigen kann. Auch die übrigen Nervina und Sedativa können namentlich für den Abend zur Beruhigung und Milderung des Juckreizes herangezogen werden.

#### Leukoplakia vulvae.

Während der mit Vorliebe zur Zeit der Klimax sich entwickelnde Vitiligo therapeutisch unbeeinflussbar ist und auch keiner Behandlung bedarf, weil dieser Pigmentschwund am Genitale belanglos ist, ist die Leukoplakie mit ihren grauweißlichen Hautverfärbungen und Verdickungen der Hornschicht unter Verbreiterung des Rete malpighii keineswegs gleichgültig, weil diese Krankheit in die Craurosis übergehen oder aber auch mit und ohne diese Vorstufe zu dem mit Recht so gefürchteten Vulvakarzinom das Vorspiel abgeben kann. Sie wird ja sogar als präkanzeröse Krankheit geführt, und in der Tat beobachtet man aufschießende Krebse des äußeren Genitales inmitten von leukoplakischen Feldern. Die Behandlung ist schwierig und wird mehr von dermatologischer, denn von gynäkologischer Seite betrieben und beruht auf Strahlentherapie einerseits, anderseits intern auf Arsenotherapie (S. 13 ff.). Da der Juckreiz dabei ein ungemein heftiger ist, so kann man auch um die symptomatische Behandlung desselben nicht herumkommen. Nachdem heute alles innersekretorisch erklärt wird, wofür wir keine andere Erklärung haben, versucht man es auch mit wechselndem Erfolge mit den wiederholt angeführten Eierstocks- und Corpus-luteum-Präparaten. Syphilis kann bei der Leukoplakie eine Rolle spielen, weshalb die W-Probe unbedingt anzustellen ist. Manche Autoren gehen mit Rücksicht auf die Möglichkeit einer Entstehung eines Karzinoms auf dem Boden einer Leukoplakie soweit, daß sie die Exstirpation der Vulva fordern, wozu sich die Frauen allerdings nur ganz ausnahmsweise entschließen können. Auch die Exzision der einzelnen leukoplakischen Herde ist zu erwägen, wenn bei starkem Juckreiz, Fissuren- und Geschwürbildung die Patientin nicht in die Totalexstirpation der Vulva einwilligt.

#### Craurosis vulvae.

Die Craurosis, eine Schrumpfung der Haut an der äußeren Scham, gekennzeichnet durch straffe, faltenlose, derbe, zu Einrissen neigende Haut auf weiß verfärbtem oder blaßgrauem Grund mit Ausfall der Schamhaare und in höheren Graden zu beträchtlicher Schrumpfung der Schamspalte unter Bildung von schmerzhaften Ragaden und Fissuren führend, beruht in ihrem Wesen auf einer Atrophie, deren histologische Einzelheiten hier nicht zur Besprechung gelangen sollen. Wesentlich ist nur, daß der Schrumpfung und Atrophie fast immer die weißlichen Veränderungen, wie wir sie bei der Leukoplakie kennen, vorangehen. Für die Therapie ist der fast immer fortschreitende Charakter der Krankheit richtunggebend. Im Anfang ist es meist der Juckreiz allein, der die Frauen zum Arzte führt und dessen Behandlung, wie oben dargetan worden ist, vielfach eine recht undankbare Aufgabe darstellt. Die Ovarialersatztherapie wird versucht, ohne überzeugende Erfolge zu liefern. Die

erwähnten Heilmittel bewähren sich natürlich nur symptomatisch gegen den Juckreiz und lassen auch hierin oft im Stich. Die Strahlenbehandlung weiß leider von Heilungen nicht zu berichten. Immerhin ist sie schon zwecks Linderung des Juckreizes anzuwenden. VOGT tritt für sie in Verbindung mit Ovarialersatz- und Hormontherapie ein. Von den chirurgischen Verfahren haben sich die Novocaininfiltration und die Stichelung mit dem Paquelin nicht ganz selten bewährt. In Fällen heftiger Juckbeschwerden auf dem Boden der Craurosis kann man gezwungen sein, die Vulvektomie am besten als totale (weniger empfehlenswert als partielle) auszuführen. Wenn sie auch ein verstümmelnder Eingriff ist, der körperlich und seelisch die Kranke belastet, so ist dagegen anzuführen, daß es sich vielfach um ältere, jenseits der Jahre der Geschlechtsbetätigung stehende Frauen handelt, und daß im übrigen die regelrecht ausgeführte Vulvektomie den Geschlechtsverkehr keineswegs unmöglich macht. Mit Rücksicht auf die naheliegende Möglichkeit des Aufkommens eines Karzinoms auf dem Boden der Craurosis, kann der Vulvektomie ein bedeutender therapeutischer Wert nicht abgesprochen werden. In leichteren Fällen wird man den Zustand durch die erwähnten Maßnahmen einschließlich der Quarz- und Röntgenbestrahlung erträglich machen können.

Von größter Wichtigkeit ist es, Trägerinnen einer Craurosis, aber auch einer Leukoplakie, ständig unter ärztlicher Überwachung zu halten und ihnen die periodische Untersuchung als notwendig hinzustellen, ohne deswegen das freilich nicht ganz selten drohende Gespenst der Krebs-erkrankung an die Wand zu malen.

### Vaginismus.

Höhere Grade dieses Zustandes, der in einer Verkrampfung des *M. constrictor cunni*, vergesellschaftet mit einem Krampf der Beckenbodenmuskulatur, ja sogar der Adduktorenmuskeln besteht, sind nicht gerade häufig. Leichtere Grade werden öfter beobachtet. Die längste Zeit hat man dieses Leiden als rein örtliches aufgefaßt und nach pathologisch-anatomischen Grundlagen gesucht, die sich ja auch in einer Reihe von Fällen finden lassen, aber meist nicht Ursache, sondern Wirkung vergeblicher Bestrebungen von Seiten des Ehepartners sind, den Krampf zu überwinden. Nur selten liegen tatsächlich krankhafte oder zumindestens abwegige Veränderungen am Hymen, eine besondere Festigkeit desselben vor oder es sind leichte Fissuren am Introitus, die infolge Bloßliegens des nervenreichen Unterhautzellgewebes auf jede Berührung noch weiter gereizt werden und zur Abwehrstellung führen. Der Vaginismus ist nämlich nichts anderes, als eine Abwehrstellung des Weibes gegenüber dem eindringenden Penis oder auch bei der ärztlichen Untersuchung gegenüber dem eindringenden Finger oder einem Instrument. Diese Abwehrstellung aber geht vom Gehirn aus; sie ist die Schutzmaßnahme gegenüber der gefürchteten, schmerzhaften Einführung des Gliedes auf dem Boden einer besonderen Überempfindlichkeit einerseits, andererseits aus der Vorstellung der Unlust, ja des Abscheus vor dem Geschlechtsverkehr oder auch vor dessen möglichen Folgen heraus. Dort, wo örtliche

Ursachen offenkundig vorliegen, besonders dann, wenn ein schwach potenter Mann durch ständig wiederholte, aber vergebliche Versuche vorzudringen, zur Reizung, Verschwellung und Fissurenbildung an der hinteren Kommissur oder am Hymen Veranlassung gegeben hat, ist mit und ohne lokale Behandlung der Zustand leicht der Behebung fähig. Die Benützung anästhesierender Salben, wie der 5- bis 10%igen *Anästhesin-salbe*, 5- bis 10%igen *Cocain-*, *Percain-* (1,5%) und *Perkainalsalbe* macht die Empfindlichkeit weit geringer und es gelingt alsbald, den Krampf zu beheben, besonders dann, wenn die Patientin dem eindringenden Körper, sei es der Penis, ein Instrument oder ein Finger, dadurch möglichst entgegenkommt, daß sie die Bauchpresse kräftig anspannt, ein Kunstgriff, den uns WALTHARD gelehrt hat, und der von größter Bedeutung für die Behebung des Zustandes ist. Dort, wo der Hymen besonders fest und undehnbar ist und dadurch auch einem kräftig potenten Manne die Defloration unmöglich macht, wird man bei vielen Versuchen, sie doch zu erzwingen, selbst bei einem gesunden Nervensystem schließlich auch einen Vaginismus erleben können. In diesen Fällen von Pseudovaginismus und in schwereren von echtem Scheidenkrampf erscheint die operative Beseitigung des Hindernisses geboten. Am besten bewährte sich Verfasser bei dieser Operation die Nachahmung der natürlichen Defloration. In tiefer Narkose wird zunächst ein Finger durch den Hymen eingeführt und kräftig nach abwärts gegen den Damm zu gedrückt, worauf ihm ein zweiter folgt, der den Hymen bis an seine Basis einreißend, auch das darunterliegende Gewebe soweit dehnt, daß nunmehr eine solche Weite geschaffen ist, daß leicht der Penis eindringen kann. Indem mit den beiden eingeführten Fingern der Scheideneingang nach allen Richtungen stumpf gedehnt wird, ist die Operation beendet. Man kann auch zu blutigen Operationsmaßnahmen mit Messer und Schere greifen, von denen sich namentlich die Methode von POZZI bewährt. Die Operation ist ihrem Wesen nach eine mediane Episiotomie, die so ausgeführt wird, daß der Hymenalsaum rechts und links von der Mittellinie von zwei Assistenten angespannt und nun in der Medianlinie  $1\frac{1}{2}$  cm nach innen und ebensoweit nach außen durchtrennt wird. BUCURA rät, den Einschnitt weniger lang, als vielmehr tief zu machen, damit die Fasern des *M. constrictor cunni* und auch die des *Transversus perinei superficialis* getroffen werden. Man kann nun an die Durchschneidung noch die stumpfe Dehnung mit den Fingern anschließen und vernäht dann den sagittalen Schnitt durch quere Nähte mittels feinen Katguts. Laterale Episiotomien sind nicht empfehlenswert, weil sie die Form des äußeren Genitales verunstalten und zu Fluß führen können. Sie sind auch kaum notwendig. Andere bevorzugen die Hymenexzision mit und ohne mediane Episiotomie (NOVAK). Eine weitere Behandlung nach völliger Abheilung und Schmerzlosigkeit der Hymeneinrisse durch Einführen von Hegarstiften, die man der Patientin schließlich selbst in die Hand gibt, ist auch insofern praktisch wichtig, als mit der klaglosen Einführbarkeit immer größerer Nummern (bis 33, 34) die Patientin selbst von ihrer Heilung überzeugt wird, bevor sie den Geschlechtsverkehr aufnimmt (v. DITTEL).

Wie erwähnt, ist aber der Vaginismus in der größten Mehrzahl der Fälle nur der Ausdruck einer neuropathischen Konstitution (KRÖNIG, WALTHARD). Darum ist bei diesen Fällen eine örtliche Behandlung allein nicht aussichtsreich. Das Hauptgewicht liegt hier auf der seelischen Beeinflussung der Kranken, nachdem durch eine der angeführten Operationen in der Patientin die Überzeugung gefestigt wurde, daß sie zur Zulassung des Geschlechtsverkehrs befähigt ist. Wenn es gelingt, restlos das Vertrauen der Frau zu gewinnen, wird man durch die Betonung der normalen Beschaffenheit der Geschlechtsteile und den kategorischen Hinweis auf die Grundlosigkeit der Abwehrstellung schon mit der bloßen Überredungskunst, die man nach DUBOIS Persvasion nennt, Erfolge erzielen. Bei der schwankenden Beschaffenheit des Seelenlebens solcher Frauen aber muß man auch auf das Scheitern solcher Bemühungen gefaßt sein. Man glaube auch nicht, daß der Versuch der Psychoanalyse sicher zum Ziele führt. Auch gegen eine von fachmännischer Seite ausgeführte Hypnose wird nichts einzuwenden sein. Aber auch damit sieht man Mißerfolge. Gelegentlich sind die Ursachen des Vaginismus in sexueller Perversion oder vollkommener Frigidität auf dem Boden asthenischer Körperanlage zu finden, manchmal beruhen sie auf tragischen Konflikten der Jahre der Geschlechtsreife. Oft genug aber sind sie auch bei körperlich vollendet entwickelten und im seelischen Verhalten uns ausgeglichen erscheinenden Frauen nicht ohne weiteres zu ergründen und auch durch Psychoanalyse nicht zu beheben.

Die Schwierigkeit der Behandlung kann man nicht anschaulicher, als durch Mitteilung selbst erlebter Fälle schildern. In besonderer Erinnerung ist Verfasser ein solcher Fall, den er u. a. gerichtlich anlässlich eines Ehescheidungsprozesses begutachtet hatte, wo eine Frau 9 Jahre lang mit einem Ingenieur zusammenlebend, auch nicht ein einziges Mal den Congressus, ja auch nur eine Annäherung des Penis zum Genitale zugelassen hatte, weil sie schon beim Anblick des Gliedes nicht nur einen Krampf der Beckenboden-, sondern auch der Adduktorenmuskulatur bekam. An dieser Frau, die keinerlei Abwegigkeiten, weder im Bereiche der Geschlechtsteile, noch im übrigen Körper aufwies, war im Verlaufe der 9 Jahre — ihr Mann hatte eine große Zuneigung zu ihr und wollte nichts unversucht lassen, um ein Zusammenleben zu ermöglichen — wohl alles an therapeutischen Bestrebungen aufgeboren worden, was überhaupt möglich ist. Abgesehen von zahlreichen, aber ganz erfolglosen Dilatationen des Hymens und der Scheide mit Hegarstiften, gläsernen und hölzernen Bolzen, von einer Dehnung und Diszission des Hymens in Narkose, Pinselung des Introitus mit Cocain und ähnlichen Mitteln, war es trotz geduldig geübter Persvasion, 6wöchentlicher Psychoanalyse und 8 hypnotischen Sitzungen durch Neurologen von Fach und Namen nicht gelungen, den Zustand zu beheben oder auch nur um Haaresbreite zu bessern. Schließlich verlangte der Mann die Scheidung, die auch gerichtlich ausgesprochen wurde, wobei es sich zeigte, daß auch jetzt noch die Ehegatten in Freundschaft und Anhänglichkeit einander zugetan waren. Die Frau nahm übrigens die ganze „Schuld“ ohne weiteres auf sich und hat Verfasser bei der Untersuchung auch auf die Wurzeln ihres Vaginismus blicken lassen, die in zwei seelischen Traumen in der Pubertätszeit gelegen waren. Es war einerseits eine unzünftige Berührung, wie sie sich ausdrückte,

durch einen verheirateten Mann, die sie mit heftigem Abscheu erfüllte, anderseits die Gegenwart bei der letzten Entbindung ihrer Mutter, die sie als 14jähriges Kind im Nebenzimmer mit anzuhören gezwungen war, wobei die Geburt nach mehrtägiger Dauer erst mit Zange unter den heftigsten Schmerzäußerungen der nicht betäubten Mutter beendet worden war. Im Gutachten wurde darauf hingewiesen, daß bei dem von Haus aus offenbar besonders empfindlichen Nervensystem der Frau der Eindruck der Geburt ein so mächtiger gewesen ist, daß die Angstvorstellung vor einem solchen Erlebnis diesen unbehebbarsten Zustand heraufbeschworen hat.

Dieser Fall zeigt zugleich die Wege der Behandlung, welche gewöhnlich begangen werden und die, sofern sie örtlich angreifen, beim echten Vaginismus so und so oft fehlschlagen und, sofern sie seelisch einsetzen, auch Mißerfolge keineswegs ausschließen, weil eben bei einem von Haus aus abwegigen Vorstellungsleben solche Angst- und Zwangsvorstellungen unsere therapeutischen Kräfte mächtig überwiegen können. Zusammenfassend kommt Verfasser daher für die Behandlung des Vaginismus zu dem Teil skeptischen Aussichten, sofern er mit der betreffenden Persönlichkeit untrennbar verbundene Grundlagen hat.

### Ursachen, Erkennung und Behandlung des Fluor.

Von den Kardinalsymptomen der Gynäkologie, Blutung, Ausfluß, Schmerz und Verdrängungserscheinungen ist das weitaus am häufigsten geklagte Symptom der Fluor. Er ist auch zunächst nichts als ein Symptom. So merkwürdig es klingt, den Fluor nachzuweisen, ist es manchmal gar nicht so leicht, nämlich deswegen, weil der Begriff des Ausflusses von den verschiedenen Frauen ganz verschieden gefaßt wird. Es gibt solche Frauen, die ohne eigentlichen Fluor zu haben, von einem Fluorgefühl gequält werden und andere, die einen tatsächlich bestehenden beträchtlichen Fluor nicht wahrnehmen.

Darum ist es immer richtig, nach dem Aussehen der Leib- und Bettwäsche zu fragen, welches objektiv einen Anhaltspunkt für eine in der Tat vermehrte Sekretion oder das Fehlen einer solchen gibt. So untersucht man genug Frauen, die bei peinlich genauer Beobachtung des Körpers schon die physiologische stärkere Durchfeuchtung des Genitalapparates bei erotischen Vorstellungen und vor der Menstruation als Fluor deuten und dann wieder Frauen, die nach v. JASCHKE infolge Klaffens der äußeren Scham das Abfließen des physiologischen Sekretes peinlich empfinden. Aber auch das Gegenteil ist wichtig, nämlich daß es Frauen mit geringem Reinlichkeitssinn gibt, die trotz schweren Fluors kein richtiges Fluorgefühl haben.

Mag auch ein vorübergehender, kurzdauernder Fluor bedeutungslos sein, so ist er zweifelsohne bei längerem Bestand auch durch seine Folgen gewichtig. Mit Recht warnt daher NÜRNBERGER, über dem Versuche und Bestreben, die Ursachen des Fluors zu ergründen, mögen sie nun im Genitale oder außerhalb desselben gelegen sein, die Fluorfolgen zu vernachlässigen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß eine ständig unterhaltene Ausscheidung von Körpersäften, wenn sie längere Zeit

dauert, einen Eiweißverlust bedeutet, der für den Organismus letzten Endes nicht gleichgültig sein kann. Aber auch das quälende Gefühl einer ständigen Feuchtigkeit oder Nässe, welches den ehelichen Verkehr zu stören geeignet ist und welches bei Schritt und Tritt, bei Tag und Nacht der Patientin immer wieder auffällt, ganz besonders wenn sie ihren körperlichen Funktionen nachkommt, ist in erster Linie bei seelisch empfindsamen Frauen eine ständige Quelle der Beunruhigung und neurasthenischer Beschwerden.

Die Therapie wird nur dann erfolgreich sein oder wenigstens Aussicht auf Erfolg haben, wenn man nicht bloß die Ursache des Fluors und seinen Entstehungsort kennt, sondern auch über das normale Geschehen in der Scheide unterrichtet ist. Es ist notwendig zu wissen, daß eine Drüsensekretion nur im Scheidenvorhof von den Bartholinischen und von Talg- und Schweißdrüsen stattfindet, und daß die Scheide selbst keinerlei Drüsen aufweist. Es ist also die Herkunft der Scheidenfeuchtigkeit nicht als Produkt der Drüsen, sondern als Transsudat von den Wänden derselben aufzufassen. Dagegen liefert die Cervix in ihren Drüsen den alkalischen Cervixschleim, während die Mucosa uteri nicht mehr Sekret erzeugt, als eben zur Erhaltung einer gewissen Feuchtigkeit der Schleimhaut notwendig ist. Was nun die Scheide anlangt, so ist die Bildung eines Sekretes in normaler Menge und normaler Beschaffenheit Ergebnis einer gesunden Scheidenwand unter Anwesenheit bestimmter Bazillen, der sogenannten DÖDERLEINSchen Milchsäurestäbchen. Sie sind es, welche aus den Scheidenepithelien und zwar aus deren Produkt, dem Glycogen, die Milchsäure bilden, welche in einer bestimmten Konzentration von etwa 0,5% solche biologische Verhältnisse in der Scheide gewährleistet, daß für gewöhnlich wenigstens eingeführte Keime verschiedener Art, besonders Streptokokken in diesem sauren Nährboden nicht aufkommen können. Darauf beruht also im wesentlichen das Selbstreinigungsvermögen, der Selbstschutz der Scheide. Wenn einer der drei, die normale Scheidenbiologie gewährleistenden Faktoren versagt, sei es, daß die Flora verunreinigt wird, sei es, daß der Säuregehalt sich ändert oder daß die Scheidenwand pathologisch wird, entsteht der Fluor. „In der Schwierigkeit, die primäre Schädigung zu erfassen, liegt das Problem“ (v. JASCHKE). Wenn auch der Säuregehalt des Scheideninhaltes von dem Gehalt der Milchsäure herrührt, die wieder von den Vaginalbazillen erzeugt wird, so spielt doch letzten Endes der Gesamtzustand des Körpers in gesunden und kranken Tagen, ebenso wie die Konstitution für die Säuerung des Scheideninhaltes und eine normale Beschaffenheit der Scheidenwand eine wesentliche Rolle, Umstände, die im Hinblick auf die Therapie nicht übersehen werden dürfen. Ein normaler Scheideninhalt ist von krümeliger Beschaffenheit und weißer Farbe, manchmal topfigem Aussehen und wird in 24stündiger Beobachtungsdauer in nicht mehr als etwa rund 1 g Menge geliefert. Dieser normale Scheideninhalt zeigt unter dem Mikroskop die absolute Vorherrschaft der Döderleinschen Milchsäurebazillen, langer, ziemlich großer Stäbchen, die sich lebhaft nach Gram färben, Epithelien der Scheidenschleimhaut und Detritus; er reagiert sauer. Beim II. Reinigungs-

grad ist die Eintönigkeit des Bildes schon durch die Mengeschen Comma-stäbchen und durch Kokken nebst einigen Leukozyten belebt. Beim III. Reinheitsgrad, der bereits schwächeren oder reichlicheren, gelblichen oder gelblich-weißen Fluor erzeugt, ist ein reichlicher Gehalt an Leukozyten und eine starke Mischflora vorhanden; die Döderleinschen Stäbchen sind in den Hintergrund gedrängt und eine bunte Menge von grampositiven und -negativen Kokken, Sarzinen und anderen Bakterien beherrscht das Bild. Bei diesem Reinheitsgrad ist die Reaktion nur mehr schwach sauer und kann sogar bei weiterer Verunreinigung bis zur Alkaleszenz umschlagen.

Diese Tatsachen muß man vorausschicken, weil sich nur so die allbekannten Fluorursachen, nämlich mechanische, chemische, thermische und bakterielle besser verstehen lassen. Von den mechanischen ist es der Fremdkörperreiz, der besonders bei den Maßnahmen der Schwangerschaftsverhütung durch den Reiz der verschiedensten Okklusivpressare, der Sicherheitsschwämmchen, des Condoms usw., bei Vorfällen durch den eines Pessars gegeben ist. Ferner sind es Schädlichkeiten im Gewerbebetrieb, namentlich Staubeinwirkung, besonders bei klaffender Scham, dann Unreinlichkeit beim Geschlechtsverkehr, wobei nicht zu vergessen ist, daß im Sulcus coronarius glandis massenhaft Bakterien, gar bei mangelhafter Körperpflege ständig hausen, ebenso bei Frauen an der äußeren Scham, wenn dieselbe nicht einer regelrechten Reinigung unterzogen wird. Nicht zuletzt sind es die ewigen Spülungen, besonders mit chemisch nicht gleichgültigen Mitteln, die den Chemismus der Scheide ebenso stören, wie sie die Wand schließlich verändern können. Endlich sind es die verschiedenen bakteriellen Noxen und nebst diesen Darmwürmer, wie die Oxyuren, ferner die Trichimonaden und schließlich der Soor, die zum entzündlichen Fluor führen. Diesen Schädlichkeiten gegenüber ist die Scheide einer von Haus aus vollwertigen Frau besser gewappnet, als die der Hypoplastin oder Asthenikerin. Bei diesen genügen schon die geringfügigsten, für uns oft nicht greifbaren Ursachen in der Säftezusammensetzung des Körpers, um einen Fluor auszulösen.

Es ist für die Zwecke erfolgreicher Behandlung notwendig, die Fluorquellen nach den verschiedenen Lokalisationen, in denen sie entstehen, zu trennen. Darum unterscheidet man von innen nach außen fortschreitend den tubaren Fluor, der bekanntlich durch schubweise Flüssigkeitsentleerung gekennzeichnet ist; auf ihn kann dann mit Sicherheit geschlossen werden, wenn man einen dem Sitz der Tube entsprechenden Tumor tastet. Sehr wichtig ist es, daß ein solcher schubweise auftretender, gußartiger Fluor, wenn er eine bernsteingelbe Farbe hat, so gut wie immer auf einem Tubenkarzinom beruht (LATZKO). Farbloser oder grauweißlicher Fluor kann in Hydrosalpinx und Tuboovarialzysten seine Ursache haben. Mit dieser Feststellung ist auch schon der Weg der Behandlung eindeutig bestimmt. Er kann natürlich nur in der Entfernung des kranken Organs, selbstverständlich beim Tubenkarzinom nur in der Entfernung des gesamten inneren Genitales bestehen. (An dieser Stelle sei angeführt, daß freilich auch die Operation des Tuben-

karzinoms recht unbefriedigende Ergebnisse zeitigt.) Jedenfalls muß das Symptom des gußweisen Fluors sehr ernst gewertet werden.

Die Quellen des corporealen Fluors sind spärlich und können in schwerer eitriger Endometritis, die auch von einer Pyometra gefolgt sein kann, gelegen sein; dabei treten aber die Symptome der Endometritis weit mehr als der Fluor in den Vordergrund, der als Nebenerscheinung einherlaufend, mit der Behandlung und Besserung der Endometritis zu versiegen pflegt (siehe S. 162). Große diagnostische Bedeutung hat ein corporealer Fluor als Begleiterscheinung eines Krebses des Gebärmutterkörpers. Er ist meist sehr übelriechend, kann spärlicher oder reichlicher sein und läßt selten Blutbeimengungen neben Eiter vermissen. Auch bei submukösen Myomen kommt Fluor gar nicht so selten vor, ganz besonders dann, wenn die Myome sich anschicken geboren zu werden, und bereits ein offener Weg von der bakterienhaltigen Scheide zur Korpushöhle besteht, auf dem es zur echten Endometritis kommen kann. Auch reichliche Mengen von Fluor werden in solchen Fällen beobachtet. Für den praktischen Arzt ist natürlich mit der richtigen Erkenntnis auch der Rat bezüglich der Therapie, die in der Entfernung des Uterus zu bestehen hat, gegeben.

Gelegentlich wird es notwendig sein, zwecks einwandfreier Feststellung des corporealen Fluors und Unterscheidung eines solchen vom zervikalen Fluor, sich des ursprünglichen oder modifizierten SCHULTZESchen Probetampons zu bedienen. Er wird nach WINTER in der Weise verwendet, daß man eine sterile, möglichst breite und nicht sehr dicke Watte, kreuzweise mit einem Faden zusammengebunden, vor die gereinigte Portio legt und nach 24 Stunden wieder unter Einführung der Spekula mit einer Zange entfernt. Ein aus dem Uterus stammendes Sekret liegt immer in der Mitte des Tampons, nahe dem Kreuzungspunkt des Fadens, während Scheidensekret diese Stelle freiläßt. Damit ist aber immer noch nicht die Entscheidung getroffen, ob das Sekret aus der Cervix oder aus dem Korpus fließt. Im allgemeinen ist es richtig, daß reiner Eiter einer Endometritis corporis, Schleim der Cervix entstammt. Ist Eiter und Schleim vermischt, so kann man auf einen eitrigen Zervikalkatarrh schließen. Für die weitere Differentialdiagnose spielt auch noch das Aussehen der Portio vaginalis eine Rolle, weil Erosionsbildung und Ektropium, Polypen und Ovula Nabothi für den Zervikalkatarrh sprechen, denn der zervikale Fluor ist in der Mehrzahl aller Fälle entzündlichen Ursprungs. Wird er in übermäßiger Menge geliefert, so beeinflußt er zufolge seiner alkalischen Reaktion die gesunde Scheidenflora und ist somit doppelt belangvoll.

Sind die oben erwähnten Quellen des Fluors auszuschließen, dann ist der vermehrte Flüssigkeitsstrom der Hauptsache nach aus der Scheidenwand bedingt, wenngleich wenigstens teilweise auch noch aus der Cervix Sekret hinzukommen kann. Der vaginale Fluor muß als eine vermehrte Transsudation der Scheidenwand aufgefaßt werden. Er ist entschieden der häufigste und beschäftigt täglich den praktischen Arzt und den Gynäkologen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Fluor

in entzündlichen und nicht entzündlichen Formen auftritt. Wer nicht mikroskopisch untersucht und darum den Leukozytengehalt des Sekretes nicht feststellen kann, sieht bei der bloßen Einstellung im Spiegelbild, ja schon an der Vulva, an der Portio und in der Scheide entweder die entzündlichen Veränderungen oder es fällt ihm ihr Fehlen auf. Beide, der entzündliche Fluor wie der auf der krankhaften Transsudation der Scheidenwand beruhende Weißfluß, der Fluor katexochen, sind für die Praxis von größter Wichtigkeit. Darum werden auch die im nachfolgenden gegebenen Behandlungsverfahren sich der Hauptsache nach auf den Scheidenfluß beziehen.

Schließlich darf man nicht vergessen, daß es auch einen psychogenen Fluor gibt, der freilich der Hauptsache nach vestibularen Quellen entspringt. Bei normalen oberen Geschlechtsabschnitten einschließlich einer normalen Scheide ist in solchen Fällen die äußere Scham der Ort der Fluorbildung. Aber auch aus der Cervix kann auf vagotonischer Grundlage ein glasiger, klarer Schleim in größeren Mengen bei Frauen austreten, die auch sonst durch die Neigung zu Spasmen im Magen und Darm und vagotonische Übererregbarkeit ausgezeichnet sind. Sehr wichtig ist, daß solche Fluores psychogenen Ursprungs im Vestibulum sich bei genauerer Beschäftigung mit der Seele der Patientin meistens aus erotischen Wurzeln erklären. Versuch eines gewollten und doch nicht gewollten Coitus, also eine Art Abwehr und Kampf zwischen Libido und Moral, ferner Angst vor den Folgen eines solchen Verkehres, sei es im Sinne der Befürchtung einer Schwangerschaft, sei es im Sinne einer etwa erfolgten Infektion, können diesen psychogenen Fluor auslösen. Wenn man bei jungen Mädchen nur an derartiges denkt und bei einem normalen Befund vorsichtig und zart in der Richtung fragt, kann man diese Vermutung oft bestätigt finden und hat geradezu im Augenblick mit der Feststellung, daß alles in Ordnung ist, auch schon die manchmal recht bedrückte Kranke geheilt. Psychoanalyse im eigentlichen Sinne des Wortes ist für die Behandlung derartiger Fälle wohl immer überflüssig.

#### Fluor vaginalis.

Hat man einen Fall von Fluor als Scheidenfluß erkannt, so läßt, wie eben ausgeführt, die Untersuchung im Spiegelbild auch meist die Feststellung zu, ob dieser Fluor entzündlicher Natur oder der weiße Fluß, eine Erkrankung sui generis ist. Trotzdem kann man, soll man namentlich über den Fortschritt der Behandlung im klaren sein, regelrechter Präparate nach Gram nicht entraten.

An dieser Stelle sei zunächst allein der Fluor als vermehrte Transsudation aus den bei der Betrachtung nicht oder kaum veränderten erscheinenden Scheidenwänden hinsichtlich der Therapie besprochen. Wollte man alle Behandlungsverfahren anführen, welche beim Fluor mit und ohne Erfolg gebraucht wurden und auch im Gebrauche stehen, so würde jede Übersicht und Kritik der Behandlungsverfahren verloren gehen. Es kann daher nur die Aufgabe sein, die Typen der Verfahren, die altbewährt sind, vorzustellen und von den Mitteln nur jene anzuführen, welche

unabhängig von therapeutischen Modeströmungen der Zeit standgehalten haben. Man kann, wie dies auch von gynäkologischer Seite, namentlich von gynäkologisch-neurologischer Seite vorgeschlagen und durchgeführt worden ist, der Meinung sein, daß die lokale Fluorbehandlung überflüssig sei, eine Anschauung, der sich Verfasser nicht anschließen kann, im Gegenteil. Auch in jenen Fällen, in denen ohne Zweifel ein neurotisches Nervensystem an der Vermehrung der Sekretion ursächlich mitbeteiligt ist, kann man auch einer lokalen Behandlung nicht entraten. Die alleinige Allgemeinbehandlung läßt auch dort meistens im Stich, wo offenbar eine Stoffwechselstörung den Fluor bedingt. Diese Anschauung von der Überflüssigkeit, ja vom Schaden der lokalen Behandlung hat aber Wurzeln, denen eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen ist. Sie beruht darauf, daß man über dem Lokalsymptom des Fluors oft die Frau als ganzes unbeachtet läßt und daß man Eigentümlichkeiten der Konstitution und allgemeine Krankheiten und Zustände geflissentlich übersieht oder gering achtet. Darum heißt die Devise der Fluortherapie örtliche und Allgemeinbehandlung, wobei im Einzelfall sogar die Allgemeinbehandlung in den Vordergrund gerückt werden muß.

Was nun die nicht zu umgehende Lokalbehandlung anlangt, so seien die folgenden Typen der Behandlungsart als brauchbar angeführt.

Obenan steht das Lapisbad von ZWEIFEL-MENGE, wohl das beste und verlässlichste Verfahren der Fluorbehandlung. Es ist technisch nicht schwierig. Der mit behandschuhten Händen versehene Arzt läßt die Patientin auf den Untersuchungsstuhl steigen, welcher zwecks Vermeidung der Beschmutzung mit Lapisflecken mit einem bis in den Kübel herabreichenden Gummi- oder Billrothbatisttuch bedeckt ist und führt geschlossen ein langes Trélat'sches Spekulum ein, welches langsam gespreizt wird. Man wählt gerade dieses Spekulum, weil es zufolge seiner schmalen Blätter sehr wenig von den Scheidenwänden bedeckt und daher auf die ganze Scheidenwand das Mittel aufzutragen gestattet. Nachdem durch eine Scheidenspülung die Scheide mechanisch gereinigt worden ist, wird ein großer, in 2%ige Lapislösung getauchter, tropfnasser Wattetupfer in die Scheide gebracht, so daß die Portiooberfläche in einen Teich der Lösung eintaucht. „Durch drängende, nicht reibende Bewegungen des Stieltupfers läßt sich dann die Ätzlösung zunächst mit der ganzen Portiooberfläche, mit der Wand des Scheidengewölbes und mit den freiliegenden breiten Gewölben der Scheide in Kontakt bringen“ (MENGE). Dies läßt sich mit einem röhrenförmigen Spekulum weitaus nicht so gut ausführen, weshalb zum Trélat'schen Spekulum zu raten ist. Dasselbe Manöver wird noch einmal wiederholt. Die Scheide zeigt als Zeichen der Ätzwirkung eine graurote Farbe. Nun wird die Spreizung des Spiegels soweit gemildert, daß er sich leicht zurückziehen läßt. Während dies geschieht, werden auch die bislang vom Spiegel bedeckt gewesenen Partien der Schleimhaut geätzt und schließlich auch das Vestibulum und die Vulva ebenso behandelt, wenn sie Erscheinungen der Reizung erkennen lassen. Wichtig ist, daß das Verfahren nicht früher als nach 8 Tagen wiederholt werden soll, ja sogar erst nach 14 Tagen wiederholt zu werden

braucht, wenn es überhaupt noch notwendig ist. Meist gelingt es in einer Sitzung, manchmal erst nach zwei, selten nach drei Ätzungen den Zustand zu beheben. Zwischen zwei Ätzbädern läßt MENGE zur Befestigung des Ätzeffektes Scheidenspülungen mit folgenden Mitteln machen: Entweder *Kamillentee* (3 Eßlöffel Flores chamomillae auf  $\frac{5}{4}$  Liter Wasser, 5 Minuten kochen lassen, durchsiehen und mit der lauwarmen Lösung spülen oder 1 Tablette *Kamillosan* auf 1 Liter Wasser) oder *Salzwasser* (man nimmt 1 Teelöffel auf 1 Liter Wasser) oder *dünne Chlorzink-* oder *Kupfersulfatlösungen*:

110. Zinci chlorat.

Aqu. fontis..... aa 150,0

D. S. 1 Teelöffel auf 1 Liter Wasser.

111. Cupri sulfur. .... 50,0

D. S. 1 Teelöffel auf 1 Liter Wasser.

Wertvoll ist es nach MENGE, nach Abschluß der Lapisbadbehandlung die Scheidenirrigationen noch einige Wochen fortzusetzen. Gewöhnlich läßt man in der ersten Woche 3mal, in der zweiten Woche nur mehr 2mal mit Kupfer spülen und stellt dann die Irrigationen gänzlich ab. Gleichzeitig wird immer wieder betont, daß, wenn kein Fluor besteht, jedwede Scheidenirrigation eher schädlich ist, weil sie die Biologie der Scheide stört, eine Mitteilung, die von manchen Frauen mit dem größten Erstaunen beantwortet wird, weil sie von Ärzten gehört haben, daß zur täglichen Toilette der Frau die Spülung gehöre, wozu übrigens auch die geschäftige Anpreisung unzähliger Spülmittel das ihrige tut. Sehr wichtig ist es, daß, solange das katarrhalische Stadium nachweisbar ist, der Geschlechtsverkehr unterbleibe, und nicht minder wertvoll ist der Rat MENGES, von beiden Ehepartnern eine peinliche Hygiene desselben zu verlangen, weil bei Unreinlichkeit auch nur eines der Partner Rückfälle des Fluors unvermeidlich sind. Auch für die schwangere Frau mit Fluor vaginalis ist das Lapisbad das beste Verfahren. Neben dem Lapisbad kann man sich auch der officinellen *Jodtinktur* zum Scheidenbad bedienen, indem man etwa 4 ccm Jodtinktur in ein Röhrenspekulum eingießt oder mit einem in Jodtinktur getauchten Wattebauschen das hintere Drittel der Scheide einschließlich der Portio und der Scheidengewölbe bestreicht. Nach dem Jodbad streut man etwas *Milchzucker* in die Scheide ein oder legt zwei *Bacillosantabletten* ins hintere Scheidengewölbe. Wenn man es vermeidet, das vordere Drittel der Scheide und den Introitus mit Jodtinktur zu benetzen, was brennende Schmerzen verursacht, sieht man von dieser Behandlung ebenfalls gute Erfolge. Meist genügt eine Sitzung, gelegentlich ist eine zweite nach etwa 8 Tagen notwendig. Ist der Ausfluß nach der Ätzwirkung noch stark, so kann zwecks Beseitigung desselben mit indifferenten Mitteln oder mit  $\frac{1}{2}\%$ iger *Milchsäure* gespült werden.

Die Spülbehandlung beruht auf der Wirkung schwacher Adstringentien im Gegensatz zum Lapisbad, das auf Ätzung beruht. Darum ist schon theoretisch die Berieselung, die nur vorübergehender Natur ist, wie sie bei der Scheidenspülung geschieht, weniger wirksam, als die längerdauernde Ätzwirkung und hauptsächlich nur dazu geeignet, krank-

hafte Produkte abzuschwemmen, zumal bei den üblichen Spülungen auch eine Entfaltung der Scheidenwände nicht in Frage kommt. Ganz wirkungslos sind Spülungen, die im Sitzen gemacht werden, weil dann die Spülflüssigkeit das hintere Scheidengewölbe allenfalls gar nicht erreicht. Soll wenigstens der Zweck der gründlichen Abschwemmung der Sekrete erfüllt werden, muß die Spülung im Liegen, am besten auf einem Steckbecken gemacht werden, so daß das hintere Scheidengewölbe von Spülflüssigkeit berieselt wird. Es dürfen also für eine erfolgreiche Spülbehandlung, bei der die Bakterien, die Leukozyten und die abgeschilferten Epithelien entfernt werden, hauptsächlich nur Fälle herangezogen werden, bei denen die Wand der Scheide selbst möglichst intakt geblieben oder durch vorangegangene Behandlung bereits wesentlich gebessert ist. Andernfalls soll man sich des erwähnten Dauerspülapparates von JOACHIMOVITS und SCHWARZ bedienen (siehe S. 98). Die Zahl der zur Spülung angegebenen Mittel ist ungemein groß. Einzelne sind für längere Behandlung ausgesprochen schlecht und sollen der Patientin nicht in die Hand gegeben werden. Das ist das Sublimat; auch vom Lysoform und von der Dauerbehandlung mit Lysol kann nur abgeraten werden. Ebenso ist gewohnheitsmäßiger Gebrauch von Formalin nicht empfehlenswert. Je reizloser das Mittel, desto leichter kann man die Patientin vom Irrigator entwöhnen, was immer anzustreben ist. Allen übrigen ist der Kamillente, allenfalls eine Mischung von *Kamillen-* und *Salbeitee* oder der *Käspappeltee* und die *Kochsalzlösung* vorzuziehen. Gut ist die *Salizylsäure* mit und ohne Beigabe von *Resorcin*, besonders bei Bestehen eines reichlichen Fluors aus kleinen Kokken:

112. Acid. salicyl. . . . . 5,0  
 Spiritus vini dilut. ad . . 100,0  
 D. S. 1 Eßlöffel auf 1 Liter Wasser.

113. Acid. salicyl. . . . . 1,0  
 Resorcin . . . . . 3,0  
 Spiritus vini dilut. ad . . 100,0  
 D. S. 1 Eßlöffel auf 1 Liter Wasser  
 (THALER).

Hat der Ausfluß Schleimbeimengungen, so verschreibt man auch *Speisesoda* und läßt 1 Eßlöffel auf 1 Liter Wasser verwenden. Ist der Ausfluß von einem üblen Geruch begleitet, was namentlich nach der Menstruation eine häufige Erscheinung ist, läßt man 1 Teelöffel *Kölnischwasser* auf 1 Liter der Spülflüssigkeit zusetzen. Bequem ist es, *essigsäure Tonerde* in Patronen vorrätig zu haben und eine solche Patrone oder eine Tablette der *ameisensauren Tonerde* (Ormizet) auf 1 Liter Wasser zu lösen und damit zu spülen oder mit *Liquor alum. acetici* (1 Eßlöffel auf einen Irrigator). Ein mildes, dabei wohlriechendes Fluormittel ist *Gynechlorina* (Chloramin), von dem 2 Tabletten auf 1 Liter Wasser genügen. Ferner sind alle wohlriechenden, meist Menthol und Alkohol enthaltenden Mischungen, wie sie für Zahnwässer gebraucht werden, auch für Scheidenspülungen in der Menge von 1 bis 2 Teelöffeln ohne weiteres zu verwenden. Recht gut brauchbar ist auch

114. Acid. boric. crystall. . . . 100,0  
 D. S. 1 Eßlöffel auf 1 Liter Wasser.

Altbewährt ist der Alaun, der entweder als *Alumen crudum* oder als *Alumen pulver.* (1 Teelöffel auf 1 Liter warmen Wassers) aufgeschrieben wird. Viele Frauen rühmen ihm nach, daß er bei schlaffen Scheidenwänden das Gefühl besseren Haltes gebe. Dasselbe gilt vom *Tannin*, welches etwa folgendermaßen verschrieben wird:

115. Acid. tann. . . . . 10,0  
 Spir. vini dilut. ad . . . . 100,0  
 D. S. 1 Kaffeelöffel auf 1 Liter  
 warmen Wassers.

Man könnte die Zahl der Spülmittel noch beliebig vermehren, doch genügt es, einige bewährte angeführt zu haben. Im übrigen wird auf die gerade bei eitrigem Fluor besonders wirksamen Mittel wie das *Chlorzink*, das *Zinksulfat*, das *Kupfersulfat* dortselbst noch hingewiesen werden. Vom käuflichen *Formaldehyd. solut.* gibt man 1 Kaffeelöffel auf 1 Liter Wasser. Hypermangan ist am billigsten in Kristallen vorrätig zu halten, von denen in einem Liter ihrer sovielen zu lösen sind, bis die Lösung eine hellrote Farbe hat.

Was die Milchsäurebehandlung des Fluors anlangt, so beruht sie auf DÖDERLEINS Forschungen von der Anwesenheit der Milchsäurebazillen im normalen und der Abnahme derselben im pathologischen Scheidensekret bis zum gänzlichen Fehlen dieser für die normale Biologie der Scheide notwendigen Bakterien. Darum hat DÖDERLEIN die Milchsäurelösung als bestes Überleitungsmittel einer pathologischen in eine normale Scheidenflora gewählt. Nimmt man eine  $\frac{1}{2}\%$ ige Konzentration, so trifft man die normalen Säureverhältnisse der Scheide. Wir verordnen am einfachsten:

116. Acid. lact. concentrat. . . . 50,0  
 D. S. 1 Teelöffel auf 1 Liter Wasser  
 (entspricht 5 g auf 1000).

Diese Milchsäurespülungen, die sich im Anschluß an das MENGESCHE Lapisbad gut bewähren, werden im übrigen als alleiniges Mittel zur Fluorbehandlung namentlich seit den Untersuchungen von NAUJOKS und BEHRENS in Form des *Normolaktols* gebraucht und sind auch von v. JASCHKE als eine Standardmethode zur Behandlung des vaginalen Fluors ausgearbeitet worden. Es eignet sich besonders für Fälle von vaginalem Fluor schlechtwegs, weniger für solche mit ausgesprochener Kolpitis. Die Anwendung geschieht nach NAUJOKS in der Weise, daß die trocken gewischte und im Trélat'spekulum gut entfaltete Scheidenschleimhaut mit der unverdünnten Normolaktollösung abgerieben wird, welchen Vorgang man einen Tag später wiederholt. Bleibt man bei der Behandlung mit der Lösung, so muß man eine Woche lang das Normolaktolbad fortsetzen, und zwar mit drei Teilen Leitungswasser auf einen Teil der Normolaktollösung, die man im Spekulum mit einem Tupfer oder im Röhrenspekulum gleichmäßig auf die Scheidenschleimhaut verteilt. Vom Arzte unabhängig wird die Patientin, wenn man sie selbst nach der erstmaligen Eingießung der Normolaktollösung bis zum 10. oder

12. Tag täglich abends eine Normolaktoltablette einführen läßt. Überzeugung von der Wirkung ist in der Zwischenzeit anzuempfehlen. Spülungen sollen nicht gemacht werden. Kann die Frau auf sie nicht verzichten, dann soll das Normolaktol (2 Eßlöffel auf 1 Liter Wasser) benützt werden. Die erwähnte JASCHKESche Standardtherapie vereint die Vorzüge des MENGESchen Lapisbades mit der Normalisierung der Scheidenflora durch Wiederherstellung des Säuretiters des Scheideninhaltes. Fälle mit Veränderungen an den Scheidenwänden werden zunächst nach MENGE behandelt, in den folgenden Tagen mit  $\frac{1}{2}\%$ iger Milchsäure gespült. Neben Allgemeitherapie (Kalzium, vaginale Höhensonne, wovon noch die Rede sein wird) wird nun, nachdem die Scheidenschleimhaut makroskopisch normal aussieht, die Normolaktoltherapie betrieben. JASCHKE kann über ausgezeichnete Erfolge beim unspezifischen Fluor vaginalis berichten, wobei er im Anschluß an die Lapisbehandlung MENGES auf die nunmehr gesund gewordene Scheidenwand an zwei aufeinanderfolgenden Tagen das unverdünnte Normolaktol einwirken läßt und von jetzt ab die Patientin für 5, in hartnäckigeren Fällen für 10 Tage anweist, ohne Scheidenspülung jeden zweiten Abend eine Normolaktoltablette einzuführen. Wichtig ist es, daß bei Rezidivieren des Fluors nach der Periode, wenn gerade vor derselben die Behandlung zum Abschluß kam, noch einmal für einige Tage das Normolaktol neuerdings zu verwenden ist. Das *Bacillosan* LOESERS, das aus einer Reinkultur von elektiv gezüchteten Keimen des Milchsäurebazillus und Milchzucker besteht und schönen theoretischen Gedankengängen folgend ausgebaut ist, wird als Pulver und in Tabletten in den Handel gebracht. Man führt 2mal wöchentlich je zwei Tabletten in die Scheide ein oder verstäubt 3 g des Pulvers. Inkonstante Zusammensetzung des Präparates, die vorkommt, kann den erwünschten Erfolg vereiteln.

Einer großen Beliebtheit erfreut sich gerade in der neueren Zeit die Spumantherapie, welche durch das Prinzip der Oberflächenentwicklung der Schaumkörper eine weitgehende Ausnutzung der kolloidal suspendierten Heilstoffe ermöglicht. Beim unkomplizierten Fluor kann die Selbstapplikation, was ein großer Vorteil namentlich für die Landpraxis ist, bei etwa drei Wochen dauernder Behandlung zur Heilung des Fluors führen. Gegen den unspezifischen Fluor ist *Milchsäurespuman* zu empfehlen, und zwar gibt man der Patientin den Auftrag, die vor der Einführung flüchtig in Wasser getauchten Stäbchen einmal morgens, einmal abends, allenfalls auch 2 zu 1 g einzuführen. Adstringierende Wirkung haben die *Spumanstäbchen* mit Zusatz von 3%igem *Acid. tann.* Bei hartnäckigem unspezifischen Fluor hat sich das *Salizylsäurespuman* (12,5%) gut bewährt, welches man von der Patientin jeden zweiten Tag in Stäbchen zu 2 g einführen läßt. Auch die ebenfalls Schaum erzeugenden und dadurch das Cehasol auf die Scheidenschleimhaut breit verteilenden *Canatatabletten* haben sich bewährt (einmal täglich ist die kurz in Wasser getauchte Tablette tief in die Scheide einzuführen). Seit jüngster Zeit steht uns in den *Devegantabletten* ein allem Anschein nach besonders wirksames Mittel für die Therapie des Fluors zur Verfügung., welches

durch Kohlehydratzufuhr am Orte der Behandlung selbst den Ausfluß beseitigt. Fortlaufende Sekretuntersuchungen, wie sie von KLAFTEN u. NAVRATIL u. a. in Fällen hartnäckigen Fluors in einer großen Reihe ausgeführt wurden, haben gezeigt, daß dieses Präparat nicht nur zur Behandlung der *Trichomonas vaginalis*, sondern auch zur Heilung des unspezifischen Fluors befähigt ist. Die Behandlung ist höchst einfach, indem nach Austupfen der Scheide oder Spülung derselben in das vordere und hintere Scheidengewölbe je 1 Devegantablette eingelegt wird. Derselbe Vorgang wird in den nächsten Tagen wiederholt, wobei man der Patientin das Mittel in die Hand geben kann unter der Voraussetzung, daß sie 1 bis 2 Vaginaltabletten 1- bis 2mal täglich möglichst tief in die Scheide einführt.

Über die Tampontherapie des Fluors wird bei der Erosion S. 158 ff. das Nötige ausgeführt.

Die Trockenbehandlung des Fluor vaginalis, welche bald nach ihrer Erfindung durch NASSAUER sehr viel von sich reden gemacht hat, möchte Verfasser erst nach den angeführten Verfahren nennen, weil sie zwar subjektiv der Patientin das Fluorgefühl nimmt, objektiv aber eigentlich nichts als eine Aufnahme des Wassers darstellt, ohne auf die Scheidenwand selbst wesentlich zu wirken. Ein entschiedener Nachteil dieses Verfahrens ist es, daß die Scheide durch die Bolusmassen verklumpt wird, die wieder entfernt werden müssen. Zur Behandlung mit dem Bolus, dem man auch verschiedene Zusätze geben kann, muß man sich eines eigenen Gebläses, des NASSAUERSCHEN Sikkators bedienen. Der *Lenizetbolus*, *Bolus* mit *Perubalsam* oder *Jod* und *Vasenolpuder* sind dem einfachen weißen Bolus vorzuziehen, weil dieser bei längerem Liegen in der Scheide zu üblem Geruch Veranlassung gibt. Die Applikation des Bolus geschieht mit dem NASSAUERSCHEN Instrument in folgender Weise: Nachdem in die Pulverkammer 1 bis 2 Messerspitzen des Mittels gebracht sind, wird der durchbohrte Pfropf mit dem Gummigebläse aufgesetzt. Während die Glasbirne in die Scheide eingeführt und fest gegen den Scheideneingang gedrückt gehalten wird, drückt man mit der anderen Hand einige Male kräftig auf das Gebläse. Wichtig ist es, daß auch die Schamlippen und die Vulva mit dem Pulver bestäubt werden, weil dadurch auch die Vulvitis günstig beeinflusst wird. Die Einblasung ist bei stärkeren Ausflüssen zweimal, allenfalls dreimal vorzunehmen und muß in liegender Stellung gemacht werden, soll der Bolus sich gleichmäßig verteilen. Auf die Notwendigkeit der Scheidenspülungen alle 2, 3 Tage ist hingewiesen worden.

Wenn es auch richtig ist, daß man mit jedem der angeführten Verfahren Erfolge in der Fluorbehandlung zu erzielen vermag, so bleiben dieselben gar nicht so selten aus, wenn man nicht auch eine Reihe von Allgemeinmaßnahmen anordnet. Sie sind in Fällen extragenital bedingten Fluors sogar oft für den Erfolg oder Mißerfolg der Behandlung entscheidend.

Hierher gehören zunächst einmal allgemeine Maßnahmen. Sie betreffen die Lebensweise, die Art der Ernährung, das richtige Maß körperlicher und geistiger Arbeit und sind der Konstitution anzupassen.

Bei asthenischen Individuen wird alles, was zur Besserung dieser Körperbeschaffenheit beitragen kann, versucht werden müssen, worüber an verschiedenen Stellen dieses Buches ausführlich gesprochen worden ist (S. 210 ff.). Besonders wird eine Liegekur mit Mast, verbunden mit milden hydriatischen Maßnahmen von gutem Erfolge sein. Bei Stoffwechselstörungen auf dem Boden unrichtigen Zusammenspiels der endokrinen Drüsen, namentlich bei endogener Fettsucht, die nicht selten mit Fluor vergesellschaftet ist, wird man von der Schilddrüsenmedikation und von physikalischer Therapie ebenso wie von entsprechenden diätetischen Maßnahmen auch eine Besserung und Ausheilung des Fluors bei entsprechender Geduld und gutem Willen der Patientin erwarten dürfen, ebenso bei Diabetes und Fluor. Bei Individuen mit tuberkulösem Habitus oder gar bei bestehender Tuberkulose, tun Licht-, Liege- und Diätkuren das ihre, und es ist oft gar nicht notwendig, eine besonders eingreifende Lokalbehandlung des Fluors in die Wege zu leiten. Wo die nervöse Veranlagung zu einem Cervixfluor, aber auch zu einem Scheiden- oder Vestibularfluor auf dem Boden der Vagotonie führt, kann man durch vorsichtige Atropinmedikation, beispielsweise durch Atropapaverin in den angegebenen Dosen (Rp. 47—49 S. 40) die Übersekretion beeinflussen, die namentlich vor der Periode in diesen Fällen recht störend empfunden wird und sich im Bereiche des Magendarmtraktes auch zu Erbrechen steigern kann. Hier wird man aber gleichzeitig der Lokalbehandlung viel weniger entraten können, als in Fällen von Tuberkulose, in denen sie besser unterbleibt. Das ist bei Virgines selbstverständlich. Wenn es trotzdem betont wird, so geschieht es deswegen, weil gelegentlich auch heute noch Fluorträgerinnen sich vorstellen, die glaubhafterweise, allenfalls sogar schriftlich bescheinigt vorweisen, daß sie zwecks Behandlung des Fluors defloriert wurden! Von größter Wichtigkeit erscheint eine gesunde Lebensführung mit der richtigen Verteilung von Schlaf und Wachen und einer entsprechenden körperlichen Betätigung. Asthenische und nervöse Individuen können bei gut geleiteter schwedischer Gymnastik, verbunden mit Schwimm- und Wandersport zu gesunden Menschen herangezogen werden, die mit der Kräftigung des Körpers immer mehr ihre Fluorbeschwerden verlieren.

Das gilt in noch höherem Maße von der Ausgezeichnetes leistenden Bäderbehandlung in Badeorten. Wer es sich leisten kann, möge von Sol- und Moorbädern bei Fluor ausgiebig Gebrauch machen. Die Solbäder, auf die bereits bei der Amenorrhoe und den entzündlichen Erkrankungen (S. 117 ff.) ausführlich hingewiesen worden ist, sind nicht nur bei verstärkter Regelblutung, bei Hypoplasie, aber auch beim Myom, sondern ganz besonders bei Fluorkranken ein ausgezeichnetes, die Lokalbehandlung in wertvoller Weise ergänzendes Verfahren. Neben den Solbädern aber sind es die Moorbäder (S. 120 ff.), in welchen so manche Fluorkranke, besonders solche, bei denen gleichzeitig eine gewisse Hypoplasie des Genitales mit und ohne Hypomenorrhoe besteht, Heilung finden. Wie erwähnt, können die Moorbäder, namentlich bei fettleibigen Individuen, noch mit Trinkkuren, allenfalls mit kohlensauren Stahlbädern

zwecks Regelung der Stuhl­­tätigkeit, Entfettung des Organismus und Besserung der Ovarialinsuffizienz zweckmäßig verbunden werden. So richtig es ist, daß das Ergebnis der Badekur in Badeorten ein besseres und nachhaltigeres zu sein pflegt, als das häuslicher Badekuren, die Verhältnisse zwingen uns jedenfalls vielfach zu Hause Badekuren anzuempfehlen. Man tut es entweder in Form der schon bei den entzündlichen Krankheiten beschriebenen Solsitzbäder oder besser der Solvollbäder, sei es, daß man sie mit Mutterlauge macht, sei es, daß man das rohe Steinsalz oder die fertigen Solbadewürfel dazu verwendet. Die Moorbäder, die entweder als Sitzbäder oder als Vollbäder gebraucht werden können und die man 3mal wöchentlich, etwa 20 bis 21 Bäder im ganzen, gibt, werden entweder mit der Franzensbader Moorlauge (1 bis 2 Liter) oder mit dem Moorsalz ( $\frac{1}{2}$  bis 1 kg) in 15 Minuten Dauer, am besten vor dem Schlafengehen, 34 bis 36° C temperiert, gegeben und entsprechende kleinere Mengen des Badesalzes kommen für die Sitzbäder in Frage. Für sie und für die Vollbäder bewährt sich übrigens auch die Verwendung der Salhumin-Moorextrakte, auf die ebenfalls schon hingewiesen ist (vgl. S. 121).

Bei jeder Fluortherapie lokaler Art soll man auch zur Abdichtung der Gefäßwände, die die Transsudation aus der Scheidenwand herabsetzt, sich durch längere Zeit des *Kalks* bedienen. Vierwöchige Verabreichung von Kalk und nach einer Pause von einigen Wochen Wiederholung einer solchen Kur soll nur dann unterbleiben, wenn bei hartleibigen Frauen die Verstopfung durch den Kalk sehr lästig wird oder wenn, was auch vorkommt, über Magenbeschwerden Klagen laut werden. Besonders bei unterernährten und asthenischen Fluorkranken kommt man man ohne die Kalktherapie nicht aus, die übrigens den Vorteil hat, daß sie auch bei zu starker Periode hemmend wirkt. Besonders beim Fluor virgineller Personen sind die Allgemeinmaßnahmen, wie sie erwähnt wurden, insbesondere die Solbäder, und zwar besser Voll- als Sitzbäder, ferner die Regelung der Diät und die richtige Verteilung von Arbeit und Erholung sowie die sportliche Betätigung durch schwedische Gymnastik, Berg-, Wander- und Wintersport neben der Kalkbehandlung die einzigen Mittel der Therapie, während eine Lokalbehandlung zu unterbleiben hat. Die Verordnung des Kalks kann in der S. 54 angegebenen Weise geschehen. Bei Fluor unterernährter Mädchen, bei Tuberkulose und Fluor, nach Schwächezuständen und Infektionskrankheiten ist *Proossa*, ein Kalk-Phosphor-Vitaminpräparat (3mal täglich 1 bis 2 Teelöffel in Getränken verrührt) anzuempfehlen. Auch *Lebertran* oder *Vigantol* kann mit Erfolg in ausgesuchten Fällen verwendet werden. Eisen- und Arsenpräparate, Eisen- und Arsenwässer, wie sie bei der Amenorrhoe (S. 12 ff.) angeführt sind, sind gelegentlich nicht zu entbehren, künstliche Höhensonne ist immer empfehlenswert.

Es ist naheliegend, den Fluor ohne entzündlichen Befund, welcher bei Frauen mit hypoplastischem Genitale dann gerne auftritt, wenn gleichzeitig Abwegigkeiten der Regelblutung wie Amenorrhoe und Hypomenorrhoe bestehen, auf dem Wege der Hormontherapie beeinflussen zu wollen. Erfolge mit dieser Behandlung, die in der Verabreichung der

im Abschnitte der Amenorrhoe genannten Hormonpräparate besteht, sollen nicht gelegnet werden, doch sind sie weder überwältigend, noch auch immer von Dauer. Dazu kommt, daß sie uns der lokalen Behandlung nicht entheben, es sei denn, daß es sich um Virgines handelt, bei denen bei Fluor auf konstitutioneller Grundlage, überdies verbunden mit Regelstörungen, ein durch einige Zeit fortgesetzter Versuch der Hormontherapie sehr wohl angezeigt ist.

Schließlich hat noch eine Form der Allgemeinbehandlung des Fluors besonders in der letzten Zeit von sich reden gemacht. Es ist das die Behandlung desselben durch Umstimmung des Stoffwechsels. Nachdem schon A. W. BAUER u. a. darauf hingewiesen haben, daß durch eine vollständige Umstellung der Ernährung unter Bevorzugung der Vegetabilien und Vermeidung salzreicher Kost hartnäckige Fluores eine auffallende Besserung zeigen, hat neuerdings v. NOORDEN über ausgezeichnete Erfolge dieser Behandlung bei diesen Kranken berichtet. Allerdings fordert er, daß mindestens eine Woche vollständig salzfrei unter Einschaltung von Obsttagen gegessen werde und daß auch in der nächsten Zeit 1 bis 2 Hungertage eingeschaltet werden, allerdings nicht mehr bei salzfreier, sondern salzarmer Kost. Mit Rücksicht darauf, daß heutzutage die Diätküche auch bei salzfreier Kost, besonders unter Verwendung von *Citrofin* und *Hosal* einen nicht nur abwechslungsreichen, sondern auch recht schmackhaften Speisezettel zusammenzustellen versteht, kann man dieses Verfahren in der Form von NOORDENS sogenannter „Zickzackkost“ nur empfehlen. Damit wäre uns ein weiterer und, wie es scheint, recht wichtiger, die Lokalbehandlung abkürzender Helfer in der Behandlung des Fluors erwachsen, der besonders bei nervösen Frauen, welchen erfahrungsgemäß die Lokalbehandlung viel Beschwerden bereitet, Nachahmung verdient.

Endlich muß noch einer weiteren Form der Therapie beim Fluor gedacht werden und das ist die vaginale Lichtbehandlung. Die Erfolge der verschiedenen Methoden der vaginalen Bestrahlung sind zweifelsohne nicht zu leugnen. Sie kommen aber bei der immerhin kostspieligen Anschaffung der Apparate kaum für den praktischen Arzt, als vielmehr für Anstalten in Frage. Sie können gegebenenfalls zur Unterstützung oder nach Abschluß örtlicher Behandlungsmethoden verwendet werden. Ein Typus dieser Behandlungsmethoden ist die reine Ultraviolettbestrahlung durch die Quarzlampe, die nur eine kurze Bestrahlungszeit von 1 bis höchstens 8 Minuten wegen der Lichtempfindlichkeit der Schleimhaut erlaubt; sie erfordert die von WINTZ angegebenen Vaginalspekula. Neben Scheidenkatarrhen sind hartnäckiger Fluor und Erosionen der Portio ein Feld für diese Behandlung. Eingebürgert hat sich ferner die Ultrasonne nach LANDEKER, die verhältnismäßig wenig Licht-Wärmestrahlen enthält und außerdem hinsichtlich der Erythembildung ungefährlich ist, da sie nur wenige kurzwellige Ultraviolettstrahlen führt. Sie kann deswegen 15 bis 30 Minuten lang, am besten jeden zweiten Tag, gegeben werden und hat sich neben dem Hauptanwendungsgebiet, der entzündlichen Affektionen des Uterus, der Adnexe, des Beckenbinde-

gewebes und Beckenperitoneums auch bei Scheidenkatarrhen und lästigem Fluor bewährt. Die von ENGELMANN angegebene Methode mit der Jupiterlampe beruht auf der Wirkung der Licht-Wärmestrahlen.

### Kolpitis simplex.

Bezüglich der Therapie der Scheidenwandentzündungen, also der echten Kolpitis (Vaginitis), kann man sich nach den vorangegangenen Darlegungen kürzer fassen. Hat man eine gerötete und wie gekörnt aussehende, mit blutigen Stippchen versehene Schleimhaut vor sich, die reichlich übelriechendes, gelb-grünliches Sekret entleert, das sich bei höheren Graden noch über die Vulva, dieselbe entzündend, ergießt, so ist man im klaren, daß eine solche Vaginitis vorliegt und hat zu trachten festzustellen, ob nicht eine besondere Form derselben vorliege oder ob es sich um eine einfache, durch mechanische oder chemische Schäden erzeugte Vaginitis handelt. Wo wie erwähnt Pessare, Kontrazeptionsmaßnahmen und mangelhafte Reinlichkeit im Spiele sind, wo Stoffwechselstörungen, ein Diabetes, eine Furunkulose, höhere Grade von Anämie und Tuberkulose aufzufinden sind, wird man diesen Grundursachen nachgehen und auf sie neben der lokalen Behandlung Gewicht legen müssen. Handelt es sich um eine klaffende Scham infolge schlecht geheilter Dammverletzungen, durch die die Bakterien der Außenwelt ständig aufwandern können, so bleibt nur eine plastische Operation zur Wiederherstellung eines schlußfähigen Scheidenrohres übrig. Bei der Behandlung ist unbedingt auf das Kohabitationsverbot ernstlich hinzuweisen; etwa benützte Antikonzeptionsmittel, welcher Art immer, sind zu verbieten. Ohne Lokalbehandlung, welche im wesentlichen auf das bei der Fluorbehandlung Gesagte hinausläuft, kommt man nicht hinweg. Auch bei diesen ausgesprochenen entzündlichen Fluores ist das Lapisbad das leistungsfähigste Behandlungsmittel. Erst nach seiner Anwendung tritt die Spülbehandlung in ihre Rechte. Wichtig ist, daß nur reine, stets ausgekochte Mutterrohre, niemals Ballonspritzen, verwendet werden. Für die Spülungen kommen die schärfer wirkenden Adstringentien, wie der erwähnte Alaun, allenfalls in Verbindung mit *Chlorzink* und *Zinksulfat*, ganz besonders aber das *schwefelsaure Kupfer* und das *Formalin* in Betracht. Sie sollen die Schleimhaut etwas gerben, die Bakterien zumindest vermindern und den Eiter samt dem Detritus mechanisch entfernen. Manchmal muß man, wenigstens in den ersten Tagen früh und abends spülen lassen, am besten mit 1 Kaffeelöffel pulverisierten Alauns oder fein pulverisierten Kupfersulfats auf 1 Liter Wasser von 33 bis 36° C, hernach die äußere Scham vorsichtig abtrocknen und mit Vasenol-, Lenicet- oder Talkumpuder bestäuben. Meist genügt nach 3 bis 4 Tagen bereits eine Spülung am Morgen, die man dann auf 3 Spülungen wöchentlich und 2 abbaut. Jetzt ist es besser, beim abklingenden Katarrh nicht mehr chemisch differente, sondern indifferente Mittel zu nehmen, also Salzwasser (1 Kaffeelöffel auf 1 Liter), Kamillenabkochungen, Käsepappelabkochungen (3 Eßlöffel auf 1 Liter). Auf diese Art wird die Schleimhaut, die wieder ihre normale Biologie erreichen soll, am wenigsten gereizt. Ist

der Zustand deutlich besser, wird sich zur Wiederherstellung der normalen Scheidenflora, die im Mikroskop von Zeit zu Zeit überprüft werden muß, eine Milchsäuretherapie, sei es in der von NAUJOKS und BEHRENS angegebenen Normolaktoltherapie, sei es in Form der  $\frac{1}{2}\%$ igen Milchsäurespülungen, als vorteilhaft erweisen (S. 146). Hat man frische Bacillosan-tabletten vor sich, die nicht älter als drei Monate sein dürfen, so wird man sich auch dieser LOESERSchen Tabletten mit Erfolg bedienen können. Auch der bereits (S. 144) erwähnten einfachen Therapie mit Jodtinktur wird Gutes von R. SCHÖDER nachgerühmt.

Auch das LAHMSche Verfahren zur Behandlung des vaginalen Fluors in Form von Scheidenkugeln folgender Zusammensetzung:

117. Resorcini.....	0,3
Zinc. oxyd. ....	1,0
Glycerini gtts. ....	IV
But. cac. ad .....	2,5
M. f. glob. vag.	
D. tal. dos. Nr. X	

hat sich Verfasser beim essentiellen wie entzündlichen Fluor entschieden bewährt. Vorteilhaft ist es, wenn der Arzt vor einer solchen Behandlung mit Kugeln eigenhändig die Scheide zunächst für das Medikament empfänglicher macht, und zwar durch ein schleimlösendes und adstringierendes Mittel, welches WILLE in folgender Zusammensetzung angegeben hat:

118. Boracis .....	20,0
Acid. carbol. liquefact. . .	15,0
Formalin .....	10,0
Aqu. fontis ad .....	1000,0

Mit der Nennung der LAHMSchen Scheidenkugeln ist gleichzeitig eines anderen Grundsatzes der Fluortherapie, nämlich der Behandlung des Fluors durch Globuli vaginales Erwähnung getan, welche sowohl vom Arzte eingeführt, als auch von der Patientin selbst in die Scheide gebracht werden können. Die Zahl der fabriksmäßig hergestellten Kugeln ist gegenüber denen, welche magistraliter verordnet werden, unverhältnismäßig groß. Es seien nur einige Typen aus der reichlich zur Verfügung stehenden Zahl dieser Präparate in Auswahl genannt: Zunächst die wirksam gefundenen, Schwefel enthaltenden Kugeln wie die Globuli vaginales *Eutirsol* (5- und 10%ig à 3 g), die *Thiosept*-Globuli vaginales (Thioseptöl 10, Glycerin-Gelatine 90), die *Thiopinol*-Globuli (4- und 8%ig), *Jodexpessarten*, *Lactolkugeln* und *Granugenol*-Vaginalkapseln. Die pharmazeutische Industrie stellt übrigens heute Scheidenkugeln aus einer Glycerin-Gelatine-Grundmasse zur Verfügung, der die verschiedensten Medikamente beigegeben sind. So kommen von den *Tampovaganpräparaten* Vaginalkugeln mit 5%igem *Acidum lacticum*, mit *Acidum salicylicum*, mit 3- und 10%igem *Ichthyol* usw. in den Handel. Von den magistraliter zu verordnenden Kugeln seien die Ichthyol-Globuli nach folgender Vorschrift angeführt:

119. Ammonii sulfoichthyolici... 0,2  
 But. cac. ad ..... 2,0  
 M. f. Globuli vaginales  
 D. tal. dos. Nr. X  
 S. Am Abend 1 Kugel tief in die  
 Scheide einführen.

Bestehen gleichzeitig Schmerzen im Unterleib von einer begleitenden Entzündung, fügt man nach altem Brauch jeder Kugel 0,3 g *Pyramidon* oder 0,5 g *Antipyrin* bei. Alle Scheidenkugeln eignen sich weniger zur alleinigen Behandlung, als vielmehr zur Nachbehandlung im Anschluß an die ärztliche Ätztherapie des Fluors.

### Kolpitis vetularum.

Besondere Erwähnung verdient die Kolpitis vetularum, eine recht häufige, nur nach Brachliegen oder Fehlen der Eierstöcke, also entweder nach der Menopause oder nach Kastration beobachtete Krankheit. Offenbar beruht sie auf Ernährungsstörungen infolge Wegfalls der Inkrete des Eierstocks und äußert sich zunächst im Auftreten größerer und kleinerer Epitheldefekte im hinteren Drittel der atrophischen Scheidenwand, welche eine ausgesprochene Neigung zur Verwachsung zeigen. Sie kann soweit führen, daß das hintere Drittel der Scheide ganz atretisch wird. Hydro- und Pyometra können die Folge sein. Der oft recht starke, von einem heftigen Juckreiz begleitete Ausfluß ist meist der Anlaß, ärztlichen Rat einzuholen. Ebensooft aber ist es das so bedenkliche Symptom der Blutung, welches die Frau zum Arzte führt. Es ist manchmal nicht leicht zu entscheiden, ob tatsächlich nur die Kolpitis senilis die Quelle der Blutung ist oder ob in dem verengten Scheidentrichter ein Karzinom sich entwickelt. Manchmal ist die Narkoseuntersuchung, der allenfalls eine Probeexzision anzuschließen ist, nicht zu umgehen. Überhaupt spielen, worauf NÜRNBERGER ausdrücklich hinweist, bei alten Frauen Stenosen des hinteren Scheidentrittels, mögen sie nun trichterförmig, zylindrisch oder ringförmig sein, als Quelle von Fluor und Blutung eine nicht zu unterschätzende Rolle in der praktischen Gynäkologie. In solchen Fällen ist zur Klärung der Blutungsursache eine Lösung dieser Stenosen und Verklebungen meist in Narkose geboten, wobei man sieht, daß die scheinbar feste Stenose bei zartem Fingerdruck ebenso wie beim Herabziehen des Uterus mit der Kugelzange nachgibt. Findet man dahinter nichts Verdächtiges, kann man es dabei bewenden lassen. Ist der Befund auf Karzinom hoch verdächtig, so kann man mit Vorteil die vaginale Uterusexstirpation einschließlich des stenierten Scheidentheiles vornehmen und damit bestehende Fluor- und Blutungssymptome ebenso wie später drohende Gefahren für immer beseitigen. Um aber auf die Kolpitis senilis und ihre Therapie zurückzukommen, sei die bewährte FLATAUSCHE Methode der Pastenbehandlung mit *Zinkpaste* oder *Lassarscher Paste* in den Vordergrund gestellt. Nach Trockenwischen der Scheide mit einem Stieltupfer wird ein etwa halbwalnußgroßes Stück Paste mit dem Finger gleichmäßig in die Scheiden-

wände verrieben und diese Behandlung zweimal wöchentlich durch 3 bis 4 Wochen fortgesetzt. Offenbar wird, worauf FLATAU aufmerksam macht, durch diese Behandlung das Epithel der Scheide widerstandsfähiger. Auch Pinselungen mit *Granugenol* oder Einführen von Granugenolkapseln zur Selbstbehandlung sind empfehlenswert (H. RUNGE). Merkwürdig ist es, daß die naheliegende Ovarial-Hormontherapie keine, nicht einmal unterstützende Erfolge, geschweige denn alleinige zeitigt. Vielleicht, daß nach den jetzt geltenden, offenbar immer mehr an Boden gewinnenden Anschauungen, besonders große Dosen notwendig wären. Spülbehandlungen sind bei Kolpitis senilis wenig erfolgreich. Am ehesten sind noch ganz milde Mittel, wie Kamillen, Malven anzuempfehlen.

### Soor und Trichomonadenkolpitis.

Was schließlich die Fälle von spezifischer Vaginitis anlangt, so ist zunächst der Soor der Vagina und sodann die Trichomonadenvaginitis zu erwähnen, Krankheiten, welche meist auch die Vulva in Mitleidenschaft ziehen, wie bei der Vulvitis erörtert worden ist. Der mit Brennen, Jucken und Fluß einhergehende Soor der Scheide befällt meist Schwangere. Er heilt unter einer der nachfolgenden Behandlungsmethoden bald aus. Man reibt entweder die Scheide mit einem in 0,5%iger *Sublimatlösung* getauchten Tupfer ab, spült sie allenfalls mit 1‰iger *Sublimatlösung* aus und gibt der Frau eine Verschreibung auf Scheidenspülungen mit 3%iger *Borsäurelösung* mit. Handelt es sich um Hochschwangere, ist es vorteilhafter, von der Sublimatlösung abzusehen. Man kommt auch mit *Kupferspülungen* (2 Kaffeelöffel Cuprum sulfur. auf 1 Liter Wasser) oder 2%iger *Salizylsäurelösung* zum Ziele. Auch Pinselungen mit 10%igem *Pyoktanin* helfen den Soor beseitigen, wenn die Schleimhaut jeden zweiten Tag mit der Lösung bepinselt wird. Die arge Beschmutzung der Wäsche ist ein Nachteil dieses von LITTAUER sehr gelobten Verfahrens.

Ob das Protozoon *Trichomonas vaginalis* ein harmloser Mitbewohner einer verunreinigten Scheide ist oder ob, wie andere anscheinend mit Recht glauben, dieser Erreger für Entzündungserscheinungen der Scheide ätiologisch angeschuldigt werden kann, ist hier nicht der Ort zu entscheiden. Tatsache ist, daß diese Fälle von Fluor, die durch einen schaumigen, blasigen Sekretbefund ausgezeichnet sind — hervorgerufen durch den die *Trichomonas* begleitenden Mikrokokkus *gazogenes alcalescens* —, bei einer auf die Entfernung der Trichomonaden gerichteten Therapie alsbald besser werden und zu verschwinden pflegen. Mit dem Verschwinden der Trichomonaden aus dem Sekrete gibt sich auch der heftige beißende Juckreiz, der zur Rötung der äußeren Scham, zur Schwellung und Intertrigo führen kann. Mit Rücksicht darauf, daß bei Schwangeren, die Trichomonadenträgerinnen sind, auch andere, allenfalls pathogene Keime als Mitschmarotzer der Scheide aufgefunden werden, muß man ihnen um so mehr eine relative Pathogenität zusprechen, als bei Befund von Trichomonaden und Schwangerschaft eine erhöhte Wochenbettsmorbidity festgestellt worden ist. Die Therapie richtet sich am besten nach den Angaben des um die Klärung dieses Krankheitsbildes am

meisten verdienten Forschers HOEHNE, der nach gründlicher Reinigung der Scheide im Rinnenspekulum mit 1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>iger Sublimatlösung die ganze Scheidenwand einschließlich des Vestibulum vaginae mit

120. Boracis .....	10,0
Glycerini ad.....	100,0

bestreicht. Dieselbe Behandlung wird in 4 auf eine Woche verteilten Sitzungen jeden zweiten Tag wiederholt und muß gelegentlich, wenn auch unter Weglassung der Sublimatbehandlung, noch längere Zeit durchgeführt werden. SCHMID und KAMNIKER, denen wir wertvolle Feststellungen über die Trichomonadenkolpitis verdanken, sprechen sich ebenfalls für die Boraxglyzerinbehandlung aus, lassen aber in den Tagen, an denen die Patientin nicht vom Arzte behandelt wird, Scheidenkugeln bestehend aus 2 g 10%igem Boraxglyzerin in Kakaobutter die Patientin abends tief in die Scheide einführen und am Morgen ein Sitzbad nehmen, um den durch die Kugeln entstehenden reichlichen Ausfluß zu beseitigen. Auch die von WILLE zur Reinigung der Scheide angegebene Lösung, die bei der Kolpitis simplex (S. 153) erwähnt ist, dient gut den Zwecken der Trichomonadentherapie, wie sich Verfasser überzeugen konnte. Ferner sei noch darauf hingewiesen, daß die *Yatren-105-Pillen*, die hauptsächlich für die orale Behandlung der Amöbendysenterie hergestellt sind, nach dem Vorschlage von RODECURT auch für die örtliche Behandlung der Trichomonadenkolpitis brauchbar sind. Dabei ist es vorteilhaft, auch während der Periode die Pillen einlegen zu lassen, weil dadurch am ehesten dem Wiederauftreten der Trichomonaden nach Aufhören der Regel begegnet wird. Wie erwähnt, scheint nach den jüngsten Feststellungen aber die erfolgreichste Behandlung auch der Trichomonadenkolpitis die mit den *Devegantabletten* zu sein, deren einfache Handhabung überdies einen großen Vorteil bedeutet (S. 147).

Bei der Seltenheit der Scheidendiphtherie und der durch sie hervorgerufenen Kolpitis braucht sie nur gestreift zu werden, zumal sie kaum Gegenstand der Erkenntnis wird, wenn sie nicht ausgesprochene Symptome macht. Die Lokalbehandlung muß gegenüber der *Serumtherapie* ganz in den Hintergrund treten (4000 bis 6000 A. E. in ernsteren Fällen, allenfalls Wiederholung dieser Dosis nach 12 bis 24 Stunden). Bei Fortschreiten kann eine neuerliche Einspritzung am 3. bis 8. Tage notwendig werden. Die Lokalbehandlung wird nach BIBERSTEIN durch Einlegen von Mulldrains gemacht, die mit 1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>iger *Vucinvaseline* bestrichen sind; allenfalls können Streifen, die mit *Diphtherieheilserum* getränkt sind, in die Scheide eingelegt werden (NÜRNBERGER).

#### Anhang. Scheidenstenosen und Atresien nach Kolpitis.

Bei Kindern gibt es neben Diphtherie auch zweifelsohne Fälle von Scharlach, die zu pseudomembranösen Entzündungen der Scheide führen, ebenso auch bei Erwachsenen Fälle von Typhus, Blattern und anderen schweren Infektionen. Sie sind, wenn sie auch selten vorkommen, deswegen so bedeutungsvoll, weil sie in späterer Zeit, lang nach der Aus-

heilung zu Stenosen und Atresien der Scheide Veranlassung geben können. Ausnahmsweise kann es geschehen, daß auf dem Boden solcher pseudo-membranöser Entzündungen die ganze Vagina einer dissezierenden Entzündung anheimfällt, so daß nur ein schmaler Kanal übrigbleibt. Stenosen nach solchen Prozessen, aber auch nach Ätzwirkungen, wie sie in selbstmörderischer Absicht mit Sublimat, Chlorzink, Chromsäure beschrieben sind, können den Geschlechtsverkehr weitgehend stören, ja ganz vereiteln, wenn sie auch die Befruchtung keineswegs unmöglich machen und bei der Geburt unüberwindliche Hindernisse für den vorliegenden Teil bedeuten. Die Behandlung ist schwierig. Während man in frischen Fällen die Epithelisierung durch 2%ige *Argentumsalbe*, *Scharlachrotsalbe*, *Pellidolsalbe* (2%), die man mit Gazestreifen einführt, zu befördern und die Verklebung zu verhindern hat, kann man in Fällen bestehender Stenosen mit der stumpfen Dehnung besonders in Narkose manches erreichen, wenn sie nicht zu tief greifen und die Nachbarorgane frei lassen. Eine langdauernde und geduldige Salbenbehandlung zwecks Erhaltung des erzielten Erfolges ist notwendig. Die Neigung zu neuerlicher Schrumpfung ist allerdings immer gegeben. Wo aber feste, mit der Umgebung verwachsene Stenosen vorliegen, wo Blase und Mastdarm herangezogen sind, müssen atypische operative Eingriffe gemacht werden. Sie sind schon oft deswegen notwendig, weil es bei höhergradigen Stenosen oder Verschlüssen der Scheide zur Sekret- und Blutstauung kommen kann (Pseudoamenorrhoe). Während die *Atresia hymenalis* als angeborener Zustand eine der einfachsten Operationen ist, sind solche Fälle von Atresie der Scheide auf dem Boden ausgedehnter *Ulcera* technisch sehr schwierig und nur dem Einzelfalle anzupassen. Bei der ausgezeichneten Technik des Scheidenersatzes, wie wir ihn von SCHUBERT gelernt haben, wird gelegentlich sogar, namentlich bei vollständiger Atresie derselben oder bei Fehlen der Scheide infolge vorangegangener Gangrän die SCHUBERTSche Operation oder auf Grund der neuesten Erfahrungen die Scheidenplastik nach KIRSCHNER-WAGNER in Frage kommen.

#### Cervicitis und zervikaler Fluor.

Da erfahrungsgemäß der zervikale Fluor in weitaus der größten Zahl aller Fälle, besonders in seinen hartnäckigen Formen, auf der Gonorrhoe beruht, so sind auch die Grundzüge seiner Behandlung bei der gonorrhöischen Cervicitis (S. 98ff.) bereits angeführt. Hier gilt es nur, einige Ergänzungen zu machen.

Neben den Fällen von Cervicitis durch die erwähnten Schädlichkeiten wie das Geburtstrauma, Intrauterinpestare, Polypen usw., gibt es auch noch Katarrhe der Cervixschleimhaut, welche Ausdruck einer veränderten Säftemischung sind. Nach Infektionskrankheiten, besonders dann, wenn eine alte Tuberkulose sich wieder zu rühren beginnt, bei den heute allerdings seltenen Fällen von Chlorose und bei asthenischen Individuen, besonders solchen Frauen, die auch an Dysmenorrhoe leiden, sind diese Katarrhe nicht ganz selten. Vielleicht spielt dabei eine mangelhafte Ovarialtätigkeit und eine durch sie bedingte oder zumindestens erhöhte

Vagotonie eine Rolle, wie dies R. SCHRÖDER wahrscheinlich macht. In solchen Fällen soll man die Allgemeinbehandlung in den Vordergrund schieben und durch Persvasion im Sinne von DUBOIS die Übersteigerung der Beschwerden auf das richtige Maß zurückführen. Die Medikation von *Atropin* und *Atropapaverin* (Rp. 47, 48 S. 40) ist anzuzufempfehlen. *Hormon-* und *Kalkpräparate* können versucht werden, besonders wenn gleichzeitig auch eine Dysmenorrhoe besteht.

Was die Behandlung der echten entzündlichen Cervicitis anlangt, so seien zunächst die Ätzverfahren angeführt. Die Formalinätzung nach MENGE ist sowohl beim postgonorrhöischen, wie bei dem nichtgonorrhöischen zervikalen Fluor ein ausgezeichnetes Mittel, dessen Technik S. 47 beschrieben ist. Desgleichen sind auch beim nichtgonorrhöischen Zervikalkatarrh *Lapisätzungen* mit 10%iger Lösung, die mit sterilem Wattestäbchen 2- bis 3mal wöchentlich nach Entfernung des Schleims mit 10- bis 20%iger *Sodalösung* oder 10%igem *Sodaglyzerin* gemacht werden, sehr wirksam. Auch die Einführung von Zervixstäbchen, beispielsweise der *Tampovagan-Zervixstäbchen* mit 5%igem *Acidum lacticum* ist gebräuchlich. In Amerika erfreut sich die Elektrokaustik bei hartnäckiger Hypersekretion einer großen Beliebtheit, die vielleicht auch bei uns mehr angewendet werden könnte. Aber auch die Behandlung mit dem Kugelbrenner des Paquelin gibt in der Hand Geübter keine schlechten Ergebnisse. SCHWEIZER geht so vor, daß er nach Erweiterung der Cervix mit Laminaria rasch und oberflächlich einmal durch den weiten Halskanal „hindurchhuscht“. Dort, wo zahlreiche Ovula Nabothi vorliegen, die Cervix plump, follikulär hyperplastisch erscheint, kann man durch einfaches radiäres Inzidieren und Eröffnung der zahlreichen Ovula die Cervix anschwellen und den Katarrh zum Schwinden kommen sehen, ein Verfahren, das übrigens auch bei der gonorrhöischen Cervicitis von BUCURA empfohlen wird. Besteht gleichzeitig als Begleiterscheinung des Zervixkatarrhs Polypenbildung, so muß der Polyp mit einer Kornzange abgedreht und einige Zeit darnach die Zervikalschleimhaut am besten mit *Formalin* geätzt werden.

#### Erosion.

Wie schon bei der Gonorrhoe ausgeführt, ist die häufigste Begleiterscheinung des Zervikalkatarrhs, die Erosion, in ihrem Verhalten vom Zustand der Cervicitis weitgehend abhängig. Gelingt es, den Zervikalkatarrh günstig zu beeinflussen, so bessert sich zwangsläufig in der Mehrzahl der Fälle die Erosion. Dort freilich, wo der Boden für sie infolge klaffenden Muttermundes mit vorquellender Schleimhaut nach alten Geburtsnarben und gewaltsamen Aufschließungen nach Aborten günstig ist und dort, wo infolge schlecht vernarbter Dammrisse die Scham klafft und die Bakterien der Außenwelt ständig aufwandern, ist die Erosion schwer beeinflussbar und rührt sich auch nach entsprechender Behandlung gerne wieder. In der konservativen Behandlung derselben ist noch immer das 2- bis 4%ige *Lapisbad* im Röhrenspekulum führend. Man nimmt ein nicht zu großes, daher bei der Einführung nicht schmerzendes Milchglas-

spekulum, stellt die Portio ein und badet die mit 10%iger Sodalösung vom Schleim gereinigte Portio in der 2- bis 4%igen Argentumlösung durch 5 Minuten nicht öfter als zweimal wöchentlich, schiebt während des Bades das Spekulum auch hin und her, um gleichzeitig die so gut wie immer mit ergriffene entzündlich veränderte Vaginalschleimhaut zu behandeln. Länger als 3, höchstens 4 Wochen mache man die Prozedur nicht, weil durch die zu langdauernde erfolglose Lokalbehandlung die Frauen in ihrem Nervensystem sehr leiden. Altbewährt ist auch der Holzessig, und zwar der *rohe Holzessig*:

121. Acet. pyrolignos. crud. . . 200,0

welchen man im Milchglasspekulum nach sorgfältiger Reinigung der Portio durch 5 Minuten 2- bis 3mal wöchentlich einwirken läßt. Die Wirkung des Holzessigs wird verstärkt, wenn man

122. Acet. pyrolignos. crud. . . 100,0  
Acid. carbolic. . . . . 3,0

verordnet. Gutes kann man auch bei nicht zu lange bestehenden Erosionen mit der Behandlung mit dem Lapisstift sehen, wobei man aber die Behandlung nicht öfter als 2- bis 3mal und das nur in 8- bis 10tägigen Zwischenräumen machen soll. Dabei ist bei der Anwendung des Lapisstiftes Vorsicht geboten, indem das überschüssige Medikament abgetupft werden muß. Man kann auch die Lapisstiftbehandlung durch Bepinselung der Erosion mit Jodtinktur oder durch ein Jodbad ersetzen. Auch erweist sich die Vorlage eines Glycerintampons als vorteilhaft, der am nächsten Tag von der Patientin entfernt wird. Zwei Tage nach der Behandlung läßt man die erste Spülung machen, und zwar zuerst mit Kamillentee, dann täglich einmal, und zwar morgens mit 0,5%iger Milchsäure oder 1 Eßlöffel Holzessig (Rp. 121, 122) auf 1 Liter Wasser.

Großer Beliebtheit erfreut sich auch heute noch bei der Behandlung der Erosion und des Fluors die Tampontherapie. Zugegeben sei, daß Tampons, mit Flüssigkeiten oder mit Salben und Pasten beschickt, eine längere Einwirkung des Heilmittels auf die Gewebspartien, also bei Erosion auf die Geschwürfläche gestatten. Es soll auch nicht gelehrt werden, daß die Glycerintampons mit und ohne Zusatz durch ihre wasserentziehende Wirkung keinesfalls bedeutungslos sind. Der günstige Einfluß des Glycerins und der Kombinationen der verschiedensten Mittel mit Glycerin wie Tannin, Thigenol, mag auch darauf beruhen, daß vielleicht aus Glycerin Milchsäure gebildet und so dem Aufkommen der normalen Scheidenflora der Boden bereitet wird (R. SCHRÖDER). Eine resorptive Wirkung aber ist von der Tampontherapie nach allem, was wir heute wissen, nicht zu erwarten, und die Anschauung, daß Entzündungen der Adnexa durch die Tampontherapie zu heilen sind, nicht haltbar. Wendet man sie an, so muß auch für sie der Satz gelten, daß gerade bei ihrer zweifelhaften Wirksamkeit niemals zu oft hintereinander und auch im ganzen nicht länger als in einem 4 wöchentlichen Turnus behandelt werde.

Am ehesten ist die Tampontherapie noch in der ambulatorischen Behandlung der Erosion angezeigt. Vor jeder Tamponbehandlung reinigt man die Scheide durch eine Spülung mit lauem oder warmem Wasser, wozu sich meist zwecks Entfernung von Schleim eine schwache Sodalösung (1 Eßlöffel auf 1 Liter Wasser) sehr gut eignet. Man nimmt zum Tränken des Tampons beispielsweise

123. Kalii jodati . . . . .	5,0—10,0	124. Acid. tann. . . . .	5,0—20,0
Glycerini ad . . . . .	50,0	Glycerini ad . . . . .	50,0
D. S. Äußerlich.		D. S. Äußerlich.	

Man kann auch den Tampon mit Salben bestreichen, als deren Grundlage man Vaseline nimmt, zu welcher man von dem betreffenden Medikament etwa um die Hälfte mehr zusetzt als für die Glycerinlösung (СНРОБАК). Der Schwefel ist seit alters her in der Tamponbehandlung besonders gerne gebraucht. In der Tat leisten die *Cehasolpräparate*, ferner das *Thiosept*, das *Eutirsol* (als 5- und 10%ige Lösung sowie als 10- und 20%ige Salbe) entschieden Gutes. Die schon bei der Fluorbehandlung erwähnte Therapie mit Scheidenkugeln und Schaumkörpern findet auch bei Erosionen und begleitenden Scheidenkatarrhen namentlich als Zusatzbehandlung im Hause durch die Patientin selbst vielfach Verwendung. Die hierzu gebräuchlichen Globuli sind beim Fluor S. 153 ff. angeführt.

Trotz aller Bemühungen sieht man namentlich bei Frauen, die geboren haben, wo vielfach durch das Geburtstrauma, besonders infolge alter, schlecht vernarbter Zervixrisse die Schleimhaut Neigung zum Vorquellen hat, daß unsere ganzen konservativen Maßnahmen keinen Erfolg haben. In solchen Fällen wird die SCHRÖDER-EMMETSche Operation, welche gleichzeitig auch alte Zervixrisse zu beseitigen hat, empfohlen. Sie bringt aber nicht ganz selten die Schleimhaut wieder zum Vorquellen. Damit ist der alte Zustand wieder hergestellt, meist ist er sogar noch schlechter. Dagegen liefert eine regelrecht ausgeführte plastische Operation der Portio nach der Methode STURMDORFS oder der ganz ähnlichen BONNEYS weit bessere Ergebnisse. Das wesentliche der Methode ist aus den leicht erreichbaren Abbildungen ersichtlich, wie sie von FRÄNKEL im Zentralblatt für Gynäkologie 1930, Nr. 34, S. 2214, gebracht werden. Das Verfahren von BONNEY ist in HINSELMANNS Schrift über die Kolposkopie (Paul Hartung, Hamburg) in schönen Abbildungen weiten Kreisen zugänglich gemacht. Freilich sei nicht verschwiegen, daß die Operationen nicht für den praktischen Arzt geeignet sind, da sie immerhin eine gewisse Operationstechnik erfordern. Entschließt man sich zu einer solchen Plastik zu früh, etwa im subakuten Stadium, so kann sie zu sehr unangenehmen Nachwehen führen. Schwere Parametritis und Wiederaufflackern einer abgeheilt gehaltenen Entzündung der Adnexa könnte die Folge sein. Sie ist daher erst nach Erschöpfung der konservativen Behandlungsmethoden bei weiter bestehender Erosion angezeigt.

Die Behandlung des seltenen tubaren Fluors ist in den Vorbemerkungen dieses Kapitels S. 140, die des korporealen eben daselbst und

soweit er durch Endometritis bedingt ist, bei der Behandlung der Endometritis S. 141 geschildert.

### 3. Die Behandlung der septischen Entzündungen der oberen Geschlechtswege.

Eine erschöpfende Darstellung des im Titel umschriebenen Kapitels würde einer Aufrollung der Therapie des Puerperalprozesses<sup>1</sup> gleichkommen, die den Rahmen dieses Buches überschreiten müßte. Gleichwohl sei betont, daß es vornehmlich die Vorgänge gestörter Schwangerschaft und die Komplikationen des Wochenbettes, besonders nach Abortus, aber auch nach rechtzeitiger und frühzeitiger Geburt sind, welche die Ursache der Mehrzahl aller Fälle der septischen Entzündungen sind. Natürlich können entzündliche Krankheiten der Geschlechtswege auch ohne Bestehen einer Schwangerschaft aus den verschiedensten anderen Ursachen heraus sich ausbilden, auf die zurückzukommen sein wird. Die Keime der septischen Entzündung sind in der Mehrzahl aller Fälle die sogenannten Wundkeime, also Streptokokken, Staphylokokken und *Bacterium coli*, welche nicht selten miteinander vergesellschaftet zur Mischinfektion führen. Der Infektionsweg erfolgt in diesen Fällen entweder durch Infektion des Corpus uteri, also durch Erzeugung einer Endometritis, die ihrerseits wieder die Tuben ergreift und zur Salpingitis, aber auch zur Erkrankung des Ovariums, allenfalls zum Ovarialabszeß Veranlassung geben kann und dabei selbstverständlich das umgebende Peritoneum wesentlich in Mitleidenschaft zieht. Weiters sind es die Infektionen, die auf dem Wege der Lymphbahn das Beckenzellgewebe befallen und die echten Parametritiden erzeugen, ganz besonders nach Verletzungen und Manipulationen an der Cervix. Schließlich kann auch auf dem Lymphwege das Peritoneum ergriffen werden, was besonders leicht von dem in die Bauchhöhle hineinragenden Gebärmuttergrund geschieht. Endlich sind es Fälle reiner Infektion auf dem Wege der Blutbahn, die zu Pyämie oder Sepsis führen. Die Krankheitsbilder, welche sich bei den septischen Erkrankungen darbieten, sind keineswegs immer so scharf umrissen, wie sie in den Lehrbüchern dargestellt werden und aus didaktischen Gründen beschrieben werden müssen. Unklare Zustände, Aufpflropfung verschiedener Ausbreitungswege bei ein und demselben Falle und demnach Verschwimmen der charakteristischen Krankheitszeichen beobachtet man immer wieder, was die Therapie erschwert (HALBAN u. KÖHLER). Trotzdem erscheint es richtig, mit R. SCHRÖDER etwas schematisierend zunächst die Lokalentzündungen septischer Natur zu streifen und auf die Behandlung dieser einzugehen.

Von einer tiefergreifenden Kohabitationsverletzung angefangen, bis zu den bei der Operation gesetzten, also lege artis versorgten Wunden, können lokale Entzündungserscheinungen auftreten, welche sich durch

<sup>1</sup> Siehe die Monographie „Die Therapie des Wochenbettfiebers“ von R. KÖHLER. 2. Aufl., Wien, F. Deuticke, 1924.

speckigen Belag der Wunden, üblen Geruch, Ausfluß, Rötung und Schwellung der Ränder auszeichnen. Absolute Bettruhe, Entfernung etwa spannender Nähte, Berieselung der Wunden mit *essigsaurer Tonerde*, *Bleiwasser*, *3%igem Wasserstoffsuperoxyd* und besonders mit der recht gut bewährten *2%igen Tanninlösung* besorgen die Reinigung solcher Geschwüre rasch, gar dann, wenn allenfalls bei Bestehen von tieferen Buchten ein Streifen oder Drain locker eingelegt ist. Erhöhung der Abwehrkräfte des Körpers durch parenterale Eiweißzufuhr von *Omnadin* oder *Casein*-Injektion kann vorteilhaft sein. Wichtig erscheint es, die Bettruhe möglichst lang auszudehnen.

### Endometritis.

Häufiger ist die Endometritis post abortum, bzw. die Endometritis post partum. Ohne das Kapitel, welches in die Geburtshilfe gehört und uns in betreff der durch die verursachten Blutungen bereits S. 61 ff. beschäftigt hat, hier abzuhandeln, sei nur darauf verwiesen, daß in Fällen der akuten Endometritis — gekennzeichnet durch Temperatursteigerung, Schmerzhaftigkeit des Uterus oder gar vielleicht seiner Seitenkanten, Blutungen, übelriechenden Ausfluß — zunächst eine abwartende und konservative Behandlung am Platze ist, wenn nicht eine sehr starke Blutung diese zu stillen energisch gebietet. Wer bei strenger Bettruhe zuwarten kann, wird bessere Erfolge erzielen, als der, welcher aktiv vorgeht, weil er auch bei noch so zarter Behandlung der Gewebe, selbst wenn er den soviel gelästerten, angeblich so groben Finger nicht benützt, auch mit Instrumenten frische Wunden setzt, die von den vorhandenen Keimen besiedelt werden. Es genügt, gegen die Schmerzen eines der bei der akuten Gonorrhoe zur Schmerzstillung und Ruhigstellung des Uterus angeführten Medikamente (S. 104 ff.) zu geben, feuchtwarme Kompressen aufzulegen und die Wärme durch einen 3- bis 4stündlich zu wechselnden Thermophor zu halten, in anderen Fällen wieder, wo Kälte angenehm empfunden wird, durch den Eisbeutel die Gebärmutter ruhigzustellen. Der Darm ist durch Kamilleneinläufe und Rizinusöl (2 Kapseln à 4 g) zu entleeren und die Entfieberung abzuwarten. Immer hat sich uns in solchen Fällen das Chinin als ein die Entfieberung beschleunigendes Mittel bei solchen Wundinfektionen erwiesen, mögen sie puerperalen Ursprungs sein oder nicht. 2 g *Chinin* (4 × 0,25), besonders in Form der *Cardiacol-Chinindrages* oder die von WILLE gegebene Vorschrift

125. Amidopyrin .....	3,0
Tinct. chin. comp. ....	15,0
Syrup. simpl. ....	20,0
Aqu. fontis ad .....	200,0
D. S. 4mal täglich 1 Eßlöffel nach gutem Umschütteln.	

hat sich uns ausgezeichnet bewährt. Immer noch ist bei der Endometritis post abortum, gar wenn das Bild von der Blutung beherrscht wird, die Ausschabung das gebräuchlichste Mittel. Wo es sich aber nur um kleinere

Reste von Eihäuten und Decidua handelt, gelingt es oft ohne jedwede Ausschabung auszukommen und bei streng eingehaltener Bettruhe und Ergotin (S. 25 ff.) die Rückbildung des Uterus ohne Übergreifen der Entzündung auf die Umgebung zu erzielen. Wo aber die Blutung stärker ist und vermutlich in zurückgebliebenen Nachgeburtsresten ihre Ursache hat, wird man am besten, wie bekannt, erst 4 Tage, am frühesten 3 Tage nach der Entfieberung die Ausräumung vornehmen. In diesen Fällen ist der Kürette wohl vor dem Finger der Vorzug zu geben. Die Dilatation hat dabei sehr zart, mit Rücksicht auf die Gefahr von Verwundung des Zervikalkanals und dessen Besiedelung mit Keimen, zu geschehen.

Die Endometritis nichtpuerperalen Ursprungs kann mannigfaltige Ursachen haben. Operationseingriffe wie die Probeexzision aus der Portio, die Erweiterung des Halskanals mit Hegar- und Laminariastiften, Muttermunddiszissionen wegen Stenosen, Einführen und Liegenlassen von Röhrchen zum Zwecke der Beseitigung einer Dysmenorrhoe und einer Erleichterung der Empfängnis, intrauterine Stifte und Okklusivpessare zwecks Verhütung derselben, spielen hinsichtlich der Entstehung einer Endometritis eine wichtige Rolle. Auch nach Entfernung von Polypen, besonders myomatösen Polypen bei weit klaffendem Halskanal, können solche Endometritiden entstehen. Schließlich und nicht zuletzt muß ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß eine ganze Reihe von Fällen, die im Anschlusse an die Periode auftreten, so verdächtig sie auch auf Gonorrhoe sein mögen, einwandfrei septischen Ursprungs sein und sogar infolge Mitbeteiligung des Bauchfells recht bedrohlich aussehen können. Zweifelsohne kommt eine Besiedelung des Trümmerfeldes des Corpus uteri während der Menstruation mit septischen Keimen offenbar unter dem Einfluß gewisser, die Abwehrkräfte des Körpers schwächender Umstände vor. Solche sind ganz besonders Verkühlungen während der Periode, wie sie durch kalte Bäder entstehen, aber auch der Geschlechtsverkehr während derselben, der, ganz abgesehen von seiner undelikaten Seite, um diese Zeit keineswegs gefahrlos ist (H. KÜSTNER).

Weniger eindrucksvoll, mehr schleichend, durch kleine unregelmäßige Blutungen, ständigen Ausfluß und leichte Schmerzen ausgezeichnet, sind jene Endometritiden, welche nach längerem Gebrauche der Okklusivpessare gar nicht selten entstehen. An dieser Stelle müssen dieselben als Quellen mannigfaltiger, zum Teil nur mehr schwer oder überhaupt nicht mehr behebbarer entzündlicher Schäden angeprangert werden, besonders, wenn sie jeweils durch einen ganzen Zyklus hindurch, vielleicht sogar jahrelang getragen und nur während der Periode fortgenommen werden. Der äußerst üble, widerliche Geruch derartiger Pessare nach vierwöchigem Liegen müßte es auch dem Laien klar machen, daß der Verschluß einer natürlichen Öffnung auf so lange Zeit nicht folgenlos bleiben kann. Läßt man in den angezogenen Fällen die Pessare für immer fort, so sieht man alsbald die subjektiven Beschwerden abklingen und objektiv Ausfluß und Blutung zurückgehen. Längere Gaben leichter Styptica (S. 26 ff.), Prießnitzwickel und Thermophore,

warme Spülungen mit 1 Eßlöffel *Steinsalz* auf 1½ Liter Wasser oder 2 Eßlöffel *Mutterlauge* auf dieselbe Menge, allenfalls längerdauernde Scheidenspülungen mit 10 bis 15 Liter der Salzlösung sind vorteilhaft, ebenso Spülungen mit *Jod*, wenn sicher eine Hyperthyreose ausgeschlossen werden kann, am wohlfeilsten mit

126. Kal. jodat. ....	5,0
Tinct. jod. ....	20,0
Aqu. dest. ad .....	200,0
D. S. 2 Teelöffel auf 1 Liter Wasser.	

Auch *Steinsalz*-Sitzbäder mit und ohne Badespekulum, ganz besonders aber Moorbäder und in Ermangelung solcher *Moorlaugen*-, *Moorextrakt*- oder *Salhumin*-Sitzbäder (S. 121) sind zu empfehlen. Bei längerdauernden Blutungen, die in diesen Fällen nicht heftig zu sein pflegen und besonders ante und post menstruationem sich bemerkbar machen, kann man neben den oben erwähnten Stypticis mit Vorteil von der vaginalen, allenfalls auch von der zervikalen Behandlung mit *Tampospumanstäbchen* Gebrauch machen. Man läßt vaginal 3mal täglich ein Stäbchen zu 1 g tief in die Scheide einführen oder führt Stäbchen zu 0,5 g 3mal wöchentlich in die Cervix ein. Wird eine Abrasio notwendig, so geschehe sie möglichst zart. Nur in Ausnahmefällen, wo neben einer beträchtlichen Dauerblutung auch ein hartnäckiger, unbeeinflussbarer korporealer Fluor besteht, wird man die Ätzung des Cavum uteri mit Formalin oder Jodtinktur wie sie S. 47 geschildert ist, vornehmen müssen. In der Mehrzahl dieser Zustände kommt man mit den genannten Maßnahmen zum Ziele, wenngleich es so und so oft nicht mehr gelingt, eine durch Übergreifen der Entzündung auf die Tuben entstandene Sterilität infolge Tubenverschlusses zu beseitigen.

### Septische Salpingoophoritis, Pelveoperitonitis (Perimetritis), Douglasabszeß.

Eine gesonderte Besprechung verdient die septische Entzündung der Adnexa, sei es, daß sie durch Fortschreiten der Entzündung vom Endometrium her entstanden ist, sei es, daß sie einer Metastase ihren Ursprung verdankt. Die septischen Adnextumoren sind im Gegensatz zu den gonorrhöischen glücklicherweise häufig einseitig und neigen im allgemeinen leichter zur Naturheilung. Entstehen sie im Anschluß an Geburten, so können sie sich recht schleichend und allmählich entwickeln, aber auch stürmisch beginnen, was man namentlich im Gefolge krimineller Aborten immer wieder sieht. Häufiger sind entschieden die Fälle, wo der Beginn an ein verlängertes Wochenbett sich anschließt, von dem die Frau sich nicht recht erholen will. Bei chronischen Krankheiten des uropoetischen Systems, die auf die Scheide und die oberen Geschlechtswege übergreifen, ist der Verlauf ebenfalls ein schleppender. Ist die Entzündung vom Darm fortgeleitet, beispielsweise wie nicht selten bei Appendicitis, gelegentlich auch bei Sigmoiditis, können auch heftige akute Erscheinungen den Beginn bezeichnen. Die septischen Adnextumoren puerperaler

Natur sind auch dadurch bemerkenswert, daß umfänglicher wie bei der Gonorrhoe das Ovarium mitbefallen wird, welches leicht abszediert. Auch die Tuben haben Neigung zur Bildung von großen mächtigen Eitersäcken. Wenn sie auch, ebenso wie ein Ovarialabszeß in die Bauchhöhle durchbrechen können — ein höchst gefährliches Ereignis, dem man nur durch sofortige Laparotomie nach dem Durchbruch allenfalls noch begegnen kann — so soll man sich trotz dieser Möglichkeit und trotz längere Zeit anhaltenden Fiebers nicht zu früh zur chirurgischen Therapie entschließen. Hat man zu früh operiert, so gelingt nur ausnahmsweise, solche mit hoch virulenten Keimen angefüllte Eitersäcke uneröffnet zu entfernen und das Einreißen derselben mit dem nachfolgenden Erguß über das Bauchfell kann die Katastrophe der allgemeinen Peritonitis herbeiführen. PEHAM und KEITLER erwähnen, daß sie auch in solchen Fällen beim Bauchschnitte sich auf die bloße Inzision und Drainage mit Mikulicztampon begnügt haben und damit lebensrettend wirken konnten. Wie die Erfahrung von der geburtshilflichen Klinik her lehrt, zeigen solche mächtige, durch Tage und Wochen hohe Temperaturen unterhaltende Eitersäcke trotz allem doch die Tendenz zur Heilung. Darum ist es vorteilhaft, sozusagen mit dem Messer in der Hand zuzuwarten, und wenn die Operation dennoch notwendig wird, womöglich den vaginalen Weg der Inzision und Drainage zu beschreiten. Er ist der Weg der Wahl beim echten Douglasabszeß, also der Eiteransammlung am tiefsten Punkt des Beckens. Weit weniger günstig sind die Aussichten der Heilung, wenn nicht der Douglas, sondern eine abgesackte Pyosalpinx eröffnet wird. Dann kommt es, worauf STOECKEL besonders hinweist, zu einer Tuben-Scheidenfistel, weil die infizierte Tubenschleimhaut nach wie vor Eiter sezerniert. Das ist dann keine Heilung, und erst mit der Exstirpation der Pyosalpinx von oben her, mit der man sehr lange warten muß, kommt es zum Aufhören der Eiterung und zur Heilung. Auch die an Stelle der Inzision vorgeschlagene Punktion und Aspiration hat, wie erwähnt, ihre nicht unberechtigten Bedenken.

Schließt sich an die akute Entzündung der Adnexe aber eine diffuse Bauchfellentzündung an, dann sind auch bei frühzeitiger medianer Laparotomie und ausgiebiger Drainage nach den Flanken und nach dem Douglas zu die Heilungsaussichten sehr gering. Nach den Erfahrungen der Chirurgen, welche bei diffuser Peritonitis infolge Perforation der Appendix durch Eingießen des Peritonitisserrums der Höchster Farbwerke in die Bauchhöhle und durch intramuskuläre bzw. intravenöse Injektion des Serums die Mortalität wesentlich herabdrücken konnten (LÖHR und GEISSLER, KUNZ u. a.), ist auch für die Peritonitis nach septischer Entzündung der Adnexa dieses Vorgehen um so mehr zu empfehlen, als Kolieregger, ebenso wie Anaerobier, gegen deren Toxine dieses Serum wirksam ist, auch bei septischen Adnexentzündungen eine wesentliche Rolle spielen. Daneben muß man alle Mittel, die wir im Kampf gegen die Peritonitis haben, mit allem Nachdruck solange anwenden, bis sich eine Wendung nach der einen oder anderen Seite hin gezeigt hat. In dieser

Hinsicht bewähren sich die Tropfklysmen und Infusionen mit ständigem Pituitrin-, Digipurat- und Koffeinzusatz, also die von LATZKO inaugurierte Peritonitistherapie, ebenso wie die Revitentherapie nach HOLZBACH, während es um die Ätherbehandlung der Peritonitis recht stille geworden ist. Das *Reviten* gebe man entweder in injectione oder aber vorteilhafter als Zusatz zum Tropfklyisma (10 ccm auf 1 Liter Ringerlösung). Sehr zu empfehlen sind auch die intravenösen Dauertropfinfusionen, welche mit 5%iger Traubenzuckerlösung oder mit *Tutofusin* durch Tage hindurch unterhalten werden können. In der Mehrzahl der Fälle septischer Adnexentzündung ist es aber so, daß selbst nach einem stürmischen Beginn die Zeichen der akuten Perimetritis — Spannung und Auftreibung des Bauches, hochgradige Druckschmerzhaftigkeit und Erschwerung von Stuhl- und Windabgang — nach einigen Tagen abklingen, worauf alsbald bei der Untersuchung durch die Scheide die sich nunmehr ausbildenden Adnextumoren als Zeichen der Begrenzung der Entzündung feststellbar werden. Hier hat der Arzt ein dankbares Feld entsprechender konservativer Betätigung.

Gegen die Schmerzen ist mit Wärme, besonders dem Dunstwickel, aber auch der erwähnten Antiphlogistine, sodann mit warmen Scheidenspülungen, denen man auf 1 Liter 8 Tropfen *Opiumtinktur* zusetzen kann, ferner durch *Papaverinsuppositorien* und *Antipyrikklysmen* (S. 105) nebst der Sorge für Stuhl durch *Kamillen-* und *Öleinläufe* viel getan. *Proteinkörpertherapie* (Omnadin, Casein) kann versucht werden. Mehr als die Anwendung von 5 bis 10 ccm einer 1%igen *Elektrargol-* oder *Collargol-*lösung leisten *Detoxininjektionen* (intramuskulär oder besser intravenös) in größeren Dosen von 10 bis 20 ccm, von denen wir wiederholt in derartigen Fällen schwerer Art entschieden Gutes gesehen haben. Auch die intravenöse Injektion 1- bis 2%iger *Trypaflavinlösung* bringt Erfolg, doch hüte man sich vor paravenöser Injektion mit Rücksicht auf die Möglichkeit tiefgreifender Nekrosen. Ein wesentlicher Punkt in der Behandlung derartiger Fälle, die sich auf längere Zeit hinziehen, ist eine sorgfältige Pflege und eine richtige Ernährung. Der Arzt muß trachten, Abwechslung in die Kost zu bringen und die Nahrung häufiger, wenn auch in kleineren Mengen, verabreichen lassen. *Stomachica* (S. 211) kann man nicht entbehren. Geschabtes Fleisch, Fleischextrakte, Fleischgelees, verschiedene Suppen, Kartoffelpüree, Eier, Kompotte, Fruchtsäfte und leichte Mehlspeisen können die Körperkräfte aufrechterhalten. Sorgfältige Körperpflege, regelmäßige Waschungen und Abreibungen, Verhütung von Decubitus obliegt uns weiter bei solchen Kranken. Hat sich eine Thrombophlebitis entwickelt, so erweist sich neben Hochlagerung der mit kühlenden Umschlägen bedeckten und auf dem Häckselkissen ruhigestellten Gliedmaße, das Ansetzen von Blutegeln nicht nur als das beste Mittel zur Schmerzstillung, sondern auch zur wesentlichen Abkürzung der Heilungsdauer. Sie werden auf die nicht mit Benzin sondern mit Wasser und Seife gereinigten und allenfalls mit Zuckerwasser bestrichenen Stellen aus einem Likörgläschen ausgeleert und setzen sich so am leichtesten fest.

Eine aktive Immunisierung, wie sie bei der Gonorrhoe durch die Gonokokkenvakzine geschieht, ist bei den Adnextumoren, die durch Wundkeime erzeugt worden sind, durch die BUCURASche *Mischvakzine* durchführbar. Eine solche darf erst nach Abklingen des Fiebers und der Allgemeinerscheinungen eingeleitet werden. Mit Rücksicht darauf, daß bei der Verabfolgung dieser, in 1 ccm 1000 Millionen Staphylokokken, Streptokokken und Kolibazillen (ohne Gonokokken) enthaltenden Vakzine, verborgene Krankheitsherde, welche dieselben Bakterien enthalten, heftigst mitreagieren, müssen die Gegenanzeigen, wie etwa eine bestehende Appendizitis, ein Ulcus ventriculi, Lungentuberkulose, Nephritis, besonders streng beachtet werden. Darum soll auch die Dosierung vorsichtig sein. Man beginnt mit  $\frac{1}{10}$  ccm der Mischvakzine, die man tief intramuskulär in das Gesäß oder in die Außenseite des Oberschenkels gibt. Dreimalige Temperaturmessung im Tage klärt neben mehr minder starken Allgemeinerscheinungen über den Grad der Reaktion auf, die auch örtlich durch vermehrte Schmerzen, stärkeren Ausfluß usw. sich dartut. Erst bis die Temperatur zur Norm zurückgekehrt ist, gibt man die nächste Einspritzung, die wir, war die Reaktion nicht stürmisch, um  $\frac{3}{10}$  ccm steigern, während wir bei stürmisch gewesener Reaktion dieselbe Dosis wiederholen und die nächste nur um 1 bis  $\frac{2}{10}$  steigern. Die größte Menge, die wir verabreichen, sind 2 ccm. Daneben kommt auch parenterale Eiweißzufuhr in Form der intramuskulären *Omnadininjektion* oder als *Yatren-Casein* „stark“ und in chronischen Fällen das *Yatren-Casein* „schwach“ zur Anwendung. Das Yatren-„stark“ wird in der ersten Dosis mit 5 ccm und dann in dreitägigen Abständen mit 3, 2 und 1 ccm immer intramuskulär gebraucht. Ebenso kann man *Aolan*, täglich eine Ampulle zu 1 ccm, ferner *Milch* 5 ccm bis 10 ccm (schmerzhaft) und *Terpichin* (2 ccm) mit Erfolg anwenden; auch *Calciumgluconat* in täglichen Injektionen von 10 ccm, abwechselnd intravenös und intragluteal kann versucht werden.

Nach dieser Behandlung treten die milden hydriatischen Maßnahmen in ihre Rechte.

Eine besondere Betonung verdienen noch die metastatischen Entzündungen der Eileiter und Ovarien. Sie entstehen nach Infektionskrankheiten, und zwar seltener nach den klassischen Infektionen wie Typhus, Variola, Mumps, sondern, was praktisch viel wichtiger ist, besonders nach Angina, Grippeinfektion und durch Metastasen von irgendwo im Körper bestehenden (oft unerkannt gebliebenen) Eiterherden, Zahnfisteln, Abszessen, Furunkeln. Sie erfordern aber nur ganz ausnahmsweise ein chirurgisches Eingreifen und pflegen meist allmählich abzuklingen. Hier dreht sich alles um die richtige Diagnose und um den Mut zuzuwarten, der anfangs manchmal größer sein muß, als der Entschluß, operativ einzugreifen. Kann man eine akute Appendizitis, den Durchbruch eines Ulcus ventriculi, eine Infektion der Gallenwege ausschließen, und besteht, noch dazu meist zur Zeit einer Grippeepidemie ein katarrhalisches Krankheitsbild, so kann man die Genitalbefunde auf diese beziehen, wenn auch die Schmerzhaftigkeit der Unterbauchgegend und des Douglas

oft eine ganz unheimlich heftige ist, die außer in den entzündeten Adnexen auch in der toxischen Neuritis der Beckennerven (CRAMER) ihre Ursache haben kann. Es hat den Anschein, als würden Fälle, bei denen seinerzeit aus anderen Ursachen, beispielsweise infolge Mißbrauches des Genitales durch viele künstliche Aborten u. ä., alte entzündliche Veränderungen an den Adnexen entstanden sind, diese leichter der metastatischen Entzündung anheimfallen, als gesunde Genitalorgane. Bei der Behandlung dieser Entzündungen beschränkt man sich selbstverständlich unter ständiger Überwachung des örtlichen Befundes auf feuchte Wärme, *Papaverin*, *Opiate* und *Salizylpräparate*, Stammwickel sowie auf Abführmittel. Kaum jemals wird man zur Operation greifen müssen, es sei denn, daß ein Douglasabszeß sich entwickelt.

### Parametritis.

Ganz im Gegensatz zur Gonorrhoe, welche das Parametrium nur ganz ausnahmsweise befällt, ist bei den septischen Erkrankungen das Beckenbindegewebe ein Lieblingssort ihrer Lokalisation. Wenn auch anfänglich das Bild der Parametritis acuta nicht in allen Einzelheiten sich erweisen läßt, indem oft genug auch peritoneale Symptome verwirrend in die Diagnose hineinspielen, so sieht man es doch sich allmählich herausbilden. Es ist in  $\frac{2}{3}$  aller Fälle durch Geburtsinfektionen und so dann durch die bereits erwähnten verschiedensten Infekte bedingt. Zufolge der anatomischen Lage des Parametriums können alle Bindegewebslager des Beckens von der Entzündung ergriffen werden, wenngleich die laterale und nächst dem die hintere Parametritis die häufigste Lokalisation darstellt. Zufolge der unmittelbaren Nachbarschaft mit dem Peritoneum ist ein Mitbefallenwerden des Beckenperitoneums, der Uterusserosa und der Blasenserosa recht häufig und kann nicht bloß zu Verklebung, sondern zu intraperitonealer Eiterbildung neben der parametranen Veranlassung geben. Grundsatz einer rationellen Therapie ist die Erkennung der wahrhaft parametranen Natur des Prozesses, für welche immer noch, ja einzig eine geübte Hand entscheidend ist, welcher es gelingt, die Ausbreitung des Prozesses bis an die Beckenwand festzustellen im Gegensatz zur entzündlichen Krankheit der Adnexa, die nach unten zu konvexe Konturen aufweisen und immer zwischen Beckenwand und Tumor den Finger ein Stück Weges vorrücken lassen. Mag auch am Anfang eine Parametritis infolge des hohen Fiebers und der Störung des Allgemeinbefindens unbedingt die Operation notwendig erscheinen lassen, so verhält es sich in Wahrheit doch so, daß auch länger fiebernde Fälle oft allmählich abklingen, ohne daß operativ eingegriffen werden muß. Nicht jede Parametritis muß eitrig einschmelzen; sie kann auch selbst bei länger bestehendem hohen Fieber resorbiert werden und restlos ausheilen oder, was leider nicht selten ist, in schwere Schwielenbildung, die das Becken ganz ausmauern und sogar das Rektum stark verengern kann, übergehen. Im akuten Zustand stehen die Hebung der Herzkraft, die Erhöhung der Hautrespiration durch Ganz- und Halbpackungen und Einreiben mit spirituösen Flüssigkeiten, ebenso wie An-

regung des Appetits bei der strengsten Bettruhe als Allgemeinmaßnahmen im Vordergrund. Kaum zu umgehen ist bei schwereren Fällen eine ständige Flüssigkeitszufuhr durch rektale Einläufe, denen grundsätzlich blutdrucksteigernde Mittel, *Pituitrin* und *Digipurat* (1 ccm auf 1 Liter) zugesetzt werden. Bei diesen Tröpfcheneinläufen verdienen die *Ringerlösung* und das *Normosal* vor dem gewöhnlichen Kochsalz entschieden den Vorzug. Feuchtwarme Wickel, die 3stündlich gewechselt werden, werden bei uns lieber genommen, als Eisblasen, die man aber bei Mitbeteiligung des angrenzenden Beckenbauchfells versuchen wird. Zwecks Milderung der Schmerzen sind *Spasmolytica* und *Antidolorosa*, wie sie bei der akuten Entzündung der Adnexa (S. 104 ff.) geschildert wurden, notwendig. Einläufe mit Kamillen schaffen Erleichterung. Besteht das Fieber trotzdem längere Zeit weiter, bekommt es gar septisch-pyämischen Charakter, wird es Zeit, zur Inzision zu schreiten, weil die eitrige Einschmelzung erfolgt ist. Man lasse sich aber auf Inzisionen nicht ein, wenn das Exsudat nur schwer oder kaum erreichbar ist. Die gute alte Methode der Reifung durch entsprechende Maßnahmen ist auch heute nicht obsolet. Es bewährt sich hierzu die Auflage von *Leinsamenkataplasmen*<sup>1</sup> und ganz besonders die *Antiphlogistine* (S. 115), die man auch zur Reifung von solchen Exsudaten mit Erfolg anwenden kann, welche nur vaginal anzugehen sind (S. 16). Auch zweimal täglich durchgeführte heiße Spülungen, am besten mit der genannten Spülbirne und großen Mengen Wassers (10 bis 20 Liter) können gut tun. Die Inzision selbst ist bei parametranen Exsudaten keineswegs so einfach, wie sie scheint und muß dem Facharzt überlassen werden. Das Selbstheilungsbestreben der Natur läßt oft den Eiter in das Rektum, die Scheide oder die Blase den Weg nehmen. Wenn der Eiterdurchbruch ein breiter ist und die Perforationsöffnung sich nicht zu bald schließt, ist dieser Weg nur zu begrüßen, weil ihm dann die Ausheilung folgt. Auch der Durchbruch in die Blase ist eine Heilung. Nach dem nur kurze Zeit dauernden Eiterharnen bessert sich das Krankheitsbild meist sehr rasch. Vorsichtige Blasenspülungen mit 3%iger Borsäure, reichliche Durchspülung der Blase durch alkalisch muriatische Mineralwässer nebst Wärmeapplikation sind zur Beförderung der Heilung vorteilhaft. Ganz anders ist es, wenn Adnextumoren, Ovarialabszesse, besonders aber Pyosalpingen, also präformierte Hohlräume mit sezernierendem Epithel in die genannten Organe durchbrechen. Das sind die Fälle,

---

<sup>1</sup> Bereitung:  $\frac{3}{4}$  Liter Wasser werden zum Kochen erhitzt und auf diese Menge allmählich 250 g Leinsamen eingerührt, die man unter Umrühren einmal aufkochen läßt, wodurch sich ein gleichmäßiger Brei ergibt. Diese Menge reicht gewöhnlich für zwei größere Kataplasmen, von denen man das eine auflegt, während das andere auf einer heißen Wärmeflasche warm gehalten wird. Noch einfacher ist die Bereitung mittels des Cataplasme instantané, das aus einem Seetang bereitet und in Plattenform in den Handel kommt. Ein nach Bedarf entsprechend groß geschnittenes Stück wird für 5 Minuten in kochendes Wasser getaucht, wodurch es aufquillt, dann legt man es, überdeckt mit Billrothbatist, allenfalls mit einer Schicht Watte, auf die erkrankte Stelle, die erweicht werden soll.

in denen der Durchbruch ungünstig gewertet werden muß. Bei diesen soll er eher vermieden werden. Wenn sich der Durchbruch durch Tenesmen und schleimige Stühle anzeigt, soll man vorbeugend, noch bevor es zu ihm kommt, von der Vagina her inzidieren, weil die sonst entstehenden Fisteln keinerlei Neigung zur Heilung zeigen, vielmehr in einem späteren Stadium die Radikaloperation verlangen, die durchaus nicht ungefährlich ist.

Mit der Entleerung der Exsudate ist zwar die Heilung angebahnt und wird auch nach entsprechender Zeit oft völlig erreicht. In anderen Fällen wieder schließt sich an die Entleerung des Eiters das Bild der chronischen Infiltration und Schwielenbildung an, das sich übrigens auch in weniger stürmisch verlaufenden Fällen allmählich aus dem subakuten Zustand entwickeln kann. Die Beschwerden können durch Narben zu Druckgefühl, Kreuzschmerzen, starken Unlustgefühlen beim Geschlechtsverkehr, zu Erschwerung der Miktion und Stuhlentleerung und zu verstärkten Regelblutungen infolge einer gewissen Unbeweglichkeit des von Schwielen umgebenen Uterus führen. Auch Neuralgien durch Druck verhärteter Exsudate auf die Nerven können sich einstellen. Hier ist dann die konservative Behandlung am Platze, die naturgemäß ausgiebiger sein muß als in jenen Fällen, in denen es überhaupt nicht zur eitrigen Einschmelzung gekommen ist, und die von Haus aus eine gewisse Neigung zur Selbstheilung zeigen. Wieder beginnt man mit den mildesten resorptionsbefördernden Verfahren, mit den warmen Umschlägen, Prißnitz mit Thermophor, behält die Bettruhe bei und gibt den Heißluftkasten zunächst nur mit einer vorsichtig tastenden Temperatur von 70° und nur durch 5 Minuten. Kommt es nicht zu Temperatursteigerungen, wird die Heißluft hinsichtlich der Temperatur und der Dauer der Sitzung gesteigert, ja es kann dann bereits der Pelvitherm von FLATAU eingeführt werden und wird auch meistens vertragen. Von besonderem Einfluß auf die Resorption ist des weiteren die Diathermie, die man in 10 bis 15 Sitzungen, am besten nach äußerer Diathermie in der ersten Woche, dann in kombinierter Form gibt, worüber bereits S. 116 ff. das Nötige ausgeführt ist. So recht die Domäne langwieriger, nur geringe Heilungsneigung zeigender Exsudate und Schwielen parametraner Natur sind dann die Moorbäder in den genannten Badeorten, deren Wirkung manchmal eine geradezu frappante ist, und die uns kaum jemals enttäuschen. Wer in der Kunst der Massage geübt ist, wird gerade bei der Parametritis die besten Resultate erzielen, während die Adnextumoren, wie ausgeführt, für die Massage nicht geeignet sind. Hinsichtlich der Erweichung der Schwielen und der Erlangung neuer Beweglichkeit für den Uterus ist die Belastungstherapie mit dem quecksilbergefüllten Kolpeurynter, wie sie S. 125 geschildert wurde, recht vorteilhaft.

#### 4. Genitaltuberkulose.

Wenn auch die Zahl der wegen Genitaltuberkulose sich uns stellenden Frauen, soweit man dies abschätzen kann, kaum mehr als 1% beträgt,

so kann doch die Wichtigkeit dieser Krankheit um so weniger zweifelhaft sein, als gerade die Jahre der Blüte, besonders das 3. Lebensjahrzehnt und nächst dem das zweite die Lieblingszeit sind, in der sie zur Beobachtung kommt. Bei der ersten Wertung, die dieses Krankheitsbild verdient, ist es ungünstig, daß die Symptomatologie im Vergleich zu den weitgehenden anatomischen Befunden oft eine recht dürftige ist, und daß sich das Leiden mehr schleichend und mit unklaren Symptomen ausbildet, welche vielfach der Diagnose Schwierigkeiten entgegenstellen. Da die Genitaltuberkulose keine selbständige Krankheit ist, sondern nur eine Lokalisation in einem tuberkulösen Körper, so ist auch die Vorhersage dieser Krankheit weitgehend davon abhängig, ob die tuberkulöse Erkrankung des Genitales als solche allein besteht und bestehen bleibt oder ob anderweitige Äußerungen der Tuberkulose die Frau zugrunde richten. Das Selbstheilungsbestreben der Natur soll nicht geleugnet werden, es aber allein wirken zu lassen, wäre verfehlt, wengleich die Wege der Therapie durchaus keine einfachen sind. Auch bei der Behandlung muß man die Tatsache obenanstellen, daß die Tuberkulose des Bauchraumes, sei es die Bauchfelltuberkulose, sei es die der Geschlechtswege, immer eine sekundäre ist, und daß die Tuberkuloseerkrankungen die Neigung haben, von den Tuben nach abwärts zu schreiten und sogar über den Uterus in die Cervix bis in die Portio und Vagina vordringen können, wengleich letzteres sehr selten ist. Zwei Formen der Genitaltuberkulose sind es, die besonders unsere therapeutischen Maßnahmen erfordern; die Tuberkulose der Adnexa einerseits und die des Bauchfells andererseits, während die Tuberkulose des Uterus und der abführenden Geschlechtswege seltener beobachtet und daher auch seltener Gegenstand der Therapie werden. Da man damit rechnen muß, daß etwa 10% der uns als Adnexentzündung imponierenden Fälle Tuberkulosen, und andererseits die Schwierigkeiten der Feststellung der Tuberkulose bekannt sind, erhellt daraus, daß eine Zeitlang wenigstens in so manchen Fällen die Therapie zunächst Wege geht, welche nicht auf die Behandlung der Genitaltuberkulose, insbesondere tuberkulöser Adnexen eingestellt ist, sondern auf die Behandlung der Adnexentzündungen, wie wir sie bei den gonorrhoeischen und septischen Adnextumoren geschildert haben. Erst der mangelnde Erfolg, die unverhältnismäßig lange Dauer des Zustandes, eine auffallende Schwächung der Körperkraft überhaupt und Temperatursteigerungen auf lange Sicht hinaus, wie wir sie von den Adnextumoren nicht zu sehen gewohnt sind, diese Umstände sind es häufig erst, welche uns in der Richtung einer Tuberkulose weisen. Große, auffallend schwartige, besonders unbewegliche, jeder konservativen Behandlung trotzende Tumoren machen gar dann, wenn vom Douglas her Knötchen tastbar werden, die Diagnose fast sicher und lassen nun die Frage, was zu geschehen hat, an uns herantreten. Da aber der Diagnose Tuberkulose der Adnexa auf den bloßen Palpationsbefund hin, wenige Fälle ausgenommen, immer etwas Unsicheres anhaftet, wird eine Laparotomie zur Festigung der Diagnose in den meisten Fällen angezeigt sein, um so mehr, als damit eine wichtige und erfolgreiche therapeutische

Handlung, welche gleichzeitig die Entleerung von Aszites und allenfalls von Käsemassen bewirkt, gesetzt wird. Nun steht man vor der Frage, ob nach einem solchen entlastenden und klärenden Eingriff etwa erkrankte Adnexe, vielleicht sogar der Uterus entfernt werden sollen. Diese Frage ist mit WEIBEL dahin zu beantworten, daß, je fester die Adnexe eingewachsen sind, um so mehr von der Entfernung abzuraten ist, und daß die Entfernung des tuberkulösen Uterus einen schweren und gefährlichen Eingriff, Aufwühlung eines vielleicht latenten Zustandes, Keimverschleppung und Steigerung der Peritonitisgefahr bedeutet. Ganz besonders gefährlich ist bekanntermaßen jedwede präparatorische Arbeit am Darm, welche zu den so mit Recht gefürchteten, nicht heilen wollenden, die Frauen vorzeitig erschöpfenden Bauchdecken- und besonders Darmfisteln führt. Demnach ist der therapeutische Weg in Form der Probepelaparotomie, allenfalls verbunden mit der Entfernung wenig verwachsener Tuben für die größte Mehrzahl der Fälle gegeben, die durch Entleerung des Aszites erfahrungsgemäß die souveräne Methode der Behandlung, nämlich die Röntgenbestrahlung, gut vorbereitet. Somit wird man nur dort, wo die Diagnose der Tuberkulose auch ohne Probepelaparotomie verläßlich sichergestellt werden kann (Adnextumoren bei Virgines, sichere Knötchen im Douglas, deutliche Symptome einer begleitenden tuberkulösen Peritonitis, WEIBEL), primär zur Röntgenbestrahlung greifen, gewöhnlich aber erst nach der die Diagnose allenfalls durch Probeexzision sichernden Laparotomie. Die Röntgenbestrahlung ist auch, was von großer Wichtigkeit ist, bei fiebernden Kranken erlaubt, während die Operation im Fieber gefährliche Folgen nach sich ziehen kann.

Ein Wort noch über die Abrasio bei der Uterustuberkulose. Es ist möglich, daß in Fällen oberflächlicher, nur die Functionalıs des Endometriums betreffender Tuberkulose mit der Entfernung der Schicht, welche die Tuberkel trägt, auch die Uterustuberkulose ausheilt. Solche Ereignisse entspringen aber niemals rationellen therapeutischen Absichten, sondern sind zufällig. Eine Tuberkulose des Uterus aber — übrigens nur die Teilerscheinung einer deszendierenden Tuberkulose — durch Kürettament heilen zu wollen, wäre ein gefährliches Beginnen, das gerade ins Gegenteil, nämlich eine besonders rasche Ausbreitung umschlagen könnte, was auch für die Totalexstirpation des Uterus gilt.

Bedenkt man, daß die Operationsmortalität bei einigermaßen aktiverem, aber keineswegs radikalem Vorgehen Höhen erreicht, welche der Wertheimschen Operation gleichkommen, ja sie übertreffen, so weiß man erst den Wert der Röntgenbestrahlung richtig einzuschätzen. Der Aszites schwindet, die Adnextumoren pflegen Rückbildung zu zeigen und die Amenorrhoe, die übrigens bei den Tuberkulösen schon vor der Behandlung mit Röntgenstrahlen so und so oft vorhanden ist, ist kein Nachteil des Verfahrens, um so weniger, als der monatliche Blutverlust nur unerwünscht wäre und bei dem Zustande der Tuben ohnehin die Sterilität fast sicher ist. Im übrigen kann es, wie WEIBEL gezeigt hat, nach Jahren wieder zur Periode kommen, Fälle, die offenbar als Zeichen der Ausheilung der Krankheit nun unter günstigen Bedingungen auch die Ovarial-

funktion wieder erlangen. Angesichts der ausgezeichneten Erfolge der Röntgenbehandlung tritt der beobachtete günstige Einfluß der Quarzlichtbestrahlung in den Hintergrund, die aber immerhin im Einzelfalle gemacht werden kann, und in 4 bis 20 Minuten dauernder Bestrahlung des ganzen Körpers von vorne und hinten im Abstand von 50 cm bis 1 m besteht (GAL). Daß Luft und die natürliche Höhensonne für die Genitaltuberkulose von wohltätigem Einfluß sind, wird man wohl eher auf dem Umwege der Allgemeinkräftigung des Körpers, denn auf dem der direkten Beeinflussung der tiefliegenden Herde verstehen müssen. Da diese Luft- und Sonnenkuren meist in Anstalten gebraucht und somit mit entsprechenden diätetischen und hygienischen Maßnahmen, insbesondere mit regelrechten Mast- und Liegekuren verbunden werden, leisten sie erfahrungsgemäß Gutes.

Hinsichtlich der Behandlung der Portiotuberkulose ist anzuführen, daß man mit dem ultravioletten Licht ausgezeichnete Erfolge erzielt. Die bei der Fluorbehandlung erwähnte Vaginalbestrahlung mit der Quarzlampe kann mit den von WINTZ angegebenen Vaginalspekulis bei der isolierten Bestrahlung der tuberkulösen Portio, die gegen die Ultraviolettstrahlen weniger empfindlich ist, auf 10 bis 15 Minuten ausgedehnt werden. VAN DE VELDE benützt die Kromayersche Lampe. GAL weiß auch über befriedigende Ergebnisse der Radiumbehandlung isolierter Portiotuberkulosen zu berichten, und zwar bei vaginaler Applikation von 60 mg Radium Element für 24 Stunden.

Was nun die Tuberkulose des Peritoneums betrifft, so kommt sie entweder in Gesellschaft mit ausgesprochen tuberkulösen Adnex- und Uteruserkrankungen vor oder aber die Beziehungen zur Genitaltuberkulose bestehen nur darin, daß so wie die Serosa des Bauchfells, so auch die der Tuben und des Douglas von Knötchen besetzt ist. Zwei Formen, die mehr exsudative und die plastische trockene Form, bilden die Haupttypen. Bei der ersteren, die durch reichlicheren Aszites gekennzeichnet ist, ist die Ablassung desselben durch Laparotomie das gegebene Verfahren. Die Punktion, welche die Verhältnisse übrigens nicht klärt und den Aszites schwieriger zu entleeren gestattet, ist erst bei neuerlicher Ansammlung beträchtlicher Mengen von Aszites und Versagen der anderen Entwässerungsverfahren (s. später) am Platze. Leider kommen solche Fälle vor, die trotz Laparotomie und Röntgenbehandlung bald wiederum hochgradigen Aszites liefern. Bei der Operation der trockenen Form ist jedwede präparatorische Arbeit von Übel und nicht einmal der Versuch einer eingehenderen Orientierung durch Lösung der Adhäsionen angezeigt. Diese Form der Tuberkulose ist es, die kein undankbares Feld konservativ-chirurgischer und physikalischer Therapie darstellt. Besonders in den ersten Wochen der Erkrankung läßt eine Liegekur, verbunden mit den zu erörternden physikalischen und medikamentösen Maßnahmen nicht selten den Grad und den Charakter der Krankheit erkennen, der entweder zum Fortschreiten oder zur Ausheilung neigt. Die ermutigenden Erfolge der Chirurgen, die durch die einfache Inzision in 70% Heilung erzielten, lassen diesen kombinierten Weg als sehr aus-

sichtsreich erscheinen. Das gesamte Rüstzeug der Lungenheilstätten, verbunden mit dem Ultraviolettlicht der künstlichen Höhensonne, schafft hier Gutes. Nach LAQUEUR kann in fieberfreien Fällen täglich, solange Fieber besteht, jeden zweiten Tag bestrahlt werden, und zwar die Vorderseite des Körpers mit 90 cm Distanz und 2 Minuten Dauer im Beginne, bis 70 und 60 cm Distanz und 20 bis 30 Minuten Dauer im weiterem Verlauf. Allerdings reagieren nach der Feststellung WEIBELS und LAQUEURS die tuberkulösen Adnexe selbst auf das Quarzlicht nicht. Wenn in Höhenkurorten und an der See trotzdem sichtliche Besserungen beobachtet werden, so beruhen sie eben auf der Wirkung der klimatischen Faktoren, ganz besonders der natürlichen Sonnenbestrahlung. Wichtig ist ferner, daß nach Operationen, und seien es auch nur Probeparotomien bei Bauchfelltuberkulose, fistelnde Wunden durch das natürliche und künstliche Ultraviolettlicht sehr günstig beeinflusst werden. Gegenüber der einfachen Laparotomie treten die medikamentösen Maßnahmen in den Hintergrund. Sie können aber, solange die Ausführung der Operation noch nicht tunlich ist, sowie bei Wiederkehr des Aszites in Form des *Jod, Eisen, Arsen* und *Gold* gebraucht werden. Einreibungen von *grauer Quecksilbersalbe* (2 bis 4 g täglich bis zum beginnenden Speichelfluß), gelten als gute Resorbentien. Diuretika wie *Harnstoff*

127. Urae purae . . . . . 10,0  
 Aqu. naphae  
 Cognac . . . . . aa 75,0  
 D. S. 2stündlich 1 Eßlöffel

und *Aqu. petroselina* (2stündlich 1 Eßlöffel) mit und ohne *Liquor Kalii acet.* (Rp. 133, S. 204) und *Theobromin* (3 g pro Tag) können den Aszites, ebenso wie *Novurit*- und *Salyrganinjektionen* bessern. Eine *Schmierseifenkur* aber scheint von den medikamentösen Maßnahmen das beste zu leisten. 1 Eßlöffel *Sapo calinus* wird mit lauem Wasser zu einem dicken Brei verrührt und jeden Abend die Bauchhaut eingeschmiert. Nach  $\frac{1}{2}$  Stunde wird der Bauch abgewaschen. Ist die Haut des Bauches empfindlich geworden, dann wird der Rücken solange eingerieben, bis die Bauchhaut die Prozedur von neuem verträgt. Interne *Lebertrantherapie* wirkt unterstützend.

Was die seltenen Fälle von Tuberkulose der Vulva (*Tuberculosis cutis et mucosae miliaris*, das *Ulcus vulvae chronicum tuberkulosum* und andere Formen) anlangt, so kann hier eine chirurgische Therapie, am besten mit nachfolgender Paquelinisierung der Wundränder in Frage kommen. Nach den Erfahrungen der Dermatologen aber scheint Röntgen- und Finsenbestrahlung und die Quarzlampe mehr zu leisten. Dabei darf über den örtlichen Heilverfahren die Sorge für die Hebung der Gesamtkräfte des Körpers nicht vernachlässigt werden.

Alles in allem können wir die Vorhersage der Genitaltuberkulose dank der Anwendung von Probeparotomie und Röntgenlicht ganz tröstlich stellen, kommt es nicht — was glücklicherweise sehr selten ist — zu einer miliaren Aussaat oder zu einer Mischinfektion.

## Behandlung der Sterilität.

Die Belebung der Sterilitätsforschung durch neue Untersuchungsmethoden und die Fortschritte in der Therapie haben das Problem der Sterilität wieder in den Vordergrund gerückt. Nicht zuletzt hat es aber auch deswegen an Bedeutung gewonnen, weil die letzten Jahrzehnte zweifelsohne eine Vermehrung der altbekannten Sterilitätsursachen noch um jene gebracht haben, welche in der weitgehenden Verwendung schwangerschaftsverhütender Maßnahmen, in der Zunahme der Geschlechtskrankheiten und in der soweit verbreiteten Abtreibung mit ihren bösen Folgen für die Fruchtbarkeit des Weibes gelegen sind. Der Begriff der Sterilität wird verschieden gefaßt. Während einzelne Schriftsteller von sterilen Ehen sprechen, in denen in einer zweijährigen Beobachtungszeit Befruchtung nicht eintritt (CHROBAK, ROSTHORN), fordern andere 3 und sogar 5 Jahre. Immerhin können mit KISCH Frauen, bei denen der Eintritt der ersten Empfängnis sich über 16 Monate nach der Hochzeit hinzieht, schon mit gewisser Wahrscheinlichkeit als steril betrachtet werden. Mit ENGELMANN muß man sagen, daß es zunächst Geschmacksache ist, bei welchem Grad der Wahrscheinlichkeit, daß noch Schwangerschaft erfolgt, man von Sterilität reden will, und vom praktischen Standpunkt aus ist es gewiß gut, den Zeitpunkt nicht zu weit hinaus zu verlegen. Ruft man sich ins Gedächtnis, daß die Wahrscheinlichkeit der Befruchtung nach 2 Jahren steriler Ehe nur 12 und nach 3 Jahren nur mehr 6% beträgt, so kann man praktisch von Sterilität sprechen, wenn die Aussichten der Befruchtung nur mehr rund 10% betragen, wie dies CHROBAK und ROSTHORN getan haben. Daß der Erfolg der Behandlung solcher Fälle in wissenschaftlicher Hinsicht bei kurzdauernder Sterilität keineswegs jedem Einwand Stich hält, sei ohne weiteres mit ENGELMANN zugegeben, gehört aber auf ein anderes Blatt.

Bekanntlich spricht man von primärer und sekundärer Sterilität. Jene nimmt man dann an, wenn trotz regelrechten Geschlechtsverkehrs durch den genannten Zeitraum hindurch jede Befruchtung ausbleibt. Von sekundärer Sterilität aber, welche immer erworben ist, sprechen wir dann, wenn nach einer Geburt oder Fehlgeburt jedwede weitere Schwangerschaft ausbleibt.

### Sterilitätsursachen.

Es ist immer schwierig gewesen, Klagen wegen Sterilität in ihrer richtigen Ursache zu deuten. Ursprünglich war meist die Frau die Leidtragende allein, der man die „Schuld“ (ein besonders unglücklich gewählter, aber nicht auszurottender Ausdruck) an der Kinderlosigkeit in die Schuhe geschoben hat, ohne sich um den Gatten überhaupt zu kümmern. Damit ist es jetzt besser geworden, weil wir wissen, daß so und so oft im Manne die Ursache gelegen sein kann. Er kann bekanntlich infolge einer beiderseitigen Trippererkrankung des Nebenhodens unwegsame Ausführgänge für seine Samenfäden haben und damit nicht imstande sein, einen befruchtenden Beischlaf zu vollziehen. Ungleich öfter aber ist er an der

Einkindsterilität insofern schuldtragend, als er meist von einem alten Tripper her sein Eheweib gonorrhöisch infiziert hat, welche Krankheit dann im Wochenbett nach der ersten Geburt zur inneren Gonorrhöe und durch Tubenverschluß zur Ursache der dauernden Sterilität wird. Man muß sich daher, und das ist eine Grundregel, von der man nicht abweichen soll, — auch wenn der Mann im Brustton der Überzeugung den Verdacht, daß er der „schuldtragende“ Teil sein könnte, weit von sich weist — beide Ehegatten anschauen, um ein Urteil fällen zu können. Mit der bloßen Besprechung mit dem Manne und seiner äußerlichen Untersuchung ist es dabei nicht getan, denn Fälle ausgesprochener Hypospadie des männlichen Gliedes, die so tief hodenwärts sitzt, daß das Glied gekrümmt ist und der Same vor der Vulva abfließen muß, sind Seltenheiten, die praktisch kaum je in Frage kommen. Ebenso gehören Fälle mehr minder vollständiger Impotentia coeundi von Seiten des Mannes zwar nicht zu Seltenheiten, wohl aber ist in solchen Fällen von Seite der Frau nur ausnahmsweise das Bedürfnis vorhanden, von diesem schwachen Gatten schwanger zu werden. Dagegen verdienen volle Berücksichtigung die Fälle fraglicher Azoospermie des Mannes. Darum muß unbedingt eine Spermauntersuchung vorgenommen werden. Je frischer die Samenflüssigkeit aus dem Condom zur Untersuchung kommt, desto klarer die Befunde, insbesondere auch die Möglichkeit, bewegliche Spermatozoen ohne Zusatz irgendwelcher Flüssigkeiten im Mikroskope bei starker Vergrößerung feststellen zu können. Man hüte sich vor der Diagnose Nekrospermie und Kümmerformen der Spermatozoen, wenn man älteren, vor vielen Stunden gewonnenen Samen untersucht. Findet man überhaupt Spermatozoen, muß man die Möglichkeit der Befruchtung zugeben und nur bei vollständigem Fehlen derselben das harte gegenteilige Urteil aussprechen. Aber auch das soll man nach SELLEHEIM nur dann tun, wenn man es mit einem sonst gesunden Manne zu tun hat und nicht dann, wenn vielleicht unmittelbar vorher schwere körperliche Krankheiten oder erschütternde seelische Konflikte vorangegangen sind, weil angesichts solcher die Samenbildung für einige Zeit aufhören kann, wie wir von STEVE u. a. wissen.

Bei einwandfreien Spermaverhältnissen des Mannes muß man die Ursachen der Sterilität im Weibe ergründen, was bei der Mannigfaltigkeit derselben recht schwierig sein kann. Mit Recht hebt HOFSTÄTTER hervor, daß es sich sehr häufig nicht um eine einzige, leicht zu überblickende Ursache der Sterilität handelt, sondern daß sich die Unfruchtbarkeit aus verschiedenen wichtigen Teilursachen zusammensetzen kann. Nur durch eine möglichst genaue Anamnese und Untersuchung der Frau läßt sich in die schwierigen Verhältnisse ein genügender, auch therapeutisch auszuwertender Einblick gewinnen. Was nun die durch die gynäkologische Untersuchung für die Ursachen der Sterilität allenfalls verantwortlichen Befunde anlangt, so seien sie gemäß dem Gange der gynäkologischen Untersuchung vom äußeren Genitale nach innen fortschreitend aufgezählt und gewertet. Beginnen wir mit dem äußeren Genitale:

Nicht häufig sind es Veränderungen am Hymen, welche als Ursache

der Sterilität anzuschuldigen sind, es sei denn, daß es sich um die so leicht behebbare Atresia hymenalis handelt. Etwas anderes ist es schon mit jenen nicht oder kaum dehnsamen Hymen, bei denen auch bei gesunder Potenz des Mannes die Immisio penis schwierig oder gar unmöglich wird, wie dies auch bei höheren Graden von Vaginismus naturgemäß der Fall ist. Im übrigen ist das Verhalten der äußeren Scham schon oft ein Hinweis auf eine bestehende Hypoplasie mit ihrem niedrigen muldenförmigen Damm, welcher nicht allein für sich vorzukommen pflegt, sondern mit weiteren abwegigen Zuständen verbunden ist, welche ursächlich für die Sterilität sehr wichtig sind. Da ist es die kurze, enge, entsprechender Gewölbe ermangelnder Scheide, aus der der Samen infolge Fehlens dieses Receptaculum seminis nach dem Verkehr abfließt. Übrigens kann auch bei durchaus vollkommen entwickeltem Genitale dieser Samenabfluß die Ursache sekundärer Sterilität nach vorangegangener Geburt sein, wenn breite, weit aufklaffende Dammrisse bestehen, die mangelhaft versorgt wurden. In derartigen Fällen ist auch als Ursache der Sterilität so und so oft nicht bloß der Samenabfluß anzuschuldigen, sondern ein durch das Klaffen der Vulva bedingter und ständig unterhaltener eitriger Ausfluß, der dem Chemismus der Spermatozoen abträglich ist.

Wichtig, aber in der älteren Zeit über Gebühr, sozusagen als der Angelpunkt der Sterilitätslehre und Behandlung angesehen gewesen, ist das abwegige Verhalten des Scheidenteiles der Gebärmutter. Beim Infantilismus ist er entweder auffallend lang und ins Mißverhältnis zur Korpuslänge gesetzt, dabei konisch zugespitzt und dünn ausgezogen; er trägt eine nur sehr kleine und sehr enge Muttermundöffnung an seiner Spitze ohne Ausbildung deutlicher Muttermundlippen oder aber er ist ein ganz flacher Knopf. Zur Zeit, als man über die Undurchgängigkeit der Tuben als dem wichtigsten Hindernis der Empfängnis weder zahlengemäß die richtige Vorstellung hatte, noch in der Lage war, das Verhalten der Tuben zu prüfen, spielte die sogenannte Stenose des äußeren Muttermundes und die angeborene Enge des Halskanals in der Behandlung der Sterilität eine geradezu führende Rolle, auf die weiter unten zurückzukommen sein wird. Soviel ist freilich gewiß, daß keine Muttermundöffnung und kein Halskanal so eng sein können, daß die Samenfäden nicht passieren könnten. Hingegen ist es durchaus verständlich, daß zwar nicht die enge Muttermundöffnung, wohl aber ein sie hermetisch abschließender zäher Schleimpfropf in der Tat dem Eintritt der Spermatozoen unüberwindliche Hindernisse in den Weg stellen kann (KERMAUNER).

Durchaus nicht belanglos ist nicht nur die Form der Portio und des Muttermundes, sondern auch die Stellung desselben im Becken und damit die Aufnahmefähigkeit des Muttermundes für den Samen. Befindet sich der Uterus in Retroflexionsstellung, so taucht die Portio vaginalis nicht in den Samensee ein, womit allein schon die Möglichkeit der Befruchtung herabgemindert ist, und das um so mehr, wenn überdies noch flache, den Samenabfluß begünstigende Scheidengewölbe vorhanden sind. Das ist bei der Hypoplasie oft der Fall. Auch die folliculäre Hyperplasie der Portio und alte schlecht geheilte Cervixrisse, wie sie meist nach

operativen Geburten gefunden werden, können Ursache der sekundären Sterilität sein. Dabei spielt der diese Zustände begleitende Cervixkatarrh, wie überhaupt die Entzündung der Cervix, besonders die gonorrhoeische, eine wichtige Rolle.

Wenn wir das Corpus uteri als Ursache der Sterilität betrachten, so müssen wir sagen, daß die häufigste Ursache wieder die Hypoplasie ist, mit ihrer schon erwähnten ungünstigen Kleinheit des Korpus, dem Überwiegen der starren Faser, dem mangelhaft entwickelten Muskelgewebe und der oft spitzwinkeligen Anteflexion des Korpus.

Die echt entzündlichen Erkrankungen des Endometriums, wie sie durch den unverantwortlich langen Gebrauch von Intrauterinpressaren, durch Pinselungen des Cavum uteri und durch wiederholtes Kürettament mit und ohne Ausbreitung der Entzündung auf die Eileiter entstehen, spielen in der Jetztzeit eine größere Rolle in der Sterilität als zugegeben wird.

Anders ist es schon in Fällen von Metropathie, wo es trotz Tubendurchgängigkeit und normaler Beschaffenheit des Muttermundes und Halskanals aus unerfindlichen Gründen so und so oft nach meist vorangegangenen Geburten und Aborten nicht mehr zur Befruchtung kommt. Gelegentlich sieht man auch heute noch Verödung des Corpus uteri infolge zu energischer Ausschabung und Verätzung als Ursache unheilbarer Sterilität.

Ein recht heikles Problem stellt die Bedeutung der Myome für eine bestehende Sterilität dar. In Fällen submuköser Myome, gar solcher, die während der Periode bei klaffendem Halskanal die Diagnose ermöglichen, aber auch in solchen, wo sie aus dem Untersuchungsbefund und dem Blutungstypus mit Recht vermutet werden können, ist die Ursache der Sterilität entweder in mechanischen Hindernissen oder in Entzündungen bedingt, was auch für Tubenwinkelmyome gelten darf. Ob die Unfruchtbarkeit auch in Störungen im Geschlechtsleben zu suchen ist, wie KEHRER dartut, ist sehr schwer zu entscheiden. Bekannt ist weiter, daß subseröse Myome, wenn sie Kindskopfgröße erreichen, aus nicht leicht erklärlichen Gründen (vielleicht auf dem Boden der Hypoplasie) meist mit Sterilität verbunden sind.

Während wir in der früheren Zeit hinsichtlich des häufigsten und darum bedeutungsvollsten Hindernisses der Befruchtung, nämlich der Unwegsamkeit der Eileiter im Dunkeln tappten, wenn auch nicht so völlig im Dunkeln, wie es jetzt dargestellt wird, so hat doch das Verfahren der Tubendurchblasung von RUBIN einen ganz ausgezeichneten Fortschritt gebracht, den wir heute in der Behandlung der Sterilität nicht mehr missen möchten. Die Vereinfachung der Methode auf jene Art, wie sie im wesentlichen auf SELLHEIM zurückzuführen ist, erlaubt ohne großen Apparat und ohne besondere Aufmachung die Verhältnisse der Wegsamkeit der Tuben zu klären.

Dieses Verfahren hat erst die überragende Bedeutung der entzündlichen Veränderungen der Eileiter als Sterilitätsursache ins wahre Licht

gerückt. Durch sie konnte besonders von v. GRAFF gezeigt werden, daß in mehr als der Hälfte aller darauf untersuchten Fälle Unwegsamkeit der Eileiter besteht, die, rechnet man jene hinzu, in denen schon durch die Untersuchung allein grobe Veränderungen an den Adnexen feststellbar sind, die erschreckend hohe Zahl von 70% als Ursache der Sterilität erreicht. Dabei hat sich durch v. GRAFFS Untersuchungen erwiesen, daß nicht allein die gonorrhöische Salpingitis von weitesttragender Bedeutung für den Tubenverschluß ist, sondern daß auch die Schwangerschaftsunterbrechung, der künstliche Abort, und zwar ein einziger künstlicher Abort, in fast der Hälfte aller untersuchten Fälle die Empfängnisfähigkeit für immer vernichten kann! Die Tubendurchblasung, welche nach ihrem Aufkommen zweifelsohne einmal durch unrichtige Anzeigestellung, dann aber auch durch mangelhafte Technik nicht zuletzt unerfahrener Ärzte bei so mancher Frau schwere Nachteile bewirkt, ja sogar in einzelnen Fällen einen tödlichen Ausgang heraufbeschworen hat, ist in der Hand des erfahrenen Facharztes bei strenger Anzeigestellung und Beachtung aller Möglichkeiten etwaiger Gefahren ungefährlich. In die Hand des praktischen Arztes gehört sie aber keinesfalls. Indem sie Fälle von Tubenverschluß aufzudecken gestattet, die auch bei genauester Untersuchung der tastenden Hand entgehen, leistet sie weit mehr als die gewöhnliche Untersuchung und muß daher angewendet werden, bevor man zu irgendwelchen operativen Maßnahmen am äußeren Muttermund, Halskanal oder der Gebärmutter greift, die bei Tubenundurchgängigkeit vollkommen zwecklos sind. Bei einem Verfahren, welches niemals zu Heilzwecken im Sinne der Beseitigung eines das Leben irgendwie beeinträchtigenden Zustandes ausgeübt wird, ist es ein selbstverständliches Gebot, daß der Eingriff der Patientin keinesfalls schade. Fehler, die in dieser Hinsicht begangen werden, sind folgende:

Eine allenfalls gefährliche Unterlassung ist es, das Cervixsekret nicht zu untersuchen, gar in gonorrhöisch verdächtigen Fällen, in welchen die Tubendurchblasung zu unterbleiben hat, weshalb man sich in solchen Fällen erst bei wiederholter Untersuchung und nach Provokation bei sicher negativem Gonokokkenbefund dazu entschließen darf. Der günstige Zeitpunkt zur Durchblasung ist das Intermenstrum, nicht die Zeit vor der zu erwartenden Periode. Daß während der Menstruation und im Wochenbett die Durchblasung zu unterbleiben hat, bedarf keiner Begründung, ebenso bei der Möglichkeit einer bestehenden Schwangerschaft. Nicht genug verdient hervorgehoben zu werden, daß jede Schmerzhaftigkeit an den Adnexen als subakute entzündliche Veränderung derselben zu deuten ist und infolgedessen unbedingt die Durchblasung verbietet. Ein weiteres Gebot der Vorsicht ist es, in jedem Falle von beabsichtigter Durchblasung die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen zu prüfen und nur bei entsprechend langdauernder Senkung dieselbe auszuführen, um auch Fälle, die bei der gynäkologischen Untersuchung keine Schmerzäußerung hervorrufen, vor Gefährdung zu bewahren. Blutungen, Verdacht auf eine Eileiterschwangerschaft und die Möglichkeit einer Genitaltuberkulose sind ebenfalls Gegenanzeigen

gegen die Durchblasung (GRAFF). Auch besonders empfindliche Frauen eignen sich für das Verfahren wenig. Eine richtig ausgeführte Tubendurchblasung genügt bei richtiger Beobachtung des Manometerdruckes und gleichzeitiger Auskultation, besonders unter Berücksichtigung des so bezeichnenden Schulterschmerzes, in der Regel zur Feststellung der Durchgängigkeit oder Unwegsamkeit der Tuben.

Die Technik derselben, wie sie sich uns nach SELLHEIM bewährt hat, ist die folgende:

Steinschnittlage der Frau. Äußere Waschung der Scham, Kürzung der Schamhaare wie vor geburtshilflichen Operationen, Spülung der Scheide mit warmer Hypermanganlösung, Trocknung derselben, Einsetzen eines kurzen hinteren Blattes mit Gewicht, Einstellung der Portio, quere Anhakung der vorderen Muttermundlippe, welche mit dem Katheter so verkuppelt wird, daß ein Assistent gespärt wird. Als Luftquelle wird eine gut schließende Blasenspritze benützt, die einerseits mit einem auf einem Tischchen stehenden Manometer, andererseits mit dem Katheter verbunden ist, welcher Katheter, wie bekannt, eine entsprechende Abdichtung am Muttermund durch einen Gummipfropfen hat. Das Abhören der Geräusche geschieht entweder durch ein Phonendoskop, womit wieder eine Person erspart ist oder aber durch Aufsetzen von Hörrohren durch assistierende Personen. Nicht genug zu unterstreichen ist der Rat SELLHEIMS, alle brusken Maßnahmen wie vorhergehende Sondierung, Dilatation und rasches Ansteigenlassen des Druckes zu vermeiden, der bei vollständiger Durchgängigkeit der Tuben nicht mehr als 50 bis 100 mm erreicht. Abgesehen davon, daß nach diesem Autor bei rascher und exzessiver Steigerung des Luftdruckes, der niemals 200 mm Hg übersteigen darf, ein relativer Eileiterverschluß vorgetäuscht werden kann, ist das bruske Vorgehen zweifelsohne mit größeren Gefahren (Tubenerreißung, Emphysembildung, Embolie) behaftet, als das einschleichende Verfahren mit ganz allmählich ansteigendem Drucke. Darüber kann kein Zweifel herrschen, daß das Durchblasen hinsichtlich der Feststellung der Durchgängigkeit oder Undurchgängigkeit der Tuben dasselbe leistet, wie die Einbringung eines Kontrastmittels in die Gebärmutter und die Eileiter unter dem Röntgenschirm. Dieses Verfahren der Röntgenographie hat gegenüber der Durchblasung den Vorteil, uns den Sitz des Hindernisses aufzuzeigen und damit bereits eine etwa geplante Operation in eine bestimmte Richtung zu lenken. (Öffnung der Tube am abdominalen Ende oder Wiedereinpflanzung der Tube in den Uterus bei Undurchgängigkeit in der Pars isthmica.) Wie mehrfache Berichte des Schrifttums dartun, ist übrigens nach der Tubendurchblasung bei durch einschleichendem Verfahren schließlich erzielter Tubendurchgängigkeit bald darauf Befruchtung eingetreten, ein Beweis also, daß der Tubendurchblasung nicht bloß ein diagnostischer, sondern auch therapeutischer Wert innewohnt. Trotzdem muß man mit v. GRAFF eine wiederholte Durchblasung zur Öffnung der verschlossenen Eileiter im Sinne einer Behandlung ablehnen, weil die Möglichkeit einer Schädigung bei wiederholter Durchblasung nicht von der Hand gewiesen werden

kann. Unter entsprechenden Vorsichtsmaßregeln muß also die Tubendurchblasung als ein heute nicht mehr zu missendes Verfahren, ja, bei der Häufigkeit des Tubenverschlusses, als das wichtigste diagnostische Verfahren in der Sterilitätslehre angesehen werden, welches die Frauen bei entsprechender Kritik vor unnötigen, bei unwegsamem Eileitern zwecklosen Sterilitätsoperationen, wie Muttermunddiszission, Sondierungen, Retroflexionsoperationen bewahrt. Schließlich ist es nur im Interesse der Patientin und des Arztes gelegen, wenn die Tubendurchblasung nicht ambulant durchgeführt, sondern gleich einer Operation gewertet, mit einer mindestens 36stündigen Bettruhe verbunden wird.

Wenn auch die Unwegsamkeit der Tuben das häufigste und daher praktisch wichtigste Hindernis der Befruchtungsfähigkeit ist, so bleiben noch Fälle vollständig negativen Befundes übrig, die die größten Schwierigkeiten der Erkennung und der Behandlung machen. Da ist es zunächst die ovarielle Sterilität, die nicht oder kaum je im Ovarium selbst, sondern in angeborenen Zuständen, Krankheiten und Schädigungen des Gesamtorganismus ihren Ursprung hat, die wieder die Funktion der Keimdrüse vernichten oder schwer stören. Hierher gehören die Fälle von Sterilität auf dem Boden der angeborenen Hypoplasie, die Sterilität infolge Unterentwicklung des Genitales nach schweren Infektionskrankheiten der Kinderjahre, die Schäden, wie sie chronische Infektionen wie Lues, Malaria, Tuberkulose hervorbringen, die Krankheiten endokriner Drüsen (Basedow, Myxödem, Akromegalie, Fettsucht, Addison), Stoffwechselerkrankheiten, Atherosklerose, chronischer Mißbrauch von Rauschgiften, wie Kokain, Morphin, Äther.

Außer diesen Sterilitätsursachen muß auch noch der Frigidität und Dyspareunie als Hindernis der Befruchtung gedacht werden. Die Dyspareunie, das Fehlen jeglicher Wollustempfindungen beim Geschlechtsverkehr, kann sehr wohl im kranken Genitale begründet sein, weil namentlich bei entzündlichen Prozessen der Geschlechtsverkehr schmerzhaft ist. Während also hier die Dyspareunie und der Schmerz begreifliche Begleiterscheinungen sind, die mit der Gesundung des Genitales auch wieder schwinden, ist bei normalen Genitalien die Dyspareunie ein Umstand, der erfahrungsgemäß die Befruchtungsaussichten herabmindert, wenn sie auch dieselben keineswegs unmöglich macht, wie wir alle wissen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß der Orgasmus zum Aufsteigen der Spermatozoen durch Druck- und Saugbewegungen des Uterus vielleicht doch wesentlich beiträgt, wenngleich er für die Befruchtung keineswegs unbedingt notwendig ist.

Neben den psychischen Ursachen der Sterilität mag es auch Abnormitäten der weiblichen Geschlechtszellen geben, die — uns freilich unfaßbar — Sterilität hervorrufen. Besser sind wir über solche Abnormitäten der männlichen Geschlechtszellen unterrichtet, welche nicht nur im Tierreiche (WILLIAMS und SAVAGE), sondern auch für den Menschen von MOENCH beschrieben worden sind und sehr wohl die Ursache für so manche dunkle Fälle von Sterilität abgeben können.

### Ihre Behandlung.

Was nun die Therapie der Sterilität anlangt, so seien auch die Grundzüge der Behandlung in der Reihenfolge der angeführten Sterilitätsursachen erörtert.

Die Eröffnung einer *Atresia hymenalis* als Sterilitätsursache ist ein einfacher Eingriff, der auch dem praktischen Arzt unter den S. 21 angegebenen Vorsichtsmaßregeln zugänglich ist. Die Behandlung eines abnormen Hymens ist im Abschnitt des Vaginismus ausführlich erörtert, ebenso die schwierige Behandlung dieser Abwegigkeit (S. 135).

Alte Dammrise, die den Abfluß des Samens verursachen, müssen bei Durchgängigkeit der Eileiter durch Wiederherstellung einer gut schließenden Scheide beseitigt werden. Der mit den Dammrissen so häufig vergesellschaftete Fluor ist dann durch die bei der Fluortherapie geschilderten Maßnahmen leicht behebbar. Vorteilhaft kann mit und ohne Bestehen eines Fluors die Anwendung alkalischer Scheidenspülungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen für die Spermatozoen sein. STOECKEL rät zu Spülungen mit 2%igem *Natrium bicarbonicum ante coitum*.

Auch die Stellung der Ehepartner beim Geschlechtsverkehr, namentlich aber die Lagerung der Frau nach dem Vollzug desselben, kann bei infantilem Genitale mit flachen Scheidengewölben, aber auch bei klaffender Scham infolge von Dammrissen, bedeutungsvoll werden, weil sie entweder das Abfließen des Samens in seiner Gänze verhindern oder dasselbe begünstigen kann. Einnehmen der Knieellenbogenlage unmittelbar nach erfolgter Insemination oder in Rückenlage Tieferlegen des Oberkörpers und Zusammenkneifen der Beckenbodenmuskulatur, Vorlegen einer Watte vor den Introitus und der Versuch, nach vollzogenem Beischlaf doch noch den Orgasmus zu erzielen, sind gelegentlich erfolgreiche Maßnahmen, lassen aber auch oft im Stich. Während in früherer Zeit das vollständige Fehlen der Scheide zwangsläufig mit Sterilität verbunden war, muß dies heute nicht mehr der Fall sein, weil der Mangel der Scheide oder der Verlust derselben durch Krankheit oder Trauma durch künstliche Scheidenbildung wettgemacht und sogar zur Geburt durch diese künstliche Scheide führen kann, wie der berühmte Fall G. A. WAGNERS beweist.

Was die Behandlung der Muttermunds- und Zervixstenose anlangt, so kann sie in Auswischen und Lösen des Schleimpfropfes mit 10%iger Sodalösung bestehen, ein Vorgehen, das wiederholt zur Befruchtung geführt hat. Dasselbe gilt von der einfachen Sondierung mit Hegarstiften, von der Sondierung mit Dilatation, Eingriffe, die nur dann berechtigt sind, wenn die Durchgängigkeit der Tuben gesichert ist. Um den Muttermund dauernd weit zu halten, bedient man sich am einfachsten der Diszission der hinteren Muttermundslippe nach CHROBAK, oder der bilateralen seitlichen Diszission, wie sie bei der Dysmenorrhoe S. 44 erwähnt ist, vor. NÜRNBERGER lobt zur dauernden Erweiterung des inneren Muttermundes und des Zervikalkanals das Metronom.

Was die unblutigen Dilatationsverfahren anlangt, so muß bei allen mit derselben Genauigkeit und Vorsicht, wie sie eine große Operation hinsichtlich der Asepsis erfordert, vorgegangen werden. Das gilt von der einfachen Sondierung ebenso wie von der Sondierung mit Hegarstiften, die nicht gewaltsam übertrieben werden darf. Ganz besonders aber gilt die größte Vorsicht bei der Anwendung der Laminaria, welche schließlich doch zur Sekretstauung Anlaß geben können. Sie sind daher gerade bei der Behandlung der Sterilität weniger empfehlenswert als die wohl das gleiche leistenden Metaldilatatoren (NÜRNBERGER).

Es ist richtig, daß durch Röhrchen, welche in den Zervikalkanal eingelegt werden und liegen bleiben, der Halskanal eher wegsam gemacht und damit die Befruchtung leichter vermittelt werden kann, als durch einmalige Erweiterung. FEHLINGS Röhrchen einerseits, andererseits das von NASSAUER konstruierte Fruktulett haben zweifelsohne so mancher Frau zu einem Kinde verholfen, und es ist von H. R. SCHMIDT aus der v. FRANQUESchen Klinik über 35,5% Erfolge hinsichtlich der Gravidität bei 32 Frauen durch das FEHLINGSche Verfahren berichtet worden. Auch NASSAUER hat mit seinem Instrument bei 120 Fällen 11 Erfolge aufzuweisen. Trotzdem muß man sagen, daß die Infektionsmöglichkeit, die diesem Verfahren anhaftet, nicht unterschätzt werden darf, wie ja einschlägige Literaturberichte dartun. FEHLING verbindet die Einführung seines Röhrchens mit einer Spülkur. Wenn das durchlöchernte Glasrohr ohne Anstand vertragen wird, bleibt es 3 Tage liegen. Nach seiner Herausnahme wird die Uterushöhle mit 1%iger Formalinlösung gespült, um durch eine mechanische Durchgerbung der Schleimhäute eine Herabminderung der Sekrete zu erzeugen. Das Verfahren wird 2- bis 3mal wiederholt.

Besteht das Konzeptionshindernis offenbar in einer Retroflexio uteri bei sonst völlig normalem Genitalbefund, so ist, wieder unter der Voraussetzung der Wegsamkeit der Tuben, ohne Zweifel eine den Uterus in Normalstellung bringende und erhaltende Operation nicht überflüssig. Dabei ist jene Art der Suspension, welche gleichzeitig einen Überblick über die anatomischen Verhältnisse der Bauchhöhle gestattet und allenfalls auch in derselben etwa als notwendig sich ergebende Eingriffe zu machen erlaubt, allen anderen Methoden vorzuziehen. In dieser Hinsicht hat sich uns die Methode von DOLERIS, die aus einem kleinen, im Bereiche der Schamhaare gelegenen Querschnitt gemacht wird, und kosmetisch und funktionell gleich ausgezeichnetes leistet, bewährt.

Was die spitzwinkelige Anteflexion des Corpus anlangt, so ist diese Stellung durch die genannten Dilatationsverfahren hinsichtlich der mechanischen Stenose der Cervix verbesserungsfähig und besonders durch die Suspension des Uterus noch weiter ausgleichbar, die abnorme Kleinheit des Corpus und die Beschaffenheit ihrer Wand ist aber nur durch jene allgemeinen Maßnahmen in gewissem, leider nur geringen Grade zu beeinflussen, welche im Kapitel der Amenorrhoe auf dem Boden des Infantilismus ausführlich geschildert worden sind. Hier sei nur noch

einmal neben dem Hinweis auf die Bäderkuren, der Abrasio als wichtigem Ovarialreiz bei hypoplastischen und hypomenorrhöischen Frauen gedacht. Von ihr sieht man nicht selten auf einen der Abrasio alsbald folgenden Geschlechtsverkehr Befruchtung. Im übrigen begrüßen wird bei infantilem Genitale die erste Schwangerschaft, wenn sie auch so und so oft mit Abortus endet, auf jeden Fall freudig, ist doch der Abortus in solchen Fällen, der meist nicht aufzuhalten ist, eines der besten Heilmittel der Natur, indem die Schwangerschaftsauflockerung und -vergrößerung der Gebärmutter das Organ nun in seine richtige Größe hineinwachsen läßt, womit es ungleich besser für eine spätere Schwangerschaft befähigt ist. Daher sind wir gerade in solchen Fällen berechtigt, der Frau alle Hoffnung auf eine spätere Schwangerschaft zu machen.

Nicht einfach ist die Stellungnahme zur Behandlung bei Myomen als Ursachen der Sterilität. Sind die Frauen jünger, haben sie insbesondere das 35. Lebensjahr nicht überschritten, sind nur wenige, am besten nur ein einziger Myomknoten da, sind sie nicht zu groß und liegen andere Ursachen für die Sterilität nicht vor, so ist es durchaus angezeigt, bei dringendem Wunsch nach Kindern die Operation in Vorschlag zu bringen, aber mit dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß man vielleicht auf Grund eines ungünstigen Befundes nach geöffneter Bauchhöhle bei sicherer Unmöglichkeit einer Konzeption im Interesse der Frau den Uterus wird absetzen dürfen. Andererseits darf man nicht vergessen, daß bei einem Viertel aller richtig ausgewählten Fälle steriler Myomträgerinnen nach der Operation Schwangerschaft eintritt, und Geburt und Wochenbett durch Komplikationen nur ausnahmsweise belastet sind. Ist aber die Frau einmal gegen 40 Jahre alt oder gar älter, also in einem Lebensabschnitt, in welchem natürlicherweise die Kurve der Fruchtbarkeit bereits deutlich absinkt, ist der Rat zu einer solchen konservativen Myomoperation um so weniger berechtigt, als einerseits die Hoffnung auf Befruchtung gering, andererseits die Möglichkeit des Rezidivs der Myome in bedenkliche Nähe gerückt ist.

Was die Behandlung der Sterilität infolge Entzündung der Adnexe auf dem Boden der Gonorrhoe, aber auch auf dem durch septische Keime anlangt, so ist die Hauptaufgabe des Arztes die Verhütung der Sterilität durch gründlichste, womöglich spezifische Behandlung (Vakzine-therapie) und Erschöpfung aller physikalischen Heilmethoden. In dieser Hinsicht gilt auch heute noch der Gebrauch der Bäder, insbesondere der Moorbäder als eine der wichtigsten Stützen unserer Therapie. Wenn wir auch nicht glauben, daß feste, bindegewebige Verschlüsse der Eileiter durch eine derartige Therapie zur Lösung kommen, so können wir aber wohl die Beseitigung leichter Verklebungen von ihr erwarten. Hat aber, nachdem die Entzündung längst abgeklungen ist, die Tubendurchblasung einwandfrei den beidseitigen Tubenverschluß ergeben, ist vielleicht gar durch röntgenographische Darstellung des Uterus und der Tuben der Sitz des Verschlusses bekannt, so kann man der Frage nach operativer Behebung desselben nähertreten, wenn der brennende Wunsch nach Kindern besteht. Bevor man eine solche Operation ausführt, muß man

den Mut der Aufrichtigkeit haben und darf die Aussichten, die, sind wir ehrlich, ja doch für eine Schwangerschaft keine sehr großen sind, nicht in zu rosigem Licht darstellen. Die Eingriffe zur Wiederherstellung der Konzeptionsfähigkeit sollen hier nicht zur Erörterung kommen. Es sei nur darauf hingewiesen, daß sie entweder in Öffnung des verschlossenen Tubenlumens entweder am ampullären (MARTIN), besser in der Mitte zwischen mittlerem und lateralen Drittel (NÜRNBERGER, HALBAN) oder in Einpflanzung der Tube in den Uterus nach Resektion des kranken uterinen Teiles nach CULLEN, A. MAYER, UNTERBERGER und SELLHEIM bestehen, wobei UNTERBERGER bereits in 5 Fällen mit vollem Erfolg operiert hat. Schließlich kommt bei vollständig unbrauchbaren und nicht mehr wegsam zu machenden Tuben allenfalls noch die Implantation des Ovariums in den Uterus in Frage, deren Erfolg freilich hinter denen der Einpflanzung des Eileiters wesentlich zurückbleibt (TUFFIER, A. MAYER und andere).

Wo schwere Infektionskrankheiten eine Unterentwicklung des Genitales verschuldet haben, wird man jene allgemeinen Maßnahmen ergreifen, wie sie auch für die angeborene Hypoplasie gelten. Sie bestehen bekanntlich hauptsächlich in allgemeinen, den Körper als ganzes kräftigenden physikalischen und diätetischen Maßnahmen, in der Verabreichung von Eisen und Arsen und außerdem je nach der Lage des Falles in Extrakten der Schilddrüse, der Hypophyse, sowie den Hormonen des Eierstockes, nicht zu vergessen der Bäderbehandlung, ganz besonders der Moorbäder, die ja bei der Therapie des Infantilismus Ausgezeichnetes leisten. In solchen Fällen, ganz besonders aber bei Sterilität auf dem Boden schwerer endokriner Störungen erster Art wird man den Wunsch nach Behebung der Sterilität mit HOFSTÄTTER, SCHRÖDER u. a. im Sinne einer eugenischen Beratung in taktvoller Weise dahin richtigstellen müssen, daß in derartigen Fällen Nachkommenschaft unerwünscht und zu widerraten ist.

Da die Dyspareunie als Sterilitätsursache sehr häufig seelischen Ursprungs ist, ist ihre Behandlung erfahrungsgemäß sehr schwer. Vielfach versagt auch die so gepriesene Psychoanalyse selbst dann, wenn sie von vollständig fachkundiger Seite unternommen wird. Man darf übrigens nicht vergessen, daß es vollständig geschlechtskalte Frauen gibt, die trotzdem ohne weiteres schwanger werden. Wie oft festgestellt, kann die Dyspareunie übrigens nach Eingehen einer neuen Ehe schlagartig behoben werden. Wo sie Teilerscheinung und Ausdruck eines hypoplastischen Genitales ist, kann man die bei der Hypoplasie geschilderten Maßnahmen anzuwenden versuchen. Die Erfolge sind problematisch. Seit alters gilt das Strychnin als Heilmittel gegen Sexuälschwäche. Man kann es nach folgender Verschreibung etwa verordnen:

128. Strychnin. nitr. . . . . 0,05  
 Solve in Aqu. ferv.  
 Pulv. et extract. liquor. q.  
 s. u. f. pil Nr. XXV  
 D. S. Früh und abends 2 Pillen.

Auch medikamentöse Beeinflussung des Lendenmarkes durch *Yohimbin* Tabletten zu 0,005, allenfalls Injektion zu 0,01, ferner *Thelygan* in Ampullen und Tabletten kann man versuchen. ASCHNER hält kleine Gaben von *Tinctura cantharidum* (3mal täglich 10 Tropfen), und zwar sowohl beim Manne wie bei der Frau, die organsund, aber steril verheiratet sind, für sehr wertvoll. Man verordnet sie mit Vorsicht und nur auf etwa 8 Tage, und wird diese Gaben nur unter Kontrolle des Harns und bei negativem Harnbefund allenfalls nach 8 Tagen Pause für dieselbe Zeit wiederholen. Schließlich muß man, ohne undelikat zu sein, auch darauf hinweisen, daß eine entsprechende lokale Irritation des Genitales, wie sie durch VAN SWIETENS Rat zu klassischer Berühmtheit gelangt ist, zur Besserung der Dyspareunie und allenfalls auch zur Konzeption beitragen kann.

Erst neuere Erfahrungen haben uns gezeigt, daß bei vollständig normalem Genitale offenbar die Befruchtungsbereitschaft eine zeitlich recht verschiedene ist. Wir sind ja heute so weit, daß wir mit gewissen Einschränkungen sogar von einer physiologischen Sterilität des Weibes zu sprechen geneigt sind. Dort, wo es zum Kindersegen nicht kommen will, und anatomisch gesunde Genitalien vorliegen, wird man auch dem Datum des Beischlafes volle Aufmerksamkeit zu widmen haben und den Erfahrungen von KNAUS folgend das Konzeptionsoptimum, also vom 11. bis 17. Tag bei 28tägigem Zyklus bevorzugen. Es hat viel für sich, nicht wahllos, sondern zu einer dem physiologischen Optimum der Befruchtungsfähigkeit angepaßten Zeit den Verkehr zu pflegen. Es läuft eben darauf hinaus, daß offenbar weder das Ovulum, noch auch das Sperma eine längere Wartezeit vertragen, und daß die Aussichten der Befruchtung um so günstigere sind, je rascher die zeitliche Vereinigung erfolgen kann.

### Die künstliche Befruchtung.

Die künstliche Befruchtung hat mehr Gegner als Anhänger. Trotzdem kann es Fälle geben, in denen dieser letzte Schritt zur Vermittlung von Nachkommenschaft auch in ethischer Hinsicht Berechtigung hat. Sie kann sich dort ergeben, wo bei gesundem, durch Tubendurchblasung für die Eiwanderung geeignet befundenen und auch sonst normalen Genitale der Frau, von Seite des Mannes eine Befruchtungsunfähigkeit zufolge Verschlusses der Nebenhodenausführungsgänge besteht. In solchen Fällen kann jahrelang nach Ablauf einer beidseitigen Epididymitis gonorrhoeica immer noch gesundes Sperma gebildet werden, wie die Punktion aus den Hoden und der gelungene Nachweis von Sperma POSNER und ROHLEDER ergeben hat. Ein solches Sperma könnte zu einem geeigneten Zeitpunkt zur künstlichen Befruchtung verwendet werden. Wenngleich manche Autoren wie ALFIERI u. a. ganz allgemein die Ausführung der künstlichen Befruchtung bei einem anatomisch gesunden Genitale der Frau und Unmöglichkeit der Befruchtung auf natürlichem Wege befürworten, so sollen gerade für die Frage der künstlichen Befruchtung eugenische Gesichtspunkte, die beide Ehegatten betreffen, die Entscheidung für oder gegen dieses Verfahren wesentlich beeinflussen.

Am besten ist es, bei der künstlichen Befruchtung sich nach jenen Regeln zu richten, welche Ärzte angegeben haben, die dieselbe öfter und mit Erfolg ausführen konnten und die auch die theoretischen Grundlagen der ganzen Angelegenheit wohl studiert haben, wie ROHLEDER, PROCHOWNIK, SELLHEIM, ENGELMANN u. a. Es will Verfasser bedeutungsvoll erscheinen, daß PROCHOWNIK seine Erfolge bei Injektion des Spermas in den Uterus gewöhnlich am 15. bis 22. Tag nach dem Beginn der letzten Periode eintreten sah, wenn er die künstliche Befruchtung wenige Minuten nach dem ehelichen Verkehr vornahm, eine Tatsache, die mit den neueren Anschauungen über den Follikelsprung und die größten Aussichten der Befruchtung nach KNAUS in schönem Einklang steht und die man sehr wohl berücksichtigen muß. PROCHOWNIK vermied ausdrücklich alle umfangreichen antiseptischen und aseptischen Vorbereitungen und hielt auch die Instrumente nur rein, warm und trocken. Er benützte stets die einfache BRAUNSCHE Spritze und sog die Flüssigkeit direkt aus dem Condom und injizierte sie dann langsam intrauterin in der Menge von höchstens  $\frac{1}{2}$  ccm, wenn möglich ohne Anhaken der Portio. Den Rest des Samens brachte er auf steriler Gaze vor den Muttermund und hielt ihn mit einem Gazetampon angepreßt. Nach  $1\frac{1}{2}$  Stunden Ruhelage entfernte er beides. ROHLEDER legt Wert darauf, die künstliche Befruchtung womöglich im Privathause, unmittelbar nach der Beiwohnung, des Mannes im Querbett durchzuführen. Er aspiriert eine geringe Menge Sperma mit einer Tropfenspritze, führt diese 2 cm tief in den mit der Sonde dilatierten Uterus ein, läßt sie  $\frac{3}{4}$  Minuten liegen und entfernt sie dann vorsichtig. Zum Schlusse wird ein mit Sperma benetzter Tampon vor den äußeren Muttermund gelegt und der Frau die Knie mit einem Handtuch zusammengebunden. Sie bleibt den ganzen Tag im Bette liegen. ROHLEDER und ebenso PROCHOWNIK treten unbedingt bei Ausbleiben des Erfolges für ein- bis zweimalige Wiederholung des Befruchtungsversuches ein. Die Aussichten der künstlichen Befruchtung sind auf etwa 30% zu schätzen.

## Richtlinien zur Beratung geschwulstkranker Frauen.

### Myoma uteri.

Es kann hier nicht der Ort sein, das Kapitel Myom nach allen Richtungen zu beleuchten. Worauf es an dieser Stelle ankommt, ist einzig und allein mit bestimmten Richtlinien dem Arzt an die Hand zu gehen, der sich bei der Häufigkeit der Myomleiden so und so oft in der Lage sieht, hierin klipp und klar zu raten. Vorangestellt muß werden, daß die Mitteilung der Diagnose Myom bei so mancher Frau im umgekehrten Verhältnis zu der Bedeutung des Leidens steht. Myome, die kaum der Tastung zugänglich sind, erbsen- und haselnußgroße Knötchen mit eben angedeuteter subseröser Wachstumsrichtung werden vielfach mit allem Ernst der Patientin dargestellt, die nun nicht eher ruht, bis sie dieses Leiden los ist, während in Wahrheit solche und auch beträchtlich größere Myome, solange sie beschwerdelos bleiben, zwar vermerkt, aber

nicht behandelt werden sollen. Am besten hält man es so, daß man, je nach der seelischen Veranlagung der Patientin, die man vor sich hat, von solchen Myomen zur Frau überhaupt nicht, sondern nur zu den Angehörigen redet. Recht wichtig scheint es heutzutage, wenn man die Überflüssigkeit der Behandlung betont, ausdrücklichst darauf hinzuweisen, daß für ein solches nicht behandlungsbedürftiges Myom auch die Röntgenbestrahlung nicht nur nicht angezeigt, sondern schlecht sein kann. Es macht immer Eindruck, wenn man anläßlich solcher Fälle den ausgezeichneten Satz LOKYERS zitiert, der lautet: „So wie es besser ist, eine schlafende Dogge nicht zu wecken, soll man auch ein schlummerndes Myom in keiner Weise, auch nicht durch Röntgenstrahlen, angehen“.

Wie steht es aber mit dem Verhalten des Arztes bei Myomen, die Symptome machen, aber bei Patientinnen sich finden, die der Operation abhold sind oder vielleicht wirklich kein geeignetes Objekt für die Operation darstellen, andererseits aber auch für die Röntgenbehandlung nicht geeignet sind. Soll man es mit internen Maßnahmen versuchen und soll man solche auf längere Zeit aufnehmen? In erster Linie sind es die Blutungen, welche die Stillung manchmal ganz energisch gebieten. Abgesehen von jenen Fällen, in denen plötzlich auftretende, sehr heftige und langdauernde Regelblutungen augenblickliche Blutstillungsmaßnahmen erfordern, als da sind, die angeführten Injektionen von *Ergotin*, *Gynergen*, *Stryphnon*, und *Hypophysenpräparaten*, heiße und eiskalte Spülungen mit und ohne *Tannin-* oder *Alaunzusatz* (1 Eßlöffel auf 1 Liter Wasser 2mal täglich), sind es jene Fälle, welche seit längerer Zeit eine nicht unbeträchtliche Anämie durch die verlängerte und verstärkte Periode erzeugen. In der alten Zeit hat man in solchen Fällen nebst der bereits historisch gewordenen elektrischen Behandlung nach APOSTOLI systematische Ergotinkuren vorgenommen, und Fälle, die Hunderte solcher Injektionen bekamen, sind bekannt geworden. Einer solchen Behandlung kann man heute keinesfalls mehr das Wort reden, zumal sie bei der schlechten Blutversorgung des Myoms überhaupt zur Nekrose der Geschwulst führen kann. Bei strengen Gegenanzeigen gegen eine Operation — die übrigens nicht so häufig sind — und bei offenkundiger Unmöglichkeit durch Röntgen die Amenorrhoe zu erzielen, kann man eine Zeitlang wenigstens durch eine entsprechende Lebensweise und medikamentöse Therapie die Blutungen etwas einschränken. Durch Einhalten von Bettruhe, namentlich in den ersten Tagen der Menstruation und in den folgenden, durch Sorge für leeren Darm und regelmäßig entleerte Blase, Vermeidung zu reichlich fleischhaltiger Nahrung, kann man die Zeit der Periode dann erträglicher gestalten, wenn man vor Beginn derselben bereits auf den Uterus tonisierend einwirkt. Hier bewährt sich die *Hydrastis*, wie bereits angeführt, 8 bis 10 Tage vor der Periode regelmäßig zu 3mal 20 Tropfen genommen, ebenso wie Ergotinpillen, 6 Stück pro Tag, im ganzen ihrer 30 (Rezepte Nr. 25, 21, 22, S. 25/26). Wenn die Patientin diese Mittel durch mehrere Perioden regelmäßig nimmt (etwa 5- bis 6mal im Jahr) kann man mit den übrigen Maßnahmen tatsächlich so manche Frau

einige Zeit lang halbwegs vor schwerer Anämie bewahren. Die Fälle, in denen die Frauen sich so sehr von der Operation zu drücken trachten, sind vornehmlich solche, in denen die Myome in den Jahren Beschwerden machen, die nahe dem Wechsel liegen. Die Hoffnung auf das Schwinden derselben durch den Wechsel ist, so berechtigt sie auch vielfach sein mag, in den Kreisen der Frauen so sehr verankert, daß es oft nur schwer hält, ihnen vorzuführen, daß die Periode bei Myomträgerinnen sehr häufig recht spät aussetzt und daß bis dahin kaum mehr tragbare Grade der Blutarmut entstehen können, ganz abgesehen von den anderen, sich durch die Zunahme des Myoms steigenden Beschwerden, wie Völle im Bauch, Erschwerung der Harn- und Stuhlentleerung und Schmerzen. Gerade diese Fälle von Myomen nahe den Wechseljahren sind es ja, welche nebst den anderen zu erwähnenden vielfach, allerdings nur bei entsprechender Lokalisation ein dankbares Feld für die Betätigung der Röntgenstrahlen darstellen. Daß diese im Publikum in allen Fällen von Myomen zunächst Trumpf ist, und jede Diagnose eines Myoms von Seite der Patientin mit der Frage, warum nicht bestrahlen, beantwortet wird, ist verständlich. Grundsätzlich muß gesagt werden, daß der praktische Arzt weit weniger als der Gynäkologe in der Lage ist, zu entscheiden, ob im gegenständlichen Falle die Wahl des Verfahrens freisteht oder ob die Operation angezeigt, die Strahlenbehandlung aber nicht am Platze ist oder umgekehrt. Es ist jedenfalls schlecht, wenn Myomträgerinnen mit einer bestimmten Marschroute, Bestrahlung oder Operation, ganz besonders aber mit der Marschroute Bestrahlung zum Gynäkologen kommen, weil sie dann von dem einmal vorgeschriebenen Plan entweder überhaupt nicht oder nur mit der größten Mühe abzubringen sind und glauben, daß ihnen Unrecht aus eigennützigen Gründen geschehe. Bleibt auch die Entscheidung über das zu wählende Behandlungsverfahren Sache des Gynäkologen, so muß dennoch der praktische Arzt die richtige Vorstellung vom Wesen und von den Grundunterschieden der beiden Behandlungsverfahren haben. Unleugbare Tatsache ist und bleibt, daß die Bestrahlung mit keiner Sterblichkeit belastet ist. Daß dies der Angelpunkt des Problems ist, wird niemand leugnen. Trotzdem ist dieser Punkt nicht der einzige, und Fälle, wo die vergeblich gewesene Bestrahlung später, und vielleicht unter schwierigeren Verhältnissen, uns zwangsweise das Messer in die Hand drückt, allenfalls mit üblem Ausgang, sind kein Beweis für die vollständige Ungefährlichkeit der Bestrahlung; sie zeigen vielmehr, daß eine Bestrahlung am unrichtigen Orte das Bild ins Ungünstige verschieben kann. Nicht minder grundlegend ist die Tatsache, daß jede Myombestrahlung nicht das kranke, sondern das gesunde Gewebe angreift, wirkt sie doch so gut wie einzig und allein nur auf dem Umwege über die Vernichtung des lebenden Follikels und wird also in jedem Fall um die Preisgabe der Inkrete des Eierstockes erkaufte. Das kranke Gewebe, das Myom als solches, bleibt bestehen, wenngleich es mit dem nunmehr der Altersatrophie anheimfallenden Uterus der Schrumpfung entgegengeht, wie dies mit Myomen nach den Wechseljahren auf natürlichem Wege geschieht. Es kann nun nicht zweifelhaft sein, daß die Belastung

eines kranken Gewebes immerhin gewisse Bedenken hat. In der größten Mehrzahl der Fälle sind sie unberechtigt, in anderen wieder aber kommt es auf dem Boden dieses zurückgebliebenen Gewebes zu Veränderungen, von denen die degenerativer Natur noch geringfügig sind im Vergleich zu jenen, die bösartigen Charakter haben. Um nicht mißverstanden zu werden, bis heute liegt kein Beweis vor, daß etwa ein bestrahltes Myom eher zu sarkomatösen Degeneration neige; ebensowenig ist erhärtet, daß in einem Uterus myomatosus, der bestrahlt worden ist, ein Korpuskarzinom sich häufiger entwickle als in einem nicht bestrahlten myomatösen Uterus. Aber an der Tatsache, daß gerade die myomatöse Gebärmutter, offenbar auf dem Boden ihrer Minderwertigkeit, auch zur Entstehung von Korpuskarzinomen besonders neigt, kann niemand vorübergehen. Wenn eben die myomatöse Gebärmutter exstirpiert ist, dann ist diese nicht zu unterschätzende Möglichkeit ein für allemal aus dem Wege geräumt. Gerade das Aufkommen eines Korpuskarzinoms in einem bestrahlten Uterus ist, und darauf muß der praktische Arzt besonders hingewiesen werden, deswegen manchmal so bedenklich, weil nach eingetretener Kastration eine neuerliche Blutung sehr oft, weder von der Patientin, noch vom beratenden Arzt, so ernst genommen wird, als sie es verdient. Mit der Selbsttäuschung, daß das Myom sich wieder rühre, kann kostbare Zeit verloren werden, und inzwischen ein Korpuskarzinom in einer Weise fortgeschritten sein, welche die Radikaloperation nicht mehr ermöglicht. Freilich kann bei jüngeren Frauen, die bestrahlt werden, eine solche Blutung auch darin ihren unschuldigen Grund haben, daß einzelne Follikel nicht vernichtet wurden und deswegen die Monatsblutung wieder auftritt. Auch Polypen der Korpshöhle, endometritische Prozesse und Gefäßveränderungen können eine solche ungefährliche Blutung in einem bestrahlten Uterus erzeugen. Auch Myome, die nach den Wechseljahren Beschwerden machen, indem sie zu bluten beginnen, größer werden und auf die Nachbarorgane drücken, sind kein geeignetes Feld der Röntgentherapie, einmal deswegen nicht, weil die Blutungen meist nicht mehr auf einem Impuls vom Ovarium beruhen — dasselbe ist atrophiert — sondern entweder in gestörten lokalen Zirkulationsverhältnissen oder aber, was weit bedenklicher ist, in maligner Umwandlung zu Sarkomen oder in Entwicklung eines Korpuskarzinoms in der myomatösen Gebärmutter begründet sind.

Mit Recht ist allgemein anerkannt, daß bei jungen Frauen die Bestrahlung nicht am Platze ist. Mag auch der Grad der Ausfallserscheinungen in hohem Maße von der körperlichen und seelischen Verfassung der betreffenden Frau abhängen, auch ausgeglichene, seelisch durchaus nicht schwankende Charaktere leiden in somatischer und seelischer Hinsicht in jüngeren Jahren schwer. Die Behandlung dieser Kastrationsfolgen (s. S. 83ff.) stellt eine schwierige und mühselige Aufgabe auf lange Sicht dar. Dazu kommt, daß Myomträgerinnen, die, wie so häufig, niemals geboren haben, wenn sie in jungen Jahren durch Röntgen kastriert werden, neben den allgemeinen Ausfallserscheinungen auch eine Atrophie des Genitales davontragen, welches ganz dem einer

Greisin gleichen und die Zulassung des Geschlechtsverkehrs zur Qual machen kann; daran sind auch glückliche Ehen gescheitert. Daher ist und bleibt es oberster Grundsatz, mindestens bis zum 42. Lebensjahr die Bestrahlung überhaupt nicht in Vorschlag zu bringen. Deswegen soll der praktische Arzt, der ja von der Patientin zu einer Äußerung gezwungen wird, will er sie nun abgeben oder nicht, von vornherein die Bestrahlung in jungen Jahren als ungünstig hinstellen, was sie tatsächlich ist und deswegen von ihr entschieden abraten. So viel über das Grundsätzliche.

Und nun noch einige Sonderbemerkungen zur Therapie der Myome, insofern sie sich für die Operation und nicht für die Bestrahlung eignen und umgekehrt. Unleugbare Tatsache bleibt, daß trotz aller Fortschritte in der operativen Technik und aller Vorbeugungsmaßnahmen die Operation mit einer gewissen Sterblichkeit behaftet ist. Nimmt man alle Operationen, die wegen Myoms auf vaginalem und abdominalem Wege gemacht werden, zusammen, so bleibt eine Mortalität, die auch in den besten Händen um 2 v. H. schwankt, vielfach aber höher ist. Daran ist die größere Mortalität der abdominellen Operationen hauptsächlich beteiligt, während in den Statistiken jener Autoren, die sich mehr des vaginalen Weges befleißigen, die entschieden geringere Sterblichkeit des vaginalen Weges die Gesamtmortalität wesentlich herabdrückt. Ohne irgendwie auf die Methoden der Operationen kommen zu wollen, sei nur ausgesprochen, daß die vaginale Operation, sofern sie nicht an der Größe des Tumors, an dessen etwa intraligamentärem Sitz, der mangelnden Eindrückbarkeit ins Becken und einer unklaren Diagnose, sowie operationsbedürftiger, nur vom Abdomen anzugehender Krankheiten von vornherein nicht angezeigt ist, mehr begangen zu werden verdient als dies vielfach geschieht. Sie ist entschieden beträchtlich ungefährlicher als der abdominelle Weg, enthebt die Frauen einer längeren Rekonvaleszenz und führt sie mangels eines Bauchschnittes früher in die häuslichen Verhältnisse und an ihre Arbeitsstätten zurück, ohne für späterhin in der überwiegenden Zahl aller Fälle irgendwelche Nachwehen zu hinterlassen. Trotzdem kann man selbstverständlich den Weg durch die Bauchhöhle in einer großen Zahl der Fälle, und das sind die schwierigeren, nicht umgehen, welcher immer eine höhere Mortalität aufweist als der vaginale.

Zur Operation muß man sich, mag sie nun per laparotomiam oder per vaginam zu machen sein, entschließen, weil die Bestrahlung erfolglos ist, in folgenden Fällen: Abgesehen von Fällen unklarer Diagnose, bei sehr großen Geschwülsten, bei submukösen Myomen, beim myomatösen Polyp, bei Verdacht auf sarkomatöse Entartung, aber auch bei Verdacht auf Nekrose, zystischen Myomen, bei verjauchenden Tumoren, bei gleichzeitiger Vergesellschaftung mit Geschwülsten der Eierstöcke, Adnextumoren und Vorfällen, bei jugendlichem Alter, wo wir der Inkrete der Ovarien nicht entbehren können und bei Myomen nach der Menopause. (Bei Sterilität, die offenbar auf dem Boden eines Myoms besteht, kommt die konservative Myomoperation in Frage, über die bei der Sterilität S. 184 das Nötige ausgeführt ist.)

Die Bestrahlung ist bei den allgemeinen Kontraindikationen gegen

die Operation angezeigt; solche sind Nieren-, Stoffwechsel-, Herz- und Lungenkrankheiten, auch bei hochgradiger Krampfaderbildung wird sie mit Rücksicht auf die drohende Gefahr der Embolie sehr zu erwägen sein, ferner bei frischen Infektionen an den Genitalien und ihrer Nachbarschaft (STOECKEL). Weiter eignen sich gut für die Bestrahlung nicht zu große, intramural gelegene und kleinere, nicht gestielte subseröse Knoten, besonders bei Frauen nach dem 42. Lebensjahr. Ist einmal operiert worden, wurde beispielsweise der Uterus wegen Prolaps interponiert und entsteht in einem solchen Uterus ein Myom, ist es unbedingt angezeigt zu bestrahlen, um den Erfolg der ersten Operation nicht zu zerstören (WEIBEL). Grundsätzlich ist zu fordern, daß man vor jeder Bestrahlung durch Abrasio eine maligne Erkrankung der Schleimhaut ausgeschlossen werden kann. Mögen einzelne Ärzte gelegentlich bei verlängerten und verstärkten Regelblutungen, die aber ihren zyklischen Charakter nicht verloren haben, von einer solchen absehen, so hat dies immer etwas Unheimliches an sich und ist kaum anzuraten. Sind dagegen die Blutungen unregelmäßig, kann überhaupt die Abrasio unter gar keinen Umständen umgangen werden. Die Tatsache der notwendigen Abrasio bedeutet also für die Patientin einen operativen Eingriff, der allenfalls nur der Vorakt zu einer zweiten Operation ist, was bei der Radikaloperation natürlich sehr zum Vorteil der Methode gänzlich in Wegfall kommt. Am schwierigsten ist es, sich in Fällen von Myomen, die submukös und zum Teil intramural sitzen, für die richtige Art der Behandlung zu entscheiden.

Der mangelnde Erfolg einer Bestrahlung zeigt in so manchen dieser Fälle von submukös-intramuralen Myomen, daß sie eben nicht mehr für die Bestrahlung, sondern für die Operation geeignet waren. Besonders verantwortungsvoll ist es, bei ausgebluteten Myomträgerinnen das richtige zu treffen. Ohne den Uterus aufgeschlossen zu haben, ist es ja oft nicht möglich, Bestimmtes über den Sitz des Myoms, insbesondere, ob es ausgesprochen submukös ist, zu sagen. Da kann es nun geschehen, daß man wegen der hochgradigen Anämie die Bestrahlung ausführen läßt, aber vergeblich auf den Erfolg wartet, ja sogar noch besonders schwere Blutungen erlebt, die die Frau aufs äußerste gefährden. Dann operiert man unter vielleicht noch ungünstigeren Verhältnissen als vorher. In solchen Fällen erscheint es immer noch am zweckmäßigsten, bei strengster Bettruhe unter reichlicher Gabe der genannten Mittel die Blutung zum Stillstand zu bringen und die Frau nach dem Vorgang STOECKELS durch Bluttransfusion, in leichteren Fällen durch systematische Einläufe von Ringerlösung, ferner durch Eisengaben, aber auch durch intramuskuläre Blutinjektion in kleinen Gaben (8 bis 10 ccm eine Woche lang gegeben) operationsbereit zu machen.

Der in der Scheide geborene Polyp ist für den praktischen Arzt von großer Wichtigkeit. Die im Abdrehen desselben bestehende Behandlung ist S. 63 geschildert.

Im Abschnitt der Kastration ist ausführlich über die Folgen derselben die Rede (S. 83ff.). Hier soll nur darauf hingewiesen werden, daß nach der Meinung so mancher Gynäkologen zumindestens ähnliche Folgen

zu befürchten sind, wenn zwar die Eierstöcke belassen, der Uterus aber entfernt wird. Dieser Meinung kann sich Verfasser aus den dort angeführten Gründen nicht anschließen. Trotzdem muß es als bindende Pflicht gelten, in jüngeren Jahren unter allen Umständen zu trachten, wenigstens einen Eierstock bei der Myomoperation zu erhalten. Nimmt man ohne zwingenden Grund beide weg, dann hat man nicht viel mehr geleistet, als mit der Röntgenbehandlung, dabei aber die Frau einem Eingriff ausgesetzt, der dennoch trotz aller Fortschritte mit einer Mortalität belastet ist. Dagegen erscheint es richtig, bei Frauen nahe der Menopause und selbstverständlich bei Myomträgerinnen nach der Menopause, wenn operiert wird, die Eierstöcke mitzunehmen, um die Frau ein für allemal durch diese eine Operation vor allen Weiterungen zu sichern. Daß man auch von der konservativen Myomoperation nach Möglichkeit Gebrauch machen wird, bedarf wohl keiner besonderen Betonung. Sie aber um jeden Preis erzwingen zu wollen, ist verfehlt. Nach kürzerer oder längerer Zeit melden sich die zurückgebliebenen, inzwischen gewachsenen Myomknoten von neuem und die Patientin kann vor die Notwendigkeit einer zweiten, jetzt vielfach technisch weit schwierigeren Operation gestellt sein.

## Carcinoma uteri.

### Operables Uteruskarzinom.

Mit Fug und Recht bezeichnet STOECKEL die rechtzeitige Erkennung des Gebärmutterkrebses als die Aufgabe des praktischen Arztes. Bei der Häufigkeit des Kollumkarzinoms (61% aller Genitalkarzinome) gegenüber dem ungleich gutartigeren und selteneren Korpuskarzinom (16% der Genitalkarzinome) muß denn auch der praktische Arzt in jedem Fall unregelmäßiger Blutungen, ganz besonders aber der so bezeichnenden Kontaktblutungen und des fleischwasserähnlichen Ausflusses unter allen Umständen die Diagnose durch Untersuchung klären und darf in den immer wieder gerügten Fehler, ohne Untersuchung Therapie treiben zu wollen, unter gar keinen Umständen verfallen, weil er sich damit eines sträflichen Leichtsinns schuldig macht, der der Frau das Leben kosten kann. Er soll auch Erosionen, die nur einigermaßen verdächtig erscheinen, nicht durch längere konservative Behandlung hinziehen, weil er unbringliche Zeit versäumen kann, sondern soll sie dem Facharzt zuweisen oder einer Anstalt überantworten, wo leichter auf Grund reichlicher Erfahrungen, oft schon durch die bloße Palpation und Inspektion, die Diagnose gemacht werden kann, während sie dem weniger Geübten naturgemäß öfter verschlossen bleibt. Auch der Probeexzision durch den praktischen Arzt kann man, wenn er nicht gut gynäkologisch vorgebildet ist, nicht vorbehaltlos das Wort reden, weil es geschehen kann, daß, abgesehen von den immerhin möglichen Gefahren des Eingriffes (Blutung, Parametritis, Sepsis) die verdächtige Stelle belassen, eine unverdächtige aber exzidiert oder das Gewebe so entnommen wird, daß es nicht im Zusammenhange mit seinem Mutterboden bleibt (ADLER). Dadurch werden

dem Pathologen, der gerade das charakteristische Tiefenwachstum neben den anderen Merkmalen der Krebswucherung feststellen soll, unnötig und sehr zum Nachteil der betreffenden Frau Rätsel aufgeben. Auch die Probeabscabung SCHILLERS und die nicht eindeutige Lugolpinselung der Portio desselben Autors sind nicht Sache des praktischen Arztes. Ebenso bleibt die HINSELMANNSche Kolposkopie dem Facharzt vorbehalten. Dem praktischen Arzt obliegt es, in klaren Fällen die Diagnose Karzinom den Angehörigen der Patientin auszusprechen, in verdächtigen unter allen Umständen auf die baldigste Klärung des Krankheitsbildes zu dringen. Entledigt er sich dieser Aufgabe rechtzeitig und mit aller Energie, so hat er von seinem Posten aus das größere Verdienst an der Heilung einer Karzinomkranken als der gynäkologische Techniker, der große Reihen solcher Fälle operiert.

Auch für das Karzinom gilt mit Recht dem praktischen Arzt gegenüber der Rat, daß er seiner Patientin die vom Facharzt einzuschlagende Therapie nicht vorschreiben soll. Bei der aber heute betriebenen Aufklärung des Volkes gerade hinsichtlich des Krebses, seiner Gefahren und seiner Heilbarkeit, muß der Arzt in Fällen, wo zwischen Operation und Bestrahlung scheinbar die freie Wahl besteht, entsprechenden Fragen gegenüber Rede und Antwort stehen können. Darum seien einige diesbezügliche Bemerkungen hier angeschlossen. Mag man auch entschieden ein Anhänger der Operation sein, so muß man als solcher billigerweise den Standpunkt derer, die in der Radium-Röntgenbestrahlung — es ist hier zunächst nur vom Kollumkarzinom die Rede — das Verfahren der Wahl erblicken, sich mindestens teilweise zu eigen machen. Die Ergebnisse umfangreicher und genauer statistischer Forschungen müssen denn doch auch die Anhänger der operativen Therapie, zu welcher sich Verfasser als Schüler PEHAMS bekennt, insoweit berücksichtigen, daß sie dieses Verfahren, dessen Ausbau zur gegenwärtigen Höhe wir vor allem DÖDERLEIN, SEITZ, WINTZ, GAUSS u. a. verdanken, als nahezu gleichwertiges Konkurrenzverfahren, ja in ausgesuchten Fällen als das der Operation entschieden vorzuziehende anerkennen müssen. Wenn die Strahlentherapeuten mit eiserner Folgerichtigkeit grundsätzlich nur dieses Verfahren gelten lassen, so ist anderseits ein einseitiger Standpunkt für die Anhänger der Operation aber nicht mehr haltbar. Die geringe Gefährlichkeit der Radium-Röntgenbehandlung ist das den praktischen Arzt und noch mehr die Patientin am meisten bestechende in dieser Art der Therapie. In der Tat ist es ja die Mortalität der Radiumbehandlung (an gelegentlich sich anschließender Sepsis, besonders in fortgeschrittenen Fällen), gering im Vergleich zur primären Mortalität der Karzinomoperation. Sie beträgt nach den letzten Berichten in den Händen der erfahrensten Strahlenforscher (Klinik GAUSS) etwa  $1\frac{1}{4}\%$  für das Kollum- und noch nicht  $1\%$  für das Korpuskarzinom. Wenn aber trotzdem die Dauerheilung operierter Karzinomkranker die Bestrahlter übertrifft, obwohl der primäre Operationsverlust von 6 bis  $10\%$  und mehr schwer ins Gewicht fällt, muß man doch der Anschauung huldigen, daß die Operation hinsichtlich der Dauerergebnisse günstiger ist, zumal wir heute mit ihr in

der postoperativen Nachbestrahlung mit Röntgen uns auch die Vorteile dieses Verfahrens sichern. Es gibt aber Fälle, in denen heutzutage auch von unentwegten Anhängern der Operation die Bestrahlung entschieden vorgezogen werden muß. Selbstverständlich ist das bei schweren Allgemeinerkrankungen, in denen früher der einzig gangbare Weg der Operation nicht selten zugleich das Todesurteil bedeutete; es gibt aber auch noch andere innere und äußere Umstände, welche auch die Anhänger der Operation zum Aufgeben des Operationsplanes und Einleitung der Strahlentherapie veranlassen sollen. Mit v. MIKULICZ-RADEZKI hält Verfasser die Operation eines Halskrebses der Gebärmutter bei einer Frau unter 30 Jahren nicht mehr für angezeigt, weil der Verlust der Geschlechtsorgane, insbesondere der halben Scheide, denn doch eine zu schwere Verstümmelung bedeutet, ganz besonders dann, wenn es sich um Fälle handelt, die auf die Portio lokalisiert sind, wo wir von der Radium-Röntgenbehandlung dauernde Heilung erwarten können, ohne die Frau als Geschlechtswesen völlig zu vernichten und ohne sie der auch bei beginnenden Fällen leider nicht ganz zu bannenden primären Operationsmortalität auszusetzen. Man wird einwenden, daß die notwendige Röntgennachbestrahlung, welche die Eierstöcke zerstört, auf dasselbe hinausläuft wie die Ausrottung des Genitales, kann aber diesem Einwurf damit begegnen, daß der Verlust der Scheide die Patientin vor dem Bewußtsein, als Geschlechtswesen ausgespielt zu haben, bewahrt und ihr daher auch die Ausfallerscheinungen nicht so sehr fühlbar werden läßt, als bei der Operation. Es können also auch äußere Umstände, denen sich der Arzt auch als Anhänger der Operation nicht verschließen darf, für die Wahl der Radium-Röntgenbehandlung entscheidend sein. Umgekehrt hören wir — wenn man nur darnach fragt — wiederholt die bittersten Klagen von jüngeren Frauen über die Zerstörung ihrer Ehe nach der Radikaloperation wegen der Schwierigkeit des Beischlafvollzuges infolge des kurzen Scheidenblindsackes und der oft bestehenden Schmerzen beim Verkehr. Solche Fälle geben denn doch zu bedenken, ob sie nicht besser trotz guter Operabilität bestrahlt worden wären. Auch Fälle mit angeborenen Abwegigkeiten des uropoetischen Systems sind m. E. nach, mögen sie auch gut operabel sein, weit besser der Strahlenbehandlung zuzuführen. Frauen mit Dystopie der Nieren, Hufeisenniere, Verdoppelung der Harnleiter und Nephrektomierte werden besser der Strahlentherapie unterworfen, weil die Gefahr der Pyelitis in solchen Fällen, sogar bei der erweiterten vaginalen Operation zu groß ist. Was die allgemeinen Kontraindikationen anlangt, die Krankheiten des Herzens, der Lunge, Stoffwechselkrankheiten usw., so sind diese heute, wo das erweiterte vaginale Verfahren, ganz besonders im Verein mit der Lokalanästhesie so leistungsfähig ausgebaut ist, vielfach nicht mehr so ernstlich zu Recht bestehend wie für den abdominellen Weg, der im übrigen durch die Verwendung der Lumbalanästhesie auch in dieser Hinsicht viel breiter geworden. Immerhin wird man bei solchen Gegenanzeigen sich heute sehr zum Vorteil der Kranken für die Bestrahlung leichter entscheiden. Bei der anerkannten Leistungsfähigkeit der Bestrahlung und ihren nicht nennenswerten Ge-

fahren werden auch von den Freunden der Operation die Grenzfälle, die erfahrungsgemäß eine hohe primäre Mortalität bei der Operation geben, mit Recht der Bestrahlung zugewiesen. Wiederholt gelingt es auch, solche Fälle dauernd zu heilen, und die Frauen mit Rezidiven nach Bestrahlung sind besser daran als die Frauen mit Rezidiven nach der Operation, weil sie in weit fortgeschrittenen Fällen nach der Operation kaum mehr eine Erholung erleben. So ergibt sich heute für die Behandlung der Karzinome eine Therapie der mittleren Linie, die die besten Erfolge hinsichtlich einer möglichst geringen Operationssterblichkeit und einer möglichst großen Dauerheilungsziffer dann gewährleistet, wenn der Operation im allgemeinen beginnende und mittelschwere Fälle zugewiesen, die übrigen der Bestrahlung überantwortet werden, und wenn der Standpunkt des Gynäkologen kein starrer, sondern den Verhältnissen des Einzelfalles möglichst weit angepaßter ist.

Es würde den Rahmen dieses Buches überschreiten, sollten die Vor- und Nachteile der beiden Operationsverfahren, des vaginalen und abdominalen Weges, hier kritisch gegeneinander abgewogen werden. Nur soviel sei gesagt, daß die erweiterte vaginale Operation bei annähernd gleichen Dauerergebnissen eine wesentlich geringere Operationssterblichkeit aufweist, weshalb sie namentlich bei älteren Frauen, besonders solchen mit dicken Bauchdecken und Krankheiten des Herz-Gefäßsystems und der Respirationsorgane auch von den Anhängern des abdominalen Verfahrens entschieden bevorzugt wird, ja von einzelnen Gynäkologen wie STOECKEL, v. MIKULICZ-RADECKI u. a. überhaupt nur mehr allein geübt wird.

Da der praktische Arzt immer über die Heilungsaussichten seiner Karzinomkranken, mögen sie nun bestrahlt oder operiert werden, befragt wird, so soll er wissen, daß von beginnenden Fällen 75 bis 85% bei rechtzeitiger Inangriffnahme der Therapie einer Dauerheilung zugänglich sind, wengleich auch nach der willkürlich festgesetzten Zeit der Beobachtung von 5 Jahren, nach welchen man von Dauerheilung spricht, auch noch Rezidive vorkommen. Fälle, welche bereits weiter fortgeschritten, aber immer noch gut operabel sind, bieten bereits weniger Aussichten für die Dauerheilung, doch kann man mit ruhigem Gewissen sagen, und das soll der Arzt weiterverbreiten, daß von allen Karzinomen des Collum uteri, welche sich in einem Zustand befinden, daß sie noch operiert werden können, nach 5 Jahren rund 42 bis 50 v. H. noch gesund am Leben sind, und von allen Karzinomen des Kollum überhaupt, auch die inoperablen und ganz aussichtslosen Fälle inbegriffen, nach 5 Jahren immerhin noch rund  $\frac{1}{4}$ , ja mehr leben. Das ist eine sehr respektable Zahl, die im Vergleich zu den traurigen Ergebnissen der Karzinomoperation anderer Organe — man denke nur an das Magenkarzinom — diese bösartige Krankheit in weit günstigerem Licht erscheinen läßt als andere Karzinome, darunter auch das Mammakarzinom.

Über das Korpuskarzinom, soweit es operabel ist, können wir uns kürzer fassen. Es ist fast regelmäßig die Krankheit der Matrone, das Karzinom des abgelebten Lebens (STOECKEL). Es beginnt und verläuft

durch lange Zeit recht unscheinbar, und durch Monate kann nichts als das gelegentliche Auftreten leichter Blutungen und eines spärlichen, nicht selten übelriechenden Ausflusses der Hinweis auf schwere Veränderungen sein, die in der Korpushöhle vor sich gehen. FRANKL hat mit Recht auf die Tatsache hingewiesen, daß man auf die Vergrößerung des Uterus nicht warten darf. Lange Zeit bleibt der Uterus trotz eines sich entwickelnden Karzinoms klein und der Befund eines atrophischen Uterus ist noch kein Gegenbeweis gegen das Karzinom. Bekannt ist ferner, daß nur die mikroskopische Untersuchung der zu diesem Zwecke aus der Korpushöhle entnommenen Partikel die Diagnose sichern kann, die unter allen Umständen bei einer jenseits der Menopause blutenden Frau mit normalem Muttermund gemacht werden muß. Wichtig ist die von meinem Lehrer PEHAM immer betonte Tatsache, daß bei ungenügender Aufschließung der Gebärmutter ein beginnendes, besonders in einer Tubenecke sitzendes Karzinom sehr leicht übersehen werden kann. Darum ist es nur anzuraten, gründlich zu dilatieren, bevor cürettirt wird.

Im übrigen kann man in Fällen von Karzinomverdacht im Matronenalter auch ohne Sicherung der Diagnose durch Probeabrasio von vornherein die vaginale Totalexstirpation des Uterus ausführen, mag sich auch dann herausstellen, daß die Blutungsursache nicht in einem Karzinom, sondern in einem Adenom der Korpushöhle oder in Gefäßveränderungen gelegen war. Bei der Ungefährlichkeit der einfachen vaginalen Totalexstirpation ist dieser radikale Standpunkt, wie ihn PEHAM und STÖCKEL vertreten, durchaus berechtigt und hat Verfasser so gut wie niemals zu üblen Zufällen geführt.

Mit der Diagnose Karzinom durch den praktischen Arzt und der Zuweisung des Falles in fachärztliche Hand ist die Aufgabe des praktischen Arztes aber nicht erschöpft. Im Gegenteil, nach vollendeter Operation oder Strahlenbehandlung übernimmt der praktische Arzt von neuem seine Patientin und kann durch zweckmäßige Ratschläge und Behandlung, die im Anschluß an die Entlassung für die nächsten Wochen und Monate immer noch notwendig sind, viel Gutes tun. Außerdem aber hält er die Patientin zusammen mit der Anstalt in ständiger Beobachtung und sorgt dafür, daß sie die Kontrolluntersuchungen nicht versäume. Diese finden am besten in den beiden ersten Jahren jedes Vierteljahr, im dritten alle vier Monate und im vierten und fünften Jahr jedes halbe Jahr statt, entsprechend der Erfahrung, daß, je weiter zurück die Operation liegt, desto geringer die Rezidivgefahr wird, wissen wir doch durch WEIBELS Untersuchungen, daß ins erste Jahr nach der Operation 50% aller Rezidive, in das fünfte aber nur mehr 3,4% fallen. Dieses Zusammenarbeiten zwischen Arzt und Klinik, wie es die großen Kliniken halten, kann sich nur zum Segen für die Patientin und zum Vorteile des praktischen Arztes, der die Frauen nicht verliert, auswirken. Besonders wichtig sind regelmäßige Wägungen des Körpergewichtes, welches, wie bekannt, eines der wichtigsten Hinweise auf Rezidivfreiheit oder ein Rezidiv ist, indem ein deutlich sinkendes Körpergewicht leider im Sinne eines aufkommenden Rezidivs spricht. Neben dieser Gewichtsprüfung

fällt dem praktischen Arzt die Nachbehandlung so mancher Nachwehen, wie sie sich an die Operation anschließen, zu. Anordnung einer natürlichen Lebensweise, richtige Einteilung der Zeit mit besonderer Rücksichtnahme auf den Aufenthalt im Freien, entsprechende Verteilung der Mahlzeiten, Verordnung appetitanregender Mittel (Stomachica S. 211), Verschreibung von Nährpräparaten (S. 211), Nachbehandlung der so lange sich immer wieder rührenden Blasenerscheinungen, entsprechende Verordnungen für den regelmäßigen Stuhlgang und ganz besonders Maßnahmen zur Linderung von Ausfallerscheinungen, wie sie durch die Entfernung der Ovarien bzw. die Vernichtung der Follikel durch die Röntgenbestrahlung, namentlich bei Frauen in jüngeren Jahren notwendig werden. Außerdem hat in Fällen, die nur der Bestrahlung unterzogen wurden, der praktische Arzt Hautschädigungen nach der Bestrahlung zu verhüten, indem er auf die Druckgefahren der Mieder, auf die Unzweckmäßigkeit feuchter Umschläge, zu energischer Beheizung durch den Thermophor hinweist und auf die Vermeidung scharfer Seife dringt. Bekanntlich dürfen in den ersten 4 Wochen nach der Bestrahlung Waschungen nicht vorgenommen werden, und müssen Abreibungen mit fettentziehenden Mitteln, wie Benzin, unter allen Umständen vermieden werden. Als Mittel zur Einfettung der Bauchdecken dienen *Vaseline*, *Lanoline*, *Niveacreme*, *Fissanpaste*, *Zinkpaste* oder nach WINTZ die folgende Salbe:

129. Adeps lanae anhydr.	
pharm. ....	34%
Vaseline .....	22%
Ceresin .....	2%
Ölige oder wässrige Auszüge aus Semen terminaliae	
Folia Psidi pyrifera	
Radix Rumicis crispae ....	42%

Diese Aufgaben harren des praktischen Arztes, dem die Patientin also wieder in die Hände gegeben wird, nachdem die fachärztliche Behandlung beendet ist.

Auch beim Korpuskarzinom treten manche Anhänger der Bestrahlung des Kollumkarzinoms für diese Art der Behandlung ein. Soll man nach dem heutigen Stand unseres Wissens — beim Kollumkarzinom auch als Anhänger der Operation — der Bestrahlung einen entsprechenden breiten Raum einräumen, so ist gegenüber der Bestrahlung des Korpuskarzinoms ein ablehnender Standpunkt durchaus berechtigt. Die geradezu ausgezeichneten Ergebnisse der einfachen Totalexstirpation des Uterus und der Adnexa beim Korpuskarzinom, welche bei geringer primärer Sterblichkeit hinsichtlich der Dauerheilung von ca. 60% wesentlich bessere sind als bei der Strahlenbehandlung, lassen uns diesen Standpunkt im Verein mit der prophylaktischen Nachbestrahlung unbeirrbar beibehalten. Dazu kommt noch ein wichtiger, wie es scheint nicht genug gewürdigter Punkt. Bei dem Umstand, daß die Radiumbehandlung für die Patientin mit nicht geringen

Unannehmlichkeiten und Beschwerden und sogar stärker als das Kollumkarzinom mit Läsionen der Blasenschleimhaut durch die Radiumwirkung belastet ist, stellt namentlich die vaginale Totalexstirpation des Uterus körperlich und seelisch an die Patientin keine sehr großen Anforderungen und macht die Frau mit einem Schlag frei vom örtlichen Behandlungszwange, was nicht zu unterschätzen ist. Die abdominelle Totalexstirpation freilich, welche notwendig wird, wenn das Korpuskarzinom in einem größeren Uterus myomatosus auftritt oder dann, wenn die Entwicklung des Uterus per vaginam von vornherein schwierig, ja unmöglich erscheint, ist freilich kein kleiner Eingriff, zumal es sich, wie gesagt, um Frauen handelt, deren Organe verbraucht sind. Trotzdem ist er nicht zu umgehen, denn gerade diese großen myomatösen Uteri mit der unregelmäßig gestalteten Zervixhöhle eignen sich nicht für die Bestrahlung.

### **Inoperables Uteruskarzinom.**

Was nun die Behandlung des inoperablen Uteruskarzinoms anlangt, so muß offen zugegeben werden, daß die alten Gynäkologen in der symptomatischen Behandlung der Krankheit mehr erfahren waren als wir, da ihnen nichts als diese zu Gebote stand. Heute ist auch die symptomatische Behandlung des inoperablen Karzinoms ganz unter die Wirkung der Strahlen gestellt. Wo immer es angeht, muß der Arzt trachten, das inoperable Karzinom der Anstalt einzuweisen. Ganz abgesehen davon, daß er nicht in der Lage ist, zu entscheiden, ob der Fall wirklich inoperabel ist oder nicht, lehrt ja die Erfahrung, daß auch inoperable Karzinome durch Radium-Röntgenbehandlung gesund werden können, wie wir dies vor allem aus der DÖDERLEINschen Klinik in bis zu 10% solcher Fälle wissen. Ist dieser Umstand allein schon richtunggebend für diese Behandlung, so muß sie auch bei offenkundiger Aussichtslosigkeit einer Radikalheilung durch die Radiumbehandlung deswegen als großer Segen bezeichnet werden, weil sie am besten die Symptome, insbesondere die Blutung und Jauchung zu beseitigen gestattet und das mit einem, verhältnismäßig wenigstens, leicht für die Patientin ertragbaren Verfahren. Dazu kommt noch ein unschätzbare Vorteil, und das ist der, daß das die Frauen am meisten beunruhigende Symptom, die Blutung, vielfach dauernd beseitigt werden kann. Damit ist aber so viel gewonnen, daß die Patientin den an ihr zehrenden Verdacht einer krebsigen Neubildung meist von sich weist, und nun der Arzt es viel leichter hat, die Symptome des in der Bauchhöhle fortschreitenden Leidens durch kluge Täuschung der Patientin so zu verschleiern, daß ihr das Trostlose ihrer Lage bis zum Ende nicht zum Bewußtsein kommt.

Immerhin gibt es auch heute noch Fälle, in denen äußere Umstände die immer erstrebenswerte Radium-Röntgenbehandlung nicht durchzuführen gestatten. Dann muß man sich jener Methoden bedienen, wie wir sie ursprünglich angewendet haben und wie wir sie auch im Beginne der Radiumbehandlung zur Vorbereitung der Radiumeinlage verwendeten, nämlich das Auslöffeln und Verschorfen des Karzinoms. Wie STÖECKEL mit Recht hervorhebt, ist die gründliche, in Narkose aus-

geführte Auslöfflung eines Karzinoms, die von einer heftigen Blutung begleitet ist, und zum Einbrechen des Löffels in die Blase und ins Rektum führen kann, bzw. zur Eröffnung des Douglas, technisch gar nicht so leicht und soll nur von solchen, die es gemacht haben, und auch da nur mit guter Assistenz durchgeführt werden. Wird sie nämlich nur oberflächlich gemacht, ist der Erfolg ganz ungenügend, die stehengebliebenen Karzinomreste wuchern weiter, bluten mächtig, und die Jauchung nimmt kein Ende. Man muß so tief auskratzen, bis man auf das harte Muskelgewebe kommt, wobei es geschehen kann, daß auch größere Schlagaderäste recht heftig bluten. Nun muß man das Gewebe entweder mit dem alten Glüheisen oder mit dem Kugelbrenner des Paquelin ganz verschorfen, bis es hart und trocken geworden ist. „Glashart muß der Brennschorf sein, man muß auf ihn klopfen können. Nach der Verschorfung darf auch nicht ein Tropfen Blut mehr kommen“ (STOECKEL). Sehr vorteilhaft ist es, entsprechend dem Rate dieses Autors, den Krater mit *Bortannin* zu plombieren, indem man einen Gazetupfer mit Bortannin beschickt, zu einem Beutelchen zusammenbindet und in den Krater steckt. In Fällen nicht zu stillender Blutung muß man Tampons, die mit *Liquor ferri sesquichlorati* getränkt sind und die man mit Wasser dann völlig ausdrückt, so daß der ätzende Liquor nicht ausfließt, den Krater tamponieren. Dann tamponiert man die Scheide, damit die Liquorkugeln im Krater liegen bleiben. Tamponentfernung nach 5 Tagen. Zur Verkleinerung des Kraters wendet man Gazetupfer an, die mit einem Brei aus 10%igem *Tannin-Borglyzerin* getränkt sind. In Fällen, wo trotzdem die Blutung weiter besteht, rät STOECKEL zur subkutanen Injektion von *Gelatine*, die man auch in den Speisen und als *Gelatineklyisma* geben kann, wie bei den Blutungen (S. 55) beschrieben ist. Intern wendet er 8 bis 10 Tropfen einer *Adrenalinlösung* 1 : 1000 an. In ganz vereinzelt Fällen immer wieder sich meldender schwerer Blutungen kann man in Anstalten von der Unterbindung der zuführenden Gefäße Gebrauch machen (die Unterbindung der Art. hypogastrica ist übrigens nach dem Vorschlage ORTNER'S [Ried] extraperitoneal durchführbar). Ein altes, gelegentlich auch in unserer Zeit wieder empfohlenes Verfahren der Behandlung inoperabler Karzinome und besonders der Korpuskarzinome, ist die Verätzung des Krebses mit *Chlorzink* nach DUMONT-PELLIERE. Man kann Chlorzink in Substanz, verdünnt mit Wasser 1 : 2 oder 2 : 1 in ausgedrückten Wattebäuschchen in den Halskanal bringen, muß aber durch feuchte, in Natrium-Bicarbonatlösung getränkte Tampons die Scheide vor der Verätzung schützen. So kann man Blutungen, wie sie trotz gründlicher Verschorfung noch auftreten können, zum Stillstand bringen, doch darf nicht vergessen werden, daß das Verfahren schmerzhaft ist und auch gar nicht ungefährlich, weil sich sehr tiefe Ätzschorfe bilden können. Das ist ganz besonders zu bedenken, wenn man das Verfahren beim inoperablen Korpuskarzinom anwendet. Nach Erweiterung des Halskanals legt man Chlorzinkstäbchen in die Gebärmutter von 8 mm Dicke und 7 cm Länge, die nach folgender Vorschrift bereitet werden:

130. Zinci chlorati . . . . .	20,0—40,0
Zinci oxydati . . . . .	10,0
Farina trit. . . . .	30,0
Aq. q. s. ut. f. bac. . . . .	8 × 70 mm

Natürlich muß auch hier die Scheide vor der Verätzung geschützt werden. Unter Temperatursteigerung und heftigen krampfartigen Schmerzen kommt es zu völliger Nekrose um das Stäbchen herum, und in der zweiten Woche kann man, wie dies DRIESSEN neuerdings gezeigt hat, den Ausguß mit der Kornzange herausheben. Für solche Fälle kann man zur Chlorzinkätzung immerhin gelegentlich greifen, um so mehr, als man bei den inoperablen Korpuskarzinomen mit der Bestrahlung nicht gerade Glänzendes erzielt.

Die schwierigste Aufgabe des Arztes bleibt eine gute symptomatische Behandlung der so mannigfaltigen Beschwerden der Karzinomträgerin. Sie ist eine große Kunst, und es ist begreiflich, wenn CHROBAK sagte, daß er stolzer war, wenn es ihm gelang, eine solche Frau bis zu ihrem Ende über ihren wahren Zustand hinwegzutäuschen, als über eine gelungene Operation. Zunächst sind es die Schmerzen, die keiner Frau erspart bleiben; wenn sie sich auch anfänglich in erträglichen Grenzen halten, später erreichen sie meist hohe Grade. Es ist natürlich sehr einfach, sie gleich mit Morphin zu bekämpfen. Bei einer längeren Dauer, wie sie diese schreckliche Krankheit hat, muß man sich auf einen langen Behandlungsplan gefaßt machen, in dessen Verlauf man mit dem Morphium so umgehen soll, daß es auch in den letzten Stadien seine wohltätige Wirkung nicht versagt. Wir beginnen grundsätzlich mit der großen Serie der bekannten Antineuralgica und Nervina, angefangen von den einfachen Pulvern *Pyramidon*, *Antipyrin*, *Salipyrin*, *Migränin*, *Aspirin*, *Codein*, *Dionin*, *Gardan*, *Compral*, übergehend zu den Mischpulvern *Veramon*, *Phenacodin*, *Codein-Amidopyrin*, *Codein-Migränin*, *Cibalgin*, *Titretta analgica*, *Dormalgin*, *Treupelsche Tabletten*, *Gelonida antineuralgica*, *Neocratin*, *Belladonna*, bis wir zu *Dicodid*, *Dilaudid*, *Pantopon* und *Morphin* gelangen. Besonders bewährt haben sich die Mischpulver in der MARBURG'schen Zusammensetzung:

131. Amidopyrin.	
Phenacetin. . . . .	aa 0,3
Coff. natr. benz. . . . .	0,1
Codein. phosphor. . . . .	0,02

Vor dem Morphin versuchen wir es noch mit dem *Kirschlorbeerwasser* (mehrmals täglich 20 Tropfen Aqu. laurocerasi). Die *Morphindarreicherung* beginnen wir grundsätzlich mit *1%iger Lösung in Tropfen*, gehen zur *2%igen* über, geben es dann in *Tabletten* oder *Pulvern*, in *Stuhlzäpfchen* und schließlich in *Injektionen*; manchmal genügen auch diese nicht und wir müssen zum *Modiscop*-, *Stark* greifen (Morphin 2%ig — Dionin 3%ig — Scopolamin 0,04%ig). Der vielerfahrene ZWEIFEL hat folgendes Rezept für solche Fälle als manchmal bis zum Tode ausreichend angegeben:

132. Morph. hydrochlor. ....	0,6
Eumidrin .....	0,2
Aqu. dest. ad .....	30,0

D. S. 3mal täglich 15 Tropfen.

Eine kolossale Plage für die Frau bedeutet das Auftreten von Fisteln, von denen die Blasen-Scheidenfisteln auch bei sauberster Pflege, ständigem Wechsel der Unterlagen, Auftragen von Zinkpasta in dicken Lagen über der äußeren Scham und an den Genitoglutfalten das Wundwerden nicht verhindern können. Am besten ist es noch, in solchen Fällen ein Urinale zu geben und durch Spülungen mit *Kalium-hypermanganicum*, 3%igem *Wasserstoffsperoxyd* und 1%igem *Thymol* den Geruch zu bessern. Auch ein Tampon in *Karbol* getaucht und mit *Wismut* eingefettet, hält den Harn etwas zurück und nimmt den Geruch. FRITSCH und STÖCKEL empfehlen Umschläge mit *Aqua chlorata* zu machen, um den Geruch zu bessern. Die Stuhlbeschwerden beim Karzinom sind oft auch geradezu unerträgliche. Milde Einläufe mit Kamillen oder Öl, am besten am Abend gemacht ( $\frac{1}{4}$  Liter) und milde Abführmittel (siehe diese) sind nicht zu umgehen.

Bekanntlich ist der Ausgang vieler solcher Fälle der in Urämie, eine Wohltat für die Patientin, die ihre letzte Lebenszeit benommen dahindämmert und der Schwere ihres Zustandes sich nicht bewußt ist. Da sie auf der Kompression der Harnleiter und damit auf der Unmöglichkeit der Harnausscheidung beruht, hat man versucht, ihr chirurgisch beizukommen und sozusagen prophylaktisch die Harnleiter per laparotomiam oberhalb des Krebses in die Blase einzupflanzen, um sie länger durchgängig zu erhalten. In Fällen ausgesprochener Urämie hat man auch die Nephrostomie vorgeschlagen. Derartige Operationen sind wohl grundsätzlich verfehlt. Die innere Therapie der Urämie kann in diesen Fällen nur eine symptomatische sein. Sie wird sich hauptsächlich gegen das Erbrechen wenden, gegen welches wir 2 Tropfen *Jodtinktur* in einem Eßlöffel Wasser und Nachtrinken von Milch verordnen oder von der *Aqu. chloroformiata* 2stündig 1 Eßlöffel. Wir werden *Eispillen* schlucken lassen, eisgekühltes *Selterswasser* geben, im übrigen aber sind wir gegen die gründliche Ausscheidung von Giftstoffen in diesen Fällen so gut wie machtlos. Bei urämischen Konvulsionen können wir gelegentlich durch eine *Venae sectio* wenigstens diese beseitigen, wobei wir etwa 200 bis 300 ccm Blut entnehmen. Die heftigen Kopfschmerzen werden durch *Migränin*, *Antipyrin*, *Phenacetin*, das *Marburgsche Pulver* usw. und durch *Eisbeutel* einigermaßen gelindert. Schließlich wird man bei großer zerebraler Unruhe wieder zur Morphiumspritze greifen.

### Ovarialgeschwülste.

Es sollte nicht mehr vorkommen, daß echte Geschwülste des Eierstockes von Ärzten zur Bestrahlung uns in Fällen zugewiesen werden, in denen an der Tatsache der Geschwulst und ihrer Operabilität nicht gezweifelt werden kann. Es soll aber auch nicht geschehen, daß Kystome des Eierstockes, die ohne weiteres als solche erkennbar sind, heute noch

punktiert, ja mehrmals punktiert werden, und unter der Diagnose Wassersucht laufen. Die rechtzeitige Erkennung der Eierstocksgeschwulst ist von der größten Tragweite. Würde man die gutartigen Ovarialgeschwülste in eine Skala der Gefährlichkeit der Genitalgeschwülste überhaupt einreihen, so müßten sie zwischen den Myomen und den Karzinomen stehen. Sie sind jedenfalls weit ernster zu nehmen als die Myome, weil sie, mögen sie gutartig sein und auch bleiben, in sich den unaufhaltsamen Trieb des Wachstums bergen, ganz im Gegenteil zum Myom, das wachsen kann, aber nicht wachsen muß. Auch heute kommen noch riesige ein- und mehrkammerige Geschwülste vor, von denen ihre Trägerin den Stillstand ihres Wachstums erhofft, allein vergeblich. Ist dieser Punkt schon von größter Wichtigkeit, so sind es die anderen Gefahren, die von den Eierstocksgeschwülsten ausgehen, nicht minder. Das sind die Stieldrehung, die Ruptur, die Vereiterung, die Blutung in stielgedrehte und nicht stielgedrehte Tumoren und ganz besonders die maligne Entartung, die bei gutartigen Geschwülsten in 20% der Fälle beobachtet wird. Nicht weniger als 17% aller Genitalkarzinome sind solche des Eierstocks (LIEPMANN). Es gibt für jedwede Eierstocksgeschwulst nur eine Therapie und das ist die Operation, und es dreht sich alles darum zu erkennen, daß eine Geschwulst vorliegt. Darum ist es eine unverrückbare Notwendigkeit, an der die Strahlentherapie nichts geändert hat, jede überfaustgroße Ovarialgeschwulst operativ anzugehen. Ist freilich die Geschwulst von Haus aus bösartig, dann hat man leider mit der Radikaloperation nur recht geringe Erfolge, beträgt doch die durchschnittliche Lebensdauer von operierten Ovarialkarzinomen kaum mehr als 1 Jahr (STOECKEL). Man kommt eben meist zu spät. Hinsichtlich der Vorhersage bewährt sich am besten die Erfahrung FRANKLS, derzufolge Karzinome der Eierstöcke, natürlich primäre, die noch innerhalb der Kapsel liegen, gute Heilungsaussichten geben, alle anderen aber schlechte. Trotzdem ist auch bei inoperablen Karzinomen in der Mehrzahl der Fälle eine Laparotomia probatoria angezeigt. Abgesehen davon, daß es oft gelingt, subjektiv durch Entfernung des Ascites entlastend zu wirken, ist man nicht selten in stände, große Tumoren der Hauptsache nach zu entfernen, womit einerseits für die Patientin eine gewisse Erleichterung geschaffen, anderseits einer postoperativen Bestrahlung der im Bauchraum verstreuten Metastasen die Wege gut vorbereitet werden. Eine regelmäßige Röntgen-nachbestrahlung vermag nicht nur das Leben zu verlängern, sondern gelegentlich auch, selbst bei erwiesener Bösartigkeit und Unmöglichkeit einer radikalen Operation, nach Entfernung der Hauptmassen des Tumors durch die Operation, den Zustand durch Jahre so leidlich zu erhalten, daß man von einer Heilung sprechen kann (v. FRANQUE, SIMON u. a.). Wo der praktische Arzt auch nur den entfernten Verdacht einer Eierstocksgeschwulst hat, insbesondere, wo es ihm nicht klar wird, ob eine Entzündung oder ein Tumor vorliegt, wo eine Zyste mehr als Faustgröße erreicht, soll er jede weitere konservative Behandlung ablehnen.

Die symptomatische Behandlung inoperabler Ovarialgeschwülste deckt sich vielfach mit den Maßnahmen, wie sie bei der sympto-

matischen Behandlung der Allgemeinbeschwerden beim inoperablen Uteruskarzinom erwähnt sind. Die von ORTNER (Ried) bei inoperablen Karzinomen, ganz besonders beim inoperablen Gebärmutterkrebs empfohlene Darreichung von *Lebertran* scheint auch nach Verfassers bisherigen Erfahrungen in der Tat nicht nur den Verlauf langsamer zu gestalten, sondern auch der Kachexie beträchtlich entgegenzuarbeiten, so daß für alle inoperablen Karzinome, sofern sie nicht ganz verlorene Fälle darstellen, diese Therapie nur empfohlen werden kann. Über die Leistungsfähigkeit der diätetischen, das tierische Fett ganz ausschaltenden Behandlung FREUNDS, sind die Akten noch nicht geschlossen. Im allgemeinen sollen wir u. E. nach in derartigen Fällen nach Ausschöpfung der Operations- und Bestrahlungsmethoden den verschiedenen, in der Krebsbekämpfung vielfach angewendeten, wenn auch nicht durchwegs anerkannten Mitteln nicht ganz ablehnend gegenüberstehen. Ist auch ihr Erfolg durchaus zweifelhaft, so vermag man damit vielleicht doch in dem einen oder anderen Falle den Zustand zu bessern und der verzweifelten Kranken damit einen Hoffnungsfunken geben. Bei den Eierstocksgeschwülsten kommt als ein die Behandlung erschwerender Umstand noch die große Ileusgefahr hinzu, die man infolge Kompression des Darmes durch solche Tumoren sieht, ferner der rasch wachsende Ascites und die schlechte Lüftung der Lunge durch den Hochstand des Zwerchfells. Bauchpunktion kann für einige Zeit recht vorteilhaft wirken, gar dann, wenn die wiederholte postoperative Röntgenbestrahlung, die nie verabsäumt werden soll, in ihrer Wirkung nachläßt. Es ist kein Zweifel, daß in einzelnen Fällen die Kolostomie als letzter Ausweg zu machen ist, doch finden sich für sie begreiflicherweise auch hier nicht viele Freunde, weil sie nur geeignet ist, den unleidlichen Zustand etwas länger hinzuschleppen. — Der Versuch einer erhöhten Diurese durch

133. Liquor. kali. acetici . . . . . 30,0  
 Ol. Petroselini gtt. III  
 Aqu. ad . . . . . 200,0  
 D. S. 3stündlich 1 Eßlöffel.

und durch Harnstoff (Urea 2mal täglich 10 g) kann gegen Ascites versucht werden (vgl. auch S. 174).

Es ist eine nicht zu verkennende Tatsache, daß den Eierstockskrebsen, die nächst dem Kollumkarzinom die häufigste bösartige Krankheit der Genitalorgane sind, nur ein kleiner Teil jener Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie den Geschwülsten der Gebärmutter. Das hat seinen begreiflichen Grund einerseits im vielfach symptomlosen Aufkeimen dieser Geschwülste, andererseits im rapiden Wachstum und schließlich in der zunächst unerkant vor sich gehenden bösartigen Degeneration ursprünglich gutartiger Geschwülste.

Eine eigene Gruppe bilden neben den Epithelialgeschwülsten, den Cystomen und Karzinomen, die bindegewebigen, die Fibrome und Sarkome, welche ebenfalls operativ beseitigt werden, und eine dritte bilden die Dermoide und ihre bösartige Spielart die Teratome,

für die es auch nur das Messer als Therapie gibt. Schließlich kommen noch Fälle von sogenannten Krukenbergtumoren vor, wohl umschriebenen, großen, durch ein typisches mikroskopisches Bild ausgezeichneten metastatischen Geschwülsten, deren Operation immer anzuraten ist, wo dies angeht, nicht bloß deswegen, weil sie eine wesentliche Befreiung für die Frau bedeutet, sondern weil es gelingen kann, sei es im selben, sei es in einem späteren Akte, den Primärtumor — etwa im Magen, Darm, der Gallenblase oder im Dickdarm — zu exstirpieren und die Frau gesund zu machen. Über Granulosazelltumoren s. S. 59.

### Vaginal- und Vulvakarzinom.

Diese glücklicherweise selteneren Karzinomformen sind leicht erkennbar und werden vom praktischen Arzt, ohne den verschiedenen therapeutischen Wegen des Facharztes vorgreifen zu wollen, ehetunlichst diesem zugewiesen. Den Angehörigen gegenüber darf der praktische Arzt hinsichtlich der Vorhersage nicht hinter dem Berg halten, die bei der Behandlung, Operation wie Bestrahlung, ebenso wie bei der Operation und Nachbestrahlung, eine traurige ist. Wenn auch hier Heilungen vorkommen, so gilt dies noch eher vom Vulva- denn vom Vaginalkarzinom, welches besonders schlechte Ergebnisse bei der Operation und wie es scheint, noch schlechtere bei der Bestrahlung — seltene Fälle ausgenommen — zeitigt. Für das Vulvakarzinom, welches einmal besonders bösartig, ein anderes Mal wieder weniger bösartig sein kann, lassen sich auch heute allgemeine Regeln für eine einheitliche Behandlung nicht aufstellen. Operation und Strahlenbehandlung mit Radium, Spicken des Primärtumors mit Radiumnadeln und Röntgenbestrahlung sind die Verfahren, welche teils für sich, teils vereint zur Anwendung kommen. Dabei erweist sich die notwendige Behandlung der Drüsen auch recht schwierig. In weniger vorgeschrittenen Fällen ist die Entfernung der Vulva mitsamt den zugehörigen Drüsen ein zwar großer, aber immerhin nicht aussichtsloser Eingriff. Die Nachbehandlung rezidivierender Fälle stellt an den praktischen Arzt im Hause die größten Anforderungen an dessen Geduld und Fähigkeit, die Schmerzen und mannigfaltigen Beschwerden zu lindern. Bei mächtig wuchernden, fressenden Geschwülsten erweist sich das Halten solcher Patienten im Wasserbette besonders wohltätig.

### Behandlung der Endometriosis.

Diese Krankheit gewinnt in den letzten Jahren immer mehr und mehr an Bedeutung. Aus der verwirrenden Fülle dieser durch Wucherung endometroiden Gewebes am unrichtigen Ort ausgezeichneten Krankheitsbilder lassen sich heute drei Gruppen herausheben, welche für die Erkennung und Behandlung genügend Klarheit bieten. Man unterscheidet die interne Endometriosis, die intraperitoneale und die retrozervikale Endometriosis. Was die Endometriosis interna mit dem Sitze im

Uterus anlangt, so ist das Symptomenbild durch vermehrte und verlängerte Menstruationsblutungen, aber auch durch unregelmäßige Blutungen und durch Dysmenorrhoe gekennzeichnet. Es findet sich vielfach in diesen Fällen ein großer harter, meist druckschmerzhafter, schlecht beweglicher Uterus mit kurzen Parametrien, häufiger bei Frauen in den Vierzigerjahren, seltener früher. Die Probeabrasio gibt keine Klärung der Diagnose. Auch von der Ausschabung als Therapeutikum haben wir nie viel gesehen. Das wichtigste ist, daß aber auch die Röntgenbestrahlung gar nicht selten Versager aufweist. Die vaginale Totalexstirpation ist in derartigen Fällen das Verfahren der Wahl.

Sehr schwer zu erkennen ist die intraperitoneale Endometriosis. Oft geht sie lange unter der Diagnose von Adnextumoren, die der konservativen Behandlung trotzen, und ist auch nicht selten gegenüber der Tuberkulose in Differentialdiagnose zu ziehen. Auffällig bleibt, daß mehr als bei der internen Endometriosis die Beschwerden vom Ovarialzyklus zwangsläufig abhängig sind. Während desselben kommt es auch zu Blutungen in das am Ovar und Peritoneum sitzende Gewebe, welche im Ovar dann zu den bekannten Teer- und Schokoladezysten führen. Wie SERTZ betont, neigen diese Zysten infolge der Nachgiebigkeit ihrer dünnen Wände unter dem Druck des sich immer wieder ergießenden Menstrualblutes zur Zerreißen und damit zur neuen Aussaat heterotoper Herde aufs Peritoneum. Die dysmenorrhöischen Beschwerden sind besonders heftig und pflegen an Stärke von Monat zu Monat zuzunehmen. Vorsichtiger Gebrauch von Jobbädern (Bad Hall, Tölz) sollen nach VOGT günstig wirken. Die Entscheidung über die Therapie gehört zu den schwierigsten Punkten. Man folgt am besten SERTZ, wenn man es zunächst zufolge der Bindung des Krankheitsbildes an den Ovarialzyklus mit der Kastrationsbestrahlung versucht, mit der man hier weit bessere Resultate als bei der uterinen Endometriosis erlebt, indem man den das Krankheitsbild immer verschlechternden Zyklus abschneidet. Dadurch sieht man die peritonealen Reizerscheinungen und die Dysmenorrhoe schwinden, die Tumorbildung sich auch meist verkleinern. Wichtig ist der Rat von SERTZ, bei jüngeren Frauen es zuerst mit kleineren Dosen oder mit der temporären Kastration zu versuchen. Was die Operation anlangt, die in Fällen größerer Schokoladezysten, heftigen Beschwerden und Erfolglosigkeit der Röntgenbestrahlung in Frage kommt, so scheint durch die bloße Entfernung einer Teerzyste und der Erhaltung eines Ovars noch weniger die Rezidivfreiheit gewährleistet als bei der Bestrahlung, wengleich in Ausnahmefällen nach einseitiger Ovariectomie Heilung sogar mit nachfolgender Schwangerschaft beobachtet worden ist (MENGE). Jedenfalls ist die Radikaloperation in derartigen Fällen das sicherste Mittel gegen Rezidive, wengleich die Operation technisch infolge der zähen Verwachsungen mit dem Darm sehr schwierig werden kann. In Fällen nahe der Menopause ist das Krankheitsbild durch Eintritt der Klimax auch durch die Natur im Sinne der Besserung und Heilung beeinflusbar, doch ist darauf kein sicherer Verlaß.

Eine wahre Crux für den behandelnden Arzt, aber noch mehr für die

Frauen können die Fälle von retrozervikaler Endometriosis bilden, die man leider auch in recht jungen Jahren zu Gesicht bekommt. Tumorartige Infiltrate zwischen hinterer Zervixwand und Vagina mit der Neigung, sich gegen die Rektumwand zu verbreiten, ja dieselbe zu durchsetzen, charakterisieren dieses Krankheitsbild, welches geradezu unerträgliche dysmenorrhische Beschwerden auslösen kann. Ob einer Kur in *Jodbädern* mehr als ein symptomatischer Erfolg zukommt, bleibe unentschieden. Zweifelsohne dürfte die Entlastung des Darmes durch den *Enterocleaner* nach der Empfehlung VOGTS, anfangs zweimal, später einmal in der Woche die Beschwerden lindern. *Spasmolytica*, Wärme in jeder Form, wie überhaupt alle jene Maßnahmen, welche bei der Behandlung des dysmenorrhischen Anfalles (S. 36 ff.) geschildert wurden, sind nicht zu entbehren. Was die eigentliche Therapie anlangt, so ist wohl auch hier die Röntgenbestrahlung das am meisten zu empfehlende Verfahren. Sie kann in leichteren Fällen und bei jüngeren Frauen in Form der temporären Kastration versucht werden, während solche mit ausgesprochener Neigung zur Ausbreitung besser von vornherein dauernd kastriert werden. Gegenüber der Bestrahlung leistet die Radikaloperation bei ihren keineswegs geringen Gefahren (Rektumverletzung, allenfalls Notwendigkeit der Resektion desselben) nicht mehr, besonders dann, wenn man in besonders hartnäckigen Fällen die Röntgenkastration mit Radiumbehandlung verbindet.

Auch die Blasenendometriose, welche zuerst von OTTOW mit dem Zystoskop erkannt worden ist, zeichnet sich durch die Abhängigkeit der Symptome — vermehrter Harndrang, Schmerzen bei der Entleerung, blutiger Harn — vom Ovarialzyklus aus. Solche Zeichen können namentlich bei jungen Frauen für den Untersucher ein wichtiger Hinweis auf eine etwa bestehende Endometriosis sein.

## Grundsätze für die Behandlung der Lageanomalien.

### 1. Enteroptose.

#### Ursachen, Bedeutung und Prophylaxe der Enteroptose.

Wenn man die Lageabweichungen der Gebärmutter richtig kritisch würdigen will, insbesondere wenn man die durch Falschlage verursachten Beschwerden nicht einseitig und daher unsachgemäß behandeln, sondern mit dem Blick aufs Ganze gerichtet kurieren will, muß man sich so gut wie in jedem Falle die Frage vorlegen, ob nicht Beschwerden von Seite abwegiger Haltung der Genitalorgane nur Teilerscheinung eines allgemeinen Krankheitsbildes, nämlich des der Senkung des Eingeweideblockes, der Enteroptose, sind. Die Bedeutung der Enteroptose ist für das weibliche Geschlecht eine überragende. Bekanntlich ist die Enteroptose fast immer Teilerscheinung und Ausdruck der Asthenie, einer angeborenen schlaffen Beschaffenheit der Gewebe, der so viel genannten schlaffen Faser, welche sich einerseits im Bereiche der Brustorgane durch

Tiefstand der Lungen und des Zwerchfelles, Verschwinden der Sinus pleurocostales, durch Tropfenherz kundtut, anderseits in der Senkung entweder des gesamten Eingeweideblockes oder bestimmter Organe, Magen, Niere, seltener Leber, Milz und ganz besonders in der Senkung des Genitalapparates und dem Nachgeben der vorderen Bauchwand gekennzeichnet ist. Oft genug ist bei einer solchen abwegigen Konstitution eine Reihe von Schädlichkeiten aufzuzeigen, welche bei der bestehenden Anlage das Maß des für einen so gebauten Körper Tragbaren voll machen und zu recht lästigen, das Leben zwar nicht verkürzenden, aber die Lebensfreude ebenso wie die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigenden Zuständen führen. Neben einer besonders leichten Ermüdbarkeit sind es quälende Kreuzschmerzen, ziehende Schmerzen in den Leisten, in der Lendengegend, Schmerzen in der Gegend des Nierenlagers, die mannigfaltigsten Beschwerden von Seite des Magens, Stuhlverstopfung, das lästige Gefühl des Verlierens der Genitalorgane, das quälende Bewußtsein des wie ein Keil zwischen die Schamlefzen herabtretenden Genitales auch bei geringer Senkung desselben, Schmerzen in den unteren Gliedmaßen, schließlich und nicht zuletzt allgemeine Beschwerden, häufige Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, seelische Verstimmung u. ä. Aber auch ohne eine besondere Anlage, ohne ausgesprochene Zeichen des Infantilismus und der Asthenie können dieselben Beschwerden in erster Linie infolge mangelhafter Wochenbettpflege zur Entwicklung kommen, besonders bei schweren, operativen, aber auch nach durchaus normalen Geburten, wenn sie rasch aufeinanderfolgen und wenn nach deren Ablauf sogleich harte körperliche Arbeit ohne Schonung betrieben werden muß. Sie kommen auch als Folge unzweckmäßiger, durch schwere körperliche Arbeit bedingter, namentlich sitzender Berufsarbeit vor. Wenn sie auch in der überwiegenden Mehrzahl Frauen, die geboren haben, betrifft, so sind auch Nulliparae, besonders solche asthenischer Konstitution davor nicht gefeit. Wie MATHES, MAX HIRSCH und SELLHEIM zeigen konnten, erlahmen bei solchen Frauen mit dauernder sitzender Beschäftigung die Beckenbodenmuskeln. Auch Rücken- und Kreuzschmerzen stellen sich als Anzeichen der Lockerung der Haftapparate ein. „Der Uterus schwebt mehr oder weniger in der Luft und zerrt an den von ihm zur Beckenwand ziehenden empfindlichen Gebilden“ (SELLHEIM). So bildet sich als Vorstufe der Enteroptose, der Senkung und des Vorfalles ein bezeichnendes Krankheitsbild heraus, dem SELLHEIM den treffenden Namen „die schwebende Pein“ gegeben hat.

Enteroptose kann auch infolge mangelhafter, zu rascher Abmagerung führender Ernährung bedingt sein. War das im Krieg und in den ersten Nachkriegsjahren eine vielfach unausbleibliche Folge der Not, so ist es heute, wie man sich nicht selten überzeugen kann, eine durchaus vermeidbare Folge unnatürlicher, auf eine gefährliche Spitze getriebener Abmagerungskuren, welche sich bis vor kurzem bei Jung und Alt einer zunehmenden Beliebtheit erfreuten. Gerade diese Abmagerungskuren sind es, welche in jedem Lebensalter, besonders aber bei klimakteriumnahen Frauen, das Bild der Enteroptose auslösen und, um als Gewährsmann

MENGE anzuführen, zu einem körperlichen und geistigen Zusammenbruch führen können, wird doch das Herz und das Nervensystem, gar bei Hungerkuren unter Anwendung von reichlichen salinischen Abführmitteln und Thyreoideapräparaten, manchmal einer kaum tragbaren Belastung ausgesetzt.

Der häufigsten Ursache der Enteroptose bei einer Neigung zu diesem Zustandsbilde, nämlich der Erschlaffung der Bauchdecken, der Bauchwand und der Beckenbodenmuskulatur durch die Geburten muß man durch entsprechende Schwangerschafts- und Wochenbettprophylaxe begegnen. In jenem Zustand durch Verordnung eines Stützmieters für das wachsende Abdomen, das vom 5. Monat an zweckmäßig getragen wird, durch Fortsetzung einer leichten, für die Verhältnisse der Schwangerschaft entsprechend abgestuften täglichen Leibesübung, wie sie von SIEBER in seiner empfehlenswerten Schrift ausgearbeitet ist oder zumindest wenigstens durch Atemübungen, welche in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft wohl die einzig zulässige Methode der Gymnastik darstellen und auch bei an Gymnastik nicht gewöhnten Frauen vielfach für die ganze Zeit der Schwangerschaft genügen, besonders dann, wenn regelmäßige Spaziergänge eingeschaltet werden. Gerade die Atemübungen sind mit Rücksicht auf die unter der Geburt notwendige Zwerchfellarbeit von der größten Wichtigkeit (EDITH v. LOHLÖFFEL), da durch sie der Hauptatemmuskel, das Zwerchfell, besonders in Anspruch genommen wird. Mit der Massage, die zweifelsohne die Muskeln stärkt, besser durchblutet und den Rücklauf des Blutes ebenso erleichtert, wie sie den Stoffwechsel günstig beeinflusst, muß man natürlich vorsichtig sein; sie darf nur von geübter Hand ausgeführt werden. Auf ihre Technik kann hier nicht eingegangen werden, doch seien in dieser Hinsicht die einschlägigen Schriften von SIEBER, KOBLANK und KIRCHBERG empfohlen. Von größtem Wert ist die Wochenbettprophylaxe, die mehr leisten kann als die Therapie bei der einmal ausgebildeten Enteroptose. Sie beginnt mit der Anlegung einer Schnallenbinde oder einer breiten, aus Gummistoff bestehenden oder der dasselbe leistenden wohlfeilen *Lastexbinde* nach KAZDA, welche sich dem verringerten Umfang des Bauches anpaßt und den schlaffen Bauchdecken die erste Stütze verleiht, und findet ihre Fortsetzung durch eine leichte, am zweiten Tage nach der Geburt beginnende Gymnastik, die in Atemübungen und in aktiven Bewegungen zur Stärkung der Bauch- und Beckenbodenmuskulatur, sowie in aktiven Bewegungen der Gliedmaßen zur künstlichen Strombeschleunigung im Venensystem der unteren Körperhälfte besteht. Die von WALTHARD an der Züricher Frauenklinik eingeführte Wochenbettgymnastik, welche vom Verfasser nur nach Spontangeburt ohne ausgiebige Episiotomie geübt wird, besteht im wesentlichen im Folgenden: 2. Tag: 1. Tiefes Ein- und Ausatmen in Rückenlage. 2. Beugen und Strecken der Knie. 3. In Rückenlage Arme vorwärts, aufwärts und seitwärts heben. Am dritten Tag werden diese Übungen mit Aufrichten des Rumpfes verbunden, jede Übung 5mal ausgeführt und außerdem 10mal täglich das Zusammenkneifen des Afters wie bei der Zurückhaltung

dünnen Stuhles empfohlen. Diese WALTHARDSchen Übungen werden gerne von den Wöchnerinnen gemacht, da sie nicht ermüdend wirken. Wenn es auch richtig ist, daß das Frühaufstehen — normale Wundverhältnisse des Genitalkanals vorausgesetzt — wenn es unter Leitung des Arztes und einer entsprechend geschulten Schwester geübt wird, für die Tonussteigerung der Muskulatur, insbesondere der Beckenboden- und Bauchmuskeln Hervorragendes leistet, so stehen doch dem Frühaufstehen ernste Bedenken in dem Sinne gegenüber, daß von der Mehrzahl der Frauen, namentlich der arbeitenden Kreise, das Frühaufstehen so gut wie immer mit der gleichzeitigen Aufnahme der Hausarbeit verbunden wird, und das ist schlecht, weil sie zu große Anforderungen an die Wöchnerin stellt. Unter solchen Verhältnissen ist es zweifelsohne besser, wenn im Wochenbett eine längere Bettruhe von etwa 8 bis 10 Tagen eingehalten und der Erschlaffung der Muskulatur und der Überdehnung der Bauchdecken durch die beschriebenen Turnübungen entgegengearbeitet wird. Es bedarf natürlich keiner besonderen Betonung, daß jede Gymnastik im Wochenbett bei Thrombosegefahr oder gar bei Thrombose zu unterbleiben hat.

### Behandlung der Enteroptose.

Trotz dieser Prophylaxe sind wir so und so oft nicht imstande, der Ausbildung einer Enteroptose Einhalt zu tun, insbesondere, wenn die Schädlichkeiten der Unterernährung und schwerer körperlicher Arbeit nicht zu umgehen sind. Gelingt es im Einzelfalle, wo harte Körperarbeit mit unzweckmäßiger Zwangshaltung Hauptschuld einer Enteroptose ist, dieselbe günstiger zu gestalten oder kann die Arbeit eingestellt werden, dann ist viel gewonnen. Wo es die Unterernährung ist, erweisen sich immer noch 4- bis 6wöchige Liegekuren, am besten in Anstalten in mittlerer Höhenlage, als weitaus die zweckmäßigsten Behelfe. Durch solche Liegekuren wird Gewicht angesetzt, die Fettlager und die Aufhängeapparate des Eingeweideblocks werden verstärkt, die allgemeine Nervenruhe tut ein übriges, um auch die Schmerzen und mannigfaltigen Beschwerden zu lindern. Man kann dabei eine *Mastdiät* anordnen, kommt aber auch ohne ausgesprochene Mastkur in leichteren Fällen aus, indem man alle 2 bis 3 Stunden hochwertige Nahrung verabreicht, in der man überdies 70 bis 80 g Butter auf Brot, in Gemüsen und fetten Süßspeisen geschickt und bekömmlich unterbringt. Statt Wasser läßt man den Tag über Milch trinken. Sehr nahrhaft ist die Verabreichung einer Mehlsuppe mit reichlich guter Butter vor dem ersten Frühstück. Bei Widerwillen gegen Milch gebe man Kefir. Auch Fettkäse ist empfehlenswert. Den Appetit steigert man aber dadurch, daß man leichte hydriatische Prozeduren, Teil- und Ganzabreibungen, Strahlen- und Fächerduschen auf Bauch und Damm und Vollbäder (mindestens 3mal wöchentlich) mit einer am Morgen auszuführenden täglichen Gesamtmassage des Körpers verbindet. Dadurch wird die Muskulatur infolge ihrer besseren Durchblutung gekräftigt, die Zirkulation durch erhöhte Saug- und Druckwirkung auf die Venen gebessert und

der Gasstoffwechsel erhöht. Sie ist auch bei der gleichzeitig so oft bestehenden Stuhlverstopfung ein ausgezeichnetes Mittel zur Belebung der darniederliegenden Darmtätigkeit, und auch bei Gastropose in Form von Klopf- und Schüttelbewegungen empfehlenswert. Es muß also die Patientin täglich das Bett verlassen, und dann am besten in Verbindung mit leichten Turnübungen massiert werden, bevor die diätetische Liegekur beginnt. Zweifelsohne wirkt eine nur wenige Kilogramm betragende Zunahme des Körpergewichtes oft Wunder. Appetitanregende Mittel wie die *Tinct. Amara* mit und ohne *Tinct. aromatica aa* ( $\frac{1}{4}$  Stunde vor dem Essen 20 Tropfen in Wasser) oder

134. Acid. hydrochlor. dilut. . . . . 5,0  
 Vin. Condurango ad . . . . . 30,0  
 D. S. 3mal täglich 25 Tropfen.

dann die *Chinatinktur* (10 bis 20 Tropfen) und der *Chinawein* (1 Eßlöffel vor dem Essen) unterstützen die Behandlung. *Tonika* wie der *Hellsicolsyrup* oder das *Recresal* (2mal täglich 1 bis 3 Tabletten oder 25 Tropfen in der Suppe), *Phosvitanon*, *Tonicum Roche* u. a. können ein übriges tun. Auch die freilich vielfach überschätzten *Nährpräparate* wie z. B. *Eatan*, *Somatose*, *Plasmon*, *Sanatogen*, *Ovomaltine*, *Robural*, *Promonta*, *Hygiama* können herangezogen werden, wenn die Geldverhältnisse es erlauben.

Man darf auch nicht vergessen, daß die Beschwerden der Enteroptose auch im entgegengesetzten Verhalten, nämlich in übermäßiger, besonders rascher Gewichtszunahme und ausgesprochener Fettsucht gelegen sein können. Hier ist der Hängebauch und mit ihm die Kreuzschmerzen und das ganze Bild der Enteroptose durch die Zunahme des Fettgewebes bedingt. Deshalb muß in solchen Fällen eine ärztlich geleitete und recht vorsichtig abgestufte Entfettungskur einsetzen, soll es besser werden. Die bekannten Diätvorschriften, welche weitgehend das Fett und die Kohlehydrate einschränken, ohne bei reichlicher, aber nicht zu reichlicher Eiweißzufuhr unter Beigabe von Gemüse, Obst und Fruchtsäften ein Hungergefühl aufkommen zu lassen, finden wieder unter ärztlicher Leitung in der Verabreichung von Schilddrüsenpräparaten eine wertvolle Unterstützung, am besten so, daß durch 14 Tage hindurch 0,3 g der Schilddrüsensubstanz täglich gegeben wird, wobei bei den ersten Störungen des Allgemeinbefindens mit dem Präparate ausgesetzt werden muß. Werden Hunger- (Milch- oder Obst-) Tage eingeschaltet, so darf dies niemals ohne gleichzeitige Verordnung von Bettruhe geschehen. Daneben kommen noch die bei der Amenorrhoe und Fettsucht erwähnten Abführmittel in Frage, ebenso eine entsprechende Muskelbetätigung durch Gymnastik, welche das einzig verlässliche physikalische Hilfsmittel der Entfettung ist. Ausgezeichnetes leistet, wie bekannt, eine Abmagerungskur in Marienbad, Franzensbad, Mergentheim und anderen Badeorten. Einer neuerlichen Gewichtszunahme kann man zweckmäßig durch *Lipolysingaben* bei entsprechender Diät vorbeugen.

Nicht zu umgehen ist in Fällen schwererer Enteroptose neben Gymnastik und Massage eine gewisse orthopädische Behandlung. Von

der einfachen Binde angefangen bis zu eigens konstruierten entsprechenden Miedern wird man greifen müssen, um die Beschwerden erträglich zu machen oder zu beheben. Was nun die Stützlieder anlangt, so soll man namentlich unbemittelten Frauen nicht gleich mit einem orthopädischen Mieder kommen, sondern auf die einfache Einwicklung durch eine selbsterzustellende Flanellbinde dringen, die man nach CHROBAK in folgender Weise macht:

Ein rechteckiges Stück elastischen Stoffes, am besten Flanell, wird fest um das Abdomen gelegt und an der Rückseite geschlossen. Die unteren Ränder der Binde sind soweit auszuschneiden, daß sie gerade oberhalb des Darmbeinkammes laufen. Dann läßt man so viele Falten legen und provisorisch befestigen, daß die Binde allenthalben genau anliegt. Dann werden die Falten ausgeschnitten und die Schnittländer durch Naht vereinigt. Rückwärts schaltet man, um die Binde zu schließen, ein etwa handbreites Schnürstück ein.<sup>1</sup>

Wichtig ist, daß alle diese Binden, seien sie nun selbst gefertigt, seien sie von der Miedermacherin gemacht, dann gut wirken, wenn sie in liegender Stellung angelegt werden. Eine schädliche Druckwirkung dürfen sie nie entfalten. Bekanntlich sind die verschiedenen Leib- und Beckengürtel, wie sie von der orthopädischen Industrie geliefert werden, und von denen manche wie die *Thalysia*-, *Emylis*-, *Kalasisgürtel* und die Mieder von Dr. Steffek und Warner brothers weit verbreitet sind, ständig Gegenstand der Verbesserung. Wenn sie auch eine erschlaffte Bauchwand naturgemäß nicht vollwertig ersetzen können, so gelingt es doch durch sie die Muskelschwäche dadurch zu bessern, daß diese Mieder in verschiedener Richtung entsprechend den natürlichen Muskelschichten der Bauchwand angreifen und auch die Wirbelsäule stützen, deren Rolle für die Auslösung und Unterhaltung von Kreuzschmerzen durch die Untersuchungen von SAXL und JUNGSMANN u. a. in ein neues Licht gerückt worden ist (vgl. S. 240). Recht wertvoll erweist sich auch der von KNAPP empfohlene GLÉNARDSche Handgriff, den KNAPP als Gürtel- oder Stützgriff bezeichnet, in diagnostischer und therapeutischer Hinsicht. Seitlich von der Frau stehend, unterstützt man mit der linken Hand die Kreuzgegend und hebt mit der rechten durch einen allmählich gesteigerten Druck das gesamte Paket der Eingeweide gegen die Zwerchfellkuppe empor, als ob man es gleichsam reponieren wollte. Empfindet die Patientin diesen Handgriff angenehm, so zeigt das an, daß man mit der Verordnung eines Mieders, das an Stelle der Bauchwand den Eingeweideblock möglichst gut hinaufhält, das richtige treffen wird. Ein solches Mieder muß entsprechend fest gearbeitet sein, weil es die Baueingeweide aufnehmen und zurückhalten muß, während beim bloßen Fettbauch mit straffer Muskulatur das Mieder leichter sein kann, da es bloß das Fett zu tragen hat. Die Frage, welches Mieder zu verordnen ist, wäre dann weit leichter für den Arzt zu lösen, wenn, wie dies verdienst-

<sup>1</sup> S. bei L. KNAPP, Die Prophylaxe und Therapie der Enteroptose. Urban und Schwarzenberg, 1921.

vollerweise STEMMER und HEYDE hervorheben, die Mieder der orthopädischen Industrie nicht Phantasienamen, sondern solche Bezeichnungen hätten, die das Wesen ihrer Wirkung klar dartun. Die in dieser Hinsicht gemachten Vorschläge der genannten Autoren sollten von der Industrie aufgegriffen werden. Mit STEMMER und HEYDE kann man für leichtere Fälle 20 bis 25 cm breite Gummigürtel verordnen, deren Vorder- und Rückenteile frei von Einlagen, während das hintere Stück durch Stäbe versteift und der Verschuß durch kreuzende Gurten hergestellt ist. Den nächst höheren Wirkungsgrad stellen nach diesen Autoren die Gummileibbinden dar, bei denen das ganze vordere Stück aus Gummi besteht und die Seiten- und Rückenteile aus festem Gewebe gefertigt und von Stäben gestützt sind. Für die schwersten Grade eignen sich Binden, wie sie die Thalysia-Edelgurte und Thalysia-Frauegurte darstellen.

Was Sportleistungen anlangt, so dürfen sich dieselben nur in mäßigen Grenzen bewegen, sollen sie nicht das Gegenteil bewirken; nur leichtere Sportarten, in erster Linie der Wandersport, Tennis und ganz besonders der Schwimmsport sind anzuraten. Vor Radfahren muß eher gewarnt werden.

Neben diesen allgemeinen Bemerkungen über die Therapie der Enteroptose müssen auch noch einige Worte über die Behandlung der sie begleitenden Gefühle des Unbehagens, die sich bis zum ausgesprochenen Schmerz äußern können, gesagt werden. Hervorzuheben ist, daß Schmerzen keineswegs immer vorhanden sein müssen. Die richtige Deutung der verschiedensten Art der Bauchschmerzen, seien sie nun über den ganzen Bauch verbreitet oder auf das Epigastrium, das rechte oder linke Hypochondrium oder die Lumbalgegend beschränkt, ist recht schwer, weil sie die mannigfaltigsten Ursachen haben können, aber auch bei Enteroptose sich finden. Sie zu behandeln ist Sache wahrhaft ärztlicher Kunst. Mit dem bloßen Feststellen, daß „nichts los sei“, ist den Frauen keineswegs geholfen, für die die Beschwerden ebenso ernst sind als wären sie durch einen Tumor bedingt. Darum muß mit Geduld und Genauigkeit auf die mannigfaltigen, nicht immer leicht anzuhörenden Klagen eingegangen werden. Man muß versuchen, von allgemeinen und besonderen Gesichtspunkten aus den Beschwerden beizukommen. Hierzu eignet sich vielfach eine eingehende Aussprache, welche auf die Überredungskunst des Arztes als wichtigen therapeutischen Behelf hinauslaufen und welche trachten wird, offenkundige Schädlichkeiten, die auf die Patientin seit langem einwirken, zu beseitigen. Berücksichtigung der Familien- und Erwerbsverhältnisse, Erkundigung über die Diät, über den Anteil der körperlichen Betätigung im Tageswerk, Eheleben, Schlaf, Appetit, alles das wird zu erwägen sein und muß dort, wo Fehler vorliegen, in gesunde Bahnen gelenkt werden. Damit allein ist schon viel getan; kommt noch bei der offenkundigen reizbaren Schwäche ein entsprechendes tonisierendes Regime hinzu, besonders in Form milder Wasserbehandlung, wie Teil- und Ganzabreibungen, kurzer Duschen, so wird die allgemeine Verfassung mit und ohne die genannten Roborantia gebessert. Nicht genug zu betonen ist der wohltätige Einfluß der geänderten Umgebung,

das Ausspannen aus dem Berufe, das Aufsuchen von Kur- und Badeorten oder auch der einfache Landaufenthalt.

Was die Beschwerden im einzelnen anlangt, so ist eine der häufigsten Klagen durch die Ptose des Magens und Dickdarms mit und ohne Verlagerung des Uterus und der Nieren bedingt. Die Senkung dieser Organe äußert sich in Koliken und Blähungen, ebenso wie in hartnäckiger Stuhlverstopfung und Magendruck, womit seelische Verstimmungen und Beeinträchtigung der Arbeitslust Hand in Hand gehen. Es ist nicht leicht, die Darmstörungen bei der Enteroptose scharf in solche der gestörten Motilität und Sensibilität und schließlich in die der Sekretionsneurose zu trennen. Vielfach verwischen sich die Bilder und überlagern sich. Für uns kommt in erster Linie die Frage der geeigneten Therapie zur Besprechung. Die spastischen Zustände erfordern zunächst eine schlackenarme Kost, wie Schleimsuppen, geschabtes Fleisch, Bries, Hirn, Eier, geschabten Schinken, passierte Kartoffel, und erst nach Besserung der Beschwerden legt man reichlich Gemüse zu, vermeidet aber immer Schwarzbrot und viel Obst. Von Abführmitteln sind besonders *Öleinläufe* (200 ccm warmen Sesam- oder Erdnußöls), ferner die Gleitmittel wie *Paraffin*, *Paraffinal*, sodann *Regulin* und *Artin* empfehlenswert. Am beliebtesten sind in diesen Fällen begreiflicherweise jene, welche kleine Mengen von Belladonna und Papaverin enthalten, wie beispielsweise das *Belladonna-Regulin* (2- bis 4mal täglich 1 bis 2 Teelöffel). Auch die SINGERSche Vorschrift:

135. Chinin. bihydrochlor. . . . . 0,2  
 Ol. cacao . . . . . 2,5  
 M. f. suppos. D. tal. dos. X  
 S. Morgens und abends 1 Zäpfchen

ist anzuraten. Besonders quälend ist die trommelartige Spannung des Bauches und die oft nicht zu beseitigende Flatulenz. Die Kohlepräparate wie die *Tierkohle* (Carb. med.) in Form des Pulvers, des Granulats oder der Kompretten (täglich 1 Eßlöffel des Pulvers oder 1 Teelöffel des Granulats, bzw. 1 bis 4 Kompretten), das ausgezeichnet wirkende *Eucarbon* (2mal täglich 1 bis 2 Tabletten nach den Mahlzeiten) oder das *Intestilax* (1 bis 3 Stück) sollen ebenso Anwendung finden, wie die *Aqua carminativa* (3mal täglich kaffeelöffelweise). Öffnung beengender Kleidungsstücke nach den Mahlzeiten,  $\frac{1}{2}$ stündige Ruhe nach dem Mittagessen mit und ohne Thermophor sind oft nicht zu umgehen. Recht Gutes leistet das *Magnesiumperhydrol* (2 bis 4 Tabletten täglich zu 0,5 g), welches nicht nur die Flatulenz und Gärungen behebt, sondern auch gleichzeitig als ein mildes und unschädliches Abführmittel wirkt.

Da die schlaaffe Faser der enteroptotischen Frau nicht bloß zur Senkung des Eingeweideblocks führt, sondern auch das Aufkommen von Bauchbrüchen (Nabel-, Crural-, Leistenbrüchen und Bauchwandhernien) begünstigt, so ist man oft gezwungen, sich auch zur Frage der Behebung der Bruchleiden beratend zu stellen. Wenn auch entsprechend gearbeitete Mieder, gar solche mit Pelotten, den Bauchinhalt

zur Not zurückzuhalten vermögen, so sind das doch nur unvollkommene Behelfe. Wenn keine allgemeine Gegenanzeige gegen die Operation besteht, so soll man bei stärkeren Beschwerden zu den entsprechenden Operationen raten, zumal dieselben in örtlicher Betäubung ausführbar sind. Bei großen Nabelbrüchen mit sehr fettreichen Bauchdecken ist ernstlich eine gleichzeitige ausgiebige Entfernung des Fettes in Form der SCHEPELMANNschen Operation durch Querschnitt zu erwägen. Von ihr sieht man ganz ausgezeichnete Ergebnisse, nicht bloß kosmetischer, sondern auch funktioneller Art, doch stellt sie keinen geringen Eingriff dar. Recht viel Sorgfalt ist der Operation der Bauchwandhernien zuzuwenden, deren Verschuß bei großen Brüchen technisch sehr schwierig sein kann, und die auch nach gelungener Plastik noch Bauchbandagen erfordern.

Ein Kapitel für sich stellt die Behandlung der Wanderniere dar, welches hier nur gestreift werden kann. Hat sich das Schreckgespenst der Wanderniere einmal im Gehirn einer Patientin festgesetzt, so kann es die abenteuerlichsten Vorstellungen so lange wach erhalten, bis nicht die Niere irgendwie operativ befestigt wird, mag auch der Grad der Nierenverlagerung durchaus nicht bedeutend sein und auch das orthopädische Resultat nicht befriedigen. Dort, wo ausstrahlende krampfartige Schmerzen die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit stören oder wo mechanische Schäden durch Harnstauung bis zur Hydronephrose bewiesen sind, wird man allenfalls die Operation machen, immerhin aber mit der Indikationsstellung sehr vorsichtig sein. Recht bemerkenswert ist, daß auch die Nephropexie und die Nephrorrhaphie nicht sofort die Aufnahme des Tagewerkes gestatten, sondern daß auch von den warmen Verfechtern dieser Operation auf eine längere Schonung nach derselben in Verbindung mit reichlicher Ernährung und Verwendung von Stützmiedern Wert gelegt wird. Das sind Umstände, die zeigen, daß offenbar diese konservativen Verfahren, mit denen man in der größten Mehrzahl der Fälle allein auskommt, das Richtige leisten. Es würde den Rahmen dieses Buches überschreiten, wollte man auch noch auf die übrigens wohl allgemein wieder verlassene chirurgische Behandlung der Magensenkung eingehen. Bei den Frauen, die sich uns zur Beobachtung und Behandlung stellen, hat noch immer die im obigen skizzierte konservative Behandlung, insbesondere die Liegekur, ihre Schuldigkeit ohne Operation getan.

So manche Frau mit Enteroptose wird nicht nur durch die Senkung des Eingeweidepaketes, durch Vorfälle der Scheide und der Gebärmutter und andere Brüche gequält, sondern auch von Senk- und Plattfußbeschwerden, ausgedehnten Varizen an den unteren Gliedmaßen, gelegentlich auch im Bereiche des Ligamentum latum, sogenannte Varikokele des Ligamentum latum (ENGELMANN) und im Bereiche des Plexus haemorrhoidalis betroffen.

Die Varikokele des Ligamentum latum kann sich durch dumpfes Gefühl und Drängen nach unten sowie Kreuzschmerzen (VON JASCHKE), hauptsächlich beim Gehen und Stehen äußern. Ihre Erkennung ist schwer, ja unmöglich, und wird am ehesten noch bei Bestehen von

Varikositäten an anderen Körperstellen erschlossen werden können. Alle Maßnahmen, die geeignet sind, den Blutabfluß aus den unteren Körperabschnitten zu erleichtern (s. S. 65) sind anzuwenden. Die Operation, welche bei einseitigem Prozeß durch Exstirpation der Adnexe der betreffenden Seite und Suspension des Uterus Besseres leisten soll als die unsichere Unterbindung, wird wohl kaum je notwendig sein. Wird bei unklarer Diagnose die Bauchhöhle geöffnet und ergibt sich eine solche Varikokele, dann kann diese Art des operativen Vorgehens allenfalls Berechtigung haben.

#### Anhang. Hämorrhoiden und Fissura ani.

Wenn die so weit verbreiteten Hämorrhoiden oft genug auch ohne Enteroptose vorkommen, so sind doch diese venösen Stauungen im Beckenbereiche gerade bei der Enteroptose eine recht häufige Erscheinung, die durch vorangegangene Geburten und rasch übergangene Wochenbetten eine Vertiefung erfahren. Besonders schädlich wirken noch die beim weiblichen Geschlecht so unendlich oft beobachtete Obstipation, Mangel an Körperbewegung, besonders sitzende Lebensweise u. ä. Hier hat zunächst der Hebel der Therapie einzusetzen. Gymnastische Übungen, und wo die nicht möglich sind, wenigstens regelmäßige ausgiebige Spaziergänge, Massage, kurz alles, was den Rücklauf des Blutes erleichtert, wirkt günstig, während Arbeiten an der Nähmaschine, ebenso wie das Radfahren schaden. Die Behandlung bleibt natürlich erfolglos, wenn Krankheiten, die offenkundig zur Stauung in den Hämorrhoidalvenen führen, nicht beseitigt werden, wie die Lageveränderungen oder Myome u. a. Die Kost sei schlackenreich, möglichst reizlos unter Verzicht auf scharfe Gewürze und Einschränkung des Fleisches und Alkohols, auf Vegetabilien, Gemüse, Obst, Kompotte und reichlich Fett (Butter) eingestellt. Werden Abführmittel notwendig, da täglich ein breiiger Stuhlgang erzielt werden muß, so gebe man neben salinischen die *Schwefelpräparate*, besonders das *Pulvis liquir. comp.* (abends 1 Kaffeelöffel) oder *Rheumpräparate*, beispielsweise die *Rheum-compositum-Kompretten* oder das *Pulvis magnesiae cum Rheo* (2 bis 3 Teelöffel in Wasser verrührt) oder *Paraffinum liquidum* (2 Eßlöffel). Die örtliche Behandlung kann nicht umgangen werden und muß in kühlen Waschungen, noch besser Sitzbädern nach jedem Stuhlgang mit Reinigung des Afterns mit Watte bestehen. Diese wird am besten in Öl oder Vaseline getaucht, und der After hernach mit Zink- oder Bor-salbe oder mit Präzipitatsalbe

136. Ungt. Hydrarg. praec. alb. 5,0  
Vaselin. Lanolin..... aa 10,0

D. S. Salbe.

vorsichtig eingefettet.

Besondere Beschwerden machen die inneren, nach dem Stuhlgang hervortretenden Knoten. Sie schmerzen auch dann, wenn sie nach Defäkation verschwunden sind, noch stundenlang und können einen äußerst lästigen Stuhldrang verursachen. Um ihn zu beheben, können

für einige Zeit Bettruhe, gelegentlich auch ein Belladonna-Suppositorium oder Salben nach folgender Zusammensetzung:

137. Extract. Belladonn. .... 0,1	138. Chrysarobin. .... 0,05
Cocain. mur.	Jodoform. .... 0,02
Extract. Ratanh.	Extract. Belladonn. .... 0,01
Tannin. .... aa 1,0	But. cac. qu. s. u. f. suppos.
Vaselin ..... 20,0	D. tal. dos. Nr. X
D. S. Salbe.	S. Stuhlzäpfchen

notwendig werden. Wenn solche innere Knoten vorkommen, müssen sie möglichst rasch reponiert werden, weil sie sonst infolge Stauung so stark anschwellen, daß ihr Zurückbringen immer schmerzhafter und schwieriger wird. Die Reposition geschehe mit einem mit einer Salbe bestrichenen Leinwandläppchen. Bei der akuten Entzündung der Knoten ist Bettruhe nicht zu umgehen. Ein kleiner Eisbeutel oder der ATZBERGERSCHE Kühl Schlauch und in Ermangelung eines solchen ein Prießnitzumschlag lindern die Beschwerden. Sie können auch durch das Ansetzen von 1 bis 2 Blutegeln wesentlich gebessert werden. Gegen den lästigen Juckreiz sind neben dem bekannten *Zymoidin* in Salbe oder Zäpfchen, den *Anusol-Präparaten*, *Acetonalsuppositorien*, der *Hüdensa-* und *Perkainalsalbe*, Verordnungen wie die folgende:

139. Eucaïn. $\beta$ ..... 1,0
Menthol. .... 0,2
Ol. olivar. .... 2,0
Lanolin. ad ..... 10,0
D. S. Salbe.

und viele andere in Gebrauch. Bestehen die Beschwerden dauernd, sind die Blutungen stark oder wird das Bild gar durch Entzündung und Einklemmung der Knoten beherrscht, so soll man unbedingt zur Radikaloperation raten, für die auch heute noch das LANGENBECKSCHE Verfahren allgemein Geltung hat. Freilich ist der Radikaloperation in der Verödung der Hämorrhoidalknoten durch Injektion von Substanzen, welche eine aseptische Thrombose (BOAS) hervorrufen sollen, ein wichtiges und namentlich für einzelne Knoten sehr empfehlenswertes Konkurrenzverfahren entstanden. Hierzu eignet sich neben der Verödung der Knoten mit *Alkohol* besser die durch Injektion (einiger Tropfen) hochprozentiger steriler *Chininlösung* wie des *Antiphlebin* (Ampullen zu 0,5 ccm) in die Knoten selbst. Gegen die Blutungen wird man, wenn man nicht operativ eingreift, palliativ durch Secalepräparate, besonders aber durch Hydrastis und Hamamelis

140. Extract. Hydrastid. Can. fl.
Extract. Hamamelis virg. aa 25,0
D. S. 3mal täglich 1 Teelöffel.

ankämpfen können, örtlich durch Stuhlzäpfchen folgender Zusammensetzung:

141. Calc. chlorat. ....	0,05
Extract. Hamamelid. ....	0,03
Bals. peruv. ....	0,1
But. cac. ....	2,0
M. f. suppos. D. tal. dos. X	

S. Zäpfchen.

Mit und ohne Hämorrhoiden kommen radiäre Einrisse meist der hinteren Afterwand, die *Fissura ani*, vor, die sich manchmal in unerträglichen Schmerzen nach der Defäkation äußern. Wenn man darauf untersucht und die bezeichnende Klage der Patientin über die heftigen Schmerzen nach Passieren der Stuhlballen über die Afteröffnung nicht überhört, ist das Leiden nicht zu verkennen. Daß dies aber vorkommt, beweist die berühmte Erzählung ALBERTS von einer vermöglichen Dame, die sämtliche Chirurgen und Gynäkologen Europas bereiste und nirgends Heilung finden konnte, bis ALBERT durch bloße Inspektion des Afters das Leiden entdeckte und dann leicht der Heilung zuführte! Nur in leichten Fällen gelingt es mit Salben, wie der 10%igen *Argentum-nitricum-Salbe* oder der 10%igen *Orthoformsalbe* die Fissur bei peinlichster Sorge für eine breiige Stuhlentleerung zum Ausheilen zu bringen, wobei man vielfach des *Cocains* und *Belladonna* in Form von Zäpfchen nicht entraten kann (S. 217). Weit einfacher und sachgemäßer ist es, in Narkose nach RECAMIER mit den beiden in den After eingeführten Zeigefingern den Sphinkter schonend zu dehnen und über die Fissur mit dem Paquelin hinüberzuhuschen. Für die nächsten zwei Tage verordnet man dann eine flüssige und breiige Diät, aber kein Opium. Dann läßt man Rhizinusöl oder größere Mengen Paraffin geben.

Der recht seltene Mastdarmvorfall, der auch bei Enteroptose als Teilerscheinung derselben ausnahmsweise beobachtet wird, häufiger in Verbindung mit Prolapsus uteri et vaginae, ist konservativ kaum beeinflussbar, wengleich Massage des Beckenbodens, elektrische Massage, tonisierende Mittel wie Strychnin in kleinsten Dosen, Tanninklysmen, kalte Bäder und Absetzen des Stuhles in liegender Stellung angeraten werden. Meist läßt sich die Operation, die keineswegs einfach und auch in ihren Erfolgen nicht immer sicher ist, nicht umgehen.

## 2. Bedeutung der Lageveränderungen der Geschlechtsorgane und ihre Behandlung.

### Retroflexio uteri mobilis.

Es ist bekannt, daß 25 v. H. aller Frauen mit einer Retroflexion der Gebärmutter behaftet sind, von deren Vorhandensein ein Großteil überhaupt nichts weiß. Die Erkennung dieses Zustandes bleibt also in einer großen Reihe von Fällen dem Zufall und einer nicht eigens darauf gerichteten Untersuchung vorbehalten. Das ist der klarste Fingerzeig dafür, daß die *Retroflexio uteri mobilis* keinesfalls unter allen Umständen eine Krankheit sein kann, sondern nur in einer gewissen Zahl der Fälle als ein abwegiges Zustandsbild empfunden wird. Es muß darauf hin-

gewiesen werden, und das ist Erkenntnis der neueren Generation der Gynäkologen, daß die vollkommen beschwerdelos getragene Retroflexio Angriffspunkt einer Therapie, sei sie konservativ, sei sie operativ, nicht zu sein hat, denn wo ein gleichgültiger Zustand keine Symptome macht, sind ärztliche Handlungen überflüssig, gar dann, wenn sie auch auf spätere Sicht hinaus zu Weiterungen nicht führen. Es ist klug, ja in der Zeit schärfsten Konkurrenzkampfes geradezu geboten, daß der Arzt, der die Retroflexion auch als belanglosen Zufallsbefund entdeckt, einem Familienmitglied mit dem Hinweis auf die Gleichgültigkeit des Befundes Mitteilung macht, weil es ihm sonst geschehen kann, daß ein später untersuchender Arzt denselben Befund erhebend, ihn in den Mittelpunkt seiner Behandlung stellt und sich wundert, daß so etwas übersehen werden konnte! Den Befund der Frau selbst mitzuteilen, halten wir in Fällen vollkommener Beschwerdefreiheit nicht für gut, denn die Erfahrung lehrt, daß von dem Augenblick an, wo die Frau um diesen Zustand weiß, nur zu leicht sich bereits Beschwerden um ihn herum einstellen. Die Beschwerden, welche bei der Retroflexio uteri mobilis beobachtet werden können, sind entweder örtlicher oder allgemeiner Natur. Vielfach sind es sowohl örtliche, wie allgemeine (konsensuelle Beschwerden nach MENGE), welche zur Beobachtung kommen. Diejenigen Frauen, welche Allgemeinerscheinungen aufweisen, und diese sind die Zeichen der raschen Ermüdbarkeit, Neuralgien in Kopf und Rücken, in den Brüsten, Schmerzen im Kreuz, die auch zwischen die Beine ausstrahlen können, Steißbeinschmerz, Magendruck und Üblichkeiten, Störungen des Schlafes, gehören zum größten Teil jener Gruppe von Frauen an, die als Asthenisch-photische zu bezeichnen sind. Sie leiden vielfach an der Enteroptose, zum Teil auf dem Boden einer mangelhaften Entwicklung der Haftapparate, zum Teil durch Verstärkung dieser Anlage durch die im vorangegangenen erwähnten äußeren Schädlichkeiten. Wie von STILLER und MATHES klassisch beschrieben, sind diese zarten, schmalen, mit langem Thorax und fluktuierender 10. Rippe behafteten Frauen oft genug noch Trägerinnen einer Nephroptose und eines Senkmagens, und als Persönlichkeit genommen, von ungemein leichter Reizbarkeit des Nervensystems. Bei diesen ist eine aufgefundene Retroflexio nur eine Teilerscheinung im Rahmen der Gesamtpersönlichkeit, eine Tatsache, die im Beginn der operativen Ära so oft verkannt wurde, wodurch sich die zahllosen Mißerfolge einer rein auf das Organ gerichteten Therapie ohne weiteres erklären. Wie immer, so hat auch hier in unserer Zeit das Pendel nach der anderen Seite ausgeschlagen und jede Retroflexio und von ihr ausgehende Symptome sind mehr minder sicher als Beweis eines hinfalligen Nervensystems angesehen, als hysterisch bezeichnet und deswegen als nicht örtlich zu behandeln hingestellt worden. Auch das ist ein Fehler, auf den mit Nachdruck hingewiesen zu haben, besonders v. JASCHKES Verdienst ist, der zeigen konnte, daß gerade in Fällen allgemeiner minderwertiger Körperveranlagung und gleichzeitig im Vordergrund stehender Lokalsymptome die Behandlung der Retroflexio sehr wohl berechtigt ist. Abgesehen nämlich von den Schmerzen im Kreuz, welche eine Retroflexio

machen kann, aber nicht machen muß, ist sie imstande, weitere örtliche Krankheitszeichen hervorzurufen, die keineswegs immer zusammen bei mobiler Retroflexion beobachtet werden müssen, ja, die auch bei erschöpften, nervösen, unterernährten und blutarmen Frauen mit normaler Anteversioflexio beobachtet werden können. Seit altersher gilt die Tatsache erwiesen, daß der schlaffe, in Retroflexionsstellung liegende Uterus zu starker Regelblutung neigt, die in etwa 30% der Fälle beobachtet wird. Es mag übrigens sein, daß die Retrodeviation in der Mehrzahl der Fälle nur Teilerscheinung der allgemeinen Enteroptose, und damit auch eine verstärkte Regelblutung nichts anderes als Folge von Beckenhyperämie ist, so daß die Retroflexio und die Menstruationsstörung als eine koordinierte Folgeerscheinung der Asthenie betrachtet werden kann. Wie dem auch sei, die Tatsache muß in der Therapie Berücksichtigung finden, daß in einem großen Teil der Fälle von Retroflexion Menorrhagien vorkommen, die mehr minder berechtigt auf die Abwegigkeit zurückgeführt werden können. Was den Fluor albus anlangt, der auch oft als geradezu bezeichnend für die Retroflexion dargestellt wird, so kann man ihn mit v. JASCHKE ätiologisch nicht mit derselben in Zusammenhang bringen, sondern muß ihn, wo er vorkommt, auf die gleiche Linie mit der Asthenie stellen. Man darf diesen Fluor niemals als uterinen auffassen, sondern muß ihn als einen vaginalen betrachten. Sein Aufkommen kann entweder in der bei Asthenie so oft gefundenen leichten Ovarialschwäche oder in einer von Haus aus abwegigen Scheidenbeschaffenheit seine Ursache haben. Die alte Annahme, daß durch Retrodeviation des Uterus der Drang zur Miktion vermehrt werde, ist heute auch kaum mehr haltbar, weil der Druck des Collum uteri gegen den Blasenboden bei nichtschwangerem Uterus ein zu geringer ist. In Einzelfällen mag allerdings die Retroflexion zur häufigen Miktion Veranlassung geben. Bei der riesigen Verbreitung der Stuhlverstopfung beim weiblichen Geschlecht muß man gerechterweise sagen, daß die Bedeutung der Retroflexio für die Stuhlverstopfung wohl auch seinerzeit übertrieben wurde, wenngleich asthenische Individuen auch den mäßigen Druck des Corpus uteri auf den Mastdarm unangenehm fühlen können. Die Retroflexion aber als alleinige Ursache der Stuhlverstopfung anzusprechen, ist außer in Fällen eines hoch pathologischen veränderten Organs entschieden übertrieben. Nicht unwichtig ist, daß solche Frauen mit reizbarem Nervensystem auch während des Geschlechtsverkehrs durch die mit dem Uterus herabgetretenen Ovarien Schmerzen verspüren und auch den Uteruskörper selbst dabei lästig empfinden können. Weiters erscheint es begründet, wenn Frauen mit einem gesunden Nervensystem die menstruellen Kontraktionen des nach rückwärts gelagerten Uterus verstärkt und schmerzhaft empfinden. Diese Klagen über ausgesprochene Dysmenorrhoe hört man ganz besonders häufig von Frauen mit allgemeiner Ptose und Retroflexion als Teilerscheinung derselben. Diese hier angeführten Zustände und Beschwerden, die, um es noch einmal zu sagen, vorkommen können, aber nicht müssen und die entweder in ihrer Gesamtheit oder nur in einzelnen Symptomen sich finden können, lassen eine Therapie nicht nur anzeigen,

sondern vielfach auch notwendig erscheinen. Worin hat dieselbe nun zu bestehen? Dort, wo die mobile Retroflexion nur Teilerscheinung und Ausdruck einer Asthenie ist, wird sie dann auch lokalbehandlungsbedürftig sein, wenn nicht allein die asthenischen Erscheinungen Beschwerden machen, sondern ganz besonders über ein Senkungsgefühl auch ohne deutliche Senkung des retrovertierten Uterus geklagt wird. Schon mit Rücksicht darauf, daß bei dem recht häufig schwachen Beckenboden die Retroversion nur den Auftakt zu einem sich später entwickelnden Prolaps sein kann, erscheint uns die Wiederherstellung der Normallage des Uterus in diesen Fällen geboten. Sie wäre aber nur eine halbe Maßnahme, wollte man nicht gleichzeitig mit der Behebung der Retroflexion auch gegen das Gesamtbild der Asthenie ankämpfen, was keineswegs hoffnungslos ist, wie so manche Nihilisten der Therapie glauben. Die unter der Enteroptose geschilderten Maßnahmen, insbesondere eine durch gymnastische Übungen eingeleitete und unterhalten bessere Körperkultur, der Schwimm- und Wassersport, Bewegungsspiele, in Fällen hochgradiger Abmagerung die erwähnten Liegekuren mit und ohne Fettmast, Bäderbehandlung milder Art, vermögen mit medikamentösen Maßnahmen, Eisen-, Arsen- und Nährpräparaten in den geschilderten Gaben so manche Frau zu einem volltätigen Wesen zu machen. In den Fällen aber, in denen man annehmen kann, daß die Retroflexio uteri und von ihr ausgehende Beschwerden, insbesondere unbestimmte Schmerzen, solche rein neurasthenischer Art sind, lehnen viele Gynäkologen jedwede Lokalbehandlung ab. Mit v. JASCHKE scheint auch diese Ablehnung über das Ziel geschossen, denn v. JASCHKE hat recht, wenn er sagt, daß eine psychoanalytische Behandlung keineswegs bei allen Frauen imstande ist, die Beschwerden zu beseitigen, zumal psycho-neurotische Frauen, die sich aus allen Ständen zusammensetzen, diese Behandlungsart nur bei entsprechender Bildung und auch dann keineswegs immer hinnehmen, während man großen Kreisen der Bevölkerung, wie dem Dienstmädchen vom Lande, der einfachen Bauersfrau mit Psychoanalyse, aber auch mit Persvasion nicht kommen kann. Damit soll der Persvasion in einzelnen ausgesuchten Fällen durchaus nicht der Wert abgesprochen werden, wenn der Arzt liebevoll und mit viel Zeitaufwand auf die Beschwerden eingeht und dadurch mithilft, sie abzubauen. In einer großen Zahl der Fälle aber führt dieses Verfahren trotzdem nicht zum Ziel, und das Ergebnis ist, daß die Frau zu einem anderen geht, der es versteht, sie aus dem richtigen Punkte zu kurieren, nämlich den Uterus aufzurichten.

Auch dort, wo neben Schmerzen noch verstärkte Regelblutungen vorliegen, wo bei durchgängigen Tuben eine offenkundige Sterilität vorliegt, sollte man bei Wunsch nach Kindersegen unbedingt zur Behebung der Retroflexion schreiten.

Was nun die Beseitigung der Retroflexion und ihrer Beschwerden anlangt, und zwar der mobilen Retroflexion, von deren Behandlung zunächst die Rede sein soll, so stehen uns zwei Wege offen. Der eine ist der der orthopädischen oder Pessartherapie und der andere ist der der

operativen Maßnahmen. Um es gleich vorwegzunehmen, die orthopädische Therapie, die Pessarbehandlung, hat heute bei der mobilen Retroflexion nur mehr ein sehr eng begrenztes Anwendungsgebiet. Man kann sie für Fälle gelten lassen, wo man, nicht überzeugt von der Auslösung der Beschwerden durch die Retroflexio, sich von der Therapie mit Pessar einen suggestiven Erfolg verspricht. Man kann sie in Fällen anwenden, wo ernstere Beschwerden im Vordergrunde stehen, und eine Lageverbesserung durch Operation aus allgemeinen Gegenanzeigen gegen eine Operation überhaupt nicht möglich ist. Weiter hat sie ein und zwar nicht unwichtiges Anwendungsgebiet in Fällen von Retroflexio und Kreuzschmerzen im Anschluß an die Geburt. Wenn man 6 Wochen nach der Geburt, wie dies meist üblich und auch zu empfehlen ist, den Genitalapparat einer Untersuchung unterzieht, findet man in einer Reihe der Fälle — es sind etwa 20 v. H. — die Gebärmutter nach hinten liegend. Oft genug kommt es noch zur Normallagerung derselben ohne jedwedes Zutun; dort, wo aber Kreuzschmerzen im Vordergrunde stehen, ist es recht vorteilhaft, den Uterus aufzurichten und ihn durch ein Pessar in der Lage zu erhalten. Für solche Fälle braucht man übrigens nicht eines der typischen Pessare zur Behandlung der Retroflexio zu benützen, sondern es genügt, einen einfachen, nicht zu großen MAYERSchen Ring zu nehmen, wie dies PEHAM immer gelehrt hat. Überdies kann dieser Ring meist nach einigen Monaten schon entfernt werden, und die Frau bleibt beschwerdefrei. Etwas strittiger ist schon die Anwendung eines Pessars bei Retroflexio uteri gravidi. Wenn die betreffende Frau mit dem retroflektierten Uterus gravid ist, und man ihn, ohne daß Beschwerden und eine eigentliche Anzeige bestehen, aufrichtet und durch ein Pessar fixiert, kann es ob diesen Handgriffen das eine oder andere Mal zum Abortus kommen, den man ja vermeiden wollte. Wenn daher der Arzt in der Lage ist, seine Patientin ständig im Auge zu behalten und Arzt und Frau am selben Orte sich befinden, erscheint es vorteilhafter, die Retroflexio nicht zu beheben, sondern vielmehr darauf zu warten, daß die Spontanaufrichtung eintritt, bzw. nur für den Fall einzugreifen, daß Erscheinungen einer beginnenden Inkarzeration sich störend bemerkbar machen sollten. In diesen Fällen ist dann die schonende Aufrichtung durch einen Kolpeurynter verbunden mit Bettruhe anzuempfehlen und bei Einhalten der Bettruhe, besonders in Bauchlage, kommt man über die kritische Zeit hinweg, bis der Uterus so groß geworden ist, daß er über die Linea terminalis anteflektiert hinausragt (PEHAM). In allen anderen Fällen erscheint uns die Pessartherapie veraltet. Sie wird weit besser durch die operative Therapie ersetzt. Was nun die Methode der Aufrichtung anlangt, so muß man sagen, daß unsere Vorfahren in dieser Art der Aufrichtung Meister gewesen sind, weil sie ja in diesem retroflektierten Organ das Um und Auf der Therapie gesehen und von einer nicht behandelten Retroflexion das Schlimmste befürchtet haben. Die manuelle Aufrichtung des Uterus wird am besten nach der Methode von B. S. SCHULTZE gemacht, die es zu klassischer Berühmtheit gebracht hat. Die Frau legt sich nach gut entleerter Blase und entleertem Darm in Steiß-Rückenlage auf den Unter-

suchungstisch, worauf der Arzt mit zwei Fingern in die Scheide eingehend, vom hinteren Scheidengewölbe aus den Gebärmutterkörper gegen das Promontorium und über den Rand der Linea terminalis hinaufschiebt, bis er den Fundus mit der äußeren Hand übernehmen und nach vorne bringen kann. Während dieser Manipulation der äußeren Hand drängen die Finger der inneren die Portio nach hinten gegen das Kreuzbein, wodurch eine Hebelwirkung gewährleistet ist, welche die Aufrichtung erleichtert. Bei infantilem Scheidengewölbe kann man sich nach v. JASCHKES Empfehlung der Aufrichtung vom Rektum her, allenfalls von diesem und von der Scheide aus bedienen. Führen diese Methoden nicht zum Ziel, so bleibt noch das KÜSTNERSCHE Verfahren. Es beruht darauf, daß man mit einer Kugelzange die vordere Muttermundslippe anhakt und den Uterus so tief als möglich herabzieht. Während die eine Hand diese Stellung an der Kugelzange beibehält, geht man mit zwei Fingern der anderen ins hintere Scheidengewölbe und hebt das Korpus nach vorne. Das ist jetzt, wo der Uterus beträchtlich tiefer gezogen ist, auch wesentlich leichter. Ist man soweit, werden die Zangenriffe erhoben, ohne daß der Tiefstand der Portio verändert wird; nun wird die Kugelzange und mit ihr die Portio nach dem Kreuzbein zu ins Becken hineingedrückt. Dann nimmt man die Kugelzange ohne Zug ab. Neben anderen Verfahren, die hier nicht erörtert werden sollen, sei nur noch darauf hingewiesen, daß sich die Aufrichtung mit der Sonde zur Zeit, als die Sonde das Instrument des Gynäkologen gewesen ist, hierzu sehr bewährt hat. Weil aber, abgesehen von Fällen, in denen es gefährlich ist, zu sondieren, die Methode selbst bei Geschulthen zur Perforation führen kann, ist sie dem praktischen Arzte unbedingt zu widerraten. Schließlich kann es in einzelnen Fällen notwendig sein, wenn man unter allen Umständen die Reposition machen muß, sie in Narkose auszuführen. Dann gelingt sie immer, es sei denn, daß die Annahme der mobilen Retroflexion falsch war, und daß es sich um eine fixierte Retroflexion handelt. In solchen Fällen hat dieses Verfahren auch einen diagnostischen Wert. Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß vor einer an eine solche Reposition angeschlossenen Zerreißen von Strängen, wie sie die alten Gynäkologen noch übten, gewarnt werden muß, weil sie ein unkontrollierbares und rohes, im Einzelfall sogar tödliche Zufälle möglicherweise heraufbeschwörendes Verfahren ist. Ist in solchen Fällen eine Aufrichtung überhaupt notwendig (siehe später), kann nur die Laparotomie in einer die Patientin nicht gefährdenden Weise den Uterus aus seinen Verwachsungen befreien und in seine Normalstellung zurückbringen. Doch kehren wir nach diesem Ausblick zu dem in Rede stehenden Thema, nämlich zur Pessartherapie zurück. Sie ist nur dann berechtigt, wenn der Einführung des Pessars die Aufrichtung vorangegangen ist; ohne eine solche ist sie ein Scheinmanöver und zu verwerfen. Für die Zwecke der Retroflexionsbehandlung seien nur zwei Pessare, nämlich das von HODGE und das von THOMAS, ersteres sanft, letzteres stärker in seinem hinteren Bügel gebogen, empfohlen. Diese aus Hartgummi gefertigten Pessare werden auch heute noch am meisten gebraucht. Es mag sein, daß die Hartglas- oder

Silikatpessare weniger reizend wirken, sie sind aber schwer und können zerbrechen. Darum wählen wir die Hartgummipessare, für deren Einführung folgende Regel gilt: der wichtigste Grundsatz muß bleiben, daß das Pessar niemals zu groß, eher kleiner gewählt werden muß, und daß jenes Pessar das beste ist, welches bei kleinster Größe seinen Zweck erfüllt. Zunächst versuche man es immer mit einem Hodgepessar mit seinem sanft gebogenen hinteren Bügel. Dieses wird, ebenso wie das Thomaspessar so eingeführt, daß dasselbe nach Spreizen der Labien schräg unter Vermeidung des Harnröhrenwulstes, dessen Berührung immer schmerzhaft empfunden wird, die Vulva passiert, worauf mit dem in die Scheide eingeführten Finger der hintere Bügel hinter die Portio gedrückt wird. Dieser hintere Bügel ist nun eine Art Lehne für den aufgerichteten Uterus, an der er seine Stütze findet und am Zurückfallen verhindert wird. Nun wird die Frau gefragt, ob sie den Fremdkörper spüre, solange sie noch auf dem Tische liegt. Ist dies nicht der Fall, läßt man sie vom Tische steigen, im Zimmer auf- und abgehen und auf einen Sessel setzen und wiederholt die Frage, ob sie irgendwie das Pessar unangenehm empfinde. Ist auch jetzt keine Klage, kann man annehmen, daß das Pessar jedenfalls nicht zu groß ist und daß Gefahren im Sinne des Drucks und der Geschwürsbildung nicht auftreten werden. Es kann aber noch zu klein sein und bei starker Anspannung der Bauchpresse vor die Vulva treten. Von dieser Möglichkeit soll man sich, bevor die Patientin vom Tische steigt, durch Anweisung, die Bauchpresse anzustrengen, überzeugen. Es kann aber trotzdem geschehen, daß beim ersten harten Stuhlgang das scheinbar gut sitzende Pessar doch herausfällt. Weiter ist es geboten, nach 2, 3 Tagen nachzusehen, ob das Pessar gut liegt, und insbesondere, ob der Uterus seine Stellung in Anteflexio beibehalten hat. Außerdem muß man der Frau noch eine Reihe von Regeln mitgeben. Oberstes Gebot ist peinliche Reinlichkeit. Tägliche Scheidenspülungen, entweder mit Kamillentee oder Hypermangan in lichter Lösung oder zwecks Aufrechterhaltung einer sauren Scheidenflora mit Milchsäure (1 Kaffeelöffel auf 1 Liter Wasser), oder mit dünner essigsaurer Tonerde (1 Eßlöffel auf 1 Liter Wasser) sind nicht zu umgehen. Dort, wo über schleimige Sekretion geklagt wird, läßt man am besten mit warmer Sodalösung (1 Teelöffel auf 1 Liter Wasser) spülen. Sorge für guten Stuhl ist geboten, neben entsprechender Diät wird man allenfalls auch milde Abführmittel für längere Zeit anwenden müssen. Auch an eine geregelte Blasenentleerung muß sich die Patientin gewöhnen. Schließlich bleibt sie auch vom Arzte abhängig. Vierwöchentliche, allenfalls sechswöchentliche Kontrolle des Ringes durch den Arzt, Herausnahme desselben, Einstellen der Scheide im Spekulum, um allfälligen Druck rechtzeitig zu entdecken, Reinigung des Pessars und Neueinsetzen desselben, hat in diesen Zwischenräumen zu geschehen. Dabei erweist es sich nötig, den Ring durch einen neuen zu ersetzen, wenn er rauh zu werden beginnt. Sind Druckgeschwüre feststellbar, so müssen dieselben dadurch zur Ausheilung gebracht werden, daß zunächst der Ring wegbleibt. Salbenbehandlung, am besten mit 2%iger Silbersalbe

142. Argent. nitric. ....	0,5
Bals. peruv. gutt. III	
Adip. lan. ....	25,0
D. S. Salbe.	

wird benützt, um die Geschwüre zur Überhäutung zu bringen.

Was das sonstige Verhalten der Pessarträgerin mit aufgerichteter mobiler Retroflexion betrifft, so muß man betonen, daß ein gut angepaßtes Pessar, welches von der Frau in keiner Weise als Fremdkörper empfunden wird, eine besonders auf diesen orthopädischen Apparat gerichtete Lebensweise nicht erfordert. Wichtig ist, daß der Geschlechtsverkehr ohne weiteres stattfinden kann, und daß vielfach vom Manne das Pessar überhaupt gar nicht empfunden wird, weiter, daß die Besorgung des Hauswesens, ebenso wie eine mäßige sportliche Betätigung im Sinne des Bewegungs- und Schwimmsports stattfinden kann. Mit Rücksicht darauf, daß die Mehrzahl dieser Pessarträgerinnen entweder asthenischen Habitus ist oder mit und ohne diese Anlage an Senkung des Eingeweideblocks leidet, ist das Tragen guter Stützmieder (S. 212) geradezu notwendig. Bei den Asthenikerinnen haben sie, worauf v. JASCHKE mit Recht hinweist, den großen Vorteil, daß sie das Aufhängen der Kleider auf dem Schultergürtel unnötig machen, was für solche Frauen wichtig ist, weil deren hängender Schultergürtel die Belastung nicht gut trägt. Die Hauptfrage, die nun noch zu beantworten ist, ist die, wie lange solch ein Pessar zu liegen hat. In Fällen von Retroflexion nach Partus kann man schon nach 3 bis 4 Monaten bis nach einem halben Jahr sehen, daß der Uterus in Normallage bleibt oder man erlebt es wenigstens, daß er zwar wieder in die Fehllage zurückkehrt, aber keine wesentliche Beschwerden mehr bestehen. Dann soll man es dabei bewenden lassen. In anderen Fällen wieder braucht es länger bis das Pessar seine Schuldigkeit getan hat oder es tut es nie. KÜSTNER rechnet die mittlere Zeit, die notwendig ist, bis ein Pessar seine Aufgabe erfüllt, auf 1 bis 2 Jahre. Dieser Umstand genügt allein, die Pessartherapie auf ganz wenige Ausnahmefälle und womöglich auf kürzere Zeit zu beschränken. Bei Eintritt einer Schwangerschaft ist es nach der halben Tragzeit zu entfernen.

In allen anderen Fällen, wo eine Behandlung der Retroflexio notwendig ist, ist die operative einmalige Korrektur (s. unten) zu wählen.

### Retroflexio uteri fixata.

Wenn auch zweifellos eine fixierte Retroflexio immer ein krankhafter Zustand ist, so muß man doch, wenn man daran geht, ihn in seiner klinischen Bedeutung unter dem Gesichtswinkel der Behandlung zu werten, grundsätzlich die Frage aufwerfen, ob der Zustand der fixierten Retroflexion, wie er seinem Hauptanteil nach durch die entzündlichen Krankheiten des Genitales bedingt ist, also die Gonorrhoe mit ihren Folgen und die septischen Krankheiten, sich in einem Stadium akuter, subakuter oder chronischer Natur befindet. Im akuten, aber auch im subakuten wäre es ein schwerer Fehler, irgendwie an dieser Retroflexion zu rühren oder sie gar operativ beseitigen zu wollen. Im

chronischen wird bei ernstlichen Beschwerden die Operation in ihre Rechte treten, die überdies noch andere, etwa notwendige Eingriffe im kleinen Becken vorzunehmen gestattet, insbesondere die Lösung von Verwachsungen mit den Nachbarorganen, wie dem Sigma, dem Cöcum, die Entfernung kranker, allenfalls auch die Eröffnung verschlossener Eileiter, die Entfernung der Appendix. An dieser Stelle muß ausdrücklich betont werden, daß die fixierte Retroflexion heute nicht mehr Gegenstand einer polypragmatischen konservativen Therapie sein soll. Wenn nach vorausgegangener gründlicher Behandlung der Entzündung, nach Ausproben der Vakzinetherapie und Erschöpfung der physikalischen Heilmethoden die Beschwerden weiter bestehen, dann kann auch der Wiederholung einer unwirksam gebliebenen Massage und Belastungstherapie nicht mehr das Wort geredet werden, gar dann, wenn es sich um neurotische Individuen handelt, denen durch die Massage nichts Gutes erwiesen wird. Ausdrücklich muß festgestellt werden, daß in Fällen der fixierten Retroflexio die Pessartherapie überhaupt nicht in Frage kommt. Bleiben sogar nach den so oft wohltätig wirkenden Badekuren, hauptsächlich in den bewährten Moorbädern, die Beschwerden weiter bestehen, dann hat die operative Korrektur volle Berechtigung. Sowohl bei der mobilen, wie der fixierten Retroflexion stehen die abdominellen Verfahren der Suspension des Uterus, die im wesentlichen an den runden Mutterbändern angreifen, weitaus im Vordergrund. Wichtig ist, daß diese Methoden Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett in keiner Weise alterieren, ja im Gegenteil, wie erwähnt, die Schwangerschaft sogar begünstigen. Daneben spielen die vaginalen Suspensionsverfahren nur eine untergeordnete Rolle und eignen sich auch nur für mobile Retroflexionen und auch da nur in erster Linie für Frauen, die geboren haben. Soviel sei noch bemerkt, daß wir die ALEXANDER-ADAMSche Operation, wenn wir überhaupt operieren, nicht wählen, weil sie uns den Einblick in die Bauchhöhle verwehrt und uns die Möglichkeit benimmt, auch unerwartete Komplikationen, Lösung von Verwachsungen usw. zu beseitigen. Wir haben keinen Grund, von der Methode von DOLERIS oder wie sie vielleicht richtiger genannt wird, GILIAMS-SCHAUTA-DOLERIS abzugehen, die sich uns in bester Weise bewährt hat. Es bedarf keiner besonderen Betonung, daß natürlich die operative Suspension allein in Fällen, wo gleichzeitig Allgemeinbeschwerden bestehen, nicht genügt, sondern daß die genannten allgemeinen Maßnahmen zur Ertüchtigung des Körpers werden einsetzen müssen, um einer etwa bestehenden Enteroptose entgegen zu arbeiten. Vor einem Punkte sei besonders gewarnt, und der ist der, bei der Retroflexio uteri fixata das Krankheitsbild immer nur von dem Gesichtswinkel des retroflektierten Uterus allein zu betrachten. Die fixierte Retroflexion des Uterus ist nur Teilerscheinung einer Pelveoperitonitis obsoleta und demnach durch mannigfaltige, verschieden gelagerte Fäden, Stränge und Bänder gekennzeichnet, welche den Uterus an die Adnexa und umgekehrt diese an ihn heranziehen und ihn oft mit dem Rektum, aber auch mit anderen Darmabschnitten verbinden. Es läuft daher die Opera-

tion vielfach keineswegs auf die bloße Suspension des Uterus hinaus, sondern gipfelt im wesentlichen in dessen zarter und sorgsamer Befreiung aus den Adhäsionen und in der Freimachung der Nachbarorgane von denselben. Sie ist keine Operation für Anfänger, wie manche glauben, sondern erfordert neben technischen Erfahrungen auch immer einen an vielen Fällen gewonnenen geübten Blick für das richtige Ausmaß und die Grenzen des erträglichen Konservativismus. Wenn man die Bauchhöhle geöffnet hat, kann man unter Umständen finden, daß der ursprüngliche Operationsplan in einen solchen geändert werden muß, der größere technische Fertigkeiten erfordert als die bloße Suspension. Gleichzeitig muß man auch bereit sein, kranke, verschlossene und offenbar nicht mehr zur Funktion zu bringende Tuben zu entfernen, allenfalls ein Ovarium zu resezierem. Auch die Technik der Peritonealisierung muß man gut beherrschen, noch mehr, es kann sein, daß ein Fall, in dem man auszog, um den Uterus zu suspendieren, damit endet, daß man ihn deswegen extirpiert, weil eine Deckung seiner großen Wundflächen ebenso wenig wie die Erhaltung der Adnexa gelingt.

Bei heftigen Retroflexionsbeschwerden, insbesondere bei ziehenden, durch den fixierten, auf das Rektum drückenden Uterus bewirkten Kreuzschmerzen, ist statt der Suspension die vaginale Entfernung des Uterus bei Frauen, die bereits Kinder haben und sich der Klimax nähern, gewiß berechtigt. In solchen Fällen ist sie weitaus das einfachste und beste Verfahren, für das mein Lehrer PEHAM unter diesen Umständen immer eintrat, da es recht ungefährlich ist und schlagartig alle Beschwerden aus dem Wege räumt.

### Descensus und Prolapsus uteri et vaginae.

Die Ursachen für die Entstehung von Vorfällen der Scheide und der Gebärmutter sind in wenigen Worten nicht zu fassen. An dieser Stelle sei nur folgendes bemerkt: Nachdem lange Zeit die Lehre in Geltung stand, daß die Erschlaffung der Band- oder Haftapparate die wichtigste Ursache für den Prolaps der Gebärmutter sei, ist durch die berühmten Untersuchungen von HALBAN und TANDLER erwiesen worden, daß die Vorfälle zweifellos durch eine primäre Insuffizienz des muskulären Beckenbodens, also der Stützapparate entstehen, mithin Hernien des Hiatus genitalis sind. Daß aber auch der alten Lehre von der Wichtigkeit der Erschlaffung der Bandapparate für die Entstehung der Vorfälle ein hoher Wert zukommt, ist durch die überzeugenden Forschungen ED. MARTINS über die Bedeutung des bindegewebigen Haftapparates — des parametranen, paravaginalen, paravesikalen Gewebes etc., der sogenannten Retinacula uteri — bewiesen worden. Muß man auch der Insuffizienz des Beckenbodens den Hauptanteil in der Ätiologie der Prolapse zuschreiben, so darf man andererseits nicht vergessen, daß Haft- und Stützapparat ein untrennbares Ganzes sind und zusammengehören, weshalb Schädigungen des einen ohne solche des anderen im wesentlichen gar nicht denkbar sind, welche Tatsache ins rechte Licht gerückt zu haben, v. JASCHKES unbestrittenes Verdienst ist. Mit

diesem Autor nimmt man wohl am besten an, daß ein von Haus aus minderwertiger Haft- und Stützapparat eine allgemeine Disposition zum Prolaps schafft und daß die Insuffizienz des bindegewebigen Haftapparates im Verein mit der Tonusverminderung des Uterus zur Retroflexion und damit zur weiteren Begünstigung des Prolapses führt. Der in Retroflexion befindliche Uterus wird nämlich in der Richtung der Vaginalachse durch den abdominellen Druck nach abwärts gedrängt, da er in dieser Richtung auf keinen hemmenden Widerstand stößt (HALBAN). Der so vorbereitete Prolaps kommt aber erst zur vollen Ausbildung, wenn der Beckenboden, der Stützapparat, durch das Geburtstrauma geschädigt wird, wodurch im Hiatus genitalis eine Bruchpforte entsteht.

Senkung und Vorfal der vorderen Scheidenwand sind in höheren Graden durch eine Zystokele, also eine herniöse Ausbuchtung der Blasenwand bedingt, da Blase und vordere Scheidenwand durch derbe Gewebfasern miteinander fest verbunden sind und deswegen zwangsläufig die tiefertretende Blase die Scheidenwand mitnehmen muß. Isolierte Zystokelen ohne gleichzeitigen Vorfal des Uterus und der hinteren Scheidenwand entstehen durch traumatische Zerreiung der Gewebsbündel im Septum vesicovaginale, wobei Drehbewegungen der Zange wohl die Hauptrolle spielen (STOECKEL). Während beim Prolaps die Blase immer in Mitleidenschaft gezogen ist, gilt dies für das Rektum keineswegs in demselben Ausmae. Man sieht häufig Totalprolapse ohne jede Rektokele, weil das rektovaginale Bindegewebe ungleich lockerer gewebt ist als das vesicovaginale.

Weit seltener als Geburtstraumen sind es angeborene Defektbildungen in der Muskulatur des Beckenbodens oder angeborene, allenfalls auch erworbene Lähmungen der Muskulatur desselben infolge Rückenmarks- und Nervenkrankheiten, welche zum Prolaps Veranlassung geben. Bekannt ist, daß die Spina bifida occulta infolge mangelhafter Innervation der Beckenbodenmuskulatur und Kontraktionschwäche derselben auch bei virginellen Individuen einen Prolaps verursachen kann.

Die Verbreitung geringfügiger Senkungen, aber auch höherer und höchster Grade des Vorfalles des Genitales ist leider eine sehr große. Daran tragen bei der betonten abwegigen Körperveranlagung besonders späte, gar schwere Erstgeburten, gewaltsame Entbindungen mit Zerreiung des Levator und mangelhafte Wochenbettspflege Schuld. Eine schonende Geburtsleitung, welche die Extraktion der Frucht durch den noch nicht gedehnten Hiatus genitalis ebenso zu umgehen weiß, wie Zerreiungen der oberflächlichen Dammuskeln durch rechtzeitigen Entspannungsschnitt, vermag weitgehend spätere Schäden zu verhüten. Wenn bei geringeren Graden dieses Zustandes die Beschwerden auch fehlen können oder zumindestens nicht unerträgliche sind, so sind es bei stärkerer Ausbildung einer Senkung die Beeinträchtigung der Arbeitsfreude und Lebenslust, welche uns zwingen, zu dem Zustande Stellung zu nehmen, und zwar in der Mehrzahl der Fälle je früher je besser, weil

bei so mancher Frau vorbeugende Maßnahmen Schlimmeres verhüten können. Richtig ist, worauf besonders MENGE aufmerksam macht, daß schwer körperlich arbeitende Frauen, die von der Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt finden, auch in bedeutenden Vorfällen weder einen Grund für die Arbeitseinstellung, noch für die Klage über Beschwerden sehen. Im Gegensatz dazu sind asthenische, nervöse und unterernährte Personen geneigt, geringe Grade des Descensus der vorderen Scheidenwand ebenso wie einen Zug am Blasenboden frühzeitig unangenehm zu empfinden und über vermehrte Sekretion aus der Scheide zu klagen. Diese Zustände üben nun ihrerseits auf die Psyche, aber auch auf den übrigen Körper sozusagen zwangsläufig einen üblen Einfluß und machen bei einem bestehenden örtlichen Leiden die Frau als ganzes zum kranken Wesen. Darum ist es notwendig, beginnenden Fällen das volle Augenmerk der Behandlung zuzuwenden, weil in jeder Senkung, besonders bei Retroversio uteri, und in jedem sich vorbereitenden Vorfall aus mechanischen Gründen schon die Neigung zur Verschlimmerung liegt. Daher sind Vorfälle in ihren Anfangsstadien bereits Anzeigen zur Behandlung, und es steht natürlich außer jedem Zweifel, daß Senkungen höheren Grades durch die lästigen Beschwerden, das Drängen nach unten, das Gefühl der Zerrung an Blase und Darm und vor allem durch die schlechte Verschlusmechanik des Blasenschließmuskels und das durch ihn bedingte Harnträufeln auch bei geringer Anstrengung der Bauchpresse unbedingt Gegenstand unserer Behandlung sein müssen. Es ist hier nicht der Ort, ausführlich die Symptome des Descensus zu schildern, wohl aber ist es geboten, darauf hinzuweisen, daß in Fällen höhergradigen Prolapses bei Vorfall der Blase trotz Hypertrophie derselben die Entleerung nicht vollständig gelingt und Restharn zurückbleibt, der so und so oft zu langwieriger schmerzhafter Cystitis Veranlassung gibt. Dann sind es wieder die so häufigen Dehnungsgeschwüre des Vorfalles, die auf die Dauer auch von gleichgültigen Frauen nicht ertragen werden und schließlich dort, wo auch eine Rektokele da ist, Stauungen des Kotes, der manchmal überhaupt nicht anders als mit dem Finger aus diesem ausgestülpten Sack entfernt werden kann. Schließlich sind Frauen mit vollständigem Vorfall, der durch das Stauungsödem Kindskopfgröße und mehr erreichen kann, zu einer sitzenden, manchmal zu einer liegenden Lebensweise verurteilt, die auf die Dauer unerträglich ist.

Beschäftigen wir uns zunächst mit der Behandlung der beginnenden Senkung. Hier gilt wie bei der Retroflexio simplex der Satz, daß nicht allein eine lokale, sondern auch eine allgemeine Therapie in die Wege geleitet werden muß, will man der beginnenden Senkung erfolgreich begegnen. Liegen nämlich Fälle vor, in denen der Levator-spalt nicht weit aufklafft und sind die Levatorschenkel nicht atrophisch, vermögen die Kranken noch entsprechend diesen Muskel anzuspannen, dann soll man sich zunächst der Massage und Gymnastik bedienen, um die Beckenbodenmuskulatur zu bessern. Nach Durchführung von Liege- und Mastkuren, Arsen- und Eisenbehandlung und Regelung der Darm-

tätigkeit, leistet die Massage des Uterus, der Scheide und ihrer Aufhängeapparate Gutes. Die von Thure BRANDT eingeführte, seinerzeit viel geübte, jetzt immer mehr in Vergessenheit geratene Massage, vermag durch Kneten, Streichen und Zirkelbewegungen, Drücken und vibrierendes Aufsetzen der Finger den Beckenboden zu stärken. Zwei in die Scheide eingeführte Finger und die auf den Hinterdamm aufgelegten Daumen vermögen die Hyperämie und Durchknetung des Darmes ebenso zu bewirken, wie vorsichtig ausgeführte, mit dem gut eingefetteten Finger vom Rektum her gemachte Massage des Levator ani. Daneben kann man der schwedischen Gymnastik mit besonderer Berücksichtigung der Bauch- und Schenkelmuskulatur in solchen Übungen nicht entraten, welche synergetisch die Beckenbodenmuskulatur zur Kontraktion zwingen. Hierher gehören das Aufrichten des Rumpfes aus der Horizontalen ohne Zuhilfenahme der Extremitäten, das Erheben der in den Knien gestreckten Beine im Hüftgelenk bis zur Senkrechten, das Auseinanderziehen der geschlossenen Kniegelenke und ganz besonders das Einkneifen des Afters (sog. Klemmübungen). Gut bewähren sich auch Fächerduschen, am besten wechselwarm, die auf den Damm wirken, auch wechselwarme Sitzbäder, wechselwarme Scheidenduschen, allenfalls auch Spülungen mit Tanninlösungen und Bäder mit Eichenrinde, welche eine gewisse, wohl mehr subjektiv empfundene Straffung des Scheidenrohres bewirken sollen. Es sei daran erinnert, daß nach der ersten Geburt bereits im Wochenbett die vorbeugenden Maßnahmen gegen die Entstehung der Vorfälle einzusetzen haben. Dabei darf es aber nicht bleiben, vielmehr muß bereits nach dem erstmaligen Eintreten der Periode, wenn man also mit der Rückkehr des Genitales zur Norm rechnen kann, eine regelrechte Freigymnastik an die Wochenbettübungen angeschlossen und in der Folgezeit weiter betrieben werden. Wie SIEBER und KIRCHBERG gezeigt haben, läßt sich der Ausbildung einer Senkung sogar schon in der Schwangerschaft recht zweckmäßig durch entsprechende Gymnastik begegnen. Sie läuft nicht nur auf Übungen zur Kräftigung der Bauch- und Rückenmuskulatur und der des Beckenbodens hinaus, sondern muß auch in Atemgymnastik bestehen, deren zirkulationsfördernde Wirkung von grundlegender Wichtigkeit ist. Das, aber auch nicht mehr leisten physikalisch-diätetische Maßnahmen in Fällen beginnender Senkung. Daß sie einen bereits in Ausbildung begriffenen ausgesprochenen Prolaps noch zurückbringen, darf man nicht erwarten.

In allen Fällen weiter fortgeschrittener Senkung muß eine Lokaltherapie zur Anwendung kommen, welche die Aufgabe hat, die in Normallage zurückgebrachten Teile entweder auf konservativem Wege, also orthopädisch oder chirurgisch in dieser richtigen Stellung zu erhalten. Es muß nun gerade herausgesagt werden, daß beide Arten der Therapie ihr Wenn und Aber haben. Eine ideale Lösung ist für eine große Serie von Fällen, ganz besonders für die Gruppe der jüngeren Frauen auch heute noch nicht vorhanden, Grund genug, immer wieder die oben angedeutete Prophylaxe in den Vordergrund zu schieben. Gegen die Pessartherapie im allgemeinen sind gewichtige Bedenken vorzubringen.

Der Fremdkörper in der Scheide, der, wie es bei größeren Prolapsen unvermeidlich ist, einen beträchtlichen Umfang haben muß, ist geradezu ein Beischlafhindernis. Der kleinere Fremdkörper tut wieder seinen Zweck nicht. Die Frau ist dauernd vom Arzt abhängig, hat ständig für entsprechende Maßnahmen zu sorgen und muß vor dem Pessardrucke bangen, kann aber anderseits das Bewußtsein nicht los werden, daß der Prolaps niemals durch den Ring zur Heilung oder auch nur zur Besserung kommt, kurz Mißstände, die recht beträchtlich sind und es begreiflich erscheinen lassen, daß man zusieht, wo es angeht, den Pessaren aus dem Wege zu gehen. Nun setzt die chirurgische Therapie ein. Aber auch sie befriedigt nur dann, wenn sie aufs strengste den Bedürfnissen des Einzel-falles angepaßt ist. Wieder sind es die verschiedenen Lebensalter, die ein ganz verschiedenes Vorgehen erfordern. Grundsätzlich erscheint wichtig, bei jungen Frauen mit geringfügiger Senkung die Operation zunächst zurückzustellen und sie erst für einen Zeitpunkt im Auge zu behalten, wo weitere Geburten nicht mehr zu erwarten sind. Geringfügige Senkungen jüngerer Frauen können durch die geschilderten physikalisch-diätetischen Maßnahmen objektiv und noch mehr subjektiv beim Status quo erhalten werden, ja für die Patientin können die Beschwerden nach entsprechender Kräftigung der Muskulatur geradezu ganz verschwinden, gar dann, wenn einer etwa bestehenden Enteroptose, einem in Entwicklung begriffenen Fetthängebauch durch ein gutes Mieder entgegengearbeitet wird. Kleinere Eingriffe, die so beliebten vorderen und hinteren, ein Schleimhautoval exzidierenden Kolporhaphien, welche an dem meist retroflektierten Uterus gar nicht angreifen, führen nach einer kurzen Spanne Zeit besseren Befindens sehr bald wieder zu den alten Zuständen. Ist die Frau jung und besteht eine offenbar fortschreitende Senkung, gar mit reflektiertem Uterus, so ist es richtiger, will man kein Pessar geben — und es ist unsympathisch bei jungen Frauen eines zu geben, weil sie davon nicht loskommen — von der Scheide und der Bauchhöhle her operativ vorzugehen, nämlich in derselben Sitzung zuerst das Scheidenrohr zu verengern und den Damm plastisch zu verstärken und sodann den Uterus vom Pfannenstielschen Querschnitt aus zu suspendieren. Das Verfahren ist zwar kein ganz kleiner Eingriff und dauert geraume Zeit, liefert aber ausgezeichnete funktionelle und orthopädische Ergebnisse, ohne irgendwie nachteilig auf die Schwangerschaft oder die Geburt einzuwirken. Auch höhergradige Vorfälle junger Frauen, die man jetzt übrigens bereits seltener sieht, sind durch diese Methode gut anzugehen, allenfalls noch im Verein mit einer Amputation des Collum. Bei ausgesprochenen Vorfällen wird man um eingreifende Operationen nicht herumkommen, von denen die Methode HALBANS und die WERTHEIM-SCHAUTASche Interposition angeführt sei. HALBANS Methode hat gegenüber der Interposition den großen Vorteil für sich, daß sie eine Sterilisation nicht notwendig macht, weil durch sie die Geburtsvorgänge nicht gestört werden, während die Interposition zwangsläufig mit Sterilisation verbunden werden muß. Da nach derselben auch Klagen über Schmerzen beim Geschlechtsverkehr laut werden, scheint es zweckmäßig, sie auf

Fälle totalen Prolapses in den Wechseljahren oder zumindestens nahe diesen zu beschränken. Bei der Leistungsfähigkeit unserer Operationsmethoden und ihren geringen unmittelbaren Operationsgefahren, ganz besonders aber bei dem Umstande, daß wir uns vielfach der Lokalanästhesie bedienen können, weil wir ausgezeichnete vaginale Verfahren haben, ist auch die Zahl der Kontraindikationen gegen die Operationen so eingeschränkt, daß wir bei Frauen, die irgendwie im Leben tätig sind, auch so gut wie immer die Operation ausführen können. Das gelingt uns auch mit wenigen Ausnahmen bei höherem Alter über das Klimakterium hinaus, weil die vaginalen Verfahren denn doch die Frauen weniger gefährden und die Narkosezufälle wegfallen. Natürlich bleiben immer Fälle übrig, in denen Krankheiten des Herzens, der Lungen und des Stoffwechsels die Operation verbieten, wie denn manchmal ganz besonders hohes Alter es auch zweckdienlicher erscheinen lassen kann, zur Pessartherapie zu greifen. An dieser Stelle möchte Verfasser auch noch anfügen, daß bei Frauen im Klimakterium und jenseits desselben als Prolapsoperation, besonders bei kleinem, vor der Vulva liegenden Uterus die Totalexstirpation desselben mit einer ausgiebigen vorderen, ein neues Blasenbett wieder herstellenden Plastik und Raffung der Blase, im Verein mit einer Vernähung der Levatorschenkel ganz ausgezeichnete Ergebnisse liefert und nicht gefährlich genannt werden darf. Diese Operation hat sich beim Verfasser auch noch bei Frauen in den Sechzigerjahren bei Totalprolaps mit großen Dekubitalgeschwüren aufs beste bewährt. Sind die Frauen recht schwach und herabgekommen, bestehen gar hochgradige Altersveränderungen, so daß man bei der nach einer größeren Operation unbedingt notwendigen längeren Bettruhe mit Lungenkomplikationen rechnen muß, kann man auch kleinere, aber immerhin ziemlich erfolglichere Operationsverfahren wählen, wie den Verschuß der Scheide nach NEUGEBAUER-LEFORT, eine Operation, die in örtlicher Betäubung und in kurzer Zeit auch bei ganz schwachen Frauen der ältesten Jahrgänge ausgeführt werden kann. Freilich ist es nicht jeder Frau Sache, sich der Operation zu unterwerfen, und so manche bleibt lieber zeitlebens Sklavin ihres Pessars, bis es schließlich soweit gekommen ist, daß sie zur Operation zu alt wurde. Die Fälle hoher Altersklassen und die ernster Gegenanzeige gegen eine Operation überhaupt sind es, die heute noch die Mehrzahl der Pessarträgerinnen stellen. Junge Frauen finden sich aus den erwähnten Gründen begreiflicherweise nicht damit ab, und es ist auch gar nicht zu raten, solche Frauen mit Ringen zu versorgen. Der praktische Arzt muß für die erwähnten Möglichkeiten in der Pessartherapie beim Prolaps entsprechend gerüstet sein und bestimmte Richtlinien verfolgen. Zweck und Sinn der Pessartherapie ist es, durch einen Stützapparat einerseits die Schwebeapparate, andererseits den Tragboden zu unterstützen, was nur durch Anspannung und Entfaltung der Scheidenwände möglich wird. Dem Herabsinken soll durch eine Überlagerung des klaffenden Levatorspaltes Einhalt geboten werden. Grundsätzlich aber ist zu sagen, daß die ganz großen Prolapse, bei denen die Muskulatur des Beckenbodens weitgehend geschwunden ist, der orthopädischen Therapie

die größten Schwierigkeiten entgegensetzen. Mittlere Grade lassen sich durch einfache Vorrichtungen, höhere durch komplizierte wenigstens soweit heben, daß die Trägerin für die Besorgung leichter Arbeiten wieder tauglich wird. Mit den komplizierteren Apparaten ist zwangsläufig die Unmöglichkeit der Zulassung des Beischlafes verbunden, die einfacheren gestatten denselben ohne weiteres. Für die leichteren Fälle eignet sich am besten der kreisrunde Hartgummiring mit dickem Rahmen. Die vielfach noch gebrauchten dünnen Ringe sind nicht zu empfehlen, weil sie zu leicht Druckgeschwüre erzeugen, wenngleich sie durch ihren dünnen Rahmen den Scheidenschlauch zirkulär spannen und sich daher, wie dies MENGE hervorhebt, unter dem Einfluß des Bauchdruckes besser an die Fläche der Levatoren auflegen. Alle Ringe haben nur dann einen sicheren Halt, wenn sie sich breit auf die restliche Muskulatur des Beckenbodens stützen können. Ist dies nicht der Fall, und liegt der größere Teil des Ringrahmens im Hiatus genitalis, so stellen sich die Instrumente auf die Kante und werden aus der Scheide geboren. Sie müssen also eine zirkuläre Anspannung des Scheidenrohres über den Levatoren erzeugen, Forderungen, die wieder einerseits unsere Bedenken gegen die Usuren verstärken, andererseits notwendigerweise zu einer weiteren Ausdehnung der Scheide führen. Das sind die Umstände, die es uns, wo immer es angeht, wünschenswert erscheinen lassen, von der Pessartherapie Abstand zu nehmen und sie durch die operative Therapie zu ersetzen. Richtig ist, daß ein Ring nicht bloß den Hiatus verschließt, sondern daß er infolge seiner Spannkraft durch das Auseinanderdrängen der Scheidenwände das hintere Scheidengewölbe hebt und mit ihm das paravaginale Gewebe, die parametranen Lager des Uterus und das Septum vesico- und recto-uterinum. Bekanntlich spielt bei der Verstärkung des Prolapses der in Retroversionsstellung befindliche Uterus eine wesentliche Rolle, weil die Richtung des Abdominaldruckes den nach hinten verlagerten Uterus in den Bereich des Levatorschlitzes treibt. Ist dagegen der Uterus antevertiert, bzw. reponiert worden, so ist der Druck des normal gelagerten Uterus auf die Levatorplatte gerichtet. Darum ist es nur natürlich, daß man versucht hat, auch Pessare zu verwenden, welche man von der Behandlung der Retroflexio uteri mobilis her als wirksam zur Aufrechterhaltung der normalen Schwebelage des Uterus kennt. Trotzdem eignen sie sich nur ausnahmsweise, weil der hintere Stützbügel meist an den auseinandergewichenen Schenkeln des Levator keinen Halt findet. Außerdem wird die vordere Scheidenwand zu wenig gespannt, und damit wird das die Frauen besonders belastigende Harnträufeln bei jedweder Anstrengung der Bauchpresse nicht beseitigt. Es bleibt deswegen am einfachsten, entweder auf den genannten kreisrunden Hartgummiring mit dickem Rahmen zurückzugreifen oder aber, namentlich bei etwas größeren Prolapsen, das Schalenpessar von SCHATZ zu verwenden. Indem dieses Pessar einen schalenförmigen Körper darstellt, fängt es die vordere Scheidenwand mit der Zystokele gut auf. Wesentlich ist, daß in der Regel der Rand der Schale auch an den untersten Abschnitten der Symphyse eine Stütze findet. Nicht nur daß es, wie die anderen Pessare,

die Scheidenwände spannt und die paravaginalen Stützgewebe in Schwebelage hält, es ist auch eine Pelotte für die herabgetretene Portio vaginalis, welche auf dem Grunde der Schale aufliegt. Was die Einführung der Ringe anlangt, so hat sie unter denselben Vorsichtsmaßnahmen zu geschehen wie die der ovalären, bei der Retroflexio geschilderten Stützapparate. Während bei der Retroflexion als Regel gilt, mit einem möglichst kleinen Ring das Auslangen zu finden, muß beim Prolaps jene Pessargröße gewählt werden, welche von der Scheide und den Stützapparaten eben noch ohne verderblichen Druck ertragen wird. Diese Wahl ist nicht leicht und erfordert Erfahrung und Geduld. Das Pessar wird nach Einfettung seines Randes und Spreizen der Labien schräg unter Vermeidung des schmerzempfindlichen Harnröhrenwulstes eingeführt. Wichtig ist dabei, daß man den schräggestellten Ring von vorne und oben her auf das Frenulum und auf die Fossa navicularis aufsetze und das Dammgewebe nach hinten drücke, so daß der Damm rektalwärts ausweicht, womit die Urethralgegend ungeschoren bleibt. Dann wird das Pessar entlang der hinteren Scheidenwand nach aufwärts geschoben, so daß seine Ränder den Resten des Levatorspaltes aufliegen. Es gibt aber Fälle, in denen auch das SCHATZSche Schalenpessar nicht mehr hilft. Es sind dies solche mit ganz elendem Levator. Für derartige hat man kompliziertere Apparate angegeben, die entweder auf dem Grundsätze beruhen, sie von der Scheide her wirken zu lassen, oder man bedient sich der Hystero-phore, welche die Stütze für den Uterus an einem Bauchgürtel, also einer Tragbandage befestigt haben. Diese Apparate verschmutzen ungemein leicht und rasch und sind heute kaum mehr in Verwendung. Auch von den zahlreichen, die ganze Scheide erfüllenden und entfaltenden Pessaren stehen nur mehr wenige in Gebrauch. Deswegen sollen nur zwei Formen, welche sich immer noch am besten bewähren, hier angeführt werden, und das sind das Zapfenpessar von ROSENFELD und das Keulenpessar von MENGE. Beobachtet man eine Frau mit Totalprolaps, bei dem auch große Nummern eines Pessares nicht halten, so sieht man, daß bei Anstrengung der Bauchpresse die Schale oder der Ring sich auf die Kante stellen und dann herausgleiten. Diese Kantenstellung zu verhindern, gelingt durch Anbringung stielartiger Fortsätze, welche vertikal zur Fensterfläche des Ringes stehen. Ein solcher Fortsatz stößt an die Scheidenwandungen an, wenn der Ring in Kantenstellung zu kippen droht und hält ihn in dauernder Querstellung. Da die Einführung solcher Instrumente technisch gar nicht leicht und überdies recht schmerzhaft ist, müssen diese Fortsätze oder Zapfen abnehmbar sein. Diesen Forderungen entspricht das ROSENFELDSche — und das Keulenpessar von MENGE. Ring und Fortsatz sind auseinandernehmbar, weshalb beide gesondert eingeführt werden können, und auch das Einlegen eines großen Ringes sich schmerzlos gestalten läßt. Beim ROSENFELDSchen Pessar wird der Zapfen in den trichterförmigen Teller eingeschraubt. Bei dem Keulenpessar wird ein an der Spitze der Keule befindlicher Stecker in ein Loch eingeführt, das sich in dem die Ringlichtung quer überspannenden Bügel befindet; durch eine kurze Drehung der Keule um ihre Längs-

achse im Sinne der Uhrzeigerbewegung wird sie vermittels eines Bajonettverschlusses festgestellt. Aber auch die Einpassung der Keule ist nicht ganz leicht, weshalb man gut tut, sich einer eigenen Zange, die der Autor konstruiert hat, zu diesem Zwecke zu bedienen.

Gänzlich verfehlt ist der Versuch, isolierte herniöse Vorstülpungen des Rektums, hervorgerufen durch Zerreiung des Septum rectovaginale, also Rektokelen durch Pessare zurckhalten zu wollen. Sie knnen nur durch plastische Operationen beseitigt werden. Man sieht aber nicht selten Frauen mit derartigen, nur schdlichen Behelfen, die sie die lngste Zeit getragen haben, sich Rat holen. Wiederholt kommen bei lngerer Verwendung der Pessare in solchen Fllen neben Ulzerationen auch schwere Entzndungen im Septum rectovaginale vor, offenbar durch Besiedlung des einem dauernden schweren Druck ausgesetzten Bindegewebes mit Keimen vom Rektum her, die eine chirurgische Therapie (Inzision) notwendig machen.

Noch einige Worte ber Reposition von Totalprolapsen. Beim totalen Prolaps des Uterus und der Scheide hat man mit der Reposition, die man mit zwei Fingern durch Druck auf die vor der Vulva liegende Portio erzielt, nur dann Schwierigkeiten, wenn man es mit Riesenprolapsen zu tun hat, die seit einiger Zeit bereits nicht mehr reponiert, hart und demats geworden sind. Vorteilhaft ist es in solchen Fllen, die Frau zunchst ins Bett zu bringen, wenn der erste Versuch der Reposition auf dem gynkologischen Untersuchungstisch in Stei-Rckenlage milungen ist. Gazekompressen, die in Glyzerin getaucht sind, bewirken bei der im Bett liegenden Frau, deren Becken man durch Erhhung des Fuendes des Bettes zweckmig hochlagert, sehr rasch ein Abschwellen des Prolapses, so da man ihn dann gewhnlich ohne Schwierigkeiten zurckschieben kann. Unter dieser Behandlung bessern sich auch die Dekubitalgeschwre, deren berhutung abzuwarten meist sehr viel Zeit erfordert und deren Reinigung von speckig belegten Massen gengt, die Frau operationsreif zu machen. Dagegen ist es nicht empfehlenswert, bei noch nicht gereinigten Dekubitalgeschwren zu operieren, da sogar Sepsis und Pymie von ihnen ausgehen und die Operation zu einem unglcklichen Ende bringen knnen.

## Behandlung der Kreuzschmerzen.

### Kreuzschmerzen bei Krankheiten der Genital- und Harnorgane und ihre Behandlung.

Die lngste Zeit ist das Symptom der Kreuzschmerzen ein wahres Stiefkind hinsichtlich seiner Beachtung und auch seiner Behandlung gewesen. Die Erklrung liegt zunchst darin, da die Erkennung ihrer Ursachen oft besonders schwierig, manchmal sogar ganz unmglich ist und dann auch darin, da die Frauen Schmerzen, die sich im Kreuz, also einer den Geschlechtsorganen nahen Gegend abspielen, urschlich auf eine Krankheit der Geschlechtsorgane zurckzufhren geneigt sind und deswegen seit

jeher den Frauenarzt aufgesucht haben und aufsuchen. Die Frauenärzte haben nun vielfach recht gewaltsam Zusammenhänge zwischen Geschlechtsorganen und Kreuzschmerzen geschaffen, wo sie gar nicht vorlagen und dadurch die Erkennung und Behandlung der Kreuzschmerzen vielfach auf eine falsche Ebene verschoben. Die Erkenntnis, daß die Kreuzschmerzen der Frau, die entschieden häufiger an ihnen krankt als der Mann, keineswegs in der Mehrzahl der Fälle genitalen Ursprungs sind, ist nicht alt. Gerade unsere Gegenwart bemüht sich, die Kreuzschmerzen auf nicht genitaler Ursache gegenüber denen, welche in kranken Geschlechtsorganen bedingt sind, ins rechte Licht zu setzen und durch Zusammenarbeit zwischen Orthopäden und Gynäkologen strittige Fragen zu klären. Aus dieser Zusammenarbeit, die uns Hans ALBRECHT in seinem erschöpfenden Referat vor Augen geführt hat, werden wir sehr zum Vorteil unserer Kranken so manche dunkle Punkte der Therapie klären.

Selbstverständlich ist es geboten, daß man zunächst immer eine genaue Untersuchung des Genitales vornehme und auch die rektale Untersuchung keineswegs vernachlässige, weil ja die Kreuzschmerzen in einer großen Zahl der Fälle dennoch mit Veränderungen der Genitalorgane, seltener des Darmes (Rektumkarzinom) ursächlich in Zusammenhang stehen. Wer wollte leugnen, daß die entzündlichen Krankheiten des Genitales häufige und heftige Kreuzschmerzen zu erzeugen imstande sind, und daß diese Kreuzschmerzen das führende Symptom sein können, welches die Frau zum Arzte treibt? Da sind es vor allem einmal die dumpfen und bohrenden Schmerzen in akut entzündlichen Stadien der gonorrhöischen und nichtgonorrhöischen Perimetritis und Salpingoophoritis, die freilich mit dem Abklingen des akuten Stadiums unter den im Abschnitt der Entzündungen (S. 102) geschilderten Maßnahmen besonders bei längerer Bettruhe erträglicher werden, sich aber während der Periode oft genug heftig steigern. Dasselbe sieht man in subakuten und chronischen Fällen, gar wenn sich Adnextumoren ausgebildet haben und besonders dann, wenn durch mehr minder reichliche Verwachsungen die Gebärmutter nach hinten zu verlagert ist und durch Strangbildung mit der Nachbarschaft ein verderblicher Zug am Beckenbauchfell ausgelöst wird. Recht häufig ist die Parametritis, ganz besonders die Parametritis posterior Ursache heftigster, geradezu unerträglicher Kreuzschmerzen, mag sie mit oder ohne fixierte Retroflexion einhergehen. Die mobile Retroflexion dagegen vermögen wir mit v. JASCHKE u. a. als alleinige Ursache von Kreuzschmerzen nicht anzuschuldigen, lehrt doch die bis zum Überdruß gemachte Erfahrung nutzloser Suspensionen, ja Exstirpationen retroflektierter Uteri, die beweglich waren, daß die freie Retroflexion die Kreuzschmerzen nicht auslöste, indem sie nach der Suspension oder gar Entfernung des Uterus nach wie vor weiterbestehen. Wenn sie es tut, so sind diese Kreuzschmerzen nur Teilerscheinung einer allgemeinen Insuffizienz des Band- und Stützapparates, wovon schon ausführlich die Rede war.

Ohne Zweifel vermögen natürlich auch Geschwülste des Genitales, Myome des Uterus, gar solche der hinteren Wand, besonders dann zu

Kreuzschmerzen zu führen, wenn sie ins Becken eingekleibt sind. Aber auch kleinere, intramurale und subseröse Geschwülste können für sich oder durch Verwachsungen dasselbe Symptom auslösen, ganz besonders deswegen, weil die Myome die perioden An- und Abschwellungen der Gebärmutter entsprechend dem Verlaufe des Menstruationszyklus mitmachen, wodurch sie gerade zur Zeit der Periode sich unangenehm fühlbar machen. Geschwülste des Eierstockes sind gelegentlich ebenfalls mit Kreuzschmerzen verbunden, wobei natürlich auch die Lage und ihre Beweglichkeit eine Rolle spielen. Seltener sind schon Fälle von Karzinomen operabler Art, die zu Kreuzschmerzen führen. Doch sieht man bei Kollumkarzinomen, welche die hintere Muttermundlippe mehr befallen als die vordere, infolge der sehr bald auftretenden Entzündung der Sacrouterinligamente (Rektaluntersuchung!) Kreuzschmerzen zu einer Zeit, wo das Karzinom noch sehr gut operabel ist. Daß natürlich inoperable Kollumkarzinome, wenn sie bereits in die Parametrien vorgedrungen sind und die Nerven umschneiden, gar solche, welche den Knochen bereits ergreifen, schwerste Kreuz- und Nervenschmerzen machen können, liegt auf der Hand. Auch beim Korpuskarzinom hört man Klagen über Kreuzschmerzen, und auch da nicht nur in Fällen, wo das Karzinom bereits die Gebärmutter zu einer beträchtlichen Vergrößerung gebracht hat, sondern auch in jüngeren Stadien. Wichtig ist es, daß eine retrocökal gelagerte, entzündlich fixierte Appendix eine Ursache hartnäckiger und nur durch die Operation zu behebender Kreuzschmerzen sein kann.

Seltener ist es schon, daß Krankheiten der Harnwege Kreuzschmerzen erzeugen. Diese, welche in Paranephritis, in Nieren- und Uretersteinen und Geschwülsten der Niere ihre Ursache haben können, sind durch Ausstrahlung des Schmerzes gegen die Leiste und schmerzhaftes Harnen ausgezeichnet und ebenfalls nur durch darauf gerichtete Maßnahmen behebbar. Heftige, auch anfallsweise auftretende Kreuzschmerzen, können gelegentlich durch Knickung des Ureters in Fällen hochgradiger Wanderiere vorkommen; ebenso kann eine Beckeniere Kreuzschmerzen auslösen.

Die genital bedingten Kreuzschmerzen sind zum größten Teile einer erfolgreichen Behandlung zugänglich. Sie bestehen in akuten Fällen der Entzündung in allen jenen Maßnahmen, welche in der Ruhigstellung der Organe — besonders zu Zeiten der Periode — in späteren in der Resorption der Exsudate und der möglichsten Hintanhaltung der Verwachsungen liegen. Sie sind bei den Entzündungen und ihren Folgezuständen (S. 114) ausführlich geschildert. Dort, wo es sich um die Endausgänge der Entzündung, die Schwartenbildung und die Verwachsungen der Genitalorgane mit der Nachbarschaft handelt, ist freilich die resorptive und hyperämisierende Behandlung in allen ihren Formen manchmal letzten Endes nicht mehr imstande, den Kreuzschmerzen erfolgreich zu begegnen. Hier ist operatives Vorgehen am Platze. Der Operationsplan wird durch das Operationsbild erst nach Eröffnung der Bauchhöhle entschieden. Wenn man auch trachten wird, namentlich bei jüngeren Frauen möglichst organerhaltend vorzugehen, so wird man doch, um nicht dasselbe Krankheitsbild wieder heraufzubeschwören, auch vor

radikaleren Eingriffen, selbst vor der Totalexstirpation manchmal nicht zurückschrecken dürfen. Bei älteren Frauen aber wird man so und so oft, gar wenn der Uterus deszendiert und mit dem Rektum breit verwachsen ist, durch vaginale Totalexstirpation die Kreuzschmerzen schlagartig beheben können. In Fällen von Myomen kann es gerade bei subserösen Geschwülsten der hinteren Wand der Gebärmutter, besonders bei einzelnen Knoten möglich sein, durch die Exstirpation des Myoms allein und Behebung der Einkeilung Kreuzschmerzen und Stuhlbeschwerden zu beseitigen. Freilich wird man auch hier bestimmte Zusagen über die Erhaltungsmöglichkeit des Uterus niemals vor der Operation geben dürfen, sondern das Vorgehen einzig und allein von den anatomischen Befunden nach Eröffnung der Bauchhöhle abhängig machen müssen. Kreuzschmerzen bei Eierstocksgeschwülsten können manchmal das einzige Symptom sein, das die Frauen zum Arzt treibt, ein Symptom, das mit der Beseitigung der Geschwulst durch Operation schwindet.

Die Kreuzschmerzen, welche als Ausdruck der Infiltration der Sacrouterinligamente, seltener nach Entzündungen puerperalen und nicht puerperalen Ursprungs, häufiger beim Coitus interruptus, bei gestauten metritischen Uteri mit und ohne Ektropium und Erosion, aber auch bei chronischer Stuhlverstopfung mit geschwürigen Prozessen im Rektum sich finden können, sind kein ganz undankbares Feld der Behandlung. Naturgemäß ist die schmerzhaftige Spannung der Sacrouterinligamente dort leichter rückgängig zu machen, wo es sich gemäß den Anschauungen von OPITZ um einen spastischen Zustand, um eine Tonussteigerung auf dem Boden chronischer Hyperämie handelt, wie beim Coitus interruptus. Schwerer kehren sie dort zur Norm zurück, wo entzündliche, bakterielle Vorgänge die Infiltration der Ligamente bedingen, also bei der Erosion, beim Zervikalkatarrh, bei geschwürigen Prozessen des Rektums. Die Abstellung des Coitus interruptus, die Anbahnung einer gleichzeitigen Akme des Geschlechtsgenusses bei den Partnern, die Verordnung von Steinsalzsitzbädern und in hartnäckigen Fällen ganz besonders die Vibrationsmassage sind gute Heilmittel. Sie wird am besten unter Leitung des Zeigefingers, der im hinteren Scheidengewölbe liegt, in der Weise gemacht, daß die Massagekugel sanft gegen das eine und dann gegen das andere Sacrouterinligament gedrängt wird. Heftiger Druck gegen das Scheidengewölbe verursacht Schmerzen. 8 bis 10, in hartnäckigen Fällen auch 20 Sitzungen von 2 bis 6 Minuten Dauer können notwendig werden. STOECKEL, GRAEFE u. a. rühmen ihr besonders gute Erfolge nach. Verfällt die Frau wieder in den Coitus interruptus, so tritt meist das Krankheitsbild neuerlich auf. Daneben kann man durch 10% *Glyzerin-Ichthyol-* und *Thygenol-* Tampons und *Glyzerintampons* sowie Scheidenduschen, durch Heißluftbehandlung und Diathermie die Schmerzhaftigkeit der Sacrouterinligamente mildern und die Kreuzschmerzen zum Schwinden bringen. Gleichzeitig erweist sich in solchen Fällen, namentlich bei vollblütigen, zu Krampfadern, Stuhlverstopfung und Beckenhyperämie neigenden Frauen eine mehrmalige Stichelung der Portio mit feiner Lanzette, die etwa bei jeder Sitzung 1 Eßlöffel Blutes

zum Abfluß bringt, als äußerst vorteilhaft, zumal sie auch günstig auf das Verhalten des Zervikalkatarrhs und der Erosion wirkt. Zu früh vorgenommene Plastiken an der Portio wegen Erosionen können das Bild der Parametritis posterior und damit die Kreuzschmerzen nur verschlimmern! Auch die Vibrationsmassage darf erst nach beendeter Behandlung etwa bestehender Zervikalkatarrhe und Erosionen einsetzen. Dann tun salinische Abführmittel, Öleinläufe, leichte Körpergymnastik ein übriges. Die örtliche Massage bringt nicht viel Erfolg, zumal sie bei erotisch veranlagten Frauen den Blutzufuß vermehrt und Neurasthenische hochgradig angreift. Wenn auch spontane Ausheilungen selbst schwerer und langdauernder Fälle vorkommen — die Ligamente bleiben dauernd verkürzt und verdickt, sind aber nicht mehr empfindlich — so kann man sich auf die Selbstheilung nicht verlassen und muß in hartnäckigen Fällen sogar zu eingreifenderen Maßnahmen schreiten. Hierher gehört zunächst die Dehnung der Sacrouterinligamente in tiefer Narkose, wie sie von SELLHEIM, BRÖSE und KELLER angegeben ist. BRÖSE dehnt in der Weise, daß er mit der einen Hand von der Scheide, mit der anderen von den Bauchdecken her die Ligamente in die Finger nimmt und nach rechts, bzw. links zieht und von der Scheide den ganzen Beckenboden energisch nach oben drängt. Bei sehr starker Schrumpfung faßt er sie auch vom Rektum. Eine Adnexerkrankung schließt natürlich eine derartige energische Dehnung aus, die mit keinem kleinen Schock verbunden ist, kommt es doch vor, daß während der Dehnung der Puls aussetzt! Eine einfache und erfolgreiche Maßnahme kann die Einspritzung einer 1%igen Novokainlösung ins hintere Parametrium vom hinteren Scheidengewölbe her sein, die fächerförmig erfolgt und in der Menge von etwa 30 bis 40 ccm gegeben wird. Sie ist von NOVAK und unabhängig davon von HARTUNG angegeben worden und soll die krankhafte Erregbarkeit des sympathischen Nervensystems des Beckens herabsetzen. Die Durchtränkung und Lockerung des Gewebes durch die Flüssigkeit mag neben dem Anästhetikum wirksam sein. Versagen auch diese Verfahren, so kommt die Durchschneidung der Sacrouterinligamente durch hintere Kolpotomie in Frage. Diese ebenfalls von BRÖSE ausgeführte und von VEIT mit dem technischen Hinweis der möglichst uterusnahen Durchschneidung der Ligamente befürwortete Operation kann aber auch nicht immer vor Rückfällen schützen, indem die durchschnittenen Gewebe sich wieder vereinigen. Diesem Nachteil begegnet erfolgreich die Methode G. A. WAGNERS, der nach Durchtrennung der Sacrouterinligamente zur Verhütung der Wiederverwachsung Appendices epiploicae der vorderen Rektalwand zwischen die durchtrennten Ligamentstümpfe lagert. Auch die Ventrifixur des Uterus, die durch die Streckung desselben und die Dehnung des Gewebes die Kreuzschmerzen beseitigen soll, ist mit Erfolg von BRÖSE angewendet worden. Wie man sieht, sind der Vorschläge zur Behandlung dieses Leidens nicht gerade wenig. Beweis genug, wie schwer es im einzelnen Falle der Heilung zugänglich sein kann.

Die Kreuzschmerzen beim operablen Karzinom des Kollum pflegen mit der Entfernung des Karzinoms keineswegs immer zu schwinden.

Im Gegenteil, man sieht bei radikal operierten Fällen noch wochen- und monatelang Kreuzschmerzen, welche auch bei der Kohabitation besonders störend empfunden werden, offenbar deswegen, weil es bei der Einstülpung des kurzen Scheidenblindsackes durch das Membrum virile zur Zerrung der darunterliegenden Gewebe, besonders der parametranen, narbig veränderten Stümpfe kommt (vgl. S. 195). Man muß trachten, die Kreuzschmerzen durch symptomatische Maßnahmen, wie Einreibungen, Wärmeapplikation, Schlamm packungen, heiße Sitz- und Vollbäder, Antineuralgica und Organo- und Hormontherapie zu mildern (S. 80 ff.).

### **Kreuzschmerzen aus anderen Ursachen und ihre Behandlung.**

Sind diese Arten der Kreuzschmerzen dem Gynäkologen durchaus geläufig, so ist eine zweite Gruppe von Kreuzschmerzen, welche die genital bedingten an Häufigkeit überragt, verschiedenen Ursprunges und schwerer deutbar. Um sie zu erkennen und richtig zu behandeln, bedarf es zunächst einer anderen als der üblichen Untersuchungstechnik der Gynäkologie. Es ist unbedingt notwendig, daß derartige Kranke völlig entkleidet untersucht werden, und daß man nicht bloß die Bauch- und Kreuzgegend einer Betrachtung und Betastung unterzieht, sondern auch von der Profilansicht die Stellung der Wirbelsäule beachtet und sogar das Verhalten der unteren Gliedmaßen hinsichtlich eines etwa vorhandenen Genu valgum oder eines Pes planus prüft. Außerdem muß man den Grad der Beweglichkeit der Lendenwirbel beim Beugen und seitlichen Rumpfneigen ermitteln, um Fälle mit anatomischer Unterlage von solchen ohne Befund unterscheiden zu können. Bei derartigen Untersuchungen wird sich gelegentlich auch die Notwendigkeit einer Röntgenaufnahme zur Klärung des Falles ergeben. Am häufigsten liegen die Ursachen der Kreuzschmerzen in regelwidrigen Zuständen des lumbo-sakralen und sakroiliakalen Teiles der Wirbelsäule. Sie sind entweder in einer Fehlhaltung des Beckens (statisch-dynamische Dekompensation, Jungmann) bedingt oder durch Fehlbildungen dieses Skelettabschnittes, der ja durch solche leider geradezu ausgezeichnet ist. Zu diesen gehören die Sakralisation und Lumbalisation, die Spondylolisthesis und Defektbildungen wie die Spina bifida. Ferner werden solche Kreuzschmerzen durch arthritische Prozesse der *Articulatio sacroiliaca*, schließlich auch durch Tuberkulose derselben und durch eine solche des 5. Lendenwirbels hervorgerufen. Erst dann, wenn trotz allen Bemühens ein Befund nicht zu erheben ist, wird man zu der Diagnose Rheumatismus greifen müssen, die freilich so und so oft nur eine Verlegenheitsdiagnose bedeutet und entschieden zu häufig gestellt wird. Schließlich wird man aber auch Fälle ohne anatomischen Befund als reine Neurose der Asthenischen und Neuropathen aufzufassen haben, wenn bei negativem Röntgenbefunde und normaler Rumpfhaltung namentlich der Druck auf die Dornfortsätze der Wirbelsäule schmerzhaft ist, und der Kreuzschmerz in deutlicher Abhängigkeit von der seelischen Stimmung steht (Rhachialgie).

Was nun die Behandlung dieser so schwer zu deutenden Kreuz-

schmerzen aus den genannten Ursachen anlangt, so sei zunächst auf die statischen Veränderungen, die Fehlhaltung des Beckens als Ursache der Kreuzschmerzen hingewiesen. Diese Fehlhaltung des Beckens, nach FICK sagittale Beckensenkung genannt, beruht im wesentlichen auf einer Verkleinerung des lumbosakralen Winkels und auf einer Vermehrung der Beckenneigung. Dehnungen und Zerrungen der Ligamente stören die Zusammenarbeit des Bandapparates, der das Kreuzbein einerseits mit der unteren Lendenwirbelsäule, andererseits mit den beiden Darmbeinen verbindet. Schließlich kommt es zur Erschlaffung des gesamten Bandapparates und damit zur Lockerung der Gelenkverbindungen, womit die Verschiebung der Statik und Dynamik der Wirbelsäule eingeleitet und dauernd unterhalten wird (HASS). Rasche Gewichtszunahme, ganz besonders aber Schwangerschaft und Geburt, harte Berufsarbeit mit ungünstiger Zwangshaltung sind die auslösenden Ursachen für die Entstehung dieser meist bei Frauen im mittleren Lebensalter auftretenden Zustände. Die beginnende Insuffizienz des Halte- und Stützapparates versucht der Körper durch eine entsprechende Zwangshaltung der Muskeln, insbesondere der geraden Rückenmuskeln, aber auch des M. pyriformis und des M. ileopsoas wettzumachen, eine Inanspruchnahme der Muskulatur über Gebühr, die sich in schmerzhafter Spannung und diffusen Rückenschmerzen äußert (MARTIUS). Aber auch die gesamte Lenden- und Bauchmuskulatur wird nicht verschont. Zu diesen Muskelschmerzen kommen die von den überdehnten Gelenkkapseln und deren Nerven ausgelösten Schmerzen hinzu (v. SCHUBERT, ALBRECHT). Während die Pyknica, die für die Fortpflanzung wie keine andere Frau geschaffen ist — wiederholen sich die Schwangerschaften nicht zu rasch — durch den guten Bau ihres Körpers und die Festigkeit der Stütz- und Halteapparate solchen Insuffizienzerscheinungen gegenüber gewachsen ist, ist die infantile und asthenische Frau weit mehr gefährdet. Wird dem Zustandsbild nicht entgegengearbeitet, so vertieft es sich durch die eingangs erwähnte Dehnung und Zerrung der Haltebänder und durch Abnützungsvorgänge an den Zwischenwirbelscheiben, allenfalls auch durch arthritische Prozesse an Knochen und Gelenken. Heute wissen wir aus den Forschungen SCHMORLS, JUNGHANS, UEBERMUTHS u. a., daß Eindellungen der Bandscheiben, knöcherne Verdichtung und ähnliches durch Abnützung schon in den Zwanziger- und noch mehr in den Dreißigerjahren zum Elastizitätsverlust derselben und dadurch mittelbar zur Schädigung der Wirbelkörper führen können, wodurch das Zustandsbild der Behandlung noch schwerer zugänglich wird. Diese sucht eine Stützung des Beckens durch Bandagen zu erzielen und dadurch die vermehrte Beckenneigung allmählich aufzurichten. Alle Binden, welche ihren Stützpunkt im Kreuzbein finden, sind fehlerhaft, weil sie die Beckenneigung und damit die Lordose nur vermehren. Die im Wiener orthopädischen Institut von HASS verwendete Miedertype, die mit je einer Pelotte über der Schoßfuge und dem Kreuzbein versehen, entsprechend tief sitzt und durch Schenkelbänder gesichert ist, erfüllt ihren Zweck gut, indem die beiden Pelotten durch einen schmalen Stoffgurt fest gegen-

einander gepreßt werden. Nicht zu vergessen ist, daß das Mieder auch entsprechend hoch hinaufreiche, damit es den Bauch stützt und der abdominelle Druck zur Stützung der unteren Wirbelsäule mit herangezogen wird. Eine andere Type ist von JUNGSMANN angegeben, welche sich in einschlägigen Fällen sehr gut bewährt hat. Mit der Verordnung des Mieders allein ist es nicht getan. Massage, Bäderbehandlung, aktive und passive Bewegungen und richtig abgestufte, eigens auf die Entspannung der Muskulatur gerichtete Übungen müssen sich an die Miederbehandlung anschließen, auch Heißluftkuren und Schwimmen gehören mit der Diathermie zum Rüstzeug der Therapie.

Gegenüber dieser so häufigen Ursache der Kreuzschmerzen treten die anatomischen Veränderungen angeborener Art im Lumbosakralabschnitt etwas in den Hintergrund. Nicht jede Spina bifida occulta muß von Kreuzschmerzen begleitet sein, wengleich mangels einer anderen Ursache Kreuzschmerzen und Ischias bei Auffindung einer Spaltbildung wohl darauf zu beziehen sein werden.

Auch die Einbeziehung des 5. Lendenwirbels ins Kreuzbein (Sakralisation) und andererseits die Umwandlung des ersten Sakralwirbels in einen Lumbalwirbel (Lumbalisation des ersten Sakralwirbels) kann Ursache der Kreuzschmerzen sein. Bei der Lumbalisation ergibt sich aus der verlängerten Lendenwirbelsäule und dem verkürzten Kreuzbein eine größere Beweglichkeit der Wirbelsäule, wodurch die Tragkraft des Beckens herabgesetzt und die Ermüdungsgrenze niedriger ist (ALBRECHT). Bei der Sakralisation verursachen ein- oder doppelseitige, gelenkige und knöcherne Verbindungen der abnorm stark entwickelten Querfortsätze des 5. Lendenwirbels mit der Pars lateralis des Kreuzbeins oder mit den Darmbeinkämmen entweder lumbale Skoliosenbildung oder Schmerzen, die in Arthritis, Periostitis und Bursitis gelegen sein können, Beschwerden, die besonders bei der Beugung auffallen und streng an den Ort der pathologischen Veränderung gebunden sind. Es ist sehr schwierig, diese Fälle richtig zu deuten, aber wenn man nur daran denkt, so kann man mit Zuhilfenahme des Röntgenbildes und der Auswertung der Symptome zum diagnostischen und auch therapeutischen Ziele kommen. Dabei muß man an der nackten Patientin die Wirbelsäule nach allen Richtungen, im Stehen und Gehen, bei Neigung und Drehung, bei Beugung und Streckung, in Zwangs- und Ruhehaltung prüfen, den Grad der Lordose und die Haltung der Muskulatur berücksichtigen. Vor Überschätzungen dieser Befunde sei mit HASS gewarnt, da man sehr häufig Sakralisation aufdeckt, ohne daß sie klinische Symptome macht. Wohl nur ausnahmsweise wird der Orthopäde zur Exstirpation des Querfortsatzes raten. Die Beschwerden bei Lumbalisation liegen in derselben Richtung. Gelegentlich kann bei Veränderungen der Lendenwirbelsäule an einem Querfortsatz eine verblüffend einfache Maßnahme, wie Erhöhung eines Schuhabsatzes um wenige Millimeter die Zwangshaltung aufheben, den verderblichen Druck beseitigen und osteoarthritische Prozesse zum Rückgang bringen (STRASSER).

Verhältnismäßig selten wird man es mit echten Fällen von Spandy-

lolisthesis zu tun haben, dem Gleiten des 5. Lendenwirbelkörpers gegen den ersten Kreuzbeinwirbel. Bekanntlich beruht dieses Leiden meist auf einem Ausbleiben der knöchernen Vereinigung von Körper und Bogen des 5. Lendenwirbels, wodurch der Wirbelkörper mit dem Vordertheil des Bogens und der darüber gelegenen Wirbelsäule nach vorne rückt; dadurch ist der Zusammenhang mit dem Kreuzbein nur durch den Bandapparat erhalten. Auch für solche Fälle besteht die Behandlung in Miedern mit einer über der Symphyse und dem Kreuzbein liegenden Pelotte, die gegeneinander durch einen festen Stoffgürtel gepreßt werden.

Bei älteren Frauen kann die bereits erwähnte Bandscheibengeneration im Bereiche der untersten Brust- und Lendenwirbelsäule neben Veränderungen in den Articulationes sacroiliacae (Arthritis deformans) und Porose der Knochen zu heftigen Schmerzen Veranlassung geben (KIENBÖCK). Dies beobachtet man besonders zur Zeit des Klimakteriums; offenbar spielen die fehlenden Eierstockinkrete eine ursächliche Rolle für diese Arthropathia ovaripriva (MENGE). In solchen Fällen wird man es immer neben orthopädischer und physikalischer Therapie auch mit den Ovarial-Hormonpräparaten versuchen (S. 80), ohne daß ihre Erfolge auch immer überragende sind. Nicht zu vergessen aber ist, daß zweifelsohne auch, wie dies ALBRECHT mit Recht hervorhebt, die im Klimakterium so häufige Körpergewichtszunahme eine weitere Belastung des Stützapparates darstellt. Diese Belastung führt wieder zur Zwangsspannung der Muskeln und Bänder, zu Kapselüberdehnungen der Gelenke und damit zu den Schmerzen. Für den Gynäkologen nur schwer faßbar sind die entzündlichen Veränderungen und Verknöcherungen der kleinen Wirbelgelenke und des Bandapparates, wie sie bei der Spondylarthritis meist auf rheumatischer Basis vorkommen und zur Fixation des betroffenen Wirbelsäulenabschnittes führen. Wärme in jeder Form, *Mirioninjektionen*, Radiumtrink- und ganz besonders Badekuren, Schwefelbäder, Pistyaner Schlammkuren werden neben Stützriedern nicht zu umgehen sein. Auch auf die Tuberkulose der Wirbelsäule ist als Ursache der Kreuzschmerzen bereits hingewiesen worden. Schließlich sei noch jener Kreuzschmerzen gedacht, welche auf Metastasen nach scheinbar radikal operierten Mamma-, Uterus- und anderen Karzinomen vorkommen. Man vergesse nicht auf Stauchungsschmerz in solchen Fällen zu prüfen.

Zu erwähnen ist auch, daß Genu valgum und Pes planus zwangsläufig zur Änderung der Haltung und Spannung der Wirbelsäule und damit zu Kreuzschmerzen Veranlassung geben können. Mit der Korrektur dieser Deformitäten, wobei nicht nur der gewöhnliche Senkfuß, sondern auch der quere Plattfuß zu berücksichtigen sind, pflegen die Kreuzschmerzen rasch abzuklingen.

Gegenüber den angeführten Ursachen von Kreuzschmerzen extragenitaler Art treten im Einzelfalle andere entschieden in den Hintergrund. Es soll nicht geleugnet werden, daß Gichtknoten im Kreuzbeinbereich Ursache der Kreuzschmerzen sein können. Jedenfalls kommen sie bei unserer Bevölkerung kaum jemals vor. Muskelschmerzen, besonders

die des *M. pyriformis* sind wohl immer Teilerscheinung einer statisch-dynamischen Dekompensation, weshalb es nicht verwunderlich ist, wenn diese Schmerzen, besonders nach schwerer Arbeit, langem Gehen, Sitzen, Coitus interruptus, Wochenbett und Abortus vorkommen. JENTTER hat beim innerlichen Gebrauch von *Jodtinktur* in *Milch* und Mastdarmzäpfchen aus *Jodkali* (0,06 bis 0,1) jeden Abend durch 10 Tage, nach einer Woche Pause Wiederholung, im Verein mit Diathermie und Abstellung der Gelegenheitsursachen diesen Prozeß ausheilen gesehen, der sich nach diesem Autor in einer Schwellung in der Gegend des Foramen ischiadicum majus seitlich vom Kreuzbein kundtut. Offenbar handelt es sich um leichtere Fälle, wahrscheinlich um solche beginnender statisch-dynamischer Dekompensation, bei der, wie erwähnt, die Glutäalmuskulatur mit-ergriffen ist und zu besonderer Schmerzhaftigkeit des *M. pyriformis* führt.

Es mag sein, daß in einzelnen Fällen Kreuzschmerzen nichts anderes als HEADSche Hyperalgesien infolge Reizzustandes des vegetativen Nervensystems sind und demnach durch Fortleitung von Reizen, welche das vegetative Nervensystem treffen, in die sensiblen Bahnen des Rückenmarks entstehen. Der Erfolg einer entsprechenden Therapie, insbesondere der *Atropindarreichung* (S. 40) spricht für die Richtigkeit dieser Anschauung. Namentlich NOVAK und KLOTZ haben diese Erklärung recht wahrscheinlich gemacht.

Jüngstens ist von CRAMER auf die Beckenneuritis (im Bereiche des Plexus sacralis pudendus und Nervus obturatorius) als Ursache heftiger Kreuzschmerzen hingewiesen worden. Diese Schmerzen strahlen bis in die Labien und die Innenseite der Oberschenkel aus und sind besonders durch Druckschmerzhaftigkeit der Vorderseite des Kreuzbeins zu beiden Seiten der Medianlinie, aber auch durch Druckschmerzhaftigkeit über dem Tuberculum pubicum gekennzeichnet. Sie kommen mit und ohne anderweitige Neuralgien meist als Folgezustände infektiöser Krankheiten, wie Grippe, Angina, vor. Durch Wärme (Thermophor, Pelvitherm, Diathermie), heiße Sandbäder, Salizylpräparate und heiße Scheidenspülungen sind sie gut beeinflussbar. Differentialdiagnostisch können auch metastatische Entzündungen der Adnexe, wie sie ebenfalls nach Grippe beobachtet werden, in Frage kommen. Diese Beckenneuritis kann auch zu recht heftigen, pathologisch-anatomisch nicht faßbaren Scheidenschmerzen bei der Kohabitation Veranlassung geben. Dabei hat sich Verfasser die Verabreichung von *Scheidenkugeln mit Ichthyol* im Verein mit *Pyramidon* (Amm. sulfo-ichthyol. 0,2, Pyramidon 0,3) ebenso wie die STRASSMANNsche Vorschrift

143. Anästhesin . . . . .	0,2
oder Eucaïn $\beta$ . . . . .	0,03
Acid. boric. . . . .	0,25
But. cac. ad . . . . .	2,0
M. f. glob. vag. d. tal. dos.	
Nr. X	

S. 1(—2)mal täglich eine Kugel in die Scheide einführen

gut bewährt.

Daß Kreuzschmerzen mit besonderer Empfindlichkeit der Wirbeldorne und Schmerzhaftigkeit der Haut über den unteren Wirbelsäulenabschnitten bei Abheben einer Hautfalte dann neurasthenischer Natur sind, wenn die Beweglichkeit der Wirbelsäule in keiner Hinsicht gelitten hat, wurde angedeutet. Die Behandlung kann nur in einer Stärkung der Gesamtperson bestehen und wird weniger auf örtliche Verfahren, denn auf die Besserung der seelischen und körperlichen Verfassung hinauslaufen, wozu die Persönlichkeit des Arztes durch entsprechenden Zuspruch nicht wenig beiträgt. Medikamente, und zwar leichte Antidolorosa, werden nur im Beginn der Behandlung notwendig sein. Milde Wasserkuren sind sehr vorteilhaft. Hierzu eignen sich besonders Teilwaschungen oder Teilabreibungen von 20° C, lauwarne Halbbäder (33 bis 35° C) mit allmählicher Abkühlung, und warme Vollbäder mit Zusatz von *Fichtennadeln*- oder *Kamillenextrakt*, ferner Sauerstoff- und Luftperlbäder.

Glücklicherweise beruht in vielen Fällen der Kreuzschmerz nicht auf statischen Veränderungen der Wirbelsäule und auch nicht auf arthritischen der kleinen und großen Gelenke, sondern tatsächlich auf rheumatischen Prozessen der Muskulatur. Daß der akute wie der chronische rheumatische Reiz zu Druckschmerz und harter Spannung der Muskulatur führt, steht außer Zweifel. HENSSE empfiehlt mit Recht in Fällen, die durch Druckschmerz am Seitenrand des M. sacrospinalis gekennzeichnet sind, die Vibrationsmassage, die in 10 bis 12 Sitzungen so manchen Rheumatismus zum Schwinden bringt. Freilich gelingt das nicht jedes Mal. Darum müssen wir bei rheumatischen Kreuzschmerzen nicht selten das ganze Register der Behandlungsmöglichkeiten aufziehen; aber auch dabei sehen wir so manchen Mißerfolg. Trotzdem wir es mit Massage, Wärme in jeder Form, heißen und Dampfbädern, Flanelltüchern und Tierfellen versuchen, ist es oft notwendig, zu örtlichen Einreibungen zu schreiten, welche wohl im wesentlichen durch Erzeugung einer Hauthyperämie eine Art Ableitung bewirken. Die *Erucadinsalbe* (Acid. salicyl., Camphora, Ol. Sinapis, Ol. Eucalypti), der wohlfeile *Opodeldok* (Liniment. sap. camphor.), die *Polymeurinsalbe* (Ol. Menthae, camphora, acid. salicyl., tinct. capsici., Ol. Eucalypti), die *Ichthyolsalbe* (Amm. sulfo-ichthyolicum 20%ig), *Spiritus camphoratus* und *formicarum*, das *Rheumafluid*, die 25%ige *Mesothanvaseline*, das *Rheumasan* (10%iges Acid. salicyl. enthaltend), 20%ige *Atochinolsalbe*, das *Spirosal*, die *Salit-Creme*, das *Salitöl* u. v. a. sind mit mehr minder gutem Erfolg in Gebrauch. So und so oft kann man auch der innerlichen Darreichung, namentlich der Salicylpräparate, nicht entbehren. Daß trotzdem rheumatische Kreuzschmerzen, besonders in späteren Jahren, zu regelmäßig zu wiederholenden Badekuren in den Schwefelthermen, in radioaktiven Wässern (radioaktivem Mineralschlamm) zwingen, beweist der Weltruf derartiger Kurorte wie Baden, Schallerbach, Bad Gastein, Aachen, Pstyan, Ragaz, St. Joachimsthal, Brambach u. v. a.

Schließlich sei auf die Injektionstherapie bei Kreuzschmerzen ohne groben anatomischen Befund und nicht immer klaren Ursprungs mit einigen

Worten hingewiesen. NÜRNBERGER hat bei klimakterischen, neurasthenischen und hysterischen Kreuzschmerzen, bei unerträglichen Beschwerden infolge parametraner Schwielen und Adhäsionen nach Art der parasakralen Injektion eine Lösung von

144. Eucain $\beta$ .....	0,1
Natr. chlorat. ....	0,8
Aqu. dest. ad .....	100,0

injiziert und durch die mechanische Dehnung und die Erzeugung von Hyperämie, wahrscheinlich auch durch Beeinflussung des Nervus sympaticus Erfolge erzielt. Die epidurale Injektion in Fällen von Kreuzschmerzen ohne grobe Erkrankung der Genitalien kann dort, wo alle anderen Maßnahmen im Stiche lassen, als einmalige Injektion mit physiologischer Kochsalzlösung vorgenommen, den Kreuzschmerz beseitigen. Man wird mit ALBRECHT zu solchen Verfahren freilich erst nach Ausschöpfung anderer Maßnahmen greifen. Gute Erfolge hat auch BURCKHARD (Würzburg) mit den präsakralen Injektionen gemacht, indem er in Fällen von Kreuzschmerz ohne groben anatomischen Befund entsprechend den Sakrallöchern 10 bis 15 cm einer  $\frac{1}{2}\%$ igen *Novocain-Suprareninlösung* injizierte. Solche Verfahren werden freilich auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Leider versagen sie bei den unerträglichen Schmerzen, wie sie gelegentlich inoperable Kollumkarzinome haben.

Die Resektion des Nervus praesacralis, wie sie die Franzosen üben, hat bei uns Anhänger offenbar nicht gefunden. Gelegentlich wird bei wahrhaft unerträglichen Schmerzen beim Uteruskarzinom die Durchtrennung der vorderen Seitenstrangbahn des Rückenmarks (Chordotomie), für die HENKEL eintritt, dann zu erwägen sein, wenn aller Voraussicht nach die Karzinomkranke noch eine längere Lebensdauer vor sich hat.

Die nicht häufigen Fälle von Steißbeinschmerz (Coccygodynie) können therapeutisch recht schwer beeinflussbar sein. Dieses Leiden wird entweder nach Trauma (beispielsweise Fall oder Schlag auf das Gesäß, Entbindung) beobachtet oder es entsteht auf dem Boden einer neuropathischen Veranlagung. Hydrotherapie, wie Kreuzduschen, Fächerduschen, seien sie kalt, seien sie wechselwarm, Anwendung des Atzbergerischen Mastdarmkühlers (O. FRANKL), daneben Faradisation und Galvanisation sollen versucht werden. Leichte Nervina wird man nicht entbehren können. Einreibung mit

145. Veratrin .....	0,1
Chloroform .....	5,0
Ol. Arachid. ad .....	50,0
M. D. S. Äußerlich (STRASSMANN).	

oder Kokainsuppositorien

146. Cocaini muriatici .....	0,02
Suprarenin .....	0,1
Butyr. Cacao ad .....	2,0
M. f. suppos. d. tal. dos.	
Nr. X	

S. Früh und abends ein Zäpfchen

können erfolgreich sein. Besser wirkt allenfalls die rhombische Umspritzung des Steißbeins mit 10 bis 20 ccm einer 1- bis  $1\frac{1}{2}\%$ igen Novokainlösung. Führt auch diese Behandlung nicht zum Ziele, kann sich die bei den Kreuzschmerzen ohne anatomischen Befund erwähnte epidurale und präsakrale Injektion von Kochsalzlösung, bzw.  $1\frac{1}{2}\%$ igen Novokains, wie sie H. ALBRECHT und BURCKHARD gemacht haben, gerade bei diesem manchmal recht hartnäckigen Leiden bewähren. In einzelnen Fällen macht es sogar nach den Mitteilungen des Schrifttums die Resektion des Steißbeins nötig, doch ist dies meist nur nach Trauma notwendig.

## Die Bauchdeckenhyperästhesie und ihre Behandlung.

Dieses in seiner Erkennung nicht leichte und nicht ganz seltene Krankheitsbild, welches uns besonders durch ASCH, HALBAN und HOEHNE in seiner Bedeutung erschlossen worden ist, zeichnet sich durch eine meist dauernde, entweder umschriebene oder den ganzen Bauch betreffende, oft heftige Schmerzhaftigkeit der Bauchdecken selbst, und zwar sowohl der Cutis wie des Unterhautzellgewebes, aber auch der Muskulatur aus. Zweifelsohne sind neurolabile Frauen mehr davon betroffen als nervengesunde. Konstitutionstypen scheinen keine entscheidende Rolle zu spielen, auch die Körperfülle ist nicht ausschlaggebend, findet man doch dieses schmerzhaft Leiden, mit dem manche Frau von Arzt zu Arzt irrt, der immer auf ein inneres Leiden untersucht, sowohl bei Frauen mit fetten Bauchdecken, wie bei ausgesprochen mageren, bei Hängebauch und lordotischer Verstärkung der Wirbelsäule ebenso wie bei straffem Bauche. Es wird offenbar, wenn man die Bauchhaut in Falten aufhebt, sie kneift und quetscht, wobei sich herausstellt, daß diese Manöver auf der Bauchhaut äußerst schmerzhaft empfunden werden, während sie an anderen Stellen keinen Schmerz auslösen. Auch beim sanften Auflegen der Hand auf die Bauchdecke und dem Befehl an die Patientin, sich rasch mit dem Oberkörper zu erheben, wird dieser zarte Druck als Schmerz empfunden. Bei diesem Leiden kann es sich entweder um ein selbstständiges Krankheitsbild handeln, das man als Adiposalgie, Gelose und Zellulalgie bezeichnet, oder um eine neuralgische oder vielleicht rheumatische Krankheit der Bauchdecken ohne Erkrankung innerer Organe. REICHELt grenzt diese Fälle als essentielle Bauchdeckenhyperästhesie von der symptomatischen Form ab, die Ausdruck einer inneren Erkrankung ist und entsprechend den Headschen Zonen gleichsam eine Projektion der inneren Organschmerzen auf die Körperoberfläche darstellt. Das kommt bei Appendix-Adnexerkrankungen und Krankheiten der Gallenblase in Frage, aber auch bei Laparotomienarben nach Totalextirpation des Uterus wird sie gesehen. Wie REICHELt mit Recht bemerkt, sind Fehldiagnosen deswegen so häufig, weil der Arzt an das Krankheitsbild nicht denkt und daher die richtige Behandlung nicht einleitet. Vage Adnexschwellungen, die nicht vorhanden sind, Appendizitiden ohne Befund, Adhäsionsbeschwerden u. ä. werden angenommen.

Aufklärung der Patientin über die Ungefährlichkeit des Zustandes und das verläßliche Schwinden der Schmerzen, Verschreibung von Antineuralgicis und Antirheumaticis (20%ige *Ichthyolsalbe* oder 10%ige *Salicylvasogene* O. P.) nebst *Aspirin* genügen in leichteren Fällen. Bei großer Hartnäckigkeit des Leidens wird man sich am besten der Hochfrequenzstrahlen nach KOWARSCHIK bedienen, wobei sich fast durchwegs eine Besserung, oft sogar ein völliges Schwinden der Beschwerden einstellt. Sollte diese Behandlung einmal fehlschlagen, vermag dann noch die Diathermie Linderung zu bringen, die allein angewandt, gewöhnlich versagt. Auch die Massage der Bauchhaut, die aber von geübter Hand einschleichend und zart ausgeführt werden muß, kann versucht werden. Umständlicher und auch Dauererfolge nicht immer versprechend ist die örtliche Betäubung der betroffenen Nerven im Sinne der Blockierung der Headschen Zonen. Der betreffende Quadrant wird mit 1%iger *Novokainlösung* umspritzt. Auch dieses, besonders von HALBAN und HOEHNE geübte Verfahren, wird gelegentlich anzuwenden sein. Die Annahme, daß bei Enteroptose und Hängebauch ursächliche Zusammenhänge mit der Bauchdeckenhyperästhesie bestehen, scheint sich insofern nicht haltbar zu erweisen, als trotz entsprechender Maßnahmen gegen den Hängebauch durch orthopädische Mieder die Schmerzhaftigkeit erhalten bleibt.

### Behandlung der Obstipation.

Die chronische Stuhlverstopfung der Frau ist geradezu der wunde Punkt des Frauenkörpers auch in gesunden Tagen. Die beim weiblichen Geschlecht zweifelsohne größere Neigung zur Stuhlträgheit wird vielfach in der Kindheit schon durch unzweckmäßiges Verhalten geradezu gezüchtet. Indem man es versäumt, die kleinen Mädchen zu einer regelmäßigen, auf eine bestimmte Stunde des Tages festzusetzenden Entleerung anzuhalten, kommt es, besonders im Drange der Schuljahre, unterstützt durch sitzende Lebensweise und unzweckmäßige Ernährung, um so leichter zur Stuhlverstopfung, als man von diesen Dingen bei jungen Mädchen nicht redet und sie einfach als belanglos übergeht. Dann ist es so weit, daß die junge Frau dieses Leiden weiterschleppt, das sich in den Schwangerschaften noch weiter verschlechtert und nach den Geburten unter dem Einfluß schlaffer Bauchdecken womöglich noch ärger wird. Zwangsmäßige Abhängigkeit von den Abführmitteln, tagelange Stuhlverstopfung wechselnd mit diarrhoischen Entleerungen, Übeligkeiten, Blässe, Kopfschmerzen, Menstruationsstörungen, Kreuzschmerzen, Verstimmung, das sind so die Folgen der von Jugend an verschlumpten schlechten Darmtätigkeit. Weitaus die Mehrzahl der an Stuhlverstopfung leidenden Frauen dankt diese einer Schwäche der Darmmuskulatur und der Bauchmuskeln und leidet an jener Form, die man als atonische Stuhlverstopfung bezeichnet. Seltener, aber in unserer Frauenwelt auch häufig anzutreffen, ist die spastische Form, die durch krampfartige Zusammenziehung des Darmes und Absetzung manchmal bleistiftdünner Stuhl-

massen gekennzeichnet ist. So schön die Einteilung in atonische und spastische Obstipation ist, so schwer ist es oft im Einzelfalle die Formen zu trennen, wenngleich bei nervösen und asthenischen Frauen die spastische Obstipation im Vordergrund steht, während der reinen Enteroptose die atonische entspricht. Das wesentliche jeder Form der Obstipation ist das zu wenig an Entleerung; hiezu ist aber zu sagen, daß eine auch nur alle zwei Tage erfolgende Defäkation, wenn sie reichlich genug ist, noch keine Verstopfung darstellt, während auch bei täglichem Stuhlgang bei ungenügender Menge eine Verstopfung vorliegen kann. Wenn es auch richtig ist, daß in 98 v. H. aller Fälle die Stuhlbeschwerden auf einer der genannten Formen der Obstipation, allenfalls auch auf der durch unzweckmäßige Ernährung bedingten, sogenannten alimentären Obstipation beruhen, man soll sich doch zur Richtschnur dienen lassen, namentlich bei Klagen über mehr minder unvermutet einsetzende Obstipation die rektale Untersuchung unbedingt vorzunehmen, um nicht organisch greifbare Ursachen zu übersehen, was von den schwersten Folgen begleitet sein könnte.

Die Behandlung dieses wichtigen, in der Frauenheilkunde von den Ärzten und von den Frauen selbst ungebührlich unterschätzten Zustandes ist durchaus nicht leicht. Die chronische Stuhlverstopfung muß von verschiedenen Punkten aus angegangen werden, soll sie nicht vorübergehend, sondern dauernd behoben und sollen ihre Folgezustände auf den Körper als ganzes, aber auch auf die Geschlechtsorgane im besonderen vermieden werden. Obenan steht eine richtige diätetische Behandlung. Peinlich genau einzuhaltende Mahlzeiten, richtiger Wechsel von Arbeit und Pausen, regelmäßige, aber nicht zu anstrengende Körperbewegung in frischer Luft — ein die Körpersäfte eindickendes Schwitzen infolge großer körperlicher Anstrengungen ist geradezu schlecht — sind ebenso notwendig, wie strengste Einhaltung einer bestimmten Zeit für die Stuhlentleerung, die am besten am Morgen nach dem Frühstück erfolgen soll. Zu dieser muß sich die Frau unter allen Umständen Zeit nehmen können, eine Forderung, die freilich vielfach bei beschäftigten Hausmüttern und noch mehr bei im Beruf tätigen Frauen auf große Schwierigkeiten stößt, von der aber nicht abgewichen werden sollte. Nächstdem müssen bestimmte Kostverordnungen eingehalten werden. Die Frau muß zunächst wissen, welche Mittel stopfen und welche das Gegenteil bewirken. Daß Weißbrot, Reis, Grieß, Sago, Gerste und Schleimsuppen stuhlhemmend wirken, ist nur zum Teil bekannt, von Kakao und Schokolade wissen es alle, weniger daß auch der ständige Gebrauch von Tee und Rotwein, Heidel- und Preiselbeeren dasselbe bewirkt. Von den Flüssigkeiten mit abführender Wirkung ist das beste ein Trunk kalten Wassers am Morgen nach dem Aufstehen, 1 Tasse gekochter Zwetschken, ferner Fruchtsäfte, Apfelweine, Honig, Zitronenlimonade, saure Milch. Bei der heutigen Einstellung unserer Frauenwelt zur Ernährung wird besonders rohes Obst gern genommen. Während Pflaumen gut abführen, ist dies von Äpfeln und Birnen weniger zu erwarten. Butter, Öl, überhaupt Fette, ferner süße Marmeladen, die von sehr guter Wirkung

auf die Stuhlentleerung sind, werden dagegen vielfach mit Rücksicht auf die ängstlich gehütete schlanke Linie zurückgewiesen. So geht es auch mit der Kefir- und Joghurtmilch und mit Pumpnickel, die nahrhaft, dabei aber gute Abführmittel sind, während sich für die kalorienarmen und dabei schlackenreichen Nahrungsmittel wie Salate, Tomaten, Rüben schon Freundinnen finden. Schwarzbrot, Grahambrot, T. K. Brot, Steinmetzbrot, Simonsbrot sind unter allen Umständen dem weißen vorzuziehen. Wichtig ist, daß die Kohlehydrate Kohlensäure abspalten, welche ihrerseits das beste Mittel für Peristaltik und damit für die Stuhlentleerung ist.

Man darf mit der diätetischen Behandlung nicht zu früh abbrechen, im Gegenteil, sie soll in ihren Grundzügen beibehalten werden. Mit ihr allein kommt man aber oft nicht aus und muß noch andere Hilfen, und zwar mechanisch wirkende Maßregeln, ebenso wie vielfach die medikamentöse Behandlung anwenden.

Gerade bei der atonischen Form der Verstopfung hat sich gezeigt, daß eine bei Fehlen entzündlicher Veränderungen vorsichtig ausgeführte Massage des Bauches, nüchtern am Morgen vorgenommen, Gutes leisten kann. Es soll nicht verschwiegen werden, daß dieses Verfahren seine Gegner ebenso wie seine Freunde hat. Richtig ist, daß Ungeschick und zu große Energie hier Fehler anstellen können, weshalb es vorteilhafter ist, wenn zunächst der Arzt oder eine geschulte Hilfsperson die Massage vornehmen und sie erst dann der Frau überlassen. Die Patientin liegt auf dem Rücken mit erhöhtem Oberkörper, gebeugten Hüften und Kniegelenken und etwas abduzierten Beinen und atmet dabei mit geöffnetem Mund langsam tief ein und aus. Der Arzt, auf der rechten Seite der Patientin stehend, beginnt mit zirkulären Streichungen der flach aufgelegten, dorsal flektierten Hände nach oben um den Nabel herum. Die Fingerspitzen wenden sich dabei unter Drehen der Hand von rechts nach links. Stärkere und schwächere Streichungen wechseln ab. Um besonders auf den Dickdarm einzuwirken, macht man Streichungen entlang dem Colon ascendens, dem Transversum und dem Colon descendens. Aber auch Streichungen in der Richtung von oben nach unten und von den Seiten her sind nach GOCHT anzuempfehlen. Die Massage darf anfangs nicht zu kräftig sein und wird sehr wirksam unterstützt durch schwedische Gymnastik. Das Aufrichten des flachen Rumpfes ohne Unterstützung der Arme bei festgehaltenen Beinen und das Verharren in hockender Stellung bei gebeugten Hüft- und Kniegelenken, sowie Beugeübungen der Hüft- und Kniegelenke bei der auf dem Rücken liegenden Patientin haben guten Erfolg. Vorteilhaft kann man auch Freiübungen im Stehen, wie Rumpfbeugen und Drehen, tiefe Kniebeuge, Beinheben und -senken anschließen. Natürlich muß die Gymnastik durch längere Zeit (mindestens 4 bis 8 Wochen) vorgenommen werden, soll sie wirklich Erfolge erzielen und darf auch dann nicht mehr aufgegeben werden. Übungen von  $\frac{1}{4}$  Stunde Dauer täglich genügen. Daß Entzündungen der Adnexe, ebenso wie Geschwülste des Abdomens und Krankheiten der Leber und Gallenwege sie verbieten, bedarf keiner besonderen Betonung. Im übrigen ist es staunenswert, wie auch in ganz verschlammten

Fällen bei regelmäßig durchgeführter Gymnastik, besonders nach dem System der auf den Frauenkörper allein zugeschnittenen Methoden von Doktor BESS-MENSENDECK<sup>1</sup>, DORA MENZLER u. a. die regelmäßige Darmtätigkeit wiederkehrt, wenn nur einigermaßen auch in der Kost darauf Rücksicht genommen wird. Viel bewährt ist die Selbstmassage, die mit einer mit Schrot gefüllten Holzkugel von verschiedenen Gewichten (1 bis 2½ kg) vorgenommen wird. Sie ist leichter ausführbar als die Selbstmassage durch Streichung und Knetung, weshalb die Kugelmassage unbedenklich den Frauen überlassen werden kann. Dabei kommt es weniger auf Bewegungen der Kugel im Sinne des Dickdarmverlaufes, als vielmehr auf gründliche Durcharbeitung des ganzen Bauches an. Sie wird in Rückenlage nach entleerter Harnblase gemacht. Benützt man eine Metallkugel, so näht man sie in ein Flanelltuch ein und läßt die Frau damit 10 bis 15 Minuten arbeiten. Manchmal kann es notwendig werden, neben gymnastischen Übungen und Massage auch noch die Kotentleerung durch Ausstreichen des gefüllten Mastdarmes entlang dem Damm von der Steißbeinstütze aus zu besorgen, was in hockender Stellung leichter zu Stuhl drang führt.

In so manchen Fällen atonischer Verstopfung kann man mit Faradisation des Abdomens und Hydrotherapie Gutes leisten. Kalte Duschen, die aber bei empfindlichen Frauen nicht unter 20° C beginnen sollen, wirken anregend auf die Peristaltik. Auch die schottische Dusche wird in Wasserheilanstalten gerne angewendet, die im Wechsel kalten und warmen Wassers besteht. Bei den kalten Duschen ist es besonders die Strahlendusche, die nicht nur einen thermischen, sondern auch einen mechanischen Effekt bewirkt. Aber auch im Hause kann man bei atonischer Obstipation durch 5 Minuten dauernde Sitzbäder von 15° C und kühle Halbbäder (30 bis 24° C) der Stuhlverstopfung auf diese Weise beikommen. Bei der spastischen hingegen sind kühle Bäder nicht angezeigt. Hier wirken im Gegenteil heiße Umschläge auf die Stuhlentleerung unterstützend.

Bevor die medikamentöse Behandlung der verschiedenen Formen der Obstipation besprochen wird, sollen kurze Bemerkungen über den Einlauf und dessen Anzeigen eingeschaltet werden. Er ist gerade bei uns in der Frauenheilkunde ein wichtiges, nicht zu vermissendes Behandlungsmittel. Bei den vielen Fällen der Koprostase im Anschluß an entzündliche Krankheiten, aber auch bei Geschwülsten, wie Myomen, in der Nachbehandlung nach Bauchhöhlenoperationen, im Wochenbett nach Fehlgeburt und Geburt, bei anämischen und bettlägerigen Kranken müssen wir oft von ihm Gebrauch machen. Der Zweck des Einlaufes, die einmalige Entfernung der angesammelten Kotmassen im Mastdarm, geschieht weniger durch Aufweichung des harten Kotes, als vielmehr durch Erzeugung der Peristaltik infolge Füllung der Ampulle mit Flüssigkeit, wobei die Menge derselben, die Temperatur, besonders niedrige Grade und der Zusatz Peristaltik anregender Stoffe eine große Rolle spielen. Will man

---

<sup>1</sup> Körperkultur der Frau, 9. Auflage, München, bei F. Bruckmann A.-G.

eine ausgesprochen starke Wirkung erzielen, sind die kühlen und kalten Einläufe am besten anzuwenden, die, wenn sie nur auf den untersten Abschnitt des Darmes wirken sollen, in der Menge von  $\frac{1}{4}$  Liter genügen, während, soll die Entleerung auch höhere Abschnitte betreffen,  $\frac{1}{2}$  Liter und mehr angewendet werden müssen. Bewährt sind die Zusätze von *Schmierseife* oder *geschabter Seife* in der Menge von mehreren Gramm, besonders der Zusatz von *Kochsalz* (2 bis 3 Eßlöffel) und ebenso gut der von *Speisesoda* (1 Kaffeelöffel auf ein kleines, 1 Eßlöffel auf 1 Liter Klyasma). Will man gründliche Entleerungen erzielen, so geschieht dies am besten und für die Frau am angenehmsten mit körperwarmen Flüssigkeiten. Einer gewissen Beliebtheit erfreuten sich, namentlich zur Zeit als Medikamentenpreise noch keine überragende Rolle spielten, die Ölklysmen, die man vielfach mit *Olivenöl* machte, heute aber besser mit *Oleum arachidis* (Erdnußöl) oder *Oleum sesami*, welche wesentlich billiger sind und dasselbe leisten. Wenn man das Öl langsam einfließen läßt (in der Menge von 50 bis 150 g) und wenn es möglichst lange, am besten die Nacht über gehalten werden kann, so erzielt man eine ganz ausgezeichnete, schmerzlose Entleerung. Auch das *Glyzerin* wirkt schon in kleinen Mengen stuhlbefördernd. Ein Mikroklyasma (5 g Glyzerin mit derselben Menge Wasser) mit der Spritze aufgezogen und mit einem Kautschukrohr ins Rektum eingeführt, wirkt rasch und erzeugt meist breiigen Stuhl. Angewöhnung kommt leider vor. Recht brauchbar und billig sind die Glyzerinstuhlzäpfchen

147. Glycerini ..... 2,0  
 D. tal. dos. in suppos. oper-  
 culat. Nr. X  
 S. Morgens ein Stuhlzäpfchen.

Tägliche Wiederholung der Einläufe, besonders solcher mit großen Flüssigkeitsmengen kann zur Dehnung und Erschlaffung des Dickdarmes und damit zur Erfolglosigkeit der Klysmen führen, weshalb Irrigationen als ein von Fall zu Fall anzuwendendes, besonders bei bettlägerigen Kranken zu gebrauchendes Mittel zu gelten haben.

Was nun die medikamentöse Behandlung der habituellen Stuhlverstopfung anlangt, so lehrt die Flut der täglich den Schreibtisch des Arztes überschwemmenden Anzeigen neuer Abführmittel und alter in neuer Form und Zusammensetzung, daß jedes dieser Mittel wirksam ist und wirksam sein kann, daß es aber mehr minder bald zur Gewöhnung und damit zur Abwendung von diesem und Wahl eines neuen kommt. Hier kann nicht auf die Pharmakologie der Abführmittel ausführlich eingegangen werden, nur einige Typen der bewährten Medikamente sollen Anführung finden und auch diese nur unter ausdrücklicher Bedachtnahme auf die Tatsache, daß die dauernde Anwendung von Abführmitteln um so mehr bedenklich ist, als so vielen der Abführmittel nach einer Stuhlentleerung eine Stuhlverstopfung nachfolgt, womit der verderbliche Kreis geschlossen ist. Kann man ohne sie nicht auskommen, so ist der Wechsel in denselben anzuempfehlen, wie man auch bei längerem Gebrauch auf Mittel wird

dringen müssen, die eine schmerzlose und breiige Entleerung gewährleisten und in einer Form zu nehmen sind, welche die Patientin nicht zu sehr behelligt. Für die akuten Kotstauungen, wie wir sie am Krankenbette notwendigerweise beheben müssen, wirkt immer noch neben dem Einlauf für die einmalige Entleerung am besten das *Rizinusöl*, entweder in Form von 3 bis 4 Gelatine kapseln zu 3 bis 4 g oder 1 bis 2 Eßlöffel desselben, das man in einem mit Kognak oder Orangensaft befeuchteten Likörgläschen, mit diesem Geschmackskorrigens überdies überschichtet, rasch trinken läßt.

Muß man aber öfter der Stuhlträchtigkeit nachhelfen, so verordnet man zweckmäßig bei wöchentlich wiederholter Darreichung das altbewährte *Pulvis magnesiaee cum Rheo* messerspitzweise. Es ist das berühmte HUFELANDSche Medikament, dem auch ein gewisser Einfluß auf den Magen nachgerühmt wird oder das einfache *Pulvis radicee Rheee* (messerspitzweise kaffeelöffelweise). Bekannt ist auch seine Kombination mit einem Mittelsalz

148. Rhei in pulv. ....	20,0
Natr. sulfur. ....	10,0
Natr. bicarbonic. ....	5,0

M. D. S. Abends eine Messerspitze bis  
1 Kaffeelöffel in einem Glas warmen  
Wassers zu nehmen (ORTNER).

Wenig zur Gewöhnung führen die *Tamarinden*, die man entweder als *Pulpa tamarindi depur.* (1 bis mehrere Teelöffel abends) gibt; sie kommen auch gut dragiert als Bonbons in den Handel, freilich verlieren auch sie ihre Wirksamkeit, wenn nicht die angeführten Verhaltensmaßregeln eingehalten werden. Auch im kalifornischen *Feigensirup Califig* sind sie neben Sennesblättern enthalten ( $\frac{1}{2}$  bis 1 Eßlöffel). Recht bewährt ist die *Pasta Palm*, nur aus Feigen und anderen pflanzlichen Abführmitteln bestehend, von der durchschnittlich ein Würfel genügt. Lind und recht gut brauchbar ist der *Milchzucker* (vor dem Schlafengehen oder morgens nüchtern 1 bis 2 Eßlöffel in einem Glas Wasser). Das *Extractum Cascarae sagradae* ist ebenfalls auch für längeren Gebrauch empfehlenswert. Es ist mild und frei von Nebenwirkungen, wird zu 30 bis 50 Tropfen oder teelöffelweise am Abend genommen und bringt gewöhnlich nach 10 bis 12 Stunden eine breiige Stuhlentleerung zuwege. Auch *Sagrada-Kompotten*, *Tabletten* und *Pillen* kommen in den Handel. Beliebt und gut ist das *Regulin*, dessen Hauptbestandteil, das Agar-Agar, in der Darmflüssigkeit aufquillt und dessen Sagradazusatz Peristaltik anregend wirkt. Man gibt es entweder in Suppe oder Kompott (1 Kaffeelöffel bis 1 Eßlöffel) oder in Tabletten zu 0,6 g (3 bis 5 Stück). Auch das *Peristaltin* ist aus der Sagradarine gewonnen und wird mehr in der operativen Gynäkologie in Injektion verwendet, kann aber auch in Tabletten (1 bis 3 Stück zu 0,1 g) gegeben werden. Gern genommen werden von den Frauen auch die *Isticin-tabletten* zu 0,15 g (1 bis 3 Stück), besonders in Form der *Isticin-bonbons*, daneben auch die *Isacenkügelchen* mit ausgesprochener Dickdarmwirkung, von denen 2 bis 4 am Abend genommen, gewöhnlich am Morgen Stuhl erzeugen. Das Rheum, die Cascarapräparate, das Regulin und be-

sonders das *Pulvis liquiritiae compositus* (1 Teelöffel abends) — letzteres auch bei Flatulenz und Hämorrhoiden wertvoll — können auch bei täglichem Gebrauch kaum ernststen Schaden stiften. Die *Folia Sennae* hingegen erzeugen häufig Schmerzen und Kollern im Bauch, was entschieden einen Nachteil bedeutet. Weniger ist dies bei dem sehr beliebten *St. Germaintee* (Spec. laxant. St. Germain) der Fall, dessen Abführwirkung ebenfalls auf dem Gehalt an Sennesblättern beruht (2 Teelöffel auf 1 Tasse Wasser). Auch die *vegetabilischen Abführpastillen* (Gewa), Extract. Aloes und Frangulae enthaltend, sind empfehlenswert. Ebenfalls Frangula enthält das *Normacol*, welches in der Menge von 1 bis 2 Teelöffeln mit Wasser gerne genommen wird.

Nicht vergessen seien auch die in der letzten Zeit mit Recht zu einem gewissen Ansehen gelangten, in der habituellen Obstipation vielfach angewendeten Gleitmittel, die also Abführmittel im eigentlichen Sinne nicht sind. Das *Paraffinum liquidum* (mehrere Eßlöffel) und die teureren paraffinhaltigen Präparate *Paraffinal* (1 bis 2 Eßlöffel), *Nujol* (reines Paraffin), die paraffinhaltigen Präparate *Mitilax* und *Cristolax*, leisten erfahrungsgemäß Gutes. Dasselbe tut das wohlfeile *Paraffluid* (reines Paraffin, 1 bis 3 Eßlöffel). Jedenfalls sind sie alle bei leichteren Formen der chronischen Obstipation im Verein mit allgemeinen Maßnahmen und Regelung der Diät den lange gebrauchten Abführmitteln entschieden vorzuziehen. Auf dem Grundsatz der die Peristaltik anregenden Kohlensäurebildung beruhen die *Lecicarbonzäpfchen* GLÄSSNERS, die bei der atonischen Obstipation empfehlenswert sind.

Dort, wo man glaubt, daß spastische Zustände wesentlich mitbeteiligt sind, und gar in den Fällen, in denen man die Konstitution der Frauen als spastisch erkannt hat, wird man mit und ohne darmentleerende Maßnahmen zu den *Antispasmodicis* greifen müssen. In den *Laxativum-vegetabile-Kompressen* ist neben Aloe, Jalape und Podophyllin auch Hyosciamin enthalten, wodurch sie sich auch bei dieser Form der Obstipation bewähren. Mit solchen Mitteln allein aber ist es nicht getan, man muß einerseits durch physikalische Heilbehelfe, besonders durch Wärme auf den Leib, Umschläge mit warmem Wasser oder besser Kamillen, Diathermie und durch Regelung der Diät die Wirksamkeit der Medikamente vorbereiten. Hier ist die schlackenreiche Kost nicht angezeigt. Im Gegenteil, man empfiehlt am besten ein *Diätschema*, wie es S. 214 angeführt ist. Von Medikamenten haben sich die TROUSSEAU'schen Pillen als Spasmen lösend bewährt:

149. Extract. opii . . . . . 0,2  
 Extract. Belladonnae . . . 0,6  
 Mass. pil. q. s. ut f. pil. Nr. XXX  
 D. S. 3mal täglich 1 Pille.

oder

150. Extract. Belladonnae 0,3—0,6  
 Papaverini hydrochlor. . . 1,2  
 Rad. liquirit. q. s. ut. f.  
 pil. Nr. XXX  
 D. S. 3mal täglich 1 Pille (FRANK).

Ferner das LEUBESche Pulver, das auch Flatulenz und Sodbrennen beseitigt:

151. Natrii bicarbon.  
 Natrii sulfuric. sicc.  
 Elcosacchar. foenicul. . aa 20,0  
 Extract. Belladonnae . . . . 0,5  
 M. f. p. 3mal täglich 1 Messerspitze  
 voll nach den Hauptmahlzeiten in  
 etwas Wasser.

Auch *Atropinpillen* zu 0,0005 sind wirksam. Gute Erfolge sehen wir auch vom *Novatropin*, vom *Atropapaverin* und vom Chinin (Rp. 135). Daneben wird man auf die *Paraffinpräparate*, dann auf das *Belladonna-Regulin* (S. 214) und *Artin* vielfach nicht verzichten können.

Bei habitueller Obstipation können das *Karlsbadersalz* und die *natürlichen Mineralwässer* auch durch längere Zeit verordnet werden. Vom Karlsbadersalz gibt man 1 Kaffeelöffel bis 1 Eßlöffel gelöst in  $\frac{1}{4}$  Liter lauen Wassers. Seine Wirkung beruht im wesentlichen auf seinem Gehalt an Natrium sulfuricum (Glaubersalz), das man ebenfalls in der Menge von 1 Kinder- bis 1 Eßlöffel morgens nüchtern in einem Glas warmen Wassers als Abführmittel gerne gibt. Was die *Bitterwässer* anlangt, so wirken sie in kleinen Mengen mild abführend, in großen aber drastisch. Bei längerem Gebrauch entziehen sie Fett, weshalb man von ihnen in solchen Fällen mit Vorteil Gebrauch macht. Für eine milde Abführwirkung läßt man abends und morgens ein kleines Weinglas (100 g) des Bitterwassers und hierauf 1 Glas kalten Wassers nachtrinken. Für eine einmalige ausgiebige Entleerung bedarf es der doppelten Menge. Die ungarischen Bitterwässer enthalten mehr Bittersalz (schwefelsaure Magnesia und schwefelsaures Natrium) wie die deutschen, was bei der zu verabreichenden Trinkmenge Berücksichtigung verdient. Bekannt sind die Wässer von Ofen, Apenta, Friedrichshall, Mergentheim u. a. Ferner werden die alkalisch-salinischen Quellen von Marienbad, Franzensbad, Elster bei habitueller Stuhlverstopfung mit bestem Erfolg kurmäßig gebraucht (2 bis 3 und mehr Becher Wasser nüchtern). Auch Schwefeltrink- und Badekuren erweisen sich durch die Tonussteigerung der glatten Muskulatur des Darmes als vorteilhaft in der Behandlung der Obstipation.

## Richtlinien zur Behandlung der wichtigsten Krankheiten der Harnwege.

Von den Krankheiten der Harnorgane kann nur ein kleiner, scharf umschriebener Abschnitt Gegenstand der Behandlung durch den praktischen Arzt sein, ja, bei der Teilung unserer Fächer halten wir auch schon dort, daß viele Gynäkologen Krankheiten der Harnorgane kurzweg dem Urologen abtreten, vielfach sehr zum Schaden der Gynäkologie, da die natürlichen Zusammenhänge zwischen den Krankheiten der Harnwege und den Frauenleiden zerrissen werden. An dieser Stelle kann eine aus-

fürliche Besprechung der Therapie dieser Krankheiten um so weniger Platz finden, als sie mit der Kenntnis und dem Gebrauche der speziellen Untersuchungsmethoden untrennbar verknüpft ist, die der praktische Arzt nicht, der Facharzt nicht immer übt.

### Die nichtgonorrhöische Urethritis und Zystitis.

Über die häufigste Art der Entzündung der Harnröhre, die durch den Gonokokkus, ist im Abschnitt Gonorrhoe ausführlich gehandelt. Die anderen Entzündungen derselben, welche durch Streptokokken, Staphylokokken, Kolibazillen u. a. erzeugt werden können, rücken gegenüber der gonorrhöischen Urethritis ganz in den Hintergrund. Es sei aber gebührend auf jene Urethritiden, welche im Anschlusse an die Defloration auftreten und sich ebenso wie die gonorrhöische Urethritis durch Brennen beim Wasserlassen äußern, nochmals hingewiesen. Diese meist durch Koli erzeugten „Deflorationskatarrhe“ der Urethra und Blase sind auch anamnestisch insofern belangvoll, als die Angaben einer Frau, daß sie bald nach der Hochzeit an einem Blasenkatarrh erkrankt sei, keineswegs immer ein Beweis einer um diese Zeit akquirierten Gonorrhoe sein müssen. Ein recht bedenklicher, immer wieder beobachteter Fehler ist es, daß die Urethritis übersehen und aus dem Bilde eines trüben Harns, der an sich nichts sagt, eine Zystitis diagnostiziert wird. Man muß sich vorher die Harnröhre anschauen und kann oft schon aus ihrer geschwollenen und geröteten Mündung, aus der der Eiter vorquillt, sodann aber durch das Ausstreifen der Harnröhre von der Scheide her mit dem Zeigefinger gegenüber dem von oben her die Harnröhre fixierenden Daumen, den Eiter auspressen und damit die Diagnose der Harnröhren- und nicht der Blasenentzündung machen. Bei dieser ist im akuten Zustand, wie immer wieder darauf hingewiesen wird, ohne daß dieser Hinweis auch befolgt würde, der Katheterismus falsch, weil er eine Zystitis, die noch nicht besteht, bewirkt, indem er die Keime aus der Urethra in die Blase bringt. Gerade der Katheterismus ist es, der den Blasenkatarrh im Wochenbett ebenso wie nach Operationen, aber auch zu anderen Zeiten vermittelt. Demgegenüber steht die Ausbreitung von entzündlichen Prozessen von den Adnexen, Beckenexsudaten, ebenso wie die hämatogene Keimverschleppung und die lymphogene im Hintergrund. Wir haben es also in der Mehrzahl der Fälle in der Praxis mit aufsteigenden Infektionen und nur bei primärer Erkrankung der Niere, wovon die Tuberkulose das bezeichnendste Beispiel ist, mit absteigender Infektion zu tun. Unreinlichkeit, masturbatorische Akte, Fluores sind es, die bei einer Schwächung des Körpers die Infektion hinauftragen. Sicher ist auch, daß unter dem Einfluß einer Erkältung nicht nur heftiger Harndrang entsteht, sondern auch infolge Schwächung der Abwehrkräfte vorhandene Bakterien gerade bei der Frau leichter den Weg nach aufwärts finden. Jeder kennt das Krankheitsbild der durch schmerzhaft, häufige Entleerung eitriges Harnes charakterisierten Zystitis. Fieber ist oft genug, namentlich im Anfang eine Begleiterscheinung, welches übrigens bald zurückgeht. Die Schmerzen und der Harndrang nehmen ab, der Urin bleibt weiter eitrig.

Ist die Zystitis erkannt, dann muß sie auch behandelt werden, und eine richtige Zystitisbehandlung ist ein dankbares Feld der Betätigung des praktischen Arztes. Sie ist nicht schwer zu erkennen. Wenn man sich nicht der Zweigläserprobe, sondern nach STOECKEL der Mehrgläserprobe bedient und sich vorher die Urethra genau betrachtet, kann man sehr wohl zwischen Urethritis und Zystitis unterscheiden. Sieht man nämlich, daß bei einem in drei oder vier Absätzen gelassenen Urin der Eitergehalt von Probe zu Probe immer geringer wird, daß er gar vielleicht nur in der ersten Probe vorhanden ist, dann liegt eine Urethritis vor und der Katheter wird nicht benützt. Bleibt sich der Eitergehalt gleich oder wird er gar in den späteren Proben stärker, dann stammt die Eiterung aus der Blase oder gar aus dem Nierenbecken. Die Behandlung der Urethritis ist im Abschnitt Gonorrhoe (S. 92 ff.) geschildert. Bei festgestellter akuter Zystitis wird nun zunächst der Frau unter allen Umständen absolute Bettruhe empfohlen. Jede lokale Behandlung hat zu unterbleiben. Die Wärme ist immer noch das die Blase, insbesondere ihre Krämpfe am besten beruhigende Mittel. *Kataplasmen mit Leinsamen* (Bereitung S. 169), solche mit *Kamillen*, ein feuchtes Tuch mit einem trockenen bedeckt, und darüber ein Warmwasserkissen, daneben noch ein zweites Warmwasserkissen zu den Füßen, lindern die Schmerzen ausgezeichnet. Auch heiße Sitzbäder (38 bis 40° C, 15 Minuten Dauer) können empfohlen werden, wenn darnach das vorgewärmte Bett gleich aufgesucht wird. Viele Ärzte lassen im akuten Stadium besonders reichliche Mengen von Flüssigkeit trinken, um von oben her die Blase durchzuspülen, wie wir das schon bei der Urethritis erwähnt haben. Dabei ist aber zu bedenken, daß die Einnahme reichlicher Flüssigkeitsmengen auch eine häufige Abgabe und damit ständigen Größenwechsel der Blase erfordert, der immer wieder schmerzhaft empfunden wird. Darum ist der Rat von STOECKEL, nicht zuviel an Flüssigkeit zu geben, nur empfehlenswert. Es ist sogar gut, namentlich für die Nacht, das Trinken überhaupt abzustellen. Die Kost muß eine reizlose sein, am einfachsten in Milchdiät bestehen, sei es in Form reiner Milch, sei es in Form von Milchspeisen, (Milchreis, Milchgrieß), leichten Mehlspeisen mit Kompotten. Von den Flüssigkeiten, die getrunken werden, stehen seit altersher der *Bärentrauben- und Bruchkrauttee*, nebst dem der *Wacholdertee* in hohem Ansehen. Man nimmt von *Folia uvae ursi* und *Herba herniarum* aa 1 Eßlöffel und bereitet daraus durch 3 Minuten Kochen und kurzes Ziehenlassen einen Tee, ebenso aus *Fructus juniperi*. Mit Medikamenten bewirkt man einerseits Schmerzstillung, andererseits trachtet man durch Harnantiseptica bakterizid zu wirken. Bei heftigen Blasenschmerzen kann man schmerzstillende Mittel nicht entbehren. Man verordnet etwa

152. Extract. Belladonn. . . . .	0,1
Natr. salicyl. . . . .	5,0
Syr. simpl. . . . .	10,0
Aqu. dest. ad . . . . .	100,0
M. D. S. 3mal täglich 1 Eßlöffel	
(STRASSMANN).	

Morphin wird man fast immer entbehren können, wenn man es braucht, genügt eine Zusammensetzung von

153. Morph. muriat. .... 0,1  
 Aqu. Laurocerasi ..... 10,0  
 D. S. 4mal täglich 15 Tropfen.

*Belladonnazäpfchen* zu 0,02 g sind ebenfalls gut. Entzündung und Schmerzen werden ferner durch *Aspirin*, *Antipyrin*, *Pyramidon* und *Salol* (S. 93), besonders das letztere, erfolgreich bekämpft.

Mischungen von den genannten Mitteln aa 0,2 werden von BLUM warm empfohlen. *Cystopurin* und das schon erwähnte *Uromed* haben sich sehr bewährt. Auch das bei den entzündlichen Erkrankungen angegebene *Antipyrinklysma* erweist sich bei der Zystitisbehandlung in folgender Verordnung sehr wirksam (BLUM nach DUCHASTELET):

154. Antipyrini..... 2,0  
 Tinct. Opii gtts. XV  
 Aqu. fervidae ad..... 100,0  
 S. Klysma.

Sehr wichtig ist, daß man die auf die desinfizierende Wirkung des Harnes abzielenden Medikamente von der Reaktion des Harnes abhängig macht. Es ist eine geradezu reflektorische Handlung vieler Ärzte, daß sie bei der Diagnose Zystitis einerseits auf Urotropin einschnappen, anderseits Alkalitherapie betreiben. Nun ist die Wirkung des Urotropins an einen saueren Harn gebunden und bei alkalischer Reaktion ist es unwirksam, weil dann das wirksame Formalin nicht abgespalten wird. Man darf also Urotropin nur geben, indem man gleichzeitig für die Harnansäuerung sorgt. Dies geschieht durch Phosphor- und Salzsäure, nicht aber durch Trinkenlassen alkalischer Wässer. Man verordnet von *Acid. hydrochlor. dilut.* 3mal täglich 20 Tropfen oder man gibt

155. Acid. phosphor..... 5,0	156. Ammon. chlorat..... 6,0
Syr. Rubi Id. .... 20,0	Syr. simpl. .... 30,0
Aqu. ad ..... 150,0	Aqu. ad ..... 150,0
S. 3stündlich 1 Eßlöffel.	S. 3stündlich 1 Eßlöffel.

schränkt die Flüssigkeitszufuhr auf 600 g ein und gibt urinsäuernde Speisen wie Fleisch, Fett, Eier, Brot, Mehl. Das *Urotropin* selbst soll man in möglichst großen Dosen geben (4 g im Tag zu 4 Pulvern à 1 g und mehr), oder man verschreibt

157. Saloli (Phenyl. salicyl.)... 10,0  
 Hexamethylenetetramin. . . 5,0  
 M. f. pulv. Div. in doses  
 Nr. XXX  
 S. 3 Pulver täglich.

Die intravenöse Anwendung des Urotropins beschränke man auf schwerere Fälle, besonders auf die von Pyelitis und Pyelonephritis. Dann verwendet

man es, wenn man es intravenös zu gebrauchen hat, weitaus am besten in Form des *Cylotropin*, welches namentlich bei der Koliinfektion in der Dosis von 5 bis 10 ccm durch das mitverwendete Salizyl und Koffein die Durchblutung der Niere erhöht und eine bessere diuretische und bakterizide Kraft entfaltet. Bei der Urotropinmedikation darf man nicht vergessen, daß sie gar nicht so selten zum gesteigerten Harndrang, Schmerzen beim Urinieren und auch zu Blutharnen führen kann. Besonders bei Erkältungsblasen und in Zeiten, wo Grippe- und Anginaepidemien, wie im Frühjahr und Herbst, sich so häufig einstellen, und solche Zystitiden an der Tagesordnung sind, sieht man diese Formen mit blutiger Verfärbung des Urins, besonders in den letzten Tropfen desselben einhergehen. Sie sprechen auf Urotropinmedikation mit heftigen Schmerzen und Vermehrung des Harndranges an. Hier ist das Urotropin, wie BLUM besonders betont, durchaus nicht angezeigt, vielmehr bildet die *Alkalitherapie* eine ausgezeichnete, auch die Schmerzen lindernde Methode. Der saure Harn ist es, den wir hier alkalisch umstimmen wollen, am besten nach BLUM durch folgendes Rezept:

158. Natr. bicarbon.  
 Magnes. ust.  
 Natr. citric. . . . . aa 15,0  
 D. S. 3mal täglich ein gestrichener  
 Kaffeelöffel voll.

Hier sind auch die alkalischen Mineralwässer von ausgezeichneter Wirkung, von denen das Preblauer, das Biliner, Salvator, Fachinger und Wildunger genannt seien. Gegenüber der Blutungsbereitschaft bei der hämorrhagischen Zystitis kann man Kalk (S. 54) verordnen, darf aber dabei die thermische Behandlung, die Wärmezufuhr im Sinne heißer Sitzbäder, heißer Thermophore und warmer Dunstumschläge nicht vernachlässigen.

In akuten Fällen ist bekanntlich jede örtliche Behandlung der Blasenentzündung möglichst zu vermeiden; erst bei chronischen kommt die Lokalbehandlung in Frage. Diese hat auf das durch die Entzündung ungünstig beeinflusste Fassungsvermögen der Blase Rücksicht zu nehmen und muß Spülungen mit großen Flüssigkeitsmengen unter allen Umständen vermeiden. Reinigung der Blase mit nicht ätzenden und das Gewebe nicht schädigenden Flüssigkeiten als Vorakt zur Verwendung desinfizierender Mittel ist zweckmäßig. Vorteilhaft bedient man sich dazu der Spülung mit warmer physiologischer Kochsalzlösung oder 3%iger *Borsäure*. Jetzt erst, nachdem man den infizierten Harn mit seinem Detritus fortgespült hat, wirkt die Behandlung mit *salpetersaurem Silber* besonders günstig. Wir beginnen mit Lösungen von 1 : 4000 zu spülen und steigen auf 1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>ige. Auch die *Pregelsche Jodlösung*, ferner *Trypaflavin* und *Rivanol* (1 : 1000) sind brauchbar. Auf dem Wiener Boden hat sich besonders nach der Blasenspülung die Einbringung von 5 bis 10 ccm *Agoleum*, einer kolloidalen Silberlösung nach PLESCHNER, eingebürgert.

Dort, wo es notwendig ist, einen Dauerkatheter als Heilmittel zur Ruhigstellung bei hartnäckiger chronischer Zystitis zu geben, bewährt sich einerseits die Ansäuerung des Harns mit den genannten Säuren per os, andererseits die Urotropin- und Saloltherapie in Verbindung mit den angeführten Spülungen. Modell I des von BOSCH<sup>1</sup> angegebenen Dauerkatheters, welcher zufolge seiner sinnreichen und einfachen Konstruktion eine ebenso leichte Einführung gestattet, wie er das sichere Liegenbleiben gewährleistet, macht die Nachbehandlung und allenfalls den Katheterwechsel für Arzt und Patientin zu einem ungleich bequemeren Eingriff als ehemals. Auf ihn sei ausdrücklich hingewiesen. Bei chronischen Fällen kann gemischte Kost, allerdings gewürzfrei und salzarm gegeben werden, Alkohol bleibe fort.

### Pyelitis.

Die Behandlung der Pyelitis ist gleichfalls für den praktischen Arzt, dem sie meist in Form der Schwangerschaftspyelitis unterkommt, von großer Wichtigkeit. Alles kommt darauf an, daß sie rechtzeitig erkannt wird, und an sie denken, heißt sie auch schon erkennen. Wenn auch bei der meist rechtsseitig sitzenden Pyelitis die Appendizitis, Erkrankungen der Gallenblase und -wege und auch eine basale Pneumonie rechts ernstliche differentialdiagnostische Schwierigkeiten machen können, so lehrt doch die Erfahrung, daß durch die Beachtung der Symptome, nämlich die Schmerzen in der Lende und entlang dem Harnleiter, Fieber, Schüttelfröste und allenfalls Harndrang, die Fälle dann mit einem Schlag geklärt werden können, wenn auf die Untersuchung des Katheterharns, auf die es ankommt, nicht vergessen wird. Der alkalische, oft schon faulig riechende, infolge der massenhaften Leukozyten trübe Harn bestimmt die Diagnose der meist durch Kolibazillen hervorgerufenen Infektion geradezu eindeutig. Strengste Bettruhe mit Entlastung der erkrankten Seite durch dauerndes Liegen auf der gesunden, warme Lendenwickel und flüssige Diät, zunächst nur Milch, müssen in den ersten Tagen die Therapie beherrschen. Diese hat dann die alkalische Reaktion des Harns in die saure umzusetzen, was durch die erwähnte *Salzsäure-* oder *Phosphorsäurebehandlung* per os im Verein mit *Urotropin-* und *Urotropin-Salol* nach der gegebenen Vorschrift gelingt. Wichtig ist, daß der Darm gründlich entleert werde, schon mit Rücksicht auf die Möglichkeit lymphogener Ausbreitung der Krankheit vom Colon descendens auf die rechte Niere. Hiezu empfehlen sich entweder Abführmittel wie *Rheum*, *Cascara sagrada*, *vegetabilische Abführpastillen* oder noch besser *Verbindungen vegetabilischer und mineralischer Purgantien* wie

159. Rad. Rhei pulv. . . . . 10,0  
Tartarus depur. . . . . 20,0  
M. f. pulv.

D. S. Abends 1 Kaffeelöffel in Oblaten.

oder Rp. 148. Während man das Urotropin spritzt, am besten das Cyotropin, bei schlechten Venen auch das für intramuskuläre Injektionen

<sup>1</sup> Württ. Mediz. Korr.-Blatt, Nr. 14, 1931.

bereitgestellte Präparat, schränkt man die Flüssigkeitszufuhr strenge ein. Trockenkost ist während dieser Zeit am Platze (Fett, Fleisch, Eier), allenfalls in Verbindung mit einem Schwitzbad unter dem Lichtkasten. Führt die Ansäuerung des Harns nicht zum Ziele, dann versuche man es mit dem Umschlagenlassen der Harnreaktion ins alkalische, indem man jetzt viel Obst, Gemüse und 4mal täglich eine Messerspitze von *Natrium bicarbonicum* gibt. Gleichzeitig läßt man die genannten Mineralwässer reichlich trinken. In England und Amerika ist immer die Verwendung von Alkalien (3mal täglich 2 g Natrium bicarbonicum) entgegen der Urotropintherapie üblich. HOFBAUER empfiehlt die Kombination von *Natrium bicarbonicum* und *Natrium citricum* aa partes (3mal täglich 2 g) und hält auch zwecks Steigerung des Tonus der Uretermuskulatur die Verabreichung von *Pituitrin* für gegeben. Im selben Sinne wie die Pituitrinmedikation kann die von *Tonephin* nach NAUJOKS verwendet werden. Hier bewähren sich auch dann die bereits erwähnten diuretischen Teesorten (Rp. 77, 78, S. 92).

Für die meisten Fälle von Pyelitis, insbesondere die Schwangerschaftspyelitis findet man mit diesem Vorgehen, welches die Harnstauung beseitigt, das Auskommen, wenn es auch die Bakteriurie nicht zu bannen vermag. In einer kleineren Zahl derselben aber gelingt es nicht, die Harnstauung soweit zu beseitigen, daß die Schüttelfröste, die dauernden Temperatursteigerungen und die heftigen Lendenschmerzen aufhören. Es scheint aber, daß die Injektion großer Mengen von Hexamethylentetramin, wie sie durch die 40%ige *Amphotropinlösung* möglich ist, auch in hartnäckigen Fällen die Zahl der Versager herabmindert. Man gibt intravenös in Abständen von 2 bis 3 Tagen 20 bis 40 bis 60 ccm der Lösung und geht mit der Dosis auf die Hälfte (10, 20, 30) nur bei akuten Fällen und schwächlichen Personen herab. Versagt auch dieses Verfahren, so ist die Ureterensondierung mit Spülung des Nierenbeckens und besonders der Dauerkatheterismus für 12 bis 24 Stunden durch den Facharzt angezeigt. Er läßt kaum jemals im Stiche. Gerade in dieser Hinsicht bedeutet die von STÖCKEL inaugurierte Therapie einen gewaltigen Fortschritt gegenüber jener Zeit, da man in schweren Fällen von Pyelitis, besonders in solchen, hinter denen Mischinfektionen von Kolibazillen mit Streptokokken und Staphylokokken steckten, zur Unterbrechung der Schwangerschaft greifen mußte, eine Notwendigkeit, die heute zu den allergrößten Ausnahmen gehört. Noch ein Wort über die Pyelitis im Wochenbett. Mit der Harnstauung, die durch die Geburt behoben ist, ist auch das Fieber, das toxisch durch die angereicherten Kollikeime entsteht, gewöhnlich beendet. Die Bakteriurie aber besteht fort. Darum muß man trachten, durch innere Behandlung im geschilderten Sinne, also Cytotropinmedikation intravenös, allenfalls auch durch lokale Behandlung die Bakteriurie möglichst weitgehend zu beeinflussen, damit nicht Rezidiven der Pyelitis eintreten, welche schließlich die Patientin gefährden können. Auch der *Vakzinetherapie*, und zwar in Form der aus dem eigenen Harn gezüchteten Kolibazillen (Autovakzine) oder der polyvalenten Vakzine kann man sich mit Erfolg bedienen. Bei Misch-

infektionen kann die BUCURASche Mischvakzine Verwendung finden. Bei starker Beteiligung der Blase wird man auch einer Behandlung derselben in der geschilderten Art nicht entraten können.

### Tuberkulose der Harnorgane.

Die Tuberkulose der Harnorgane ist bekanntlich niemals eine primäre Tuberkulose und entsteht beim Weibe zufolge der anatomischen Trennung zwischen Harn- und Geschlechtsorganen auch niemals durch Übergreifen einer Peritoneal- oder Genitaltuberkulose auf den Harntraktus, sondern auf hämatogenem Wege von einem (oft unbekanntem) Primärherd. Von der Niere, die beim Weib häufiger befallen wird als beim Mann, breitet sich die Infektion absteigend nach der Blase aus. Die möglichst frühzeitige Erkennung, um die sich alles dreht, ist schwer. So manchen Fall kann der Hausarzt retten, wenn er bei Frauen mit und ohne tuberkulösem Habitus mit vagen Harnbeschwerden, wie fortwährenden leichten Tenesmen und häufigen Blasenkatarrhen, die nie recht heilen wollen, auf eine genaue urologische Untersuchung dringt (STOECKEL). Ist schon die saure Reaktion eines eitrigen und trotzdem sterilen, erythrozytenhaltigen Urins höchst verdächtig, so wird der Verdacht durch den positiven Ausfall des Experimentes am Meerschweinchen und die Untersuchungsmethoden der Urologie zur Gewißheit. Die Therapie ist bei einseitiger Erkrankung die möglichst frühzeitige Nephrektomie, die auch bei Erkrankung der zweiten Niere, sofern dieselbe sich im Beginn befindet und ihrer Funktion noch genügend nachkommen kann, angezeigt ist. Nur so kann eine Blasentuberkulose ausgeheilt werden. In bereits zu weit vorgeschrittenen Fällen, besonders bei beidseitiger Nierentuberkulose, wird das ganze Rüstzeug der konservativen Tuberkulosetherapie, wie die klimatische Behandlung (Ägypten), Diätbehandlung und die recht leistungsfähige Röntgentherapie anzuwenden sein.

Was die symptomatische Behandlung der Zystitis tuberculosa anlangt, so muß bei diesem so quälenden und schmerzhaften Leiden auf das geringe Fassungsvermögen der Blase und ihre heftigen Tenesmen schon bei der Kost und Flüssigkeitszufuhr Rücksicht genommen werden. Flüssige Diät ist schlecht, weil sie die Tenesmen vermehrt und zu häufiger Miktion zwingt. Bei der örtlichen Behandlung muß man auf die Einbringung ganz kleiner Mengen öligere Medikamente Wert legen, die gleichzeitig Anästhetika enthalten wie

160. Novojodin.  
 Anästhesin. .... aa 1,0  
 Ol. Amygdal. ad..... 100,0  
 D. S. Täglich eine Instillation von  
 5 ccm (BLUM).

Anodyna und Antispasmodica wie *Belladonna* (0,02), *Papaverin* (0,04), *Eupaverin*, *Eupaco*, *Pantopon* sind in schweren Fällen kaum entbehrlich.

**Incontinentia urinae.**

Von den mannigfaltigen Ursachen, die zur Unfähigkeit, den Harn zu halten, führen können, sei nur auf jene eingegangen, welche dem praktischen Arzt tagtäglich unterkommen. Es soll hier nicht von Mißbildungen und Verletzungen der ableitenden Harnwege (Blasen- und Ureterfisteln) die Rede sein, wie sie nach geburtshilflichen Traumen und noch häufiger nach gynäkologischen Operationen sich leider gelegentlich einstellen, da sie den praktischen Arzt nur insoweit beschäftigen, als er sie der Operation zuweist, welche, heilen sie nicht spontan aus, naturgemäß das einzige Heilverfahren darstellt. Weit wichtiger sind für ihn jene Fälle unwillkürlichen Harnabganges, wie sie sich an die Geburt infolge Schädigung des Schließmuskels und seiner Befestigung am Diaphragma urogenitale und durch Senkung der bindegewebigen Unterlage ergeben. Wenn sie im Wochenbett sich durch Nässen beim Husten, Nießen, kurz bei Anstrengung der Bauchpresse bemerkbar machen, so müssen sie deswegen nicht bestehen bleiben. Sie können sich vielmehr restlos zurückbilden, wozu im späteren Wochenbett Sitzbäder mit *Eichenrinde* (S. 94) und Vaginalspülungen nach der STÖBECKELschen Vorschrift mit

161. Acid. salicyl. .... 20,0  
 Spir. vin. dilut. .... 200,0  
 D. S. Davon 2 Eßlöffel auf 1 Liter  
 Wasser.

gegeben werden können. Auch der Versuch, die Harnröhre gegen den Symphysenrand durch einen Hartgummiring anzudrücken, kann 6 Wochen post partum gemacht werden, um dadurch die Incontinenz zu bessern, bzw. zu beheben. Niemals rate man den Frauen zu früh zur Operation, die frühestens ein halbes Jahr nach der Geburt gemacht wird, wenn der Zustand unbeeinflussbar blieb. Sie besteht in einer Raffung der Harnröhre und des Blasenbodens und liefert in dieser einfachen Form recht gute Ergebnisse.

Dem praktischen Arzt kommen auch Fälle von Incontinentia urinae unter, welche auf langdauernder Kälteeinwirkung auf die Beine und den Unterleib und auf einer Zystitis beruhen. Hierfür erweist sich neben den genannten Medikamenten auch eine systematische Erhöhung des Fassungsvermögens der Blase durch tägliche Einspritzung steriler, möglichst warmer Kochsalzlösungen (von 30 ccm bis 200 ccm) in langsam gesteigerter Menge recht vorteilhaft. Vielfach sieht man, daß auch bei leichteren Graden des Descensus mit Senkung des Septum vesicovaginale unter dem Einfluß der Tonusverminderung des Klimakteriums eine bislang leidliche Incontinenz stärker wird. Ein Versuch, dieselbe allenfalls konservativ zu behandeln, und zwar neben *Ovarialpräparaten* (S. 82) mit Massage durch den in die Scheide eingelegten Zeigefinger, der den Schließmuskel gegen die hintere Fläche der Symphyse drückt oder ihn über einem eingeführten Metallkatheter bestreicht, ist weniger aus-

sichtsreich als die dosierbare Vibrationsmassage mit dem Ansatz nach STÖCKEL, allenfalls die Faradisation des Sphinkters. (Knopfförmige Elektrode in der Urethra—Plattenelektrode über der Symphyse). Daß bei der Zystokele mit Incontinentia urinae, wenn die Operation aus irgendwelchen Gründen versagt wird oder nicht ausführbar ist, gelegentlich ein Ring den herabgesunkenen Blasenhalss stützen und die Incontinentia beseitigen kann, wurde bei der Prolapstherapie erörtert. Daß eine schonende Geburtsleitung gerade hinsichtlich der Erhaltung des unverletzten Sphinkters nach dem Grundsatz, daß Vorbeugen besser als Heilen ist, am ehesten derartige Schäden von vornherein ausschalten kann, bedarf keiner besonderen Betonung.

Dem praktischen Arzt kommen auch jene Fälle von Enuresis unter, die sich von der Kindheit in die Jahre der Pubertät und darüber hinaus fortziehen. Sie können der Behandlung hartnäckig trotzen, aber auch zu vollem Erfolge führen, gar dort, wo neurolabile Seelenverfassung hauptsächlich an diesem Leiden Schuld trägt, das nicht selten auch durch Onanie gesteigert wird. Persvasion, Freigymnastik und Hydrotherapie, besonders aber die Vibrationsmassage des Sphinkters und die gleichfalls von STÖCKEL empfohlene einmalige kräftige Harnröhrenverätzung mit 10%iger *Silbernitratlösung* sollen immer versucht werden.

### Steinbildung in den Harnwegen.

Bekanntlich ist das männliche Geschlecht weit häufiger von der Steinbildung befallen. Nach den neueren Untersuchungen scheint es tatsächlich so zu liegen, daß neben der Veranlagung eine einseitige Ernährung für die Entwicklung von Steinen, die meist Uratsteine im Nierenbecken, seltener Oxalatsteine und nächst dem Phosphatsteine in der Blase sind, eine Rolle spielt. Wenn die Steine der Niere und des Ureters, die die Wand durch den Druck schädigen, auch lange Zeit symptomlos verlaufen können, so kann doch plötzlich das Krankheitsbild heftigster kolikartiger Schmerzen, die bis in die Urethra ausstrahlen, schwerer Tenesmen und Hämaturie, zur sofortigen Behandlung zwingen. Heute ist die Röntgenuntersuchung nicht mehr zu umgehen, die uns alle wünschenswerte Aufklärung schafft. Sind die Steine bislang ohne Beschwerden getragen, so muß bei der Doppelseitigkeit des Prozesses auf die Entfernung derselben gedrungen werden. Für den Steinanfall stehen uns symptomatische Maßnahmen zur Verfügung. Nur über diese soll hier berichtet werden, während über Indikation und Technik der Operation, die von der Pyelotomie über Nephrotomie und Nephrektomie bis zur Nephrostomie sich erstreckt, nicht geredet werden soll. Die dumpfen Nierenschmerzen, welche vor und während des Anfalls eine Behandlung erfordern, werden durch feuchtwarme Lendenumschläge, warme bis heiße Bäder und durch Einreiben mit *Ungt. terebinth.* oder *Belladonnasalbe*

162. Extract. Belladonnae . . . . 2,0  
 Ungt. Glycerini . . . . . 20,0  
 S. Salbe.

gebessert. Bei heftigsten Schmerzattacken kann man der Morphiumspritze gelegentlich nicht entraten oder man gibt intravenös ein Gemisch von *Eucodal* (0,02) und *Eupaverin* (0,03). Bei leichteren Schmerzanfällen genügt

163. Extract. Opii ..... 0,05  
 Extract. Belladonnae .... 0,02  
 Oleum Cac. ad ..... 2,0  
 M. f. suppos. an.  
 D. tal. supp. dos. Nr. X  
 S. Bis 2stündig 1 Zäpfchen.

Die Nierenblutung ist selten so heftig, daß gegen sie eingegriffen werden muß. Wo dies der Fall ist, muß man neben absoluter Bettruhe, Sorge für Darmentleerung und Anordnung von Milchdiät, jene Styptika geben, wie wir sie bei den Uterusblutungen kennengelernt haben, in erster Linie das Ergotin, am besten in injectione.

Im übrigen muß man bei der konservativen Therapie der Nephrolithiasis die Nephrolithiasis urica, bei der sich die Steine, aus harnsaurem und oxalsaurem Kalk bestehend, nur im sauren Harn bilden, von der Behandlung der Phosphatsteine trennen, die eine alkalische Reaktion des Harns und damit eine schon bestehende Harnaffektion voraussetzen. Dort, wo Nierensand und Nierengriß der Urat- und Oxalatsteinbildung vorausgehen, kann durch innere Behandlung noch vieles gebessert werden, wobei man freilich auch von Seite der Patientin viel Geduld wird verlangen müssen. Was die Therapie der Nephrolithiasis urica anbelangt, so muß man trachten, die uratische Diathese zu verhindern, also den Ausfall der Harnsäure aus dem Urin zu verhindern. Die diätetische Therapie leistet hier weit mehr wie die medikamentöse. Erhebliche Einschränkung des Fleischgenusses gegenüber der Pflanzen-, Fett- und Kohlehydratnahrung ist notwendig. Kochsalzarmut der Nahrung ist anzuraten, schwarzes Fleisch und Gewürze zu meiden, gesottenes Fleisch entschieden dem rohen und gebratenen vorzuziehen. Laue Bäder von 35 bis 37° C, 2- bis 3mal wöchentlich, sind vorteilhaft. Alkohol wird, wenn überhaupt, nur stark verdünnt getrunken werden dürfen. Hinsichtlich der medikamentösen Therapie steht die Verabreichung der Alkalien obenan. Man kann entweder das *Natrium bicarbonicum* in der Dosis von 2 g innerhalb von 24 Stunden nehmen oder man läßt die kalten und warmen *alkalischen Säuerlinge* — Radeiner, Franzensbader, Preblauer u. a., bzw. Neuenahr, Vichy, — aber auch das Karlsbader Wasser trinken. Besonders beliebt sind die *Lithionwässer*, wie die Radeinerquelle, die Salvatorquelle in Eperies, der Bonifaziusbrunnen in Salzschiefer, die Wildunger Helenenquelle u. a.

Nicht zu unterschätzen ist die Möglichkeit des Abganges von Nieren- und Uretersteinen unter dem Einfluß des Darmbades (Enterocleaner nach BROSCHE), welches auch von chirurgischer und urologischer Seite gerade bei Uretersteinen sehr gerühmt wird. Ein Zusatz von 2 g *Tinct. Belladonnae* zur Spülflüssigkeit erweist sich vorteilhaft. Daneben sind Injektionen von *Hypophysin forte*, besonders nach Einbringen von

Glyzerin in die Umgebung des Uretersteines gebräuchlich. Wenn es auch nicht gelingt, den Stein auf den ersten Anhieb in die Blase zu bringen, so sieht man doch oft, daß er tiefer wandert und bei einem nächsten Versuch allenfalls endovesikal entfernt werden kann. Wenn Fieber auftritt und dasselbe länger dauert oder gar reflektorische Anurie und gefährliche Harnstauung durch den Stein bedingt wird, müssen allenfalls operative Maßnahmen der Urologie einsetzen. Es bleibe nicht unerwähnt, daß ORTNER bei kleinen Nierensteinchen mit einer Glyzerinkur ausgezeichnete Erfolge erzielte. Er verordnet

164. Glycerin. depurati  
Succ. citri..... aa 30,0  
D. S. 4 Eßlöffel täglich.

oder er läßt zu 1 Liter *Zitronenlimonade* (1 bis 2 Zitronen) statt des Zuckers 30 g *Glyzerin* zusetzen und diese Limonade binnen 24 Stunden trinken. Auch das *Uricedin* (2- bis 3mal täglich 1 Teelöffel) und das *Piperacin*, von dem man 1 bis 2 g in einer Flasche Selters oder Preblauer gelöst tagsüber trinken läßt, sind von Vorteil.

Bei den Oxalatsteinen soll Hyperazidität des Magens eine wichtige Rolle spielen, weshalb man gerne *Magnesia usta* verordnet und eine „oxalfreie“ Diät gibt, aus der Salate, Tomaten und rote Rüben, Spinat und Pfeffer ausgeschaltet werden, während Fleisch, Fett und oxalfreie Kohlehydrate erlaubt sind.

Die Phosphatsteine treffen wir viel häufiger in der Blase wie in der Niere an. Entzündliche Erkrankungen der Blase mit Harnstauung und bakterieller Zersetzung des Harns gehen der Steinbildung fast immer voraus. Darum finden wir sie nicht ganz selten in großen Zystokelen bei alten Frauen mit reichlich Restharn, gelegentlich auch in Divertikeln der Blase. Eine weitere wichtige Ursache der Blasensteine ist der Ligaturstein, der sich um eine eingewanderte Ligatur als Kern in der Blase bildet und den man, seit wir mit Katgut nähen, immer seltener sieht. Ferner sind es Fremdkörper, die bei spielerischen onanistischen Manipulationen in die Blase gebracht, sich inkrustieren. Mit ihrer Entfernung, die entweder bei kleineren Steinen in der keineswegs gefahrlosen Extraktion durch die Urethra, in der Lithotripsie bei größeren und schließlich allenfalls auch in der Eröffnung der Blase (Kolpocystotomie, Sectio alta) besteht, wird der Zustand geheilt.

Primäre Lithiasis phosphaturica kann durch Ansäuern des Harns mit Phosphorsäure, Zitronenlimonade, Salol und Urotropin unter gleichzeitiger Beschränkung der Vegetabilien und Bevorzugung von Fleisch bekämpft werden. Diese Verhaltensmaßregeln werden sich auch in der Nachbehandlung als wichtig erweisen.

### Geschwülste der Harnwege.

Von den Geschwülsten der Niere sind die sogenannten Hypernephrome oder Grawitztumoren die häufigsten. Sie erfordern natürlich

die möglichst frühzeitige operative Entfernung. Längerdauernde Hämaturie im Verein mit einem entsprechend gelegenen Tumor weist in die Richtung dieser bösartigen Geschwülste.

Von den Geschwülsten der Blase sind die Papillome als die wichtigsten anzuführen, von denen rund die Hälfte durch infiltrierendes Wachstum sich als bösartig erweist. Auch primäre Karzinome kommen vor. Glücklicherweise sind sie durch ein sehr langsames Wachstum ausgezeichnet. Die Elektrokoagulation steht als Therapie im Vordergrund, mit ihr konkurriert, namentlich seit den guten Erfolgen der Implantation der Harnleiter in den Darm, die Exstirpation der Blase (LATZKO und COFFEY) und dies um so mehr, als Metastasen bei Blasenkarzinomen, wenn überhaupt, ungemein spät auftreten.

Kommt es bei Geschwülsten der Blase zu heftigen Blasenblutungen, so kann der praktische Arzt gezwungen sein, augenblicklich gegen sie einschreiten zu müssen. Man spült die Blase mit eisgekühlter Kochsalz- oder 3%iger Borlösung, der man 10 Tropfen *Adrenalin* (1:1000) auf je 100 ccm zusetzt, allenfalls auch mit *Aqua destillata* unter Zusatz von 20 bis 40 ccm einer 5%igen *Stryphnonlösung* auf ein Liter. Ebenso verfährt man bei Blasenblutungen ex vacuo, wie sie besonders bei Einklemmung der schwangeren Gebärmutter nach brusker Entleerung der überdehnten Blase vorkommen können.

Von den Geschwülsten der Harnröhre sei vor allem die so häufig, namentlich bei alten Frauen, anzutreffende Harnröhrenkarunkel genannt, die durch Blutungen, Harndrang und Ausfluß lästig werden und die Entfernung verlangen kann. Am einfachsten ist ihre Abtragung durch Galvanokaustik oder mit Messer und Schere und Versorgung des blutenden Schnittrandes mit feinsten Katgutnähten an die Harnröhrenmündung, gelegentlich genügt auch zur Blutstillung das Einführen eines Dauerkatheters. Ätzungen mit Trichloressigsäure, Salpetersäure usw. sind langwierig und schmerzhaft. Blüten Karunkeln nicht, so brauchen sie nicht entfernt zu werden. Wichtig ist, daß die histologische Untersuchung papilläre, teils angiomatöse Geschwülste, teils Granulome ergibt, die dem Unerfahrenen leicht als Karzinome imponieren können (FRANKL). Die Karzinome selbst sind entweder in der Urethra gelegen oder sie sind im Bereiche der Vulva entstanden und beziehen die Harnröhre mit ein. Die Therapie, die im übrigen keine guten Aussichten bietet (Verfasser ist nur ein Fall bekannt, der nach Radiumbehandlung 6 Jahre gesund ist) kann in der Strahlenbehandlung oder Operation bestehen. Die Operation macht wegen der durch das radikale Verfahren bedingten Inkontinenz die Implantation der Ureteren in den Darm notwendig.

## Sachverzeichnis.

- Ableitung auf den Darm bei Hypermenorrhoe 29.
- Abmagerungskur bei Enteroptose und Fettsucht in Badeorten 211.
- Abnormitäten der männlichen Geschlechtszellen 181.
- Abortus bei Dysmenorrhoe 33.
- Abort, habitueller, medikamentöse Behandlung des, mit Eisen und Jod; Rp. 53, 54, S. 51.
- — Hormonbehandlung (Corpus-luteum) 51.
- Abrasio bei Amenorrhoe 20.
- bei Dysmenorrhoe 43.
- bei Endometritis 162, 164.
- bei Hypermenorrhoe 30, 31.
- bei Metropathia juvenilis 56.
- bei Metropathie 46, 52.
- bei Sterilität 184.
- bei Uterustuberkulose 172.
- Abwegige Konstitution bei Amenorrhoe 20.
- — bei Dysmenorrhoe 31.
- — bei Enteroptose 207ff.
- — und Klimakterium 67.
- — bei Prolaps 227ff.
- — bei Sterilität 178ff.
- Aderlaß bei Adipositas 65.
- bei Amenorrhoe 16.
- im Klimakterium 77.
- Adiposalgie 247.
- Adipositas, Aderlaß bei 65.
- Entfettungskur bei 65.
- Adnexa, Tuberkulose der 171.
- Adnexentzündung, Bäderbehandlung bei 117.
- Diät bei septischer 166.
- Mischvakzine bei septischer 167.
- Operation im akuten Stadium der septischen 165.
- Adnexentzündung, Proteinkörpertherapie bei septischer 166.
- Schmerzbekämpfung der akuten 104.
- Ursachen der septischen 164.
- Adnextumoren, Diathermie bei 170.
- Durchbruch von, in die Blase, Rektum, Scheide 169.
- Heißluftbehandlung der 170.
- physikalische Behandlung der 170.
- Wärmeanwendung bei 115.
- Änderung der Kost bei Metropathie 56.
- der Lebensweise bei Metropathie 56.
- Ätiologie des Pruritus vulvae 129.
- des Vaginismus 135.
- der Vulvitis 126.
- Ätiologische Therapie bei Hypermenorrhoe 28.
- Ätzbehandlung bei Endometritis 62.
- bei Hypermenorrhoe 30.
- bei Metropathia juvenilis 56.
- bei Metropathie 47.
- der spitzen Kondylome 97.
- Ätzung der Cervix bei Cervicitis gonorrhoeica 99.
- der Korpusschleimhaut bei Gonorrhoe 102.
- Ätzverfahren bei Cervicitis 158.
- Akromegalie, Metrorrhagien bei 58.
- ALEXANDER-ADAMSche Operation bei Retroflexio uteri 226.
- Allgemeinbehandlung der Cervicitis 158.
- der Enteroptose 213.
- Allgemeinmaßnahmen bei Retroflexio uteri 221.
- Allgemeinreaktion bei Vakzinetherapie 108.

- Allgemeintherapie bei Fluor vaginalis 147, 148.  
 — bei beginnender Senkung 229.
- Amenorrhoe 1.  
 — Abrasio mucosae bei 20.  
 — Aderlaß bei 16.  
 — Allgemeinbehandlung der 7.  
 — bei Akromegalie 3.  
 — bei akuten Infektionskrankheiten 4.  
 — bei Appendizitis 6.  
 — Badekuren bei 17.  
 — Behandlung der, bei bestehender Fettsucht 14.  
 — bei Chlorose 3, 13.  
 — bei chronischen Infektionskrankheiten 5.  
 — bei Diabetes 3.  
 — Diathermie bei 18.  
 — Duschen bei 17.  
 — echte 1.  
 — Eierstockersatztherapie bei 8.  
 — und Einflüsse der Umwelt 2.  
 — Eisentherapie bei 13.  
 — nach Erschöpfung 4, 13.  
 — I. und II.° 10.  
 — Faradisation bei 19.  
 — bei Fettsucht 3.  
 — funktionelle 1.  
 — Galvanisation bei 18.  
 — bei Gelenkrheumatismus 6.  
 — bei Geschwülsten des Eierstocks 7.  
 — infolge von Gonorrhoe 6.  
 — Güsse bei 17.  
 — heiße Scheidenspülungen bei 16.  
 — — Sitzbäder bei 16.  
 — Heißluftbehandlung bei 18.  
 — Homoiotransplantation der Ovarien bei 11.  
 — Hormoninjektionen bei 9.  
 — Hormonkuren bei 9.  
 — Hormontherapie bei 8.  
 — bei Hypoplasie des Genitales 6.  
 — bei Hypothyreosen 2.  
 — Intrauterinstift bei 19.  
 — kalte Sitzbäder bei 16.  
 — bei Krankheiten des Genitales 6.  
 — — des Herz- und Gefäßsystems 4.  
 — Kurgebrauch bei 14.  
 — bei Lungentuberkulose 5.  
 — bei Krankheiten der Verdauungs- und Harnwege 4.
- Amenorrhoe, bei Magengeschwüren 6.  
 — bei Malaria 6.  
 — medikamentöse Therapie der 12.  
 — bei Morbus Basedow 2.  
 — bei Myxödem 2.  
 — bei Neurosen und Psychosen 4.  
 — örtliche Behandlung der 19.  
 — physikalische Behandlung der 16.  
 — primäre 6.  
 — bei Pyämie und Sepsis 6.  
 — Scheidenatrophie bei 2.  
 — Skarifikation der Portio bei 19.  
 — Sondierung des Cavum uteri bei 19.  
 — Tuberkulinkur bei 6.  
 — bei Tuberkulose der Genitalorgane 6.  
 — bei Tumoren der Nebenniere 3.  
 — infolge Unterernährung (Kriegsamenorrhoe) 13.  
 — Vorderlappenhormonbehandlung bei 10.  
 — Wärme bei 18.
- Anatomische Veränderungen des Genitales im Klimakterium 69.
- Ansäuerung des Harns; Rp. 155, 156, S. 258.  
 — — — bei Pyelitis 261.
- Arthritis deformans der Articulationes sacroiliacae, Kreuzschmerzen bei 243.  
 — der Fingergelenke im Klimakterium 80.  
 — gonorrhoeica, Vakzinetherapie bei, nach WIEDMANN 107.  
 — der Sacroiliacal- und kleinen Wirbelsäulengelenke im Klimakterium 80.
- Arthropathia ovaripriva im Klimakterium 80, 81.
- Ascension der Gonorrhoe 88.
- Atemübungen bei Schwangerschaft und Enteroptose 209.
- Atherosklerose, Diät bei 66.  
 — Metrorrhagien infolge 65.  
 — als Sterilitätsursache 181.
- Atresia hymenalis 21, 157, 182.  
 — — als Sterilitätsursache 177.
- ATZBERGERSCHER Mastdarmkühlschlauch bei Entzündung der Adnexa 105.  
 — — bei Steißbeinschmerz 246.
- Aufrichtung vom Rektum her bei Retroflexio uteri mobilis 223.

- Aufrichtung nach SCHULTZE bei Retroflexio uteri mobilis 222.  
 — mit der Sonde bei Retroflexio uteri mobilis 223.  
 Aufrichtungsverfahren nach KÜSTNER bei Retroflexio uteri mobilis 223.  
 Augenbindehaut, Ansteckung der, bei Gonorrhoe 87.  
 Ausbreitung der septischen Entzündungen 161.  
 — und Verlauf der Parametritis 168.  
 Ausfallserscheinungen nach Entfernung des Uterus 85.  
 Ausfluß als Sterilitätsursache 177.  
 Auslöffeln und Verschorfen des inoperablen Uteruskarzinoms 199.  
 Aussichten der künstlichen Befruchtung 187.  
 Bacillus crassus 128.  
 Badekuren bei Amenorrhoe 17.  
 — häusliche, bei Fluor 56.  
 — im Klimakterium 81.  
 — bei Metropathie 56.  
 — bei Obstipation 255.  
 Badespekula 119.  
 Bäderbehandlung bei Adnexentzündung 117.  
 — in Badeorten bei Fluor 149.  
 — bei Kreuzschmerzen 242, 245.  
 — bei Sterilität 184.  
 Bäder, heiße, bei Dysmenorrhoe 33.  
 — — im Klimakterium 81.  
 — — bei Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum 101.  
 BARTHOLINISCHE Drüse, Inzision des Pseudoabszesses der 97.  
 — — Sekretentnahme aus der 91.  
 Bartholinitis 96.  
 — Eigenblutumspritzung bei 96.  
 — Vollmischvakzine bei 96.  
 Bauchbrüche 214.  
 Bauchdeckenhyperästhesie 247.  
 Bauchfell, Tuberkulose des 171.  
 Becken neuritis, Kreuzschmerzen infolge 244.  
 BECKH-GÄNSBAUERSCHE Glasstifte 42.  
 Bedeutung des Haftapparates 227.  
 — der Retroflexio uteri mobilis 218.  
 Befruchtungsbereitschaft 186.  
 Beginnende Senkung, Allgemeinthherapie bei 229.  
 — — Behandlung der 229.  
 Behandlung des akuten Stadiums der inneren Gonorrhoe 102.  
 — der beginnenden Senkung 229.  
 — der diffusen Peritonitis 165.  
 — der Enteroptose 210.  
 — der entzündlichen Krankheiten des Genitales 86.  
 — der Gonorrhoe der unteren Geschlechtswege 92.  
 — der gonorrhoeischen Entzündung der Adnexa 102.  
 — der Hypermenorrhoe 24.  
 — der inneren Gonorrhoe 101.  
 — von klimakterischen Beschwerden 69.  
 — der Ovarialgeschwülste 202.  
 — der Parametritis 169.  
 — physikalische, der Adnextumoren nach Gonorrhoe 114.  
 — — der Pelveoperitonitis chronica nach Gonorrhoe 114.  
 — der septischen Entzündungen 162.  
 — der Sterilität 182.  
 — der Thrombophlebitis 166.  
 — unregelmäßiger Blutungen verschiedenen Ursprungs 64.  
 Beidseitige Resektion der Eileiter bei Gonorrhoe 112.  
 Belastungstherapie 125, 170.  
 Beschwerden bei Retroflexio uteri mobilis 219.  
 Bestrahlung beim Korpuskarzinom 198.  
 — oder Operation bei Myomen 189.  
 — bei Ovarialgeschwülsten 203.  
 BEUTTNERSCHE Operation 112.  
 Biologie der Scheide 139.  
 Blasenblutungen, Behandlung der 267.  
 Blasenendometriose 207.  
 Blasen-Scheidenfisteln 263.  
 Blasenschmerzen bei Zystitis; Rp. 152, S. 257.  
 Blasenspülungen bei Zystitis 259.  
 Blenovakzine 108.  
 Blutdruck im Klimakterium 76 ff.  
 Blutegel bei Hämorrhoiden 217.  
 — bei Thrombophlebitis 166.  
 Blutende Geschwüre bei Pessarträgerrinnen 66.  
 Blut- und Serumtherapie bei Metropathie 55.

- Blutstillungsmaßnahmen bei Myomen 188.
- Bluttransfusion bei Metropathie 56.  
— bei Myomoperationen 192.
- Blutungen infolge aktiver und passiver Hyperämie der Gefäße 64.  
— bei Endometritis 62.  
— bei Granulomen nach vaginaler Totalexstirpation des Uterus 67.  
— bei Hämorrhoiden 217, 218.  
— bei Kolpitis vetularum 66.  
— beim Mittelschmerz 58.  
— bei Ovarialgeschwülsten 203.  
— nach Röntgenkastration bei Myomen 190.  
— infolge Veränderungen der Gefäßwände 64.
- Blutzirkulationsstörungen im Klimakterium 71.
- Calciumtherapie bei Metropathie 53.  
— bei Fluor 150.
- Cervicitis, Allgemeinbehandlung der 158.  
— Ätzverfahren bei 158.  
— Behandlung mit dem Paquelin bei 158.  
— Elektrokaustik bei 158.  
— Formalinätzung bei 158.  
— gonorrhoea 98.  
— — Ätzung der Cervix bei 99.  
— — Entfernung des Cervixschleims bei 99.  
— — Erosion bei 100.  
— — Saugglockenbehandlung bei 99.  
— — Stäbchenbehandlung der 99.  
— Hormontherapie bei 158.  
— Kalktherapie bei 158.  
— Lapisätzung bei 158.  
— Persvasion bei 158.  
— Ursachen der 157.  
— und zervikaler Fluor 157.
- Cervix, Massage der, nach BUCURA 99.
- Cervixrisse als Sterilitätsursache 177.
- Cervixsekretuntersuchung in gonorrhoeisch verdächtigen Fällen 179.
- Chemische Provokation bei Gonorrhoe 113.
- Chirurgische Behandlung der spitzen Kondylome 97.
- Chlorose, Amenorrhoe bei 3, 13.  
— Kurgebrauch bei 14.
- CHROBAKScher Tamponträger 95.
- Chronische Infektionen als Sterilitätsursache 181.
- Coccygodynie (Steißbeinschmerz) 246.  
— im Klimakterium 80.
- Coitus condomnatus bei fraglicher Ausheilung der Gonorrhoe 114.  
— interruptus, Hypermenorrhoe infolge 29.  
— — Kreuzschmerzen bei 238.
- Corporealer Fluor 141.
- Corpus-luteum 110.
- Corpus-luteum-Zysten, Metrorrhagien bei 59.
- Corpus uteri, Gonorrhoe des 101.
- Craurosis vulvae 134.  
— — Röntgenbestrahlung bei 135.  
— — Vulvektomie bei 135.
- Curettement beim Korpuskarzinom 197.
- Dammplastik bei Descensus 231.
- Dammrisse, alte 152, 182.
- Dammriß als Sterilitätsursache 177.
- Dauer der Pessarbehandlung bei Retroflexio uteri mobilis 225.
- Dauerergebnisse der Karzinombestrahlung 194.  
— der Karzinomoperation 194.
- Dauerkatheter von BOSCH 260.  
— bei Pyelitis 261.
- Dauerspülapparat nach JOACHIMOVITS und SCHWARZ 145.
- Dauertropfinfusionen bei Peritonitis 166.
- Deflorationskatarrhe 256.
- Deflorationsverletzungen, mechanisch bedingte Blutungen bei 66.
- Dehnungsgeschwüre bei Prolapsus uteri 66, 229, 235.
- Dekubitalgeschwüre, s. Dehnungsgeschwüre.
- Dermoide des Eierstocks 204.
- Descensus, Dammplastik bei 231.  
— Gymnastik bei 230.  
— Kolporrhaphie bei 231.  
— Massage bei 230.  
— operative Therapie bei 231.  
— der Ovarien 220.  
— vaginae 227.
- Diabetes und Fluor 149.  
— als Ursache der Kolpitis simplex 152.

- Diagnose und Differentialdiagnose der  
 Metropathia haemorrhagica 46.  
 — — — der Pyelitis 260.  
 — der Genitaltuberkulose 171.  
 Diät bei Atherosklerose 66.  
 — bei Enteroptose infolge Fettsucht  
 211.  
 — bei Hypermenorrhoe 29.  
 — im Klimakterium 71.  
 — bei septischen Adnexentzündun-  
 gen 166.  
 — bei spastischer Obstipation 254.  
 Diätetische Behandlung der Genital-  
 tuberkulose 173.  
 — — der Metropathie 56.  
 — — der Obstipation 249.  
 — — bei Steinbildung 265.  
 Diathermie bei Adnextumoren 170.  
 — bei Amenorrhoe 18.  
 — äußere 117.  
 — bei Dysmenorrhoe 42.  
 — bei Gonorrhoe 116.  
 — der Hypophyse 18, 42.  
 — kombinierte 117.  
 — Kontraindikationen der 117.  
 — bei Kreuzschmerzen 238, 242.  
 — Vorsichtsmaßregeln bei 117.  
 Differentialdiagnose zwischen Urethri-  
 titis und Zystitis non gonorrhoeica  
 256.  
 Dilatation des Halskanals mit Lami-  
 naria, mit Hegar bei Dysmenor-  
 rhoe, bei Sterilität 42, 183.  
 Diszission, bilaterale des äußeren  
 Muttermundes nach Pozzi bei  
 Dysmenorrhoe und Sterilität 44,  
 182.  
 — der hinteren Muttermundlippe  
 nach CHROBAK 182.  
 — des Muttermundes bei Dysmenor-  
 rhoe 43.  
 Dosierung der Vakzine bei intra-  
 muskulärer Verabreichung 108.  
 — — — bei Portioinjektionen 108.  
 Douglasabszeß 164.  
 Druckgeschwüre bei Pessarträgerin-  
 nen 224.  
 Durchbruch von Adnextumoren in  
 die Blase, Rektum, Scheide 169.  
 Durchschneidung der Sacrouterin-Li-  
 gamente bei Kreuzschmerzen nach  
 G. A. WAGNER 239.  
 Duschen bei Amenorrhoe 17.  
 Dysmenorrhoe 31.  
 — Abortus bei 33.  
 — Analgetica 37ff.  
 — Antispasmodica 39ff.  
 — bei abwegiger Konstitution 31.  
 — Änderung der Lebensweise bei 32.  
 — Aufrichtung der Gebärmutter bei  
 36.  
 — Eierstockersatztherapie bei 32.  
 — Elektrotherapie bei 33.  
 — infolge entzündlicher Genitalver-  
 änderungen 35.  
 — Gymnastik bei 32.  
 — infolge Haematosalpinx 36.  
 — heiße Bäder bei 33.  
 — Intrauterinstifte bei 43.  
 — künstliche Höhensonne bei 32.  
 — infolge Lageabweichungen und  
 Mißbildungen des Genitales 31.  
 — Laminariastifte bei 42.  
 — lauwarmer Sitzbäder bei 37.  
 — Ligamentverkürzung bei 36.  
 — mechanische und chirurgische Be-  
 handlungsverfahren bei 42.  
 — MENGESCHE Behandlung bei 43.  
 — und Migräne 33.  
 — infolge Myomen des Uterus 35.  
 — nasale Behandlung der nach  
 FLEISS 41.  
 — — — der, nach WORMSER 41.  
 — operative Suspension des Uterus  
 bei 36.  
 — Ovarialinsuffiziente 32.  
 — Persvasion bei 34.  
 — primäre 32.  
 — Psychanamnese bei 34.  
 — auf psychischer Grundlage 33.  
 — infolge Retroflexio uteri 36.  
 — rudimentäres Uterushorn als Ur-  
 sache der 36.  
 — sekundäre 34.  
 — Sondierung des Halskanals bei 42.  
 — Sport bei 32.  
 — symptomatische Behandlung der  
 36.  
 — Stuhlverhaltung bei 37.  
 — Stützmieder bei 32.  
 — Teil- oder Ganzabreibungen bei 32.  
 — Bade- und Trinkkuren bei 32, 33.  
 Dysmenorrhoebereitschaft, Ursachen  
 der, und ihre Behandlung 31.

- Dysmenorrhische Beschwerden bei Endometriosis 206.
- Dyspareunie, Behandlung der, bei Sterilität 185.
- als Sterilitätsursache 181.
- Dystrophia adiposogenitalis 2.
- — Forme fruste der 2.
- Eierstock, Kystome des 202ff.
- Dermoide des 204.
- Fibrome des 204.
- generative Funktion des 2.
- Karzinom des 204.
- Sarkome des 204.
- Teratome des 204.
- vegetative Funktion des 2.
- Eierstockersatztherapie bei Amenorrhoe 8.
- bei Dysmenorrhoe 32.
- Eierstocksgeschwülste, Kreuzschmerzen bei 238.
- Eigenblutinjektionen bei Metropathie 55.
- Eigenblutumspritzung bei Bartholinitis 96.
- Einkindersterilität bei Gonorrhoe 88.
- Eisbeutel bei (gonorrhöischer) Entzündung der Adnexa 105.
- Elektrokaustik bei Cervicitis 158.
- Elektrotherapie bei Amenorrhoe 18.
- bei Dysmenorrhoe 33.
- Embolie bei Tubendurchblasung 180.
- Emphysembildung bei Tubendurchblasung 180.
- Emylisgürtel 212.
- Endometriosis 205.
- dysmenorrhische Beschwerden bei 206.
- Enterocleaner bei 207.
- interna 205.
- — Probeabrasio bei 206.
- — Röntgenbestrahlung bei 206, 207.
- — Totalexstirpation bei 206.
- intraperitoneale 206.
- Jodbäder bei 206, 207.
- Kastrationsbestrahlung bei 206.
- Radikaloperation bei 206.
- Retrozervikale 207.
- Spasmolytica bei 207.
- Endometritis, Abrasio bei 162, 164.
- Endometritis, Ätzbehandlung bei 62.
- Ätzung bei, mit Formalin und Jod 164.
- Blutungen bei 62.
- Chinin bei 162.
- Hypophysenpräparate bei 62.
- Kälteanwendung bei 162.
- Moor- (Extrakt-, Laugen-) Bäder 164.
- nach Okklusivpressaren 61, 163.
- post abortum und partum 162.
- — — zuwartendes Verhalten bei 62.
- Probeabrasio bei 62.
- Scheidenspülungen mit Mutterlauge bei 164.
- — mit Steinsalz bei 164.
- Steinsalzbäder bei 164.
- symptomatische Behandlung der 162.
- syphilitische 63.
- Tampospumanstäbchen bei 164.
- Ursachen der nicht puerperalen 163.
- verschiedene Formen der 61.
- Wärmeanwendung bei 162.
- durch Zervixpolypen 61.
- Enterocleaner bei Endometriosis 207.
- bei Metrorrhagien 65.
- bei Pruritus vulvae 132.
- (Sudabad) bei Steinbildung 265.
- Enteroptose 207.
- Abführmittel bei 214.
- Allgemeinbehandlung der 213.
- Behandlung der 210.
- Diät bei, infolge Fettsucht 211.
- diätetische Behandlung bei 214.
- und Fettsucht, Abmagerungskur bei, in Badeorten 211.
- — — Gymnastik bei 211.
- — — Schilddrüsenbehandlung bei 211.
- Gymnastik bei Schwangerschaft und 209.
- Hydrotherapie bei 210.
- Klemmübungen bei 209.
- Liegekuren bei 210.
- Massage bei 210.
- orthopädische Behandlung der 211.
- Prophylaxe der 207.
- SCHEPELMANNSCHE Operation bei Hängebauch 215.

- Enteroptose und Senk- und Plattfuß-  
 beschwerden 215.  
 — Spasmen bei 214.  
 — Sport bei 213.  
 — Stützieder bei 212.  
 — Ursachen der 207, 210, 211.  
 Entfernung des Cervixschleims bei  
 Cervicitis gonorrhoea 99.  
 Entfettungskur bei Adipositas 65.  
 Entzündliche Erkrankungen des Endo-  
 metriums als Sterilitätsursache  
 178.  
 — Krankheiten des Genitales, Be-  
 handlung der 86.  
 Entzündungen des Cavum uteri, Zy-  
 klusstörungen infolge 61.  
 — metastatische der Eileiter und  
 Ovarien 167.  
 Enuresis 264.  
 — Faradisation bei 263.  
 — Harnröhrenverätzung bei 264.  
 — Vibrationsmassage nach STÖCKEL  
 bei 264.  
 Episiotomie, prophylaktische 228.  
 Ergotinkuren bei Myomen 188.  
 Erosion 158.  
 — bei Cervicitis gonorrhoea 100.  
 — Lapisbad bei 158.  
 — Lapisstiftbehandlung bei 159.  
 — Operation nach BONNEY bei 160.  
 — — nach STURMDORF bei 160.  
 — SCHRÖDER-EMMETSche Operation  
 bei 160.  
 — Spülbehandlung bei 159.  
 — Tamponbehandlung bei 159.  
 — Ursachen der 158.  
 Erweiterung des Halskanals mit  
 Hegarstiften bei Dysmenorrhoe 42.  
 Eugenische Beratung bei Sterilität  
 185.  
 — Gesichtspunkte bei künstlicher Be-  
 fruchtung 186.  
 Exstirpation der Blase bei Geschwül-  
 sten derselben 267.  
 Exsudative Form der Tuberkulose  
 des Peritoneums 173.  
 Fächerduschen bei Amenorrhoe 17.  
 — bei Hypermenorrhoe 29.  
 — bei Klimakterischen 78.  
 — bei Steißbeinschmerz 246.  
 Fangopackungen bei Arthritis 81.  
 Fangopackungen bei septischen Ent-  
 zündungen 121.  
 Faradisation bei Amenorrhoe 19.  
 — bei Dysmenorrhoe 42.  
 — bei Incontinentia urinae 263.  
 — im Klimakterium 78.  
 — bei Obstipation 251.  
 — bei Steißbeinschmerz 246.  
 FEHLINGSche Röhrechen 42, 183.  
 Feststellung der Ausheilung der  
 Gonorrhoe 113.  
 Fettsucht, endogene 3.  
 — exogene (Mastfettsucht) 3.  
 Fibrome des Eierstocks 204.  
 Fissura ani 216.  
 — — konservative Behandlung der  
 218.  
 — — operative Behandlung der, nach  
 RECAMIER 218.  
 Fluor 138.  
 — Ätztherapie des 154.  
 — Bäderbehandlung in Badeorten bei  
 149.  
 — corporealer 141.  
 — und Diabetes 149.  
 — Hormontherapie bei 150.  
 — kohlen saure Stahlbäder bei 149.  
 — Lokalbehandlung des 149.  
 — bei Mittelschmerz 58.  
 — Moor- (Sitz-, Voll-) Bäder bei 149,  
 150.  
 — SCHULTZEScher Probetampon bei  
 141.  
 — schwedische Gymnastik bei 149,  
 150.  
 — Sol- (Sitz-, Voll-) Bäder bei 149, 150.  
 — Trinkkuren bei 149.  
 — tubarer 140.  
 — Ultraviolettbestrahlung durch die  
 Quarzlampe bei 151.  
 — Umstimmung des Stoffwechsels  
 bei 151.  
 — vaginale Lichtbehandlung bei 151.  
 — vaginalis 142.  
 — — Allgemeinthherapie bei 147, 148.  
 — — Hydrotherapie bei 149.  
 — — Jodbad bei 144.  
 — — Lapisbad nach ZWEIFEL-MENGE  
 bei 143, 146.  
 — — Liegekuren mit Mast bei 149.  
 — — Milchsäurebehandlung des,  
 nach DÖDERLEIN 146.

- Fluor vaginalis, Scheidenirrigationen nach Lapisbehandlung bei 144.  
 — — Schilddrüsentherapie bei 149.  
 — — Spülbehandlung bei 144.  
 — — Spumantherapie bei 147.  
 — — Trockenbehandlung des 148.  
 — vestibularer (psychogener) 142.  
 — zervikaler und Cervicitis 141, 157.  
 — Zickzackkost nach NOORDEN bei 151.  
 Fluorquellen 140.  
 Fluorursachen 140.  
 Folgezustände nach Gonorrhoe, Indikationen zur Operation bei 111.  
 — — — Wahl der Operationsverfahren bei 111.  
 Follikelhormon 8.  
 Follikelhormonbehandlung der Metropathia haemorrhagica juvenilis 50.  
 Follikelsprung, Metrorrhagien beim 58.  
 Follikelzysten, Metrorrhagien bei 58.  
 Formalinätzung bei Cervicitis 158.  
 Formalinlösung, Spülung des Cavum uteri mit 183.  
 Fortgeschrittene Senkung 230.  
 Freibäder 122.  
 Freiluftgymnastik bei Metropathie 56.  
 Frigidität als Sterilitätsursache 181.  
 Frühaufstehen im Wochenbett 210.  
 Fruktulett von NASSAUER bei Sterilität 183.  
 Furunkulose als Ursache der Vulvitis 126.  
 Fußbäder, kalte im Klimakterium 72.  
 — wechselwarme im Klimakterium 72, 79.  
 Galvanisation bei Amenorrhoe 18.  
 — bei Dysmenorrhoe 41.  
 — bei Steißbeinschmerz 246.  
 Ganzwaschungen bei Hypermenorrhoe 29.  
 Geburtstraumen als Ursache des Descensus und Prolapsus 228.  
 Gefahren vorzeitiger Operation bei innerer Gonorrhoe 103.  
 — der Ovarialgeschwülste 203.  
 — der Tubendurchblasung 179.  
 Gefäßschmerzen im Klimakterium 76.  
 Gelose 247.  
 Genitaltuberkulose 171.  
 Genitaltuberkulose, Diagnose der 171.  
 — diätetische Behandlung der 173.  
 — Häufigkeit der 171.  
 — als Kontraindikation gegen Tubendurchblasung 179.  
 — Mast- und Liegekuren bei 173.  
 — Operationstherapie bei 172.  
 — Quarzlichtbestrahlung bei 173.  
 — Röntgentherapie bei 172.  
 — Strahlenkastration bei 172.  
 — Totalexstirpation des Uterus bei 172.  
 Genu valgum, Kreuzschmerzen bei 243.  
 Geschlechtsverkehr, Gefahren des, während der Periode 163.  
 — Stellung beim, bei Sterilität 182.  
 Geschwülste der Harnwege 266.  
 Globuli vaginales 153.  
 Glycerinkur bei Steinbildung; Rp. 164, S. 266.  
 Gonokokken, Nachweis der 89.  
 Gonokokkennachweis bei Mastdarmgonorrhoe 100.  
 Gonorrhoe 86.  
 — Ansteckung der Augenbindehaut bei 87.  
 — Ascension der 88.  
 — Behandlung des akuten Stadiums der inneren 102.  
 — beidseitige Resektion der Eileiter bei 112.  
 — BEUTNERSche Operation bei 112.  
 — Blenovakzine bei 108.  
 — chemische Provokation bei 113.  
 — Coitus condomnatus bei fraglicher Ausheilung der 114.  
 — des Corpus uteri 101.  
 — Einkindersterilität bei 88.  
 — Feststellung der Ausheilung der 113.  
 — Gefahren vorzeitiger Operation bei innerer 103.  
 — Hemikastration bei 112.  
 — Immunität gegen 89.  
 — Indikation und Kontraindikationen der Vakzinetherapie bei 106.  
 — Indikationen zur Operation bei Folgezuständen nach 111.  
 — Infektionsvermittlung bei 87.  
 — Inkubationszeit bei 89.  
 — Intrauterinbehandlung der 101.

- Gonorrhoe, Laparotomie bei innerer 103.  
 — mechanische Provokation bei 113.  
 — Mischinfektionen bei 89.  
 — physikalische Behandlung der Adnextumoren nach 114.  
 — — — der Pelveoperitonitis chronica nach 114.  
 — Provokation durch Arthigon bei 91.  
 — — durch Vakzine bei 114.  
 — Sekretentnahme aus der Cervix bei 91.  
 — Sekretuntersuchung bei 90.  
 — Senkungsgeschwindigkeit bei 112.  
 — Sterilität infolge Ascension der 88.  
 — Strahlenbehandlung bei 110.  
 — supravaginale Amputation bei 112.  
 — symptomatische Behandlung (Schmerzstillung) der akuten inneren 104.  
 — Totalexstirpation bei Folgezuständen nach 112.  
 — der unteren Geschlechtswege, Behandlung der 92.  
 — vaginale Incision im akuten Stadium der inneren 103.  
 — Vaginalsekretentnahme bei 91.  
 — Vakzinetherapie der 106.  
 — Vollmischvakzine bei 108.  
 — — — Behandlung der Stuhlverstopfung bei 105.  
 Granulome, Blutung bei 67.  
 Granulosazellgeschwülsten, Metrorrhagien bei 59.  
 Graviditätsamenorrhoe 1.  
 GRAWITZ-Tumoren 266.  
 Gürttelektrode von KOWARSCHIK und KEITLER 117.  
 Güsse bei Amenorrhoe 17.  
 — bei Hypermenorrhoe 29.  
 Gymnastik bei Descensus 230.  
 — bei Dysmenorrhoe 32.  
 — bei Enteroptose und Fettsucht 211.  
 — bei Hypermenorrhoe 29.  
 — im Klimakterium 71.  
 — bei Retroversion und unregelmäßiger Blutung 65.  
 — bei Schwangerschaft und Enteroptose 209.  
 — bei Fluor 149.  
 Gynäkologische Massage bei septischen Entzündungen 123.  
 Gynatresien 21.  
 Gynotherm 116.  
 Habituelle Stuhlverstopfung 255.  
 Halbbäder bei Obstipation 251.  
 — bei Pruritus vulvae 130.  
 Haematokolpos 21.  
 Haematometra 21.  
 Haematosalpinx 21.  
 — Dysmenorrhoe infolge 36.  
 Hämorrhoiden 216.  
 — Abführmittel bei 216.  
 — Blutungen bei 217, 218.  
 — innere 216.  
 — Kost bei 216.  
 — LANGENBECKSche Operation bei 217.  
 — örtliche Behandlung der 216.  
 — Verödung der 217.  
 Harnröhrengonorrhoe, Sekretentnahme bei 90.  
 Harnröhrenkarunkel 267.  
 Harnröhrenverätzung bei Enuresis 264.  
 Harnträufeln bei Prolapsus uteri 229.  
 Hautschädigungen bei der Karzinombestrahlung 198.  
 HEADSche Hyperalgesien 244.  
 Heiße Bäder bei Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum 101.  
 Heißluftapparat nach HILZINGER-REINER 116.  
 Heißluftbehandlung der Adnextumoren 170.  
 — bei Amenorrhoe 18.  
 — im Klimakterium 81.  
 — bei Kreuzschmerzen 238, 242.  
 — bei Pelveoperitonitis chronica 115.  
 Hemikastration bei Gonorrhoe 112.  
 — Metrorrhagien bei 59.  
 Herdreaktion bei Vakzinetherapie 108.  
 Hochfrequenzbehandlung nach KOWARSCHIK bei Kreuzschmerzen 248.  
 HODGE-Pessar bei Retroflexio uteri mobilis 223.  
 Höhensonne, künstliche bei Dysmenorrhoe 32.  
 Homoiotransplantation der Ovarien bei Amenorrhoe 111.

- Homoiotransplantation nach Kastration 84, 85.  
 Hormoninjektionen, intramuskuläre 9.  
 — intravenöse 9.  
 — subkutane 9.  
 Hormonkuren, enterale 9.  
 — rektale 9, 11.  
 Hormon- und medikamentöse Therapie der Metropathie 49.  
 Hormonpräparate 110.  
 — bei Dysmenorrhoe 32.  
 — bei Pruritus vulvae 132.  
 Hormontherapie bei Amenorrhoe 8.  
 — bei Cervicitis 158.  
 — bei Fluor 150.  
 — im Klimakterium 81.  
 Hormonverabreichung, Schemata der 11.  
 Hydrogenium hyperoxydatum 128.  
 Hydrotherapie bei Enteroptose 210.  
 — bei Fluor vaginalis 149.  
 — bei Hypermenorrhoe 29.  
 — im Klimakterium 72, 78.  
 — bei Metropathie 56.  
 — bei Metrorrhagien 65.  
 — bei Obstipation 251.  
 — bei Pruritus vulvae 130.  
 — bei Steißbeinschmerz 246.  
 Hymen septus, Blutung infolge 66.  
 Hyper- und Hypothyreosen, Metrorrhagien bei 58.  
 Hypermenorrhoe 22.  
 — Ableitung auf den Darm bei 29.  
 — Abrasio mucosae bei 30, 31.  
 — ätiologische Therapie bei 28.  
 — Ätzbehandlung bei 30.  
 — Behandlung der 24.  
 — Diät bei 29.  
 — Entzündung der Adnexa infolge 28.  
 — Gymnastik bei 29.  
 — Haemostyptica und ihre Verwendung bei 24.  
 — Hydrotherapie bei 29.  
 — infolge Coitus interruptus 29.  
 — Keilresektion des Uterus bei 30.  
 — Lokalbehandlung der 30.  
 — bei Myomträgerinnen 28.  
 — bei Retroflexio uteri 29.  
 — salinische Abführmittel bei 29.  
 — Sitzbäder bei 29.  
 — Skarifikation der Portio bei 30.  
 — Styptica bei 51.  
 Hypermenorrhoe, Uterustonica bei 51.  
 — vaginale Totalexstirpation bei 30.  
 Hyperplasie, follikuläre, der Portio als Sterilitätsursache 177.  
 Hypoplasie als Sterilitätsursache 177, 181.  
 Hypertonie im Klimakterium 76ff.  
 — Menorrhagien infolge 24.  
 Hypnose bei Vaginismus 137.  
 Hypomenorrhoe 1, 21.  
 Hypophysenbestrahlung bei Metropathia juvenilis 57.  
 Hypophysenextrakte, Einspritzung von, bei Tubargravidität 61.  
 Hypophysenpräparate 15, 41, 51, 60, 110.  
 — bei Endometritis 62.  
 Immunität gegen Gonorrhoe 89.  
 Implantation des Ovariums in den Uterus bei Sterilität 185.  
 — der Harnleiter in den Darm bei Geschwülsten der Blase 267.  
 — der Tuben bei Sterilität 185.  
 Incision des Pseudoabszesses der BARTHOLINischen Drüse 97.  
 Incontinentia urinae 263.  
 — — Faradisation bei 263.  
 — — Massage bei 263.  
 — — Ovarialpräparate bei 263.  
 — — Sitzbäder mit Eichenrinde bei 263.  
 — — Vaginalspülungen nach STÖCKEL bei; Rp. 161, S. 263.  
 — Vibrationsmassage bei 263.  
 — im Wochenbett 263.  
 Indikationen und Kontraindikationen der gynäkologischen Massage 123.  
 — — — zu Moorbädern 121.  
 — — — zur Tubendurchblasung 179.  
 — — — der Vakzinetherapie bei Gonorrhoe 106.  
 — zur Myombestrahlung 191.  
 — zur Myomoperation 191.  
 — zur Operation bei Folgezuständen nach Gonorrhoe 111.  
 Infantilismus der Scheide als Sterilitätsursache 177.  
 Infektionsvermittlung bei Gonorrhoe 87.  
 Infusionen bei Peritonitis 166.

- Injektionsbehandlung der Urethritis gonorrhoeica 94.  
 Injektionstherapie bei Kreuzschmerzen 245.  
 Inkubationszeit bei Gonorrhoe 89.  
 Insuffizienz des Beckenbodens 227.  
 Interposition bei Prolapsus uteri 231.  
 Intrauterinbehandlung der Gonorrhoe 101.  
 Intrauterinpressare 178.  
 Intrauterinstifte bei Amenorrhoe 19.  
 — — Dysmenorrhoe 43.
- JASCHKESche Standardtherapie bei Fluor vaginalis 147.**  
 Jodbäder bei Endometriosis 206, 207.  
 Jodbad bei Fluor vaginalis 144.  
 Jodbasedow im Klimakterium 77.  
 Jupiterlampe nach ENGELMANN 152.  
 Juvenile Metropathie virgineller Mädchen 53.
- Kalasisirgürtel 212.**  
 Kalktherapie bei Cervicitis 158.  
 Kälteanwendung bei Endometritis 162.  
 Karzinom der Blase 267.  
 — des Eierstocks 204.  
 — der Tube 140.  
 — der Urethra 267.  
 — des Uterus 193.  
 — der Vagina und Vulva 207.  
 Karzinombestrahlung, Dauerergebnisse der 196.  
 — bei jungen Frauen 195.  
 — Hautschädigungen bei 198.  
 Kastration, Homoiotransplantation bei Ausfallserscheinungen infolge vorzeitiger 84, 85.  
 — Milchkur nach KISCH bei frühzeitig vorgenommener 85.  
 Kastrationsbestrahlung bei Endometriosis 206.  
 Kefir- und Joghurtmilch bei Obstipation 250.  
 Keilresektion des Uterus bei Hypermenorrhoe 30.  
 — — — bei Metropathie 49.  
 Keulnepessar von MENGE bei Prolapsus uteri 234.  
 Kleinzystische Degeneration des Ovariums, Metrorrhagien bei 58.
- Klimakterische Beschwerden und deren Behandlung 69.  
 — Blutungen, Therapie der 70.  
 Klimakterium, Aderlaß im 77.  
 — anatomische Veränderungen des Genitales im 69.  
 — Arsen-Bromtherapie im 74.  
 — Arthritis im 80.  
 — Arthropathia ovaripriva im 80, 81.  
 — Badekuren im 81.  
 — Blutdruck im 76ff.  
 — Blutzirkulationsstörungen im 71.  
 — Coceygodynie im 80.  
 — Diät im 71.  
 — Fangopackungen im 81.  
 — Gefäßschmerzen im 76.  
 — Gymnastik im 71, 78.  
 — heiße Bäder im 81.  
 — Hormon- und Organotherapie im 81, 82.  
 — Hydrotherapie im 72.  
 — Jodbasedow im 77.  
 — kalte Fußbäder im 72.  
 — Kopfschmerzen im 79.  
 — künstliches 83.  
 — Luftperlbäder im 72.  
 — natürliches 67.  
 — Nervenstörungen im 71.  
 — Neuralgie des Nervus ischiadicus im 81.  
 — salinische Abführmittel im 78.  
 — Sauerstoffbäder im 72.  
 — Schilddrüsentherapie im 80.  
 — Schlaflosigkeit im 79.  
 — Schlamm packungen im 81.  
 — Schweiße im 78.  
 — Seebäder im 72.  
 — Senffußbäder im 79.  
 — statisch-dynamische Dekompensation im 81.  
 — Stoffwechselstörungen im 71.  
 — Trinkkuren im 81.  
 — Vasalgien im 79.  
 — verspätetes 68.  
 — vorzeitiges 68.  
 — wechselwarme Fußbäder im 72.  
 Klimatotherapie bei Tuberkulose des Peritoneums 174.  
 Klimawechsel, brusker bei Metropathie 56.  
 Klysmen, kalte bei Metropathie 53.  
 — bei Obstipation 251.

- Knieguß 17.  
 Kohabitationsverbot bei Kolpitis 152.  
 Kohabitationsverletzungen, septische Entzündungen infolge 161.  
 Kolpitis, Scheidenstenosen und Atresien nach 156.  
 — senilis, Therapie der 154.  
 — simplex, Ätiologie der 152.  
 — — Lapisbad bei 152.  
 — — Milchsäuretherapie bei 153.  
 — — Spülbehandlung bei 152.  
 — — Therapie der 152.  
 — vetularum 154.  
 — — Blutungen bei 66.  
 — — Pastenbehandlung nach FLA-  
 TAU bei 154.  
 — — Probeexcision bei 154.  
 Kolporrhaphie bei Descensus 231.  
 Kolposkopie nach HINSELMANN 194.  
 Komplementbindungsreaktion nach  
 MÜLLER-OPPENHEIM 86, 90.  
 Kontaktblutungen beim operablen  
 Uteruskarzinom 193.  
 Kontraindikationen gegen die Opera-  
 tion bei Prolapsus uteri 232.  
 — gegen die Uteruskarzinomoperation  
 195.  
 — der Vakzinetherapie 107.  
 Kontrolluntersuchung beim Uterus-  
 karzinom 197.  
 Konzeptionsoptimum nach KNAUS  
 186.  
 Korpuskarzinom 196.  
 — Bestrahlung beim 198.  
 — Curettement beim 197.  
 — in der myomatösen Gebärmutter  
 190.  
 — Nachbehandlung beim 197.  
 — Operation beim 198.  
 — Prognose beim 198.  
 Korpuspolyphen 63.  
 Kreuzduschen bei Steißbeinschmerz  
 246.  
 Kreuzschmerzen 235.  
 — infolge von Appendizitis 237.  
 — bei Arthritis deformans der Arti-  
 culationes sacroiliacae 243.  
 — Bäderbehandlung bei 242, 245.  
 — infolge Beckenneuritis 244.  
 — Behandlung der genital bedingten  
 237.  
 — bei Carcinoma colli 239.  
 Kreuzschmerzen bei Coitus inter-  
 ruptus 238.  
 — Dehnung der Sacrouterinligamente  
 bei 239.  
 — Diathermie bei 238, 242.  
 — Durchschneidung der Ligamente  
 bei, nach G. A. WAGNER 239.  
 — bei Eierstocksgeschwülsten 238.  
 — infolge Entzündungen der Genital-  
 organe 236.  
 — epidurale Injektion bei 246.  
 — bei Fehlbildungen der Lenden-  
 wirbelsäule 240.  
 — infolge Fehllhaltung des Beckens  
 240.  
 — — Geschwülste des Genitales  
 236.  
 — — Gicht 243.  
 — Heißluftbehandlung bei 238, 242.  
 — Hochfrequenzbehandlung bei 248.  
 — konservative Behandlung der 238.  
 — Körpergewichtszunahme und 243.  
 — infolge Krankheiten des Darmes  
 236.  
 — — — der Harnwege 237.  
 — bei Lumbalisation 243.  
 — Massage bei 242.  
 — Miedertype nach HASS bei 241.  
 — — nach JUNGSMANN bei 242.  
 — bei Muskelrheumatismus 243, 245.  
 — bei Myomen 238.  
 — neurasthenische 245.  
 — Novocaininfiltration bei 239.  
 — operative Behandlung der 239.  
 — bei Parametritis posterior 238.  
 — parasakrale Injektion bei; Rp. 144,  
 S. 246.  
 — bei Pes planus und Genu valgum  
 243.  
 — präsakrale Injektion bei 246.  
 — bei Sakralisation 242.  
 — bei Spondylarthritis 243.  
 — Spondylolisthesis bei 243.  
 — Stichelungen der Portio bei 238.  
 — bei Tuberkulose der Wirbelsäule  
 243.  
 — infolge von Veränderungen der  
 Genitalorgane 236.  
 — Vibrationsmassage bei 238.  
 Kriegsamorrhoe 3, 13.  
 KROMAYERSche Lampe 173.  
 KRUKENBERG-Tumoren 205.

- Kugelmassage bei Obstipation 251.  
 Künstlicher Abort als Sterilitäts-  
 ursache 179.  
 Künstliche Befruchtung 186ff.  
 — — Technik der 187.  
 — — Wahl des Zeitpunktes bei 187.  
 — Höhensonne 123, 174.  
 Künstliches Klimakterium 83.  
 — — Sympaticusausschaltung im 84.  
 Kurgebrauch bei Amenorrhoe 14.  
 — bei Chlorose 14.  
 Kystoma ovarii 202ff.
- Laktationsamenorrhoe 1, 3, 4, 13.  
 Laminariastifte bei Dysmenorrhoe 42.  
 — bei Sterilität 183.  
 Laparotomie bei Tuberkulose des  
 Peritoneums 173.  
 Lapisätzung bei Cervicitis 158.  
 Lapisbad bei Erosion 158.  
 — bei Kolpitis simplex 152.  
 — nach ZWEIFEL-MENGE bei Fluor  
 vaginalis 143, 146.  
 Lapislösung, äußerliche Anwendung  
 bei Vulvitis 94.  
 Lapisstiftbehandlung bei Erosion  
 159.  
 Leberdiät 14.  
 Leber- und Milzbestrahlung der Me-  
 tropathia juvenilis 57.  
 Lebertran beim inoperablen Uterus-  
 karzinom 204.  
 — bei Tuberkulose des Peritoneums  
 174.  
 Leinsamenkataplasmen (Umschläge)  
 169.  
 Leukoplakia vulvae 134.  
 — — symptomatische Behandlung  
 der 134.  
 — — Vulvektomie bei 134.  
 Lichtbehandlung, vaginale bei Fluor  
 151.  
 Liegekuren bei Enteroptose 210.  
 Liegekur mit Mast bei Fluor vaginalis  
 149.  
 — bei Tuberkulose des Peritoneums  
 173.  
 Ligamentverkürzung bei Dysmenor-  
 rhoe 36.  
 Lösen des Schleimpfropfes bei Mutter-  
 munds-Zervixstenosen 182.  
 Luftperlbäder im Klimakterium 72.
- Lugolpinselung beim Uteruskarzinom  
 194.  
 Lumbalisation, Kreuzschmerzen bei  
 242.  
 Macula gonorrhoeica Sängeri 96.  
 Maligne Entartung der Ovarialge-  
 schwülste 203.  
 Massage der Cervix nach BUCURA 99.  
 — bei Descensus 230.  
 — bei Enteroptose 210.  
 — gynäkologische, Indikationen und  
 Kontraindikationen der 123.  
 — bei Incontinentia urinae 263.  
 — bei Kreuzschmerzen 242.  
 — bei Obstipation 250.  
 — bei Parametritis 170.  
 — Technik der gynäkologischen 124.  
 Mastdarmeinläufe, heiße, bei Metro-  
 pathie 53.  
 Mastdarmgonorrhoe 100.  
 — Salbenbehandlung bei 100.  
 — Spülbehandlung bei 100.  
 — Gonokokkennachweis bei 100.  
 Mastdarmvorfall 218.  
 Mastliegekur 14.  
 — bei Genitaltuberkulose 173.  
 Mechanisch bedingte Blutungen bei  
 Deflorationsverletzungen 66.  
 — — — bei Verletzungen der äußeren  
 Scham und der Scheide 66.  
 Mechanische Provokation bei Gonor-  
 rhoe 113.  
 Medikamentöse Therapie der Amenor-  
 rhoe 12.  
 — — des habituellen Abort mit Eisen  
 und Jod; Rp. 53, 54, S. 51.  
 — — der Obstipation 252.  
 — — bei Pruritus vulvae 131.  
 — — des Steißbeinschmerzes; Rp.  
 145, 146, S. 246.  
 — — der Tuberkulose des Perito-  
 neums 173.  
 Mehrgläserprobe bei Zystitis 257.  
 Meerbäder (auch Meerwasser-Wannen-  
 bäder) 122.  
 MENGESCHE Behandlung bei Dysme-  
 norrhoe 43.  
 Menopause 68.  
 Menschenseruminjektionen bei Metro-  
 pathie 55.  
 Menstruation, normale Blutmenge bei  
 der 22.

- Metastatische Entzündungen der Eileiter und Ovarien 167.
- Metronom 183.
- Metropathia haemorrhagica, Diagnose und Differentialdiagnose der 46.
- — juvenilis 49.
  - — — Follikelhormonbehandlung der 50.
  - juvenilis, Ätzbehandlung der 56.
  - — Abrasio bei 56.
  - — beidseitige Ovarialresektion bei 57.
  - — Hypophysenbestrahlung bei 57.
  - — Leber- und Milzbestrahlung bei 57.
  - — operative Behandlung der 56.
  - — Strahlenbehandlung der 56.
  - — supravaginale Amputation des Uterus bei 57.
  - — temporäre Röntgenkastration bei 57.
  - — vaginale Totalexstirpation des Uterus bei 57.
  - operative und Strahlenbehandlung der 46.
  - Änderung der Lebensweise bei 56.
  - Abrasio bei 46.
  - Ätzbehandlung bei 47.
  - Badekuren bei 56.
  - Blut- und Serumtherapie bei 55.
  - blutstillende Teesorten bei; Rp. 64, 65, 66, S. 55.
  - Bluttransfusion bei 56.
  - brusker Klimawechsel bei 56.
  - Calciumtherapie bei 53.
  - diätetische Behandlung der 56.
  - Eigenblutinjektionen bei 55.
  - Fortdauer der Blutung trotz Röntgenbehandlung bei 48.
  - Freiluftgymnastik bei 56.
  - Gelatineklyisma bei 55.
  - heiße Mastdarmläufe bei 53.
  - Hormon- und medikamentöse Therapie der 49.
  - Hydrotherapie bei 56.
  - intramuskuläre Gelatineinjektion bei 54.
  - kalte Klysmen 53.
  - Keilresektion des Uterus bei 49.
  - Menschenseruminjektionen bei 55.
  - Pferdeseruminjektionen bei 55.
  - Radiumbehandlung bei 57.
- Metropathia, Röntgenbehandlung (Dauerkastration) bei 48.
- Scheidentamponade bei 53.
  - als Sterilitätsursache 178.
  - Tamponade des Uterus bei 53.
  - Unterwertigkeit der Schilddrüse bei 51.
  - vaginale Totalexstirpation bei 48.
- Metrorrhagien bei Adipositas 65.
- bei Akromegalie 58.
  - infolge Atherosklerose 65.
  - bei bösartigen Ovarialgeschwülsten 60.
  - bei Corpus-luteum-Zysten 59.
  - bei Descensus und Retroversio uteri 65.
  - Enterocleaner bei 65.
  - infolge Entzündungen der Adnexa 60.
  - beim Follikelsprung 58.
  - bei Follikelzysten 58.
  - bei Granulosazellgeschwülsten 59.
  - infolge heißer Bäder 64.
  - heiße Scheidenspülungen bei 60.
  - bei Hemikastration 59.
  - Hydrotherapie bei 65.
  - bei Hyper- und Hypothyreosen 58.
  - bei kleinzystischer Degeneration des Ovariums 58.
  - kühle Teilwaschungen bei 65.
  - bei Morbus Addison 58.
  - psychisch bedingte 64.
  - infolge sexueller Erregung 64.
  - Teilabreibungen bei 65.
- Mikroklyisma bei Obstipation 252.
- Mikrokokkus gazogenes alcalescens 155.
- Milchkur nach KISCH bei Kastration 85.
- Milchsäurebehandlung des Fluor vaginalis nach DÖDERLEIN 146.
- Milchsäuretherapie bei Kolpitis simplex 152.
- Mischinfektionen bei Gonorrhoe 89.
- Mischvakzine bei septischen Adnexentzündungen 167.
- Mißbrauch von Rauschgiften als Sterilitätsursache 181.
- Mittelschmerz, Blutung beim 58.
- Fluor bei 58.
- Molimina menstrualia 85.
- Moorbäder 17, 32, 120.

- Moorbäder bei Endometritis 164.  
 — bei Fluor 149, 150.  
 — im Hause 120, 121.  
 — in Kurorten 120.  
 Moorextraktbäder bei Endometritis 164.  
 Moorlaugenbäder bei Endometritis 164.  
 Moorpackungen 17.  
 Moorbäder bei Fluor 150.  
 Moorumschläge 122.  
 Morbus Addison, Metrorrhagien bei 58.  
 — Basedow, Pituitrin bei 16.  
 Mortalität der Karzinomoperation 194.  
 — der Radiumbehandlung beim operablen Uteruskarzinom 194.  
 Muttermunds- und Zervixstenosen, Behandlung der 182.  
 Myom und Vorfal 191.  
 — und Wechsel 189.  
 Myoma uteri, Beratung bei 187.  
 Myomatöse Gebärmutter, Korpuskarzinom in 190.  
 — Polypen 62.  
 Myomatöser Polyp, Operation beim 191.  
 Myombestrahlung, Indikation zur 191.  
 Myome, Bestrahlung oder Operation bei 189.  
 — Blutstillungsmaßnahmen bei 188.  
 — Blutungen nach Röntgenkastration bei 190.  
 — Ergotinkuren bei 188.  
 — Kreuzschmerzen bei 238.  
 — nach der Menopause 191.  
 — als Sterilitätsursache 178, 184.  
 — submuköse 63.  
 — — Operation bei 191.  
 — symptomlose 188.  
 — Therapie der 191.  
 — Umwandlung zu Sarkomen 190.  
 — des Uterus, Dysmenorrhoe infolge 35.  
 — verjauchende 191.  
 — zystische 191.  
 Myomoperation, Indikation zur 191.  
 — konservative 193.  
 Nachbehandlung beim Uteruskarzinom 197.  
 Nachbestrahlung bei Ovarialgeschwülsten 203.  
 Nachweis der Gonokokken 89.  
 Narkoseuntersuchung bei Stenosen des hinteren Scheidendrittels 154.  
 Nasale Behandlung der Dysmenorrhoe nach FLEISS 41.  
 — — — nach WORMSER 41.  
 NASSAUERSCHES Fruktulett 183.  
 NASSAUERSCHER Sikkator 148.  
 Natürliches Klimakterium 67.  
 Nephrektomie als Gegenanzeige gegen die Karzinomoperation 195.  
 Nephropexie bei Wanderniere 215.  
 Nervenstörungen im Klimakterium 71.  
 Neuralgie des Nervus ischiadicus im Klimakterium 81.  
 Nierenblutung bei Steinbildung 265.  
 Normale Blutmenge bei der Menstruation 22.  
 Novocaininfiltration bei Kreuzschmerzen 239.  
 — bei Pruritis vulvae 132.  
 Novocainumspritzen bei Steißbeinschmerz 247.  
 Obstipation 248.  
 — abführende Speisen bei 249.  
 — Abführmittel bei atonischer 252, 253.  
 — — bei spastischer; Rp. 149, 150, S. 254.  
 — Badekuren bei 255.  
 — Brotsorten bei 250.  
 — Diät bei spastischer 254.  
 — diätetische Behandlung der 249.  
 — Faradisation bei 251.  
 — Hydrotherapie bei 251.  
 — Klysmen bei 251.  
 — Kugelmassage bei 251.  
 — Massage bei 250ff.  
 — medikamentöse Behandlung der 252.  
 — Schwefeltrinkkuren bei 255.  
 — Ursachen der 248.  
 Okklusivpressare, Endometritis nach 61, 163.  
 Öleinläufe 214, 251ff.  
 Oligomenorrhoe 1, 2.  
 Operation im akuten Stadium der septischen Adnexentzündungen 165.  
 — nach BONNEY bei Erosion 160.  
 — nach DOLERIS bei Retroflexio uteri 222, 226.

- Operation bei Erosion nach STURM-DORF 160.  
 — beim Korpuskarzinom 198.  
 — nach NEUGEBAUER-LEFORT bei Prolapsus uteri 232.  
 — bei Ovarialgeschwülsten 203.  
 — bei Tubenverschluß 184ff.  
 Operative Behandlung des Descensus 231.  
 — — der Fissura ani nach RECAMIER 218.  
 — — der Genitaltuberkulose 172.  
 — — der Kreuzschmerzen 239.  
 — — der Metropathia juvenilis 56.  
 — — der Metropathie 46.  
 — — des Vaginismus 136.  
 — Kastration 83.  
 Organotherapie im Klimakterium 81.  
 Örtliche Behandlung der Amenorrhoe 19.  
 — — der Hämorrhoiden 216.  
 — — der Urethritis gonorrhoeica 94.  
 Orthopädische Behandlung der Enteroptose 211.  
 Ovarialgeschwülste 202.  
 — Behandlung der 202.  
 — Bestrahlung bei 203.  
 — Blutung bei 203.  
 — bösartige, Metrorrhagien bei 60.  
 — Gefahren der 203.  
 — Häufigkeit der 203.  
 — maligne Entartung der 203.  
 — Nachbestrahlung bei 203.  
 — Operation bei 203.  
 — Prognose bei 203.  
 — Ruptur bei 203.  
 — symptomatische Behandlung inoperabler 203.  
 — Stieldrehung bei 203.  
 — Vereiterung bei 203.  
 Ovarialresektion, beidseitige bei Metropathia juvenilis 57.  
 Ovarialschwäche, Behandlung der Zyklusverschiebungen infolge primärer und sekundärer 44.  
 Ovarien, Homoiotransplantation der 11.  
 Oxalatsteine 264.  
 Oxyuren 126.  
 Papillome 267.  
 Paquelin, Behandlung mit dem, bei Cervicitis 158.  
 Paquelinisierung bei Pruritus vulvae 133.  
 Parametritis 168.  
 — Behandlung der 169.  
 — Massage bei 170.  
 — posterior, Kreuzschmerzen bei 238.  
 Parauretrale Gänge 96.  
 Pastenbehandlung nach FLATAU bei Kolpitis vetularum 154.  
 Pelveoperitonitis chronica, Heißluftbehandlung bei 115.  
 — — Wärmeanwendung bei 115.  
 — septische 164 ff.  
 Pelvitherm 18, 116, 170.  
 Peritonitis, Behandlung der diffusen 165.  
 — Infusionen bei 166.  
 — Revitentherapie nach HOLZBACH bei 166.  
 — Scheidenspülungen mit Opiumtinktur bei 166.  
 — Tropfklysmen bei 166.  
 Peritonitistherapie nach LATZKO 166.  
 Persvasion bei Cervicitis (Vagotomie) 158.  
 — bei Dysmenorrhoe 34.  
 — bei Pruritus vulvae 130.  
 — bei Retroflexio uteri mobilis 221.  
 — bei Vaginismus 137.  
 Pes planus, Kreuzschmerzen bei 243.  
 Pessartherapie bei Prolapsus uteri 232.  
 — bei Retroflexio uteri mobilis 221.  
 Pfählungs- und Maschinenverletzungen, mechanisch bedingte Blutungen bei 66.  
 Phosphatsteine 264.  
 Physikalische Behandlung der Adnextumoren 114.  
 — — der Amenorrhoe 16.  
 — — der Pelveoperitonitis chronica nach Gonorrhoe 114.  
 — Heilmethoden bei Sterilität 184.  
 — Therapie der Tuberkulose des Peritoneums 173.  
 Physiologische Sterilität des Weibes 186.  
 Plastische Form der Tuberkulose des Peritoneums 173.  
 Polypen, myomatöse 63.  
 Portiotuberkulose 173.  
 — Radiumbehandlung bei 173.

- Portiotuberkulose, Vaginalbestrahlung mit der Quarzlampe bei 173.  
 Prießnitzumschläge 105, 170.  
 Primäre Sterilität 175.  
 Probeabrasio bei Endometriosis interna 206.  
 — bei Endometritis 62.  
 Probeexcision beim Kollumkarzinom 193.  
 Profunduslampe 81.  
 Prognose beim Kollumkarzinom 196.  
 — beim Korpuskarzinom 198.  
 — bei Ovarialgeschwülsten 203.  
 Prolan A und B 8.  
 Prolapsus uteri, Zystitis infolge Restharns bei 229.  
 — — Dehnungsgeschwüre beim 66, 229.  
 — — Harnträufeln bei 229.  
 — — Interposition bei 231.  
 — — Keulenpessar von MENGE bei 234.  
 — — Kontraindikationen gegen die Operation bei 232.  
 — — Operation nach NEUGEBAUERLEFORT bei 232.  
 — — Pessartherapie bei 232.  
 — — Ringpessar bei 233.  
 — — Schalen- (SCHATZ-) Pessar bei 233.  
 — — Totalexstirpation bei 232.  
 — — et vaginae 227.  
 — — Zapfenpessar von ROSENFELD bei 234.  
 Prophylaxe der Enteroptose 207.  
 Proteinkörpertherapie bei septischen Adnexentzündungen 166.  
 Provokation durch Arthigon bei Gonorrhoe 91.  
 — durch Vakzine bei Gonorrhoe 114.  
 Pruritus vulvae 129.  
 — — Ätiologie des 129.  
 — — Hormonpräparate bei 132.  
 — — Hydrotherapie bei 130.  
 — — medikamentöse Therapie bei 131.  
 — — Novocain- (Tutocain-) Infiltration bei 132.  
 — — Ovarialpräparate bei 132.  
 — — Paquelinisierung bei 133.  
 — — Persvasion bei 130.  
 Pruritus vulvae, Phenolpinselung nach DOPPLER bei 133.  
 — — Pudendusanästhesie bei 133.  
 — — Radiumbehandlung bei 133.  
 — — Röntgenbehandlung bei 133.  
 — — Salben bei; Rp. 101—107, S. 131.  
 — — Schilddrüsentherapie bei 132.  
 — — Sudabad bei 132.  
 — — symptomatische Therapie bei 130.  
 — — Zickzackkost nach NOORDEN bei 132.  
 Pseudoabszeß der Bartholinischen Drüse 97.  
 Pseudoamenorrhoe 1, 21.  
 Pseudovaginismus 136.  
 Psychisch bedingte Metrorrhagien 64.  
 Psychische Behandlung des Vaginismus 137.  
 — — bei Retroflexio uteri 221.  
 Ptose des Magens 214.  
 Pudendusanästhesie bei Pruritus vulvae 133.  
 Punktion des Hodens bei künstlicher Befruchtung 186.  
 — bei Tuberkulose des Peritoneums 173.  
 Pyelitis 260.  
 — Abführmittel bei; Rp. 159, S. 260.  
 — Alkalitherapie bei 261.  
 — Ansäuerung des Harns bei 261.  
 — Behandlung der 260.  
 — Diagnose und Differentialdiagnose bei 260.  
 — nach Operation des Kollumkarzinoms 195.  
 — Spülung des Nierenbeckens bei 261.  
 — Trockenkost bei 261.  
 — Ureterensondierung bei 261.  
 — Vakzinetherapie bei 261.  
 Pyometra bei Tuberkulose 6.  
 Quarzlampe 81.  
 Quarzlichtbestrahlung bei Genitaltuberkulose 173.  
 Quecksilberdruck bei Tubendurchblasung 180.  
 Radikaloperation bei Endometriosis 206.  
 Radiumbehandlung bei Metropathie 57.

- Radiumbehandlung [bei Portiotuberkulose 173.  
 — bei Pruritus vulvae 133.  
 — der spitzen Kondylome 98.  
 Radium-Röntgenbestrahlung beim operablen Uteruskarzinom 194.  
 Regelblutung, verstärkte bei Retroflexio uteri 220.  
 Regeln für Pessarträgerinnen bei Retroflexion 224.  
 Rektokele 228.  
 Reposition von Totalprolapsen 235.  
 Resektion der Tuben nach MARTIN 185.  
 — — — nach NÜRNBERGER, HALBAN 185.  
 Retroflexio uteri, Dysmenorrhoe infolge 36.  
 — — — Hypermenorrhoe bei 29.  
 — — — als Sterilitätsursache 183, 221.  
 — — — fixata 225.  
 — — — Operation nach DOLERIS bei 226.  
 — — — operative Korrektur bei 226.  
 — — — vaginale Totalexstirpation bei 227.  
 — — — gravidi 222.  
 — — — mobilis 218.  
 — — — Allgemeinmaßnahmen bei 221.  
 — — — ALEXANDER-ADAMSche Operation bei 226.  
 — — — DOLERISsche Operation 226.  
 — — — im Anschluß an die Geburt 222.  
 — — — Aufrichtung nach KÜSTNER bei 223.  
 — — — Aufrichtung vom Rektum her bei 223.  
 — — — — nach SCHULTZE bei 222.  
 — — — Beschwerden bei 219.  
 — — — Dauer der Pessarbehandlung bei 225.  
 — — — HODGE-Pessar bei 223.  
 — — — MAYERScher Ring bei 222.  
 — — — operative Therapie bei 222.  
 — — — Pessartherapie bei 221.  
 — — — psychoanalytische Behandlung bei 221.  
 — — — Regeln für Pessarträgerinnen bei 224.  
 — — — Technik der Einführung des Pessars bei 224.
- Retroflexio uteri mobilis, THOMAS-Pessar bei 223.  
 Rezidivgefahr beim Uteruskarzinom 197.  
 Ringpessar bei Prolapsus uteri 233.  
 Röntgenbehandlung bei Craurosis vulvae 135.  
 — bei Endometriosis interna 206, 207.  
 — der Genital- und Peritonealtuberkulose 172, 173.  
 — (Dauerkastration) bei Metropathie 48.  
 — bei Pruritus vulvae 133.  
 — der spitzen Kondylome 98.  
 — bei Tuberkulose der Harnwege 262.  
 Röntgenographie der Eileiter bei Sterilität 180.  
 Rückenmarks- und Nervenkrankheiten als Ursache des Descensus und Prolapsus 228.  
 Rudimentäres Uterushorn als Ursache der Dysmenorrhoe 36.  
 Ruptur bei Ovarialgeschwülsten 203.
- Sakralisation, Kreuzschmerzen bei 242.  
 Salbenbehandlung bei Druckgeschwüren 224.  
 — bei Mastdarmgonorrhoe 100.  
 — bei Vaginismus 136.  
 Salpingoophoritis, septische 164.  
 Sandbäder 122, 123.  
 Sarkome des Eierstocks 204.  
 Sauerstoffbäder im Klimakterium 72.  
 Saugglockenbehandlung bei Cervicitis gonorrhoeica 99.  
 Säuretitler der Scheide 139.  
 Seebäder (Meerbäder) 29, 72, 122.  
 Sekretentnahme bei akuter Harnröhrengonorrhoe 90.  
 — aus der Bartholinischen Drüse 91.  
 — aus der Cervix bei Gonorrhoe 91.  
 — bei chronischer Harnröhrengonorrhoe 90.  
 Sekretuntersuchung bei Gonorrhoe 90.  
 Sekundäre Sterilität 174.  
 Selbstmassage bei Obstipation 78, 250.  
 Senffußbäder im Klimakterium 76, 79.  
 Senkungsgeschwindigkeit bei Gonorrhoe 112.  
 — Prüfung der, bei Tubendurchblasung 179.

- Septische Entzündungen, Behandlung der 162.  
 — — der oberen Geschlechtswege 161.  
 — — infolge infizierter Operationswunden 161.  
 Serumtherapie bei Scheidendiphtherie 156.  
 Sexualhormon 8.  
 Sexualschwäche, Strychnin gegen 185.  
 Sitzbäder mit Eichenrinde bei Incontinentia urinae 263.  
 — heiße 16.  
 — — bei Zystitis 257.  
 — bei Hypermenorrhoe 29.  
 — kalte 16, 65.  
 — mit Kamillentee 100, 127, 128.  
 — mit Käsepappel 100, 127.  
 — mit Kleie 100, 127.  
 — lauwarme bei Dysmenorrhoe 37.  
 Skarifikation der Portio bei Amenorrhoe 19.  
 — — — bei Hypermenorrhoe 30.  
 Solbäder 17, 29, 33.  
 — bei Fluor 149.  
 — im Hause 118.  
 — in Kurorten 118, 120.  
 Solsitzbäder 29.  
 Solsitz- (Voll-) Bäder bei Fluor 150.  
 Sondierung des Cavum uteri bei Amenorrhoe 19.  
 — des Halskanals bei Dysmenorrhoe 42.  
 Soor der Vagina 155.  
 Spasmen bei Enteroptose 214.  
 Spasmolytica bei Endometriosis 36 ff., 207.  
 Spina bifida occulta als Ursache des Descensus und Prolapsus 228.  
 Spitze Kondylome, Ätzbehandlung der 97.  
 — — chirurgische Behandlung der 97.  
 — — Radiumbehandlung der 98.  
 — — Röntgenbehandlung der 98.  
 Spitzwinkelige Anteflexion des Corpus, Suspension des Uterus bei 183.  
 Spondylarthritis, Kreuzschmerzen bei 243.  
 Spondylolisthesis, Kreuzschmerzen bei 243.  
 Sport bei Dysmenorrhoe 32.  
 — bei Enteroptose 213.  
 Spülapparat nach JOACHIMOVITS und SCHWARZ 98.  
 Spülbehandlung bei Erosion 159.  
 — bei Fluor vaginalis 144.  
 — bei Kolpitis simplex 152.  
 — bei Mastdarmgonorrhoe 100.  
 Spülbirnen nach HASSE, PINKUS 16.  
 Spülung des Cavum uteri mit Formalinlösung 183.  
 Spülungen, eiskalte 53.  
 Spumantherapie bei Fluor vaginalis 147.  
 Submuköse Myome 63.  
 Sudabad bei Endometriosis 207.  
 — bei Pruritus vulvae (s. auch Enterocleaner) 132.  
 Supravaginale Amputation des Uterus bei Folgezuständen nach Gonorrhoe 112.  
 — — — — bei Metropathia juvenilis 57.  
 Suspension, operative, des Uterus bei Dysmenorrhoe 36.  
 — des Uterus bei spitzwinkeliger Anteflexion des Corpus 183.  
 Sympathektomie der Art. hypogastrica 133.  
 Sympaticusausschaltung nach DOPPLER 84, 133.  
 Symptomatische Behandlung der akuten inneren Gonorrhoe 104.  
 — — der Dysmenorrhoe 36.  
 — — der Endometritis 162.  
 — — der Leukoplakia vulvae 134.  
 — — inoperabler Ovarialgeschwülste 203.  
 — — der Urämie 202.  
 — — des inoperablen Uteruskarzinoms 201.  
 — Therapie bei Pruritus vulvae 130.  
 Schalenpessar bei Prolapsus uteri 233.  
 SCHAUTASche (erweiterte vaginale) Karzinomoperation 195.  
 Scheidenbildung, künstliche nach SCHUBERT, nach KIRSCHNER-WAGNER 157, 182.  
 Scheidendiphtherie 156.  
 Scheidenheizlampen 18.  
 Scheidenspiegel nach GUTHMANN 16.

- Scheidenspülungen, heiße, bei Amenorrhoe 16.  
 — — bei Metropathie 53.  
 — — bei Metrorrhagien 60.  
 — mit Mutterlauge (mit Steinsalz) bei Endometritis 164.  
 — mit Opiumtinktur bei Peritonitis 166.  
 — bei Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum 101.  
 Scheidenstenosen und Atresien nach Kolpitis 156.  
 Scheidentamponade bei Metropathie 53.  
 SCHEPELMANNSche Operation bei Fett-Hängebauch 215.  
 Schilddrüse, Unterwertigkeit der, bei Metropathie 51.  
 Schilddrüsenbehandlung bei Enteroptose und Fettsucht 211.  
 Schilddrüsenbestrahlung bei Pruritus vulvae 133.  
 Schilddrüsentherapie bei Fluor vaginalis 149.  
 — im Klimakterium 80.  
 — bei Pruritus vulvae 132.  
 Schlaflosigkeit im Klimakterium 79.  
 Schlafmittel bei Pruritus vulvae; Rp. 108, S. 133.  
 Schmierseifenkur bei Tuberkulose des Peritoneums 174.  
 SCHRÖDER-EMMETSche Operation bei Erosion 160.  
 SCHUBERTSche Operation 157, 182.  
 SCHULTZEScher Probetampon bei Fluor 141.  
 Schwangerschafts- und Wochenbettprophylaxe bei Enteroptose 209.  
 Schwebende Pein 208.  
 Schwedische Gymnastik bei Fluor 149, 150.  
 — — nach MENSENDIECK 78.  
 Schweiß im Klimakterium 78, 79.  
 — — — spirituöse Flüssigkeiten bei 78.  
 Stäbchenbehandlung der Cervicitis gonorrhoeica 99.  
 — der Urethritis gonorrhoeica 94.  
 Statisch-dynamische Dekompensation 81.  
 — — Kreuzschmerzen bei 240.  
 Steinattacken 265.  
 Steinbildung in den Harnwegen 264.  
 — diätetische Therapie bei 265.  
 — Enterocleaner (Darmbad) bei 265.  
 — Glyzerinkur bei; Rp. 164, S. 266.  
 — Zitronenkur bei 266.  
 Steinextraktion (Urethra, Blase) 266.  
 Steinsalz-Sitzbäder (Solbäder) 17, 29, 118, 164.  
 Steinbildung, Nierenblutung bei 265.  
 — oxalfreie Diät bei 266.  
 — in den Harnwegen, symptomatische Maßnahmen bei 264.  
 Steißbeinschmerz (Coccygodynie) 246.  
 — ATZBERGERScher Mastdarmkühl-schlauch bei 246.  
 — Elektrotherapie bei 246.  
 — Hydrotherapie bei 246.  
 Stellung beim Geschlechtsverkehr bei Sterilität 182.  
 — der Portio im Becken als Sterilitätsursache 177.  
 Sterilität 175.  
 — Abrasio bei 184.  
 — infolge Ascension der Gonorrhoe 88.  
 — Bäderbehandlung bei 184.  
 — Behandlung der 181.  
 — — der Dyspareunie bei 185.  
 — eugenische Beratung bei 185.  
 — FEHLINGSche Röhren bei 183.  
 — Fruktulett von NASSAUER bei 183.  
 — Implantation des Ovariums in den Uterus bei 185.  
 — — der Tuben bei 185.  
 — künstliche Scheidenbildung bei 182.  
 — Laminariastifte bei 183.  
 — ovarielle 181.  
 — physikalische Heilmethoden bei 184.  
 — physiologische des Weibes 186.  
 — primäre 175.  
 — durch Retroflexion 221.  
 — Röntgenographie der Eileiter bei 180.  
 — sekundäre 175.  
 — Unterentwicklung des Genitales, Behandlung der, bei 185.  
 Sterilitätsursachen 175ff.  
 — bei der Frau 176.  
 — beim Mann 176.

- Stichelung der Portio bei Kreuzschmerzen 238.  
 Stieldrehung bei Ovarialgeschwülsten 203.  
 Stoffwechselstörungen im Klimakterium 71.  
 — als Sterilitätsursache 181.  
 — als Ursache der Kolpitis simplex 152.  
 Strahlduschen 78, 251.  
 Strahlenbehandlung bei Gonorrhoe 110.  
 — der Metropathia juvenilis 56.  
 — der Metropathie 46.  
 Strahlenkastration bei Genitaltuberkulose 172.  
 — künstliches Klimakterium durch 83.  
 Stuhlverstopfung, Behandlung der, bei gonorrhöischer Entzündung der Adnexa 105.  
 — habituelle 255.  
 Stützmieder bei Dysmenorrhoe 32.  
 — bei Enteroptose 211.  
 — nach Dr. STEFFECK 212.  
 — nach Warner brothers 212.  
 Tamponade des Uterus bei Metropathie 53.  
 Tampontherapie bei Erosion 159.  
 Technik der Einführung des Pessars bei Retroflexio uteri mobilis 224.  
 — der gynäkologischen Massage 124.  
 — der künstlichen Befruchtung 187.  
 — der Tubendurchblasung 180.  
 Teer- (Schokolade-) Cysten 206.  
 Teilabreibungen bei Metrorrhagien 65.  
 Teil- und Ganzabreibungen bei Dysmenorrhoe 32.  
 Teilwaschungen, kühle bei Metrorrhagien 65.  
 Temporäre Amenorrhoe durch Röntgenbestrahlung 57.  
 — Röntgenkastration bei Metropathia juvenilis 57.  
 Teratome des Eierstocks 204.  
 Thalysiagürtel 212.  
 Therapeutische Tubendurchblasung 180.  
 Therapie der klimakterischen Blutungen 70.  
 Therapie der Myome 191.  
 — der Kolpitis senilis 154.  
 — — — simplex 152.  
 — der Oxyurasis 126.  
 Thermische Sonden 18.  
 THOMAS-Pessar bei Retroflexio uteri mobilis 223.  
 Thrombophlebitis, Behandlung der 166.  
 — Blutegel bei 166.  
 Totalexstirpation des Uterus bei Endometriosis interna 206.  
 — — — bei Folgezuständen nach Gonorrhoe 112.  
 — — — bei Genitaltuberkulose 172.  
 — bei Prolapsus uteri 232.  
 Totalprolaps, Reposition des 235.  
 Tränengangkanüle nach ASCH 96.  
 Trichomonadenvaginitis 155.  
 Tripperspritze nach FRITSCHE 95.  
 — nach NEISSER 95.  
 Trockenbehandlung des Fluor vaginalis 148.  
 Tropfklysmen bei Peritonitis 166.  
 Tubarer Fluor 140.  
 Tubargravidität, Einspritzung von Hypophysenextrakten bei 61.  
 Tubendurchblasung, Embolie durch 180.  
 — Emphysembildung bei 180.  
 — Gefahren der 179.  
 — Genitaltuberkulose als Kontraindikation gegen 179.  
 — günstiger Zeitpunkt zur 179.  
 — Indikationen und Kontraindikationen zur 179.  
 — Prüfung der Senkungsgeschwindigkeit bei 179.  
 — Quecksilberdruck bei 180.  
 — Schmerzhaftigkeit an den Adnexen als Kontraindikation gegen 179.  
 — Schwangerschaft als Kontraindikation gegen die 179.  
 — Technik der 180.  
 — therapeutische 180.  
 — Tubenzerreißung bei 180.  
 — Verdacht auf Eileiterschwangerschaft als Kontraindikation gegen 179.  
 — wiederholte 180.  
 Tubenkarzinom 140.

- Tubenverschluß, Operation bei 184ff.  
 — als Sterilitätsursache 178.  
 Tuberkulose der Adnexa 171.  
 — des Bauchfells 171.  
 — der Harnorgane 262.  
 — der Niere 262.  
 — des Peritoneums 173.  
 — — — exsudative Form der 173.  
 — — — Klimatotherapie bei 174.  
 — — — künstliche Höhensonne bei 174.  
 — — — Laparotomie bei 173.  
 — — — Lebertran bei 174.  
 — — — Liegekur bei 173.  
 — — — medikamentöse Therapie der 173.  
 — — — physikalische Therapie der 173.  
 — — — plastische Form der 173.  
 — — — Punktion bei 173.  
 — — — Röntgenbehandlung bei 173.  
 — — — Schmierseifenkur bei 174.  
 — des Uterus 171.  
 — der Vulva 174.  
 — der Wirbelsäule, Kreuzschmerzen bei 243.  
 Ulcus chronicum vulvae (Esthiomène) 129.  
 — vulvae acutum 128.  
 Ultrasonne nach LANDEKER 151.  
 Ultraviolettbestrahlung bei Fluor 151.  
 Umstimmung des Stoffwechsels bei Fluor 151.  
 Unregelmäßige Blutungen verschiedenen Ursprungs 64.  
 Unterbindung der Art. hypogastrica beim inoperablen Uteruskarzinom 200.  
 Unterentwicklung des Genitales, Behandlung der, bei Sterilität 185.  
 — — — als Sterilitätsursache 181.  
 Unterernährung als Ursache der Enteroptose 210.  
 Unterguß 17.  
 Urämie, symptomatische Behandlung der 202.  
 — Venae sectio bei 202.  
 Uratsteine 264.  
 Ureterensondierung bei Pyelitis 261.  
 Urethritis gonorrhoeica 92.  
 — — Injektionsbehandlung der 94.  
 — — örtliche Behandlung der 94.  
 — — Stäbchenbehandlung der 94.  
 — — Wischverfahren bei 94.  
 — non gonorrhoeica 256.  
 Urinsäuernde Speisen bei Zystitis 258.  
 Ursachen der septischen Adnexentzündungen 164.  
 — der Cervicitis 157.  
 — des Descensus und Prolapsus 228.  
 — der Dysmenorrhoebereitschaft und ihre Behandlung 31.  
 — der nicht puerperalen Endometritis 163.  
 — der Enteroptose 207.  
 — der Erosion 158.  
 — der Kolpitis simplex 152.  
 — der Obstipation 248.  
 — der Zystitis non gonorrhoeica 256.  
 Uterus, Tuberkulose des 171.  
 Uteruskarzinom, diätetische Behandlung des, nach FREUND 204.  
 — Kontrolluntersuchung beim 197.  
 — Körpergewicht beim 197.  
 — Prognose beim 196.  
 — Rezidivgefahr beim 197.  
 — operables 193.  
 — Kolposkopie nach HINSELMANN beim 194.  
 — Kontaktblutungen beim 193.  
 — Lugolpinselung nach SCHILLER beim 194.  
 — Mortalität der Radiumbehandlung beim 194.  
 — Probeexcision beim 193.  
 — Radium-Röntgenbestrahlung beim operablen 194.  
 — inoperables 199.  
 — Auslöffeln und Verschorfen des inoperablen 199.  
 — Gelatineinjektion beim inoperablen 200.  
 — Lebertran beim inoperablen 204.  
 — symptomatische Behandlung des inoperablen 201.  
 — Verätzung des inoperablen 200.  
 Uteruskarzinomoperation, Kontraindikationen gegen die 195.  
 — SCHAUTASCHE (erweiterte vaginale) 195.

- Uteruskarzinomoperation, WERTHEIM-  
 sche (erweiterte abdominale) 196.  
 Uterustonica 51, 65.  
 Uterustuberkulose, Abrasio bei 172.
- Vaginalbestrahlung mit der Quarz-  
 lampe bei Portiotuberkulose 173.  
 Vaginale Applikation der Antiphlo-  
 gistine 115.  
 — Incision im akuten Stadium der  
 inneren Gonorrhoe 103.  
 — Totalexstirpation des Uterus bei  
 Hypermenorrhoe 30.  
 — — — bei Metropathia juveni-  
 lis 57.  
 — — bei Metropathie 48.  
 — — bei Retroflexio uteri fixata 227.
- Vaginalkarzinom 205.  
 Vaginalsekretentnahme bei Gonorrhoe  
 91.
- Vagina septa, mechanisch bedingte  
 Blutungen bei 66.
- Vaginismus 135.  
 — Hypnose bei 137.  
 — operative Behandlung des 136.  
 — psychische Behandlung des 137.
- Vagotonie 33.
- Vakzine, Dosierung der, bei intra-  
 muskulärer Verabreichung 108.  
 — — der, bei Portioinjektionen 108.
- Vakzinetherapie, Allgemeinreaktion  
 bei 108.  
 — bei Arthritis gonorrhoeica 107.  
 — bei Gonorrhoe, Indikationen und  
 Kontraindikationen der 106.  
 — Herdreaktion bei 108.  
 — bei Pyelitis 261.
- Varikokele des Ligamentum latum  
 215.
- Vasalgien im Klimakterium 79.
- Venae sectio bei Urämie 202.
- Vereiterung bei Ovarialgeschwülsten  
 203.
- Verletzungen der äußeren Scham und  
 der Scheide 66.
- Verödung der Hämorrhoiden 217.
- Verspätetes Klimakterium 68.
- Vestibularer (psychogener) Fluor 142.
- Vibrationsmassage bei Incontinentia  
 urinae 263.
- Vibrationsmassage bei Kreuzschmer-  
 zen 238.
- Vollmischvakzine bei Bartholinitis 96.  
 — bei Gonorrhoe 108.
- Vorderlappenhormonbehandlung bei  
 Amenorrhoe 10.
- Vorzeitiges Klimakterium 68.
- Vulvakarzinom 205.
- Vulva, Tuberkulose der 174.
- Vulvektomie bei Craurosis vulvae 135.  
 — bei Leukoplakia vulvae 134.
- Vulvitis 93, 125, 128.
- Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum  
 100 ff.
- Wanderniere, Nephropexie bei 215.
- Wärme bei Amenorrhoe 18.
- Wärmeanwendung bei Adnextumoren  
 115.  
 — bei Endometritis 162.  
 — bei Pelveoperitonitis chronica 115.
- WERTHEIM-SCHAUTASche Interposi-  
 tion bei Prolapsus uteri 231.
- WERTHEIMsche (erweiterte abdomi-  
 nale) Karzinomoperation 196.
- Wochenbett, Frühaufstehen im 210.  
 Wochenbettgymnastik nach WALT-  
 HARD 209.
- Zapfenpessar von ROSENFELD 234.
- Zellulalgie 247.
- Zervikaler Fluor 141.
- Zervixpolypen, Endometritis durch  
 61.
- Zickzackkost nach NOORDEN bei Fluor  
 151.  
 — — bei Pruritus vulvae 132.
- Zyklusstörungen infolge Entzündun-  
 gen des Cavum uteri 61.
- Zyklusverschiebungen infolge Ovarial-  
 schwäche 44.
- Zystitis 93, 256 ff.  
 — Behandlung der 257.  
 — Blasenpülungen bei 259.  
 — heiße Sitzbäder bei 257.  
 — Mehrgläserprobe bei 257.  
 — urinsäuernde Speisen bei 258.  
 — (non gonorrhoeica), Ursachen der  
 256.  
 — tuberculosa 262.
- Zystokelen 266.

## Medikamentenverzeichnis.

- Abasin** 79, 133.  
**Abführmittel** bei Enteroptose 214.  
 — bei Hämorrhoiden 216.  
 — bei Pyelitis; Rp. 159, S. 260.  
 — bei atonischer Obstipation 252, 253.  
 — bei spastischer Obstipation; Rp. 135, 149, 150, S. 214, 254.  
 — salinische 16, 37, 255.  
**Acetonal** 217.  
**Acidum salicylicum** 153.  
**Adalin** 79, 133.  
**Adrenalin** 51, 53, 200.  
**Adrenosan** 51.  
**Afenil** 41, 54.  
**Agarol** 105.  
**Agoleum** 229.  
**Agomensin** 11.  
**Alaun**; Rp. 58, S. 53, 146, 152.  
**Alaun-Bleiwasser**; Rp. 100, S. 127.  
**Albargin** 95.  
**Alkalische Eisenwässer** 56.  
 — Säuerlinge 265.  
**Alkalisch-salinische Quellen** 56, 255.  
**Alkalithérapie**; Rp. 158, S. 259.  
 — bei Pyelitis 261.  
**Alkohol** 217.  
**Aloe** 12.  
**Alumnosalbe** 100.  
**Amasiratee** 36.  
**Ameisensaure Tonerde (Ormizet)** 145.
- Aloe-Eisenpillen**; Rp. 1, S. 12.  
**Amidopyrin**; Rp. 39, S. 38.  
**Amphotropin** 261.  
**Analgetica**; Rp. 35—39, S. 38.  
**Amylnitrit** 76.  
**Anästhesinsalbe** 136.  
**Antidolorosa**; Rp. 35 bis 39, S. 38, 78, 169.  
**Antineuralgica**; Rp. 35 bis 39, S. 38, 78, 81.  
**Antiphlebin** 217.  
**Antiphlogistine** 115.  
**Antipyrin** 38, 201, 202.  
**Antipyrinklysmen** 105, 166, 258.  
**Antispasmodica** 39 ff., 254.  
**Anusol** 217.  
**Aolan** 61.  
**Apiol** 12.  
**Aqua carminativa** 78, 214.  
 — chlorata 202.  
 — chloroformiata 202.  
 — petroselina 174.  
**Argentamin** 95.  
**Argentum-nitricum** 95, 99, 100, 102.  
**Argentum-nitricum-Salbe** 100, 157, 218.  
**Arsamon** 14.  
**Arsen** 13, 32, 174.  
**Arsendauerkuren** 14.  
**Arsen-Feometten** 14.  
**Arsen-Ferraeductin** 14.  
**Arsen-Ferratin** 14.  
**Arsenquellen** 33.
- Arsen-Triferrintabletten** 14.  
**Arsoferrintektolettes** 14.  
**Arthigon** 91, 110, 113.  
**Artin** 214, 255.  
**Aspirin** 38, 201, 248.  
**Atochinolsalbe** 245.  
**Atophan** 81.  
**Atropapaverintabletten** 40, 255.  
**Atropin** 33, Rp. 47, S. 39, 149, 158, 244, 255.
- Bacillosantabletten** 144, 147, 153.  
**Baldriandispert** 37.  
**Baldriantee** 37, 75.  
**Balsamica**; Rp. 79—81, S. 92.  
**Bärentraubentee**; Rp. 78, S. 92.  
**Belladonna**; Rp. 82, 83, 96, S. 93, 104, 201, 262  
 — mit Codein; Rp. 97, S. 104.  
**Belladonna-Excludzäpfchen** 105.  
**Belladonna-Regulin** 214.  
**Belladonnasalbe**; Rp. 162, S. 264.  
**Bellafolin** 75, 105.  
**Bitterwässer** 78, 255.  
**Blaudische Pillen**; Rp. 4, S. 13.  
**Bleiwasser**; Rp. 85, S. 94, 127, 162.  
**Blenovakzine** 108.

- Blutstillende Teesorten; Rp. 64, 65, 66, S. 55.  
 Blutstillung bei Hämorrhoiden; Rp. 140, 141, S. 217, 218.  
 Bolus mit Jod 148.  
 — mit Perubalsam 148.  
 — mit Vasenolpuder 148.  
 Borax 127.  
 Borax-Glycerin; Rp. 120, S. 156.  
 Borsäure; Rp. 86, 114, S. 94, 145, 155.  
 Bortannin 200.  
 Brennesseltinktur Rp. 31, S. 27.  
 Brom-Calcium; Rp. 68, S. 74.  
 Bromocollsalbe 132.  
 Bruchkrauttee; Rp. 77, S. 92.  
 Butolan 126.  
 Calcantabletten 54.  
 Calcium; Rp. 60, S. 54, 110.  
 — chloratum crystallisatum; Rp. 61, S. 54.  
 — Ampullen; Rp. 62, 63, S. 54.  
 Calcium-Clavipurin 54.  
 Calcium EGGER 54.  
 Calcium-Gluconat 54, 167.  
 Calcium-lacticum-Tabletten 54.  
 Calcium SANDOZ 54.  
 Calmedtabletten 54.  
 Calomel 106.  
 Canatbatabletten 147.  
 Carbolwasser; Rp. 109, S. 133.  
 Casein 162.  
 Caseosan 61.  
 Castoreum-Bromid 76.  
 Cardiazol-Chinindragees 162.  
 Cehasol 160.  
 Chinawein 211.  
 Chinin 162.  
 Chininlösung nach WILLE; Rp. 125, S. 162.  
 Chlorcalcium 79.  
 Chlorzink; Rp. 110, S. 144, 47, 99, 146, 152, 200.  
 Chlorzinkstäbchen; Rp. 130, S. 201.  
 Cholevalstäbchen 99.  
 Chologentabletten 106.  
 Cibalgin 39, 201.  
 Cineol nach JOACHIMOVITS; Rp. 95, S. 99.  
 Citrofin 151.  
 Clauden 53.  
 Clavipurin 52.  
 Coagulen 53.  
 Cocainsalbe 136, 218.  
 Cocain-Zäpfchen Rp. 147, S. 246.  
 Codein; Rp. 98, S. 104, 201.  
 Codein-Amidopyrin 201.  
 Codein-Migränin 201.  
 Collargol 166.  
 Compral 39, 201.  
 Compnett. Kola cum Lecithino 14.  
 Cornutum - Ergoticum - Bombelon-Tabletten 25.  
 Corpus-luteum-Hormon 8, 50.  
 Cotarnin 27, 65.  
 Cristolax 254.  
 Cuprum sulfuricum 95; Rp. 111, S. 144.  
 Cyotropin 259.  
 Cystopurin 258.  
 Decorpa 80.  
 Dermatol 97, 128.  
 Desitinsalbe 66.  
 Detoxin 166.  
 Devegan 132, 147, 156.  
 Diodid 37, 201.  
 Digipurat 169.  
 Digitalis mit Secale; Rp. 67, S. 65.  
 Dilaudid 37, 201.  
 Dionin 201.  
 Diphtherieheilserum 156.  
 Ditonal-Stuhlzäpfchen 39.  
 Diuretica Rp. 133, S. 204.  
 Dormalgin 201.  
 Eatan 211.  
 Eichenrindenbäder 94, 128.  
 Eierstocksextrakte (s. Ovarialauszüge) 8 ff.  
 Eisen 174.  
 Eisen-Arsen-Calciumpillen nach JASCHKE; Rp. 69, S. 74.  
 Eisenpräparate, 13 ff., 52.  
 Eiweißpräparate 41.  
 Elektrargol 166.  
 Elityran 15, 51, 80, 81.  
 Emenagoga 12.  
 Ergostabil; Rp. 16, S. 25, 52.  
 Ergotamin (Gynergen) 74.  
 Ergotin 62.  
 Ergotin-Chinin-Calcium-Pillen; Rp. 22, S. 25.  
 Ergotinklysma; Rp. 24, S. 26.  
 Ergotin-MERCK-Neu 25, 52.  
 Ergotinpillen; Rp. 21, S. 25.  
 Erucadinsalbe 245.  
 Essigsäure Tonerde; Rp. 84, S. 94, 145, 162.  
 Eucain-B; Rp. 139, S. 217.  
 Eucain-Kochsalzlösung (parasakrale Injektion); Rp. 144, S. 246.  
 Eucarbontabletten 78, 214.  
 Eucodal 78, Rp. 163, S. 265.  
 Eukliman 82.  
 Eumenol 40.  
 Eupaco 105, 262.  
 Eupaverin 262, 265.  
 Eutirsol 153, 160.  
 Evipan 79.

- Extractum Belladonnae**; Rp. 42—45, S. 39.  
 — **Cascarae sagradae** 253.  
 — **Cornutinum ergoticum Bombelon** 25, 52.  
 — **Gossypii**; Rp. 29, S. 27.  
 — **Hippocastani fluid.** 78.  
 — **Hydrastid. fluid.**; Rp. 25—30, S. 26, 27, 65.  
 — **Secal. cornut. fluid.**; Rp. 17, 18, S. 25.  
 — **Viburni prunifolii fluidum**; Rp. 50, S. 40.  
**Feigensirup Califig** 253.  
**Ferratin**; Rp. 13, S. 14.  
**Ferronovin** 14.  
**Ferrovarialtabletten** 14, 41.  
**Ferrum carbonicum saccharatum**; Rp. 7, S. 13, 53, S. 51.  
 — **dialysatum**; Rp. 6, S. 13.  
 — **lacticum**; Rp. 8, S. 13.  
 — **reductum**; Rp. 5, 9, 12, S. 13, 14.  
**Fissanpaste** 198.  
**Fliedertee** 36.  
**Folia Sennae**; Rp. 15, S. 16, 254.  
**Folipex** 10, 11.  
**Follikulin-Menformon** 10, 82.  
**Formaldehyd. solutum** 146.  
**Formalin** 99, 102, 145, 152.  
**Franzbranntwein** 37.  
**Franzensbader Moorlauge** 150.  
**Gardan** 39, 133, 201.  
**Gelatineinjektion**, 54, 200.  
**Gelatineklyisma** 55, 200.  
**Gelonida antineuralgica** 39, 105, 210.  
**Glaubersalz** 78.  
**Glaubersalzquellen** 17.  
**Glyzerin** 159, 252.  
**Glyzerin-Ichthyol-Tampons** 238.  
**Glyzerinkur** (Steinkrankheit); Rp. 164, S. 266.  
**Glyzerinstuhlzäpfchen**; Rp. 147, S. 252.  
**Glyzerintampons** 238.  
**Gold** 174.  
**Gonargin** 110.  
**Gonokokkenvakzine, polyvalente, von MERCK** 110.  
**Gonostyli Albargini** 96.  
**Gonoyatren** 110.  
**Granugenol** 153, 155.  
**Gravitol** 28.  
**Gynechlorina (Chloramin)** 145.  
**Gynergen** 28, 52, 79.  
**Hädensasalbe** 217.  
**Hämorrhoidalsalbe**; Rp. 137, 139, S. 217.  
**Hämorrhoidal-Stuhlzäpfchen**; Rp. 138, S. 217.  
**Haemostyptica** 24, 49 ff.  
**Harnsäurende Medikamente**; Rp. 155, 156, S. 258.  
**Harnstoff**; Rp. 127, S. 174, 204.  
**Hellsikolsirup** 14, 211.  
**Helminal** 126.  
**Heroin** 37, 105.  
**Hexal** 92.  
**Hexamethylentetramin** 92, 258.  
**Hirtentäschelkraut** 27, 55.  
**Hogival** 10, 82.  
**Holzessig**; Rp. 121, 122, S. 159.  
**Hosal** 151.  
**Hovaletten** 76, 133.  
**Hygiama** 211.  
**Hypermangan** 93, 146.  
**Hypophysin** 51.  
 — **forte** 265.  
**Ichthargan** 95.  
**Ichthyoglobuli**; Rp. 119, S. 154.  
 — **mit Antipyrin** 154.  
 — **mit Pyramidon** 154.  
**Ichthyolglyzerin**; Rp. 89, S. 96, 99.  
**Ichthyolsalbe** 245, 248.  
**Ichthyolscheidenkugeln** 244.  
**Indigo**; Rp. 3, S. 12.  
**Inkretan** 80, 81.  
**Intestilax** 214.  
**Intestinalin** 78.  
**Isacen** 253.  
**Isophenal** 84.  
**Isticintabletten (Bonbons)** 253.  
**Jodglyzerin (Tamponbehandlung)**; Rp. 123, S. 160.  
**Jodhaltige Quellen** 18, 119.  
**Jodkalium (innerlich)**; Rp. 54, S. 51.  
**Jodkalium (Lugol, Scheidenspülung)**; Rp. 126, S. 164.  
**Jodoform** 128.  
**Jodtinktur** 48, 102, 144, 152, 202.  
**Jodtropaletten** 41.  
**Jodvasogen** 102.  
**Juckspiritus nach UNNA**; Rp. 76, S. 79.  
**Kalium hypermanganicum**; Rp. 2, S. 12, 100, 201.  
**Kalium jodatum (Scheidenspülung)**; Rp. 123, S. 160.  
**Kalk** 33, 54, 150, 259.  
**Kamillenbäder** 94.  
**Kamillentee** 98, 145, 155.  
**Kampfersäure** 78.

- Karbolseife 130, 131.  
 Karlsbadersalz 37, 78, 255.  
 Käspappelbäder 94.  
 Kastanienextrakt 78.  
 Kataplasmen mit Leinsamen 169, 257.  
 Kirschlorbeerwasser 201.  
 Klimakton (Klimakterin) 82.  
 Klimasan 75.  
 Klimova 82.  
 Knoblauchklistiere 126.  
 Knöterich 55.  
 Kochgelatine 55.  
 Kochsalzlösung 145.  
 Kohlensaure Stahlbäder 149.  
 Kölnischwasser 145.  
 Kongorot; Rp. 55, S. 52, 60.  
 Kupferspülungen 155.  
 Kupfersulfat; Rp. 111, S. 144, 146.
- Lacteolkugeln 153.  
 LAHMSche Scheidenkugeln; Rp. 117, S. 153.  
 Lanoline 198.  
 Lapissalbe 66.  
 LASSARSche Paste 154.  
 Laxativum-vegetabile-Kompressen 254.  
 Lebertran 53, 150.  
 Lecicarbonzäpfchen nach GLÄSSNER 254.  
 Lenicet (Bolus, Puder) 127, 148, 152.  
 LEUBESches Pulver bei Flatulenz und Sodbrennen; Rp. 151, S. 255.  
 Lindenblütentee 92.  
 Lipolysin 211.  
 Liquidrast 26.  
 Liquor Burowi 93 ff.  
 — ferri sesquichlorati 47, 200.
- Liquor Kalii acetici; Rp. 133, S. 204.  
 — Kal. arsenicos.; Rp. 10, 11, S. 13.  
 Lithionwasser 265.  
 Luminal 133.  
 Luminaletten 79.  
 Luminal mit Theobromin; Rp. 75, S. 79.  
 Luteogan 50, 51.  
 Luteoglandol 50.  
 Luteolipex 50.  
 Luteototal 50.  
 Lutophorin 50.  
 Lysoform 145.  
 Lysol 93, 145.
- Magnesia usta 266.  
 Magnesiumperhydrol 214.  
 Magnobrol 132.  
 Malven 155.  
 MARBURGpulver; Rp. 131, S. 201, 202.  
 Massa pil. Ruffii 12.  
 Mecessan 82.  
 Mesotanvaseline 37, Rp. 106, S. 131, 245.  
 Metrostyp 26.  
 Metyrintabletten 41.  
 Migränin 201, 202.  
 Migränpulver; Rp. 38, 39, 41, S. 38.  
 Milch pro injektionen 61.  
 Milchsäure 144.  
 — konzentrierte 97.  
 Milchsäurelösung; Rp. 116, S. 146.  
 Milchsäurespuman 147.  
 Milchzucker 253.  
 Mischvakzine 167.  
 Mitilax 254.  
 Modiscop-„Stark“ 201.  
 Moorextrakte 121.  
 Moorlaugen 121.  
 Moorlauge, Franzensbader 150.  
 Moorsalze 121, 150.  
 Morphin 37, 105, 201.  
 Morphin-Eumidrin; Rp. 132, S. 202.
- Mutterkorn 25.  
 Mutterlaugen 118.
- Nährpräparate 14, 32, 211.  
 Naphthalanzinksalbe 131.  
 Natrium arsenicosum 14.  
 Natrium-Bicarbonat 99, 261, 265.  
 Natrium citricum 261.  
 — kakodylicum 14.  
 — sulfuricum 16, 37.  
 Neocratin 39, 201.  
 Nervina 201.  
 Nitroglycerin; Rp. 73, S. 76.  
 Niveacreme 198.  
 Normacol 254.  
 Normolaktol 146, 152.  
 Normosal 169.  
 Novarial 9, 10, 82.  
 — „Stark“ 9, 82.  
 Novatropin; Rp. 49, S. 40, 255.  
 Novojodin-Emulsion; Rp. 160, S. 262.  
 Novurit 174.  
 Nujol 105, 254.
- Oktin 40.  
 Oleum arachidis (Erdnußöl) 252.  
 — olivarum 252.  
 — sesami 252.  
 Omnadin 162, 167.  
 Onuclex 82.\*)  
 Ophorin 9, 10.  
 Opiate 168.  
 Opium 37, 105.  
 Oprotex 82.\*)  
 Optalidon 105.  
 Optarson 14.  
 Orasthin 51.  
 Organ-Trockenpräparate 8.  
 Orthoformsalbe 218.  
 Ovanorm 9, 10.  
 Ovaradentriferrintabletten 41.

\*) Mittlerweile aus dem Handel gezogen.

- Ovarialauszüge (s. Ex-  
trakte des Eier-  
stocks) 8 ff..
- Ovarial- und Hypophy-  
senpräparate 41.
- Ovarialpräparate 82,  
132, 263.
- standardisierte 82.
- Ovaria siccata 82.
- Ovarium-Panhormon  
10.
- Ovobrol 79.
- Ovomaltine 211.
- Ovosan 9, 10, 82.
- Ovosanzäpfchen 11.
- Ovosedicyl 82.
- Ovotransannon 82.
- Ovowop 9, 10, 82.
- Panhormon 9.
- Pantocainsalbe 132.
- Pantopon 105, 201, 262.
- Papaverin; Rp. 48, 70,  
S. 40, 75, 78, 168,  
262.
- mit Belladonna; Rp.  
96, S. 104.
- Papaverinsuppositorien  
166.
- Paraffin 214.
- Paraffinal 105, 214, 254.
- Paraffinpräparate 255.
- Paraffinum aromati-  
cum 105.
- liquidum 105, 216,  
254.
- Paraffinfluid 105, 254.
- Partagonstäbchen 99.
- Pasta Palm 253.
- Pastill. hydrorargyr.  
oxycyanat. 93.
- Pellidolsalbe 66, 157.
- Percainalsalbe 132, 136,  
217.
- Percainsalbe 136.
- Peristaltin 253.
- Peritonitisserum 165.
- Perlitan 10.
- Pfefferminztee 36.
- Pferdeserum 55.
- Phanodorm 79.
- Phenacodin 202.
- Phenacodin 201.
- Phenolpinselung nach  
DOPPLER 84, 133.
- Phenylum-salicylicum  
93, 258.
- Phosphorlebertran; Rp.  
52, S. 41.
- Phosphorsäure 258.
- Phosvitanon 14, 211.
- Physormon 51.
- Pillulae aloeticæ fer-  
ratae Rp. 1, S. 13.
- Pituglandol 51.
- Pituigan 51.
- Pituisan 51.
- Pituitrin 15, 16, 51, 169,  
261.
- Plasmon 211.
- Polyhormon fem. 82.
- Polyneurinsalbe 245.
- Präpitan 10, 132.
- Präzipitatsalbe; Rp.  
136, S. 216.
- REGELSche Jodlösung  
259.
- Preloban 15, 132.
- Progynon 10, 82.
- Prokliman 82.
- Prolan 10.
- Proluton 50.
- Promonta 211.
- Proossa 150.
- Protargol 98, 99, 100,  
102.
- Protargolglyzerin 95,  
Rp. 94, S. 99.
- Protargolstäbchen 96,  
99.
- Protargolvaseline 100.
- Proteinkörperpräparate  
60, 61.
- Puder gegen Juckreiz;  
Rp. 99, S. 127.
- Pulpa tamarind. depur.  
253.
- Pulvis liquiritiæ com-  
positus 216, 254.
- magnesiæ cum Rheo  
216, 253.
- radiciis Rhei; Rp.  
148, S. 253.
- Purgiolax 105.
- Pyoktanin 155.
- Pyramidon 38, 201, 244.
- Pyramidon-Medinal-  
zäpfchen; Rp. 108;  
S. 133.
- Pyridium 93.
- Quecksilberpräzipitat  
131.
- Quecksilbersalbe 174.
- Radium-Trinkkuren 81.
- Radix Gossypii 36.
- Rauchende Salpeter-  
säure 97.
- Recresal 211.
- Regulin 214.
- Reiherschnabel 55.
- Resorbentien 174.
- Resorcin; Rp. 91, S. 97,  
127.
- Reviten nach HOLZ-  
BACH 166.
- Rheumafluid 245.
- Rheumasan 245.
- Rheum-compositum-  
Kompressen 216.
- Rheumpräparate 216.
- Rigalit 105.
- Ringerlösung 169.
- Rivanol 259.
- Robural 211.
- Ruhrwurz 55.
- Sabina; Rp. 90, S. 97.
- Salbeitee 98, 145.
- Salben bei Pruritus vul-  
væ; Rp. 101—107,  
S. 131.
- Salbe nach WINTZ bei  
Röntgenbestrahlten;  
Rp. 129, S. 198.
- Salhumin 121, 150.
- Salinische Abführmit-  
tel 16, 29, 65, 78,  
105, 255.
- kombiniert mit  
Rheum; Rp. 148, S.  
253.
- Salipyrin 201.
- Salitereme 245.
- Salitöl 245.

- Salizylpräparate 81, 168.  
 Salizylsäure 155.  
 — mit und ohne Resorcin; Rp. 112, 113, S. 145.  
 Salizylsäurespuman 147.  
 Salizyltalk 132.  
 Salizylvasogene 248.  
 Salol 93, Rp. 153, 157, S. 258.  
 Salpetersaures Silber 259.  
 Salysatum 79.  
 Salyrgan 174.  
 Salzsäure 258.  
 Salzsäure-Pepsin bei Eisenmedikation; Rp. 57, S. 53.  
 Sanatogen 211.  
 Saridon 105.  
 Secacornintabletten 25, 52.  
 Secale cornut. pulv. Rp. 19, 20, 21, S. 25  
 Secaleexcludzäpfchen 26.  
 Secalepulver; Rp. 19, 20, S. 25.  
 Secalezäpfchen; Rp. 23, S. 26.  
 Secalysatum 52.  
 Secamintabletten 25.  
 Secointabletten 25.  
 Sedicyl 82.  
 Sedormid 79, 133.  
 Seidlitzpulver 78.  
 Seifenspiritus 16.  
 Senfmehl zu Fußbädern 76.  
 Silbersalbe; Rp. 142, S. 224.  
 Sistomensin 50.  
 Solarson 14.  
 Solbadewürfel 150.  
 Sole 118.  
 Solquellen 118.  
 Solutio arsenical. Fowleri; Rp. 10, 11, S. 13, 74.  
 Somatose 211.  
 Somnacetin 133.  
 Spasmolytica 38ff., 75, 93, 104, 169.  
 Spasmyl 37.  
 Species gynecologicae MARTIN; Rp. 74, S. 77.  
 — nervinae; Rp. 71, S. 75.  
 Speisesoda 145, 252.  
 Spirosal 245.  
 Spülmittel bei Cervicitis gonorrhoeica; Rp. 92, 93, S. 98.  
 — bei Flour vaginalis 144 ff.  
 Sublimat 145, 155.  
 Scharlachrotsalbe 157.  
 Scheidenkugeln nach STRASSMANN; Rp. 143, S. 244.  
 Scheidenspülmittel nach WILLE; Rp. 118, S. 153.  
 Schlafmittel 79, 133.  
 Schmierseife 252.  
 Schwefelinjektionen 81.  
 Schwefelpräparate 216.  
 Schwefelsaures Kupfer 152.  
 Schwefeltrinkkuren 255.  
 Stahlbäder, kohlen-saure 17, 72.  
 Steinsalz, rohes 150.  
 St. Germaintee 254.  
 Stomachica; Rp. 134, S. 211.  
 Strychnin Rp. 128, S. 185.  
 Stryphnon 52, 53.  
 Styli Spuman 96.  
 Styptica, pflanzliche 55.  
 Stypticin 27, 51.  
 Styptisatum 27.  
 Styptogentabletten 27.  
 Styptol 27.  
 — pulveris.; Rp. 32, S. 27.  
 Styptural 27, 65.  
 Talkumpuder 152.  
 Tamarinden 253.  
 Tampospuman 53.  
 — Tabletten 60, 164.  
 — Styli 53, 100.  
 Tampospumantabletten 53.  
 Tampovagan-Cervixstäbchen mit Acidum lacticum 158.  
 Tampovagankugeln 153.  
 Tannin; Rp. 59, 115, S. 53, 146, 159, 162.  
 Tannin-Borglyzerin 200.  
 Tanninglyzerin 99 (Tampontbehandlung) Rp. 124, S. 160.  
 Targesinzäpfchen 100.  
 Teerseife 131.  
 Tenosin 27.  
 Terpichin 167.  
 Thelygan 12, 82, 186.  
 Thelygan-Antepan 12, 82.  
 Theobromin 174.  
 Theocinum natrio-aceticum; Rp. 14, S. 15.  
 Thigenol-Tampons 159, 238  
 Thiopinol 153.  
 Thiosept 153, 160.  
 Thymol 202.  
 Thyreoidin 15, 51.  
 Tierkohle 78, 214.  
 Tinctura Amara 211.  
 — aromatica 211.  
 — Cantharidum 186.  
 — Chinae 211.  
 — Ferri ATHENSTAEDT 14.  
 — Haemostyptica DENZEL 25.  
 — Pulsatillae; Rp. 40, S. 38.  
 — Strychni; Rp. 34, S. 37.  
 — Valerianae; Rp. 33, S. 37.  
 Titretta analgica 201.  
 Tonephin 261.  
 Tonika 211.  
 Tonicum Roche 14, 211.  
 Transargan 95.  
 Transarganstäbchen 99.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p>TRÜPELSche Tabletten<br/>39, 105, 201.<br/>Trigemin; Rp. 46, S. 39.<br/>Trinkkuren 17, 33, 56,<br/>81, 149.<br/>Troparin-Fortetabletten<br/>40.<br/>Trypaflavin 166, 259.<br/>Tumenol 131.<br/>Tumenol-Ammonium-<br/>salbe 132.<br/>Tutofusin 166.<br/>Tutocain 132.</p> <p>Unden 10, 82.<br/>Urethralstäbchen nach<br/>ASCH; Rp. 88, S. 96.<br/>Uricedin 266.<br/>Uromed 93, 258.<br/>Urotropin-Salol; Rp.<br/>157, S. 258.<br/>Uzara 40.</p> | <p>Valeriana 75, 133.<br/>— und Tinctura Casto-<br/>rei; Rp. 72, S. 75.<br/>Valydol 37.<br/>Valyl 37.<br/>Vaseline 198.<br/>Vasenolpuder 127, 152.<br/>Vegetabilische Abführ-<br/>pastillen 254.<br/>Veramontabletten 38,<br/>105, 201.<br/>Veratrin-Chloroform-<br/>Einreibung Rp. 145,<br/>S. 246.<br/>Vigantol 53, 150.<br/>Vitrisolemulsion 131.<br/>Vollmischvakzine 109.<br/>Vucinvaseline 156.</p> <p>Wasserpfeffer 55.<br/>Wasserstoffsperoxyd<br/>113, 162, 202.</p> | <p>Weinsteinpräparate 78.<br/>Wildbäder (Akrato-<br/>thermen) 72, 81, 120.</p> <p>Xeroformpuder 128.</p> <p>Yatren-Casein<br/>„schwach“ 167.<br/>— „stark“ 167.<br/>Yatren-105-Pillen 132,<br/>156.<br/>Yatrenpuder 132.<br/>Yohimbin; Rp. 51, S.<br/>41, 186.</p> <p>Zinkoxydalkumpuder;<br/>Rp. 87, S. 94, 128.<br/>Zinkpaste 131, 154, 198.<br/>Zinksulfat 146, 152.<br/>Zinnkraut 55.<br/>Zymoidin 217.</p> |
|---|---|---|
-

**Manzsche Buchdruckerei, Wien IX.**

**Handbuch der Gynäkologie.** Dritte, völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage des Handbuches der Gynäkologie von J. Veit. Herausgegeben von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. W. Stoeckel, Berlin. In 10 Bänden. *Die Bände sind einzeln käuflich; jedoch verpflichtet die Abnahme eines Teilbandes zur Abnahme des ganzen Bandes.*

Bisher sind erschienen:

- I. Band. 1. Hälfte: **Anatomie und topographische Anatomie, Entwicklungsgeschichte und Bildungsfehler der weiblichen Genitalien.** Bearbeitet von K. Menge-Heidelberg, J. W. Müller-Barmen, K. J. von Oettingen-Heidelberg, A. Spuler-Erlangen, J. Tandler-Wien. Mit 239 z. T. farb. Abbildungen. XII, 723 Seiten. 1930. RM 98.—; gebunden RM 106.80\*
2. Hälfte: **Der mensuelle Genitalzyklus des Weibes und seine Störungen.** Bearbeitet von R. Schröder-Kiel. Mit 193 teils farb. Abbildungen. XII, 551 Seiten. 1928. RM 62.50; gebunden RM 69.50\*
- II. Band: **Hygiene und Diätetik der Frau.** Von H. Sellheim-Leipzig. **Die Grundlagen der Vererbungslehre.** Von J. Meisenheimer-Leipzig. Mit 265 Abbildungen. VII, 487 Seiten. 1926. RM 39.—; gebunden RM 45.—\*
- III. Band: **Sterilität und Sterilisation. Bedeutung der Konstitution für die Frauenheilkunde.** Bearbeitet von F. Engelmann-Dortmund und A. Mayer-Tübingen. Mit 302 teils farb. Abb. XII, 879 Seiten. 1927. RM 75.—; gebunden RM 82.50\*
- IV. Band. 1. Hälfte: **Die physikalische Therapie in der Gynäkologie.** Bearbeitet von A. Laqueur-Berlin, W. Rump-Erlangen, H. Wintz-Erlangen. Mit 272 Abbildungen. X, 476 Seiten. 1930. RM 69.—; gebunden RM 77.—\*
2. Hälfte: **Klinik der gynäkologischen Röntgentherapie.** 1. Teil: **Die Behandlung der gutartigen Erkrankungen.** Bearbeitet von H. Wintz und F. Wittenbeck, Erlangen. Mit 105 Abbildungen. X, 714 Seiten. 1933. RM 108.—; gebunden RM 117.—
- V. Band. 1. Hälfte: **Die Vulva und ihre Erkrankungen, Lage und Bewegungsanomalien des weiblichen Genitalapparates.** Bearbeitet von E. Kehrer-Marburg und Rud. Th. von Jaschke-Gießen. Mit 469 z. T. farb. Abbildungen. XII, 1041 Seiten. 1929. RM 138.—; gebunden RM 146.—\*
2. Hälfte: **Die Erkrankungen der Scheide.** Bearbeitet von L. Nürnberger-Halle a. S. Mit 271 z. T. farb. Abbildungen. XII, 788 Seiten. 1930. RM 118.—; gebunden RM 127.—\*
- VI. Band. 1. Hälfte: **Anatomie und Diagnostik der Carcinome, der Bindegewebsgeschwülste und Mischgeschwülste des Uterus, der Blasenmole und des Chorionepithelioma malignum.** Bearbeitet von O. von Franqué-Bonn, H. Hinselmann-Altona, R. Meyer-Berlin. Mit 698 z. T. farb. Abbildungen. XVI, 1167 Seiten. 1930. RM 168.—; gebunden RM 176.80\*
2. Hälfte: **Die Klinik der Uterus-Tumoren.** Bearbeitet von P. Esch-Münster i. W., H. Martius-Göttingen, O. Pankow-Freiburg i. Br., H. v. Peham†-Wien, L. Schönholz-Köln. Mit 160 z. T. farb. Abbildungen. X, 838 Seiten. 1931. RM 139.—; gebunden RM 148.—
- VII. Band: **Die Erkrankungen der Eierstöcke und Nebeneierstöcke und die Geschwülste der Eileiter.** Bearbeitet von F. Kermauner†-Wien und L. Nürnberger-Halle a. S. Mit 472 z. T. farb. Abbildungen. XI, 1014 Seiten. 1932. RM 180.—; gebunden RM 189.—
- VIII. Band. 1. Teil: **Bauchfellentzündung. Genitaltuberkulose. Krankheiten des Beckenbindegewebes.** Bearbeitet von R. Freunder-Berlin, Th. Heynemann-Hamburg, G. Linzenmeier-Karlsruhe i. B. Mit 128 z. T. farb. Abbildungen. IX, 761 Seiten. 1933. RM 136.—; gebunden RM 144.—
2. Teil: **Die akuten und chronischen Infektionen der Genitalorgane mit Ausnahme der Tuberkulose und Gonorrhöe.** Von C. Bucura-Wien. Mit 65 z. T. farb. Abbildungen. VI, 514 Seiten. 1933. RM 90.—; gebunden RM 98.—

\* Auf die Preise der vor dem 1. Juli 1931 erschienenen Bände wird ein Notnachlaß von 10 % gewährt.

**Die Konstitution der Frau** und ihre Beziehungen zur Geburtshilfe und Gynäkologie. Von Dr. **Bernhard Aschner**, Privatdozent an der Universität Wien. („Deutsche Frauenheilkunde“, 4. Band.) 1. Teil: Allgemeine Konstitutionslehre. 2. Teil: Spezielle Konstitutionslehre. XIX, 887 Seiten. 1924. RM 45.—; gebunden RM 48.—\*

**W Die Menstruation und ihre Störungen.** Von Professor Dr. **Josef Novak**, Wien. (Bücher der ärztlichen Praxis, 11. Band.) Mit 6 Abbildungen. III, 93 Seiten. 1928. RM 3.—

**W Die Wechseljahre der Frau.** Von Privatdozent Dr. **Hans Zacherl**, Assistent der Universitäts-Frauenklinik in Graz. („Abhandlungen aus dem Gesamtgebiet der Medizin.“) Mit 1 Textabb. VI, 128 Seiten, 1928. RM 7.50 Für Abonnenten der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ ermäßigt sich der Preis um 10%.

**W Die Unfruchtbarkeit der Frau.** Bedeutung der Eileiterdurchbläsung für die Erkennung der Ursachen, die Voraussage und die Behandlung. Von Dr. **Erwin Graff**, a. o. Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Universität Wien. („Abhandlungen aus dem Gesamtgebiet der Medizin.“) Mit 2 Abbildungen im Text. V, 100 Seiten. 1926. RM 6.90 Für Abonnenten der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ ermäßigt sich der Preis um 10%.

**W Die entzündlichen Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane**, ihr Wesen, ihre Erkennung und Behandlung. Von Professor Dr. **C. Bucura**, Vorstand der Frauenabteilung der Wiener Allgemeinen Poliklinik. Mit 22 Abbildungen. VI, 206 Seiten. 1930. RM 12.60; gebunden RM 14.20

**W Die Gonorrhöe des Weibes.** Ein Lehrbuch für Ärzte und Studierende. Von Dr. **R. Franz**, Privatdozent an der Universität und Direktor-Stellvertreter am Maria Theresia-Frauenhospital in Wien. Mit 43 zum Teil farbigen Textabbildungen. VIII, 194 Seiten. 1927. RM 12.—; gebunden RM 13.20

**Gonorrhöe.** (Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten, 20. Band.) 1. Teil. Mit etwa 120 zum Teil farbigen Abbildungen. Etwa 800 Seiten. Erscheint im Frühjahr 1934

Allgemeine Ätiologie, Pathologie und bakteriologische Diagnose. Von Geheimrat Professor Dr. **J. Jadassohn**-Breslau. — Immunität. — Serodiagnose. — Hautreaktionen. — Allgemeinbehandlung. Von Professor Dr. **C. Bruck**-Altona. — Die allgemeinen Grundlagen der lokalen Behandlung der Schleimhautgonorrhöe des Mannes. Von Dozent Dr. **A. Perutz**-Wien. — Gonorrhoea acuta et chronica anterior et posterior. Von Professor Dr. **W. Scholtz**-Königsberg i. Pr. und Dozent Dr. **J. Dörfel**-Königsberg i. Pr. — **Gonorrhöe der Frau.** Von Dozent Dr. **R. Franz**-Wien. — Vulvovaginitis infantum. Von Dr. **K. Roscher**-Koblenz. — Gonorrhöe der Mundhöhle, des Ohres und der Nase. Von Dr. **O. Sprinz**-Berlin. — Gonorrhöe des Rectum. Von Dr. **B. Peiser**-Berlin.

**Lehrbuch der Gynäkologie** für Studierende und Ärzte. Von Dr. med. **Robert Schröder**, ord. Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie und Direktor der Universitäts-Frauenklinik in Kiel. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 330 teils farbigen Abbildungen im Text und 3 farbigen Tafeln. XVII, 725 Seiten. 1926. RM 35.—; gebunden RM 39.—\*

**Massage und Gymnastik in Schwangerschaft und Wochenbett.** Von Dr. med. und jur. **Franz Kirchberg**, Lektor für Massage und Heilgymnastik an der Universität Berlin. Zweite Auflage. V, 94 Seiten. 1933. RM 3.60

\* Auf die Preise der vor dem 1. Juli 1931 erschienenen Bücher des Verlages Julius Springer in Berlin wird ein Notnachlaß von 10% gewährt. <sup>W</sup> Verlag von Julius Springer in Wien.