



Портал бесплатной медицинской литературы

MedWedi.ru

Уважаемый читатель!

Если вы скопируете данный файл, Вы должны незамедлительно удалить его сразу после ознакомления с содержанием.

Копируя и сохраняя его Вы принимаете на себя всю ответственность, согласно действующему международному законодательству .
Все авторские права на данный файл сохраняются за правообладателем.
Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено.

Публикация данного документа не преследует никакой коммерческой выгоды.

Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.

Все авторские права сохраняются за правообладателем. Если Вы являетесь автором данного документа и хотите дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора или опубликовать другие документы, пожалуйста свяжитесь с нами - мы будем рады услышать ваши пожелания.

*** Данный файл скачан с портала **MedWedi** (<http://medwedi.ru>) ***

Заходите - будем рады :-)

...
," " ", 1991.

1. **2**

2. **3**

. 7
. 8
. 11
11

3.

12
. 13
. 15
. 15
. 16
16
. 18
. 18
19
,
21
. 21
21
. 19

4. **21**

. 22
. 23
. 24
. 26
. 28
. 29
. 29
30

5. **31**

. 34
. 35
. 36
. 37
38
. 38
39

6. **39**

. 39

.. 1977).

- 1) ; 2) ; 3)
- ; 4)
- ; 5) ; 6) ; 7)
- ; 8) ; 9)

1983):

XIII " () 9-

2.

G. Ladurnez W. Pritz (1987),
 4,3 1000 .L. Dombovy
 (1986), ; 38%
 30 ; 100 10, 40
 , 40- , 10

.X. (1935),

(. . . , . . . , 1960).

(1982),

(1971)

20-

(1970),

1926

(1939, 1948),

(1947, 1975)

, 1979)

, 1979).

1963 . .

20%

17%

750-1000

15%

1

(. . . , 1975).

4-5

(

()

(" ").

()

(1975),

: 1. (85%

). 2.

(15%).

(. . . , 1975).

(') .

(' ,) ,

(1975), 75%

10% - 5% - 20% - 85-90% - 5-

1.

2.

(1963),

(1963)

1. 2. 3.

III.

31%

1.

5,5%

2.

16%

(
12,2%

I-II

3,8%

1-2

II-III

30%

70% -

(53% -

13% -

3%

). 3.

9,5%

- 3,2%.

6,3%,

0,5-1¹₃

(. . . , 1971).

46

(

(. . . , 1964).

893

211

682

(70%),

(70%
(15%).

).

		(1963).	-
		(1983).	-
			-
			-
			-
I.	(-
II.			-
1.	-		-
2.		-	-
	(-
)		-
3.			-
)		-
) ;)	(-
			-
III.	:		-
IV.	:		-
V.	:		-
VI.	:		-
VII.	:		-
			-
		(1983), "	-
			-
			-

1. Атеросклероз с преимущественным поражением сосудов головного мозга, хроническая декомпенсированная недостаточность мозгового кровообращения с умеренным снижением интеллекта, раздражительной слабостью. Последствия перенесенного ишемического инсульта в бассейне правой средней мозговой артерии с нерезко выраженным левосторонним гемипарезом в периоде стойких остаточных явлений. Нетрудоспособен

2. Острое нарушение мозгового кровообращения в левой гемисфере с правосторонней гемиплегией, моторной афазией. Церебральный атеросклероз, гипертоническая болезнь III стадии, медленно текущая форма, церебральный вариант клинического течения.

3. Хроническая субкомпенсированная недостаточность мозгового кровообращения преимущественно в вертебро-базилярном бассейне, церебральный криз меньероподобного характера, регрессирующее течение. Шейный остеохондроз. Временно нетрудоспособен.

4. Разрыв аневризмы в бассейне корковых ветвей правой средней мозговой артерии, субарахноидальное кровоизлияние, нерезко выраженный левосторонний гемипарез, регрессирующее течение.

5. Атеросклеротический стеноз правой внутренней сонной артерии, ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии, левосторонняя гемиплегия, гемианестезия в периоде восстановления. Нетрудоспособен, нуждается в постороннем уходе.

3.

(5,8%),
(... , 1966).

30% (... , 1969; ... 60 80% , 1978).
70%

30-50
(... , 1981).

(1978, 1983, 1984),

(1976). "

"

1965).

“ ”,

1933 .

(, ') ,

(. . . , 1972) .

:

(. . . , . . . , 1984) .

()
3-4 .

(. . . . , 1970 ;

, 1978) .

”

(. . . , 1971) .

(1975)

(. . . , 1971) .

(1964) ,

20- 30-

(1967),

(. . . , 1966; . . . , 1965; . . . , 1972).

(1971)

(1982)

: 1) (; 2) ; 3) ; 4) (, ,)

(1972)

1. :) ;) ;) () ;)

2.) ;) :) (

I.

1.

(. . . , 1967).

(. . . , 1972).

(. . . , 1975).

2.

);

;

(

);

).

(1975),

II.

: 1.

2.

96%

(. . .

, 1964)

;)

81%

(1964);

. . .

(1971),

89,5%

(. . .

, 1964);)

97,9% (. . . , 1971).

(. . . , 1972);)

"

"

III. , :)
 , ,)i) (-
 (- , - ,)i) ()i)
 ()i) (- , - ,)i) (, -
 (, ,) . , , -
 - , - , , , -
 X. . (1981) . I (-) -
 , , - , -
 . II () . III -
 , - , -
 (. . , 1964; . . , 1971) . -
 , - -
L₁-L₃ -
 , , , -
 (. . , 1975) . -
L₄ -
 (, . . (1971) . . (1972) ,) . -
 , . . (1975) , -
 . -
 (. . , 1975) . -
L₅ -
 , , (. . , 1975) . -
 . -
S₁ -
 , IV, V , -
 . . (1972) , -
 , - .

. (1964), 70%, - 71,7%. -
 (1964) :
 - 13%. - 71% - 16%, -
 1-3 -
 : -
 (1971), -
 (1964), -
 - LII-LIIII, L₄- LIIII-LIV, L₃ L₅- LIV-LV, -
 S₁- LV-SI. Norlen (1944), -
 50-80% -
 -
 1968 -
 I. - -
 II. - -
 III. : 1. :) -
) ;) ; 2. :) -
 ;) (-
 IV. (, , -
 ,) -

V. (, ,).

2700 - -

98,4% (2655) - (, -

1,6% (45) - (, -

405 (15,3%).

25 . 135

(5,1%).

10-12 , ,

270 (10,2%) , ,

(. .),

(. .).

2250 (84,4%).

45 (63%).

(. .).

1590 (60%) , '660 -

(24,7%) ,

(15%), L4 (7%). L4-5 S1 (6%), L4-L5 (3%) , L5-S1 (43%), L5 (25,2%), S1

52,8% , L2-L3 (0,8%).

- 47,2% .

L4 , -

Ls , I .

I .

S1 -

IV V

:

(. .)

1. Люмбаго дискогенной природы.
2. Хроническая люмбалгия, обусловленная остеохондрозом диска LIII—LIV, в период обострения, умеренно выражен болевой синдром.
3. Поражение корешков L₅—S₁ справа, обусловленное боковой грыжей диска LV—SI, невралгическая стадия, подострый период с умеренно выраженным болевым синдромом.
4. Поражение корешка L5 справа, обусловленное остеохондрозом диска LIV—LV, невритическая стадия, подострый период с выраженным болевым синдромом.
5. Вегетативно-алгический синдром, обусловленный остеохондрозом диска LIII—LIV, период умеренного обострения, периартроз правого коленного сустава.

:

() , ()

() . ()

1. Левосторонняя цервикобрахиалгия, обусловленная остеохондрозом дисков CV—CVIII и сопровождающаяся синдромом плече-лопаточного периартроза, период обострения с резко выраженным болевым синдромом.
2. Поражение корешков D₇ — D₈ слева, обусловленное остеохондрозом дисков DVI—DVIII, невралгическая стадия, период обострения с умеренно выраженным болевым синдромом.

4.

40—60% (X. 21,1—21,8 .X. , 1974). (. 1983). (1974), 1/3

40%

55%

-

'

-

-

'

-

-

'

(. . . , 1974,

. . . , 1979).

-

(. . . , 1987).

300

(300.1- 300.9),

" " (. . . ,

1987).

. . . , 1980; (. . . , 1982), . . . , 1974; . . . , 1974;

,

-

-

.

-

(,)

-

XVIII .

-

" "

-

" "

-

" "

"

-

",

1827 .,

-

XIX .

. Littré . Robin

-

(. . . , 1965).

-

(D. Rogers, 1987).

-

(J. Charcot . Janet)

(R. Sommer, 1884),

" "

XIX .-

XX .

3. 1893—1894

3.

(),
(. . . , 1983).

(. . . , 1980).

XIX

“ ”
“ ”

(),

(. . . , 1957, . . . , 1974).

(. . . , 1971).

() , (-
-
(-
(. . . , 1986).
(. . . , 1982).
(. . . , 1979).
(. . . , 1982).
(. . . , 1974,
(1984)
(. . . , 1986).
(. . . , 1981; . . . , 1986). 3.
(. . . , 1981; . . . , 1986).

1960 . ,
,
,
" " ,
(. . . , 1980; . . . " " , 1980).
. . . (1974), . . . (1982),
(. . .)
. . . : 1)
, 2)
(1980) : " " (1982),
,
,
()
) - . -
(. . .)
,
" " .
,
,
,
(. . . , 1980).
: . . .
I
II
:
;

(. . . , 1974; . . . , 1980).

1.

2.

3.

(1980),

8,3% —
5,3% —

16,7%

6,3% —

39,5%

4.

(. . . , 1982).

5.

1.

2.

3.

"
".
70%.

4.

5.

),

,).

() (1979), , , -
, (1983) (1986) -
, (1974) -
. (1986) - ; (1974) -
, (1973) , -
- (1966) - -
- (1971), ,
. (1979) - ,
- (1979), -
, " " , -
- ()) -
- (1986) , , , -
; , " " ; -
, , , , -
(. , 1980) . , , -

(1968), :) -
 ;) -
 : ;) -
 : -
 () , (, -
 () , () ,
 (- ,) ,
). 1- , , ,
 2- - , 3- -
 4- - (. . , 1987) .

2040 , -
 , , -
 (27%) , (49,5%) ,
 (10%) ,
 8% , - 5,5% ;
 58% , -24% . 18% , 18%
 2% (, ,)

(. . . , 1979).

1.

2.

). 2.

: 1.

. 3.

. 4.

. 5.

1. Неврастения (гиперстеническая форма), умеренно выраженная, начальный период.

2. Невроз навязчивых состояний, затяжное течение у личности с тревожно-мнительными чертами характера, умеренно выраженные нарушения, период стабилизации.

3. Реактивно-невротическое состояние, выраженные нарушения в эмоциональной сфере, период выздоровления.

4. Патологический климакс. Астено-невротический синдром в выраженной степени, затяжное течение у личности с истерическими чертами характера.

5. Язвенная болезнь. Язва луковицы двенадцатиперстной кишки в фазе обострения. Астенический синдром соматогенного характера, умеренно выраженный, период стабилизации.

6. Тиреотоксикоз. Астено-вегетативный синдром эндокринного генеза с преобладанием симпатического тонуса, затяжное течение, значительно выраженные нарушения, период стабилизации.

5.

60% (. . . , 1984).

6 8% (N. Brooks, 1986). . . . 3. (1986),

XIX . ,

" .

XIX .

(. . . , 1935), " " " (. . . , 1937). (1941-1945 .)

"

" ,

" "

1980).

(. . . , . . .)

(S. Galbraith, 1987).

(1985) 6,5%

(... , 1962).

(... , 1984; R.G. Dacey .., 1986).

(...), (...)

" " " "

4-5

... , 1986). D. . Feeney, J. . Baron (1986)

(... , ... , 1981).

(...)

(...) (...)

. W.I. Rosenblum (1986)

globus caroticus,

. . . (1984),

(. . . , . . . , . . . , 1973).

" " (. . . , 1975).

(. . .).

).

(. . . , 1973),

(. . . , 1973; . . . , 1986),

(... , 1970),

(1985)

(... , 1960),
1970),
1985).

3 20%.

(... , 1966).

(... , ... , 1983).

1962; ... , 1970).

(1986)

70-80%

5
(1980)

1-

10

2-4%

74%

(1973),

(1972)

(1945),

1.

2.

3.

4.

840

18 51

87, 21 16 338 415

690

150

(596)

(84%), (40%),

54% 36% 52% 20% 5,2% 5%

(. . . , 1962) .

- I. Нарушение психических функций 241 (29%)
 - а) астенический синдром 141
 - б) синдром аффективной неустойчивости 90
 - в) травматическое слабоумие 10
- II. Нарушение вегетативных функций 223 (27%) (синдром вегетативной дистонии)
- III. Нарушение функции ликвороциркуляции 104 (12%)
 - а) синдром ликворной гипертензии 97
 - б) синдром ликворной гипотензии 7
- IV. Нарушение двигательных функций 93 (11%)
 - а) синдром пирамидной недостаточности 75
 - б) синдром экстрапирамидной недостаточности 18
- V. Травматическая эпилепсия 58 (7%)
- VI. Нарушение мозгового кровообращения 58 (7%) (травматическая вазопатия)
- VII. Нарушение координаторных функций 38 (4,4%) (окуло-вестибуло-мозжечковый синдром)
- VIII. Нарушение эндокринных функции 25 (3%) (нейроэндокринный синдром)

840,

72

168

1. Последствия сотрясения мозга—нерезко выраженный астенический синдром, регрессирующий тип течения, период восстановления.

2. Последствия ушиба головного мозга в области левой передней центральной извилины — оболочечно-мозговой рубец; правосторонний гемипарез, редкие эпилептиформные припадки, аффективная неустойчивость; стабильный тип течения, умеренное нарушение функций, период стойких остаточных явлений.

3. Последствия сотрясения головного мозга — церебральная вазопатия. регрессирующий тип течения, период восстановления с неустойчивой компенсацией и умеренным нарушением функций.

4. Последствия закрытой черепно-мозговой травмы — слипчивый арахноидит выпуклой поверхности правого полушария, внутренняя гидроцефалия, частые джексоновские припадки, умеренное снижение интеллекта, вегетативная неустойчивость, ремиттирующий тип течения; период восстановления с неустойчивой компенсацией.

“ ”, —
(“ ” .), —
, —

6.

— , , , , —
, — , , , —
.

1,25% , 20–30% 1 —
(. . .) , —
1959) . —

(.) , —
, , , —

, —
, —

(J. Bleistein, W. Tockmann, 1986).

() —
— , —
(, ,) . —

1. ()

2. ()

3. ()

4. ()

5. ()

6. ()

7. ()

8. ()

9. ()

10. ()

11. ()

12. ()

13. ()

14. ()

15. ()

16. ()

17. ()

18. ()

19. ()

20. ()

21. ()

22. ()

23. ()

24. ()

25. ()

26. ()

27. ()

28. ()

29. ()

30. ()

31. ()

32. ()

33. ()

34. ()

35. ()

36. ()

37. ()

38. ()

39. ()

40. ()

41. ()

42. ()

43. ()

44. ()

45. ()

46. ()

47. ()

48. ()

49. ()

50. ()

51. ()

52. ()

53. ()

54. ()

55. ()

56. ()

57. ()

58. ()

59. ()

60. ()

61. ()

62. ()

63. ()

64. ()

65. ()

66. ()

67. ()

68. ()

69. ()

70. ()

71. ()

72. ()

73. ()

74. ()

75. ()

76. ()

77. ()

78. ()

79. ()

80. ()

81. ()

82. ()

83. ()

84. ()

85. ()

86. ()

87. ()

88. ()

89. ()

90. ()

91. ()

92. ()

93. ()

94. ()

95. ()

96. ()

97. ()

98. ()

99. ()

100. ()

... () ...

... (...) ...

10-25% (... , 1974).

(1974) (... , 1964).

- I. : . . .
 - II. - . . .
 - III. . . .
 - IV. () - . . .
- (1982)

IV. (, , , .) . II. (III.) . V. ,

... (... , 1974)

, 5- , 16 - . -
 (, (-
) , -
 , ,) . -
 4. . 2 -
 , .
 5. . 45 , 3 - 28 -
 1 - 1 - 12 - , , . ,
 , , : -
 , , (-
 , . . .) .
 .
 - , - -
 .
 . . .) . (, ,) . -
 (, , - - - , , -
 - . . .) . -
 , (, ,) . -
 (, , - - - , , -
 - . . .) . -
 , (, ,) . -
 :) () ;)
 , , , , . . .) ;) () ;)
 (, , , , . . .) . -
 - .
 : , , .

“ ” : “ ” .

1. Клещевой энцефалит, полиоэнцефаломиелитическая форма, тяжелое течение, вялый паралич шейных мышц и нерезко выраженный нижний парапарез центрального характера, острый период.

2. Стволовой энцефалит неясной этиологии, окуло-вестибулярная форма средней тяжести, период выздоровления.

3. Последствия перенесенного цереброспинального менингита. Внутренняя гидроцефалия, умеренно выраженная. Оболочечно-мозговой рубец в области передней центральной извилины справа, нерезко выраженный левосторонний гемипарез и редкие приступы очаговой эпилепсии, стабильное течение, период стойких остаточных явлений.

4. Гипоталамический синдром неясной этиологии, вегетативно-сосудистая форма средней тяжести, нарушения терморегуляции, частые симпатико-адреналозые кризы.

7.

3,5–4%

1987).

(Van H. Albert. 1987; V. Wagle

(. . . , 1982).

(. . . , 1973).

(X. . . , 1974). . . . (1959)

55%

10%

30%

40%

15-20%

20%

8-10%

3-62,7%

(. . . . , 1973).

Berlit
80%

Ganshirt (1985)

, 15%-

, 5%-

(26,6%),

(19,5%).

- 1-3

V. Pechova-Petrova
30%,

. Kalvach (1986),
- 15,8%,

- 11,7%,

9,2%

104. (3,8%). 4000 , 154 50, -
 , 50-59 20-29 11 , 30-39 - 12 , 40-49 -23
 -53 , 60 - 55 . 35 -
 (34 , 12, - 11, - 5, -
 6 .) .
 18, 17 - 13, 3 - 2 31 (-
 , 17 - 13, 3 - 2 14) .
 - 7, - 6, - 15 , - 2. -
 : 38 - 21, -
 (- 4, (- 11, - 2). 9 (-
 - 4, - 2). 2 , - 3, - 2). -
 2 , 45 (90%). 2 (-
) . 3 , - (-
 .
 28 (56%). 40 (80%), -
 104 (2,5%).
 : - 73 (70,2%) , -
 - 14 (13,5%), - 11 (10,6%), - 6 (5,7%) . -
 : - 56 , - 14, -
 11, - 5, - 3, - 1, - 1 . -
 104 20. , -
 84 , . -
 15 , . -
 44 , 12- 7 12 , 7 - 1 1-6 , 6 -
 6
 -71%, 4 -26%, 4 -3%. : 2

1. 298 , 53 -
56 (29%). 3 2 6 . 10

2. 40 , 14 (35%) -
(; 10 5, - 9). 4 2 6 . -

3. 412 , 13 (3%) -
(1 - 5, - 8). 2 5 . -
3 12

4. 11 , 1 , 10 2
() , 9 12 .

5. 28 , 6 (-
- 3, - 3). 1 2

3 6. 46 - , 1 ,
(2-4 - 1, - 2). , 1 ,

7. 126 , 2 4 2 -
(1,5%). , 1 , .

8. 1 .

90% .

80%. 56% . 81% .

95-96%. - 90-92%,
- 65-70% (. . , 1956; X. . , 1974).

... , 1975; ... , 1986). (. . . , 1971; . . . J. Hoffman (1986)

2-3
)

1. Парасагиттальная арахноидэндотелиома правой теменной доли, левосторонний гемипарез и гемигипестезия, более выраженные в левой ноге, частые приступы джексоновской эпилепсии чувствительного и двигательного характера в дистальных отделах левой ноги. Умеренно выраженная внутричерепная гипертензия.
 2. Невринома правого мосто-мозжечкового угла, легкий альтернирующий синдром Мийара—Гублера, умеренно выраженный гипертензионный синдром, внутренняя гидроцефалия.
 3. Аденома гипофиза, прогрессирующее течение, битемпоральная гемианопсия, атрофия дисков зрительных нервов, умеренно выраженный синдром адипозогенитальной дистрофии.
 4. Рак желудка, множественные метастазы в заднюю черепную ямку. Карциноматоз мозговых оболочек, левосторонняя гемиатаксия, более выраженная в руке, менингеальный синдром, отек и дислокация мозга.
- По этим же принципам строится и диагноз опухоли спинного мозга: субдуральная невринома корешка С₅ слева, умеренно выраженный синдром Броуна—Секара.

1. Интоксикационно-ишемический неврит правого лучевого нерва с выраженным нарушением функций, период восстановления.

2. Сирингомиелия, поражение C₅ — D₃ сегментов спинного мозга, умеренно выраженный атрофический паралич верхних конечностей, двустороннее диссоциированное расстройство чувствительности в сегментах C₅—D₃. Медленно прогрессирующее течение.

3. Отогенный абсцесс глубоких отделов правого полушария, левосторонний гемипарез, больше выраженный в руке. Стадия инкапсуляции. Умеренно выраженная внутричерепная гипертензия.

4. Боковой амиотрофический склероз, бульбарная форма, выраженные нарушения жевания, глотания, артикуляции. Спастический тетрапарез (умеренно выраженный), гипотрофия мышц дистальных отделов верхних конечностей. Быстро прогрессирующее течение.

5. Рассеянный склероз, спинномозговая форма, умеренно выраженный левосторонний гемипарез, мозжечковая атаксия, паралич правого отводящего нерва, период обострения.

6. Миастения, тяжелая форма, глазодвигательные нарушения. Медленно прогрессирующее течение.