

Praktische Neurologie für Ärzte

DR. M. LEWANDOWSKY



**PRAKTISCHE
NEUROLOGIE
FÜR ÄRZTE**

VON

PROFESSOR DR. M. LEWANDOWSKY
IN BERLIN

MIT 20 TEXTFIGUREN



SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG GMBH 1912

ISBN 978-3-662-35548-0 ISBN 978-3-662-36377-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-36377-5

Copyright 1912 by Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Ursprünglich erschienen bei Julius Springer in Berlin 1912
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1912

Dem Krankenhaus im Friedrichshain

gewidmet

Vorwort.

Das vorliegende Buch ist nur für diejenigen Ärzte geschrieben, welche die Neurologie nicht als Spezialfach betreiben.

Die Neurologie als Spezialfach hat sich so ausgedehnt, daß es selbst dem Neurologen schwer fällt, sie in allen Einzelheiten zu beherrschen. Es liegt darum die Gefahr vor, daß der allgemeine Arzt oder die Vertreter anderer Spezialfächer, daran verzweifelnd, ein so umfangreiches und verzweigtes Fach auch nur in seinen wesentlichen Zügen zu übersehen, die Neurologie entweder ganz vernachlässigen oder sie mit einer gewissen Willkür behandeln. Es wäre das außerordentlich zu bedauern, denn die große Mehrzahl der Nervenkranken stehen in der Behandlung des allgemeinen Arztes und sollen darin verbleiben. Sind doch auch häufig die nervösen Erscheinungen nur Ausdruck einer allgemeineren Erkrankung. Und der Praktiker braucht auch die Neurologie nicht aufzugeben, trotzdem sie so außerordentlich ausgedehnt und verzweigt geworden ist. Denn ihre Grundzüge sind doch sehr einfach, und das Instrumentarium der Neurologie geradezu primitiv zu nennen. Weniger als vielleicht in irgend einem anderen Spezialfach kommt es auf besondere technische Fertigkeiten oder spezielle Apparate an, sondern auf die genaue Kenntnis und Beherrschung einiger wenigen fundamental wichtigen Untersuchungsmethoden, und auf die Folgerungen, die aus dem Ausfall dieser Untersuchungen gezogen werden können.

Diese Kenntnis zu vermitteln, ist die Aufgabe des vorliegenden Buches.

Ich habe mich bemüht, die Neurologie von ganz elementaren Voraussetzungen ausgehend, und mit einem Mindestmaß von theoretischer Begründung, zu entwickeln. So ist insbesondere von der Anatomie des zentralen Nervensystems nur das für die Praxis wirklich ganz unentbehrliche aufgenommen. Denn ich weiß aus vielfältiger Erfahrung, daß es demjenigen, der sich nicht in eigener Arbeit mit diesem Gebiet beschäftigt, niemals gelingt, sich ein körperliches Bild, etwa

der Gehirnanatomie, zu machen, und daß, was der Student davon zum Examen lernt, in wenigen Wochen vergessen wird.

Der Student muß aber nicht nur viel lernen, was der Arzt nicht braucht, sondern der Arzt braucht auch viel, was der Student nicht lernt.

Aus diesem letzteren Gesichtspunkte habe ich diejenigen Krankheiten verhältnismäßig ausführlich behandelt, welche den Praktiker interessieren, auf Kosten derjenigen, welche ein mehr theoretisches Interesse haben. Zu letzteren rechne ich etwa die Lehre von den progressiven Muskelatrophien, um nur ein Beispiel zu nennen. Es wird dem Arzte weniger wichtig sein, welche von den mannigfachen Formen der progressiven Muskelatrophie vorliegt, wenn er nur weiß, daß eine progressive Muskelatrophie vorliegt, und daß bei allen ihren Formen nichts zu helfen ist. Dagegen bin ich vor allem auf diejenigen Krankheiten und Situationen eingegangen, welche bestimmte Indikationen bieten, und habe versucht, diese Indikationsstellung aus der praktischen Notwendigkeit heraus zu entwickeln, der sich der Arzt gegenüber sieht. Denn es gibt in der Neurologie eine große Anzahl von Fällen, in welchen eine bestimmte, sichere und schnelle Indikationsstellung von der größten Bedeutung ist. Die Neurologie kann nicht nur viel und ganz Bestimmtes leisten; noch mehr kann man und zwar nicht nur bei den schwersten Erkrankungen, wie etwa dem Hirnabszess, sondern auch bei unscheinbareren Fällen, z. B. den Psychoseosen, durch die Vernachlässigung ihrer Regeln schaden.

So habe ich mich denn auch bemüht die wirksamen therapeutischen Methoden so ausführlich zu entwickeln, daß der Arzt in der Lage sein wird, sie selbständig anzuwenden und individuell zu modifizieren. In bezug auf die Therapie bin ich besonders kritisch verfahren. Wenn man große Lehrbücher der Neurologie durchsieht, so hat man leicht den Eindruck, daß in der Neurologie bei fast jeder Krankheit alles nützt, und zieht daraus selbstverständlich den Schluß, daß eigentlich nichts nütze. Es kommt das daher, weil in der Tat eine große Reihe von Krankheitsformen der Neurologie unbeeinflussbar sind, teils indem sie spontan heilen, teils indem sie dauernd fortschreiten, und weil dann, um etwas zu tun, alles mögliche angewendet wird, ebenso der Urväter therapeutischer Hausrat, wie das Allerneueste der modernen Therapie. Demgegenüber habe ich mich bemüht, die wirklich nützlichen und meist sehr einfachen therapeutischen Maßnahmen herauszuheben. Daß der Arzt aus Rücksicht auf den Patienten manches anwenden wird, von dem er sich eine Wirkung nicht oder nicht mehr verspricht, versteht sich von selbst, aber diese Art der Behandlung bedarf doch wohl keiner besonderen Darstellung. Speziell ist der kritischen Art der Betrachtung der Therapie der größte Teil der Elektrotherapie zum Opfer gefallen, was allerdings wohl nur noch Mitglieder der älteren Generation überraschen dürfte. Nachdem die Elektrotherapie

Jahrzehnte lang als die herrschende Methode der Neurologie gegolten hat, kann es heute kaum mehr geleugnet werden, daß sie in den meisten Fällen entweder objektiv gar nichts nützt, oder daß andere — merkwürdigerweise erst viel später gewürdigte physikalische Heilmethoden sehr viel mehr leisten als sie. Daß ihre kritiklose Anwendung sogar schaden kann, darauf ist im letzten Kapitel dieses Buches hingewiesen, in dem gleichzeitig einem neuen und ganz zu Unrecht noch vielfach mißachteten Zweige der Therapie zu seinem Rechte verholfen werden sollte, der Psychotherapie.

Was die Einteilung des Buches anlangt, so wird man trotz der Zerlegung des Stoffes in eine große Anzahl von kleinen Kapiteln einen planmäßigen Fortschritt erkennen. Nach einer Reihe allgemeiner Kapitel (1—13) folgen die Erkrankungen der peripheren Nerven und der Muskeln, dann die des Rückenmarks, dann die des Gehirns, letztere nach einem vorbereitenden Kapitel über die Lokalisation im Gehirn. Von dem bis hierhin im wesentlichen eingehaltenen topographischen Prinzip ist in den drei nächsten Kapiteln (26—28) zugunsten des ätiologischen abgewichen. Die Zusammenfassung der syphiligen Erkrankungen (26) bringt es dann z. B. mit sich, daß die Tabes hier und nicht unter den Rückenmarkskrankheiten zu finden ist. Die zusammenfassende Darstellung der syphiligen Erkrankungen in einem Kapitel erschien mir aber als eine zwingende Notwendigkeit. Es folgen dann vom Kapitel 29 ab eine Reihe besonderer Krankheitseinheiten, Chorea (29), Paralysis agitans (30), Meningitis (31), dann die Epilepsie und andere Krampfkrankheiten (32 und 33), weiterhin die Erkrankungen der Blutdrüsen (34) und die Intoxikationen (35), schließlich die vasomotorisch-trophischen Erkrankungen (36) und nach einigen kurzen Bemerkungen über die Unfallbegutachtung der organischen Nervenkrankheiten (37) die Psychoneurosen (38).

Ich habe dem Problem der Disposition der Nervenkrankheiten schon einmal bei der Herausgabe des Handbuches der Neurologie gegenübergestanden. Entsprechend der verschiedenen Bestimmung dieses Handbuches habe ich da eine andere Einteilung gewählt. Aber auch da hat es sich gezeigt, daß ein einheitliches Prinzip, etwa das symptomatologische oder das topographische oder das ätiologische nicht starr angewendet werden kann, wenn man ein praktisch-brauchbares Ganze schaffen und nicht zusammengehöriges auseinanderreißen will. Die spezielle Einteilung des vorliegenden kleinen Buches hat sich mir von selbst ergeben bei dem Bestreben, eine in fortschreitendem Zusammenhang im ganzen lesbare Übersicht der Neurologie zu geben. Für die schnelle Orientierung im einzelnen soll das Inhaltsverzeichnis und das Register Sorge tragen.

Wenn ich hoffe, daß dieses Buch in der Hand des Arztes seine Brauchbarkeit erweisen wird, so würde ich das zu einem großen Teil den Erfahrungen zu danken haben, die ich im Krankenhaus Friedrichshain gesammelt habe. Ich denke dabei nicht nur an die Bereitwilligkeit, mit der mir die dirigierenden Ärzte das ganze neurologische Material des Krankenhauses zugänglich gemacht haben, sondern ebenso an die fortgesetzten Besprechungen am Krankenbett mit einer großen Anzahl von Assistenten, Volontären und Famuli, die sich nun nicht mehr dem Examen, sondern praktischen Aufgaben gegenüber sahen, und ihre Fragen nach dieser Richtung an mich stellten.

So darf ich als ein Zeichen aufrichtiger Dankbarkeit dieses Buch dem Krankenhause Friedrichshain widmen.

Berlin, Februar 1912.

M. Lewandowsky.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
1. Die erste Aufgabe der Untersuchung von Nervenkranken. Einteilung der Nervenkrankheiten	1
Organisch 1. — Funktionell 1. — Neurosen 1. — Psychoneurosen 1. — Praktischer Gebrauch der Worte organisch und funktionell 2. — Keine positive Diagnose der Hysterie! 2. — Nicht mit der Sensibilitätsuntersuchung anfangen! 3. — Überschätzung der Anamnese 3.	
2. Die wichtigsten Handgriffe der neurologischen Untersuchung.	4
Notwendigkeit der Untersuchung bei allgemeinen nervösen Beschwerden 4. — Grundstock der Untersuchung 4. — Pupillen 5. — Ausgiebigkeit der Reaktion 6. — Atropin 7. — Morphium 7. — Einfluß der Amaurose 7. — Lichtstarre 7. — Pupillenweite 7. — Akkomodation 8. — Reflektorische Starre 8. — Absolute Starre 8. — Untere Extremitäten 8. — Patellarreflex 9. — Kunstgriffe 9. — Achillessehnenreflex 10. — „Verstärkte Reflexe“ 10. — Fehlen der Reflexe 10. — Differenz der beiden Seiten 11. — Klonus 11. — Pseudoklonus 11. — Dauerklonus 11. — Positiver und negativer Babinski 11. — Zweifelhafter Ausfall 12. — Babinski bei Kindern und Neugeborenen 13. — Babinski in Narkose und im Koma 13. — Babinski nach epileptischen und paralytischen Anfällen 13. — Fehlen des Sohlenreflexes 13. — Ophthalmoskopie 13. — Kein unnützes Atropin 13 — Neuritis, Stauungspapille, Optikusatrophie 14. — Wert der bisher genannten Symptome für die Diagnose für die Ausschließung einer organischen Nervenkrankheit 14.	
3. Motilitätsausfälle. Pyramidenzeichen	14
Notwendigkeit einer „allgemeinen Lokaldiagnose“ 15. — Motorische Ausfallserscheinungen 15. — Einteilung der motorischen Bahn 15. — Hysterische Schmerzen 15. — Pyramidenzeichen 16. — Babinski 16. — Klonus 16. — Ort der Pyramidenschädigung zunächst unbestimmbar 16. — Wichtigkeit der einzelnen Zeichen 17. — Bauchdeckenreflex 17. — Kremasterreflex 17. — Fußrückenreflex 18. — Unterschenkelreflex 18. — Gekreuzter Adduktorenreflex 18. — Steigerung der Sehnenreflexe 18. — Obere Extremitäten, Trizepsreflex 18. — Radius und Ulnareflex 19. — Einschränkung des Wertes der Pyramidenzeichen 19. — Pyramidenlähmung 19. — Prädilektionstypus 20. — Atrophie bei Pyramidenlähmung 20. — Ausfälle der Bahn vom Rückenmark zum Muskel 20. — Bedeutung der Verteilung der Lähmung 20. — Degenerative Lähmungen 20. — Elektrische Reizung 20. — Galvanischer und faradischer Strom 21. — Elektroden 21. — Konstanter (galvanischer) Strom 21. — Faradischer Strom 24. — Normale elektrische Reaktion 24. — E. R. 24. — Grenzen der Beweiskraft der E. R. 24. — Überschätzung der elektrischen Untersuchung 25. — Atrophie und Lähmungen 25. — Spezielle Tatsachen der peripheren Innervation 26. — Arm, N. radialis 26. — N. ulnaris 26. — N. medianus 26. — N. musculocutaneus 26. — N. axillaris 26. — N. thoracicus longus 26. — Cucullaris 26. — Plexuslähmungen 27. — Bein 27. — N. cruralis 27. — N. peroneus 27. — N. tibialis 27. — Segmentale Innervation 27. — Die Sehnenreflexe bei degenerativen Lähmungen 28.	

	Seite
4. Motilität des Kopfes	28
Verschiedene Lokalisation 28. — Supranukleäre Lähmung 28. — Periphere Lähmung 29. — Fazialislähmung 30. — Periphere Fazialislähmung 30. — Bellsches Phänomen 30. — Supranukleäre Fazialislähmung 30. — Zunge 30. — Augenmuskeln 31. — Okulomotorius 31. — Ptosis 31. — Mydriasis 31. — Abduzenslähmung 31. — Doppelbilder 32. — Supranukleäre Augenlähmungen 32. — Déviation conjuguée 32. — Sitz der peripheren Augenmuskellähmungen 32. — Nystagmus 32. — Stimmbandlähmungen 32. — Doppelseitige Affektion der Hirnnerven 34. — Bulbärparalyse 34. — Dysarthrie 34. — Sitz der Bulbärparalyse 34. — Bulbärparalyse ohne Befund 34. — Pseudobulbärparalyse 34.	
5. Motorische Reizerscheinungen	34
Kontraktur 34. — Pyramidenkontraktur 34. — Bindegewebige Retraktionen 35. — Ankylotische Veränderungen 35. — Rigidität 35. — Chorea 35. — Athetose 35. — Zittern 35. — Grosser epileptischer Anfall 36. — Jacksonscher Anfall 36. — Paralytische und eklamptische Anfälle 36. — Hysterischer Anfall 36.	
6. Sensibilitätsstörungen	38
Mittel der Sensibilitätsuntersuchung 38. — Subjektive Bedingungen der Sensibilitätsprüfung 38. — Suggestion 38. — Vermeidung der Suggestion 39. — Untersuchung der Somnolenten und Dementen 39. — Bedeutung der Ermüdbarkeit 39. — Ausschluß der Augen 39. — Belehrung des Kranken 39. — Form der Prüfung 39. — Muskel- und Lagesinn 42. — Einzelfehler 42. — Anatomische Grundlage der Sensibilitätsausfälle 42. — Periphere Sensibilitätsstörungen 42. — Radikuläre Sensibilitätsstörungen 43. — Teilung der sensiblen Fasern beim Eintritt in das Rückenmark 43. — Dissoziation der Sensibilität 43. — Hinterhorn-typus 43. — Genauere Untersuchung einzelner Stränge 43. — Distale Zunahme der Sensibilitätsstörung 44. — Dissoziation in den Strängen 45. — Sensibilitätsbahnen vom Rückenmark zum Gehirn 46. — Kreuzung aller Qualitäten 46. — Typus der zentralen Sensibilitätsstörung 46. — Störung der Lokalisation 46. — Trigemini bei zentralen Herden 47. — Anästhesia alternans 47. — Häufige Verschonung des Gesichts 47. — Haut- und Schleimhautreflexe bei organischen Sensibilitätsstörungen, Areflexie der Cornea 47. — Sehnenreflexe bei Sensibilitätsstörungen ohne Bedeutung 47. — Unterscheidung hysterischer Sensibilitätsstörungen von organischen 47.	
7. Ataxie	49
Definition 49. — Fingernasenversuch 49. — Kniehackenversuch 49. — Rombergscher Versuch 49. — A. Folge von Sensibilitätsstörungen 50. — Tiefe Sensibilität 50. — Sehnenreflexe bei Ataxie 50. — Hypotonie 50. — Tabische Ataxie 50. — Kleinhirnataxie 51. — Abweichung nach einer Seite 51. — Adiadochokinesie 51. — Zerebrale Ataxie 51. — Rombergscher Versuch bei Neurasthenie 51. — Astasie-Abasie 51.	
8. Störungen der Sinnesfunktionen	51
Sehen 51. — Gesichtsfeld bei Neuritis 51. — Retrobulbäre Neuritis 52. — Hysterische Amblyopie 52. — Hemianopsie 52. — Bitemporale Hemianopsie 52. — Hören 52. — Otoskopie 53. — Geschmacks- und Geruchsprüfung 53.	
9. Die Lumbalpunktion	53
Technik 53. — Druckmessung 54. — Drucksteigerung 54. — Trübungen 54. — Blutbeimengungen 55. — Sediment 55. — Eiweißgehalt 55. — Wassermannsche Reaktion 55. — Schwierigkeit der Punktion 55. — Unannehmlichkeiten 56. — Gefahren 56. — Diagnostische Bedeutung 56. — Hirnpunktion 57. — Ventrikelpunktion 57.	
10. Krankhafte Störungen des sympathischen Systems	57
Begriff des sympathischen Systems 57. — Okulomotorius, Mydriasis 58. — Vagus 58. — Druckpuls 58. — Erbrechen 58. — Sympathikuslähmung 58. — Ursprung im Rückenmark 59. — Blasen- und Mastdarmstörungen 59. — Genitalien 59. — Sensibilität der sympathisch innervierten Organe 59.	

	Seite
11. Benommenheit und Bewußtlosigkeit	59
Allgemeine Ursachen und primär nervöse Ursachen 60. — Wert der Anamnese 60. — Wert der organischen Zeichen in der Benommenheit 60. — Lumbalpunktion 61. — Blasen-Mastdarmfunktion 61. — Temperatur 61.	
12. Der Schwindel	62
Labyrinthschwindel 62. — Otosklerose 62. — Menièrescher Symptomenkomplex 63. — Vestibularisreaktionen 63. — Taubstumme 63. — Seekrankheit 63. — Schwindel durch Affektion des N. acusticus und seiner Bahnen 64. — Schwindel durch allgemeine Zirkulationsstörungen des Gehirns 64. — Augenschwindel 64. — Schwindel bei Tabes 64. — Reflektorischer Schwindel 65. — Neurasthenischer und hysterischer Schwindel 65. — Therapie 65. — Prognose 65.	
13. Kopfschmerz und Migräne	66
Kopfschmerz bei allgemeinen Erkrankungen und Vergiftungen 66. — Reflektorische Kopfschmerzen 66. — Organische Erkrankungen des Gehirns 67. — Syphilis 67. — Psychosen 67. — Hysterie, Neurasthenie 67. — Ermüdungskopfschmerz 67. — Migräne 67. — Art der Schmerzen 67. — Flimmerskotom 67. — Besondere Formen der Migräne 68. — Vasomotorische Erscheinungen 68. — Erblichkeit 68. — Anfall, auslösende Ursachen 68. — Untersuchung bei Kopfschmerzen 68. — Therapie 69. — Ätiologische Therapie 69. — Symptomatische Behandlung 69. — Prognose 71.	
14. Schmerzen. Neuralgien. Neuritis. Polyneuritis.	71
a) Schmerzen und Neuralgien	71
„Nervenschmerzen“ 71. — Organschmerzen 71. — Nichtneuralgische Schmerzen im Gesicht und Kopf 71. — Schädel 71. — Kiefer 72. — Zähne 72. — Nase 72. — Auge 72. — Extremitäten 72. — Lunge 73. — Herz 73. — Abdomen 73. — Niere 73. — Genitalien 73. — Headsche Zonen 73. — Neuralgische Schmerzen als Symptom anderer Erkrankungen des Nervensystems 74. — Echte Neuralgie 74. — Beziehung von Neuralgie und Neuritis 74. — Schmerzanfälle 75. — Rezidive 75. — Irradiation 75. — Radikuläre Formen 75. — Druckpunkte 75. — Trigeminusneuralgie 75. — Ischias 76. — Lasègue oder Kernig 76. — Scoliosis ischiadica 76. — Herpes zoster 76. — Therapie 77. — Morphinum 78. — Nervendehnung 78. — Massage 78. — Thermisch-hydriatische Behandlung 79. — Elektrotherapie 79. — Badereise 79. — Psychischer Faktor 79. — Injektionstherapie 79. — Epidurale Injektionen 80. — Alkoholinjektionen 80. — Chirurgische Behandlung 80. — Elektrische Behandlung 80. — Psychotherapie 80. — Psychogene Neuralgien 81.	
b) Neuritis und Polyneuritis	81
Schmerzhaftigkeit nicht Bedingung der Diagnose 81. — Ausbreitung 81. — Lokale Ursachen 81. — Trauma 81. — Beschäftigungsneuritis 81. — Allgemeine Ursachen 82. — Neuritis ischiadica 82. — Neuritis brachialis 82. — Neuritis facialis 82. — Prognose und Therapie der Mononeuritiden 82. — Polyneuritis, Ätiologie 82. — Alkohol 82. — Diphtherie 82. — Blei 82. — Zustandsbild 83. — Gemischt motorisch sensible Form 83. — Pseudotabes peripherica 83. — Landrysche Paralyse 84. — Übergänge zur Mononeuritis 84. — Bleineuritis 84. — Allgemeinsymptome 84. — Trophische Störungen 84. — Verlauf 84. — Prognose 84. — Korsakowsche polyneuritische Psychose 85. — Reste neuritischer und polyneuritischer Erkrankungen 85. — Therapie 85. — Adipositas dolorosa 86. — Osteomalazische Lähmung 86. — Hereditäre Formen der Polyneuritis 86.	
15. Myalgie, Myositis und andere Muskelerkrankungen	86
Myalgie 86. — Ursachen 86. — Schmerzen 87. — Lumbago 87. — Therapie 87. — Myositis 87. — Ischämische Muskelveränderungen 87. — Myositis ossificans 88. — Muskeltrophie bei Gelenkerkrankungen 88. — Myasthenie 88. — Wichtigkeit der Augenlähmungen dabei 88. — Verlauf 89. — Prognose 89. — Therapie 89. — Angeborene Muskeldefekte 89.	
16. Nervenverletzungen	90
Nervenwunden 90. — Naht 90. — Nervenlähmung durch stumpfe Gewalt 90. — Nervengeschwülste 91. — Multiple Neurofibromatose 91.	

	Seite
17. Rückenmarkserkrankungen und progressive Muskelatrophien	92
a) Die einheitlich herdförmigen Rückenmarkserkrankungen	92
Allgemeine Symptomatologie des Rückenmarkes 92. — Cauda 92. — Quersyndrom 92. — Blase und Mastdarmlähmung 93. — Wichtigkeit der oberen Grenzlinie 94. — Sensible Symptome 94. — Motorische Symptome 95. — Bastiansche Regel 95. — Brown-Séquardscher Symptomenkomplex 95. — Zentralsyndrom 95. — Wurzelsymptome 95. — Einzelne Krankheiten, Syringomyelie 95. — Blutung in das Rückenmark 97. — Myelitis 97. — Beziehung der Myelitis zur multiplen Sklerose 98. — Caissonkrankheit 98. — Enzephalomyelitis 98. — Rückenmarkstumor 98. — Probelaminektomie 100. — Operation 100. — Meningitis serosa zirkumskripta 101. — Unterster Rückenmarksabschnitt 102. — Konus und Kauda 102. — Rückenmarkserkrankungen durch Wirbelerkrankung 102. — Wirbelbruch 102. — Kümelsche Krankheit 104. — Wirbelkaries 104. — Infektiöse Spondylitis 105. — Spondylose rhizomélitique 105. — Spina bifida 105. — Wirbeltumor 106.	
b) Die diffusen Spinalerkrankungen	106
Anämische Spinalerkrankung 106. — Funikuläre Myelitis 106. — Degenerative diffuse Rückenmarkserkrankungen 107. — Spastische Spinalparalyse 108. — Amyotrophische Lateralsklerose 109. — Bulbärparalyse 109. — Spinale Muskelatrophien 109. — Chronische Poliomyelitis 109. — Myatonie 110.	
c) Myopathien	111
Pseudohypertrophie 111. — Myotonie 111. — Myotonia atrophica 111.	
d) Friedreichsche Ataxie	111
18. Die Lokalisation im Gehirn	112
Umfang und Einteilung des Gehirns 112. — Großhirnhemisphären 112. — Thalamus 114. — Hirnstamm 114. — Kleinhirn 114. — Lokalisation der Großhirnrinde 114. — Motilität 114. — Sensibilität 115. — Astereognosis 115. — Sehen 115. — Hemianopische Pupillenstarre 116. — Sprachfunktion und Aphasie 116. — Sensorische Aphasie 116. — Amnestische Aphasie 117. — Motorische Aphasie 118. — Anarthrie 118. — Schriftsprache 118. — Stumme Gehirnteile 119. — Rechter Temporallappen 119. — Stirnlappen 119. — Herde unterhalb der Rinde 119. — Bewegungsstörungen 120. — Innere Kapsel 120. — Hirnstamm 120. — Alternierende Lähmungen 120. — Sensibilität 121. — Thalamusherde 121. — Hemianopsie 122. — Kleinhirn 122.	
19. Der Hirntumor	122
Lokalsymptome 122. — Allgemeinsymptome 122. — Nachbarschaftssymptome 122. — Verlauf 123. — Hirndruck 123. — Verlaufstypen 123. — Parasiten 124. — Aneurysma 124. — Ausgang 124. — Diagnose 125. — Feststellung des Hirndrucks 125. — Kopfschmerz 125. — Ophthalmoskopie 125. — Puls 125. — Erbrechen 125. — Neuritis und Papillitis 126. — Lumbalpunktion 126. — Gruppe mit geringen Herdsymptomen 126. — Hirnpunktion 127. — Tumor ohne Hirndruck 128. — Lokaldiagnose 128. — Hypophysentumor 129. — Akustikustumor 129. — Ventrikeltumoren 130. — Operative Behandlung 130. — Kontraindikation 131. — Dekompressive Trepanation 131. — Diagnostische Irrtümer 131.	
20. Hirnabszeß	132
Wichtigkeit der Indikation zur Operation 132. — Symptome 132. — Temperatur 132. — Augenhintergrund 133. — Allgemeinsymptome 133. — Lokalsymptome 133. — Symptomlose Entwicklung 133. — Gefahr der Meningitis 133. — Ätiologie 133. — Traumatischer Abszeß 133. — Otitische Abszesse 134. — Schlafenlappenabszeß 134. — Kleinhirnabszeß 134. — Unterscheidung von der Meningitis 134. — Unterscheidung von der Sinusthrombose 135. — Otitische Komplikationen bei Kindern 135. — Rhinogene Abszesse 135. — Metastatische Abszesse 135. — Differentialdiagnose des metastatischen Abszesses 136. — Prophylaxe 136. — Therapie 137.	

	Seite
21. Die nichteitrige Enzephalitis	137
Ätiologie 137. — Symptome 138. — Verlauf 139. — Poliencephalitis haemorrhagica superior 139. — Hitzschlag 139. — Diagnose 139. — Therapie 139.	
22. Sinusthrombose	140
Einfache Sinusthrombose 140. — Ursachen 140. — Symptome 140. — Eitrige Sinusthrombose 141. — Therapie 141. — Gutartige Fälle 141.	
23. Hirnblutung. Hirnembolie und Thrombose. Arteriosklerose der Gehirngefäße	141
Hirnblutung 141. — Hemiplegie 141. — Andere Herdsymptome 142. — Kleinere Blutungen 142. — Embolie 142. — Thrombose 142. — Ätiologie 143. — Arteriosklerose 143. — Auslösende Ursache 143. — Miliaraneurysmen 143. — Diagnose von Blutung, Erweichung, Thrombose 143. — Ätiologische Diagnostik 144. — Diagnose der Apoplexie 145. — Karotisunterbindung 145. — Diffuse Arteriosklerose des Gehirns 145. — Arteriosklerotische Epilepsie 146. — Arteriosklerose des Rückenmarks 146. — Neurasthenische Bilder 146. — Prognose der Herderkrankungen und der Arteriosklerose 147. — Rückbildung der Herderkrankungen 148. — Begleiterscheinungen der Hemiplegie 148. — Therapie 148.	
24. Gehirnverletzungen	155
Stumpfe Gewalt 156. — Schädelverletzung 156. — Gehirnverletzung 156. — Blutung aus der Meningea 156. — Chirurgische Indikation 157. — Commotio 157. — Psychische Störungen nach Trauma 157. — Spätaoplexie 157. — Umschriebene traumatische Herde 158. — Dauerfolgen von Schädelverletzungen 158. — Expektative Therapie 158. — Elektrische Traumen 158.	
25. Angeborene und früh erworbene Defekte und Entwicklungsstörungen des Gehirns. Zerebrale Kinderlähmungen	159
Defektbildungen 159. — Idiotie 159. — Schädelmaße 159. — Hydrozephalus 159. — Turmschädel 160. — Kretinismus 160. — Infantiles Myxödem 160. — Mongolismus 160. — Schwachsinn 160. — Amaurotische Idiotie 161. — Therapie 161. — Lokale Defekte 161. — Folgezustände von Enzephalitis 162. — Zerebrale Kinderlähmung 162. — Rudimentäre Formen 162. — Little'sche Krankheit 162. — Epilepsie 163. — Zerebellare Störungen 163. — Therapie 163. — Mechanische Behandlung 163. — Ätiologische Behandlung 164. — Foerster'sche Operation 164. — Operation bei Jacksonscher Epilepsie 164.	
26. Die syphiligen Nervenkrankheiten: Tabes. Paralyse. Lues cerebrospinalis.	165
a) Allgemeines zur Ätiologie und Diagnose	165
Tabes und Paralyse syphiligen 165. — Intervall zwischen Infektion und Erkrankung 165. — Neurorezidive 165. — Gemeinsame Symptome 166. — Pupillenstarre 166. — Absolute Starre 166. — Wassermann'sche Reaktion 166. — Lymphozytose der Lumbalflüssigkeit 167.	
b) Tabes	168
Pupillenstarre, Patellarreflexe, Lanzinierende Schmerzen 168. — Achillesreflexe 168. — Unterscheidung von Polyneuritis 168. — Tabes superior 169. — Schmerzen 169. — Krisen 169. — Arthropathien, Spontanfrakturen 170. — Blasenstörungen 170. — Darmentleerung 170. — Potenz 170. — Sensibilität 170. — Augenmuskelparesen 170. — Lähmungen 170. — Herz- und Gefäßerkrankungen 171.	
c) Lues cerebrospinalis	171
Neuritis 171. — Vaskuläre Form 171. — Apoplexie jugendlicher Personen 171. — Myelitis 171. — Hirnblutung 172. — Aneurysmen 172. — Gummöse Form 172. — Meningitische Form 172. — Basale Symptome 172. — Okulomotorius 172. — Pachymeningitis haemorrhagica 172. — Syphilitische Kopfschmerzen 172. — Diffuse Hirnsyphilis 173. — Syphilitische Psychosen 173. — Syphilitische Epilepsie 173. — Diffuse Rückenmarkssyphilis 173.	

	Seite
d) Progressive Paralyse	173
Somatische Symptome 173. — Taboparalyse 173. — Sprachstörung 173. — Fehlen von Herdsymptomen 174. — Paralytische Anfälle 174. — Schwindelanfälle 174. — Kopfschmerzen 174. — Erkennung im Frühstadium 175. — Formen 175. — Intelligenzstörung 175. — Merkfähigkeit 175. — Rechnen 176. — Unterscheidung von der Neurasthenie 176. — Mitteilung der Diagnose 176. — Diagnostische Irrtümer 176. — Hereditäre Lues 177.	
e) Allgemeines zur Therapie	177
Therapie der syphiligenen Krankheiten 177. — Prophylaxe 177. — Therapie der Lues cerebrospinalis 178. — Hg 178. — Salvarsan 179. — Jod 180. — Therapie der Tabes 180. — Hg 180. — Salvarsan 181. — Therapie der Paralyse 181. — Allgemeine und symptomatische Therapie der Tabes 181. — Verlauf und Prognose der Tabes und Paralyse 183. — Benigne Fälle 183.	
27. Multiple Sklerose	184
Nystagmus 184. — Tremor 184. — Sprache 184. — Pyramidenzeichen 184. — Optikus 185. — Kopfschmerz 185. — Schwindel 185. — Andere Symptome 185. — Diagnose im Beginn 185. — Endzustand 186. — Akute multiple Sklerose 187. — Ätiologie 187. — Differentialdiagnose 187. — Therapie 187.	
28. Heine-Medinsche Krankheit bzw. spinale Kinderlähmung	188
Epidemien 188. — Virus 188. — Art der Infektion 188. — Allgemeinsymptome 189. — Vorderhorntypus 189. — Spinale Kinderlähmung 189. — Landry'sche Paralyse 190. — Meningitische Form 190. — Zerebrale Kinderlähmung 190. — Zerebellare Formen 190. — Polyneuritische Form 190. — Auftreten bei Erwachsenen 191. — Prognose 191. — Wachstumshemmung 191. — Therapie 191. — Prophylaxe 192.	
Chorea	193
Chorea minor 193. — Infektiöse Erkrankung 193. — Schwere Fälle 193. — Therapie 193. — Bleibende Symptome 193. — Huntingtonsche Chorea 193. — Chorea durch apoplektische Herde 194.	
30. Paralysis agitans	194
Tremor und Rigidität 194. — Sine agitatione 194. — Retro- und Propulsionen 194. — Verlauf 194. — Therapie 194.	
31. Meningitis	195
Allgemeine Symptomatologie 195. — Tuberkulöse Meningitis 195. — Basale Symptome 195. — Lumbalflüssigkeit 195. — Besondere Formen 196. — Ausgang 196. — Eiterige Meningitis 196. — Fortgeleitete Formen 196. — Infektiöse Formen 196. — Bakteriologischer Befund 197. — Therapie 197. — Prognose 197. — Epidemische Meningitis 197. — Verlauf 198. — Komplikationen 198. — Therapie 198. — Meningitis serosa 199. — Bei Otitis 199. — Spontane Form 199. — Erworbener Hydrozephalus 199. — Pachymeningitis 199. — Meningealblutung 200.	
32. Epilepsie	200
Epilepsie und epileptischer Anfall 200. — Große epileptische Anfälle ohne Epilepsie 200. — Diagnose des epileptischen Anfalls 200. — Vorboten 202. — Nachwirkungen 202. — Diagnose der Epilepsie 202. — Besondere Formen der genuinen Epilepsie 203. — Myoklonie 203. — Paralytische Äquivalente 203. — Absencen 203. — Petit mal 203. — Dämmerzustand 204. — Forensische Bedeutung 204. — Nachwandeln 205. — Verstimmungen 205. — Poriomanie 205. — Pavor nocturnus, Enuresis 205. — Epileptische Demenz 205. — Verlaufsformen 205. — Eklampsie und Epilepsie 205. — Therapie 206. — Brom 206. — Bromismus 207. — Diät 207. — Opiumbromkur 207. — Operation 208. — Lebensweise der Epileptiker 209. — Ätiologische Beziehungen der Epilepsie 209. — Schwachsinn 209. — Alkoholepilepsie 209. — Pathologischer Rausch 210. — Bleiepilepsie 210. — Epilepsie nach Infektionskrankheiten 210. — Traumatische Epilepsie 210. — Spätepilepsie 211. — Lues 211. — Arteriosklerotische Epilepsie 211. — Reflexepilepsie 211.	

	Seite
33. Lokale Krämpfe. Tetanie und Spasmophilie. Tetanus	211
a) Lokale Krämpfe	211
Formen 211. — Periphere motorische Krämpfe 212. — Reflektorische Krämpfe 212. — Crampi 212. — Tics 212. — Stottern 214. — Beschäftigungs-krämpfe 214. — Fehlerhafte anatomische Verknüpfung 214. — Therapie 215.	
b) Tetanus	216
Formen 216. — Infektion 216. — Inkubation 216. — Trismus 216. — Verlauf 216. — Kopftetanus 216. — Prognose 216. — Therapie 217. — Prophylaxe 217. — Lyssa 217.	
c) Tetanie und Spasmophilie	217
Art der Krämpfe 217. — Parästhesien 217. — Epidemisches Auftreten 218. — Schwangerschaftstetanie 218. — Therapie 218. — Kindertetanie 218. — Spasmophilie 218. — Laryngospasmus, Eklampsie 218. — Therapie 219.	
34. Krankheiten der Blutdrüsen	219
a) Schilddrüse	219
Basedowsche Krankheit 219. — Struma 219. — Exophthalmus 219. — Tachykardie 220. — Tremor 220. — Schwitzen 220. — Magendarmkanal 220. — Nervöse Beschwerden 220. — Therapie 220. — Myxödem 223. — Abortive Fälle 223.	
b) Hypophysis	224
Akromegalie 224. — Dystrophia adiposogenitalis 225. — Therapie 225.	
c) Genitalien	225
d) Neurogener Diabetes	226
35. Vasomotorisch-trophische Erkrankungen	226
Organische Gefäßerkrankungen 226. — Intermittierendes Hinken 227. — Zirkulationsstörungen bei Arteriosklerose 227. — Organische Nervenkrankheiten 228. — Dekubitus 228. — Neurosen 228. — Akroparästhesie 229. — Raynaudsche Krankheit 229. — Erythromelalgie 231. — Ätiologie 231. — Neurotisches Ödem 231. — Sklerodermie 231. — Progressive Gesichtsatrophie 231. — Traumatische Atrophien 231.	
36. Intoxikationen	232
a) Endogene Intoxikationen	232
Urämie 232. — Kachexie 232. — Eklampsia gravidarum 232. — Diabetes 233.	
b) Akute exogene Vergiftungen	233
Strychninkrämpfe 233. — Epileptiforme Krämpfe 233. — Pupillensymptome 234. — Schlafmittel 234. — CO-Vergiftung 234.	
c) Chronische exogene Vergiftungen	234
Alkoholismus 234. — Trinkerfürsorge 235. — Dipsomanie 236. — Morphismus 236. — Nikotin 236. — Kaffee 236. — Ergotismus 236. — Pellagra 237. — Blei 237. — Arsen 237. — Andere Ployneuritisgifte 237. — Hg 237. — Mangan 238.	
37. Unfall	238
38. Psychoneurosen	239
a) Neurasthenie	240
Ermüdbarkeit 240. — Unlustgefühle 240. — Kopfschmerz 240. — Schwere Fälle 240. — Oppressions- und Angstgefühl 241. — Reizbarkeit 241. — Schlaflosigkeit 241. — Stellung des Kranken zu seinen Beschwerden 241. — Hypochondrische Befürchtungen 241. — Syphilidophobie 241. — Die allgemeine Art der neurasthenischen Beschwerden 241. — Beteiligung innerer Organe durch die Neurasthenie 242.	
b) Nervöse Organstörungen	242
Organneurosen 242. — Theoretisches 242. — Gefäße 243. — Dermographie 243. — Schweißanomalien 243. — Herz 243. — Subjektive Beschwerden 244. — Paroxysmale Tachykardie 244. — Lunge 245. — Magen 245. — Darm 246. — Blase 246. — Männliche Genitalien 247. — Weibliche Genitalien 247. — Fieber 248.	

	Seite
c) Zwangsvorstellungen	248
Zwangsvorstellungen 248. — Grenze der Zwangsvorstellungen 249. — Psychotische Ausartung 249. — Platzangst 249. — Angst 250. — Errötungsangst 250.	
d) Hysterie	250
Umschriebenheit der Symptome 250. — Hysterische Symptome 251. — Lähmungen 251. — Gangstörungen 252. — Kontrakturen 252. — Krämpfe 252. — Sensibilitätsausfälle 252. — Reflexe 253. — Schmerzen 253. — Sinnesstörungen 254. — Psychischer Mechanismus 254. — Affektausbrüche 255. — Angst 255. — Dämmerzustände 255. — Psychologische Ätiologie 256. — Suggestion 256. — Gefühlsbetonte Erlebnisse 258. — Ursachen 258. — Überarbeitung 258. — Affektbetonte Erlebnisse 258. — Uterus, Hysteria virilis 258. — Hysterische Konstitution 259. — Pseudologia phantastica 259. — Kinder 260. — Neurasthenische Konstitution 260.	
e) Traumatische „Neurosen“	261
Traumatische Psychoneurosen 261. — Schwere des Traumas 261. — Latenz nach dem Trauma 261. — Rentenkampf 262. — Simulation 263. — Flucht in die Krankheit 264. — Atteste bei Neurasthenie 264.	
f) Differentialdiagnose der Psychoneurosen	265
Differentialdiagnose der Psychoneurosen gegenüber körperlich bedingten Zuständen 265. — Neurasthenische Bilder durch organische Erkrankungen des Nervensystems 266. — Unterscheidung der Psychoneurosen von den Psychosen 267. — Suizid 269.	
g) Therapie der Psychoneurosen	270
Therapie der Psychoneurosen 270. — Bedeutung der Diagnose 270. — Prognose der Therapie 271. — Therapie der Erschöpfungszustände 271. — Allgemeine Lebensweise Nervöser 272. — Diät 272. — Psychotherapie 273. — Persönlichkeit des Arztes 273. — Ärztliche Vorurteile 274. — Aufklärung der psychischen Ursache 274. — Vorurteile des Publikums 274. — Freudsche Psychoanalyse 275. — Persuasion 278. — Suggestion 279. — Hypnose 280. — Klinische Behandlung 281. — Allgemeinzustand 282. — Arbeitstherapie 282. — Besondere Bedingungen der Psychotherapie 282. — Physikalische und pharmakologische Maßnahmen 283. — Schädlichkeit lokaler Behandlung 283. — Brom 284. — Baldrian 284. — Schlafmittel 284. — Maskierte Psychotherapie 286. — Elektrizität 286. — Nervenpunktmassage 286. — Schluß 289.	

1. Die erste Aufgabe der Untersuchung von Nervenkranken. Einteilung der Nervenkrankheiten.

Die Untersuchung eines Nervenkranken hat sich zuerst immer auf die Feststellung zu richten, ob eine organische Nervenkrankheit vorliegt oder nicht. Rechnet man alle Kranken, bei denen eine Untersuchung des Nervensystems notwendig ist, so kann man ruhig sagen, daß der größte Teil gerade der diagnostischen Arbeit, welche jeder Praktiker zu leisten hat, mit dieser einen Entscheidung getan ist.

Wir haben uns daher zunächst darüber zu verständigen, was eine organische Nervenkrankheit ist. Als den Gegensatz von organisch hört man fast allgemein heute noch das Wort funktionell. Mit dem Worte funktionell fast homonym wird dann das Wort Neurose gebraucht. Diese Unterscheidung geht noch auf die Überschätzung der früheren, ziemlich primitiven, anatomischen Methoden zurück. Wo man nichts Grobes nachweisen konnte, nahm man an, wäre überhaupt nichts da. So hat man denn heute eine Reihe von früheren „Neurosen“ mit feineren Methoden als „organisch“ erkannt, z. B. die Paralysis agitans und die Chorea minor. Nun aber sind die anatomischen Methoden so fein geworden, daß sie auch bei Geisteskrankheiten, wie z. B. bei der Dementia praecox — von der progressiven Paralyse natürlich gar nicht zu reden —, ferner auch bei der Epilepsie deutliche Veränderungen des Gehirns ergeben. Damit ist die alte Unterscheidung zwischen den organischen Krankheiten als den anatomisch nachweisbaren, und den funktionellen, als den anatomisch nicht nachweisbaren, praktisch wertlos geworden. Sie gab auch früher dazu Anlaß, die verschiedenartigsten Krankheiten zusammenzuwerfen. Hysterie und Chorea sind für die praktische Beurteilung verschieden wie Tag und Nacht, und waren es immer, aber Neurosen im alten Sinne waren sie beide.

Man hat daher in neuerer Zeit die Neurasthenie, die Hysterie und einige verwandte Formen als „Psychoneurosen“ abgetrennt. Der Name ist nicht ganz einwandfrei, er bezeichnet aber wenigstens das eine, daß wir es hier, bei der Hysterie, der Neurasthenie und einigen anderen Formen mit psychischen Erkrankungen zu tun haben, während von psychischer Erkrankung bei der Chorea, der Paralysis agitans etc.

Organisch

Funktionell
Neurosen

Psycho-
neurosen

gar keine Rede ist und das ist auch für die Praxis ganz fundamental wichtig. Auch in der Theorie stehen die Hysterie, die Neurasthenie u. a. den eigentlichen Geisteskrankheiten, den Psychosen viel näher, als den anderen genannten „Neurosen“, z. B. der Paralysis agitans. Neurasthenie und Hysterie sind in der Tat als die allerleichtesten psychischen Störungen aufzufassen, wie das am Schluß dieses Buches des weiteren ausgeführt werden wird. Es sind die alleroberflächlichsten Störungen des Nervensystems, die wir kennen. Auf dem großen Abstand, der sie von allen anderen Nervenkrankheiten trennt, beruht die außerordentliche Wichtigkeit, die ihrer Unterscheidung beizulegen ist.

Praktischer Gebrauch der Worte organisch und funktionell

Trotzdem also die alte Unterscheidung von „organisch“ und „funktionell“ ihren eigentlichen Sinn verloren hat, haben diese alten Bezeichnungen sich gehalten, und werden sich als kurze und schlecht entbehrliche Gegensatzbezeichnungen auch weiterhin halten für die Fälle, in denen es nur darauf ankommt, die schweren organischen Herderkrankungen, die Strang-, Wurzel- und Zelldegenerationen, die Muskelatrophien einerseits von den Psychoneurosen, d. h. wesentlich Hysterie und Neurasthenie andererseits zu unterscheiden, und sehr oft kommt es nur auf diese Unterscheidung an. Man muß sich dann aber durchaus darüber klar sein, daß die Epilepsie, die Chorea, die Paralysis agitans, die vasomotorisch-trophischen Neurosen, die Psychosen und noch verschiedenartiges andere in der Eventualität „organisch-funktionell“ beiseite gelassen sind, und daß diese besonders genannten Erkrankungen eine besondere Stellung einnehmen, ihre besonderen Merkmale, ihre besondere Prognose haben, die man eben einzeln kennen lernen muß.

Keine positive Diagnose der Hysterie!

Es ist nun das eine große Geheimnis der neurologischen Diagnostik, daß die Frage, ob eine nervöse Erkrankung „funktionell“, d. h. eine Psychoneurose, d. h. meist eine Hysterie ist, nicht durch positive Merkmale dieser Psychoneurosen zu beantworten ist, sondern ausschließlich dadurch, daß man die „organischen“, oder, wenn man lieber will, die schwereren Erkrankungen des Nervensystems in dem oben erläuterten Sinne ausschließt.

Tagtäglich werden viele schwere Fehler gemacht, indem man diese Grundregel außer Acht läßt. Man läßt sich durch die Anamnese, durch ein „hysterisches Wesen“ oder auch durch sogenannte hysterische Stigmata verführen, eine Hysterie zu diagnostizieren, wo doch eine organische Krankheit vorliegt, die freilich manchmal durch hysterische Züge überlagert ist. Aber es ist doch leicht ersichtlich, daß für die Beurteilung einer multiplen Sklerose die multiple Sklerose die Hauptsache ist, auch wenn der Kranke nebenbei einige hysterische Züge aufweist, und nicht diese hysterischen Züge. Man würde eben eine an multipler Sklerose Leidende, die man als solche erkannt hat, nicht jahrelang als hysterische Simulantin durch die Krankenhäuser hetzen, auch dann nicht, wenn sie etwas hysterisch ist.

Insbesondere sei aus diesem Gesichtspunkt, daß man nämlich die Hysterie niemals allein auf ihre positiven Merkmale hin diagnostizieren darf, schon gleich hier davor gewarnt, die Untersuchung mit der Sensibilitätsprüfung zu beginnen. Man prüfe zunächst weder auf Anästhesie noch auf Stigmata. Man kann manchmal auf einzelnen Pavillons ganze Epidemien hysterischer Anästhesien sehen, weil einige junge Famuli in der Freude ihres Herzens, die Symptome dieser interessanten Krankheit untersuchen zu können, sie ausgiebig suggeriert haben. Dabei aber haben sie natürlich leichte und schwere Symptome organischer Nervenkrankheiten übersehen, und man hat alle Mühe, ihnen klar zu machen, daß eine Tabes mit Pupillenstarre darum noch keine Hysterie wird, weil sie ihr noch eine hysterische einseitige Anästhesie ansugeriert haben.

Nicht mit der Sensibilitätsuntersuchung anfangen!

In der allgemeinen Praxis wird vielfach auf die Anamnese zu viel Wert gelegt. „Die Patientin war ihr ganzes Leben lang nervös, also wird auch die jetzige Krankheit Neurasthenie sein“, ist eine Folgerung, die häufig, aber nicht immer stimmt. Ebenso darf man auf die Ätiologie von Anstrengungen, Sorgen, Überarbeitung für Hysterie und Neurasthenie nur dann etwas geben, wenn man zuvor untersucht hat. Selbst der Geübte wird häufig überrascht, bei solchen typischen Anamnesen und entsprechenden subjektiven Symptomen bei der Untersuchung dann doch eine organische Erkrankung zu finden. Andererseits darf man die Hysterie nicht von vornherein ausschließen, wenn ein großer kräftiger Mann, der niemals nervös war, plötzlich mit einer Lähmung beider Beine zusammengesunken ist. Die Voraussetzung jeder Diagnose bleibt eben immer die Untersuchung und auch unsere Studenten sollten gewöhnt werden, sich nicht zu lange mit der genauen Anamnese abzugeben, sondern nach einigen orientierenden Fragen über Art und Dauer der Beschwerden zunächst zur objektiven Untersuchung zu schreiten. Im Laufe der Untersuchung erst ergeben sich dann Möglichkeiten und Schlüsse, welche später durch eine speziell gerichtete Anamnese geprüft werden sollten.

Über-schätzung der Anamnese

Es muß also unsere Aufgabe sein, den Nervenkranken in jedem einzelnen Falle zunächst soweit zu untersuchen, daß wir „organische“ Erkrankungen entweder ausschließen können, oder daß wir sie annehmen müssen. Die nächsten Kapitel werden sich daher immer wieder mit der Frage beschäftigen, inwieweit diese beiden — nicht ganz zusammenfallenden — Postulate zu erfüllen sind.

Das eine aber möchten wir als die Grundlage der modernen Neurologie hier ein- und für allemal feststellen, daß die neurologische Diagnose eine ebenso exakte ist, wie die Diagnose auf anderen Gebieten. Die in vielen Köpfen spukende Ansicht, daß man in der Neurologie Diagnosen mit „Intuition“ stellen könne, und die sich daraus ergebende Nichtachtung unseres Gebietes kann gar nicht scharf genug zurückgewiesen werden. Daß eine bestimmte Diagnose nicht zu stellen ist, daß Zweifel übrig bleiben, daß ein gewisser Zeitraum abgewartet werden muß, kommt natürlich in der Neurologie auch vor, aber nicht häufiger als auf anderen Gebieten.

2. Die wichtigsten Handgriffe der neurologischen Untersuchung.

Wir haben dargelegt, daß die alte Einteilung der Nervenkrankheiten in organische und funktionelle uns keinen scharfen Sinn mehr gab, weil eine Stufenleiter die schweren organischen mit den oberflächlicheren organischen und diese mit den leichteren verbindet. Sehr häufig aber kommt es darauf an, zwischen den beiden Enden der Leiter, den schweren im alten Sinne organischen Nervenkrankheiten einerseits und den leichtesten, insbesondere den Psychoneurosen, der Hysterie, Neurasthenie etc. zu unterscheiden.

Man kann sagen, daß die überwiegende Menge der Kranken, welche überhaupt den Arzt wegen nervöser Beschwerden aufsuchen, ihn nur vor die Entscheidung stellen: Entweder Hysterie, Neurasthenie, wenn man so will, Nervosität oder organisches, d. h. anatomisch grob nachweisbares zentrales Leiden des Rückenmarks oder Gehirns. Die peripheren Nervenkrankheiten kommen in diesen Fällen weniger in Betracht; soweit erforderlich werden sie sogleich noch berücksichtigt werden.

Notwendigkeit der Untersuchung bei allgemeinen nervösen Beschwerden

Es handelt sich um jene Fälle, welche mit anscheinend allgemeinen Beschwerden zu uns kommen, mit Klagen über Schwäche, über Kopfschmerzen, über Schwindel, über Schlaflosigkeit, über Gedächtnisschwäche, über Parästhesien etc. etc., ganz einfach manchmal „über die Nerven“. Gewiß gehört meist kein großer Scharfblick dazu, um auf Grund der typischen Beschwerden und der entsprechenden Anamnese hier die Diagnose Nervosität oder dergl. zu stellen, und doch kann die Diagnose täuschen. Nicht selten verbergen sich hinter diesen harmlosen Beschwerden eine multiple Sklerose, ein Hirntumor, eine progressive Paralyse, eine Tabes, überhaupt jede organische Nervenkrankheit. Nur durch die genaue Untersuchung kann man die Möglichkeit dieser ernstesten Erkrankungen ausschließen, und durch diese genaue Untersuchung zugleich das Vertrauen des Kranken und das Vertrauen zur Richtigkeit seiner eigenen Therapie gewinnen. Während das Publikum der Privatpraxis eine solche Untersuchung ohne weiteres als notwendige Vorbedingung der Diagnose erwartet, ist bei den Kassen- und Armenpatienten diese Erkenntnis noch nicht allgemein. Wie häufig habe ich es nicht gehört, auch von Kranken mit Kopfschmerzen: „Ich war schon bei so vielen Ärzten, aber meine Beine hat noch keiner untersuchen wollen“. Vom Augenspiegeln natürlich gar nicht zu reden. Das haben die meisten Nervenkranken noch nie erlebt. Und das unerhörte ist, daß diese Kranken unwillkürlich dahin dressiert sind, daß sie dem Arzte, der genau untersucht, Mißtrauen entgegenbringen, weil der andere doch ohne Untersuchung Medizin verschreiben oder elektrisieren konnte, also doch wohl von Natur klüger sein mußte.

Grundstock der Untersuchung

Wenn wir uns nun sogleich zu der praktischen Untersuchung Nervenkranker wenden, so sind eine Reihe von sehr einfachen Handgriffen hier voranzustellen, die gleichsam den Grundstock

der neurologischen Untersuchung bilden. Wenn diese paar Handgriffe auf den Universitäten praktisch geübt und in ihrer praktischen Bedeutung erschöpfend besprochen würden, so wäre damit zehnmal mehr für die spätere Praxis getan, als mit der Einprägung unbrauchbarer Feinheiten. Ergibt nämlich die Untersuchung, daß diese „primären“ Handgriffe keine pathologischen Reaktionen ergeben, dann kann man in 90 % der in Frage kommenden Fälle auch sicher sein, daß keine organische Erkrankung vorliegt.

Derjenige Handgriff, den man zweckmäßig zuerst anwendet, weil der Patient sich dazu noch nicht ausziehen muß, ist die Untersuchung der Pupillen. Pupillen

Bei der Untersuchung der Pupillen kommt in allererster Linie die Lichtreaktion der Pupillen in Frage, d. h. die Verengung der Pupillen bei Belichtung, und zwar ist jede Pupille einzeln unter Bedeckung des anderen Auges zu untersuchen. Dabei ist die erste Bedingung und zugleich fast die einzige Schwierigkeit die Ausschaltung der Akkommodationsreaktion der Pupillen, welche bekanntlich gleichfalls in einer Verengung der Pupille besteht. Man muß also darauf achten, daß der Patient ruhig in die Ferne sieht, und während der Untersuchung auch nicht vorübergehend Hand oder Gesicht des Untersuchers fixiert. Untersucht man bei Tageslicht am Fenster, so gibt man zweckmäßig die Vorschrift, während man die Augen mit der flachen Hand verdeckt: „Sehen Sie ruhig gerade auf das gegenüberliegende Haus, wie wenn Sie durch meine Finger hindurchsehen wollten.“ Auch wenn man bei künstlicher Beleuchtung untersucht, ist es zweckmäßig, dem Patienten ein bestimmtes Ziel für seinen Blick zu geben, das dann soweit entfernt sein muß, daß eine Akkommodation nicht mehr in Frage kommt, also eine entferntere Zimmerecke, Schrankkante oder dergl. Dabei wähle man die Blickrichtung horizontal, lasse den Patienten nicht nach oben oder nach unten sehen. Der Untersucher selbst stelle sich etwas seitwärts, einmal damit im Augenblick der Belichtung die volle Lichtstärke das Auge trifft, und auch, um den Patienten nicht doch zu einer Akkommodationsbewegung zu veranlassen. Man kann dem Patienten auch die ausdrückliche Vorschrift geben: „Sehen Sie an mir vorbei nach der Zimmerecke oder dergl.“ Licht-
reaktion

Wenn man bei Tage untersucht, so hat man die Wahl zwischen Tageslicht und künstlicher Beleuchtung der Pupille. Im ersten Falle stellt man den Patienten möglichst nahe an das Fenster, sich selbst dem Patienten gegenüber mit dem Rücken zur Straße, verdeckt beide Augen des Patienten mit den beiden flachen Händen, gibt ihm auf, die Augen auf zu halten und geradeaus zu blicken (s. oben) und zieht dann rasch eine Hand zur Seite, während man sofort die Pupille beobachtet. Das Verfahren, die Augen schließen zu lassen, bzw. die Lider des Patienten zuerst passiv zu schließen, und dann in die Höhe zu ziehen, ist im allgemeinen nicht so gut, gibt aber manchmal bei schwer belehrbaren Patienten, bei vielen Kindern, auch bei benommenen Patienten, wenn man geeignetes Tageslicht im Krankenzimmer hat, doch raschere Resultate, als das erste Verfahren, wenn man dann auch noch genauer auf die

Akkommodation achten muß. Nicht zu empfehlen ist die Benutzung des direkten Sonnenlichts, weil die Blendungsreaktion störend wirken kann; andererseits muß das Tageslicht eine gewisse Stärke haben, und an trüben Tagen ist man durchaus auf künstliche Beleuchtung angewiesen, die man in der Sprechstunde jetzt im allgemeinen überhaupt vorzieht.

Als künstliche Beleuchtung nimmt man am besten eine der kleinen elektrischen Taschenlampen, wie sie überall zu haben sind. Auch hier ist das nicht geprüfte Auge zu verdecken, während man das zu prüfende offen läßt. Dabei ist dann selbstverständlich dafür zu sorgen, daß dieses Auge nicht von vornherein zu stark belichtet ist. Es genügt aber meist in nicht gar zu hellen Räumen, den Patienten mit dem Rücken gegen das Fenster und 2—3 Meter von diesem entfernt zu prüfen. In Krankensälen, wo allseitige Belichtung vorhanden ist, kommt man dadurch mit leichter Mühe zum Ziel, daß man mit einigen Fingern derselben Hand, die das eine Auge schließt, über dem Augenbrauenbogen des zu prüfenden Auges ein Dach bildet und dabei seinen Körper so wendet und zugleich so weit nähert, daß man damit die Haupttrichtungen des Lichts verstopft. An Stelle der elektrischen Taschenlampe kann man auch einen Reflektor beliebiger Art nehmen. Die direkte Beleuchtung durch ein brennendes Streichholz, eine Tischlampe gibt meist keine genügenden Resultate. Auch die fokale Beleuchtung ist zwar brauchbar, aber wegen der großen Annäherung der Linse an das Auge (Gefahr der Akkommodation) nicht gerade zu empfehlen und jedenfalls immer überflüssig.

Ich würde alle diese Einzelheiten wirklich nicht anführen, wenn ich nicht Dutzende von Malen die Erfahrung gemacht hätte, daß ganz gut reagierende Pupillen als reaktionslos bezeichnet wurden und umgekehrt, und daß man z. B. im ersten Fall eine Tabes diagnostiziert hatte an Stelle eines harmlosen Rheumatismus, oder im zweiten eine Paralyse übersehen hatte.

Solche Irrtümer können nun auch, wenn auch sehr viel seltener, dadurch hervorgerufen werden, daß der Untersucher zwar richtig untersucht, aber die Reaktion falsch beurteilt, daß er also schwach reagierende Pupillen als reaktionslos bezeichnet. Wir müssen also noch darüber handeln, wie ausgiebig denn eine normale Pupillenreaktion zu sein hat. Das ist nun beinahe unmöglich; wer auch nur 20 normale Personen aufmerksam und richtig untersucht hat, der weiß ohnehin, in welchen Grenzen die Ausgiebigkeit der Pupillenreaktion normalerweise schwankt, und wer es nicht getan hat, der muß es noch tun. Trotzdem kann auf einige Punkte aufmerksam gemacht werden. Einmal kann im Alter, in dem auch häufig eine gewisse Enge der Pupillen besteht, die Pupillenreaktion recht gering sein. Man untersucht dann besser im ganz dunklen Raum. Wenn bei alten Leuten aber nur überhaupt eine deutliche, wenn auch geringe Pupillenreaktion besteht, und dabei — wir kommen auf diese Hilfsatsache noch zurück — die Pupillen rund und gleichweit sind, so kann man diese Reaktion unbedenklich als normal und positiv bezeichnen. Zu berücksichtigen ist ferner der Einfluß von

Ausgiebig-
keit der
Reaktion

Giften auf die Pupillenreaktion. Es handelt sich dabei einmal um die lokale Wirkung von Atropin, Eserin etc. Daß es auch schon vorgekommen ist, daß eine Pupille für starr gehalten wurde, weil dem Patienten soeben von einem Kollegen Atropin eingeträufelt war, das sei nur vorsichtshalber erwähnt. Wichtiger ist schon die Tatsache, die mir merkwürdigerweise von einzelnen Ophthalmologen bestritten wurde, daß die Wirkung nicht nur des Atropins, sondern auch des Hom- Atropin
atropins, die angeblich in 24 Stunden vorbei sein soll, in einzelnen Fällen viel länger, bis zu 4 und 5 Tagen die Pupillenreaktion stören kann. Vor allem handelt es sich hier aber bekanntlich um die Wirkung des Morphiums, das, sei es zu therapeutischen Zwecken gegeben, sei es Morphium
bei Morphinisten, zu Miosis und zu fast vollständiger Aufhebung der Pupillenreaktion, demgemäß besonders zur Fehldiagnose Tabes führen kann. Man versäume daher in entsprechenden Fällen niemals, danach zu fragen, ob in den letzten Tagen viel Morphinium gegeben ist.

Daß umgekehrt fälschlich eine spurweise Reaktion für eine positive angesehen wird, also eine fast lichtstarre Pupille als reagierend bezeichnet wird, kommt tatsächlich nur sehr selten vor. Erstens sind die Pupillen meist wirklich völlig starr, und zweitens hat man hier Hilfsmomente in den anderen Eigenschaften der Pupille, die später noch in ihrer besonderen Bedeutung betrachtet werden sollen, die aber als im Zweifelsfalle (!) fast immer entscheidend, hier schon angeführt werden müssen. Diese Hilfsmomente sind in Zweifelsfällen Ungleichheit, deutliche Unregelmäßigkeit oder hochgradige Enge (Stecknadelkopfgroße) der Pupillen. Ist eins von diesen Merkmalen vorhanden und die Reaktion so schwach, daß man zweifelt, dann sind die Pupillen praktisch als lichtstarr zu betrachten.

Es sei aber daran erinnert, daß eine verzogene und starre Pupille auch durch eine alte Iritis verursacht sein kann, und dann natürlich für die neurologische Untersuchung nicht zu verwerten ist.

Stillschweigende Voraussetzung dieser ganzen Betrachtung der Lichtreaktion der Pupille war ferner, daß das Auge nicht blind ist. Einfluß der Amaurose
Selbst in Fällen, in denen eine totale Optikusatrophie besteht, und die Pupille natürlich auch nicht auf Licht reagiert, spricht man nicht von Lichtstarre der Pupille, noch viel weniger etwa bei totaler Amaurose durch Glaukom oder dgl. Die Bezeichnung „Lichtstarre“ hat zur Lichtstarre
Voraussetzung, daß ein Sehen da ist, daß eine lichtempfindliche Retina von den optischen Strahlen getroffen wird, und daß trotzdem keine Pupillenreaktion eintritt.

Lichtstarre der Pupillen (oder auch nur einer Pupille!) ist in jedem Falle Zeichen einer schweren organischen Erkrankung und mit der Annahme Hysterie oder Neurasthenie unvereinbar.

Die Prüfung der Lichtreaktion der Pupillen ist nicht das einzige, wenn auch bei weitem das wichtigste, was an den Pupillen festzustellen ist. Indem wir uns zur Prüfung der Lichtreaktion anschicken, stellen wir ohne weiteres noch eins fest, die Weite der Pupillen. Hier ist Pupillen-
weite
von wesentlicher Bedeutung nicht die absolute Weite der Pupille sondern etwaige Differenzen in der Weite der beiden Pupillen. Allerdings kommen

geringe Differenzen in der Weite der Pupillen bei manchen Personen angeboren vor, und wenn nur ein wenig differente Pupillen prompt auf Licht reagieren, kann man mit dem Symptom im allgemeinen nichts anfangen, und solche Pupillendifferenz ist mit völliger Gesundheit des Nervensystems jedenfalls verträglich¹⁾. Erheblichere Differenzen in der Pupillenweite sind dagegen auf eine organische Erkrankung allerdings außerordentlich verdächtig, auch wenn keine Lichtstarre besteht. Besteht letztere, so ist die Diagnose ja ohnehin sicher. Die absolute Weite gleicher Pupillen gibt nur dann einen Hinweis auf eine organische Erkrankung, wenn sie ganz eng, stecknadelkopfgroß, sind. Sie sind aber dann eben wieder auch lichtstarr, wenn es sich um eine organische Erkrankung handelt (über die Pupillen im Senium und bei Morphinismus vgl. oben, über den epileptischen Anfall unter Epilepsie).

Akkommodation Wenn die Pupillen auf Licht reagieren, so braucht man die Prüfung auf Akkommodation gar nicht vorzunehmen, weil sie dann immer auch auf Akkommodation reagieren. Reagieren die Pupillen aber nicht auf Licht, so hat man auch die Reaktion bei Akkommodation zu prüfen, indem man einen Gegenstand, am besten den Finger des Arztes, zuerst in etwa 1 m Entfernung fixieren läßt und dann unter der Aufforderung, weiter zu fixieren, den Finger allmählich immer weiter gegen das Gesicht des Patienten hin führt. Reagieren lichtstarre Pupillen noch auf Akkommodation, und sehr häufig ist der Unterschied ganz frappant, dann bezeichnen wir das als Argyll-Robertsonsches Phänomen oder reflektorische Starre. Reagieren die Pupillen weder auf Licht noch auf Akkommodation, so sprechen wir von absoluter Starre. Die Bedeutung dieser beiden Arten der Starre fällt nicht ganz zusammen. Für die jetzige Betrachtung geht sie aber nicht weiter als die Bedeutung der Lichtstarre überhaupt, d. h. Argyll-Robertsonsches Phänomen, ebenso wie absolute Starre sind sichere Zeichen einer organischen Erkrankung des Nervensystems.

Reflektorische Starre
Absolute Starre

Untere Extremitäten Von den Augen begeben wir uns sofort zur Untersuchung der unteren Extremitäten — immer wieder eine Gelegenheit zur Verwunderung für den Patienten, der selbstverständlich nicht begreift, was die Untersuchung der Beine zur Aufklärung seiner Kopfschmerzen beitragen könne.

Zur Untersuchung dieser Phänomene muß sich der Patient ausziehen. Sehr zu empfehlen ist, daß der Patient sich von vornherein vollständig entkleidet, was durchzusetzen bei Männern ja keine Schwierigkeit macht. Frauen wird man ja sich nicht auf einmal ganz nackt ausziehen lassen, sondern sie in bekannter Weise sukzessive untersuchen. In der Babinskischen Poliklinik in Paris muß sich auch jede Frau völlig entkleiden. Es bereitet nicht die geringsten Schwierigkeiten und beschleunigt die Untersuchung ungemein. Man sieht dann

¹⁾ Wenn andere Symptome hinzukommen, kann allerdings die Differenz in der Weite lichttüchtiger Pupillen entweder auf eine Okulomotoriusstörung oder auf eine Sympathikusstörung hinweisen, wie weiter unten erwähnt werden wird (S. 58).

auch häufig beim ganz unbedeckten Menschen Dinge, die sonst leicht der Feststellung entgehen, so Wirbelsäulendeformitäten, Wachstumsungleichheiten etc. Daß aber derjenige Körperteil, den man jeweils untersucht, unbedeckt sein muß, darüber sollte wirklich kein Zweifel sein.

Die Achillesreflexe bekommt man manchmal beinahe besser durch die Stiefel hindurch, was die Notwendigkeit nicht ausschließt, sie auch am unbedeckten Fuß zu untersuchen.

An den Beinen gibt es drei Symptome von größter Bedeutung, den Kniereflex, den Achillessehnenreflex und den Fußsohlenreflex.

Der Kniereflex, der ja schon seit langer Zeit fast als wichtigstes aller Prüfungsmittel der Nervenkrankheiten betrachtet wird, wird am besten beim liegenden Kranken geprüft, indem man ihn auffordert, das eine Bein ein wenig über das andere zu legen. Man sage dem Kranken ja nicht, was man tun will, man bemerke nur kurz, daß man seine Beine untersuchen müsse, und lasse ihn dabei seine Beine nicht ansehen, sondern den Kopf rückwärts lehnen und an die Zimmerdecke sehen. Der größte Fehler, den man machen kann ist der, daß man von vornherein dem Kranken aufgibt „nicht zu spannen“. Hat er es bis dahin noch nicht getan, so tut er es nun sicher. Verfährt man ruhig, so braucht man den Jendrassik'schen und andere Handgriffe nur in einer verschwindenden Minderzahl der Fälle, ich schätze auf 1—2%. Man kann den Patienten natürlich auch sitzen und ihn wie üblich die Beine übereinander schlagen, oder auch die Beine nebeneinander im Knie in stumpfem Winkel gebeugt mit der Hacke lose auf den Fußboden aufstellen lassen. Man kann den Patienten sich auch auf einen Tisch setzen und ihn die Beine lose herunterhängen lassen.

Patellar
reflex

Der Schlag auf die Sehne soll kurz und federnd sein. Man kann ihn mit dem Perkussionshammer, der Kante einer Elektrode, einem Lineal oder dgl. ausführen. Die bloße Hand eignet sich nicht so gut dazu, mindestens ist dazu dann eine gewisse besondere Übung erforderlich.

Man achte dann nicht nur auf die Streckbewegung des Unterschenkels, sondern sehe sich auch die Quadrizepszuckung selbst an. Letztere ist manchmal viel deutlicher und sicherer als erstere.

Wenn man keinen Reflexerfolg sieht, so kann man einen der sogenannten Kunstgriffe anwenden, welche wesentlich den Zweck verfolgen, die Aufmerksamkeit des Patienten abzulenken, und von denen der Jendrassik'sche immer noch als ausreichend und vielleicht als der beste erscheint. Man wendet ihn zweckmäßig so an, daß man seine (des Untersuchers) linke Hand in die eine des Patienten legt (nicht also den Patienten seine eigenen Hände auseinander ziehen läßt) und ihm aufgibt bei 1, 2, 3 die Hand des Untersuchers kräftig zu drücken. Das hat gegenüber der anderen Methode den Vorzug, daß man weiß, wann der Patient drückt. In diesem Augenblick führt man dann den Schlag gegen die Sehne.

Kunst-
griffe

Es kommt ganz außerordentlich selten, eigentlich wohl niemals vor, daß man nicht zu einem bestimmten Resultat kommt.

Achilles-
sehnen-
reflex

Nicht ganz so leicht zu beurteilen ist der Achillessehnenreflex, d. h. die reflektorische Kontraktion der Wadenmuskulatur bei Beklopfen der Achillessehne. Wenigstens lehrt mich meine persönliche Erfahrung, daß selbst Geübtere den Reflex nicht so ganz selten als fehlend bezeichnen, da wo er doch vorhanden ist.

Man prüft den Achillessehnenreflex, indem man beim liegenden Patienten das Bein durch entsprechende Unterstützung des Fußes passiv etwas beugt und zugleich den Fuß etwas dorsal flektiert; dann fühlt man bei positivem Reflex die Plantarflexion des Fußes sehr deutlich. Oder man läßt den Patienten, das Gesicht nach der Lehne, auf einen Stuhl knien, die Beine recht weit dabei auf den Sitz schieben, so daß die Tibia etwa eine Handbreite über den Sitz noch hervorsteht und klopfe dann auf die Sehne. Man kann sich durch vorheriges Zufassen davon überzeugen, daß der Kranke nicht zu sehr spannt. Auch hier versuche man es zuerst ohne mündliche Vorschriften an den Kranken auszukommen; sonst sind die Kunstgriffe entsprechend wie beim Patellarreflex. Manchmal tut man gut auch bei knieendem Patienten den Fuß passiv etwas dorsal zu beugen, um die Sehne anzuspannen. Die Schwierigkeit bei der Beurteilung des Reflexes, soweit überhaupt eine solche vorhanden ist, liegt manchmal darin, die rein mechanische Wirkung des Schlages — die Sehne zieht beim Schlage naturgemäß etwas am Calcaneus — von einer reflektorischen Wirkung zu unterscheiden, hier muß man sich eben eine gewisse Übung verschaffen.

„Ver-
stärkte
Reflexe“

Die Beurteilung sowohl des Patellar- wie des Achillessehnenreflexes wird nun ganz wesentlich dadurch erleichtert, daß es zunächst nur darauf ankommt, ob die beiden Reflexe überhaupt da sind, oder ob sie nicht da sind. Es ist ein beinahe allgemein verbreiteter Irrtum, daß man aus der Stärke des Patellarreflexes etwas schließen könne, z. B. daß bei lebhaften oder — der gewöhnliche und ganz fehlerhafte Ausdruck — bei „verstärkten“ Patellarreflexen etwa ein Verdacht auf eine organische Erkrankung gegeben sei. Die Stärke des Patellarreflexes schwankt normalerweise in so weiten Grenzen, daß man mit der Beurteilung der Stärkegrade gar nichts anfangen kann. Selbst sehr starke Reflexe sind mit nervöser Gesundheit, oder mit Neurasthenie, Hysterie u. dgl. durchaus vereinbar, wenn sie nicht zugleich besondere Merkmale aufweisen¹⁾, auf die wir später (S. 18) zurückkommen. Ebenso sind sehr schwache Reflexe noch nicht pathologisch. Unbedingt pathologisch ist nur das Fehlen der Reflexe oder auch nur eines Reflexes, wenn das nicht durch augenscheinliche Veränderungen in der Nähe der Sehne, z. B. Gelenkergüsse u. dgl., bedingt ist²⁾. Pathologisch ist ferner

Fehlen der
Reflexe

¹⁾ Auch die Ausdehnung der „reflexogenen Zone“, z. B. die Möglichkeit, durch Beklopfen der Tibia noch einen Patellarreflex auszulösen, ist an und für sich nicht pathologisch.

²⁾ Daß Fehlen der Patellarreflexe angeboren und ohne weitere Bedeutung ist, kommt unter vielen tausend Fällen einmal vor; daß bei hysterischen Lähmungen zeitweise der Kniereflex nicht auszulösen ist, hat wohl die große Mehrzahl der Neurologen überhaupt noch nicht gesehen, und die Fälle, in denen das bisher beobachtet ist, lassen sich an den fünf Fingern einer Hand abzählen. Mit diesen Eventualitäten rechnet man am besten gar nicht.

eine sehr deutliche unzweifelhafte Differenz in der Stärke der beiderseitigen Reflexe, wenn etwa also der eine Patellarreflex sehr lebhaft und der andere kaum auszulösen ist. In der Tat werden nämlich solche angebliche Differenzen viel häufiger gefunden als sie da sind, und die Angaben darüber, ebenso wie die über die absolute Stärke der Reflexe zu Folgerungen über einen zugrunde liegenden Krankheitsprozeß, z. B. in Gutachten, in ganz unrichtiger Weise benutzt.

Differenz
der beiden
Seiten

Um auf die Beurteilung der absoluten Stärke des Patellarreflexes zurückzukommen, so ist außer dem Fehlen noch sicher pathologisch eine Verstärkung zum Patellar- bzw. zum Fußklonus. Denn Patellar- und Fußklonus sind nur Verstärkungen des Patellar- und Achillessehnenreflexes, wenn sie auch in anderer Weise hervorgerufen werden müssen, als durch die Beklopfung der Sehnen mit dem Hammer. Den Patellarklonus prüfen wir, indem wir, die Hand oberhalb der Patella, diese mit Daumen und Zeigefinger umfassen und mit einem Ruck fußwärts drängen. Den Fußklonus prüfen wir, indem wir den Fuß am besten bei leicht gebeugtem Knie in entsprechender Weise dorsalwärts drängen. Aus der Bewegung, die wir so ausüben und aus der reflektorischen Gegenbewegung des Muskels ergibt sich dann das regelmäßige rhythmische Spiel des Muskels, das wir Klonus nennen.

Klonus

Auch hier gibt es wieder eine, wenn auch recht selten in Erscheinung tretende Schwierigkeit, den „Pseudoklonus“, es gibt Hysterische und Neurasthenische, die auch eine Art Klonus haben, aber der ist schneller und zugleich unregelmäßiger als der „echte“ und tritt anscheinend nur dann auf, wenn der Kranke gegen den dorsal gerichteten Druck des Untersuchers aktiv plantarwärts flektiert. Es ist also darauf zu achten, daß er das nicht tut. Ferner tut man gut, nur die Fälle als echte Klone zu zählen, die nicht nach 3—4 Schlägen wieder aufhören, sondern nur diejenigen, welche dauernd sind. Es kommt ja vor, daß man auch auf weniger ausgeprägte Klone etwas geben kann, aber dann sind regelmäßig noch andere Symptome eines organischen Nervenleidens da. Für sich allein beweist nur der echte Dauerklonus etwas.

Pseudo-
klonus

Dauer-
klonus

Wir haben dann endlich noch ein Symptom von allergrößter Bedeutung an den unteren Extremitäten, den Fußsohlenreflex. Dieses Symptom ist verhältnismäßig neu. Während früher fast allgemein die Annahme bestand, daß beim Berühren der Fußsohle zuerst eine Dorsalflexion der Zehen eintrete, hat Babinski zuerst gezeigt, daß die normale Reaktion im Gegenteil die Plantarflexion und daß die Dorsalflexion der Zehen pathologisch sei. Man spricht seitdem von einem „positiven Babinski“ wenn die Reaktion pathologisch, von einem negativen, wenn sie normal ist. Man prüft den Fußsohlenreflex, indem man mit einem der Empfindlichkeit des Untersuchten angepaßten Gegenstand mäßig schnell der Länge nach und zwar von hinten nach vorn über die Fußsohle fährt. Bei sehr empfindlichen Patienten, auch bei Kindern, nimmt man am besten die Fingerkuppe bzw. den Fingernagel, sonst den Stiel des Perkussionshammers, einen Bleistift oder dgl., bei sehr schwer reagierenden eine Nadel. Man streicht zweckmäßig nicht weit vom äußeren Fußrand und achte darauf,

Positiver
und
negativer
Babinski

daß man weit genug nach vorn kommt (wenn der Reflex nicht schon früher eingetreten ist), d. h. bis über die Köpfchen der Metatarsalknochen. Die Ruhestellung der Zehen ist ohne Belang. Der Reflex kann bei plantar stehenden Zehen positiv und bei dorsal stehenden negativ sein und dann ist die Richtung der reflektorischen Bewegung entscheidend. Beweisend für den Ausfall des Reflexes ist in erster Linie das Verhalten der großen Zehe. Es ist also pathologisch eine Dorsalflexion der großen Zehe (Fig. 1), und zwar kommt es noch darauf an, ob sie primär erfolgt. Wenn, was bei nicht ganz adäquater Reizung oft geschieht, zuerst eine Plantarflexion der Zehe und dann eine Dorsalflexion eintritt, „gilt“ die Plantarflexion. Das Verhalten der anderen Zehen ist verschieden,




Fig. 1. Positiver Babinski.

am auffälligsten ist das pathologische Verhalten der großen Zehe dann, wenn die 2.—5. Zehe sich zugleich plantar flektieren. Bedingung aber für die Anerkennung des „Babinski“ ist das nicht. Die kleinen Zehen können auch mit der großen zusammen dorsalflektiert werden. Im allgemeinen soll man eine Dorsalflexion des ganzen Fußes vermeiden; es ist das aber nicht immer möglich, und auch bei einer leichten Dorsalflexion des Fußes kann die Dorsalflexion der Zehe ganz überzeugend sein. Gerade in diesen Fällen muß man aber besonders darauf achten, ob der Extension der ersten Zehe nicht etwa eine Plantarflexion vorausgegangen ist. Am deutlichsten ist die Extension der Zehe dann, wenn sie langsam erfolgt, und in der Mehrzahl der Fälle ist das der Fall, aber eine unbedingte Regel ist das auch nicht. Es ist auch zuzugeben, daß in einer Reihe von Fällen der „Babinski“ auch für den Geübten

Zweifel-
hafter
Ausfall

zweifelhaft bleibt, so daß man nur Verdacht schöpfen kann und sich nach anderen Zeichen richten muß, aber diese Fälle sind doch die sehr große Minderzahl.

Ein zweifellos positiver Babinski aber bedeutet unter allen Umständen eine organische Erkrankung des Nervensystems — mit drei Ausnahmen: 1. Bei Kindern bis etwa zum Beginn des 3. Lebensjahres kann die Dorsalflexion normal sein, bei Neugeborenen ist sie sogar beinahe physiologisch.

Babinski
bei Kin-
dern und
Neuge-
borenen

2. Kommt der Babinski in narkotischen und komatösen Zuständen (z. B. nach Skopolamininjektionen oder bei Urämie), wenn auch keineswegs regelmäßig, als Folge der Vergiftung des Nervensystems vor.

Babinski
in Narkose
und im
Koma

3. Kommt der Babinski vorübergehend (d. h. selten länger als Stunden) nach epileptischen und paralytischen Anfällen vor.

Babinski
nach epi-
leptischen
und para-
lytischen
Anfällen

Alle diese drei Ausnahmen bestätigen im wahrsten Sinne nur die Regel, denn sie beruhen (1.) auf der Nichtentwicklung oder auf der vorübergehenden Außerfunktionssetzung (2. und 3.) derjenigen Teile des Nervensystems, deren dauernde Schädigung in den anderen Fällen den positiven Babinski bedingt. So sind die Ausnahmen nur eine Illustration zu dem, was wir über die Undurchführbarkeit der scharfen Trennung von organischen und (im früheren Sinne vgl. S. 1) funktionellen Erkrankungen sagten (S. 1). Praktisch ist es natürlich notwendig, die drei „Ausnahmen“ des Babinski bei der Diagnose zu berücksichtigen.

Von gar keiner praktischen Bedeutung ist zunächst das Fehlen oder die schwere Auslösbarkeit des Sohlenreflexes. Die Frage ist nur: Babinski positiv oder negativ?

Fehlen des
Sohlen-
reflexes

Hat man nun eines von den bisher genannten Symptomen an der Pupille, an den Sehnenreflexen der unteren Extremitäten und dem Sohlenreflex positiv gefunden, so ist man sicher, daß eine organische Erkrankung vorliegt und die Untersuchung wird dann in bestimmte Bahnen gelenkt, die wir weiterhin besprechen werden. Hat man sie negativ gefunden, so ist noch eins die Pflicht eines ordentlichen Arztes, ohne deren Erfüllung er sein Gewissen unmöglich beruhigt fühlen kann: die ophthalmoskopische Untersuchung. Jeder Arzt sollte imstande sein, ohne künstliche Erweiterung der Pupille so weit zu ophthalmoskopieren, daß er einen zweifellos normalen Befund an der Papille als solchen erkennt. Die künstliche Erweiterung der Pupille durch Homatropin muß für seltene Fälle mit zweifelhaftem Befund oder mit ganz engen Pupillen, oder für unruhige und benommene Kranke reserviert bleiben. Die Atropinisierung stört nicht nur den Patienten in seiner Arbeitsfähigkeit, sondern kann auch dem etwa zugezogenen Spezialisten die Beurteilung der Pupillen unmöglich machen. Denn daß man auf die bloße Versicherung, die Pupillen hätten vor der Atropinisierung reagiert oder nicht reagiert, entscheidenden Wert nicht immer legen kann, ist eine Erfahrung, die wir oben begründet haben.

Ophthal-
moskopie

Kein un-
nützes
Atropin

Was nun jeder Arzt bei der ophthalmoskopischen Untersuchung ausschließen oder sehen muß, ist in erster Linie Neuritis optica bzw. Stauungspapille. Nicht so häufig kommt Optikusatrophie in Be-

Neuritis,
Stauungs-
papille,
Optikus-
atrophie

tracht, letztere entweder in der totalen (genuinen oder neuritischen) Form, oder in der auf die temporale Hälfte der Papille beschränkten Form, der „temporalen Abblassung“. Über das, was in diesen Richtungen pathologisch ist oder nicht, hat natürlich in letzter Linie der Ophthalmologe zu belehren. Hier sei nur darauf aufmerksam gemacht, daß es eine „Pseudoneuritis optica“ gibt, welche allerdings wesentlich nur bei Hypermetropie vorkommt und wohl eine Entwicklungsanomalie darstellt, und daß man mit der Diagnose „temporale Abblassung“ im pathologischen Sinne sehr vorsichtig sein soll, weil eine mäßige Blässe der temporalen Papillenhälften physiologisch häufig ist. Auch der Neurologe vom Fach wird übrigens gewiß gern in zweifelhaften Fällen mit dem Ophthalmologen beraten; aber zur Erkennung der groben und sicheren Anomalien, wie vor allem zu einem Urteil in den weitaus meisten Fällen, daß der Augenhintergrund normal ist, muß nicht nur der Neurologe, sondern auch jeder praktische Arzt fähig sein, der sich auch nur einigermaßen mit Nervenkranken beschäftigen will.

Wert der
bisher ge-
nannten
Symptome
für die
Diagnose
für die Aus-
schließung
einer or-
ganischen
Nerven-
krankheit

Wenn man eine sichere Neuritis optica, eine Stauungspapille oder eine Optikusatrophie festgestellt hat, so ist die Diagnose einer organischen Nervenkrankheit ebenso gesichert, wie durch eine Lichtstarre der Pupille, Fehlen des Patellar- oder Achillessehnenreflexes oder durch einen positiven Babinski.

Wenn andererseits keines dieser Symptome vorhanden ist, so wird das Bestehen einer organischen Nervenkrankheit ganz außerordentlich unwahrscheinlich und ich glaube, behaupten zu können, daß wenn nur die genaue und zuverlässige Untersuchung dieser wenigen Symptome allgemein verbreitet wäre, mehr als 90 % der groben diagnostischen Fehler vermieden werden könnten, die einfach darin bestehen, daß schwere organische Nervenkrankheiten für Hysterie oder umgekehrt Hysterie für eine organische Nervenkrankheit gehalten wird.

3. Motilitätsausfälle. Pyramidenzeichen.

Nachdem wir im vorigen Kapitel die allerwichtigsten Symptome der Nervenkrankheiten gewürdigt haben, müssen wir nun ein wenig in eine systematische Symptomatologie eintreten. Es ist das durchaus nötig, um später Wiederholungen vermeiden zu können. Diejenigen Symptome, die eine nur spezielle Bedeutung für einzelne Krankheiten haben, werden jedoch später behandelt werden. Bei der Schilderung der einzelnen Symptome werden wir uns überall mit ihrer Lokalisation zu befassen haben, denn in der Neurologie schließt fast jede Diagnose einer Krankheit zugleich eine Lokaldiagnose ein, in viel höherem Grade als das bei irgend einem anderen Organ der Fall ist. Niemals ist das ganze Nervensystem befallen, wie etwa bei vielen Leberkrankheiten das ganze Leberparenchym befallen ist, sondern immer nur sind Teile des Nervensystems erkrankt, und sehr häufig — wenn auch keineswegs immer — ist es so, daß wir vorzugsweise aus der diagnostizier-

baren Lokalisation der Erkrankung einen ziemlich sicheren Schluß auf die Art der Erkrankung ziehen, weil wir wissen, daß ein bestimmter ätiologischer Faktor oder eine Erkrankung einer gewissen histologischen Eigenart fast immer das Nervensystem in dieser oder jener charakteristischen Lokalisation und Verteilung befällt.

Auch die praktische Diagnostik wird in ganz außerordentlichem Maße erleichtert, wenn man nicht immer gleich nach dem Krankheitsnamen fragt, sondern sich immer zuerst die Frage vorlegt, wo denn der Ort der Schädigung ist. Selbst bei einem im allgemeinen so einheitlichen Bilde wie dem der Tabes können Irrtümer vorkommen, wenn man nicht zuerst davon ausgeht, daß eine Erkrankung der hinteren Wurzeln vorliegt, und erst dann fragt, ob die Ursache dieser Erkrankung auch die tabische Degeneration sei, so rasch auch in der Mehrzahl der Fälle diese diagnostische Zwischenstation übersprungen werden wird und übersprungen werden kann.

Notwendigkeit einer „allgemeinen Lokaldiagnose“

Wir betrachten in diesem Kapitel nur die Lokalisation der einzelnen Symptome; die praktische Lokaldiagnose aus Symptomenkomplexen, also die Lokaldiagnostik des Rückenmarks und Gehirns, wird erst in späteren Kapiteln (S. 92 und S. 112) gegeben werden.

Ein ganz besonderes Augenmerk werden wir ferner in Verfolgung des im ersten Kapitel begründeten Grundgedankens der Unterscheidung der organischen und funktionellen Störungen immer darauf richten, ob die einzelnen zu schildernden Symptome bei den Psychoneurosen, der Neurasthenie und der Hysterie vorkommen.

So betrachten wir zunächst die motorischen Ausfallserscheinungen, d. h. die Überlegungen, die wir über die Örtlichkeit der Läsion anzustellen haben, wenn der Patient über Lähmung oder über Schwäche klagt, oder wenn wir etwa zufällig solche Ausfälle entdeckt haben, von denen der Kranke gar nichts gewußt zu haben braucht.

Motorische Ausfallserscheinungen

Wir können zu diesem Zwecke die motorische Bahn, welche von der Großhirnrinde beginnt und im Muskel endet, in drei Abschnitte teilen (Fig. 2). Der erste Abschnitt (I) umfaßt die Großhirnrinde selbst, der zweite Abschnitt (II) beginnt in den Zellen der Rinde, in welcher die zentrifugalen Bahnen entspringen (aller Wahrscheinlichkeit nach den Beetzschen Riesenpyramidenzellen) und endet vor den Zellen der Vorderhörner, der dritte Teil (III) beginnt in den Zellen der Vorderhörner und endet im Muskel. Den Zellen der Vorderhörner sind die Zellen der Hirnnervenkerne gleichwertig.

Einteilung der motorischen Bahn

Zu den motorischen Störungen des ersten intrakortikalen Abschnitts gehören vor allem die hysterischen Störungen. Wir gehen, entsprechend unseren allgemeinen Grundsätzen (S. 2) vorläufig am sichersten, wenn wir sie nicht positiv, sondern negativ, d. h. durch den Ausschluß der beiden anderen Lokalisationen diagnostizieren. Für diese beiden anderen Lokalisationen haben wir positive Merkmale.

Hysterische Störungen

Der zweite Abschnitt, beginnend an den Beetzschen Riesenpyramidenzellen an der Grenze von Rinde und Mark und endend vor den Vorderhorn- bzw. Hirnnervenzellen, ist die Pyramidenbahn; die

Pyramidenzeichen Symptome ihres Ausfalls fassen wir als Pyramidenzeichen zusammen.

Es ist nun zu merken, daß die wichtigsten, weil ganz objektiven Pyramidenzeichen auf dem Gebiete der Reflexe liegen, und wir haben unter den wenigen bisher schon besprochenen Symptomen bereits nicht weniger als drei Pyramidenzeichen gehabt, nämlich den Babinskischen

Klonus

Ort der Pyramidenschädigung zunächst unbestimmbar




Fig. 2. Einteilung der motorischen Bahn.

I = Intrakortikale Strecke. II = Pyramidenbahn.
III = Periphere Strecke aus dem Vorderhorn zum Muskel.

Reflex, den Patellarklonus und den Fußklonus. Wo wir eins dieser drei Zeichen haben, können wir mit Sicherheit annehmen, daß die Pyramidenbahn an irgend einer Stelle ihres Verlaufs zwischen der Rinde der einen Seite und dem Vorderhorn der anderen Seite geschädigt ist. Finden wir die Pyramidenzeichen einseitig, so wissen wir, welche Pyramide betroffen ist. Wo der Ort dieser Schädigung ist, ob die Riesenpyramidenzellen, ob die innere Kapsel, ob Pons, ob Medulla oblongata, ob die Kreuzung selbst an der Grenze von verlängertem Mark und Rückenmark (hier wechselt also die betroffene Seite!), ob endlich die Pyramidenstränge des Rückenmarks¹⁾, das können wir aus den Pyramidenzeichen noch nicht sagen, aber sie sind eben darum so ungeheuer wichtig, weil sich der Verlauf der Pyramiden durch das ganze zentrale Nervensystem erstreckt, und weil

wir sie deshalb bei einer so großen Anzahl von Erkrankungen des zentralen Nervensystems finden. Wir finden sie also bei den meisten Hirnblutungen und Erweichungen, bei vielen Hirn-

¹⁾ Wie aus der Anatomie bekannt (vgl. auch Fig. 11), teilt sich die Pyramidenbahn an der Grenze von verlängertem Mark und Rückenmark in einen kreuzenden Anteil, die Pyramidenseitenstrangbahn, und einen ungekreuzten Anteil, die Pyramidenvorderstrangbahn. Die Funktion dieser letzteren, der ungekreuzten Pyramidenvorderstrangbahn, muß eine sehr unbedeutende sein, denn alles was wir über die Zeichen der Pyramidenläsion wissen, bezieht sich auf den Pyramidenseitenstrang. In diesem Sinne also ist Pyramidenkrankung klinisch immer der Ausdruck einer Seitenstrangerkrankung.

geschwülsten, sei es daß diese in der Pyramidenbahn selbst ihren Sitz haben, oder sie nur irgendwo auf ihrem Verlauf, z. B. in der inneren Kapsel oder der hinteren Schädelgrube durch Druck aus der Nachbarschaft schädigen, wir finden sie bei vielen Verletzungen des Gehirns, fast regelmäßig bei Verletzungen, Kompressionen oder auch bei Geschwülsten des Rückenmarks, wir finden sie bei der Mehrzahl der multiplen Sklerosen, weil deren Herde meist an irgend einer Stelle des Verlaufs die Pyramidenbahn beteiligen, wir finden sie aus demselben Grunde bei Syringomyelie etc., wir finden sie endlich bei den Strangenerkrankungen, welche die Pyramiden beteiligen.

Sowohl von den oben bisher schon angeführten, wie den gleich noch zu besprechenden Pyramidenzeichen gilt eine Grundregel: Sie brauchen niemals alle zusammen vorhanden zu sein, sondern ein einziges Zeichen, wenn es nur sicher festgestellt ist, genügt, um die Pyramidenschädigung zu erweisen. Bei Fällen mit ausgesprochener Lähmung sind häufig alle Zeichen da; wir wissen auch nicht, warum manchmal dieses oder jenes oder die Mehrzahl der Pyramidenzeichen fehlt, aber wenn etwa der Babinski allein vorhanden ist ohne Fußklonus, so ist das genau so beweisend, wie wenn der Fußklonus vorhanden, der Babinski aber negativ ist.

Wichtig-
keit der
einzel-
nen
Zeichen

Der Grund, warum die nunmehr zu schildernden anderen Pyramidenzeichen nicht einen so großen Wert haben, wie die in Kap. 2 berichteten, liegt zum Teil darin, daß die einen (Bauchdeckenreflex) unter manchen Umständen fehlen können, die mit Nervenkrankheiten nichts zu tun haben, die anderen seltener vorkommen und schwerer zu prüfen sind.

Der Bauchdeckenreflex wird dadurch hervorgerufen, daß man mit dem Stiel des Perkussionshammers, einem Streichholz, der Spitze einer Nadel, entweder parallel oder senkrecht zur Mittellinie leicht und schnell über die Bauchwand streicht. Man sieht dann die Einziehung des Bauches oder die seitliche Verziehung des Nabels. Der Bauchdeckenreflex ist ein normaler Reflex und Pyramidenzeichen ist das Fehlen des Bauchdeckenreflexes, aber nur dann, wenn das Fehlen keine anderen Gründe hat. Solch ein Grund kann z. B. hochgradige Schlaffheit der Bauchdecken hauptsächlich bei Frauen sein, oder sehr große Adipositas, bei welcher der Reflex vielleicht da ist, man ihn aber schlecht oder gar nicht sieht. Ein weiterer Grund sind entzündliche Prozesse (Typhus, Appendizitis) oder große Tumoren im Bauchraum. Drittens endlich kann er wie die meisten Hautreflexe auch bei Anästhesien jeden Ursprungs, bei organischen und hysterischen und zwar einseitig und doppelseitig fehlen. Trotzdem bleibt er ein recht wichtiges aber eben nicht fundamentales Zeichen. Sein doppelseitiges Fehlen bei jungen Menschen mit zweifelhaften Symptomen ist besonders häufig auf Beteiligung der Pyramidenbahn durch multiple Sklerose verdächtig.

Bauch-
decken-
reflex

Noch weit weniger wichtig ist der Kremasterreflex, erhältlich durch Streichen der Innenseite des Oberschenkels und bestehend in einer Kontraktion des Kremaster bzw. einer Hebung des Hodens. Pyramidenzeichen ist, analog wie beim Bauchdeckenreflex sein Fehlen, das wir auch meist bei organischen Hemiplegien finden, aber eine selbständige Bedeutung in Zweifelsfällen hat er nicht.

Kre-
master-
reflex

Fuß-
rücken-
reflex

Zu erwähnen ist noch der Bechterew-Mendelsche „Fußrückenreflex“, erhältlich durch Beklopfen des Fußrückens am besten in der Gegend des Os cuboideum III, beim Gesunden sieht man dann entweder nichts oder eine Dorsalflexion der 2. bis 5. Zehe, Pyramidenzeichen ist (umgekehrt wie beim Babinski!) die Plantarflexion. Aber das Symptom ist auch bei Pyramiden-erkrankungen selten.

Unter-
schenkel-
reflex

Der Oppenheimsche Unterschenkelreflex wird erzeugt, indem man mit dem Stiel des Perkussionshammers oder mit der Pulpa des Daumens in kräftigem Zuge von oben nach unten über die Innenfläche des Unterschenkels an der Tibia entlang fährt. Normal ist dann Plantarflexion des Fußes und der Zehen, Pyramidenzeichen die Dorsalflexion. Der Reflex ist schwer zu beurteilen, viel seltener als der Babinski und hat außerdem den Nachteil, daß er dem Patienten sehr unangenehm ist. Man überläßt ihn ebenso wie den vorigen am besten dem Neurologen vom Fach, der ihn in einer kleinen Anzahl von Fällen mit Nutzen verwenden wird.

Gekreuzter
Adduk-
torenreflex

Von größerer Bedeutung als die letztgenannten und auch leichter zu prüfen erscheint mir noch der im allgemeinen wenig bekannte sogenannte gekreuzte Adduktorenreflex. Es handelt sich darum, daß bei der Auslösung des Patellarreflexes zugleich eine Zuckung der Adduktoren des Oberschenkels der anderen Seite eintritt. Man muß nur genau zusehen, und die Kontraktion selbst beobachten; sonst kann man durch mechanische Erschütterungen der Unterlage getäuscht werden. Der Reflex ist ein Pyramidenzeichen und zwar derjenigen Seite, wo die Adduktoren zucken. Er ist auch sehr häufig vorhanden. Sein Wert wird nur dadurch etwas eingeschränkt, daß man ihn zuweilen auch bei Fällen schwerer Kachexie (bei Karzinom, Tuberkulose) beobachtet. Wenn er auch da vielleicht auf einer ganz leichten Pyramidenstörung beruhen mag, so ist er eben ein etwas zu feines Reagens.

Steigerung
der Seh-
nenreflexe

Ein Pyramidenzeichen kann endlich die Steigerung der Sehnenreflexe bzw. der Periostreflexe schlechthin sein. Es war aber bereits früher (S. 10) darauf hingewiesen worden, daß wir diese Steigerung nur dann als organisches Zeichen betrachten können, wenn entweder ganz bestimmte Reaktionen vorliegen (Klonus, auch der eben genannte gekreuzte Adduktorenreflex kann als eine Form pathologischer Steigerung eines Sehnenreflexes aufgefaßt werden) oder wenn ganz sichere Unterschiede in der Stärke der Reaktion beider Seiten vorliegen — wobei dann noch manchmal die Schwierigkeit vorliegt, zu unterscheiden, ob der eine Reflex pathologisch verstärkt oder der andere pathologisch abgeschwächt ist. Während wir an den unteren Extremitäten aber im allgemeinen die genannten besonderen Merkmale besitzen, haben wir an den oberen keines außer der Verstärkung und sie muß dann eben mit der nötigen Reserve *faute de mieux*¹⁾ als ein Pyramidenzeichen angesehen werden.

Obere Ex-
tremi-
täten, Tri-
zepsreflex

Von den Sehnenreflexen der oberen Extremität ist am leichtesten und sichersten, unter normalen Bedingungen regelmäßig, der Trizepsreflex auszulösen, indem man bei gebeugtem Arm nahe dem Olecranon auf die Trizepssehne schlägt. Ferner kommen noch der Radiusperiost-

¹⁾ Echte Klone der oberen Extremitäten kommen vor, sind aber so selten, daß man gar nicht damit rechnen kann.

reflex und der Ulnaperiostreflex, auszulösen durch Schlag auf den Knochen nicht weit oberhalb des Handgelenks, in Frage.

Vom Babinskischen Reflex war bereits erwähnt, daß sein Wert eingeschränkt wird durch drei Ausnahmen, sein Vorkommen 1. beim Neugeborenen und beim jungen Kinde, 2. in manchen Fällen von Koma und Narkose, 3. nach epileptischen und paralytischen Anfällen. Das gleiche gilt vom Fußrückenreflex und vom Unterschenkelreflex. Der Bauchdeckenreflex kann abgesehen von den bereits oben erwähnten Ausnahmen nach paralytischen und epileptischen Anfällen auch fehlen. Fußklonus kann unter denselben Umständen eintreten. Selbst in den Ausnahmen bewähren sich die Zeichen noch als Pyramidenzeichen; so beruht der Babinski beim Neugeborenen darauf, daß die Pyramidenbahn hier noch unentwickelt und marklos ist, so ist auch durch das urämische Koma die Pyramidenbahn vergiftet, so ist sie nach einem epileptischen Anfall „erschöpft“. Praktisch aber sind das alles wohl zu beachtende Ausnahmen, weil wir ja vorläufig nur nach Zeichen einer organischen Schädigung fahnden. Sie sind auch nicht gar so gefährlich, weil die Pyramidenzeichen selbst im urämischen Koma, wo sie am häufigsten sind, nur in einer Minderzahl von Fällen vorkommen, und weil weder diese Fälle noch die postepileptischen Zustände so zu liegen pflegen, daß wir aus einem Symptom eine Indikation zu einem bestimmten therapeutischen Eingriff ableiten und nicht noch etwas abwarten könnten. Und vor allem bleibt der Wert des negativen Ausfalls der Pyramidensymptome ganz unberührt.

Wir haben aus guten Gründen bisher den Hauptausfall, der infolge der Störung der Pyramidenleitung eintritt, noch nicht berührt, nämlich die Lähmung der willkürlichen Bewegung. Denn einmal sind die Reflexe ein häufig viel feineres Reagens als die motorische Tüchtigkeit. So finden wir etwa noch Jahre lang nach einer Kopfverletzung bei einer zufälligen Untersuchung einen einseitigen Babinski bei einem Mann, der seine schwere Arbeit längst wieder aufgenommen hat. So finden wir einen Babinski oder fehlende Bauchdeckenreflexe als Anfangszeichen einer multiplen Sklerose, deren Träger subjektiv nur über Schwindel und Kopfschmerzen klagt etc. Und andererseits ist die Deutung der Bewegungsstörung an und für sich lange nicht so zuverlässig, wie die Reflexe. In der Tat sind wir gerade auch bei ausgesprochenen Lähmungen eben häufig ohne die Prüfung der Reflexe gar nicht sicher, ob die Lähmung eine intrakortikale, z. B. hysterische, oder eine pyramidale ist. Wenn freilich ein alter Mann eine Apoplexie bekommt und danach die ganze eine Körperhälfte vom Gesicht bis zum Bein gelähmt ist, so brauchen wir allerdings im allgemeinen überhaupt keine Untersuchung. Aber so einfach liegen die Dinge eben nicht immer. Die Frage, ob eine Monoplegie etwa hysterisch oder organisch ist, taucht durchaus nicht selten auf und daß z. B. hysterische Paraplegien nach Wirbeltrauma jahrelang als organisch angesehen und entsprechend falsch behandelt wurden, ist mehr als einmal vorgekommen. Es ist auch gar nicht möglich, mit Sicherheit aus der Lähmung selbst die Diagnose organische oder hysterische Lähmung zu stellen; insbesondere

Radius-
und Ulna-
reflex
Einschrän-
kung des
Wertes der
Pyrami-
denzeichen

Pyrami-
denläh-
mung

Prädilektionstypus

kann sowohl die hysterische Lähmung mit Kontrakturen verbunden, wie die organische völlig schlaff sein. Nur anmerkungsweise sei darauf aufmerksam gemacht, daß Pyramidenlähmungen mittlerer Schwere eine gewisse Verteilung, den sogenannten Wernickeschen Prädilektionstypus aufzuweisen pflegen in der Weise, daß am Bein die Kniestrecker weniger gelähmt sind, als die Kniebeuger, die Dorsalflexoren des Fußes weniger als die Plantarflexoren und daß zugleich die weniger gelähmten Muskeln die mehr kontrakturierten sind. Am Arm sind es besonders die Flexoren des Unterarms und die Beuger der Finger, die weniger beteiligt (und zugleich stärker kontrakturiert sind) als ihre Antagonisten. Auch dieser Prädilektionstyp ist ganz unabhängig von dem Ort, wo die Pyramidenbahn getroffen ist, er bezeichnet nur die Pyramidenbahn als Ganzes. Wenn der Prädilektionstyp da ist, wird ihn der einigermaßen Geübte ohne weiteres als Pyramidenzeichen erkennen, aber es gibt von ihm viele Ausnahmen (z. B. Beugekontrakturen am Bein) und nicht nur feiner, sondern auch sicherer sind immer die Reflexanomalien.

Atrophie bei Pyramidenlähmung

Endlich sei noch bemerkt, daß auch bei den Pyramidenlähmungen Atrophien vorkommen, die meist gering sind, manchmal aber recht erheblich sein können, aber zum Unterschied von der folgenden Gruppe niemals die scharfe Begrenzung auf einzelne Nervengebiete zeigen, sondern sich im wesentlichen „en masse“, d. h. das ganze Glied betreffend, darstellen, und auch niemals „Entartungsreaktion“ (S. 24) zeigen.

Ausfälle der Bahn vom Rückenmark zum Muskel

Die Motilitätsausfälle von den Zellen des Vorderhorns (diese eingeschlossen) bis zum Muskel selbst (diesen eingeschlossen) müssen zusammengekommen werden, weil sie qualitativ die gleichen Symptome machen können. Wenn also im Vorderhorn des Rückenmarks gerade alle diejenigen Zellen, welche einen Muskel mit Nervenfasern versorgen, vernichtet würden, so wären die Erscheinungen genau die gleichen, als wenn die Nervenfasern selbst durchschnitten oder wenn die Muskelfasern selbst außer Funktion gesetzt würden. Das was diesen Zuständen, je nachdem sie im Vorderhorn des Rückenmarks oder im peripheren Nerven oder im Muskel sich abspielen, in jedem Falle das besondere Gepräge gibt, ist nicht der Zustand der Muskulatur, der in allen Fällen im wesentlichen gleich sein kann, sondern die Verteilung der Lähmungen. Das will sagen: Die Vorderhornzellen, welche den Nervenfasern für einen Muskel zum Ursprung dienen, sind so verteilt, daß ein einheitlicher Herd in der grauen Substanz niemals alle Nervenzellen eines Muskels und nur diese treffen kann. Vielmehr sind bei Affektionen der Vorderhörner mehrere Muskeln in ganz bestimmter Verteilung betroffen; die Verteilung der Lähmungen ist wieder eine andere, wenn ein Nerv (bzw. ein Nervenplexus) getroffen ist.

Bedeutung der Verteilung der Lähmung

Degenerative Lähmungen

Was nun aber zunächst die gemeinsame Art der Lähmungen anlangt, so sind es vorzugsweise diejenigen, die man als degenerative bezeichnet, d. h. diejenigen, welche zu einer Entartung und zum Schwund der betroffenen Muskeln führen.

Elektrische Reizung

Die Entartung kann in einem Teil der Fälle durch die elektrische

Entartungsreaktion angezeigt werden, und es muß hier das allernotwendigste über die elektrische Reizung gesagt werden.

Wir bedienen uns zu diagnostischen Zwecken des faradischen und des galvanischen Stroms, und auch viele praktischen Ärzte verfügen über diese beiden Stromquellen. Ein faradischer Apparat macht jedenfalls nur geringe Kosten, für den galvanischen braucht man eine große Batterie, bzw. Anschluß an eine starke Stromquelle (z. B. die städtischen Elektrizitätswerke)¹⁾. Als einen wesentlichen Mangel eines allgemein ärztlichen, nicht speziell neurologischen, Instrumentariums können wir es mit Hinweis auf unsere Anschauung von dem therapeutischen Unwert des konstanten Stromes (vgl. auch Vorwort) nicht betrachten, wenn es keinen galvanischen Apparat enthält.

Wir benutzen zur diagnostischen Anwendung sowohl des konstanten, wie des faradischen Apparats immer zwei verschieden große gut durchfeuchtete Elektroden, eine möglichst große (handtellergröße), die in- Elektroden
differente, die wir an einer beliebigen (gut befeuchteten) Stelle des Körpers, gewöhnlich an Nacken oder Brust aufsetzen lassen, und die differente, die wir auf den Muskel oder den Nerven aufsetzen, den wir prüfen wollen, die letztere muß mit einem Kontakt versehen sein, der erst dann betätigt wird, wenn die Elektrode schon aufgesetzt ist. Die Elektrode wird an den Punkten aufgesetzt, welche sich als die zweckmäßigsten erwiesen haben (Fig. 3 a—c), im einzelnen Fall wird man manchmal etwas suchen müssen, um den besten Punkt zu finden. Man kann sowohl die Nerven, wie die Muskeln reizen. In einzelnen Fällen muß man auch kleinere Anteile von Muskeln durch Verschieben der Elektroden prüfen, wenn etwa nur einzelne Bündel von der Entartung betroffen sind, und sehr viel daran liegt, ob Entartungsreaktion da ist oder nicht. Der allgemeine Praktiker wird sich darauf kaum einlassen, wie denn überhaupt die kunstgerechte Handhabung der elektrischen Apparate eine gewisse Übung verlangt, und der Ungeübte z. B. dadurch, daß er die richtigen Punkte verfehlt, zu recht falschen Resultaten kommen kann.

Die Apparate selbst kann ich hier nicht im einzelnen beschreiben.

Bei Anwendung des konstanten Stroms handelt es sich diagnostisch immer darum, die minimale Stromstärke zu ermitteln, bei der ein Nerv oder Muskel noch zuckt, und zwar getrennt für die Kathoden- und Anodenreizung. Die Stromstärke wird, nachdem man einmal eine deutliche Zuckung bekommen hat, durch Einschaltung von Widerständen solange vermindert, bis man nur noch eben eine deutliche Zuckung sieht, und dann, während man diesen Minimalstrom weiter durch den Körper gehen läßt, am Milliampèremeter abgelesen. Der normale Muskel reagiert bei Kathodenschließung (= Kathode als differente Elektrode und Schluß des vorher geöffneten Stromes) bei viel schwächeren Strömen als bei Anodenschließung. Wenn man nicht weiß, wie der Umschalter steht, d. h. wo am Apparat die Kathode und die Anode ist, so braucht man nur irgend einen einzelnen normalen Muskel, eventuell

¹⁾ Dort wo Wechselstrom besteht, braucht man noch einen Transformer.




Fig. 3 a.

Fig. 3 a—c. Die Muskeln und Nerven des Körpers
(Handbuch der Neurologie,

einen der Daumenmuskeln des Untersuchers zu nehmen; bei derjenigen Stellung des Umschalters, bei der der schwächere Strom als Schließungswirkung genügt (Elektrode beim Wenden des Stromes nie verrücken!), ist die Kathode die differente Elektrode.

Faradi-
scher
Strom

Bei Anwendung des faradischen Stroms gibt es keine Anode oder Kathode, deswegen entfällt hier der Umschalter. Es gibt auch kein absolutes Maß, wie es der Milliampèremeter beim konstanten Strom bietet. Der Rollenabstand ist nur ein ganz ungefähres Maß, auch wenn die Elemente nicht gewechselt werden. Bei Anwendung des faradischen Stroms erhält man nur einen fortdauernden Tetanus und keine einzelne Muskelzuckungen.

Normale
elektrische
Reaktion

Der Praktiker braucht von der normalen Reaktion nur das zu wissen, daß 1. alle erreichbaren Muskeln und Nerven auf den faradischen und auf den galvanischen Strom zu reagieren haben, und 2. daß die Kathodenschließungszuckung bei schwächeren Strömen eintritt, als die Anodenschließungszuckung (die Nervenreizung bezeichnet man auch als „indirekte“, die Muskelreizung als direkte — zwei überflüssige Ausdrücke), 3. daß die Zuckung normalerweise eine schnell verlaufende ist (was differentialdiagnostisch aber nur für die Muskelreizung, nicht für die Nervenreizung in Betracht kommt).

E.R.

Die Entartungsreaktion (E.R.) besteht nun darin, daß 1. zunächst die Nervenregbarkeit aufhört, 2. daß die Muskeln für den faradischen Strom unerregbar werden, daß 3. bei Anwendung des konstanten Stromes die Anodenschließung früher wirkt, als die Kathodenschließung und daß 4. die Zuckung nicht mehr schnell, sondern langsam, „wurm förmig“ wird.

Von diesen Symptomen ist am meisten Wert zu legen auf den Verlust der Erregbarkeit vom Nerven aus, auf den Verlust der faradischen Erregbarkeit des Muskels und vor allem auf die langsame Zuckung. Die Umkehrung der Zuckungsformel ($An\ S\ Z > K\ S\ Z$ anstatt $K\ S\ Z > An\ S\ Z$) ist nicht so konstant.

Ich kann nur raten, nicht zu viel auf die unvollkommenen Entartungsreaktionen zu geben, und auf die quantitative Herabsetzung der Erregbarkeit, und sich auch nicht auf die Stromöffnungsreaktionen einzulassen. Wer nicht ganz geübt ist, bringt dann häufig nur falsche Notizen in die Krankengeschichte.

Grenzen
der Beweis-
kraft der
E.R.

Die Beweiskraft der Entartungsreaktion hat ohnehin ihre natürlichen Grenzen. Die eine besteht darin, daß sie einige Zeit (mehrere Tage bis Wochen) braucht, um sich zu entwickeln. Wenn also, wie das so häufig der Fall ist, ein Patient mit frischer, plötzlich entstandener Fazialislähmung zu uns kommt, so brauchen wir erst gar nicht elektrisch zu prüfen, wir finden doch nichts und müssen die Diagnose ohne elektrische Untersuchung stellen. Ferner gibt es leichtere periphere Lähmungen, wie z. B. gerade periphere Fazialislähmungen, bei denen es überhaupt nie zu typischer E.R. kommt, sondern die Lähmung schon wieder restituiert ist, ehe E.R. hat eintreten können. Ferner kann die Degeneration

so diffus und zu gleicher Zeit so langsam erfolgen, daß während der Muskel in toto deutlich atrophisch ist, doch der jeweils intakte Teil überwiegt und eine normale Reaktion gibt, wie das z. B. bei der spinalen progressiven Muskelatrophie der Fall sein kann, und endlich kann sie gerade bei primären Muskelkrankheiten (Muskeldystrophien) fehlen.

Ich führe das verhältnismäßig so ausführlich an, weil vielfach die Meinung verbreitet ist, der Nervenarzt könne ohne elektrischen Apparat beinahe überhaupt keine Diagnose stellen. Es ist gewiß nicht nur mir, sondern auch anderen Neurologen passiert, daß für Konsultationen bei gewöhnlichen Apoplexien faradische und galvanische Batterie auf Veranlassung des behandelnden Arztes in die Wohnung des Kranken geschafft waren. Der betreffende Kollege wußte auch genau, daß es sich um zentrale Apoplexien handelte, aber er hatte die ganz irrige Vorstellung, als wenn zur Beurteilung solcher Fälle die elektrische Untersuchung etwas nützen könne.

Über-
schätzung
der elek-
trischen
Unter-
suchung

Eine gewisse prognostische Bedeutung hat die E.R. bei peripheren Lähmungen. Je länger E.R. bestehen bleibt, um so schlechter die Prognose. Am schwersten sind die Fälle, in welchen schließlich jede, auch die galvanische Muskeleerregbarkeit, verschwindet.

Die elektrische Entartungsreaktion ist nur ein Zeichen der Neigung zur Entartung, welche den Lähmungen vom Typus III in ganz besonders hohem Maße zukommt. Die Entartung ist aber sehr häufig ohne weiteres als Atrophie sichtbar, und wir können die Diagnose auf diese Gruppe und ihre Unterabteilungen daher meist aus der Feststellung der Atrophien und ihrer Verteilung, die der Verteilung der Lähmungen entspricht, machen. Ein recht wichtiges unterstützendes Symptom der Atrophie sind dabei die im degenerierenden Muskel sehr häufig auftretenden fibrillären Zuckungen, die allerdings nicht mit harmlosen, bei Nervenkranken sich häufig an der Lidmuskulatur und anderswo findenden faszikulären Muskelkontraktionen zusammengeworfen werden dürfen. Um die Lähmung und Atrophie eines Muskels festzustellen, braucht man nun allerdings die Kenntnis seiner Wirkung und seiner Lage, und um aus der Muskellähmung auf den Ort der Läsion schließen zu können, braucht man die Kenntnis der Nervenversorgung der Muskeln durch die peripheren Nerven einerseits und die Wurzeln andererseits. Die Wurzeln entsprechen dabei den Rückenmarkssegmenten, so daß also für letztere eine besondere Kenntnis nicht nötig ist. Die Bezeichnung segmentale Verteilung und radikuläre Verteilung werden daher synonym gebraucht.

Atrophie
und Läh-
mungen

Während also für den ganzen Symptomenkomplex von Gruppe I und II die anatomische Kenntnis genügt, daß es eine Rinde und eine Pyramidenbahn gibt, und daß diese Pyramidenbahn an der Grenze von Hirn und Rückenmark kreuzt, ist die periphere Neurologie angewandte, detaillierte Anatomie. Auch der Praktiker muß wohl wenigstens einige grobe Bilder von gewissen Lähmungen gegenwärtig

haben, während man Details ja immer in einem größeren Werke nachsehen kann¹⁾).

Spezielle
Tatsachen
der
peripheren
Innervation

Als die allerwichtigsten Tatsachen möchte ich vielleicht folgende herausheben:

Arm
N. radialis

Am Arm: Der N. radialis versorgt den M. triceps am Oberarm, am Unterarm den M. supinator, die Strecker des Handgelenks, die langen Strecker der Finger, welche an der Grund- und Mittelphalanx angreifen, sowie die Extensoren und den Abductor longus des Daumens. Dementsprechend ist das Hauptsymptom der Radialislähmung das Herabhängen der Hand, und die Unmöglichkeit, Handgelenk oder Grundphalangen der Finger zu strecken. Bringt man die Grundphalangen passiv in Streckstellung, so gelingt bei reiner Radialislähmung die aktive Streckung der Endphalangen (durch Wirkung der vom Ulnaris versorgten Interossei). Die Tricepslähmung kommt natürlich nur bei sehr hohem Sitz der Läsion zum Ausdruck.

N. ulnaris

Der N. ulnaris versorgt wesentlich die kleinen Fingermuskeln, insbesondere die Interossei am 2.—5. Finger und am Daumen isoliert den M. adductor, den Flexor digitorum profundus für die drei letzten Finger und den Flexor carpi ulnaris. Es fällt bei seiner Lähmung vor allem die Spreizung und Adduktion der Finger aus, die Adduktion des Daumens und die Streckung der Mittel- und Endphalangen neben der Beschränkung der Flexion der Grundphalangen. Die Atrophie ist sehr charakteristisch.

N.
medianus

Der N. medianus versorgt alle Muskeln am Vorderarm und der Hand, welche die beiden vorgenannten Nerven nicht versorgen, das sind insbesondere die Flexoren und Pronatoren der Hand, die langen Beuger der Finger und des Daumens (ferner den Opponens und den Flexor brevis des Daumens, sowie die beiden ersten Lumbricales). Die Funktionsstörung ist daraus ohne weiteres klar. Charakteristisch für die Atrophie ist besonders der Zustand des Daumenballens. Auch hier kommt es für die Gestaltung der Lähmung im einzelnen natürlich darauf an, ob der Nerv hoch oder tief verletzt ist.

N. muscu-
locutaneus

Der N. musculocutaneus versorgt die Beuger des Unterarms, insbesondere den M. biceps. Seine isolierte Lähmung ist sehr selten, die Atrophie des M. biceps unverkennbar.

N. axillaris

Der N. axillaris versorgt wesentlich den Deltoideus (Seitwärtshebung des Arms). Die Erkennung der Atrophie des Deltoideus ist nicht ganz so leicht, wie die des vorgenannten M. biceps.

N.
thoracicus
longus

Von der Schultermuskulatur sei dann zunächst noch erwähnt der Serratus, der vom N. thoracicus longus versorgt wird, und dessen Lähmung sich in einem flügel förmigen Abstehen der Scapula vom Rücken besonders bei Vorwärtsheben der Arme äußert.

Cucullaris

Der Cucullaris wird zum Teil vom N. accessorius, zum Teil vom Plexus cervicalis versorgt. Bei Cucullarlähmung steht die Schulter

¹⁾ Für die periphere Innervation (nur periphere Nerven, nicht Wurzeln) ist auch das kleine Buch von Villiger, Die periphere Innervation, Leipzig 1908, zu nennen.

tiefer als an der gesunden Seite, das Schulterblatt steht weiter von der Mittellinie ab. Die Kraft der Schulterhebung ist sehr herabgesetzt.

Es gibt selbstverständlich nicht nur Lähmungen der einzelnen Nerven, sondern auch mehrerer gemeinsam, sei es, daß dieselben an der Peripherie gemeinsam betroffen werden (z. B. bei ausgedehnten Armverletzungen), sei es, daß sie bald nach dem Austritt aus dem Rückenmark, im Plexus, wo die Fasern noch dicht zusammenliegen, affiziert werden. Von diesen Plexuslähmungen nennen wir hier die Erbsche (obere) Plexuslähmung, welche den M. deltoideus, biceps, brachialis internus und Supinator longus betrifft, und demnach die sehr charakteristische Kombination der Lähmung dieser Muskeln verursacht.

Plexus-
lähmungen

Die untere Plexuslähmung (Klumpkesche Lähmung) zeichnet sich neben der Lähmung der kleinen Handmuskeln und der Vorderarmflexoren meist durch die Lähmung der sympathischen Fasern für die Pupille — also eine Verengerung der Pupille auf der kranken Seite aus (vgl. auch das Kapitel über Erkrankungen des sympathischen Systems).

Wir kommen jetzt zu den degenerativen Lähmungen der unteren Extremität.

Bein

Der N. cruralis versorgt vor allem den Iliopsoas und den Quadrizeps. Seine Affektion bedingt daher Aufhebung oder Schwäche der Hüftbeugung und der Kniestreckung. Die Atrophie des Quadrizeps ist unverkennbar.

N. cruralis

An den unteren Extremitäten ist die Lähmung des N. peroneus die häufigste. Gelähmt sind die Dorsalflexoren des Fußes und der Zehen, die Abduktoren und der Tibialis anticus. Die Lähmung ist gar nicht zu verkennen, unvollständige Lähmungen stören gewöhnlich hauptsächlich die Hebung des seitlichen Fußrandes und führen beim Gang, weil Schleifen des herunterhängenden Fußes am Boden verhindert werden soll, zu einem übermäßigen Emporheben des Beins (Steppgang).

N.
peroneus

Die seltene Lähmung des N. tibialis führt zum umgekehrten Symptomenkomplex (Lähmung der Plantarflexion).

N. tibialis

Bei Lähmungen des ganzen Ischiadikus oder des Plexus sind die Ausfälle entsprechend ausgedehnter.

N.
ischiadicus

Aus dem Gebiete der segmentalen Innervation der Muskeln seien nur ganz wenige Tatsachen erwähnt:

Segmen-
tale Inner-
vation

Die Lähmungen der 5. und 6. Zervikalwurzel wurden bereits als obere Plexuslähmung beschrieben.

Im 6. und 7. Zervikalsegment sind wesentlich die Vorderarmmuskeln lokalisiert.

Sehr wichtig ist die Innervation durch das 8. Zervikalsegment und auch noch durch das 1. Dorsalsegment (vgl. auch oben unter Klumpkesche Lähmung), weil durch die auf deren Schädigung zurückzuführende Lähmung und Atrophie der kleinen Finger Muskeln eine große Reihe krankhafter atrophischer Störungen charakterisiert werden (z. B. die Aran-Duchennesche Form der spinalen Muskelatrophie).

Vom 4. Zervikalsegment entspringt der N. phrenicus zum Zwerchfell.

Die Dorsalsegmente gehören weiterhin hauptsächlich den kurzen Rückenmuskeln, den Interkostalmuskeln und den Bauchmuskeln an.

Die ersten Lumbalsegmente versorgen die Muskeln der Hüfte und des Oberschenkels, der 3. und insbesondere der 4. den wichtigen Quadrizeps, 5. Lumbalsegment und 1.—2. Sakralsegment Kniebeuger, sowie Muskeln des Unterschenkels und des Fußes.

Das 3. und 4. Sakralsegment hat die wichtige Versorgung der Blase und des Mastdarms.

Zu allen peripheren und segmentalen Lähmungen können nach längerem Bestehen fixe Kontrakturen der nichtgelähmten Muskeln hinzutreten (vgl. unter motorische Reizerscheinungen).

Die
Sehnen-
reflexe bei
degenera-
tiven Läh-
mungen

Ein charakteristisches Zeichen für die Affektionen des ganzen III. Teiles der motorischen Bahn, also für die peripheren, radi- kulären und Vorderhornlähmungen ist das Fehlen der Sehnen- bzw. Periostreflexe im Bereiche der Lähmung. Denn diese Reflexe gehen über das Vorderhorn, durch die vorderen Wurzeln und die peripheren Nerven (vgl. Fig. 10). Eine Reihe der Sehnenreflexe war schon genannt (Trizeps-, Radius-, Ulna-, Patellar-, Achillesreflex). Für den Kopf sei der fast entbehrliche Masseterreflex angeführt, zu erzielen durch einen Schlag von oben gegen den geöffneten Unterkiefer.

Es ist jedoch zu bemerken, daß die Sehnenreflexe manchmal auch bei recht hochgradigen Lähmungen noch erhalten sind, weil nicht der ganze Muskel zerstört, vielmehr noch genug funktionierende Substanz verblieben ist.

4. Motilität des Kopfes.

Gesondert zu besprechen sind die Bewegungsstörungen im Bereiche des Kopfes. Es handelt sich um die Augenmuskeln, die Gesichtsmuskeln, die Muskeln der Mundhöhle und des Kehlkopfs. (Der zu den Hirnnerven gehörende, aber einen Teil des Schultermuskels Cucullaris und den Sternokleidomastoideus versorgende Accessorius. (11. Hirnnerv) war schon früher (S. 26) erwähnt.)

Verschie-
dene Lo-
kalisation

Auch bei den Kopf- bzw. Hirnnerven müssen wir verschiedene Lokalisationen ihrer Lähmungen unterscheiden, und zwar können wir auch hier die drei Abschnitte der Körpermotilität wiederholen: I. einen intrakortikalen (der wesentlich für die hysterische Lähmung in Betracht kommt), II. einen Weg, der die Rinde mit den Kernen verbindet und III. den Abschnitt von den Kernen, diese eingeschlossen, bis zum Muskel (diesen eingeschlossen) (vgl. Fig. 2).

Supra-
nukleäre
Lähmung

Der Weg II. ist nun nur da, wo schon eine geschlossene Pyramidenbahn besteht, d. h. ungefähr von der Medulla oblongata an die „Pyramide“, so daß wir nicht schlechthin von Pyramidenlähmungen sprechen können; für die oberen Hirnnerven verlaufen die kortikalen Bahnen zusammen mit den Pyramidenfasern im Fuß der Brücke. Weiter kor-

tikelwärts verlaufen die Fasern dann wie die Pyramidenfasern und mit ihnen zusammen in der inneren Kapsel. Man wendet als Bezeichnung für den ganzen Abschnitt am besten die „supranukleären Lähmung“ an.

Über den Abschnitt III. der motorischen Kopfnerven ist zu sagen, Periphere
Lähmung daß eine Unterscheidung von peripherer Nervenlähmung und Wurzel-




Fig. 4. Die Lage der Hirnnervenkerne im Hirnstamm mit Benutzung eines Toldtschen Schemas von der Seite und von oben (nach Fortnahme des Kleinhirns) gesehen. —

Schwarz die motorischen Kerne, schraffiert die sensiblen. *II* = Optikus (vorderer Vierhügel). *III* = Okulomotorius. *IV* = Trochlearis. *V* = Trigeminus, bestehend aus zwei motorischen Wurzeln, von denen die eine im Mittelhirn, die andere im Pons entspringt und der sensiblen, die bis in das Rückenmark hinunterreicht. *VI* = Abduzens. *VII* = Fazialis. *VIII* = Akustikus. *IX + X* = Vagoglossopharyngeus. *Xa* = Nuc. ambiguus vagi (Ursprung der motorischen Kehlkopfnerven). *XI* = Accessorius mit Zuzug aus dem Rückenmark. *XII* = Hypoglossus.

lähmung hier durch die Verteilung der Lähmung im allgemeinen nicht möglich ist, weil die motorischen Hirnnerven im Unterschied von den Spinalnerven als einheitliche Gebilde schon aus der Hirnsubstanz austreten und weiter verlaufen. Während wir es also einer Lähmung der Hand im allgemeinen ansehen können, ob sie segmental bzw. radikulär oder peripher bedingt ist, können wir bei einer Lähmung der Augen-

muskeln oder der Zunge gar nicht oder nur durch Hilfsmomente des einzelnen Falles erschließen, ob die Lähmung den Kern, den Nerv an der Basis. oder in seinem weiteren Verlauf betroffen hat.

Was den Abschnitt II anlangt, so wird die Diagnostik dadurch kompliziert, wenn auch kaum erschwert, daß zum Unterschied von den Extremitäten für eine Reihe der Kopfmuskeln eine doppel-seitige Innervation, d. h. von beiden Hemisphären aus besteht. Das hat zur Folge, daß an diesen Muskeln sich einseitige Störungen des „supranukleären“ Weges nur wenig oder gar nicht zu äußern brauchen.

Auf Grund dieser Vorbemerkungen werden nun die praktischen Fragen der Diagnostik auf diesem Gebiete leicht verständlich sein.

Fazialis-
lähmung
Periphere
Fazialis-
lähmung

Nehmen wir zuerst den N. facialis, so äußert sich seine totale periphere Lähmung bekanntlich in einem einseitigen Verlust der gesamten Innervation des Gesichts, und einer entsprechenden Entstellung des Gesichts in der Ruhe. Wesentlich ist vor allem die Unmöglichkeit das Auge zu schließen und das Herabsinken des Mundwinkels. Beim Versuche die Lider zu schließen, sehen wir das Auge sich nach oben drehen (eine „Mitbewegung“, die normalerweise vom geschlossenen Lide verdeckt wird), so daß wir die weiße untere Sklera zu Gesicht bekommen (Bellsches Phänomen). Besteht die Lähmung lange genug (vgl. S. 24), so können wir E. R. im Fazialisgebiet nachweisen.

Bellsches
Phänomen

Supra-
nukleäre
Fazialis-
lähmung

Für die supranukleäre Lähmung, wie sie also am häufigsten bei Hemiplegie vorkommt, ziemlich charakteristisch ist nun das Verschontbleiben des oberen Fazialis. Das Auge kann geschlossen werden. Es erklärt sich das dadurch, daß das obere Fazialisgebiet zu den oben erwähnten gehört, die doppelseitig innerviert werden. Leichte Störungen im oberen Fazialisgebiet finden sich aber trotzdem sehr häufig, und man darf nicht etwa aus einer Schwäche des Augenlidschlusses ohne weiteres auf eine periphere Lähmung schließen. Andererseits kann natürlich auch eine periphere Fazialislähmung sich auf den unteren Fazialis beschränken, wenn der Nerv erst nach seiner Teilung in die beiden Äste getroffen ist, was aber so gut wie ausschließlich bei ohne weiteres sichtbaren Verletzungen im Gesicht vorkommt. E. R. findet sich bei supranuklearer Lähmung ebensowenig wie an den Extremitäten bei Pyramidenlähmung. Ihr Fehlen ist aber unter gewissen früher (S. 24) erwähnten Bedingungen kein unbedingt entscheidendes Merkmal für die supranukleäre gegen periphere Fazialislähmung.

Zunge

Für die Zungeninnervation gilt ein Satz: Die Zunge weicht nach der Seite des gelähmten Muskels ab, d. h. also bei peripherer Lähmung nach der Seite des Herdes, bzw. der Verletzung, bei supranukleärer (z. B. Hemiplegie) nach der dem Herde entgegengesetzten Seite. Die Entscheidung ob die Lähmung dabei supranukleär oder peripher ist, kommt hier selten in Betracht; sie ist meist durch die Art der begleitenden Symptome, z. B. der bei supranukleärem Sitz zugleich bestehenden Fazialislähmung von vornherein entschieden. Eventuell kommt die E. R. mit dem fibrillären Zittern in Betracht.

Was die Augenmuskeln anlangt, so stehen sie bekanntlich unter der Herrschaft dreier Nerven, des Okulomotorius, Trochlearis und Abduzens.

Augen-
muskeln

Der Okulomotorius versorgt alle Augenmuskeln mit Ausnahme des externus (N. abducens) und des Obliquus sup. (N. trochlearis), ferner den Levator palpebrae und den Sphincter pupillae. Seine Lähmung ist also ganz unverkennbar. Er braucht nicht in toto gelähmt zu

Okulo-
motorius




Fig. 5. Ursprung der Hirnnerven nach H. Vogt.
(Handb. der Neurologie, herausgegeben von Lewandowsky.)

sein, sondern es kann z. B. fast ausschließlich der Levator palpebrae gelähmt sein (Ptosis) oder vorzugsweise der Sphincter pupillae (Mydriasis und absolute Starre).

Ptosis

Mydriasis

Abduzens-
lähmung

Häufig isoliert und daher wichtig sind Abduzensparesen oder Lähmungen. Man hüte sich aber, die Beobachtung, daß die Pupille beim Blick zur Seite nicht bis ganz an den Lidwinkel herangeht, ohne weitere Prüfung als den Ausdruck einer organischen Abduzensparese

aufzufassen. Es kommt das auch bei Normalen vor. Größere Abweichungen sind natürlich pathologisch.

Die isolierte Trochlearislähmung spielt keine Rolle.

Doppel-
bilder

Die für die Augenmuskellähmungen überhaupt ausschlaggebende Prüfung auf Doppelbilder mittelst farbiger Gläser muß in den Lehrbüchern der Ophthalmologie nachgesehen werden. In groben Fällen kommt man auch ohne farbige Gläser zum Ziel. Die Frage nach der subjektiven Wahrnehmung von Doppelbildern ist wichtig, genügt aber an und für sich nicht.

Supra-
nukleäre
Augen-
lähmungen

Für die supranukleären Lähmungen ist es wichtig, daß bei ihnen weder einzelne Augenmuskellähmungen noch überhaupt einseitige Störungen vorkommen, sondern daß, wenn überhaupt supranukleäre Störungen da sind, sie erstens doppelseitig und zweitens konjugiert sind.

Dévi-
ation
conjuguée

Eigentlich ist es überhaupt nur eine supranukleäre Augenbewegungsstörung, die in Frage kommt, d. i. die *Dévi-ation conjuguée*. Es ist das die bekannte Erscheinung, daß nach Hemiplegien der Kranke seinen Herd ansieht, d. h. von der Seite der gelähmten Glieder weg sieht. Dabei sind nicht nur die Augen, sondern auch der Kopf nach derselben Seite gedreht. Auch diese Erscheinung ist nur vorübergehend, und zwar deswegen, weil eine Gehirnhälfte bald die andere ersetzt und auf die Dauer dann zu einer völlig normalen Innervation beider Augen genügt.

Die sehr seltene laterale Blicklähmung, wo die Augen nicht deviiert sind, der Kranke aber seine beiden Augen nur bis zur Mittellinie bewegen kann, beruht auf gleichseitigen Herden im Pons. Vertikale Blicklähmungen kommen (noch seltener) bei Vierhügelaffektionen vor.

Sitz der
peripheren
Augen-
muskellähmungen

Wenn wir also entweder einseitige Störungen haben oder nicht-konjugierte doppelseitige, z. B. Lähmung beider Interni, sind wir völlig sicher, daß es sich um nukleäre oder um periphere Lähmungen handelt, und zwar sind am häufigsten und praktisch wichtigsten diejenigen Lähmungen, welche durch Läsion der Nerven an der Basis (z. B. durch eine syphilitische Meningitis) zustande kommen. Für einen Sitz dicht an der Orbita spricht es, wenn nicht nur ein Augennerv, sondern alle ergriffen sind. Andererseits kommt natürlich die Lähmung einzelner Muskeln auch sehr häufig bei ganz peripherem Sitz der Läsion vor.

Nystagmus

Bei der Prüfung der Augenbewegungen achtet man zugleich darauf, ob Nystagmus vorhanden ist. Der Nystagmus tritt am deutlichsten oder allein dann auf, wenn die Augen forziert nach einer Seite gewandt werden. Der echte Nystagmus, das rhythmische konjugierte „Schlagen“ der Augen nach einer Seite ist ein Zeichen von Störungen im Bereiche des Bogengangs-(Vestibular)Apparates oder seiner Bahnen in der Medulla oblongata. Der echte Nystagmus ist nicht zu verwechseln mit „nystagmiformen Zuckungen“ unregelmäßiger Art, welche sehr häufig Augenmuskellähmungen begleiten, ohne von selbständiger Bedeutung zu sein. Über den kalorischen Nystagmus vgl. unter Schwindel.

Stimm-
bandläh-
mungen

Ausgesprochene Störungen der Kehlkopfmuskeln, wie insbesondere Rekurrenslähmung oder auch einseitige oder doppel-

seitige Postikuslähmung sind entweder nukleären oder (häufiger) peripheren Ursprungs. Supranukleäre Störungen spielen hier überhaupt keine Rolle.




Fig. 6. Schädelbasis nach Spalteholz.

Die Lähmung des motorischen Trigemini für die Kaumuskulatur spielt keine erhebliche Rolle.

Doppel-seitige Affektion der Hirnnerven
Bulbärparalyse
Dysarthrie
Von besonderer Bedeutung sind die doppelseitigen Lähmungen der unteren Hirnnerven, weil sie einen Zustand ergeben, den man speziell als „Bulbärparalyse“ bezeichnet hat, und dessen Komponenten man z. T. aus der synonymen Bezeichnung der „Labio-glosso-pharyngeal-Paralyse“ entnehmen kann. Sie beteiligt aber oft auch die Gesichts- und Kiefermuskeln. Die Erscheinungen sind je nach den vorzugsweise ergriffenen Muskeln, im einzelnen Fall ein wenig verschieden, ergeben aber immer ein Bild, das man kaum verkennen wird. In leichten Fällen ist die Sprache zuerst nasal, in schweren verwaschen (dysarthrisch) bis zur völligen Tonlosigkeit und Unverständlichkeit. Der Gaumen hebt sich wenig oder gar nicht. Das Kauen ist erschwert. Selbst das Schlingen macht Schwierigkeiten.

Sitz der Bulbärparalyse
Die Bulbärparalyse kann nuklear, peripher und supranuklear bedingt sein. Bei der nuklearen Form findet man deutliche Atrophien. Eine Bulbärparalyse durch Affektion der Nervenstämmen selbst kommt nur selten vor; häufiger dagegen eine durch Affektion der Muskeln. Es ist dies die sogenannte „Bulbärparalyse ohne Befund“ (ohne Befund nämlich im Nervensystem), und sie bildet eine Teilerscheinung der später zur Besprechung kommenden Myasthenie.

Bulbärparalyse ohne Befund
Mit der „Bulbärparalyse ohne Befund“ darf nicht verwechselt werden die „Pseudobulbärparalyse“. Das ist nämlich nichts weiter als ein schlechter, aber allgemein gebräuchlicher Name für die supranukleare Form der Bulbärparalyse, wo also die Kerne und die Peripherie intakt sind, die Innervation aber durch doppelseitige Herde im Bereiche der kortikofugalen Bahnen zwischen Rinde und Kernen gestört ist.

5. Motorische Reizerscheinungen.

Die motorischen Reizerscheinungen stellen eine sehr bunte und verschiedenartige Gesellschaft dar.

Kontraktur
Als die erste erwähnen wir die muskuläre Kontraktur. Es handelt sich dabei um dauernde Muskelspannung. Die echte muskuläre Kontraktur erkennt man leicht an dem fehlenden Widerstand, den der Muskel leistet, wenn man die Kontraktur passiv überwindet. Denn man kann die muskuläre Kontraktur durch passive Gegenbewegung langsam überwinden, wonach sich die Kontraktur freilich sofort wieder einstellt.

Pyramidenkontraktur
Die muskuläre Kontraktur ist fast immer ein Pyramidenzeichen, und es war auf die typische Verteilung der Pyramidenlähmung und Kontraktur bereits hingewiesen (s. o.). Es tritt hier der Fall ein, daß die Folge eines Ausfalls einer willkürlichen Bahn, nämlich der Pyramidenbahn eine teilweise und unwillkürliche Überfunktion der willkürlich gelähmten Muskulatur ist.

Die Kontraktur kommt aber, wenn auch nicht in derselben Verteilung auch bei Hysterie vor. Die Differentialdiagnose gegenüber der

organischen Kontraktur ermöglichen unsere früheren „Pyramidenzeichen“ (S. 16).

Nicht mit der echten Kontraktur zu verwechseln sind die bindegewebigen Retraktionen der Muskulatur. Diese sind durch passiven Gegenzug nicht zu überwinden. Sie können eintreten bei peripheren Lähmungen dadurch, daß die Antagonisten der gelähmten Muskeln sich allmählich retrahieren. So kommt z. B. die Klauenhand bei Ulnarislähmung zustande, so entstehen z. B. Achillessehnenverkürzungen bei spinaler Kinderlähmung etc. Sie können sich auch mit der echten Kontraktur kombinieren, ein Fall, der beim Erwachsenen sehr selten, aber bei der zerebralen Hemiplegie der Kinder ganz gewöhnlich ist. Der Pes equinovarus und die Kontraktur der Flexoren der Hand und der Finger bei diesen Kindern sind fast immer durch fixe fibröse Kontrakturen wesentlich mitbedingt.

Bindegewebige Retraktionen

Ganz und gar nicht darf man ankylotische Verwachsungen der Gelenke als Kontrakturen bezeichnen.

Ankylotische Veränderungen

Dagegen steht der Kontraktur ganz außerordentlich nahe die sogenannte Rigidität, ein Symptom, das allein der Paralysis agitans zukommt. Dabei haben wir bei passiven Bewegungen einen im allgemeinen nicht sehr großen, aber auffällig gleichmäßigen Widerstand zu überwinden, so daß wir den Eindruck der Starre des ganzen Gliedes bekommen.

Rigidität

Es folgen nun einige Bewegungsstörungen, die schwer zu beschreiben, aber leicht wieder zu erkennen sind, wenn man sie einmal gesehen hat.

Es ist das zuerst die Chorea mit ihren schnellen, zuckenden, unregelmäßigen Bewegungen, die manchmal wie willkürliche Unarten aussehen, in den schweren Fällen aber bis zu den furchtbarsten Jaktationen führen (vgl. Kap. Chorea).

Chorea

Die Athetose hat im Gegensatz zur Chorea langsame, manchmal vertrackte und übermäßige, meist auf die Extremitätenenden beschränkte Bewegungen. Sie kommt so gut wie ausschließlich als dauernde Folge der zerebralen Kinderlähmung vor und hat deswegen nur eine sehr geringe praktische Bedeutung.

Athetose

Dann die verschiedenen Formen des Zitterns: Die ganz feinen und schnellen Zitterbewegungen der Hände und Finger bei Basedowscher Krankheit; die gröberen durch die gleichzeitige charakteristische Handhaltung des Pillendrehens meist auf den ersten Blick erkennbaren Zitterbewegungen der Paralysis agitans, welche sich in derselben Art auf den ganzen Körper, den Kopf, die Kiefer ausbreiten können; die ganz groben wackelnden und langsamen Bewegungen der multiplen Sklerose; die unregelmäßigen und unruhigen, besonders an den Händen und der Zunge wahrnehmbaren Zitterbewegungen der Paralyse und des Alkoholismus, sowie einiger anderen Vergiftungen (Quecksilber), das ein wenig schüchterne Zittern des Greisenalters. Das Zittern tritt im allgemeinen bei der Bewegung oder bei einer bestimmten Haltung (Fingerspreizen ist die beliebteste Prüfungsart) am besten oder überhaupt erst hervor (Intentionstremor).

Zittern

Nur bei der Paralysis agitans wird unter der Bewegung das Zittern besser oder verschwindet ganz, um in der Ruhe wiederzukehren.

Das Zittern kann auch bei Neurasthenikern oder Hysterischen vorkommen. Besonders in Gutachten findet man häufig das Zittern der Augenlider bei Augenschluß als Zeichen der Neurasthenie erwähnt. Man kann die Neurasthenie aber auch ohne das diagnostizieren.

Großer
epileptischer
Anfall

Die mächtigste motorische Reizerscheinung ist der große epileptische Anfall. Er besteht aus einer tonischen und einer klonischen Phase. Gewöhnlich bildet die Kontraktion der Gesichtsmuskeln und die tonische Drehung der Augen nach einer Seite die Eröffnung der Szene, dann folgt die gewaltige tonische Anspannung der ganzen Muskulatur, die sich in klonischen Krämpfen löst. Der Anfall dauert alles in allem gewöhnlich nicht länger als 2 Minuten. Da man den Anfall nur in seltenen Fällen selber zu sehen bekommt, ist auf die Anamnese und die Begleitumstände für die Diagnose Epilepsie besonderer Wert zu legen, insbesondere auf die völlige Bewußtlosigkeit, auf den Zungenbiß, auf die kurze Dauer, wie das im Kapitel der Epilepsie ausführlich auseinander gesetzt werden wird.

Jackson-
scher
Anfall

Während der große epileptische Anfall auf einer plötzlich über die ganze Großhirnrinde hereinbrechenden Reizung beruht, bezeichnen wir als Jacksonsche Anfälle solche, in denen nur Teile der Rinde in Erregung versetzt werden, von denen aus sich die Reizung dann allmählich über die Hirnrinde ausbreitet. Der Jacksonsche Anfall ist gewissermaßen ein Experiment der Natur, um die Anordnung der Rindenzentren zu demonstrieren. Seine Ausbreitung, wenn er nicht auf einen einzelnen Muskel beschränkt bleibt, stimmt genau mit der durch die elektrische Reizung der Großhirnrinde festgestellten Zentren der einzelnen Körperteile überein. Er beginnt im Unterschied von dem großen epileptischen Anfall gewöhnlich klonisch, z. B. am Daumen, geht auf die Finger, den Arm, die Schulter, dann auf das Bein und die andere Seite. Er kann an jeder Stelle Halt machen, kann sich aber auch allmählich zu einem allgemeinen Krampf entwickeln. Seine Verlaufsgesetze ergeben sich am besten aus nebenstehender Figur 7. Über die Begleitumstände muß auf das Kapitel Epilepsie verwiesen werden. Bemerkt sei nur, daß das Bewußtsein im Jacksonschen Anfall erhalten bleiben kann, so daß der Kranke seinem Anfall zusieht, aber nicht erhalten bleiben muß.


Zuckungen in den Extremitäten können auch durch die Reizung der Pyramidenbahn in ihrem Verlauf, z. B. durch eine Rückenmarksgeschwulst bedingt sein, solche Zuckungen haben aber mit Epilepsie nichts zu tun (vgl. auch später unter lokale Krämpfe).

Para-
lytische
und
eklamp-
tische
Anfälle

Den epileptischen Anfällen stehen nahe die Anfälle der progressiven Paralyse und der Ekklampsie, auch manche der Urämie. Sie können sogar ganz als große epileptische Anfälle verlaufen. Häufig aber sind sie diffuser und verzettelter, insbesondere die paralytischen können stundenlang in ziemlich milder Weise sich fortschleppen.

Hysteri-
scher
Anfall

Die hysterischen Anfälle erkennt man daran, daß sie keiner der bekannten Arten gleichen, und an der Theatralik, mit der sie ge-



Fissura Sylvii

Fig. 7. Elektrische Reizpunkte der menschlichen Großhirnrinde nach F. Krause.
Alle elektrische „Foci“ liegen vor der Zentralfurche.

wöhnlich in Szene gesetzt werden. Die Charcotsche Auffassung von den 4 Phasen des hysterischen Anfalles, die man überflüssigerweise noch vielfach abgebildet findet, ist falsch, die 4 Phasen sind nur ein Kunstprodukt der Dressur der Hysterischen in der Salpetriere gewesen (vgl. Kapitel Hysterie).

Über die lokalen peripheren Krämpfe, Crampi, Tiks, Beschäftigungskrämpfe, vgl. das besondere Kapitel.

Mitbewegungen Im weitesten Sinne wären dann noch unter den motorischen Reizerscheinungen die Mitbewegungen aufzuführen, das sind solche Bewegungen, welche unwillkürlich zusammen mit willkürlichen Bewegungen entstehen. In einem gewissen Maße sind sie physiologisch, besonders ausgesprochen finden sie sich oft in den gelähmten Gliedern bei zerebraler Hemiplegie.

Sie sind denn auch schon zur Diagnose der zerebralen Hemiplegie (als Pyramidenzeichen) verwandt worden. Wenn man einen Kranken mit Hemiplegie sich platt mit etwas auseinander gespreizten Beinen auf den Boden legen läßt und ihn nun auffordert, mit auf die Brust gekreuzten Armen sich aufzusetzen, so bleibt der gesunde Fuß dem Boden aufliegen, während der hemiplegische sich durch unwillkürliche Mitbewegung etwas vom Boden hebt. (Babinski's Mitbewegung). Die Bedeutung dieser Erscheinung für den Praktiker ist gering.

6. Sensibilitätsstörungen.

Mittel der Sensibilitätsuntersuchung

Wir prüfen den Sinn für Berührung, für Schmerz, für Warm und Kalt, und den Lagesinn.

Für Prüfung der Berührungs- und Schmerzsensibilität genügt die Fingerkuppe und eine Stecknadel, für die Temperaturprüfung müssen noch 2 Reagensgläser, eines mit Eiswasser, eines mit Wasser von 50—60° C zu Hilfe genommen werden.

Die Prüfung auf Sensibilitätsausfälle soll erst geschehen, wenn man Reflexe, Augenhintergrund, Pupillen untersucht und man sich auch ein Bild von der Motilität gemacht hat. Hat man bei diesen Untersuchungen nichts gefunden, so kann man auf die Sensibilitätsuntersuchung beinahe verzichten (und tut es häufig, wenn nicht spezielle Beschwerden auf eine Beteiligung der sensiblen Sphäre hindeuten). Hat man bei den vorhergehenden Symptomen etwas gefunden, so lenkt das die Sensibilitätsuntersuchung in gewisse Bahnen.

Subjektive Bedingungen der Sensibilitätsprüfung

Wenn wir der Sensibilitätsuntersuchung an und für sich so nur einen verhältnismäßig geringen Wert beimessen, so liegt das daran, daß keine andere Funktionsprüfung so von subjektiven Faktoren des Untersuchers und des Untersuchten abhängig ist. Darauf beruht zunächst die Tatsache, daß bei Hysterischen nichts häufiger gefunden wird als Sensibilitätsausfälle, und es ist ziemlich sicher, daß in mehr als $\frac{9}{10}$ dieser Fälle diese Sensibilitätsausfälle durch die ärztliche Untersuchung suggeriert sind (vgl. Kapitel Hysterie). Man kann fast jeder Hysterischen in wenigen Minuten eine einseitige Hypästhesie suggerieren,

Suggestion

und bei vielen genügt die Frage „Fühlen Sie auf der einen Seite besser als auf der anderen?“ um nicht nur für die eine Untersuchung, sondern dauernd die Hypästhesie zu erzeugen. Dabei haben diese hysterischen bzw. suggerierten Hypästhesien, Analgesien und dergl. einen sehr geringen Wert; denn wir finden sie häufig aufgepfropft auf organische Störungen, wie Syringomyelie, multiple Sklerose etc., und sie komplizieren dann nur den Fall. Die Hysterie aber müssen wir, wie schon wiederholt betont, nicht durch ihre „Stigmata“, sondern durch den Ausschluß der organischen Erkrankungen diagnostizieren. Es ist meiner Auffassung nach ein direkter Fehler, die Hysterie positiv durch die Suggestion eines Sensibilitätsausfalles diagnostizieren zu wollen.

Man frage bei allen Sensibilitätsuntersuchungen daher zunächst immer der Suggestion einer Sensibilitätsstörung entgegen, also vor allem in ganz gleichgültigem Ton, und scheue sich auch nicht, wenn man den organischen Ursprung der Sensibilitätsstörung bezweifelt, sofort milde Gegensuggestionen zu geben, etwa: „Passen Sie genau auf, ist es wirklich verschieden? Vielleicht habe ich verschieden stark berührt“ oder dergl. Die organischen Störungen reagieren auf solche Gegensuggestionen gar nicht.

Vermeidung der Suggestion

Ein Ausdruck der subjektiven Beeinflußbarkeit der Sensibilität ist ferner die große Schwierigkeit der bezüglichen Untersuchungen bei somnolenten oder etwas dementen Personen. Hier kann nur der Geübte nicht durch eine, sondern durch mehrere Untersuchungen zu einem gewissen Ergebnis kommen, und auch der Geübte nicht immer.

Untersuchung der Somnolenten und Dementen

Da auch der normale, und noch mehr der irgendwie kranke Mensch bei Sensibilitätsuntersuchungen leicht ermüdet, kann man eine genaue Untersuchung meist nicht in einer Sitzung durchführen. Auch dann, wenn es sich nur um eine grobe Untersuchung, um Stichproben handelt, muß man daher immer Vexierversuche einschieben, um zu prüfen, ob der Kranke überhaupt noch aufpaßt.

Bedeutung der Ermüdbarkeit

Daß man dem Kranken die Augen verbindet oder ihn die Augen schließen läßt, ist eigentlich nur bei Prüfung der Gesichtssensibilität nötig. Sonst stören diese Maßnahmen nur den Kranken und machen ihn unruhig. Es genügt, wenn man ihn wegsehen läßt, z. B. nach links, wenn man den rechten Arm prüft etc., oder wenn man ihm die Aussicht auf die Beine durch ein entsprechendes Arrangement der Bettdecke verbaut.

Ausschluß der Augen

Man schärfe von vornherein auch dem Kranken ein, daß auch eine ganz leichte Berührung eine Berührung ist — ein Punkt, über den man manchmal in Verzweiflung geraten kann. Denn immer wieder antwortet der anscheinend anästhetische Kranke auf die Behauptung „er müsse das gefühlt haben“, „ja, aber beinahe gar nicht“.

Bildung des Kranken

Ob man dem Kranken aufgibt, jede geschehene Berührung mit einem „jetzt“ zu bestätigen, oder ob man ihn bei jeder Berührung fragt, ob er fühlt, richtet sich nach der Individualität des Kranken. Bei schwer zu prüfenden Kranken bekommt man manchmal das beste Urteil, wenn man sie mit einem Finger auf die soeben berührte Stelle zeigen läßt. Es ist das dann zugleich eine Prüfung des Lokalisationsvermögens, dessen Feststellung in manchen Fällen ohnehin erwünscht ist.

Form der Prüfung




Fig. 8 b.

Fig. 8a.

Fig. 8a—c. Die Gebiete der sensiblen
(Handbuch der Neurologie,




Fig. 8c.

Nerven nach Kramer.
 herausgegeben von Lewandowsky.)

Bei der Prüfung auf Berührung gehe man zuerst mit ganz leichten Reizen vor. Wie bemerkt, genügt die Fingerkuppe, selbstverständlich tuts ein Pinsel oder ein Stück Watte auch. Wenn allein stärkere Berührungen und tieferer Druck gefühlt werden, so ist das ein pathologisches Zeichen.

Bei der Prüfung auf „spitz oder stumpf“ (Schmerzsinn) oder „warm oder kalt“ ist die Art der Prüfung natürlich gegeben.

Bei organischen Störungen ist es meist zweckmäßig, bei der Sensibilitätsprüfung an den Extremitäten in verschiedenen Höhen zirkulär um die Extremität herum zu prüfen, am Rumpf dagegen in der Längsachse des Körpers.

Weiß man einmal erst, daß die Sensibilitätsstörung organisch ist, braucht man sich vor Suggestiones natürlich nicht mehr so sehr in acht zu nehmen. Die äußerste Grenze organischer Sensibilitätsstörungen findet man vielmehr am besten dann häufig so, daß man aus dem Gesunden in die kranke Region fortschreitend, den Kranken auffordert, anzugeben, wo er die Reizung schwächer, dumpfer oder dergl. spüre.

Muskel-
und Lage-
sinn

In manchen Fällen ist die Prüfung des Muskelsinnes unentbehrlich, die der Praktiker zweckmäßig auf die Prüfung des Lagesinnes beschränkt. Unter möglichster Vermeidung eines Druckes faßt man das zu prüfende Glied — es kommt hier wesentlich auf Finger und Zehen an — bringt es in eine beliebige Stellung und fordert den Kranken auf, mit der anderen Seite — falls diese gesund ist — die gleiche Lage einzunehmen. Oder man bringt den Finger oder die Zehe zuerst in zwei extreme Stellungen, sagt dem Kranken, dies ist „oben“, dies ist „unten“ und prüft nun, bei wie kleinen Bewegungen der Patient in der Angabe der Richtungen Fehler macht.

Einzel-
fehler

Bei allen Sensibilitätsprüfungen darf man auf vereinzelte Fehler nichts geben. Wie weit solche Fehler gehen dürfen, das kann man allerdings nicht lehren, aber ein jeder kann sich hier in kurzer Zeit durch die Prüfung einer Anzahl Gesunder ein genügendes Urteil verschaffen.

Ana-
tomische
Grundlage
der Sensi-
bilitäts-
ausfälle

Wenn wir, unserem Programm getreu, nun wieder fragen, inwiefern wir aus einem Sensibilitätsausfall auf die Lokalisation der zugrunde liegenden Erkrankung schließen können, so liegen die Dinge hier ein wenig komplizierter, als bei den Motilitätsausfällen, und zwar einmal deswegen, weil die Sensibilität nicht eine einheitliche Funktion ist, wie die Motilität, sondern weil sie in eine Anzahl von „Qualitäten“ zerfällt und zweitens, weil sie im Innern des Zentralnervensystems nicht nur über eine Bahn verfügt, wie die Motilität — Pyramidenbahn — sondern über mehrere.

Periphere
Sensibili-
tätstö-
rungen

Diese beiden Schwierigkeiten treten allerdings erst dann ins Spiel, wenn es sich um zentrale Erkrankung handelt. Sowohl bei Erkrankung der peripheren sensiblen Nerven, wie bei solchen der sensiblen Wurzeln sind — verschwindende Ausnahmen abgerechnet — alle Qualitäten gleichmäßig beteiligt (weil die Fasern für Berührung, Schmerz und Temperatur bis zum Rückenmark innig gemischt verlaufen), und man bekommt daher meist schon aus der Prüfung des Berührungs- und Schmerzsinnes allein ein richtiges Urteil.

Bei peripheren und radikulären Sensibilitätsausfällen findet man häufig trotz Herabsetzung der Berührungsempfindung bei länger dauernder Schmerzreizung, d. h. nicht ganz kurzen Stichen oder Kneifen eine scheinbare Hyperalgesie. Die Reizung wird sehr unangenehm empfunden und strahlt weit aus. Diese Hyperalgesie hat als solche keine Bedeutung, man muß sie aber, um ein falsches Urteil zu vermeiden, kennen.

Wie bei der Motilität entscheidet zwischen peripherem Nerv und Wurzel auch bei der Sensibilität die Verteilung, hier besser die Umgrenzung der Sensibilitätsstörung. Im einzelnen will ich über diese Begrenzung hier gar nichts sagen, sie geht ohne weiteres aus den Fig. 8a—c und 9 hervor. Nur im allgemeinen sei darauf aufmerksam gemacht, daß die radikulären Zonen sich unabhängig von der Ausbreitung der peripheren Nerven, an den Extremitäten in längs verlaufenden, am Rumpf in zirkulären Streifen erstrecken.

Radikuläre Sensibilitätsstörungen

Die Ausfälle brauchen weder bei peripheren, noch bei radikulären Störungen total zu sein, vielmehr ist das selbst bei peripheren Störungen die große Ausnahme, und kommt bei radikulären Störungen beinahe überhaupt nicht vor, weil die sensiblen Wurzeln sich derart überlagern, daß mindestens drei ein Gebiet gemeinsam versorgen. Aber der Verlust der Empfindung für leichte Berührung genügt durchaus, um die Diagnose zu stellen, und man muß weiterhin auch damit rechnen, daß, wenn nur ein Teil der Fasern eines Nerven betroffen wird, die Grenzen der Sensibilitätsstörung untypisch sein, dieselben sich z. B. unregelmäßig fleckförmig darstellen können.

Die obengenannten Schwierigkeiten, die also in dem Augenblicke anfangen, in dem die Wurzeln in das Rückenmark eintreten, sind außerordentlich leicht überwunden, wenn man einen Augenblick einer anatomisch-physiologischen Überlegung folgen will.

Beim Eintritt in das Rückenmark teilen sich die sensiblen Fasern; diejenigen, welche die Temperaturen und den Schmerz leiten, gehen zunächst in die graue Substanz, und steigen dann in den weißen Rückenmarkssträngen zum Großhirn auf, die für Berührung (und für den Muskelsinn) gehen sofort in die (Hinter- und Seiten-) Stränge (Fig. 10).

Teilung der sensiblen Fasern beim Eintritt in das Rückenmark

Bei Erkrankungen der grauen Substanz, d. h. wesentlich solchen der Hinterhörner haben wir deshalb eine mehr oder weniger große Dissoziation der Sensibilität in der Weise, daß Temperaturempfindung und Schmerzempfindung gestört, die Berührungsempfindung aber erhalten ist (Fig. 15). Die Anordnung der Sensibilitätsstörung ist in diesem Falle noch immer die radikuläre, weil die Anordnung der grauen Substanz der der Wurzelfasern entspricht. Man nennt diese Form der Störung, welche bekanntlich bei der Syringomyelie eine große Rolle spielt, auch den „Hinterhorntypus“ der Sensibilitätsstörung.

Dissoziation der Sensibilität

Hinterhorntypus

Wenn nun nicht oder nicht allein die graue Substanz betroffen, sondern die sensiblen Rückenmarksstränge unterbrochen sind, was ja viel häufiger ist, z. B. bei jeder Verletzung des Rückenmarkes,

Genaue Untersuchung aller Stränge

beim Tumor des Rückenmarkes etc. etc. vorzugsweise in Betracht kommt, so wird vor allem die Ausbreitung der Sensibilitätsstörung eine andere. Sie befällt dann nämlich den ganzen Körperabschnitt, der unterhalb der Unterbrechung liegt und schließt nach oben mit einer




Fig. 9. Segmentale Sensibilitäts-
(Handbuch der Neurologie,

Linie ab, die der oberen Begrenzungslinie des befallenen Segments entspricht (Fig. 13). Also ist dann nur die obere Grenze segmental, bzw. radikulär.


Distale
Zunahme
der Sensi-
bilitäts-
störung

Ist die Querschnittsunterbrechung nicht vollständig, aber sind alle Bahnen einigermaßen gleichmäßig beteiligt, so ist die fast ausnahms-

lose Regel, daß die Sensibilitätsstörung nach den distalen Extremitätenenden zunimmt.

Nun kann aber noch der Fall eintreten, daß nur einzelne Stränge befallen sind; dann ist die Begrenzung, wie bei den Querschnittsstörungen

Einzelne Stränge



verteilung nach E. Flatau.
herausgegeben von Lewandowsky.)


überhaupt, aber die Störung kann sich auf einzelne Qualitäten beschränken (Fig. 14) und zwar ist es sicher, daß der Lagesinn (Muskelsinn) im Hinterstrang und zwar ungekreuzt geleitet wird, während Wärme, Kälte und Schmerz im vorderen Seitenstrang und zwar gekreuzt aufwärts steigen. Ist also der Seitenstrang isoliert betroffen, so gibt

Disso-
ziation
in den
Strängen

es dieselbe Dissoziation wie beim „Hinterhorntypus“, aber in anderer Verteilung, nämlich erstens gekreuzt, und dann von der Störungsstelle an abwärts über die ganze Körperhälfte. Der Berührungssinn verfügt über gekreuzte und ungekreuzte Bahnen im Seitenstrang und Hinterstrang, so daß er in den Fällen, wo nur einzelne Stränge oder selbst eine ganze Rückenmarkshälfte geschädigt sind, nur unwesentlich gelitten hat.

Verfolgen wir nun die Wege der Sensibilität großhirnwärts, so wird die Sachlage schon am Beginn des verlängerten Marks wieder sehr viel

Sensibilitätsbahnen vom Rückenmark zum Gehirn



Kreuzung aller Qualitäten

Fig. 10. Die wichtigsten Wege der Sensibilität.

Durch den sensiblen Nerv (S.N.) treten alle sensiblen Nervenfasern in das Spinalganglion *Sg.*, von dort in die hintere Wurzel (H.W.) und das Hinterhorn (H.H.). Hier teilt sich die Sensibilität. 1 ist die Verbindung zum Vorderhorn (*Vz* = Vorderhornzelle), also der reflektorische Weg zum Motorischen Nerv (*Mo*) und zum Muskel (*Mu*). 2 steigt im Hinterstrang der gleichen Seite auf (S. 45). 3 kreuzt in der grauen Kommissur (*3K*) und steigt im Vorderseitenstrang der entgegengesetzten Seite auf (Brown-Séquardsche Bahn vgl. Text S. 45 und Abb. 14). Die Verbindungen zum Kleinhirn sind fortgelassen.

Typus der zentralen Sensibilitätsstörung

Störung der Lokalisation

einfacher, dadurch, daß die im Rückenmark noch nicht gekreuzten Bahnen am Beginn des verlängerten Marks in der Schleifenkreuzung auch noch kreuzen und sich mit der schon im Rückenmark gekreuzten vereinigen. Während also bei einseitiger Unterbrechung der Bahnen im Rückenmark die Störungen teils gleichseitig (Lage- und Temperatursinn), teils gekreuzt (Schmerz- und Temperatursinn) sind (Fig. 14), sind von dem Beginn der Medulla oblongata an bis zur Rinde alle Störungen herdkontralateral. Die Bahn der Sensibilität geht wesentlich durch die Schleife, die dorsal von der Pyramide liegt, allmählich zum Thalamus, und von da durch die innere Kapsel zur Großhirnrinde. Eine Dissoziation der Sensibilität kann jedoch auch hier noch vorkommen, weil die Bahnen des Temperatur- und Schmerzsinnens zwar beide gekreuzt sind, aber doch noch so weit auseinander liegen, daß oft nur Temperatur bzw. Schmerz betroffen sind.

Der Typus der Sensibilitätsstörung bei Herden von der oralen Grenze des Rückenmarks an aufwärts ist jedenfalls die ziemlich gleichmäßige, sich aber wie bei den Rückenmarksstrangstörungen fast

immer nach den distalen Extremitätenenden zu steigende Verminderung der Empfindungsschärfe. Eine vollkommene Aufhebung der Sensibilität, wie sie bei totaler Rückenmarksquetschung vorhanden ist, kommt bei den höheren Herden (so insbesondere den Herden der Hemiplegie) fast niemals vor. Insbesondere längere schmerzhaft Reize dringen bei zerebralen Sensibilitätsstörungen fast immer durch, wenn auch oft mit erheblicher Verzögerung. Ein neues Moment tritt dann besonders bei den zerebralen Sensibilitätsstörungen zu Tage, die Störung der Lokalisation der Empfindung (vgl. oben). Der Kranke fühlt die Berührung oder den Schmerz zwar als solche, aber wenn er aufgefordert wird, die

Stelle des Reizes anzugeben, macht er große, manchmal ganz enorme Fehler, viel größere, als sie bei peripheren Sensibilitätsstörungen vorkommen. Über die Stereoagnosis vgl. unter Lokalisation im Gehirn.

Der Trigeminus kann natürlich erst von der Medulla oblongata aufwärts betroffen werden, und zwar ist die Sensibilitätsstörung im Gesicht dann gleichseitig, wenn der Herd so tief unten sitzt, daß die Sensibilität noch nicht gekreuzt ist, dann kontralateral, wenn die Trigeminussensibilität auch gekreuzt ist. Sind, wie meist, die anderen sensiblen Bahnen mitbetroffen, so haben wir im zweiten Falle also eine Hypästhesie einer ganzen Seite vom Kopf bis zum Fuß, im ersteren eine Anaesthesia alternans, gekreuzt an den Extremitäten, ungekreuzt im Trigeminusgebiet (Fig. 12).

Trigeminus bei zentralen Herden

Anästhesia alternans

Zu merken ist, daß bei den zerebralen Herden das Trigeminusgebiet häufig verhältnismäßig sehr wenig ergriffen ist, während die Extremitäten deutlich betroffen sind (das Umgekehrte ist seltener). Es liegt das daran, daß die Bahnen sich im Gehirn mehr verteilen und demnach einzelne verschont bleiben. Praktisch ist es darum wichtig, weil man aus einer Hemi-anästhesie, die das Gesicht verschont, nicht ohne weiteres den Schluß ziehen darf, daß der Herd unterhalb des Eintritts des Trigeminus in den Hirnstamm liege.

Häufige Verschonung des Gesichts




Fig. 11. Die wichtigsten Bahnen auf dem Querschnitt.

H. = Hinterstrangbahn (2 in Fig. 10),
PS. = Pyramidenseitenstrangbahn,
PV. = Pyramidenvorderstrangbahn,
BS. = Brown-Séquard'sche Bahn = 3 in Fig. 10.

Haut- und Schleimhautreflexe bei organischen Sensibilitätsstörungen
Areflexie der Cornea

Im Bereiche einer organischen Sensibilitätsstörung, gleichviel welcher, d. h. sowohl peripherer wie zentraler Lokalisation, können die Haut- und Schleimhautreflexe ausfallen. Es gibt sogar Fälle, wo diese Reflexe empfindlicher sind als die eigentliche Sensibilitätsprüfung. So ist der Verlust des Lid-schlußreflexes bei Berührung der Kornea nicht selten ein frühes Zeichen einer Affektion des sensiblen Trigeminusstammes.

Die Sehnenreflexe brauchen auch bei ausgedehnten Anästhesien peripheren und radikulären Ursprungs nicht verloren zu gehen, sondern nur bei denen, welche auch die tiefe Sensibilität (d. h. die Sensibilität der Muskeln und Gelenke) beteiligen und das ist insbesondere die an anderer Stelle zu besprechende tabische Degeneration der hinteren Wurzeln. Bei zentraleren Anästhesien gehen die Sehnenreflexe überhaupt nicht verloren. Zur Definition der Anästhesien sind also die Sehnenreflexe im allgemeinen zu entbehren.

Sehnenreflexe bei Sensibilitätsstörungen ohne Bedeutung

Die Unterscheidung der hysterischen Sensibilitätsstörung von den organischen ist viel schwerer als die Unterscheidung der Motilitätsstörungen. Letztere helfen vielfach indirekt. Wenn wir etwa eine organische, motorische Querlähmung des Rückenmarks feststellen, so werden wir kaum auf die Idee kommen,

Unterscheidung hysterischer Sensibilitätsstörungen von organischen

daß eine entsprechende Sensibilitätsstörung hysterisch sein könnte. So ganz sicher ist aber auch dieser Weg keineswegs, Fälle von Syringomyelie oder multipler Sklerose können sich mit hysterischen Sensibilitätsstörungen so verquicken, daß auch dem Geübtesten manchmal eine




Fig. 12. Hemianaesthesia alternans (Herd in der Medulla oblongata).

Abgrenzung unmöglich ist. Ein positives Zeichen der hysterischen Sensibilitätsstörung ist ihre große Wandelbarkeit, unter Umständen auch die Möglichkeit, sie wegzusuggerieren. Aber dieses Merkmal braucht nicht notwendig vorhanden zu sein. Dann hilft manchmal die Art der Begrenzung, die bei der Hysterie eben nicht den Begrenzungen

bei organischen Störungen entspricht. So sind insbesondere an den Extremitäten nach oben zirkulär abschneidende Sensibilitätsdefekte, z. B. strumpf- oder handschuhförmige, fast immer hysterisch. Die hysterischen Defekte zeichnen sich auch meist aus durch ihre scharfe Begrenzung; völlige Anästhesie und normale Berührungsempfindlichkeit grenzen häufig scharf aneinander, was bei organischen Störungen kaum jemals vorkommt. So finden wir bei den Hypästhesien, die eine ganze Seite einnehmen, und die an und für sich bei organischen und bei hysterischen Störungen vorkommen, die Grenze bei der Hysterie oft genau in der Mittellinie, während bei den zentralen Lähmungen immer größere Partien seitlich der Mittellinie wenig oder gar nicht gestört sind. Ebenso kommen absolute Sensibilitätsaufhebungen mit Ausnahme der an und für sich unverkennbaren Rückenmarksquetschungen bei organischen Störungen so gut wie nie vor. Wenn ein Glied also für Reize aller Art absolut unempfindlich ist, wenn man es stechen, kneifen kann, ohne daß der Patient das geringste merkt, so besteht im Zweifelsfalle die allergrößte Wahrscheinlichkeit, daß die Störung hysterisch ist.

Die Hautreflexe geben an und für sich kein ganz unterscheidendes Merkmal für oder gegen Hysterie. Verlust der Sehnenreflexe bedeutet jedoch eine organische Störung.

7. Ataxie.

Ataxie ist ein Ausdruck für eine Ungeordnetheit, eine Inkoordination der Bewegungen. Der Ataktische verfehlt das Ziel seiner Bewegung, sowohl in der Richtung wie in der Entfernung. Die Bewegung selbst ist schwankend, unruhig. Zur Ataxie gehört es auch, daß der Kranke ruhige Haltungen der Glieder oder des Körpers nicht einhalten kann, daß auch dabei die Glieder oder der Körper schwanken. Definition

In ausgesprochenen Fällen erkennen wir die Ataxie ohne weiteres, wenn der Kranke zur Tür hereinkommt. In leichteren Fällen haben wir eine Anzahl von allgemein üblichen Bewegungsaufgaben, bei denen sich das ataktische der Bewegung besonders gut zeigt. Für die oberen Extremitäten ist zu nennen der Fingernasenversuch: man fordert den Kranken auf, mit dem ausgestreckten Zeigefinger gegen die Nasenspitze zu fahren. Der Ataktische greift vorbei, der Finger schwankt etc. An den unteren Extremitäten ist die Aufgabe gebräuchlich, den einen Hacken auf das andere Knie setzen zu lassen. Besonders wichtig ist die Prüfung des Stehens bei aneinander geschlossenen Füßen. Fast immer tritt die Ataxie auch bei den genannten Extremitätenversuchen hervor, wenn man die Augen schließen läßt, weil dann der Kranke nicht durch das Sehen die Bewegung korrigieren kann. Die Prüfung des Stehens bei geschlossenen Augen ist als Romberg'scher Versuch bekannt, bei dem der Patient in ausgesprochenen Fällen in Gefahr kommt, infolge von Schwanken umzufallen. Fingernasenversuch

Kniehackenversuch

Romberg'scher Versuch

Bei der reinen Ataxie ist die grobe Kraft der Muskulatur intakt, die Ataxie kann sich aber auch mit Paresen oder Spasmen kombinieren.

A. Folge
von Sen-
sibilitäts-
störungen

Tiefe Sen-
sibilität

Die ganz überwiegende Zahl der Ataxien sind eine Folge oder besser ein motorischer Ausdruck von Sensibilitätsstörungen, und zwar der „tiefen Sensibilität“, d. h. der Sensibilität der Muskeln und Gelenke. Diese Sensibilität ist dazu da, um den Menschen über die Stellung der Glieder zu orientieren; auf Grund dieser Orientierung, welche wesentlich unbewußt erfolgt, werden die Bewegungen geordnet. Wenn die Benachrichtigung des zentralen Nervensystems durch die Sensibilität ausfällt, so werden die Bewegungen unregelmäßig und ungeordnet.

Sehnen-
reflex bei
Ataxie

Daher kommt es, daß in den — wie gesagt ganz überwiegenden — Fällen, wo die Ataxie Folge einer Störung der Sensibilität ist, auch andere Zeichen von Störungen der Sensibilität vorhanden sind. Dazu gehört vor allem der Verlust der Sehnenreflexe; die Sehnenreflexe werden ausgelöst durch die Erregung der tiefen Sensibilität des Muskels mittelst des Schlages auf die Sehne und so kann ihr Verlust auch eine Sensibilitätsstörung, wenn auch nicht im Sinne einer Störung der bewußten Sensibilität bedeuten, und in den Fällen von Ataxie, in denen auch die Sehnenreflexe fehlen, ist es der sensible, der zentripetale Teil des Reflexbogens, dessen Degeneration an dem Verlust der Reflexe Schuld ist; und zwar liegt die Störung entweder im peripheren sensiblen Nerv oder in der hinteren Wurzel bzw. im Hinterstrang und ebenda liegt auch die Ursache der Ataxie.

Hypotonie

Als ein weiteres Zeichen der gestörten Tiefensensibilität ist ein Symptom anzusehen, das erst in neuerer Zeit recht bekannt geworden ist, und das die Fälle der „sensugenen“ Ataxie fast immer begleitet, die Hypotonie. Als solche bezeichnet man die Tatsache, daß sich die Gelenke weiter strecken und beugen lassen, als normal ist. So kann man beim Tabiker das Bein oft so weit in der Hüfte beugen, daß man es beinahe der Schulter anlegen kann, so kann man das Knie bis zu einem stumpfen Winkel durchdrücken etc. Das kommt daher, weil die passive Beweglichkeit durchaus nicht allein eine Funktion der Anatomie der Gelenkbänder und Kapseln ist, sondern eben reflektorisch, d. h. durch die Sensibilität, schon gehemmt wird, ehe die anatomische Grenze erreicht ist.

Tabische
Ataxie

Vor allem bei der Tabes als der häufigsten Erkrankung der hinteren Wurzeln finden sich diese drei Symptome, Ataxie, Verlust der Sehnenreflexe und Hypotonie meist zusammen, aber wie wir später genauer ersehen werden, sind sie doch nur Symptome der sensiblen Bahn überhaupt, und kommen auch bei anderen als bei tabischen Affektionen derselben vor, nur daß die Affektionen einigermaßen ausgedehnt sein müssen. Ausfall einer oder nur weniger hinterer Wurzeln kann leicht durch die übriggebliebenen kompensiert werden.

Endlich kann man die Störung der Lageempfindung bei der Ataxie, speziell der tabischen, sehr häufig auch unmittelbar in der gewöhnlichen Weise (S. 42) nachweisen. In einer Anzahl von Fällen gehören dazu allerdings feinere Methoden, die hier nicht zur Darstellung kommen können.

Nun gibt es auch eine zweite Art der Ataxie, bei der die Zentralorgane für die Koordination selbst geschädigt sind, und bei der

infolgedessen Störungen der Sensibilität und der Reflexe fehlen können. Es ist das die Kleinhirnataxie. Diese zeichnet sich dadurch aus, daß ganz besonders das Gehen und Stehen gestört ist, während die einzelnen Bewegungen der Extremitäten fast oder ganz koordiniert bleiben. So ein Kranker kann also z. B. den Kniehackenversuch leidlich gut ausführen, trotzdem er nicht mehr frei stehen kann — ein Gegensatz, der bei der sensugenen Ataxie nie vorkommt. Die Art der Ataxie beim Kleinhirnkranken ist als Taumeln oder „Gang des Betrunkenen“ bekannt. Die Kranken selbst gebrauchen häufig den Ausdruck „Ich gehe, wie wenn ich betrunken bin“. Häufig taumelt der Kranke immer nach ein und derselben Seite, und zwar bei einseitigen Herden meist nach der Seite des Kleinhirnherdes. Diese Abweichung nach einer Seite wird meist deutlicher, wenn man den Kranken die Augen schließen läßt, ihm z. B. aufgibt, aus einer Ecke des Zimmers mit geschlossenen Augen gerade auf den Untersucher zu kommen. Das Taumeln selbst und die Unsicherheit beim Stehen wird aber durch den Augenschluß im Gegensatz zu der sensugenen Ataxie meist nicht wesentlich beeinflusst.

Kleinhirn-
ataxieAb-
weichung
nach einer
Seite

Im Anschluß an die Schilderung der Kleinhirnataxie sei ein Symptom erwähnt, das B a b i n s k i bei Kleinhirnkranken entdeckt und als Adiadochokinesie bezeichnet hat: Man fordert den Patienten auf, macht es ihm am besten vor, die Hand möglichst schnell zu supinieren und zu pronieren. Auf der Seite der Kleinhirnerkrankung geht es häufig lange nicht mehr so schnell, als auf der gesunden Seite. Das Symptom kann oft gute Dienste leisten.

A dia-
docho-
kinesie

Auch bei zerebralen Sensibilitätsstörungen kann eine geringe Ataxie der hypästhetischen Glieder vorkommen.

Zerebrale
Ataxie

Die Ataxie ist jedenfalls immer ein Symptom einer organischen Erkrankung, aber man sehe sich vor, nicht das Schwanken eines Neurasthenikers beim Rombergschen Versuch als Ataxie zu nehmen. Da sind eben die anderen Zeichen der oben genauer erörterten Sensibilitätsanfälle (Reflexe etc.) manchmal von entscheidendem Wert. Meist allerdings genügt beim Neurastheniker ein energisches Anfahren, um ihn zum ruhigen Stehen zu bringen. Beim Tabiker würde ein solches Vorgehen die Ataxie nur verschlimmern.

Romberg-
scher
Versuch
bei:
Neur-
asthenie

Hysterisch ist die Astasie-Abasie, die Unfähigkeit, zu stehen und zu gehen, ohne ersichtliche sonstige Störungen, auch ohne Ataxie.

Astasie-
Abasie

8. Störungen der Sinnesfunktionen.

Die Prüfung der Sehfunktion wird durch die ophthalmoskopische Untersuchung eingeleitet. Es war auf deren fundamentale Wichtigkeit schon hingewiesen (S. 13). Mehr als die Neuritis, die Papillitis und die neuritische Atrophie (vgl. S. 14 und später) interessiert uns an dieser Stelle die genuine Atrophie und die temporale Ablassung der Papille. Der ersteren entspricht gewöhnlich eine konzentrische Einschränkung des Gesichtsfeldes, bekanntlich zuerst für Farben, der letzteren ein zentrales Skotom. Es bedarf aber zur Feststellung dieser Gesichtsfeldeinschränkung doch eines Perimeters; wenn auch eines

Sehen

Gesichts-
feld bei
Neuritis

der primitiven Handperimeter meist genügt, der Praktiker wird diese Untersuchung selten ausüben. Die Neuritis und Papillitis nervi optici macht, ehe nicht eine Atrophie eingetreten ist, sehr häufig nur ganz unbedeutende und subjektiv gar nicht wahrgenommene Sehstörungen.

Retro-
bulbäre
Neuritis

Sehr wichtig ist die Kenntnis der retrobulbären Neuritis, welche mit einer organischen schweren Sehstörung bis zur Amaurose einsetzen kann, ohne daß ein Augenspiegelbefund da ist.

Hyste-
rische
Amblyopie

Die Differentialdiagnose gegenüber der hysterischen Amblyopie gibt in diesen Fällen gewöhnlich das Verhalten der Pupille, welches bei Hysterie nie Störungen zeigt, während bei einer im Sehnerven lokalisierten Neuritis retrobulbaris, wenigstens wenn die Sehstörung hochgradig oder total ist, die Lichtreaktion der Pupille erheblich gestört oder aufgehoben ist. Die hysterische Amblyopie ist übrigens hier zu Lande selten. Über andere hysterische Sehstörungen wird später berichtet werden (Kapitel Psychoneurosen).

Hemiano-
psie

Im Tractus opticus vereinigen sich bekanntlich die Fasern der homonymen Retinahälften, und wir haben daher vom Tractus opticus an aufwärts als Symptom der einseitigen Zerstörung der Sehbahn bis zur Okzipitalrinde die Hemianopsie und zwar kann bei Affektionen der linken Seite der Patient in seinem rechten Gesichtsfeld oder im homonymen Teile desselben (Quadrantenhemianopsie etc.) nichts sehen und umgekehrt. In den meisten Fällen kommt man zur groben Feststellung der Hemianopsie mit sehr einfachen Mitteln aus. Man verdeckt das eine Auge des Kranken, postiert eine Hilfsperson ihm gegenüber, deren ihm gerade gegenüber vorgehaltenen Finger er ansehen muß. Die betreffende Person hat darauf zu achten, daß er es auch tut. Man tritt selber hinter den Kranken und führt nun im Halbkreis (wie am Perimeter) ein nicht zu kleines Stückchen Papier an seinem Auge vorbei. Oft braucht man auch gar keine Hilfsperson, sondern läßt, dem Kranken gegenüber sitzend, einen Zeigefinger des Untersuchers fixieren, während die andere Hand sich im Halbkreis von der Seite nähert.

Bitempo-
rale
Hemiano-
psie

Außer der homonymen Hemianopsie, wo also eine temporale und eine nasale Gesichtsfeldhälfte ausgefallen ist, kommt, wenn auch selten, noch in Betracht die bitemporale Hemianopsie, wo die beiden äußeren Hälften des Gesichtsfeldes fehlen. Sie kommt dadurch zustande, daß bei Prozessen, die auf das Chiasma, also die Kreuzung der Sehnerven drücken (Hypophysentumoren), gerade die kreuzenden Fasern, welche den beiden inneren Netzhauthälften entsprechen, eher getroffen werden, als die am Chiasma gewissermaßen nur vorbeiziehenden Fasern der äußeren Retina (inneren Gesichtsfeld-)hälften (vgl. Fig. 19).

Hören

Auf die feinere Hörprüfung will ich hier gar nicht eingehen. Es sei auf die Lehrbücher der Otologie verwiesen. Es gibt eigentlich nur einen Fall, in welchem die genaue Hörprüfung für die Diagnostik des therapeutischen Handelns auch des Neurologen bestimmend ist, das ist der Verdacht auf Akustikustumor (vgl. unter Hirntumor). Hier handelt es sich darum, andere mögliche Ursachen der Schwerhörigkeit außer der Nervenaffektion auszuschließen, insbesondere Otosklerose. Auch der Neurologe wird sich hier meist mit dem Otologen beraten müssen. Hörstörungen nervösen Ursprungs kommen natürlich auch aus anderen Gründen

noch vor (Verletzungen, Tabes etc.) und da genügen meist die einfachsten Methoden (Uhr, Wiederholenlassen von geflüsterten Worten).

Zentrale Taubheit setzt doppelseitige Herde im Gehirn voraus. Die Störungen des Sprachverständnisses sind bei der Besprechung der Aphasie im Kapitel Gehirnlokalisation erörtert.

Sehr wichtig ist natürlich in einer großen Reihe von Fällen die Otoskopie
Ohrenspiegeluntersuchung, insbesondere bei benommenen Kranken und meningitisch erkrankten Kindern darf sie nicht unterlassen werden, weil sich in einer Otitis die Quelle einer zerebralen Erkrankung darbieten kann.

Geschmacks- und Geruchsprüfung sind nur sehr selten von nöten. Geschmacksprüfungen sind in einem Falle von einem gewissen Werte, wenn man bestimmen will, ob eine Fazialislähmung vor oder hinter dem Ganglion geniculi stattgefunden hat — in letzterem Falle fehlen Störungen. Ge-
schmacks-
und
Geruchs-
prüfung

Geruchsprüfungen, die man nicht mit Salmiak und Äther, sondern mit Blumen, einem Stück Seife oder dergl. anstellen soll, auf beiden Seiten getrennt, sind allerdings manchmal für die Erkennung von Prozessen, die den Riechnerven zerstört haben, von Wichtigkeit. Hier muß man jedoch mit der durch Schleimhauterkrankung der Nase erworbenen Anosmie rechnen.

9. Die Lumbalpunktion.

Die Quinckesche Lumbalpunktion ist ein technisch sehr ein- Technik
facher Eingriff, der natürlich unter allen Maßregeln der Asepsis auszuführen ist. Es sind eine ganze Reihe von Instrumentarien angegeben, von denen z. B. das Kroenigsche zu empfehlen ist. Narkose ist nur bei sehr unruhigen Patienten nötig, auch bei Kindern manchmal angenehm.

Der Eingriff ist in Seitenlage des Patienten auszuführen. Beim sitzenden Patienten ist er zwar vielleicht eine Spur einfacher, aber gefährlicher und die Ergebnisse der wichtigen Druckmessung bieten keinerlei Vergleichsmöglichkeiten mit den üblicherweise im Liegen gewonnenen. Der Patient muß am Rand des Bettes liegend einen Buckel machen und die Beine an den Leib ziehen. Eine vor dem Kranken stehende Hilfsperson hält mit der einen Hand den Kopf, mit der anderen die Knie des Kranken. Der Einstich erfolgt in der Mittellinie oder ein wenig seitlich davon. Die Nadel ist horizontal und etwas kopfwärts gerichtet, einzuführen. Als Einstichstelle wählt man gewöhnlich den Raum zwischen 3. und 4. Lumbalwirbel, man kann auch einen Wirbel höher oder tiefer eingehen und einige bevorzugen den Raum zwischen Kreuzbein und letztem Lendenwirbel. Man fühlt meist sofort, wenn man durch die ligamentösen Widerstände in den Wirbelkanal einge- drungen ist; auch fühlt der Kranke dabei häufig durch die Berührung der Kauda einen in das Bein ausstrahlenden Schmerz. Die Tiefe, bis zu welcher die Nadel eindringen muß, beträgt beim Erwachsenen im Durchschnitt 5 cm, auch bis 7 cm.

Bei Kindern ist der Eingriff am leichtesten, und man kommt hier manchmal schon in 1 cm Tiefe auf Flüssigkeit.

Glaubt man im Kanal zu sein, so zieht man den Mandrin vorsichtig heraus, und sobald man Flüssigkeit in der Nadel erscheinen sieht, schließt man den Hahn und setzt die Ansatzröhrchen an, in denen beim Öffnen des Hahns dann die Lumbalflüssigkeit emporsteigt, und die man durch Anfügen weiterer Ansatzstücke beliebig verlängern kann.

Druck-
messung

Für die Druckmessung kommt sehr viel darauf an, daß möglichst nichts, höchstens wenige Tropfen, verloren gehen. Schon der Verlust weniger Kubikzentimeter kann den Druck ganz unverhältnismäßig stark herabsetzen.

Die Höhe des Druckes liest man mit Hilfe eines von einer Hilfsperson angehaltenen Zentimetermaßes in Zentimeter Wasser ab. An der stehenden Liquorsäule sieht man die Atemschwankungen und die Pulsschwankungen.

Nachdem der Druck bestimmt ist, kann man nun Lumbalflüssigkeit ablassen; dazu schließt man wieder den Drehhahn der Nadel, so daß nur die Flüssigkeit, die in den Druckröhren sich befindet, ablaufen kann, öffnet die Klemme, mit der der untere Gummischlauch bis dahin verschlossen war, und läßt die Flüssigkeit in ein Reagensglas. Dann schließt man die Klemme wieder, öffnet den Hahn wieder, läßt die Flüssigkeit erst wieder aufsteigen, bestimmt wieder den Druck und so fort.

Druck-
steigerung

Ich halte es für einen Fehler, den Druck nicht dauernd zu bestimmen, sondern nach Gutdünken abzulassen. Nicht nur, daß man sich eines wichtigen diagnostischen Hilfsmittels beraubt, es können durch Außerachtlassung der Druckbestimmung schwere Unglücksfälle verschuldet werden. Der Normaldruck beträgt 120—200 cm Wasser, für sicher pathologisch tut man aber gut, bei tadellos ausgeführter Punktion, erst Drucke von vielleicht 280—300 cm anzusehen, der Druck kann bis 1000 cm und darüber steigen. Ist der Druck normal, so darf man nur ganz langsam wenige (5—10) ccm ablassen, wenn man die histologische Untersuchung machen will.

Ist der Druck hoch, so tut man gut, allmählich abzulassen, bis der normale Druck von etwa 120—200 erreicht ist. Bei sehr hohem Drucke ist es vorsichtiger, noch nicht einmal soweit herunter zu gehen, sondern schon bei 300 aufzuhören. Sofort hat man aufzuhören, wenn bei anfangs erhöhtem Druck nach Ablassen weniger Kubikzentimeter der Druck plötzlich auf ganz niedrige, unternormale Werte sinkt. Es kann das die Gefahr eines Abschlusses der Schädelhöhle von der Rückgratshöhle durch Einpressen des Inhalts der hinteren Schädelgrube in das Foramen magnum und Kompression der Medulla oblongata bedeuten.

Trübungen

Außer der Druckmessung kommt die Untersuchung der physikalischen Beschaffenheit und des Zellgehalts der Lumbalflüssigkeit als diagnostische Methode in Betracht. Die normale Zerebrospinalflüssigkeit ist wasserklar. Jede Trübung, auch die leichteste, ist das Zeichen einer schweren Erkrankung, Fehlen einer Trübung beweist noch nichts gegen eine seröse oder tuberkulöse Meningitis.

Leider wird die Beurteilung des physikalischen Zustandes und auch die spätere Untersuchung des Zellgehaltes nicht selten durch Blutbeimengungen gestört, die durch Anstechen intraduraler Venen bedingt sind, ein Vorkommnis, das man mit Sicherheit gar nicht vermeiden kann. Das Schlimme dabei ist, daß ja auch nicht artifiziell bedingte Blutbeimengungen zur Lumbalflüssigkeit (bei Ventrikelblutungen, bei Pachymeningitis haemorrhagica) vorkommen. Indessen sind gröbere artifizielle Blutbeimengungen doch meist nur in den ersten Kubikzentimetern enthalten, später wird die Flüssigkeit klar, während bei den präformierten Blutbeimengungen die Flüssigkeit dauernd von derselben sanguinolenten Beschaffenheit bleibt. Auch ist die Farbe älteren Blutes eine andere. Die mikroskopische Untersuchung des Sediments kann aber auch durch ganz minimale artifizielle Beimengungen von Blut illusorisch werden.

Blut-
bei-
mengungen

Zur Untersuchung des Sediments wird die Flüssigkeit entweder auf einer Wasserzentrifuge oder auf einer besonders guten Handzentrifuge in einem Spitzglas mindestens $\frac{1}{4}$ Stunde zentrifugiert, die Flüssigkeit abgegossen und von dem Sediment dann ein Tropfen in einer Kapillarpipette aufgenommen und auf ein Deckglas gebracht. Schon die Betrachtung des frischen Präparats lehrt, ob eine Vermehrung der Zellen vorhanden ist oder nicht. In der normalen Flüssigkeit sind nur ganz wenige Zellen, bei Immersionsvergrößerung etwa 1—4, während wir bei pathologischer Vermehrung selbst mäßigen Grades meist dichte Haufen von Zellen sehen. Man wird zweckmäßig auch ein Präparat trocknen, fixieren und färben, in derselben Weise, wie Blutpräparate.

Sediment

Für die allgemeine Praxis noch nicht geeignet sind die feineren Zellzählungen mit besonders dafür hergestellten Objektträgern, und für diesen Zweck ist auch die chemische Untersuchung auf den Eiweißgehalt oder einzelne Eiweißbestandteile noch nicht reif. Die Wassermannsche Reaktion im Liquor kann dagegen von Wert sein, stimmt aber in ihren Ergebnissen mit denen aus dem Blut nicht völlig überein, wie im Kapitel Syphilogene Nervenkrankheiten auseinander gesetzt werden wird.

Eiweiß-
gehalt

Wasser-
mannsche
Reaktion

So einfach nun im Betriebe eines Krankenhauses oder einer Klinik auch die Ausführung einer Lumbalpunktion ist, in der Privatpraxis hat sie ihre großen Bedenklichkeiten. Schon die Durchführung einer wirklichen Asepsis im chirurgischen Sinne erfordert Vorbereitungen oder die Mitnahme geschulter Hilfspersonen, die auch für das Halten des Kranken, wenn der Arzt schon das ganze Instrumentarium mit den wechselnden Handgriffen selber versorgt, notwendig sind. Es ist im übrigen bemerkenswert, daß trotz sicherlich oft ungenügender Asepsis fast nie eine Infektion der Meningen durch die Lumbalpunktion erfolgt. Wenn man nicht zwei Personen zur Hilfe hat, so riskiert man die Punktion; gelingt sie nicht sofort beim ersten Einstich tadellos, infolge der Unruhe des Kranken aufgeben zu müssen. Die Punktion gelingt aber häufig nicht beim ersten Einstich, man muß zwei- oder dreimal einstechen, und ich habe gesehen, daß Ärzte, die viele 1000 Punktionen gemacht hatten, selbst unter Krankenhausbedingungen manchmal keine Lumbalflüssigkeit bekamen. In den Kanal kommt man schon, aber es müssen sich wohl manchmal Wurzelfäden, vielleicht auch entzündliche Auf-

Schwierig-
keit der
Punktion

lagerungen so vor die Kanüle legen, daß man trotz wiederholten Einschiebens des Mandrins keine Flüssigkeit bekommt. Im Krankenhaus oder Sanatorium wiederholt man die Versuche dann am nächsten Tag mit einer Vorbereitung von 5 Minuten. Versagt die Punktion einmal in der Privatpraxis, so ist das sehr unangenehm, da man nicht die ganze Schererei am nächsten Tage noch einmal machen kann.

Un-
annehm-
lichkeiten

Dazu kommt, daß die Lumbalpunktion nun erstens sehr unangenehme subjektive Folgen haben kann, und nicht einmal ganz ungefährlich für das Leben ist.

Die unangenehmen Folgen sind Schmerz im Rücken, Kopfschmerzen, Ohrensausen und Schwindel, letzterer besonders beim Aufrichten aus liegender Stellung. Die Einzelnen sind dagegen sehr verschieden empfindlich, Tabiker und Paralytiker anscheinend besonders unempfindlich, aber es ist unbedingt nötig, daß der Kranke nach einer Lumbalpunktion sich mindestens 24 Stunden im Bett hält. Ich warne ferner davor, „Traumatiker“ lumbal zu punktieren. Es ist mir zu oft vorgekommen, daß diese später ihre neurasthenischen Beschwerden ganz oder zum größten Teil nicht mehr auf das Trauma, sondern auf die Lumbalpunktion zurückführten, und für den Praktiker kann das im Zeitalter der Haftpflicht unter Umständen recht unangenehme Folgen haben.

Gefahren

Dagegen ist die Lebensgefahr der Lumbalpunktion früher erheblich überschätzt worden, weil man ganz ohne Vorsicht und ohne Druckmessung beliebig viel Lumbalflüssigkeit abließ und dann Blutungen in die Hirnhäute, Blutungen aus Tumoren in die Ventrikel die Folge waren. Die Gefahren der Lumbalpunktion bei — wie oben geschildert — kunstgerechter Ausführung sind außerordentlich kleine, aber die Gefahren sind doch nicht ganz wegzuleugnen. Es kann besonders bei Geschwülsten der hinteren Schädelgrube plötzlicher Tod eintreten durch den oben angedeuteten Mechanismus. Es sind mir ferner Fälle bekannt, wo bei Meningitis in der ersten Stunde nach der Punktion ein plötzlicher Tod durch Atemstillstand eintrat. Da ein solcher Tod bei Meningitis doch ganz ungewöhnlich ist, glaube ich, daß hier derselbe Mechanismus, wie bei den Geschwülsten der hinteren Schädelgrube eingetreten ist, daß nämlich die Druckverminderung hauptsächlich im Wirbelkanal stattgefunden hatte und daß der intrazerebrale Druck, anstatt sich auszugleichen, das Kleinhirn mit der Medulla oblongata in das Foramen magnum hineingepreßt hat, was autoptisch mit Sicherheit kaum festzustellen ist. Auch Großhirntumoren habe ich, ohne daß etwa Blutungen zustande gekommen wären, auffallend kurze Zeit nach einer Lumbalpunktion zugrunde gehen sehen. Wenn diese Dinge auch außerordentlich selten sind, so sind sie doch für den Praktiker ein Grund, die Lumbalpunktion nur dann auszuführen, wenn er davon eine für die praktische Beurteilung oder Behandlung ins Gesicht fallende Entscheidung erwarten kann.

Diagno-
stische Be-
deutung

Dieses ist vor allem der Fall bei einer großen Reihe von unklaren Benommenheitszuständen, wo wir entscheiden wollen, ob eine Meningitis im Spiel ist oder vielleicht eine Urämie, ein Typhus

oder dergl. vorliegt. Hier gibt die Lumbalpunktion sehr häufig sowohl durch den negativen, wie durch den positiven Ausfall in wenigen Minuten eine Entscheidung. Zweitens kann die Lumbalpunktion von höchstem Wert sein, um die Art einer bereits diagnostizierten Meningitis durch den bakteriologischen und zytologischen Befund (Leukozyten bei eitriger Meningitis, meist Lymphozyten bei tuberkulöser s. auch unter Meningitis) festzustellen. Drittens kann es für die Frühdiagnose eines Hirntumors von großem Wert sein, eine Drucksteigerung festzustellen, welche der Stauungspapille manchmal lange vorausgehen kann. Viertens ist die Lymphozytose ohne Drucksteigerung ein fast regelmäßiges Zeichen der Tabes und Paralyse und (hier manchmal auch mit Drucksteigerung) der Lues cerebrospinalis. Indessen ist die Anzahl der Kranken dieser vierten Gruppe, wo wir bei der Differentialdiagnose dieser Erkrankungen den Befund der Zerebrospinalflüssigkeit wirklich brauchen, doch äußerst gering, wie später des näheren ausgeführt wird, besonders durch die Benutzung der Wassermannschen Reaktion im Blute. Es kommen nach meiner Erfahrung in dieser Gruppe wesentlich einige Fälle in Betracht, wo die Differentialdiagnose Polyneuritis (negativer Befund der Lumbalflüssigkeit) oder Tabes (Lymphozytose) anders als durch Lumbalpunktion nicht zu stellen ist.

Zu erwähnen ist, daß Lymphozytose auch bei Myelitis nicht syphilitischen Ursprungs, bei multipler Sklerose, bei Herpes zoster und einigen anderen Erkrankungen vorkommen kann.

Die Lumbalpunktion ist also sicherlich in den passenden Fällen kunstgerecht angewandt, ein ausgezeichnetes und unentbehrliches Hilfsmittel der Diagnose, aber der Praktiker tut gut daran, sie nicht wahllos, sondern nur in ganz bestimmten Fällen anzuwenden.

Die Neißer-Pollaksche Hirnpunktion besteht in der Punktion des Gehirns ohne größere Trepanation, nur durch einen kleinen unter Lokalanästhesie mit einem elektrischen Drillbohrer leicht herzustellenden kleinen Kanal. Diese Methode hat sich zur Feststellung von pathologischem Schädelinhalt z. B. von Geschwülsten in gewissen Fragen brauchbar gezeigt (vgl. auch unter Hirntumor). Sie ist jedoch durchaus dem Krankenhaus und der Klinik vorbehalten, da sie nicht ohne jede Gefahr ist, und man darauf vorbereitet sein muß, wenn etwa Eiter aspiriert wird, sofort die Trepanation anzuschließen.

Hirnpunktion

Auch die Ventrikelpunktion zur Feststellung (und auch zur Therapie) eines Hydrozephalus (vgl. unter Entwicklungshemmungen des Gehirns) wird man nur in einem Krankenhaus vornehmen.

Ventrikelpunktion

10. Krankhafte Störungen des sympathischen Systems.

Das sympathische (oder autonome oder vegetative) Nervensystem umfaßt die motorische Innervation aller glatten Muskeln des Körpers, aller Drüsen, und von quergestreiften Muskeln die des Herzens. Es gehören außer dem Herzen und den Drüsen zum Innervationsgebiet des sympathischen Nervensystems also die Pupille und die glatten

Begriff des
sym-
pathischen
Systems

Muskeln der Orbita, die Muskulatur fast des gesamten Magendarmkanals, die Blase, die Muskulatur der Genitalien, alle Gefäße. Anatomisch ist das sympathische System bekanntlich ausgezeichnet durch die in seine Nervenwege überall eingestreuten Ganglien. Trotzdem ist das sympathische Nervensystem keineswegs unabhängig vom Gehirn und vom Rückenmark. Der Einfluß der psychischen Erregungen auf die Herztätigkeit ist bekannt, in der Blase haben wir ein sympathisches Organ, das unter ausgesprochen willkürlichen Einfluß steht. In der Tat entspringen alle sympathischen Nervenfasern aus der Zerebrospinalachse und zwar aus dem Mittelhirn mit dem Okulomotorius (für den Sphincter pupillae und die Orbitalmuskeln), aus der Medulla oblongata im Vagus¹⁾ (besonders für Herz und Magendarmkanal), aus dem Dorsolumbalmark (für den Dilatator pupillae, die Gefäße des Körpers und der Eingeweide, zum Teil auch noch für die Muskulatur der Eingeweide) und aus dem Sakralmark für Anus, Rektum, Blase und äußere Geschlechtsorgane. Die aus dem Rückenmark entspringenden Fasern verlaufen zuerst zu den vorderen Wurzeln und mischen sich dann entweder den zerebrospinalen gemischten Nerven bei (z. B. die Fasern für die Gefäße) oder bilden eigene Nerven, wie den Hals-sympathikus und die Splanchnici.

Von den krankhaften Erscheinungen, welche durch Störungen im Ursprung und Verlaufe der sympathischen Nervenfasern hervorgebracht werden können, sei hier nur das allerwichtigste erwähnt.

Okulo-
motorius
Mydriasis

Eine Affektion des Okulomotorius oder seines Kernes macht Mydriasis und zugleich absolute Pupillenstarre. Weil im Okulomotorius auch noch Fasern für die quergestreiften Muskeln des Auges verlaufen, kommt diese Mydriasis fast immer zugleich mit Paresen oder Lähmungen der Augenmuskeln vor.

Auch die verschiedenen Formen der Pupillenstarre bei Tabes beruht schließlich auf Störungen im Bereiche des sympathischen Systems, hauptsächlich wohl des Okulomotorius. Aber der spezielle Sitz gerade dieser Störung ist noch umstritten.

Vagus

Druckpuls

Erbrechen

Sympathi-
kusläh-
mung

Zerstörungen des Vagusstammes am Halse können symptomlos verlaufen, wenn nur ein Vagus betroffen ist. Auf eine Reizung und Lähmung des Vagusernes wird die Pulsverlangsamung und Pulsbeschleunigung bei Steigerung des Zerebrospinaldrucks (Tumor, Meningitis) bezogen, auf eine Reizung des zum Vaguskerne in sehr engen Beziehungen stehenden Brechzentrums das Erbrechen bei zerebralen Erkrankungen

Sehr charakteristisch sind die Folgen der Unterbrechung des Halssympathikus (Hornerscher Symptomenkomplex): Enge der Pupille durch Lähmung des Dilatators, Verengung der Lidspalte durch Lähmung der glatten Müllerschen Orbitalmuskeln, Hyperämie und Hyperthermie des Gesichts auf der betroffenen Seite und Anhidrosis

¹⁾ Der Vagus ist ein Nerv, der aus drei ganz verschiedenen Elementen gemischt ist: 1. aus „sympathischen oder autonomen“ (s. oben), 2. aus sensiblen vom Eingeweidekanal, der Lunge, dem Kehlkopf herstammenden und 3. aus motorischen Nervenfasern zur quergestreiften Muskulatur der Stimmbänder.

daselbst durch Lähmung des Vasokonstriktoren und der Schweißfasern. Wenn der Sympathikus am Halse betroffe ist (Verletzungen, Tumoren), so kann dieser Symptomenkomplex rein zur Erscheinung kommen. Wenn die betroffenen Fasern aber in ihrem Ursprung im Rückenmark oder in den Wurzeln beschädigt sind, so ist diese Zumischung sympathischer Symptome zu Bewegungs- und Empfindungsstörungen uns ein wichtiges Zeichen für den Ort der zugrunde liegenden Erkrankung. Denn wir wissen, daß die Fasern für die Pupille in der Höhe der obersten Dorsalsegmente und des untersten Zervikal-segments das Rückenmark verlassen. So haben wir bei der Klumpkesschen Plexuslähmung (vgl. S. 27) sehr häufig eine Miosis, und auch für die Lokalisation intramedullärer Erkrankungen ist das Zeichen von Wert.

Ursprung
im
Rücken-
mark

Sehr wichtig sind dann noch die Blasen- und Mastdarmstörungen bei Erkrankungen des Rückenmarks. Sie äußern sich entweder in einer Retentio urinae et alvi oder in einer Inkontinenz. Häufig geht der letztere Zustand aus dem ersten hervor. Sie kommen nicht nur durch eine Zerstörung der Ursprungsstellen der Blasen- und Mastdarmnerven im Sakralmark zustande, sondern auch durch höher gelegene Rückenmarksveränderungen, weil durch diese der Weg vom Gehirn zum Sakralmark und dadurch jede willkürliche Regulierung der Urin- und Harnentleerung unterbrochen wird. Die Störungen der Blasen- und Mastdarmfunktionen sind meist begleitet von Störungen der Innervation der Genitalien, beim Manne von Verlust der Erektionsfähigkeit. Auch diese Störungen des sympathischen Systems treten fast immer mit den anderen Zeichen der Rückenmarksläsion (Lähmungen, Sensibilitätsstörungen) zusammen auf.

Blasen-
und
Mastdarm-
störungen

Genitalien

Eine besondere Bedeutung haben die Blasenstörungen bei Tabes (vgl. das betreffende Kapitel), aber auch sie sind jedenfalls von einer Erkrankung des Rückenmarks abhängig.

Die vasomotorischen Neurosen haben ihr eigenes Kapitel in diesem Buche. Auch wird auf die „funktionellen“ oder psychogenen Störungen im Bereiche des sympathischen Systems noch eingegangen werden. Wir werden auch bei einer ganzen Reihe von Erkrankungen noch auf Störungen im Bereiche des sympathischen Systems stoßen. Hier lag uns nur daran, einige allgemeine Tatsachen aus der Pathologie dieses Systems von vornherein festzustellen.

Wir haben das sympathische System von vornherein als ein motorisches System definiert. Damit ist wohl vereinbar, daß die Organe des sympathischen Systems (Herz, Darm, vielleicht auch die Gefäße) sensible Fasern haben, nur verlaufen diese Fasern mit den übrigen sensiblen Fasern durch die hinteren Wurzeln, bzw. durch die sensiblen Gehirnnerven.

Sensibilität
der sym-
pathisch
inner-
vierten
Organe

11. Benommenheit und Bewußtlosigkeit.

Sehr häufig kommt der Praktiker in die Lage, ein Urteil über die Ursache eines Zustandes der Benommenheit oder der Bewußtlosigkeit abgeben zu müssen.

Es handelt sich dabei vor allem darum, zu bestimmen, ob der Zustand der Benommenheit oder der Bewußtlosigkeit, den er vorfindet, primär durch intrakranielle Erkrankung, oder sekundär durch einen Zustand allgemeiner Intoxikation oder Infektion, z. B. durch einen Typhus, eine Wurstvergiftung, eine Alkoholvergiftung, ein Coma uraemicum oder diabeticum herbeigeführt ist.

Es kommt dann darauf an, eine Herdstörung des Gehirns, eine Meningitis oder endlich einen postepileptischen oder paroxysmalen paralytischen Zustand zu beweisen oder auszuschließen.

Wenn wir in solchem Falle eine Anamnese haben, so kann sie uns natürlich viel helfen. Erfahren wir ganz sicher, daß der Zustand aus voller Gesundheit plötzlich eingetreten ist, so sind eine Reihe von Ursachen, wie insbesondere Infektionskrankheiten fast auszuschließen. Erfahren wir, daß der Kranke ein Epileptiker ist, so wird es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen epileptischen Zustand handeln, wobei freilich zu berücksichtigen ist, daß Hirnblutungen durch Schädelverletzungen im epileptischen Anfall nicht ganz selten vorkommen. Erfahren wir, daß ein in mittlerem Alter stehender Kranker in letzter Zeit psychische Sonderbarkeiten gezeigt hat, daß er reizbar geworden ist, sein Geschäft vernachlässigt hat etc., so wird sich unsere Aufmerksamkeit sofort auf einen paralytischen Zustand richten. Die häufigste Ursache der plötzlichen Bewußtseinsverluste bei älteren Leuten aber ist natürlich die Apoplexie durch Hirnblutung oder Erweichungsherde des Gehirns.

Ist der Zustand der Benommenheit langsam eingetreten, so werden wir eher zunächst an eine allgemeine Ursache infektiöser oder toxischer Entstehung denken. Langsam eintretende Apoplexien sind sehr selten. Von den intrakraniellen Affektionen kommen in diesem Fall in erster Linie die Meningitiden in Frage.

In keinem Falle darf eine gründliche Untersuchung des Nervensystems versäumt werden. Diese ist unser einziges Hilfsmittel in den häufigen Fällen, wo jede Anamnese fehlt. Über die Zeichen der organischen Erkrankungen des Nervensystems im Zustande von Benommenheit und Bewußtlosigkeit läßt sich etwa folgendes sagen.

Eine typische Hemiplegie kann der Prüfung auch im Koma kaum entgehen. Neben der einseitigen schlaffen Lähmung ist auch die *Déviation conjugée* noch bei völlig Bewußtlosen zu erkennen. Leichtere einseitige Erscheinungen (Babinskischer Reflex, Fußklonus) u. dgl. lassen es aber meist zweifelhaft, ob es sich um eine leichtere bzw. ungewöhnlich lokalisierte Apoplexie oder um die Reste eines epileptischen oder paralytischen Anfalls handelt. Doppelseitige Reflexstörungen, insbesondere doppelseitiger Babinski kommt nicht nur bei organischen Herderkrankungen, sondern gelegentlich bei Koma jeder Ursache, am häufigsten beim urämischen, vor (s. S. 13). Auf das Fehlen der Sehnenreflexe und auch der Pupillarreflexe bei komatösen ist zur Diagnose einer organischen Erkrankung des Nervensystems nicht allzuviel zu geben, wenngleich in der großen Mehrzahl der Fälle Sehnenreflexe und Pupillarreflexe bis zur Agone erhalten bleiben. Immer-

hin bleiben aber differente, verzogene und lichtstarre Pupillen auf Lues oder Paralyse auch im Koma mindestens sehr verdächtig. Lähmungen der äußeren Augenmuskeln sind auch in Zuständen der Bewußtlosigkeit wichtig zur Diagnose entsprechend gelegener, sei es basaler, sei es intrazerebraler Herde. Hemianopsien kann man wenigstens in Zuständen mäßiger Benommenheit durch die Beobachtung des reflektorischen Lidschlusses bei Zufahren gegen das Auge von verschiedenen Seiten her mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit feststellen.

Ganz allgemein muß man in Zuständen mäßiger Benommenheit die Untersuchung des Nervensystems mit großer Zähigkeit durchführen. Man bekommt dann manchmal z. B. auf dem Gebiete der Sprachfunktionen Resultate, die ein Unerfahrener gar nicht zu erzielen versucht hätte.

Die Nackensteifigkeit der Meningitis bleibt wohl immer auch im Koma bestehen, auch das Kernigsche Symptom führt gewöhnlich in demselben Zustande zu einer schmerzlichen Verziehung des Gesichts.

In jedem Falle ist es ferner sehr wichtig die Ophthalmoskopie und die Otoskopie auszuführen. Die Ophthalmoskopie kann nicht nur Beweise für intrakranielle Drucksteigerung (Meningitis, Tumor) in einer Stauungspapille, oder auch urämische und diabetische Veränderungen ergeben. Ein normaler Augenspiegelbefund beweist freilich an und für sich noch nichts gegen alle diese Erkrankungen.

Die Otoskopie ist insofern mit Vorsicht zu brauchen, als wir außerordentlich oft alte otitische Veränderungen sehen, welche mit den vorliegenden zerebralen Stauungen gar nichts zu tun haben. Andererseits kann ihr Anfall entscheidend sein für die Diagnose einer Meningitis, eines Hirnabszesses oder einer Sinusthrombose.

In irgend zweifelhaften Fällen ist gerade bei benommenen Kranken die Lumbalpunktion anzuwenden. Ergibt diese keinen pathologischen Befund und fehlen sichere Zeichen einer zerebralen Herderkrankung, so können wir mit der einen Ausnahme eines postepileptischen oder alkoholischen Zustandes wohl alle primären nervösen Ursachen des Zustandes ausschließen.

Lumbal-
punktion

Auf die Untersuchung der inneren Organe kann ich hier natürlich nicht eingehen. Bemerkt sei, daß der unwillkürliche Abgang von Harn und Kot bei allen Arten der Benommenheit vorkommt, daß man ihm also ohne ganz spezielle Befunde keine Wichtigkeit im Sinne einer primären zerebralen oder medullären Störung beilegen darf.

Blasen-
Mastdarm-
funktion

Das Fehlen von Fieber spricht immer gegen eine allgemeine infektiöse Ursache, aber im allgemeinen auch gegen Meningitis. Temperatursteigerungen kommen dagegen auch bei primären nervösen Störungen vor, abgesehen von der Meningitis auch bei Apoplexie und im paralytischen Anfall. Eine Verfolgung der Temperaturkurve oder ein Blick auf eine etwa vorhandene kann natürlich hier von vornherein manches entscheiden.

Tem-
peratur

12. Der Schwindel.

Nachdem wir bis jetzt nur Tatsachen der allgemeinen Pathologie und Diagnostik besprochen haben, wenden wir uns nun zu zwei Gegenständen, die zwar meist nur Symptome anderer Krankheiten darstellen, und insofern also sich an das bisher behandelte Gebiet anschließen, in einzelnen Formen jedoch schon eine nosologische Selbständigkeit beanpruchen, dem Schwindel und den Kopfschmerzen.

Schwindel ist jede Unsicherheit oder Fälschung unseres Raumbewußtseins. Daher können bei seiner Auslösung auch alle Organe beteiligt sein, welche diesem Raumbewußtsein dienen, d. h. das Labyrinth und seine zentralen Bahnen und Zentren, das Auge, das uns über den Sehraum orientiert, die tiefe Sensibilität, welche uns von der Lage unserer Glieder im Raume unterrichtet, und endlich kann eine Art Schwindel auch durch leichte Trübungen des Bewußtseins selbst hervorgerufen werden.

Labyrinth-
schwindel

Die schwersten Schwindelerscheinungen werden durch Affektionen des Labyrinths ausgelöst. Sie bilden zum Teil auch die nosologisch selbständige Form des Schwindels. Es handelt sich meist um die ausgesprochenen Formen des spontanen Drehschwindels. Die Patienten glauben umhergewirbelt zu werden, in einen Abgrund zu stürzen, oder sie fühlen, wie die Umgebung sich um sie dreht. Es handelt sich also da um ausgesprochene Scheinbewegungen des eigenen Körpers oder des umgebenden Raumes. Steht der Kranke, so stürzt er meist zu Boden. Ja, selbst wenn er am Tisch sitzt und sich mit aller Kraft festzuhalten sucht, kommt es vor, daß er durch die innere Gewalt mitsamt dem Stuhl und Tisch zu Boden geschleudert wird. So heftig sind natürlich auch bei Labyrinthkrankung nur die schlimmsten Fälle, es finden sich auch dabei oft nur leichte Andeutungen von Schwindel. Das allgemeine Bewußtsein geht bei dem reinen Labyrinthschwindel nur selten auf Augenblicke verloren, gewöhnlich bleibt es klar, und das ist eins der wichtigsten Zeichen gegenüber etwaigen apoplektischen Anfällen. Immerhin sind ganz kurze Bewußtseinsverluste, die vielleicht nur Bruchteile einer Sekunde betragen mögen auch bei Labyrinthschwindel nicht ungewöhnlich.

Eine nicht seltene Begleiterscheinung des Labyrinthschwindels ist das Erbrechen.

Im Schwindelanfall selbst und einige Sekunden später besteht meist Nystagmus, in den anfallsfreien Zeiten kann er auch bei Labyrinthkrankung fehlen.

Oto-
sklerose

Der Labyrinthschwindel kommt in erster Linie durch Erkrankung des Labyrinths selbst zustande. So ist er ein häufiger Begleiter der Otosklerose; wenn wir bei älteren Leuten von Schwindel neben Ohrensausen und Schwerhörigkeit hören, so ist die Diagnose gewöhnlich gegeben. Trotzdem gehen diese Kranken vielfach als Neurastheniker,

oder ihre Klagen werden auf eine Arteriosklerose des Gehirns bezogen, die zwar mit der Otosklerose verbunden sein, aber auch ganz fehlen kann.

Selbst bei Coeruminalpräpfen kann übrigens Schwindel vorkommen.

Eine andere Form ist der eigentliche Menièresche Symptomenkomplex¹⁾, der bei bis dahin gesundem Ohr apoplektiform auftritt, gewöhnlich zusammen mit starkem Ohrensausen, Schwerhörigkeit oder Taubheit auf einem Ohr. Er beruht auf Blutungen oder Entzündungen²⁾ des Labyrinthes. Die Schwindelanfälle wiederholen sich auch nach einmaliger Blutung meist einige Male durch Wochen hindurch, und sind auch durch Kopfdrehungen, durch Bücken, Hintenüberneigen zu provozieren. Wir bemerken bei den Kranken auch außerhalb der Schwindelanfälle ein Unsicherheitsgefühl beim Gehen, soweit sie dazu überhaupt imstande sind, sehr häufig auch eine Ungeschicklichkeit bei einfachen Lageveränderungen, wenn sie z. B. aus der sitzenden Positur sich hinlegen wollen, so fallen sie gewissermaßen hin, ein Zeichen, daß der vorübergehenden Reizung des Labyrinths, die sich in den Schwindelanfällen kundgibt, doch ein dauernder Ausfall des Gleichgewichtsapparates, der sich im Labyrinth befindet, zugrunde liegt.

Menière-
scher
Sympto-
men-
komplex

Dieser Ausfall zeigt sich auch in dem Fehlen der Reaktionen, welche wir für die Vestibularisfunktionen besitzen, auf der Seite der Funktionsstörung. Die erste Stelle unter diesen Funktionsprüfungen nimmt heute die Prüfung des kalorischen Nystagmus, der nach Injektion von kaltem resp. warmem Wasser in den Gehörgang entsteht, ein. Es tritt nach Spritzen von Wasser von 25° C oder weniger ein horizontaler und rotatorischer Nystagmus nach der entgegengesetzten Seite auf, bei Spritzen warmen Wassers ein rotatorischer Nystagmus nach der gleichnamigen Seite. Genauere Angaben muß ich mir an dieser Stelle ersparen.

Vestibu-
larisreak-
tionen

Der galvanische Schwindel beim Durchströmen des Kopfes mit einem galvanischen Strom ist für die Zwecke des Praktikers ungeeignet, da sein Verhalten selbst für klinische Zwecke noch nicht übersichtlich erkannt worden ist. Ebenso wird der Praktiker kaum in die Lage kommen den Drehstuhl als Funktionsprüfung des Labyrinthapparates anzuwenden, es sind das doch Prüfungen, die dem otologischen oder neurologischen Spezialarzt vorbehalten bleiben dürften. Beide sind auch theoretisch dadurch kompliziert, daß stets beide Labyrinth erregt werden.

Im übrigen ist es wichtig zu wissen, daß der künstliche Drehschwindel und der Drehnystagmus vom Labyrinth ausgelöste Erscheinungen sind. Taubstumme, deren Labyrinth ganz fehlen, haben keinen Drehschwindel und keinen Drehnystagmus.

Taub-
stumme

Mit dem Drehschwindel hängt auch die Seekrankheit zusammen, deren gesamte Erscheinungen, auch das Brechen, durch die Erregungen des Labyrinths infolge der unregelmäßigen Bewegungen der Schiffe ausgelöst werden.

Seekrank-
heit

¹⁾ Der Name wird mitunter für jeden Schwindel bei Ohrerkrankung, also auch für die vorgenannte Form gebraucht.

²⁾ Die Labyrinthitis kann eine eiterige oder nicht eiterige sein. Nicht-eiterige Formen kommen z. B. nach Infektionskrankheiten vor.

Schwindel
durch
Affektion
des N.
acusticus
und seiner
Bahnen

Zu dem Labyrinthschwindel steht dann der Schwindel durch Affektionen des N. acusticus (genauer seines Vestibularanteils¹⁾ und seiner Bahnen in engster Beziehung. Der Unterschied ist nur der, daß nicht das Endorgan selbst, sondern der Weg vom Endorgan zum Zentrum betroffen ist. Demgemäß sind z. B. die Schwindelerscheinungen bei Tumoren des Akustikus oder bei Verletzung des Akustikus durch Schädelbasisbrüche von dem eigentlichen Labyrinthschwindel gar nicht zu unterscheiden. Sitzen Herde innerhalb der Medulla oblongata oder des Kleinhirns, so ist das Bild häufig nicht mehr so typisch, weil da gewöhnlich die Nervenfasern beider Labyrinththe in mehr diffuser Weise betroffen sind. Solche Herde sind z. B. bei multipler Sklerose, bei Apoplexie der Medulla oblongata, bei Tumoren des Kleinhirns, Ursache des Schwindels. Der Schwindel ist hier natürlich immer nur ein Symptom unter vielen anderen.

Schwindel
durch all-
gemeine
Zirkula-
tionsstö-
rungen des
Gehirns

Hier sind dann diejenigen Schwindelzustände anzuschließen, welche durch Zirkulationsstörungen des Gehirns hervorgerufen werden, und die z. B. bei Chlorose und anderen Bluterkrankungen so häufig vorkommen, aber auch bei Herzerkrankungen, wenn die dem Gehirn zugeführte Blutmenge ungenügend wird. Vielleicht gehört hierher auch der arteriosklerotische Schwindel. Sie haben selten den Charakter des heftigen Drehschwindels, es ist mehr das Gefühl des Schwankens und des Verschwimmens der Gegenstände vor den Augen, was diese Kranken empfinden. Der Kranke selbst kann diese Form von kleinen Ohnmachten manchmal nicht unterscheiden, von einem einfachen Schwarzwerden vor den Augen, und in der Tat gehen diese Schwindelanfälle häufig in Ohnmachten über. Sie dürften wesentlich auf Funktionsstörungen des Großhirns beruhen, und gerade mit Rücksicht auf die ganz verschiedene Bedeutung, welche dieser Form gegenüber dem Labyrinthschwindel zukommt, darf man nicht unterlassen, sich genau nach der Art des Schwindels zu erkundigen, d. h. nach der genauen subjektiven Empfindung. Man kann aus ihr meist ohne spezielle Untersuchung der Labyrinthfunktionen Art und Sitz des Schwindels mit großer Wahrscheinlichkeit bestimmen.

Augen-
schwindel

Lange nicht so häufig als der Labyrinthschwindel ist der Augenschwindel. Man hat früher, als man den Labyrinthschwindel und die Bedeutung des Labyrinths als spezifisches Organ des Gleichgewichts noch nicht genau erkannt hatte, die Häufigkeit des Augenschwindels überschätzt. Sein bekanntestes Beispiel ist der Höhenschwindel beim Blick in die Tiefe, der ja nicht als krankhaft zu betrachten ist. Schwindel kommt ferner, wenn auch nicht gerade gewöhnlich, bei Augenmuskellähmungen vor, hat aber dann nicht den Charakter des Drehschwindels, sondern mehr den einer allgemeinen Unsicherheit.

Schwindel
bei Tabes

Dasselbe ist von dem Schwindel der Tabischen zu sagen, der durch die Störung der Tiefensensibilität erzeugt wird.

¹⁾ Der N. acusticus (besser N. octavus) besteht aus 2 Teilen, dem eigentlichen Hörnerv, der von der Cochlea kommt = N. cochlearis, und dem Gleichgewichtsnerv, der vom Vestikulum bzw. Bogengängen kommt = N. vestibularis.

Indessen kommt bei Tabes auch echter Labyrinthschwindel durch syphilitische oder tabische Erkrankung des Labyrinths und seiner Bahnen vor.

In seltenen Fällen kann der Schwindel auch reflektorisch erzeugt werden und zwar meist vom Eingeweideapparat aus durch Affektion des Darms oder des Magens, z. B. durch Obstipation oder Eingeweidewürmer. Ehe man sich aber dazu entschließt, diese Ursache anzunehmen, müssen alle anderen sorgfältig ausgeschlossen werden.

Reflektorischer Schwindel

Endlich ist dann noch der neurasthenische bzw. hysterische Schwindel zu erwähnen. Er zeichnet sich meist aus durch ein Mißverhältnis in den subjektiven Beschwerden und ihren objektiven Folgen. Hysterische, die dauernd Schwindelempfindungen haben, können z. B. mit großem Vergnügen Aeroplanfahrten machen. Auch die subjektiven Erscheinungen haben manchmal etwas charakteristisch extravagantes. Die Kranken empfinden Wellenbewegungen u. dgl., dabei stehen sie ganz fest auf ihren Füßen. Man muß trotzdem zugeben, daß dieser Schwindel manchmal nicht ganz leicht von dem durch Hirnanämie zu unterscheiden ist.

Neurasthenischer und hysterischer Schwindel

Die Therapie des Schwindels richtet sich nach der Grundkrankheit oder kann sich wenigstens nach der Grundkrankheit richten. So ist es selbstverständlich, daß eine eiterige Labyrinthitis zu operieren ist, daß der Versuch gemacht werden muß, einen Kleinhirntumor zu extirpieren etc. Bei Chlorotischen bessern sich die Schwindelanfälle durch die entsprechende Behandlung mit Arsen, Eisen etc. bei Arteriosklerose (vgl. ein späteres Kapitel) tut eine Jodkur manchmal sehr gutes. Die Behandlung des neurasthenischen und hysterischen Schwindels ist die allgemeine der Neurasthenie und Hysterie (vgl. später).

Therapie

Leider gibt es gerade für die Mehrzahl der schwersten und quälendsten und gerade dem Praktiker zu Gesicht kommenden Schwindelercheinungen, diejenigen bei chronischen otosklerotischen Veränderungen keine ätiologische Therapie. Hier wirkt Brom, in nicht zu kleinen Dosen (3—5 g) monatelang hindurch genommen, manchmal jedoch ganz außerordentlich gut, und ich möchte diese symptomatische Behandlung besonders empfehlen. Auch hier wird, wie bei der Brombehandlung der Epilepsie (vgl. ein späteres Kapitel), häufig der Fehler gemacht, daß man zu kleine Dosen gibt oder nicht konsequent genug verfährt. Das Brom ist auch wesentlicher Bestandteil mancher gegen otosklerotische Beschwerden angepriesener angeblich spezifischer Mittel. Von dem viel empfohlenen Chinin habe ich nie etwas gesehen. Inwieweit die bei Otosklerose gebräuchlichen otologischen Maßnahmen, Vibrationsmassage u. dgl. einen Erfolg haben, kann ich nicht beurteilen. Auch die einmalige Lumbalpunktion ist empfohlen. Vor elektrischer Behandlung, insbesondere vor galvanischer Durchströmung des Kopfes bei Schwindel ist zu warnen, da sie nichts nützt und die Beschwerden oft verschlimmert.

Prognose

Die Prognose ist nach der Art der Grundkrankheit und der Möglichkeit der Therapie zu stellen. Von den zu berücksichtigenden und schon oben genannten Grundkrankheiten sei auch hier noch einmal auf die multiple Sklerose, die nicht selten mit anscheinendem Laby-

rinthschwindel debütiert, aufmerksam gemacht, da sie die Prognose gänzlich verändert. Was den echten Labyrinthschwindel anlangt, so können sich die Erscheinungen nach Verlust eines Labyrinthes, das z. B. durch einen akuten Menière'schen Anfall verloren gegangen ist, in hohem Maße spontan wieder ausgleichen. So tritt auch der Schwindel bei Otosklerose oft mit dem Fortschreiten des otosklerotischen Prozesses zurück.

13. Kopfschmerz und Migräne.

Der Kopfschmerz ist immer nur ein Symptom. Als Ausnahmen von dieser Regel und als selbständige Krankheit können wir nur die Migräne zulassen, weil bei ihr der Kopfschmerz wenigstens die alles beherrschende Rolle spielt. Als Symptom ist der Kopfschmerz wohl der allerhäufigste nicht nur der Neurologie, sondern vielleicht der ganzen Medizin.

Der Kopfschmerz dürfte auf pathologischen Vorgängen im Gehirn oder in den Meningen beruhen; wenn er so viele krankhafte Zustände begleitet, so zeigt diese Tatsache, daß Gehirn und Meningen bei ihnen beteiligt sind.

Kopfschmerz bei allgemeinen Erkrankungen und Vergiftungen

So gibt es ja keine fieberhafte Allgemeinerscheinung, welche keine Kopfschmerzen macht. Ferner ist der Kopfschmerz eine häufige Begleiterscheinung fast aller Vergiftungen, z. B. der Kohlenoxydvergiftung, wie auch der gewerblichen Vergiftungen durch Anilin, Schwefelkohlenstoff etc. Er ist die gewöhnliche Nachwirkung der Nar-kose und somit auch der akuten Alkoholvergiftung.

Der Kopfschmerz spielt auch eine große Rolle bei den fieberlosen Autointoxikationen, heftiger Kopfschmerz ist insbesondere einigermaßen charakteristisch für die Urämie.

Auch der Gichtkopfschmerz spielt eine gewisse Rolle, und sehr gewöhnlich sind die in ihren Ursachen (Hysterie) meist allerdings komplizierten Kopfschmerzen bei Chlorose.

Reflektorische Kopfschmerzen

Weiter gibt es dann eine Reihe von Kopfschmerzen, die reflektorisch entstehen, insbesondere durch Erkrankungen im Bereiche des Schädels. Hierher gehört der Kopfschmerz bei Hypermetropie infolge Überanstrengung des Akkommodationsmuskels, der Schläfenkopfschmerz bei Zahnerkrankungen, welcher die eigentlichen Zahnschmerzen ganz verdecken kann, hierher endlich die Kopfschmerzen bei adenoiden Vegetationen — die häufigste Ursache der sogenannten Cephalaea adolescentium —, bei Erkrankungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen.

Viel erwähnt wird neuerdings der sogenannte Schwielenkopfschmerz, der auf leichten myositischen Veränderungen der Nackenmuskeln beruht. Wir finden in der Tat bei einer Anzahl von Kopfschmerz-fällen die Nackenmuskulatur druckempfindlich.

Auch Organe der Brust und des Bauches können reflektorische Kopfschmerzen verursachen. Die Kopfschmerzen bei Obstipationen, bei Entozoen, bei manchen Magenaffektionen, bei der Gravidität und der Menstruation gehören (zum Teil wenigstens) hierhin.

Die heftigsten Kopfschmerzen machen die organischen Erkrankungen des Gehirns und seiner Häute, insbesondere die entzündlichen Erkrankungen der Dura und der weichen Hirnhäute. Auch die sogenannten syphilitischen Kopfschmerzen beruhen auf einer Affektion der Dura bzw. des mit ihr einheitlich verbundenen Periosts. Rasende Kopfschmerzen bis zur Ohnmacht macht der Tumor cerebri, auch der Hirnabszeß. Es gibt aber keine Gehirnerkrankung, die keine Kopfschmerzen macht. Selbst der benommene Hemiplegiker faßt sich oft noch stöhnend nach der Kopfseite, auf der die Blutung stattgefunden hat. Kopfschmerzen sind auch ein wichtiges Zeichen der multiplen Sklerose. Die Kopfschmerzen bei Arteriosklerose des Gehirns können außerordentliche Stärke erreichen.

Organische
Erkrankungen des
Gehirns

Syphilis

Der Kopfschmerz ist ferner gewöhnliches Anfangssymptom vieler, vielleicht der meisten Psychosen, er kommt bei der Paralyse ebenso vor, wie bei der Dementia praecox und bei der Melancholie. Manche Epileptiker ersehen bekanntlich aus ungewöhnlichen Kopfschmerzen, daß sie in der Nacht einen Anfall gehabt haben, aber auch unabhängig von den Anfällen stellt er sich ein.

Psychosen

Endlich haben wir die Kopfschmerzen bei den Psychoneurosen, der Hysterie und Neurasthenie. Bei dem Neurastheniker tritt er besonders häufig bei Ermüdung ein, und damit ist der Übergang zum Gesunden gegeben. Auch gesunde Personen bekommen häufig nach heftiger und andauernder Anstrengung Kopfschmerzen.

Hysterie
Neurasthenie
Ermüdungs-
kopfschmerz

Zu unterscheiden von diesen Kopfschmerzen sind die konstitutionellen Kopfschmerzen. Es gibt sonst in nervöser Hinsicht ganz gesunde Leute, die fast dauernd unter heftigen Kopfschmerzen zu leiden haben, ohne daß sich eine lokale oder allgemeine Ursache nachweisen ließe.

Die eigentliche Kopfschmerzkrankheit ist die Migräne. Ihr Bild ist ja außerordentlich bekannt. Meist handelt es sich um halbseitige tiefe Kopfschmerzen, aber es kommen auch doppelseitige, z. B. Stirnkopfschmerzen vor. Manche Kranke haben einmal auf dieser, ein anderes Mal auf der anderen Seite ihre Migräne. Die Krankheit tritt in Anfällen auf, die meist einige Stunden bis einen Tag, seltener länger dauern. Der Kopfschmerz ist meist sehr heftig, Die Kranken scheuen jede Bewegung und suchen ein dunkles Zimmer auf. In anderen Fällen können die Kopfschmerzen recht unbedeutend sein. Dem Kopfschmerz selbst gehen häufig stundenlange Beschwerden unbestimmter Art voraus, aus denen der Betreffende mit Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit, manchmal schon beim Aufstehen merkt, daß er an dem Tage seinen Anfall bekommen wird. Andere Male beginnt der Anfall jedoch plötzlich, und dann meist zunächst mit einem Flimmerskotom, jener bekannten Erscheinung, die von dem Kranken als ein im Gesichtsfeld sich hin und herbewegender leuchtender Punkt oder als eine Zackenfigur beschrieben wird. Der Flimmerskotom kann aber auch fehlen. Für den Anfall selbst ist ganz charakteristisch das Gefühl von Übelkeit und sehr häufig Erbrechen. Nach dem Aufhören der Schmerzen tritt häufig Schlaf ein, aus dem der Kranke gesund erwacht.

Migräne

Art der
SchmerzenFlimmer-
skotom

Besondere Formen der Migräne Seltene Fälle von Migräne kombinieren sich mit im Migräneanfall auftretenden und ihn dann längere oder kürzere Zeit überdauernden zerebralen Störungen, wie Hemiparesen, Aphasien. Auch die „periodische Okulomotoriuslähmung“ ist als eine Form der Migräne anzusehen.

Vasomotorische Erscheinungen Im Migräneanfall finden wir sehr häufig vasomotorische Differenzen der beiden Gesichtsseiten. Die Patienten wissen auch, daß im Anfall ein Ohr heiß wird und dergl. Auch Pupillendifferenzen finden sich, sind aber inkonstant.

Erblichkeit Über die Ursache der Migräne wissen wir sehr wenig oder nichts. Vielleicht handelt es sich um einen Krampf der Hirngefäße; so viel ist sicher, daß sie eine besondere sehr häufig vererbte Krankheit darstellt, welche keineswegs auf eine Stufe mit neurasthenischen und hysterischen Beschwerden gestellt werden darf. Die Migräne ist ein Beispiel für die Unrichtigkeit des Standpunktes, der alle Nervenkrankheiten nur in organische und funktionelle teilen wollte (vgl. Einleitung des 1. Kapitels). Trotzdem die Migräne zweifellos nicht psychogen ist, sind für die Auslösung der einzelnen Anfälle doch psychische Einflüsse von Bedeutung. Die Anfälle treten sehr häufig nach geistiger ermüdender Arbeit ein, wie sie andererseits nach Erholungsreisen oft längere Zeit ausbleiben. Auch psychische Erregungen lösen oft Anfälle aus, aber eben nur bei Migränekranken oder Disponierten. Die Lehre von einer echten hysterischen Migräne halte ich nicht für begründet. Aber es ist doch wichtig, zu wissen, daß suggestive und autosuggestive Einflüsse bei der Auslösung der einzelnen Anfälle wirksam sein können.

Anfall auslösende Ursachen

Auch körperliche Krankheiten, sowohl akute fieberhafte, wie chronische, die zu einer Abnahme des Körpergewichts führen, können die Migräne fördern. Bei Frauen ist die Menstruation nicht selten ein auslösender Faktor.

Untersuchung bei Kopfschmerzen

Die Vielheit der Ursachen, welche der Kopfschmerz hat, muß zu genauer Untersuchung jedes Kranken mahnen, der wegen Kopfschmerzen den Arzt aufsucht. Zuerst wird man Allgemeinerkrankungen ausschalten. Es ist besonders in der neurologischen Poliklinik gar nicht so selten, daß ein Mann wegen Kopfschmerzen behandelt zu werden wünscht, der eine akute fieberhafte Influenza hat. Wenn wir Albumen im Urin finden, bekommt der Fall natürlich sofort ein besonderes Aussehen. Harmloser ist die Feststellung einer Blutarmut oder Chlorose, aber für die Therapie doch keineswegs ohne Bedeutung. Auch die Möglichkeit einer Schwangerschaft soll man nicht ganz vergessen. Ich habe eine Patientin gesehen, der die völlig gesunde Stirnhöhle eröffnet worden war, und die sich als im 2. Monat schwanger erwies.

Es müssen ferner alle oben genannten organischen Gehirnerkrankheiten ausgeschlossen werden, wofür auf andere Kapitel verwiesen werden kann. Nur die Augenspiegeluntersuchung sei auch hier noch einmal hervorgehoben. Bei Kindern sind beginnende Meningitiden als Ursache von Kopfschmerzen nicht zu vergessen, und auch an die syphilitischen Kopfschmerzen (mit den bei ihnen häufigen nächtlichen Exazerbationen) sei noch einmal erinnert.

Wenn wir also Allgemeinerkrankungen und organische Hirn- und Hirnhauterkrankungen ausgeschlossen haben, ist, abgesehen von der

Epilepsie und den Psychosen, nur noch die Migräne von den neurasthenischen und hysterischen und den reflektorisch bedingten Kopfschmerzen zu unterscheiden, was durch die charakteristischen Angaben der Migränekranken meist unschwer gelingt. Praktisch werden wir ja die Diagnose der Migräne aus den charakteristischen Angaben meist schon vorher gemacht haben, wir werden auch oft genug den ersten sicheren Eindruck einer Neurasthenie nur bestätigen können; und trotzdem muß jeder Fall mit genau der gleichen Sorgfalt wieder untersucht werden. Denn der Hirntumor und die Paralyse können ganz typische Migräneanfälle machen, und die Kopfschmerzen der multiplen Sklerose sind von denen der Neurasthenie nicht zu unterscheiden.

Wir haben überhaupt darauf verzichtet, auf alle die verschiedenen Arten, in denen Kopfschmerzen empfunden und beschrieben werden, einzugehen, weil Art und Ort der Kopfschmerzen niemals an und für sich eine Unterscheidung der verschiedenen Formen ermöglicht.

Da der Kopfschmerz fast immer nur ein Symptom ist, die alleinige Behandlung von Symptomen aber auf die Dauer meist nutzlos ist, so werden wir in erster Linie immer die Ursache der Kopfschmerzen zu behandeln haben, z. B. also Chlorose oder Nephritis. Soweit eine organische Ursache des Kopfschmerzes im Gehirn und in den Hirnhäuten vorliegt, wird die ursächliche Therapie in späteren Kapiteln dieses Buches gegeben werden. Die reflektorischen Kopfschmerzen sind durch Wegschaffung der reflektorischen Ursache zu behandeln — Korrektur von Hypermetropie, Myopie, Behandlung von Zähnen, Entfernung von adenoiden Vegetationen. Die Kopfschmerzen, die mit Empfindlichkeit der Nackenmuskulatur einhergehen und vielleicht von hier aus reflektorisch bedingt sind, sind durch kräftige und längere Zeit fortgesetzte Massage der Nackenmuskulatur oft sehr günstig zu beeinflussen — eine einfache und auch dem Praktiker zugängliche, von ihm aber bisher nicht genug gewürdigte Maßregel. Auch Injektionen von einigen Kubikzentimetern physiologischer Kochsalzlösung in die Nackenmuskulatur tun in diesen Fällen oft gute Dienste. Es muß aber doch bemerkt werden, daß der echte sogenannte „Schwielenkopfschmerz“ doch lange nicht so häufig ist, als die Lobredner der Massage und der Injektionen in die Nackenmuskulatur meist wollen. Die Behandlung der neurasthenischen und hysterischen Kopfschmerzen dagegen hat wieder die allgemeine Behandlung dieser Krankheitsformen zur Voraussetzung, soweit die äußeren Verhältnisse diese gestatten.

Ein Neurastheniker, der unter Kopfschmerzen leidet, will und kann sich aber nicht auf Tage, nicht einmal auf Stunden seiner Arbeit entziehen. Also bleibt uns in vielen Fällen gar nichts anderes übrig, als eine rein symptomatische Behandlung der Kopfschmerzen (vgl. im übrigen das Kapitel Neurasthenie).

Zu dieser symptomatischen Behandlung haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Verfügung. An erster Stelle nenne ich die physikalischen Maßnahmen und zwar eine geschickte Kopfmassage, die mit der schon erwähnten Nackenmassage zweckmäßig verbunden

Therapie

Ätiologische
TherapieSymptomatische
Behandlung

wird. Man braucht sie nicht mit der traditionellen Technik und der Unzahl von geheiligten Handgriffen, welche die Massagespezialisten kennen, auszuführen. Die Hauptsache ist, daß man die ganze Kopfhaut mit kleinen vibrierenden und rotierenden Fingerbewegungen bearbeitet, besonders an den Stellen, wo die Patienten Schmerz angeben. Von den „Naegelischen Handgriffen“, die im wesentlichen in der Herbeiführung extremer Kopfstreckung oder Kopfbeugung, Kopfrückwärtslegung bestehen, habe ich nicht viel gesehen. Sie entsprechen immerhin der Erfahrung mancher Patienten, daß ihre Kopfschmerzen bei gewissen Stellungen des Kopfes erleichtert werden. Ferner sind heiße Stirn- und Nackenumschläge (tägl. 2—3 $\times$ 5 Minuten, so heiß es vertragen wird, und die Umschläge so häufig wechseln, daß sie heiß bleiben) manchmal von außerordentlich guter, auch dauernder Wirkung, während kalte Eis-Essig- und dergl. Umschläge meist nur einen vorübergehenden Einfluß auf die Schmerzen haben. Die physikalischen Maßnahmen eignen sich am besten für die Fälle von dauerndem geringen Kopfschmerz und Kopfdruck, und man soll versuchen, gerade bei diesen Fällen zunächst ohne Medikamente auszukommen.

Wenn das Elektrisieren bei Kopfschmerzen einen Einfluß hat, so höchstens einen suggestiven.

Von den medikamentösen Mitteln hat manchmal ausgezeichnete Wirkung das Brom (1—3 g pro Tag), das ja ohnehin als ein Mittel gegen etwaige zugrunde liegende Neurasthenie viele Anwendung findet. Es bewährt sich aber auch bei nicht neurasthenischen, z. B. arteriosklerotischen Kopfschmerzen. Es ist natürlich nicht gegen den Kopfschmerz-anfall, sondern als mindestens über Wochen dauernd durchgeführte Medikation zu brauchen. Bei Migräne mit häufigen und lang dauernden Anfällen, die auf anderem Wege nicht zu bekämpfen sind, ist eine systematische Bromkur mit größeren Dosen (4—5 g) sehr zu empfehlen. Ein Vorzug der Mischungen der Bromsalze vor den einzelnen ist nicht ersichtlich.

Die eigentlichen Symptomatika für den Kopfschmerz sind ja wohl allgemein bekannt. Ich nenne (unter Anführung der Tagesdosen) Chinin $\frac{1}{2}$ bis 1 g, Pyramidon (0,3—0,8), Antipyrin (0,5—2,0), Aspirin bzw. Natr. aceto-salicylicum (0,5—2,0), Phenacetin (0,25—1,0), Laktophenin (0,5), Migrälin (Mischung von Zitronensäure, Antipyrin, Koffein soll in Dosen von 1,1 g gegeben werden), das Trigemin (Mischung von Antipyrin und Butylchloralhydrat 0,6—1,0 g). Es gibt eine Unmenge von Mischungen unter dem Namen Migränepulver etc., auf die man verzichten kann. Vielleicht am freiesten von Nebenwirkungen von allen genannten und zugleich sehr wirksam ist das Pyramidon; gegen Antipyrin bestehen bekanntlich nicht selten Idiosynkrasien (Exantheme), die Salizylpräparate (z. B. Aspirin) erzeugen auch in kleinen Dosen nicht selten Schweiß und machen häufig Magenschmerzen; Chinin — immer noch eines der wirksamsten Mittel, wenn nicht das wirksamste — erzeugt bekanntlich häufig Ohrensausen. Es ergibt sich aber von selbst die Notwendigkeit, häufig mit den einzelnen Mitteln zu wechseln, so daß nur die eine Vorschrift zu beachten ist, die Patienten sich nicht allzusehr an das Arzneinehmen über-

haupt gewöhnen zu lassen. Die gleichen Mittel in ziemlich hohen Dosen sind auch im Migräneanfall anzuwenden. Es gelingt auch nicht selten, durch eine Dosis von 0,6—1,0 g Pyramidon oder 1,5—2,0 g Aspirin beim allerersten Beginn der Erscheinungen gegeben einen Migräneanfall zu koupieren, und man wird das jedenfalls versuchen. Bei anderen Patienten wird der Anfall unter dieser Medikation zwar milder, aber zieht sich in die Länge, so daß die Patienten selbst den kurzen und heftigen Anfall vorziehen. Bei einer Anzahl von Kranken wird durch die mehrfache Koupierung von Migräneanfällen ein mehr chronischer Zustand von leichten Kopfschmerzen erzeugt, der verschwindet, wenn ein Anfall sich einmal ordentlich entladet (Ähnliches sieht man bei der Epilepsie). Die Prognose der Kopfschmerzen hängt natürlich von der Prognose der Grundkrankheit ab. Die Migräne ist unberechenbar, sie kann für lange Zeit oder auch für immer plötzlich verschwinden. Prognose

14. Schmerzen. Neuralgien. Neuritis. Polyneuritis.

a) Schmerzen und Neuralgien.

Schon das Laienpublikum unterscheidet zwischen „Nervenschmerzen“ und denjenigen Schmerzen, welche von einer Erkrankung der Organe herrühren. Wenngleich der Laie meist dabei von der Vorstellung ausgeht, daß es Schmerzen gibt, die mit den Nerven und dem Gehirn gar nichts zu tun haben, und daß der Schmerz auch in dem Organ „sitzt“, wo er empfunden wird, so liegt dieser Laienvorstellung doch auch eine medizinische prinzipiell wichtige Unterscheidung zugrunde. Der Arzt, der eine Neuralgie oder eine Neuritis oder Schmerzen durch sonstige Erkrankungen des Nervensystems annimmt, muß in allen Fällen eine Erkrankung anderer Gewebe, durch welche das Nervensystem erst sekundär erregt wird, ausschließen. Wer alle die Möglichkeiten, die hier zu Irrtümern Veranlassung geben können, beschreiben wollte, der müßte die ganze Medizin, nicht nur die innere, sondern auch die Chirurgie durchgehen. Nur auf ganz wenige, aber praktisch wichtige Dinge sei hier kurz hingewiesen. Es genügt ja, daß der Praktiker an diese Dinge denkt, dann wird er folgenschwere Irrtümer vermeiden, auch dann, wenn eine Entscheidung im einzelnen Fall nicht gleich getroffen werden kann. „Nervenschmerzen“
Organ-schmerzen

Bei Kopf- und Gesichtsschmerzen kommen die Erkrankungen des knöchernen Skelets nicht selten in Frage. Die syphilitischen Dolores osteocopi gehören zwar schon halb und halb zur Neurologie, aber man versäume es nie, den Schädel auch auf gröbere Abweichungen zu untersuchen. Dabei berücksichtige man allerdings, daß besonders die Okzipitalfläche des Schädels recht verschiedenartig gestaltet ist, und daß man nicht harmlose Buckel oder Vertiefungen hier für pathologische Produkte halten darf. Auf die Schmerzhaftigkeit des Schädels an und für sich ist sehr wenig zu geben, sie kommt in fast gleicher Weise bei Schädelkrankungen, bei Gehirn- und Meningealerkrankungen und Nichtneur-
algische
Schmerzen
im Gesicht
und Kopf
Schädel

sogar bei Hysterie vor. Um Schädelkrankungen auszuschließen, kann man neuerdings die Röntgenuntersuchung in Anwendung ziehen.

Kiefer Auch den Kiefer vergesse man nicht zu untersuchen. Schon manche Kiefergeschwulst ist lange Zeit als Neuralgie gegangen.

Zähne Einige Schwierigkeiten bereiten die Zahnkrankheiten, Schwierigkeiten, die manchmal nur mit Hilfe eines sachverständigen Zahnarztes zu überwinden sind. Gar nicht so selten sehen wir aber auch heute noch Patienten mit Trigeminusneuralgie, die zunächst zu einer zahnbehandelnden Persönlichkeit (nicht zu einem sachverständigen Arzt) gegangen sind, um sich einen, wenn das nicht half, mehrere oder gar sämtliche Zähne einer Kieferseite ziehen zu lassen, und umgekehrt ist es manchmal ganz außerordentlich schwierig, einen wirklich schuldigen Zahn zu finden, indessen besitzt die Zahnheilhunde in der Röntgenuntersuchung und der Prüfung der einzelnen Zähne mit dem elektrischen Strom neue und, wie es scheint, Fortschritte bedeutende Methoden.

Nase In viel erheblichere Konflikte geraten wir bei den Nasenkrankheiten, und zwar scheint mir hier die Gefahr vorzuliegen, daß neurasthenische oder hysterische Beschwerden am Kopf viel häufiger, als es nützlich ist, ja sogar mit Nachteil von der Nase aus zu beeinflussen versucht werden. Ich spreche natürlich nicht von so schweren Erkrankungen, wie dem Empyem der Highmorshöhle oder der ausgesprochenen Eiterung der Stirnhöhle, die sogar zu einer Neuritis optica führen kann. Ich weiß auch, daß Kopfschmerzen im Kindesalter sehr häufig durch eine Auskratzung der adenoiden Wucherungen beseitigt werden. Ich gebe selbst zu, daß es nasale Reflexneurosen gibt, wie — in recht seltenen Fällen — das Bronchialasthma. Aber ich kann nicht zugeben, daß auf die vage Vermutung, daß irgendwelche nervösen Beschwerden mit geringen Veränderungen in der Nase, wie leichteren Katarrhen und Schwellungen, zusammenhängen könnten, eine langdauernde lokale Behandlung der Nase am Platze wäre. Hat der Behandelnde Glück, so werden zwar mit der Behandlung, weil sie suggestiv gewirkt hat, die Beschwerden verschwinden, um meist bald wieder aufzutauchen; hat er Pech, so werden sich — und das ist sicherlich viel häufiger der Fall — die nervösen Beschwerden nicht bessern, sondern eher verschlimmern. Von der Anschauung einiger Spezialisten, die in der Nase Geschlechtsstellen und dergl. suchen, sehe ich dabei noch ganz ab.

Auge Bei Gesichtsschmerzen in der Augengegend versäume man dann ferner nicht, an die Möglichkeit eines Glaukoms zu denken. Über die reflektorischen Kopfschmerzen vgl. S. 66.

Extremitäten Die geringsten Schwierigkeiten macht die Diagnose der Neuralgie nach der hier behandelten Richtung an den Extremitäten, wegen deren verhältnismäßig leichten Abtastbarkeit. Indessen können kleine, nur durch das Röntgenverfahren zu ermittelnde und verhältnismäßig benigne osteomyelitische Herde das Bild von Gelenkneuralgien machen, und an schwer zu erreichenden Stellen, wie insbesondere der Hüfte können auch größere lokale Erkrankungen zu ernsthaften Schwierigkeiten Veranlassung geben. Daß es z. B. manchmal ohne genaueste Röntgenunter-

suchung gar nicht so einfach ist, die Diagnose einer angeborenen Hüftgelenksluxation zu stellen, sei erwähnt, wenngleich es sich hier nicht um die Diagnose von Schmerzen handelt. Auch tiefe Eiterungen der Hüftgegend — Senkungsabszeß und dergl. — machen Schwierigkeiten. Die Schwierigkeit bei entzündlichen Gelenkerkrankungen ist dann die, daß sie sich nicht selten mit Neuralgie verbinden, aber dann ist praktisch immer zuerst die Gelenkaffektion in Angriff zu nehmen. An den unteren Extremitäten vergesse man nicht die Plattfußbeschwerden und auch nicht die Varicen.

Lungenkrankheiten geben nur selten zu Zweifeln Veranlassung. Daß man bei Interkostalschmerzen und bei Schmerzen in der Schultergegend die Lunge zu untersuchen und nach entsprechenden Beschwerden zu fragen hat und dann auch oft Lungenerkrankungen findet, ist selbstverständlich. Die neuralgischen Schmerzen hauptsächlich im linken Arm bei Herzkrankheiten sind bekannt. Die Wirbelerkrankungen werden in einem besonderen Kapitel abgehandelt.

Lunge

Herz

Die mit Schmerzen einhergehenden Abdominalerkrankungen machen Schwierigkeiten weniger gegenüber den einfachen Neuralgien, als gegenüber den tabischen Krisen. Hier können manchmal bekanntlich organische Erkrankungen, wie Gallensteine und dergl. nur mit großen Schwierigkeiten diagnostiziert oder ausgeschlossen werden. Vom neurologischen Standpunkt kann man dann sagen, daß eine Tabes allein aus dem Schmerz nicht diagnostiziert werden kann, und daß, wenn aus anderen Zeichen eine Tabes diagnostiziert ist, deren ursächliche Beziehung zu den vorhandenen Schmerzen sehr wahrscheinlich ist. Freilich kann sich auch einmal beides kombinieren, ich sah vor kurzem einen Fall, der einen großen Stein der Harnblase und doch eine Tabes hatte.

Abdomen

Die Mode, alle möglichen Beschwerden auf eine Wanderniere zu beziehen, scheint vorbei zu sein.

Niere

Ein Gebiet endlich, über welches sich der Neurologe nur mit äußerster Zurückhaltung äußern kann, sind endlich die Schmerzen infolge Erkrankung der weiblichen Genitalien. Aber aus der gynäkologischen Literatur der letzten Zeit scheint sich der Schluß zu ergeben, daß die Gynäkologen vom Fach sich mehr und mehr von der lokalen Behandlung aller zweifelhaften nervösen Beschwerden zurückziehen. Andererseits muß man mit den außerordentlich heftigen, manchmal neuralgischen Beschwerden vertraut sein, welche durch Verwachsungen im Bereiche der Genitalien, z. B. auch infolge künstlicher Fixationen des Uterus ausgelöst werden können, und welche meist ausgezeichnet durch die von gynäkologischer Seite vorzunehmende Lockerung dieser Verwachsungen durch Massage beeinflußt werden.

Genitalien

Ehe wir diesen Gegenstand verlassen, müssen noch die sogenannten Headschen Zonen erwähnt werden. Daß bei Erkrankungen innerer Organe häufig eine gesteigerte Empfindlichkeit gewisser Hautregionen vorhanden ist, ist einem jeden bekannt. Nicht bekannt war, daß eine große Regelmäßigkeit in der Ausbreitung dieser Hauthyperalgesien bei den Erkrankungen der einzelnen Organe (z. B. des Magens, der Leber etc.) statthat, und daß diese Zonen

Headsche Zonen

wesentlich segmental angeordnet sind (vgl. S. 44). Es rührt das daher, daß auch die inneren Organe mit sensiblen Fasern ausgestattet sind, die zusammen mit den sensiblen Fasern der Haut in den hinteren Wurzeln zum Rückenmark ziehen (vgl. S. 46). Die Erregung der Organfasern irradiert auf die Fasern der Haut, so daß sogar Schmerzen in entfernten Gebieten ausgelöst werden können, wie z. B. die bekannten Schulterschmerzen bei Gallensteinleiden, oder aber wenigstens eine Hyperalgesie zustande kommt, eben die Headschen Zonen. Man kann sie mittelst der Prüfung der Schmerzhaftigkeit von Nadelstichen sehr fein begrenzen. Eine wesentliche Bedeutung zur praktischen Diagnostik haben sie bisher nicht erlangt, wohl aber bilden sie eine beachtenswerte Fehlerquelle gegenüber primär neuralgischen Erkrankungen.

Neuralgische Schmerzen als Symptom anderer Erkrankungen des Nervensystems

Wenn wir nun eine Erkrankung anderer Gewebe als der nervösen ausgeschlossen haben, handelt es sich weiter darum, festzustellen, ob die Schmerzen ein Symptom einer anderen nervösen Grundkrankheit sind, oder ob sie eine eigentliche Neuralgie (bzw. Neuritis, über den Zusammenhang weiter unten!) darstellen. Praktisch werden wir meist diese Untersuchung des ganzen Nervensystems zuerst vornehmen, und wenn wir ein Grundleiden finden, der genaueren Untersuchung der Organe ziemlich überhoben sein. So können also Schmerzen im Arm, im Rücken etc. Ausdruck eines Rückenmarkstumors, einer Syringomyelie, einer multiplen Sklerose, vor allem auch einer Lues spinalis oder einer Tabes sein, und dann hat die Behandlung des Grundleidens einzusetzen, und selbst da, wo, wie etwa bei der Syringomyelie oder der multiplen Sklerose, eine solche nicht möglich ist, ist leicht einzusehen, wie die Beurteilung und Prognose durch die Feststellung eines Grundleidens geändert wird.

Echte Neuralgie

Die echte Neuralgie entsteht meist auf der Basis von Infektionskrankheiten, in malariefreien Ländern jetzt wohl am häufigsten bei Erkältungskrankheiten (Influenza) und hier entweder im Beginn oder Verlauf, oder auch nach anscheinendem Ablauf der eigentlichen Krankheit. Auch kann die Krankheit selbst beinahe unbemerkt verlaufen sein, und erst auf unsere ausdrückliche Frage hören wir, daß einige Tage vor dem Einsetzen der Neuralgie der Kranke sich schlecht und fiebrig gefühlt habe oder dergl. Inwieweit lokale thermische Einflüsse (Erkältung) oder „rheumatische“ in Frage kommen, ist nicht ganz sicher. In vielen Fällen scheint der Zusammenhang doch ein ziemlich zwingender. Ebenso sind lokale Traumen unter den sicheren Ursachen der Neuralgien. Seltener sind schon die Fälle, wo Intoxikationen mit Blei oder anderen Metallen oder Alkohol angeschuldigt werden; die Erscheinungen pflegen aber hier schon etwas diffuser zu sein, als bei den infektiös entstandenen, und dasselbe gilt von den Neuralgien bei Diabetes, bei Gicht, bei Karzinomkachexie, bei Basedow, auch hier pflegt es sich jedoch um mehr kontinuierliche, wenn auch zeitweise unterbrochene Schmerzen zu handeln.

Beziehung von Neuralgie und Neuritis

Die Ursachen der Neuralgien sind dieselben oder sehr ähnlich denen der Neuritis, und in der Tat scheint es uns sehr zweifelhaft, ob

irgend ein durchgreifender Unterschied zwischen Neuralgie und Neuritis besteht. Man verlangt von einer reinen Neuralgie gewöhnlich, daß sie nicht auf die motorischen Fasern der Nerven übergreife, also nicht zu atrophischen Lähmungen führe, daß kein dauernder Ausfall von Sensibilität und dementsprechend auch keine Reflexstörungen nachzuweisen sind. Ist das eine oder das andere da, so spricht man von einer Neuritis. Diese „neuritischen“ Erscheinungen sind manchmal aber so gering, daß die Neuralgie alles beherrscht, und gerade bei ausgesprochener Neuritis kommen die schwersten neuralgischen Anfälle vor. Es ist für viele Fälle mindestens ein Streit um des Kaisers Bart, ob man von einer Neuralgie oder einer Neuritis sprechen will. Würde man genau untersuchen, so würde man m. E. wahrscheinlich schon mit unseren heutigen Methoden irgendwo im Verlaufe des neuralgischen Nerven oder seiner Wurzeln auch immer neuritische Veränderungen degenerativer oder infiltrativer Art finden. Trotzdem mag man im klinischen Sinn die Bezeichnung Neuralgie beibehalten.

In diesem Sinne also bestehen die echten Neuralgien in Schmerzanfällen, die längere oder kürzere Zeit dauern und voneinander durch mehr oder weniger lange Intervalle getrennt sind. Eine wie enorme Intensität diese Neuralgien erreichen können, ist jedem Praktiker aus den Schilderungen seiner Patienten bekannt. „Wie wenn heißes Eisen ins Gesicht gegossen würde“, „Wie wenn der ganze Arm ausgerissen würde“ etc. Natürlich gibt es auch leichte Formen bis zu einem schwachen Ziehen oder Reißen. Die Dauer der Neuralgie schwankt von einem neuralgischen Anfall bis zu vielen Jahren. Wer einmal eine Neuralgie gehabt hat, neigt häufig zu Rezidiven. So gibt es Menschen, die bei jeder Influenza in dem einmal betroffen gewesenem Nervengebiet wieder ihre Neuralgie bekommen. Die Verteilung der Neuralgie richtet sich nach der Verteilung der Nerven und Nervenäste, wie z. B. im Trigeminus bekanntlich die einzelnen Äste (vgl. Fig. 8a) isoliert betroffen werden können; der Schmerz kann dann auf die benachbarten Nervengebiete irradiieren. Man ist in neuerer Zeit darauf aufmerksam geworden, daß ein nicht unerheblicher Teil der Neuralgien, z. B. viele Fälle von Ischias, ihre Ausbreitung nicht nach Nerven-, sondern nach Wurzelgebieten nehmen, so daß angenommen werden muß, daß in diesen Fällen die Neuralgie ihre Entstehung nicht in den Nerven, sondern in den Nervenwurzeln findet.

Viele Neuralgien sind auch außerhalb des Paroxysmus ausgezeichnet durch Druckpunkte, die sich im Verlaufe der ergriffenen Nerven finden; diese Druckpunkte können jedoch auch völlig fehlen.

Die Trigeminusneuralgie erstreckt sich manchmal nur auf einen, häufiger auf zwei, nur selten auf alle drei Äste des sensiblen Trigeminus (Fig. 8a). Als (häufig fehlende) Druckpunkte sind zu erwähnen der Supraorbitalpunkt, der Infraorbitalpunkt und der Kinnpunkt an den Stellen, wo die drei Äste aus dem Knochen heraustreten. Gerade bei der Trigeminusneuralgie sehen wir nicht ganz selten eine bisher noch nicht erwähnte Eigenschaft der Neuralgie, daß sie nämlich zu reflektorisches, d. i. willkürlich nicht beherrschbaren Zuckungen in den ent-

Schmerz-
anfälle

Rezidive

Irradiation

Radikuläre
FormenDruck-
punkteTrige-
minus-
neuralgie

sprechenden motorischen Nerven, bei Trigeminusneuralgie also besonders im Fazialisgebiet führen kann.

Bei der Okzipitalneuralgie finden wir einen (nur selten fehlenden) Druckpunkt an der Austrittsstelle des N. occipitalis major.

Über die Brachialgien und Interkostalneuralgien ist nichts Besonderes zu sagen, die Druckpunkte folgen dem Laufe der Nerven.

Ischias

Bei der Ischias, der häufigsten Neuralgie überhaupt, kommen mehr als bei den anderen Neuralgien lokale Ursachen, insbesondere Durchnässungen, ätiologisch in Betracht. Auch können an und für sich harmlose Erkrankungen im Bereiche des Beckens, wie Hämorrhoiden, selbst einfache Obstipation die Erscheinungen einer Ischias mindestens sehr verschlimmern. Ebenso kann der Druck des schwangeren Uterus Ischias — ebenso übrigens auch andere Neuralgien an den unteren Extremitäten hervorrufen. Doppelseitige Ischias muß wenigstens den Verdacht einer Wirbelerkrankung erwecken (vgl. unter Wirbeltumor), kommt aber auch gelegentlich als einfache Neuralgie, z. B. bei Diabetes vor. Selbstverständlich muß man auch bei einseitiger Ischias immer an die Möglichkeit einer ernsteren Beckenerkrankung, z. B. eines Tumors denken.

Lasègue
oder
Kernig

Diagnostisch wichtig sind die Druckpunkte längs des Verlaufes der Nerven, die aber, wie auch bei den anderen Neuralgien, fehlen können. Auch sind gerade bei den Neuralgien im Bereiche des Ischiadikus nicht selten nur Äste des Nerven befallen, so daß man anscheinend atypische Druckpunkte findet¹⁾. So gut wie konstant ist dagegen das Lasèguesche (oder Kernigsche) Phänomen, die Schmerzhaftigkeit der Beugung des im Knie gestreckten Beines gegen den Rumpf. Es ist genau das gleiche Symptom, das wir bei der Meningitis finden, und es kommt dadurch zustande, daß die Dehnung des entzündeten (bzw. neuralgischen) Nerven oder bei der Meningitis seiner Wurzeln schmerzhaft ist.

Scoliosis
ischiadica

Die Scoliosis ischiadica ist eine Haltungsanomalie bei Ischias, die wohl durch eine Schonung des schmerzenden Nerven entsteht.

Herpes
zoster

Zu den Neuralgien kann wegen seines unangenehmsten Symptoms auch noch der Herpes zoster gerechnet werden. Er beruht auf einer hämorrhagischen Entzündung der Spinalganglien, in deren Bereiche die — also segmentale — Neuralgie dann einsetzt. Der Herpes zoster der Kopfganglien führt zu entsprechender Lokalisation im Kopfgebiet, insbesondere dem Trigeminus. Das zweite Symptom ist dann die bekannte bläschenförmige Eruption, welche sich immer nach Segmenten, bzw. Wurzelgebieten ausbreitet. Am Rumpf hat sie daher ja auch den populären Namen der Gürtelrose. Der Herpes zoster ist

¹⁾ Auch die Metatarsalgie, auch als „Mortonsche Krankheit“ bekannt, wird neuerdings mehrfach auf eine Neuralgie des Ischiadikus bezogen. Dagegen dürfte die Coccygodynie zum Teil auf lokale Prozesse am Steißbein zurückzuführen sein. Man muß sich bei allen den zirkumskripten Neuralgien sehr vorsehen, lokale entzündliche Veränderungen (z. B. Bursitiden) zu übersehen.

wahrscheinlich in der Mehrzahl der Fälle eine spezifische Infektionskrankheit. Sie beginnt meist mit leichtem Fieber. In einer Minderzahl von Fällen scheint der Herpes zoster aber nur ein Symptom der Lokalisierung anderer infektiöser Prozesse in den Spinalganglien zu sein.

Die Therapie der Neuralgien muß vor allem darauf gerichtet sein, die Krankheit im akuten Stadium zu beenden und sie nicht in das prognostisch viel ungünstigere chronische übergehen zu lassen. Therapie

Das beste ist, jede akut beginnende Neuralgie auf einige Tage ins Bett zu stecken, eine Maßnahme, die freilich bei Neuralgien geringer Intensität auf den Widerstand des Patienten stößt. Dann gebe man Chinin, welches mir nicht nur bei Malarianeuropathie, sondern auch bei den Influenzaneuralgien (und auch bei Herpes zoster) immer noch das mächtigste antineuralgische Mittel zu sein scheint; man fange, wenn nicht besondere Kontraindikationen vorliegen und man vielleicht vorher eine kleine Probedosis gegeben hat, mit einer Dosis von 1 g an, der man am selben Tage noch eine zweite gleiche oder auch nur 0,5 g folgen läßt. Zu empfehlen sind zugleich auch einige Blutegel in der Nähe der Neuralgie. Am zweiten Tage gebe ich neben 0,5 g Chinin gewöhnlich Aspirin und lasse unter warmen Einpackungen und heißen Getränken ordentlich schwitzen, am dritten Tage wieder Chinin, am vierten noch einmal Schwitzen, dann sind die weiteren Maßnahmen danach einzurichten, wie sich nach diesen vier Tagen die Neuralgie gestaltet hat. Wenn möglich setzt man das Chinin nun am besten auf einige Tage aus und gibt zweckmäßig dann etwa Pyramidon zweimal 0,3—0,5 g täglich. Lokal wendet man während der ganzen Zeit trockene Wärme (Gummiwärmflaschen, Thermophorkompressen oder dergl.) an. Kälte ist zwar dem Patienten häufig momentan angenehm, scheint aber objektiv häufig ungünstig zu wirken. Der betroffene Körperteil ist ruhig zu halten, und es sind nicht etwa bei Ischias in dieser Zeit Dehnungsversuche, Massage oder dergl. zu machen. Wie nach Ablauf der ersten Woche die Behandlung weiterzuführen ist, darüber lassen sich schematische Vorschriften nicht geben. Im Prinzip ist während dieser an der Behandlung noch nichts zu ändern. Zweckmäßig kann es manchmal erscheinen, mit den Antineuralgika zu wechseln, ihre Dosis zu erniedrigen oder zu erhöhen. Es sollen hier nicht alle die bekannten Antineuralgika genannt werden. Von einigen wird Aconitin (Dosen von 0,0002, Tabletten à 0,0001 B. W. u. Co.) in Kombination mit einer Abführkur bei Trigeminusneuralgie gelobt. Man gebe sich auch gerade dann, wenn die Neuralgie anscheinend fast verschwunden, aber noch leichte Beschwerden, Ziehen, Kribbeln etc. bestehen, mit diesem Erfolg nicht zufrieden, sondern behandle den Patienten bis zur absoluten Beschwerdelosigkeit weiter, allzuleicht bekommt man sonst Rezidive, vor denen man freilich die erste Zeit auch nach anscheinend völliger Heilung nicht geschützt ist. Der Patient muß jedenfalls die Anweisung bekommen, sich bei dem geringsten Zeichen eines Rezidivs wieder vorzustellen.

Man wird eine große Anzahl von Fällen durch eine ungefähr in der beschriebenen Weise durchgeführte Behandlung zur Heilung bringen

können, und wenn vielleicht auch eine Anzahl darunter spontan geheilt wären, so ist das ein Einwurf, der dem Praktiker höchst gleichgültig sein kann. Es ist auch wirklich sehr wahrscheinlich, daß man mit Hilfe einer von Anfang an energisch einsetzenden Therapie auch schwerere Fälle, welche sonst vielleicht den Ausgang in ausgesprochene Neuritis genommen hätten, koupieren kann.

Morphium So lange wie möglich vermeide man Morphinum. Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, daß ein Arzt, der bei einer Neuralgie Morphinum gegeben hat, diese Neuralgie nicht zur Heilung bekommt, weil er dem Drängen des Kranken und seiner Umgebung, wieder Morphinum zu geben, nicht widerstehen kann. Es ist andererseits zuzugeben, daß manche Neuralgien von einer Stärke sind, daß alle Schlafmittel nichts helfen und Morphinum unvermeidlich wird.

Nervendehnung Nach Ablauf des akuten Stadiums, aber nicht früher als 14 Tage nach Beginn, je nach Lage des Falles aber manchmal noch später beginne man bei der Ischias mit unblutigen¹⁾ Nervendehnungen, die überhaupt nach jeder Ischias anzuraten sind, auch wenn keine Beschwerden mehr bestehen. Sie sind gewissermaßen das Kernig'sche Phänomen (S. 76), zu therapeutischen Zwecken angewandt. Also geht es ohne Schmerzen dabei nicht ab. Energische Patienten können auch selber lernen, täglich mehrere Male solche Übungen in der Dehnung des Ischiadikus vorzunehmen, bis sie das Bein ebenso weit wie das gesunde beugen können.

Massage Damit Hand in Hand kann man auch mit leichter Massage nunmehr vorgehen. Gerade in diesen verhältnismäßig noch frischen Fällen darf die Massage nicht so geübt werden, daß eine erhebliche Steigerung der Schmerzen während oder nach der Massage eintritt, leichtere Schmerzen während der Massage sind aber nicht zu vermeiden. Bei der Massage der Ischias berücksichtige man das ganze Bein, von der Lende an bis zum Fuß. Man orientiert sich dabei auch über die nicht immer übereinstimmende Verteilung der Neuralgie, d. h. über die Stellen, die besonders schmerzhaft sind, und behandle diese besonders sorgsam, auch so weit als möglich in die Tiefe dringend. Man kann in einer Sitzung nicht immer das ganze Bein massieren. Die sogenannte Nervenpunktmassage ist nichts anderes als eine Muskelmassage, da ihre Vertreter zugeben, die Nervenpunkte nur durch die bei ihrer Berührung auftretende unwillkürliche Muskelkontraktion zu erkennen. Die Nervenpunktmasseure forschen in dieser Weise besonders sorgsam nach der individuellen Verteilung der Neuralgie, ein Punkt, der von dem üblichen „geprüften Masseur“, der in schematischer Weise massiert, natürlich nicht berücksichtigt wird, den der massierende Arzt aber auch ohne angebliche Nervenpunktmassage leicht berücksichtigen kann. Wenn verständige Ärzte die Massage ausüben, so werden sie bei entsprechender Mühewaltung auch mindestens die gleichen Erfolge haben, wie die „Nervenpunktmasseure“. Vor allem erwecke man in dem Patienten nicht die Hoffnung, daß mit ein paar Sitzungen die Sache abgemacht

¹⁾ Die blutige Ischiadikusdehnung kann als verlassen gelten.

sei, sondern nehme sich in diesem einen Punkt die Nervenpunktmasseure zum Vorbild, welche ihre Patienten auf eine vielmonatige Kur vorbereiten. Geht es schneller, um so besser.

Nervendehnung und Massage halte ich auch für die Hauptmittel bei der eigentlich chronischen, sei es durch die Machtlosigkeit oder durch die Mangelhaftigkeit der Behandlung chronisch gewordenen Ischias. Auch bei anderen chronischen Neuralgien an den Extremitäten und Rumpf wird man sie anwenden, und selbst bei Trigemimusneuralgien nützt eine Massage der Kopfhaut, der Gesichtshaut und der Gesichtsmuskulatur manchmal ganz außerordentlich. Bei den chronischen Ischiasfällen ist nach den ersten Sitzungen eine manchmal sehr erhebliche Steigerung der Schmerzen durch die Massage gar nicht zu vermeiden, so daß man dann sogar diese Steigerung durch eine Morphinum-einspritzung ausgleichen muß. Von sehr gutem Erfolge kann dann bei diesen chronischen Fällen die Kombination energischer Hitze-einwirkungen mit der mechanischen Behandlung sein, insbesondere leistet die Dampfdusche 15—20 Minuten dem Verlaufe des N. ischiadicus entsprechend angewandt, außerordentlich gutes. Für die sachgemäße Anwendung dieser hydriatischen Maßnahmen ist ja heute mancherorts auch für die Arbeiterbevölkerung hinreichend gesorgt, und es wird auch viel erreicht.

Thermisch-hydriatische Behandlung

Die empfohlene elektrische Behandlungsmethode ist die stabile Galvanisation mit der Anode als differenter Elektrode auf den neuralgischen Nerven oder Nervenästen, was die Erregbarkeit herabsetzen soll. Wir sind von der Wirksamkeit nicht überzeugt, und wir würden nicht raten, sich allein auf diese Methode zu verlassen. Sie schadet aber sicherlich nichts.

Elektrotherapie

Für diejenigen, die es sich leisten können, ist zur Heilung chronischer Neuralgien dann noch eine Badereise nach einem der bekannten Thermal- und Mineralbäder das beste Mittel. Ich nenne Baden-Baden, Badenweiler, Gastein, Bormio, Wiesbaden, Wildbad (Württemberg), Warmbrunn, Teplitz, Leuk, Ragaz u. v. a. Auch die Moorbäder kommen hier sehr in Betracht, wenn sie schonend angewandt werden: Elster, Flinsberg, Franzensbad, Marienbad, Pyrmont, Spaa etc. Endlich seien noch die Dampfgrotten von Monsumano, Battaglia und Bagni di Lucca erwähnt.

Badereise

Ein Faktor bei dem Erfolg dieser Badereisen, wenn auch nicht der Hauptfaktor, ist auch bei der echten Neuralgie unzweifelhaft der psychische. Das Herausreißen aus der Umgebung, in der sich die Kranken an ihre Neuralgie sozusagen gewöhnt haben, und die Versetzung in eine völlige psychische Ruhe wirkt ganz erheblich mit — neben der exakten Durchführung der in einem Privathaus selbst unter günstigsten Verhältnissen häufig mangelhaft bleibenden Technik der Therapie.

Psychischer Faktor

Ein besonderer Zweig der Therapie hat sich in der Injektionstherapie entwickelt. Für die Ischias kommen die großen Langeschen Eingießungen von Kochsalzlösungen in Betracht. Schepelmann hat dafür eine stumpfe Nadel mit Mandrin angegeben¹⁾. Man geht in der Mitte zwischen Trochanter maior

Injektionstherapie

¹⁾ Zu haben bei Fr. Baumgartel, Halle.

und Tuber ischii mit von der nach unten gehaltenen Nadel ein, entfernt nach Durchbohrung der Haut und der Muskeln in 4—6 cm Tiefe den Mandrin und sondiert mit der stumpfen Nadel, bis man in 5—8 cm Tiefe den derben Nervenstrang findet, und der Patient den ziemlich heftigen Schmerz davon angibt. Gegen den Nervenstrang wird die Nadel angedrückt, um die Nervenscheide zu perforieren, und dann werden aus einer 150 ccm Spritze unter starkem Druck zuerst in den Nerven selbst wenige Kubikzentimeter physiologischer Kochsalzlösung eingespritzt, der Rest dann nach Zurückziehen der Nadel in die Umgebung, eventuell noch weitere 150 ccm nachgegeben. Andere Autoren spritzen nur in die Umgebung des Nerven. Nach der Injektion können trotz aseptischer Ausführung Fiebererscheinungen auftreten. Man braucht meist mehrere Injektionen, ganz sicher ist die Methode auch nicht, aber wenn es darauf ankommt, schwere chronische Fälle in kurzer Zeit wenigstens vorläufig beschwerdefrei zu machen, ist sie zu empfehlen.

Epidurale In- jektionen

Es sind ferner die Chatelinschen epiduralen Injektionen in den das Kreuzbein längs durchziehenden Kanal, also mehr an die Wurzeln des N. ischiadicus, zu erwähnen. Man spritzt hier nur 10 ccm ein. Der Patient liegt in Seitenlage. Man tastet sich die hintere bzw. untere (von Bandmassen) verschlossene Öffnung des Sakralkanals ab und wendet, nachdem man durch die Ligamente senkrecht hindurchgedrungen ist, die Nadel um etwa 20° nach oben. Man dringt dann meist ganz ohne Schwierigkeit mit einer entsprechend langen Nadel 6—7 cm in den Knochen ein. Man soll sich überzeugen, daß keine Lumbalflüssigkeit ausfließt, d. h. daß man — was aber wohl kaum jemals geschehen wird — nicht in den Lumbalsack selbst geraten ist. Es wird angegeben, daß man manchmal 5 Injektionen in Intervallen von je 2—3 Tagen nötig hat. Das durchzusetzen hat in der Privatpraxis seine Schwierigkeiten. Ich habe von der Methode, trotzdem sie angenehmer ist als die Injektion in den Nervenstamm, weil die anatomischen Verhältnisse gar keinem Zweifel unterliegen, während man nach dem Ischiadikusstamm im weichen Gewebe tappt, nicht so Gutes gesehen, wie andere. Andererseits ist es klar, daß die Fälle von Wurzelschias durch die Injektionen in den Stamm kaum beeinflußt werden können. Beide Methoden sind aber nur für eine kleine Anzahl von Fällen unentbehrlich.

Alkohol- injektionen

Die Schlösserschen Alkoholinjektionen kommen meines Erachtens nur für den Trigemini in Betracht. Man injiziert 1—2 ccm 80% igen Alkohol in den Nervenstamm. Die Wirkung beruht auf der vollkommenen Zerstörung des Nerven durch den Alkohol; nach einer gelungenen Injektion muß also eine Anästhesie bestehen, wie nach einer Durchschneidung der betreffenden Fasern. Wenn die Leitung sich nach Monaten oder Jahren wieder herstellt, so kann auch die Neuralgie wieder erscheinen. Für den ersten Ast mag die Methode gehen, was den zweiten und dritten Ast betrifft, die man entweder vom Munde oder vom Gesicht aus, an der Schädelbasis aufsuchen soll, so erscheint uns diese im Dunkeln tappende Methode so „un chirurgisch“ und gefährlich, daß ich die chirurgische Exzision der betreffenden Nervenstämmen bei weitem vorziehen würde.

Chirur- gische Be- handlung

Bei den schwersten Fällen, die sich gar nicht beherrschen lassen, kommt die chirurgische Behandlung in Frage, die nach allgemeiner Anschauung sich zuerst auf die Exzision der peripheren Äste zu beschränken hat, und erst dann, wenn sich diese peripheren Operationen als nutzlos erwiesen haben, zur Resektion des Ganglion Gasseri schreiten darf.

Psycho- therapie

Schon bei dem Einfluß der Badereise hatten wir auf das psychische Moment bei der Behandlung der Neuralgie hingewiesen, und so sicher die echten Neuralgien organische, im Nerven sich abspielende Krankheitsprozesse sind, so sicher spielt bei vielen Neuralgien, besonders im späteren Stadium das psychische Moment eine große Rolle. Der Kranke hat sich so an seine Schmerzen gewöhnt, er hat die Zuversicht auf Heilung so völlig verloren, daß die früher organische Neuralgie

nunmehr wesentlich psychogen fortgesetzt wird. Es sind das diejenigen Fälle, wo insbesondere eine anscheinend schwere chronische Ischias in wenigen Tagen oder sogar auf einen Schlag unter dem Einfluß einer dem Patienten imponierenden und von allen bisher versuchten ganz abweichenden Behandlung, oder eines Arztes, zu dem der Kranke besonderes Vertrauen faßt, geheilt wird. So kann es z. B. gelingen, durch einen tiefen Einstich in die Glutäen ohne jede Injektion die Krankheit zur Heilung zu bringen.

Wir sind damit auf dem Gebiete der rein funktionellen psychogen entstandenen Neuralgien, wie sie insbesondere bei Hysterischen vorkommen. Wenn meist die Diagnose organischer und funktioneller Erkrankungen keine unüberwindlichen Schwierigkeiten macht, wenn vielmehr motorische Symptome und auch sensible Ausfallssymptome fast sicher in der einen oder der anderen Richtung zu diagnostizieren sind, so muß man bei der Diagnose der Schmerzen Schwierigkeiten zugeben. Brauchen doch die reinen Neuralgien eben gar nichts anderes zu haben als die Schmerzanfälle. Können doch sogar die Druckpunkte fehlen oder auch bei den echten Neuralgien an atypischen Stellen sitzen. Es gibt hier in der Tat Fälle, wenn auch immerhin eine recht geringe Anzahl, wo man auf den Gesamteindruck und die Anamnese hin die Diagnose stellen muß. Man wird sagen dürfen, daß, wenn ein erfahrener Beobachter ernsthaft zweifelt, die Wahrscheinlichkeit einer Hysterie sehr groß ist. Mit dieser Unvollkommenheit unserer Diagnostik hängt die Bedeutung der Schmerzen für die Simulanten zusammen, so wenig simulierte Schmerzen etwa mit hysterischen auf eine Stufe zu stellen sind. Trotzdem ist Simulation von Schmerzen fast unmöglich zu erweisen. Man kann zwar unter Umständen nachweisen, daß der Betreffende keine organische Neuralgie hat, aber niemals, daß er keine Schmerzen hat. Von den angegebenen Unterscheidungsmitteln ist auch nicht eines wirklich brauchbar.

Psycho-
gene Neur-
algien

b) Neuritis und Polyneuritis.

Die Neuritiden zeigen eine ganz außerordentlich verschiedene Erscheinungsweise. Wenn man im allgemeinen geneigt ist, mit der Diagnose Neuritis die Vorstellung der Schmerzhaftigkeit zu verbinden, so ist das durchaus nicht für alle Neuritiden richtig. Es gibt Neuritiden, die völlig schmerzfrei verlaufen. Eine weitere große Verschiedenheit wird durch die Ausbreitung bedingt. Von den Formen, wo nur ein Nerv oder ein Nervenast betroffen ist, steigt sie bis zu denen, wo fast der ganze Körper und Kopf völlig gelähmt sind.

Schmerz-
haftigkeit
nicht Be-
dingung
der
Diagnose
Aus-
breitung

Ein Teil der zirkumskripten Neuritiden ist durch lokale Ursachen bedingt, es seien hier einmal die Neuritiden, die sich an Traumen bzw. an entzündliche Affektionen der Weichteile anschließen, erwähnt, andererseits die professionellen Neuritiden, die immer in denjenigen Nervengebieten auftreten, welche durch den Beruf am meisten heimgesucht werden (Tambourneuritis am linken Daumen, Plätterinnen-neuritis etc.)

Lokale
Ursachen
Trauma
Beschäfti-
gungs-
neuritis

Allgemeine
Ursachen

Es können aber auch aus allgemeinen oder unbestimmten Ursachen sich Neuritiden einzelner Nerven entwickeln. Es sind das genau die gleichen Ursachen, die bei der Neuralgie wirksam sind, die wir ja nur aus praktisch-klinischen Gründen von den Neuritiden getrennt haben. Der wirkliche Unterschied der Neuralgie von der Neuritis ist aber nur die Schwere der Erscheinungen, speziell das Vorkommen von dauernden Sensibilitätsausfällen, von atrophischen Lähmungen und Reflexanomalien. So sprechen wir nicht mehr von einer Ischias, sondern von einer Neuritis ischiadica, wenn wir eine hypästhetische Zone im Peroneusgebiet haben, oder der Achillessehnenreflex fehlt; so können bei einer Brachialneuritis die Muskeln des Armes und der Hand atrophisch werden etc.

Neuritis
ischiadica

Neuritis
brachialis

Neuritis
facialis

Zu den Mononeuritiden ohne sensible Erscheinungen gehört auch die gewöhnliche periphere Fazialislähmung (vgl. S. 30). Meist erscheint sie plötzlich ohne ersichtliche Ursache, man nennt sie dann rheumatisch, in einer Anzahl von Fällen hängt sie mit infektiösen Ohrenerkrankungen zusammen.

Prognose
und
Therapie
der Mono-
neuritiden

Die Mononeuritiden stimmen in bezug auf die Therapie ungefähr mit der Neuralgie überein und es ist auf das soeben Gesagte zu verweisen. Die Prognose ist naturgemäß etwas schlechter, die Heilung erst in längerer Zeit zu erwarten. Eine sehr günstige Prognose hat im allgemeinen die rheumatische Fazialislähmung. Sie heilt mit wenigen Ausnahmen in 4—10 Wochen. Um etwas zu tun, kann man während dieser Zeit elektrisieren. Soweit ich urteilen kann, geht es ohne Elektrizität aber ebenso schnell, und die seltenen ungünstigen Fälle heilen auch mit Elektrizität nicht oder unvollkommen. Es kann hier auch zu einer Kontraktur der paretischen Gesichtsseite kommen, so daß auf den ersten Blick die gesunde Seite als paretisch erscheint.

Poly-
neuritis
Ätiologie

Die Polyneuritis ist entweder infektiösen oder toxischen Ursprungs. In manchen Fällen können wir die Ursache nicht ermitteln, sie werden dann häufig als „idiopathische“ Polyneuritis bezeichnet. In neuerer Zeit meint man, daß ein Teil dieser idiopathischen Fälle dem Virus der Heine-Medinschen Krankheit (vgl. diese) ihre Entstehung verdanken. Eine bei uns nur gelegentlich bei aus den Tropen heimkehrenden Personen gesehene Form der idiopathischen Polyneuritis ist ferner die epidemische oder endemische „Beri-Beri“. Auch die Lepra, die wir ja kaum mehr zu Gesicht bekommen, betrifft das Nervensystem in Form einer Polyneuritis.

Alkohol
Diphtherie
Blei

Für den Praktiker am wichtigsten sind 1. die sicherlich häufigste Form, die Alkoholpolyneuritis, 2. die postdiphtherische, 3. die durch Blei. Die Anamnese ist daher zunächst nach diesen drei Richtungen zu orientieren. Man entdeckt auf diese Weise dann manchmal, daß anscheinend harmlose Anginen doch wahrscheinlich Diphtherie gewesen sind. Erst wenn glaubwürdig diese drei Ursachen ausgeschlossen werden können, forsche man nach weiteren Ursachen. Als solche kommen beinahe alle Infektionskrankheiten und ebenso die chemischen Intoxikationen in Betracht. Von den ersteren erwähne ich septische Prozesse aller Art, z. B. septische Aborte, Typhus, Influenza (als Ursache der

Andere
Ursachen

Polyneuritis, seltener als der Mononeuritis). Sehr häufig bricht die Polyneuritis erst in der Rekonvaleszenz der Infektionskrankheit aus. Bei der Diphtherie beträgt der Abstand von der akuten Erkrankung meist 3—6 Wochen, indessen kann die Latenz auch fehlen. Von der zweiten Gruppe nenne ich Schwefelkohlenstoff (Gummiarbeiter), Kohlenoxyd, Arsen (Tapetenuntersuchung). Auch zu Arzneien verwendete Stoffe können Polyneuritis machen, wie Kreosot, Sulfonal (vgl. auch das Kapitel über Vergiftungen). Endlich ist noch eine dritte Gruppe, die sogenannten dyskrasischen Neuritiden bei Karzinomkachexien, bei Diabetes zu nennen, und endlich gehören hierhin Polyneuritiden bei Arteriosklerose, weiter solche in der normalen Gravidität oder nach normalem fieberlosem Puerperium.

Zuerst muß man die Polyneuritis aber aus dem Zustandsbild diagnostizieren; das ist im allgemeinen recht leicht. Eine Polyneuritis liegt zunächst immer dann vor, wenn über den Körper verstreute periphere Lähmungen mit Verlust der Sehnenreflexe, und — falls die Polyneuritis nicht ganz frisch ist — auch mit E. R., mit Sensibilitätsausfällen, und meist mit heftigen spontanen Schmerzen und großer Druckempfindlichkeit der Nervenstämmen besteht. Es ist dieses Bild, welches also alle Elemente der peripheren Nerven, die motorischen wie die sensiblen, beteiligt zeigt, das gewöhnliche, insbesondere der Alkoholpolyneuritis. Intensität und Ausdehnung der Erscheinungen können verschieden sein, einzelne Patienten kommen in den Anfangsstadien noch in die Sprechstunde, aber in verhältnismäßig häufigen Fällen ist das Bild ein schweres, die Lähmung in Armen und Beinen so stark, daß der Kranke sich nicht bewegen, auch nicht allein essen kann. Nicht selten haben wir einen Wechsel der Symptome; während z. B. im Beginn die Beine gelähmt waren, und an den Armen nur leichte Schwäche und Schmerzen bestanden, werden im Verlauf die Beine besser, aber es setzen schwere Lähmungen der Arme ein. Auch die Gesichts- und Kopfnerven können von Polyneuritis betroffen werden, es kann also doppelseitige Fazialislähmung, auch Augenmuskellähmungen verschiedenster Art bestehen. Ja, es kann die Polyneuritis auch am Kopf beginnen. Verschont bleibt mit enorm seltenen Ausnahmen gerade bei Polyneuritis fast immer der Optikus. Sehr gegen Polyneuritis spricht auch die Mitbeteiligung von Blase und Mastdarm. Selbstverständlich ist eine reine Polyneuritis dann ausgeschlossen, wenn Pyramidensymptome, also z. B. das Babinskische Zeichen bestehen.

Zustands-
bild

Gemischt
motorisch
sensibile
Form

Es gibt dann Formen der Polyneuritis, bei welcher gerade diejenigen Elemente der Nerven von dem neuritischen Prozesse betroffen werden, welche auch der Prädilektionsort tabischer Degenerationsprozesse sind. Diese Formen haben daher auch den Namen der „Pseudotabes peripherica“ erhalten. Ihr wesentliches Kennzeichen ist die Ataxie und dementsprechend die Störung der tiefen Sensibilität wie der Sehnenreflexe (vgl. S. 50), während die Störung der oberflächlichen Sensibilität und der motorischen Kraft sehr unbedeutend sein und auch die Empfindlichkeit der Nervenstämmen beinahe fehlen kann. Es ist das eine Form, die wir besonders häufig, wenn auch mit Über-

Pseudo-
tabes peri-
pherica

gängen nach der ersten allgemeinen Form als postdiphtherische Lähmung sehen. Der Kranke kommt zu uns mit der Klage, daß er unsicher gehe, kein Gefühl in den Händen habe etc.

Recht charakteristisch für die postdiphtherische Lähmung ist dann bekanntlich die Gaumensegelparese und die Akkommodationsparese. Der Kranke verschluckt sich und kann nicht mehr lesen.

Die ataktische Form kommt übrigens aber nicht nur bei der Diphtherie, sondern auch bei anderen Ursachen, wie dem Alkoholismus vor. Es ist klar, daß manchmal die Differentialdiagnose der echten Tabes gegenüber Schwierigkeiten machen muß, wie das im Kapitel der Tabes besprochen werden wird.

Landrysche
Paralyse

Unter den Verlaufsformen sei noch eine als typisch hervorgehoben, die Landrysche auf- oder absteigende Paralyse. Nicht alle Landryschen Paralysen sind zwar Polyneuritiden, es gibt auch Landrysche Paralysen als Verlaufsform der Poliomyelitis (Heine-Medinsche Krankheit). Jedenfalls kann aber auch die Polyneuritis so verlaufen, daß sie allmählich meist im Verlauf von einigen Tagen von den Füßen über den Rumpf zu den Armen und manchmal von da noch auf das Gesicht fortschreitet oder auch den umgekehrten Weg beschreibt. Es sind das manchmal Formen, die — umgekehrt wie die vorige — die Sensibilität sehr wenig beteiligen, sich vielmehr auf die Motilität beschränken, also das Bild schmerzloser Lähmungen machen.

Übergänge
zur Mono-
neuritis

Endlich gibt es alle Übergänge von der Polyneuritis zur Mononeuritis. Sind ja zum großen Teil die Ursachen der beiden Erkrankungen die gleichen. Es ist auch in jeder Beziehung gleichgültig, ob wir eine auf beide Beine beschränkte Neuritis eine Polyneuritis nennen wollen oder nicht. Eine besondere Stellung nimmt hier die Bleineuritis ein, welche gewöhnlich nur einzelne Nerven betrifft, und zwar bekanntlich am häufigsten die Radiales, dabei fast immer als rein motorische Form ohne Schmerzen und Sensibilitätsstörungen sich darstellend.

Blei-
neuritis

Allgemein-
symptome

Die Allgemeinsymptome einer entzündlichen Erkrankung spielen bei der Polyneuritis nur eine sehr geringe Rolle. Fieber kann in den ersten Tagen bestehen, ist aber auch hier meist schon Symptom der Grundkrankheit oder einer Komplikation.

Trophische
Störungen

Trophische Störungen der Haut, Trockenheit, Abschilfern, Dekubitus, Mal perforant sind nicht ungewöhnlich.

Verlauf

Zu der unendlichen Mannigfaltigkeit der Verteilung der Ätiologie und der Schwere der Erkrankung kommt nun weiter eine große Verschiedenheit des Verlaufs. Es gibt Polyneuritiden, die in wenigen Tagen zum Tode führen, andere, die chronisch bleiben, solche, die langsam nach Monaten und Jahren heilen, solche, die schnell heilen. Nur bei wenigen Formen kann man den Verlauf aus der Ätiologie mit großer Wahrscheinlichkeit voraussagen. Dazu gehört die postdiphtherische Polyneuritis, die bei Erwachsenen fast ausnahmslos in völlige Heilung übergeht; wenn sie bei Kindern nicht selten zum Tode führt, so liegt das nicht eigentlich an der Polyneuritis, sondern an der Beteiligung des Herzens. Diese Beteiligung des Herzens ist wohl eine muskuläre Er-

Prognose

krankung. An eine Besserung werden wir andererseits überhaupt nicht denken bei der senilen arteriosklerotischen langsam progressiven Polyneuritis und bei der Polyneuritis der Karzinomkachexie. Bei den metallischen Giften ist die Prognose meist die einer langsamen Gesundung nach Entfernung aus dem toxischen Bereiche, aber die Fälle können auch mit dauernden Defekten ausheilen.

Die Alkoholpolyneuritis hat eine recht zweifelhafte Prognose, schon weil es sich um in ihrer allgemeinen Konstitution meist sehr geschwächte schwere Trinker handelt. Sie verbindet sich sehr häufig mit den enzephalitischen Erkrankungen der Trinker, mit Delirien und anderen psychotischen Zuständen. Unter diesen ist hier zu erwähnen die sogenannte polyneuritische oder Korsakowsche Psychose, Korsakowsche polyneuritische Psychose welche sich auszeichnet durch eine Aufhebung der Merkfähigkeit für die jüngste Vergangenheit und durch Konfabulationen, welche die Lücken dieser Merkfähigkeit ausfüllen. Diese Kranken können also über ihre frühere Vergangenheit Auskunft geben, sie wissen aber nicht, wo sie sich augenblicklich befinden, ob in einem Krankenhaus, einem Schloß oder einer Badeanstalt; sie wissen nicht, ob es morgens oder abends ist, nicht ob sie ausgegangen sind, oder ob sie zu Bett geblieben sind. Sie konfabulieren darauf los, was sie alles erlebt haben oder lassen sich wenigstens die unglaublichsten Erlebnisse suggerieren. Diese Komplikationen geben dann der Alkoholpolyneuritis im allgemeinen eine ziemlich schlechte Prognose, fast immer verläuft sie mindestens sehr chronisch und gelangt selten zu völliger Heilung.

Die Korsakowsche Psychose kommt übrigens auch gelegentlich bei Polyneuritiden anderen Ursprungs vor.

In den sehr akut verlaufenden Fällen, z. B. bei vielen Landry'schen Lähmungen, hängt die Prognose von der Beteiligung der Atemmuskulatur ab. Bleibt sie verschont, so kann der Kranke in wenigen Wochen wieder gesund sein. Sonst tritt das tödliche Ende manchmal schon am zweiten Tage der Krankheit ein.

Sehr wichtig ist die Berücksichtigung der Überbleibsel von Neuritiden und Polyneuritiden zur Vermeidung falscher Diagnosen. Reste neuritischer und polyneuritischer Erkrankungen Insbesondere bleiben die Sehnenreflexe, Patellar- und Achillessehnenreflexe manchmal noch erloschen, nachdem der Kranke schon monatelang seinem Beruf nachgeht. Durch die so häufige Ischias ist nicht der Patellarreflex, aber der Achillessehnenreflex gefährdet. Bei einem Kranken, der den Arzt wegen allgemeiner nervöser Beschwerden aufsucht, darf man also ein isoliertes Fehlen des Achillessehnenreflexes nicht ohne weiteres mit den augenblicklich bestehenden Beschwerden in Zusammenhang bringen — so wichtig das Zeichen in anderen Fällen sein kann. Man erkundige sich dann nach Ischias, nach Blei etc. und denke auch an die senile Neuritis, die sich häufig nur in solchen kleinen Zeichen äußert.

Die Therapie der Polyneuritis ergibt sich aus der der Neuralgie Therapie und der der Neuritis. Nur daß die dort erwähnten Maßregeln meist noch energischer und konsequenter durchgeführt werden müssen. Bettruhe ist bei der Polyneuritis für Wochen geboten, auch dann, wenn der Patient

etwa imstande wäre, etwas umherzugehen. Schwitzkuren sind ganz im Beginn nur mit Vorsicht anzuwenden, wenn Fieber besteht, zu vermeiden. Man begnügt sich mit warmen Einpackungen und Antineuralgicis. Bei der postdiphtherischen Neuritis wird man einerseits mit Rücksicht auf die gute Prognose, andererseits auf die Gefährdung des Herzens überhaupt jede eingreifende Behandlung vermeiden. Später aber leisten Schwitzkuren sehr gutes, gleichgültig wie man sie durchführt. Als eine einfache und wirksame Methode wird neuerdings das Pilokarpin, subkutan tägl. 0,005—0,015, gelobt. Auch wird empfohlen jeden zweiten Tag nach einer Strychnininjektion von 3 mg ein kurzes Bad von 35—40 ° C zu geben und dann im Bett nachschwitzen zu lassen. Die Strychnininjektionen sind ein altes und anscheinend in gewissen Grenzen wirklich nützliches Mittel. Man beginnt mit 1 mg täglich und kann bis 8 mg steigen, einige Kranke bekommen aber schon bei kleinen Dosen leichte Strychninkrämpfe, besonders dann wenn man täglich Strychnin gibt; man muß dann wieder zurückgehen.

Massage ist außerordentlich nützlich, nützlicher als Elektrizität. Vor allem achte man auch auf eine sorgsame Hautpflege wegen der Gefahr von Dekubitus und Mal perforant. Badekuren in der Rekoneszenz sind sehr anzuraten.

Adipositas
dolorosa.

Einige Beziehungen zur Polyneuritis hat wohl die Adipositas dolorosa oder Dercum'sche Krankheit, eine besondere Form der Fettsucht die sich durch die Kombination mit Schmerzen auszeichnet.

Osteo-
malazische
Lähmung

Hier wäre dann auch wohl die nicht ganz aufgeklärte osteomalazische Lähmung der Muskeln des Beckens und des Oberschenkels zu erwähnen. Sie kann einen erheblichen Anteil an der Bewegungsstörung der Osteomalazie haben.

Hereditäre
Formen
der Poly-
neuritis

Ganz abseits von allen anderen Polyneuritiden stehen einige sehr seltene familiäre hereditäre Formen, zu denen auch die sogenannte Charcot-Marie'sche neurotische Muskelatrophie zu zählen scheint.

15. Myalgie, Myositis und andere Muskel- erkrankungen.

Myalgie

Die Myalgie ist wahrscheinlich ebenso als eine leichte Entzündung des Muskels, d. h. als eine Myositis aufzufassen, wie die Neuralgie als eine leichte Neuritis. Klinisch decken sich diese leichten Fälle ungefähr mit dem, was populär als Muskelrheumatismus bezeichnet wird.

Ursachen

In der Tat ist die eine Ursache Erkältung, eine andere Muskeltraumen verschiedener Art (Muskelzerrungen etc.), eine dritte weniger bekannte die Syphilis. An die letztere denke man besonders bei jungen Frauen, deren Myalgien, häufig mit nächtlichen Exazerbationen, allen Behandlungsmethoden trotzen, da die Frauen selbst gewöhnlich von der luetischen Infektion nichts wissen. Zu den Muskeltraumen kann man auch die Myalgie durch dauernde Überanstrengung rechnen, wie sie z. B. bei Geigen- und Klavierspielern vorkommen.

Myalgien der Rückenmuskulatur kommen ferner sehr häufig bei anämischen Personen vor, und entstehen oder verstärken sich bei Mädchen und Frauen unter reflektorischen Einflüssen bei der Menstruation und Erkrankungen der Genitalien.

Die spontanen Schmerzen bei der Myalgie sind mehr kontinuierlich als die der Neuralgie. Druck auf den Muskel, mehr noch der Versuch willkürlicher Bewegung ist schmerzhaft, die willkürliche Bewegung manchmal durch die Schmerzen unmöglich. Am bekanntesten ist das Bild der Myalgie bei der Lumbago (Hexenschuß) und der Torticollis rheumatica (dem steifen Hals), auch Myalgien der Interkostalmuskeln und der Bauchmuskulatur sind gar nicht selten, letztere können zur Verwechselung mit Appendizitis führen. Die Myalgie kann sich mit der Neuralgie kombinieren, so ist es manchmal gar nicht möglich zu sagen, wo eine Ischias aufhört und eine Myalgie der Lenden- und Gesäßmuskulatur anfängt.

Die Therapie besteht in Salizylpräparaten, Hitze, Hautreizen, eventuell lokalen Blutentziehungen. Der faradische Strom erweist sich bei der Myalgie als nützlich. Chronische Fälle sind mit Massage zu behandeln. Auch kann hier, z. B. bei chronischem Lumbago, die intramuskuläre Injektion von 2—5 ccm 40—80 % igen Alkohols sehr empfohlen werden.

Die syphilitische Myalgie ist natürlich spezifisch zu behandeln.

Oft sehr hartnäckig und neben Massage durch absolutes manchmal mehrmonatliches Ruhen des Berufes zu behandeln sind die Myalgien bei Geigern und Pianisten (über die lokalen Beschäftigungskrämpfe vgl. ein späteres Kapitel).

Ausgesprochene Myositiden sind viel seltener als Neuritiden. Sie sind an der Schmerzhaftigkeit, der bedeutenden Anschwellung der Muskulatur, dem Ödem der Haut über den Muskeln unschwer zu erkennen. Die Myositis kann lokal oder multipel auftreten. Unter den Fällen von Poliomyositis finden sich außerordentlich schwere durch Infektion bedingte Krankheitsfälle, die auch letal verlaufen können. Wochenlanges Fieber ist bei der Poliomyositis im Gegensatz zur Polyneuritis gewöhnlich. An der Entzündung beteiligt manchmal sich sehr ausgesprochen die Haut (Dermatomyositis), häufig die Nerven (Neuromyositis). In den letzten Fällen liegt also eine Mischform von Neuritis und Myositis vor. Syphilis kann ebenso wie Ursache von Myalgien, auch von gummösen Myositiden sein, aber wohl nie von den ganz schweren diffusen Formen, wie sie bei anderen Infektionen gesehen werden.

Eine besondere Form der Myositis kommt bekanntlich bei Trichinose vor, für welche die gleichzeitigen gastrointestinalen Erscheinungen und das gruppenweise Auftreten, ferner das Auftreten von Ödem der Augenlider im Beginn Hinweise geben.

Mehr myositisch als neuritisch sind auch die ischämischen Muskelveränderungen nach Esmarchscher Blutleere und nach zu festen Verbänden. Ihre Prognose ist eine sehr schlechte, daher die Differentialdiagnose von Neuritiden, bzw. Narkosenlähmungen, die durch die gleiche Ursache zustande kommen können, praktisch wichtig; die

Schmerzen

Lumbago

Therapie

Myositis

Ischämische Muskelveränderungen

Verteilung der Lähmung, welche bei der ischämischen Muskelnekrose nicht den Nervengebieten folgt, ermöglicht die Unterscheidung.

Myositis
ossificans

Die seltene Myositis ossificans progressiva ist ohne weiteres zu erkennen.

**Muskel-
atrophie
bei Gelenk-
erkrankungen** Eine sehr wichtige Erkrankung ist die lokale Muskelatrophie bei Gelenkerkrankungen. Ihre Pathologie ist noch nicht ganz aufgeklärt. Sicher ist soviel, daß sie bei akuten (z. B. gonorrhoeischen) Gelenkaffektionen ganz außerordentlich schnell zur Entstehung kommt, und daß sie nach Ablauf der eigentlichen Gelenkerkrankung fortbestehen und schwere Funktionsstörung machen kann. Ihr Lieblingssitz ist der Quadrizeps bei Kniegelenkentzündung. Viele sich lang hinziehende Beschwerden nach einer solchen beruhen auf der Quadrizepsatrophie und können fast immer durch eine energische und sachgemäße Massage in nicht langer Zeit beseitigt werden. E. R. findet sich übrigens bei ihr nicht, sondern nur eine quantitative Herabsetzung der Erregbarkeit.

My-
asthenie

Endlich haben wir noch einer Muskelerkrankung zu gedenken, der Myasthenie. Es handelt sich hier um die gleiche Erkrankung, die früher als Bulbärparalyse ohne Befund bekannt war, ein Name, der aber fallen gelassen werden muß, seitdem es feststeht, daß alle Muskeln des Körpers von dieser Paralyse befallen, und daß sogar die bulbären Muskeln von der Erkrankung verschont bleiben können, ferner daß die Ursache der Erkrankung nicht im Bulbus, überhaupt nicht im Nervensystem, sondern in den Muskeln liege. In den Muskeln finden wir nicht nur mikroskopische lymphozytäre Infiltrate, sondern wir haben in ihnen auch eine fast spezifische Reaktion, eben die myasthenische (Jollysche) Reaktion, gekennzeichnet durch die Erschöpfbarkeit des Muskels, der bei Wiederholung des Reizes (am besten des faradischen) sich immer weniger, schließlich oft gar nicht mehr kontrahiert.

Die leichte Erschöpfbarkeit der Muskulatur ist auch das vornehmste Zeichen der willkürlichen Bewegung bei dieser Krankheit. Es ist sehr bezeichnend, daß solche Kranke z. B. morgens nach dem Aufwachen gut sehen, gut essen, gut gehen können. Nach einigen Stunden bekommen sie Doppelbilder, das Lid fällt herunter, sie können nicht mehr kauen, sie verschlucken sich, sie können nur mit Mühe gehen. Man kann diese Erschöpfbarkeit auch durch das Wiederholenlassen willkürlicher Bewegungen besonders im Bereiche des Kopfes demonstrieren. Es gibt solche Kranke, die nur wenige Bissen essen können, dann versagt die Mund- und Schlundmuskulatur ihren Dienst. In schwereren Fällen findet sich außer der Erschöpfbarkeit auch eine ausgesprochene dauernde Muskelschwäche.

Wichtig-
keit der
Augenläh-
mungen

Die Krankheit beginnt am häufigsten in den Augenmuskeln (Ptosis und Doppelbilder). Der Befund der Augenmuskelparesen muß immer an Myasthenie denken lassen, wenn andere Ursachen (Syphilis, Tabes) auszuschließen sind. Demnächst folgen in der Häufigkeit des Beginnes die Gesichts- und Kaumuskeln, dann die Extremitätenmuskeln.

Wegen der Häufigkeit des Beginnes am Kopfe ist die Krankheit früher mit der echten progressiven Bulbärparalyse verwechselt worden,

tatsächlich bekommt man sie, wenigstens meiner Erfahrung nach, erheblich häufiger zu sehen, als letztere. Sie zeichnet sich vor der echten Bulbärparalyse abgesehen von der anderen Verteilung der Lähmungen und der Erschöpfbarkeit der Muskulatur durch die Unregelmäßigkeit des Verlaufs aus. Während die echte Bulbärparalyse eine progressive, dauernd fortschreitende ist, zeigt die Myasthenie schubweise Verschlimmerungen und manchmal schnelle Besserungen. Niemals besteht bei der Myasthenie eine Kombination mit Pyramidenenerkrankungen oder sonstigen zentralen Erscheinungen, die Sensibilität ist nur manchmal mit leichten Schmerzen beteiligt, die Sehnenreflexe fast immer normal, das Herz wohl wesentlich durch die ungenügende Atemtätigkeit etwas geschädigt. Wenn man das Bild der Myasthenie nur einige Male gesehen hat, ist es schwer, die Diagnose zu verfehlen. Die Gefahr für das Leben liegt einmal in der Erschwerung des Kauakts, und wesentlich in der Beteiligung der Atemmuskulatur. So kommen plötzliche Todesfälle aus leidlichem Wohlbefinden heraus unter den Zeichen der Erstickung vor, andererseits weitgehende Besserungen und völlige Remissionen aus ziemlich verzweifelt erscheinenden Zuständen. Die Dauer des Verlaufes schwankt zwischen Wochen (mit tödlichem Ausgang) und Jahrzehnten. Manchmal erfährt man bei anscheinend frischen Erkrankungen, daß vor Jahren einmal schon leichte Erscheinungen z. B. Doppelsehen bestanden haben. Ob völlige Heilungen vorkommen, ist zweifelhaft. Jedenfalls ist jede Myasthenie auch in der Remission dauernd auf das schwerste gefährdet, die Prognose der Familie gegenüber also entsprechend zu stellen.

Verlauf

Prognose

Die Ursache der Myasthenie ist völlig im Dunkeln. Verhältnismäßig häufig ist eine Hyperplasie der Thymus gefunden, aber häufig auch vermißt.

Die Therapie ist demnach eine rein symptomatische und auf die Vermeidung der Erschöpfung durch Ruhe gerichtet. Jede Myasthenie soll zunächst, wenn man sie diagnostiziert hat, einige Wochen Bettruhe einhalten. Selbst leichte Fälle sind ohnehin arbeitsunfähig. Nach einer solchen Ruhekur sieht man manchmal erhebliche Remissionen. Aber auch darüber hinaus ist der Myasthenische immer wieder auf die Wichtigkeit langen Ausruhens hinzuweisen. Sonst kommen noch die sogenannten roborierenden Maßnahmen in Betracht; Arsenkuren, Strychnin, Chinin; Koffein (dreimal täglich 0,05—0,2 g) sind zu empfehlen, ohne daß man davon eine ursächliche Beeinflussung der Krankheit erwarten dürfte. Massage und Elektrizität sind kontraindiziert.

Therapie

Endlich wären dann noch die angeborenen Muskeldefekte zu erwähnen, die besonders häufig an den Brustmuskeln sind. Die angeborenen Defekte der Gesichts- oder Augenmuskeln werden von einigen auf angeborenen oder erworbenen Schwund der Hirnnervenkerne (infantiler Kernschwund) zurückgeführt.

Angeborene Muskeldefekte

Über die progressive Muskelatrophie und die Myotonie vgl. ein späteres Kapitel.

16. Nervenverletzungen.

Die Symptome der Verletzungen peripherer Nerven folgen ohne weiteres aus der Zusammensetzung der motorischen und der sensiblen Symptome der einzelnen Nerven, wie sie aus den Tafeln 3 und 8 hervorgehen.

Nerven-
wunden

Bei offenen Wunden, welche Nerven getroffen haben könnten (Stich, Schnitt, Schuß), soll man genau untersuchen, ob sich aus der Motilität oder besonders, weil die Motilität bei einem soeben gequetschten Gliede manchmal nicht zu untersuchen ist, auch nebenbei Sehnenverletzungen vorliegen können, aus Sensibilitätsausfällen eine Nervenverletzung ergibt. Es ist sehr unangenehm, wenn man eine solche etwa erst nach Heilung der Wunde und Abnahme des Verbandes entdeckt. Denn jede Nervenverletzung soll sofort genäht werden, man warte nicht, ob die Restitution ohne Naht eintritt. Mit der Naht ist eigentlich alles geschehen, was geschehen kann; von dem Einfluß einer Elektrotherapie oder irgend einer anderen Maßnahme habe ich mich nie überzeugen können. Die Heilung kann auch nach der Naht sehr lange auf sich warten lassen. Selbst die ersten Spuren einer Wiederkehr der Sensibilität oder Motilität treten häufig erst nach 3—6 Monaten und später ein. Eine vollkommene Restitution tritt erst nach Jahren ein. Wenn die ersten Spuren von Motilität sich zeigen, kann man zweckmäßig durch die Übung willkürlicher Bewegungen nachhelfen.

Naht

Nerven-
lähmung
durch
stumpfe
Gewalt

Die Nervenlähmungen durch stumpfe Gewalt kommen zustande durch Druck oder durch Zerrung. Hier sind zu erwähnen die Arrestantenlähmungen, ferner die Schlafdrucklähmungen, welche meist der Radialis betreffen, bei denen aber neben der traumatischen Einwirkung meist noch eine neuritische Komponente im Spiel ist, es handelt sich meist um Alkoholisten. Die Narkosenlähmungen betreffen meist den Plexus brachialis, der durch die Elevation des Arms gezerrt wird. Durch denselben Mechanismus kommen die Entbindungslähmungen der Kinder zustande, die meist die ganz typische Erbsche Plexuslähmung darstellen (S. 27). Man muß sich hier überzeugen, daß keine Knochenverletzung vorliegt¹⁾. Die Entbindungslähmungen der Mutter entstehen durch den Druck des Kopfes auf die Nerven der unteren Extremität, z. B. den Kruralis. Nicht ganz selten sind auch die Plexuslähmungen nach Verletzung der Schulter, mit und ohne Luxation des Humerus. Bei Frakturen kann der Nerv entweder durch die Fraktur selbst oder später durch die Kallusbildung geschädigt werden. Ich nenne noch die Lähmungen durch zu feste Verbände, durch Krückendruck; die Serratuslähmungen nach heftigen Anstrengungen sind durch eine Zerrung des N. thoracicus longus zu erklären. Eine seltene, immerhin aber erwähnenswerte Ursache von Paresen und Schmerzen in der oberen Extremität kann eine Halsrippe werden (Druck auf den Plexus).

¹⁾ Es kommen, wie hier bemerkt sei, bei Kindern lähmungsartige Zustände der Extremitäten besonders nach Trauma vor, die aber nur durch die Furcht vor Schmerzen bei Bewegungen zu erklären sind.

Eine operative Therapie kommt bei den Nervenlähmungen durch stumpfe Gewalt wesentlich nur für die durch Frakturen und durch kallöse Narben bedingten in Frage, wo entweder der Nerv von Knochenfragmenten zu befreien oder aus kallösen Verwachsungen zu lösen ist. Die anderen Fälle zeigen erfahrungsgemäß fast nie Kontinuitätstrennungen. Man wird trotzdem in manchen Fällen traumatischer Entstehung, um nichts zu versäumen, sich in Anbetracht der Einfachheit und Gefährlosigkeit der Operation veranlaßt sehen, den Nerven freizulegen, wie ich es z. B. einmal bei Plexuslähmung nach einfachem Fall auf die Schulter veranlaßt habe, wird aber meist nichts finden, und kann dann den Heilungsvorgang im wesentlichen nur den Naturkräften überlassen. Daneben sollte man für regelmäßige Massage, Verhinderung von Kontrakturen (S. 35) und kann auch Elektrizität anwenden, die Kathodengalanisation wird meist empfohlen. Faradisation hat nur so lange einen Sinn, als noch faradische Erregbarkeit besteht. Daß die elektrische Behandlung etwas nützt, glaube ich zwar nicht, aber es wäre Torheit, sie in solchen Fällen, wo sie sicher nichts schadet und möglicherweise nützen könnte, zu perhorreszieren; wir haben ja sonst nichts. Man inhibiere ferner reichlichen Alkoholgenuß, der außerordentlich ungünstig wirken kann. Ich habe eine Plexuslähmung gesehen, die solange ganz gut heilte, wie der Mann nicht trank und dann wahrscheinlich unter dem Einfluß des Alkoholismus in einem Stadium noch schwerer Parese mit Kontrakturen fixiert wurde.

Die Prognose der hier behandelten Fälle ist im allgemeinen keine schlechte, die Drucklähmungen heilen fast alle, bei den Zerrungslähmungen ist die Heilung zweifelhafter, so bleiben Serratuslähmungen häufig dauernd bestehen, dagegen heilen die Entbindungslähmungen der Kinder mit wenigen Ausnahmen, die Plexuslähmungen durch stumpfe Gewalt beim Erwachsenen haben eine schlechtere Prognose.

Orthopädisch-chirurgische Maßnahmen kommen erst dann in Betracht, wenn eine weitere Besserung ganz ausgeschlossen ist. Dann sind z. B. auch bei Entbindungslähmungen noch im späten Alter erfolgreiche Muskel- und Sehnentransplantationen gemacht worden. Nervenpflöpfungen sind besonders bei Fazialislähmungen im Bereiche des Mittelohres gemacht worden, weil es da nicht gelingt, die beiden Stümpfe zu nähen; man hat den Fazialis in den Accessorius oder den Hypoglossus gepfropft. Die Erfolge sind, selbst im Falle die fremden Nerven in das Fazialisgebiet auswachsen, nicht gerade ideal, wegen sich dort einstellender unwillkürlicher Muskelkontrakturen (vgl. das Kapitel über lokale Krämpfe).

Anhangsweise müssen dann hier noch die primären Nervengeschwülste erwähnt werden, die sehr selten sind und natürlich auch zu den Erscheinungen der peripheren Nervenlähmung führen.

Nicht auf eine Stufe mit den eigentlichen Nervengeschwülsten ist die multiple Neurofibromatose (Recklinghausensche Krankheit) zu stellen. Sie macht nur in den seltenen Fällen eigentliche nervöse Symptome, wenn die kleinen Geschwülste im Wirbelkanal, z. B. am Akustikus oder an den Rückenmarkswurzeln sitzen. Sonst bietet sie wesentlich das Bild einer Hautaffektion.

Nervenge-
schwülste

Multiple
Neuro-
fibroma-
tose

17. Rückenmarkserkrankungen und progressive Muskelatrophien.

Wir können unter den Rückenmarkserkrankungen die einheitlich herdförmigen und die diffusen unterscheiden. An die letzteren schließen sich zweckmäßig dann die progressiven Myopathien an, trotzdem sie ihren Ursprung nicht mehr im Rückenmark, sondern im Muskel haben.

a) Die einheitlich herdförmigen Rückenmarkserkrankungen.

Unter den räumlich einheitlichen Erkrankungen befinden sich Verletzungen des Rückenmarks, die Kompressionen des Rückenmarks durch Wirbelerkrankungen und extramedulläre Geschwülste, die Blutungen des Rückenmarks, die Siringomyelie und die Myelitis.

Allgemeine
Symptomatologie
des
Rückenmarks

Wollen wir uns zuerst klar machen, was denn durch einen einheitlichen Herd des Rückenmarks, gleichviel welcher Ursache, für Symptome hervorgebracht werden können, so haben wir uns an die beiden Bestandteile des Rückenmarks zu erinnern. Das Rückenmark besteht aus einer weißen, peripher gelegenen Substanz, welche die Bahnen vom Rückenmark zum Gehirn und vom Gehirn zum Rückenmark enthält und aus einer zentral gelegenen grauen Substanz. Letztere ist das motorische und trophische Zentrum der Muskulatur, durch sie passieren die Sehnenreflexe von hinterer auf vordere Wurzel, durch sie müssen endlich, wie an einer früheren Stelle schon erwähnt (S. 46), die Schmerz- und Temperaturreize passieren, um die weißen Stränge der gekreuzten Seite zu erreichen. Zu dem Rückenmark gehören endlich in gewisser Weise auch noch die Wurzeln des Rückenmarks und hier ist ganz besonders zu erinnern, daß ein erheblicher Teil des Wirbelkanals, nämlich vom 1. Lendenwirbel ab abwärts überhaupt gar kein Rückenmark mehr enthält, sondern nur Wurzeln, nämlich die Cauda equina, deren Erkrankungen so von denen des eigentlichen Rückenmarks nicht ganz scharf zu trennen sind.

Cauda

Über die allgemeinen Tatsachen der Funktion der Stränge und der grauen Substanz ist S. 45 bis 47 nachzulesen. Dann wird alles Folgende leicht verständlich sein.

Entsprechend der Einteilung des Rückenmarks haben wir nun Symptomenkomplexe, die wesentlich von der Affektion der weißen Stränge, und andere, welche wesentlich von der Affektion grauer Substanz gebildet werden (wenn wir von der Beteiligung der Wurzeln noch absehen wollen).

Quersyndrom

Die erste bezeichnen wir als Quersyndrom, weil es durch die quere Unterbrechung der weißen Stränge, die zum Großhirn führen, hervorgebracht wird. Es besteht also darin, daß von einer gewissen Höhe ab, die der Höhe der queren Schädigung des Rückenmarks entspricht, bis zur Fußspitze willkürliche Bewegung

und bewußte Empfindung geschädigt oder aufgehoben sind. Wenn, wie das meist der Fall ist, die Unterbrechungsstelle zwischen den Zentren für die vorderen und denen der hinteren Extremitäten liegt, so haben wir also die Lähmung der Beine bei völliger Bewegungsfreiheit




Fig. 13. Quersyndrom.

der Arme, und wir stellen an einer den Rumpf zirkulär umgreifenden Linie die Grenze fest, unter der Berührungen nicht mehr empfunden werden. In Fig. 13 liegt die Grenze höher im Bereiche der Arme selbst. Es besteht ferner Lähmung der Blase und des Mastdarms, zuerst meist

Blase und
Mastdarm-
lähmung

Wichtig-
keit der
oberen
Grenzlinie

Auch wenn die Lähmung nicht ganz vollständig und die Empfindungsstörung nicht total ist, so ist das Wesentliche dieses Quersyndroms immer die Feststellung der Grenzlinie, oberhalb welcher alles normal ist, unterhalb welcher die schweren Störungen bestehen.




Fig. 14. Verteilung der Sensibilitätsstörung bei linksseitiger Quertrennung des Rückenmarks in der Höhe des 6. Dorsalsegments.

Rechts Aufhebung des Schmerz- und Temperatursinnes (schraffiert), links Aufhebung des Lagesinnes (Kreuze).

Am raschesten orientiert man sich immer über die Grenze der Sensible Symptome Empfindungsstörung, und man braucht dann nur auf der Fig. 9 nachzusehen, um die Höhe der Läsion zu finden. Nur am Rumpf

verlaufen diese Grenzlinien, wie die Tafeln zeigen, zirkulär; wenn die Querschädigung in das Gebiet der Arme selbst fällt, so verlaufen die Linien an den Armen längs, so daß wir dann die ulnare Seite des Arms hypästhetisch, die radiale normal finden können.

Die motorische Querlähmung hat natürlich alle Charaktere der Pyramidenlähmung: gesteigerte Sehnenreflexe, Babinski, Kontrakturen etc. mit einer sehr wichtigen Einschränkung: Wenn die Quertrennung total, oder auch wenn sie nicht total, aber frisch ist, kann die Lähmung eine ganz schlaffe sein, und die Reflexe, Sehnenreflexe, sowohl wie Hautreflexe können vollständig fehlen (Bastiansche Regel).

Motorische Symptome

Bastiansche Regel

Ebenso wichtig wie das totale Quersyndrom ist das der einseitigen Quertrennung, das mit dem Namen Brown-Séquards verbunden ist. Die Eigenart dieses Syndroms ist dadurch bedingt, daß die motorischen Bahnen (Pyramiden) nach der Kreuzung in der Medulla oblongata im Rückenmark selbst ungekreuzt verlaufen, daß die sensiblen Bahnen aber zum Teil (nämlich Schmerz- und Temperaturbahnen) im Rückenmark kreuzen (vgl. auch S. 46). Wir haben also beim Brown-Séguard gleichseitige Pyramidenlähmung und kontralaterale Hyp- oder Anästhesie für Schmerz- und Temperaturreize bis zu der der Unterbrechung entsprechenden Stelle, ferner gleichseitige (auf der Seite der Pyramidenlähmung lokalisierte) Aufhebung des Muskelsinns (Fig. 19). Der Berührungssinn ist intakt oder nur wenig gestört.

Brown-Séquardscher Symptomenkomplex

Die Höhenbestimmung geschieht nach denselben Prinzipien wie bei der Totalform.

Dem „Quersyndrom“ möchte ich das „Zentralsyndrom“ gegenüberstellen, als die Gesamtheit derjenigen Symptome, welche durch die Zerstörung der grauen Substanz des Rückenmarks bedingt sind, das sind die segmental angeordneten Lähmungen, das Fehlen der Sehnenreflexe in demselben Bereiche und die beiderseits segmental begrenzte dissoziierte Sensibilitätsstörung, während die sensible Querlähmung nur nach oben segmental begrenzt ist. Die Ausdehnung der „zentralen“ Symptome entspricht also der Längsausdehnung des Herdes im Rückenmark.

Zentralsyndrom

Zu diesen Rückenmarkssymptomen kommen noch die Wurzelsymptome. Sie sind entweder Schmerzen oder radikuläre nicht dissoziierte Sensibilitätsausfälle. Sie kommen am ehesten bei Prozessen zustande, die von außen auf das Rückenmark einwirken, also die Wurzeln selbst komprimieren. Aber auch intramedulläre Prozesse großen Umfangs können die ins Rückenmark einstrahlenden Wurzelfasern beteiligen. Wenn solche radikuläre Sensibilitätsausfälle da sind, so verschmelzen sie natürlich mit der Quersensibilitätsstörung, so daß erstere die obere Grenze der letzteren bilden.

Wurzelsymptome

Den Typus der zentralen Erkrankung stellt die Syringomyelie dar, die entsprechend ihrer Seltenheit und praktisch geringen Wichtigkeit hier nur kurz erwähnt sei. Es handelt sich da um eine Höhle, welche sich von der grauen Substanz aus entwickelt, und welche in der grauen

Einzelne Krankheiten Syringomyelie

schwere Quersymptome durch die Ausdehnung der syringomyelitischen Höhle auf die weiße Substanz auf. Angedeutet (z. B. durch den Babinski) können sie allerdings auch in frühen Stadien sein. Von den Symptomen der Syringomyelie seien dann noch die trophischen und vasomotorischen Störungen erwähnt, welche zur Abstoßung von Fingern und Fingergliedern führen und so zur Verwechslung mit Lepra Veranlassung geben können.

Sehr ähnlich der Syringomyelie lokalisiert sich häufig die Blutung in das Rückenmark, die Hämatomyelie. Die Blutung kann sich als „Röhrenblutung“ auf große Strecken hin durch das Rückenmark ergießen. Sie kommt entweder durch ein Trauma der Wirbelsäule zustande, wobei aber eine Kontinuitätstrennung der Wirbelsäule gar nicht nötig ist, oder unter dem Einfluß großer körperlicher Anstrengung (Heben schwerer Lasten und dergl.) und zwar meist bei jugendlichen Personen mit bisher anscheinend ganz gesunden Gefäßen. Derjenige Zustand, der dem Zentralsyndrom entspricht, stellt sich aber hier erst im späteren Verlauf ein. Durch die indirekte Schädigung der weißen Substanz kommt es auch bei der Hämatomyelie zunächst gewöhnlich zu den Erscheinungen einer totalen Querläsion, die sich sogar kaum bei irgend einer anderen Erkrankung mit solcher Schnelligkeit im Laufe von Stunden einstellen, als gerade bei der Hämatomyelie. Die Plötzlichkeit der Entstehung einer Querläsion ist geradezu charakteristisch für die Hämatomyelie. Trotz dieses sehr fulminanten Bildes ist die Prognose der Hämatomyelie darum verhältnismäßig günstig, weil die Quersymptome sich meist wieder bis zu einem hohen Grade oder vollständig zurückbilden können, wonach manchmal dann nur die Zentralsymptome zurückbleiben, die natürlich unangenehm genug sind, auch den Patienten freilich dauernd arbeitsunfähig machen, aber ihn doch wenigstens nicht, wie man zuerst befürchten mußte, dauernd an das Bett fesseln. Hämatomyelien, die den untersten Teil des Rückenmarks betreffen, führen natürlich nicht zu Quersymptomen, sondern zu (segmentalen) atrophischen Lähmungen und entsprechenden Sensibilitätsstörungen neben Blasen-Mastdarmstörungen (vgl. auch das weiter unten (S. 102) über die Tumoren des untersten Rückenmarksabschnittes Gesagte). Therapeutisch können wir gegen die Hämatomyelie außer Ruhe und Pflege (steriles Katheterisieren, Verhinderung des Dekubitus) gar nichts tun.

Hämatomyelie

Nicht mit der Hämatomyelie auf eine Stufe zu stellen sind die an anderer Stelle behandelten Zertrümmerungen und Quetschungen des Rückenmarks.

Den Typus der reinen Quererkrankung sieht man häufig bei der Myelitis. Nicht ganz so schnell, wie bei der Hämatomyelie, aber doch in einigen Stunden oder über Nacht stellt sich die Paraplegie mit allen ihren Symptomen ein. Die Myelitis folgt meist Infektionskrankheiten (z. B. Influenza), setzt dann unter Allgemeinerscheinungen und Fieber ein, die bei der Hämatomyelie fehlen. Über dieluetische

Myelitis

Myelitis vgl. unter Lues cerebrospinalis. Dunkler ist das Verhältnis der Myelitis zur multiplen Sklerose (vgl. das Kapitel über multiple Sklerose); d. h. Fälle, die als anscheinende Myelitis beginnen, erweisen sich nach Jahren durch den Verlauf manchmal als multiple Sklerosen. Man steht zwar heute meist auf dem Standpunkt, daß die multiple Sklerose ein besonderer Prozeß sei, demnach auch die anscheinende Myelitis schon histologisch von der eigentlichen Myelitis verschieden sein müsse; ganz sicher ist das nicht. Praktisch folgt aber, daß man bei der Prognose einer „Myelitis“ sich immer die Möglichkeit einer multiplen Sklerose offen halten soll, die Fälle verlaufen dann zunächst meist günstig, oft in anscheinend völlige Heilung, bis dann nach kürzerer oder längerer Zeit andere Schübe der multiplen Sklerose folgen. Von den anderen Myelitiden ist durch besondere Behandlung nur die syphilitische günstig zu beurteilen, wenn auch der Erfolg hier nicht immer eintritt. Die anderen Formen verlaufen meist ungünstig. Die Infektion der Harnwege und der Dekubitus lassen sich auf die Dauer schwer hintanhaltend, der Kranke geht nach einigen Wochen zugrunde. Es gibt aber auch Fälle, die spontan heilen.

Beziehung
der Myelitis
zur multi-
plen
Sklerose

Caisson-
krankheit

Ein der Myelitis ganz gleichendes Bild kommt durch die Caissonkrankheit zustande, jene Krankheit, welche durch die Entbindung des unter hohem Druck in den Geweben absorbierten Stickstoffes entsteht. Es kommt dabei zu Gasembolien und auch zu „Explosionen“ im Nervengewebe.

Enze-
phalomye-
litis

Die Myelitisherde können multipel auftreten und sich mit Enzephalitis kombinieren (Enzephalomyelitis). Die Diagnose dieser Zustände muß aus dem Ausschluß von Lues, von multipler Sklerose und den anämischen Rückenmarkskrankheiten (vgl. diese weiter unten) gemacht werden, was sich erst nach längerer Beobachtung ermöglichen läßt.

Rücken-
marks-
tumor

Die langsame Entwicklung ist das Charakteristische des Rückenmarkstumors. Wir unterscheiden intramedulläre und extramedulläre Tumoren; unter extramedullären Tumoren verstehen wir dabei wesentlich die von den Häuten des Rückenmarks ausgehenden, nicht die im nächsten Kapitel zu besprechenden von den Wirbeln aus entstehenden Geschwülste. Ihre Unterscheidung ist praktisch außerordentlich wichtig, weil die extramedullären operabel, die intramedullären in der großen Mehrzahl nicht operabel sind. Beide Formen machen häufig zuerst Brown-Séquardsche Symptome, d. h. sie beginnen einseitig. Wir finden dann etwa auf der einen Seite nur eine leichte motorische Schwäche mit Babinskischem Reflex, auf der anderen eine Abstumpfung der Temperatur- und Schmerzempfindung, die nach den Fußspitzen zunimmt. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal der beiden Formen sind in der Mehrzahl der Fälle die bei den intramedullären Prozessen sich früh einstellenden Schmerzen. In der, vom praktischen Gesichtspunkt gesehen, sehr eintönigen und unfruchtbaren Ebene der Rückenmarkskrankheiten ist die Diagnose der operablen Rückenmarkstumoren wohl der höchste Gipfel. Dieser Gipfel ist sehr leicht zu erreichen, man muß ihn wirklich nur ins Auge fassen, d. h. man muß bei jedem allmählich fortschreitendem

und einheitlich lokalisiertem Rückenmarksleiden an die Möglichkeit eines Tumors denken, und ganz besonders dann, wenn das Leiden mit Schmerzen angefangen hat. Ja, neuralgische Schmerzen, sei es im Arm, seien es sogenannte Interkostalneuralgien etc., müssen in jedem einzelnen Falle Veranlassung geben, auf ein Rückenmarksleiden und speziell auf Rückenmarkstumor zu untersuchen. Die Höhendignose des Tumors ist auf Grund der Kenntnisse, die wir heute von der Segmentinnervation des Körpers haben, wirklich kein so großes Kunststück. Hervorgehoben sei, daß wir immer nur den obersten Pol des Tumors diagnostizieren können, aber das ist für die operative Behandlung völlig genügend. Sehr wichtig, wenn auch allgemein bekannt, ist, daß die Wurzeln den Wirbelkanal nicht an ihrer Eintrittsstelle aus dem Rückenmark verlassen, sondern ein oder mehrere Wirbel tiefer, wie das Fig. 16 für die einzelnen Wirbel zeigt. Will man also einen Tumor operieren, dessen oberer Pol in der Höhe der 4. Dorsalwurzel lokalisiert ist, so sieht man, daß diese Wurzel etwa am 3. Dorsalwirbelkörper entspringt, und daß, um diese Stelle zu treffen, der Chirurg am 1. Dorsaldornfortsatz eingeht.

Was wir aus den Symptomen diagnostizieren, ist nun aber zunächst nicht der operable Rückenmarkstumor, sondern ein Prozeß, der das Rückenmark an einer bestimmbaren Stelle allmählich ausschaltet.




Fig. 16. Topographie des Rückenmarks, der Wurzeln und der Wirbelsäule nach Dejerine-E. Flatau.

Ehe wir da zur Diagnose Rückenmarkstumor kommen, müssen wir einige andere Möglichkeiten ausschalten. Von der Syringomyelie war bereits die Rede. In seltenen Fällen kann die Unterscheidung recht schwierig sein, der Verlauf der Syringomyelie ist aber ein gewöhnlich viel mehr chronischer. Weiter kann zwar ein Tumor da sein, aber ein Gumma, also ein Tumor, der, soweit überhaupt zu beseitigen, durch die interne Therapie zu beheben ist.

Die Syphilis ist an anderer Stelle dieses Buches besprochen. Es gilt als Regel, daß selbst in Fällen, wo man keine allgemeinen Symptome der Lues, z. B. keine Wassermannsche Reaktion hat, man doch jeden tumorverdächtigen Fall, wenn nicht die Operation gar zu sehr drängt, zunächst spezifisch behandelt und erst nach dem Versagen einer energischen 4—6 Wochen durchgeführten Kur die Operation in Frage zieht.

Die Differentialdiagnose gegenüber den Wirbelerkrankungen ist hier nur ganz kurz zu berühren, weil diese weiter unten behandelt werden. Hier ist nur zu sagen, daß die Unterscheidung zwischen einem extramedullären Rückenmarkstumor und einem Wirbeltumor nicht immer möglich ist, wenn der Wirbeltumor nicht zu einem Gibbus geführt hat. Für einen primären Wirbeltumor spricht auch ohne Gibbus immer eine sehr lebhafte lokale Druckschmerzhaftigkeit der Wirbel. Aber einerseits kann diese auch bei Wirbeltumor ganz fehlen und eine mäßige Schmerzhaftigkeit der Wirbel kommt nicht nur bei dem Rückenmarkstumor, sondern gelegentlich auch bei allen Rückenmarkserkrankungen (z. B. Myelitis, Hämatomyelie) vor. Gegen Wirbelaaffektion — wenn auch nicht absolut — spricht Einseitigkeit des Leidens, also Brown - Séquardsches Syndrom. Es bleibt dann noch die Differentialdiagnose zwischen einem intramedullären und einem extramedullären Tumor übrig. Das einzige Merkmal, das für einen extramedullären Tumor spricht, sind die Wurzelschmerzen, besonders im Beginne des Leidens, sie können aber, wenn auch nicht gerade sehr häufig, bei intramedullärem Tumor vorhanden sein und — häufiger — sie können bei extramedullärem Tumor fehlen.

Probe-
lamin-
ektomie

Operation

Es bleibt in zweifelhaften Fällen, da auch die Röntgenuntersuchung bei den eigentlichen Rückenmarksgeschwülsten — also den nicht vom Wirbel, sondern gewöhnlich von den Häuten des Rückenmarks ausgehenden — völlig im Stich läßt, nichts anderes übrig, als die Probelaminektomie, die in der Tat von einer Reihe von Autoren dringend empfohlen wird. Auch wir müssen sagen, daß sie sich durchaus lohnt, denn ein intramedullärer Tumor ist doch nicht zu beeinflussen; die Operation sachgemäß ausgeführt, ist kein schwerer Eingriff und schadet nichts, und die Prognose der Operation extramedullärer Rückenmarkstumoren ist, weil sie meist histologisch gutartig sind, eine so gute, daß wir alles daran setzen müssen, sie alle und möglichst früh zur Operation zu bekommen. Selbst, wenn schon schwerste Lähmungen da waren, kann der Erfolg der Operation noch die vollkommene Restitution sein.

Selbstverständlich gibt es auch Fälle, wo sich so langgestreckte Tumoren finden, daß man sie nicht exstirpieren kann. Auch sind Opera-

tionen am Halsmark natürlich gefährliche Operationen von einer gewissen Operationsmortalität. Im allgemeinen aber ist die Exstirpation eines diagnostizierten Rückenmarkstumors bei exakter Technik kein sehr schwieriger Eingriff und etwa mit den Operationen in der hinteren Schädelgrube an Schwierigkeit gar nicht zu vergleichen.




Fig. 17. Sensibilitätsstörung (schwarz) bei Erkrankung des untersten Rückenmarksabschnittes.

Man hat in den letzten Jahren in einer Reihe von Fällen anstatt des erwarteten Tumors eine zirkumskripte seröse zystische Meningitis gefunden. Auch sie wird aber durch die Operation günstig beeinflusst, so daß sie also differentialdiagnostisch nicht sehr ins Gewicht fällt.

Meningitis
serosa
zirkum-
skripta

Unterster
Rücken-
marksab-
schnitt

Einen besonderen Typus bilden nun noch die Erkrankungen am unteren Rückenmarksende. Hier spielen naturgemäß die Querschnittssymptome keine wesentliche Rolle mehr, da unter der Störungsstelle ja kein Rückenmark mehr ist, sondern das Bild ist fast ausschließlich bestimmt durch die Zentral- und die Wurzelsymptome. Bei ausgedehnten Läsionen haben wir hier atrophisch-degenerative Lähmungen der unteren Extremitäten, segmentale Sensibilitätsstörungen und Blasen- und Mastdarmlähmung. Wenn der allerunterste Teil des Rückenmarkes, der Konus, betroffen ist, so brauchen nur geringe Störungen der Extremitäten da zu sein. Es sind nur einige Fußmuskeln gelähmt, die Achillessehnenreflexe fehlen, die Patellarreflexe sind erhalten, bei ausgedehnten Läsionen sind auch diese vernichtet. Die Sensibilitätsstörungen sind bei den ganz tiefen Läsionen in charakteristischer Weise um die Genitalien, den Damm und den After angeordnet (manchmal „reithosenförmig“) und die Sensibilitätsprüfung dieser Gegend ist bei Verdacht auf eine tiefe Läsion etwa eines Tumors niemals zu vergessen. Der Babinskische Reflex als Querschnittssymptom ist in diesen Fällen nicht vorhanden. Meist fehlen die Fußsohlenreflexe überhaupt. Sehnenreflexe sind im Bereiche der Störung erloschen, es kommt bald E. R. zur Erscheinung.

Konus und
Kauda

Ganz besonders schwer und von den Geübtesten manchmal verfehlt wird die Differentialdiagnose zwischen Konus- und Kaudaerkrankung. Die Symptome können ganz dieselben sein, sie können auch kombiniert sein, weil die Kaudafasern ja an dem Konus vorbeiziehen, ein Tumor neben dem Konus auch die Kaudafasern trifft. Im allgemeinen sprechen einseitige Störungen für die Kauda, auch Schmerzen sprechen als Wurzelsymptom (s. o.) immer für die Kauda. Die Bestimmung des Sitzes einer Läsion ist ja besonders für die Operation eines Tumors wichtig, da es sich um große räumliche Distanzen — die ganze Lendenwirbelsäule — handelt. Der allgemeine Praktiker wird sich hier gern spezialistischer Hilfe versichern.

Rücken-
marks-
erkrankungen
durch
Wirbelerkrankung

Affektionen der Wirbelsäule, welche das Rückenmark schädigen, können traumatisch oder infektiös oder können Geschwülste sein. In den beiden letzten Fällen liegt häufig die Sache so, daß wir durch nervöse Symptome erst auf das Wirbelleiden aufmerksam gemacht werden.

Wirbel-
bruch

Bei den traumatischen Fällen haben wir allerdings fast immer die Anamnese und es muß bei jedem Kranken, der nach einem Sturz von einem Gerüst oder dgl. in die Behandlung kommt, das erste sein, daß wir ihn auf eine Beteiligung des Rückenmarks durch die Verletzung untersuchen. Eine Minute genügt meist dazu, um Sehnenreflexe und Babinski zu prüfen und den Kranken, wenn er nicht gleichzeitig durch eine Gehirnverletzung bewußtlos ist, einige willkürliche Bewegungen machen zu lassen. Was die Sehnenreflexe anlangt, so sei hier noch einmal betont (vgl. oben S. 95), daß sie nach frischen Verletzungen meist aufgehoben sind. Sind aber die Sehnenreflexe da, und ist kein Babinski vorhanden, so kann man zunächst erleichtert aufatmen. Größere

Störungen des Rückenmarks sind dann ausgeschlossen. Darum kann doch eine Wirbelverletzung vorhanden sein. Selbst große Frakturen und Luxationen der Wirbelsäule können ohne Rückenmarksverletzung erfolgen. Man muß dann mit großer Vorsicht auf die Wirbelverletzung weiter untersuchen, man darf den Kranken nicht etwa aufsetzen lassen, weil es vorgekommen ist, daß durch ungeschickte Hantierungen in solchen Fällen erst sekundär Rückenmarksschädigungen gemacht wurden.

Sind Rückenmarksverletzungen da, so sind sie leider meist schwer und haben die Form des totalen Quersyndroms, wie wir es im Anfang dieses Kapitels geschildert haben, bei tiefen Verletzungen natürlich die Form der Konus- und Kaudasympptome. Aus der oberen Grenze der Sensibilitätsstörung können wir die Höhe der Verletzung häufig sicherer angeben, als es durch die Untersuchung der Wirbelsäule möglich ist. Die anatomische Grundlage dieser Verletzungen bildet meist eine völlige Zertrümmerung des Rückenmarks und diese Fälle sind prognostisch sehr ungünstig. Die Patienten gehen nach Tagen oder Wochen an den Folgen der meist gar nicht vermeidbaren Infektion der Harnwege zugrunde. Wenn sie durchkommen, so hat es sich nicht um totale Querläsionen gehandelt, und es war schon erwähnt (S. 97), daß insbesondere traumatische Hämatomyelien im Anfang durch indirekte Wirkung das Bild einer Querläsion machen können, während der Verlauf zeigt, daß der Herd nur ein zentraler von geringer Ausdehnung gewesen ist. Wenn aber eine Rückenmarksverletzung etwa 2—3 Tage nach ihrem Entstehen noch gar keine Spur von Bewegung oder Empfindung in den unteren Extremitäten zeigt, dann kann man die Hoffnung ziemlich aufgeben, und auch von den mittelschweren Verletzungen gehen schließlich eine ganze Anzahl zugrunde. Prognostisch günstig sind die ganz leichten Verletzungen, insbesondere die, die nur zu Wurzelsymptomen, insbesondere zu Wurzelschmerzen geführt haben, wie sie am häufigsten naturgemäß an der Kauda vorkommen. Hier sei als praktisch wichtig der „Verhebungsbruch“ des 5. Lendenwirbels erwähnt, der beim Heben einer schweren Last entstehen kann, ohne daß eine Gewalteinwirkung auf die Wirbelsäule selbst stattzuhaben brauchte, und der leichte und oft jahrelang verkannte Beschwerden macht (Röntgenuntersuchung!).

Die operative Therapie der Wirbel-, bzw. Rückenmarksverletzungen beschränkt sich mit wenigen Ausnahmen auf die seltenen Fälle, in welchen aus allgemeinen chirurgischen Grundsätzen, also bei Infektion von einer äußeren Wunde aus, die Freilegung nötig ist. Bei der traurigen Prognose dieser schweren Verletzung fühlt man sich ja immer wieder versucht zu einem Eingriff zu raten, in der Hoffnung, etwa ein abgesprengtes Knochenstück, das das Rückenmark komprimiert, zu finden, und ich rate auch einzugreifen, wo man eine solche Vermutung aus dem Befunde von Reizsymptomen — Zuckungen in den Beinen, oder dem in diesen Fällen nicht so ganz seltenen Priapismus — begründen kann. Selbst in den Fällen, wo man chirurgisch zu beseitigende Verengungen des Kanals antrifft, erlebt man wenig Freude, und in der großen Mehrzahl der Fälle sind solche Veränderungen gar nicht da,

vielmehr die etwaige Luxationsfraktur wieder reponiert, die einmalige Quetschung aber hatte das Rückenmark unwiderruflich zerstört. Daher wird man bei diesen Rückenmarksverletzungen, je mehr man davon sieht, immer zurückhaltender mit der Operation, die ja doch auch einen erheblichen Eingriff darstellt und in Fällen, deren spontaner Ausgang zweifelhaft ist, den Ausschlag nach der unglücklichen Seite geben kann.

Die Wirbelverletzung selbst ist nach chirurgischen Grundsätzen mit langdauernder Ruhigstellung und späterer Sicherung der Konsolidation durch Verordnung von Stützapparaten und Korsetts zu behandeln. Das muß gerade auch in den Fällen geschehen, wo trotz Wirbelverletzung das Rückenmark gar nicht verletzt war.

Viel häufiger als Folge von Wirbelverletzungen ohne Rückenmarksschädigung sind Wirbelschmerzen, die nach Verletzungen entstehen, zunächst nur Folgen leichter Muskelzerrungen u. dgl., später dann Ausdruck einer traumatischen Neurose (vgl. später). Hier ist dann jede lokale Behandlung kontraindiziert.

Kümmel-
sche
Krankheit

Es sei trotz der Seltenheit der Erkrankung darauf hingewiesen, daß nach wenig oder gar nicht beachteten Wirbeltraumen sich nach Wochen oder Monaten ein Gibbus herausbilden kann, der auf eine durch das Trauma eingeleitete rarefizierende Ostitis zurückgeht (sogenannte Kümmelsche Krankheit). Man denke doch ab und zu an diese Erkrankung, da man sonst den Leuten mit anscheinend neurasthenischen Wirbelschmerzen unrecht tun kann. Auch an die häufige Förderung tuberkulöser Karies durch ein Trauma ist in diesem Zusammenhange zu erinnern.

Wirbel-
karies

Eine sehr häufige Erkrankung ist dann die tuberkulöse Karies der Wirbelsäule. Sie kann in jedem Lebensalter, auch noch in sehr hohem, zur Entwicklung kommen. Bei Kindern ist ihre Erkennung meist schon durch den Gibbus nahegelegt; bei Erwachsenen aber fehlt der Gibbus sehr häufig vollständig; und auch bei Kindern ist er nicht obligatorisch. Die beginnende Karies ist in diesen Fällen durchaus nicht leicht zu diagnostizieren und manche Kranke, die nur eine gewisse Steifigkeit und Schmerzhaftigkeit der Wirbelsäule zeigen, laufen monatelang mit der Diagnose Hysterie herum, bis sich dann z. B. plötzlich eine Kompressionsmyelitis des Rückenmarks herausstellt. So lange das Rückenmark noch nicht ergriffen ist, fehlen bei den Wirbelerkrankungen ja die zentralen (Pyramiden) Symptome. Hier leitet uns dann nur die Druckschmerzhaftigkeit der Wirbel, die doch einen anderen Charakter hat als die neurasthenische — aber auch bei tuberkulöser Karies beinahe völlig fehlen kann, und andere lokale oder allgemeine Symptome der Tuberkulose, Senkungsabszesse u. dgl. Zu dem Wirbelruckschmerz gesellen sich dann Wurzelschmerzen, die am Rumpfe gürtelförmig ausstrahlen. Sie werden manchmal mit Interkostalschmerzen verwechselt. Es ist jedoch außerordentlich wichtig noch in diesem Stadium die Diagnose zu stellen, weil durch eine orthopädische Behandlung der Beteiligung des Rückenmarkes noch entgegen gearbeitet werden kann.

Eine Rückenmarksbeteiligung kann sich allmählich oder auch plötzlich einstellen, und wir haben dann wieder in allen Abstufungen unser Quersyndrom, von leichten Pyramidensymptomen an bis zu totaler motorisch-sensibler Lähmung, fast immer doppelseitig. Auf die Fälle von Caries tuberculosa überhaupt wird man die Häufigkeit von Rückenmarkserkrankungen mit etwa 10 % berechnen dürfen.

Für die Behandlung der Rückenmarkserkrankungen bei Spondylitis tuberculosa gelten keine anderen Indikationen als die der Spondylitis selbst, d. h. die orthopädisch-chirurgischen. Wenn man nämlich annimmt, daß die Rückenmarkskomplikationen der Caries tuberculosa durch eine Verengung des knöchernen Wirbelkanals bedingt seien, so ist das ein Irrtum. Es handelt sich dabei fast immer um die Folge komplizierter entzündlich-ödematöser Zustände im Rückenmark und seiner Umgebung (Kompressionsmyelitis). Welchen Deformationen der Wirbelsäule sich das Rückenmark anpassen kann, zeigen ja die Fälle von enormem Gibbus ohne Rückenmarksercheinungen. Wenn das Redressement des Buckels und die Ruhigstellung der Wirbelsäule auch für die Behandlung der Rückenmarkserkrankung indiziert sind, so liegt es an der günstigen Wirkung auf das Ödem und die Entzündung. In die Frage nach der operativen Behandlung der Wirbelherde kann man sich vom neurologischen Standpunkte aus nicht einmischen. Jedoch sind auch diese Eingriffe manchmal von sehr gutem Einfluß auf die Rückenmarkssymptome gewesen. Trotzdem ist im ganzen die Prognose der Kompressionsmyelitis bei Tuberkulose eine nicht günstige. Man kann auf nicht mehr als 20—40 % vollkommene und unvollkommene Heilungen rechnen.

Selten und prognostisch meist günstig (dies mit Ausnahmen der akuten Wirbelosteomyelitiden) sind die Spondylitiden nach Infektionskrankheiten (z. B. Typhus), ganz ungünstig die Aktinomykose der Wirbelsäule.

Infektiöse
Spondy-
litis.

Eine besondere Erkrankung, die aber niemals eine Beteiligung des Rückenmarks herbeiführt, ist die Spondylose rhizomélitique, oder Spondylosis ankylopoetica oder chronische Wirbelversteifung, eine sich allmählich entwickelnde Ankylosierung der ganzen Wirbelsäule, die auch die Wurzelgelenke der Extremitäten (*ρίζα* = Wurzel), d. i. Hüft- und Schultergelenk ergreift, chronisch fortschreitet, eine Affektion, der wir ganz hilflos gegenüberstehen.

Spondy-
lose rhizo-
mélitique

Die Spina bifida ist eine angeborene Spaltbildung der Wirbelsäule, welche sehr häufig mit einer Defektbildung des Rückenmarks an der Stelle der Wirbelmißbildung verbunden ist. In den Fällen stärkerer Ausbildung ist zumeist ein zystischer Tumor unter der Rückenhaut zu fühlen (Meningozele), der mit Zerebrospinalflüssigkeit gefüllt ist. Da die Spina bifida meist die Lendenwirbelsäule betrifft, so sind die nervösen Störungen meist die einer Erkrankung des untersten Rückenmarksabschnittes — Blasenstörungen und schlaffe Beinlähmungen mit Verlust der Reflexe. Eine Spina bifida occulta (ohne Zystenbildung) ist häufig an einer abnormen Haarentwicklung an der betreffenden Stelle zu erkennen, eventuell durch die Röntgenuntersuchung zu bestätigen. Der Befund einer Spina bifida gibt in seltenen Fällen die Er-

Spina
bifida

klärung für angeborene Störungen an den unteren Extremitäten. Neuerdings hat man auch die Enuresis nocturna darauf bezogen. Meist ist aber die Spina bifida occulta eine besondere Mißbildung ohne jede nervösen Folgen. Die Spina bifida cystica bedarf wenn möglich der Operation wegen der Gefahr einer Infektion des Zystensackes.

Wirbel- tumor

Wichtig sind wieder die Wirbeltumoren, leider nicht praktisch-therapeutisch, sondern nur diagnostisch-prognostisch. Daß wir bei ihnen nichts tun können, liegt schon daran, daß sie in den meisten Fällen metastatisch sind. Nicht selten konstatieren wir ein Wirbelleiden mit Beteiligung des Rückenmarks, stellen die Diagnose Wirbeltumor und finden, weil wir wissen, daß diese Tumoren meist metastatisch sind, dann erst den primären Tumor. Bei Männern ist der primäre Tumor in solchen Fällen häufig ein Prostatakarzinom, bei Frauen ein Mammakarzinom. Letzteres ist manchmal lange operiert, die Operationsnarbe und die Wirbelschmerzen sichern dann die Diagnose. Es kann aber auch jeder maligne Tumor, insbesondere auch Sarkome jeder Lokalisation zu Wirbelmetastasen führen. Primäre Wirbelgeschwülste sind prognostisch nicht viel günstiger, nur wenige sind mit Erfolg operiert worden, weil sie in Anbetracht des Sitzes fast nie annähernd vollständig zu entfernen sind. Die Symptome des Wirbeltumors werden beherrscht durch die außerordentlich heftigen Schmerzen. In dieser Beziehung sind am ärgsten die Tumoren, welche tief sitzen, und die Cauda equina beteiligen, und die in immer wiederkehrender Weise das Bild der doppelseitigen Neuritis ischiadica machen. Das Bild ist so typisch, daß man auf die Anamnese hin meist schon die richtige Diagnose stellen kann. Eine „doppelseitige Ischias“ in höherem Alter ist fast immer ein metastatischer Wirbeltumor. Nur selten kommt es vor, daß man sich in der Diagnose Wirbeltumor irrt. Manchmal ist man nicht sicher, ob nicht eine Karies vorliegt, dann ist entsprechend den Erfordernissen einer Karies zu behandeln. Manchmal denkt man an einen Tumor der Rückenmarkshäute (vgl. S. 98), leider erweist sich die ungünstige Möglichkeit in solchen Fällen fast immer als die zutreffende; aber es ist gewiß richtig, Fälle, in denen man einen operablen Tumor nicht ausschließen kann, doch zur Operation zu bringen. Sonst bleibt nur Morphium, und auch zu dem Versuch einer Behandlung mit rasch und hoch gesteigerten Arsendosen ist zu raten.

b) Die diffusen Spinalerkrankungen.

Anämische Spinaler- krankung

Die praktisch wichtigsten der diffusen Rückenmarkserkrankungen sind die bei schweren Bluterkrankungen und bei Kachexien auftretenden. Es sind das zu einem großen Teile diejenigen Fälle, welche man früher als kombinierte systematische Strangerkrankungen bezeichnete, bis sich herausgestellt hat, daß es sich bei diesen Erkrankungen um nichtsystematische außerordentlich ausgedehnte leichte myelitische Veränderungen („funikuläre Myelitis“) handelt.

Funikuläre Myelitis

Diese Erkrankungen kommen vor bei perniziöser Anämie, bei Leukämie, bei Karzinomkachexien und anderen kachektischen Zuständen, am ausgeprägtesten bei den erstgenannten Blutkrankheiten.

Entweder entdeckt man Nervensymptome zufällig bei der Untersuchung des Nervenstatus solcher Kranker, oder gar nicht selten führen die nervösen Beschwerden den Kranken zuerst zum Nervenarzt, der dann durch die Eigenart der Symptome aufmerksam gemacht, die Diagnose auch des Grundleidens stellt.

Die Symptome sind in den verschiedenen Fällen nicht ganz übereinstimmend, da die einzelnen Stränge, d. h. Hinterstrang und Seitenstrang (Pyramide) verschieden stark beteiligt sind. Wohl in der Mehrzahl der Fälle findet man den Babinskischen Reflex, während die spastischen Symptome der Pyramidenerkrankung (wegen der gleichzeitigen Erkrankung der Hinterstränge) oft verhältnismäßig schwächer ausgebildet sind. Sind nur oder wesentlich die Hinterstränge und die hinteren Wurzeln ergriffen, so haben wir ein der Tabes nicht ganz unähnliches Bild, wenigstens können die Sehnenreflexe fehlen und auch eine gewisse Ataxie bestehen, aber die anderen Symptome der Tabes fehlen, dagegen kommen Übergänge zu der herdförmigen Myelitis vor, also zur Querunterbrechung des Rückenmarks (S. 97).

Subjektiv steht, wenn nicht die Ataxie überwiegt, motorische Schwäche im Vordergrund, und besonders häufig finden sich ausge dehnte Parästhesien, Ameisenlaufen, Gefühl als wenn die Glieder abgestorben wären (fast nie ausgesprochene Schmerzen). Diese Parästhesien fangen häufig an den distalen Enden der Glieder an und schreiten im Laufe von Wochen nach dem Rumpfe zu fort. Mir hat sich die Angabe dieser eigentümlichen Parästhesien schon eine Anzahl von Malen als ein zutreffender Hinweis auf anämische Spinalerkrankung bewährt.

Der Verlauf der Erkrankung ist ein ziemlich chronischer, zieht sich aber schon wegen der Prognose des Grundleidens meist nur sehr viel kürzere Zeit hin, als die in Betracht kommenden anderen Krankheiten (multiple Sklerose, Lues).

Die Therapie ist die Therapie der Grundkrankheit, und wenn diese nicht zu weit vorgeschritten ist, und die nervösen Symptome nicht bereits sehr massiv waren, so können insbesondere durch eine energische Arsenbehandlung auch die Symptome der Spinalerkrankung gebessert oder zum Verschwinden gebracht werden — ob für die Dauer, möchte ich nicht mit Bestimmtheit sagen.

Wir kommen jetzt zu einem der traurigsten Kapitel der Neurologie, einer Gruppe von Fällen, in welchen in früherem oder mittlerem Alter gewisse Teile des Nervensystems — in diesem Kapitel werden speziell die Rückenmarkserkrankungen dieser Art behandelt — entweder Bahnen oder Zellen, ohne eigentliche Entzündung einfach atrophieren, zugrunde gehen und die entsprechenden Ausfallserscheinungen eintreten. Es handelt sich dabei besonders häufig um familiäre Erkrankungen,

Degenera-
tive diffuse
Rücken-
marks-
erkrankungen

welche also in der gleichen Weise mehrere Geschwister betreffen oder von einer Generation auf die andere — manchmal mit Überspringen von Generationen — fortgeerbt werden. Es gibt aber auch unter diesen Fällen sogenannte „freistehende“, in welchen wir eine Vererbung in den nächsten Generationen nicht nachweisen können. Trotzdem ist es wahrscheinlich, daß ein großer Teil auch dieser Fälle ihrem Wesen nach als hereditär aufzufassen ist, da die moderne experimentelle Erforschung der Vererbungsgesetze es verständlich macht, wie pathologische Abweichungen der Art, auch wenn sie hereditär sind, nur einmal in vielen Generationen zur Erscheinung kommen können.

Die Prognose dieser Fälle ist eine trostlose; wenn sie auch nicht alle zum Tode führen, so sind sie doch ihrem Wesen nach progredient. Eine Therapie gibt es nicht. Es sind diejenigen Fälle, welche als untätige, unnütze und bemitleidete Menschen entweder in den Familien mitgeschleppt werden oder ins Siechenhaus wandern müssen. Sie bilden so eine wesentliche Grundlage dessen, was man als „Siechenhausneurologie“ bezeichnen könnte.

Wir betrachten zunächst die rein motorischen Erkrankungen und beschränken uns nicht auf die Erkrankungen des Rückenmarks, sondern betrachten der Ähnlichkeit der Symptomatologie wegen im Anschluß daran dann die hereditär degenerativen Erkrankungen der Muskeln.

Wir hatten früher (S. 16) den Weg der Motilität in drei Abschnitte zerlegt; 1. einen intrakortikalen, 2. einen supranukleären (bzw. pyramidalen), 3. in einen peripheren von der Vorderhornzellen des Rückenmarks bis zum Muskel.

Für die chronisch progressiven degenerativen Erkrankungen des motorischen Systems kommen nur die Abschnitte 2 und 3 in Betracht.

Wenn der Abschnitt 2 erkrankt, so werden wir eine fortschreitende spastische Pyramidenlähmung mit allen ihren Zeichen erwarten dürfen, eine Erkrankung, die als spastische Spinalparalyse bezeichnet wird. Diese Erkrankung ist ganz außerordentlich selten, ja in ihrer nosologischen Selbständigkeit sogar bestritten, und trotzdem glaube ich sagen zu dürfen, daß im Verhältnis zu der tatsächlichen Anzahl der Fälle vielleicht keine andere Krankheit von dem Praktiker so häufig falsch diagnostiziert wird, als gerade die spastische Spinalparalyse. Der Praktiker sieht eine spastische Lähmung der unteren, oder auch zugleich der oberen Extremitäten und sagt „spastische Spinalparalyse“, ohne zu bedenken, daß das ein Krankheitsname, aber nicht die Bezeichnung eines Symptomenkomplexes ist. Die Gefahr dieser Verwechslung liegt darin, daß allzuleicht die traurige Prognose der echten spastischen Spinalparalyse auf Krankheiten übertragen wird, von denen einige einflußbar, andere wenigstens prognostisch anders zu beurteilen sind.

Wenn ich von den typischen Quererkrankungen des Rückenmarks (S. 97 f.) ganz absehe, so handelt es sich bei den falschen spastischen Spinalparalysen am häufigsten um multiple Sklerosen, um diffuse Formen spinaler Lues, um arteriosklerotische Erkrankungen und um

Spastische
Spinal-
paralyse

die anämischen Rückenmarkserkrankungen. Man darf überhaupt keinen Fall echter „spastischer Spinalparalyse“ diagnostizieren, ehe man ihn nicht längere Zeit beobachtet und die genannten anderen Erkrankungen ausgeschlossen hat.

Häufiger als die reine „spastische Spinalparalyse“ ist die amyotrophische Lateralsklerose, die Kombination der Pyramiden-degeneration mit den atrophischen progressiven Erkrankungen der motorischen Zellen des Vorderhorns (und der Hirnnervenkerne der Medulla oblongata). Wir haben dann eine Kombination der Pyramidenparese mit den atrophischen Zuständen der spinalen Muskelatrophien. Einerseits finden wir also spastische Symptome, die durch die Atrophien etwas gemildert werden, aber meist nicht völlig hinter ihnen verschwinden, andererseits Atrophien im Beginn besonders der Handmuskulatur. Die Atrophien können sich aber bald außerordentlich weit verbreiten, und es ist beinahe charakteristisch in diesen Fällen, daß auch das Symptomenbild der Bulbärparalyse durch Degeneration der Hirnnervenkerne (vgl. S. 34) sich zu den anderen Symptomen gesellt. Wichtig sind die Fälle, in welchen die Erkrankung als Bulbärparalyse beginnt. Ja es scheint, als wenn es eine echte progressive Bulbärparalyse (nicht zu verwechseln mit der Bulbärparalyse ohne Befund sive Myasthenie vgl. S. 88, ebenso wenig mit der Pseudobulbärparalyse, auch nicht mit der apoplektiformen Bulbärparalyse) gar nicht gibt, sondern daß, wo diese Form auftritt, sie immer den Beginn der amyotrophischen Lateralsklerose darstellt. Sensibilitätsstörungen werden bei der amyotrophischen Lateralsklerose durchaus vermißt.

**Amyo-
trophische
Lateral-
sklerose**

**Bulbär-
paralyse**

Die amyotrophische Lateralsklerose beginnt meist im Alter über 30 Jahren. Ihr Verlauf erstreckt sich meist über mehrere Jahre. Die Prognose ist trostlos, die Therapie wirkungslos.

Als spinale Muskelatrophie bezeichnen wir die fortschreitende Atrophie der Muskulatur, die infolge der Degeneration der Vorderhornzellen eintritt (also ohne Pyramidensymptome). Sie beginnt meist in jugendlicherem Alter als die vorige Form, bekanntlich meist an den kleinen Handmuskeln, am Daumenballen, an den Interossei und Lumbricales, sowie dem Kleinfingerballen (Type Aran-Duchenne). Im Anfang ist manchmal eine Hand bevorzugt, aber nach kurzer Zeit ist die Erkrankung immer doppelseitig und schreitet nun auf Schulter, Rumpf, Kopf fort, wo das Gesicht betroffen wird, und auch das Krankheitsbild der Bulbärparalyse zur Erscheinung kommen kann. Stillstände kommen vor, ein wirkliches dauerndes Stationärbleiben gehört zu den größten Seltenheiten. Die Krankheit kann auch an anderen Stellen als der gewöhnlich zuerst betroffenen Hand beginnen, an Schulter und Gesicht = Typus facio-scapulo-humeralis, am Rumpf; es gibt auch Fälle, die sich von vornherein gleichmäßig über große Partien der Muskulatur ausbreiten.

**Spinale
Muskel-
atrophien**

Es gibt auch Fälle, die mehr sprunghaft fortschreiten, und bei denen man infolgedessen die Diagnose einer Poliomyelitis chronica gestellt hatte, die sich aber

**Chronische
Poli-
myelitis**

bei der Autopsie später dann doch als reine degenerative Degeneration im Vorderhorn herausgestellt haben. Vom Gesichtspunkt der praktischen Indikationsstellung hat die Unterscheidung dieser Fälle jedoch auch intra vitam keine Bedeutung.

Die elektrische Untersuchung ergibt Veränderungen, aber nur selten die typische E.R. Sehr häufig ist ausgedehntes fibrilläres Zittern der ergriffenen Muskeln. Die Sehnenreflexe sind im Bereiche der Atrophien abgeschwächt und verschwinden schließlich.

Weder bei der amyotrophischen Lateralsklerose noch bei der spinalen progressiven Muskelatrophie kommen im allgemeinen Störungen von Seiten des sympathischen Systems vor, also keine Pupillenstörungen, keine Blasenstörungen, ein differentialdiagnostisch in zweifelhaften Fällen recht wichtiger Umstand, ebenso wie das Fehlen von Sensibilitätsstörungen bei diesen spezifisch motorischen Erkrankungen gegenüber polyneuritischen Zuständen¹⁾. Mit den „geschlossenen Herderkrankungen“ werden im übrigen diese Erkrankungen meist nur von denen verwechselt, die gar nicht untersuchen. Die Atrophie der Hand kann natürlich an und für sich bei einem Tumor im Halsmark ebenso aussehen, wie bei progressiver Atrophie, aber dann findet man dabei auch andere Tumorsymptome. Die einzige geschlossene Krankheit, die auch dem Erfahrenen hier manchmal Schwierigkeiten macht, ist die Syringomyelie, wenn die Höhlenbildung sich auf das Vorderhorn beschränkt, bei der aber zwar die Prognose etwas anders ist, eine Therapie jedoch auch nicht existiert. Bei der Differentialdiagnose gegenüber den multiplen Erkrankungen denke man vor allem an Lues, die dadurch, daß sie sich an den vorderen Wurzeln lokalisiert, ähnliche Bilder machen kann, es wird hier aber die Diagnose Lues immer möglich sein (vgl. Kapitel syphilitogene Nervenkrankheiten).

Im übrigen wird die Diagnose „Progressive Muskelatrophie“ nur sehr selten zu Unrecht gestellt, viel seltener, wie die der spastischen Spinalparalyse.

Was die Ätiologie der spinalen Muskelatrophie, der chronischen Poliomyelitis und der amyotrophischen Lateralsklerose anlangt, so liegt sie ganz im Dunkeln. Für die Unfallpraxis ist es wichtig, daß eine Anzahl von Fällen auf Traumen bezogen werden. Mindestens eine große Anzahl sind aber nicht durch äußere (exogene), sondern durch endogene Ursachen in dem oben (S. 107) angegebenen Sinne bedingt.

Myatonie

Erwähnt sei hier noch die angeborene „Myatonie“, deren Selbständigkeit jedoch fraglich ist, die vielleicht in die infantilen atrophischen Zustände verschiedenen Ursprungs aufzulösen ist. Es handelt sich um Kinder mit außerordentlich schlaffer Muskulatur und fehlenden Sehnenreflexen. Der Zustand hat sich — das ist das bemerkenswerte — in einigen Fällen als besserungsfähig erwiesen, speziell sind in einigen Fällen die Sehnenreflexe wieder erschienen. Trotzdem ist die Auffassung, daß es sich nur um eine verzögerte Entwicklung der Muskulatur handele, zweifelhaft.

¹⁾ Es gibt auch davon eine außerordentlich seltene Ausnahme, die neurotische progressive Muskelatrophie, eine familiäre Erkrankung, die das Peronealgebiet und die Wadenmuskulatur betrifft, und mit Druckschmerzhaftigkeit der Nervenstämmen, auch Sensibilitätsstörungen verbunden ist. Sie dürfte auf Veränderungen in den Nervenstämmen beruhen (vgl. auch unter Polyneuritis S. 86).

c) Myopathien.

An die spinalen Formen, die durch den Untergang der Vorderhornzelle bedingt sind, schließen wir zweckmäßig die Myopathien an, diejenigen Muskelatrophien, welche durch degenerative Erkrankungen der Muskulatur selbst bedingt sind, und bei denen Veränderungen im Rückenmark eine erhebliche Rolle nicht spielen. Die Erkrankung beginnt meist schon im Kindesalter oder in der Pubertät, also im Durchschnitt früher als die spinalen Formen; einzelne Fälle, auch der muskulären, Form kommen indes noch später vor. Die Erkrankung ist in der Mehrzahl der Fälle nachweislich hereditär und kommt besonders oft bei mehreren Geschwistern vor. Die Krankheit befällt, was die spinale Form nur ausnahmsweise tut, zuerst meist die proximalen Teile der Extremitäten. Sehr häufig erscheinen die Muskeln alle oder zum Teil hypertrophisch trotz der Parese, eine Pseudohypertrophie, welche durch Einlagerung von Fett in die Muskeln bedingt ist. E. R. fehlt, ebenso fibrilläre Zuckungen. Die Sehnenreflexe können verloren gehen. Die Erkrankung verläuft im allgemeinen etwas gutartiger, als die spinale Form, die kleinen Kranken sterben häufig an interkurrenten Krankheiten; wenn aber ein höheres Alter erreicht wird, bleibt die Erkrankung bei einem Zustand sehr herabgeminderter Beweglichkeit nicht selten beinahe stationär.

Pseudo-
hyper-
trophie

Die Thomsensche Krankheit (Myotonie) ist eine Muskelerkrankung derart, daß die Muskeln bei einer Innervation oder bei elektrischer Reizung (myotonische Reaktion) länger in dem Kontraktionszustand verharren, als der Reiz dauert. Der Kranke kann wegen dieser Überdauer der Kontraktion z. B. die einmal geschlossene Hand nicht sofort wieder öffnen. Bei der Wiederholung der Innervation läßt dann die Überdauer allmählich nach und die Innervation wird normal. Kranke mit Myotonie an den Beinen können z. B. Briefträger sein, weil sie dann aus der Bewegung nicht herauskommen. Vitale Folgen hat die sehr seltene und fast immer familiäre Erkrankung nicht.

Myotonie

Myotonie der Handmuskeln kann sich in einer typischen Form (anscheinend häufiger als die Thomsensche Krankheit) mit Myatrophie im Gesicht und anderen Muskeln des Körpers verbinden (Myotonia atrophica). Der Verlauf ist hier wie bei den Dystrophien.

Myotonia
atrophica

d) Friedreichsche Ataxie.

Besondere Formen der hereditär-familiären Krankheiten sind durch die Fälle gebildet, in welchen zu der Erkrankung der Pyramidenbahnen noch eine Erkrankung der Hinterstränge und der Kleinhirnseitenstränge hinzukommt. Diese Kombination liegt den Fällen von Friedreichscher Ataxie oder „hereditärer Ataxie“ zugrunde. Die Erkrankung beginnt meist im 1. Lebensjahrzehnt, selten später, und äußert sich in einer Ataxie, die der Tabes

Friedreich-
sche Ataxie

sehr ähnlich sieht, oft aber auch etwas zerebellares hat. Untersucht man, so findet man meist schon im Beginn Pyramidensymptome, vor allem den Babinskischen Reflex, während die Steigerung der Sehnenreflexe durch die Hinterstrangserkrankung kompensiert wird, die Sehnenreflexe vielmehr entweder von Anfang an fehlen oder doch im weiteren Verlauf verloren gehen. Zum Krankheitsbild gehört ferner Nystagmus und skandierende Sprache, woraus folgt, daß nicht nur das Rückenmark, sondern auch Medulla oblongata und Kleinhirn beteiligt sind. Bei Betonung der zerebellaren Erkrankung und Zurücktreten der spinalen Symptome spricht man von einer Hérédo-ataxie cérébelleuse, ohne daß dieser Unterscheidung eine prinzipielle Bedeutung zukäme. In anderen Fällen tritt das spastische Element mehr hervor neben den zerebellaren Erscheinungen.

Der Krankheitsverlauf ist ein eminent chronischer. Wichtig ist einerseits das Vorkommen „freistehender“ (s. oben) und dann das Vorkommen sehr rudimentärer und anscheinend nicht progressiver Fälle. Wenn z. B. Geschwister eines Friedreichkranken keine Sehnenreflexe haben, so ist man wohl berechtigt, diese Erscheinung als rudimentäre Friedreichsche Krankheit aufzufassen.

Differentialdiagnostisch wichtig ist natürlich hauptsächlich die Unterscheidung von der echten juvenilen (syphiligenen) Tabes. Bei Friedreichscher Krankheit kommt Pupillenstarre und Optikusatrophie nicht vor.

18. Die Lokalisation im Gehirn.

Die Lokalisation im Gehirn ist nicht so schwierig, daß der Praktiker daran verzweifeln müßte, ihre Grundlagen sich zu eigen zu machen. Er wird dazu vielleicht etwas geneigter sein, wenn der gewissenhafte Neurologe ihm nicht verschweigt, daß auch er in einer Anzahl von Fällen die Lokaldiagnose eines Tumors nicht stellen kann.

Sehen wir zunächst von einzelnen Krankheiten ab und erörtern wir die theoretisch-anatomischen und physiologisch-pathologischen Grundlagen, auf die sich jede Lokaldiagnostik zu stützen hat:

Umfang und Einteilung des Gehirns
 Als Gehirn bezeichnen wir die Großhirnhemisphären, das Kleinhirn und den Hirnstamm bis zur Pyramidenkreuzung hinunter.

In den Großhirnhemisphären unterscheiden wir 1. die graue Rinde, 2. die Markstrahlung (das Centrum semiovale), dazu kommen 3. die Großhirnganglien (welche nur eine sehr geringe Bedeutung für die praktische Diagnostik haben). Ihnen folgt 4. der eigentliche Hirnstamm, charakterisiert als Ursprung der Hirnnerven (mit Ausnahme des Riechnerven) und ihm aufgelagert 5. das Kleinhirn.

Großhirnhemisphären
 Für die Großhirnhemisphären (und die Großhirnganglien) gilt als der fundamentale Satz, daß ihre Beziehungen zur Körperperipherie wesentlich gekreuzte sind. Erkrankt die rechte Großhirnhemisphäre, so sind die Bewegungsstörungen, die Empfindungsstörungen, die Hemi-anopsie auf der linken Seite und umgekehrt.




Fig. 18 a und b. Laterale und mediale Ansicht einer linken Hemisphäre mit den wichtigsten Hirnterritorien.

Die Fissura Sylvii (*F.S.*) ist (Fig. 18 a) auseinandergezogen, so daß die Insel (*J*) sichtbar wird. *C* = Zentralfurche. Davor die vordere Zentralwindung (*V.C.W.*), eingenommen durch das wagrecht schraffierte motorische Gebiet mit den Abschnitten für Bein, Arm, Kopf, letzterer Abschnitt nimmt das Operkulum (*Op*) ein. Nach vorn von der vorderen Zentralwindung die drei Frontalwindungen *F*₁, *F*₂, *F*₃. Das motorische Gebiet für die Augen (vgl. über *Déviation conjuguée*, S. 32 u. 115) liegt im Fuße von *F*₂. Hinter der Zentralfurche das senkrecht schraffierte sensible Gebiet, das die hintere Zentralwindung (*H.C.W.*) einnimmt und in den Parietallappen, insbesondere den Gyrus supramarginalis (*Sm*) übergreift. Motorisches und sensibles Gebiet setzen sich auf der Medialfläche in den Parazentrallappen (*P.C.*) fort. *C* auch auf Fig. 18 b Zentralfurche. Auf der Medialfläche der Hauptteil der Sehregion (kreuzweise Schraffierung) um die Fissura calcarina (*Fc*), die Sehregion erstreckt sich nur wenig auf die laterale Fläche. *OP* = Fissura occipitoparietalis. *Cu* = Cuneus. *B* = Balken. *Hi* = Gyrus Hippocampi, letzterer wahrscheinlich die zentrale Riechregion. Auf der lateralen Fläche ventralwärts von der Fissura Sylvii (*F.S.*) die drei Temporalwindungen *T*₁, *T*₂, *T*₃. Das Sprachgebiet ist punktiert, es erstreckt sich vom Fuß der dritten Frontalwindung, *Br* = Broca'sches motorisches Sprachzentrum, durch die Insel (*J*) in den Temporalappen, insbesondere *T*₁. Als Zentrum des sensorischen Sprachzentrums ist die Stelle *W* (= Wernicke'sche Stelle) zu betrachten. Nach hinten oben von dieser Stelle im Gyrus angularis (*G.a*) die Stelle für das Lesen. Der linke Temporalappen dient außerdem, der rechte allein zum Hören (vgl. S. 116).

Auf beide Seiten gleich verteilt, so daß der Ausfall einer Hemisphäre keine Folgen hat, ist das Hörvermögen.

Nur auf einer Seite, nämlich beim Rechtshänder auf der linken (beim Linkser auf der rechten), so daß der alleinige Ausfall die ganze Funktion vernichtet, ist das Sprachvermögen und das Sprachverständnis mit ihren Hilfsfunktionen, dem Lesen und dem Schreiben, und ein kleiner Teil dessen was man als Praxie = Handlungsvermögen bezeichnet. Über die Aphasie und Apraxie wird weiter unten ausführlich zu sprechen sein.

Thalamus Von den Großhirnganglien kommt nur der Thalamus als Durchgangsstelle der Sensibilität (gekreuzt) in Frage. Von der Funktion des Linsenkerns wissen wir nichts sicheres.

Hirnstamm Der Hirnstamm hat als wesentliche Symptome die Lähmungen der Hirnnerven und ihrer Kerne, die im Gegensatz zu ihrer Lokalisation im Großhirn, ungekreuzt entspringen. Nur beim Sehnerven sind etwas kompliziertere Verhältnisse, dadurch daß die Sehnerven sich im Chiasma teilweise kreuzen und daher durch Störungen oberhalb des Chiasmas, vom Traktus (inklusive) bis zur Großhirnrinde das bereits (S. 52) beschriebene Symptom der gekreuzten Hemianopsie hervorgebracht wird.

Kleinhirn Das Kleinhirn, dessen Symptome auch bereits beschrieben sind (S. 51), hat im Gegensatz zum Großhirn wesentlich gleichseitige Funktionen.

Lokalisation der Großhirnrinde Gehen wir nun ins Einzelne und betrachten zunächst die Lokalisation innerhalb der Großhirnrinde.

Motilität Die Bewegungsfunktion für die Gegenseite knüpft sich, wie heute feststeht, an die Rinde vor der Zentralfurche (Fig. 18), wesentlich also an die vordere Zentralwindung, von da auf die hintersten Teile des Stirnlappens übergreifend. Innerhalb der Bewegungsrinde bestehen noch weitere Lokalisationen, so zwar, daß das Bewegungsterritorium für die hintere Extremität am weitesten der Mittellinie zu liegt und hier von der lateralen Hemisphärenfläche sogar auf die mediale Hemisphärenfläche übergreift (im sogenannten Parazentrallappen Fig. 18b). Dann folgt nach einer schmalen praktisch kaum in Betracht kommenden Zwischenzone für den Rumpf das Territorium für die obere Extremität, und zwar zuerst die Gegend für die Schulter und den Arm, dann für die Finger, und noch weiter abwärts dem Operkulum zu und in diesem der Fazialis und die anderen Kopfmuskeln.

Die feinste Differenzierung innerhalb der motorischen Region zeigen uns die Reizzustände, die wir bereits früher als „Jacksonsche Epilepsie“ geschildert haben. Wenn wir also einen epileptischen Krampf haben, der sich auf die Finger beschränkt oder dort beginnt, so können wir mit absoluter Sicherheit die Stelle bezeichnen, wo die Erregung sich in der Großhirnrinde abspielt oder wenigstens, wo sie beginnt (vgl. Fig. 7).

So zirkumskript wie die Reizerscheinungen sind die Ausfallserscheinungen nicht. Hier begnügen wir uns am besten mit der Einteilung in die beiden Extremitätenregionen und den Kopf und weisen dann der Monoplegia cruralis das obere Drittel, der Monoplegia brachialis das mittlere und der Monoplegia faciolingualis das

untere Drittel der vorderen Zentralwindung zu. Die Seitwärtswendung der Augen liegt im Fuß der zweiten Frontalwindung. Der Ausfall der einen Hemisphäre, bezw. dieses Territoriums, hat aber für die Augenbewegung nur vorübergehende Folgen (*Déviation conjugée*, S. 32), ist also für die Lokalisation länger bestehender Herde nicht sehr in Rechnung zu ziehen. Die Art der Bewegungsstörungen, die durch Affektionen der Bewegungsrinde verursacht werden, ist überhaupt in jeder Beziehung die der Pyramidenlähmung bzw. der supranukleären Lähmung, die wir mit all ihren Zeichen für die Extremitäten (S. 16) sowohl wie für den Kopf (S. 30) kennen gelernt haben. Nur daß je näher der Herd der Rinde rückt, wegen der räumlichen Ausbreitung der Faserung, es um so wahrscheinlicher wird, daß er nicht die ganze Faserung, sondern nur für einzelne Glieder bestimmte Teile derselben unterbricht, also Monoplegie erzeugt. Wenn aber etwa die ganze Rinde der vorderen Zentralwindung zerstört ist, so entsteht natürlich eine vollkommene Hemiplegie.

Wir dürfen weiter annehmen, daß die Sensibilität des Körpers parallel der Motilität hinter der Zentralfurche, also zunächst in der hinteren Zentralwindung lokalisiert ist, aber über diese auch etwas auf den Gyrus angularis und supramarginalis übergreift, ohne daß wir die hintere Grenze der sensiblen Rinde genau bestimmen könnten. Wahrscheinlich besteht auch hier eine Teilung in Territorien, die denen der Motilität entsprechen, ohne daß diese feinere Einteilung bisher praktisch lokaldiagnostische Bedeutung erreicht hätte.

Sensibilität

Dagegen ist besonders wichtig zur Auffindung der zerebralen Sensibilitätsstörungen überhaupt die Prüfung auf Stereognosis, die man bei keinem auf einen Hirnherd Verdächtigen unterlassen darf. Sie besteht darin, daß man dem Kranken, unter Ausschluß der Augen, einen Gegenstand (Uhr, Uhrkette, Bleistift, Feder, Flasche etc.) in die Hand gibt, ihn auffordert, ordentlich zuzufühlen, was er da in der Hand habe und es dann zu sagen. Man vergleicht dann natürlich die gesunde Seite. Wir entdecken auf diese Weise manchmal Sensibilitätsstörungen, die durch die Prüfung der einzelnen Qualitäten nicht festzustellen sind, und für Lokalisationen von Prozessen, die sich primär hinter der Zentralfurche entwickeln, hat diese Untersuchungsart eine große Bedeutung. Bei schweren Störungen sind auch die einzelnen Qualitäten gestört (und dann natürlich meist auch eo ipso die Stereognosis).

Astereognosis

Die eigentliche Sehregion liegt wahrscheinlich wesentlich in dem hinteren Teil der medialen Fläche der Hemisphäre um die *Fissura calcarina herum* (Fig. 18b). Das Symptom dieser Gegend ist also die Hemianopsie. Indessen gehört es doch keineswegs nur der Sehregion. Denn dieses selbe Symptom haben wir vom *Tractus opticus* ab, als Symptom der Sehbahn in ihrem ganzen Verlauf, und die Sehbahn erreicht die mediale Sehrinde erst in einem großen Bogen, der sie bis nahe an die laterale Fläche des Okzipitallappens führt (Fig. 19). So bleibt die Hemianopsie denn das Symptom des Okzipitallappens schlechthin.

Sehen

Hemiano-
pische
Pupillen-
starre

Zur Unterscheidung der Traktushemianopsie von der okzipitalen ist die hemianopische Pupillenreaktion angegeben. Die Pupillen sollen bei Traktusläsionen im Bereiche des hemianopischen Gesichtsfeldes auf Licht nicht reagieren, weil im Traktus noch Pupillenfasern mitgehen, die im Vierhügel enden und in der Sehstrahlung dann nicht mehr enthalten sind. Die Reaktion ist ganz außerordentlich schwierig sicher anzustellen und nicht einmal ganz unbestritten, kommt aber praktisch nicht in Betracht.

Sprach-
funktion
und
Aphasie

An die Rinde ist dann noch die Sprachfunktion gebunden. Unter Sprachfunktion verstehen wir erstens die Funktion des Sprechens und zweitens die Funktion des Sprachverständnisses. Den Verlust der ersten Teilfunktion bezeichnen wir als motorische,




Fig. 19. Schema der Sehbahnen.

den der zweiten als sensorische Aphasie. Die beiden Funktionen sind auf der Rinde räumlich getrennt, stoßen jedoch aneinander (Fig. 18a). Die Region des Sprechens liegt vor der Zentralfurche, und zwar etwa vom Operkulum bis zum Fuß der dritten Frontalwindung (Broca'sche Windung) nach vorn, die des Sprachverständnisses im Temporallappen, speziell in der Gegend der ersten Schläfenwindung.

Senso-
rische
Aphasie

Die Diagnose einer sensorischen Aphasie setzt voraus, daß der betreffende überhaupt hört. Daß diese Trennung des Hörens vom Sprachverständnis überhaupt möglich ist, kommt daher, daß der rechte Schläfenlappen wohl zum Hören, aber nicht zum Sprachverstehen ausgebildet ist, so daß mit dem Wegfall des linken

nur noch das Hören übrig bleibt. Solche sensorisch-aphasische Kranke können also manchmal Melodien nachsingen, sie können auch das Klingeln einer Glocke hören, ja manchmal sind ihnen Geräusche sehr unangenehm. Nicht immer braucht man sich aber mit solchen Prüfungen des Gehörs aufzuhalten, da die Situation oft ohnehin klar ist.

Bei der Prüfung des Sprachverständnisses hat man darauf zu achten, daß der Kranke den Mund des Arztes nicht sieht. Man stelle sich also hinter den Kranken und spreche ruhig und langsam zuerst einfache Aufforderungen, dann schwerere. Man fordert etwa zuerst auf, die Augen zu schließen, dann die Zunge zu zeigen, dann die Zähne zu zeigen, dann die Hand hochzuheben, dann an das Ohr, an den Schnurrbart zu fassen, neben dem Bett stehende Gegenstände zu zeigen etc., dann gebe man noch etwa den Auftrag, die Hand dreimal nacheinander aufzuheben. Man wundere sich dann nicht, wenn anscheinend gleichleichte Aufgaben das eine Mal ausgeführt, das andere Mal nicht verstanden werden. Es ist gewöhnlich so, daß bei leichteren sensorischen Aphasien einmal etwas „durchdringt“, das andere Mal nicht, längere und schwierigere Dinge aber immer schwerer als leichte. So wird man z. B. bei dem „die Hand dreimal hochheben“ häufig bereits ein mangelndes Verständnis konstatieren, wo Handhochheben noch prompt ausgeführt wurde. Die letzten Reste von Sprachverständnis prüft man mit komisch wirkenden oder sehr affektbetonten Fragen, z. B. kann man sich mit Wasser betrinken? Kann man sich mit Schnaps betrinken? Haben Sie gestohlen? Sind Sie schwanger? Aber auch die Feststellung leichter Störungen des Sprachverständnisses ist z. B. zur Diagnose eines otitischen Schläfenlappenabszesses durchaus wichtig.

Die Diagnose der sensorischen Aphasie, mit dem Sitz im Bereiche des linken Temporallappens wird durch eine Begleiterscheinung fast immer wesentlich erleichtert, durch die Paraphasie. Als Paraphasie bezeichnen wir die Erscheinung, daß der Kranke die Worte oder Silben verwechselt. Er sagt z. B. statt Schlüssel Messer, statt Messer Musser, sowohl in der Spontansprache als auch bei der Aufgabe, ihm vorgelegte Gegenstände zu bezeichnen. Dabei macht sich meist ein Haftenbleiben an dem, was der Kranke einmal gesagt hat, bemerkbar, so daß er z. B. wenn er einmal Messer gesagt hat, nun jeden Gegenstand als Messer bezeichnet. In groben Fällen wird durch die unaufhörlichen Paraphasien die spontane Sprache zu einem ganz unverständlichen Wortsalat, und sehr viele Fälle mit Herden des linken Schläfenlappens sind als angeblich Geisteskranke wegen dieser Paraphasie auf die Irrenanstalten anstatt in ein Krankenhaus gekommen.

In den Bereich der sensorischen Aphasie bzw. des linken Schläfenlappens gehört auch die amnestische Aphasie. Hier handelt es sich darum, daß der Kranke die Bezeichnung eines Gegenstandes nicht spontan findet, aber keine falsche Bezeichnung sagt, auch ihm vorgeschlagene falsche ablehnt, wenn der Arzt aber die richtige Bezeichnung sagt, sie als richtig erkennt und nun eventuell seinerseits nachspricht. Es ist wichtig, diese Form nicht mit der motorischen Aphasie zu verwechseln.

Am-
nestische
Aphasie

**Motorische
Aphasie**

Die motorische Aphasie zeigt sich darin, daß der Kranke überhaupt nicht sprechen kann. Nur sind manchmal sogenannte Sprachreste geblieben, die der Kranke immer wiederholt, z. B. tan, tan, tan, oder auch einzelne ganze Worte, ohne daß er sonst ein Wort sprechen könnte. Man prüft gewöhnlich außer dem Spontansprechen noch das Nachsprechen und es kommt hier in leichteren Fällen vor, daß der Kranke noch einzelne Silben oder die Anfangsbuchstaben der ihm vorgesprochenen Worte leidlich wiederholt, während der Rest verloren geht.

Anarthrie

Die motorische Aphasie ist noch zu unterscheiden von der Anarthrie, wie sie bei Bulbärparalyse und Pseudobulbärparalyse vorkommt (vgl. S. 34), und bei der die Worte ganz verwaschen und durch die Verwaschenheit unverständlich herauskommen, aber man fühlt hier doch, daß der Fehler in der Ausführung des Sprechakts liegt, während bei der motorischen Aphasie das Wort selbst fehlt und auch nicht undeutlich gebildet werden kann, gewissermaßen schon vor der Ausführung verloren gegangen ist. Bei der Anarthrie handelt es sich um doppelseitige Herde der Bahnen, welche die Rinde mit den Sprachmuskeln verbinden.

Ich weiß wohl, daß mit den kurzen Bemerkungen über die Aphasie die wissenschaftliche Seite des Problems nicht erschöpft ist, daß es insbesondere da Schemata gibt, deren heuristisch-wissenschaftlichen Wert ich gewiß nicht bestreite, und die der Student zum Examen wissen muß. Ich weiß aber auch, daß vier Wochen nach dem Staatsexamen fast niemand mehr mit den Bezeichnungen subkortikal und transkortikal einen Begriff oder die Vorstellung eines Faktums verbindet, und für die praktische Lokalisation in den Fällen, wo es sich darum handelt einzugreifen, dürfte das oben Gesagte fast immer genügen.

**Schrift-
sprache**

Nun über die Schriftsprache noch ein paar Worte. Als isolierte Störung der Schriftsprache kommt nur die isolierte (sogenannte reine oder subkortikale) Alexie in Frage. Sie kommt nur zusammen mit Hemianopsie nach rechts vor. Sie besteht darin, daß der Betroffene schreiben, aber absolut nicht lesen kann, auch das nicht, was er eben geschrieben hat. Es handelt sich dabei fast immer um Herde im Mark des linken Gyrus angularis, also nicht weit vor der sensorischen Sprachregion, weswegen auch meist leichte sensorische Sprachstörungen (Paraphasien) dabei sind.

Mit Ausnahme dieses Falles begleiten ganz bestimmte Schrift- und Lesestörungen fast regelmäßig die Störungen der Lautsprache, und zwar führt die motorische Aphasie als solche, d. h. durch den vor der Zentralfurche gelegenen Herd mit ganz seltenen Ausnahmen zum Verlust des Lesens und Schreibens. Es werden nur „Krakel“ geschrieben, auch wenn die rechte Hand nicht gelähmt ist, wobei übrigens zu bemerken ist, daß bei Lähmung der rechten Hand die linke bei einiger Unterstützung durch den Untersucher immer genügenden Aufschluß über die Schreibfähigkeit gibt.

Diese Störung des Lesens und Schreibens dient in den wenigen Fällen, wo die Diagnose zweifelhaft sein kann, häufig zur Unterscheidung

der Aphasie von den hysterischen Zuständen. Die Hysterischen schreiben und lesen fast immer gut. Bei der Aphasie kommt das nur in extrem seltenen Fällen vor.

Bei sensorischer Aphasie wird gewöhnlich paraphasisch geschrieben, d. h. mit richtigen Buchstaben, die aber in mehr weniger sinnloser Folge nacheinander hingesetzt werden. Es wird auch paraphasisch gelesen und das Gelesene meist nicht verstanden, z. B. werden geschriebene Aufforderungen nicht befolgt, indessen gibt es auch hier, wie bei der Sprache selbst (s. oben), verschiedene Grade der Intensität der Störungen.

Als Apraxie bezeichnet man die Unfähigkeit, zusammengesetzte Bewegungen oder Handlungen auszuführen trotz erhaltener Beweglichkeit. Der Kranke ist z. B. nicht imstande, auf Befehl zu drohen, zu winken, eine Kußhand zu werfen oder er macht falsche Handlungen. Er kann ferner Bewegungen, die ihm vorgemacht werden, nicht richtig nachmachen, und in den schwersten Fällen kann er auch mit ihm in die Hand gegebenen Gegenständen nicht richtig hantieren, er steckt sich z. B. eine Zahnbürste wie einen Federhalter hinter das Ohr etc. Eine geringe, manchmal nur mit Mühe zu findende Apraxie der linken Hand ist die typische Folge linksseitiger Rindenherde neben der Lähmung der rechten Körperseite. Diese Apraxie ist ein Zeichen dafür, daß beim Rechtshänder die linke Hemisphäre (beim Linkshänder bestehen wie auch für die Sprache die umgekehrten Verhältnisse) in die Praxis der linken Hand eingreift (vgl. oben). Da dies auf dem Umwege über den Balken und die rechte Hemisphäre geschieht, so ist diese selbe Apraxie aber ohne rechtsseitige Lähmung ein Zeichen eines Balkenherdes.

Apraxie

Die Gehirnteile, deren Funktion nicht bekannt ist, und die vielleicht eine bestimmte Funktion gar nicht haben, bezeichnet man als stumme. Es ist das zuerst der rechte Temporallappen, dessen isolierter Ausfall keine Symptome macht — doppelseitiger Ausfall der beiden Temporallappen würde allerdings zentrale Taubheit bedingen; infolgedessen ist die Bezeichnung stumm für den rechten Temporallappen nicht ganz exakt. Es sind das ferner die beiden Stirnlappen mit Ausnahme des hintersten Teiles des linken, desjenigen Teiles, welcher Zentren für die Augenbewegungen und die Sprache enthält. Von dem ganzen rechten Stirnlappen und den vorderen zwei Dritteln des linken wissen wir zwar, daß ihre Zerstörung in einer Anzahl von Fällen psychische Störungen macht in Form der Witzelsucht oder der Moria, des heiteren Blödsinns, aber diese selben Symptome kommen auch bei den Erkrankungen anderer Hirnregionen vor, entscheidender Wert für die Lokaldiagnose ist also auf sie nicht zu legen.

Stumme Gehirnteile

Rechte Temporal-lappen

Stirnlappen

Soviel über die Lokalisation auf der Rinde.

Nun aber kann eine große Reihe der Symptome, die durch Rindenzerstörungen gemacht werden, auch bei Integrität der Rinde, nämlich durch die Unterbrechung der von der Rinde zu den tieferen Teilen des Gehirns und zum Rückenmark absteigenden Bahnen auch verursacht werden, ja das ist sogar im allgemeinen das

Herde unterhalb der Rinde

häufigere, und wir haben uns daher noch mit der Frage zu beschäftigen, wie wir bei den einzelnen Funktionen bestimmen können, ob und wo die Störung im Verlaufe der Bahnen liegt, und zwar mit besonderer Rücksicht darauf, inwieweit der topographischen Bestimmung die Möglichkeit eines operativen Eingriffs (Verletzungen, Tumoren) nachfolgen kann. Die spezielle Besprechung dieser Prozesse wird aber erst an späterer Stelle gegeben.

Bewe-
gungsstö-
rungen

Zuerst die Bewegungsstörungen: Hier ist hervorzuheben, daß die Jacksonschen Krämpfe immer auf eine Affektion der Rinde selbst oder wenigstens ganz nahe der Rinde hinweisen. Wenn in einem Krankheitsverlauf, der schließlich zu einer Hemiplegie geführt hat, Krämpfe von vornherein und dauernd gefehlt haben, so spricht das sehr dagegen, daß die Krankheit von der Rinde ihren Ursprung genommen hat.

Ein weiteres Kennzeichen der Rindenherde oder der dicht unter der Rinde gelegenen kann ihre Beschränkung auf einzelne Glieder sein, weil die Territorien der einzelnen Glieder hier am weitesten auseinanderliegen. Es ist sehr selten, daß schon in der inneren Kapsel ein Herd gerade die für ein Glied oder den Kopf bestimmten Fasern isoliert trifft, hier kommt es meist zu mehr weniger vollständiger Hemiplegie, oft auch mit Sensibilitätsstörung oder mit Hemianopsie, bei rechtsseitiger Lähmung dann meist mit sensorischer oder motorischer Aphasie. Wenn wir eine solche Kombination von Aufhebung mehrerer Funktionen haben, so ist es immer sehr wahrscheinlich, daß die Störung da sitzt, wo die Bahnen dieser Funktionen einander am nächsten liegen, das ist in der inneren Kapsel. Eingriffe in diese Gegend sind jedoch bereits sehr problematisch.

Innere
Kapsel

Hirn-
stamm

Alter-
nierende
Läh-
mungen

Wenn die Störung der motorischen Bahn nun noch weiter rückenmarkwärts liegt, so haben wir sehr gute Anhaltspunkte an den „alternierenden Lähmungen“. Diese kommen dadurch zustande, daß im Hirnstamm — vom Rückenmark aus gerechnet — die Pyramiden gekreuzt verlaufen, während die Hirnnerven auf der Seite ihrer Kerne zu ihren Muskeln gehen. Wir haben dann also z. B. bei rechtsseitigem Herd eine gekreuzte Pyramidenlähmung, d. h. Lähmung der linken Körperseite mit einer ungekreuzten Hirnnervenlähmung.

Da nun die Pyramidenbahn nacheinander in der Vierhügelgegend am Okulomotorius, im Pons am Fazialis und Abduzens, in der Medulla oblongata am Hypoglossus vorbeizieht, so haben wir in den entsprechenden alternierenden Lähmungen eine ausgezeichnete Bestimmung des Sitzes des Herdes (vgl. Fig. 4, S. 29). Auf weitere Feinheiten und Kombinationen mit den Symptomen anderer Hirnnerven brauche ich hier nicht einzugehen, da sie praktisch ohne Interesse sind. Praktisch kommt es wesentlich darauf an, sagen zu können, daß der Herd im Stamm sitzt. Damit ist der Herd, welcher Art er auch sei, für einen chirurgischen Eingriff ein Noli me tangere.

Eine Ausnahme in dieser Hinsicht bildet nur die alternierende Fazialislähmung bei Akustikustumor (vgl. unter Hirntumor).

Was die Sensibilität anlangt, so hat eine positive praktische Bedeutung die schon erwähnte Stereoagnosie als Hinweis auf erreichbare Prozesse im Parietallappen. Stärkere rein einseitige Sensibilitätsstörungen kommen häufig bei Affektionen des hinteren Teils der inneren Kapsel und bei Herden im Thalamus vor. Die Diagnose

Sensibilität
Thalamus-herde




Fig. 20. Krönleins Konstruktion.

Die Unterlagen für die Krönleinsche Konstruktion bilden die deutsche horizontale Grundlinie (GL), die obere Horizontale (O'H') und zwei auf der deutschen Horizontalen errichtete Senkrechte. Dies sind 1. die auf der Mitte des Jochbogens (Z) errichtete und bis zum Schnittpunkt mit der oberen Horizontalen (K) reichende Linie ZK und 2. die am hinteren Rande des Processus mastoideus (M) bis zur Mittellinie des Schädels (P) gezogene Linie MP. Die Verbindungslinie zwischen K und P gibt die Richtung der Rolandischen Furche an. Der unterste, etwas nach hinten abbiegende Teil des Sulcus centralis reicht aber nicht bis K herab, sein Ende wird vielmehr durch eine in der Depressio præauricularis errichtete Senkrechte und zwar auf dieser etwa 6 cm über der oberen Ohröffnung bestimmt (R).

Die Halbierungslinie des Winkels PKH gibt die Lage der Fossa Sylvii an, ihr hinteres ziemlich variables Ende wird etwa durch die Linea mastoidea berührt.

auf Thalamusherd ist sicher, wenn zugleich mit der Sensibilitätsstörung eine einseitige Chorea (auf der Seite der Sensibilitätsstörung besteht¹⁾). Dort ist der Herd gänzlich unerreichbar.

¹⁾ Eine Beziehung des Thalamus zur Mimik, „Amimie“ bei Thalamusherden ist nicht sicher erwiesen.

Daß bei Herden im Stamm alternierende Sensibilitätsstörungen vorkommen können, war bereits erwähnt (S. 47). Auch sie weisen also, wie die alternierenden Lähmungen auf diese Lokalisation.

Hemi-
anopsie

Daß die Hemianopsie sowohl ein Symptom der medialen Rinde in der Gegend der Calcarina, wie auch der durch den Okzipitallappen laufenden, dann zum Zwischenhirn und zum Tractus opticus verlaufenden Bahn sein kann, war bereits mehrfach erwähnt (S. 115). Wir können hier — soweit überhaupt — die genauere topische Diagnose nur aus der Kombination mit anderen Symptomen (Alexie, Aphasie, Anästhesie) stellen.

Kleinhirn

Endlich bleibt uns noch das Kleinhirn. Sein Hauptsymptom ist die Ataxie, die (mit der Adiadochokinesie) schon geschildert ist (S. 51). Ein weiteres Symptom ist ein subjektives, der Drehschwindel, der besonders häufig ein „systematischer“ ist, d. h. der Patient hat das Gefühl, wie wenn sich die Welt in einer bestimmten Richtung um ihn dreht, oder als wenn er in einer bestimmten Richtung gedreht würde (vgl. S. 62). Einen Schluß auf den Sitz des Herdes kann man aus der Richtung der Scheinbewegung nicht ziehen, die Ataxie ist auf der Seite des Herdes. Das Taumeln beim Gehen geschieht auch meist nach der Seite des Herdes (Lateropulsion).

Umstehend sei dann hier noch die topographische Bestimmung der Hauptfurchen am Schädel nach der meist üblichen Krönleinschen Methode wiedergegeben (nach W. Braun)¹⁾.

19. Der Hirntumor.

Von den speziellen Erkrankungen des Gehirns wenden wir uns zuerst zum Hirntumor, derjenigen Erkrankung, bei welcher die Bedeutung der Lokalisation am meisten hervortritt. Wir verstehen unter Tumor hier nicht nur die Tumoren im Sinne der pathologischen Anatomie, sondern auch die Tuberkel, die Cysticerken und Echinokokken, die Zysten und die Aneurysmen.

Lokal-
symptome
Allgemein-
symptome
Nachbar-
schafts-
symptome

Der Tumor selbst ist eine lokal begrenzte Erkrankung des Gehirns, aber in weitaus der Mehrzahl der Fälle führt er zu Folgen, welche, von seinem speziellen Sitz unabhängig, vielmehr von seiner Einwirkung auf das ganze Gehirn und dessen Hüllen abhängig sind. Wir unterscheiden daher die Lokalsymptome von den Allgemeinsymptomen. Die große Mehrzahl der allgemeinen Symptome sind die Folge des gesteigerten Hirndrucks, d. h. der erhöhten Spannung und der Vermehrung der Zerebrospinalflüssigkeit. Die sogenannten Nachbarschaftssymptome kommen dadurch zustande, daß der Tumor, ganz anders wie etwa eine Blutung, je länger er besteht, um so mehr, und im Einzelfall in sehr verschiedenem Grade, auf die Umgebung wirkt, sie durch den von ihm ausgehenden Druck schädigt. Der Druck, der sich vom Tumor aus fortpflanzt, wirkt besonders leicht da schädigend, wo er Gebilde trifft, welche

¹⁾ Chirurgische Therapie der Nervenkrankheiten in Handbuch der Neurologie, herausgegeben von Lewandowsky. Bd. I. S. 1253.

nicht mehr ausweichen können, welche vielmehr dem knöchernen Schädel schon unmittelbar anliegen. Es sind das in erster Linie die Gehirnnerven an der Basis, die daher in der Lehre von den Nachbarschaftssymptomen eine besonders große Rolle spielen.

Der Krankheitsverlauf bei den eigentlichen Hirntumoren, speziell den Gliomen und Sarkomen, ist ein bis zum Tode langsam fortschreitender. Dabei gehen die allgemeinen Symptome den lokalen sehr häufig voran. Das häufigste Anfangssymptom sind die Kopfschmerzen, verbunden nicht selten mit Beschwerden, die denen des Neurasthenikers nicht unähnlich sind. Auch allgemeine epileptische Krämpfe, die sich von denen der genuinen Epilepsie in nichts zu unterscheiden brauchen, können jahrelang den Lokalsymptomen vorangehen, immerhin ist das ein selteneres Frühsymptom. Von den gewöhnlichen ist der gesteigerte Hirndruck mit allen seinen Symptomen, besonders aber der sichtbare Ausdruck des Hirndrucks, die Stauungspapille, häufig ein sehr frühes Zeichen, besonders bei den expansiv wachsenden Tumoren der hinteren Schädelgrube. Absolute Gesetze sind aber hier nicht vorhanden. In einer kleineren Gruppe von Fällen treten von vornherein die Lokalsymptome in den Vordergrund, und es gibt natürlich alle Mischungen von lokalen und allgemeinen Symptomen. Nicht selten treten Reizsymptome, bei Tumoren der motorischen Region epileptische Anfälle von Jacksonschem Typus, schon im Beginne der Entwicklung auf, und keine andere Erkrankung des Gehirns führt so häufig zu solchen Reizerscheinungen wie die Hirngeschwulst. Ein ganz gleichmäßiges Fortschreiten des Krankheitsverlaufs ist nicht das gewöhnliche. Es können mehr oder weniger langandauernde Exazerbationen, besonders solche der Allgemeinsymptome auftreten, die zum Teil wieder zurückgehen, aber häufig eine dauernde Verschlimmerung zurücklassen. Nur selten treten völlige Intermissionen, die den Anschein der Genesung erwecken, ein. Von den Lokalsymptomen schreiten die Ausfallserscheinungen häufig kontinuierlich fort, während die Reizerscheinungen, z. B. die Jacksonschen Krämpfe, nur in Intervallen auftreten sich aber zuzeiten häufen können. Ganz akute Verschlimmerungen sind manchmal die Folge einer Blutung in den Tumor oder auch Folge einer plötzlichen Steigerung des Hirndrucks. Die Größe, die ein Tumor haben muß, um Erscheinungen zu machen, ist sehr verschieden, wesentlich von seinem Sitze abhängig. Kirschkerne große Tumoren der motorischen Region können Krampfanfälle machen, und nicht viel größere in der Umgebung des vierten Ventrikels können sogar schon den Tod bedingen. Andererseits aber gibt es apfelgroße Geschwülste besonders der weniger wichtigen Teile des Großhirns, und sogar, wenn auch selten, der hinteren Schädelgrube, welche sehr lange keine Symptome machen, wenigstens den Betroffenen in seiner Arbeitsfähigkeit und seinem Wohlbefinden keineswegs stören. In solchen Fällen können dann manchmal aber die Störungen ziemlich plötzlich beginnen und schnell fortschreiten. Abgesehen von dem Ort der Neubildung, hängt die Schnelligkeit des Verlaufs ab von der Schnelligkeit des Wachstums, die bei den weichen Sarkomen und bei gewissen Gliomen am größten

Verlauf

Hirndruck

Verlaufs-
typen

ist; andere Formen des Glioms wachsen langsamer. Langsam wachsen die Fibrome und manche Endotheliome (Psammome); sie können sogar ebenso wie die Angiome und Enchondrome im Wachstum stille stehen, so daß die Symptome dann stationär werden. Auch die Zysten können natürlich stationär sein, manchmal nur von Zeit zu Zeit Symptome machen. Tuberkel verlaufen im allgemeinen schnell, können aber durch Verkalkung zu klinischer Heilung kommen. Zur Heilung — selten spontan, häufiger durch innere Medikation — gelangen in erster Linie die Gummata. Endlich kann durch die Operation eine Unterbrechung des Verlaufs herbeigeführt werden. Die Dauer des Verlaufs bei den am gewöhnlichsten vorkommenden Gliomen, Sarkomen und Endotheliomen beträgt im Durchschnitt etwa sechs Monate bis zwei Jahre. Es sind aber auch schon Tumoren beobachtet worden, die jahrzehntelang bestanden hatten.

Parasiten

Die parasitären Erkrankungen, d. h. Echinokokken und Cysticerken können ganz in der gleichen Weise verlaufen, wie die echten Tumoren. Häufiger wohl als diese bleiben sie stationär. Cysticerken können, wie oben schon bemerkt, zur Verkalkung kommen und bilden dann, wenn sie nicht an besonders wichtiger Stelle sitzen, einen zufälligen Sektionsbefund, nachdem sie im Leben manchmal keine, manchmal auch vorübergehende Symptome gemacht haben.

Aneurysma

Auch das Aneurysma (vgl. bei syphiligen Erkrankungen) kann wie ein echter Tumor verlaufen und allmählich zum Tode führen. In vielen Fällen tritt derselbe durch eine Ruptur ein. In anderen Fällen ist Heilung durch Organisation des Aneurysmas beobachtet, manchmal allerdings erst dann, wenn das Aneurysma durch seine Ausdehnung zu dauernden Defekten des Gehirns geführt hatte.

Ausgang

In weitaus der Mehrzahl der Fälle ist der schließliche Ausgang der Gehirngeschwulst der Tod. Er erfolgt gewöhnlich im tiefen Koma, nachdem alle Stadien der Bewußtseinstörung bis hierhin durchlaufen worden sind. Die lebenswichtigen Zentren des verlängerten Marks versagen allmählich, wesentlich unter dem Einfluß des vermehrten Hirndrucks; die Atmung wird ungenügend, kann schließlich den Cheyne-Stokesschen Typus zeigen, das Vaguszentrum wird gelähmt, das Schlucken ist erschwert, teils durch die direkte Schädigung seiner bulbären Zentren, teils durch die Benommenheit, welche zum Verschlucken Veranlassung gibt. So kann sub finem Pneumonie entstehen, und auch die Erschöpfung infolge der enormen Schmerzen wie die Unmöglichkeit genügender Ernährung angesichts des Erbrechens und der Schluckstörung können den Tod beschleunigen.

In einer Minderzahl der Fälle tritt der Tod plötzlich ein, besonders häufig, aber nicht ausschließlich, bei Geschwülsten der hinteren Schädelgrube, die plötzlich das Atemzentrum durch Druck lähmen können. Dasselbe kann jedoch auch eine plötzliche Steigerung des allgemeinen Hirndrucks ohne lokale Affektion der hinteren Schädelgrube, z. B. bei Stirnhirntumoren, bewirken. In seltenen Fällen kann eine starke Blutung aus dem Tumor, besonders wenn sie in den Ventrikel durchbricht, ein schnelles Ende herbeiführen. Ein Solitär tuberkel führt häufig durch

Infektion der Hirnhäute zu einer tuberkulösen Meningitis und durch deren Vermittlung zum Tode.

Entsprechend der Einteilung der Tumor-Symptome in lokale und allgemeine kann man praktisch zwei Gruppen von Kranken unterscheiden, solche, bei welchen die Allgemeinsymptome vorherrschen oder allein vorhanden sind, und solche, in denen die Lokalsymptome entweder das Bild beherrschen oder doch wenigstens in ausgesprochenem Maße vorhanden sind. Diagnose

Die Allgemeinsymptome des Tumors beruhen fast alle auf dem gesteigerten Hirndruck; es handelt sich also in einer großen Gruppe von Fällen darum, und überhaupt muß in jedem Falle bei Tumorverdacht die Aufmerksamkeit sich darauf richten, den Hirndruck festzustellen. Von seinen Folgezuständen ist der Häufigste der Kopfschmerz. Der Tumorkopfschmerz in seinen geringeren Graden hat nichts Charakteristisches, und auch in seinen höheren Graden ist er durch seine Art niemals mit Sicherheit von anders bedingtem Kopfschmerz, z. B. bei Migräne, bei Urämie zu unterscheiden. Daher ist die erste Regel, jeden Menschen, der sich mit Kopfschmerzen vorstellt (wie eigentlich zwar überhaupt jeden Nervenkranken) zu augenspiegeln. Bei der Häufigkeit der Kopfschmerzen und der verhältnismäßigen Seltenheit der Tumoren genügt ja meist ein Blick auf die Papille, um sich von dem Fehlen einer Neuritis optica zu überzeugen, und diese kleine Mühe belohnt sich, da das Fehlen einer Neuritis optica einen Tumor, wenn auch nicht ausschließt, so doch immerhin unwahrscheinlich macht. Die Fälle, in denen der Kopfschmerz wirklich das einzige Tumorsymptom ist und sowohl Stauungspapille wie Lokalsymptome fehlen, sind eben zunächst nicht zu diagnostizieren, aber niemals darf das Fehlen einer Stauungspapille bei sonst tumorverdächtigen Symptomen die Diagnose Tumor umstoßen. Feststellung des Hirndrucks
Kopfschmerz
Ophthalmoskopie

Der Ausdruck der allgemeinen Störung in den Funktionen der Hirnrinde, welche durch den Hirndruck bedingt wird, ist die Benommenheit, der für den Allgemeinzustand des Tumorkranken charakteristische psychische Zustand. Von einem leichten Gefühl der Schwerbesinnlichkeit und Dumpfheit, das dem Kranken zunächst noch mehr subjektiv zum Bewußtsein kommt, als daß es, besonders bei einmaliger Untersuchung, besonders auffiele, von diesen leichtesten Störungen also bis zum tiefsten Sopor, in welchem alle bewußten Reaktionen fehlen, Stuhl und Urin unwillkürlich abgeht, finden sich alle Grade. Sehr gewöhnlich ist schon im Beginn der Erkrankung eine große Schlafsucht.

Nicht ganz selten sind mehr oder weniger plötzliche Anfälle von Bewußtlosigkeit, die durch Schwindelerscheinungen eingeleitet werden können.

Neben dem Kopfschmerz und der Benommenheit sind klassische Allgemeinsymptome des Hirntumors in erster Linie noch die Pulsverlangsamung, Druckpuls und das Erbrechen. Sie beruhen auf Reizung des Herzvaguszentrums, das den Herzschlag verlangsamt, und des Brechzentrums (vgl. auch S. 58). Puls
Erbrechen

Wenn nun in einem Falle, gleichgültig, ob der Kopfschmerz oder

sonst ein Symptom uns zunächst auf die Neuritis optica geleitet hat, diese festgestellt ist, so folgt daraus mit größter Wahrscheinlichkeit ein gesteigerter Hirndruck; denn die ausgebildete Stauungspapille, d. h. die Hervorwölbung des Sehnervenkopfes kommt sicherlich nur in extrem seltenen Fällen anders als durch gesteigerten Hirndruck bedingt, vor. Ein bloßes Verwaschensein und eine Stauung in den Retinalvenen aber kommt bei multipler Sklerose, bei Enzephalitis doch häufiger vor, und schließlich muß man daran denken, daß auch die einfache Chlorose, die multiple Neuritis und die Urämie Bilder erzeugen können, welche von den bei Tumor vorkommenden nicht zu unterscheiden sind. Sollte die Entscheidung in solchen Fällen aus Gründen, die in den Symptomen dieser anderen Erkrankungen selbst liegen, nicht gegeben werden können, und dabei doch dringlich sein, so ist die Lumbalpunktion zu machen (unter den Kautelen, die früher (S. 53) erwähnt wurden). Es wird das immerhin nur in einer Minderzahl von Fällen dringend notwendig, wenn auch in recht vielen erwünscht sein.

Neuritis
und
Papillitis

Lumbal-
punktion

Eine Neuritis optica, bei der die Lumbalpunktion einen erhöhten Hirndruck nicht ergibt, bleibt auf eine der anderen genannten Ursachen der Neuritis optica verdächtig. Wenigstens ist es wohl sicher, daß bei Chlorose, bei multipler Sklerose, bei multipler Neuritis Hirndruck nicht vorkommt; bei Urämie scheint er zuweilen, aber nur vorübergehend vorhanden zu sein.

Gruppe mit
geringen
Herdsym-
ptomen

Diejenigen Fälle, in denen nun die häufigsten und auch die praktisch bedeutungsvollsten Schwierigkeiten entstehen, sind die, in welcher Bestehen eines Hirndrucks zweifellos feststeht, in denen unter Umständen alle die im vorigen Abschnitt genannten Folgen gesteigerten Hirndrucks vorhanden sind, in denen aber keine oder nur sehr geringe Lokalsymptome bestehen.

Zunächst handelt es sich natürlich darum, auch die kleinsten Zeichen irgend einer lokalen Affektion des Gehirns herauszufinden, weil diese ja auch als Nachbarschaftssymptome so wertvolle Hinweise auf den Sitz des Tumors geben können. Am wichtigsten bleiben natürlich hier die Ausfallsymptome von seiten der motorischen Region oder der von ihr ausgehenden Bahnen, als welche wir hier nur kurz aufzählen den Babinskischen Zehenreflex, den gekreuzten Adduktorenreflex, endlich einseitiges Fehlen des Bauchdeckenreflexes. Über den Wert dieser Symptome für die Diagnostik ist ja in einem früheren Kapitel gehandelt worden. Häufig ist nur ein einziges von ihnen vorhanden, aber jedes einzige ist beweisend für eine Affektion der motorischen Bahn und kann also geeignet sein, den Verdacht z. B. auf einen Stirnhirntumor zu lenken, der eben beginnt, die Gegend der Zentralwindungen zu affizieren, oder auf einen basalen Tumor, der auf den Hirnschenkel drückt usw. So wird man doch in vielen Fällen wenigstens zunächst einmal die Diagnose der Seite des Tumors machen können. Selbstverständlich wird man auch nach dem gelegentlichen Vorkommen Jacksonscher Krämpfe zu forschen haben und den Kranken in wichtigen und dringenden Fällen zur Beobachtung dieser Krampfanfälle unter die

dauernde Beobachtung einer geschulten Pflegeperson zu stellen haben. Ebenso wichtig wie die Symptome, welche auf eine Erkrankung der motorischen Bahn hinweisen, sind diejenigen, die eine Affektion eines Hirnnerven anzeigen, besonders dann, wenn sie einseitig sind. In Betracht kommen hier besonders Riechstörungen, Pupillendifferenzen, leichte Grade von Ptosis und diejenige leichte Form der Trigeminaffektion, die sich nur in der Areflexie der Kornea kundgibt (S. 47). Gerade die Symptome von seiten der Hirnnerven sind ja schon geeignet, den Verdacht auf die Lokalisation in einer von den drei Schädelgruben zu begründen (vgl. Fig. 6, S. 33).

Diese eben erwähnten Fälle mit nur sehr wenig ausgesprochenen Herdsymptomen bilden ja nur eine praktisch besonders schwierige Gruppe. Denn je ausgesprochener und massiver die Herdsymptome sind, um so wahrscheinlicher ist von vornherein die Diagnose des Hirntumors. Aber in jedem Falle muß trotzdem die Frage aufgeworfen werden, ob wir es wirklich mit einem Tumor oder mit einem anderen Leiden, das unter Steigerung des Hirndrucks einhergeht, zu tun haben.

Für die Entscheidung dieser Frage kommen in erster Linie differentialdiagnostisch die Meningitis serosa, bzw. der erworbene Hydrozephalus (vgl. den Schluß dieses Kapitels) in Betracht. Nur ganz gelegentlich kann, wie schon bemerkt, auch die Urämie einmal eine ins Gewicht fallende Drucksteigerung machen. Zur Entscheidung also zwischen Tumor und Meningitis serosa, bzw. Hydrozephalus führt in einer Reihe von Fällen die mikroskopische Untersuchung des Lumbalpunktats. Es spricht hier der Befund einer Lymphozytose mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gegen das Bestehen eines Tumors, bei welchem sie nur in extrem seltenen Fällen gefunden wird, vielmehr für seröse Meningitis. Nur bei syphilitischen Tumoren ist gleichfalls die Lymphozytose gewöhnlich. Nicht denselben Wert hat das Fehlen einer Lymphozytose. Denn es kommen auch Fälle von Hydrozephalus mit Herderscheinungen ohne Lymphozytose vor, wenngleich sie doch wohl in der Mehrzahl der Fälle gefunden wird.

Differential-
diagnose

Sonst ist noch anzuführen, daß beim erworbenen Hydrozephalus die Erscheinungen des gesteigerten Hirndrucks über lange Zeiträume hinaus sich in remittierender Weise wiederholen können; aus der Art des Verlaufs wird man aber immerhin nur in seltenen Fällen Schlüsse von einiger Sicherheit ziehen können.

Kann man sich aus den Lokal- und Allgemeinsymptomen und auch aus der Lumbalpunktion ein Bild von genügender Klarheit nicht machen, dann ist die Neißer-Pollacksche Gehirnpunktion (vgl. S. 57) mit dem Versuch der Aspiration von Tumorgewebe zur mikroskopischen Feststellung an den in Betracht kommenden Stellen anzuwenden, deren positiver Ausfall natürlich beweisend ist, während der negative Zweifel übrigläßt, da die Punktion ja nicht genau die Stelle des Tumors getroffen zu haben braucht.

Hirnpunktion

Ein positiver Ausfall der Neißerschen Punktion enthebt uns ja mit einem Schlage gleichzeitig mit der Sicherheit der Diagnose Tumor auch der lokaldiagnostischen Schwierigkeit. In den meisten Fällen aber ist sie, da sie wohl nur im Krankenhaus ausgeführt werden sollte,

zunächst überhaupt nicht anwendbar, ihr negativer Ausfall ist für viele Fälle nicht beweisend, und jedenfalls sollte sie in allen Fällen doch nur das letzte heroische Mittel der Lokaldiagnose sein. Trotzdem nicht zu leugnen ist, daß die Einführung der Hirnpunktion die Lokaldiagnostik etwas verändert hat, ist doch nichts falscher, als zu glauben, daß man mit ihr auskommen könnte, wenn man nicht vorher die anderen Mittel der Lokaldiagnose erschöpft hätte. Vielmehr steht im Mittelpunkt der diagnostischen Aufgabe nach wie vor, nachdem die Diagnose „Tumor“ überhaupt einmal mit dem nötigen Grade von Wahrscheinlichkeit gestellt ist, der Versuch, den Tumor nach seinen klinischen Symptomen genau zu lokalisieren.

Tumor
ohne
Hirndruck

Ehe wir aber dazu übergehen, muß noch kurz die Differentialdiagnose derjenigen Tumoren besprochen werden, die ohne Drucksteigerung und ohne Stauungspapille einhergehen. Zunächst muß man wissen, daß bei gewissen Lokalisationen der Hirntumor überhaupt nur selten Hirndruck macht. Es gilt das in erster Linie für die Tumoren des Pons. Gelegentlich können aber Tumoren jeder Lokalisation auch solche des Kleinhirns, welche ja gewöhnlich schon sehr früh Stauungspapille machen, ohne solche bis zum Exitus verlaufen.

Häufig machen die Fälle von Hirntumor, die ohne Hirndruck, besonders auch ohne Stauungspapille, aber mit Lokalsymptomen verlaufen, doch durch ihren Bewußtseinszustand und durch die Heftigkeit der Kopfschmerzen den Verdacht auf Tumor rege. Aber man wird überhaupt bei jeder Gehirnerkrankung, die sich bei jüngeren Individuen anscheinend von einem Punkt aus langsam progressiv entwickelt, die Diagnose Tumor in Erwägung ziehen. In weitaus der Mehrzahl der Fälle entwickeln sich die Symptome des Tumors langsamer als alle anderen Erkrankungen. Die wichtigste Differentialdiagnose des Hirntumors bleibt natürlich immer die gegenüber der Lues. Hier werden die Anamnese und die Auffindung syphilitischer Zeichen am Körper oder spezifisch syphilitischer Nervensymptome, insbesondere der reflektorischen Pupillenstarre, maßgebend sein (vgl. das Kapitel syphilogene Nervenkrankheiten).

Lokal-
diagnose

Wenn wir nunmehr also unabhängig von der Stellung der allgemeinen Diagnose auf Tumor überhaupt zur Besprechung der Lokaldiagnose des Tumors übergehen, so haben wir zunächst eine kleinere Gruppe von lokalen Symptomen, die durch die Untersuchung des Schädels festzustellen sind. Man wird nie versäumen dürfen, den Schädel überall vorsichtig auf lokale Klopff- und Druckempfindlichkeit zu prüfen. Die Feststellung einer solchen ist kein irgendwie sicheres Zeichen, aber in einer Reihe von Fällen deckt sie sich doch ungefähr mit dem Sitze des Tumors. In vielen Fällen besteht auch an der Stelle der objektiven Empfindlichkeit der subjektiv empfundene Kopfschmerz, der aber auch ein unsicheres Symptom ist. Die objektive lokale Empfindlichkeit des Schädels kann durch die schmerzhaftes Verziehen des Gesichts bei Beklopfen, besonders bei benommenen Kranken, einen guten Anhalt geben. Mehr als einen Anhalt gibt die lokale Klopff- und Druckempfindlichkeit des Schädels nur dann, wenn sie dem auf anderem

Wege gefundenen vermuteten Ort des Tumors entspricht; dann kann sie die Diagnose wesentlich stützen.

Für die Hauptgruppe der Lokalsymptome, die durch die Schädigung der nervösen Substanz hervorgebracht werden, muß im wesentlichen auf das vorige Kapitel Lokalisation im Gehirn verwiesen werden.

Zu bemerken ist, daß ein jedes Lokalsymptom um so mehr Wert hat, je isolierter, je konstanter es ist, und je früher im Verlaufe der Erkrankung es auftritt. Ein Lokalsymptom, das im späteren Verlauf der Erkrankung womöglich schon bei hochgradiger Benommenheit auftritt, kann trügerisch sein. Sieht man daher die Kranken erst im späteren Verlauf des Leidens, so ist es immer von großer, manchmal entscheidender Wichtigkeit, sich, wenn möglich, über die Entwicklung und die Aufeinanderfolge der im Augenblick vorhandenen Symptome zu unterrichten. Es ist ja ersichtlich für die Beurteilung des primären Sitzes einer Geschwulst außerordentlich wichtig, ob die Anamnese dahin lautet, etwa, daß der Kranke seit einem halben Jahre an ab und zu sich wiederholenden Krämpfen der linken Seite leidet, und daß neuerdings starke Kopfschmerzen und Schlafsucht aufgetreten sind, oder ob wir erfahren, daß seit einem halben Jahre sich die allgemeinen Zeichen einer Hirnkrankheit bemerkbar gemacht haben, und daß nun in der letzten Woche ein- oder zweimal ein halbseitiger Krampf aufgetreten ist. Im ersten Falle werden wir von vornherein geneigt sein, den Tumor in der motorischen Region selbst zu suchen, im zweiten die Krämpfe nur als ein Nachbarschaftssymptom vielleicht von einem sich primär im Stirn- oder Schläfenlappen entwickelnden Tumor anzusehen. Die in jedem Falle anzustellenden diagnostischen Erwägungen dieser Art sind hier natürlich unmöglich im einzelnen aufzuführen.

Nur über einige Tumorformen sei hier noch etwas bemerkt: Das ist zuerst der Hypophysentumor, der sich außer der schon früher (S. 52) erwähnten bitemporalen Hemianopsie, außer den Nachbarschaftssymptomen auszeichnen kann durch die Entwicklung einer Akromegalie (vgl. später) oder einer Dystrophia adiposogenitalis, d. i. einer mächtigen Fettentwicklung am ganzen Körper mit Atrophie der Genitalien, und der endlich bei Frauen zu einer diagnostisch nicht ganz unwichtigen vorzeitigen Menopause führen kann.

Hypo-
physen-
tumor

Der Hypophysistumor ist die einzige Tumorlokalisation, bei welcher die Röntgenuntersuchung durch den Nachweis der Ausbuchtung der Sella turcica die Diagnose fördert.

Da ist zweitens der in den letzten Jahren viel erwähnte Akustikus- tumor, auch Tumor des Kleinhirnbrückenwinkels genannt. Es handelt sich meist um histologische gutartige Geschwülste, welche sich am Austritt des Akustikus aus der Brücke entwickeln und den Hirnstamm komprimieren. Seine Symptome sind die Entwicklung einseitiger Taubheit (dabei meist nur geringgradige periphere Fazialislähmung), zerebellare Symptome und Pyramidensymptome, letztere gekreuzt. Ein Frühsymptom ist oft die Areflexie der Kornea (Druck des Tumors auf den Trigeminus S. 127).

Akustikus-
tumor

Sowohl der Hypophysistumor wie der Akustikustumor sind Beispiele von basalen Tumoren, die aber auch an anderen Stellen der Basis, z. B. am Okulomotorius mit dem jeweiligen Sitz entsprechenden Symptomen beobachtet werden.

Ventrikel-
tumoren

Da sind endlich die Tumoren der Ventrikel, von denen hier nur der Cysticerkus des vierten Ventrikels erwähnt sei. Er verläuft wegen der Nachbarschaft des Kleinhirns meist unter zerebellaren Symptomen, die sich mit denen der aus dem Boden des vierten Ventrikels entspringenden Hirnnerven (z. B. Abduzenslähmung) mischen. Gerade der Cysticerkus des vierten Ventrikels verläuft häufig mit sehr großen Remissionen.

Operative
Behand-
lung

Wenngleich es nun in einer großen Anzahl von Fällen gelingt, Hirntumoren richtig zu lokalisieren, ja, wenn man diese Lokalisation — soweit sie überhaupt möglich ist — durchaus nicht als die schwierigste neurologische Aufgabe anzusehen braucht, so ist trotzdem die Heilung des Tumors durch die Operation damit nun keineswegs auch nur wahrscheinlich. Vielmehr ist ein voller Erfolg der operativen Entfernung in den überhaupt zur Operation gebrachten Fällen nach der Statistik nur in 7 % der Fälle zu erwarten, eine Heilung mit Defekt — wenn also der Tumor entfernt werden konnte, die Störung des Gehirns aber irreparabel war — in höchstens weiteren 7 %. Da nun aber zur Operation nur die erstens überhaupt lokalisierbaren und zweitens an erreichbarer Stelle lokalisierten Tumoren gebracht werden, deren Zahl kaum mehr als 40 % der Gesamtzahl der Tumoren beträgt, so werden wir die obengenannten Zahlen noch einmal halbieren müssen.

Dabei ist allerdings zu bemerken, daß die Zahl der geheilten Fälle sich wieder hebt, wenn man auch die einfachen Zysten, die — insbesondere am Kleinhirn — völlig wie Tumoren verlaufen können, einrechnet. Deren Prognose ist eine sehr günstige.

Die Prognose der eigentlichen Tumoren ist aus verschiedenen Gründen so ungünstig. Die Hauptform der Gehirngeschwülste, die Gliome, sind fast immer diffus, und demnach gar nicht total zu exstirpieren. Sie lassen sich selbst am freigelegten Gehirn oft kaum von der gesunden Hirnsubstanz unterscheiden, und wenn noch so viel Gehirn weggenommen wird, entdeckt die spätere Untersuchung, daß auch nicht annähernd die Grenzen des Tumorgewebes erreicht sind.

Chancen bieten überhaupt nur die ausschälbaren Geschwülste (Endotheliome, Fibrome), die sich aber leider in der großen Minderzahl befinden. Auch hier kann es, wie z. B. bei Sarkomen, dann noch zu Rezidiven kommen, und eine Anzahl von ihnen ist — ein dritter Grund — nicht erreichbar, z. B. die meisten Geschwülste der inneren Kapsel, die des Thalamus, die meisten Basisgeschwülste.

Freilich hat sich auch die Meinung von der operativen Zugänglichkeit mancher Gehirnteile geändert; die hintere Schädelgrube, die früher ein *Noli me tangere* darstellte, bildet heute insbesondere der Kleinhirngeschwülste wegen einen durch die Chirurgen vielfach und zum Teil mit Erfolg in Angriff genommenen Ort. Ja, selbst Geschwülste der Hypophysis sind bereits von der Nase her angegriffen worden.

Operativ zugänglich ist ferner ohne weiteres die Konvexität des Großhirns, auch Geschwülste der Markstrahlung sind in einigen Fällen entfernt worden. Der Vorschlag, einen Cysticercus des vierten Ventrikels operativ anzugreifen, ist noch nicht ausgeführt worden.

Die letzte Ursache der ungünstigen Prognose ist endlich die Gefahr der Operation selbst, die unter allen Umständen einen gewaltigen Eingriff darstellt, besonders wenn es sich um einen Tumor der hinteren Schädelgrube handelt. Die besten Operateure berichten hier von Fällen, die zugrunde gingen, ehe man den Tumor überhaupt zu Gesicht bekam. Ein ganz erheblicher Teil stirbt Stunden oder Tage nach der Operation an deren Folgen.

Trotzdem muß man jeden diagnostizierten und lokalisierten Tumor zur Operation bringen, und zwar möglichst früh. Denn andere Methoden der Tumorbehandlung haben wir nicht. Der Erfolg der Operation kann ein vollständiger sein dadurch, daß nach der Exstirpation eines expansiv wachsenden Tumors die durch den Druck geschädigte Hirnsubstanz sich völlig erholt, und auch die Allgemeinsymptome ganz zurückgehen. Es können aber auch dauernde Defekte zurückbleiben, wenn der Tumor die Gehirnssubstanz in irreparabler Weise geschädigt hatte, oder wenn etwa die Narbe doch eine dauernde Schädigung der Gehirnssubstanz herbeiführt. Insbesondere geht auch eine totale neuritische Sehnervenatrophie nie wieder zurück.

Kontraindikationen der Operation geben metastatische Geschwülste, wie sie bei jeder Tumorlokalisation im Körper vorkommen, und auch der Verdacht auf ein Aneurysma. Tuberkel dagegen sollen operativ angegangen werden. Kontra-indikation

Ist der Tumor nicht lokalisierbar oder nicht exstirpierbar, so kommt in einer Reihe von Fällen die palliative (dekompressive) Trepanation, die Schaffung einer Knochenlücke, in Frage. Es ist kein Zweifel, daß sie in einer Reihe von Fällen die Allgemeinsymptome ganz erheblich bessert, Schwerkranke für Monate wieder lebens- und arbeitsfähig machen kann, und daß sie vor allem der Entwicklung und Verschlimmerung der Stauungspapille vorbeugen kann. Versprechen kann man aber solche Erfolge nicht, da die Operation in manchen Fällen auch gar nichts nützt. Dekompressive Trepanation

Wird die palliative Trepanation verweigert, so können wiederholte Lumbalpunktionen erheblichen Nutzen und Linderung bringen, in den Fällen besonders, in denen sich der Hirndruck nur langsam wiederherstellt, und es daher genügt, die Punktion alle paar Wochen einmal auszuführen.

Eine der besten Chancen des Hirntumors sind noch immer die diagnostischen Irrtümer. In erster Linie handelt es sich ja hier, wie immer in der Neurologie, um die Lues, und es ist ganz berechtigt, in jedem Fall von Hirntumor, selbst wenn wir sichere Zeichen von Lues nicht haben, eine antisypilitische Kur für einige Wochen einzuleiten. Das isolierte Gumma kann die gleichen Symptome machen, wie der echte Tumor. Freilich soll man die Kur nicht zu lange ausdehnen und muß auch wissen, daß manchmal echte Geschwülste vorübergehend günstig auf eine spezifische Kur reagieren. Von vornherein wird man auf eine Diagnostische Irrtümer

spezifische Kur verzichten, wenn etwa die Unterlassung der Operation die Gefahr einer Erblindung durch eine starke Stauungspapille involvieren würde.

Dann sind in den letzten Jahren immer mehr Fälle publiziert worden, wo Erkrankungen, die unter den allgemeinen und lokalen Erscheinungen eines Hirntumors verliefen, entweder wieder völlig gesund wurden oder ad exitum kamen, und in letzterem Falle die Autopsie keinen Tumor aufdeckte.

Es handelte sich da einmal um chronische zirkumskripte Meningitiden, die auch zu Zysten führen können. Wichtiger sind aber die Fälle, wo sich trotz der Lokalsymptome ein lokaler Befund überhaupt nicht erheben ließ. In einer Anzahl von ihnen handelt es sich um einen allgemeinen Hydrozephalus, bzw. um eine allgemeine seröse Meningitis, in anderen Fällen fehlte überhaupt jeder Befund, so daß man schon von einem Pseudotumor cerebri gesprochen hat.

Pseudo-
tumor

Gerade diese Fälle von seröser Meningitis, Hydrozephalus und Pseudotumor sind aber durch die dekompressive Trepanation oft sehr günstig zu beeinflussen. Die Operation ist geradezu indiziert, wenn durch Zunahme der Neuritis Erblindung droht. Ich kenne solche Fälle, die nicht operiert wurden, und die jetzt gesund aber blind sind. Gerade wenn die Differentialdiagnose zwischen Tumor und Meningitis serosa nicht sicher zu machen ist, soll man um so mehr operieren.

20. Hirnabszeß.

Die Diagnose eines Hirnabszesses ist eine schwierige und verantwortungsvolle Sache. Führt sie doch zu sofortiger Operation als einziger Möglichkeit der Heilung. Man kann bei keiner anderen Erkrankung so wenig abwarten, als beim Hirnabszeß. Ich erlebte einen Fall, wo Verzögerung der Einwilligung der Eltern zur Operation um 24 Stunden den Tod eines Knaben zur Folge hatte.

Für den Praktiker kommt es wesentlich darauf an, daß er frühzeitig den Verdacht auf Hirnabszeß faßt. Möge er dann mit Hilfe des Neurologen diesen Verdacht weiter verfolgen. Auch der Neurologe kann aber nicht immer mit unbedingter Sicherheit die Diagnose eines Hirnabszesses stellen oder ausschließen. Er kann häufig nur die Indikation zum operativen Eingriff geben. Denn die neben einem Hirnabszeß etwa noch in Frage kommenden zerebralen Erkrankungen bedürfen zum Teil gleichfalls der operativen Behandlung.

Wichtig-
keit der
Indikation
zur Opera-
tion
Symptome

In bezug auf Symptome des Abszesses, ist vor allem ein Irrtum zu korrigieren, der uns meist entgegentritt, daß nämlich der Hirnabszeß Fieber mache. Der Hirnabszeß kann Fieber machen, verläuft aber in der Mehrzahl der Fälle ohne Fieber bis zu dem Augenblick, wo der letale Durchbruch in die Ventrikel oder die Meningen eintritt. Dann ist das Fieber also Zeichen der Meningitis.

Tempe-
ratur

Ebenso verläuft der Hirnabszeß in der Mehrzahl der Fälle ohne Stauungspapille und ohne wesentliche Drucksteigerung der Lumbalflüssigkeit. Augen-
hinter-
grund

Die positiven Symptome des Hirnabszesses sind einerseits allgemeine, das sind die Benommenheit, die Kopfschmerzen, und in einer Minderzahl der Fälle Fieber, Stauungspapille und Steigerung des Lumbal-drucks. Zweitens macht der Hirnabszeß die gleichen Lokalsymptome wie sie eben seinem jeweiligen Sitze entsprechen, wobei von vornherein zu bemerken ist, daß Reizsymptome, besonders Jacksonsche Krämpfe, bei Abszeß häufig neben den Ausfallssymptomen vorkommen. Allgemein-
symptome

Lokal-
symptome

Es können sich aber Abszesse ohne jedes Symptom bis zu nicht unbeträchtlicher Größe entwickeln, und dann ziemlich plötzlich manifest werden. Ja ein Latenzstadium von mehreren Wochen, in dem der Kranke gar keine Beschwerden, höchstens etwas Kopfschmerzen hat, ist die Regel, und es sind Fälle berichtet, in denen ein solcher latenter Abszeß mehrere Jahre lang getragen wurde. In diesem Latenzstadium wird der Arzt gar nicht gerufen werden, sondern erst dann wenn der Abszeß manifest wird, aber von diesem Augenblick bis zum Exitus liegen oft nur wenige Stunden. So sind Fälle, die nach einer Ohraufmeißelung in dauernder ärztlicher Beobachtung in Ohrenkliniken standen, wiederholt plötzlich ad exitum gekommen, und die Autopsie ergab als Ursache einen Kleinhirnabszeß, der in die Meningen durchgebrochen war. Solche Fälle werden sich natürlich ärztlichem Eingriff immer entziehen. Aber in den Fällen, die aus dem Stadium der Latenz allmählich in das manifeste Stadium hinübergehen, muß man allen Spürsinn anspannen, um während dieser Zeit, wo noch ein Eingreifen möglich ist, die Erkrankung zu erkennen. Symptom-
lose Ent-
wicklung

Die tödliche Gefahr des Hirnabszesses ist der Durchbruch in die Meningen. Mit dem Augenblick, wo wir eine Meningitis haben, kommen alle Rettungsversuche zu spät. Gefahr der
Meningitis

Der Verdacht auf Hirnabszeß ist in zwei Fällen ein besonders naheliegender, wenn nämlich nach einem Schädeltrauma oder nach einer Otitis cerebrale Symptome auftreten. Ätiologie

Ganz einfach sind natürlich diejenigen traumatischen Fälle, in welchen im Zusammenhang mit einer Schädelverletzung und in unmittelbarem zeitlichen Anschluß daran sich die Zeichen eines Hirnabszesses ausbilden, die traumatischen Frühabszesse. Trauma-
tischer
Abszeß

Nicht ganz so leicht, aber auch noch einfach sind die traumatischen Spätabszesse, wo entweder, ohne daß der knöcherne Schädel selbst überhaupt verletzt wurde, oder nachdem eine völlige Heilung, sei es prima, sei es secunda intentione eingetreten ist, der Abszeß manifest wird. Ist ein Schädeltrauma anamnestisch erhoben, oder ist eine Haut- oder Knochennarbe am Schädel feststellbar, und treten nun, am häufigsten einige Wochen oder Monate nach dem Trauma, allgemeine oder lokale Hirnsymptome auf, so wird man immer sofort an einen Hirnabszeß zu denken haben.

Dabei ist es wichtig, daß der Abszeß fast immer an der Stelle des Traumas sich befindet; wenn wir also eine Narbe der rechten

Schädelseite haben, und es wird von Krämpfen berichtet, die auf der rechten Körperseite beginnen, also in der linken Gehirnhälfte entstehen, so werden wir die Narbe nicht mit den Symptomen zusammenbringen.

Otitische
Abszesse

Ferner werden wir bei bestehender Otitis, insbesondere bei der chronischen Form, sobald Hirnsymptome auftreten, immer sogleich mit der Möglichkeit eines Abszesses rechnen müssen. Es ist dabei nicht nur die chronische Otitis, sondern in einer ganz beträchtlichen Anzahl von Fällen auch die akute die Ursache eines Hirnabszesses, wenngleich sich ein Abszeß niemals eher als 3 Wochen nach dem Beginn einer Otitis entwickelt.

Für die Diagnose eines otitischen Hirnabszesses ist es wichtig, daß er sich (mit verschwindenden Ausnahmen) immer auf der Seite der Otitis und dort entweder im Schläfenlappen oder im Kleinhirn entwickelt, weil das mittlere und innere Ohr diesen beiden Hirnteilen besonders naheliegt, Eiterungen (von der Paukenhöhle und dem Labyrinth) also fast immer zunächst dorthin fortgeleitet werden.

Schläfen-
lappen-
abszeß

Die Diagnose des linksseitigen Schläfenlappenabszesses ist im allgemeinen nicht sehr schwer, weil im linken Schläfenlappen das Zentrum der sensorischen Aphasie ist (vgl. S. 117). Nur muß man schon auf ganz leichte Symptome, insbesondere auf leichte Paraphasien achten und in diesen Fällen systematisch auch das Sprachverständnis, das Lesen und Schreiben untersuchen.

Da der rechte Schläfenlappen aber zu den stummen Gehirnteilen gehört, ist seine Erkrankung sehr viel schwieriger zu erkennen und zwar an der Beteiligung der an ihn angrenzenden Bahnen, Gehirnteilen und Nerven. So kommt es durch indirekte Schädigung der Sehstrahlung manchmal zu Hemianopsie, manchmal zu leichten gekreuzten Pyramidensymptomen, die dann eine große Bedeutung haben. Besonders wichtig sind auch leichte Paresen des in der Nähe des Temporalapparates durch die mittlere Schädelgrube verlaufenden Okulomotorius, insbesondere Pupillenerweiterung und Ptosis. Ist irgend eines der erwähnten Symptome vorhanden, so ist die Gefahr eines Hirnabszesses mindestens als sehr dringend zu bezeichnen und die Indikation zum Eingreifen fast immer gegeben.

Bei linksseitigem Schläfenlappenabszeß können diese indirekten Symptome natürlich zu den direkten hinzukommen und auch dort sehr wertvoll sein.

Kleinhirn-
abszeß

Die Kleinhirnabszesse verursachen zerebellare Ataxie. Sitzen sie in den Seitenteilen des Kleinhirns, so können sie aber fast ganz ohne Symptome verlaufen. Einerseits gilt es auch hier, ganz geringe Zeichen aufzufassen, andererseits ist es manchmal beinahe unmöglich, die Differentialdiagnose zwischen einer Labyrintheiterung und einem Kleinhirnabszeß zu machen.

Unter-
scheidung
von der
Meningitis

Sonst handelt es sich dann noch häufig um die Differentialdiagnose: Abszeß-Meningitis. Die allgemeinen sicheren Symptome der Meningitis sind in einem anderen Kapitel dargestellt. Ist die Diagnose zweifelhaft, so ist zur Feststellung einer Meningitis, sei es, daß eine solche durch Durchbruch des Abszesses oder durch die Otitis direkt ver-

ursacht ist, in jedem Fall ein wichtiges Hilfsmittel die Lumbalpunktion, und zwar bietet die Druckmessung in dem Fall eine annähernd sichere Entscheidung, wenn sie eine klare Flüssigkeit ohne erhöhten Druck ergibt. Es ist das ein Verhalten, das im Zweifelsfall jedenfalls nicht bei Meningitis vorkommt. Andererseits kommt eine Trübung der Lumbalflüssigkeit, die dann auch immer erhöhten Druck zeigt, nur bei eitriger Meningitis vor. Weniger sichere Schlüsse gestattet die Lumbalpunktion gegenüber der serösen Meningitis. Bei ihr steht die Lumbalflüssigkeit unter erhöhtem Druck, erscheint makroskopisch völlig klar, zeigt aber bei Untersuchung des Sediments reichliche Lymphozyten. Das kann aber auch, wenn auch selten, beim Abszeß vorkommen. Erhöhter Druck ohne Lymphozyten spricht immer für Abszeß (oder Tumor).

Sind überhaupt keine Lokalsymptome, sondern nur allgemeine Erscheinungen (Benommenheit etc.) da, so spricht das natürlich zunächst für Meningitis. Indessen haben doch gerade die im Gefolge der Otitis eintretenden Abszesse des rechten Schläfenlappens und häufig auch Kleinhirnabszesse nur sehr geringe oder keine Lokalsymptome.

Bei den otitischen Abszessen kommt ferner noch die Unterscheidung von der Sinusthrombose in Frage (vgl. S. 140). Sie verläuft im Gegensatz zum Abszeß meist mit hohem remittierendem Fieber, wiederholten Schüttelfrösten. Massive Lokalsymptome sprechen gegen Sinusthrombose; die Unterscheidung ist aber nicht immer zu machen, um so weniger, als Abszeß und Sinusthrombose gleichzeitig vorkommen können.

Unter-
scheidung
von der
Sinus-
thrombose

Besondere Schwierigkeiten macht die Beurteilung der endokraniellen Komplikationen der Otitis bei kleinen Kindern. Hier ist immer daran zu denken, daß allger-eine Konvulsionen und meningitis-ähnliche Zustände auch bei reiner akuter Otitis, besonders im Beginn einer solchen vorkommen können.

Otitische
Kompli-
kationen
bei
Kindern

Wie die otitischen Eiterungen können auch andere Eiterherde am Schädel Hirnabszesse induzieren.

Rhinogene
Abszesse

An die otogenen würden sich die rhinogenen Abszesse anschließen. Ihr Ort ist der Stirnlappen, und daher können sie fast ohne lokale Symptome verlaufen. Sie sind sehr selten. Meist handelt es sich differentialdiagnostisch hier um Fälle von Stirnkopfschmerz, die auf Hirnabszeß verdächtig erscheinen. Man wird sich bei der Ablehnung der Diagnose Hirnabszeß auf das Fehlen der Allgemeinsymptome — Erbrechen, Benommenheit — verlassen und immerhin sich auch darauf stützen müssen, daß das Fehlen eines jeden Lokalsymptoms doch auch bei Stirnlappenerkrankung selten ist. Man wird auf das genaueste nach Differenzen der Reflexe suchen müssen. Sind solche vorhanden (etwa Fehlen des Bauchdeckenreflexes auf einer Seite oder Babinski), so rückt natürlich die Möglichkeit des Abszesses näher.

Aber außer den durch lokale Eiterung am Schädel herbeigeführten Abszessen gibt es auch metastatische, von denen am bekanntesten die nach eitrigen Lungenerkrankungen besonders nach Empyem, eitriger Bronchitis und Bronchiektasien sind, aber es können sich gelegentlich Hirnabszesse an Eiterungen jeden Ortes, an Erysipel und an andere Infektionskrankheiten anschließen. In einer erheblichen

Metasta-
tische
Abszesse

Zahl von Fällen sind sie der Diagnose zugänglich, wenigstens soweit, daß man doch einen explorativen chirurgischen Eingriff veranlassen wird.

Differen-
tial-
diagnose
des meta-
statischen
Abszesses

Wenn man alle die Hirnerkrankungen aufzählen wollte, welche zu differentialdiagnostischen Erwägungen gegenüber dem metastatischen Abszeß einmal Anlaß geben können, dann dürfte man wohl kaum eine einzige auslassen. Wenn man in erster Linie nur diejenigen Erkrankungen berücksichtigt, bei denen motorische Reizerscheinungen vorkommen — denn diese lenken immer noch am unmittelbarsten die Diagnose auf die Möglichkeit eines Abszesses —, so möchte ich neben dem Tumor noch auf zwei gleich wenig bekannte Zustände hinweisen: die marantische Sinusthrombose und hemiepileptische Zustände bei seniler Hirnatrophie, beziehungsweise multiplen arteriosklerotischen Erweichungen. Gerade hier werden auch dem Erfahrensten die Differentialdiagnosen nicht immer gelingen, und besonders nicht bei fehlender oder mangelhafter Anamnese. Im allgemeinen wird das Krankheitsbild bei der marantischen Thrombose und bei alten Leuten mit multiplen Erweichungen etwas milder, die Benommenheit — die beim Abszeß häufig etwas Charakteristisches hat — nicht so schwer sein. Auch sind die Reizerscheinungen diffuser, und beide erwähnte Symptombilder sind im übrigen noch erheblich seltener als der Hirnabszeß.

Etwas häufiger sind zwei andere, die akute, nicht eitrige Enzephalitis und die Pachymeningitis haemorrhagica interna. Die Differentialdiagnose gegenüber der nicht eitrigen Enzephalitis kann unmöglich sein. Wenn ein Kind z. B. nach Scharlach an einseitigen Krämpfen erkrankt, so kann das Bild der Encephalitis non purulenta sich von dem des Hirnabszesses zunächst in gar keiner Weise unterscheiden.

Bei der Pachymeningitis haemorrhagica wird — wenn die Anamnese nicht schon auf schweren Alkoholismus oder Lues hinweist — die Lumbalpunktion wohl immer eine hämorrhagisch gefärbte Spinalflüssigkeit ergeben.

Es ist die Frage, ob die neue Neißersche Gehirnpunktion die Diagnose wesentlich erleichtern wird. Daß die Chirurgen im allgemeinen nicht geneigt sind, sie bei Abszeß auszuführen, aus Furcht, die Meningen eventuell mit dem Eiter zu infizieren, erscheint mir unberechtigt. Denn diese Gefahr besteht doch wohl, wenn auch minder groß, auch bei der kunstgerechten breiten Eröffnung des Abszesses, und selbstverständlich darf die Punktion nur unter Verhältnissen ausgeführt werden, unter denen, im Falle Eiter gefunden wird, sofort die Operation angeschlossen werden kann. Im Falle des Abszeßverdachts wird die Neißersche Punktion daher nur auf der chirurgischen Abteilung eines Krankenhauses ausgeführt werden dürfen, und bei dringendem Verdacht auf Abszeß wird man überhaupt keine Punktion machen, sondern sofort breit eröffnen. Es ist sicherlich unrichtig, wenn auch das negative Ergebnis der Hirnpunktion als beweisend gegen das Vorhandensein einer lokalen Erkrankung angesehen wird. Denn ich habe es erlebt, daß von einer über dem Abszeß angelegten breiten Trepanationsöffnung verschiedentlich in die Tiefe punktiert wurde, ohne daß Eiter herauskam, weil die Nadel immer gerade an dem Abszeß vorbeiglitt. Das ist natürlich bei der Neißerschen Punktion noch viel eher möglich. Die Neißersche Punktion wird aber vielleicht von Nutzen sein in den Fällen, in denen eine Lokaldiagnose nicht mit genügender Sicherheit gestellt werden kann, besonders in solchen, in welchen sie zwischen zwei weit auseinanderliegenden Orten, wie das, was ja nicht so selten ist, etwa zwischen Stirnhirn und Kleinhirn, schwankt. Man wird aber nicht etwa die Punktion machen, weil man mit der neurologischen Methode der Lokaldiagnose etc. nicht vertraut ist.

Prophy-
laxe

Prophylaktisch wirken der Entstehung von Hirnabszessen entgegen einmal die sachgemäße Versorgung von Schädelswunden und zweitens die radikale Behandlung der Othreiterungen. Es dürfte kein Zweifel sein, daß durch die Fortschritte in diesen beiden Richtungen die Häufigkeit der Hirnabszesse an vielen Orten eine wesentliche Minderung erfahren hat. Gehören doch die traumatischen Spätabszesse heute in den städtischen Krankenhäusern schon zu den großen Seltenheiten.

Ist ein Hirnabszeß vorhanden, so kann nur die Trepanation und die breite Eröffnung des Abszesses helfen. Ist der Verdacht auf Abszeß für den kompetenten Beurteiler ein dringender, so muß der Entschluß zur Operation sofort gefaßt werden und dieselbe rücksichtslos durchgeführt werden. Insbesondere begnüge man sich nicht mit Punktionen in die Tiefe, sondern spalte breit die Hirnsubstanz. Die Nadel kann auch bei wiederholten Punktionen den Abszeß verfehlen, und eine Verzögerung der Operation kann infolge des Durchbruchs des Abszesses den tödlichen Ausgang verursachen. Nach dem tödlichen Ausgang die Diagnose zu stellen und den Fall mit der richtigen Diagnose auf den Sektionstisch zu bringen, ist beim Hirnabszeß kein besonderer Triumph. Die Diagnose freilich ist manchmal so schwer, daß sich einerseits weder dieser Fall, noch auch unbegründete — wenigstens durch das Vorhandensein eines Abszesses nicht begründete — Operationen, wo man also etwa eine nichteitrige Enzephalitis findet, ganz vermeiden lassen werden. Wenn jemand allerdings überhaupt nicht operiert oder operieren läßt, wird er auch keine unbegründeten Operationen erleben. Besonders zu bemerken ist, daß auch die metastatischen Hirnabszesse operativ angegriffen werden sollen, wenn sie nicht nachweislich multipel sind, und sie sind in einem großen Prozentsatz der Fälle nicht multipel. Nachweisliche Multiplizität ist allerdings eine Kontraindikation, fast die einzige. Keine Kontraindikation ist ein schlechter Allgemeinzustand der Kranken; denn es sind Fälle, in denen im Koma operiert wurde, völlig wieder genesen. Auch eine beginnende eitrige Meningitis wird heute nicht mehr überall als eine unbedingte Kontraindikation angesehen, indessen sind die Chancen, wenn die Lumbalpunktion deutlich getrübbte Flüssigkeit nachweist, doch minimal.

Therapie

Die Operation bietet zwar die einzige Möglichkeit, aber keineswegs die Sicherheit der Heilung, auch dann, wenn sie zu rechter Zeit ausgeführt ist, und Komplikationen, wie Meningitis, Sinusthrombose, Pyämie, nicht vorliegen. Der Grund des Mißerfolges kann, abgesehen von den Gefahren der Operation als solcher, der sein, daß nur ein Teil des Abszesses entleert wurde, oder daß ein zweiter Abszeß vorhanden ist, oder daß eine fortschreitende Erweichung in die Umgebung des Abszesses sich ausbreitet. Die Prozentzahl der durch Operation geheilten Hirnabszesse schwankt so außerordentlich in den Statistiken auch hervorragender Operateure, zwischen ca. 25 Proz. und ca. 95 Proz., daß hier wohl das Material, bzw. dessen Auswahl zur Operation, bestimmend gewesen sein muß. Besonders schlechte Chancen bieten der operativen Heilung allgemeiner Ansicht gemäß die Kleinhirnabszesse.

21. Die nichteitrige Enzephalitis.

Ein noch keineswegs geklärtes Gebiet stellt die nichteitrige, meist hämorrhagische Enzephalitis dar. Sie entsteht als eine im allgemeinen doch recht seltene Affektion am häufigsten nach Infektionskrankheiten, insbesondere nach Influenza, seltener nach

Ätiologie

Typhus, Pneumonie, Masern, Scharlach etc. Symptomatologisch steht diesen Fällen gleich die Enzephalitis der Kinder, welche in einer Anzahl von Fällen durch das Virus der Heine-Medinsche Krankheit (vgl. diese) hervorgerufen wird. Aber wir können keineswegs in allen Fällen, weder bei der Erkrankung der Erwachsenen noch der Kinder, die Ursache der Enzephalitis ausfindig machen. Immerhin ist die vorhergehende allgemeine Infektion so häufig, daß eine entsprechende Anamnese wenigstens den Gedanken an Enzephalitis bei entsprechenden Symptomen erwecken muß.

Weiter kommen Intoxikationen mit Kohlenoxyd und Fleischgift als Ursache der Enzephalitis vor.

Eine dritte Ursache ist die Otitis media, welche ebenso zu einem Hirnabszeß, als zu einer meist eitrigen Enzephalitis führen kann, das gleiche gilt vom Trauma.

Symptome Eine sehr große Anzahl der Enzephalitiden zeichnet sich durch den akuten Verlauf aus. In der großen Mehrzahl der Fälle besteht Fieber. Das Fieber kann kontinuierlich oder remittierend sein. Bei der Enzephalitis des Kindesalters kann das Fieber der Herderkrankung vorausgehen, bei der Enzephalitis der Erwachsenen scheint das im allgemeinen nicht der Fall zu sein. Der Typus dieser Erkrankung ist die Influenzaenzephalitis. Die Influenzaenzephalitis bricht gewöhnlich erst nach Ablauf der eigentlichen Influenza mit erneutem Fieber aus, manchmal aus voller Rekonvaleszenz, manchmal nachdem allgemeine Prodrome tagelang vorausgegangen sind. Sehr schnell stellt sich Somnolenz und tiefe Benommenheit ein. Erbrechen kann schon im Beginn vorhanden sein. Psychische Erregungszustände im Beginn sind selten. Der Schädel kann diffus oder an zirkumskripter Stelle klopfempfindlich sein. Nackensteifigkeit kommt vor. Allgemeine Konvulsionen sind die Regel bei der Enzephalitis der Kinder; auch bei erwachsenen jugendlichen Individuen kommen sie, aber seltener, vor. Es gibt Fälle, in welchen nach mehrtägigem Bestehen von Fieber auch beim Erwachsenen plötzlich allgemeine Konvulsionen auftreten, sich häufen und die Erkrankung sehr schnell ungünstig verläuft.

Neuritis optica kommt zuweilen vor. Herderscheinungen können von vornherein vorhanden sein oder erst im Verlauf der Erkrankung hervortreten. Wir verzichten darauf, sie einzeln zu beschreiben. Da die Enzephalitis jeden Teil des Gehirns befallen kann, so können eben auch alle Arten der lokalisierten Ausfallserscheinungen vorkommen, wie sie im Kapitel 18 geschildert worden sind, Hemiplegien, Aphasien, zerebellare und pontine Symptome, Lähmungen der Hirnnerven durch Affektion der Kerne, manchmal alternierende Lähmungen usw. Sind die Herderkrankungen nicht sehr massiv, so können sie unter der allgemeinen Benommenheit nur schwer festzustellen sein.

In einer Minderzahl von Fällen, die trotzdem zu der Gruppe der infektiös-toxischen zu gehören scheinen, kann die Entwicklung eine abweichende sein. Daß das Fieber fehlen kann, war bereits bemerkt.

Auch das Bewußtsein kann ziemlich intakt bleiben. Die Herderscheinungen können sich ganz allmählich herausbilden.

Der Lumbaldruck ist meist erhöht, und es besteht Lymphozytose als Ausdruck einer begleitenden „serösen Meningitis“ (vgl. Kap. Meningitis), der aber in diesen Fällen eine selbständige Bedeutung nicht zukommt.

Der Verlauf der Enzephalitis ist in einer ganzen Anzahl von Fällen ein akuter oder perakuter, in wenigen Tagen oder Wochen zum Tode führender. Seltener sind Fälle, in welchen die Erkrankung subakut, in Schüben verläuft, schließlich aber doch der Exitus nicht aufzuhalten ist. Heilungen mit Defekt, entsprechend der Ausdehnung des zerstörten Gebiets, sind besonders häufig bei Kindern, kommen aber auch beim Erwachsenen vor. Die dauernden Folgezustände bei Kindern sind zum Teil im Kapitel der zerebralen Kinderlähmung nachzulesen. In einer nicht ganz geringen Anzahl von Fällen kommt aber auch völlige Heilung vor, und zwar auch in solchen, die sehr akut mit schweren Allgemein- und Herdsymptomen begonnen haben.

Verlauf

Eine besondere Form der Enzephalitis ist die Polioencephalitis haemorrhagica superior. Sie ist eine fast spezifische Erkrankung der Trinker. Sie besteht in kleinen hämorrhagischen Herden meist in der Umgebung des Aqueductus Sylvii und führt dementsprechend meist zu Augenlähmungen. Fast immer entsteht sie zugleich mit schweren Delirium tremens und diese Kombination zugleich mit der Anamnese ermöglicht die Diagnose. Die Gefahr des letalen Ausgangs ist sehr groß.

Polioencephalitis haemorrhagica superior

Als eine Form der Enzephalitis muß dann noch der Hitzschlag erwähnt werden. Nicht nur die initiale Bewußtlosigkeit beim Hitzschlag scheint durch eine Enzephalitis, die hier also „kalorischen“ Ursprung hat, hervorgerufen zu sein, sondern es können auch infolge eines Hitzschlags meist vorübergehende lokale Symptome, wie Aphasie und Hemiplegie enzephalitischen Ursprungs entstehen, wobei bemerkt sei, daß irgend ein ätiologischer oder symptomatologischer Unterschied zwischen Hitzschlag und Sonnenstich nicht mehr aufrecht zu erhalten ist.

Hitzschlag

Im übrigen ist das ganze Gebiet der nicht eitrigen Enzephalitis auch rein symptomatologisch und diagnostisch recht schwierig. Man kann die Diagnose Encephalitis non purulenta ganz allgemein nur dann stellen, wenn man andere Hirnerkrankungen ausgeschlossen hat, besonders Hirnblutung, Gefäßthrombose, Hirnabszeß und Syphilis. Wichtig sind die beiden letzten, weil sie eine bestimmte Therapie bedingen. Haben wir sie ausgeschlossen, so können wir der weiteren Entwicklung der Dinge daher vom praktischen Gesichtspunkt aus mit Ruhe entgegensehen. Therapeutisch wirkt bei der Enzephalitis selbst manchmal recht günstig die Lumbalpunktion, wohl hauptsächlich deshalb, weil zugleich mit der Enzephalitis häufig eine Drucksteigerung bzw. eine Meningitis serosa besteht. Bei den exzitierten Formen, wie der Polioencephalitis haemorrhagica superior der Gewohnheitstrinker, wird man natürlich nach den allgemeinen Regeln der Behandlung des Deliriums verfahren; man wird, wenn auch natürlich so wenig wie möglich Narkotika geben (Veronal, Chloral, bei ganz schwerer Erregung Hyoszin), bei nicht ganz schwerer Erregung und befriedigender Herztätigkeit kann man mit Nutzen, wo es möglich ist, Dauerbäder anwenden. Im übrigen ist die Überwachung und Exzitierung der Herztätigkeit die Haupt-

Diagnose

Therapie

aufgabe, wofür hier natürlich nicht der Ort sein kann, Vorschriften zu geben. Außer den gleichen Maßregeln, je nach dem Bedürfnis des einzelnen Falles sind in den Fällen der akuten hämorrhagischen Enzephalitis vielleicht mit einigem Erfolg Blutegel in den Nacken oder die Schläfengegend angewendet worden. Nicht nur in den Fällen, in denen man eine Intoxikation vom Darm aus vermutet, sondern in allen Fällen soll jedenfalls für eine gründliche Entleerung des Darms gesorgt werden, wozu sich am besten das Kalomel eignet.

22. Sinusthrombose.

Einfache
Sinus-
thrombose

Der Enzephalitis steht die Sinusthrombose sehr nahe und zwar kann man die eitrige Sinusthrombose mit der eitrigen Enzephalitis, dem Hirnabszeß, analogisieren, die einfache nicht eitrige Sinusthrombose mit der nicht eitrigen Enzephalitis. Die einfache Sinusthrombose wurde früher schlechthin als „marantische“ Sinusthrombose bezeichnet, aber für die Mehrzahl der Fälle ist die Bezeichnung darum falsch, weil sie schließlich doch bakteriellen Ursprungs sind, und die Verlangsamung des Blutkreislaufs nur als unterstützender Faktor in Betracht kommt. Es bleiben nur wenige Fälle übrig, wo eine rein mechanische Ursache der Sinusthrombose in einem Erlahmen der Herzkraft oder einer lokalen Kompression der Sinus angenommen werden muß. In der Mehrzahl der Fälle ist die Sinusthrombose infektiös, oder die Infektion findet wenigstens in dem sehr verlangsamten Kreislauf einen besonders günstigen Boden. Warum die Bakterien das eine Mal zu einer eiterigen Entzündung, das andere Mal nur zu einer Thrombose führen, das ist ebenso unklar, als warum sie das eine Mal zum Hirnabszeß, das andere Mal zur nichteitrigen Enzephalitis Anlaß geben.

Ursachen

Die Ursachen der einfachen Sinusthrombosen sind auch die gleichen wie die der Enzephalitiden, nämlich Eiterungen im Bereiche des Schädels, und allgemeine Infektionskrankheiten, bei Kindern z. B. sogar schwere Darmkatarrhe; dazu kommen dann noch die „marantischen“ Ursachen, schwere Herzerkrankungen, Kachexien und die Chlorose.

Symptome

Eine Sinusthrombose hat als besondere Symptome nur die Stauungserscheinungen im Bereiche der äußeren Schädel- und Gesichtsvenen; die ödematöse Schwellung der Haut lokalisiert sich je nach dem Sitze der Thrombose; Protrusio bulbi und Stauungserscheinungen im Auge können bei frontalem Sitz der Thrombose entstehen. Aber diese Erscheinungen können selbst bei ausgesprochener Thrombose völlig fehlen und dann stehen wir vor einem sehr schwierig zu beurteilenden Krankheitsbild, welches auch symptomatologisch der Enzephalitis am nächsten steht: meist plötzlicher Beginn mit hohem Fieber, Kopfschmerzen, Benommenheit, Delirien, oft Reizerscheinungen und auch herdförmige Ausfallserscheinungen.

Man kann wohl sagen, daß, wenn die äußeren Stauungserscheinungen fehlen, und eine lokale Ursache einer Sinusthrombose (Otitis) nicht da ist, die Diagnose auch dem Geübten unmöglich sein wird, daß

er neben anderen Möglichkeiten nur eventualiter an die Sinusthrombose denken wird.

So hat denn eine praktische Bedeutung hauptsächlich die eitrige Sinusthrombose bei Otitis, die neben den lokalen Erscheinungen gewöhnlich sehr bald zu den Erscheinungen der Pyämie und der Sepsis führt, wenn auch gelegentlich das Fieber einmal fehlen oder sehr unbedeutend sein kann. Der Neurologe wird in diesen Fällen kaum bemüht. Es gilt ja hier zu Recht das Prinzip, daß in irgend zweifelhaften Fällen von otitischen Erkrankungen Dura und Sinus vom Ohr aus freizulegen sind. Die Erfolge, welche durch Freilegung und Eröffnung des Sinus hier erzielt werden können, sind ja bekannt.

Die eitrige Sinusthrombose bei Otitis (und anderen lokalen Erkrankungen des Schädels) ist zugleich die einzige therapeutisch einflußbare. In den anderen Fällen können wir nichts tun als, wie man sich ausdrückt, die Bedingungen der Zirkulation zu verbessern — aber meist ohne Erfolg. Gerade die nichteitrige „marantische“ Sinusthrombose hat eine sehr schlechte Prognose. Hat sie erst einmal zu deutlichen Erscheinungen geführt, so führt sie auch fast immer zum Ende.

Nur auf eine sehr seltene, aber wichtige kleine Gruppe sei aufmerksam gemacht. Es sind junge chlorotische Mädchen, welche den Arzt wegen Kopfschmerzen aufsuchen, und bei denen er zu seinem Schrecken eine Stauungspapille findet. Das können gutartig verlaufende und zu voller Genesung führende Sinusthrombosen sein, wenn auch im Augenblick ein Hirntumor nicht ausgeschlossen werden kann.

23. Hirnblutung. Hirnembolie und Thrombose. Arteriosklerose der Gehirngefäße.

Von den plötzlich in die Erscheinung tretenden Hirnerkrankungen ist die Hirnblutung die häufigste. Selbst der Laie hat eine Vorstellung davon, daß der „Schlaganfall“ meist eine Gehirnblutung ist, und er kennt auch die wesentliche Ursache der Hirnblutung: die Gefäßverkalkung.

Die häufigste Lokalisation der Blutung ist die innere Kapsel in der Nachbarschaft des Linsenkerns, und da in der inneren Kapsel die Pyramidenbahn und die supranukleären Fasern für die Hirnnervenkerne getroffen werden, so haben wir dann die typische Hemiplegie: Lähmung der einen Seite, die gewöhnlich auch das Gesicht und die Zunge miteinbegreift. Die Hemiplegien dieser Art sind meist von einer stunden- oder tagelangen Bewußtlosigkeit begleitet. Trotz dieser Bewußtlosigkeit läßt sich die Diagnose der Hemiplegie an der Schlaffheit der Glieder und an den einseitig vorhandenen Pyramidenzeichen (Babinski, Fehlen des Bauchdeckenreflexes!), sowie an der gerade in den ersten Tagen nach der Apoplexie meist vorhandenen Déviation conjuguée (vgl. S. 115) unschwer stellen. Bemerkt sei nur, daß die Sehnenreflexe auf der hemi-

plegischen Seite in den ersten Tagen nach einer Apoplexie manchmal herabgesetzt sind und fehlen können, während sie in späterer Zeit sich dann in der früher (S. 11) geschilderten Weise klonisch verändern.

Erwähnt sei die Möglichkeit einer Temperatursteigerung und auch von Glykosurie als vorübergehende Folgen von Apoplexie.

Andere
Herd-
symptome

Es kann eine Blutung jedoch natürlich auch jedes andere Herd-symptom machen, je nachdem sie diese oder jene Gegend des Gehirns befällt, und wir brauchen dieserhalb nur auf das Kapitel über die Lokalisation im Gehirn zu verweisen. Jedes plötzlich und anscheinend spontan auftretende Symptom einer lokalisierten Gehirnerkrankung — Hemianopsie, Hemianästhesie, Aphasie, Hemiplegia alternans, Monoplegie etc., ist am häufigsten Folge einer Hirnblutung. Die anderen Lokalisationen sind aber allerdings ungleich seltener als die gewöhnliche in der inneren Kapsel. Kleinere Blutungen sind sehr gewöhnlich nicht von langdauernder Bewußtlosigkeit, sondern nur von einer leichten Trübung des Bewußtseins, von Schwindel und manchmal von Erbrechen gefolgt. In seltenen Fällen fehlt jedes Allgemeinsymptom.

Kleinere
Blutungen

Embolie

Lange nicht so häufig wie die Blutung ist eine Embolie in die Gehirngefäße die Ursache einer Apoplexie. Auf 100 Blutungen kommen etwa 4 Embolien. Der Embolus stammt in $\frac{9}{10}$ der Fälle aus dem Herzen (Endokarditis, Herzthrombosen), in dem Rest aus der Lunge (z. B. bei Lungengangrän) oder aus Thrombosen im Bereiche des großen Kreislaufs ¹⁾ (z. B. bei Erkrankungen der weiblichen Genitalien). Die Embolie betrifft in $\frac{4}{5}$ der Fälle die Art. fossae Sylvii, etwas öfter die linke als die rechte, und macht daher in diesen Fällen entweder Hemiplegien, Monoplegien oder Aphasien. Bei Verstopfung eines sehr großen Gefäßgebiets sehen wir auch bei der Embolie dieselbe schwere Bewußtseinsstörung, wie bei der Blutung. Da aber oft nur kleinere Gefäßgebiete verstopft werden, so sind bei Embolien die leichteren Bewußtseinsstörungen häufiger.

Selten sind Fettembolien nach Knochenbrüchen oder orthopädischen Operationen oder nach Knochenerschütterungen. Die Symptome treten manchmal unmittelbar nach dem Trauma, z. B. bei der orthopädischen Operation, spätestens 9 Tage nach dem Knochentrauma, auf und zwar überwiegen von vornherein schwere Allgemeinerscheinungen, Benommenheit bis zum Koma, allgemeine Krämpfe usw. In einer Anzahl von Fällen sind auch Herderscheinungen, einseitige Krämpfe und auch Ausfallserscheinungen beobachtet. Die Prognose scheint fast unbedingt schlecht. Der Tod tritt meist 1—4 Tage nach Beginn der Gehirnerscheinungen ein.

Thrombose

Endlich können auch Thrombosen der Gehirnarterien zu plötzlich einsetzenden Apoplexien führen, wenn eine sehr geringe Blut-

¹⁾ Das Foramen ovale wird bei $\frac{1}{3}$ aller Leichen offen gefunden. Es besteht also bei einem erheblichen Teile der Menschen die Möglichkeit, daß Emboli aus den Venen des großen Kreislaufs unter Umgehung des Lungenkreislaufs direkt vom rechten ins linke Herz und von da auch ins Gehirn gelangen.

versorgung die Funktion noch leidlich aufrecht hielt bis zu dem Augenblick, wo die Zirkulation ganz unterbrochen wurde.

Häufiger allerdings findet sich bei Thrombose ein allmählich sich ausbreitender Ausfall der Gehirnfunktionen, während ein solches allmähliches Ansteigen bei der Blutung ganz außerordentlich selten, bei der Embolie ausgeschlossen ist.

Die Ätiologie der Embolie war bereits erwähnt und steht für sich.

Ätiologie
Arterio-
sklerose

Dagegen haben Hirnblutung und Hirnarterienthrombose in der Mehrzahl der Fälle dieselbe Ätiologie oder dieselben beiden Ätiologien, die Arteriosklerose oder die Syphilis. Die Arteriosklerose liefert im Verhältnis mehr Blutungen, die Syphilis mehr Thrombosen, wobei alles in allem doch die Arteriosklerose gewaltig in der Überzahl ist.

Besonders gefährdet durch Hirnblutung sind die Fälle von arteriosklerotischer Schrumpfniere. Auf dem Umwege über die Erzeugung oder Verstärkung der Arteriosklerose macht sich ein Einfluß des Alkoholismus, der Bleiintoxikation, des Diabetes geltend. Der „Habitus apoplecticus“ ist in seiner Bedeutung für die Apoplexie sehr zweifelhaft.

Seltenere Ursachen von Hirnblutungen sind Bluterkrankungen (pern. Anämie, Leukämie), Geschwülste und Embolien. Insbesondere die seltenen Hirnblutungen im Kindesalter sind meist sekundär nach infektiösen Embolien der Hirngefäße entstanden.

Eine auslösende Ursache für die Hirnblutung ist meist nicht zu finden. In einer Minderzahl von Fällen finden wir Entstehung bei heftigen Muskelanstrengungen: Heben schwerer Gewichte, Koitus, Pressen beim Stuhlgang etc. Sehr selten sind Hirnblutungen beim Keuchhusten, und es sei gleich bemerkt, daß beim Keuchhusten auch Hemiplegien ohne Blutungen (wahrscheinlich durch Enzephalitis) vorkommen.

Auslösende
Ursache

Die direkte pathologisch-anatomische Ursache wurde lange in den sogenannten Miliaraneurysmen der Hirngefäße, die infolge der Arteriosklerose entstehen sollten, gesehen; es hat sich jedoch herausgestellt, daß diese „Miliaraneurysmen“ wahrscheinlich erst das Produkt kleiner Blutungen, nicht ihre Ursache sind, und daß das Gefäß auch an ganz aneurysmenfreier Stelle platzen kann.

Miliar-
aneu-
rysmen

Über die Differentialdiagnose der drei Erkrankungen: Blutungen, Embolie, Thrombose, wird man sich in vielen Fällen nicht allzusehr bemühen brauchen. Aus dem zerebralen Symptomenkomplex ist die Diagnose ob Blutung, Thrombose oder Embolie überhaupt nicht zu machen. Sehr schwere Erscheinungen sprechen immer für Blutung, kommen aber auch bei großer Embolie vor. Andererseits machen leichte Blutungen auch nur leichte Erscheinungen. Wenn der Insult von motorischen Reizerscheinungen, insbesondere Jacksonschen epileptischen Anfällen begleitet ist, so kommt das häufiger bei Embolie und Thrombose als bei Blutung vor. Die Reizerscheinungen sind aber auch bei Embolie und Thrombose schon selten. Praktisch wichtig ist es aber, ihr Vorkommen zu kennen, damit man aus ihrem plötzlichen Auftreten nicht ohne weiteres auf eine chirurgisch angreifbare Erkrankung schließt.

Diagnose
von Blu-
tung, Er-
weichung,
Thrombose

Für Embolie spricht immer der Nachweis einer Herzerkrankung und jugendliches Alter der Betroffenen. Leicht ist die Diagnose dann, wenn auch Embolien (Infarkte) in anderen Organen nachzuweisen sind. Daß die Herzerkrankung klinisch noch gar nicht manifest zu sein braucht, wenn die Embolie eintritt, erschwert andererseits die Diagnose, und man muß sich ferner erinnern, daß auch Gehirnblutungen bei jugendlichen Personen, insbesondere infolge von Lues, durchaus nicht übermäßig selten sind; hier ist die Feststellung der luetischen Ätiologie wieder das praktisch bei weitem Wichtigste.

Ätio-
logische
Diagnostik

Eine viel größere Rolle spielt die ätiologische Diagnostik. Wenn wir einen Kranken mit einer schweren Herderkrankung des Gehirns vor uns haben, etwa einer Hemiplegie oder Aphasie, so ist es uns vom praktischen Gesichtspunkt aus ziemlich gleichgültig, ob es sich da um einen kortikalen oder subkortikalen Symptomenkomplex handelt, ob der Herd auf diese oder jene Windung sich erstreckt, wir wollen wissen, auf welcher Grundkrankheit er beruht. Ja, es tritt sogar die Differentialdiagnose der Hirnblutung und der Hirnerweichung durchaus zurück, wenn wir nur wissen, daß es sich um arteriosklerotische Veränderungen handelt.

Haben wir es mit alten Leuten zu tun, schon von den letzten Jahren des 6. Lebensjahrzehnts ab, so werden wir die arteriosklerotische oder senile Entstehung solcher Herderscheinungen als die zunächst gegebene und bei weitem wahrscheinlichste ins Auge fassen. Je jünger ein Kranker ist, um so mehr sind etwaige Bedenken gegen die Arteriosklerose zu berücksichtigen, die ja auch im Alter nicht völlig auszuschalten sind. Die bei weitem wichtigste Feststellung ist, ob Lues vorliegt oder nicht. Jeder Hirnherd im jugendlichen Alter, besonders die apoplektiform entstandenen sind auf Lues verdächtig, und man wird umgekehrt bei festgestellter oder konzederter Lues mit seltenen Ausnahmen gut tun, eine Herderkrankung auf diese Lues zu beziehen und entsprechend zu behandeln. Die Diagnose der Lues wird ja in dem entsprechenden Kapitel besprochen; zur Abgrenzung der Lues gegenüber anders bedingten Herderkrankungen dienen insbesondere der Nachweis der syphilitischen Erkrankung des Körpers (an der Haut, dem Auge, Mundschleimhaut usw.), die Wassermannsche Reaktion im Blut, die Feststellung einer Lymphozytose im Liquor cerebrospinalis und die Pupillenreaktion. Die Wassermannsche Reaktion ist ein sicheres Zeichen für Lues, wobei auch hier bemerkt sei, daß die Reaktion im Liquor cerebrospinalis bei Lues meist negativ¹⁾ ist. Der negative Ausfall der Wassermannschen Reaktion im Blut kann jedoch als nicht unbedingt beweisend gegen Lues angesehen werden. Lymphozytose im Liquor ist in den hier in Frage kommenden Fällen fast sicher beweisend gegen reine Arteriosklerose und für Lues (oder progressive Paralyse). Daß

¹⁾ Wenigstens bei der bisher üblichen Methodik. Neuerdings wird behauptet, daß bei Verwendung größerer Liquormengen die Reaktion doch meist positiv ausfällt.

eine echte reflektorische Pupillenstarre bei Arteriosklerose vorkommt, halte ich für nicht erwiesen, betrachte sie vielmehr als einer der wesentlichsten Hinweise auf Lues, dessen Fehlen natürlich nichts gegen Lues beweist (vgl. im übrigen das Kapitel der syphiligen Nervenkrankheiten).

Die Diagnose einer Herzerkrankung als Grundkrankheit fällt mit der Diagnose einer Embolie fast zusammen.

Die Grundkrankheit zu erkennen ist jedenfalls die hauptsächlichste diagnostische Aufgabe, denn von ihr hängt das therapeutische Vorgehen ab.

Wer zu einem frischen „Schlaganfall“ gerufen wird, hat dann noch zu berücksichtigen, daß genau gleiche Zustände, wie nach Blutung, Embolie und Thrombose auch als Folgeerscheinung eines epileptischen oder paralytischen Anfalls auftreten können. Wenn man also nach diesen Richtungen Zweifel hat, was besonders bei leichteren Herderscheinungen der Fall sein wird, so frage man einerseits, ob nicht früher epileptische Anfälle beobachtet worden sind, und forsche nach den Anzeichen und der Anamnese der Paralyse. Kann man im Augenblick zu einer bestimmten Diagnose nicht kommen, so wird die Beobachtung einiger Tage fast immer genügen, um zu einem Schluß zu kommen. Denn sowohl die Anzeichen des paralytischen als die des epileptischen Anfalls gehen sehr schnell zurück. Insbesondere die paralytischen Anfälle werden in der Praxis häufig verkannt, trotzdem man häufig schon aus der Erzählung, daß „gestern eine schwere Hemiplegie (oder Aphasie etc.) bestanden hätte, die heute schon wieder fast völlig verschwunden ist“, die Diagnose Paralyse stellen und bei der Untersuchung oder aus der Anamnese bestätigen kann.

Diagnose
der
Apoplexie

In den Fällen plötzlicher Entstehung von Herdsymptomen kommt dann noch die Enzephalitis und die Venen- bzw. Sinusthrombose in Betracht. Für die Enzephalitis ist meist der fieberhafte Beginn und ein mehr oder weniger langes Vorstadium von Unwohlsein, Kopfschmerzen usw. bezeichnend. Der Enzephalitis ähnlich kann der Hitzschlag verlaufen.

Gegen die Verwechslung mit einem ersten Schub gewisser Fälle von multipler Sklerose, die apoplektiform beginnen, schützt manchmal nur die weitere Verfolgung des Falles, soweit nicht hohes Alter eine beginnende multiple Sklerose von vornherein unwahrscheinlich macht.

Schließlich können fast alle Gehirnerkrankungen gelegentlich einmal zu Schwierigkeiten führen. Ein Abszeß kann durch einen septischen Embolus entstehen und dann gelegentlich zunächst die Erscheinungen der Embolie machen, die Sinusthrombose kann plötzliche Erscheinungen machen, der Tumor kann plötzliche Herdsymptome verursachen, auch dann, wenn eine sekundäre Blutung nicht im Spiel ist, usw.; aber es kann zu nichts führen, alle diese seltenen Möglichkeiten hier einzeln zu besprechen, denen nur Erfahrung und Urteil am Krankenbett gerecht werden kann.

Als eine besondere Ursache einer Hemiplegie sei noch die Karotisunterbindung genannt, die aber nur in einer Minderzahl von Fällen zu zerebralen Störungen führt, von einem tüchtigen Gefäßsystem meist durch kollateralen Blutstrom anstandslos getragen wird.

Karotis-
unter-
bindung

Ehe wir auf den Verlauf der Erscheinungen bei den einzelnen großen Herden eingehen, müssen wir noch auf mehr diffuse Erscheinungen zu sprechen kommen, welche häufig infolge der Arteriosklerose

Diffuse
Arterio-
sklerose
des Gehirns

der Hirngefäße entstehen. Es sind das zunächst diejenigen Fälle, wo sich ein schweres Krankheitsbild aus einer Reihe von kleinen Apoplexien (meist Erweichungen durch Thrombosen der kleinen Gefäße) entwickelt. Solche Kranken haben wiederholt leichte „Ohnmachten“ oder Schwindelanfälle gehabt. Der vorsichtige Arzt spricht hier von „Blutstockung“, ein Ausdruck, der auch beim Laien viel Anklang findet. Dabei auftretende Übelkeiten oder Erbrechen sind vielleicht gar als Magenindispositionen gedeutet, aber es hat sich ein Nachlassen der geistigen Spannkraft bemerkbar gemacht, und die nun herbeigeführte Untersuchung führt zur Aufdeckung der organischen Herdsymptome. Oder es hat eine leichte Lähmung der einen Seite stattgefunden, und bei der Untersuchung merken wir, daß auch auf der nicht gelähmten Seite schon früher Herde sich ausgebildet haben müssen. Auf der Grundlage solcher multipler kleinen Herde — von welchen bei der Autopsie manchmal Hunderte von Stecknadelkopf- bis Kirschkerngröße gefunden werden — entwickelt sich dann neben psychischer Schwäche oder ausgesprochener Demenz, allmählich besonders oft das Bild der Pseudobulbärparalyse (S. 34) und auch eigentümliche Gangstörungen, die manchmal, trotzdem größere Lähmungen fehlen, bis zur völligen Unfähigkeit zu stehen und zu gehen, fortschreiten. Leichtere Fälle machen sich häufig durch einen schlurfenden Gang mit kleinen Schritten schon von weitem kenntlich. Zwischen diesen in kleinen Schüben oder auch manchmal mehr kontinuierlich verlaufenden Fällen und den Ausfallserscheinungen bei groben und einheitlichen Herden gibt es nun alle Übergänge und Mischungen. Häufig findet ein solcher diffuser Fall durch eine große Blutung sein Ende.

Arteriosklerotische Epilepsie Eine besondere Form der diffusen Arteriosklerose des Gehirns ist dann noch die Epilepsie. Ein Teil der sogenannten Spätepilepsien entsteht auf arteriosklerotischer Grundlage. Herdsymptome können, aber brauchen sich dabei nicht zu finden.

Arteriosklerose des Rückenmarks Nicht so selten verbindet sich mit einer Arteriosklerose des Gehirns auch eine diffuse Arteriosklerose des Rückenmarks. Ihre Symptome sind im Einzelfall von der ersteren gar nicht scharf zu trennen, so ist es z. B. ganz unsicher, ob die früher sogenannte Greisenlähmung im Rückenmark oder im Gehirn ihren Sitz hat.

Neurasthenische Bilder Endlich sind als leichteste Formen der arteriosklerotischen Gehirnveränderung der Neurasthenie ähnliche Krankheitsbilder zu erwähnen, wenn diese auch nicht so häufig sind, wie bei der Paralyse. Einen Hinweis auf diese Formen der Gehirnarteriosklerose gibt der gewöhnlich bei ihnen sehr lästige Schwindel, der manchmal dauernd besteht, häufiger in Anfällen auftritt. Ferner bestehen oft Kopfschmerzen von außerordentlicher Heftigkeit.

Auch psychotische Bilder kommen vor, und zwar entweder als akute delirante Zustände oder als chronisch progressive. Letztere zeichnen sich häufig aus durch den Mangel der Orientierung, durch den Verlust der Merkfähigkeit und durch Halluzinationen und Konfabulationen (Presbyophronie). Ein Bild übrigens, das der früher erwähnten polyneuritischen Psychose (S. 85) nicht fern steht.

Für die Diagnose dieser mehr diffusen arteriosklerotischen Zustände ist es wichtig, zu wissen, daß Arteriosklerose der fühlbaren Körpergefäße zwar ein häufiges, aber durchaus nicht unumgängliches Begleitsymptom ist, daß es vielmehr Fälle gibt, wo sich die Arteriosklerose fast ausschließlich an den Gehirngefäßen lokalisiert.

Die Prognose der in diesem Kapitel behandelten Erkrankungen ist auch für die Herderkrankungen zum erheblichen Teil eine Prognose der Grundkrankheit. Hier spielt die ganz überragende Rolle die Arteriosklerose, gleichgültig, ob es sich um die mehr allgemeinen Formen derselben oder um ihre Verbindung mit lokalen Manifestationen, d. i. Blutung und Thrombose handelt. Diese Prognose kann im allgemeinen keine gute sein, denn die Arteriosklerose ist anatomisch keine rückbildungsfähige Erkrankung. Selbst die leichtesten Fälle, die etwa wesentlich sich nur mit Kopfschmerz, Schwindel, Nachlassen der geistigen Spannkraft einleiten, neigen zur Progression. Remissionen auch längerer Dauer kommen hier vor; aber gerade die Fälle, in denen sich die Arteriosklerose nicht in einzelnen, sondern in multiplen Herden, gleichviel welcher Art (vgl. oben), zeigt, haben fast immer einen mehr kontinuierlich zum Schlimmen fortschreitenden Verlauf, als die einherdigen. Immerhin wird man sich vor einer allzuschlechten Prognose zu hüten haben.

Prognose
der Herd-
erkrankungen
und der
Arterio-
sklerose

Die Dauer des Lebens kann man im einzelnen Falle überhaupt nicht prognostizieren. So schnell eine Erkrankung ablaufen kann, so kann selbst ein progressiver Verlauf sich in anderen Fällen über Jahre und Jahrzehnte hinziehen.

Daß die Prognose der Arteriosklerose wieder wesentlich durch Komplikationen, die zum Teil ja die Grundursache der Arteriosklerose sind, wesentlich mitbestimmt wird, braucht nur kurz erwähnt zu werden. In erster Reihe stehen da Nephritis und Alkoholismus, weiter der Diabetes als die Prognose wesentlich verschlechternde Faktoren. Das Lebensalter, in welchem die Arteriosklerose auftritt, scheint einen wesentlichen prognostischen Wert nicht zu besitzen.

Für die Embolien handelt es sich um die Prognose des Vitium cordis bzw. der anderen verursachenden Krankheit.

Für die Lues vgl. das Kapitel über syphilogene Nervenkrankheiten.

Die Prognose des einzelnen Falles einer Herderkrankung quoad vitam gestattet sich im allgemeinen um so ungünstiger, je größer der Herd, je schwerer die Ausfallserscheinungen waren. Ein erheblicher Teil der schweren Fälle geht in den ersten Tagen nach der Apoplexie oder in den ersten Wochen zugrunde. Am ungünstigsten sind die Fälle von Blutung, bei welchen ein Durchbruch in die Ventrikel stattgefunden hat.

Ist der erste Monat überwunden, so ist auch bei den schweren Fällen die Prognose quoad vitam eine verhältnismäßig gute, und die mögliche Lebensdauer nicht abzuschätzen. Es gibt Personen, die im 6. Lebensjahrzehnt eine Hirnblutung, sogar eine Reihe von nicht unerheblichen Schlaganfällen erleiden und trotzdem ein Alter von 80—90 Jahren erreichen.

Daß die sogenannten „Prodrome“, d. i. leichte Apoplexien, isoliert bleiben und zu weiteren Erscheinungen für lange Zeit nicht führen, ist sogar eine häufige Beobachtung.

Rückbildung der Herd-
erkrankungen Die nicht zum Tode führenden Fälle schwerer Herd-erkrankungen nun bilden sich bis zu einem gewissen Grade zurück, ein Zeichen dafür, daß ein Teil der Anfangssymptome nur durch indirekte Wirkungen des Gefäßverschlusses oder der Blutung bedingt war. Zuerst weicht allmählich die Bewußtlosigkeit, dann beginnen die Herderscheinungen zurückzugehen. Diese Rückbildung der Herderscheinungen kann aber monatelang auf sich warten lassen.

Der Eintritt der Rückbildung der Hemiplegie gibt sich oft zuerst in dem Erscheinen leichter Spasmen in den bis dahin völlig schlaffen Gliedern kund, und leider bilden sich dann im weiteren Verlauf diese Spasmen — wenn es sich nicht von vornherein um leichte Fälle gehandelt hatte — zu Kontrakturen aus (S. 34), die die Wirksamkeit der etwa wiederkehrenden willkürlichen Beweglichkeit sehr vermindern, am Arm meist völlig illusorisch machen. Am Bein kommt durch die Kontraktur, welche die Bewegung verhindert, dann die bekannte Zirkumduktion beim Gange zustande. Während so der Gang schließlich — oft erst nach vielen Monaten — doch wieder möglich wird, ist von einer Gebrauchsfähigkeit der Hand selbst nach leichteren Hemiplegien eigentlich nie mehr die Rede. Ein Arbeiter ist selbst nach leichteren Hemiplegien fast immer auf die Dauer erwerbsunfähig.

Begleiterscheinungen der Hemiplegie Als häufige Begleiterscheinungen hemiplegischer Lähmungen sind zu nennen vasomotorische Störungen (kalte, zyanotische Hände) und Schmerzen auf der hemiplegischen Seite, die meist durch Arthritiden bedingt, nur sehr selten zentralen Ursprungs sind. Bei gestörter Herztätigkeit oder bei Nephritis sind die Ödeme an der hemiplegischen Seite oft stärker und erscheinen dort früher, als an der gesunden. Häufig findet sich eine gleichmäßige Volumenabnahme der hemiplegischen Glieder (ohne E. R.).

Wie die Hemiplegie können sich auch alle anderen Herdsymptome im Lauf der Zeit zurückbilden, ohne daß man von vornherein sagen könnte, wie weit die Restitution gehen wird. Keine günstige Prognose haben im allgemeinen die Sprachstörungen. Besonders totale motorische Aphasien und auch sensorische Aphasien selbst geringen Grades stören das Leben des Kranken durch die Schwierigkeit des Lesens und Schreibens meist auf die Dauer sehr erheblich.

Therapie Bei der Therapie der uns beschäftigenden Erkrankungen ist zu unterscheiden die Therapie der Grundkrankheit, die der zerebralen Herde und endlich die Therapie der Ausfallserscheinungen.

Die Therapie etwaiger Herzerkrankungen, die zu einer Embolie geführt haben, zu besprechen, ist hier nicht der Ort; die Therapie der Lues wird an anderer Stelle abgehandelt. Über die Therapie der Arteriosklerose des Gehirns, die mit der der allgemeinen Arteriosklerose ziemlich zusammenfällt, soll kurz einiges bemerkt werden.

Die Therapie der Arteriosklerose ist sowohl in ihren Voraussetzungen, wie in ihren Erfolgen eine recht unsichere.

Eins dürfte sicher sein, daß wir einem Kranken, bei dem wir Arteriosklerose der Gehirngefäße mit oder ohne Herdsymptome diagnostizieren, zunächst eine möglichste Schonung nach jeder Richtung zur Pflicht zu machen haben. Die Behandlung beginnt auch und besonders dann, wenn akute Herdsymptome zurzeit nicht vorhanden sind, am besten damit, daß wir den Kranken zunächst auf einige Zeit ganz aus seiner Tätigkeit herausnehmen und ihn aufs Land, in einen Kurort¹⁾, eine Nervenheilstätte oder ein Sanatorium schicken. Was dadurch erzielt werden soll, ist in erster Linie völlige psychische Ruhe, absolute körperliche Ruhe ist nicht notwendig, wenn nicht besondere Indikationen sie erfordern. Sportliche Betätigung, jede anstrengende Arbeit überhaupt, Bewegung in der Hitze ist natürlich zu unterlassen, dagegen abgestufte Spaziergänge, auch mit leichten Steigungen erwünscht. Es ist nicht ungewöhnlich, daß nach einer solchen Schonung von 2—3 Monaten der Kranke anscheinend gesund, d. h. ohne subjektive Beschwerden und für lange Zeit arbeitsfähig, wieder zurückkehrt. Man hat dann die Aufgabe, mit Rücksicht auf den Zustand und die Interessen des Patienten seine Lebensweise zu regeln und vor allem ist die Wiederholung solcher Ruhekuren in regelmäßigen Intervallen wenn möglich durchzusetzen. Es ist davor zu warnen, dem Kranken auf die Feststellung einer Arteriosklerose oder auf leichte Bewußtseinsverluste, Schwindel, Kopfschmerzen, selbst auf die Feststellung leichter motorischer Ausfälle (Babinskischer Reflex oder sonstige vereinzelte Symptome) von vornherein und ohne lange Beobachtung die dauernde Aufgabe seines Berufes oder seiner Stellung vorzuschreiben.

Es gibt natürlich Fälle genug, wo der Beruf schließlich doch aufgegeben werden muß. Aber ehe der Arzt zu einem solchen Schritte rät, muß er den Fall längere Zeit verfolgt haben. Selbstverständlich darf auch dem Kranken gegenüber nie von Arterienverkalkung oder „Arterienverhärtung“ gesprochen werden, da der Laie dieses Wort regelmäßig als ein in kurzer Zeit vollstreckbares Todesurteil auffaßt.

Andererseits ist es Aufgabe des Arztes, ohne pessimistische Diagnose und Prognose, dem Kranken eine Verminderung seiner Arbeitsleistung zur Pflicht zu machen, und ihm auch exakte Vorschriften darüber zu geben, d. h. ihm gewisse Ruhestunden am Tage zu bestimmen u. dgl., unter Umständen die allmähliche Aufgabe seines Berufs und die Abwicklung seiner Verbindlichkeiten nahezulegen.

¹⁾ Die Auswahl der Kurorte für die Arteriosklerotiker richtet sich zum Teil nach der Art der Bäder, die man eventuell für nützlich hält, auch mit Rücksicht auf Komplikationen des Herzens, rheumatische Beschwerden u. dgl. Will man von Bädern absehen, so tut ein bequemer Landaufenthalt in der Ebene schon die besten Dienste, wobei in der Auswahl natürlich auf die Jahreszeit Rücksicht zu nehmen ist. Die nördlich gelegenen Meere, sogar die Ostsee werden vielfach nicht vertragen, ebenso sind Höhen über 1000 m nach allgemeinem Urteil nicht zu empfehlen. Mit Recht am beliebtesten sind im Sommer geringe oder mittlere Höhen im Mittelgebirge an waldreichen Orten mit der Möglichkeit ebener oder wenig ansteigender Spaziergänge, im Frühjahr und Spätherbst die italienischen Seen, der Genfer See (mit seinen am nördlichen Ufer in der Höhenlage so gut abgestuften Kurorten), Meran und Bozen und die Küsten des Mittelländischen Meeres.

Wenn wir bei den Angehörigen der sogenannten höheren Berufe den Kranken vielfach am besten dadurch nützen, daß wir sie in der Arbeit halten und sie schließlich „in den Sielen“ sterben lassen, werden wir bei dem Arbeiter, insbesondere dem schwer körperlich arbeitenden, nicht zögern, sobald wir die sicheren Zeichen einer Arteriosklerose und entsprechende Beschwerden haben, ihn, wo bezügliche Einrichtungen oder Gesetze vorhanden sind, zu invalidisieren und ihm die ihm zustehende Pension oder Rente zu verschaffen. Hier wird häufig der umgekehrte, wie der oben genannte Fehler gemacht; ehe nicht eine ausgesprochene Hemiplegie oder dgl. da ist, findet man „nichts“, und versucht so, von dem Leidenden immer wieder Arbeitsleistungen zu erzwingen, denen er tatsächlich nicht gewachsen ist, und deren Ausführung ihm auch schadet. Ohnehin ist man immer wieder erstaunt, wie schwere Arbeit doch bei nicht unerheblichen Krankheitserscheinungen geleistet wird.

Die Einflußnahme auf die Berufsarbeit des Kranken kann unterstützt werden durch eine Reihe physikalisch-diätetischer Maßnahmen und auch durch eine medikamentöse Therapie.

Über die Diät bei Arteriosklerose ist viel geschrieben, was wir hier nicht anführen wollen. Zum Teil beruhen die mannigfachen Vorschriften auf hypothetischen Vorstellungen über die Ursache der Arteriosklerose. Es scheint jedoch, als wenn gerade die erfahrensten Ernährungstherapeuten dahin übereinkommen, daß eine gemischte Diät bei Arteriosklerose einer einseitigen vorzuziehen ist, und daß insbesondere eine vielfach empfohlene strenge lakto-vegetabilische¹⁾ Ernährungsweise keine Vorteile bietet, vielmehr durch das dabei vergrößerte Nahrungsvolumen ungünstig wirken kann. Ein Übermaß von Fleischnahrung ist zu verhindern. Erheblichen Nutzen habe ich bei den Erscheinungen gerade auch der zerebralen Arteriosklerose von der Verordnung einer salzfreien Kost gesehen. Zu den Selbstverständlichkeiten gehört es, daß die Quantität der einzelnen Mahlzeit zu regeln ist, daß insbesondere die Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen beim Essen zu beschränken, und daß für kleinere häufiger wiederholte Mahlzeiten zu sorgen ist. Unzweifelhaft hat die Überfüllung des Magens häufig einen Einfluß auf die Stärke der subjektiven Beschwerden auch bei zerebraler Arteriosklerose.

Gegen vorsichtige Entfettungskuren bildet Arteriosklerose bekanntlich keine Kontraindikation, vielmehr wirken Entfettungskuren häufig günstig auf die Beschwerden.

Als aufs strengste zu verbieten werden gewöhnlich Alkohol, Kaffee und meist auch Nikotin bezeichnet. In der Praxis wird man mit diesen Verboten manchmal nicht ganz streng sein. Ein bis zwei Zigarren am Tag oder ein Glas Pilsener am Abend sind für manchen eine solche Erquickung, daß in dem zweifelhaften Nutzen des absoluten Verbots ein genügendes Äquivalent nicht gesehen werden kann. Ein

¹⁾ Die Yoghurt-Milch ist ganz gut; von einer spezifischen Wirkung gegen das Altern und die Arteriosklerose ist natürlich nicht die Rede.

Mehr solcher Genüsse, wie stärkere Alkoholika überhaupt, dürften allerdings mit Strenge zu verbieten sein. An Stelle des gewöhnlichen Kaffees kann man den koffeinfreien verwenden, dem bei gleichem Geschmack die erregende Wirkung in der Tat zu fehlen scheint.

Auch sonst sei man bei Arteriosklerotikern nicht gar so streng. Es gibt Leute, denen bei verschiedenen Ärzten allmählich so ziemlich alles Eßbare verboten ist, und die sowohl körperlich in die Höhe kommen, wie von einer psychischen Last befreit werden, wenn man ihnen einige Freiheit gewährt.

Die Regelung des Stuhlgangs gehört ja auch zu den Maßnahmen, die der Arzt gewissermaßen instinktiv und selbstverständlich vornimmt. Daß Schwindelanfälle, Kopfschmerzen u. dgl. bei Arteriosklerotikern durch Obstipation, und zwar allem Anschein nach reflektorisch vom Dickdarm aus ausgelöst werden können, ist keine Fabel, abgesehen von dem Einfluß der Obstipation auf die Zirkulation im Bauchraum und dadurch auf die Blutverteilung im allgemeinen.

Mit der Verordnung von Bädern und hydriatischen Maßnahmen wird man außerhalb der eigentlichen Kurzeiten, bzw. der Ferien der Kranken sehr zurückhaltend sein. Wenn die Kranken keine Zeit haben, der Badeprozedur und der darauffolgenden Reaktion wenigstens 2 Stunden zu einer geeigneten Tageszeit zu widmen, wird man die Bäder am besten ganz lassen. Gerade Patienten mit nervösen Erscheinungen brauchen diese Ruhe. In Kurorten dagegen können zweckentsprechend verordnete Bäder von erheblich unterstützender Wirkung sein. Im allgemeinen richtet sich die Badebehandlung ja nicht nach der Indikation der Behandlung der zerebralen Arteriosklerose, aber auch deren Erscheinungen werden durch die allgemeine Behandlung im allgemeinen günstig beeinflusst. Von vielen Autoren wird die „Gefahr einer Apoplexie“ als Kontraindikation gegen Bäder oder gewisse Bäderarten angeführt. Woran erkennen diese Autoren aber die „Gefahr einer Apoplexie“? Daß man einen Kranken, der immer wieder kleine Apoplexien erleidet, nicht baden lassen wird, setzen wir voraus. Im übrigen aber ist jeder Arteriosklerotiker in der „Gefahr“ einer Apoplexie. Auch seit langer Zeit zum Stillstand gekommene Folgeerscheinungen, z. B. Hemiparesen, bilden keine unbedingte Kontraindikation gegen milde Badeprozeduren.

Die gegen die Arteriosklerose überhaupt angewandten Badeprozeduren sind von milderer Art; lauwarme (nicht über 37—38° C) Voll- und Teilbäder mit oder ohne Zusatz von aromatischen Substanzen, Soolbäder, schwache Kohlensäurebäder von indifferenter Temperatur, Sauerstoffbäder. Daß auch kaltes Wasser bei Arteriosklerose häufig von Vorteil ist, insbesondere auch in Form von schottischen Teilabreibungen, ist sicher. Kalte Vollbäder wird man jedoch besser vermeiden. Straßer betont die überraschende Ungefährlichkeit von Schwitzbädern, besonders elektrischen Glühlichtbädern bei Arteriosklerotikern.

Zur Vermeidung der sogenannten Kongestionen nach dem Kopf ist bei fast allen allgemeinen warmen Bädern die Anwendung kalter Kopfkompresen oder Kopfkühlschläuche zu empfehlen.

Die isolierte Anwendung von hydriatischen Maßnahmen auf den Kopf bei Arteriosklerose wird wenig geübt. Bei bettlägerigen Kranken wendet man gern und zur subjektiven Zufriedenheit des Kranken kalte Kompressen, Eisblase oder Kühlschläuche an.

Gegen die Kopfschmerzen und den Schwindel der Arteriosklerotiker habe ich kurze (2—5 Minuten) und 2—3 mal am Tage wiederholte heiße Umschläge auf Stirn und Nacken von sehr guter subjektiver Wirkung und ohne jeden objektiven Nachteil gesehen. Gerade bei ambulanten Kranken sind sie ein empfehlenswertes und überall leicht anzuwendendes Symptomatikum.

Von allen Badeprozeduren, und insbesondere von den allgemeinen Bädern gilt die Vorschrift, daß ihre Dauer und Häufigkeit bei Arteriosklerotikern nach der zirkulatorischen und allgemeinen Reaktion einzurichten sei; der Kranke muß sich nach jeder einzelnen Badeprozedur behaglich und ruhig fühlen. Ist das nicht zu erreichen — eine Anzahl von Kranken fühlen sich ohne Bäder eben wohler —, so sollen die Bäder ausgesetzt werden. Die Wirkung einer Badekur darf bei Arteriosklerose nicht erst „nachkommen“.

Die Massage ist bei Arteriosklerose nicht kontraindiziert, sondern als milde allgemeine oder Extremitätenmassage oft von sehr guter Wirkung. Auch eine milde Massage des Kopfes und des Nackens habe ich bei Arteriosklerotikern mit zerebralen Symptomen ohne Schaden, vielmehr mit anscheinendem Erfolg angewandt.

Elektrizität, Hochfrequenzströme, D'Arsonvalisation u. dgl. wird der einigermaßen kritische Arzt bei der Behandlung der zerebralen Arteriosklerose nicht anwenden.

Über das Radium fängt man erst jetzt an Erfahrungen zu sammeln. Die eventuelle allgemeine Verwendbarkeit der Radiumtherapie hängt ja auch davon ab, ob die Monopolisierung der Radiumtherapie in geschlossenen „Emanatorien“ sich wissenschaftlich rechtfertigen läßt, oder ob mehrmals wiederholtes Trinken von Radiumemanationswasser die gleiche oder annähernd die gleiche Konzentration von Radiumemanation im Körper herstellen kann. Der lange Aufenthalt in den geschlossenen Emanatorien wird für die Arteriosklerotiker auch nicht als günstig bezeichnet werden können.

Die medikamentöse Therapie der Arteriosklerose, auch der zerebralen Form, wird seit jeher durch das Jod beherrscht. Der allgemeine Eindruck ist der, daß das Jod in vielen Fällen die Beschwerden der Arteriosklerotiker bessert, und vielleicht auch den Verlauf der Erkrankung verzögert oder aufhält. Aus dem letzteren Grunde ist es eine weit verbreitete Anwendungsweise, die Arteriosklerotiker mehrere Male im Jahre eine mehrwöchige Jodkur durchmachen zu lassen. Dabei stimmen fast alle erfahrenen Beobachter überein, daß man das Jod, wenn irgend möglich, in Form der Jodalkalien und nur, wenn es nicht anders geht, als organische Jodverbindung geben soll, und auch in der anorganischen Form in nicht zu kleiner Dosis. Als die mittlere, in den meisten, nicht in allen Fällen ausreichende Dosis wird man 2,5—3,0 g bezeichnen können.

Ein geringer oder sogar mäßiger Jodismus ist kein Grund, die Behandlung abzubrechen. Unzweckmäßig ist es, das Jod überhaupt dauernd durch viele Monate oder gar Jahre zu geben. Zur Vermeidung

des Jodismus wird empfohlen, Alkalien, also z. B. *Natr. bicarbonicum* mit dem Jod zu geben und dabei eine lakto-vegetabilische Ernährungsweise zu bevorzugen. Die organischen Jodpräparate (etwa Jodipin 1 g 3—4 mal täglich oder Sajodin 0,5 g 4—6 mal täglich) sollen nicht verworfen werden.

Aus der medikamentösen Therapie können wir mit einer Reihe von anderen Autoren, dann noch, und auch bei zerebralen Störungen, die Diuretinkuren (0,5—0,6 g 3 mal täglich 2—3 Wochen lang) empfehlen.

Den Mitteln, die die angeblich bei der Arteriosklerose verminderten Blut-salze ersetzen sollen (Antisklerosintabletten) scheint nach den meisten Berichten sowohl die theoretische Begründung wie der praktische Erfolg zu fehlen.

Zur Erweiterung der peripheren Gefäße und um dadurch den Blutdruck herabzusetzen, sind seit langer Zeit von einer Anzahl von Autoren die Nitrate (*Natr. nitrosum* 1—2: 200,0 g 3 mal täglich 1 Eßlöffel nach Senators Vorschrift zusammengelöst mit Jodkali), das Nitroglyzerin, neuerdings aus derselben Indikation das Vasotonin empfohlen worden.

Zu den Medikamenten, von denen man weiß, annimmt oder erwartet, daß sie auf die Blutgefäße und den Blutkreislauf wirken, kommen dann bei den nervösen Störungen der Arteriosklerose noch die Symptomatika für das Nervensystem. Hier erweist sich das Brom, und wieder parallel den Jodalkalien (s. oben), die Bromalkalien von der besten, manchmal für sich allein ausreichenden Wirkung gegen die diffusen Erscheinungen der zerebralen Arteriosklerose, Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Erregung. Wenn es, was wenigstens im Beginn der Behandlung meist zweckmäßig ist, einige Wochen dauernd gegeben werden soll, so kann man es mit dem Jod zusammen lösen und einnehmen lassen (2—4 g täglich). Später ist es vielfach vorzuziehen, das Brom nur nach Bedarf nehmen zu lassen, und man kann dann die Dosierung des Broms von Tag zu Tag intelligenten Patienten auch selbst überlassen. Bei jeder Form der arteriosklerotischen Epilepsie ist das Brom wie bei der genuinen Epilepsie anzuwenden (vgl. das Kap. Epilepsie).

Hypnotika wird man möglichst einschränken. Wie sonst auch, wird man jedoch auch bei Arteriosklerose, wenn Schlaflosigkeit vorliegt, bei sehr ruhebedürftigen und heruntergekommenen Kranken nicht zögern, die Behandlung mit einigen nicht zu kleinen Dosen von wirksamen Schlafmitteln (Veronal, Trional) zu beginnen, um sie allerdings sobald wie möglich wieder wegzulassen. Im übrigen ist gerade die arteriosklerotische Schlaflosigkeit oft ganz außerordentlich schwer zu bekämpfen. Die Verordnung auch der schwächsten Hypnotika (Bromural, Adalin) während des Tages zur „Beruhigung“, soll auf ganz seltene Fälle beschränkt bleiben — abgesehen natürlich von psychotischen Zuständen.

Die Antineuralgika wirken bei arteriosklerotischen Kopfschmerzen im allgemeinen wenig. Man mag sie aber versuchen.

So haben wir denn schließlich eine ganze Reihe von Maßnahmen, die, zweckentsprechend kombiniert, jedenfalls die Symptome und die

subjektiven Beschwerden des Kranken sehr häufig vermindern oder zum Schwinden bringen können — so fraglich es im einzelnen Falle immer sein wird, ob der Gang der Erkrankung selbst wesentlich beeinflußt werden konnte. Die Therapie einer begleitenden Nephritis oder einer Diabetes kann hier nicht besprochen werden.

Die Behandlung im apoplektischen Anfall ist eine sehr beschränkte. Ob die Apoplexie durch eine Embolie oder eine Blutung hervorgerufen ist, ist dabei gleichgültig. Denn wir können zunächst nichts weiter tun, als den Kranken vor Erschütterungen, weitem und ungeeignetem Transport möglichst in acht zu nehmen, ihn bequem mit mäßig erhöhtem Kopf lagern und ihm eine Eisblase auf den Kopf legen.

Wir haben uns dann sofort von der Füllung der Blase zu überzeugen, und bei starker Füllung zu katheterisieren.

In sehr schweren Fällen von Hirnbluten befürworten einige Autoren den Aderlaß. Ich habe mich von seinem Nutzen nicht überzeugen können.

Jedenfalls haben unsere Maßnahmen damit zunächst ein Ende.

In den ersten Tagen nach dem Insult entscheidet sich dann meist das Schicksal des Kranken. Wir haben hier nur auf eine zweckmäßige Ernährung zu achten, oder vielmehr nur darauf, daß durch unvorsichtige Ernährung nicht eine Schluckpneumonie entsteht. Es schadet nichts, wenn der Kranke die ersten Tage nach dem Insult ohne Nahrung bleibt. Pflege des Mundes ist selbstverständlich. Künstliche Ernährung durch Nährklysmen, im Falle gar keine Flüssigkeit genommen wird, auch eine subkutane Kochsalzinfusion mag manchmal angemessen erscheinen. Schlundsondenernährung kommt in den ersten Tagen nicht in Frage, kann aber etwa vom 4. Tage ab bei halbbenommenen Kranken, die sich leicht verschlucken oder gar nicht schlucken, von großem Vorteil sein.

Die Anschauungen darüber, wie lange man den Kranken ganz ruhig lassen soll, sind verschieden. Ich habe nicht den Eindruck, daß man dem Kranken durch vorsichtigen Wechsel der Lage des Oberkörpers, wie er auch sonst zur Vermeidung von Hypostase der Lunge geübt wird, nach Ablauf des 2. Tages etwas schadet. Wie lange man rekonvaleszente Kranke im Bett behält, wird dem persönlichen Ermessen überlassen bleiben. Im allgemeinen wird man das Empfinden haben, daß man gerade bei leichten Apoplexien, auch wenn sie bewegungsfähig sind, sehr vorsichtig zu sein hat, und sie etwa 3 Wochen zu Bett lassen. Andererseits wird man alte Leute auch mit schweren Hemiplegien, wenn irgend möglich, bald, wenigstens zeitweise, in einen Lehnstuhl bringen.

Hauptpflege, sowohl im allgemeinen wie speziell der vom Dekubitus gefährdeten Stellen (Wasserkissen!) und Sorge für die Darmentleerung sind natürlich nicht zu vergessen.

Wir haben dann endlich die Behandlung der Folgen einer Apoplexie zu besprechen. In Betracht kommen dabei wesentlich die Lähmungszustände der Körpermuskulatur und die aphasischen Zustände.

Was wir leisten können und zu leisten haben, dürfte etwa folgendes sein. Zunächst haben wir arthritisch-ankylosierende Veränderungen in der Schulter zu verhüten. Es kommen häufig Fälle zur Beobachtung, deren Armuskulatur wieder verhältnismäßig bewegungstüchtig geworden ist, und deren Beweglichkeitsbeschränkung zum größten Teil auf einer Versteifung des Schultergelenks (viel seltener anderer Gelenke) beruht. Das Eintreten dieser Versteifung kann wohl fast immer durch ausgiebige regelmäßige passive Bewegung des Humerus (Fixation des Schulterblattes!) verhindert werden. Ist die Versteifung erst da, so hat man mit ihrer Beseitigung durch passive Bewegungen, die jetzt dem Patienten sehr schmerzhaft sind, große Mühe. In solchen Fällen habe ich mit Erfolg als von einem unterstützenden Mittel von Fibrolysininjektionen Gebrauch gemacht.

Die passiven Bewegungen im Schultergelenk sind mit besonderer Aufmerksamkeit, aber doch zweckmäßig und natürlich nur als ein Teil einer allgemeinen Massage der gelähmten Extremitäten zu machen. Wenn die Lähmung nicht oder nicht mehr vollständig ist, so hat sich die Massage hauptsächlich den schwerer betroffenen Muskelgruppen zuzuwenden. Man beginnt zweckmäßig schon am Ende der ersten Woche nach dem Insult.

Zur Bekämpfung der Kontraktur ist es zweifellos zweckmäßig, die Glieder passiv in eine der zu erwartenden oder schon bestehenden Kontrakturstellung entgegengesetzte Stellung zu lagern.

Die systematische Übungstherapie kann erst längere Zeit nach der Apoplexie beginnen. Man muß sich in den einzelnen Fall vertiefen und allmählich die übriggebliebenen Bewegungsreste zu entwickeln versuchen. Man hat mit Energie zu versuchen, die Innervation der ungelähmten Muskeln zu veranlassen und zu verstärken, und weiter, die Dissoziation der Bewegungen zu erreichen bzw. Mitbewegungen auszuscheiden. Diese Übungen sind jedoch von dem allgemeinen Praktiker wegen der großen Zeit, die sie in Anspruch nehmen, kaum zu überwachen. Dasselbe gilt von der Übungstherapie der Aphasie.

Eine eigentliche Elektrotherapie wende ich in keiner Form an. Ich würde aus eigener Erfahrung kein genügendes Urteil darüber begründen können, wenn ich nicht wohl Hunderte von Hemiplegischen gesehen hätte, die allerorts und auch von berühmten Vertretern der Elektrotherapie mit dem galvanischen und dem faradischen Strom, mit Franklinisation und d'Arsonvalisation behandelt sind, und bei denen nach Lage der Dinge irgendein Resultat nicht zu erkennen war. Andererseits glaube ich, daß man der Elektrizität zu viel Ehre antut, wenn man glaubt, daß sie hier in irgend einer Form schaden könne. Wer an sie glaubt oder wer meint — und dies sind die Mehrzahl — sie aus Rücksicht auf das Publikum nicht entbehren zu können, ist freilich durch das autoritative Urteil der Mehrzahl der Neurologen heute noch gedeckt. Man bedenke auch, daß andere Methoden, insbesondere eine systematische Übungstherapie sehr viel mehr Zeit kosten als elektrotherapeutische Sitzungen.

24. Gehirnverletzungen.

Die Verletzungen des Gehirns sind sehr häufige Vorkommnisse. Im Krankenhaus Friedrichshain kommen im Jahre etwa 100 Fälle

schwerer Schädelverletzung zur Aufnahme, fast alle mit vorübergehenden oder dauernden Gehirnstörungen.

Stumpfe
Gewalt

Bei Einwirkung stumpfer Gewalt auf den ganzen Schädel kommen in vielen Fällen die Gehirnschädigungen zu gleicher Zeit mit Basisbrüchen zustande. Seltener sind die durch direkte Gewaltwirkung an umschriebenen Stellen zustande kommenden Schädelbrüche mit Gehirnverletzung an entsprechender Stelle. Es können aber auch Gehirnverletzungen ohne jegliche Schädelverletzung entstehen, und zwar nicht nur die allgemeine Hirnerschütterung, sondern auch lokale Quetschungsherde. Letztere kommen am häufigsten an der Stelle des „Coup“ und des „Contrecoup“, manchmal aber auch an entfernteren Stellen zur Ausbildung.

Die infektiösen Komplikationen der Schädel- und Hirnverletzung, Meningitis und Hirnabszeß werden an anderer Stelle behandelt.

Schädel-
verletzung

Wenn wir einen Kranken beurteilen wollen, von dem wir wissen oder vermuten, daß er eine Gehirnverletzung erlitten hat, werden wir trotzdem zuerst nach einer Schädelverletzung suchen, weil dadurch eine gewisse Schwere des Falles von vornherein gegeben ist. Direkter Nachweis einer Basisfraktur am Schädel selbst ist nun fast nie möglich, aber sichere Zeichen sind Ausfluß von Blut, Liquor oder Gehirnmasse aus dem Mund und Ohr. Blutausfluß insbesondere findet sich in $\frac{3}{4}$ aller Fälle von Basisfraktur. Ebenso sind Gehirnnervenlähmungen — Fazialis, Okulomotorius, Abduzens können wir ja auch bei benommenen Kranken beurteilen — sichere Zeichen einer Basisfraktur.

Gehirn-
verletzung

Nach diesen Feststellungen erst werden wir uns dem Zustand des Nervensystems zuwenden. Ist der Patient bei Besinnung, so ist die Untersuchung die gewöhnliche. Wir werden dann bald in der Lage sein, etwaige Herde durch die Untersuchung festzustellen. Ist der Patient benommen, so kann es sich entweder um eine *Commotio cerebri* oder um schwere Hirnquetschung oder um eine *Compressio cerebri* durch ein extrameningeales Blutestravasat aus der *Meningea media* handeln. Die Differenzierung der letzten Möglichkeit ist dabei die wichtige, weil in diesem Fall ein Eingriff erforderlich ist. Der wichtigste Faktor der Diagnose ist hier seit jeher das „freie Intervall“ und die allmähliche Zunahme der Erscheinungen bei der Meningeablutung. Ein langsamer und gespannter Puls (Druckpuls, S. 58) kann hinzukommen, auch einseitige Krämpfe, Mydriasis, Erbrechen können auf Hirndruck hinweisen, aber alles das kann fehlen und auch bei einfacher *Commotio cerebri* vorhanden sein. Die allmähliche Zunahme der Erscheinungen nach einem freien Intervall genügt für sich allein, um einen Eingriff zu rechtfertigen oder erforderlich zu machen. Es kann aber auch bei Hirndruck das freie Intervall fehlen, und dann ist die Diagnose manchmal nicht sicher zu machen. In solchen Fällen ist zu einer explorativen Hirnpunktion oder zur Anlegung eines kleinen Bohrloches an der wahrscheinlich betroffenen Seite, kontralateral also etwaigen Pyramidenzeichen oder Extremitätenkrämpfen zu raten. Von da aus

Blutung
aus der
Meningea

kann man dann mit der Uhrfedersonde die Dura vom Knochen abschieben und die Anwesenheit eines Hämatoms mit Sicherheit feststellen oder ausschließen. Besteht ein Hämatom, so ist es auszuräumen und die Meningea media zu unterbinden, ein Eingriff, der noch bei anscheinend Sterbenden einen lebensrettenden Erfolg haben kann.

Ist kein Hämatom da, so kommt eine chirurgische Therapie nur dann in Betracht, wenn eine Depressionsfraktur vorliegt. Jacksonsche Krämpfe, welche auf eine Reizung der motorischen Zone hinweisen oder andere Reizerscheinungen sind an und für sich noch keine Indikation zum chirurgischen Eingriff. Wenigstens ist der Eingriff aus solcher Indikation nicht eilig, und kann sogar schaden. Denn solche Reizungserscheinungen können bei Commotio, sie können bei traumatischen Rindenblutungen vorkommen und werden dann besser zunächst mit großen Bromdosen behandelt (5—10 g). Stellt sich heraus, daß sie auf diese Weise nicht zu beherrschen sind, hat man zu einem Eingriff in den ersten Tagen immer noch Zeit, um eventuell nach einem Knochensplitter oder dergl. zu suchen. Bei dem duralen Hämatom aber sind die Minuten kostbar.

Chirurgische Indikation

Als Commotio cerebri bezeichnet man im allgemeinen nur die vorübergehenden Störungen des Bewußtseins nach Schädelverletzungen. Diese Zustände können aber auch mehrere Tage dauern, ohne daß sie auf größeren Verletzungen beruhen. Es hat keinen Sinn, in diesen Zuständen chirurgisch zugreifen, die meist durch eine somnolente Unruhe hindurch zur Genesung gelangen.

Commotio

Begleiterscheinungen der Commotio, die oft mehrere Tage andauern, sind Schwindel und Erbrechen.

Für die Zeit des Unfalls und manchmal weit darüber hinaus besteht nach dem Erwachen häufig Amnesie. Die amnestische Lücke wird später meist bis zu einem gewissen Grade oder auch vollständig wieder ausgefüllt. Auch nach dem Erwachen bleibt die Aufnahmefähigkeit für neue Eindrücke zunächst noch gering und sie werden leicht wieder vergessen.

Psychische Störungen nach Trauma

In selteneren Fällen sind, und auch ohne daß völlige Bewußtlosigkeit vorhergegangen wäre, Dämmerzustände nach Kopftraumen beobachtet worden. So wird die Geschichte einer Hebamme erzählt, die, auf dem Wege zu einer Gebärenden von einer leichten Commotio getroffen, ihren Weg fortsetzte, die Entbindung besorgte und dann, nach Hause zurückgekehrt, jede Erinnerung an diese Tätigkeit verloren hatte.

Nicht häufig schließt sich an das Trauma, bzw. an die Commotio unmittelbar ein psychotischer Zustand an. Diese akute Kommutationspsychose geht aus dem Zustande deliranter Somnolenz hervor, den die abklingende Commotio gewöhnlich bietet. Sie besteht in einem Korsakowschen Symptomenkomplex (vgl. unter Polyneuritis) und zeigt dementsprechend bei leidlich erhaltener Auffassung und momentan guter Aufmerksamkeit, Erhaltensein des Gedächtnisses für frühere Daten, eine Störung der Orientierung, Reduktion der Merkfähigkeit, amnestische Defekte, die zum Teil retrograd sind, Neigung zum Konfabulieren und getrübbte Urteilsfähigkeit.

Die Kommutationspsychose kann in völlige Heilung oder Heilung mit Defekt ausgehen.

Eine besondere Bedeutung in der Unfallpraxis hat die Frage nach der traumatischen Spätapoplexie. Zweifellos gibt es Fälle, wo Tage oder Wochen nach einem Kopftrauma eine Hirnblutung eintritt, und wo wir den Zusammenhang anerkennen müssen. Diese Fälle sind

Spätapoplexie

aber sehr selten und nur mit größter Vorsicht und unter Würdigung aller erreichbaren anamnestischen Daten zu begutachten.

Umschriebene traumatische Herde

Über die Quetschungsherde und die intrazerebralen traumatischen Blutungen ist symptomatologisch nichts Besonderes zu sagen. Sie entsprechen durchaus den spontan eintretenden Herden. Wir haben Hemiplegie, Aphasien etc. Nur ist ihre Prognose besser, weil es sich einmal um jugendliche Individuen handelt, deren Gehirn noch mehr Ersatzmöglichkeiten hat, und weil sie meist die Rinde betreffen, während die thrombotischen Erweichungsherde, die spontanen Blutungen etc. häufig im Marklager sitzen.

Dauererfolge von Schädelverletzungen

Sehr lange Zeit nach dem Schädeltrauma können Kopfschmerzen und Schwindelanfälle bestehen bleiben, auch dann, wenn es sich nicht um traumatische Neurosen handelt. Infolge der Reizung der motorischen Region durch die infolge der Zertrümmerung des Gehirns sich bildenden Narben, Erweichungszysten, Verwachsungen des Gehirns mit den Meningen, kann es zu Spätfolgen, insbesondere dauernd bestehen bleibenden, in verschiedenen Intervallen sich wiederholenden Jacksonschen Anfällen kommen. Diese posttraumatischen Jacksonschen Anfälle sind ja der Typus der Jacksonschen Epilepsie überhaupt. Sie können auch in allgemeine Anfälle übergehen. Diese Jacksonschen Anfälle müssen operativ behandelt, etwaige Zysten eröffnet werden etc.

Durchaus zu unterscheiden von diesen Fällen klarer Ätiologie sind diejenigen, in denen eine Epilepsie nach einem Schädeltrauma entsteht, ohne daß eine zirkumskripte Gehirnverletzung nachweisbar wäre. Die Frage der traumatischen Entstehung einer echten Epilepsie ist ja noch nicht ganz klar. Jedenfalls ist eine Operation der nicht streng Jacksonschen Anfälle recht problematisch. Man findet meist nichts Grobes, was operativ beseitigt werden könnte und nur in seltenen Fällen wird man sich zu der Exstirpation des „primär krampfenden“ Zentrums entschließen.

Expektative Therapie

Die Therapie der Schädel- und Hirnverletzungen muß abgesehen von den wenigen von uns genannten Ausnahmen und den infektiösen Prozessen eine ganz expektative sein. Auch Schußverletzungen sind expektativ zu behandeln, selbst dann, wenn die Kugel sich im Gehirn befindet. Man sorge in der ersten Zeit nur für gute Pflege, Katheterisierung etc., sowie für Exzitierung mit Koffein. Dann lasse man die Kranken sehr lange liegen, bei einigermaßen schweren Erscheinungen mindestens 4—5 Wochen. Es scheint, als wenn eine Reihe von chronischen Beschwerden in einer Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßregel ihren Grund hätte. Elektrisieren während dieser Zeit halte ich für kontraindiziert, da es nur etwaige Beschwerden fixiert.

Elektrische Traumen

Auch elektrische Starkströme, wie auch Blitzschläge können organische Veränderungen des Gehirns und Rückenmarks hinterlassen. In der Mehrzahl der Fälle wirken sie allerdings entweder unmittelbar tödlich oder die Betroffenen erholen sich nach einem Stadium der Bewußtlosigkeit wieder vollständig.

25. Angeborene und früh erworbene Defekte und Entwicklungsstörungen des Gehirns. Zerebrale Kinderlähmungen.

Die angeborenen Erkrankungen des Gehirns sind zum Teil so hochgradig, daß sie mit der Fortdauer des Lebens nicht vereinbar sind. Dahin gehören die großen Defekte des Gehirns, Anenzephalie, Zyklenzephalie, die demnach praktisch nicht interessieren.

Die geringeren Defektbildungen, die also mit der Fortdauer des Lebens verträglich sind, kann man in solche teilen, die nur Allgemeinerscheinungen machen, und in solche, die neben den Allgemeinerscheinungen — sehr selten ganz ohne solche — auch lokale Ausfälle (Hemiplegie, Diplegien etc.) bedingen.

Die Allgemeinerscheinung der Defektbildungen des Gehirns ist die Imbezillität und die Idiotie. Die mangelhafte Entwicklung des Gehirns braucht sich am Schädel nicht kundzugeben. Einen anderen Teil dieser Kranken kann man bekanntlich schon an der Mikrozephalie erkennen.

Es seien hier die ungefähr normalen Schädelumfangsmaße des Kinderschädels (nach Bendix) wiedergegeben:

Ende des	1. Monats	35,4 cm
„ „	3. „	40,9 „
„ „	6. „	42,7 „
„ „	9. „	45,3 „
„ „	12. „	45,6 „
„ „	15. „	46,2 „
„ „	18. „	46,9 „
„ „	2. Jahres	48,0 „
„ „	3. „	48,5 „
„ „	4. „	50,0 „
„ „	5. „	50,0 „
„ „	6. „	50,9 „
„ „	7. „	51,0 „
„ „	8. „	51,3 „
„ „	9. „	51,7 „
„ „	10. „	51,8 „

Für den Erwachsenen läßt sich sagen, daß ein Umfang unter 52 cm mit normalen geistigen Fähigkeiten kaum vereinbar ist, ohne daß darüber hinaus etwa die geistigen Fähigkeiten proportional mit dem Umfange zunehmen.

Wie die Mikrozephalie bieten auch die Fälle von angeborenem Hydrozephalus, welche sich immer mit psychischen Störungen kombinieren, keine Schwierigkeiten der Erkennung. Das gleiche gilt von den Enzephalozelen (Hirnbrüchen).

**Turm-
schädel**

Als Turmschädel bezeichnet man eine Schädelform, bei der das Hinterhaupt gerade aufsteigt und der Kopf dann zu der flachen Stirn schräg, dachförmig, herabfällt. Diese Anomalie hat gewöhnlich gar keine nervös psychischen Folgen, führt aber, und zwar häufig, erst im späteren Leben aus nicht ganz aufgeklärter Ursache noch zu genuiner Optikusatrophie.

Ein besonderes Aussehen haben noch drei Formen der zerebralen Entwicklungsstörungen, der Kretinismus, das infantile Myxödem und der Mongolismus.

**Kretinis-
mus**

Der Kretinismus zeichnet sich außer durch die ganz eigentümliche Schädel- und Gesichtsform, die man nur einmal gesehen haben muß, um sie wiederzuerkennen, durch die Störungen des Wachstums aus. Selten erreichen die Kretins eine Körperlänge von mehr als 130 bis 140 cm, und der Körper bleibt während des Wachstums entsprechend zurück. Die Knochen sind dabei nicht unähnlich der Rachitis verformt, die Haut dick, die Genitalien fast immer unentwickelt. Der endemische Kretinismus ist meist mit Kropfbildung, selten mit Fehlen der Schilddrüse verbunden.

Der sporadische Kretinismus ist immer mit Aplasie der Schilddrüse verbunden, das Bild im übrigen ein sehr ähnliches. Die Verlangsamung des Wachstums, der Stillstand in der geistigen Entwicklung wird meist nach Ablauf des ersten Lebenshalbjahres deutlich.

**Infantiles
Myxödem**

Das infantile Myxödem ist dem der Erwachsenen (siehe unter Erkrankungen der Blutdrüsen) völlig analog, und entwickelt sich im Unterschied von dem sporadischen Kretinismus erst im mittleren Kindesalter.

Da die palpatorische Feststellung des Fehlens der Schilddrüse immer höchst zweifelhaft bleibt, muß die Diagnose der thyreoaplastischen Zustände aus dem Gesamtbilde gestellt werden.

**Mongolls-
mus**

Die „Mongolen“ sehen den Kretins ein wenig ähnlich. Der Name bezeichnet den Typ ganz gut: breite Backenknochen, schlitzförmige Augen, platte Nase. Eine bei ihnen besonders ausgesprochene — sich jedoch auch bei anderen Idioten und Imbezillen gelegentlich findende — Eigentümlichkeit ist eine große Schlapfheit der Gelenke. Mit der Schilddrüse hat aber der Mongolismus anscheinend nichts zu tun. Auch bleibt im Gegensatz zu den thyreogenen Erkrankungen das Längenwachstum des Körpers bei ihm ungestört.

**Schwach-
sinn**

Auf die Erkennung des kindlichen Schwachsinnns will ich hier nicht eingehen. Dieses Gebiet ist zu verzweigt, und zugleich in seinen Einzelheiten zu wichtig, als daß es möglich wäre, auch nur besonders wichtige Formen mit ein paar kurzen Sätzen hervorzuheben.

Die schweren Formen werden ja ohnehin meist sogar von den Eltern erkannt, die dann zum Arzt kommen, um sich über die Zukunft des Kindes beruhigen zu lassen, und die es dem Arzt gewöhnlich außerordentlich übelnehmen, wenn er doch nicht umhin kann, gewisse Vorbehalte nach dieser Richtung zu machen.

Die leichtesten Formen fangen erst auf der Schule an, sich bemerkbar zu machen. Auch dann ist es keine leichte Aufgabe, eine Lösung der Schwierigkeiten zu finden, die einerseits das objektive Wohl des Kindes wahr, und die Eltern, die bekanntlich mit besonderer Liebe

gerade an diesen minderbegabten Kindern hängen, in ihrem Selbstgefühl nicht verletzt.

Eine ganze Literatur ist in den letzten Jahrzehnten auch über die Erkennung der Schwachsinnigen beim Militär entstanden.

Eine besondere Form der Idiotie ist die amaurotische Idiotie, eine hereditär familiäre Erkrankung, die meist bei jüdischen Kindern im zweiten Lebensjahre beginnt und innerhalb weniger Jahren tödlich verläuft. Der spezifische Befund bei diesem Leiden ist eine scharfbegrenzte hellweiße Verfärbung der Macula lutea, in deren Mitte die Fovea centralis als ein kirschroter Punkt erscheint.

Amaurotische Idiotie

Eine eigentliche Therapie der angeborenen allgemeinen Entwicklungsstörungen des Gehirns gibt es nur in einer sehr kleinen Anzahl von Fällen. Eine operative Therapie kann und soll versucht werden in den Fällen von angeborenem und früh erworbenem Hydrozephalus. Es kommt hier in Frage die Punktion der Ventrikel durch den intakten Schädel, eine einfache und fast ungefährliche Maßregel, die beliebig oft wiederholt werden kann, und in einigen Fällen von gutem Erfolge ist. Eine eingreifendere, immerhin noch leichte Operation ist der Anton-Bramannsche Balkenstich, welcher durch eine breite Öffnung im vorderen Teil des Balkens die Ventrikel mit dem Subduralraum verbindet, so daß die Hydrozephalusflüssigkeit nach dem Subduralraum abfließen kann, eine schon in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen mit deutlichem Erfolg durchgeführte Operation. Zur Operation müssen endlich auch die Enzephalozelen gebracht werden.

Therapie

Der internen Behandlung mit Schilddrüsensubstanz oder Thyreoiodin ist zugänglich das kindliche Myxödem (über die Dosierung vgl. unter Myxödem), und wenn auch in beschränktem Maße und keineswegs regelmäßig der Kretinismus. Auch bei Mongolismus soll diese Medikation manchmal günstig wirken, und man kommt ohnehin in der Praxis oft dazu, sie versuchsweise auch bei anderen Formen des Schwachsinnis gelegentlich anzuwenden, aber fast immer ohne Erfolg.

Endlich muß bemerkt werden, daß in einer wenn auch nicht sehr großen Anzahl von Fällen kindlichen Schwachsinnis eine Lues der Eltern und bei den Kindern Wassermannsche Reaktion festgestellt wurde. Diese Fälle sind nicht etwa mit der juvenilen Paralyse zu verwechseln. Man wird bei ihnen jedenfalls die Behandlung der Syphilis versuchen müssen.

Die Therapie aller anderen Formen des Schwachsinnis und auch der soeben genannten dann, wenn die angeführten Maßregeln nichts nützen, muß ersetzt werden durch eine zweckmäßige Erziehung und Vorbereitung für bestimmte Berufe, bei weitem am besten in den eigens zu diesem Zwecke eingerichteten Anstalten. Wir besitzen ja eine größere Anzahl privater Anstalten der Art. Die Kommunen müßten freilich noch mehr leisten, um die Fürsorge für imbezille Kinder und Erwachsene zu organisieren.

Die lokalen Defekte des Gehirns wirken natürlich je nach ihrer Lokalisation. Es sei hervorgehoben, daß wir hier in dieser praktischen Zwecken dienenden Darstellung die früh erworbenen von den

Lokale Defekte

angeborenen Defekten nicht trennen wollen. Die vorliegende Schilderung bezieht sich also auch auf die Folgezustände der Enzephalitis bei Kindern. Beruhen doch die angeborenen Defekte zum Teil auf derselben Ursache wie die erworbenen, nämlich auf Entzündungen oder Blutungen in die Substanz des Gehirns. Auch entsteht ja in manchen Fällen die Störung bei der Geburt selbst.

Folgezu-
stände von
Enzepha-
litis

Prinzipiell kann es sich bei den lokalen Folgen der Hirndefekte der Kinder um nichts anderes handeln, wie um die gleichen Störungen, die wir beim Erwachsenen schon beschrieben haben, aber es sind doch Eigenschaften des Kindesalters, welche diesen Störungen eine besondere Form geben können.

Zerebrale
Kinder-
lähmung

So sind bei der zerebralen Hemiplegie der Kinder — zerebrale Kinderlähmung — für das Bild der Lähmung bezeichnend die schweren Wachstumsstörungen der Glieder der betroffenen Seite. Zum Teil mit diesen Wachstumsstörungen hängt der Umstand zusammen, daß die Kontrakturen der zerebralen Kinderlähmung meist bindegewebig und fix, nicht allein die dauernden Muskelkontraktionen des Erwachsenen sind (vgl. S. 35).

Die Stellung der gelähmten Extremitäten beim Kinde wird dann eine in den meisten Fällen ganz typische, die Hand ist in Beugung gegen den Unterarm fixiert, der Arm selbst adduziert und im Ellbogengelenk gebeugt. Der Fuß ist ein Pes equinovarus, die Achillessehne verkürzt. Kontrakturen finden sich auch in den anderen Muskeln des Beines, am stärksten meist in den Adduktoren des Oberschenkels. Die Sehnenreflexe sind nur beim Erwachsenen verstärkt, der Babinski ist meist positiv, kann aber auch negativ sein. Fehlen der Sehnenreflexe spricht immer für spinale Kinderlähmung.

In einer nicht kleinen Zahl von Fällen ist die zerebrale Kinderlähmung mit Athetose der Extremitäten (vgl. S. 35) kompliziert, die bei der Hemiplegie der Erwachsenen nur außerordentlich selten vorkommt.

Auffällig wenig oder gar nicht beteiligt ist bei der zerebralen infantilen Kinderlähmung der Fazialis, offenbar weil die andere Großhirnhemisphäre hier in noch viel vollkommenerer Weise für die verloren gegangene eintreten kann, als beim Erwachsenen (vgl. S. 30).

Rudimen-
täre
Formen

Nicht übersehen darf man die Fälle von nur eben angedeuteter zerebralen Hemiplegie im Kindesalter. Es handelt sich da manchmal nur um eine leichte Ermüdbarkeit und geringe Atrophie eines Beines. Spasmen sind kaum vorhanden, der Fuß erscheint ein wenig kleiner und hohler als der andere. Solche Kinder werden manchmal lange Zeit mit der Diagnose aller möglichen lokalen Erkrankungen, Hüftgelenksleiden u. dgl. behandelt.

Littlesche
Krankheit

Das Bild der doppelseitigen Gliederstarre oder Littleschen Krankheit oder zerebralen infantilen Diplegie ist in den schweren Fällen ein sehr prägnantes. In den schwersten liegen die Kinder wie ein harter Klotz im Bett und bleiben auch später — die Diplegien sind fast immer angeboren — unfähig zu Bewegungen. Es gibt solche Kranke in den Siechenhäusern, die dort viele Jahrzehnte ohne jede Möglichkeit einer spontanen Fortbewegung und mit nur sehr beschränkter Beweglichkeit

der oberen Extremitäten ihr Leben hinbringen. In freilich seltenen Fällen können dabei diese Kranken geistig rege sein.

Auch zu der infantilen Diplegie können die Erscheinungen der Athetose und auch gewisse pseudobulbärparalytische Erscheinungen, wie beim Erwachsenen (vgl. S. 34) treten.

Von den ganz schweren Fällen Littlescher Krankheit gibt es alle Übergänge bis zu den ganz leichten. Letztere können, wenn man sie im Liegen untersucht, einen fast normalen Befund bieten. Erst wenn sie gehen, sieht man die Steifigkeit des Ganges und die Tendenz, auf der Fußspitze zu gehen.

Mit den hemiplegischen und diplegischen Lähmungen mischen sich in ungefähr der Hälfte der Fälle Reizzustände: Jacksonsche und allgemeine epileptische Krämpfe. Epilepsie

Zerebellare Störungen kommen auch bei Kindern sowohl auf Grund angeborener Entwicklungsstörungen, wie auch entzündlicher Erkrankungen des Kleinhirns vor. Auch die angeborenen Fälle zeigen manchmal eine gewisse Besserung im Verlaufe der Entwicklung, so daß Kinder, die ausgesprochene zerebellare Symptome darboten, doch allmählich laufen lernen können. Zerebellare Störungen

Halb als lokale Störungen, halb als Folge der Intelligenzstörungen müssen die Sprachstörungen bei angeborenen Defekten des Gehirns aufgefaßt werden. Ausgesprochene Aphasien sind im Kindesalter ganz außerordentlich selten, Defekte und Verzögerung der Sprachausbildung sehr häufig. Genauer kann an dieser Stelle darauf nicht eingegangen werden (über Stottern vgl. weiter unten).

Ein Zurückbleiben und ein Stillstand der geistigen Entwicklung ist die gewöhnliche Folge der ausgedehnteren erworbenen Defekte, ebenso wie der angeborenen.

Die Therapie der zerebralen Hemiplegie muß vor allem versuchen, das Zustandekommen der fixen bindegewebigen Kontrakturen zu verhindern. Es gelingt das durch mechanische Dehnungen, Massage und passive Bewegungen der Gelenke, besonders in den nicht angeborenen Fällen. Diese methodisch täglich oder einen Tag um den anderen geübte Beaufsichtigung der gelähmten Extremitäten ist darum so wichtig, weil bei weiterem Wachstum nicht selten eine überraschend große Beweglichkeit der gelähmten Seite wiederkehrt, die nur durch die etwaige Verkürzung der Muskulatur nicht zum Ausdruck kommen kann. Es wird in dieser allerdings jahrelang durchzuführenden, vom Arzt zu beaufsichtigenden mechanischen Behandlung der Extremitäten im allgemeinen viel zu wenig getan. Wenn das Kind Intelligenz besitzt, kann man diese mechanische Behandlung von einem gewissen Alter ab mit einer systematischen Übungsbehandlung verbinden. Wachstumsstörungen sind durch entsprechend hergestelltes Schuhwerk zu korrigieren. Therapie

Mechanische Behandlung

Auch wenn schon leichte fixe Kontrakturen da sind, kann man mit methodischer Massage, Dehnung der verkürzten Sehnen, passiven Bewegungen und etwaiger Übungstherapie mehr erreichen, als selbst

in spezialistischen Kreisen bekannt ist. Geduld und Energie gehören freilich dazu. Das Elektrisieren nützt gar nichts.

Auch in den leichten Fällen von Diplegien (Littlescher Krankheit), d. h. in solchen, wo ausgesprochene fixe Kontrakturen fehlen, kommt man meist mit mechanischer und mit Übungsbehandlung aus. Jedenfalls wird in leichten Fällen der Zustand durch Tenotomie und orthopädische Operationen oft auch nicht besser, manchmal schlechter.

Ätiogra-
dische Be-
handlung

Diese eingreifenden Behandlungsmethoden sind vielmehr auf die schweren Fälle zu beschränken und hier nicht vor Vollendung des dritten Lebensjahres anzuwenden. Es kommen bei Littlescher Krankheit in Frage die Tenotomie bzw. plastische Verlängerung der Adduktoren, der Kniegelenkbeuger und der Achillessehne, Korrektur durch einen mehrere Wochen getragenen Gipsverband, und dann methodische Übung im Laufstuhl, wenn es nicht anders geht unter Verwendung von Schienenhülsenapparaten für beide Beine. Damit wurden von den Orthopäden in sehr vielen Fällen von Diplegie ausgezeichnete Resultate erzielt, ebenso wie in den Fällen von schwerer zerebraler Hemiplegie. An Arm und Hand lassen sich ja auch analoge Operationen machen, hier ist aber eine Verbesserung der Beweglichkeit bis zu einem Grade, daß ein praktischer Nutzen daraus hervorgeht, wohl ganz außerordentlich selten. Häufiger gelingt es durch Gipsverbände, Redressement, Tenotomie, Keilresektion etc. wenigstens ein kosmetisches Resultat zu erzielen. Auch die Nerventransplantation ist versucht worden.

Foerster-
sche Ope-
ration

Neuerdings ist zur Behandlung der allerschwersten Fälle von Littlescher Krankheit noch von ihrem Erfinder die „Foerstersche Operation“ vorgeschlagen worden, die Durchschneidung einiger hinterer Nervenwurzeln für die hintere Extremität, der Lumbalis II, III, V und Sakralis II. Diese Operation geht von der Tatsache aus, daß ein Einfluß der Sensibilität auf das Zustandekommen der spastischen (nicht der fixen!) Kontraktur besteht, und daß andererseits schwere Folgen für die Sensibilität durch die Erhaltung von Wurzeln zwischen den durchschnittenen vermieden werden. Die Operation kommt in Frage, wenn alle anderen Maßnahmen versagt haben. Aber sie bedarf einer monate- und jahrelangen Nachbehandlung durch Übung.

Deutlicher Schwachsinn ist eine Kontraindikation gegen jede eingreifende Behandlung.

Operation
bei Jack-
sonscher
Epilepsie

Eine Gehirnopoperation kommt in Frage bei denjenigen Fällen, welche mit einer Hemiplegie oder einer Diplegie zugleich Anfälle Jacksonscher Epilepsie zeigen. Wenn hier die Operation einen groben Befund ergibt, insbesondere entzündliche Zysten, so kann durch deren Eröffnung und Beseitigung eine wesentliche Besserung des Zustandes herbeigeführt werden. Für diejenigen Fälle, in welchen ein grober Befund nicht zu erheben ist, ist die Exstirpation der Rinde an der Stelle des „primär krampfenden Zentrums“ vorgeschlagen worden. Über den Erfolg dieser Operation, die man immerhin versuchen wird, ist ein abschließendes Urteil noch nicht möglich.

26. Die syphilogenen Nervenkrankheiten: Tabes. Paralyse. Lues cerebrospinalis.

a) Allgemeines zur Ätiologie und Diagnose.

Tabes und Paralyse sind ebenso syphilogene Erkrankungen als die Lues cerebrospinalis selbst. Inwieweit sie sich in einzelnen Punkten der Entstehung von der Lues cerebrospinalis im engeren Sinne unterscheiden, ist eine zweite Frage; es ist ja bekannt, daß man die Tabes und Paralyse als metaluetische Erkrankungen den echten luetischen gegenübergestellt hat, ohne daß wir uns, besonders nach den positiven Ergebnissen der Wassermannschen Reaktion bei diesen „metaluetischen“ Erkrankungen, darunter noch viel denken könnten. Man darf ferner heute behaupten, daß sowohl Tabes wie progressive Paralyse ausnahmslos syphilitischen Ursprungs sind. Wenn nicht alle Tabiker und Paralytiker wissen, daß sie Lues gehabt haben, so liegt das daran, daß Primär- und Sekundärstadium der Lues besonders bei der Frau, aber auch oft beim Manne so leicht verlaufen — das Sekundärstadium kann überhaupt fehlen — daß sie nicht nur vom Patienten selbst, sondern häufig auch vom Arzte als eine harmlose Bagatelle aufgefaßt werden. Es ist ja heute wohl bekannt, daß man diese Fälle von zweifelhaftem Primäraffekt häufig nur mit der Wassermannschen Reaktion identifizieren kann. Früher gab sich der Arzt oft damit zufrieden, den Primäraffekt zur Heilung gebracht zu haben. Man frage daher jedesmal, wenn ein Tabiker die luetische Infektion leugnet „Haben Sie mal etwas gehabt, wovon der Arzt gesagt hat, es ist nichts?“ Man wird darauf nicht selten noch eine bejahende Antwort bekommen. Es gibt aber auch Tabiker, die mit gutem Gewissen jede Wahrnehmung von Infektion verneinen, ebenso wie es Leute mit unzweifelhafter tertiärer Lues gibt, die von der Infektion nichts wissen.

Ein weiterer Grund dafür, daß man die syphilitische Wurzel der Tabes und der Paralyse nicht anerkannt hat, liegt daran, daß man früher eine Reihe von Erkrankungen zur Tabes und besonders zur Paralyse gerechnet hat, die wir heute davon unterscheiden, und die auch keinen syphilitischen Ursprung haben, wie z. B. arteriosklerotische Prozesse und polyneuritische. Es wird darauf noch eingegangen werden.

Anzuerkennen als wesentliche Differenzpunkte zwischen der Lues cerebrospinalis einerseits und der Tabes und Paralyse andererseits ist allerdings die Verschiedenheit des mittleren Intervalls zwischen luetischer Infektion und nervöser Erkrankung. Bei Tabes und Paralyse beträgt es im Mittel 10—15 Jahre, nicht ganz selten einige Jahre weniger, ganz selten geht es bei der Paralyse bis auf zwei Jahre herunter. Dagegen kann die Lues cerebrospinalis zwar auch diese langen Intervalle haben, aber sie tritt doch häufig schon in den ersten Jahren nach der Infektion auf, nicht so ganz selten schon im Sekundärstadium. Betrachtet doch Ehrlich die Neurorezidive als sekundäre Symptome der Lues an den

Tabes und
Paralyse
syphilogen

Intervall
zwischen
Infektion
und Er-
krankung

Neuro-
rezidive

Hirnnerven, und es ist sicher, daß sie, wenn auch wohl seltener, auch ohne Salvarsanbehandlung vorkommen (vgl. unter Therapie).

Eine weitere Differenz ist die geringe therapeutische Beeinflussbarkeit der Tabes und Paralyse im Gegensatz zur Lues cerebrospinalis.

Gemeinsame Symptome Die gleichartige Wurzel der drei Erkrankungsformen weist sich nun auch aus in einer bis zu einem gewissen Punkte gemeinsamen Symptomatologie.

Pupillenstarre Von den Zeichen auf dem Gebiete des Nervensystems ist es eins, das allen syphiligenen Erkrankungen gemeinsam ist, die reflektorische Pupillenstarre (S. 7). Die reflektorische Pupillenstarre oder das Argyll-Robertson'sche Phänomen ist nicht nur ein sicheres Zeichen einer organischen Erkrankung des Nervensystems, als welches wir es früher betrachteten, sondern es ist das einzige Symptom, welches zugleich einen Schluß auf die Ätiologie zuläßt, und zwar auf die Lues als Ätiologie; man kann schätzen, daß das Symptom in etwa der Hälfte aller Fälle syphilogener Erkrankung vorhanden ist, und das ist um so wertvoller, als es in sehr vielen Fällen ein Frühzeichen, in vielen das überhaupt erste ist.

Es soll nicht verschwiegen werden, daß das Symptom in vereinzelten Fällen auch bei schwerem chronischem Alkoholismus, vorübergehend auch nach Schädeltrauma gesehen wird. Jedenfalls kann man viele Tausende von Nervenfällen sehen, ohne auch nur einmal eine Ausnahme von der Regel des syphiligenen Ursprungs feststellen zu können.

Es ist ganz merkwürdig, wie die Ausnahmen irgend einer Regel im allgemeinen überschätzt werden. Kaum ist so eine enorm seltene Ausnahme irgendwo publiziert, so ist sie fast bekannter als die Regel und man kann mit Sicherheit darauf rechnen, daß sie einem in ganz zweifelsfreien Fällen entgegengehalten wird.

Absolute Starre Der Wert der absoluten Starre (vgl. S. 8) ist nicht ganz der gleiche, wie der des Argyll-Robertson'schen Phänomens. Auch sie ist zwar in den meisten Fällen syphiligenen Ursprungs, und ist in einer Anzahl von Fällen auch aus der reflektorischen Starre hervorgegangen, aber da sie eben bei allen Prozessen jedweden Ursprungs, die sich am Okulomotoriuskern oder im Okulomotoriusstamm lokalisieren, vorkommt, so ergibt hier erst die übrige Untersuchung, ob sie ein Beweis gerade für eineluetische Affektion ist; wenn wir etwa fehlende Patellarreflexe, lanzinierende Schmerzen und absolute Starre zusammen haben, so handelt es sich sicher um eine absolute Starre bei Tabes. Wenn wir aber z. B. absolute Starre mit Pyramidensymptomen an den Beinen haben, so muß erwogen werden, ob es sich um einen syphilitischen Prozeß in der Höhe des Okulomotorius oder etwa um einen nichtsyphilitischen Tumor daselbst handelt.

Wassermannsche Reaktion Das zweite Symptom, welches den drei genannten Krankheiten zusammen zukommt, hat die Neurologie der Serologie zu danken, es ist die Wassermannsche Reaktion. Sie ist in zweifelhaften Fällen durchaus unentbehrlich. Weder der Praktiker, noch auch der Neurologe wird sie im allgemeinen selbst ausführen, sondern wird sich an ein zuverlässiges Institut wenden. Wenn sie aber zuverlässig und mit allen Kautelen ausgeführt ist, ist sie oft entscheidend für Diagnose und Therapie, und zwar trifft es sich bequem, daß wir eigentlich praktisch nur ganz

selten die Reaktion im Liquor cerebrospinalis brauchen, sondern daß die Reaktion im Blut viel bessere Dienste leistet ¹⁾).

In bezug auf die drei uns hier beschäftigenden Formen ist zu sagen, daß die Wassermannsche Reaktion im Blut fast ohne Ausnahme (ca. in 98 %) positiv ist bei progressiver Paralyse, ein wenig seltener bei Lues cerebrospinalis, während sie bei Tabes in kaum mehr als 60 % der Fälle positiv ist.

Daraus folgt, daß in zweifelhaften Fällen ein negativer Ausfall der Wassermannschen Reaktion im Blut so gut wie unbedingt beweisend gegen progressive Paralyse ist, daß er auch sehr stark gegen Lues cerebrospinalis ins Gewicht fällt, immerhin aber nicht so stark, daß man darauf allein den Verdacht fallen lassen könnte; es folgt weiter, daß ein negativer Ausfall nicht gegen Tabes verwertet werden kann. Ein positiver Ausfall läßt natürlich alle drei Möglichkeiten, aber eben nur diese offen.

Die Wassermannsche Reaktion kann bei allen syphiligen Erkrankungen negativ werden durch eine spezifische Kur, sowohl mit Hg wie Salvarsan. Man frage also, ob solche Kuren in letzter Zeit stattgefunden haben.

Es kann sich auch einmal bei einem Syphilitischen eine nicht syphilogene Erkrankung des Nervensystems, z. B. ein Gliom des Gehirns ausbilden, und dann die Wassermannsche Reaktion irreführen, aber das ist ganz außerordentlich selten. Eine Luesanamnese ohne Wassermannsche Reaktion ist bei nichtsyphilitischen Erkrankungen schon häufiger, aber die Regel bleibt es immer, bei jedem früher einmal syphilitisch gewesenem, der nervös oder nervenkrank wird, zuerst ernsthaft alle Möglichkeiten einer luetischen Erkrankung durchzudenken.

Man kann auch die Frage aufwerfen, wann man denn eine Wassermannsche Reaktion machen lassen soll. Ich glaube, daß das im allgemeinen jetzt unnötig oft geschieht. Man ist oft überrascht zu hören, daß bei Symptomen, die auf Lues gar nicht verdächtig sind, sofort eine Wassermannsche Reaktion gemacht worden ist, die den Patienten nur beunruhigt hat. Ebensowenig braucht man auch die Wassermannsche Reaktion bei ausgesprochener Paralyse oder wenn ein etwa 40jähriger Mann, der die Lues konzidiert, eine Hemiplegie erlitten hat. Dann ist die Lues ohne weiteres klar.

Noch ein drittes gemeinsames Merkmal aller drei syphiligen Affektionen ist zu nennen, die Lymphozytose der Lumbalflüssigkeit (vgl. S. 55). Sie ist aber zwar fast in allen Fällen vorhanden, aber doch eben nicht spezifisch für die drei, sondern nur ein Zeichen meningitischer Reizzustände, die sich auch auf anderer als syphilitischer Basis ausbilden können, und seit der Einführung der Wassermann-

Lympho-
zytose der
Lumbal-
flüssigkeit

¹⁾ Weil nämlich merkwürdigerweise bei der Lues cerebrospinalis zum Unterschied von der Paralyse die Reaktion im Liquor meist negativ ist, wenigstens bei der bisher üblichen Technik. Neuerdings ist man mit Versuchen darüber beschäftigt, inwieweit die Reaktion bei Verwendung größerer Liquormengen, als man sie bisher zur Anstellung der Reaktion verwandte, doch noch positive Resultate ergibt.

schen Reaktion hat sie selbst im Krankenhausbetrieb zur Erkennung der syphilogenen Erkrankungen sehr an Wichtigkeit verloren. In der allgemeinen Praxis wird man sie hier wegen der früher (S. 55) erwähnten Unbequemlichkeiten der Lumbalpunktion fast gar nicht anzuwenden brauchen.

b) Tabes.

Was nun die besonderen Bilder der drei uns beschäftigenden Erkrankungen anlangt, so wenden wir uns zuerst zur Tabes.

Das Bild der ausgesprochenen Tabes ist so bekannt, daß ich in diesem für den Praktiker bestimmten Buche eigentlich nur an die Hauptsymptome zu erinnern brauche: Die Ataxie, die in den höchsten Graden den Kranken ans Bett fesseln kann, sich in geringeren Graden als „schleudernder Schritt“ markiert, meist mit dem nach hinten durchgedrückten Knie (Folge der Hypotonie S. 50), das Fehlen der Sehnenreflexe, die Optikusatrophie, die lanzinierenden Schmerzen, die Krisen, von denen die Magenkrisen die häufigsten sind, die Störungen der Harnentleerung, die Arthropathien.

Aber auf dieses Gesamtbild dürfen wir nicht warten, bis wir die Diagnose Tabes stellen, wenn wir vielleicht noch vorbeugend eingreifen wollen; wir sind vielmehr immer mehr dahin gekommen, aus wenigen Symptomen die Diagnose zu stellen und es sind schon lange nicht mehr die klassischen Symptome (neben der Ataxie die Pupillenstarre, Verlust der Patellarreflexe und lanzinierende Schmerzen), die allein zur Diagnose berechtigt. Wie weit man da gehen darf, darüber kann man natürlich keine ganz bestimmten Vorschriften geben.

Über die Erkennung der Ataxie (Rombergsches Phänomen etc.) ist S. 49 zu vergleichen. Eine Ataxie ohne Fehlen der Achilles- oder Patellarreflexe kommt kaum vor, wohl aber das Umgekehrte (sogenanntes präataktisches Stadium der Tabes).

Was die Reflexe betrifft, so hat sich der Achillessehnenreflex als beinahe ebensowichtig gezeigt, als der Patellarreflex. Man kann aus dem Fehlen der Achillessehnenreflexe und dem Argyll-Robertsonschen Phänomen die Diagnose ebensogut stellen, wie aus dem Fehlen der Patellarreflexe und dem genannten Phänomen. Ja, wenn eine Lues konzidiert ist, der Mann etwa über lanzinierende Schmerzen klagt, und wir finden dann nichts weiter als die Achillessehnenreflexe, oder auch nur einen, zuverlässig fehlend, so kann das zur Diagnose Tabes durchaus genügen. Ebenso sind Magenkrisen und Fehlen des Patellar- oder des Achillessehnenreflexes hinreichend.

Bei fehlenden Reflexen macht eigentlich nur eine Erkrankung Schwierigkeiten, d. i. die Polyneuritis oder die Neuritis, und das um so mehr, als längst abgelaufene Neuritiden noch Monate und Jahre ein Fehlen der Sehnenreflexe hinterlassen können. Insbesondere ist es die Neuritis ischiadica, welche die Achillessehnenreflexe bedroht (vgl. S. 85). Aus den Sehnenreflexen allein die Diagnose zu

stellen, ist also gefährlich. Ein Hilfsmittel ist bei der Diagnose aus den Sehnenreflexen die Schmerzhaftigkeit der Nervenstämme bei den meisten Formen der Neuritis, während sie bei der Tabes geradezu auffallend unempfindlich sind. Damit hängt zusammen, daß bei der Tabes gewöhnlich eine hochgradige Hypotonie besteht, während die Polyneuritis, auch die nicht gerade mehr floride, gegen eine Überstreckung der Glieder und die damit verbundene Dehnung der Nerven gewöhnlich außerordentlich empfindlich ist. Hypotonie und Fehlen der Sehnenreflexe spricht sehr für Tabes. Das Vorhandensein ausgesprochener motorischer Ausfallserscheinungen (z. B. Peroneuslähmung) spricht sehr für Neuritis, aber sie können eben auch bei Neuritis fehlen und in — wenn auch außerordentlich seltenen Fällen — bei Tabes vorkommen.

Sehr schwierige Fälle der Art lassen sich manchmal nur durch die Lumbalpunktion und den Nachweis der Lymphozytose der Lumbalflüssigkeit bei Tabes aufklären. Dabei ist dann noch zu erwähnen, daß bei unserer Arbeiterbevölkerung manchmal Tabes und Alkoholpolyneuritis zusammen vorkommen.

Nicht gerade häufig, aber immerhin erwähnenswert sind diejenigen Fälle, wo die Tabes sich zunächst an den oberen Extremitäten lokalisiert und Ataxie und Sehnenreflexe an diesen die Diagnose geben müssen (Tabes superior). Daß die oberen Extremitäten sich in den späteren Stadien an dem tabischen Prozeß beteiligen, ist ganz gewöhnlich.

Tabes
superior

Die tabischen Schmerzen sind bekanntlich gewöhnlich von typisch lanzinierendem, blitzartigem, schießendem Charakter und können anfallsweise, länger oder kürzer dauernd, mit längeren oder kürzeren Intervallen auftreten. Je nach der Art der Entwicklung des tabischen Prozesses können sie an jeder Stelle des Körpers (auch im Gesicht) auftreten. Es gibt aber auch Tabiker, die gar keine Schmerzen haben, und nie welche gehabt haben.

Schmerzen

Eng verschwistert mit den tabischen Schmerzen sind die tabischen Krisen; die häufigsten sind die Magenkrisen mit dem schrecklichen Erbrechen und Würgen, die plötzlich einsetzen und ebenso plötzlich verschwinden. Allein auf die Magenkrisen hin darf man aber die Tabes nicht diagnostizieren, wenngleich die Fälle von „periodischem Erbrechen“ fast alle Tabes sind. Es finden sich hier aber eben doch wohl immer noch andere tabische Zeichen. Sind solche andere tabische Zeichen nicht da, so ist man doch nie sicher, daß nicht irgend ein organisches Magen- oder Gallenleiden vorliegt. Ich erinnere mich an eine Patientin, die nur dreimal in ihrem Leben in Abständen von je einem Jahr „Magenkrisen“ gehabt haben wollte, bei der wir die anderwärts gestellte Diagnose Tabes aber nicht anerkennen konnten, und die dann plötzlich durch Perforation eines Ulcus der hinteren Magenwand zugrunde ging. Häufiger allerdings ist das Gegenteil, daß nämlich ganz sichere Tabiker jahrelang als Magenkranke behandelt werden. Darmkrisen, Kehlkopfkrisen, Blasenkrisen sind auch noch recht häufig. Es gibt aber keine sensible Fläche des Körpers, die nicht von der tabischen Erregung in Form von

Krisen

Krisen befallen werden könnte, z. B. gibt es Augenkrisen, Klitoris-krisen etc.

Arthro-
pathien
Spontan-
frakturen

In bezug auf die Arthropathien und Spontanfrakturen ist zu bemerken, daß sie sehr häufig ein frühes Symptom der Tabes darstellen, manchmal das Symptom, was den Kranken zuerst zum Arzte führt. Man darf bei allen aus anscheinend unbedeutender Ursache hervorgegangenen derartigen Zuständen nie versäumen, auf Tabes zu untersuchen, und wird, wenn Tabes vorliegt, auch immer andere Zeichen von Tabes schon finden. Wegen der Erkrankung der tiefen Sensibilität zeichnen sich diese sonst so schmerzhaften Erkrankungen der Knochen und Gelenke bei Tabes häufig durch vollkommene Schmerzlosigkeit aus.

Blasen-
störungen

Selten werden wir in der Anamnese von Tabikern Angaben von Blasenstörungen vermissen und man soll immer danach fragen. Wir hören, daß der Kranke zeitweise lange warten müsse, bis der Harn kommt, ja, daß er einen Tag mal habe gar keinen Urin lassen können, daß immer einige Tropfen des Urins in die Kleider gingen etc. Manchmal ist der Kranke sogar ganz zufrieden, seltener als früher Urin lassen zu müssen. Auch Harndrang kommt vor und steht den erwähnten Blasenkrisen nahe. Sehr früh tritt manchmal Zystitis ein, und ein Teil der Tabiker geht zuerst zum Urologen.

Darmen-
t-leerung

Die Störungen der Stuhlentleerung sind weniger auffällig und dem Patienten weniger unangenehm, bewegen sich aber in derselben Richtung wie die Blasenstörungen. In schweren Fällen haben wir unwillkürliche Entleerungen, von denen der Kranke (wegen der fehlenden Sensibilität seiner Schleimhäute) nichts merkt.

Potenz
Sensibili-
tät

Der Verlust der Potenz ist häufig ein frühes Symptom der Tabes.

Wir erkennen die Tabes hauptsächlich an den Störungen der tiefen Sensibilität (Ataxie, fehlende Sehnenreflexe, Hypotonie s. S. 50), aber es ist natürlich, daß da ja alle sensiblen Fasern in den hinteren Wurzeln verlaufen, auch die oberflächliche Sensibilität (der Haut) bei Tabes nicht ganz verschont bleiben wird. Wir finden denn auch häufig Störungen der Berührungsempfindung. Besonders bekannt ist die „Hitzigsche Zone“, ein hypästhetisches Gebiet, das den Rumpf ringförmig umgibt. Diagnostisch ist mit diesen hypästhetischen Zonen nicht viel anzufangen, sie unterstützen meist nur ohnehin schon sichere Diagnosen. Wichtig ist, daß ihnen oft subjektive unangenehme Empfindungen entsprechen (Gürtelgefühl etc.).

Augen-
muskel-
paresen

Von eigentlich motorischen Störungen sind bei der Tabes Augenmuskellähmungen auch als Frühsymptom sehr häufig, meistens allerdings nur sehr vorübergehender Art, so daß man nur anamnestisch vorübergehendes Doppeltsehen ermitteln kann.

Läh-
mungen

Es kommen auch dauernde schwere Lähmungen aller Art und jeder Lokalisation bei Tabes vor, aber sie sind selten und werden hier nur erwähnt, damit man die Diagnose Tabes in einem entsprechenden Fall nicht der Lähmung wegen aufgibt. Zur Diagnose genügen sie allein natürlich nie. Erwähnt seien noch als verhältnismäßig häufig die Kehlkopflähmungen, z. B. die der Postici.

Selten ist ein Babinskischer Reflex bei Tabes. Wenn er da ist, ist er ein Zeichen entwederluetischer Erweichungsherde im Gehirn oder auch einer die Tabes in seltenen Fällen komplizierenden Degeneration der Seitenstränge (Tabes combiné).

Erwähnt sei endlich die nicht seltene Komplikation der Tabes mit syphilitischen Herz- und Gefäßerkrankungen, hauptsächlich Aortenaneurysma und Aorteninsuffizienz. Diese Erkrankungen verlaufen sehr häufig bei der Tabes mit nur sehr geringen Beschwerden, so daß man sie erst bei der darauf gerichteten Untersuchung zufällig entdeckt. Über die tabische Optikusatrophie vgl. S. 14 u. 51.

Herz- und
Gefäßer-
kran-
kungen

c) Lues cerebrospinalis.

Die Lues cerebrospinalis im engeren Sinne kann so ziemlich alle Symptome machen, die es überhaupt auf dem Gebiete des Nervensystems gibt. Wollen wir in diese Vielheit etwas Übersichtlichkeit bringen, so können wir zunächst drei große Gruppen bilden, die des Gefäßverschlusses, die der gummösen Erkrankungen des Zentralorgans und die meningitischen Erkrankungen.

Um vorher zunächst noch einmal auf die allen syphiligen Erkrankungen gemeinsamen Symptome (S. 166) zurückzukommen, so sei erwähnt, daß die reflektorische Pupillenstarre bei Lues cerebrospinalis zwar häufig, aber doch lange nicht so häufig ist, wie bei der Tabes und Paralyse.

Dagegen ist ein Augenhintergrundsymptom bei der Lues cerebrospinalis häufig, das bei der Tabes und der Paralyse überhaupt nicht vorkommt, die Neuritis optica.

Neuritis

Die Symptome der ersten der von uns bezeichneten Gruppen, der Gefäßform, die auf der sogenannten Endarteriitis obliterans syphilitica beruht, sind bei weitem am häufigsten die des Gefäßverschlusses und unterscheiden sich dann an und für sich in gar nichts von den Symptomen der Gefäßverschlüsse auf anderer, insbesondere arteriosklerotischer Grundlage. Vor allem sei bemerkt, daß diese Symptome, trotzdem der zugrunde liegende thrombotische Prozeß sich natürlich über längere Zeit hinzieht, doch sehr häufig ziemlich plötzlich und oft ganz apoplektisch eintreten. Hinweisend ist auf den ersten Blick hauptsächlich das Alter der Erkrankten. Jeder jüngere Mensch — sagen wir etwa bis zum Alter von 45 Jahren —, der aus anscheinender Gesundheit heraus eine Apoplexie erleidet, ist auf Lues mindestens sehr verdächtig. Embolien vom Herzen aus kommen natürlich in jedem Alter auch vor, sind aber doch seltener und fast immer mit einem groben Befund am Herzen verbunden.

Vaskuläre
Form

Apoplexie
jugend-
licher
Personen

Die Symptome des Gefäßverschlusses richten sich ganz nach dem Gefäß, das verschlossen wird. Wir haben also Hemiplegien, Aphasien aller Art, und auch andere Hirnsymptome etwa in derselben Häufigkeitsskala, wie sie auch bei der Arteriosklerose vorkommen. Besonders zu erwähnen ist auch das Vorkommen von Gefäßverschlüssen im Rückenmark, wo denen der Quermyelitis (S. 97) ganz gleiche Bilder hervorgerufen werden können.

Myelitis

Hirnblutung
Aneurysmen

Andere Folgen der syphilitischen Gefäßerkrankung sind die Hirnblutung und die großen Aneurysmen der Hirnarterien (nicht die „miliaren“, welche vielmehr arteriosklerotischen Ursprungs sind S. 143). Die Hirnblutung unterscheidet sich wieder an und für sich nicht von der Hirnblutung aus anderer Ursache; das Aneurysma macht entweder gar keine oder in einer Minderzahl der Fälle die Symptome eines Tumors, bis zu dem Augenblick, wo es platzt.

Gummöse Form

Wenn die Symptome der „vaskulären Form der Syphilis“ eben an und für sich nur die der Gefäßerkrankung sind, so sind die der gummösen Form wieder ähnlich denen des Tumors. Denn auch das Gomma ist ja ein Tumor. Die Ähnlichkeit der beiden Prozesse geht so weit, daß solange wir noch nicht die Allgemeinzeichen der Syphilis so genau kannten — Wassermannsche Reaktion und Lumballymphozytose sind ja ganz neue Errungenschaften —, jeder Tumor zunächst antisiphilitisch behandelt wurde, weil sich Lues nicht ausschließen ließ.

Wie die vaskuläre Lues kann sich auch die gummöse überall lokalisieren, sie kann die Symptome der Tumoren jeden Sitzes, insbesondere nicht nur die des Hirntumors auch die des Rückenmarkstumors machen.

Meningitische Form

Die gummöse Form der Lues hängt nun mit der dritten von uns genannten Hauptform der Lues eng zusammen, mit der meningitischen. Denn die Meningitis ist in den meisten Fällen teilweise eine gummöse, und zwar lokalisiert sich diese gummöse Meningitis mit Vorliebe an der Basis des Gehirns. Deswegen sind basale Symptome immer in hohem Grade auf Syphilis verdächtig und insbesondere ist es bekannt, daß der Okulomotorius durch die Syphilis besonders gefährdet ist. Augenmuskellähmungen und Ptosis sind tatsächlich in der großen Mehrzahl der Fälle auf diese Weiseluetischen Ursprungs und daher immer in hohem Maße geeignet, von vornherein den Verdacht auf Syphilis zu lenken. Aber vergessen darf man die Syphilis überhaupt bei keinem Symptomenkomplex, der auf eine lokale Infiltration oder Reizung der Hirn-Rückenmarkshäute hindeutet.

Basale Symptome

Okulomotorius

So hat sich die früher als besondere Krankheit beschriebene Pachymeningitis cervicalis hypertrophica ganz in die Syphilis aufgelöst.

Die Allgemeinsymptome der Meningitis brauchen bei derluetischen nur sehr gering sein und beschränken sich häufig auf Schwindel und Kopfschmerzen, allgemeine Mattigkeit und dergl. Sie können jedoch auch zu den höchsten Graden meningitischer Drucksteigerung fortschreiten, wenn auch immer sehr viel langsamer als bei den Formen der eigentlichen infektiösen Meningitis. Etwaiges Fieber ist meist gering.

Pachymeningitis haemorrhagica

Die Pachymeningitis haemorrhagica ist eine seltenere Erkrankung, die verhältnismäßig oft die Paralyse kompliziert, aber auch isoliert vorkommt. Nicht selten führt sie zu einseitigen Jacksonschen Krämpfen. Die Symptome sind im übrigen denen der leptomeningitischen sehr ähnlich. Die Lumbalpunktion kann eine hämorrhagische Beschaffenheit zeigen.

Syphilitische Kopfschmerzen]

Nicht zu vergessen sind an dieser Stelle die zum Teil auf meningitischer Reizung beruhenden Kopfschmerzen der Luetiker,

die im übrigen gar keine manifesten Symptome von Lues darzubieten brauchen. Niemals vergesse man, wenn man glänzende therapeutische Resultate erzielen will, diese Möglichkeit, wenn ein Patient über Tag und Nacht, besonders aber Nachts, andauernde Kopfschmerzen klagt.

Die drei von uns geschilderten Gruppen kommen häufig genug isoliert vor, aber sie verbinden sich erstens oft miteinander oder machen diffuse oder multiple Erkrankungen. So müssen wir hinweisen besonders auf die diffusen Formen der Hirnsyphilis, welche nur zu sehr geringen Herdstörungen, vorzugsweise vielmehr zu psychischen Symptomen führen, oder auch zu echter Epilepsie. Ein Teil der sogenannten „Spätepilepsien“ ist syphilitischen Ursprungs.

Diffuse
Hirn-
syphilis

Syphi-
litische
Psychose

Syphi-
litische
Epilepsie

Auch diffuse, auf große Gebiete des Rückenmarks sich erstreckende syphilitische Prozesse kommen vor. Manchmal sind anscheinend nur die Pyramiden doppelseitig betroffen (syphilitische spastische Spinalparalyse, Erbsche Paralyse).

Diffuse
Rücken-
marks-
syphilis

d) Progressive Paralyse.

Wenngleich die progressive Paralyse eine syphilogene Erkrankung des Gehirns ist, so ist sie keineswegs eine beliebige diffuse Hirnsyphilis. Vielmehr sei es gleich vorausgeschickt, daß die Paralyse gekennzeichnet ist durch einen besonderen histologischen Prozeß, zu dem neben Zell- und Faseratrophien eine lange unbekannt gebliebene Plasmazell-anhäufung um die Gefäße der Rinde gehört. Es ist das darum auch für den Praktiker wichtig, weil wir heute in der Lage sind, post mortem durch die histologische Untersuchung festzustellen, ob jemand an Paralyse gelitten hat oder nicht, eine Entscheidung, die für forensische Zwecke — nicht gerade gegenüber der Lues cerebrospinalis — aber gegenüber anderen, z. B. alkoholistischen Psychosen nicht so ganz selten erfordert wird.

Die Symptome der Paralyse werden eingeteilt in somatische und psychische. Somatische Symptome sind in allererster Linie Pupillenstarre oder Fehlen der Patellar- und Achillessehnenreflexe. Das Fehlen der Patellar- oder Achillessehnenreflexe bedeutet eigentlich nur leichte Andeutungen einer Kombination der Paralyse mit Tabes, und es kommen von hier bis zur Kombination der ausgesprochenen schweren Tabes mit der Paralyse (Taboparalyse) alle Übergänge vor. Wir diagnostizieren also die Paralyse in diesem Falle eigentlich aus der Tabes. Die Paralyse ist dann aber das praktisch bei weitem wichtigere und es kann in diesem Sinne gar nicht genug betont werden, daß nicht nur jedes — seltene oder häufige — Zeichen der Tabes bei Paralyse vorkommt, sondern auch, daß jedes tabische Zeichen Anlaß geben muß, zu prüfen, ob nicht auch Paralyse vorliegt.

Soma-
tische
Symptome

Tabo-
paralyse

Die reine Paralyse hat oft sehr lebhaft, aber nicht die echten „klonischen“ Reflexe (S. 11). Hier kommt dann außer der Pupillenstarre noch als bekanntestes und wichtiges Symptom die Sprachstörung, in erster Linie das Silbenstolpern der Paralytiker in Betracht. Wenn man die Sprachstörung nicht schon in der Unterhaltung merkt, so sind

Sprach-
störung

die Paradigmata noch immer „Dritte reitende Garde-Artilleriebrigade“ und „Dampfschiffschleppschiffahrt“; man kann sich auch von dem Kranken etwas vorlesen lassen. Dabei ist nicht nur ein Stolpern, sondern auch ein Verschleifen, auch ein Wiederholen einzelner Silben bei Paralyse gewöhnlich, Störungen, die im Endstadium der Paralyse ja bis zu vollkommener Dysarthrie gehen. Ganz charakteristisch sind die Sprachstörungen für Paralyse nicht, wir können sie gelegentlich auch bei arteriosklerotischen Herden des Gehirns, auch bei schweren Alkoholisten sehen, aber sie können doch zusammen mit den psychischen Störungen in vielen Fällen allein genügen, die Diagnose zu stellen.

Recht wichtig sind auch die Schreibstörungen der Paralytiker, die allerdings nur zum Teil Folge der Innervationsstörung, zum anderen Folge der psychischen Schwäche sind. Die Schrift wird zittrig und unregelmäßig, Buchstaben werden ausgelassen, Worte wiederholt. Am besten kann man diese Störungen aus den spontanen Schreibproduktionen des Kranken beurteilen, und man möge sich daher etwa von ihm geschriebene Briefe von den Angehörigen vorlegen lassen, und sie mit Schriftstücken aus früheren Zeiten vergleichen.

Zittern der Hände und der Zunge sind sehr häufige, aber ebenso wie die vielfach erwähnte Asymmetrie der Fazialisinnervation, doch nur hinweisende, an und für sich noch nicht beweisende Symptome.

Von den anderen organischen Erkrankungen des Gehirns, wie der Lues cereбрalis und der Arteriosklerose ist die Paralyse häufig zu unterscheiden durch Fehlen von dauernden Herdsymptomen. So fehlen bei der Paralyse vor allem fast immer alle deutlichen Pyramidenzeichen. Ausnahmen kommen vor, aber schon die Feststellung eines Babinskischen Reflexes deutet immer auf eine andere Erkrankung z. B. Lues cereбрalis hin.

Dagegen sind für Paralyse wieder sehr charakteristisch vorübergehende Herdstörungen. Typische epileptiforme Anfälle können als Zeichen der Paralyse auftreten (vgl. auch unter Epilepsie). Ferner kommen ausgesprochene und sich zauberhaft schnell, manchmal in wenigen Stunden restituierende Hemiplegien vor. In diesen epileptischen oder hemiplegischen Anfällen und auch noch einige Zeit nachher können dann auch die Pyramidenzeichen da sein, aber sie bleiben nicht dauernd. In der Anamnese vergesse man nicht die Frage nach anfallsweisen Sprachverlusten, ob also dem Kranken einmal für eine Zeit lang, wenn auch nur für wenige Minuten, die Worte gefehlt hätten, ein bei Paralyse nicht seltenes Vorkommnis.

Hieran schließt sich die Frage nach schweren Ohnmachts- oder Schwindelanfällen, Dinge, die ja an und für sich nicht charakteristisch, aber doch bei Paralyse sehr häufig sind.

Zu erinnern ist auch an die manchmal außerordentlich heftigen Kopfschmerzen, die auch in Form von Migräneanfällen auftreten können. Auch neuralgische Beschwerden kommen, z. B. im Trigeminalg Gebiet, vor.

Was nun die psychischen Symptome betrifft, so darf ich mir hier

die Schilderung des Endstadiums mit seiner völligen Verblödung und Verstumpfung, oder seinen blühenden schwachsinnigen Größenideen ersparen.

Es handelt sich ja für den Praktiker hauptsächlich darum, die Paralyse im Frühstadium zu erkennen. Erkennung
im Früh-
stadium

Hier kommt es wohl in erster Linie darauf an, einerseits das richtig einzuschätzen, was man als Zerfall der Persönlichkeit oder auch als Charakterveränderung bezeichnet, andererseits die Intelligenzverminderung festzustellen.

Die Charakterveränderung ersehen wir meist am besten aus der Anamnese, die uns die Angehörigen des Kranken liefern: gute Familienväter, die anfangen, Frau und Kinder jähzornig und gewalttätig zu behandeln, frische kräftige Naturen, die plötzlich rührselig und weinerlich werden, sparsame Geschäftsleute, die große unnütze Einkäufe machen oder zweifelhafte Engagements eingehen, adrette Hausfrauen, die Kleidung und Sauberkeit vernachlässigen sind das Gewöhnlichste; Details, die im einzelnen manchmal genügen, die Szene vollkommen zu erhellen, sind Legion, ich erinnere z. B. an einen biedereren Wachtmeister, der auf der Eisenbahnfahrt die Milchflasche seines Kindes ergriff und sie austrank, einen Kaufmann, der an die Kronprinzessin von Sachsen telegraphierte, daß er ihr ein Schloß zur Verfügung stelle, einen Offizier, der sich in Gesellschaft die Hosen aufknöpfte. So grobe Sachen kommen ja nicht immer vor, aber auch aus geringeren anamnestischen Angaben ersieht man die Veränderung der Persönlichkeit.

Man unterscheidet im allgemeinen mehr depressive und mehr expansive (manische) Formen. Besonders den letzteren eigentümlich ist die vollkommen fehlende Einsicht nicht nur in die Unsinnigkeit ihrer Ideen, sondern in die Elendigkeit ihrer ganzen Lage und das fehlende Bewußtsein des körperlichen Verfalls. Bei den depressiven Formen findet man doch nur selten und vorübergehend die Geschlossenheit des Affekts, wie wir ihn bei der Melancholie haben, und die tiefe Angst, welche den Melancholischen zum Selbstmord treibt. Das ganze Bild hat eben doch von vornherein meist das Gepräge der Schwäche und des Schwachsinns. Davon ist auch die häufige sogenannte „emotionelle Inkontinenz“ ein Zeichen. Sie besteht darin, daß die Kranken bei den kleinsten Anlässen alle Anzeichen großer Affekte, besonders oft heftige Weinausbrüche zeigen; Zustände freilich, die meist ebenso schnell verschwinden, wie sie gekommen sind. Formen

In der Sprechstunde zeigt der Paralytiker häufig noch eine gewisse Haltung und Konzentration, wenn aus der Anamnese schon grobe Anomalien bekannt sind. Die geistige Schwäche zeigt sich trotzdem meist bald in der Unterhaltung, in der Gleichgültigkeit, mit der der Paralytiker mit sich verfahren läßt — wenn er nicht im Gegenteil laut und renitent ist. Wichtig ist die Prüfung der Merkfähigkeit, als welche wir die Möglichkeit bezeichnen, jüngst vergangenes zu reproduzieren. Sie entspricht zum Teil der Verminderung der Gedächtnisleistungen, über die entweder der Patient selbst oder seine Umgebung berichtet. Man prüft sie meist durch Vorsprechen einzelner Ziffern. Das Normal- Intelli-
genz-
störung

Merk-
fähigkeit

mindestmaß sind 7 Ziffern, also etwa 1532974, 9152803. Selbstverständlich kommt die Verminderung der Merkfähigkeit auch anderen Psychosen, z. B. chronischen alkoholistischen und senilen zu, auch bei Neurasthenikern, Traumatikern, passiert es manchmal, daß man sie in ihrer ängstlichen Stimmung absolut nicht dazu bringen kann, 7 Zahlen korrekt zu wiederholen. Trotzdem bleibt die Feststellung der verminderten Merkfähigkeit ein wichtiges Merkmal, das auch bei eventuellen Gutachten als objektiver Beleg seine Stelle finden muß. Dann prüft man zweckmäßig auch die Rechenfähigkeit, und hier ist es auffallend, daß der Paralytiker nicht nur falsche Resultate nennt, sondern auch mit welcher Sicherheit er das tut. Bemerkt man dann, daß das Resultat falsch sei, so wird er meist mit derselben Sicherheit ein ganz anderes Resultat bringen. Immerhin sind das aber schon gröbere Merkmale, die schon nicht mehr den allerersten Anfängen der Paralyse entsprechen. In diesen kommt es auf die ärztliche Empfindung davon an, daß wir es in der Nervosität und Schwäche nicht mit einer gewöhnlichen Neurasthenie, sondern mit einem psychischen Zerfall zu tun haben.

Rechnen

Unter-
scheidung
von der
Neur-
asthenie

Es ist ja eine alte Regel, daß man immer einen Paralyseverdacht schöpfen soll, wenn Leute im Alter um 40 herum, die nie nervöse Beschwerden gehabt haben, plötzlich anfangen „nervös“, erregt und reizbar zu werden, ob sie nun Lues konzedieren oder nicht.

Gerade in diesen Fällen sind wir aber durch die Anstellung der Wassermannschen Reaktion nunmehr in der Lage mit fast vollkommener Sicherheit ein Urteil fällen zu können (vgl. oben). Haben wir keine Wassermannsche Reaktion im Blut, so ist Paralyse so gut wie ausgeschlossen.

Die Wassermannsche Reaktion brauchen wir da nicht, wo wir andere luetische Zeichen finden, insbesondere die Lichtstarre der Pupillen. Eine Neurasthenie mit Pupillenstarre gibt es nicht.

Die Diagnose der Paralyse ist ja eine Sache von größter praktischer und sozialer Wichtigkeit. Wie haben wir uns da mit der Mitteilung der Diagnose an die Angehörigen des Kranken zu verhalten? Der Praktiker befindet sich hier in einer wesentlich schwierigeren Lage als der Anstaltsarzt. Gerade der Arzt, der gut und früh diagnostiziert, tut gut daran, das Wort „Paralyse“ oder „Gehirnerweichung“ nicht zu früh und nicht bei der ersten Konsultation auszusprechen, aber erstens die dauernde weitere Beobachtung des Kranken zu verlangen, und die Familie — aber auch sehr vorsichtig — bald auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die besonders aus unüberlegten finanziellen Verpflichtungen hervorgehen könnten.

Mitteilung
der
Diagnose

Dia-
gnostische
Irrtümer

Muß man doch auch immer bedenken, daß man sich auch einmal irren kann, und daß schon viele Diagnosen hervorragender Diagnostiker auf Paralyse durch den Verlauf der Krankheit Lügen gestraft worden sind. In den Fällen, wo die organischen (syphilogenen) Zeichen der angeblichen Paralyse nachzuweisen waren, kann es sich um zweierlei handeln, um psychotische, manchmal neurasthenische Zustände bei Tabes, Zustände, die vollständig wieder zurückgehen können oder um diffuse Hirnlues. Letztere können gewissen Fällen von Paralyse

ähneln wie ein Ei dem anderen. Epileptiforme Anfälle z. B. können bei beiden in ganz gleicher Weise zur Ausbildung kommen, auch Sprachstörungen und Intelligenzstörungen können vorhanden sein. Von den nichtsyphiligen Erkrankungen macht differentialdiagnostisch der Alkoholismus und schwere traumatische Neurasthenie am meisten Schwierigkeiten. Der erstere kann zu einem geradezu täuschend ähnlichen Bilde führen: „alkoholistische Pseudoparalyse“, in dem wenn auch nur extrem selten (weniger als 1 pro mille S. 166) sogar die reflektorische Pupillenstarre vorkommen soll.

Wenn man aber auch in einer Anzahl von Fällen mit der Diagnose und Prognose vorsichtig sein muß, so darf sich diese Vorsicht nicht auf die Durchführung der in Anbetracht des Geisteszustandes notwendigen Schutzmaßregeln — Entmündigung, Internierung — erstrecken. Hier ist rücksichtslose Entschiedenheit am Platze.

Zu all den syphiligen Erkrankungen, die in diesem Kapitel be- Hereditäre
Lues
handelt sind, sei bemerkt, daß sie alle — die Tabes, die Paralyse und alle Formen der Lues cerebrospinalis — auch auf dem Boden der hereditären Lues in entsprechend jugendlichem Alter, d. h. selten später als mit dem 20. Lebensjahr, als „juvenile Tabes“ und „juvenile Paralyse“ entstehen können. Die Diagnose ist hier sogar durch die körperlichen Merkmale der hereditären Lues meist besonders leicht, man muß nur daran denken. Die gleichen Bilder können auch durch frühe Infektion, z. B. durch eine Amme entstehen.

e) Allgemeines zur Therapie.

Die Therapie der syphiligen Erkrankungen beruht zunächst auf der spezifischen Prophylaxe durch Behandlung der konstitutionellen Syphilis. Diese Behandlung ist seit der Einführung der Wassermannschen Reaktion sehr viel rationeller geworden; die Wassermannsche Reaktion ist so für die Therapie der Syphilis im Ganzen mindestens ebenso bedeutsam geworden, als das Ehrlichsche Salvarsan. Während früher die chronisch-intermittierende Behandlung aufs Geratewohl vorgenommen werden mußte, wissen wir heute durch die Wassermannsche Reaktion viel häufiger als früher, wann wir aufhören und wann wir anfangen müssen. Daß, wenn man syphilitische Erscheinungen ohne Wassermannsche Reaktion hat, man auch behandeln muß, ist selbstverständlich. Man soll dabei, wie schon oben bemerkt, die Wassermannsche Reaktion nicht ohne Not anstellen. Hat man sie aber aus irgend einem Grunde angestellt, und hat man sie positiv gefunden, dann muß man auch die Konsequenz ziehen und sie durch spezifische Behandlung, wenn irgend möglich, negativ zu machen versuchen. Dabei ist mir sehr wohl bekannt, daß das manchmal nicht möglich ist, diese Fälle halte ich für die Dauer durchaus nicht für günstig. Vielleicht sind es die, die später Paralyse bekommen. Es ist jedenfalls auch vom Stand-

Prophy-
laxe

punkte der Prophylaxe für das Nervensystem unbedingt zu fordern, daß die Syphilitiker jahrelang unter Kontrolle, auch unter serologischer gehalten werden müssen. Darüber hinaus müssen sogar auch bei negativer Wassermannscher Reaktion und bei Fehlen von Erscheinungen in den ersten Jahren nach dem Primäraffekt antisymphilitische Kuren gemacht werden. Es ist gar kein Zweifel, daß die Mehrzahl derjenigen, die später an den syphiligen Nervenstörungen erkranken, früher ungenügend behandelt waren — nicht durch Schuld des Arztes. Geht es doch sehr häufig so, daß wenn auf wenige Einspritzungen oder Einreibungen die größten Symptome der Sekundärperiode geschwunden sind, der Kranke sich der weiteren Behandlung entzieht.

Die prophylaktische Behandlung ist um so wichtiger, als gerade bei den syphiligen Nervenerkrankungen, wenn sie erst einmal da sind, der Wirksamkeit der spezifischen Behandlung enge Grenzen gezogen sind.

Therapie
der Lues
cerebro-
spinalis

Die antisymphilitische Behandlung wirkt nämlich mit einiger Sicherheit überhaupt nur bei der Lues cerebrospinalis in dem engeren Sinne, wie wir ihn oben gegeben haben. Hier allerdings gehören ihre Erfolge zu den besten, erfreulichsten und sichersten, die der Neurologe erreichen kann. Es ist ganz unverständlich, daß man bei Einführung der Salvarsantherapie so getan hat, als wenn unsere Hg-Therapie bei Lues cerebrospinalis nicht genug leisten kann. Bei keinem anderen Organe haben wir so schöne und so häufige Erfolge zu verzeichnen, wie bei der eigentlichen Lues des Gehirns und Rückenmarks — unter zwei Bedingungen: Einmal darf die Erkrankung noch nicht zu alt sein, bzw. nicht allzu ausgedehnte und irreparable Zerstörungen verursacht haben. Wenn erst einmal eine Thrombose der Art. fossae Sylvii mit ihren großen Erweichungen da ist, dann kann keine Macht der Erde, auch das Salvarsan nicht mehr, die Erscheinungen zurückbringen. Es ist schon merkwürdig genug, daß überhaupt solche Erscheinungen, wie Hemiplegien und Paraplegien unter spezifischer Behandlung restlos verschwinden können. Es ist das ein Zeichen, daß die Erscheinungen nicht durch einen unwiderruflichen Gefäßverschluß, sondern nur durch eine hochgradige Einschränkung der Blutzufuhr bedingt werden und bei Hebung der Blutzufuhr wieder schwinden können. Deswegen ist auch die frühe Diagnose des syphilitischen Ursprungs dieser Erscheinungen so wichtig. Von vornherein können wir die Möglichkeit der Restitution allerdings nicht prognostizieren. Wir können zwei Fälle nebeneinander, die zu gleicher Zeit die gleichen Symptome bekommen haben, mit der gleichen Therapie behandeln und sehen, daß die Erscheinungen des einen schwinden, die des anderen bleiben. In dem letzteren Fall war der Gefäßverschluß eben bereits irreparabel.

Hg

Die zweite Bedingung ist die, daß die Behandlung eine genügend energische ist. Die energischsten Hg-Kuren sind wohl die mit den unlöslichen Salzen, insbesondere dem gar nicht genug zu empfehlenden Kalomel¹⁾ (1 : 10 Ol. olivarium), wöchentlich 1, im Notfall

¹⁾ Injektionen mit grauem Öl sind bei Lues cerebrospinalis nicht üblich.

2 Spritzen, 6—12 Spritzen im ganzen intramuskulär. Diese Behandlung ist anzuwenden, wenn eine schnelle Therapie wünschenswert ist oder wenn andere Quecksilberanwendungen versagt haben; in den meisten Fällen kommt man mit milderer Anwendungsformen aus, also mit der Schmierkur (bis zu 6 g täglich) und der Injektion löslicher Salze (Sublimat 0,01 jeden zweiten Tag). Wie weit man mit der einzelnen Kur gehen muß, und wie oft man sie wiederholen muß, das richtet sich nach der Lage des Falles. Eine Kur kann, auch dann, wenn sie zu anscheinender Heilung geführt hat, niemals als ausreichend gelten; für die einzelne Kur liegt manchmal etwas Wahres in der alten Beobachtung, daß man die Menschen etwas mit Quecksilber vergiften muß, ehe es hilft.

Das Salvarsan wird unsere Situation der Lues cerebrospinalis gegenüber nicht viel verbessern, sie war schon vorher zu gut. Es mag einzelne Fälle geben, wo Hg auch bei energischer Behandlung nicht mehr hilft, und wo dann doch noch Salvarsan hilft, es gibt auch gewiß Leute, die Hg nicht vertragen, und für die Salvarsan eine große Hilfe bedeutet. Dafür gibt es auch wieder Leute, denen Salvarsan nichts geholfen hat und die dann Hg heilt. Auch daß Salvarsan auf die Wassermannsche Reaktion stärker wirkt als Hg, insbesondere Kalomelinjektionen, scheint mir nicht erwiesen. Von der *Therapia sterilisans magna* spricht ohnehin niemand mehr und so wird man sich angesichts der Gefahren zur Salvarsanbehandlung bei Lues cerebrospinalis nicht leicht und nur selten entschließen.

Die Gefahren des Salvarsans für Herz und Gefäße sollen hier nicht weiter erörtert werden. Die Gefahren für das Nervensystem müssen hier besprochen werden, trotzdem sie keine speziellen Gefahren der syphiligen Nervenkrankheiten darstellen, sondern gerade bei der Behandlung der allgemeinen Lues im Primär- und Sekundärstadium in die Erscheinung getreten sind. Es kommt zuerst die Möglichkeit einer schweren Arsenvergiftung mit tödlich verlaufender Encephalitis haemorrhagica in Betracht. Diese Möglichkeit ist gar nicht auszuschließen. Es sind Fälle bekannt gegeben worden, wo der Patient einmal Salvarsan ganz gut vertragen hat, und dann einer zweiten, Monate nach der ersten vorgenommenen, Injektion der gleichen Dosis erlegen ist. Die Dose braucht dabei nicht groß zu sein (0,3 intravenös). Der Verlauf dieser Fälle scheint ein typischer zu sein. Die Kranken fühlen sich ca. 48 Stunden ohne jede Beschwerde. Dann werden sie schnell benommen und erliegen unter dem Bilde schwerster Gehirnerkrankung in wenigen Stunden oder Tagen. Diese Enzephalitis ist ganz sicher eine Arsenvergiftung. Dagegen sind die sogenannten Neurorezidive wahrscheinlich meist nurluetische Manifestationen. Man versteht darunter insbesondere die Affektionen der Hirnnerven. Am häufigsten sind solche des Akustikus mit den charakteristischen Symptomen des Schwindels und der Ertaubung beobachtet, aber auch Affektionen anderer Gehirnnerven und auch solche des zentralen Nervensystems kommen vor. Wahrscheinlich können gelegentlich alle Symptome der Lues cerebrospinalis als Neurorezidive auftreten. Es ist kaum ein Zweifel, daß die Neurorezidive zwarluetisch sind, daß aber dieseluetischen

Manifestationen unter dem Einfluß des Salvarsans viel häufiger sind, als sie ohne Salvarsan waren. Meist treten die Neurorezidive wohl schon in den ersten Wochen nach der Salvarsanbehandlung auf, aber es scheint mir, daß gerade aus der kurzen Zeit, wo einige Ärzte ausschließlich mit Salvarsan behandelten, verhältnismäßig viel Fälle stammen, bei denen in dem ersten Jahr nach der Infektion schwere tertiäre Erscheinungen, wie man sie sonst erst viel später sieht, zur Entstehung gekommen sind. Eine Behandlung der Lues nur mit Salvarsan ohne Hg wird ja auch heute fast allgemein als ungenügend bezeichnet. Aus der Tatsache, daß die Neurorezidiveluetische Manifestationen darstellen, hatte Ehrlich den Schluß gezogen, daß man sie durch wiederholte Injektion von Salvarsan bekämpfen müsse. Aber auch hier wird man wohl mit Hg oder durch eine Kombination von Hg und Salvarsan ebensogut oder besser zum Ziele kommen. Die Anwendung des Salvarsans geschieht übrigens, um auch das noch zu erwähnen, jetzt allgemein intravenös in Dosen von 0,3—0,6 g.

Jod Auch Jodkali in großen Dosen ist ein mächtiges Mittel bei Lues cerebrospinalis. Ich halte es aber für einen Fehler, sich selbst in den Fällen, wo es symptomatisch nützt, mit Jodkali zu begnügen. Die weitverbreitete Meinung, daß auf Jodkali die tertiärenluetischen Prozesse der zerebrospinalen Lues zurückgehen müßten, wenn sie überhaupt beeinflussbar sind, ist gänzlich falsch.

Therapie der Tabes Ob die bereits ausgesprochene Tabes und Paralyse durch die Hg-Behandlung zu beeinflussen sind, ist heute noch eine offene Frage. Der Eindruck vieler ist der, daß der Verlauf insbesondere der Tabes, Hg weniger oder gar nicht der Paralyse, unter der Hg-Behandlung ein milderer wird und zu Stillständen neigt. Ich glaube auch, daß im Beginne einer Tabes, besonders dann, wenn ihr Träger lange keine spezifische Kur durchgemacht hat, eine Hg-Behandlung von Nutzen sein kann und jedenfalls versucht werden, auch nach einiger Zeit einmal und sogar öfter wiederholt werden sollte. Indessen gibt es Fälle, die unter der Hg-Behandlung nicht nur nicht besser, sondern schlechter werden, und hier hat man sofort abubrechen. Es ist insbesondere kein Zweifel, daß sich Optikusatrophien unter der Einwirkung der Hg-Kur sehr verschlimmern können, und man ist daher verpflichtet, während einer Hg-Kur bei Tabes den ophthalmoskopischen Befund, unter Umständen auch das Gesichtsfeld genau zu kontrollieren. Auch die Ataxie kann sich unter einer energischen Hg-Kur verschlimmern.

Es ist daher zu raten, gerade bei der Tabes nicht die Hg-Kuren mit Kalomel und auch nicht Schmierkuren mit sehr hohen Dosen, sondern Schmierkuren mit kleinen Dosen oder die Injektion von löslichen Salzen anzuwenden¹⁾. Diese Kuren wirken oft auch recht gut auf die tabischen Schmerzen und Krisen.

¹⁾ Ob die Wirkung dieser löslichen Salze sich untereinander unterscheidet, ist zweifelhaft. Am besten scheint mir immer noch Sublimat. Neuerdings wird gerade bei Tabes vielfach das Enesol, ein Arsenquecksilberpräparat, angewendet, mehr als vom Sublimat habe ich nicht davon gesehen.

Das Salvarsan leistet, soweit die Literatur erkennen läßt, bei Salvarsan Tabes nicht mehr, sondern eher weniger als Hg. Da — abgesehen von den Gefahren des Salvarsans — sehr starke Verschlimmerungen der Tabes nach seiner Anwendung gesehen worden sind, kann man von ihm bei Tabes im allgemeinen nur abraten. Einen Versuch halte ich für gerechtfertigt bei sehr starken, anderweitig nicht zu beherrschenden und zu beeinflussenden Krisen.

Um es also zu wiederholen, ein Versuch mit einer spezifischen Kur bei Tabes ist nicht nur erlaubt, sondern sogar empfehlenswert aus theoretischer Überlegung nicht nur, sondern auch aus wahrscheinlich zureichender praktischer Erfahrung. Eine Heilung der Tabes kommt dabei nicht in Frage, aber wohl ein Stillstand des Prozesses.

Um nun endlich zur Paralyse zu kommen, so kann eine Hg-Kur Therapie
der
Paralyse und auch Salvarsan hier kaum etwas schaden. Die Paralyse ist eine so trostlose Krankheit, daß hier jeder Versuch gerechtfertigt erscheint. Wenn allerdings das Salvarsan, wie neuerdings Neißer angibt, geeignet wäre, paralytische Erscheinungen zu provozieren, so wird man sich allerdings die Anwendung des Salvarsans bei nicht ganz sicherer Diagnose sehr zu überlegen haben. Die Hg-Behandlung ist geboten in denjenigen Fällen, in denen man nicht ganz sicher ist, ob eine diffuse Hirnlues oder eine Paralyse vorliegt. Es sind seltene aber stolze Fälle, wo es gelingt, von anderen als Paralyse beiseite geschobene und unbehandelt gelassene Kranke durch eine spezifische Kur zu heilen. Möglich erscheint es auch, daß gelegentlich die Remissionen der Paralyse durch Hg-Kuren herbeigeführt werden können, und wenn diese Remissionen auch vielleicht nur post nicht propter eintreten, so ist es doch für den Praktiker durchaus nötig, wie schon bemerkt, eine Paralyse zu behandeln, schon um sie im Auge zu behalten, und da bleibt das, was vielleicht doch einmal helfen könnte, doch die Hg-Kur.

Das Salvarsan hat bei Paralyse völlig versagt.

Man hat neuerdings Tuberkulinkuren bei Paralyse versucht, nicht aus der Annahme etwa, daß die Paralyse eine tuberkulöse Erkrankung wäre, sondern um eine allgemeine Reaktion des Körpers zu erzielen. Man hat in der Tat einiges Gute von diesen Tuberkulinkuren gesehen und es liegt kein Grund vor, sie nicht gelegentlich zu versuchen.

Außer der spezifischen Therapie haben wir bei der Tabes noch Allgemeine
und sym-
ptomati-
sche
Therapie
der Tabes eine allgemeine und eine symptomatische. Die allgemeine besteht in dem Verbot aller Anstrengungen und Exzesse. Daß man Tabikern jeden Tropfen Alkohol verbietet ist nicht nötig. Erfahrungsgemäß von recht guter Wirkung sind bei Tabes auch Badekuren in den hierfür bekannten Bädern¹⁾. Die Bäder wirken natürlich nicht spezifisch, aber die dortigen Ärzte kennen ihre Tabiker und wissen sie zweckmäßig zu behandeln. Niemals sollen Tabiker, ohne einen Badearzt zu befragen,

¹⁾ Einerseits Schwefelquellen, wie Aachen, Aix les Bains, Baden bei Wien, Bentheim, Kreuth (Bayern), Bagni di Lecco (Italien), La Prest (Frankreich), Lippspringe, Tölz, Schinznach, Yverdun etc., andererseits die kohlensäurereichen Thermalbäder, wie Oeynhausen, Nauheim, Szliács (Ungarn) etc.

auf ihre eigene Faust eine solche Badekur betreiben. Tatsache ist, daß viele Tabiker der mittleren Stadien viel arbeitsfähiger aus solchen Bädern zurückkehren, und daß auch Schmerzen und Krisen, die jeder ambulanten Behandlung gespottet hatten, nach einer Badekur manchmal auf lange Zeit verschwunden sind.

Auch eine Arsenbehandlung ist vielfach zur Hebung des Allgemeinzustandes von Nutzen.

Symptomatologisch müssen behandelt werden Ataxie und Schmerzen (bzw. Krisen). Die symptomatische Behandlung der Ataxie ist die Frenkelsche Übungstherapie, die aber außerordentlich viel Sorgfalt und genaue Kenntnis der Physiologie der Bewegung, sowie ein Studium des einzelnen Falles verlangt. Der praktische Arzt tut wohl am besten, sie gar nicht anzuwenden, er wird keine Erfolge damit erzielen¹⁾.

Beim Bestehen von Arthropathie muß man manchmal Schienenhülsenverbände anlegen lassen. Auch bei sehr schwerer Atonie ohne Arthropathie sind das Knie zusammenhaltende Apparate dieser Art gelegentlich von Vorteil.

Die lanzinierenden Schmerzen sind wohl mit allen therapeutischen Maßnahmen behandelt worden, die es überhaupt gibt. Gut wirken häufig die Antirheumatika, wie z. B. das Aspirin. Auch das Pyramidon ist zu empfehlen. Man wechsele häufig das Mittel. Morphinum wende man nur an, wenn es gar nicht anders geht, wie z. B. bei heftigen Magenkrisen und höre sobald wie möglich damit auf. Denn es besteht beim Tabiker eine besonders große Gefahr des Morphinismus, und der Morphinumhunger äußert sich dann in unaufhörlichen tabischen Krisen.

Von physikalischen Maßnahmen sind mäßige Hautreize, z. B. Faradisieren, nicht selten von Nutzen. Neuestens hat man auch von den Hochfrequenzströmen Gebrauch gemacht; daß die Erfolge mit dieser Methode besser sind als mit anderen, kann nicht zugegeben werden.

Bei heftigen Magenkrisen sind ferner kalte Magenspülungen, eventuell mit Adrenalinzusatz empfohlen.

Eine ganz neue Behandlung der Magenkrisen ist die „Foerstorsche Operation“, d. i. die Durchschneidung der sensiblen Wurzeln für den Magen, d. i. der 7.—11. Dorsalwurzel nach Laminektomie und Eröffnung des Duralsacks. Die Operation kommt überhaupt nur in Frage bei Fällen, in denen die Magenkrisen erstens sehr stark sind und zweitens ein Frühsymptom bilden, so daß man hoffen darf, mit der Beseitigung der Magenkrisen den Kranken wenigstens subjektiv beschwerdefrei zu machen. Es hat sich aber gezeigt, daß die Operation erstens gefährlich ist, daß eine Anzahl der Operierten an ihren Folgen sterben, und daß sie zweitens durchaus nicht immer nützt, daß man also dem Kranken keine Versprechungen über den Erfolg des großen und gefährlichen Eingriffs machen darf. Die Beobachtungsdauer der mit Erfolg operierten Fälle ist für die Beurteilung von Dauererfolgen und der Folgen für den Verlauf der Tabes, an die man doch auch denken muß, zu gering. Wie selten die Indikation für den Eingriff ist, möge daraus hervorgehen, daß im Krankenhaus Friedrichshain — trotzdem man doch im Krankenhaus jede therapeutisch-chirurgische Anregung mit viel mehr Interesse aufnimmt als in der Privatpraxis — wir noch niemals uns veranlaßt gesehen haben,

¹⁾ Ich verweise den, der sich damit beschäftigen will, auf Goldscheider, Übungstherapie der Tabes dorsalis.

auf die Foerstersche Operation bei Tabes zurückzugreifen. Ein Fall, den ich außerhalb des Krankenhauses habe operieren lassen, war ein ausgesprochener Mißerfolg. Ich zweifle — nicht nach diesem Falle, sondern nach dem Gesamteindruck der Literatur — ob die Foerstersche Operation bei Tabes sich überhaupt halten wird.

Wie gesagt, steht es dahin, ob durch die Therapie an dem Verlaufe der Tabes und der Paralyse etwas geändert wird, aber über den Verlauf selbst ist doch noch einiges zu sagen.

Verlauf
und Pro-
gnose der
Tabes und
Paralyse.
Benigne
Fälle

Insbesondere für die Tabes ist es in weiteren Kreisen doch noch wenig bekannt, was die Forschungen der letzten Jahre gelehrt haben, daß sie in vielen Fällen doch eine recht *benigne* Erkrankung ist, daß sie jahrzehntelang stationär bleiben kann, ja daß einzelne Symptome, wie gerade auch die Ataxie sogar zeitweise spontan erhebliche Rückgänge zeigen können. Ich kenne einen Tabiker, dessen unzweifelhafte Tabes, von anderer Seite schon vor 30 Jahren festgestellt, auch heute noch nur aus einer geringen Ataxie mit Verlust der Sehnenphänomene und seltenen lanzinierenden Schmerzen um den Rumpf besteht, einen anderen, bei dem Fehlen der Pupillarreaktion schon vor 20 Jahren festgestellt worden war und der auch heute außerdem nicht mehr hat, wie das Fehlen eines Achillessehnenreflexes ohne jede Ataxie — beide Fälle nie behandelt. Im Krankenhaus entdecken wir gar nicht so selten, insbesondere bei Leuten mit Aortenfehlern zufällig eine Tabes, die wahrscheinlich schon lange bestanden hat, ohne ernstere Beschwerden zu machen. Wenn auch schließlich die Mehrzahl der Fälle einen progredienten Verlauf nimmt, so zwingen doch die oben berichteten Erfahrungen dazu, die Prognose nicht zu ungünstig zu stellen. Analog wie bei der Paralyse (S. 176) vermeide man auch hier das Wort „Rückenmarkschwindsucht“ oder „Tabes“, man sage auch nicht, daß das „Rückenmark etwas angegriffen sei“, sondern spreche lieber von einer Nervenentzündung infolge der alten Syphilis oder dergl.

Und selbst bei der Paralyse muß man mit einer gewissen Benignität rechnen, wenn sie auch sehr viel seltener ist, als wie bei der Tabes. Es ist vor kurzem erst wieder von berufener und langerfahrener psychiatrischer Seite ¹⁾ ausgesprochen worden, daß so viele und so vollständige Remissionen der Paralyse, wie wir sie heute sehen, früher nicht beobachtet wurden. Ich selbst wurde vor kurzem zu einem Manne gerufen, der an einer floriden Paralyse erkrankt war; bei der Nachforschung stellte es sich heraus, daß der Mann schon vor 14 Jahren mit der Diagnose Paralyse monatelang in einer Anstalt gewesen war, in der Zwischenzeit aber sein nicht ganz kleines Geschäft mit Erfolg geführt hatte und seiner Familie ein guter Berater gewesen war (unbehandelt). Mit gutem Gewissen können und müssen wir deshalb, auch wenn wir die sichere Diagnose Paralyse stellen — selbstverständlich nicht in vorgeschrittenem Stadium —, den Angehörigen die Möglichkeit lang dauernder Erholung in Aussicht stellen, nachdem wir allerdings auf den großen Ernst der Situation und die Notwendigkeit strengster Überwachung in schärfster Form hingewiesen haben.

¹⁾ Leppmann.

27. Multiple Sklerose.

Die multiple Sklerose ist eine der häufigsten chronischen organischen Nervenkrankheiten. Sie wird trotzdem von dem Praktiker nicht selten verkannt, die Kranken werden oft als Hysteriker abgetan. Es hängen solche Irrtümer eng mit dem Wesen der Krankheit zusammen. Sie verläuft einmal meist schubweise und mit großen Besserungen und Remissionen. Zweitens kommt es infolge der eigenartigen histologischen Beschaffenheit ihrer Herde nicht zu totaler Zerstörung, sondern nur zu einer Schädigung des Gewebes und dementsprechend nicht zu „kompakten“, sondern nur zu diffusen oder ganz leichten, angedeuteten Symptomen. Aber die Zeit ist vorüber, wo man zweifelnd diagnostizierte: „Diagnose: Hysterie; Autopsie: multiple Sklerose“. Wir haben in den letzten Jahrzehnten die diagnostischen Hilfsmittel so vermehrt, daß nur in ganz seltenen Ausnahmefällen bei sachverständiger und genauer Untersuchung noch Irrtümer in der Unterscheidung organischer und funktioneller Nervenkrankheiten vorkommen. Und darum handelt es sich. Die Darstellung, die wir im Anfang dieses Buches von der Unterscheidung organischer Nervenkrankheiten von den funktionellen gegeben haben, bezieht sich implicite gerade auch auf die multiple Sklerose. Nicht etwa daß die multiple Sklerose besondere Zeichen hätte, die schwer zu erkennen wären. Wenn wir überhaupt erst eine organische Erkrankung diagnostiziert haben, dann denken wir auch jedesmal an multiple Sklerose. Denn wir wissen, daß die Herde der multiplen Sklerose sich an jeder Stelle des Zentralnervensystems lokalisieren und die entsprechenden Lokalsymptome machen können.

Freilich ist zu betonen, daß die multiple Sklerose gewisse Lieblingsorte und dementsprechend Lieblingssymptome hat. Solch Symptom ist vor allem der Nystagmus (ausgehend von den Vestibulariskernen), ferner der beinahe nur bei der multiplen Sklerose vorkommende Wackeltremor (vgl. S. 35), der bei Bewegungen sich verstärkt (ausgehend wahrscheinlich vom Mittelhirn), ferner die skandierende Sprache (ausgehend wahrscheinlich vom Kleinhirn). In den seltensten Fällen werden die Pyramiden von der multiplen Sklerose verschont, nicht darum, weil sie ein besonderer Prädilektionsort wären, sondern weil einem multiplen Prozeß, der sich über das ganze Zentralnervensystem verbreitet, die Pyramiden an irgend einer Stelle ihres Verlaufs schwerlich entgehen können; wir haben daher gewöhnlich irgend eins der schon früher beschriebenen Pyramidenzeichen; insbesondere ist darauf hingewiesen worden, daß das Fehlen der Bauchdeckenreflexe bei der multiplen Sklerose den anderen Pyramidenzeichen häufig vorausgeht. Natürlich hindern stärkere Symptome, wie Babinski'scher Reflex, spastisch-paretischer Gang, Fußklonus die Diagnose nicht, sondern bestärken sie nur. Haben wir aber auch z. B. nur Fehlen der Bauchdeckenreflexe und daneben Nystagmus, so ist die Diagnose einer multiplen Sklerose so gut wie gesichert. Denn damit ist der

Nachweis multipler Herde erbracht. Man könnte zwar sagen, daß die Pyramiden ja in der Höhe der Vestibulariskerne getroffen sein könnten, also nur ein Herd da zu sein brauchte. Aber wenn ein solcher Herd etwa ein Erweichungsherd bei Lues wäre, so würde er die kompaktesten Störungen, nämlich eine vollkommene Paraplegie, Fazialislähmung etc. machen, wie es dem vollen Ausfallsbild der betroffenen Stelle entsprechen würde. Fast nur bei der multiplen Sklerose haben wir infolge der Eigenart des histologischen Prozesses, der die Nervenfasern nur ganz allmählich zugrunde richtet, die Möglichkeit der Kombination verschiedenartig lokalisierter Symptome. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß aus anderen Gründen die Differentialdiagnose der multiplen Sklerose von anderen multiplen Herderkrankungen, z. B. multiplen Formen der Lues nicht Schwierigkeiten machen könnte.

Nach dieser Abschweifung, die in die praktische Diagnostik auch ein wenig logischen Zusammenhang bringen sollte, kehren wir zu den Symptomen der multiplen Sklerose zurück. Als Prädilektionsort in dem oben definierten Sinne haben wir noch den Optikus zu erwähnen. Temporale Abblassung mit zentralem Skotom, fast nie totale Atrophie, sind sehr verdächtig, bei Vorhandensein anderer Symptome häufig entscheidend für multiple Sklerose. Es kommen aber auch vorübergehende Amaurosen ohne ophthalmologischen Befund (retrobulbäre Neuritis) vor, und auch echte Neuritis optica.

Optikus

Zu den wichtigen Symptomen gehören dann noch zwei subjektive Zeichen, der Schwindel und der Kopfschmerz. Letzterer ist an und für sich nicht charakteristisch, kann aber doch manchmal die Fehldiagnose eines anscheinend rein spinalen Leidens verhüten und so den Verdacht auf multiple Sklerose erregen. Der Schwindel (vgl. S. 62) ist das subjektive Symptom derselben Vestibularisbeteiligung, auf der auch das objektive des Nystagmus beruht, kann aber auch ohne letzteren vorkommen. Er hat nur dann einen Wert für die Diagnose, wenn er nicht als einfaches Schwarzwerden vor den Augen und dergl., sondern (meist anfallsweise) als richtiger Drehschwindel auftritt (vgl. S. 62). Dann ist er im selben Sinne, wie der Kopfschmerz, zu verwerten.

Kopfschmerz

Schwindel

Wenn die genannten die Hauptsymptome sind, so kann jedes andere Symptom auch vorkommen z. B. (meist leichte) Augenmuskelerkrankungen, (meist vorübergehende) Blasenstörungen. Fast gar keine Rolle spielen praktisch die objektiven Störungen der Sensibilität, wenn sie auch bei eigens darauf gerichteter Untersuchung häufig festgestellt werden können. Vielmehr weist das Fehlen grober Sensibilitätsstörungen bei schweren motorischen Erscheinungen, z. B. bei spastischer Paraplegie, darauf hin, daß dann kein kompakter Herd, wie etwa bei Myelitis vorliegen kann, und die nicht kompakten Herde (vgl. oben) sind immer ein Hinweis auf die Möglichkeit einer multiplen Sklerose. Schmerzen sind besonders im Beginn häufig. In seltenen Fällen können die Sehnenreflexe nicht, wie gewöhnlich, erhöht, sondern erloschen sein (Beteiligung der hinteren Wurzeln).

Andere Symptome

Die Diagnostik macht besonders in denjenigen Fällen Schwierigkeiten, wo wir noch nicht multiple Herde haben, sondern wo die Krankheit

Diagnose im Beginn

apoplektiform mit einem Herde anfängt. Es ist sehr wichtig, jede plötzlich auftretende Herderkrankung des Gehirns oder Rückenmarks ohne ersichtliche Ursache (Lues) bei bis dahin gesunden jungen Menschen als auf multiple Sklerose verdächtig anzusehen. Es gibt da nichts, was nicht vorkommt: Hemiplegien, die im Verlauf einer Nacht entstanden sind, Aphasien, halbseitige Sensibilitätsstörungen, anscheinende Myelitiden jeden Sitzes (vgl. S. 95), auch schnell entstandener Brown-Séquardscher Symptomenkomplex, das Syndrom des untersten Rückenmarksabschnittes (vgl. S. 102), vor allem auch plötzliche Erblindungen. Nicht ganz so schnell wie diese Dinge entstehen, vergehen sie wieder, aber immerhin sind häufig nach wenigen Wochen alle subjektiven, selten auch alle objektiven Zeichen spontan verschwunden, und dieses schnelle Verschwinden ist ein weiteres Verdachtsmoment für die multiple Sklerose. Meist dauert es dann nur einige Monate, nicht selten einige Jahre, bis andere Symptome erscheinen, gleichfalls noch einmal verschwinden können, um dann schließlich doch zu einem zuerst geringen und sich allmählich verstärkenden dauernden Anfall zu führen. In sehr seltenen Fällen kann das völlig freie Intervall viele Jahre, z. B. in einem von mir gesehenen Fall 13 volle Jahre, betragen, so daß die Möglichkeit auch einer dauernden Heilung durchaus nicht als ausgeschlossen zu betrachten ist; aber rechnen kann man damit leider nicht, vielmehr ist der Verlauf der meisten Fälle ein innerhalb weniger Jahre progressiver. Die Kenntnis dieses anscheinend freien Intervalls ist aber praktisch sehr wichtig; so kann man z. B. nach der Ehefähigkeit während eines solchen Intervalls gefragt werden, die man unbedingt ablehnen oder hinausschieben muß, wenn sich ein Verdacht auf multiple Sklerose ernsthaft begründen läßt. Ferner fand z. B. ein von mir gesehener Fall von „traumatischer“ multipler Sklerose dadurch seine Erledigung, daß ein Augenarzt ihn 6 Jahre vorher wegen einer Neuritis optica behandelt hatte etc.

Von diesen in Schüben verlaufenden Fällen sind diejenigen zu unterscheiden, bei welchen sich die Krankheit mehr kontinuierlich entwickelt. Es sind das diejenigen, die mit Beschwerden über allgemeine Nervosität, besonders mit Klagen über leichte motorische Erschöpfbarkeit zum Arzt kommen, und bei denen wir dann ein oder mehrere der genannten Anfangssymptome feststellen können. Streng sind diese Formen natürlich von den sprungartig fortschreitenden nicht zu trennen, es kommen vielmehr alle Übergänge vor.

End-
zustand

Der Endzustand, der nach Jahren oder Jahrzehnten erreicht wird, ist ein außerordentlich trauriger. Schwere Spasmen, in diesem Stadium manchmal völlige Querlähmungen fesseln den Kranken an seinen Stuhl, auch die Arme sind fast unbrauchbar, die Sprache mühsam, das Sehvermögen eingeschränkt etc. Es ist gut, daß eine gewisse euphorische Demenz (durch die Herde in der Rinde bedingt) die Kranken diesen Endzustand häufig nicht so schwer empfinden läßt.

Als ein gerade bei multipler Sklerose häufiges, aber auch bei anderen multiplen Erkrankungen des Gehirns vorkommendes Symptom sei noch das Zwangslachen und Zwangsweinen (ohne die entsprechenden Affekte) erwähnt.

Als eine besondere Form ist dann noch die **akute multiple Sklerose** zu erwähnen, die unter den Erscheinungen einer disseminierten Enzephalomyelitis, meist mit schweren Bewußtseinstörungen und Neuritis optica in wenigen Monaten tödlich verläuft. Sie ist von anderen enzephalomyelitischen Erkrankungen intra vitam mit Sicherheit nicht zu unterscheiden. Akute multiple Sklerose

Über die **Ätiologie** der multiplen Sklerose wissen wir gar nichts, so wenig, daß von einzelnen sogar ein „endogener“ Ursprung noch behauptet wird, während die Mehrzahl allerdings den Prozeß als einen entzündlichen betrachtet. Letztere Anschauung stützt sich besonders darauf, daß man die multiple Sklerose besonders häufig nach Infektionskrankheiten hat entstehen sehen. Auch die Möglichkeit einer traumatischen Entstehung wird vielfach angenommen und muß unter Umständen in Gutachten vertreten werden. Dabei ist dann nur eine Tatsache merkwürdig und schwer erklärlich, daß die multiple Sklerose fast ausschließlich eine Krankheit des jugendlichen Alters ist, mit wenigen Ausnahmen im Alter von 15—35 Jahren zur Entstehung kommt — eine Tatsache von zugleich erheblicher differentialdiagnostischer Bedeutung Ätiologie

Im übrigen ist die Differentialdiagnose gegenüber anderen organischen Erkrankungen im allgemeinen nicht schwer. Stellt man auf die eine Seite die Erkrankungen, wo man therapeutisch etwas ernstliches tun kann, auf die andere die therapeutisch unzugänglichen, zu denen wir eben auch die multiple Sklerose rechnen, so ist fast ausschließlich eine Verwechslung mit Lues cerebrospinalis zu fürchten. Hier entscheiden die Merkmale der Lues, welche in deren Kapitel besprochen werden. Die echte multiple Sklerose ist übrigens niemalsluetischen Ursprungs. Differentialdiagnose

Therapeutisch gehört die multiple Sklerose zu jenen Gruppen von Erkrankungen, wo wir alles mögliche anwenden, ohne sicher zu sein, daß irgend etwas nur im geringsten hilft. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind es eben nur die spontanen Remissionen, welche die Wirksamkeit einer Therapie vortäuschen. Von dem Gedanken des entzündlichen Ursprungs der multiplen Sklerose ausgehend, hat man Quecksilberkuren oder Kuren mit Credéscher Silbersalbe vorgeschlagen. Auch ich habe schon erhebliche Besserungen danach gesehen, und man wird den Dank der Kranken ja nicht ablehnen. Das einzige, wovon wir in einer hinreichend großen Zahl von Fällen eine objektive Besserung sehen, so daß z. B. bei Arbeitern eine Arbeitsfähigkeit auf einige Zeit sich wieder herstellen kann, sind einige Wochen dauernde Ruhekuren ohne weitere spezielle Behandlung, höchstens mit kurzen Badeprozeduren, etwas Massage und guter kräftiger Ernährung. Auch macht die Krankheit sicherlich bei Patienten, die sich besonders mit Gehen und Stehen nicht schonen können, oft schnellere Fortschritte. Frühzeitig bereite man den Kranken auf die Notwendigkeit einer gewissen Resignation vor. Das ist viel besser, als daß er viele Jahre hindurch eine unwirksame therapeutische Methode nach der anderen an sich erprobt. Therapie

28. Heine-Medinsche Krankheit bzw. spinale Kinderlähmung.

Wenn der alte Name der akuten Poliomyelitis oder der spinalen Kinderlähmung berechtigt wäre, so hätte ihr Bild in dem Kapitel der Rückenmarkskrankheiten Aufnahme finden können. Diese Bezeichnungen haben sich aber als ungenügend erwiesen. Wir haben vielmehr gelernt unter dem Namen der Heine-Medinschen Krankheit eine ätiologisch-nosologische Einheit zu verstehen, welche nach verschiedenen Richtungen weitergreift, als es mit dem alten Namen auszudrücken ist; wir haben das gelernt durch das Studium der großen Epidemien, die zuerst auf der nordischen Halbinsel, dann in Deutschland, Österreich, Amerika in den letzten Jahren ein Material von vielen tausend Fällen geliefert haben. Es ist dabei über allen Zweifel sicher, daß die alten Fälle von sporadischer Poliomyelitis nichts anderes sind als Einzelfälle der epidemischen Krankheit, die also seit langer Zeit überall endemisch geherrscht hat, und die nur in den letzten Jahren unter dem Einfluß unbekannter Hilfsursachen den gefährdrohenden Charakter geschlossener Epidemien angenommen hat. Es ist das ja ganz analog dem Verhalten der epidemischen Zerebrospinalmeningitis, die ja auch immer bei uns endemisch ist und nur von Zeit zu Zeit zu Epidemien anschwillt.

Epidemien

Virus

Das Virus der Heine-Medinschen Krankheit ist mikroskopisch und kulturell noch nicht bekannt, weil es sich um außerordentlich kleine Lebewesen, die das Berkefeldfilter passieren, handelt. Da sich aber die Krankheit auf Affen übertragen läßt, so wissen wir, daß es recht widerstandsfähig ist, insbesondere auch gegen Kälte und Glycerin — Eigenschaften, durch welche es sich dem ihm auch durch die Filtrierbarkeit nahestehenden Lyssavirus verwandt erweist.

Im Serum von Personen, die die Heine-Medinsche Krankheit überstanden haben, finden wir Antikörper, die in Vitro die Wirkung des Virus aufheben, dagegen finden wir keine komplementbindenden Antikörper, so daß die Möglichkeit, die Krankheit ohne den direkten oder indirekten Versuch am lebenden Tier, vielmehr durch eine reine Reagensglasreaktion zu diagnostizieren, wie die Syphilis, noch nicht gegeben ist.

In zur Sektion kommenden Fällen kann jedoch heute durch das Experiment am Affen die Zugehörigkeit des Falles zur Heine-Medinschen Krankheit verifiziert werden.

Art der Infektion

Das Studium der großen Epidemien hat zwei Dinge sehr wahrscheinlich gemacht oder erwiesen, die für die Verbreitung der Erkrankung sehr wichtig sind, einmal die Tatsache, daß das Virus durch nicht erkrankte Zwischenträger, ja sogar durch unbelebte Gegenstände (z. B. Postpakete) übertragen werden kann, und zweitens, daß es eine große Reihe von Erkrankungsformen gibt, die speziell das Nervensystem gar nicht oder nur ganz leicht beteiligen, vielmehr unter den Erscheinungen einer allgemeinen Infektion verlaufen. Insbesondere sind es häufig Anginen, fieberhafte Magendarmkatarrhe, auch Bronchitiden, welche nichts anderes als der Ausdruck der Heine-Medinschen Krankheit sind, und denen die eigentlichen nervösen Erkrankungen nachfolgen können, aber nicht nachzufolgen brauchen. Es ist

ganz klar, daß diese Abortivformen nur in Epidemiezeiten mit einiger Wahrscheinlichkeit werden diagnostiziert werden.

Die Allgemeinerscheinungen fehlen auch bei den schweren nervösen Formen nur selten, und ganz wohl überhaupt nicht. Allgemein-
symptome

Sie drängen sich besonders im Beginn der Krankheit auf, wenn sie auch später keineswegs zu fehlen brauchen, und bestehen in ziemlich plötzlich auftretendem Fieber, Kopfschmerzen, Schmerzen und Steifigkeit des Nackens, Schmerzen und Druckempfindlichkeit der Glieder, in anderen Fällen in Erscheinungen eines Magendarmkatarrhes, Erbrechen und Durchfall, noch in anderen in einer Angina, Schnupfen oder Bronchitis. Die Schmerzhaftigkeit und Empfindlichkeit des ganzen Körpers und die meningitischen Reizerscheinungen sind sehr häufig, in manchen Epidemien fast typisch. Da sie mit der landläufigen Vorstellung der spinalen Kinderlähmung durchaus nicht übereinstimmen, sind sie besonders geeignet, den unerfahrenen Beobachter irrezuführen.

Bei der Betrachtung der einzelnen Formen wollen wir zunächst diejenigen zusammenfassen, die sich auszeichnen durch schlaffe Lähmungen vom Vorderhorn-typus bzw. vom Kerntypus. Dazu gehört in erster Linie natürlich die allbekannte spinale, im eigentlichen Sinne poliomyelitische Form (spinale Kinderlähmung). Die Vorstellung, die man früher ziemlich allgemein von der Entstehung dieser Fälle hatte, war etwa die folgende: Ein Kind erkrankt unter nicht sehr schweren, manchmal sehr leichten Allgemeinerscheinungen, insbesondere Fieber, und man findet dann eine schlaffe Lähmung eines oder mehrerer Glieder, die sich während einiger Wochen und Monate bis zu einem gewissen Punkte zurückbildet, die aber doch in der Mehrzahl der Fälle dauernde Symptome in Form von Muskelatrophien mit nachfolgender Wachstumshemmung usw. hinterläßt, also schließlich das Bild der sogenannten spinalen Kinderlähmung bietet. Wenn aber vielfach das unbemerkte Einsetzen einer solchen Lähmung früher als charakteristisch betrachtet wurde, so hat die Erfahrung ergeben, daß diese „Paralysis in the morning“ gar nicht so häufig ist. Vielmehr entwickelt sich meist im Anschluß an das Fieberstadium oder schon während desselben die Lähmung allmählich im Verlauf von 1—3 Tagen. Ferner sind sehr häufig Schmerzen und leichte meningitische Erscheinungen mit dem Eintreten der Lähmung verbunden. Diese Lähmung kann jede Ausdehnung und jede Lokalisation in den Vorderhörnern oder in den Hirnnervenkernen erlangen. Am häufigsten sind bei weitem Lähmungen eines oder beider Beine (etwa 40 %), sehr häufig auch noch kombinierte Lähmungen von Armen und Beinen, manchmal gekreuzt (z. B. linker Arm und rechtes Bein); sehr zu beachten sind ferner die Rumpf- und Bauchmuskellähmungen und endlich die Gehirnnervenzlähmungen, welche letzteren entweder isoliert auftreten oder mit Spinallähmungen sich in der verschiedensten Weise kombinieren. Was die Extremitätenlähmungen betrifft, so sind allgemeiner Erfahrung gemäß die proximalen Abschnitte der Extremitäten verhältnismäßig häufig und stark betroffen. Aber es kommt auch genau das Gegenteil vor. Der Charakter

Vorder-
horn-
typus

Spinale
Kinder-
lähmung

dieser Lähmungen ist bekannt, die Lähmungen sind schlaff, und die Sehnenreflexe fehlen in ihrem Bereiche.

Die anatomische Grundlage dieser Fälle ist eine Entzündung des Vorderhorns des Rückenmarks auf mehr oder weniger große Strecken hin.

Hier sind noch die Blasen- und Mastdarmlstörungen, sowie die okulopupillären Symptome zu erwähnen. Sowohl die Nerven der Blase und des Mastdarms, wie der Halssympathikus entspringen ja im Rückenmark (vgl. S. 58), und wenn ihre Ursprungszellen dort von dem poliomyelitischen Prozeß betroffen sind, so kommt es zu den charakteristischen Ausfallserscheinungen, insbesondere sind Urinretention und Inkontinenz durchaus nicht selten.

In sehr seltenen Fällen können auch die weißen Stränge und insbesondere die Pyramidenbahnen betroffen werden. Wir haben dann eventuell das Babinski'sche Symptom, Fußklonus, Spasmen usw. Wenn sich diese Pyramidensymptome dann mit den schlaffen Lähmungen kombinieren, so kann das Bild außerordentlich kompliziert werden.

Besonders bemerkenswert ist die Feststellung, daß zu den spinalen Formen der Heine-Medinschen Krankheit auch das Verlaufsbild der Landry'schen Paralyse gehören kann. Wir verstehen unter Landry'scher Paralyse eine aufsteigende (oder absteigende) Spinallähmung. Sie verläuft in der Weise, daß eine an den Beinen einsetzende Lähmung nach oben fortschreitet, manchmal bis zum Fazialis. Der Ausgang ist in diesen Fällen meist entweder Tod durch Lähmung der Atemmuskulatur oder vollständige Genesung. Im allgemeinen aber sind die unter Landry'scher Form verlaufenden Fälle allerdings sehr zu fürchten, sie stellen einen erheblichen Teil der tödlich endigenden dar, und es ist merkwürdig, daß die Heine-Medinsche Krankheit gerade beim Erwachsenen besonders gern in dieser gefährlichen Form auftritt.

Wenn das Virus der Heine-Medinschen Krankheit sich wesentlich in den Meningen lokalisiert, so entsteht die meningitische Form, die unter allen Erscheinungen der akuten Meningitis: Erbrechen, Kopfweg, Nackensteifigkeit, Rückensteifigkeit, Kernig'schem Symptom (S. 76), mehr oder weniger akut verlaufen kann. Diese Fälle können ganz unmöglich zu diagnostizieren sein, wenn sie nicht gerade zur Zeit einer Epidemie auftreten. Mit dem Ablauf der akuten meningitischen Erscheinungen kommen dann doch manchmal noch poliomyelitische Lähmungen zum Vorschein.

Bei einer Lokalisation des Virus im Gehirn kann das Bild der zerebralen Kinderlähmung zustande kommen (vgl. S. 162); die Hauptmenge der zerebralen Kinderlähmungen scheint jedoch nicht auf die Heine-Medinsche Krankheit zurückzugehen, weil diese Fälle bei Epidemien doch verhältnismäßig sehr selten sind. Auch zerebellare Bilder kommen durch Entzündungen im Bereiche des Zerebellums und seiner Bahnen zustande, so daß also der Beweis geliefert ist, daß sich die Heine-Medinsche Krankheit an jeder Stelle des zentralen Nervensystems lokalisieren kann, und darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, daß sie auch an den peripheren Nerven in der Form der Polyneuritis auftreten kann (vgl. S. 82).

Endlich ist auch eine Abweichung von dem klassischen Bilde der Poliomyelitis sehr wichtig, daß sie nämlich als Heine-Medinsche

**Auftreten
bei Er-
wachsenen**

Wachstums-
hemmung

Therapie

Die Therapie des einzelnen Falles im akuten Stadium ist bisher eine rein symptomatische. Zwar ist es nach mehreren Methoden, von denen eine der Pasteurschen Lyssamethode nachgebildet ist — entsprechend der nahen Verwandtschaft zwischen dem Virus der Lyssa und dem der Heine-Medinschen Krankheit — gelungen, im Experiment eine Immunität gegen die Infektion zu erzielen. Nach übereinstimmendem Urteil eignen sich aber diese Methoden zur praktischen Verwertung am Menschen wegen ihrer Gefährlichkeit durchaus noch nicht.

Außer den landläufigen Methoden der Krankenpflege, der Exzitation usw., die sich für jeden Arzt nach Lage des Falles von selbst verstehen, ist noch die Lumbalpunktion zu therapeutischen Zwecken angewandt worden. Sie entspricht ja in manchen Fällen der Indikation der Druckentlastung und wirkt manchmal zweifellos subjektiv erleichternd. Ob sie irgend einen objektiven Nutzen hat, ist noch recht zweifelhaft.

Prophy-
laxe

Die Krankheit folgt den großen Verkehrswegen und bildet dann Zentren, von denen aus sich die Erkrankungsfälle oft strahlenförmig verbreiten. So ist in den schwedischen Dörfern häufig das Schulhaus Zentrum eines solchen Herdes gewesen. Demgemäß muß es bei Ausbruch einer Epidemie die erste Aufgabe sein, solche Zentren zu ermitteln und unschädlich zu machen. Es muß also besonders auf Schulen, Spielplätze, Turnplätze u. dgl. geachtet werden. Diese Ermittlungen sind natürlich nur möglich auf Grund einer Anzeigepflicht, und in Preußen ist die Heine-Medinsche Krankheit jetzt allgemein anzeigepflichtig. Es gelten auch für die Isolierung der Krankheit die Vorschriften für infektiöse Erkrankungen. Für die Isolierung begnügte man sich bei der schwedischen Epidemie mit 3 Wochen. Es muß uns hier die experimentelle Forschung noch genaueren Aufschluß geben. Da die Untersuchungen am Affen schon gelehrt haben, daß die Darmschleimhaut, Nasenschleimhaut und die Speicheldrüsen als Ausscheidungsstätten für das Virus in Betracht kommen, so ist eine Desinfektion der Darmentleerungen und des Nasenrachenraumes angezeigt. Dafür genügt eine 1 %ige Lösung von Wasserstoffsuperoxyd, welche das Virus zerstört. Es ist jedoch unzweifelhaft, daß durch die abortiven Formen und durch die Existenz gesunder Virusträger die epidemiologische Prophylaxe außerordentlich erschwert, in Gegenden mit dichter Bevölkerung wahrscheinlich beinahe unwirksam gemacht werden muß. Trotzdem bleibt es für den Praktiker die Kenntnis all der verschiedenen Formen der Heine-Medinschen Krankheit ungeheuer wichtig, um für die Verhütung der Epidemie das Veranlassen zu können, was nach Lage der Dinge möglich ist. Bemerkt sei noch, daß das Maximum der Epidemien in der Regel in den Sommer und den Anfang des Herbstes fällt, daß von dieser Regel aber Abweichungen vorkommen.

29. Chorea.

Die Chorea minor ist eine der häufigsten infektiösen Erkrankungen des Nervensystems. Ob sie auf einer Invasion der Bakterien selbst in das Nervensystem oder nur auf einer Wirkung der Toxine beruht, ist zweifelhaft; nicht zweifelhaft ist es aber mehr, daß Bakterien, vielleicht Streptokokken besonderer Art die Chorea als die Teilerkrankung einer allgemeinen Infektion hervorrufen, deren weitere Teilerkrankungen Herz- und Gelenkerkrankungen sein können, nicht zweifelhaft weiter, daß den choreatischen Bewegungen kleine entzündliche Veränderungen in gewissen Teilen des Nervensystems zugrunde liegen. Die Krankheit kommt in der großen Mehrzahl der Fälle im Kindesalter vor, seltener beim Erwachsenen; hier ist die Gravidität ein besonderer ätiologischer Faktor.

Infektiöse
Erkrankung

Die choreatischen Zuckungen sind bereits an früherer Stelle beschrieben worden (S. 35). Nicht selten tritt die Krankheit wesentlich einseitig auf. Selten führt sie zu schweren Krankheitsbildern mit wilden Jaktationen, Unmöglichkeit zu schlucken infolge der Mitbewegungen, die bei dem Versuche dazu eintreten, Aufhebung der Sprache. Ein großer Teil dieser schweren Fälle geht an Erschöpfung zugrunde. Nicht so ungünstig zu beurteilen ist die Chorea mollis, bei der die Schlaffheit der Muskulatur, welche überhaupt eine häufige Begleiterscheinung der Chorea ist, so hervortritt, daß die choreatischen Zuckungen fast dahinter zurücktreten. Es entsteht dann das Bild einer lähmungsartigen Schwäche neben der Chorea.

Schwere
Fälle

Die Verwechslung der Chorea minor ist eigentlich nur mit Hysterie möglich. Indessen haben die hysterischen Formen doch bei genauerer Betrachtung besondere Kennzeichen, entweder eine gewisse Rhythmik der Bewegungen oder etwas Tikartiges. Beides fehlt der echten Chorea ganz.

Die meisten Fälle heilen innerhalb weniger Monate vollständig. Zunächst ist Bettruhe am Platze. Auch sollen die kleinen Kranken nicht mit anderen Kindern zusammenkommen und selbstverständlich für die ganze Dauer der Krankheit vom Schulbesuch dispensiert werden. Man gibt Arsen (Liq. arsenicalis Fowleri je nach dem Alter bis zu 3 mal täglich 10 Tropfen, neuerdings hat man auch Salvarsan versucht) und Brom. In den ganz schweren Fällen muß man zu Choloralklystieren oder zu Skopolamininjektionen greifen.

Therapie

In manchen Fällen bleibt die Neigung zu choreatischen Zuckungen, auch abgesehen von echten Rezidiven, durch lange Jahre, ja durch das ganze Leben bestehen. Solche Personen reagieren leicht auf psychische Erregungen und auf die Gravidität mit einem Aufflackern der Zuckungen. In solchen Fällen ist Brom von großem Nutzen.

Bleibende
Symptome

Die Huntingtonsche Chorea hat ätiologisch mit der Chorea minor gar nichts zu tun. Sie ist eine exquisit familiär hereditäre Erkrankung, welche trotzdem gewöhnlich erst im 4. und 5. Lebensdezennium zum Ausdruck kommt. Es gibt auch von ihr, wie von jeder familiär hereditären Erkrankung anscheinend

Hunting-
tonsche
Chorea

freistehende Fälle (vgl. S. 108). Die Zuckungen selbst sind denen der Chorea minor ziemlich gleich, nur noch grotesker und vertrackter. Die Krankheit ist immer mit Demenz verbunden und verläuft in einer Reihe von Jahren tödlich. Eine Therapie existiert nicht.

Chorea
durch apo-
plektische
Herde

Durch Erweichungsherde im Bereiche der Bahnen (Bindearm, Thalamus), welche auch bei der infektiösen Chorea geschädigt sind, kann auch eine Herdchorea zustande kommen, z. B. nach apoplektischen Anfällen. Sie ist fast immer streng einseitig. Die Anamnese sichert die Diagnose.

30. Paralysis agitans.

Wie die Chorea ist auch die Paralysis agitans keine blasse „Neurose“, sondern eine Gehirnerkrankung. Die anatomischen Befunde stehen denen bei den Alterserkrankungen nahe, ohne mit ihnen und speziell nicht mit der Arteriosklerose identisch zu sein.

Tremor
und
Rigidität

Die beiden Hauptsymptome der Krankheit, das Zittern und die Rigidität, sind bereits früher geschildert worden (S. 35). Sie ergeben zusammen ein Bild, das gar nicht verkannt werden kann. Charakteristisch ist auch die vorgebeugte Haltung und die maskenartige Leblosgigkeit des Gesichts (die auf der Rigidität der Gesichtsmuskulatur beruht). An der steifen Haltung, der Rigidität und dem regungslosen Ausdruck kann man die Paralysis agitans auch in den nicht ganz ungewöhnlichen Fällen erkennen, in denen das eine Symptom, das Zittern, fehlt (Paralysis agitans sine agitatione). Ebenfalls nicht selten sind die Fälle, in welchen die Krankheit sich, wenigstens im Beginn, auf eine Körperseite beschränkt. Zittern ohne Rigidität kommt nur in leichten Fällen und im Beginn vor.

Sine
agitazione

Retro- und
Propul-
sionen

In schweren Fällen finden sich Gangstörungen in Gestalt von Retro- und Propulsionen. Die letzteren bestehen darin, daß der Kranke nicht Halt machen kann, wenn er will, sondern von einer inneren Gewalt nach vorn gestoßen wird, bis er sich irgendwo festhalten kann.

Die Sehnenreflexe und Hautreflexe sind meist nicht verändert.

Häufige Symptome sind noch ein großes Hitzegefühl, so daß den Kranken die leichteste Bettdecke zu schwer erscheint, und ferner Speichelfluß.

Verlauf

Die Krankheit, die meist im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, selten früher, beginnt, ist im allgemeinen eine progressive. In Siechenhäusern finden wir die schweren Endformen dauernd ans Bett gefesselt. In nicht seltenen Fällen schreitet sie jedoch sehr langsam fort oder kommt auch ganz zum Stillstand. Ich kenne Fälle, die schon 15 Jahre leichtere Form von Paralysis agitans darstellen. Man stelle also die Prognose nicht allzu ungünstig.

Therapie

Die Therapie ist dem Fortschreiten der Krankheit gegenüber völlig machtlos. Einige Erleichterung gewährt den Kranken Massage. Auch soll man sie anhalten, doch die aktive Bewegung nicht ganz aufzugeben. Eine unzweifelhafte Besserung des ganzen Bildes erhält man in den meisten Fällen durch Injektionen von Hyoscin oder Duboisin (0,0005

bis 0,001). Aber diese Besserung hält nur einige Stunden an, und dauernd kann man diese Mittel nicht geben. Intern (als Pillen zu 0,3 mg 3 mal täglich) sind sie viel weniger wirksam.

31. Meningitis.

Eine Meningitis besteht in einer entzündlichen Veränderung der Meningen. Diese führt zu einer Zunahme und zu einer entzündlichen Veränderung der Lumbalflüssigkeit. Demgemäß sind die nervösen Symptome der Meningitis zusammengesetzt aus den Erscheinungen des erhöhten Zerebrospinal(=Hirn)-Druckes, wie sie schon beim Hirntumor beschrieben sind, und den Folgen der entzündlichen Veränderung der Meningen selbst. Durch die Reizung der Wurzeln, welche die Meningen ja durchbohren, kommen die heftigen Schmerzen und die Empfindlichkeit bei Meningitis zustande, und ebenso die reflektorische Nackenstarre, der Opisthotonus und das Kernigsche Phänomen (vgl. S. 76), welches dem bei Ischias ganz gleich ist.

Allgemeine
Symptomatologie

Wir sehen am häufigsten von allen Meningitisformen die tuberkulöse Entzündung der weichen Hirnhäute. Besonders bei Kindern hat jeder Praktiker dieses traurige Bild wieder und wieder sehen müssen. Kinder, die meist allmählich erkrankt sind, von denen wir hören, daß sie unruhig geworden sind, nichts essen, erbrechen und über Kopfschmerzen geklagt haben, finden wir mäßig fiebernd im Bett mit angezogenen Beinen, etwas eingezogenem Bauch; wir fassen nach dem Kopf, er läßt sich nur schwer und unter Schmerzen gegen die Brust hinbewegen, wir fassen nach den Beinen und versuchen sie gestreckt gegen den Rumpf hinzubewegen (Kernigsches Phänomen), das Kind gibt lebhaft Schmerzäußerungen von sich; ist es schon schwer benommen, verzieht es doch noch schmerzlich das Gesicht. Damit ist die Diagnose dann schon so gut wie sicher. Beim Augenspiegeln finden wir sehr häufig eine Staunungspapille, aber sie ist keine notwendige Bedingung für die Diagnose, ebenso wie die bei Kindern manchmal schwer festzustellende Lähmungen oder Paresen basaler Hirnnerven, am häufigsten des Abduzens. Wenn solche da sind, sind sie natürlich wichtig. Sie beweisen die vorwiegend basale Lokalisation, die der tuberkulöse Prozeß zum Unterschied von den sich meist an der Konvexität lokalisierenden Formen bevorzugt. Auf den Puls allein kann man nicht zuviel geben. Er ist häufig im Verhältnis zur Höhe des Fiebers langsam (Druckpuls), in den Endstadien dann sehr beschleunigt.

Tuberkulöse M.

Basale
Symptome

Etwaige Zweifel beseitigt dann die bei Kindern besonders leicht auszuführende Lumbalpunktion (vgl. S. 54). Wir finden meist einen sehr hohen Druck und dabei eine kaum getrübte, manchmal ganz klar erscheinende Flüssigkeit. Die Sedimentierung ergibt meist eine reine Lymphozytose. Polynukleäre Zellen findet man in geringer Anzahl, manchmal in den Anfangsstadien, sonst spricht ihr Befund im allgemeinen gegen die tuberkulöse Natur einer Meningitis. Der definitive

Lumbal-
flüssigkeit

Beweis kann durch den Nachweis von Tuberkelbazillen erbracht werden. Aber es gehört dazu eine sehr sorgfältige und lange Untersuchung.

Besondere
Formen

Der Verlauf kann einzelne Besonderheiten zeigen, die das Bild im ganzen aber kaum verändern. So kann der Beginn sich als ein plötzlicher darstellen. Die Kinder erkranken manchmal unter Krämpfen, sind einige Stunden bewußtlos, das Bewußtsein stellt sich wieder her; die Eltern glauben die Kinder gerettet; es war aber nur der Beginn der langsam fortschreitenden Erkrankung. Außer den oben genannten Symptomen finden wir häufig noch Pyramidenzeichen, vor allem den Babinskischen Reflex einseitig oder doppelseitig. Er beruht auf einer Schädigung der Großhirnhemisphären durch die Meningitis, muß aber immer dazu führen, nachzuforschen, ob die anscheinende Meningitis nicht einer primären Erkrankung der Hemisphären selbst ihren Ursprung verdankt (Lues, Solitärtuberkel, Abszeß).

Beim Erwachsenen, bei dem die tuberkulöse Meningitis verhältnismäßig viel seltener ist als beim Kinde, haben wir das gleiche Bild. Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen, Benommenheit, nicht so selten hier delirante Unruhe, Nackensteifigkeit, Kernigsches Symptom. In ganz seltenen Fällen kann das Fieber fehlen, der Puls ist dann häufig von großer Bedeutung. Beim Erwachsenen geben die im Beginn durch ein basales meningitisches Exsudat bedingten Lähmungen der Hirnnerven häufig die ersten Fingerzeige. Die Entscheidung gibt auch hier die Lumbalpunktion, die man in diesen Fällen sofort ausführen soll (vgl. S. 56).

Ausgang

Die Krankheit führt beim Kind wie beim Erwachsenen rettungslos, meist in einigen Wochen zum Tode.

Eiterige
Meningitis

Die eiterige Meningitis unterscheidet sich von der tuberkulösen zunächst durch ihren akuten Verlauf; und dementsprechend durch die Schwere der Symptome schon im Beginn der Erkrankung; das hohe Fieber, die hochgradige Nackensteifigkeit, die große Empfindlichkeit des ganzen Körpers, die heftigen Kopfschmerzen. Die basalen Symptome fehlen bei der eiterigen Form meist, weil sie sich zum Unterschied von der tuberkulösen (und der syphilitischen) mehr an der Konvexität abspielt. Dem entsprechen manchmal Krämpfe auch Jacksonscher Art und einseitige oder doppelseitige Pyramidenzeichen.

Die Lumbalpunktion ergibt bei der eiterigen Form eine deutlich getrübbte, manchmal dickeiterige Flüssigkeit mit vielen polynukleären Leukozyten und verhältnismäßig wenig Lymphozyten.

Fortge-
leitete
Formen

Die eiterige Meningitis ist in einer Anzahl von Fällen hervorgerufen durch die Ausdehnung von eiterigen Prozessen am Schädel durch die Meningen. Es kommen besonders Eiterungen des mittleren und inneren Ohres und Schädeltraumen in Frage. Seltener sind Erkrankungen der Nebenhöhle der Nase die Ursache. Wohl die foudroyantesten Formen sieht man beim Durchbruch von Hirnabszessen.

Infektiöse
Formen

Eine zweite Ursache der eiterigen Meningitis sind Infektionskrankheiten. Nach Typhus, Influenza, Gelenkrheumatismus, Pneumonien, Scharlach und bei septischen Prozessen sehen wir, wenn auch selten, Meningitiden von sehr verschiedener Schwere, von den aller-

schwersten Formen, wo die Punktion ein dickeiteriges Exsudat ergibt, bis zu ganz leichten Formen, wo die Patienten nur einige Male Erbrechen, etwas Nackensteifigkeit, Kopfschmerzen, dabei leichtes Fieber haben, um nach einigen Tagen wieder zu gesunden. Wir würden in den letzten Fällen die Diagnose gar nicht mit Sicherheit stellen können, wenn nicht die Lumbalflüssigkeit uns einen erhöhten Druck und polynukleäre Leukozyten ergäbe. Für die Praxis, wo man in solchen leichten Fällen nicht immer die Lumbalpunktion machen wird, ergibt sich die Regel, keine zu pessimistischen Prognosen zu stellen.

Die Prognose ist auch in den ausgesprochenen Fällen von fortgeleiteter und infektiöser Meningitis nicht ganz so schlecht wie bei der tuberkulösen Form. Entscheidend für die Möglichkeit einer Heilung scheint mir der bakteriologische Befund. Ich habe niemals Meningitiden, wo im Lumbalpunktat Streptokokken nachgewiesen wurden, heilen sehen. Dagegen können Meningitiden mit vereinzelten Staphylokokken, Diplokokken, Stäbchen (Influenzabazillen?) zur Heilung kommen. Auch gibt es Fälle von fortgeleiteter Meningitis, wo wir bei ausgesprochen trüber Flüssigkeit gar keinen bakteriologischen Befund erheben können — ein Zeichen, daß der eigentliche infektiöse Prozeß noch lokalisiert, noch nicht allgemein geworden ist.

Bakterio-
logischer
Befund

Die Therapie hat sich dementsprechend einzurichten. Bei Streptokokkenmeningitiden halte ich jeden Eingriff für nutzlos, aber er wird nichts schaden. Bei den anderen fortgeleiteten Meningitiden müssen die ersten Anzeichen der Meningitis das letzte Signal zu einer sofortigen Freilegung des Eiterherdes am Schädel sein. Es gilt das sowohl von traumatischen Fällen wie insbesondere von der otogenen Form, bei der durch Freilegung und Eröffnung der Meningen vom Ohre aus auch eine Reihe schöner Heilungserfolge erzielt sind. Bei den infektiösen Formen gibt es natürlich keinen lokalen Herd und auch kein chirurgisches Eingreifen; an dessen Stelle tritt hier die wiederholte Lumbalpunktion, die erstens von außerordentlich beruhigendem Einfluß auf die subjektiven Beschwerden des Kranken ¹⁾, aber auch anscheinend von Bedeutung für die objektive Heilung des Prozesses ist. Außer diesen beiden Maßnahmen — Operation und Lumbalpunktion — gibt es nur die üblichen allgemeinen exzitierenden und symptomatischen Mittel.

Therapie

Die Prognose ist natürlich auch bei kunstgerechter Therapie nicht etwa eine gute. Die Mehrzahl dieser infektiösen und fortgeleiteten eiterigen Meningitiden gehen doch zugrunde, ganz schlecht ist natürlich die Prognose der septischen Meningitis, und auch der ausgesprochenen Meningitiden nach Pneumonie.

Prognose

Die epidemische Meningitis (Genickstarre) ist nur eine Form der eiterigen Meningitis, diejenige, welche durch den Weichselbaumschen Meningococcus intracellularis erzeugt wird. Die

Epide-
mische
Meningitis

¹⁾ Dieser subjektive Einfluß macht sich nach der Lumbalpunktion bei jeder Form der Meningitis, auch der tuberkulösen und der epidemischen geltend.

Krankheit ist durch die großen Epidemien der letzten Jahre (z. B. in Schlesien und am Rhein) wieder in den Vordergrund des Interesses gerückt. Aber sie ist auch außerhalb von Epidemiezeiten, also endemisch, keine seltene Erkrankung. Es vergeht doch kein Jahr, wo wir nicht eine ganze Anzahl von „epidemischen“ Fällen, deren Infektion uns unklar bleibt, zur Beobachtung bekämen, und wir müssen jederzeit mit dieser Erkrankung rechnen.

Verlauf

Die Mehrzahl dieser Fälle zeichnet sich aus durch einen sehr akuten Beginn mit hohem Fieber und sogleich auch allen meningitischen Symptomen — Benommenheit, Kopfschmerzen, Erbrechen, Nackensteifigkeit, Kernigesches Symptom, große Empfindlichkeit des ganzen Körpers, sehr erhöhter Lumbaldruck, eiterig getrübbtes Punktat. Die Auffindung von Meningokokken macht manchmal etwas Schwierigkeiten. Trotzdem ist der Verlauf der endemischen Fälle, beim Erwachsenen wenigstens, bei uns ein ziemlich benigner. Ich habe unter vielleicht 70—80 Fällen doch nur ganz wenig Todesfälle gesehen, und zwar ohne Serumanwendung. Der Verlauf ist dabei ein sehr wechselvoller; nachdem das Krankheitsbild einige Tage in voller Schwere bestanden hat, gehen die Erscheinungen zurück, um ganz unberechenbar und plötzlich, manchmal schon aus anscheinend voller Rekonvaleszenz, wieder akut anzuschwellen. Mit den Symptomen kann die Beschaffenheit des Lumbalpunktates von Tag zu Tag wechseln.

Schlechter erscheint die Prognose der endemischen Genickstarre bei Kindern. Auch hier ist zwar der Verlauf selten ein so akuter, wie er zu Epidemiezeiten sein kann, aber die Krankheit geht häufiger als beim Erwachsenen in einen chronischen Hydrozephalus über, in welchem die Kinder unter hochgradiger Abmagerung, von Zeit zu Zeit sich wiederholenden Krämpfen und Erbrechen, unter Fortdauer leichter meningitischer Symptome allmählich zugrunde gehen, ohne daß es gelingt, den Prozeß aufzuhalten.

Komplikationen

In den großen Epidemien kommen sehr viel mehr schwere Fälle vor, Fälle, die manchmal in 24 Stunden tödlich verlaufen, Fälle mit Komplikationen wie insbesondere eiteriger Iritis, Otitis, Fälle endlich, welche auch den Erwachsenen langsam in das Stadium eines chronischen Hydrozephalus führen, und die entweder schließlich nach einigen Monaten in Tod oder in einen bleibenden psychischen Defektzustand oder auch Blindheit oder Taubheit ausgehen. Andererseits gibt es auch gerade in Epidemien Fälle so leichter Art, daß sie nur im Zusammenhang mit der herrschenden Epidemie als Genickstarre erkannt werden.

Therapie

Die Therapie besteht wie bei der infektiösen Form in regelmäßig täglich oder alle zwei Tage vorgenommenen Lumbalpunktionen, bei denen unter genauer Druckmessung ganz allmählich bis zu dem normalen Druck von 120—200 mm Wasser Lumbalflüssigkeit abgelassen wird. Neuerdings wird vielfach die Injektion von Meningokokkenserum an diese Lumbalpunktionen angeschlossen, ohne daß ein sicheres Urteil sich über die Zweckmäßigkeit dieser Maßregel bisher gewinnen ließe. Daß aber die Lumbalpunktionen als solche nützen, erscheint ganz zweifellos.

Unter dem Namen der Meningitis serosa gehen wahrscheinlich eine Anzahl verschiedener Affektionen. Wenn man sie nämlich nur durch die seröse, nicht getrübte, Beschaffenheit des Lumbalpunktats charakterisiert, so gehören eine große Anzahl von infektiösen Meningitiden zur serösen Meningitis. Es hat aber keinen Sinn, diese Formen abzutrennen, die nur leichte Fälle der anderen Formen sind.

**Meningitis
serosa**

Eine besondere Stellung könnte allenfalls der Meningitis serosa bei Otitis zugebilligt werden. Es können im Verlaufe einer Otitis media chronica nicht nur ausgesprochene eiterige Meningitiden zur Ausbildung kommen, sondern auch gutartigere Formen, die niemals eine trübe, sondern nur eine seröse Lumbalflüssigkeit ergeben, und dabei fieberlos und mehr chronisch verlaufen, so daß das klinische Bild völlig den Allgemeinsymptomen des Tumor cerebri gleichen kann: Benommenheit, Stauungspapille, Erbrechen, einseitige oder allgemeine Krämpfe. Die Zeichen der akuten Meningitiden, die Nackenstarre, das Kernigsche Symptom können dabei recht zurücktreten. Es wird vermutet, daß diese Formen nicht infektiösen, sondern toxischen Ursprungs sind. Ihre Unterscheidung von den anderen Komplikationen der Otitis, insbesondere vom Abszeß, ist natürlich sehr schwer, manchmal unmöglich, besonders wenn sie mit einer nicht eiterigen Enzephalitis (vgl. S. 137) verbunden sind. Ihre Therapie ist zunächst die Behandlung der Otitis, ferner Lumbalpunktionen. Die Gefahr für das Auge (Neuritis) kann die dekompressive Trepanation erforderlich machen, nach der manchmal ganz enorme Quantitäten von Zerebrospinalflüssigkeit abgesondert werden. In anderen Fällen heilt die seröse Meningitis auch spontan.

bei Otitis

Nun kann eine solche Meningitis serosa auch ohne alle ersichtliche Ursache zur Entstehung kommen, und es ist nach dem Gesagten klar, daß sie ganz unter den Allgemeinerscheinungen eines Hirntumors verlaufen muß. Das schlimmste für die Diagnostik ist aber die Tatsache, daß diese anscheinend ganz allgemeine Erkrankung auch zu lokalen Symptomen Veranlassung geben kann, ohne daß wir einen lokalen Befund erheben konnten. So sind eine ganze Reihe von Fällen unter der Diagnose Tumor des Kleinhirns operiert worden, bei denen Operation und eventuell Autopsie gar keinen Befund ergab außer dem einer Meningitis serosa bzw. ihres Folgezustandes, eines Hydrocephalus acquisitus. Die Fälle sind dabei prognostisch durchaus nicht etwa günstig, sondern sie kommen in erheblicher Zahl zum Exitus. Alles in allem bilden sie natürlich keine häufige Erkrankung. Über die Differentialdiagnose gegenüber dem Hirntumor ist S. 134 einiges gesagt. Für die Therapie sei nur noch einmal betont, daß gerade bei ihnen die Dekompressivtrepanation sehr in Betracht kommt. Ferner hat man trotz des nicht syphilitischen Ursprungs Schmierkuren von Erfolg gefunden.

**Spontane
Form**

**Erworbe-
ner Hydro-
cephalus**

Über die syphilitischen Meningitiden vgl. S. 172. Eine Pachymeningitis haemorrhagica kommt außer bei Syphilis noch bei Alkoholisten vor.

**Pachy-
meningitis**

Meningeal-
blutung

Blutung in die Meningen oder Durchbruch einer Hirnblutung können zu Erscheinungen führen, die mit Meningitis verwechselt werden können. Die Lumbalpunktion korrigiert etwaige Irrtümer.

32. Epilepsie.

Epilepsie
und epi-
leptischer
Anfall

Ehe wir die Epilepsie des weiteren besprechen, muß Klarheit geschaffen werden über das Verhältnis zwischen Epilepsie und epileptischem Anfall. Wir haben schon im allgemeinen Teil dieses Buches (S. 36) zwei Arten von epileptischen Anfällen unterschieden, den „großen“ epileptischen und den Jacksonschen Anfall. Der erste beteiligt fast gleichzeitig die ganze Körpermuskulatur, verläuft mit einer tonischen und klonischen Phase, der zweite beschränkt sich auf einen Teil des Körpers oder er pflanzt sich zuerst klonisch, dann erst tonisch werdend, von einem Punkte allmählich bis zur beliebigen Ausdehnung über den Körper fort.

Es ist nun wichtig festzuhalten, daß einmal der große epileptische Anfall keineswegs nur für die „genuine Epilepsie“ charakteristisch ist, und daß zweitens der Jacksonsche Anfall ¹⁾ nicht in allen Fällen auf eine grobe, organische Schädigung des Gehirns, etwa einen Tumor, zurückgeführt werden muß, sondern auch als Ausdrucksform der genuinen Epilepsie erscheinen kann.

Das heißt, jeder epileptische Anfall ist zunächst immer nur ein Symptom, dessen Ursache wir zu erforschen haben, und speziell nach der Richtung, ob die Epilepsie d. h. die Krankheit Epilepsie in ihm zum Ausdruck kommt.

Große epi-
leptische
Anfälle
ohne
Epilepsie

Große epileptische Anfälle ohne Epilepsie kommen vor bei Paralyse, bei Eklampsia infantum et gravidarum, bei Urämie, beim Hirntumor, beim Hirnabszeß, bei Lues cerebrospinalis, bei der Meningitis, bei Commotio cerebri und bei einer großen Reihe von akuten und chronischen Vergiftungen, Fleischvergiftung, Kohlenoxydvergiftung. Bei allen diesen Krankheiten kommen auch partielle (Jacksonsche) Anfälle vor. Die Diagnose ergibt sich einesteils aus den sicheren Erscheinungen der organischen Herdläsion beim Tumor, Abszeß, Lues etc., andererseits aus den begleitenden Umständen bei der Eklampsie, der Urämie etc. Wenn organische Hirnerkrankungen ohne lokale Ausfallssymptome verlaufen, so kann selbst bei länger sich hinziehenden Fällen die Entscheidung, ob es sich um eine genuine oder symptomatische Epilepsie handelt, manchmal unmöglich sein. So sind z. B. Fälle bekannt, bei denen sich als zufälliger Sektionsbefund einer anscheinend genuinen Epilepsie multiple Zystizerken des Gehirns fanden.

Diagnose
des epi-
leptischen
Anfalls

Ehe wir uns die Frage vorlegen, ob ein epileptischer Anfall ein Symptom einer genuinen Epilepsie war, müssen wir nun freilich erst

¹⁾ Wenn wir, wie das einige andere tun, den Jacksonschen Anfall nicht symptomatologisch, sondern ätiologisch als durch eine „organische“ Hirnerkrankung bedingt, definieren, so kommen wir aus den Schwierigkeiten überhaupt nicht heraus.

entscheiden, ob er überhaupt ein epileptischer war. Wenn man zufällig einmal zum Anfall selbst kommt, so ist er kaum zu verkennen. Die Verdrehung der Augen und des Kopfes, die klonischen nicht ganz regelmäßigen allmählich abnehmenden schüttelnden Krämpfe, die rücksichtslose Gewalt aller dieser Krampfbewegungen, die Erschwerung der Atmung ergeben bei der völligen Bewußtlosigkeit des Kranken ein ganz typisches Bild. Bekannt als diagnostisches Hilfsmittel ist ferner die Weite und Starre der Pupillen im Anfall, die nur in ganz außerordentlich seltenen Fällen gelegentlich auch einmal bei der Hysterie beobachtet wird. Die Pupillen sind aber im Anfall überhaupt nicht leicht zu prüfen. Die Farbe des Gesichts im Beginn des Anfalls ist meist blaß, im weiteren Verlauf zyanotisch, gibt aber keine Differentialdiagnose. Wer einige Male echte epileptische Anfälle gesehen hat, wird sich durch hysterische Anfälle kaum jemals täuschen lassen. Das Gemachte der hysterischen Anfälle, die Rücksicht, die der Hysterische selbst bei den wildesten Verdrehungen, dem stärksten Fuchteln und Stoßen noch auf sich und seine Umgebung nimmt, sind im allgemeinen bald herauszufühlen. Nur wenn sich jemand eigens darauf einübt, epileptische Anfälle zu simulieren, kann es vorkommen und ist vorgekommen, daß er auch Ärzte, die in Epileptikeranstalten fast nur mit Epileptikern zu tun haben, lange Zeit täuscht.

Kommt der Arzt kurze Zeit nach dem Anfall, so ist der tiefe und kaum zu störende Schlaf, den die meisten Epileptiker nach dem Anfall zeigen, etwas sehr charakteristisches. Freilich kann er fehlen und der Kranke nach einigen Minuten der Bewußtlosigkeit, der Benommenheit und oft der Verwirrtheit wieder zu klarem Bewußtsein erwachen, ohne meist eine Ahnung von dem Vorgefallenen zu haben. Kurz nach dem Anfall versäume man auch nie die Zehenreflexe zu prüfen. Ein positiver Babinski ist manchmal noch einige Stunden nach dem Anfall zu erzielen und ohne weiteres beweisend gegen Hysterie. Ein dauernder Babinski ganz ohne Zusammenhang mit den Anfällen kommt bei genuiner Epilepsie wenigstens nicht vor, sondern ist immer ein Zeichen von symptomatischer Epilepsie. Bei der genuine Epilepsie sind Herdsymptome wie der Babinskische Reflex immer nur vorübergehend. Auch die Pupillenstarre kann den epileptischen Anfall etwas überdauern und ist in solchen Fällen auch ein wichtiges Zeichen. Das Fehlen von organischen Zeichen als Folgeerscheinung des Anfalles ist aber natürlich niemals gegen die Diagnose Epilepsie zu verwenden.

In den meisten Fällen wird der Arzt den Anfall selber oder seine etwaigen Folgeerscheinungen aber gar nicht zu Gesicht bekommen, sondern muß sich aus der Anamnese ein Bild machen. Eine Hauptfrage ist hier die, ob der Kranke während des Anfalles wirklich ganz bewußtlos gewesen ist. Der epileptische Krampfanfall macht fast immer volle Bewußtlosigkeit, und der Kranke kann sich hinterher an gar nichts erinnern. Wenn wir die Angabe hören, daß der Kranke während des Krampfanfalls nicht aufgehört hat, dasjenige, was um ihn vorging wenn auch dunkel, wahrzunehmen, so werden wir von vornherein das größte Mißtrauen haben.

Von den Vorgängen während des Anfalls selbst sprechen dann noch für Epilepsie der häufige „epileptische Schrei“ im Beginn, dann der Zungenbiß mit blutigem Schaum vor dem Munde. Frischere Zungenbisse sind meist auch als solche leicht zu erkennen, bei alten kann man oft recht zweifelhaft sein. Ferner sprechen für Epilepsie unwillkürlicher Abgang von Urin und Kot, und Verletzungen während des Anfalls. Selbstverständlich brauchen diese Dinge nicht bei jedem Anfall vorzukommen. Am häufigsten von ihnen ist der Zungenbiß, am seltensten schwere Verletzungen. Wenn sie aber überhaupt einmal vorgekommen sind, so spricht das sehr für Epilepsie. Die Fälle von Hysterie, welche sich in die Zunge oder die Backe beißen, während des Anfalls sich beschmutzen, oder sich absichtlich schwere Verletzungen beibringen, sind doch sehr selten, so daß man doch schon einen besonderen Verdacht haben muß, um nach dieser Richtung Zweifel zu fassen.

Vorboten Man wird sich dann nach den Vorboten des Anfalls erkundigen. Wenn solche Vorboten gar nicht da sind, der Kranke plötzlich bewußtlos in Krämpfen zu Boden stürzt, so handelt es sich fast immer um einen echten epileptischen Anfall. Für die Epilepsie sind aber auch die verschiedenen Formen der Aura ziemlich charakteristisch. Gewöhnlich treten sie bei ein und derselben Person immer in gleicher Form auf, als ein Nebel vor den Augen, als Funkensehen, als Hören von Geräuschen, als ein bestimmter Geruch, als Schmerzen, die sich z. B. allmählich aus dem Bauche nach dem Kopfe zu ausbreiten. Häufig merkt der Kranke nur einen Schwindel, der ihm aber noch Zeit läßt, sich irgendwo hinzulegen, sehr häufig befällt ihn eine kurze Angst, ehe der Anfall eintritt. Während diese eigentlichen Auraformen nur wenige Sekunden oder Minuten dauern, merken manche Epileptiker es schon stundenlang vor dem Anfall an einem unbehaglichen eigentümlichen Gefühle, Kopfschmerzen u. dgl., daß ein Anfall bevorsteht, und können sich darauf einrichten. Je unbestimmter die Aura ist, um so weniger kann man natürlich mit ihr differentialdiagnostisch etwas anfangen.

Nachwirkungen Von den Vorgängen nach dem Anfall frage man nach dem schon erwähnten Schlaf, nach Verwirrtheitszuständen und nach Kopfschmerzen. Es gibt Epileptiker, die nur an den morgendlichen schweren Kopfschmerzen merken, daß sie nachts einen Anfall gehabt haben.

Diagnose der Epilepsie Nachdem man sich so über den einzelnen Anfall orientiert hat, fragt man nach der Anzahl, nach Zeit und Wiederholung der Anfälle und geht somit zur Diagnose der Epilepsie über. Es kommt zuweilen vor, daß wir nach einem einzigen Anfall konsultiert werden, der aller Wahrscheinlichkeit nach als Beginn der Epilepsie anzusehen ist. Immerhin werden wir mit unserem Urtheil in solchen Fällen sehr vorsichtig sein. Man stelle überhaupt die Diagnose Epilepsie dem Kranken und dessen Familie gegenüber nicht zu früh. Denn die Diagnose ist für das Publikum sehr entmutigend. Der Patient geht zu einem anderen Arzt und wenn dieser dann anstatt von epileptischen von „nervösen“ Anfällen spricht, hat der erste natürlich Unrecht. Man kann ja auch ohne ausgesprochene Diagnose sachgemäß behandeln.

Die Häufigkeit der Anfälle bei der Epilepsie ist eine ganz außerordentlich verschiedene. Es gibt Kranke, die auch ohne Behandlung nur alle Jahre oder alle paar Jahre einen Anfall (oder mehrere kurz nacheinander) haben, andere dagegen, die alle Woche mehrere haben. Besonders häufig sind die nächtlichen und morgendlichen Anfälle.

Als Status epilepticus bezeichnen wir den Zustand, in welchem die Anfälle in ununterbrochener Reihenfolge so schnell einander folgen, daß die Bewußtlosigkeit andauert.

Bisher haben wir nur von den typischen großen Anfällen gesprochen. Wie oben bereits flüchtig erwähnt war, gibt es aber auch Fälle von genuiner Epilepsie, welche Jacksonsche oder den Jacksonschen ähnliche Anfälle zeigen. Wir hören gar nicht selten, der Anfall beginne immer in einer Hand oder in einem Fuß, seltener schon beschränkt er sich auf einen Körperteil oder auf eine Körperseite, aber auch das kommt vor. Hierher gehört auch die *Epilepsia rotatoria* und *procursiva*, in welcher der Kranke sich um sich selbst dreht oder nach vorne drängt. Es kann dann noch zu einem großen Anfall kommen, kann aber auch bei dem Drehen oder Vorwärtslaufen verbleiben. Auch koordinierte und ganz unwillkürlich und maschinenmäßig ausgeführte Handlungen als Ausdruck des epileptischen Anfalls kommen vor, wie Reiben mit der Hand auf dem Kopf, Aufknöpfen des Rockes etc.

Besondere
Formen
der
genuinen
Epilepsie

Alle diese Fälle sind wichtig, weil sie bei ungenügender Beurteilung dazu führen könnten, den Kranken als eine organische Epilepsie durch Herderkrankung dem Chirurgen zu übergeben. Sie unterscheiden sich von den organischen Epilepsien aber dadurch, daß nicht die geringsten dauernden Herderscheinungen bestehen, ein Verhalten, das bei der organischen Epilepsie ganz außerordentlich selten ist. Ein positives, aber natürlich nicht absolut zuverlässiges Merkmal der genuinen Epilepsie selbst in der Form der partiellen Anfälle ist die im Verhältnis zu den Bewegungsstörungen meist ganz auffallend schwere oder totale Bewußtseinsstörung.

Manche Epileptiker zeigen auch außerhalb des Anfalles einzelne unregelmäßige, blitzartige Muskelzuckungen, sogenannte myoklonische Zuckungen — Myoklonusepilepsie. In ganz außerordentlich seltenen Fällen scheinen solche myoklonischen Zuckungen auch ohne Epilepsie vorzukommen (*Paramyoclonus multiplex*).

Myoklonie

Recht selten sind auch vorübergehende freistehende hemiplegische oder monoplegische oder aphatische Zustände bei genuiner Epilepsie, also das Gegenstück der Krämpfe.

Paralytische
Äquivalente

Die Epilepsie zeigt sich nun weiter aber überhaupt nicht nur in Krampfanfällen, sondern auch in anfallsweise auftretenden Bewußtseinsstörungen. Die leichtesten sind die sogenannten Absencen oder Petit mal Anfälle. Man darf nie vergessen, die Umgebung der Kranken nach ihnen zu fragen. In der leichten Form bestehen sie darin, daß der Kranke einige Sekunden starr vor sich hinsieht, und die Umgebung merkt, daß er währenddessen die Vorgänge um sich her nicht aufgefaßt hat, sondern „abwesend“ war. Manchmal merkt es die Umgebung auch nicht, und das kann zu sehr unangenehmen Folgen führen, wenn z. B. ein Bureaubeamter sich an Aufträge, Briefe, An-

Absencen
Petit mal

fragen oder dgl. nicht erinnert und sie sogar ableugnet. In etwas schweren Fällen hat der Patient das Gefühl eines Schwindels oder von Angst vor der Absence, in der Absence selbst kann er dann auch umsinken, um nach einigen Sekunden wieder zu erwachen. Es ist manchmal nach dem einzelnen Anfall gar nicht möglich, diese Art von Absenzen von einfachen Ohnmachten zu unterscheiden und man kann dann ein Urteil nur nach dem ganzen Verlauf fällen. Wenn z. B. jemand auch nur einmal einen großen epileptischen Anfall gehabt hat und dann häufig Ohnmachten bekommt, so sind es eben Petit mal Anfälle. Es gibt aber Epileptiker, die nur Petit mal Anfälle haben.

In anderen Fällen kombinieren sich Absenzen mit auraartigen Zuständen, z. B. einem bestimmten schlechten Geruch oder einem Überrieseln über den Körper oder dgl.

In wieder anderen Fällen ist der Kranke gar nicht ganz abwesend, sondern er glaubt nur eine Veränderung um sich her wahrzunehmen. Die Umgebung erscheint ihm plötzlich fremdartig, die Gesichter anders, verzerrt u. dgl., gerade solche kleinen Anfälle können sich sehr häufen.

Dämmer-
zustand

Diese Zustände gehen unmittelbar über in die eigentlichen epileptischen Dämmerzustände. Diese Dämmerzustände erscheinen entweder als präkonvulsive oder postkonvulsive oder unabhängig vom epileptischen Anfall als epileptische Äquivalente. Ein Dämmerzustand bildet eine Unterbrechung der normalen Kontinuität des Bewußtseins und ist charakterisiert durch die Amnesie, die nach seinem Aufhören für die Zeit des Zustandes, häufig auch noch für einen Zeitraum vor Beginn des Dämmerzustandes besteht. Man kennt ja die Geschichten von Personen, die plötzlich auf einer Weltreise auf irgend einem Punkte der Erde „erwachen“ und sich verwundert fragen, wie sie denn da hingekommen sind. Sie haben die ganze Zeit zwischen dem Antritt der Reise und dem Augenblick des Erwachens vergessen. Diese Geschichten illustrieren eine Tatsache gut, daß das Verhalten des Epileptikers im Dämmerzustand selbst völlig korrekt und zweckmäßig sein kann, denn sonst wäre der im Dämmerzustand Reisende doch irgendwo angehalten worden. Im übrigen sind solche geordnete Dämmerzustände von wochenlanger Dauer sehr selten, kürzere aber sehr häufig. Am häufigsten ist das Verirren im Dämmerzustand. Der Kranke steht plötzlich in einer ihm unbekannten Straße oder Gegend und weiß nicht, wie er dahin gekommen ist. Er mag dann nur einige Sekunden oder Minuten gedämmt haben. Oder er findet sich plötzlich in einem Laden, ohne zu wissen, was er da eigentlich will. In einem Dämmerzustand werden häufig auch kriminelle Handlungen verübt, Totschläge, Angriffe auf Schutzleute, Brandstiftungen, exhibitionistische Handlungen etc. Wird jemand im Dämmerzustand selbst verhaftet und vernommen, so kann er auf der Polizeiwache dann unter Umständen ein ganz geordnetes „Geständnis“ ablegen. Dann tritt Schlaf und Amnesie ein und wenn der Patient erwacht, hat er keine Ahnung weder von der Tat, noch von seiner Verhaftung und seinem Geständnis.

Foren-
sische Be-
deutung

Häufig sind die epileptischen Dämmerzustände aber ganz ungeordnete und stellen sich auf den ersten Blick als psychotische dar. Es

sind darunter vielleicht die wildesten Tobsuchtsanfälle, die es gibt, ängstliche Delirien etc. Auch einfache Stuporzustände kommen nicht selten vor.

Als besondere Form der Dämmerzustände kann das Nachtwandeln aufgefaßt werden; es findet sich jedoch auch bei nichtepileptischen Psychopathen zuweilen. Nachtwandeln

Dämmerzustände kommen nun nicht nur bei der Epilepsie, sondern auch bei der Hysterie vor, und manchmal in Formen, die als solche von den epileptischen nicht zu unterscheiden sind. Auf die feineren Unterscheidungsmöglichkeiten will ich hier nicht eingehen. Man tut also gut, sich bei der Diagnose Epilepsie nicht allein auf die Dämmerzustände zu verlassen.

Eine weitere vorübergehende psychische Störung sind die Verstimmungen vieler Epileptiker. Sie sind an manchen Tagen nicht zu brauchen und scheinen nur darauf zu warten, sich in einem heftigen Wut- und Zornausbruch zu entladen. Diese Jähzornsausbrüche der Epileptiker sind auch für die Diagnose der Epilepsie wichtig und man darf nicht vergessen, in der Anamnese nach ihnen zu fragen. Auch sie führen manchmal zu kriminellen Handlungen, häufiger noch zu großen sozialen Nachteilen und Unannehmlichkeiten für die Kranken. Verstimmungen

Epileptiker zeigen auch nicht selten sogenannte impulsive Handlungen, von denen die Porio manie (Fugues) am bekanntesten ist, der unwiderstehliche Trieb zum planlosen Fortlaufen. Die Dauer dieser Fugues ist eine sehr verschiedene. Sie kommen aber nicht nur bei Epileptikern vor, sondern auch bei anderen Psychopathen, besonders auch bei psychopathischen Kindern. Porio manie

Epileptische Kinder leiden nicht selten an Pavor nocturnus, an Bettnässen, an Zähneknirschen im Schlaf. Alle diese Symptome kommen jedoch auch bei nichtepileptischen Psychopathen vor. Pavor nocturnus
Enuresis

Endlich tritt in einer großen Anzahl von Fällen auch eine dauernde psychische Veränderung in Form einer Demenz auf. In den leichtesten Fällen findet sich als erstes Symptom dieser Demenz eine außerordentliche Weitschweifigkeit der Kranken. Bei ihren Mitteilungen und Erzählungen kommen sie ja schließlich dazu, das zu sagen, was sie vorgenommen hatten, aber auf unendlichen Umwegen und mit unerträglicher Ausführlichkeit. Auch eine Einbuße des Gedächtnisses und der Merkfähigkeit wird fast nie vermißt. Häufig zeigen sie weiter eine große Sorglosigkeit, Urteilslosigkeit und dementsprechend einen heiteren Optimismus, wenn sie nicht gerade ihre Verstimmungen haben. Die Demenz kann sehr hohe Grade erreichen, die wir hier nicht weiter beschreiben wollen. Epileptische Demenz

Es ist nun noch einiges über den Verlauf der Epilepsie nachzutragen. Die Krankheit kann in jedem Lebensalter beginnen. Im frühen Kindesalter ist die Unterscheidung von der Eklampsie recht schwierig, aber darum wichtig, weil insbesondere von den Pädiatern die Auffassung vertreten wird, daß die eklamptischen Anfälle keinerlei Disposition für eine spätere Epilepsie hinterlassen. Die entgegengesetzte Anschauung, daß die Eklampsie zur Epilepsie Verlaufsformen

Eklampsie und Epilepsie

gehöre, halte ich zwar für völlig unberechtigt; die Frage aber ob die „Spasmophilie“ im Sinne der Pädiatrie durch die elektrische Übererregbarkeit genügend charakterisiert sei, ist noch nicht ganz gelöst (S. 218). Im mittleren Kindesalter, im Pubertätsalter und weiterhin ist der Beginn einer Epilepsie gewöhnlich unschwer zu diagnostizieren.

Der Verlauf der Epilepsie ist im ganzen ein recht ungünstiger, im einzelnen erst nach längerer Zeit mit Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren, und zwar kommt es einmal auf die durchschnittliche Häufigkeit der Anfälle und ihre Beeinflussbarkeit, mehr noch aber darauf an, ob sich dauernde psychische Defekte entwickeln.

Es gibt zunächst eine Anzahl von Fällen, die außerordentlich günstig verlaufen, Leute, die in ihrem ganzen Leben nur wenige schwere Anfälle und daneben wohl immer gelegentlich Absenzen haben, deren Intelligenz und psychische Energie aber durch die Krankheit in keiner Weise beeinflußt wird. Ob alle großen Männer, denen man Epilepsie nachgesagt hat, wirklich Epilepsie gehabt haben, ist eine Frage, die man auf sich beruhen lassen kann, aber es gibt in jedem Berufe, unter den Staatsbeamten, Ärzten, Juristen etc. Epileptiker, die ihren Kollegen in nichts nachstehen. Auch diese Fälle sind jedoch ohne Ausnahme sehr gefährdet durch einen progressiven Verlauf. Haben sie sich aber lange Jahre anfallsfrei gehalten, so kann man sie günstiger ansehen, muß aber immer damit rechnen, daß plötzlich wieder ein Anfall ausbricht, oder sogar ein Status epilepticus, in dem der Kranke zugrunde gehen kann. Es sind das Überlegungen, die man dem Kranken auch mitteilen muß — vom Tod im Status epilepticus wird man ihm ja nichts sagen — wenn es sich etwa um die gerade von Epileptikern nicht selten angeregte Frage einer Eheschließung handelt.

Eine anscheinend besonders günstige Gruppe sind Fälle, welche im kindlichen oder dem Pubertätsalter, häufig unter dem Einfluß psychischer Erregungen, Absenzen und Starrezustände zuweilen auch sogenannte „psychasthenische“ Krämpfe, zeigen; hier ist aber wegen des psychogenen Ursprungs die Zugehörigkeit zur Epilepsie überhaupt zweifelhaft. Sonst beeinflußt das Alter, in welchem die Epilepsie auftritt, die Prognose nur in soweit, als die Spätfälle meist besonders ungünstig verlaufen. Wir haben aber in jedem Fall, in dem Epilepsie fortbesteht, damit zu rechnen, daß eine dauernde geistige Veränderung in dem oben geschilderten Sinne eintritt. Nur etwa $\frac{1}{5}$ der Kranken bleiben davon ganz verschont.

Dazu kommt die Gefahr des einzelnen Krampfanfalles, die in etwaigen Verletzungen, Schädelbrüchen etc. besteht. Der Status epilepticus ist an und für sich sehr bedrohlich für das Leben.

Therapie
Brom

Die Therapie der Epilepsie besteht hauptsächlich in der Medikation von Brom. Das Brom wird als Bromnatrium oder Bromkalium oder als Erlenmeyersche Mischung gegeben, letztere bietet indessen keinerlei Vorteile. Man steigert die Bromdosis zunächst so lange, bis die Anfälle aufhören. Mehr als 8 g täglich wird man in der ambulanten Praxis freilich nicht geben können, häufig genügen 3—6 g, in sehr schweren Fällen und im Status epilepticus kann man vorübergehend bis zu 15 g

(unter Umständen per clysmā) steigen. Die Brommedikation stößt in der Praxis auf mancherlei Schwierigkeiten. Zunächst haben weite Kreise des Publikums gerade gegen dieses verhältnismäßig so harmlose Medikament eine große Abneigung. Es kommt vor, daß die Mutter eines schwachsinnigen Epileptikers das Brom ablehnt mit der Begründung, daß das Brom dumm mache. Dieselben Patienten nehmen natürlich eines der vielen Geheimmittel, deren wirkender Bestandteil fast immer das Brom ist. Ferner geben viele Kranken an, sie hätten schon Brom genommen, es habe ihnen aber nichts genützt. Darauf gebe man nichts, denn es werden meist ungenügende Dosen und nicht lange genug gegeben. Man muß von vornherein darauf aufmerksam machen, daß das Brom mindestens monatelang, wahrscheinlich jahrelang gegeben werden müsse. In einer großen Anzahl von Fällen, sowohl von grand wie petit mal, hat man doch den Erfolg, daß die Kranken nach einigen Wochen wieder ganz frei von Anfällen sind, und man dann mit dem Brom wieder heruntergehen kann. Dabei sei man immer bereit, die Dose wieder zu steigern, sobald neue Erscheinungen auftreten. Aber auch wenn keine Erscheinungen da sind, muß man wenigstens 2—3 g viele Monate lang fortgeben.

Eine objektive Schwierigkeit der Brommedikation ist der Bromismus. Schon die Bromakne und andere Hauterkrankungen durch Brom können sehr unangenehm sein. Der eigentliche Bromismus äußert sich vornehmlich in psychischen Veränderungen, denselben, auf welche der Laie seine allgemeine und unberechtigte Furcht vor dem Brom gründet. Es kommt zu einem Gefühl von Kraftlosigkeit, von dauernder Schläfrigkeit, Schwerbesinnlichkeit. Objektiv kann man in schweren Fällen eine Aufhebung des Kornealreflexes feststellen. Man muß dann mit dem Brom aufhören, kann aber doch später vielleicht wieder damit beginnen.

Bromismus

Eine Unterstützung des Broms gewährt die kochsalzarme Ernährung. Es scheint sicher, daß man bei kochsalzarmer oder kochsalzfreier Ernährung mit geringeren Bromgaben auskommt, und daß zwischen dem Chlor und dem Brom ein gewisser Antagonismus besteht. Ob damit viel gewonnen ist, ist allerdings zweifelhaft; denn auch die Gefahr des Bromismus erscheint bei der kochsalzfreien Diät früher einzutreten, als bei kochsalzhaltiger.

Diät

Andererseits sind Kochsalzgaben ein schnell wirkendes Mittel gegen den Bromismus. Äußerlich werden Kochsalzumschläge gegen Bromakne empfohlen.

Zu erwähnen ist dann noch die Flechsigsche Opiumbromkur. Man gibt (nach Kellner) 50 Tage lang Opium in allmählich steigender Dosis, beginnend mit 3 mal täglich 0,05, an jedem zweiten Tag um 0,01 steigend und erreicht am 50. Tag so dreimal 0,29. Dann läßt man das Opium plötzlich weg und beginnt mit 4 g Brom täglich, steigend täglich um 1 g bis 9 g Brom täglich. Die großen Opiumdosen werden im allgemeinen gut vertragen und wirken nur in einer Minderzahl der Fälle erheblich verstopfend. Zweckmäßig gibt man mit dem Opium größere Dosen von Salzsäure, und muß einer etwaigen Obstipation durch Laxantien entgegenwirken. Der gefährliche Augenblick dieser Kur ist der der plötzlichen Fortlassung des Opiums.

Opiumbromkur

Hier kann es zu schweren Kollapserscheinungen, sogar mit tödlichem Ausgange, kommen. Außerhalb eines Krankenhauses ist daher die Kur auf keinen Fall durchzuführen. Ob diese gefährliche plötzliche Weglassung des Opiums durchaus nötig ist, scheint mir jedoch zweifelhaft.

Es sind ja noch hunderte von Mitteln gegen Epilepsie angepriesen worden. Außer den Narkotika, die ja selbst in Form der leichtesten Schlafmittel, Bromural, Adalin etc. nur für kurze Zeit in Betracht kommen, ist bisher nicht ein einziges von solcher Wirkung, daß Zufälligkeiten des Verlaufs der Epilepsie nicht der Grund der angeblichen Wirkung sein könnten. Wer ein Mittel in dem Augenblick anwendet, in dem die Epilepsie eben spontan eine größere Pause macht, hat natürlich den Erfolg, und daher kann man viele alte und neue Mittel versuchen — aber erst, wenn man die Möglichkeiten der Brommedikation erschöpft hat.

Die schweren Formen der Epilepsie müssen in Epileptikeranstalten untergebracht werden.

Operation

Sehr häufig tritt schon aus dem Publikum die Frage an uns heran, ob genuine Epileptiker operiert werden sollen. Es ist dafür zunächst die Trepanation mit Bildung einer Knochenlücke bzw. eines „Ventils“ vorgeschlagen. Die Operation beruht auf der Vorstellung, daß dem Druck des Liquor cerebrospinalis eine gewisse Rolle bei der Auslösung des epileptischen Anfalls zukomme. Die Richtigkeit dieser Vorstellung ist sehr zweifelhaft und die operativen Erfolge sind nicht geeignet, sie mit Sicherheit zu stützen. Nur in einer Minderzahl von Fällen ist überhaupt eine Besserung, also eine Verminderung der Anfälle zu verzeichnen gewesen, und ob diese Besserung nicht auch auf anderem Wege hätte erreicht werden können, ist kaum in irgend einem Falle bewiesen. Ich könnte zu der Operation nur in ganz besonderen Ausnahmefällen raten, wenn wirklich alles andere kunstgerecht versucht ist, und der Patient erstens keine Intelligenzstörung zeigt, zweitens selbst zur Operation drängt.

In den Fällen von genuiner Epilepsie, die als Jacksonsche Epilepsie verlaufen oder beginnen, kommt noch die Exstirpation des „primär krampfenden“ Zentrums in Frage. Die vordere Zentralwindung wird freigelegt, das Zentrum mittelst faradischer Reizung bestimmt und dann die Rinde im Bereiche dieses Zentrums exstirpiert. Ich habe eine kleine Reihe so operierter Fälle gesehen und noch bei keinem einen dauernden Erfolg, aber es ist von einigen Seiten über solche Erfolge berichtet worden, man darf aber wohl sagen, daß solche Erfolge nur in einer erheblichen Minderzahl der bezeichneten Fälle zu erreichen sein werden. Dagegen fällt als Nachteil sehr ins Gewicht, daß selbst bei sehr kleinen Exstirpationen im Bereiche der vorderen Zentralwindung doch die Bewegungsfähigkeit der Hand für feinere Zwecke dauernd erheblich gestört werden kann, und daß ein solcher Mann, der bis dahin wenigstens außerhalb der Anfälle ganz leistungsfähig war, nach der Operation eine dauernde Ungeschicklichkeit der Hände zeigen kann. Diese recht schlechte Prognose geben, um es noch einmal zu betonen, aber von der Jacksonschen Epilepsie nur die Fälle, die als Ausdruck der genuine Epilepsie, also ohne Herderkrankung, auftreten.

Über die organische, prognostisch ganz verschieden zu beurteilende Jacksonsche Epilepsie und ihre Therapie vgl. bei Hirntumor, Hirnabszeß, Hirnverletzung, zerebraler Kinderlähmung etc.

Niemals soll man neben der medikamentösen Therapie vergessen, dem Patienten noch einige allgemeine Vorschriften über seine Lebensweise und Ernährung zu geben. Von der kochsalzarmen Diät als Unterstützung der Bromtherapie war bereits gesprochen. Gerade in Zeiten, wo man kein Brom gibt, sieht man von der kochsalzfreien Diät an sich manchmal recht gutes¹⁾. Man kann und soll unter Umständen auch reine laktovegetabile Diät für einige Wochen versuchen. Andere Diätvorschriften oder Verbote von gewissen Klassen von Nahrungsmitteln haben keinen Zweck, so z. B. das beliebte Verbot von schwarzem Brot, schwarzem Fleisch und ähnliches. Daß ausgesprochene Verdauungsstörungen epileptische Anfälle hervorrufen können, ist richtig, es genügt aber eben, solche gröbere Fehler zu vermeiden. In Zeiten, wo sich Anfälle häufen, kann für manche Kranke eine mehrwöchentliche Bettruhe neben der Bromkur diesen Erfolg erheblich verbessern.

Lebensweise der Epileptiker

Wichtiger aber als alle sonstigen allgemeinen Maßnahmen ist das absolute Alkoholverbot bei Epilepsie. So sehr man sonst die absolute Abstinenz übertrieben finden kann, für die Epileptiker gibt es nichts anderes. Ein kleines Glas Bier kann den Anstoß zu einer Serie von Anfällen geben, kann Dämmerzustände veranlassen, in denen rohe Gewalttaten ausgeführt werden. Häufig äußert sich die Intoleranz gegen Alkohol auch nur in schweren Kopfschmerzen. Auch können selbst einzelne Exzesse gelegentlich mal gut ablaufen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß für den Epileptiker nichts gefährlicher ist als der Alkohol.

Wir haben bisher nur von „genuiner“ Epilepsie schlechthin gesprochen, und haben sie nur der symptomatischen Epilepsie bei den lokalisierten Hirnerkrankungen gegenübergestellt. Der Begriff der genuinen Epilepsie ist aber nun kein ganz fester; vielleicht wird es zwar noch einmal gelingen, eine ganze Reihe von „Epilepsien“ zu unterscheiden, und dabei als genuine Epilepsie die auf einer degenerativen epileptischen Anlage beruhenden Fälle rein auszuscheiden. Vom praktischen Gesichtspunkt aber müssen wir hier zunächst noch auf eine Anzahl von besonderen Formen der Epilepsie aufmerksam machen.

Ätiologische Beziehungen der Epilepsie

Da sind zunächst epileptische Krämpfe bei Imbezillen und Idioten zu erwähnen. Sie sind eine sekundäre Folge der Entwicklungsstörung des Gehirns und spielen neben der Grundstörung keine Rolle.

Schwachsinn

Auch bei der zur Verblödung führenden Psychose, der Dementia praecox bzw. der Hebephrenie können vereinzelte epileptische Anfälle vorkommen, ohne daß dadurch die Psychose zu einer epileptischen Psychose würden.

Daß Alkohol die Epilepsie außerordentlich befördert, war bereits erwähnt. Es gibt aber darüber hinaus eine Reihe von Fällen, in welchen der chronische Alkoholmißbrauch auch die Ursache der epi-

Alkohol-epilepsie

¹⁾ Jod scheint mir bei Epilepsie manchmal recht ungünstig zu wirken.

Patho-
logischer
Rausch

leptischen Veränderung ist. Die epileptischen Krämpfe verbinden sich häufig mit deliranten Zuständen, das eigentliche Delirium tremens kann jedoch auch fehlen, und dann können die Fälle der echten Epilepsie völlig gleichen, die Entziehung des Alkohols allein führt jedoch die Heilung herbei. Besonders wichtig ist die Tatsache, daß diese Fälle nicht nur die Krampfanfälle, sondern auch oder allein die Dämmerzustände der Epilepsie aufweisen können. Wenn diese Dämmerzustände unter der unmittelbaren Wirkung des Alkoholgenusses, der gar nicht den Umfang eines Exzesses zu haben braucht, auftreten, so nennt man sie pathologische Räusche. Die Zeichen der allgemeinen „sinnlosen“ Trunkenheit, der schwankende Gang, die lallende Sprache, die allgemeine Umnebelung können beim pathologischen Rausch völlig fehlen. Wie in allen Dämmerzuständen kann vielmehr eine gewisse Folgerichtigkeit des Handelns gewahrt werden. Hinterher besteht tiefe Amnesie. Es ist sehr schwer, in foro dem Richter die völlige Unzurechnungsfähigkeit solcher Leute im pathologischen Rausch klarzustellen. Auch das „Volksempfinden“ und leider auch das vieler Ärzte will diese Unzurechnungsfähigkeit nicht anerkennen. Als ich als ganz junger Assistent vor dem Amtsgericht in M. das Gutachten einer Universitätsklinik nach sorgfältiger Anstaltsbeobachtung zu vertreten hatte, daß ein Handwerksmeister eine exhibitionistische Handlung im pathologischen Rausch begangen hatte, und dieses Gutachten unter anderem damit begründete, daß der Mann durch langjährigen Genuß von täglich mindestens 10 Gläsern Bier allmählich in den Zustand eines zu epileptiformen Zuständen disponierten chronischen Säufers gekommen sei, trat mir der alte Gerichtsarzt des Ortes mit den Worten entgegen: „Ja, meine Herren, wenn wir jeden Menschen, der täglich 10 Glas Bier trinkt, einen chronischen Säufer nennen wollen, dann besteht ganz M. aus chronischen Säufern“. Gegen dieses Argument war nichts zu machen. Der Mann wurde zwar zu einer milden Geldstrafe, aber er wurde verurteilt. Vielleicht entspricht es wirklich dem Empfinden weiter Kreise, daß solche im Dämmerzustand oder pathologischem Rausch begangenen größeren verbrecherischen Handlungen bestraft werden. Nur muß man dann die Gesetze ändern und den Alkoholgenuß unter Strafe stellen, und was würde dann aus „ganz M.“?

Blei-
epilepsie

In seltenen Fällen kann auch chronische Bleiintoxikation zur Epilepsie führen.

Epilepsie
nach In-
fektions-
krank-
heiten

Ob die Epilepsie, die nach Infektionskrankheiten, z. B. nach Scharlach zuerst auftritt, von der genuinen Epilepsie theoretisch unterschieden werden muß, bleibt dahin gestellt, es ist die Vermutung geäußert worden, daß gerade diese Fälle auf einer Enzephalitis beruhten, praktisch in bezug auf Prognose und Therapie sind sie nicht zu unterscheiden.

Trauma-
tische
Epilepsie

Ebenso geht es meist mit derjenigen Form der Epilepsie, welche nach einem Trauma zuerst zur Entstehung kommt und in Form von großen Anfällen auftritt. Ein grobes anatomisches Substrat ist in den Fällen nicht vorhanden und sie verlaufen wie eine genuine Epilepsie. Diese Fälle sind übrigens sehr selten und man muß sich sehr in acht nehmen, nicht einer Täuschung durch den Verletzten, der alles Interesse

hat, seine Epilepsie auf den Unfall zurückzuführen, zum Opfer zu fallen.

Besondere Vorsicht ist aus anderen Gründen dann auch bei den „Spätepilepsien“, die etwa im Alter von 40 Jahren aufwärts beginnen, geboten. Hier handelt es sich häufig um eineluetische Epilepsie (S. 173), die ausschließlich in der Form der großen Anfälle ohne jede Spur einer lokalen Herdstörung auftreten kann.

Spät-
epilepsie

Lues

Niemals wird man bei diesen Fällen die genaueste Untersuchung auf Lues und bei positivem Ergebnis eine antiluetische Kur verabsäumen dürfen. Häufiger noch als um Lues handelt es sich in den Spätfällen, besonders denen nach dem 50. Lebensjahre um arteriosklerotische Epilepsie (S. 146). Es ist aber zu betonen, daß auch Fälle genuiner Epilepsie noch im 5. Lebensjahrzehnt beginnen können. In der Therapie der arterioskleriotischen Epilepsie ist die Therapie der Arteriosklerose mit der der Epilepsie zu kombinieren.

Arterio-
sklero-
tische
Epilepsie

Eine früher vielbeliebte „Reflexepilepsie“ gibt es aller Wahrscheinlichkeit nicht. In allen längere Zeit beobachteten Fällen hat sich herausgestellt, daß die Heilung einer Epilepsie durch Entfernung des angeblichen reflektorischen Reizes, z. B. einer Narbe, eines Zahnes, nur eine scheinbare war und daß die Epilepsie später als unzweifelhaft genuine wieder erschien. Nur als Ursache einzelner Anfälle kommen solche Ursachen, wie auch Magendarmstörungen etc., in Betracht.

Reflex-
epilepsie

33. Lokale Krämpfe. Tetanie und Spasmophilie. Tetanus.

a) Lokale Krämpfe.

Die „lokalen“ Muskelkrämpfe bilden ein Gebiet, in das es schwer ist, den Praktiker einzuführen, weil die meisten Formen sehr seltene Erkrankungen und nur einige wenige häufig sind, und weil den lokalisierten Muskelkrämpfen sehr verschiedenartige Erkrankungen zugrunde liegen — von den schweren organischen bis zur Hysterie — und weil endlich das ganze Gebiet selbst in systematisch theoretischer Hinsicht noch durchaus nicht durchgearbeitet ist.

Wir sehen dabei schon von den lokalisierten epileptischen Krämpfen (Jacksonsche Epilepsie) ganz ab; sie sind teils im Kapitel der Epilepsie (S. 200), teils im Kapitel der motorischen Reizerscheinungen (S. 34) behandelt. Hier sei nur erwähnt, daß nicht nur durch Reizung der Rinde, sondern auch durch Reizung der motorischen Bahnen, z. B. im Rückenmark bei Rückenmarkstumor Zuckungen der Glieder zustande kommen können. Man wird dann aber die anderen Zeichen des Rückenmarkstumors nie vermissen und nicht in Gefahr kommen, die Diagnose auf lokalisierte Muskelkrämpfe zu stellen.

Die Anfälle der Tetanie, die sich ja auf einzelne Körperteile, z. B. die Arme beschränken können, sind weiterhin besonders beschrieben.

Der Tetanus gehört zu den allgemeinen Krämpfen; daß man sich hüten muß, seinen Beginn im Trismus als einen lokalen Krampf anzusehen, ist bekannt.

Die anderen Krampfformen können wir theoretisch l. in solche scheiden, welche auf Reizung der peripheren motorischen Bahn vom

Formen

Kern bis zum Muskel beruhen, 2. in die reflektorischen Krämpfe, 3. in die Tics und die psychogenen Krämpfe, 4. in Krämpfe durch das Bestehen abnormer anatomischer Bahnen.

Diese Einteilung ist jedenfalls besser als die in tonische und klonische Krämpfe. Tonische und klonische Krämpfe kommen bei den Gruppen 1, 2 und 3 in gleicher Weise vor.

Periphere
motorische
Krämpfe

Die Gruppe 1, die also als Krämpfe durch Reizung der peripheren motorischen „Neuron“ definiert sei, zeichnet sich dadurch aus, daß die Krampfform genau dem Reizerfolg einer elektrischen Reizung der peripheren Nerven oder ihrer Äste entspricht. Von dem Jacksonschen epileptischen Anfall unterscheiden sich diese Krämpfe dadurch, daß sie nicht die Tendenz haben, fortzuschreiten, und auf ganz bestimmte Nervengebiete beschränkt bleiben. Das typische Beispiel dafür ist der Hemispasmus facialis, eine im übrigen außerordentlich seltene Krampfform. Der Fazialis oder sein Kern kann hier z. B. durch ein Aneurysma der Art. basilaris intermittierend in Erregung (klonische oder tonische) versetzt werden. Selbstverständlich kann auch jeder andere periphere Nerv solche Krampfstände erzeugen. Es kommen aber diese Krämpfe auch ohne groben anatomischen Befund vor; welche Veränderungen — wohl solche neuritischer Art — hier zugrunde liegen, ist noch nicht erforscht. Dadurch werden für die praktische Beurteilung ganz verschiedene Untergruppen gebildet, eine mit der Prognose des schweren Grundleidens, eine mit einer elbständigen Prognose, die auch die Möglichkeit einer Heilung einschließt.

Reflektorische
Krämpfe

Die reflektorische Gruppe umfaßt zuerst die Krämpfe bei Neuralgien, also z. B. die Fazialis- oder Masseterenkrämpfe bei Trigemino neuralgie, ferner diejenigen Krämpfe, welche durch Reizzustände in der Peripherie unterhalten werden. Von den letzteren ist der Blepharospasmus der bekannteste. Auch der Trismus bei rheumatischen Erkrankungen der Kiefergelenke und ihrer Umgebung würde hierhin gehören.

Crampi

Zu den reflektorischen Krämpfen scheinen auch die durch ihre Schmerzhaftigkeit ausgezeichneten Crampi zu rechnen, deren häufigster Repräsentant der Wadenkrampf ist. Fast jeder weiß, daß solche Crampi durch gewisse ungeschickte Bewegungen hervorgerufen werden können. Toxische und infektiöse Zustände können ihre Auslösung begünstigen. Bei vielen Menschen genügt schon die akute mäßige Alkoholintoxikation; bekannt sind die schweren Wadenkrämpfe bei der Cholera. Einzelne Personen haben eine idiopathische besonders starke Neigung zu solchen Crampi (Crampusneurose). Differentialdiagnostisch ist für die Crampi der lebhaft im Muskel gefühlte Schmerz sehr charakteristisch. Fast alle anderen Krämpfe verlaufen schmerzlos. Die sekundären Krämpfe bei Neuralgien sind bei einigermaßen sorgfältiger Untersuchung mit Crampi nicht zu verwechseln.

Tics

Die Tics erscheinen immer unter dem Bilde koordinierter, häufig zweckmäßiger oder anscheinend gewollter Bewegungen. Es gibt daher fast so viele Tics als es koordinierte Bewegungen gibt. Sehr häufig beobachten wir ein Schließen des einen Auges, ein Zucken der Achsel

eine Drehung des Kopfes, wie wenn sich der Betreffende nach jemanden umdrehen wollte, ein Schütteln des Kopfes, ein Räuspern, ein Schlagen mit der Hand auf den Schenkel, ein Hochfahren der Hand über das Auge. Diese Bewegungen können sich mehr oder weniger oft und zwar ohne bestimmten Rhythmus wiederholen; ihre Intensität und Häufigkeit wird insbesondere durch jede psychische Erregung gesteigert.

Zu den koordinierten Tics, die aber nicht oder wenigstens nicht deutlich nach dem Typus der Ausdrucksbewegungen gestaltet sind, gehören gewisse Formen der Torticollis, die in dauernd sich wiederholenden Verdrehungen des Halses sich kundgeben (Torticollis mental), gehören auch manche Bewegungen des Kopfes, z. B. langsame dauernde Nickbewegungen.

Es fehlt diesen Unterformen der Charakter des Gelegentlichen der Bewegung, das die vorige Untergruppe noch hatte, ohne daß die beiden Formen voneinander aber scharf und immer zu trennen wären. Auch tonische Tics, also dauernde Muskelkontraktionen, werden von einigen anerkannt.

Ein Teil dieser ganzen Gruppe der Tics ist hysterischen Ursprungs und unterliegt den Gesetzen der Entstehung der hysterischen Symptome. Für diese Gruppe spricht das bei manchen Tickranken zur Beobachtung kommende Symptom, daß sie durch gewisse Hilfsbewegungen, z. B. Anlegen eines Fingers an die Stirn oder ähnliches ihren Tic zum Stillstand bringen können. Ein anderer Teil steht den Zwangserscheinungen nahe, der Patient fühlt einen Zwang den Tic zu betätigen, dem er nicht widerstehen kann. Ein dritter Teil ist aber wohl weder hysterisch noch zwangsmäßig, sondern beruht auf speziellen Mechanismen, welche wohl der Großhirnrinde angehören mögen, aber doch nicht psychogen sind. Ob etwa später auch eine anatomische Grundlage dieser Fälle nachgewiesen werden kann, ist für deren Auffassung erst von sekundärer Bedeutung. Es handelt sich eben um eine spezielle neuropathische Anlage auch in den Fällen, die erst in späterem Lebensalter zur Entstehung kommen. Dieser Annahme widerspricht nicht die Möglichkeit, auch auf diese Fälle durch psychische Maßnahmen Einfluß zu gewinnen. Ganz abgesehen davon, daß die traktablen Fälle Hysterie sein könnten, liegt es durchaus nicht im Wesen einer nicht psychogenen Erkrankung, daß sie nicht durch psychische Einwirkungen bis zu einem gewissen Grade überwunden werden könnte. Es befinden sich aber tatsächlich unter diesen Tics und verwandten Formen auch jeder Beeinflussung trotzendes Fälle, besonders die des zweiten von uns gekennzeichneten Typus, Fälle, deren geringe Chancen der Erfahrene schon aus dem speziellen Bilde und aus dem Fehlen aller sonstigen nervösen und hysterischen Symptome voraussehen kann. Eben diese Fälle dürfen nicht ohne weiteres den hysterischen zugerechnet werden.

Hierhin gehört auch eine spezielle und seltene Form, die Grande maladie des tics, bei welcher die Bewegungen sehr mannigfaltig sind, und in deren späteren Stadien es zu gewissen Zwangshandlungen, Echolalie, Koprolalie, kommt. Auch diese Form trotz jeder Behandlung.

Auch eine neuerdings bei einer Anzahl russisch-jüdischer Kinder beobachtete Krankheitsform mit windenden Bewegungen des ganzen Körpers — progressive Torsionsneurose — gehört wahrscheinlich hierher. Sie ist ebenfalls einer Behandlung unzugänglich.

Stottern

Dieser Gruppe der Tics steht auch das Stottern sehr nahe, das sich bekanntlich in spastischen Zuständen der Artikulationsmuskulatur kundgibt, die den Fluß der Sprache hemmen. Auch das Stottern ist, wie die echten Tics keineswegs psychogen, trotzdem ist ein erheblicher Einfluß der Psyche auf seine Intensität festzustellen.

Beschäftigungs-
krämpfe

Die Beschäftigungskrämpfe sind Krampfstände der Muskulatur, welche sich ausschließlich bei einer einzelnen Art der Tätigkeit dieser Muskulatur geltend machen. Die bekannteste Form ist der Schreibkrampf. Nachdem der Kranke einige Worte geschrieben hat, beginnt eine unwillkürliche Kontraktion der Handmuskeln von individuell verschiedener Ausdehnung und Wirkung. Manchmal sind es die Muskeln der Daumen, manchmal die der Finger oder der Hand, die den Dienst versagen und das Schreiben erschweren oder unmöglich machen. Für alle anderen Tätigkeiten noch so komplizierter Form bleibt die Hand tüchtig und gewandt. Es handelt sich sicherlich um zentral in der Großhirnrinde zustande kommende Überinnervation. Auch diese Form der Krämpfe kann wie der Tic (s. oben) Beziehungen zur Hysterie zeigen. Er kann z. B. bei Schülern unter dem Einfluß eines Tadels des Lehrers zustande kommen. Die Prognose ist um so besser, je mehr eine solche psychische Komponente ersichtlich ist. Im allgemeinen handelt es sich um ein sehr langes, manchmal das ganze Leben dauerndes Leiden.

Der Schreibkrampf kann mit erheblichen ziehenden Schmerzen verbunden sein, in einzelnen Fällen sind diese Schmerzen allein das Störende. Es handelt sich aber nicht um neuralgische oder neuritische oder myositisches Beschwerden. Vielmehr müssen sie von diesen sorgfältig unterschieden werden.

Neben dem Schreibkrampf sind zu erwähnen der Klavierspieler-, Violinisten-, Melker-, Telegraphistenkrampf etc.

Fehler-
hafte ana-
tomische
Ver-
knüpfung

Eine der allerhäufigsten Formen ist die vierte Gruppe durch Fehler der anatomischen Verknüpfung. Man stelle sich vor, daß ein peripherer Nerv mit einem falschen Muskel in Verbindung gebracht ist, dann wird der Muskel bei den Reizen reagieren, die einem anderen Muskel zugeordnet waren. Diese Erfahrung hat man auch wirklich bei der künstlichen Nervenpropfung gemacht; wenn man also den peripheren Stumpf des gelähmten Fazialis auf den zentralen des Accessorius aufpropfte (S. 91), so daß die für den die Schultermuskulatur bestimmten Impulse zum Teil dem Gesicht zufließen, so zuckt die betreffende Gesichtshälfte bei jeder Hebung der Schulter mit — und es ist mit sehr unvollkommenem Erfolg große Sorgfalt darauf verwandt worden, diese unerwünschte Folge der Operation mittels Übungen aus der Welt zu schaffen. Dasselbe, was hier durch die Therapie geschaffen wird, kann auch nach Nervenverletzungen zur Beobachtung kommen, wenn nämlich die verletzten Fasern zu einem anderen Muskel auswachsen, als zu dem sie ursprünglich gehörten. Das sieht man be-

sonders häufig im Gesicht, und zwar bei der fälschlich als Tic bezeichneten Erscheinung, daß bei jedem Lidschluß, auch dem spontanen Lidschlag, sich auch Gebiete des unteren Fazialis kontrahieren, z. B. Backe und Mundmuskeln. Hier hat immer früher einmal ein oft unbeachtetes Trauma von Fazialisfasern stattgefunden, die zur Lidmuskulatur gingen, die Fasern haben sich regeneriert, aber nach einer falschen Richtung und nun zuckt der neue Muskel an Stelle des alten. Entscheidend für die Diagnose dieser Form der Fazialiskrämpfe ist also der Synchronismus mit dem Lidschlag und die Möglichkeit, durch festen Augenschluß den Krampf noch deutlicher zur Erscheinung zu bringen.

Die Therapie aller dieser lokalen Krämpfe ist naturgemäß je nach der Form und der Ursache eine sehr verschiedene. Soweit etwa angreifbare lokale Ursachen, z. B. Geschwülste vorhanden sind, werden sie beseitigt werden müssen. Indessen sind diese Fälle die Ausnahmen. Etwa angenommenen neuritischen Veränderungen wird man mit den gegen die Neuritis (s. diese) passenden Behandlungsmethoden beizukommen versuchen. Auch reflektorische Ursachen sind möglichst zu beseitigen, z. B. die Trigeminusneuralgie als Ursache von Gesicht- oder Kaumuskelerkrankungen. Bei den hysterischen und den Zwangstics sind psychotherapeutische Maßnahmen zu versuchen, die darauf hinzahlen, durch sorgsame von Tag zu Tag verlängerte Ruheübungen — mit Benutzung des Spiegels — allmählich eine Herrschaft des Bewußtseins über die Bewegungen anzubahnen. Die Übungen bedürfen großer Energie und Ausdauer seitens des Arztes und des Patienten. Wie schon bemerkt, sind eine nicht kleine Anzahl nicht nur ganz rebellisch gegen jede Behandlung, sondern erscheinen auch dafür von vornherein ungeeignet. Hier hat man dann versucht, den zugehörigen Nerven zu durchschneiden, z. B. den N. accessorius bei Torticollis mental. Die vereinzeltten Erfolge erscheinen nicht gerade ermutigend, in einigen Fällen ging der Krampf nach der Durchschneidung auf andere Muskeln über, aber wir bestreiten die Berechtigung nicht, in einzelnen besonders ausgesuchten Fällen auch diesen Eingriff zu versuchen.

Beim Schreibkrampf ist therapeutisch eine Veränderung der häufig unzweckmäßigen Schreibmethode zu empfehlen, insbesondere auf die Vermeidung jeglicher unnützen Muskelanstrengung zu achten. Massage der Hand und Gymnastik der Finger sind von Nutzen. Ohne eine ganz systematische Schreibkur, die auf die Eigentümlichkeiten des einzelnen Falles Rücksicht nimmt, wird aber nicht viel erreicht werden. Unter Umständen muß man seine Zuflucht zu an der Hand befestigten Vorrichtungen nehmen, welche den Federhalter festhalten. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Konstruktionen, z. B. der Nußbaumsche Bracelet.

Schreibenlernen mit der linken Hand nützt dann nichts, wenn der Schreibkrampf auch diese ergreift. Wo psychogene Ursachen ersichtlich sind, sind diese durch Aufklärung und Suggestion zu bekämpfen.

Die Übungstherapie des Stotterns, die darauf hinhelt, die normale Artikulation und die normale Atmung beim Sprechen genau einzuüben, ist ein Spezialzweig der Therapie geworden.

b) Tetanus.

Formen	Es ist heute sicher gestellt, daß alle die früher unterschiedenen Formen des Tetanus, des Tetanus traumaticus, des Tetanus puerperalis, der Tetanus neonatorum und der Tetanus rheumaticus auf der gleichen Ursache, nämlich auf der Infektion des Körpers mit dem Tetanusbazillus und der nachfolgenden Intoxikation durch die von dem Tetanusbazillus im Körper produzierten Gifte beruhen.
Infektion	Der Tetanusbazillus, der außerordentlich verbreitet ist, insbesondere in kultivierter Erde, und dessen Sporen sehr resistent sind, kann eben an jeder wunden Stelle des Körpers festen Fuß fassen. Die besten Bedingungen findet er anscheinend bei grob verunreinigten Wunden, aber auch von ganz kleinen und aseptisch heilenden Schrunden kann Tetanus ausgehen.
Inkubation	Die Inkubation des Tetanus beim Menschen beträgt 2 Tage bis 5 Wochen.
Trismus	Der Tetanus tritt gewöhnlich zuerst an der Kiefermuskulatur in der Form des Trismus auf, und man muß sich sehr hüten, diesen ominösen Trismus für eine rheumatische Erkrankung oder dgl. zu nehmen. Fehldiagnosen im Beginn seitens Unerfahrener sind in der Tat sehr häufig.
Verlauf	Der weitere Verlauf des Tetanus ist dann so, daß die in der Kiefermuskulatur zuerst aufgetretene Starre, d. h. der dauernde Krampf sich bald, in Stunden bis Tagen, auf den übrigen Körper fortsetzt, die Gesichtsmuskulatur, den Rücken, die Beine ergreift. Es kommt so zu den bekannten Symptomen des Risus sardonicus im Gesicht, zu Opisthotonus und schließlich zu der Bogenstarre des ganzen Körpers. Nur wenig werden gewöhnlich die Arme betroffen. Während diese Starre in der Entwicklung begriffen ist, beginnen schon auch Einzelkrämpfe, an welchen zunächst die von der Starre schon ergriffenen Muskeln, aber auch solche von ihr bisher verschonten sich beteiligen. Am meisten ist der Krampf der Atemmuskulatur zu fürchten. Diese Krämpfe sind oft, nicht immer, reflektorisch auszulösen. Zu erwähnen ist der bei einer Anzahl von Kranken sehr unangenehme Schlundkrampf beim Versuch zu trinken oder zu essen.
	Die Temperatur bei Tetanus kann normal bleiben, erhebliche Temperatursteigerung ist ein schlechtes Zeichen.
	Meist besteht starkes Schwitzen.
	Das Bewußtsein ist ungetrübt.
Kopftetanus	Eine besondere Form des Tetanus stellt der Kopftetanus dar, der oft Wunden im Bereiche des Gesichts folgt, der lange Zeit oder überhaupt auf den Kopf beschränkt bleiben kann und merkwürdigerweise meist mit einer peripheren Fazialislähmung auf der Seite der Wunde verbunden ist. Seltener ist ein lokaler Beginn des Tetanus an einer infizierten Extremität.
Prognose	Die Prognose des Tetanus hängt in erster Linie von der Inkubationszeit ab, je kürzer diese, desto schlechter jene. Die Mortalität bei Ausbruch des Tetanus innerhalb der ersten Woche beträgt über 90 %.

Die Fälle, deren Inkubationszeit mehr als 9 Tage beträgt, geben erheblich bessere Chancen.

Die spezifische Behandlung hat sich als so unsicher gezeigt, daß viele auf sie ganz verzichten. Man sollte sie aber doch versuchen. Man gibt neuerdings sehr hohe Dosen und zwar täglich bis zu 400 Antitoxineinheiten (A. E.) des Behringschen Serums subkutan. Ferner hat man das Antitoxin in die Lumbalflüssigkeit eingespritzt (20 A. E. nach Ablassen einer entsprechenden Menge Flüssigkeit) und in die Ventrikel. Ob die Statistik sich dadurch wesentlich bessern wird, ist noch nicht zu beurteilen. Therapie

Die symptomatische Behandlung besteht in der Herbeiführung einer Narkose, zu der man meist das Chloralhydrat verwendet, 3—5 mal täglich 2 g per os oder suppositorium ist die gewöhnliche Anwendungsart, es ist aber auch schon das doppelte gegeben worden. Einige ziehen Morphin vor.

So wenig sicher die therapeutische Wirkung des Serums ist, so segensreich ist seine prophylaktische. Man gebe bei jeder verdächtigen Wunde sofort 100 A. E. subkutan. Eine Verzögerung der prophylaktischen Injektion verschlechtert die Chancen sehr erheblich. Prophylaxe

Anhangsweise sei die Lyssa oder Hundswut erwähnt, deren Inkubationszeit bis zu 6 Monaten beträgt, und die unter Fieber, sowie den furchtbarsten Exzitationserscheinungen, von denen die hydrophobischen Schlundkrämpfe die bekanntesten sind, zum unentrinnbaren Tod führt. Die Prophylaxe nach dem Biß durch ein lyssakrankes Tier wird durch die Pasteursche Schutzimpfung bewirkt. In die damit befaßten Institute (Berlin, Budapest, Paris etc.) sind die Kranken sofort nach dem Biß zu senden. Lyssa

c) Tetanie und Spasmophilie.

Die wesentliche Symptome der Tetanie sind tetanische symmetrisch auftretende Krämpfe der Muskulatur. Charakteristisch ist die an den Armen dabei auftretende Geburtshelfer- oder Pfötchenstellung der Hand (Streckung der Mittel- und Endphalangen, Beugung der Grundphalangen). An den Beinen sind besonders die Beuger der Füße und Zehen beteiligt, auch die Rumpf- und Gesichtsmuskeln können an den Krämpfen teilnehmen. Die Krämpfe dauern Minuten bis Stunden, selten länger, können sich häufig wiederholen. Das Bewußtsein bleibt ungetrübt. Fast immer werden die Kranken durch Parästhesien in den Gliedern auf das Nahen des Krampfes aufmerksam gemacht. Wenn man von solchen Parästhesien als Vorboten von Krämpfen hört, wird man sofort nach der Stellung der Hand während des Krampfes fragen und dann häufig sogleich die Diagnose machen können. Durch einige Minuten fortgesetzten Fingerdruck auf den Nerven im Sulcus bicipitalis oder durch Umschnürung des Oberarms des Kranken mit Esmarchscher Binde kann man dann häufig einen Anfall produzieren (Trousseau'sches Phänomen). Immer gelingt das aber nicht, sondern es kommt dabei häufig nur zu Parästhesien. Als Chvostek'sches Phänomen wird die mechanische Übererregbarkeit des Nervus facialis bezeichnet, derart, daß ein Schlag mit dem Perkussionshammer Art der Krämpfe
Parästhesien

auf die Gegend des Fazialisstammes vor dem äußeren Gehörgang eine Zuckung der ganzen Fazialismuskulatur zur Folge hat. Dieses Phänomen ist aber auch außerhalb der Tetanie zu häufig, um darauf allein etwa die Diagnose zu machen.

Seltenere Symptome sind trophische Störungen an den Nägeln und Haaren und Katarakt.

Epidemisches Auftreten In manchen Orten, wie z. B. Wien, tritt und zwar merkwürdigerweise bei gewissen Gewerben (Schuster, Schneider) und zu bestimmten Jahreszeiten (Winter) die Tetanie epidemisch auf. In denselben Orten scheint auch die Schwangerschaftstetanie besonders häufig zu sein, die in Norddeutschland ungemein selten ist. Wenn wir hier eine Tetanie feststellen, so handelt es sich meist um diejenige Form, welche als Folgeerscheinung von chronischen Magendarmstörungen, insbesondere bei Magenektasie auftritt, und es ist darum in jedem Falle der Magen einer genauen Untersuchung zu unterziehen. Als letzte Form ist dann noch die Tetania thyreopriva nach Kropfoperationen zu nennen, welche jedoch wahrscheinlich nicht auf die Entfernung der Schilddrüse selbst, sondern auf die der Glandulae parathyreoideae zurückzuführen ist. Es gilt schon lange als Regel weder die ganze Schilddrüse, noch alle Glandulae parathyreoideae bei Operationen zu entfernen.

Therapie Da wo die Ursache der Tetanie unbekannt ist, kann man nur symptomatisch vorgehen (Brom, Chloralhydrat, in schweren Fällen Morphium). Lektovegetabile Diät wird empfohlen. Ferner gibt man mit Rücksicht auf die etwaigen Beziehungen zu den Parathyroideae mit sehr zweifelhaftem oder negativem Erfolge Parathyroideapräparate. Bei der Magentetanie ist die Behandlung des Grundleidens durch Ausspülungen, eventuell Operation dann von gutem Erfolge, wenn das Grundleiden nicht selbst eine deletäre Prognose hat.

Kindertetanie Die Kindertetanie wird neuerdings von den führenden Pädiatern allgemein nur als der Ausdruck einer umfassenderen Krankheitseinheit angesehen, der Spasmophilie. Der Begriff der Spasmophilie wird als eine allgemeine Übererregbarkeit des Nervensystems gefaßt. Als deren feinsten diagnostisch nachweisbarer Ausdruck wird die galvanische Übererregbarkeit der peripheren Nerven angesehen; Thiemich legt besonderen Wert auf die Kathodenöffnungszuckung und bezeichnet als pathologisch alle Fälle, in denen eine Kathodenöffnungszuckung bei Strömen unter 5 Milliampère eintritt. Es wird abzuwarten sein, ob sich eine solche elektrische Reaktion wirklich als Maß einer einheitlichen Erkrankung, nämlich der Spasmophilie und nur dieser bewähren wird. Die meisten Neurologen werden gestehen müssen, daß sie in dieser Frage mangels genügenden Materials kein zureichendes Urteil haben, und die Entscheidung dem Pädiater überlassen. Für den Praktiker wird vorläufig noch die gröbere Symptomatologie maßgebend sein.

Laryngospasmus Eklampsie Außer der eigentlichen Tetanie werden als Formen der Spasmophilie noch der Laryngospasmus und die Eklampsie der Kinder angesehen. Die Tetanie selbst äußert sich beim Kinde nicht wesentlich anders wie beim Erwachsenen. Der Stimmritzenkrampf mit seiner juchenden Inspiration ist jedem bekannt. Gefährlicher noch sollen die An-

fälle von expiratorischer Apnoe sein. Sie können mit tetanischen und eklamptischen Anfällen sich kombinieren. Der Eklampsie-Anfall der Kinder ist dem epileptischen manchmal zum Verwechseln ähnlich, häufig ist er mehr in die Länge gezerrt, nach dem eklamptischen Anfall ist zum Unterschied vom epileptischen das Kind meist sofort wieder wohl.

Die Behandlung der kindlichen Tetanie bzw. Spasmophilie besteht vor allem in einer Änderung der Ernährungsweise. Da es sich herausgestellt hat, daß einseitige Kuhmilchernährung und speziell die Kuhmilchmolke geeignet sind, die spasmophile Übererregbarkeit des Nervensystems zu unterhalten, so ist die Ernährung mit Mehldiät oder mit Frauenmilch einzuleiten, nachdem der Darm zunächst gründlich entleert ist. Auch der Mehlnährschaden wird übrigens als Ursache tetanischer Erscheinungen angesehen. Die Parathyroidtherapie hat sich auch bei der Kindertetanie nicht als wirksam gezeigt. Dagegen ist der Phosphorlebertran, der seit langem gegen die Rhachitis Verwendung findet, auch bei der Tetanie und Spasmophilie von großem Nutzen. Von der früheren Annahme, daß die Tetanie und Spasmophilie eine Folge der Rhachitis ist, ist man abgekommen, trotzdem diese nervösen Affektionen ganz besonders häufig bei rhachitischen Kindern auftreten. Im eklamptischen Anfall sind Chloralhydratklystiere (0,5 g), oder in ganz dringenden Fällen die Inhalation von etwas Chloroform anzuwenden. Von überraschendem Erfolge ist in schweren Fällen manchmal die Lumbalpunktion. Eine ganz besondere Wirkung scheint ihr bei den nach Keuchhusten auftretenden Krämpfen zuzukommen, die allerdings wohl der Spasmophilie im eigentlichen Sinne fernstehen.

Als Spasmus nutans werden rhythmische Kopfbewegungen in Form von Nicken, Drehen, Schütteln bezeichnet, die bei Kindern bis zu drei Jahren vorkommen und auf den Einfluß dunkler Wohnungen zurückgeführt werden. Mit der Spasmophilie hat der Spasmus nutans nichts zu tun.

34. Krankheiten der Blutdrüsen.

a) Schilddrüse.

Das ausgesprochene Bild der Basedowschen Krankheit wird fast nie verkannt. Die Hauptsymptome sind Struma, Exophthalmus, Tachykardie. und Tremor. Wie bei vielen anderen Krankheiten haben wir allmählich gelernt, daß wir einerseits nicht das ganze klassische Bild zur Diagnose brauchen, und daß andererseits eine Reihe von Nebensymptomen diagnostisch sehr wichtig werden können.

Wohl niemals fehlt dem Basedow die Struma. Sie kann aber in leichterem Fällen recht unbedeutend sein, nur in einer geringen Vergrößerung eines Lappens sich kundgeben. Nicht selten findet man eine Struma substernalis. Struma allein macht natürlich keinen Basedow.

Der Exophthalmus kann vollständig fehlen, ist in der Mehrzahl der Fälle aber vorhanden, und führt bekanntlich oft sogleich zur Diagnose. In weniger ausgesprochenen Fällen erscheint das Auge auf den ersten

Therapie

Basedow-
sche
Krankheit

Struma

Exoph-
thalmus

Blick nur eigentümlich glänzend und starr. Es kommt das zum Teil von einem leichten Exophthalmus, zum Teil aber von der ganz auffälligen Seltenheit des Lidschlags beim Basedow (Stellwagsches Symptom).

Als Graefesches Zeichen wird das Zurückbleiben des oberen Lides beim Blick nach unten bezeichnet, wodurch ein Stück der oberen Sklera zwischen Kornea und Lid sichtbar wird. Das Moebius'sche Symptom besteht in einer Akkommodationsschwäche der Interni. Beiden kommt nur eine geringe Bedeutung zu.

Tachy-
kardie

Die Tachykardie ist ein regelmäßiges Symptom des Basedow, so daß man ohne Tachykardie die Krankheit nicht diagnostizieren kann. In den allerleichtesten Fällen braucht sie freilich in der Ruhe nur sehr gering zu sein (80—90), meist aber bleibt sie nicht unter 120 und steigt in schweren Fällen bis zu 200. In den ganz leichten Fällen ist es natürlich wichtig, die normale Pulszahl der Betroffenen zu kennen. Der Puls ist meist weich und schwach, oft unregelmäßig, aber ohne ausgesprochene Intermittenzen. Subjektive Klagen über Luftmangel, Oppressionsgefühl, Angina pectoris-ähnliche Anfälle sind gewöhnlich. Das Herz ist oft etwas verbreitert, die Herztöne unrein, der erste Ton an der Spitze häufig von einem blasenden Geräusch begleitet. In späteren Stadien treten dann die schweren Zeichen der Insuffizienz des Herzmuskels hinzu. Die Tachykardie kommt nie als einzelnes Symptom vor, so daß man kaum in Verlegenheit kommt, schwierige differentialdiagnostische Erregungen anzustellen. Wenn man bei auffallender Tachykardie nur an Basedow denkt, und sich die Augen, den Hals und die Hände ansieht, so wird man keine Fehldiagnose stellen.

Tremor

Der Tremor ist ein sehr regelmäßiger und feinschlägiger, und wird am besten beim Ausstrecken der Hände sichtbar. Er ist nur ein Hilfszeichen, ebenso wie das in vielen Fällen sehr starke Schwitzen der Basedowkranken (welches der Grund ist für die früher vielfach in den Vordergrund gestellte Verminderung des Leitungswiderstandes der Haut).

Magen-
darmkanal

Weniger diagnostisch als symptomatologisch wichtig sind ferner die Durchfälle bei Basedow, dyspeptische Beschwerden und die starke Körpergewichtsabnahme.

Nervöse
Beschwer-
den

Die nervösen Beschwerden des Basedow entsprechen etwa den neurasthenischen, bestehen in Ermüdbarkeit, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit etc.

Therapie

Die Therapie der Basedowschen Krankheit steht heute im Zeichen des Kampfes zwischen der inneren und der chirurgischen Therapie. Die chirurgische Therapie geht von der Annahme aus, daß die Ursache aller Erscheinungen in der Veränderung der Schilddrüse liegt, und daß die Veränderung der Schilddrüse als eine Überfunktion aufzufassen, demnach die Exstirpation des größten Teiles der Schilddrüse zur Heilung führen könne. Die innere Therapie ficht mit einem Heer von allgemeinen „roborierenden“ Mitteln mit Antithyroidinpräparaten (Rodagen), dem unvermeidlichen Elektrisieren, diesmal des Halssympathikus etc. etc. Nur ein internes Mittel ist heute verworfen, das Jod. Man kann sich nicht vorstellen, daß das Jod bei einer Hyperfunktion der Schilddrüse, die doch selbst Jod enthält, nützen könne, und man hat in einer Anzahl

von Fällen nach Jod schwere Verschlimmerungen des Leidens gesehen, so daß man bereits anfängt, die Jodmedikation bei Basedow als einen „Kunstfehler“ zu brandmarken.

Ich kann dieser Jodfurcht nicht beitreten. Ich kenne nur eine interne Maßnahme, die bei Basedow wirklich und manchmal geradezu spezifisch wirkt, das ist Jodkali in mittleren bis großen Dosen. Von allen anderen Maßnahmen habe ich auch nicht das geringste gesehen, weder vom Arsen, noch vom Rodagen, noch vom Elektrisieren, das ich bei einer Anzahl von Kranken monatelang durchgeführt habe. Alle diese Erfolge sind, soweit ich sehen kann, entweder nur zufällig oder scheinbar. Denn besonders die subjektiven Symptome des Basedows schwanken nicht unerheblich, und nach monatelanger Behandlung und vielleicht einiger Besserung erscheint der Kranke wieder mit noch schwereren Symptomen als bei der ersten Konsultation.

Dagegen läßt es sich gar nicht bestreiten, daß durch die Verordnung von Jodkali, zunächst 2—3 g pro Tag, ohne alle anderen Maßnahmen in einer nicht kleinen wenn auch im ganzen der Minderzahl von Basedowfällen im Laufe von wenigen Wochen ein Rückgang der Struma (in einem Fall von mir auf 4 cm Halsumfangsabnahme bestimmt), eine Besserung des Exophthalmus, eine Verminderung der Pulsfrequenz und sogar ein Einfluß auf die Beschwerden von seiten des Magendarmkanals zu erreichen ist, neben einer Hebung des Allgemeinzustandes. Es wäre ja auch außerordentlich merkwürdig, wenn die solange bei Basedow geübte Jodtherapie nun plötzlich schädlich sein sollte, weil die theoretischen Grundlagen nicht mehr stimmen. Die theoretischen Grundlagen werden sich auch hier der Praxis anpassen, der Einfluß des Jodkalis braucht mit dem Jodgehalt der Schilddrüse ja gar nichts zu tun zu haben. Das Jod befindet sich in der Schilddrüse in organischer Bindung, und weil Jodkali bei Basedow wirkt, wird darum doch an der Theorie über die Schilddrüsenfunktion noch gar nichts geändert. Ich habe auch gefunden, daß Jodothyryn oder Schilddrüsen-tabletten bei Basedow durchaus nicht die Wirkung des Jodkalis haben¹⁾. Ich will keineswegs behaupten, daß Jodkali bei Basedowscher Krankheit nicht schädlich wirken könne. Ist es doch bekannt und nicht zu bestreiten, daß durch übermäßigen chronischen Jodgebrauch, oder bei besonderer Empfindlichkeit gegen Jod durch das Jod allein ein Basedow ähnlicher Symptomenkomplex sogar hervorgerufen werden kann (Jodbasedow)²⁾. Was ich behaupte, ist dies, daß man berechtigt ist, Jodkali bei Basedow anzuwenden, und daß man in einer Anzahl von Fällen erfreuliche, in einzelnen weitgehende Erfolge sehen wird. Wenn man den Kranken jeden zweiten Tag kontrolliert, halte ich auch

¹⁾ Ebenso wie Jodkali bei Myxödem nicht die therapeutische Wirkung des Jodothyryns und der Schilddrüsensubstanz hat.

²⁾ Wenn sich die Jodschädigungen nicht nur bei Basedow, sondern auch bei einfachem Kropf in manchen Gegenden häufen, so muß das an besonderen lokalen Bedingungen liegen. Es ist wohl möglich, daß man in solchen Gegenden (Schweiz) am besten von der Jodmedikation Abstand nimmt, allgemeine Gültigkeit aber hat das nicht.

ernstliche Schädigungen für ausgeschlossen; dabei soll man sich durch eine Zunahme der Beschwerden in den ersten 3—4 Tagen noch nicht entmutigen lassen. Nach dieser Zunahme sieht man dann manchmal eine schnelle Abnahme. Ich mache die Kranken auch ausdrücklich darauf aufmerksam, daß das Jodkali schaden, aber auch nützen könne. Bei kachektischen bettlägerigen Patienten habe ich Jodkali überhaupt nicht angewandt. Was in drei oder vier Wochen einer Jodbehandlung nicht erreicht ist, wird zunächst auch nicht mehr erreicht, der Rückgang der Struma hört gewöhnlich schon früher wieder auf. Man muß dann die Kur aussetzen, den Patienten einige Zeit beobachten und sich dann ein Bild machen, was aus dem Fall werden kann. Bei der Beurteilung ist die Größe der Struma von geringerer Bedeutung als die Tachykardie, der Exophthalmus und die anderen nervösen Beschwerden. Ich habe Fälle gesehen, die in drei Wochen nur unter Jodkali aus völliger Arbeitsunfähigkeit zur Arbeitsfähigkeit gebracht wurden. Diesen Fällen wird dann ein gewisses Regime verschrieben, man wird ihnen Schonung anempfehlen, die nervösen Beschwerden mit Brom bekämpfen etc. Jedenfalls kann man da warten, ohne dem Kranken zu schaden, und kann nach einigen Monaten noch einmal eine Jodkalibehandlung einleiten und diese bei weiterer Besserung sogar in Abständen von etwa 4—6 Monaten eventuell wiederholen. Wenn der Kranke in entsprechenden Verhältnissen ist, soll man ihn inzwischen ins Hochgebirge schicken, das im allgemeinen einen besonders guten Einfluß hat. Schwere Herzstörungen schicke man in die bekannten Herzbäder. Auch wenn später eine Operation vorgenommen werden soll, ist die mögliche Regulierung der Herztätigkeit von großem Wert. Auch mit Digitalis und den anderen Herzmitteln ist bei Basedowscher Krankheit doch einiges zu erreichen, der Herzschlag doch oft etwas zu verlangsamen, leichte Arrhythmien zu beseitigen. Man braucht durchaus nicht das Stadium ausgesprochener Herzschwäche abzuwarten, um mit kleinen und längere Zeit gegebenen Dosen (etwa Tinct. digitalis und Tinct. strophant. aa 3 mal täglich 5—8 Tropfen) einzugreifen.

Wenn die Basedowkranken mittlerer Schwere auf Jod nicht oder ungenügend reagieren, empfehle ich ohne weiteres die Operation. Die Chance, daß solche Kranke noch spontan wieder genesen, ist zu gering, wenn wir auch gelegentlich Leute zu Gesicht bekommen, die vor langen Jahren nach ihrem Bericht ziemlich schweren Basedow gehabt und allmählich wieder ganz gesund geworden sind, meist bis auf eine nun harmlose Struma. Bei leichteren Fällen, die auf Jod nicht reagieren, wird man warten können, sie gehen nicht so selten spontan innerhalb einiger Jahre zurück, es kommt da auch viel auf die ökonomischen Verhältnisse an, besonders darauf, wie weit der Kranke sich der Ruhe und der Erholung hingeben kann, aber jedenfalls ist die Gefahr, die Operation zu spät zu machen, viel größer als die Gefahr der Operation selbst. Die Operation, die in mittelschweren Fällen keine erhebliche Gefahr bietet, bedingt in schweren Fällen große Gefahren für das Herz, auch wenn die allgemeine Narkose vermieden wird, und die Erfolge der Operation werden viel unsicherer, wenn es sich um sehr lange bestehende, an der

Schwelle der Kachexie stehende Fälle handelt. In den meisten mittelschweren Fällen aber ist die Operation von außerordentlichem Nutzen und unzweifelhaft eine der eindrucksvollsten Errungenschaften der modernen Medizin. Ohne Operation gehen eine Anzahl von Fällen unter allen Zeichen der Kachexie und der Herzinsuffizienz rettungslos zugrunde.

Das Myxödem hat seinen Namen von der eigentümlichen **Myxödem** pachydermischen Veränderung der Haut, hauptsächlich im Gesicht und an den Extremitäten. Die Erkrankung äußert sich im übrigen in einem allmählichen psychischen und körperlichen Verfall. Trophische Störungen an den Haaren und Nägeln sind manchmal ziemlich frühe Hinweise. Die Ursache der Erkrankung ist eine Atrophie der Schilddrüse, von der bei etwaiger Autopsie nur noch kleine Reste gefunden werden. Die Cachexia strumipriva nach Kropfexstirpationen ist nur eine Form des Myxödems. Seitdem diese Form bekannt ist, wird bei Kropfoperationen bekanntlich nie mehr die ganze Schilddrüse exstirpiert. (Die Tetania thyreopriva ist man geneigt auf die Exstirpation der Glandulae parathyroideae, nicht der Schilddrüse selbst, zu beziehen, vgl. S. 218.) Auch die Zerstörung der Schilddrüse durch entzündliche Prozesse oder durch Lues kann zu den Symptomen des Myxödems führen.

Es ist eine große Freude, einen Myxödemkranken zu entdecken, weil in einer sehr großen Anzahl von Fällen mit der spezifischen Therapie durch Fütterung mit Schilddrüsensubstanz eine weitgehende Besserung aller Symptome bis zu völlig normalem Befinden erzielt werden kann. Man beginne mit 1 Tablette von Merck, Bourroughs Welcome, Knoll, Poehl, Roche, à 0,1 wirksamer Substanz täglich, steige bis das Maximum der Wirkung erzielt ist, gehe dann wieder herunter. Die Kranken richten sich dann selbst leicht auf die genügende Dosis ein und können auch größere Pausen machen. Bei kleinen Kindern beginnt man mit $\frac{1}{8}$ der Dosis für den Erwachsenen und steigt im allgemeinen nicht höher als bis auf $\frac{1}{2}$ Tablette täglich (vgl. darüber auch S. 161). Jodothylin wirkt meist ebenso gut, wie Schilddrüsensubstanz selbst. Die absolute Anzahl der Myxödemkranken ist jedoch recht gering.

Man hat jedoch neuerdings die Aufmerksamkeit auf abortive Fälle **Abortive Fälle** des Myxödems gerichtet, bei denen die charakteristischen Hautveränderungen fehlen können. Ob es aber richtig ist, daß ein Myxoedem fruste bestehen kann ohne Veränderungen der Haut und ohne psychische Veränderungen, nur mit einem neurasthenischen Symptomenkomplex, scheint uns noch nicht erwiesen. Man muß in diesen Fällen die Diagnose allein auf die Unmöglichkeit stützen, die Schilddrüse zu tasten, und das macht bekanntlich bei kurzen dicken Hälsen überhaupt große Schwierigkeit. Immerhin sei wegen der praktischen Konsequenz die Aufmerksamkeit auf diese Fälle gelenkt. Im allgemeinen besteht seit einer Reihe von Jahren sicherlich eine übertriebene Tendenz, alle möglichen Störungen den Blutdrüsen in die Schuhe zu schieben. Die Lehre von der inneren Sekretion und der Wechselwirkung der Blutdrüsen aufeinander, ist noch ein sehr luftiges Gebäude, und viele seiner Teile werden eines Tages zusammenstürzen wie Kartenhäuser. In der Praxis brauchen wir uns im Prinzip ja nicht auf wissenschaftliche Grundlagen zu stützen, und

wir haben das Recht, Empiriker zu sein. Nur hat mich, wie wohl viele andere, die ab und zu Organpräparate ohne genaue Indikation, auf gewisse unsichere Vorstellungen und Erwartungen bei einzelnen Fällen angewandt haben, die Erfahrung gelehrt, daß sie ohne genaue Indikation gegeben, eben nichts nützen. Versagt doch selbst in den Fällen, in welchen wir die Ursache einer Krankheit in einer Störung der Funktion einer Blutdrüse sicher erkannt haben, wie z. B. bei der Addison'schen Krankheit, die Organtherapie, weil wir offenbar nicht in der Lage sind, die Funktion der lebenden Zelle durch Einführung toten Materials zu ersetzen. Möge hier die Transplantation berufen sein, Wandel zu schaffen.

Mit der Unwirksamkeit der spezifischen Präparate bei nicht streng spezifischen Erkrankungen dürfen natürlich nicht die allgemeinen Wirkungen der Präparate, z. B. die wichtige Einwirkung der Schilddrüsenpräparate auf den Stoffwechsel der Fettleibigen zusammengeworfen werden.

b) Hypophysis.

Akro-
megalie

Die Akromegalie beruht wahrscheinlich immer auf einer Überfunktion und einer „Struma“ der Hypophyse, wie die Basedowsche Krankheit auf einer Überfunktion und einer Struma der Schilddrüse beruht.

Die Geschwulst der Hypophyse macht die Erscheinungen des Hirntumors und zwar natürlich entsprechend der Lage der Hypophyse (vgl. S. 129). Neben den allgemeinen Störungen des Hirntumors ist das besonders charakteristische Lokalsymptom die bitemporale Hemianopsie durch Druck auf das Chiasma (S. 52). Die Erweiterung der Sella turcica läßt sich auch röntgenologisch feststellen. Die Entwicklung des Hypophysentumors geschieht jedoch manchmal in einer anderen Richtung, so daß die Ausweitung der Sella turcica recht gering bleiben kann.

Die Akromegalie selbst besteht in einer Längen- und Dickenzunahme der Hände und Füße, ebenso in Massenzunahme von Schädel, Kiefer, Brustkorb. Die charakteristische Formation der Akromegalie ist durch das abnorme Wachstum der Knochen bedingt, indessen beteiligen sich auch die Weichteile in verschieden starkem Maße. Besonders bekannt ist die Veränderung der Zunge (Makroglossie).

Das Leiden ist in seiner vollen Entwicklung nicht zu verkennen. Nicht zu verwechseln ist es mit dem einfachen Riesenwuchs, der gewöhnlich in dem Alter schon längst abgeschlossen ist, in dem die Akromegalie erst beginnt (zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr). Den Riesen fehlen alle anderen Erscheinungen der Akromegalie, und die Röntgenuntersuchung wird mit Ausnahme sehr weniger Fälle (vgl. oben), jetzt die Differentialdiagnose noch leichter machen als früher. Auch die verschiedenen Formen der auf eine Seite oder auf einzelne Glieder beschränkten Hypertrophie, z. B. an der Hand sogenannte Cheiromegalie, können mit Akromegalie nicht verwechselt werden.

Wichtig ist es, mit Rücksicht auf die neuerdings nahe gerückte Behandlung die Anfangsstadien der Akromegalie zu erkennen. Die Kranken merken oft selbst die ersten Erscheinungen an den Händen (Zuengwerden der Handschuhe). An den Kiefern ist das Auseinander-rücken der Zähne manchmal ein frühes Symptom.

Außer der Wachstumsstörung ist noch ein Symptom bei der Akromegalie, wie auch bei anderen Hypophysentumoren ziemlich charakteristisch, und man versäume nicht, bei entsprechendem Verdacht danach zu fragen, d. i. das frühzeitige und anscheinend grundlose Ausbleiben der Menses bei Frauen und die Impotenz beim Mann.

Die Beziehung der Hypophyse zu den Genitalien zeigt sich dann noch in einer erst neuerdings gewürdigten Erkrankung, der *Dystrophia adiposo-genitalis*, einer allgemeinen sehr starken Fettsucht neben einer Atrophie der Genitalien und einem Verlust der Sexualcharaktere, Ausfallen der Bart- und Schamhaare etc. Auch hier werden Tumoren der Hypophyse gefunden; die allgemein pathologische Feststellung, der besonderen Bedingungen, unter welchen einmal die Akromegalie, das andere Mal die *Dystrophia adiposo-genitalis* zur Entstehung kommt, steht noch aus.

Die Therapie war bei Hypophysischgeschwülsten bis vor kurzem machtlos. Seit einigen Jahren hat man jedoch versucht, die Hypophyse operativ zu erreichen. Es erscheint, als wenn der nasale Weg der beste und verhältnismäßig leichteste ist. Die partiellen Verkleinerungen des Tumors, die auf diesem Wege vorgenommen wurden, haben zu erfreulichen Besserungen auch des Bildes der Akromegalie geführt, so daß man diese Behandlung in entsprechenden Fällen jetzt vorschlagen muß.

Therapie

c) Genitalien.

Zu den Störungen durch Veränderungen der Blutdrüsen wären dann noch die klimakterischen Beschwerden zu rechnen, die auf der Atrophie der Ovarien beruhen. Es sind die gleichen, die auch nach vorzeitiger künstlicher Kastration beim Weibe zur Entwicklung kommen. Es handelt sich hauptsächlich um vasomotorische Störungen. Die „Wallungen nach dem Kopf“ können außerordentlich quälend werden, mit Schweißausbrüchen und Schwindel- oder Ohnmachtgefühl verbunden sein. Auch die Erscheinungen der Akroparästhesie, die ja vasomotorischen Ursprungs sind (vgl. S. 229), sowie flüchtige Ödeme, ebenso wie Tachykardien und basedowähnliche Symptomenkomplexe kommen vor.

Klimakterium

Kastration

Nicht alles, was man gemeinhin als klimakterische Beschwerden bezeichnet, darf jedoch ohne weiteres als Folge des Ausfalls der inneren Sekretion der Ovarien betrachtet werden und insbesondere scheinen die allgemeinen neurasthenischen Beschwerden zum Teil nicht hierher zu gehören. Diese angeblichen Neurasthenien des kritischen Alters, die bei Männern und Frauen in gleicher Weise gerade im Rückbildungsalter vorkommen, sind häufig leichte Melancholien, bzw. Depressionen (vgl. auch unter Psychoneurosen). Daß sie von einer verminderten Funktion der Ge-

nitalien nicht abhängen, geht daraus hervor, daß sie in genau der gleichen Art sowohl einige Jahre vor, wie auch viele Jahre nach dem Klimakterium auftreten, und daß beim Manne die Potenz unter dem depressiven Zustand zwar leidet, aber nach dessen Ablauf wieder ansteigt. Von einem Klimakterium des Mannes, von dem man neuerdings spricht, bin ich überhaupt in keiner Weise überzeugt.

Gegen die vasomotorischen Beschwerden hat man neben den üblichen allgemeinen Maßnahmen und neben Brommedikation vielfach Ovarialpräparate angewandt. Man hat den Eindruck, als wenn sie in einer Anzahl von Fällen von Erfolg sind, eine unmittelbare durchschlagende Wirkung habe ich jedoch noch nicht gesehen. Von Nutzen scheinen auch Hypophysispräparate zu sein.

Eunuchoidide

Den Erscheinungen, die beim Manne nach künstlicher Kastration auftreten, sind Veränderungen analog, welche bei angeborener Hypoplasie der Hoden vorkommen. Man hat einen eunuchoiden Hochwuchs und einen eunuchoiden Fettwuchs unterschieden. In beiden Fällen besteht Kastratenstimme; die Axillar-, Scham- und Bart Haare sind wenig entwickelt oder fehlen. Eine Therapie, etwa durch Fütterung mit Hodensubstanz, scheint ohne Wirkung zu sein.

d) Neurogener Diabetes.

Anhangsweise kann auch der neurogene Diabetes noch in diesem Kapitel behandelt werden, obwohl die Störung gewisser Blutdrüsen (Pankreas, Nebenniere?) hier erst sekundär ist. Am bekanntesten ist seine Entstehung nach Kopftraumen, jedoch in einwandsfreier Weise nur sehr selten festzustellen, ebenso wie die nach anderen organischen Erkrankungen des Gehirns (Erweichungsherden, Tumor). Immerhin kann an solchen Fällen nicht gezweifelt werden, ebenso wie es auch solche nach rein psychischen Traumen gibt, Fälle, die sich auch im späteren Verlauf manchmal in ganz besonderem Maße von dem psychischen Zustand des Patienten abhängig erweisen. (Daß auch der nicht neurogene Diabetes von dem psychischen Zustand des Erkrankten in gewissem Umfang abhängig ist, ist bekannt.)

Viel häufiger als echter Diabetes sind vorübergehende Glykosurien bei Erkrankungen des Nervensystems.

Über die Nervenstörungen beim Diabetes (Neuritis etc.) vgl. unter endogene Vergiftungen.

35. Vasomotorisch-trophische Erkrankungen.

Wenn wir vasomotorische oder trophische Störungen sehen, oder Klagen hören, die wir auf solche Störungen beziehen, so haben wir zu untersuchen, ob diese Störungen primär oder sekundär sind.

Organische
Gefäß-
erkrankungen

Die primären Ursachen solcher Störungen können organische Gefäßveränderungen sein. Wir rechnen also Fälle, in welchen auf Grund einer Arteriosklerose oder auch beim Diabetes, vasomotorische trophische

Störungen auftreten, nicht zu den vasomotorisch-trophischen „Neurosen“, ebensowenig Fälle, wo auf Grund einer Endarteriitis luetica oder infectiosa (z. B. nach Typhus) vasomotorisch-trophische Veränderungen an den Extremitäten entstehen. Bei geringerer Intensität können diese arteriellen Verschlüsse gelegentlich auch ernsthafte diagnostische Schwierigkeiten machen. Bei einer typischen trockenen arteriosklerotischen Gangrän wird natürlich niemand an eine Neurose denken.

Eine Mittelstellung zwischen den Gefäßerkrankungen und den Neurosen nimmt das „intermittierende Hinken“ ein. Hier werden wir durch die nervösen Störungen auf das arterielle Leiden erst aufmerksam gemacht. Der Kranke kann nicht längere Zeit, nur wenige Minuten bis eine halbe Stunde, gehen, ohne zu ermüden, und zugleich Parästhesien, das Gefühl von Kälte, oft heftige Schmerzen in den Füßen zu verspüren. Er muß sich dann ausruhen, kann dann wieder eine Strecke gehen, um sich wieder ausruhen zu müssen und so fort. Meistens werden die Erscheinungen spontan in typischer Weise angegeben, in anderen nicht ganz typischen muß man danach forschen. Wir finden als Grundlage eine ausgesprochene (auch durch die Röntgenuntersuchung zu bestätigende) Sklerose der Gefäße des Beines und Fußes und ein Fehlen der Fußpulse. Die Grundlage ist wahrscheinlich eine besondere Form der Arteriosklerose, die sich ganz besonders häufig bei starken Rauchern, seltener auf dem Boden von Alkoholismus, Schrumpfnieren, Blei und Lues findet. In selteneren Fällen sind die Fußpulse erhalten, und es sind dann angiospastische Zustände für das Leiden verantwortlich gemacht worden. Demgegenüber behaupten andere wieder, diese anscheinend angiospastischen Zustände wären nur das erste Symptom einer organischen Arterienveränderung.

Intermittierendes Hinken

An den Armen können, wenn auch viel seltener, analoge Zustände vorkommen.

Durch energische Jodtherapie und Abstellung der verursachenden Schädlichkeit (Rauchen) kann man in einer Anzahl von Fällen viel erreichen.

Im Anschluß an dieses arteriosklerotische intermittierende Hinken seien im einzelnen noch wenig bekannte, gerade dem Praktiker aber wohl recht geläufige vorübergehende vasomotorische Störungen erwähnt, die bei Arteriosklerose und bei Myokarditis vorkommen. Es handelt sich um bald hier, bald da, bald ohne Veranlassung, bald regelmäßig nach dem Essen oder einige Zeit nach dem zu Bettegehen eintretende vasomotorische Beschwerden und Klagen. Die Füße sind abgestorben, die Hände sind wie tot, Stellen an den Extremitäten werden kalt etc. Diese Zustände sind häufig recht schmerzhaft. Vasomotorische Störungen, Bläß- und Blauwerden der Stellen sind manchmal zu beobachten, manchmal auch nicht. Aber es ist hervorzuheben, daß wir die tiefen Gefäße ja nicht sehen können. Daß diese Störungen nicht primär „nervös“ sind, wenn sie auch durch Nervosität sicher verstärkt werden

Zirkulationsstörungen bei Arteriosklerose

können, sieht man daran, daß sie bei einer Hebung der Blutversorgung bzw. der Herzkraft verschwinden, um alsbald wiederzukehren, wenn sich wieder eine Verschlechterung der Zirkulation bemerkbar macht.

Organische Nerven- krank- heiten

Ebensowenig wie die von organischen Erkrankungen der Gefäße und des Herzens abhängigen rechnen wir die vasomotorisch-trophischen Störungen bei organischen Nervenkrankheiten zu den vasomotorisch-trophischen Neurosen. Solche vasomotorisch-trophische Störungen sehen wir bei einer großen Reihe von peripheren und zentralen Nervenerkrankungen, so bei Neuritis und Polyneuritis; besonders bekannt und schwer sind sie bei der leprösen Neuritis, wir sehen sie ferner bei Syringomyelie, bei Hemiplegie etc. Es macht kaum jemals Schwierigkeiten die Grundkrankheit zu erkennen, so daß man auf die vasomotorischen Störungen, z. B. bei der Neuritis und der Hemiplegie in der Praxis kaum achtgibt. Auch gibt es in diesen Fällen keine besondere Therapie für diese Störungen.

Bei Tabes kommen rein vasomotorische Störungen selten vor. Hier ist neben den Gelenkerkrankungen die häufigste Störung eine trophische, das „Mal perforant“, das manchmal als ganz frühes Symptom der Tabes auftreten kann. Das Mal perforant wird übrigens durch die antisiphilitische Behandlung (Jod, Hg, Salvarsan) besonders günstig beeinflusst.

Dekubitus

Noch einige Worte über den Dekubitus, diese so häufige Begleiterscheinung schwerer nervöser organischer Erkrankungen aller Art. Wir können ihn als trophische Störung heute nur noch in beschränktem Maße anerkennen. Zwar gibt die nervöse Erkrankung eine gewisse Prädisposition zum Dekubitus durch eine etwas veränderte Widerstandsfähigkeit der Haut gegen mechanischen Druck, aber es ist eben dieser Druck neben einer mangelhaften Pflege der Haut, welche die Hauptursache des Dekubitus ist. Der Dekubitus läßt sich daher auch bei sorgsamster Pflege, Wasserkissen, Trockenhalten, spirituöse Abreibungen, meist vermeiden. Eine Ausnahme bilden die sehr seltenen Fälle, wo, z. B. manchmal bei progressiver Paralyse, schon der Druck der Bettdecke genügt, um Dekubitus zu erzeugen. Ist der Dekubitus einmal da, so ist es nicht leicht, manchmal unmöglich, ihn wieder zu beseitigen. Umschläge mit essigsaurer Tonerde und Kampherspiritus sind da gewöhnliche Mittel. Das beste Mittel in schweren Fällen ist das Dauerbad.

Neurosen

Wenn wir nun also zu den vasomotorisch-trophischen Neurosen im eigentlichen Sinne gelangen, so muß in Anbetracht der Zweideutigkeit des Wortes „Neurose“ von vornherein betont werden, daß es sich hier nicht etwa um psychogene, sondern ganz sicher um ausgesprochen organische Erkrankungen handelt. Nur wissen wir noch nicht, wo der Sitz dieser Prozesse ist. Viel spricht dafür, daß sie sich in den peripheren vasomotorischen Nervenfasern oder der Muskulatur der Gefäße selbst abspielen, so daß man also die Erkrankungen vielleicht in die Nähe derjenigen der peripheren Nerven zu rücken hätte.

Die praktisch wichtigste dieser Erkrankungen ist die leichteste, die Akroparästhesie. Diese praktische Wichtigkeit beruht nicht auf einer besonderen therapeutischen Zugänglichkeit, sondern auf ihrer Häufigkeit und Harmlosigkeit. Der Arzt muß sie kennen, um den Patienten über die von diesem als alarmierend angesehenen Symptome zu beruhigen. Die Bezeichnung „Akroparästhesie“ bringt das Wesen der Erkrankung als einer vasomotorischen nicht zum Ausdruck, sondern nur ein Symptom, die Parästhesie. Die Parästhesien bestehen in unangenehmen Empfindungen meist in den Händen, seltener in den Füßen, und zwar Gefühl von Kälte, von Taubheit, von Eingeschlafensein, von Kriebeln, nicht selten auch von ziehenden Schmerzen. Sie sind selten kontinuierlich da, oder es setzen sich doch auf den dauernden Zustand Anfälle von erheblicher Steigerung der Beschwerden auf, meist morgens beim Erwachen. Die Finger sind dann auch klamm. Die Patienten geben häufig an, durch längeres Eintauchen in warmes Wasser oder durch passive und aktive Bewegung die Finger wieder geschmeidig machen zu können. Meist sind die Finger im Anfall blaß oder ein wenig blau und fühlen sich kalt an. Wenn man das nicht immer feststellen kann, so ist die einfache Betrachtung der Hautgefäße ja nur eine sehr grobe Methode und die Gefäße der Muskulatur entziehen sich ja überhaupt dem Auge. Jedenfalls glauben wir, daß die Akroparästhesien in allen Fällen auf vasomotorischen Veränderungen beruhen, wenn man dies auch nicht immer sicher feststellen kann. Auf der vasomotorischen Störung beruhen auch wahrscheinlich objektive leichte Sensibilitätsstörungen, die man an den betroffenen Teilen in einer Anzahl von Fällen feststellen kann, und durch welche man sich nicht verleiten lassen darf, eine echte Neuritis oder dgl. anzunehmen. Die Ausdehnung der Beschwerden und Erscheinungen ist sehr verschieden. Manchmal sind nur einzelne oder mehrere Finger ergriffen (Totenfinger), seltener die ganze Hand. Die Beschwerden können auf lange Zeit auch ohne Therapie völlig aufhören, um dann gelegentlich wieder zu erscheinen. Jedenfalls kann das Leiden unbegrenzt lange bestehen, ohne daß irgend eine Komplikation eintritt.

Akropar-
ästhesie

Die Diagnose, trotzdem sie leicht ist, darf man doch nur auf Grund einer genauen allgemeinen Untersuchung (Arteriosklerose, Schrumpfniere) und einer genauen Untersuchung des ganzen Nervensystems (Ausschluß von anämischen Spinalerkrankungen, Tabes, Tetanie) stellen.

Die Fälle sind manchmal so leicht, daß sie sich einer Behandlung gar nicht unterziehen. Gegen die Parästhesien und Schmerzen empfiehlt sich einige Wochen hindurch täglich fortgesetzte Biersche Stauung (3—15 Minuten, die ersten Male unter ärztlicher Kontrolle). In einigen Fällen ist der Erfolg eklatant, in anderen nützt sie gar nichts. Massage ist von Nutzen. Daß die Warmhaltung der Hände Erleichterung bringt, wissen die Patienten meist selbst.

Eine schwerere vasomotorische Neurose ist die Raynaudsche Krankheit, und trotzdem wir die Prognose der Akroparästhesien so

Raynaud-
sche
Krankheit

leicht stellen, muß gesagt werden, daß es Fälle gibt, von denen wir nicht recht wissen, ob wir sie noch zu dieser eben behandelten Form oder zu der schweren Raynaudschen Krankheit stellen wollen, daß also Übergänge zwischen den beiden wahrscheinlich sind.

Es gilt das insbesondere von den mehr chronisch verlaufenden Fällen der Raynaudschen Krankheit. Das Zustandsbild, das wir hier am häufigsten zu sehen bekommen, ist eine livid zyanotische Verfärbung der Hände. Die Patienten geben an, daß anfallsweise die Hände ganz schwarzblau werden, und sind manchmal imstande, durch Eintauchen der Hände in kaltes Wasser einen solchen Anfall zu provozieren. Seltener wird in diesem Stadium noch von anfallsweise auftretender Anämie berichtet, aber man erfährt, daß solche Anfälle, die also denen bei Akroparästhesie recht nahe stehen, nur viel schwerer aufgetreten sind, früher bestanden haben. Meist kann man an den Händen leichte Rhagaden, auch kleine Geschwüre, Nagelveränderungen, seltener auch kleine Nekrosen, Mutilationen sehen. Schmerzen bestehen manchmal dauernd, manchmal nur im Anfall. Parästhesien, Gefühl von Kälte etc. sind gewöhnlich. In diesem Stadium können sich die Kranken Jahre und jahrzehntelang halten. Die Therapie ist die gleiche wie bei den Akroparästhesien.

Ihnen stehen gegenüber die klassischen schnell und schwer verlaufenden Fälle der Raynaudschen Krankheit. Sie sind ungleich seltener als die verhältnismäßig gutartige vorige Form. Sie verlaufen von vornherein in schweren Anfällen, die sich häufig zuerst in schwerer Ischämie (Syncope locale), manchmal auch von vornherein in Zyanose (Asphyxie locale) kundgeben. Im zweiten Stadium treten immer die Zyanose und die Schmerzen in den Vordergrund. An diesen Anfällen beteiligen sich fast immer hauptsächlich die Hände, meist nur in geringerem Maße die Füße und die vorspringenden Teile des Gesichts (Nase und Ohren). Die Anfälle dauern Minuten bis Stunden. Kürzere Anfälle können sich 30 mal am Tage wiederholen, bald treten Nekrosen und Blasen an den betroffenen Teilen, hauptsächlich wieder an den Händen auf. Die Gangrän ergreift ganze Phalangen und Finger, meist an beiden Händen symmetrisch (daher „symmetrische Gangrän“). Die gangränösen Teile werden abgestoßen, die Stümpfe vernarben, die Krankheit ist abgeschlossen. Die Krankheit kann in einigen Tagen, meist jedoch erst in Wochen und Monaten ihren Höhepunkt erreichen. Eine wirksame Therapie der Krankheit gibt es nicht. Ich selbst würde kein Bedenken tragen, in einem ganz akut verlaufenden Falle die Injektion von Atropin in die Venen des Arms zwecks Lähmung der Gefäßmuskulatur nach Analogie des Bierschen Vorgehens für Anästhesierung der Extremitäten vor Operationen vorzuschlagen. Vielleicht versucht das einmal jemand, dem diese Zeilen zu Gesicht kommen. Die Fälle sind freilich sehr selten, wie daraus hervorgeht, daß ich in dem ganzen Material des Krankenhauses Friedrichshain noch keinen zu Gesicht bekommen habe, dagegen viele der vorerwähnten leichteren und chronischen Fälle. Bei diesen wird man die etwas heroische vorgeschlagene

Maßregel nicht anwenden. Chinin und Arsen wird empfohlen, ein Erfolg der Therapie ist sehr zweifelhaft.

Als die seltenste der vasomotorisch-trophischen Neurosen gilt die Erythromelalgie. Sie besteht in heftigen Schmerzanfällen mit nachfolgender umschriebener Rötung und Schwellung der Extremitätenenden, und zwar meist der Füße. Auch hier gibt es mehr chronische und mehr akute Formen, auch ist die Grenze gegenüber der Raynaud-schen Krankheit nicht scharf.

Erythro-
melalgie

Unter den Ursachen der bisher genannten vasomotorischen Neurosen sei das berufliche Arbeiten im kalten Wasser genannt, es kommen aber auch andere, zum Teil vielleicht toxische Ursachen in Frage. Meist ist eine bestimmte Ursache nicht zu ermitteln.

Ätiologie

Zu den vasomotorisch-trophischen Neurosen rechnet man noch das neurotische Ödem. Es handelt sich dabei um meist flüchtige, wenn auch manchmal sehr starke zirkumskripte Schwellungen, die an jeder Stelle des Körpers auftreten können und nach kurzem Bestehen wieder verschwinden. Selten gibt es länger dauernde Schwellungen. Bei manchen Kranken wechselt der Ort der Schwellung, andere haben ihre typischen Stellen. Es handelt sich fast immer um nervöse Personen, bei denen das Leiden häufig rezidiert. Manche reagieren auf psychische Erregung mit Ödembildung. Eine besondere ursächliche Beziehung wird der Menstruation und dem Klimakterium zugeschrieben. Das Leiden steht der Urtikaria zweifellos nahe, und man wird bei beiden auch immer auf eine toxische Ursache fahnden müssen. Bei den auf ganze Extremitäten ausgedehnten Formen wird man immer auch dann an Gefäß-erkrankungen denken, wenn wir sie nicht mit Sicherheit diagnostizieren können. Ich erinnere mich, daß, als Babinski in seinen Consultations externes ein solcher Fall von „nervösem Ödem“ eines Beines gezeigt wurde, er sagte, er sehe keine Notwendigkeit ein, jedes in seiner Ursache unklare Leiden immer als nervös zu bezeichnen.

Neuroti-
sches
Ödem

Ein sehr seltenes schweres Leiden unbekannter Ursache ist die Sklerodermie, die man in ein ödematöses, ein induratives und ein atrophisches Stadium einzuteilen gewohnt ist. Daneben finden sich immer auch Pigmentanomalien. Die Haut ist an den betroffenen Stellen fixiert. Je nach der Lokalisation unterscheidet man eine symmetrische, eine diffuse und eine Form in multiplen Herden. Der Verlauf ist nicht aufzuhalten.

Sklero-
dermie

Eine rein trophische Neurose stellt die besonders in leichteren Fällen nicht ganz seltene progressive Gesichtsatrophie dar. Sie besteht in einer im jugendlichen Alter beginnenden fortschreitenden Atrophie der Haut, der Weichteile und der Knochen des Gesichts, die gar nicht zu verkennen ist. Die Atrophie ist häufig nicht gleichmäßig verteilt, sondern es kommt zu fleck- und streifenförmigen Veränderungen der Haut oder zu groben Vertiefungen des Knochens. Die Therapie ist machtlos.

Progres-
sive Ge-
sichts-
atrophie

Endlich ist noch auf eigentümliche atrophische Zustände nach Traumen aufmerksam zu machen. Ohne daß eine grobe Ver-letzung nachweisbar sein müßte, sieht man eine Atrophie des vom

Trauma-
tische
Atrophien

Trauma betroffenen Gliedes sich ausbilden. Auch die Röntgenuntersuchung erweist dann atrophische Veränderungen des Knochens. Es handelt sich nicht etwa um eine traumatische Poliomyelitis, sondern um Veränderungen besonderer Art von anscheinend nicht guter Prognose.

36. Intoxikationen.

a) Endogene Intoxikationen.

Urämie

Von den endogenen Intoxikationen ist die wichtigste die Urämie. In geringerer Intensität führt sie zu neurasthenieartigen Störungen, Schlaflosigkeit, sehr heftigen Kopfschmerzen, zeitweisem Erbrechen, mittlere Grade zeigen nicht selten epileptiforme Anfälle. Diese Erscheinungen steigern sich bekanntlich bis zum urämischem Koma. Die Ophthalmoskopie zeigt bei der Urämie nicht selten Neuritis optica. Der Zerebrospinaldruck kann leicht erhöht sein.

Sehr häufig kommen gerade bei der Urämie neben verhältnismäßig geringen Allgemeinsymptomen Herdsymptome vor, und zwar ohne daß man bei der etwaigen Autopsie grobe Herde findet. Zu den urämischen gehört die Hauptzahl der sogenannten „Hemiplegien ohne Befund“. Es muß sich hier wohl um lokal besonders ausgesprochene Einwirkung des Urämiegiftes auf das Gehirn handeln. Es kann außer zu Hemiplegie zu Aphasie, besonders häufig auch zu Amaurose etc. kommen. In letzter Zeit ist besonders auf das Vorkommen des Babinskischen Reflexes bei Urämie, und sogar in frühen Stadien derselben hingewiesen worden. Über sein Vorkommen im Koma S. 13.

Die Diagnose der urämischen Intoxikation muß durch den Urinbefund und durch die Anamnese festgestellt werden.

Die Therapie der nervösen Symptome ist keine andere, als die der Urämie überhaupt, d. h. Aderlaß, Durchspülung des Körpers, Anregung der Diurese etc. Die nervösen Symptome, auch die lokalen, können danach vollständig wieder weichen, in anderen Fällen erweisen sich z. B. urämische Hemiplegien trotz Rückgangs der Allgemeinsymptome als dauerhafte Ausfallserscheinungen.

Von der Lumbalpunktion ist in den Fällen mit erhöhtem Druck manchmal einiger Erfolg gesehen worden. Auch ich habe davon einmal einen eklatanten Erfolg bei einem urämischem Kinde gesehen. Man möge sie also versuchen.

Kachexie

Zu den den urämischen ähnlichen Herderscheinungen, und zwar auch ohne groben Befund, kann es bei Kachexien aller Art, besonders bei Karzinomkranken kommen.

Eclampsia gravidarum

Für die Eclampsia gravidarum macht man heute nicht mehr ein urämisches, sondern ein pathologisches Plazentargift verantwortlich.

Die Nierenschädigung betrachtet man als sekundär. Nach dem Prodromalstadium kommt es zu den typischen epileptiformen Anfällen, die eine außerordentliche Heftigkeit und Häufigkeit erreichen können. Indessen ist die Prognose nicht allein von diesen Anfällen abhängig, sondern das Koma tritt manchmal ziemlich unvermutet schon

nach wenigen Anfällen ein, und selbst Eklampsien ohne Anfälle sind gesehen worden. Die Therapie ist eine geburtshilfliche. Große Dosen Brom und Chloral sind nach Analogie der Behandlung schwerer epileptischer Zustände angebracht.

Der Diabetes mellitus führt ja in der Mehrzahl der Fälle zu nervösen Beschwerden aller Art. Sind es doch diese unbestimmten Klagen über meist neurasthenische Beschwerden, welche die Aufmerksamkeit des Arztes oft erst auf die Möglichkeit eines Diabetes lenken. Diabetes

Auch lokalisierte Nervenstörungen in großer Anzahl, ferner epileptiforme Anfälle sind bei Diabetes beschrieben worden; am wichtigsten sind die neuritischen und polyneuritischen Erscheinungen, die sich oft nur in dem zufälligen Befund eines Fehlens der Achilles- oder Patellarreflexe, seltener in ausgesprochener Neuritis oder Polyneuritis kundgeben. Wenn keine anderen Symptome als Reflexstörungen vorliegen, darf man daher die Diagnose Tabes nie stellen, ohne vorher den Urin auf Zucker untersucht zu haben.

Ein Teil der Nervensymptome der Diabetiker kommt auf Rechnung der den Diabetes so häufig begleitenden Arteriosklerose. Das gilt vor allem für die Apoplexien der Diabetiker.

Die Therapie der diabetischen Nervensymptome ist neben der symptomatischen die des Diabetes. Sie ist nicht nur bei den leichteren Allgemeinstörungen, sondern auch gegen die neuritischen Beschwerden oft von bestem Erfolge.

Über das Coma diabeticum, das eine Säurevergiftung der Nervensystems darstellt, brauche ich an dieser Stelle nichts zu sagen.

b) Akute exogene Vergiftungen.

Die akuten exogenen Vergiftungen haben mit wenigen Ausnahmen in ihren nervösen Symptomen sehr wenig Charakteristisches. Es kommt hier ja wesentlich darauf an, nach den allgemein gebräuchlichen Maßnahmen — Magenaussheberung, Exzitierung —, durch anamnestiche Feststellung oder auch durch chemische Untersuchung das Gift zu ermitteln, um etwaige spezifische Antidote geben zu können.

Zu den Ausnahmen gehören die Krampfgifte nach dem Typus des Strychnin, deren Wirkungen in den bei erhaltenem Bewußtsein sich abspielenden, dem Tetanus sehr ähnlichen Krämpfen, leicht zu erkennen sind. Ganz leichte und ungefährliche Grade dieser Vergiftung sieht man manchmal schon bei therapeutischen Dosen. Strychnin-
krämpfe

Dagegen gibt es außerordentlich viel Gifte, die regelmäßig oder gelegentlich epileptiforme mit Benommenheit aller Grade einhergehende Krämpfe machen, so Santonin, Kokain, Atropin, Koffein, Kampfer (Monobromkampfer), Absinth, Äthylalkohol, Methylalkohol, Benzin, Jodoform, das Botulismusgift etc. In einer Anzahl von Fällen treten solche Krämpfe als Ausdruck einer Überempfindlichkeit schon bei recht kleinen Dosen auf. Es braucht sich bei dieser Überempfindlichkeit nicht um die Auslösung einer latenten Epilepsie Epilepti-
forme
Krämpfe

zu handeln. Unverhältnismäßig empfindlich gegen Krampfgifte sind ferner Kinder.

Pupillen-
symptome

Verengung der Pupille — Miosis — weist unter den gebräuchlichen Giften am ehesten auf Morphin (vgl. auch S. 7) hin, daneben auch auf Pilokarpin und Nikotin.

Erweiterung der Pupille mit ungenügender oder fehlender Pupillenreaktion kommt bei außerordentlich vielen Giften gelegentlich vor. Typisch ist die Erweiterung für die Gifte vom Typus des Atropins (Tollkirschengenuß), Skopolamin etc. Atropin macht daneben außerordentliche heftige Unruhe und Erregung. Es ist an dieser Stelle aber nicht angängig, alle Symptome der einzelnen Vergiftungen zu beschreiben. Die Pupillenerweiterung ist weiter sehr charakteristisch für viele Fälle von Botulismus und auch für den neuerdings bekannt gewordenen Methylalkohol. Bei Botulismus werden häufig auch die äußeren Augenmuskeln gelähmt, bei Methylalkohol kommt es oft zu Neuritis optica und zur Erblindung.

Schlaf-
mittel

Das Bild der reinen Narkose ergeben die Vergiftungen mit Schlafmitteln etc.

CO-Ver-
giftung

Die Kohlenoxydvergiftung (Leuchtgas) ist bemerkenswert durch die ihr nicht selten folgenden nervösen Nachkrankheiten. Es sind ausgedehnte Erweichungen des Gehirns beobachtet (übrigens auch bei Phosphorvergiftung) mit entsprechenden zirkumskripten oder diffusen Herderscheinungen, die zum Teil in Demenz oder sogar letal endigen.

Eine große Anzahl von anderen Giften — Benzol, Benzin, Petrol, Pyridin — kommen noch bei gewerblichen, akuten und subakuten, manchmal auch chronischen Vergiftungen in Frage. Ihre nervösen Symptome, die im wesentlichen in den gewöhnlichen diffusen zerebralen Erscheinungen bestehen — Schwindel, Benommenheit, Erbrechen, gelegentlich fast bei allen auch Konvulsionen — sind aber nicht so charakteristisch, daß ohne Kenntnis der speziellen Arbeit des Erkrankten, wie sie oft nur der Fabrikarzt besitzt, im Einzelfall ein Urteil gefällt werden könnte. In der allgemeinen Praxis und selbst im Krankenhaus entgehen solche Fälle ganz unvermeidlich nicht selten der ätiologischen Bestimmung.

c) Chronische exogene Vergiftungen.

Von noch allgemeinerer Wichtigkeit sind die exogenen chronischen Vergiftungen durch Genußmittel, gewerbliche Gifte oder Medikamente. Wir können auch dieses Gebiet hier nur ganz oberflächlich streifen und müssen besonders für die beiden letztgenannten Gegenstände im wesentlichen auf die Lehrbücher der Toxikologie und der Gewerkrankheiten verweisen¹⁾.

Alkohol-
lismus

Von den Genußmitteln steht natürlich in erster Reihe der Alkohol. Die Einzelercheinungen des chronischen Alkoholismus, soweit sie in

¹⁾ Eine kurze und verhältnismäßig sehr vollständige Zusammenstellung der „Beziehungen der technischen und gewerblichen Gifte zum Nervensystem“ hat vor kurzem H. Zangger gegeben (Ergebn. d. inneren Medizin u. Kinderheilk. 5, 1910).

das Gebiet der Neurologie fallen, sind bereits an früherer Stelle dieses Buches erwähnt, der Tremor, die Polyneuritis alcoholica, mit der polyneuritischen Psychose, die Polioencephalitis haemorrhagica, die Pachymeningitis haemorrhagica, die Alkohol-epilepsie. Dazu kämen dann noch die Alkoholamblyopie und als rein psychotische Erscheinungen das Delirium tremens, die Alkoholhalluzinose, der Eifersuchtswahn der Trinker und der alkoholistische Schwachsinn. Die Behandlung der schweren psychotischen Störungen fällt den Irrenanstalten zu, die Entziehung des Alkohols neben diesen den Trinkerheilstätten; die ambulante Behandlung der Trinker hat sehr wenig Zweck. In Rußland will man zwar mit der ambulanten hypnotischen Behandlung einiges erreicht haben.

Dagegen sei der Praktiker auf eine neue sozial-medizinische Erregenschaft dringend aufmerksam gemacht: die Fürsorge des Alkoholkranken und seiner Angehörigen, wie sie in den zahlreichen neugegründeten Fürsorgestellen für Alkoholkranke gehandhabt wird.

Trinker-
fürsorge

Diese Stellen, die eigentlich von einem Nervenarzte geleitet werden müßten (was heute nicht durchgängig eingeführt ist), dem als Hilfskräfte Fürsorgeschwestern zur Verfügung stehen, dienen kurz folgendem Zwecke: Wenn der Stelle ein Alkoholkranker gemeldet wird, so wird dieser schriftlich oder persönlich durch die Fürsorgeschwester aufgefordert, sich zu der Sprechstunde einzufinden. Hier wird er vom Arzte untersucht, der zunächst einmal die Aufgabe hat, den Alkoholiker von anderen Geisteskranken, deren eigentliche Seelenstörung durch Alkoholismus larviert ist, zu scheiden. Der chronische Alkoholiker wird auf die Gefahren des Alkoholmißbrauchs hingewiesen und veranlaßt, sich einer Abstinenzvereinigung anzuschließen. Es kommen hier je nach der individuellen Anlage des Patienten in Betracht: der Guttemplerorden in erster Linie, ferner das evangelische Blaue Kreuz und das katholische Kreuzbündnis; die beiden letzteren haben ausgeprägt religiöse Tendenzen. Mit sämtlichen steht die Fürsorgestelle in dauerndem Konnex.

Der Trinker, der bei seiner Aufnahme das Enthaltensamkeitsgelübde ablegen muß, wird ständig von den Logenmitgliedern kontrolliert und nimmt an den geselligen Veranstaltungen in den Logen teil. Manchmal genügt allein schon diese Maßnahme zur Heilung. In anderen Fällen muß ein mehrmonatlicher Aufenthalt in einer Trinkerheilstätte durchgeführt werden. Die Mehrzahl von solchen Heilstätten stehen wiederum mit Abstinenzvereinen in Verbindung und sorgen dafür, daß schon vor der Entlassung die Kranken sich einer Loge anschließen; an einigen Stellen wird hierzu die Vermittelung der Fürsorgestelle in Anspruch genommen.

Bei Kranken, die mehrfach rückfällig geworden sind, kommt die Entmündigung¹⁾ in Frage, ferner die Überweisung an Invalidenheime, Arbeiterkolonien und Irrenanstalten.

¹⁾ § 6, 3 des BGB. „Entmündigt kann werden, wer infolge von Trunksucht seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag oder sich und seine Familie der Gefahr des Notstandes aussetzt oder die Sicherheit anderer gefährdet.“

Ein besonderes wichtiges Feld der Tätigkeit hat die Fürsorgeschwester, die einerseits durch häufige Familienbesuche die hygienischen und sozialen Verhältnisse der Trinkerfamilien prüft und im Bedarfsfalle durch ihre Beziehungen zum großen Apparate der Wohltätigkeitsbestrebungen helfend und vermittelnd eingreift, andererseits die Frauen der Trinker in ihren Angelegenheiten beraten und ihnen den Weg zu den zuständigen Behörden weisen kann.

Vorbeugend und unterstützend wirkt die sehr bewährte Maßnahme, die Frauen zu zwingen, sich zugleich mit ihren Ehegatten in die Logen aufnehmen zu lassen und die Kinder den Jugendlogen zuzuführen.

Dipso-
manie

Mit dem chronischen Alkoholismus ist die Dipsomanie (Quartalsäufertum) nicht zu verwechseln, ein in Intervallen sich einstellendes, impulsives und unüberwindliches Verlangen nach Alkoholgenuß, nach dessen in totaler Narkose endenden Befriedigung der Kranke für längere Zeit wieder ein nüchterner Mensch ist. Es gibt Menschen, die, wenn sie dieses Verlangen, das man sogar epileptoiden Zuständen analogisiert hat, überfällt, jede Arbeit stehen und liegen lassen und unter Umständen weite Strecken laufen, um nur irgendwo Alkohol zu bekommen.

Morphi-
nismus

Hier ist die Erwähnung des Morphinismus und des Kokainismus einzuschieben. Entziehungskuren haben auch hier nur in einer Anstalt Erfolg.

Nikotin

Gegenüber dem Alkohol spielt der gewohnheitsmäßige Genuß von Nikotin als Ursache nervöser Erkrankungen nur eine verschwindende Rolle. Seine Bedeutung für das intermittierende Hinken wurde bereits erwähnt (S. 227). In seltenen Fällen sollen auch vorübergehende zerebrale Herdsymptome, wie z. B. Aphasien, auch Migräneanfälle bei starken Rauchern beobachtet werden. Nicht so selten sind neurasthenieähnliche Bilder. Die Erscheinungen von seiten des Herzens und der Gefäße bei Gewohnheitsrauchern können indirekt das Entstehen von Nervenkrankheiten fördern. Die Tabakamblyopie bietet ein der Alkoholamblyopie entsprechendes Bild. Die Therapie aller Beschwerden ist die Entziehung des Nikotins, die einer energischen Vorschrift wohl meist unschwer gelingt usw.

Bei Tabakarbeitern kommen zuweilen die schweren Formen der akuten oder subakuten Nikotinvergiftung zur Entstehung.

Kaffee

Die chronische Kaffeevergiftung äußert sich wiederum in allgemeinen neurasthenischen Beschwerden, Schlaflosigkeit, Herzklopfen etc. In geringen Graden sehen wir die Schädlichkeit des Kaffeegenusses bei vielen Gesunden und speziell bei Nervösen in schlaflosen Nächten und Herzbeschwerden. Auch die Schädlichkeit des Kaffeegenusses bei vielen nervösen Darmaffektionen (wie auch beim chronischen Dünndarmkatarrh) steht außer Zweifel. Der Kaffee muß mit wenigen Ausnahmen in der Tat bei Nervösen verboten werden. Wenn der koffeinfreie Kaffee auch immer noch etwas Koffein enthält, so fehlt ihm doch meist die exzitierende Wirkung. Man kann ihn daher meist erlauben; aber eben wegen des Fehlens der gesuchten Wirkung verschmähen ihn viele Patienten.

Ergotis-
mus

Der in Mitteleuropa ausgestorbene Ergotismus beruht auf einer Vergiftung mit dem *Secale cornutum*, dem Dauermyzel der gelegentlich auf allen Getreidearten parasitisch lebenden *Claviceps purpurea*. Die nervösen Erkrankungen sind außerordentlich schwere, zum Teil dauernde. Nur der vierte Teil

der Erkrankten wird wieder ganz gesund. Die Symptome gehen zum Teil vom Großhirn, zum Teil vom Rückenmark aus. Regelmäßig sind typische epileptische Anfälle beobachtet. Vom Rückenmark aus kommt es zu tabischen Symptomen sehr ähnlichen Erscheinungen, denen auch wie bei der Tabes eine — nur viel schneller — einsetzende Degeneration der Hinterstränge zugrunde liegt.

Die Pellagra kommt nur in den Ländern vor, in welchen viel Mais gegessen wird, dort (Italien) zeitweise als Volkskrankheit. Das giftige Prinzip ist noch nicht bekannt. Ihr Verlauf ist ein sich meist über viele Jahre hinstreckender, schubweiser. Neben der körperlichen Allgemeinerkrankung bis zur Kachexie machen sich wesentlich schwere allgemeine psychotische Symptome geltend, die bis zu einer der progressiven Paralyse nicht unähnlichen Demenz fortschreiten können. Pellagra

Von den chronischen gewerblichen Vergiftungen steht die mit Blei an der Spitze. Wenn man Verdacht auf eine Bleivergiftung hat, so genügt es heute nicht mehr, zu fragen, ob der betreffende Maler ist. Die Verwendung des Bleies ist in den modernen Industrien in starker Zunahme begriffen, und ein großer Teil der mit Blei beschäftigten weiß gar nicht, daß er damit arbeitet. Ich nenne dafür nur manche Posamentenarbeiten, Filze, Beizen, Lacke, Glasuren, Gummiwaren. Offenkundiger ist das Blei bei Akkumulatoren, Kabeln, Flaschenverschlüssen, im ganzen sollen mehr als 150 Industrien damit arbeiten. Einen Hinweis auf Blei kann die basophile Granulation der roten Blutkörperchen geben, die hier noch vor der manifesten Anämie auftreten kann. Blei

Die typische Form der Bleiwirkung auf das periphere Nervensystem ist die Bleineuritis (vgl. S. 84), die sich meist in symmetrischen Lähmungen äußert, und zwar in der großen Mehrzahl der Fälle in Radialislähmungen; aber es können auch andere Nervengebiete betroffen sein, und bei Kindern soll sich speziell am häufigsten eine doppelseitige Poneuritis finden. Vom zentralen Nervensystem gehen eine große Reihe von gelegentlich beobachteten Herdsymptomen, sehr heftige Kopfschmerzen, psychotische Zustände, für die früher der Name Enzephalopathia saturnina gebraucht wurde, und auch ein häufig beobachteter Tremor aus. Es wird neuerdings behauptet, daß bei chronischer Bleiintoxikation sehr häufig Lymphozytose der Lumbalflüssigkeit vorkomme, was im entsprechenden Falle zu beachten sein wird.

Polyneuritiden sind weiter der häufigste Ausdruck der chronischen Arsenvergiftung am Nervensystem. Daneben ist für Arsen noch eine auffällige Pigmentation der Haut charakteristisch. Auch das Arsen kommt in vielerlei Materialien vor, ohne daß die Arbeiter davon etwas wissen. Am bekanntesten ist seine Anwesenheit im Glasfluß und in grünen Farben. Auch nach medikamentöser Anwendung kommen gelegentlich nicht ganz leichte Vergiftungen vor. Arsen

Atoxyl macht nicht selten Optikusatrophie.

Wie bei Blei- und Arsen können Polyneuritiden auch Folge einer großen Anzahl anderer gewerblicher Gifte sein. Zu nennen sind Kupfer, Antimon, Schwefelkohlenstoff (in den Kautschukfabriken), so daß bei jeder Polyneuritis, deren Ursache sonst nicht ersichtlich ist, auf das Genaueste nach solchen gewerblichen Schädigungen zu suchen ist. Andere Polyneuritisgifte

Das Quecksilber, das ebenso im medizinischen wie technischen Gebrauch zu Vergiftungen Anlaß gibt, bringt neben den bekannten Hg

Erscheinungen an den Schleimhäuten, der Niere etc. ein ziemlich charakteristisches feinschlägiges Zittern hervor.

Mangan

Manganvergiftungen, die ein sehr schweres und prognostisch in schweren Fällen ungünstiges Bild einer zentralen Erkrankung des Nervensystems geben, kommen nur bei Braunsteinmüllern vor.

Über Jodismus und Bromismus vgl. S. 221 u. S. 207.

37. Unfall.

Eine ausführliche zusammenhängende Darstellung der Beziehungen zwischen Unfall und Nervenkrankheiten können wir hier nicht geben. Die Folgen der einfachen und der infizierten Verletzungen des Nervensystems haben wir an anderen Stellen besprochen (S. 90, 97, 102, 133, 155, 196), und sie sind natürlich die gleichen, wenn die Verletzungen als Unfälle¹⁾ auftreten. Der Begriff des Unfalls erschöpft sich andererseits nicht in der mechanischen Verletzung; es können Erkältungen, Vergiftungen, elektrische Schädigungen, psychische Traumata (Schreck), und auch die Arbeitsleistung als solche unter bestimmten Voraussetzungen die Rolle des Unfalls übernehmen²⁾. Eine ausführliche Darstellung wird im nächsten Kapitel die traumatische Neurose finden. Wir haben es ferner schon vielfach bemerkt, wo die Möglichkeit besteht, daß organische Nervenkrankheiten auf traumatischem Boden entstehen, so bei der spinalen Muskelatrophie, der amyotrophischen Lateralsklerose, der multiplen Sklerose, der Apoplexie, dem Gehirntumor, der Epilepsie, gewissen vasomotorisch-trophischen Störungen etc. Es gibt fast keine Nervenkrankheit, für die nicht auch gelegentlich einmal ein Trauma verantwortlich gemacht worden wäre. Ich erwähne noch die Syringomyelie, die Paralysis agitans. Im Sinne einer wissenschaftlich zu begründenden Ätiologie ist ein großer Teil dieser Angaben nicht zu verwerten, und ich glaube, daß in diesem wissenschaftlichen Sinne die traumatische Ätiologie organischer chronischer Nervenkrankheiten immer mehr zurückgedrängt werden wird. So ist die Frage nach einer traumatischen Tabes und einer traumatischen Paralyse mit der Aufdeckung der ausnahmslos syphilitischen Ätiologie heute als erledigt zu betrachten.

Worauf ich hier allein aufmerksam zu machen habe, ist dies, daß die Beantwortung der Frage, ob die traumatische Ätiologie eines bestimmten einzelnen Falles im streng wissenschaftlichen Sinne gesichert ist, nicht zusammenfällt mit der anderen Frage, ob im Sinne des Gesetzes ein Unfallschaden vorliegt. Auch die Frage, die an den Gutachter gemeinhin gerichtet wird, verlangt meist keine ganz entschiedene Beantwortung, sondern lautet gewöhnlich „ob es wahrscheinlich ist, daß ein Zusammenhang besteht“ oder auch nur „ob durch den Betriebsunfall das Leiden des N. derart verschlimmert ist, daß für den

¹⁾ Über den Begriff des Unfalls und die in Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen vgl. Thiem, Handbuch der Unfallkrankheiten 2. Aufl. 1910 in Deutsche Chirurgie. Verlag von Enke, Stuttgart.

²⁾ Vgl. auch darüber Thiem.

ungünstigen Verlauf des Leidens der Unfall als wesentlich mitwirkende Ursache erachtet werden muß“. Die zweite Fragestellung kommt speziell bei Krankheiten, wie der Tabes, der Paralyse, der Arteriosklerose in Betracht, die moderner Anschauung nach durch den Unfall nie verursacht, wohl aber in Erscheinung gerufen werden können. Jedenfalls soll niemals prinzipielle, sondern nur praktische Arbeit geleistet werden; der einzelne Fall ist anamnestisch und klinisch auf das genaueste zu untersuchen, und dann auf Grund der vorhandenen Möglichkeiten und auf Grund der geltenden Rechtsprechung¹⁾ zu beurteilen. Es gehört dazu eine besonders genaue Kenntnis nicht nur der Neurologie im allgemeinen, sondern auch der Kasuistik, um etwa beurteilen zu können, eine wie große Latenz zwischen Unfall und ersten Symptomen einer Krankheit noch zulässig ist u. dgl. Gerade die Frage der traumatischen Entstehung chronischer organischer Nervenkrankheiten führt verhältnismäßig sehr häufig zu langen Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Gegengutachten, Obergutachten. Ein jeder, der einen Verletzten zu behandeln hat, sollte es sich daher zur Regel machen, nicht nur den Befund, sondern auch die genaue Anamnese des Unfalls sofort schriftlich zu fixieren, in einem Augenblick also, wo noch niemand daran denkt, die Folgen des Unfalls bzw. die Gesundheit des Kranken vor dem Unfall zu übertreiben. Bei der Entscheidung und als Grundlage des Gutachtens kommt es bei Unfallserkrankungen beinahe mehr auf die Anamnese als auf den Befund an. Bei Attesten für angeblich Unfallkranke, die man nicht genau kennt und nicht selbst beobachtet hat, muß man daher besonders vorsichtig sein, wenn nicht die Akten oder Zeugnisse oder Berichte anderer Ärzte vorliegen. Die anamnestischen Angaben des Unfallkranken selbst sind nur bedingungsweise zu verwenden: „Wenn die Angaben des X. richtig sind, so“ Über die besonderen Schwierigkeiten der Gutachten und Atteste bei traumatischer Neurose vgl. das nächste Kapitel.

38. Psychoneurosen.

Der Begriff Psychoneurose (vgl. S. 1) ist kein ganz feststehender. Wir verstehen darunter in diesem Kapitel hauptsächlich die neurasthenischen und die hysterischen Symptome. Altem Brauche gemäß werden auch die Zwangsvorstellungen, die in engen Beziehungen zur Neurasthenie stehen, hier abgehandelt, und es müssen endlich einige Worte über die nervösen Organstörungen eingefügt werden.

Begriff

Von vornherein sei gesagt, daß die neurasthenischen, die hysterischen, die Zwangssymptome, wie die nervösen Organstörungen nur in den seltensten Fällen praktische Krankheitseinheiten sind. Ein bekannter Psychiater konnte aussprechen, daß er noch niemals eine reine Neurasthenie gesehen habe, und man kann diesen Satz analog auf die

¹⁾ Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts. Speziell Sammlung ärztlicher Obergutachten. Berlin, Behrend & Co.

Symptomatologische Einheiten
 anderen Formen anwenden. Immerhin kann man sich nur durch die Aufstellung solcher symptomatologischer Einheiten in dem ganzen Gebiet orientieren, muß in der Praxis aber eingedenk bleiben, daß sich alle die hier zu schildernden Symptome in unendlich mannigfacher Weise miteinander kombinieren können.

a) Neurasthenie.

Wie es der Name ausdrückt, ist das wesentliche Symptom der Neurasthenie die Schwäche, zwar nicht der Nerven, sondern psychischer Funktionen. Man würde daher richtiger Psychasthenie sagen, wenn dieser Name nicht von einigen für andere Gruppen der Nervosität gebraucht, von anderen für die ganze Gruppe der Psychoneurosen, die Neurasthenie eingeschlossen, verwendet würde.

Ermüdbarkeit

Das Hauptsymptom ist leichte Ermüdbarkeit. Der Kranke kann nicht mehr so viel leisten wie früher, er braucht mehr Zeit für die gleiche Arbeit. Das geht oft so weit, daß der Kranke überhaupt keine ernsthafte Arbeit mehr leisten, ja selbst nicht mehr wenige Seiten in einem Buche lesen kann. Der Neurasthenische klagt über den Mangel an Energie, an Konzentrationsvermögen. Er vermag seine Aufmerksamkeit nicht anzuspannen. Meistens klagt er auch über Abnahme des Gedächtnisses, die sich freilich objektiv gewöhnlich nicht verifizieren läßt. Wenn wir den Patienten etwa Zahlen wiederholen lassen (vgl. S. 176), so finden wir nur ganz geringe Abweichungen von der Norm. Trotzdem ist es schon richtig, daß er häufig einzelnes vergißt und sich Dinge notieren muß, die ihm früher „von selbst“ wieder eingefallen wären.

Unlustgefühle

Kopfschmerz

Der Versuch sich anzustrengen oder überhaupt geistige Arbeit zu leisten, hat fast regelmäßig gewisse Unlustgefühle zur Folge. Es besteht das Gefühl von Eingenommensein im Kopfe, von Schwindligwerden, von Kopfdruck bis zum ausgesprochenen Kopfschmerz. Der Ermüdungskopfschmerz fehlt beim Neurastheniker fast nie.

Neben diesen allgemeinen Unlustgefühlen bestehen noch spezielle.

Beim Versuche zu lesen verschwinden die Buchstaben vor den Augen, beim Hören von Musik haben die Kranken bald nur das Gefühl eines Tonwirrwarrs.

Schwere Fälle

Diese Unlustgefühle, der Druck im Kopf, der Kopfschmerz etc. sind in schweren Fällen aber nicht mehr allein durch den Versuch zur Arbeitsleistung auszulösen, sondern sie bestehen dauernd. Allenfalls fühlen sich die Kranken bei völliger geistiger und körperlicher Ruhe noch leidlich, aber schon einige wenige Schritte im Zimmer, oder einige wirtschaftliche Anordnungen, die zu geben sind, führen sofort zu langdauernden heftigen Beschwerden. Jedes Geräusch, ja selbst helles Licht, ist dem Schwerneurasthenischen zu viel. Vielen Neurasthenischen erscheint ein Ausgang von wenigen Schritten eine schwierige Aufgabe, sie bleiben ganze Monate im Zimmer, weil sie fürchten, diese Anstrengung mit langdauernden Beschwerden büßen zu müssen. Sie klagen über Schwäche in den Beinen. Sehr oft besteht ein unregelmäßiger Tremor.

Sehr häufig empfinden Neurastheniker beim Gehen unbestimmten Schwindel oder glauben ohnmächtig zu werden.

Fast immer bestehen dann nicht nur Unlustgefühle, sondern auch Oppressionsgefühl und mehr weniger schwere Angstempfindungen. Oppressions- und Angstgefühl

Die leichte Ermüdbarkeit des Neurasthenikers hat ihre natürliche Ergänzung in seiner Reizbarkeit. Sie äußert sich in großer Ungeduld, in unwirschem Benehmen, in ungewohnter Heftigkeit, in Wutausbrüchen. Trotz der Heftigkeit haben die Ausbrüche der Neurastheniker etwas Schwächliches, im Gegensatz zu denen der Epileptiker. Häufig schlagen sie bald in eine weinerliche Stimmung um, in der der Kranke seine Reizbarkeit bereit und bedauert. Aber nicht alle Neurastheniker sind reizbar. Manche sind ganz resigniert und legen Wert darauf, ihren Zustand mit großer Geduld zu ertragen. Reizbarkeit

Eine fast — aber auch nicht ganz — regelmäßige Begleiterscheinung der Neurasthenie sind die Störungen des Schlafes. Am häufigsten liegt die Schwierigkeit im Einschlafen; andere schlafen leicht ein, wachen aber nach wenigen Stunden wieder auf und können nun nicht wieder einschlafen. Andere schlafen unruhig, sehr leise, und werden von Träumen gequält. Schlaflosigkeit

Der Eindruck der Beschwerden des Neurasthenikers wird in ganz wesentlicher Weise bestimmt durch die subjektive Stellung des Kranken zu ihnen. Der Kranke erwartet und fürchtet seine Beschwerden. Er legt sich zu Bett mit dem Gedanken nicht schlafen zu können, er geht aus mit dem Gedanken, durch die Anstrengung Kopfschmerzen zu bekommen, er will in kein Konzert, in keine Gesellschaft gehen, weil er angeblich „weiß“, daß er dort von Kopfschmerzen, Angst und Schwindel befallen werden wird. Stellung des Kranken zu seinen Beschwerden

Oft führen diese Gedanken an die Krankheit zu hypochondrischen Befürchtungen über die Natur und den Verlauf des Leidens¹⁾. Es gibt fast keinen gebildeten Neurastheniker, vor dessen Blicken nicht das Gespenst der Rückenmarksschwindsucht, der Gehirnerweichung, der Gefäßverkalkung — um nur die gewöhnlichsten zu nennen — erscheint, und ihn manchmal eiligst in die Sprechstunde des nächsten Arztes treibt. Hypochondrische Befürchtungen

Die Angst vor Krankheiten kann in die weiter unten zu schildernden Zwangsvorstellungen übergehen. Diese Form zeigt manchmal die Syphilidophobie. Solche Kranken können ganz genau wissen, daß sie keine Syphilis haben und haben können, trotzdem haben sie die zwangsmäßige Befürchtung, doch welche zu haben. Ich behandelte eine 17jährige Gymnasiastin, virgo, die immer wieder die Zwangsvorstellung hatte, ihre kleinen Aknepusteln wären Syphilis. Syphilidophobie

Wenn man überhaupt dem neurasthenischen Symptomenkomplex unter den Psychoneurosen eine Sonderstellung einräumen will, so muß Die allgemeine Art der neurasthenischen Beschwerden

¹⁾ Eine „Hypochondrie“ als eigene Krankheit wird im allgemeinen heute nicht mehr anerkannt. Hypochondrische Beschwerden aber spielen nicht nur bei der Neurasthenie eine große Rolle, sondern in anderer und schwererer Form bei der Melancholie, in wahnhafter Umbildung bei der Paranoia und der Dementia praecox; auch der Dementia paralytica und der Arteriosklerose des Gehirns sind hypochondrische Beschwerden nicht fremd.

man das Diffuse und Allgemeine der Beschwerden betonen. Nicht irgend eine spezielle Funktion, sondern das Ganze der Psyche ist in der neurasthenischen Veränderung betroffen.

Beteili-
gung innerer
Organe
durch die
Neur-
asthenie

Es haben deswegen schon diejenigen Formen der Neurasthenie eine Sonderstellung, bei welchen sich die Klagen der Kranken hauptsächlich auf einzelne Organsysteme beziehen. Es sind das am häufigsten Blutgefäße und Herz, der Magendarmkanal und die Genitalien, aber gerade bei diesen Formen ist es wichtig, die Organstörungen als Ausdruck der allgemeinen Störung, gewissermaßen als eine Lokalisation des allgemeinen Unlustgefühls auf bestimmte Körperteile aufzufassen. Wir nennen die Störungen dieser Art „psychogene“. Sie können, insoweit sie psychogen sind, im übrigen genau so gut als Teilsymptome der Neurasthenie wie der Hysterie auftreten. Einen Unterschied zwischen neurasthenischen und hysterischen Organstörungen kann ich nicht anerkennen.

b) Nervöse Organstörungen.

Organ-
neurosen
Theore-
tisches

An dieser Stelle müssen wir uns nun jedoch die weitergehende Frage vorlegen, nicht nur, welche psychogenen, sondern welche nervösen Organstörungen es überhaupt gibt. Es handelt sich ja um Organe, die dem sympathischen System angehören, wie es früher definiert war (S. 57), also um glattemuskelige Eingeweide, Gefäße, Drüsen und das Herz. Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, daß auch diese Organe unter dem Einfluß des zerebrospinalen Nervensystems stehen, wenngleich sie alle in sich selbst eine viel größere Selbständigkeit tragen als die quergestreifte Körpermuskulatur. Man braucht für diese letzte Tatsache ja nur auf das Herz zu verweisen, das bekanntlich in hohem Maße, wenn auch nicht ganz, unabhängig vom zerebrospinalen Nervensystem ist. Insoweit die Organe also vom zerebrospinalen Nervensystem abhängen, werden sie auch zu einer pathologischen Funktion von ihm beeinflußt werden können, und dann müßten wir auch noch weiter wissen, von welchen Teilen des Zentralnervensystems die verschiedenen Wirkungen, also welche speziell vom Rückenmark bzw. dem Hirnstamm, welche vom Großhirn und von der Psyche aus ausgelöst werden können.

In der Tat sind unsere Kenntnisse über die Innervation dieser Organe noch nicht so vollständig, daß wir diese Bestimmung der möglichen physiologischen und pathologischen Wirkung des zerebrospinalen Nervensystems und seiner einzelnen Teile auf die Organe des sympathischen Systems in allen Fällen machen und die zentralen Erkrankungen seiner Organe von den peripheren mit Sicherheit unterscheiden könnten. So wissen wir in der Tat von den bereits in einem eigenen Kapitel (S. 228) behandelten „vasomotorischen Neurosen“ im eigentlichen Sinne noch nicht sicher, wo hier der Ort der Erkrankung ist, im Rückenmark oder in der Peripherie. Es kommt hinzu, daß auch bei den Erkrankungen, die sicher nicht psychischen Ursprungs sind, psychische Einflüsse doch eine erheblich verstärkende Wirkung erlangen können. Das

ganze Gebiet ist also außerordentlich schwierig und zum Teil ganz unsicher und hypothetisch, und — was gerade für die Betrachtung der Organstörungen innerhalb der Psychoneurosen von größter Wichtigkeit ist — es ist in den einzelnen Fällen von Organneurosen durchaus nicht immer sicher, ob diese Neurosen psychogen sind oder nicht. Denn der Mechanismus der psychogenen Organstörungen ist in vielen Fällen noch recht undurchsichtig, und wir können uns in der folgenden kurzen Skizze auch durchaus nicht darauf einlassen, die bestehenden Möglichkeiten im Einzelnen darzulegen, werden uns vielmehr oft mit der Feststellung begnügen, daß diese oder jene Störung psychogen sein könne.

Gehen wir die einzelnen Organe durch und beginnen wir bei den Gefäßen, so gehören die bereits oben erwähnten „vasomotorischen Neurosen“ zweifellos nicht zu den psychogenen Erkrankungen (vgl. S. 228).

Gefäße

Zu erwähnen ist als Teilerscheinung psychoneurotischer Symptombilder die Dermographie, die vasodilatatorische Reaktion der Haut auf mechanische Reizung, oder Urticaria facticia. Es kann dabei sogar zur Quaddelbildung kommen. Es scheint nun, daß bei besonders erregbaren Hysterischen es schon unter der reinen Vorstellung, daß eine Stelle der Haut verletzt oder verbrannt wurde, d. h. ohne daß eine Berührung der Haut wirklich statthatte, zu einer Quaddelbildung kommen kann. Wenigstens liegen ziemlich einwandfreie mit allen Kautelen gegen eine absichtliche Täuschung (Bedeckung der Haut, dauernde Beobachtung) vorgenommene Beobachtungen nach dieser Richtung vor. Wenn das richtig ist, so wird die auch sonst überall in die Augen fallende Tatsache aufs beste beleuchtet, daß nämlich die psychische Erregbarkeit der sympathisch innervierten Gewebe individuell außerordentlich verschieden ist, und man darf aus dem Fehlen solcher erhöhten Erregbarkeit niemals den Schluß ziehen, daß keine Psychoneurose vorliege. So ist auch die einfache Dermographie zwar kein seltenes aber ein keineswegs notwendiges Symptom der Psychoneurosen. Andererseits gibt es unzweifelhafte spontane Urtikaria psychogenen Ursprungs (über die Beziehungen zum flüchtigen Ödem vgl. S. 231). Die psychogene Natur der Errötungsangst und des Errötens ist ohne weiteres klar. Auch plötzliches Erblassen des Gesichts oder der Extremitäten liegt noch im psychogenen Bereich.

Dermographie

Auch Schweißausbrüche können psychogenen Ursprungs sein. Sicherlich nicht psychogen sind hingegen Fälle von einseitiger Hyperhidrosis oder Fälle, bei denen z. B. beim Essen saurer Speisen sich jedesmal eine Schweißbildung des Gesichts einfindet. Diese Anomalien müssen auf abnormen Nervenverknüpfungen in der Peripherie oder im Zentralorgan beruhen. Sie mögen dann im weitesten Sinne auch als Degenerationszeichen aufgefaßt werden, aber sie sind nicht Ausdruck einer bestehenden Neurasthenie.

Schweißanomalien

Ein noch keineswegs geklärtes Gebiet ist das der nervösen Herzbeschwerden. Daß bei psychischen Erregungen, wie insbesondere bei Angst und Wut sich der Herzschlag verändern, beschleunigen, un-

Herz

regelmäßig werden oder auch aussetzen kann, weiß ein jeder. Das gleiche sehen wir beim Neurastheniker und Hysteriker. Pulsfrequenzen bei der Untersuchung von 100—120 sind gewöhnlich. Auch sehr starke Pulsbeschleunigung durch geringe körperliche Anstrengungen kann noch im Rahmen der Neurasthenie liegen. Die moderne Lehre von den Herzarhythmien kann an dieser Stelle unmöglich zur Besprechung kommen. Bemerkt sei nur, daß einzelne Arrhythmien, insbesondere Extrasystolen mit kompensatorischer Pause in vielen Fällen bei nervösen Personen, unter dem Einfluß von psychischer Erregung oder auch reflektorisch wirkenden Ursachen, z. B. Darmstörungen, vorkommen und in diesen Fällen eine ernstere Bedeutung nicht haben. Die Pseudoangina pectoris mag in einer Anzahl von Fällen psychogenen Ursprungs sein; es ist nur außerordentlich schwer und nach dem Urteil von Spezialisten für Herzkrankheiten sogar häufig unmöglich, zu sagen, was eine wahre und was eine falsche Angina pectoris ist. Häufig verhält sich die Sache wohl auch so, daß organische myokarditische Veränderungen bei Neurasthenikern zu ungewöhnlich schweren Symptomen führen, dadurch daß der Neurastheniker dem Herz dann seine unausgesetzte hypochondrische Aufmerksamkeit zuwendet und dadurch nicht nur die subjektiven, sondern auch die objektiven Erscheinungen verstärkt.

Subjektive Beschwerden

Die subjektiven Empfindungen der Herzstörung können beim Neurastheniker überhaupt sehr stark sein, und eine große Anzahl von Neurasthenischen und Hysterischen suchen wegen dieser subjektiven Beschwerden, Beklemmungen, Herzklopfen, Herzstiche, in mannigfacher Weise beschriebener Sensationen etc. den Arzt auf. Das subjektive Gefühl des Herzklopfens tritt häufig zu bestimmten Zeiten auf, z. B. wenn der Kranke eben zu Bett gegangen ist oder nachdem er aufgewacht ist, oft zugleich mit Schweißausbrüchen. Dabei ist dann eine mäßige Beschleunigung des Herzschlags gewöhnlich.

Eine durch besonders schwere Symptome ausgezeichnete, aber wohl doch nicht scharf abzugrenzende Form psychogener Herzneurose ist neuerdings unter dem Namen der Phrenokardie beschrieben worden. Ihr Entstehen wurde, wie auch das anderer nervöser Herzstörungen, auf sexuelle Schädlichkeiten bezogen. Es mag sein, daß solche sexuellen Schädlichkeiten (Coitus interruptus etc.) gerade die Entstehung nervöser Herzstörungen begünstigen, aber sicher sind sie nicht ausschließlich an ihnen schuld.

Paroxysmale Tachykardie

Dagegen ist die echte paroxysmale Tachykardie, bestehend in ohne jede Erregung ausgelösten Anfällen von starker Beschleunigung bis 200, eine Erkrankung, die auch tödlich verlaufen kann, wohl sicher nicht psychogenen, sondern intrakardialen Ursprungs. Das gleiche gilt von der Bradykardie des Adam-Stokesschen Symptomenkomplexes, dessen nervöse Komponenten-Bewußtseinsverluste und epileptiforme Anfälle — erst durch die Zirkulationsstörung hervorgerufen werden.

Auch die Tachykardie beim Basedow ist nicht eine psychische,

sondern beruht aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Intoxikation mit dem Basedowgift.

Selbstverständlich für alle die hier behandelten Störungen ist die Ausschließung erheblicher organischer Veränderungen des Herzens. Es scheint jedoch, als wenn eine angeborene oder erworbene Schwäche des Zirkulationssystems zur Entstehung nervöser Herzbeschwerden besonders prädisponiert.

Das nervöse Asthma bronchiale, das wohl sicher auf einem Krampf der Bronchialmuskulatur und einer Sekretion der Bronchialdrüsen beruht, steht zu den Psychoneurosen nur in indirekter Beziehung insofern, als besonders viele nervöse Personen daran leiden. Aber es ist nur in den allerseltensten Fällen eine rein psychoneurotische Manifestation, sondern eine nervöse Erkrankung für sich. Unzweifelhaft ist es in einer Anzahl von Fällen eine Reflexneurose, die besonders gern von der Nase aus unterhalten wird und durch nasale Behandlung der reflexogenen Stelle zu beseitigen ist. Andererseits betonen gerade erfahrene Laryngologen, daß die suggestive Wirkung solcher nasalen Eingriffe eine Rolle spiele, und daß der vorübergehende Erfolg der Therapie nicht ohne weiteres den Sitz der Erkrankung sicher stelle. Mit der Annahme eines suggestiven Faktors wäre dann auch die Möglichkeit psychogener Entstehung in einer Anzahl von Fällen nahe gerückt. Lunge

Die typische psychoneurotische, ebenso bei Neurasthenie, wie Hysterie vorkommende Magenstörung ist die nervöse Dyspepsie, die man auch als psychische Dyspepsie bezeichnet hat. Immer bestehen eine Reihe von subjektiven Beschwerden, wie Gefühl von Völle, von Leere, von Schmerzen, von Angst in der Magengegend. Der Appetit kann erhalten, aber auch verloren gegangen sein. Der Kranke gibt an, nur ganz leichte Speisen oder überhaupt nichts mehr zu vertragen. Gewöhnlich haben diese Kranken bereits allerhand Diätkuren durchgemacht und sind in ihrer Kost immer mehr eingeschränkt worden. Der eine verträgt kein Fleisch, der andere keine Milch, der dritte keine Eier, keine sauren Dinge etc., oder der Kranke darf nur purierte Speisen essen u. dgl. Eine andere Gruppe bekommt Beschwerden und Schmerzen, wenn der Magen leer ist. Sehr häufig ist das Gefühl des „Aufstoßenmüssens“. Viele geben an, nach dem Aufstoßen sich erleichtert zu fühlen. Dabei stoßen sie wesentlich nur die immer wieder verschluckte Luft aus. Oft kommt es zum Regurgitieren von ein wenig Mageninhalt in die Mundhöhle bzw. bis in den Rachen; meist nur nach Genuß von Speisen, die der Kranke „nicht verträgt“. Seltener besteht Erbrechen. Objektiv kann man manchmal eine mäßige Atonie oder Schwankungen der Säurewerte nach oben oder unten feststellen. Die Hyperazidität kann erhebliche Werte erreichen. In anderen Fällen fehlt jeglicher Befund. Magen

Ein dauerndes Fehlen der Salzsäureabsonderung (Achylie) halte ich mit der Annahme psychoneurotischer Zustände für nicht mehr vereinbar. Ebenso ist der kontinuierliche Magensaftfluß (Gastro-succorrhöe) zwar vielleicht eine Erkrankung der Nerven der Magendrüsen, aber keine psychogene oder psychoneurotische Erkrankung. Nicht ganz das gleiche gilt vielleicht für den Pylorospasmus. In einer Anzahl

von Fällen dürfte er doch auch eine selbständige Affektion darstellen. Damit daß der Pylorospasmus, wie vielleicht auch der kontinuierliche Magensaftfluß besonders oft bei sogenannten Neuropathen beobachtet wird, ist die Zugehörigkeit zum psychoneurotischen Symptomenkomplex jedenfalls noch nicht erwiesen.

Auch der Pylorospasmus der Säuglinge beweist, daß diese Erkrankung nicht psychogenen Ursprungs zu sein braucht.

Darm

Von den psychoneurotischen Darmstörungen ist am häufigsten die habituelle Obstipation. Sie ist oft sogar ein ausgezeichnetes Beispiel einer psychoneurotischen Störung ohne Psychoneurose. Denn es ist nicht zu bezweifeln, daß eine ihrer wichtigsten Quellen eine verkehrte Gewöhnung des Darms, also ein psychischer Faktor ist. Diesen Fehler der verkehrten Gewöhnung begehen aber auch viele nicht im geringsten nervöse Personen. Andererseits ist sie auch als Teil eines neurasthenischen oder hysterischen Komplexes außerordentlich häufig. Entgegengesetzt der nervösen Obstipation kommt die nervöse Diarrhöe, wenn auch nicht so häufig, vor. Aber auch hier sind wir wohl noch nicht am Ende unserer Kenntnisse. Ganz abgesehen davon, daß viele Dünndarmkatarrhe nur wegen des schwankenden Verlaufs zu unrecht für nervös gehalten werden, glaube ich, daß es auf nervösen Störungen der Darmfunktion beruhende Diarrhöen gibt, die aber nicht psychoneurotisch sind.

Eine in diesem Sinne wahrscheinlich nervöse, aber keinesfalls psychoneurotische Erkrankung ist die bekannte *Enteritis membranacea*.

Die Beziehungen des psychoneurotischen Symptomenkomplexes, insbesondere der Hysterie zur Darminnervation sind im einzelnen keineswegs geklärt. So ist es recht dunkel, auf Grund welches psychischen Mechanismus es nicht nur zu Meteorismus, sondern auch zu ausgesprochenen Ileuserscheinungen mit Kotbrechen kommen kann. Die Erscheinungen sind manchmal so drohend, daß der Chirurg sich entschließt, operativ einzugreifen, weil er die Verantwortung für die Unterlassung der Operation nicht tragen will, und das selbst in Fällen, die ihm als hysterisch und wiederholt bereits ohne Befund operiert bekannt sind.

Blase

Von nervösen Störungen der Blasentätigkeit sind zu nennen die Pollakiurie und das Harnstottern oder Unvermögen, bei Anwesenheit anderer Urin zu lassen, beides Störungen, die sich auch im Rahmen der Gesundheit noch finden, aber bei Neurasthenischen doch häufiger sind. Auch eine hysterische *Retentio urinae* erheblichen Grades ist nicht zu bezweifeln.

Die *Enuresis nocturna* ist im Gegensatz zu den eben genannten wieder eine nervöse Störung für sich. Sie hat bekanntlich einen Wert als Kennzeichen neuropathischer Anlage überhaupt, und speziell kommt das Bettnässen über die erste Kindheit hinaus bei der epileptischen Konstitution vor. Wenn die *Enuresis* einen Bestandteil psychoneurotischer Symptomenkomplexe bildet, so ist der psychische Mecha-

nismus häufig durch einen Traum entsprechender Situationen gegeben. In anderen Fällen ist eine besonders große Schlaftiefe festgestellt worden.

Ob eine Hemmungsbildung am unteren Ende des Rückenmarks, eine rudimentäre Spina bifida (Myelodysplasie) allgemein an der Enuresis nocturna des erwachsenen Alters Schuld ist, ist uns zweifelhaft. Für einzelne Fälle liegt die Möglichkeit vor.

Von den Störungen der männlichen Genitalorgane ist die häufigste die Impotenz. Bei kaum einer anderen Störung ist die psychische Wurzel oft so durchsichtig wie hier. Dem Patienten ist der Koitus einmal aus irgend welchem Grunde mißlungen, und nun quält ihn die Angst, daß sich das immer wiederholen werde. Er denkt nicht mehr an den Koitus, sondern nur daran, ob er auch gelingen werde. Oft ist auch die Furcht vor Ansteckung oder auch die Abneigung vor Prostituierten der eigentliche Grund der Impotenz, und wenn eine Impotenz aus solchem Grunde längere Zeit bestanden hat, so fixiert sich bei dem Kranken das Bewußtsein der Impotenz und diese tritt auch unter günstigen Verhältnissen in Erscheinung. Auch der Coitus reservatus kann Impotenz zur Folge haben, auch hier ist der psychische Mechanismus klar.

Männliche
Genitalien

Eine Schwäche des Sexualapparats bedeutet häufig auch die Ejaculatio praecox, die in ähnlicher Weise psychisch bedingt sein kann.

Ob die Miktions- und Defäkationsspermatorrhöe mit psychischen Vorgängen etwas zu tun hat, ist oft sehr zweifelhaft, ihre hauptsächlichste Quelle ist die chronische Gonorrhöe. Die Patienten ängstigt dieses Symptom nur meist außerordentlich. Dagegen können häufige Pollutionen, auch die Pollutiones diurnae psychogenen Ursprungs sein. Sie sind häufig nur der Ausdruck einer sexuellen Übererregbarkeit, können aber fortbestehen, wenn eine solche Übererregbarkeit — wenigstens bewußter Art — nicht mehr vorhanden ist.

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, das umfangreiche Gebiet der sogenannten „sexuellen Neurasthenie“ des genaueren durchzugehen. Nur das sei noch hervorgehoben, daß eine Reihe von Fällen von Impotenz und auch von Ejaculatio praecox sicherlich nicht psychisch bedingt, sondern primäre, angeborene oder erworbene Störungen der Organfunktion sind (paralytische Impotenz). Häufig ist angestrengte Berufstätigkeit die Ursache; in diesen Fällen weicht die Impotenz z. B. häufig während der Sommerreise. Eine andere Reihe hat ihre Wurzel in der mangelnden Libido. Denn wir bezeichnen als Impotenz nur die mangelnde Reaktion der Sexualorgane auf die Libido. Fehlt die Libido, entweder aus einer angeborenen Anlage heraus, oder aus Mangel an sexueller Zuneigung etwa zur Ehefrau, so kann man auch nicht von eigentlicher Impotenz sprechen.

Bei den Frauen kommen sehr oft dysmenorrhöische Beschwerden unter dem Einfluß der Psyche vor. Wie dieser Einfluß zustande kommt, ist nicht ganz klar; sicher ist aber soviel, daß durch ganz sicher suggestive Einflüsse die dysmenorrhöischen Beschwerden manchmal wie weggeblasen sind. Direkte Wachsuggestion tut freilich nicht viel, aber in der Hypnose gelingt es nach den Berichten der Autoren manchmal sogar die Menstruation durch entsprechende Suggestion an vorher bestimmten Tagen zu bewirken. Mir ist es mehrere Male vorgekommen, daß

Weibliche
Genitalien

ich jungen chlorotischen Mädchen durch eine mehrwöchige Arsenkur eine Besserung ihrer Beschwerden versprach, ein Mittel, das ja wohl sicherlich auch auf den physiologischen Vorgang der Menstruation wirkt, daß dann aber ganz gegen die Erwartung schon die erste Menstruation nach drei oder viertägigem Gebrauch des Mittels ganz schmerzlos und auch mit geringer Blutung verlief. Das kann wohl nur eine suggestive Wirkung, die Ursache also sehr wahrscheinlich psychogen gewesen sein, und daher habe ich auch ein großes Mißtrauen gegen die vieldiskutierte Wirkung der Nasenbehandlung (Geschlechtsstellen der Nase) auf menstruelle Beschwerden. Die Wirkung ist schon da, aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist sie auch suggestiv.

Sehr klar ist die psychische Wurzel meist beim Vaginismus. Es ist die bewußte oder unbewußte Furcht vor dem Koitus, sei es vor etwaigen Schmerzen, sei es vor der Schwangerschaft, sei es die Abneigung gegen einen ungeliebten Mann.

Der Impotenz des Mannes wäre die Frigidität der Frau gegenüberzustellen. Über ihre Häufigkeit ist viel Unbewiesenes geschrieben, man hat sie beinahe als normal bezeichnet. Das ist ganz falsch. In den allermeisten Fällen ist sie die Folge einer Heirat mit einem ungeliebten Mann. Eine positive Abneigung braucht dabei noch gar nicht vorhanden zu sein. Häufiger ist es, daß die Frauen vor ihrer Verheiratung anderen als dem schließlichen Ehegatten eine sexuell gefärbte Zuneigung entgegengebracht hatten, und daß das Bild des früheren Geliebten — wiederum entweder bewußt oder unbewußt — eine sexuelle Empfindung dem anderen gegenüber verhindert. Daß es sich häufig nur um eine Frigidität dem einen Manne gegenüber handelt, also um eine ganz sicher psychische Erscheinung, zeigt dann in vielen Fällen das Verschwinden der Frigidität beim sexuellen Verkehr mit einem anderen.

Anhangsweise wäre dann noch zu erwähnen, daß ein echtes hysterisches Fieber heute von den meisten durchaus bestritten wird, wie man denn bei Hysterischen immer auf absichtliche Täuschungen gefaßt sein muß, auf trophische Störungen durch Selbstverbrennungen, auf Chylurie durch Zugießen von Milch in den Urin, und was der Beispiele mehr sind.

c) Zwangsvorstellungen.

Zwangs-
vorstel-
lungen

Wie mit den nervösen Organerkrankungen geht es mit einem zweiten besonderen Symptom vieler Neurasthenien, den Zwangsvorstellungen. Sie sind oft eine Teilerscheinung der Neurasthenie (oder der Hysterie), besonders wenn sie in minderem Grade auftreten; in einer Anzahl von schweren Fällen aber müssen sie als eine eigene Krankheitsform, als „Zwangsneurose“ von der Neurasthenie abgesondert werden. Vielleicht die häufigste, sogar bei vielen sonst ganz Gesunden sich findende, Zwangsvorstellung ist die, sich zum Fenster herausstürzen zu müssen. Viele Leute empfinden diesen unbestimmten Zwang, der sie vom offenen Fenster zurücktreibt, im übrigen niemals zur Ausführung kommt. Fast ebenso häufig ist der Zwang, irgendwelche gleich-

gültige Dinge: Zitate, Namen, suchen zu müssen. Gewöhnlich ist auch der Zwang, nachzusehen, ob gewollte Handlungen auch wirklich ausgeführt sind, ob der Gashahn geschlossen, die Türe abgeriegelt, die Briefe nicht verwechselt, das Rezept nicht falsch ausgeschrieben ist etc. Das Kennzeichen der Krankhaftigkeit ist, daß diese Handlungen häufig sogar wiederholt ausgeführt werden müssen, trotzdem der Kranke genau weiß, daß der Gashahn geschlossen, die Türe abgeriegelt ist etc.

Eine schon sehr viel seltenere Form ist der Zwang, alle möglichen anscheinenden Schädlichkeiten für sich selbst und andere hinwegräumen zu müssen. So gibt es Kranke, die auf der Straße zwangsweise alle Obstreste sammeln, weil darüber irgend jemand fallen könne. In dieser an und für sich nicht ganz gewöhnlichen Gruppe gibt es einige typische Formen, so der Zwang sich die Hände zu waschen, der Zwang alle Klinken desinfizieren zu müssen.

Diesem Zwang entgegengesetzt ist die Zwangsvorstellung, schädliche, auffällige, kriminelle oder sakrilegische Dinge auszuführen. Dazu gehört der bereits erwähnte Zwang, sich zum Fenster herauszustürzen, ferner die Vorstellung sich auf offener Straße die Hosen aufknöpfen zu müssen, obszöne Worte ausstoßen, seine Kinder erstechen, zu müssen etc.

Alle diese Zwangsvorgänge gehen im allgemeinen nur so weit, daß irgend eine ernsthafte Unannehmlichkeit weder für die Kranken noch für seine Umgebung herbeigeführt wird. Die obszönen Worte werden gelegentlich ausgestoßen, wenn der Kranke allein im Zimmer ist, aber nicht in Gesellschaft anderer. Ein Kranker, der entsprechende Zwangsvorstellungen oder Zwangsansätze hat — es ist das nur ein Gradunterschied — kann gelegentlich ein Bild von der Wand reißen oder sich eine kleine Wunde beibringen; ich kenne eine Kranke, die 20 Jahre lang allwöchentlich mindestens einmal die Axt aus der Küche geholt hat, um ihren Mann totzuschlagen. Wenn man aber dieser selben Kranken Straffreiheit zusichern und sie auffordern würde, ihren Mann wirklich totzuschlagen, so würde sie niemals dazu imstande sein. Alle diese Kranken wissen im Innersten ganz gut, daß sie Auffälliges oder Kriminelles nicht tun werden, und doch haben sie die Vorstellung oder den Antrieb das zu tun, was sie nie tun werden.

Grenze der
Zwangs-
vorstel-
lungen

Andererseits können die Zwangsvorgänge der Bewegungsfreiheit und der Arbeitsfähigkeit der Kranken sehr hinderlich sein. Bei manchen erreichen sie einen geradezu psychotischen Grad, und ihr Inhalt wechselt unaufhörlich. Es gibt solche, die bitten und flehen, man möge sie nur festbinden, damit sie ihren Zwangsansätzen nicht Folge leisten können. Dabei ist zur Unterscheidung von anderen Psychosen, wie überhaupt zur Charakterisierung aller Zwangsvorstellungen eins wichtig, daß nämlich — mit ganz wenigen Ausnahmen — das Bewußtsein von der Krankhaftigkeit der Zwangsvorstellungen dauernd erhalten bleibt.

Psycho-
tische
Ausartung

Von einzelnen Zwangsvorstellungen ist die sehr verbreitete Platz- Platzangst ihrem Träger am hinderlichsten. Es gibt sie in allen Graden, von der Unlust, allein über einen weiten Platz zu gehen, bis zu der Un-

möglichkeit auch in Begleitung überhaupt das Haus zu verlassen. Will man dann solche Kranke zwingen, die gefürchtete Handlung doch auszuführen, so zeigen sie alle Zeichen lebhaften Angstaffekts, der Puls ist beschleunigt, Schweiß bricht aus, es erfaßt sie ein Schwindel, daß sie glauben, zu Boden fallen oder sich auf offener Straße hinlegen zu müssen. Noch hinderlicher ist die Kleiderangst, derentwegen Kranke manchmal lange Zeit das Bett nicht verlassen können.

Angst

Die Unlust — oder in höherem Grade der Angstaffekt — ist sehr häufig die Folge des Versuchs gegen eine Zwangsvorstellung oder einen Zwangsantrieb anzugehen. Der Kranke, der es versucht, seinem Trieb, den Gasometer zum dritten Male nachzusehen, oder sich zum 20. Male die Hände zu waschen, zu widerstehen, wird von der Unruhe und Angst so lange gequält, bis er diese Dinge doch noch einmal und immer wieder tut. Ein merkwürdiger Zwangsvorgang ist das Lampenfieber vor öffentlichem Auftreten, bzw. die Zwangsvorstellung, nicht auftreten zu können. Es kann so stark sein, daß es die Leistung wesentlich herabdrückt. Manche allerdings behaupten, daß sie um so Besseres leisten, je stärker vorher das Lampenfieber gewesen war.

Errötungs-
angst

Eine besondere Stellung nehmen dann noch einige Zwangsvorgänge ein, die sich auf Vorgänge am eigenen Körper beziehen. Dahin gehört die häufige Errötungsangst, die meist mit wirklichem Erröten, auch mit Schweißausbruch, verbunden ist. Hier sieht man schon sehr deutlich den Zusammenhang mit der neurasthenischen Art, die Aufmerksamkeit auf ein anscheinend körperliches Leiden zu lenken und es dadurch zu verstärken. Wie der Neurastheniker darum impotent ist, weil er fürchtet, impotent zu sein, so errötet der Erythrophobe, weil er fürchtet, zu erröten.

d) Hysterie.

Umschrie-
benheit
der
Symptome

Psychogen

Eine andere Spezialisierung der nervösen Erkrankung sehen wir in den hysterischen Symptomen. Die Aufgabe zwar, die hysterischen Symptome ganz scharf von den neurasthenischen (und auch von gewissen Zwangsvorstellungen) abzugrenzen, ist, wie schon oben bemerkt, eine unlösbare. Eine scharfe Grenze gibt es nicht. Aber einen Unterschied finden wir zunächst in der Umschriebenheit der hysterischen Symptome. Während die Neurasthenie die allgemeine psychische Schwäche darstellt, betrifft das typische hysterische Symptom nur einen Teil der Psyche. Darüber allerdings müssen wir uns zunächst einig sein, alle hysterischen Symptome sind psychische, alle Lähmungen, Krämpfe, alle Sensibilitätsstörungen, Sehstörungen etc. sind nur psychisch bedingt, und ebenso sind die Stigmata der Hysterie ausschließlich psychischer Natur. An den Nerven der Peripherie ist nichts, aber auch gar nichts Pathologisches, am Rückenmark, der Medulla oblongata, dem Kleinhirn, dem Hirnstamm auch nichts, und selbst in der grauen Rinde sind nur diejenigen Elemente als betroffen anzusehen, welche psychischen Prozessen dienen. Wenn wir also auf den „Mammalpunkt“ drücken, und die Kranke gibt dann lebhaften Schmerz an, so geschieht das nur darum, weil

— wenn ich mich kurz so ausdrücken darf — die psychische Vertretung dieser Körperstelle im Gehirn überempfindlich geworden ist. Wenn ein Kranker eine hysterische Armlähmung hat, so ist die psychische Vertretung dieses Armes ausgeschaltet. Diese psychischen Vertretungen sind durchaus nicht zu identifizieren mit den kortikalen Rindenfeldern, welche letzteren, wie wir früher sahen, in der vorderen und der hinteren Zentralwindung aneinander gereiht sind. Die psychischen Felder sind im Gegensatz dazu anatomisch unlokalisierbar. Daher ist es eine fundamentale Regel, daß die hysterischen Symptome in ihrer Art und Verteilung niemals mit den organischen übereinstimmen. Es war diese Regel ja die Fragestellung, von der wir in diesem Buche ausgingen, und auf die wir fast in jedem Kapitel zurückgekommen sind: Wie unterscheidet man organische Symptome von hysterischen? Darauf haben wir immer wieder geantwortet, daß man die organischen Symptome erkennt oder ausschließt. Man muß also die Symptome der zerebralen organischen Erkrankungen, speziell der Pyramidenbahn, die Symptome des Kleinhirns, des Rückenmarks und der hinteren Wurzeln und der peripheren Nerven, eingeschlossen die Zeichen der Epilepsie, der Chorea, Paralysis agitans etc. kennen und durch sorgfältige Untersuchung ausschließen. Muß man die hysterischen Symptome auch kennen? Die Frage ist nicht so komisch, wie sie erscheint. Man muß wohl die Haupttypen kennen, aber alle hysterischen Symptome kann man gar nicht kennen, denn sie sind so unerschöpflich mannigfaltig, wie die Psyche unerschöpflich mannigfaltig ist.

Hyste-
rische
Symptome

Wir haben zunächst die Lähmungen. Sie können in Form von Monoplegien, Hemiplegien, Paraplegien auftreten, aber die eigentümliche Verteilung der organischen Lähmungen (S. 19, 20) kann die Hysterie nicht nachahmen, noch weniger die Anomalien der Reflexe, die für die organischen Formen so charakteristisch sind. Kommt es doch bei organischen Lähmungen z. B. niemals vor, was bei der Hysterie so häufig ist, daß z. B. nur eine Hand und zwar vollständig gelähmt ist. Die Begründung liegt darin, daß der Begriff der Hand eine psychische Einheit ist. In der motorischen Zone der Rinde des Großhirns, in den zentralen Bahnen und selbst in den peripheren Nerven ist die Vertretung der Hand eine so ausgebreitete, daß eine völlige Lähmung der Hand ohne gleichzeitige schwere Störungen im Arm, und bei der organischen Rindenlähmung selbst nicht ohne Spuren anderer hemiplegischer Störungen, möglich ist.

Läh-
mungen

Aus analogem Grunde gibt es keine eigentlichen hysterischen Augenmuskellähmungen. Es kommt zwar vor, daß Kranke ihre Augen überhaupt nicht oder nicht nach einzelnen Richtungen hin bewegen können, z. B. infolge maximaler Akkommodationskrämpfe. Diese konjugierten Bewegungen der Augen sind ja ersichtlich psychische Einheiten. Niemals aber kommt die Lähmung eines Muskels mit der charakteristischen Abweichung der beiden Augenachsen und den gesetzmäßigen Doppelbildern vor.

Bemerkt sei, daß es infolge von langem Nichtgebrauch hysterisch gelähmter Glieder zu leichter Atrophie der Muskulatur, niemals aber zu E. R. kommen kann.

Gangstör-
rungen

Unerschöpflich sind die hysterischen Gangstörungen; die Kranken taumeln, wackeln, zittern, springen. Wenn sie fallen, tun sie sich aber beinahe nie wehe. Als Astasie-Abasie (vgl. S. 51) bezeichnet man die völlige Unfähigkeit zu gehen oder zu stehen. Das Gemeinsame dieser Störungen ist nur, daß sie organischen Störungen nicht gleichen.

Ich erspare mir und dem Leser die Aufzählung aller möglichen hysterischen Motilitätsstörungen, erwähne nur noch die hysterische Aphonie und den hysterischen Mutismus. Die Aphonie bietet im Kehlkopf nur diejenigen Befunde, die auch willkürlich hervorgebracht werden können, aber keine respiratorische Lähmung der Stimmbänder. Den Mutismus kann man nur dann verkennen, wenn man keine Ahnung von aphasischen Störungen hat. Schwerer ist manchmal das hysterische Stottern von dem echten (S. 214) zu unterscheiden.

Kontrak-
turen

Von den motorischen Reizerscheinungen erwähne ich zunächst die Kontrakturen, die meist ganz bizarre Stellungen ergeben. So kommt es ja bei organischen Nervenlähmungen gar nicht vor, daß etwa ein Bein im Knie so flektiert ist, daß der Kranke ohne Krücke gar nicht gehen kann. Ebenso gibt es keine organische Krankheit, die den berühmten isolierten Hemispasmus glosso-labio-maxillaris machen kann. Dafür liegen Hypoglossus, Fazialis und Trigeminskern zu weit auseinander und zu nahe an anderen zentralen Mechanismen. Für die Kranken bildet aber der Bereich des Kopfes wieder eine psychische Einheit.

Krämpfe

Mannigfaltig sind auch die hysterischen Konvulsionen. Der Versuch, sie zu schematisieren, ist gescheitert. Der „große hysterische Anfall“ mit seinen vier Stadien gehört als ein Kunstprodukt der Salpêtrière der Geschichte an. Alle Bewegungen, Verdrehungen, Krampfstellungen, die der Mensch auch willkürlich hervorbringen kann, leistet auch der hysterische Anfall, aber nicht mehr, insbesondere niemals einen echten epileptischen Anfall. Dabei kann das Bewußtsein auch beim hysterischen Anfall in weiter unten zu besprechender Weise gestört sein. Bei der Differentialdiagnose der Epilepsie gegenüber handelt es sich aber wieder in erster Linie darum, nicht die Hysterie, sondern die Epilepsie festzustellen oder auszuschließen.

Schwierig kann die Unterscheidung von der Chorea sein (vgl. S. 35), deren Bewegungen man willkürlich gut nachahmen kann.

Ganz benachbart dem Gebiete der hysterischen Mobilitätsstörungen ist der Tic. Den echten Tic (S. 212) darf man wohl zwar nicht als ein hysterisches Symptom auffassen, wohl aber gibt es Formen der Hysterie, welche den echten Tic ganz täuschend nachahmen können.

Sensibili-
tätsaus-
fälle

Wie die Motilitätsausfälle stimmen auch die Sensibilitätsausfälle der Hysterie mit denen organischer Störungen nicht überein. Nie werden einzelne Nerven- oder Wurzelgebiete betroffen. Meist schneiden die hysterischen Störungen an den Gliedern scharf und zirkulär (strumpfähnlich, handschuhförmig etc.) ab, was bei organischen Störungen zu den allergrößten Seltenheiten gehört. Erstreckt sich die Störung auf eine ganze Körperseite, so schneidet sie gewöhnlich genau in der Mittellinie ab, was bei hemiplegischen Sensibilitätsstörungen nie der Fall ist. Hysterische Sensibilitätsstörungen sind auch sehr häufig

absolut, was bei organischen Störungen die große Ausnahme ist, und eigentlich nur bei den organischen Paraplegien durch Rückenmarksquetschung vorkommt. Vielmehr ist bei den meisten organischen Störungen ein Rest von Sensibilität, der sich bei stärkeren oder länger fortgesetzten Reizen geltend macht, erhalten. Mit dem anästhetischen Gliede des Hysterikers kann man machen, was man will, es mit Nadeln durchstechen, es zwicken, es fühlt gar nichts. In seltenen Fällen sind auch nur einzelne Qualitäten, z. B. die Wärmeempfindung vollständig verloren gegangen.

Die Haut- und Schleimhautreflexe können — im Gegensatz zu Reflexo den Sehnenreflexen — im Bereiche hysterischer Anästhesien verloren gehen.

Sehr schwer zu beurteilen sind manchmal die hysterischen Schmerzen Schmerzen und Neuralgien, weil wir ja auch für die im peripheren Nerv sich abspielenden Neuralgien manchmal keine objektiven Zeichen haben (vgl. S. 81). Man kann aber gar nicht scharf genug den unwissenschaftlichen Versuchen entgegentreten, den fundamentalen Unterschied zwischen der hysterischen und der peripheren Neuralgie aufzuheben. Der periphere Ursprung der hysterischen Schmerzen wird neuerdings wieder von den Vertretern der Lehre der „Nervenzpunktmassage“ behauptet. Damit würde die Wissenschaft wieder um Jahrzehnte zurückgeschraubt werden. Diese Herren operieren wieder mit dem „gesunden Menschenverstand“, der ihnen ebenso wie dem Laien sage, wenn man in der Peripherie Schmerz verspüre und Druckpunkte feststelle, dann säße die Ursache des Leidens eben peripher. Sie glauben dabei mit der Feststellung, daß bei Druck auf gewisse schmerzhafteste Punkte reflektorische Muskelspannungen entstehen, eine neue Entdeckung gemacht zu haben. Diese reflektorischen Muskelspannungen bei Druck auf die schmerzhaften Punkte (die sogenannten Nervenzpunkte der Nervenzpunktmasseure) waren uns immer bekannt. Nur bieten sie an und für sich kein differentielles Merkmal zwischen der organischen und der hysterischen Neuralgie. Nur dann, wenn die Druckpunkte typisch dem Verlaufe der großen Nerven folgen, kann man sie für eine organische Neuralgie verwenden. Wenn die Druckpunkte nicht typisch sitzen, so kann das daher kommen, daß entweder eine organische Neuralgie nicht in der gewöhnlichen Weise verteilt ist, oder aber, daß eine hysterische Neuralgie vorliegt. Wahrscheinlicher ist dann immer das letztere. Vor allem ist daran gar kein Zweifel, daß man solche Nervenzpunkte in beliebiger Menge ansuggerieren kann, und wenn die Nervenzpunktmasseure den ganzen Körper nach Nervenzpunkten absuchen, so suggerieren sie ihren Patienten ungezählte Nervenzpunkte, um sie ihnen subforma Massage dann wieder wegzusuggerieren. Der Wahn, daß die Druckpunkte bei der Hysterie einen organischen Hintergrund hätten, hat ja lange in der Geschichte der Stigmata eine große Rolle gespielt. So glaubte man, bei Druck auf die untere Bauchgegend auf das Ovarium zu drücken und in dem dann entstehenden Schmerz geheimnisvollen Zusammenhängen auf der Spur zu sein. Man hat inzwischen eingesehen, daß ein Druck auf das Ovarium schlechterdings unmöglich ist, und aus dem Ovarialpunkt ist ein bescheidener

„Iliakalpunkt“ geworden. Alle diese Punkte: Mammalpunkte, Sternalpunkte etc., haben aber gar keine lokale Bedeutung, und man kann sie finden, wo man will.

Die allerschlimmsten ausgebreiteten hysterischen Schmerzzustände führen schließlich zu einer weitgehenden Einschränkung der Beweglichkeit oder sogar völlige Bewegungslosigkeit, man hat sie auch als *Akinesia algera* bezeichnet.

Andererseits brauchen nur geringe Parästhesien und Mißempfindungen zu bestehen. Eine gewisse Berühmtheit hat der *Globus hystericus* erreicht.

Gewöhnlich leicht zu diagnostizieren sind die hysterischen Kopfschmerzen, die man, wenn sie an umschriebener Stelle sitzen, auch als *Clavus hystericus* bezeichnet.

Eine genaue Untersuchung verlangen die hysterischen Gelenkneuralgien. Wenn man nicht ganz sicher ist, nehme man die Röntgenuntersuchung zu Hilfe (Möglichkeit kleiner osteomyelitischen Herde).

Sinnesstörungen

Hysterische Sehstörungen treten in der Form von Amblyopien bis zu totalen Amaurosen auf. Von der Feststellung des konzentrisch eingeeengten Gesichtsfeldes wird noch zu sprechen sein. Im allgemeinen macht die Erkennung dieser hysterischen Sehstörungen keine Schwierigkeiten. Es fehlen eben auch hier die typischen Formen der organischen Sehstörungen, d. h. die Augenhintergrundveränderungen, die Pupillenerkrankungen, die typische Hemianopsie etc.

Die hysterische Taubheit pflegt sich durch ihre Totalität von den organischen Formen auszuzeichnen. Der Kranke behauptet, absolut nichts zu hören.

Ähnlich ist es auch fast immer mit den hysterischen Geruchs- und Geschmacksstörungen. Gewöhnlich riechen und schmecken die Kranken gar nichts mehr, oder es riecht und schmeckt ihnen alles gleich.

Psychischer Mechanismus

An dieser Stelle müssen wir nun einen Augenblick haltmachen, um die Art des psychischen Prozesses, um den es sich bei den hysterischen Manifestationen handelt, noch etwas weiter zu klären, nur so weit, als es für das elementarste Verständnis doch nützlich und nötig sein dürfte.

Was sind das für psychische Prozesse, die bewirken, daß ein Arm gefühllos, ein Bein bewegungslos wird, die Augen nicht mehr sehen etc.? Willkürliche Prozesse sind es ganz sicher nicht. Denn ein normaler Mensch kann seinen Arm gar nicht willkürlich unempfindlich machen. Was willkürlich ist, ist Simulation, die Hysterie ist aber keine Simulation. Der Kranke will sein Bein nicht etwa nicht bewegen, das Bein ist gelähmt, er kann es nicht bewegen. Auch die Schmerzen hat der Hysteriker wirklich, er erfindet sie nicht. Notwendigerweise müssen diesen hysterischen Erscheinungen unbewußte psychische Vorgänge zugrunde liegen. Man fürchtet sich ja heute vor der Anerkennung unbewußter oder, wie einige vorsichtiger sagen, unterbewußter psychischer Vorgänge nicht mehr. Sehen wir doch auf Schritt und Tritt, wie auch im gewöhnlichen psychischen Leben nur ein ganz

kleiner Teil der psychischen Vorgänge in den Blickpunkt des Bewußtseins tritt.

Ich will hier keine Erklärungen geben, die den letzten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen sollen, aber die hysterischen Störungen werden am leichtesten verständlich, wenn wir uns vorstellen, daß gewisse psychische Inhalte unbewußt aus dem Gesamtleben der Persönlichkeit abgespalten sind, und daß diese abgespaltenen psychischen Inhalte besonderen Veränderungen unterliegen. Das ist ganz klar für die Sensibilitäts- und Motilitätsausfälle. Die Sensibilität des unempfindlichen Beines ist psychisch ausgeschaltet, ebenso wie die Motilität des gelähmten. Wie das möglich ist, darüber brauchen wir keine weiteren Erklärungen, nehmen wir es hier nur als eine Umschreibung unbestreitbarer Tatsachen. Ebenso ist es nur eine Umschreibung der Tatsachen, wenn wir für die Reizerscheinungen der Hysterie eine Übererregbarkeit oder sogar spontane Erregungen des psychischen Teilinhaltes konstatieren. Ein kleiner Teil der Psyche, z. B. die Sensibilität eines Armes drängt sich vor, tritt in den Vordergrund des Bewußtseins. Es ist das zwar ein entgegengesetzter Vorgang als die Ausschaltung, die den Ausfällen zugrunde liegt, aber beide Vorgänge beruhen auf der Heraushebung einzelner psychischer Inhalte aus dem psychischen Gesamthalt.

Ich habe diese Überlegungen an dieser Stelle wiedergegeben, weil sie uns leicht auch zu den anderen Erscheinungen der Hysterie führen. Denn die willkürliche Motilität und die bewußte Sensibilität sind doch nur einige Seiten der Psyche. Die Spaltung der Psyche — wenn man so sagen darf — kann aber auch in anderer Weise geschehen als durch Hervorhebung der Motilität und der Sensibilität.

Die besondere Erregbarkeit gewisser psychischer Vorgänge kommt nämlich weiter zunächst zum Ausdruck in den Affektausbrüchen der Hysterischen. Bei kleinen Anlässen beobachten wir die ungemehrten Ausbrüche von Angst, Wut oder Schmerz. Die Aufstellung einer besonderen Angstneurose erscheint uns überflüssig, sie gehört in den Rahmen der Hysterie. Eine gewisse Selbständigkeit können auch die Ausdrucksmittel dieser Affekte bei der Hysterie erlangen, z. B. das Weinen. Bei der geringsten Erregung laufen manchen Hysterischen die Tränen aus den Augen, ohne daß er dabei den Affekt der Trauer empfindet, der sonst das Weinen hervorbringt. Manchmal kommt es zu perversen Affektäußerungen, wie den bekannten Lachkrämpfen mancher Hysterischen. Auch die Entstehung der psychogenen Organstörungen erhält ein gewisses Licht von diesem Standpunkt aus. Die Beeinflussung der Organfunktion (des Herzens etc.) ist beim Gesunden ein integrierender Bestandteil der Affekte. Beim Hysterischen und Neurasthenischen kann sich die Änderung der Organfunktion von dem zugrunde liegenden Affekt ablösen und isoliert — also ohne den bewußt psychischen Inhalt des Affekts bestehen bleiben.

Die erwähnte Spaltbarkeit der hysterischen Psyche zeigt sich auch in essentiell psychischen Störungen, in den hysterischen Dämmerzuständen. Die Definition eines Dämmerzustandes war bereits bei Gelegenheit der Epilepsie gegeben (S. 204). Die hysterischen Dämmer-

Affektaus-
brüche

Angst

Dämmer-
zustände

zustände verlaufen im allgemeinen milder als die epileptischen. Der in ihnen wach werdende Bewußtseinsinhalt ist in sich und von dem normalen nicht so abgeschlossen, wie das bei den epileptischen der Fall zu sein pflegt. Vielleicht die mildeste Form ist das „Tagträumen“ mancher Hysterischen. Schwerer sind schon halluzinatorische Zustände ängstlich deliranten Inhalts. Häufig sind es romantische phantastische Erlebnisse, die in diesen Zuständen durchlebt werden, während derer der Kranke für jede äußere Einwirkung unzugänglich ist, auch Personen verkennt etc. Meist zeigt er dabei ausgesprochene allgemeine Hypästhesie. Unverkennbar ist meist ein affektiertes und theatralisches Verhalten. Die schwersten Dämmerzustände können wochenlang dauern, häufig unterbrochen von leichten Intervallen.

Das Vorbeireden oder das Gansersche Symptom, das in hysterischen Dämmerzuständen häufig ist, besteht in, wie absichtlich erscheinenden, falschen Antworten auf Fragen, die jeder Geisteskranke richtig beantworten würde, z. B. wie viel Hände haben Sie? „20“ etc. Es kommt hauptsächlich bei hysterischen Strafgefangenen vor.

Die Amnesie nach dem Erwachen aus dem hysterischen Dämmerzustand ist gewöhnlich nicht so tief und läßt sich durch entsprechende Fragen oft leicht aufhellen, was beim epileptischen Dämmerzustand nie der Fall ist.

Zu den Dämmerzuständen müssen auch die Schlafzustände mancher Hysterischen gerechnet werden, die von wenigen Minuten bis zu mehreren Tagen und noch länger dauern können. Die Kranken schlafen ruhig und sind unerweckbar. Ihnen etwa gereichtes Essen pflegen sie halb mechanisch zu sich zu nehmen. Es handelt sich offenbar um Zustände, die dem hypnotischen Schlaf sehr nahe stehen. Es kommen dann auch kataleptische Zustände vor, mit *Flexibilitas cerea* oder Negativismus, welche dann schon zum Gebiet des hysterischen Stupors gerechnet werden.

Die bekannten somnambulen Schlafzustände sind nur eine besondere Form von Dämmerzuständen. Auf die Bedeutung, welche sie für den Spiritismus haben, sei hingewiesen.

Endlich ist noch einmal hervorzuheben, daß der Bewußtseinszustand während der hysterischen Krämpfe durchaus dem eines Dämmerzustandes gleichen kann.

Die psychologische Ätiologie der hysterischen Symptome ist in der großen Mehrzahl der Fälle durch Suggestion oder Autosuggestion gegeben. Unter Suggestion verstehen wir die Realisierung eines psychischen Vorgangs oder Inhalts unter dem Einflusse seiner Vorstellung. Der Kranke stellt sich vor, der Arm sei gelähmt, und er ist es wirklich. Nur daß die Vorstellung hier meist nicht die bewußte Vorstellung im gewöhnlichen Sinne, sondern ein merkwürdiges Mischprodukt aus Bewußtsein und Unbewußtsein ist. Nur in sehr seltenen Fällen werden solche Vorstellungen wirklich ganz bewußt eingeübt, so z. B. bei Artisten, die für ihre Triks eine Anästhesie des Körpers brauchen. Diese Suggestion kann entweder von einem Fremden oder von dem Kranken selber ausgehen (Fremdsuggestion und Autosuggestion). Die häufigsten Fremdsuggestionen sind die von den Ärzten ausgehenden. Es ist be-

hauptet worden, daß alle hysterischen Sensibilitätsausfälle, alle sensiblen Stigmata, alle Gesichtsfeldeinengungen durch ärztliche Untersuchung hervorgebracht seien und in mehr als $\frac{9}{10}$ der Fälle trifft das sicherlich zu. Durch eine ungeschickte Fragestellung fühlt der Kranke heraus, der Arzt erwarte einen Unterschied der beiden Seiten, ein Schmerzgefühl, ein Nichtsehen des von der Peripherie an seinen Augen vorbeigeführten Gegenstandes — die berühmte Einengung des Gesichtsfeldes — etc., und schon ist das betreffende Symptom da. Wenn man daher dem Kranken keine neuen Symptome machen will, muß man ganz objektiv und gleichgültig fragen, sogar von vornherein Gegensuggestionen geben. Geradezu unsinnig ist es, wie das vielfach beliebt ist, dem Kranken mit aller Macht einzureden, daß er auf der einen Seite weniger fühle, als auf der anderen. Zur Diagnose der Hysterie brauchen wir diese ärztlichen Suggestionen wirklich nicht. Daß bestimmte hysterische Krampfformen früher vielfach gezüchtet, d. h. ärztlich suggeriert wurden, war bereits mehrfach erwähnt. Vielfach wurde auch durch Druck auf einen Punkt des Körpers der hysterische Anfall erzeugt, durch Druck auf einen anderen wieder beendet — ein Verfahren, das heutzutage nur auf ganz unverständige Laien einen anderen als lächerlichen Eindruck machen kann. Außer der Fremdsuggestion des Arztes sind noch besonders wirksam die Suggestionen durch den Verkehr oder den Anblick von Kranken. Wer denkt da nicht an sein erstes klinisches Semester, wo er die Ansätze zu so viel Krankheiten in sich verspürte. Bei hysterisch disponierten löst sehr oft die Pflege oder auch nur der Anblick von Kranken hysterische Symptome aus oder auch nur der Bericht von Krankheiten. Eine nervöse Kranke erzählte mir, daß auf der Straße jetzt manchmal das eine Bein nicht mehr weiter wolle. Im Laufe des Gesprächs erfuhr ich, daß sie vor einigen Tagen die Nachricht vom Schlaganfall einer Freundin bekommen hatte. Auf ähnliche Weise kommen auch hysterische Epidemien z. B. „Veitstanz“epidemien in Schulen zustande. Ebenso häufig sind Autosuggestionen. Jemand erhält einen Schlag auf den Arm, der Arm schmerzt ein wenig, der Kranke hält die Verletzung aber für schwer, nach kurzer Zeit nehmen die Schmerzen zu und der Arm wird bewegungslos. Ein anderer bekommt bei Berührung eines elektrischen Kontakts einen harmlosen elektrischen Schlag, er hat einmal gehört, daß das Lähmungen gebe, er legt sich hin und ist am ganzen Körper gelähmt. Ein dritter erleidet auf einem Auge eine Ablatio retinae. Er erkundigt sich, ob die Erkrankung auf das andere Auge auch übergreifen könne, und schon beginnt er auch auf dem zweiten ganz gesunden Auge schlecht zu sehen.

Nicht in jedem Falle ist der Zusammenhang so klar wie in den angeführten. Der Kranke selbst gibt ihn in dieser klaren Form beinahe nie zu, weil er seinen Zustand ja für körperlich bedingt hält. Auch ist die ursprüngliche suggerierende Veranlassung sehr häufig längst vergessen, aber die Folgen, die Anästhesie, die Lähmung können jahrelang bestehen bleiben. Damit hängt die sehr häufig zu beobachtende Tatsache zusammen, daß wirkliche körperliche Erkrankungen, wie z. B. Gelenkdis-

torsionen bei Hysterischen viel schwerere und länger dauernde Symptome machen, als bei Nichthysterischen.

Gefühls-
betonte Er-
lebnisse

Besonders geeignet, Suggestionen hervorzurufen sind gefühlsbetonte Vorstellungen oder Erlebnisse. Ein elektrischer Schlag, den wir unversehens erhalten, und bei dem wir erschrecken, ist viel suggestionskräftiger, als einer, auf den wir vorbereitet sind. Die sogenannten Schrecklähmungen sind nichts als hysterische Lähmungen. Außerordentlich starke hysterogene Kraft haben Eisenbahnkatastrophen u. dgl.

Ursachen

Von der psychischen Vermittelung der einzelnen Symptome haben wir die Ursache des ganzen psychoneurotischen Zustandes und der psychoneurotischen Disposition zu unterscheiden.

Über-
arbeitung

Wir haben hier vorweg eine Anzahl von Fällen geistiger Überarbeitung abzutrennen. Es gibt das meistens vorwiegend neurasthenische Zustandsbilder, die sich nach einer mehrwöchigen Ausspannung wieder zurückbilden. Wir kommen darauf weiterhin noch zurück.

Affektbe-
tonte Er-
lebnisse

Viel häufiger aber sind es Aufregungen und Sorgen aller Art, auch einzelne affektbetonte Erlebnisse, welche nicht nur einzelne Symptome auslösen — ein Punkt, auf den eben bereits eingegangen war —, sondern die auch den Grundstein zu der ganzen Erkrankung legen und diese Erkrankung weiterhin unterhalten. Man muß deswegen auch in der Praxis sehr vorsichtig sein, die einfache Überarbeitung als Ursache schwerer neurotischer Zustände hinzunehmen. Sehr häufig sind geschäftliche Sorgen, unerquickliche Familienverhältnisse, Enttäuschungen, sexuelle Erlebnisse die wahre Ursache. Eine mächtige Ursache waren z. B. die mit den russischen Revolutionsversuchen der letzten Jahre verknüpften Gewalttaten. Im allgemeinen sind diese Ursachen eher geeignet, hysterische Komplexe hervorzurufen, aber sie führen auch zu ziemlich reinen neurasthenischen Bildern.

In den letzten Jahren hat eine Theorie viel Aufsehen erregt, nach welcher die einzige Ursache der Hysterie in sogenannten sexuellen Traumata, die noch dazu in der Kindheit stattgefunden haben sollten, bestehen sollte (vgl. S. 275). Wir stimmen mit fast allen Neurologen überein, wenn wir im Gegensatz zu den Anhängern dieser Lehre, die sexuellen Traumata nur als eine Ursache von vielen möglichen ansehen (vgl. auch weiter unten unter Therapie). Richtig ist, daß gerade sexuelle Erlebnisse besonders gefühlsbetont und daher besonders geeignet sind, hysterische Bilder hervorzurufen. Richtig ist auch, daß der Grundstein zur Hysterie in einer wahrscheinlich kleinen Anzahl von Fällen schon in der Kindheit und auch durch sexuelle Erlebnisse der Kindheit gelegt wird.

Uterus
Hysteria
virilis

Daß die Sexualität dabei nicht etwa als eine Uteruserkrankung ins Spiel kommt, das brauche ich wohl heute kaum mehr zu betonen, ebensowenig, daß sie sowohl bei Männern als bei Frauen vorkommt.

Aber die Sexualität, selbst im allerweitesten Sinne als psychischer Komplex verstanden, ist nur eine Ursache aus vielen. Es gibt ja nicht nur Liebe, sondern auch Hunger auf der Welt, und die Sorge um Verdienst, um das tägliche Brot etc. sind auch starke Wurzeln der

Hysterie, nicht minder gekränkter Ehrgeiz, ehrenkränkende Anschuldigungen, Verwicklung in gerichtliche Prozesse. Es kommt aber auf die Stärke der psychischen Erregung an, die beim Einzelnen mit diesen Dingen verbunden ist.

Diese Affekterregbarkeit und die Fortwirkung von Affekten in das weitere Leben hinein ist nun bei den verschiedenen Individuen eine sehr verschieden große, und damit kommen wir auf die Frage nach der Konstitution als Ursache der Psychoneurosen oder, wie man das auch ausgedrückt hat, nach der endogenen Komponente der Psychoneurosen.

Die Frage ist ja auch praktisch sehr wichtig: Gibt es bestimmte psychische Konstitutionen, bestimmte Charaktere, welche als neurasthenische oder als hysterische Konstitutionen aus sich heraus die Symptome der Neurasthenie und der Hysterie hervorbringen?

Die Frage ist nur in gewisser Richtung zu bejahen: Wenn wir als die Hauptcharaktere der Hysterie die Spaltbarkeit der Psyche, die Suggestibilität und den besonderen Einfluß stark affektbetonter Vorgänge bezeichnet haben, so wissen wir ja, daß nicht alle Menschen diese Bedingungen der Hysterie haben, also muß wohl schon eine abnorme Konstitution vorliegen. Aber andererseits muß festgestellt werden, daß es sich dabei um keine einheitliche Konstitution handelt.

Allenfalls kann man mit der Eigenschaft der Hysterie, einzelne Bewußtseinsinhalte abzutrennen und zu selbständiger Entwicklung zu bringen, die bekannte Lügenhaftigkeit (Mythomanie, Pseudologia phantastica) zusammenbringen, die viele Hysterische auszeichnet. Indem sie sich eine Sache als möglich darstellen, ist sie ihnen auch schon wirklich geworden, und sie erzählen mehr minder mögliche oder abenteuerliche Dinge, ohne eigentlich selbst noch zu wissen, ob sie wahr sind oder nicht. Aber es geht nicht an, diese Lügenhaftigkeit als einen integrierenden Bestandteil des hysterischen Charakters hinzustellen.

Wir finden unter den Hysterischen auch die aufrichtigsten und zartesten Naturen, wir finden unter ihnen speziell viele „Künstlernaturen“, von starker Phantasie und starken Affekten.

Ferner haben viele Epileptische hysterische Symptome, eine besondere Krankheitsform der Hysteroepilepsie lohnt es aber darum nicht aufzustellen.

Vor allem sind viele Hysterische schwachsinnig. Es können sehr schwere Grade des Intelligenzdefektes vorhanden sein, besonders oft aber scheinen mir die ganz leichten Fälle von Schwachsinn, die man auch als Debilität bezeichnet, zu hysterischen Symptomen zu neigen, Persönlichkeiten, deren Intelligenz vielleicht gerade ausreicht, um eine untergeordnete Stelle im Leben mit Mühe und Not auszufüllen, und die dann bei irgend einem Anlaß zusammenbrechen.

Auch Sonderlinge, Leute die „überwertige Ideen“ hüten, ferner „epileptoide“ Charaktere mit Neigung zu Heftigkeits- und Zornausbrüchen können ausgesprochene hysterische Symptome zeigen, ebenso Homosexuelle und andere sexualpathologische Konstitutionen.

Endlich sei auch auf die Kombination von organischen und hysterischen Symptomen noch einmal hingewiesen. In solchen Fällen hat die Schwächung des Nervensystems, z. B. durch die Herde einer multiplen Sklerose den Boden für die Hysterie vorbereitet.

Wir finden also die Neigung zu hysterischen Symptomen bei allen möglichen abnormen oder „psychopathischen“ Konstitutionen, aber der Arzt hat die Aufgabe in jedem einzelnen Fall die zugrunde liegende Konstitution zu bestimmen. Es ist allzu bequem, alle Eigenschaften eines Kranken als hysterisch zu bezeichnen, weil er einige hysterische Symptome hat.

Man kann nun noch weiter gehen und aussprechen, daß auch Konstitutionen von normaler, d. h. mittlerer Gesundheit hysterisch werden können. Es handelt sich da dann nicht mehr um eine Konstitution, die die Ausbildung der Hysterie erleichtert, sondern um so starke äußere Ursachen, daß ihnen auch gesunde Naturen erliegen. Man kann doch schließlich nicht nur die ganz baumstarken und gleichgültigen Kraftnaturen als normal bezeichnen, an denen alle Schicksale wie Wassertropfen ablaufen. Sollte man einer „normalen“ Mutter nicht das Recht zugestehen, hysterisch zu werden, wenn ihr bei einem Prognostizieren von Kindern und Mann vor den Augen getötet werden. Man darf wohl auch glauben, daß eine erzwungene Ehe mit einem ungeliebten Mann oder auch die Verhinderung einer ersehnten Verbindung, eine, wenn auch nicht jede, gesunde Frau hysterisch machen kann.

Kinder

Ähnlich steht es mit der Hysterie im Kindesalter. Hysterische Symptome entstehen durch analoge Ursachen wie bei Erwachsenen und besonders leicht bei psychopathischen, insbesondere bei etwas phantastisch veranlagten Kindern; aber daß sie nur bei solchen vorkommen, halten wir für ein unbegründetes Axiom. Die hysterischen Symptome selbst sind bei Kindern übrigens gewöhnlich besonders „naiv“, d. h. besonders leicht in ihrem psychogenen Mechanismus zu durchschauen.

Neurasthenische Konstitution.

Ähnliches wie von der hysterischen, kann man von der neurasthenischen Konstitution sagen. Ist doch, wenn wir von der bereits geschilderten Erschöpfungsneurasthenie absehen, der psychisch-ätiologische Mechanismus der Neurasthenie ein sehr ähnlicher wie der der Hysterie. Der Unterschied beruht oft wesentlich nur darauf, daß der Patient sich das eine Mal eine allgemeine, das andere Mal eine mehr lokalisierte Erkrankung suggeriert hat; die Art der so entstehenden Beschwerden wird dann allerdings auch von der speziellen Konstitution abhängen.

Überall zeigt es sich, daß die einzelnen Symptomengruppen der Psychoneurosen so eng miteinander zusammenhängen, daß eine Trennung eben nur schematisch möglich ist, so auch in der Frage der Unterscheidung neurasthenischer und hysterischer Konstitution.

Am ehesten dürften noch die Zwangsvorstellungen die Aufstellung einer ganz besonderen Konstitution rechtfertigen, aber auch ihre Entstehung ist nachweislich in einer großen Reihe von Fällen ganz analog der der hysterischen Symptome. So gibt es Kranke, die an Er-

rötungsangst leiden, seitdem sie einmal ein entsprechendes eindrucksvolles Erlebnis gehabt haben, z. B. als Schüler einmal vor versammelter Klasse blamiert worden waren.

e) Traumatische „Neurosen“.

Von dem so gewonnenen Standpunkt ist es nun auch leicht, die Beziehungen der Psychoneurosen zum Trauma festzustellen. Es gibt keine einheitliche „traumatische Neurose“, sondern es gibt nur traumatisch ausgelöste Neurasthenien und Hysterien. Ob die Wirkung des Traumas mehr in der Heftigkeit der Gemütsbewegung besteht oder in Autosuggestionen, die unter dem Einflusse dieser Affekte wach werden, ist ein Streit um Worte. Die Wirkung spezieller Suggestionen sehen wir in der besonders häufigen Lokalisation der Beschwerden in den vom Trauma betroffenen Körperteil. So lokalisieren sich die Kopfschmerzen manchmal jahrelang an der von einem leichten Trauma betroffenen Stelle des Kopfes, die hysterische Lähmung betrifft oft den vom Trauma betroffenen Arm etc.

Trauma-
tische
Psycho-
neurose

Die Schwere des Traumas ist nicht entscheidend für die Schwere der traumatischen Erkrankung. Den einen sehen wir 5 Wochen nach einem schweren Basisbruch seine gewohnte Arbeit wieder aufnehmen, der andere erkrankt nach einem leichten Anschlagen des Kopfes gegen die Wand eines Straßenbahnwagens. Ein Arbeiter erholt sich sehr rasch von den Folgen eines Starkstromunfalls, ein anderer wird durch einen harmlosen Schwachstrom des Telephons für sein Leben hysterisch. Ausschlaggebend ist einmal die angeborene Anlage zur Neurasthenie und Hysterie, und vor allem der Affektwert des Erlebnisses. Kann doch auch der Affekt allein, der mit dem Erleben einer Eisenbahnkatastrophe verbunden ist, ohne jedes eigentliche Trauma zu den Erscheinungen der Neurasthenie oder Hysterie führen? Es ist ganz unmöglich, bei der Begutachtung traumatischer Neurosen das Urteil auf die Schwere des Traumas zu gründen. Man hat zwar im Gutachten leichteres Spiel, wenn man feststellen kann, daß das Trauma zunächst eine schwere Commotio cerebri mit Bewußtlosigkeit und Erbrechen zur Folge gehabt hatte, richtig ist natürlich auch, daß schwere Traumen bei sonst gleichen Bedingungen leichter die Grundlage zu neurotischen Erkrankungen abgeben¹⁾, als leichte, aber entscheidend ist die Schwere des Traumas nicht.

Schwere
des
Traumas

Eine weitere Schwierigkeit ist in der häufigen Latenz zwischen Unfall und Beginn der Beschwerden gegeben. Sehr häufig vergehen

Latenz
nach dem
Trauma

¹⁾ Man darf bei schweren Unfällen mit langdauernder Bewußtlosigkeit im Gutachten auch wahrheitsgemäß den Gesichtspunkt geltend machen, daß organische Herdstörungen der Feststellung entgehen können, wenn sie klein genug oder in sogenannten „stummen“ Hirnteilen (S. 119) lokalisiert sind. Denn solche Veränderungen werden bei den Autopsien von angeblichen „Gehirnerschütterungen“ sehr häufig festgestellt, und es ist sehr möglich, daß sie ihr Teil zu der Verminderung der Widerstandsfähigkeit des Kranken, die sich in der „Neurose“ äußert, beitragen.

Tage voller Arbeitsfähigkeit, bis der Patient anfängt zu klagen, und nun schreitet die Krankheit dauernd fort. Oder die Patienten, die Wochen nach einer *Commotio* anscheinend genesen entlassen werden, finden erst nach einigen Arbeitstagen, daß sie die gewohnte Arbeit nicht mehr verrichten können.

Renten-
kampf

Es ist ja bekannt, daß nun noch eine weitere Ursache der traumatischen Neurosen neben dem reinen Affektwert des Traumas ins Spiel kommt, der Rentenkampf. Man ist ja soweit gegangen, das Verlangen nach Recht als alleinige Ursache der traumatischen Neurosen hinzustellen. Das ist zweifellos falsch. Eine Ursache ist das Trauma. Ich kenne begüterte Personen, die gerne einen erheblichen Teil ihres Vermögens opfern würden, wenn sie von den Folgen des Traumas befreit werden könnten. Ich kenne auch Ärzte, die ihre Meinung über die traumatischen Neurosen sehr geändert haben, seitdem sie einmal selbst von einem Trauma betroffen wurden.

Daß die Sorge um die Existenz die Wirkung des Traumas noch verstärkt, ist nach dem Mechanismus der Entstehung der Psychoneurosen ganz natürlich, und so lebt sich der Arbeiter, der zuerst nur wenig hinter den an ihn gestellten Ansprüchen zurückblieb, in eine immer wachsende Entmutigung und unbewußt in eine dementsprechend gesteigerte Arbeitsunfähigkeit hinein. Es wäre eine wichtige organisatorische Aufgabe, den nur vermindert Arbeitsfähigen eine entsprechende leichte Tätigkeit in den verschiedenen Betrieben zu verschaffen und sie unter ärztlicher Aufsicht und Ermutigung wieder zu ihrer alten Tätigkeit zurückzuführen. Man könnte diesen vermindert Arbeitsfähigen sogar einen minderen Lohn geben. Vermindert Arbeitsfähige aber werden heute in den Betrieben nur ganz kurze Zeit geduldet, dann werden sie gekündigt und stehen mit ihrer Familie und ohne jeden Erwerb auf der Straße. Was ist da natürlicher, als daß sich die Folgen des Unfalles durch die Sorge vor der völligen Erwerbslosigkeit immer mehr verstärken, und daß der Kranke sich als einzige Hoffnung nun an die Unfallrente klammert.

Unter diesen Umständen ist es geradezu merkwürdig, daß die Anzahl der Neurosen zuverlässigen Statistiken zufolge sich nur auf ungefähr 1,5 pro Mille der Unfälle beläuft. Daß die absolute Zahl doch ziemlich beträchtlich ist, ist eben durch die enorme Menge der Unfälle zu erklären.

Freilich sollen die Unfallneurosen in Ländern, in denen keine dauernde Rente, sondern eine einmalige Abfindung gezahlt wird, noch viel seltener sein, und es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Form zweckmäßiger ist. Trotzdem darf diese Tatsache nicht dazu führen, die Differenz auf bewußte Simulation zurückzuführen.

Wir dürfen auch nicht verlangen, daß der Arbeiter, der nach einem Unfall neurasthenisch-hysterische Beschwerden hat, diese dem Arzte leichter darstellt als sie sind. Es ist sein ganz selbstverständliches Interesse, seine Arbeitsunfähigkeit genügend zu begründen. Es handelt sich doch — täuschen wir uns darüber doch nicht — oft wirklich um einen Kampf zwischen der Berufsgenossenschaft und dem Arbeiter, einen Kampf, in welchem der Behörde nach Ansicht des Arbeiters

die größeren Machtmittel zur Verfügung stehen, einen Kampf, in welchem der Arbeiter sich verständnislos behandelt glaubt. Denn viele Ärzte glauben heute noch, daß Neurasthenie oder Hysterie, besonders aber die traumatischen Formen, doch eigentlich nur Simulation seien. Sehr oft deuten sie das dem Kranken in mehr weniger verblümter Weise an. Soll der Kranke, der sich dadurch gekränkt und sich doch wirklich arbeitsunfähig fühlt, nun vielleicht sagen: „Sie haben eigentlich recht, Herr Doktor, die Beschwerden sind wirklich nicht gar so schlimm“? Selbstverständlich reizen ihn solche Bemerkungen und treiben ihn immer tiefer in seine Krankheit und seinen Kampf hinein. Ein für körperliche Erkrankungen wirklich ausgezeichnete Arzt sagte mir einmal, er verstehe nicht, wie man sich mit nervösen Leuten abgeben könne, er hätte immer Lust, jeden Nervösen durchzuprügeln. Von diesem Standpunkt aus wird man ein Verständnis für die Leiden der Traumatiker nicht erlangen können. Viele Traumatiker sind ganz aufrichtig, wenn sie sagen, daß sie gerne arbeiten würden, aber nicht arbeiten können. Wir sehen genau die gleichen Beschwerden bei Personen, denen jeder Gedanke der Rente oder der öffentlichen Versorgung ganz fern liegt. Sehr oft findet man in Gutachten die Bemerkung, daß der Kranke wahrscheinlich oder sicher aggraviere. Woher der Gutachter das weiß, erfährt man meist nicht; neulich las ich in einem Gutachten, daß der Gutachter einen Mann der Simulation für besonders verdächtig hielte, weil er Schlächter sei und außerdem noch eine ältere Frau habe. Die Schlächter seien besonders gerissene Leute, und ältere Frauen stachelten die Männer immer zur Simulation an. Man sollte solche Bemerkungen nicht machen, wenn man sie nicht beweisen kann, und man kann sie ohne längere und sorgfältige Beobachtung auf einer Krankenstation überhaupt nicht beweisen. Ausnahmen mögen vorkommen, aber es ist doch recht selten, daß der Arzt aus dem Fenster schauend, den Kranken, der im Sprechzimmer eben noch halb lahm gewesen ist, auf der Straße vergnügt davon eilen sieht.

Es ist auch heute wohl immer allgemeiner die Überzeugung durch-Simulation gedrungen, daß eine Simulation sehr viel seltener ist, als man früher in der Unbekanntheit mit den schweren neurotischen Erscheinungen geglaubt hat. Ich selbst erinnere mich aus meiner Tätigkeit am Krankenhaus Friedrichshain, wo ich außerordentlich häufig in solchen Fällen um Rat gefragt wurde, höchstens an drei Fälle, in denen man wohl Simulation annehmen mußte.

Man hat von der traumatischen Neurose eine reine Rentenkampfneurose unterscheiden wollen — eine höchst zweifelhafte Sache. Es soll sich dabei darum handeln, daß nicht das Trauma, auch nicht Simulation, sondern „nur der eingebildete, einer rechtlichen Grundlage entbehrende Anspruch“ Ursache der Neurose wird. Diese Fälle würden dann nicht unter das Unfallgesetz fallen. Wer diese feine Unterscheidung mit Sicherheit machen kann, der möge es tun. Ich würde mir eine so subjektive Entscheidung kaum je zutrauen. Denn wir wissen ja ohnehin, daß der Rentenkampf als untrennbarer Faktor in Unfallneurosen eingeht.

Flucht in
die Krank-
heit

Wie bei der traumatischen Neurasthenie und Hysterie, so spielt der unbe-
wußte Wunsch krank zu sein, auch bei anderen Formen der Psychoneurose eine
Rolle. Man hat das auch „Flucht in die Krankheit“ genannt. Eine solche kommt
z. B. bei Untersuchungs- und Strafgefangenen besonders häufig vor und zwar hier
in Form hysterischer Dämmerzustände. Auch bei Armenkranken, die sich nach
einer Aufnahme in ein Siechenhaus sehnen, sehen wir den Wunsch den Vater der
Krankheit werden.

Atteste bei
Neur-
asthenie

Ebenso häufig, wie eine Simulation unberechtigter Weise angenom-
men wird, wird auf die sogenannten objektiven Symptome der
Neurasthenie und Hysterie zu großer Wert in Gutachten und Attesten ge-
legt, nicht nur in Unfallgutachten, sondern auch in Attesten zum Zwecke
von Urlaubsgesuchen, Terminversäumnis etc. Das Publikum weiß natür-
lich nichts davon, braucht auch nichts davon zu wissen, daß wir die
körperliche Untersuchung seiner Nerven wesentlich zu dem Zwecke
vornehmen, organische Erkrankungen auszuschließen. Es kennt den
Unterschied der beiden Gruppen überhaupt nicht. Aber der Arzt sollte
sich doch hüten, den Anschein zu erwecken, als ob er auf Grund einer
einmaligen, oder auch wiederholten Untersuchung durch die Feststellung
einzelner körperlicher Symptome eine Neurasthenie diagnostizieren
könnte. Es findet sich sehr häufig in Attesten und Gutachten eine Art
Schema: Verstärkte Sehnenreflexe, etwas Tremor, Lidflattern, Schwanken
beim Augenschluß, feuchte Haut, beschleunigter Puls, als Haupttrumpf
dann noch Dermographie und dann die Folgerung: „Der N. leidet also
an Neurasthenie“. Dabei wird einmal vergessen, daß alle die genannten
Symptome fehlen, und der Patient doch an Neurasthenie leiden kann,
und daß der Kranke, wenn er nämlich will, sich durch einige schwere
Zigarren und einige Tassen schweren Kaffees ein sehr ähnliches oder
ganz gleiches Bild verschaffen kann. Es ist mir auch ganz unverständ-
lich, wie selbst vielbeschäftigte Gutachter allein aus dem Fehlen solcher
früher einmal festgestellten objektiven Zeichen, z. B. dem Fehlen des
Lidflatterns, des Tremors bei erneuter Untersuchung ohne weiteres eine
erhebliche Besserung und eine dementsprechende Herabsetzung der Rente
ableiten können¹⁾. Wir sind tatsächlich bei Attesten und Gutachten
auf Neurasthenie für Leute, die wir nicht genau kennen, zum großen
Teil auf die Glaubwürdigkeit der betreffenden angewiesen, und wir sind
verpflichtet, das in dem Gutachten zum Ausdruck zu bringen. Auf
Grund einer gewissen speziellen und allgemeinen Erfahrung werden wir
grobe und ungeschickte Simulationsversuchen nicht zum Opfer fallen,
aber einem raffinierten Schauspieler und Betrüger gegenüber reicht das
intuitive Urteil auch des besten Sachverständigen nicht aus. Jeden-

¹⁾ Mit der Feststellung der Besserung bei traumatischen Neurosen ist das
überhaupt eine sehr schwierige Sache, wenn die Kranken die Besserung bestreiten.
Gar nicht so selten wird in Gutachten behauptet, der Rückenschmerz, der
Schwindel o. dgl. müßte jetzt, z. B. nach einjährigem Bestehen, geheilt sein.
Als wenn wir nicht genug Hysterische (ohne Trauma) kennen, die ihre Rücken-
schmerzen, Schwindel, Kopfschmerzen jahrzehntelang mit sich herumtragen. Man
soll gewiß der Aggravation und Simulation keinen Vorschub leisten, aber man
soll auch nichts behaupten, was man nicht beweisen kann. Das Resultat solcher
unbegründeten Rentenherabsetzungen ist dann sehr häufig, daß die Kranken zwar
die Rente verlieren, aber von nun ab der öffentlichen Armenpflege zur Last fallen.

falls wird man immer gut tun, sein Attest etwa so abzufassen: N. N. klagt über folgende subjektive Beschwerden..... Die Untersuchung ergibt..... Es besteht also keine organische Erkrankung des Nervensystems. Die psychische Untersuchung ergibt..... Die körperlichen Symptome (wenn welche da sind) unterstützen die Angaben des Kranken. Die Angaben des Patienten erscheinen mir auf Grund der Untersuchung (wobei dann nicht nur die körperliche, sondern auch die psychische gemeint ist) glaubwürdig, und ich bescheinige demnach, daß.....

Diese notwendigen Reservationen gelten natürlich nicht für Hausärzte, die ihre Patienten seit langer Zeit kennen, sie können auch manchmal durch eine klinische Beobachtung beseitigt werden, aber ohne diese beiden Voraussetzungen kann man ein schärfer als oben gefaßtes Gutachten in Fällen von Neurasthenie oder Hysterie nicht begründen. In Fällen von traumatischer Neurose kommt daher auch den Erhebungen der behördlichen Instanzen über die wirklichen Arbeitsleistungen eine große Bedeutung zu.

f) Differentialdiagnose der Psychoneurosen.

Wenn wir unter Psychoneurosen nur diejenigen Krankheitsformen verstehen, deren Symptome nicht nur als psychische aufzufassen sind, sondern auch psychogen — durch geistige Erschöpfung oder besondere psychische Ursachen — ausgelöst sind, so haben wir hier zunächst diejenigen Formen auszuschneiden, welche durch körperliche Erkrankungen verursacht sind.

Differential-
diagnose
der Psycho-
neurosen
gegenüber
körperlich
bedingten
Zuständen

In der Tat leidet das Nervensystem unter einer großen Anzahl von körperlichen Erkrankungen mit, und am häufigsten kommen dabei neurasthenische Bilder zur Erscheinung. Ich verweise z. B. auf die weiteren Folgen von akuten Erkrankungen, die einem jeden Praktiker bekannt sind. Wir sehen diese Bilder psychischer Schwäche im Rekonvaleszenzstadium nach Influenza, nach fieberhaften Wochenbetterkrankungen, nach Diphtherie, nach Operationen etc. Es sind die Kranken, die sich „nicht erholen können“, und bei denen neben meistens nur unbedeutenden körperlichen Schwächezuständen, geringen Herzbeschwerden u. dgl., wesentlich die leichte psychische Ermüdbarkeit zu bemerken ist. Sie fühlen sich matt, können kaum einige Minuten lesen, ohne daß sie Kopfschmerzen oder Flimmern vor den Augen bekommen, sie können die Geräusche der Straße, die Anwesenheit spielender Kinder im Zimmer nicht vertragen, sie klagen über Vergeßlichkeit, sind leicht gereizt und andererseits häufig weinerlich gestimmt. Es handelt sich hier sicherlich um die nachdauernden Folgen der Intoxikation des Nervensystems.

Von den psychischen Bildern während der akuten Infektionen will ich ganz absehen. In höheren Graden tragen sie deliranten Charakter, in geringeren verschwinden sie in dem Bilde der allgemeinen Krankheit.

Dagegen ist es wichtig, daß eine große Reihe chronischer körperlicher Erkrankungen sehr häufig neurasthenieähnliche Bilder macht, und daß die an solchen Krankheiten leidenden nur mit den Klagen über

Nervosität zu uns kommen. So entdecken wir chronische Nephritis, Lungentuberkulose, Karzinome. Mitunter werden solche Kranken monatelang als „nervös“ behandelt. Vor solchen Irrtümern kann nur eine gründliche allgemeine Untersuchung schützen.

In vielen Fällen können wir zweifeln, ob eine körperliche Erkrankung oder rein nervöse Störungen vorliegen. Das kommt z. B. bei chlorotischen jungen Mädchen nicht selten vor, bei denen allerdings die nervösen Beschwerden zum großen Teil nicht von der Chlorose abhängen, sondern psychogen sind.

Sehr große Schwierigkeiten machen oft auch nervöse Zustände bei Erkrankungen einzelner Organe, z. B. des Magens oder des Herzens. Wir können die Bedeutung, welche der Organerkrankung einerseits, der Nervosität andererseits zukommt, oft nur auf Grund längerer Beobachtung oder genauer Kenntnis des Patienten abschätzen. Gerade auf diesem Gebiete werden viele Fehler gemacht. Wieviele Leute gibt es, denen der Arzt einen Herzfehler andiagnostiziert hat, und die ein völlig gesundes Herz, aber eine Neurasthenie haben. Andererseits werden viele Erkrankungen, die dem Arzte unklar sind, häufig zunächst als „nervös“ bezeichnet in dem Sinne, daß sie Folge einer allgemeinen Neurasthenie seien. So sehen wir unter denen, die sich als nervös melden, Myokarditiden, Magen- und Duodenalulcera, Gallensteinkranke, Leute mit mächtigen Magendilatationen, chronischen Dünndarmkatarrhen etc.

Die Abtrennung aller dieser auf körperlichen Erkrankungen beruhenden anscheinenden Nervositäten und Neurasthenien ist darum so wichtig, weil sie einer ganz anderen Behandlung bedürfen, als die psychogenen Fälle. Was soll eine alleinige Behandlung der Nervosität bei beginnender Lungentuberkulose, bei Nephritis oder auch nur bei chronischem Darmkatarrh oder bei Magendilatation? Oft hört man den Einwurf, die nervösen Beschwerden sind durch die organischen Veränderungen nicht zu erklären, stehen in keinem Verhältnis zu ihnen. Das können wir eben meist gar nicht wissen. Ein organisch Kranker hat eo ipso auch das Recht nervös zu sein. Der Versuch einer Behandlung der Nervosität schlägt jedenfalls fehl, solange die organische Erkrankung nicht beseitigt ist. Trotzdem ist es in solchem Falle wohl zweckmäßig, dem Patienten zu sagen, seine Beschwerden wären zum Teil „nervös“, zunächst müßte aber das Organleiden behandelt werden. Sollte danach von den nervösen Beschwerden etwas übrig bleiben, wäre es noch immer Zeit, diese für sich zu behandeln. Hoffentlich werde das aber gar nicht nötig sein.

Selbstverständlich sind, um das noch einmal zu betonen, diese Fälle nicht mit jenen zu verwechseln, bei denen Beschwerden von seiten der Organe Ausdruck der Neurasthenie sind, mit den nervösen Dyspepsien, nervösen Herzbeschwerden etc. (vgl. oben S. 242).

Neurasthenische Bilder durch organische Erkrankungen des Nervensystems

Wie ein Symptom körperlicher Erkrankungen kann die Neurasthenie auch Ausdruck organischer Erkrankungen des Nervensystems sein. Ich erinnere hier daran, daß besonders die progressive Paralyse, die Arteriosklerose des Gehirns und die multiple Sklerose unter den

Symptomen der Neurasthenie beginnen können, und daß die Hauptvoraussetzung der Diagnose der eigentlichen Neurasthenie der Ausschluß einer jeden organischen Erkrankung des Nervensystems ist.

Die Umkehrung dieses Satzes gilt jedoch nicht. Die Feststellung einer organischen Erkrankung schließt eine Hysterie nicht aus, vielmehr sehen wir oft eine Hysterie sich auf eine organische Erkrankung, z. B. eine multiple Sklerose aufpfropfen (vgl. auch S. 2).

Ebensowichtig wie die Unterscheidung der Psychoneurosen von den organischen Erkrankungen im engeren Sinne ist ihre Unterscheidung von den Psychosen. Auch hier kann die Differentialdiagnose nur durch die Ausschließung der Psychosen gemacht werden, und man muß also mit den Symptomen der Psychosen und ihren charakteristischen Gruppierungen bekannt sein. Die Unterscheidung ist um so schwieriger, als ja die Psychoneurosen schließlich auch psychotische Veränderungen, wenn auch leichter Art als die eigentlichen Psychosen darstellen. Es ist im Rahmen dieses Buches unmöglich, die Einzelheiten der Unterscheidung auch nur annähernd darzustellen. Nur auf einzelne Möglichkeiten sei aufmerksam gemacht.

Unter-
scheidung
der Psycho-
neurosen
von den
Psychosen

Die Verwechselung der Psychoneurosen mit Psychosen in der Praxis geschieht viel häufiger in der Richtung, daß Psychosen für Psychoneurosen genommen werden, als umgekehrt.

Es kommen da in Betracht gewisse Formen der Dementia praecox, des manisch-depressiven Irreseins und der Melancholie des Rückbildungsalters, drei Erkrankungen, die in sich die große Mehrzahl aller ausgesprochenen Psychosen vereinigen.

Die Dementia praecox ist dadurch charakterisiert, daß sie zu einer Verblödung führt und dadurch von der Hysterie, welche die Intelligenz unberührt läßt, sich prinzipiell unterscheidet. Sie kann in drei Formen auftreten, der paranoiden, der hebephrenen und der katatonischen, Formen, die übrigens mannigfache Übergänge und Wechsel untereinander zeigen. Dabei sei bemerkt, daß die eigentliche Paranoia nach moderner Auffassung ¹⁾ eine außerordentlich seltene

¹⁾ Wir bekennen uns in allen praktisch-prinzipiellen Fragen der Psychiatrie zu Kraepelins Standpunkt. Die Bedeutung der Kraepelinschen Psychiatrie besteht nicht einfach in einer anderen Abgrenzung der Psychosen, als man sie bisher gewohnt war, sondern in der Methode, mit welcher er, Kahlbaum folgend, diese Abgrenzung vorgenommen hat. Diese Methode besteht in der über Jahrzehnte hinaus fortgesetzten Verfolgung der einzelnen Fälle. Indem er feststellte, welche Fälle dauernd gesunden, welche rezidierten, welche in Verblödung übergingen, gelang es ihm, bestimmte prognostische Merkmale des einzelnen Falles zu finden. So sind denn die berühmten beiden großen Krankheitsgruppen der Dementia praecox und des manisch-depressiven Irreseins ganz wesentlich prognostische und daher gerade auch für den Praktiker besonders wichtige Einheiten. Diese ganze Richtung der Psychiatrie ist ein unermeßlicher Fortschritt gegenüber einer anderen, welche die „prognostische Diagnose“ für die Mehrzahl der Fälle von vornherein ablehnt, und keinem Symptomenbild eine bestimmte Prognose zuerkennen will. Sie bleibt durch die besondere Methodik auch ein Fortschritt, wenn sich im Einzelnen an der Abgrenzung der Krankheitsbilder noch so viel ändern sollte.

Erkrankung ist. Es hat sich herausgestellt, daß die sogenannten Paranoiker fast alle später verblöden, daß die Wahnsysteme zerfallen, oder daß paranoische Zustände mit hebephrenen und katatonischen abwechseln. Wir brauchen darauf um so weniger einzugehen, als Wahnbildungen mit der Diagnose Hysterie fast unvereinbar sind. Auch diejenigen Formen der Paranoia, welche nicht zur Dementia praecox gehören, und welche die Intelligenz nicht schädigen, sondern auf der Grundlage einer degenerativen Persönlichkeit in verschiedenen Formen erwachsen, sind jedenfalls von der Hysterie zu trennen. Wie die paranoischen Erscheinungen gehören lebhaft halluzinatorische — mit Ausnahme der erwähnten Dämmerzustände — fast nie in das Gebiet der Hysterie.

Die katatonische Form der Dementia praecox kann insofern mit der Hysterie einige Ähnlichkeit zeigen, als auch bei der Hysterie die eigentümlichen Spannungszustände der Muskulatur vorkommen können, von denen die Katatonie ihren Namen hat: Katalepsie, Flexibilitas cerea, und die Stuporzustände. Das Augenblicksbild kann völlig übereinstimmen. Aufklärung gibt gewöhnlich schon die Anamnese, die bei Hysterie die psychogene Ursache, bei der Katatonie andere vorhergegangene psychotische Symptome ergibt. Ausgesprochene langdauernde kataleptische Zustände sind jedenfalls auf Dementia praecox immer sehr verdächtig, und die ab und zu auftauchenden Zeitungsberichte, daß in irgend einem abgelegenen Dorfe ein Mädchen nach monatelangem Schlaf plötzlich erwacht sei, betreffen wohl fast ausnahmslos Fälle von Dementia praecox.

Am häufigsten werden die leichten Formen beginnender Hebephrenie mit Hysterie verwechselt. Es sind das Personen, die meist um die 20 herum eine auffallende Veränderung des Charakters darbieten. Sie werden gleichgültig, vor allem gegen ihre Familie und ihre Freunde, vernachlässigen ihren Beruf, tun bald überhaupt nichts mehr. Ihr Benehmen wird albern und läppisch ohne ausgesprochenen Affekt. Man ist leicht geneigt diese Fälle dann als „hysterisch“ abzutun, wie man so viel mit dem Worte hysterisch abtut, bis ernstere Erscheinungen auftreten. Die formalen Intelligenzstörungen, auf welche der Name der Dementia praecox hinweist, können im Beginn fehlen und daher die Diagnose sehr schwer sein. Auch die Diagnose und Prognose der Dementia praecox ist keine von denen, die man in der Praxis zu früh stellen wird; man muß aber in solchen Fällen diese Erkrankung im Auge behalten, um bei einer ersten Wendung nicht überrascht zu sein.

In der Gruppe des manisch-depressiven Irreseins sind alle diejenigen Psychosen aufgegangen, die man früher als Manie, Melancholie, als periodische und zirkuläre Psychosen bezeichnete. Mit der Hysterie haben alle diese Psychosen im Unterschied von der Dementia praecox eins gemein, daß sie ohne Intelligenzdefekt verlaufen¹⁾, und daß sie im Prinzip heilbar sind, daß wenigstens aus den einzelnen Anfällen

¹⁾ Der Begriff der sekundären Demenz ist aus der modernen Psychiatrie verschwunden.

der Psychose die Persönlichkeit unverändert hervorgeht, wenn auch immer neue Anfälle drohen. Zu Verwechslungen mit Hysterie und Neurasthenie führen fast ausschließlich die depressiven (melancholischen) Zustände. Diese sind in ausgesprochener nicht zu verkennender Form charakterisiert durch den tiefen depressiven Affekt mit seinen Folgen, den Kleinheitsideen, Versündigungsideen, manchmal schweren hypochondrischen Ideen, sehr häufig durch außerordentliche Angst, durch die motorische Hemmung. Nun gibt es aber ganz leichte Verlaufsformen des manisch-depressiven Irreseins, die man auch als „zyklothyme“ bezeichnet hat. Dazu gehören viele der Personen, die heute himmelhochjauchzend, morgen zu Tode betrübt sind, und auch diese werden oft zu Unrecht und manchmal ihr ganzes Leben lang als hysterisch bezeichnet. Eine leichte depressive ängstliche Periode kann ja auch außerordentlich einem hysterischen oder neurasthenischen Zustand gleichen. Die Differentialdiagnose ist durch die Anamnese im allgemeinen unschwer zu stellen. Charakteristisch ist, daß diese Anfälle, die Tage bis Wochen dauern, ganz ohne Ursache kommen und gehen, und bei der gleichen Person meist in der gleichen Weise verlaufen. Die Kranken selbst empfinden diese unerklärliche Hemmung, die auf ihnen lastet, meist viel schwerer als die Hysterischen. Nur selten ist bei der Zyklothymie eine psychische Ursache für die depressiven Perioden, Trauerfall, Aufregung, festzustellen, so oft auch eine solche von der Umgebung, die ja für alle Krankheiten die psychische Ursache immer bereit hat, angeschuldigt wird. Die genauere Anamnese ergibt dann doch meist, daß die Depression wahrscheinlich auch dann eingetreten wäre, wenn die psychische Ursache ausgeblieben wäre, und daß in anderen Fällen psychische Shocks viel schwererer Art von derselben Person ohne jede Depression vertragen wurden.

Sowohl von den Zyklothymen, wie von der Hysterie sind die konstitutionell dauernd depressiven Naturen zu unterscheiden, und ebenso scheinen diejenigen, die nur auf entsprechende Affekte mit besonders starken und langedauernden depressiven Perioden reagieren, eine besondere Gruppe zu bilden.

Eine andere Form der Melancholie ist die nicht periodische, die nur einmal im Leben und zwar im Rückbildungsalter, meist um das 50. Jahr (beim Manne sowohl wie bei der Frau) auftritt. Sie zeichnet sich in ihren schweren Formen durch besonders lebhaftes Angst aus, die Symptome sind im übrigen die gleichen wie die oben geschilderten. In ihren leichten Formen wird sie sehr häufig verkannt und als Neurasthenie, hypochondrische Neurasthenie oder dgl. bezeichnet.

Die Bedeutung der Unterscheidung der Psychoneurosen von den depressiven Zuständen des manisch-depressiven Irreseins und der Melancholie des Rückbildungsalters liegt in der Verschiedenheit der Prognose und der Therapie. Auch die leichtesten Formen der Depression sind einer Therapie unzugänglich. Sie kommen und gehen, wann es ihnen beliebt. Sie bedürfen nicht der Therapie, sondern der Aufsicht wegen der großen Suizidgefahr in den Anfällen der depressiven Angst. Daß Hysterische sich das Leben nehmen, kommt demgegenüber nur sehr selten vor; sie sind ja geradezu bekannt durch die demonstrative Art,

Suizid

wie sie Suizidversuche in Szene setzen. Immerhin kann man die Suizidgefahr auch bei Psychoneurosen nicht ganz ablehnen, und es kann sogar im einzelnen Falle viel schwerer sein, ihr bei Psychoneurosen zu begegnen, als bei Melancholischen. Denn die letzteren gehören, wenn sie suizidverdächtig sind, in eine geschlossene Anstalt. Auf die Psychoneurosen aber hat die Verbringung in geschlossene Anstalten meist einen sehr ungünstigen Einfluß. Man muß sich also mit einer unauffälligen, aber auch demgemäß unvollkommenen Überwachung begnügen. Falsch ist es, die Berührung der Suizidgedanken im Gespräch mit dem Patienten zu vermeiden; es ist im Gegenteil sehr nützlich, in den psychotherapeutischen Gesprächen (s. unten) auch diesen Punkt mit aller Offenheit und Klarheit zu erörtern.

g) Therapie der Psychoneurosen.

Therapie
der Psycho-
neurosen

Die Therapie der Psychoneurosen ist eine außerordentlich mannigfaltige. Welchen Weg man im einzelnen Fall einschlägt, das hängt nicht nur vom Krankheitsherde ab, sondern auch von den Bedingungen, unter denen der Kranke lebt, ferner von der Persönlichkeit des behandelnden Arztes und dessen Anschauungen.

Bedeutung
der
Diagnose

Über einen Punkt dürfte aber wohl Einstimmigkeit herrschen, daß gerade bei den Psychoneurosen die ganze Behandlung von einer richtigen Diagnose abhängt. Wer nicht sicher ist, ob er eine Psychose oder eine organische Nervenkrankheit oder eine Organkrankheit vor sich hat, kann überhaupt nicht behandeln. Denn durch eine Behandlung, welche geneigt ist, die psychoneurotischen Beschwerden des Kranken als organisch anzusehen, müssen dem Kranken immer neue Krankheitssuggestionen gegeben werden.

Wie kann ein Arzt, der nicht sicher ist, ob die anscheinende Hysterie nicht doch eine Tabes ist, einen Standpunkt für die Behandlung finden? Ist auch über diese Unterscheidung der organischen von der funktionellen Erkrankung in diesem Buche genugsam gesprochen worden, so sei nur noch einmal kurz als die unerläßliche Bedingung einer wirklichen Therapie die sichere Unterscheidung der beiden Gruppen betont.

Was die Unterscheidung von Organkrankheiten anlangt, so besteht für die praktische Therapie die Regel, in zweifelhaften Fällen nicht zu schnell mit der Diagnose neurasthenischer Herzbeschwerden oder nervöser Dyspepsie oder dgl. zu sein. Hat man irgendwelche Zweifel, so bestelle man den Kranken wieder oder unterwerfe ihn einer klinischen Beobachtung. Man braucht auch vor den Errungenschaften der neueren Magen- und Herzdiagnostik nicht zurückzuschrecken aus Furcht, den Kranken ängstlich zu machen. Im Gegenteil sind solche Untersuchungen (mit Röntgenstrahlen, Magenaufblähung, Urethroskopie u. dgl.) nur geeignet, dem Kranken die Überzeugung beizubringen, daß er so gründlich untersucht ist, wie möglich, und daß also die endliche Diagnose gut begründet ist. Man darf natürlich nicht kleine Abweichungen vom „normalen“, z. B. kleine sogenannte Hyper- oder Hypaziditäten, im Sinne einer organischen Veränderung werten, wozu Spezialisten zu-

weilen geneigt sein mögen. Wenn dann die Diagnose der neurasthenischen Herz- oder Darmbeschwerden gestellt werden kann, so muß man nunmehr mit aller Entschiedenheit daran festhalten; immer aber sei man bereit, solange sich solches Verlangen des Patienten in einigermaßen vernünftigen Grenzen hält, den Kranken auch körperlich wenigstens auskultatorisch und perkutorisch wieder zu untersuchen. Was eine einmalige Untersuchung nicht bewirkt hat, nämlich den Kranken zu beruhigen, bewirkt manchmal eine dreimalige. Nur in Ausnahmefällen wird man sich weigern dürfen, und den Kranken dadurch mehr überzeugen, daß man unter Berufung auf frühere Untersuchungsergebnisse eine nochmalige Untersuchung ablehnt.

Wenn man die Überzeugung gewonnen hat, daß weder körperliche Krankheit, noch organische Nervenkrankheit, noch Psychose vorliegen, sondern psychoneurotische Symptome, so muß man sich ein Bild machen von dem, was im Einzelfalle günstigsten Falles zu erreichen sein wird. Es hängt das zunächst von der Persönlichkeit des Kranken ab. Es war ja oben schon darauf eingegangen, daß die psychoneurotischen Symptomenkomplexe auf dem Boden abnormer Anlagen der verschiedensten Art erwachsen können. Eine Verbrechernatur bleibt eine Verbrechernatur, auch wenn der hysterische Dämmerzustand und die hysterische Anästhesie beseitigt sind. Wir werden auch aus einem haltlosen, jedem Einfluß sich hingebenden schwächlichen Charakter keine Kraftnatur machen, ebensowenig wie wir die geborenen Prahler und Renommisten in bescheidene und sichere Persönlichkeiten umwandeln können. Auch die diesen Zuständen nahestehende typische *Pseudologia phantastica* (S. 259), jene Unmöglichkeit, Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden, ist das Zeichen einer degenerativen Anlage, die wir beim Erwachsenen nicht mehr ändern werden, und die auch in der Kindheit besondere und durch Jahre fortgesetzte Erziehung verlangt. Eine besondere Aufmerksamkeit müssen wir auch von vornherein der Frage zuwenden, ob nicht ein geringer oder gar mittlerer Grad von Imbezillität vorliegt, der natürlich nicht nur nach der Behandlung bestehen bleibt, sondern auch die Chancen jeder Behandlung von vornherein ganz erheblich herabsetzt. So gibt es eine ganze Reihe von Fällen, wo der pathologische Charakter so überwiegend ist, daß jede Therapie aussichtslos ist.

Prognose
der
Therapie

Dagegen bieten Schwere und Dauer der einzelnen psychoneurotischen Symptome und Syndrome keine Kontraindikation gegen die Therapie, und nicht einmal eine besonders schlechte Prognose.

Eine besondere Stellung zur Therapie nehmen zunächst die eigentlichen Erschöpfungszustände ein, sei es, daß sie durch körperliche Krankheit oder auch durch geistige Überarbeitung bedingt sind; es genügt hier in vielen Fällen eine einfache Ruhekur, die man am besten natürlich nicht innerhalb einer Großstadt, sondern auf dem Lande, in einem Sanatorium, in einem Badeort oder dgl. durchmachen lassen wird. Dabei sind eine Überernährung und leichte hydriatisch-physikalische Maßnahmen am Platze, und die Hebung des Körpergewichts ist meist

Therapie
der Er-
schöp-
fungszu-
stände

dann ein Maßstab für die Wiederherstellung der psychischen Gesundheit. Zu bemerken ist, daß man sich im allgemeinen scheut, Nervöse in das Hochgebirge (über 1000 m) oder an kräftige Seebadeorte zu schicken. Es ist das in der Tat ein Risiko, weil die Schlaflosigkeit und auch die Unruhe- und Angstzustände sich bei vielen dort nur steigern. Trotzdem gibt es eine ganze Anzahl Neurosen, denen nichts besser bekommt, als die Nordsee oder das Engadin. Man kann sich hier einmal auf die Angaben der Patienten stützen, daß ihnen die See oder das Hochgebirge schon früher gut bekommen sei, und man kann auch versuchen, die Kranken nach einer gewissen Erholung in mehr indifferenten Orten, dann zum Schluß in das Hochgebirge oder an die See zu schicken.

Es sei aber noch einmal wiederholt, daß nicht alles, was als Erschöpfungsneurasthenie geht, allein durch Überarbeitung bedingt ist, sondern daß psychische Emotionen oder auch die Autosuggestion der einmal wirklich dagewesenen, aber längst beseitigten Erschöpfung dabei eine große Rolle spielen kann. Man muß also jedenfalls nach solchen Ursachen forschen und ein Urteil zu gewinnen suchen, welche Bedeutung ihnen im Gesamtbilde zukommt, und ob man wohl zunächst wagen darf, sie zugunsten der reinen Ruhekur zu vernachlässigen. Gar keinen Sinn hat es, Neurasthenische, die schon einmal eine solche Ruhekur durchgemacht, sich dabei auch leidlich befunden haben, sofort nach der Rückkehr aber wieder krank und arbeitsunfähig geworden sind, noch einmal wegzuschicken. Hier liegen dann jedesmal noch andere Ursachen vor, die man durch eine Ruhekur nicht beseitigt.

Allgemeine
Lebensweise
Nervöser

Hier ist dann auch wohl der Ort für einige Bemerkungen über die allgemeine Lebensweise der Nervösen, solange sie nicht in klinischer Behandlung sind. Daß man sie vor allen Erregungen möglichst warnen muß, ist selbstverständlich. Leider hat man damit nur wenig Glück, wenn diese Erregungen eine objektive Unterlage haben, z. B. Sorgen um die Existenz, Familienkonflikte. Auch eine Einschränkung beruflicher Tätigkeit ist eben oft nicht zu erzwingen. Einiges läßt sich nach dieser Richtung aber immerhin durch die bestimmte Verordnung der Einhaltung einer gewissen Schlafenszeit, und auch durch Einschiebung von einer oder zwei Ruhepausen am Tage erreichen, die durch Liegen oder durch Spazierengehen auszufüllen sind. Auch eine sportliche Betätigung läßt sich wenigstens zweimal in der Woche bei kräftigen Menschen trotz Berufs meist durchsetzen — Fechten, Schwimmen, Turnen etc.

Diät

Für eine Einschränkung der Diät bietet die Nervosität im allgemeinen keine Anzeige. Dafür ist, wie bemerkt, eher eine Überernährung am Platze und zwar durch gemischte Diät. Es ist von hervorragender Seite empfohlen worden, Nervöse (allerdings bei klinischer Behandlung) zunächst einige Zeit auf reine Milchdiät zu setzen; der Grund ist absolut nicht einzusehen.

Nährpräparate können in demselben Maße angewendet werden, wie sie in Anbetracht des körperlichen Zustandes erwünscht erscheinen. Ein — man kann es gar nicht anders bezeichnen — unglaublicher Unfug wird jetzt mit der populären Anpreisung von Lezitinpräparaten als

„Nervennahrung“ getrieben. Es ist in gar keiner Weise erwiesen oder auch nur wahrscheinlich, daß das eingeführte Lezitin etwaige Verluste an Nervensubstanz ersetzen kann. Selbst die wissenschaftlichen Arbeiten über Lezitinstoffwechsel bei Nervenkrankheiten, z. B. Tabes, stützen sich alle noch auf eine ganz unzureichende Bestimmungsmethode.

Verboten werden im allgemeinen der Alkohol und der Kaffee. An und für sich wäre gegen ein Glas Wein zu Tisch oder ein Glas Bier zum Abendbrot auch bei Nervösen nichts einzuwenden, wenn sie nicht diese Grenze häufig alsbald überschreiten würden, und daher ist das absolute Verbot meist durchaus am Platze. Das Rauchen muß wenigstens auf ein Minimum eingeschränkt werden, und manche Raucher wählen dann spontan an Stelle der Einschränkung die volle Entziehung. Eine Hauptsache bei allen diesen Dingen ist, daß die Verordnungen des Arztes auch wirklich durchgeführt werden, und daß der Arzt sich nicht düpiieren läßt, sondern, wenn er Verdacht schöpft, betont, daß er jede Verantwortung ablehne, wenn seine Verordnungen nicht strikte befolgt würden.

Häufig wird dann noch von Männern nach der erlaubten Häufigkeit des Koitus gefragt. Man braucht da im allgemeinen keine Einschränkung der Gewohnheiten des Patienten eintreten zu lassen.

Abgesehen von den Erschöpfungszuständen muß die Behandlung der psychoneurotischen Symptome in allererster Linie eine psychotherapeutische sein. Man sollte meinen, daß diese Überzeugung angesichts des psychischen Ursprungs aller psychoneurotischen Symptome eine allgemeine sein sollte, und doch wird von vielen Praktikern eine planmäßige Psychotherapie noch immer ironisch behandelt. Zur Psychotherapie werden die Kranken erst dann bestimmt, wenn der ganze „Heilschatz“ der physikalischen und der pharmakologischen Mittel erschöpft ist, die Kranken galvanisiert, faradisiert, franklinisiert, mit Packungen, mit heißen, kalten und wechselwarmen, mit Kohlensäure-, Fichtennadel- und Vierzellenbädern, mit Badekuren, mit Brom, Arsen, Antineuralgizis und Narkotizis gehörig traktiert worden sind. Diese Mittel sind ja alle nicht von vornherein zu verwerfen, aber sie bleiben in weitaus der Mehrzahl der Fälle ohne genügende und nachhaltige Wirkung, wenn sie nicht in bewußter und geschickter Weise als Hilfsmittel und nur als Hilfsmittel einer psychotherapeutischen Behandlung zur Anwendung gebracht werden. Es bringt die Einrichtung besonderer Institute für einzelne Zweige der Therapie, wie z. B. die Hydrotherapie, leider mit sich, daß jeder Patient sich von vornherein selbst die Therapie verschaffen kann, die er für richtig hält; denn ein Arzt oder ein Institut, die sich speziell für Hydrotherapie empfehlen, werden den Kranken, wenn es nur irgend möglich ist, mit Hydrotherapie behandeln, und die Lehrbücher der Hydrotherapie zeigen, daß eben alle Krankheiten der Hydrotherapie zugänglich sind.

Psycho-
therapie

Eine gewisse und nicht ganz gering anzuschlagende Psychotherapie liegt nun schon in der Persönlichkeit des Arztes, aber es ist sicherlich nicht richtig — was man vielfach hört — daß die ganze Psychotherapie nichts als eine Wirkung dieser Persönlichkeit, und daß

Persönlich-
keit des
Arztes

es nicht nötig sei, psychotherapeutische Regeln und Gesetze aufzustellen. Die Wirkung der sogenannten Persönlichkeit, die oft nur eine äußerliche ist, verfliegt sehr rasch.

Ärztliche
Vorurteile

Wenn die planmäßige Psychotherapie noch immer nicht die absolute Anerkennung gefunden hat, die ihr gebührt, so beruht das sicherlich zum Teil auf dem latenten Vorurteil, daß bei ihr die wissenschaftliche Grundlage nicht gegeben, daß sie eine Art Charlatanerie sei. Nun, fester als die der Elektrotherapie, ist die Grundlage der Psychotherapie jedenfalls, und nebenbei ist die Psychotherapie auch noch eine Kunst, was man von der Elektrotherapie wohl nicht sagen kann. Eine vernünftige Psychotherapie kann Kranke dem Siechtum entreißen, und — was noch wichtiger ist — die Unterlassung der Psychotherapie und die kritiklose Anwendung aller möglichen anderen Mittel kann beinahe gesunde Menschen in schwer kranke verwandeln. Es muß im Prinzip die Forderung aufgestellt werden, daß — soweit es die Umstände irgend gestatten — neben den soeben genannten Arten der Allgemeinbehandlung Nervöser bei Psychoneurosen nur mit psychotherapeutischen Methoden vorgegangen wird.

Aufklärung
der
psychischen
Ursache

Vorurteile
des
Publikums

Wenden wir uns also zunächst der idealen reinen Psychotherapie zu, so ist deren erster Zweck, dem Kranken überhaupt begreiflich zu machen, daß seine Beschwerden psychisch bedingt sind. Damit muß man nun freilich sehr vorsichtig sein. Denn der Annahme einer solchen Belehrung stehen zwei Vorurteile des Publikums gegenüber. Entweder hält es jede psychische Krankheit für eine „eingebildete“. Es fühlt sich daher mit der Annahme einer psychischen Erkrankung beleidigt — und wenn man ihm noch so eindringlich versichert, daß seine Beschwerden wirklich vorhanden, aber doch psychisch bedingt seien, vermag es das nicht einzusehen. Das zweite Vorurteil des Publikums ist dieses, daß psychische Erkrankungen unheilbar seien. Psychische Erkrankungen sind dem Publikum gleichbedeutend mit Verrücktheit, und wer einmal verrückt oder gar in einer Anstalt war, der ist und bleibt für die meisten Laien — auch für viele Ärzte — gezeichnet, verdächtig und geisteskrank sein Leben lang. (Daher ja auch die ungeheure Abneigung, wirklich Geisteskranke in eine Anstalt zu bringen.) So muß man denn, wenn einem daran liegt, den Kranken öfter als einmal zu sehen, mit größter Vorsicht zwischen der Scylla der eingebildeten Krankheit und der Charybdis der Verrücktheit hindurchzukommen versuchen. Man kann natürlich das Wort „nervenkrank“, das der Kranke ja hören will, von vornherein nicht vermeiden, aber man mache es sich zur Regel, nichts zu sagen, was man später nicht aufrecht erhalten kann. Denn die Kranken behalten oft mit unglaublicher Genauigkeit den Wortlaut der ersten ärztlichen Äußerungen, um ihn später dem Arzte zur Herstellung von Widersprüchen vorzuhalten.

Man muß herausfühlen, wie weit man bei der ersten Konsultation mit der Andeutung des psychischen Faktors gehen darf, jedenfalls tut man gut, von vornherein das Hauptgewicht auf die Erschöpfung oder Ermüdung des „ganzen“ Nervensystems zu legen. Auf dieser Grund-

lage ist dem Kranken später die psychische Ursache am ehesten verständlich zu machen. Und weiter darf man von vornherein auf keinen Fall dem Kranken zugeben, daß eine lokale „Nervenzündung“, eine „Herzschwäche“, eine „Magenerweiterung“ vorliege, oder ihn mit dem stolzen Bewußtsein entlassen, daß er „zuviel Magensäure“ habe oder dgl. Der Arzt muß auch hier, um später nicht mit seinen eigenen Waffen von dem Kranken geschlagen zu werden, jedes Wort sorgfältig erwägen. Insbesondere bei den neurasthenischen Organstörungen betone er, daß die Organe, z. B. das „Herz selbst“ vollständig gesund seien.

Wenn man diese Belehrung richtig, geschickt und mit derjenigen Sicherheit gibt, die nur eine gute objektive Untersuchung gestattet, so ist dem Kranken schon dadurch manchmal sehr erheblich geholfen.

Eine weitere Unterstützung erhält die Behandlung dadurch, daß der Arzt die einzelnen auslösenden Ursachen der psychoneurotischen Erkrankung aufdeckt. Manchmal kennt sie der Patient selbst; oft jedoch ist er nicht geneigt, einen Zusammenhang zwischen den affektbetonten Erlebnissen, um die es sich meistens handelt, und seiner Erkrankung anzunehmen oder zuzugeben. Vielmehr betont er oft, daß diese Erlebnisse, deren zeitlichen Zusammenhang mit der Erkrankung er nicht bestreiten kann, ihn gar nicht aufregt, gar nicht erschüttert hätten, und es ist dann die Aufgabe, ihn von dem wahren Zusammenhang zu überzeugen. Man darf sich — wie schon erwähnt — auch nicht mit der Angabe des Patienten, er hätte sich überarbeitet, zufrieden geben. Meist haben da noch andere Dinge, z. B. Erlebnisse sexueller Natur oder Zurücksetzungen im Amt etc. mitgespielt, Dinge, mit denen der Kranke erst ganz allmählich herausrückt. Es ist nicht gut, daß der Arzt in einer Untersuchung alles aus dem Patienten herauszudrücken versucht. Der Patient, der eine natürliche Scheu hat, Dinge, die ihm peinlich sind, einem Unbekannten sogleich zu äußern, wird dadurch abgeschreckt.

Die Aufdeckung der psychischen Ursache der Beschwerden trägt natürlich sehr viel dazu bei, ihn auch von deren psychogenen Natur zu überzeugen.

Es ist einerseits Sache der Geschicklichkeit, die Fäden, welche die Symptome mit den Ursachen verbinden, im einzelnen aufzurollen, andererseits Sache des Takts und der richtigen Beurteilung des einzelnen Falls, zu wissen, wie weit man zweckmäßig in der Analyse geht.

Am weitesten geht darin die Freudsche Psychoanalyse, deren Ergebnisse und Folgerungen wir aber in keiner Weise als bindend anerkennen können.

Freudsche
Psycho-
analyse

Da es sich hier aber um Dinge handelt, nach denen der Arzt heute in der Praxis vielfach gefragt wird, sei hier das wesentlichste zur Kritik der Theorie und der Methode mitgeteilt.

Nach Freud ist die Quelle der Hysterie immer ein sexuelles Trauma, das in der Kindheit (vor dem 8. Lebensjahr) eingewirkt hat. Es gibt keine Hysterie ohne ein solches Trauma. Dieses Trauma wirkt durch die Zurückhaltung des ihm normalerweise zukommenden Affektes, der nun „verdrängt“ oder „eingeklemmt“ wird und zeitlebens bereit ist, bei einer akzessorischen Veranlassung aus dem Unbewußten heraus, eben die hysterischen Symptome, besonders auch die körperlichen

Symptome zu erzeugen. Die Ursache der Hysterie kann man nur beseitigen, wenn man dieses sexuelle Trauma der Kindheit ausfindig macht, es aus der Verdrängung löst; darin besteht also die Behandlung: eine Psychoanalyse bis zur Entdeckung dieses sexuellen Kindheitstraumas durchzuführen.

Man muß die Analysen von Freud und seinen Schülern lesen, um zu sehen, zu welcher Sexualitätsschnüffelei diese Methode führt. Der Patient kann über seine psychischen Erlebnisse erzählen, was er will, immer wird die unbewußte sexuelle Beziehung hineingedeutet. Ich zitiere mit Absicht keine Einzelheiten aus den Analysen, die Freud und seine Schüler publiziert haben, weil man glauben würde, die Wirkung des Wiedergegebenen beruhe darauf, daß die Einzelheiten ohne Zusammenhang sind.

Zu widerlegen und nachzuprüfen sind natürlich die Anschauungen von Freud nicht. Wer durch seine Analysen zu dem Ergebnis kommt, daß die Genese der Hysterie eine kompliziertere ist, und daß sie nicht nur auf sexuellem Grunde ruht (s. oben), zieht sich eben den Vorwurf zu, daß er nicht verstehe, zu analysieren. In der Tat kann Psychoanalysen, wie Freud, eben nur jemand machen, der von vornherein überzeugt ist, daß es gilt, das sexuelle Trauma zu finden, koste es, was es wolle, und daß es erlaubt ist, alle anderen Wege zu vernachlässigen. Das kann natürlich derjenige nicht, der zu sehen glaubt, wie Freud seinen Patienten die sexuellen Motive suggeriert, wie er ihre Erinnerungen fälscht, und der es nicht für gleichgültig hält, wenn Kranke bei diesen Analysen monatelang und jahrelang — eine Analyse kann 6 Monate bis 3 Jahre in Anspruch nehmen — mit der Schilderung sexueller Vorgänge unterhalten werden. Wie Freud auf der einen Seite zugeben kann, dem Patienten „bewußte Erwartungsvorstellungen“ zu geben, und auf der anderen die Suggestion leugnen kann, das bleibt sein Geheimnis. Es gibt auch eine Grenze, wo über alle noch so wissenschaftlich gemeinten Auslegungen der gesunde Menschenverstand ein Recht hat, sein Veto einzulegen, z. B. wenn die kleinsten Kinder die Exkremente zurückhalten, „um sich dadurch einen „sexuellen Lustgewinn“ zu verschaffen. Diese Grenze ist auch erreicht in der hier als Beispiel anzuführenden Analyse der Phobie eines 5jährigen Knaben, die von den Anhängern Freuds gewiß für ein Beweisstück ersten Ranges gehalten wird. Hier handelt es sich um einen 5jährigen Jungen, der das Unglück hatte, von Eltern erzogen zu werden, die als Anhänger der Freudschen Theorien von vornherein das Bestreben hatten, den Jungen erstens mit „nicht mehr Zwang zu erziehen, als zur Erzielung guter Sitte unbedingt erforderlich sein sollte“, und die zweitens die Entwicklung seines Sexuallebens beobachten wollten. Dieser Junge bekommt eine Phobie vor Pferden, und der Vater — wohl auch ein Arzt — schreibt sofort an Freud: „Sexuelle Übererregung durch Zärtlichkeit der Mutter hat wohl den Grund gelegt, aber den Erreger der Störung weiß ich nicht anzugeben. Die Furcht, daß ihn auf der Gasse ein Pferd beißen werde, scheint irgendwie damit zusammenzuhängen, daß er durch einen großen Penis geschreckt ist — den großen Penis des Pferdes hat er schon zeitig bemerkt, und er hat daraus den Schluß gezogen, daß die Mama, weil sie so groß ist, einen Penis haben müsse wie ein Pferd.“ Nun wird später festgestellt, daß die Angst von dem Augenblick datiert, als der Junge einmal ein Pferd hat umfallen sehen. Ehe man aber diesen einfachen Vorgang entdeckt, hat man bereits 3 Monate analysiert, ein Beispiel für die Objektivität dieser Analysen. Es ist doch ein reiner Zufall, daß dieser Vorfall überhaupt der Analyse bekannt geworden ist. Aber dieser Vorfall, der wohl den meisten nun als Quelle der Angst genügen würde, kann ja der Grund nicht sein, sondern nur der „aktuelle Anlaß“, und die Analyse beginnt also wieder von neuem. Den Vater, der die Analyse selbst macht, scheint die Aufdeckung des wirklichen Erschreckens vor dem gefallenen Pferde gar nicht zu rühren, sondern er fragt einen 5jährigen Jungen — 3 Monate nach dem Vorfall —: „Hast Du, wie das Pferd gefallen ist, an den Vati gedacht?“, weil er nämlich der festen Überzeugung ist, der Junge habe den Wunsch gehabt, den Vater, auf den der Junge der Mutter wegen sexuell eifersüchtig sein soll, tot umfallen zu sehen. Der Junge antwortet: „Vielleicht. Ja. Es ist möglich.“ Und das soll keine Suggestion sein?

Wenn das nun schon bei einem Kinde geschieht, so denke man sich erst die

Art (oder sehe sie in der Freudschen Schrift nach), wie Erwachsenen allmählich das in der Kindheit erlittene sexuelle Trauma glaubhaft gemacht wird.

Es versteht sich von selbst, daß Freud bei allen, die ihm nicht zustimmen, Übelwollen voraussetzt, daß er „nur für diejenigen schreibt, welche sich eine Überzeugung von der Objektivität des pathogenen Materials bereits erworben haben“. Man soll also glauben.

Wir glauben aber nicht, sondern wir wollen Beweise, und an Stelle von Beweisen bringt man uns phantastische Konjekturen.

Selbst wenn es wahr wäre, daß nämlich jede Hysterie auf ein sexuelles Trauma zurückzuführen sei, so wäre damit noch keineswegs ausgesprochen, daß die Aufdeckung dieses Traumas und die „Abreagierung“ des mit ihm verbundenen Affekts nun auch die Heilung der Hysterie bewirke, ja, noch nicht einmal, daß es auch nur zweckmäßig sei, von vornherein jeder Hysterischen auf den Kopf zuzusagen, daß ihre Erkrankung sexuellen Ursprungs sei, und sie nun monatelang nach ihrem Sexualleben auszuforschen. Der Beweis für den überwiegenden Erfolg dieser Therapie ist in den Arbeiten der Freudschen Schule durchaus nicht erbracht.

Dazu kommt, daß von Freudschülern alles mögliche, was mit Hysterie gar nichts zu tun hat, auf sexuelle Traumata analysiert wird, z. B. Stottern und Heuschnupfen.

Es kann aber überhaupt nicht zugegeben werden, daß die Sexualität die ausnahmslose Ursache der Hysterie ist. Viele Hysterien sind ganz unabhängig von der Sexualität, und so behalten wir nach der Freudschen Methode nur das Prinzip der weitgehenden Analyse des psychogenen Ursprungs der hysterischen Erscheinungen und halten für nicht weniger wichtig die Analyse des ganzen, auch mit den hysterischen Symptomen nicht direkt in Zusammenhang stehenden Bewußtseinsinhaltes des Kranken, führen diese Analyse aber unbefangen nach allen Richtungen und nicht nur nach der Sexualität.

Ohne Berührung des Sexualgebietes geht es allerdings nicht ab. Oft wird uns ein völlig normales Sexualleben glaubhaft beschrieben. Es macht aber keinerlei Schwierigkeiten, wenn sich in sexuellen Affekten Mitursachen des neurasthenischen oder hysterischen Zustandes zu ergeben scheinen, diesen Ursachen nachzugehen. Wie man dabei z. B. das Traumleben benutzt, ist von Freud gezeigt worden. Nur muß es abgelehnt werden, nun alle Träume sexuell zu deuten. Auch glaube ich, daß aus dem wachen Bewußtsein des Kranken meist schon das wesentliche über seine Sexualerlebnisse herauszuholen ist, wenn er nur erst das Peinliche dieser Mitteilungen überwunden hat. Diejenigen Dinge, die der Patient nicht erzählen will, von denen er wohl angibt, daß er mit ihnen längst fertig sei, erweisen sich dann in der Tat meist als die wichtigsten.

Um ein ganz einfaches Beispiel herauszugreifen, so ließ es sich in einem Falle unschwer feststellen, daß die schwer neurasthenischen Beschwerden eines jungen Mädchens von dem Augenblicke an datierten, als sie einem jungen Manne einige Vertraulichkeiten gestattet hatte. Seit Jahren machte sie sich über diese Stunde Vorwürfe, sie übertrieb die Größe ihrer Schuld, von der sie zu niemandem gesprochen hatte, ganz

grotesk, und sie war beinahe geheilt, als sie hörte, daß andere Leute von diesen Dingen eine wesentlich abweichende Auffassung hätten, daß von einer Schuld keine Rede sei, daß sie sich auslachen lassen solle etc. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die katholische Beichte in manchen ähnlichen Fällen eine Prophylaxe psychogener Krankheitszustände herbeiführt.

Wichtig ist es andererseits auch, dem Kranken begreiflich zu machen, daß auch unbewußte psychische Vorgänge als Ursachen seiner Krankheitserscheinungen eine Rolle spielen. Es macht sich das ganz von selbst, und die Kranken finden sogar häufig eine gewisse Befriedigung darin, selbst solche Beispiele zu finden und zur Prüfung vorzulegen.

Ganz von selbst kommt es in diesen psychoanalytischen Gesprächen nicht nur zu einer Analyse der Krankheitssymptome, sondern auch zu einer Analyse der ganzen psychischen Persönlichkeit des Kranken, besonders derjenigen Charakterzüge, welche zu der psychischen Erkrankung disponierten, weiter zu einer Berichtigung falscher Auffassungen und falscher Wertungen. Ich empfehle einem jeden Arzt, der sich für diese Dinge interessiert, die Lektüre der Schriften von Dubois¹⁾. Sie sind für die Art des Verkehres mit dem Kranken sehr belehrend, so wenig tief die philosophische Grundlage und so unnötig die ethisch-moralisierenden Tendenzen in ihnen erscheinen können.

Es genügt, dem Kranken gegenüber den Standpunkt des empirischen Arztes und Psychologen einzunehmen, und ihn anstatt der Moral auf die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge und die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit einer Änderung seines Zustandes zu verweisen.

Bei dieser Analyse der ganzen Persönlichkeit finden wir dann auch Gelegenheit, die falschen Auffassungen des Kranken von seiner Krankheit und deren Ursachen zu beseitigen. Wir kommen damit schon in ein Gebiet der Psychotherapie, das man neuerdings als Persuasion bezeichnet hat. Eine Persuasion ohne Analyse (aber nicht im Freudschen Sinne) ist aber überhaupt nicht möglich, sondern beide müssen sich aufs innigste verbinden. So führen eine Anzahl von Kranken ihre Beschwerden auf früher einmal geübte Onanie zurück, und sind außerordentlich erstaunt und erfreut, wenn man wahrheitsgemäß ihnen mitteilt, daß die Onanie verhältnismäßig sehr harmlos ist, daß sie Tausende üben, ohne jemals davon einen Schaden zu sehen. In dieser wie in vielen anderen Beziehungen stellt es sich oft heraus, daß der Kranke eine große Anzahl populärer oder auch wissenschaftlicher Bücher durchsucht hat, um sich eine falsche Theorie seiner Krankheit, ihre Unheilbarkeit, und neue Krankheitssymptome zu suggerieren.

Man muß dem Kranken es also allmählich beibringen, wie falsch er seine Symptome wertet und welche Rolle die Autosuggestion dabei spielt. Das allgemeinste Beispiel dafür ist die Schlaflosigkeit. Bei den meisten Kranken setzt sich die Schlaflosigkeit dadurch fort, daß sie schon mit dem Gedanken zu Bette gehen, nicht schlafen zu können,

¹⁾ Die Psychoneurosen und ihre seelische Behandlung. 2. Aufl. Bern 1910.

und mit dem anderen, am Tage nach einer nicht durchschlafenen Nacht krank und arbeitsunfähig zu sein. Diese Kranken lernen wieder schlafen, wenn man sie überzeugt hat, daß sie den Schlaf verscheuchen, indem sie auf ihn warten, daß es gar nicht so wichtig ist, ob sie schlafen oder nicht, und daß die Leistungsfähigkeit durch eine oder mehrere durchwachte Nächte nicht beeinträchtigt würde. Deswegen sollten sie sich weder sorgen, noch sollten sie Schlafmittel nehmen. Ob der Schlaf in der nächsten Nacht oder in acht Tagen käme, wäre sehr gleichgültig, aber er würde sich schon wieder einstellen.

Eine zweite Beschwerde, die etwa in der gleichen Weise zu behandeln ist, ist die psychische Impotenz. Hier ist es gewöhnlich sehr leicht, dem Kranken das Vorliegen einer Autosuggestion glaubhaft zu machen. Die Kranken zittern und schwitzen ja oft vor Erwartung, ob der Koitus gelingen werde. Man muß den Kranken ferner versichern, daß die Schmerzen, die Parästhesien und die Schwäche, die sie meist im Rücken, in den Genitalien oder den Beinen fühlen, rein psychogen, nur Folge der Vorstellung einer nicht vorhandenen Impotenz sind. Ferner besteht auch hier beim Publikum ähnlich wie für die Bedeutung des Schlafes eine ganz übertriebene Schätzung der Bedeutung der Potenz für die geistige Energie und die geistige Arbeitsfähigkeit. Die Kranken suggerieren sich eine Arbeitsunfähigkeit, solange sie nicht potent sind. Auch diese Auffassung muß man korrigieren. Um den störenden Einfluß der Erwartung zu beseitigen, kann man gerade bei der psychischen Impotenz dieser Kategorie mit Erfolg einen alten Trick anwenden. Man gestattet dem Patienten, sich an den weiblichen Körper zu gewöhnen, verbietet aber den Koitus. Der Kranke übertritt das Gebot und ist geheilt. In den Fällen, in denen allgemeiner Ekel vor Prostituierten oder die Furcht vor Infektion die Impotenz bedingt, wird man dem Kranken helfen, indem man ihm die Quellen seines Leidens darlegt und es ihm überläßt, die Konsequenzen zu ziehen.

Zum Unterschied von der Persuasion, welche allmählich in dem Suggestion Kranken die Überzeugung wachruft, daß und wie seine Beschwerden psychogen begründet sind, und dadurch am meisten geeignet ist, das verloren gegangene Selbstvertrauen zu heben, und ihn so der Heilung zuzuführen, verstehen wir unter Suggestion die Beeinflussung der Krankheitssymptome durch den Willen und den Befehl des Arztes. Wir zeigen dem Kranken also nicht, warum er schlaflos ist, sondern wir versichern ihm einfach, er werde in der nächsten Nacht schlafen. Oder, ohne daß wir ihn im geringsten in den Mechanismus seiner etwaigen Astasie-Abasie eingeführt haben, versichern wir ihm, daß er gehen könne, befahlen ihm zu gehen, und der Kranke geht. Es ist das ja der Mechanismus aller Wunderheilungen. Ein Stück Suggestion ist jedoch auch bei jeder systematischen Psychotherapie unentbehrlich, aber wir behandeln mit der reinen Suggestion wesentlich nur ein krankhaftes Symptom, nicht den kranken Menschen. Die Erfolge sind oft die äußerlich eindruckvollsten, die man sich denken kann, aber sie sind oft nur von geringer Dauer und die verschwundenen Symptome werden bald durch andere ersetzt. Für eine Reihe von Symptomen aber sind

wir durchaus auf die Suggestion angewiesen. So müssen wir z. B. einem Herzneurastheniker garantieren, daß er diese oder jene körperliche Anstrengung leisten könne. So müssen wir dem Kranken mit nervöser Dyspepsie versichern, daß er die von uns verordnete schwere Diät vertragen werde. Ein bekannter Arzt erzielte ausgezeichnete Erfolge dadurch, daß er solchen Kranken trotz aller ihrer Versicherungen, daß sie gewiß brechen würden, zum ersten Frühstück ein Stück saure Gurke und Schweizerkäse verordnete. Das ist natürlich Suggestion.

Ein außerordentlich dankbares Gebiet ist die Psychotherapie der chronischen Obstipation durch Suggestion (und Persuasion), und ich führe die von mir mehrfach mit vollkommenem Erfolge erprobten Ratschläge des schon genannten Dubois hier wörtlich an:

„1. Machen Sie den Kranken auf die Nachteile der Abführmittel und Klystiere aufmerksam. Erklären Sie das alles in Acht und Bann und verbrennen Sie getrost ihre Schiffe hinter sich!

2. Behaupten Sie recht kühn, die psychische Dressur führe stets zum Ziel. Haben Sie bereits glückliche praktische Erfahrungen damit gemacht, so schildern Sie dieselben in beredter, überzeugender Weise.

3. Fragen Sie Ihren Kranken, wann er gewöhnlich aufzustehen und zu frühstücken pflegt. Sie dürfen ganz gut bis zu einem gewissen Grade seinen Gewohnheiten Rechnung tragen. Wenn er z. B. um 7½ Uhr aufsteht, so entwerfen Sie ihm etwa folgendes Programm:

7½ Uhr: Aufstehen.

7¾ Uhr: Ein Glas kaltes Wasser trinken. Wer abergläubisch an Mitteln hängt, mag etwa ein am vorigen Abend zubereitetes Quassia-infus nehmen.

8 Uhr: Erstes reichliches Frühstück mit Milch, Kaffee oder Tee nach freier Wahl, sogar mit Schokolade, wenn sie nicht konstipierend wirkt; Brot, wenn möglich Grahambrot, Butter, Konfitüren oder Honig.

9 Uhr: Versuch einer Stuhlentleerung zu bestimmter Zeit. Untentwegt daran festhalten! Nicht etwa zu einer anderen Stunde den Abort aufsuchen, sondern diesem Drange widerstehen, indem man zu seinem Darne „sagt“: du hast um 9 Uhr nicht gewollt, nun mußt du bis morgen warten!

Im übrigen reichliche, vorwiegend vegetabilische Nahrung.

Mit der Aufzählung und schriftlichen Verordnung dieser Maßnahmen dürfen Sie sich aber nicht begnügen. Sie müssen dieselben mit einem erläuternden Kommentar begleiten und die einzelnen „Anregungen“, welche in diesen Vorschriften enthalten sind, der Reihe nach aufzählen.

Der Kranke wird Ihnen vielleicht entgegen: Ich habe es ja um eine bestimmte Stunde schon versucht und auch schon ein Glas kaltes Wasser getrunken! Darauf können Sie erwidern: Mein lieber Freund, sechs Kanonen vermögen da eine Bresche zu schießen, wo eine oder zwei nichts ausrichten. Also mutig ans Werk, und es wird Ihnen gelingen!“ etc.

Selbst hartnäckige Dysmenorrhöen ohne genügenden lokalen Befund sind einer suggestiven Therapie oft in ganz erstaunlichem Maße zugänglich.

Hypnose

Eine Steigerung der Wirksamkeit der Suggestionsbehandlung ist durch die Hypnose zu erreichen. Daran, daß die Hypnose eine medizinisch erlaubte und bei vorsichtiger Verwendung recht segensreiche Behandlung ist, ist gar nicht zu zweifeln. Unter vorsichtiger Anwendung verstehe ich, daß man mit möglichst leichten Hypnosen auszukommen sucht und jedenfalls erst allmählich zu den tieferen Graden fortschreitet, eine Methode, die auch gestattet, alle unerwünschten Folgen der Hypnose sofort zu beseitigen. Daß die Hypnose auch einmal schädlich wirken kann, soll nicht geleugnet werden, obwohl ich es noch nicht erlebt habe.

Jede wirksame medizinische Methode kann auch einmal schaden, und wenn bei einer schweren hysterischen wirklich einmal ein paar Krampfanfälle ausgelöst werden sollten, so ist das noch kein so großes Unglück. Es ist nötig, daß man die Hypnose aller mystischen Ausstattung entkleidet und ihr das Geheimnisvolle nimmt. Man kann dem Patienten wahrheitsgemäß versichern, daß 90% aller Menschen zu hypnotisieren sind, daß es sich nur um einen natürlichen Schlafzustand handle, in dem Suggestionen besser wirken etc. Als Methode wählt man am besten die einfache Einrede der Symptome des Schlafes, also ohne geheimnisvolles Fixieren, Streichen etc. Man legt dem Kranken die Hand auf die Stirn und versichert ihm nun nacheinander, daß er müde werden würde, daß seine Augenlider schwer würden, zufallen, daß er sie nicht mehr öffnen könne, daß seine Glieder schwer würden etc. Man spreche dabei nicht zu viel. Wie schon bemerkt, genügen schon ganz leichte Grade von Hypnose oft zu einer erheblichen Verstärkung der Wirkung von Suggestionen. Ehe man tiefe Hypnosen erreicht, hat man oft eine große Anzahl von Hypnoseversuchen nötig.

Man soll aber die Hypnose nie anwenden, ohne sich mit dem Kranken durch Psychoanalyse etwas vertraut gemacht zu haben.

Für nicht richtig halte ich es, die Hypnose einem Kranken von vornherein als das einzige Mittel zu bezeichnen, das ihm helfen könne, aber es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn der Arzt ihre Anwendung sich als ein Mittel, das wahrscheinlich nicht nötig werden würde, vorbehält.

In der Tat wird die Überzeugung immer allgemeiner, daß man in der Mehrzahl der Fälle besseres ohne als mit Hypnose erreicht. Die Hypnose bleibt aber ein ausgezeichnetes Mittel, um Symptomen beizukommen, die man durch Psychoanalyse und Persuasion oft nicht beseitigen kann, wie in vielen Fällen die Zwangsvorstellungen. Auch gibt es Kranke, die sich einer länger dauernden Psychotherapie nicht unterwerfen können oder wollen, und denen vor allem daran liegt, ein Symptom, z. B. eine hysterische Neuralgie, beseitigt zu sehen, etwa Frauen, die solche Symptome jedesmal nach einem Zank mit ihrem Manne bekommen. In solchen Fällen, in denen man die Ursache der Hysterie, nämlich die dauernden Mißhelligkeiten in der Familie ja doch nicht beseitigen kann, kann die Hypnose das Mittel der Wahl sein.

Ein notwendiger Faktor der Psychotherapie kann eine klinische Behandlung sein, d. h. die Aufnahme in ein Sanatorium oder eine Pension, wo der Arzt vor allem den Verkehr der Kranken mit anderen so weit einschränken kann, als es für eine Wirkung der Therapie nötig ist. Einzelne gehen so weit, als Bedingung einer Behandlung dem Kranken die Verpflichtung aufzuerlegen, auf jeden Verkehr mit der Außenwelt, selbst auf das Empfangen von Briefen zu verzichten. Der Grund ist klar. Einmal will man den Kranken vor allen unangenehmen Nachrichten und dann speziell vor Suggestionen der Umgebung schützen. Die absolute Isolierung ist trotzdem wohl nur sehr selten, notwendig; aber man muß auf das allerstrengste darüber wachen, daß der Kranke weder mit anderen Kranken, noch mit Besuchern, noch

Klinische
Behand-
lung

mit dem Wartepersonal über seine oder anderer Krankheit spricht, sondern nur mit dem Arzt. Selbst die Behandlung durch mehrere Ärzte, die nicht ganz aufeinander eingearbeitet sind, ist schon bedenklich, weil der eine durch eine unvorsichtige Bemerkung leicht das zerstören kann, was der andere in wochenlanger Arbeit aufgebaut hatte.

Weil diese Bedingung weitgehender Isolierung gar nicht zu erfüllen ist, hat die Aufnahme von Nervösen und Hysterischen in die großen Säle der inneren Abteilungen unserer Krankenhäuser, wo sie von Schwerkranken umgeben sind, gar keinen Sinn.

Allgemeinzustand

Legitimes Hilfsmittel der Psychotherapie ist ferner die Hebung des körperlichen Allgemeinzustandes, wenn es sich um heruntergekommene und erschöpfte Kranke handelt. Wir verweisen dafür auf das oben für die Behandlung der eigentlichen Erschöpfungszustände Gesagte. Auch interne oder subkutane Arsenkuren bei Chlorose wirken in dem gleichen Sinne und können durch die Hebung des Allgemeinzustandes den Erfolg einer psychotherapeutischen Kur gut unterstützen. Bei ambulatorischen Kranken sind tägliche Injektionen von *Natr. cacydylum*¹⁾ ein sehr gutes Mittel, um in der unauffälligen Art eines kurzen Gesprächs eine Psychoanalyse und suggestive Psychotherapie anzubahnen.

Arbeits-therapie

Ein Hilfsmittel der Psychotherapie ist ferner die Arbeitstherapie. Dieses Hilfsmittel darf man aber nicht zum Hauptmittel machen, wie das mancherorts in ganz geistloser und schematischer Weise geschieht. Sonst hat man nur Mißerfolge. Vor allem berücksichtige man, daß der Kranke nicht nur an Arbeit, sondern an eine für ihn zweckmäßige Art der Arbeit gewöhnt werden soll. So ist es denn ganz falsch, alle Kranken schematische Gartenarbeit machen zu lassen, sondern viel wichtiger ist es, Leute, die geistig arbeiten müssen, allmählich an geistige Arbeit wieder zu gewöhnen, indem man sie etwa Auszüge aus wissenschaftlichen Arbeiten machen läßt, und diese Arbeit genau regelt und steigert. Es ist der persönlichen Geschicklichkeit des Arztes hier ein großer Spielraum geboten.

Besondere Bedingungen der Psychotherapie

In der Wahl der einzelnen Mittel und Wege der Psychotherapie ist der Arzt in hohem Grade von Umständen und Nebenumständen des einzelnen Falles abhängig. So werden wir uns bei Kindern nicht auf Psychoanalyse einlassen, sondern uns mit energischer Suggestion begnügen und die Kinder vor allem schädlichen Einflüssen, die ihre Umgebung auf sie ausübt, entziehen. Hysterische Kinder müssen aus der Familie entfernt werden, die durch zu großer Besorgnis die hysterischen Symptome nur züchtet.

¹⁾ *Natr. cacodyl.* 0,75, *Acid. carbol.* gtt. I., *Aq. sterilis.* ad 25,0. Mit vier Teilstrichen anfangen, steigen jeden Tag um einen Teilstrich bis 20, dann heruntergehen. Cocainzusatz ist nicht notwendig, macht vielmehr bei manchen Kranken Herzbeschwerden. Auch die teuren fertigen Ampullen sind durchaus entbehrlich. Die Spritze soll vor jeder Injektion ausgekocht werden; dann habe ich noch niemals die sonst bei der Injektion von Arsenikalien gefürchteten stärkeren Reizerscheinungen gesehen. Einige Kranke vertragen jedoch auch die subkutane Anwendung von Arsenikalien nicht, sondern bekommen danach Magen- und Darmbeschwerden.

Auch bei Imbezillen werden wir uns mit Psychoanalyse nicht erst abgeben, ja man kann sagen, daß zur erfolgreichen Durchführung einer Psychotherapie sogar meist ein gewisser Grad von Bildung des Patienten gehört. Jedenfalls ist einer primitiven Bildung auch eine primitivere Art der Belehrung und Behandlung gegenüberzustellen.

Keinesfalls darf die Psychotherapie aber als ein Reservat für die Reichen angesehen werden. Wer einmal die wundervolle Dejerinesche Abteilung für Psychotherapie in der Salpêtrière in Paris gesehen hat, der ist überzeugt, daß sich mit geringen Mitteln, selbst unter den schwierigen Verhältnissen eines ganz veralteten und mitten in der Stadt gelegenen Bauwerks, für viele Kranke sehr segensreiches schaffen läßt. Leider sind unsere Stadtverwaltungen für solche Dinge meist nicht zu gewinnen. Vielleicht, daß sich einige Nervenheilstätten, in denen, wenn auch nur in recht beschränktem Maße, schon jetzt etwas Psychotherapie getrieben wird, bereit finden ließen, einen Versuch mit systematischer Psychotherapie für geeignete Fälle in dem Stile der genannten Dejerineschen Abteilung zu machen. Bei der Aufnahme in solche Anstalten für Psychotherapie wird man nur die Psychosen, auch die allerleichtesten, auf das strengste ausschließen müssen.

Wir kommen nun zu einer sehr wichtigen Frage, inwieweit nämlich die Psychotherapie durch die ganze Reihe der physikalischen und pharmakologischen Maßnahmen, die man anzuwenden gewöhnt ist, unterstützt werden darf. Es muß als Prinzip aufgestellt werden, daß das so wenig als möglich geschehe, und daß dem Kranken immer bewußt bleiben muß, daß die Hauptsache bei seiner Behandlung die Psychotherapie ist.

Diese Forderung beruht auf der Tatsache, daß dem Kranken durch die Anwendung von Mitteln, welche gegen seine ihm als körperlich erscheinenden Krankheiten gerichtet sind, unbewußt die Überzeugung suggeriert wird, daß seine Beschwerden wirklich da stecken, wo er sie fühlt, daß sein vom Arzt mit so viel Inbrunst elektrisierter Arm krank ist, daß sein Gehirn doch schwer erkrankt sein müsse, wenn der Arzt mit so großem Ernst täglich den galvanischen Strom hindurchschickt etc. Nicht nur, daß der Kranke in seiner Überzeugung von der Schwere seiner Erkrankung bestärkt wird; durch diese lokalen Maßnahmen wird der Kranke auch immer wieder auf den angeblichen Sitz seiner Erkrankung verwiesen und seine hypochondrischen Beschwerden werden dementsprechend gesteigert. So ist es ein schwerer Fehler, Herzneurasthenikern das Tragen von Herzflaschen mit kühlem Wasser oder dgl. zu verordnen. Man muß im Gegenteil ja alles aufbieten, um die Aufmerksamkeit des Kranken von dem angeblichen Sitz der Krankheit abzulenken.

Bei klinisch zu behandelnden Kranken kann man in der Tat meist alle besonderen physikalischen und pharmakologischen Maßnahmen entbehren mit Ausnahme von einigen indifferenten Bädern und ein wenig allgemeiner Massage, Maßnahmen, welche die Psychotherapie gewiß nicht stören. Auch gegen eine morgendliche zimmerwarme oder (bei sehr Anämischen) heiße Abreibung ist sicherlich nichts

Physikalische und pharmakologische Maßnahmen

Schädlichkeit lokaler Behandlung

einzuwenden. Man begründet diese Maßnahmen mit der zutreffenden Indikation der Hebung des Allgemeinzustandes. Demgegenüber wird in vielen Sanatorien eine ganz unnütze und für den Kranken nur schädliche Überfülle der verschiedensten Arten von hydiatischen Prozeduren zur Anwendung gebracht und dadurch dem Kranken die Überzeugung erweckt, daß das luxuriös eingerichtete Badehaus die Hauptsache bei seiner Behandlung ist. Man braucht sich ja nur die Prospekte der Sanatorien anzusehen. Keines scheint den Mut zu haben, sich diesem unsinnigen Luxus zu entziehen, der natürlich die Verpflegungspreise erheblich erhöht; ein jedes sucht das andere zu übertrumpfen, und es gibt wohl keins, das bisher gewagt hat, die Psychotherapie als seinen wesentlichen Heilfaktor hinzustellen.

Auch für die ambulant in der Sprechstunde zu behandelnden Kranken kann es von vornherein wünschenswert erscheinen, von allen Medikamenten und allen physikalischen Prozeduren Abstand zu nehmen. Es gibt auch Patienten, die diesen Vorschlag sehr freudig begrüßen. Anderen sieht man es an, daß sie sich dabei von vornherein doch nicht beruhigen werden. Bei noch anderen kann uns selbst aus diesem oder jenem Grunde dieses oder jenes physikalische oder pharmakologische Mittel wünschenswert erscheinen. Prolongierte warme Bäder, morgendliche Abreibungen, Massage werden auch hier nichts schaden, können vielmehr für die Hebung des Allgemeinzustandes unterstützend wirken; die prolongierten warmen Bäder (einen Tag um den anderen, sind ein gutes Beruhigungsmittel und Schlafmittel. Man lasse sie aber weg, wenn sie entgegengesetzt wirken, was auch vorkommt. Den meisten Nervösen nicht zuträglich sind Kaltwasseranwendungen, und auch kohlen-saure Bäder wirken eher erregend. Unnötig sind die aromatischen Zusätze (Fichtennadel), aber man kann sie natürlich verordnen.

Von den Medikamenten ist eines für die ambulanten Kranken oft recht nützlich, das Brom. Es ist in Dosen von 1—3 g pro Tag ein allgemeines Beruhigungsmittel und zugleich ein mildes unschädliches Schlafmittel, das viele Patienten lange Zeit nehmen, ohne sich sehr daran zu gewöhnen.

Wie die neurasthenischen Ermüdungskopfschmerzen durch Anwendung der Antineuralgika und anderer Mitteln zu behandeln sind, ist bereits bei anderer Gelegenheit geschildert (S. 70). Die hysterischen Kopfschmerzen sind gewöhnlich gegen alle Mittel renitent.

Auch gegen Baldrian und seine Präparate (Bornyval, Gynoval etc.) ist nichts einzuwenden, wenngleich ihre Wirkung zum Teil eine suggestive ist und die Reklame, die für eine Anzahl von ihnen als Universalmittel gemacht wird, fast lächerlich ist. Aber manchen Kranken ist es angenehm, eine Schachtel von Bornyvalpillen oder dgl. mit sich zu führen, und davon im Falle von Schwächezuständen, Herzklopfen etc. eine zu nehmen. Es ist das ein harmloses Mittel der Suggestion und man wird daraus gewiß keine Prinzipienfrage machen.

Anders steht die Sache doch mit den Schlafmitteln. Es gibt allerdings Fälle, wo sie direkt indiziert sind, und das sind die Zustände von Schlaflosigkeit bei Erschöpfungszuständen und bei vorüber-

gehendem Versagen des Schlafes nach heftigen Aufregungen (ganz abgesehen natürlich von den psychotischen Zuständen). Hier gibt man sie dann sofort und muß sie auch zu einer Dosis steigern, wo wirklich Schlaf eintritt. Es seien hier die gebräuchlichsten Schlafmittel aufgezählt: das schwächste ist wohl das Bromural (0,3—0,6 g); etwas stärker ist das ihm eng verwandte Adalin (0,5—1,0 g); in mittelschweren Fällen wird jetzt wohl das Veronal (0,25—1,5 g [= Diäthylbarbitursäure, diese Verschreibung erheblich billiger]) am meisten gebraucht und das Medinal = Veronalnatrium in der gleichen Dosis wie Veronal, aber schwächer wirkend; das Proponal, auch ein Abkömmling des Veronals, wirkt stärker (in Dosen von 0,2—0,6—1,0 g); das Trional (1,0—2,0 g, in heißem Selterswasser oder warmer Milch) ist immer noch eins der wirksamsten Schlafmittel in schweren Fällen; das Sulfonal (in der gleichen Dosis wie das Trional) wird nur noch wenig gebraucht, zum Teil wegen der aber auch dem Trional nicht ganz fehlenden Gefahr der Hämatorporphyrinurie bei längerer Anwendung. Wegen seiner unangenehmen Nebenwirkungen ist als einfaches Schlafmittel auch das Chloral (1—2 g in Schleimsuppe) nur noch wenig in Anwendung; dagegen ist es noch immer ein ausgezeichnetes Mittel zur Herbeiführung einer leichten Narkose im Status epilepticus und beim Tetanus, wo ganz außerordentliche Dosen per os und als Klystier gegeben wurden (bis 16 g täglich sind gegeben). Das Chloralamid (2—4 g) ist ihm verwandt und wird von einigen geschätzt, ebenso das Amylenhydrat (in derselben Dosis, wegen des unangenehmen Geschmacks vorzugsweise als Klysma). Recht bequem, wenn auch schwächer als die vorigen, aber anscheinend fast frei von allen Nebenwirkungen ist der Paraldehyd, der (in Dosen von 3—8 g) trotz seines unangenehmen Geruches meist gern genommen wird. Morphium ist ganz zu perhorreszieren.

Jedes neue Schlafmittel wird mit der Reklame angepriesen, daß es von Nebenwirkungen frei ist. Das ist bei keinem richtig; mindestens das unangenehme Gefühl der Benommenheit und des Kopfdruckes hinterlassen die auch am schwächsten wirkenden sehr häufig. Vielen Kranken geht es so, daß der erquickende Schlaf, aus dem sie dann mit freiem Kopf gestärkt aufwachen, erst in der zweiten Nacht ohne weitere Medikation eintritt. Besonders bekannt ist das vom Veronal, kommt aber selbst nach Adalin vor.

Niemals gebe man dem Kranken ein Schlafmittel in die Hand, damit er es nehme, wenn er nicht schlafen könne, sondern man bestimme, daß der Patient das Schlafmittel $\frac{3}{4}$ — $\frac{1}{4}$ Stunde vor dem Zubettegehen auf alle Fälle zu nehmen habe, ob er sich müde fühle oder nicht; dann läßt man sich über den Erfolg berichten und bestimmt dann weiter, erhöht oder erniedrigt die Dosis, wechselt das Präparat etc. Mindestens jeden dritten Tag ist es — abgesehen von ganz schweren Fällen — zweckmäßig, jedes Schlafmittel auszusetzen, und man muß es sich von vornherein zur Aufgabe machen, dem Patienten die Schlafmittel durch Einschiebung immer mehr schlafmittelfreier Tage so bald als irgend möglich wieder abzugewöhnen. Allzuleicht suggerieren sich die Patienten sonst die Überzeugung, daß sie ohne Schlafmittel überhaupt

nicht mehr schlafen können. Bekommt man solche Patienten, die monatelang, oft jahrelang mit Schlafmitteln gefüttert worden sind, in Behandlung, so tut man am besten, ihnen sofort alle Schlafmittel zu entziehen und ihnen zu versichern, daß sie, wenn auch vielleicht noch nicht gerade in der nächsten Nacht, auch ohne Schlafmittel schlafen würden, daß ein paar schlaflose Nächte ihnen lange nicht so viel schaden, wie die Schlafmittel etc. (s. oben S. 278). Man wird dann meist Erfolge und dankbare Patienten haben. Es ist gar kein Zweifel, daß gerade bei nervösen Patienten, nicht nur in der ambulanten Praxis, sondern auch in Sanatorien, um das Vielfache mehr Schlafmittel verschrieben werden als nötig und nützlich sind. Ich spreche dabei natürlich nicht von psychotischen und auch nicht von körperlich Kranken. Außer bei ausgesprochenen Erschöpfungszuständen und manchen Fällen starker Erregung soll man bei einfach nervösen überhaupt keine Schlafmittel geben, sondern sich allein auf die Wirkung der Psychotherapie und einer angemessenen Lebensweise verlassen.

Für harmlos, jedenfalls harmloser als die Schlafmittel, halte ich auch eine Flasche Porter oder ein Glas Kulmbacher Bier kurz vor oder beim Zubettegehen.

Viele Patienten haben sich übrigens selbst gewisse Suggestivmaßregeln für den Schlaf zurecht gemacht, also eine eigene Psychotherapie begründet. Der eine kann nur schlafen, wenn die Fenster auf sind, der zweite nur, wenn er im Bett noch etwas gelesen hat, der andere nur, wenn er gymnastische Übungen gemacht hat. Beim Wiedereinschlafen nach zu frühzeitigem Erwachen haben sich viele Kranke gewöhnt, etwas zu essen oder zu trinken und dann wieder einzuschlafen. Ich kenne eine Dame, die aus diesem Grunde, weil sie nämlich danach wieder einschläft, warme Milch als ein ausgezeichnetes Schlafmittel empfiehlt.

Die Schlafmittel sind das beste Beispiel dafür, wie gefährlich es sein kann, Einzelsymptome der psychoneurotischen Zustände einzeln zu behandeln, aber die Schlafmittel wirken doch wenigstens objektiv schlafmachend.

Maskierte
Psycho-
therapie

Demgegenüber steht nun die verbreitetste Art der Psychotherapie, die irgend welche wirkungslose Maßnahmen zur Anwendung bringt, in dem Gedanken durch diese an und für sich physikalisch oder pharmakologisch wirkungslosen Maßnahmen eine suggestive Therapie auszuüben, aber ohne dem Patienten diesen Gedankengang mitzuteilen. Vielmehr wird der Patient absichtlich möglichst zu dem Glauben beeinflusst, daß dieses oder jenes, und womöglich nur dieses oder nur jenes Mittel ihn auf pharmakologische oder physikalische Weise heilen könne. Also nicht etwa offene Suggestion, sondern ein frommer Betrug. Das bekannteste und gebräuchlichste der so verwandten Mittel ist die Elektrizität in allen ihren Formen, als galvanische, faradische, statische, als Hochfrequenz, Vierzellenbad¹⁾ etc. Ja sogar der Riesenmagnet wird von sehr hervorragenden Ärzten noch zur Behandlung herangezogen. Zu dieser Gruppe gehört auch die Nervenpunkt-massage. Daß ihre Vertreter sie für ein objektives Mittel

Elektri-
zität

Nerven-
punkt-
massage

¹⁾ Die schärfste Kritik ist hier auch im allgemeinen Interesse der Ärzte geboten. Denn es handelt sich da zum Teil um sehr kostspielige Apparate, die man sich nur anschaffen wird, wenn objektive, nicht nur suggestive Wirkungen nachzuweisen sind. Suggestive Maßnahmen kann man billiger haben.

halten können, weil sie den Sitz der nervösen Beschwerden fälschlich in der Peripherie annehmen, tut nichts für die Beurteilung dieser Methode. Sie ist in den Fällen von Psychoneurose nichts als Suggestion unter der Maske der Massage, ganz analog der Suggestion unter der Maske der Elektrizität, übrigens nicht schlechter als diese, und die Vertreter der Nervenpunktmassage haben sogar vor den Elektrotherapeuten voraus, daß sie an die objektive Wirkung ihrer Methode glauben, während selbst die Elektrotherapeuten — es werden ihrer wohl immer weniger, die eine große objektive Wirkung der Elektrizität bei organischen Leiden behaupten — für die Psychoneurosen doch selbst nur eine suggestive Wirkung für möglich halten. In diese Gruppe gehört dann die Verordnung von besonders riechenden oder schmeckenden Substanzen. Auch die Verordnung ganz neuer eben auf den Markt gelangter Substanzen wird insbesondere von sehr beschäftigten Konsiliarien zum Zwecke der Suggestion beliebt. Die Taschen der Patienten sind ja manchmal geradezu Kataloge der neuesten Fortschritte der chemischen Industrie in Form von Rezeptsammlungen. Daß die Rezept-schreiber in der Mehrzahl der Fälle etwa wirklich geglaubt hätten, mit dem neuen Mittel mehr zu erreichen als mit dem alten, ist wohl auszuschließen, sie vertrauten aber auf die suggestive Wirkung des Neuen. In diese Gruppe gehören auch die Umschläge mit äußerlich gar nicht wirkenden Substanzen, wie z. B. Bromumschläge bei Kopfschmerzen, und gehört endlich die Verordnung von allen physikalischen Maßnahmen mit der Unterstellung, daß sie physikalisch auf die Nerven wirkten und nicht nur zur Hebung des Allgemeinzustandes angewandt würden (vgl. oben S. 282).

Besondere
Mittel

Es gibt natürlich nichts bequemer als diese Therapie des frommen Betrugers. Man verordnet irgend etwas, oder wendet irgend etwas an, was einem in den Sinn kommt, und schickt den Patienten weg. Es muß auch zugegeben werden, daß, wie die Dinge heute liegen, in vielen Fällen gar nichts anderes möglich ist. Was soll denn ein Arzt, der durch seine Anstellung gezwungen ist, täglich bis zu 200 Patienten abzufertigen, anders machen? Nehmen wir nur die Hälfte, das sind 100 Patienten à 3 Minuten, das sind 300 Minuten, d. h. 5 Stunden Arbeit. Rechnen wir 1 Minute auf die notwendigen Schreibformalitäten pro Kranken, bleiben für den Kranken 2 Minuten. In dieser Zeit ist natürlich auch nur die geringste psychotherapeutische Beeinflussung — selbstverständlich mit Ausnahme der berühmten „Wirkung der Persönlichkeit“ — nicht zu versuchen, ja nicht einmal eine elektrische Einzelbehandlung durchzuführen, die immerhin 5 Minuten in Anspruch nimmt, und so kommt es denn, daß sich Einzelne besondere elektrische Apparate haben anfertigen lassen, wo immer 3 Patienten auf einmal elektrisiert werden. Zur Psychotherapie gehört aber viel Zeit, bei ambulanter Behandlung noch mehr als bei klinischer und die wirklich kunstgerechte Behandlung der Psychoneurosen für die ärmere Bevölkerung ist allerdings ein Problem, das nur mit neuen Organisationen gelöst werden kann.

Erklärt sich oft eine Behandlung, die einfach eine Karrikatur einer

Behandlung ist, hier durch den Zwang der Umstände, in anderen Fällen aus der Bequemlichkeit und einem therapeutischen Nihilismus, so tönt auch aus der Psychotherapie an und für sich günstigeren Verhältnissen, z. B. aus wenig gefüllten Privatsprechstunden, die Frage: Was sollen wir denn machen, wenn wir nicht elektrisieren? Darauf kann man nur antworten, die Psychotherapie zur Hauptsache und nicht zur verschleierte Neben Sache machen. Denn tatsächlich wirken alle die genannten Mittel der wirklichen Psychotherapie entgegen, indem sie den Kranken über den psychischen Grund seiner Beschwerden täuschen. Soll vielleicht der Kranke, dessen Haare sich unter der Platte des Franklinisationsapparates sträuben, oder dessen Kopf die elektrische Hand des Arztes — die Hand als Elektrode! auch so ein beliebtes Stück angeblicher Suggestion — streichelt, der Kranke, der sich in einem Zimmer befindet, das oft schon eine Art physikalischen Laboratoriums ist, soll dieser Kranke glauben, daß dieser Aufwand an physikalischen Kräften etwa nicht physikalisch wirke? Und weil er es gar nicht glauben kann und ja auch nicht glauben soll, sind diese Mittel in einer großen Anzahl von Fällen nicht nur nicht harmlos, sondern direkt schädlich, weil sie die Überzeugung des Kranken von der körperlichen physikalischen Natur seiner Beschwerden nur fixieren, anstatt sie zu beseitigen. Die Erfolge sind in den weitaus meisten Fällen daher nur vorübergehend, und oft wird der Zustand auch verschlimmert. Die Beweise dafür findet man auf der Straße. Man zeige doch den Neurastheniker, die Hysterische, den Traumatiker, die nicht mit Elektrisieren und mit den anderen Mitteln behandelt wären.

Wir sind nichts weniger als Prinzipienreiter. Warum soll man das Elektrisieren oder sonst irgend etwas in bestimmten Fällen nicht anwenden? So werde ich einem Kind, das mit einer hysterischen Lähmung zu mir kommt, zwar wohl auch sagen, „der Arm ist schwach, weil Du einen Schreck bekommen hast“, aber ich werde den Arm dann, wenn reine verbale Suggestion nichts nützt, ruhig elektrisieren und dem Kind suggerieren, wie der Arm unter der Wirkung der Elektrizität wieder bewegungsfähig wird, und wenn das gelungen ist, mir ausbitten, daß sowas nicht wieder vorkommt. Ich denke auch gar nicht daran, mich mit einer imbezillen Hysterischen auf lange Gespräche über den psychischen Grund ihrer Aphonie einzulassen, sondern elektrisiere auch da, oder drücke auf irgend einen Nervenpunkt oder dgl. Man möge auch soviel Kompromisse aus welchen Gründen immer schließen, als man will. Als zwei bekannte Kliniker bei einem exotischen Prinzen konsultierten und der eine vorschlug, den Prinzen zu elektrisieren, sagte der andere: „Sehr einverstanden, aber die andere Elektrode halte ich“. Im Prinzip aber muß gefordert werden, daß diese Art der Behandlung auf das denkbar geringste Maß eingeschränkt wird zugunsten einer systematischen Psychotherapie. Wenn dieser Standpunkt der herrschende geworden sein wird, wird auch die Achtung vor der neurologischen Therapie wieder steigen, die darum in weiten Kreisen des Publikums und der Ärzte eine so geringe ist, weil sie es nie anders gelernt

und gesehen haben, als daß neurologische Therapie ungefähr gleich Elektrisieren ist.

Ich zweifle nicht, daß selbst bei den der Behandlung am allerwenigsten zugänglichen Formen, das sind aus früher erörterten Gründen die traumatischen Neurosen, durch eine von Anfang an einsetzende systematische reine Psychotherapie unter Ausschluß aller störenden Suggestionen, die durch physikalische und mechanische Maßnahmen und ungeeignete Umgebung bewirkt werden, viel bessere Resultate zu erzielen wären als bisher (zu berücksichtigen dabei allerdings das S. 262 über die Möglichkeit einer Gewöhnung an Berufsarbeit Gesagte).

Man kann die Psychotherapie als ätiologische Therapie neben die beiden anderen mächtigen Methoden der Neurologie: die operative Therapie und die antiluetische Therapie stellen. Das Anwendungsgebiet der Psychotherapie ist aber ein sehr viel größeres und allgemeineres, als das der beiden anderen Methoden. Denn die Mehrzahl der Nervenkranken, die in der allgemeinen Sprechstunde und auch in der des Neurologen erscheinen, leiden weder an Tumoren noch an Lues, ja überhaupt nicht an „organischen“ Nervenkrankheiten, sondern an „funktionellen“, d. h. an Psychoneurosen. Darum muß nicht nur der Neurologe, sondern auch der allgemeine Praktiker sich mit der systematischen Psychotherapie vertraut machen. Es gehört dazu nur eine gewisse ärztlich-psychologische Begabung, daneben viel Zeit, Unermüdlichkeit, Aufrichtigkeit, der feste Wille dem Kranken zu helfen, Freiheit von jedem Schematismus, dies alles auf dem Grunde einer sicheren Diagnose; dann wird sich jeder Arzt, nicht nur der Neurologe, unschwer überzeugen können, daß die Psychotherapie den Vergleich mit anderen, äußerlich glänzenderen, Methoden nicht zu scheuen hat, und daß sie in den geeigneten Fällen durch andere Methoden überhaupt nicht zu ersetzen ist.

Sachregister.

- Abblassung, temporale** 51.
Abdominalerkrankungen 73.
Abduzenslähmung 31.
 — bei Meningitis 195.
Abszeß, vgl. Hirnabszeß 132.
Absencen 203.
Absinth 233.
Absolute Pupillenstarre 8, 31, 166.
Achillesreflexe bei Diabetes 233.
 — bei Ischias 82, 85.
Achillesreflex 9, 10.
 — bei peripherer Lähmung 28.
 — bei Paralyse 173.
 — bei Tabes 168.
Achylie 245.
Adam-Stokessche Krankheit 244.
Adduktorenreflex, gekreuzter 18.
Adenoide, Kopfschmerz bei 66, 69.
Aderlaß bei Apoplexie 154.
Adiadochokinesie 51, 122.
Adipositas dolorosa 86.
Affekte bei Hysterie 255.
Akinesia algera 254.
Akkomodation 8.
Akkomodationskrampf 251.
Akkomodationslähmung b. Neuritis 84.
Akonitin 77.
Akromegalie 129, 224.
Akroparästhesie 229.
Aktinomykose der Wirbelsäule 105.
- Akustikustumor** 52, 64, 120, 129.
Akzessoriusdurchschneidung bei Torticollis 215.
Alexie 118.
Alkohol 233.
 — bei Epilepsie 209.
 — bei Nervösen 273.
Alkoholepilepsie 209.
Alkoholinjektionen bei Myalgie 87, bei Neuralgie 80.
Alkoholismus 234.
 — Apoplexie bei 143.
 — Zittern 35.
Alkoholpolyneuritis 82, 85.
Alter, Pupillen im 6.
Alternierende Lähmungen 120.
Amaurose, Pupillen bei 7.
 — bei multipler Sklerose 185.
 — bei Urämie 232.
Amaurotische Idiotie 161.
Amblyopie 52.
Amimie 121.
Amnesie nach Dämmerzuständen 204, 210.
 — hysterische 256.
 — nach Schädeltrauma 157.
Amnestische Aphasie 117.
Amyotrophische Lateralsklerose 109.
Anämische Spinalerkrankung 106.
Anamnese, Überschätzung der 3.
Anaesthesia alternans 47, 48.
Anästhesie, hysterische 3, 17.
- Anenzephalie** 159.
Aneurysma vgl. auch Mi-liaraneurysma.
 — des Gehirns 122, 124, 131.
Aneurysma, syphilitisches 172.
Anfälle, paralytische 174.
Angina pectoris 244.
Angst, epileptische 202, 204.
 — bei Neurasthenie 241.
 — bei Zwangsvorstellungen 250.
Angstneurose 255.
Ankylose 35.
Anode 21.
Anosmie 53.
Antimon 237.
Antipyrin 70.
Anus 58.
Aphasie 116.
 — im Kindesalter 163.
 — bei Lues 171.
 — bei Migräne 68.
 — bei multipler Sklerose 186.
 — bei Urämie 232.
Aphonie, hysterische 252.
Apoplexie 19, 60, 145.
 — bei Diabetes 233.
Apraxie 119.
Aran-Duchenneschers Typ 109, 27.
Arbeitstherapie 282.
Areflexie der Kornea 47.
 — — — bei Akustikustumor 129.
Argyll-Robertsonisches Phänomen 8, 166.
Armmuskeln 26.
Arrestantenlähmung 90.

- Arsen bei Chorea 193.
 Arsenkuren 282.
 Arsenneuritis 83.
 Arsenvergiftung 83, 237.
 Art. fossae Sylvii 142.
 Arteriosklerose, diffuse —
 des Gehirns 145.
 — Ätiologie von Gehirn-
 erkrankungen 143, 144.
 — Neuritis bei 83, 85.
 — des Rückenmarks 146.
 Arteriosklerotische Epilep-
 sie 211.
 — Kopfschmerzen 67.
 — Schwindel 64.
 Arthropathien 170, 182.
 Asphyxie, lokale 230.
 Aspirin 70, 77.
 Astasie-Abasie 51, 252.
 Astereognosis 115, 121.
 Asthma bronchiale 245.
 Ataxie 49, 168.
 — zerebellare 50, 122.
 — zerebrale 51.
 — bei Polyneuritis 83.
 — bei Strangerkrankung
 107.
 Athetose 35, 162.
 Atoxyilvergiftung 237.
 Atrophie bei Hysterie 251.
 Atrophie bei Pyramiden-
 lähmung 20.
 Atropin 7, 13, 233.
 Atteste bei Neurasthenie
 264.
 Augenkrisen 170.
 Augenlähmungen bei My-
 asthenie 88.
 Augenmuskeln 31.
 Augenmuskellähmungen
 32.
 — bei multipler Sklerose
 185.
 — hysterische 251.
 Augenschwindel 64.
 Aura 202.
 Autosuggestion 256, 278.
 Axillarislähmung 26.

Babinskis Mitbewegung 38.
Babinskischer Reflex 11,
16, 19, 60.
 — — bei Epilepsie 201.
 — — bei Heine-Medin-
 scher Krankheit 190.
 — — bei Paralyse 174.
 — — bei Tabes 171.
 Badekuren bei Tabes 181.
 Badeorte 79, 149.

 Balken 113, 119.
 Balkenstich 161.
 Basale Tumoren 130.
 Basedowsche Krankheit
 219, Neuralgie bei 74.
 — — Tremor bei 35.
 Basisbruch 156.
 Brotiansche Regel 95.
 Bauchdeckenreflex 17, 19.
 — bei multipler Sklerose
 184.
 Bechterew-Mendelscher
 Fußrückenreflex 18, 19.
 Beinmuskeln 28.
 Bellsches Phänomen 30.
 Benommenheit 59.
 — bei Hirntumor 125.
 Benzin 233.
 Berührungssinn 38.
 Beri-Beri 82.
 Beschäftigungskrämpfe
 214.
 Beschäftigungsneuritis 81.
 Bettnässen 205.
 Bewußtlosigkeit 59.
 — bei Apoplexie 142.
 Biersche Stauung 229.
 Bitemporale Hemianopsie
 52.
 Blase 58, 59, 61.
 Blasen- und Mastdarmstör-
 rungen bei Heine-Me-
 dinscher Krankheit 190.
 Blase und Mastdarm bei
 Neuritis 83.
 Blaseninnervation 28.
 Blasenkrisen 179.
 Blasen-Mastdarm lähmung
 b. Rückenmarkserkran-
 kung 92, 102.
 Blasenstörungen bei mul-
 tipler Sklerose 185.
 — bei Tabes 170.
 Bleiepilepsie 210.
 Bleineuritis 82.
 Bleivergiftung 237.
 Blicklähmungen 32.
 Blitzschlag 158.
 Botulismus 233, 234.
 Brachialgie 76.
 Bradykardie 244.
 Brechzentrum 58.
 Brocasche Windung 113.
 Brom bei Arteriosklerose
 153.
 — bei Chorea 193.
 — bei Epilepsie 206.
 — bei Kopfschmerzen 70.
 — bei Schwindel 65.
 Bromismus 207.

 Brown-Séquardsche Bahn
 46.
 — — Symptomenkomplex
 94, 15.
 — — Syndrom bei Rük-
 kenmarkstumor 98, 100.
 Bulbärparalyse 34, 109.
 — ohne Befund 34, 88.
 Bursitiden 76.

 Caissonkrankheit 98.
 Caries tuberculosa 104.
 Cauda equina 92.
 Centrum semiovale 112.
 Cephalaea adolescentium
 66.
 Charcot-Mariesche neuro-
 tische Muskelatrophie
 86, 110.
 Cheiromegalie 224.
 Chiasma 52.
 Chinin 70, 77.
 Chlorose, Kopfschmerz bei
 66, 69.
 — Schwindel bei 64.
 Chorea 35, 121.
 — apoplectica 194.
 — hysterische 252.
 — minor 1, 193.
 — mollis 193.
 Chvostekskes Phänomen
 217.
 Clavus hystericus 254.
 Coccygodynie 76.
 Coitus interruptus 244.
 Coma diabeticum 233.
 Commotio cerebri 157.
 Contrecoup 156.
 Crampi 212.
 Credésche Salbe bei mul-
 tipler Sklerose 187.
 Cucullarislähmung 26.
 Cuneus 113.
 Cyclothymie 269.
 Cystizerken des Gehirns
 122, 124.
 Cysticercus des 4. Venti-
 kels 130.

Dämmerzustand, epilepti-
scher 204, 209.
 Dämmerzustände n. Kopf-
 trauma 157.
 Dampfdusche 79.
 Dampfgrotten 79.
 Darmkrisen 169.

- Darmstörungen bei Tabes 170.
 Dauerklonus 11.
 Daumenmuskeln 26.
 Dekompressive Trepanation 199.
 Dekubitus 228.
 — bei Neuritis 84.
 Defekte des Gehirns 159, 161.
 Degenerative Lähmungen 20.
 Delirien, senile 146.
 Delirium tremens 139.
 Demenz, arteriosklerotische 146.
 — epileptische 205.
 Dementia praecox 1, 267.
 — — epileptische Anfälle bei 209.
 Demenz bei multipler Sklerose 186.
 Depressionsfraktur 157.
 Dercumsche Krankheit 86.
 Dermatomyositis 87.
 Dermographie 273.
 Déviation conjuguée 32, 60, 115, 141.
 Diabetes, Hirnblutung bei 143.
 — nervöse Störungen bei 233.
 — Neuralgie bei 74, 76.
 — Neuritis bei 83.
 — neurogener 226.
 Diarrhöe 246.
 Diät bei Arteriosklerose 150.
 — bei Epilepsie 207, 209.
 — bei Nervösen 272.
 Diphtherische Polyneuritis 82, 84.
 Diplegie, infantile 162, 164.
 Dipsomanie 236.
 Dissoziation der Sensibilität 43, 96.
 Diuretin bei Arteriosklerose 153.
 Dolores osteocopi 71.
 Doppelbilder 32.
 Dorsalsegmente 27, 28.
 Drehschwindel 62.
 — bei Kleinhirnerkrankung 122.
 Druckpuls 58, 125.
 — bei Meningitis 195.
 — bei Meningeablutung 156.
 Druckpunkte bei Neuralgie 75.
 Drüsen 57.
 Durchfälle bei Basedow 220.
 Dysarthrie 34.
 Dyskrasische Neuritis 83.
 Dysmenorrhöe 247, 280.
 Dyspepsie 245.
 Dystrophia adiposogenitalis 129, 225.
 Echinokokken des Gehirns 122, 124.
 Echolalie bei Tic 213.
 Eclampsia gravidarum 232.
 Eklamptischer Anfall 36.
 Ehefähigkeit bei multipler Sklerose 186.
 Eheschließung bei Epilepsie 206.
 Ejaculatio praecox 247.
 Eklampsie 205.
 — der Kinder 217.
 Elektrische Untersuchung 21.
 Elektrischer Starkstrom 158.
 Elektrotherapie bei Arteriosklerose 152.
 — bei Fazialislähmung 82.
 — bei Hemiplegie 155.
 — bei Kopfschmerz 70.
 — bei Myalgie 87.
 — bei Nervenverletzungen 90, 91.
 — bei Neuralgie 79.
 — bei Neurosen 286.
 — des Schwindels 65.
 — bei Tabes 182.
 Embolie 142, 144.
 Emotionelle Inkontinenz 175.
 Encephalopathia saturnina 237.
 Endarteriitis obliterans 171.
 Endotheliom 124, 130.
 Enesol 180.
 Entartungsreaktion 24.
 Entbindungslähmung 90.
 Enteritis membranacea 246.
 Entmündigung bei Paralyse 177.
 Enuresis nocturna 106, 296.
 Enzephalitis 137.
 — und Epilepsie 210.
 — nach Salvarsan 179.
 Enzephalozele 159, 161.
 Enzephalomyelitis 98.
 Epidemien, hysterische 257.
 Epidurale Injektionen 80.
 Epilepsie 1, 200.
 — bei Arteriosklerose 146.
 — Babinski bei 13, 19.
 — Kopfschmerz bei 67.
 Epilepsia procursiva 203.
 — rotatoria 203.
 Epilepsie bei Syphilis 173.
 — nach Trauma 158.
 Epileptischer Anfall 36.
 Epileptische Anfälle und Epilepsie 200.
 — Bewußtseinsstörung 60.
 — Krämpfe bei Hirntumor 123.
 — — bei zerebraler Kinderlähmung 163.
 Erblassen 243.
 Erbsche Lähmung 27.
 — luetische Spinalparalyse 173.
 Erbrechen 58.
 — bei Hirntumor 125.
 — bei Schwindel 62.
 Erektion 59.
 Ergotismus 236.
 Erkältung 74.
 Ermüdbarkeit bei Neurasthenie 240.
 Ermüdungskopfschmerz 67.
 Errötungsangst 243, 250, 261.
 Erythromelalgie 231.
 Eunuchoidie 226.
 Exophthalmus 219.
 Familiäre Erkrankungen 107.
 — Formen der Polyneuritis 86, 110.
 Faradischer Strom 21, 24.
 Fazialisasymmetrie bei Paralyse 174.
 Fazialiskrämpfe 215.
 Fazialislähmung 30.
 — Nervenpfropfung bei 91, 214.
 — periphere 24, 82.
 Fettembolie 142.
 Fibrilläre Zuckungen 25.
 Fibrilläres Zittern 30.
 Fibrom 124, 130.
 Fieber nach Apoplexie 142.
 — bei Benommenheit 61.
 — bei Hirnabszeß 132.
 — hysterisches 248.

- Fingernasenversuch 49.
 Fissura calcarina 113, 115.
 — occipitoparietalis 113.
 Flechsig'sche Opium-Bromkur 207.
 Flexibilitas cerea 268.
 Flimmerskotom 67.
 Flucht in die Krankheit 264.
 Foci 37.
 Foramen ovale, offenes 142.
 Foerster'sche Operation bei Little'scher Krankheit 164.
 — bei Magenkrise 182.
 Freistehende Fälle 108.
 Fremdsuggestion 256.
 Freud'sche Theorie 258, 275.
 Friedreich'sche Ataxie 111.
 Frigidität 248.
 Fugues 205.
 Funktionell 1, 3, 4.
 Fußklonus 11, 16, 19, 60.
 Fußmuskeln 27.
 Fußbrückenreflex 18, 19.
 Fußsohlenreflex 11 s. auch Babinskischer Reflex.

 Gallensteine 73, 74.
 Galvanischer Strom 21.
 Gang bei Hemiplegie 148.
 Ganglien, sympathische 58.
 Ganglion Gasseri, Resektion 80.
 Gangstörung bei Arteriosklerose 146.
 Gangstörung, hysterische 252.
 Gansersches Symptom 256.
 Gaumensegelparese bei Neuritis 84.
 Gedächtnis bei Epilepsie 205.
 — bei Paralyse 175.
 Gefäße 58.
 Gehirnerschütterung 157.
 Gehirnnervenlähmungen bei Schädelbruch 156.
 Gehirnverletzung 155.
 Geigenspieler, Myalgie der 86, 87.
 Geigenspielerkrampf 214.
 Gelenkneuralgien 72.
 Gelenkneuralgie, hysterische 254.
 Genickstarre, epidemische 197.
 Genitalien 58, 59, 225.
 Genitalien, Erkrankungen d. weiblichen 73.
 Geruchsprüfung 53.
 Geruchsstörungen, hysterische 254.
 Geschmacksprüfung 53.
 Geschmacksstörungen, hysterische 254.
 Gesichtsatrophie, progressive 231.
 Gesichtsfeld 51.
 Gesichtsfeldeinengung, hysterische 257.
 Gesichtslähmung 30.
 Gicht, Neuralgie bei 74.
 Gibbus 104.
 Glaukom 72.
 Gliederstarre 162.
 Gliom 123, 130.
 Globus hystericus 254.
 Glykosurie nach Apoplexie 142.
 — neurogene 226.
 Graefesches Zeichen 220.
 Grande maladie des tics 213.
 Gravidität, Chorea bei 193.
 Graviditätsneuritis 83.
 Greisenalter, Zittern 35.
 Greisenlähmung 146.
 Großhirnganglien 112.
 Großhirnhemisphären 112, 113.
 Gumma 122, 124.
 Gürtelgefühl 170.
 Gyrus angularis 113, 115, 118.
 — supramarginalis 113, 115.

Habitus apoplecticus 143.
 Haftenbleiben 117.
 Halsrippe 90.
 Hämatom, extrameningealer 156.
 Hämatomyelie 97.
 Handmuskeln 26.
 Harnstottern 246.
 Hautreflexe 11, 17.
 — bei Sensibilitätsstörung 47.
 Headsche Zonen 73.
 Hebephrenie 267.
 — epileptische Anfälle bei 209.
 Heine-Medinsche Krankheit 188.
 — — — Enzephalitis bei 138.
 Heine-Medinsche Krankheit Polyneuritis bei 82, 84, 190.
 Hemianopsie 52, 115, 116, 122.
 — bei Benommenheit 61.
 Hemiplegie 60, 141.
 — ohne Befund 232.
 — infantile 35.
 — bei Lues 171.
 — bei Migräne 68.
 — bei multipler Sklerose 186.
 Hemispasmus facialis 212.
 — glosso-labio-maxillaris 252.
 Hérédotaxie cérébelleuse 112.
 Herpes zoster 76.
 — — Lumbalflüssigkeit bei 57.
 Herz 57, 243.
 Herzbeschwerden 244.
 Herzerkrankung, Schwindel bei 64.
 — bei Tabes 171.
 Hg 178, 180, 181.
 — bei multipler Sklerose 187.
 Hinken, intermittierendes 227.
 Hinterhorntypus 43.
 Hinterstrang 45, 46, 47.
 Hippocampus 113.
 Hirnabszeß 132.
 — Kopfschmerz bei 67.
 Hirnblutung 141.
 — traumatische 158.
 — bei Tumor 123, 124.
 Hirndruck 122, 123, 125.
 Hirnnerven 29.
 Hirnnervenlähmungen bei Meningitis 195.
 Hirnpunktion 57, 127.
 — bei Abszeß 136.
 — bei Schädelverletzung 156.
 Hirnstamm 29, 112, 114.
 Hirntumor 122.
 — Lumbalpunktion bei 56, 57, 126, 127.
 Hitzigsche Zone 170.
 Hitzschlag 139.
 Hochgebirge bei Nervösen 272.
 Höhenschwindel 64.
 Homatropin 7, 13.
 Hören, Lokalisation 114.
 Hornerscher Symptomenkomplex 58.

- Hörprüfung 52.
 Hörstörungen, nervöse 52.
 Hüfteiterungen 73.
 Huntingtonsche Chorea 193.
 Hydrocephalus 159, 161.
 — acquisitus 127, 132, 198, 199.
 Hydrotherapie 273.
 — bei Arteriosklerose 151.
 Hyperazidität 245.
 Hyperhidrosis 243.
 Hypermetropie, Kopfschmerz bei 66, 69.
 Hypnose 280.
 Hypochondrie 241.
 Hypophysentumor 52, 129, 224.
 Hypotonie 50, 168, 169.
 Hysterie 1, 2, 3, 256.
 — Kontraktur bei 35.
 — männliche 258.
 — Sehstörung bei 52.
 — Zittern 36.
 Hysterischer Anfall 36, 201.
 Hysterische Konstitution 259.
 Hysterischer Kopfschmerz 67.
 Hysterische Lähmungen 15, 19.
 Hysterische Neuralgien 81.
 Hysterischer Schwindel 65.
 Hysterische Sensibilitätsstörung 47.
 Hysteroepilepsie 259.
 Idiotie 159.
 — Epilepsie bei 209.
 Ileus bei Hysterie 246.
 Imbezillität 159.
 Impotenz 247, 279.
 Influenzaenzephalitis 138.
 Influenza, Neuralgie bei 74.
 — Neuritis nach 82.
 Injektionen bei Kopfschmerzen 69.
 Injektionstherapie b. Neuralgien 79.
 Inkontinenz 59.
 Insel 113.
 Intelligenzstörung bei Paralyse 175.
 Intentionstremor 35.
 Interkostalneuralgie 76.
 Interkostalschmerzen bei Lungenkrankheiten 73.
 Intermittierendes Hinken 227.
 Intuition 3.
 Intervall, freies 156.
 Intoxikationen 232.
 — Neuralgien nach 74.
 Isolierung von Hysterischen 281.
 Ischämische Muskelerkrankung 87.
 Ischiadikuslähmung 27.
 Ischias 76, 79.
 Jacksonsche Anfälle 36, 114, 120, 123, 203.
 — — bei Hirnabszeß 133.
 — — bei zerebraler Kinderlähmung 163, 164.
 — — bei Pachymeningitis 172.
 — — nach Schädelverletzung 157, 158.
 — — bei Thrombose 143.
 Jähzorn, epileptischer 205.
 Jendrassikscher Kunstgriff 9.
 Jod bei Arteriosklerose 152.
 — bei Basedow 220.
 — bei Syphilis 180.
 Jodbasedow 221.
 Jodipin 153.
 Jodismus 152.
 Jodoform 233.
 Jollysche Reaktion 88.
 Kachexie, Herdsymptome bei 232.
 — Neuralgie bei 74.
 Kaffee bei Nervösen 273.
 Kaffeevergiftung 236.
 Kalomel 178.
 Kampfer 233.
 Kapsel, innere 120, 121.
 Karzinom, Rückenmarkserkrankung bei 107.
 Karotisunterbindung 145.
 Katalepsie 268.
 Katatonie 267.
 Kathode 21.
 Kaudaerkrankung 102, 103.
 Kehlkopf 32.
 Kehlkopfkrisen 169.
 Kehlkopflähmungen bei Tabes 170.
 Kernisches Phänomen 61, 76, 195, 198.
 Kernschwund infantiler 89.
 Keuchhusten, Hirnblutung bei 143.
 Keuchhustenkrämpfe 219.
 Kiefererkrankungen 72.
 Kinderhysterie 260, 282.
 Kinderlähmung, spinale 188, 189.
 — zerebrale 159, 162.
 Kindern, Babinski bei 13, 19.
 Kindesalter, Hirnblutung im 143.
 Klauenhand 35.
 Klavierspieler, Myalgie der 86, 87. Klavierspielerkrampf 214.
 Kleinhirn 112, 114.
 — Beziehung zum Schwindel 64.
 Kleinhirnabszeß 134.
 Kleinhirnataxie 51, 122.
 Kleinhirnbrückenwinkeltumor vgl. Akustikustumor.
 Klimakterium 225.
 — des Mannes 225.
 Klitoriskrisen 170.
 Klonus 11 vgl. auch Fußklonus und Patellarklonus.
 Klopfempfindlichkeit des Schädels 128.
 Klumpkesche Lähmung 27.
 Kniehackenversuch 49.
 Kniehöcker 116.
 Kniereflex siehe Patellarreflex.
 Kochsalz bei Epilepsie 207.
 Koffein 233.
 Kohlenoxyd 83.
 Kohlenoxydvergiftung 235.
 Kokain 233.
 Kokainismus 236.
 Koma 60.
 Kombinierte Strangerkrankung 106.
 Kompressionspsychose 157.
 Kompressionsmyelitis 104.
 Konstitutioneller Kopfschmerz 67.
 Kontraktur 34.
 — hysterische 252.
 — bei Hemiplegie 148.
 — bei zerebraler Kinderlähmung 163.
 Konuserkrankung 102.
 Kopfschmerz 66.
 — neurasthenischer 240.

- Kopfschmerzen bei multip-
 ler Sklerose 185.
 — bei Hirntumor 123, 125.
 — bei Arteriosklerose 146.
 — epileptische 202.
 — bei Syphilis 172.
 Kopftetanus 216.
 Kopfumfang 159.
 Koprolalie bei Tic 213.
 Kornealreflex 47.
 Korsakowsche Psychose 85.
 — — nach Trauma 157.
 Krämpfe, hysterische 252.
 — lokale 211.
 Krampfgifte 233.
 Kremasterreflex 17.
 Kreosotneuritis 83.
 Kretinismus 160, 161.
 Kreuzung der Sensibilität
 46.
 Krisen 168, 169.
 Kroenleinsche Konstruk-
 tion 121.
 Kümmelsche Krankheit
 104.
 Kupfer 237.

 Labio-glosso-pharyngeal-
 paralysie 34.
 Labyrinthblutung 63.
 Labyrinthitis 63.
 Labyrinthschwindel 62.
 Lagesinn 38, 42, 43.
 Lähmungen bei Tabes 170.
 Laktophenin 70.
 Lampenfieber 250.
 Lanznierende Schmerzen
 168, 169, 182.
 Landrysche Paralyse 84,
 85, 190.
 Laryngospasmus 217.
 Lasèguesches Phänomen
 76 vgl. auch Kernig-
 sches Phänomen.
 Lateralisklerose 109.
 Lateropulsion 51, 122.
 Lepre 82.
 Lesen 118.
 Lezitin 272.
 Lichtreaktion der Pupille 5.
 Lichtstarre 7, 166.
 — der Pupille 145.
 Linkshändigkeit 114, 119.
 Liq. cerebrospinalis 54.
 Littlesche Krankheit 162,
 164.
 Lokalisation im Gehirn
 112.
 — der Sensibilität 46.

 Lues cerebrospinalis 171
 vgl. auch Syphilis.
 Lumbago 87.
 Lumbaldruck 54.
 Lumbalpunktion 53.
 — bei Benommenheit 61.
 — bei Enzephalitis 139.
 — bei Heine-Medinscher
 Krankheit 192.
 — bei Hirnabszeß 135.
 — bei Meningitis 195, 196.
 — bei Schwindel 65.
 — bei Urämie 232.
 Lumbalsegmente 28.
 Lymphocytose bei Bleiver-
 giftung 237.
 — der Lumbalflüssigkeit
 57, 127, 167, 169.
 Lyssa 217.

 Magenektasie, Tetanie bei
 217.
 Magendarmkanal 58.
 Magenkrise 168, 169, 182.
 Magensaftfluß 245.
 Magenschwindel 65.
 Makroglossie 224.
 Mal perforant 84, 228.
 Malaria, Neuralgie bei 74.
 Manganvergiftung 238.
 Manisch-depressives Irre-
 sein 267.
 Marantische Sinusthrom-
 bose 140.
 Markstrahlung 112.
 Massage bei Arteriosklerose
 152.
 — bei Genitalerkrankun-
 gen 73.
 — bei Hemiplegie 155.
 — bei Kopfschmerzen 69.
 — bei Muskelatrophie 88.
 — bei Myalgie 87.
 — bei Neuralgien und
 Ischias 78.
 — bei Neuritis 86.
 — bei Paralysis agitans
 194.
 Masseterreflex 28.
 Mastdarminnervation 28.
 Medianuslähmung 26.
 Medulla oblongata 29, 120,
 Beziehung zum Schwin-
 del 64.
 Melancholie 267, 269.
 — des Rückbildungsalters
 225.
 Menièrescher Symptomen-
 komplex 63.

 Meningealblutung 156.
 Meningealblutung 200.
 Meningitis 60, 61, 195.
 — bei Hirnabszeß 133.
 — Kernigesches Phänomen
 bei 76.
 — Lumbalpunktion bei 56.
 — serosa 127, 132, 135,
 139.
 — circumscripta 101.
 — syphilitica 172.
 Meningitische Form der
 Heine-Medinschen
 Krankheit 190.
 Meningocele 105.
 Meningokokkus 197.
 Meningokokkenserum 198.
 Menopause bei Hypophy-
 sentumor 129, 225.
 Merkfähigkeit bei Epilep-
 sie 205.
 — bei Paralyse 175.
 Metalles 165.
 Metastatische Abszesse
 135.
 Metatarsalgie 76.
 Meteorismus bei Hysterie
 246.
 Methylalkohol 233, 234.
 Migräne 66, 67, 71.
 Migränin 70.
 Miliaraneurysmen 143.
 Mimik 121.
 Miosis 7, 59.
 Mitbewegungen 38.
 Mongolismus 160, 161.
 Mononeuritis 82.
 Monoplegie 114, 120.
 Moorbäder 79.
 Moria 119.
 Morphin 234.
 Morphinismus 236.
 Morphinium bei Neuralgie
 78.
 — Wirkung auf Pupille 7,
 234.
 Mortonsche Krankheit 76.
 Motilitätsausfälle 14.
 Motorische Aphasie 118.
 — Bahn 15.
 — Region 114.
 Mutismus, hysterischer 252.
 Multiple Sklerose 19, 98,
 184.
 — — Lumbalflüssigkeit
 bei 57.
 — — Schmerzen bei 74.
 — — Schwindel bei 65.
 — — Zittern 35.
 M. adductor pollicis 26.

- M. abductor pollicis longus 26.
 M. adductor pollicis 26.
 M. biceps 26, 27.
 M. cucullaris 26.
 M. deltoideus 26, 27.
 M. externus oc. 31.
 M. flexor brevis poll. 26.
 — — carpi uln. 26.
 — — digitor. prof. 26.
 M. iliopsoas 27.
 M. interossei 26.
 M. levator palpebrae 31.
 M. lumbricales 26.
 M. obliq. sup. ocul. 31.
 M. opponens 26.
 M. quadriceps 27.
 M. serratus 26.
 M. sphincter pupillae 31, 58.
 M. supinator 26, 27.
 M. tibialis antic. 27.
 M. triceps 26.
 Muskelatrophien, elektrische Reaktion bei 25.
 Muskelatrophie bei Gelenkerkrankung 88.
 Muskelatrophie, spinale 109.
 Muskeldefekte, angeborene 89.
 Muskelkrämpfe bei Neuralgie 75.
 Muskelrheumatismus 86.
 Muskelsinn 43.
 Myalgie 86.
 Myasthenie 34, 88.
 Myatonie 110.
 Myelodysplasie 247.
 Mydriasis 58.
 — bei Okulomotoriuslähmung 31.
 Myelitis 97, 106.
 — Lumbalflüssigkeit bei 57.
 — und multiple Sklerose 186.
 — bei Syphilis 171.
 Myoklonie 203.
 Myopathie 111.
 Myositis 86, 87.
 — ossificans 88.
 Myotonie 111.
 Mythomanie 259.
 Myxödem 223.
 — infantiles 160, 161.
 Nachtwandeln 205.
 Nackensteifigkeit 61.
 Naegelsche Handgriffe 70.
 Narkose, Babinski in 13, 19.
 Narkosenlähmungen 90.
 Nervendehnung 78.
 Nervengeschwülste 91.
 Nervenkrankheiten 72.
 Nervennaht 90.
 Nervenpfropfung 214.
 — bei Fazialislähmung 91.
 Nervenpunktmassage 253, 286.
 Nervenverletzungen 90.
 Nervosität 4.
 Nervus abducens 29, 31.
 — accessorius 26, 28, 31.
 — acusticus 29, 31, 64.
 — axillaris 26.
 — cochlearis 64.
 — cruralis 27.
 — facialis 29, 31.
 — glossopharyngeus 29, 31.
 — hypoglossus 29, 31.
 — ischiadicus 27.
 — medianus 26.
 — musculocutaneus 26.
 — oculomotorius 29, 31.
 — — Einfluß auf Pupille 8.
 — olfactorius 31.
 — opticus 29, 31.
 — peroneus 27.
 — phrenicus 27.
 — radialis 26.
 — splanchnicus 58.
 — sympathicus 58.
 — — Einfluß auf Pupille 8.
 — thoracicus longus 90.
 — tibialis 27.
 — trigeminus 29, 31.
 — — sensibler 47.
 — trochlearis 29, 31.
 — ulnaris 26.
 — vagus 29, 31, 58.
 — vestibularis 64.
 Neugeborene, Babinski bei —n 13.
 Neuralgie 71.
 — hysterische 253.
 — bei Herzkrankheiten 73.
 — bei Paralyse 174.
 Neurasthenie 2, 3, 240.
 — bei Arteriosklerose 146.
 — bei Paralyse 176.
 — Zittern bei 36.
 Neurasthenischer Kopfschmerz 67.
 — Schwindel 65.
 Neuritis 74, 81.
 Neuritis ischiadica 82, 106.
 — optica 13, 51, 52, 126, 171, 185.
 — — bei Enzephalitis 138.
 — — bei Nebenhöhlenerkrankung 22.
 — retrobulbaris 52.
 Neurofibromatose 91.
 Neuromyositis 87.
 Neurorezidive 165, 179.
 Neurosen 1, 2.
 Neurotisches Ödem 231, 243.
 Nikotin 234, 236.
 Nitrate 153.
 Nitroglyzerin 153.
 Nuc. ambiguus 29.
 Nystagmus 32, 62.
 — bei Friedreichscher Krankheit 112.
 — kalorischer 63.
 — bei multipler Sklerose 184.
 Obstipation 246.
 — Psychotherapie der 280.
 Okzipitallappen 115, 116.
 Okzipitalneuralgie 76.
 Okzipitalrinde 52.
 Okulomotoriuslähmung 31.
 — periodische 68.
 — bei Syphilis 172.
 Ödem, neurotisches 231, 243.
 Ödeme bei Hemiplegie 148.
 Ohnmacht bei Paralyse 174.
 Operation bei Basedow 222.
 — bei Epilepsie 158, 208.
 — bei Rückenmarkstumor 101.
 — bei Hirntumor 130.
 Operkulum 113, 114.
 Ophthalmoskopie 13, 51, 61, 125.
 Opiumbromkur 207.
 Opisthotonus bei Meningitis 195.
 — bei Tetanus 216.
 Oppenheimscher Unterschenkelreflex 18.
 Optikusatrophie 13, 51.
 — Pupillen bei 7.
 — bei Turmschädel 160.
 Orbitalmuskeln, glatte 58.
 Organisch 1, 3, 4.
 Organstörungen, nervöse 242.

- Organtherapie 223.
 Orthopädie bei spinaler
 Kinderlähmung 191.
 Osteomalazische Lähmung
 86.
 Osteomyelitis 72.
 Otitis 53.
 Otitische Enzephalitis 138.
 — Meningitis 196, 199.
 — Sinusthrombose 140.
 Otitischer Hirnabszeß 134.
 Otosklerose, Schwindel bei
 62.
 Otoskopie 53, 61.
 Ovarien 225.
- Pachymeningitis cervical.
 hypertr. 172.
 — haemorrhagica 55, 172.
 199.
 Papillitis s. Stauungspa-
 pille. 14.
 Parazentrallappen 113, 114.
 Paraphrie 119.
 Paralyse, progr. 1, 165, 173.
 — juvenile 177.
 — Lumbalpunktion bei 56,
 57.
 — Babinski bei 13, 19.
 — Zittern 35.
 Paralysis agitans 1, 35,
 194.
 Paralytische Äquivalente
 203.
 Paralytischer Anfall 36, 60.
 Paramyoklonus 203.
 Paranoia 267.
 Paraphrasie 117, 119.
 Parästhesien bei anämi-
 schen Strangerkran-
 kungen 107.
 Parathyroideae 217, 218.
 Parietallappen 113.
 Patellarklonus 11, 16.
 Patellarreflex 9.
 — angeborenes Fehlen 10.
 — bei Hysterie 10.
 — bei peripherer Lähmung
 28.
 — bei Diabetes 233.
 — nach Neuritis 85.
 — bei Paralyse 173.
 — bei Tabes 168.
 Pavor nocturnus 205.
 Pellagra 237.
 Periphere Sensibilitätsbe-
 zirke 40, 41.
- Peroneuslähmung 27.
 — bei Tabes 169.
 Persuasion 278.
 Pes equinovarus 35.
 Petit mal 203.
 Phenazetin 70.
 Phrenokardie 244.
 Pilokarpin 234.
 — bei Neuritis 86.
 Plattfußbeschwerden 73.
 Platzangst 249.
 Plexuslähmung 27, 90.
 Polioencephalitis haemor-
 rhagica 139.
 Poliomyelitis acuta 188.
 Pollakiurie 246.
 Pollutionen 247.
 Poliomyelitis chronica 109.
 Poliomyositis 87.
 Polyneuritis 82.
 Polyneuritisgifte 237.
 — Lumbalpunktion bei 57.
 — Diagnose gegenüber der
 Tabes 168.
 Polyneuritische Psychose
 85.
 Pons, Tumoren des 128.
 Poriomanie 205.
 Postikuslähmungen bei Ta-
 bes 170.
 Potenz bei Tabes 170.
 Präataktisches Stadium
 168.
 Prädiaktionstypus der Py-
 ramidenlähmung 20.
 Presbyophrénie 146.
 Priapismus bei Rücken-
 marksverletzung 103.
 Probelaminektomie 100.
 Propulsion 194.
 Psammom 124.
 Pseudoangina pectoris 244.
 Pseudobulbärparalyse 34.
 146.
 — beim Kind 163.
 Pseudoklonus 11.
 Pseudohypertrophie 111.
 Pseudologia phantastica
 259.
 Pseudoneuritis optica 14.
 Pseudoparalyse, alkoholi-
 stische 177.
 Pseudotabes, peripherica
 83.
 Pseudotumor 132.
 Psychasthenie 240.
 Psychasthenische Krämpfe
 206.
 Psychoanalyse 275.
 Psychoneurosen 1, 239.
- Psychosen 1, 2, 267.
 — bei Hirnluës 176.
 — Kopfschmerz bei 67.
 — bei Tabes 176.
 Psychotherapie 273.
 Ptosis 31.
 Puerperale Neuritis 83.
 Pupille 8, 57, 58, 166.
 — im Koma 60.
 — bei Plexuslähmung 27.
 Pupillen im epileptischen
 Anfall 201.
 — bei Migräne 68.
 Pupillengifte 234.
 Pupillenstarre, absolute 8,
 58.
 — bei Paralyse 173.
 Pupillensymptome bei
 Heine-Medinscher K.
 190.
 Pupillenuntersuchung 5.
 Pupillenweite 7.
 Pylorospasmus 245, 246.
 Pyramiden 70, 77.
 — Kontraktur 34.
 Pyramidenkreuzung 16.
 Pyramidenlähmung 19,
 108, 115.
 Pyramidenseitenstrang-
 bahn 16.
 Pyramidenvorderstrang-
 bahn 16.
 Pyramidenzeichen 14, 16.
 — bei multipler Sklerose
 184.
- Quadrantenhemianopsie
 52.
 Quecksilber vgl. Hg.
 Quecksilbervergiftung 237.
 — Zittern 35.
 Quersyndrom 92.
- Radialislähmung 26.
 — bei Bleineuritis 84.
 Radikuläre Innervation 25,
 27.
 — Sensibilitätsstörung 43.
 Radium 152.
 Radiusreflex 18, 28.
 Rauchen bei Nervösen 273,
 Raucher 227.
 Rausch, pathologischer
 210.
 Raynaudsche Krankheit
 229.
 Rechnen bei Paralyse 176.
 Recklinghausensche
 Krankheit 91.

- Rektum 58, 59, 61.
 Rekurrenslähmung 32.
 Redressement des Buckels 105.
 Reflektorische Kopfschmerzen 66, 69.
 — Krämpfe 212.
 Reflexe bei Hysterie 253.
 Reflexepilepsie 211.
 Reflexneurosen, nasale 72.
 Reflexogene Zone 10.
 Remissionen der Paralyse 181, 183.
 Rentenkampf 262.
 Rentenkampfneurose 263.
 Retentio urinae et alvi 59.
 — — bei Hysterie 246.
 Retropulsion 194.
 Rheumatische Schädlichkeiten 74.
 Rhinogene Abszesse 135.
 Riechregion 113.
 Riesenwuchs 224.
 Riesenpyramidenzellen 15, 16.
 Rigidität 35, 194.
 Risus sardonius 216.
 Rodagen 220, 221.
 Romberg'scher Versuch 49, 51, 168.
 Röntgenbehandlung der Syringomyelie 96.
 Röntgenfeststellung des Hypophysentumors 129, 224.
 Rückenmarksstränge, sensible Leitung der 43.
 Rückenmarkstumor 98.
 — Schmerzen bei 74.
 — Zuckungen bei 36.
 Rückenschmerzen bei Anämie 86.
 Ruheübungen 215.
 Sakralsegmente 28.
 Sajodin 153.
 Salvarsan 178, 179.
 — bei Chorea 193.
 Santonin 233.
 Sarkom 123, 130.
 Skapula 26.
 Schädelaffektionen 71.
 Schädelbruch 156.
 — Schwindel bei 64.
 Schädelmaße 159.
 Schädeluntersuchung 128.
 Schilddrüse 219.
 Schlaf, postepileptischer 202.
 Schlafdrucklähmung 90.
 Schläfenlappenabszeß 134.
 Schlaflosigkeit 278.
 — bei Neurasthenie 241.
 Schlafmittel 284.
 Schlaganfall 141.
 — bei Arteriosklerose 153.
 Schlafzustände, hysterische 256.
 Schleife 46.
 Schleimhautreflexe b. Sensibilitätsstörung 47.
 Schlundkrämpfe 216, 217.
 Schmerzen 71.
 — bei Hemiplegie 148.
 Schmerzsinne 38.
 Schrecklähmung 258.
 Schrei, epileptischer 202.
 Schreiben 118.
 Schreibkrampf 214.
 Schreibstörung bei Paralyse 174.
 Schriftsprache 118.
 Schrumpfnieren 143.
 Schultermuskulatur 26.
 Schußverletzungen des Gehirns 158.
 Schwachsinn 160.
 — bei Hysterie 259.
 Schwefelkohlenstoff 83.
 Schwefelkohlenstoff 83, 237.
 Schwefelquellen 177.
 Schweißstörungen 243.
 Schwielenkopfschmerz 66, 69.
 Schwindel 62.
 — bei Arteriosklerose 146.
 — epileptischer 204.
 — bei Neurasthenie 241.
 — bei Paralyse 174.
 — bei multipler Sklerose 185.
 — nach Trauma 158.
 Schwitzkuren bei Neuritis 86.
 Scoliosis ischiadica 76.
 Skotom 51.
 Sediment der Lumbalflüssigkeit 55.
 Seeaufenthalt für Nervöse 272.
 Seekrankheit 63.
 Segmente des Rückenmarks 25, 27.
 Sehbahn 52.
 Sehnenreflexe bei Anästhesie 47.
 Sehnenreflexe bei Ataxie 50, 168.
 — im Koma 60.
 — bei degenerativen Lähmungen 28.
 — bei Querschnittserkrankung 95, 102.
 — vgl. auch Patellarreflex, Achillesreflex etc.
 Sehnentransplantation bei spinaler Kinderlähmung 191.
 Sehnervenkreuzung 52.
 Sehregion 113.
 Sehstörungen, hysterische 254.
 Sehstrahlung 116.
 Seitenstrang 43, 45, 46, 47.
 Sensibilität, tiefe 50.
 Sensibilitätsprüfung 3, 38.
 Sensibilitätsstörungen 38.
 — hysterische 252.
 — bei multipler Sklerose 185, 186.
 — bei Tabes 170.
 — bei Thalamusherd 121.
 Sensible Bahnen 45, 46.
 Sensorische Aphasie 116.
 Serratuslähmung 90.
 Sexuelles Trauma 258, 275.
 Silbenstolpern 173.
 Simulation 254, 263.
 — von Schmerzen 81.
 Sinusthrombose 140.
 Skandierende Sprache 184.
 Sklerodermie 231.
 Somnambule Zustände 256.
 Sonnenstich 139.
 Spasmophilie 206, 217, 218.
 Spasmus nutans 219.
 Spastische Spinalparalyse 108.
 Spätapoplexie 157.
 Spätepilepsie 146, 173, 211.
 Speichelfluß bei Paralysis agitans 194.
 Spermatorrhoe 247.
 Spina bifida 105, 247.
 Spinalparalyse, spastische 108.
 — syphilitische 173.
 Spiritismus 256.
 Spondylitis 104, 105.
 Spondylose rhizomélitique 105.
 Spontanfraktur 170.
 Sprache bei multipler Sklerose 184.

- Sprachfunktion 116.
 Sprachstörung bei Paralyse 173, 174.
 Sprachstörung im Kindesalter 163.
 Sprachverständnis 116, 117.
 Status epilepticus 203.
 Stauungspapille 14, 51, 123, 125.
 — bei Chlorose 141.
 — bei Hirnabszeß 133.
 — bei Meningitis 195.
 Stehen bei Ataxie 49, 51.
 Stellwagsches Phänomen 220.
 Steppgang 27.
 Stereognosis 115.
 Stigmata 253.
 Stimmritzenkrampf 217.
 Stirnlappen 113, 116, 119.
 Stottern 214, 215.
 Struma bei Basedow 219.
 Strychnin bei Neuritis 86.
 Strychninkrämpfe 233.
 Stumme Gehirnteile 119.
 Stupor 268.
 — bei Epilepsie 205.
 — hysterischer 256.
 Sublimat 179.
 Suggestion 256, 279.
 — von Sensibilitätsstörungen 39.
 Sulfonalneuritis 83.
 Supranukleäre Lähmung 29.
 Sympathikuslähmung 58.
 Sympathisches System 57.
 Syncope locale 230.
 Syphilis 143, 144, 165, 171.
 — Epilepsie bei 211.
 — hereditäre 177.
 — bei Schwachsinn 161.
 — Lumbalpunktion bei 57.
 — Myelitis durch 98.
 — des Rückenmarks, Schmerzen bei 74.
 Syphilitische Kopfschmerzen 67.
 — Myalgie 86.
 Siringomyelie 95.
 — Schmerzen bei 74.
 Tabes 165.
 — combiné 171.
 — juvenile 177.
 Tabes, Lumbalpunktion bei 56, 57.
 — superior 169.
 Tabespsychosen 176.
 Tabes, Schmerzen bei 74.
 — Schwindel bei 64, 65.
 Tabische Ataxie 50, 168.
 — Krisen 73.
 Taboparalyse 173.
 Tachykardie 244.
 Tachykardie bei Basedow 219, 220.
 Tagträume 256.
 Taubheit 53.
 — hysterische 254.
 Taubstumme, Schwindel bei 63.
 Täuschungen bei Hysterie 248.
 Temperatursinn 38.
 Temporale Ablassung bei multipler Sklerose 14, 185.
 Temporallappen 113, 116, 119.
 Tenotomie 164.
 Tetanie 217.
 Tetanus 216.
 Thalamus 46, 114, 121.
 Thermalbäder 79.
 Thomsensche Krankheit 111.
 Thrombose der Gehirnarterien 142.
 Thymus bei Myasthenie 89.
 Tic 212.
 — hysterischer 252.
 Topographie des Rückenmarks 99.
 — des Schädels 121.
 Torsionsneurose 214.
 Torticollis rheumatica 87.
 — mental 213.
 Totenfinger 229.
 Tractus opticus 52, 116.
 Trauma bei Lateralsklerose 110.
 — bei Muskelatrophie 110.
 Traumatische Atrophien 231.
 — Enzephalitis 138.
 — Epilepsie 210.
 Traumatischer Hirnabszeß 133.
 Traumatische Meningitis 196.
 — Neurose 261.
 — Entstehung der multiplen Sklerose 187.
 Traumleben 277.
 Tremor 35.
 — bei Basedow 220.
 — neurasthenischer 240.
 — bei Paralyse 124.
 — bei Paral. agit. 194.
 — bei multipler Sklerose 184.
 Trepanation, dekompresive 131.
 Trizepsreflex 18, 28.
 Trichinose 87.
 Trigemini 70.
 Trigemineuralgie 75, 79.
 Trigeminooperationen 80.
 Trinkerfürsorge 235.
 Trismus 211, 212, 216.
 Trochlearislähmung 32.
 Trophische Störungen 226, bei Neuritis 84.
 — bei Siringomyelie 97.
 Trousseau'sches Phänomen 217.
 Tuberkel des Gehirns 122, 124, 131.
 Tuberkulin bei Paralyse 181.
 Tuberkulose der Wirbel 104.
 Tumor des Gehirns 122.
 — Kopfschmerz bei 67, 69.
 Turmschädel 160.
 Typhus, Neuritis nach 82.
 Überarbeitung 258.
 Übungstherapie der Aphasie 155.
 — bei Lähmungen 155.
 — bei Tabes 182.
 Ulnarreflex 19, 28.
 Ulnarislähmung 26, 35.
 Unfall 238.
 Urämie 60, 232.
 — Babinski bei 13.
 — Kopfschmerz bei 66.
 Urtikaria 231.
 — facticia 243.
 Vaginismus 248.
 Varizen 73.
 Vasomotoren bei Migräne 68.
 Vasomotorisch-trophische Erkrankungen 226, 243.
 Vasomotorische Störungen bei Hemiplegie 148.
 Vasotonin 153.

Ventrikelblutung, Lumbal- flüssigkeit bei 55. Ventrikelpunktion 57. — bei Hydrozephalus 161. Ventrikeltumor 130. Vergiftungen, Kopfschmerz bei 66. Verhebungsbruch 103. Verstimmungen, epilepti- sche 205. Vierhügel 29. Vorbeireden 256. Wachstumshemmung bei spinaler Kinderlähmung 191. Wachstumsstörung bei ze- rebraler Kinderlähmung 162. Wadenkrampf 212.	Wanderniere 73. Wassermannsche Reaktion 144, 165, 166, 176, 177. Wassermannsche Reaktion im Liquor 55, 167. Wernickesche Stelle 113. Wirbelbruch 102. Wirbelschmerzhaftigkeit 100. Wirbeltumor 100, 106. Witzelsucht 119. Wortsalat 117. Wunderheilung 279. Wurmförmige Zuckung 24. Wurzelneuralgie 75. Wurzelsymptome 95. Wutkrankheit 217. Zähneknirschen 205. Zahnkrankheiten 72.	Zentralfurche 114, 115. Zentralsyndrom 95. Zentralwindungen 114, 115. Zerebellare Störungen bei Kinderlähmung 163. Zervikalsegmente 27. Zirkumduktion 148. Zittern vgl. Tremor. Zuckungsformel 24. Zunge 30. Zungenbiß 202. Zungenlähmung 30. Zwangslachen und -weinen 186. Zwangsvorstellungen 248, 260. Zysten des Gehirns 122, 124, 130.
-

Verlag von Julius Springer in Berlin.

Handbuch der Neurologie.

Bearbeitet von

Prof. Dr. G. Abelsdorff-Berlin, Privatdozent Dr. R. Bárány-Wien, Dr. M. Bielschowsky-Berlin, Prof. Dr. R. du Bois-Reymond-Berlin, Prof. Dr. K. Bonhoeffer-Breslau, Prof. Dr. H. Borutta-Berlin, Dirig. Arzt Dr. W. Braun-Berlin, Privatdozent Dr. K. Brodmann-Tübingen, Prof. Dr. O. Bumke-Freiburg i. Br., Privatdozent Dr. R. Cassirer-Berlin, Dr. T. Cohn-Berlin, Prof. Dr. A. Cramer-Göttingen, Privatdozent Dr. H. Eppinger-Wien, Prof. Dr. R. Finkelnburg-Bonn, Dr. E. Flatau-Warschau, Dr. G. Flatau-Berlin, Privatdozent Dr. E. Forster-Berlin, Prof. Dr. H. Gutzmann-Berlin, Dr. H. Haenel-Dresden, Prof. Dr. Fr. Hartmann-Graz, Prof. Dr. K. Hellbronner-Utrecht, Prof. Dr. R. Henneberg-Berlin, Prof. Dr. S. E. Henschen-Stockholm, Dr. R. Hirschfeld-Berlin, Prof. Dr. E. Jendrassik-Budapest, Dr. O. Kallischer-Berlin, Dr. S. Kallischer-Berlin, Privatdozent Dr. M. Kauffmann-Halle a. S., Privatdozent Dr. Fr. Kramer-Breslau, Prof. Dr. A. Léri-Paris, Prof. Dr. M. Lewandowsky-Berlin, Dr. F. H. Lewy-München, Privatdozent Dr. O. Marburg-Wien, Prof. Dr. P. Marie-Paris, Dr. Fr. Mohr-Coblenz, Prof. Dr. E. Neisser-Stettin, Dr. E. Phleps-Graz, Dr. F. H. Quix-Utrecht, Prof. Dr. E. Redlich-Wien, Prof. Dr. K. Schaffer-Budapest, Dr. H. Schrottenbach-Graz, Privatdozent Dr. A. Schüller-Wien, Prof. Dr. P. Schuster-Berlin, Privatdozent Dr. W. Spielmeier-Freiburg i. Br., Prof. Dr. H. Vogt-Wiesbaden, Dr. W. Vorkastner-Greifswald, Prof. Dr. O. Vulpius-Heidelberg, Prof. Dr. E. Weber-Berlin, Prof. Dr. J. K. A. Wertheim-Salomonson-Amsterdam, Privatdozent Dr. J. Wickman-Stockholm, Prof. Dr. K. Wilmanns-Heidelberg.

Herausgegeben von Professor Dr. M. Lewandowsky-Berlin.

Im Jahre 1910 erschien:

Erster Band: Allgemeine Neurologie.

1618 Seiten. Mit 322 zum Teil farbigen Textabbildungen und 12 Tafeln.

Preis M. 68.—; in 2 Halblederbände gebunden M. 73.50.

Im Jahre 1911 erschien:

Zweiter Band: Spezielle Neurologie I.

1170 Seiten mit 327 Textabbildungen und 10 Tafeln.

Preis M. 58.—; in Halbleder gebunden M. 61.50.

Im Jahre 1912 erschien:

Dritter Band: Spezielle Neurologie II.

1170 Seiten mit 196 Textabbildungen und 8 Tafeln.

Preis M. 58.—; in Halbleder gebunden M. 61.50.

Der vierte (Schluß-)Band, enthaltend „Spezielle Neurologie III“, erscheint im Herbst 1912.

Lehrbuch der Nervenkrankheiten. Von G. Aschaffenburg-Köln, H. Curschmann-Mainz, R. Finkelnburg-Bonn, R. Gaupp-Tübingen, C. Hirsch-Göttingen, Fr. Jamin-Erlangen, J. Ibrahim-München, Fedor Krause-Berlin, M. Lewandowsky-Berlin, H. Liepmann-Berlin, L. R. Müller-Augsburg, Fr. Pineles-Wien, F. Quensel-Leipzig, M. Rothmann-Berlin, H. Schlesinger-Wien, S. Schoenborn-Heidelberg, H. Starck-Karlsruhe, H. Steinert-Leipzig. Herausgegeben von Dr. Hans Curschmann, Dirigierendem Arzt der Inneren Abteilung des St. Rochus-Hospitals in Mainz. Mit 289 in den Text gedruckten Abbildungen. 1909.

In Leinwand gebunden Preis M. 24.—.

Taschenbuch zur Untersuchung nervöser und psychischer Krankheiten und krankheitsverdächtiger Zustände.

Eine Anleitung für Mediziner und Juristen, insbesondere für beamtete Ärzte. Von Dr. W. Cimbäl, Nervenarzt und Leitender Arzt der psychiatrischen Abteilung des Städt. Krankenhauses zu Altona. 1909.

In Leinwand gebunden Preis M. 3.60.

Die Neuralgien der täglichen Praxis.

Von Dr. O. Schellong in Königsberg i. Pr. 1911.

Preis M. 1.80.

Neurasthenie. Eine Skizze.

Von Dr. Otto Veraguth, Privatdozent an der Universität Zürich. 1910.

Preis M. 3.60.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von Julius Springer in Berlin.

Handbuch der Inneren Medizin.

Bearbeitet von

L. Bach-Marburg, J. Baer Straßburg, G. von Bergmann-Altona, R. Bing-Basel, H. Curschmann-Mainz, W. Falta-Wien, W. A. Freund-Berlin, H. Gutzmann-Berlin, C. Hegler-Hamburg, K. Heilbronner-Utrecht, R. Heinz-Erlangen, G. Jochmann-Berlin, K. Kießling-Hamburg, O. Kohnstamm-Königstein, W. Kotzenberg-Hamburg, P. Krause-Bonn, B. Krönig-Freiburg, F. Külbs-Berlin, F. Lommel-Jena, E. Meyer-Berlin, E. Meyer-Königsberg, L. Mohr-Halle, P. Morawitz-Freiburg, Ed. Müller-Marburg, F. Rolly-Leipzig, O. Rostoski-Dresden, M. Rothmann-Berlin, C. Schilling-Berlin, H. Schottmüller-Hamburg, R. Staehelin-Basel, E. Steinitz-Dresden, J. Strasburger-Breslau, F. Suter-Basel, F. Umber-Berlin, R. von den Velden-Düsseldorf, O. Veraguth-Zürich, H. Vogt-Straßburg, F. Volhard-Mannheim, K. Wittmaack-Jena.

Herausgegeben von

Prof. Dr. L. Mohr und Prof. Dr. R. Staehelin
Direktor der Medizin. Poliklinik zu Halle (Saale) Direktor der Medizin. Klinik zu Basel.

Erster Band: Infektionskrankheiten.

Mit 288 zum Teil farbigen Textabbildungen und 3 Tafeln in Farbendruck.

Preis M. 26.—; in Halbfranz gebunden M. 28,50.

Preis des in 6 Bänden vollständigen Werkes etwa M. 150.—.

Inhaltsverzeichnis:

A. Allgemeiner Teil. Von Prof. Dr. O. Rostoski, Dresden.

B. Spezieller Teil.

Akute Exantheme. Von Professor Dr. F. Rolly, Leipzig.

Keuchhusten, Influenza, Febris herpetica, Parotitis epidemica, Diphtherie, Tetanus, Typhus exanthematicus (Fleckfieber), Cholera asiatica. Von Professor Dr. P. Krause, Bonn.

Dysenterie (Ruhr). Von Professor Dr. G. Jochmann, Berlin.

Die typhösen Erkrankungen. Von Oberarzt Dr. H. Schottmüller, Hamburg.

Septische Erkrankungen, Erysipel, Der akute Gelenkrheumatismus, Meningitis cerebrospinalis epidemica. Von Professor Dr. G. Jochmann, Berlin.

Die epidemische Kinderlähmung (Heine-Medinische Krankheit). Von Prof. Dr. Ed. Müller, Marburg.

Die akute Miliartuberkulose. Von Dr. E. Steinitz, Dresden und Professor Dr. O. Rostoski, Dresden.

Lepra. Von Professor Dr. P. Krause, Bonn.

Pest. Von Professor Dr. G. Jochmann, Berlin.

Maltafieber, Protozoenkrankheiten, Gelbfieber, Denguefieber, Beriberi. Von Professor Dr. C. Schilling, Berlin.

Zoonosen. Von Professor Dr. F. Lommel, Jena.

Autorenregister. — Sachregister.

Ergebnisse der Inneren Medizin und Kinderheilkunde. Herausgegeben von Proff. DDr. F. Kraus-Berlin, O. Minkowski-Breslau, Fr. Müller-München, H. Sahli-Bern, A. Czerny-Straßburg, O. Heubner-Berlin. — Redigiert von Proff. DDr. Th. Brugsch-Berlin, L. Langstein-Berlin, Erich Meyer-Straßburg, A. Schittenhelm-Erlangen. Jährlich 2 Bände.

Bis Frühjahr 1912 sind erschienen Band I bis VIII.

Diagnose und Therapie innerer Krankheiten. Von Oberstabsarzt Dr. Kühnemann. 1911. In Leinwand gebunden Preis M. 6.—.

Die Krankheiten der oberen Luftwege. Aus der Praxis für die Praxis. Von Prof. Dr. Moritz Schmidt. Vierte, umgearbeitete Auflage von Prof. Dr. Edmund Meyer in Berlin. Mit 180 Textfiguren, 1 Heliogravüre und 5 Tafeln in Farbendruck. 1909. In Leinwand gebunden Preis M. 22.—.

Die Praxis der Hydrotherapie und verwandter Heilmethoden. Ein Lehrbuch für Ärzte und Studierende. Von Dr. A. Laqueur, Leitender Arzt der hydrotherapeut. Anstalt am Rudolf-Virchow-Krankenhaus zu Berlin. Mit 57 Textfiguren. 1910. Preis M. 8.—; in Leinwand gebunden M. 9.—.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von Julius Springer in Berlin.

Diätetik innerer Erkrankungen. Zum praktischen Gebrauch für Ärzte und Studierende. Nebst einem Anhang: Die diätetische Küche. Von Prof. Dr. Th. Brugsch, Assistent der II. Medizin. Klinik der Universität Berlin. 1911. Preis M. 4.80; in Leinwand gebunden M. 5.60.

Kochlehrbuch und praktisches Kochbuch für Ärzte, Hygieniker, Hausfrauen, Kochschulen. Von Prof. Dr. Chr. Jürgensen in Kopenhagen. Mit 31 Figuren auf Tafeln. 1910. Preis M. 8.—; in Leinwand gebunden M. 9.—.

Die Röntgentherapie in der Dermatologie. Von Dr. Frank Schultz, Privatdozent, Oberarzt der Abteilung für Lichtbehandlung an der Königlichen Universitätspoliklinik für Hautkrankheiten zu Berlin. Mit 130 Textfiguren. 1910. Preis M. 6.—; in Leinwand gebunden M. 7.—.

Mikroskopie und Chemie am Krankenbett. Für Studierende und Ärzte bearbeitet von Prof. Dr. Hermann Lenhartz, Direktor des Eppendorfer Krankenhauses in Hamburg. Sechste, wesentlich umgearbeitete Auflage. Mit 92 Textfiguren. 4 Tafeln in Farbendruck und einem Bildnis des Verfassers. 1910. In Leinwand gebunden Preis M. 9.—.

Medizinisch-klinische Diagnostik. Lehrbuch der Untersuchungsmethoden innerer Krankheiten für Studierende und Ärzte. Von Professor Dr. F. Wesener, Oberarzt des Städtischen Elisabeth-Krankenhauses zu Aachen. Mit röntgendiagnostischen Beiträgen von Dr. Sträter in Aachen, sowie Textabbildungen und 21 farbigen Tafeln. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 1907. In Leinwand gebunden Preis M. 18.—.

Lehrbuch der Herzkrankheiten. Von James Mackenzie, M. D., M. R. C. P. Autorisierte Übersetzung der zweiten englischen Auflage von Dr. F. Grote in Caux. Mit einem Vorwort von Wilhelm His. Mit 280 Textfiguren. 1910. Preis M. 15.—; in Leinwand gebunden M. 17.—.

Praktische Kinderheilkunde in 36 Vorlesungen für Studierende und Ärzte. Von Prof. Dr. M. Kassowitz in Wien. Mit 44 Abbildungen im Text und auf einer farbigen Tafel. 1910. Preis M. 18.—; in Leinwand gebunden M. 20.—.

Einführung in die moderne Kinderheilkunde. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Von Prof. Dr. B. Salge, Direktor der Universitäts-Kinderklinik in Freiburg i. B. Zweite, vermehrte Auflage. Mit 15 Textfiguren. 1910. In Leinwand gebunden Preis M. 9.—.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von Julius Springer in Berlin.

Technik der Thoraxchirurgie. Von Dr. F. Sauerbruch, o. ö. Professor, Direktor der Chirurg. Universitätsklinik Zürich und Dr. E. D. Schumacher, Privatdozent, I. Assistent an der Chirurg. Universitätsklinik Zürich. Mit 55 Textfiguren und 18 mehrfarbigen Tafeln. 1911.

In Leinwand gebunden Preis M. 24.—.

Ergebnisse der Chirurgie und Orthopädie. Herausgegeben von Geh. Medizinalrat Prof. Dr. E. Payr-Leipzig und Geh. Medizinalrat Prof. Dr. H. Küttner-Breslau. Jährlich 2 Bände.

Bis Frühjahr 1912 sind erschienen Band I—IV.

Lehrbuch der Geburtshilfe. Von Dr. Max Runge, Geh. Medizinalrat, ord. Professor der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der Universitäts-Frauenklinik zu Göttingen. Achte Auflage. Mit 236, darunter zahlreichen mehrfarbigen Textfiguren. 1909. In Leinwand gebunden Preis M. 15.—

Lehrbuch der Gynäkologie. Von Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Max Runge. Vierte Auflage, bearbeitet von Prof. Dr. R. Birnbaum, Privatdozent an der Universität Göttingen. Mit 211, darunter zahlreichen mehrfarbigen Textfiguren. 1910. In Leinwand gebunden Preis M. 14.—.

Der Lupus. Seine Pathologie, Therapie, Prophylaxe. Für den praktischen Gebrauch. Von Professor Luigi Philippson, Direktor der Dermatologischen Universitätsklinik zu Palermo. Aus dem italienischen Manuskript übersetzt von Dr. Fritz Juliusberg. Mit 14 Figuren auf Tafeln. 1911.

Preis M. 2.—; in Leinwand gebunden M. 2.60.

Die Gonorrhöe des Mannes. Ihre Pathologie und Therapie. Von Dr. med. W. Karo, Berlin 1911. Preis M. 2,80; Leinwand gebunden Mk. 3,40.

Praktische Anleitung zur Syphilisdiagnose auf biologischem Wege. (Spirochaeten - Nachweis, Wassermannsche Reaktion.) Von Dr. P. Mulzer. Zweite Auflage. Mit 20 Abbildungen und 4 Tafeln. 1912. In Leinwand gebunden Preis M. 4,80.

Die Therapie der Syphilis. Ihre Entwicklung und ihr gegenwärtiger Stand. Von Dr. P. Mulzer. Mit einem Vorwort von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. P. Uhlenhuth. 1911. Preis M. 2,80; in Leinwand gebunden M. 3,60.

Der Harn sowie die übrigen Ausscheidungen und Körperflüssigkeiten von Mensch und Tier. Ihre Untersuchung und Zusammensetzung in normalem und pathologischem Zustande. Ein Handbuch für Ärzte, Chemiker und Pharmazeuten sowie zum Gebrauche an landwirtschaftlichen Versuchsstationen. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Dr. Carl Neuberg, Universitätsprofessor und Abteilungsvorsteher am Tierphysiologischen Institut der Königlichen Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin. 2 Teile. Mit zahlreichen Textfiguren und Tabellen. 1911. Preis M. 58.—; in 2 Halblederbänden geb. M. 63.—.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
