

ИЗОБРАЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ,

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РОССИЙСКИХЪ, УПОТРЕБ-
ЛЯЕМЫХЪ ВЪ ЛѢКАРСТВА, И ТАКИХЪ, КОТО-
РЫЯ НАРУЖНЫМЪ ВИДОМЪ СЪ НИМИ СХОДНЫ
И ЧАСТО ЗА НИХЪ ПРИНИМАЮТСЯ, НО ЛѢКАР-
СТВЕННЫХЪ СИЛЪ НЕ ИМѢЮТЬ.

ИЗДАВАЕМЫЯ

Докторомъ Медицины, ИМПЕРАТОРСКАГО Мо-
сковскаго Университета Профессоромъ Ботаники,
Статскимъ Советникомъ и Кавалеромъ,

Иваномъ Двигубскимъ.

ЧАСТЬ I.



МОСКВА.

Въ Университетской Типографии.

1828.

Печатано съ одобренія ощдѣленія Врачебныхъ на-
укъ, по опредѣленію Университетскаго Совѣща 25го
Апрѣля 1828 года.

Секретарь Совѣта *О. П. Надв. Соб. и Кавалерѣ*
Павелъ Щепкинъ.



2007338189

606

АВРАНЬ ЛѢКАРСТВЕННЫЙ.

Gratiola officinalis. LINN.

(КЛ. II. Diandria, ПОР. I. Monogynia. Линн. сист.)

Призн. рода: Чаш. 5-лиспная; вѣнт. 1 - лепестный неправильный, 4-раздѣльный; тыт. 4, двѣ безъ пыльниковъ; мак. 2-гнѣздная.

Призн. породы. АВР. лѣкарственныи, листья ланцетовидные, зазубренные (къ верхушкѣ); цветы на ножкахъ. Моск. Флора, стр. 18.

G. officinalis, foliis lanceolatis serratis, floribus pedunculatis. Hayne. B. III. N. 15.

Аврань дикой, лихорадочная трава, благодать, коневый прутъ. Руск. лѣгеб. травы. Ч. I, стр. 73. Хозяйств. Ботан. Т. XII стр. 114.

По Нѣм. achtes Purgierkraut; по Фр. Gratiolle officinale; по Анг. Hedge Hyssop; по Ит. Gratiolle officinale.

Ростетъ по всей почти Россіи по влажнымъ лугамъ, около рѣкъ, озеръ. 2.

Цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Сентябрѣ.

Корень горизонтальный, колѣнчатый; стебель прямый, круглый, $\frac{1}{2}$ арш. и выше; листья сидячие, прошивуположные, ланцетовидные: *нижніе* о 5 жилкахъ, а *верхніе* и на вѣтвяхъ о 3 жилкахъ, пѣ и другіе зазубренные, особенно къ верхушкѣ листа. Цвѣты сидячіе по одинакѣ на длинныхъ ножкахъ; *ташетка* 5-лиспная, съ двумя при основаніи прицвѣтниками, которые нѣкоторыми принимаются за листочки чашечки и тогда чаш. почитаются 7-лиспною; *вѣнчикъ* однолепестный, неправильный, блѣдорозовый и бѣлый: (пробка длиннѣе чашечки, углалѣпая); *отгибъ* о 4-разрѣзахъ: верхній разрѣзъ ширѣ другихъ, съ выемкою и загнулся назадъ, *противъ* одинаковы, скруглены и прямы; *тычинокъ* 4, изъ которыхъ двѣ короче другихъ двухъ и безъ пыльниковъ; у *пестика* завязь продолговатая, столбикъ прямой, рильце двураздѣльное; *маковка* двугнѣздная

двуспворчашая; *сѣмѧнѣ* много продолговатыхъ, мѣлкихъ.

Въ лѣкарства употребляется *трава* (*Herba gratiolae s. gratiae Dei*), которую собираюшь предъ пѣмъ временемъ, какъ цвѣшамъ надобно показываться, и. е. въ началѣ Іюня мѣсяца.

Трава сія запаху не имѣетъ, но горьковатый и даже нѣсколько пропивный вкусъ. Она составляетъ сильное слабительное и рвотное лѣкарство, почему и совѣтуюшь давать ее во всѣхъ пѣхъ болѣзняхъ, копорыя требуюшь сихъ лѣкарствъ; но по причинѣ сильнаго ея дѣйствія въ небольшихъ приемахъ. Высушеннная не споль сильно дѣйствуетъ. Она заслуживаетъ пѣмъ большее вниманіе Россійскихъ врачей, что слабительныя расщепительныя лѣкарства всѣ почти должно выписывать изъ чужихъ и при томъ отдаленныхъ земель и дорогою цѣною, между пѣмъ какъ права сія росшепть почти вездѣ въ Россіи. Даюшь ее (въ порошкѣ, въ видѣ оливара и винной наливки) въ водяной болѣзни брюшной, и пропиву глиставъ, въ желчныхъ и другихъ упорныхъ, а наипаче осирыхъ лихорадкахъ. Въ аптекахъ пріуготовляюшь иногда и *экстрактъ* (*Extractum gratiolae*). Для лошадей вредна.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) *таверка* съ пестникомъ и двумя прицѣшниками; 2) *стѣнка*, разрѣзанный вдоль; 3) *лыльникъ* съ наружной стороны и 4) съ внутренней стороны (увеличен.); 5) *лесникъ* (увелич.); 6) *треснувшая* вдоль *маковка*; 7) *створка* ея (увелич.); 8) *стѣмѧнѣ* (увелич.); 9) оно же попечечно, а 10) вдоль разрѣзанное.



ВАЛЕРИЯНА АПТЕЧНАЯ.

Valeriana officinalis. LINN.

(КЛ. III. Diandria, ПОР. I. Monogynia. Линн. сист.)

Призн. рода. Чаш. нѣть; вѣнц. 1 - лепесточный, при основании съ горбикомъ; сѣмя 1 съ хохолкомъ.

Призн. породы. В. обыкновенная, листья крылатые, листочки ланцетовидные зубчатые; стебель бороздчатый. Моск. Флора, стр. 40.

V. officinalis, caule tereti sulcato, foliis omnibus pinnatis, pinnis serratis, floribus triandris. Hayne. B. III. N. 32.

Называется также: Маунъ, земляный ладонъ; очной корень, балдырянъ дикой. Руск. лѣтн. травникъ Ч. 1 стр. 519. Хозяйст. Бот. Т. IV. стр. 7.

По Нѣмец. Gemeiner Baldrian; по Фр. Valeriane sauvage; по Анг. Great wild Valerian. по Ит. Valeriana officinale.

Ростетъ по всей Россіи и Сибири по влажнымъ и пѣнистымъ мѣстамъ. 2.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ, Іюле и Августѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Августѣ и Сентябрѣ.

Корень мочковатый, съ весьма короткимъ шупыремъ сдержнемъ; стебель цилиндрический, бороздчатый, около 1 арш. и выше; листья всѣ крылатые: стебельные пропивуложные, листочки ланцетовидные, овальные, зазубренные; цвѣты полузонниками, разделенными на три части: подъ каждымъ цвѣткомъ по два прицвѣтика; ташетки нѣть; вѣнчикъ однолепесточный, воронковидный о 5 разрѣзахъ, бѣлый, а иногда блѣднорозовый; тычинокъ 3, длиннѣе вѣнчика; пыльники продолговатые; у пестика связь продолговата подъ вѣнчикомъ; рыльце на столбикѣ, 3-раздѣльное; сѣмя одно продолговано-яйцевидное, съ хохолкомъ на верху.

Въ лѣкарства употребляется корень (*Radix Valeriana sylvestris s. Valeriana minoris*). Его собираютъ должно весною прежде нежели спасть въ стволъ роспи, сберегаютъ въ сухомъ мѣстѣ, въ большомъ количествѣ.

въ въ ящикахъ, хорошо запертыхъ, а въ маломъ въ посудѣ стеклянной: роспущій по сухимъ мѣстамъ и припомъ опь узколистнаго выродка, какой представлень на рисункѣ, гораздо лучше и дѣйствительнѣе собираемаго въ мѣстахъ мокрыхъ, или опь выродка широколистнаго. Запахъ корня сырого не очень примѣтнъ, но высушенного особенный, тяжелый, проницательный, непріятный; вкусъ острозватый, горькій.

Корень сей составляющій весьма дѣйствительное лѣкарство возбуждающее, дѣйствующее преимущественно на мозгъ и нервы. Употребляется особенно въ нервическихъ болѣзняхъ, падучей болѣзни, истерики, спазмахъ, судорогахъ, опь глисповъ. Прописывають его въ порошкѣ, въ видѣ пилюль, кашки, настойки и проч.

Въ аптекахъ пріуготовляютъ изъ него: *перегонное масло* (*oleum Valeriana aethereum*); *экстрактъ* (*extractum Valeriana*); *противуелистную кашку* (*Electuarium anthelminticum*); *настойку простую, летучую и эфирную* (*Tinctura simplex, volatilis et aetherea*), имѣющія также силы какъ и корень.

Кошки очень любятъ сей корень; овцы и козы їдятъ праву охотно; изъ цвѣтовъ пчелы собираютъ медъ.

Излѣчение рисунка:

Фиг. 1) цветокъ цѣльный; 2) вѣнчикъ вдоль разрѣзанный, съ тычинками, 3) лестникъ (увелич.); 4) сѣмл съ хохолкомъ; 5) оно же увеличенное; 6) перерѣзанное попечечно и 7) вдоль.



ВАЛЕРИАНА ФУ.

Valeriana phu. LINN.

(КЛ. III. *Triandria*, ПОР. I. *Monogynia*. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. нѣшъ; вѣнт. 1 - лепестинный, при основаніи съ горбикомъ; сѣмя 1, съ хохолкомъ.

Призн. породы. В. фу; стебель гладкій, коренные листья цѣльные, стебельные неровно перистые, разрѣзы ланцетовидные цѣльные.

V. Phu, caule glabro, foliis radicalibus integris, caulinis sublyrato-pinnatifidis, pinnis lanceolatis integerrimis. Hayne B. III. N. 33.

По Нѣм. Grosser Baldrian; по Фр. Valeriane phu; по Ит. Valeriana phu.

Ростетъ по всей почти Россіи по мокрымъ и гористымъ лѣсамъ. ♀.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Августѣ.

Корень спержневой, шупой, косвенно подъ землею ростущій; стебель гладкій, вышиною около 1 арш.; листья коренные цѣльные, въ видѣ опрокинутаго яйца, шупые: стебельные пропивуложные, перистые съ цѣльными разрѣзами; прицвѣтки узенькие, цѣльные; цвѣты въ видѣ кислистыхъ полузонниковъ; тащеки нѣшъ; вѣнчикъ однолепестинный 5-раздѣльный, бѣлый; тычинокъ 3 длиннѣе вѣнчика, пыльники продолговатые; у пестика завязь подъ вѣнчикомъ, почти цилиндрическая, рыльце на столбикѣ 3-раздѣльное; сѣмя продолговато-яицевидное сплюснутое, съ хохолкомъ.

Въ аптекахъ употребляется корень подъ именемъ: *Radix Valerianae maioris*, который должно собирать или весною, прежде нежели станеть ростъ стебель, или осенью, по опаденіи листьевъ. Запахъ корня проницательный, непріятный; вкусъ горьковатый.

Употребляется въ исперики, ипохондріи и другихъ нервическихъ болѣзняхъ; но дѣйствіе его слабѣе Валеріяны обыкновенной.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) цветокъ цѣльный; 2) стигма разрѣзанный вдоль съ тычинками; 3) лестникъ (увеліч.); 4) стмл.; 5) оно же увеличенное и разрѣзанное поперечно и 6) вдоль.



ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ.

Chironia Centaurium. Wild.

(Кл. V. Pentandria, Пор. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Признаки рода. Вѣнц. воронкообразный; пыльники опцивѣпши сверпываются въ видѣ винта; рылецѣ 2; мак. 2 спворчата.

Признаки породы. З. обыкновенный, стебель двураздѣльный четырехсторонній, листья яицевидно-продолговатые. Моск. Флора, стр. 137.

C. centaurium, caule dichotomo, quadrangulo, foliis ovato-oblongis. Hayne. B. I. N. 29. Gentiana Centaurium. Linn.

По Нѣм. TausendgÃ¼ldenkraut; по Фр. Petite centaurée; по Англ. Lesserry Centaury; по Ит. Centaurea minore.

Ее называютъ въ нѣкомпорыхъ мѣстахъ Россіи: горечавка красная. Pallas Flora Rossica Т. I. Р. II. стр. III.

Ростетъ по лугамъ, полямъ, около рѣкъ по всей Россіи, выключая самыя холодныя мѣста. ◎

Цвѣтетъ отъ Мая до Августа; сѣмянка поспѣваютъ въ Іюль и Августъ.

Корень мочковатый; стебель сплющій, четырехсторонній съ пропиву положными въ верху вѣнцями; листья сидячіе, проежильные, пропиву положные, продолговатые, цѣльные; цвѣты полузонтиками; гашетка 1-листная 5-раздѣльная; вѣнчикъ однолистный, воронкообразный о 5 - разрѣзахъ, розовой; тычинокъ 5; пыльники по испущеніи пыли завиваются винтобразно; у пестика завязь продолговатая, столбикъ длиною ровняется тычинкамъ, рылецѣ два; маковка одногнѣздная, двуспворчата съ оспающимся на верху ея столбикомъ, раздѣленнымъ на двѣ части; сѣмянѣ много, очень мѣлкихъ.

Въ лѣкарства употребляются листья, или стебель, особливо же верхушки всего расшенія (Herba, s. summities Centaurii minoris), которыхъ должно собирать въ то время, какъ придется время цвѣтамъ распуститься, или во время самаго цвѣтенія.

Запахъ травы не сильный, вкусъ же очень горький; она имѣетъ силу укрепляющую желудокъ и вообще все тѣло, также гонитъ мѣсячныя крови; дается въ видѣ настоекъ въ лихорадкахъ, цингѣ, подагре, для изгнанія глистовъ, въ желтухѣ.

Въ аптекахъ пріуготовляется изъ нея *и вытяжка* (Extractum Centaurii minoris).

Пчелы берутъ изъ цвѣтовъ сей травы много меду, и скопина Ѳспѣе ее охотно; красятъ ею также и въ желтый цвѣтъ шерстяные матеріи.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) цветокъ; 2) верхняя часть стигника, разрѣзанная вдоль (увелич.); 3) тычинка съ неразкрытымъ еще пыльникомъ и 4) съ разкрытымъ завитымъ (увелич.); 5) лестникъ (увелич.); 6) лаковка съ чашечкою и вѣничкомъ; 7) она же разщепившаяся безъ чашечки и вѣничка; 8) она же увеличенная; 9) сѣмена; 10) одно сѣмя увеличенное; 11) разрѣзанное попечечно и 12) вдоль.



ВАХТА ВОДЯНЫЙ ТРИЛИСТНИКЪ.

Menyanthes trifoliata. LINN.

(Кл. V. Pentandria, ПОР. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Приз. рода. Вѣнц. воронкообразный, внутри мохнатый, рѣльце 2-раздѣльное.

Приз. породы. В. водяный трилистникъ, листья тройные. Моск. Флора, стр. 124.

M. trifoliata, foliis ternatis. Hayne B. III. N. 14.

По Нѣм. Bitterklee; по Фр. Trefle d'eau; по Анг. Water trifoliate; по Ит. Meniante trifoliato.

Называемся также бобровица, спрѣла, павунъ, водяной трилистникъ. Руск. лѣтеб. трава. Ч. I. стр. 126; Хозяйств. Бот. Т. IV. стр. 26.

Ростетъ по полямъ, болотамъ, около рѣкъ и озеръ по всей Россіи и Сибири. 2.

Цвѣтетъ въ Маѣ, Іюнѣ, а сѣмена поспѣваютъ въ Іюлѣ и Августѣ.

Корень колѣнчатый; стебель ползучій, круглый въ $\frac{1}{2}$ аршина и выше; листья тройные, черешковые; листочки яицевидные; цвѣты въ видѣ кисти, оканчивающей стебель; ташетка 1-лиспная, 5-раздѣльная; вѣнчикъ однолепестный, воронковидный, бѣлый, оптигъ на 5 разрѣзовъ раздѣляющійся, снаружи красноватый, а внутри мохнатый; тычинокъ 5, длиниче трубки вѣнчика; пыльники продолговатые; у пестика завязь яицевидная, столбикъ длиниче тычинокъ, рѣльце двойное; маковка 1-гнѣздная 2-спворчата со сполбикомъ на верху; сѣмянъ много, мѣлкихъ.

Въ лѣкарства употребляются листья (*Herba trifolii fibrini, aquatica s. paludosi*), которые должно собирать прежде нежели цвѣты начнутъ распускаться. Все расщеніе запаха не имѣеть, но вкуса весьма горькаго; оно имѣетъ силу укрѣпляющую, пропиувутгильную, пропивуглиспную, мочегонительную, и употребляется: въ слабости желудка, завалѣ брюшныхъ частей, водяныхъ опекахъ и водяной болѣзни, въ

ревматизмъ и подагръ, въ перемежающихся лихорадкахъ, цингъ и въ разныхъ наружныхъ сыпяхъ. Прописываютъ ее въ настойкахъ, рѣдко въ порошкѣ.

Въ аптекахъ пріуготовляютъ изъ нея *вытяжку* (*Extractum amarum s. trifolii fibrini*).

Въ Англіи кладутъ Вахшу въ пиво и портвье вмѣсто хмѣля; козы, овцы и коровы єдятъ ее охотно. Корень съ правою примѣшанный зимою въ кормъ скотинѣ, умножаетъ въ коровахъ молоко; вареные и выжатые листья даютъ зеленую краску для живописи.

Изъяснение рисунка.

Фиг. 1) гашетка съ пестикомъ; 2) вѣнчикъ, разрѣзанный вдоль; 3) тычинка и 4) пестикъ (увелич.); 5) маковка созрѣлая; 6) она же разпреснущая; 7) стѣна; 8) оно же увеличенное и 9) попечно и 10) вдоль разрѣзанное.



А Н И С Ъ.

Pimpinella Anisum. LINN.

(КЛ. V. Pentandria, ПОР. II. Digynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. *Плоды* яйцевидные, съ 5 шупыми ребрышками; впадинки гладкія съ полосками, обвертокъ нѣтъ или 1-листная.

Призн. породы. *Бедренецъ Анисъ*, листья коренные цѣльные и тридольные, а стебельные прираздѣльные и пройные.

P. Anisum, foliis radicalibus integerrimis et trilobis, caulinis trifidis et ternatis. Hayne B. VII. N. 22.

По Нѣм., Фр., Анг. и Ит. *Anis. Хозяйст. Ботан.* Т. XIII и XIV. спр. 77. Анисъ или Ганусъ *Руск. лѣт. трави. Ч. I* спр. 77.

Ростетъ собственно на востокѣ въ Египтѣ, Сиріи и проч.; а у насъ разводится въ огородахъ южной Россіи (*).

Цвѣтетъ въ Іюлѣ, а сѣянца созреваютъ въ Августѣ. ☽.

Корень мочковатый; стебель прямой, спурччатый; листья коренные длинные, черешковые, цѣльные и неправильно раздѣленные на три доли: стебельные цѣльные и прираздѣльные; цвѣты зонтичные: общій зонтикъ о 4—9 лучахъ, а частный о 4—9 цвѣткахъ; общая обвертка 1-листная; ташетка едва примѣтная; вѣнчикъ 5-лепесточный бѣловатый, лепестки сгибаются въ видѣ опрокинутаго сердца; тычинокъ 5, длиннѣе вѣнчика; пыльники кругловатые; завязь подъ вѣнчикомъ, столбиковъ два, рыльца шупыя; плодъ почки яйцевидный выпуклый съ шупыми ребрами; сѣянъ два гладкихъ, копо-рыя съ одной стороны выпуклы, а съ другой плоски.

(*) На восточной сторонѣ Кавказа по опушкѣ лѣсовъ и около ручьевъ растетъ порода бедренца, запахомъ и вкусомъ сѣянъ совершенно похожая на Анисъ, ошъ котораго отличается только перистыми листьями: *Pimpinella aromatica. Flora Taurico-Caucasica; Marschall - Bieberstein. T. 1. p. 241.*

Въ лѣкарства употребляются сѣмяна (*Semen Anisi vulgaris*), которыя по причинѣ пахучаго содержащагося въ нихъ масла, сильно раздражаютъ волокна, гоняютъ вѣпры и способствуютъ изверженію мокроты изъ груди. Ихъ собираютъ по ихъ созрѣніи; даютъ въ порошкѣ и въ видѣ чайной наспойки.

Въ аптекахъ держатъ пахучее изъ сѣмянъ *перегоняемое масло* (*oleum Anisi aethereum*), которое дѣйствуетъ сильнѣе сѣмянъ; *нашатырную анисную жидкость* (*Liquor ammonii anisatus*) и *бальзамъ* (*Balsamus sulphuris anisatus*); *перегонную изъ сѣмянъ воду* (*aqua Anisi*).

Анисныя сѣмяна, по ихъ пріятному вкусу и запаху, употребляются также для приправы многихъ кушаньевъ, для конфектовъ, водокъ и проч.

Изълсненіе рисунка:

Фиг. 1) цветокъ и 2) листикъ (увелич.); 3) разпреснущій плодъ на двѣ половины; 4) онъ же увеличенный; 5) разрѣзанный попечечно и 6) вдоль; 7) онъ же разрѣзанный попечечно и очень увеличенный.



ОСЕННИКЪ ЛУГОВЫЙ.

Colchicum autumnale. LINN.

(КЛ. VI. Hexandria, ПОР. III. Trigynia. Линн. Сист.),

Призн. рода. Чаш. крыло; вѣнг. 1-лепестный 6-раздѣльный, длинный; рыльца желобковатыя; мак. 3 - гнѣздная, многосѣменная.

Призн. породы. О. луговыи, листья плоские, ланцетовидные, споячие.

C. autumnale, foliis planis lanceolatis erectis. Hayne. B. V. N. 45.

Безвременной цветкъ, луговой шафранъ. Руск.

лѣтеб. травн. Ч. I. стр. 94.

По Нѣм. Herbstzeit-lose; по Фр. Colchique; по Анг. Common meadow Saffron; по Ит. Colchico autumnale.

Ростетъ въ Губ. Подольской, Волынской, въ Крыму и около р. Терека по низменнымъ лугамъ. 2.

Цвѣтетъ въ Августѣ и Сентябрѣ, а сѣмяна поспѣваютъ на другой годъ въ Маѣ, Іюнѣ.

Корень луковичный яицевидный; стебель осенью во время цвѣта сокрытъ въ луковицѣ и выросаетъ уже на другой годъ, поддерживая листья и плодъ; листьевѣ большею частію 3, объемлющихъ стебель, ланцетовидныхъ; цветты выходятъ изъ корня, обыкновенно по два; ташетки нѣшь; вѣнчикъ 1-лепестный лилейный, о 6 разрѣзахъ, лиловый или красноватый; тычинокъ 6, короче лепестковъ; у пестика завязь продолговатая, въ луковицѣ сокрытая, столбиковъ 3, длиною съ тычинки, рыльца загнуты внутрь; маковка яицевидно-продолговатая, 1-гнѣздная; сѣмянѣ много морщиноватыхъ.

Вѣкарства употребляются луковицы (*Radix colchici*), которыя надоно собирать въ началѣ лѣта и братъ однѣ только молоденкія, а старыя отбрасывались. Запахъ ихъ пропивный и вкусъ Ѣдкій горькій, больше или меныше, смотря по свойству почвы, на которой онъ росли. Силы ихъ усыпительныя, мочегонительныя, проносныя, а иногда и рвотныя;

почему и употребляютъ ихъ въ водяныхъ болѣзняхъ груди, брюха и проч.; въ подагрѣ, ревматизмахъ хроническихъ, удушье, мочерѣзъ. Давать ихъ надобно съ оспорожностию, ибо онъ, въ большемъ количествѣ принятый, вредны; вредная же отъ нихъ послѣдствія отвращающіяся рвотными и парными молокомъ. Прописывають въ настойкѣ, рѣдко въ порошкѣ.

Въ аптекахъ готовятъ изъ нихъ уксусъ (*acetum colchici*) и уксусный съ нимъ медъ (*oximel colchici*).

Листья даютъ красноватую краску.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) часть стигника и тычинокъ; *2*) завязь съ тремя столбиками и рыльцами; *3*) маковка на 3 части разпресневшаяся; *4*) она же поперечно перерѣзанная; *5* и *6*) сѣмена въ увеличенномъ и естественномъ видѣ; *7*) сѣмя разрѣзанное вдоль и *8*) поперечно.



УЗИКЪ ЗАВЯЗНЫЙ КОРЕНЬ.

Tomentilla erecta. LINN.

(КЛ. XII. Icosandria, ПОР. V. Polyandria.)

Приз. рода. Чаш. о 8-разрѣзахъ; лепестковъ 4; сѣмяна голыя безъ оспей, на сухомъ ложѣ.

Приз. породы. У. завязнѣй корень, стебель почки прямо споящій; листья сидячіе. Моск. Флора стр. 282.

T. erecta, caule erectiusculo, foliis sessilibus. Hayne. В. II. N. 48.

Завязникъ споячій, завязнѣй корень. Руск. тракт. Ч. I. спр. 246. Хозяйст. Бот. Т. V. спр. 33.

По Нѣм. *Tomentilwurz*; по Фр. *Tomentille*; по Анг. Wild *Tomentil*; по Ит. *Tomentilla*.

Ростетъ по всей Россіи по лугамъ, выгонамъ и распуштіямъ. ♀.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюль; а сѣмяна поспѣваютъ въ Августѣ.

Корень спержневый, почки цилиндрическій, закривленный, внутри желтоватый, а снаружи шемный; стебли (которыхъ много выходитъ изъ одного корня) приподнимаются почки прямо вверхъ отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ арш. и выше; листья коренные на длинныхъ черешкахъ сидячіе по три вмѣстѣ, круглозубчатые: стебельные сидячіе тройные же; цвѣты сидячіе поодинакѣ; гашетка 1-лисцовая, раздѣленная на 8 глубокихъ разрѣзовъ; вѣнчикъ 4-лепесточный; тычинокъ 12, короче вѣнчика; завязей отъ 5 до 12 и больше, рыльца на сплюснутыхъ короткихъ, шуплыхъ; сѣмяна мѣлкія на сухомъ ложѣ.

Въ лѣкарства употребляется корень (*radix Tomentillae*), который надоно собирать весною рано, или осеню поздно; запахъ сего корня непріятный, а вкусъ горьковатый, очень вяжущій; почему и дающій сей корень въ долговременныхъ поносахъ, кро-

вопеченихъ а снаружи употребляютъ его какъ по-
лоскательное.

Въ аптекахъ пріуготовляется иногда и *екстрактъ* (Extractum tormentillae).

Изъ корня сего можно съ желѣзнымъ купоросомъ и камедью дѣлать хорошія чернила; въ разныхъ мѣстахъ дубяще имъ кожи, а въ Лапландіи красяще имъ кожи въ красный цвѣлъ; съ квасцами можно даже сукно красить въ красный цвѣлъ. Въ Голландіи даютъ его скопинѣ отъ кроваваго поноса; въ Сибири Буряты и другіе кочующіе народы варятъ изъ него съ прибавленіемъ муки, масла и соли родъ супу; въ иныхъ мѣстахъ подкрашивають имъ хлѣбное вино.

И зъл спеніе ри сунка.

Фиг. 1) цветокъ, отъ коего отнято при лепестка; 2) два большихъ и 2 меньшихъ чашечныхъ разрѣза (увелич.); 3) пычинка (увелич.); 4) пестники съ ихъ столбиками и рыльцами (увелич.); 5) 1 лестникъ особо (увелич.); 6) стмл.; 7) оно же увеличенное; 8) оно же разрѣзанное попечечно и 9) вдоль. —



МАКЪ САДОВЫЙ.

Papaver somniferum. LINN.

(КЛ. XIII. Polyandria, ПОР. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. 2-лиспин.; лепестк. 4; рыльце лучистое; у созревшей мак. опверстія подъ рыльцемъ.

Призн. породы. *M. садовый*, спебель голый многоцвѣтный; листья объемлющіе спебель разрѣзные; маковки яицевидныя или шаровидныя голые; волоски на цв. ножкахъ опипотыренные.

P. somniferum, caule glabro multifloro, foliis amplexicaulis incisis, capsulis ovato vel subgloboso - urceolatis, pilis penduncularum divergentibus. Hayne B. VIII. N 40.

Макъ бѣлый садовый, Руск. лѣт. трав. Ч. I. спр. 497. Макъ снопворный. Хозяйств. Бот. Т. XV. спр. 77.

По Нѣм.: Garten-Mohn; по Фр. Pavot blanc; по Анг. common white Poppy; по Ит. Papavero somnifero.

Ростетъ въ Азіи; но съеется по огородамъ и полямъ по всей почти Россіи. ☺:

Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюль а сѣмяна поспѣваютъ въ Августѣ.

Корень перпендикулярный; стебель споячій голый, вышиною въ $\frac{3}{4}$ арш и выше; листья продолговатые острѣе съ разрѣзами, нижніе черешковые, а верхніе объемлющіе спебель, сизеватые; цвѣты сидячіе поодинакѣ; тащетка 2-лиспная, при раскрытиї вѣнчика спадывающая, вѣнтикъ 4-лепеспинный, цвѣла сѣромолочного или краснаго различныхъ оттенковъ, но при основаніи всегда шемнокраснаго; тыгинокъ много; пыльники продолговатые; у пестика завязь больше или меныше шаровидная; рыльце сидячее о 10-15 лукахъ; маковка яицевидная или шаровидная со скважинами подъ рыльцемъ при созрѣніи сѣмянъ; сѣмянѣ много почковидныхъ бѣлыхъ или шемносѣрыхъ.

Есть два выродка сего распенія: а) съ сѣменами бѣлыми, маковками яицевидными нераспрескивающимися и вѣнчиками молочного цвѣла; это: papaver officinale

ficinale; и b) съ съменами шемносѣрыми, маковками болѣе шаровидными и вѣнчиками различныхъ красныхъ оиппѣнковъ.

Въ лѣкарства употребляюся маковки, собираемые еще незрѣлыми (capita papaveris), и дающія бѣлый сокъ, когда ихъ надрѣжемъ; держатъ также въ апшекахъ и бѣлыя сѣміяна мака (semina papaveris albi). Изъ незрѣлыхъ маковокъ сего расщепленія доспаютъ въ разныхъ странахъ на воспокѣ, какъ - по въ малой Азіи, Персіи, Аравіи и пр. Опій (opium), изъ колпораго въ апшекахъ пріуготовляють множество соспавовъ, какъ на пр: Laudanum liquidum Sydenhami; Tinctura opii s. Tinctura Thebaica, Tinctura opii ammoniacalis, s. elexirium paregoricum; и проч. Сила опія усыпительная и болеуполишельная — извѣстны.

Изъ головокъ маку, роспушаго въ Европѣ шакъ же можно пріуготовлять експрактъ, подобный опію, только силы и дѣйствія его гораздо слабѣе. Незрѣлые маковки идутъ въ составъ грудныхъ наборовъ (Species pectorales compositae Pharmacop. castrens. Ross.)

Маковое масло (oleum papaveris albi) замѣняетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ миндалевое и другія масла.

Въ домашнемъ бытѣ сѣміяна употребляются какъ для дѣланія изъ нихъ макового сока, шакъ ихъ и самыхъ ёдяпъ съ медомъ, прибавляя къ хлѣбу и проч.; доспаютъ также изъ нихъ масло, которое и употребляется вмѣсто оливковаго или Провансакаго для приправы кушаньевъ, и для горѣнія и проч. Въ Германіи молодая листья ёдяпъ вмѣсто салата; оспающіяся выжимки опѣ масла доспавляють хороший кормъ скоту.

Изѣсленіе рисунка:

Фиг. 1. Нераспушившійся цветокъ; 2) лестникъ съ шычинками, изъ ложа выходящими; 3) тычинка (увелич.); 4) маковка, у которой верхняя половина обрѣзана; 5) сѣміяна; 6) сѣмія увеличенное и 7) разрѣзанное попечечно, а 8) вдоль.



МАКЪ СОМНИТЕЛЬНЫЙ.

Papaver dubium. LINN.

(КЛ. XIII. Polyandria, ПОР. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. 2-лисчная; лепестковъ 4; рыльце лучистое; у созрѣвшей мак. отверстія подъ рыльцемъ.

Призн. породы. М. сомнительный, спбель многоцвѣтный волосистый: волоски на нижней части спбеля отклонившіеся отъ спбеля, а на верхней части и на цвѣтныхъ ножкахъ къ нему прижатые; чашечки волосистыя; листья перистые разрѣзные; маковки голыя, продолговатыя; рыльце съ 6—8 лучами.

P. dubium, caule multifloro piloso, pilis caulis patulis, peduncularum adpressis; calicibus hispidis, capsulis oblongis glabris, foliis pinnatifidis incisis, stigmate 6—8 radiato. Hayne B. VIII. N. 39.

По Нѣм. zweifelhafter Mohn; по Фр. Pavot douteux; по Ане. Long - Smooth - headed; по Ит. Papavero dubio.

Ростетъ въ южной и умѣренной Россіи по пашнямъ между хлѣбомъ. ☺

Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюль, а сѣмяна поспѣваютъ въ Августѣ и Сентябрѣ.

Макъ сей весьма похожъ на макъ дикій корнемъ; спблемъ, листьями, цвѣтами, чашечкою, вѣнчикомъ, пестикомъ, маковкою и сѣменами. Единственныя признаки, по которымъ можно его отличить отъ дикаго, состоять въ томъ, члп: 1) на цвѣт. ножкахъ щепинки не длинны а коротки и прижались къ ножкѣ, равно какъ и на верхней части спбеля, который можно почесать цвѣтною ножкою; 2) цвѣтъ вѣнчиковъ почти алый, а не пунцовыи; 3) зацвѣть продолговатая, а не шаровидная; 4) на рыльце никогда не болѣе лучей 8—9; 5) маковка продолговатая съ рыльцемъ лучистымъ, по срединѣ плоскимъ, а не вогнутымъ.

Макъ сей не употребляется въ лѣкарства, но по изслѣдованіямъ новѣйшихъ химиковъ и врачей, долженъ имѣть одинакія силы съ М. дикимъ.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) переспущившійся цветокъ 2) Пестика съ тычинками; 3) лыльникъ; 4) онъ же открывшійся (увелич.); 5) увеличенное рильце; 6) маковка 7) она же разрѣзанная поперечно; 8) стѣна въ естественной величинѣ, 9) стѣна увеличенное; 10) стѣна, разрѣзанное поперечно; 11) стѣна, разрѣзанное вдоль.

МАКЪ ДИКІЙ.

Papaver Rhoeas. LINN.

(Кл. XIII. Polyandria , ПОР. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. 2 - листная; лепестковъ 4; рыльце лучистое; у созревшей маковки отверстія подъ рыльцемъ.

Призн. породы. М. дикій, стебель многоцвѣтный, волосистый: волоски всѣ опклонившіеся отъ спбеля; листья перистые разрѣзные; маковки почки шаровидные голые; рыльце о.о. лучахъ. Моск. Флора стр. 246.

P. Rhoeas, caule folioso hirsuto multifloro, foliis pinnatifidis, lacinis incisis, capsulis obovato - urceolatis, glabris, pilis caulis peduncularum que divergentibus. Hayne B. VII. N. 38.

По Нѣм. wilder Mohn; по Фр. Pavot coquelicot; по Анг. Common red Poppy; по Ит. Papavero potolaccio.

Ростетъ по всей почве Россіи по полямъ между хлѣбомъ, въ садахъ и огородахъ. О.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ, а сѣміна поспѣваютъ въ Августѣ.

Корень мочковатый; стебель прямой, круглый, вѣщевистый, около $\frac{1}{2}$ арш. вышиною; съ длинными оппъ спбеля опклонившимися волосками; листья перистые съ осирими разрѣзами: коренные сидячіе на длинныхъ а стебельные на весьма короткихъ черешкахъ; цвѣты на длинныхъ ножкахъ, которые не разцвѣтиши внизъ висячіе, а во время цвѣту поднимаючися вверхъ; на нежкахъ волоеки опппопыренные; гашетка 2 - листная, волосистая, опадывающая когда вѣнчикъ совсѣмъ распустится; вѣнчикъ 4 - лепестковый пунцовыій, лепестки при основаніи съ темнофиолетовымъ пятномъ; тычинки (до 150) выходячіе изъ ложа; завязь въ видѣ опрокинутаго яйца, голая; столбика нѣшъ, рыльце лучистое (оппъ 10 до 13 лучей); маковка въ видѣ опрокинутаго яйца, 1 - гнѣздная, со внутренними перегородками, почки до средины доходящими; созревшая, многочисленная

мѣлкія сѣмна выбрасываются чрезъ скважинки, подъ
рыльцемъ открывающейся.

Въ лѣкарства употребляются вѣнтиki сего ра-
спенія, извѣстные въ аптекахъ подъ именемъ: Flores papaveris Rhœados s. papaveris erratici, которые идутъ
въ грудные наборы, а также приуготовляется изъ
нихъ тинктура (Tinctura papaveris) и сиропъ (Syrupus
papaveris erratici s. Rhœados).

Свѣжіе цвѣты имѣюшъ запахъ нѣсколько одуря-
ющій и горьковатый вкусъ. Въ настояхъ даютъ отъ
сухаго кашля, воспаленія въ лёгкихъ.

Тинктура, какъ прохладительное лѣкарство, даетъ-
ся въ горячкахъ.

Въ недавнія времена начали приуготовлять изъ
сока сего распенія экспрактъ, похожій на опій; цвѣ-
ты собираются, когда вѣнчики совсѣмъ распустились.
Изъ цвѣтовъ дѣлаютъ рапафію; они же даютъ
красивую красную краску для шелковыхъ, полотня-
ныхъ и хлопчатой бумаги тканей, приуготовлен-
ныхъ прежде съ квасцами. Въ Ирландіи молодые ли-
стья варятъ въ супахъ и соусахъ; въ Голландіи
красятъ цвѣтами сыры въ красный цвѣтъ.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) Цвѣтокъ еще нераскрывшійся, ошъ кошораго описаніи одинъ
чашечный листочекъ; 2) лестникъ съ тычинками; 3) тычинка
съ пыльникомъ; 4) открытымъ (увеліч.); 5) рыльце (увеліч.); 6)
маковка со скважинами подъ рыльцемъ); 7) она же поперечно
разрѣзанная; 8) сѣмна; 9) сѣмля (увеліч.); 10) сѣмля, разрѣзанное
поперечно; 11) сѣмля, разрѣзанное вдоль.



МАКЪ ПОЛЕВЫЙ.

Papaver Argemone. LINN.

Призн. рода. Чаш. 2-лисп.: лепестк. 4; рыльце
лучистое; у созревшей маковки опровергнія подъ
рыльцемъ.

Призн. породы. М. полевый, стебель листьяный,
щепинистый многоцвѣтный; листья крылатые, лис-
тички разрѣзные; маковки продолговатыя щепинис-
тыя; волоски и на стеблѣ и на ножкахъ прижатыя.

P. Argemone, caule folioso hirsuto multifloro, foliis pinnatifidi-
s, laciniis incisis, capsulis clavato - urceolatis hispidis, pilis cau-
lis peduncolorum que adpressis. Hayne B. VIII. N. 37.

По Нѣм. Acker Mohn; по Фр. pavot argemone; по Ит.
Papavero argemone.

Ростетъ по полямъ въ Юго - Западной Россіи. ◎.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюль, а сѣянна поспѣваютъ
въ Августѣ.

Корень проспшій; стебель прямыи съ жеспкими
прилегшими къ нему щепинками; листья крылатые,
съ листочками разрѣзными; цвѣты сидячы пооди-
нажкѣ; тащека 2 - листная, при выходѣ вѣнчика
спадывающая, съ жеспкими волосками; вѣнчикъ 4 -
лепестковый, шемно - красный съ шемнымъ при осно-
ваніи лепестковъ пятномъ; тычинокъ много; пыль-
ники кругловатыя; у пестика завязь продолговатая;
рыльце о 4 — 5 лучахъ; маковка продолговатая о
4 — 5 бороздкахъ; сѣянѣ много маленькихъ почко-
образныхъ.

Макъ сей не употребляется въ лѣкарства, но
если бы кто и употребилъ его вмѣсто маку дикаго,
то вреда бы не было, ибо будучи одного рода, вѣро-
ятно онъ имѣеть и одинакія силы.

Овцы и козы ѿдягъ сю праву, а прочая скопина ее не прогаепъ.

Изъяснение рисунка.

Фиг. 1) цветокъ нераспустившійся; 2) тычинка (увелич.); 3) пыльникъ (увелич.); 4) пестикъ; 5) рильце (увелич.); 6) маковка; 7) она же перерѣзанная попречнио; 8) сѣмля; 9) сѣмля (увелич.); 10) оно же перерѣзанное попречнио и 11) вдоль (увелич.). —



МАКЪ ГЛАДКІЙ.

Papaver laevigatum. BIEBERST.

(КЛ. XIII. Polyandria, ПОР. 1. Monogynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. 2-лиспн.; лепестк. 4; рыльце лучистое; у созревшей мак. отверстие подъ рыльцемъ.

Призн. породы. М. гладкій, продолговатая маковка и чашечки голыя; спебель много вѣтвистый, усаженный весьма рѣдкими щепинками; листья перистые, разрѣзные, съ рѣдкими волосками.

P. laevigatum, capsulis oblongis calycibus que glabris, caule multifloro setis rarissimis subhispidi, foliis pinnatifidis incisis subpilosis. Mharschall a Biberstein Flora Taurico - Caucasic. Т. III. p. 364.

Ростетъ по пригоркамъ около Одессы, и на скалахъ около Константиногорскихъ теплицъ. ⊖.

Цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ.

Весьма похожъ на макъ сомнительный, а особенно на его мѣлкій выродокъ; но отличается отъ него щепинками, которыя сидятъ на спебль и ножкахъ въ довольно разстояніи однѣ отъ другихъ и всѣ прилегаютъ къ спеблю и ножкамъ; на листьяхъ также меньше волосковъ, примѣромъ они не споль сложны, и разрѣзы у нихъ уже и острѣе; ташетка голая съ весьма немногими щепинками; вѣнтикъ красный; рыльце обѣ въ лучахъ.

Хотя сія порода и не употребляется въ лѣкарства; но по чрезвычайному своему сходству съ другими породами, весьма отличныхъ отъ нихъ качествъ вѣроятно не имѣеть.

Примѣтіе, Г. Маршалѣ-Биберштейнѣ описалъ еще одну новую породу, ростущую по сыпучимъ пескамъ около рѣки Терека и похожую на макъ гладкій

и сомнительный, отъ которыхъ она впрочемъ отличается листьями, очень мѣлко разрѣзанными; при томъ у ней щепинокъ на спебль и на ножкахъ еще меньше нежели на М. голомъ; вѣнчикъ красный, съ черными основаниями лепестковъ, рыльце имѣетъ 12 лучей — *Биберштейнъ* назвалъ сю породу. *P. arenarium*, *capsulis oblongis glabris, calycibus hispidis; foliis bipinnatifidis: lacinulis linearibus, caule multifloro, setis patulis: peduncularum adpressis, fructiferorum raris caducis.* *Flora Taur. Cauc.* Т. III. р. 364.

Изъясненіе рисунка.

а Раскрывшаяся чашечка съ шычинками и пестиками



ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ.

Organum vulgare. Linn.

(Кл. XIV Didynamia, ПОР. 1. Gymnospermia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. опцвѣтиши закрываются волосками; верхняя губа єѣнтика плоская, нижняя 2-раздѣльная, разрѣзы неровные.

Призн. породы. Д. обыкновенная, колоски полукруглые мелчайшие, собранные въ кучу; прицвѣтичики равны длиною чашечкамъ. Моск. Флора стр. 308.

O. vulgare, foliis petiolatis ovatis acutis pubescentibus, spicis subrotundis in corymbos congestis, bracteis oblongo-ovalibus acutis glabris. Hayne B. VIII. N. 8.

По Нѣм. gemeiner Dost; по Фр. origan commun; по Анг. Common Majoram; по Ит. Origano vulgare.

Въ Малороссіи называется Материнкою. Руск. лѣгебн. травы. Ч. 1. стр. 211. Хозяйств. Ботан. Тет. IV. стр. 33.

Ростетъ по всей Россіи по холмамъ, полямъ, по краямъ лѣсовъ и въ самыхъ лѣсахъ, около дорогъ и проч. 2.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Августѣ.

Корень почки горизонтальный; стебель сплющій четыреугольный, мягковолосый, вѣтвистый, $\frac{1}{2}$ арш. и выше; листья промежуточные, черешковые, яицевидные, мягковолосые; цвѣты щипкомъ на верхушкѣ стебля и вѣтвей; прицвѣтичики при каждомъ цвѣткѣ по одному, длиннѣе чашечки; ташетка 1-липтина о 5 зубчикахъ, внутри съ волосками; єѣнтикъ 1-лепесточный, неправильный, зіяющій, розового и пурпурового цвѣту, рѣдко благо: верхняя губа скруглена съ выемкою, нижняя трираздѣльная; тычинокъ 4, изъ которыхъ двѣ короче; у пестика связь 4-раздѣльная, столбикъ длиннѣе єѣнтика, прилагающій къ верхней его губѣ, рыльце двураздѣльное; сѣмянъ 4 яицевидныхъ.

Въ лѣкарства употребляется *трава*, (Herba origani) которую собираютъ во время цвѣта. Трава сія и свѣжая и сухая пахнетъ пріятно; вкусъ имѣеть пріянный, горьковатый; силу разбивающую густыя мокроты; употребляется въ кашль, удушье, а болѣе снаружи для разбивающихъ и укрѣпляющихъ припарокъ; даютъ ее внутрь въ видѣ чайной настойки; въ порошкѣ нюхаютъ отъ насморка и головной боли.

Въ аптекахъ пріуготовляютъ *перегонное изъ нея масло* (Oleum distillatum origani vulgaris) и *ароматные травные наборы* (Species aromaticae); въ Швеціи употребляютъ листья, крѣпко подсущенные на чистой сковородѣ, вместо чаю; кладутъ также ихъ въ пиво; красятъ ея верхушками шерстяныя маперіи въ темнокрасный и пурпуровый цветъ. Будучи положена между плащемъ, предохраняетъ оное отъ моли.

Цвѣты ея доспавляютъ много меду пчеламъ.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) *цвѣтокъ* съ прицвѣтникомъ (увелич.); *2*) *ташечка*, вдоль разрѣзанная, съ пестикомъ; *3*) *вѣнчикъ*, вдоль разрѣзанный, съ тычинками (увелич.); *4*) *ташечка* и *5*) *сѣмена*; *6*) *ташечка* съ сѣменами, вдоль разрѣзанная (увелич.); *7*) *сѣмя* и *8*) *опоже*, попечено разрѣзанное.



ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ.

Sinapis nigra. LINN.

(Кл. XV. Tetrady namia, ПОР. II. Siliquosa.)

Признаки рода. Чаша открыта; у лепестковою ногочкой стоячие; стручки внизу жесеневые съ носикомъ; сѣмядыя шаровидные.

Признаки породы. Г. черная, стручки голые, почки четырехспоронные, прямо стоячие съ носикомъ короткимъ; листья верхние узенькие, цѣльные, голые. Моск. Флора, спр. 340.

S. nigra, caule glabro, foliis petiolatis, inferioribus - lyrate-pinnatis, superioribus lanceolatis, floralibus integerrimis, siliquis breviter pedunculatis adpressis tetragonis glabris. Hayne. В. VIII. N. 40.

Горчица черная. Руск. травн. Ч. I. стр. 168.

По Нѣм. Schwarzer Senf; по Фр. Moutarde noir; по Англ. Common Mustard. по Ит. Senape nera.

Растетъ по всей почве Россіи по полямъ, около дорогъ, по развалинамъ и пустырямъ; въ Южныхъ Губерніяхъ съемается. ☽.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюль, а сѣмядыя поспѣваютъ въ Іюль и Августъ.

Корень вѣтвистый; стебель стоячій, круглый вѣтвистый, отъ $\frac{3}{4}$ до 1 арш. и выше; листья нижние лировидно - перистые, листочки зубчатые, верхние ланцетовидные а прицвѣтные узенькие цѣльные; цвѣты сидячіе на концахъ вѣтвей, стебля и образующіе родъ кисти; ташетка о 4хъ листочкахъ, лежащихъ горизонтально; вѣнчикъ 4-лепесточный, желтый съ стоячими ноготками длиною съ чашечку; тычинокъ 6, изъ которыхъ двѣ не длиннѣе чашечки а 4 длиннѣе; завязь цилиндрическая, столбикъ не длиннѣе тычинокъ, рыльце цѣльное шаровидное; стручокъ длинный, 4-сторонній, дву - гнѣздный съ оспающимся на верхушкѣ столбикомъ, голый; сѣмядыя шаровидные, каштанового цвѣта.

Въ лѣкарства употребляються сѣмѧна (*Semen sinapaeos s. sinapis nigrae*), копорыя запаха не имѣють, но вкусы острый и горьковатый. Онъ сильно раздражаютъ волокна и разводятъ мокроты, но внутрь даются рѣдко: въ брюшныхъ завалахъ, водяной болѣни, частыхъ запорахъ; болѣе же употребляются снаружи. Будучи исперты и смѣшаны съ квашенымъ шѣстомъ или мукою и уксусомъ, прикладываются къ икрамъ и подошвамъ ногъ, къ рукамъ, груди, спинѣ, въ лихорадочномъ брѣдѣ, головной боли, кашлѣ, ревматизмѣ, параличѣ и пр.

Въ аптекахъ составляютъ горгигтную сыворотку (*Serum lactis sinapinum*), противуцѣноготное пиво, (*cerevisia antiscorbutica*), полосканье (*gargarisma sinapiosum*), катаплазмы (*cataplasma*).

Горгигтное масло употребляется въ пищу; цвѣты даютъ пчеламъ много меду; скопина ъстъ шраву охопино.

Излѣченіе рисуника.

Фиг. 1) цветокъ (увелич.); 2) гаметка съ шычинками, пестикомъ и медовыми железками (увелич.); 3 и 4) железки, лежащія между шычинками при ихъ основаніи (увелич.); 5) созревлый стругокъ; 6) онъ же распредѣлившій; 7) онъ же разрѣзанный поперечно (увелич.); 8) сѣмѧ; 9) оно же поперечно разрѣзанное (увелич.).



ПРОСВИРНЯКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ.

Althaea officinalis. LINN.

(КЛ. XVI. Monadelphia, ПОР. IV. Polyandria Линн. Сист.).

Призн. рода. Чаш. двойная: наружная о 6 или 9 разрѣзахъ; маковокъ много, 1 - съменныхъ, кольцевидныхъ.

Призн. породы. П. обыкновенный, листья мохнатые: нижние сердцевидные, верхние продолговато-яицевидные, почти триольные.

A. officinalis, foliis tomentosis, inferioribus cordatis, superioribus oblongo-ovatis obsolete trilobis. Hayne B. II. N. 25.

По Нѣм. Gemeiner Eibisch; по Фр. Guimauve; по Анг. Mallow of the shops; по Ит. Altea officinale.

Ростетъ по шѣнистымъ влажнымъ мѣстамъ по всей Юго-Западной Россіи и въ нѣкоторыхъ Губерніяхъ Сѣверо-Восточной; разводится же по садамъ и огородамъ повсюду. 2.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августъ, а сѣмяна созреваютъ въ Августъ и Сентябрь.

Корень толстый, большою частію косвенно идетъ подъ землею, снаружи желтоватъ, а внутри бѣль; стебель сплющій, мохнатый, вѣнциспій, въ 1 арш. и выше; листья черешковые поперемѣнны, мягкие, мохнатые, нижние сердцевидные а верхніе наддѣленные на при доли, всѣ зубчатые; цвѣты сидячіе пурпурны; таш. двойная: наружная 1-листная, о 9 осипрыхъ разрѣзахъ, она меньшѣ внутренней 5-раздѣльной; вѣнчикъ 5-лепестный блѣдно-розовый; тычинокъ много, сросшихся своими основаниями, въ трубку, чрезъ которую проходитъ пестикъ, у коего завязь сплюснутая, лучистая, столбиковъ много до половины сросшихся, рильца простыя; маковокъ много, сначала представляющихъ одно круглое плоское шѣло, но по созрѣніи распадающихся; сѣмянѣ въ каждой маковкѣ по одному.

Все расщепіе запаху опличного не имѣетъ, а
скусъ склизистый, и содержитъ много склизи; въ осо-
бенности же корень (*Radix altheae s. bismalvæ*), копорой
надобно собирать весною или осенью; онъ употреб-
ляется какъ лѣкарство размягчающее въ премногихъ
болѣвняхъ воспалительныхъ, проспудныхъ, и проч;
употребляюся такъ же листья и цветы (*Herba, flo-
res altheae*); снаружи служатъ въ видѣ припарокъ,
клистировъ и проч.

Бѣ аптекахъ пріуготовляють изъ сего расщеп-
нія сиропъ (*Syrupus altheae*), постилу, извѣстную подъ
именемъ дѣвичьей кожи (*Pasta altheae*) и мазь (*Unguentum de althea*).

Спѣбли можно обрабатывать какъ коноплю для
пряжи, веревокъ, канаповъ и проч.

Изъясненіе рисунковъ.

Фиг. 1) Двойная гашетка; 2) основание прикрепленія лепестковъ 5
раздѣльное (увелич.); 3) тычинка (увелич.); 4) пыльникъ
(увелич.); 5) сѣмянная пыль пыльниковъ (увелич.); 6) лес-
тичка (увелич.); 7) рыльце (увелич.); 8) плодъ или собраніе
маковокъ въ чашечкѣ; 9) маковки безъ чашечки; 10) маковка от-
дельно (увелич.); 11) сѣмя цѣльное и 12) разрѣзанное (увелич.).



ЛАКРИЧНИКЪ ГОЛЫЙ.

Glycyrrhiza glabra. LINN.

(Кл. XVII. Diadelphia, ПОР. III. Decandria. Линн. Сист.)

Призн. рода: Чаш. о 4 зубчикахъ; верхній раздвоенный; боббъ продолговатый съ немногими съменами.

Л. голыи, листья перистые непарные, листочки эллиптико-лицевидные голые, съисподи клейкие; прилистники одинакие промежуточные почковидные, цвѣты киспями; бобы голые.

G. glabra, foliis impari-pinnatis, pinnis elliptico-ovatis breviter mucronatis glabris subtus glutinosis, stipulis solitariis axillaribus gemmiformibus, floribus racemosis, leguminibus glabris. Hayne. B. VI. N. 42.

Солодка обыкновенная, солодковой корень: Хоз. Бот. Тем. XI и XIII стр. 148.

По Нѣм. Gemeine Süssholz; по Фр. Réglisse glabre; по Анг. Common liquorice; по Ит. Glicirriza glabra.

Ростетъ въ южной части Россіи, какъ то въ Крыму, въ Губерніи Екатеринославской, Кавказской Астраханской, и въ землѣ Донскихъ и Черноморскихъ казаковъ. 2.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августѣ; а сѣмяна созреваютъ въ Августѣ и Сентябрѣ.

Корень почти цилиндрический, толщиною въ большой палецъ; снаружи шемнаго цвѣту а внутри желтоватъ; стебель (которыхъ нѣсколько выходить изъ одного корня) бороздчатый, сверху угластый, голый, вышиною въ 1 арш. и выше; листья непарноперистые противуположные. Листочки (опь 5 до 8 паръ) лицевидно-ovalные, цѣльные съ весьма коротенькимъ на верху остріемъ, съисподи поблѣднѣе; прилистники въ промежуткахъ листьевъ похожи на почку; цвѣты на коротенькихъ ножкахъ въ видѣ киспи, имѣющей длинную бороздчатую ножку; ташетка 1-листная, трубчатая, о 4 зубцахъ, изъ которыхъ верхній 2-раздѣльный; вѣнчикъ 5-лепесточный, мопыльковый: флагъ бѣлый, крылья и дно ли-

ловыя: *тычинокбъю*, изъ которыхъ 9 срослися основаниями: у лестника засязь продолговатая, столбикъ вверхъ загнулся; рильце шупое; бобъ продолговатый сплюснутый; стмлъ опъ 1 до 4 почковидныхъ.

Въ лѣкарства употребляется корень, извѣстный подъ именемъ солодковаго корня (*radix liquoritiae*), ибо онъ дѣйствительно имѣетъ сладкій вкусъ, хотя и пригорный; собираютъ его рано весною или очень поздно осеню; даютъ его вмѣстѣ съ другими веществами въ грудныхъ болѣзняхъ и болѣзняхъ мочеваго пузыря. Выжатый изъ него сокъ (*Succus liquoritiae*) имѣетъ тѣ же самыя свойства и употребляется въ тѣхъ же болѣзняхъ; изъ него же съ сахаромъ пріуготовляютъ поспишу извѣстную подъ именемъ *бабы кожа* (*Pasta liquoritiae*).

Изъясненіе рисунка.

Ф. 1) Цветокъ; 2) гашечка, (увелич.); 3) флагъ, 4) крылья и 5) дно, (всѣ увелич.); 6) тычинки съ пыльцой; 7) лестникъ (увелич.); 8) бобы; 9) бобъ раскрытий; 10) стмл.; 11) оно же разрѣзанное пополамъ и 12) вдоль.



ЛАКРИЧНИКЪ ИГОЛЧАТЫЙ.

Glycyrriza echinata. Linn.

(Кл. XVII. Diadelphia, ПОР. II Decandria. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. о 4 зубчикахъ, верхній раздвоеній; вовь продолговатый съ немногими съменами.

Л. иголчатыи; листья непарно-перистые; листочки овально-продолговатые съ осирпіемъ, гладкіе, голые; прилистниковъ по два боколистныхъ, ланцетовидныхъ; цветы головчатые; бобы шероховатые.

E. echinata, foliis impari-pinnatis, pinnis ovali-oblongis, mucronatis glabris nudis; stipulis geminis laterifoliis lanceolatis, floribus capitatis, leguminibus echinatis. Hayne B. VI. N. 41.

По Нѣм. Stachlige Suescholz; по Фр. Réglisse herissonnée.

Ростетъ вмѣстѣ съ Лакр. голымъ. 2.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августѣ, а сѣмяна созреваютъ въ Августѣ и Сентябрѣ.

Порода сія чрезвычайно похожа на Л. еолый всѣми своими частиями и отличается отъ нея только низшимъ ростомъ (отъ $\frac{5}{4}$ арш. до 1. $\frac{1}{2}$), листочками листьевъ овально-продолговатыми (отъ 5 до 6 паръ); цветами головчатыми, ташеткою почки колокольчатою; а особливо бобами, которые у сей породы болѣе употреблено-продолговаты и усыяны поненѣкими иголочками; и съменами, которыхъ обыкновенно по два.

Въ лѣкарства употребляется корень, и такую же имѣвшъ силу, какъ и корень Л. голаго.

Прилѣтъ вообще въ Россіи, по изслѣдованию посылаемыхъ для описанія естественныхъ произведеній Ботаниковъ, ростетъ 4 породы Лакричника: G. glabra, G. echinata, G. hirsuta, и Gl. aspera Pall. которыхъ всѣ растутъ преимущественно въ степяхъ, между Дономъ и Волгою лежащихъ и около Каспійского моря; но попадаются въ другихъ степяхъ между Днѣпромъ и Дономъ, въ Крыму и даже въ Сибирскихъ степяхъ.

около Иртыша. Изъ всѣхъ сихъ расщепій выкапываются корни и употребляются въ лѣкарства, какъ имѣющія одинакія силы. Въ Астрахани вываривають изъ нихъ лакричный сокъ въ большомъ количествѣ, и который споль же хорошъ какъ и привозимый изъ Калабріи и Испаніи; его можно отпѣтить по тому только, что между кусками его кладутся дубовые листья а не лавровые.

Г. Маршал-Биберштейнъ въ своей Флорѣ (*Flora Taurico - Caucasica* t. I. р. 178 и т. III. р. 458.) описалъ Лакричникъ желѣзносный (*G. Glandulifera*), росшущій въ Крыму и около Кавказа. По его мнѣнію изъ сего то расщепія, котораго выродкомъ починается и *G. hirsuta*, доспашаютъ и корень и сокъ лакричный, а не изъ *C. glabra*, которыи едва ли въ Россіи находится, а посему весьма желательно, чтобы Ботаники, имѣющіе случай быти въ Южныхъ мѣстахъ Россіи, обратили особенное свое вниманіе на изслѣдованіе сего замѣчанія.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) Чашечка; 2) цветокъ (увелич.); 3) флагъ; 4) крылья и 5) дно (всѣ увелич.); 6) тычинки съ лестникомъ; 7) завязь пестика разрѣзана и увеличена; 8) бобъ; 9) онъ же раскрытий; 10) стѣна; 11) оноже поперечно и 12) вдоль разрѣзаное.



ЗВѢРОБОЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ.

Hypericum Perforatum. LINN.

(КЛ. XVIII. Polyadelphia, ПОР. I. Polygynia. Линн. Сист.)

Признаки рода. Чаша. 5, раздельная; венчик. 5 - лепесточный; тычинки срослись основаниями въ 3 — 5 пучковъ; столбиковъ 3 — 5; маковка многосемянная.

З. обыкновенный, стебель обоюдный; листья шуплые съ полупрозрачными точками; чашечные разрезы ланцетовидные. Моск. Флора стр. 251.

H. perforatum, caule herbaceo ancipiti, foliis obtusis pellucido — punctatis, floribus trigynis, lacinii calycinis lanceolatis acutis. Hayne B. VIII. N. 42.

Называемая въ ивкоморыхъ, мѣстахъ Россіи и заячья кровца. Руск. лѣтеб. трав. Ч. 1. спр. 251. Звѣробой обыкновенный или проколопый. Хоз. Бот. Темп. XI и XII спр. 29.

По Нѣм. Gemeines Hartheu, Iohanniskraut; по Фр. Millepertuis, по Англ. St. John's Wort; по Итл. Iperico perforato.

Растетъ по всей Россіи и Сибири по полямъ, особенно низменнымъ, лесамъ, кустарникамъ, около дорогъ, заборовъ. 2

Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюль, а сѣмяна поспѣваютъ въ Августѣ.

Корень ползучій; стебель стоячій, вѣтвистый цилиндрическо - обоюдный, $\frac{1}{2}$ арш. и выше; листья сидячіе, пропивуложные продолговато - яицевидные, по краямъ съ черными точками; цвѣты въ видѣ трехраздельныхъ полузонниковъ; ташетка 1 - листная, 5 - раздельная; венчикъ 5 - лепесточный, желтолимонного цвета съ мѣлкими круглыми зубчиками; тычинокъ много (опыт 18 до 100) неровныхъ, основаниями своими сросшихся въ 3 пучка; пыльники кругловатые; у пестика завязь продолговатая яицевидная; столбиковъ три; рыльца прозрачныя красныя; маковка треугольная, 3 - гнѣздная, двусперчаторная; семянъ много.

Въ лѣкарства употребляется вся трава (*Herba seu summittates hyperici*), которую надо брать во время ее цветения; держать въ аптекахъ также и одни цветы звѣробоя (*Flores hyperici*). Запахъ цветковъ и травы слабый, вкусъ горьковатый; сила разводящая мокроты, пропив углиспная; употребляется въ чахоликѣ, кровохарканіи, отъ глистовъ, въ исперикѣ, ипохондріи; снаружи въ видѣ припарокъ къ опухолямъ; внутрь даютъ въ видѣ чайной настойки.

Въ домахъ пріуготовляютъ иногда звѣробойное масло для заживленія ранъ и отъ обжоги.

Цвѣтные верхушки, собранныя прежде разцвѣтанія, даютъ нелинию красную краску для суконъ; имъ же можно красить и въ желтый цветъ машеріи, пріуготовленныя съ квасцами, а съ желѣзнымъ купоросомъ въ черный.

Скопъ ъспѣ охопито сюю праву, и цветы ея доставляютъ много меду пчеламъ.

Линней и Палласъ нашли на корняхъ звѣробоя особенный родъ червеца, не уступающаго въ краскѣ обыкновенному червецу.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) Разрѣзъ гашетки ошѣльно; 2) тычинки и лестники (увелич.); 3) тычинка (увелич.); 4) лестникъ (увелич.); 5) зреяла маковка; 6) она же поперечно - разрѣзанная; 7) она же расщепившаяся; 8) стѣна; 9) стѣна (увелич.); 10) она же поперечно разрѣзанное.



БѢЛОКОПЫТНИКЪ МАТЬ И МАЧИХА.

Tussilago Farfara. Linn.

(Кл. XIX. Syngenesia, ПОР. II. Polygamia Superflua. Линн. Сист.)

Признаки рода. *Ложе* голое; *хохолокъ* простой; чашечные чешуйки почки перепончатые.

Признаки породы. Б. *Мать и матиха*, стрѣлка одноцвѣтная чешуистая, листья сердцевидные, угловатые, зубчатые. *Моск. Флора*. спр. 417.

T. Farfara, scapo unifloro squamoso, flore radiato, foliis cordatis angulatis dentatis, subtus pubescentibus. *Hayne B. II N. 16.*

Бѣлокопытникъ; *Мать и матиха*, *матерникъ*; подбѣль; двоелистникъ. *Руск. Травы. Ч. I. стр. 125.* *Хоз. Бот. Тет. IV. стр. 16.*

По Нѣм. gemeiner Huflattig; по Фр. Tussilage; по Анг. Coltsfoot; по Ит. Tussilagine Farfara.

Ростетъ по мокрымъ глинистымъ мѣстамъ, по берегамъ рѣкъ, пустырямъ, лѣсамъ, по всей почве Россіи. 2.

Цвѣтетъ въ Апрѣль и Маѣ; а сѣмяна поспѣваются въ Іюнѣ.

Корень перпендикулярный; листья коренные сердцевидные, сверху голые, а снизу пушистые, по опицвѣтеніи появляющіеся; стрѣлка чешуистая сплющая опять 2 до 4 вершк. и выше; цвѣты сложные лучистые, по опицвѣтеніи повисшіе, попомъ опять выпрямляющіеся; чашечки съ ланцетовидными, по краямъ перепончатыми листочками; вѣнчики желтые, внутренне трубчатые, а окружные языковидные; тычинокъ 5 съ пыльниками въ трубку сросшимися; на пестикѣ рыльце въ двуполыхъ вѣнчикахъ простое, въ женскихъ же двураздѣльное; сѣмяна бороздчатыя съ сидячимъ волосистымъ хохолкомъ; *ложе* плоское голое.

Въ лѣкарства употребляются: корень, листья и цвѣтѣ (Radices, folia seu herba et flores farfarae). Всѣ ча-

сли сего расщепенія имѣюшъ запахъ слабый а вкусъ
клейкий горьковатый, а особливо листья; они употребляются во всѣхъ вообще грудныхъ припадкахъ:
отъ кашля, одышки и пр. въ видѣ отваровъ и чаю,
а особливо вмѣстѣ съ другими травами. Снаружи
заполненные листья прикладываются къ ранамъ для за-
живленія ихъ.

Сухіе листья можно употреблять вмѣсто пру-
ту; цвѣты доспавляютъ пчеламъ медъ.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) Сложный цвѣтъ съ отвороченными внизъ листьями; та-
шечка съ несколькими штрублочными и лучистыми вѣнчиками и ло-
жемъ; 2) вѣнчики двуполые; 3) ихъ столбикъ и рыльце (уве-
лич.); 4) рыльце очень увелич.; 5) женскій вѣнчикъ (увелич.);
6) стыкъ съ хохолкомъ; 7) оно же увеличено, и разрѣзано 8)
поперечко, а 9) вдоль.



ШАФРАНЪ САДОВЫЙ.

Crocus sativus. LINN.

(Кл. III. Triandria. ПОР. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Признаки рода. Вѣнч. воронковидный о 6 разрѣзахъ; рыльце 3, завитыхъ; мак. 3-гнѣздная, 3-створчатая.

Признаки породы. Ш. садовый, разрѣзы у вѣнчика шуплые цѣльные; зѣвъ бородастый; столбикъ короче трубки вѣнчика, рыльца вверхъ поднявшіяся, свернувшись въ видѣ трубки, къ верху толще, длиннѣе тычинокъ.

C. sativus, lacinis corollae obtusis integris, fauce barbata, stylo tubo breviore, stigmatibus inclusis, erecto-patentibus tubuloso-involutis sursum incrassatis staminibus longioribus. Hayne B. IV. N. 25.

По Нѣм. Aechter Safran; по Фран. Safran cultivé; по Англ. Saffron; по Ит. Zafferano.

Рост. въ Крыму и разводится въ садахъ южной Россіи.

Цвѣтетъ осенью; сѣмяна въ Россіи не созревающіе. 2.

Луковицы коренные плотные; листья почти нилеобразно - узенькие, шуплые съ завороченными краями; Чашечки нѣть, а только двулисплоное покрывало; вѣнчикъ однолистный, лилейный, блѣднофіолетовый съ темными жилками; разрѣзы вѣнч. длинные шуплые, ровные; тычинокъ 3, короче вѣнчика, изъ него онъ выходятъ; завязь продолговато - прехугольная, столбикъ короче трубки вѣнчика, рыльце три, длиннѣе тычинокъ, но короче вѣнчика, цвѣту оранжеваго и почти алого, въ сѣжихъ вѣнчикахъ, съ особымъ запахомъ; онъ свернулся въ видѣ трубки, у которой верхъ толще, кончикъ о 4 скругленныхъ зубчикахъ.

Въ лѣкарства употребляются одинъ только рыльца съ столбиками подъ именемъ: *crocus orientalis*, ибо

прежде получали его только съ Востока, но теперь разводятъ его во многихъ мѣстахъ Европы посредствомъ луковицъ какъ и другія луковичныя расщепнія. Шафранъ, въ малыхъ пріемахъ принимаемый внутрь, увеличиваетъ дѣятельность желудка, кровеносныхъ сосудовъ, а чрезъ то и теплолюту, и производитъ бодрость. Онъ есть лѣкарство противогонительное и мочегонительное, гонитъ также и мѣсячные у женщинъ крови: въ пріемахъ очень большихъ одуряетъ, почему и надобно употреблять его съ осторожностью. Снаружи прикладываютъ его какъ лѣкарство мягкительное.

Свѣрхъ сего Шафранъ употребляется для крашения шелковыхъ и другихъ матерій въ желтый цветъ.

Изъ спасительного рисунка.

Фиг. 1. верхняя двухцвѣтная луковица, ошъ кошорой опиная покрывала и листья; а) трубка вѣничка вдоль разрѣзанная, и у которой 5 разрѣзовъ опиная, а остались тычинки и пестрики, б) весь вѣничокъ срѣзанъ и осстался одинъ только пестрикъ; 2) Заглазъ разрѣзанная поперечно и очень увеличенная; 3) рыльце (увелич.).



ШАФРАНЪ ВЕСЕННИЙ.

Crocus vernus. LINN.

(КЛ. III. Triandria. ПОР. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. *Bült.* воронковидный о б разрѣзахъ; рылецъ 3 завитыхъ; мак. 3-гнѣздная, 3-спворчата.

Призн. породы. Ш. весенний, разрѣзы вѣнчи-ка шупые съ вырѣзкою, зѣвъ бородастый, столбикъ длиннѣе трубки вѣнчика, рыльца свернутыя въ видѣ клобучка, длиннѣе тычинокъ.

C. vernus, lacinis corollae obtusis emarginatis, fauce barbata, stylo tubo longiore, stigmatibus inclusis patentibus cucullato - involutis staminibus longioribus. Hayne. B. VI. N. 26.

По Нѣм. Frühlings - Safran; по Фр. Safran printannier; по Англ. Saffron; по Ит. Croco vernale.

Рост. въ Крыму и по Кавказскимъ горамъ.

Цвѣтетъ рано весною. ♀.

Луковицы коренные плоскія; листья узенькие шупые съ завороченными краями; ташетки нѣть а только двулиспное покрывало; вѣнчикъ однолепест-ный лилейный блѣдый или блѣдно - лиловый съ фиолетовыми жилками; тычинокъ 3, короче вѣнчика; завязь продолговатая трехугольная; рылецъ 3, оранжеваго цвѣту, безъ запаха, завитыхъ въ видѣ клубочки складками; маковка 3-спворчата, 3-гнѣздная, сѣмляна кругловатыя. По чрезвычайному сходству съ Шафраномъ садовымъ употребляется иногда вместо его, но тѣхъ врачебныхъ силь не имѣетъ.

Изъясненіе рисунка.

Здѣсь представлены два выродка: одинъ съ лиловымъ и другой съ блѣдымъ вѣнчикомъ. Фиг. 1.) Цвѣтокъ, выходящій изъ луковицы,

и ошъ котораго ошияты покрывала, а шрубка вѣничка вдоль разрѣзана ; 2) *цвѣтокъ*, у котораго оставленъ только пестикъ ; 3) *заязъ* перерѣзанная попечечно (увелич) ; 4) *рыльце* (увелич) *маковка* ; 5) она же перерѣзанная попечечно и 7) раскрышаа ; 8) *стѣна*.

ПОПУТНИКЪ КОЛОСЕНИЦА.

Plantago Cynopsis. Linn.

(Кл. IV. Tetrandria. ПОР. I. Monogynia, Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. 4-листная; вѣнц. гвоздочный, о 4 разрѣзахъ; тыкв. длиннѣе вѣнчика; мак. обрѣзная.

Призн. породы. П. колосеница, стебель подкустарный вѣтвистый, нѣсколько жесткій, листья узенькие желобковато - трехугольные цѣльные, щетинистые; головки съ покрывалами, чашечные листочки почки одинакой длины.

P. Cynopsis, caule suffruticoso ramoso scabriusculo, foliis linearibus subcanaliculato - triquetris integerrimis hirtis, capitulis involucratis, foliis calycinis subaequalibus. Hayne B. V. N. 18.

По Нѣм. Strauchartiges Wegetritt; по Фр. Plantain des chiens; по Анг. Shrubby plantain; по Ит. Plantagine canino.

Рост. по песчанымъ мѣстамъ въ Крыму около Днѣспра, Днѣпра, Дона и Волги.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августъ. 2.

Корень деревянистый, различнымъ образомъ изгибающійся; стебель больше или меньше сплющій, подкустарный, усаженный короткими жесткими волосками, вышиною около $\frac{1}{4}$ аршин. и выше; листья сидячіе, прошивуположные, очень узенькие, жесткіе; цвѣты образующіе яицевидныя съ покрывалами головки; ташетка 4-листная: листочки почки ровные, острѣе; вѣнчикъ 1-лепестный, гвоздочный, сухой, съ 4 разрѣзами ланцетовидными, острѣми; тычинокъ 4, длиннѣе вѣнчика; завязь продолговатая, рыльце на сполбикѣ мохнатое; маковка яицевидная, обрѣзная, опкрывающаяся при основаніи; сѣмянъ два.

По словамъ Галлера и Берегіуса шакъ называемыя блошныя сѣмяна (*Semen Psyllii*) собираются изъ сей травы; а по увѣренію Линнея изъ попутника блошной травы. Впрочемъ оба сіи распенія въ разсужденіи своихъ качествъ и врачебныхъ силъ шакъ

сходны, чи то все равно, будупъли съмъна взяты отъ plantago Psyllium или plantago Супорс.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. I.) цветокъ съ прицѣшникомъ; 2) онъ же безъ прицѣшника, и пришомъ съ передней стороны; 3) онъ же съ задней стороны (увелич.); 4) онъ же безъ чашечки; 5) лестникъ (увелич.); 6) пестикъ (болѣе увелич.); 7) зреяла маковка, сверху прикрыта оспавшимся на ней вѣнчикомъ (увелич.); 8) она же безъ вѣнчика; 9) она же съ открытою верхнею часщю, чтобы видны были и съмъна; 10) съмъ; 11) оно же увеличенное съ наружной стороны, а 12) съ внутренней; 13) оно же разрѣзанное попечечно, а 14) вдоль.



ПОЛУТНИКЪ БЛОШНАЯ ТРАВА.

Plantago Psyllium. LINN.

(Кл. IV. Tetrandria. ПОР. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. 4-лиспная; вѣнц. гвоздочный съ 4 разрѣзахъ; тыт. длиннѣе вѣнчика; мак. обрѣзная.

Призн. породы. П. блошная трава, клейко-пушистая, стебель травяный, вѣпвистый, листья узенькие ланцетовидные плоскіе нѣсколько зубчатые; головка безъ покрываль, ташетные листочки почкировные.

P. Psyllium, viscidо pubescens, caule herbaceo ramoso, foliis lanceto-linearibus planis subdentatis, capitulis involucro destitutis, foliolis calycinis subaequalibus. Hayne. B. V. N. 17.

По Нѣм. Betaubendes Wegetritt; по Фр. Plantain pulicaire; по Англ. Clammy plantain; по Ит. Plantaggine psyllo.

Рост. въ Югоzapадныхъ губерніяхъ по степямъ, а также и по Кумѣ.

Цвѣт. въ Іюнѣ въ Іюлѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Августѣ. ☽.

Корень перпендикулярный; стебель стоячій, круглый, вѣпвистый въ $\frac{1}{2}$ арш. вышиною, покрытый малыми волосками, испускающими клейкій сокъ; листья сидячіе, пропивуположные, ланцетовидные, съ нѣсколькими зубчиками; цвѣты въ видѣ головокъ; ташетка 4-лиспная; листочки узенькие, ланцетовидные; вѣнчикъ 1 - лѣпеспній, гвоздочный съ 4 разрѣзами яицевидными, заостренными, цвѣту бѣловатаго; тыт.инокѣ 4, длиннѣе вѣнчика; завязь кругловатояицевидная, рыльце на столбикѣ пушистое; маковка обрѣзная, по срединѣ открывающаяся; сѣмяна продолжовато-яицевидныя, числомъ два.

Въ лѣкарства употребляются сѣмяна (*Semen Psyllii*), имѣющія въ себѣ довольно остропы и множество склизи. Теперь употребляются онѣ рѣдко, особенно же склизъ изъ нихъ внутрь дается въ глазныхъ воспаленіяхъ, а снаружи прикладывается какъ

средство мягчительное. Прежде же употребляли его какъ слабительное.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1.) Листокъ обвертки; 2) прицѣпникъ; 3) цветокъ безъ прицѣпника; 4) онъ же увеличенъ и припомъ съ передней стороны; 5) съ задней стороны; 6) онъ же безъ чашечки; 7). лепестокъ (увелич.); 8) онъ же больше увеличенъ; 9). зрѣлая маковка съ вѣнчикомъ (увелич.); 10) она же безъ вѣнчика и 11) такъ представлена, чтобы внутренность ея и 2 сѣмичка можно было видѣть; 12) сѣмя; 13) оно же увеличенное съ наружной и 14) со внутренней стороной; 15) оно же перерѣзанное попечечно, а 16) вдоль.



ЧЕРНАЯ БѢЛЕНА.

Hyoscyamus niger. LINN.

(Кл. V. Pentandria. ПОР. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Вѣнц. воронковидный съ шупыми разрѣзами; тылт. загнутыя; мак. 2-гнѣздная съ крышечкою.

Призн. породы. Б. терная, листья объемлющіе стебель угластые, цвѣты сидячіе. Моск. Фл. стр. 135.

H. niger, foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. Hayne. В. I. N. 28.

Бѣлена черная или блекома, Руск. травн. Ч. I. стр. 97. Описаніе дикорастущихъ въ Россіи врачебн. распеній, Щеглова, 2. Ч. сп. 2.

По Нѣм. Schwarzes Bilsenkraut; по Фр. Iusquiamo noire; по Анг. Common Henbane; по Ит. Iosciamo nero.

Ростетъ по всей почти Россіи' около дорогъ, заборовъ, по пустырямъ.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Августѣ. ◎.

Корень бѣловатой, вѣшивистой; стебель стоячій, клейкій; листья поперемѣнныя, объемлющіе стебель продолговатые, зубчато-выемчатые, клейкіе; цвѣты почти сидячіе въ промежуткахъ листьевъ; ташетка 1 - листная, воронкообразная съ 5 зубчиками; вѣнчикъ однолепестный, воронкообразный съ неровными шупыми разрѣзами, цвѣту желтоватаго съ пурпуровыми жилками, различнымъ образомъ себя пересѣкающими и образующими сѣпть; тычинокъ 5 кривыхъ, мохнатыхъ, пыльники фиолетовые; завязь кругловата, столбикъ внизу, усаженъ мѣлкими волосками, рыльце головчатое; маковка почти яице-видная, съ крышечкою, которая по созрѣніи сѣмянъ открывается, и при этомъ плотно соединяется съ чашечкою, сѣмяна почковидныя.

Въ лѣкарства употребляются листья или трава и сѣмяна бѣлены (*Folia s. herba et semen Hyosciami*)

Все распеніе , а особливо свѣжее , имѣетъ непріятный вонючій , одуряющій запахъ , вкусъ слабый склизковатый . Трава сія принадлежитъ къ числу ядовитыхъ распеній , и въ большомъ количествѣ принятая внутрь причиняетъ головную боль , круженіе головы , судороги , параличи , бѣшенство и другіе опасные припадки ; въ малыхъ же пріемахъ служитъ лѣкарствомъ въ ипохондрии , падучей болѣзни , корчахъ , упорныхъ кашляхъ , параличѣ , исперикѣ , и проч . По увѣренію нѣкоторыхъ врачей , она съ пользою замѣняетъ опій : дается въ порошкѣ , но въ аппекахъ держать и *Екстрактъ* (*Extractum Hyosciami*) , масло , выжатое изъ сѣмянъ (*oleum Hyosciami expressum*) , не имѣющее впрочемъ большаго преимущества предъ другими маслами ; масло вареное (*oleum Hyosciami coctum*) , также мазь и пластырь (*Unguentum et emplastrum Hyosciami*) , употребляемые снаружи для разбиванія опівердѣлыхъ опухолей и утоленія боли . Толченые свѣжіе листья , смѣшанные съ свинымъ саломъ или вареные въ молокѣ , прикладываются снаружи для разбиванія и смягченія разныхъ опухолей . Въ случаѣ отравленія бѣленою , лучшія средства суть : уксусъ , клюковый сокъ , свѣжее масло , парное молоко , рвотное , слабительные клистиры .

Изълненіе рисунка .

Fig. 1.) Чашечка ; 2) вѣнчикъ разрѣзанный вдоль ; 3) тычинка (увелич .) 4); пыльникъ раскрытий (увелич .); 5) плододвигатель лыль , разсматриваемая въ увеличенномъ видѣ: а) на воздухѣ , б) на водѣ ; 6) лестникъ ; 7) рильце (увелич .); 8) чашечка съ маковкою ; 9) маковка безъ чашечки ; 10) маковка съ поднятою крышечкою ; 11) сѣмя ; 12) оно же увеличенное ; 13) оно же поперечно и 14) вдоль разрѣзанное .



ЦИКУТА ВЁХЪ.

Cicuta virosa. LINN.

(Кл. V. Pentandria. ПОР. II. Digynia, по Линн. Сист.)

Приз. рода. *Общай обвертки* нѣшъ, *таспная* 1-лиспная; *лепестки* ровные; *плод* почти шаровидный съ бороздками.

Приз. породы. Ц. вёхъ, зонтики пропиву-
положные листьямъ; черешки съ закраинами, шу-
пые. Моск. Флора спр. 161.

C. virosa, glabra, caule petiolisque fistulosis teretibus lae-
viter striatis, foliolis lanceolatis serratis, fructibus subglobosis
depressis. Hayne. B. I. N. 57.

Омегъ водяной или болиголовъ водяной; бѣше-
ница водяная. Руск. лѣт. травн. Ч. I. спр. 633. бѣ-
шеница ядовитая, Щегловъ врачебн. расп. Ч. II.
спр. 44.]

По Нѣм. giftiger Wasserschierling; по Фр. Cicutaire aqua-
tique; по Англ. Water - Hemlock; по Ит. Cicuta aquatica.

Ростетъ по болотамъ, берегамъ рѣкъ, прудовъ
и озеръ во всей почти Россіи, и Сибири, выключая
холодныхъ оной страны.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ, Іюль и даже въ Августѣ а
съмяна поспѣваютъ въ Іюлѣ и Августѣ. 2.

Корень полстпой спержневой, внутри съ попе-
речными перегородками, содержитъ свѣтлолѣпой
сокъ, которой на воздухѣ становился оранжевымъ;
стебель стоячій, круглый, голый, при корнѣ ше-
мнокрасный, двураздѣльный, вышиною отъ $\frac{1}{2}$ до $1\frac{1}{2}$
аршина; листья голые: коренные многосложные,
стебельные пропиву-
положные, нижніе двукрылые,
а верхніе крылатые сложные; листочки ланцетовид-
ные, зазубренные, непарные, всегда раздѣленные на
три части, черешки голые; цвѣты зонничные, си-
дячіе на верхушкѣ стебля и пропиву листьевъ;
обвертки общай нѣшъ, часпная многолиствная; та-
шетка едва примѣшная о 5 зубчикахъ; єнтикѣ 5-ле-

леспинный, лепестки одинаковой величины, свернутые, сердцевидные; тычинок 5; завязь подъ чашечкою почки шаровидная, столбиковъ два, рыльца тупыя; плодъ почки шаровидный съ широкими нѣсколько возвышенными ребрышками, раздѣляется на двѣ половины; сѣмянѣ два, съ пятыю на выпуклой ихъ споронѣ ребрышками.

Цикуша принадлежитъ къ самымъ сильнымъ Европейскимъ ядовитымъ расщепеніямъ; ее употребляютъ иногда только снаружи, прикладывая полченую къ запвердѣвшимъ опухолямъ внутрь же опасно давать; особенно ядовитъ ея корень. Въ несчастныхъ случаяхъ оправленія цикушою, надобно произвести рвоту механическимъ образомъ или большимъ количествомъ воды теплой, смѣшанной съ льнянымъ или коноплянымъ масломъ; давать парное молоко, уксусъ и клейкія вещи.

Поелику Цикуша похожа на болиголовъ, извѣстный въ аптекахъ также подъ именемъ Цикупы, и употребляемый внутрь, то и надобно умѣть ее отличать. Опль болиголова цикуша отличается: 1) мѣстомъ, ибо всегда росшепъ въ водѣ; 2) перегородчатыми корнемъ; 3), неимѣніемъ на стеблѣ красноватыхъ пятенъ, холя и есть краснота при корнѣ; 4) листочками ланцетовидными зазубренными, раздѣленными иногда на 2 и на 3 части, но непродолговатыми, зубчатыми и нераздѣльными; 6) неимѣніемъ общей обвертки; 7) широкими ребрышками на сѣмянахъ, но некруглозубчатыми и волнистыми.

Цикушу принимаютъ иногда и за бдомыи бутень (*Myrrhys bulbosa*, *Chaerophyllum bulbosum*); но опль сего послѣдняго она отличается: 1) мѣстомъ; 2) перегородчатыми корнемъ; 3) голымъ и безъ всякихъ пятачъ стеблемъ, какой у бутня; 4) голыми и несжатыми черешками; у бутня же они мохнаты; 5) верхними листочками, опль нижнихъ не отличающимися; 6) одинаковою величиною всѣхъ лепестковъ; 7) шаровидносплю сѣмянъ; а у бутня онѣ продолговаты.

Изглаженіе рисунка.

Цикуша представлена съ корнемъ, перерѣзаннымъ вдоль, чтобы видны были въ немъ перегородки.

Фиг. 1. цветокъ (увелич.); 2) листокъ (увелич.); 3) созрѣлой плодъ, состоящій изъ 2 сѣмянъ, изъ которыхъ каждое имѣетъ свою особую ножку; 4) онѣ же увеличенъ; 5) сѣмя увеличенное и перерѣзанное поперечно, а 6) вдоль.



ЛАНДЫШ ОБОЮДНЫЙ.

Convallaria Polygonatum. Linn.

(Кл. VI. Hexandria. ПОР. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. нѣпъ; вѣнг. о б разрѣзахъ; ягода при основаніи 3-гнѣздная.

Призн. породы. Л. обоюдный, стебель обоюдный; листья поперемѣнныя, объемлющіе стебель, ножки промежуточныя одно- и двуцвѣтныя. Моск. Фл. спр. 181.

C. Polygonatum, caule ancipiti, foliis oblongo-ovatis alternis amplexicaulibus, pedunculis axillaribus subunifloris, filamentis glabris, antheris conniventibus pistillum aequantibus. Hayne. B. III. N. 19.

Ландышъ многоколѣнчаторный; Купена, Соломонова печать. Руск. лѣт. травн. Ч. I. стр. 411.

По Нѣм. Weiss-wurz-mayblümchen; по Фр. Muguet anguleux; по Анг. Salomons Seal; по Ит. Convallaria Polygonato.

Ростетъ по лѣсамъ по всей Россіи и Сибири.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ, а сѣмяна посыпають въ Іюль. 2.

Корень колѣнчатый, шишковатый, бѣловатый; стебель обоюдный, опь $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$ аршина вышиною; листья сидячіе, однобочныя, продолговато-лицевидные шуплые, цѣльные, голые, съисподи бѣловатые; цвѣты сидячіе въ промежуткахъ листьевъ по одинарнѣ, рѣдко по два, висячіе; ташетки нѣпъ; вѣнчикъ однолепестный, колокольчатый, бѣлый о б закругленныхъ разрѣзахъ; тычинокъ 6, выходящихъ изъ вѣнчика; завязь почти шаровидная съ 3 бороздками, столбикъ трехъ-сторонній, рыльце почти тридольное; ягода при основаніи пригнѣздная, черная; сѣмяна кругло-трехугольныя, обыкновенно числомъ 6.

Въ лѣкарства употребляется корень сего Ландыша (*Radix sigilli Salomonis*), которой собирается весною. Корень сей запаха не имѣетъ, хотя цвѣты и пахнутъ пріятно; вкусъ его сладковатой склизистой; силу

имѣетъ мягчительную, притупляющу оспроту и очищающую, почему даютъ отваръ его въ кашль и печеніи бѣлей, а вареный въ молокѣ въ почечуѣ; снаружи же прикладываютъ въ разныхъ воспаленіяхъ; Отваръ листьевъ полезенъ для омыванія чесомочныхъ спрупьевъ.

Молодые стебли и побѣги могутъ употребляемы быть вмѣсто спаржи, а корень замѣняетъ нѣкоторымъ образомъ хлѣбъ.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1.) Цвѣтокъ разрѣзанный вдоль; 2) тычинка со споропы перстнѣка, а 5) съ боку (увелич.); 4) лестникъ (увелич.); 5) созрѣлая ягода; 6) она же разрѣзанная поперечно, что бы можно было видѣть, что она вверху одногнѣздная, а 7) внизу 3-гнѣздная; 8) стѣлл; 9) она же поперечно, а 10) вдоль разрѣзанное.



АИРЪ БОЛОТНЫЙ.

Acorus palustris. LINN.

(Кл. VI. Hexandria. ПОР. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Приз. рода. Вънчикъ почки кеглевидный, по крытый цвѣтами; таш. нѣпъ; вѣнц. б-лепестный; ягода 3-гнѣздная.

Приз. породы. А. болотный, у стрѣлки конецъ мечевидной длинной листвяной. Флор. Моск. стр. 182.

A. palustris, scapi mucrone foliaceo ensiformi spadecem multoties superante. Hayne. B. N. 31.

Ирь или Аиръ; Косапникъ, Лепешникъ, Татарской сабельникъ, Руск. травн. Ч. I. стран. 274.

По Нѣм. gemeiner Calmus; по Фр. Jonc odorant; по Англ. Sweet cane; по Ит. Acoro-calamo.

Рост. по всей Россіи, по болотамъ, прудамъ, озерамъ.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюль, а сѣмяна поспѣваютъ въ Августѣ. 2.

Корень колѣнчатый, стрѣлка споячая, проспая, вышиною около аршина и выше, внизу почки трехугольно-скжатая, близъ вѣничка мечеобразная и выше его листвяная; листья выходятъ изъ корня, мечеобразные; цвѣты сидячіе въ коническихъ вѣничкахъ безъ чашечки; вѣнчикъ б-лепестный, лепестки тупые; тычинокъ 6, нѣсколько длиннѣе вѣничка; завязь продолговатая, 3-4-5 или 6 спорония; рыльце сидячее съ премя бороздками; ягода продолговатая, углата, 3-гнѣздная, наполненная прозрачною склизью; сѣмянѣ много продолговатыхъ.

Въ лѣкарствѣ употребляются корни аира (*Radix calami aromatici*, *calami vulgaris*, *acori veri*); ихъ надобно собирать весною рано, или еще лучше осенью, и очищивъ отъ верхней кожицы, высушивать и беречь въ закрытыхъ сосудахъ. Они имѣютъ запахъ балзамической проницательный, а вкусъ пряный, горковатый.

Корни сіи принадлежатъ къ масляно - зеирнымъ средствамъ и имѣютъ силы возбуждающія, умножающія теплоту, потогонипельная и укрѣпляющія желудокъ, почему и даются въ лихорадкахъ перемежающихся и другихъ, въ слабости желудка, отъ глисповъ; въ припадкахъ чувственноможильныхъ, въ цингѣ, коспоѣдѣ и проч.

Корень сей дається въ порошкѣ или въ видѣ лепешекъ, а также и въ настойкѣ. Въ Аптекахъ пріуготовляютъ изъ него *тинктуроу*. (*Tinctura calami simplex et tinctura calami composita*) и сверхъ того конфекты (*Confectio calami*).

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1. Вѣнчикъ разрѣзанный поперечно; 2) Цвѣтокъ (увелич.); 3) онъ же развернутъ и увеличенъ; 4) тычинка (увелич.); 5) завязь съ рыльцемъ увеличена и 6) поперечно разрѣзана; 7) незрѣлая ягода (увелич.); 8) стѣлла или лучше сказашь, зародышъ его съ пуповиною.



ОДНОЯГОДНИКЪ ЧЕТЫРЕЛИСТНЫЙ.

Paris quadrifolia. LINN.

(КЛ. VIII. Octandria. ПОР. IV. Tetragynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. 4-листная; лепестковъ 4; у же чашечныхъ листочковъ (иногда ихъ и совсѣмъ не бываешь); ягода 4-гнѣздная.

Призн. породы. О. четырелистный, съ 4-рымами листьями. Моск. Фл. спр. 208.

P. quadrifolia. foliis quaternis, flore completo. Hayne. В. III. N. 7.

Воронецъ или Вороній глазъ, Паридова трава. Руск. травн. Ч. I. спр. 153. Воронецъ четырелистной. Щеглов. врачеб. Ч. II. спр. 50.

По Нѣм. Vierblättrige Einbeere; по Фр. Parisette; по Анг. The herb Paris; по Ит. Paride quadrifoliata.

Ростетъ по мокрымъ лѣсамъ по всей Россіи, выключая самыя холодныя Губерніи.

Цѣпаетъ въ Маѣ и Іюнѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Іюль и Августѣ. 2.

Корень спирожневый съ мочками; стебель сплющій, голый, въ $\frac{1}{2}$ арш. вышиною; листья выходяще только изъ верхушки стебля, числомъ 4 (редко 6 и 8), одинъ прошивъ другаго, яичевидные, голые, цѣльные; цветокъ одинъ на верхушкѣ стебля; ташечка 4-листная, листочки ланцетовидные, острѣе; вѣнчикъ 4-лепесточный, лепестки узенькие, острѣе, блѣдно зеленаго цвѣта; тычинокъ 8, съ пыльниками, сидящими по срединѣ; завязь кругловатая, почти четырехшоронная, столбиковъ 4 съ закривленными рыльцами; ягода кругловатая, 4-гнѣздная, синяя, сѣмяна лежатъ въ два ряда.

Въ лѣкарства употребляются корень, трава и ягоды (Radix, Herba et Bassae Paridis), которыхъ запахъ пропивный, вкусъ сладковато-приторный. Корень производитъ рвоту, въ большихъ приемахъ;

права дается въ удушливомъ кашль, въ судорожныхъ припадкахъ, поносахъ. Снаружи ягоды и полченые листья помогаютъ въ злокачественныхъ нарывахъ и ногтевѣдѣ. Ягоды ядовиты и причиняютъ рвоту и боль въ желудкѣ.

Листья, собранные прежде нежели спанелись расстеніе цвѣсть, красяще въ желтую краску нипки и хол спину, подголовленныя квасцами; изъ незрѣлыхъ ягодъ получается для живописцевъ краска зеленая.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1.) тычинка съ наружной стороны и 2.) съ внутренней (узел.); 3.) лестникъ; 4.) онъ же увеличенъ; 5.) созревшая ягода съ чашечкою и вѣничкомъ; 6.) она же разрѣзанная попечечно; 7.) стмл.; 8.) оно же увеличенное и 9.) разрѣзанное попечечно, а 10.) вдоль.



МЫЛЬНИНКА ОБЫКНОВЕННАЯ.

Saponaria officinalis. LINN.

(Кл. X. Decandria. ПОР. II. Digynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. 1-лиспная, трубчатая, при основании без чешуекъ; лепест. 5 съ ноготками; мак. продолговатая, 1-гнѣздная.

Призн. породы. *M. обыкновенная*, листья яицевидно-ланцетообразные, гладкие; чашечки цилиндрическія. Моск. Фл. спр. 223.

S. officinalis, calicibus cylindricis, foliis ovatolanceolatis. Hayne. В. II. N. 2.

Мыльная трава или мыльникъ. Руск. травн. Ч. I. спр. 571. Мыльница аптечная. Щеглов. врачеб. Ч. I. спр. 73.

По Нѣм. Gemeines Seifenkraut; по Фр. Saponaire; по Ане. Soapwort; по Ит. Saponaria officinale.

Ростетъ по лугамъ, около заборовъ и куспарниковъ по всей южной и умѣренной Россіи.

Цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ, а сѣмена поспѣваютъ въ Августѣ и Сентябрѣ. ♀.

Корень ползучій, темный, а внути при бѣловатый; стебель стоячій, круглый, колѣнчатый, проспій, вышиною отъ $\frac{1}{2}$ арш. до $\frac{3}{4}$ арш. и выше; листья яицевидно-ланцетообразные, промежуточные, сидячіе, съ волосками по ребрышкамъ; цвѣты на коротенькихъ ножкахъ, на верхушкѣ стебля и въ промежуткахъ листьевъ кучами; ташетка цилиндрическая съ 5 зубцами; вѣнчикъ 5-лепестный, гвоздичный: лепестки съ длинными узенькими ноготками, по краямъ зазубренные и при основании съ зубчиками (2), сославляющими коронку; тычинокъ 10, длиною съ ноготки вѣнчика, (5 изъ нихъ позже доспигаютъ длины первыхъ); завязь почки цилиндрическая, столбиковъ два съ осирными рильцами; маковка продолговатая 1-гнѣздная, раскрывающаяся на верху съ 5 зубчиками; сѣмянъ много почковидныхъ.

Въ лѣкарствѣ употребляются корень и листья (*Radix et Herba Saponariae s. saponariae rubrae*), корпорыя запаху почти никакого не имѣють, а вкусъ горьковатый. Они принадлежатъ къ лѣкарствамъ склизистымъ и даются болѣею частію въ видѣ отвара: въ болѣзняхъ кожныхъ, злокачественныхъ горячкахъ, венерическихъ болѣзняхъ, ломотныхъ и подагрическихъ боляхъ, желтухѣ, чревныхъ завалахъ, кашлѣ, опѣженскихъ бѣлей, и пр.

Въ Аптекахъ пріоупоровляющій изъ корня сего расщепленія, вмѣстѣ съ другими, древесные кровоти-стительные наборы (*Species lignorum purificantes*).

Корень можетъ служить вмѣсто мыла для бѣлья, и выведенія пятенъ изъ шелковыхъ матерій. Скомѣтъ ъспѣшно шраву сю охотно.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1.) гашетка съ прицѣпниками; 2.) лелестокъ; 3.) погошокъ его разрѣзанный попечечно; 4.) тычинки, внизу сросшіяся; 5.) лестники; 6.) лыльникъ съ верхнею частію шычинки; 7.) рыльце (увелич.); 8.) распредѣснувшая маковка; 9.) она же разрѣзанная вдоль; 10.) стѣна; 11.) оно же увеличенное; 12.) разрѣзанное попечечно и 13.) вдоль.



КОПЫТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКІЙ.

Asarum Europaeum. Linn.

(Кл. XI. Dodecandra. ПОР. I. Monogyna. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. о 3 разрѣзахъ; завязь подъ чашечкою; вѣнтика нѣть; мак. кожистая съ оспающимся на ней чашечкою.

Призн. породы. К. Европейскій, листья почковидные. Моск. Фл. стр. 287.

A. Europaeum, foliis reniformibus obtusis binis. Hayne.
B. I. N. 44.

Копытень подлѣсной или подлѣсникъ, Копытникъ, сухой Водолень; Подорѣшникъ; Облапа; Охвашка; Скипидарникъ. Руск. травн. Ч. I. стр. 353. Щеглова врачеб. Ч. II. стр. 9.

По Нѣм. Europaische Haselwürz; по Фр. Asaret; по Анг. Asarabacca; по Ит. Asaro Europeo.

Ростетъ по лѣсамъ всей Россіи и Сибири.

Цвѣтетъ въ Апрѣль и Маѣ, а сѣяна поспѣвающъ въ Іюль. 2.

Корень мочковатый; стебель голой съ опраслями и коропенькими вѣнчиями, сперва сплющими, а по созрѣніи плода лежачими и пускающими новые корни; листья почковидные, черешковые, кожистые, сверху темнозеленые блестящіе, съисподи блѣднозеленые, а иногда и темнокрасноватые; цвѣты сидячіе по одинаркѣ; ташечка 1-листная, колокольчатая, 3-раздѣльная, красноватая, разрѣзы заворачиваются назадъ; вѣнтика нѣть; тычинокъ 12, короче чашечки, и 6 изъ нихъ развертываются, прежде другихъ 6, пыльники сидячіе почки на срединѣ тычинокъ; завязь подъ чашечкою, или почки въ веществѣ ея находятся, рыхлыце на сполбикѣ, раздѣлено на 6 пупырьихъ разрѣзовъ въ видѣ звѣзды; маковка кожистая полушешигнѣздная въ самомъ веществѣ чашечки; сѣяна почки яицевидныя.

Въ лѣкарства употребляються листья и корень (Folia s. Herba et radices Asari). Запахъ всего свѣжаго расщепенія нѣсколько пряній, похожій на кардамонный или канфарный, вкусъ острый горьковатый и противный. Корень давно уже извѣстенъ какъ лѣкарство рвотное и можетъ замѣнять дорогую ипекакуану; служить также и лѣкарствомъ слабительнымъ. Полезенъ въ перемежающихся и другихъ лихорадкахъ, въ водяной болѣзни, чревныхъ завалахъ, запорѣ кривой. Высущенный корень теряетъ свое дѣйствіе рвотное и слабительное, а дѣйствуетъ болѣе на мочу; по сему-то и копытневый Экстрактъ (Extractum rad. Asari) дѣйствуетъ слабѣе. Листья имѣютъ одинаковую почву силу съ корнемъ; изъ нихъ, вмѣстѣ съ маораномъ и лавандою приготавлиаютъ нюхательный порошокъ, полезный въ упорныхъ головныхъ боляхъ. Даютъ копытень въ порошкѣ и отварахъ.

Коновалы употребляють копытень какъ слабительное лѣкарство для лошадей, также для изгнанія у нихъ червей, очищенія отъ шелудей.

Копытень даютъ зеленую краску, которой можно красить шерстяные материи, подготавленные висмутомъ.

Излѣченіе рисунка.

Фиг. 1.) цветокъ безъ чашечки, но съ щычниками (увелич.); 2) ти-
чица (увелич.); 3) созрѣлая маковка съ чашечкою вмѣстѣ; 4)
она же перерѣзанная поперечно; (увелич.); 5) стѣна; 6) она же
увеличенное и 7) перерѣзанное поперечно, а 8) вдоль.



БУКВИЦА АПТЕКАРСКАЯ.

Betoniea officinalis. LINN.

(КЛ. XIV. Didynamia. ПОР. I. Gymnospermia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. о 5 зубчикахъ; вѣнчикъ двугубый, трубка коего цилиндрическая, верхняя губа заворочена вверхъ и нѣсколько плоская.

Призн. породы. Б. аптекарская, средний разрѣзъ нижней губы у вѣнчика круглоузубчайный, волосистый. Б. прямая, Моск. Фл. спр. 362.

B. officinalis, foliis ovato-cordatis hirtis, spicis verticillatis, plerumque interruptis, corollarum labio superiore integro, labii inferioris lacinia media emarginata crenulata. Hayne. B. VI. N. 10.

Буквица черная. Руск. травн. Ч. 1. спр. 120.

Щегл. Врачебн. Ч. 1. спр. 61.

По Нѣм. Gemeine Betonie; по Фр. Betoine; по Анг. Wool Betony; по Ит. Betonica.

Ростетъ по полямъ, лѣсамъ и рощамъ по всей почти Россіи.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ, Іюль и Августѣ, а сѣмянка созрѣваютъ въ Іюль, Августѣ и Сентябрѣ. 2.

Корень перпендикулярный со множествомъ мочекъ; стебель сплющій, четырехсторонний, мохнатый, вышиною отъ $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$ арш.; листья яйцевидно-сердцеобразные, морщиноватые, прошивуположные, остроп-и-круглоузубчайные: нижніе черешковые, а верхніе почки сидячіе; цвѣты кольчатые: кольца многоцвѣтныя, нижнія больше или меньше сближены, а верхнія очень сближены и образуютъ колось; ташетка 1 - листовая, трубчатая о 5 зубчикахъ, больше или меньше волосистая, съ зубчиками краеволосными; вѣнчикъ 1 - листовой двугубый, белый или пурпуровый: трубка кривая: верхняя губа щѣльная, почки плоская, съ кончикомъ вверхъ загнувшимся; нижняя о 3 разрѣзахъ, средний разрѣзъ шире другихъ и круглоузубчай; тычинокъ 4, изъ которыхъ двѣ короче другихъ двухъ; завязь раздѣленная на 4 ча-

сти, рыльце двураздѣльное на сполбикѣ, длиною съ тычинки; маковки вѣтъ, а 4 продолгованыя прех-стороннія сѣміна лежатъ въ чашечкѣ.

Прим. *Betonica stricta* Айпона, Вилденова, Московской Флоры и другихъ, по щапельнѣйшемъ изысканіи, есть не особая порода, но выродокъ Б. аптекарской.

Въ лѣкарства употребляются листья, цветы и коренья (*Herba, flores et radices Betonicae*), имѣющіе слабый запахъ, не очень пріятный; вкусъ нѣсколько освѣрый, горьковатый. Причисляется къ лѣкарствамъ возбуждающимъ и полезна въ проспудахъ, мокропныхъ болѣзняхъ, въ головной боли и проч. Дають въ настойкѣ или отварѣ наподобіе чаю. Сухие испершіе листья можно нюхать въ долговремяныхъ насморкахъ. Корень имѣетъ рвотное и слабительное свойства. Собираютъ сюю траву во время ея цвѣта.

Листья съ цвѣтными верхушками даютъ для шерсти, подголовленной висмутомъ, темнооливковую не линючую краску. Буквица сваренная съ молокомъ, полезна скопинѣ, спраждущей воспаленіемъ кишечка опѣ съяденія ядовитыхъ травъ.

Изъясненіе рисунка.

Поелику *восточная буквица* (*B. orientalis*) отличается отъ аптекарской звѣздчатыми только волосками на нижней сторонѣ листьевъ, то сіи волоски и предшавлены увеличенными въ фиг. 1; фиг. 2) гашетка съ пестикомъ и сѣменами (увелич.); 3) вѣнчикъ разрѣзанный (увелич.); 4) тычинка (увелич.); 5) заевъ (увелич.); 6) сѣм.; 7) оно же увеличенное; 8) разрѣзанное попечечно, а 9) вдоль.



КРЕССЪ ГОРЬКІЙ.

Cardamine amara. LINN.

(Кл. XV. Tetrodynamia. Пор. II. Siliquosa. Линн.
Сист.)

Признаки рода. Чаша почки открыта, рыльце щельное; стругок длинный, раскрывающийся съ упругостью, послѣ чего створки заворачиваются назадъ.

Признаки породы. К. горький, листья крылатые: нижніе листочки эллиптическіе, продолговатые, зубчатые; стебель при основаніи окореняющейся. Моск. Фл. спр. 335.

C. amara, caule erecto solido, basi stolonifero, foliis pinnatis, radicalium foliolis subrotundis, caulinorum ovali-oblongis subdentato-angulatis. Hayne. B. V. N. 30.

По Нѣм. Bitteres Schaumkraut; по Фр. Cardamine amère; по Англ. Bitter Ladies' Smock; по Ит. Cardamine amara.

Растетъ по мокрымъ лѣсамъ, канавамъ, около ручьевъ по всей умѣренной и холодной Россіи.

Цвѣтетъ въ Маѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Іюнѣ, Іюль. 2.

Корень колѣнчатый; стебель стоячій, голый, нѣсколько углазистый, вышиною въ $\frac{1}{2}$ арш. и выше; листья крылатые: коренные колѣнчатые, а стебельные поперемѣнныe, листочки коренныхъ кругловатые, нѣсколько углазистые, а стебельныхъ яицевидно-продолговатые, нѣсколько зубчатые; цвѣты въ видѣ щипка; гашетка о 4 листочкахъ яицевидно-продолговатыхъ, тупыхъ, при основаніи горбатыхъ; вѣнчикъ 4 лепестинный, крестовидный, лепестки бѣлые; при основаніи тычинокъ четыре железки; тычинокъ 6, изъ числа которыхъ 4 длиннѣе другихъ двухъ; завязь цилиндрическая, столбикъ не длиннѣе длинныхъ тычинокъ, рыльце тупое, почки головчатое; стругокъ длинный, кругло-сплюснутый, дву-

гнѣздный, двусимворчатый, и копораго сиворки при раскрытии, когда созрѣютъ сѣмяна, свертываются заворачиваясь назадъ; *сѣмѧнѣ* много продолговатыхъ.

Въ лѣкарства употребляются листья и цветы (Herba et flores Cardamines amarae seu Nasturtii majoris). Запахъ травы, особенно свѣжей и сполченой, нѣсколько остреватъ, а вкусъ горький. Свѣжая трава дается какъ лѣкарство противузынгопное.

Молодую траву можно употреблять вмѣсто салата; скопъ ехопно ъсть сюю траву, а пчелы берутъ медъ изъ цвѣновъ.

Излѣченіе рисунка.

Фиг. 1.) цветокъ; 2) два лепестка; 3) цветокъ, онъ копораго чашечка и вѣнчикъ опиная, чтобы можно было видѣть железки; 4) пыльники (увелич.); 5) созрѣлый стручокъ съ завороченными назадъ сиворками; 6) сѣмѧ (увелич.); 7) око же развязанное цоперечно.



ЗИНЗИВЕРЬ КРУГЛОЛИСТНЫЙ.

Malva rotundifolia. LINN.

(Кл. XVI. Monadelphia. ПОР. III. Polyandria. Линн.
Сист.)

Признаки рода. Чаш. двойная: наружная о 3 листьяхъ; мак. 1 - съмняйный; лежащъ кольцеобразно.

Признаки породы. З. круглолистный, листья сердцевидно-круглые съ 5 неглубоко-разрѣзанными долями; ножки у плодовъ наклоняющіяся внизъ; вѣничекъ вдвое длиннѣе чашечки. Моск. Фл. ст. 347. (З. калачики).

M. rotundifolia, caule subprostrato pubescente scabriusculo, foliis pubescensibus, inferioribus cordato-orbiculatis obsolete septemangularibus, superioribus subquinquelobis, pedunculis pubescentibus, fructiferis declinatis. Hayne. B. II N. 27.

По Нѣм. Rundblättrige Malve; по Фр. la petite Mauve; по Анг. Dwarf Mallow; по Ит. *Malva rotundifolia*.

Ростетъ по пустырямъ, дорогамъ, улицамъ, пригоркамъ, по всей южной и умѣренной Россіи, и въ нѣкоморыхъ губерніяхъ холодныхъ.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ, Іюль и Августѣ, а плоды поспѣваютъ въ Іюль, Августѣ и Сентябрѣ. 2.

Корень перпендикулярный, вѣшниспай съ множествомъ мочекъ, внутри бѣлый, а снаружи желтоватъ; стебель лежачій, но иногда бываетъ и споячій, мохнатый, вѣшниспай, вышиною въ $\frac{1}{2}$ арш. и выше; листья на длинныхъ черешкахъ, кругло-и-осиро-зубчатые, съ обѣихъ сторонъ усаженные мягкими звѣздообразными волосками: *нижніе* сердцеобразно-круглые, почки 7-угольные, верхніе почки 5-дольные, а верхушечные 5-дольные; цвѣты на ножкахъ выходящіе изъ промежутковъ: ножки одноцвѣтныя, короче листьевъ черешковъ, во время цветенія спояты прямо, а по

созрѣніи плодовъ повисають внизъ; *ташетка* двойная: наружная о 3 листочкахъ острыхъ, внутренняя 1 - листовая, 5 - раздѣльная; *вѣнчикъ* 5 - лепестковый, блѣднорозовый; *тычинокъ* много, сросшихся основаниями въ трубку, *пыльники* почкообразные; завязь кругловатая, лучистая, бороздчатая, *столбикъ* много съ проспыми рыльцами; *маковокъ* двуспиральныя много: онъ лежатъ вокругъ ложа и сначала представляютъ одно лучистое круглое пѣло, а при созрѣніи съмянѣ опадаютъ; *сѣмяна* плоскія, кругловатыя, почки почковидныя, сидячіе по одному въ маковкѣ.

Въ *Аптекахъ* употребляются: *корень*, *трава* и *цвѣты* (*Radix, herba et flores Malvae vulgaris*). Всѣ части сего расщепенія содержатъ много слизи, а особенно корень; почему и принадлежитъ къ лѣкарствамъ мягчительнымъ и употребляется съ пользою въ тѣхъ же самыхъ случаяхъ, гдѣ и просвирнякъ. См. N. 16.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1.) двойная *ташетка*; 2) *вѣнчикъ* и *тычинки*; 3) основаніе ложа штубки, составляющееся изъ тычинокъ, и къ кошорому приросшають лепестки снизу, и 4) сверху (увелич.); 5) *лыжникъ* съ верхнею частію тычинки; 6) раскрывшійся *пыльникъ* (увелич.); 7) крушинка *сѣмянной лыжи* (увелич.); 8) *лестникъ* (увелич.); 9) *рыльце* съ верхнею частію столбика (увелич.); 10) *плодъ*; 11) онъ же съ исключеніемъ нѣсколькихъ маковокъ; 12) *раздѣльная маковка*; 13) *сѣмя*; 14) оно же перерѣзанное (увелич.).



ЗИНЗИВЕРЬ ЛѢСНЫЙ.

Malva sylvestris. LINN.

(КЛ. XVI. *Monadelphia.* ПОР. III. *Polyandria.* Линн.
Сист.)

Призн. рода. Чаша двойная, наружная о 3 листочкахъ; маковки 1-семенные, лежать кольцеобразно.

Призн. породы. З. лѣсный, листья 5-7-дольные: доли острыя; черешки и листья волосистые. Моск. Фл. спр. 348.

M. sylvestris, caule suberecto piloso scabro, foliis septemlobis pubescentibus, petiolis pedunculis que pilosis, petalis emarginatis. Hayne. B. II. N. 28.

Рожа лѣсная, Щегл. врачебн. Ч. I. спр. 196.

По Нѣм. Wald-Malve; по Фр. Mauve; по Анг. Common Mallow; по Итл. *Malva selvatica*.

Ростетъ около дорогъ, заборовъ, изгородь, развалинъ по всей южной и умѣренной Россіи и во многихъ холодныхъ Губерніяхъ.

Цвѣтетъ съ Іюня по Августъ, а сѣмяна созревають въ Августъ и Сентябрь. 2.

Корень перпендикулярный, вѣшивистый со множествомъ мочекъ, внутри бѣлъ, а снаружи желтоватъ; стебель сплющій, но иногда бываешь и лежачій, мохнатый, вышиною опъ $\frac{3}{4}$ аршина до $1\frac{1}{4}$ и выше; листья на длинныхъ черешкахъ островерхие-шуппо-зубчатые, волосистые, волоски звѣздчатые: нижніе почки 7-дольные, съ долями закругленными, верхніе 7-дольные, съ долями острыми, верхушечные 5-дольные; нижніе черешки въ 2 и 3 раза длиннѣе листьевъ, а верхніе споль же длинны какъ и листья; цветы сидячіе на ножкахъ, выходящихъ изъ промежуточковъ листьевъ; ножки одноцвѣтныя, всегда сплющія и во время цвѣтенія и во время созрѣнія плодовъ; ташетка двойная: наружная 3-листная, внутрен-

ная 1 - листная, 5 - раздѣльная; *сѣнгикъ* 5 - лепестп-
ный: лепески обращно-сердцевидные, большиe, блѣд-
норозовые; *тычинокъ* много, основаніями сросшихся
въ трубку; *завязь* кругловатая, сплюснутая, лучи-
стая, *столбиковъ* много съ просыпми *рыльцами*;
маковки двуспирчашыя, кольцеобразно лежащія во-
кругъ ложа, и по созрѣніи сѣмянъ опадающіяся
одна опъ другой; *сѣмяна* почки почковидныя, сплю-
снутыя.

Онъ очень похожъ на З. круголистный, но отлич-
ается отъ него наипаче: 1) листьями, не такъ глубо-
ко разрѣзанными; 2) цвѣточными ножками, стоячими
и по созрѣніи плодовъ; 3) большими вѣничками; 4)
голыми маковками и съ наружной стороны не покры-
тыми волосками.

Въ лѣкарства употребляются *цвѣты, трава и*
корни (*Flores, herba et radices Malvae maioris*). *Запаха*
не имѣетъ, *вкусъ* же склизистый; сила мягчительная,
почему и употребляется во всѣхъ болѣзняхъ, тре-
бующихъ мягчительныхъ и болѣуполищельныхъ лѣ-
карствъ, какъ то: въ разныхъ внутреннихъ воспа-
леніяхъ, въ поносахъ, кровавой рвотѣ, промиву
оспрыхъ сыпей. Снаружи прикладывается въ видѣ
припарокъ на воспалительные опухоли, чирьи, бу-
боны, и пр. Дають внутрь въ видѣ настойки или
отвара.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1.) *кашечка* двойная; 2.) *сѣнгикъ* съ *тычинками*; 3.) *ложе*,
изъ коего выходящіе лепески сини; 4.) оно же сверху (увелич.);
5.) *пыльникъ* съ верхнею часцію *шычинки* и 6.) оно же распре-
снувшій (увелич.); 7.) *крупинка* сѣмянной пыли (увелич.); 8.)
лестники (увелич.); 9.) *рыльце* (увелич.); 10.) *плоды* въ *чашечкѣ*;
11.) они же безъ *чашечки*; 12.) они же безъ *чашечки*, и опъ ко-
ей нѣсколько ихъ опадѣло; 13.) *маковка* опадѣльная; 14.) *сѣмя*,
15.) оно же перерѣзанное (увелич.).



ДЫМЯНКА АПТЕКАРСКАЯ.

Fumaria officinalis. LINN.

(Кл. XVII. Diadephia. ПОР. I. Hexandria. Линн. Сист.)

Признаки рода. Чаша 2-лисцевая, опадывающая; венчик морыльковый, закрытый, со шпорцом; тычинки 2, каждая с 3 пыльниками; плоды односеменные.

Признаки породы. Д. аптекарская, стебель разветвистый; бобы односеменные почковидные; листья многосложные. Моск. Фл. спр. 355.

F. officinalis, caule erecto ramoso, foliis tricompositis pinnatis, foliolis multifidis, basi cuneiformibus, drupis subglobosis retusis. Hayne. B. V. N 4.

Дымница аптечная, земляной дымъ, Чистякъ, полевая Рута, Кокорышъ, Дымянка. Руск. лѣт. травн. Ч. 1. спр. 218. Дымница аптечная, Щел. врачеб. Ч. 1. спр. 132.

По Нѣм. Gemeines Erdrauch; по Фр. Fumeterre; по Англ. Fumitory; по Ит. Fumaria officinale.

Растет по пашнямъ, огородамъ, полямъ по всей почве Россіи.

Цвѣтет въ Іюнѣ, Іюль, и Августѣ, а сѣмена созреваютъ въ Іюль и Августѣ. ☺.

Корень со многими мочками; стебель сплющій, вѣтвистый, 4-спиронный, вышиною отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{5}{4}$ аршина; листья поперемѣнны, прикрашено-крылатые; листочки 2-или 3-раздѣльные; цветы въ видѣ кистей верхушечныхъ и промежуточныхъ: прицвѣтники ланцетовидные, острыве, не длиннѣе ножки; ташетка 2-лисцевая, опадывающая; венчикъ морыльково-закрытый, со шпорцомъ, розово-пурпуровый: флагъ или верхняя губа при основаніи имѣетъ короткій закрытенный шпорецъ, нижняя или дно, подобна верхней, но безъ шпорца, крылья кончиками сходящія и закрывающія зѣвъ; тычинокъ двѣ, кожистыхъ,

раздѣленныхъ на верхушкѣ на три части, на каждой изъ которыхъ лежитъ по одному пыльнику; завязь продолговато-круглая, рыльце на столбикѣ о трехъ шупыхъ зубчикахъ; бобъ односѣменный не раскрывающійся; сѣмя нѣсколько сжатое.

Въ лѣкарства употребляется *трава* (*Herba Fumariae*), которую надо собирать въ то время, какъ начнутъ показываться первые цветы. Свѣжая трава запаху не имѣетъ, а вкусъ нѣсколько пропивный, горьковатый; причисляется къ лѣкарствамъ горькимъ, и даетъ въ слабости желудка, желчной рвотѣ, желтухѣ, въ брюшныхъ завалахъ; даютъ въ видѣ настоеки, а также и выжатый изъ травы сокъ. Изъ нее приготовляютъ *экстрактъ* (*Extractum fumariae*). Она входитъ въ составъ пропивуцинготиновыхъ соковъ и *противуцинготныхъ наборовъ* (*Species antiscorbuticae*).

Она даетъ желтую краску для шерстяныхъ матерій, а въ соединеніи съ вайдою, синюю.

Изображеніе рисунка.

Фиг. 1.) цветокъ (увелич.); 2) онъ же вдоль разрѣзанный (увелич.); 3) тычинка; 4) пыльникъ средний (увелич.); 5) лестникъ (увелич.); 6) рыльце (увелич.); 7) бобъ созрѣлый; 8) онъ же увеличенный и 9) разрѣзанный поперечно, а 10) вдоль.



РОМАШКА ОБЫКНОВЕННАЯ.

Matricaria Chamomilla. Linn.

(Кл. XIX. Syngenesia. ПОР. II. Superflua, Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. полушаровидная съ чешуйками, наподобие черепицъ одна другую покрывающими; ложе голое коническое; сѣмяна безъ хохолковъ.

Призн. породы. Р. обыкновенная; листья голые крылатые: крыльшки узенькие цѣльные и разрѣзные (почти щетиновидные), лучевые цвѣты распросперты горизонтально; чашечная чешуйка плоскія. Моск. Фл. спр. 42б.

M. Chamomilla, receptaculo cavo conico, foliis subpinnatifidis, laciniis linearibus. Hayne. B. I. N. 3.

Маточница ромашка. Щегл. врачеб. Ч. I. спр. 189.

По Нѣм. Gemeine Chamille; по Фр. Camomille ordinaire; по Англ. Fine leaved Feverfew; по Ит. Matricaria Chamomilla.

Ростетъ по всей почти Россіи, наиболѣе по пашнямъ.

Цвѣтетъ съ Іюня по Августъ мѣсяцъ, а сѣмяна созрѣваютъ въ Іюль, Августъ и даже въ Сентябрь. ☽.

Корень мочковатый; стебель очень вѣтвистый, вышина въ $\frac{1}{4}$ арш. и выше; листья сидячіе, поперемѣнны; нижніе двуперистые, а верхніе перистые съ разрѣзами узенькими; цвѣты сложные, въ срединѣ желтые, а крайніе бѣлые; сидячіе поодинакѣ на концахъ вѣтвей; тащетка полушаровидная съ узенькими, почти наподобие черепицы одна другую покрывающими чешуйками зелеными; вѣнчикъ сложной: внутренніе вѣч. прубчатые двуполые о 5 разрѣзахъ, лучевые женскіе, продолговатые узенькие; тычинокъ у цвѣтовъ двуполыхъ по 5, еросящихся пыль-

никами въ трубку; *засязь* у двуполыхъ цвѣтковъ продолговатая съ двумя на сполбикѣ *рыльцами*, которые дѣлаются примѣшными въ то время, когда уже плодотворная пыль изъ пыльниковъ высыпается; у женскихъ цвѣтовъ *рыльца* закривленныя; *сѣмѧ* продолговатыя безъ хохолковъ; *ложе* голое, коническое, внутри пустое.

Въ лѣкарства употребляются *цвѣты* (*Flores Chamomillae vulgaris*), которыхъ запахъ не очень пріятель и вкусъ нѣсколько горекъ. Они имѣютъ силу полигонную, утишающую судороги, помогающую пищеваренію; даютъ ихъ въ видѣ настоекъ, въ перемежающихся лихорадкахъ, въ коликахъ опѣ вѣтровъ, въ слабости желудка; снаружи прикладываясь ихъ для разбиванія разныхъ опухолей.

Въ аптекахъ пріуготовляютъ изъ нихъ *екстрактъ*, *сиропъ*, *воду*, *эфирное и вареное масла* (*Extractum, Syrupus, Aqua, Oleum aethereum et coctum Chamomillae vulgaris*).

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) двуперистый листъ опѣ нижней части сшебля; 2) га-
шетка съ ложемъ (увелич.); 3) опаже съ ложемъ разрѣзанный
вдоль; 4) двуполый цвѣтокъ (увелич.); 5) тычинки двуполаго
цвѣтка (увелич.); 6) пестикъ двуполаго цвѣтка (увелич.); 7)
женскій цвѣтокъ (увелич.); 8) сѣмѧ двуполаго цвѣтка (увелич.);
9) оно же поперечно разрѣзанное.



КИРКАЗОНЪ ВЬЮЩІЙСЯ.

Aristolochia Clematitis. Linn.

(Кл. XX Gynandria. ПОР. II. Hexandria. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. нѣпъ; вѣнчикъ 1 - лепестинный, трубчатый, оканчивающійся кругловатымъ язычкомъ; пыльники приросли къ столбикамъ подъ рыльцами; мак. подъ чашечкою о 6 сиворкахъ и 6 гнѣздахъ; сѣмя плоское съ сѣменною крышечкою.

Призн. породы. К. вьющійся; стебель стоячій; листья кругловато - сердцевидные, черешковые; у вѣнчика губа продолговатая. Моск. Фл. спр. 446.

A. Clematitis, caule plerumque simplici erecto, foliis longe petiolatis subtriangulari-cordatis obtusis vel emarginatis, floribus pedunculatis aggregatis, corollis erectis, labio oblongo. Hayne. B. IX. N. 24.

Кокорникъ или Кирказонъ; Шиковникъ; Пхиновникъ; Смольникъ. Руск. лѣт. травн. Ч. I. спр. 333.

По Нѣм. Gemeine Osterluze; по Фр. Aristolochie clematite; по Анг. Climbing Birthwort; по Ит. Aristolochia clematite.

Ростетъ по лѣсамъ и рощамъ около канавъ и по полямъ по всей южной и умѣренной Россіи.

Цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Іюль. 2.

Корень ползучій, колѣнчатый, толщиною въ гусиное перо, различнымъ образомъ изгибающійся, темножелтоватый; стебель стоячій, круглый, голый, вышиною отъ $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$ арш. и выше; листья по-перемѣнно - сидящіе, на длинныхъ черешкахъ трехугольно сердцевидные, голые, снизу бѣловато - зеленые; цвѣты выходятъ въ промежуткахъ листьевъ на ножкахъ, отъ 3 до 8 вмѣстѣ; ташетки нѣтъ; вѣнчикъ 1 - лепестинный, трубчатый, темножелтый, оканчивающійся кругловатымъ язычкомъ; тычинокъ нѣпъ, а пыльниковъ 6, приросшихъ попарно къ столбiku подъ рыльцемъ; завязь нижняя (т. е. подъ

вѣнчикомъ) б - спорония, съ б приростками, ры-
лец б, плоскихъ, трехугольныхъ, изъ которыхъ
каждое срослось съ основаниемъ наружной стороны
сказанного приростка; маковка грушевидная, б-гнезд-
ная о б спворкахъ; сѣмянѣ много, плоскихъ, трех-
угольныхъ, каштанового цвѣту.

Въ лѣкарствѣ употребляется корень (*Radix Aristolochiae vulgaris s. tenuis*), имѣющій крѣпкій непріят-
ный запахъ, похожій почти на канфарный, и вкусъ
острый, горькій. Дають въ порошкѣ и въ отварѣ
отъ чахомки и кроваваго кашля, остановки мѣсяч-
ныхъ кровей, маточныхъ судорожныхъ припадковъ,
подагры, ломоты. Снаружи присыпаютъ порошкомъ
всякія застарѣлые раны.

Пчелы берутъ изъ цвѣтовъ сей шравы медъ; ко-
новалы употребляютъ кирказонъ для лѣченія лошадей;
полезна она такжѣ въ заразѣ рогатаго скопа.

Ізъясненіе рисунка.

Фиг. I) цветокъ, у котораго язычекъ вѣнчика совсѣмъ, а трубка вдоль до половины опиная, чтобы можно видѣть пыльники и
рыльца; 2) завязь перерѣзанная поперечно (увелич.); 3) столбикъ съ пыльниками и рыльцами (увелич.); 4) пыльникъ одинъ (увелич.); 5) маковка, начинаяющая раскрываться; 6) она же до
раскрытия поперечно разрѣзанная; 7) сѣмя, покрытое еще кры-
шечкою и 8) поперечно разрѣзанное; 9) оно же безъ крышечки, 10)
поперечно а 11) вдоль разрѣзанное.



ОСОКА ПЕСОЧНАЯ.

Carex arenaria, LINN.

(Кл. XXI. Monoecia. ПОР. III. Triandria. Линн. Сист.)

Призн. рода. Мужеск. цв. Чаш. 1 - пленчатая, 1 - цветная; колоски черепицевидные; венч. нетъ.

Женск. цв. Чаш. 1 - пленч., 1 - цветни.; колоски черепицевидные; венч. 1 - пленчатой при отверстии съ 2 зубчиками; съмля (орехъ) покрыто оставшимся венчикомъ.

Призн. породы. О. песочная; соломина 3-сторонняя; колосье сложный, содержащий цветы съ тычинками и пестиками, колоски попеременные густые: нижние изъ нихъ женские, а верхние мужские, средние же на верхушкѣ мужские, рылецъ два; плоды яйцевидные сжатые съ двумя зубчиками, крылатые волосисто - зазубренные.

C. arenaria, culmo triquetro, spica androgyna composita, spiculis alternis confertis, inferioribus femineis, superioribus masculis, intermediis apice masculis, stigmatibus binis, fructibus ovatis compressis bidentatis alatis ciliato serratis. Hayne. B. V.
N. 7.

Осока песочная, или Нѣмецкая Сарсанарель; Песчанка права, Руск. лѣтеб. травы. Ч. I. спр. 655.

По Нѣм. Sand Segge; по Фран. Carex des Sables; по Англ. The sea carex; по Ит. Carice arenaria.

Ростетъ по всей почве Россіи по пескамъ, и по песчанымъ берегамъ рекъ.

Цвететъ въ Маѣ, а съмля поспѣваютъ въ Юнь.

Корень ползучій, колѣнчатый, чешуйчатый, вѣтвистый съ мочками у колѣнцовъ; соломина сплющая или нѣсколько наклоненная, трехугольная, бороздчатая, по угламъ, особенно вверху осипрая, внизу покрыта чешуйками, вышиною въ $\frac{1}{2}$ арш. и выше; листья густые, различнымъ образомъ изогну-

тые, узенькие, острые, голые, часто длиннее соломин; цветы образуют колоски черепицеобразные, сидящие на верхушке соломины и составляющие колос: нижние колоски женские, средние внизу женские, а вверху мужские, верхние мужские; прицветники яйцевидно-ланцетообразные, при основании колосков, нижние 3 или 4, длинее колосков; у мужских цветков гашетка 1 - пленчатая, 1 - цветная, яйцевидно-ланцетообразная, коричневая с зеленою по средине жилкою; вентика непр.; тычинок три недлиннее чашечки; у женского цветка чашечка такая же какъ и у мужского; венчик 1-лепестный, несколько сжатый, яйцевидно-продолговатый, при отверстии с 2 зубчиками; завязь кругловатая несколько сжатая, рыльца на столбиках волосоподобныя, изгибистыя; орех кругловатый, сжатый, окруженный оставшимся засохшимъ вѣничкомъ, имѣющимъ два крыла волосисто-зазубренныя; ствоя одно.

Въ лѣкарства употребляется корень осоки (*Radix Caricis arenariae s. graminis majoris s. graminis rubri*), собираемый весною, когда листья начнутъ выходить изъ земли. Свѣжий корень пахнетъ почти какъ перепонинъ, вкусъ же имѣетъ сладковатый балзамическая; производилъ исперику и гонитъ мочу. Подобно сарсапарели даютъ его въ отварахъ отъ простудной ломоты, заваловъ во внутренностяхъ, также въ болѣзняхъ венерическихъ. Въ аптекахъ идешъ сей корень въ наборѣ кровоостанительный (*Species lignorum*).

Осока сія полезна для удержанія сыпучихъ песковъ.

Излѣченіе рисунка.

Фиг. 1) перерѣзанный корень (увелич.); 2) соломина перерѣзанная (увелич.); 3) мужской цветокъ (увелич.); 4) пленка ошъ женского цветка; 5) венчикъ ошъ него же, съ рыльцами пестика (увелич.); 6) зрѣлый плодъ съ оставшимся вѣничкомъ, который въ ф. 7) представленъ попечечно разрѣзаннымъ; 8) орехъ безъ вѣничка (увелич.); 9) онъ же попечечно перерѣзанный.



ПЛАУНЪ АПТЕКАРСКІЙ.

Lycopodium clavatum. LINN.

(Кл. XXV. Cryptogamia. ПОР. II. Muscі. Линн. Сист.)

Призн. рода. Коробочки въ промежуткахъ листьевъ или чешуйкахъ колосковъ, почковидныя, 1-гнѣздныя, 2-створчатыя; сѣміна чрезвычайно малыя въ видѣ пыли и въ чрезвычайномъ количествѣ.

Призн. по роды. П. аптекарскій, стебель ползучій, вѣтви поднимающіяся вверхъ; листья разсѣянные, безжильные, заостренные, наклоненно-щепинноносные; колоски почки парные, цилиндрические на ножкахъ, чешуйки яйцевидныя, заостренные неровно-зубчатыя.

L. clavatum, caule repente, ramis adscendentibus, foliis sparsis confertis enerviis incurvato-setigeris, spicis subgeminatis cylindricis pedunculatis, squamis ovatis acuminatis setigeris erosodenticulatis. Hayne. B. VIII. N. 47.

Плаунъ булавастый, Щегл. врачебн. Ч. I. стр. 187.

По Нѣм. Gemeine Bärlappe; по Фр. Pied de loup, по Англ. Common club-moss; по Ит. Lycopodi clavato.

Ростетъ по лѣснымъ мѣстамъ по всей Россіи; пыль появляется въ Іюлѣ и Августѣ. ♀.

Корень низкообразный съ мочками; стебель лежачій, вѣтвистый, просирающійся въ длину иногда аршина на два и болѣе, вѣтви также ползучія; листья густые разсѣянные, узенькие, заостренные и оканчивающіеся щепинкою: стебельные отклоняющіеся отъ стебля, однорядные и будучи размаштруиваемы посредствомъ микроскопа, щепинисто-зубчатые по краямъ, вѣтвистые безъ порядку сидящіе, нижніе, чрезъ увеличительное стекло кажутся зазубренно-зубчатыми, а верхніе цѣльными; коробочки сидячія въ промежуткахъ чешуекъ, желтые, 1-гнѣздныя, двустворчатыя; они образующіе колоски, сославляю-

щіе колосъ, опадающійся опь стебля длинною ножкою, круглой, съ чешуйками черепицевидными, оканчивающимися щепинкою, и по краямъ неправильно зазубренными. Ножка, поддерживающая плодъ, прямая чешуйчатая; пыль чрезвычайно мѣлкая желтоватая въ большомъ количествѣ.

Въ аптекахъ держать сю съменную пыль подъ именемъ *сѣмянъ плауновыхъ* или *мутки*. (*Farina Lycopodii, Pulvis, Semen, Sulphur Lycopodii, Sulphur vegetabile*); ее собираютъ въ Августѣ или Сентябрѣ, отрѣзывая колоски, которые попомъ сушатъ въ печи и пыль выпрясаютъ. Въ аптекахъ употребляется она для обсыпки пилоль, и снаружи присыпаютъ ею перепрѣлый мѣсто у дѣтей и ранки.

Надлежало бы изслѣдывать, заслуживающій ли вниманія разсказы многихъ людей, что пыль сія, принятая внутрь въ проспомъ винѣ, слабитъ и притомъ безъ всякой боли и рѣзу? въ такомъ случаѣ плаунъ былъ бы очень полезное и дешевое домашнее лѣкарство.

Въ шеапрахъ употребляется для произведенія искусственной молнии. Сія права красина въ синій цвѣтъ шерстяная, опущенную попомъ въ отваръ Бразильского сандала.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) и 2) листья изъ нижнихъ вѣтвей; 3) чешуйка пыль ножки плода; 4) чешуйка колоса съ раскрывшемся коробочкою (увелич.); 5) щетинка кисти (увелич.); 6) и 7) лычинки лыни, увеличенные разнымъ образомъ.



СКАБИОЗА ЛУГОВАЯ.

Scabiosa succisa. LINN.

(Кл. IV. Tetrandria. ПОР. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Признаки рода. Чаша общая многолистная, та-
стная двойная; венчик воронкообразный; ложе голое
или щепшинистое.

Признаки породы. С. луговая, венчики ровные;
стебель не очень въпивистый; листья стебельные
зубчатые, коренные цельные; цветы почти шаро-
видные. Моск. Фл. спр. 82.

S. succisa, caule adscendente, foliis radicalibus obovatis vel
oblongis utrinque attenuatis, caulinis oblongo-lanceolatis vel
lanceolatis utrinque attenuatis, floribus subglobosis, corollulis
quadrifidis, receptaculo paleaceo. Hayne. B. V. N. 37.

Трава сія называется въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
и *Одышкою травою* и *Дьявольскимъ укушениемъ*.

По Нѣм. Sumpf-scabiose; по Фран. Scabieuse succi-
se, по Анг. Devil's-bit scabious, по Ит. Scabiosa succisa.

Ростетъ по всей Россіи по лугамъ, влажнымъ
насажденіямъ, около лѣсовъ и проч.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августъ, а сѣмена созре-
ваютъ въ Августъ. 2.

Корень тупоконечный и какъ бы опкушенный;
стебель сплющій, круглый, вышиною въ $\frac{1}{2}$ арш. и выше,
съ пропилюположными вѣнчиками; листья черешковые:
коренные шуплые, продолговатые, стебельные
пропилюположные, ланцетовидные, цельные или съ
рѣдкими по краямъ зубчиками; цветы собраны въ
видѣ полушара на верхушкѣ стебля и вѣнчей; та-
шетка общая многолистная, и заключаетъ множе-
ство вѣнчиковъ съ ихъ гастными ташетками; вѣн-
чики 1-лепестные, трубчатые, о 4 неровныхъ раз-
рѣзахъ, цвету голубаго, лиловаго и красноватаго;
тычинокъ 4, длины вѣнчика; завязь продолговато-
яицевидная подъ вѣнчикомъ въ общей чашечкѣ, риль-
це на сполбикѣ шаровидное; сѣмена яицевидно-

продолговатыя съ частною чашечкою на верху; ложе пленчатое.

Въ лѣкарства употребляются *трава* и *корень* скабіозы (Radix et Herba Succisae s. morsus Diaboli), не имѣющіе запаху особенного, вкусъ же горьковатый, нѣсколько вяжущій. Прежде приписывали сей травы множествомъ лѣкарственныхъ силъ пропиву глиставъ, Антиона огня, водяной болѣзни; но теперь пропиву сихъ болѣзней есть лучшія лѣкарства; однажды надобно умѣть различать ее и потому, что иногда корень ея выкапываютъ и употребляютъ вмѣсто *мауинаго*, отъ котораго впрочемъ онъ легко отличается неимѣніемъ вовсе никакаго запаху.

Скопина охотно єстъ сю праву и пчелы изъ цвѣтковъ берутъ медъ. Отваръ ея полезенъ для лошадей, когда у нихъ на копытахъ будуть раны. Цвѣты даютъ зеленую краску для шерсти и льну, а сѣмяна желтую. Корни, по вяжущему своему свойству, могутъ употребляться для выдѣлки кожъ.

Изъ спасибо рисунка.

Фиг. 1) цветокъ; 2) листикъ (увелич.); 3) листикъ безъ вѣнчика и половины наружной чашечки, чтобы можно было видѣть завязь подъ частною чашечкою (увелич.); 4) растение (увелич.); 5) сѣмя съ общую и частную чашечками; 6) оно же увеличено; 7) оно же безъ чашечки и 8) вдоль, а 9) поперечно разрѣзанное; 10) ложе.



П А Д У Б Ъ.

Ilex aquifolium. LINN.

(Кл. IV. Tetrandria. ПОР. IV. Tetragynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. о 4 зубчикахъ; вѣнц. плоский о 4 разрѣзахъ; столбика нѣшь; ягода 4-сѣмянная.

Призн. породы. П. *обыкновенный*, листья кожистые всегда зеленѣющи, яицевидные и продолговатые, выемчатые, волнистые, блестящіе: разрѣзы ихъ большею частію колючіе; цвѣты въ промежуткахъ листьевъ выходяще кучами.

I. aquifolium, foliis coriaceis sempervirentibus ovatis oblongis vel sinuatis undatis nitidis, lobis spinescentibus, floribus axillaribus subumbellatis. Hayne B. VIII. N. 25.

По Нѣм. Stechpalme, gemeine Hülsem; по Фр. Ноух commun; по Англ. The holly; по Ит. Ilice aquifolio.

Ростетъ въ южныхъ мѣстахъ Европы; въ Россійскомъ Государствѣ въ Грузіи.

Цвѣтетъ въ Маѣ, а сѣмёна созрѣваютъ въ Іюль. ѣ.

Корень деревянистый, съ горизонтальными вѣшнями; стебель кустарный отъ 2 до 6 аршинъ вышиною, или деревянистый отъ 10 аршинъ до 20 вышины, и въ поперечникѣ около полуаршина, покрытый шемносѣрою корою; листья черешковые, противуположные, кожистые, всегда зеленѣющіеся, яицевидные и продолговатые колючіе, сверху блестящіе; цвѣты на ножкахъ, собраны кучами почки въ видѣ зонтика; ташетка 1-листная, о 4 разрѣзахъ; вѣнчикъ 1-листный, о 4 разрѣзахъ, плоский, бѣлый; тычинокъ 4, выходящихъ изъ вѣнчика, копораго онъ короче; завязь кругловата, столбика нѣшь, рылецъ 4 шупыхъ; ягода шаровидная, 4-гнѣздная, алаго цвѣту, съ слѣдомъ рыльца на верхушкѣ; сѣмѧ одно, трехугольное.

Примѣт. Падубы попадаються съ цвѣтами двуполыми, и мужскими и женскими особо, но рѣдко на одномъ спѣблѣ вмѣстѣ, а большею частію сіи разнополые цвѣты примѣщаются на разныхъ стволахъ.

Въ лѣкарства употребляются листья падуба (*Folia Aquifolii s. agrifolii s. Ilicis aquifolii*); они безъ запаху, но вкусъ имѣютъ горьковатый вяжущій. Дають ихъ въ видѣ отвара въ болѣзняхъ ломотныхъ, въ подагрѣ, а особливо для сдѣланія соспавовъ гибкими; похваляютъ также ихъ и въ перемежающихся лихорадкахъ, слабости желудка, коликѣ и рѣзахъ; ягоды похваляются въ падучей болѣзни.

Изъ коры падуба доспиваютъ клей для ловли птицъ; цветы даютъ медъ пчеламъ, а твердое и пяжелое бѣлаго цвету дерево употребляется для дѣланія математическихъ инструментовъ, шокарями и рѣзчиками.

И з з л с и е н i е р и с у н к а .

Фиг. 1) цветокъ; 2) онъ же безъ вѣнчика и тычинокъ; 3) лгода разрѣзанная поперечно; 4) сѣмя; 5) оно же перерѣзанное поперечко, а 6) вдоль.



БУЗИНА ЧЕРНАЯ.

Sambucus nigra. LINN.

(Кл. V. Pentandria. ПОР. III. Trigynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. о 5 разрѣзахъ; вѣнт. о 5 разрѣзахъ; завязь подъ чашечкою; ягода 3-сѣмянная.

Призн. породы. Б. терная, спбель деревянистый; полуузонники пятираздѣльные. Моск. Фл. спр. 168.

S. nigra, trunko arboreo, stipulis subsubulatis, cymis quinquepartitis. Hayne. В. IV. N. 16.

Бузина черная, или деревянистая, Боръ дерево. Рук. лѣт. травн. Ч. I. спр. 116. Щеглова врачеб. спр. 156.

По Нѣм. Gemeiner Hollunder; по Фр. Sureau commun; по Анг. Common Elder; по Ит. Sambuco nero.

Ростет по лѣсамъ и около заборовъ въ Крыму, по Кавказу и въ другихъ мѣстахъ южной Россіи; по садамъ же встрѣчается вездѣ въ Россіи умѣренной, а опчастии и въ холодной.

Цвѣтет въ Маѣ, ягоды поспѣваютъ въ Августѣ. лѣт.

Корень деревянистый; стволъ прямый, вѣшви-
стый, покрытый свѣплосѣрою распрескавшееся ко-
рою, вышиною въ сажень и выше; вѣшви на немъ про-
тивуположные; листья промивуположные, крыла-
тые, голые: листочки черешковые яицевидные зазуб-
ренные; цвѣты образуютъ пятираздѣльные гусимые
полузонники; ташетка 1-лисичная 5-раздѣльная; вѣн-
тикъ 1-лепестный, плоскій о 5 разрѣзахъ, бѣлый;
тычинокъ 5, съ желтыми пыльниками; завязь подъ
чашечкою, рылецъ 3 тупыхъ безъ столбика; ягода
круглая чернаго цвѣту, 1-гнѣздная; сѣмянѣ три,
продолговато - яицевидныхъ.

Въ лѣкарства употребляются внутренняя кор-
ка, листья, цвѣты, ягоды и сѣмяна бузины (*Cortex*
Sambuci interior, *folia*, *flores*, *baccae et semen*). Все распѣ-

ніе издаєшъ пропивный запахъ. Вкусъ внутренней корки горьковашъ и приторенъ, а ягодъ пріянно-кислый. Срединая корка похваляется въ водяной болѣзни и опекахъ ногъ; она имѣетъ силу слабительную и рвотную; цветы (сухие) производятъ попѣ и уменьшаютъ молоко въ грудяхъ; имѣютъ также силу разбивающую: ихъ пьютъ наподобіе чаю въ легкихъ проспудныхъ болѣзняхъ, въ насморкахъ, спрятавшихся накожныхъ сыпяхъ; снаружи прикладываютъ ихъ для размягченія и разбиванія опухолей; пріуготовляютъ также изъ нихъ и воду (aqua florum Sambuci). Ягоды имѣютъ силу пологонипельную и даютъся въ водяныхъ опухоляхъ, и пріуготовляемый изъ нихъ кисель (Roob sambuci) имѣетъ свойства пологонипельные; листья слабятъ и производятъ рвоту, а снаружи прикладываемые въ видѣ капаплазмы разбиваютъ разныя опухоли.

Дерево бузинныхъ спарыхъ споловъ твердое и крѣпкое годится для разныхъ подѣлокъ сполярамъ и покарямъ; молодые вѣтви для чубуковъ и цѣвокъ; сердцевина для дѣланія игрушекъ и украшеній; цветы даютъ пчеламъ медъ; а будучи наспояны съ винограднымъ виномъ сообщаютъ ему мушкатный вкусъ; ягоды, подверженныя броженію, доспавляютъ винный спиртъ; съ примѣсью желѣзного купороса красятъ хлопчатую бумагу и шелкъ въ черный цветъ, а съ квасцами въ синій; съ квасцами и уксусомъ доспавляютъ синія чернилы; ими же подкрашиваютъ красныя вина. Вообще всѣ части сего кустарника имѣютъ красильные свойства; листья прогоняютъ гусеницъ.

Разводимся сей кустарникъ легко посредствомъ кореньевъ и отводковъ.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) цветокъ (увелич.) 2) гашетка съ пестикомъ; 3) вѣнчикъ (увелич.); 4) тычинка (увелич.); 5) ягода; 6) она же разрѣзанная поперечно, а 7) вдоль (увелич.); 8) стволъ; 9) она же увеличенное; 10) перерѣзанное поперечно, а 11) вдоль.



ДЯГИЛЬ САДОВЫЙ.

Angelica Archangelica. LINN.

(КЛ. V. Pentandria. ПОР. II. Digynia. Линн. Сист.)

Признаки рода. Външ. ровные; лепестки цѣльные, загнутое внутрь; плодъ углостный, плопинный съ столбиками, назадъ опклонившимися.

Признаки породы. Д. садовый, листья двусложные: листочки яицевидно-ланцетообразные, зазубренные, непарный листъ прилопастный. Моск. Фл. стр. 159.

A. *Archangelica*, pinnulis lateralibus integris bilobis que, terminalibus trilobis.. Hayne B. VII. N. 8.

Дягиль аптечный или дягильникъ, Коровникъ и Коровошникъ. Русск. лѣт. травы. Ч. I. спр. 223. Дягиль аптечный, Щегловъ. вратеб. Ч. I. спр. 67.

По Нѣм. Garten - Angelik; по Фр. Angelique officinale; по Англ. Angelica; по Итл. Angelica Arcangelica.

Ростетъ по лѣсистымъ и гористымъ мѣстамъ по всей Россіи и въ Сибири.

Цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ, а єѣмляна созреваютъ въ Августѣ и Сентябрѣ. ♂.

Корень перпендикулярный: въ первый годъ почти конусомъ, а на другой годъ дѣлается какъ бы опукшеннымъ, толщиною до трехъ пальцевъ, снаружи каштанового цвѣту, а внутри бѣлаго съ узенькими перегородочками; стебель стоячій, бороздчатый, голый, внизу пурпурового цвѣту, высотою отъ 1½ до 2 аршинъ; листья голые: коренные проесложные и двусложные крылатые, стебельные попреремѣнныe, нижніе и верхніе большею частию двусложно-крылатые, а самые верхніе только тройные; листочки яицевидно-ланцетные, острые, неровно зазубренные, боковые двудольные, а верхушечный всегда 5-дольный; общій терешокъ при основаніи широкій, обхватывающій стебель; цвѣты составляютъ зонтики на верхушкѣ стебля и вѣтвей; общій зонтикъ почки шаровидный, частные полушаровидные,

всѣ плодоносныя; общая обвертка 1 - листная, спадывающая, гастнья многолистная; ташетка о 5 зубчикахъ; вѣнчикъ 5 - лепестный: лепестки ровные, съ кончикомъ внутрь загнувшимся, цвѣту желтова-таго; тычинокъ 5, длиннѣе вѣнчика; завязь подъ чашечкою, кругловатая, столбиковъ 2, съ рыльца-ми простыми, шупыми; плодъ эллиптическій съ крылушкиами по краямъ; сѣмянка съ тремя острый-ми ребрышками почки крылатыми, лопинки борозд-чатыя; сѣмянѣ 2 продолговато-янцовидныхъ, сжатыхъ.

Въ лѣкарствѣ употребляются корень, трава и сѣмяна (*Radix, herba et fructus Angelicae*). Корень имѣеть запахъ пріятный, вкусъ острый, горячи-тельный; права и сѣмяна тяжелы же на вкусъ и запахъ, но слабѣе. Корень надобно собирать рано весною; онъ имѣеть свойство возбуждающее, слиногон-ное, вѣтрогонное и постгонное, укрѣпляющее желу-докъ. Даютъ въ порошкѣ и наподобіе чая въ слабо-сти желудка, вѣтряной коликѣ, параличѣ, проспуд-ныхъ лихорадкахъ, заспарѣломъ кашль и проч. Сѣ-мяна имѣютъ тѣ же силы, но въ меньшей степени.

Теплымъ отваромъ корня лѣчапъ шейныя боли-чки у лошадей и даютъ корень рогатому скоту для предохраненія его отъ заразы. — Дягильные спебли въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ъдятъ сырье и варятъ какъ спаржу. Въ аптекахъ держатъ пинктуру, масло, воду и спиртъ дягильные (*Tinctura, oleum, aqua et spiritus Angelicae*).

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) цветокъ; 2) листикъ (увелич.); 3) сѣмяна, раздѣленыя на две половины; 4) они же увеличены; 5) сѣмянка вдоль, а 6) по-перечно разрѣзанная и сильно увеличенная для показанія внутренне-аго строенія сѣмени; 7) разрѣзъ сѣмени еще больше увели-ченный.



БОЛИГОЛОВЪ ОМЕГЪ.

C onium maculatum. LINN.

(Кл. V. Pentandria. ПОР. II. Digynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. *Общая обвертка* спадывающая, частная односсторонняя 3-лиспная; лепестки почкировные; плодъ шаровидно-яицевидный съ ребрышками сжатыми, которыя передъ созрѣніемъ дѣлающіяся круглозубчатыми.

Призн. породы. Б. омегъ, корень веретеновидный; стебель очень вѣтвистый, гладкій съ пяпнами; семяна спруйчатыя; листья многосложные. Моск. Фл. спр. 154.

C. maculatum, glabrum, caule fistuloso laeviter striato, foliolis oblongis dentatis, petiolis teretibus, subcarinatis fistulosis, seminibus costatis. Hayne. В. I. N. 31.

Омегъ пестрый, или болиголовъ большой, Головоломъ, Мушникъ, Вяха, Вонючка, Дехтярка. Руск. лѣт. травн. Ч. I. спр. 625. Омегъ пестрый или из-пяпнанный. Щеглов. врачеб. Ч. II. спр. II.

По Нѣм. Gefleckter Schierling; по Фр. Cigue ordinaire; по Анг. Common Hemlock; по Ит. Conio macchiato.

Ростетъ по огородамъ, лугамъ, около дорогъ, заборовъ, по пустырямъ по всей Россіи, а так же и въ Сибири до рѣки Тобола.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августъ, а сѣмяна созрѣвающія въ Августъ и Сентябрь. ♂.

Корень коническій; стебель сплющій, спруйчатый, голый съ пурпуровыми крапинами, опъ 1 до 2 арш. вышины; вѣтви рѣдко имѣющія крапины; листья голые: нижніе многосложные, поперемѣнныe, верхніе двухкратно-крылапые, пропивуположные, листочки продолговатые зубчатые; цветы образующія на верху стеблей и въ промежуткахъ вѣтвей сложные зонтики, нѣсколько выпуклые: общая обвертка 5-лиспная спадывающая, частная 3-лиспная повислая; ташетка съ 5 зубчиками едва примѣнными; вѣнчикъ 5-лепесточный: лепестки почки-

ровные, круглые; завязь подъ чашечкою почки яйцевидная, столбиковъ 2, рильца тупыя; плодъ шаровидно-яйцевидный со сжатыми ребрышками, (пока не созрѣюлъ, круглозубчатыми), раздѣляющейся на двѣ половины; стмѧнѣ 2, съ одной стороны выпуклыхъ, а съ другой почки плоскихъ, прикрѣпленныхъ каждое особою ножкою. —

Въ лѣкарства употребляются листья (*Herba Conii maculati s. Cicutae maculatae s. Cicutae majoris Stoerkii*). Запахъ травы, которую надо бно собирашь въ Іюнь мѣсяцѣ, передъ шѣмъ временемъ какъ ей цвѣсть, не-пріятный, похожій на кошечью мочу; вкусъ острый, горкій, приторный. Листья ея собравши и высушивши надо бно шточашь сполоскъ въ порошокъ и беречь въ стеклянныхъ банкахъ, хорошо закупорен-ныхъ. Она принадлежитъ къ одуряющимъ ядови-тымъ расplenіямъ; однако же даютъ ее съ пользою въ запвердѣніяхъ железъ, ракѣ и другихъ злокачествен-ныхъ болѣчкахъ, въ подагре, желтухѣ, Англійской болѣзни у дѣтей, коклюшѣ, водяной болѣзни, въ за-спарѣлой головной боли, въ заспарѣлой венерической ломотѣ и проч.

Въ аптекахъ пріготовляющъ сгущенныи сокъ или экстрактъ (*Extractum conii s. cicutae majoris*), со-ставную катаплазму (*Cataplasma cicutae compositum*); пластирь (*Emplastrum conii s. cicutae*), который при-кладывающъ снаружи къ скиррознымъ запвердѣло-стямъ, раку и проч.

Трава сія овцамъ, козамъ и коровамъ не вредитъ, но лошадямъ причиняетъ головокруженіе. Коновалы даютъ ее лошадямъ отъ мышку и запвердѣлости же-лезъ.

Изъясненіе рисуника.

Фиг. 1) цветокъ; 2) несозрѣлый плодъ (увелич.); 3) зрѣлый плодъ; 4) онъ же увеличенный; 5) стмѧ, перерѣзанное поперечно, а 6) вдоль и увеличенное.



ГРЕЧИХА ГОРЛЕЦЪ.

Polygonum Bistorta. LINN.

(КЛ. VIII. Octandria. ПОР. III. Trigynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. нѣпъ; вѣнц. 5-раздѣльный, чашечковидный (по мнѣнию же другикъ вѣнц. нѣпъ; а чаш. покрашенная); сѣмя 1, прехугольное или сжатое.

Призн. рода. Г. горлецъ, стебель проспой съ однимъ колоскомъ; листья яицевидные: коренные по черешку нисходящіе. Моск. Фр. спр. 206.

P. Bistorta, caule simplici, foliis radicalibus petiolo decurrentibus, racemo subspicato terminali. Hayne. B. V. N. 19.

Горецъ аппетчный, Сердечный корень, Змѣевикъ, Ужовникъ, Песникъ, Горлецъ. Руск. лѣт. травн. Ч. I. стр. 162. Горецъ аппетчной. Щеглов. Ч. I. стр. 56.

По Нѣм. Wiesen - Knöterig; по Фр. Bistorte; по Анг. Snax Weed; по Ит. Poligono Bistorta.

Ростетъ по всей Россіи и Сибири по влажнымъ мѣстамъ и лугамъ гористымъ.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюль, а сѣміна поспѣвають въ Іюль и Августъ. 2.

Корень червеобразный, нѣсколько сжатый, кольчатый; стебель простой, стоячій, круглый, голый, вышиною отъ $\frac{1}{2}$ до $1\frac{1}{4}$ арш.; листья голые, волнистые, цѣльные: коренные длинные, нисходящіе по стеблю, яицевидные или ланцетовидные, стебельные сидячіе поперемѣнныe, яицевидно-ланцетовидные, при основаніи съ бороздчатыми влагалищами; цвѣты сидячіе въ видѣ кистеобразнаго колоса, который только и бываетъ на стебль большею частію одинъ; та-шетки нѣпъ; вѣнчикъ похожъ на чашечку, пятираздѣльный, темно-пурпуровый; тычинокъ 8, (рѣдко 7, 9 или 10); нижнія пять длиннѣе остальныхъ, и длиннѣе даже самаго вѣнчика; завязь продолговатая, прехугольная, столбиковъ 3, рыльца шаровидныя; сѣмя 1, голое, прехугольное, покрывающееся только засохлымъ вѣнчикомъ. +

Въ лѣкарства употребляется корень (*Radix Bistortae*), который собирается весною. Онъ не имѣетъ никакаго запаху, но вкусъ крѣпкій вяжущій; а посему и употребляется какъ сильное вяжущее средство въ хроническихъ печеніяхъ поносовъ, бѣлей, кровей, и проч.; дается въ порошкѣ и въ видѣ опвара; съ горчанкою похваляется и въ перемежающихся лихорадкахъ; въ видѣ полосканья употребляется для укрепленія зубовъ и проч.

Тунгусы, Оспяки и другіе Сибирскіе народы варятъ толстые и мучнистые кореня и ёдятъ, собираютъ и на зиму; въ другихъ же мѣстахъ примѣшиваютъ къ ржаной муцѣ. Скопина, кромѣ лошадей, єсть праву охотно; пчелы берутъ изъ цвѣтовъ медъ. Корень годится для дубленія кожъ, пріуготовленія черниль и черной краски.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) цветокъ; 2) листикъ; 3) онъ же увеличенный; 4) лылникъ съ передней стороны, и 5) съ задней (увелич.); 6) зрѣлое стмл; 7) оно же увеличенное; 8) стмл голое, безъ вѣничка; 9) оно же увеличенное и 10) попечечно, а 11) вдоль разрѣзанное.



КЛЮКВА КРАСНАЯ.

Oxycoccus palustris. Person.

(Кл. VIII. Octandria. Пор. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Признаки рода. Чаш. о 4 разрезахъ; вѣнц. 4-лепестный, лепестки заворотились назадъ; тычинки выходятъ изъ вѣнчика; завязь подъ чашечкою; ягода многогнѣздная, многостѣмянная.

Признаки породы. К. красная, стебли ползучие, тоненькие, голые; листья яйцевидные. Моск. Фл. спр. 202.

O. palustris, caule filiformi glabro repente, foliis subcordato-ovatis margine revolutis. Hayne. В. IV. N. 18.

Vaccinium oxycoccus. Linn. Schollera oxycoccus. Roth.

Клюква, Журавлина, Журавика. Руск. лѣт. травы. Ч. I. спр. 325.

По Нѣм. Moosbeere; по Фр. Airelle Canneberge; по Англ. The Cranberry; по Ит. Ossicocco.

Растетъ въ сѣверной части Россіи и Сибири по мшистымъ торфянымъ болотамъ.

Цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ, а плоды поспѣваютъ осенью. ю.

Корень деревянистый со многими мочками, стебель деревянистый, тоненький, ползучий, вѣшникъ голый, каштанового цвета, вышиною около $\frac{1}{4}$ арш.; листья маленькие, поперемѣнныe, черешковые, кожистые; почки сердцевидно-лицеобразные, цѣльные, съ заворотившимися краями, съисподи блѣдно-зеленые; цветы выходятъ на длинныхъ ножкахъ изъ верхушки стебля, иногда отдельно, а иногда по нѣсколько вмѣстѣ, ножки пурпурового цвета; ташетка 1-листовая о 4 разрезахъ, пурпурового цвета; вѣнчикъ 4-лепестный свѣтлопокрасный: лепестки узенькие, тупые, разцвѣтиши совершенно, заворачиваются назадъ; тычинокъ 8, прикрепленныхъ къ вѣнчику, пыльники трубчатые; завязь подъ чашечкою, синяя, длиною 1/2 дычинокъ, рильце тупое; ягода круглая, красная многогнѣздная, съмято 4 лицеобразныхъ.

Въ лѣкарства употребляются ягоды (Vacciae Oxy-cocci). Онѣ очень кислы, но когда промерзнутъ, то дѣлаются не столь кислы, а попомъ довольно пріятны; ихъ собираютъ послѣ первыхъ морозовъ. Онѣ полезны въ цынгѣ, горячкахъ желчныхъ и гнильныхъ, воспалительныхъ лихорадкахъ и проч.; ибо онѣ имѣютъ прохладительное свойство, подобное лимонной кислотѣ. Ягоды ёдяпъ съ сахаромъ или медомъ и пьюпъ выжатый сокъ, примѣщиваемый къ водѣ, ячному ошвару и проч.

Въ аптекахъ пріуготовляются *клюковный* медъ (Mel oxycocci), *клюковный* кисель (Roob oxycocci), *клюковный* сокъ съ селитрою (Succus oxycocci cum nitrate potassi).

Сокомъ сихъ ягодъ чистяпъ серебро, и дѣлаютъ изъ него *клюковный* квасъ, постилу и проч.

И зъл си е ніе р и с у и к а .

Фиг. 1. Цвѣтокъ съ однимъ только лепесткомъ и двумя тычинками (увелич.); 2) лепестокъ (увелич.); 3) тычинки съ наружной стороны (увелич.); 4) онѣ же съ внутренней стороны (увелич.); 5) ягода, перерѣзанная попечечно; 6) стмл; 7) оно же увеличенное; 8) стмл перерѣзанное попечечно, а 9) вдоль.



БАГУЛЬНИКЪ БОЛОТНЫЙ.

Ledum palustre. LINN.

(Кл. X. Decandria. ПОР. I. Monogynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. 5 - раздѣльная; вѣнг. 5 - лепесточный плоский; мак. 5 - гнѣздная, у основания распределяющаяся.

Призн. породы. Б. болотный, листья узенькие съ завороченными краями, съисподи пушистые. Моск. Фл. спр. 217.

L. palustre, foliis lanceolato-linearibus marginе revolutis subtus ferrugineo-tomentosis. Hayne. В. III. N. 21.

Багульникъ Багульникъ, Клоповникъ, Руск. лѣтеб. травн. Ч. I. спр. 83. Багульникъ болотный. Щеглов. вратебн. Ч. II. спр. 100.

По Нѣм. Sumpf-Porst.; по Фр. Ledon des marais; по Анг. Marsh-Ledum.

Ростетъ по болотамъ и мокрымъ лѣсистымъ мѣстамъ вездѣ въ умѣренной и Сѣверной части Россіи и Сибири.

Цвѣтетъ въ Маѣ и Юнѣ, а плоды поспѣваютъ въ Августѣ. І.

Корень деревянистый; стебель кустарный, красновато-сѣрою корою покрытый, выпинаю около аршина и даже до $1\frac{3}{4}$ арш.; листья кожистые, всегда зеленѣющіеся, узкие, ланцетовидные, у которыхъ края заворотились назадъ, и нижняя поверхность пушистая ржавчинного цвѣту; цвѣты сидятъ на длинныхъ ножкахъ кучами, во время цвѣшенія споятъ прямо, а попомъ повисаютъ внизъ; ташетка 1-листочная, 5 - раздѣльная; вѣнчикъ 5 - лепесточный, белый; тычинокъ 10, длиною съ вѣничекъ; завязь кругловатая, столбикъ длиною съ тычинки, рѣзьце пупное, почти 5 - лопастное; маковка продолговатая, 5 - гнѣздная, 5 - спворчатая, опкрывающаяся при основаніи; сѣмянѣ много продолговато-круглыхъ.

Въ лѣкарства употребляются листья сего кустарника (Herba Rosmarini sylvestris s. Ledi palustris);

скусъ ихъ горьковатъ и вяжущъ, а запахъ весною
только не непріятенъ, въ другое же время пропив-
ный; имъ приписываютъ силу одуряющую, полигон-
ную, мочегонительную, кровоостанавлильную. Даютъ
отваръ ихъ въ коклюшъ, кровавомъ поносѣ, ломотѣ
костей, въ чесоткѣ, шелудяжъ и для испребленія
внѣшней; въ послѣднихъ случаяхъ употребляется багуль-
никъ снаружи.

Можно употреблять листы сего куспарника и
для выдѣлки кожъ.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) нижная поверхность листа, поперечно перерѣзанного (увелич.); 2) гашетка; 3) лестникъ; 4) тычинки и лестникъ (увелич.); 5) лестникъ съ рыльцемъ (увелич.); 6) маковка; 7) она же перерѣзанная поперечно (увелич.); 8) она же раскрышая (увелич.); 9) она же съ одною только спиралью и юбками, гдѣ прикрѣпляющаяся стѣнка (увелич.); 10) стѣнконосецъ съ стѣнками (увелич.); 11) стѣнка (увелич.); 12) оно же поперечно разрѣзанное (увелич.).



КИСЛИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ.

Oxalis acetosella. LINN.

(Кл. X. Decandria. ПОР. V. Pentagynia. Линн. Сист.

Призн. рода. Чаш. 5-листная; вѣнт. 5-лепестный, тычинки неровные, основаниями сросшиеся; лист. 5-дольная, 5-гнѣздная, раскрывающаяся на углахъ.

Призн. породы. *K. обыкновенная*, спрѣлка однолиствѣнная, длиннѣе листьевъ; листья пройные. Моск. Фл. спр. 234.

O. acetosella, scapo unifloro, foliis ternatis longiore, foliolis obcordatis, stylis stamina longiora superantibus, radice repente. Hayne. B. V. N. 39.

Кислица щавельная, Оробинецъ, Заячій щавель, Кислецъ цвѣтущій. Руск. лѣт. травн. Ч.—1. спр. 312.

По Нѣм. Gemeiner Sauerklee; по Фр. Oxalide Oseille; по Англ. Common Wood-sorrel; по Ит. Ossalide acetosella.

Ростетъ по лѣсамъ и кустарникамъ по всей почти Россіи и Сибири.

Цвѣтетъ въ Апрѣлѣ и Маѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Іюлѣ. 2.

Корень ползучій, колѣнчатый, покрытый чешуйками; спрѣлка сплющая, тоненькая: длиннѣе листьевъ, усаженная мѣлкими волосками; листья коренные на длинныхъ черешкахъ, пройные: листочки превратно - сердцевидные, усаженные по краямъ чрезвычайно мѣлкими волосками, съисподи иногда красноватые; цвѣты выходящіе поодинаково на верхушкѣ спрѣлки; ташетка 5-листная; вѣнчикъ 5-лепестный, бѣловатый съ пурпуровыми жилками; тычинокъ 10, основаниями своими сосшавляющіхъ трубку, изъ числа которыхъ 5 короче 5-ти другихъ; завязь продолговато-яицевидная, сплющенная; матка яицевидная, 5-сторонняя, 5-гнѣздная, распространяющаяся на углахъ; сѣмянѣ много яицевидныхъ нѣсколько сжатыхъ, красноватыхъ.

Въ лѣкарствѣ употребляется *трава* (*Herba Acetosellae*) свѣжая кислая, а высохши теряющая сей вкусъ. Она полезна какъ прохладжающее средство въ горячкахъ; полченые листья прикладываются снаружи къ золотушнымъ и другимъ злокачественнымъ язвамъ, особенно же сокъ кислицы полезенъ въ разныхъ воспалительныхъ болѣзняхъ. Пріуготовляемая изъ сей травы соль (*Sal acetosellae*) кромѣ того, что употребляется какъ прохладительное, служитъ еще для выведения чернильныхъ пятенъ изъ линялыхъ, суконныхъ и шелковыхъ матерій; листья можно употреблять какъ салатъ и щавель.

Траву сюю ъспѣвъ всякая скотина, кроме лошадей; пчелы берутъ изъ цвѣтовъ ея мѣдь.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) Лепестки сросшіеся основаниями; 2) тычинки сросшіеся основаниями (увелич.); 3) пыльникъ (увелич.); 4) лѣстикъ (увелич.); 5) маковка; 6) она же поперечно перерѣзанная (увелич.); 7) расстеснущая маковка, изъ коей выходить стѣнка (увелич.); 8) она же разрѣзанная поперечно (увелич.); 9) стѣна въ своей оболочкѣ; 10) она же увеличенное; 11) она же безъ оболочки; 12) она же вдоль, а 13) поперечно разрѣзанное (увелич.).



РЕПЕЙНИКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ.

Agrimonia Eupatoria. LINN.

(Кл. XI. Dodecandra. ПОР. II. Dyginia.. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. 5-раздѣльная, а другая наружная 2-листная; вѣнц. 5-лепестный; орѣхъ 1-гнѣздный, 2-сѣмянnyй, покрытый закорюченными щепинками.

Призн. породы. Р. обыкновенныи, стебельные листья крылатые, плоды щепинистые. Моск. Фл. стр. 288.

A. *Eupatoria*, fructibus hispidis, foliis caulinis pinnatis, foliolis oblongo-ovatis, spicis elongatis, floribus remotis, petalis calyce duplo longioribus. Hayne. B. 11. N. 19.

Репейникъ обыкновенныи. Щеглов. вратебн. Ч. I. стр. 134.

По Нѣм. Gemeiner Odermannig; по Фр. Agrimoine; по Англ. Agrimony; по Ит. Agrimona Eupatoria.

Ростетъ по всей Россіи и Сибири по лугамъ, дорогамъ, въ лѣсахъ, около заборовъ.

Цвѣтетъ въ Іюнѣ, Іюль и Августѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Іюль, Августѣ и Сентябрѣ. 2.

Корень перпендикулярный съ мочками; стебель стоячій, круглый, мохнатый, вышиною около 1 арш. и выше; листья неровно-крылатые: листотки продолговато-яицевидные, зазубренные, мохнатые, парные сидячіе, непарные черешковые; цвѣты образующъ родъ длинныхъ колосьевъ; гашетка 1-листная, 5-раздѣльная, окруженнная другою двулисистною; вѣнчикъ 5-лепестный желтый; тычинокъ отъ 10 до 20, выходящихъ изъ чашечки и короче вѣнчика, пыльники сжатые; завязь погруженная въ чашечку, столбиковъ два, рильца тупыя; орѣхъ 1-гнѣздный, 2-сѣмянnyй, закорюченными щепинками покрытый, составляющійся изъ отвердѣвшей чашечки; сѣмянѣ 2 продолговато-яицевидныя, съ одной стороны плоскія, а съ другой выпуклые,

Въ лѣкарства употребляется трава (Herba Agrimoniae), которой листья, особенно коренные, собираются весною. Запахъ свѣжей травы слабо-пряный, вкусъ горьковатый, нѣсколько вяжущій. Дають ее въ порошкѣ или въ видѣ отвара въ болѣзняхъ печени и селезенки, кровотеченіяхъ, долговременныхъ испеченіяхъ мокротъ, и какъ полоскательное въ воспаленіи миндалевыхъ железъ.

Цвѣты доставляютъ пчеламъ медъ, а листья съ цвѣтами, еще не распустившимися, даютъ весьма хорошую желтую краску для шерстии, подготавленной висмутомъ. Распеніе сіе годится и для дубленія кожъ.

Изълспеніе рисуика.

(Fig. 1) Чашечка; 2) лелестокъ; 3) чашечка съ тычинками; 4) пыльникъ (увелич.); 5) плодотворная пыль а) на воздухѣ, б) на водѣ чрезъ увеличеніе скло видимая; 6) лептицы, кошораго завяза окружена чашечкою (увелич.); 7) ненастоящій орѣхъ; 8) онъ же перерѣзанный попечечно, а 9) вдоль (увелич.); 10) стил; 11) онъ же перерѣзанное попечечно и увеличеніе.



СТАРОДУБКА ВЕСЕННЯЯ.

Adonis vernalis. LINN.

(Кл. XIII. Polyandria. ПОР. VI. Polygynia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. 5 - листная; лепестковъ 6 и больше, безъ медовыхъ сосудцевъ; плодовъ много, собранныхъ въ видѣ головки.

Призн. породы. С. весенняя, лепестковъ отъ 12 до 16; плоды яицевидные, стебель нѣсколько мохнатый.

A. vernalis, flore dodecapetalо vel hexdecapetalо, fructu ovato, caule pilosiusculo. Hayne. B. II. N. II.

По Нѣм. Frühlings-Adonis; по Фр. Adonide printaniere; по Ит. Adone vernale.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи называется желтоцвѣтомъ.

Ростетъ въ южной Россіи, а отчасти и въ Сибири по Тоболу и Иртышу, по мѣстамъ холмистымъ.

Цвѣтетъ въ Апрѣль и Маѣ, а сѣмяна созреваютъ въ Іюнѣ и Іюль. ♀.

Корень спержневый; вѣнчикъ пурпурный, со многими мочками; стебель проспиртый, сплющій, большою частью одноцвѣтный, нѣсколько мохнатый, при основаніи покрытый чешуйками, вышиною отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ арш.; листья: нижніе дланевидно - многораздѣльные; верхніе перисто - раздѣльные, очень узенькие, длинные; цвѣты большие на верхушкѣ стеблей; гашетка 5 - листная; вѣнчикъ изъ 12 — 16 лепестковъ продолговатыхъ, на кончикѣ съ зубчиками, желтовато-losняющихся; тычинокъ очень много; завязей много, въ видѣ головки собранныхъ, столбики очень короткие, рыльца острые; плоды кожистые, слабкіе съ опушкой столбика на верху, и собраны въ видѣ головки; сѣмя одно кругловатое; ложе цвѣтное продолговато - яицевидное, а плодовое почки призматическое.

Корень сейправы подъ именемъ Radix Hellebori Hippocratis, употребляется въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

въ лѣкарства; ему приписываютъ свойство сильно слабить, и счишаютъ полезнымъ въ водяныхъ болѣзняхъ и накожныхъ сыпяхъ, а также и въ оспа-новкѣ мѣсячныхъ кровей. Корень сей оспръ, горекъ и не рѣдко его смѣшиваютъ съ корнями *Геллебора* (*Helleborus niger et viridis*), съ копорыми онъ имѣетъ весьма большое сходство какъ въ силахъ такъ и въ наружномъ видѣ; при употреблении его должно наблюдать осторожность.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи, какъ на пр. въ Губерніяхъ Казанской и Пензенской, трава сія доставляется желтую краску, копорую извлекаютъ, варя ее въ квасу.

Изображеніе рисунка.

Фиг. 1. 2. 5. 4) разрѣзъ корневыхъ мочекъ (увелич.); 5) листъ съ нижней части стебля; 6) онъ же съ верхней части стебля; 7) ложе цветка съ тычинками и пестиками, разрѣзанное; 8) тычинка (увеличенная); 9) лестникъ увеличенъ; 10) зрѣлый плодъ; 11) ложе съ нѣсколькими плодами; 12) плодъ (увелич.); 13) онъ же съ лежащимъ въ немъ сѣмечкомъ разрѣзанъ вдоль, а 14) по-перечно.



МАИОРАНЪ.

Origanium Maiorana. LINN.

(КЛ. XIV. Didynamia. ПОР. I. Gymnospermia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чашетный зѣбѣз закрыть волосками, подъ чашечкою прилипшникъ больше ее; вѣнт. 2-губый, верхняя губа стоячая, плоская, нижняя о трехъ разрѣзахъ. Цѣѣты собраны въ видѣ 4-спиронняго колоса.

Призн. породы. Душица маюранѣ, листья черешковые превратно - овальные и яицевидные тупые, нѣсколько пушистые; колоски четырехсторонние кругловатые, большою частію по три вмѣстѣ и на ножкахъ; прицвѣтники кругловатые тупые, нѣсколько пушистые.

O. Maiorana, foliis petiolatis ovalibus ob-ovatis que obtusis laeviter pubescentibus, spicis tetragono - subrotundis subternato - compactis petiolatis, bracteis subrotundo - spiculatis obtusis, laeviter pubescentibus. Hayne. B. VIII. N. 9.

Маюранъ, Душица садовая. Руск. лѣтеб. травн. ч. I. стр. 491.

По Нѣм. Maioran-Dosten; по Фр. Marjolaine; по Анг. Sweet Marjoram; по Ит. Majorana.

Въ Россіи не ростетъ дикимиѣ, но разводится въ садахъ южной и умѣренной ея части; цѣѣтъ лѣтомъ, а сѣянна поспѣваютъ осенью. 2.

Корень перпендикулярный; стебель стоячій, вѣтвистый, голый, вышиною отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ аршина; листья пропивуположные, овальные или превратно-яицевидные, тупые, цѣльные, мицисные; цѣѣты сидячіе, представляющіе четвероугольно - кругловатые коротенькие колосья, большою частію по три вмѣстѣ соединенные; прицвѣтники продолговатые, длиннѣе чашечки, мицисные; ташетка, 1-лиспная, мѣлко-мицисная; вѣнчикъ 1-лепестный, двугубый, бѣлый: верхняя губа стоячая съ выемкою, нижняя 3-раздѣльная, средній разрѣзъ съ выемкою; тычинокъ 4, изъ которыхъ 2 короче другихъ 2; завязь 4-раздѣльная, стол-

бикѣ длиннѣе тычинокъ, рѣзьце двураздѣльное; сѣмилѣтіи 4, лежащихъ въ чашечкѣ безъ особой оболочки.

Въ лѣкарства употребляется трава (*Herba Majoranae s. Sampsuchi*), имѣющая запахъ благовонный, пріятный, вкусъ пряный, горковатый. Даютъ ее пить вместо чаю въ заспарѣлой проспудѣ, нервныхъ головныхъ и макочныхъ припадкахъ, головокруженіи и проч. Спершага въ порошокъ употребляется для произведенія чиханія; прикладывается также снаружи какъ опухоли разбивающее средство.

Въ аптекахъ держатъ маоранное масло (*oleum majoranae*).

Изълѣспеніе рисунка.

Фиг. 1) Нижній прицѣтникъ; 2) цветокъ съ прицѣтникомъ (увелич.); 3) гашетка (увелич.); 4) она же разрѣзанная (увелич.); 5) стѣнникъ разрѣзанный (увелич.); 6) сѣмѧ; 7) она же увеличенное и 8) поперечно разрѣзанное.



ЗМЪЕГОЛОВНИКЪ МОЛДАВСКІЙ.

Dracocephalum Moldavica. LINN.

(Кл. XIV. Didynamia. ПОР. I. Gymnospermia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаш. о 5 зубчикахъ или 2-губая; вѣнчикъ двугубый: зѣбъ одуплый, верхняя губа выпуклая.

Приз. породы. Р. Молдавскій, листья продолговатые и ланцетовидные зазубренные, съисподи съ почками: зазубрины неровныя, нижня большею частию съ щепинками; цвѣты кольчатые, прицвѣтники ланцетовидные щепинисто-зазубренные.

D. Moldavica, foliis oblongis lanceolatis que grosse serratis subtus punctatis, serraturis inaequalibus, infimis plerumque setiferis, floribus verticillatis, bracteis lanceolatis setoso-serratis. Hayne. B. VIII. N. 32.

Змѣеголовникъ Молдавскій или Турецкая мелисса Рук. лѣт. травн. Ч. 1. стр. 258.

По Нѣм. Türkischer Drachenkopf; по Фр. Dracocephale de Moldavie; по Ит. Dracocephalo Moldavico.

Ростетъ въ Бессарабской области, въ Подольской губерніи, по Уралу и въ умѣренной части Сибири.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августъ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Августъ и Сентябрь. ◎.

Корень перпендикулярый; стебель стоячій 4-угольный, вышиною отъ $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$ арш; листья пропивуложные, черешковые, голые: стебельные продолговатые зазубренные, вѣтвенные ланцетовидные неровно-зазубренные; цвѣты образуютъ колыца о 4 и 6 цвѣткахъ, прицвѣтники ланцетовидные щепинисто-зубчатые; ташетка 1-лиспная, 2-губая, о 5 бороздкахъ и зубчикахъ; вѣнчикъ 1-лиспный, двугубый, голубый и бѣлый: труботка короче чашечки, зѣбъ одуплый, верхняя губа выпуклая, нижня о 3 разрѣзахъ; медовой сосудецъ — железка о 5 зубчикахъ подъ завязью; тычинокъ 4, изъ которыхъ 2 короче другихъ 2; завязей 4, продолговатыхъ, столбикъ длин-

нѣе вѣнчика, рѣмѣце 2-раздѣльное; сѣмѧнѣ 4, на днѣ чашечки, яицевидныхъ, почки 4-стороннихъ.

Въ лѣкарства употребляется *трава* (Herba Melissae Turcicae); запахъ ея благовонный, вкусъ ароматической пріятный; пьющъ ее въ видѣ чаю отъ головной боли, трепетанія сердца, желудочныхъ спазмовъ, въ проспудной ломотѣ. Снаружи въ видѣ припарки она помогаетъ въ ногтоѣдѣ.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) Цвѣтокъ; 2) гашечка (увелич.); 3) цвѣтокъ разрѣзанный вдоль и увеличенный; 4) и 5) четыре залѣзи, съ разлыхъ сторонъ видимыя (увелич.); 6) гашечка съ врѣльми въ ней сѣмѧнами; 7) сѣмѧни, въ чашечкѣ лежащи; 8) сѣмѧ 1 раздѣльно; 9) сѣмѧ съ паружной спорокой (увелич.); 10) оно же съ виупренной спорокой (увелич.); 11) оно же разрѣзанное попечечно, а 12) вдоль (увелич.).



ЖАБРЕЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ.

Antirrhinum Linaria. Linn.

(Кл. XIV. Didynamia. ПОР. II. Angiospermia. Линн. Сист.)

Призн. рода. Вѣнц. закрытый съ выдавшимся внизу мѣдникомъ (въ видѣ шпорца или горбика); мак. 2 - гнѣздная.

Призн. породы. Ж. обыкновенный, листья ланцетовидные, узенькие, густые, стебель прямостоячій; цвѣти. колосья на верху стебля сидячіе, цвѣты настельные; чашечки голыя, короче шпорца. Моск. Фл. спр. 318.

Linaria vulgaris, caule erecto, foliis sparsis confertis lanceolati-linearibus, racemis subspicatis terminalibus imbricatis. Hayne. B. VI. N. 53.

Ленъ дикой, Льняной жабрей, Малой жабрей, Львиныя уста, Льнянка. Руск. лѣт. травн. Ч. I. спр. 418.

По Нѣм. Gemeiner Frauen-Flasch; по Фр. Linaire commune; по Анг. Common Toadflax; по Ит. Linaria.

Ростетъ по спѣнамъ, заборамъ, дорогамъ, пашнямъ по всей Россіи и Сибири.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августѣ, а сѣмяна созрѣваютъ въ Августѣ и Сентябрѣ. 2.

Корень изгибистый, вѣтвистый; стебель споячій, круглый, голый, вышиною около $\frac{1}{2}$ арш. и выше; листья густые, сидячіе, узенькие, ланцетовидные, цѣльные; цвѣты собраны въ видѣ кисти на верхушкѣ стебля; ташетка 1 - листовая 5 - раздѣльная; вѣнчикъ 1 - лепестковый, закрытый, съ шпорцомъ, блѣдно-желтый: верхняя губа 2 - раздѣльная съ завороченными краями, нижняя 3 - раздѣльная, зѣбъ 2-лонгипастный, изъ-желта - красноватаго цвѣта; медовой сосудецъ соскошитъ изъ шупаго шпорца, продолговано-кеглевиднаго, выходящаго изъ основанія вѣнчики; тычинокъ 4, изъ которыхъ двѣ длинище другихъ двухъ, тычиники сердцевидные; завязь кругловатая,

столбикъ длиною равенъ тычинкамъ, *рыльце* шуплое; *маковка* продолговатая, 2-гнѣздная, открывающаяся въ верхушкѣ 7 зубчиками; *сѣмѧнѣ* много кругловато-лицевидныхъ сжатыхъ.

Въ лѣкарствѣ употребляются *трава* и *цвѣты* (*Herba et flores Linariae*); *запахъ* свѣжей травы нѣсколько прошивный, и *вкусъ* непріятный горьковатый; ей приписываютъ силы мягчишельныя уполяющія боль, мочегонныя и слабишельныя; ее даютъ въ видѣ наливки въ желтухѣ, запорѣ мочи, а снаружи прикладываютъ какъ припарку къ воспалительнымъ геморроидальнымъ шишкамъ. Въ аптекахъ изъ соку ея пріуготовляютъ *мазь* (*Unguentum de Linaria*).

Пчелы берутъ изъ цвѣтовъ ея медъ; а мухи на нихъ умираютъ, почему въ Швеціи спавяютъ сю траву въ горшкахъ на окошкахъ, или цвѣты ея кладутъ въ молоко для отправы мухъ. Она даетъ темнооливковую краску.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) Чашечка; 2) вѣнчикъ съ боку; 3) вѣнчикъ безъ нижней губы, чѣмъ бы виды были тычинки и пестрикъ; 4) нижняя губа; 5) лысьникъ (увелич.); 6) рильце (увелич.); 7) маковка; 8) она же раскрывшаяся; 9) она же увеличенная; 10) она же поперечно, а 11) вдоль разрѣзанная (увелич.); 12) сѣмѧ; 13) оно же увеличенное, 14) оно же поперечно, а 15) вдоль разрѣзанное.



ХРЕНЬ ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА.

Cochlearia officinalis. LINN.

(КЛ. XV. Tetrady namia. ПОР. I. Siliculosa. Линн. Сист.)

Призн. рода. *Стругатекъ* морщиноватый, сердцевидный, спворки шупыя выпуклые; *перегородка* поперечная.

Призн. породы. Хр. ложечная трава, коренные листья кругловатые, сердцевидные, стебельные продолговатые съ выемками почки непримѣтными, при основаніи спрѣловидные.

C. officinalis, foliis radicalibus subrotundis cordatis, caulinis oblongis subsinuatis, basi sagittatis. Hayne B. V. N. 28.

Ложечная трава, Ложечникъ, Варуха, Цынгомитная трава, Морской салашъ. Руск. лѣтн. трави. Ложечникъ аппечный Щеглов. вратеб. Ч. 1. стр. 157.

По Нѣм. Echtes Löffelkraut; по Фр. Herbe aux cuillers; по Англ. Scurvy grass; по Итл. Coclearia officinale.

Ростетъ по берегамъ воспочного Океана, въ Камчаткѣ и по оспровамъ; въ Россіи же разводятъ въ садахъ по влажнымъ мѣстамъ.

Цвѣтетъ въ Маѣ и Юнѣ, а сѣмена поспѣваютъ въ Юнѣ. ☺

Корень перпендикулярный; стебель угластый, вышиною отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ арш. и выше; листья мясистые, голые: корневые черешковые круглогушко-сердцевидные, стебельные поперемѣнныe, продолговатые, шупые, верхніе сидячіе спрѣловидные; цвѣмы образуютъ кисли, выходящія изъ верхушки стеблей; ташетка 4-лиспина; вѣнтикъ 4-лепестный, бѣлый; медовый со-судецъ составляютъ 4 железки, находящіяся при основаніи коропенькихъ тычинокъ; тыгинокъ 6, изъ копорыхъ двѣ короче другихъ четырехъ, равняющихся длиною чашечкѣ; завязь яицевидно-кругловатая, столбикъ цилиндрическій короткій, рильце шупое; стругатекъ яицевидно - кругловатый, съ выпуклыми

спворками и поперечною перегородкою; сѣмѧнѣ въ каждомъ гнѣздѣ по четыре.

Въ лѣкарства употребляется свѣжая трава (*Herba Cochleariae recens*), которая будучи расщеплена, издастъ особенный острый запахъ и имѣетъ солоноватый острый вкусъ. Свѣжая трава составляетъ весьма дѣйствительное лѣкарство возбуждающее и мочегонительное и прописывается особенно въ цынгѣ, но сверхъ этого и въ брюшныхъ завалахъ, водяной болѣзни, параличѣ, бѣляхъ, сыпяхъ; снаружи прикладываютъ свѣжую траву къ цынготнымъ ранамъ и какъ полоскательное употребляютъ въ цынготныхъ ранкахъ и опухоляхъ во рту. Сухая трава дѣйствія никакого не имѣетъ.

Въ аптекахъ пріуготовляютъ сокъ (*Succus cochleariae*), консерву (*Conserua cochleariae*), спиртъ (*Spiritus cochleariae*), воду и пинктуру.

Можно ёсть ее какъ салатъ.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) Цвѣтокъ (увелич.); 2) тычинки съ железками (увелич.); 3) зашерченный листочекъ (увелич.); 4) лепестокъ (увелич.); 5) зрѣлый стручочекъ; 6) онъ же, но опь кошораго 7) отдушенена одна спворка; 8) перегородка съ сѣмѧнами (увелич.); 9) сѣмѧ; 10) оно же увеличенное; 11) оно же перерѣзанное поперечно, а 12) вдоль.



ДРОКЪ КРАСИЛЬНЫЙ.

Genista tinctoria. LINN.

(КЛ. XVII. Diadelphia. ПОР. II. Decandria. Линн. Сист.).

Призн. род а. Чаш. двугубая: верхніе два разъза короче другихъ; флагб вѣнчика отъ тычинокъ и пестника отклоняется внизъ; бобб 1-гнѣздный, 1-сѣмянный.

Призн. породы. Д. красильный, листья ланцетовидные, голые; вѣтви круглые дорожчатые, прямо стоящія; бобы голые. Моск. Фл. стр. 356.

G. tinctoria, caule erecto, ramis patentibus teretibus striatis glabris, foliis lanceolatis glabris, laciniis calycinis subulato-acuminatis, leguminibus glabris. Hayne B. IX. N. II.

Дрокъ, Шильная трава, Руск лѣт. травн. Ч. I. стр. 200.

По Нѣм. Färbender Ginster; по Фр. Génêt der Teintres, по Ит. Ginestra tintoria.

Ростетъ по лѣсамъ и полямъ по всей почти Россіи и Сибири, выключая самыя холодныя мѣста.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августъ; а сѣмяна созрѣваютъ въ Августъ и Сентябрь. 5.

Корень вѣтвистый; стебель деревянистый, стоячій, около $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$ арш. и выше; листья поперемѣнныя, сидячіе, острѣе, цѣльные; цвѣты выходятъ изъ промежутковъ листьевъ, поодинакѣ, но довольно густо, такъ члопъ всѣ вмѣстѣ представляютъ кисть; ташетка 1-листная, двугубая, верхняя о 2, а нижняя о 3 зубчикахъ; вѣнчикъ 4-лепестный мотыльковый, желтый, флагб продолговатый, завороченный, крылья узкія, продолговатыя, короче флага, дно 1-листное, серповидное, длиннѣе крыльевъ; тычинокъ 10, всѣ сросшіяся основаніями; завязь продолговатая, столбикъ загнутый; бобб продолговатый, сжатый, усаженный маленькими колючками, 1-гнѣздный; сѣмяна яичевидно-кругловатыя.

Въ лѣкарства употребляются трава, цвѣты и сѣмяна (Herba, flores et semina Genistae), копорыя

запаху не имъютъ, а *скусъ* горьковатый. Дають опваръ сей травы въ водяной болѣзни, копораго также мочу гонить и слабитъ; *трава* найдена очень полезною отъ укушенія бѣшеною собакою.

Упоминаяется для крашения въ желтый цветъ; пчелы изъ цветовъ берутъ медъ и скопъ ѿспы траву охоплю.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) Флагъ юнчика; 2) и 3) крылья, 4) дно, у копораго одна половинка опрѣзана; 4 гашетка съ юнчиками и пестиками (увелич); 5) бобъ; 6) сѣмя; 7) оно же увеличенное; 8) оно же попечечно перерѣзанное, а 9) вдоль.*



ДОННИКЪ ВРАЧЕБНЫЙ.

Melilotus officinalis. WILD.

(КЛ. XVII. Diadelphia. ПОР. II. Decandria. Линн. Сист.)

Призн. рода. Чаша трубчатая съ 5 зубчиками; дно вѣнчика короче его флага и крыльевъ; бобы длиннѣе чашечки.

Призн. породы. Д. вратебный, бобы киспямы голые двусѣмянные, морщноватые, яицевидные, нѣсколько сжатые, осипрые; прилиспники осипрые, стебель стоячій. Моск. Фл. стр. 367.

Trifolium officinale LINN. leguminibus racemosis nudis dispermis subrugosis ovatis compressis acutis, stipulis subulatis, caulo erecto, foliolis subtruncatis serratis, interioribus obovatis, superioribus lanceolato-linearibus. Hayne. B. II. N. 31.

По Нѣм. Melilote; по Франц. Melilot; по Англ. Melilot trefoil; по Ит. Meliloto officinale.

Ростетъ по полямъ и кустарникамъ, около пашень, дорогъ, по всей почти Россіи и Сибири.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Августѣ и Сентябрѣ. ♂.

Корень перпендикулярный вѣтвистый; стебель стоячій, круглый, опь $\frac{1}{2}$ до $1\frac{1}{2}$ арш. вышиною; листья тройные: листочки голые зазубренные, почки усѣченные, нижніе обращено-яицевидные, а верхніе узенькие ланцетовидные; цвѣты собраны въ видѣ киспей; ташетка 1 - листная почки колокольчашая, о 5 зубчикахъ; вѣнчикъ 4 - листный, мопыльковый, желтый: флагъ съ выемкою, крылья длиною съ флагъ и основаниемъ срослися съ дномъ, которое нераздѣльно и длиною съ флагъ; тычинокъ 10: девять срослися вмѣстѣ а 1 свободная; завязь продолговата, столбикъ длиннѣе тычинокъ, рыльце прослое; бобъ яицевидный, сжатый, двуспирочатый; сѣмянъ обыкновенно два, кругловато-яицевидныхъ.

Въ лѣкарства употребляются трава и цвѣты (Herba et flores Meliloti); вкусъ травы горьковатый, а запахъ особенный, сильный, довольно пріятный, а

особливо высушенней. Внутрь рѣдко дається, а болѣе употребляется снаружи какъ средство очень мягчительное и разбивательное. Въ аптекахъ приготавляютъ мелилонный пластырь (Emplastrum de Meliloto).

Въ Швейцаріи употребляютъ его для подкрашиванія сыра въ зеленый цветъ; а табачные фабриканты кладутъ цветы въ никальный табакъ; въ Молдавіи употребляютъ ихъ для прогнанія моли. — Трава сія доставляетъ скоту очень хороший кормъ, а пчеламъ медъ.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) Чашечка съ тычинками и пестикомъ (увелич.); 2) флагъ (увелич.); 3) крыло; 4) крыло съ дномъ (увелич.); 5) лылокъ; 6) лестникъ съ завязью (увелич.); 7) бобъ; 8) оно же увеличенъ; 9) оно же по шву разрѣзанный; 10) стволъ; 11) оно же увеличенное; 12) оно же перерѣзанное попечечно, а 13) вдоль.



ЛАПУШНИКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ.

Arctium Lappa. Linn.

(Кл. XIX. Syngenesia. ПОР. I. Polygamia aequalis. Линн.
Сист.)

Призн. рода. *Ложе* пленчатое; *таш.* шаровидная, кончики чешуекъ загнуты въ видѣ крючка; *холокъ щепинисто - перистый.*

Призн. породы. *Л. обыкновенный*, чашечки шаровидныя голыя, цвѣты сидячіи поодинакѣ на верху стеблей. (*Arctium maius. Моск. Фл. спр. 401.*)

A. *Lappa*, calycibus glabris. *Hayne*, В. II. N. 35.

Лапушникъ обыкновенный, Репейникъ. *Щеглов. сратеб. Ч. I. спр. 58.*

По *Нѣм.* Gemeine Klette; по *Фр.* Bardanne a la grosse tete; по *Англ.* Common Bordock; по *Итл.* Arzio Lappa.

Ростетъ по всей Россіи и Сибири по пустырямъ, дорогамъ, около заборовъ, кустарниковъ.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Августѣ и Сентябрѣ. ♂.

Корень перпендикулярный, довольно толстый; стебель сплющій, вѣнцестый, вышиною отъ $\frac{3}{4}$ до $1\frac{1}{2}$ арш.; листья сердцевидно-яицевидные, весьма великие, зубчатые, на исподней сторонѣ мѣлко - мшистые; цветы сидячіи на верхушкѣ стеблей и въ промежуткахъ листьевъ наподобіе зонтика; *ташетка* шаровидная, чешуйки наспельныя, съ загнутымъ наподобіе крючка кончикомъ; *вѣнчики* 1 - лепесчинные трубчато - воронкообразные, блѣднокрасные; *тычинокъ* въ каждомъ вѣнчикѣ по 5, сросшихся своими голубыми пыльниками въ трубку, чрезъ которую проходитъ двураздѣльное рыльце пестика; завязь продолговатая; *сѣмяна* длинныя безъ покрова, хохолокъ на нихъ перисто - щепинистый; *ложе* пленчатое.

Теперь употребляются въ лѣкарства одни только корни лапушника (*Radix Bardanae*), а прежде употреблялись и листья и сѣмяна; корни должно выкапывать или весною рано, или осенью поздно; они сна-

ружи темнаго цвѣту, а внути при бѣлы, пахнутъ непріятно, а вкусъ имѣютъ сладковатый, склизистый. Корень сей составляеть хорошее кровочиспительное лѣкарство и даетя въ видѣ отвара въ сыпяхъ на кожѣ, въ подагрѣ и въ венерическихъ болѣзняхъ какъ и сассапарель, которму онъ равняется своими целебными силами, листья же прикладываются къ ранамъ и язвамъ на ногахъ.

Молодые стебли употребляются въ нѣкомпорыхъ спранахъ вмѣсто спаржи, которые варяшь и ѓдяшь какъ спаржу; а корни чахолнымъ овцамъ помогаютъ, буде ихъ примѣщаюшь въ кормъ; листья и спебли даюшь много поашу.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1. 1* чешуйки ошъ чашечки двухъ выродковъ лапушника 2. 2* щетинки изъ краевъ чешуйки двухъ выродковъ лапушника (увелич.); 3) вѣнчикъ (увелич.); 4) тычинки съ разрѣзанными вдоль пыльниками (увелич.); 5) ложе, разрѣзанное поперечно; 6) пленка ложа свѣжал, а 7) сухая (увелич.); 8) сѣмя; 9) оно же увеличенное; 10) оно же разрѣзанное поперечно, а 11) вдоль; 12) перистая щетинка хохолка (увелич.).



ЛАПУШНИКЪ МОХНАТЫЙ.

Arcium Bardana. Wild.

(Кл. XIX. Syngenesia. ПОР. II. Polygamia aequalis. Линн.
Сист.)

Признаки рода. *Ложе* пленчатое; *гаш.* шаровидная, чешуйки на кончикѣ загнулись въ видѣ крючка; *хохолокъ щетинисто* - *перистый*.

Признаки породы. *Л. мохнатый*, стебельные листья сердцевидные, черешковые цѣльные; чашечки шаровидныя, какъ бы паушиною перепушанныя. (*A. tomentosum. Моск. Фл. спр. 402*).

A. Bardana, calycibus arachnoideo-tomentosis. Hayne. В. II. N. 36. (A Lappa β. Linn.)

По Нѣм. Filzige Klette; по Фр. Bardane a tête cotonneuse; по Итл. Arzio Bardana.

Ростетъ по всей Россіи и Сибири по пустырямъ, дорогамъ, около заборовъ и пр.

Цвѣтетъ въ Іюль и Августѣ, а сѣмяна поспѣваютъ въ Сентябрѣ. ♂.

Сія порода совершенно во всѣхъ своихъ частяхъ похожа на *Л. обыкновенный*, и отличается отъ него тѣмъ, что 1) пушокъ на листьяхъ нѣсколько гуще; 2) чашечки покрыты какъ бы пауциными нитями, а не голыя; 3) трубочка у цвѣтковъ, состоящая изъ пыльниковъ, на кончикѣ имѣетъ шуплые а не острѣе зубчики; 4) у сѣмянъ хохолокъ нѣсколько короче. До Вилденова считали сію породу съ *Л. мохнатымъ* за одинъ только выродки, но Вилденовъ доказалъ, что оба сія расщепенія, будучи съяны нѣсколько разъ, въ сказанныхъ признакахъ ни мало не перемѣнились.

Въ лѣкарства употребляются корни и листья и подъ тѣмъ же именемъ (Folia et radix Bardanae), и въ тѣхъ же точно болѣзняхъ.

Изъясненіе рисунка.

Фиг. 1) Чешуйка чашечки (увелич.); 2) щетинка изъ краевъ чашечки (увелич.); 3) сѣмянка (увелич.); 4) тычинки съ пыльниками

ками, которые сросшавшися въ трубку, разрѣзанныя (увелич.); 5) ложе съ сѣмнами разрѣзанное перпендикулярно; 6) пленка изъ ложа въ свѣжемъ состояніи, а 7) въ сухомъ состояніи (увелич.); 8) сѣмля; 9) оно же увеличенное и 10) разрѣзанное попечечно, а 11) вдоль; 12) перистая щетинка изъ сѣмнаго хохолка (увелич.).



ПАРМЕЛІЯ СТѢННАЯ.

Parmelia Parietina. АСНАРД.

(Кл. XXIV. Cryptogamia. ПОР. III. Lichenes. Линн. Сист.)

Призн. рода. Щитки толстые или почти кожистые, сначала вдавленные, а напослѣдокъ почки плоские или выпуклые, иногда въ самой рострецъ вдавленные и едва изъ него выдающіеся, а иногда выше его поднимающіеся и какъ бы на ножкахъ — (Рострецъ очень различенъ какъ по существу своему, такъ и по виду).

Призн. породы. П. стѣнная, рострецъ перепончатый, сугубо - лопастный, кругловатый, вдавленный, настельный, изъ зелена - желтый, съисподи нѣсколько мочковатый: лопасти лучистыя, кругловатыя почки плоскія, доли лопастей кругловатыя круглозубчатыя; щипки ржавчинно - оранжевые съ цѣльнымъ краемъ.

P. parietina, thallo membranaceo duplicato - lobato orbiculato depresso imbricato virescenti - vitellino subtus subfibrilloso amiantino: lobis radiantibus subrotundis subplanis, lobulis rotundatis crenulatis; scutellis ferrugineis aurantiacis margine integro. Hayne. B. V. N. 47.

По Нѣм. Wandschildflechte; по Фр. Parmelie des parois; по Ит. *Parmelia parietina*.

Ростетъ по всей Россіи на стволахъ деревьевъ, деревянныхъ и каменныхъ стѣнахъ и кровляхъ.

Пармелія въ мокрое время бываетъ зеленоватаго цвѣта.

Галлеръ и Гуннеръ давно уже поросли сему приписывали свойства исцѣлять желтуху; въ недавнее же время Докторъ Зайдеръ замѣтилъ, что поросль сей въ цѣлебныхъ силахъ не только не уступаетъ хинѣ или лихорадочной коркѣ, но еще въ нѣкоторыхъ случаяхъ превосходитъ ее. Зайдеръ даетъ ее въ порошкѣ, въ пилиоляхъ и въ отварѣ; можно также пріуготовлять изъ пармеліи и вытяжку или экстрактъ. Она очень полезна въ пе-

ремежающихся и гнильыхъ лихорадкахъ, въ водяной, болѣзни головы, въ невареніи желудка, въ кровопеченьяхъ изъ малпки, коклюшѣ, золотухѣ, и проч.

Порослѣ сей надобно собирашь осенью въ сырую погоду и высушивъ на солнцѣ, очистишь отъ земли и другихъ постороннихъ приставшихъ къ нему шѣль, и беречь въ спеклянныхъ, хорошо закупоренныхъ банкахъ.

Изъясненіе рисунка.


Фиг. 1) Нѣкоторые щитки, сверху видимые; 2) одинъ изъ нихъ съ боку; обѣ фигуры увеличены; 3) кусочекъ, вырѣзанный изъ средины щитка и очень увеличенный; 4) та же часть, но болѣе увеличена, что бы можно было видѣть кутику сѣмянки, 5) тѣ же части, но еще болѣе увеличенныя. —





Аgravia лекарственная.

Gentianella officinalis. L.




Valeriana amurensis. *Valeriana officinalis. L.*



Baropiana Py.

Valeriana Phu. L.



Родотысячник обыкновенный. *Chironia Centaurium* L.



Барма водяной трехлистникъ.

Menyanthes trifoliata. L.



Борецъ Анисъ.

Pimpinella Anisum L.



Осеннюк луковичный.

7.

Colchicum autumnale L.




Чубъкъ за възнонъ коренъ. *Formentilla erecta* L.



Makr cadobovú.

Papaver somniferum. L.



Макъ сомнительный.


10.

Papaver dubium L.



Mars oukii.

Papaver Rhoeas. L.



Marcus mordovii.

Papaver Argemone. L.



Мак гладкокий.

Papaver laevigatum. M.B.



Душица обыкновенная. *Origanum vulgare* L.



Серная горчица.

Sinapis nigra L.



Просторечъеъ обыкновеній. *Althaea officinalis*. L.



Лакричник горош.
Glycyrrhiza glabra L.

Glycyrrhiza glabra L.



Лакричник исолигатный.


18.

Glycyrrhiza echinata L.



Звездчатый обыкновенный.

Hypericum perforatum L.



Богатырник мать и мариха. *Tusfilago Farfara*. L.



Шафранъ сафовой.

21.

Crocus sativus. L.



Шафранъ весенний. *Crocus vernus*, L.



Попутник калоценица. *Plantago Ovata* L.




Попутникъ листовая трава. *Plantago Psyllium L.*




Бълена черна. *Нуоскуамус нигер*:*Л.*



Yukyma boxo. *Cicuta virosa* L.




Ландыш ободной. *Convallaria Polygonatum*. L.




Acorus Calamus L.

Acorus Calamus L.



Однолетник четырехлистный. *Paris quadrifolia* L.



Копытень Европейский. *Asarum europaeum* L.




Мыльнянка обыкновенная. *Saponaria officinalis* L.



Буквица аптечарская. *Betonica officinalis* L.




Кресс горький. *Cardamine amara*. L.



Дильвіверо круглолистий. *Malva rotundifolia* L.




Зипчевер лъсновий. *Malva sylvestris* L.




Донника аптечнаа. *Fumaria officinalis* L.



Ранунка обыкновенная. *Matricaria Chamomilla L.*



Kupkazonz borwuiüce. *Aristolochia Clematitiae*.



Ocoka necornaz. Carex arenaria L.



Плакун амекарокий. *Lycopodium clavatum* L.
40.



Скабиоза луковиц.
44.

Scabiosa lucerosa L.



Ilex.

Ilex Aquifolium L.



Черная бузина.

Sambucus nigra L.



Древо садовое. Angelica Archangelica L.
44.




Ботаническое описание. *Conium maculatum*. L.



Горчевъ.

Polygonum Bistorta L.




Клюква красная.

47.

Oxycoccus palustris. PERS.



Багульникъ. *Ledum palustre* L.



Кислица обыкновенная.

Oxalis Acetosella L.




Ренцинник обыкновенный.

Agrimonia Eupatoria L.




Стародудка весенняя. Adonis vernalis L.



Majorana. *Origanum Majorana*. L.



Витегоровник Молдавский. *Dracoceratum Moldavicum*.




Жаспин обыкновенный.

Anthirrinum Linaria L.



Хризант ложечная трава. *Cochlearia officinalis* L.



Дрок красильный. *Genista tinctoria*. L.




Долникъ бражбній.



Melilotus officinalis L.



Лапушицкъ обыкновеній. *Arctium lappa* L.



Лапушиникъ мохнатый. *Arctium lappa* L.
59.



Пармелія стінна. *Parmelia parietina*. Ach.