

DIE REZEPTUR
AN DER ABTEILUNG
PROF. HERMANN SCHLESINGER
IM
WIENER ALLGEMEINEN KRANKENHAUS

ACHTE
ERWEITERTE AUFLAGE



WIEN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1933

DIE REZEPTUR
AN DER ABTEILUNG
PROF. HERMANN SCHLESINGER
IM
WIENER ALLGEMEINEN KRANKENHAUS

ACHTE
ERWEITERTE AUFLAGE



W I E N
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1933

ISBN-13:978-3-7091-9602-1 e-ISBN-13:978-3-7091-9849-0
DOI: 10.1007/978-3-7091-9849-0

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Analeptica

- Adrenalin hydrochl. Amp. zu 0,001 subkutan, ev. intrakardial.
Cadechol Tabl. zu 0,1 2—5mal tgl.
*Camphogen Amp. zu (0,02 Campfer) 1,0 intramuskulär-intravenös, mehrmals tgl.
*Campfer-Gelatinetten 0,1 (Kampfer in Glyzerin-Gelatine) 1—2 Tabl. 3mal tgl.
Cardiazol Amp. zu 0,1 subkutan, intravenös, mehrmals tgl.; 2—4 Tabl. tgl.
Cardiazol liquid. 3—4mal tgl. 10—20 Tropfen.
Cardiazol-Ephedrin Amp. zu 0,015, 1—3 Tabl. tgl., 10 Tropfen mehrmals tgl.
Cardiazol-Ephetonin wie Cardiazol-Ephedrin.
Coramin Amp. zu 1,0 subkutan, intramuskulär, intravenös, mehrmals tgl., Coramin liquid. 3mal 20 Tropfen tgl.
*Camphaquin (wässrige Kampferlösung) 10% Lösung intramuskulär, 2% Lösung intravenös.
Hexeton braune Amp. zu 0,1—0,2 intramuskulär, blaue Amp. zu 0,01—0,02 intravenös.
Kamphokoniol Amp. zu 0,05—0,1 intravenös.
Lobelin Amp. zu 0,003 intravenös, Amp. zu 0,01 subkutan.
Ol. camphor. 10% Lösung 2,0—10,0 intramuskulär.
Spirit. aether. Hoffmanni mehrmals tgl. 15 Tropfen.
Strychnin nitr. Amp. zu 0,001—0,002 subkutan, intravenös.
Suprarenin in Amp. zu 0,2—1,0 subkutan der Lösung 1 : 1000.

Anthelmintica

- Allium sativum, Abkochung als Klysma.
*Antoxurin 7—10 Pillen tgl. durch 4 Tage, am 1. und 3. Tag ein Abführmittel.

Die mit einem * bezeichneten Rezepturen werden nur zeitweilig verordnet.

Butolan Tabl. zu 0,5 3mal tgl. durch eine Woche, Kinder die Hälfte.

Decoct. cort. punic. granat. 60,0 : 200,0, Extr. filic. maris. aether. rec. parat. 6,0 (kein öliges Abführmittel!).

Extr. filic. maris. aether. recenter parat. 8,0 ad caps. gelatin. (kein öliges Abführmittel).

*Filmaronkapseln große Kapseln zu 0,33, 3 Kapseln für Erwachsene, kleine Kapseln zu 0,12, 6 kleine für Kinder.

*Gelonida Aluminii subacetici (Boehringer) Tabletten zu 0,5 6—8 Tabl. für Erwachsene, 3 Tabl. für Kinder. Helminal, 3mal 2—3 Tabl. tgl.

*Ol. chenopodii anthelminthica, 8—10 Tropfen, 3mal tgl. für Erwachsene (Erblindungsgefahr).

Santonin Pulver od. Trochisci zu 0,025 3—6mal tgl.

Arsenpräparate

*Arsamon in Amp. zu 1,0 subkutan.

Arsen-Ferratose 2—4 Kaffeelöffel tgl.

Arsotonin in Amp. zu 1,0 subkutan.

*Arsoferrin 2—8 Tabl. tgl. steigend.

Arsylen 2—6 Granula tgl. steigend, Ampullen f. subkut. Inj.

Elarson 1—5 Pillen tgl. steigend.

Ferrum kakodylic. 1,0 : 30,0 Aqu. cinnam., von 5 Trpf. ansteigend.

Liqu. arsen. Fowler. 5,0 Aqu. dest. 15,0 von 5 Trpf. ansteigend (nie nüchtern).

*Metharsinate Clin in Amp. zu 1,0 subkutan.

Natr. arsenicos. 0,03, Extr. chiae 2,0, ad pil. XL., 1—3 Pillen tgl. steigend.

Natr. arsenicos. 0,05, Acid. boric. 0,2, Aqu. destill. 10,0 0,25 subkutan, steigend.

Natr. kakodyl Amp. zu 0,05—0,10 subkutan.

Natr. kakodyl., Extr. nuc. vom. aa 0,15, Extr. et pulv. rad. rhei ad pil. XXX., 1—5 Pillen tgl. steigend.

Natr. methyl. arsenic. Amp. zu 0,03, 0,05, 0,10, subkutan.

*Optarson (Arsen-Strychnin) Amp. zu 1,0—2,0 subkutan. Pil. asiatic. (acid. arsenicos. 0,1, Piper. nigri 2,0, Rad. liquir., gum. arab. qu. s. ad pil. C.), 1—3 Pillen tgl.

*Solarson Amp. zu 1,0—2,0 subkutan.

- *Strychno - Phosphor - Arsen - Injektionen (Natr. glycerinophosph. 0,1, Strychnin. nitr. 0,0005, Natr. monomethylarsenic. 0,05) Amp. zu 1,0 subkutan.
*Strychnotonin (Chinoin-Werke) Amp. zu 1,0 subkutan.

Antisyphilitische Mittel

Bismogenol Orig. Flaschen, 0,5—1,0 intramuskulär jed. 3. Tag.

Bismosalvan Amp. zu 2 ccm 1,0—2,0 intramuskulär.

*Decoct. Zittmanni fortius 100,0 warm, nüchtern morgens, mitius 100,0 nachmittags.

*Decoct. (Sarsaparillae) Zittmann (Mittelbach) (Pralinéform 1 Stück entspricht 100,0 Decoct. mit. oder fort.).

Embial (Wismuth in ölig. Lösung Orig. Flaschen) 1,0 intramuskulär.

Emplastrum cinereum.

Endojodin (ca 60% Jod) Amp. zu 2,2 subkutan, intramuskulär, intravenös jed. 2. od. 3. Tag.

Enesol (salicylarsen. saures Hg.) Amp. zu 2,0 intramuskulär jed. 3. Tag.

Hydrargyr. bichlor. corros. 0,02 Natr. chlorat. physiol. 10,0 intramuskulär, jeden 2. Tag 1,0 (kein Jod daneben geben).

Hydrargyr. salicyl. 0,3 ad pil. XXX 2—4 Pillen tgl.

Hydrargyr. succinimid 0,2 Cocain. hydr. 0,1 Aq. dest. ad 10,0, 1,0 jeden 2. Tag intramuskulär.

*Jodglidine Tabl. zu 0,05, 2—4 Tabl. tgl.

Jodnatrium in Lösung 1,0—3,0 tgl.

Jodnatrium (10% wässerige Lösung) 5,0—10,0 intramuskulär, intravenös, intraartikulär.

Jodipin 10%, 20%, 1—2 Kaffelöffel tgl.

*Jodival Tabl. zu 0,3 2—4 Tabl. tgl.

*Jodostarin Tabl. zu 0,25, 2—6 Tabl. tgl.

Jodvasogen Tropfen 2mal 15 Tropfen tgl.

Jothion 2,0, Lanolin 2,0 Einreibung tgl.

Jodex Einreibung tgl.

*Jodomelin (Jodwismutheiweiß) Tabl. zu 0,5—1,0 3mal tgl.

*Lipojodin (41% Jod) Tabl. zu 0,3, 1—3 Tabl. tgl.

*Mergal Original-Kapseln zu 0,05 2—4 tgl.

Modenol (Quecksilber-Arsenlösung [0,06 Hg]) in Amp. zu 2,0, 1,0—2,0 intramuskulär jed. 3. Tag.

Myosalvarsan in Amp. zu 0,10—0,6 intramuskulär, 2 Injektionen pro Woche, steigend (im ganzen 3—4 g).

Mesurol in Amp. zu 1,0— $\frac{1}{2}$ —1,0 jed. 3. Tag (im ganzen 9—10 ccm).

*Natr. jodicum in Lösung 0,5—1,0 tgl.

Neosalvarsan Amp. zu 0,15—0,45 intravenös, 3,0—4,0 pro Kur.

Natr. rhodanat. in Lösung 1,0—3,0 tgl.

Novurit (Hg-Theopyllin) Amp. zu 1,1—2,2 intramuskulär, intravenös jed. 3. Tag.

Protojoduretum Hydrargyr. 1,5 M. pil. ad pil. XXX. 3 Pillen tgl.

Rubidium jodatum in Lösung 0,5—1,0 tgl.

Sajodin Tabl. zu 0,5, 4—6 Tabl. tgl.

Salyrgan Amp. zu 0,5—2,0 intramuskulär, intravenös, intraperitoneal jed. 3. Tag.

Solusalvarsan in Amp. 0,1—0,6, 1—2 intramusk. Injekt. pro Woche.

Spirobismol (Wismut-Jod-Chinin in Öl) Originalflaschen 0,5—1,0 intramuskulär.

Spirocid (= Stovarsol) Tabl. zu 0,25, 3 Tage $\frac{1}{2}$ —3 Tabl. tgl. steigend, mit 3 Tage Pause usw., 6,0 in einer Kur.

Unguent. ciner. 2,0 zur Schmierkur, 10,0 zu Salbenumschlägen.

Antineuralgica, Antipyretica, Antirheumatica

Aconitin Pillen zu 0,1 mg steigend bis 15 Pillen (Achtung auf Intoxikation).

Antifebrin zu 0,25, 3—4mal tgl.

Antipyrin zu 0,25—0,50, 3mal tgl.

Argent. nitr. Pillen zu 0,015, 2—3 Pillen tgl. (bei maximum 4 g Gesamtverbrauch Argyrosegefahr).

Aspirin (acid. acetylosalicyl.) Tabl. zu 0,5, 3—10 Tabl. tgl.

*Atochinol Tabl. (Atophan-Salicyl) Tabl. zu 0,25, 2—8 Tabl. tgl.

*Atochinolsalbe zur Einreibung.

Atophan (Acid. phenylchinolincarbon.) Tabl. zu 0,5, 2—6 Tabl. tgl. (Intoxikationsgefahr).

Atophanyl (Atophan-Salicyl) in Amp. zur intramuskulären Injektion 5,0, in Amp. zur intravenösen Injektion 10,0 (bei längerer Anwendung Intoxikationsgefahr).

Aconit-Dispert Tabl. zu 0,05 mg.

*Agit (Calc. salicyl.-Calc. lact.-Acetylin) 2 Dragees mehrmals tgl.

- *Apyron (Acid. acetylosalicyl. + Calc. carbon.) Kerne
(zu 0,25 Salicyl) 2—10 Kerne tgl.
Cehasol (wie Ichthyol) 10% Salbenverband mit Vaselin.
Cerium oxalic. 0,05, 5 Pulver tgl. (bei gastrischen
Krisen).
Chinin mur. zu 0,2—0,5, 3—4mal tgl.
Chinin bihydrochl. Amp. zu 0,25 intravenös.
Chinin hydrochl. 0,5, Urethan 0,25, aqu. dest. ad 5,0,
intramuskulär.
*Chlorylen 20 Trpf. 2mal tgl. einatmen (elektiv bei
Trigeminusneuralgien).
Causyth Tabl. zu 0,5 1—6 Tabl. tgl.
Cibalgin (Pyramidon-Dial) Amp. zu 1,0—2,0 subkutan,
intramuskulär, intravenös, 1—2 Tabl. tgl., 15 Trpf.
mehrmais tgl.
Chloroform, Öl. hysocym. aa zur Einreibung.
Citrophen zu 0,5, 3mal tgl.
*Coffetylín (Acetylín-Coffein) Tabl. zu 0,5, 3mal tgl.
*Compral (Voluntal-Pyramidon) Tabl. zu 0,5, 1—2 Tabl.
mehrmais tgl.
*Dialys. Semin. Colchic. (Golaz) 2—3mal 5—15 Trpf.
tgl. (bei Durchfall aussetzen).
Diplosal zu 0,5, 4—10mal tgl.
Diplosal 6,0 (od. Natr. salicyl. 6,0) Pyramidon, Phen-
acetin, Coffein. natr. sal. aa 2,0, Dionin 0,2 in dos.
XX, 1—3 Pulver tgl.
Euchinin (Ersatz für Chinin) aa 0,5, 4—5 Pulver tgl.
Farin. semin. sinap.
Gardan Tabl. 0,5 3mal tgl. 1 Tabl.
Hexophan Tabl. 0,5 3—4mal tgl.
20% Ichthyol-Vaselin zur Einreibung.
Impletol (Novokain-Coffein) Amp. 2,0 subkutan, intra-
muskulär.
*Kalmopyrin (Aspirin-Calcium) 0,5, 2—10mal tgl.
Melubrin Tabl. 1,0, 3—4mal tgl.
Menthol 1,0, Camphora 0,5, Vaselin ad 50,0, zur Ein-
reibung.
Methylenblau 0,1 in Capsul. gelatinos., 3 Kapseln tgl.
intern.
Natr. salicyl. zu 0,5, 2—10mal tgl.
Novalgin Tabl. zu 0,5, 2—4 Tabl. tgl., in Amp. (50%
Lösung) 1,0—2,0 subkutan.
Opolen. Dragees zu 0,5, 3—4mal tgl. Supp. zu 0,5
3—4mal tgl.

- Pasta Guarana (Pulv. Paullin. sorb.) zu 0,5, 2—6mal tgl.
Phenacetin (= Acetphenetidin) zu 0,30, 3mal tgl.
Pyramidon (= Amidopyrin) zu 0,25—0,3, 3mal tgl.
*Neutrales kampfersaures Pyramidon zu 0,25, 4—6mal tgl.
*Sauers kampfersaures Pyramidon zu 0,25, 4—6mal tgl.
Pyrenol zu 0,3—0,5, 1—3mal tgl.
Pyrenol Sirup 10% mehrmals tgl. 1 Kaffeelöffel.
Radium-Emanation 20.000—60.000 M. E. als Zusatz zu Bädern oder Trinkkuren. 300.000—600.000 M. E. zur Inhalation.
Rheumasan in Tuben zur Einreibung.
Salol zu 0,5, 3—4mal tgl.
Salophen zu 0,5, 3mal tgl.
Schleichsche Lösung (Novocain 0,1—0,4, Adrenalin hydr. 0,0002, aqu. dest. ad 20,0) zur Hautinfiltration.
*Spirosal zum Aufpinseln.
Sufrogel (Schwefelpräparat) 0,25—1,0 intramuskulär, steigend (erwärmen).
Schwefel-Diasporal Amp. zu 2,0 intramuskulär und intravenös.
Tct. Colchici 5,0, Spirit. aromat. 15,0 mit 3 Trpf. tgl. beginnend, bis 15 Trpf. tgl. steigend. Einreibung.
Trigemin zu 0,3, 2 Pulver tgl. (in Kapseln).
Togal Tabl. zu 0,5 3mal tgl.
Unguent. aromaticum, Einreibung.
Unguent. Juniperi, Einreibung.

Cardiaca

- *Adonidin 0,1, Aqu. dest. 20,0, 3mal tgl. 15 Trpf.
*Adonidin 0,002, Natr. benzoic. 0,15 in Pillen, 2—3 Pillen tgl.
Adonigen 3mal tgl. 20 Trpf.
Adonis vernalis Dialys. Golaz 3mal tgl. 5—15 Trpf.
Amyl. nitros. 10,0, 1—3 Trpf. zur Inhalation (explosibel bei offenem Licht).
*Adovern 1—3mal tgl. 15 Trpf., 2—4 Körner tgl.
*Baryum chlorat. 0,02, Sacchar. lact. 0,5, 2—3 Pulver tgl. (bei Erbrechen aussetzen).
Benzyl. benzoic. 5,0, Spirit. aromat. 20,0, 3mal 20 Trpf.
Calcium-Diuretin Tabl. zu 0,5, 2—4 Tabl. tgl.
Campher-Papaverin Gelatinetten (0,1 Campher, 0,04 Papaverin hydr.) 2—4 Stück tgl.

- Cardiotonin (Convallaria-Coffein), 3mal tgl. 10 Trpf.
Chinin. mur. zu 0,25, 3—4mal tgl.
Chininhydr. zu 0,25, 3—4mal tgl. durch 3 Tage, dann
3 Tage Pause.
Coffein. natr. benzoic. 30% wäßrige Lösung, 0,3
subkutan, 3mal tgl. oder 3mal 20 Trpf. tgl.
Coffein. natr. sal. 1,0 : 150,0 tgl.
Coffein. natr. sal. 1,0 : 20,0 Aqu. fontis für 2 Mykro-
klysmen.
Cymarin (Extr. Apocynii) Tabl. zu 0,0003, 2—3 Tabl.
tgl., Amp. zu 0,001, $\frac{1}{2}$ —1 Amp. intramuskulär, intra-
venös.
Digitalis-Dispert 3—6 Tabl. tgl. 1—2 Supp. tgl.
Dialys. Digit. purp. 3mal tgl. 10—20 Trpf.
Dialysat. adon. vern. 3mal tgl. 20 Trpf.
Dialysat. convall. majal. 3mal tgl. 20 Trpf. (kontra-
indiziert bei Diarröen).
Digalen Tabl. zu 0,1, 1—3 Tabl. tgl., 2—3mal 10—15 Trpf.
tgl., Amp. zu 1,0, 1,0—6,0 intramuskulär, intravenös.
Digifolin Tabl. zu 0,1, 2—3 Tabl. tgl., 2—3mal tgl. 15
Trpf., Amp. zu 1,0, 1,0—3,0 subkutan, intramuskulär,
intravenös.
Digipurat Tabl. zu 0,1, 1—3 Tabl. tgl., 2—3mal tgl.
10—15 Trpf., Amp. zu 1,0 intramuskulär, intravenös,
in Suppositorien zu 0,1, 2—3mal tgl.
Digistabil 2mal tgl. 20 Trpf., in Suppositorien 0,15
1—3mal tgl.
Digitalysat (Bürger) 3mal tgl. 10—15 Trpf.
*Dyspnōn (Diuretin 0,25, Agurin 0,10, Extr. Quebracho
0,1) 4—5 Tabl. tgl.
Digitalin 2mal 15 Trpf. tgl.
Erythroltetranitrat Tabl. zu 0,005, steigend 1—3 Tabl.
(bei Kopfschmerz aussetzen!).
Extr. Cacti grandiflori 3mal tgl. 1—15 Trpf.
*Extr. Sambuc. fluid. 3mal tgl. 15 Trpf. bis 3mal tgl.
1 Kaffeelöffel.
Eutonon (Herzhormon-Zuelzer) Amp. zu 1,1 subkutan,
3mal tgl. 15—20 Trpf.
Fol. Digital. in Pulv. 0,1, 2—3 Pulver tgl.
Pulv. fol. Digital. titr. 1,0, Chinin-hydr. 2,0, Coffein.
natr. sal. 3,0, Extr. Kolae aquos. 4,0, in dos. LX.
(Pillen, Pulver) 2—6 Stück tgl.
*Gitapurin Tabl. zu 0,1, 1—3 Tabl. tgl., Amp. zu 0,1,
1—2 Amp. intramuskulär, intravenös.
*Guipsine in Gelatinekapseln, 3mal tgl. 2 Kapseln.

- Infus. adon. vern. 5,0—8,0 : 150,0, Theophyllin. natr. acet. 0,5—1,0 (nur jeden 2. Tag geben).
Infus. fol. Digital. 0,5—1,0 : 120,0.
Infus. fol. Digital. 0,5—1,0 Tct. strophanti. Coffein. natr. sal. 0,5 : 120,0.
Infus. fol. nerei oleandri 1,0 : 120,0.
Jod-Calcium-Diuretin Tabl. (0,1 Kal. jodat.) 2—4 Tabl. tgl.
Kohlensäure-Bäder: Natr. bicarb. 250,0, Natr. chlorat. 250,0, Acidi hydrochl. crud. 250,0.
Lacarnol Amp. zu 1,0 subkutan, intramuskulär, intravenös, 1—3mal tgl. 10—20 Trpf.
Natr. carbon. 1,8, Kal. nitric. 1,2, Natr. nitros. 0,03, als Tagesdosis in Wasser gelöst.
Natr. nitros. 0,02 subkutan tgl.
Nitroglycerin Schokolade-Tabl. (Perlingual Tabletten) zu 0,0005, 1—3 Tabl. steigend.
Nitroskleran Amp. zu 0,02—0,04, subkutan, intravenös.
Ouabaine (Strophantinpräp.) Granula zu 0,10, Tabl. zu 0,25 mg 2mal tgl., solubile 3mal 5 Trpf. tgl.
Padutin (Kreislaufhormon) Amp. zu 1,0, 3mal 15 Trpf. tgl.
*Pandigital 2mal tgl. 10—15 Trpf., 2—3 Suppos. tgl.
Scillaren 15 Trpf. 1—4mal tgl., Tabl. zu 0,2, 2—4 Tabl. tgl., Amp. zu 1,0 intramuskulär, intravenös.
*Serum anorganicum sec. Trunecek, 1,0—5,0 intramuskulär, jeden 3. Tag.
Sol. nitroglyc. alcoholic. 1% gtt. XXX. Aqu. 300,0, 1 Eßlöffel tgl. (= $\frac{1}{2}$ mg).
Sol. nitroglyc. alcoholic. 1%, Spir. aether. nitros., Tet. valerian. aa 8 Trpf. 2—3mal tgl.
*Spartein sulf. zu 0,03, 2—3 Pulver tgl.
*Subtonin A (mit Digitalis), Subtonin B (ohne Digitalis) 2—4 Tabl. tgl.
Strophantin 1% Lösung, 0,25—0,5 intravenös (kontraindiziert bei vorausgegangener Digitalis-Behandlung).
Telatuten Amp. zu 1,0 intravenös, 2mal wöchentlich.
Tct. Digital., 3mal tgl. 10 Trpf.
Tct. nerei oleandri, 3mal 10—15 Trpf. tgl.
Tct. Strophanti 1,0 : 150,0.
Tct. Strophanti (od. Tct. valerian.) Spirit. aromat. aa 15,0, 3mal tgl. 10 Trpf.
Traubenzuckerlösung 20—40% (Osmon „Phiag“ 33%), 10,0—40,0 intravenös.

Theominal Tabl. zu 0,33 2—3mal tgl.
Viscysatum (Bürger) 3—10 Trpf. tgl. (Blutdrucksenkend).

Diuretica

- Ammon. chlorat. 4,0, Succ. Liquirit. 2,0 : 100,0 (Vorbereitung zur Hg-Diurese).
Acetum Scillae, 2—3mal tgl. 15—20 Trpf.
Aqua Petroselini 150,0 tgl.
Aqua Petroselini 130,0, Liqu. kal. acetic. 20,0 tgl.
Bacc. Juniperi, Tee aus einem Teelöffel der Droge, 2mal tgl.
Calcium-Diuretin Tabl. zu 0,5, 3—6mal tgl.
Decoct. Fructus Phaseoli immaturi 25,0 : 150,0 als Klysma tgl.
Decoct. Ononid. spin. 10,0 : 150,0 tgl.
Decoct. Equiseti 15,0 : 150,0 tgl.
Dialys. Spec. diuret. (Golaz), 3mal tgl. 1 Kaffelöffel.
*Gelamon (Pastillen zu 0,4 Salmiak) 10—20 Pastillen tgl. als Vorbereitung zur Verstärkung der Hg-Diurese.
Euphyllin-Calcium, Euphyllin-Jodcalcium, Euphyllin, Supp. zu (0,36) 2 Stück tgl., in Amp. (24%) intravenös (wie bei Theophyllin, nur jeden 2. Tag).
Fol. Betulae, Tee aus einem Teelöffel der Droge, 2mal tgl.
Jodcalciumdiuretin Tabl. zu 0,5 3—6 Tabl. tgl.
Kalomel, 3mal 0,2, 4 Tage hintereinander (bei Gingivitis oder Judgebrauch aussetzen).
Liqu. Kal. acet., 15,0—30,0 : 150,0 tgl.
Natr. acet. 15,0—25,0 : 150,0 tgl.
Novurit (Hg. + Theophyllin) Amp. zu 1,1—2,2 jed. 3. Tag intramuskulär od. intravenös.
Sacchar. lact. 30,0—50,0 pro die.
Salyrgan 0,5—2,0 intramuskulär, intravenös jeden 3. Tag (bei Durchfällen aussetzen!).
Strontium lacticum, 4,0—6,0 tgl. in Lösung.
Tet. Urticae, 3mal 15 Trpf. tgl.
*Theacylon, Tabl. zu 0,5, 1—3 Tabl. tgl., Kapseln zu 0,25, 2—6 tgl.
Theobromin. pur. zu 0,5, 3—5 Pulver tgl.
Theobromin. natr. acet. (Agurin) zu 1,0, 3—6 Pulver tgl.
Theobromin. natr. salicyl. (Diuretin) zu 0,5—1,0, 3—6 Pulver tgl.

- *Theocal (Theobromin-Calcium) Tabl. zu 0,5, 2—4 Tabl. tgl.
- Theophyllin pur. (Theocin) 0,8 : 150,0 (nicht über 0,8 pro die hinausgehen, nur jeden 2. Tag, bei Kopfschmerzen aussetzen).
- Theophyllin (Theocin) natr. acetic. 1,0, Infus. Adonid vernalis. 8,0 : 150,0, jeden 2. Tag.
- Theophyllin (Theocin) natr. salicyl. zu 0,5, 2 Pulver tgl. nur jeden 2. Tag.
- *Theophyllin- (Theocin-) Natrium zu 0,4, 1—2 Pulver tgl., nur jeden 2. Tag.
- Urea 15,0—30,0 : 150,0 tgl.

Diverse

- Acetum Sabadillae.
- Acid. lact. 10% (Ätzung).
- Anästhesin 4,0, Natr. bicarb. 6,0 (Einblasung).
- Anusol-Suppositorien.
- Argrochrom 1% in Amp. 10,0—20,0 intravenös.
- Argent. colloidal. 3,0 : 50,0 im Klysma.
- *Benzol 0,5 ad. caps. gelatin., 1—4 Kapseln tgl.
- *Bromipin 33% zur röntgen. Darstellung der Bronchien. Cehasol-Hämorrhoidaltorpedo.
- *Citrofin, Ersatzsalz für Nierenkranke.
- *Elektroaurol (Clin) in Amp. intramuskulär, intravenös. Elektrokollargol in Amp. 5,0 intravenös.
- *Fibrolysin in Amp. subkutan jeden 3. Tag.
- Galaktose 40,0 zur Leberfunktionsprüfung.
- Homatropin 0,05—10,0 (Augentropfen).
- *Hosal, Ersatz-Salz für Nierenkranke.
- Jodipin 40% zur röntgen. Darstellung des Wirbelkanals.
- *Jodostarin-Schokoladetabletten 1—3 Tabl. tgl.
- Lipiiodol wie Jodipin 40%.
- Mitigal zur Einreibung bei Hautjucken.
- Natr. sozojodol., Flor. sulf. zu 2,0 (Einblasung).
- Natr. thiosulf. 0,15—2,0 intravenös (bei Salvarsan-Hg-Dermatitis).
- Natr. chlor. 10% 10,0 intravenös (bei Röntgenkater).
- Optochin. bas. Tabl. zu 0,2, 2—4mal tgl. bis 2,0 Gesamtdosis, stets Natr. bicarbon. nachnehmen! (Achtung auf Intoxikation!).
- Omnadin Amp. zu 2,0 intramuskulär.

Plasmochin Tabl. zu 0,02 2—3 Tabl. tgl. (in Summe 8—10 Tabl.) Achtung auf Cyanose.
*Percainal Hämorrhoidalsalbe.
*Siliatren, 2mal 15 Trpf. tgl.
Solvochin Amp. zu 2,0 intramuskulär.
Strontiuran 10% Lösung 10,0 intravenös (bei Hautjucken).
Sionon 30—80 g als Zuckerersatz.
Tetrajodphenolphthalein, Tetrabromphenolphthalein,
(Merk) in Kapseln zu 1,0, 8—10 Stück zur röntgen.
Darstellung der Gallenblase.
Tetrophan Tabl. zu 0,5, 1—2 Tabl. tgl. (bei Spasmen kontraindiziert).
Trypaflavin Amp. zu 5,0—10,0 intravenös.
Unguent. Credé 2,0—3,0 als Einreibung.
Zymoidin-Haemorrhoidal Supp.

Expectorantia, Antiasthmatica

Ammon. chlor., Elaeosach. foenic. aa 5,0, Natr. bicarb.
15,0 3mal tgl. 1 Messerspitze.
Apomorphin. hydrochlor. 0,015 : 150,0, Acid. hydrochlor.
gtt. 1. tgl. (Dunkles Glas! Kein Sirup!)
Aqua Picis zur Inhalation (mit der gleichen bis doppelten Menge Wasser zu verdünnen).
Asthmolysin (Adrenalin hydr. 0,0003, Pituitrin 0,2)
Amp. zu 1,0 subkutan.
*Asthmapulver (von Neumayer) zur Inhalation.
*Astucco (Asthmamittel nach Tucker) zur nasalen
Inhalation mit eigenem Zerstäuber (ebenso „Tucker-Ersatzmittel“).
Atropin. sulf. 0,01, Cocain hydr. 0,025, Adrenalin hydr.
1 : 1000, 10,0 zur Inhalation.
Atropin. sulf. 0,015, Extr. et pulv. rad. rhei qu. s. ad
pil. XXX., 1—4 Pillen tgl.
Calc. chlorat. 10%, 10,0 intravenös.
Camphor. trit. 0,05, flor. benzoës 0,3, mehrmals tgl.
Decoct. Senegae 8,0 : 150,0 tgl.
*Droserin Tabletten 3—6 Trpf. tgl.
*Drosithym 3—10 Trpf. tgl.
Emser Pastillen synthet. Ö. M. A. G.
Euporphin 0,01—0,02 in wässriger Lösung tgl.
Extr. fluid. Quebracho, 1—2 Kaffeelöffel tgl.
Ephedralin (Ephetonin + Adrenalin) in Amp. subkutan.

- Ephedrin Tabl. zu 0,05 2—3mal tgl., in Amp. subkutan.
*Epherit (Synthet. Ephedrin) Tabl. zu 0,05.
Ephetonin Tabl. zu 0,05, in Amp. subkutan.
Extr. Primulae fluid. (= Syngulin) 3mal 15 Trpf. tgl.
Fol. Stramonii, Kal. nitr. aa 20,0, Fol. Belladonnae,
Herba Cannab. ind. aa 10,0 Räucherpulver.
Formalin-Tabletten zum Verdampfen (bei Pertussis).
*Felsol 3 Tabl. tgl.
Infus. Ipecac. 0,2—0,8 : 150,0 tgl.
*Iminol 1—2 Tabl. tgl.
Liqu. ammon. anis. 1,0 (Natr. bicarb. 2,0) : 150,0.
*Kresival 1 Eßlöffel 3—4mal tgl.
Natr. benzoic. 0,2, mehrmals tgl.
Natr. jodat. 1,0 : 120,0 tgl.
Ol. pini pumilionis, tropfenweise zur Inhalation.
Ol. therebinthinae, zur Inhalation.
*Pollantin (Originalflasche) zur Inhalation, zur Pin-
selung der Konjunktival und Nasenschleimhaut.
Pyrenol 3,0, Sirup, simpl. 20,0, Aqu. dest. 100,0 als
Tagesdosis.
Pyridin, 1—15 Trpf. steigend, auf warmes Wasser zur
Inhalation, nicht intern.
Sodener Pastillen synthet., Ö. M. A. G.
Spec. Althaeae, Tee.
Syngulin-Tabletten, 3—6 Tabl. tgl.
Syngulin Fluid 3,0, Syr. spl., 10,0 Aqu. 100,0 Tages-
dosis.
Syr. Thymi. comp. 3 Kinderlöffel tgl.
Sympatol Tabl. zu 0,1, Amp. zu 0,06 intravenös.
Tet. Ledi palustris, 3mal 20 Trpf. tgl.
Transpulmin 1,0—2,0 intramuskulär.
Theophyll. n. acet. 0,2 Theobromin n. salicyl. 0,3 Anti-
pyrin 0,4 2—3 Pulver tgl. durch 3 Tage, dann
3 Tage Pause usw.

Fieber und Sepsistherapie

- Aolan, 2,0—10,0 intramuskulär.
Caseosan 0,5—5,0 intramuskulär.
Detoxin (Schwefelpräparat) 1,0—10,0 intramuskulär.
Milch 2,0—10,0 intramuskulär (durch 10 Minuten langes
Kochen sterilisiert).
Novatropin 0,25—3,0 intramuskulär, intravenös.
Omnadin 0,25—1,0 intramuskulär.

Ol. therebinth., 10—20 Trpf. subkutan (zur Abszeß-Erzeugung).
Phlogetan 1,0—5,0 intramuskulär.
Schwefel-Diasporal 0,5—2,0 intramuskulär, intravenös.
Sufrogel 0,2—1,0 intramuskulär.
Trypaflavin in Amp. 2% Lösung, 5,0—10,0 intravenös.
Vaccineurin, Serie I, II, III, steigend, intramuskulär, intravenös.
Yatren-Casein 0,5—5,0, schwach und stark, intramuskulär.
Pyriter in Amp., Beginn mit Stärke I und steigen je nach Fieberreaktion bis Stärke VII.

Gargarismen, Munddesinficientia

Acid. boric. 6,0 : 200,0.
Angina-Pastillen österr. Heilmittelstelle.
Decoct. Althaeae 300,0.
Decoct. Quillajae 5,0 : 250,0.
Formamint-Tabletten, 2—6 Stück tgl.
Hydrogen. hyperoxid. 3% (Volumperzent) — Perhydrol 3,0 : 100,0.
Kal. hypermangan. 1,0 : 1000,0.
Pulv. dentifric. nig.
*Panflavin-Tabletten mehrmals tgl.
Tet. gallarum.
Tet. Jodi 5,0, Spirit. vini. rectific. 45,0, zum Einpinseln des Zahnfleisches.
Tet. Myrrhae, Tet. Ratanhiae zu, zum Reinigen des Zahnfleisches.

Hypnotica, Anaesthetica

Adalin, zu 0,5, 1—3 Tabl. tgl.
Allonal 1—4 Tabl. tgl.
Alypin in 3% wässriger Lösung, 3mal 5 Trpf.
Anaesthesia (Anaesthan) 10,0, Lanolin, Vaselin zu 45,0, Salbe.
Anaesthesia 0,15 für 1 Suppositorium.
Anaesthesia 1,5, Natr. bicarb. 10,0, in dos. XX. 2—4 Pulver tgl.
Amylenum hydratum 2,0—4,0, in Zuckerwasser.
Aqua chloroformiat. 150,0, Ol. menthae gtt. II. Eßlöffelweise.

- Acedicon Tabl. zu 0,005—0,01 1—3mal tgl., Amp. zu 0,01 subkutan.
- *Adamon Tabl. zu 0,5 mehrmals tgl.
- *Bromipin 10%, kaffeelöffelweise mehrmals tgl.
Bromural 1—2 Tabl. zu 0,3 tgl.
- Baldrian-Dispert Tabl. mehrmals tgl.
- Banisterin = Harmin.
- Chloral. hydrat. 2,0—6,0 prg die, per os oder mit Mucilago gumm. arab. 75,0 (für 2 Klysmen).
- Cibalgin in Amp. zu 1,0—2,0 subkutan, intramuskulär, 1—3 Tabl. tgl., 15—20 Trpf., 2—3mal tgl.
- Chinin. hydrobrom. 0,25, 2—3mal tgl.
- Codein hydr. s. phosphor. 0,6 : 30,0, 1—3mal tgl. 20 Trpf.
- Codein mur. 0,02—0,03 mit Sacch. oder Natr. bicarb. 0,5, 2—3 Pulver tgl.
- Codeonal-Tabletten zu 0,5, 1—3 Tabl. tgl.
- Collempplastr. Belladonnae 10—25%.
- Cycloform 1,0, Spirit. Menth. pip. 10,0, 3mal tgl. 6 Trpf.
- Compral Tabl. zu 0,5 1—2mal tgl.
- Diaethylbarbitursäure (-Veronal) 0,3—0,75 tgl.
- Dial Tabl. zu 0,1 1—2 Tabl. abends, Amp. zu 2,0 intramuskulär.
- Dicodid Tabl. zu 0,01, 1—3mal tgl., in Amp. zu 0,015 subkutan.
- Dilauidid Tabl. zu 0,0025, $\frac{1}{2}$ —3 Tabl. tgl., in Amp. zu 0,002 subkutan.
- *Dilauidid 0,002, Scopolamin. hydrobrom. 0,0003 in Amp. subkutan.
- Dionin 0,02—0,03 tgl. in Suppositorien zu 0,03 2—3mal tgl.
- Domopon Tabl. zu 0,01, 1—3 Tabl. tgl., in Amp. zu 1,0 subkutan.
- Dormalgin Tabl. zu 0,2, 1—3 Tabl. tgl., Suppositorien zu 0,2, 2—3 Stück tgl., in Amp. zu 1,0—2,0 subkutan. intramuskulär.
- *Ditonal in Suppositorien 2—3mal tgl.
- Eucain. lact. 1,0, Aqu. dest. 10,0, 4—6mal tgl. 5 Trpf.
- Eucodal, Tabl. zu 0,005, 2—4mal tgl., in Amp. zu 0,01—0,02 subkutan.
- Extr. Cannab. indic. fl., 3—10 Trpf. mehrmals tgl.
- Extr. opii aquos. 1,0, Extr. et Pulv. rad. rhei q. s. ad pil. C, 1—10 Pillen tgl.
- Harmin Amp. zu 0,02 subkutan.
- Heroin, 3%, wässerige Lösung 10 Tropf. (zersetzlich gefährlich!).

- *Impletol in Amp. zu 2,0, subkutan, intramuskulär.
- *Isopral Tabl. zu 0,25—1,0 (luftdicht verschlossenes Gefäß!).
- Laudanon, Tabl. zu 0,01, 3mal tgl., Amp. zu 0,02 subkutan.
- Luminal, 0,1—0,2, $\frac{1}{2}$ —2mal tgl.
- Luminaletten Tabl. zu 0,015, 2—4 Stück tgl.
- Luminal-Natrium, Amp. zu 0,22 subkutan.
- Magnes. sulf., 10% wässerige Lösung 10,0 intravenös, 25% wässerige Lösung 5,0—10,0 intramuskulär, intralumbal.
- Medinal (Veronal-Natrium) wasserlösliches Präparat, 0,5—1,0 abends in Tee.
- Medinal 0,5 : 20,0 als Klysma, in Amp. 10%, 5,0 subkutan, intramuskulär.
- Morphin. hydrochlor. 0,1, Aqu. Lauroceras. 10,0, 1—3mal tgl. 10 Trpf.
- Morphin. hydrochlor. 0,005—0,015, Sacch. oder Natr. bicarb. 0,5, 1—3mal tgl.
- Morphin. hydrochlor. 0,01—0,03 : 150,0 tgl. Supp. zu 0,01—0,02 1—3mal tgl.
- *Modiscop Tabl. 1—3mal tgl.
- Multibrol Dragees zu 0,2 3mal tgl.
- Nautisan in Pillen und Suppositorien (fort.) mehrmals tgl.
- Neodorm Bohnen zu 0,3 1—2mal tgl.
- *Narcophin Tabl. zu 0,015—0,03, Amp. zu 0,01—0,03 subkutan.
- Natr. brom. 2,0—4,0 : 150,0.
- Natr. brom., Kal. brom. aa 15,0, Ammon, brom. 10,0 : 300,0 (Erlenmeyersche Mischung) 1—2 Eßlöffel tgl.
- *Neuronal Tabl. zu 0,5, 1—3 Tabl. tgl.
- *Noktal Tabl. zu 0,1, 1—2 Tabl. tgl.
- Pantopon Tabl. zu 0,01, 1—4 Tabl. tgl., in Amp. 0,01—0,02 subkutan, 1—3mal tgl.
- Paracodin Tabl. zu 0,01, 2—4 Tabl. tgl., in Amp. 0,5—1,0 subkutan.
- *Paralaudin Amp. zu 0,015, subkutan.
- Paraldehyd 2,0—4,0, Syrup. Cort. Aurant. ad 25,0.
- Phanodorm Tabl. zu 0,2, $\frac{1}{2}$ —2 Tabl. tgl.
- Psikain, 2—4% Lösung, 8—15 Trpf., mehrmals tgl.
- Pernocton Amp. zu 1,1, 2,2 und 5,0 subkutan, intramuskulär, intravenös.
- *Optalidon 1—2 Tabl. abends.

- *Sabromin zu 1,0, mehrmals pro die.
Scopolamin hydrobrom. Amp. zu 0,00025 subkutan.
(Trübe Lösung sehr toxisch.)
Sedobrol, 1—2 Tabl. tgl. in heißem Wasser.
Somnacetin (Codein-Veronal-Phenacetin) Amp. zu 2,0
subkutan, 2—3 Tabl. tgl.
Scopolamini hydrobrom. 0,0025, Morph. mur. 0,2,
Dionin 0,3, Aqu. dest. 10,0, (getrübte Lösungen sehr
toxisch). Gebrauchsfertige Lösungen unter dem
Namen „Modiscop“ und „Dioscopin“, 0,5—1,0 sub-
kutan.
*Sandoptal Tabl. zu 0,2.
*Sedal 2—4 Tabl. tgl.
Sedormid 2—3 Tabl. tgl.
Somnifen 1—2mal tgl. 15—20 Trpf., Amp. zu 2,2 cm
intramuskulär.
Tct. Valerianae 3mal tgl. 10—15 Trpf.
Tct. Valerian. ammoniat. (Mittelbach) 3mal 20 Trpf.
tgl.
Theominal 1—3 Tabl. tgl.
*Trional, zu 0,5—2,0 in Tee. Dauergebrauch wirkt oft
toxisch.
Veramon Tabl. zu 0,4, 1—3mal tgl.

Indifferentia

- Aqua Melissae 100,0.
Aqu. Menth. pip. 100,0.
Aqu. Rub. idaei 100,0.
Emulsio amygdalin. 100,0 (konzentrierte Form als Syr.
amygdalar., einige Tropfen auf ein Glas Wasser).
Extr. Cent. min., 1,0 : 150,0.
Extr. fol. Trif. fibr. 1,0 : 150,0.
Extr. Gentian. 1,0 : 150,0.
Extr. Gramin. 1,0 : 150,0.
Extr. Liquirit. 1,0 : 150,0.
Extr. Taraxaci 1,0 : 150,0.
Tct. Chin. comp. 1,0 : 150,0.

Laxantia

- Aloe, Extr. Rhei zu 3,0, Pulv. Jalapae 10,0 f. pil.
No. C., 1—2 Pillen tgl.
Aqua laxat. Viennens. 50,0, als Tagesdosis.
Bitterwasser: Ofner, Igmander, Hunyadi.

- Extr. fluid. Cascar. sagrad., kaffeelöffelweise.
Extr. Rhamni frangulæ fluid., kaffeelöffelweise.
Fol. Sennae i. p., Flor. sulf., Magnes. ustae. aa 10,0,
Pulv. Cinamom., Sacch. aa 5,0, messerspitzenweise.
Glyzerin 10,0—20,0, Mikroklysma.
Tub. Jalapae 0,9, Extr. et pulv. rad. rhei qu. s. ad pil.
XXX., 2—6 Pillen tgl.
Inf. fol. Sennae 5,0—10,0 : 150,0 (Klysma oder intern).
Isazen, 2—4 Granula tgl.
Istizin, 1—2 Tabl. tgl.
*Kalomel, P. Jalap. zu 0,5, 1 Pulver (nur eine Dosis).
Magnes. sulf., 1—2 Kaffeelöffel tgl.
*Neo-Hormonal mit Eucainzusatz 10,0—20,0 intramuskulär.
Normacol, 2mal tgl. 1 Kaffeelöffel.
Ol. Ricini 3,0 in Kapseln, 5—8 Kapseln.
Ol. Sesam. 100,0—200,0 Klysma.
Peristaltin in Amp. 1,0—2,0 subkutan, 1,0 intravenös,
1—3 Tabl. tgl.
Phenolphthalein 0,05, 0,1, 0,5, 1—2 Pillen tgl.
Physostygmin. salicyl. 0,0005—0,00075 subkutan (bei
Darmlähmung).
Pil. laxant. (offizinell), 1—3 Pillen.
Pituitrin 1,0 subkutan (bei Darmlähmung).
Podophyllin 0,4, Extr. belladonnae 0,4, m. pil. ad pil.
XL., 1—2 Pillen tgl.
Pulv. liquirit. composit., kaffeelöffelweise.
Pulpa Tamarindor., eßlöffelweise.
Pulv. rad. Rhei, 3 Messerspitzen tgl.
Rad. Rhei, Magn. ust., Natr. bicarb. aa, 3 Messerspitzen
tgl.
Regulin, kaffeelöffelweise in Apfelpüree.
Saccharum lactis, 1—3 Eßlöffel tgl.
Sal. therm. Carol. artef. $\frac{1}{2}$ —2 Kaffeelöffel tgl. in lauwarmem Wasser gelöst.
Semen Psyllii, kaffeelöffelweise in Kompott.
*Sennatin, 2,0—5,0 intramuskulär.
Syrup. Fici („Califig“), 1—2 Kaffeelöffel tgl.
Syrup. mannatus 50,0 (auf einmal zu nehmen).
Syr. rhamni frangulæ, kaffeelöffelweise.
Supposit. Glycerin. 2,0.
Supposit. Ol. Cacao 2,0.
*Tonephin in Amp. zu $\frac{1}{2}$ —1,0 intramuskulär, 0,2—0,5
intravenös.
Tinctura balsamica, kaffeelöffelweise.

Tubera Jalap. 5,0, Phenolphthalein 2,5, Podophyllin 0,5,
Gutti 0,5, Extr. Bellad. 0,25 f. Pastill. Nr. 50,0, 1—3
Pastillen.

Nervina, Tonica

Bornyval in capsul. gelat. 0,25, 2—4 Kapseln tgl.

*Dialys. nuc. Kolae, 3mal 15 Trpf.

Extr. Kolae aquos. spiss. 0,1, mehrmals tgl.

Extr. Strychni 0,2, Extr. et pulv. rad. rhei ad pil.
Nr. XL., 1—2 Pillen tgl.

Ferratin 0,1 pro Pill., 4—6 Pillen tgl.

Ferr. carbon. sacchar., messerspitzenweise.

Ferr. hydrooxyd. dialys. liquid., 3mal 10—20 Trpf.

Ferr. jodat. 0,015 pro Pill., 4—6 Pillen tgl.

Ferr. lact. 3,0 (sive Ferratin 10,0), Extr. Strychni 0,5,
Extr. Chiniae 2,0, f. pil. Nr. C., 3 Pillen tgl.

Ferr. oxyd. sacchar. solub., 3mal 0,5 tgl.

*Gynoval, Originalkapseln, 0,25, 1—5 Kapseln tgl.

*Juvenin 3mal tgl. 1 Dragee.

Klimasan-Tabletten, 3 Tabl. tgl.

*Natrium sulfanilic. 0,5—1,0 in Lösung oder als Pulver.

Natrium phosphoric. zu 1,0—2,0 mehrmals tgl.

Pro ossa 3mal tgl. 1—2 Teelöffel in Wasser.

Phosphor 0,01 (= Ol. Phosphor 10,0), Ol. jecor. aselli
100,0 1 Kaffeelöffel tgl.

Phosphor 0,01, Ol. jecor. aselli 60,0, Mucilag. gummi
arab. 30,0, Aqua font. 15,0 f. Emulsio, $\frac{1}{2}$ —1 Kaffeelöffel tgl.

Pil. Blaudii (Ferr. carbon. 0,01 pro Pille). 3—5 Pillen
tgl.

Recresal, 2—5 Tabl. tgl., 2mal 15 Trpf. tgl.

*Syrup. Kolae comp., 3 Kaffeelöffel tgl.

Tet. malat. ferri, 3mal 10—20 Trpf. tgl.

Tet. nerv.-tonic. Bestuscheff, 3mal 10—20 Trpf. tgl.

Triferrin 0,3 pro Pill., 3 Pillen tgl.

Tonicum „Roche“ 3mal tgl. 1 Kaffeelöffel.

*Vinum Kolae, 50,0—100,0 tgl.

Validol (Menthol. valerian.), 3—5mal 5 Trpf. tgl.

Valofin, 3mal 20—25 Trpf. tgl.

*Valyl-Perlen zu 0,125, 4—6 tgl.

Obstruentia

Acid. tannic. zu 0,3, 3 Pulver tgl.

*Adsorgan, 1 Kaffeelöffel mehrmals tgl.

- *Bolucarbon mehrmals tgl. 1 Tabl.
Bismut. subgallic. (= Dermatol).
Bismut. salicyl. zu 0,5—1,0, 3 Pulver tgl.
Bismut. salicyl., Benzonaphthol, Salol zu 0,3 3 Pulver
tgl.
Bismut. subnitr. zu 1,0, 4—6 Pulver tgl.
Bismut. tannic. zu 0,5, 4—6 tgl.
Bolus alba 50,0 : 150,0, Aqua Menth. Tagesdosis.
Calcar. carbon. pur. (pro usu intern.), 1—3 Kaffee-
löffel tgl.
Carbo animal. 2,0—5,0 mehrmals tgl.
Decoct. Salep. 5,0 : 150,0 (Tet. opii spl. gtt. X—XXX).
Dermatol (Bismutum subgallic.), 3—5mal 0,5 tgl.
Pulv. Doveri 3,0, Extr. belladon. 0,1, Sacch. 6,0, div. in
dos. XX., 3—6 Pulver tgl.
Heidelbeersaft (alkoholfrei). Decoct. myrtill. 200,0 tgl.
Ipecopan 3mal tgl. 1 Tabl.
Pulv. opii 0,10, Sacchar. 0,3, 2—3 Pulver tgl.
*Sanasorben (Kohle), 1—2 Päckchen tgl.
Semen Querc. tost. (Eichelkaffee).
Stärkeklysmen.
Tanninklysmen ($\frac{1}{4}$ — 2% acid. tannic.).
Tannalbin (Tannin, albumin) zu 1,0 3—6 Pulver tgl.
Tannigen zu 0,5, 4—8 Pulver tgl.
*Tannismut (Bismut. subtannic.) zu 1,0 mehrmals tgl.
Tet. Coto, 3mal 15 Trpf.
Tet. opii simpl., 3mal 8—10 Trpf. tgl.

Organ- und Hormontherapie

- Adrenalin hydrochl. (Adrenosan Sanabo) 1 : 1000, sub-
kutan 0,25—1,0.
Antithyreoidin Möbius-Tabletten zu 0,05 3 Tabl. tgl.,
2mal 15—20 Trpf. tgl.
Antithyreoidin „stark“ Tabletten zu 0,5 3 Tabl. tgl.
Asthmolysin (Adrenalin 0,0003, Pituitrin 0,2) zu
0,5—1,0 subkutan.
Campolon Leberextrakt (1 Amp. = 500 g Frischleber)
Amp. zu 2,0 mehrmals tgl. intramuskulär.
Elityran Tabl. (Thyroxin) zu 25 mg E 1—2 Tabl. tgl.
Epiphysin in Ampullen 0,5—1,0 subkutan.
Hypophysin subkutan 1,0.
*Hepatopson. liquid. 2—3 Eßlöffel tgl.
*Hepatrat 5,0—6,0 tgl.

- Hogival (weibl. Sexualhormon). Amp. zu 50 ME. u. 100 ME. subkutan.
- Insulin (Degewop, Höchst, Lilly) 10—100 Einheiten tgl., im Koma 40—50 Einheiten, 4—6mal tgl., 5—20 Einheiten, 1—2mal tgl. als Roborans (Kontrolle des Blutdruckes).
- *Klimakterin 3mal tgl. 1—2 Bohnen.
- *Lipolysin intramuskulär.
Menformon (= Folliculin) (weibl. Sexualhormon) Amp. zu 1,0 (= 100 ME) subkutan.
- *Mucotrat, Magenextrakt, kaffeelöffelweise.
- *Myoston, Skelettmuskelextrakt in Amp. täglich intramuskulär.
- Milzpräparat „Degewop“ während des Essens 20,0 bis 25,0 g Pulver tgl.
- Ovarin 3 Tabl. tgl.
- Ovoglandol in Amp. 1,0 subkutan.
- *Ovosan Tabletten zu 0,1—0,3, 3—6 Tabl. tgl.
- *Owowop (Ovarialsubstanz mit 5 ME., Menformon pro Dragee) 2—4 Dragees 3mal tgl.
- Parathormone (Nebenschilddrüsenpräp.) in Amp. subkutan (kühl aufbewahren). Genaue Indikation!
- Progynon (Zyklushormon) 1 Dragee zu 250 ME.
- Prokliman 2mal tgl. 2 Tabl.
- Prolan (Hypophysenvorderlappenhormon) 1—3 Dragees tgl.
- Pernaemon (Leberextrakt) 1—3 Eßlöffel (entspricht 100—300 g Frischleber) 1,0—2,0 intramuskulär tgl.
- Pankreon Tabl. zu 0,25 3 Tabl. tgl. (zerkauen).
- Pituglandol, Pituitrin, Pituisan in Amp. zu 0,5—1,0 subkutan.
- Präphyson (Hypophyse pars anterior) Sanabo in Amp. 1,0 subkutan.
- Splenotrat, Milzextrakt.
- Stomopson, Magenschleimhautpräp. 30,0 tgl.
- Synthalin B Tabl. à 5 mg 3mal tgl. 1—2 Tabl.
- Testosan Tabletten zu 0,3, 1—3 Tabl. tgl., in Amp. 0,5—1,0 intramuskulär.
- Testogan in Amp. 0,5—1,0 intramuskulär.
- Thelygan in Amp. 0,5—1,0 intramuskulär.
- Gland. Thymi-Tabletten zu 0,1, 3 Tabl. tgl.
- Thyreоidea (Burrough-Wellcome, Merk, Richter).
- *Thyreosan, Thyrephorin Tabletten zu 0,1—0,5, 1—3 Tabl. tgl. in Amp. 0,5—1,0 subkutan.
- Thyroxin 0,02, 1—2mal tgl. Tabletten.

- *Thyrowop (0,3 Schilddrüsenpulver entsprechend 0,1 mg Jod). 1—5 Tabl. tgl.
Unden 1,0 = 100 ME.
- *Ventraemon Magenschleimhautpräp. während d. Essens $1\frac{1}{2}$ —3 Tabl. oder 10—30 g Pulver tgl.
Vigantol. 2mal 5 Trpf. tgl., 2 Dragees tgl.

Refrigerantia, Roborantia

- Acid. citric., messerspitzenweise in Zuckerwasser.
Cognak 30,0, Vitell. ovi unius, Aqu. cinam. 100,0 Syr. spl. 20,0 als Tagesdosis.
Emulsio amygdalina 50,0—100,0.
Hafermehl (Nestle, Liebig, Knorr).
*Hygama 1—3 Kaffeelöffel in Milch tgl.
*Hypophosphit-Sirup, eßlöffelweise während der Mahlzeit.
*Larosan 20,0—40,0 tgl.
Lebertran-Emulsion, kaffeelöffelweise.
Lecithin in Tabl. 0,5, 2—5 Tabl. tgl.
Liqu. acid. Halleri 1,0, acid. phosphor. 5,0, Syr. rubi Idaei 40,0, 1 Kaffeelöffel auf 1 Glas Wasser.
Malzextrakt, kaffeelöffelweise.
Milch-Nährklysma: 200 Milch, 2 Eier, 1 Eßlöffel Rotwein, 1 Prise Salz, 1 Eßlöffel Stärke oder Sanatogen, 8 Trpf. Tct. opii.
Oxaphor 10,0, Aqu. amygdal. amar. 4,0, Syr. et spir. menthae piper. zu 20,0, Aqu. ad 200,0, Tagesdosis.
Pepton-Nährklysma 15,0 : 150,0.
*Perdynamin, 3 Kaffeelöffel tgl.
Sanatogen, messerspitzenweise.
*Somatose, 3—4mal tgl. 1 Teelöffel.
Sorisin (Sirolin, Syr. Guajac. comp.), 3 Kaffeelöffel tgl.
Zuckertropfklysma 10—15%.

Sera und Vakzine

- Arthigon diagn. 0,03—0,1, therap. 0,05—0,1, steigend bis 1,0, intramuskulär und intravenös.
Coli-Vakzine (Serother. Institut, Autovakzine), Serie I und II 0,5—3,0 steigend, intramuskulär.
Diphtherie-Antitoxin 5000—10.000 A.-E. intramuskulär.
Dysenterie (Shiga-Kruse, polyvalent) Serum, 20,0 bis 80,0 subkutan, intravenös.

Gonokokkenvakzine (Serother. Institut), Serie I und II
5—2000 Millionen Keime steigend intramuskulär.
Hämotest zur Blutgruppenbestimmung.
Meningokokkenserum 10,0—20,0 intralumbal.
Staphylokokkenvakzine (Serother. Institut, Autovakzine), Serie I und II 0,5—3,0 steigend, intramuskulär.
Streptokokkenvakzine (Serother. Institut, Autovakzine), Serie I und II 0,5—3,0 steigend, intramuskulär.
Tetanusantitoxin 5,0—10,0 intramuskulär, intralumbal.
Typhusdiagnosticum, Paratyphus A, Paratyphus B,
Diagnosticum (Serother. Institut).
Typhusvakzine (Serother. Institut) 0,5—2,0 intramuskulär.
Vakzine zur Schutzpockenimpfung.

Stomachica, Antispasmodica, Cholagoga

Acid. hydrochlor. dilut. 0,5 : 150,0 eßlöffelweise.
Acid. hydrochlor. 6,0, Pepsin. 3,0, Sirup. Menth. pip.,
Sirup. Cort. Aurant. zu 30,0, 1 Kaffeelöffel auf 1 Glas
Wasser (Pawlowsche Mischung).
Aqu. carminat. 100,0 tgl.
Acidol-Pepsin 1—3 Tabl. tgl. (stark und schwach
sauer).
Aqu. chloroform., 1 Kaffeelöffel auf 1 Glas Wasser
mehrmais tgl.
Apomorphin. hydr. 0,005—0,01 subkutan.
Alumin. silicic. kaffeelöffelweise.
*Atophanyl 5,0 intramuskulär, 10,0, intravenös (be-
sondere Packung).
*Agobilin, 2—4 Tabl. tgl.
Atropin. sulf. 0,00025—0,001 subkutan.
Atropin. sulf. 0,0005, Papaverin hydr. 0,04 subkutan.
Atropin. sulf. 0,0005, Morph. hydr. 0,01 subkutan.
*Alucol 1 Kaffeelöffel mehrmais tgl.
*Bilival, 2—4 Pillen tgl.
*Bellafolin 1 Tabl. mehrmais tgl. in Amp. subkutan,
2—3mal 15—20 Tropfen.
*Belladonysat 2mal 15 Trpf. tgl.
*Bismoterran 1—2 Kaffeelöffel tgl.
*Choleflavin 3mal tgl. 2 Perlen.
Extr. belladon., Extr. hyoscyami aa 0,025 in Supposi-
torien.
Decoct. Condurango 8,0 : 150,0 tgl.

- Decholin 5% Lösung 10,0 intravenös.
*Degalol-Tabletten 0,1 2—3 Tabl. tgl.
Extr. mari veri fluid., 3mal tgl. 10 Trpf.
Extr. Condurango, 3mal 15 Trpf. tgl.
Extr. Strychni, Extr. Secal. cornute aa 0,5, Extr. fol.
Trif. fibr., Extr. Chin. aa 2,0 ad pil. C., 3 Pillen tgl.
Extr. Quassiae, Extr. Chin. aa 3,0, Extr. Nuc. vom.
1,0, M. f. pil. ad pil. C., 1—3 Pillen tgl.
*Felamin-Tabletten 2—3 Tabl. tgl.
Imido (= Histamin) in Amp. zu 0,25—1,0 subkutan.
Intestinol 1—2 Tabl. nach d. Essen.
*Ikterosan (Atophanpräparat) Schering in Ampullen,
intramuskulär, intravenös, 5,0 (nicht ungefährlich).
Karlsbader Salz (kristallisiert, pulverisiert), $\frac{1}{2}$ —2
Kaffeelöffel.
Karlsbaderwasser (Mühlbrunn, Schloßbrunn, Sprudel).
Magnesia ammon. phosphor. 30,0, Calcar. phosphor.
10,0, Elaeosacch. Menth. 5,0, messerspitzenweise.
Magnes. ammon. phosphor., Natr. citr. neutr. zu 25,0,
Extr. belladon. 0,1, 2mal tgl. 1 Kaffeelöffel.
Magnesiumperhydrol, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Teelöffel.
Fol. menthae piper., fol. menthae crispaee aa 100,0, rad.
onon. spin., rad. gent. aa 25,0, cort. frangulae 15,0,
tgl. 5 Eßlöffel auf 5 Schalen Tee.
Natr. choleinicum 0,25, 3—4 Pillen tgl.
Natr. citric. neutrale, messerspitzenweise.
*Neu-Cesol Tabletten zu 0,05, 2—3 Tabl. tgl., in Amp.
0,025 subkutan.
Novatropin-Tabletten 0,0025, 1—2 Tabl. tgl., Amp.
0,0025 subkutan.
Neutralon (Aluminium-Silikat) messerspitzenweise.
Orexinum tannic. 0,2 in Pil., 3 Pillen tgl.
Ol. amygdal. dulc., 2—3 Eßlöffel tgl.
*Ovogal (0,5) 2—3 Tabl. tgl.
Pankreon, Tabl. 0,25, 2—6 Tabl. tgl.
Papaverin, hydr. 0,04 subkutan.
Papaverin. hydr. 0,04, Extr. belladon. 0,01, Sacch. 0,4,
2—3 Pulver tgl.
Pepsin 0,5, 3mal tgl.
Rivanoletten (Darm-Desinficiens) Körner zu 0,025
2—3mal tgl.
Spir. menthae piper., 1 Eßlöffel auf 1 Glas Wasser.
*Spasmopurin, 2—3 Suppositorien tgl.
Tet. amara, 3mal tgl. 10—20 Trpf.
Tet. cort. aurant., Tet. cinam. aa 15,0, 3mal tgl. 15 Trpf.

Tet. nuc. vomic. 5,0, Tet. amara 15,0, 3mal tgl. 15 Trpf.
Vinum Condurango 50,0—100,0 tgl.
Extr. Condurango 25,0, Tet. Cinamom. 5,0, 3mal 20 Trpf.

Styptica

Afenil (Calciumchlorid-Harnstoff) in Amp. 10,0 intravenös.

Calc. lactic. mehrmals tgl. 1 Tabl.

Calcium „Sandoz“ 2—3 Tabl. tgl., 2—3 Kaffeelöffel tgl.
10,0 intramuskulär od. intravenös.

Calcium bromatum 10% 10,0 intravenös.

Calcium chloratum 1,5 : 20,0 Aqu. für 2 Mikroklysmen.

Calcium chloratum 10% Lösung, 10,0 intravenös.

Ol. camphor. 25%, 2,0—10,0 subkutan.

Calcium chloro-acetic. 1,0—3,0 : 180,0, Gelatinae 20,0
(Tagesdosis).

Clauden 2% Lösung in Amp. 2,5—10,0 subkutan.

Coagulen 2,0—15,0 subkutan.

*Epirenan, 10 Trpf. mehrmals tgl.

Ergotin (Extr. haemostaticum) 1,0, Aqua font. 130,0,
Sirup. Menth. pip. 20,0 als Tagesdosis.

Ergotin 2,0, Chinin. mur. 4,0, Extr. belladon. 0,4, f.
pil. Nr. XL, 2—4 Pillen tgl.

Ergotin 0,5, Glycerin, Aqua dest. aa 5,0, 0,5—1,0 sub-
kutan (Ersatz für das teuere Ergotin. Bombellon).

*Extr. Capsulae bursae pastor. fluid., 3mal 20 Trpf.

Extr. Hamamelid. Virg., 3mal 15 Trpf. tgl.

Extr. Hydrastid. Canad., 3mal 15 Trpf. tgl.

Gelatinae 8,0 : 150,0, Acid. citric. 0,5 pro die.

Gelatinae purae alb. 20,0 : 180,0, Sirup. Menth. pip. 20,0,
Calcium chloro-acet. 2,0, Morphin. hydrochlor. 0,01
—0,02.

Gelatina steril. 40,0 in tub. origin. subkutan.

Inkalven Amp. zu 10,0 intravenös.

Kalzan mehrmals tgl. 1 Tabl.

Morphin. mur. 0,2, Atropin. 0,01, Aqua dest. 10,0, 0,5
bis 1,0 subkutan.

Natr. chlorat. 10%, 10,0—20,0 intravenös.

Pepton 5% Lösung, intramuskulär (auch Antidiarrhoi-
cum, Antiasthmaticum).

Pferdeserum (karbolfrei) 5,0—10,0 intramuskulär.

Plumb. acet. 0,05 (Morphin. mur. 0,005), 3—5 Pulver tgl.
Pulv. Secale cornuti 0,3, 1—2 Pulver tgl.

*Secaeornin Tabl. 1—2 Stück tgl.

Stryphnon 5% Lösung, 1,0 subkutan, 5‰ Lösung, 1,0 intravenös.

Stypticin (Styptol), Tabl. zu 0,05, 3—4 Tabl. tgl.

*Selvadin Amp. zu 5,0 und 10,0 intramuskulär.

Terpen. hydrat. 0,25 ad caps. gelat., 3 Kapseln tgl.

Tuberkulose-Behandlung

Acid. camphor., 3—5mal 0,5.

Agaricin 0,005 in Pillen, 1—3 Pillen tgl.

Albumosefreies Tuberkulin steigend von 0,001 mg subkutan.

Alttuberkulin in physiolog. NaCl-Lösung gelöst, von 0,001 mg jeden 3. Tag steigend, subkutan.

Alttuberkulin 0,1, Aqu. dest., Glycerin aa 5,0 zur Einreibung mit 1 Trpf. beginnend, allmähliche Konzentrationssteigerung bis 10%.

Alttuberkulin zu diagnostischen Zwecken, $\frac{1}{50}$ — $\frac{1}{2}$ mg subkutan, frisch bereitete 1% Lösung für Ophthalmreaktion; 0,01‰—1‰ für intrakutan. Reaktion.

Atropin. sulf. 0,015, Extr. et pulv. rad. rhei ad pil. XXX., 1—3 Pillen tgl.

*Beranecks Tuberkulin, Anfangsdosis eine Spritze der Lösung A/124 steigend bis A 2, dann B-Lösungen.

Campher-Gelatinetten 2—4 Tabl. tgl.

*Capsul. cum Eucalyptol (Cognet): Eucalyptol 0,15, Creosot 0,05, Jodoform 0,01, 4 Kapseln tgl.

*Duotal, 3mal 0,3—0,5.

Eucalyptol 0,15—0,25, 1—3 Kapseln tgl.

Eumydrin 0,001—0,0025, 1—2 Pulver tgl.

Extr. hyoscyam., Extr. bellad. aa 0,025, 1—2 Pillen tgl.

Guajaceton 0,5, 3mal tgl.

*Guacamphol, Natr. bicarb. zu 0,25, 1—3 Pulver tgl.

*Gamelan-Tafeln zur Einreibung.

Kreosot 0,1, Ol. jecor. aselli 0,2 in capsulis gelatin., 3 Kapseln tgl.

Kreosotal 1,0—2,0, 1—3 Kapseln tgl.

*Manganchlorid $\frac{1}{2}\%$ wässerige Lösung, 1,0—4,0 intravenös.

Methylatropinum bromat. 0,0005 in Pill., 1—3 Pillen tgl.

*Mineralogen, 1—2 Kaffeelöffel tgl. (besondere Diätvorschriften).

Myrtol in Capsul. gelatin. 0,15, 3 Kapseln tgl.

Neutuberkulin (Bazillen-Emulsion) von 0,001 mg steigend subkutan.
Ol. Cupressae tropfenweise zur Inhalation.
Ol. Eucalypti, 4mal tgl. 5 Trpf.
Perlsucht-Tuberkulin intramuskulär mit 0,001 mg beginnend.
Pneumin 20,0, Natr. bicarbon. 40,0, 3 Messerspitzen tgl.
Salvysat 3mal tgl. 15 Trpf.
Sapon. kalin., Vaseline zu 25,0, Ol. lavandul. gtt. II zur Einreibung.
Syrup. Guajacol. comp. 3 Kaffeelöffel tgl.
Syrup. Thymi., 3—6 Kaffeelöffel tgl.
Tct. Eucalypt., 1—2 Kaffeelöffel.
Tct. Salviae, 3mal 20,0 Trpf. tgl.
Terpinol, 3mal 15 Trpf. tgl.
Thiocol, 3mal 0,3—0,5.
Triphal (Goldpräparat) 0,008 steigend bis 0,015 intravenös.
*Tuberculomuçin (Weleminsky).
Lopian (Goldpräparat) 0,08—0,015 intravenös.
Solganal (Goldpräparat) 0,01 intravenös.

Bei Erkrankungen des uropoetischen Apparates

*Albargin 1,0 : 1000,0 (für Blasenspülungen).
Borovertin-Tabletten 0,5, 4 Tabl. tgl.
Cylotropin (Urotropin-Coff.-Salicyl) in Amp. 5,0 intramuskulär, intravenös (besondere Packung!).
Cystopurin in Tabl. zu 1,0 3—6mal tgl.
Agoleum (5% wässrige Kollargollösung, Ol. Sesamia 10,0) zur Instillation.
Extr. Rhois aromatic. fluid., 3mal 15 Trpf. gegen Enuresis nocturna der Kinder.
Hemmitol 0,5, 3 Pulver tgl.
Herba Herniar., Herba Chenopodii, Fol. Uv. ursi aa 2—3 Tassen Tee tgl.
Herba Equiset. arvens. Decoct. 15,0 : 150,0 tgl.
Hetalin 0,5 3 Tabl. tgl.
Hexal-Tabletten 0,5 3—5 Tabl. tgl.
Natr. sozojodol. 1,0 : 4000,0 (Blasenspülung).
Neotropin (Pyridium) Dragees zu 0,1 3mal tgl.
Salol 0,5, 3—6mal tgl.

Urotropin (Hexamethylentetramin) 0,5, 3—6mal tgl.,
40% Lösung, 1,0—2,0 intravenös.
Uvalysat 3mal tgl. 15—20 Trpf.

Verband- und Desinfektionsmittel

Acid. carbolic. crystal. 25,0 : 500,0 zur Wäschedesinfektion.
Alkohol 50—60%, zu Umschlägen (mit 3 Teilen Wasser verdünnt).
Antiphlogistine erwärmt zur Einpackung.
Alum. crud. 3,0 Plumb. acet. basic. sol. 15,0, Vaselin 100,0 (zu Salbenumschlägen).
Aluminium acetic. 25,0 : 500,0, zu Umschlägen.
Argent. nitr. fusum.
Balsam. peruvian. Rein oder als 5%—10% Salbenzusatz.
Calcaria bituminata (subtilissime pulverisat.).
Cedeform (analog Lysoform).
Hydrarg. bichlorat. corros. in Tabl. zu 0,5—1,0.
Hydrargyr. oxycyanat. 0,2 : 5000,0 zu Blasenspülungen (nicht ungefährlich).
Hydrogen. hyperoxydat., 3% Gurgelwasser.
Jodoformkolloidum 10%.
Lysol in 1% Lösung für Instrumente.
Mastisol.
Pellidolsalbe 2% in Tuben.
Plumb. acet. basic. solut. 25,0 : 500,0 zu Umschlägen.
Plumb. acet. basic. solut. 25,0, Alumen crud. 5,0, Aqua font. 500,0 (ne filtra!), zu Umschlägen.
Preglsche Jodlösung.
Stryphnon-Gaze.
Yatren pur., 2—4% wässrige Lösung zu Spülungen.
Rivanol 0,2 : 1000,0 zu Blasen- und Darmspülungen.

MANZSCHE BUCHDRUCKEREI, WIEN, IX

Verlag von Julius Springer / Berlin

Grundlagen der allgemeinen und speziellen Arzneiverordnung. Von Paul Trendelenburg †, Professor der Pharmakologie an der Universität Berlin. Dritte, verbesserte Auflage. IV, 285 Seiten. 1931. Gebunden RM 17.50

Arzneiverordnungen zum Gebrauche für Klinizisten und praktische Ärzte. Zusammengestellt von Professor Dr. S. Rabow, Hon.-Professor der Universität Lausanne, und Professor Dr. S. Janssen, Direktor des Pharmakologischen Universitäts-Institutes Freiburg i. Br.
I. Teil: Sechst und fünfzigste, umgearbeitete Auflage. VI, 208 Seiten. 1930. Gebunden RM 4.80*
II. Teil: **Neueste Arzneimittel, Spezialitäten und Geheimmittel.** 100 Seiten. 1930. Gebunden RM 4.50*
Teil I und II zusammen in zwei Bänden gebunden RM 8.10*

Handbuch der allgemeinen und speziellen Arzneiverordnungslehre für Ärzte. Mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Arzneimittel-Gesetzgebung, zugleich als Pharmacopoea universalis. Fünfzehnte, gänzlich umgearbeitete Auflage. Auf Grundlage des Deutschen Arneibuches 6. Ausgabe und zahlreicher ausländischer Pharmakopöen bearbeitet von Dr. G. Klemperer, Geh. Medizinalrat, Professor, Direktor der IV. Medizinischen Universitätsklinik im Städtischen Krankenhaus Moabit, Berlin, und Dr. E. Rost, Geh. Regierungsrat, nichtbeamter a. o. Professor an der Universität, Mitglied des Reichsgesundheitsamtes Berlin. XII, 944 Seiten. 1929. RM 64.—; gebunden RM 67.40*

Schlafmittel-Therapie. Von Dr. Albrecht Renner, Städtisches Krankenhaus Altona. (Erweiterter Sonderabdruck aus „Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde, 28. Band.“) IV, 125 Seiten. 1925. RM 4.80*

Die Wirkungen von Gift- und Arzneistoffen. Vorlesungen für Chemiker und Pharmazeuten. Von Professor Dr. med. Ernst Frey, Marburg an der Lahn. Mit 9 Textabbildungen. VI, 176 Seiten. 1921. RM 5.—*

Einfaches pharmakologisches Praktikum für Mediziner. Von R. Magnus, Professor der Pharmakologie in Utrecht. Mit 14 Abbildungen. VIII, 51 Seiten. 1921. RM 2.—*

Arznei als Wert. Antrittsvorlesung gehalten zu Heidelberg am 29. November 1930 von Wolfgang Heubner, Professor der Pharmakologie. 26 Seiten. 1931. RM 0.90*

* Auf die Preise der vor dem 1. Juli 1931 erschienenen Bücher wird ein Notnachlaß von 10% gewährt.

Syphilis und innere Medizin. Von Hofrat Professor Dr. Hermann Schlesinger, Vorstand der III. Medizinischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses in Wien.

I. Teil: **Die Arthro-Lues tardiva und ihre Therapie.** Mit 8 Abbildungen im Text. IV, 165 Seiten. 1925. RM 9.90*

II. Teil: **Die Syphilis der Baucheingeweide.** Mit 17 Abbildungen im Text. VI, 283 Seiten. 1926. RM 19.50*

III. Teil: **Die Syphilis des Zirkulations- und Respirationstraktes und der innersekretorischen Drüsen. Syphilis und Blutkrankheiten.** Mit 12 Abbildungen im Text. VI, 284 Seiten. 1928. RM 18.—*

Syphilis: Herz und Gefäße. Innersekretorische Drüsen. Intestinaltractus. Leber. Luftwege. Lungen. („Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten“, Band XVI, 2. Teil.) Mit 146 meist farbigen Abbildungen. VIII, 866 Seiten. 1931.

RM 186.—; gebunden RM 191.80*

Syphilitische Veränderungen des Herzens und der Arterien. Von G. Herxheimer-Wiesbaden. — Syphilitische Veränderungen der Venen. Von C. Evelbauer-Wiesbaden. — **Die syphilitischen Erkrankungen des Herzens und der großen Gefäße, der innersekretorischen Drüsen.** Von H. Schlesinger-Wien. — Syphilis des Intestinaltractus und des Peritoneum. Von A. Gigon-Basel. — Syphilis der Leber. Pathologische Anatomie. Von G. Herxheimer-Wiesbaden. — Klinik der Lebersyphilis. Von A. Bittorf Breslau. — Syphilis der Nase und des Nasenrachenraumes. Von K. Grünberg-Bonn und G. Theissing-Bonn. — Die Syphilis des Kehlkopfes und der Lufröhre. Von W. Klestadt-Magdeburg. — Die Syphilis der Lunge und des Mediastinum. Von A. Lieven-Aachen.

Syphilis-Therapie. („Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten“, Band XVIII.) Mit 43 zum Teil farbigen Abbildungen. XI, 1035 Seiten. 1928. RM 136.—; gebunden RM 144.—*

Quecksilber: Theoretisches, Chemisches und Experimentelles. Von S. Lomholt-Kopenhagen. — Praxis der Quecksilberbehandlung. Von O. Rosenthal-Berlin. — Quecksilberschädigungen. Von J. Almkvist-Stockholm. — Wismut: Theoretisches, Chemisches und Experimentelles. Von S. Lomholt-Kopenhagen. — Praxis der Wismutbehandlung. Von H. Müller-Mainz. — Die Nebenwirkungen der Wismutbehandlung. Von F. Juliusberg-Braunschweig. — Salvarsan: Chemisches und Experimentelles. Von W. Weise-Hamburg. — Die Praxis der Salvarsanbehandlung. Von P. Linser-Tübingen. — Schädigungen durch Salvarsan. Von W. Kerl-Wien. — Jod und Jodalkalien: Experimentell-Pharmakologisches. Von J. Pohl-Hamburg. — Jodbehandlung der Syphilis. Von W. Heuck-München. — Die anderen Antisyphilitica: Experimentelle und klinische Ergebnisse. Von A. Perutz-Wien. — Die physikalische Behandlung der Syphilis. Von C. A. Hoffmann-Berlin. — Allgemeine Behandlung und Abortivbehandlung der Syphilis. Von J. Werther-Dresden. — Persönliche Prophylaxe der Syphilis. Von P. Manteufel-Düsseldorf und W. Wörms-Berlin.

* Auf die Preise der vor dem 1. Juli 1931 erschienenen Bücher wird ein Notnachlaß von 10% gewährt.