

**Fr. A. OTTO**  
**Pharmazeutisches**  
**Tiermanual**

Pharmazeutisches  
**Tier-Manual**

von

**Friedrich Albrecht Otto**  
Apotheker, Hamburg



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH

1918

**Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen,  
vorbehalten.**

**Copyright 1918 by Springer-Verlag Berlin Heidelberg**

**Ursprünglich erschienen bei Julius Springer in Berlin 1918**

**Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1918**

**ISBN 978-3-662-42111-6**

**ISBN 978-3-662-42378-3 (eBook)**

**DOI 10.1007/978-3-662-42378-3**

Pharm. Zeit. 1916, Nr. 96, 29. Novbr., S. 730.

Wenn jemand in der Apotheke ein Räudemittel usw. verlangt und der Apotheker ein solches nach einer bekannten Vorschrift verabfolgt, so liegt keine Ausübung der Tierheilkunde vor. Man kann diese Ansicht auf ein Urteil des K. G. vom 29. Mai 1902 (Pharm. Zeit. 1902, Nr. 45) stützen. Außerdem ist zu bestreiten, daß die Ausübung der Tierheilkunde den preussischen Apothekern verboten ist.

## **Vorwort.**

Ich unterbreite hiermit den Kollegen ein „Pharmazeutisches Tier-Manual“; es soll nicht den Tierarzt ersetzen, sondern den Apothekern von Stadt und Land in der Pharmazeutischen Praxis ein unentbehrliches Nachschlagewerk sein und somit gute Dienste leisten.

**Der Verfasser.**

## Allgemeines.

### Ameisenvertilgung.

I. Ammon. carbon.  
Rhiz. Calami  $\overline{aa}$   
DS. Ausstreuen.

II. Sacchar. pulv.  
Sulfur  $\overline{aa}$   
DS. Ausstreuen.

### Blähsuchtstropfen.

I. Tinct. Asae foetid. 30,0  
— Valer. aether. 30,0  
— Capsic. 10,0  
Ol. Menth. pip. 5,0  
misc. DS. Bei Kolik Pferd  $\frac{1}{2}$ ,  
Fohlen  $\frac{1}{4}$  Port. Kühen  
2—3 Eßl. Rindern u. Käl-  
bern halb so viel in Kam-  
millentee.

II. Ol. Croton. 2,0  
— Lin. sulf. 30,0  
Liq. Ammon. caust. 50,0  
Ol. Carvi 4,0  
Tinct. Aloes  
— Asae foetid.  $\overline{aa}$  15,0  
DS. 1 Eßlöffel voll mit  $\frac{1}{4}$  Liter  
Wasser alle 10—20 Minu-  
ten. Für Jungvieh ent-  
sprechend weniger.

### Blasenziehende Salbe.

Cantharid. pulv. 2,4  
Euphorbii pulv. 2,0  
Adip. benz. 20,0

Ol. Juniper.  
— Rosmar.  
— Terebinth.  $\overline{aa}$  gtt. 20  
m. f. ungt.

### Bremsensalbe.

Vaselin 90,0  
Creolin 10,0  
m. f. ungt.

### Butterfarbe.

Buttergelb (Brauns & Co.  
1532) 2,5  
Hanföl 100,0  
misc. et solv.

### Butterpulver.

Curcuma pulv. 1,0  
Natr. bicarbon. 100,0  
m. f. pulv. DS. 50,0 auf 20 Liter  
Milch in Wasser gelöst der  
Milch zusetzen.

### Desinfektionsöl.

Creolin  
DS. 1 Eßl. auf 1 Liter lauw.  
Wassers gemengt.

### Dreierlei Öl.

Ol. Lauri  
— Hyoseyam.  $\overline{aa}$  30,0  
— Terebinth. 40,0  
misc. DS. morgens und abends  
täglich einreiben.

**Durchfallpulver für Großvieh.**

Natr. bicarb.	100,0
— chlorat.	150,0
Ferr. sulfur.	75,0
Cort. Querc. pulv.	75,0
misc. DS. 3 × tägl. 1 Eßl. voll ins Futter.	

**Durchfallpulver für Kleinvieh.**

Acid. tannic.	3,0
Rhiz. Tormentill. p.	10,0
Rad. Gent. p.	10,0
Magn. carbon.	7,0
misc. pulv. DS. 4–5 × tägl. 1 Eßlöffel.	

**Durchfalltinktur für Kleinvieh.**

Acid. salicyl.	2,0
Spiritus	50,0
Aqua dest.	46,0
Tinct. Catechu	2,0
DS. 4–5 × tägl. 1 Teelöffel voll in Schleim.	

**Drusen- und Kehlkopfsuchts-  
tropfen.**

I. Ammon. chlorat.	10,0
Aqua dest.	50,0
Elix. e Succ. Liquir.	30,0
Liq. Ammon. caust.	10,0
DS. 4 × tägl. 50 Tropfen auf Brot oder Zucker.	

II. Innerlich: Natr. sulfuric.  
DS. 1–2 Eßlöffel voll.

**Felle-Bearbeitung.**

Das Fell wird mit der Fleischseite nach oben auf ein Brett gespannt und mit Alaunpulver und Sodapulver im Verhältnis

von 10 : 1 bestreut; die Gerbung wird so lange wiederholt, wobei das Fell mit einer Gießkanne besprengt wird, bis es gar ist, d. h. bis ein am Rande genommener Querschnitt, mit Essigsäure befeuchtet, keine glasige Schicht mehr zeigt. Die Fleischseite wird dann abgewaschen und Dégras oder Tran eingefettet.

**Fieberhafte Erscheinungen.**

Acid. mur.	50,0
Spiritus	150,0
Aquae dest.	1000,0
DS. 2–3 × tägl. 100,0 ins Trinkwasser.	

**Fistelgeschwüre usw.**

Jodoform	10,0
Acid. tannic.	5,0
Carb. veg.	30,0
DS. Ausspritzen resp. Auswaschen der Fistelgänge und Einblasen obigen Pulvers. Öfter täglich zu wiederholen.	

**Frischerhaltung von Vollmilch.**

Für je 1 Liter Milch sind im Winter 33 ccm, im Sommer 50 ccm H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 3% zuzusetzen. (Hydrogen. peroxydat.)

**Hufkitt.**

Ammoniakgummi	30,0
Terpentin	10,0
(schmelzen im Dampfbade)	
Guttapercha	60,0

DS. Mit heißem Wasser erweicht in die mit Weingeist gereinigte Hufspalte eindrücken.

**Hufschmiere.**

Lanolin	40,0
Sebum ov.	20,0
Terebinth	5,0
Pix liquid.	20,0
Sapon. vir.	5,0
Aqua	10,0

m. f. ungt.

DS. Zum Einschmieren d. Hufe.

**Konservierungssalz.**

Kal. nitric. pulv.	150,0
Natr. chlorat. crud.	300,0
Acid. boric. pulv.	50,0

m. f. pulv.

**Läusesalbe.**

I. Ungt. Hydrarg. cin.	25,0
Adip. suillus	25,0
Ol. Lavandul. gtt. X.	

m. f. ungt.

II. Naphtalin	5,0
Ol. Cupressi	5,0
Sap. virid.	40,0
Lanolin anhydr.	10,0

m. f. ungt.

DS. Jeden Abend auf die leidenden Stellen gestrichen.

**Lebertran-Emulsion fürs Vieh.**

Tuber. Jalap. pulv.	
Ferr. lactic.	aa 18,0
Magn. usta	36,0
Calc. carbon. pulv.	90,0

Calc. phosphoric. crud.	180,0
Ol. Lini	270,0
Jecor. Asell.	810,0
Aqua Cabariae	1080,0

m. f. emuls.

**Mäuse- und Rattengift.**

Calc. sulfur. ust.	
Sacchar. alb. pulv. aa	

DS. Auf einen Teller in die Nähe eines Gefäßes mit Wasser gesetzt.

**Neunerlei Öl.**

Ol. Rosmarin.	5,0
— Juniperie lign.	10,0
— Terebinth.	70,0
— Petrae	50,0
— Rapae	75,0
Tinct. Capsici	20,0
Spir. saponat.	50,0
— Formicar.	50,0
— camphor.	50,0
Liq. Ammon. caust.	20,0

m. f. liniment.

DS. 3—4 × tägl. einreiben.

**Restitutionsfluid.**

I. Tinct. Capsic.	15,0	} solv.
Spiritus	20,0	
Spir. camphor.	10,0	
— aether.	10,0	
Ol. Terebinth.	1,0	
Liq. Ammon. caust.	2,0	
Ammon. chlorat.	5,0	} misc. et solv.
Natr. chlorat	2,0	
Aqua destill.	35,0	

II. Spir. russic.	600,0
Ammon. chlorat. cr.	50,0
Natr. chlorat. cr.	20,0
antea solut. in	
Aqua destill.	330,0
misc.	

**Scharfe Salbe (Ungt. acre).**

Cantharid. pulv.	225,0
Euphorb. pulv.	30,0
Colophon.	140,0
Tereb. commun.	140,0
Cer. flav.	70,0
Adip. suillus	1000,0
m. f. ungt.	

**Verstärkte scharfe Salbe.**

Cantharidin	2,0
Ol. Tereb. q. s.	
add. len. cal. Ungt.	
basilic.	970,0
add. Euphorb.	25,0
m. f. ungt.	

**Vertilgung von Füchsen.**

Zum Vertilgen von Füchsen empfiehlt sich das Auslegen von strychninhaltigen Giftbrocken. Am besten verfährt man so, daß man in den Schlund eines kleinen, frisch geschossenen Vogels etwa 1,0 Strychnin einführt, und den Vogel dann in die Nähe des Baues oder auf einen bekannten Wechsel des Fuchses legt. Wasser muß in der Nähe sein. Auch kann man Wurst, Heringe oder Bücklinge als Köder nehmen. Um den Fuchs nicht durch den menschlichen Geruch abzuschrecken, tut man gut, vor der Behandlung des Köders die

Hände mit ein wenig Anisöl 14,0 und Moschustinktur 1,0 zu befeuchten.

**Vertilgung von Krähen.**

Ausstreuen von Semen Strychni tot.

**Tympanitessenz.**

I. Liq. Ammon. caust.	10%
Tinct. Asae foet.	
— Aloes	
Spir. aether.	aa ad 125,0
DS. Halbstündl. $\frac{1}{3}$ in Kalk-	
wasser od. Kamillentee.	

II. Liq. Ammon. caust.	95,0
Tinct. Aloes	5,0
misc. DS.	

**Viehwaschessenz.**

I. Tinct. Quassiae	
— Quillay	aa 50,0
— Asae foet.	25,0
— Aloes	25,0
Spir. denaturat.	50,0
Aqua destill.	300,0
DS. Beim Gebrauch verdünnt	
man mit 10 Liter Wasser.	

II. Rohsolutol »Heyden«	
DS. 1 Teil mit 20 Teil. Aqua	
verdünnen.	

**Viehwaschpulver.**

I. Semen Sabadill. pulv.	75,0
Rhiz. Verabri pulv.	15,0
Zinc. sulfuric. crud.	10,0
m. f. pulv.	



II. Zinc. sulfuric. 40,0  
Liq. Quassiae pulv. 200,0  
Tinct. Asae foet. 10,0  
Ol. Anisi 1,0  
m. f. pulv.  
DS. 125,0 mit 8 Liter Wasser  
und  $\frac{1}{4}$  Liter Essig  $\frac{1}{2}$  Stde.  
stark gekocht und darauf  
wird das verkochte Wasser  
ersetzt. Mit der noch lauwar-  
men Abkochung wird das  
Vieh mittels kräftigen Bür-  
stens abgewaschen, doch sind  
Augen, Nase und Maul vor

der Berührung damit zu be-  
wahren. Am 2. Tage nach der  
Waschung wird das mit auf-  
getragene, jetzt angetrocknete  
Pulver mit einem Strohwich  
zwischen die Haare eingerie-  
ben.

**Wunden jeder Art.**

Tinct. Myrrhae  
— Aloes aa 50,0  
Acid. carbol. 5,0

DS. Zum Pinseln.

## Pferde.

### Atemnot (Druse).

Ol. Liq. Juniperi  
DS. Auf einen heißen Stein  
träufeln und einatmen.

### Aufziehen (Satteldruck).

Zinc. oxydat.  
Aqua dest.           aa 10,0  
Acid. salicyl.       5,0  
Seb. ovil.           25,0  
Adip. suillus       50,0  
m. f. ungt.

### Augensalbe.

Ungt. Hydrarg. praec. flav.  
— Zinci           aa 10,0  
DS. Linsengroß tägl. 1× ins  
Auge einzustreichen.

### Augentropfen.

Argent. nitric.     0,1  
Aqua destill.       20,0  
DS. Tägl. 1× 2–3 Tropfen in  
das vorher mit Borwasser  
augewaschene Auge.

### Augenwasser.

Zinc. sulfur.       1,0  
Aqua destill.       500,0  
Tinct. Opii croc. q. s.  
DS. Zum Auflegen.

### Blutarmut (Anämie).

I. Ferr. pulv.       20,0  
  Natr. chlorat.   150,0  
  Rad. Gent. p.   150,0  
  m. f. pulv.  
DS. Tägl. 3 Eßl. aufs Futter.

II. Sulf. sublimat.   50,0  
  Stib. sulfurat. nigr. 25,0  
  Ferr. sulfuric.   25,0  
  Rhiz. Calam. pulv. 50,0  
  Natr. sulfuric. pulv. 150,0  
  Natr. chlorat.   200,0  
  m. f. pulv.

DS. Man gibt auf jedes Futter  
1 Eßlöffel.

### Bremsenöl.

Ol. Eucalypt.       10,0  
— Lauri           100,0  
— Rapae           500,0  
DS. A.

### Bronchialkatarrh.

I. Natr. chlorat.   500,0  
  Stib. sulfur. nigr. 100,0  
  Sem. Foenigraec. p. 50,0  
  Rad. Liquir. p.   50,0  
  m. f. pulv.  
II. Einreibung des Kehlkopfes.  
  Ungt. Hydrarg. ciner.  
  Ol. Hyoscyam.   aa 50,0

**Brustseuche (Influenza).**

I. Ammon. chlorat. 30,0  
 Kal. nitric. 30,0  
 Natr. sulfuric. 100,0  
 Rad. Liquir. p. 65,0  
 misc.  
 DS. 3 × tägl. 1 Eßlöffel voll in warmem Kleientrank.

II. Einreibung.  
 Spir. camphor.  
 — Sinapis aa 50,0

**Buglähme.**

Tinct. Capsici 15,0  
 Spiritus 20,0  
 — camphor. 10,0  
 — aether. 10,0  
 Ol. Terebinth. 1,0  
 Liq. Ammon. caust. 2,0  
 Ammon. chlorat. 5,0  
 Natr. chlorat. 2,0  
 Aqua 35,0 } solve  
 misc.

**Druckwunden.**

I. Liq. Alumin. acet.  
 DS. 2 Eßl. auf ½ Liter Wasser, 3 × tägl. waschen.

II. Pasta Zinci

**Druse (Atemnot).**

I. Ol. Lign. Juniperi  
 DS. Auf einen heißen Stein träufeln und einatmen.

**Druse.**

Innerlich:  
 Stib. sulfurat. aur. 15,0  
 Ammon. chlorat. 100,0

Fruct. Juniperi pulv.  
 Rad. Gent. pulv.  
 Sulf. sublimat. aa 250,0  
 Sem. Foenigraec.  
 Rad. Liquir. pulv. aa 120,0  
 misc.

DS. 3 × tägl. 1 Eßlöffel voll aufs Futter.

Einreibung der Kehlkopfgegend:  
 Spir. Sinap. 100,0  
 — camphor.  
 Ol. Terebinth. aa 50,0  
 DS. 3 × tägl. einreiben.

Ungt. einer.  
 Ol. Hyoscym. aa 50,0  
 misc.

Zum Breiumschlag:  
 Plac. sem. Lini  
 Flor. Chamomill. p. aa 200,0  
 Weizenkleie 600,0  
 DS. Man rührt das Pulver mit heißem Seifenwasser an u. legt den Breiumschlag auf die Anschwellungen des Halses.

**Dummkoller.**

Aloes 20,0  
 Natr. sulfur. 200,0  
 Plac. Sem. Lini 100,0  
 DS. misc. et fiat latwerge.  
 In 2 Portionen innerhalb 2 Stunden, dann Tierarzt.

**Durchfall.**

Natr. bicarbon. 100,0  
 — chlorat. 150,0

Ferr. sulfuric. 75,0  
Cort. Querc. pulv. 75,0  
misc. et pulv.  
DS. 3 × tägl. 1 Eßl. im Futter.

Sem. Foenigraec.  $\overline{aa}$  50,0  
Plac. Sem. Lini 150,0  
m. f. pulv.  
DS. 4 × tägl. 1 Eßl. aufs Futter.

**Ernährungsstörung.**

Natr. chlorat. 250,0  
— bicarbon. 100,0  
Rhiz. Calam. 50,0  
Ferr. pulv. 10,0  
DS. Auf jedes Futter 1 Eßl. voll.

II. Rad. Gentian. p. 200,0  
Natr. sulfuric. p. 100,0  
— chlorat. 50,0  
— bicarbon. 50,0  
m. f. pulv.  
DS. Auf jedes Futter 2 Eßl. voll.

**Fieber.**

Camphor trit. pulv. 2,0  
Kal. nitric. pulv. 8,0  
Tart. stibiat. 2,0  
Plac. sem. Lini 30,0  
Mel q. s.  
misc. f. bolus I tal. dos. VI.  
DS. 2 × tägl. 1 zu geben.

Cupr. sulfuric., Ferr.  
oxyd.  $\overline{aa}$  120,0  
Acid. acetic. glac. 90,0  
Glycerin 30,0  
DS. Wird mit Ol. Lini zu einer  
Paste verarbeitet.

**Fußfäule.**

**Fieberpillen.**

Camph. pulv. 2,0  
Kal. nitric. 8,0  
Tart. stibiat. 2,0  
Plac. Lini 30,0  
Mel q. s. f. bolus  
DS. Nicht öfters als 2 × tägl.  
zu geben.

I. Jod. pur. 1,0  
Kal. jodat. 5,0  
Sap. virid.  
Ungt. ciner.  $\overline{aa}$  35,0  
m. f. ungt.  
DS. Zum Einreiben.

**Galle.**

II. Tinct. Jodi 25,0  
Spir. saponat. 100,0  
DS. Tägl. 1 × einzureiben.

**Freßlustmangel.**

I. Natr. chlorat. 100,0  
— bicarbon. 50,0  
— sulfuric. 400,0  
Stib. sulf. nigr.  
Sulf. sublimat.  
Rad. Gentian.  
Rhiz. Calami  
Fruct. Juniperi p.

**Geschlechtstriebanregung.**

Cantharid. pulv. 1,0  
Fruct. Capsic. p. 6,0  
Fruct. Carvi p. 15,0  
f. pilul. Nr. 3.  
DS. Tägl. 1 Pille zu geben.

**Haarausfall.**

- I. Sem. Sabadill. pulv. 100,0  
 Alum. usta pulv. 40,0  
 Sulf. sublimat. 60,0  
 Ol. Olivar. 1000,0  
 diger. p. horas un. (I)  
 DS. Die kranken Tiere vorher  
 mit Teerschwefelseife was-  
 schen und mit dem Öl  
 3× tägl. einreiben.
- II. Tinct. Capsic. 1,0  
 — Chinae 10,0  
 Glycerin 90,0  
 DS. Zum Einreiben.
- III. Tinct. Cantharid. 1,0  
 Acid. tannic. 0,5  
 Glycerin 100,0  
 DS. Äußerl.

**Harnruhr.**

- I. Ferr. sulfur. 100,0  
 Fruct. Juniperi p. 50,0  
 Natr. chlorat. 100,0  
 — bicarbon. aa 250,0  
 Sem. Foenigraec. aa 100,0  
 Plac. Sem. Lini aa 100,0  
 misc. f. pulv.  
 DS. 4× tägl. 1 Hand voll aufs  
 Futter.
- II. Camphor. titr. 4,0  
 Rhiz. Zingib. p. 10,0  
 Roggenmehl q. s. (50,0)  
 Aqua q. s.  
 f. Latwerge tal. dos. VIII.  
 DS. Morgens und abends die  
 Hälfte geben.

**Harnverhaltung.**

- I. Fruct. Juniperi 330,0  
 Natr. sulfur. cryst. 150,0  
 Kal. nitric. 20,0  
 DS. Halbstündl. 1 Eßl. mit  
 $\frac{1}{4}$  Liter Kalkwasser oder  
 Kamillentee (Klistiere).
- II. Spir. camphorat.  
 Liq. Ammon. caust. aa  
 DS. Einreibung.

**Hautentzündung (nässende).**

- Pyoktanin 15,0  
 Pix liquid.  
 Sulf. sublimat. aa 100,0  
 Sap. virid.  
 Spiritus aa 200,0  
 Aqua 600,0  
 DS. Nach gründlicher Reini-  
 gung der Wundflächen wer-  
 den mit diesem Liniment  
 getränkte Wattebauschen  
 aufgebunden und tägl. er-  
 neuert.

**Hufbeschlag.**

- Ol. Pretoselin.  
 DS. Einige Tropfen auf ein Tuch  
 gegossen zur Beruhigung.

**Hufkitt.**

- I. Guttapercha 10,0  
 Ammiakharz 20,0  
 Tereb. ven. 5,0  
 wird geschmolzen und warm in  
 die Risse geschmiert.

- II. Ammiakgummi 30,0  
Tereb. 10,0  
Guttapercha 60,0  
f. Zylinder 9 cm/3,5 cm Durchmesser.

**Hufschmiere.**

- I. Lanolin. crud. 85,0  
Ol. Rapae 15,0  
— Mirban gtt. X  
— Citronell. gtt. V  
misc. f. ungt.
- II. Vaseline. flav. crud.  
mit Fulig (Ruß) gefärbt.
- III. Adips Lan. anhydr. 40,0  
Sebum ovil. 20,0  
Terebinth. 5,0  
Pix liquid. 20,0  
Sap. kal. 5,0  
Aqua dest. 10,0  
DS. Zum Einschmieren d. Hufe.

**Husten.**

- I. Natr. chlorat. 500,0  
Stib. sulfur. nigr. 100,0  
Sem. Foenigraec. p. 50,0  
Rad. Liquir. p. 50,0  
misc. f. pulv.
- DS. Auf jedes Futter 1 Eßlöffel voll.

- II. Breiumschlag auf d. Brust:  
Sem. Sinap. pulv. 100,0  
Weizenkleie 900,0  
misc. f. pulv.

- DS. Man rührt das Pulver mit auf 70—80° C erhitzten Wasser an und macht mit dem Teig den Breiumschlag.

- III. Hustenlatwerge:  
Extr. Belladon. 20,0  
Mellis  
Glycerin  
Kal. chloric.  $\overline{aa}$  10,0  
m. f. Latwerge.

**Influenza (Brustseuche).**

- I. Ammon. chlorat. 30,0  
Kal. nitric. 30,0  
Natr. sulfuric. 100,0  
Rad. Liquir. pulv. 65,0  
misc.
- DS. 3 × tägl. 1 Eßl. voll in warmem Kleientrank.

- II. Spirit. camph.  
— Sinap.  $\overline{aa}$  50,0  
Einreibung.

**Kniebeule.**

- Ammon. chlorat. 50,0  
Spir. camphor. 50,0  
Acetum 500,0  
Aqua 1 Liter  
misc.
- DS. Man taucht eine Leinwandbinde in die Lösung, umwickelt das Knie damit und verbindet dann recht dicht mit wollenen Binden.

**Kolik.**

- I. Einreibung:  
Spir. camphor.  
— saponat.  
Liq. Terebinth.  
Ol. Ammon. caust.  $\overline{aa}$

II. Bei Verstopfungskolik:  
 a) Tart. stibiat. 3,0  
    Natr. sulfuric. 100,0  
    Fruct. Carvi p. 25,0  
 DS. Alle  $\frac{1}{2}$  Stde. 1 Pulver bis  
 zur Wirkung.

b) Stib. sulfurat. nigr. 15,0  
    Tart. depur. 30,0  
    Natr. sulfur. crist. 200,0  
    Flor. Chamomill. p. 60,0  
    Farin 40,0  
    Aqua q. s.

misc. Latwerge.  
 DS. In 2 Hälften innerhalb  
 $\frac{1}{2}$  Stde.

III. Bei Windkolik u. Krampf-  
 kolik:

Tinct. Opii simpl. 30,0  
    Spir. aether. 70,0  
    Aether 10,0  
    Ol. Anisi 2,0

DS.  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ stündl. 1 Eßl. voll  
 mit  $\frac{1}{2}$  Liter Wasser ver-  
 dünnen.

IV. Bei Kolik mit Durchfall:

Alumen pulv. 20,0  
    Flor. Chamomill. p. 50,0  
    Cort. Querc. p. 50,0  
    Fruct. Juniperi p. 50,0  
    Sir. q. s.

DS. Alle Stdn. den 4. Teil der  
 Latwerge geben.

V. Bei Harnverhaltung:

Fruct. Juniperi p. 330,0  
    Natr. sulfur. crist. 150,0  
    Kal. nitric. 20,0

DS. Halbstündl. 1 Eßlöffel mit  
 $\frac{1}{4}$  Liter Kalkwasser.

VI. Koliktinktur:

a) Tinct. Aconit. \_\_\_\_\_  
    Aether  $\overline{aa}$  10,0  
    Spir. camphor. 15,0  
    Ol. Petroselin. 5,0

DS. Stündl. 1 Teelöffel voll zu  
 geben.

b) Aether 50,0  
    Tinct. Valer. 49,0  
    Ol. Carvi 1,0

misc.

DS. In kaltem Wasser die Hälfte  
 und nach  $1\frac{1}{2}$  Stde. den  
 Rest geben.

**Magendarmkatarrh.**

Natr. chlorat. pulv.  
    Rad. Gentian. „  
    Fruct. Juniperi „  
    Natr. sulfuric. „  $\overline{aa}$  100,0

DS. Auf jedes Futter 1 Eßlöffel  
 voll.

**Mauke.**

I. Bism. subgallic. 5,0  
    Amyl. tritic. 30,0

DS. Zum Pudern.

II. Thioform 5,0  
    Alumen 15,0

Zinc. oxyd.  
    Amyl.  $\overline{aa}$  75,0

DS. Zum Pudern.

III. Alumen pulv.

Cupr. sulfur. p.

**Pferdepulver.**

Rad. Gentian. pulv. 50,0  
    Fruct. Juniperi „ 75,0

Rhiz. Calami pulv. 100,0  
Sem. Foenigraec. „ 75,0  
Natr. sulfur. sicc. 100,0  
Sulfur. sublimat. 100,0  
Natr. bicarbon. 100,0  
Stib. sulfur. nigr. 100,0  
Rad. Liquir. pulv. 100,0  
m. f. pulv.  
DS. 3× tägl. 3 Eßlöffel voll  
mit Kurzfutter, Brot oder  
Honig zu geben.

### Piephacke.

I. Jodvasoliment  
DS. Tgl. 2× einreiben.

II. Ungt. acre.

### Räude.

I. 1. Pix liquid.  
Sulfur sublimat.  $\overline{aa}$  25,0  
Sap. vir.  
Spiritus  $\overline{aa}$  50,0  
2. Pix liquid. 17,5  
Sulfur subl. 17,5  
Spir. sap. kal. ad 100,0  
misc.

DS. Die kranken Stellen mit  
warmem Seifenwasser tüch-  
tig und täglich mit der Ein-  
reibung einschmieren.

II. Creolin 20,0  
Sap. vir. 10,0  
Spiritus 10,0

DS. Täglich 1—2× einreiben.

III. Hydr. sozodolic. 10,0  
Natr. chlorat. 50,0  
Aq. d. fervid. ad 1000,0

DS. Zum Einreiben.

### Rhachitis.

Calc. carbon. praec.  
— phosphoric. pulv.  $\overline{aa}$  100,0  
Kal. bicarbon.  
Fruct. Foenicul. p.  $\overline{aa}$  50,0  
misc.  
DS. Auf jedes Futter 1 Eßlöffel  
voll.

### Rheumatismus.

I. Natr. salicyl. 100,0  
Rad. Gentian. pulv.  
— Valerian. „  $\overline{aa}$  5,0  
Aqua dest. q. s. fiat Lat-  
werge

Divid. in part. III.

DS. Tägl. 1× ein Stück zu  
geben.

II. Spir. camphor. 250,0  
Tinct. Capsic. 30,0  
Ol. Terebinth. 20,0  
misc.

DS. 3× tägl. einreiben.

### Rossen.

Natr. bromat.  
Kal. bromat.  $\overline{aa}$  50,0  
DS. Zwei Abende hintereinan-  
der je die Hälfte im Saufen  
zu geben.

### Ruhr der Fohlen.

I. Acid. tannic. 15,0  
Rad. Liquir. p. 30,0  
Sir. q. s. f. pilul. V.  
DS. 3stündl. 1 Pille.

II. Einreibung:  
Tinct. Capsic. 20,0



Spir. Sinap. 30,0  
 — camphor. 150,0  
 DS. 3× tägl. 1 Eßlöffel voll den  
 Leib einreiben.

**Satteldruck.**

Empl. Lithargyr. 40,0  
 Seb. oval. 25,0  
 Adip. suillus 33,0  
 Acid. salicyl. 2,0  
 DS. 2—3× tägl. messerrücken-  
 dick auflegen, vorher mit  
 Creolinwasser reinigen.

**Schulterlähme.**

Spir. saponat.  
 — camphor. aa 250,0  
 Liq. Ammon. caust. 50,0  
 DS. Zum Einreiben.

**Sehnenklapp.**

I. Ammon. chlorat.  
 Spir. camphorat. aa 50,0  
 Acetum 1 Liter  
 Aqua dest. 3 „  
 DS. Morgens und abends 8 Tage  
 lang Priebnitzumschlag.

II. Salbe:

Kal. jodat.  
 Aqua dest. aa 10,0  
 Sap. kal. 20,0  
 Ungt. Hydr. cin. 60,0  
 misc. f. ungt.  
 DS. Tägl. 2× vor dem Auflegen  
 des Umschlags einreiben.

**Spat.**

Ungt. Hydr. cin. 30,0  
 Acid. salicyl. 10,0

Adip. suillus 60,0  
 misc. f. ungt.  
 DS. Tägl. 1× die Spatstelle  
 einreiben — 1 Woche lang.

**Stärkungspillen.**

Rad. Gentian. pulv. 4,0  
 Rhiz. Zingib. „ aa 8,0  
 Cort. Cinnamon. „ aa 8,0  
 Fruct. Capsic. „ aa 1,2  
 Ol. Anisi aa 1,2  
 Sem. Foenigraec. 8,0  
 Glycerin . . . q. s.  
 m. f. bolus.  
 DS. Bei Bedarf eine Pille.

**Stärkungspulver.**

Arsenic. alb.  
 Cantharid. pulv. aa 0,6  
 Ferr. sulf. pulv. 8,0  
 DS. Einmal tägl. mit dem Fut-  
 ter zu geben.

**Stollschwamm.**

Einreibung:  
 Sap. vir. 130,0  
 Liq. Ammon. caust. 30,0  
 Ol. Petrae 20,0  
 Tinct. Canthar. 20,0  
 misc.  
 DS. Tägl. 1× einreiben und  
 zwar 2 Tage hintereinander  
 und setzt 2 Tage aus.

**Strahlfäule.**

I. Tinct. Aloes  
 — Myrrhae aa 15,0  
 DS. 2× tägl. einpinseln.

II. Acid. salicyl. 5,0  
Glycerin 20,0  
Tinct. Aloes 100,0  
— Gallar. 100,0  
misc.  
DS Tägl. 1 × einpinseln.

### Überbein.

I. Für leichtere Fälle:  
Camphor. trit.  
Acid. salicyl.  $\overline{aa}$  10,0  
Ungt. einer. 30,0  
Adip. suillus 50,0  
misc. f. ungt.  
DS. 4 Wochen lang morgens  
und abends einreiben.

II. Für hartnäckige Fälle:  
Kal. jodat. 10,0  
Aqua dest. 8,0  
Sap. kal. 1,0  
Ungt. ein. 80,0  
misc. f. ungt.  
DS. siehe oben!

### Verstopfung.

I. Aloe 20,0  
Natr. sulfur. 250,0  
Rad. Gent. pulv. 100,0  
Rad. Valer. „ 50,0  
m. f. electuar.  
DS. In 2 × zu geben.

II. Calomel 10,0  
Tub. Jalap. pulv. 15,0  
Aloe pulv. 30,0  
Sap. kal. 15,0  
f. pilul. Nr. I.  
DS. Auf einmal dem Pferde  
einzugeben.

### Wunden.

I. Acid. salicyl. 5,0  
Tinct. Myrrhae  $\overline{aa}$  45,0

II. Kreosot 5,0  
Tinct. Myrrhae  $\overline{aa}$  20,0

III. Tinct. Aloes  
— Myrrhae  
Ol. Terebinth.  $\overline{aa}$  75,0  
Acid. carbol. gtt. XV.  
DS. A. zum Pinseln.

### Würmer.

I. Eosin 0,2  
Tart. stib. 20,0  
Sacchar. alb. 30,0  
div. in part. aeq. VI.  
DS. Morgens u. abends I Pulver  
in Wasser.

II. Tub. Jalap. 30,0  
Flor. Cinae  
Fruct. Foenicul. p.  $\overline{aa}$  100,0  
Natr. sulfur. p. 200,0  
DS. 3stündl. 3 Löffel (für junge  
Pferde).

III. Aloe 30,0  
Kamal. 16,0  
Tart. stibiat. 8,0  
Sap. virid. q. s.  
f. pilul. Nr. II.  
DS. 1 Pille morgens vor dem  
Futter, die 2. wenn nötig  
nach 4 Tagen zu geben.  
Für Fohlen die Hälfte.

IV. Tart. stibiat.	20,0	Natr. sulfur.	200,0
Aqua dest.	300,0	misc. divid. in part aeq. VI.	
Tinct. Arnicae q. s.		DS. Diese Portion in einem	
DS. 3 Eßlöffel ins Getränk tägl.		Tage geben.	
2 bis 3.			
<hr/>			
V. Calomel	10,0	VI. Ol. Terebinth.	100,0
Tart. stibiat.	12,0	— Ricini	400,0
		DS. Auf einmal einschütten.	

## Rinder.

### Aufblähen (Trommelsucht).

I. Liq. Ammon. caust. 200,0  
Spir. camphor. 250,0  
Aether 50,0  
DS. 1 Eßlöffel auf  $\frac{1}{2}$  Liter  
Wasser.

II. Liq. Ammon. caust. 100,0  
Tinct. Colchic. 10,0  
Liq. Ammon. anis. 20,0  
DS. Alle 5–10 Minuten 1 Eß-  
löffel mit  $1\frac{1}{2}$  Liter  $H_2O$ .

III. Ol. Croton. 2,0  
— Lini sulfur. 30,0  
Liq. Ammon. caust. 50,0  
Ol. Carvi 4,0  
Tinct. Aloes  
— Asae foet.  $\overline{aa}$  15,0  
DS. 1 Eßlöffel mit  $\frac{1}{4}$  Liter  
Wasser alle 10–20 Minu-  
ten. Für Jungvieh ent-  
sprechend weniger.

### Augenentzündung.

I. Liq. Plumbi subacet. 15,0  
Aqua dest. 300,0  
DS. Alle Stunde anzuwenden.

II. Zinc. sulfur. 0,5  
Tinct. Opii 1,0  
Aqua dest. 100,0  
DS.

III. Augenfell (Hornhauttrü-  
bung):  
Ungt. Hydr. oxyd. rub.  
— Zinci  $\overline{aa}$  20,0  
Camphor. 0,5  
m. f. ungt.

DS. 8 Tage hindurch 1 Linse  
groß in das kranke Auge  
einzustreichen und mit dem  
Augenlid auf dem Augapfel  
verreiben.

IV. Calomel v. h. p. 5,0  
Sacchar. p. s.  
— Lact.  $\overline{aa}$  2,5  
m. f. pulv.

DS. Alle 2 Tage eine Federmes-  
serspitze voll in das kranke  
Auge einzublasen.

### Bläschenkatarrh (Scheiden- katarrh).

I. Lysol  
DS. 1 Eßl. auf 1 Liter Wasser  
zum Ausspülen.

II. Lysol 6,0  
Vaselin 100,0  
DS. Zum Aufstreichen.

### Blutharnen.

I. Ferr. sulf. crud. 50,0  
Natr. bicarbon. 150,0  
Sem. Lini 100,0

m. f. pulv.  
DS. 3 × tgl. 2 Eßl. in je 1 Liter  
Kamillentee.

II. Cerruss. 3,0  
Nat. acet. 10,0  
Camph. trit. 12,0  
Calc. carbon. 120,0

misc. f. pulv. div. in part VI.  
DS. Morg. u. abends 1 Pulver  
in 1 Liter Mehltrank zu  
geben.

**Bremsenöl.**

Oleum Lauri  
— Eucalypt.  $\overline{aa}$  5,0  
Nitrobenzol. 10,0  
Petroleum 30,0  
Ol. Rapae 50,0  
DS. Zum Einreiben. A.

**Brunstpulver.**

Cantharid. pulv. 1,0  
Caryophill. „ 1,0  
Fruct. Capsic. „ 2,0  
— Juniperi „ 2,0  
Sem. Sinap. nigr. „ 6,0  
— Lini „ 3,0  
m. f. pulv.  
DS. In 2 Portionen innerhalb  
einer Stunde zu geben.

**Buglähme (Schulterlähme).**

Spir. camphor.  
— saponat.  $\overline{aa}$  100,0  
Liq. Ammon. caust.  
Ol. Terebinth.  $\overline{aa}$  50,0  
DS. 3 × tägl. einzureiben und  
warm verbinden.

**Darm- und Magenentzündung.**

I. Trank:

Tinct. Veratr. 15,0  
— Gentian. 20,0  
Acid. hydrochlor. 80,0  
DS. 3stündl. 1 Eßlöffel voll mit  
 $\frac{1}{2}$  Ltr. Kamillentee.

II. Klistier:

Seifenwasser 1000,0  
Nat. chlorat. 50,0  
Ol. Lini 100,0  
misc.  
DS. Alle Stunden ein Klistier,  
bis Darmentleerung erfolgt.

III. Einreibung:

Ol. Lini 100,0  
Liq. Ammon. caust. 100,0  
Ol. Terebinth. 100,0  
misc.  
DS. Den Leib alle 3 Stunden  
damit einreiben.

**Durchfall.**

Für Kühe:

I. Alumen pulv.  
Cort. Querc. „  
Rad. Valerian. „  $\overline{aa}$  30,0  
div. in part. III.  
DS. Man gibt ein Pulver in  
 $\frac{3}{4}$  Liter Pfefferminztee.

II. Acid. tannic. 15,0  
Rad. Gentian. p. 60,0  
Magn. carbon. 30,0  
Nat. bicarb. 60,0  
Fruct. Carvi p. 60,0  
m. f. pulv.

DS. Stdl. 1 Eßlöffel in Braun-  
bier.

Für Kälber:

I. Rhiz. Tormentill. pulv.  
Acid. tannic.  $\overline{aa}$  10,0  
Ungt. Glycerini q. s. f. pilul. X.  
DS. 3× tägl. 1 Pille.

II. Acid. salicyl.  
— tannic.  $\overline{aa}$  50,0  
Tinct. Opii simpl. 500,0  
— Strychni  $\overline{aa}$  50,0  
— Ipec.  $\overline{aa}$  50,0  
Kreosot 7,5

DS. 2—3stündl. 1 Teelöffel in  
einer Tasse Kamillente.

III. Opium 0,5  
Acid. salicyl.  
— tannic.  $\overline{aa}$  10,0

DS. 3× täglich 1 Teelöffel in  
Pfefferminztee.

**Eingeweidewürmer.**

I. Aloe pulv. 150,0  
Sem. Arecae p. 240,0  
Fruct. Anisi „ 30,0  
Sem. Foenigraec. „ 60,0

DS. Morgens und abends 1 Eß-  
löffel voll ins Futter.

II. Herb. Absinth pulv.  
— Tanacet. „  
Aloe „  $\overline{aa}$  30,0  
Ol. Animal. foet. 15,0  
— Lini 500,0

misc.

DS. Unter Einhaltung einer  
Pause von 5 Stunden, auf  
2× einzuschütten.

**Euterentzündung.**

I. Acid. salicyl. 3,0  
Ol. camphor. 100,0  
DS. Tägl. 2× das Euter vor-  
sichtig einreiben.

II. Ammon. sulfoichtyol.  
Spiritus dilut.  
Adips suillus  $\overline{aa}$  10,0  
Lanolin 50,0  
DS. Tägl. 2× einreiben.

III. Bildung von Knoten:  
Camphor 6,0  
Ungt. flav.  
Ol. Lauri  $\overline{aa}$  25,0  
DS. Zum Einreiben 2× tägl.

IV. Abführmittel:  
Kal. nitric. 60,0  
Nat. sulfuric. 600,0  
m. f. pulv. divid. in part. III.  
DS. 1 Päck. morg., mittags und  
abends in 1 Liter Kamillen-  
aufguß (1 : 10).

**Fieber.**

Nat. sulfur. 250,0  
Kal. nitric. 25,0  
misc. f. pulv.  
DS. Morgens und abends die  
Hälfte in 1 Liter warmen  
Kleientrank.

**Flechte.**

I. Creolin 5,0  
Ol. Lini 100,0  
DS. Zum Abweichen.

II. Acid. nitric. 17,0  
Adip. suillus 90,0  
Lanolin 30,0  
m. f. ungt.  
DS. Tägl. 1× einreiben.

III. Tinct. Jodi oder 2% Pyo-  
ktaninlösung.  
DS. Zum Einreiben.

**Freßlustmangel.**

I. Aloe pulv. 15,0  
Rad. Gentian. pulv. 120,0  
Rhiz. Calam. „ 100,0  
Rad. Althaeae „ 50,0  
Natr. chlorat. 50,0  
— sulfuric. 500,0  
DS. 2 Eßlöffel aufs Futter zu  
streuen.

II. Acid. mur. pur. 120,0  
Spiritus 180,0  
DS. 3× tägl. 3 Eßl. in eine  
Weinflasche voll Wasser.

III. Für ein Kalb:  
Natr. bicarbon. 20,0  
Rhiz. Rhei pulv. 5,0  
DS. Auf 2mal in je 1 Tasse  
Kamillentee einzugeben.

**Fußrände (Schlempe-Mauke).**

I. Innerlich:  
Calc. carbon.  
DS. 2× tägl. 1 Eßlöffel voll.

II. Alumen  
DS. Zum Pudern.

III. Lysol 5,0  
Vaselin 100,0  
DS. Zum Aufstreichen.

**Gelbsucht.**

Aloe pulv. 20,0  
Natr. sulfur. 250,0  
Rad. Gent. p. 30,0  
Fruct. Juniperi 30,0  
DS. 3× tägl. 1 Handvoll aufs  
Futter.

**Halsentzündung.**

I. Ol. Terebinth.  
Lin. volat.  $\overline{aa}$  150,0  
DS. 3× täglich einreiben, um  
den Hals warme Umschläge  
machen.

II. Alaun 50,0  
Acid. salicyl. 3,0  
Mel. 50,0  
Acetum 100,0  
Aqua dest. ferv. 1800,0  
misc.

DS. Man erwärmt die Lösung  
und spritzt alle  $\frac{1}{2}$  Stunden  
das Maul aus.

**Harnverhaltung.**

I. Fruct. Juniperi pulv. 150,0  
Magn. sulfur. 75,0  
Natr. sulfur. 75,0  
Fol. Uvae ursi pulv. 75,0  
Kal. nitric. 25,0  
Ol. Juniperi 10,0  
m. f. latwerge.  
DS. Stündlich hühnereigroß auf  
die Zunge.

II. Ol. Terebinth. 90,0  
— rubr. 10,0  
DS. Den Bauch und Nieren-  
gegend tüchtig einreiben.

### Kalbfeiber (Milchfeiber).

I. Tierarzt.  
Camphor. trit. 20 0  
Acid. salicyl. 40,0  
Natr. sulfuric. 400,0  
misc. f. pulv. divid. in part. IV.  
DS. Alle 4 Stunden 1 Pulver in  
 $\frac{1}{2}$  Liter warmen Kamillen-  
tee.

II. Ol. Terebinth.  
Liq. Ammon. caust.  
Spir. saponat.  
— camphor.  $\overline{aa}$  75,0  
DS. 2stündl. den Körper ein-  
reiben.

### Klauenseuche (Maul- und Klauenseuche).

I. Tierarzt.  
Acid. hydrochloric. crud.  
DS. 1—2 Eßlöffel ins Saufen.

II. Creolin.  
DS. 2 Eßlöffel auf 1 Liter Was-  
ser zum Desinfizieren.

III. Pyoktanin 1,0  
Aqua dest. 500,0  
DS. Zum Pinseln.

IV. Acid. mur. crud. 30,0  
Mel. 50,0  
Aqua dest. 300,0  
DS. Zum Pinseln der Mäuler.

V. Cupr. sulfur. 30,0  
Aqua dest. 200,0  
DS. Zum Pinseln der Klauen.

### Knieschwamm.

I. Ammon. chlorat.  
Aqua dest.  
Acid. acetic.  
Spir. camphor.  $\overline{aa}$  40,0  
DS. 2 Eßlöffel auf  $\frac{1}{2}$  Liter Was-  
ser zu Umschlägen, mor-  
gens und abends.

II. Jodvasogen  
DS. 3× tägl. einpinseln.

### Knötchenseuche.

Pyoktanin 2,0  
Natr. bicarbon. 5,0  
Bolus alba ad 100,0  
DS. Jeden 2.—3. Tag soviel wie  
ein Kaffee- oder Eßlöffel  
voll in der Scheide des  
kranken Tieres mittelst Ein-  
blasens zu zerstäuben.

### Kolik.

I. Seifenklistier:  
Sap. virid. 125,0  
Aqua dest. 1000,0  
Natr. chlorat. 125,0  
Ol. Lini 250,0  
DS. Alle Stunden ein Klyisma.

II. Spir. aether. nitros. 25,0  
Tinct. Opii  
— Aconit.  $\overline{aa}$  1,0  
DS.  $\frac{1}{2}$  Liter Wasser z. gebr.,  
nach 1 Stde. wiederholen.



III. Aether 50,0  
Tinct. Valer. 49,0  
Ol. Carvi 1,0  
misc.  
DS.  $\frac{1}{2}$  Liter Kamillentee einzu  
geben.

**Kreuzlähme.**

I. Spir. camphor.  
— Formic. aa 50,0  
Ol. Rosmar. gtt. XX.  
misc.  
DS. Zum Einreiben der ge-  
schwollenen Gelenke.

II. Natr. salicyl. 20,0  
tal. dos. IV.  
DS. 3stündlich 1 Pulver.

**Läuse.**

Lysol.  
DS. 3 Eßlöffel auf 1 Liter Was-  
ser und mehrmals waschen.

**Magenkatarrh.**

I. Acid. mur. 30,0  
Tinct. amara 30,0  
Ol. Menth. pip. 2,0  
Aqua dest. 120,0  
DS. 3 × tägl. 2 Eßlöffel im Ge-  
tränk.

II. Stib. sulf. nigr. 16,0  
Natr. sulfur. 40,0  
Magn. sulfur. 40,0  
Fruct. Foenic. p. 40,0  
— Anis. „ 20,0  
— Cardomom. „ 2,0  
DS. 3 × tägl. 1 Eßlöffel voll  
aufs Futter.

III. Rad. Gent. pulv.  
Rhiz. Calam. „  
Herb. Absinth. „ aa 100,0  
Natr. sulfur. „ 200,0  
DS. Auf jedes Futter 2 Hände  
voll.

**Maulgrind der Kälber.**

I. Borax 5,0  
Aqua dest.  
Glycerin aa 100,0  
DS. Zum Einpinseln d. Grindes.

**II. Salbe:**

Sulfur. sublimat. 20,0  
Ol. Lini 30,0  
Adip. suillus 50,0  
m. f. ungt.  
DS. Man reibt nach Entfernung  
des Grindes die Narben  
recht vorsichtig mit der  
Salbe alle Tage 1 × ein.

**III. Äbführmittel:**

Rhiz. Rhei pulv. 5,0  
Magn. carbon. 2,0  
Tart. natronat 22,0  
misc. f. pulv.  
DS. Man gibt das Pulver auf  
1 × in Milch ein.

**Maulschwämmchen der Kälber.**

I. Einpinselung:  
Inf. Salv. (1 : 10,0) 500,0  
Mel. 50,0  
Alumen 20,0  
DS. Man pinselt und spritzt das  
Maul 2stündl. damit aus,  
nachdem es vorher mit  
frischem Wasser ausgewa-  
schen ist.

II. Pulver innerlich:

Rhiz. Rhei pulv. 12,0  
Calc. carbon. 30,0

m. f. pulv. divid. in part. III.  
DS. 3 Tage hintereinander jeden  
Morgen 1 Pulver in etwas  
Milch.

**Maulseuche (siehe Klauen-  
seuche).**

**Milch (bittere).**

Stib. sulfur. nigr. 50,0  
Natr. chlorat. 50,0  
Fruct. Foenicul.  
Sulf. sublimat.  $\overline{aa}$  100,0  
Fruct. Juniperi p. 50,0

DS. 3  $\times$  tägl. eine Handvoll aufs  
Futter streuen.

**Milch (blaue).**

I. Mixt. sulfur. acid.  
DS. Tägl. der Kuh 20,0—30,0  
in  $\frac{1}{2}$  Flasche Wasser.

II. Camphor 5,0  
Natr. bicarbon.  
Natr. chlorat.  
Sem. Foenugraec.  $\overline{aa}$  15,0  
Rad. Gent. p. 50,0  
DS. 3  $\times$  tägl. 1 Eßlöffel voll.

**Milch (blutige).**

Natr. bicarbon. 100,0  
DS. Tägl. auf einmal zu geben.

**Milch (rote).**

Kal. nitric. 100,0  
Natr. sulfur. 400,0  
DS. 3  $\times$  tägl. 2 Eßlöffel voll.

**Milch (wässerige).**

I. Trockenfütterung: innerlich  
Fruct. Carvi pulv.

— Anis. „

— Juniperi „

Natr. chlorat.

— bicarbon.  $\overline{aa}$  100,0

DS. 3  $\times$  tägl. eine Handvoll aufs  
Futter.

II. Herba Absinthii pulv.

Rhiz. Calam. „

Natr. chlorat.  $\overline{aa}$  100,0

Tart. depurat. 20,0

Stib. sulfur. nigr. 10,0

misc. f. pulv.

DS. 3  $\times$  tägl. eine Hand voll  
aufs Futter.

**Milch (zähe).**

I. Herb. Absinth. pulv.

Natr. bicarbon.  $\overline{aa}$  250,0  
DS. 2—3  $\times$  tägl. 2 Eßlöffel voll.

II. Flor. Chamomill. pulv.

Fruct. Carvi „

Rhiz. Calami „

Natr. chlorat.

Natr. sulfur.  $\overline{aa}$  100,0

DS. Magenstärkendes Pulver.  
3  $\times$  tägl. 1 gehäuften Eß-  
löffel in  $\frac{1}{2}$  Liter warmem  
Wasser.

**Milch, Nichtbuttern der.**

Curcum. pulv. 1,0

Natr. bicarbon. 100,0

m. f. pulv.

DS. 50,0 auf 20 Liter Milch, in  
Wasser gelöst der Milch  
zusetzen.

**Milch, Säuren der.**

Reinigen der Gefäße mit heißer Sodalösung.

Natr. bicarbon. 200,0

Calc. carbon. 200,0

divid. in part. IV.

DS. 2 Pulver täglich zu geben.

**Milchfieber (siehe Kalbfieber).**

**Milchmangel.**

Rad. Gent. pulv. gr.

Fruct. Foenicul. „ „

— Juniperi „ „ aa 100,0

Sulfur 50,0

Natr. bicarbon. 200,0

Stib. sulfur. nigr. 150,0

DS. 3 × tägl. eine Handvoll aufs Futter streuen.

**Nabelsalbe für Kälber.**

Thymol 0,3

Acid. boric. 4,7

Vasel. flav. 22,5

Adip. Lanae 22,5

m. f. ungt.

DS. Morgens und abends nach sorgfältiger Reinigung bestreichen.

**Räude.**

Pix liquid.

Sulfur. sublimat. aa 150,0

Sap. kalin. 50,0

Spir. dilut. 500,0

DS. Zum Einreiben.

**Rheumatismus.**

I. Natr. salicyl. 75,0

divid. in part. aeq. Nr. III.

DS. Im Laufe eines Tages zu verabreichen.

**II. Einreibung:**

a) Salicylvasoliment 10%

b) Spir. camphor. 250,0

Ol. Terebinth. 25,0

DS. Alle 6 Stunden einreiben und dann sofort einen Prießnitzumschlag.

**Prießnitzumschlag:**

Plumb. acet. 15,0

Aquae 2000,0

Spirit. 90% 50,0

DS. Äußerlich.

**III. Abführmittel bei Fieber:**

Ammon. chlorat. 60,0

Kal. nitric. 60,0

Natr. sulfur. 350,0

divid. in part. IV.

DS. 3stündl. 1 Pulver in 1 Liter warmem Wasser gelöst zu geben.

**Rindern (zu stark).**

I. Camphor 20,0

Rad. Val. pulv. 50,0

m. f. pulv. divid. in part. VI.

DS. In 2 Tagen zu verbrauchen.

II. Kal. bromat. 4,0

Camphor 0,5

Natr. bicarbon. 3,0

dos. IV.

DS. 2 × tägl. 1 Pulver.

**Ringflechte (siehe Flechte).**

**Ruhr.**

I. Alumen 25,0

Acid. tannic. 25,0

— salicyl. 5,0

Ol. Lini 200,0  
Inf. Menth. pip. e fol.  
(20,0/200,0) 200,0  
misc.  
DS. Auf 2× mit 3stündlicher  
Pause einzuschütten.

II. Acid. salicyl. 1,0  
Ol. Lini  
Aqua dest. aa 100,0  
DS. Als Klistier alle 1/2 Stunden  
angewärmt.

#### Ruhr der Kälber.

I. Tinct. Opii simpl. 50,0  
— Strychn. 10,0  
Vin. rubr. 300,0  
DS. Alle 3 Stunden 1 Eßlöffel  
voll.

II. Acid. salicyl. 0,5  
Extr. Ratanh. 2,0  
add. Aqua dest. 3,0  
Glycerin 2,0  
Sebum 5,0  
Ol. Cacao 25,0  
divid. in part. X f. suppos.  
DS. Nach jeder Darmentlee-  
rung 1 Zäpfchen.

#### Scheidenkatarrh (Bläschen- katarrh).

I. Lysol  
DS. 1 Eßlöffel auf 1 Liter Was-  
ser zum Ausspülen.  
II. Lysol 6,0  
Vaselin 100,0  
DS. Zum Aufstreichen.

#### Schlempe (Mauke-Fußbräude).

I. Innerlich:  
Calc. carbon.  
DS. 2× tägl. 1 Eßlöffel.

II. Alumen  
DS. Zum Pudern.

III. Lysol 5,0  
Vaselin 100,0  
DS. Zum Aufstreichen.

#### Schulterlähme (Buglähme).

Spir. camphor.  
— saponat. aa 100,0  
Liq. Ammon. caust.  
Ol. Terebinth. aa 50,0  
DS. 3× tägl. einzureiben und  
warm verbinden.

#### Trommelsucht (Aufblähen).

I. Liq. Ammon. caust. 200,0  
Spir. camphor. 250,0  
Aether 50,0  
DS. 1 Eßlöffel auf 1 Liter Was-  
ser.

II. Liq. Ammon. caust. 100,0  
Tinct. Colchic. 10,0  
Liq. Ammon. anis. 20,0  
DS. Alle 5—10 Minuten 1 Eß-  
löffel mit 1 1/2 Ltr. H<sub>2</sub>O.

III. Ol. Croton 2,0  
— Lini sulf. 30,0  
Liq. Ammon. caust. 50,0  
Ol. Carvi 4,0  
Tinct. Aloes  
— Asae foet. aa 15,0

DS. 1 Eßlöffel mit  $\frac{1}{4}$  Liter Wasser alle 10—20 Minuten. Für Jungvieh entsprechend weniger.

**Verkalben (ansteckendes).**

Calc. phosphor. crud. 500,0  
 Rad. Valer. pulv.  
 — Gent. „ aa 200,0  
 Asae foet.  
 Ferr. sulfur. aa 50,0  
 DS. 2× tägl. 1 Eßlöffel voll aufs Futter.

**Verstopfung.**

I. Tart. stibiat. 5,0  
 Natr. sulfur. sicc. 250,0  
 Aloe pulv. 30,0  
 DS. Alle 3 Stunden 1 Eßlöffel in Kamillentee.

II. Natr. sulfur. 750,0  
 Tart. stibiat. 5,0  
 Aloe pulv. 30,0  
 DS. Mit 1 Fl. Leinsamenabkochung auf einmal.

III. Sap. virid. 100,0  
 Aqua dest. 1000,0  
 DS. Alle Stunden ein solches Klistier.

**Wiederkäuen.**

Tinct. Veratri 10,0  
 Acid. muriat. dil.  
 Aqua dest. aa 75,0  
 DS. 3× tägl. 2 Eßlöffel auf  $\frac{1}{2}$  Flasche Aqua.

**Würmer (Eingeweide).**

I. Aloe pulv. 150,0  
 Sem. Arecae p. 240,0  
 Fruct. Anis. „ 30,0  
 Sem. Foenugraec. „ 60,0

DS. Morgens und abends 1 Eßlöffel aufs Futter.

**II. Herba Absinthi pulv.**

— Tannacet. „  
 Aloe „ aa 30,0  
 Ol. Animal. foet. 15,0  
 — Lini 500,0

misc.

DS. Unter Einhaltung einer Pause von 5 Stunden auf 2× einzuschütten.

**Zurückbleiben der Nachgeburt.**

I. Summitat. Sab. pulv. 100,0  
 Aloe „ 50,0  
 Myrrha „ 20,0  
 Fruct. Anis. „ 100,0  
 Natr. sulfur. 200,0  
 m. f. pulv.

DS. 3stdl. 4 Eßlöffel voll in Braunbier.

**II. Creolin**

DS. 1 Eßlöffel voll auf 1 Liter lauwarmen Wassers, 3× tägl. die Gebärmutter ausspülen.

**III. Kal. permang.**

DS. 2,0 auf 1 Liter lauwarmen Kamillentee, 3× tägl. die Gebärmutter ausspülen.

## Schweine.

### Appetitlosigkeit.

- I. Rhiz. Calam. pulv.  
 Rad. Gent. „  
 Stib. sulfur. nigr.  $\overline{aa}$  20,0  
 Natr. bicarbon.  
 — chlorat.  
 — sulfur. p. crist.  $\overline{aa}$  100,0  
 m. f. pulv.

DS. Tägl. 2 × 1 Eßlöffel.

- II. Acid. tartaric. 50,0  
 Aqua Foenicul. 200,0

- III. Pepsin 20,0  
 Acid. mur. 40,0  
 Aqua dest. 60,0

DS. Zu jedem Futter  $\frac{1}{2}$  EBl.

### Augenentzündung.

- I. Zinc. sulfur. 0,5  
 Tinct. Opii 1,0  
 Aqua dest. 100,0

- II. Chinosol 0,5  
 Aqua dest. ad 100,0

DS. Man wäscht die Augen  
 tägl. 3 ×, zuerst mit warmem  
 Wasser und dann mit dem  
 Augewasser aus.

### Bräune (Halsentzündung).

- I. Tierarzt.  
 Rhiz. Veratr. alb. pulv.  
 Tart. stibiat.  $\overline{aa}$  1,0

DS. Mit einem Löffel Wasser  
 angerührt, einschütten, ev.  
 nach  $\frac{1}{2}$  Stunde, wenn kein  
 Erbrechen erfolgt, dasselbe.

- II. Ol. Cantharid.  
 — Terebinth.  $\overline{aa}$  40,0  
 Acid. salicyl. 3,0  
 misc.

DS. Den Hals resp. Kehlkopf  
 1 × einreiben.

- III. Kal. nitric. 5,0  
 Natr. sulfur. 50,0

DS. Innerlich 3 × tägl. 1 Eß-  
 löffel voll.

### Brunstpulver.

- I. Cantharid. pulv. 1,0  
 Fruct. Capsic. „ 2,0  
 Caryophyll „ 2,0  
 Sem. Lini „ 6,0  
 — Sinap. „ 3,0  
 m. f. pulv.

DS. In 2 Portionen innerhalb  
 1 Stunde zu geben.

- II. Rhiz. Zingib. pulv. 2,0  
 Cardamom. „ 3,0  
 Cort. Cinnam. „ 5,0  
 Bolet. Cervin „ 10,0  
 m. f. pulv.

DS.

**Durchfall**

der Schweine:

- I. Alumen. pulv.
- Cort. Querc. „
- Rad. Valer. „ aa 30,0

DS. Stündlich einen Eßlöffel.

- II. Ferr. sulfur. 2,5
- Alum. pulv. 2,5
- Gumm. arab. p. 25,0
- Sacchar. lact. „ 20,0

m. f. pulv. divid. in part. IV.

DS. Alle 3 Std. 1 Pulver in 1 Tasse warm. Kamillentee.

- III. Acid. tannic. 5,0
- Cort. Querc. pulv. 10,0
- Fol. Ment. pip. p. 10,0

m. f. pulv.

DS. Im Laufe des Tages zu geben.

der Ferkel:

- I. Rhiz. Rhei pulv. 1,0
- Calc. carbon. 10,0

m. f. pulv. divid. in part. X.

DS. Man rührt tägl. 2× 1 Pulver in 1 Eßlöffel v. Kamillentee an und gibt dies dem Ferkel ein.

- II. Tinct. Opii croc. 2,0
- Sol. Natr. bicarbon. 18,0

DS. 20 Tropfen in Pfefferminztee.

**Einpökeln von Schweinefleisch.**

Zum Einpökeln von 70 Pfd. Schweinefleisch stellt man sich eine Pökellake her, die aus

- 17,5 Liter Wasser,
- 3,5 kg Kochsalz,
- 105 g Kalisalpete,
- 350 g Zucker

besteht. Die Lake muß über dem Fleisch stehen, so daß es davon bedeckt ist, und es muß mindestens 8 Tage der Einwirkung ausgesetzt sein. Sollte die angegebene Pökellake wegen der Form der Fleischstücke nicht genügen, so bereitet man mehr unter Berücksichtigung der gegebenen Mengen.

**Englische Krankheit (Knochenweiche).**

Für das Muttersehein:

- Calc. phosphor. crud. 100,0
- Rad. Liquid. pulv. 20,0

— Gent.

Fruct. Foenicul. „ aa 20,0

DS. In jedes Futter 1 Kaffeelöffel voll.

Für ein Ferkel:

- Calc. carbon. praec. 30,0
- phospor. crud. 20,0
- Ferr. sulfur. 5,0
- Sacchar. Lact. pulv. 30,0

DS. 2× täglich 1 Messerspitze bis Teelöffel dem Futter beifügen.

**Erbrechen.**

- I. Natr. chlorat. pulv. 30,0
- Natr. bicarbon. „ 30,0
- Calc. carbon. „ 20,0

m. f. pulv.

DS. 3× tägl. 1 Eßlöffel aufs Futter.

II. Calc. carbon. 5,0  
Natr. bicarbon.  
— chlorat.  
— sulfur. c.  $\overline{aa}$  10,0  
Sem. Lini pulv. 50,0  
m. f. pulv. divid. in part. V.  
DS. Alle 3 Stunden 1 Pulver in  
einer Tasse warmen Kamil-  
lentee.

### Ferkelgrind (Ferkel- ausschlag)

I. Ol. Lini  
Aqua Calc.  $\overline{aa}$  50,0  
Liq. Plumb. subacet. 2,0  
misc.  
DS. Liniment zum Bepinseln.  
Man pinselt die Bläschen  
und den Grind tägl. 2× ein.

### II. Innerlich:

Natr. sulfur. pulv. 80,0  
— chlorat. „ 20,0  
Stib. sulfur. nigr. 20,0  
m. f. pulv.  
DS. Man gibt der Mutter tägl.  
2× 1 Eßlöffel voll 2 Tage  
hintereinander. Einem Fer-  
kel gibt man 2 Tage hinter-  
einander tägl. 1 Kaffee-  
löffel voll.

### Freßlustmangel.

I. Natr. chlorat.  
Stib. sulfur. nigr.  
Sul. sublimat.  
Natr. sulfuric.  $\overline{aa}$  100,0  
Sem. Foen. graec. p.  
— Lini „  $\overline{aa}$  150,0  
Natr. bicarbon. „ 200,0  
DS. Auf jedes Futter eine Hand-  
voll.

II. Fruct. Lauri pulv.  
Stib. sulfur. nigr.  
Sulfur. sublimat.  
Calc. phosph. crud.  $\overline{aa}$  100,0  
m. f. pulv.

DS. Je nach Alter 2 Messer-  
spitzen bis 1 Kaffeelöffel  
voll im Getränk.

### III. Sulfur. sublimat.

Rhiz. Calam. pulv.  $\overline{aa}$  100,0  
Rad. Gent. „ 200,0  
Natr. sulfur.  
— bicarbon.  
Calc. phosphor.  $\overline{aa}$  250,0  
DS. 3× tägl. 2 Eßlöffel voll  
ins Saufen.

### Gebärfieber (Milchfieber).

#### I. Innerlich:

Kal. nitric. 10,0  
Natr. sulfur. 30,0  
DS. In 1 Liter Kamillentee auf-  
lösen, stündl.  $\frac{1}{4}$  Liter.

II. Spirit. 100,0  
Ol. Terebinth. 30,0

DS. Zum Einreiben.

### Halsentzündung (Bräune).

#### I. Tierarzt:

Rhiz. Veratr. alb. pulv.  
Tart. stibiat.  $\overline{aa}$  1,0  
DS. Mit 1 Löffel Wasser ange-  
rührt einschütten, event.  
nach  $\frac{1}{2}$  Stde., wenn kein  
Erbrechen erfolgt, dasselbe.

#### II. Ol. Cantharid.

— Terebinth.  $\overline{aa}$  40,0  
Acid. salicyl. 3,0



misc.

DS. Den Hals resp. Kehlkopf einreiben 1 × .

III. Kal. nitric. 5,0  
Nat. sulfur. 50,0

DS. Innerlich: 3 × tägl. 1 Eßlöffel voll.

**Katarrh und Schnupfen.**

Sulfur. sublimat.  
Fruct. Anisi pulv. 50,0  
Rad. Liquir. „  
— Althaeae „ aa 50,0  
Nat. sulfur. „  
Ammon. chlorat „ aa 25,0

m. f. pulv.

DS. 3 × tägl. 1 Eßlöffel voll.  
Als Getränk: Kleienwasser.

**Knochenweiche (Englische Krankheit).**

I. Für das Mutterschwein:  
Calc. phosphor. crud. 100,0  
Rad. Liquir. pulv. 20,0  
— Gent. „  
Fruct. Foenicul. „ aa 20,0

DS. In jedes Futter 1 Kaffee-  
löffel voll.

II. Für ein Ferkel:

Calc. carbon. praec. 30,0  
— phosphor. crud. 20,0  
Ferr. sulfur. 5,0  
Sacch. Lact. pulv. 30,0

DS. 2 × tägl. 1 Messerspitze—  
Teelöffel dem Futter bei-  
fügen.

**Kolik.**

I. Natr. sulfur. pulv. 40,0  
Fol. Menth. pip. „  
Flor. Chamomill. „  
Natr. chlorat. „ aa 10,0

misc.

DS. Auf 2 × mit Einhalt einer  
Istündigen Pause in je  
¼ Liter schwach. schwarz.  
Kaffee zu geben.

II. Wurmkolik:

Naphthalin 5,0  
Natr. sulfur. pulv. 50,0  
Ol. Animal. foet. 3,0

m. f. latwerge.

DS. In 3 Portionen 2stündl. zu  
geben.

III. Zum Klistier:

Fol. Menth. pip.  
Flor. Chamomill. aa 10,0  
f. infus. c. Aqua dest. 1000,0  
adde et solve

Sap. virid. 50,0  
Ol. Lini 50,0

DS. Alle halbe Stdn. erwärmt  
man ¼ Liter und klistiert  
dann.

**Krämpfe.**

I. Kal. bromat. 4,0—8,0

DS. Einem jungen Tier 3 × tägl.  
4,0. Einem älteren Tiere  
3 × tägl. 8,0.

II. Kal. bromat.

Natr. bromat.  
Ammon. bromat. aa 6,0  
Acid. salicyl. 0,1

Aqua Calc. 120,0  
Ol. Jecor. Asell. 50,0  
add. Ol. Lini 50,0  
— camphor. 5,0  
Tinct. Jod. 2,0  
misc. f. lin.  
DS. N. B.

**Lähmung.**

I. Ol. Terebinth. 30,0  
Liq. Ammon. caust. 10,0  
Ol. Lini 10,0  
DS. Zum Einreiben.

II. Lebertran  
DS. Innerlich: Tägl. 1 Eßlöffel

**Läuse.**

I. Tabakabkochung  
DS. 100,0 Fol. Nicotian. auf  
1 Liter Wasser zu Wa-  
schungen.

II. Kal. sulfurat p. baln. 100,0  
Sap. virid. 900,0  
DS. Man wäscht die Tiere alle  
2 Tage mit warmem Wasser  
und Schmierseife ab und  
reibt dann sofort die Schwe-  
felseife an allen Teilen des  
Körpers ein. Man wieder-  
holt am 3. und 5. Tage.

**Milchfieber (Gebärfieber).**

I. Kal. nitric. 10,0  
Nat. sulfur. 30,0  
DS. In 1 Liter Kamillentees auf-  
lösen, stündl.  $\frac{1}{4}$  Liter.

II. Spirit. 100,0  
Ol. Terebinth. 30,0  
DS. Zum Einreiben.

**Muskelrheumatismus (Ver-  
fangen).**

I. Spir. camphor.  
Ol. Terebinth.  $\overline{aa}$  50,0  
Liq. Ammon. caust. 30,0  
Spir. denatur. 100,0  
DS. Zum Einreiben.

II. Kal. nitric. 10,0  
Herba Absinthii pulv. 30,0  
Stib. sulfur. nigr. 20,0  
Nat. sulfur. 80,0  
m. f. pulv. divid. in part. III.  
DS. 3stündl. 1 Pulv. in  $\frac{1}{2}$  Liter  
warm. Kamillentees.

III. Nat. salicyl. 10,0  
— sulfur. 70,0  
m. f. pulv. divid. in part. aeq.  
IV.  
DS. In 1 Tag zu verbrauchen.

**Räude.**

I. Pix liquid.  
Sulfur. sublimat.  $\overline{aa}$  25,0  
Sap. virid.  
Spir. denatur.  $\overline{aa}$  50,0  
DS. Täglich 1  $\times$  einreiben.

II. Kal. sulfurat p. baln. 100,0  
Ol. Rapae 100,0  
Sap. virid. 900,0  
DS. Jeden 2. Tag einreiben,  
vorher mit warmem Was-  
ser abwaschen.

**Rotlauf.**

- I. (Tierarzt!) (Widerspruch mit dem Viehseuchengesetz).  
 Acid. salicyl.  
 Creolin  $\overline{aa}$  10,0  
 Adip. suill. 80,0  
 m. f. ungt.  
 DS. 3× tägl. einreiben.
- 
- II. Chin. sulfur. 5,0  
 solv. in  
 Acid. mur. 5,0  
 Aqua dest. 49,0  
 add. solut.  
 Acid. salicyl. 1,0  
 Tinct. Chinoidin. 20,0  
 — Chin. cps. 10,0  
 — aromat. 10,0  
 DS. 4 Stunden lang alle Viertelstunden 15 Tropfen vermischt mit 2 Löffel Milch einschütten.
- 
- III. Lysol  
 DS. 200,0 auf 10 Liter Wasser fortgesetzt begießen.
- 
- IV. Innerlich:  
 Chin. sulfur. 1,5  
 Spirit. 35,0  
 Acid. mur. dil. 5,0  
 Ol. Santal gtt. V.  
 DS. Auf einmal einzugeben.
- 
- V. Den gesunden Tieren gibt man als Vorbeugung:  
 Calomel 3,0  
 Ol. Ricini 40,0  
 DS. Auf einmal einzugeben.

**Schnupfen.**

- Sulfur. sublimat.  
 Fruct. Anisi pulv.  
 Rad. Liquir. „  
 — Althaeae „  $\overline{aa}$  50,0  
 Natr. sulfur. „  
 Ammon. chlorat. „  $\overline{aa}$  25,0  
 m. f. pulv.  
 DS. 3× tägl. 1 Eßlöffel voll.  
 Als Getränk: Kleienwasser.

**Unruhige Mutterschweine.**

- I. Kal. nitric. 30,0  
 Magn. carbon. 10,0  
 Pulv. Dower. 15,0  
 Fruct. Foenicul. 50,0  
 DS. Anfangs  $\frac{1}{2}$ stündl., dann 1—2stündl. 1 Eßlöffel.
- II. Tinct. Opii simpl. 5,0  
 Spir. camphor. 20,0  
 DS. Man gieße dem Tier die Hälfte davon ins Ohr; nach 24 Stunden den Rest.

**Unzuchtvertreibung.**

- Summitat. Sabin. 15,0  
 Natr. bicarbon. 15,0  
 Rad. Gent. pulv. 60,0  
 Sulfur. sublimat. 60,0  
 DS. Am 1. Tag 4, am 2. Tag 3, am 3. Tag 2, am 4. Tag 1 Löffel voll zu geben.

**Verfangen (Muskelrheumatismus).**

- I. Spir. camphor.  
 Ol. Tereb.  $\overline{aa}$  50,0  
 Liq. Ammon. caust. 30,0  
 Spir. denatur. 100,0  
 DS. Zum Einreiben.

II. Kal. nitric. 10,0  
Herba Absinthii p. 30,0  
Stib. sulfur. nigr. 20,0  
Natr. sulfur. 80,0  
m. f. pulv. divid. in part. III.  
DS. 3stündl. 1 Pulver in  $\frac{1}{2}$  Li-  
ter warm. Kamillentee.

III. Natr. salicyl. 10,0  
— sulfur. 70,0  
m. f. pulv. divid. in part.  
aeq. IV.  
DS. An 1 Tag zu verbrauchen.

**Verstopfung.**

I. Fol. Senn. pulv.  
Mell.  $\overline{aa}$  1,5—20,0  
m. f. elect.

II. Natr. sulfur. 50,0  
DS. In Leinmehlwasser gelöst  
einzugeben.

**Würmer.**

I. Flor. Cinae pulv. 50,0  
Natr. sulfur. „ 100,0  
Rhiz. Calam. „  
Rad. Gent. „  $\overline{aa}$  10,0  
DS. 3× tägl. 1 Eßlöffel dem  
Futter zuzusetzen.

**II. Wurmcolik:**

Naphthalin 5,0  
Ol. Animal. foet. 3,0  
Natr. sulfur. 50,0  
mf. f. latw.  
DS. In 3 Portionen 2stündl. zu  
geben.

## Schafe.

### Augenentzündung.

I. Äußerlich:  
 Tinct. Opii croc. 1,0  
 Aqua Plumb. 100,0  
 DS. Tägl. 2× anzuwenden.

II. Innerlich:  
 Natr. sulfuric.

### Bandwurm.

I. Aloe pulv. 5,0  
 Extr. Filic. 1,0  
 Naphthalin 0,1  
 Spir. sapon. q. s.  
 f. pilul. No. I.  
 DS. Man gibt morgens nüchtern  
 die Pille und wiederholt  
 nach 8 Tagen.

II. Ol. Animal. foet.  
 — Terebinth.  $\overline{aa}$  30,0  
 Spiritus 100,0  
 DS. 2× tägl. morgens u. abends  
 1 Eßlöffel in 1 Tasse Milch  
 für Lämmer. Schafen gibt  
 man 2 Eßlöffel.

III. Pulver für 10 Schafe.  
 Kamala 10,0  
 Asae foet. 35,0  
 Ferr. sulfur. 35,0  
 Flor. Tanacet. 70,0  
 Herba Absinthi 70,0  
 Fruct Anis. pulv. 70,0  
 — Juniperi „ 70,0  
 Natr. chlorat. 70,0  
 Ol. Animal. foet. 10,0

Ol. Terebinth. 10,0  
 m. f. pulv.  
 DS. 3× tägl. eine Walnuß groß  
 mit Wasser zur Latwerge  
 gemacht, auf die Zunge  
 geben.

### Bleichsucht.

I. Ferr. sulfur. crud. 100,0  
 Natr. sulfur. 500,0  
 Fruct. Juniperi p. 250,0  
 DS. Als Lecke für 100 Schafe.

II. Fruct. Juniperi pulv. 1000,0  
 Natr. chlorat. „ 1000,0  
 Sem. Sinap. „ 500,0  
 Ferr. sulfur. „ 20,0  
 misc. f. pulv.

### Blutharnen.

Camphor trit. 3,0  
 Cort. Quercus pulv. 50,0  
 Plumb. acet. 5,0  
 Plac. sem. Lini 50,0  
 DS. 3× tägl. 1 Teelöffel.

### Durchfall.

Cort. Quercus pulv. 30,0  
 Rad. Valerian. „ 30,0  
 Calc. carbon. „ 30,0  
 Rad. Gent. „ 20,0  
 Natr. chlorat. „ 50,0  
 DS. Schafe 3× tägl. 1 Eßlöffel  
 auf die Zunge. Lämmer  
 3× tägl. 1 Teelöffel auf die  
 Zunge.

**Euterentzündung.**

Camphor 6,0  
Ungt. flav.  
Ol. Laur. aa 25,0

m. f. ungt.

DS. Zum Einreiben der Knoten.

**Freßpulver.**

Asae foet. pulv. 15,0  
Rad. Valer. „ 20,0  
Fruct. Foenicul. „ 60,0  
— Anisi „ 60,0  
Natr. chlorat. 60,0

m. f. pulv.

DS. Früh nüchtern 1 Eßlöffel voll in Kleientrank.

**Gebärmutterentzündung.**

Lysol

DS.  $\frac{1}{2}$  Eßlöffel auf 1 Liter Wasser alle 2 Stunden ca.  $\frac{1}{10}$  Liter in die Scheide.

**Gesichtsgrind.**

I. Creolin 5,0  
Ol. Lini 100,0

DS. Die Borken tägl. 1× abwaschen.

II. Kal. sulfurat pro baln. 5,0  
Eigelb  
Ol. Olivar.  
Glycerin  
Aqua dest. aa 20,0

misc.

DS. 3× tägl. einpinseln und den aufgeweichten Grind durch Abwaschung vor jedem neuen Einpinseln entfernen.

III. Kal. sulfurat p. b. 5,0  
Aquae Calcar. 50,0  
Ol. Lini 50,0  
misc.

**Harnruhr.**

I. Camphor. 5,0  
Aloe 5,0  
Rad. Valer. p. 10,0

f. latweg. c. Eigelb divid. in part. IV.

DS. Tägl. 1 Stück auf die Zunge.

**II. Alumen**

Ferr. sulfur. aa 150,0

DS. Ins Saufen in 50 Liter Wasser zu lösen.

**Harnverhaltung.**

I. Fruct. Juniperi pulv. 30,0  
— Juniperi cont. 30,0  
Natr. sulfur. 15,0

DS. Mit 1 Liter Wasser zum Tee kochen und 2ständl.  $\frac{1}{4}$  Liter.

II. Fruct. Juniperi cont.  
Sem. Cannab. aa 25,0

DS. Mit  $1\frac{1}{4}$  Liter heißem Wasser zu übergießen, nach halbstündlichem Stehen die Brühe abseihen und  $\frac{1}{4}$  Liter alle  $\frac{1}{2}$  Stunden zum Klistier.

**Hautjucken.**

I. Lysol

DS. 2 Eßlöffel auf 1 Liter Wasser zum Waschen.

II. Acid. boric.  
 — carbol. aa 10,0  
 Aqua dest. 1000,0  
 DS. Tägl. 1× zum Waschen.

III. Ammon. sulf. ichtyol. 10,0  
 Aqua dest. 15,0  
 Lanolin 50,0  
 Axung. Pore. 15,0  
 m. f. ungt.  
 DS. Tägl. 2—3× gut einreiben.

**Husten.**

Sulf. stib. aurant. 5,0  
 Fruct. Juniperi pulv.  
 Rad. Liquir. „ aa 30,0  
 Natr. chlorat. 100,0  
 m. f. pulv.  
 DS. 2× tägl. 1 Eßlöffel.

**Insekten.**

Sem. Sabadill. pulv. 75,0  
 Rhiz. Veratri „ 15,0  
 Zinc. sulfur. 10,0  
 m. f. pulv.  
 DS. Mit 8 Liter Wasser  $\frac{1}{2}$  Stde.  
 kochen und mit der Flüssigkeit waschen.

**Klaunenpulver.**

I. Cupr. sulf. pulv.  
 Stib. sulfurat. nigr. aa 70,0  
 Zinc. sulf. pulv. 100,0  
 DS. Zum Bestreuen der offenen  
 Klaunen.

II. Acid. mur. crud. 30,0  
 Mel 50,0  
 Aqua commun. 300,0  
 DS. Zum Pinseln der Mäuler.

III. Pyoktanin 1,0  
 Aqua 500,0  
 DS. Zum Pinseln.

**Kolik.**

I. Erkältungskolik:  
 Fruct. Capsic. pulv. 2,0  
 Rhiz. Zingib. „ 8,0  
 Fol. Menth. pip. „ 10,0  
 Plac. Sem. Lini 10,0  
 Natr. sulfur. p. 60,0  
 misc. f. pulv. divid. in part. IV.  
 DS. Alle Stunden 1 Pulver in  
 Warmbier.

II. Wurmkolik:

Ol. Animal. foet. 2,0  
 — Tereb. 2,0  
 Spiritus 4,0  
 DS. Auf einmal zu geben mit  
 1 Tasse Milch.

III. Klistier:

Sap. medicat. 5,0  
 Natr. chlorat. 45,0  
 div. in part. V.  
 DS. Alle Stunden 1 Pulver in  
 $\frac{1}{4}$  Liter Kamillentee zu lösen  
 und damit Klistier.

IV. Bei Verstopfung und Überfressen:

Natr. sulfur. 100,0  
 DS. In  $\frac{1}{4}$  Liter Kamillentee auflösen  
 u. auf einmal eingeben.

**Kropf.**

Kal. jodat.  
 Aqua dest. aa 10,0  
 Ungt. Hydrarg. cin. 80,0  
 m. f. ungt.  
 DS. Täglich 1× einreiben.

**Lämmerlähme.**

- I. Stib. sulf. nigr. 50,0  
Butyr. 10,0  
DS. Täglich 3× haselnußgroß  
einzugeben bis Darment-  
leerung erfolgt.

- II. Ol. Terebinth. 40,0  
Spir. Formic. 60,0  
— camphor. 100,0  
misc.  
DS. Täglich 1× die lahmen  
Glieder einzureiben.

**Lungenwurmpulver.**

- Für 10 Schafe:  
Ferr. sulfur. 15,0  
Asae foet. 50,0  
Fruct. Juniperi 50,0  
Flor. tanacet. 150,0  
Herb. Absinthii 150,0  
Ol. Terebinth. 30,0  
m. f. pulv.  
DS. Täglich 1× eine Walnuß  
groß auf die Zunge ge-  
strichen; zur Latwerge mit  
Aqua.

**Maulschwämmchen.**

- I. Abführmittel für das Mut-  
terschaf:  
Natr. sulfur. 80,0  
— bicarbon. 10,0  
— chlorat. 10,0  
Rad. Gentian. 10,0  
m. f. pulv.  
DS. Man löst das Pulver in  
 $\frac{1}{2}$  Liter Wasser und gießt  
die Lösung auf 2× mit  
einstündiger Pause ein.

**II. Pulver für das Lamm:**

- Rhiz. Rhei pulv. 5,0  
Magn. carbon. 10,0  
misc.  
DS. Täglich 3× eine Messer-  
spitze voll in Wasser.

- III Einpinselung:  
Thymol 0,25  
Tinct. Myrrhae  
— Ratanh. aa 15,0  
DS. 2stündlich einzupinseln.

**Milchpulver.**

- Natr. bicarbon. p. 40,0  
Fruct. Anis. „ 40,0  
Natr. chlorat. „ 80,0  
Sem. Foenigraec. „ 80,0  
Fruct. Foenicul. „ 160,0  
m. f. pulv.  
DS. 2× tägl. 1 gehäuften Eß-  
löffel voll in Warmbier.

**Räude.**

- I. Lysol-Bäder.  
DS.  $2\frac{1}{2}$  Liter Lysol oder Creo-  
lin auf 100 Liter Wasser bei  
30° R oder 38° C. 3 Minu-  
ten baden. Nach 1 Woche  
wiederholen.  
II. Lysol 10,0  
Spir. denat. 10,0  
Sap. virid. 80,0  
DS. Die erkrankten Körperstel-  
len einreiben.

**Rheumatismus.**

- I. Spir. camphor.  
— saponat. aa 150,0



Liq. Ammon. caust.  
Ol. Terebinth.  $\overline{aa}$  10,0  
DS. Tägl.  $2 \times$  die Glieder ein-  
reiben.

II. Innerlich:  
    Natr. salicyl. 5,0  
    — sulfur. 50,0  
m. f. pulv.

DS. Tägl.  $3 \times 1$  Eßlöffel für  
Schafe; für Lämmer: Tägl.  
 $3 \times 1$  Teelöffel.

**Schnupfen.**

Stib. sulfurat. aurant. 5,0  
Sulf. sublimat. 20,0  
Ammon. chlorat. 20,0  
Rad. Althaeae p. 100,0  
Sem. Foenigraec. „ 100,0

m. f. pulv.  
DS.  $2 \times$  tägl. 1 Eßlöffel aufs  
Futter.

**Skorbut.**

Inf. rad. Angelic. 15,0/300,0  
Acid. mur. 15,0  
DS. Dem kranken Lamm täg-  
lich  $2 \times 1$  Eßlöffel voll zu  
geben.

**Trommelsucht.**

Liq. Ammon. caust. 20,0  
Spir. saponat. 130,0  
misc.  
DS. Man gibt alle Viertelstun-  
den 1 Eßlöffel voll in 1  
Tasse Milch.  
Trokar! Tierarzt!

**Verstopfung.**

I. Natr. sulfuric. pulv. 75,0  
Plac. Sem. Lini 20,0  
Natr. bicarbon. 10,0  
Fruct. Carvi pulv. 10,0  
m. f. pulv. divid. in part. III.  
DS. Alle 3 Stunden 1 Pulver in  
 $\frac{1}{4}$  Liter warmem Wasser  
mit  $\frac{1}{2}$  Tasse voll Leinöl.

II. Sapon. medicat. 5,0  
Roggenmehl 45,0  
div. in part. V.

DS. Man löst 1 Pulver in  $\frac{1}{4}$  Lit.  
warm. Wasser und gibt  
alle Stunden ein solches  
Klistier.

**Würmer.**

Ol. Animal. foet. 2,0  
— Terebinth. 2,0  
Spiritus 4,0  
misc. dent tal. dos. IV.  
DS. Jeden Tag 1 Portion in  
einer Tasse Milch auf ein-  
mal zu geben.

**Zurückbleibender Nachgebur.**

I. Kal. carbon. 5,0  
Fruct. Carvi pulv.       
Summitat. Sab. „  $\overline{aa}$  15,0  
divid. in part. II.  
DS. Morgens und abends 1 Pul-  
ver.

II. Ausspülen der Scheide mit  
    Kal. permang. 1,0  
    Aqua dest.  $\frac{1}{2}$  Liter  
DS. Zum Ausspülen.

## Ziegen.

### Augenentzündung.

- I. Äußerlich:  
Tinct. Opii croc. 1,0  
Aqua Plumb. 100,0  
DS. Täglich 2× anzuwenden.

- II. Innerlich:  
Natr. sulfuric.

### Bandwurm.

- I. Aloe pulv. 5,0  
Extr. Filic. 1,0  
Naphthalin 0,1  
Spir. sapon. q. s.  
f. pilul. Nr. I.  
DS. Man gibt morgens nüch-  
tern 1 Pille, nach 8 Tagen  
wiederholen.

- II. Ol. Animal. foet. aa 30,0  
— Tereb. „ 30,0  
Spiritus 100,0  
DS. Morgens und abends 2 Eß-  
löffel voll.

### Bleichsucht.

- I. Ferr. sulfur. crud. 100,0  
Natr. sulfur. 500,0  
Fruct. Juniperi p. 250,0  
DS. Als Lecke für 100 Ziegen.

- II. Fruct. Juniperi pulv. 1000,0  
Natr. chlorat. „ 1000,0  
Sem. Sinap. „ 500,0  
Ferr. sulfur. „ 20,0  
m. f. pulv.

### Blutharnen.

- Camphor. 3,0  
Cort. Querc. pulv. 50,0  
Plumb. acet. 5,0  
Plac. Sem. Lini 50,0  
DS. 3× tägl. 1 Teelöffel.

### Durchfall.

- I. Rhiz. Formentill. p. 40,0  
Rad. Althaeae „ 40,0  
— Valer. „ 40,0  
Natr. bicarb. 80,0  
Ol. Menth. pip. 2,0  
— Carvi 4,0  
DS. 3× tägl. 1 Löffel voll.  
II. Acid. tannic. 4,0  
Vin. rubr. 250,0  
DS. 5—6× 1—2 Eßlöffel voll.

### Euterentzündung.

- Camphor. 7,5  
Ol. Hyoscyam. 10,0  
Adip. Lanae 12,5  
Adip. suill. 75,0  
m. f. ungt.  
DS. Zum Einreiben d. Knoten.

### Freßpulver.

- I. Asae foetid. 15,0  
Rad. Valer. pulv. 20,0  
Fruct. Foenic. „ 60,0  
— Anis. „ 60,0  
Natr. chlorat. „ 60,0  
m. f. pulv.

DS. Früh nüchtern 1 Eßlöffel voll in Kleientrank.

**Gebärmutterentzündung.**

Lysol

DS.  $\frac{1}{2}$  Eßlöffel auf 1 Liter Wasser alle 2 Stunden ca.  $\frac{1}{10}$  Liter in die Scheide.

**Gesichtsgrind.**

I. Creolin 5,0  
Ol. Lini 100,0

DS. Die Borken täglich 1× abwaschen.

II. Ol. Lini 75,0  
Aq. Calcar. 100,0

DS. Morgens und abends die nässenden Stellen einpinseln.

III. Lysol 2,5  
Ungt. Zinc. 50,0

DS. Täglich 2× einreiben.

**Harnruhr.**

I. Camphor. 5,0  
Aloe pulv. 5,0  
Rad. Valer. p. 10,0  
f. Latwerge c. Eigelb, div. in part. IV.

DS. Täglich 1 Stück auf die Zunge.

II. Alum.  
Ferr. sulf.  $\overline{aa}$  150,0

DS. Ins Saufen in 50 Liter Wasser zu lösen.

**Harnverhaltung.**

I. Fruct. Juniperi pulv. 30,0  
— Juniperi cont. 30,0  
Nart. sulfur. 15,0

DS. Mit 1 Liter Wasser zum Tee kochen und 2stündlich  $\frac{1}{4}$  Liter.

II. Fruct. Juniperi cont.  
Sem. Cannab.  $\overline{aa}$  25,0

DS. Mit  $1\frac{1}{4}$  Liter heißem Wasser zu übergießen, nach  $\frac{1}{2}$ stündigem Stehen die Brühe abseihen und  $\frac{1}{4}$  Liter alle  $\frac{1}{2}$  Stunden zum Klistier.

**Hautjucken.**

I. Lysol

DS. 2 Eßlöffel auf 1 Liter Wasser zum Waschen.

II. Acid. boric.  
— carbol.  $\overline{aa}$  10,0  
Aqua dest. ad 1000,0

DS. Täglich 1× zu waschen.

III. Ammon. sulf. ichthyol. 10,0  
Aqua dest. 15,0  
Lanolin 50,0  
Axung. Porc. 15,0  
m. f. ungt.

DS. Täglich 2–3× einzureiben und die Haut einbinden.

**Husten.**

I. Stib. sulfur. aur. 5,0  
Fruct. Juniperi p.  
Rad. Liquir. „  $\overline{aa}$  30,0  
Natr. chlorat. 100,0  
m. f. pulv.

DS. 2× täglich 1 Eßlöffel.

- II. Natr. chlorat. 1000,0  
Fruet. Juniperi p. 2000,0  
Stib. sulfur. nigr. 250,0  
m. f. pulv.  
DS. Eßlöffelweise mehrmals  
wöchentlich.

#### Insekten.

- I. Sem. Sabadill. pulv. 75,0  
Rhiz. Veratr. 15,0  
Zinc. sulfur. 10,0  
m. f. pulv.  
DS. Mit 8 Liter Wasser  $\frac{1}{2}$  Stde.  
kochen und mit der Flüssigkeit waschen.

- II. Lysol vel Creolin 5—6%  
parat. c. Branntwein.  
DS. 3× mit der Bürste das  
Waschen vornehmen und  
nach 5—6 Tagen wieder-  
holen.

#### Klauenpulver.

- Cupr. sulf. pulv.  
Stib. sulfurat. nigr. aa 70,0  
Zinc. sulfur. pulv. 100,0  
DS. Zum Bestreuen der offenen  
Klauen.

#### Klauenseuche.

- I. Acid. mur. crud. 30,0  
Mel 50,0  
Aqua commun. 300,0  
DS. Zum Pinseln der Mäuler.
- II. Pyoktanin 1,0  
Aqua dest. 500,0  
DS. Zum Pinseln.

#### Kolik.

- I. Erkältungskolik:  
Fruet. Capsic. pulv. 2,0  
Rhiz. Zingib. „ 8,0  
Fol. Ment. pip. „ 10,0  
Plac. Sem. Lini „ 10,0  
Natr. sulfur. „ 60,0  
m. f. pulv., div. in part. VI.  
DS. Alle Stunden 1 Pulver in  
Warmbier.

- II. Wurmkolik:  
Ol. Animal. foet. 2,0  
— Terebinth. 2,0  
Spiritus 4,0  
DS. Auf einmal zu geben mit  
1 Tasse Milch.

- III. Verstopfung u. Überfressen  
Natr. sulfur. 100,0  
DS. In  $\frac{1}{4}$  Liter Kamillentee  
auflösen und auf einmal  
eingeben.

- IV. Klistier:  
Sap. medicat. 5,0  
Natr. chlorat. 45,0  
div. in part. V.  
DS. Alle Stunden 1 Pulver in  
 $\frac{1}{4}$  Liter Kamillentee zu  
lösen zum Klistier.

- V. Innerlich:  
Acid. mur. 5,0  
Pepsin 10,0  
Aqua dest. 200,0  
DS.  $\frac{1}{2}$ stündlich 1 Eßlöffel in  
Kamillentee.

#### Kropf.

- Jod. pulv. 1,0  
Kal. jodat.

Aqua dest.  
 Axung. Porc.  $\overline{aa}$  5,0  
 Adip. Lanae 35,0  
 m. f. ungt.  
 DS. Zum Einreiben.

**Leckpulver.**

Innerlich:  
 Nat. chlorat. 100,0  
 — bicarbon. 50,0  
 — sulfur. 400,0  
 Stib. sulfur. nigr.  
 Sulf. sublimat.  
 Rad. Gentian. p.  
 Rhiz. Calam. „  
 Fruct. Juniperi „  
 Sem. Foenigraec. „  $\overline{aa}$  50,0  
 Plac. Sem. Lini 150,0  
 m. f. pulv.  
 DS. 3 × tägl. 1 Eßlöffel voll.

**Maulschwämmchen.**

I. Thymol 0,25  
 Tinct. Myrrhae  
 — Ratanh.  $\overline{aa}$  15,0  
 DS. 2stündlich einpinseln.

II. Natr. sulfur. 80,0  
 — bicarbon.  
 — chlorat.  $\overline{aa}$  10,0  
 Rad. Gent. pulv. 10,0  
 m. f. pulv.  
 DS. Innerlich: Man löst das Pulver in  $\frac{1}{2}$  Liter Wasser und gießt die Lösung auf 2 × mit einstündiger Pause ein.

III. Pyoktanin 0,1—0,5%

**Milchpulver.**

Natr. bicarbon. 40,0  
 Fruct. Anis. pulv. 40,0

Nat. chlorat. pulv. 80,0  
 Sem. Foenigraec. „ 80,0  
 Fruct. Foenicul. „ 160,0  
 m. f. pulv.  
 DS. 2 × tägl. 1 gehäuften Eßlöffel.

**Räude.**

I. Creolin 10,0  
 Sap. virid. 25,0  
 Adip. suill. 200,0  
 m. f. ungt.  
 DS. 3 × täglich einreiben.  
 II. Pix liquid. 5,0  
 Sap. virid. 5,0  
 Spiritus 50,0  
 m. f. sol.  
 DS. Äußerlich.

**Rheumatismus.**

I. Äußerlich:  
 Spir. camphor.  
 — saponat.  $\overline{aa}$  150,0  
 Liq. Ammon. caust.  
 Ol. Terebinth.  $\overline{aa}$  10,0  
 DS. Täglich 2 × die Glieder einreiben.

II. Innerlich:  
 Natr. salicyl. 5,0  
 — sulfur. 50,0  
 m. f. pulv.  
 DS. 3 × tägl. 1 Eßl. für Ziegen,  
 3 × tägl. 1 Teel. für Zickl.

**Schnupfen.**

Stib. sulfur. aur. 5,0  
 Sulf. sublimat. 20,0  
 Ammon. chlorat. 20,0

Rad. Althaeae pulv. 100,0  
Sem. Foenigraec. „ 100,0  
m. f. pulv.  
DS. 2× tägl. 1 Eßl. aufs Futter.

**Skorbut.**

Inf. rad. Angelic. 15,0/300,0  
Acid. mur. 15,0  
DS. Täglich 2× 1 Eßlöffel.

**Trommelsucht.**

Liq. Ammon. caust. 20,0  
Spirit. saponat. 130,0  
DS. Man gibt alle  $\frac{1}{4}$  Stunden  
1 Eßlöffel voll in einer Tasse  
Kümmeltee.  
Trokar! Tierarzt!

**Verstopfung.**

I. Aloe pulv. 5,0  
Rad. Gent. pulv. 5,0  
Fruct. Foenic. „  
— Carvi „ aa 5,0  
m. f. pulv. tal. dos. II.  
DS. N. B.

II. Sap. medicat. 5,0  
Roggenmehl 45,0  
div. in part. V.  
DS. Man löst ein Pulver in  
 $\frac{1}{4}$  Liter warmem Wasser

und gibt alle Stunden ein  
Klistier.

**Würmer.**

I. Sem. Arec. pulv. 5,0  
Aloe pulv. 10,0  
Rad. Liquirit. p. 60,0  
m. f. pulv.  
DS. 3× tägl. 1 Eßl. mit Milch.

II. Ol. Animal. foet. 2,0  
— Terebinth. 2,0  
Spirit. 4,0  
misc. tal. dos. IV.

DS. Jeden Tag 1 Portion in  
einer Tasse Milch auf 1×  
zu geben.

**Zurückbleiben der Nachgeburt.**

I. Kal. carbon. 5,0  
Fruct. Carvi pulv.  
Summitat. Sabin. p. aa 15,0  
div. in part. II.  
DS. Morgens und abends 1 Pul-  
ver.

II. Ausspülen d. Scheide mit  
Kal. permang. 1,0  
Aqua dest.  $\frac{1}{2}$  Liter  
DS. Zum Ausspülen.

## Hunde.

### Abführmittel.

Natr. nitric. 2,0  
Liq. Ammon. acet. 20,0  
Magn. sulfur. 30,0  
Aqua dest. 100,0  
DS. 2stündlich einen Eßlöffel.

### Augenentzündung.

I. Zinc. sulfur. 1,0  
Aqua Rosae 200,0  
DS. Man feuchtet die kranken  
Augen stündlich an.

II. Zinc. sulfur. 1,0  
Aqua dest. 200,0  
DS. Täglich 3× die Augen aus-  
waschen.

### Bandwurm.

I. Kamala 8,0 (Mitteldosis)  
„ 2,0—6,0 kl. Hunde  
„ 10,0—15,0 gr. „

II. Santonin 0,1  
Calomel 0,2  
Kamala 2,0  
m. f. pulv. tal. dos. VI.  
DS. 2× tägl. 1 Pulver.

### Blutharn.

Ol. Ricini  
— Olivar. aa 30,0  
DS. 4× tägl. 1 Eßlöffel voll.

### Durchfall.

I. Spir. camphorat.  
— Juniperi aa  
DS. 3× täglich den Leib ein-  
reiben und mit warmen  
Decken umhüllen.

II. Bism. subnitric. 1,0  
Extr. Ratanh. 2,5  
Sacch. Lactis 6,5  
divid. in part. aeq. V.  
DS. 4stündlich ein Pulver.

III. Xeroform  
Sacchar. aa 1,0  
tal. dos. VI.  
DS. 3× tägl. 1 Pulver.

### Eingeweidewürmer.

Extr. Filic. 2,0  
Ol. Ricini 20,0  
DS. Man erwärmt das Öl und  
gießt es morgens dem nüch-  
ternen Hund ein.

### Englische Krankheit.

I. Emuls. Ol. Jecor.  
II. Calc. phosphor.

### Erbrechen.

Kal. bromat. 10,0  
Aqua dest. 100,0  
DS. 3× täglich 1 Eßlöffel.

**Erkältung (Schnupfen usw.).**

Chin. mur.	2,0
Acid. mur.	2,5
Sir. Rub. Idaei	25,0
Aqua dest.	250,0

DS. Im Tage öfters 1 Eßlöffel.

**Fetträude.**

Creolin	20,0
Sap. virid.	20,0
Spir. dilut.	30,0

DS. Mit Schwefelteerseife waschen und einreiben.

**Fettsucht.**

Natr. sulf. sicc.	20,0
Aloe pulv.	
Sulf. sublimat.	
Stib. sulf. nigr.	
Fruct. Anis. pulv. aa	10,0

DS. 3 × tägl. 1 Messerspitze voll.

**Gehirnentzündung.**

Calomel	0,2
Sacchar.	1,0

m. f. pulv. divid. in part. II.  
DS. 1 Pulver sofort und das 2. Pulver nach 3 Stunden.

**Glatzflechte.**

Acid. salicyl.	
Kreosot	aa 5,0
Adip. suill.	90,0

m. f. ungt.  
DS. Täglich 1 × einschmieren, vorher waschen.

**Hautausschlag.**

Pix liquid.	3,0
Spiritus	100,0

DS. Zum Pinseln.

**Husten.**

Stib. sulfurat. aur.	0,5
Ammon. chlorat.	2,0
Succ. Liquir. dep.	10,0
	solv. et add.
Sir. Althaeae	90,0

DS. Tägl. 2 × 1 Kaffeel. voll.

**Krämpfe (nervöse Staupe).**

Kal. bromat.	
Natr. bromat.	aa 5,0
Ammon. bromat.	2,5
Aqua dest.	136,5
Tinct. Sacchar. tost. q. s.	(1,0)

DS. Mit Milch vermischt tägl. großen Hunden 2 Teelöffel, kleineren Hunden 1 Teelöffel voll.

**Kropf.**

I. Vasogen. jodat.	15,0
--------------------	------

DS. Zum Einreiben.

II. Kal. jodat.	5,0
Aqua dest.	150,0

DS. Tägl. 1 Eßlöffel voll großen Hunden, tägl. 1 Teelöffel voll kleinen Hunden.

**Magenkatarrh.**

Acid. tannic.	1,0
Bism. subnitric.	0,5
Rhiz. Calam. pulv.	10,0
	divid. in part. V.

DS. Jeden Tag 1 Pulver.

**Magenverstimmung.**

I. Tinct. Strychni	5,0
Acid. hydrochlor. pur.	2,0



Aqua dest. 180,0  
 Sir. Aurant. cort. 25,0  
 DS. 3× tägl. 1 Tee- bis Eßlöffel  
 voll zu geben.

II. Tinct. Absinth.  
 — Rhei vinos.  $\overline{aa}$  25,0  
 DS. Öfters im Tage 1 Teelöffel  
 voll zu geben.

**Maulschwämmchen.**

Borax 10,0  
 Aqua Salviae 200,0  
 DS. 2stündlich die Mäuler aus-  
 wischen.

**Ohrzwang (-wurm).**

I. Creolin 1,0  
 (seu Acid. carb. 1,0)  
 Spirit. 20,0  
 Aqua 50,0  
 DS. Täglich 1 Teelöffel voll ins  
 Ohr zu gießen.

II. Acid. salicyl. 1,0  
 Ol. Hyoscyam. 50,0  
 DS. 3× täglich mit einem Pin-  
 sel in das kranke Ohr zu  
 streichen.

**Räude.**

I. Bei Sarkoptesräude = äußer-  
 liche Räude:  
 Bals. peruv.  $\overline{aa}$  25,0  
 Creolin  $\overline{aa}$  25,0  
 Spir. Vin. 500,0  
 misc.  
 DS. Einen um den anderen Tag  
 einreiben.

II. Bei Akarusräude = Talg-  
 drüsenräude: Täglich baden  
 mit  
 Kal. sulfurat. p. b. 60,0  
 Aqua 10 Liter

III. Hydr. sozodol. 10,0  
 Vaseline ad 200,0  
 DS.

IV. Innerlich:  
 Sulf. sublimat. 20,0  
 Fruct. Laur. p. 5,0  
 DS. 3× täglich 1 Messerspitze  
 voll.

V. Acid. salicyl. 2,5  
 Ol. Petrae 10,0  
 — Rapae 20,0  
 DS. 3× täglich 10 Tropfen.

VI. Salbe:  
 Pix liquid.  
 Sulf. sublimat.  $\overline{aa}$  25,0  
 Sap. virid.  
 Spir. denat.  $\overline{aa}$  50,0  
 m. f. ungt.

VII. Creolin 10,0  
 Sap. kalin. 25,0  
 Adip. suill. 200,0  
 m. f. ungt.  
 DS. Tägl.  $\frac{1}{3}$  des Körpers ein-  
 reiben.

**Rheumatismus.**

I. Natr. salicyl. 10,0  
 Aqua dest. 200,0  
 DS. 3× tägl. 1 Eßlöffel voll.

II. Salol. 0,5  
dos. X.  
DS. 3× tägl. 1 Pulver.

III. Einreibung:  
Spir. camphor.  
— Formicar.  $\overline{aa}$  50,0  
misc.  
DS. 3× täglich einreiben.

**Schutzpulver (gegen  
Krankheit).**

Natr. chlorat. 30,0  
Kal. nitric. 20,0  
Aloes 50,0  
Sulfur. 100,0  
misc.  
DS. Je nach Größe des Hundes  
 $\frac{1}{2}$ —1 Teelöffel voll aufs  
und ins Futter.

**Skorbut.**

I. Thymol 0,25  
Tinct. Myrrhae  
— Ratanh.  $\overline{aa}$  15,0  
DS. 2× täglich einpinseln.

II. Aloe p. 5,0  
Rad. Gent. „ 5,0  
Rhiz. Calam. „ 10,0  
Mel q. s. f. pilul. VI.  
DS. 3× täglich 1 Pille.

**Staupe.**

I. Calomel 2,0  
Sacchar. 3,0  
divid. in part. X.  
DS. 2× täglich 1 Pulver.

II. Rhiz. Veratr. pulv. 0,3  
DS. Auf die Zunge streuen.

III. Kal. jodat. 3,5  
Aqua dest. 5,0  
Ol. Calam.  
— Valer.  $\overline{aa}$  4,0  
— Menth. pip. 2,0  
Tinct. Arnicae 18,0  
Ol. Jecor. Asell. 250,0  
DS. Täglich 2× 1 Eßlöffel voll.

IV. Antifebrin  
Sacchar.  $\overline{aa}$  0,5  
tal. dos. V.  
DS. Täglich 1—2 Pulver.

V. Lactophonin 0,5—1,0  
dos. VI.  
DS. 2—3× täglich 1 Pulver  
(Fieber).

VI. Einreibung:  
a) Spir. camphor.  
b) Liniment. volat. 100,0  
Ol. Terebinth. 10,0  
DS. 2× täglich den Rücken  
einreiben.

VII. Umschlag über d. Kopf:  
Spir. camphor.  
— 90%  $\overline{aa}$  100,0  
Aqua dest. 300,0  
DS. Man füllt die Flüssigkeit in  
einen Eisbeutel, verbindet  
und legt ihn auf den Kopf  
des Hundes.

VIII. Staupe des Halses und der  
Brust:  
Creolin 10,0  
Aqua 1000,0

DS. Täglich 15 Minuten lang  
Dämpfe.

IX. Decoct. Seneg. 10,0 (200,0)  
Ammon. chlorat.  
Succ. Juniperi aa 10,0  
DS. 3× tägl. 1 Eßlöffel voll.

X. Nervöse Staupe (Krämpfe):  
Kal. bromat.  
Natr. bromat. aa 5,0  
Ammon. bromat. 2,5  
Aqua dest. 136,5  
Tinct. Sacch. tost. q. s. (1,0)  
DS. Mit Milch vermischt, täg-  
lich großen Hunden 2 Tee-  
löffel, kleineren Hunden  
täglich 1 Teelöffel voll zu  
geben.

XI. Bei Schwächezuständen:  
Aether 5,0  
Vin. Malag. 100,0  
DS. 3× täglich 1 Teelöffel.

**Ungeziefer.**

Lysol vel Lysoform  
DS. 1 Eßlöffel auf 1 Liter Was-  
ser und tüchtig durch-  
bürsten.

**Vergiftung durch Strychnin.**

Acid. tannic. 1,0  
Aqua dest. 100,0  
DS. Alle 5 Minuten 1 Eßlöffel  
voll.

**Verstopfung.**

I. Inf. Sennae comp. 100,0  
DS. Auf 1—2× einzugeben.

II. Sir. Rhamni canthart. 30,0  
DS. Auf 2× zu geben innerhalb  
3 Stunden.

III. Magn. sulfuric.  
Succ. Juniperi aa 15,0  
Aqua dest. ad 100,0  
DS. Auf 2× zu geben mit Ein-  
haltung einer einstündigen  
Pause.

IV. Podophyllin 0,1  
Sacchar. 1,0  
m. f. pulv.

**Verunreinigung der Hausecken.**

Ol. Terebinth. vel. Piper nigr.

**Vorhautkatarrh (Tripper.)**

Zinc. sulfur. 1,0  
Aqua dest. 100,0  
DS. Mehrmals täglich gründlich  
zu waschen.

**Würmer (Spulwürmer).**

Santonin 0,1  
Calomel 0,2  
Sacchar. 2,0  
m. f. pulv. tal. dos. VI.  
DS. Täglich 2 Pulver.

**Wurmpillen.**

Aloe pulv. sabt. 4,0  
Sap. medicat. 2,0  
Sem. Arecae pulv. 5,0  
Flor. Koso „ 1,0  
Adip. suill. q. s.  
f. pilul. VI. consperg. c. Tal-  
cum.  
DS. Morgens und abends 1 Pille.

**Wundlaufen der Füße.**

I. Liq. Alum. acet. 50,0  
Aqua dest. 40,0  
Glycerin 10,0  
misc.

II. Cupr. sulf. 2,0  
Alumen 8,0  
Aqua dest. ad 100,0

DS I und II. Dem Hunde die

Füße am Ballen und zwischen den Zehen jeden Morgen und Abend mit einem in das Wasser getauchten Schwamm auswaschen.

**Zecken.**

Ol. Terebinth.

DS. Zum Pinseln.

## Katzen.

### Abführen.

Sir. Rhamni canthart.  
DS. 1—2 Teelöffel öfters.

### Bandwurm.

Kamala 1,0—2,0

### Durchfall.

I. Tinct. Opii 5,0  
Gummi arab. 10,0  
Aqua dest. 100,0  
DS. 3× täglich 1 Teelöffel voll.

II. Acid. tannic. 0,1  
Pulv. gummos. 0,5  
tal. dos. VI.  
DS. 3stündlich 1 Pulver.

### Dyspepsie (Magenüberladung).

I. Magn. carbon.  
Rhiz. Rhei pulv. aa 5,0  
Sacchar. alb. 10,0  
m. f. pulv.  
DS. Messerspitzenweise.

II. Inf. Rhei 2,0/80,0  
Natr. bicarb. 5,0  
Sir. simpl. 15,0  
DS. 3× täglich 1 Teelöffel.

III. Pepsin 2,0  
Acid. mur. 2,0

Sir. Rub. Jd. 10,0  
Aqua dest. 100,0  
DS. 3× täglich 1 Teelöffel.

IV. Tinct. Chin.  
— Rhei vinos. aa 20,0  
DS. 3× täglich 10 Tropfen.

### Räude.

I. Bals. peruv.  
Sulf. depur. aa 2,0  
Adip. benz. 20,0  
m. f. ungt.  
DS. Äußerlich.

II. Sulfur. sublimat. 15,0  
Kal. carbon. 7,0  
Adip. suillus 60,0  
m. f. ungt.  
DS. Äußerlich: Alle 2 Tage  
einreiben.

III. Lac. sulf. 40,0  
Adip. Lan. anhydr. 10,0  
Acet. 30,0  
Vaselin 20,0  
m. f. ungt.  
DS. Alle 2 Tage einreiben. Ba-  
den und Waschen ist nicht  
angängig.

### Töten von Katzen.

Coniin  
DS. 3—4 Tropfen genügen, um  
eine Katze innerhalb ½  
bis 1½ Minuten zu töten.

## Kaninchen.

### Auflaufen.

Liq. Ammon. caust.  
DS. 5 Tropfen in etwas Wasser.

### Augenentzündung.

Flor. Chamomill. 50,0  
DS. Mit Wasser abkochen. Nach dem Abkühlen wischt man die Augen mit dieser Abkochung öfters aus.

### Durchfall.

Acid. salicyl.  
DS. Früh und abends 1 Messerspitze.

### Geschwüre.

Lysol oder Cresepton  
DS. 3—5% anwenden.

### Ohrenräude.

Bals. peruv.  
Spirit.  
Aether. aa 10,0  
DS. Zum Bepinseln der Borken.

### Räude.

Ol. Carvi 10,0  
Adip. suill. 50,0  
m. f. ungt.  
DS. Zum Einreiben.

### Speichelfluß.

Alaun 25,0  
DS. In  $\frac{1}{4}$  Liter Wasser lösen.  
In die Lösung taucht man die Schnauze ein.

### Trommelsucht.

Liq. Ammon. caust.  
DS. 3 Tropfen auf 1 Teelöffel voll Wasser eingeben.

### Verstauchung.

Man kühlt mit Bleiwasser und reibt darauf mit flüchtiger Salbe nach.

## Hühner.

### Augenkrankheit.

- I. Lysol 0,5  
 Aqua dest. 100,0  
 DS. Man wäscht täglich mehrmals.

- II. Ungt. Zinci 20,0  
 DS. Zum Streichen.

### Bandwurm.

- Sem. Arecae pulv. 1,0  
 DS. 2× täglich 1 Pulver mit etwas Butter zusammengeknetet. Jeden 3. Tag wiederholen.

### Diphtherie.

- I. Zitronensaft 100,0  
 DS. Zum Auspinseln der Rachenhöhle.

- II. Creolin 25,0  
 Glycerin 50,0  
 Aqua dest. 50,0  
 DS. Zum Aufpinseln der Rachenhöhle.

- III. Creolin 5,0  
 Aqua dest. 95,0  
 DS. Zum Auswaschen d. Augen.

- IV. Inf. fol. Jugland. 15,0/200,0  
 Glycerin 15,0  
 Kal. chloric. 5,0  
 Acid. salicyl. 0,6  
 Spir. rect. 15,0

- DS. Größeren Geflügel gibt man tägl. 1—2×  $\frac{1}{2}$ —1 Eßlöffel voll; kleineren Tieren je 1—2× täglich  $\frac{1}{2}$  Teelöffel voll.

- V. Kreosot 3,0  
 Acid. boric. 5,0  
 Spir. vin. 15,0  
 Glycerin 20,0  
 Aqua dest. 160,0

- DS. Zum Pinseln der sehr festen Belagmassen.

### Durchfall.

- I. Sem. Myristic. pulv. 1,0  
 (Muskatnüsse)  
 DS. Täglich 1 Pulver.

- II. Ferr. sulfur. pulv. 10,0  
 DS. Auf 1 Liter Trinkwasser.

### Eierlegepulver.

- Pip. nigr. pulv. 25,0  
 Rhiz. Zingib. „ 50,0  
 Sem. Urticae „ 75,0  
 Ferr. oxydat. „ 50,0  
 Calc. phosphor. „ 100,0  
 — carbon. „ 200,0

- DS.

### Eileiterverfall.

- Alum. pulv. 10,0  
 DS. In 1 Liter Wasser lösen.  
 Von der Lösung spritzt man öfters am Tage etwas in den Darm ein.

### Federfressen der Hühner.

- I. Grünfutter mit Fleisch ver-  
abfolgen.  
II. Tinct. Aloes  
DS. Zum Bepinseln der Federn.

### Fußkrankheit (Fuß- geschwulst).

- a) Glycerin 50,0  
DS. Man pinselt die Geschwulst,  
nachdem man die Füße in  
lauwarmem Wasser gebadet  
hat, mit Glycerin ein.  
b) Bei Vorhandensein von  
Hitze kühlt man zuerst mit  
Aqua Plumb. 200,0  
c) Bei Entzündung oder Eiter-  
bildung  
Plac. sem. Lini 125,0  
werden zu heißem Brei an-  
gerührt. Wenn die Ge-  
schwulst erweicht ist,  
schneidet man ein, wäscht  
mit  
Liq. Creosol. sap. 1,0  
Aqua dest. 99,0  
aus und pinselt in die  
Höhlung  
Tinct. Myrrhae.

### Hühnerfutter-Zusatz.

- Fruct. Capsic. pulv. 40,0  
Sem. Foenigraec. „  
Rad. Gentian. „  
— Liquirit. „  
Cret. alb. pulv. aa 80,0  
misc.

### Hühnerpulver.

- I. Für Hühner, welche Eier  
ohne Schale legen:  
Calc. phosphor. crud. 80,0  
Fruct. Anis. pulv. 10,0  
Rhiz. Calam. „ 10,0  
misc. f. pulv.  
DS. Für jedes Huhn 1 Messer-  
spitze voll täglich ins Fut-  
ter geben.  
II. Ferr. sulfur. 10,0  
Fruct. Capsic. p. 10,0  
Pip. nigr. „ 20,0  
Sem. Foenigraec. „ 40,0  
Avenae 40,0  
Sem. Lini pulv. gr. 50,0  
Calc. phosphor. crud. 80,0  
DS. Für 20 Hühner täglich 1  
Eßlöffel voll ins Futter.

### Kalkbeine.

- I. Creolin 2%  
DS. 3 × täglich baden, 3 Eß-  
löffel voll auf 1 Liter Aqua.  
II. Carbolvaselin 1,0/20,0  
DS. Zum Einreiben.  
III. Kreosot 3,0  
Adip. suill. 30,0  
DS. m. f. ungt.

Der Stall muß ausgeräumt  
und frisch mit Kalk geweißt  
werden.

- IV. Man erweiche die Borke  
mit einem Gemisch von  
Creolin 2,0  
Sapo virid. 48,0  
m. f. ungt.



entferne die Borke und streiche

Bals. peruv. 10,0  
auf. Nach einigen Tagen reibt man den ganzen Lauf mit Glycerin ein, das man mit etwas Wasser verdünnt hat.

**Kropfentzündung (harter Kropf).**

Man gebe  
Ol. Ricini 5,0  
auf einmal ein.  
Außerdem  
Acid. hydrochlor.  
3 × täglich 2 Tropfen in 1 Löffel Wasser. Ferner suche man durch vorsichtiges Streichen den Kropf zu entfernen.

**Lungenentzündung.**

Acid. salicyl. 2,5  
löse man in  $\frac{1}{4}$  Liter heißem Wasser auf und pinsele sorgfältig Nasenlöcher, Mund und Schlund damit aus.

**Mauser.**

Fruct. Cannab. cont.	150,0
— Anis.	100,0
Ov. Formic.	100,0
Conch. praep.	350,0
Calc. phosphor.	300,0

DS.

In das Trinkwasser:  
Ferr. sulfur. cr. p. 1,0  
DS. In 1 Liter Wasser lösen

**Nasenkatarrh (Schnupfen, Luftröhrenkatarrh).**

I. Kal. permang. 1,0  
Aqua dest. 100,0  
DS. Man pinselt die Nasenöffnungen und den Schlund öfters aus.

II. Mel Foenicul.  
DS. Mehrere Male täglich 1 Teelöffel.

**Pips.**

Creolin	3,0
Glycerin	10,0
Aqua dest.	87,0

DS. Zum Auspinseln.

**Rheumatismus.**

Tinct. Arnic.	50,0
Acid. salicyl.	2,0
Sap. kalin.	10,0
Aqua d. fervida	1000,0

DS. Zum Baden.

**Verdauungsbeschwerden (Appetitlosigkeit).**

Sem. Myrist. pulv. 1,0  
DS. Täglich  $\frac{1}{2}$ —1 Pulver in Wasser.

## Geflügel und Vögel.

### Asthmamittel.

Für Kanarienvögel:

Tinct. Capsic.	18,0
Spir. Chloroform	4,5
Ferr. citric.	2,0
Aqua Foenicul.	45,0

DS. Man gibt täglich einige Tropfen auf 1 Stück Zucker.

### Bronchitis (Luftröhren-entzündung).

Ol. Sesami

DS. 1 Teelöffel voll schwach angewärmt zu geben.

### Croup (Pips—Diphtherie).

I. Creolin	5,0
Glycerin	75,0
Aqua dest.	125,0

misc.

DS. 3× täglich die Rachenhöhle und Kehlkopf ausspinseln.

II. Acid. mur. dil. 1 : 15

DS. Zum Pinseln und 3× tägl. 5 Tropfen eingeben.

III. 5% Salicylsäurelösung

DS. Zum Pinseln und 3× tägl. 5—10 Tropfen eingeben.

IV. Ferr. sulfur.

DS. 1 Messerspitze in 1 Liter Aqua.

V. Acid. tannic. 10,0

Aqua dest. 100,0

DS. Tauben täglich 5—10, Hühnern 10—20, Gänsen 20 bis 40 Tropfen.

### Durchfall für Geflügel.

I. Tinct. Opii simpl. 1,0

Vin. rubr. 10,0

DS. 5—10 Tropfen.

II. Ferr. sulfur. 10,0

DS. 1 Teelöffel auf 1 Liter Wasser.

### Eierkonservierungssalz.

I. Kal. nitric. pulv. 150,0

Natr. chlorat. „ 300,0

Acid. boric. „ 50,0

m. f. pulv.

### Eierkonservierungsflüssigkeit.

I. Liq. Natr. silicici

DS. 1 Teil Wasserglas und 6 bis 8 Teile Wasser

oder

½ Liter Wasserglas u. 5 Liter Wasser für 100 Eier.

### Erfrierungen.

Ichthyol 5,0

Ol. camphorat. 20,0

DS. 1—2× täglich einreiben.

**Geflügelcholera.**

- I. Ferr. sulfur. 10,0  
 DS. Als Trinkwasser 1 Teelöffel  
 (10,0) voll auf 1 Liter  
 Wasser.
- II. Innerlich:  
 Lysol  
 DS. ½ Eßlöffel voll auf 1 Liter  
 Wasser.

**Geflügelpocken.**

- |          |      |
|----------|------|
| Kreosot  | 1,5  |
| Borsäure | 2,5  |
| Spiritus | 7,5  |
| Glycerin | 10,0 |
| Wasser   | 80,0 |
- DS. Zum Pinseln.

**Luftröhrentzündung.**

- Ol. Sesami  
 DS. 1 Teelöffel voll schwach  
 angewärmt zu geben.

**Verstopfung.**

- I. Ol. Lini vel Ol. Sesami  
 DS. 1 Eßlöffel voll zu geben.
- II. Ol. Ricini 30,0  
 DS. 2× täglich 1 Teelöffel voll.

**Vogelmilben.**

- I. Tinct. Asae foet. 10,0  
 Ol. Anis. 2,0  
 Spiritus 90,0  
 DS. Zum Zerstäuben.
- II. Spir. Formicar.  
 Aqua dest. aa 15,0

- DS. 1 Teelöffel voll auf 1 Tasse  
 lauwarm. Wasser.

**Weißer Kamm.**

- I. Tinct. Jodi  
 DS. Zum Bepinseln 1× täglich.
- II. Acet. pyrolignos. crud. 20,0  
 Wasser 80,0  
 DS. Zum Bepinseln 1× täglich.

**Vogelsand.**

Feiner Flußsand wird gut ge-  
 trocknet und fein gesiebt. Dann  
 mischt man  
 2% gepulverte Ossa Sepiae und  
 0,5% gepulverte Flor. Pyrethri  
 (Insektenpulver)  
 darunter.

**Vogelfutter.**

- a) Drossel:  
 Ameiseneier . . . . 100,0  
 Paniermehl . . . . 200,0  
 Mohn, zerquetscht . 400,0  
 Mohrrüben, zerrieben 50,0  
 Gerstengrütze . . . 250,0
- b) Finken:  
 Rübsamen . . . . 1000,0  
 Kanariensamen . . . 200,0  
 Hirse, geschälte . . 200,0  
 Hanf, zerquetscht . 200,0  
 Distelsamen . . . . 200,0  
 Klettensamen . . . . 200,0
- c) Kanarienvogel:  
 Kanariensamen . . . 300,0  
 Rübsamen . . . . . 700,0

d) Körnerfresser (im allgemeinen):		g) Tauben:	
Rübsamen . . . . .	400,0	Erbsen . . . . .	400,0
Hanf . . . . .	100,0	Gerste . . . . .	400,0
Hirse . . . . .	300,0	Weizen . . . . .	200,0
Hafer, geschält . . . . .	200,0		
e) Nachtigallen:		h) Zeisige:	
Drosselfutter . . . . .	1000,0	Rübsamen . . . . .	500,0
Hanf, zerquetscht . . . . .	25,0	Kanariensamen . . . . .	250,0
Ameiseneier . . . . .	100,0	Hanf, zerquetscht . . . . .	250,0
Weißwurm . . . . .	100,0	Mohn . . . . .	250,0
		Distelsamen . . . . .	125,0
f) Papageien:		Klettensamen . . . . .	125,0
Hanf . . . . .	650,0	i) Singvogelfutter:	
Erdnüsse . . . . .	50,0	Rübsamen . . . . .	250,0
Sonnenblumenkerne . . . . .	50,0	Kanariensamen . . . . .	200,0
Zirbelnüsse . . . . .	100,0	Hirse . . . . .	200,0
Kürbiskerne . . . . .	50,0	Leinsamen . . . . .	100,0
Bucheckern . . . . .	50,0	Mohn . . . . .	100,0
Kanariensamen . . . . .	50,0	Hanf . . . . .	100,0
		Grassamen . . . . .	25,0
		Salatsamen . . . . .	25,0

## Dosierung der Vieh-Arzneimittel.

Name des Arzneimittels	Geflügel	Katze	Hund	Schwein	Schaf, Ziege	Rind	Pferd
<b>Acetum Digitalis</b> . . . . .	—	0,3—0,8	1,0—2,5	5,0—10,0	5,0—10,0	20,0—50,0	20,0—50,0
<b>Acid. arsenicosum</b> als Antilemptic . . . . .	—	—	—	—	—	—	2,0—3,0
<b>Acid. arsenicosum</b> als Plasticum . . . . .	0,0005—0,002	0,001—0,002	0,001—0,005	0,01—0,05	0,01—0,05	0,1—0,5	0,1—0,5
<b>Acid. carbolic.</b> . . . . .	0,05—0,1	—	0,05—0,2	0,5—1,0	1,0—2,0	5,0—15,0	5,0—15,0
<b>Acid. salicyl. pro dosi.</b> . . . . .	0,1—0,2	0,1—0,25	0,25—2,0	2,0—5,0	5,0—10,0	25,0—75,0	25,0—50,0
<b>Acid. salicyl. pro die.</b> . . . . .	0,5	0,5—2,0	2,0—8,0	10,0	25,0	150,0	100,0
<b>Acid. tannicum</b> . . . . .	0,1—0,5	0,05—0,2	0,1—0,5	1,0—2,5	2,5—6,0	10,0—16,0	7,0—20,0
<b>Aconitum nitric. cryst.</b> . . . . .	—	—	0,0005—0,002	0,001—0,002	0,0005—0,001	0,005—0,02	0,005—0,02
<b>Aloë</b> als Amarum . . . . .	0,1—0,2	0,1—0,2	0,1—0,5	1,0—2,0	2,0—5,0	8,0—12,0	3,0—5,0
<b>Aloë</b> als Laxans . . . . .	0,5—2,0	0,2—1,0	3,0—5,0	5,0—15,0	15,0—30,0	40,0—60,0	30,0—50,0
<b>Alumen</b> . . . . .	0,5—1,0	0,5—1,0	1,0—2,0	2,0—5,0	4,0—7,0	10,0—25,0	10,0—30,0
<b>Antifebrin</b> . . . . .	—	0,1—0,25	0,3—1,0	1,0—2,5	2,0—5,0	10,0—20,0	10,0—20,0
<b>Antipyrin</b> . . . . .	—	0,3—0,8	2,0—5,0	2,0—5,0	8,0—12,0	15,0—20,0	15,0—20,0
<b>Apomorphin. hydrochlor.</b> . . . . .	—	Emetic.	Emetic.	Expector.	Expector.	Expector.	Expector.
<b>Atropin. snlf.</b> . . . . .	—	0,002—0,005	0,02—0,05	0,01—0,03	0,005—0,01	0,02—0,05	0,02—0,05
<b>Cantharides</b> . . . . .	—	0,002—0,005	0,005—0,02	0,01—0,03	0,01—0,05	0,05—0,1	0,05—0,1
<b>Chinin. hydr. et sulf.</b> . . . . .	—	0,02—0,05	0,1—0,2	0,3—0,5	0,4—0,7	2,0—5,0	0,5—2,0
<b>Chloralum hydr.</b> . . . . .	0,25—2,0	0,1—0,25	0,3—1,0	1,5—3,0	2,0—5,0	15,0—25,0	10,0—25,0
		0,5—2,0	1,0—5,0	5,0—10,0	8,0—15,0	25,0—50,0	25,0—50,0

Name des Arzneimittels	Geflügel	Katze	Hund	Schwein	Schaf, Ziege	Rind	Pferd
<b>Cuprumsul f.</b> als Emeti- cum . . . . .	—	0,05—0,2	0,1—0,5	0,5—1,0	—	—	—
<b>Cuprum sulf.</b> als Antidot. des Phosph. . . . .	0,02—0,05	0,05—0,08 0,005	0,05—0,1 0,0005—0,001	1,0—1,5 0,005—0,01	0,5—1,0 0,005—0,01	2,0—8,0 0,01—0,05	2,0—15,0 0,01—0,05
<b>Curare</b> . . . . .	—	0,01—0,025	0,02—0,05	0,05—0,2	0,05—0,2	0,5—1,0	0,5—1,0
<b>Cyankalium</b> . . . . .	—	0,05—1,0	0,05—0,3	1,0—1,5	1,5—3,0	2,0—5,0	1,0—4,0
<b>Extr. Aloës</b> als Amarum .	0,05—0,1	—	—	—	—	—	—
<b>Extr. Aloës</b> als Laxans .	0,3—1,0	0,1—0,5	1,5—4,0	3,0—10,0	10,0—15,0	25,0—30,0	10,0—25,0
<b>Extr. Opii</b> . . . . .	0,03—0,05	0,03—0,1	0,05—0,3	0,5—1,0	0,5—1,0	5,0—15,0	2,0—8,0
<b>Folia Belladonn.</b> . . . .	—	—	0,2—1,0	2,0—10,0	2,0—10,0	15,0—30,0	15,0—30,0
<b>Folia Digitalis</b> als Car- diacum . . . . .	0,03—0,05	0,05—0,1	0,1—0,3	0,5—1,0	0,5—1,0	3,0—6,0	3,0—6,0
<b>Folia Digitalis</b> als Anti- pyreticum . . . . .	—	0,1—0,2	0,3—0,6	1,5—2,0	1,5—2,0	10,0—12,0	8,0—12,0
<b>Fol. Nicotinae</b> . . . . .	0,1—0,3	0,1—0,3	0,3—0,5	1,0—2,0	3,0—5,0	25,0—50,0	12,0—25,0
<b>Fol. Stramonii</b> . . . . .	—	—	—	—	—	—	60,0
<b>Gutti</b> . . . . .	0,03—0,1	0,02—0,1	0,4—1,0	2,0—4,0	4,0—10,0	30,0—50,0	15,0—30,0
<b>Herba Conii</b> . . . . .	—	—	1,0—5,0	6,0—10,0	8,0—15,0	50,0—100,0	30,0—100,0
<b>Herba Gratiolae</b> . . . . .	—	—	0,5—1,0	1,0—3,0	1,0—3,0	8,0—15,0	8,0—15,0
<b>Herba Hioscyami</b> . . . .	—	—	0,5—4,0	10,0—30,0	10,0—30,0	15,0—90,0	15,0—100,0
<b>Hydrag. bichlorat.</b> cor- ros. . . . .	0,002—0,005	0,002—0,005	0,005—0,01	0,01—0,02	0,01—0,03	0,1—0,2	0,1—0,3
<b>Hydrag. bichlorat.</b> cor- ros. höchste Gabe . . . .	—	—	0,05	0,1	0,1	0,5	0,5

Name des Arzneimittels	Geflügel	Katze	Hund	Schwein	Schaf, Ziege	Rind	Pferd
Hydrargyr. chlor. mite . . . . .	0,05—0,1	0,02—0,07	0,03—0,1	1,0—4,0	0,3—0,8	1,0—5,0	2,0—8,0
Kalium chloric. . . . .	0,2—0,5	0,2—0,5	0,25—1,0	1,0—2,5	3,0—5,0	5,0—10,0	5,0—10,0
Kalium jodat. . . . .	0,1—0,2	0,1—0,2	0,5—1,0	3,0—5,0	3,0—5,0	7,0—15,0	7,0—15,0
Kreosotum . . . . .	0,01—0,05	—	0,05—0,2	1,0—2,0	1,0—2,0	5,0—15,0	5,0—15,0
Liquor Kalii arsenic. . . . .	0,05—0,2	0,1—0,2	0,1—0,5	1,0—5,0	1,0—5,0	10,0—50,0	10,0—50,0
Morphin. hydrochl. . . . .	—	0,01—0,03	0,03—0,1	0,2—0,5	0,5—1,0	0,7—2,5	0,7—2,5
Natrium salicyl. pro dosi . . . . .	0,1—0,3	0,1—0,3	0,5—3,0	3,0—5,0	5,0—10,0	30,0—80,0	25,0—50,0
Natrium salicyl. pro die . . . . .	0,5	0,5—2,0	2,0—8,0	10,0—12,0	25,0	150,0	100,0
Oleum Crotonis . . . . .	1/4—1 gk	1/4—1 gk	2—5 gk	6—10 gk	8—12 gk	15—30 gk	10—20 gk
Opium . . . . .	0,05—0,1	0,05—0,2	0,2—0,5	1,0—3,0	1,0—3,0	10,0—25,0	8,0—20,0
Phosphor. . . . .	0,0005—0,001	0,0005—0,001	0,0005—0,001	0,002—0,005	0,002—0,005	0,001—0,005	0,01—0,05
Physostigmin. sulf. . . . .	—	0,0003—0,0005	0,0005—0,003	0,0005—0,002	0,002—0,05	0,1—0,2	0,05—0,1
Pilocarp. hydrochlor. . . . .	—	—	—	—	0,05	0,2—1,5 (!)	0,1—0,8
Plumb. acet. . . . .	0,01—0,05	0,02—0,05	0,1—0,3	0,3—1,0	0,3—1,0	1,5—4,0	3,0—10,0
Santonin . . . . .	0,02—0,05	0,02—0,05	0,05—0,2	0,5—1,0	—	—	—
Secale cornutum . . . . .	1,5—3,0	3,0—5,0	10,0—20,0	—	5,0—10,0 für Lämmer	—	—
Spartein. sulf. . . . .	—	—	0,1—0,5	—	—	—	1,0—5,0
Stibium sulfurat. nigr. et aurant. . . . .	0,03—0,05	0,03—0,05	0,05—0,5	0,3—0,5	3,0—5,0	10,0—25,0	10,0—25,0
Strychnin. nitr. . . . .	0,0002—0,0005	0,0005—0,001	0,001—0,003	0,002—0,005	0,004	0,05—0,15	0,05—0,1
Tartar. stibiatas als Emetic. . . . .	0,05—0,1	0,05—0,1	0,1—0,3	1,0—2,0	—	—	—

Name des Arzneimittels	Geflügel	Katze	Hund	Schwein	Schaf, Ziege	Rind	Pferd
Tartar. stibiatus als Le-	0,03-0,05	0,02-0,05	0,05-0,1	0,8-2,0	0,5-2,0	10,0-20,0	2,0-10,0
xans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
Tartar. stibiatus als Ex-	—	0,005-0,001	0,03-0,05	0,2-0,5	0,3-0,5	2,0-5,0	1,0-3,0
pector. . . . .	—	—	0,5-1,0	—	—	10,0-25,0	12,0-25,0
Tinct. Aconiti . . . . .	—	—	0,3-1,0	2,0	2,0	20,0	10,0
Tinct. Cantharid. . . . .	0,05-0,1	0,05-0,1	—	—	—	—	—
Tinct. Colchici . . . . .	—	—	0,5-1,0	—	—	—	—
Tinct. Digitalis (Cardia-	—	—	—	—	—	—	—
cum). . . . .	—	0,1-0,2	0,5-1,0	2,0-5,0	5,0-10,0	12,0-25,0	10,0-23,0
Tinct. Opil simpl. . . . .	0,3-0,5	0,2-1,0	2,0-5,0	10,0-25,0	25,0-50,0	100,0-200,0	50,0-150,0
Tinct. Strychni . . . . .	—	—	0,3-0,5	—	—	—	5,0-10,0
Tinct. Strophanti . . . . .	—	0,2-0,4	0,5-1,0	2,0-5,0	3,0-10,0	10,0-25,0	12,0-25,0
Tinct. Veratri . . . . .	0,005-0,01	0,005-0,02	0,01-0,03	0,5-2,0	2,0-5,0	8,0-20,0	8,0-15,0
Tubera Aconiti . . . . .	—	—	0,1-0,5	—	—	5,0-10,0	3,0-5,0
Veratrinum . . . . .	0,0005-0,001	0,0005-0,001	0,001-0,05	0,02-0,03	0,01-0,02	0,05-0,2	0,05-0,2
Zincum acetic. . . . .	0,03-0,07	0,03-0,07	0,1-0,2	0,2-0,5	0,5-1,0	3,5-5,0	4,0-10,0

In der Regel rechnet man für ein erwachsenes Tier die angegebene Menge, für ein jüngeres Tier entsprechend dem Alter weniger. So z. B. für ein Pferd von 6 Jahren  $\frac{1}{1}$ , 3 Jahren  $\frac{1}{2}$ , 1 Jahr  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$  Jahr  $\frac{1}{16}$ , 1 Monat  $\frac{1}{24}$ .



## Inhaltsverzeichnis.

<b>Allgemeines.</b>		Augenwasser . . . . .	6
Ameisenvertilgung . . . . .	1	Blutarmut (Anämie) . . . . .	6
Blähsuchtstropfen . . . . .	1	Bremsenöl. . . . .	6
Blasenziehende Salbe . . . . .	1	Bronchialkatarrh. . . . .	6
Bremsensalbe . . . . .	1	Brustseuche (Influenza). . . . .	7
Butterfarbe . . . . .	1	Buglähme . . . . .	7
Butterpulver . . . . .	1	Druckwunden . . . . .	7
Desinfektionsöl . . . . .	1	Druse (Atemnot). . . . .	7
Dreierlei Öl . . . . .	1	Druse. . . . .	7
Durchfallpulver für Großvieh. . . . .	2	Dummkoller . . . . .	7
Durchfallpulver für Kleinvieh. . . . .	2	Durchfall . . . . .	7
Durchfalltinktur für Kleinvieh . . . . .	2	Ernährungsstörung . . . . .	8
Drusen- und Kehlsuchtstropfen . . . . .	2	Fieber . . . . .	8
Fellebearbeitung . . . . .	2	Fieberpillen . . . . .	8
Fieberhafte Erscheinungen . . . . .	2	Freiblustmangel . . . . .	8
Fistelgeschwüre usw. . . . .	2	Fußfäule . . . . .	8
Frischerhaltung von Vollmilch . . . . .	2	Galle . . . . .	8
Hufkitt . . . . .	2	Geschlechtstriebanregung . . . . .	8
Hufschmiere. . . . .	3	Haarausfall . . . . .	9
Konservierungssalz . . . . .	3	Harnruhr . . . . .	9
Läusesalbe . . . . .	3	Harnverhaltung . . . . .	9
Lebertran-Emulsion fürs Vieh. . . . .	3	Hautentzündung (nässende) . . . . .	9
Mäuse- und Rattengift . . . . .	3	Hufbeschlag . . . . .	9
Neunerlei Öl . . . . .	3	Hufkitt . . . . .	9/10
Restitutionsfluid. . . . .	3/4	Hufschmiere. . . . .	10
Scharfe Salbe (Ungt. acre) . . . . .	4	Husten . . . . .	10
Verstärkte scharfe Salbe . . . . .	4	Influenza (Brustseuche). . . . .	10
Tympanit-Essenz . . . . .	4	Kniebeule . . . . .	10
Vertilgung von Füchsen . . . . .	4	Kolik . . . . .	10/11
Vertilgung von Krähen. . . . .	4	Magen-Darmkatarrh . . . . .	11
Viehwaschessenz . . . . .	4	Mauke . . . . .	11
Viehwaschpulver . . . . .	4/5	Pferdepulver . . . . .	11/12
Wunden jeder Art . . . . .	5	Piephacke. . . . .	12
<hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>		Räude . . . . .	12
<b>Pferde.</b>		Rhachitis . . . . .	12
Atemnot (Druse). . . . .	6	Rheumatismus. . . . .	12
Aufziehen (Satteldruck). . . . .	6	Rossen . . . . .	12
Augensalbe . . . . .	6	Ruhr der Fohlen . . . . .	12/13
Augentropfen . . . . .	6	Satteldruck . . . . .	13
		Schulterlähme . . . . .	13

Sehnenklapp. . . . .	13	Milch, wässerige . . . . .	22
Spat . . . . .	13	Milch, zähe . . . . .	22
Stärkungspillen . . . . .	13	Milch, Säuren der . . . . .	23
Stärkungspulver . . . . .	13	Milch, nicht buttern . . . . .	22
Stollschwamm . . . . .	13	Milchfieber . . . . .	20
Strahlfäule . . . . .	13/14	Milchmangel . . . . .	23
Überbein . . . . .	14	Nabelsalbe für Kälber . . . . .	23
Verstopfung . . . . .	14	Räude . . . . .	23
Wunden . . . . .	14	Rheumatismus. . . . .	23
Würmer . . . . .	14/15	Rindern, zu starkes . . . . .	23
<b>Rinder.</b>		Ringflechte . . . . .	18/19
Aufblähen (Trommelsucht) . . . . .	16	Ruhr . . . . .	23/24
Augenentzündung . . . . .	16	Ruhr der Kälber . . . . .	24
Bläschenkatarrh (Scheidenka- tarrh). . . . .	16	Scheidenkatarrh (Blasenkatarrh) . . . . .	24
Blutharnen . . . . .	16/17	Schlempe (Mauke, Fußräude) <b>24 u. 19</b>	
Bremsenöl. . . . .	17	Schulterlähme (Buglähme). <b>24 u. 17</b>	
Brunstpulver . . . . .	17	Trommelsucht (Aufblähen) . . . . .	24
Buglähme (Schulterlähme) . . . . .	17	Verkalben (ansteckendes) . . . . .	25
Darm- und Magenentzündung. . . . .	17	Verstopfung . . . . .	25
Durchfall . . . . .	17/18	Wiederkäuen . . . . .	25
Eingeweidewürmer . . . . .	18	Würmer (Eingeweide) . . . . .	25
Euterentzündung . . . . .	18	Zurückbleiben der Nachgeburt . . . . .	25
Fieber . . . . .	18	<b>Schweine.</b>	
Flechte . . . . .	18/19	Appetitlosigkeit . . . . .	26
Freßlustmangel . . . . .	19	Augenentzündung . . . . .	26
Fußräude (Schlempe = Mauke). . . . .	19	Bräune (Halsentzündung) . . . . .	26
Gelbsucht . . . . .	19	Brunstpulver . . . . .	26
Halsentzündung . . . . .	19	Durchfall . . . . .	27
Harnverhaltung . . . . .	19/20	Einpökeln von Schweinefleisch . . . . .	27
Kalbfieber (Milchfieber) . . . . .	20	Englische Krankheit (Knochen- weiche) . . . . .	27
Klauenseuche (Maul- u. Klauen- seuche) . . . . .	20	Erbrechen. . . . .	<b>27/28</b>
Knieschwamm . . . . .	20	Ferkelgrind (Ferkelausschlag) . . . . .	28
Knötchenseuche . . . . .	20	Freßlustmangel . . . . .	28
Kolik . . . . .	20/21	Gebärfieber (Milchfieber) . . . . .	28
Kreuzlähme . . . . .	21	Halsentzündung (Bräune) <b>28/29</b>	
Läuse. . . . .	21	Katarrh und Schnupfen . . . . .	29
Magenkatarrh . . . . .	21	Knochenweiche (Englische Krankheit) . . . . .	29
Maulgrind der Kälber . . . . .	21	Kolik . . . . .	29
Maulseuche . . . . .	20	Krämpfe . . . . .	<b>29/30</b>
Maulschwämmchen der Kälber <b>21/22</b>		Lähmung . . . . .	30
Milch, bittere . . . . .	22	Läuse. . . . .	30
Milch, blaue. . . . .	22	Milchfieber (Gebärfieber) . . . . .	30
Milch, blutige . . . . .	22	Muskelrheumatismus(Verfangen) <b>30</b>	
Milch, rote . . . . .	22	Räude . . . . .	30

Rotlauf . . . . .	31	Gesichtsgrind . . . . .	39
Schnupfen . . . . .	31	Harnruhr . . . . .	39
Unruhige Mutterschweine . . . . .	31	Harnverhaltung . . . . .	39
Unzuchtvertreibung . . . . .	31	Hautjucken . . . . .	39
Verfangen (Muskelrheumatismus) . . . . .	31	Husten . . . . .	39/40
Verstopfung . . . . .	32	Insekten . . . . .	40
Würmer . . . . .	32	Klauenpulver . . . . .	40
		Klauenseuche . . . . .	40
<b>Schafe.</b>			
Augenentzündung . . . . .	33	Kolik . . . . .	40
Bandwurm . . . . .	33	Kropf . . . . .	40/41
Bleichsucht . . . . .	33	Leckpulver . . . . .	41
Blutharnen . . . . .	33	Maulschwämmchen . . . . .	41
Durchfall . . . . .	33	Milchpulver . . . . .	41
Euterentzündung . . . . .	34	Räude . . . . .	41
Freßpulver . . . . .	34	Rheumatismus . . . . .	41
Gebärmutterentzündung . . . . .	34	Schnupfen . . . . .	41/42
Gesichtsgrind . . . . .	34	Skorbut . . . . .	42
Harnruhr . . . . .	34	Trommelsucht . . . . .	42
Harnverhaltung . . . . .	34	Verstopfung . . . . .	42
Hautjucken . . . . .	34/35	Würmer . . . . .	42
Husten . . . . .	35	Zurückbleiben der Nachgeburt . . . . .	42
Insekten . . . . .	35		
Klauenpulver . . . . .	35	<b>Hunde.</b>	
Kolik . . . . .	35	Abführmittel . . . . .	43
Kropf . . . . .	35	Augenentzündung . . . . .	43
Lämmerlähme . . . . .	36	Bandwurm . . . . .	43
Lungenwurmpulver . . . . .	36	Blutharnen . . . . .	43
Maulschwämmchen . . . . .	36	Durchfall . . . . .	43
Milchpulver . . . . .	36	Eingeweidewürmer . . . . .	43
Räude . . . . .	36	Englische Krankheit . . . . .	43
Rheumatismus . . . . .	36/37	Erbrechen . . . . .	43
Schnupfen . . . . .	37	Erkältung (Schnupfen usw.) . . . . .	44
Skorbut . . . . .	37	Fetträude . . . . .	44
Trommelsucht . . . . .	37	Fettsucht . . . . .	44
Verstopfung . . . . .	37	Gehirnentzündung . . . . .	44
Würmer . . . . .	37	Glatzflechte . . . . .	44
Zurückbleiben der Nachgeburt . . . . .	37	Hautausschlag . . . . .	44
		Husten . . . . .	44
<b>Ziegen.</b>			
Augenentzündung . . . . .	38	Krämpfe (nervöse Staupe) . . . . .	44
Bandwurm . . . . .	38	Kropf . . . . .	44
Bleichsucht . . . . .	38	Magenkatarrh . . . . .	44
Blutharnen . . . . .	38	Magenverstimmung . . . . .	44/45
Durchfall . . . . .	38	Maulschwämmchen . . . . .	45
Euterentzündung . . . . .	38	Ohrzwang (Wurm) . . . . .	45
Freßpulver . . . . .	38	Räude . . . . .	45
Gebärmutterentzündung . . . . .	39	Rheumatismus . . . . .	45/46
		Schutzpulver (gegen Krankheit) . . . . .	46

Skorbut . . . . .	46	Durchfall . . . . .	51
Staupe . . . . .	46/47	Eierlegepulver . . . . .	51
Ungeziefer . . . . .	47	Eileitervorfall . . . . .	51
Vergiftung durch Strychnin . . . . .	47	Federfressen der Hühner . . . . .	52
Verstopfung . . . . .	47	Fußkrankheit (Fußgeschwulst). . . . .	52
Verunreinigung der Hausecken . . . . .	47	Hühnerfutterzusatz . . . . .	52
Vorhautkatarrh (Tripper) . . . . .	47	Hühnerpulverzusatz . . . . .	52
Würmer (Spulwürmer) . . . . .	47	Kalkbeine . . . . .	52/53
Wurmpillen . . . . .	47	Kropfentzündung (harterKropf) . . . . .	53
Wundlaufen der Füße . . . . .	48	Lungenentzündung . . . . .	53
Zecken . . . . .	48	Mauser . . . . .	53
		Nasenkatarrh (Schnupfen, Luft- röhrenkatarrh) . . . . .	53
		Pips . . . . .	53
		Rheumatismus. . . . .	53
		Verdauungsbeschwerden (Appe- titlosigkeit). . . . .	53
<b>Katzen.</b>		<b>Geflügel und Vögel.</b>	
Abführen . . . . .	49	Asthmamittel . . . . .	54
Bandwurm . . . . .	49	Bronchitis (Luftröhrenentzün- dung) . . . . .	54
Durchfall . . . . .	49	Croup (Pips—Diphtherie) . . . . .	54
Dyspepsie (Magenüberladung) . . . . .	49	Durchfall für Geflügel . . . . .	54
Räude . . . . .	49	Eierkonservierungssalz . . . . .	54
Töten von Katzen . . . . .	49	Eierkonservierungsflüssigkeit . . . . .	54
		Erfrierungen. . . . .	54
		Geflügelcholera . . . . .	55
		Geflügelpocken . . . . .	55
		Luftröhrenentzündung . . . . .	55
		Verstopfung . . . . .	55
		Vogelmilben . . . . .	55
		Weißer Kamm . . . . .	55
		Vogelsand . . . . .	55
		Vogelfutter . . . . .	55/56
<b>Kaninchen.</b>			
Auflaufen . . . . .	50		
Augenentzündung . . . . .	50		
Durchfall . . . . .	50		
Geschwüre . . . . .	50		
Ohrenräude . . . . .	50		
Räude . . . . .	50		
Speichelfluß . . . . .	50		
Trommelsucht . . . . .	50		
Verstauchung . . . . .	50		
<b>Hühner.</b>			
Augenkrankheit . . . . .	51		
Bandwurm . . . . .	51		
Diphtherie . . . . .	51		

\***Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis** für Apotheker, Ärzte, Drogisten und Medizinalbeamte.

\***Hauptwerk**: Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner vollständig neu bearbeitet und herausgegeben von **B. Fischer**-Breslau u. **C. Hartwich**-Zürich. Siebenter, unveränderter Abdruck. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Figuren. Zwei Bände. Preis je M. 20.—, gebunden je M. 22.50.

\***Ergänzungsband**: Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben von **W. Lenz**-Berlin und **G. Arends**-Chemnitz. Zweiter, unveränderter Abdruck. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Figuren. Preis M. 15.—, gebunden M. 17.50.

---

\***Neues Pharmazeutisches Manual** von **Eugen Dieterich**. Elfte, vermehrte Auflage. Herausgegeben von Dr. **Karl Dieterich**, Direktor der Chemischen Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen Dieterich, Privatdozent für Pharmakochemie an der Kgl. tierärztl. Hochschule zu Dresden. Mit 148 Textfiguren. Preis gebunden M. 20.—.

---

\***Buchheisters Handbuch der Drogistenpraxis**. Ein Lehr- und Nachschlagebuch für Drogisten, Farbwarenhändler usw. Im Entwurf vom Drogistenverband preisgekrönte Arbeit. Von **G. A. Buchheister**. I. Teil. Zwölfte, neu bearbeitete Auflage von **Georg Ottersbach** in Hamburg. Mit 527 Textfiguren. Preis gebunden M. 16.—.

---

\***Vorschriftenbuch für Drogisten**. (Buchheisters Handbuch II. Teil). Die Herstellung der gebräuchlichen Verkaufsartikel. Von **G. A. Buchheister**. Siebente, neu bearbeitete Auflage von **Georg Ottersbach** in Hamburg. Preis gebunden M. 12.—.

---

\***Volkstümliche Namen der Arzneimittel, Drogen und Chemikalien**. Eine Sammlung der im Volksmunde gebräuchlichen Benennungen und Handelsbezeichnungen. Zusammengestellt von Dr. **J. Holfert**. Siebente, verbesserte u. vermehrte Auflage. Bearbeitet von **G. Arends**. Preis gebunden M. 4.80.

---

\***Die neueren Arzneimittel und die pharmakologischen Grundlagen ihrer Anwendung in der ärztlichen Praxis**. Von Dr. **A. Skutetzky**, k. u. k. Stabsarzt, Vorstand der Abteilung für innere Krankheiten am k. u. k. Garnisonsspitale, Privatdozent für innere Medizin, und Dr. **E. Starkenstein**, Privatdozent für Pharmakologie an der deutschen Universität in Prag. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. Preis gebunden M. 12.—.

---

---

\***Teuerungszuschlag für die vor dem 1. Juli 1917 erschienenen Bücher**: auf geheftete 20 %, auf gebundene 30 %

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

---

---

**Deites Handbuch der Seifenfabrikation.** Unter Mitwirkung von **Otto Spangenberg**, Chemnitz neu herausgegeben von **Dr. Walther Schrauth**, Privatdozent an der Universität Berlin.

Erster Band: **Hausseifen, Textilseifen und Seifenpulver.** Vierte Auflage. Mit 90 Abbildungen. Preis gebunden M. 16.—.

\*Zweiter Band: **Toiletteseifen, medizinische Seifen und andere Spezialitäten** herausgegeben von **Dr. C. Deite**. Dritte Auflage. Mit 85 Textfiguren. Preis gebunden M. 11.—.

---

\***Die medikamentösen Seifen.** Ihre Herstellung und Bedeutung. Ein Handbuch für Chemiker, Seifenfabrikanten, Apotheker und Ärzte. Von **Dr. Walther Schrauth**. Preis M. 6.—, gebunden M. 6.60.

---

\***Malmaterialienkunde als Grundlage der Maltechnik.** Für Kunststudierende, Künstler, Maler, Lackierer, Fabrikanten und Händler. Von **Dr. A. Eibner**, a. o. Professor, Leiter der Versuchsanstalt und Auskunftsstelle für Maltechnik an der Technischen Hochschule in München. Preis M. 12.—, gebunden M. 13.60.

---

\***Die Tablettenfabrikation und ihre maschinellen Hilfsmittel.** Von Apotheker **Georg Arends**. Mit 26 Textfiguren. Preis kart. M. 1.60.

---

\***Die Ampullenfabrikation.** In ihren Grundzügen dargestellt von **Dr. Hans Freund**. Mit 68 Textfiguren. Preis kartoniert M. 2.40.

---

\***Die medizinischen Verbandmaterialien** mit besonderer Berücksichtigung ihrer Gewinnung, Fabrikation, Untersuchung und Wertbestimmung sowie ihrer Aufbewahrung und Verpackung. Von **P. Zelis**, Apotheker und Verbandstoff-Fabrikant. Mit in den Text gedruckten Figuren. Preis M. 6.—, gebunden M. 7.—.

---

\***Arzneipflanzenkultur und Kräuterhandel.** Rationelle Züchtung, Behandlung und Verwertung der in Deutschland zu ziehenden Arznei- und Gewürzpflanzen. Eine Anleitung für Apotheker, Landwirte und Gärtner. Von **Th. Meyer**, Apotheker in Colditz. Zweite Auflage. Mit 21 Textabbildungen. Preis gebunden M. 5.40.

---

\***Volkstümliche Anwendung der einheimischen Arzneipflanzen.** Von Apotheker **Georg Arends**. Preis kartoniert M. 1.20.

---

---

\***Teuerungszuschlag für die vor dem 1. Juli 1917 erschienenen Bücher:**  
auf geheftete 20%, auf gebundene 30%

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

---

---

**\*Kommentar zum Deutschen Arzneibuch. 5. Ausgabe. 1910.**

Auf Grundlage der Hager-Fischer-Hartwichschen Kommentare der früheren Arzneibücher unter Mitwirkung von hervorragenden Fachgelehrten herausgegeben von Privatdozent Dr. **O. Anselmino** und Prof. Dr. **Ernst Gilg**. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Figuren. 2 Bände. Jeder Band M. 15.—, gebunden M. 17.50.

---

**\*Anleitung zur qualitativen Analyse.** Von Dr. **Ernst Schmidt**,

Geh. Regierungsrat, Professor an der Universität Marburg. Siebente Auflage. Preis M. 2.80.

---

**\*Grundriß der anorganischen Chemie.** Von Professor **F. Swarts**.

Autorisierte deutsche Ausgabe von Dr. **Walter Cronheim**, Privatdozent an der Kgl. Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin. Mit 82 Textfiguren. Preis M. 14.—, gebunden M. 15.—.

---

**\*Lehrbuch der analytischen Chemie.** Von Dr. **H. Wöbling**,

Dozent und etatsmäßiger Chemiker an der Kgl. Bergakademie zu Berlin. Mit 83 Textfiguren und 1 Löslichkeitstabelle. Preis M. 8.—, geb. M. 9.—.

---

**Praktikum der quantitativen anorganischen Analyse.** Von

Professor Dr. **Alfred Stock** und Professor Dr. **Arthur Stähler**. Mit 36 Textfiguren. In Vorbereitung.

---

**\*Anleitung zur Darstellung phytochemischer Übungs-**

**präparate** für Pharmazeuten, Chemiker, Technologen u. a. Von Dr. **D. H. Wester**. Mit 59 Textfiguren. Preis M. 3.60, gebunden M. 4.20.

---

**\*Der Harn** sowie die übrigen Ausscheidungen und Körperflüssigkeiten

von Mensch und Tier. Ihre Untersuchung und Zusammensetzung in normalem und pathologischem Zustande. Ein Handbuch für Ärzte, Chemiker und Pharmazeuten sowie zum Gebrauche an landwirtschaftlichen Versuchsstationen. Unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben von Professor Dr. **Carl Neuberg**. Mit zahlreichen Textfiguren u. Tabellen. Zwei Teile. Preis M. 58.—, in 2 Bänden geb. M. 63.—.

---

**\*Anleitung zu medizinisch-chemischen Untersuchungen**

für Apotheker. Von Dr. **Wilhelm Lenz**. Mit 12 Textabbildungen. Preis gebunden M. 3.60.

---

**\*Hermann Lenhartz Mikroskopie und Chemie am Kranken-**

**bett.** Achte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Von Professor Dr. **Erich Meyer**, Direktor der medizinischen Universitätsklinik zu Straßburg i. E. Mit 150 Abbildungen im Text und einer Tafel. Preis gebunden M. 12.—.

---

---

**\*Teuerungszuschlag für die vor dem 1. Juli 1917 erschienenen Bücher:**

auf geheftete 20%, auf gebundene 30%.

---

---

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

---

---

- \***Schule der Pharmazie** in 5 Bänden herausgegeben von Prof. Dr. **H. Thoms**, Dr. **E. Mylius**, Prof. Dr. **K. F. Jordan**, Prof. Dr. **E. Gilg**.
- \*Band I: **Praktischer Teil**. Bearbeitet von Dr. **E. Mylius**. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 137 in den Text gedruckten Abbildungen. Preis gebunden M. 4.—.
- \*Band II: **Chemischer Teil**. Bearbeitet von Prof. Dr. **H. Thoms**. Sechste, verbesserte Auflage. Mit 90 Textabbildungen. Preis gebunden M. 10.—.
- \*Band III: **Physikalischer Teil**. Bearbeitet von Prof. Dr. **K. F. Jordan**. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 153 in den Text gedruckten Abbildungen. Preis gebunden M. 5.—.
- \*Band IV: **Botanischer Teil**. Bearbeitet von Prof. Dr. **E. Gilg**. Fünfte, verbesserte Auflage. Mit 559 in den Text gedruckten Abbildungen. Preis gebunden M. 8.—.
- \*Band V: **Warenkunde**. Bearbeitet von Prof. Dr. **H. Thoms** und Prof. Dr. **E. Gilg**. Vierte, völlig umgearbeitete und verbesserte Auflage. Mit 289 in den Text gedruckten Abbildungen. Preis gebunden M. 8.—.
- 
- \***Lehrbuch der Pharmakognosie**. Von Dr. **Ernst Gilg**, a. o. Prof. der Botanik und Pharmakognosie an der Universität, Kustos am Kgl. Botanischen Museum zu Berlin. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 411 Abbildungen. Preis gebunden M. 8.—.
- 
- \***Pharmazeutisch-chemisches Praktikum**. Die Herstellung, Prüfung und theoretische Ausarbeitung pharmazeutisch-chemischer Präparate. Ein Ratgeber für Apothekerelevanten von Dr. **D. Schenk**, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker. Mit 51 in den Text gedruckten Abbildungen. Preis gebunden M. 5.—.
- 
- \***Pharmazeutische Übungspräparate**. Anleitung zur Darstellung, Erkennung, Prüfung und stöchiometrischen Berechnung von officinellen chemisch-pharmazeutischen Präparaten. Von Apotheker Dr. **Max Biechele**. Dritte, verbesserte Auflage. Mit 6 Figuren im Text. Preis gebunden M. 6.—.
- 
- \***Einführung in die Chemie**. Ein Lehr- und Experimentierbuch. Von **Rudolf Ochs**. Mit 218 Textfiguren und einer Spektraltafel. Preis gebunden M. 6.—.
- 
- \***Qualitative botanische Analyse der Drogenpulver**. Eine Einführung in den Gang einer systematischen mikroskopischen Pulveruntersuchung. Von Dr. **P. Schürhoff**. Preis gebunden M. 2.—.
- 
- \***Tabelle zur mikroskopischen Bestimmung der officinellen Drogenpulver**. Von Dr. **H. Zörnig**, Apotheker, Kustos am Kgl. pflanzen-physiologischen Institut München. Preis gebunden M. 2.40.
- 
- 
- \***Teuerungszuschlag für die vor dem 1. Juli 1917 erschienenen Bücher:**  
auf geheftete 20 %, auf gebundene 30 %