

DIE
ANATOMISCHEN
NAMEN

IHRE ABLEITUNG UND AUSSPRACHE
ANHANG: BIOGRAPHISCHE NOTIZEN

VON

DR. HERMANN TRIEPEL
PROFESSOR IN BRESLAU



SIEBZEHNTE AUFLAGE

SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG GMBH / 1935

DIE ANATOMISCHEN NAMEN
IHRE ABLEITUNG UND AUSSPRACHE

DIE
ANATOMISCHEN
NAMEN

IHRE ABLEITUNG UND AUSSPRACHE
ANHANG: BIOGRAPHISCHE NOTIZEN

VON

DR. HERMANN TRIEPEL
PROFESSOR IN Breslau



SIEBZEHNTE AUFLAGE

SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG GMBH 1935

Alle Rechte,
insbesondere das der Uebersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.
Copyright 1927 by Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Ursprünglich erschienen bei J. F. Bergmann, München 1927
ISBN 978-3-662-29875-6 ISBN 978-3-662-30019-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-30019-0

Aus dem Vorwort zur ersten Auflage.

Bevor ich an die Ausarbeitung des vorliegenden Wörterbuches der anatomischen Sprache ging, habe ich mir überlegt, ob es nicht vielleicht eher die Sache eines Philologen, als die eines Anatomen sei, ein solches Büchlein zu schreiben. Ich kam zu der Überzeugung, dass hier der Anatom die Feder anzusetzen habe, denn er kennt die praktischen Bedürfnisse seiner Wissenschaft am besten, er allein weiss, wie weit er gehen kann, wenn es gilt, sprachliche Misstände zu beseitigen, der Philologe würde vielleicht die Hälfte unseres Wortschatzes über Bord zu werfen geneigt sein. Aber dessen ungeachtet habe ich es für meine Pflicht gehalten, mit der grössten Gewissenhaftigkeit vorzugehen und alle Wörter auf ihren Wert oder Unwert zu prüfen. Wir Anatomen legen bei der Herstellung von Präparaten mit Recht grosses Gewicht auf das Äussere, ebenso kann man verlangen, dass unsere Rede nicht nur ihrem Inhalte, sondern auch ihrer Form nach korrekt sei.

Zur Abfassung dieses Wörterbuches wurde ich vor allem durch zwei Gründe bestimmt. Einmal haben nämlich erfreulicherweise viele Studierende den Wunsch, die Abstammung der im anatomischen Unterricht gehörten Kunstausdrücke kennen zu lernen und zur Deutung zahlreicher Namen reichen die auf der Schule erworbenen Kenntnisse nicht aus. Das gilt schon für den Fall, dass die Studieren-

den eine gymnasiale Vorbildung genossen haben, und wird immer mehr sich bemerkbar machen, da heute für den künftigen Mediziner die reale Vorbildung als besonders erstrebenswert angesehen wird. Dass der Wunsch nach Aufklärung über den Sinn der von uns gebrauchten Worte besteht, haben mir die vielen darauf abzielenden Fragen gezeigt, die auf dem Präpariersaal an mich gerichtet worden sind. Es ist erfreulich, denn man soll, so meine ich, von den einer fremden Sprache entlehnten Kunstausrücken, die man oft im Munde führt, auch wissen, woraus sie gebildet sind und welche Grundbedeutung sie besitzen. Der zweite Grund, der mich zum Schreiben des Büchleins bestimmte, war darin gegeben, dass viele anatomische Namen sehr oft mit falscher Betonung ausgesprochen werden. Man bekommt manchmal auf dem Präpariersaal (und leider auch an andern Orten) Dinge zu hören, die jedem einen Stich durchs Herz geben müssen, der einmal die Schönheit der griechischen und die Exaktheit der lateinischen Sprache bewundern gelernt hat.

Bei der Auswahl der Wörter, die aufgenommen werden sollten, habe ich mich wesentlich an die „BNA“ gehalten, d. i. das aus dem Jahre 1895 stammende „Verzeichnis der von der anatomischen Gesellschaft auf ihrer IX. Versammlung in Basel angenommenen Namen“.

Von den wissenschaftlichen Hilfsmitteln, die ich bei der Ausarbeitung benutzte, will ich ausser den grossen Wörterbüchern und Glossarien der alten Sprachen (Stephanus, Passow, Georges, Du Cange u. a.) vor allem Hyrtls „Onomatologia anatomica“ erwähnen, ein Buch, das für jeden, der sich mit der Geschichte unserer Wissenschaft und unserer Sprache beschäftigt, eine unerschöpfliche Fundgrube des Wissenswerten bildet.

Eine Geschichte der anatomischen Namen zu schreiben war nicht meine Absicht. Deswegen habe ich es im allgemeinen vermieden, Belege oder genaue Angaben über die Zeit einzuflechten, aus der die einzelnen Bezeichnungen stammen, und über die Zeit, in der sie zuerst in ihrem anatomischen Sinne gebraucht wurden.

Greifswald, im Oktober 1905.

Hermann Triepel.

Vorwort zur siebzehnten Auflage.

Die siebzehnte Auflage unterscheidet sich von der vorhergehenden nur in einigen unwesentlichen Punkten. Auch diesmal bin ich der Verlagshandlung für ihr Entgegenkommen verpflichtet.

Breslau, im Juni 1935.

Hermann Triepel.

Einleitung.

Fast alle anatomischen Namen gehören entweder dem lateinischen oder griechischen Formenkreise an. Nur einige wenige, die sich leicht vermeiden lassen, entstammen dem Arabischen und dem Französischen oder sind ganz willkürlich gebildet worden. Ich sage nicht, dass die meisten Bezeichnungen der lateinischen oder altgriechischen Sprache entnommen wären, denn begreiflicherweise wird man nicht sämtliche Namen, deren die Anatomie bedarf, bei Schriftstellern der alten Sprachen finden, auch wenn man sich nicht eng an diejenigen der klassischen Periode hält. Viele neue Ausdrücke waren zu formen, und wenn hierbei die für das Lateinische und Griechische geltenden Gesetze der Wortbildung gehörig berücksichtigt worden sind, darf das Neue keinesfalls beanstandet werden.

Leider ist sehr oft gegen jene Gesetze verstossen worden, und schon seit Jahren bemühen sich die Anatomen, ihre Sprache zu reinigen. Vieles ist in dieser Richtung geschehen, einiges, was noch beanstandet werden kann, muss allerdings vorläufig so bleiben, wie es ist. Denn ohne Zweifel können wir verschiedene sprachlich nicht ganz einwandfreie Bezeichnungen, wie gewisse hybride Bildungen (s. u. S. 6), aus praktischen Gründen nicht ausmerzen, nämlich deswegen, weil wir sie durch keine besseren ersetzen können, die in gleich kurzer und prägnanter Weise das, was sie sollen, zum Ausdruck bringen.

Andererseits soll man natürlich das, was in unserem anatomischen Sprachschatz als praktisch richtig erkannt worden ist, zu erhalten suchen, und man soll bei Neubildungen, wenn sie nötig werden, die in Frage kommenden Regeln gehörig beachten. Wichtig ist dabei für uns die Sprache, die heute in Griechenland geschrieben wird, denn das heutige Schriftgriechisch ist nichts anderes als das alte Attisch (das nur im Laufe der Zeit mancherlei Vereinfachungen

und Abschleifungen erfahren hat). Wir sind daher berechtigt, Ausdrücke zu gebrauchen, die heute von sprachkundigen Griechen geformt und in wissenschaftlichen Werken niedergelegt werden.

Ferner soll man, wogegen leider sehr viel gesündigt wird, sich einer richtigen Aussprache der Kunstausdrücke befleißigen. Nach den für das Lateinische geltenden Regeln sind auch diejenigen anatomischen Namen auszusprechen, die aus dem Griechischen stammen. Das ergibt sich aus folgender Überlegung. Fast alles, was unsere Zeit von der griechischen Kultur überkommen hat, ist durch das Lateinische hindurchgegangen. Den einfachsten Beweis hierfür liefern die bei uns gebrauchten Formen und die übliche Aussprache der aus dem Griechischen stammenden Fremdwörter oder der griechischen Namen. So gehen wir nicht ins Museion und hören nicht von bösen Daimonen, wir gehen vielmehr ins Museum und hören von Dämonen; wir bewundern nicht die Philosophie des Sokrates, das Wissen des Aristoteles, wir bewundern dagegen Sókrates und Aristóteles; wir suchen das hunderttorige Theben nicht im Lande des Nil, sondern am Nil. Obschon Altertumsforscher die Anlehnung an das Griechische suchen und lieber von der Kunst des Pheidias als von der des Phidias sprechen, so ist doch der überragende Einfluss des Lateinischen auf unsere Sprache leicht zu erkennen.

Wenn in unserer Nomenklatur Wörter mit griechischen Endungen (z. B. *ganglion*, der Genitiv *baseos*) vorkommen, so widerspricht das nicht der angegebenen Auffassung und der gestellten Forderung, denn Formen wie die genannten finden sich auch im guten Latein.

Die Diphthonge α , α und ϵ griechischer Worte erscheinen im Lateinischen entsprechend umgewandelt wieder: α wird zu *ae*, α zu *oe* und ϵ vor Konsonanten zu *i*, vor Vokalen zu *i* oder *ë*.

Die Regeln, nach denen drei- (und mehr-) silbige Wörter gleichviel ob sie aus dem Lateinischen oder aus dem Griechischen stammen, betont werden müssen, sind die bekannten:

Ist die vorletzte Silbe, bezw. ihr Vokal, kurz, so wird die drittletzte Silbe betont.

Ist die vorletzte Silbe, bezw. ihr Vokal, lang, so ruht der Ton auf ihr.

Ist der Vokal der vorletzten Silbe an und für sich kurz, folgen ihm aber zwei (oder mehr) Konsonanten, oder folgt ihm einer der Doppelkonsonanten *x* und *z*, so wird er durch Position lang.

Muta (b, c, d, f, g, k, p, t) cum liquida (l, m, n, r) macht keine Positionslänge.

ch, ph, th werden nur als einzelne Buchstaben empfunden.

In lateinischen Wörtern ist ein Vokal vor einem anderen kurz. (Es gibt einige wenige Ausnahmen von dieser Regel.)

Aus dem letzten Satze folgt natürlich nicht, dass in griechischen Wörtern, wenn sie nach lateinischen Regeln ausgesprochen werden, ein an sich langer Vokal, dem ein anderer folgt, nunmehr kurz wird; ein solcher Vokal bleibt lang, und, wenn er in der vorletzten Silbe steht, ruht auf ihm demgemäss der Ton.

Im allgemeinen wird es nach dem Gesagten für die Auffindung der richtigen Betonung genügen, wenn in dem folgenden Verzeichnis bei drei- und mehrsilbigen Wörtern der Vokal der vorletzten Silbe mit einem Länge- oder Kürzezeichen (— oder ~) versehen wird. Es ist aber zweckmässig, ausserdem noch bei einer Reihe von anderen Vokalen (z. B. auch in zweisilbigen Wörtern) die Quantität zu bezeichnen, nämlich überall dort, wo erfahrungsgemäss oft Fehler in der Betonung gemacht werden.

Positionslänge wird nicht besonders angegeben.

Viele Namen haben neben ihrer antiken Form noch eine zweite erhalten, die der deutschen Sprechweise angepasst ist. Natürlich behalten in solchen Fällen die mitgeteilten Betonungsregeln nicht mehr ihre Giltigkeit. Obwohl in dem Verzeichnis angegeben ist *anatomia, histologia, choana, scelētum*, so sprechen wir doch im allgemeinen von Anatomie, Histologie, Choane (mit betontem *a*), Skelett.

Von den für uns in Frage kommenden Wortbildungsregeln ist besonders diejenige wichtig, die besagt, dass man sich nach Möglichkeit vor hybriden Bildungen hüten soll, d. h. man soll nicht Griechisches mit Lateinischem vermengen, soll keine griechischen Endungen an lateinische Stämme, keine lateinischen Endungen an griechische Stämme hängen. Inwieweit Ausnahmen gestattet werden können, wird noch zu besprechen sein. Die Erfüllung der gestellten Forderung setzt die Kenntnis der den beiden Sprachen eigentümlichen Suffixe voraus. Im folgenden sollen daher die für uns wichtigsten Endungen besprochen werden.

Die Adjektivendung *-eus* (mit kurzem *e*!) — bezeichnet den Stoff, ist lateinisch (*cinereus, vitreus* usw.). Es gibt allerdings auch griechische Adjektiva, die mit *ēus* (εος) endigen (sie bezeichnen

gleichfalls den Stoff), wie χρῶσις golden, aber solche kommen in unserer Nomenklatur nicht vor.

Die Endung *-ius* (mit kurzem *i*) findet sich bei lateinischen Adjektiven (wie in denen auf *-orius*, die die Befähigung zu einer Tätigkeit bezeichnen), sowie, von *ιος* stammend bei griechischen Adjektiven (bezeichnet eine allgemeine Beziehung). Auf *-ιος* gehen namentlich solche griechischen Adjektiva aus, die mit Hilfe einer Präposition vom Hauptwort abgeleitet sind, auch wenn das unmittelbar abgeleitete Adjektivum die Endung *-ιος* hat (z. B. *gastricus*, aber *epigastricus*, das besser ist als das gebräuchliche *epigastricus*).

Die Endungen der Deminutiva *-ulus* und *-ulus*, bezw. *-ula*, *-ulum* und *-ula*, *-ulum* sind lateinisch. Desgleichen sind lateinisch die Adjektivendungen *-alis* und *-aris* (bezeichnen die Zugehörigkeit im allgemeinen, *-aris* wird an Stelle von *-alis* in der Regel dann gebraucht, wenn in dem Worte vor der Endung ein *l* vorkommt), *-ivus* (bezeichnet die Dienlichkeit), *-osus* (bezeichnet eine Fülle, entspricht unserem *-reich*, in seltenen Fällen kann durch *-osus* auch eine Art bezeichnet werden, nämlich dann, wenn der Typus der Art viele gleiche Einzelheiten zeigt, wie *spongiosus* schwammig), *-atus* (bezeichnet ein Versehensein, bisweilen die Ähnlichkeit).

Die Endung *-acus* (*-ακος*, für allgemeine Beziehungen) gehört zu griechischen Stämmen.

Die Endung *-icus* (ebenfalls für allgemeine Beziehungen) findet sich bei vielen griechischen Adjektiven (herstammend von *-ικός*), sie wird am häufigsten zur Weiterbildung griechischer Hauptwörter verwendet. Seltener ist sie bei lateinischen Eigenschaftswörtern. Eine besondere Stellung nehmen die nicht von Substantiven abgeleiteten Adjektiva *anticus* und *posticus* (mit langem *i*) ein. Bei verschiedenen Substantiven kommt die gleiche Endung mit langem *i* vor, wie bei *umbilicus*, *vestica*.

Die adjektivische Endung *-inus*, mit langem *i* (bezeichnet meistens die Herkunft, aber auch eine allgemeine Beziehung), ist lateinisch, *-inus*, mit kurzem *i*, findet sich bei solchen lateinischen Adjektiven, durch die eine Angabe über die Zeit gemacht wird (z. B. *serotinus*), ferner auch bei *geminus*, *biginus*, *triginus* usw. Substantiva können die gleiche Endung mit langem und mit kurzem *i* zeigen: *vagina*, aber *terminus*, *lamina*. Griechische Adjektiva haben die aus *-ιος* hervorgegangene Endung *-inus* mit kurzem *i* (bezeichnet meist den Stoff).

Die Endung *-aeus* (-αιος) kommt einigen griechischen Adjektivis zu.

Die Endung *-eus*, mit langem *e* (-ειος) gehört zu griechischen Stämmen. Sie bezeichnen im allgemeinen die Herkunft und ist daher bei den anatomischen Namen, die sie besitzen, nicht am Platze. Aus diesem Grunde ist auch die Endung *-ideus*, die in den folgenden Abschnitten besprochen wird, nicht einwandfrei.

Sehr häufig begegnen wir anatomischen Namen, die auf *-ides* (*-ideus*) ausgehen. Der Grieche bildet, um die Ähnlichkeit eines Gegenstandes mit einem anderen zu bezeichnen, Eigenschaftswörter mit Hilfe der Silben *-ειδής* (-förmig, von τὸ εἶδος die Form). Im Lateinischen wird hieraus *ides*. (Nicht gestattet ist es, wie Hyrtl meinte, *-ειδής* in *-ideus* umzuwandeln.) Es folgt, dass beispielsweise der deltaförmige Muskel nur heissen kann *musc. deltoides*. Unter den neueren Lehrbüchern haben nur wenige eine derartige Bezeichnungsweise konsequent durchgeführt.

Nun hat die Anatomie das Bedürfnis, auch solche Organe zu benennen, die zu den einem bestimmten Gegenstand ähnlich sehenden Organen in irgend einer Beziehung stehen, wie etwa die zum *musc. deltoides* laufende Arterie. Wenn wir ganz korrekt sein wollen, müssen wir diese als *arteria musculi deltoidis* bezeichnen. Neuere griechische Autoren verwenden sowohl für die einem bestimmten Objekt ähnlich sehenden Körperteile als auch für das, was zu diesen gehört, die gleichen Namen auf *-ειδής*. Sie empfinden hier offenbar nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung des Eigenschaftswortes, das nach Art eines Eigennamens gebraucht und nicht nur dem Ganzen, sondern auch seinen Teilen und den mit ihm in Beziehung stehenden Dingen beigelegt wird. Bei dieser Auffassung könnten wir von einer *art. deltoides* sprechen, wenn auch die Arterie nicht deltaförmig ist.

Indessen scheint mir der Zwang unerträglich zu sein, den man sich bei einem solchen Vorgehen auferlegen müsste, und jedenfalls entspricht es den Forderungen der Logik, wenn man die Zugehörigkeit nicht durch Adjektiva auf *-ides* bezeichnet, sondern durch andre, die von jenen abgeleitet sind. Die grösste Verbreitung haben die Weiterbildungen auf *-ideus* gefunden.

Es ist viel darüber geschrieben worden, ob diese berechtigt sind oder nicht, und ferner, wie sie auszusprechen sind, ob mit

langem oder kurzem *e*. Philologen und Mediziner (vorwiegend natürlich Anatomen) haben sich mit der Frage beschäftigt (Ritschl, Kilian, Sigm. Schultze, Hyrtl, Gegenbaur, von Bardeleben, auch Verf. selbst), und es sind verschiedene Ansichten darüber geäußert worden. Von philologischer Seite wurde der Gebrauch der Wörter auf *-ideus* verworfen, weil es keine von Adjektiven auf *-ειδής* abgeleiteten Adjektiva auf *-ειδεος* gibt, aus denen sie gebildet sein könnten.

In jüngerer Zeit ist von einem griechischen Gelehrten (B. Leonardos in Athen) der ausgezeichnete Vorschlag gemacht worden, Weiterbildungen auf *-idicus* (ειδικός) einzuführen. Diese sind in sprachlicher Beziehung den Bildungen auf *-ideus* weitaus überlegen, es ist aber kaum anzunehmen, dass sie sich einbürgern würden, und darum sind sie auch in dem folgenden Verzeichnis weggelassen worden. Aus praktischen Gründen muss man sich an die Endung *-idēus* (ειδ, εις) halten, wenn sie auch sprachlich nicht einwandfrei ist (vgl. das über die Endung *-eus* Gesagte. (S. 5).

Es wurde oben (S. 3) bemerkt, dass nicht unbedingt alle hybriden Bildungen verworfen werden müssen. Ein solcher Versuch würde auf bedeutende Schwierigkeiten stossen, da die anatomische Sprache sehr reich an hybriden Namen ist — besonders gehören viele Adjektiva auf *-alis* hierher. Auch können wir konstatieren, dass selbst im klassischen oder nachklassischen Latein hybride Wörter gefunden werden. Es handelt sich vor allem um Deminutiva, sowie um Adjektiva auf *-alis* und *-osus*. Ich erwähne als Beispiele: ζώνη, *zona*, ζωνύλα, *zonalis*; κίρκος, *circus*, *circulus*; κορώνη, *corona*, *coronalis* (auch *coronarius*); κέντρον, *centrum*, *centralis*; πύραμις, *pyramis*; *pyramidalis*; σπογγία, *spongia*, *spongiosus*. Offenbar wurden aber hier überall die griechischen Stammwörter, als sie die lateinische Endung erhielten, nicht mehr als etwas Fremdes empfunden, sondern waren im lateinischen Sprachschätze aufgegangen, darum soll man doch den Gebrauch hybrider Wörter und ihre Neubildung nach Möglichkeit einschränken. Hybrid sind begreiflicherweise zahlreiche zusammengesetzte Namen, woran man keinen Anstoss nehmen darf.

Bei grösseren Zusammensetzungen muss der Stamm des ersten Wortes, falls er griechisch ist, durch ein eingeschobenes *o* mit dem zweiten Wort verbunden werden. Die lateinische Sprache kennt nur

Zusammensetzungen von Wörtern, die in einem logischen Abhängigkeitsverhältnis zu einander stehen (z. B. *lucifer*). Zur Verbindung dient hier der Vokal *i*, in der Anatomie kommen Ausdrücke vor wie *oviger*, *sudorifer* u. a. Die anatomische Sprache muss aber auch oft lateinische Wörter zusammensetzen, die einander gleichwertig sind. Analogieen aus dem guten Latein fehlen, und die moderne Ausdrucksweise verwendet auch hier zur Verbindung ein eingeschobenes *o* (z. B. in *nasopalatinus*).

Zum Schluss noch ein Wort über die Orthographie! Man könnte im Zweifel sein, ob man die Buchstaben *k* und *z*, und *ev*. in welchem Umfang man sie gebrauchen soll. Es macht sich gegenwärtig das Bestreben geltend, nicht nur in Fremdwörtern, sondern selbst in Kunstausdrücken, die den alten Sprachen entnommen sind, vor den Vokalen *a*, *o*, *u* und vor *au*, sowie vor Konsonanten ein *c* durch ein *k* und vor *e*, *i*, *y*, *ae*, *oe* ein *c* durch ein *z* zu ersetzen. In Wörtern, die dem Griechischen entlehnt sind, sucht man überall das *κ* zur Geltung zu bringen und ersetzt es durch *k* ohne Rücksicht auf den folgenden Buchstaben. Das von der deutschen Rechtschreibung geforderte *z* erscheint aus sprachlichen Gründen öfter bedenklich, so z. B. in Plazenta (für *placenta*), während die Verwendung des *k* in griechischen Wörtern (*Sokrates*, *Brachykephalie*, *Dolichocephalie*) innerhalb eines deutschen Textes gebilligt werden kann.

Für die Bildung und Umbildung des *c* sind besonders drei Tatsachen wichtig: 1. dass das Griechische durch das Lateinische hindurchgegangen ist; 2. dass die Römer das Zeichen *k* nur vereinzelt in einigen Abkürzungen gebraucht n, sonst in weitem Umfange das aus dem griechischen Γ differenzierte Zeichen *c*, das sie freilich ebenso oder ähnlich aussprachen wie unser *k*; 3. dass wir uns seit der Zeit des Mönchslateins daran gewöhnt haben, dieses *c* vor den hellen Vokalen und Diphthongen wie *z* auszusprechen.

Bei den anatomischen Namen haben wir uns zunächst auf jeden Fall an die lateinische Schreibweise zu halten. Somit muss der Buchstabe *c* in weitestem Umfange gebraucht, dagegen *k* vollkommen ausgemerzt werden; *z* ist nur dort am Platze, wo es einem griechischen ζ entspricht.

Hinsichtlich der Aussprache des lateinischen *c* sind die Vertreter der klassischen Sprachen seit einer Reihe von Jahren der

Überzeugung, dass sie nur durch den *l*-Laut zu erfolgen hat. Die Anatomen müssen sich hiernach richten und werden z. B. cerebrum, cervix, cilia, cingulum auszusprechen haben wie kerebrum, kervix, kilia, kingulum. (So zu schreiben wäre natürlich falsch.) Entsprechendes gilt für die aus dem Griechischen stammenden Namen; centrum, cephalicus, circulus, cystis lauten wie kentrum, kephalikus, kirkulus, kystis. Daneben hat der alltägliche Sprachgebrauch sein, Zentrum, seinen Zirkel und seine Zyste.

Griechisches Alphabet.

Grosse Schrift	Kleine Schrift	Name	Aussprache
A	α	alpha	a
B	β	beta	b
Γ	γ	gamma	g (wie n vor γ, κ, χ, ξ)
Δ	δ	delta	d
E	ε	epsilon	ë
Z	ζ	zeta	z
H	η	eta	ē
Θ	θ	theta	th
I	ι	jota	i*
K	κ	kappa	k
Λ	λ	lambda	l
M	μ	my	m
N	ν	ny	n
Ξ	ξ	xi	x
O	ο	omikron	ō
Π	π	pi	p
P	ρ	rho	r
Σ	σ ς	sigma	s
T	τ	tau	t
Υ	υ	ypsilon	ü
Φ	φ	phi	ph
X	χ	chi	ch
Ψ	ψ	psi	ps
Ω	ω	omëga	ō

* Das untergeschriebene *ι* in *α, η, φ* wird nicht gesprochen.

Der spiritus asper ' entspricht unserem h, der spiritus lenis ' wird nicht gesprochen. Die heute meist angewandte Aussprache der griechischen Vokale und Diphthonge geht auf den Humanisten Erasmus von Rotterdam (1467—1536) zurück und weicht z. T. von derjenigen des heutigen und wahrscheinlich auch des alten Griechenlands ab.

Die fettgedruckten Namen sind sprachlich einwandfrei. Inkorrekte, aber viel gebrauchte Bezeichnungen sind gesperrt gedruckt. Bei ihnen sind, sofern die Betonung unbestimmt ist, Quantitätszeichen nicht angegeben. Ein * hinter einem fettgedruckten oder einem griechischen Worte bedeutet, dass dieses bei Schriftstellern des Altertums nicht vorkommt.

A.

abdōmen, -inis, *n.* der Bauch, eigentlich im Sinne von Wanst.

abdominālis* zum Bauch gehörend.

abdūcens, -entis, wegführend, partic. von *abdūcere*.

abductor*, -ōris, *m.* der Abzieher, *abdūcere* abziehen, wegführen.

accessoriūs* hinzukommend. *accessor*, -ōris, *m.* der Hinzukommende *accēdere* hinzukommen.

acervūlus, -i, *m.* das Häufchen. Deminutiv von *acervus*, -i, *m.* Gebraucht für Hirnsand, was besser durch *sabulum cerebrale* bezeichnet wird.

acetabūlum, -i, *n.* eigentlich das Essigschälchen (*acētum* Essig), dann überhaupt eine Schale, in der Anatomie die Pfanne des Hüftbeins.

ācīnus, -i, *m.* die Beere. Gebraucht für Drüsenendstück.

acrencēphālon*, -i, *n.* das Endhirn. Gebildet von *ἄκρος* äusserst und *encephalon* (s. d.). Besser als *telencephalon* (s. d.).

acrōmion (auch -ium), -ii, *n.* eigentlich die Schulterhöhe, dann das äusserste Ende der *spina scapulae*. τὸ ἀκρώμιον. ἄκρος äusserst, ὀμῶς die Schulter.

acromiālis* zum Acromion gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6). Die Griechen sagen ἀκρωμιακός*.

acustīcus das Hören betreffend. ἀκουστικός. ἀκούειν hören.

adamantīnus stählern, stahlhart. ἀδαμάντινος. ὁ ἀδάμας, -αντος der Stahl.

adipōsus* fettreich. *adeps*, -ipis, *m. u. f.* das Fett, eigentlich in übertragener Bedeutung für Schmerbauch, Bequemlichkeit.

adītus, -ūs, *m.* der Zugang. *adire* hinzugehen.

admīnīcūlum, -i, *n.* die Stütze, eigentlich das, was die Hände unterstützt. *ad* zu, *mānus*, -ūs, *f.* die Hand.

adventicius hinzukommend. *advenire* hinzukommen. Daneben, aber weniger gut *adventitius*.

aequator, -ōris, *m.* der Aequator, d. i. derjenige Kreis, der eine Kugel in zwei gleiche Hälften teilt. Beim Augapfel sind allerdings der vordere und der hintere Abschnitt, die durch den sogenannten *aequator bulbi* geschieden werden, nicht gleich. *aequare* gleich machen, *aequus* gleich. Bei den Römern hiess *aequator* ein Arbeiter in einer Münzstätte.

affērens, -entis, zutragend, partic. von *afferre*.

affixus angeheftet, partic. von *affigere*.

agger, -ēris, *m.* der Schutzwall, Damm.

aggregātus geschart, partic. von *aggregare*. *grex*, *grēgis*, *m.* die Herde.

āla, *ae, f.* der Flügel.

alāris* zum Flügel gehörend, gebraucht für flügel förmig.

albicans, -antis, weisslich (schimmernd), partic. von *albicare*. *albus* weiss.

albuginēus* weisslich. *albūgo*, -inis, *f.* der weisse Fleck (weissliche Trübung der Hornhaut des Auges).

allantōis der Harnsack, eigentlich die wurstähnliche Haut. *ὁ ἀλλὰς*, -αντος die Wurst. *ὁ ἀλλαντοειδής ὄμην* wird von Galen gebraucht, das Adjektivum kann, was sprachlich einwandfrei ist, in *ἀλλαντός* kontrahiert werden. Man macht Allantois gewöhnlich zum Femininum, hiernach hätte man in Gedanken nicht etwa *ὁ ὄμην*, sondern „die Haut“ ergänzend hinzusetzen.

alveolus, -i, *m.* die kleine Aushöhlung, in der Anatomie gebraucht für Zahnfach oder für Lungenbläschen. *alvēus* die Aushöhlung, der Kahn. „Die Alveole“ zu sagen ist zwar gebräuchlich, aber nicht korrekt.

alveolāris* zum Alveolus gehörend.

ambigūns sich nach zwei Seiten neigend. *ambigere* nach zwei Seiten treiben (bestreiten).

Ammōn, -ōnis, *m.* hoher ägyptischer Gott. *Ἀμμων*, -ωνος. In *cornu Ammonis*, Wulst im Seitenventrikel des Gehirns, häufiger als *pes Hippocampi* (s. d.) bezeichnet.

amniōn, -iī, *n.* oder

amniōs, -iī, *m.* die Schafhaut (die beim Opfern trächtiger Schafe beobachtete durchsichtige Hülle des Embryos). Beide Bezeichnungen sind zulässig. Jene ist abgeleitet von *τὸ ἀμνίον*,

diese von δ ἀμνείος (ἀμῆν). *amnios* ist daher als Masculinum zu verwenden und nicht, wie es vielfach geschieht, ebenso wie *amnion* als Neutrum.

amphiarthrōsis*, -is (auch -ēs), *f.* das straffe Gelenk. ἢ ἀμφιάρθρωσις*. ἀμφί herum, ἀρθρῶσειν gliedern.

ampulla, -ae, *f.* kolbenförmiges Gefäß (Ampel). Nach Hyrtl aus *ampla bulla* (s. d) entstanden.

ampullāris* zur Ampulle gehörend.

amygdāla, -ae, *f.* die Mandel. ἢ ἀμυγδάλη.

amygdalīnus zur Mandel gehörend. ἀμυγδαλίνος.

anālis s. *anus*.

anastomō-is, -is (auch -ēs), *f.* Vereinigung zweier Kanäle. ἢ ἀναστόμωσις. τὸ στόμα der Mund ἀναστομῶσειν eine Mündung herstellen.

anastomōtīcus zur Anastomose gehörend. ἀναστομωτικός. Sollte bei Bezeichnung von Nerven vermieden werden.

anatōmīa, -ae, *f.* die Kunst des Zerlegens. ἢ ἀνατομή. ἀνατέμνειν aufschneiden.

anatōmīcus anatomisch. ἀνατομικός.

anconiāēus, *a n c o n ā ē u s* zum Ellenbogen gehörend. Die Griechen sagen ἀγκωνιαῖος*. ὁ ἀγκών, -ῶνος der Ellenbogen. Das Adjectivum Ἀγκώνιος wurde von den Alten gebraucht im Sinne von: Bewohner der Stadt Ἀγκών.

angiōlōgīa, -ae, *f.* die Gefäßlehre. τὸ ἀγγεῖον das Gefäß, ἀγγειολογία ist ursprünglich der Name für eine Operation, wobei der zweite Teil des Wortes -λογία (von λέγειν) die Tätigkeit des Aufnehmens bedeutet. Später hat (hier und in anderen Worten) -λογία die Bedeutung -lehre erhalten (λέγειν sagen, lehren), nach Analogie mit entsprechenden Zusammensetzungen (z. B. θεολογία Lehre von Gott, φυσιολογία Lehre von der Natur).

angūlus, *i, m.* der Winkel. Verwandt mit ἀγκύλος krumm.

angulāris zum Winkel gehörend, winkelig.

annūlus, -i }
annulāris } s. *anus*.

anōnŷmus unbenannt. ἀνώνυμος. α privativum, τὸ ὄνομα der Name.

ansa, -ae, *f.* der Henkel, die Öse, Schlinge.

anserīnus zur Gans gehörend. *anser*, -ēris, *m.* die Gans.

- anterior**, -ōris, vorn liegend, der vordere, vgl. *anticus*.
- antebrachium***, -ii, *n* der Vorderarm. *ante* vor, *brachium*, -ii, *n*. der Arm. Man vermeide *antibrachium*, denn das griechische ἀντί (gegen) kann nicht bei der Wortbildung verwandt worden sein.
- anterolateralis** vorn seitlich liegend. Sprachlich schlechte Bildung, von *anterior* und *lateralis* (s. d.).
- anthélix**, -icis, *f*. die Gegenwindung, die der *helix* (s. d.) der Ohrmuschel gegenüberliegende Windung. ἡ ἀνθελίξ. ἀντί gegen, ἡ ἑλιξ, -κος die Windung.
- anticus** der vordere. Wird mehr und mehr durch *anterior* verdrängt. Oft falsch ausgesprochen (mit kurzem i), man erinnere sich, dass das Wort identisch ist mit *antiquus*.
- antitragus**, -i, *m*. der „Gegenbock“, die dem *tragus* (s. d.) gegenüberliegende Erhebung an der Ohrmuschel. ὁ ἀντίτραγος. ἀντί gegen, ὁ τράγος der Bock.
- antitragicus*** zum Antitragus gehörend. In *musc. antitragicus*. Besser wäre *musc. antitrangi* (vgl. *tragicus*).
- antrum**, -i, *n*. die Grotte, Höhle. τὸ ἄντρον.
- anus**, -i, *m*. der Ring, (in übertr. Sinne) der After.
- anālis** zum After gehörend.
- anūlus**, annūlus, -i, *m*. eigentlich der kleine Ring, dann überhaupt der Ring.
- anulāris***, annulāris, zum Ring gehörend.
- aorta**, -ae, *f*. die Aorta, grösste Körperschlagader. ἡ ἀορτή. Hängt zusammen mit ἀείρειν emporheben. Also die (das Herz) emporhebende (Arterie).
- aorticus*** zur Aorta gehörend. ἀορτικός*.
- apertūra***, -ae, *f*. die Öffnung. Spätlateinisch. *aperire* öffnen.
- āpex**, -icis, *m*. die Spitze.
- apocentros*** von dem Körpermittelpunkt oder einem Zentralorgan abgewendet. ἀπό von weg, τὸ κέντρον s. *centrum*. Besser als *distalis* (s. d.).
- aponeurōsis**, -is (auch -ēos), *f*. die flach ausgebreitete Sehne. ἡ ἀπονεύρωσις ursprünglich das Abschneiden einer Sehne, aber schon im Altertum in dem angegebenen Sinne gebraucht. τὸ νεῦρον die Sehne (erst später der Nerv). ἀπονευρόειν eine Sehne abschneiden.

aponeuroticus* aponeurosenartig.

apophysis, -is (auch -ēos), *f.* der Auswuchs (an Knochen). ἡ ἀπόφυσις. ἀπό weg von, φύειν wachsen.

apparātus, -ūs, *m.* die Vorrichtung, der Apparat. *apparare* zurüsten.

appendix, -icis, *f.* der Anhang. *appendere* anhängen.

appendiculāris* zum Anhang gehörend. *appendicūla*, -ae, *f.* Deminutiv von *appendix*.

āquaeductus, -ūs, *m.* die Wasserleitung.

arachnoīdes, arachnoideus spinnengewebähnlich. ἀραχνοειδής. ὁ ἄραχνος (neben ἡ ἀράχνη) die Spinne, auch das Spinnengewebe.

arachnoidālis*, -eālis zur *meninx arachnoīdes* gehörend. *arachnoidalis* ist hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6), *arachnoidealis* ist sprachlich schlecht.

arbor, -ōris, *f.* der Baum. In *arbor vitae (cerebelli)*.

arcus, -ūs, *m.* der Bogen.

arcuātus bogenförmig gekrümmt. partic. von einem ungebrauchlichen Verbum *arcuare*.

ārēa, -ae, *f.* das Feld (Platz).

areōla, -ae, *f.* Deminutiv von *area*, *areola mammae* der Warzenhof.

areolāris* zum Warzenhof gehörend.

arrector*, -ōris, *m.* der Aufrichter. *arrigere* aufrichten.

artēria, -ae, *f.* die Arterie, Schlagader. ἡ ἀρτηρία. ἀρτάειν aufhängen. Ursprünglich Luftröhre (s. trachea). ἀρτάειν hängt mit ἀσιζειν zusammen, also auch *arteria* mit *aorta* (s. d.). Wird auch mit ὁ ἀήρ, die Luft, und τηρεῖν, behüten, in Zusammenhang gebracht (im frühen Altertum hielt man die Arterien für lufthaltig).

arteriōla* Deminutiv von *arteria*. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

arteriōsus* reich an Arterien. Wird auch gebraucht für: zur Arterie gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

arthrōdīa, -ae, *f.* das (freie) Gelenk, konventionell das dreiachsige Gelenk. ἡ ἀρθρωδία. τὸ ἄρθρον das Glied, Gelenk.

articulatio, -ōnis, *f.* das Gelenk. Heißt eigentlich Gliederung. Besser ist *articulus*.

articulāris zum Gelenk gehörend. *articulus, -i, m.* das Gelenk.

arytaenoīdes, *arytaenoides*, giessbeckenähnlich. ἀρυταινωειδής. ἢ ἀρύταινα das Giessbecken. Eigentlich besteht nur eine Ähnlichkeit zwischen den beiden cartilagine *arytaenoides* in ihrer Vereinigung und dem Schnabel eines Giessbeckens (Hyrtl). Bis zum Anfang des 16. Jahrh. hielt man die beiden Giessbeckenknorpel für eine einzige Masse. In Zusammensetzungen, in denen der Giessbeckenknorpel die erste Stelle einnimmt, ist es üblich, das lange Wort zu *ary-* abzukürzen.

arytaenoidēus zur *cartilago arytaenoides* gehörend.

ascendens, -entis, aufsteigend. partic. von *ascendere*.

asper, -ēra, -ērum rauh.

asperitas, -ātis, *f.* die Rauigkeit.

astragālus, -i, *m.* eigentlich das Würfelbein (auch Halswirbel) ὁ ἀστράγαλος. Das (fast) kubische Sprungbein mancher Huftiere wurde von den Alten als Würfel benutzt, der Name wurde dann auch auf das menschliche Sprungbein übertragen (Hyrtl). Jetzt durch *talus* (s. d.) fast ganz verdrängt.

atlas, -antis, *m.* der Träger, erster Halswirbel. Ἄτλας, -αντος Gott, der die Säulen des Himmels trug. κλῆναι tragen.

atrium, -īi, *n.* der Vorsaal, die Vorhalle. War bei dem römischen Haus durch den Haupteingang von dem *vestibulum* (s. d.) getrennt.

audītus, -ūs, *m.* das Gehör. *audire* hören.

auditīvus* zum Hören dienend, zum Gehörorgan gehörend.

auris, -is, *f.* das Ohr.

auriculā, -ae, *f.* Deminutiv von *auris*. Auch gebraucht für Ohrmuschel oder Herzohr.

auriculāris zum Ohr gehörend, ohrförmig.

axilla, -ae, *f.* die Achselhöhle.

axillāris zur Achselhöhle gehörend.

axis, -is, *m.* die Achse. Vgl. *epistropheus*.

azýgos unpaar. ἄζυγος, auch ἀζυγής. τὸ ζυγόν das Joch. In *vena azygos*.

B.

barba, -ae, *f.* der Bart.

basilīca, *scil. vena*, die an der ulnaren Seite des Armes liegende Vene. Ist nach Hyrtl hier nicht zu übersetzen mit „königlich“ (βασιλικός), der Name stammt aus dem Arabischen, er

wurde zuerst gebraucht als Übersetzung des arabischen al-bāsilik. Nach Macalister ist jedoch das Wort der arabischen Sprache ursprünglich fremd und in diese als Fremdwort aus dem Griechischen gekommen. Die Deutung als „königliche“ Vene würde demnach zu Recht bestehen.

bāsis, -ēos, *f.* der Untergrund. ἡ βᾶσις, -εως.

basiallis*, basālis, basilāris zur Basis gehörend. *basialis* ist hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6)

bi- zwei- in Zusammensetzungen für *bis* zweimal.

biceps, -cipitis, zweiköpfig. *cāput*, -itis, *n.* der Kopf.

bicipitalis* zum zweiköpfigen (Muskel) gehörend.

bicuspidālis* zweispitzig, zweizipfelig. *cu-pis*, -idis, *f.* die Spitze, eigentlich Lanzenspitze.

bifurcus, bifurcātus* zweizackig. *furca*, -ae, *f.* die Gabel.

bifurcatio*, -ōnis, *f.* die Gabelung.

bigēminus zweimal doppelt. *geminus* doppelt, einer von Zwillingen.

bipennis, bipennātus doppelt gefiedert. *penna*, -ae, *f.* die Feder.

biventer* zweibäuchig. *venter*, -tris, *m.* der Bauch.

bilis, -is, *f.* die Galle.

bilifer*, -fēra, -fērum, Galle leitend. *ferre* tragen.

biliōsus reich an Galle.

brachīum, -ii, *n.* der Arm, in der Anatomie meist für Oberarm gebraucht (bei den Römern dagegen auch für Unterarm).

brachiālis zum Arm (Oberarm) gehörend.

brachycēphālus, -i, *m.* der Kurzköpfige. ὁ βραχυκέφαλος. βραχύς, -σία, -ό kurz, ἡ κεφαλή der Kopf.

bregma, -ātis, *n.* der Vorderkopf, dann im besonderen die Stelle, an der sich Kranz- und Pfeilnaht kreuzen, auch der Scheitel. τὸ βρέγμα, -ατος. Hängt mit βρέγειν befeuchten zusammen. (Vgl. *fonticulus*.)

bregmaticus* zum Scheitel gehörend. βρεγματικός*.

brēvis, -e, kurz.

bronchus, -i, *m.* (eigentlich die Luftröhre, dann) Hauptast der Luftröhre. ὁ βρόγχος.

bronchālis* zum Bronchus gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

bronchīum, -ī, *n.* der Luftröhrenast. τὸ βρόγχιον, Deminutiv von βρόγχος. War ursprünglich Knorpel der Luftröhre.

bronchiālis* zu den Luftröhrenästen gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

bronchiōlam*, -i, *n.* Deminutiv von *bronchium*. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6). Sprachlich schlecht ist das oft gebrauchte *bronchiolus*.

bucca, *ae, f.* die Backe.

buccālis zur Backe gehörend.

bucinātor, -ōris, *m.* (nicht *buccinator!*) der Hornbläser, bildlich gebraucht als Name des tiefen Wangenmuskels. *bucīna*, -ae, *f.* das Hirtenhorn, Signalhorn. Ableitung wahrscheinlich von *bos* das Rind (die Silbe *bu* findet sich in mehreren von *bos* abgeleiteten Zusammensetzungen) und *canēre* singen.

bucinātorius* zum Hornbläser bzw. zum tiefen Wangenmuskel gehörend.

bulbus, -i, *m.* die Zwiebel. ὁ βολβός.

bulbiformis* und

bolboīdes, *bulboīdes*, *bulboideus* zwiebelförmig. βολβοειδής.

bullā, -ae, *f.* die Blase, der Buckel.

bursa, -ae, *f.* der Beutel. In diesem Sinne aber erst spät gebraucht (im Italienischen *borsa*), ursprünglich war *bursa* das Fell wie das verwandte ἡ βόρσα.

C.

caecus (nicht *coecus*) blind, blind endigend. *caecum* (scil. *intestinum*) der Blinddarm.

caecālis* zum Blinddarm gehörend.

caerulēus (nicht *coeruleus*) bläulich.

cālāmus, -i, *m.* das Rohr, die Schreibfeder. ὁ κάλαμος. *calamus scriptorius* Bezeichnung für das hintere Ende des Bodens der Rautengrube.

calcanēus, -i, *m.* das Fersenbein. Ursprünglich (ebenso *calcaneum*) in gleichem Sinne wie *calx* gebraucht. *calx* die Ferse. *calcare* treten.

- calcaneāris***, *calcaneus* das Fersenbein betreffend.
- calcar**, -āris, *n.* der Sporn.
- calcarīnus*** zum Sporn gehörend.
- cālix**, -icis, *m.* der Kelch. Verwandt mit ἡ κόλιξ, -ικος der Becher. (Nicht *calyx*, s. *calycūlus*).
- calicūlus**, Deminutiv von *calix*. (Nicht *calyculus*.)
- callōsus** schwierig. *callum*, -i, *n.* die Schwiele. Als *corpus callosum* wird der Balken des Gehirns, die *commissura maxima*, bezeichnet.
- calvarīa**, -ae, *f.* das Schädeldach. *calvus* kahl, *calva*, -ae, *f.* der Schädel.
- calx**, -cis, *f.* die Ferse.
- calycūlus**, -i, *m.* die (kleine) Knospe. Deminutiv von *calyx*, ἡ κάλοξ die Fruchtkapsel, Knospe. In *calyculus gustatorius*, *calyx* ist im Lateinischen männlich!
- camēra**, -ae, *f.* die Kammer. Hängt zusammen mit ἡ καμάρα Raum mit gewölbter Decke.
- canālis**, -is, *m.* die Röhre, der Kanal, die Rinne.
- canalicūlus**, -i, *m.* der kleine Kanal.
- canīnus** vom Hund. *cānis*, -is, *m.* u. *f.* der Hund. *dens caninus* der Eckzahn, nach der Ähnlichkeit mit dem Reisszahn der Carnivoren. Weiterhin wird *caninus* gebraucht für: zum Eckzahn gehörend.
- canthus**, -i, *m.* der Augenwinkel. ὁ κανθός.
- cānus** grau.
- capillus**, -i, *m.* das (Kopf-) Haar. *capitis pilus*.
- capillāris** haarartig.
- capsūla**, -ae, *f.* die Kapsel. Deminutiv von *capsa*, -ae, *f.* *cāpere* fassen.
- capsulāris** zur Kapsel gehörend.
- cāput**, -itis, *n.* der Kopf.
- capitātus** mit einem Kopf versehen.
- capitūlum**, -i, *n.* Deminutiv von *caput*.
- cardīa**, -ae, *f.* der Magenmund. ἡ καρδία kommt in zwei Bedeutungen vor: 1. das Herz, 2. der Magenmund. Die Anatomie verwendet *cardia* nur in der zweiten Bedeutung, in dem ab-

geleiteten *cardiacus* (s. u.) und in Zusammensetzungen (endo-, epi-, myo-, pericardium) erscheint auch die erste Bedeutung des Grundwortes. Wird sehr oft falsch ausgesprochen!

cardiācus zum Herzen oder zum Magenmund gehörend. καρδιακός. Die Alten verwandten das Wort im Sinne von herzkrank oder magenkrank. Hyrtl empfiehlt, an Stelle von *cardiacus* (zum Herzen gehörend) den Genitiv *cordis* zu verwenden.

carīna, -ae, *f.* der Kiel.

cāro, -nis, *f.* das Fleisch. Selten gebraucht für *musculus*, z. B. in *caro quadrata*, für *musc. quadratus plantae*.

carnālis fleischig.

caruncūla, -ae, *f.* das Fleischwärtchen, die warzenförmige Erhebung.

carōtis, -idis, *f.* die Kopfschlagader. ἡ καρωτις, -ίδος. Hängt mit τὸ κάρ(α), Gen. καρτός, der Kopf, zusammen oder mit ὁ κάρως der Schwindel, κάρωειν betäuben (Hyrtl).

carotīcus zur Carotis gehörend. Besser wäre *carotidicus*, griechisch: καρωτιδικός*. καρωτικός heisst betäubend.

carpus, -i, *m.* die Handwurzel. ὁ καρπός.

carpālis*, *carpēus* zur Handwurzel gehörend. *carpalis* ist hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6). Zur Endung -eus in *carpeus* (s. Einl. S. 5). Die Griechen sagen καρπικός*.

cartilāgo, -inis, *f.* der Knorpel.

cartilaginēus knorpelig.

cartilaginōsus knorpelreich.

caseōsus* käsig. *cāsēus*, -i, *m.* der Käse.

cauda, -ae, *f.* der Schwanz.

caudālis* schwanzwärts.

caudātus* mit einem Schwanz versehen.

cāvus hohl.

caverna, -ae, *f.*,

cavitas*, -ātis, *f.* und

cāvum, -i, *n.* die Höhlung, der Hohlraum.

cavernōsus höhlenreich. Die Nerven, die zum *corpus cavernosum* gehen, sollte man nicht als *nervi cavernosi* bezeichnen.

cella, -ae, *f.* der (abgeschlossene) Hohlraum, die Zelle. Verwandt mit *cellare* verbergen.

cellŭla, -ae, *f.* die kleine Zelle.

centrum, -i, *n.* der Mittelpunkt. τὸ κέντρον, eigentlich der Stachel, dann der Punkt, in dem der Zirkel angesetzt wird.

centrālis am Mittelpunkt liegend. Hybrid, ist aber bei Plinius belegt. (Vgl. Einl. S. 6.)

cephalīca, scil. *vena*, die an der radialen Seite des Armes liegende Hautvene. Ist nach Hyrtl nicht zu deuten als „zum Kopf gehörend“ (κεφαλικός), die Bezeichnung ist die Übersetzung des arabischen *al-kifāl*. Nach Macalister ist jedoch das Wort der arabischen Sprache ursprünglich fremd und in diese als Fremdwort aus dem Griechischen gekommen. Die Deutung als „zum Kopf gehörende“ Vene würde demnach zu Recht bestehen.

cērāto- in Zusammensetzungen für das grosse Zungenbeinhorn und für das untere Horn des Schildknorpels gebrauchte Bezeichnung. τὸ κέρασ, -ατος das Horn.

cērēbrum, -i, *n.* das Gehirn. Im Besonderen Grosshirn, gebraucht als zusammenfassende Bezeichnung für Vorder- und Mittelhirn.

cerebrālis* zum Gehirn gehörend.

cerebellum, -i, *n.* Deminutiv von *cerebrum*, das Kleinhirn, das zusammen mit der Brücke (*pons*) das Hinterhirn (*opisthencephalon*) bildet.

cerebellāris zum Kleinhirn gehörend. *cerebellare* hiess bei den Römern die Kopfbedeckung.

cerumen, -inis, *n.* der Ohrenschmalz. Aus *cēra* (Wachs) *aurium* willkürlich gebildet (Hyrtl). Die Römer sagten *aurium sordes* (s. d.).

ceruminōsus ohrenschmalzreich. Gebraucht für ohrenschmalzbereitend. Willkürlich gebildet, besser ist *sordipar* (s. d.).

cervix, -icis, *f.* der Hals, Nacken.

cervicālis zum Hals gehörend.

chiasma, -ātis, *n.* die Kreuzung (von der Form des χ). τὸ χίασμα.

chīrurgicus chirurgisch. χειρουργικός, eigentlich mit der Hand arbeitend. ἡ χεὶρ die Hand, τὸ ἔργον das Werk. χειρουργεῖν mit der Hand verrichten, ἡ χειρουργία die Handarbeit.

chōāna, -ae, *f.* die hintere Nasenöffnung. ἡ χοάνη der Trichter, auch die Schmelzgrube, an die der Blasebalg angesetzt ist.

cholödöchus Galle aufnehmend. χοληδόχος. ἡ χολή die Galle. δέχεσθαι aufnehmen.

chondrālis* zum Knorpel gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6). Die Griechen sagen χονδρικός*. ὁ χόνδρος der Knorpel, eigentlich das Korn.

chondrīnus knorpelig. χόνδρινος.

chondropharyngēus (scil. *musculus*) derjenige der Pharynxconstrictoren, der sich an dem (oft knorpelig bleibenden) kleinen Zungenbeinhorn ansetzt. ὁ χόνδρος der Knorpel, eigentlich das Korn. Vgl. *pharyngeus*.

chorda, -ae, *f.* die Saite. ἡ χορδή, ursprünglich der Darm, dann die aus der Darmwand hergestellte Saite. In der Anatomie mehrfach bildlich gebraucht.

chorion, -ii, *n.* das Chorion, äussere Haut des Eies. τὸ χόριον, eigentlich nur die Haut. (Vgl. *corium*.)

chorioides, chorioideus dem Chorion ähnlich, hinsichtlich des Gefässreichtums. χοριοειδής. In Zusammensetzungen zu *chorio-* abgekürzt (*choriocapillaris*).

chorioidēs zur *chorioides* (scil. *tunica oculi* oder *tela ventriculi* III., IV.) gehörend.

chylus, -i, *m.* die Darmlymphe. ὁ χολός, eigentlich nur der Saft. chylifer, -ëra, -ërum chylusführend. *ferre* tragen. Hybrid.

chymus, -i, *m.* der Speisebrei. ὁ χυμός, eigentlich nur der Saft. χέειν giessen.

cilium, -ii, *n.* die Wimper. Ursprünglich das Augenlid, erst spät auf die am Lidrande stehenden Wimpern übertragen.

ciliāris* eigentlich zum Augenlid bezw. den Wimpern gehörend. Dann übertragen auf den vor der *chorioides* liegenden Teil der *tunica vasculosa oculi*, dessen Fältchen den parallel stehenden Wimpern ähneln, und auf Organe, die mit diesem Teil in Zusammenhang stehen (Hyrtl).

cīnērēus aschgrau, *cīnis*, -ēris, *m.* die Asche.

cingūlum, -i, *n.* der Gürtel. *cingere* gürten.

circūlus, -i, *m.* der Kreis. Deminutivum von *circus*. ὁ κίρκος die Gabelweihe, die im Schweben Kreise beschreibt. Hybrid, aber klassisch (s. Einl. S. 6).

circulāris kreisförmig. Hybrid, aber statthaft (vgl. Einl. S. 6).

circumanālis* um den After herum liegend. *circum* um herum, *analīs* (s. d.).

circumferentia, -ae, *f.* der Umkreis. *circumferre* herumtragen.

circumflexus umgebogen. *partic.* von *circumflectere*.

cisterna, -ae, *f.* die Zisterne, das (in die Erde gegrabene) Wasserreservoir. Vielleicht verwandt mit *cista*, -ae die Kiste, ἡ κίστη.

claustrum, -i, *n.* der Verschluss, die Schranke. *claudere* schliessen.

clāva, -ae, *f.* die Keule.

clāvicūla, -ae, *f.* das Schlüsselbein. Deminutiv von *clāvis*, -is, *f.* der Schlüssel. Die Griechen sagen sowohl für Schlüssel wie für Schlüsselbein ἡ κλείς, -ειδός. Die *clavicula* erhielt vielleicht ihren Namen von ihrer Ähnlichkeit mit Türklinken, oder weil sie wie ein Riegel vor der oberen Brustapertur liegt; jedenfalls sieht sie nicht aus wie ein Schlüssel (Hyrtil). Bei den Römern war *clavicula* eine Ranke, als Deminutiv von *clava*.

claviculāris* zum Schlüsselbein gehörend.

cleido- Schlüsselbein-. κλειδο-. Nur in Zusammensetzungen gebraucht. Vgl. *clavicula*.

clinoīdes, *clinoideus* lagerähnlich, dann auch: ähnlich einem Lagerpfosten (wobei der Teil für das Ganze genommen ist). κλινοειδής. In *processus clinoīdes*, sechs nach dem Schädelinneren gerichteten Fortsätzen des Keilbeins, von denen die auf jeder Seite liegenden drei zu einem Ruhebett zu gehören scheinen. ἡ κλίνη das Bett. κλίνειν neigen.

clitōris, -idis, *f.* der Kitzler. ἡ κλειτορίς, -ίδος.

clivus, -i, *m.* der Hügel.

cloāca, -ae, *f.* die Schleuse, Kloake.

clūnis, -is, *f.* der Hinterbacken. *pl.* das Gesäss.

coccyx, -ygis, *m.* der Kuckuck. ὁ κόκκυξ, -υγος. In *os coccygis* das Steissbein, das einem Kuckucksschnabel ähnlich sein soll. Wird oft falsch betont!

coccygēus zum Steissbein gehörend. Die Griechen sagen *κοκκυγικός**. Die Alten kannten *κοκκύγιος* zum Kuckuck gehörend (*ὄρος κοκκύγιον* Kuckucksberg).

cochlēa, -ae, *f.* die Schnecke. Verwandt mit ὁ κόχλος (auch ὁ κοχλίας) Schnecke.

cochleāris zur Schnecke gehörend, schraubenförmig. Hiess bei den Römern: zum Löffel (*cochlear*) gehörend.

cochleariformis* löffelförmig. *cochlēar*, -āris, *n.* der Löffel (der mit einer *cochlea* Ähnlichkeit besitzt).

coecus s. caecus.

coeliäcus zur Bauchhöhle gehörend. κολιακός. κοίλος hohl. ἡ κοιλία die Höhle, im bes. die Bauchhöhle. κολιακός heisst ursprünglich bauchkrank.

coerulëus s. caeruleus.

collaterälis* seitlich. *lätus*, -ëris, *n.* die Seite. Gebildet als Erweiterung von *lateralis*.

collicūlus, -i, *m.* der kleine Hügel. Deminutiv von *collis*, -is, *m.*

collum, -i, *n.* der Hals.

cölon, -i, *n.* der Hauptteil des Dickdarms. Die Quantität des *o* ist nicht ganz sicher. τὸ κόλον und τὸ κῶλον, jenes soll besser sein. τὸ κῶλον wird auch in anderem Sinne, für Glied des Körpers gebraucht.

cölicus* zum Colon gehörend. κολικός*. κωλικός heisst: am Grimmdarm leidend.

colostrum, -i, *n.* die erste Milch (während der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt).

cölumna, -ae, *f.* die Säule.

columella, -ae, *f.* Deminutiv von *columna*.

cömütans, -antis, begleitend. partic. von *comitare*. cömes, -itis, *m.* der Begleiter.

commissūra, -ae, *f.* die Verbindung. *committère* zusammenfügen.

commūnis, -e, gemeinsam.

commūnicans, -antis, mitteilend. partic. von *communicare*.

compactus zusammengedrängt. partic. von *compingère*.

complexus umfassend. partic. von *complexi*.

compösitus zusammengesetzt. partic. von *compönère*.

cönarium, -ii, *n.* die (pinienzapfenähnliche) Epiphyse des Gehirns. τὸ κωνάριον. ὁ κῶνος der Kegel, auch der (kegelförmige) Zapfen der Pinie (vgl. *pinealis*).

concha, -ae, *f.* die Muschel. ἡ κόγχη. Gebraucht für Nasenmuschel oder für die von der *anthelex* (s. d.) umzogene Aushöhlung der Ohrmuschel.

conchälis* zur Muschel gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6). Die Griechen sagen κογχικός* oder κογχιαῖος*.

condylus, -i, *m.* der Gelenkfortsatz. ὁ κόνδυλος, eigentlich der Fingerknöchel.

- condyloides**, condyloideus dem Fingerknöchel ähnlich.
 κονδυλοειδής.
 condyloidēus zum *processus condyloides* gehörend.
- conflūens**, -entis, *m.* der Zusammenfluss. Als Substantiv ge-
 brauchtes partic. von *confluere* zusammenfliessen.
- conjugātus** verbunden. partic. von *conjugare*. In *conjugata*
 (scil. *diametros*) der sogen. gerade (sagittale) Durchmesser des
 Beckens. Die Bezeichnung *conjugata* (die „verbundene“) ist
 ungereimt. Hyrtl empfahl, sie durch *diametros recta* zu
 ersetzen.
- conjunctivus*** der Verbindung dienend. *conjungere* verbinden.
 In *conjunctiva* (scil. *tunica*) die Bindehaut des Auges.
- conjunctivālis*** zur Bindehaut gehörend.
- conjungens**, -entis, verbindend. partic. von *conjungere*.
- contortus** gewunden. partic. von *contorquere*.
- cōnus**, -i, *m.* der Kegel. ὁ κώνος.
cōnicus kegelförmig. κωνικός.
cōnoides kegelförmig. κωνοειδής.
- convolūtus** zusammengerollt. partic. von *convolvere*.
- cōr**, *cordis*, *n.* das Herz.
- coracoīdes**, coracoideus eigentlich rabenähnlich, gebraucht
 für rabenschnabelähnlich (schon im Altertum). κορακοειδής.
 ὁ κόραξ, -ακος der Rabe (vgl. *coronoīdes*). In Zusammen-
 setzungen wird als Abkürzung *coraco-* gebraucht.
 coracoidēus zum *processus coracoīdes* gehörend.
- cōrium**, -ii, *n.* die Haut, Lederhaut. τὸ χόριον (vgl. *chorion*).
- cornu**, -ūs, *n.* das Horn.
cornēus hörnern. In *cornea* (scil. *membrana*) die Hornhaut,
 und *stratum corneum* die Hornschicht der Epidermis.
corneālis* zur Hornhaut gehörend.
cornicūlum, -i, *n.* das Hörnchen.
corniculātus* mit einem Hörnchen versehen.
- corōna**, -ae, *f.* der Kranz. ἡ κορώνη (vgl. *coronoīdes*).
- coronālis** und
coronārius zum Kranz gehörend. Hybrid, aber statthaft
 (vgl. Einl. S. 6).

coronoïdes*, coronoidesus hakenähnlich. κορωνοειδής*. ἡ κορώνη bedeutet 1. das Gekrümmte (Haken, Ring, s. *corona*), 2. Krähle. *coronoïdes* ist nicht krähenschnabelähnlich (s. *coracoïdes*).

coronoidēus, zum *processus coronoïdes* gehörend.

corpus, -ōris, *n.* der Körper.

corpuscūlum, -i, *n.* das Körperchen.

corrugātor*, -ōris, *m.* der (Stirn)runzeler (Muskelname), *corrugare* runzelig machen. *rūga*, -ae, *f.* die Runzel.

cortex, -icis, *m.* die Rinde.

corticālis zur Rinde gehörend.

costa, -ae, *f.* die Rippe.

costālis*, costarius zur Rippe gehörend.

cotylēdon, -ōnis, *f.* Lappen der Placenta oder auch Zottenbüschel des Chorions. ἡ κοτυληδών, -όνος. In der angegebenen Bedeutung wurde das Wort nicht ursprünglich verwendet, κοτυληδόνες hiessen zuerst die Gebärmutternäpfe, in denen (z. B. beim Schaf) die Zottenbüschel des Chorions stecken. ἡ κοτύλη der Napf.

coxa, -ae, *f.* die Hüfte.

crānium, -ī, *n.* der Schädel. τὸ κρανίον. Verwandt mit τὸ κάρα, Gen κρατός, und τὸ κάρηνον der Kopf.

craniālis* kopfwärts. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

crassus dick.

cremaster, -ēris, *m.* der Aufhänger. ὁ κρεμαστήρ. Der im Samenstrang zum Hoden laufende Muskel. κρεμᾶν aufhängen.

cremastericus*, zum *musc. cremaster* gehörend.

crēna, -ae, *f.* die Spalte, Kerbe.

cribrum, -i, *n.* das Sieb.

cribriformis* siebförmig.

cribrōsus reich an Sieben. Wird auch für siebartig gebraucht.

cricoïdes, cricoideus ringförmig, κρικκοειδής. ὁ κρίκος der Ring (= κρίκος, s. *circulus*). In *cartilago cricoïdes*, was in Zusammensetzungen zu *crico-* abgekürzt wird.

cricoidēus zur *cartilago cricoïdes* gehörend.

crista, -ae, *f.* die Leiste, eigentlich der Kamm (bei Vögeln).

cruciatus, partic. von *cruciare*, wird fälschlicherweise gebraucht für gekreuzt, heisst aber gekreuzigt. *crux*, *crucis*, *f.* das Kreuz. Besser ist *cruciformis* oder *chiastus* nach *χιαστός* gekreuzt wie ein *χ*. *χιάζω* (eine Münze) mit einem *χ* versehen.

cruciformis kreuzförmig. *S. cruciatus.*

crūs, *crūris*, *n.* der Unterschenkel.

crurālis* zum Unterschenkel gehörend.

crystallīnus kristallklar. *κρυστάλλινος*. *ὁ κρύσταλλος* das Eis, der Kristall.

cūbus, *-i, m.* der Würfel, auch gebraucht für würfelförmiger Knochen. *ὁ κύβος*.

cubālis* zum Würfel, bzw. würfelförmigen Knochen gehörend.

cubiformis* würfelförmig. *cubus* der Würfel. *ὁ κύβος*. Das klassische *κυβοειδής* würde latinisiert *cyboïdes* lauten.

cuboidēus würfelförmig, auch: zum würfelförmigen Knochen gehörend. Sprachlich schlecht.

cūbitus, *-i, m.* der Ellenbogen. *cubare* liegen.

cubitālis zum Ellenbogen gehörend.

cucullāris zur Kapuze gehörend, kapuzenförmig. *cucullus*, *-i, m.* die Kapuze. In *musc. cucullaris*, selten mehr gebrauchte Bezeichnung des *musc. trapezius*.

cūmūlus, *-i, m.* der Haufe.

cūnēus, *-i, m.* der Keil, auch gebraucht für keilförmiger Knochen.

cuneālis* zum Keil, bzw. keilförmigen Knochen gehörend.

cuneātus* mit einem Keil versehen, gebraucht für keilförmig.

cuneiformis*, *-e*, keilförmig.

cunnus, *-i, m.* die Scheide des Weibes. Nur in *musc. constrictor cunni*.

cūpūla, *-ae, f.* die Kuppel, eigentlich die kleine Kūpe als Diminutivum von *cūpa*, *-ae, f.*

cūpulāris zur Kuppel gehörend.

curvīlinēus* krummlinig. Bezeichnung des hinteren Schenkels vom Steigbügel (Gehörknöchelchen). *curvus* krumm, *līnēa*, *-ae, f.* die Linie. Gebildet nach Analogie von *rectilineus*.

cuspis, *-idis, f.* die Spitze, eigentlich Lanzenspitze, gebraucht für Klappenzipfel.

cūtis, -is, *f.* die Haut.

cutanēus* zur Haut gehörend.

cuticūla, -ae, *f.* das Häutchen.

cymba, -ae, *f.* der obere Teil der als *concha* (s. d.) bezeichneten Höhlung der Ohrmuschel, eigentlich der Nachen. ἡ κόμβη.

cystīcus* zur Blase (Gallenblase) gehörend. κυστικός*. ἡ κύστις die Blase.

D.

dartos, adj. scil. *tunica*, die Fleischhaut des Hodens. δαρτός heisst eigentlich abgehäutet, wurde aber schon von den Alten in dem angegebenen Sinne gebraucht. δέρειν abhäuten, schinden.

decīdūus hinfällig, eigentlich abfallend. *decidēre* abfallen.

declīve, -is, *n.* der Abhang. *declivis* abschüssig. *clivus* der Hügel.

decussatio, -ōnis, *f.* die Kreuzung. *dēcussis*, -is, *m.* (von *dēcem* zehn und *ās*, *assis*, *m.* die Münze „As“) der Zehner, geschrieben X. *decussare* in die Form eines X bringen.

dēfērens, -entis, herabführend. partic. von *deferre*. In dem vom Hoden kommenden *ductus deferens*, der freilich nach dem *descensus testiculī* nur teilweise herabführend ist.

deferentiālis* zum *ductus deferens* gehörend.

deltoidēs, deltoideus deltaförmig, von der Form eines Δ. δελτοειδής. τὸ δέλτα.

deltoidēus zum *musculus deltoides* gehörend.

dens, *dentis*, *m.* der Zahn.

dentātus mit Zähnen versehen.

dentīcūlus, -i, *m.* Deminutiv von *dens*.

dentīculātus mit Zähnchen versehen.

depressor, -ōris, *m.* der herabdrückende (Muskel). *deprimere* herabdrücken.

derma, -ātis, *n.* die Lederhaut. Identisch mit *corium*. τὸ δέρμα. δέρειν abhäuten.

descendens, -entis, herabsteigend. partic. von *descendēre*.

descensus, -ūs, *m.* das Herabsteigen. *descendēre* herabsteigen.

diamētros, -tri, *f.*, *diamēter*, -tri, *f.* der Durchmesser. ἡ διάμετρος. διά durch, μετρεῖν messen.

diaphragma, -ātis, *n.* die Scheidewand, im besonderen das Zwerchfell. τὸ διάφραγμα. φράσσειν umzäunen, διαφράττειν eine Scheidewand bilden.

diaphragmaticus* zum Zwerchfell gehörend. διαφραγματικός*.

diaphysis*, -is (auch -eos), *f.* das Mittelstück der Röhrenknochen. ἡ διάφυσις*. διαφύσειν dazwischenwachsen. Das Dazwischengewachsene heisst im Griechischen ἡ διαφυσή.

diarthrosis, -is (auch -eos), *f.* das Gelenk. ἡ διάρθρωσις, eigentlich das Zerlegen in Glieder. διάρρθρῶσειν in Glieder zerlegen. τὸ ἄρθρον das Glied.

diencephalon, -i, *n.* das Zwischenhirn. διά zwischen, durch, und *encephalon* (s. d.). Das durch Elision verkürzte διά kann mit δι- zwei- verwechselt werden, darum empfiehlt sich der Gebrauch von *thalamencephalon* (s. d.).

digastricus (scil. *musculus*) der zweibäuchige (Muskel). δι- zwei- (verwandt mit δύο zwei) und ἡ γαστήρ, -τρός der Bauch. Besser wäre *digastricus*. Sollte nicht gebraucht werden für: zum zweibäuchigen Muskel gehörend, hier ist der Genitiv *digastrici* (bezw. *digastrii*) am Platze. Die Griechen nennen den Muskel ὁ διγάστωρ*.

digestorius, zur Verdauung dienend. *digèrere* zerteilen, verdauen. *di(s)-* entspricht unserer Vorsilbe zer-, *gerère* tragen.

digitus, -i, *m.* der Finger, die Zehe.

digitalis zum Finger (zur Zehe) gehörend.

digitatus mit Fingern versehen. Vgl. *interjugalis*.

digitatio, -ōnis, *f.* wird gebraucht für fingerförmige Bildung, würde aber im guten Latein die Tätigkeit bedeuten, durch die etwas mit Fingern (oder Zehen) versehen wird (Hyrtl). Es kann durch *digitus* ersetzt werden.

diploë, -ēs, *f.* die spongiöse Substanz des Schädeldaches. ἡ διπλόη der Doppelteil, ursprünglich das aus zwei Tafeln bestehende Schädeldach selbst, dann übertragen auf das zwischen den Tafeln liegende (Hyrtl). διπλός doppelt.

diploicus* zur Diploë gehörend.

directio, -ōnis, *f.* die Richtung. *dirigère* gerade richten.

distalis (von dem Körpermittelpunkt bezw. einem Zentralorgan) abgehend. *distare* getrennt stehen. Besser ist *apocentros* (s. d.).

diverticulum, -i, *n.* die Abzweigung. *divertère* abwenden.

dōlichocēphālus*, -i, m. der Langköpfige. Gebildet nach Analogie von *brachycephalus* (s. d.). δολιχός lang, ἡ κεφαλὴ der Kopf.

dorsum, -i, n. der Rücken.

dorsālis* zum Rücken gehörend.

ductus, -ūs, m. die Leitung, der Gang. *dūcere* führen.

ductūlus, -i, m. Deminutiv von *ductus*.

duodēnum, -i, n. das Zwölfwache, der sog. Zwölffingerdarm, der erste Dünndarmabschnitt. *duodenus* zwölffach, häufiger ist der Plural *duodeni* je zwölf. Hyrtl schlägt vor, die unrichtige Bezeichnung — das Duodenum kommt in seiner Länge weder der Länge noch der Breite von zwölf Fingern gleich — durch Gallendarm zu ersetzen. Luschka bringt *intestinum pancreaticum* in Vorschlag. Der Name δωδεκαδάκτυλον έντερον geht auf Herophilus (300 v. Chr.) zurück.

duodenālis* zum Duodenum gehörend.

dūrus hart.

E.

ēbur, -ōris, n. das Elfenbein.

ēburneus elfenbeinern.

effērens, -entis, abführend, herausführend. partic. von *efferre*.

ejaculatorius* zum Herausschleudern dienend. *ejaculari* Herausschleudern.

elasticus* elastisch. ἐλαστικός*. Gebildet in Anlehnung an ἐλαύνειν treiben, in Bewegung setzen, in die Länge ziehen. Die Alten kannten das Adjectivum ἐλαστικός zu einem Einzug gehörend.

ellipsoideus ellipsoidähnlich. Willkürlich gebildet.

ellipticus elliptisch. ἑλλειπτικός. ἡ ἑλλειψις die Ellipse, eigentlich der Mangel. ἐλλείπειν unterlassen. Die Ellipse erhielt ihren Namen, weil ihre Gleichung dann aus der allgemeinen Kegelschnittsgleichung gewonnen wird, wenn man in dieser die numerische Excentricität kleiner als 1 setzt.

emboloīdes*, emboliformis, pfpfenförmig. ὁ ἔμβολος der Pfpf. ἐμβάλλειν hineinwerfen, hineinstossen. ἐμβολοειδής*.

embryo, -ōnis, m. die ungeborene Leibesfrucht. Dem Wort *embryo* liegt ein nicht gebrauchtes ἐμβρύων zu Grunde, es gibt nur τὸ ἔμβρυον. Demnach wäre besser *embryon*, -ontia, n. Die Franzosen sagen *l'embryon*. ἐν in, βρώειν strotzen.

embryonālis zum Embryo gehörend. Sollte durch *fetalis* ersetzt werden.

eminentiā, -ae, *f.* die Erhöhung. *eminere* hervorragen.

emissariūm, -i, *n.* der Abzugskanal. *emittere* herausschicken.

emprosthencephālon*, -i, *n.* das Vorderhirn. ἔμπροσθε(ν) vorn und *encephalon* (s. d.). Schlecht ist *prosencephalon* (s. d.).

enarthrōsis, -is (auch -ōsis), *f.* das Nussgelenk (Kugelgelenk, in dem die Pfanne mehr als die Hälfte des Gelenkkopfes umfasst). ἡ ἐνάρθρωσις. τὸ ἄρθρον das Glied, Gelenk.

encēphālon, -i, *n.* das Gehirn. Substantiviertes Adjectivum. Die Griechen gebrauchen ὁ ἐγκέφαλος (scil. μωσλός Mark). ἐν in, ἡ κεφαλή der Kopf.

encephalicus* zum Gehirn gehörend. ἐγκεφαλικός*.

endocardium*, -i, *n.* die Auskleidung des Herzens. τὸ ἐνδοκάρδιον*. ἔνδον innen. ἡ καρδία das Herz.

endolympha, -ae, *f.* die (im häutigen Gehörlabyrinth) eingeschlossene Flüssigkeit. ἔνδον innen. Besser ist *lymph interna*. Vgl. *lymph*.

endolymphaticus zur *lymph interna* gehörend. *ductus (saccus) endolymphaticus* kann durch *ductus (saccus) lympharis* (s. d.) *labyrinthi* ersetzt werden.

endoneurium*, -i, *n.* das in einem Nervenbündel liegende Bindegewebe. ἔνδον innen, τὸ νεῦρον (auch ἡ νεύρα) ursprünglich die Sehne, dann der Nerv.

endopelvinus s. *intrapelvinus*.

endothelium*, -i, *n.* das Endothel, die zellige Auskleidung der Gefäße und serösen Höhlen. τὸ ἐνδοθήλιον*. Gebildet als Gegensatz zu *epithelium* (s. d.). ἔνδον innen, ἡ θηλή die Brustwarze. Heißt also eigentlich das, was sich in der Brustwarze befindet.

endothoracicus* die Brusthöhle auskleidend. ἔνδον innen, ὁ θώραξ, -ακος, die Brust. Vgl. *thoracicus*.

ensiformis schwertförmig. *ensis*, -is, *m.* das Schwert.

entericus zu den Eingeweiden gehörend. ἐντερικός. τὰ έντερα die Eingeweide.

epi- auf-, ἐπί. *epi-* findet sich in folgenden Zusammensetzungen:

eparteriālis auf einer Arterie liegend. Hybrid. ἡ ἀρτηρία die Arterie.

ependŷma, -ŷtis, *n.* der Überzug, Auskleidung der Gehirnhöhlen. τὸ ἐπένδυμα. ἐνδύειν bekleiden.

ephippium, -ii, *n.* die Pferdeschabracke. τὸ ἐφίππιον, heisst bei neueren der Sattel. ὁ ἵππος das Pferd. Wird für den sattelförmigen Teil des Keilbeinkörpers gebraucht, jetzt aber zumeist durch *sella ossis sphenoidis* ersetzt.

epicardium*, -ii, *n.* das dem Herzen aufliegende seröse Blatt. ἡ καρδία das Herz. *S. cardia*.

epicentros* nach der Körpermitte oder einem Zentralorgan hingewandt. Vgl. *centrum*. Besser als *proximalis*.

epicondylus*, -i, *m.* der auf dem Condylus liegende Fortsatz. ὁ κόνδυλος der Gelenkfortsatz. *S. condylus*.

epicranius auf dem Schädel liegend. ἐπικράνιος. τὸ κράνον der Kopf. τὸ ἐπικράνιον die Kopfbedeckung.

epidermis, -idis, *f.* die Oberhaut. ἡ ἐπιδερμίς, -ίδος. τὸ δέρμα die Haut.

epididymis, -idis, *f.* der Nebenhoden. ἡ ἐπιδιδυμίς, -ίδος. διδυμος zweifach, οἱ διδυμοὶ die Zwillinge, auch angewandt auf die Hoden.

epidurālis s. *supraduralis*.

epigastricus sich auf dem Bauche oder auf dem Magen befindend. ἡ γαστήρ der Bauch, der Magen. Besser wäre *epigastricus*, ἐπιγαστριος. Die Alten kannten ἐπιγαστριος in der Bedeutung Schlemmer.

epigastrium, -ii, *n.* die Magengrube. τὸ ἐπιγαστριον. *S. epigastricus*.

epiglottis, -idis, *f.* der Kehldeckel. ἡ ἐπιγλωττίς. Vgl. *glottis*.

epiglotticus zum Kehldeckel gehörend. Besser wäre *epiglottidicus*. ἐπιγλωττιδικός*.

epineurium*, -ii, *n.* die bindegewebige Hülle eines peripherischen Nerven. τὸ νεῦρον (s. *nervus*). Vgl. *endoneurium*.

epiphysis, -is (auch -eos), *f.* das Endstück der langen Knochen (das von dem Mittelstück vor Abschluss der Entwicklung durch Knorpel getrennt ist), dann auch ein zapfenähnliches, zum Epithalamus des Gehirns gehörendes Gebilde. ἡ ἐπίφυσις, φύσει wachsen (wachsen lassen).

epiplodon, -i, *n.* das grosse Netz, eigentlich das darauf (näml. auf den Eingeweiden) schwimmende. τὸ ἐπίπλοον (auch ὁ ἐπίπλοος). ἐπιπλέειν darauf schiffen.

epiploicus* zum grossen Netz (*epiplodon*) gehörend. ἐπιπλοϊκός*.

episclerālis auf der Sclera liegend. Hybrid. Korrekt wäre *episcleriūs*. *sclera* (s. d) die fibröse Hülle des Augapfels.

epistrophēūs, -ēi (auch -ēos), *m.* der zweite Halswirbel, eigentlich der Umdreher. ὁ ἐπιστροφεύς, -έως, ἐπιστρέφειν umwenden. Würde besser für den ersten Halswirbel passen, der sich mit dem Schädel auf dem zweiten dreht, und ist auch im Altertum, ebenso von heutigen Griechen, für den Atlas gebraucht worden. Der zweite Halswirbel wird öfter auch als *axis* bezeichnet.

epistrophīcus* zum Epistropheus gehörend.

epithelīum*, -īi, *n.* die oberflächliche Zellschicht. τὸ ἐπιθήλιον*. Gebildet von ἡ θηλή die Brustwarze, ursprünglich auch nur auf die die *papilla mammae* deckende Epidermis bezogen (Hyrtl), später in allgemeinerer Bedeutung gebraucht.

epitheliālis* zum Epithel gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

epithalāmus*, -i, *m.* der auf dem Thalamus liegende Gehirnabschnitt. Gebildet von θάλαμος. S. *thalamus*.

epitympanicus auf der Trommelhöhle liegend. Gebildet von τύμπανον. S. *tympaanum*. Besser wäre *epitympaanīus*.

epitrochleoanconāeus. Sprachlich sehr schlechte Bezeichnung eines als Varietät auftretenden kurzen Muskels, der vom *epicondylus medialis humeri* zur Ulna zieht, den *sulcus nervi ulnaris* überbrückend. Besser ist *epicondyloanconaeus*.

epoophōron*, -i, *n.* das auf dem Eierstock liegende Organ, der Nebeneierstock. τὸ ᾠόν das Ei, φέρειν tragen. Früher wurde an Stelle von *epoophoron* die hybride Bezeichnung *parovarium* gebraucht, die Griechen sagen ἐποοθήριον* (vgl. *ovarium*).

ēquīnus vom Pferde (*ēquus*) stammend.

ethmoīdes, *ethmoidālis* siebähnlich. ἡθμοειδής. ὁ ἡθμός das Siehetuch, Sieb. In *os ethmoides*, von dem allerdings nur die horizontale Platte siebähnlich ist.

ethmoidālis* zum *os ethmoides* gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

excavatīo, -ōnis, *f.* die Aushöhlung. *excavare* aushöhlen. Vgl. *cavus*.

excretorīus* der Ausscheidung dienend. *excernere* ausscheiden.

extensor, -ōris, *m.* der Strecker (Streckmuskel). Den Römern war *extensor* als der Folterknecht bekannt. *extendere* ausstrecken.

extensorius* zum Streckmuskel gehörend (zum Strecken dienend).

externus aussen liegend.

extremitas, -ätis, *f.* das äusserste Ende. *extremus* äusserst. Für Gliedmasse wurde das Wort erst seit dem 18. Jahrhundert gebraucht. Extremität. In diesem Sinne ist besser *membrum*.

F.

facies, -iei, *f.* die äussere Erscheinung, die Aussenfläche, das Gesicht. Verwandt mit *facere* ausführen. Zu *faciēi* (mit langem e vor einem Vokal) vgl. Einl. S. 3.

facialis zum Gesicht gehörend.

falx, -cis, *f.* die Sichel.

falciformis* sichelförmig.

fascia, -ae, *f.* die Binde. Wird gebraucht für die (allerdings meist in breiter Fläche ausgedehnten) bindegewebigen Hüllen der Muskeln und ähnliche Membranen.

fasciōla, -ae, *f.* das Bändchen.

fasciōulus, -i, *m.* das (kleine) Bündel. Deminutiv von *fascis*, -is, *m.*

fastigium, -ii, *n.* der Giebel.

fauces (plur.), -um, *f.* der Schlund.

fel, fellis, *n.* die Galle.

fellēus gallig. Ganz am Platze ist das Adjectivum nicht in *vesica fellea*, die besser *vesica fellis* heisst. (Übrigens ist *fel* von den Alten auch für Gallenblase gebraucht worden.)

fēmininus weiblich. *fēmīna*, -ae, *f.* das Weib (in physischer Beziehung).

fēmur, -ōris, *n.* der Oberschenkel, auch gebraucht für den Knochen des Oberschenkels.

femorālis zum Oberschenkel gehörend. Die Römer kannten nur das substantivierte *femoralia*, -ium: Binden um die Oberschenkel, die zum Schutz gegen die Kälte getragen wurden.

fenestra, -ae, *f.* das Fenster.

fētus, -ūs, *m.* die Leibesfrucht. Verwandt mit dem veralteten *feo* ich erzeuge. Nicht *foetus*, was man von *fovere* erwärmen hat ableiten wollen.

fetalis* zur Leibesfrucht gehörend.

fibra, -ae, *f.* die Faser, eigentlich das durch Spaltung entstandene.
Verwandt mit *findere* spalten.

fibrilla*, -ae, *f.* das Fäserchen.

fibrocartilago, -inis, *f.* der Faserknorpel. Sprachlich schlechte
Bildung, richtig ist *cartilago fibrosa*.

fibrösus* faserreich.

fibula, -ae, *f.* das Wadenbein, eigentlich die Heftnadel, Spange.
figere heften.

fibuläris* zum Wadenbein gehörend.

filum, -i, *n.* der Faden.

filiformis* fadenförmig.

frimbriae, -arum, *f.* die Franse. Die Anatomie gebraucht auch
den Singular *frimbria* für bandartigen Besatz.

frimbriatus mit einer Franse besetzt.

fissura, -ae, *f.* die Spalte. *findere* spalten.

fixor*, -ōris, *m.*, *fixator*, -ōris, *m.* der Befestiger. *figere*, *figo*,
fixi, *fixum*, befestigen.

flaccidus schlaff. *flaccus* schlaff, im besonderen herabhängende
Ohren habend.

flāvus gelb.

flexor*, -ōris, *m.* der Beuger (Beugemuskel). Gebildet von *flectere*
beugen, biegen.

flexorius* zum Beugemuskel gehörend (zum Beugen dienend).

flexura, -ae, *f.* die Biegung. *flectere* biegen.

flocculus, -i, *m.* die (kleine) Flocke. Deminutiv von *floccus*.

flūmen, -inis, *n.* die Strömung. In *flumina pilorum* die Rich-
tungen (der Strich) der Haare. *fluere* fließen.

foetus s. *fetus*.

folium, -i, *n.* das Blatt.

foliatus mit Blättern besetzt.

folliculus, -i, *m.* der kleine Schlauch, Beutel, das Bläschen.
Deminutiv von *folliculus*, -is, *m.* Wird in der Anatomie (unrichtiger-
weise) auch für ein solides Knötchen (*nodulus*) gebraucht.

fonticulus, -i, *m.* die kleine Quelle, gebraucht für Fontanelle.
Deminutiv von *fontis*, *m.* Die Verwendung des Namens

Triepel, Die anatomischen Namen.

schreibt sich daher, dass man früher glaubte, bei nässenden Erkrankungen der Kopfhaut sei Feuchtigkeit vom Gehirn abgesondert worden und durch die Fontanellen ausgetreten.

föramen, -inis, *n.* das Loch. *forare* durchbohren.

foraminösus reich an Löchern.

formatio, -önis, *f.* die Bildung. *formare* bilden.

fornix, -icis, *m.* der Gewölbebogen.

fornicätus mit einem Gewölbe versehen.

fossa, -ae, *f.* der Graben, die Grube. *födere* graben.

fossula, -ae, *f.* die kleine Grube.

föväa, -ae, *f.* die Grube. Entspricht einer rundlichen Grube, während *fossa* eine längliche Grube, einen Graben bedeutet. *födere* graben.

foveöla*, -ae, *f.* die kleine Grube, das Grübchen.

foveöläris* zur kleinen Grube gehörend.

frönulum*, -i, *n.* der kleine Zügel. Gebildet als Deminutiv von *frenum*, -i, *n.* der Zaum, Zügel.

frondösus laubreich, gebraucht für zottenreich. *frons*, -dis, *f.* das Laub.

frons, -tis, *f.* die Stirn. In Zusammensetzungen auch für Stirnbein gebraucht.

frontälis zur Stirn gehörend.

fundiformis* schleuderförmig. *funda*, -ae, *f.* die Schleuder. *fundere* giessen, auch schleudern.

fundus, -i, *m.* der Boden, Grund.

fungiformis* pilzförmig. *fungus*, -i, *m.* der Pilz.

funiculus, -i, *m.* der (kleine) Strang. Deminutiv von *fünis*, -is, *m.* der Strick.

füsiformis* spindelförmig. *fusus*, -i, *m.* die Spindel.

G.

gäläa, -ae, *f.* der (lederne) Helm, die Haube.

gallus, -i, *m.* der Hahn. In *crista galli* = *crista ethmoidalis*.

ganglion, -i, *n.* das Ganglion, der Nervenknoten. τὸ γαγγλίον. Ursprünglich das Überbein, dann auf die Nervenknoten (zunächst des Sympathicus) übertragen.

- gangliōsus*** ganglienreich. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).
- gaster**, gastris, *f.* der Magen, der Bauch. ἡ γαστήρ, Gen. γαστρός. Die Griechen nennen jetzt den Magen auch ὁ στόμαχος, früher war ὁ στόμαχος die Speiseröhre.
- gastricus*** zum Magen gehörend, γαστρικός*.
- gastrocnemius*** (scil. *musculus*) der bauchige, hinter dem Schienbein liegende Wadenmuskel. Griechisch: γαστροκνήμιαιος* oder γαστροκνήμιος*. ἡ κνήμη das Schienbein. Die Alten kannten das Wort nicht als Adjectivum, sie gebrauchten ἡ γαστροκνήμια für den Muskel, τὸ γαστροκνήμιον für den Bauch der Wade.
- gastrocnemiālis*** zum Wadenmuskel gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).
- gelatinōsus** gallertig. Neulateinisch, gebildet von *gelatina* die Gallerte, dies gebildet von *gelare* gefrieren.
- gemellus** doppelt, einer von Zwillingen. Deminutiv von *geminus*.
- generālis** zur Gattung gehörend, allgemein. *genus*, -ōris, *n.* das Geschlecht, die Gattung.
- geniculum** s. *genu*.
- genioglōssus** vom Kinn zur Zunge gehend. Die Griechen sagen γενειογλωσσικός*. τὸ γένειον das Kinn, ἡ γλῶσσα die Zunge. Wird oft falsch ausgesprochen! Vgl. *glotticus*.
- geniohyoidēus** vom Kinn zum Zungenbein gehend. τὸ γένειον das Kinn, ὁσειδής ypsilonförmig. Wird oft falsch ausgesprochen! Vgl. *hyoidēus*.
- gēnitālis** zur Zeugung gehörend. *gēnēre* (vorklassisch, später *gignēre*) zeugen. *gigno*, *genui*, *genitum*.
- genitofemorālis** zu den Geschlechtsorganen (wörtlich: zu dem Gezeugten) und dem Oberschenkel gehörend. S. *genitalis* und *femoralis*.
- gēnu**, -ūs, *n.* das Knie.
- geniculum**, -i, *n.* die knotenförmige Anschwellung, eigentlich das kleine Knie.
- geniculātas*** mit Knoten versehen. Man bezeichnet jeden der beiden an der Unterseite des *thalamus opticus* liegenden länglichrunden Körper als *corpus geniculatum*, besser und einfacher ist es, von zwei *genicula* zu sprechen.
- germinatīvus*** zum Keimen geeignet. *germinare* keimen. *germen*, -inis, *n.* der Keim.

gingīva, -ae, *f.* das Zahnfleisch.

gingivālis* zum Zahnfleisch gehörend.

ginglŷmus, -i, *m.* das Scharniergelenk. ὁ γίγγλωμος, eigentlich die Türangel.

glabella (scil. *pars*) die unbehaarte Stelle zwischen den Augenbrauen, auch die entsprechende Stelle am Stirnbein. *glāber* kahl, Deminutiv *glabellus*.

glans, -dis, *f.* die Eichel.

glandŷla, -ae, *f.* die Drüse. Deminutiv von *glans*, also eigentlich die kleine Eichel, das Kügelchen.

glandulāris* zur Drüse gehörend.

glēnoīdes, glenoidālis dem glänzenden Augapfel ähnlich. γληνοειδής. ἢ γληνη der (glänzende) Augapfel, verwandt mit γλαύσσειν glänzen. Die Gelenkpfanne wird wegen des glänzenden Knorpelüberzuges *cavitas glenoīdes* genannt.

glenoidālis* zur *cavitas glenoīdes* gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

glōbus, -i, *m.* die kugelförmige Masse.

globōsus kugelförmig (über die Endung -osus s. Einl. S. 4).

glōmus, -ēris, *n.* der Knäuel. Verwandt mit *globus*.

glomeriformis* knäueiförmig. (Nicht *glomiformis*!)

glomerŷlum*, -i, *n.* Als Deminutiv von *glomus* gebildet und im besonderen angewandt auf Gefäßknäuel. (Nicht *glomerulus*!) Man könnte daran denken, *glomusculum* zu bilden, nach Analogie von *opusculum*.

glomerulōsus* reich an Gefäßknäueln.

glōssopharyngēus zur Zunge und zum Schlundkopf gehörend. Die Griechen sagen γλωσσοφαρυγγικός*. ἢ γλώσσα die Zunge, ὁ oder ἡ φάρυγξ, -γγος der Schlund. S. *pharyngēus*.

glōttīcus (glōssīcus) zur Zunge gehörend. γλωττικός (γλωσσικός). ἢ γλώσσα die Zunge.

glōttis, -idis, *f.* der Stimmapparat. ἢ γλωττίς, -ίδος das zungenförmige (ἢ γλώσσα die Zunge) Mundstück einer Pfeife. Mit einem solchen glaubte man den stimmbildenden Teil des Kehlkopfes vergleichen zu können.

glutāēus* (scil. *musculus*) der Gesäßmuskel, auch gebraucht für: zum Gesäßmuskel gehörend. ὁ γλουτός die Hinterbacke. Sehr schlecht sind die (selten gebrauchten) Ausdrücke *glutēus* und *glutēus*. Galen brauchte das Deminutivum τὰ γλοῦττα für die Sehhügel des Gehirns. Die Griechen sagen γλουτταῖος*.

gompōsis, -is (auch -ēs), *f.* die Knochenverbindung durch Einkeilung. ἡ γόμφωσις. ὁ γόμφος der Keil. γομφόειν zusammenfügen.

grācīlis, -e, dünn, zart.

grānūlum, -i, *n.* Deminutiv von *grānum*, -i, *n.* das Korn.

granulāris* körnig.

granulatīo, -ōnis, *f.* die Körnelung.

granulōsus* körnerreich.

grisēus grau. Neulateinisch, von dem französischen *gris*, grau, gebildet. Vgl. *canus*.

gubernacūlum, -i, *n.* das Steuerruder, das Leitende, Leitband. *gubernare* steuern, leiten.

gustus, -ūs, *m.* der Geschmack.

gustatorīus dem Schmecken dienend. *gustare* schmecken, kosten.

gŷrus, -i, *m.* die Windung. ὁ γŷρος. γρῶς gebogen.

H.

habēnūla, -ae, *f.* der kleine Zügel, gebraucht für die beiden zur Epiphyse des Gehirns ziehenden Leisten. Deminutiv von *habēna*, -ae, *f.* der (zum Halten bestimmte) Riemen. *habere* haben, halten.

haemorrhoidālis* wird gebraucht für: zum Mastdarm gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6). Die Griechen sagen αἱμορροϊδικός*. ἡ αἱμορροΐς, -ίδος die zum Blutfluss gehörende Ader. τὸ αἷμα das Blut. ῥέειν fließen. Verwandt sind αἱμόρροος an Blutfluss leidend, αἱμορροϊκός zum Blutfluss gehörend.

hallex, -icis, *hallux*, -ucis, *m.* die grosse Zehe. Die Alten kannten *allex*, -icis (auch *hallex*), *m.* und *hallus*, -i, *m.*, zwei Worte, die man bei der Bildung von *hallux* zusammengeworfen hat. Für die Betonung des Genitivs *hallucis* kann, da es sich hier um willkürliche Wortbildung handelt, keine Vorschrift gegeben werden.

hamātus mit einem Haken versehen. *hāmus*, *i. m.* der Haken.

hāmūlus, -i, *m.* der kleine Haken. Deminutiv von *hāmus*.

harmōnīa, -ae, *f.* die Fuge, Verbindung zweier Knochen durch feste Vereinigung glatter Ränder. ἡ ἄρμονία. ὁ ἄρμός die Fuge. ἀρμόζειν zusammenfügen.

haustum, -i, *n.* das Schöpfrad, der Schöpfmeier, gebraucht für die Ausbuchtungen am Dickdarm. *haurire* schöpfen.

hēlix, -icis, *f.* die Windung, im bes. die äusserste Windung der Ohrmuschel. ἡ ἑλιξ, -ικος.

helicīnus* zur äussersten Windung der Ohrmuschel gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6.) *helicīnus* (mit kurzem *i*) zu bilden, wäre nicht gut, wegen der Bedeutung der Endung -ικος. Vgl. Einl. S. 4.

helicotrēma*, -ātis, *n.* das Schneckenloch, die Verbindung zwischen den beiden Treppen an der Schneckenkuppel im Gehörorgan. τὸ τρήμα das Loch.

hemi- halb, ἡμι-. hemi- findet sich in folgenden Zusammensetzungen:

hemiazȳgos* (scil. *vena*) wörtlich: die halb unpaare Vene, gebraucht für diejenige Vene, die der *V. azygos* in ihrer unteren Hälfte korrespondiert. *S. azygos*. Genau genommen verdient weder jene Vene den Namen *azygos*, noch diese den Namen *hemiazzygos*. Neuere bilden ἡμιαζυγής* neben ἡμιάζογος*

hemisphaerium, -ī, *n.* das Hemisphärenhirn. τὸ ἡμισφαιρίον die Halbkugel. ἡ σφαῖρα die Kugel.

hēpar, -ātis, *n.* die Leber. τὸ ἥπαρ.

hepaticus zur Leber gehörend. ἡπατικός.

hiātus, -ūs, *m.* die (klaffende) Öffnung. *hiare* klaffen, offen stehen.

hilus der Ort des Gefässeintritts bei Lunge, Niere und Nebenniere. Nur *hilum*, -i, *n.* war den Römern bekannt, es bedeutete ein Fäserchen (vielleicht Nebenform von *filum*), dann das der Bohne anhängende Fädchen, aber wohl nicht, wie Hyrtl meint, die eingezogene Stelle an der Oberfläche einer Bohne. Besser ist es, von *porta* (*pulmonis, renis, corporis suprarenalis*) zu sprechen.

hippocampus, -i, *m.* ein fabelhaftes Tier, mit dem (oder mit dessen Fuss) ein Wulst im Seitenventrikel des Gehirns verglichen wird. Der Hippocampus hatte den Vorderleib eines Pferdes, Beine ohne Kniee und einen geringelten Schwanz. ὁ ἵπποκαμπος. ὁ ἵππος das Pferd. κάμπτειν biegen.

hirci, -ōrum, *m.* die Achselhaare, selten gebraucht für die Haare des äusseren Gehörgangs, neben *tragi* (s. d.). *hircus*, -i, *m.* eigentlich der Bock, dann der üble Geruch des Achselweißes.

histologia*, -ae, *f.* die Gewebelehre. ὁ ἱστός, der Webstuhl, das Gewebe. Besser als *histiologia*, τὸ ἱστόν, eigentlich Deminutiv von ἱστός, wird im besonderen für Segel gebraucht.

horizontālis* wagerecht, auf den Horizont zielend, d. h. denjenigen Kreis, der scheinbar die Erdoberfläche begrenzt.

horizon, -ontis, *m.* der Horizont. ὁ ὁρίζων (scil. κύκλος). ὁρίζειν begrenzen. ὁ ὅρος die Grenze. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

hämērus (ämērus) -i, *m.* der Oberarmknochen. Von den Römern auch gebraucht für Oberarm und für Schulter.

humerālis zum Oberarmknochen gehörend. Die Römer kannten nur das substantivierte *humerales*, -is, *n.* der Überwurf, der um die Schultern gehängt wurde.

hūmor, -ōris, *m.* die Feuchtigkeit. *humere* feucht sein.

hyaloīdes, *hyaloideus* glasartig. ὑαλοειδής. ἡ ὑαλος das Glas *hyaloidēus* zum Glaskörper gehörend.

hýmēn, -ēnis, *m.* das Jungfernhäutchen. ὁ ὑμήν, -ένος die dünne Haut (ganz allgemein), und ἑμίτην der Hochzeitsgott.

hymenālis* zum Jungfernhäutchen gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

hyoglōssus von dem ὀförmigen Knochen (Zungenbein) zur Zunge gehend. τὸ ὀ der Buchstabe υ, ἡ γλῶσσα die Zunge. Besser wäre *hyoglossicus*. Griechisch: ὑογλωσσικός*. Vgl. *glotticus*.

hyoides, *hyoideus* dem Schweinsrüssel oder dem Buchstaben ο (ι) ähnlich. ὑοειδής. ὀ, ἡ ὄς, ὄς das Schwein. τὸ ὀ. In *os hyoides*, wofür in Zusammensetzungen *hyo-* gebraucht wird. *hyoidēus* zum ὀförmigen Knochen (Zungenbein) gehörend.

hyopharyngēus von dem ὀförmigen Knochen (Zungenbein) zum Schlund gehend. τὸ ὀ der Buchstabe υ, und ὀ oder ἡ φάρυγξ der Schlund. Griechisch: ὑοφάρυγγικός*. Vgl. *pharyngēus*.

hypo- unter-, ὑπό. *hypo-* findet sich in folgenden Zusammensetzungen:

hyparteriālis unter einer Arterie liegend. ἡ ἀρτηρία die Arterie. Hybrid.

hypochondrīum, -ii, *n.* der seitlich von der Magenrube (kaudal von den Rippenknorpeln) liegende Teil der Oberbauchgegend. τὸ ὑποχόνδριον. ὀ χόνδρος der Knorpel, eigentlich das Korn.

hypogastrīcus unter dem Bauche liegend. Besser wäre *hypogastricus*. ὑπογάστριος. ἡ γαστήρ der Bauch.

hypogastrīum, -ii, *n.* die Unterbauchgegend. τὸ ὑπογάστριον. ἡ γαστήρ der Bauch.

hypoglōssus unter der Zunge liegend. Name des letzten Gehirnnerven. Die Griechen sagen ὑπογλώσσιος*. ὑπόγλωσσιος heisst eigentlich geschwätzig. Vgl. auch *glotticus*.

hypophŷsis*, -is (auch -ŷos), *f.* der Hirnanhang. ἡ ὑπόφωσις*. φύειν wachsen.

hypothalamŷcus unter dem Sehhügel liegend. Besser wäre *hypothalamŷus*. Vgl. *thalamus*.

hypothalāmus*, -i, *m.* der unter dem Thalamus liegende Teil des Gehirns. ὁ υποθάλαμος*. ὁ θάλαμος das Gemach. Vgl. *thalamus*.

hypothēnar, -āris, *n.* der Kleinfingerballen. τὸ ὑπόθεναρ*. Vgl. *thenar*. Richtig: τὸ ὑποθέναρ. ὑποθε(ν) hinten.

I.

(I vor Vokalen s. J.)

ile, -is, *n.* die Weiche, bei den Alten (fast) ausschliesslich im Plural vorkommend, *ilia*, -ium. In *os ilium* das Weichenbein. Davon gebildet *iliohypogastricus*, *ilioinguinalis*. Vgl. *hypogastricus*, *inguinalis* und wegen des eingeschobenen *o* Einl. S. 7.

ilīcus*, *iliācus* zur Weiche oder zum Weichenbein (sog. Darmbein) gehörend. In *os ilicum* = *os ilium*, *musc. ilicus* u. a. *Iliacus* heisst: zu Troja (Ilion) gehörend. *iliacus* willkürlich als Adjectivum zu *ileus* (s. d.) gebildet, heisst: an Darmbeschwerden leidend! Die vielgebrauchten Bezeichnungen *musc. iliacus*, *spina iliaca* usw. sind daher zu beanstanden; vgl. die Namen *cardiacus*, *thoracicus* und *ischiadicus*, die ursprünglich auch einen Kranken bezeichneten, die aber alle von Namen von Körperteilen abgeleitet sind.

ilēus willkürlich gebildetes Adjectivum. *ileus* als Substantivum, ὁ εἰλεός, ist die Darmverschlingung. εἰλέειν drehen. In (*intestinum*) *ileum* der sog. Krummdarm, besser ist *intestinum ilicum*. *os ilei* das Darmbein (wörtlich: Knochen der Darmverschlingung!) = *os ilium*. Vgl. *ile*.

impressio, -ōnis, *f.* der Eindruck. *imprimere* eindrücken.

incisivus* zum Schneiden geeignet, dann zu den Schneidezähnen gehörend. *incidere* einschneiden.

incisūra, -ae, *f.* der Einschnitt. *incidere* einschneiden.

inclinatio, -ōnis, *f.* die Neigung. *inclinare* neigen. Verwandt mit κλίνειν neigen.

incus, -ūdis, *f.* der Amboss. Gehörknöchelchen. Verwandt mit *cadere* schlagen.

index, -icis, *m.* der Anzeiger, Zeigefinger.

indicans, -antis, anzeigend. part. von *indicare*.

indicātor, -ōris, *m.* der Anzeiger, identisch mit *musculus extensor digit II. indicare* anzeigen.

inferior, -ōris, weiter unten gelegen, der untere.

infra unterhalb von. Mit *infra-* sind gebildet die Zusammensetzungen:

infraglenoidālis unterhalb der Gelenkpfanne (*cavitas glenoides*) liegend. Hybrid.

infraorbitālis* unterhalb der Augenhöhle (*orbita*) liegend.

infrapatellāris* unterhalb der Kniescheibe (*patella*) liegend.

infrascapulāris* unterhalb des Schulterblattes (*scapula*) liegend

infraspinalis*, **infraspinātus*** unterhalb des Grates (des Schulterblattes) liegend. *spina*, -ae, *f.* der Dorn, der Grat. *infraspinalis* ist dem Namen *infraspinatus* vorzuziehen, vergl. dazu *spinatus*.

infrasternalis unterhalb des Brustbeins (*sternum*) liegend. Hybrid.

infratemporalis* = *subtemporalis*.

infratrochleāris* unterhalb der Rolle (*trochlea*) liegend.

infundibulum, -i, *n.* der Trichter. *infundere* hineingiessen.

inguēn, -inis, *n.* die Leistengegend.

inguinālis zur Leistengegend gehörend.

inscriptio, -ōnis, *f.* die Einzeichnung, figürlich gebraucht in *inscriptio fibrosa (tendinea)*, *inscribere* daraufschreiben.

insūla, -ae, *f.* die Insel.

intēgumentum, -i, *n.* die Decke. *intēgere* bedecken.

inter zwischen. Mit *inter-* sind gebildet die Zusammensetzungen:

intervalveolāris* zwischen den Zahnfächern (*alveoli*) liegend.

interarytaenoidēus zwischen den Giessbeckenknorpeln (*cartilagineus arytaenoides*) liegend. Sprachlich schlecht.

intercarpēus zwischen den beiden Knochenreihen der Handwurzel (*carpus*) liegend. Sprachlich schlecht.

intercavernōsus* zwischen den *sinus cavernosi* liegend.

interchondrālis zwischen Knorpeln (*χόνδρῶν*) liegend. Hybrid.

intercondyloidēus zwischen den Gelenkfortsätzen (*condyli*) liegend. Sprachlich schlecht.

intercostälis* zwischen Rippen (*costae*) liegend.

intercuneälis* zwischen den keilförmigen Knochen liegend.
Vgl. *cuneus*.

interfoveoläris* zwischen den Grübchen (*foveolae*) liegend.

interglobuläris* zwischen Kügelchen (*globuli*) liegend.

interjugälis* zwischen den *juga cerebralia* des Schädels liegend. *impressiones interjugales* ist besser als *impressiones digitatae* (s. d.).

interlobäris zwischen Lappen (*lobi*) liegend. Hybrid.

interlobuläris zwischen Läppchen (*lobuli*) liegend. Hybrid.

intermēdius in der Mitte zwischen zwei anderen liegend.
medius der mittlere.

intermetacarpēus zwischen Knochen der Mittelhand (*metacarpus*) liegend. Sprachlich schlecht.

intermetatarsēus zwischen Knochen des Mittelfusses (*metatarsus*) liegend. Sprachlich schlecht.

interossēus* zwischen Knochen (*ossa*) liegend.

interparietälis* zwischen dem oberen und unteren *lobulus parietalis* des Gehirns oder zwischen den beiden *ossa parietalia* liegend.

interscapuläris* zwischen den Schulterblättern (*scapulae*) liegend.

intersphenoidälis zwischen den beiden Teilen des Keilbeinkörpers (*os sphenoides*) liegend. Hybrid.

interspinälis* zwischen den *processus spinales* der Wirbel liegend.

intertarsēus zwischen Knochen der Fusswurzel (*tarsus*) liegend.
Sprachlich schlecht.

intertragicus zwischen dem *tragus* und dem *antitragus* am Eingang des äusseren Gehörganges liegend. Hybrid.

intertransversälis* zwischen den *processus transversi* der Wirbel liegend.

intertrochantericus zwischen den beiden Rollhügeln (*trochanteres*) des Oberschenkelbeines liegend. Hybrid.

intertuberculäris* zwischen den beiden *tubercula* des *humerus* liegend.

intervertebrälis* zwischen Wirbeln (*vertebrae*) liegend.

interior, -ōris, der innere.

intestinum, -i, n. das Eingeweide, der Darmkanal. *intestinus* innen (*intus*) liegend.

intestinalis* zum Darmkanal gehörend.

Intra innerhalb von. Mit *intra-* sind gebildet die Zusammensetzungen:

intrajugularis* innerhalb des *foramen jugulare* liegend. S. *jugularis*.

intraoccipitalis* innerhalb des Hinterhauptsbeines liegend. *os occipitis* das Hinterhauptsbein.

intrapelvinus* innerhalb des Beckens (*pelvis*) liegend. Besser als das hybride *endopelvinus*.

intratendineus innerhalb der Sehne liegend. Gebildet von dem neulateinischen *tendo* (s. d.).

intumescētia*, -ae, *f.* die Anschwellung. *intumescere* anschwellen. *tumor*, -ōris, *m.* die Geschwulst.

Iris, -idis, *f.* die Regenbogenhaut des Auges. ἡ ἶρις, ἶριδος, der Regenbogen, nach Ἴρις, Personifikation des Regenbogens, Götterbotin.

iridicus* zur Regenbogenhaut des Auges gehörend. ἰριδικός*.

ischium, -ii, *n.* das Gesäss. τὸ ἰσχίον, hiess in frühester Zeit die Hüfte, dann (bei Aristoteles) das Gesäss, das den Sitzenden trägt. ἴσχισιν (= ἔχισιν) haben, halten. In *os ischii* das Sitzbein.

ischiadicus zum Sitzbein gehörend. ἰσχιαδικός, heisst eigentlich an der Hüfte leidend.

isthmus, -i, *m.* eine schmale Verbindung. ὁ ἰσθμός, ursprünglich die Landenge, später auch für die enge Verbindung zweier Hohlräume gebraucht (schon bei den Alten für Racheneingang).

isthmicus zum Isthmus gehörend. ἰσθμικός.

J.

jejūnus nüchtern, in der Anatomie bildlich gebraucht für leer. In *intestinum jejunum* der Leerdarm. Besser wäre nach Hyrtl *intestinum vacuum*.

jejunalis* zum Leerdarm gehörend.

jūgum, -i, *n.* das Joch (das auf den Hals der Zugtiere aufgelegt wurde), ferner auch der Gebirgskamm. In der Anatomie nur in diesem zweiten Sinne bildlich gebraucht, in *juga cerebralia*.

jugalis zum Joch (im ersten Sinne) gehörend. In *os jugale*, Jochbein, identisch mit *os zygomaticum* (s. d.).

jūgūlum, -i, *n.* die (zwischen den beiden Schlüsselbeinen liegende) Drosselgrube. Ursprünglich die oberhalb des Schlüsselbeins liegende Grube, auf diese übertragen von dem Schlüsselbein selbst, das mit einem kleinen Joch (*jugum*) verglichen werden kann. Weiterhin von den Römern gebraucht für die vordere Seite des Halses, die Kehle.

jugūlāris* zur Drosselgrube oder zur vorderen Seite des Halses gehörend.

junctūra, -ae, *f.* die Verbindung. *jungere* verbinden.

L.

lābium, -ii, *n.* und

lābrum, -i, *n.* die Lippe, Lefze, der Rand. Beide Worte sind verwandt mit *lambēre* lecken.

labiālis* zur Lippe gehörend.

labŷrinthus, -i, *m.* das Labyrinth. ὁ λαβŷρινθος. Das griechische Wort entstand aus dem altägyptischen *lopero hunt* = Palast am See (ein grosser Tempel am Mörissee mit ausserordentlich zahlreichen Abteilungen).

labyrinthīcus* zum Labyrinth gehörend.

lāc, lactis, *n.* die Milch.

lactifer, -ēra, -ērum, milchführend. *ferre* tragen.

lācer, -ēra, -ērum, zerrissen. Die Anatomie besitzt ein *foramen lacerum*, obgleich nicht das Loch zerrissen ist, sondern der Knochen, in dem es sich befindet. Besser wäre hierfür *foramen dentatum*.

lacertus, -i, *m.* wurde von den Römern für Muskel und für (den muskulösen) Arm gebraucht. Die Anatomie spricht von einem *lacertus fibrosus* und meint damit den sehnigen Faserzug, der, von der Endsehne des *musc. biceps brachii* kommend, in die Fascie des Unterarms ausstrahlt (also eigentlich *fibrae lacerti*).

lacīnīa, -ae, *f.* der Zipfel. Verwandt mit *lacer* zerrissen.

laciniātus in Zipfel zerrissen. *partic.* von *laciniare*.

lacrīma, -ae, *f.* die Träne.

lacrimālis* zu den Tränen (auch dem Tränenbein) gehörend.

lacūna, -ae, *f.* die (mit Wasser angefüllte) Vertiefung, dann auch die Lücke. Verwandt mit

lācus, -ūs, *m.* der See.

laevis s. lēvis.

lambdoīdes, lambdoideus dem Buchstaben Λ ähnlich
λαμβδοειδής. τὸ λάμβδα.

lambdoidēus zur *sutura lambdoīdes* gehörend.

lāmīna, -ae, *f.* das Blatt, die Platte.

lamella, -ae, *f.* das Plättchen.

lamellōsus* reich an Plättchen.

lānūgo, -īnis, *f.* das Wollhaar, primitives Haarkleid. *lāna*, -ae,
f. die Wolle.

lāquēus, -i, *m.* die Schlinge. Zur Benennung gewisser Faserzüge in der Gehirnanatomie gebraucht, gewöhnlich aber durch das bezeichnendere *lemniscus* (s. d.) ersetzt.

lārynx, -yngis, *m.* der Kehlkopf, ὁ λάρυγξ, -υγγός. Das Deminutiv τὸ λαρύγγιον bedeutet Gurgel, Kehle.

laryngēus zum Kehlkopf gehörend. Über die Endung -eus s. Einl. S. 5. Die Griechen sagen: λαρύγγικός*.

lātus, -ēris, *n.* die Seite.

laterālis seitlich.

lātus breit. In *mus. latissimus dorsi* der breiteste Rückenmuskel.

lemniscus, -i, *m.* die Schleife. Bezeichnung zweier Faserzüge im Gehirn: *lemniscus medialis*, von den Endkernen des Hinterstrangs des Rückenmarkes, *lemniscus lateralis*, von den Endkernen des *Nerv. cochlearis* im verlängerten Mark ausgehend.

lens, -tis, *f.* die Linse.

lenticūla, -ae, *f.* die kleine Linse.

lenticulāris linsenförmig.

leptomēninx, -ingis, *f.* die zarte Gehirnhaut, *meninx vasculosa* und *arachnoides* zusammengefasst. λεπτός zart, ἡ μήνιγξ, μήνιγγος die Hirnhaut. Die Griechen sagen: ἡ λεπτή μήνιγξ.

levātor, -ōris, *m.* der Heber. *levare* heben. *lēvis* leicht.

lēvis, -e, (nicht *laevis*) glatt.

liber, -ēra, -ērum, frei.

liēn, -ēnis, *m.* die Milz.

lienālis* zur Milz gehörend.

ligamentum, -i, *n.* das Band. *ligare* binden, verbinden.

limbus, -i, *m.* der Saum.

l̄m̄ēn, -inis, *n.* die Schwelle.

l̄m̄itans, -antis, begrenzend, partic. von *limitare*. *l̄m̄es*, -itis, *m.* der Grenzrain, die Grenze, der Grenzwall.

l̄n̄ēa, -ae, *f.* die Linie.

l̄nḡūa, -ae, *f.* die Zunge.

l̄nḡūalis* zur Zunge gehörend.

l̄nḡūla, -ae, *f.* (auch *l̄ḡūla*) das Züngchen.

l̄quor, -ōris, *m.* die Flüssigkeit.

l̄ōbus, -i, *m.* der Lappen. ὁ λοβός, eigentlich das Ohrläppchen, dann auch der Leberlappen.

l̄ōbāris* zum Lappen gehörend. Hybrid, aber statthaft (siehe Einl. S. 6).

l̄ōbūlus*, -i, *m.* das Läppchen. Hybrid, aber statthaft (siehe Einl. S. 6).

l̄ōbulāris* zum Läppchen gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

l̄ōcus, -i, *m.* der Ort.

l̄ōngitudinālis* längs gerichtet. *l̄ōngitūdo*, -inis, *f.* die Länge.

l̄ōngus lang. In *musc. longissimus* der längste (über die ganze Länge des Rückens sich erstreckende) Muskel.

l̄umbus, -i, *m.* die Lende.

l̄umbāris, **l̄umbālis*** zur Lende gehörend. Wegen der Endungen -alis und -aris vgl. *pulmonalis*.

l̄umbricālis*, regenwurmähnlich. *l̄umbricus*, -i, *m.* der Regenwurm.

l̄ūna, -ae, *f.* der Mond.

l̄unāris zum Monde gehörend, gebraucht für (halb)mondförmig.

l̄unātus halbmondförmig gekrümmt. partic. von *lunare*.

l̄ūnūla, -ae, *f.* das Mōndchen

l̄ūtēus gelb. *l̄ūtum*, -i, *n.* heist eine zur Färberei benutzte Resedaart, dann die gelbe Farbe.

l̄ympha, -ae, *f.* die Lymphe, die von den Saugadern resorbierte Flüssigkeit. Bedeutete bei den Römern reines klares Quellwasser. Das Wort wird in verschiedener Weise abgeleitet, entweder ist es verwandt mit *limpidus* klar (es kommt auch *limfa* vor) oder stellt (was weniger wahrscheinlich ist) das

griechische Νύμφη (weibliche Gottheit einer Quelle, auch eines Haines, eines Berges) dar, in dem der erste Buchstabe *n* durch das verwandte *l* ersetzt ist. Die Griechen sagen: ὁ λέμφος. Ursprünglich heisst λέμφος der eingetrocknete Schleim, dann in übertragenem Sinne einfältig, blödsinnig.

lymphāris*, **lymphaticus** zur Lymphe gehörend *Lymphaticus* wurde von den Römern für wasserscheu gebraucht. Hyrtl schlug vor, *vasa lymphatica* durch *vasa absorbentia* zu ersetzen. Einfacher ist wohl *vasa lympharia*.

lymphoglandūla, -ae, *f.* der Lymphknoten. Schlechte Übersetzung der (sachlich nicht einwandfreien) Bezeichnung Lymphdrüse. Auch *lymphonodus*, besser ist *nodus lympharis*.

M.

mācūla, -ae, *f.* der Fleck.

maculāris* zum Fleck gehörend.

maculōsus fleckenreich.

magnus gross.

mājor, -ōris, grösser, compar. von *magnus*.

māla, -ae, *f.* die Wange. Eigentlich der Oberkiefer, wahrscheinlich entstanden durch Zusammenziehung, entweder aus *mandēla* (*mandēre* kauen) oder aus *maxilla* (s. d.).

malāris* zur Wange gehörend.

mallēus, -i, *m.* der Schläger, Hammer. Gehörknöchelchen.

malleōlus, -i, *m.* das Hämmerchen. Gebraucht (erst in jüngerer Zeit) für Knöchel (am Fuss).

malleolāris zum Knöchel gehörend.

mamma, -ae, *f.* die (weibliche) Brust.

mammālis*, **mammariūs** zur (weiblichen) Brust gehörend.

mamilla, -ae, *f.* die Brustwarze. Deminutiv von *mamma*.

mamillāris gebraucht im Sinne von: der Brustwarze ähnlich. Die Römer verstanden unter *mamillare* eine Binde, durch die grosse weibliche Brüste gehalten wurden.

mandibūla, -ae, *f.* der Unterkiefer. Kommt im klassischen Latein nicht vor, erst im Spätlatein. Vgl. *maxilla. mandēre* kauen. Nach Analogie mit ähnlichen Wortbildungen könnte man *mandibulum* bilden (Hyrtl), jedoch ist *mandibula* nicht zu beanstanden. Mit *mandibulum* wurde im Mittelalter die Serviette übersetzt.

- mandibularis*** zum Unterkiefer gehörend.
- mānus**, -ūs, *f.* die Hand.
- manūbrīum**, -īi, *n.* der (mit der Hand zu fassende) Griff.
- margo**, -īnis, *m.* u. *f.* der Rand.
- marginālis*** zum Rande gehörend.
- masculīnus** männlich. *mās, māris, m.* das Männchen.
- massa**, -ae, *f.* die Masse, der Klumpen.
- massēter**, -ēris, *m.* der (vom Jochbogen zum Unterkieferwinkel ziehende) Kaumuskel. ὁ μασ(σ)ητήρ, -ήρος. μασ(σ)άσθαι kauen.
- masseterīcus*** zum *masseter* gehörend.
- masticatorīus*** dem Kauen dienend. *masticare* kauen. Verwandt mit ἡ μάσταξ, -ακος der Kiefer.
- mastoīdes**, *mastoideus* brustwarzenförmig. μαστοειδής. ὁ μαστός die Brustwarze.
- mastoidēus* zum *processus mastoīdes* des Schläfenbeins gehörend.
- māter**, -tris, *f.* die Mutter. Wird in der Anatomie im Sinne von Umhüllung gebraucht (wie auch das deutsche Wort eine ähnliche Bedeutung haben kann), für Gehirnhaut. Besser ist *meninx*.
- maternus** zur Mutter gehörend.
- mātrix**, -icis, *f.* der Mutterboden, eigentlich die Gebärmutter.
- maxilla**, -ae, *f.* der Oberkiefer. Wurde im Altertum sowohl für Ober- wie für Unterkiefer gebraucht, später kam *mandibula* (s. d.) für den Unterkiefer in Gebrauch, neben *maxilla inferior*.
- maxillāris** zum Oberkiefer gehörend.
- maxīmus** der grösste, superl. von *magnus*.
- meātus**, -ūs, *m.* der Gang. *meare* gehen.
- mecōnīum**, -īi, *n.* das Kindspech, der Darminhalt der Neugeborenen. τὸ μηκόνιον, eigentlich der (eingedickte) Mohnsaft. ἡ μήκων, -ωνος der Mohn.
- mēdius** in der Mitte liegend. *mēdium*, -īi, *n.* die Mitte.
- mediālis** nach der Mitte zu gelegen.
- mediānus** in der Mitte liegend. *vena mediana* soll nach Hyrtl eine Übersetzung des arabischen al-madian sein, und dieses soll bedeuten: Vene des Madjan (Kommentator des Avicenna). Nach Macalister ist dagegen al-madian nichts anderes als ein aus dem Lateinischen entlehntes *mediana*.

mediastinum, -i, n. der mittlere Teil der Brusthöhle, Mittelfellraum, auch in *mediastinum testis* ein in das Innere des Hodens von hinten her vorragender Wulst. Der Gebrauch des Wortes in diesen Bedeutungen ist willkürlich. Die Römer verstanden unter *mediastinus* einen Sklaven, der sich in den mittleren Gemächern des Hauses, auch in der Mitte der öffentlichen Bäder aufhielt und niedere Dienste tun musste. Wird oft falsch ausgesprochen.

mediastinālis* zum Mittelfellraum gehörend.

medulla, -ae, f. das Mark (in der Mitte der Knochen liegend).

medullāris zum Mark gehörend.

membrāna, -ae, f. die (zarte) Haut.

membranacēus häutig.

membranōsus* membranreich. Wird auch im Sinne von häutig gebraucht, nach Analogie von *globosus* (s. d.), *spongiosus* (s. d.) u. a. Vgl. Einl. S. 4.

membrum, -i, n. das Glied (allgemein), auch die Extremität.

mēnix, -ingis, f. die Hirnhaut. ἡ μῆνιγξ, μῆνιγγος, ursprünglich überhaupt Haut.

meningēus zur Hirnhaut gehörend. Über die Endung *-eus* s. Einl. S. 5. Die Griechen sagen: *μηνιγγικός**.

meniscus, -i, m. der Halbmond, gebraucht für die halbmondförmigen Schaltknorpel des Kniegelenks. ὁ μηνίσκος. Deminutiv von ἡ μῆνιγξ der Mond.

mentum, -i, n. das Kinn.

mentālis* zum Kinn gehörend.

mēridiānus (scil. *circulus*) der Meridian (Mittelkreis), d. h. ein grösster Kreis, der durch die beiden Pole einer Kugel (des Augapfels) hindurchgeht. *mēridies*, -ei, f. (*media dies*) Mittag, Süden. Vgl. zu *meridiēi* Einl. S. 3.

meridionālis wie ein Meridian laufend.

meso- zwischen, *meso-*. Nur in Zusammensetzungen, in denen es wie eine Präposition gebraucht wird. μέσος mittel. Es findet sich in:

mesaraicus zum Gekröse gehörend. *μσαραϊκός*. τὸ μσάραϊον das Gekröse. ἀραιός dünn, eng, ἡ ἀραιά (mit und ohne γαστήρ) die Weichen, der Bauch. Besser als das meistgebrauchte *mesentericus* (s. d.).

mesencephālon*, -i, n. das Mittelhirn. Vgl. *encephalon*.

Triepel, Die anatomischen Namen.

mesenterialis*, mesentericus zum Mesenterium gehörend. *mesenterialis* ist hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6). Die Griechen sagen: μεσεντέριος.

mesenteriolum*, -i, *n.* Gebildet als Deminutiv von *mesenterium*. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

mesentërium, -ii, *n.* das Gekröse, wörtlich: das in der Mitte der Eingeweide liegende. τὸ μεσεντέριον. τὸ ἔντερον das Eingeweide. ἐντός innen.

mesocolon* (dazu das Adject. **mesocolicus***), **mesogastrium***, **mesometrium***, **mesorchium***, mesorectum, **mesosalpinx***, mesovarium (dazu mesovaricus), die Bauchfellduplicaturen, bezw. -falten, die zum Dickdarm (*colon*), Magen (*gaster*), Uterus (ἡ μήτρα die Gebärmutter), auf frühem Entwicklungsstadium zum Hoden (ὁ ὄρχις, -εως der Hoden), ferner zum Mastdarm (*rectum*), zur Tube (ἡ σάλπιγξ, -ιγγος die Trompete), zum Eierstock (*ovarium*) ziehen. *mesorectum*, *mesovarium*, *mesovaricus* sind hässliche hybride Bildungen. Bei den Griechen kommt vor τὸ μεσόκολον*, τὸ μεσογάστριον*, τὸ μεσομήτριον*, τὸ μεσοόρχιον*, τὸ μεσοσαλπίγγιον*. Vgl. *colon* usw.

mesonëphros*, -i, *m.* die an mittlerer (d. i. zweiter) Stelle gebildete Niere; dasselbe wie Urniere (*ren primordialis*). ὁ νεφρός die Niere.

mesotënon*, -ontis, *m.* das (gekröseähnliche) Haftband der Sehne in Sehnenscheiden. ὁ τένων die Sehne.

meta-, μετά 1. vom Ort: inmitten, zwischen, 2. von der Zeit: nach. *meta-* findet sich in folgenden Zusammensetzungen:

metacarpus*, -i, *m.* die Mittelhand. Die Griechen sagen: τὸ μετακάρπιον*. ὁ καρπός die Handwurzel. Vgl. *carpus*.

metacarpälis*, metacarpëus zur Mittelhand gehörend. *metacarpalis* ist hybrid, aber statthaft. Über die Endung *-eus* in *metacarpëus* s. Einl. S. 5. Die Griechen sagen: μετακάρπιος*.

metanëphros*, -i, *m.* die Nachniere, d. h. die zuletzt gebildete Niere. ὁ νεφρός die Niere.

metatarsus*, -i, *m.* der Mittelfuss. Die Griechen sagen: τὸ μετατάρσιον*. ὁ τάρσος die Fusswurzel. Vgl. *tarsus*.

metatarsälis*, metatarsëus zum Mittelfuss gehörend. *metatarsalis* ist hybrid, aber statthaft. Über die Endung *-eus* in *metatarsëus* s. Einl. S. 5. Die Griechen sagen: μετατάρσιος*.

metathalamus der hinter dem Sehhügel liegende Gehirnteil. Da μετά im allgemeinen nicht die Bedeutung hinter hat, ist besser *opisthothalamus* (s. d.).

metencephälon, -i, *n.* das Hinterhirn. Vgl. *encephalon*. Da *μετά* im allgemeinen nicht die Bedeutung hinter hat, ist besser *opisthencephalon* (s. d.).

mīnīmus der kleinste, superl. von *parvus*.

mīnor, -ōris, kleiner, compar. von *parvus*.

mirābilis wunderbar. *mirāri* sich wundern. In *rete mirabile* das Wundernetz.

mitrālis* einer Mitra (Kopfbedeckung des Bischofs) ähnlich. Hybrid, aber statthalt (s. Einl. S. 6). Die Griechen sagen: *μῆτρασιδής**. ἡ *μίτρα* war ursprünglich der Leibgurt eines Kriegers, später die Kopfbinde oder überhaupt Kopfbedeckung (von Orientalinnen, Griechinnen, ebenso *mitra* bei Römerinnen). In der katholischen Kirche wurde *mitra* die Kopfbedeckung des Bischofs.

mōbilis, -e, beweglich. *mōvere* bewegen.

modiōlus, -i, *m.* die (an ihrer Basis ausgehöhlte) Achse der Schnecke des Gehörorgans. Deminutiv von *mōdius*, -ī, *m.* der Scheffel. Wurde von den Römern zur Bezeichnung verschiedener Dinge von Hohlzylinderform gebraucht, wie des Mantels am Trepan, der Nabe am Rad.

mōdūlus, -i, *m.* das Mass, der Massstab. Deminutiv von *mōdus*, -i, *m.*

mōlāris zum Mahlen gehörend. Auch als Substantivum (scil. *lapis*) bekannt: der Mühlstein. *mōla*, -ae, *f.* der Mühlstein, plur. die Mühle, verwandt mit ἡ *μύλη* die Mühle.

mons, -tis, *m.* der Berg.

monticūlus, -i, *m.* Deminutiv von *mons*.

motōrius der Bewegung dienend. *mōtor*, -ōris, *m.* der Bewegter. *mōvere* bewegen. *motorius* hiess bei den Römern beweglich (in übertragenem Sinne), regsam.

mūcus, -i, *m.* der Schleim.

mucōsus schleimig.

muliēbris, -e, weiblich. *muliēr*, -ēris, *f.* das Weib.

multangūlus* vielwinkelig, vieleckig. *multus* viel, und *angulus*, -i, *m.* der Winkel.

multifīdus vielfach gespalten. *multus* viel, *findere* spalten.

muscūsus, -i, *m.* der Muskel, eigentlich das Mäuschen. *mūs*, *mūris*, *m.* die Maus.

musculāris* zum Muskel gehörend.

- myelencephalon***, -i, *n.* das Markhirn, Nachhirn. Gebildet von $\delta \mu\epsilon\lambda\acute{o}\varsigma$ das Mark, Rückenmark, und $\epsilon\gamma\kappa\epsilon\varphi\alpha\lambda\omicron\varsigma$. Vgl. *encephalon*. Wird besser vermieden, da das Gehirn ein Teil des ganzen Markes ($\mu\epsilon\epsilon\lambda\acute{o}\varsigma$) ist. Gemeint ist *medulla oblongata* (s. d.)
- myentericus*** zur Muskulatur des Darms gehörend. Gebildet von $\delta \mu\acute{\omega}\varsigma$, $\mu\omega\acute{\omega}\varsigma$ der Muskel, eigentlich die Maus, und $\epsilon\upsilon\tau\epsilon\rho\iota\kappa\acute{o}\varsigma$. Vgl. *entericus*.
- mylohyoidēus** den (die Mahlzähne tragenden) Unterkiefer mit dem Zungenbein verbindend. Gebildet von $\delta \mu\acute{\omega}\lambda\omicron\varsigma$ der Mühlstein (vgl. *molaris*), und *hyoidēus* (s. d.).
- myocardium***, -ii, *n.* die Herzmuskulatur. Gebildet von $\delta \mu\acute{\omega}\varsigma$, $\mu\omega\acute{\omega}\varsigma$ der Muskel, eigentlich die Maus, und $\eta \kappa\alpha\rho\delta\iota\alpha$ das Herz. Vgl. *cardia*.
- myolōgia***, -ae, *f.* die Muskellehre. Gebildet von $\delta \mu\acute{\omega}\varsigma$, $\mu\omega\acute{\omega}\varsigma$ der Muskel, eigentlich die Maus, und $\lambda\acute{\epsilon}\gamma\epsilon\iota\nu$ sagen, lehren.
- myoides** muskelähnlich. $\mu\omega\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$. $\delta \mu\acute{\omega}\varsigma$, $\mu\omega\acute{\omega}\varsigma$ der Muskel, eigentlich die Maus.
- myrtiformis** myrtenfruchtähnlich. *myrtum*, -i, *n.* die Myrtenfrucht, $\tau\omicron \mu\acute{\omega}\rho\tau\omicron\nu$. In *carunculae myrtiformes* Reste des zerstörten Hymens, gewöhnlich als *carunculae hymenales* bezeichnet. Hybrid.

N.

- nāres**, -ium, *f.* die Nase (als Geruchsorgan). Der Singular *nāris*, -is, *f.* das Nasenloch.
- nāsus**, -i, *m.* die (äussere) Nase.
- nasālis** zur Nase gehörend.
- nātes**, -ium, *f.* das Gesäss. Der Singular *nātis*, -is, *f.* die Hinterbacke.
- nāvīcularis** kahnförmig. *nāvīcula*, -ae, *f.* das kleine Schiff. Deminutiv von *nāvis*, -is, *f.*
- nervus**, -i, *m.* der Nerv, eigentlich die Sehne. $\tau\omicron \nu\epsilon\acute{\omega}\rho\omicron\nu$, ursprünglich die Sehne, wurde aber schon von Aristoteles für Nerv gebraucht.
- nervōsus** wird gebraucht für nervenreich, bedeutet eigentlich sehnig.
- neurolemma***, *neurilemma*, -ātis, *n.* die Scheide der Nervenfasern. Gebildet von $\tau\omicron \nu\epsilon\acute{\omega}\rho\omicron\nu$ (s. *nervus*) und $\tau\omicron \lambda\acute{\epsilon}\mu\mu\alpha$, -ατος die Hülle.

neurologġa*, -ae, *f.* die Nervenlehre. Gebildet von τὸ νεῦρον (s. *nervus*) und λέγειν sagen, lehren.

nġdus, -i, *m.* das Nest.

nġger, *nġgra*, *nġgrum*, schwarz.

nġdus, -i, *m.* der Knoten, die knotenförmige Anschwellung.

nġdġsus reich an Knoten.

nġdġlus, -i, *m.* das Knötchen.

nġmen, -inis, *n.* der Namen.

nġbġcġla, -ae, *f.* das Wölkchen, weiche Substanz, in der die *otoconia* (s. d.) suspendiert ist. *nġbes*, -is, *f.* die Wolke.

nucha, -ae, *f.* der Nacken. Das Wort wird flektiert wie ein lateinisches Substantivum, stammt aber in Wirklichkeit aus dem Arabischen und kam zu der ihm zugeschriebenen Bedeutung durch eine Verwechslung. Der Nacken ist im Arabischen *nugrah*, dagegen *nucha* das Rückenmark (Hyrtl). Man sollte *nucha* durch *cervix* ersetzen.

nuchġlis zum Nacken gehörend. Zu ersetzen durch *cervicalis*.

nġclġus, -i, *m.* der Kern. Für *nġcġlġus* Kern einer *nucġla*.
Deminutiv von *nux*, *nġcis* *f.* die Nuss.

nucleġlus, -i, *m.* Deminutiv von *nucleus*. In der Histologie gebraucht für Kernkörperchen.

nutricġus, ernährend. *nġtrix*, -icis, *f.* die Amme. *nutrire*, säugen, ernähren. Besser als *nutritius*.

⓪.

ġbex, -icis, *m.* u. *f.* der Riegel. *ġbjġcere* entgegenwerfen.

ġbliġuus schief.

ġblongġta (scil. *medulla*) das verlängerte Mark. Particip eines neugebildeten Verbums *ġblongare*, dem man die Bedeutung verlängern untergelegt hat, das jedoch nur mit länglichmachen übersetzt werden könnte (*ġblongus* länglich). Besser wäre nach Hyrtl *ġprolongata*.

ġblongus länglich.

ġbtġrġtus verstopft. partic. von *ġbturare*.

ġbturġtor*, -ġris, *m.* der Verstopfer.

ġbturatorġus* zum verstopfenden Muskel gehörend.

occiput, -itis, *n.* das Hinterhaupt. *ob* gegenüber, *cäput*, -itis, *n.* der Kopf.

occipitälis* zum Hinterhaupt gehörend.

occultus verborgen. *partic.* von *occülère*.

ocūlus, -i, *m.* das Auge.

oculomotorius*, oculomotorius zu den das Auge bewegenden (Muskeln) gehörend. Vgl. *motorius*. Zu dem eingeschobenen *i* bezw. *o* s. Einl. S. 7.

oesophägnus, -i, *m.* die Speiseröhre. *ὁ οἰσοφάγος*. *οἶσεν* tragen, *φαγεῖν* essen.

oesophagēus zur Speiseröhre gehörend. Über die Endung *-eus* s. Einl. S. 5. Die Griechen sagen: *οἰσοφαγικός**.

olecrānon, -i, *n.* der Fortsatz der *ulna*, der die *trochlea humeri* von hinten umgreift. *τὸ ὠλέκρανον*, nach Hyrtl zusammengesogen aus *τὸ τῆς ὠλένης κράνον*, der Kopf des Ellenbogens. *ἡ ὠλένη* der Ellenbogen, die Elle, *τὸ κράνον* (= *κάρηνον*, *s. cranium*) der Kopf. Wird oft falsch betont.

olfactorius* dem Riechen dienend. *olfācère* riechen (= Geruch empfinden, während *olère* riechen = einen Geruch von sich geben ist).

olfactus, -ūs, *m.* der Geruchssinn. *olfācère* riechen.

olīva, -ae, *f.* die Olive.

olivāris* zur Olive gehörend.

omentum, -i, *n.* das Netz (Bauchfeldduplicatur). Vielleicht durch Zusammenziehung entstanden aus *ὄπερimentum* die Decke (wenigstens das grosse Netz kann als Decke der Eingeweide angesehen werden). *operire* bedecken. Man hat das Wort *omentum* noch auf manche andere Weise zu erklären versucht, man hat es in Verbindung gebracht mit *ὁ δμῆν* die Haut, mit *ὁ ὀπός* der Saft, mit *optimus* fett.

omentälis* zum Netz gehörend.

omohyoidēus vom Schulterblatt zum Zungenbein ziehend. Gebildet von *ὁ ὦμος* die Schulter (verwandt mit [*h*]umerus) und *hyoidēus* (*s. d.*).

omoplāta, -ae, *f.* das Schulterblatt. Fast ganz durch *scapula* verdrängt. *ἡ ὠμοπλάτη*. *ὁ ὦμος* die Schulter, *ἡ πλάτη* die Platte. *πλατός*, -εία, -ό breit, flach.

ontogenēticus* zur individuellen Entwicklung gehörend. Gebildet von *τὸ ὄν*, *ὄντος* das Seiende, jetzt bestehende (*partic.* von *εἶναι* sein) und *γενετικός* (= *γεννητικός*) zur Zeugung gehörend, *γεννάειν* zeugen.

- ōōgēnēsis***, -is (auch -ēsis) *f.* die Entwicklung des Eies. Gebildet von τὸ ᾠόν das Ei und ἡ γένεσις, -εως die Entstehung. Nicht *ovigenesis* oder *ovogenesis*!
- ōōlemma***, -ātis, *n.* die Eihülle. Gebildet von τὸ ᾠόν das Ei und τὸ λέμμα, -ατος die Hülle.
- ōōphōrus*** eitragend. ᾠοφόρος*. τὸ ᾠόν das Ei und φέρειν tragen.
- oophōron***, -i, *n.* = *ovarium* (s. d.). Substantiviertes Adjectiv.
- ōpercūlum**, -i, *n.* der Deckel. *operire* bedecken.
- operculāris*** zum Deckel gehörend.
- opisthencephālon***, -i, *n.* das Hinterhirn, bestehend aus Brücke und Kleinhirn. ὀπισθε(v) hinten und *encephalon* (s. d.). Sprachlich schlecht ist *metencephalon* (s. d.).
- opisthotalāmus***, -i, *m.* der hinter dem Sehhügel liegende Gehirnteil. ὀπισθε(v) hinten und *thalamus* (s. d.). Sprachlich schlecht ist *metathalamus* (s. d.).
- ophthalmicus** zum Auge gehörend. ὀφθαλμικός. ὁ ὀφθαλμός das Auge. Zurückzuführen auf den Stamm ὀπτ, der bei der Konjugation von ὄρᾱν, sehen, zur Bildung verschiedener Formen herangezogen wird. Die Römer haben *ophthalmicus* geschrieben.
- oppōnens**, -entis, gegenüberstellend, *partic.* von *oppōnere*.
- opticus** zum Sehen gehörend. ὀπτικός. Abgeleitet vom Stamm ὀπτ.
- ōra**, -ae, *f.* der Rand, Saum. Verwandt mit *ōs*, *ōris*, *n.* der Mund.
- oralis** s. *ōs*.
- orbicūlus**, -i, *m.* Deminutiv von *orbis*, -is, *m.* der Kreis.
- orbiculāris** kreisförmig.
- orbita**, -ae, *f.* die Augenhöhle. Verwandt mit *orbis* der Kreis. Im guten Latein verstand man unter *orbita* das von einem Rade ausgefahrene Geleise, und vermutlich hat man späterhin zunächst nur den Raum, innerhalb dessen sich der runde Augapfel dreht, mit einer Radspur verglichen, in der Folge wurde der Name auf die ganze Augenhöhle übertragen.
- orbitālis*** zur Augenhöhle gehörend.
- orgānon** (auch -um), -i, *n.* das Werkzeug, Organ. τὸ ὄργανον. Verwandt mit ἐργάζεσθαι arbeiten.
- ōrificium**, -ii, *n.* die Öffnung, eigentlich etwas, das das Aussehen des Mundes hat. *ōs*, *ōris*, *n.* der Mund, *facies*, -ei, *f.* die äussere Erscheinung. Vgl. zu *faciei* Einl. S. 3.
- ōrigo**, -inis, *f.* der Ursprung. *oriri* sich erheben, entstehen.

ὄσ, *ōsis*, *n.* der Mund.

orālis zum Munde gehörend.

ὄσ, *ossis*, *n.* der Knochen.

ossēus knöchern.

ossicūlum, *-i, n.* das Knöchelchen.

osphrencēphālon*, *-i, n.* das Riechhirn. Gebildet von ὀσφραίνεσθαι riechen und *encephalon* (s. d.). Besser als *rhinencephalon* (s. d.).

ostēōlōgia, *-ae, f.* die Knochenlehre. ἡ ὀστεολογία. τὸ ὀστέον (ὀστοῦν) der Knochen, λέγειν sagen, lehren.

ostium, *-ii, n.* die Mündung. Verwandt mit *ōs, ōsis*, *n.* der Mund.

ōticus zum Ohr gehörend. ὠτικός. τὸ ὄζ, ὠτός das Ohr.

ōtōcōnia*, *-ae, f.* der Ohrstaub, die Gesamtheit der auf den *maculae acusticae* des Raumorgans in der *nubecula* (s. d.) eingebetteten mikroskopischen Kristalle (*otolithi*, s. d.) ἢ ὠτοκονία*. Gebildet von τὸ ὄζ, ὠτός das Ohr und ἡ κωνία der Staub.

ōtolīthi*, *-ōrum, m.* die Gehörsteine, die die *otoconia* (s. d.) zusammensetzen. οἱ ὠτόλιθοι*. Gebildet von τὸ ὄζ, ὠτός das Ohr und ὁ λίθος der Stein. Rauber nennt sie *statolithi* (s. d.).

ovālis* s. *ovum*.

ovārium s. *ovum*.

ōvum *-i, n.* das Ei. Verwandt mit τὸ φόν.

ōvālis* eiförmig, oval. Die Römer kannten *ōvalis* (mit kurzem *o*) als: zu einem kleinen Triumph (einer *ovatio*) gehörend. *ōvare* frohlocken, einen kleinen Triumph (zu Pferd oder zu Fuss, nicht im Wagen) feiern, abzuleiten von dem Jubelruf *euoē*.

ovarium, *-ii, n.* der Eierstock. Erst in jüngerer Zeit in diesem Sinne gebraucht. *ovaria* (= *ova*) hiessen die sieben eiförmigen Figuren im Zirkus, durch deren Wegnahme die Umläufe markiert wurden. *ovarius* war bei den Römern ein Sklave, der die Eier aufzubewahren hatte. Die Griechen nennen den Eierstock ἡ φῶθ-ήκη* (vgl. *theca*).

ovariālis zum Eierstock gehörend.

ōvaricus zum Eierstock gehörend.

ōviger*, *-ēra, -ērum*, eitragend. *gerēre* tragen.

ōvūlum*, *-i, n.* Gebildet als Deminutiv von *ovum*.

P.

pachymēnix, -ingis, *f.* die derbe, fibröse Gehirnhaut = *dura meninx*. Gebildet von *παχύς*, -εῖα, -ὸ dick, derb und *ἡ μήνιγξ*, μήνιγγος die Hirnhaut. Die Griechen sagen: *ἡ παχῆα μήνιγξ* oder *ἡ σκληρὰ μήνιγξ*.

pālātum, -i, *n.* der Gaumen.

palatīnus zum Gaumen gehörend. Bei den Römern war *Palatinus*: zum Hügel *Palatium* gehörend.

pallīdus *u*lass, *pallere* blass sein. In *globus pallidus* die beiden inneren Teile des Linsenkerns im Gehirn.

pallium, -i, *n.* der Mantel, das weite Obergewand, wie es von Griechen getragen wurde. In der Anatomie: der Gehirnmantel, der äussere Teil des Grosshirns, der den Hirnstamm deckt.

palma, -ae, *f.* hat zwei Bedeutungen: die flache Hand, Handfläche und die Palme.

palmāris nur gebraucht für: zur Handfläche gehörend.

palmātus mit Palmenzweigen verziert. Gebraucht im Sinne von: palmenzweigähnlich.

palmiformis* palmenzweigähnlich.

palpēbra, -ae, *f.* das Augenlid. Vielleicht von *palpitare* zucken, des Lidschlags wegen, oder von *palpare* streicheln, weil das Lid sanft über den Augapfel streicht.

palpebrālis zum Augenlid gehörend.

pampīniformis rankenförmig. *pampīnus*, -i, *m.* die Weinranke.

pāncrēas, -ātis, *n.* die Bauchspeicheldrüse. τὸ πάγκρεας. πᾶς, πᾶσα, πᾶν ganz, völlig, τὸ κρέας, -ατος das Fleisch, Fleischgericht, das Essbare vom Tier.

pancreaticus* zur Bauchspeicheldrüse gehörend. *παγκρεατικός**.

pannicūlus, -i, *m.* gebraucht für Haut, Lage, Schicht. Diminutiv von *pannus*, -i, *m.* das Kleid, besonders ein zerrissenes, schmutziges, der Lumpen.

papilla, -ae, *f.* eigentlich nur die Brustwarze. Wurde später auf verschiedene warzenähnliche Erhebungen (in der Haut, in der Niere) übertragen.

papillāris* warzenartig.

pāpŷrācēus papierartig. *papŷrus*, -i, *m.* u. *f.* das Papier, aus dem Bast der Papyrusstaude hergestellt. ὀ und ἡ πάπυρος, wahrscheinlich ägyptischen Ursprungs.

para- neben-, παρά. Mit *para-* sind gebildet die Zusammensetzungen:

paracentrālis neben den Zentralwindungen des Gehirns liegend. Hybrid. Die Griechen sagen: παράκεντρος*.

paracoliceus neben dem Colon liegend. Besser wäre *paracolius*.

paradidymis*, -idis, *f.* das am Hoden (dorsal vom Kopf des Nebenhodens) liegende, aus gewundenen Kanälchen bestehende rudimentäre Organ. ἡ παραδιδυμῖς*. διδυμος zweifach, οἱ διδυμοὶ die Zwillinge, auch angewandt auf die Hoden.

paraglenoidālis neben der Gelenkpfanne (*cavitas glenoides*) liegend. Hybrid.

paramastoidēus neben dem Warzenfortsatz (*processus mastoideus*) des Schläfenbeins liegend.

paramētrium*, -ī, *n.* das neben dem Uterus liegende Gewebe. ἡ μήτρα die Gebärmutter.

paranasālis neben der Nasenhöhle liegend. Vgl. *nasus*. Hybrid. Besser wäre *adnasalis*.

parasternālis neben dem Brustbein (*sternum*) liegend. Hybrid. Die Griechen sagen: παραστέρνος*.

parenchýma, -ātis, *n.* die Substanz der grossen Drüsen und drüsenähnlichen Organe. τὸ παρέγχυμα, -ατος. παρ-εν-χέειν daneben hineingiessen. Der Name rührt von der Vorstellung her, dass die besondere Substanz der Drüsen von den Venen zugeführt und in die Zwischenräume zwischen die Gefässe ergossen wird.

parenchymatōsus* reich an *parenchýma* (s. d.). Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

parolfactorius neben dem *trigōnum olfactorium* liegend. Hybrid. Besser wäre *adolfactorius*.

parōphōron*, -i, *n.* das medial vom Nebeneierstock liegende, aus verzweigten Kanälen bestehende rudimentäre Organ. Gebildet von τὸ ὄφον das Ei, φέρειν tragen. Griechisch: τὸ παρῳφθήκιον* (vgl. *ovarium*).

parōtis, -idis, *f.* die Ohrspeicheldrüse. ἡ παρωτίς, -ίδος war bei den Alten die Entzündung am Ohr (der sog. Mumps), als Name der Drüse wurde *parōtis* erst im Mittelalter gebraucht. τὸ ὄς, ὠτός das Ohr.

parotidēus zur Ohrspeicheldrüse gehörend. Über die Endung *-eus* s. Einl. S. 5. Die Griechen sagen: παρωτιδικός*.

parovarium, -ī, *n.* s. *epoophoron*.

parumbilicālis neben dem Nabel (*umbilicus*) liegend. Hybrid.
Besser wäre *adumbilicaris*.

parureterius* neben dem Harnleiter (*ureter*) liegend.

paraurethralis neben der Harnröhre (*urethra*) liegend. Hybrid.

paries, -ētis, *m.* die Wand. In Zusammensetzungen auch gebraucht für Seitenlappen des Gehirns.

parietālis zur Wand (zum Seitenwandbein) gehörend.

pars, -tis, *f.* der Teil.

parvus klein.

patella, -ae, *f.* die Kniescheibe, schon von den Alten in diesem Sinne gebraucht. Eigentlich ein (Opfer)teller, Deminutiv von *patina*, -ae, *f.* die Schüssel. *patere* offen stehen.

patellāris* zur Kniescheibe gehörend.

pecten, -inis, *m.* der Kamm. Verwandt mit ὁ κτεῖς, κτενός der Kamm. In *pecten ossis pubis* Schambeinkamm. Bei den Römern war *pecten* das ganze Schambein, wie auch κτεῖς in derselben Bedeutung vorkommt. *pecten* (κτεῖς) ist zunächst Kamm zum Kämmen, nicht etwa Kamm = Grat. Das Schambein hat kaum Ähnlichkeit mit einem Kamm, höchstens mit einem solchen, der nur zwei Zähne besitzt, mit denen man die beiden Schambeinäste vergleichen könnte. Später, seit dem Mittelalter, wurde nur noch ein Teil des Schambeins, sein Grat, als *pecten* bezeichnet. Besser ist *crista ossis pubis*.

pectinēus zum Schambein gehörend. Über die Endung -ēus s. Einl. S. 3.

pectinātus kammähnlich, eigentlich mit einem Kamm versehen.

pectus, -ōris, *n.* die Brust.

pectorālis zur Brust gehörend.

pedistibulum* s. pes.

pedistibulāris* s. pes.

pedunculus, -i, *m.* der Stiel. Deminutiv von *pēs*, *pēdis*, *m.* der Fuss. Findet sich bei alten Schriftstellern sehr selten für *peduculus* (= *pediculus*).

pellucidus durchsichtig. *pellucere* (für *per-lucere*) durchscheinen. *lux*, *lūcis f.* das Licht.

pelvis, -is, *f.* das Becken.

pelvicus* zum Becken gehörend.

pelvīnus* zum Becken gehörend.

- pēnis**, -is, *m.* das männliche Glied, ursprünglich der Schwanz.
- pēnicillus**, -i, *m.* der Pinsel. Deminutiv von *peniculus* der Büschel, Deminutiv von *penis*.
- pennātus**, beflügelt, gefiedert *penna*, -ae, *f.* die Feder.
- perforans**, -antis, durchbohrend. *partic.* von *perforare*. Wird oft falsch ausgesprochen!
- perforātus** durchbohrt. *partic.* von *perforare*.
- permānens**, -entis, bleibend, dauernd. *partic.* von *permanere*.
- peri-** um-. περί um herum. Mit *peri-* ist gebildet:
- pericardium***, -ii, *n.* der Herzbeutel. τὸ περικάρδιον*. ἡ καρδία das Herz.
- pericardiācus*** zum Herzbeutel gehörend.
- perichondrium***, -ii, *n.* die Knorpelhülle. τὸ περιχόνδριον*. ὁ χόνδρος der Knorpel, eigentlich das Korn.
- perichorioideālis* die *tunica chorioidea* (s. d.) des Auges umgebend. Sprachlich schlecht.
- pericrānium**, -ii, *n.* das Periost (s. *periostium*) des Schädeldaches. ὁ περικράνιος χιτῶν.
- perilympha*, -ae, *f.* die Flüssigkeit, die das häutige Gehör-labyrinth umspült. Besser ist *lympha externa*.
- perimētrium*** der peritoneale (s. *peritoneum*) Überzug der Gebärmutter (ἡ μήτρα).
- perimysium***, -ii, *n.* die Hülle des Muskels oder der Muskelbündel. Die Griechen sagen: τὸ περιμύϊον*. ὁ μῦς, μῶς der Muskel, eigentlich die Maus. Das *s* in *perimysium* ist des Wohlklangs halber eingeschoben.
- perināeum**, -i, *n.* (oder **perinēum**, aber nicht *perineum*) der Damm, das Mittelfleisch, τὸ περίναιον oder περίνεον.
- perineālis*** zum Damm gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).
- perineurium***, -ii, *n.* die Umhüllung eines Nervenbündels. τὸ νεῦρον. Vgl. *nervus*.
- periorbīta*, -ae, *f.* das die *orbīta* auskleidende Periost (vgl. *periostium*). Das schlechte hybride Wort ist durch *periostium orbitae* zu ersetzen.
- periostēum, periostium**, -ii, *n.* die Knochenhülle. Im Griechischen kommt vor τὸ περίοστεον, ὁ περίοστεος und περίοστιος χιτῶν (*tunica*). τὸ ὀστέον (ὀστούν) der Knochen.
- periphēricus*** zu den äusseren Teilen (Gegensatz: *centrum*) gehörend, peripherisch. περιφερικός*. περιφέρειν herumtragen. ἡ περιφορά der Umkreis.

- peritonäeum**, -i, *n.* das Bauchfell. ὁ περιτόναιος χιτῶν (*tunica*). περιτείνειν herumspannen
- peronäeus*** zum Wadenbein gehörend. Die Griechen sagen: περονιαῖος*. ἡ περόνη das Wadenbein, eigentlich die Spange.
- perpendicularis** senkrecht. *perpendicularium* das Richtblei, Lot *per-pendēre* genau abwägen.
- pēs, pēdis**, *m.* der Fuss.
- pedistibulum***, -i, *n.* der Steigbügel. Gehörknöchelchen. Gebildet von *pes* und *stare* stehen (Skutsch). Das vielgebrauchte *stapes* ist sprachlich sehr schlecht. Die Alten kannten keine Steigbügel.
- pedistibularis*** zum Steigbügel gehörend. Schlecht ist *stapedius*.
- petiōlus**, -i, *m.* der Stiel. Deminutiv von *pēs, pēdis*, *m.* der Fuss, anstatt *pediolus*. In *petiolus epiglottidis*.
- petrōsus*** felsig. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6) Gebildet von ὁ πέτρος (auch ἡ πέτρα) der Felsen. In *os petrosum (pars petrosa ossis temporalis)*, das z. T. aus sehr hartem Knochengewebe besteht. — Leider sind eingebürgert *fossula petrosa, sulcus petrosus, nervus petrosus*. Man muss an einen Ersatz durch *fossula* usw. *ossis petrosi* denken — In Zusammensetzungen wird *os petrosum* zu *petro-* abgekürzt, was man unmittelbar auf πέτρος beziehen kann.
- phālanx**, -angis, *f.* das Finger-(Zehen-)glied. ἡ φάλαγξ, -αγγος hiess, bevor es auch in dem angegebenen Sinne gebraucht wurde, 1. ein rundes Stück Holz, Rolle, 2. die (dicht gedrängte) Schlachtordnung. Nach Hyrtl war die unter 2. genannte Bedeutung massgebend, so dass φάλαγξ eigentlich die Gesamtheit der Finger(Zehen-)glieder vorstellt und hiervon auf ein einzelnes Glied übertragen erscheint.
- phalangēus* zum Finger(Zehen-)glied gehörend. Über die Endung *-eus* s. Einl. S. 5. Die Griechen sagen: φαλαγγικός*.
- pharynx**, -yngis, *m. u. f.* der Rachen. ὁ u. ἡ φάρυγξ, -υγγος.
- pharyngēus* zum Schlund gehörend. Über die Endung *-eus* s. Einl. S. 5. Die Griechen sagen: φαρυγγικός*.
- philtrum**, -i, *n.* das Grübchen in der Oberlippe. τὸ φίλτρον, eigentlich der Liebeszauber. φιλεῖν lieben.
- phrēnes**, -um, *f.* das Zwerchfell. = *diaphragma*. αἱ φρένες. Kommt nur in Zusammensetzungen vor, in denen man oft fälschlicherweise *phrenico-* verwendet (*phrenicocolicus, phrenicohepaticus, phrenicolienalis*, während es *phreno-* heissen muss. Der Singular ἡ φρήν, -νόος das Ge-

müt, αὶ φρένες auch die Gemütsäusserungen. Gemütliche Erregungen rufen körperliche Empfindungen in der oberen Bauchgegend hervor, so dass sehr wohl in alter Zeit das Zwerchfell als ihr Sitz angesehen werden konnte (vgl. unser „Herz“).

phrēnīcus zum Zwerchfell gehörend. φρενικός.

pigmentum, -i, n. der Farbstoff. *pingere* malen.

pīlus, -i, m. das (einzelne) Haar.

pineālis* zum Fichtenzapfen gehörend. *pineā*, -ae, f. der Fichtenzapfen *pinus*, -i (oder -us), f. die Fichte. In *corpus pineale* die einem Fichtenzapfen ähnliche Epiphyse des Gehirns (s. *epiphysis*).

pinguicūla (scil. *macula*) ein gelegentlich vorkommender gelblicher Fleck in der Bindehaut des Auges, nahe dem Hornhautrande gelegen. *pinguiculus* hübsch fett, Deminutiv von *pinguis* fett. Nicht *pinguecula*! Die Bezeichnung ist sachlich nicht einwandfrei, da in der *pinguicula* kein Fett, sondern hypertrophiertes Bindegewebe und verdicktes Epithel vorliegt.

pīriformis* birnförmig. *pīrum*, -i, n. die Birne. Schlecht ist *pyriformis*, indessen damit zu erklären, dass von dem Grammatiker Isidorus *pirum* aus Gründen der Ähnlichkeit in Verbindung gebracht worden ist mit τὸ πῦρ, πῦρός das Feuer, die Flamme.

pīsiformis* erbsenförmig. *pīsum*, -i, n. die Erbse. *pisum* ist vielleicht das latinisierte τὸ πῖσον die Erbse, freilich ist in den beiden Wörtern die Quantität des *i* verschieden.

pituitariūs* Schleim absondernd. *pituita*, -ae, f. der Schleim. In *glandula pituitaria*, einer nur historischen Interesse beanspruchenden älteren Bezeichnung der Hypophyse des Gehirns.

pīus fromm. In *pia mater*, der dem zentralen Nervensystem dicht anliegenden Gehirnhaute, die besser als *meninx vasculosa* bezeichnet wird. Das Wort wurde von Mönchen bei der Übersetzung aus dem Arabischen in die anatomische Sprache eingeführt (Hyr tl).

placenta, -ae, f. der Kuchen, Mutterkuchen (in der letzten Bedeutung erst seit dem Mittelalter). ὁ πλακούς, -οῦτος der Kuchen. Man sollte nicht, wie es oft geschieht, plazenta (mit z) schreiben.

planta, -ae, f. die Fußsohle. Vielleicht verwandt mit *planus* eben. Man findet bei den Alten *planta* auch für den ganzen Fuß gebraucht.

plantāris* zur Fußsohle gehörend. Die Römer nannten *plantaria*, -ium die Absenker von Gewächsen (*planta* auch = Pflanze).

plānum, -i, n. die Fläche, Ebene. *planus* flach, eben.

- platysma**, -ātis, *n.* der Hautmuskel des Halses (*musc. subcutaneus colli*), τὸ πλάτυσμα in Verbindung mit μωῶδες (= μωοειδές, s. *myoides*), eigentlich das muskelähnliche breite Gebilde, πλατός, -εῖα, -ὸ breit.
- pleura**, -ae, *f.* das Brustfell. ἡ πλευρά heisst die Seite, auch die des Leibes, ferner die Rippe. Im Mittelalter wurde *pleura* auf das an der Innenseite der Rippen liegende Brustfell übertragen.
- pleurālis*** zum Brustfell gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6). Die Griechen verwenden πλευρικός* für: zur Rippe gehörend.
- plexus**, -ūs, *m.* das Geflecht. *plectere* flechten. Verwandt mit πλέκειν flechten.
- plicā**, -ae, *f.* die Falte. *plicare* falten.
- plicātus** gefaltet. partic. von *plicare*.
- pneumāticus** lufthaltig. πνευματικός. τὸ πνεῦμα, πνεύματος der Hauch, Luftstrom.
- pollex**, -icis, *m.* der Daumen.
- pōlus**, -i, *m.* der Pol. ὁ πόλος, eigentlich die Achse, auch Himmelsgewölbe, Sonnenuhr. πείειν sich bewegen.
- pons**, -tis, *m.* die Brücke.
- pōples**, -itis, *m.* die Kniekehle.
poplitæus zur Kniekehle gehörend. Über die Endung -æus s. Einl. S. 3.
- porta**, -ae, *f.* die Pforte, Eintrittsstelle der Gefässe an verschiedenen Organen. Wird auch im Plural gebraucht in *vena portarum* (neben *vena portae*), die in die Leber eintretende Pfortader, im Anschluss an das griechische αἶ πόλαι das Tor (das aus mehreren Flügeln besteht).
- portio**, -ōnis, *f.* der Anteil. Wird oft ohne Zusatz im Sinne von *portio vaginalis uteri* gebraucht.
- pōrus**, -i, *m.* der Weg. Durchgang. ὁ πόρος. περάειν hindurchgehen.
- postcentralis hinter den Zentralwindungen des Gehirns liegend. *post* hinter und *centralis* (s. d.). Hybrid.
- posterior**, -ōris, der hintere. Wird im guten Latein fast nur von der Zeit gebraucht, selten vom Ort, wie in *posteriōra*, -um die Rückseite des Körpers, der Hintere. Hat jetzt, gebraucht im Gegensatz zu *anterior*, fast ganz das klassische *posticus* verdrängt.

posticus der hintere (vergl. *posterior*). Wird oft falsch ausgesprochen.

prae vor (vom Ort). Mit *prae-* sind gebildet die Zusammensetzungen:

praecentrālis vor den Zentralwindungen des Gehirns liegend. Hybrid.

praecūnēus*, -i, *m.* der sogenannte Vorkeil, vor dem Keil (*cūnēus*) liegender Abschnitt der Gehirnoberfläche.

praemōlāris* vor den Mahlzähnen liegend. Vgl. *molaris*.

praepatellāris* vor der Kniescheibe liegend. Vgl. *patellaris*.

praeperitoneālis vor dem Bauchfell (*peritoneum*) liegend. Hybrid.

praepūtium, -ii, *n.* die Vorhaut. Abzuleiten entweder von τὸ πρόσθιον (ἢ πρόσθῃ*) das männliche Glied oder von *pūtāre* beschneiden (besonders in der Gartenkunst gebraucht). Die zweite Ableitung unwahrscheinlich, der verschiedenen Quantitäten des *u* wegen. Bei den Griechen heisst die Vorhaut ἡ ἀκροποσθία*.

praeputiālis* zur Vorhaut gehörend.

primarius zu den ersten gehörend (im Sinne von vornehm). In *folliculus ovarii primarius*. Besser ist hier *primordialis* (s. d.).

primordiālis zum Anfang gehörend. *primordium*, -ii, *n.* der Anfang, Uranfang. *primus* der erste, *ordiri* anfangen.

primus der erste.

princeps, -ipis, der erste, wichtigste. *primus* der erste, *cāpēre* fassen.

prisma, -ātis, *n.* die Säule mit eckigem Querschnitt. τὸ πρίσμα, πρίσματος, eigentlich das Herausgesägte, auch die Sägespäne. πρίστυν sägen.

prōcērus schlank. Verwandt mit *crescere* wachsen.

prōcessus, -ūs, *m.* der Fortsatz, eigentlich der Fortgang, Fortschritt. *prōcedere* vorwärts gehen.

prōencephālon*, -i, *n.* das Vorderhirn. πρὸ vor und *encephalon* (s. d.). Vgl. *prosencephalon*.

prōfundus tief. Verwandt mit *prōfundere* hervorgiessen.

prōmīnens, -tis, vorragend. partic. von *prōmīnere*.

prominentia, -ae, *f.* die Hervorragung. Besser *eminentia* (s. d.).

promuntürüm, -ii, *n.* der Vorsprung, besonders eines Gebirges. Verwandt mit *prominere* vorragen. Ist nicht mit *mons*, der Berg, verwandt und darf nicht *promontorium* geschrieben werden.

prönätor, -ōris, *m.* der Neiger. Gebildet von *prönare* vornüberneigen. Gebraucht für diejenigen Muskeln, die durch Drehung des Unterarms die Handfläche nach unten richten. *pronus* vornüber geneigt.

proprius allein gehörend. Charakteristisch.

pronēphros*, -i, *m.* die Vorniere, d. i. die zuerst gebildete Niere. πρό vor, ὁ νεφρός die Niere.

prosenēphālon, -i, *n.* das Vorhirn. Gebildet von πρό vor und *encephalon* (s. d.), wobei das *s* des Wohlklangs wegen eingeschoben wurde. Das ist indessen nicht statthaft, da man in dem Wort eine Zusammensetzung mit πρός gegen vermuten muss. Richtig ist *proēncephalon* oder *emprosthencephalon* (s. d.).

prostāta*, -ae, *f.* die vom Anfangsteil der männlichen Harnröhre durchbohrte Drüse, die sog. Vorsteherdrüse. Ursprünglich wurde der griechische Plural προστάται für die Samenbläschen gebraucht. Der Singular, der seiner Bedeutung nach sehr wohl auf das bezeichnete Organ übertragen werden konnte, ist ὁ προστάτης der Vordermann, der Beschützer. προστῆναι voranstellen. Die Änderung von *prostates* in *prostata* ist sprachlich zu rechtfertigen, vgl. μαργαρίτης und *margarita* die Perle.

prostāticus zur Vorsteherdrüse gehörend. προστατικός.

prōtūberantīa*, -ae, *f.* die Hervorragung. *protuberare* vorragen. Vgl. *tuber*.

proximālis nach der Körpermitte (oder einem Zentralorgane) hingewandt. Gebildet von *proximus* der nächste. Besser ist *epicentros* (s. d.).

psōas (gebraucht als *m.*) der Lendenmuskel. ἡ ψόα heisst die Lende, ψόας ist der Genitiv davon und dürfte nicht als Nominativ gebraucht werden. Möglich wäre *musculus psoae*, aber nicht der *psoas*. Die Griechen nennen den Lendenmuskel ὁ ψοίτης. ψοίτης ist schon altgriechisch.

ptērýgoīdes, *pterygoideus* flügel förmig. πτερογοειδής. ἡ πτέρυξ, -υγος, der Flügel. In *processus pterygoīdes ossis sphenoidis*. In Zusammensetzungen braucht man der Kürze halber *pterygo-* für flügelähnlichen Fortsatz.

pterygoīdēus zum *processus pterygoīdes* des Keilbeins gehörend.

Triepel, Die anatomischen Namen.

pūbes, -is, *f.* die Schamgegend, Scham. Ebenfalls im Singular gebraucht für Schamhaare.

pubīcus* zur Schamgegend gehörend.

pūdendus einer, dessen man sich schämen muss. *partic.* von *pūdere* sich schämen. *arteria pudenda* und *nervus pudendus* heisst: Arterie und Nerv, deren man sich schämen muss (!), besser ist *a.* und *n.* *pudendorum*. — *pudenda*, -orum, *n.* plur. als Substantiv gebraucht, die Scham, Schamgegend.

pudendālis zur Schamgegend gehörend. Unschöne Bildung, besser ist der Genitiv *pudendorum*. S. *pudendus*.

pulmo, -ōnis, *m.* die Lunge. Verwandt mit ὁ πνεύμων, -ονος die Lunge.

pulmonāris*, **pulmonālis*** zur Lunge gehörend. Die Römer kannten nur das Adjektivum *pulmonēus*. *pulmonaris* ist besser als *pulmonalis*, dieses aber immerhin statthaft, da im guten Latein Ausnahmen von der S. 4 angegebenen Regel über die Endungen *alis* und *aris* vorkommen.

pulpa, -ae, *f.* das weiche Mark oder Parenchym eines Organs. In *pulpa dentis* und *pulpa lienis*.

pulpōsus* aus weicher Substanz bestehend.

pulvīnar, -āris, *n.* das Kissen. Gebraucht für das hintere Ende des Sehhügels im Gehirn.

punctum, -i, *n.* der Punkt, eigentlich der Stich. *pungēre* stechen.

pūpilla, -ae, *f.* die Pupille (Augenstern, Sehloch). Deminutiv von *pupa* das Mädchen. Auch die kleinen Figürchen (Puppen), mit denen die kleinen Mädchen spielten, hiessen *pupae*, und *pupilla* ist eigentlich das verkleinerte Spiegelbild, das man im Augenstern eines anderen sieht (Hyrtl). Ausserdem war *pupilla* bei den Römern die Waise.

pūpillāris zur Pupille gehörend. Von den Alten nur gebraucht mit Bezug auf *pupilla* die Waise.

putāmen, -inis, *n.* die Schale, der äussere Teil des Linsenkerns im Gehirn. *putare* beschneiden, besonders in der Gartenkunst.

pylōrus, -i, *m.* der Magenausgang, die enge Übergangsstelle zwischen Magen und Darm. ὁ πυλωρός der Pförtner, Torwächter. Schon von Galen zum Vergleich herangezogen. ἡ πύλη (meist im Plural αἱ πύλαι gebraucht) das Tor, ὄρεσθαι Aufsicht führen (verwandt mit ὄραν sehen.)

pylōricus* zum Magenausgang gehörend. πυλωτικός*.

pyrämis, -idis, *f.* die Pyramide. ἡ πυραμίς, -ίδος, wahrscheinlich ägyptischen Ursprungs.

pyramidälis zur Pyramide gehörend, pyramidenförmig. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

pyriformis jetzt kaum mehr gebraucht, fehlerhafte Schreibweise von *piriformis* (s. d.).

Q.

quadranguläris vierwinkelig, viereckig. *quattuor* vier, *angulus* der Winkel, verwandt mit ἀγκύλος krumm.

quadrätus viereckig. *partic.* von *quadrare* viereckig machen. *quattuor* vier. Von dem *Musc. quadratus labii superioris* ist nur das *Caput infraorbitale* viereckig.

quadriceps, ἑπίτις, vierköpfig. *quattuor* vier, *caput*, -itis, *n.* der Kopf.

quadrigēminus vierfach, viermal vorhanden. *quattuor* vier, *geminus* von Geburt doppelt. Hier wird es nicht mehr empfunden, dass in *geminus* der Begriff „doppelt“ liegt, somit ist *quadrigeminus* nicht etwa achtfach. Die Bezeichnung eines Vierhügels als *corpus quadrigeminum* ist richtig. Nennt man die ganze Vierhügelplatte *corpus quadrigeminum* oder *lamina quadrigemina*, so setzt man voraus, dass *quadrigeminus* auch bedeutet: in vier Teile gespalten. Das könnte man auf Grund von Analogien verteidigen (vgl. *trigeminus*).

quartus der vierte.

quintus der fünfte.

R.

rādīus, -ii, *m.* eigentlich der Stab, dann die Speiche des Rades, auch der Halbmesser des Kreises, der Strahl der Sonne und Name des einen der beiden Unterarmknochen.

radiälis* zum *radius* des Unterarms gehörend.

radiätus mit Strahlen versehen, strahlend.

radiatio, -ōnis, *f.* die Ausstrahlung.

rādix, -icis, *f.* die Wurzel.

radiculäris* zur Wurzel gehörend. Gebildet von *radicula*, Deminutiv von *radix*.

rāmus, -i, *m.* der Ast, Zweig.

ramūlus, -i, *m.* das Ästchen.

raphe s. *rhaphe*.

rēcessus, -ūs, *m.* der Rückgang, dann die Einbiegung, Vertiefung. *rēcedēre* zurückweichen.

rectus gerade. Adjectivisch gebrauchtes partic. von *rēgēre* richten. — *rectum*, -i, *n.* (mit oder ohne *intestinum*) der Enddarm, Mastdarm. Nach Hyrtl soll die Bezeichnung auf Galen zurückgehen, der nur tierische Kadaver seziierte, hier den Enddarm gestreckt fand, also anders, als es beim Menschen der Fall ist, und ihn ἀπευθόμενον ἔντροπον = *intestinum rectum* nannte. (Verwandt mit ἀπευθόμενον gerade richten, εὐθός, -σία, -ό gerade). Indessen braucht schon Celsus vor jenem *rectum* für Mastdarm. Besser wäre *intestinum terminale*.

rectālis* zum Mastdarm gehörend. Besser wäre der Genitiv *intestinali terminalis*.

rectilinēus aus geraden Linien bestehend. Bezeichnung des vorderen Schenkels vom Steigbügel (Gehörknöchelchen). *linēa*, -ae, *f.* die Linie.

rēcurrens, -entis, zurücklaufend, partic. von *recurrere*.

rēgio, -ōnis, *f.* die Lage, Gegend, eigentlich die Richtung. *rēgēre* richten.

rēn, -is, *m.* die Niere.

renālis zur Niere gehörend.

renicūlus, *reniculus*, -i, *m.* die kleine Niere. Wird gebraucht für die einzelnen Lappen, aus denen sich die Niere bei ihrer Bildung zusammensetzt.

respiratorius der Atmung dienend. *respirare* Atem holen. *spiritus*, -us, *m.* der Hauch, Atemzug.

restiformis* strangförmig. *restis*, -is, *f.* der Strick, Strang.

rēte, -is, *n.* das Netz.

reticūlum, -i, *n.* das kleine Netz.

reticulāris* zum Netz gehörend, netzförmig.

retīna*, -ae, *f.* (scil. *tunica*) die Netzhaut des Auges. Wird fast immer falsch ausgesprochen, von *rete* kann nur *retinus* mit langem *i* abgeleitet werden (s. Einl. S. 4). Die Griechen nennen die Netzhaut ὁ ἀμφιβληστροειδής χιτών. τὸ ἀμφιβληστρον das Fischernetz. ἀμφιβάλλειν umfassen. Die wenig passende Bezeichnung wurde gewählt, weil die Nervenhaut des Auges den Glaskörper umfaßt „wie ein Fischernetz den Fang“. (Gerardus Cremonensis, Übersetzer des Avicenna. Ausführliches bringt Hyrtl.)

rētīnācūlum, -i, *n.* das zum Halten dienende Band. *retinere* zurückhalten.

rētrō zurück, rückwärts liegend. Da *retro* keine Präposition, sondern ein Adverbium ist, sollte es nicht mit Adjektiven zusammengesetzt werden. Man findet es in:

retrocaecālis hinter dem Blinddarm (vgl. *caecus*) liegend. Besser wäre *postcaecalis*.

retroflexus zurückgebogen. *partic.* von *retrofectere*.

retromalleolāris hinter dem Knöchel (*malleolus*) liegend. Besser wäre *postmalleolaris*.

retromandibulāris hinter dem Unterkiefer (*mandibula*) liegend. Besser wäre *postmandibularis*.

retromaxillāris hinter dem Oberkiefer (*maxilla*) liegend. Besser wäre *postmaxillaris*.

retroperitonaeālis hinter dem Bauchfell (*peritoneum*) liegend. Hybrid.

reuniens*, -tis, verbindend. *partic.* von (dem erst im mittelalterlichen Latein vorkommenden) *reunire* vereinigen.

rhāphe, -ēs, *f.* die Naht. ἡ ῥαφή, ῥάπτειν zusammennähen. Oft fälschlicherweise *raphe* geschrieben.

rhinencēphālon*, -i, *n.* das Riechhirn. Gebildet von ἡ ῥίς, ῥινός die Nase, und *encephalon* (s. d.) Heißt eigentlich Gehirn der Nase, darum ist besser *osphrencephalon* (s. d.).

rhombencēphālon*, -i, *n.* das Rautenhirn, der die Rauten-grube enthaltende Teil des Gehirns. Gebildet von ὁ ῥόμβος, ursprünglich der Kreisel (ῥέμβειν herumdrehen), als mathematischer Ausdruck die Raute, das verschobene Quadrat, und *encephalon* (s. d.).

rhomboides, *rhomboides* rautenförmig. ῥομβοειδής. ὁ ῥόμβος die Raute (s. d. vor.).

rhomboidēus zur *fossa rhomboides* gehörend.

rīma, -ae, *f.* die Spalte.

rīsōrius* zum Lachen dienend. Gebildet von *risor*, -ōris, *m.* der Lacher, Spötter. *ridere* lachen.

rīvus, -i, *m.* der Bach.

rostrum, -i, *n.* der Schnabel. Verwandt mit *rodere* benagen.

rostrālis zum Schnabel gehörend, gebraucht bei Embryonen im Sinne von: nach dem vorderen Körperende hin gelegen.

rōtātor, -ōris, *m.* der Dreher (Muskelname). *rotare* herumdrehen.

rotundus rund. *rōta*, -ae, *f.* das Rad.

rudimentum, -i, *n.* der erste rohe Anfang eines Unternehmens, gebraucht für ein nur angelegtes, nicht ausgebildetes, verkümmertes Organ. *rudire* (= *erudire*) ausbilden, *rudis* roh.

rūber, *rubra*, *rubrum* rot.

rūga, -ae, *f.* die Runzel.

S.

sābūlum, -i, *n.* der Sand.

saccus, -i, *m.* der Sack.

sacciformis* sackförmig.

saccūlus, -i, *m.* das Säckchen.

sacculāris* zum Säckchen (im bes. des Gehörlabyrinthes) gehörend.

sācer, *sacra*, *sacrum* heilig. In *os sacrum* das Kreuzbein. Der lateinische Name ergab sich als Übersetzung des griechischen τὸ ἱερόν δοκοῦν, und diese Bezeichnung des grössten Knochens der Wirbelsäule erklärt sich dadurch, dass die Alten auffallend grosse Dinge ἱερός, heilig, nannten. (Auch der deutsche Name Kreuzbein ist auffallend, er ist darauf zurückzuführen, dass im Althochdeutschen *criuzzi* — unser Kreuz — eine Erhöhung bedeutete. Hyrtl.)

sacrālis* zum Kreuzbein gehörend.

saeptum, -i, *n.* der Zaun, die Scheidewand. *saepire* umzäunen. Besser als *septum*.

saeptūlum*, -i, *n.* die kleine Grenz wand. Besser als *septulum*.

sagittālis die Richtung des abgesandten Pfeiles besitzend. *sagitta*, -ae, *f.* der Pfeil.

saliva, -ae, *f.* der Speichel.

salivāris* zum Speichel gehörend.

salpinx, -ingis, *f.* die Trompete. ἡ σάλπιγξ, -γγος. Identisch mit *tuba*, fast nur in Zusammensetzungen gebraucht.

salvatella, scil. *vena*, Hautvene am Handrücken. Verdorben aus dem arabischen *al-a-seilem* die Fliessende (Hyrtl).

sanguis, -inis, *m.* das Blut.

sanguinēus blutig, aus Blut bestehend. Auch in *vasa sanguinea* Blutgefässe.

saphēna(us), scil. *vena (nervus)*, Hautvene (-nerv) der unteren Extremität. Der Name stammt nicht, wie man glauben könnte, von dem griechischen σαφής deutlich, sondern von al-sāfin der Araber (Hyrtl). Vielleicht ist das Wort dem Hebräischen entnommen, in dieser Sprache — nicht im Arabischen selbst — heisst sāfin der Verbergende. So wurde die an der inneren Seite des Beines liegende Vene genannt, weil sie im Gegensatz zu anderen Hautvenen fast während ihres ganzen Verlaufes nicht durch die Haut hindurchschimmert. — Könnte durch *occulata (us)* ersetzt werden.

sarcolemma*, -ātis, *m.* die Scheide der Muskelfaser. Gebildet von ἡ σάρξ, σαρξός das Fleisch, und τὸ λέμμα, -ατος die Hülle.

sartoriūs* zum Schneidern dienlich. *sartor*, -ōris, *m.* der Schneider, Flickschneider. *sarctre* ausbessern.

scāla, -ae, *f.* die Treppe. Entstanden durch Zusammenziehung aus *scandēla*, *scandēre* steigen. Von den Römern immer im Plural gebraucht.

scalēnus schief, ungleichseitig dreieckig. σκαληνός. Verwandt mit σκολιός krumm, auch mit σκάζειν hinken.

scāpha, -ae, *f.* der Nachen. ἡ σκάφη, eigentlich das Ausgehöhlte. σκάπτειν graben. Gebraucht für die zwischen *helix* und *anthelex* liegende Furche der Ohrmuschel.

scaphoïdes kahnförmig. σκαφοειδής.

scāpūla, -ae, *f.* das Schulterblatt. Die Römer brauchten nur den Plural, im Sinne von Rücken.

scapulāris* zum Schulterblatt gehörend.

scāpus, -i, *m.* der Schaft. ὁ σκάπος der Stock, Schaft.

scēlētum (auch *sceletum*), -i, *n.*, **scēlētus**, -i, *m.* das Skelett. ὁ σκελετός. Ursprünglich ist σκελετός Adjectivum und heisst ausgedörrt. Die Bezeichnung wurde Mumien beigelegt, entspricht eigentlich nicht unserem Knochengerüst. Verwandt mit σκέλλειν ausdörren, auch mit τὸ σκέλος, -ους das Schienbein und überhaupt der (harte) Knochen. Nicht *skeleton* zu schreiben (s. Einl. S. 8).

sclēra (scil. *tunica oculi*) die feste Hülle des Augapfels, die zusammen mit der Hornhaut die *tunica fibrosa oculi* bildet. σκληρός hart.

scriptoriūs zum Schreiben dienend. *scriptor*, -ōris, *m.* der Schreiber, *scribēre* schreiben. In *calamus scriptorius*, Bezeichnung des hinteren Endes vom Boden der vierten Gehirnkammer, das mit dem zugeschärften Teil einer Schreibfeder verglichen werden kann.

scrobiculus, -i, *m.* die kleine Grube. Deminutiv von *scrob(i)s*, -is, *m.* die Grube. In *scrobiculis cordis* die Herzgrube, womit gelegentlich (unpassenderweise) das Epigastrium (s. d.) bezeichnet wird.

scrōtum, -i, *n.* der Hodensack. Ursprünglich überhaupt ein Sack. Die ältere Form ist *scrautum*. Es bedeutete *scrautum pellicium* einen ledernen Sack, in dem Pfeile aufbewahrt wurden.

scrotālis* zum Hodensack gehörend.

scybalum, -i, *n.* der Kotballen. τὸ σκύβαλον. Meist im Plural (*scybalā*) gebraucht.

scyphus, -i, *m.* der Becher. ὁ σκύφος. Gebraucht für das trichterförmige Ende des Achsenblattes (*lamina modiolii*) in der Schnecke des Gehörgans.

sēbum, -i, *n.* der Talg.

sebacēus* aus Talg bestehend. Wird unrichtigerweise im Sinne von talgbereitend (in *glandula sebacea*) gebraucht.

sebiparus, -a, -um talgbereitend. *parere* hervorbringen.

sectio, -ōnis, *f.* der Schnitt. *secare* schneiden.

secundus der zweite.

sella, -ae, *f.* der Sessel. Verwandt mit *sedere* sitzen.

sellāris zum Sessel, im bes. zur *sella ossis sphenoidis* gehörend.

sēmen, -inis, *n.* der Samen.

seminālis zum Samen gehörend.

seminifer, -ēra, -ērum samentragend. *ferre* tragen.

semi- halb-. Mit *semi-* sind gebildet die Zusammensetzungen:

semicanālis, -is, *m.* der Halbkanal, die Rinne. Richtig ist *canālis*.

semicirculāris halbkreisförmig. Hybrid.

semilunāris halbmondförmig. Dasselbe wird schon durch *lunatus* (oder *lunaris*) ausgedrückt.

semimembranōsus* halbhäutig. In *musc. semimembranosus*, ein Name, der deswegen getadelt werden muss, weil der so bezeichnete Muskel zur Hälfte aponeurotisch ist, *membrana* aber eine zarte Haut bedeutet. Vorzuziehen wäre darum *hemiaponeuroticus*.

semiovalis* halbeiförmig.

- semispinālis*** halb zum Dorn (zu den Dornfortsätzen der Wirbel) gehörend.
- semitendinōsus** halbsehnig. Von dem neulateinischen *tendo* (s. d.) gebildet. Die Griechen sagen: ἡμιτενοντώδης*. ἡμι- halb-, ὁ τένων die Sehne.
- sensitivus** der Empfindung dienend. Falsch gebildet von *sentire*, *sentio*, *sensi*, *sensum*, empfinden. Es müsste *sensivus* heissen.
- sensorius*** der Empfindung dienend. *sentire* empfinden. Vergl. d. vor.
- sensus**, -ūs, *m.* die Empfindung, der Sinn.
- septum** s. *saeptum*.
septulum s. *saeptulum*.
- serotinus** spät auftretend. *sēro* spät.
- serratus** gesägt, gezähnt. *serra*, -ae, *f.* die Säge.
- serum**, -i, *n.* die Molken, gebraucht für Blutflüssigkeit (ohne Faserstoff). *serum articulare* = *smegma articulare* die Gelenkschmiere, kann an Stelle von *synovia* (s. d.) gebraucht werden.
- serosus** reich an Blutflüssigkeit.
- sesamoīdes**, *sesamoideus* sesamähnlich. σησαμοειδής. τὸ σήσαμον die Schotenfrucht der (aus Ägypten und Arabien stammenden) Sesampflanze. In *os sesamoīdes*, plur. *ossa sesamoīde* (ὄσα σησαμοειδή*).
- sesamoīdēus* zum *os sesamoīdes* gehörend.
- sigmoīdes** dem Buchstaben Sigma ähnlich. σιγμοειδής. τὸ σίγμα. Da mit diesem Namen halbmondförmige Gebilde bezeichnet werden, so ist bei ihm nicht an die spätere Form des Sigma (Σ), sondern an die ältere Form (C) zu denken (Hyrtl).
- sigmoīdēus* zu einem sigmaförmigen Organ gehörend.
- simplex**, -icis, einfach.
- sinciput**, -itis, *n.* der Vorderkopf, eigentlich überhaupt ein halber Kopf. *semi* halb, *caput*, -itis, *n.* der Kopf.
- singulāris** einzeln, vereinzelt.
- sinister**, -tra, -trum links, der linke.
- sinus**, -ūs, *m.* die Vertiefung, der Busen In der Anatomie werden, was nicht korrekt ist, auch einzelne geschlossene Kanäle, nämlich die Blutleiter der fibrösen Gehirnhaut, als *sinus* bezeichnet.
- skelēton** s. *sceletum*.

- smegma**, -ātis, *n* die Salbe, Schmiere. τὸ σμηγμα. In der Anatomie gebraucht in *smegma praeputii*, das sich an dem Hals der Eichel des männlichen Gliedes findet und wesentlich aus abgestossenen und verklebten Epithelzellen besteht, und in *smegma articulare* (= *serum articulare* = *synovia*, s. d.) die Gelenkschmiere. σμάξιν abreiben, salben.
- solāris** zur Sonne gehörend, gebraucht für sonnenähnlich. *sol*, -is, *m*. die Sonne.
- solēus**, scil. *musc.*, der breite, sich nach unten verschmälernde Wadenmuskel, der vom *musc. gastrocnemius* bedeckt wird. Gebildet von *solēa* die Seeszunge, aus Gründen der Ähnlichkeit. Der deutsche Name Schollenmuskel ist insofern berechtigt, als die Scholle (*Pleuronectes platessa*) mit der Seeszunge (*Solea vulgaris*) nahe verwandt ist. *solea* ist auch die Sandale, indessen kann dem Muskel weniger Ähnlichkeit mit einer Schuhsohle als einem Plattfische zugesprochen werden. Besser wäre *soleiformis*.
- solitariū** alleinstehend, abgesondert. *solus* allein.
- sordes**, -is, *f*. der Schmutz. *sordes aurium* der Ohrenschmalz.
- sordīpar***, -a, -um, ohrenschmalzbereitend, eigentlich schmutzbereitend. *parēre* hervorbringen.
- spātium**, -ī, *n*. der Raum, Zwischenraum.
- spectans**, -antis, hinzielend, partic. von *spectare* betrachten, nach etwas zielen, gerichtet sein.
- sperma**, -ātis, *n*. der Samen. τὸ σπέρμα, -ατος.
- spermatīcus** zum Samen gehörend. σπερματικός.
- spermatogēnēsis***, -is (auch -ōsis), *f*. die Entwicklung des Samens. Gebildet von τὸ σπέρμα und ἡ γένεσις, -εως die Entstehung.
- spermīum***, -ī, *n*. der Samenfaden (= *spermatosoma*, s. d.). Weiterbildung (Deminutiv) von *sperma*.
- spermatosōma***, -ātis, *n*. das (befruchtende) körperliche Samenelement. Gebildet von τὸ σπέρμα und τὸ σῶμα der Körper.
- spermatozōon***, -i, *n*. das Samentierchen. Bedauerlicherweise noch öfter gebrauchte Bezeichnung der Samenfäden. Gebildet von τὸ ζῶον das Lebende, das Tier. Griechisch: τὸ σπερματοζῶάριον*.
- sphaerīcus** kugelförmig. σφαιρικός. ἡ σφαῖρα die Kugel.
- sphaerōides**, sphaeroideus kugelförmig, rund. σφαιροειδής. ἡ σφαῖρα die Kugel.

sphaeroidēus zu einem kugelartigen Organ gehörend.

sphenoides, sphenoidālis keilförmig. σφηνοειδής. ὁ σφήν, σφηνός der Keil.

sphenoidālis* zum Keilbein gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

sphincter, -ēris, *m.* der Schnürer, der Schnürmuskel, Ringmuskel. ὁ σφιγκτήρ, -ήρος. σφίγγειν zusammenschnüren.

spīna, -ae, *f.* kommt schon bei den Römern in verschiedener Bedeutung vor: der Dorn, das Rückgrat. In der Anatomie pflegt man Rückgrat mit *spina dorsalis* wiederzugeben. In Anlehnung an die zweite Bedeutung von *spina* gab man der *spina scapulae*, dem Schulterblattgrat, den Namen. Vielleicht verwandt mit ὁ σπόνδυλος, der Wirbel, oder mit *spīca*, die Ähre.

spinālis* zum Dorn, Grat, Rückgrat gehörend.

spinātus* wird in Zusammensetzungen (*supra-*, *infraspīnatus*) in derselben Bedeutung wie *spinālis* gebraucht, obgleich es heissen würde: mit einem Dorn oder Grat versehen.

spinōsus eigentlich an Dornen reich, wird aber, was zu verurteilen ist, in derselben Bedeutung wie *spinālis* gebraucht.

spirālis* schlangenförmig gewunden. *spira* die schlangenförmige Windung. ἡ σπείρα. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

splanchnīcus zu den Eingeweiden gehörend. σπλαγγικός. τὸ σπλάγγιον das Eingeweide (meist im Plural gebraucht. τὰ σπλάγγινα).

splanchnolōgīa*, -ae, *f.* die Eingeweidelehre. Gebildet von τὸ σπλάγγιον das Eingeweide, und λέγειν sagen, lehren.

splēn, -ēnis, *m.* die Milz. ὁ σπλήν. -ήνος. Gewöhnlich durch *lien* (s. d.) ersetzt.

splenīcus zur Milz gehörend. σπληνικός. Gewöhnlich durch *lienālis* (s. d.) ersetzt.

splenīum, -ī, *n.* der Wulst. In *splenium corporis callosi* der Balkenwulst des Gehirns. Eigentlich ist *splenium* das Pflaster, der Bausch, auch das Schönheitspflasterchen. τὸ σπληνίον.

splēnīus pflasterförmig. Name eines am Nacken liegenden trapezförmigen Muskels. Der (sprachlich schlechte) Ausdruck *splenīus* stammt aus dem Mittelalter, er könnte mit „milzförmig“ übersetzt werden (s. *splen*), bezeichnet dann aber die Gestalt des Muskels nicht richtig. Griechisch: σπληνοειδής*.

spondylus, -i, *m.* der Wirbel. ὁ σπόνδυλος. Gewöhnlich durch *vertebra* ersetzt.

spongiōsus schwammig, *spongia*, ἡ σπογγία der Schwamm. Hybrid, ist aber bei Celsus u. a. belegt. (Vgl. Einl. S. 6.)

spūrius falsch, untergeschoben. Ursprünglich von illegitimen Kindern.

squāma, -ae, *f.* die Schuppe.

squamālis* zur Schuppe gehörend.

squamātus* mit einer Schuppe versehen.

squamōsus reich an Schuppen, schuppig. Der früher angewandte Ausdruck *pars squamosa ossis temporalis* (eine einzige Schuppe) ist durch *squama temporalis* ersetzt worden, doch braucht man noch mehrfach *squamosus* für: zur Schuppe gehörend. Anstatt *sutura squamosa* ist besser *sutura squamata*.

stapes, -edis, *m.* der Steigbügel, das kleinste der drei Gehörknöchelchen, das einem Steigbügel ähnlich sieht. Das hässliche Wort wurde erst in neuerer Zeit gebildet, nach Du Cange von dem germanischen und dänischen *staf*, Stock, vielleicht auch nur als unüberlegte Zusammensetzung von *stare* stehen, und *pes*, *pedis* der Fuss. Die Alten kannten überhaupt keine Steigbügel. Die Quantität des *e* in der Genitivendung muss unbestimmt bleiben. Vgl. *pedistibulum*.

stapedius zum Steigbügel gehörend. Ebenso hässlich wie *stapes*. Vgl. *pedistibularis*.

staphylīnus zum Zäpfchen gehörend. ἡ σταφυλή die Weintraube, das Zäpfchen. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6). σταφύλιος (mit kurzem ι) heisst: von der Traube stammend. ὁ σταφυλίνος ist ein Pflanzename (unsere Pastinake).

statolithi, -ōrum, *m.* die Gehörsteine (*otolithi*), Gleichgewichtssteinchen. Gebildet von στατός stehend, ὁ λίθος der Stein (Rauber).

stella, -ae, *f.* der Stern.

stellātus mit Sternen besetzt, wird gebraucht für sternförmig.

stelliformis* sternförmig.

sternum, -i, *n.* das Brustbein. τὸ στέρνον. An Stelle des langen Muskelnamens *sternocleidomastoideus* gebraucht Bonnet *sternocleidomasticus*, dessen letzter Teil unmittelbar von μαστός (Brustwarze, hier auf den warzenähnlichen Fortsatz übertragen) abgeleitet ist (vgl. *cleido-* und *mastoideus*).

sternālis* zum Brustbein gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6). Die Griechen sagen: στεινικός*.

stömächus s. *gaster*.

strätum, -i, *n.* das Ausgebreitete, die Decke, das Lager. *sternëre* ausbreiten. *sterno, stravi, stratum*.

striä, -ae, *f.* der Streifen.

striätus mit Streifen versehen.

strōma, -ätis, *n.* wird in der Anatomie für Grundlage, Stützgerüst eines Organs gebraucht. τὸ στρώμα, στρώματος heisst eigentlich das Ausgebreitete, Bettpolster, die Decke. στρωνόναι (= στρονόνα) hinbreiten.

structūra, -ae, *f.* der Bau. *struëre* schichten.

styloïdes, styloideus griffelförmig. στυλοειδής. ὁ στύλος die Säule, dann der Griffel. Für *processus styloides ossis temporalis* wird in Zusammensetzungen *stylo-* gebraucht.

styloidëus zum *processus styloïdes* gehörend.

sub unter. Mit *sub-* sind gebildet die Zusammensetzungen:

subacromiälis unter dem *acromion* (s. d.) liegend. Hybrid.

subanserinus* unter der als *pes anserinus* bezeichneten Sehnenausstrahlung liegend.

subarachnoid(e)älis unter der *meninx arachnoïdes* (s. d.) liegend. Hybrid.

subarcuätus* unter einem Bogengang (dem vorderen des Gehörlabyrinthes) liegend. *arcus*, -üs, *m.* der Bogen. *arcuatus* bogenförmig gekrümmt.

subcallōsus* unter dem Balken des Gehirns (*corpus callosum*) liegend.

subclavius* unter dem Schlüsselbein liegend. *clavis*, -is, *f.* der Schlüssel, hier bildlich für *clavicula* (s. d.) gebraucht.

subcutanëus* unter der Haut liegend. *cütis*, -is, *f.* die Haut. Die Römer gebrauchten *subtercutaneus* (*subter* = *sub*).

subdeltoidëus unter dem *musculus deltoïdes* (s. d.) liegend. Sprachlich schlecht.

subdurälis* unter der fibrösen Gehirnhaut (*meninx dura*) liegend.

subfrontälis* unter der Stirn (*frons*) liegend, gebraucht für: unter dem Stirnlappen des Gehirns liegend.

subhyoidëus unter dem *os hyoïdes* (s. d.) liegend. Sprachlich schlecht.

subicūlum, -i, n. die Unterlage. Verdorben aus *subucula*, -ae, f. das Unterkleid, von dem ungebräuchlichen *subuere* unterziehen.

subinguinālis* unter der Leistengegend (*inguen*) liegend.

sublīmis erhaben. Vielleicht von *sublevare* emporheben. Wird fälschlicherweise in *musc. flexor digitorum sublimis* für hochgelegten gebraucht, richtig ist hier *superficialis* oder *superior*.

sublinguālis* unter der Zunge liegend. *lingua*, -ae, f. die Zunge.

submandibulāris* unter dem Unterkiefer liegend. Vgl. *mandibula*.

submaxillāris* unter dem Kiefer liegend. Die *Glandula submaxillaris* liegt unter dem Unterkiefer und sollte nach v. Bardeleben (*sub*)*mandibularis* heißen. Der Gebrauch der Bezeichnung ist darauf zurückzuführen, dass früher *maxilla* sowohl Ober- wie Unterkiefer bedeutete (vgl. *maxilla*).

submentālis* unter dem Kinn liegend. *mentum*, -i, n. das Kinn.

submucōsus* unter der Schleimhaut (*tunica mucosa*) liegend.

suboccipitālis* unter dem Hinterhaupt (*occiput*) liegend.

subparietālis* unter der Wand (*paries*) liegend, gebraucht für: unter dem *lobus parietalis* des Gehirns liegend.

subscapulāris* unter dem Schulterblatt (*scapula*) liegend.

subserōsus* unter der *tunica serosa* liegend.

substantia, -ae, f. die Substanz. *substare* darunter sein, existieren.

subtemporālis* unter der Schläfe (*tempora*) liegend.

subtendinēus unter der Sehne liegend. Von dem neulateinischen *tendo* (s. d.) abgeleitet.

succus s. *sucus*.

sūcus (besser als *succus*), -i, m. der Saft.

sūdor, -ōris, m. der Schweiß.

sudōrifer (nicht *sudoriferus*!), -ēra, -ērum schweißbringend. *ferre* tragen.

sulcus, -i, m. die Furche.

summus = *supremus* (s. d.).

süperciliūm, -i, *n.* die Augenbraue, eigentlich das über (*super*) dem Augenlid liegende (vgl. *ciliūm*).

süperciliāris* zur Augenbraue gehörend.

süperficiēs, -ēi, *f.* die Oberfläche. *super* über, *facies* die äussere Gestalt. Zur Endung -ēi vgl. Einl. S. 3.

süperficiālis an der Oberfläche liegend.

süpērior, -ōris, weiter oben gelegen, comparat. von *süpērus* oben gelegen.

süpinātor*, -ōris, *m.* der Aufwärtsdreher. Gebildet von *supinare* rücklings beugen, nach oben drehen. Gebrauchte als Bezeichnung eines Muskels, der durch Drehung des Unterarms die Handfläche nach oben richtet. *süpinus* rücklings gebogen, nach oben gerichtet.

supra oberhalb von. Mit *supra-* sind gebildet die Zusammensetzungen:

suprachorioidēus über der *chorioides* (s. d.), scil. *tunica oculi*, liegend. Sprachlich schlecht.

supraclaviculāris* über dem Schlüsselbein (*clavicula*) liegend.

supracondyloidēus über dem Gelenkfortsatz (*processus condyloides*) liegend. Sprachlich schlecht.

supradurālis* auf der *dura meninx* (*spinalis*, der fibrösen Umhüllungshaut des Rückenmarks) liegend. Besser als das hybride *epiduralis*. *durus* hart.

supraglenoidālis über der Gelenkpfanne (*cavitas glenoides*) liegend. Hybrid.

suprahyoidēus über dem Zungenbein (*os hyoides*) liegend. Sprachlich schlecht.

supramarginālis* über dem Rande (*margo*) liegend. Bezeichnung derjenigen Hirnwindung, die das Ende der *fissura cerebri lateralis* umfaßt, also einen dem Rande des Hemisphärenhirns entsprechenden Einschnitt.

supraorbitālis* über der Augenhöhle (*orbita*) liegend.

suprapatellāris* über der Kniescheibe (*patella*) liegend.

suprarenālis* über der Niere (*ren*) liegend.

suprascapulāris* über dem Schulterblatt (*scapula*) liegend.

supraspinālis*, *supraspinātus* über dem Grate (des Schulterblattes) liegend. *spina* der Dorn, der Grat. *supraspinalis* ist dem Namen *supraspinatus* vorzuziehen, vgl. dazu *spinatus*.

suprasternalis über dem Brustbein (*sternum*) liegend. Hybrid.

supratragicus über dem Bock des äusseren Ohres (*tragus*, s. d.) liegend. Hybrid.

supratrochleāris* über der Rolle (*trochlea*) liegend.

supravaginālis* über der Scheide (*vagina*) liegend.

suprēmus (= *summus*) der höchste, superlat. von *superus* oben liegend.

sūra, -ae, f. die Wade.

surālis* zur Wade gehörend.

suspensōrius* zum Aufhängen dienend. *suspendere* aufhängen.

sustentāculum, -i, n. die Stütze. *sustentare* unterstützen.

sutūra, -ae, f. die Naht. *suere* nähen.

sympāthicus*, scil. *nervus*. Name des an den Blutgefässen, dem Darmkanal, dem Urogenitalapparat sich ausbreitenden Nerven. Gebildet in neuerer Zeit von συμπαθείν Mitgefühl haben, σύν mit, τὸ πάθος das Leid. Bei den Griechen heisst συμπαθής in Mitleidenschaft gezogen, συμπαθητικός mitleidig. Die Neueren bezeichnen auch den Nerven mit συμπαθητικός. Die Engländer sprechen von *sympathetic nerve*.

sympḗsis, -is (auch -ῆος), f. die Verwachsung, Vereinigung zweier Knochen. Vorzugsweise gebraucht in *symphysis ossium pubis* die Schambeinfuge. ἢ σύμφυσις. σύν mit, συμφύειν zusammenwachsen lassen.

sŷn- mit-, σύν. *syn-* findet sich in folgenden Zusammensetzungen:

synarthrōsis, -is (auch -ῆος), f. die Verbindung zweier Knochen durch zwischengelagerte Gewebsbestandteile, unter Ausschluss eines wahren Gelenkes (Gegensatz: *diarthrosis*). ἢ συνάρθρωσις. τὸ ἄρθρον das Glied. συναρθρῶειν Glieder zusammenfügen.

synchondrōsis, -is (auch -ῆος), f. die Verbindung zweier Knochen durch Knorpel. ἢ συγχόνδρωσις. ὁ χόνδρος der Knorpel, eigentlich das Korn.

syndesmologīa*, -ae, f. die Bänderlehre. Gebildet von ὁ σύνδεσμος das Band, Verbindungsmittel (δεῖν binden) und λέγειν sagen, lehren.

syndesmōsis*, -is (auch -ῆος), f. die Verbindung zweier Knochen durch zwischengelagertes Bindegewebe. ὁ σύνδεσμος das Band.

synovia, — die Gelenkschmiere. Das Wort wurde von Theophrastus Paracelsus († 1541) frei erfunden, es besitzt keine sprachliche Grundlage. Paracelsus verstand unter *synovia* den Ernährungssaft der Organe, als einen solchen sah er auch die Gelenkschmiere an. Nur zur Bezeichnung dieser wurde der Name *synovia* später beibehalten. Man kann *synovia* ersetzen durch *serum articulare* (griechisch: ἀρθρικός ὑπός) oder *smegma articulare*.

synoviälis zur Gelenkschmiere gehörend. Zu ersetzen durch *serosus*.

systema, -ätis, *n.* das Zusammengestellte, die Gruppe, das System. τὸ σύστημα, συστήματος. συνστάναι zusammenstellen.

T.

tactilis berührbar, wird fälschlicherweise gebraucht für: dem Berühren dienend. *tangere* berühren.

taenia, -ae, *f.* das schmale Band, der Streifen. ἡ ταινία.

talus, -i, *m.* das Sprungbein. Eigentlich der Würfel, zu Würfeln benutzten die Alten die Sprungbeine verschiedener Huftiere, der Name wurde auf das ganz anders gestaltete Sprungbein des Menschen übertragen. Vgl. *astragalus*. Der Plural *tali* bedeutete die Knöchel.

taläris* zum Sprungbein gehörend.

tapetum, -i, *n.* der Teppich, Wandbehang. Gebraucht für die Decke des *recessus posterior* und *inferior* vom Seitenventrikel des Gehirns, sowie als *tapetum nigrum* für die Pigmentschicht der Netzhaut.

tarsus, -i, *m.* 1. die Fusswurzel. 2. die fibröse Platte des Augenlids. ὁ τάρσος, bedeutete ursprünglich überhaupt einen flach ausgebreiteten Gegenstand, und am Fuss wurde unter diesem Namen zunächst der ganze zwischen Knöcheln und Zehen liegende Teil verstanden. Erst im Mittelalter wurden *Mittelfuss*, *metatarsus*, und *tarsus* scharf unterschieden.

tarsälis*, *tarsëus* zur Fusswurzel oder zur Platte des Augenlids gehörend. *tarsälis* ist hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6). Zur Endung -eus in *tarsëus* s. Einl. S. 5. Die Griechen sagen: τάρσατος*.

tectörinus zum Bedecken dienlich. *tector*, -öris, *m.* der Wanddecker, Stuckaturarbeiter. *tëgere* decken.

tegmen, -inis, *n.* und

tegumentum, -i, *n.* die Decke. *tëgere* decken.

tegmentālis* zur Decke gehörend.

tēla, -ae, *f.* das Gewebe, auch gebraucht für Gewebsschicht oder Gewebsblatt. Zusammengezogen aus *texēla*, *texēre* weben.

telencēphālon, -i, *n.* das Endhirn. Gebildet aus τὸ τέλος, -ους das Ende, und *encephalon* (s. d.). Griechisch: ὁ τελικὸς ἐγκέφαλος*. Sprachlich besser ist *acrencephalon* (s. d.).

tempōra, -ōrum, *n.* (plur. von *tempus*, -ōris) die Schläfe.

temporālis zur Schläfe gehörend.

tendo, -inis, *m.* die Sehne. Neulateinisches Wort, gebildet von *tendēre* spannen. Besser wäre *tenon* (s. d.).

tendinēus sehnig. Neulateinisch, kann durch *fibrosus* ersetzt werden.

tendinōsus sehnereich. Neulateinisch, kann durch *fibrosus* ersetzt werden.

tēnon, -ontis, *m.* die Sehne. ὁ τένων.

tensus gespannt. partic. von *tendēre*.

tēnūis, -e, dünn, fein. Verwandt mit *tendēre* spannen, ziehen (in die Länge gezogen).

tēres, -ētis, länglichrund, glattrund (wie z. B. eine Lanze). Verwandt mit *tērere* reiben. Hyrtl tadelt mit Recht, dass das dreikantige Schenkelkopfband als *teres* bezeichnet wird. Besser wäre hierfür *ligamentum triquetrum*.

termīnus, -i, *m.* die Grenze, im Spätlatein auch gebraucht für Ausdruck (Wort).

terminālis zur Grenze gehörend, die Grenze, das Ende bezeichnend. Die Römer nannten Terminalia, plur. *n.*, das zu Ehren des Gottes der Grenzen gefeierte Fest.

tertīus der dritte.

testis, -is, *m.* der Hoden, eigentlich der Zeuge.

testicūlus, -i, *m.* der Hoden. Deminutiv von *testis*.

testiculāris* zum Hoden gehörend.

thālāmus, -i, *m.* (*opticus*) der Sehhügel. ὁ θάλαμος, heisst das Gemach, bezeichnet also einen Hohlraum. Galen glaubte, dass die Sehnerven in näherer Beziehung zum vorderen Winkel der Seitenkammern des Gehirns (ἡ θάλαμη = ὁ θάλαμος) ständen, der Name wurde auf die die Seitenkammern begrenzenden Hügel übertragen, als man die Sehnerven mit diesen in Verbindung brachte.

thalamencēphālon*, -i, *n.* das Thalamushirn, Zwischenhirn. Besser als *diencephalon* (s. d.). Vgl. *thalamus* und *encephalon*.

thalamīcus* zum Sehhügel gehörend.

thēca, -ae, *f.* das Behältnis, die Kapsel. ἡ θήκη.

thēnar, -āris, *n.* der Daumenballen. τὸ θέναρ, -αρος, ursprünglich die Handfläche, mit der man schlägt. θείνειν schlagen.

thōrax, -ācis, *m.* die Brust. ὁ θώραξ, -ακος, ursprünglich der Brustharnisch.

thoracīcus, thoracālis* zur Brust gehörend. θωρακικός, heisst eigentlich brustkrank. *thoracalis* ist hybrid, aber statt- haft (s. Einl. S. 6).

thŷmus, -i, *m.* der Thymus, der drüsenähnliche Körper, der (bei Embryonen und Kindern) hinter dem oberen Teil des Brustbeins und am Halse liegt, bei Tieren als Briesel bezeichnet. ὁ θŷμος, hiess ausserdem der Thymian (Quendel). Nach Hyrtl erklärt sich die anatomische Verwendung des Namens dadurch, dass zwischen dem körnig aussehenden Thymus geschlachteter Tiere und den Blütenköpfchen und Fruchtbüscheln des bei Opfern mitverbrannten Thymians eine gewisse Ähnlichkeit besteht, oder dadurch, dass in der Brust, besonders in dem Herzen, dem der Thymus aufliegt, der Sitz des θυμός (das Gemüt, die Leidenschaften) angenommen wurde. Die zweite Erklärung ist unwahrscheinlich, der verschiedenen Betonung wegen. Sehr oft wird „die Thymus“ gesagt, was zu verurteilen ist.

thymīcus zum Thymus gehörend. θυμικός war den Alten nur in dem Sinne von leidenschaftlich bekannt (als von θυμός abgeleitet).

thŷreoides, thyreoides schildförmig. θυρεοειδής. ὁ θυρεός der lange, viereckige, türähnliche Schild (ἡ θύρα die Tür). *cartilago thyreoides* (der Schildknorpel), wird in Zusammen- setzungen abgekürzt zu *thyreo*.

thyreoidēus zur *cartilago thyreoides* gehörend.

thyreoglōssus von der Schilddrüse (*glandula thyreoides*) zur Zunge ziehend. Vgl. *glotticus*.

tībia, -ae, *f.* das Schienbein. Aus den langen Schienbeinen verschiedener Tiere stellten sich die Römer Pfeifen her, daher *tibia* auch Name einer (beim Blasen sagittal gehaltenen) Flöte oder Pfeife.

tibiālis zum Schienbein gehörend. Die Römer nannten *tibialia*, plur. *n.*, Binden, die um den Unterschenkel gewickelt wurden.

tonsilla, -ae, *f.* die Mandel am Halse, auch gebraucht zur Bezeichnung eines Lappens am Kleinhirn, der mit der Halsmandel eine gewisse Ähnlichkeit besitzt.

tonsillāris* zur Mandel gehörend.

tōrus, -i, *m.* der Wulst.

tōrulus, -i, *m.* das Wülstchen.

trābēcūla, -ae, *f.* das Bälkchen. Deminutiv von *trābes*, -is, *f.* der Balken.

trabeculāris* zum Bälkchen gehörend.

trachēa, -ae, *f.* die Luftröhre. ἡ (ἀρτηρία) τραχεῖα die rauhe Arterie, so genannt im Gegensatz zu ἡ ἀρτηρία λεία die glatte Arterie, die Schlagader. Auch die Schlagadern galten zur Zeit des Aristoteles für lufthaltig. Vgl. *arteria*. τραχός, -εία, -ό rauh, die Luftröhre konnte der in die Wand eingefügten Knorpelhalbringe wegen als rauh bezeichnet werden. *trachēa* erscheint ebenso gut wie das von Hyrtl befürwortete *trachta*. Die Aussprache mit kurzem *e* (*trachēa*) wird von Philologen als möglich bezeichnet.

tracheālis* zur Luftröhre gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

tractus, -ūs, *m.* der Zug, das langgestreckte Organ. *trāhēre* ziehen.

trāgus, -i, *m.* der Bock, die vor der Öffnung des äusseren Gehörganges liegende Erhebung, hinter der, namentlich bei älteren Leuten, ein Haarbüschel sichtbar wird. Auch die Haare dieses Büschels nennt man mit einer gewissen Freiheit *trāgi*. ὁ τράγος der Ziegenbock.

tragicus bocksmässig, zum Bock gehörend. τραγικός, hiess auch zur Tragödie, τραγῳδία (eigentlich Bocksopfergesang, ἡ αἰοδή, ᾠδή der Gesang), gehörend, d. i. tragisch. Anstelle von *musc. tragicus* wäre besser *musc. tragi*.

transitīvus den Übergang vermittelnd. *transire* hinübergehen.

transversus quer verlaufend. *transvertēre* umwenden.

transversālis* zum *processus transversus* oder zum *musculus transversus* gehörend.

transversariūs quer verlaufend, unrichtigerweise gebraucht für: zum *proc. transversus* gehörend.

trapezius trapezförmig (oder tafelförmig). Gebildet von ἡ τράπεζα der Tisch, die Tafel, in der Mathematik das Trapez, ein Viereck mit zwei parallelen und zwei nicht parallelen Seiten. Name des obersten breiten Rückenmuskels, der

besser *musc. trapezoides* heißen würde. Fick bezeichnet, wie es auch früher nach Henle's Vorgang gebräuchlich war, den gewöhnlich *os multangulum majus* genannten Knochen als *os trapezium*.

trapezoides tischförmig, trapezförmig. *τραπεζοειδής*. Früher bei Henle, jetzt bei Fick Name des *os multangulum minus*.

triangulāris dreieckig. *triangulum* das Dreieck. *tres, tria* drei, *angulus* der Winkel.

triceps, -ipītis, dreiköpfig. *tres* drei, *caput, -itis, n.* der Kopf.

tricuspidālis* mit drei Spitzen versehen. Gebildet von *tres* drei, und *cuspis, -idis, f.* die Spitze.

trigēmīnus dreifach, dreimal vorhanden, aber auch — und so in der Anatomie gebraucht — in drei Teile zerlegt. *tres* drei, *geminus* von Geburt doppelt. Hier wird nicht mehr empfunden, dass in *geminus* der Begriff „doppelt“ liegt, somit ist *trigeminus* nicht etwa sechsfach.

trigōnus dreieckig. *τρίγωνος. τρεῖς, τρία* drei, *ἡ γωνία* der Winkel. In *os trigonum*, einem selbständigen *tuberculum laterale* des *processus posterior tali* (Variation).

trigōnum, -i, n. das Dreieck. *τὸ τρίγωνον*.

trīquētrus dreieckig, mit dreieckigem Querschnitt.

tritīcēus weizenkornähnlich. *tritīcum, -i, n.* der Weizen.

trochanter, -ēris, m. der Rollhügel (des Oberschenkelbeins), an dem, oder in dessen Nähe die den Oberschenkel rotierenden Muskeln angreifen. *ὁ τροχαντήρ, -ῆρος. ὁ τρόχος* das Rad. *τροχάζειν = τρέχειν* laufen, rennen.

trochanterīcus* zum Rollhügel gehörend.

trochlēa, -ae, f. die Rolle. Verwandt mit *ἡ τροχίλια* der Zylinder.

trochleāris* in Beziehung zur Rolle stehend.

trochoides, trochoideus radförmig. *τροχοειδής. ὁ τρόχος* das Rad. *τρέχειν* laufen. *articulatio trochoides* das Radgelenk, ein einachsiges Gelenk, bei dem die Drehungsachse parallel der Längsachse des einen der verbundenen Knochen ist bzw. mit ihr zusammenfällt.

trochoidēus zu einem radförmigen Organ gehörend.

truncus, -i, m. der Stamm.

tūba, -ae, f. die Trompete, Tube. War bei den Römern ein gerades Blasinstrument, das am einen Ende sich trichterförmig erweiterte.

tubālis*, tubariūs zur Tube gehörend. Die Römer nannten *tubarius* den Tubenfabrikanten.

tüber, -*öris*, *n.* der Höcker. *tümēre* anschwellen.

tuberälis* zum Höcker gehörend.

tuberculum, -*i*, *n.* der kleine Höcker.

tuberösus reich an Höckern.

tuberositas*, -*ätis*, *f.* die an Höckern reiche Stelle, die Rauigkeit. Oft ist besser *asperitas*.

tübus, -*i*, *m.* die Röhre.

tübulus, -*i*, *m.* das Röhrchen.

tünica, -*ae*, *f.* das Unterkleid, Hemd, in der Anatomie gebraucht für Gewebsschicht.

turbinälis* gewunden. *turbo*, -*önis*, *m.* der Wirbelwind. *turbare* verwirren.

turbinätus gewunden. *partic.* von *turbinare*. Vgl. *turbinalis*.

turcicus türkisch. Neulateinisches Wort. In *sella turcica*, der Türkensattel, die obere Fläche des Keilbeinkörpers, die mit dem türkischen Sattel mit den bedeutenden Erhebungen am vorderen und hinteren Ende verglichen werden kann, = *sella ossis sphenoidis*.

tymphänum, -*i*, *n.* die Trommel, Handpauke, das Tambourin. τὸ τύμπανον.

tympanicus zur Trommel, bezw. *membrana tympani* oder zum *cavum tympani* gehörend. *os tympanicum* wird in Zusammensetzungen zu *tympano-* abgekürzt. τυμπανικός, ist eigentlich jemand, der an Bauchwassersucht leidet, die den Leib einer Trommel ähnlich macht.

U.

ulna, -*ae*, *f.* die Elle, der an der Kleinfingerseite des Unterarms liegende Röhrenknochen. Wurde von den Römern — ausserdem — auch zur Bezeichnung des ganzen Arms gebraucht. Verwandt mit ἡ ὀλένη der Ellenbogen.

ulnāris* zur Elle gehörend.

umbo, -*önis*, *m.* der Buckel (des Schildes). Mit *umbo membranae tympani* sollte nicht, wie es geschieht, der eingezogene Mittelpunkt des Trommelfells bezeichnet werden, sondern nach Hyrtl eher die durch den kurzen Fortsatz des Hammers vorgetriebene Stelle der Membran. Der Mittelpunkt wird besser *umbilicus* genannt.

umbilicus, -*i*, *m.* der Nabel. Wird oft falsch ausgesprochen!

- umbilicaris, umbilicālis*** zum Nabel gehörend. Wegen der Endungen *-aris* und *-alis* vgl. *pulmonaris*.
- uncīnus, -i, m.** (Deminutivform) und
- uncus, -i, m.** der Haken. Verwandt mit ὄγκος der Haken.
- uncinātus** mit (einem) Haken versehen.
- unguis, -is, m.** der Nagel (auch Krallen, Huf).
- unguicūlus, -i, m.** Deminutiv von *unguis*.
- unguiculāris*** zum Nagel gehörend, auch gebraucht für nagelförmig, hufförmig.
- anipennātus** einfach gefiedert. Gebildet von *unus* eins, und *penna, -ae, f.* die Feder. Dasselbe besagt *pennatus*.
- urāchus, -i, m.** der Harngang, der die Blase mit der Allantois verbindet. ὀδραχός. Wahrscheinlich abzuleiten von τὸ ὄδρον der Harn, und χεῖν giessen.
- urēter, -ēris, m.** der Harnleiter. ὀδρητήρ, -ῆρος der Harnlasser, Harnleiter. ὀρέσειν Harn lassen. τὸ ὄδρον der Harn.
- uretericus** zum Harnleiter gehörend. ὀδρητηρικός.
- urēthra, -ae, f.** die Harnröhre. ἡ ὀρήθρα.
- urethrālis*** zur Harnröhre gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).
- urīna, -ae, f.** der Harn.
- urinālis, urinarīus** zum Harn gehörend. *urinari* bedeutete bei den Römern untertauchen.
- urogenitālis*** zum Harn und zur Zeugung gehörend. Gebildet von τὸ ὄδρον der Harn, und *genitalis* (s. d.). In *apparatus urogenitalis*. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).
- uropoēticus*** Harn bereitend. Gebildet von τὸ ὄδρον der Harn und ποιητικός zum Hervorbringen gehörend. ποίσειν machen, bereiten.
- ūtērus, -i, m.** die Gebärmutter.
- uterīnus** zur Gebärmutter gehörend. Hiess bei den Römern: von derselben Mutter stammend.
- utricūlus, -i, m.** Deminutiv von *uter, -tris, m.* der Schlauch.
- utriculāris*** zum *utriculus* (des Gehörlabyrinths) gehörend.
- uvēa, scil. tunica oculi,** die weinbeerenartige Hülle des Augapfels, d. i. *iris, corpus ciliare* und *chorioides* zusammengenommen, identisch mit *tunica vasculosa oculi*. *uvēus* weinbeerenartig, gebildet von *uva, -ae, f.* die Weintraube.
- uvūla*, -ae, f.** das Zäpfchen. Gebildet als Deminutiv von *uva, -ae, f.* die Weintraube.

V.

vācūs leer.

vagīna, -ae, *f.* die weibliche Scheide, eigentlich die Scheide des Schwertes.

vaginālis* zur Scheide gehörend.

vāgus umherschweifend. Bezeichnung des heute als zehnter gezählten Gehirnnerven, des Lungenmagennerven, die er wegen der weiten Ausdehnung der von ihm durchlaufenen Strecke erhielt (obschon bei ihm der in *vagus* liegende Begriff des Unstäten, Ungewissen nicht passt). *vagari* umherschweifen.

vallātus mit einem Wall umgeben. *vallum*, -i, *n.* der Wall.

vallēcūla, -ae, *f.* das Tälchen. Die Einsenkungen zwischen Zunge und Kehledeckel, sowie mehrere Einsenkungen am Gehirn führen diesen Namen, *valles*, -is, *f.* das Tal.

valvūla, -ae, *f.* die Klappe. Deminutiv von *valvae*, -arum, *f.* (nur im Plural vorkommend) die Türflügel, Doppeltür. Vielleicht verwandt mit *volvĕre* wälzen.

vās, *vāsis*, *n.* das Gefäss.

vasculōsus* gefässreich. Gebildet von *vasculum*, -i, *n.* Deminutiv von *vas*.

vastus ungeheuer gross, öde und wüst. (Nicht sehr geschickt gewählter) Name dreier Streckmuskeln des Unterschenkels. Hyrtl schlägt vor, sie als die drei kurzen Köpfe eines *musc. extensor cruris quadriceps* (innerer, mittlerer und äusserer) zu bezeichnen, dessen langer Kopf durch den *musc. rectus femoris* dargestellt wird.

vĕlum, -i, *n.* das Segel.

vĕna, -ae, *f.* die Vene, sog. Blutader, die das Blut zum Herzen führt. Die Römer bezeichneten als *venae* auch die Schlagadern.

venōsus venenreich, auch gebraucht für: zur Vene gehörend.

venūla, -ae, *f.* die kleine Vene.

venter, -tris, *m.* der Bauch.

ventrālis zum Bauch gehörend, bauchwärts.

ventricūlus, -i, *m.* 1. der Magen. 2. (mit oder ohne *cordis*) die Herzkammer. 3. als *ventriculus laryngis* die taschenförmige seitliche Ausstülpung des Kehlkopfraumes. 4. die Gehirnkammer.

ventriculāris* zum Magen oder zur Herzkammer oder zum *ventriculus laryngis* oder zur Gehirnkammer gehörend.

vermis, -is, *m.* der Wurm. Gebraucht für den mittleren, die beiden Hemisphären verbindenden Abschnitt des Kleinhirns. Verwandt mit *vertēre* drehen, wenden.

vermiformis* wurmförmig.

vernix, -icis, *f.* entspricht unserem Firniss. Neulateinisches Wort, vielleicht verwandt zu denken mit *vitrum*, -i, *n.* das Glas. In *vernix caseosa* der schmierige, aus Epithelzellen und Talgdrüsensekret bestehende Hautbelag der Neugeborenen.

vertēbra, -ae, *f.* der Wirbel, ursprünglich das Gelenk. Verwandt mit *vertēre* drehen.

vertebrālis* zum Wirbel gehörend.

vertex, -icis, *m.* der Scheitel, eigentlich der Wirbel, dann Haarwirbel des Hauptes. *vertēre* drehen.

verticālis scheidelrecht, senkrecht.

vesīca, -ae, *f.* die Blase, Harnblase. Besonders in Zusammensetzungen hört man oft Betonungsfehler.

vesicālis zur Blase gehörend.

vesicūla, -ae, *f.* das Bläschen.

vesiculāris* zum Bläschen gehörend.

vesiculōsus reich an Bläschen, auch gebraucht für bläschenförmig.

vestibūlum, -i, *n.* der Vorplatz, Vorhof, Vorraum. Vielleicht (als Kleiderablage) verwandt mit *vestis*, -is, *f.* das Kleid (Hyrtl) oder mit *Vesta*, Göttin des häuslichen Herdes.

vestibulāris* zum Vorhof gehörend.

vibrissae, -arum, *f.* die Nasenhaare. Verwandt mit *vibrare* zittern, schnurren. Nach Hyrtl möglicherweise zuerst für die Schnurrhaare der Katzen gebraucht, und dann auf die Nasenhaare des Menschen übertragen.

villus, -i, *m.* das zottige Haar, die Zotte. Verwandt mit *pilus*, -i, *m.* das Haar.

villōsus zottenreich, zottig.

vincūlum, -i, *n.* das Band, die Fessel. *vincire* binden, fesseln.

virīlis, -e, zum Manne gehörend, männlich. *vir*, *vīri*, *m.* der Mann.

viscus, -ëris, *n.* das Eingeweide. Gewöhnlich im Plural gebraucht: *viscëra*, -ërum.

viscerälis zu den Eingeweiden gehörend.

visus, -üs, *m.* das Sehen, Gesicht (als Vermögen). *videre* sehen.

vita, -ae, *f.* das Leben. In *arbor vitae* (*cerebelli*). *vivere* leben.

vitellus, -i, *m.* der Eidotter, ursprünglich das Kälbchen (Liebosungswort), Deminutiv von *vitulus*, -i, *m.* das Kalb.

vitellinus zum Dotter gehörend. Hiess bei den Römern nur: vom Kalb stammend. Wird oft falsch ausgesprochen!

vitreus gläsern, glasartig. *vitrum*, -i, *n.* das Glas.

vocälis Stimme habend, tönend. *vox*, *vöcis*, *f.* die Stimme.

völa, -ae, *f.* die Hohlhand. Hiess auch der Hohlfuss, ferner wurde mit *vola* der mittlere Teil des Vogelflügels bezeichnet, so dass man geglaubt hat, *vola* von *volare* (fliegen) ableiten zu können.

voläris* zur Hohlhand gehörend, auf der Seite der Hohlhand liegend.

vömer, -ëris, *m.* die Pflugschar, das Pflugeisen. Als *vomer* wird ein (zur Nasenscheidewand gehörender) verschoben vierseitiger Knochen bezeichnet, der sich an seinem oberen Rande in zwei seitlich umgebogene Plättchen (*alae*) spaltet. Soll mit *vömere*, sich erbrechen, verwandt sein (die Pflugschar wirft die Erde aus), obgleich, was befremdet, die Quantität des *o* in beiden Wörtern verschieden ist.

vortex. -icis, *m.* = *vertex* (s. d., *vortex* ist die ältere Form) der Wirbel, Strudel. Man hat sich in der Anatomie daran gewöhnt, *vortex* im besonderen für die Haarwirbel (*vortices pilorum*) anzuwenden.

vorticösus strudelreich, strudelartig. In den *venae vorticosae* der *tunica vasculosa oculi*.

vulva, -ae, *f.* die äusseren weiblichen Geschlechtsteile. In diesem Sinne erst im Spätlatein gebraucht, ursprünglich war *vulva* die Gebärmutter bei Menschen und bei Tieren. Verwandt mit *volvere* rollen.

X.

xiphoides, xiphoides schwertförmig. ξιφοειδής. τὸ ξίφος, -ος das Schwert, das Schlachtschwert mit gerader Klinge. Der *processus xiphoides* des Brustbeins erscheint als eine recht kleine Schwertklinge, zu der *corpus* und *manubrium sterni* zusammen als Griff gelten müssen.

xiphoidëus zum Schwertfortsatz des Brustbeins gehörend.

Z.

zōna, -ae, *f.* der Gürtel. ἡ ζώνη. Mit dem pleonastischen *zona orbicularis* wird die ringförmige fibröse Schicht der Hüftgelenkkapsel bezeichnet. ζωνόναι gürtlen.

zonālis zum Gürtel gehörend, gürtelförmig. Wurde bei den Alten auf die Himmelszonen bezogen. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

zōnūla, -ae, *f.* der kleine Gürtel. Hybrid, ist aber bei Catull belegt (s. Einl. S. 6).

zonulāris* zur *zonula (ciliaris)*, dem Haftbändchen der Linse gehörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

zygomaticus* zum Jochbogen, der Stirn- und Schläfenbein miteinander verbindet, gehörend. ζυγωματικός*. τὸ ζύγωμα, ζυγώματος der Jochbogen. Für *os zygomaticum* wird in Zusammensetzungen *zygomatico-* gebraucht. τὸ ζυγόν das Joch, das um den Nacken der Zugtiere gelegt wurde. ζευγόναι zusammenjochen.



Anhang: Biographische Notizen.

- Aranzi**, Giulio Cesare. 1530—1589. Professor der Medizin und Anatomie in Bologna. — Ductus venosus (Arantii). Ligamentum venosum [Arantii]. Noduli valvularum semilunarium [Arantii].
- Arnold**, Friedrich. 1803—1890. Professor der Anatomie und Physiologie in Heidelberg. — Substantia reticularis alba [Arnoldi].
- Auerbach**, Leopold. 1828—1897. Arzt in Breslau. — Plexus myentericus [Auerbachi].
- Bartholin**, Caspar. 1655—1738. Professor der Physik und Medizin, später General-Prokureur in Kopenhagen, Sohn des Anatomen Thomas B. — Ductus sublingualis major [Bartholini]. Glandula vestibularis major [Bartholini].
- Bauhin**, J. Caspar. 1560—1624. Professor der Anatomie in Basel. — Valvula coli [Bauhini].
- Bertin**, Exupère-Joseph. 1712—1781. Arzt in Reims und Paris. — Columnae renales [Bertini].
- Blandin**, Philippe-Frédéric. 1798—1849. Chirurg in Paris. — Glandula lingualis anterior [Blandini, Nuhni].
- Botallo**, Leonardo. 16. Jahrh. (geb. 1530). Anatom und Wundarzt, Leibarzt Heinrichs III. von Frankreich. — Ductus arteriosus [Botalli].
- Bowman**, William. 1816—1892. Professor der Anatomie und Physiologie, Wundarzt, Augenarzt in London. — Lamina elastica anterior [Bowmani].
- Breschet**, Gilbert. 1784—1860. Chef der anatomischen Arbeiten in Paris. — Canales diploici [Brescheti].
- Broca**, Paul. 1824—1880. Anthropologe, Professor der Chirurgie in Paris. Entdeckte das Sprachzentrum. — Area parolfactoria [Brocae].

- Brücke**, Ernst Wilhelm Ritter von. 1819—1892. Professor der Physiologie in Königsberg, der Physiologie und mikroskopischen Anatomie in Wien. — *Fibrae meridionales musc. ciliaris* [Bruecke].
- Brunner**, Johann Konrad. 1653—1727. Professor in Heidelberg, Leibarzt des Kurfürsten von der Pfalz. — *Glandulae duodenales* [Brunner].
- Burdach**, Karl Friedrich. 1776—1847. Professor der Anatomie in Dorpat und Königsberg. — *Fasciculus cuneatus* [Burdachi].
- Celsus**, Aulus Cornelius. Lebte zur Zeit des Tiberius. Gelehrter. Sein Werk „*De medicina libri VIII*“ enthält einen grossen Teil der heute gebrauchten lateinischen Kunstdrucke der Anatomie.
- Chopart**, François. 1743—1795. Chirurg in Paris. — *Articulatio tarsi transversa* [Choparti].
- Civinini**, Filippo. † 1844. Professor der chirurgischen Pathologie und Anatomie in Pistoja. — *Processus pterygospinalis* [Civinini].
- Clarke**, Jacob Augustus Lockhart. 1817—1880. Arzt in Pimlico und London. — *Nucleus dorsalis columnae griseae posterioris* [Stillingi, Clarkii].
- Cloquet**, Jules-Germain. 1790—1883. Professor der Anatomie und Chirurgie in Paris. — *Saeptum femorale* [Cloquet].
- Colles**, Abraham. 1773—1843. Professor der Anatomie und Chirurgie in Dublin. — *Ligamentum inguinale reflexum* [Collesi].
- Cooper**, Astley Paston. 1768—1841. Leibwundarzt des Königs Georg IV. von England, Leibarzt der Königin Victoria von England. — *Fascia cremasterica* [Cooper].
- Corti**, Marchese Alfonso. 1822—1876. Prosektor Hyrtl in Wien (1848); war sodann wissenschaftlich tätig in Würzburg, Utrecht, Turin; lebte später in seiner Villa bei Casteggio, wo er sich dem Weinbau widmete. 1851 erschien seine Arbeit über das Gehörorgan der Säugetiere. — *Organon spirale* [Cortii].
- Cowper**, William. 1666—1709. Anatom und Chirurg in London. — *Glandula bulbourethralis* [Cowperi].
- Darwin**, Charles Robert. 1809—1882. Berühmter englischer Naturforscher, lebte auf einem Landsitz in Kent. 1859 erschien sein Werk „*On the origin of species by means of natural selection*.“ — *Tuberculum auriculae* [Darwini]. *Apex auriculae* [Darwini].
- Demours**, Pierre. 1702—1795. Augenarzt in Paris. — *Lamina elastica posterior* [Demoursi, Descemeti].

- Descemet, Jean.** 1732—1810. Arzt in Paris. — Lamina elastica posterior [Demoursi, Descemeti].
- Douglas, James.** 1675—1742. Arzt in London. — Linea semicircularis [Douglasi]. Plica rectouterina [Douglasi]. Excavatio rectouterina [Douglasi].
- Eustachi, Bartolomeo.** † 1574. Päpstlicher Leibarzt und Professor der Medizin in Rom. — Valvula venae cavae inferioris [Eustachii]. Tuba auditiva [Eustachii].
- Fallopia, Gabriele.** (latinisiert Falloppius). 1523—1562. Anatom und Chirurg in Ferrara, Pisa und Padua. — Canalis facialis [Falloppii]. Tuba uterina [Falloppii].
- Ferrein, Antoine.** 1692—1769. Professor der Anatomie und Chirurgie in Paris. — Pars radiata lobulorum corticalium renis [Processus Ferreini].
- Flechsigt, Paul Emil.** 1847—1929. Professor der Psychiatrie in Leipzig. — Fasciculus anterior (und lateralis) proprius [Flechsigt]
- Folius (Folli), Cecilio.** Erste Hälfte des 17. Jahrh. (geb. 1615). Anatom in Venedig. — Processus anterior mallei [Folii].
- Fontana, Felice.** 1720—1805. Professor in Pisa, später in Florenz. — Spatia anguli iridis [Fontanae].
- Galenos, Claudius** aus Pergamon. 131—201 n. Chr. Berühmter Arzt und medizinischer Schriftsteller. Meist in Rom. Die anatomischen Kunstausrücke seiner (griechischen) Schriften sind zum grossen Teil heute im Gebrauch. — Vena cerebri magna [Galenii].
- Gartner, Benjamin.** 1790—1834. Arzt auf St. Thomas und in Kopenhagen. — Ductus epoophori longitudinalis [Gartneri].
- Gasser, Johann Laurenz.** Mitte des 18. Jahrh. Professor der Anatomie in Wien. — Ganglion semilunare [Gasseri].
- Gimbernat, Antonio de.** Ende des 18. Jahrh. Anatom in Barcelona, dann Chirurg in Madrid. — Ligamentum lacunare [Gimbernati].
- Glaser, Johann Heinrich.** 1629—1675. Professor der Anatomie und Botanik in Basel. — Fissura petrotympanica [Glaseri].
- Glisson, Francis.** 1597—1677. Professor der Anatomie in Cambridge, dann Arzt in London. — Capsula fibrosa hepatis [Glissoni].
- Goll, Friedrich.** 1829—1903. Arzt und Professor der Arzneimittellehre in Zürich. — Fasciculus gracilis [Golli].

- Gowers, William Richard.** 1845—1915. Arzt und Professor der klinischen Medizin in London. — Fasciculus anterolateralis superficialis [Gowersi].
- Graaf, Regnier de.** 1641—1673. Arzt in Paris und Delft. Die Eierstocksfollikel, die er entdeckte, hielt er für Eier. — Folliculi oophori vesiculosi [Graafi].
- Gratiolet, Louis-Pierre.** 1815—1865. Lehrte Anatomie, Physiologie und Zoologie in Paris. — Radiatio occipitohalamica [Gratioleti].
- Gudden, Bernhard von.** 1824—1886. Professor der Psychiatrie in Zürich und in München. — Commissura inferior [Guddeni].
- Haller, Albrecht von.** 1708—1777. Naturforscher und Dichter. Lebte in Göttingen und Bern. — Arcus lumbocostalis medialis (und lateralis) [Halleri]. Rete testis [Halleri]. Circulus vasculosus nervi optici [Halleri].
- Hasner, Joseph Ritter von Artha.** 1819—1892. Professor der Augenheilkunde in Prag. — Plica lacrimalis [Hasneri].
- Heister, Lorenz.** 1683—1758. Professor der Anatomie und Chirurgie in Altdorf, der Chirurgie in Helmstädt. — Valvula spiralis [Heisteri].
- Hensen, Victor** 1835—1924. Professor der Physiologie in Kiel. — Ductus reuniens [Henseni].
- Hesselbach, Adam Kaspar.** 1788—1856. Professor der Chirurgie und Oberwundarzt in Bamberg. Sohn des Anatomen Franz Kaspar H. — Ligamentum interfoveolare [Hesselbachi].
- Highmore, Nathanael.** 1613—1685. Arzt in Shrewsbury. — Sinus maxillaris [Highmori]. Mediastinum testis [Corpus Highmori].
- Horner, William Edmonds.** 1793—1853. Professor der Anatomie in Philadelphia. — Pars lacrimalis musc. orbicularis oculi [Horneri].
- Hunter, John.** 1728—1793. Bedeutender Chirurg in London. — Canalis adductorius [Hunteri]. Gubernaculum testis [Hunteri]. — Auch William Hunter (1718—1783), der Bruder von John H., war bedeutend als Arzt und Anatom.
- Jacobson, Ludwig Levin.** 1783—1843. Arzt in Kopenhagen, später Militärarzt bei französischen und englischen Armeen. — Organon vomeronasale [Jacobsoni]. Cartilago vomeronasalis [Jacobsoni]. Plexus tympanicus [Jacobsoni].
- Jung, Karl Gustav.** 1793—1864. Professor der Anatomie in Basel. — Musculus pyramidalis auriculae [Jungi].

- Kerckring**, Theodor. 1640—1693. Arzt in Amsterdam, später im Dienst des Herzogs von Toscana. — Plicae circulares [Kerckringi].
- Krause**, Wilhelm. 1833—1910. Professor der Anatomie in Göttingen und Berlin. Sohn des Anatomen C. F. Th. Kr. — Glandulae mucosae conjunctivae [Krausei]. Corpuscula bulboidea [Krausei].
- Lauth**, Ernest-Alexandre. 1803—1837. Professor der Physiologie in Strassburg. — Sinus venosus sclerae [Schlemmi, Lauthi].
- Lieberkühn**, Johann Nathanael. 1711—1756. Arzt in Berlin. — Glandulae intestinales [Lieberkuehni].
- Lientaud**, Joseph. 1703—1780. Arzt in Aix, später Leibarzt Ludwigs XV. und Ludwigs XVI. in Paris. — Trigonum vesicae [Lientaudi].
- Lisfranc**, Jacques. 1790—1847. Chirurg in Paris. — Tuberculum musculi scaleni anterioris [Lisfranci]. Articulationes tarsometatarsae [Lisfranci].
- Littre**, Alexis. 1658—1726. Anatom und Chirurg in Paris. — Glandulae urethrales [Littrei].
- Lower**, Richard. 1631—1691. Arzt und Anatom in London. — Tuberculum intervenale [Loweri].
- Luys**, Jules-Bernard. 1828—1897. Arzt in Paris. — Nucleus hypothalamicus [Corpus Luysi].
- Magendie**, François. 1783—1855. Physiologe, Professor der Medizin in Paris. — Apertura mediana ventriculi quarti [Magendii].
- Maissiat**, Jacques-Henri. 1805—1878. Professor in Paris, Conservateur der Sammlungen der Ecole de Médecine. — Tractus iliotibialis [Maissiat].
- Malpighi**, Marcello. 1628—1694. Professor der Medizin in Rom, Leibarzt des Papstes Innocenz XII. — Noduli lymphares lienales [Malpighii]. Pyramides renales [Malpighii]. Corpuscula renis [Malpighii]. Stratum germinativum [Malpighii].
- Marshall**, John. 1818—1891. Professor der Anatomie und der Chirurgie in London. — Vena obliqua atrii sinistri [Marshalli].
- Meibom**, Heinrich. 1638—1700. Professor der Medizin (auch der Geschichte und Poesie) in Helmstädt. — Glandulae tarsales [Meibomi].
- Meissner**, Georg. 1829—1905. Professor der Anatomie und Physiologie in Basel, der Physiologie und Zoologie in Freiburg, der Physiologie in Göttingen. — Plexus submucosus [Meissneri]. Corpuscula tactus [Meissneri].

- Meynert, Theodor.** 1833—1892. Professor der Psychiatrie in Wien. — Fasciculus retroflexus [Meynerti]. Commissura superior [Meynerti].
- Moll, Jacob Anton.** 19. Jahrh. Arzt in Utrecht. Schrieb 1857 seine Dissertation, sowie eine holländische und deutsche Arbeit über Anatomie und Physiologie der Augenlieder. — Glandulae ciliaris [Molli].
- Monro, Alexander.** 1773—1859. Professor der Anatomie und Chirurgie in Edinburg. — Foramen interventriculare [Monroi]. Sulcus hypothalamicus [Monroi].
- Montgomery, William Fetherston.** 1797—1859. Geburtshelfer in Dublin. — Glandulae areolares [Montgomerii].
- Morgagni, Giovanni Battista.** 1682—1771. Professor der Anatomie in Padua. — Columnae rectales [Morgagnii]. Ventritulus laringis [Morgagnii]. Appendix testis [Morgagnii]. Lacunae urethrales [Morgagnii] Appendices vesiculosae epophori [Morgagnii].
- Müller, Heinrich.** 1820—1864. Professor der Anatomie in Würzburg. — Fibrae circulares musc. ciliaris [Muelleri].
- Müller, Johannes.** 1801—1858. Professor der Anatomie und Physiologie in Berlin. — Ductus parureterius primordialis [Muelleri].
- Nuhn, Anton.** 1814—1889. Professor der Anatomie in Heidelberg. Glandula lingualis anterior [Blandini, Nuhni].
- Pacchioni, Antonio.** 1665—1726. Anatom in Rom. — Foveolae granulares [Pacchionii]. Granulationes arachnoidales [Pacchionii].
- Pacini, Filippo.** 1812—1883. Professor der Anatomie in Florenz. Corpuscula lamellosa [Vateri, Pacinii].
- Petit, Jean-Louis.** 1674—1760. Chirurg in Paris. — Trigonum lumbale [Petiti].
- Peyer, Johann Konrad.** 1653—1712. Professor der Rhetorik, Logik und Physik in Schaffhausen. — Noduli lymphares aggregati [Peyeri].
- Poupart, François.** 1616—1708. Arzt in Paris. — Ligamentum inguinale [Poupartii].
- Purkinje, Johannes Evangelista.** 1787—1869. Professor der Physiologie und Pathologie in Breslau, der Physiologie in Prag. — Stratum gangliosum cerebelli [Purkinjei].
- Reil, Johann Christian.** 1759—1813. Professor der Medizin in Halle und Berlin. — Insula [Reili].

- Reissner**, Ernst. 1824—1878. Professor der Anatomie in Dorpat. — Membrana vestibularis [Reissneri].
- Rivinus (Bachmann)**, Augustus Quirinus 1652—1723. Professor der Physiologie und Botanik in Leipzig. Von ihm stammt die oft wiederholte falsche Behauptung, dass das Trommelfell in seinem oberen Teile in der Gegend der Incisura tympanica des äusseren Gehörganges regelmässig durchbohrt sei. — Incisura tympanica.
- Rolando**, Luigi. 1773—1831. Leibarzt des Königs Victor Emmanuel von Sardinien, Professor der Medizin in Sassari, der Anatomie in Turin. — Substantia gelatinosa [Rolandi]. Sulcus centralis [Rolandi].
- Rosenmüller**, Johann Christian. 1771—1820. Professor der Anatomie in Leipzig. — Recessus pharyngeus [Rosenmuelleri].
- Rosenthal**, Friedrich Christian. 1780—1829. Professor der Anatomie und Physiologie in Greifswald. — Vena basialis [Rosenthali].
- Santorini**, Giovanni Domenico. 1681—1737. Professor der Anatomie und Arzt in Venedig. — Papilla duodeni [Santorini]. Ductus pancreaticus accessorius [Santorini]. Concha nasalis suprema [Santorini]. Cartilago corniculata [Santorini]. Tuberculum corniculatum [Santorini]. Incisura cartilaginis meatus acustici externi [Santorini].
- Sappey**, Marie-Philibert-Constant. 1810—1896 Professor der Anatomie in Paris. — Venae parumbilicales [Sappeyi].
- Scarpa**, Antonio. 1752—1832. Professor der Anatomie in Modena und Pavia, Wundarzt Napoleons. — Trigonum femorale [Scarpae]. Nervus nasopalatinus [Scarpae].
- Schlemm**, Friedrich. 1795—1858. Professor der Anatomie in Berlin. Sinus venosus sclerae [Schlemmi, Lauthi].
- Spigelius (van den Spieghel)**, Adriaan. 1573—1625. Professor der Anatomie und Chirurgie in Padua. — Lobus caudatus [Spigeli]. Linea semilunaris [Spigeli].
- Steno**, Nicolaus (Niels **Stensen**). 1638—1686. War Arzt, Professor, Erzieher, Priester, lebte in Florenz, Kopenhagen, Hannover, Münster, Hamburg, Schwerin. Ductus parotidis [Stenonis].
- Stilling**, Benedict. 1810—1879. Anatom und Chirurg in Cassel und Wien. — Nucleus dorsalis columnae griseae posterioris [Stillingi, Clarkii].
- Silvius (De la Boë)**, Franciscus. 1614—1672. Arzt in Amsterdam, Professor in Leyden. — Aquaeductus cerebri

[Sylvii]. Fossa cerebri lateralis [Sylvii]. Fissura cerebri lateralis [Sylvii]. — Erwähnung verdient als Lehrer Vesals noch ein anderer Sylvius (Dubois), Jacob. 1478—1555. Anatom in Paris.

Tarin, Pierre. 1725(?)—1761. Anatom in Paris. — Fossa interpeduncularis [Tarini].

Tenon, Jacques-René. 1724—1816. Chirurg und Augenarzt in Paris. — Fascia bulbi [Tenoni]. Spatium interfasciale [Tenoni].

Thebesius, Adam Christian, geb. Ende des 17. Jahrh. Arzt in Hirschberg in Schlesien. — Valvula sinus coronarii [Thebesii]. Foramina venarum minimarum [Thebesii].

Valsalva, Antonio. 1666—1723. Wundarzt, Professor der Anatomie in Bologna. — Sinus aortae [Valsalvae]. Ligamenta auricularia [Valsalvae].

Varolio, Costanzo. 1543—1575. Professor der Anatomie und Chirurgie in Bologna, Professor in Rom, Leibarzt Gregors XIII. — Pons [Varoli].

Vater, Abraham. 1684—1751. Professor der Anatomie in Wittenberg. — Corpuscula lamellosa [Vateri, Pacinii].

Vesalius, Andreas. 1514—1564. Professor der Anatomie in Padua, Pisa, Bologna und Basel, Leibarzt Karls V. und Philipps II. Restaurator der Anatomie. Veröffentlichte 1543 „De humani corporis fabrica libri septem“.

Vicq d'Azyr, Félix. 1748—1794. Naturforscher in Paris. — Fasciculus thalamomamillaris [Vicq d'Azyri].

Vidius, Vidus (Guido Guidi). Anfang des 16. Jahrh. — 1569. Arzt am Hofe Franz I. von Frankreich, dann Professor der Philosophie und Medizin in Pisa. — Canalis pterygoideus [Vidii].

Vieussens, Raymond de. 1641—1716. Arzt in Montpellier, zeitweise in Paris. — Limbus fossae ovalis [Vieussenii]. Ansa subclavia [Vieussenii].

Wharton, Thomas. 1610—1673. Arzt in London. — Ductus submaxillaris [Whartoni].

Willis, Thomas. 1622—1675. Professor der Naturphilosophie in Oxford, Arzt in London. — Circulus arteriosus [Willisi].

Winslow, Jacob Benignus. 1669—1760. Professor der Anatomie in Paris. — Processus uncinatus pancreatis [Pancreas Winslowi]. Foramen epiploicum [Winslowi].

Wirsung, Johann Georg. † 1643. Prosektor in Padua. Wird oft fälschlich Wirsung geschrieben. — Ductus pancreaticus.

- Wolff**, Kaspar Friedrich. 1733—1794. Anatom und Physiologe in Petersburg. Schrieb 1759 die Dissertation „Theoria generationis“, die den Gedanken der Epigenesis begründete und so für die Entwicklungslehre wichtig wurde. — Ren primordialis [Corpus Wolffii]. Ureter primordialis [Ductus Wolffii].
- Wrisberg**, Heinrich August. 1739—1808. Professor der Anatomie in Göttingen. — Cartilago cuneiformis [Wrisbergi]. Tuberculum cuneiforme [Wrisbergi]. Ganglion cardiacum [Wrisbergi].
- Zinn**, Johann Gottfried. 1727—1759. Professor der Medizin und Direktor des Botanischen Gartens in Göttingen. — Zonula ciliaris [Zinni]. Anulus fibrosus communis [Zinni].
-