

ENCYKLOPÄDIE
DER
MATHEMATISCHEN
WISSENSCHAFTEN
MIT EINSCHLUSS IHRER ANWENDUNGEN

ZWEITER BAND IN DREI TEILEN

ANALYSIS

REDIGIERT VON

H. BURKHARDT † (1896—1914)

M. WIRTINGER IN WIEN (1905—1912)

R. FRICKE IN BRAUNSCHWEIG

UND

E. HILB IN WÜRZBURG

DRITTER TEIL

ERSTE HÄLFTE



Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

1909—1921

ENCYKLOPÄDIE
DER
MATHEMATISCHEN
WISSENSCHAFTEN
MIT EINSCHLUSS IHRER ANWENDUNGEN

ZWEITER BAND IN DREI TEILEN

ANALYSIS

REDIGIERT VON

H. BURKHARDT † (1896–1914)

M. WIRTINGER IN WIEN (1905–1912)

R. FRICKE IN BRAUNSCHWEIG

UND

E. HILB IN WÜRZBURG

DRITTER TEIL

ERSTE HÄLFTE



Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

1909—1921

ISBN 978-3-663-15459-4 ISBN 978-3-663-16030-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-16030-4

Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1921

ALLE RECHTE, EINSCHLIESSLICH DES ÜBERSETZUNGSRECHTS, VORBEHALTEN

ENCYKLOPÄDIE
DER
MATHEMATISCHEN
WISSENSCHAFTEN
MIT EINSCHLUSS IHRER ANWENDUNGEN

ZWEITER BAND:
ANALYSIS

Inhaltsverzeichnis zu Band II, 3. Teil, 1. Hälfte.

C. Nachträge.

1. Algebraische Analysis. Von ALFRED PRINGSHEIM in München und GEORG FABER in Karlsruhe, jetzt in München.

	Seite
Einleitung: Historisches	3
1. Potenzreihen. Der Konvergenzkreis	4
2. Verhalten von Potenzreihen auf dem Konvergenzkreise	9
3. Weitere Fundamenteigenschaften von Potenzreihen	11
4. Rationale Funktionen und rekurrente Reihen	16
5. Der allgemeine binomische Satz	20
6. Die Exponentialreihe	25
7. Der natürliche Logarithmus und die allgemeine Potenz	27
8. Die logarithmische Reihe	29
9. Die Berechnung der Logarithmen	32
10. Die Funktionen $\sin x$ und $\cos x$	33
11. Die zyklometrischen Funktionen	37
12. Unendliche Produkte für $\sin x$ und $\cos x$	40
13. Partialbruchreihen für $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cot} x$, $\operatorname{cosec} x$, $\operatorname{sec} x$	42
14. Potenzreihen für $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cot} x$, $\operatorname{cosec} x$, $\operatorname{sec} x$, $\lg \frac{\sin x}{x}$, $\lg \cos x$	44
15. Die hypergeometrische Reihe	45

(Abgeschlossen im November 1908.)

2. Numerische und graphische Quadratur und Integration gewöhnlicher und partieller Differentialgleichungen. Von C. RUNGE in Göttingen und FR. A. WILLERS in Charlottenburg.

I. Numerische und graphische Quadratur.

1. Allgemeines	50
2. Methoden, die gegebene Abszissen verwenden	53
a) Allgemeines	53
b) Formeln von Newton-Cotes	55
c) Formeln von Mac Laurin	57
3. Methode von Gauß	58
a) Bestimmung der Abszissen	58
b) Die Koeffizienten	64
c) Fehlerabschätzung	66
4. Spezielle Fälle der Gaußschen Formel	71
a) $\varphi(x) = 1$	71
b) $\varphi(x) = (1-x)^\lambda (1+x)^\mu$	72
c) $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	72
d) $\varphi(x) = \sqrt{1-x^2}$	74

	Seite
e) $\varphi(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$	75
f) $\varphi(x) = \sqrt{x(x-\alpha)(x-\beta)}$	76
g) $\varphi(x) = e^{-x^2}$	76
h) $\varphi(x) = e^{-x}$	76
5. Verallgemeinerung der Methode von Gauß	77
a) Formeln von August	77
b) Verallgemeinerung von Christoffel	78
c) Mehrfache Integrale	82
6. Methode von Massau	83
7. Methoden, bei denen die Koeffizienten gegeben sind	86
a) Allgemeines	86
b) $\varphi(x)$ ist eine gerade Funktion	87
c) $\varphi(x)$ ist eine ungerade Funktion	88
8. Formeln, die durch Kombination entstehen	90
9. Die Eulersche Formel	91
10. Formeln der Differenzenrechnung	96
11. Annäherung durch mehrere Parabeln	100
12. Methoden der graphischen Quadratur	111
a) Allgemeines	111
b) Bestimmung der mittleren Ordinaten und Abszissen	115
c) Einzeichnung der Integralkurve	120
d) Erweiterungen und Ergänzungen	121
e) Einige Anwendungen der graphischen Quadratur	126
13. Kubatur	129
a) Kubatur durch einfache Quadratur	129
b) Allgemeine Betrachtungen	131
c) Bestimmte Begrenzungen	132
d) Zerlegung in Teilgebiete	135
e) Graphische Methoden	137
14. Differentiation	138
a) Die numerische Differentiation	138
b) Graphische Differentiation	139

II. Numerische und graphische Integration gewöhnlicher Differentialgleichungen.

15. Integration gewöhnlicher Differentialgleichungen	141
a) Methode von E. Czuber	141
b) Methode der Isoklinen	143
c) Methode der Krümmungsradien	144
16. Eine Reihe mehr rechnerischer Methoden	147
a) Ältere Methoden	147
b) Methode von Runge-Heun-Kutta	148
c) Methoden der Differenzenrechnung	150
17. Asymptotische Integration	151
18. Methode der sukzessiven Approximation	152
a) Graphische Methode	152
b) Numerische Methoden	154
c) Methoden der Himmelsmechanik	157

III. Graphische und numerische Integration partieller Differential- gleichungen.

19. Partielle Differentialgleichungen mit reeller Charakteristik	159
a) Lineare Differentialgleichung	160
b) Differentialgleichungen zweiter Ordnung	161
c) System zweier simultanen linearen Differentialgleichungen	163
20. Zur Integration der partiellen Differentialgleichungen mit imaginären Charakteristiken	164
a) Methoden, die alle Randbedingungen approximieren	164

	Seite
b) Methoden, die eine Randbedingung streng erfüllen und das Integrationsnetz durch endliche Stücke approximieren	165
c) Eine Methode, die alle Randbedingungen streng erfüllt und durch endliche Stücke approximiert.	168
d) Methoden, die die Randbedingungen streng erfüllen und das Netz infinitesimal approximieren	169
21. Numerische Integration partieller Differentialgleichungen.	171
a) Übertragung der Methoden von Runge-Heun-Kutta	172
b) Eine andere Methode ersetzt die Differentialgleichung durch eine Differenzgleichung.	173
c) Methode von Rayleigh-Ritz.	173
22. Experimentelle Methoden	176

(Abgeschlossen im Februar 1915.)

3. Neuere Entwicklung der Potentialtheorie. Konforme Abbildung. Von L. LICHTENSTEIN in Berlin, jetzt in Leipzig.

I. Definitionen und Bezeichnungen.

1. Allgemeines über zwei- und dreidimensionale Gebiete	181
2. Spezielle Klassen ebener und räumlicher Gebiete	183
3. Ortsfunktionen	190
4. Allgemeines über unendlichvielblättrige schlichtartige Gebiete	193

II. Allgemeine Sätze der Potentialtheorie.

5. Definition der Potentialfunktion	197
6. Potential einer einfachen Belegung.	199
7. Potential einer Doppelbelegung	204
8. Logarithmisches Potential einer ebenen Flächenbelegung. Potential einer Volumladung	206
9. Newtonsches Potential einer einfachen Linienbelegung	210
10. Greensche Formeln. Allgemeine Eigenschaften der Potentialfunktionen	210
11. Die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen	214

III. Besondere Methoden für einzelne Klassen zwei- und dreidimensionaler Gebiete. Spezielle Theorie der konformen Abbildung.

12. Die erste und die zweite Randwertaufgabe. Problemstellung und Unitätssätze	218
13. Explizite Lösung der ersten Randwertaufgabe für die Kreisfläche und den Kugelkörper	220
a) Die Poissonschen Integrale	220
b) Entwicklungssatz. Folgerungen	225
14. Kreisringfläche. Entwicklungssatz. Folgerungen	227
15. Positive Potentialfunktionen	229
16. Die Sätze von A. Harnack.	230
17. Methode des arithmetischen Mittels	231
a) Allgemeine Ansätze und Resultate von C. Neumann und G. Robin	231
b) Die grundlegende Wendung durch H. Poincaré	233
c) Weiterführung der Poincaréschen Methoden	235
d) Zurückführung auf eine lineare Integralgleichung	238
18. Verhalten der Lösung des ersten Randwertproblems am Rande des Definitionsgebietes	242
19. Lösung des ersten Randwertproblems als Potential einer einfachen Belegung.	244
20. Stetig gekrümmte Gebiete. Greensche Funktion. Greensche Formel	246
21. Stetig gekrümmte Gebiete. Greensche Funktionen zweiter Art.	250

	Seite
22. Konforme Abbildung einfach zusammenhängender Gebiete der Klasse B in \mathfrak{C} auf ein Kreisgebiet	253
23. Gebiete der Klasse D in \mathfrak{C} . Konforme Abbildung	255
24. Kombinatorische Methoden	256
a) Alternierendes Verfahren. Drei Grundtypen von Aufgaben	256
b) Ebene Gebiete der Klasse E und M . Das erste Randwertproblem	259
c) Gebiete der Klasse E und M in \mathfrak{C} . Konforme Abbildung auf analytische Gebiete. Das zweite Randwertproblem	260
d) Lösungen mit vorgeschriebenen Periodizitätsmoduln	262
e) Zweidimensionale Gebiete auf einer Fläche im Raume. Konforme Abbildung auf ebene Gebiete	263
f) Gebiete in \mathfrak{C}_m . Existenzsätze der Riemannschen Theorie	267
g) Weitere Anwendung des alternierenden Verfahrens	268
h) Strömungspotential. Abbildung auf ein Schlitzgebiet	268
i) Gemischte Randbedingungen	269
j) Weitere kombinatorische Methoden	272
25. Kreispolygonflächen Polyeder	273
26. Konvexe Gebiete. Rundungsschranke. Bedingungen für die Schlichtheit einer Abbildung	276
27. Konforme Abbildung mehrfach zusammenhängender Gebiete	277
28. Das dritte Randwertproblem	279
29. Weitere Randwertaufgaben	282
30. Die Poissonsche Differentialgleichung	286
31. Einzelbetrachtung besonderer Gebiete	287
32. Wirkliche Bestimmung der Lösung von Randwertaufgaben. Besondere Ansätze	292
33. Lösung in Abhängigkeit von der Begrenzung	294

IV. Umfassende Methoden. Allgemeine Theorie der konformen Abbildung.

34. Leitgedanken. Heuristisches	296
35. H. A. Schwarz, Zur Theorie der Abbildung	298
36. Ergebnisse von A. Harnack. Méthode de balayage von H. Poincaré	300
37. H. Poincaré, Sur un théorème de la théorie générale des fonctions	302
38. Einfach zusammenhängende schlichte Gebiete. Greensche Funktion. Konforme Abbildung auf ein Kreisgebiet	303
39. Auflösung des ersten Randwertproblems in der Ebene	306
40. Einfach zusammenhängende Gebiete der allgemeinsten Natur	307
a) H. Poincaré, Sur l'uniformisation des fonctions analytiques	307
b) P. Koebe, Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven	309
41. Zweidimensionale schlichtartige Gebiete der allgemeinsten Natur	315
42. Das Strömungspotential	316
43. Das iterierende Verfahren von P. Koebe	319
44. Konforme Abbildung eines p -fach zusammenhängenden Gebietes in \mathfrak{C} auf ein Vollkreisgebiet	324
45. Variationsmethoden	327
a) Allgemeines	327
b) Die ersten Arbeiten von D. Hilbert	330
c) Auflösung des ersten Randwertproblems in der Ebene und im Raume	333
d) Strömungspotential. Der Hilbertsche Ansatz. Konforme Abbildung auf ein Schlitzgebiet	338
46. Kontinuitätsmethode im Gebiete der konformen Abbildung	346
47. Funktionentheoretische Richtung	352
48. Abbildung des Randes	365
a) Besondere Klassen schlichter Gebiete	365
b) Allgemeine Theorie	366
49. Variable Gebiete	373

(Abgeschlossen im Mai 1918.)

4. Neuere Untersuchungen über Funktionen von komplexen Variablen. Von LUDWIG BIEBERBACH in Frankfurt a. M., jetzt in Berlin.

Grundlagen der Theorie.

	Seite
1. Definition des analytischen Charakters einer Funktion	382
2. Der Fundamentalsatz der Funktionentheorie	384
3. Die Integralformel	386
4. Erweiterungen	387
5. Begriff der analytischen Funktion	389
6. Riemannsche Mannigfaltigkeiten	390
7. Uniformisierung	396
8. Begriff der singulären Stelle.	401
9. Begriff der Umgebung einer singulären Stelle.	403
10. Eindeutige isolierte Singularitäten	404
11. Mehrdeutige isolierte Singularitäten	405
12. Der Monodromiesatz	405
13. Verteilung der Singularitäten bei eindeutigen Funktionen	406

Der Picardsche Satz.

14. Der Picardsche Satz	409
15. „Elementare“ Methoden	410
16. Der Landausche Satz	411
17. Verallgemeinerungen	413
18. Der Schottkysche Satz	414
19. Erweiterungen	415

Weiteres über das Verhalten in der Nähe wesentlich singulärer Stellen.

20. Grundbegriffe	417
21. Geradlinige Annäherung an singuläre Stellen	418
22. Sätze von W. Groß	421
23. Werteverteilung in Winkelräumen	421
24. Ränderzuordnung bei konformer Abbildung	424
25. Der Fatousche Satz.	424

Ganze transzendente Funktionen.

26. Weierstraß	425
27. Laguerre.	425
28. Poincaré. Hadamard. Borel	428
29. Grundbegriffe.	429
30. Ordnung und Koeffizienten	431
31. Ordnung und Grenzexponent.	433
32. Ausnahmefälle	438
33. Bestimmung des Geschlechtes aus den Koeffizienten	441
34. Das Geschlecht von Summe und Ableitung	441
35. Funktionen unendlicher Ordnung und Funktionen der Ordnung Null	442
36. Beziehungen zwischen dem Maximalbetrag einer ganzen Funktion und dem Betrag des größten Gliedes ihrer Potenzreihenentwicklung.	442

Analytische Fortsetzung.

37. Die erste Methode Mittag-Lefflers	445
38. Methode der konformen Abbildung.	447
39. Modifikation der Methode durch Painlevé.	450
40. Der Hauptstern als Konvergenzstern	451
41. Zurückführung auf die Summation der geometrischen Reihe	451
42. Integraldarstellungen	453

	Seite
43. Eine neue Methode Mittag-Lefflers	458
44. Verallgemeinerungen	459

**Zusammenhang zwischen den Koeffizienten eines Funktionselementes
und den Singularitäten der durch dasselbe definierten Funktion.**

45. Die Singularitäten auf dem Konvergenzkreis	460
46. Der Hadamardsche Multiplikationssatz	464
47. Der Satz von Leau	465
48. Sätze von Lindelöf	467
49. Rekurrierende Reihen	470
50. Untersuchungen von Darboux	471
51. Die Lage der Pole	472

Die Potenzreihen an der Konvergenzgrenze.

52. Der Abelsche Grenzwertsatz	475
53. Die Hölderschen und die Cesàroschen Mittel	477
54. Weitere Summationsmethoden	480
55. Beziehungen zwischen den verschiedenen Summationsmethoden	481
56. Das Wachstum der Funktion bei Annäherung der Variablen an die Konvergenzgrenze.	487

Reihen analytischer Funktionen.

57. Eigenschaften der Summen konvergenter Reihen von analytischen Funk- tionen	491
58. Der Vitalische Satz	494
59. Weiteres über Reihen analytischer Funktionen	496

Funktionsfamilien.

60. Die Taylorkoeffizienten beschränkter Funktionen	500
61. Jensens Verallgemeinerung des Schwarzschen Lemmas	506
62. Die Funktionen $M(r)$, $\mu(r)$, $\mathfrak{M}(r)$	508
63. Schwankungen	509
64. Schlichte Familien	510
65. Familien, die schlicht und beschränkt zugleich sind	512
66. Konvexe Familien	513

Arithmetische Eigenschaften analytischer Funktionen.

67. Arithmetische Eigenschaften analytischer Funktionen	514
---	-----

Analytische Funktionen von mehreren komplexen Variablen.

68. Definition des analytischen Charakters einer Funktion	517
69. Die Konvergenz der Potenzreihen in zwei komplexen Veränderlichen	519
70. Die singulären Stellen der analytischen Funktionen von zwei komplexen Veränderlichen	522
71. Meromorphe Funktionen	526
72. Implizite Funktionen	528
73. Analytische Abbildungen	529

(Abgeschlossen am 1. Dezember 1920.)

**5. Arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen. Von
K. HENSEL in Marburg a. L.**

I. Der Körper $K(z)$ der rationalen Funktionen von z .

1. Untersuchung der rationalen Funktionen von z für eine Stelle dieser Variablen	536
---	-----

	Seite
2. Der Körper $\bar{K}(\mathfrak{p})$ aller zur Stelle \mathfrak{p} gehörigen Potenzreihen und der Unterkörper $K(\mathfrak{p})$ der zu \mathfrak{p} gehörigen konvergenten Potenzreihen . . .	539
3. Untersuchung der rationalen Funktionen von z für alle Stellen der ganzen Kugelfläche. Die rationalen Divisoren	539

II. Der Körper $K(u, z)$ der algebraischen Funktionen einer Variablen.

4. Allgemeine Sätze über die algebraischen Funktionen	542
5. Untersuchung der Funktionen des Körpers $K(u, z)$ in der Umgebung einer Stelle \mathfrak{p} der unabhängigen Variablen	544
6. Die Grundgleichung ist für den Bereich $\bar{K}(\mathfrak{p})$ irreduktibel	545
7. Allgemeiner Fall: Die Grundgleichung zerfällt innerhalb $\bar{K}(\mathfrak{p})$ in mehrere irreduktible Faktoren.	548
8. Die dem Körper $K(u, z)$ zugeordnete Riemannsche Kugelfläche \mathfrak{R}_z	550
9. Direkte Berechnung der zu einer Stelle \mathfrak{p} gehörigen Wurzelzyklen. Das zu \mathfrak{p} gehörige Diagramm	551
10. Untersuchung der algebraischen Funktionen des Körpers für alle Stellen der Riemannschen Kugelfläche \mathfrak{R}_z . Die algebraischen Divisoren	552
10 a. Die arithmetischen Begründungen des Punktbegriffes.	554
11. Untersuchung der Funktionen des Körpers $K(u, z)$ in bezug auf ihre Teilbarkeit durch einen beliebigen Divisor	557
12. Die algebraischen Systeme und ihre Elementarteiler.	562
13. Die eindeutigen Transformationen des Körpers $K(u, z)$ in den ihm gleichen $K(y, x)$ bei beliebiger Annahme der unabhängigen Variablen x	567
14. Die Einteilung der algebraischen Divisoren in Klassen	568
15. Die Divisorenscharen und ihre Invarianten	570
16. Die ganzen Divisoren einer Klasse Q	572

III. Die zu dem Körper $K(y, x)$ gehörigen Abelschen Integrale.

17. Die Abelschen Integrale	574
18. Die Differentiale der Elemente des Körpers K und die zugehörigen Divisoren	575
19. Die Differentialklasse W	577
20. Die Fundamentalaufgabe in der Theorie der Abelschen Integrale. Der Riemann-Rochsche Satz	577
21. Die Elementarintegrale erster, zweiter und dritter Gattung.	579
22. Spezialisierung für die Integrale mit rationalem Integranden	581

IV. Die zum Körper $K(y, x)$ gehörigen algebraischen Kurven.

23. Die ebenen algebraischen Kurven und ihre singulären Punkte	581
24. Der zur Kurve \mathcal{C} gehörige Divisor der Doppelpunkte	583
25. Auflösung der Singularitäten einer Kurve.	587
26. Die zu einer Gleichung $F(x, y)$ gehörigen Funktionenringe.	590
27. Darstellung der zum Körper K gehörigen Kurven durch homogene Koordinaten	591
28. Die Differentialteiler einer Divisorenschar und ihre Anwendung in der Geometrie. Die Plücker'schen Formeln	597
29. Theorie der algebraischen Raumkurven.	602

V. Die Klassen algebraischer Gebilde.

30. Die Hauptkurve eines Körpers und ihre Weierstraßpunkte	605
31. Die Normalgleichungen und die Moduln der algebraischen Körper	609
32. Die Normalgleichungen und die Moduln der allgemeinen Körper vom Geschlecht p	613

VI. Algebraische Relationen zwischen Abelschen Integralen.

33. Algebraische Normierung der Fundamentalintegrale erster und zweiter Gattung	616
---	-----

	Seite
34. Die Integrale dritter Gattung und der Satz von der Vertauschung von Parameter und Argument	618
35. Einteilung aller Wege auf einer Riemannschen Fläche in Klassen	621
36. Die Fundamentalsysteme von Periodenwegen für eine Riemannsche Fläche	624
37. Die Periodenrelationen der Integrale erster und zweiter Gattung	628
38. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Fundamentalsystemen von Periodenwegen	629
39. Die Perioden der Integrale zweiter und dritter Gattung als Funktionen ihrer Unstetigkeitspunkte	630
40. Die Primfunktionen. Zerlegung der Funktionen des Körpers in Primfunktionen	632
41. Das Abelsche Theorem als Additionsprinzip der Integrale	635
42. Die aus dem Abelschen Theorem folgenden Reduktionsprobleme	638
43. Das Umkehrproblem für die Abelschen Integrale	640

VII. (Anhang.) Arithmetische Theorie der algebraischen Zahlen.

44. Der Körper $\mathbb{F}(1)$ der rationalen Zahlen und der Körper $K(p)$ der p -adischen Zahlen	642
45. Die algebraischen Zahlkörper und die ihnen isomorphen rationalen Kongruenzkörper	643
46. Untersuchung der rationalen Kongruenzkörper für den Bereich einer Primzahl p . Ihre Reduktion auf die p -adischen Kongruenzkörper	644
47. Die p -adischen Kongruenzkörper und die ihnen isomorphen Körper $K(\mathbb{F})$ der π -adischen algebraischen Zahlen	645
48. Der zu einer vorgelegten Gleichung $F(x) = 0$ zugehörige Galois'sche π -adische Zahlkörper	649

(Abgeschlossen im März 1921.)

6. Arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen zweier unabhängigen Veränderlichen. Von HEINRICH W. E. JUNG in Halle a. S.

I. Einleitung.

II. Der Körper der algebraischen Funktionen zweier Veränderlichen.

1. Die Darstellung der Funktionen des Körpers in der Umgebung einer Kurve	653
2. Die Darstellung der Funktionen des Körpers in der Umgebung einer Stelle	654
3. Die Stellen des Körpers $K(x, y, z)$	656

III. Primteiler und Divisoren.

4. Die Primteiler erster Stufe	658
5. Die Einteilung der Primteiler erster Stufe in zwei Arten	659
6. Die Primteiler zweiter Stufe	664
7. Divisoren, Divisorenklassen	665
8. Grad und Geschlecht einer Klasse	667
9. Birationale Transformation	668
10. Fundamentalsysteme für die Vielfachen eines Divisors	670

IV. Die Zeuthen-Segresche Invariante und das numerische Geschlecht.

11. Die Fläche F	670
12. Die Zeuthen-Segresche Invariante	672
13. Das numerische oder arithmetische Geschlecht p_a von F	673

(Abgeschlossen im April 1921.)

Übersicht
über die im vorliegenden Bande II, 3. Teil, 1. Hälfte
zusammengefaßten Hefte und ihre Ausgabedaten.

C. Nachträge.

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Heft 1.
29. I. 1909. | { | 1. PRINGSHEIM u. FABER: Algebraische Analysis. |
| Heft 2.
8. VIII. 1915. | { | 2. RUNGE u. WILLERS: Numerische und graphische Quadratur und Integration gewöhnlicher und partieller Differentialgleichungen. |
| Heft 3.
25. XII. 1919. | { | 3. LICHTENSTEIN: Neuere Entwicklung der Potentialtheorie. Konforme Abbildung. |
| Heft 4.
30. VI. 1921. | { | 4. BIEBERBACH: Neuere Untersuchungen über Funktionen von komplexen Variablen. |
| Heft 5.
30. VI. 1921. | { | 5. HENSEL: Arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen.
6. JUNG: Arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen zweier unabhängigen Veränderlichen. |
-

Verbesserungen zu II C 3, L. Lichtenstein.

- p. 229 Z. 3 v. u. $D_n(1, \alpha_1, \dots, \alpha_n) > 0$ statt $D_n(1, \alpha_1, \dots, \alpha_n) \geq 0$.
- p. 230 Z. 1 v. u., p. 231 Z. 1 v. o. des Haupttextes: positiver statt nicht negativer.
- Zu Nr. 21 und 22: *P. Lévy* hat seine Ergebnisse über das asymptotische Verhalten der *Greenschen* Funktionen am Rande des Definitionsgebietes ausführlich in *Acta Math.* 42 (1919), p. 207—267 veröffentlicht. Nach *P. Lévy* bedarf die Formel von *Cisotti* (p. 252) einer Verbesserung.
- Zu der Arbeit von *Bieberbach*, p. 363, 592b) vgl. Bemerkungen von *Bieberbach* in dem Autoreferat *F. d. M.* 46 (1916—1918), p. 548, sowie eine demnächst in den *Math. Ann.* 90 erscheinende Arbeit von *Rados*.
- p. 372 Formel (1): $1 - |Z|$ statt $|1 - Z(z)|$.
- p. 375, 636): Durchmesser statt Länge. Vgl. *R. Courant*, *Gött. Nachr.* 1922, p. 69—70.

Berichtigungen zu II C 4, L. Bieberbach.

- p. 385 Z. 4 v. o. lies: müssen^{6, 1)} statt müssen. Zuzufügen 6, 1). Einige derselben kommen mit geringeren Voraussetzungen aus und sind in ihrem bewußten Abweichen von dem *Riemannschen* Beweisgang als Vorläufer des modernen Beweises anzusehen: *C. J. Malmsten*, *Svenska Akads. Förhandl.* Bd. 6 Nr. 3 (1865), *G. Mittag-Leffler*, a) *Svenska Vet. Akads. Översikt* 1873, b) Beweis für den *Cauchyschen* Satz *Gött. Nachr.* 1875, p. 65—73, *Briot et Bouquet*, *Théorie des fonctions elliptiques* 2. ed., Paris 1875, p. 128—132.
- p. 410 Note 62) zuzufügen: *P. Montel*, a. a. O. 77, 1); *G. Julia*, a. a. O. 81, 1); *G. Valiron*, a. a. O. 151 c) und Le théorème de M. Picard et les généralisations de M. Borel, *Paris C. R.* 168 (1920), p. 167—169.
- p. 412 Note 68 lies α statt α_0 .
- p. 413 Mitte lies 1 statt $(-1)^m$; Z. 3 v. u. lies $r \leq (A_p)^{\frac{1}{k+1}}$; Z. 2 v. u. hinter sein einfügen: Das ist die wahre Schranke. Note 69a) zuzufügen: *P. Montel*, a. a. O. 77, 1).
- p. 415 Z. 5 v. o. lies $\log K(\alpha_0, \varrho)$ statt $K(\alpha_0, \varrho)$. Am Schluß von 18. zuzufügen: *P. Montel*^{77, 1)} hat gezeigt, daß sich die *Borelsche* Methode⁶³⁾ zu einem Beweis des *Schottkyschen* Satzes verwenden läßt. Zuzufügen 77, 1) *P. Montel*, *Sur les familles normales des fonctions analytiques*, *Ann. Éc. norm.* (3) 33 (1916), p. 223—302. Vgl. hierzu ferner die in 62) und 65) genannten Arbeiten sowie: *De la Vallée Poussin*, *Démonstration simplifiée du théorème fondamental de M. Montel sur les familles normales de fonctions*, *Ann. of math.* (2) 17 (1915), p. 5.

- p. 416 Z. 3 v. u. zuzufügen: Er hat ihn später^{80q)} auf die Umgebung einer wesentlich singulären Stelle ausgedehnt. Die Zahl der Ausnahmewerte ist da $\text{Min}(3\nu, 2\nu^2)$. Note 80: Zuzufügen q): Paris C. R. 170 (1920), p. 1557—1560; 171 (1920), p. 157—159; *Th. Varopoulos*, Paris C. R. 171 (1920), p. 991—992.
- p. 417. Ende von 19. zuzufügen: *G. Julia*^{81, 1)} hat gezeigt, daß es bei jeder ganzen Funktion beliebig schmale an passende Kurven angelehnte Winkelräume gibt, in welchen die Funktion jeden Wert mit höchstens einer Ausnahme unendlich oft annimmt. Das Hilfsmittel der Untersuchung ist die Theorie der normalen Familien. Mit ihrer Hilfe hat *Julia* entsprechende tiefgreifende Untersuchungen auch über den Wertevorrat angestellt, den eine ganze Funktion in gewissen gegen unendlich sich häufenden diskreten Gebieten annimmt. Sie gehen aus einem derselben durch Multiplikation mit gewissen Zahlen σ_i hervor, für die $|\sigma_i| \rightarrow \infty$ gilt. Zuzufügen: 81, 1) *G. Julia*, Paris C. R. 168—170 und ausführlicher: Sur quelques propriétés nouvelles des fonctions entières ou méromorphes. I, II, III, Ann. ec. norm. III 36 (1919), p. 93—125; 37 (1920), p. 165—218; 38 (1921), p. 165—181.
- p. 422 Note 90 zuzufügen: Nahe damit verwandte Untersuchungen finden sich gleichzeitig bei *G. Valiron*, Remarques sur le théorème de M. Picard, Bull. sc. math. (2) 44 (1921), p. 91—104.
- p. 424 Note 95 zuzufügen: Zu dieser letzteren Arbeit vgl. man die Bemerkungen von *Fatou*, Paris C. R. 168 (1919), p. 501—502.
- p. 425 Z. 1 v. o. Das Wort wahrscheinlich ist zu streichen. Am Ende von 25. ist zuzufügen: *F.* und *M. Riesz*⁸⁸⁾ zeigen die Existenz der Randwerte bis auf eine Nullmenge für Funktionen $f(z)$, deren $\int_0^{2\pi} |f(re^{i\varphi})| d\varphi$ im Einheitskreis beschränkt ist. Note 96 zuzufügen: Hier ist der Satz endlich bewiesen.
- p. 428 Note 107 zuzufügen: *P. Montel*, a. a. O. 77, 1).
- p. 442. 35. Z. 2 hinter Arbeiten einfügen: insbesondere die von *Borel*.¹¹²⁾ Z. 5 lies: entwickelt.^{147, 2)} Zuzufügen 147, 2) *G. Rémoundes*, Paris C. R. 170 (1920), p. 829—832. *Th. Varopoulos*, Paris C. R. 171 (1920), p. 613—614.
- p. 443 Z. 4 lies *Hadamard* (Paris C. R. 104, p. 1053; *Borel*, fonct. entières, p. 3/4); lies: $A(r)$ der positiven Werte. Z. 5 lies: $|a_m| r^m \leq 4 \text{Max}(0, A(r)) - 2\Re(a_0)$. Z. 8 lies: $A(r) \leq M(r)$. Z. 9 lies: $A(r) \leq M(r)$. 151, 1) zuzufügen c) Les théorèmes généraux de M. Borel dans la théorie des fonctions entières, Ann. Éc. norm. III 37 (1920), p. 219—253.
- p. 445 Ende von 36. zuzufügen: Aus seiner Theorie der normalen Funktionenfamilien hat *P. Montel*^{77, 1)} die Theorie der ganzen Funktion endlicher Ordnung entwickelt.
- p. 464 Note 194 zuzufügen: *J. Soula*, Paris C. R. 171 (1920), p. 541—543.
- p. 465 Z. 10 v. o. lies: singulär, wenn die α, β isoliert sind.
- p. 466 am Ende des kursiv gedruckten zuzufügen: *J. Soula*¹⁹⁸⁾ hat gezeigt, daß man in c) statt einer ganzen Funktion irgendeine bei $x=0$ und bei den $x = a^{(n)}$ reguläre Funktion nehmen kann. Note 198 anzufügen: *J. Soula*, Paris C. R. 171 (1920), p. 614—616.
- p. 468 Note 202. Die hier erwähnte Behauptung ist, wie Herr *Pólya* bemerkt hat, unrichtig.
- p. 479 Z. 10—12 v. o. der Satz „Chapman . . . seien“ ist zu streichen.

- p. 492 Z. 2 v. u. lies: gezeigt. ^{271, 1)} Zuzufügen 271, 1) Notwendige und hinreichende Bedingungen für den analytischen Charakter der Reihensumme hat auch *J. Wolff* angegeben. Paris C. R. 169 (1919), p. 566—569.
- p. 495 Z. 4 v. o. lies: einer, im Anschluß an *Hilberts* ^{275, 1)} Arbeiten über das *Dirichletsche* Prinzip (1900) namentlich . . . Zuzufügen 275, 1) Hier tritt der Gedanke der Auswahlkonvergenz zum ersten Male auf.
- p. 501 am Ende des ersten Absatzes anzufügen: *C. Carathéodory* ²⁹²⁾ gibt ein dem *Schwarzschen* analoges Lemma an für den Fall, daß $f(z)$ statt einem inneren Punkt zwei Randpunkte, z. B. $+1$ und -1 , festläßt. $f(z)$ nimmt dann in jedem zur reellen Achse symmetrischen Kreisbogenzweieck mit den Ecken 1 und -1 nur Werte aus dieser Sichel an. *G. Julia* ^{292, 1)} endlich betrachtet den Fall, wo $f(z)$ nur einen Randpunkt, z. B. $+1$, festläßt. Dann gilt folgendes Lemma: $w = f(z)$ sei in $|z| < 1$ regulär. Es sei daselbst $|f(z)| < 1$, $f(z) = 1$ und es existiere $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ für $|1+h| < 1$, dann ist $\frac{1 - w\bar{w}}{|1 - \bar{w}|^2} \geq \frac{1}{|f'(1)|} \frac{1 - z\bar{z}}{|1 - \bar{z}|^2}$. Zuzufügen 292, 1) *G. Julia*, a) Mémoire sur l'itération des fonctions rationnelles, J. de math. (8) 1 (1918), p. 47—245. b) Extension nouvelle d'un lemme de Schwarz, Acta math. 42 (1920), p. 349—355.
- p. 503 Z. 4 v. u. lies: gegeben, und nicht alle Null.
- p. 504 Z. 1 v. o. lies: $m \leq n$ statt n .
- p. 505 Mitte lies: ist durch *Bohr* ³⁰³⁾ im negativen Sinn erledigt. ³⁰¹⁾
- p. 506 Mitte lies: 1899 statt 1895. Streiche: Nach *Hurwitz*. Lies: Sie findet sich . . . *Jacobi*. ³⁰⁹⁾ Streiche Note 308.
- p. 509 in der letzten Formel sind unter dem arcsin Zähler und Nenner zu vertauschen.
- p. 526 Ende von 70. anzufügen: *G. Julia* hat gezeigt, daß die hier für den Regularitätsbereich einer analytischen Funktion angegebenen Eigenschaften auch denjenigen Bereichen zukommen, in welchen Familien von analytischen Funktionen mehrerer Variablen normal sein können. Hier erweisen sich jene Eigenschaften sogar als hinreichend zur Charakterisierung solcher Bereiche. ^{309, 1)} Zuzufügen 369, 1) *G. Julia*, Sur les familles de fonctions de plusieurs variables, Paris C. R. 170 (1920), p. 791—793, 875—877, 1040—1042, 1234—1236, 1363—1365.
- p. 527 Z. 12 lies: zweidimensionale Ebene.
- p. 530 Z. 10 v. u. einzuschalten: „Ihre Resultante sei von Null verschieden.“
- p. 531 Z. 11 v. o. hinter Entwicklung einzufügen: „Deren Resultante sei von Null verschieden.“ Z. 1 v. u. hinter Bereiche einschalten: „durch am Rande noch reguläre Funktionen“.
- p. 532 Note 383 hinter der Arbeit von *T. Levi-Civita* einschalten: *C. Segre*, Le rappresentazioni reali delle forme complesse agli enti iperalgebraici, Math. Ann. 40 (1892), p. 413—467. *E. Study*, Sugli enti analitici, Pal. Rend. 21 (1906), p. 345—359. Die drei letztgenannten Arbeiten enthalten Sätze über analytische Mannigfaltigkeiten, die bei *Study* zu voller Allgemeinheit ausgereift erscheinen. Dieser Arbeit, welche in Verallgemeinerungen der *Schwarzschen* Spiegelungssätze gipfelt, wohnt eine besondere grundlegende Bedeutung inne.

II C 1. ALGEBRAISCHE ANALYSIS.

VON

ALFRED PRINGSHEIM UND GEORG FABER

IN MÜNCHEN.

IN KARLSRUHE.

Inhaltsübersicht.

Einleitung: Historisches.

1. Potenzreihen. Der Konvergenzkreis.
2. Verhalten von Potenzreihen auf dem Konvergenzkreise.
3. Weitere Fundamenteigenschaften von Potenzreihen.
4. Rationale Funktionen und rekurrente Reihen.
5. Der allgemeine binomische Satz.
6. Die Exponentialreihe.
7. Der natürliche Logarithmus und die allgemeine Potenz.
8. Die logarithmische Reihe.
9. Die Berechnung der Logarithmen.
10. Die Funktionen $\sin x$ und $\cos x$.
11. Die zyklometrischen Funktionen.
12. Unendliche Produkte für $\sin x$ und $\cos x$.
13. Partialbruchreihen für $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cot} x$, $\operatorname{cosec} x$, $\operatorname{sec} x$.
14. Potenzreihen für $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cot} x$, $\operatorname{cosec} x$, $\operatorname{sec} x$, $\lg \frac{\sin x}{x}$, $\lg \cos x$.
15. Die hypergeometrische Reihe.

Literatur.

Lehrbücher.

- Leonhard Euler*, *Introductio in analysin infinitorum* 1, Lausannae 1748. Deutsch von *A. C. Michelsen* (Berlin 1788) und von *H. Maser* (Berlin 1885).
- Augustin Cauchy*, *Cours d'Analyse de l'école polytechnique*. — I. Analyse algébrique, Paris 1821 (= *Oeuvres* (2), 3). Deutsch von *B. Huzler* (Königsberg 1828) und von *C. Itzigsohn* (Berlin 1885). (Die Originalausgabe zitiert als *Cauchy An.*)
- *Résumés analytiques*. Turin 1833 (= *Oeuvres* (2), 10).
- Martin Ohm*, *Versuch eines vollkommen konsequenten Systems der Mathematik* 2, Berlin 1829.
- E. H. Dirksen*, *Organon der gesamten transzendenten Analysis*, Berlin 1845.
- Encyklop. d. math. Wissensch. II 3.

- Oskar Schlömilch*, Handbuch der algebraischen Analysis, Jena 1845 (5. Aufl. 1873).
(Zitiert als *Schlömilch*).
- J. Dienger*, Grundzüge der algebraischen Analysis, Karlsruhe 1851.
- M. A. Stern*, Lehrbuch der algebraischen Analysis, Leipzig 1860.
- Eugène Catalan*, Traité élémentaire des séries, Paris 1860.
- H. Laurent*, Théorie des séries, Paris 1862.
- G. Novi*, Analisi algebraica, Firenze 1863.
- Charles Méray*, Nouveau Précis d'analyse infinitésimale, Paris 1872; Leçons nouvelles sur l'analyse infinitésimale 1, Paris 1894; 2, 1895.
- Karl Hattendorff*, Algebraische Analysis, Hannover 1877.
- Rudolph Lipschitz*, Lehrbuch der Analysis; 1, Grundlagen der Analysis, Bonn 1877.
- J. Thomae*, Elementare Theorie der analytischen Funktionen, Halle 1880; 2. Aufl. 1898.
- Richard Baltzer*, Die Elemente der Mathematik 1 (7. Aufl.), Leipzig 1885.
- Otto Stolz*, Vorlesungen über allgemeine Arithmetik 1, 2, Leipzig 1885—86. (Zitiert als: *Stolz* 1 bzw. 2).
- u. *J. A. Gmeiner*, Theoretische Arithmetik, Leipzig 1902. (Zitiert als *Stolz-Gmeiner A.*)
- — Einleitung in die Funktionentheorie, Leipzig 1902, 1904. (Zitiert als *Stolz-Gmeiner F.*)
- A. Capelli-G. Garbieri*, Analisi algebraica, Padova 1886.
- A. Capelli*, Istituzioni di analisi algebraica, Napoli 1902 (3. Aufl., 4. unter der Presse).
- Jules Tannery*, Introduction à la théorie des fonctions d'une variable, Paris 1886. 2. éd. 1, Paris 1904.
- Otto Biermann*, Theorie der analytischen Funktionen, Leipzig 1887.
- Elemente der höheren Mathematik, Leipzig 1895.
- Salvatore Pincherle*, Analisi algebraica, Milano 1893.
- Lezioni di algebra complementare. I. Analisi algebraica, Bologna 1906.
- Joseph Bertrand et Henri Garcet*, Traité d'algèbre 2, Paris 1894.
- Ernesto Cesàro*, Corso di analisi algebraica, Torino 1894. — Deutsche Ausgabe von *G. Kowalewski* unter dem Titel: Elementares Lehrbuch der algebraischen Analysis und der Infinitesimalrechnung. Leipzig 1904.
- Maurice Godefroy*, Théorie élémentaire des séries, Paris 1903.
- Heinrich Burkhardt*, Algebraische Analysis, Leipzig 1903.
- Heinrich Weber und Josef Wellstein*, Enzyklopädie der Elementarmathematik. I. Elementare Algebra und Analysis, Leipzig 1903.
- Alfred Pringsheim*, Vorlesungen über die elementare Theorie der unendlichen Reihen und der analytischen Funktionen. (In Vorbereitung.)
- (Die englische und amerikanische Literatur scheint keine Lehrbücher über algebraische Analysis zu enthalten. Allenfalls wäre der 2. Band von *Chrystal's Algebra* hierzu zu rechnen. Im übrigen verwenden die englischen und amerikanischen Mathematiker auch in relativ elementaren Darstellungen stets die Hilfsmittel des „Calculus“ d. h. der Differential- und Integralrechnung. So z. B. *T. J. 'a Bromwich*, An introduction to the theory of infinite series. London 1908. — *William F. Osgood*, Introduction to infinite series. Cambridge Mass. 1897 [2. Aufl. 1902].)

Monographien.

(Jean Robert Argand) Essai sur une manière de représenter les quantités imaginaires dans les constructions géométriques. 1° éd. (*sans nom d'auteur*) Paris 1806. 2° éd. (par J. Hoüel), Paris 1874.

Bernhard Bolzano, Der binomische Lehrsatz und als Folgerung aus ihm der polynomische und die Reihen, die zur Berechnung der Logarithmen und Exponentialgrößen dienen, genauer als bisher erwiesen, Prag 1816.

N. H. Abel, Untersuchungen über die Reihe $1 + \frac{m}{1}x + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2}x^2 + \dots$, herausgeg. von A. Wangerin (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Nr. 71, Leipzig 1895) (= J. f. Math. 1 (1826), p. 31 = Oeuvres éd. Sylow-Lie 1, p. 219).

Einleitung: Historisches. Nachdem man gegen Ende des 17. Jahrhunderts mit Hilfe der Differential- und Integralrechnung die allgemeinen Grundlagen für eine Theorie der elementaren transzendenten Funktionen gewonnen hatte, machte sich schon sehr bald das Bestreben geltend, diese Theorie im Anschlusse an die Arbeiten der älteren Analytischen *ohne* Benutzung des Infinitesimalcalculus durch wesentlich *algebraische* Methoden zu begründen. *Eulers introductio in analysin infinitorum* (1748) ist der erste systematische Versuch zur Errichtung eines derartigen Lehrgebäudes, das sofort durch den von *Euler* entdeckten Zusammenhang zwischen $e^{\xi i}$ und $\cos \xi$, $\sin \xi$, somit schließlich durch die prinzipielle Einführung des gleichfalls der *Algebra* entlehnten *Imaginären* in die *Analysis* gegenüber den systematischen Darstellungen der ausschließlich mit reellen Veränderlichen arbeitenden Infinitesimalrechnung seinen besonderen Charakter erhielt und späterhin im Gegensatze zur letzteren als *algebraische Analysis* bezeichnet wurde. Gelang es auch *Eulers* rechnerischem Genie, zahlreiche in der angedeuteten Richtung erwachsende Probleme mit glücklichstem Erfolge zu behandeln, so blieb doch die strengere Begründung seiner zumeist durch rein formale Übertragung algebraischer Methoden auf sogenannte unendliche Algorithmen gewonnenen Resultate einer späteren Periode vorbehalten. Die entscheidende Wendung beginnt erst mit *Cauchys Analyse algébrique* (1821), einem auch für die Gegenwart in vieler Hinsicht noch muster-giltigen Werke, in welchem neben dem Bestreben nach strenger Behandlung des Grenz- und Stetigkeitsbegriffes die konsequente Ausdehnung des Funktionsbegriffes auf *komplexe Veränderliche* charakteristisch hervortritt. Weitere erhebliche Fortschritte bringen *Abels* Abhandlung über die *Binomialreihe* (1826) und *Cauchys Résumés analytiques* (1833). Sucht auch — unter dem Einflusse der sogenannten

kombinatorischen Schule (*Hindenburg, Eschenbach, Rothe*) zumal in der deutschen Lehrbuchliteratur (*Ohm, Dirksen, Stern*) — noch bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus neben der durch *Cauchy* und *Abel* inaugurierten *kritisch-exakten* Behandlungsweise (*Schlömilch*) und teilweise im bewußten Gegensatze dazu eine Weiterbildung des *Euler*-schen *Formalismus* sich geltend zu machen, so gewinnt jene erstere doch schließlich die Oberhand und wird namentlich durch den Einfluß von *Weierstraß*' Vorlesungen zur Vollendung gebracht (*Lipschitz, Stolz*). Freilich erreicht die *algebraische Analysis* damit gewissermaßen auch ihr Ende: sie geht in der von *Weierstraß* geschaffenen *elementaren Theorie der analytischen Funktionen* auf. Will man heute überhaupt noch von der Sonderexistenz einer *algebraischen Analysis* reden, so wird man sie allenfalls als eine *Vorstufe* zur *Weierstraß*-schen Funktionenlehre auffassen können und ihr etwa die (besser als Gegenstand der „*allgemeinen Arithmetik*“ zu bezeichnende) Lehre von den *unendlichen Algorithmen* (mit konstanten Termen) und von den allgemeinen Eigenschaften der *Potenzreihen*, sowie eine Anzahl *spezieller* Methoden zur Darstellung der *Elementarfunktionen* durch unendliche Reihen, Produkte und Kettenbrüche zuteilen. Nachdem nun die Lehre von den *unendlichen Algorithmen mit konstanten Termen* angemessener Weise bereits in dem der *Arithmetik und Algebra* gewidmeten Bande der Enzyklopädie (unter I A 3 und I G 3: *Pringsheim*) ihre Erledigung gefunden hat und bei dieser Gelegenheit auch schon diejenigen Arbeiten berücksichtigt worden sind, welche sich mit den Kettenbruchentwicklungen gewisser *Elementarfunktionen* beschäftigen (s. I A 3, Nr. 55), so hat sich das folgende Referat auf die noch übrig bleibenden der genannten Gegenstände zu beschränken.

Dabei soll hier, im wesentlichen dem Vorgange *Cauchys* folgend und im Gegensatze zu einigen neueren Lehrbüchern (*Cesàro, Godefroy, Burkhardt*) durchweg der Begriff der *komplexen* Veränderlichen in den Vordergrund gestellt werden. Hiernach bedeutet im Folgenden das Zeichen x stets eine *komplexe* Veränderliche von der Form $\xi + i\eta$; bzw. $r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, wo man unter ξ, η, ϑ *reelle* Veränderliche, unter r eine *positive reelle* Veränderliche zu verstehen hat.

1. Potenzreihen: Der Konvergenzkreis. Der Konvergenzbereich einer „*gewöhnlichen Potenzreihe*“

$$(1) \quad \mathfrak{P}(x) = \sum_0^{\infty} a_n x^n$$

ist unter Zugrundelegung der üblichen Repräsentation einer *komplexen Zahl* $\xi + i\eta$ durch den Punkt mit den rechtwinkligen Koordinaten

(ξ, η) allemal ein — eventuell auch *unendlich großer* oder *in den Nullpunkt sich zusammenziehender* — Kreis um den Nullpunkt, „der *Konvergenzkreis*“, dessen Radius R eindeutig durch die Beziehung bestimmt wird¹⁾:

$$(2) \quad R = (\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|})^{-1}$$

(bzw. $= \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$, wenn dieser Limes existiert).

$\mathfrak{B}(x)$ konvergiert alsdann für $|x| < R$, divergiert für $|x| > R$ (geometrisch gesprochen: innerhalb, bzw. außerhalb des Kreises $(0, R)$; über das Verhalten für $|x| = R$ s. Nr. 2. In den beiden Grenzfällen $R = \infty$ (d. h. $\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$, also geradezu $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = 0$) und $R = 0$ (d. h. $\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$) heißt die Reihe *beständig*²⁾ konvergent bzw. divergent. Konvergiert $\sum a_n x^n$ für einen gewissen Wert $x = X$ oder weiß man nur, daß für irgend ein X und alle n : $|a_n X^n| < G$ bleibt, so konvergiert $\sum |a_n x^n|$ zum mindesten für $|x| < |X|$.³⁾ Man erschließt daraus, daß $\mathfrak{B}(x)$ für $|x| < R$ stets *absolut* und für $|x| \leq r$, wo $r < R$, auch *gleichmäßig*⁴⁾ konvergiert, also für $|x| < R$ eine (eindeutige und *stetige*⁵⁾ Funktion darstellt.

1) *Cauchy*, An., p. 286. Vgl. im übrigen I A 3, p. 81 Fußn. 167, 168; II B 1, p. 83 Fußn. 204). (NB. Die an letzterer Stelle gegebenen Hinweise auf *Cauchy* sind nicht ganz korrekt, sie beziehen sich lediglich auf den entsprechenden Satz für *reelle* Reihen.)

2) Bezeichnung von *Weierstraß*.

3) In der ersten Fassung für positive X bei *Abel* (*J. f. Math.* 1 (1826), p. 314 = *Oeuvres* 1, p. 223); anderer Beweis bei *P. F. Arndt* (*Arch. f. Math.* 25 (1855), p. 211), welcher den *Abelschen* Beweis irriger Weise für falsch hält (*Arch. f. Math.* 20 (1853), p. 464). In der zweiten Fassung (mit Benutzung der auch von *Arndt* angewendeten Schlußweise) wohl von *Weierstraß*: cf. *S. Pincherle*, *Giorn. di mat.* 18 (1880), p. 328. Der Konvergenzradius R erscheint dabei als obere Grenze der Zahlen $|X|$, für welche $|a_n X^n|$ endlich bleibt; cf. *Pincherle* a. a. O. p. 331.

4) *Pincherle* a. a. O.³⁾ p. 333. Vgl. im übrigen II A 1, Nr. 17; II B 1, Nr. 6.

5) Eine Funktion $f(x)$ der komplexen Veränderlichen $x = \xi + \eta i$ heißt für $x = x_0 = \xi_0 + \eta_0 i$ (oder auch an der Stelle x_0) *stetig*, wenn $f(x)$ für $x = x_0$ und eine gewisse Umgebung von $x = x_0$ eindeutig definiert ist und:

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad \text{für} \quad |x - x_0| < \delta$$

(nach *Weierstraß*, s. *Pincherle* a. a. O.³⁾ p. 246). Ist

$$f(x) = \varphi(\xi, \eta) + i \cdot \psi(\xi, \eta),$$

so zieht die Stetigkeit von $f(x)$ an der Stelle x_0 diejenige der *reellen* Funktionen $\varphi(\xi, \eta)$, $\psi(\xi, \eta)$ an der Stelle (ξ_0, η_0) nach sich *und umgekehrt*. Das Analoge gilt, wenn man setzt:

$$x = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta) \quad \text{und} \quad \varphi(x) = \Phi(r, \vartheta) + i \cdot \Psi(r, \vartheta),$$

Werden x_0 und h beliebig, jedoch so angenommen, daß $|x_0| + |h| < R$ ist, so findet man mit Hilfe des *Cauchyschen Doppelreihensatzes* (s. I G 3, Nr. 4) die „*Taylorische Entwicklung*“:⁶⁾

$$(3) \quad \mathfrak{P}(x_0 + h) = \mathfrak{P}(x_0) + \mathfrak{P}'(x_0) \frac{h}{1!} + \dots + \mathfrak{P}^{(n)}(x_0) \frac{h^n}{n!} + \dots$$

Die als n^{te} *Derivierte* ($n = 1, 2, \dots$) von $\mathfrak{P}(x)$ bezeichneten Potenzreihen

$$(4) \quad \mathfrak{P}^{(n)}(x) = \sum_n^{\infty} \nu(\nu - 1) \dots (\nu - n + 1) a_\nu x^{\nu - n}$$

besitzen denselben Konvergenzkreis wie $\mathfrak{P}(x)$ selbst⁷⁾. Die Reihe (3) bzw. die durch Substitution von $x_0 + h = x$ daraus hervorgehende „aus $\mathfrak{P}(x)$ *abgeleitete* Reihe $\mathfrak{P}(x|x_0)$ “⁸⁾, nämlich:

$$(5) \quad \mathfrak{P}(x|x_0) = \mathfrak{P}(x_0) + \mathfrak{P}'(x_0) \frac{x - x_0}{1!} + \dots + \mathfrak{P}^{(n)}(x_0) \frac{(x - x_0)^n}{n!} + \dots$$

konvergiert auf Grund der Herleitung *zum mindesten* für

$$|h| \equiv |x - x_0| < R - |x_0|,$$

kann aber auch einen *größeren*, also über den Kreis $(0, R)$ *hinausragenden* Konvergenzkreis besitzen und liefert dann die *analytische Fortsetzung*⁹⁾ von $\mathfrak{P}(x)$. Im entgegengesetzten Falle heißt die Stelle $a = R \cdot \frac{x_0}{|x|}$, d. h. geometrisch, der in der Verlängerung des Strahles $\bar{O}x_0$ gelegene Peripheriepunkt von $(0, R)$, eine *singuläre*¹⁰⁾. Der (wahre)

(wobei zur Erhaltung der *Umkehrbarkeit* für den Fall $x_0 = 0$ noch der Zusatz erforderlich ist, daß $\Phi(0, \vartheta)$, $\Psi(0, \vartheta)$ eindeutige, von ϑ unabhängige Werte besitzen müssen). Es kann also auch die Stetigkeit der reellen Funktion $\varphi(\xi, \eta)$, $\psi(\xi, \eta)$ bzw. $\Phi(r, \vartheta)$, $\Psi(r, \vartheta)$ als *Definition* der Stetigkeit von $f(x)$ dienen (vgl. das Analogon in I G 3, Nr. 1); so z. B. durchweg bei *Cauchy*, bei dem freilich andererseits die Stetigkeit eines $\varphi(\xi, \eta)$ nicht ausreichend definiert erscheint (An., p. 37; vgl. hierzu II A 1, p. 48). Ist $f(x)$ für $x = x_0$ stetig, so hat man:

$$\lim_{x=x_0} f(x) = f(x_0),$$

eine Beziehung, welche wieder auch umgekehrt, mit dem Zusatze, daß $f(x_0)$ endlich, als *Definition* der Stetigkeit dienen kann (vgl. II A 1, p. 9, Gl. (21), (22)).

6) Vgl. II A 2, Nr. 14.

7) Dies folgt unmittelbar aus der Herleitung von Gl. (3) oder auch unabhängig davon aus Gl. (2), vermöge der Beziehung;

$$\overline{\lim} \sqrt[\nu]{\nu(\nu - 1) \dots (\nu - n + 1) |a_\nu|} = \overline{\lim} \sqrt[\nu]{|a_\nu|}.$$

8) Bezeichnung von *Weierstraß*: *Pincherle*, a. a. O. p. 347.

9) Grundlage des Begriffs der *analytischen Funktion* nach *Weierstraß* und *Méray*, als Weiterbildung von *Lagranges* „*Fonctions analytiques*“; vgl. II B 1, p. 40, Fußn. 77.

10) Eine solche *singuläre* Stelle a ist also dadurch charakterisiert, daß die

Konvergenzkreis $(0, R)$ ist dann dadurch charakterisiert, daß auf ihm *mindestens* eine singuläre Stelle liegen muß¹¹⁾. Es können aber auch *sämtliche* Stellen von $(0, R)$ *singuläre* sein¹²⁾, ja dieser Fall ist in *Wahrheit* sogar als der *allgemeinere* zu betrachten¹³⁾. Die Konvergenzeigenschaften von Reihen der Form

$$(6) \quad \mathfrak{P}(x - x_0) = \sum_0^{\infty} a_\nu (x - x_0)^\nu, \quad \mathfrak{P}\left(\frac{1}{x}\right) = \sum_0^{\infty} a_\nu x^{-\nu}$$

ergeben sich aus den vorstehenden durch Substitution von $x - x_0$ bzw. x^{-1} anstelle von x ; sodann durch Kombination auch diejenigen von

$$(7) \quad P(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_\nu x^\nu \quad \text{bzw.} \quad P(x - x_0) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_\nu (x - x_0)^\nu.$$

Als Konvergenzbezirk erscheint in letzterem Falle ein *Kreisring* (dessen *äußerer* Grenzkreis eventuell *unendlich* groß werden, dessen *innerer* sich in den *Nullpunkt* bzw. den *Punkt* $x = x_0$ *zusammenziehen* kann)¹⁴⁾.

Als typisch für die Potenzreihen mit p Variablen

$$\mathfrak{P}(x_1 x_2 \dots x_p) = \sum_0^{\infty} a_{\nu_1 \dots \nu_p} x_1^{\nu_1} \dots x_p^{\nu_p}$$

kann der Fall $p = 2$, also

$$(8) \quad \mathfrak{P}(x, y) = \sum_0^{\infty} a_{\mu\nu} x^\mu y^\nu$$

betrachtet werden; es gilt hier zunächst der Satz: Hat man für irgend ein von Null verschiedenes Wertepaar X, Y und alle μ, ν : $|a_{\mu\nu} X^\mu Y^\nu| < G$, so konvergiert $\mathfrak{P}(x, y)$ *absolut* für alle x, y , welche

untere Grenze für die *Konvergenzradien* der aus $\mathfrak{P}(x)$ ableitbaren Reihen in der Nähe von a den Wert *Null* hat: *Weierstraß*, s. *Pincherle*, a. a. O.³⁾ p. 353.

11) Dem wesentlichen Inhalte nach schon von *Cauchy* herrührend als Folgerung des nach ihm benannten Integralsatzes (vgl. II B 1, Nr. 7); in der vorliegenden Fassung von *Weierstraß* formuliert und elementar bewiesen: s. *Pincherle*, a. a. O.⁵⁾ p. 350; *Stolz* 2, p. 183; *Stolz-Gmeiner*, F. 1, p. 212.

12) s. II B 1, p. 83, 84.

13) Zuerst ausgesprochen und bewiesen von *A. Pringsheim*, *Math. Ann.* 44 (1894) p. 50. Andere Beweise bei *Émile Borel* (*Par. C. R.* 123 [1896], p. 1051; *Acta math.* 21 [1897], p. 243) und *Eugène Fabry* (*Par. C. R.* 124 [1897], p. 142; *Acta math.* 22 [1899], p. 65). Vgl. im übrigen *Jacques Hadamard*, *la série de Taylor et son prolongement analytique*, Paris 1901, p. 33, sowie auch II B 1, p. 84.

14) Über Umformung von $P(x)$ in eine $\mathfrak{P}(x, x_0)$ s. z. B. *Stolz* 2, p. 167.

der Bedingung genügen $|x| < |X|$, $|y| < |Y|$ ¹⁵⁾ und *gleichmäßig* für $x \leqq r$, $y \leqq r'$, sofern $r < |X|$, $r' < |Y|$.¹⁶⁾ Ist ϱ die kleinere der beiden Zahlen $|X|$, $|Y|$, so konvergiert also $\mathfrak{P}(x, y)$ *absolut*, wenn $\left. \begin{matrix} |x| \\ |y| \end{matrix} \right\} < \varrho$. Bedeutet \bar{R} die *obere* Grenze der Zahlen ϱ , oder, was im wesentlichen dasselbe aussagt, setzt man:

$$(9) \quad \bar{R} = \left(\overline{\lim}_{\mu + \nu = \infty}^{\mu + \nu} \sqrt[\mu + \nu]{|a_{\mu\nu}|} \right)^{-1} \quad 17),$$

so wird auf Grund der Analogie mit Gl. (8) von manchen Autoren \bar{R} als der „*wahre Konvergenzradius*“ von $\mathfrak{P}(x, y)$ bezeichnet¹⁸⁾. Zu einem allgemeineren Resultate führt die folgende Auffassung. Sind R, R' zwei positive Zahlen von der Art, daß $|a_{\mu\nu}| R^\mu R'^\nu < G$ für alle μ, ν , daß dagegen eine solche endliche Schranke G *nicht* mehr vorhanden ist, wenn nur *eine* der Zahlen R, R' beliebig wenig vergrößert wird, so *konvergiert* $\mathfrak{P}(x, y)$, wenn *gleichzeitig* $|x| < R$, $|y| < R'$, *divergiert*, wenn *gleichzeitig* $|x| > R$, $|y| > R'$. R, R' heißen dann

15) *Pincherle* nach *Weierstraß* a. a. O.³⁾ p. 329.

16) *O. Biermann*, Theorie der analyt. Funkt., p. 137 (in der freilich nicht korrekten Fassung, daß $\mathfrak{P}(x, y)$ für $|x| < |X|$, $|y| < |Y|$ gleichmäßig konvergiere). — Man findet auch in Lehrbüchern, selbst in solchen, welche der neuesten Zeit angehören, den folgenden (nach Analogie eines für Potenzreihen *einer* Variablen *richtigen* Satzes gebildeten) *falschen* Satz: „*Konvergiert* die Reihe $\mathfrak{P}(x, y)$ für ein gewisses Wertepaar $x = X, y = Y$, so *konvergiert* sie auch für $|x| < |X|$, $|y| < |Y|$.“ Aus der *bloßen* (d. h. eventuell nur bei bestimmter Anordnung vorhandenen) *Konvergenz* der *Doppelreihe* $\mathfrak{P}(X, Y)$ folgt nämlich keineswegs, daß die $|a_{\mu\nu} X^\mu Y^\nu|$ unter einer endlichen Grenze bleiben (vgl. I A 3, p. 98 und insbesondere *Pringsheim*, München Ber. 27 (1897), p. 130). Der obige Satz ist vielmehr nur dann richtig, wenn man ausdrücklich diese letztere Eigenschaft oder auch die *absolute* Konvergenz von $\mathfrak{P}(X, Y)$ voraussetzt (was im Falle *einer* Veränderlichen keineswegs erforderlich ist).

Eine sehr eingehende Untersuchung auch der eventuell nur bedingten Konvergenz der Potenzreihen von zwei Veränderlichen sowohl bei der Anordnung als Doppelreihen als bei derjenigen nach Zeilen, Kolonnen oder Diagonalen gab neuerdings *Friedrich Hartogs* in zwei Abhandlungen: 1) Beiträge zur elementaren Theorie der Potenzreihen usw., Münchener Diss., Lpzg. 1904; 2) Math. Ann. 62 (1905), p. 1—88.

17) Ist $c_{\mu\nu}$ eine Doppelfolge positiver Zahlen, so bedeutet $\overline{\lim}_{\mu + \nu = \infty} c_{\mu\nu}$ den *oberen Limes* der („nach *Diagonalen*“ geordneten) einfachen Folge:

$$c_{00}, c_{01}, c_{10}, \dots, c_{0\mu}, c_{1, \mu-1}, \dots, c_{\mu, 0}, \dots$$

(bei welcher alle Terme nach Gruppen mit konstantem $\mu + \nu$ geordnet sind), und darf nicht verwechselt werden mit dem *oberen Limes* der *Doppelfolge*, in Zeichen: $\overline{\lim}_{\mu, \nu = \infty} c_{\mu\nu}$ (vgl. *Pringsheim*, Math. Ann. 53 (1900), p. 296).

18) *Biermann*, Analyt. Funkt., p. 138; Math. Ann. 48 (1897), p. 394.

ein Paar *assoziierter* Konvergenzradien. Da *im allgemeinen* die Bedingung $|a_{\mu\nu}| R^\mu R^\nu < G$ bei *Verkleinerung* von R eine *Vergrößerung* von R' zulassen wird — und umgekehrt —, so gibt es alsdann unendlich viele Paare assoziierter Konvergenzradien¹⁹⁾ (unter denen das Paar $R' = R$ den oben erwähnten „wahren“ Konvergenzradius liefert). Als Verallgemeinerung der Beziehung (9) erscheint alsdann die folgende²⁰⁾:

$$(10) \quad \lim_{\mu+\nu=\infty} R \sqrt[\mu+\nu]{|a_{\mu\nu}| \left(\frac{R'}{R}\right)^\nu} \equiv \lim_{\mu+\nu=\infty} \sqrt[\mu+\nu]{|a_{\mu\nu}| \cdot R^\mu R^\nu} = 1.$$

2. Verhalten von Potenzreihen auf dem Konvergenzkreise.

Auf dem Konvergenzkreise kann $\mathfrak{B}(x) = \sum a_\nu x^\nu$ noch *durchweg*, *teilweise* oder auch *nirgends* konvergieren. Im *ersten* der genannten Fälle konvergieren zwar die bekannteren Reihen zugleich *absolut*, doch gibt es auch allgemeine Typen von Reihen, welche auf dem Konvergenzkreise *ausnahmslos*, dennoch nur *bedingt* konvergieren²¹⁾. Bei *teilweiser* Konvergenz kann dieselbe allemal nur eine *bedingte* sein²²⁾. Konvergiert $\mathfrak{B}(x)$ für eine gewisse Stelle X des Konvergenzkreises, so hat man²³⁾:

$$(11) \quad \lim_{\rho \rightarrow 1-0} \mathfrak{B}(\rho X) = \mathfrak{B}(X)$$

19) Daß die Funktion $R' = \varphi(R)$, welche zu einem Konvergenzradius den assoziierten angibt, (im allgemeinen) stetig ist, bewiesen: *A. Meyer*, Stockh. Vet. Ak. Förh. Öfv. 40 (1883), Nr. 9, p. 15; *Phragmén*, ebenda Nr. 10, p. 17; *F. Hartogs* Diss.¹⁶⁾ p. 8. Eine weitere von *E. Fabry* (Paris C. R. 134 (1902) p. 1190—1192) als für die Funktion φ *notwendig* erkannte Bedingung wurde später von *G. Faber* (Math. Ann. 61 (1905), p. 300), sowie von *F. Hartogs* (Math. Ann. 62 (1905), p. 81) wiedergefunden und als für φ *charakteristisch* nachgewiesen. Vgl. das Referat von *F. Hartogs*, D. M.-V. 16, 1907, p. 231.

20) *E. Lemaire*, Darb. Bullet. (2), 20 (1896), p. 286.

21) *Pringsheim*, Math. Ann. 25 (1885), p. 419; München Ber. 30 (1900), p. 68. Einfachstes Beispiel:

$$a_\nu = (-1)^{[\sqrt{\nu}]} \cdot \frac{1}{\nu},$$

wo $[\sqrt{\nu}]$ die größte in $|\sqrt{\nu}|$ enthaltene ganze Zahl bedeutet).

22) Ist Σa_ν divergent, dagegen $\Sigma |a_\nu - a_{\nu+1}|$ konvergent, so konvergiert $\Sigma a_\nu x^\nu$ *bedingt* für alle $|x| = 1$ außer $x = 1$, wie sich unmittelbar mit Hilfe der sog. *Abelschen* Transformation ergibt: s. IG 3 Nr. 4. Ebenda siehe auch einen besonderen, von *Weierstraß* hervorgehobenen Fall dieses Satzes.

23) Für *reelle* X ausdrücklich formuliert und bewiesen von *Abel*, J. f. Math. 1 (1826), p. 314 = Oeuvres 1, p. 223. Anderer Beweis von *Dirichlet*, J. de math. (2), 7 (1852), p. 253. Vgl. die Bemerkungen von *Pringsheim*, München Ber. 27 (1897), p. 344.

und etwas allgemeiner:

$$(12) \quad \lim_{x' = X} \mathfrak{P}(x') = \mathfrak{P}(X),$$

falls x' aus dem Innern des Konvergenzkreises auf irgend einem Strahle²⁴⁾ (auf irgend einer den Konvergenzkreis nicht tangierenden Kurve²⁵⁾) der Stelle X zustrebt. Die Konvergenz von $\mathfrak{P}(x)$ bleibt nämlich eine *gleichmäßige* im Innern und auf der Begrenzung jedes innerhalb $(0, R)$ liegenden Dreiecks mit der Spitze X .²⁶⁾ Eine direkte Verallgemeinerung des *Abelschen Satzes* (11) bzw. (12) liefert der Satz von *Frobenius*²⁷⁾, welcher besagt, daß:

$$(13) \quad \lim_{\varrho = 1-0} \mathfrak{P}(\varrho X) = \lim_{n=\infty} \frac{1}{n} \sum_0^n s_\nu,$$

$$\text{bzw.}^{28)}: \lim_{x' = X} \mathfrak{P}(x') = \lim_{n=\infty} \frac{1}{n} \sum_0^n s_\nu$$

$$(\text{wo: } s_\nu = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \cdots + a_\nu X^\nu),$$

falls der rechts stehende Grenzwert existiert. Auf Grund von (11) ist die Bedingung

$$(14) \quad \lim_{\varrho = 1-0} \mathfrak{P}(\varrho X) = A \quad (\text{d. h. endlich})$$

eine *notwendige* für die *Konvergenz* von $\mathfrak{P}(X)$, übrigens *keine hinreichende*. Dies ist nicht einmal der Fall, wenn die weitere Bedingung hinzukommt²⁹⁾:

$$(15) \quad \lim a_n = 0,$$

wohl aber wenn³⁰⁾:

$$(16) \quad \lim_{n=\infty} \frac{1}{n} \sum_0^n \nu a_\nu X^\nu = 0,$$

24) *Stolz*, Zeitschr. Math. Phys. 20 (1875), p. 370; desgl. 29 (1884), p. 127; Allg. Arithm. 2, p. 157; *Stolz-Gmeiner* F. 2, p. 287.

25) *E. Picard*, Traité d'Analyse 2, p. 73 (2. Aufl., p. 77). Diese Fassung ist übrigens nur dann korrekt, wenn man unter „Kurve“ schlechthin eine solche Linie versteht, die in X eine *Tangente* hat. Andernfalls müßte man sagen: auf einer Kurve, welche in der Nähe von X ganz *innerhalb* eines im Innern des Kreises $(0, R)$ liegenden Winkels mit dem Scheitel X verläuft.

26) In dieser Fassung bei *Pringsheim* a. a. O. p. 347.

27) *J. f. Math.* 89 (1880), p. 262. Weitere Verallgemeinerungen bei *Hölder*, *Math. Ann.* 20 (1882), p. 535. Vgl. auch I A 3, p. 108, Fußn. 287.

28) Bezüglich dieses verallgemeinerten (d. h. ebenso wie bei Gl. (12) zu verstehenden Grenzüberganges) s. *Pringsheim*, München Ber. 31 (1901), p. 517.

29) *Pringsheim*, a. a. O.²⁸⁾ p. 505.

und zwar besteht die letztere Bedingung mit Sicherheit für alle X , wenn

$$(17) \quad \lim na_n = 0.$$

Andererseits ist für die *Konvergenz* von $\mathfrak{P}(X)$ an irgend einer *einzelnen* Stelle X außer der Bedingung (14) das Verhalten der „*Randfunktion*“

$$(18) \quad f(X) = \lim_{\rho \rightarrow 1-0} \mathfrak{P}(\rho X)$$

längs des *gesamten* Kreises $|X| = R$ maßgebend³¹⁾. Für genauere Untersuchungen in der fraglichen Richtung erweisen sich die rein elementaren Hilfsmittel als unzureichend. Als zweckmäßige Grundlage dient alsdann die Darstellung der a_n in der *Cauchyschen* bzw. *Fourierschen* Integralform³²⁾.

Ist $\sum a_n X^n$ *eigentlich* divergent, so hat man allemal³³⁾:

$$(19) \quad \lim_{\rho \rightarrow 1-0} \mathfrak{P}(\rho X) = \infty.$$

3. Weitere Fundamenteigenschaften von Potenzreihen. Kon-

vergiert $P(x) \equiv \sum_{-\infty}^{+\infty} a_n x^n$ gleichmäßig für alle x mit dem absoluten Betrage $|x| = r$ und ist $|P(x)| \leq M$, so besteht für jedes r die

30) *A. Tauber*, Monatsh. f. Math. 8 (1897), p. 273. — *Pringsheim*, München Ber. 30 (1900), p. 51. — Andere Bedingungsformen bei *Konrad Knopp*, Palermo Rend. 25 (1908), p. 237.

31) Selbst wenn $\lim_{x' \rightarrow X} \mathfrak{P}(x')$ für alle X endlich und bestimmt ausfällt, braucht $\mathfrak{P}(x)$ für kein einziges X zu konvergieren. *Beispiel*:

$$\frac{1}{(x-1)^2} e^{\frac{1}{x-1}}$$

(*Pringsheim*, München Ber. 30 (1900), p. 39; vgl. auch Math. Ann. 44 (1894), p. 54).

32) *Literatur*: *L. W. Thomé*, J. f. Math. 87 (1879), p. 333; desgl. 95 (1883), p. 97; desgl. 100 (1887), p. 167; *G. Darboux*, J. de math. (3), 4 (1878), p. 13; *J. Hadamard*, J. de math. (4) 8 (1892), p. 169; *A. Tauber*, Monatshefte f. Math. 2 (1891), p. 79; desgl. 6 (1895), p. 118; *Pringsheim*, München Ber. 25 (1895), p. 337; desgl. 30 (1900), p. 54, 79; *K. Knopp*, Dissert. Berlin 1907; Versuch einer zusammenfassenden Darstellung: *K. Jahraus*, Progr. des Gymn. Ludwigshafen a. Rh. 1901/2. — Vgl. auch II A 11.

33) Ein besonderer Fall schon bei *Abel*, Oeuvres 2, p. 203; allgemeiner bei *Stolz*, 2, p. 159; genauer *Pringsheim*, München Ber. 30 (1900), p. 41. Bei *Stolz* a. a. O. sind auch gewisse Fälle *uneigentlicher* Divergenz behandelt; *Stolz-Gmeiner*, F. 2, p. 289.

Beziehung:

$$(20) \quad |a_\nu| \leq M \cdot r^{-\nu}$$

(sog. *Cauchyscher Koeffizientensatz*³⁴).

Entsprechend hat man im Falle $|P(x, y)| \leq M:$
 $x=r, y=r'$

$$(21) \quad |a_{\mu\nu}| \leq M r^{-\mu} r'^{-\nu} \text{ }^{35}.$$

Ist für *unendlich viele* x mit der *Häufungstelle* 0: $\sum_0^\infty a_\nu x^\nu = 0$, so ist $a_\nu = 0$ für jedes ν .³⁶ Der Satz gilt auch noch, wenn die Stellen, für welche $\sum_0^\infty a_\nu x^\nu = 0$ ist, eine beliebige *im Innern*³⁷ des Konvergenzkreises gelegene Häufungsstelle a besitzen³⁸. Hieraus

34) Bei *Cauchy* als Folgerung aus seinem Integralsatze Exerc. d'anal. 2 (1841), p. 53 (Wiederabdruck aus einer lithographierten Turiner Abhandlung von 1831). Elementar bewiesen von *Weierstraß*: Werke 1, p. 67 (aus einer nicht publizierten Abhandlung von 1841); s. a. *Pincherle*, a. a. O. p. 353. Mit Hilfe einer schon von *Cauchy* herrührenden (Exerc. d'an. 1 (1840), p. 278), die Integraldarstellung der Koeffizienten durch *elementare Mittelwerte* ersetzenden Methode im wesentlichen bewiesen von *E. Rouché*, Journ. de l'éc. polyt. cah. 39 (1862), p. 198; ausführlicher bei *J. A. Serret*, Cours d'algèbre 1 (5^{me} éd. 1885), p. 468. Exakte Begründung und zweckmäßige Weiterbildung dieser Methode bei *Pringsheim*, Math. Ann. 47 (1896), p. 121; München Ber. 26 (1896), p. 167.

35) *Weierstraß*, a. a. O.³⁴ p. 68; *Pincherle*, a. a. O.³ p. 336.

36) Früher gewöhnlich so ausgesprochen, daß die Voraussetzung $\sum a_\nu x^\nu = 0$ für alle $|x| < \rho$ gefordert wurde, oft auch nach *Eulers* Vorgange (Introductio 1, art. 214) unstreng bewiesen (durch Einsetzen von $x = 0$, Division mit x , Einsetzen von $x = 0$ usw.). Strenger Beweis basiert auf der Stetigkeit der Potenzreihe, vgl. *Stolz*, 1, p. 183; 2, p. 160; *Stolz-Gmeiner*, F. 1, p. 180. Anderer, noch anschaulicherer Beweis nach *Weierstraß* mit Hilfe des Koeffizientensatzes bei *Pincherle*³, p. 344. — Der Satz läßt sich auf beliebig viele Veränderliche ausdehnen; s. z. B. *Stolz-Gmeiner*, F. 1, p. 226.

37) Das ist *wesentlich*; besitzen die Stellen x' , für welche $\mathfrak{P}(x') = 0$, eine Häufungsstelle nur *auf* dem Konvergenzkreise, so braucht $\mathfrak{P}(x)$ *nicht* identisch zu verschwinden. (Beispiel: $\mathfrak{P}(x) = \sin \frac{\pi}{x-1}$).

38) Unter der engeren Voraussetzung, daß $\sum a_\nu x^\nu = 0$ für alle x zwischen zwei positiven Zahlen, als zu beweisendes Theorem aufgestellt von *Abel*, J. f. Math. 2 (1827), p. 286 = Oeuvres 1, p. 618. — Der Beweis des Satzes in der allgemeineren Form beruht auf der Umformung von $\mathfrak{P}(x)$ in $\mathfrak{P}(x|a)$ und dem folgenden von *Weierstraß* formulierten Fundamentalsatze: Konvergieren $\mathfrak{P}_1(x-a)$ und $\mathfrak{P}_2(x-b)$ in T und ist $\mathfrak{P}_1(x-a) = \mathfrak{P}_2(x-b)$ für unendlich viele x mit einer *im Innern* von T gelegenen Häufungsstelle, so besteht jene *Gleichheit* für alle x von T (*Pincherle*, a. a. O.³ p. 329; *Stolz-Gmeiner*, F. 1, p. 198).

folgt die *Identität* von $\sum_0^{\infty} a_v x^v$, $\sum_0^{\infty} b_v x^v$, wenn *Gleichheit* besteht für unendlich viele x mit einer im *Innern* des gemeinsamen Konvergenzbezirktes gelegenen Häufungsstelle³⁹⁾.

Auf dieser „*Eindeutigkeit*“ der Potenzreihenentwicklung beruht die Berechtigung der von den älteren Analytischen meist ohne hinlängliche Begründung benützten überaus fruchtbaren *Methode der unbestimmten Koeffizienten*⁴⁰⁾.

Die Anwendung der für beliebige konvergente Reihen geltenden Additions- und Multiplikationsregeln liefert das Resultat, daß $P_1(x) \pm P_2(x)$, $P_1(x) \cdot P_2(x)$ wieder in der Form $P(x)$ darstellbar sind⁴¹⁾. Dasselbe gilt dann von $(P_1(x))^n$ und schließlich von jeder ganzen

39) Gilt auch für $\sum_{-\infty}^{+\infty} a_v x^v$, $\sum_{-\infty}^{+\infty} b_v x^v$. Beweis mit Hilfe des Satzes in

Fußn. 38 und des Koeffizientensatzes nach *Weierstraß*; s. z. B. *Stolz*, 2, p. 167—173.

40) Im Principe 1637 von *Descartes* ausgesprochen (*Geometria*, ed. Schooten (1659), p. 45), seit Ende des 17. Jahrhunderts zur Auffindung von Potenzreihenentwicklungen gegebener Funktionen sowie zur Integration von Differentialgleichungen vielfach angewandt.

41) *Cauchy*, An., p. 156—157. — Sind R_1, R_2, R die Konvergenzradien von $\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2, \mathfrak{F}$, wo $\mathfrak{F} = \mathfrak{F}_1 \pm \mathfrak{F}_2$, so ist R *mindestens* gleich der *kleineren* der Zahlen R_1, R_2 , und zwar *stets* genau gleich der *kleineren* dieser beiden Zahlen, falls R_1 und R_2 *verschieden* sind. Ist aber $R_1 = R_2$, so kann R *beliebig viel größer* sein.

$$\text{Beispiele:} \quad \sum_0^{\infty} x^v \pm \sum_0^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^v = \sum_0^{\infty} \left(1 \pm \left(\frac{1}{2}\right)^v\right) x^v,$$

also:

$$R_1 = 1, R_2 = 2, R = R_1 = 1.$$

Dagegen:

$$\sum_0^{\infty} x^v + \sum_0^{\infty} \left(\frac{1}{v!} - 1\right) x^v = \sum_0^{\infty} \frac{x^v}{v!}, \text{ also: } R_1 = R_2 = 1, R = \infty.$$

Anders liegt die Sache im Falle $\mathfrak{F} = \mathfrak{F}_1 \cdot \mathfrak{F}_2$. Auch hier ist zwar *stets* R *mindestens* gleich der *kleineren* der Zahlen R_1, R_2 , dagegen kann R auch gleich der *größeren* der Zahlen R_1, R_2 , sowie *beliebig viel größer* sein als R_1 und R_2 , *gleichgiltig*, ob R_1 und R_2 *einander gleich* oder *verschieden* sind.

Beispiele:

$$\mathfrak{F}_1 = \frac{1}{1-x}, \quad \mathfrak{F}_2 = \frac{1}{2-x}, \quad \text{also: } R_1 = 1, R_2 = 2, R = R_1 = 1.$$

$$\mathfrak{F}_1 = \frac{1}{1-x}, \quad \mathfrak{F}_2 = \frac{1-x}{2-x}, \quad \text{also: } R_1 = 1, R_2 = 2, R = R_2 = 2.$$

$$\mathfrak{F}_1 = \frac{1}{1-x}, \quad \mathfrak{F}_2 = \frac{1}{1+x}, \quad \text{also: } R_1 = R_2 = R = 1.$$

rationalen Funktion $g(P_1(x))$. Die Anwendbarkeit der Additionsregel auch für *unendlich viele* $P_\mu(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_\nu^{(\mu)} x^\nu$ ($\mu = 1, 2, 3, \dots$) ergibt sich für $R_0 < |x| < R$ aus dem *Cauchyschen* Doppelreihensatze (s. I G 3, Nr. 5), falls nicht nur $\sum_1^\infty \sum_{-\infty}^{+\infty} a_\nu^{(\mu)} x^\nu$, sondern auch $\sum_1^\infty \sum_{-\infty}^{+\infty} |a_\nu^{(\mu)} x^\nu|$ konvergiert. Eine *weitere* Bedingung gibt der *Weierstraßsche* Doppelreihensatz⁴²⁾, welcher nur die *gleichmäßige* Konvergenz von $\sum_1^\infty \sum_{-\infty}^{+\infty} a_\nu^{(\mu)} x^\nu$ auf jedem Kreise $|x| = r$, wo $R_0 < r < R$, verlangt⁴³⁾. Als Folgerung ergibt sich die Darstellbarkeit von $\mathfrak{P}_2(\mathfrak{P}_1(x))$ in der Form $\mathfrak{P}(x)$, falls $|\mathfrak{P}_1(0)|$ kleiner ist als der Konvergenzradius von $\mathfrak{P}_2(y)$ ⁴⁴⁾ (u. a. allemal dann, wenn $\mathfrak{P}_1(0) = 0$ oder $\mathfrak{P}_2(y)$ beständig konvergiert), endlich auch diejenige von $\frac{\mathfrak{P}_1(x)}{\mathfrak{P}_2(x)}$, sofern $|\mathfrak{P}_2(0)| > 0$. Da hiernach im Falle $|\mathfrak{P}_2(0)| > 0$ eine Entwicklung von der Form

$$(22) \quad \frac{\mathfrak{P}_1(x)}{\mathfrak{P}_2(x)} \equiv \frac{\sum_0^\infty a_\nu x^\nu}{\sum_0^\infty b_\nu x^\nu} = \sum_0^\infty c_\nu x^\nu$$

für hinlänglich kleine x *stets* und nach dem zuvor Gesagten nur auf *eine* Weise möglich ist, so gewinnt man durch Multiplikation mit $\sum b_\nu x^\nu$ und Koeffizientenvergleichung zur Berechnung der unbekanntnen

$$\mathfrak{P}_1 = \frac{1+x}{1-x}, \quad \mathfrak{P}_2 = \frac{1-x}{1+x} e^x, \quad \text{also: } R_1 = R_2 = 1, \quad R = \infty.$$

$$\mathfrak{P}_1 = \frac{2-x}{1-x}, \quad \mathfrak{P}_2 = \frac{1-x}{2-x} e^x, \quad \text{also: } R_1 = 1, \quad R_2 = 2, \quad R = \infty).$$

Vgl. auch *A. Pringsheim*, Americ. Math. Soc. Transact. 2 (1901), p. 405. —

Analoge Betrachtungen gelten für Potenzreihen von der Form $P_1(x)$, $P_2(x)$,

42) Schon in der Fußn. 34 zitierten Abhandlung von 1841 (und zwar für beliebig viele Veränderliche), p. 70. Außerdem Berlin Ber. 1880, p. 723 = Werke 2, p. 205. Vgl. auch *Stolz*, Math. Ann. 24 (1884), p. 169; *Pringsheim*, Math. Ann. 47 (1896), p. 144. — Im übrigen s. II B 1, p. 21.

43) Auch die *gleichmäßige* Konvergenz ist lediglich eine *hinreichende*, *keine notwendige* Bedingung: *C. Runge*, Acta math. 6 (1885), p. 245; *C. Arzelà*, Rendic. Accad. Bologna 1888.

44) *Cauchy*, Rés. analyt. (1833), p. 65, 161; *Pincherle*, a. a. O.³⁾ p. 339 (ebendasselbst auch für beliebig viele Veränderliche). S. z. B. auch *Stolz* 1, p. 284, 294; 2, p. 160.

Koeffizienten c_v die Rekursionsformel:

$$(23) \quad b_0 c_v + b_1 c_{v-1} + \cdots + b_v c_0 = a_v \quad (v=0, 1, 2, \dots).$$

Der Konvergenzkreis der Reihe $\sum c_v x^v$ reicht bis zu der dem Nullpunkte nächst gelegenen *singulären* Stelle von $\frac{\mathfrak{P}_1(x)}{\mathfrak{P}_2(x)}$ (s. Nr. 1); insbesondere bis zu der dem Nullpunkte nächst gelegenen *Nullstelle* α von $\mathfrak{P}_2(x)$, wenn die Konvergenzradien von $\mathfrak{P}_1(x)$, $\mathfrak{P}_2(x)$ größer als $|\alpha|$ und $|\mathfrak{P}_1(\alpha)| > 0$ ⁴⁵⁾. Dabei hat man $\lim_{v \rightarrow \infty} \frac{c_v}{c_{v+1}} = \alpha$, falls nur eine *einzige* Nullstelle mit dem absoluten Betrage $|\alpha|$ vorhanden ist⁴⁶⁾.

Für den Fall $\mathfrak{P}_2(x) = \sum_0^n b_v x^v = g(x)$, $\mathfrak{P}_1(x) = g'(x)$ resultiert hieraus eine schon von *Daniel Bernoulli* angegebene Methode zur Berechnung der numerisch kleinsten Wurzel der Gleichung $g(x) = 0$ ⁴⁷⁾

Zu den mit algebraisch-elementaren Hilfsmitteln zu erweisenden wichtigen Eigenschaften der Potenzreihe $y = \sum_0^\infty a_v x^v$ gehört noch deren *Umkehrbarkeit*⁴⁸⁾. Danach hat man⁴⁹⁾, wenn $|a_1| > 0$ und *nur* in diesem Falle: $x = \sum_1^\infty b_v (y - a_0)^v$ für eine gewisse Umgebung der Stelle $y = a_0$; die b_v können aus den a_v nach der Methode der unbestimmten Koeffizienten rekursorisch berechnet werden⁵⁰⁾. Der Satz ist ein spezieller Fall des folgenden⁵¹⁾: „Konvergiert $\sum_0^\infty \sum_0^\infty a_{\mu\nu} x^\mu y^\nu$

45) Für den Fall, daß $\mathfrak{P}_1(x)$, $\mathfrak{P}_2(x)$ sich auf Polynome reduzieren, schon bei *Cauchy*, An., p. 397. Für den allgemeinen Fall ebenfalls zuerst bei *Cauchy*, s. Fußn. 11.

46) *Julius König*, Math. Ann. 23 (1884), p. 448. Weiteres s. *Jacques Hadamard*, La série de Taylor et son prolongement analytique, p. 19, 39. Vgl. im übrigen II B 1, Nr. 35, 36.

47) S. IB 3a, Nr. 13.

48) Das Problem der *Umkehrung* einer Potenzreihe zuerst bei *Newton*, De analysi per aequationes numero terminorum infinitas (1669, publ. 1704), cap. VII = Opuscula 1 (1744), p. 20.

49) Strenger Beweis mit Benützung eines *Cauchyschen* Konvergenzprinzips (Exerc. d'anal. 1 (1840), p. 355, § III) wohl nach *Weierstraß* bei *Thomae*, El. Theorie der analyt. Funkt. (1880), p. 107 = 2. Aufl. (1898), p. 137. S. auch Fußn. 51.

50) Methode zur expliziten Darstellung der b_v bei *C. G. Jacobi*, Journ. f. Math. 6 (1830), p. 267 = Werke 6, p. 38.

51) Konvergenzbeweis bei *Stolz*, Math. Ann. 8 (1875), p. 418; Allg. Arithm. 1, p. 296; *Stolz-Gmeiner*, F. 1, p. 229; *Thomae*, a. a. O. p. 109 bzw. 139.

absolut für eine gewisse Umgebung der Stelle $x = 0, y = 0$, so hat die Gleichung

$$\sum_0^{\infty} \sum_0^{\infty} a_{\mu\nu} x^\mu y^\nu = 0$$

in der Umgebung von $x = 0$ stets eine und nur eine Auflösung von der Form:

$$y = \sum_0^{\infty} b_\lambda x^\lambda,$$

falls $a_{00} = 0, |a_{01}| > 0$.⁵²⁾ Ein analoger Satz gilt für Potenzreihen mit beliebig vielen Veränderlichen⁵²⁾ und kann schließlich als spezieller Fall eines noch allgemeineren, für die Theorie der analytischen Funktionen mehrerer Variablen grundlegenden Satzes von Weierstraß^{52a)} (des sog. „Weierstraßschen Vorbereitungssatzes“⁵³⁾) angesehen werden.

4. Rationale Funktionen und rekurrente Reihen. Reduzieren sich die in Gl. (22) mit $\mathfrak{P}_1(x), \mathfrak{P}_2(x)$ bezeichneten Potenzreihen auf Polynome m^{ten} bzw. n^{ten} Grades ohne gemeinsamen Teiler:

$$\sum_0^m a_\nu x^\nu = f(x), \quad \sum_0^n b_\nu x^\nu = g(x) \quad (\text{wo } |b_0| > 0),$$

so daß also für die (irreduzible) rationale Funktion $\frac{f(x)}{g(x)}$ eine Entwicklung von der Form besteht:

$$(24) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \sum_0^{\infty} c_\nu x^\nu,$$

so genügen nach Gl. (23) die c_ν für $\nu \geq p$ (wo p die größere der beiden Zahlen $m + 1$ und n , eventuell $p = m + 1 = n$) der folgenden $(n + 1)$ -gliedrigen, linearen homogenen Relation mit unveränderlichen Koeffizienten:

$$(25) \quad b_0 c_\nu + b_1 c_{\nu-1} + \dots + b_n c_{\nu-n} = 0.^{53)}$$

52) Beweis — wiederum mit Benützung eines von Cauchy und Weierstraß herrührenden Grundgedankens — bei Stolz, Grundz. d. Diff.- u. Integr.-Rechnung 1 (1893), p. 162.

52a) Weierstraß, Abh. aus der Funktionenlehre (1886), p. 107 = Werke 2, p. 135 (vgl. II B 1, p. 105, Nr. 45). Ebendasselbst (p. 111 bzw. 139) gibt auch W. eine Verallgemeinerung der Jacobischen Koeffizientendarstellung⁵⁰⁾.

53) Man findet Gl. (25) vermöge der Substitution — $\frac{b_\lambda}{b_0} = B_\lambda$ ($\lambda = 1, 2, \dots, n$) häufig auch in die Form gesetzt:

$$(25^a) \quad c_\nu = \sum_1^n B_\lambda c_{\nu-\lambda}.$$

Die Reihe $\sum c_v x^v$ wird alsdann nach dem Vorgange von *Abraham de Moivre*⁵⁴⁾ als eine *rekurrente* (nach *Lagrange*⁵⁷⁾ mit dem Zusatze *n*^{ter} *Ordnung*), der Zahlenkomplex (b_0, b_1, \dots, b_n) als deren *Skala* („scala relationis“, „échelle de relation“) bezeichnet. Umgekehrt kann man zu jeder rekurrenten Reihe mit der Skala (b_0, b_1, \dots, b_n) die „erzeugende Funktion“ („fonction génératrice“), d. h. eine zu ihr in der Beziehung (24) stehende *rationale Funktion* mit dem Nenner:

$$(26) \quad g(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n$$

angeben⁵⁵⁾. Daraus folgt, daß jede rekurrente Reihe *eo ipso* einen von Null verschiedenen Konvergenzbereich besitzt⁵⁶⁾.

Das schon von *Moivre* und *Euler* behandelte Hauptproblem, bei gegebenen oder willkürlich angenommenen Anfangswerten c_0, c_1, \dots, c_{n-1} einen independenten Ausdruck für jedes beliebige c_v ($v \geq n$) herzustellen, wurde von *Lagrange*⁵⁷⁾ als identisch mit der Integration einer

(Bei dieser Schreibweise pflegt man dann (B_1, \dots, B_n) als die *Skala* der Reihe zu bezeichnen.)

54) Lond. Phil. Trans. 32 (1722), p. 176. Die daselbst zunächst ohne Beweise mitgeteilten Resultate erscheinen zu einer verhältnismäßig vollständigen formalen Theorie der rekurrenten Reihe verarbeitet in den *Miscell. analyt.* (London 1730), p. 27 ff. Die in neueren Arbeiten⁶³⁾,⁶⁵⁾ auftretende irreführende Bemerkung, es habe schon *Giovanni Domenico Cassini* 1680 sich mit rekurrenten Reihen beschäftigt, reduziert sich auf das unerhebliche Faktum, daß dieser letztere gelegentlich einige ganz spezielle *arithmetische* Eigenschaften der *ganzzahligen*, allerdings unter das Rekursionsgesetz (25) fallenden Zahlenfolge: $c_v = c_{v-1} + c_{v-2}$ (wo $c_1 = c_0$ eine beliebige *natürliche* Zahl) hervorgehoben hat (Paris Hist. Acad. 1666—1686, publ. 1733, p. 201).

55) Das Problem der *Summation* einer rekurrenten Reihe bei *Moivre*, *Miscell.*, p. 72 ff.; auch bei *Euler*, *Introd.* 1, art. 231—233. In moderner Darstellung z. B. bei *Stolz*, 1, p. 292.

56) Dies kann auch leicht direkt nachgewiesen werden: vgl. *van Vleck*, *Am. M. S. Trans.* 1 (1900), p. 294, wo der etwas allgemeinere Fall

$$c_v = \sum_1^n B_\lambda^{(v)} c_{v-\lambda}, \quad \lim_{v \rightarrow \infty} B_\lambda^{(v)} = B_\lambda$$

behandelt wird. Im Anschlusse daran einige Konvergenzkriterien für Potenzreihen, deren Koeffizienten gewissen linearen Relationen genügen. Vgl. auch *D'Ocagne*⁶⁵⁾, p. 189.

57) *Miscell. Taur.* 1 (1759) = *Oeuvres* 1, p. 23; elementarer und ausführlicher *Berlin Nouv. Mém.* 1775 = *Oeuvres* 4, p. 151. *Lagrange* behandelt auch den

etwas allgemeineren Fall: $\sum_0^n b_\lambda c_{v-\lambda} = \gamma_v$ (entsprechend der linearen Differenzengleichung „mit einem zweiten Teil“).

Auch gibt er in der zweiten Abhandlung eine ausführliche Theorie der in anderer Weise schon von *Laplace* (*Paris Mém.*

linearen Differenzgleichung n^{ter} Ordnung⁵⁸) erkannt. Die Lösung hängt daher (wie bereits auch *Moirve* und *Euler* auf anderem Wege erkannt hatten⁵⁹) naturgemäß⁵⁸) von den Wurzeln der Gleichung (*équation génératrice*)

$$(27) \quad G(y) \equiv y^n \cdot g\left(\frac{1}{y}\right) = 0$$

ab. Besitzt dieselbe n verschiedene Wurzeln $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, so ergibt sich:

$$(28) \quad c_v = \sum_1^v P_\lambda \alpha_\lambda^v,$$

wo die P_λ von den Anfangswerten c_0, \dots, c_{n-1} und von α_λ abhängige Konstanten bedeuten. Ist dagegen α_λ eine κ_λ -fache Wurzel von $G(y) = 0$, so tritt an die Stelle von P_λ ein bestimmtes Polynom $P_{\kappa_\lambda}(v)$ ($\kappa_\lambda - 1$)^{ten} Grades in v .⁶⁰)

Lagranges in gewissem Sinne vollständige Lösung des fraglichen Problems leidet an dem prinzipiellen Übelstande, daß sie die im allgemeinen nicht erreichbare Kenntnis der Wurzeln α_λ voraussetzt⁶¹). Dazu kommt noch, daß die Form jener $P_{\kappa_\lambda}(v)$ mit κ_λ variiert⁶²) und ihre Komplikation mit wachsender Multiplizitätsziffer κ_λ rapid zunimmt. Aus diesen Gründen haben in neuerer Zeit *Désiré André* und *Maurice d'Ocagne* jenes Problem wieder aufgenommen.

*André*⁶³) legt seinen Untersuchungen eine allgemeinere Rekursionsformel, als die unter (25) bzw. (25^a) angegebene, zugrunde, nämlich:

$$(29) \quad c_v = \beta_v + \sum_1^{n_v} B_\lambda^{(v)} c_{v-\lambda},$$

und unterscheidet acht verschiedene Typen von Reihen, je nachdem er $B_\lambda^{(v)}$ als mit λ und v oder nur mit einem dieser beiden Indizes oder endlich gar nicht veränderlich, sodann n_v als mit v veränderlich oder

sav. étr. 6 [1774], p. 353 = Oeuvres 8, p. 5; ebendas. 7, 1773 [1776] = Oeuvres 8, p. 69) behandelten rekurrenten Doppelreihen („séries récurro-récurrentes“).

58) Vgl. I E, Nr. 15.

59) *Moirve*, Misc., p. 33; *Euler*, Introd., art. 215 (p. 177).

60) Auf diesen Fall der mehrfachen Wurzeln kommt *Lagrange* später noch ausführlicher zurück Berlin Nouv. Mém. 1792—93 = Oeuvres 5, p. 625.

61) Selbstverständlich könnte man c_v als Lösung eines linearen Gleichungssystems ohne weiteres in der Form von Quotienten zweier Determinanten anschreiben. Damit wäre aber in Wahrheit nicht viel gewonnen.

62) Über eine von *Lagrange*⁶⁰), p. 640 ohne Beweis mitgeteilte, diesen Mangel beseitigende Formel s. *G. Jacobi*, Dissert. Berol. 1825 = Werke 3, p. 3 ff. (speziell Art. 9).

63) Ann. éc. norm. (2) 7 (1878), p. 375.

konstant annimmt⁶⁴). Mit Hilfe kombinatorischer Betrachtungen entwickelt er sodann für den allgemeinsten Fall einen aus den β_λ , $B_\lambda^{(\nu)}$ zusammengesetzten Ausdruck für c_ν , der für die einzelnen Spezialtypen verschiedene, entsprechend vereinfachte Formen annimmt. *D'Ocagne*⁶⁵) beschränkt sich im wesentlichen auf die *gewöhnlichen rekurrenten Reihen* und vereinfacht vor allem die nach *Lagranges* Vorgange ihm wiederum als Grundlage dienende Integration einer linearen Differenzgleichung durch den Nachweis, daß es in der Hauptsache genügt, diese Aufgabe für die zur Skala (B_1, \dots, B_n) gehörige „Fundamentalarreihe“, d. h. diejenige mit den Anfangswerten $c_0 = \dots = c_{n-1} = 0$, $c_n = 1$, zu lösen. Er gelangt auf diesem Wege sowohl zu dem *Andréschen* Ausdrücke für c_ν , als auch zu einer wesentlich vereinfachten und verbesserten Darstellung durch die Wurzeln von $G(y) = 0$, sowie zu einem Konvergenzkriterium und einer Summationsformel für $\sum c_\nu$. Der nämlichen Darstellung der c_ν durch die Wurzeln von $G(y) = 0$ hat sich auch *A. Capelli*^{65a}) bedient, um die im wesentlichen schon von *Daniel Bernoulli* und *Euler*^{65b}) stammenden Betrachtungen über die eventuelle Existenz des Grenzwertes $\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{c_{\nu+1}}{c_\nu}$ und dessen Bedeutung als numerisch größte Wurzel der Gleichung $g(x) = 0$ zu vereinfachen und zu vervollständigen.

Die rekurrenten Reihen stehen in enger Beziehung zu der Entwicklung einer rationalen Funktion in *Partialbrüche*⁶⁶). Ist a eine k -fache Nullstelle von $g(x)$, etwa $g(x) = (x - a)^k \cdot g_1(x)$, und $f(x) = f_1(x - a)$ (wo $|f(a)| \equiv |f_1(0)| > 0$), so ergibt sich mit Benutzung von (24):

$$(30) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f_1(x - a)}{(x - a)^k \cdot g_1(x - a)} = \frac{1}{(x - a)^k} \sum_0^{\infty} c'_\nu (x - a)^\nu,$$

so daß also die Terme $c'_\nu (x - a)^{\nu-k}$ ($\nu = 0, 1, \dots, (k - 1)$) die von der Wurzel $x = a$ herrührenden Partialbrüche liefern⁶⁷).

64) Die Annahme $n_\nu = n$, $B_\lambda^{(\nu)} = B_\lambda$ für $\nu \geq n$ (bei *A.* = Typus VI, p. 399) liefert die in Fußn. 57 erwähnten allgemeineren *Lagrangeschen* und, wenn noch $\beta_\nu = 0$ für $\nu \geq n$, die *gewöhnlichen rekurrenten Reihen*.

65) *J. éc. polyt.* 64 (1894), p. 151. Auf p. 222 eine geometrische Konstruktion für die c_ν einer rekurrenten Reihe.

65a) *Napoli Rend.* (3), 1 p. 194. Auch *A. Capelli*, *Anal. algebr.* 1902, p. 538.

65b) *D. Bernoulli*, *Comment. Acad. Petrop.* 3 ad ann. 1728 [1732], p. 85; *Euler*, *Introd.* art. 332 (p. 276). Vgl. I B 3a, Nr. 13.

66) Vgl. II A 2, Nr. 26.

67) *S. z. B. Lipschitz*, *Algebr. Anal.*, p. 415; *Stolz*, 2, p. 164. — Der um-

5. Der allgemeine binomische Satz. Der binomische Satz für einen ganzen positiven Exponenten m :

$$(31) \quad (1 + \xi)^m = \sum_0^m m_\nu \xi^\nu$$

findet sich schon in *Michael Stifels Arithmetica integra*⁶⁸), jedoch nur in dem Sinne, daß daselbst ohne Beweis die *sukzessive* Berechnung der m_ν mit Hilfe der Rekursionsformel:

$$(32) \quad m_\nu = (m - 1)_\nu + (m - 1)_{\nu-1}$$

gelehrt wird. Über diese *additive* Zusammensetzung der Binomialkoeffizienten ist man länger als ein Jahrhundert kaum hinausgekommen⁶⁹). Den bekannten *independenten* Ausdruck:

$$(33) \quad m_\nu = \frac{m(m-1)\dots(m-\nu+1)}{1 \cdot 2 \dots \nu} \quad 70)$$

hat erst *Isaac Newton* auf Grund einer glücklichen Induktion auf

gekehrte Weg, die rekurrente Reihe $\sum c_\nu x^\nu$ aus der Partialbruchzerlegung von $\frac{f(x)}{g(x)}$ herzuleiten, bei *Euler*, *Introduct.*, Art. 212; *Cauchy*, *An.*, p. 396.

68) Nürnberg 1544, Fol. 44^b.

69) Vgl. *Cantor*, 2, p. 688; 3, p. 66. — Nach *Hutton*, *Phil. and math. dictionary* (London 1815) 1, p. 230 soll *Henry Briggs* (in seiner mir nicht erreichbaren *Arithmetica logarithmica*, Lond. 1624) bereits in Worten ein mit der Formel (33) übereinstimmendes Verfahren zur Berechnung der m_ν angegeben haben. Ferner ist ein von *Petrus de Fermat* (Brief an *Roberval* vom 4. Dez. 1636 = *Opera*, Tolosae 1679, p. 146; Anmerkung zu *Diophantus*, De numeris multangulis, Tol. 1670, p. 16) ohne Beweis mitgeteilter Satz über figurierte Zahlen inhaltlich gleichwertig mit der Formel: $(\nu + 1) \cdot (n + \nu)_{\nu+1} = n(n + \nu)_\nu$, anders geschrieben: $(\nu + 1) \cdot m_{\nu+1} = (m - \nu) \cdot m_\nu$, welche bei wiederholter Anwendung gleichfalls auf den *Newtonschen* Ausdruck (33) führt.

70) Die Bezeichnung m_n wohl zuerst bei *Rothe* (*Theorie der kombinatorischen Integrale*, Nürnberg 1820, p. 44), dann bei *Abel* (*J. f. Math.* 1 [1826], p. 318 = *Oeuvres* 1, p. 226). Ähnlich $(m)_n$ bei *Cauchy* (*Rés. analyt.*, p. 5) und $(m)^n$ schon bei *Condorcet* in der *Encyclop. méthodique* 1 (1784), p. 309. *Euler* (*Petrop. Acta*, 5, 1781 [1784], p. 89) schreibt $\left[\frac{m}{n}\right]$, woraus wohl die heute zu meist übliche, jedoch bei einem m in Bruchform unzweckmäßige Bezeichnung $\binom{m}{n}$ hervorgegangen ist. Andere Bezeichnungen sind: $m\mathfrak{A}$ bei *Hindenburg* (nach *Klügel*, 1, p. 309); $m\mathfrak{B}$ bei *Thibaut* (*Grundr. d. allg. Arithm.*, Göttingen 1809, p. 44), auch noch bei *Stern* (*Algebr. Anal.*, p. 44); C_m^n , der Kombinatorik entlehnt, noch heute, namentlich bei französischen Autoren, in Gebrauch. Für den Koeffizienten von ξ^ν in der Entwicklung von $(1 - \xi)^{-m}$, also für $\frac{m(m+1)\dots(m+\nu-1)}{1 \cdot 2 \dots \nu}$ schreibt *Cauchy* $[m]_\nu$ (*Rés. analyt.* p. 82).

gefunden⁷¹⁾ und damit tatsächlich auch erst die vollkommene analytische Formulierung des (gewöhnlichen) *binomischen Satzes* (31) („*der Newtonschen Formel*“) geliefert⁷²⁾. Zugleich aber gewinnt er durch Aufstellung des für jedes *beliebige* m wohldefinierten Ausdruckes (33) die Möglichkeit, die binomische Entwicklung in der *allgemeineren* (für *positive ganze* m mit (31) zusammenfallenden) Form:

$$(34) \quad (1 + \xi)^m = \sum_0^{\infty} m_\nu \xi^\nu \quad (,,\text{Binomische Reihe}“)$$

auf *beliebige reelle* m zu übertragen, freilich *ohne Beweis*, lediglich mit Hilfe einer sehr unvollkommenen, auf der rechnerischen Verifikation weniger Spezialfälle beruhenden Induktion. Der Satz, dessen universelle Bedeutung für die Analysis bald allgemein erkannt wurde, blieb trotz zahlreichster Anwendungen fast ein volles Jahrhundert ohne ausreichenden Beweis. Die zunächst vorliegenden Versuche, den Satz mit Hilfe der Differentialrechnung zu beweisen, sind teils unzulänglich⁷³⁾, teils enthalten sie einen vollständigen *circulus vitiosus*⁷⁴⁾. Erst

71) Brief an *Oldenburg* vom 24. Okt. 1676 (= *Opuscula*, Ed. Castilloneus, 1 [1784], p. 328), weniger deutlich schon in dem vorangehenden Briefe vom 13. Juni 1676 (= *Opuscula*, p. 307).

72) Die heute zumeist übliche, auf der Bestimmung der m_ν als *Kombinationsanzahl* beruhende Beweismethode (vgl. I A 2, Nr. 2, 13) wird *Jacob Bernoulli* zugeschrieben. Eine sehr elegante Form derselben bei *Cauchy*, *Rés. anal.*, p. 5, wo durch eine nur wenige Worte erfordernde kombinatorische Betrachtung die Rekursionsformel: $\nu \cdot m_\nu = m \cdot (m - 1)_{\nu-1}$ hergeleitet wird, die bei ν -maliger Anwendung den Ausdruck (33) liefert. Eine in Lehrbüchern nicht selten anzutreffende Beweisart, bei welcher aus den Spezialfällen $(1 + x)^2$, $(1 + x)^3$, $(1 + x)^4$ die Form (33) „vermutet“ (?) und sodann durch vollständige Induktion erwiesen wird, liefert lediglich eine Verifikation, keinen wirklich befriedigenden Beweis. Vervollkommener Induktionsbeweis bei *Hattendorff*, *Algebr. Anal.*, p. 84. Ein auf der Relation $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \{ (1 + x + h)^m - (1 + x)^m \} = m(1 + x)^{m-1}$ beruhender Beweis (s. z. B. *Schlömilch*, p. 146) gehört in Wahrheit der Differentialrechnung an.

73) Sie beruhen auf dem Ansatz mit unbestimmten Koeffizienten, setzen also von vornherein die erst zu beweisende *Existenz* der Entwicklung voraus; so z. B. *John Colson*, Kommentar zu *Newtons Method of fluxions* (London 1739), p. 309; *Colin Mac Laurin*, *Treatise of fluxions* (Edinburgh 1742), p. 607. Eine wirklich ausreichende Herleitung des Satzes mit Hilfe der Differentialrechnung wurde erst durch die strengere Begründung der *Taylor*schen Formel (*Lagrange*, *Cauchy* — s. II A 2, Nr. 11) ermöglicht.

74) Indem zunächst die binomische Reihe zur Differentiation der Potenz mit beliebigem Exponenten benützt wird (*Euler*, *Instit. calc. diff.* [Petrop. 1755], p. 124) und sodann die Differentialquotienten von $(1 + \xi)^m$ zur Herstellung der betreffenden *Mac Laurin*schen Reihe dienen (ebendas. p. 360). *Euler* hat diesen

1774 gab *Euler*⁷⁵⁾ einen vollgültigen, überdies durchaus elementaren Beweis, der, ganz abgesehen von der Wichtigkeit des Resultates, durch Neuheit und Fruchtbarkeit der Methode bedeutsam erscheint. *Euler* macht die Lösung der Aufgabe, statt wie bisher von der *Entwicklung* des Ausdruckes $(1 + \xi)^m$, von der *Summierung* der Reihe $\sum m_\nu \xi^\nu$ abhängig, zeigt vermittelst des sog. Additionstheorems der Binomialkoeffizienten⁷⁶⁾:

$$(35) \quad \sum_0^{\nu} m_\mu n_{\nu-\mu} = (m+n)_\nu,$$

daß $\sum m_\nu \xi^\nu$ als $f(m)$ betrachtet der *Funktionalgleichung*:

$$(36) \quad f(m) \cdot f(n) = f(m+n)$$

genügt⁷⁷⁾, und daß diese andererseits die einzige eindeutige Lösung⁷⁸⁾ $[f(1)]^m$, also im vorliegenden Falle $(1 + \xi)^m$, zuläßt.

Fehler späterhin⁷⁵⁾ selbst erkannt. — In der *Introductio*, deren wesentlichste Entwicklungen mit der binomischen Reihe stehen und fallen, findet sich merkwürdigerweise nicht die leiseste Andeutung eines Beweises: der Satz wird ohne jede nähere Erklärung als ein „*Theorema universale*“ (Art. 71) angeführt und in ausgiebigster Weise verwertet.

75) Petrop. Comment. 19 ad a. 1774 [1775], p. 103. Ein daselbst mit einiger Anerkennung zitierter Beweis von *Aepinus* (Petrop. Comment. 8 ad a. 1760 [1763], p. 169) ist gänzlich mißglückt. Ein angeblicher zweiter *Eulerscher* Beweis (vom Jahre 1776, erst nach *Eulers* Tode veröffentlicht: Petrop. Nova Acta 5 [1787]) beruht wiederum auf dem Ansätze mit unbestimmten Koeffizienten nebst Auflösung der Rekursionsformel (32) durch eine Art Probiermethode.

76) Beweis nach *Euler* a. a. O. zunächst für *positive ganze* m, n durch Koeffizientenvergleichung aus $(1+x)^m \cdot (1+x)^n = (1+x)^{m+n}$ (bei *Cauchy*, An. p. 98 mit Hilfe einer kombinatorischen Betrachtung), woraus dann *Euler* ohne weiteres (strenger *Cauchy* mit Hilfe des bekannten Identitätssatzes für ganze Funktionen) auf die vollkommene formale *Identität* der beiden Ausdrücke (35) schließt. Beweis durch vollständige Induktion bei *Simon L'Huilier* (Calc. diff. et integr. expositio element., Tubingae 1795, p. VI) und *de Stainville* (Gerg. Ann. 9 [1818—19], p. 230), welche den *Eulerschen* Beweis des binomischen Satzes von neuem aufgefunden zu haben scheinen. Beweis durch direkte Umrechnung (im wesentlichen schon bei *Euler* in der Abhandlung über die Binomialkoeffizienten⁷⁶⁾) s. z. B. *Schlömilch*, p. 154; *Baltzer*, 1, p. 219.

77) Die bei *Euler* selbstverständlich fehlende Feststellung der Konvergenz (für $|\xi| < 1$) bei *Cauchy*, An., p. 153. Letzterer zeigt auch, daß im Falle $f(1) > 0$, stets auch $[f(1)]^m > 0$, also $(1 + \xi)^m$ den (einzig)en *positiven* Wert der Potenz bedeutet.

78) Gilt zunächst nur für *rationale* m ; für *irrationale*, wenn man mit *Cauchy* (An., p. 104) $f(m)$ als *stetig* voraussetzt — eine Bedingung, die mit Benützung einer (auf die Funktionalgleichung $f(m) + f(n) = f(m+n)$ bezüglichen) Bemerkung von *Gaston Darboux* (Math. Ann. 17 [1880], p. 56), auch durch eine weniger enge ersetzt werden kann: s. *Stolz-Gmeiner*, A., p. 208. Über unstetige

Um die Summierung der Binomialreihe mit Festhaltung der *Eulerschen* Beweismethode auf den Fall einer *komplexen Veränderlichen* x zu übertragen, *definiert Cauchy* zunächst unter der Voraussetzung, daß:

$$(37) \quad a = \alpha + \beta i = \rho (\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad (-\pi < \varphi \leq \pi),$$

die Potenz a^m durch die Beziehung⁷⁹⁾:

$$(38) \quad \begin{aligned} a^m &= \rho^m (\cos m\varphi + i \sin m\varphi) \cdot ((1))^m \text{ }^{80)} \\ &= \rho^m (\cos m(\varphi + 2k\pi) + i \sin m(\varphi + 2k\pi)) \\ &\quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \end{aligned}$$

Diese Definition erweist sich als die allgemeinste, welche die Fundamenteigenschaften der Potenz mit positiver Basis und positivem Exponenten, insbesondere die Funktionalgleichung (36), bestehen läßt⁸¹⁾. Das so definierte a^m ist *einwertig*, q -wertig, ∞ -vielwertig, je nachdem m ganzzahlig, gebrochen und zwar als reduzierter Bruch $= \frac{p}{q}$, irrational. Bezeichnet man den aus (38) für $k = 0$ resultierenden Wert als den *Hauptwert*⁸⁰⁾ von a^m , so folgt⁸²⁾:

Lösungen jener Funktionalgleichung s. *G. Hamel*, Math. Ann. 60, p. 461. — Unzulänglich ist bekanntlich *Cauchys* Beweis für die *Stetigkeit* unendlicher Reihen (An., p. 131; vgl. II A 1, Nr. 17, Fußn. 178), mithin auch der daraus gezogene Schluß (a. a. O. p. 165) auf die Stetigkeit von $\sum m, \xi^v$ als Funktion von m ; derselbe kann indessen leicht durch den Nachweis ergänzt werden, daß die fragliche Reihe für $|m| \leq M$, $|\xi| \leq \rho < 1$ *gleichmäßig* konvergiert (s. z. B. *Stolz*, 1, p. 307). Das absprechende Urteil, welches *Stern* in der Vorrede seines Lehrbuches aus Anlaß dieser *einen* Beweislücke über *Cauchys* gesamte Analyse algébrique fällt, erscheint um so unberechtigter, als er jenen falschen, aber einfachen und durchsichtigen, infolgedessen auch relativ leicht zu komplettierenden Beweis *Cauchys* durch einen ebenso falschen, nur viel weitschweifigeren und äußerst konfusen ersetzt (a. a. O. p. 87; vgl. auch p. 395—399).

79) An., p. 223. Die nämliche Definition übrigens schon bei *Euler*: Berlin Hist. Acad. 5 (1749), p. 266.

80) Über die Bedeutung eines Symbols von der Form $((1))^m$ und die Bezeichnung des sog. Hauptwertes mehrdeutiger Ausdrücke s. Fußn. 98.

81) Das analoge Prinzip (nach heutiger, von *Hermann Hankel* [Theorie der kompl. Zahlensysteme, Leipzig 1867, p. 10] herrührender Bezeichnung: Prinzip der Permanenz formaler Gesetze; bei *G. Peacock*, Brit. assoc. rep. 3, 1834, p. 198: „principle of equivalent forms“) wird von *Cauchy* in der Anal. algéb. für die Übertragung der elementaren Transzendenten auf das komplexe Gebiet durchweg angewendet.

82) An., p. 296. Der Grenzfall $|x| = 1$ wird von *Cauchy* in der Anal. algéb. nicht behandelt. Dagegen zeigt er in den Exerc. de math. 1 (1826), p. 8 (= Oeuvres [2], 6, p. 19), daß die binomische Reihe noch für $x = -1$ konvergiert, wenn m positiv ist. *Bolzano*, der in seiner Abhandlung über den binomischen Lehrsatz (s. das Lit.-Verz unter „Monographien“) sich durchweg auf

Die Reihe $\sum_0^{\infty} m, x^m$ konvergiert für $|x| < 1$ nach dem Hauptwerte von $(1+x)^m$, d. h. man hat, für $x = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $r < 1$:

$$(39) \quad \sum_0^{\infty} m, x^m = \varrho^m (\cos m\psi + i \sin m\psi),$$

wo:

$$(40) \quad \left\{ \begin{array}{l} 1+x = \varrho(\cos \psi + i \sin \psi), \\ \text{d. h.: } \varrho = |\sqrt{1+2r \cos \varphi + r^2}|, \quad \operatorname{tg} \psi = \frac{r \sin \varphi}{1+r \cos \varphi} \\ \left(-\frac{\pi}{2} < \psi \leq \frac{\pi}{2}\right). \end{array} \right.$$

Die Ausdehnung dieses Resultates auf komplexe $m = \alpha + \lambda i$ nebst vollständiger Diskussion des Grenzfalles $|x| = 1$ gibt Abel⁸³), dessen Abhandlung über die binomische Reihe nicht nur durch ihr Endresultat, sondern namentlich durch exakte Behandlung der Frage nach der Stetigkeit einer Reihensumme erheblich über Cauchy hinausgeht⁸⁴). Durch geeignete Erweiterung des Eulerschen Beweisverfahrens⁸⁵) gewinnt er das folgende Resultat:

reelle x und m beschränkt, behauptet noch, daß die binomische Reihe für $x = \pm 1$, abgesehen von dem Fall eines ganzzahligen positiven m immer *divergire*.

83) J. f. Math. 1 (1826), p. 311 = Oeuvres 1, p. 219; s. auch das Lit.-Verz. unter „Monographien“.

84) Über den Satz betr. die Stetigkeit einer Potenzreihe s. Nr. 2, Fußn. 23. Ein anderer Stetigkeitssatz (Oeuvres 1, p. 223, Théorème V) ist zwar *in der von Abel gegebenen Fassung* zunächst nicht vollständig bewiesen (s. L. Sylow, Zus. z. Abel, Oeuvres 2, p. 303), ja sogar nachweisbar unrichtig (Pringsheim, München Ber. 27 [1897], p. 35), unter geeigneten Einschränkungen jedoch haltbar (vgl. Sylow, Pringsheim a. a. O.). Abels Beweise und Resultate wurden übrigens von vielen Mathematikern jener Zeit nicht verstanden (vgl. die unzutreffende Kritik Arndts³) und Björlings (Nova Acta Upsal. 13 [1847], p. 66, 156), sowie die vielfach unternommenen, als mißglückt zu bezeichnenden Versuche, die Abelschen Resultate einfacher abzuleiten, s. z. B. Crelle, J. f. Math. 4 (1829), p. 305; 5 (1830), p. 187; Grunert, Arch. f. Math. 8 (1846), p. 272 (auch: Supplem. zu Klügels Wörterb. der reinen Math. 1 (1833), p. 283); Björling, a. a. O. p. 81—86, p. 143—186.

85) Abel operiert dabei ausschließlich mit Funktionalgleichungen zwischen Funktionen reeller Veränderlicher, die er durch Trennung des reellen und imaginären Teils erhält; durch Benützung komplexer Funktionalgleichungen, unter Berücksichtigung des „analytischen“ Charakters der betreffenden Funktionen, läßt sich die Beweisführung erheblich zusammenziehen; s. Stolz, 2, p. 206; Stolz-Gmeiner, F. 2, p. 340.

Die Reihe $\sum_0^{\infty} (\kappa + \lambda i)_v \cdot x^v$ konvergiert absolut nicht nur für

$|x| < 1$, sondern im Falle $\kappa > 0$ auch noch für $|x| = 1$; ist $-1 < \kappa \leq 0$, so konvergiert sie für $|x| = 1$ noch bedingt, mit Ausnahme von $x = -1$, während sie im Falle $\kappa \leq -1$ für $|x| = 1$ ausnahmslos divergiert⁸⁶⁾. Soweit die Reihe konvergiert, hat man:

$$(41) \quad \sum_0^{\infty} (\kappa + \lambda i)_v \cdot x^v \\ = \varrho^{\kappa} \cdot (\cos \kappa \psi + i \sin \kappa \psi) \cdot e^{-\lambda \psi} \cdot (\cos (\lambda \lg \varrho) + i \cdot \sin (\lambda \lg \varrho))^{87)} \\ \text{(wo } \psi, \varrho \text{ durch Gl. (40) definiert sind).}^{88)}$$

6. Die Exponentialreihe. Die Exponentialreihe ergibt sich zunächst für eine reelle Veränderliche ξ , indem man $(1 + \frac{\xi}{n})^n$ in die binomische Reihe entwickelt⁸⁹⁾:

$$(42) \quad \left(1 + \frac{\xi}{n}\right)^n = \sum_0^{\infty} n_v \left(\frac{\xi}{n}\right)^v$$

und dann n unendlich werden läßt (s. (43^a)); die auf der rechten Seite dieser Gleichung erforderliche, von *Euler* und zunächst auch von *Cauchy*⁹⁰⁾ ohne ausreichende Begründung⁹¹⁾ vorgenommene Ver-

86) Der bei *Abel* noch recht weitläufige Konvergenzbeweis für $|x| = 1$ erledigt sich am einfachsten mit Hilfe der *Weierstraßschen* Kriterien (s. I G 3, Nr. 3, 4 und Fußn. 151 des vorliegenden Artikels). Eine in viele Lehrbücher übergegangene einfache Behandlung des Falles $|x| = 1$ für reelle m gibt *E. Heine*, J. f. Math. 55 (1858), p. 279.

87) J. f. Math. 1, p. 239 = Oeuvres 1, p. 238. Vgl. auch Nr. 7. — Aus Gl. (41) gewinnt *Abel* durch Trennung des Reellen und Imaginären, insbesondere für $|x| = 1$, Formeln zur Summation gewisser trigonometrischer Reihen, sowie zur Entwicklung von $(\cos x)^2$, $(\sin x)^2$.

88) Über Restabschätzung und Anwendung der binomischen Reihe zur numerischen Berechnung von Wurzeln s. z. B. *Schlömilch*, p. 164; *Stolz*, 1, p. 308, 313. — Bezüglich einer anderen elementaren Herleitung des allgemeinen binomischen Satzes s. Fußn. 110, 111.

89) Es ist nicht nötig n ganzzahlig zu denken.

90) *Euler*, *Introd.*, p. 85 (vorher ohne Beweis: *Misc. Berol.* 7 (1743), p. 177); *Cauchy*, *An.*, p. 167. — Die Beziehung (44) war schon 1728 *Dan. Bernoulli* bekannt (*Corresp. math.* [Fuß], p. 247); die Potenzreihe für e^{ξ} , ebenso für $\sin \xi$, $\cos \xi$, $\arcsin \xi$ wurde zuerst von *Newton* gefunden (s. *M. Cantor*, *Gesch. d. Math.* 3, p. 73–74; *A. v. Braunmühl*, *Gesch. d. Trigonometrie* 2, p. 61–62).

91) Bedenken hiergegen äußerte wohl zuerst *J. Liouville*, *J. de math.* (1840), p. 280, worauf *J. A. Grunert* (*Arch. f. Math.* 1 (1841), p. 204) einen auf dem Nachweis der gleichmäßigen Konvergenz beruhenden — der Begriff in seiner

tauschung zweier Grenzübergänge rechtfertigt sich dadurch, daß die betreffende Reihe für alle $|\xi| \leq R$ (R beliebig groß) und $n \geq n_R$ gleichmäßig konvergiert. Für $\lim n = \infty$ geht dann die Beziehung (42) in die folgende über⁹⁰⁾

$$(43^a) \quad \lim_{n=\infty} \left(1 + \frac{\xi}{n}\right)^n = \sum_0^{\infty} \frac{\xi^{\nu}}{\nu!}$$

$$(43^b) \quad = e^{\xi},^{92)}$$

wenn

$$(44) \quad \lim_{n=\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_0^{\infty} \frac{1}{\nu!}$$

mit e bezeichnet wird.

Der Grenzwert und die Reihe auf beiden Seiten von (43^a) bleiben konvergent, wenn man ξ durch die komplexe Zahl $x = \xi + i\eta$ ersetzt, und liefern dann zwei Definitionen⁹³⁾ der komplexen Potenz:

Allgemeinheit fehlt natürlich bei *Grunert* — Beweis von (44) gab. Strenger Beweis der allgemeinen Formel (43^a) bei *Cauchy*, Exerc. d'an. 4 (1847), p. 237 und in allen modernen Lehrbüchern, besonders einfach (nach *G. Darboux*) bei *Tannery et Molk*, Théorie des fonctions ellipt. 1, p. 101, 102 (auch für komplexe x). Ein durch Schärfe und Klarheit ausgezeichneter Beweis schon bei *S. L'Huilier*, Princ. calc. diff. et int. expos. element., Tubingae 1795, p. 92.

Einen direkten (nicht auf der Umformung in die Reihe beruhenden) Beweis für die Beziehung $\lim_{n=\infty} \left(1 + \frac{\xi}{n}\right)^n = e^{\xi}$ gibt *Cauchy*, Résumés des leçons etc. (1823), p. 2; vgl. I A 3, Nr. 17. (Entsprechende Herleitung der Formel $\lim_{n=\infty} n \left(\sqrt[n]{a} - 1\right) = \lg a$ bei *Schlömilch* p. 35, exakter bei *Ph. Wulff*, Monatsh. f. Math. 8 (1897), p. 49.)

92) Die Berechtigung zur Gleichsetzung der Ausdrücke (43^a) und (43^b) folgt aus der definierenden Gleichung $\lim_{\omega=\infty} \left(1 + \frac{1}{\omega}\right)^{\omega} = e$ durch die Substitution $\omega = \frac{\xi}{n}$ und Benützung der Relation $\lim_{\omega=\infty} a_{\omega}^{\xi} = (\lim_{\omega=\infty} a_{\omega})^{\xi}$ (d. h. also der Stetigkeit der Potenz) oder auch des Umstandes, daß die linke bzw. die damit identische rechte Seite von (43^a) der charakteristischen Funktionalgleichung der Potenz $f(\xi) \cdot f(\eta) = f(\xi + \eta)$ genügt (bezüglich der linken Seite: *Cauchy*, Résumés analyt., p. 118 und Exerc. d'an. 4, p. 239 [zugleich für komplexe x]; bezüglich der rechten: vgl. *Cauchy*, An., p. 168 und ⁹⁵⁾).

93) Die Reihendefinition bei *Cauchy*, An., p. 309; die Grenzwertdefinition bei *Schlömilch*, p. 237. — Eine andere Methode zur Einführung von e^x für komplexe x besteht darin, diejenige Potenzreihe (durch den Ansatz mit unbestimmten Koeffizienten) zu suchen, welche identisch die Funktionalgleichung $f(x) \cdot f(y) = f(x+y)$ mit der Nebenbedingung $f(1) = e$ befriedigt: *S. L'Huilier*, Princ. calc. diff. et int. expos. elem., p. 87—90; *Stainville*, Gergonne Ann. 9 (1818), p. 239; *Ohm*, System d. Math. 2, p. 203; *Thomae*, Elem. Theorie, p. 249; *Stolz*, 2, p. 199; *Stolz-Gmeiner*, F. 2, p. 343. — Auch das Problem, die einfachste

$e^x = e^{\xi + i\eta}$; die Zerlegung der Reihe $\sum_0^{\infty} \frac{x^v}{v!}$ bzw. des $\lim_{n=\infty} \left(1 + \frac{\xi + i\eta}{n}\right)^n$ in den reellen und imaginären Bestandteil⁹⁴⁾ ergibt:

$$(45) \quad e^{\xi + i\eta} = e^{\xi} (\cos \eta + i \sin \eta)^{95}.$$

In dieser Darstellung wird dann die Periodizität von e^x mit der Periode $2\pi i$ ersichtlich als Folge der Periodizität der trigonometrischen Funktionen mit der Periode 2π ⁹⁶⁾.

7. Der natürliche Logarithmus und die allgemeine Potenz. Jede der (unendlich vielen) Wurzeln y der Gleichung $e^y = x$ (x und y komplex) wird nach Analogie der für positive x und reelle y geltenden Definition als zur Basis e gehöriger oder natürlicher Logarithmus von x bezeichnet, in Zeichen: $y = \lg x$. Durch Auflösung von (45) ergibt sich⁹⁷⁾:

$$(46) \quad \lg x = \bar{\lg} r + i\varphi + 2k\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots),$$

wo

$$x = r (\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad (-\pi < \varphi \leq \pi)$$

ganze transzendente Funktion ohne Nullstellen zu suchen (*Weierstraß*), führt

$$\text{auf } \sum_0^{\infty} \frac{x^v}{v!}.$$

94) *Cauchy*, An., p. 300; *Schlömilch*, p. 239. Diese Zerlegung wird zunächst bei endlichem (ganzzahligem) n ausgeführt, worauf man im absoluten Betrage und Argument des Resultats n unendlich werden läßt.

95) *Cauchy*, An., p. 300; die Formel $e^{n i} = \cos \eta + i \sin \eta$ bei *Euler*, *Introductio*, p. 104; damit äquivalente schon vorher: *Misc. Berol.* 7 (1743, p. 177 und nach *Eneström* (*Bibl. math.* (1897), p. 48) in einem Briefe vom 20. Jan. 1740 an *Joh. Bernoulli*; die Formel (45): *Berlin Hist. Ac.* 5 (1749), p. 179. S. a. *Fußn.* 97.

96) Näheres über die Werteverteilung der Funktion e^x in den funktionentheoretischen Lehrbüchern, z. B. *Thomae*, p. 59; *Burkhardt*, *Analytische Funktionen* § 41. — Über den zahlentheoretischen Charakter (Irrationalität und Transzendenz) von e^x bei algebraischem x s. *IC* 3, Nr. 7, p. 667—674. Einen auf der Reihe (43*) basierenden sehr einfachen Irrationalitätsbeweis für e^{ξ} bei rationalem ξ gibt *Hermite*: *Rep. Brit. ass.* 1873; mit analogem Verfahren beweist er die Irrationalität von π : *Cours lithogr.* (1882), p. 74, 75; auch bei *Godefroy*, *Théorie élém.*, p. 153—155.

97) *Euler*, *Berlin Hist. Ac.* 5 (1749), p. 165, 277; *Cauchy*, An., p. 317. — Die Formel $\log (\cos \xi + i \sin \xi) = \xi i$ nach *v. Braunmühl* a. a. O. 2, p. 108 schon bei *R. Cotes*, *Harmonia mensurarum* (1702); vgl. auch *Fußn.* 95. *Euler* beendete durch die von ihm zuerst erkannte Unendlich-Vieldeutigkeit der mit $\lg x$ zu bezeichnenden Funktion den historisch interessanten, besonders zwischen *Leibniz* und *Joh. Bernoulli* geführten Streit über die Logarithmen negativer und imaginärer Zahlen. Vgl. *Cantor*, a. a. O. 3, p. 722.

und $\overline{\lg} r$ der einzige reelle Logarithmus der positiven Zahl r ist. Der für $k = 0$ resultierende Logarithmus heißt der *Hauptwert*⁹⁸⁾, in Zeichen: $\overline{\lg} x$; für positive x stimmt also derselbe mit dem gewöhnlichen reellen Logarithmus überein. Der allgemeine Logarithmus genügt wie der reelle der *Funktionalgleichung*:

$$(47) \quad \lg(xy) = \lg x + \lg y$$

und zwar in dem Sinne, daß jedem der unendlich vielen Werte der rechten Seite ein solcher der linken entspricht und umgekehrt, doch nicht immer der Summe zweier Hauptwerte rechts ein Hauptwert links⁹⁹⁾.

Die (wegen der Willkür von k in Gl. (46)) *unendlich vielen* Funktionen $e^{x \lg a}$ bilden in ihrer Gesamtheit die *allgemeine* x^a Potenz von a , in Zeichen a^x ; es ist also, wenn

$$x = \xi + i\eta \quad \text{und} \quad a = A(\cos \alpha + i \sin \alpha) \quad (-\pi < \alpha \leq \pi)$$

ist¹⁰⁰⁾:

$$(48) \quad a^x = A^\xi (\cos \xi(\alpha + 2k\pi) + i \sin \xi(\alpha + 2k\pi)) \cdot e^{-\eta(\alpha + 2k\pi)} (\cos \eta \lg A + i \sin \eta \lg A).$$

98) *Cauchy*, An., p. 314 nur für x mit positivem Realteil; ohne diese Einschränkung: *Exerc. d'an.* 3 (1844), p. 380; 4 (1847), p. 347; *Björling*, Acad. Stockh. 1845 = *Arch. f. Math.* 9 (1847). — Durch die Definition von Hauptwerten wird nach moderner funktionentheoretischer Auffassung ein mit einem Schnitt versehenes Blatt auf der *Riemannschen* Fläche der mehrdeutigen Funktion ausgezeichnet, und zwar bei den elementaren Funktionen (dem Logarithmus, der Potenz, den zyklometrischen) derjenige Zweig, der für positive oder reelle Variable schon durch die elementare Arithmetik oder Geometrie definiert ist. Die bei verschiedenen Autoren auftretenden verschiedenen Annahmen der Hauptwerte beruhen lediglich auf verschiedener Wahl jener Schnitte. In der Anal. algébr. sind zum ersten Male besondere unterscheidende Zeichen für die vielwertigen Funktionen, wie $l((x))$, $((a))^x$, $\sqrt[n]{a}$, $\arcsin((x))$ usw. und andererseits für ihre Hauptwerte $l(x)$, a^x , $\sqrt[n]{a}$, $\arcsin x$ usw. eingeführt, die teilweise von *Stolz-Gmeiner* adoptiert wurden, neben der *Peanoschen* Bezeichnungsweise: $\sqrt[n]{*} a$ und $\sqrt[n]{\bar{a}}$ (*Formulaire de la Rivista* 4, p. 220). In der Allgem. Arithmetik schrieb *Stolz* in entsprechendem Sinne: Lx bzw. lx ; $\text{Arctg } x$ bzw. $\text{arctg } x$. Die im Text angewendete Bezeichnung $\overline{\lg} x$ ist die der *Weierstraßschen* Vorlesungen. Die Benennung Hauptwert (*valor principalis*, *potentia principalis* usw.) geht auf *Björling* zurück: *Arch. f. Math.* 9 (1847), z. B. p. 393, 421; *ibid.* 11 (1848), z. B. p. 49.

99) Über diese und weitere Beziehungen zwischen Logarithmen, insbesondere über die Gültigkeit der Funktionalgleichung $\lg x^n = n \lg x$ s. *Cauchy*, An., p. 328; *Résumés analyt.*, p. 159; *Björling*, a. a. O.⁹⁸⁾; *Stolz*, 2, p. 201; *Stolz-Gmeiner*, F., p. 366—370.

100) *Euler*, Berlin Hist. Ac. 5 (1749), p. 273. — *Cauchy* ließ zunächst (An., p. 310) nur positives a zu, später (*Exerc. d'An.* 3, p. 385; 4, p. 255) fand er die *Eulersche* Definition wieder, ungefähr gleichzeitig mit *Björling* (*Arch. f. Math.* 9

Der hieraus für $k = 0$ resultierende Wert, welcher also mit $e^{x \lg a}$ identisch ist, heißt der *Hauptwert* der Potenz a^x .

Hiernach läßt sich die *Abelsche* Summation der Binomialreihe (s. Nr. 5 am Schluß) so formulieren: Die Reihe $\sum_0^{\infty} m_v x^v$ hat, wenn sie konvergiert, den Hauptwert von $(1+x)^m$ zur Summe.

Die Funktionalgleichungen:

$$(49) \quad \begin{aligned} a^x \cdot a^y &= a^{x+y} \\ (a^x)^y &= a^{x \cdot y}, \end{aligned}$$

wo beiderseits allgemeine Potenzen stehen, gelten nur insofern, als jedem Werte der rechten Seite auch ein solcher der linken entspricht, aber nicht umgekehrt. Dagegen ist in der Gleichung

$$(50) \quad a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$$

der Wertvorrat der linken Seite der nämliche, wie derjenige der rechten ¹⁰¹⁾.

8. Die logarithmische Reihe. Die *reellen* Logarithmen *positiver* Zahlen wurden vor Erfindung der Infinitesimalrechnung nach Methoden berechnet, die auf eine *wirkliche Herstellung* der heutzutage zur *Definition* derselben benutzten konvergenten Folgen hinauslaufen ^{101a)}. So besteht das von *Briggs* und *Vlack*¹⁰²⁾ zur Konstruktion ihrer Tafeln angewandte Verfahren¹⁰³⁾ dem Sinne nach darin, daß durch Quadrat-

(1847), p. 414. *Cauchy* und *Björling* (a. a. O.) definieren auch den zur komplexen Basis b gehörigen Logarithmus von x : $\log x = \frac{\lg x}{\lg b}$.

101) Über die „Vollständigkeit“ (d. h. Gleichheit des Wertevorrats auf der rechten und linken Seite) dieser und anderer Gleichungen zwischen Potenzen, sowie deren Gültigkeit für Hauptwerte s. *Cauchy*, Exerc. d'An. 3, p. 376; *Björling* a. a. O.⁹⁸⁾; *Stolz*, 2, p. 203 und am ausführlichsten *Stolz-Gmeiner*, F., p. 370—377.

101*) S. z. B. *Stolz*, 1, p. 143; *Stolz-Gmeiner*, F., p. 210.

102) *Arithmetica logarithmica* 1624 von *Briggs* herausgegeben, zweite vervollständigte Ausgabe von *Vlack*; der Grundgedanke des Verfahrens schon im Appendix zu *Nepers* Tafeln (Lugduni 1620), p. 39. — Die Auffassung des Logarithmus als Umkehrung der Potenz hat sich erst im 18. Jahrhundert allmählich Bahn gebrochen; bei den ersten Berechnern von Logarithmentafeln (*J. Neper*, *Mirifici logarithmorum canonis descriptio*, Lugduni 1614 und *J. Bürgi*, *Arithm. u. geom. Progreßtabulen*, Prag 1620) sind die Logarithmen aufgefaßt als eine arithmetische Reihe, die einer geometrischen (den numeris) zugeordnet ist. Vgl. *Cantor*, *Gesch. der Math.* 2, p. 662.

103) Davon ist nur in der Anordnung verschieden das von *Euler* (Introd., p. 76) zitierte und an einem Beispiel erklärte Verfahren, bei welchem als Logarithmus des geometrischen Mittels zweier Zahlen das arithmetische ihrer Loga-

wurzelausziehen die Zahlen

$$(51) \quad \sqrt[10]{10} = 10^{\frac{1}{10}}, \sqrt{\sqrt[10]{10}} = 10^{\frac{1}{4}} \dots$$

berechnet wurden, und die beliebige Zahl n in der Form

$$n = 10^m 10^{\frac{1}{2^{n_1}}} \cdot 10^{\frac{1}{2^{n_2}}} \dots$$

dargestellt wird (was stets und nur auf eine Weise möglich ist); es folgt dann in Form eines *dyadischen Bruches*^{103a)}:

$$(52) \quad \log n = m + \frac{1}{2^{n_1}} + \frac{1}{2^{n_2}} + \dots$$

In ähnlicher Weise kann man $\log n$ in Form eines *Dezimalbruchs* herstellen mit Hilfe einer Tafel der Potenzen von 10 zu den Exponenten $\frac{1}{10^k}, \frac{2}{10^k}, \dots, \frac{9}{10^k}$ ($k=1, 2, \dots$)¹⁰⁴.

Die Potenzreihe für $\lg(1 + \xi)$ findet sich auf Grund von Integralbetrachtungen zuerst bei *Nicolaus Mercator*¹⁰⁵), wurde aber bald auch auf elementare Weise aus der binomischen Reihe abgeleitet von *Edmond Halley*¹⁰⁶).

Diese Ableitung wurde später von *Euler*¹⁰⁷) wiedergefunden, von *Cauchy*¹⁰⁸) strenger gestaltet und ist noch heute die übliche; sie basiert auf der zunächst für reelle ξ und δ geltenden Beziehung¹⁰⁹):

$$(53) \quad \lim_{\delta=0} \frac{(1 + \xi)^\delta - 1}{\delta} = \lg(1 + \xi)$$

rithmen erscheint. Weitere historische Angaben bei *J. W. L. Glaisher*, Artikel „Logarithm“ in der *Encyclop. Brit.*

103*) S. z. B. *Hočevár*, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra für Ober- gymnasien (Wien und Prag 1902), p. 134.

104) Eine solche Tafel wurde nach *Stolz*, 1, p. 339 von *Kramp* durch Ausziehen von zweiten und fünften Wurzeln berechnet; eine andere bei *Egen*, Handbuch der allgemeinen Arithmetik (Berlin 1846), 1, p. 245—249.

105) *Logarithmotechnia*, London 1668.

106) *Phil. Trans.* 1695, p. 60.

107) *Introd.*, p. 88.

108) *An.*, p. 169; *Schlömilch*, p. 33, 180. — Dem *Cauchyschen* Beweise fehlt zur völligen Strenge hauptsächlich der Begriff der gleichmäßigen Konvergenz. — Eine andere elementare Herleitung durch Mittelwerte (nach Analogie

der Integralbeziehung $\lg(1 + \xi) = \int_0^\xi \frac{d\xi}{1 + \xi}$) bei *Cauchy*, *Résumés analyt.*, p. 77

und bei *Schlömilch*, p. 62—66. — *Thomae* (*Elem. Theorie*, p. 67) gewinnt die logarithmische Reihe aus der Funktionalgleichung (47), was nach *Cantor*, 3, p. 87 schon *Moiré* (*Phil. Trans.* 1699) versucht hatte.

109) *Euler*, *Comm. Ac. Petrop.* (1730—31). Beweis nach *Wulf*⁹¹) bei *Stolz-Gmeiner*, F., p. 219 (vgl. auch p. 379).

wo $(1 + \xi)^\delta$ in die binomische Reihe entwickelt und sodann in allen Gliedern $\lim \delta = 0$ gesetzt wird (was wiederum wegen der gleichmäßigen Konvergenz der Reihe für alle $|\xi| \leq \varrho < 1$ und alle $\delta \leq \delta'$ erlaubt ist). So ergibt sich:

$$(54) \quad \lg(1 + \xi) = \sum_1^{\infty} \frac{(-1)^{v+1} \xi^v}{v} \quad (-1 < \xi \leq 1),$$

speziell

$$(55) \quad \lg 2 = \sum_1^{\infty} \frac{(-1)^{v+1}}{v}.$$

Eine von *Cauchy*¹¹⁰⁾ herrührende Modifikation dieser Ableitung geht von der Beziehung aus:

$$(56) \quad \sum_0^{\infty} m_v \xi^v = (1 + \xi)^m = e^{m \lg(1 + \xi)} = \sum_0^{\infty} \frac{m^v (\lg(1 + \xi))^v}{v!} \quad (|\xi| < 1),$$

wobei die Vergleichung der Koeffizienten von m auf beiden Seiten von (56) unter Benutzung des *Cauchyschen* Doppelreihensatzes wieder die Entwicklung (54) liefert.

Die beiden Ableitungen gelten auch für komplexe x .¹¹¹⁾ Die Reihe

110) An., p. 546. Umgekehrt gewinnt *Cauchy* (*Résumés analyt.*, p. 81), indem er in dem Ausdrucke $(1 + \xi)^m = e^{m \lg(1 + \xi)} = \sum_0^{\infty} \frac{m^v (\lg(1 + \xi))^v}{v!}$ die

durch Mittelwerte¹⁰⁸⁾ gefundene logarithmische Reihe einsetzt und unter Anwendung seines Doppelreihensatzes nach Potenzen von ξ ordnet, auf sehr einfache Weise den binomischen Satz zunächst für reelle ξ und m , den er dann auf komplexe x ausdehnt (s. die folgende Note).

111) Bezüglich der ersten Ableitung s. *Cauchy*, An., p. 305. *Cauchy* hebt übrigens in der Anal. algèbr. die Übereinstimmung der von ihm summierten

Reihe $\sum_0^{\infty} (-1)^{v+1} \frac{\varrho^v}{v} (\cos v\vartheta + i \sin v\vartheta)$ mit dem von ihm an späterer Stelle

(p. 314) definierten $\bar{\lg}(1 + \varrho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta))$ nicht ausdrücklich hervor (ebenso wenig *Schlömilch*, s. p. 270—272). Die modifizierte Ableitung¹¹⁰⁾ für komplexe x bei *Stolz*, 2, p. 207; *Stolz-Gmeiner*, F. 2, p. 358. — Ohne Benutzung der binomischen Reihe folgert *Cauchy* (*Résumés analyt.*, p. 163, 164) aus seinem Doppelreihensatze, daß die im reellen Gebiete für $|\xi| < 1$ festgestellte¹⁰⁸⁾ Identität

$$1 + \xi = e^{\lg(1 + \xi)} = \sum_0^{\infty} \frac{\left(\frac{\xi}{1} - \frac{\xi^2}{2} + \frac{\xi^3}{3} - \dots\right)^v}{v!}$$

auch für komplexe x gelten muß, daß also die Reihe $\sum_1^{\infty} (-1)^{v-1} \frac{x^v}{v}$ für $|x| < 1$

$\sum_1^{\infty} (-1)^{v+1} \frac{x^v}{v}$ konvergiert im Innern und auf der Begrenzung des Einheitskreises mit Ausnahme des Punktes $x = -1$ nach dem Hauptwerte $\overline{\lg}(1+x)^{112}$).

9. Die Berechnung der Logarithmen. Zur Berechnung der Logarithmen ist die Reihe (54) wegen ihrer schwachen Konvergenz und ihres beschränkten Konvergenzgebietes¹¹³) direkt nicht geeignet. Brauchbarer ist die Reihe

$$(57) \quad \lg \frac{a}{b} = 2 \sum_0^{\infty} \frac{1}{2v+1} \left(\frac{a-b}{a+b} \right)^{2v+1} \quad 114),$$

welche vermittelt der Beziehung

nach einem Werte der vieldeutigen Funktion $\lg(1+x)$ konvergiert, der aus Stetigkeitsgründen nur der Hauptwert sein kann. Das so gewonnene Resultat

verwendet er dann zur Summation der binomischen Reihe $\sum_0^{\infty} m_v x^v$ (a. a. O, p. 165;

vgl. ¹¹⁰), wobei die Voraussetzung eines reellen m ohne weiteres durch die eines komplexen ersetzt werden könnte.

112) Über die Entstehung des allgemeinen $\lg(1+x)$ durch analytische Fortsetzung des Funktionselements $\sum_1^{\infty} (-1)^{v-1} \frac{x^v}{v}$ s. z. B.: *Thomae*, Elem.

Theorie, p. 70 (2. Aufl., p. 100).

113) Der letztere Grund ist nicht wesentlich; theoretisch reicht die Reihe in Verbindung mit der Funktionalgleichung $\lg \xi = -\lg \frac{1}{\xi}$ zur Berechnung der Logarithmen aller positiven Zahlen aus; s. *Schlömilch*, p. 181; der Gedanke nach *Cantor*, 3, p. 62 möglicherweise, wenn auch nicht recht deutlich, schon bei *Wallis*, Phil. Trans. 2 (1668), p. 753–756.

114) Von *J. Gregory*, *Exercitationes geometricae* (1668) geometrisch abgeleitet; in der im Text angegebenen Weise von *Halley*, Phil. Trans. 1695, p. 62. Gl. (57) liefert speziell für $a = b + 1$ eine zur sukzessiven Berechnung der Logarithmen ganzer Zahlen verwendbare Formel. Eine für die Rechnung vorteilhafte Kombination von (57) mit einer passenden Zerlegung des Numerus in ein Produkt benutzt *Euler* (Introd., p. 91) bei Berechnung eines Beispiels, systematisch *Adams*, *Proceed. Roy. Soc.* 27 (1878), p. 91. Auf ähnlichem Gedanken beruht das nach *J. W. L. Glaisher* (Art. Logarithm in *Encyclop. Brit.*) in England sog. *Weddlesche* Verfahren (*The mathematician*, Nov. 1845), das in seinen Hauptpunkten schon *Briggs* (*Arithmetica logarithmica* 1624) bekannt war. (Weitere Literatur in I F (*Mehmke*), Nr. 27, 28; s. auch *Stolz*, 1, p. 316–325.) Zwei elementare, nicht auf Anwendung der logarithmischen Reihe beruhende Berechnungsmethoden s. *Hermann Schubert*, *Element. Berechnung der Logarithmen*, Leipzig 1903.

$$\lg \frac{1-x}{1+x} = \lg(1-x) - \lg(1+x) = -2 \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{1}{2\nu+1} x^{2\nu+1}$$

und der Substitution $\frac{1-x}{1+x} = \frac{a}{b}$ (also $x = \frac{b-a}{b+a}$) erhalten wird¹¹⁵).

Die Berechnung von Logarithmen mit anderer Basis als e ist auf die der natürlichen durch die Funktionalgleichung

$$(58) \quad \log^a b = M \lg b,$$

zurückgeführt, wo

$$(59) \quad M = \frac{1}{\lg a} = \log^a e$$

der Modul des Logarithmensystems mit der Basis a heißt. Für die in der Praxis allein gebräuchlichen dekadischen oder gemeinen Logarithmen ist

$$(60) \quad M = \frac{1}{\lg 2 + \lg 5} = \frac{1}{2,30258\ 50230\dots} = 0,43429\ 44819\dots^{115a}).$$

10. Die Funktionen $\sin x$ und $\cos x$. Aus den Formeln $e^{\pm \xi i} = \cos \xi \pm i \sin \xi$ ¹¹⁶) (vgl. (45)) folgen durch Addition resp. Sub-

115) Durch andere Variabelntransformationen gelangte schon *Halley* zu noch rascher konvergenten Berechnungsformeln (Phil. Trans. 1695, Nr. 216), welche in der Folgezeit vielfach vermehrt wurden (s. *Klügel*, Math. Wörterbuch 3, Art. Logarithmus, p. 530: Geschichte der Logarithmotechnie). *Beispiel*: Die bei der Berechnung der Tables du Cadastre für die Primzahllogarithmen angewandte Formel:

$$\log x = \frac{1}{2} \log(x+1) + \frac{1}{2} \log(x-1) + M \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{1}{2\nu+1} \left(\frac{1}{2x^2-1} \right)^{2\nu+1}$$

(*Lefort*, Paris Ann. de l'Observat. 4 (1858), p. 130).

115^a) Von *J. C. Adams* (London R. Soc. Proc. 27 [1878], p. 91) auf 260 Stellen berechnet. Vgl. auch *Glaisher* a. a. O.¹⁰³).

116) Die ursprüngliche *Eulersche* Ableitung dieser fundamentalen Formeln (Introd., p. 98 ff.) unterscheidet sich von der Nr. 6 angedeuteten *Cauchyschen* nur durch andere Anordnung der Grenzübergänge. *Euler* geht von dem *Moirreschen* Satze (65) in der Form:

$$\begin{aligned} \cos n\xi &= \frac{(\cos \xi + i \sin \xi)^n + (\cos \xi - i \sin \xi)^n}{2}, \\ \sin n\xi &= \frac{(\cos \xi + i \sin \xi)^n - (\cos \xi - i \sin \xi)^n}{2i} \end{aligned}$$

aus, läßt hier n unendlich werden, während $n\xi$ endlich bleibt, und benutzt wie auch *Cauchy* die geometrischen Beziehungen $\lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\sin \xi}{\xi} = \lim_{\xi \rightarrow 0} \cos \xi = 1$. (Die rein formale Übereinstimmung der beiden aus der Infinitesimalrechnung bekannten Reihenentwicklungen für $2 \cos \xi$ und $e^{\xi i} - e^{-\xi i}$ war *Euler* schon früher

traktion die Beziehungen:

$$(61) \quad \cos \xi = \frac{e^{\xi i} + e^{-\xi i}}{2},$$

$$(62) \quad \sin \xi = \frac{e^{\xi i} - e^{-\xi i}}{2i},$$

und vermöge (43) die Reihenentwicklungen:

$$(63) \quad \cos \xi = \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^{\nu} \xi^{2\nu}}{(2\nu)!},$$

$$(64) \quad \sin \xi = \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^{\nu} \xi^{2\nu+1}}{(2\nu+1)!}.$$

Diese *beständig konvergenten* Reihen oder auch die damit äquivalenten Ausdrücke auf den rechten Seiten von (61) und (62) liefern für *komplexe* x (an Stelle von ξ) die *Definition*¹¹⁷⁾ der Funktionen $\sin x$ und $\cos x$, die durch *elementargeometrische* Betrachtungen nur für reelle ξ definiert sind. Die *Additions- und Periodizitätstheoreme* der trigonometrischen Funktionen bleiben auch im komplexen Gebiete in Gültigkeit, insbesondere auch der *Moirvresche Satz*¹¹⁸⁾:

$$(65) \quad (\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx.$$

Durch Entwicklung der linken Seite von (65) bei ganzzahligem $n > 0$ in die endliche binomische Reihe und Berücksichtigung von

aufgefallen (s. *Eneström*, *Bibl. math.* 1897, p. 48). Ein anderer Standpunkt vermeidet aus Gründen arithmetischer Konsequenz den Gebrauch geometrischer Begriffe. Für die dann durch die Reihen (63), (64) als *definiert* zu betrachtenden ganzen transzendenten Funktionen kann die Übereinstimmung mit den gewöhnlichen trigonometrischen Funktionen $\sin \xi$, $\cos \xi$ für reelle ξ nachträglich erwiesen werden, da jene Funktionen den für $\sin \xi$, $\cos \xi$ *charakteristischen Funktionalgleichungen* (Additionstheoremen) genügen; s. *Thomae*, *Elem. Theorie*, p. 55 (der dem Hauptschluß zugrunde liegende Halbierungsprozeß schon bei *Cauchy*, *An.*, p. 113ff.); andere Methode bei *Tannery*, *Introduction*, p. 147—152 (2^e éd. p. 312—316). — Dieselbe Problemstellung tritt auf bei den Versuchen, den Satz vom Parallelogramm der Kräfte auf einfachere Axiome zurückzuführen; s. IV 1 (*Voß*), Nr. 19. — Vgl. auch die (nur skizzierte) Ableitung der trigonometrischen und zyklometrischen Reihen aus den Additionstheoremen bei *Jack*, *Proceed. Edinb. Math. Soc.* 1894—95, p. 132—135.

117) *Euler*, *Berlin Hist. Ac.* 5 (1749), p. 279; *Cauchy*, *An.*, p. 311. — Über den Verlauf der Funktionen $\sin x$ und $\cos x$ s. die Lehrbücher, z. B. *Thomae*, *Elem. Theorie*, p. 61 (2. Aufl., p. 88); *Burkhardt*, *Funktionentheorie*, p. 119 (3. Aufl., p. 140).

118) *Moirre*, *Misc. analyt.* 1730; vorher (nach *A. v. Braunmühl*, *Bibl. math.* 2 (1901), p. 97—102) schon *Phil. Trans.* 1707 u. 1722. — Die Gültigkeit für komplexe x hebt *Cauchy* (*Exerc. d'an.* 4, p. 279) hervor.

$$(66) \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

ergeben sich die Formeln¹¹⁹⁾:

a) für gerades n :

$$(67) \quad \sin nx =$$

$$\cos x \left(n \cdot \sin x + \sum_1^{\frac{n}{2}-1} (-1)^{\nu} \frac{n(n^2-2^2)(n^2-4^2)\cdots(n^2-2\nu^2)}{(2\nu+1)!} \sin^{2\nu+1} x \right),$$

$$(68) \quad \cos nx = 1 + \sum_1^{\frac{n}{2}} (-1)^{\nu} \frac{n^2(n^2-2^2)(n^2-4^2)\cdots(n^2-2\nu-2^2)}{(2\nu)!} \sin^{2\nu} x;$$

b) für ungerades n :

$$(69) \quad \sin nx = n \sin x + \sum_1^{\frac{n-1}{2}} (-1)^{\nu} \frac{n(n^2-1)(n^2-3^2)\cdots(n^2-2\nu-1^2)}{(2\nu+1)!} \sin^{2\nu+1} x,$$

119) Schon *Vieta* gibt in einer um 1590 verfaßten, 1615 von *Alexander Anderson* mit hinzugefügten Beweisen publizierten Abhandlung die Formeln (68), (69) und an Stelle von (67), (70) analoge, nach Potenzen von $\cos x$ fortschreitende, in geometrischer Einkleidung für die Spezialwerte bis zu $n=10$, nebst Methode zur Berechnung der Coeffizienten (s. *Vieta*, Opera 1646, p. 295, 297, 299). Eine *allgemeine* Formel der vorliegenden Art, und zwar diejenige *Reihenentwicklung*, welche für *ganzzahlige* n sich auf die Formel (69) reduziert, zuerst wohl bei *Isaac Newton* (Brief an *Oldenburg* vom 13. Juni 1676 = Opuscula, ed. Castillioneus 1 [1744], p. 315), der bei dieser Gelegenheit von der betreffenden Formel als einer für *ganzzahlige* n allgemein bekannten spricht, ohne freilich die Gültigkeit der von ihm für *beliebige* n (mit Hülfe seiner Methode der Reihenumkehrung) abgeleiteten Formel wirklich zu beweisen (im übrigen vgl. hierzu Fußn. 121). — *Euler* benützt in der *Introductio* (Nr. 132) die Gleichung (65) lediglich zur Darstellung von $\cos nx$, $\sin nx$ durch Aggregate von der Form $\sum c_{\nu} \cdot \cos^{\nu} x \cdot \sin^{n-\nu} x$, während er die Formeln (67), (69) (a. a. O. Nr. 236, 238) und an Stelle von (68), (70) analoge, nach Potenzen von $\cos x$ fortschreitende (Nr. 235, 243) durch ein rekursorisches Verfahren aus dem Additionstheorem ableitet. Das nämliche Verfahren kürzer und durchsichtiger bei *Lagrange* (Leçons sur le calcul des fonctions, Paris 1808, Leçon XI = Oeuvres, 10, p. 113 ff.), welcher *alle* hierher gehörigen Formeln (d. h. außer (67)–(70)), auch die nach Potenzen von $\cos x$ fortschreitenden (letztere überdies auch noch nach fallenden Potenzen geordnet), zusammenstellt. Die im Texte angedeutete Herleitung findet sich bei *Cauchy*, An., p. 230. Andere an die Additionstheoreme von $\cos x$, $\sin x$ anknüpfende Ableitungen s. *Schlömilch*, p. 185; *Hattendorff*, p. 122.

Bei *Euler* (a. a. O. p. 220, ferner Nov. Comm. Ac. Petrop. 5 (1754–55), p. 164) finden sich auch die Auflösungen der Gleichungen (67) bis (70), durch welche die Potenzen der trigonometrischen Funktionen als Summen der Funktionen der Vielfachen des Arguments dargestellt werden. Die entsprechenden Formeln für beliebige reelle n bei *Abel*, Journ. f. Math. 1 (1826), p. 338 = Oeuvres, éd. Sylow-Lie, 1, p. 249. Vgl. im übrigen II A, 11 a.

$$(70) \quad \cos nx = \cos x \left(1 + \sum_1^{\frac{n-1}{2}} (-1)^{\nu} \frac{(n^2-1)(n^2-3^2) \cdots (n^2-2\nu-1^2)}{(2\nu)!} \sin^{2\nu} x \right).$$

Da die Nullstellen der auf den rechten Seiten von (67) bis (70) stehenden Polynome in $\sin x$ bekannt sind, so ergeben sich aus diesen Formeln zugleich die Produktentwicklungen¹²⁰⁾:

a) für gerades n :

$$(71) \quad \sin nx = n \cdot \sin x \cdot \cos x \prod_1^{\frac{n-1}{2}} \left(1 - \frac{\sin^2 x}{\sin^2 \frac{2\nu\pi}{n}} \right),$$

$$(72) \quad \cos nx = \prod_1^{\frac{n}{2}} \left(1 - \frac{\sin^2 x}{\sin^2 \frac{2\nu-1}{2n} \pi} \right);$$

b) für ungerades n :

$$(73) \quad \sin nx = n \cdot \sin x \prod_1^{\frac{n-1}{2}} \left(1 - \frac{\sin^2 x}{\sin^2 \frac{2\nu\pi}{n}} \right),$$

$$(74) \quad \cos nx = \cos x \prod_1^{\frac{n-1}{2}} \left(1 - \frac{\sin^2 x}{\sin^2 \frac{2\nu-1}{2n} \pi} \right).$$

Ist n eine ganz beliebige (auch komplexe) Zahl, so treten an die Stelle der Summen auf den rechten Seiten von (67) bis (70) die entsprechenden unendlichen Reihen, welche in der vermittelt der Ungleichung

$$(75) \quad |\sin x| \leq 1$$

definierten Umgebung des Nullpunkts (und zwar bei den aus (67) und (70) resultierenden Entwicklungen noch mit Ausschluß von $x = \pm \frac{\pi}{2}$) nach $\sin nx$ bzw. $\cos nx$ konvergieren¹²¹⁾ und die anderer-

120) *Euler* a. a. O.¹¹⁹⁾. Durch Vergleichung der symmetrischen Funktionen der Nullstellen mit den Koeffizienten der Polynome (67) bis (70) gewinnt *Euler* mannigfache Relationen; s. auch *Cauchy*, An., p. 556. Eine elegante Anwendung der Formeln (69), (73) zum Beweise des Reziprozitätsgesetzes der quadratischen Reste bei *Gotthold Eisenstein*, Journ. f. Math. 29 (1845), p. 122.

121) Über mangelhafte Herleitungen bei *Newton*¹¹⁹⁾, *Moirre*, *Johann* und *Jacob Bernoulli* s. v. *Braunmühl*, Gesch. der Trigonometrie 2 (1903), p. 6. Ableitung auch bei *Cauchy*, An., p. 548 (und zwar nur für reelle ξ) unvollständig; besser bei *Lagrange*¹¹⁹⁾, Leçon XI, mit Hilfe der nach ihm benannten Reihe;

seits für ganzzahlige n bei $\nu = \frac{n}{2} - 1$ bzw. $\frac{n}{2}, \frac{n-1}{2}$ abbrechen, also wiederum in die endlichen Summen (67)–(70) übergehen.

Für die Quotienten und reziproken Werte der Funktionen $\sin x$ und $\cos x$ existieren auch für komplexe x die zunächst im reellen Gebiet (von der Trigonometrie her) üblichen besonderen Bezeichnungen¹²²⁾:

$$(76) \quad \frac{\sin x}{\cos x} = \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cot x}, \quad \frac{1}{\sin x} = \operatorname{cosec} x, \quad \frac{1}{\cos x} = \operatorname{sec} x.$$

11. Die zyklometrischen Funktionen. Genügt x der Gleichung:

$$(77) \quad \operatorname{tg} y \equiv \frac{e^{yi} - e^{-yi}}{i(e^{yi} + e^{-yi})} \equiv i \frac{1 - e^{2yi}}{1 + e^{2yi}} = x,$$

so heißt y ein Wert der Funktion Arcustangens von x , in Zeichen $y = \operatorname{arctg} x$; die Auflösung von (77) nach y liefert alsdann:

$$(78) \quad \operatorname{arctg} x = \frac{i}{2} \operatorname{lg} \frac{1 - xi}{1 + xi}; \quad 123)$$

die unendlich vielen Werte der Funktion $\operatorname{arctg} x$ unterscheiden sich

ganz unzulänglich bei *Schlömilch*, p. 263; richtig, aber äußerst umständlich bei *Hattendorff*, p. 128, 189. Strenger und einfacher Beweis mit den Hilfsmitteln der elementaren Funktionentheorie bei *Thomae*, Elem. Theorie, p. 106 (2. Aufl., p. 136); *Stolz* 2, p. 221–224; *Stolz-Gmeiner*, F. 2, p. 382; andere Herleitung bei *Weierstraß*, Journ. f. Math. 51 (1856), p. 59 = Werke 1, p. 219.

Zur Bestimmung des Konvergenzbereiches der entstehenden unendlichen Reihen eignet sich das *Weierstraßsche* Kriterium (s. I G 3, Nr. 3, 4).

Andere Reihen für $\sin x$ und $\cos x$ (z. B.

$$\cos x = 1 - \frac{4x^2}{1 \cdot 2 \cdot \pi^2} + \frac{4x^2(4x^2 - 2^2\pi^2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \pi^4} - \frac{4x^2(4x^2 - 2^2\pi^2)(4x^2 - 4^2\pi^2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \pi^6} + \dots)$$

bei *David*, Paris Soc. math. Bull. 11 (1883), p. 72.

122) Trennung des Reellen und Imaginären in $\operatorname{tg}(\xi + i\eta)$ bei *Euler*, Berlin Hist. Ac. 5 (1749). Die Bezeichnungen $\operatorname{sec} x$, $\operatorname{cosec} x$ sind nicht mehr recht gebräuchlich; ganz veraltet ist $\operatorname{sinusversus} x$ ($\operatorname{siv} x$) und $\operatorname{cosinusversus} x$ ($\operatorname{cosiv} x$) für $1 - \cos x$ resp. $1 - \sin x$. — Über die von *V. Riccati* (*Opuscula* 1, Bononiae 1757, p. 70) eingeführten hyperbolischen Funktionen:

$$\sin hx = \frac{\sin ix}{i}, \quad \cos hx = \cos ix$$

s. die Monographien von *C. A. Laisant*, Essai sur les fonctions hyperbol., Paris 1874, und *S. Günther*, Die Lehre von den gewöhnlichen und verallgemeinerten Hyperbelfunktionen, Halle 1881.

123) *Euler*, Introd., p. 105 (x reell gedacht); für komplexe x bei *Cauchy*, Exerc. d'an. 4, p. 271; *Stolz*, p. 211; *Stolz-Gmeiner*, F. 2, p. 365. Zerlegung von $\operatorname{arctg} x$ in seinen reellen und imaginären Bestandteil *Euler*, Berlin Hist. Ac. 5 (1749), p. 286. Der Zusammenhang zwischen arctg und lg war schon 1702 (*Paris Mém. Ac. Sc.*) *Joh. Bernoulli* bekannt (s. Opera 1, p. 393–400).

voneinander um Multipla von π ; der Wert $\frac{i}{2} \overline{\lg} \frac{1-xi}{1+xi}$, dessen Realteil \Re also der Ungleichung

$$(179) \quad -\frac{\pi}{2} \leq \Re < \frac{\pi}{2}$$

genügt, heißt der *Hauptwert*¹²⁴): $\overline{\arctg} x$ und wird für alle $|x| \leq 1$, ausgenommen $x = \pm i$,¹²⁵) dargestellt durch die Reihe:

$$(180) \quad \overline{\arctg} x = \left(\frac{i}{2} \overline{\lg} (1-xi) - \frac{i}{2} \overline{\lg} (1+xi) \right) \\ = \sum_0^{\infty} (-1)^{\nu} \frac{x^{2\nu+1}}{2\nu+1} \quad (126);$$

insbesondere ergibt sich für $x=1$ die sog. *Leibnizsche* Reihe:

$$(181) \quad \overline{\arctg} 1 = \frac{\pi}{4} = \sum_0^{\infty} (-1)^{\nu} \frac{1}{2\nu+1} \quad (127)$$

Zur Berechnung von π ist dieselbe wegen ihrer schwachen Konvergenz ungeeignet; zu rascher konvergenter Formeln gelangt man entweder durch geeignete Transformation von (81)¹²⁸), oder indem man den Bogen $\frac{\pi}{2}$ mit Hilfe des sog. Additionstheorems der Funktion \arctg :

$$(182) \quad \arctg x + \arctg y = \arctg \frac{x+y}{1-xy}$$

in Teilbögen mit rationaler Tangente zerlegt, z. B.¹²⁹):

124) *Cauchy*, Exerc. d'an. 4, p. 271.

125) Die Punkte $x = \pm i$ sind die einzigen singulären der Funktion $\arctg x$; um den Punkt ∞ gelten die Entwicklungen:

$$\arctg x = \left(k - \frac{1}{2} \right) \pi - \sum_0^{\infty} (-1)^{\nu} \frac{x^{-2\nu-1}}{2\nu+1} \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

126) *Euler*, Introd., p. 105 (x reell gedacht); für komplexe x z. B. *Stolz*, p. 211; *Stolz-Gmeiner*, F. 2, p. 364. — Andere elementare Ableitungen im reellen Gebiet: *Cauchy*, An., p. 307 ebenfalls aus der logarithmischen Reihe; *Schlömilch*, p. 70 durch Mittelwerte; *Hattendorff*, p. 148 aus der in Fußnote 129 zitierten Reihe.

127) Brief an *Oldenburg* vom 27. Aug. 1786, *Acta erudit.* 1682, p. 11; schon vorher (1671) sind die Reihen (80), (81) von *J. Gregory* gefunden (*Commerc. epist.*, p. 78, 79).

128) S. I A 3, 37, besonders Fußnote 266.

129) *J. Machin* in *Jones' Synopsis* 1706. Ähnliche Zerlegungen mehrfach bei *Euler*, z. B. die besonders mit Hilfe der Reihe

$$\arctg t = \frac{t}{1+t^2} \left(1 + \frac{2}{3} \frac{t^2}{1+t^2} + \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} \left(\frac{t^2}{1+t^2} \right)^2 + \dots \right)$$

$$(83) \quad \frac{\pi}{4} = 4 \overline{\arctg \frac{1}{5}} - \overline{\arctg \frac{1}{239}},$$

und dann die Reihenentwicklung (80) benützt.

Die Auflösung der Gleichung

$$(84) \quad \sin y \equiv \frac{e^{yi} - e^{-yi}}{2i} = x$$

nach y ergibt:

$$(85) \quad y = \arcsin x = \frac{1}{i} \lg (xi \pm \sqrt{1 - x^2})^{130)}$$

Bedeutet \bar{y} irgend einen bestimmten dieser unendlich vielen Werte, so teilt sich die Gesamtheit in die zwei Gruppen:

$$y = \bar{y} \pm 2n\pi \quad \text{und} \quad \pi - y.$$

Der *Hauptwert*¹³¹⁾ $\overline{\arcsin x}$ wird durch die Vorschrift:

[Ableitung aus (67) durch Grenzübergang $n=0$ und Substitution $t = \operatorname{tg} x$ z. B. bei *Schlömilch*, p. 266; *Hattendorff*, p. 144] sehr bequem auszuwertende Formel

$$\pi = 20 \overline{\arctg \frac{1}{7}} + 8 \overline{\arctg \frac{3}{79}}$$

(*Nova Acta Ac. Petrop.* 11 (1793), p. 133 in einer Arbeit von 1779, vorher (1776) schon bei *Ch. Hutton*, *Phil. Trans.* 476). Unbegrenzte Fortsetzung dieses Zerlegungsverfahrens: *Euler*, *Comm. Ac. Petrop.* 9 (1727), p. 100; *Nov. Comm. Ac. Petrop.* 9 (1762–63), p. 40–52. Die vollständige Lösung der Gleichung

$$m_1 \arctg \frac{1}{x_1} + m_2 \arctg \frac{1}{x_2} = k \cdot \frac{\pi}{4}$$

in ganzen Zahlen m_1, m_2, x_1, x_2, k gibt *C. Störmer*, *Christ. Videnskabselskabsskrift.* 1895 und *Paris Soc. math. Bull.* 27 (1899), p. 160; er untersucht auch den allgemeineren Fall $m_1 \arctg \frac{1}{x_1} + m_2 \arctg \frac{1}{x_2} + \dots + m_n \arctg \frac{1}{x_n} = k \cdot \frac{\pi}{4}$, *Paris C. R.* 1896, Nr. 4, 5; *Arch. for Math. og Nat.* 1896.

Die Berechnung der Zahl π wurde so auf immer mehr Dezimalstellen hinausgeführt (schließlich über 700). S. darüber die Schrift von *Rudio*: *Archimedes, Huygens, Lambert, Legendre* (Lpzg. 1892). Über die Beweise der Irrationalität und Transzendenz von π s. I C 3, 7 und Fußnote 96 des vorliegenden Artikels. Vgl. auch *F. Klein*, *Vorträge über Elementargeometrie* (Lpzg. 1896), p. 53.

130) Trennung des reellen und imaginären Teils von $\arcsin x$: *Euler*, *Berlin Hist. Ac.* 5 (1749), p. 283; *Cauchy*, *An.*, p. 325. Formel (85) z. B. bei *Cauchy*, *Exerc. d'an.* 4, p. 281; *Stolz*, 2, p. 213.

131) *Cauchy* unter gesonderter Betrachtung des reellen und imaginären Bestandteils: *An.*, p. 325, 327 und präziser *Exerc. d'an.* 3, p. 385 (*Cauchy* führt die Untersuchung aus an der Funktion $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$ für allgemeinen und Hauptwert). — *Stolz*, 2, p. 213 und *Stolz-Gmeiner*, F. 2, p. 370 unterscheiden in jeder der obigen zwei Wertgruppen eigene Hauptwerte, deren Realteile dann zwischen $-\pi$ und π liegen.

$$(86) \quad -\frac{\pi}{2} < \Re(\arcsin x) \leq \frac{\pi}{2}$$

ausgesondert, wobei an den Grenzen das Vorzeichen des imaginären Teils von $\arcsin x$ noch willkürlich¹³²⁾ festzusetzen ist.

Durch Vergleichung der Koeffizienten von x^n auf beiden Seiten von (69) gelangt *Cauchy* zu der für alle $|x| \leq 1$ gültigen Reihe¹³³⁾:

$$(87) \quad \overline{\arcsin x} = x + \sum_1^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2\nu - 1)}{2 \cdot 4 \cdots 2\nu} \frac{x^{2\nu+1}}{2\nu+1}$$

Hieraus speziell für $x = \pm 1$:

$$\pm \frac{\pi}{2} = \pm \left(1 + \sum_1^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2\nu - 1)}{2 \cdot 4 \cdots 2\nu} \cdot \frac{1}{2\nu+1} \right).^{134)}$$

12. Unendliche Produkte für $\sin x$ und $\cos x$. Die Produktentwicklung

$$(88) \quad \frac{e^x + e^{-x}}{2} = x \prod_1^{\infty} \left(1 + \frac{x^2}{\nu^2 \pi^2} \right)$$

findet *Euler*¹³⁵⁾, indem er den Ausdruck

$$\frac{\left(1 + \frac{x}{n} \right)^n - \left(1 - \frac{x}{n} \right)^n}{x}$$

132) Z. B. positiv: *Cauchy*, Exerc. d'an. 3, p. 385. Der so definierte Hauptwert entspricht dann dem positiven Zeichen vor dem Hauptwerte der Quadratwurzel und dem Hauptwerte des \lg in (85), *Cauchy*, Exerc. d'an. 4, p. 281.

133) An., p. 549 (dasselbst durch Vergleichung der höheren Potenzen von x auch Reihen für $(\arcsin x)^2$ usw.; die Reihe für $(\arcsin x)^2$ hatte *Euler* schon 1737 auf anderem Wege gefunden: s. *G. Eneström*, Bibl. math. (3) 5 [1904], p. 270; *P. Stückel*, ebendas. 8 [1907], p. 45). Der *Cauchysche* Beweis ist für reelle x gedacht, läßt sich aber ohne weiteres auf komplexe x übertragen, s. *Thomae*, p. 106; *Stolz*, 2, p. 224. Andere Herleitung von (87) aus der *arctg*-Reihe bei *Cauchy* (An., p. 545 im reellen Gebiete), ferner durch elementare Darstellung der in der Infinitesimalrechnung üblichen Methoden bei *Schlömilch*, p. 220 (Ersetzung von

$\int_0^{\xi} \frac{d\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$ durch einen Mittelwert) und *Stolz*, 2, p. 216 (Benützung der Relation

$D_x \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$). — Beschreibung der *Riemanschen* Fläche des \arcsin bei *Thomae*, Elem. Theorie, p. 104–106 (nur in der 1. Aufl.; vgl. 2. Aufl., p. 135).

134) Die Konvergenz dieser Reihe wird am einfachsten mit Hilfe des *Raabe*-schen Kriteriums (s. I A 3, 27) erkannt.

135) Introd. p. 118; strenge Fassung des *Eulerschen* Beweises bei *Stolz* 2, p. 322 angedeutet, ausführlicher bei *Stolz-Gmeiner*, F. 2, p. 439. (Vgl. auch *L'Huilier*, Princ. calc. diff. et int., p. 141.)

in Faktoren zweiten Grades von der Form:

$$1 + \frac{x^2}{n^2} \frac{1 + \cos \frac{2k\pi}{n}}{1 - \cos \frac{2k\pi}{n}} \left(= 1 + \frac{x^2}{\left(n \operatorname{tg} \frac{k\pi}{n}\right)^2} \right) \quad (k = 1, 2, \dots)$$

zerlegt und dann zur Grenze $n = \infty$ übergeht. Die Substitution von ix anstelle von x ergibt sodann

$$(89) \quad \sin x = x \prod_1^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{v^2 \pi^2} \right) = x \prod_1^{\infty} \left(1 + \frac{x}{v\pi} \right) \left(1 - \frac{x}{v\pi} \right).$$

In ähnlicher Weise gelangt *Euler* zu

$$(90) \quad \cos x = \prod_0^{\infty} \left(1 - \frac{4x^2}{(2v+1)^2 \pi^2} \right)^{136}.$$

*Cauchy*¹³⁷⁾ geht bei seiner von den meisten Lehrbüchern acceptierten Ableitung von dem endlichen Produkte (73) für $\sin nx$ aus und läßt daselbst n unendlich werden, während nx endlich bleibt.

Aus (89) folgt speziell für $x = \frac{\pi}{2}$ die *Wallissche*¹³⁸⁾ Formel:

$$(91) \quad \frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \dots,$$

136) Introd., p. 131 f. Daselbst auch in ähnlicher Weise abgeleitet Produkte für $ae^x + be^{-x}$ u. a. Unvollkommene Herleitung des \sin - und \cos -Produkts sowie der Relationen (93) schon *Comm. Ac. Petrop.* 7 (1734), p. 123–134.

137) An., p. 565; vereinfacht von *Schlömilch*, p. 204. (Durch Trennung des Reellen und Imaginären gewinnt *Cauchy* (An. p. 573; *Schlömilch*, p. 274–77) weitere Produkt- und Reihenformeln.) Noch elementarere Herleitung von *Schröter* (*Zeitschr. Math. Phys.* 13 (1868), p. 257) durch iterierte Anwendung der Formel:

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \sin \frac{x + \pi}{2},$$

Nach der *Weierstraßschen* Theorie der Zerlegung ganzer Funktionen in ihre Primfaktoren (s. II B 1, 31) ergibt sich das \sin -Produkt aus den bekannten Nullstellen der Funktion $\sin x$ (vgl. *Euler*, *Misc. Berol.* 7 (1748); *Euler* zeigt bereits, daß außer $n\pi$ keine andern Nullstellen existieren) in der Form:

$$\sin x = e^{g(x)} \cdot x \prod_{-\infty}^{+\infty} \left(1 - \frac{x}{v\pi} \right) e^{\frac{x}{v}} = e^{g(x)} \cdot x \prod_1^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{v^2 \pi^2} \right),$$

worauf nur noch der Nachweis $e^{g(x)} \equiv 1$ durch zweimalige Ableitung (*Weierstraß*; vgl. *Frenzel*, *Zeitschr. Math. Phys.* 24 (1879), p. 325) oder auf Grund eines allgemeinen *Hadamardschen* Satzes (*Journ. de math.* (4) 9 [1893], p. 209) über das infinitäre Verhalten ganzer Funktionen (vgl. z. B. *Émile Borel*, *Leçons sur les fonctions entières*, p. 82; *A. Pringsheim*, *Math. Ann.* 58 (1904), p. 328) zu erbringen ist.

138) *Arithmetica infinit.* 1659.

welche u. a. zur elementaren Herleitung der *Stirlingschen*¹³⁹⁾ Formel:

$$(92) \quad n! = \sqrt{2\pi n} \cdot n^n e^{-n + \frac{\vartheta}{12n}} \quad (0 < \vartheta < 1)$$

dienen kann¹⁴⁰⁾.

Die Entwicklung der rechten Seite von (89) in eine Potenzreihe und die Vergleichung der Koeffizienten derselben mit denjenigen von (64) führt *Euler* auf die Relationen:¹⁴¹⁾

$$(93) \quad \begin{aligned} \sum_1^\infty \frac{1}{v^2} &= \frac{\pi^2}{6}, \\ \sum_1^\infty \frac{1}{v^4} &= \frac{\pi^4}{90}, \\ &\dots \dots \dots \dots \dots \dots ; \end{aligned}$$

allgemein ist

$$(94) \quad \sum_1^\infty \frac{1}{v^{2k}} = \frac{2^{2k-1} B_k}{(2k)!} \pi^{2k},$$

wo B_k die k^{te} *Bernoullische* Zahl bedeutet¹⁴²⁾.

13. Partialbruchreihen für $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cot} x$, $\operatorname{cosec} x$, $\operatorname{sec} x$. Aus (90) findet *Euler*¹⁴³⁾ durch Substitution von $x - y$ anstelle von x

139) *Methodus differentialis*, London 1730.

140) *J. A. Serret*, *Cours d'algèbre* (5. Aufl.) 2, p. 219 (deutsche Übers. v. *Wertheim* 2, p. 178); noch einfacher bei *Cesàro*, *Anal. algebr.*, p. 271, 480.

141) *Introd.* p. 136; vorher (p. 129) zeigt *Euler* ganz allgemein: Ist

$$\prod_1^\infty (1 + \alpha_v x) = \sum_0^\infty c_v x^v,$$

so gelten genau wie im Falle endlicher Produkte und Reihen die Beziehungen:

$$\sum_1^\infty \alpha_v = c_1, \quad \sum_1^\infty \alpha_v^2 = c_1^2 - 2c_2 \text{ usw.}$$

Zur Vervollständigung der *Eulerschen* formalen Betrachtungsweise ist die Voraussetzung der absoluten Konvergenz des Produktes hinreichend (nicht notwendig). Vgl. im übrigen I A 3, 43. Über die Entstehungsgeschichte der Formeln (93) und verwandte *Eulersche* Untersuchungen s. *P. Stäckel*, *Bibl. math.* (3) 8 (1907), p. 37—60.

142) Näheres über die *Bernoullischen* Zahlen s. II A 3, 18; vgl. auch im Texte 14. — Produktdarstellungen des \log , arcsin usw. bei *L. Seidel*, *J. f. Math.* 73 (1871), p. 273.

143) *Introd.*, p. 126, 134; einwandfreie Darstellung bei *Stolz*, 2, p. 252, 323; *Stolz-Gmeiner*, F., p. 444; ähnliche Ableitung bei *Schlömilch*, p. 206—209. Die Vergleichung der höheren Potenzen von y (*Euler* a. a. O.) liefert Partialbruchreihen für $(\operatorname{tg} x)^2$ usw. und durch Spezialisierung die Summation vieler merkwürdiger Reihen, darunter die im Texte (106) erwähnten.

und Division mit $\cos x$:

$$(95) \quad \left(\frac{\cos(x-y)}{\cos x} \right) = \cos y + \operatorname{tg} x \sin y$$

$$= \prod_0^{\infty} \left(1 - \frac{2y}{(2\nu+1)\pi + 2x} \right) \left(1 + \frac{2y}{(2\nu+1)\pi - 2x} \right)$$

$$= \prod_0^{\infty} \left(1 + \frac{8xy - 4y^2}{(2\nu+1)^2\pi^2 - 4x^2} \right)$$

und sodann durch Entwicklung nach Potenzen von y und Vergleichung der Koeffizienten von y die *Partialbruchreihe*:

$$(96) \quad \operatorname{tg} x = -2 \sum_0^{\infty} \nu \left(\frac{1}{2x + (2\nu+1)\pi} + \frac{1}{2x - (2\nu+1)\pi} \right)$$

$$= \sum_1^{\infty} \nu \frac{8x}{(2\nu-1)^2\pi^2 - 4x^2}.$$

Auf ähnliche Weise oder einfacher durch Substitution von $\frac{\pi}{2} - x$ für x folgt:

$$(97) \quad \cot x = \frac{1}{x} + \sum_1^{\infty} \nu \left(\frac{1}{x - \nu\pi} + \frac{1}{x + \nu\pi} \right) = \frac{1}{x} - \sum_1^{\infty} \nu \frac{2x}{\nu^2\pi^2 - x^2},$$

ferner wegen $\cot \frac{x}{2} - \cot x = \operatorname{cosec} x$:

$$(98) \quad \operatorname{cosec} x = \frac{1}{x} + \sum_1^{\infty} \nu \left(\frac{(-1)^\nu}{x - \nu\pi} + \frac{(-1)^\nu}{x + \nu\pi} \right)$$

$$= \frac{1}{x} + \sum_1^{\infty} \nu (-1)^{\nu-1} \frac{2x}{\nu^2\pi^2 - x^2}$$

und hieraus durch Substitution von $\frac{\pi}{2} - x$ für x :

$$(99) \quad \sec x = 2 \sum_1^{\infty} \nu \left(\frac{(-1)^{\nu-1}}{(2\nu-1)\pi - 2x} + \frac{(-1)^{\nu-1}}{(2\nu-1)\pi + 2x} \right)$$

$$= \sum_1^{\infty} \nu (-1)^{\nu-1} \frac{4(2\nu-1)\pi}{(2\nu-1)^2\pi^2 - 4x^2}.$$

Jede dieser Partialbruchreihen konvergiert *gleichmäßig* in jedem endlichen, von Nullstellen der Nenner freien, abgeschlossenen Bereich der komplexen Ebene; *unbedingte* Konvergenz findet aber immer nur bei paarweiser Zusammenfassung der Partialbrüche statt¹⁴⁴).

144) Alle diese Reihen lassen sich durch Addition von Konstanten in

14. Potenzreihen für $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cot} x$, $\operatorname{cosec} x$, $\operatorname{sec} x$; $\lg \frac{\sin x}{x}$, $\lg \cos x$.¹⁴⁵⁾ Die in Nr. 19 eingeführten *Bernoullischen Zahlen* treten auf Grund der Gleichung (94) wieder auf als Reihenkoeffizienten in den aus den Partialbruchreihen (96), (97), (98) abzuleitenden Potenzreihen für $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cot} x$, $\operatorname{cosec} x$,¹⁴⁶⁾ sowie in den durch gliedweise Logarithmierung aus den unendlichen Produkten (89), (90) folgenden Potenzreihen für $\lg \frac{\sin x}{x}$, $\lg \cos x$:¹⁴⁷⁾

$$(100) \quad \operatorname{tg} x = \sum_1^{\infty} \frac{2^{2\nu}(2^{2\nu}-1)}{(2\nu)!} B_\nu x^{2\nu-1} \quad \left(|x| < \frac{\pi}{2}\right),$$

$$(101) \quad x \operatorname{cot} x = 1 - \sum_1^{\infty} \frac{2^{2\nu}}{(2\nu)!} B_\nu x^{2\nu} \quad (|x| < \pi),$$

$$(102) \quad x \operatorname{cosec} x = 1 + 2 \sum_1^{\infty} \frac{(2^{2\nu}-1)}{(2\nu)!} B_\nu x^{2\nu} \quad (|x| < \pi),$$

$$(103) \quad \lg \frac{\sin x}{x} = - \sum_1^{\infty} \frac{1}{\nu} \frac{2^{2\nu-1}}{(2\nu)!} B_\nu x^{2\nu} \quad (|x| < \pi),$$

$$(104) \quad \lg \cos x = - \sum_1^{\infty} \frac{(2^{2\nu}-1) 2^{2\nu-1}}{(2\nu)! \nu} B_\nu x^{2\nu} \quad \left(|x| < \frac{\pi}{2}\right).$$

Die II A 3, 18 erwähnten Rekursionsformeln für die *Bernoullischen Zahlen* ergeben sich größtenteils durch „Koeffizientenvergleichung“ (vgl. Nr. 3) nach Einsetzen einerseits der Entwicklungen (100) bis (104), andererseits der Reihen für $\sin x$ und $\cos x$ in die mannigfachen Relationen, welche eine trigonometrische Funktion als Produkt zweier anderen darzustellen erlauben.

Zur Einführung einer verwandten Gattung ganzer Zahlen — Sekantenkoeffizienten oder *Eulersche Zahlen*¹⁴⁸⁾ E_ν , hat die Reihe

absolut konvergente mit *linearen* Partialbrüchen verwandeln (besonderer Fall des *Mittag-Lefflerschen Theorems*; s. II B 1, 32).

Andere elementare Ableitungen der obigen Partialbruchreihen (z. T. nur für reelle x) bei *Cauchy*, An., p. 573; *Schröter*, Zeitschr. Math. Phys. 13 (1868), p. 257; *Thomae*, Elem. Theorie, p. 90; *Hattendorff*, Algebr. Anal., p. 256; *Osgood*, Lehrb. der Funktionentheorie 1, p. 519.

145) Die meisten dieser Reihen (wenigstens die ersten Koeffizienten) finden sich schon bei *J. Gregory* (s. v. *Braunmühl*, Gesch. d. Trigon. 2, p. 63).

146) *Euler*, Introd., p. 160.

147) *ibid.* p. 152.

148) Die zweite Benennung von *Raabe*, J. f. Math. 42 (1851), p. 366. — Über

$$(105) \quad \sec x = \sum_0^{\infty} \frac{E_\nu}{(2\nu)!} x^{2\nu} \quad \left(|x| < \frac{\pi}{2}\right)$$

Anlaß gegeben; Rekursionsformeln zur Berechnung der E_ν liefert alsdann die Beziehung $\sec x \cdot \cos x = 1$. Da sich die Reihe (105) andererseits auch durch Entwicklung der rechten Seite von (99) nach Potenzen von x ergeben muß, so gelten die Beziehungen

$$(106) \quad \sum_1^{\infty} \frac{(-1)^{\nu-1}}{(2\nu-1)^{2k+1}} = \frac{\pi^{2k+1}}{2^{2k+2}} \frac{E_k}{(2k)!} \quad (149)$$

Die Potenzreihen (100), (101), (102), (105) divergieren, wie ihre Herleitung aus den Partialbruchreihen unmittelbar erkennen läßt, in allen Punkten ihres Konvergenzkreises, während die Reihen (103), (104) für alle nicht reellen $|x| = \pi$ bzw. $|x| = \frac{\pi}{2}$ noch konvergieren.

15. Die hypergeometrische Reihe. Fast alle in der algebraischen Analysis auftretenden Potenzreihen erweisen sich als Spezial- oder Grenzfälle der sog. *Gaußschen*¹⁵⁰⁾ hypergeometrischen Reihe:

$$(107) \quad F(\alpha \beta \gamma x) = 1 + \frac{\alpha \cdot \beta}{1 \cdot \gamma} x + \frac{\alpha(\alpha+1) \beta(\beta+1)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma+1)} x^2 + \dots, \quad (151)$$

die *Eulerschen* Zahlen und ihren Zusammenhang mit den *Bernoullischen* vgl. II A 3, 18 und insbesondere *Saalschütz*, Vorles. über die *Bernoullischen* Zahlen, Berlin 1893.

149) Zuerst von *Euler* in anderem Zusammenhang bewiesen; s. Fußn. 143.

150) Disquis. gen. circa seriem infinitam, 1812 (= Werke 3, p. 134, deutsche Ausgabe von *Heinrich Simon*, Berlin 1888). — Der Name „hyperg. Reihe“ in etwas anderer Bedeutung rührt von *Wallis* her (*Arithmetica infinitorum* = *Opera math.* 1, Oxoniae 1645, p. 466); die Reihe selbst findet sich schon bei *Euler* (*Nov. Act. Petrop.* 12 (1794), p. 58), der auch die Differentialgleichung zweiter Ordnung der hypergeometrischen Funktion und daraus die Transformation $F(\alpha, \beta, \gamma, x) = (1-x)^{\gamma-\alpha-\beta} F(\gamma-\alpha, \gamma-\beta, \gamma, x)$ ableitet und zum Schluß eine Anwendung auf die Darstellung gewisser in der Theorie der Anziehung vorkommender Fourierscher Reihenkoeffizienten macht. Sonstige histor. Bemerkungen s. *L. Jecklin*, Hist.-krit. Untersuchung über die Theorie der hypergeom. Reihe, Dissert. Bern, 1901.

151) Die Frage nach der Konvergenz der hypergeometrischen Reihe wurde im reellen Gebiete von *Gauß*¹⁵⁰⁾ mit Hilfe besonderer nach ihm benannter Kriterien (s. I A 3, 22 und Fußn. 190), im komplexen von *Weierstraß* (s. ebendas. Fußn. 161 und I G 3, 3) erledigt: Der Einheitskreis ist Konvergenzkreis; auf demselben bestehen die drei Möglichkeiten: 1) absolute Konvergenz für alle $|x| = 1$, wenn $\Re(\gamma - \alpha - \beta) > 1$; 2) bedingte Konvergenz für alle $|x| = 1$ außer $x = 1$, wenn $1 \geq \Re(\gamma - \alpha - \beta) > 0$; 3) Divergenz, wenn $0 > \Re(\gamma - \alpha - \beta)$, (s. z. B. *Pringsheim*, Archiv Math. 3 (4) (1902), p. 19). Die Annahme: $\beta = \gamma$, $\alpha = -m$, $x = -y$ liefert die betr. Resultate für die binomische Reihe. Bei *Gauß* (Werke

die dann auch besonders geeignet ist, um für diese Funktionen konvergente Kettenbrüche¹⁵²⁾ zu gewinnen. In letzteren tritt der *arithmetische* Charakter der elementaren Funktionen, insbesondere die Irrationalität von e^x und $\operatorname{tg} x$ bei rationalem x ¹⁵³⁾ deutlicher hervor als in den Reihen.

Die Theorie der hypergeometrischen Reihe überschreitet indes die Hilfsmittel der algebraischen Analysis und gehört ihrer Natur nach der eigentlichen Funktionentheorie¹⁵⁴⁾ und der Lehre von den linearen Differentialgleichungen an.

3, p. 127) sind 23 Darstellungen bekannter Funktionen durch die hypergeometrische Reihe angegeben.

152) Über die Umformung der hypergeometrischen Reihe in einen Kettenbruch und die Konvergenz des letzteren s. I A 3 55. — Einen elementaren Konvergenzbeweis gab neuerdings *van Vleck*, *Ann. of math.* (2) 3, 1901; *Am. Soc. Transact.* 5 (1904), p. 253.

153) s. I A 3 9 u. 55 u. I C 3 7, p. 669.

154) Eine Behandlung der hypergeometrischen Reihe mit den Hilfsmitteln der elementaren Funktionenlehre gibt *Thomae*, *Zeitschr. Math. Phys.* 26 (1881), p. 314; 27 (1882), p. 41.

(Abgeschlossen im November 1908.)

II C 2. NUMERISCHE UND GRAPHISCHE QUADRATUR UND INTEGRATION GEWÖHNLICHER UND PARTIELLER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN.

VON

C. RUNGE UND FR. A. WILLERS
GÖTTINGEN. CHARLOTTENBURG.

Inhaltsübersicht.

I. Numerische und graphische Quadratur.

1. Allgemeines.
2. Methoden, die gegebene Abszissen verwenden.
 - a) Allgemeines.
 - b) Methode von *Newton-Cotes*.
 - c) Methode von *Mac Laurin*.
3. Methode von Gauß.
 - a) Bestimmung der Abszissen.
 - b) Die Koeffizienten.
 - c) Fehlerabschätzung.
4. Spezielle Fälle der Gaußschen Formel.
 - a) $\varphi(x) = 1$.
 - b) $\varphi(x) = (1 - x)^\lambda (1 + x)^\mu$.
 - c) $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$.
 - d) $\varphi(x) = \sqrt{1 - x^2}$.
 - e) $\varphi(x) = \sqrt{\frac{1 - x}{1 + x}}$.
 - f) $\varphi(x) = \sqrt{x(x - \alpha)(x - \beta)}$.
 - g) $\varphi(x) = e^{-x^2}$.
 - h) $\varphi(x) = e^{-x}$.
5. Verallgemeinerung der Methode von Gauß.
 - a) Formeln von *August*.
 - b) Verallgemeinerung von *Christoffel*.
 - c) Mehrfache Integrale.
6. Methode von Massau.
7. Methoden, bei denen die Koeffizienten gegeben sind.
 - a) Allgemeines.
 - b) $\varphi(x)$ ist eine gerade Funktion.
 - c) $\varphi(x)$ ist eine ungerade Funktion.

8. Formeln, die durch Kombination entstehen.
9. Die Eulersche Formel.
10. Formeln der Differenzenrechnung.
11. Annäherung durch mehrere Parabeln.
12. Methoden der graphischen Quadratur.
 - a) Allgemeines.
 - b) Bestimmung der mittleren Ordinaten und Abszissen.
 - c) Einzeichnen der Integralkurve.
 - d) Erweiterungen und Ergänzungen.
 - e) Einige Anwendungen.
13. Kubatur.
 - a) Kubatur durch eine Quadratur.
 - b) Allgemeine Betrachtungen.
 - c) Rechteckige und kreisförmige Begrenzung.
 - d) Zerlegung in Teilgebiete.
 - e) Graphische Methoden.
14. Differentiation.
 - a) Numerische Methoden.
 - b) Graphische Methoden.

II. Numerische und graphische Integration gewöhnlicher Differentialgleichungen.

15. Graphische Methoden.
 - a) Methode von Czuber.
 - b) Methode der Isoklinen.
 - c) Methode der Krümmungsradien.
16. Numerische Methoden.
 - a) Darstellung um einen Punkt.
 - b) Methoden von *Runge-Heun-Kutta*.
 - c) Methoden der Differenzenrechnung.
17. Asymptotische Integration.
18. Methode der sukzessiven Approximation.
 - a) Graphische Methode von Runge.
 - b) Numerische Methoden von Cotton, Bärwald usw.
 - c) Methoden der Himmelsmechanik.

III. Graphische und numerische Integration partieller Differentialgleichungen.

19. Methoden, welche die reellen Charakteristiken bestimmen.
 - a) Gleichungen erster Ordnung.
 - b) Gleichungen zweiter Ordnung.
 - c) Systeme simultaner Gleichungen.
20. Graphische Methoden zur Integration der Gleichungen mit imaginären Charakteristiken.
 - a) Methode von *Maxwell*, angenäherte Erfüllung der Randbedingungen.
 - b) Methoden, die der Differentialgleichung in endlichen Stücken möglichst genügen und eine Randbedingung streng erfüllen.

- c) Methoden, die durch endliche Stücke approximieren und alle Randbedingungen streng erfüllen.
- d) Infinitesimal approximierende Methoden mit strenger Erfüllung der Randbedingungen.

21. Numerische Methoden.

- a) Übertragung der Methoden von *Runge-Heun-Kutta*.
- b) Ersetzung der Differentialgleichung durch eine Differenzgleichung.
- c) Methode von *Rayleigh-Ritz*.

22. Experimentelle Methoden.

Literatur.

Da die hier in Betracht kommende Literatur vielfach in technischen und anderen Abhandlungen zerstreut und daher schwer auffindbar ist, werden sicher die Literaturangaben nicht vollständig sein; doch hoffen wir Wesentliches nicht übersehen zu haben. Die einzelne Gegenstände betreffenden Abhandlungen sind in den Fußnoten zitiert; hier sind nur zusammenfassende Darstellungen genannt.

Bailaud, Mémoires de l'Académie des Sciences de Toulouse (8) 5 (1883), p. 161—190.
— Annales de l'observatoire de Toulouse 2 (1887), p. 1—36.

Berger, Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis (3) 16 (1893).

Bertrand, Traité de calcul différentiel et de calcul intégral II, Paris 1870, p. 331—52.

Biermann, Vorlesungen über mathematische Näherungsmethoden, Braunschweig 1905.

Boole, A treatise on the calculus of finite differences, London 1880, Kap. III, p. 46—61.

Bruns, Grundlinien des wissenschaftlichen Rechnens, Leipzig 1903.

Dirksen, Abhandl. d. kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin aus dem Jahre 1831, Berlin 1832, p. 117—159.

Heine, Handbuch der Kugelfunktionen 2, Berlin 1881.

Klügel, Mathematisches Wörterbuch II 1805, Integralgleichungen, p. 919—922, IV. 1823, Quadratur, p. 132—165.

Krölloff, Vorlesungen über angenäherte Rechnungen, Petersburg 1911.

Mansion, Mathesis 1 (1881), Supplement, p. 1—62.

Massau, Mémoire sur l'intégration graphique et ses applications, Paris-Liège 1885.
— Appendice au mémoire . . . , Paris 1890.

— Mémoire sur l'intégration graphique des équations aux dérivées partielles, Gand 1900—1903.

Markoff, Differenzenrechnung. Petersburg 1891, (deutsch von *Prümm* u. *Friesendorff*) Leipzig 1896.

Merrifield, Report on the Present State of Knowledge of the Application of Quadratures and Interpolation to Actual Data. Report of the 50. meeting of the British Association for the Advancement of Science, London 1880.

de Montessus et d'Adhemar, Calcul numérique, Paris 1911.

Moors, Valeur approximative d'une intégrale définie, Paris 1905.

Nehls, Über graphische Integration und ihre Anwendung in der graphischen Statik, Leipzig 1885.

D'Ocagne, Calcul graphique et nomographie, Paris 1908.

Pascal, Calcolo delle variazione e calcolo delle differenze finite, Milano 1897.

Possé, Sur quelques applications des fractions continues algébriques, Petersburg 1886.

Radau, Journal de Mathématique (3) 6 (1880), p. 283—336.

— Études sur les formules d'interpolation, Paris 1891, Teil IV, p. 84—96.

Runge, Graphical methods. A course of lectures delivered in Columbia University, New York 1912. Erscheint Ende 1914 in einer vom Autor bearbeiteten deutschen Ausgabe im Verlage von B. G. Teubner, Leipzig.

— Numerisches Rechnen. Autographierte Vorlesung, Göttingen 1912/13.

v. Sanden, Praktische Analysis (Handbuch der angewandten Mathematik 1), Leipzig 1914.

Schlömilch, Theorie der Summen und Differenzen, Halle 1848, Teil II, § 11—13.

Sonine, Warschauer Nachrichten 1887, p. 1—76.

Thiele, Interpolationsrechnung, Leipzig 1909, § 10, 11.

Todhunter, An elementary Treatise on Laplace's Functions, Lamé's Functions and Bessel's Functions, London 1875, p. 96—109.

Vahlen, Konstruktionen und Approximationen, Leipzig 1911.

I. Numerische und graphische Quadratur.

1. **Allgemeines** (vgl. II A 2 (*A. Voss*) Differential- und Integralrechnung Nr. 50—55). Bei der numerischen Quadratur handelt es sich darum, den Flächeninhalt eines durch eine Kurve $y = f(x)$, zwei Ordinaten und die Abszissenachse begrenzten Gebietes als Mittelwert einer endlichen Anzahl n von mit entsprechenden Gewichten A_i genommenen Ordinaten $f(x_i)$ auszudrücken. Allgemeiner heißt das, man soll den Wert eines bestimmten Integrales

$$(1) \quad I = \int_a^{\beta} f(x) \varphi(x) dx$$

aus den Werten von $f(x)$ für eine bestimmte endliche Anzahl n von Abszissen x_i und aus einer gleichen Anzahl von Koeffizienten A_i möglichst genau durch einen Ausdruck der Form

$$(2) \quad A = [A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3) + \dots + A_n f(x_n)]$$

darstellen. Der reguläre Fall ist $\varphi(x) = 1$; aber es soll hier gleich der allgemeinere ins Auge gefaßt werden. Dabei ist vorausgesetzt, daß sich $f(x)$ für $a \leq x \leq \beta$ mit ausreichender Genauigkeit durch eine ganze rationale Funktion hinreichend hohen Grades m , der erheblich größer sein kann als n

$$c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 \dots c_{m-1} x^{m-1} + c_m x^m$$

ersetzen läßt, während $\varphi(x)$ nur integrierbar zu sein braucht, also z. B. eine endliche Anzahl von Unstetigkeitsstellen haben kann. Für die Zahl n und die Lage x_i der zu benutzenden Ordinaten wird vor allem der Um-

stand maßgebend sein, daß man eine möglichst große Genauigkeit erreichen will; gelegentlich können aber für die Wahl des n und der x_i auch andere Gründe mitsprechen, etwa daß man bequeme Werte für die A_i oder die x_i zu haben wünscht, oder daß man eine bequeme Formel wünscht, deren Genauigkeit die der durch Beobachtung gewonnenen Werte $f(x_i)$ nicht überschreitet usw. Die Grenzen α, β kann man durch die Substitution:

$$x = \frac{\alpha + \beta}{2} - \frac{\alpha - \beta}{2} \xi, \quad x_k = \frac{\alpha + \beta}{2} - \frac{\alpha - \beta}{2} \xi_k, \quad A_k = - \frac{\alpha - \beta}{2} \bar{A}_k$$

auf -1 und $+1$ resp. durch ähnliche Substitutionen auf $-\frac{1}{2}$ und $+\frac{1}{2}$ oder auf 0 und 1 zurückführen.

Setzt man

$$(3) \quad a_r = \int_a^b x^r \varphi(x) dx,$$

so ist

$$(4) \quad \begin{cases} I - A = c_0 a_0 + c_1 a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_k a_k + \dots \\ \quad - A_1 (c_0 + c_1 x_1 + c_2 x_1^2 + \dots + c_k x_1^k + \dots) \\ \quad - A_2 (c_0 + c_1 x_2 + c_2 x_2^2 + \dots + c_k x_2^k + \dots) \\ \quad \dots \\ \quad - A_n (c_0 + c_1 x_n + c_2 x_n^2 + \dots + c_k x_n^k + \dots) \\ \quad = c_0 \delta_0 + c_1 \delta_1 + c_2 \delta_2 + \dots + c_k \delta_k + \dots \end{cases}$$

wo zur Abkürzung gesetzt ist:

$$(5) \quad \begin{cases} \delta_0 = a_0 - (A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n) \\ \delta_1 = a_1 - (A_1 x_1 + A_2 x_2 + \dots + A_n x_n) \\ \delta_2 = a_2 - (A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 + \dots + A_n x_n^2) \\ \dots \\ \delta_k = a_k - (A_1 x_1^k + A_2 x_2^k + \dots + A_n x_n^k) \\ \dots \end{cases}$$

Man nimmt nun an, daß in der für $f(x)$ gesetzten Funktion die c_r sehr schnell abnehmen, so daß die Annäherung um so besser wird, je mehr der δ man, von δ_0 ausgehend, zu Null macht.¹⁸⁸⁾ Wir sehen hier davon ab, daß dies bei empirisch gefundenen Kurven durchaus nicht der Fall zu sein braucht, sondern daß hier mit hohem Index versehene Werte c_i gelegentlich den Lauf der Kurve wesentlich bestimmen können. In einem solchen Falle wird unter Umständen eine Formel von geringerem Genauigkeitsgrad eine bessere Annäherung liefern können (vgl. Nr. 11). Werden die p ersten δ Null, so sagt man nach *Radau*¹⁾, die Formel habe den Genauigkeitsgrad $p - 1$; d. h. also eine

1) *Radau*, J. de math. (3) 6 (1880), p. 283—336.

Ist dagegen $\varphi(x)$ eine ungerade Funktion, so ist $\sum A_p x_p^{2h} = 0$, also $A_p = -A_{n-p+1}$, $A_0 = 0$. Es kommt dann nur eine gerade Zahl von Ordinaten in Betracht.

2. Methoden, die gegebene Abszissen verwenden. a) *Allgemeines.* Bei gegebenen Abszissen ist die Koeffizientenbestimmung das rein algebraische Problem, die Gleichungen (5) resp. (7) zu lösen, wenn die δ gleich Null gesetzt werden, was bei verschiedenen Abszissenwerten immer möglich ist. Man erhält so die A_p als Quotienten zweier Determinanten.⁵⁾ *Moors*⁶⁾ bezeichnet mit s_r die symmetrische Funktion r^{ten} Grades der x_p^2 und mit s_r^p die entsprechende Funktion ohne x_p^2 ; er erhält dann aus (7)

$$(8) \quad \left\{ \begin{aligned} A_p &= \frac{a_{2i-2} - a_{2i-4} s_1^p + a_{2i-6} s_2^p \dots (-1)^{i-1} a_0 s_{i-1}^p}{x_p^{2i-2} - x_p^{2i-4} s_1^p + x_p^{2i-6} s_2^p \dots (-1)^{i-1} s_{i-1}^p}, \\ &= \frac{a_{2i-2} - a_{2i-4} s_1^p + a_{2i-6} s_2^p \dots (-1)^{i-1} a_0 s_{i-1}^p}{(x_p^2 - x_1^2)(x_p^2 - x_2^2) \dots / \dots (x_p^2 - x_i^2)}. \end{aligned} \right.$$

Der / soll bedeuten, daß $x_p^2 - x_p^2$ fehlt. *Jacobi*⁷⁾ bestimmt die Koeffizienten mittels der *Lagrangeschen* Interpolationsformel.⁸⁾ Sind die Abszissen Wurzeln der Gleichung $F_n(x) = 0$, so ist

$$(9) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) f(x) dx = \sum_k^n \int_{\alpha}^{\beta} \frac{F_n(x) \varphi(x)}{F_n'(x_k)(x-x_k)} dx \cdot f(x_k) + c_n \delta_n + c_{n+1} \delta_{n+1} \dots$$

*Jacobi*⁷⁾ schreibt den Ausdruck für die Koeffizienten in der Form ($\varphi(x) = 1$)

$$A_k = \frac{1}{F_n'(x_k)} \int_{\alpha}^{\beta} F_n'(x_k) dx_k.$$

Diese Formel kann man nach *Radau*¹⁾ auch unabhängig von der *Lagrangeschen* Formel durch den Ansatz $f(x) = \frac{F_n(x)}{x-x_k}$ erhalten. Sind die gegebenen Abszissen sowie die Funktion $\varphi(x)$ symmetrisch zur Intervallmitte, so kann man aus (9) leicht ablesen, daß die Koeffizienten paarweise gleich sind. Bezeichnet man mit *Radau*¹⁾ den ganzen Teil einer Funktion mit E , so besteht die Gleichung, falls x_k

5) *Blaček*, Sitzungsberichte der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Prag 1879, p. 167—175.

6) *Moors*, Nieuw. Archief, Amsterdam 20 (1893), p. 129—214.

7) *Jacobi*, Journ. für Math. 1 (1825), p. 301—308.

8) *Lagrange*, Leçons élémentaires (1795), Oeuvres 7, p. 284—287 und Sur l'interpolation, Oeuvres 7, p. 535—553. Deutsch von *Schultze* im Astronomischen Jahrbuch 1783.

keine Wurzel von F_n ist,

$$(10) \quad E \frac{F_n(x)}{x - x_k} = E \frac{F_n(x_k)}{x_k - x}.$$

Konvergiert x_i gegen eine Wurzel, so läßt sich $F_n(x)$ durch $x - x_k$ dividieren. Für $\varphi(x)$ gleich eins, ist also

$$(11) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \frac{F_n(x)}{x - x_k} dx = E F_n(x_k) \int_{\alpha}^{\beta} \frac{dx}{x_k - x} = E \left[F_n(x_k) \left(\lg \frac{x_k - \alpha}{x_k - \beta} \right) \right] = Z_n(x_k),$$

so daß man für die Grenzen $+1$ und -1 aus (9)

$$(12) \quad A_i = \frac{2}{F_n'(x_i)} E \left[F_n(x_i) \left(\frac{1}{x_i} + \frac{1}{3x_i^3} + \frac{1}{5x_i^5} + \dots \right) \right] = \frac{1}{F_n'(x_i)} Z_n(x_i)$$

erhält, einen Ausdruck, der sich z. B. bei *Schellbach*⁹⁾, *Radau*¹⁾, *Hermite*¹⁰⁾ u. a. findet.

Die Korrektur gibt *Moors*⁶⁾ in der Form

$$(13) \quad c_{2i} \delta_{2i} + c_{2i+2} \delta_{2i+2} \dots = \{ a_{2i} - a_{2i-2} s_1 + a_{2i-4} s_2 - \dots (-1)^i a_0 s_i \} c_{2i} \\ + \{ a_{2i+2} - (a_{2i} - \delta_{2i}) s_1 + a_{2i-2} s_2 \dots (-1)^i a_2 s_i \} c_{2i+2}.$$

Den Rest kann man auch wie *Markoff*¹¹⁾ mit Hilfe des Restgliedes der *Lagrangeschen* Formel finden. *Bertrand*^{10³)} gibt eine Tabelle der verschiedenen Werte δ für die Formeln von *Newton-Cotes*.

Gewöhnlich dividiert man $f(x)$ durch $F_n(x)$, so daß

$$(14) \quad f(x) = P(x) + Q(x) \cdot F_n(x)$$

wird, woraus dann für die Glieder höherer Ordnung

$$(15) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) \cdot Q(x) \cdot F_n(x) dx = c_n \delta_n + c_{n+1} \delta_{n+1} + c_{n+2} \delta_{n+2} \dots$$

folgt. Also ist

$$(16) \quad \delta_{n+s} = \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) \cdot F_n(x) \cdot dx \cdot E \frac{x^{n+s}}{F_n(x)},$$

Terme, die mit den Koeffizienten von $\frac{1}{z^{n+s+1}}$ in der Entwicklung von

$$(17) \quad \frac{1}{F_n(z)} \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) \frac{F_n(x)}{z-x} dx$$

nach fallenden Potenzen von x identisch sind. Man bezeichnet daher diese Funktion nach *Heine*¹²⁾ als *erzeugende Funktion des Fehlers*.

9) *Schellbach*, Journ. für Math. 1 (1825), p. 301—308.

10) *Hermite*, Cours d'analyse, Paris 1873, p. 439—453.

11) *Markoff*, Differenzenrechnung (deutsch von *Prümm* u. *Friesendorff*), Leipzig 1896, p. 50—61.

12) *Heine*, Handbuch der Kugelfunktionen 2, Berlin 1881.

Neuerdings hat *Peano*¹³⁾ das Restglied der Quadraturformeln unter Benutzung eines Diskontinuitätsfaktors¹⁴⁾ in Form eines bestimmten Integrales zwischen den Grenzen $-\infty$ und $+\infty$ dargestellt.

b) *Formeln von Newton-Cotes*. Im allgemeinen wählt man nun die gegebenen Ordinaten äquidistant. Unter Benutzung der End- und der Teilordinaten wird bei Einteilung in $n - 1$ gleiche Teile für die Grenzen 0 und $+1$

$$x_1 = 0; \quad x_2 = \frac{1}{n-1}; \quad x_3 = \frac{2}{n-1}; \quad \dots; \quad x_n = \frac{n-1}{n-1} = 1.$$

In diesem Falle hat man nach *Gauß*⁴⁸⁾, *Grunert*²⁾, *Markoff*¹¹⁾ u. a.

$$A_k = \frac{(-1)^{n-k}}{k!(n-k+1)!} \int_0^1 \frac{(nx-x)(nx-x-1) \cdots (nx-x-n+1)}{nx-x-k+1} dx,$$

und das erste Fehlerglied läßt sich in der Form

$$\delta_n = \int_0^1 x \left(x - \frac{1}{n-1}\right) \left(x - \frac{2}{n-1}\right) \cdots (x-1) dx$$

schreiben¹⁵⁾, woraus unmittelbar durch Vertauschung von x mit $1-x$ folgt $\delta_n = (-1)^n \delta_n$, d. h. $\delta_n = 0$ für ungerade n . Den ersten Versuch, den Inhalt durch äquidistante Ordinaten auszudrücken, macht *Cavalieri*¹⁶⁾, der als sog. Faßregel (s. Nr. 13a) einen speziellen Fall der Formel für $n = 3$ gibt. Später findet sich bei *Jacob Gregorius*¹⁷⁾ allgemein die Formel für $n = 3$, d. h. die für Parabeln zweiter Ordnung exakte Formel; er erkennt aber nicht, daß diese Formel auch für den Fall $n = 4$ gilt, sondern gibt für Parabeln dritter Ordnung eine Formel, die nur für $y = ax^3 + b$ richtig ist.¹⁸⁾ Auf Parabeln vierter und fünfter Ordnung weist er ohne Formeln hin. Die erste allgemeine Lösung deutet *Newton* zuerst in einem Brief an Leibniz vom 24. X. 1676, dann in

13) *Peano*, Atti della R. Accad. dei Lincei (5) 22 (1913), p. 562—69 und Mathesis (4) 4 (1914), p. 5—10.

14) *Mansion*, Mathesis (4) 4 (1914), p. 169—174.

15) *Berger*, Nova acta Regiae societatis scientiarum Upsaliensis (3) 16 (1893), (52 S.).

16) *Cavalieri*, Una Centuria di varii Problemi in der Pratica Astrologica. Bologna 1639. In Problema 80 findet sich auf p. 446 die Angabe: Si adunque moltiplicaremo la terza parte di *IM* lunghezza della Botte *BDFH* in due cerchi maggiore *CG* e uno de minori *BH*, *DF* come in *BH*, ci verrà la capacità di detta Botte.

17) *Jacob Gregorius*, Exercitationes geometricae, London 1668, p. 25—27. Methodus facilis et accurata componendi Secantes et Tangentes artificiales.

18) *Heinrich*, Bibliotheca mathematica (3) 1 (1900), p. 90—92.

den Prinzipien an und führt sie später weiter aus.¹⁹⁾ Er gibt die Formel für $n = 4$. Cotes gibt dann ohne Ableitung die Koeffizienten von $n = 3$ bis 11 ²⁰⁾, ferner finden sie sich bei Simpson²⁰⁹⁾ bis $n = 7$, bei Atwood²¹⁾ bis $n = 9$, bei Merrifield²²⁾ und in vielen anderen Abhandlungen.

Ansätze zu den Cotesschen Formeln finden sich übrigens auch bei Lambert.²³⁾

Unabhängig kommt Kramp²⁴⁾ zu ähnlichen Formeln unter Benutzung einer Methode von Obenheim.²⁵⁾ Er teilt das Intervall in zwölf gleiche Teile, trägt den Inhalt der durch die Endpunkte von t äquidistanten Ordinaten bestimmten Sehnenpolygone als Ordinaten zu $x = \frac{1}{t}$ auf und legt durch die erhaltenen Punkte eine Parabel, die für $x = 0$ die gewünschte Formel gibt. Gergonne²⁶⁾ ersetzt die Trapeze durch Rechtecke und erhält so eine obere Fehlergrenze. Kramp²⁷⁾ gibt dann noch eine zweite Ableitung, bei der er die Kurve selbst durch eine Parabel n^{ter} Ordnung ersetzt, die er durch n äquidistante Ordinaten bestimmt und integriert. Bérard²⁸⁾ erhält die Koeffizienten durch Anwendung des Ansatzes auf spezielle Parabeln. Er gibt, wie Kramp die Koeffizienten bis $n = 13$, außerdem auch noch für $n = 25$. Für $n = 13$ sind die Werte verschieden; infolgedessen findet eine Auseinandersetzung zwischen Kramp²⁹⁾, Servois³⁰⁾, Ampère³¹⁾ statt, in der Kramp³²⁾ schließlich seine Formel als falsch erkennt.

19) Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica 3 (1687), Prop. XL Lemma 5. Newton, Invenire lineam curvam generis parabolici quae per data quotecunque puncta transibit 1711, abgedruckt: Opuscula, 1. Ausgabe von Horsley 1778, p. 521—531.

20) Cotes, Harmonia mensurarum, Cantabrigiae 1722. Anhang: Opera miscellanea, De methodo differentiali Newtonia.

21) Atwood, A Disquisition on the Stability of Ships. Philosophical Transactions 1798, p. 201—310 (die Koeffizienten finden sich p. 262).

22) Merrifield, Report of the 50. meeting of the British Association for the Advancement of science 1880, p. 321—48.

23) Lambert, Beyträge zum Gebrauch der Mathematik und deren Anwendungen 2, Berlin 1770, p. 250—313. Quadratur und Rektifikation der krummen Linien durch geradlinigte Vielecke, welche um dieselben und in dieselben beschrieben werden können.

24) Kramp, Annales de Gergonne 6 (1815/16), p. 281—302.

25) Obenheim, Balistique, Straßbourg 1816.

26) Gergonne, Annales de Gergonne 6 (1815/16) p. 303—320.

27) Kramp, Annales de Gergonne 6 (1815/16), p. 372—387.

28) Bérard, Annales de Gergonne 7 (1816/17), p. 101—116.

29) Kramp, Annales de Gergonne 7 (1816/17), p. 241—252.

30) Servois, Annales de Gergonne 8 (1817/18), p. 73—115.

Ein Korrektionsglied gibt als erster *Stirling*³³⁾ an für $n = 3, 5, 7, 9$, und zwar nimmt er die Differenz zwischen der Formel für $2i - 1$ und einer Formel mit $2i + 1$ Ordinaten, bei der die von den Grenzordinaten um $\frac{1}{n-1}$ nach außen liegenden Ordinaten mit benutzt werden, eine Methode, die sich allgemein bei *Lobatto*³⁴⁾ und besonders bei *Grunert*²⁾ durchgeführt findet. Abschätzungen des Fehlers mittels der *Taylor*schen Reihe oder der *Euler*schen Formel finden sich zuerst wohl bei *Mac Laurin* (bis $n = 5$)³⁵⁾, ferner bei *Gauß*⁴⁸⁾, *Enke*³⁶⁾, *Heine*¹²⁾, *Fonténé*³⁷⁾, *Jung*³⁾, *Moors*³⁸⁾ u. ⁶⁾ und anderen. *Enke* wendet die von *Jacobi*⁷⁾ für die *Gauß*schen Formeln (s. § 3) gegebene Methode zur Fehlerabschätzung auf die *Newton-Cotes*schen Formeln an. *Peano*¹³⁾ erläutert seine Restabschätzung mittels eines bestimmten Integrales mit Diskontinuitätsfaktors an dem Falle $n = 3$. *Quarra*³⁹⁾ wendet sie auf den Fall $n = 4$ an.

c) *Formeln von Mac Laurin*. *Mac Laurin*⁴⁰⁾ benutzt nicht die Endordinaten der einzelnen Teilintervalle, sondern die Mittelordinaten, setzt also bei n gleichen Teilen und den Grenzen 0 und $+1$

$$x_1 = \frac{1}{2n}; \quad x_2 = \frac{3}{2n}; \quad \dots; \quad x_n = \frac{2n-1}{2n}.$$

Die Koeffizienten haben für diesen Fall die Form:

$$\frac{(-1)^{n-k}}{2^{n-1} k! (n-k+1)!} \int_0^1 \frac{(2nx-1)(2nx-3) \dots (2nx-2n+1)}{2nx-2k+1} dx,$$

und das erste Korrektionsglied wird

$$\delta_n = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2n}\right) \left(x - \frac{3}{2n}\right) \dots \left(x - \frac{2n-1}{2n}\right) dx,$$

31) *Ampère*, Annales de Gergonne 8 (1817/18), p. 117—124.

32) *Kramp*, Annales de Gergonne 9 (1818/19), p. 373—396.

33) *Stirling*, Methodus differentialis sive tractatus de summatione et interpolatione serierum infinitarum, London 1730, prop. 31.

34) *Lobatto*, Lessen over Integral-Rekening, La Haye 1852 § 198/99.

35) *Mac Laurin*, Treatise of Fluxion 2, Edinburg 1742, § 848/49.

36) *Enke*, Berliner astronomisches Jahrbuch 1863. Abdruck: Gesammelte Abhandlungen 1, p. 100—124.

37) *Fonténé*, Nouv. Ann. (4) 10 (1910), p. 87—90.

38) *Moors*, Valeur approximative d'une intégral définie, Paris 1905.

39) *Quarra*, Atti della R. Accad. della scienze di Torino 43 (1912—13), p. 643—53.

40) *Mac Laurin*, Treatise of Fluxion 2, Edinburg 1742, § 832.

woraus wie oben für ein ungerades n $\delta_n = 0$ folgt.¹⁵⁾ *Moors*³⁸⁾ gibt die Koeffizienten von $n = 1$ bis 10 und die zugehörigen Korrektionsglieder. Daß der Fehler für $n = 2i + 1$ und $n = 2i + 2$ sowohl für die *Newton-Cotes*schen wie für die *Mac Laurin*schen Formeln von derselben Ordnung ist, daß also die Parabel $2i$ ter Ordnung auch eine Funktion $2i + 1$ ter Ordnung exakt zu quadrieren gestattet, wird häufig betont, so von *Dirksen*⁴¹⁾, *Catalan*⁴²⁾, *Maleyx*⁴³⁾, *Skutsch*⁴⁴⁾, *Schoute*⁴⁵⁾, *Korteweg*⁴⁶⁾, *Mannoury*⁴⁷⁾ u. a.

3. Methode von Gauß. a) *Bestimmung der Abszissen.* Der Gedanke, daß man durch passende Wahl der Funktionswerte mehr Fehlerglieder zum Verschwinden bringen kann, findet sich vielleicht zuerst bei *Buzengeiger*¹³⁸⁾ verwandt. Wirklich ausgenutzt wird dieser Gedanke dann in einer 2 Jahre später der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegten Abhandlung von *Gauß*.⁴⁸⁾

Will man mit n Funktionswerten den Genauigkeitsgrad $2n - 1$ erreichen, so muß man außer den Fehlergliedern $\delta_0 \dots \delta_{n-1}$ auch noch $\delta_n \dots \delta_{2n-1}$ in den Gleichungen (5) zum Verschwinden bringen. Die Bestimmung der n Wurzeln und der n Koeffizienten aus den $2n$ Gleichungen ist ein rein algebraisches Problem.⁴⁹⁾ Sind die Größen x_1, x_2, \dots, x_n Wurzeln der Gleichung

$$(18) \quad F_n(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

und multipliziert man mit *Joachimsthal*⁵⁰⁾ die ersten $n + 1$ Gleichungen (5) ($\delta = 0$) mit b_0, b_1, \dots, b_n , und addiert sie, verfährt genau so mit der 2ten bis $n + 2$ ten usw., so erhält man, wenn man beachtet, daß

$$(19) \quad A_s x_s^n (b_0 + b_1 x_s + b_2 x_s^2 + \dots + b_n x_s^n) = 0$$

41) *Dirksen*, Abh. d. kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin aus dem Jahre 1831, Berlin 1832, p. 117—159.

42) *Catalan*, Nouvelle correspondance mathématique 6 (1880), p. 396—402. Nouv. Ann. 16 (1857), p. 312. Manuel des Candidats de l'école polytechnique 2, p. 295.

43) *Maleyx*, Nouv. Ann. (2) 19 (1880), p. 529—551.

44) *Skutsch*, Arch. Math. Phys. (2) 12 (1893), p. 111/12.

45) *Schoute*, Paris C. R. 122 (1896), p. 1113—1115.

46) *Korteweg*, Paris C. R. 122 (1896), p. 1399.

47) *Mannoury*, Paris C. R. 122 (1896), p. 1399—1400.

48) *Gauß*, Methodus nova integralium valores per approximationem inveniendi. Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores 3 (1816). Abgedruckt: Gesammelte Werke 3, p. 163—196.

49) *Bretschneider*, Programm d. Herzogl. Realgymnasiums zu Gotha 1849 (12 Seiten).

50) *Joachimsthal*, Journ. f. Math. 48 (1854), p. 386—416.

ist, die Gleichungen

$$(20) \quad a_k b_0 + a_{k+1} b_1 + \dots + a_{k+n} b_n = 0$$

für $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$. Unter Hinzunahme der Gleichung (18) erhält man daraus für $F_n(x)$ die Gleichung

$$(21) \quad F_n(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & \dots & x^n \\ a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{n+1} \\ a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_{n+2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n-1} & a_n & a_{n+1} & \dots & a_{2n-1} \end{vmatrix} = 0.$$

Ähnlich verfahren *Ligowski*⁵¹⁾, *Andrae*⁵²⁾, *Oppermann*⁵³⁾, *Baillaud*⁵⁴⁾, *Lampe*⁵⁵⁾, *Heun*⁵⁶⁾, *Moors*⁵⁸⁾ u. a.

*Ligowski*⁵¹⁾ findet für $\varphi(x) = 1$ die Koeffizienten unter Benutzung von Sätzen der Determinantentheorie

$$b_\varrho = (-1)^{n-\varrho} \frac{(n!)^2 (n + \varrho!)}{(\varrho!)^2 (n - \varrho)! 2n!}$$

für die Grenzen 0 und 1.

*Christoffel*⁵⁷⁾, *Scheibner*⁵⁸⁾, *Baillaud*⁵⁹⁾ u. a. erhalten die Gleichungen (20) dadurch, daß sie

$$(22) \quad \sum_1^n \frac{A_k}{x - x_k} = \frac{\psi(x)}{F_n(x)}$$

nach fallenden Potenzen von x entwickeln, mit $F_n(x)$ multiplizieren und die Koeffizienten gleicher Potenzen von x gleichsetzen. Ein anderer Weg findet sich bei *August*⁶⁰⁾ angegeben (s. u. 4).

Vielfach werden aus der Gleichung (21) direkt die Wurzeln ausgerechnet; so tut es *Gauß*⁴⁸⁾ § 16 im Falle $\varphi(x) = 1$ für $n = 2, 3$,

51) *Ligowski*, Arch. f. Math. u. Phys. 36 (1861), p. 181—85.

52) *Andrae*, Oversight over det Kongelige Danske Vedenskabernes Selskabs Vorhadlinger 1867, p. 165—201.

53) *Oppermann*, Zeuthen Tidsskrift (3) 1 (1871), p. 11—27.

54) *Baillaud*, Paris C. R. 90 (1880), p. 974—976.

55) *Lampe*, Jahresb. d. Deutsch. Math.-Ver. 3 (1894), p. 102—106.

56) *Heun*, Programmabhandl. Nr. 108, Berlin 1892 (19 S.).

57) *Christoffel*, Journ. f. Math. 55 (1858), p. 61—82.

58) *Scheibner*, Leipz. Ber. 8 (1856), p. 65—76.

59) *Baillaud*, Mémoires de l'Académie des sciences de Toulouse (8) 5 (1883), p. 161—190.

60) *August*, Arch. f. Math. u. Phys. 67 (1881), p. 72—93.

*Ligowski*⁶¹) für $n = 1, 3, 5$ (vgl. auch die Arbeiten von *Lampe*⁵⁵), *Vogel*⁶²) u. a.).

Für größere Werte benutzt *Gauß*⁴⁸) die Kettenbruchentwicklung, um sukzessive die Gleichungen für $n = 4, 5$ usw. aufzustellen. Die allgemeine Gleichung für n bestimmt er schließlich durch Induktion. *Joachimsthal*⁵⁰) bestimmt die Lage und Realität der Wurzeln von Gleichungen (21) für den Fall $\varphi(x) = 1$ nach dem *Sturmschen* Prinzip.⁶³)

*Scheibner*⁵⁸) benutzt zur Lösung Sätze von *Pfaff*⁶⁴) und *Heine*⁶⁵) und findet, daß die x_p Wurzeln einer hypergeometrischen Reihe sind, die *Baillaud*⁵⁹) für die Grenze 0 und $+1$ als

$$(23) \quad F(n+1, -n, 1, x) = 0$$

angibt.

Häufig geht man, um die Gleichung (18) zu finden, auch von den Gleichungen (16) aus. Soll $\delta_n \dots \delta_{2n-1}$ verschwinden, so folgt aus den Gleichungen (16)

$$(24) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) F_n(x) x^k dx = 0 \quad \text{für } (k = 0, 1, \dots, n-1).$$

Auf andern Wege kommt *Markoff*⁶⁶) zu der Gleichung (24). Er benutzt die von *Hermite*⁶⁷) gegebene erweiterte *Lagrangesche* Interpolationsformel für den Fall, daß in den durch die Wurzeln von $F_n(x)$ bestimmten Punkten die Funktionswerte nebst ihren ersten Ableitungen gegeben sind. Er erhält so die Formel

$$(25) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) f(x) dx = \sum_1^n A_i f(x_i) + \sum_1^n B_i f'(x_i) + c_{2n} \delta_{2n} + \dots$$

und stellt nun die Bedingungen dafür auf, daß sämtliche

$$(26) \quad B_i = \frac{1}{(F_n'(x_i))^2} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{(F_n(x))^2}{x - x_i} \varphi(x) dx$$

zu Null werden. Da $F_n(x)$ durch $x - x_i$ teilbar ist, so muß für jede

61) *Ligowski*, Arch. f. Math. u. Physik 32 (1859), p. 241—49.

62) *Vogel*, Kiewer Nachr. 1887, p. 173—186.

63) *Sturm*, Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Sciences 6 (1835).

64) *Pfaff*, Nova acta Petropolitana 11 (1797) im Supplément à l'histoire, p. 51.

65) *Heine*, Journ. f. Math. 32 (1846), p. 205—210 und 34 (1847), p. 285—328.

66) *Markoff*, Mathem. Ann. 25 (1885), p. 427—432.

67) *Hermite*, Journ. f. Math. 84 (1878), p. 70—79, insbesondere: Postscriptum.

beliebige Funktion $\theta_{n-1}(x)$ von nicht mehr als $n - 1^{\text{tem}}$ Grade

$$(27) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) F_n(x) \theta_{n-1}(x) dx = 0$$

sein. Das führt zu den Gleichungen (24).

Von diesen Gleichungen gehen *Christoffel*⁶⁸⁾ und *Stieltjes*⁶⁹⁾ aus und weisen nach, daß für positive integre Funktionen $\varphi(x)$ immer ein Polynom $F_n(x)$ existiert, dessen sämtliche n Wurzeln reell und ungleich sind und zwischen den Grenzen α und β liegen. Für diese Polynome besteht die Gleichung⁷⁰⁾

$$F_{n+1}(x) = (x - k_n)F_n(x) - \lambda_n F_{n-1}(x),$$

wo

$$k_n = \frac{\int_{\alpha}^{\beta} x F_n^2(x) \varphi(x) dx}{\int_{\alpha}^{\beta} F_n^2(x) \varphi(x) dx} \quad \text{und} \quad \lambda_n = \frac{\int_{\alpha}^{\beta} F_n^2(x) \varphi(x) dx}{\int_{\alpha}^{\beta} F_{n-1}^2(x) \varphi(x) dx}$$

ist. Mittels dieser Gleichung lassen sich sukzessive die $F_n(x)$ berechnen. Ferner läßt sich mittels derselben zeigen, daß wie bei den Kugelfunktionen, in die, wie wir nachher (35) zeigen werden, die $F_n(x)$ für den Fall $\varphi(x) = 1$ übergehen, die Wurzeln von $F_{n-1}(x)$ die von $F_n(x)$ trennen.

Diese Funktionen sind nach *Christoffel*⁶⁸⁾ bis auf einen konstanten Faktor die Nenner der Näherungsbrüche der Kettenbruchentwicklung⁷¹⁾ von

$$(28) \quad K(z) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\varphi(x) dx}{z - x} = \frac{c_1}{q_1 - \frac{c_2}{q_2 - \frac{c_3}{q_3 \dots}}},$$

wo die q lineare Funktionen von z sind.⁷²⁾ Bezeichnet man den n^{ten} Näherungsbruch mit $\frac{Z_n}{F_n}$, wo F_n eine Funktion n^{ten} Grades von z ist, so ist

$$\begin{aligned} Z_{n+1} &= q_{n+1} Z_n - c_{n+1} Z_{n-1}, \\ F_{n+1} &= q_{n+1} F_n - c_{n+1} F_{n-1}, \end{aligned}$$

68) *Christoffel*, Annali di matematiche (2) 8 (1877), p. 1—10 und 57).

69) *Stieltjes*, Annales de l'école normale (3) 1 (1884), p. 409—426.

70) *Stieltjes*, Paris. C. R. 98 (1883), p. 798—799.

71) Über Kettenbrüche siehe z. B: *Günther*, Darstellung der Näherungswerte von Kettenbrüchen in independenter Form, Erlangen 1873, und die dort angegebene Literatur. Ferner *Perron*, Die Lehre von den Kettenbrüchen, Leipzig 1913, vgl. auch IA 3 Nr. 45—57.

72) *Heine*, Journ. f. Math. 67 (1876), p. 315—326 und Handbuch der Kugelfunktionen 1 (2. Aufl.), Berlin 1878, Kap. V.

woraus sich ableiten läßt

$$(29) \quad K(z) - \frac{Z_n(z)}{F_n(z)} = \frac{c_1 \cdot c_2 \cdots c_{n+1}}{(F_n \psi_n - F_{n-1} c_{n+1}) F_n} = R_n(z),^{73,74)}$$

wo ψ_n den Teil des Kettenbruches von q_{n+1} ab bezeichnet und R_n mit wachsendem n beliebig klein wird. Der erste Term der Entwicklung des Ausdruckes rechts nach fallenden Potenzen von z wird von einem Grade $\leq -(2n+1)$ sein. Läßt sich umgekehrt ein rationaler Bruch $\frac{Z_n}{F_n}$ finden, so daß $K(z) - \frac{Z_n}{F_n}$ nach negativen Potenzen von z entwickelt, mit einer Potenz $\leq -(2n+1)$ beginnt, so muß $\frac{Z_n}{F_n}$ ein Näherungsbruch n^{ter} Ordnung sein.⁷⁵ Aus (28) und (29) folgt unmittelbar

$$(30) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \frac{F_n(z) - F_n(x)}{z-x} \varphi(x) dx + \int_{\alpha}^{\beta} \frac{F_n(x)}{z-x} \varphi(x) dx = Z_n(z) + R_n(z) F_n(z),$$

woraus man durch Gleichsetzung des ganzen und des gebrochenen Teiles erhält:

$$(31) \quad Z_n(z) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{F_n(z) - F_n(x)}{z-x} \varphi(x) dx,$$

$$(32) \quad R_n(z) = \frac{1}{F_n(z)} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{F_n(x)}{z-x} \varphi(x) dx.$$

Die letzte Gleichung gibt die erzeugende Fehlerfunktion⁴⁾¹²⁾; durch Reihenentwicklung derselben nach fallenden Potenzen von z , erhält man aber, da $R_n(z)$ mit der Potenz $\frac{1}{z^{2n+1}}$ anfangen muß, gerade wieder die Gleichungen (24) resp. (27), durch die bis auf einen Faktor $F_n(x)$ bestimmt ist und aus der sich die Sätze über die Wurzeln leicht ergeben, falls man $\varphi(x)$ als positiv im betrachteten Intervall annimmt.

Diese Sätze leitet man meist folgendermaßen ab. Angenommen $F_n(x)$ hätte eine imaginäre Wurzel $x = a + bi$, so müßte auch die konjugierte Wurzel vorkommen, und man könnte setzen

$$F_n(x) = ((x-a)^2 + b^2) M_{n-2}(x),$$

wo M_{n-2} eine Funktion $n-2^{\text{ten}}$ Grades ist; setzt man in (27) nun

73) Stieltjes, Paris. C. R. 108 (1889), p. 1297—1298.

74) Possé, Nouv. Ann. (2) 14 (1875), p. 49—62.

75) Possé, Sur quelques applications des fractions continues algébriques, Petersburg 1886.

$\theta_{n-1}(x) = M_{n-2}(x)$, so müßte sein

$$\int_{\alpha}^{\beta} ((x - a)^2 + b^2) M_{n-2}^2(x) \varphi(x) dx = 0,$$

was unmöglich ist, da alle Elemente des Integranden positiv sind, s. z. B. *Possé*⁷⁵⁾, *Weber*⁷⁶⁾ usw. Also sind alle Wurzeln von $F_n(x)$ reell. Ähnlich weist man nach, daß keine Doppelwurzeln vorhanden sind und daß keine der Wurzeln außerhalb der Grenzen α und β liegen kann.⁷⁵⁾

Die Gleichungen (24) lassen sich direkt folgendermaßen zur Bestimmung von $F_n(x)$ verwenden. Transformiert man sie so, wie *Jacobi*⁷⁾ es für den Fall $\varphi(x) = 1$ tut, so findet man, daß sie gleichbedeutend sind mit den Gleichungen

$$(33) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) F_n(x) dx = 0 \quad \iint_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) F_n(x) dx^2 = 0 \dots$$

$$\iint_{\alpha}^{\beta} \dots \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) F_n(x) dx^n = 0,$$

woraus sich genau so folgern läßt¹³⁾

$$(34) \quad F_n(x) = \frac{k}{\varphi(x)} \frac{d^n}{dx^n} \psi(x) (x - \alpha)^n (x - \beta)^n.$$

$\psi(x)$ ist hier so zu wählen, daß der n^{te} Differentialquotient durch $\varphi(x)$ dividiert, eine ganze Funktion n^{ten} Grades ergibt. In den gewöhnlich betrachteten Fällen

$$\varphi(x) = 1, \quad (x - \alpha)^{\lambda}, \quad (\beta - x)^{\mu}, \quad (x - \alpha)^{\lambda} (\beta - x)^{\mu},$$

wo $\lambda > -1$, $\mu > -1$ ist, sieht man leicht, daß man $\psi(x) = \varphi(x)$ zu setzen hat.

Für $\varphi(x) = 1$ wird also

$$(35) \quad F_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} (x - \alpha)^n (x - \beta)^n,$$

wo die Konstante so bestimmt ist, daß der Koeffizient von x^n gleich 1 ist. Da diese Funktion bis auf einen Faktor mit dem *Legendreschen* Polynom identisch ist, hat man hier sofort den Satz, daß alle Wurzeln von $F_n(x)$ reell sind, zwischen α und β liegen und alle voneinander verschieden sind⁷⁷⁾, eine Tatsache, die sich aus dem *Rolleschen* Theorem leicht folgern läßt⁷⁸⁾ (vgl. II A 10). Für die Grenzen $+1$ und -1

76) *Weber*, Arch. f. Math. u. Phys. (3) 17 (1910/11), p. 113—117.

77) Für gerade n zuerst bewiesen: *Legendre*, Memoire de l'Académie 1784, p. 387, für ungerade n : *Legendre*, Exercices de Calcul intégral 2 (1806), p. 254.

78) *Rolle*, Traité de l'algèbre 1690, p. 125 ff.

wird also

$$(36) \quad F_n(x) = x^n - \frac{n(n-1)}{2(2n-1)}x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{2 \cdot 4(2n-1)(2n-3)}x^{n-4} \dots;$$

werden die Grenzen 0 und 1, so wird

$$(37) \quad F_n(x) = x^n - \frac{n^2}{2n}x^{n-1} + \frac{n^2(n-1)^2}{1 \cdot 2 \cdot 2n(2n-1)}x^{n-2} \\ - \frac{n^2(n-1)^2(n-2)^2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2n(2n-1)(2n-2)}x^{n-3} \dots$$

Für $n = 4, 5$ gibt das eine quadratische, für $n = 6, 7$ eine kubische⁷⁹⁾ für $n = 8, 9$ eine Gleichung vierten Grades⁸⁰⁾ usw. Schellbach⁷⁹⁾ erhält die Gleichung (35) dadurch, daß er für $F_n(x)$ diesen Ansatz macht und ihn unter Benutzung der Gleichungen (5) und (19) verifiziert.

b) *Die Koeffizienten.* Wählt man also jetzt in (9) für die x_i die n Wurzeln des Polynoms $F_n(x)$, so erhält man mit Beachtung von (31) die Gleichung

$$(38) \quad \int_a^{\beta} f(x) \varphi(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + c_{2n} \delta_{2n} \dots,$$

wo die

$$(39) \quad A_k = \int_a^{\beta} \frac{F_n(x) \varphi(x)}{(x-x_k) F_n'(x_k)} dx = \frac{Z_n(x_k)}{F_n'(x_k)}$$

sind. Führt man für $f(x) = F_n(x) \theta_{n-1}(x) + 1$ ein, so sieht man, daß

$$(40) \quad \sum_{k=1}^n A_k = \int_a^{\beta} \varphi(x) dx$$

ist.⁸¹⁾ Die A_k sind sämtlich positiv, und es ist wie z. B. *Stieltjes*⁸¹⁾ zeigt

$$(41) \quad \left\{ \begin{array}{l} A_1 + A_2 + \dots + A_k > \int_a^{x_k} \varphi(x) dx, \\ A_1 + A_2 + \dots + A_k < \int_a^{x_{k+1}} \varphi(x) dx. \end{array} \right.$$

Die *Koeffizientenberechnung* ist an und für sich eine algebraische Aufgabe, worauf besonders *Heun*⁵⁶⁾ hinweist. Er berechnet die Koeffizienten auf rein algebraischem Wege aus den Gleichungen (5) und

79) *Schellbach*, Über mechanische Quadratur, 2. Aufl., Berlin 1884.

80) *Strehlike*, Arch. f. Math. u. Phys. 32 (1859), p. 433—434.

81) *Stieltjes*, Paris. C. R. 99 (1884), p. 850—851.

findet

$$Z_n(x) = l_{n-1}x^{n-1} + l_{n-2}x^{n-2} + \dots + l_1x + l_0,$$

wo

$$l_{n-\nu} = a_1 b_{n-\nu+1} + a_2 b_{n-\nu+2} + \dots + a_\nu b_n$$

ist. Nach *Hurwitz*⁸²⁾ besteht der algebraische Charakter des Problems darin, eine binäre Form $2n - 1^{\text{ter}}$ Ordnung mit den Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_{2n-1}$ als Summe von Quadraten von n linearen Formen darzustellen. Ähnlich verfährt *Bretschneider*⁴⁹⁾, der für die Koeffizienten den durch sukzessive Elimination gefundenen Ausdruck

$$A_k = \frac{\frac{1}{n} - \frac{1}{n-1} C_1^{n-1} + \frac{1}{n-2} C_2^{n-1} \dots + (-1)^{n-1} C_{n-1}^{n-1}}{(x_k - x_1)(x_k - x_2) \dots \dots \dots (x_k - x_n)}$$

angibt, wo C_r^{n-1} die Summe der Kombinationen ohne Wiederholung aus den $n - 1$ Elementen x_1, x_2, \dots, x_n zur r^{ten} Klasse ist. Man kann zur Berechnung der Koeffizienten auch von Gleichungen (8), (9) oder (12) ausgehen. Nach *Tschebyscheff*⁸³⁾ läßt sich die in (9) auftretende Funktion in der Form

$$(42) \quad \frac{F_n(x)}{x - x_i F_n'(x_i)} = g_1 + g_2 F_1(x) F_1(x_i) + \dots + g_n F_{n-1}(x) F_{n-1}(x_i)$$

darstellen, wo die g_i die Faktoren von x in den q_i der (28) gegebenen Kettenbruchentwicklung sind. Daraus leitet er für eine beliebige Funktion n^{ten} Grades $\psi(x)$, die an den Stellen x_1, x_2, \dots, x_n die Werte $\psi(x_1), \psi(x_2), \dots, \psi(x_n)$ hat, die Darstellung

$$(43) \quad \Phi(x) = \sum_1^n \frac{F_n(x)}{(x - x_\nu) F_n'(x_\nu)} \psi(x_\nu) = g_1 \sum_1^n \psi(x_\nu) \\ + g_2 F_1(x) \sum_1^n F_1(x_\nu) \psi(x_\nu) + \dots + g_n F_{n-1}(x) \sum_1^n F_{n-1}(x_\nu) \psi(x_\nu)$$

ab. Die k ersten Glieder dieser Entwicklung erhält man nach *Heine*¹²⁾, wenn man eine Funktion y k^{ten} Grades sucht, die das Integral

$$(44) \quad \int_\alpha^\beta (y - \psi(x))^2 \varphi(x) dx$$

zu einem Minimum macht, ein Satz, der für $\varphi(x) = 1$ und die Grenzen -1 und $+1$ schon von *Plarr*⁸⁴⁾ bewiesen wurde.

Eine ähnliche Entwicklung gibt *Christoffel*⁵⁷⁾ für die in (11) auftretende Funktion $Z_k(x)$ für den Fall $\varphi(x) = 1$. $Z_n(x)$ genügt der

82) *Hurwitz*, Fortschritte der Math. 24 (1892), p. 271—72.

83) *Tschebyscheff*, Journ. f. Math. 53 (1857), p. 286. J. de mathématique (2) 3 (1858), p. 289—323.

84) *Plarr*, Paris. C. R. 44 (1857), p. 835—837, 484—486.

z. B. von *Bauer*⁸⁵⁾ gegebenen Gleichung

$$(45) \quad \frac{d}{dx}(x^2 - 1) \frac{dZ_n(x)}{dx} - n(n+1)Z_n(x) + 4 \frac{dF_n(x)}{dx} = 0,$$

woraus sich unter Beachtung der Gleichung

$$(46) \quad F'_{n+1}(x) - F'_{n-1}(x) = (2n+1)F_n(x)$$

folgern läßt

$$(47) \quad Z_n(x) = 2 \left[\frac{2n-1}{1 \cdot n} F'_{n-1}(x) + \frac{2n-5}{3 \cdot (n-1)} F'_{n-3}(x) + \frac{2n-9}{5 \cdot (n-2)} F'_{n-5}(x) \dots \right].$$

Eine andere Darstellung der Koeffizienten erhält man, wenn man $G(x) = \frac{F_n(x)}{x-x_k}$ setzt; dann ist $F'_n(x_k) = G(x_k)$, $F''_n(x_k) = 2G'(x_k)$; macht man nun in der Gleichung (38) $f(x) = 2G(x)G'(x)$, so erhält man für $\varphi(x) = 1$ und die Grenzen -1 und $+1$, falls $F_n(+1) = F_n(-1)$ ist, was für symmetrische x -Werte immer der Fall ist,

$$(48) \quad A_k = \frac{4x_k}{(1-x_k^2)^2} \frac{F_n^2(1)}{F'_n(x_k) F''_n(x_k)},$$

wo $F_n(x)$ der Gleichung für die Kugelfunktionen

$$(49) \quad (x^2 - 1) F''_n(x) + 2x F'_n(x) = n(n+1) F_n(x)$$

genügen muß. Wenn die Konstante so bestimmt ist, daß $F_n(+1) = 1$ ist, wird

$$(50) \quad A_k = \frac{2}{(1-x_k^2)(F'_n(x_k))^2},$$

ein Ausdruck, der sich bei *Gauß*⁴⁸⁾, *Christoffel*⁵⁷⁾, *Hermite*¹⁰⁾, *Todhunter*⁴⁾, *Radau*¹⁾, *Weber*⁷⁶⁾ und anderen findet. Ist n ungerade, findet man daraus für $k = 0$

$$(51) \quad A_0 = 2 \left(\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots n - 1}{3 \cdot 5 \dots n} \right)^2.$$

*Scheibner*⁵⁸⁾ schreibt (50) unter Benutzung der Formel für die hypergeometrische Reihe. Aus (11) und (50) folgt $(1-x_k^2)Z_n(x_k)F'(x_k) = 2$, also

$$(52) \quad A_k = \frac{(1-x_k^2)}{2} Z_n^2(x),$$

eine Formel, die sich z. B. bei *Christoffel*⁵⁷⁾, *Radau*¹⁾ u. a. findet.

c) *Fehlerabschätzung*. Was die Genauigkeit betrifft, so gibt die Formel (38) nach *Stieltjes*⁸⁶⁾ mit wachsendem n unbegrenzte Annäherung. Setzt man nämlich

$$(53) \quad V(x) = c_{2n} x^{2n} + c_{2n+1} x^{2n+1} + \dots,$$

85) *Bauer*, Habilitationsschrift München 1858.

86) *Stieltjes*, Paris. C. R. 97 (1883), p. 740—742.

so wird das Korrektionsglied

$$(54) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) V(x) dx - \sum_1^n A_k V(x_k).$$

Ist $V(x)$ für jeden Wert des betrachteten Intervalles kleiner als ε , so ist bei Beachtung von (40)

$$(55) \quad \sum_1^n A_k V(x_k) < \varepsilon \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) dx$$

und auch

$$(56) \quad \int_{\alpha}^{\beta} V(x) \varphi(x) dx < \varepsilon \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) dx,$$

d. h. also

$$(57) \quad \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \varphi(x) dx - \sum_1^n A_k f(x_k) < 2\varepsilon \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) dx,$$

da $\varphi(x)$ integrierbar und die Reihe für $f(x)$ konvergent ist, kann man mit wachsendem n den Fehler beliebig klein machen. Um die Größe des Fehlers abzuschätzen, geht man nach *Markoff*⁸⁶⁾, *Possé*⁷⁵⁾ u. a. praktisch von dem Fehlerglied der *Hermite'schen*⁶⁷⁾ Interpolationsformel aus. Ist $\Phi(x)$ eine ganze Funktion vom Grade σ , die für z_1 mit $f(z_1)$ nebst den $\alpha - 1$ ersten Ableitungen, für z_2 mit $f(z_2)$ nebst den $\beta - 1$ ersten Ableitungen usw. übereinstimmt, so ist

$$(58) \quad f(x) - \Phi(x) = \frac{\psi(x)}{\alpha! \beta! \dots \lambda!} \int_0^1 dt_n \int_0^{t_n} dt_{n-1} \dots \int_0^{t_2} f^{(\sigma)}(u) \theta dt_1,$$

wo

$$\begin{aligned} \psi(x) &= (x - z_1)^\alpha (x - z_2)^\beta \dots (x - z_n)^\lambda, \\ u &= (x - z_1)t_1 + (z_1 - z_2)t_2 \dots (z_{n-1} - z_n)t_n + z_n, \\ \theta &= (t_2 - t_1)^{\alpha-1} (t_3 - t_2)^{\beta-1} \dots (1 - t_n)^{\lambda-1}, \\ \sigma &= \alpha + \beta + \gamma \dots \lambda \end{aligned}$$

ist. Ableitungen dieser Formel aus der *Newtonschen* Interpolationsformel finden sich z. B. bei *Mansion*⁸⁷⁾, *Lipschitz*⁸⁸⁾ usw. Für unsern Fall, wo $\Phi(x)$ und $f(x)$ in den $2n$ Werten $f(x_k) = \Phi(x_k)$ und $f'(x_k) = \Phi'(x_k)$ übereinstimmen, wird, wenn ξ ein bestimmter Mittelwert zwischen α und β ist, das Integral (58)

$$(59) \quad \frac{F_n^2(x)}{(2n)!} f^{(2n)}(\xi),$$

87) *Mansion*, Paris. C. R. 104 (1887), p. 488—490.

88) *Lipschitz*, Paris. C. R. 86 (1878), p. 119—121.

also wird

$$(60) \quad \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \varphi(x) dx = \sum_1^n A_k f(x_k) + \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \int_{\alpha}^{\beta} F_n^2(x) \varphi(x) dx;$$

ist im Intervall α bis β $m < f^{(2n)}(\xi) < M$, so liegt die Korrektion zwischen

$$(61) \quad \frac{M}{2n!} \int_{\alpha}^{\beta} F_n^2(x) \varphi(x) dx \quad \text{und} \quad \frac{m}{(2n)!} \int_{\alpha}^{\beta} F_n^2(x) \varphi(x) dx,$$

eine Formel, die z. B. *Markoff*^{66, 89}), *Possé*⁷⁵), *Deruyts*⁹⁰), der sie durch Verallgemeinerung der Betrachtungen von *Mansion*⁹²) ableitet, *Teixeira*⁹¹) geben.

Ändert $f(x)$ in dem Intervall das Vorzeichen nicht, so hat man damit das Vorzeichen der Korrektion gefunden. Für $\varphi(x) = 1$ folgt aus obiger Gleichung

$$(62) \quad \frac{(\beta - \alpha)^{2n+1}}{2n+1} \left[\frac{n!}{(n+1)(n+2) \cdots 2n} \right]^2 \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!},$$

ein Ausdruck, den man bei *Scheibner*⁵⁸), *Markoff*⁶⁶), *Mansion*⁹²), der ihn mittels der *Ampèreschen* Interpolationsfunktion ableitet, *Raffy*⁹³) u. a. findet.

Von der (15) gegebenen Form des Fehlergliedes geht *Jacobi*⁷) aus und findet für $\varphi(x) = 1$

$$(63) \quad \int_0^1 F_n(x) Q(x) dx = \frac{(-1)^n n!}{(2n)!} \int_0^1 (1-x)^n x^n \frac{d^n Q(x)}{dx^n} dx$$

$$= \frac{(n!)^2}{(2n)!} \int_0^1 \int_0^x \cdot \int_0^x \frac{d^n Q}{dx^n} dx^{n+1}$$

$$= \frac{(n!)^4}{(2n!)^2} \left\{ A' c_{2n} + \left(\frac{(n+1)^2}{1 \cdot (2n+2)} A' + A'' \right) c_{2n+1} \right.$$

$$\left. + \left(\frac{(n+1)^2 (n+2)^2}{1 \cdot 2(2n+2)(2n+3)} A' + \frac{(n+1)^2}{1 \cdot (2n+2)} A'' + A''' \right) c_{2n+1} \cdots \right\},$$

89) *Markoff*, Sur quelques applications des fractions continues algébriques, St. Pétersbourg 1884.

90) *Deruyts*, Bull. de la société mathématique de France 14 (1885—86), p. 151—56.

91) *Teixeira*, Annaes scientificos da Academia Polytechnica do Porto 5 (1910), p. 220—223.

92) *Mansion*, Société des sciences de Bruxelles 15 A (1891), p. 57—59. Paris. C. R. 102 (1886), p. 412—415. Bull. de l'Acad. royale de Belgique (3) 11 (1886), p. 293—307. Bericht darüber von *Catalan* ebendort p. 270—73.

93) *Raffy*, Nouv. ann. (3) 15 (1896), p. 249—262.

wo die $A', A'' \dots$ die Zähler von x^{-n}, x^{-n-1} usw. in der Entwicklung von $\frac{1}{F_n(x)}$ sind, sich also aus den Gleichungen

$$1 = A', \quad 0 = A' \frac{n^2}{1 \cdot 2 \cdot n} + A'', \quad 0 = A' \frac{n^2(n-1)^2}{1 \cdot 2 \cdot 2n(2n-1)} - A'' \frac{n^2}{2n} + A''',$$

usw. bestimmen. Zu einem ganz ähnlichen Resultat kommen *Heine*⁹³⁾ und *Todhunter*⁴⁾ für die Grenzen -1 und $+1$, wobei ersterer von der erzeugenden Fehlerfunktion (17) bzw. (32) ausgeht. Sie finden für $\varphi(x) = 1$

$$(64) \quad R_n(z) = \frac{2}{2n+1} \left[\frac{n!}{1 \cdot 3 \dots (2n-1)} \right]^2 z^{-2n-1} \frac{F\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}n, 1 + \frac{1}{2}n, \frac{3}{2} + n, \frac{1}{z^2}\right)}{F\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}n, -\frac{1}{2}n, \frac{1}{2} - n, \frac{1}{z^2}\right)},$$

die Fehlerglieder werden also

$$c_{2n} \delta_{2n} + c_{2n+2} \delta_{2n+2} \dots = \frac{2}{2n+1} \left[\frac{n!}{3 \cdot 5 \dots (2n-1)} \right]^2 \cdot \left[c_{2n} + \frac{1}{2} \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2n+3} + \frac{n(n-1)}{2n-1} \right) c_{2n+2} \dots \right].$$

*Callendreau*⁹⁴⁾ gibt einen Ausdruck für das Fehlerglied für den Fall, daß $\omega = \frac{c_{2m+1}}{c_{2m}}$ mit wachsendem m bei gleichbleibendem Zeichen abnimmt. In diesem Falle ist der Ergänzungsterm

$$(65) \quad < c_{2n} x^{2n} (\varepsilon + \varepsilon' \omega x + \varepsilon'' \omega^2 x^2 \dots).$$

Unter Benutzung einer zu (64) analogen und einer anderen von *Gauß*⁹⁵⁾ gegebenen Formel findet er, wenn er $\omega x = \frac{4y}{1+y^2}$ setzt, für den Rest

$$(66) \quad 2\pi c_{2n} \left(\frac{y}{\omega} \right)^{2n+1}.$$

*Liwenzoff*⁹⁶⁾ geht von der Formel (26)

$$\int_{\alpha}^{\beta} \frac{\varphi(x)}{z-x} dx = \frac{Z_n(z)}{F_n(z)} + R_n(z)$$

aus, multipliziert dieselbe mit $f(z)$ und integriert über einen Kreis, dessen Radius ρ größer ist als der Modul der größten Wurzel von $F_n(z)$. Unter Anwendung des Satzes von den Residuen und Beach-

94) *Callendreau*, Paris. C. R. 90 (1880), p. 1067—1069.

95) *Gauß*, Disquisitiones generales circa seriem infinitam etc. Commentationes regiae societatis scientiarum Gottingensis recentiores 2 (1813). Abgedruckt: Gesammelte Werke 3, p. 123—166.

96) *Liwenzoff*, Math. Sammlung, herausgegeben von der Moskauer math. Gesellschaft 9 (1878), p. 569—573.

tung von (32) erhält er

$$(67) \quad 2i\pi \int_0^{\beta} \varphi(x) f(x) dx = 2i\pi \sum_1^n \frac{Z_n(x_i)}{F_n'(x_i)} f(x_i) + \int_{\zeta} \frac{f(z)}{F_n(z)} dz \int_0^{\beta} \frac{F_n(x) \varphi(x) dx}{z-x}.$$

Da $\text{mod} \frac{1}{z-x} < \frac{1}{\varrho-x}$, so wird im Rest $2i\pi \Delta$, wenn man

$$(68) \quad \int_0^{\beta} \frac{F_n(x) \varphi(x)}{z-x} dx = m \int_0^{\beta} \frac{\varphi(x)}{\varrho-x} dx$$

setzt und mit M den Maximalwert von $f(z)$ und mit μ einen Mittelwert von $F_n(z)$ bezeichnet,

$$(69) \quad \text{mod} \Delta < \frac{\varrho M m}{\mu} \int_0^{\beta} \frac{\varphi(x)}{\varrho-x} dx.$$

Callendreau⁹⁷⁾ formt das Restglied in (67) durch n -malige partielle Integration für den Fall $\varphi(x) = 1$ und die Grenzen 0 und 1 um in

$$(70) \quad \Delta = (-1)^n \int_{\zeta} \frac{n!}{F_n(z)} f(z) dz \int_0^1 \frac{[x(x-1)]^n}{(z-x)^{n+1}} dx,$$

woraus sich ergibt

$$(71) \quad 2\pi \varrho M \int_0^1 \frac{(x(x-1))^n}{(\varrho-x)^{n+1}} dx,$$

wo M das Maximum des Moduls von $f(z)$ auf dem Kreise mit dem Radius ϱ ist.

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß man die *Gaußsche* Quadraturformel nach Heun⁵⁶⁾ u. ⁹⁸⁾ nicht nur zur numerischen Berechnung eines bestimmten Integrales, sondern auch zur angenäherten Darstellung physikalischer Gesetze verwenden kann. Auch zeigt Heun⁵⁶⁾, wie man die *Gaußschen* Formeln anwenden kann zur Berechnung der Integrale, die auftreten, wenn man nach der Methode der Variation der Konstanten von dem Integral der homogenen linearen Differentialgleichung zu dem der nicht homogenen übergehen will.

Von weiteren Arbeiten über die *Gaußsche* Formel seien noch die von Hall⁹⁹⁾, Kubicek¹⁰⁰⁾, Maurer¹⁴¹⁾ und besonders die von Biermann erwähnt, der die verschiedenen Quadraturmethoden vom Stand-

97) Callendreau, Comptes rendues 84 (1877), p. 1225—1227.

98) Heun, Nachrichten der kgl. Wissenschaften zu Göttingen 1891, p. 154—58.

99) Hall, The Analyst 3 (1876), p. 1—10.

100) Kubicek, Programm Neuhaus 1910, p. 3—19.

punkt der Theorie der kleinsten Quadraté aus betrachtet. Er findet, daß der Fehler für die *Gauß*schen Abszissenwerte einen Extremwert, der jedenfalls kein Maximum ist, annimmt.³⁸⁰⁾

4. Spezielle Fälle der Gaußschen Formel. Dem $\varphi(x)$ hat man mannigfache Werte gegeben, von denen die wichtigsten hier besprochen werden sollen.

a) Der ursprünglich von *Gauß* behandelte wichtigste Fall ist $\varphi(x) = 1$, der in der vorhergehenden Nummer schon erörtert ist. Abszissen, Koeffizienten und Korrektionsglieder für diesen Fall finden sich unter andern bei *Gauß*⁴⁸⁾ selbst für die Grenzen 0 und 1 bis zu 7 Termen auf 16 Dezimalen, bei *Heine*¹²⁾ für die Grenzen -1 und $+1$ ebenfalls bis zu 7 Termen auf 16 Dezimalstellen, bei *Radau*¹⁾ u.¹⁰¹⁾ für die Grenzen 0 und 1 wie für -1 und $+1$ bis zu 10 Termen auf 8 bzw. 10 Dezimalstellen. Bei *Perrot*¹⁰²⁾ für die Grenzen 0 und 1 für 8, 9 und 10 Terme auf 16 Dezimalstellen, bei *Moors*³⁸⁾ für die Grenzen -1 und $+1$ bis zu 10 Termen auf 16 Dezimalstellen. *Bertrand*¹⁰³⁾ gibt bis zu 6 Termen Abszissen und Koeffizienten für die Grenzen 0 und $+1$. Für dieselben Grenzen finden diese Größen sich auf 16 Dezimalen bei *Todhunter*⁴⁾.

Die Fehlerbetrachtungen der vorhergehenden Nummer nehmen an, daß die Wurzeln mit beliebiger Genauigkeit bei der Berechnung der Funktionswerte benutzt werden können. Oft ist das nicht der Fall, sondern man kann aus praktischen Gründen die Wurzeln nur bis zu einer beschränkten Anzahl Dezimalstellen benutzen. Dann sind natürlich im allgemeinen die Formeln von Nr. 3 nicht genauer als die von Nr. 2. *Moors*³⁸⁾ hat nun Formeln so bestimmt, daß er $n - 2$ Werte x aus den *Gauß*schen Tafeln bis auf 8 Dezimalen entnimmt, die übrigen 2 auch bis auf 8 Dezimalen nach den in nächster Nummer angegebenen Methoden so bestimmt, daß der Fehler möglichst klein wird. Von den möglichen Fällen gibt er bis zu 8 Termen in den günstigsten die Abszissen, Koeffizienten und Korrektionsglieder an. In letztere gehen zwar dieselben Glieder der Entwicklung von $f(x)$ ein, wie bei *Newton* und *MacLaurin*, aber die Faktoren dieser Glieder sind hier wesentlich kleiner. Neuerdings¹⁰⁴⁾ geht *Moors* sogar noch

101) *Radau*, Paris C. R. 90 (1880), p. 913—915.

102) *Perrot*, Quarterly Journ. 25 (1891), p. 200—202.

103) *Bertrand*, Calcul intégral, Paris 1870, p. 331—352.

104) *Moors*, Verhandlungen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (I Sectie) Deel XI, Nr. 6 (43 p.) 1913. Bericht darüber von *Kapteijn* und *Kluyver*: Verslag van de Gewone Vergaderingen van de wis-en natuurkundige

weiter, rundet auf 2 Dezimalen ab und sucht durch die Anzahl der benutzten Ordinaten die Genauigkeit zu erhöhen. Insbesondere wenn die ersten Glieder der Entwicklung von $f(x)$ verschwinden, sind die letzten Dezimalen der Abszissenwerte ohne Wert.

b) Ein anderer Fall wird von *Mehler*¹⁰⁵⁾ behandelt. Er setzt $\alpha = -1$, $\beta = +1$ und $\varphi(x) = (1-x)^\lambda(1+x)^\mu$, wo $\lambda > -1$, $\mu > -1$ sein muß. Dann sind die x_k nach (34) Wurzeln der Gleichung

$$(72) F_n(x) = \frac{\Gamma(n+\lambda+\mu)}{\Gamma(2n+\lambda+\mu)} (1-x)^{-\lambda} (1+x)^{-\mu} \frac{d^n(1-x)^{n+\lambda}(1+x)^{n+\mu}}{dx^n} = 0,$$

und der allgemeine Ausdruck (9) für A_k läßt sich umformen in

$$(73) A_k = \frac{2^{2n+\lambda+\mu+1}}{(1-x_k^2)(F'(x_k))^2} \frac{\Gamma(n+\lambda)\Gamma(n+\mu)\Gamma(n)\cdot\Gamma(n+\lambda+\mu)}{[\Gamma(2n+\lambda+\mu)]^2}.$$

*Heine*¹²³⁾ betrachtet denselben Fall für die Grenzen 0 und 1 und findet $F_n(x)$ aus der Kettenbruchentwicklung

$$(74) \sigma = \int_0^1 \frac{x^\mu(1-x)^\lambda}{x-z} dz = \frac{1}{x} \frac{\Gamma(\lambda+1)\Gamma(\mu+1)}{\Gamma(\mu+\lambda+2)} F\left(1, \mu+1, \mu+\lambda+2, \frac{1}{x}\right),$$

deren Näherungsnenner

$$(75) F_n(x) = x^n F\left(-n, -n-\mu, -2n-\lambda-\mu, \frac{1}{x}\right)$$

sind, während das Restglied sich bestimmen läßt aus

$$(76) R_n(x) = \frac{\Gamma(n+\lambda+1)\Gamma(n+\mu+1)\Gamma(n+\mu+\lambda+1)\Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+\mu+\lambda+2)\Gamma(2n+\mu+\lambda+1)} \frac{1}{x^{n+1} F_n(x)} \cdot F\left(n+1, n+\lambda+1, 2n+\mu-\lambda+2, \frac{1}{x}\right).$$

c) Der wichtigste Spezialfall obiger Formel, den *Mehler* schon betrachtet, und der eingehend von *Tschebyscheff*¹⁰⁶⁾ und *Hermite*¹⁰⁷⁾ u. ¹⁰⁾ behandelt ist, ist $\lambda = \mu = -\frac{1}{2}$, also $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Die Gleichung (72) kann man nach *Hermite* in diesem Falle ersetzen durch

$$(77) F_n(x) = 2^{1-n} \cos(n \arccos x) = 0,$$

während *Tschebyscheff*¹⁰⁶⁾ den Ausdruck in der Form gibt

$$(78) F_n(x) = E e^{n \lg \frac{x-\sqrt{x^2-1}}{2}}.$$

Afdeeling: Koninklijke Akademie van Weetenschappen te Amsterdam 21 (1912), p. 527—29.

105) *Mehler*, Journ. f. Math. 63 (1868), p. 152—157.

106) *Tschebyscheff*, Journ. de math. (2) 19 (1874), p. 19—34.

107) *Hermite*, Math. Ann. 10 (1876), p. 287—288.

Berger¹⁵⁾ zeigt, daß die sukzessiven F_n sich aus der Gleichung

$$(79) \quad F_{n+1}(x) = 2xF_n(x) - F_{n-1}(x)$$

berechnen lassen. Er gibt für diesen Fall die Formeln bis $n = 4$. Die Koeffizienten werden alle untereinander gleich

$$(80) \quad A_k = \frac{\pi}{n}.$$

Possé⁷⁵⁾, der das F_n mit Hilfe der Kettenbruchentwicklung

$$(81) \quad \int_{-1}^{+1} \frac{dy}{\sqrt{1-y^2(z-y)}} = \frac{\pi}{z - \frac{1}{2z - \frac{1}{2z - \dots}}}$$

findet, zeigt, daß man bei gleichen Koeffizienten nur in diesem Falle den Genauigkeitsgrad $2n - 1$ erreichen kann.

Des öfteren kommt man zu diesen Formeln dadurch, daß man von einer Entwicklung von $f(x)$ in eine Fourierreihe ausgeht. Ist

$$(82) \quad y = a_0 + a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \dots + a_m \cos mx + \dots, \\ + b_1 \sin x + b_2 \sin 2x + \dots + b_m \sin mx + \dots,$$

so kann man z. B. wie Baillaud, der sowohl den Fall gerader⁵⁹⁾ wie ungerader¹⁰⁸⁾ n behandelt, von einer von Gauß¹⁰⁹⁾ aufgestellten Interpolationsformel

$$(83) \quad y = \sum_1^n \frac{\sin \frac{x-x_1}{2} \sin \frac{x-x_2}{2} \dots / \dots \sin \frac{x-x_n}{2}}{\sin \frac{x_k-x_1}{2} \sin \frac{x_k-x_2}{2} \dots / \dots \sin \frac{x_k-x_n}{2}} y_k$$

ausgehen, wo der Rest den Faktor

$$(84) \quad \sin \frac{x-x_1}{2} \sin \frac{x-x_2}{2} \dots \dots \sin \frac{x-x_n}{2}$$

hat. Will man nun die Genauigkeit steigern, so kann man, da

$$\int_0^{2\pi} y dx = \int_0^{2\pi} a_0 dx$$

ist, noch weiter die Glieder mit den Koeffizienten von a_m bis a_{2m-1} und b_m bis b_{2m-1} zum Verschwinden bringen. Für die Abszissenwerte x_r erhält man daraus die Gleichung

$$(85) \quad z^n - a = 0,$$

wo $z = e^{ix}$ ist. Setzt man a gleich einer Größe mit dem Modul 1,

108) Baillaud, Annales de l'Observatoire de Toulouse 2 (1887), p. 1—36.

109) Gauß, Theoria Interpolationis Methodo nova tractata; Gesammelte Werke, Bd. 3, p. 265—330.

so sind also

$$(86) \quad x_1 = \frac{\theta}{n}, \quad x_2 = \frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n}, \quad x_3 = \frac{\theta}{n} + 2\frac{2\pi}{n}, \dots, \quad x_n = \frac{\theta}{n} + (n-1)\frac{2\pi}{n}.$$

θ kann man noch so bestimmen, daß irgend eine Bedingung erfüllt wird. Andere Ableitungen finden sich in einer andern Arbeit von *Baillaud*¹¹⁰⁾ sowie bei *Dawidoff*¹¹¹⁾. Ist y eine gerade Funktion, so hat man in der Entwicklung nur die Glieder mit a_i . Dann ist also

$$(87) \quad \int_0^{2\pi} f(\cos z) dz = \frac{\pi}{m} \sum_1^m f\left[\cos\left(\frac{\theta}{2m} + k\frac{\pi}{m}\right)\right].$$

Führt man hierin $\theta = 0$ und $z = \arccos x$ ein, so wird, da

$$\int_0^{\pi} = \int_{\pi}^{2\pi}$$

ist, das Integral

$$\int_{-1}^{+1} \frac{f(x) dx}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Das ist aber gerade die oben betrachtete Form. *Mehler*¹⁰⁵⁾ gibt dem θ den Wert π , die Astronomen wählen gewöhnlich $\theta = 0$ ¹¹²⁾. Der Fehler hat allgemein die Form

$$(88) \quad \Delta = - \sum_1^{\infty} m (2\pi a_{m \cdot 2n} \cos m\theta + 2\pi b_{m \cdot 2n} \sin m\theta).$$

*Deruyts*⁹⁰⁾ und *Markoff*¹⁷⁸⁾ geben nach (61) als Restglied

$$(89) \quad \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \frac{\pi}{2^{2n-1}},$$

während *Liwenzoff*⁹⁶⁾ nach (69) gibt

$$(90) \quad \text{mod } \Delta < \frac{\pi M \varrho}{\mu \sqrt{\varrho^2 - 1}}.$$

*Tisserand*¹¹³⁾ verallgemeinert diese Betrachtungen auf den Fall einer geraden periodischen Funktion von zwei Variablen.

d) Ein anderer in der *Mehlerschen* Formel enthaltener Spezialfall ist $\alpha = -1$, $\beta = +1$ und $\varphi(x) = \sqrt{1-x^2}$, d. h. $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$.

110) *Baillaud*, Paris C. R. 90 (1880), p. 974—976.

111) *Dawidoff*, Journ. de math. (3) 8 (1881), p. 389—412.

112) *Bruns*, Grundlinien des wissenschaftlichen Rechnens, Leipzig 1903, § 81.

113) *Tisserand*, Paris C. R. 68 (1869), p. 1101—1104.

Nach *Hermite*¹⁰⁾ ist in diesem Falle (vgl. (34))

$$(91) \quad F_n(x) = \frac{(-2)^{-n}(n+1)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n+1)\sqrt{1-x^2}} \frac{d^n}{dx^n} (1-x^2)^{n+\frac{1}{2}},$$

was bis auf einen Faktor übereinstimmt mit

$$(92) \quad F_n(x) = 2^{-n} \frac{\sin((n+1) \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Diesen Ausdruck kann man nach *Possé*⁷⁴⁾ u. ⁷⁵⁾ auch als Näherungsnenner des Kettenbruchs

$$(93) \quad \int_{-1}^{+1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{z-x} dx = \frac{\pi}{z + \sqrt{z^2-1}} = \frac{\pi}{2z - \frac{1}{2z - \frac{1}{2z - \dots}}}$$

erhalten. Nach *Berger*¹⁵⁾ genügt dieses $F_n(x)$ auch der Gleichung (79). *Moors*⁸⁸⁾ behandelt diesen Fall elementar unter Benutzung der Gleichungen (7). Man erhält hier die Formel

$$(94) \quad \int_{-1}^{+1} f(x) \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{n+1} \sum_1^n \sin^2 \frac{k\pi}{n+1} f\left(\cos \frac{k\pi}{n+1}\right) \\ = \frac{\pi}{n+1} \sum_1^n (1-x_k^2) f(x_k),$$

bis zum Werte $n=4$ finden sich die Zahlenwerte bei *Berger*¹⁵⁾.

e) *Possé*⁷⁵⁾ behandelt noch einen andern Spezialfall der *Mehler*-schen Formeln. Er setzt $\lambda = \frac{1}{2}$, $\mu = -\frac{1}{2}$, also wird $F_n(x)$ hier Näherungsnenner des Kettenbruchs

$$(95) \quad \int_{-1}^{+1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \frac{dx}{z-x} = \pi \left(1 - \sqrt{\frac{z-1}{z+1}}\right) = \frac{2\pi}{2z+1 - \frac{1}{2z - \frac{1}{2z - \dots}}}$$

und zwar wird, wenn man $z = \cos \omega$ setzt,

$$(96) \quad F_n(z) = \frac{\sin \frac{2n+1}{2} \omega}{\sin \frac{\omega}{2}}, \quad z_k = \cos \frac{2k\pi}{2n+1};$$

man erhält so die Formeln

$$(97) \quad \int_{-1}^{+1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} f(x) dx = \frac{2\pi}{2n+1} \sum_1^n \left(1 - \cos \frac{2k\pi}{2n+1}\right) f\left(\cos \frac{2k\pi}{2n+1}\right) \\ = \frac{2\pi}{2n+1} \sum_1^n (1-x_k) f(x_k).$$

f) *Heine*¹²⁾ betrachtet weiter noch den Fall

$$\varphi(x) = \sqrt{x(x-\alpha)(x-\beta)},$$

wo die Koeffizienten von $F_n(x)$ ganze Funktionen eines Quotienten aus einem ganzen elliptischen Integral erster und einem zweiter Gattung werden. Die $F_n(x)$ genügen einer linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung. Auch *Christoffel*⁶⁸⁾ erwähnt diesen Fall. Weiter weist letzterer noch auf $\varphi(x) = x$ hin, wo nur gerade n in Betracht kommen, da

$$F_{2n}(x) = F_{2n+1}(x) = \frac{1}{x} P_{2n+1}(x)$$

wird, ferner auf $\varphi(x) = |x|$ und $\varphi(x) = \frac{1}{x^2 + a^2}$. Den Fall $\varphi(x) = x^2$ behandelt *Moors*⁸⁸⁾ elementar auf Grund der Gleichung (7).

g) *Gourier*¹¹⁴⁾, *Gram*^{114a)} und *Deruyts*¹¹⁵⁾ betrachten den Fall

$$\alpha = -\infty, \quad \beta = +\infty, \quad \varphi(x) = e^{-x^2}.$$

Hier ist

$$(98) \quad F_n(x) = U_n(x) = e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2},$$

also bis auf einen konstanten Faktor das sogenannte Polynom von *Hermite*¹¹⁶⁾. Nach *Deruyts*¹¹⁵⁾ erhält man hier

$$(99) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} f(x) dx = 2^{n+1} n! \sqrt{\pi} \sum_1^n \frac{f(x_k)}{(F'_n(x_k))^2}.$$

Bis zu $n = 4$ gibt *Berger*¹⁵⁾ die Zahlwerte.

h) Anknüpfend an *Gourier* behandelt *Radau*¹¹⁷⁾ den Fall

$$\alpha = 0, \quad \beta = \infty, \quad \varphi(x) = e^{-x}.$$

Hier ist

$$F_n(x) = (-1)^n e^x \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^n) = 1 - nx \\ + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 4} x^2 - \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 4 \cdot 9} x^3 \dots$$

Radau gibt die Koeffizienten in der Form

$$A_k = \frac{1}{F'_n(x_k)} E(F_n(x_k) e^{-x_k}).$$

Für den allgemeineren Fall

$$\varphi(x) = e^{-x} x^{p-1}$$

114) *Gourier*, Paris C. R. 97 (1883), p. 79—82.

114a) *Gram*, Tidsskrift for Mathematik (5) 1 (1884), p. 65—72.

115) *Deruyts*, Bull. de l'Acad. royale de Belgique (3) 11 (1886), p. 307—311.

Bericht darüber von *Le Paige*, ebendort p. 279—80.

116) *Hermite*, Paris C. R. 58 (1864), p. 93—100; 266—273.

117) *Radau*, Paris C. R. 97 (1883), p. 157—158.

findet *Deruyts*¹¹⁵⁾

$$F'_n(x) = e^x x^{1-p} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^{n+p-1}).$$

Hier findet man

$$(100) \quad \int_0^\infty e^{-x} x^{p-1} f(x) dx = n!(n+p-1)! \sum_1^n \frac{f(x_k)}{x_k [F'_n(x_k)]^2}.$$

Ähnliche Formeln finden sich bei *Sonine*¹¹⁸⁾.

5. Verallgemeinerungen der Methode von Gauß. a) *Formeln von August.* Die Ansätze von *Gauß* erweitert *August*⁶⁰⁾ auf den Fall, wo

$$(101) \quad \varphi(x) = 1, \quad f(x) = c_1 x^{\mu-1} + c_2 x^{\mu-1+\delta} + c_3 x^{\mu-1+2\delta}$$

ist (μ und δ positive sonst beliebige Zahlen). Setzt man

$$x = h \sqrt[\delta]{\xi}, \quad \frac{\mu}{\delta} = \varepsilon, \quad c_i h_i^{(\mu-1)\delta} = \gamma_i,$$

so wird

$$\bar{f}(\xi) = h^{\mu-1} \xi^{\varepsilon - \frac{1}{\delta}} (\gamma_1 + \gamma_2 \xi + \gamma_3 \xi^2 + \dots) = h^{\mu-1} \xi^{\varepsilon - \frac{1}{\delta}} \bar{f}'(\xi).$$

Durch Übertragung der Entwicklung von *Jacobi*⁷⁾ findet er für die Grenzen 0 und 1

$$(102) \quad F'_n(\xi) = \frac{\xi^{1-\varepsilon}}{(\varepsilon-1+2n)(\varepsilon-2+2n)\dots(\varepsilon-n)} \frac{d^n [\xi^{\varepsilon-1+n} (\xi-1)^n]}{d\xi^n}.$$

Noch auf zwei andern Wegen leitet *August* die Gleichung für $F'_n(\xi)$ ab; der eine entspricht dem von *Scheibner*⁵⁸⁾ gegebenen, beim andern folgert er aus

$$\sum_1^n \gamma_i = \frac{1}{\varepsilon}, \quad \sum_1^n \gamma_i \xi_i = \frac{1}{\varepsilon+1}, \quad \sum_1^n \gamma_i \xi_i^2 = \frac{1}{\varepsilon+2}, \dots, \quad \sum_1^n \gamma_i \xi_i^{2n-1} = \frac{1}{\varepsilon+2n-1}$$

die n Gleichungen

$$(103) \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & \frac{1}{\varepsilon + \alpha} \\ \xi_1 & \xi_2 & \dots & \xi_n & \frac{1}{\varepsilon + \alpha + 1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \xi_1^n & \xi_2^n & \dots & \xi_n^n & \frac{1}{\varepsilon + \alpha + n} \end{vmatrix} = 0 \quad \alpha = (0, 1, 2, \dots, n-1).$$

Nun sind die ξ Wurzeln der Gleichung

$$(104) \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ \xi_1 & \xi_2 & \dots & \xi_n & \xi \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \xi_1^n & \xi_2^n & \dots & \xi_n^n & \xi^n \end{vmatrix} = 0.$$

118) *Sonine*, Warschauer Nachrichten 1887, p. 1—76.

Entwickelt er diese n Gleichungen (103) und (104) nach Elementen der letzten Spalte, so erhält man als Lösung der entstehenden n Gleichungen

$$(105) \quad F_n(\xi) = \begin{vmatrix} 1 & \xi & \dots & \xi^n \\ \frac{1}{\varepsilon} & \frac{1}{\varepsilon+1} & \dots & \frac{1}{\varepsilon+n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{\varepsilon+n-1} & \frac{1}{\varepsilon+n} & \dots & \frac{1}{\varepsilon+2n-1} \end{vmatrix} = 0.$$

Die Wurzeln dieser Gleichung sind alle reell, voneinander verschieden und liegen zwischen 0 und 1. Der Rest hat nach *August*⁶⁰⁾ die Form

$$(106) \quad \Delta = \frac{h^{\mu+2n\delta}}{\delta} \left[\gamma_{2n+1} \left(\frac{1}{\varepsilon+2n} - B_{2n} \right) + \gamma_{2n+2} \left(\frac{1}{\varepsilon+2n+1} - B_{2n+1} \right) \dots \right],$$

wo

$$B_{2n} = \frac{\varepsilon+n-1}{\varepsilon+2n-1} \binom{n}{1} \frac{1}{\varepsilon+2n-1} \dots \dots (-1)^n \frac{(\varepsilon+n-1)(\varepsilon+n-2)\dots\varepsilon}{(\varepsilon+2n-1)(\varepsilon+2n-2)\dots(\varepsilon+n)} \binom{n}{n} \frac{1}{\varepsilon+n} = 0,$$

$$B_{2n+1} = \frac{\varepsilon+n-1}{\varepsilon+2n-1} \binom{n}{1} B_{2n} + \frac{(\varepsilon+n-1)(\varepsilon+n-2)}{(\varepsilon+2n-1)(\varepsilon+2n-2)} \binom{n}{2} \frac{1}{\varepsilon+2n-1} \dots \dots (-1)^n \frac{(\varepsilon+n-1)(\varepsilon+n-2)\dots\varepsilon}{(\varepsilon+2n-1)(\varepsilon+2n-2)\dots(\varepsilon+n)} \binom{n}{n} \frac{1}{\varepsilon+n+1} = 0$$

ist. Vorzüge hat die Methode erstens für große Werte von μ , d. h. wenn die ersten Glieder der *Taylor*schen Reihe fehlen und zweitens, wenn δ nicht gleich 1 ist. Z. B. braucht man für $\mu = 2, \delta = 2$, also für ungerade Funktionen im allgemeinen bei gleicher Annäherung nur die Hälfte der Funktionswerte, die *Gauß* nötig hat. Ähnliche Fälle behandelt *Radau*¹⁾ und eine von *Pujet* der Faculté des sciences 1878 vorgelegte These.

b) *Verallgemeinerung von Christoffel*. Eine andere Verallgemeinerung rührt von *Christoffel*⁵⁷⁾ her. Er nimmt an, daß für die Werte x_1, x_2, \dots, x_r die Funktionswerte gegeben sind, und daß nun weitere n Abszissen $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_{r+n}$ so zu suchen sind, daß die Annäherung bei Benutzung der zugehörigen $n+r$ Funktionswerte möglichst gut werde. Damit hat man die Möglichkeit, bei Integration einer gegebenen Funktion alle Vorteile zu vereinen, die aus der Berücksichtigung ihres numerischen Verlaufs (x_1, x_2, \dots, x_r kann man so wählen, daß $f(x)$ dort besonders leicht zu berechnen ist, oder solche Werte hat, deren Einfluß auf das Integral als sehr groß zu erwarten ist) und der Verwendung der *Gauß*schen Methode entspringen.

Setzt man die Kettenbruchentwicklung von

$$(107) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\varphi(x) \prod_1^n (x - x_i)}{z - x} dx$$

an, so folgt ähnlich wie oben, daß der Kettenbruch regulär ist. Bezeichnet man den n^{ten} Näherungsnenner und -zähler mit $N_n(z)$ bzw. $\bar{Z}_n(z)$, so folgt, daß

$$(108) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) \prod_1^n (x - x_i) N_n(x) \theta_{n-1}(x) dx = 0,$$

wo $\theta_{n-1}(x)$ irgendeine ganze rationale Funktion $(n - 1)^{\text{ten}}$ Grades von x ist. Wählen wir also die n Wurzeln von $N_n(z)$, die, falls die Quadratur ausführbar sein soll, reell alle verschieden sein und zwischen α und β liegen müssen als Abszissen $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_{r+n}$, so haben wir den Genauigkeitsgrad $r + 2n$ erreicht. Man gewinnt so die Darstellung

$$(109) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) f(x) dx = \sum_1^{n+r} \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) \frac{N_n(x) \prod_{k=1}^{k=r} (x - x_k)}{(x - x_i) \left(\prod_{k=1}^{k=r} (x - x_k) \right)'_{x=x_i}} \cdot dx \cdot f(x_i) + \varepsilon$$

$$= \sum_1^{n+r} \frac{\bar{Z}_n(x_i)}{\left(\prod_{k=1}^{k=r} (x - x_k) N_n(x) \right)'_{x=x_i}} \cdot f(x_i) + \varepsilon,$$

wo

$$\varepsilon = c_{2n+r} \left[\int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) x^{2n+r} dx - \sum_1^{n+r} \frac{\bar{Z}_n(x_i)}{\left(\prod_{k=1}^{k=r} (x - x_k) N_n(x) \right)'_{x=x_i}} \cdot x_i^{2n+r} \right] + \dots$$

ist. Die erzeugende Fehlerfunktion ist hier

$$(110) \quad \frac{1}{N_n(z) \prod_{k=1}^{k=r} (z - z_k)} \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) \frac{\prod_{k=1}^{k=r} (x - x_k) N_n(x)}{z - x} dx.$$

*Gegenbauer*¹⁰⁹⁾ zeigt, daß die N_n und \bar{Z}_n sich durch die F'_n und Z_n der Kettenbruchentwicklung von $\int \frac{\varphi(x) dx}{z - x}$ ausdrücken lassen. Man kann jede Funktion $n + r^{\text{ten}}$ Grades nach $F'_0 \dots F'_{n+r}$ entwickeln.

119) *Gegenbauer*, Wien Ber. 78 (1878), p. 768—778.

Aus der Gleichung (108) folgt aber, daß in der Entwicklung von

$\prod_{k=1}^{k=r} (x - x_k) N_n(x)$ die Funktionen $F_0 \dots F_{n-1}$ nicht vorkommen

dürfen, also wird

$$(111) \quad \prod_{k=1}^{k=r} (x - x_k) N_n(x) = AF_n(x) + BF_{n+1}(x) + \dots + RF_{n+r}(x).$$

Verbindet man das mit den r Gleichungen

$$(112) \quad 0 = AF_n(x_i) + BF_{n+1}(x_i) + \dots + RF_{n+r}(x_i) \quad i = (1, 2, \dots, r),$$

so erhält man, falls die Gleichungen voneinander unabhängig sind,

$$(113) \quad \prod_{k=1}^{k=r} (x - x_k) N_n(x) = C \begin{vmatrix} F_n(x) & F_{n+1}(x) & \dots & F_{n+r}(x) \\ F_n(x_1) & F_{n+1}(x_1) & \dots & F_{n+r}(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ F_n(x_r) & F_{n+1}(x_r) & \dots & F_{n+r}(x_r) \end{vmatrix}.$$

Aus dieser Gleichung läßt sich \bar{Z}_n und \bar{K}_n berechnen. Ähnlich und noch etwas allgemeiner finden sich diese Entwicklungen in einer zweiten Arbeit von *Gegenbauer*.¹²⁰⁾

Man kann auch einen Ausdruck für $\prod_{k=1}^{k=r} (x - x_k) N_n(x)$ erhalten, wenn man von den aus (108) folgenden Gleichungen

$$(114) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \prod_{k=1}^{k=r} (x - x_k) N_n(x) \varphi(x) x^m dx = 0 \quad (m = 0, 1, \dots, n - 1)$$

ausgeht und für

$$N_n(x) = C_n x^n + C_{n-1} x^{n-1} + \dots + C_0$$

setzt, woraus man durch Elimination der C nach *Christoffel*⁵⁷⁾

$$(115) \quad N_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{\alpha}^{\beta} \int_{\alpha}^{\beta} \dots \int_{\alpha}^{\beta} \prod_1^r (z_1 - x_{\nu}) \prod_1^r (z_2 - x_{\nu}) \dots \prod_1^r (z_n - x_{\nu}) \varphi(z_1) \varphi(z_2) \dots \varphi(z_n) \cdot (x - z_1)(x - z_2) \dots (x - z_n) \cdot \begin{vmatrix} z_1^{n-1} & z_1^{n-2} & \dots & z_1 & 1 \\ z_2^{n-1} & z_2^{n-2} & \dots & z_2 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ z_n^{n-1} & z_n^{n-2} & \dots & z_n & 1 \end{vmatrix}^2 dz_1 dz_2 dz_3 \dots dz_n$$

¹²⁰⁾ *Gegenbauer*, Wien Ber. 100 (1891), p. 635—703.

erhält. Transformiert man die Gleichung (114) nach *Jacobi*⁷⁾, so erhält man daraus

$$(116) \quad \prod_1^n (x - x_k) N_n(x) \varphi(x) = \frac{d^n}{dx^n} (x - \alpha)^n (x - \beta)^n X_r.$$

Durch Umformung der Gleichung (113) erhält man nach *Christoffel*⁵⁷⁾ für den Fall $\varphi(x) = 1$ bis auf eine Konstante

$$(117) \quad X_r = \frac{d^{r \cdot n}}{dx_1^n dx_2^n \dots dx_r^n} [(x_1 - \alpha)^n (x_1 - \beta)^n (x_2 - \alpha)^n (x_2 - \beta)^n \dots (x_r - \alpha)^n (x_r - \beta)^n]$$

$$\begin{vmatrix} x^n & x^{n-1} & \dots & x & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & \dots & x_1 & 1 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_r^n & x_r^{n-1} & \dots & x_r & 1 \end{vmatrix}.$$

Man sieht aus (116) sofort, daß im Falle $x_1 = \alpha$, $X_r = x - \alpha$, $x_1 = \beta$, $X_r = x - \beta$ und $x_1 = \alpha$, $x_2 = \beta$, $X_r = (x - \alpha)(x - \beta)$ ist. Ferner sieht man aus dieser Gleichung durch Anwendung des *Rolleschen* Satzes⁷⁸⁾: Sind die Wurzeln von X_r alle reell und liegen zwischen α und β , so müssen auch die Wurzeln von $N_n(x)$ reell, voneinander verschieden sein und zwischen α und β liegen. Ferner sieht man, daß, wenn X_r reell ist oder durch Multiplikation mit einer Konstanten reell wird, mindestens n reelle verschiedene Wurzeln zwischen α und β liegen müssen. Liegen also die gegebenen Werte außerhalb des Bereichs, oder sind sie Grenzen, so liegen die gesuchten n Wurzeln im Bereich. Weiter lassen sich folgende Sätze beweisen: Liegt eine der gegebenen Abszissen zwischen α und β , so sind alle Wurzeln von $N_n(x)$ reell und verschieden, und höchstens eine liegt außerhalb α und β . Liegen l der gegebenen Abszissen zwischen α und β , so sind bei geradem l höchstens l , bei ungeradem höchstens $l - 1$ Wurzeln komplex oder fallen zu zweifachen, vierfachen usw. Wurzeln zusammen. Höchstens l liegen außerhalb des Intervalles.

Der Fall $x_1 = \alpha$ ist von *Lampe*¹²¹⁾ behandelt worden; im Fall $x_1 = \alpha$, $x_2 = \beta$ findet sich für $n = 4$ die Formel nebst Korrektionsglied bei *Klügel*¹²²⁾, der sich aber nicht auf allgemeine Betrachtungen einläßt. Allgemeiner behandelt wird dieser Fall z. B. von *Turazza*¹²³⁾,

121) *Lampe*, Jahresber. d. Deutsch. Math.-Ver. 3 (1892/3), p. 102—106. (Bei $n = 4$ sind versehentlich imaginäre Wurzeln angegeben.) Verh. d. Ges. Deutscher Naturforscher Nürnberg 2 (1894), p. 4—8.

122) *Klügel*, Math. Wörterbuch IV 1823, Artikel: Quadratur Nr. 145.

123) *Turazza*, Memorie dell' I. R. Istituto Veneto 5 (1855), p. 277—98. *Turazza* gibt an, daß nach seiner Methode auch die allgemeinere später von *Christoffel* behandelte Aufgabe gelöst werden kann.

der die Formeln ohne Korrektionsglied bis $n = 7$ gibt, ferner von *Catalan*¹²⁴), *Peano*¹²⁵) u. a. In den schon öfters erwähnten Arbeiten von *Radau*¹) und *Moors*³⁸) sind die Abszissen, Koeffizienten und das Korrektionsglied bis $n = 11$ angegeben. Die Fehlerglieder (δ) stehen in diesem Falle zu denen der *Gaußschen* Formel δ in der Beziehung¹)

$$(118) \quad (\delta_{2n}) = -\frac{n+1}{n} \delta_{2n}, \quad (\delta_{2n+2}) = -\frac{(n+1)^2}{n(n+1)-1} \delta_{2n+2}.$$

Für $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ erhält man die *Gaußschen* Abszissen für ungerade n . Für $x = \alpha$, $x = \beta$, $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ erhält man die oben erwähnten zuerst von *Turazza* aufgestellten Formeln für ungerade n . Für $n = 2$ findet sich der letzte Fall bei *Catalan*¹²⁶) ohne, bei *Ligowski*¹²⁷) mit Restglied behandelt (s. a.³⁴)).

c) *Mehrfache Integrale*. Schließlich wurde von *Pujet*¹²⁸) zur Bestimmung des Restgliedes der *Taylor*schen Reihe die *Gaußsche* Methode zuerst auf die Berechnung mehrfacher Integrale von Funktionen einer Veränderlichen ausgedehnt. Neuerdings hat sich *Willers*¹²⁹) mit diesen Fragen beschäftigt, der die Methoden von *Newton-Cotes*¹⁹), die auch *Merrifield*²²) überträgt, die später zu erwähnende von *Tschebyscheff*¹⁰⁶), insbesondere aber die von *Gauß*⁴⁸) auf mehrfache Integrale überträgt. Er findet, daß die meisten für einfache Integrale geltenden Sätze ihre Gültigkeit für m -fache Integrale behalten, so die über die Lage der Wurzeln; ferner läßt sich zeigen, daß alle Koeffizienten positiv sind, usw. Betreffs der Lage der n Funktionswerte, die zur angenäherten Berechnung eines $(m - 1)$ -fachen und eines m -fachen Integrales nötig sind, ergibt sich für den Fall $\varphi(x) = 1$, daß erstere und der Funktionswert im Anfangspunkt durch die letzteren getrennt werden, so daß mit wachsendem m die Werte immer mehr um den Anfangspunkt zusammenrücken. Auch die Methoden der Restabschätzung, wie die von *Jacobi*⁷) oder *Markoff*¹⁷⁸) lassen sich entsprechend verallgemeinern. Bis zu $n = 3$ und $m = 4$ werden in der Arbeit Abszissen, Koeffizienten und Restglied für alle drei Methoden gegeben.

124) *Catalan*, Mémoire de l'Acad. royale de Belgique (in 4^o) 43 (1882) (9 Seiten).

125) *Peano*, Atti della R. Accad. delle scienze di Torino 27 (1891—92), p. 608—12.

126) *Catalan*, Nouvelle correspondance mathématique 6 (1880), p. 396—402.

127) *Ligowski*, Arch. Math. Phys. 58 (1875), p. 49—83; Revue Maritime et Colon. 51 (1876), p. 159—174, ferner: Neue Näherungsformeln zur Berechnung bestimmter Integrale, Kiel 1875..

128) *Pujet*, Paris C. R. 84 (1877), p. 1071—1073.

129) *Willers*, Zeitschr. Math. Phys. 1915 oder 16.

6. Methode von Massau. *Massau*¹³⁰⁾ hat eine graphische Methode angegeben, die in gewisser Weise eine Übertragung der Methoden von *Newton-Cotes* bzw. *Gauß* ins Graphische ist. Sie erlaubt durch n beliebige, eventuell mit zugehöriger Tangentenrichtung gegebene Punkte eine Parabel entsprechender Ordnung zu legen und diese für ein beliebiges Intervall beliebig oft zu integrieren.

Ist P_i ein Polygon, dessen $i + 1$ Ecken $A_i^0, A_i^1, \dots, A_i^i$ auf äquidistanten Parallelen zur Y -Achse liegen, projizieren wir ferner diese Ecken auf die Y -Achse nach $a_i^0 \dots a_i^i$ und verbinden die Punkte a mit einem Integrationspol P_i^i , so können wir ein neues Polygon P_{i+1} zeichnen so, daß wir das Intervall in $i + 1$ gleiche Teile teilen und von einem Punkte A_{i+1}^0 ausgehend ein neues Polygon zeichnen, dessen Ecken $A_{i+1}^0, A_{i+1}^1, \dots, A_{i+1}^{i+1}$ auf aufeinanderfolgenden Parallelen liegen und dessen Seiten den Strahlen $P_i^i a_i^0, P_i^i a_i^1, \dots, P_i^i a_i^i$ sukzessive parallel sind¹³¹⁾. Die Figur 1 veranschaulicht das von




Fig. 1.

P_0 bis P_3 ; die Integrationsbasis λ (vgl. 12a) kann dabei für jedes Polygon beliebig genommen werden. Ist y_n^i die Ordinate von A_n^i , so läßt sich mit Hilfe der Differenzenrechnung zeigen, daß

$$(119) \quad y_n^i = y_n^0 + \frac{i}{1} \frac{y_{n-1}^0}{n} x + \frac{i(i-1)}{1 \cdot 2} \frac{y_{n-2}^0}{n(n-1)} x^2 \dots + \frac{i(i-1) \dots 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \dots (i-1) i} \frac{y_{n-i}^0}{n(n-1) \dots (n-i+1)} x^i \quad (132)$$

130) *Massau*²⁷⁸⁾: Mémoire sur l'int. gr. et ses applications II 2, § 1, Buch II, Kap. 2, § 1.

131) *Massau*, Appendice au Memoire sur l'intégration graphique et ses applications. Paris 1890, Note V—IX insbesondere VIII.

132) Vgl. auch *d'Ocagne*, Calcul graphique et Nomographie 38—40.

ist, was für $n = i$ mit der *Mac-Laurinschen* Formel identisch ist. Der durch lineare Konstruktion gefundene Punkt A_n^n gehört also einer Parabel n^{ter} Ordnung Π_n an, die das Integral n^{ter} Ordnung von Π_0 ist, und für die $y_1^0 \dots y_n^0$ die Integrationskonstanten sind. Die Seiten $A_n^0 A_n^1$ und $A_n^{n-1} A_n^n$ sind Tangenten von Π_n in A_n^0 und A_n^n . Die Konstruktion läßt sich für links wie rechts der Y -Achse gelegene Punkte durchführen. P_n heißt der Integrant (intégrant) von Π_n . Eine ganz ähnliche Konstruktion gibt unabhängig von *Massau Muirhead*¹³³⁾. *Massau*¹³⁴⁾ zeigt, daß die Integranten von Parabeln gleicher Ordnung, die in A_n^0 eine i -fache Berührung haben, in den i ersten Seiten den Integranten ein und desselben Parabelbogens bilden; also sich zu einem Integranten vereinen lassen. Dabei ist dieser für einen Kontakt $i + 1^{\text{ter}}$ Ordnung dem für einen Kontakt i^{ter} Ordnung umbeschrieben. Gehen die Parabeln von A_n^0 aus nach derselben Seite, so stimmen sie in den ersten Seiten überein. Das gilt auch für Parabeln verschiedener Ordnung Π_n und Π_m , falls man den Integranten der Parabel Π_m niederer Ordnung ebenfalls durch n -Integrationen konstruiert, dabei aber y_0^0 bis y_{n-m-1}^0 gleich Null setzt. *d'Ocagne*¹³²⁾ weist darauf hin, daß die Ordinate des Schwerpunktes von P_{n-1} durch ein dem obigen analoges Verfahren die Sehne $A_n^0 A_n^n$ bestimmt.

Da $y_n^0 \dots y_n^n$ durch $y_0^0 \dots y_n^0$ linear auszudrücken sind, so ist die Parabel Π_n durch P_n vollkommen bestimmt. Aus dem Integranten eines Punktes mit der Abszisse x läßt sich leicht der jedes andern ($x + \Delta x$) durch lineare Operationen konstruieren. Setzt man in obige Formel für x , $x + \Delta x$ ein, so findet man nach einigen Umformungen für die Ordinate der i^{ten} Ecke des Polygons

$$(120) \quad Y_n^i = \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^i y_n^i \\ - \frac{i}{1} \frac{\Delta x}{x} \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^{i-1} y_n^{i-1} \dots (-1)^i \frac{i(i+1) \dots 1}{1 \cdot 2 \dots (i+1)^i} \left(\frac{\Delta x}{x}\right)^i y_n^0.$$

Die Ausführung der Konstruktion zeigt Figur 2 für $n = 4$. Man verlängert jede Seite $A_i A_{i+1}$, so daß die Abszisse um $\frac{\Delta x}{n}$ wächst, und erhält so das Polygon $AB_1 \dots B_n$, mit dem man von B_1 aus genau so verfährt usw. Das Polygon $AB_1 C_2 \dots R_n$ ist der gesuchte Integrant für den Punkt mit der Abszisse $x + \Delta x$.¹³²⁾ Dabei ist A_n, B_n, \dots, R_n der Integrant zwischen A_n und R_n .

133) *Muirhead*, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society XXIX 1910/11, p. 78—82.

134) *Massau*²⁷⁸⁾ I, Buch V, Kap. I, § 2.

Massau¹³⁵⁾ gibt nun weiter Methoden, wie man aus einer Anzahl gegebener Punkte und gegebener Ableitungen in denselben, den Integranten P_n der die Kurve approximierenden Parabel Π_n finden kann.




Fig. 2.

Durch die inverse Segnersche Transformation¹³⁶⁾, $n - 1$ mal angewandt, stellt man aus den gegebenen Stücken die Ausgangsgerade her und wendet auf diese dann wieder die direkte Segnersche Transformation an. Da Π_1 mit P_1 identisch ist, so kommt es im wesentlichen nur darauf an, aus dem Integranten P_{n-1} von Π_{n-1} den von Π_n für irgendein Intervall zu konstruieren, indem man von irgendeinem Anfangspunkt aus auf P_{n-1} die direkte Segnersche Transformation anwendet. Sind u und v die Abszissen der Endpunkte des betrachteten Intervalles, so ist nach Fig. 3

$$(121) \quad y_n^t = \frac{n-t}{n} u y_{n-1}^t + \left[\frac{t}{n} (v-u) + \frac{t}{n} u \right] y_{n-1}^{t-1} = \overline{P}^t y_{n-1}^t + \overline{t}^t m_n^t y_{n-1}^{t-1}.$$

Hat man eine gegebene Kurve so durch eine Parabel Π_n mit dem Integranten P_n angenähert, so ist die Konstruktion eines Integrales




Fig. 3.

135) Massau¹³¹⁾ I.

136) Segner, Acad. Petrop. Novi Comment. VII 1758/59, p. 211.

für ein beliebiges Intervall leicht möglich.¹³⁷⁾ Auch der begangene Fehler ist abzuschätzen.

7. Methoden, bei denen die Koeffizienten gegeben sind. a) *Allgemeines.* Bisweilen wird die Aufgabe behandelt: es ist eine Anzahl Koeffizienten und Abszissen gegeben, und es ist eine andere Anzahl Koeffizienten und Abszissen so zu bestimmen, daß die Annäherung möglichst gut wird. Insbesondere setzt man eine Anzahl Koeffizienten gelegentlich gleich null. Elementare Betrachtungen über diesen Fall finden sich z. B. bei *Buzengeiger*¹³⁸⁾ *Lampe*¹³⁹⁾, *Maleyx*⁴⁸⁾, *Moors*¹⁴⁰⁾ und *Maurer*¹⁴¹⁾, der auf diesem Wege höchst elementar ohne Benutzung von Kugelfunktionen oder Reihenentwicklung die Gaußschen Formeln herleitet^{141*)}. *Moors* behandelt ausgehend von den Gleichungen (7) die Aufgabe: bei $2m$ beliebig vorgeschriebenen paarweise gleichen Koeffizienten und gegebenem x_1^2 durch sukzessive Approximation die $m - 1$ zugehörigen Werte x_i^2 zu finden, wobei sich der Genauigkeitsgrad $2m - 1$ erreichen läßt. Auch *Radau*¹⁾ deutet an, wie man eine derartige Aufgabe behandeln kann. Den höchsten Genauigkeitsgrad kann man dabei leicht mit Hilfe der Gleichungen (5) oder (7) feststellen.

Der wichtigste Fall gegebener Koeffizienten ist der, daß alle den gleichen numerischen Wert haben. Diese Art der angenäherten Integration ist immer dann vorteilhaft, wenn es sich um durch Beobachtung gewonnene, also mit einem gewissen Fehler behaftete Funktionen handelt, da bei gleichen Koeffizienten der mittlere Fehler ein Minimum wird. Dieser Fall ist unabhängig von *Andrae*⁵²⁾, *Ligowski*¹²⁷⁾ und *Tschebyscheff*¹⁰⁶⁾ behandelt worden; die Formeln werden nach Lampes Angabe besonders gern im Schiffsbau benutzt. Auf dieses Gebiet wurde sie wohl zuerst von *Afonasjef*¹⁴²⁾ angewandt, jetzt findet sie sich in fast allen den Gegenstand behandelnden Werken¹⁴³⁾.

137) *Massau*¹³¹⁾ VIII, § 1.

138) *Buzengeiger*, v. Zachs Monatliche Korrespondenz 26 (1812), p. 285—94.

139) *Lampe*, Bericht der Berliner mathematischen Gesellschaft 2 (1903), p. 29—35. Unter anderm stellt Lampe hier acht Formeln mit zwei symmetrischen Ordinaten und der Mittelordinate auf, deren Koeffizienten nicht viel unbequemer wie die der Simpsonschen Formel (vgl 11, 13), und deren Fehler sämtlich von fünfter Ordnung sind. Es zeigt sich, daß die Simpsonsche Formel von diesen die schlechteste Annäherung gibt.

140) *Moors*, Nieuw Archief Amsterdam (2) 3 (1898), p. 285—91.

141) *Maurer*, Arch. Math. Phys. (3) 18 (1911), p. 40—43.

141*) S. u. a. auch *Sainte-Laguë*, Revue de mathématiques spéciales 11 (1910—12), p. 433—34.

b) $\varphi(x)$ ist eine gerade Funktion. Ist zunächst $\varphi(x)$ eine gerade Funktion, so kann man allen A_k das gleiche Vorzeichen geben und aus ähnlichen Überlegungen, wie die, welche zu (40) führen, folgt dann

$$(122) \quad A_k = \frac{1}{n} \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) dx.$$

Da sich aus den Gleichungen (5) bzw. (7) leicht die symmetrischen Funktionen der Wurzeln entnehmen lassen, kann man sofort die Gleichung für $F_n(x)$ aufstellen. Man erhält nach *Andrae*⁵²⁾ und *Ligowski*¹²⁷⁾ für die Koeffizienten derselben die rekurrierenden Formeln

$$(123) \quad b_n a_\mu + b_{n-1} a_{\mu-1} + \dots + b_{n-\mu+1} a_1 = -\mu b_{n-\mu}.$$

Zur Bestimmung des Fehlergliedes setzt man am besten obige Koeffizientenberechnung fort, oder man bestimmt nach *Radau*¹⁾

$$\delta_{m+n} = \int_{\alpha}^{\beta} x^m F_n(x) dx \quad (m = 2 \text{ für gerade, } m = 1 \text{ für ungerade } n).$$

*Tschebyscheff*¹⁰⁶⁾ kommt zu der Gleichung $F_n(x) = 0$ auf anderem Wege. Aus

$$(124) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\varphi(x)}{z-x} dx = A_k \sum_1^n \frac{1}{z-x_i} + \frac{\delta_{n+1}}{z^{n+2}} \dots$$

folgt durch Integration nach z

$$(125) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) \lg(z-x) dx = A_k \lg F_n(z) - \frac{1}{n+1} \frac{\delta_{n+1}}{z^{n+1}} \dots,$$

also ist

$$(126) \quad F_n(z) = E e^{\frac{1}{A_k} \left(\int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) \lg(z-x) dx + \frac{1}{n+1} \frac{\delta_{n+1}}{z^{n+1}} \dots \right)},$$

woraus sich für $\alpha = -1$, $\beta = +1$, $\varphi(x) = 1$ ergibt

$$(127) \quad F_n(z) = E z^n e^{\frac{n}{2 \cdot 3 \cdot z^2} + \frac{n}{4 \cdot 5 \cdot z^4} \dots}$$

Das Fehlerglied kann fortbleiben, da es sicher keinen Beitrag zu der ganzen Funktion liefert. Die Abszissenwerte werden angegeben von *Andrae*⁵²⁾ für die Grenzen $-\frac{1}{2}$ bis $+\frac{1}{2}$ von $n = 1$ bis $n = 6$ nebst

142) Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens 2 (1874), p. 527—36, 583—97. Nach einer Mitteilung von *Afonasjef* im „Morskoi sbornik“.

143) Z. B. *Johow*, Hifsbuch für den Schiffsbau, Berlin 1902, p. 313—15. *Pollard et Dubeout*, Théorie du navire IV, Paris 1894, Note 8: Méthode de calcul de *M. Kriloff*, p. 404—13.

einem Fehlerglied, *Ligowski*¹²⁷⁾ für die Grenzen 0 und 1 von $n = 1$ bis $n = 5$ ohne Fehlerglied, *Tschebyscheff*¹⁰⁶⁾ für die Grenzen -1 und $+1$ von $n = 0$ bis $n = 7$ ebenfalls ohne Fehlerglied, *Radau*¹⁾ und *Moors*¹⁴⁴⁾ für die Grenzen -1 und $+1$ von $n = 1$ bis $n = 9$ mit Fehlerglied. Für $n = 8$ und $n = 10$ werden eine Anzahl Wurzeln imaginär, hier kann man daher δ_n nicht zu null machen, sondern muß, wenn die Formeln brauchbar bleiben sollen, δ_n einen gewissen Minimalwert geben. *Moors*¹⁴⁴⁾ zeigt, daß es unter Umständen vorteilhaft ist, δ_{2m} so zu bestimmen, daß zwei, etwa die mittleren oder vier symmetrische Wurzeln zu zweien zusammenfallen. Die betreffenden Ordinaten haben dann natürlich einen doppelt so großen Koeffizienten wie die andern. Eine Reihe solcher Formeln findet sich bei *Moors*¹⁴⁴⁾ in der Tabelle G zusammengestellt.

Bei angenäherter Integration mehrfacher Integrale tritt der Fall, daß Wurzeln imaginär werden, schon für kleinere Werte von n ein.¹²⁹⁾

c) $\varphi(x)$ ist eine ungerade Funktion. Ist $\varphi(x)$ eine ungerade Funktion, so nimmt man am besten eine gerade Anzahl von Ordinaten und gibt der Hälfte der Koeffizienten ein negatives Vorzeichen. Z. B. kann man setzen

$$(128) \quad \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) f(x) dx = A \sum [f(x_n) - f(-x_n)].$$

Statt der Gleichungen (7) erhält man dann, falls man ein zum Nullpunkt symmetrisches Intervall wählt,

$$(129) \quad A \sum_1^n x_i^{2k+1} = a_{2k+1} \quad \sum x^{2k} = 0.$$

Die Koeffizienten der die Abszissen bestimmenden Gleichung

$$F_n(x) = 0 \quad (n = 2i)$$

lassen sich mittels der Gleichungen (123) als Funktionen von $\sum_1^n x_i = s$ ausdrücken. Im Falle $\varphi(x) = x$ z. B. findet man

$$(130) \quad \frac{1}{A} = 3s = 5s_3 \cdots = (n+3)s_{n+1},$$

wo $s_r = \sum_1^n x_i^r$ ist. Ähnliche Gleichungen erhält man für andere $\varphi(x)$. Ferner erhält man aus (123) eine Gleichung für s , und jedem Lösungs-

144) *Moors*, Valeur approximative d'une intégrale définie, Paris 1905, Kapitel III.

wert s entspricht ein Wert von A und ein System von Abszissen, die sich aus der Gleichung $F_n(x) = 0$ ergeben. *Radau*¹⁴⁵⁾ behandelt die Fälle

$$\varphi(x) = x \quad \text{und} \quad \varphi(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$

wo

$$A \sum_1^n x_i^{2h+1} = \frac{1}{2h+3} \quad \text{bzw.} \quad A \sum_1^n x_i^{2h+1} = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2h+1)}{2 \cdot 4 \cdots (2h+2)} \frac{\pi}{2}$$

wird. Er gibt die Abszissen für $n = 2, 4, 6$. Für $n = 8$ erhält er im ersten Falle eine Gleichung 14. Grades. *Tschebyscheff*¹⁰⁶⁾ faßt die Wurzeln, deren Funktionswerte in den angenäherten Integralwert mit positiven Zeichen eingehen, zu $F_+(x)$, und die mit negativen Zeichen zu $F_-(x)$ zusammen. Dann ist $F_n(x) = F_+(x) \cdot F_-(x)$ und nach (124)

$$\frac{F_+(x)}{F_-(x)} = e^{\frac{1}{A} \left(\int_\alpha^\beta \varphi(x) \lg(z-x) dx + \frac{\delta_{2i+2}}{(2i+2)x^{2i+2}} + \dots \right)}$$

Er entwickelt rechts in einen Kettenbruch und setzt im Näherungsbruch i^{ter} Ordnung ($n = 2i$) den Koeffizienten von $\frac{1}{z}$ gleich null, was ihm A liefert.

Statt

$$\int_\alpha^\beta f(x) \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

kann man auch

$$\int_0^\pi f(\cos \vartheta) \cos \vartheta d\vartheta$$

betrachten. *Tschebyscheff*¹⁰⁶⁾ und *Radau*¹⁴⁵⁾ betrachten anstatt dessen allgemeiner

$$\int_0^\pi f(\cos \vartheta) \cos \lambda \vartheta d\vartheta,$$

wo λ eine ganze Zahl ist. Daraus findet man als Bedingungsgleichungen

$$\sum A_i \cos h \alpha_i = 0 \quad \text{wenn} \quad h \geq \lambda, \quad \sum A_i \cos h \alpha_i = \frac{\pi}{2} \quad \text{für} \quad h = \lambda.$$

Auch hier werden die A_i einander gleich und haben alternierendes Zeichen, und es wird ($n = 2i$)

$$\alpha_i = \frac{\alpha_r + k\pi}{\lambda} \quad \left(\begin{array}{l} k = 0, 1, 2, \dots, 2\lambda - 1 \\ r = 1, 2, \dots, i \end{array} \right),$$

145) *Radau*, Paris C. R. 90 (1880), p. 520—523.

wo die A und a_r sich aus dem Bedingungen

$$\sum \cos 3a_r = \sum \cos 5a_r \dots = \sum \cos (2i + 1)a_r = 0,$$

$$A \sum \cos a_r = \frac{\pi}{4\lambda}$$

bestimmen. Man erhält nach *Radau*¹⁴⁵⁾ so

$$(131) \quad \int_0^{\pi} f(\cos \vartheta) \cos \lambda \vartheta d\vartheta = A \sum_{r=1}^{\lambda} \sum_{k=0}^{2\lambda-1} (-1)^k f\left(\cos \frac{a_r + k\pi}{\lambda}\right).$$

Die Formeln von *Tschebyscheff* und *Moors* eignen sich besonders zur Bestimmung der mittleren Ordinaten (s. 12) bei graphischer Integration, wenn man die Abszissenbestimmung etwa mittels eines ein für allemal für das betreffende n auf durchsichtiges Papier gezeichneten Strahlenbüschels vornimmt. Dieses entwirft man etwa so, daß ein durch den einen Endpunkt des Intervalles oder besser ein durch die Mitte gehender Strahl senkrecht zur Abszissenachse steht.

8. Formeln, die durch Kombination entstehen. Bisweilen hat man den Genauigkeitsgrad von Quadraturformeln dadurch zu erhöhen versucht, daß man durch Kombination zweier Formeln A und B von gleicher Genauigkeit das oder die ersten Glieder des Fehlers fortzuschaffen suchte.¹⁴⁶⁾ Dabei pflegt man die Formeln so zu wählen, daß die eine größere, die andere kleinere Werte als das gesuchte Integral gibt. Insbesondere stellt *Ligowski*¹²⁷⁾ zahlreiche solche Kombinationen

$$A + aB = (1 + a)C$$

auf. Auch *Radau*¹⁾ gibt eine solche Kombinationsformel aus der Gaußschen und der von ihm berechneten, gleicher Ordnung, die die Grenzabszissen mit enthält. *Skutsch*¹⁴⁷⁾ zeigt nun, daß, wenn A eine Gaußsche Formel für m Ordinaten ist, die Komplementärformel B mindestens $m + 1$ Ordinaten haben muß, die im allgemeinen nicht mit den m Ordinaten von A zusammenfallen. Läßt man die m Ordinaten von A mit in B eingehen, so kann C , wenn m gerade ist, höchstens den Genauigkeitsgrad, $3m + 1$, wenn m ungerade $3m + 2$ erreichen. Man darf also den Wert solcher Kombinationen nicht überschätzen, da man mit $2m + 1$ Ordinaten nach Gauß den Genauigkeitsgrad $4m + 1$ erreichen kann. Kann man a so wählen, daß in der Kombinationsformel eine oder zwei Ordinaten verschwinden, so kann aller-

146) *Mac Laurin*, Treatise of fluxions⁴⁰⁾ 849, findet auf diese Art aus der *Simpsonschen* Formel für das Ungeteilte und das in zwei Teile geteilte Intervall die *Cotesche* Formel für $n = 5$.

147) *Skutsch*, Arch. Math. Phys. (2) 13 (1894), p. 78—83.

dings eine derartige Kombination unter Umständen ganz brauchbar sein. Z. B. gibt *Ligowski*¹²⁷⁾ eine Reihe solcher Formeln. Er zeigt, wie man durch Kombination mehrerer Formeln mit symmetrischen, vorläufig unbestimmten Abszissen die Gaußschen Formeln durch Elimination der Fehlerglieder herleiten kann. Auch in anderen Fällen kann man durch solche Kombinationen brauchbare Formeln erhalten, z. B. wenn man aus auf mehrere Intervalle angewandten *Newton-Cotes*-schen Formeln das erste Fehlerglied eliminiert. So gibt bei 6 Teilintervallen die Formel für $n = 3$ (1. Simpsonsche) und $n = 4$ (2. Simpsonsche) (vgl. Nr. 11, 13 und 14) die Formel von *Weddle*³⁶²⁾. Diese und die *Cotes*sche Formel für $n = 5$ auf 12 Teilintervalle angewandt eine ziemlich einfache von *Woolsey*^{147a)} gegebene Formel, in der allerdings negative Koeffizienten auftreten.

9. Die Eulersche Formel (vgl. auch I A 3 (*A. Pringsheim*) Irrationalzahlen unendlicher Prozesse, Nr. 38 und I E (*D. Selivanoff*) Differenzenrechnung, Nr. 11). Vielfach wird für die angenäherte Quadratur die Eulersche Formel¹⁴⁸⁾ benutzt, die auch gute Dienste bei der Fehlerabschätzung¹⁴⁹⁾ leistet, wenn man den zu integrierenden Bogen nicht durch eine Parabel annähert, sondern ihn in eine Anzahl gleich breiter Streifen teilt, und in jedem Streifen durch Parabeln gleicher Ordnung annähert. Die Formel wurde von *Euler*¹⁴⁸⁾ aufgestellt und vielleicht¹⁵⁰⁾ von *Mac Laurin*¹⁵¹⁾ übernommen. Die Koeffi-

147a) *Woolsey*, The Quarterly Journal of pure and applied mathematics 43 (1912), p. 380—84 und Proceedings of the U. S. Naval Institute 37, p. 871.

148) *Euler*, Commentarii academiae Petropolitanae 6 (1732—3), Petersburg 1738, p. 68—97 und 8 (1736), Petersburg 1741, p. 9—22. Institutionum calculi differentialis pars posterior Petersburg 1757, p. 430 ist die Formel bis zu $\frac{d^{29}y}{dx^{29}}$

gegeben. Zur angenäherten Berechnung bestimmter Integrale verwendet *Euler* die Formeln z. B. in Institutionum calculi integralis volumen primum Teil I, Kap. 7 (3. Aufl. Petersburg 1824), p. 178—202.

149) Z. B. *Ligowski*, Arch. Math. Phys. 55 (1873), p. 219—21; Arch. Math. Phys. 59 (1876), p. 329—33; Arch. Math. Phys. 60 (1877), p. 336. *Bertrand*: Calcul intégral, Paris 1870, p. 331—362.

150) Zur Prioritätsfrage: *Murdoch*, Biographie von Mac-Laurin in *Mac-Laurin*, Account of Sir Isaac Newtons philosophical discoveries, London 1748; *Eneström*, Öfversigt af Kongl. Vetenskap-Akademiens Förhandlingar 36 (1879), Nr. 10, p. 3—17; *Reif*, Geschichte der unendlichen Reihen, Tübingen 1889, p. 87; *Cantor*, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik 3, 2. Aufl., Leipzig 1901, p. 663; *Schlömilch*, Vorlesungen über einzelne Teile der höheren Analysis, Braunschweig 1866, p. 226. *Moors*³⁸⁾, p. 165—175.

151) *Mac Laurin*, Treatise of fluxion II, Kap. IV, p. 663—693, Edinburgh 1742, vgl. auch *Lubbock*, Cambr. Trans. 3 (1830), p. 323.

zienten der Formel stehen in engem Zusammenhang mit den *Bernoulli*-schen Zahlen (vgl. II A 3 Nr. 18), die bis zur 31. sich z. B. bei *Ohm*¹⁵²⁾ finden.

Verschiedentlich wird die Formel abgeleitet, natürlich in zahlreichen Lehrbüchern, wie *Lacroix*¹⁵³⁾, *de Morgan*¹⁵⁴⁾, *Houël*¹⁵⁵⁾ usw., ferner außer den hier sonst zitierten Abhandlungen mittels partieller Integration, z. B. bei *Schlömilch*¹⁵⁶⁾, *Callendreau*¹⁵⁷⁾, *Kinkelin*¹⁵⁸⁾ u. a. von der Taylorschen Reihe ausgehend, z. B. bei *Tortolini*¹⁵⁹⁾, *Genocchi*¹⁶⁰⁾, *Schellbach*⁷⁹⁾ u. a. *Imschenetzky*¹⁶¹⁾ zeigt, daß die Formel sich unter gewissen Bedingungen mittels Parabeln höherer Ordnung ableiten läßt. Die beiden meist gebrauchten Formen der *Eulerschen* Formel sind

$$(132) \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \omega M - \frac{\omega^2}{12} (f'(\beta) - f'(\alpha)) + \frac{\omega^4}{720} (f'''(\beta) - f'''(\alpha)) \\ - \frac{\omega^6}{30240} (f^{(v)}(\beta) - f^{(v)}(\alpha)) \dots,$$

die sich nebst andern Formeln besonders bei *Euler*¹⁴⁸⁾ findet, und

$$(133) \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \omega N + \frac{\omega^2}{24} (f'(\beta) - f'(\alpha)) - \frac{7\omega^4}{5760} (f'''(\beta) - f'''(\alpha)) \\ + \frac{31\omega^6}{967680} (f^{(v)}(\beta) - f^{(v)}(\alpha)) \dots,$$

die z. B. *Mac Laurin*¹⁵¹⁾ (831) gibt, und die sich aus (132) leicht ableiten läßt (s. z. B. *Hardy*).¹⁶²⁾ Hier ist

152) *Ohm*, Journ. für Math. 20 (1840), p. 11—12; s. auch Trans. of Cambridge (1873), p. 384—91.

153) *Lacroix*, Traité du calcul différentiel et du calcul intégral, Deutsch nach der 4. Aufl. 1828 von *Baumann*, Berlin 1831.

154) *de Morgan*, Differential and Integral Calculus, London 1842, p. 313.

155) *Houël*, Cours du calcul infinitésimal, Anhang zu I, p. 331—335, Paris 1871.

156) *Schlömilch*, Berichte der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig 9 (1857), p. 11—17.

157) *Callendreau*, Paris C. R. 86 (1878), p. 589—592.

158) *Kinkelin*, Programm der Ober-Realschule zu Basel 1902 (30 Seiten).

159) *Tortolini*, Annali di science matematiche e fisiche 4 (1853), p. 209—231, vgl. auch eine Anzahl dort zitierter Abhandlungen.

160) *Genocchi*, Paris C. R. 86 (1878), p. 466—469 u. Annali di science matematiche e fisiche 1855.

161) *Imschenetzky*, Petersburger Abhandlungen 62 (1890), p. 45—52.

162) *Hardy*, Journ. of the Institut of Actuaries 24 (1883), p. 95—110.

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{1}{2}f(\alpha) + f(\alpha + \omega) + f(\alpha + 2\omega) + \dots \\
 &\qquad\qquad\qquad + f(\beta - \omega) + \frac{1}{2}f(\beta), \\
 (134) \quad N &= f\left(\alpha + \frac{\omega}{2}\right) + f\left(\alpha + \frac{3\omega}{2}\right) + f\left(\alpha + \frac{5\omega}{2}\right) + \dots \\
 &\qquad\qquad\qquad + f\left(\beta - \frac{3\omega}{2}\right) + f\left(\beta - \frac{\omega}{2}\right).
 \end{aligned}$$

Bisweilen läßt man die Terme $f'(\alpha)$, $f'''(\alpha)$, ... fort und fügt anstatt dessen eine Konstante C bei, z. B. *Glaiser*¹⁶³). Von diesen beiden Formeln ausgehend macht *Legendre*¹⁶⁴) darauf aufmerksam, daß, falls alle ungeraden Ableitungen an den Intervallenden null sind, $M = N$ für beliebige Unterteilung sein müßte, während sich auch in diesem Falle nachweisen läßt, daß die Genauigkeit von M und N mit n wächst.

Der erste von *Erchinger*¹⁶⁵) gemachte Versuch, ein Restglied für die Eulersche Formel aufzustellen, der von *Eytelwein*¹⁶⁶) und *Ettinghausen*¹⁶⁷) übernommen ist, befriedigt nach *Malmsten*¹⁶⁸) wenig, weil *Erchinger* von einer Differentialgleichung ausgeht, die nur für den Fall konvergenter Reihen gilt. Ausgehend von der Fourierschen Entwicklung gibt *Poisson*¹⁶⁹) als Restglied von (132)

$$(135) \quad R_{2m} = 2(-1)^{m+1} \left(\frac{\omega}{2\pi}\right)^{2m} \sum_{\varrho=1}^{\infty} \frac{1}{\varrho^{2m}} \int_{\alpha}^{\beta} f^{2m}(x) \cos \frac{2\pi\varrho(x-\alpha)}{\omega} dx$$

und zeigt, daß in dem von *Legendre* betrachteten Falle $R_m = R_{m+1}$ ist, d. h. die Genauigkeit nur mit der Abnahme von ω wächst. *Raabe*¹⁷⁰) zeigt mit Hilfe dieses R , daß, wenn $f^{2m}(x)$ in dem betrachteten Gebiet sein Zeichen nicht ändert, der Fehler immer kleiner als das letzte berechnete Glied ist. Das erlaubt ihm die Intervall-

163) *Glaiser*, Proceedings of the Lond. Math. Soc. 4 (1871–73), p. 48–56.

164) *Legendre*, Traité des fonctions elliptiques et des intégrals eulériennes 2, Paris 1826, p. 572–596.

165) Mitgeteilt nach Briefen von Erchinger in: *Schrader*, Commentatio de summatione seriei

$$\frac{a}{b(b+d)} + \frac{a}{(b+2d)(b+3d)} + \frac{a}{(b+4d)(b+5d)} + \dots;$$

Vimarise 1818, p. 57–64.

166) *Eytelwein*, Grundlehren der höheren Analysis 2, § 696, Berlin 1824.

167) *Ettinghausen*, Vorlesungen über die höhere Mathematik 1, p. 429, Wien 1827.

168) *Malmsten*, Journ. für Math. 35 (1847), p. 55–82.

169) *Poisson*, Mém. Inst. Acad. Paris 4 (1823), p. 571–602. Nouv. Bull. des sc. de la Soc. philom. Paris 1826, p. 161, 162.

170) *Raabe*, Journ. für Math. 18 (1838), p. 75–99.

größe bei vorgeschriebenem Maximalfehler abzuschätzen^{170*)}. Wird eine der niederen Ableitungen an den Grenzen null, so müssen Nullstellen der höheren Ableitungen dazwischen liegen. Das Intervall muß unterteilt werden, und das zur Erreichung derselben Genauigkeit nötige ω wird kleiner. Ferner untersucht Raabe, wie sich eine Ungenauigkeit in der Wurzelbestimmung von $f^{2m}(x) = 0$ auf die Bestimmung von ω geltend macht.

Aus der Poissonschen Form des Restgliedes kann man, wie es z. B. *Kronecker*¹⁸⁰⁾ und *Franel*¹⁷¹⁾ tun, eine unter Benutzung der Taylorschen Reihe von *Jacobi*¹⁷²⁾ gegebene Form des Restgliedes ableiten

$$(136) \quad R_{2m} = - \int_0^1 \omega^{2m+1} C_m(\nu) \sum_{r=1}^n f^{2m}(\alpha + r\omega - \nu\omega) d\nu,$$

wo C_m eng mit der *Bernoullischen* Funktion¹⁷³⁾ zusammenhängt. Daraus ergibt sich als Abschätzung, da C_m von 0 bis 1 sein Zeichen nicht ändert,

$$(137) \quad R_{2m} = (-1)^m \frac{B_m}{(2m)!} \omega^{2m+1} \sum_1^n f^{2m}(\alpha + r\omega - \nu\omega) \\ = (-1)^m \frac{\varepsilon B_m}{2m!} \omega^{2m} (\beta - \alpha) M,$$

wo $|\varepsilon| < 1$, B_m die entsprechende *Bernoullische* Zahl, M der Maximalwert von f^{2m} und $0 < \nu < 1$ ist.¹⁷⁴⁾ *Malmsten*¹⁶⁸⁾ und *Hermite*¹⁷⁵⁾ geben diesem Ausdruck, falls es sich um ein Intervall handelt, die Form

$$(138) \quad R_{2m} = \vartheta (-1)^m \frac{B_m}{2m!} C \omega^{2m} (f^{2m-1}(\beta) - f^{2m-1}(\alpha)),$$

wo $0 < \vartheta < 1$, und, falls die $2m^{\text{te}}$ und $2m + 2^{\text{te}}$ Ableitung im ganzen Intervall unverändertes, entgegengesetztes Vorzeichen haben,

$$C = \frac{2^{2m-1} - 1}{2^{2m-1}},$$

falls sie gleiches Vorzeichen haben, $C = -1$ ist.¹⁷⁶⁾ Nach *Schlömilch*¹⁷⁷⁾ und *Scheibner*¹⁷⁶⁾, die aber von der *Poissonschen* Form des Restgliedes

170*) Siehe auch *Mansion*, Annales de la Société scientifique de Bruxelles 36 A (1912), p. 117—19.

171) *Franel*, Math. Ann. 47 (1896), p. 433—440.

172) *Jacobi*, Journ. für Math. 12 (1834), p. 263—272.

173) *Bernoulli*, Ars conjectandi 2, Kap. III, Basel 1713.

174) S. a. *de la Vallée-Poussin*, Cours d'Analyse, Paris et Louvain.

175) *Hermite*, Journ. für Math. 84 (1878), p. 64—69.

176) *Scheibner*, Berichte der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig 9 (1857), p. 190—198.

177) *Schlömilch*, Zeitschr. Math. Phys. 1 (1856), p. 193—211.

ausgehen, *Markoff*¹⁷⁸⁾ u. a. erhält man einen ganz ähnlichen Ausdruck auch für eine beliebige Anzahl von Intervallen, falls nur für sämtliche Intervalle die obige Vorzeichenregel gilt. Ändert f^{2m} in dem Gebiete sein Zeichen nicht, so kann man den Mittelwertsatz auch so verwenden, daß man setzt

$$(139) \quad R_{2m} = -C_m(\nu') \omega^{2m} (f^{2m-1}(\beta) - f^{2m-1}(\alpha)) \quad 0 < \nu' < 1,$$

woraus nach *Charlier*¹⁷⁹⁾ folgt

$$(140) \quad |R_{2m}| \leq \omega^{2m} 2 \frac{B_m}{(2m)!} (f^{2m-1}(\beta) - f^{2m-1}(\alpha)),$$

d. h. also der Fehler ist kleiner als der doppelte Wert des ersten vernachlässigten Gliedes. Da die Reihen oft divergent sind, hat man so also ein Mittel, die Berechnung an der richtigen Stelle abzubrechen. *Scheibner*¹⁷⁶⁾ erhält durch partielle Integration einen ähnlichen Ausdruck, in dem aber $f^{2m+2}(\xi)$ anstatt der Differenz auftritt. Zwei andere Formen des Restgliedes finden sich bei *Kronecker*.¹⁸⁰⁾ Ist $\sum f^{2m}(\alpha + r\omega - \nu\omega)$ im ganzen Gebiet steigend oder fallend, so wird

$$(141) \quad R_{2m} = -\omega^{2m+1} C'_{m+1}(\nu_0) (f^{2m}(\beta) - f^{2m}(\alpha)),$$

wo

$$C'_m(\nu_0) = (-1)^{m-1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 \sin 2k\nu_0\pi}{(2k\pi)^{2m-1}}$$

und $0 \leq \nu_0 \leq 1$ ist.

Falls f^{2m} von 0 bis ν wächst und von ν bis 1 fällt oder umgekehrt, so wird

$$(142) \quad R_{2m} = -(-1)^m \frac{2(1-2^{-2m})}{(2m)!} B_m \omega^{2m} \left| \sum_1^n f^{2m-1}(\alpha + r\omega - \nu\omega) \right|_{\nu'}^{\nu''},$$

wo $0 \leq \nu' \leq \frac{1}{2} \leq \nu'' \leq 1$ ist. Ein ähnlicher Ausdruck findet sich bei *Sonine*¹⁸¹⁾.

Für die Reihe (133) gibt *Ostrogradsky*¹⁸²⁾ als Rest

$$(143) \quad R_{2m} = -\left(\frac{\omega}{2}\right)^{2m+1} \int_0^1 X_{m-1} dz \sum_1^n \left[f^{2m}\left(\alpha + r\omega - \frac{\omega z}{2}\right) + f^{2m}\left(\alpha + (r-1)\omega + \frac{\omega z}{2}\right) \right],$$

178) *Markoff*, Differenzenrechnung, Petersburg 1891, deutsch Leipzig 1896, Kap. IX und X.

179) *Charlier*, Mechanik des Himmels 2, Leipzig 1907, p. 3–86.

180) *Kronecker*, Vorlesungen über Mathematik 1, bearbeitet von *Netto*, Leipzig 1894, p. 130–144.

181) *Sonine*, Paris C. R. 108 (1889), p. 725–727. Ann. de l'Éc. Norm. (3) 6 (1889), p. 257–62.

wo

$$X_m = \frac{D_m z^2}{2!} + \frac{D_{m-1} z^4}{4!} + \dots + \frac{D_1 z^{2m}}{(2m)!} - \frac{z^{2m+1}}{(2m+2)!}$$

und die D sich bestimmen aus

$$D_1 - \frac{1}{3!} = 0, \quad D_2 + \frac{D_1}{3!} - \frac{1}{5!} = 0 \dots$$

Falls f^{2m} sein Vorzeichen nicht ändert, folgert er daraus

$$R_{2m} = D_m(\beta - \alpha) \left(\frac{\omega}{2}\right)^{2m} f^{2m}(\xi),$$

wo ξ ein Wert zwischen α und β ist.

Für komplexe Werte untersucht *Darboux*¹⁸³⁾ von einer allgemeineren Reihe ausgehend die Eulersche Reihe und findet als Restglied

$$(144) \quad R_{2m} = (-1)^m \frac{\lambda B_m \omega^{2m+1}}{(2m)!} f^{2m}(x + \theta \omega),$$

wo λ eine Größe ist, deren Modul kleiner ist als eins. Er findet als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Konvergenz, daß

$$\int_{-\frac{\omega}{2}}^{+\frac{\omega}{2}} f(x) dx$$

in eine Potenzreihe entwickelt, für alle ω konvergiert. Die Differentialquotienten sind oft unbequem oder überhaupt nicht zu berechnen; *Corey*¹⁸⁴⁾ umgeht dieselben so, daß er das Intervall zuerst in 1, dann in 2 usw. gleiche Teile teilt, für jede Teilung die Eulersche Formel aufstellt und aus diesen die ersten Differentialquotienten eliminiert.

Eine Übertragung der Eulerschen Formel auf mehrfache Integrale findet sich z. B. bei *Bellavitis*¹⁸⁵⁾.

10. Formeln der Differenzenrechnung (vgl. auch I D 3 (*J. Bauschinger*) Interpolation, Nr. 8 und I E (*D. Selivanoff*) Differenzenrechnung, Nr. 7). Führt man in die Eulersche Formel statt der Differentialquotienten die entsprechenden Differenzen ein, so erhält man eine Formel, die wohl zuerst *Lagrange*¹⁸⁶⁾, später in bequemerer Form

182) *Ostrogradsky*, Mém. de l'Acad. des sciences de St. Pétersbourg 1841, p. 309—336.

183) *Darboux*, Journ. de math. (3) 2 (1876), p. 291—312.

184) *Corey*, The American math. Monthly 13 (1906).

185) *Bellavitis*, Ann. Soc. Lomb. Veneto 4 (1834), p. 10—19; *Memorie dell' I. R. Istituto Veneto di scienze lettere et arti* 6 (1856), p. 91—110.

186) *Lagrange*, Mémoire de l'Acad. de Berlin 1772.

z. B. *Laplace*¹⁸⁷⁾ gibt.

$$(145) \quad \frac{1}{\omega} \int_0^n y dx = M - \frac{1}{12} (\Delta y_n - \Delta y_0) + \frac{1}{24} (\Delta^2 y_n + \Delta^2 y_0) \\ - \frac{19}{720} (\Delta^3 y_n - \Delta^3 y_0) + \frac{3}{160} (\Delta^4 y_n + \Delta^4 y_0) \dots,$$

oder wenn man nur Differenzenwerte benutzen will, die sich aus den Funktionswerten y_1, y_2, \dots, y_n bilden lassen,

$$(146) \quad = M - \frac{1}{12} (\Delta y_{n-1} - \Delta y_0) - \frac{1}{24} (\Delta^2 y_{n-2} + \Delta y_0) \\ - \frac{19}{720} (\Delta^3 y_{n-3} - \Delta^3 y_0) - \frac{3}{160} (\Delta^4 y_{n-4} + \Delta^4 y_0) \dots$$

Ableitungen der einen oder der andern Reihe finden sich z. B. bei *Lacroix*¹⁵⁸⁾, *Pontécoulant*¹⁸⁸⁾, *Grunert*¹⁸⁹⁾, *Dienger*¹⁹⁰⁾ u. a. Ebenso läßt sich die zweite Formel übertragen

$$(147) \quad \frac{1}{\omega} \int_{-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} y dx = N + \frac{1}{24} (\Delta y_{n-1} - \Delta y_0) - \frac{1}{24} (\Delta^2 y_{n-2} + \Delta^2 y_0) \\ + \frac{223}{5670} (\Delta^3 y_{n-3} - \Delta^3 y_0) - \frac{103}{2880} (\Delta^4 y_{n-4} + \Delta^4 y_0) \dots$$

Die Koeffizienten der beiden Formeln gibt z. B. *Clausen*¹⁹¹⁾ bis zum zwölften.

Diese Formeln benutzen Differenzen, die in dem Differenzenschema in einer Diagonale liegen. Oft werden auch Formeln benutzt, die in einer Zeile liegende Differenzen verwenden. Für Hauptwerte gilt so, wenn man die *Brunssche*¹¹²⁾ Bezeichnung benutzt

$$(148) \quad \frac{1}{\omega} \int_{a+\frac{1}{2}\omega}^{a+(s+\frac{1}{2})\omega} y dx = \left[a + s + \frac{1}{2}, -1 \right] - \left[a - \frac{1}{2}, -1 \right] \\ + \frac{1}{24} \left\{ \left[a + s + \frac{1}{2}, +1 \right] - \left[a - \frac{1}{2}, +1 \right] \right\} \\ - \frac{17}{5760} \left\{ \left[a + s + \frac{1}{2}, +3 \right] - \left[a - \frac{1}{2}, +3 \right] \right\} \dots \\ + A_{2m-2} \left\{ \left[a + s + \frac{1}{2}, 2m-3 \right] - \left[a - \frac{1}{2}, 2m-3 \right] \right\} + R_m,$$

187) *Laplace*, Mécanique céleste 4 (1805), Buch IV, Nr. 5.

188) *Pontécoulant*, Théorie analytique du système du monde 2, Paris 1834, p. 105.

189) *Grunert*, Arch. Math. Phys. 20 (1853), p. 361—418.

190) *Dienger*, Differential- und Integralrechnung, Stuttgart 1857—62, Bd. 1, § 65, der 3. Aufl. 1868.

191) *Clausen*, Journ. für Math. 6 (1830), p. 287—289.

und für Zwischenwerte

$$(149) \frac{1}{\omega} \int_a^{a+s\omega} y dx = [a+s, -1] - [a, -1] - \frac{1}{12} \{ [a+s, +1] - [a, +1] \} \\ + \frac{11}{720} \{ [a+s, 3] - [a, 3] \} \dots \\ + B_{2m-2} \{ [a+s, 2m-3] - [a, 2m-3] \} + R_m.$$

Das Restglied gibt *Nielsen*¹⁹²⁾ in der Form

$$B_{2m} \omega^{2m} \sum_0^{s-1} f^{2m} (a + r\omega + \frac{1}{2}\omega \pm \vartheta_r (m - \frac{1}{2})\omega),$$

wo $0 \leq \vartheta_r \leq 1$ ist. Im übrigen sei auf Abschnitt 9 verwiesen. *Quarra*³⁹⁾ zeigte neuerdings, wie sich mittels der von *Peano*¹⁸⁾ gegebenen Form des Restgliedes auch für diese Formeln der Fehler abschätzen läßt.

Es sind noch eine ganze Reihe derartiger Formeln im Gebrauch, die man am einfachsten erhält, wenn man von einer Interpolationsformel, etwa der von *Newton*, *Gauß*, *Bessel*, *Stirling* usw., ausgeht und integriert. Ableitungen finden sich z. B. bei *Encke*¹⁹³⁾, der die Formeln bei *Gauß*¹⁹⁴⁾ kennen gelernt und mit dessen Erlaubnis veröffentlicht hat, *Airy*¹⁹⁵⁾, *Terquem* und *Laffon*¹⁹⁶⁾, *Oppholzer*¹⁹⁷⁾, *Hansen*¹⁹⁸⁾, *Charlier*¹⁷⁹⁾, *Nielsen*¹⁹²⁾, *Tisserand*¹⁹⁹⁾, *Watson*²⁰⁰⁾, *Radau*²⁰¹⁾, *Valentiner*²⁰²⁾, *Thiele*²⁰³⁾ u. a. Die Koeffizienten sind in fast allen Tafelsammlungen für Astronomie und Geodäsie gegeben, z. B. bei *Bauschinger*²⁰⁴⁾, *Oppolzer*¹⁹⁷⁾.

Diese Formeln verwenden Differenzen an den Enden des Inte-

192) *Nielsen*, Arkiv för Matematik, Astr. und Fys. 4 (21), Stockholm 1908.

193) *Encke*, Berliner astronomisches Jahrbuch 1837 und 1862 abgedruckt. Gesammelte Abhandlungen 1, p. 21–60 u. 61–99, Berlin 1888; Astronomische Nachrichten 1852, Nr. 791, 792, 814.

194) *Gauß*, Brief an Encke vom 13./10. 1834, Gesammelte Werke 7, p. 433.

195) *Airy*, Nautical almanac 1856, Anhang.

196) *Terquem* u. *Laffon*, Nouvelle méthode pour calculer les perturbations des planètes par *M. Encke*, Nancy 1858.

197) *Oppholzer*, Lehrbuch zur Bahnbestimmung der Kometen und Planeten 2, Leipzig 1880.

198) *Hansen*, Abhandlung der mathematisch-physikalischen Klasse der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 7 (1864).

199) *Tisserand*, Traité de mécanique céleste 1–4, Paris 1889–1896.

200) *Watson*, Theoretical astronomy, Philadelphia 1885, p. 435–93.

201) *Radau*, Études sur les formules d'interpolation, Paris 1891, Teil IV,

202) *Valentiner*, Handwörterbuch der Astronomie 1–3, Breslau 1897–99.

203) *Thiele*, Interpolationsrechnung, Leipzig 1909, § 10, 11.

204) *Bauschinger*, Tafeln zur theoretischen Astronomie.

grationsintervalles. *Shovelton*²⁰⁵⁾ gibt eine Formel, die Differenzen in der Mitte verwendet.

$$(150) \int_{-m\omega}^{+m\omega} y dx = 2\omega(m[a, 0]) + \frac{[a, 2]}{2!} \frac{m^3}{3} + \frac{[a, 4]}{4!} \left(\frac{m^5}{5} - \frac{m^3}{3}\right) \\ + \frac{[a, 6]}{6!} \left(\frac{m^7}{7} - 5 \frac{m^5}{5} + 4 \frac{m^3}{3}\right) \dots + \frac{[a, 2m]}{(2m)!} \int_0^{m\omega} x^2(x^2 - \omega^2) \dots \\ \dots (x^2 - (m-1)^2\omega^2) dx + \frac{1}{2} \int_{-m\omega}^{+m\omega} \frac{x^2(x^2 - \omega^2) \dots (x^2 - m^2\omega^2)}{(2m+1)!} f^{2m+1}\left(\frac{x}{\omega}\right) dx.$$

Diese Entwicklungen lassen sich ohne weiteres auf mehrfache Integrale übertragen, und man erhält so für die Anfangsglieder des Doppelintegrals bei Benutzung von in einer Zeile liegenden Hauptwerten

$$\int \int_{\omega}^{a+\iota\omega} f(x) dx^2 = \omega^2 \left[(a + \iota, -2) + \frac{1}{12} (a + \iota, 0) \right. \\ \left. - \frac{1}{240} (a + \iota, +2) + \frac{31}{60480} (a + \iota, +4) \dots \right] + C$$

und bei Benutzung von Zwischenwerten

$$\int \int_{\omega}^{a+(\iota+\frac{1}{2})\omega} f(x) dx^2 = \omega^2 \left[\left(a + \iota + \frac{1}{2}, -2\right) - \frac{1}{24} \left(a + \iota + \frac{1}{2}, 0\right) \right. \\ \left. + \frac{17}{1920} \left(a + \iota + \frac{1}{2}, +2\right) - \frac{367}{193536} \left(a + \iota + \frac{1}{2}, +4\right) \dots \right] + C.$$

Ähnlich findet man für dreifache Integrale bei Benutzung von Hauptwerten

$$\int \int \int_{\omega}^{a+(\iota+\frac{1}{2})\omega} f(x) dx^3 = \left[\left(a + \iota + \frac{1}{2}, -3\right) + \frac{1}{8} \left(a + \iota + \frac{1}{2}, -1\right) \right. \\ \left. - \frac{7}{1920} \left(a + \iota + \frac{1}{2}, +1\right) + \frac{457}{967680} \left(a + \iota + \frac{1}{2}, +3\right) \dots \right] + C,$$

und von Zwischenwerten

$$\int \int \int_{\omega}^{a+\iota\omega} f(x) dx^3 = \omega^3 \left[(a + \iota, -3) + 0 + \frac{1}{240} (a + \iota, +1) \right. \\ \left. - \frac{31}{30240} (a + \iota, +3) \dots \right] + C.$$

Für vierfache Integrale finden sich die Formeln z. B. bei *Bellavitis*¹⁸⁵⁾. Zur Feststellung der Koeffizienten dieser Reihen finden sich rekurrente Beziehungen bei *Baillaud*²⁰⁶⁾, die die von *Oppholzer*¹⁹⁷⁾ und

205) *Shovelton*, The Messenger of math. 38 (1908—09), p. 49—57.

206) *Baillaud*, Paris C. R. 124 (1897), p. 737—39.

*Gruey*²⁰⁷⁾ gegebenen umfassen. Die Konstante wird im allgemeinen so bestimmt, daß die Integrale an irgendeiner vorgeschriebenen Stelle null werden, was man nach *Bruns* dadurch erreicht, daß man in der Summenreihe „das Anfangsglied gleich der umgekehrten Verbesserung“ macht, die man an dem Summenglied anbringen muß, um das Integral zu erhalten. *Strömgreen*²⁰⁸⁾ zeigt, wie die Konstanten zu bestimmen sind, wenn die aufeinanderfolgenden Integrale an dieser Stelle nicht null werden, sondern einen bestimmten endlichen Wert haben sollen.

11. Annäherung durch mehrere Parabeln (vgl. auch I E Nr. 7). Den ersten bewußten Versuch, die Genauigkeit durch Unterteilung des Intervalles zu vermehren, macht wohl *Simpson*²⁰⁹⁾. *Radau*¹⁾, *Bugajew*²¹⁰⁾ u. a. zeigen, daß bei Einteilung in n gleiche Teile und bei Annäherung vom Genauigkeitsgrade $p - 1$ durch voneinander unabhängige Parabeln gleicher Ordnung in den n Teilen Intervallen

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_1^{n-1} \int_{\frac{r}{n}}^{\frac{r+1}{n}} f(x_r) dx = \frac{1}{n} \sum_0^{n-1} \sum_x A_x f\left(\frac{1+x_x}{n}\right) + \frac{c_p \delta_p}{n^p}$$

$$\frac{c_{p+1}}{n^{p+1}} \left(\delta_{p+1} + (p+1) \frac{n-1}{n} \delta_p \right) \dots$$

wird, der Fehler also auf den n^{ten} Teil herabgedrückt wird. Daß vom Standpunkt der Theorie der kleinsten Quadrate aus die Teilung in gleiche Teile die günstigste ist, zeigt *Biermann*²¹¹⁾.

Über die auf diese Weise aufgestellten zahlreichen Formeln findet sich eine Übersicht bei *Mansion*²¹¹⁾. Zur Fehlerabschätzung kann man entweder die *Eulersche* Formel oder die *Taylorische* Reihe benutzen. Im folgenden sind für die bekannteren Formeln die Korrektionsglieder in beiden Formen angegeben, und außerdem steht hinter jeder Formel die Zahl der benutzten Ordinaten, um besser den Wert der Formel übersehen zu können.²¹²⁾

207) *Gruey*, Ann. de l'Éc. norm. 5 (1868), p. 161—227.

208) *Strömgreen*, Oversight af Kgl. Vetenskap-Academiens Förhandlingar. Stockholm Nr. 4 (1900), p. 443—54.

209) *Simpson*, Mathematical dissertations of a variety of physical and analytical subjects, London 1743, p. 109—119.

210) *Bugajew*, Nachrichten der physik.-math. Gesellschaft an der Kaiserl. Universität zu Kasan (2) 7 (1897), p. 95—117.

211) *Mansion*, Supplement zu Mathesis 1 (1881), (62 Seiten) und Ann. de la soc. sc. de Bruxelles 5 (1881), p. 231—290.

212) Für schnelle und genaue Messung der erforderlichen Ordinaten bei

1. Die gebräuchlichste Formel — und nach *Kronecker*¹⁸⁰⁾ ist diese sehr alte Methode trotz aller späteren Untersuchungen noch immer die bequemste — ist die Trapezformel, auch französische Regel, da sie besonders von den französischen Schiffsbauern gern angewandt wird²¹³⁾ oder Regel von *Borda* oder *Bezout* genannt²¹⁴⁾. Sie nähert in den einzelnen Teilintervallen durch Parabeln erster Ordnung (Gerade) an, die durch die Endpunkte der gegebenen Teilordinaten gehen.

$$(151) \quad I_1 = \frac{2H}{n} \left[\sum_0^p y_{2m} - \frac{y_0 + y_n}{2} \right] \quad \left(\frac{n}{2} + 1 \text{ Ordinaten} \right),$$

wo die Länge des ganzen Intervalles mit H bezeichnet ist; man liest aus der Formel (132) sofort das Korrektionsglied ab.

$$K_1 = \alpha_2 \left(\frac{2H}{n} \right)^2 (y_n' - y_0') + \alpha_4 \left(\frac{2H}{n} \right)^4 (y_n''' - y_0''') + \alpha_6 \left(\frac{2H}{n} \right)^6 (y_n^V - y_0^V) \dots$$

$$\alpha_2 = -\frac{1}{12}, \quad \alpha_4 = \frac{1}{720}, \quad \alpha_6 = -\frac{1}{30240}.$$

Nach der *Taylor*schen Reihe erhält man

$$K_1 = -\frac{n}{3} \left(\frac{H}{n} \right)^3 y_0'' - \frac{n^2}{6} \left(\frac{H}{n} \right)^4 y_0''' - \left(\frac{n^3}{18} - \frac{n}{45} \right) \left(\frac{H}{n} \right)^5 y_0^{IV} - \left(\frac{n^4}{72} - \frac{n^2}{90} \right) \left(\frac{H}{n} \right)^6 y_0^V \dots$$

2. Eine andere etwas genauere Methode, die ebenfalls in den einzelnen Intervallen die Bogen durch eine Gerade, nämlich durch die Tangente im Endpunkte der Mittelordinate ersetzt, rührt von *Mac Laurin*²¹⁵⁾ her

$$(152) \quad I_2 = \frac{2H}{n} \sum_1^p y_{2m-1} \quad \left(\frac{n}{2} \text{ Ordinaten} \right).$$

Das Korrektionsglied liest man aus (133) ab.

$$K_2 = -\frac{1}{2} \alpha_2 \left(\frac{2H}{n} \right)^2 (y_n' - y_0') - \frac{7}{8} \alpha_4 \left(\frac{2H}{n} \right)^4 (y_n''' - y_0''') - \frac{31}{32} \alpha_6 \left(\frac{2H}{n} \right)^6 (y_n^V - y_0^V) \dots$$

graphisch gegebenen Kurven sind mehrfach Methoden angegeben, so z. B. von *Gramberg*, Technische Messungen insbesondere bei Maschinenuntersuchungen, Berlin 1905, p. 31, der eine parallel linierte Platte, oder von *v. Sanden*, Praktische Analysis, Leipzig 1914, p. 83, der ein Meßrädchen benutzt.

213) Z. B. *Bougner*, *Traité du Navire* . . ., Paris. 1746, p. 212.

214) *Johow*, *Hifsbuch für den Schiffsbau*, Berlin 1902, p. 312.

215) *Mac-Laurin*, *Treatise of fluxions* 2, Kap. IV, 632, Edingbourg 1742; vgl. auch *Cantor*, *Vorlesungen über Geschichte der Mathematik* IV, Leipzig 1908, p. 735.

Nach der *Taylor*schen Reihe wird

$$K_2 = \frac{n}{6} \left(\frac{H}{n}\right)^3 y_0'' + \frac{n^2}{12} \left(\frac{H}{n}\right)^4 y_0''' + \left(\frac{n^3}{36} - \frac{7n}{360}\right) \left(\frac{H}{n}\right)^5 y_0^{IV} + \left(\frac{n^4}{144} - \frac{7n^2}{720}\right) \left(\frac{H}{n}\right)^6 y_0^V \dots$$

Zahlreich sind die Versuche, diese beiden Formeln dadurch zu verbessern, daß man die Ordinaten an den Enden des Intervalles H besonders berücksichtigt. Einige bekanntere seien hier mit den Korrektionsglied nach *Taylor* gegeben.




Fig. 4.

benen Polygon mit dem Inhalte M (in Fig. 4 ausgezogen) und einem eingeschriebenen mit dem Inhalte m (gestrichelt)²¹⁷⁾

$$(153) \quad I_3 = \frac{M+m}{2} = \frac{2H}{n} \left[\sum_1^p y_{2m-1} + \frac{y_0 + y_n}{8} - \frac{y_1 + y_{n-1}}{8} \right] \left(\frac{n}{2} + 2 \text{ Ordinaten} \right).$$

Daraus ergibt sich, daß der Fehler kleiner als $\left| \frac{M-m}{2} \right|$ ist, wenn die Krümmung ihr Vorzeichen nicht ändert. Nach *Taylor* ist das Korrektionsglied

$$K_3 = - \left(\frac{n}{12} - \frac{1}{4} \right) \left(\frac{H}{n}\right)^3 y_0'' - \left(\frac{n^2}{24} - \frac{n}{8} \right) \left(\frac{H}{n}\right)^4 y_0''' - \left(\frac{n^3}{72} - \frac{n^2}{16} + \frac{11n}{180} - \frac{1}{48} \right) \left(\frac{H}{n}\right)^5 y_0^{IV} \dots$$

Diese Formel findet man vielfach; sie wird z. B. im *Dictionaire math. appl.* als besonders gut bezeichnet²¹⁸⁾.

4. Eine Verbesserung dieser Formel geben fast gleichzeitig *Piobert*²¹⁹⁾, der von der Annäherung der Kurvenstücke durch zwei

216) Die Formel wurde von *Poncelet* in Vorlesung gegeben, später von *Kretz* aufgenommen in die *Introduction à la mécanique industrielle*, 2. Aufl., Metz 1839, 3. Ausg. Paris 1870, p. 197—201.

217) *Sonnet*, *Traité élémentaire de mécanique*, Paris 1851.

218) *Sonnet*, *Dictionaire des mathématiques appliquées*, Paris 1864. Artikel *Quadrature*.

219) *Piobert*, *Nouv. Ann.* 13 (1854), p. 323—331.

Kreisbogen, und *Parmentier*²²⁰⁾, der zunächst mehr gefühlmäßig später²²¹⁾ auf Grund der Darstellung durch Parabelbogen auf diese Formel kommt.

$$(154) \quad I_4 = \frac{2M+m}{3} = \frac{2H}{n} \left[\sum_1^p y_{2m-1} + \frac{y_0 + y_n}{12} - \frac{y_1 + y_{n-1}}{12} \right]$$

($\frac{n}{2} + 2$ Ordinaten).

Der Fehler ist, falls der zweite Differentialquotient sein Vorzeichen nicht ändert, absolut genommen hier kleiner als $\frac{2}{3}(M-m)$. Da in der Ponceletschen Formel die obere Fehlergrenze kleiner ist als in der Formel von Piobert-Parmentier, gibt man gelegentlich der ersteren den Vorzug.²¹⁶⁾ Daß letztere im allgemeinen besser annähert, zeigt das Korrektionsglied, wie es z. B. *Chevilliet*²²²⁾ gibt.

$$K_4 = \frac{1}{6} \left(\frac{H}{n}\right)^3 y_0'' + \frac{n}{12} \left(\frac{H}{n}\right)^4 y_0''' + \left(\frac{n^2}{24} - \frac{17n}{360} + \frac{1}{72}\right) \left(\frac{H}{n}\right)^5 y_0^{IV} \dots$$

Die Formel, die auf Grund falscher Voraussetzung gelegentlich angegriffen wurde²²³⁾, findet sich vielfach z. B. bei *Jorini*²²⁴⁾, *Harnack*²²⁵⁾, *Francke*²²⁶⁾, *Martineng*²²⁷⁾ usw.

5. Zwei weitere Korrektionsglieder bringt *Dupain*²²⁸⁾, der von der *Taylor*schen Reihe ausgeht, zum Verschwinden

$$(155) \quad I_5 = \frac{2H}{n} \left[\sum_1^p y_{2m-1} + \frac{n}{n-1} \left(\frac{y_0 + y_n}{12} - \frac{y_1 + y_{n+1}}{12} \right) \right]$$

($\frac{n}{2} + 2$ Ordinaten)

$$K_5 = + \left(\frac{n^2}{72} - \frac{n}{30}\right) \left(\frac{H}{n}\right)^5 y_0^{IV} + \left(\frac{n^3}{144} - \frac{n^2}{60}\right) \left(\frac{H}{n}\right)^6 y_0^V \dots$$

220) *Parmentier*, Mémoires de l'officier du génie 1854, p. 290 ff.; Nouv. Ann. 14 (1855), p. 370—84.

221) *Parmentier*, Nouv. Ann. (2) 15 (1876), p. 241—251; Ann. des ponts et chaussées 11 (1876), p. 631—32.

222) *Chevilliet*, Paris C. R. 80 (1875), p. 823—26.

223) Nouv. Ann. 16 (1857), p. 11—12. Antwort v. *Parmentier* auf den folgenden Seiten.

224) *Jorini*, Il Politecnico 41 (1893), p. 432—36.

225) *Harnack*, Civilingenieur 28 (1882), p. 257—70. (Bericht über die Arbeit von *Mansion*.)

226) *Francke*, Zeitschr. des Architekten- und Ingenieurvereins zu Hannover 21 (1875), p. 177—184. Hier findet sich auch eine Formel von etwa gleicher Genauigkeit, die zwei Ordinaten außerhalb des Integrationsintervalles benutzt.

227) *Martineng*, Aide mémoire du constructeur des navires, Paris 1891, p. 62.

228) *Dupain*, Nouv. ann. 17 (1858), p. 288—95.

6. Später gibt *Parmentier*²²⁹⁾ eine Formel, die ungefähr dieselbe Genauigkeit hat²¹¹⁾,

$$(156) I_6 = \frac{2H}{n} \left[\sum_1^p y_{2m-1} + \frac{1}{8}(y_0 + y_n) - \frac{1}{6}(y_1 + y_{n-1}) + \frac{1}{24}(y_2 + y_{n-2}) \right]$$

($\frac{n}{2} + 4$ Ordinaten)

$$K_6 = \left(\frac{13n}{360} - \frac{1}{12} \right) y_0^{IV} \left(\frac{H}{n} \right)^5 + \left(\frac{13n^2}{720} - \frac{n}{24} \right) y_0^V \left(\frac{H}{n} \right)^6 \dots$$

7. Eine ähnliche Formel findet sich bei *Francke* allerdings ohne Restglied.²²⁶⁾

$$(157) I_7 = \frac{2H}{n} \left[\sum_1^p y_{2m-1} + \frac{1}{9}(y_0 + y_n) - \frac{1}{8}(y_1 + y_{n-1}) + \frac{1}{72}(y_3 + y_{n-3}) \right]$$

($\frac{n}{2} + 2$ Ordinaten)

$$K_7 = \left(\frac{23n}{360} - \frac{1}{6} \right) y_0^{IV} \left(\frac{H}{n} \right)^5 + \left(\frac{23n^2}{720} - \frac{n}{12} \right) y_0^V \left(\frac{H}{n} \right)^6 \dots$$

8. Während die bisher angeführten Formeln von der *Mac-Laurinschen* Formel ausgehen, also in der Hauptsache nur Ordinaten mit ungeradem Index benutzen, sind die nun folgenden Formeln im Anschluß an die Trapezregel aufgestellt. Ähnlich wie die *Ponceletsche* Formel aus der *Mac Laurinschen* abgeleitet ist, kann man aus der Trapezregel die sog. verbesserte Trapezregel herleiten.²¹⁴⁾

$$(158) I_8 = \frac{2H}{n} \left[\sum_0^p y_{2m} - \frac{5}{8}(y_0 + y_n) + \frac{y_2 + y_{n-2}}{8} \right]$$

($\frac{n}{2} + 1$ Ordinaten)

$$K_8 = - \left(\frac{n}{12} + \frac{1}{4} \right) \left(\frac{H}{n} \right)^3 y_0'' - \left(\frac{n^2}{24} + \frac{n}{8} \right) y_0''' \left(\frac{H}{n} \right)^4 \dots$$

9. In Analogie zur Formel 6. hat *Parmentier*²²⁹⁾ an der Trapezregel dieselbe Verbesserung vorgenommen.

$$(159) I_9 = \frac{2H}{n} \left[\sum_0^p y_{2m} - \frac{3}{4}(y_0 + y_n) + \frac{1}{3}(y_1 + y_{n-1}) - \frac{1}{12}(y_2 + y_{n-2}) \right]$$

($\frac{n}{2} + 3$ Ordinaten)

$$K_9 = - \left(\frac{4n}{45} - \frac{1}{6} \right) y_0^{IV} \left(\frac{H}{n} \right)^5 - \left(\frac{2n^2}{45} - \frac{n}{12} \right) y_0^V \left(\frac{H}{n} \right)^6 \dots$$

229) *Parmentier*, Association française pour l'avancement des sciences Session Grenoble 1882.

10. Als Analogie zur *Dupainschen* Formel 5. gibt *Mansion*²³⁰⁾

$$(160) I_{10} = \frac{2H}{n} \left[\sum_0^p y_{2m} - \frac{y_0 + y_n}{2} + \frac{n}{n+1} \left(\frac{y_1 + y_{n-1}}{2} - \frac{y_0 + y_n}{3} - \frac{y_2 + y_{n-2}}{6} \right) \right]$$

($\frac{n}{2} + 3$ Ordinaten)

$$K_{10} = \left(\frac{n^2}{36} - \frac{51n}{180} + \frac{2n}{3(n+1)} \right) \left(\frac{H}{n} \right)^5 y_0^{\text{IV}}$$

$$+ \left(\frac{n^3}{72} - \frac{51n^2}{360} + \frac{n}{3} - \frac{n}{3(n+1)} \right) \left(\frac{H}{n} \right)^6 y_0^{\text{V}} \dots$$

11. Schließlich sind noch Formeln aufgestellt, die das auf den Ordinaten y_2 und y_{n-2} durch die Tangenten in den Endpunkten abgeschnittene Stück Y_2 und Y_{n-2} von der X -Achse aus gerechnet benutzen; so die als *Poissonsche* Regel bezeichnete Formel, die man gewöhnlich in der Form schreibt^{214) 231)}

$$(161) I_{11} = \frac{2H}{n} \left[\sum_0^p y_{2m} - \frac{y_0 + y_n}{2} + \frac{H}{4n} (\text{tg } \alpha_0 - \text{tg } \alpha_n) \right] \left(\frac{n}{2} + 3 \text{ Ordinaten} \right)$$

$$K_{11} = -\frac{n}{6} y_0'' \left(\frac{H}{n} \right)^3 - \frac{n^2}{12} y_0''' \left(\frac{H}{n} \right)^4 \dots$$

12. Eine Verbesserung dieser Formel findet sich bei *Mansion*²³²⁾

$$(162) I_{12} = \frac{2H}{n} \left[\sum_0^p y_{2m} - \frac{7}{12}(y_0 + y_n) + \frac{1}{12}(Y_2 + Y_{n-2}) \right]$$

($\frac{n}{2} + 3$ Ordinaten)

$$K_{12} = \frac{n}{45} y_0^{\text{IV}} \left(\frac{H}{n} \right)^5 + \frac{n^2}{90} y_0^{\text{V}} \left(\frac{H}{n} \right)^6 \dots$$

13. Eine der ältesten und wichtigsten von allen in dieser Nummer angeführten Formeln ist die von *Simpson*²⁰⁹⁾, die in den einzelnen Intervallen durch Parabeln zweiter Ordnung annähert

$$(163) I_{13} = \frac{H}{3n} \left[2 \sum_0^p y_{2m} + 4 \sum_0^p y_{2m-1} - (y_0 + y_n) \right] (n+1 \text{ Ordinaten}).$$

Sie findet sich in zahlreichen Arbeiten besonders bei Schiffsbauern, wie *de Chapmann*²⁴⁵⁾, *Woolley*²⁴⁰⁾, *Rankine*²⁴⁶⁾ usw. dann auch, z. B. bei *Steen*²³⁵⁾, der sie auf Grund einer Exhaustionsmethode, bei *Witt-*

230) *Mansion*, Mathesis 7 (1837), p. 77–84.

231) *Mansion*, Mathesis 1 (1831), p. 17–22, 33–36.

232) *Mansion*, Ann. de la société scientifique de Bruxelles 8B (1834), p. 11–24. Bericht darüber von *Le Paige*, daselbst 8A (1834), p. 51–52.

233) *Steen*, Nouv. ann. (20) 10 (1871), p. 301–304 und *Zeuthen Tidsskr.* (3) 1 (1870), p. 90.

stein²³⁴), der sie durch Betrachtung flacher Kreisbogen ableitet, ferner bei Cousinery²³⁵), Lacroix¹⁵³), Houel¹⁵⁵), Kubiček²³⁶) Peano²³⁷), Kinkelin¹⁵⁸), Jung²³⁸), Shaxby²³⁹) u. a. Gelegentlich wurde über den Wert der Formel gestritten.²⁴⁰) So zeigt Crotti²⁴¹) an einem Beispiel, daß das verschiedene Gewicht der geraden und ungeraden Ordinaten ein Nachteil ist: daran knüpft sich eine Erörterung zwischen Jadanza²⁴²), Crotti²⁴³), Bardelli, Peano²⁴⁴) und Maggi²⁴⁵). In der Tat kann ja auch, wenn die Kurve im Integrationsintervall bald konvex, bald konkav gegen die X-Achse ist, unter Umständen die Trapezregel oder die Mac Laurinsche Formel einen genaueren Wert geben.

Mehrfach wird versucht, die nur für eine gerade Anzahl von Intervallen geltende Formel auf eine ungerade Zahl zu übertragen, so fügt Mansion²¹¹) für das überzählige Intervall zwischen y_{n-1} und y_n hinzu $\frac{1}{12}h (-y_{n-2} + 8y_{n-1} + 5y_n)$, eine Formel, die gelegentlich als Fünf-Acht-Regel bezeichnet wird²⁴⁶). Von y_n ausgehend, fügt er eine analoge Formel für das Intervall y_0 bis y_1 bei und bildet dann das Mittel. Perrodil²⁴⁷) setzt für das überzählige Intervall y_0, y_1 an $h(\frac{1}{2}y_0 + \frac{1}{3}y_1 + \frac{1}{6}Y_1)$, wo Y_1 das von der Tangente im Endpunkte von y_0 auf y_1 abgeschnittene Stück ist, gerechnet von der X-Achse aus.

Das Korrektionsglied nach der Taylorsche Reihe ist

$$K_{13} = -\frac{n}{180} \left(\frac{H}{n}\right)^5 y_0^{IV} - \frac{n^2}{360} \left(\frac{H}{n}\right)^0 y_0^V - \left(\frac{n^3}{1080} - \frac{n}{1512}\right) \left(\frac{H}{n}\right)^7 y_0^{VI} \dots$$

und nach der Eulerschen Formel, wie es z. B. Fontené gibt

$$K_{13} = -\frac{1}{180} \left(\frac{H}{n}\right)^4 (y_n^{III} - y_0^{III}) + \frac{1}{1512} \left(\frac{H}{n}\right)^6 (y_n^V - y_0^V) \dots$$

234) Wittstein, Arch. Math. Phys. 39 (1862), p. 12—18. Genaueres darüber findet sich bei Vahlen, Konstruktionen u. Approximationen, Leipzig 1911, p. 195—96.

235) Cousinery, Le calcul par le trait, Paris 1840, p. 84—86.

236) Kubiček, Programm d. k. k. böhm. Gymn. Budweis 1897 (22 Seiten).

237) Peano, Applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale, p. 206.

238) Jung, Časopis pro pestovani Matematiky a fysiky 35 (1906), p. 23—32.

239) Shaxby, Lond. Roy. Soc. Proc. A. 82 (1909), p. 331—335.

240) Z. B. Fincham, History of Naval Architecture 1851 (Introduction p. 14) und Woolley, Transactions of the Institution of Naval Architects 1 (1860), p. 16, 17.

241) Crotti, Il Politecnico 33 (1885), p. 193—207.

242) Jadanza, Il Politecnico 41 (1893), p. 354—361.

243) Crotti, Il Politecnico 41 (1893), p. 361—362.

244) Jadanza, Bardelli, Peano, Rivista di matematica 3 (1893), p. 15—18.

245) Maggi, Rivista di matematica 3 (1893), p. 60—61.

246) Rankine, Watts, Burnes, Napier, Shipbuilding, theoretical and practical, London 1866, Teil I, Kap. II. Johow, Hilfsbuch für den Schiffsbau, Berlin 1902, p. 311, 312.

247) Perrodil, Annales des ponts et chaussées 1885, p. 122—128.

Gibt man nur das erste Glied dieser Korrektur, wie z. B. *Chevilliet*²⁴⁸) an, so muß man, um ein wirkliches Maß für den Fehler zu haben, hinzufügen, daß das Zeichen von $f^{IV}(x)$ sich in dem Gebiet nicht ändern darf. Des öfters wird darauf hingewiesen, daß das Korrektionsglied erst mit y^{IV} beginnt, so von *Catalan*⁴²), *Petit-Bois*²⁴⁹), *Laquière* und *Fénéon*²⁵⁰), *Dupain*²⁵¹), *Ligowski*²⁵²) u. a. Eine andere Form für das Korrektionsglied gibt *Schlömilch*²⁵³) $\frac{1}{288}h^4 \varrho (f'''(\beta) - f'''(\alpha))$, wo $-4 \leq \varrho \leq +1$, falls f^{IV} sein Zeichen nicht ändert. Nach *Hočevár*²⁵⁴) kann man das durch Addition von cx^4 verhindern, so daß dann das Intervall nicht geteilt zu werden braucht. Die von *Mansion*²¹¹) gegebene Korrektur $\frac{2}{3}\varrho D (-\frac{1}{2} < \varrho < +1)$, wo D die Differenz zwischen um- und eingeschriebenem Polygon ist, hat den Nachteil, daß sie die *Simpsonsche* Regel mit der Trapezmethode usw. auf eine Stufe stellt. *Wiecke*²⁵⁵) fügt als Korrektur für ein Intervall $E = -\frac{4h}{45} \Delta^4 y_0$ hinzu, wo $\Delta^4 y_0$ aus den Werten $f(x_0), f(x_0 + \frac{h}{2})$ usw. zu berechnen ist. Diese Formel fordert also außer den $n+1$ Ordinaten der *Simpsonschen* Regel noch weitere n Ordinaten.

Nach *Hočevár*²⁵⁴) läßt sich das vermeiden, wenn man

$$E = -\frac{h}{90}(2\Delta^4 y_0 + \Delta^4 y_3 \cdots \Delta^4 y_{n-1} + 2\Delta^4 y_{n-4})$$

setzt, was zwar ungenauer ist, wo aber nur die Ordinaten der *Simpsonschen* Regel verwandt werden. Ein ähnliches Korrektionsglied gibt *Dienger*.¹⁹⁰)

In dem Falle, wo die Begrenzungskurve parallel zur Y -Achse wird, versagt natürlich die Regel. Für dies Intervall nähert man nicht durch eine Parabel, sondern nach *Hočevár*²⁵⁴) und *Lodges* durch eine Kurve $y = a + bx^2 + cx^{2+1}$, wo man etwa $\lambda = \frac{1}{2}$ setzt. Ähnlich schlägt *Edwards*²⁵⁶) vor, hier durch $y = a + bx + c\sqrt{x}$ anzunähern. *Petit-Bois*²⁵⁷) will durch eine Hyperbel in dem betreffenden Intervall annähern, deren eine Achse parallel zur y -Achse ist.

Auf Annäherung durch Parabeln zweiter Ordnung beruht auch die von *Lambert*²³) gegebene Formel ($n = 3p$)

248) *Chevilliet*, Paris. C. R. 78 (1874), p. 1841—1843.

249) *Petit-Bois*, Mémoires de la société Royal de Liège (2) 18 (1895).

250) *Laquière et Fénéon*, Nouv. ann. 17 (1858), p. 5—6.

251) *Dupain*, Nouv. ann. 17 (1858), p. 207—208.

252) *Ligowski*, Arch. Math. Phys. 55 (1873), p. 219—221.

253) *Schlömilch*, Kompendium der höheren Analysis 1, § 82, p. 376—381.

254) *Hočevár*, Wiener Ber. 90 (1884), p. 908—922.

255) *Wiecke*, Zeitschr. deutsch. Ingenieure 23 (1879), p. 83—89.

256) *Edwards*, The Messenger of Mathematics (2) 34 (1904), p. 121—126.

257) *Petit-Bois*, Mathesis 5 (1885), p. 5—7, 27—31.

$$I = \frac{3}{4} \frac{H}{n} \left(\sum_0^{p-1} y_{3m} + 3 \sum_0^{p-1} y_{3m+2} \right).$$

Den Fehler gibt z. B. *Buzengeiger*¹⁸⁸⁾ für ein Intervall ($p = 1$) an

$$+ \frac{H^4}{36} \cdot \frac{1}{3!} y_0''' + \frac{7H^5}{135} \cdot \frac{1}{4!} y_0^{IV}.$$

14. *Catalan*²⁵⁸⁾ sucht die *Simpsonsche* Formel dadurch zu verbessern, daß er von den durch die Endpunkte dreier aufeinanderfolgender Ordinaten gehenden Parabeln immer nur die erste Hälfte benützt. Nur bei den letzten beiden Teilen benützt er die ganze Parabel. Führt man das von beiden Seiten aus durch und nimmt das arithmetische Mittel, so erhält man²⁵⁹⁾

$$(164) \left\{ \begin{array}{l} I_{14} = \frac{H}{n} \left[\sum y - \frac{5}{8}(y_0 + y_n) + \frac{1}{6}(y_1 + y_{n-1}) - \frac{1}{24}(y_2 + y_{n-2}) \right] \\ \qquad \qquad \qquad (n + 1 \text{ Ordinaten}). \\ K_{14} = - \left(\frac{19n}{720} - \frac{1}{24} \right) y_0^{IV} \left(\frac{H}{n} \right)^5 - \left(\frac{19n^2}{1440} - \frac{n}{48} \right) \left(\frac{H}{n} \right)^6 y_0^V \dots \end{array} \right.$$

15. Subtrahiert man von dem Zweifachen der *Catalanschen* Formel die *Simpsonsche*, so erhält man eine von *Parmentier*²²⁹⁾ gegebene Formel, bei der das Gewicht der Ordinaten gerade umgekehrt ist wie bei der *Simpsonschen*,

$$(165) \left\{ \begin{array}{l} I_{15} = \frac{H}{3n} \left[4 \sum_0^p y_{2m} + 2 \sum_1^p y_{2m-1} - \frac{11}{4}(y_0 + y_n) \right. \\ \qquad \qquad \qquad \left. + (y_1 + y_{n-1}) - \frac{1}{4}(y_2 + y_{n-2}) \right] \\ \qquad \qquad \qquad (n + 1 \text{ Ordinaten}). \\ K_{15} = - \left(\frac{17n}{360} - \frac{1}{12} \right) y_0^{IV} \left(\frac{H}{n} \right)^5 - \left(\frac{17n^2}{720} - \frac{n}{24} \right) y_0^V \left(\frac{H}{n} \right)^6 \dots \end{array} \right.$$

16. Ähnlichkeit mit der *Catalanschen* Formel hat eine schon von *Mac Laurin*²⁶⁰⁾ mit Korrektionsglied nach *Euler* gegebene Formel¹²²⁾

$$(166) \left\{ \begin{array}{l} I_{16} = \frac{nH}{(n-1)(n+1)} \left[\sum y - \frac{n+1}{n} \frac{y_0 + y_n}{2} \right] \\ \qquad \qquad \qquad (n + 1 \text{ Ordinaten}). \\ K_{16} = - \frac{n^2}{720} \left(\frac{H}{n} \right)^4 (y_n''' - y_0''') + \frac{n^4 + n^2}{30240} \left(\frac{H}{n} \right)^6 (y_n^V - y_0^V) \dots \\ \qquad \qquad \qquad = - \frac{n^3}{720} \left(\frac{H}{n} \right)^5 y_0^{IV} - \frac{n^4}{1440} \left(\frac{H}{n} \right)^6 y_0^V \dots \end{array} \right.$$

258) *Catalan*, Nouv. ann. 10 (1851), p. 412—415.

259) *Lacroix*, Traité des différences et des séries 1800.

260) *Mac-Laurin*, Treatise of fluxions 2, Edinbourg 1742, p. 848.

20. *Sheppard*²⁶³) gibt noch eine große Zahl weiterer Näherungsformeln²⁶⁴), die er aus dem Ausdruck $I = \frac{pA_1 + qA_2 + rA_3}{p+q+r}$ ableitet, wo p, q, r bestimmte Zahlen sind, die so gewählt werden, daß möglichst viele Glieder der *Eulerschen* Formel richtig dargestellt werden, und wo $A_1, A_2, A_3 \dots$ die Trapez- oder *Mac Laurinschen* Formeln für die Intervallbreite $h, 2h, 3h \dots$ sind; ähnlich verfährt *Becker*²⁶⁵). Mit Einführung der *Zentraldifferenzen*²⁶⁶) gibt dann *Buchanan*²⁶⁷) unter Benützung einer Interpolationsformel von *Everett*²⁶⁸) andere Ausdrücke für die Fehlerglieder.

Während die bisher angeführten Formeln äquidistante Ordinaten benützen, hat man²⁸¹) auch wohl die *Gaußsche* Formel, z. B. für $n = 2$, auf mehrere Intervalle übertragen. *Radau*²⁶⁹) überträgt die *Tschebyscheffsche* Formel für 4 Ordinaten auf mehrere Intervallen. Da die Abszissen dieser Formeln sehr wenig von 0,1, 0,4, 0,6, 0,9 verschieden sind, wählt er die Ordinaten für diese Abszissenwerte und setzt die Koeffizienten gleich $\frac{22}{90}$ bzw. $\frac{23}{90}$. Er findet

$$(170) \quad I = \frac{H}{4n} \sum (y_{0,1} + y_{0,4} + y_{0,6} + y_{0,9}) \\ + \frac{H}{180n} \sum (y_{0,4} + y_{0,6} - y_{0,1} - y_{0,9}) - \frac{c_4 H^5}{15000n^4}.$$

Die in dieser Nummer angegebenen Formeln setzen voraus, daß die einzelnen Ordinaten exakt gegeben sind. Ist das nicht der Fall, sondern hat jede einen bestimmten wahrscheinlichen Fehler, so kann eine hier als schlechtere Annäherung erscheinende Formel bessere Resultate liefern, je nachdem der Beobachtungsfehler oder der Rechnungsfehler größeren Einfluß hat.²⁷⁰) Insbesondere werden in diesem Falle die unter 1) und 2) gegebenen Formeln gute Annäherungen geben.

262) *Weddle*, Cambridge and Dublin mathematical Journal 9 (1854), p. 79, 80.

263) *Sheppard*, Proc. of the Lond. math. soc. 32 (1900), p. 258—277.

264) S. a. *Le Brun*, Le génie civil 11 (1887), p. 340 *Lambert* II.²⁵), *Klügel*¹²²), *Buzengeiger*¹³⁸) etc.

265) *Becker*, Philosophical Magazine (6) 22 (1911), p. 342—353. Amer. J. of science 31, p. 117—126.

266) *Sheppard*, Proc. of the Lond. math. soc. 31 (1899), p. 449—488; *Everett*, Quart. Journ. of math. 31 (1900), p. 357—376; *Hansen*, Abhandlungen d. kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 11 (1865), p. 505—533.

267) *Buchanan*, Proc. of Royal Soc. of Lond. 34 (1902), p. 335—345.

268) *Everett*, Journ. of the Institute of Actuaries 35, p. 452.

269) *Radau*, Journ. de math. (3) 6 (1880), § 23.

270) *Darwin*, The Messenger of Math. (2) 6 1877, p. 134—136; Report of the British Association for the Advancement of Science 1876, p. 13.

Schließlich sei noch erwähnt, daß es für die Durchführung von Rechnungen mit obigen Formeln von der größten Wichtigkeit ist, die Rechnung praktisch in Tabellen anzuordnen. Beispiele für eine praktische Anordnung finden sich z. B. bei *Merrifield*²⁷²) und besonders in der schiffsbautechnischen Literatur.²⁷¹⁾

12. Methoden der graphischen Quadratur (vgl. II A 2 (*A. Voss*) Differential- und Integralrechnung, Nr. 61). a) *Allgemeines*. Bei der graphischen Quadratur handelt es sich darum zu einer gegebenen Kurve $y = f(x)$ (sog. Differentialkurve) durch zeichnerische Methoden die Integralkurve

$$Y = \int_a^x f(x) dx^{272)}$$

zu finden. Die Einheiten, in denen Abszisse und Ordinate gemessen sind, werden im allgemeinen unabhängig voneinander gewählt, d. h. bei der Integralkurve ist die Differenz zweier Ordinaten multipliziert mit einer konstanten Strecke, der sog. Integrationsbasis, dem Inhalte des Flächenstückes gleich, das von der Differentialkurve, den korrespondierenden Ordinaten und der Abszissenachse eingeschlossen wird; die Neigung der Tangente der Integralkurve ist daher der korrespondierenden Ordinate der Differentialkurve proportional.

Die Konstruktion der Integralkurve umgeht die sog. Methode von *A. Wiener*²⁷³), die die zu integrierende y -Kurve stückweise durch eine z -Kurve ersetzt, so daß $y \Delta x = z \Delta z$ wird, d. h. die Ordinate der y -Kurve

271) Z. B. Transactions of the Institution of Naval Architects II, p. 163; V, p. 9; VI, p. 51 etc.

272) Der Zusammenhang von Differential- und Integralkurven findet sich eingehend in einem Aufsatz von *Leibniz* in den Acta Erudita 1693. (Wiedergegeben in *Ostwalds* Klassikern Nr. 162, S. 24—34.) Ob aber *Leibniz* die graphische Integration durch kleinste Elemente schon verwandt hat, wie *Massau* meint (*Massau*: Appendice du Mémoire sur l'intégration graphique et ses applications, Paris 1890, Note XI), scheint uns zweifelhaft. Verwendet wurde die Integralkurve von *Rossin* in seinen Vorlesungen an der École d'application du Génie maritime in Paris, wie sie überhaupt im Schiffsbau viel benutzt wird; vgl. auch die Literaturangaben bei *Massau* in der oben zitierten Arbeit, wie auch bei *Bitterli* im Anhang zur deutschen Ausgabe von *Abdank-Abakanowitz*: Die Integrativen. Leipzig 1889. Abgesehen von den im folgenden zitierten Arbeiten, sind von Arbeiten über die Integralkurven noch zu erwähnen:

Louis Straszewicz: La courbe intégrale etc. Thèse présentée à la faculté des sciences de l'université de Genève. Imprimerie Charles Schuchardt Genève 1884. *Terrier*, L'intégration graphique. Anhang zu Kap. XII in der französischen Übersetzung von *Favaro*, Leçons de statique graphique 2, Paris 1885, p. 367.

273) *Oesterreicher*, Zeitschrift deutscher Ingenieure 44 (1900), p. 155—56.

wird Subnormale der z -Kurve. Der Inhalt ist dann gleich dem halben Quadrat der Endordinate vermindert um das halbe Quadrat der Anfangsordinate (Fig. 5). Dabei konstruiert man die transformierte Kurve




Fig. 5.

durch Kreisbogen, wie das Fig. 5 im einzelnen zeigt. Anwendungen der Methode gibt Werner²⁷⁴). Auch Chapel²⁷⁵) umgeht die gewöhnliche Konstruktion der Integralkurve; er konstruiert mit Hilfe einer ausgeschnittenen Kurve $y = \Phi(x)$ eine Kurve, die bestimmt ist durch $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\Phi(f(x))}$.

Stellen die Strecken x, y, z gemessen in den Einheiten a, b, c die Größen X, Y, Z dar, und ist y die Ordinate der Ausgangskurve, z die der Integralkurve,

beide auf dieselben recht- oder schiefwinkligen Koordinaten bezogen, so ist

$$(171) \quad \frac{dZ}{dX} = Y \quad \text{also} \quad \frac{dz}{dx} = \frac{y}{\frac{ab}{c}} = \frac{y}{\lambda},$$

wo λ als „Integrationsbasis“ bezeichnet wird²⁷⁶). Zur graphischen Auffindung der Integralkurve kann die gegebene Kurve durch eine Stufenkurve ersetzt werden, deren einzelne Stücke parallel den Achsen sind, und die bis zu bestimmten Ordinaten denselben Inhalt wie die Ausgangskurve hat. Diese kann dann durch einen Zug aneinanderschließender Geradenstücke integriert werden, deren Neigung und Länge bekannt ist. Die Stufenkurve kann auf zwei Arten bestimmt werden, je nachdem man die Integralkurven durch ein Sehnen- oder ein Tangentenpolygon annähern will.

Im ersten Falle teilt man durch passend gewählte Ordinaten im Abstände $\Delta_n x$ die Differentialkurve in eine Anzahl von Teile und ersetzt jeden Teil durch ein inhaltsgleiches Rechteck, so daß

$$(172) \quad \Delta_n z = \int_{x_{1-n}}^{x_n} \frac{y dx}{\lambda} = \frac{y_m \Delta_n x}{\lambda}$$

274) Werner, Zeitschrift deutscher Ingenieure 21 (1877), p. 365—71.

275) Chapel, Revue d'Artillerie 34 (1889), p. 330—43.

276) Über Maßbestimmungen siehe auch: Rudolf, Zeitschrift für Elektrotechnik und Maschinenbau 1909, p. 154 ff.

ist, wo y_m als „mittlere Ordinate“ bezeichnet wird (Fig. 6). In den Teilpunkten sind die Ordinaten des integrierenden Polygons und der Integralkurve gleich, so daß man ein Sehnepolygon erhält. In diesem Falle sind also die von Ausgangskurven und Stufenkurven eingeschlossenen krummlinigen Dreiecke, die denselben Parallelen zur X-Achse anliegen, gleich zu machen.

Macht man dagegen die derselben Parallelen zur Y-Achse anliegenden Dreiecke gleich, d. h. ersetzt man jedes der Flächenstücke




Fig. 6.




Fig. 7.

durch zwei Parallelogramme, deren eine Seite gleich je einer der Endordinaten des Flächenstückes ist, so daß

$$(173) \quad \Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2 = \frac{y_1 \Delta x_1}{\lambda} + \frac{y_2 \Delta x_2}{\lambda}$$

ist — die Abszisse $x_{n-1} + \Delta x_{n,1} = \bar{x}_n$, wo $\Delta x_{n,1}$ die oben mit Δx_1 bezeichnete Größe im n^{ten} Intervall ist, wird als „mittlere Abszisse“ (Fig. 7) bezeichnet —, so haben in den Teilungsordinaten das Integrationspolygon und die Integralkurve gleiche Ordinaten und gleiche Neigungen, so daß man zur Bestimmung der Integralkurve ein Tangentenpolygon nebst den Berührungspunkten erhält.²⁷⁷⁾ Im allgemeinen ist daher die letzte Methode vorzuziehen. Zur graphischen Durchführung der Konstruktion benutzt man ein Richtlinienbüschel mit dem Träger P . Einzelheiten gehen aus den Figuren 8 (mittlere Ordinaten) und 9 (mittlere Abszissen) hervor. Hat man beliebig verschlungene Kurven zu integrieren, so hat man nur darauf zu achten, daß die Integration im Sinne der Umfahrung auf der Kurve fortschreitet. Der Bequemlichkeit wegen eingeschaltete Kurvenstücke müssen dabei durch entgegengesetztes Darüber-hin-integrieren herausfallen.

²⁷⁷⁾ *Mansion*, *Mathesis* 2 (1882), Anhang p. 6—8; *Listeferme*, *Ann. de la société scientifique de Bruxelles* B 6 (1881—82), p. 242—46.

Die bei der Quadratur auftretende Konstante bestimmt sich dadurch, daß man einen Punkt der Integralkurve gibt. Einer der Teilungsordinaten erteilt man dieselbe Abszisse, die dieser Punkt hat; von




Fig. 8.




Fig. 9.

ihm aus wird dann das Integrationspolygon nach rechts und nach links gezeichnet. Durch Verschiebung der X-Achse kann man das Integral um jede beliebige Konstante, die den der Verschiebung entgegengesetzt gleichen Betrag hat, verändern.

b) *Bestimmung der mittleren Ordinaten und Abszissen.* Um die Ausgangskurve exakter durch eine Stufenkurve ersetzen zu können, kann man die einzelnen Kurvenbogen durch Parabelbogen passender Ordnung ersetzen und für diese die exakten mittleren Abszissen oder Ordinaten konstruieren.

Es kommen da in der Hauptsache die im vorigen Paragraphen angeführten Formeln in Betracht. Aus den dort gegebenen Korrektionsgliedern ist auch der Grad der hier erreichten Genauigkeit zu entnehmen.

1) Überträgt man die Trapezregel, so ist die mittlere Abszisse gleich dem Mittelwert der Endabszissen, die mittlere Ordinate gleich dem Mittelwert der Endordinaten des Teilintervalles. Die recht häufig verwandte Methode findet sich in der einen oder in der anderen Form bei *Massau*²⁷⁸), *Solin*²⁷⁹), *Abdank-Abakanowicz*²⁸⁰), *Nehls*²⁸¹), *Collignon*²⁸²), *Merrifield*²⁸³) etc.

2) *Nehls* überträgt die Methode von *Mac-Laurin*²¹⁵) ins Graphische, eine Methode, die auch *Baldermann*³³¹) verwendet. Dieselbe Methode verwendet *Saviotti*²⁸³) bei der Bestimmung der sog. Integralpunkt-reihen²⁸⁴) zur Ermittlung der mittleren Abszissen.

Eine obere Grenze für den Fehler der so gewonnenen Näherung erhält man, falls die Krümmungsmittelpunkte stets auf derselben Seite der gegebenen Kurve liegen nach *Massau*²⁷⁸) folgendermaßen. In Fig. 10 gibt das Sehnenpolygon $A_1 C_1 E_1 G_1$ einen zu großen, das Tangentenpolygon $A_2 t B_1 C_1 E_1 r G_1$ einen zu kleinen Wert für das Integral.

278) Bericht über *Massaus* Vortrag im Bulletin mensuel de l'Association des ingénieurs sortis de l'École de Gand, décembre 1877, weiter ausgeführt in *J. Massau: Mémoire sur l'Intégration graphique et ses applications.* Buch I u. II erschienen Bruxelles 1878, in Annales de l'Association des Ingenieurs sortis de l'École de Gand, das ganze als Extrait de la Revue universelle des Mines etc. t. XVI 1884, Paris-Liège 1885. Hier kommt in Betracht Kap. III, § 1.

279) *Solin*, Über graphische Integration. Ein Beitrag zur Arithmographie, Abhandlungen der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, 6. Folge, Bd. 5, Prag 1872.

280) *Abdank-Abakanowicz*, Die Integraphen und ihre Anwendung, Original 1886, erweitert deutsch Leipzig 1889.

281) *Nehls*, Über graphische Integration und ihre Anwendung in der graphischen Statik. 1. Aufl., Leipzig 1877. 2. Aufl., Leipzig 1882.

282) *Merrifield*, Philosophical Magazine (4) 35 (1868), p. 420—23.

283) *Saviotti*, Giornale del Genio civile XX, Rom 1882 und Revue universelle des mines etc. (2) XIII, 1883.

284) Die Integralpunkt-reihen *Saviotti's* sind bestimmt durch die Schnittpunkte der Tangenten der Integralkurven mit einer zur Integrationsbasis senkrechten Geraden vgl. *Bitterli*, Anhang I zu *Abdank*²⁸⁰): Integraphen.

Nimmt man als Wert $\frac{gG_1 + g_2G_2}{2}$, so ist $\frac{gg_2 - G_1G_2}{2}$ eine obere Grenze für den Fehler.

3) Ersetzt man den Bogen durch eine Parabel zweiter Ordnung (Annäherung wie bei der *Simpsonschen* Regel) und gehören als




Fig. 10.

Koordinaten der gegebenen Kurve zusammen $x, y_0; x + \frac{\Delta x}{2}, y_1; x + \Delta x, y_2$, so ist

$$(174) \quad y_m = \frac{y_0 + 4y_1 + y_2}{6}.$$

Graphisch konstruiert man den Punkt, indem man die Strecke, die auf der Ordinate in der Mitte des Intervalles von Sehne und Bogen ausgeschnitten wird, in drei Teile teilt; der nach dem Bogen zu gelegene Teilpunkt gibt y_m ²⁷⁸⁾ (Fig. 11). Genau so findet man, wenn man die Abszissen mit den Ordinaten vertauscht, die mittlere Abszisse. Die Achse der approximierenden Parabel liegt dann parallel zur Abszissenachse; von der Mitte aus gerechnet ist nach *Goldziher*²⁹⁵⁾ der Wert der mittleren Abszisse




Fig. 11.

$$(175) \quad X = \frac{1}{3} \frac{(y_2 + y_0 - 2y_1)\Delta x}{y_2 - y_0},$$

eine Formel, die natürlich auch für Parabeln 3. Ordnung richtig ist. Ist es angebrachter, durch eine Parabel mit Achse parallel der Ordinatenachse zu approximieren, so konstruiert man zunächst die mittlere Ordinate, zieht durch ihren Endpunkt eine Parallele zur Sehne des Bogens und durch den Mittelpunkt der Sehne des Bogens eine Parallele zur X-Achse. Der Schnittpunkt beider ist der Endpunkt der mittleren Abszisse²⁸⁵⁾ (Fig. 12).

Diese Methode wird am meisten verwandt, so von *Massau*²⁸⁶), *Solin*²⁸⁷), *Nehls*²⁸¹), *Collignon*²⁸⁸), *Runge*²⁸⁹), *Pickering*²⁹⁰). Um eine Konstruktion zu erhalten, bei der alle Ordinaten in gleicher Weise berücksichtigt werden, schlagen *Merrifield* und *Russel*²⁹¹) vor, jeden Ordinatenendpunkt mit dem übernächsten zu verbinden, das auf der nächsten Ordinate abgeschnittene Stück zwischen Sehne und Kurve in sechs gleiche Teile zu teilen und auf die durch die der Kurve zunächstgelegenen Teilpunkte begrenzten Ordinaten die Trapezregel anzuwenden. Schwierigkeiten entstehen da natürlich bei den Grenzordinaten. *Collignon*²⁸⁸) gibt eine Methode, die mittleren Ordinaten der Teilgebiete sukzessive zusammzusetzen und so die mittlere Ordinate des Gesamtgebietes zu finden. Er verbindet die Endpunkte der mittleren Ordinaten zweier an einander stoßenden Gebiete und trägt die die




Fig. 12.




Fig. 13.

auf dieser Geraden gemessene Strecke vom Endpunkt der einen Ordinate bis zur Trennungslinie vom Endpunkt der andern aus auf der Verbindungslinie ab. Der so gefundene Punkt ist der Endpunkt der mittleren

285) *Lisleferme*, *Annales de la Société scientifique de Bruxelles*, B 6 (1881—82), p. 242—46.

286) *Massau*²⁷⁸), Buch I, Kap. III, § 3; *Bitterli*, Anhang I zu *Abdank*, *Die Integraphen*; *Willers*, *Z. f. Math. u. Phys.* 55, 1907.

287) *Solin*, *Beitrag zur graphischen Integration*. *Sitzungsberichte der Kgl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften*, März 1879.

288) *Collignon*, *Annales des ponts et chaussées* XIII (1887), p. 9—30 und *Bulletin de la société mathématique de France* XV (1886/87), p. 145/46.

289) *Runge*, *Graphical methods. A course of lectures delivered in Columbia University*, New York 1912.

290) *Pickering*, *Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences* (2) II (1875), p. 79—81. Die Kurve dient hier allerdings nur dazu, aus den nicht äquidistanten Ordinaten äquidistante zu gewinnen.

291) *Merrifield*, *Transactions of the Institution of Naval Architects* 6 (1865), p. 51—63; *Russel*, *The modern system of naval architecture*, London p. 117—147.

Ordinate des ganzen Gebietes. Die Methode ist natürlich unabhängig von der Bestimmung der mittleren Ordinate.

4) Ersetzt man durch eine Parabel dritter Ordnung und gehören die Koordinatenpaare (x, y_0) ; $(x + \frac{\Delta x}{3}, y_1)$; $(x + \frac{2\Delta x}{3}, y_2)$; $(x + \Delta x, y_3)$ zusammen, so ist

$$(176) \quad y_m = \frac{y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3}{8}.$$

Zur graphischen Konstruktion verbindet man die Endpunkte von y_0y_3 und y_1y_2 durch Sehnen und teilt die Strecke, welche diese auf der Ordinate in der Mitte abschneiden, in vier gleiche Teile. Der nach dem Bogen zu gelegene Teilpunkt gibt die mittlere Ordinate²⁷⁸). (Fig. 13.)

Durch Vertauschung der Ordinaten und Abszissen findet man wieder die mittlere Abszisse.

5) Approximation der Kurven durch Parabeln höherer Ordnung gibt in dieser Art keine einfachen Konstruktionen.²⁷⁸)

6) Während obige Methoden, die Übertragungen der von *Cotes* angegebenen Formeln ins Graphische sind, die Mindestzahl der Ordinaten benutzen, schlägt *Nehls*²⁸¹) vor zur Erreichung einer größeren Einfachheit der Konstruktion auf Kosten der möglichen Genauigkeit mehr Ordinaten einzuführen. So erhält er z. B. eine Übertragung der sog. *Weddleschen* Formel.²⁶²)

7) *Nehls*²⁸¹) schlägt weiter die Benutzung nicht äquidistanter Ordinaten vor. Insbesondere überträgt er eine der in Abschnitt 5 b besprochenen Formel¹²³) für $n = 4$. Wenn

$$(x, y_0), \quad (x + (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{5}})\Delta x, y_1), \quad (x + (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{5}})\Delta x, y_2), \\ (x + \Delta x, y_3)$$

zusammengehören, und man dann

$$(177) \quad y_m = \frac{y_0 + 5y_1 + 5y_2 + y_3}{12}$$

setzt, so ist der Fehler von siebenter Ordnung; bis auf Glieder höherer Ordnung ist etwa

$$F = -f^{(VII)}(x) \frac{\Delta x^7}{6!} 0,00047619.$$

8) Die Benutzung der Tangenten im Endpunkt²⁹²) ist besonders dann vorteilhaft, wenn es sich um Konstruktion eines zweiten oder höheren Integrals handelt. Hat man eine Parabel zweiter Ordnung, so schneiden sich die Tangenten auf der Ordinate in der Mitte des Intervalles. Die

²⁹²) *Cousinery*, Le calcul par le trait. Paris 1840, p. 66–88

Strecke zwischen diesem Punkt und dem Schnittpunkt der Sehne ist in drei gleiche Teile zu teilen, der nach der Sehne zu liegende Teilpunkt gibt nach bekannten Parabelsätzen die mittlere Ordinate (Fig. 14). Eine ganz ähnliche Konstruktion gibt *Lambert*²⁹³), der den dem Schnittpunkt der Tangenten zu gelegenen Teilpunkt mit *A* und *B* verbindet (Fig. 14) und so die Kurve durch zwei Trapeze ersetzt. Man kann auch benutzen, daß in Fig. 15 $\frac{ab}{3} \cdot aA + \frac{ab}{3} tT + \frac{ab}{3} bB$ gleich dem Inhalt des krummlinigen Trapezes ist.²⁷⁸)




Fig. 14.




Fig. 15.

9) Bei Approximation durch eine Parabel dritter Ordnung halbiert man die Strecke, welche die Tangenten im Endpunkte auf der Ordinate in der Mitte ausschneiden, und verfährt weiter wie oben, indem man diesen Punkt für den Schnittpunkt der Tangenten setzt.²⁷⁶) (Fig. 16.)

10) *Nehls*²⁸¹) gibt noch zwei andere Konstruktionen, die bestimmt sind durch die beiden ersten Glieder der *Euler-MacLaurin*-schen Formel, wie sie in (132) und (133) gegeben ist.

11) Einen Satz, der zu noch genauerer Konstruktion der mittleren Ordinate dienen kann, gibt *Baur*²⁹⁴), allerdings etwas anders, an. Hat man die Tangente in den Endpunkten des Bogens und bezeichnet auf der Ordinate in der Mitte gemessen




Fig. 16.

den Abstand zwischen dem Halbierungspunkt ihrer Schnittpunkte mit dieser Ordinate und dem der Sehne mit *H* und ferner auf derselben

293) *Lambert*, Beiträge zum Gebrauch der Mathematik und der Anwendungen III, Berlin 1772, p. 56—65.

294) *Baur*, Zeitschr. Math. Phys. 12 (1867), p. 355; vgl. dazu *Vahlen*, Konstruktionen und Approximationen, Leipzig 1911, p. 193.

Ordinate gemessen den Abstand Sehne-Bogen mit h , so ist der Inhalt des von Sehne und Bogen begrenzten Flächenstückes bis auf Glieder sechster Ordnung

$$(178) \quad F = \frac{8h + H}{15} \cdot \Delta x.$$

Ähnlich findet *Goldziher*²⁹⁵⁾ für die mittlere Abszisse eines Parabelbogens vierter oder fünfter Ordnung

$$(179) \quad \bar{d} = \frac{\Delta x}{15} \frac{(y_2' - y_0') \frac{\Delta x}{2} + 8(y_0 + y_2 - 2y_1)}{2(y_2 - y_0)},$$

wo \bar{d} von der Mitte aus gerechnet ist.

Eine *graphische Fehlerabschätzung* für eine Reihe der in diesem und im vorigen Paragraphen gegebenen Methoden gibt *Mansion*²⁹⁶⁾. Aus Figur 4 folgt unmittelbar, daß das Flächenstück zwischen einer nach der x -Achse konkaven Kurve und dieser Achse ein Mittel ist zwischen dem Sehnenpolygon für gleiche Sehnenprojektionen und demselben nach Substitution der zweiten und vorletzten Ordinate für die erste und letzte. Also läßt sich der Fehler mittels der beiden Enddreiecke oder des Rechtecks $ABCD$ abschätzen. *Mansion* findet folgende obere Fehlergrenzen für die Formeln von *Poncelet* $< \frac{1}{2} h d$, *Parmentier* $< \frac{2}{3} h d$, *Dupain* $< \frac{2}{3} h d$, *Trapezformel* $< h d$, *Simpson* $< \frac{2}{3} h d$, *Cattalan* $< \frac{3}{4} h d$, *Mansion* $< \frac{4}{3} h d$. Ähnliche Methoden der Fehlerabschätzung sollen sich nach *Merrifields*²⁹⁷⁾ Angaben bei *Woolhouse* und *Leclert* finden.²⁹⁷⁾

c) *Einzeichnung der Integralkurve.* Will man die Integralkurven als Parabelbogen zweiter Ordnung in das Tangentenpolygon einzeichnen, so kann man leicht weitere Tangenten und Berührungspunkte nach dem Satz konstruieren: Eine beliebige Tangente der Parabel teilt die Stücke zweier festen Tangenten zwischen ihrem Scheitelpunkt und den Berührungspunkten in umgekehrtem Verhältnis. Dieses ist ferner gleich demjenigen, in dem der vom Berührungspunkt der dritten Tangente ausgehende Durchmesser die Berührungsehne der festen Tangenten teilt.²⁹⁸⁾ Die Anordnung der Konstruktion

295) *Goldziher*, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 30 (1911/12), p. 49—53.

296) *Mansion*, Paris C. R. 95 (1882), p. 384—86 (Mathesis I).

297) *Woolhouse*, Assurance Magazine 11 (1865), p. 308; *Leclert*, Génie civil 8 (1885), p. 630.

298) Z. B. *Schilling*, Darstellende Geometrie, autographiertes Vorlesungsheft, Danzig 1910. *d'Ocagne*: Génie civil 9, 1886.

zeigt Fig. 17. — Hat die Kurve einen Wendepunkt, so approximiert man durch eine Parabel dritter Ordnung, wo $CD = \frac{AT}{8}$ ist, wenn $BD = DT$ ist (Fig. 18). Für die Konstruktion der Krümmungsradien der Integralkurven gibt *Nehls*²⁸¹) eine etwas umständliche Konstruktion. Eine einfachere




Fig. 17.




Fig. 18.




Fig. 19.

Konstruktion, die zugleich den Krümmungsmittelpunkt gibt, findet sich bei *d'Ocagne*.²⁹⁹) Der Krümmungsradius ist nämlich

$$(180) \quad R = \frac{(1 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}{z''} = \frac{(1 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}{y'} \lambda = \frac{(1 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}{z'} \frac{y}{y'}$$

$$R \cdot \operatorname{tg} \vartheta = \frac{y}{\cos^2 \theta \sin \theta},$$

wo θ der Neigungswinkel der Integralkurve, ϑ der der gegebenen Kurve ist. Die Konstruktion zeigt Fig. 19.

d) *Erweiterungen und Ergänzungen*.³⁰⁰)

α) *Beziehung der Kurven auf beliebige Linien*. Will man die Integralkurven auf andere Achsen beziehen, so macht eine Parallelverschiebung nichts aus; eine Drehung fordert eine gleiche Drehung des Richtlinienbüschels.

Ist die Ausgangskurve auf eine Kurve bezogen, d. h. sind ihre Ordinaten nicht von der X-Achse, sondern von einer beliebig gegebenen Kurve aus abgetragen, so ist die Richtung der integrierenden Tangenten so zu bestimmen, daß man die Punkte der Ausgangskurve auf die Y-Achse, die der Bezugskurve auf eine Parallele zur Y-Achse im Abstände λ überträgt. Die Verbindungsgeraden entsprechender Punkte der Y-Achse und der Parallelen geben die Tangentenrichtungen

299) *d'Ocagne*, Nouv. Ann. de Math. (3) 7 (1888), p. 438—42. Deutsch als Anhang II zu *Abdank*, Die Integraphen.

300) *Massau*²⁷⁸), Buch I, Kap. VI.

der Integralkurve. Die Quadratur durch mittlere Ordinaten ist unmittelbar einleuchtend, die durch mittlere Abszissen zeigt Fig. 20.




Fig. 20.

Soll die Integralkurve auf eine Kurve bezogen werden, so verschiebt sich der Pol wieder auf einer Parallelen zur Y -Achse im Abstände λ , und zwar bestimmt er sich durch die Parallele durch O zur Tangente in dem betreffenden Punkte der Bezugskurve.

β) *Änderung der Integrationsbasis.*³⁰⁰⁾ Die Integrationsbasis ist $\lambda = \frac{ab}{c}$; werden beide Kurven mit demselben Maßstab $b = c$ gemessen, so ist $\lambda = a$. Ist $\lambda = \frac{a}{n}$, so wird die Integralkurve n -fach überhöht. λ findet man durch Rechnung oder Konstruktion der vierten Proportionalen. Für die praktische Durchführung zeichnet man die Integralkurve zunächst probeweise so ein, daß sie den zur Verfügung stehenden Raum ungefähr ausfüllt. Danach bestimmt sich angenähert c . Für die wirkliche Durchführung wählt man für c eine ganze Zahl in der Nähe des so bestimmten Wertes. Multiplikation des Integrals mit einer Konstanten k macht sich in entgegengesetzter Änderung des Maßstabes $c' = \frac{c}{k}$ oder der Basis geltend. Hat man ein Integral $\int f \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot dx$ zu bilden und liegt $f_1 f_2 \dots$ gezeichnet vor, so empfiehlt es sich bisweilen, eine der Kurven mit variabler Basis zu integrieren, die sich mit Hilfe der andern Kurven bestimmt.³⁰¹⁾ *d'Ocagne* zeigt das im einzelnen an $\int y y_1 dx$ ³⁰²⁾ und *Nehls*³⁰³⁾ an $\int \frac{\varphi x}{\psi x} dx$, wenn $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ gezeichnet vorliegen.

301) *Massau*²⁵⁴⁾, Buch V, Kap. I, § 3.

302) *d'Ocagne*, *Calcul graphique et Nomographie* 37, Paris 1908.

303) *Nehls*²⁶⁷⁾ zeigt, daß mit Hilfe seiner Methoden nur eine Übereinstim-

γ) *Transformationen.* Was die Transformation des Richtlinienbüschels³⁰⁰) betrifft, so sind von der allg. durch $\bar{y} = \frac{ay+b}{cy+d}$ bestimmten projektiven Transformation zwei von Bedeutung. Erstens die, durch welche der Pol von $(-\lambda, 0)$ nach $(a\lambda, b)$ verschoben wird; aus $y = \int f(x) dx$ entsteht dann

$$\bar{y} = -\frac{1}{a} \int (f(x) - b) dx + b = -\frac{1}{a} y + \frac{b}{a} x + b.$$

Die Affinitätsachse dieser Transformation ist $y = \frac{b}{1+a} x + \frac{ab}{1+a}$. Sie ist parallel der Richtung der Polverschiebung. Entsprechende Sehnen, Tangenten usw. der beiden Kurven schneiden sich also auf dieser Geraden. Zweitens ist die Transformation wichtig, die bestimmt ist durch $\bar{y} = \frac{1}{y}$. Man braucht dann nur durch die Orthogonalstrahlen des Richtlinienbüschels zu integrieren. Die mittleren Ordinaten und Abszissen lassen sich dabei nicht, wie es gelegentlich versucht ist,³³⁸) durch eine einfache Konstruktion übertragen.

δ) *Benutzung einer ungleichmäßigen Skala auf der Abszissenachse.* Hat man das Integral

$$\int f(x) \varphi'(x) dx$$

zu bilden, so ist es oft vorteilhaft, $f(x)$ durch Parallelverschiebung der Ordinaten als Funktion von $\varphi(x)$ zu zeichnen und dann

$$\int f(x) d(\varphi(x))$$

zu bilden.³⁰⁴) Angewandt wird dies z. B. von *Runge*³⁰⁵) zur Bestimmung der Integrale $\int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos(ax) dx$ und $\int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \sin ax dx$, die in dem Koeffi-

mung bis zum zweiten Gliede der *Taylor*schen Reihe zu erreichen ist, so daß Integrationsmethoden, die dieses auch geben, hier ausreichen.

304) Vgl. z. B. *Massau*²⁷⁸), Buch IV, Kap. I, § 2 auch *Collignon*: *Méthode géométrique d'évaluation de certaines intégrales doubles* 1874. Zahlreiche andere Methoden sind zur angenäherten Berechnung derartiger Integrale ausgebildet worden, die insbesondere zur Berechnung der Fourierkoeffizienten dienen (vgl. II A 9 a, II A 2 Nr 60). Von neueren Arbeiten seien hier erwähnt *Pichelmayer* und *Schutka*, *Elektrotechnische Zeitschrift* 1913, p. 129 ff.; *Meurer*, *Elektrotechnische Zeitschrift* 1913, p. 121 ff.; *v. Sanden*, *Archiv für Elektrotechnik* 1 (1913), p. 42—46; 2 (1914), p. 393—94; *Slaby*, *Archiv für Elektrotechnik* 2 (1914), p. 19—21 und *Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure* 58 (1914), p. 1348—49.

305) *Runge*, *Vorlesungen über graphische Methoden*. Ausarbeitung im math. Lesezimmer in Göttingen und²⁸⁹).

zienten der *Fourierschen* Reihen auftreten. Ist

$$\varphi(x) = f(x) + f(-x), \quad \psi(x) = f(x) - f(-x),$$

so gilt für gerade β

$$a_\beta = + \frac{1}{\beta \pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\varphi(x) + \varphi(\pi - x)] d(\sin \beta x),$$

$$b_\beta = - \frac{1}{\beta \pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\psi(x) - \psi(\pi - x)] d(\cos \beta x)$$

und für ungerade β

$$a_\beta = + \frac{1}{\beta \pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\varphi(x) - \varphi(\pi - x)] d(\sin \beta x),$$

$$b_\beta = - \frac{1}{\beta \pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\psi(x) + \psi(\pi - x)] d(\cos \beta x).$$

Man zeichnet die Kurven $f(x)$ auf durchsichtiges Millimeterpapier und bildet durch Zusammenfallen obige Werte. Durch entsprechende Parallelverschiebung der Ordinaten überträgt man diese Kurven auf die ungleichmäßige Abszissenskala $\sin \beta x$ bzw. $\cos \beta x$. Man könnte auch die Kurven mit äquidistanten Ordinaten auf einen Zylinder vom Umfang $\frac{2\pi}{\beta}$ aufwickeln und dann einfach parallel projizieren und findet durch einfache Integration dieser zwischen -1 und $+1$ hin- und herlaufenden Kurven obige Integrale.³⁰⁶⁾

Hat die zu integrierende Kurve in $x = a$ eine Unendlichkeitsstelle³⁰⁷⁾ derart, daß $(x - a)^{\frac{m-1}{m}} f(x - a)$ endlich bleibt, so trägt man die Kurven $w^{m-1} f(w^m)$ zur Abszisse $w = (x - a)^{\frac{1}{m}}$ auf; dann ist

$$(181) \quad F(x) = \int f(x) dx = m \int f(w^m) w^{m-1} dw = F(w^m).$$

Die auf eine ungleichmäßige Skala für x bezogene Integralkurve läßt sich leicht auf eine gleichmäßige Skala übertragen. Bei diesen Methoden läßt sich gelegentlich eine von *Nehls*³⁰⁸⁾ gegebene Konstruktion

³⁰⁶⁾ *Perry*, *The Electrician* 35 (1895), p. 285/86. *Phil. Mag.* (5) 40 (1895), p. 506—11; *Nature* 52 (1895), p. 654.

³⁰⁷⁾ *Willers*, Über die Steighöhe von Drachen, *Zeitschr. Math. Phys.* 57 (1909), p. 158—73.

³⁰⁸⁾ *Nehls*, Über den *Amslerschen* Polarplanimeter und über graphisch-

verwenden, aus einzelnen Kurven $f_1, f_2 \dots$ die Kurven

$$f_n(f_{n-1}(f_{n-2} \dots (f_1) \dots))$$

graphisch zu finden.

ε) *Integrationskonstanten.*²⁷⁸⁾ Bei einfacher Integration kann man der Konstanten durch Parallelverschiebung der Achsen jeden beliebigen Wert geben. Bei n -fachen Integralen hat man die Integralkurve auf irgendeine Parabel ($n - 1$). Ordnung zu beziehen. Vorgegebene Integrationskonstanten geben n Bedingungen für diese Parabel und bestimmen sie dadurch. Wie derartige Parabeln graphisch zu konstruieren sind, zeigt *Massau* in dem oft zitierten Buch und noch allgemeiner im Anhang dazu.³⁰⁹⁾

ξ) Die oben auseinander gesetzten Methoden hat *Wasteels*³¹⁰⁾ auf Polarkoordinaten übertragen, wobei sowohl r wie φ unabhängige Variable sein kann. Er gibt Methoden an, die mittlere Anomalie und den mittleren Fahrstrahl zu finden. Diese Methoden können nach *Merrifield*²²⁾ bei der Inhaltsberechnung von Spantenrissen usw. gelegentlich von Nutzen sein. Planimeter für in Polarkoordinaten gezeichnete Kurven wurden übrigens von *Price*³¹¹⁾, *Pascal*⁴¹⁷⁾ und *Guarducci*³¹²⁾ angegeben.

η) Obige Methoden sind nur für reelle Variable anwendbar. Für die Funktion einer komplexen Variablen $z = x + iy$, die durch zwei Scharen von Kurven u und v dargestellt ist, erhält man das Integral

$Z = X + iY = \int_0^{z_n} f(z) \cdot dz$ durch Zerlegen in den reellen und imaginären Teil³¹³⁾

$$X = \int_0^{x_n} u_{y=0}(x) dx - \int_0^{y_n} v_{x=x_n}(y) dy, \quad Y = \int_0^{x_n} v_{y=0}(x) dx + \int_0^{y_n} u_{x=x_n}(y) dy.$$

Unter Umständen kann es allerdings vorteilhafter sein, Polarkoordinaten

mechanisches Integrieren im allgemeinen: Ergänzter Separatabdruck aus dem Zivilingenieur XX, Leipzig 1874.

309) *Massau*²⁷⁸⁾, Buch II, Kap. 4 und Appendice au mémoire sur l'intégration graphique et ses applications (Note I), Paris 1890.

310) *Wasteels*, Handelingen von het elfde vlaamsck Natuur en Geneeskundig Congres (1908), p. 56—68.

311) *Price*, The electrician 36 (1895/6), p. 73/74.

312) *Guarducci*, Memorie della R. Accademia delle science dell' istituto di Bologna (6) 8 (1911), p. 297—300.

313) *D. Killam*, Über graphische Integration von Funktionen einer komplexen Variablen mit speziellen Anwendungen, Dissertation Göttingen 1912

zu benutzen. In jedem Falle erhält man die Funktion $Z = \int_0^z f(z) dz$ dargestellt durch zwei Kurvenscharen X und Y .

e) *Einige Anwendungen der graphischen Quadratur.*³¹⁴⁾

α) *Momente ebener Flächen.* Nach *Collignon*³¹⁵⁾ wird das Moment n^{ter} Ordnung

$$\int_0^x (x - \xi)^n y(\xi) d\xi$$

in bezug auf eine Parallele zur Y -Achse so bestimmt, daß man die *Segnersche Transformation*³¹⁶⁾ n mal anwendet und dann eine einfache Integration ausführt. Der Nachteil dabei ist, daß man die Operation für jede Bezugsgerade von neuem durchführen muß³¹⁷⁾.

*Massau*³¹⁸⁾ benutzt die Tatsache, daß sich das Moment n^{ter} Ordnung bezogen auf die Endordinate

$$\mu_n = \int_0^x (x - \xi)^n y(\xi) d\xi$$

durch die Ordinate y_{n+1} des Integrals $(n + 1)^{\text{ter}}$ Ordnung ausdrückt

$$y_{n+1} = \frac{\mu_n}{n!} + P_n,$$

wobei P_n eine Parabel n^{ter} Ordnung ist, die im Anfangspunkt mit der $(n + 1)^{\text{ten}}$ Integralkurve, eine n -fache Berührung hat. Hat man das Moment n^{ter} Ordnung in bezug auf die Endordinate einer von zwei Kurven eingeschlossenen Fläche zu nehmen, so ist dies durch das auf der Endordinate von den beiden Integralkurven $(n + 1)^{\text{ter}}$ Ordnung abgeschnittene Stück bestimmt, falls die Integralkurven gleicher Ordnung von demselben Punkt ausgehen und denselben Pol haben. Das Moment bezogen auf irgendeine Parallele zur Y -Achse bestimmt sich mittels des Abschnittes, den zwei Parabeln n^{ter} Ordnung liefern, die mit den Integralkurven $(n + 1)^{\text{ter}}$ Ordnung eine n -fache Berührung im Endpunkte haben.

314) S. a. v. *Sanden*, Praktische Analysis, Leipzig 1914, p. 98—102.

315) *Collignon*, Compléments du cours d'analyse, Paris 1879.

316) *Segner*, Acad. Petrop. Novi Comment 7, pro 1758/59, p. 211.

317) Eine ähnliche Methode gibt *Nehls* vgl. ²⁸¹⁾ und *Nehls*, Über graphisch-mechanisches Integrieren. Zivilingenieur 21 (1875) p. 185 ff., 199 ff., 261 ff.

318) *Massau* ²⁷⁸⁾, Buch II, Kap. V, § 1 u. 2 und Appendice, Note III, wo besonders der Zusammenhang mit dem Restglied der *Taylor*schen Reihe behandelt wird.

Insbesondere findet man die Abszisse des Schwerpunktes (Statisches Moment = Moment erster Ordnung = Null) durch den Schnitt der Tangenten im Endpunkt der Integralkurve zweiter Ordnung (Fig. 21), eine Tatsache, die von *Froude*³¹⁹⁾ dazu benutzt wird, einen die Integralkurven annähernden Tangenzug zu konstruieren, wenn für die Integration die Trapezregel verwandt wird.³²⁰⁾ Zahlreiche spezielle Ausführungen dazu finden sich bei *Massau*³¹⁸⁾, *Nehls*³²¹⁾, *Sheppard*³²²⁾, *Rudolf*²⁷⁶⁾. Aus der Integralkurve dritter Ordnung läßt sich leicht das Trägheitsmoment bestimmen.³²⁵⁾




Fig. 21.

Um die *Bogenlänge einer Kurve* festzustellen, gibt *Nehls*³²¹⁾ zwei Methoden, deren eine den Differenzenquotienten benutzt, während die andere die Konstruktion des Differentialquotienten fordert. Ferner finden sich dort zwei Methoden zur Integration der Gleichung

$$(182) \quad \frac{dy}{ds} = \psi(x),$$

die auf den beiden vorigen beruhen. Eine andere Methode zur Bestimmung von Bogenlänge und Moment einer Kurve bezüglich der X-Achse gibt *Collignon*.³¹⁵⁾ Bei rechtwinkligen Koordinaten und $a = b$ ist (Fig. 22)

$$(183) \quad s = \int \frac{dx}{\cos \theta} = \frac{1}{k} \int MM' dx = z_1,$$

wo mit der Konstanten $MK = k$ die Kurve $A'B'$ konstruiert ist. Das Moment ist

$$(184) \quad u = \int y ds = \int MN dx = \int MM'' dx = z_2.$$

Man hat also die beiden Flächen $ABB'A'$ und $ABB''A''$ zu integrieren. Die Abszisse des Schwerpunktes des Bogens AB ist dieselbe wie die der Fläche $AA'B'B$, seine Ordinate $Y = \frac{z_2}{s} = \frac{z_2}{z_1} k$. *d'Ocagne*³²³⁾

319) *Froude*, Trans. Nav. Arch. 16 (1875).

320) *Johou*, Hilfsbuch für den Schiffsbau, Berlin 1902, p. 329—331; *Pollard-Dudebout*, Théorie du navire I, Paris 1890, p. 57—60.

321) *Nehls*, Zivilingenieur 20 (1874), p. 71—124, 295—300; 21 (1875), p. 131—148, 199—222, 261—272; Zeitschrift für Bauwesen 29 (1879), p. 259—282; 39 (1889), p. 244—310.

322) *Sheppard*, The mathematical Gazette 4 (1908), p. 325/26.

323) *d'Ocagne*, Nouv. Ann. (4) 5 (1905), p. 43—45.

gibt eine Konstruktion für die Tangenten der Kurven $A'B'$ und $A''B''$, falls die Krümmungsmittelpunkte von AB bekannt sind (s. Fig. 22).




Fig. 22.

Noch eine ganze Reihe anderer Regeln für die Rektifikation sind gegeben worden; so hat *Tschebyscheff* eine Methode zur Rektifikation von Raumkurven aufgestellt³²⁴); für ebene Kurven finden sich weitere Methoden bei *Lambert*³²⁵), *Euler*³²⁶), *Resal*³²⁷), *Pellet*³²⁸) u. a. Umgekehrt wie *d'Ocagne* drückt *Grunert*³²⁹) unter Benutzung eines Satzes von *Heuraet*³³⁰) den Inhalt eines Flächenstückes durch eine Bogenlänge aus.

β) Eine wichtige Anwendung findet die graphische Integration in der Lehre von der Zusammensetzung der Kräfte und vom Gleichgewicht elastischer Körper. Beim kontinuierlich belasteten geraden Balken z. B. ist das Integral erster Ordnung die Scherkraftlinie, das zweiter Ordnung die Momentenlinie, das dritter Ordnung gibt die Neigungen des Balkens, das vierter Ordnung bei sehr kleiner Ausbiegung die elastische Linie. Die Lagerungsbedingungen bestimmen nur die Bezugslinie. Bei Einzelkräften hat man entsprechende Unstetigkeiten der Ordinaten der Scherkraftlinie einzufügen.

Ausführliche Darstellungen der graphischen Statik unter Verwendung der Sätze über die graphische Integration geben *Massau*²⁷⁸), *Nehls*³²¹), *Baldermann*³³¹), vgl. auch *Culmann*³³²).

324) *Grave*, Bull. de S^t Pétersbourg 3 (1895), p. 131—34.

325) *Lambert*, Beiträge zum Gebrauch der Mathematik und deren Anwendungen 2, Berlin 1770, Bogen gleich Summe der Tangentenabschnitte plus der doppelten Sehne durch 4; vgl. auch *Vahlen*, Konstruktionen und Approximationen, Leipzig 1911, p. 211.

326) *Euler*, De reductione linearum curvarum ad arcus circulares Comm. Nov. Act. Petrop. II.

327) *Resal*, Paris C. R. 94 (1882), p. 1375—77; 80 (1875), p. 1185—89. Mémoires de la Société mathématique de France 1874.

328) *Pellet*, Paris C. R. 110 (1890), p. 778.

329) *Grunert*, Arch. Math. Phys. 26 (1856), p. 48—57.

330) *Heuraet*, Epistola de transmutationes curvarum linearum in rectas, abgedruckt in „Renati Descartes“ Geometria, Frankfurt a/M. 1695, p. 517. Nach Cantors Angabe (Gesch. d. Math. II, p. 920—21) ist *Heuraet* der erste, der die Bogenlänge durch eine Fläche ausdrückt (Brief v. 13. I. 1659), ähnlich verfahren auch *Neil* bei der Parabel und *Fermat* in De linearum curvarum lineis rectis comparatione 1660.

Andere Anwendungen sind zahlreich, so insbesondere in der Schiffbautechnik³³³), können hier aber nicht erwähnt werden.³³⁴)

13. Kubatur. Das Volumen eines Körpers kann man durch eine zweifache Quadratur erhalten. Bezeichnet z. B. $Q(x)$ den Querschnitt senkrecht zur x -Achse an der Stelle x , den man für jedes x durch Quadratur ermitteln kann, so ist das Volumen durch die Quadratur der Kurve zu erhalten, deren Ordinate gleich $Q(x)$ ist.

a) *Kubatur durch einfache Quadratur.* Auf Formeln der angenäherten Quadratur ist daher eine Reihe von Formeln zurückzuführen³³⁵), die den Inhalt zweier durch parallele ebene Flächen begrenzten Körper durch den Inhalt dieser oder durch den Inhalt zu ihnen paralleler Schnitte ausdrücken, wie sie zum Teil zusammengestellt sind bei *Vega*³³⁶), *Matzka*³³⁷), *Kinkelin*¹⁵⁸), *Fonténé*³³⁸), *d'Ocagne*³³⁹), *Finsterbusch*³⁴⁰) u. a. Die der *Simpsonschen* Regel entsprechende Formel (règle des trois niveaux) wird gelegentlich auf *Mascheroni*³⁴¹) zurückgeführt, findet sich aber schon bei *Cavalieri*¹⁶). Sie wird je nach der Körperform, auf die man sie anwendet, als *Lambertsche*³⁴²) Faßregel^{343*)} oder Prismoidal-

331) *Baldermann*, Försters allgemeine Bauzeitung (Wien) 46 (1881), p. 24—27, 33—41, 49—54, 97.

332) *Culmann*, Graphische Statik, 2. Aufl., Zürich 1875.

333) *Dietze*, Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ingenieure 38 (1894), p. 1234—1238; *Pollard-Dudebout*, Theorie du navire I, Paris 1890, chap. III, p. 44—60.

334) Z. B. *Massau*, Note sur la résolution graphique des équations du premier degré, Gand 1889; *Massau*²⁷⁸), Buch III u. IV; *Massau*, Calcul des cotisations des sociétés de secours mutuels, Gand 1887; *Abdank-Abakanowitz*, Die Integraphen, Kap. V, Leipzig 1889; *Brauer*, Anwendung der Integalkurven zur Volumeinteilung, Z. f. Math. u. Phys. 42 (1897); *Arnold*, Erdbewegung während der ersten Vorläufer eines Bebens, Diss. Gött. 1909, und Beiträge zur Geophysik, 5 (1909); ferner eine Anzahl der schon zitierten Abhandlungen.

335) *Lampe*, Arch. Math. Phys. (3) 16 (1910), p. 270—274.

336) *Vega*, Vorlesungen über die Mathematik, 7. Aufl. bearbeitet von *Matzka*, Wien 1835.

337) *Matzka*, Arch. Math. Phys. 33 (1859), p. 121—165.

338) *Fonténé*, Nouv. ann. (4) 8 (1908), p. 385—389; Nouv. ann. (4) 9 (1909), p. 289—293.

339) *d'Ocagne*, Nouv. ann. (4) 9 (1909), p. 50—51.

340) *Finsterbusch*, Verhandlungen des dritten internationalen Mathematikerkongresses 1905, p. 687—706.

341) *Mascheroni*, Problemi di geometria colle dimostrazioni, Milano 1800. Französisch Paris 1803.

342) *Lambert*, Beiträge zum Gebrauch der Mathematik und deren Anwendungen I, Berlin 1765, p. 314—368.

343*) *Cantor*, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik 4, Leipzig 1908, p. 370—75.

formel, gelegentlich auch als Formel von *de Chapman*³⁴³) oder *Sarrus* bezeichnet. Sie findet sich z. B. bei *Atwood*²¹), *Brix*³⁴⁴), *Finck*³⁴⁵), *Brettschneider*³⁴⁶), *Steiner*³⁴⁷), *Grunert*³⁴⁸), *Ligowski*³⁴⁹), *Wittstein*³⁵⁰), *Rouché* und *Levy*³⁵¹), *Haielecourt*³⁵²), *Trautwine*³⁵³), *Francke*³⁵⁴), *Lombard*³⁵⁵) u. a. *Grunert*³⁵⁶) gibt als Korrektion dazu

$$(185) \quad -\frac{2}{15} \left(f\left(\frac{h}{2}\right) - f(0) \right) h.$$

Mit der Aufgabe, Oberflächen zu finden, die ein Volumen einschließen, das durch obige Formel exakt dargestellt wird, beschäftigt sich *Schubert*^{356a}); sie führt nach *Hayashi*³⁵⁷) auf eine Integralgleichung erster Art, die er für spezielle Fälle löst. Eine Erweiterung der Formel in der Form

$$(186) \quad V = \frac{h}{6} \left\{ \frac{3x-h}{x} f(0) - \frac{2h-3x}{h-x} f(h) + \frac{h^2}{h(h-x)} f(x) \right\},$$

wo h die Höhe des Körpers, $f(x)$ der Inhalt des Querschnitts in der Höhe x ist, geben *Schubert*^{357a}) und *Groenemann*³⁵⁸) Eine andere auch

343) *Chapman*, *Traité de la construction des Vaisseaux...*, aus dem Schwedischen von *Vial de Clairbois*, Brest et Paris 1781, p. 3—5.

344) *Brix*, *Elementarlehrbuch der dynamischen Wissenschaften*, Berlin 1831, p. 130—148.

345) *Finck*, *Nouv. ann.* 7 (1848), p. 241—46.

346) *Brettschneider*, *Lehrgebäude der niederen Geometrie*, Jena 1844, und *Arch. Math. Phys.* 36 (1861), p. 18—21.

347) *Steiner*, *Journ. f. Math.* 23 (1843), p. 275—284. Abgedruckt Werke II, p. 311—320.

348) *Grunert*, *Arch. Math. Phys.* 10 (1847), p. 260—283.

349) *Ligowski*, *Über die Inhaltsberechnung der Körper nach einer einzigen Formel*, Berlin 1847 und *Arch. Math. Phys.* 26 (1856), p. 204—212.

350) *Wittstein*, *Das Prismatoid. Eine Erweiterung der elementaren Stereometrie*, Hannover 1860 und *Arch. f. Math. u. Phys.* 39 (1862), p. 1—12.

351) *Rouché* und *Levy*, *Traité d'analyse infinitésimale*.

352) *Haielecourt*, *Revue des sociétés savantes* 1868 und 1876.

353) *Trautwine*, *Civilingeneers pocket book*, gibt die Formel als Entdeckung von *Morris* um 1840 an.

354) *Francke*, *Zeitschr. d. Arch. u. Ing.-Ver. zu Hannover* 20 (1874).

355) *Lombard*, *Nouv. ann.* 16 (1857), p. 131—35.

356) *Grunert*, *Arch. f. Math. u. Phys.* 20 (1853), p. 301ff. und 23 (1854), p. 207—216.

356*) *Schubert*, *Auslese aus meiner Unterrichts- und Vorlesungspraxis III*, Leipzig 1906, p. 160—178.

357) *Hayashi*, *Arch. Math. Phys.* (3) 18 (1911), p. 102—104.

357*) *Schubert*, *Auslese aus meiner Unterrichts- und Vorlesungspraxis I*, Leipzig 1905, p. 122—136.

358) *Groenemann*, *Nieuw. Archief Amsterdam* (2) 6 (1905), p. 365—367.

wohl als Formel von *Sarrus* bezeichnete, ist

$$(187) \quad V = \frac{h}{4} \left(f(0) + 3f\left(\frac{2}{3}h\right) \right).$$

Sie ist noch für Funktionen 2. Grades genau und findet sich bei *Lambert*³⁵⁹), *Halsted*³⁵⁹), *Kinkelin*³⁶⁰) u. a. Erweitert wird diese Formel zu

$$(188) \quad V = \frac{h}{1+\lambda} \left(f(0) + 2f\left(\frac{\lambda h}{1-\lambda}\right) \right)$$

und von *Rudio*³⁶³) zu

$$(189) \quad V = \frac{1}{2} h \left\{ \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right) f\left(\frac{\lambda h}{1+\lambda}\right) + \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right) f(0) \right\}.$$

*Koppe*³⁶³) gibt für das Prismatoid eine auch schon von *Mascheroni*³⁴¹) gefundene Form

$$(190) \quad V = hf\left(\frac{h}{2}\right) + P\frac{h}{12},$$

wo P der Inhalt eines den Grundflächen ähnlichen Vielecks ist, dessen Seiten gleich der Differenz der Seiten der Grundflächen sind. Bei *Mac-Laurin*³⁶⁴), *Ligowski*³⁶⁵), *Desboves*³⁶⁶), *Gabriel Marie*³⁶⁷) findet sich für Rotationsellipsoide bzw. Kugeln die Formel

$$(191) \quad V = hf\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{ah^3}{12}.$$

Zahlreiche andere Formeln, so bei *Grebe*³⁶⁸), *Maleyx*³⁶⁹), *Finsterbusch*³⁴⁰), *Barbarin*³⁶¹), *Schubert*^{357a}), *Hayashi*³⁷⁰), sind nichts anderes als Quadraturformeln von *Gauß*, *Radau*, *Ligowski* u. a.³⁷¹).

b) *Allgemeine Betrachtungen.* Bei der eigentlichen Kubatur handelt es sich um Berechnung eines Doppelintegrals einer Funktion von zwei Variablen, d. h. um gleich den allgemeinen Fall zu nehmen, um Berechnung von

$$\iint \varphi(x, y) f(x, y) dx dy,$$

359) *Halsted*, Rational Geometry New-York 1904, p. 186.

360) *Kinkelin*, Arch. Math. Phys. 39 (1862), p. 181—186.

361) *Barbarin*, Procès verbaux des séances de la société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux 1907/8, p. 109—111.

362) *Rudio*, Zeitschr. Math. Phys. 47 (1901), p. 126—127.

363) *Koppe*, Journ. f. Math. 18 (1838), p. 275—277.

364) *Mac-Laurin*, Treatise of fluxions, Edinburg 1742.

365) *Ligowski*, Arch. Math. Phys. 32 (1869), p. 241—249.

366) *Desboves*, Questions algèbre 1873 und Nouv. ann. 1877.

367) *Gabriel Marie*, Géometrie 1875.

368) *Grebe*, Arch. Math. Phys. 39 (1862), p. 93—97.

369) *Maleyx*, Nouv. ann. (2) 19 (1880), p. 529—551.

370) *Hayashi*, Arch. Math. Phys. (3) 16 (1910), p. 267—269.

371) *Lampe*, Arch. Math. Phys. (3) 16 (1910), p. 270—274.

wo $f(x, y)$ sich nach *Taylor* entwickeln läßt, φ eine integrierbare Funktion sein muß und das Integrationsgebiet im allgemeinen nicht unendlich sein darf. Man kann hier genau wie bei der Quadratur von den (5) entsprechenden Gleichungen ausgehen

$$(192) \quad \delta_{\mu\nu} = A_1 x_1^\mu y_1^\nu + A_2 x_2^\mu y_2^\nu + \dots \\ \dots + A_n x_n^\mu y_n^\nu - \iint \varphi(x, y) x^\mu y^\nu dx dy.$$

Die A kann man für beliebige Werte x_i, y_i so bestimmen, daß n Werte δ Null werden, daß also eine Funktion p^{ten} Grades $n = \frac{(p+2)(p+1)}{2}$ exakt integriert wird. Wählt man außerdem noch wie bei der Methode von *Gauß* die x_i, y_i passend, so kann man $3n$ Werte δ zu Null machen; vorausgesetzt ist dabei, daß die Gleichungen verträglich sind, reelle, im Integrationsgebiet und nicht auf einer Kurve p^{ter} Ordnung liegende Werte liefern.

Überträgt man die Entwicklungen des 3. Abschnittes, so erhält man hier anstatt der Gleichung (24)

$$(193) \quad \iint U(x, y) x^i y^j \varphi(x, y) dx dy = 0,$$

wo das Integral über das betreffende Gebiet zu erstrecken ist. Ausgehend von Arbeiten von *Hermite*³⁷²), *Didon*³⁷³) und eignen Arbeiten³⁷⁴) zeigt *Appell*³⁷⁵), daß es Polynome gibt, für die

$$(194) \quad \iint \varphi(x, y) U_{m,n}(x, y) U_{\mu,\nu}(x, y) dx dy = 0 \quad (m \geq \mu, n \geq \nu)$$

ist. Falls man diese Polynome für das betreffende Gebiet kennt, spielen dieselben für die Kubatur eine ähnliche Rolle wie die Funktionen $F_n(x)$ bei der Quadratur.

c) *Bestimmte Begrenzungen.* Am häufigsten behandelt wird der Fall rechteckiger Begrenzung. Hier reduzieren sich die Gleichungen (192) wegen der Symmetrie, ähnlich wie das bei (7) der Fall ist. Im Fall von vier symmetrischen Punkten erhält man z. B., wenn $\varphi = 1$ und die Seitenlängen des Rechtecks $2h$ und $2k$ sind,

$$(195) \quad A_1 = 1, \quad x_1 = \pm \frac{1}{3} \sqrt{3} h, \quad y_1 = \pm \frac{1}{3} \sqrt{3} k$$

372) *Hermite*, Journ. f. Math. 64 (1865), p. 294—96; Paris C. R. 60 (1865), p. 370—77, 432—40, 461—66, 512—18.

373) *Didon*, Ann. l'Éc. norm. 5 (1868). p. 228—310 und 7 (1870), p. 89—98 und p. 247—268.

374) *Appell*, Paris C. R. 90 (1880), p. 296—298, 731—734, 977—979; 91 (1880), p. 364—366; Arch. Math. Phys. 66 (1881), p. 238—245.

375) *Appell*, Annales de Toulouse 4 (1890), (20 Seiten).

mit der Korrektur

$$\frac{1}{4!} \frac{16}{45} \left(\frac{\partial^4 f}{\partial x^4} h^5 k + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4} h k^5 \right) \dots$$

*Burnside*³⁷⁶⁾ betrachtet den Fall von acht symmetrischen Punkten, hier erhält er

$$(196) \quad A_{1,2} = \frac{40}{49}, \quad A_3 = \frac{9}{49}, \quad x_1 = \pm \sqrt{\frac{7}{15}} h, \quad y_1 = 0, \quad x_2 = 0, \\ y_2 = \pm \sqrt{\frac{7}{15}} k, \quad x_3 = \pm \sqrt{\frac{7}{9}} h, \quad y_3 = \pm \sqrt{\frac{7}{9}} k.$$

Die Korrektur wird

$$+ \frac{1}{6!} \frac{848}{14175} \left(\frac{\partial^6 f}{\partial x^6} h^7 k + \frac{\partial^6 f}{\partial y^6} h k^7 \right) - \frac{32}{6! 27} \left(\frac{\partial^6 f}{\partial x^4 \partial y^2} h^5 k^3 + \frac{\partial^6 f}{\partial x^2 \partial y^4} h^3 k^5 \right).$$

*Maxwell*³⁷⁷⁾ behandelt den speziellen Fall, daß sich $f(x, y)$ als Funktion von $a + bx + cy$ darstellt, und gibt für 13 Funktionswerte Wurzeln und Koeffizienten. Er dehnt seine Betrachtung auch auf das dreifache Integral aus; ein von ihm behandelter Spezialfall führt aber auf eine Lösung, die auch Punkte außerhalb des Integrationsgebietes enthält.

Des öfteren hat man die Quadraturformeln so übertragen, daß man längs jeder Parallelen zur y -Achse $x_0 + \mu \frac{x_1 - x_0}{m}$ auf die n Werte $y_0 + \nu \frac{y_1 - y_0}{n}$ die betreffende Quadraturformel anwendet, die so erhaltenen Werte als Ordinaten von $x_0 + \mu \frac{x_1 - x_0}{m}$ wählt und diese wieder nach der entsprechenden Quadraturformel zusammensetzt. Doch ist zu beachten, daß dabei mehr Ordinaten als nötig verwandt sind, falls man durch ein Paraboloid entsprechenden Grades annähern will. Man würde mit $\frac{n(n+1)}{2}$ Ordinaten für ein Paraboloid $n - 1^{\text{ter}}$ Ordnung ausreichen. Setzt man mit *Biermann*³⁷⁸⁾ die erweiterte *Lagrangesche* Interpolationsformel an

$$(197) \quad g(x, y) = \sum_1^n \frac{(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_\mu - x_1)(x_\mu - x_2) \dots (x_\mu - x_n)} \\ \sum_1^n \frac{(y - y_1)(y - y_2) \dots (y - y_n)}{(y_\nu - y_1)(y_\nu - y_2) \dots (y_\nu - y_n)} z_{\mu\nu},$$

376) *Burnside*, The Messenger of Mathematics (2) 37 (1908), p. 166—167.

377) *Maxwell*, Proc. of Cambridge Phil. Soc. 3 (1877), p. 39—74.

378) Z. B. *Biermann*, Vorlesungen über math. Näherungsmethoden, Braunschweig 1905.

so müssen $\frac{n(n-1)}{2}$ Relationen zwischen den x_{μ} bestehen. Setzt man ferner³⁷⁹⁾

$$(198) \quad G(x, y) = g(x, y) + \omega_1(x)\varphi(x, y) + \omega_2(y)\psi(x, y),$$

$$\omega_1(x) = \prod_1^n (x - x_{\mu}), \quad \omega_2(y) = \prod_1^n (y - y_{\nu}),$$

so kann man durch passende Wahl der x und y weitere $n(n+1)$ Größen im Integral der beiden Seiten zur Übereinstimmung bringen. Man erhält so für die ω die Bedingungen³⁸⁰⁾

$$(199) \quad \int_a^{\alpha} \int_b^{\beta} \omega_1(x) \vartheta_{m-1}(x, y) dx dy = 0, \quad \int_a^{\alpha} \int_b^{\beta} \omega_2(y) \vartheta_{m-1}(x, y) dx dy = 0.$$

Man könnte nun z. B. die Glieder

$$\int_a^{\alpha} \int_b^{\beta} \omega_1(x) \eta_{m-1}(x) dx dy = 0 \quad \text{und} \quad \int_a^{\alpha} \int_b^{\beta} \omega_2(y) \eta_{m-1}(y) dx dy = 0$$

aus (199) herausgreifen. Setzt man

$$\frac{x_{\mu} - a}{\alpha - a} = t_{\mu}, \quad \frac{y_{\nu} - b}{\beta - b} = \tau_{\nu},$$

so sind t und τ Wurzeln von $U(t) = \frac{d^m}{dt^m}(t^m(t-1)^m)$. Weitere Bedingungen können an die t und τ nicht gestellt werden, man kann die Wurzeln also beliebig zu Paaren verbinden. Fehlerangaben dazu finden sich bei *Minding*³⁸¹⁾ und *Biermann*³⁸⁰⁾, ferner bei *Löwenstern*³⁸²⁾, der die Betrachtung auf n Variable ausdehnt.

Für ein kreisförmiges Gebiet gibt *Bourget*³⁸³⁾ anschließend an *Appell*³⁷⁵⁾ die Punkte und Koeffizienten für die vier einfachsten Fälle an. Die Funktionswerte sind da für die Schnittpunkte der Kurven

$$(200) \quad \frac{\partial^n (x^2 + y^2 - 1)^n}{\partial x^n} = 0, \quad \frac{\partial^n (x^2 + y^2 - 1)^n}{\partial y^n} = 0$$

zu nehmen, um die Glieder bis zu denen $(2n-1)$ ter Ordnung aus der Korrektur zum Verschwinden zu bringen. Diese Kurven sind übrigens schon von *Hermite*³⁷²⁾, *Didon*³⁷³⁾ und *Appell*³⁷⁴⁾ behandelt.

379) *Biermann*, Monatshefte Math. Phys. 14 (1913), p. 211—225.

380) *Biermann*, Monatshefte Math. Phys. 14 (1913), p. 226—242.

381) *Minding*, De valore integralium duplicium quam proxime inveniendis, Dissertation Halle 1829 und Journ. f. Math. 6 (1830), p. 91—95.

382) *Löwenstern*, Mémoires présentées à l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg par divers savants 3 (1837), p. 279—289.

383) *Bourget*, Paris C. R. 126 (1898), p. 634—636.

d) *Zerlegung in Teilgebiete.* Wie man die Genauigkeit der Quadraturformel durch Zerlegen des ganzen Gebietes in Teilgebiete erhöht, so hat man auch vorgeschlagen, bei zweifachen Integralen das Gebiet in gleiche Rechtecke einzuteilen und auf jedes dieselbe Kubaturformel anzuwenden. Wir geben hier nur die Formeln für ein Rechteck mit den Ecken $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$. Hat man $m \cdot n$ Rechtecke, so tritt im Korrektionsglied zu $\frac{\partial^{\mu+\nu} f(x, y)}{\partial x^\mu \partial y^\nu}$ der Faktor $\frac{1}{m^\mu n^\nu}$.

Abgesehen von den Abschnittsprismen von *Biermann*³⁸⁴) sind die einfachsten Formeln die von *Bugajev*³⁸⁵)

$$(201) \quad I \quad (z_{00} + z_{01} + z_{10} + z_{11}) \frac{k \cdot h}{4}$$

mit der Korrektion

$$- \frac{1}{2!6} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} h^3 k + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} h k^3 \right) \\ - \frac{1}{3!4} \left(\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} h^4 k + \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} h^3 k^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} h^2 k^3 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} h k^4 \right) - \dots,$$

die für das Tangentenprisma³⁸⁴)

$$(202) \quad II \quad h k \cdot z_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}}$$

mit der Korrektion

$$+ \frac{1}{2!12} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} h^3 k + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} h k^3 \right) \\ + \frac{1}{3!8} \left(\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} h^4 k + \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} h^3 k^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} h^2 k^3 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} h k^4 \right) + \dots$$

und die Formel von *Mansion*³⁸⁶)

$$(203) \quad III \quad \left(z_{0, \frac{1}{2}} + z_{\frac{1}{2}, 0} + z_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}} + z_{\frac{1}{2}, 1} \right) \frac{kh}{4}$$

mit der Korrektion

$$- \frac{1}{2!24} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} h^3 k + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} h k^3 \right) \\ - \frac{1}{3!16} \left(\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} h^4 k + \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} h^3 k^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} h^2 k^3 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} h k^4 \right) - \dots$$

Aus II und III ergibt sich eine von *Wooley*³⁸⁷) gegebene Formel

$$(204) \quad IV = \frac{1}{3} (2 \cdot III + II) \quad \frac{hk}{6} \left(z_{0, \frac{1}{2}} + z_{\frac{1}{2}, 0} + z_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}} + z_{\frac{1}{2}, 1} + 2 z_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}} \right)$$

mit der Korrektion

$$- \frac{1}{4!5!} \frac{\partial^4 f}{\partial x^4} h^5 k + \frac{1}{4!24} \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} h^3 k^3 - \frac{1}{4!5!} \frac{\partial^4 f}{\partial y^4} h k^5 \dots$$

384) *Biermann*, Monatshefte Math. Phys. 20 (1909), p. 321–326.

385) *Bugajev*, Moskauer math. Sammlung 20 (1898), p. 451–471.

386) *Mansion*, Annales de la soc. scient. de Bruxelles 6 B (1882), p. 228–32; Paris C. R. 95 (1882), p. 384–386. Mathesis II (1882) Anhang p. 1–6.

387) *Mechanics' Magazine* 1851, p. 262–68.

Zuerst findet sich die Formel (1851). Später wird sie besonders von englischen Schiffsbauern verwandt, so findet sie sich bei *Woolley* selbst³⁸⁸), *Merrifield*³⁸⁹), der sie auf die Berechnung der Momente erweitert³⁹⁰), *Russel*³⁹¹); ferner findet sie sich bei *Mansion*³⁸⁶) u. a. Aus I und II folgt eine von *Woolley*, *Mansion*³⁸⁶) und *Rimondini*³⁹²) gegebene Formel

$$(205) \quad V = \frac{1}{3} (2II + I) = \frac{hk}{12} (z_{00} + z_{01} + z_{10} + z_{11} + 8z_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}})$$

mit der Korrektur

$$- \frac{1}{4!5!} \frac{\partial^4 f}{\partial x^4} h^5 k - \frac{1}{4!12} \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y} h^3 k^3 - \frac{1}{4!5!} \frac{\partial^4 f}{\partial y^4} h k^5.$$

Aus den letzten beiden Formeln folgert man sogleich die verallgemeinerte *Simpsonsche* Formel³⁷⁹)³⁹³)

$$(206) \quad VI = \frac{1}{3} (V + 2IV) \\ = \frac{kh}{36} \left[(z_{00} + z_{01} + z_{10} + z_{11}) + 4 \left(z_{0, \frac{1}{2}} + z_{\frac{1}{2}, 0} + z_{1, \frac{1}{2}} + z_{\frac{1}{2}, 1} \right) + 16z_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}} \right]$$

mit der Korrektur

$$- \frac{1}{4!5!} \frac{\partial^4 f}{\partial x^4} h^5 k - \frac{1}{4!5!} \frac{\partial^4 f}{\partial y^4} h k^5.$$

*Biermann*³⁷⁸) weist darauf hin, daß die hier auftretenden neun Ordinaten durch weniger ersetzt werden können, wenn man die Aufgabe so stellt: es ist durch ein Paraboloid anzunähern. Die Formel geht dann z. B. über in

$$(207) \quad VII = \frac{kh}{36} \left[12z_{00} - 12 \left(z_{0, \frac{1}{2}} + z_{\frac{1}{2}, 0} \right) + 36z_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}} + 6(z_{0,1} + z_{1,0}) \right],$$

wenn man nur die in dem von einer Diagonale begrenzten Dreieck liegenden Punkte benutzen will. Die Korrektur wird

$$+ \frac{1}{3!8} \left(\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} h^3 k^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} h^2 k^3 \right) \\ + \frac{1}{4!120} \left(- \frac{\partial^4 f}{\partial x^4} h^5 k + 30 \frac{\partial^4 f}{\partial x^3 \partial y} h^4 k^2 + 35 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} h^3 k^3 \right. \\ \left. + 30 \frac{\partial^4 f}{\partial x \partial y^3} h^2 k^4 - \frac{\partial^4 f}{\partial y^4} h k^5 \right) \dots$$

388) *Woolley*, Transactions of the Institution of Naval Architects I (1860), p. 17.

389) *Merrifield*, Transactions of the Institutions of Naval Architects VI (1865), p. 40—48.

390) *Merrifield*, Transaction of the Institutions of Naval Architects VIII (1867), p. 210—12.

391) *Russel*, The modern system of naval architecture, London, Chap. XIX, p. 117—147.

392) *Rimondini*, Atti della R. Accad. di Torino 40 (1905), p. 168—177.

393) *Rimondini*, Atti della R. Acad. di Torino 41 (1906), p. 728—738.

*Wolley*³⁸⁷⁾ leitet seine Formel IV durch ähnliche Betrachtungen aus der Formel VI ab. Für die Formeln III—V gibt *Mansion*³⁹⁴⁾ ganz ähnliche Ausdrücke für die oberen Fehlergrenzen, wie sie an anderer Stelle²⁹⁶⁾ von ihm für die Quadraturformeln gegeben sind.

Mehr noch als bei der Quadratur ist bei Anwendung der Kubaturformeln eine praktische Anordnung der Rechnung nötig. Beispiele einer praktischen Anordnung sowohl für die Volumberechnung, wie für die Berechnung des Flächeninhaltes krummer Flächen, die nach denselben Formeln ausgeführt werden kann³⁹⁵⁾, finden sich besonders wieder in der schiffsbautechnischen Literatur^{395a)}.

*Merrifield*³⁸⁹⁾ überträgt die Betrachtungen die von der verallgemeinerten *Simpson*schen zur *Woolley*schen Formel geführt haben auf dreifache Integrale und zeigt, daß die ursprünglich auftretenden 27 Ordinaten sich auf 6 reduzieren lassen; und zwar ist der Wert des Integrales gleich der Summe der 6 Werte, die die Funktion in der Mitte der Grenzflächen des Parallelepipedes von den Kantenlängen $2h$, $2k$ und $2l$ annimmt, multipliziert mit $\frac{4}{3} k \cdot h \cdot l$. *Purkiss*³⁹⁶⁾ erweitert diese Formeln auf n -fache Integrale von Funktionen von n Variablen.

e) *Graphische Methoden*. Um ein Doppelintegral in einem endlichen Bereich graphisch auszuwerten, kann man, falls $f(x, y)$ in kotierter Projektion gegeben ist, eine ähnliche Methode anwenden, wie sie die Geographen zur Bestimmung der mittleren Höhe eines Gebietes verwenden³⁹⁷⁾. Durch Integration stellt man den Inhalt der einzelnen Höhenkurven fest, und zwar nimmt man am besten stets dieselbe Integrationsbasis. Die Endordinaten dieser Integralkurven trägt man als Ordinaten zu den dazu gehörenden Höhen als Abszissen auf, legt durch die Endpunkte eine glatte Kurve und integriert diese abermals. Die Endordinate dieser Integralkurve ist ein Maß für den Wert obigen Integrals in dem betrachteten Gebiet. Man kann auch zunächst

$$z_1 = \int f(x, y_1) dx, \quad z_2 = \int f(x, y_2) dx, \dots$$

394) *Mansion*, Mathesis II (1882) Anhang p. 1—6; Mathesis IV (1884) Anhang p. 15—18.

395) *Merrifield*, Transactions of the Institution of Naval Architects 6 (1865), p. 64—72.

395a) Z. B. *Napier*, *Rankine*, *Barnes* and *Watts*, Shipsbuilding, theoretical and practical p. 46. Besonders aber vgl. die verschiedenen Jahrgänge der Trans. of the Inst. of Nav. Arch.

396) *Purkiss*, Trans. of the Inst. of Naval Architects VI (1865), p. 48—50.

397) Z. B. *Leidner*, Orometrie des Harzgebirges, Dissertation Halle 1886; *Dittenberger*, Zur Kritik der neueren Fortschritte der Orometrie, Halle 1903; *Wagner*, Orometrie des ostfälischen Hügellandes links der Leine, Stuttgart 1904.

in den zugehörigen Grenzen integrieren, z_n als Ordinate zu y_n auftragen und die durch die Endpunkte gelegte glatte Kurve integrieren. Wesentlich schneller führt eine von *Bjerkness*⁴⁰⁹⁾ angegebene ähnliche Methode zum Ziel, doch ist dieselbe bedeutend ungenauer. Ähnlich schlägt *Solin* vor²⁷⁹⁾, zur Berechnung einer Fläche z , die durch das totale Differential $dz = Mdx + Ndy$ bestimmt ist, wo $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ ist, vom Punkt x, y, z aus zunächst durch Quadratur $z = \int M(x, y_0) dx$ zu bestimmen und dann in den dazu senkrechten Ebenen durch Quadratur der Reihe nach $z = \int N(x_0, y) dy$, $z = \int N(x_1, y) dy$ usw., indem man $z = \int M(x, y_0) dx$ als Leitlinie benutzt.

Ist $f(x, y)$ eine homogene algebraische Funktion, so gibt es Methoden, aus Kurven, die diese Funktion bestimmen, und aus der Grenzkurve des Bereiches durch punktweise Konstruktion neue Kurven herzuleiten, deren Flächeninhalt dem Integral entspricht, so daß nur eine Integration nötig ist. Derartige Methoden sind besonders zur Konstruktion von Trägheitsmomenten usw. benutzt worden.³⁹⁸⁾

14. Differentiation. a) Die *numerische Differentiation* (vgl. I D 3 (*J. Bauschinger*) Interpolation, Nr. 8) besitzt ein sehr beschränktes Anwendungsgebiet, weil man bei analytisch gegebenen Funktionen im allgemeinen die direkte Ausführung vorziehen wird, und weil es bei empirisch gegebenen Funktionen nicht immer unbedenklich ist, aus einzelnen Punkten auf den Differentialquotienten zu schließen.

Sind äquidistante Punkte gegeben, so benutzt man die Differenzmethode, und zwar verwendet man auch hier meist in einer Zeile gelegene Differenzen. Man erhält so z. B. für den ersten und zweiten Differentialquotienten

$$(205) \quad \omega f' \left(a + \frac{1}{2} \omega \right) = \left[a + \frac{1}{2}, 1 \right] - \frac{1}{24} \left[a + \frac{1}{2}, 3 \right] + \frac{3}{640} \left[a + \frac{1}{2}, 5 \right] \dots$$

$$\omega^2 f'' \left(a + \frac{1}{2} \omega \right) = \left[a + \frac{1}{2}, 2 \right] - \frac{5}{24} \left[a + \frac{1}{2}, 4 \right] + \frac{259}{5760} \left[a + \frac{1}{2}, 6 \right] \dots$$

Ableitungen dieser und ähnlicher Formeln finden sich in den in Nr. **10** angegebenen Abhandlungen; vgl. auch die Arbeiten von *Everett*³⁹⁹⁾, *Runge*⁴⁰⁰⁾ und *Sheppard*.⁴⁰¹⁾ Die Koeffizienten findet man in den Tafeln von *Bauschinger*.²⁰⁴⁾ Sind die Kurven punktweise etwa durch Ver-

398) Z. B. *Lewicki*, Civilingenieur 1879; *d'Ocagne*, Bull. de la Soc. math. de France 12 (1884); *Assur*, Zeitschr. Math. Phys. 60 (1911), p. 1—60.

399) *Everett*, Nature 60 (1899), p. 271.

400) *Runge*, Nature 60 (1899), p. 365—366.

401) *Sheppard*, Nature 60 (1899), p. 390—391.

suche bestimmt, so hat man durch sie eine glatte Kurve zu legen, die allerdings oft nicht durch alle Punkte gehen wird. Rechnerisch kann man das dadurch ausführen⁴⁰²), daß man in einem Polynom

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

die a so bestimmt, daß

$$M = \int_{x_1}^{x_2} [f(x) - P(x)]^2 dx$$

ein Minimum wird, falls $f(x)$ die wahre Gleichung der Kurve ist. Das liefert $n + 1$ lineare Gleichungen, aus denen sich die a bestimmen

lassen. Das konstante Glied, das die Form $\int_{x_1}^{x_2} x^r f(x) dx$ hat, kann man durch angenäherte Quadratur berechnen. Um den Differentialquotienten zu finden, wird man dann $P(x)$ statt $f(x)$ differenzieren. Die Differentiation wird so also auf Integrationen zurückgeführt.

Sind die Kurven durch physikalische Untersuchungen festgestellt, so muß man ferner bedenken, daß gewisse Meßinstrumente eine Integration vornehmen, und daß man, um die wirklichen Werte zu erhalten, eine Art Differentiation vornehmen muß. Allgemeine Regeln lassen sich darüber nicht aufstellen. Den Fall bolometrischer Messungen im Spektrum haben *Strutt*⁴⁰³) und *Runge*⁴⁰⁴) behandelt.

b) Auch die *graphische Differentiation* ist nicht mit derselben Genauigkeit ausführbar wie die umgekehrte Aufgabe, da durch eine graphisch gegebene Kurve die Tangenten in den einzelnen Punkten nur sehr ungenau bestimmt sind.⁴⁰⁵) Man bestimmt da zur Differentiation entweder den Differenzenquotienten, und zwar kann man dazu die Kurve um ein kleines Stück parallel zur X-Achse verschieben und die Ordinatendifferenz als Ordinate der Differentialkurve nehmen, oder man bestimmt direkt die Tangenten⁴⁰⁶). Apparate dazu sind z. B. von *Reusch*⁴⁰⁷), *Wagener*⁴⁰⁸), *Bjerkness*⁴⁰⁹), *Pflüger*⁴¹⁰) u. a. angegeben.

402) v. Sanden, Archiv für Elektrotechnik 2 (1914), p. 52—57.

403) Strutt, Philosophical Magazine 42 (1871), p. 441—444.

404) Runge, Zeitschr. Math. Phys. 42 (1897), p. 205—213.

405) Vgl. z. B. *Solin-Baldermann* u. A. Interessant ist ferner eine von *Cassebaum* (Diss. Göttingen 1910) angegebene Methode, die erlaubt, die Differentialkurve graphisch zu bestimmen, wenn die Integralkurve zu einer logarithmischen Skala aufgetragen ist.

406) *Slaby*, Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ingenieure 58 (1913), p. 821 verwendet die erste Methode, die zweite findet sich z. B. bei *Christmann-Baer*, Grundzüge der Kinematik, Berlin 1910, p. 84—86.

407) *Reusch*, Carls Repertorium für experimentelle Physiologie 16 (1880), p. 255; *Mack*, Zeitschr. Math. Phys. 52 (1905), p. 435—36.

Am besten geht man bei der graphischen Bestimmung der Tangenten nicht von bestimmten Kurvenpunkten aus, sondern nimmt ein passendes Richtlinienbüschel an. Benutzt man quadriertes Papier, so ist es praktisch, die Richtlinien die Y -Achse in Punkten der Quadrierung treffen zu lassen. Parallel zu jeder dieser Richtlinien zieht man eine Anzahl Sehnen der Kurve nahe der Stelle, wo die Kurventangente der betreffenden Richtlinie parallel läuft, wie das Fig. 23 zeigt. Verbindet




Fig. 23.

man die Mitten dieser Sehnen durch eine glatte Kurve, so kann man den Punkt extrapolieren, dessen Tangente parallel zur entsprechenden Richtlinie ist. Auf diese Weise findet man einen Tangenzug⁴¹¹⁾. Als Anhalt für die Differentialkurve erhält man eine Stufenkurve, deren Parallelen zur Y -Achse durch die Schnitte aufeinander folgender Tangenten gehen und deren Parallelen zur X -Achse durch den Schnitt der entsprechenden Richtlinie mit der Y -Achse bestimmt sind. In diese Stufenkurve muß die Differentialkurve eingezeichnet werden, und zwar so, daß die zur X -Achse parallelen Stücke der Stufenkurve in Punkten geschnitten werden, die dieselbe Abszisse haben wie die Berührungspunkte der zugehörigen Tangenten, und daß die krummlinigen Dreiecke, die ein und derselben Parallelen zur Y -Achse anliegen, möglichst inhaltsgleich sind.⁴¹²⁾ Selbstverständlich wird im allgemeinen die so gefundene Kurve möglichst glatt verlaufen müssen.

408) *Wagner*, Auswerten und Indizieren von Kurbelweg- und Zeitdiagrammen, Berlin 1906, p. 72—80.

409) *Bjerkness*, Dynamische Meteorologie und Hydrographie II, Braunschweig 1913 (deutsch von Kirchner) Kap. 9, p. 93—124.

410) *Pflüger*, Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 58 (1914), p. 880—81.

411) *Lambert*, Beiträge zum Gebrauch der Mathematik und deren Anwendungen II, Berlin 1770, 2. Abhandlung, § 21.

Betrachtungen über die Differentiation im durch kotierte Projektion dargestellten Felde eines Skalars, das durch Isogonen, oder eines Vektorfeldes, das durch Isogonen und Vektorlinien gegeben ist, finden sich bei *Bjerkness*⁴⁰⁹). Die Genauigkeit der dort gegebenen Methoden, die etwa die der Trapezregel ist, würde sich sehr leicht erhöhen lassen. Da aber *Bjerkness* seine Methoden auf Wetterkarten anwendet, wo eine sehr große Anzahl solcher Operationen gemacht werden muß, würde eine genauere Methode zu langwierig sein, zumal auch die Daten nur sehr ungenau gegeben sind. *Bjerkness* zeigt auch, wie man auf zeichnerischem Wege die Divergenz und den curl eines solchen Feldes bildet.

II. Numerische und graphische Integration gewöhnlicher Differentialgleichungen.⁴¹³)

15. Bei der Integration gewöhnlicher Differentialgleichungen führen die *graphischen Methoden* am schnellsten zum Ziel und sind am übersichtlichsten; sie mögen daher hier zuerst besprochen werden.

a) Die Methode von *E. Czuber*⁴¹⁴) ist zunächst auf lineare Gleichungen erster Ordnung anwendbar. Sie benutzt die Tatsache, daß bei einer Gleichung

$$(206) \quad y' + yP(x) + Q(x) = 0$$

alle Linienelemente, die auf einer Parallelen zur *Y*-Achse liegen, von ein und demselben Punkte ausstrahlen. Alle diese Punkte liegen auf einer Kurve

$$(207) \quad \xi = x + \frac{1}{P(x)}, \quad \eta = -\frac{Q(x)}{P(x)}.$$

Man zeichnet die zu den einzelnen Parallelen zur *Y*-Achse gehörenden Punkte und kann dann die Integralkurve, deren Anfangspunkt oder Anfangsrichtung gegeben ist, leicht aus Geraden oder Parabelstücken zusammensetzen. Bei Annäherung durch Parabeln zweiter Ordnung schneiden sich dabei die Tangenten der Punkte auf den Parallelen auf den Mittellinien dieser Parallelen (Fig. 24). Eine andere Methode zur möglichst genauen Einzeichnung der Integralkurve unter Benutzung einer Integralkurve der Gleichung $y' + P(x)y = 0$ gibt *Sobotka*.⁴¹⁵)

412) Z. B. *Holzer*, Zeitschrift für das gesamte Turbinenwesen 10 (1913), p. 455—56.

413) Über Gleichungen, die durch wiederholte Quadratur zu integrieren sind, soll hier nicht gesprochen werden. Näheres über solche Gleichungen findet sich: *Nehls*, Über graphisch-mechanisches Integrieren, Zivilingenieur XXI, (1875) 199 ff.

414) *E. Czuber*, Zeitschr. Math. Phys. 44 (1899), p. 41—49.

415) *Sobotka*, Časopis pro pestovani Matematiky a fysiky 31, Prag 1902, p. 10—23, 97—105, 177—188, 265—273.

Ist $P(x)$ konstant, so haben die Parallelen und die Punkte ξ, η immer gleichen Abstand, so daß es genügt, die Kurve zu zeichnen, ohne die einzelnen Punkte zu markieren. Wir haben damit auch das Prinzip,




Fig. 24.

auf dem der *Pascalsche* Integrator aufgebaut ist.⁴¹⁶⁾ Wählt man die Integralkurven als neue ξ, η -Kurve, so kann man durch wiederholte Ausführung obiger Operation gewisse lineare Differentialgleichungen beliebig hoher Ordnung integrieren; doch muß man dann eine jedesmalige Umzeichnung der Integralkurven vornehmen. Will man das nicht, so kann man nur bestimmte lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten oder solche, deren Koeffizienten sich alle in bestimmter Weise durch eine Funktion ausdrücken lassen, integrieren.⁴¹⁷⁾

416) E. Pascal, Rendiconti della R. Accademia dei Lincei (5) XVIII (1909) u. Giorn. di Mat. di Battaglini (3) 48 (1910), p. 16 ff.

417) A. Potier, Anhang 4 zu Abdank-Abakanowitz, Die Integrgraphen, Leipzig 1889. Fr. A. Willers, Zum Integrator von E. Pascal, Zeitschr. Math. Phys. 59 (1910), p. 36 ff. E. Pascal, Giorn. di Mat. di Battaglini (3) 49 (1911), p. 155 ff.;

Ähnliche durch Umformung des sog. Stangenplanimeters, wie es Prytz⁴¹⁸), Runge⁴¹⁹), Klerit⁴²⁰) u. a. beschrieben haben, gewonnene Integrappen haben Petrovitch⁴²¹) und Jakob⁴²²) angegeben.⁴²³)

Die Methode von Czuber erweitert Sobotka⁴¹⁵) auf Gleichungen der Form

$$(208) \quad (L(x) \cdot y - M(x))y' + P(x) \cdot y = Q(x)$$

wo L, M, P und Q einwertige Funktionen von x sind. Die Richtungen, die zu den Punkten einer zur Y -Achse parallelen Geraden gehören, sind dann Tangenten einer Parabel, deren Brennpunkt die Koordinaten

$$(209) \quad \xi = x + \frac{PM + LQ}{P^2 + L^2}; \quad \eta = \frac{QP - ML}{P^2 + L^2}$$

hat. Die Konstruktion ist im einzelnen aus nebenstehender Figur 25 zu ersehen.

Weiter wäre hier noch die Methode von Láška⁴²⁴) zu erwähnen, der Gleichungen der Form

$$f\left(x + y \frac{dy}{dx}, y\right) = 0$$

mittels der Kurve $f(\xi, \eta) = 0$ integriert, wo $\xi = x + y \frac{dy}{dx}$ und $\eta = y$ ist. Da die Normale

der Integralkurve also durch $\frac{dx}{dy} = \frac{y}{\xi - x}$ bestimmt ist, und da $\Delta y = \Delta \eta$ ist, kann man sie annäherungsweise aus einzelnen Geradenstücken leicht zusammensetzen.

b) In der Geophysik, besonders häufig in der Hydrographie⁴²⁵) und




Fig. 25.

50 (1912), p. 265—83, 354. Rend. del Reale Accademia delle scienze di Napoli (3) 17 (1911), p. 405—10; (3) 18 (1912), p. 19—24; (3) 19 (1913); Rend. d. R. Accademia da Lincei (5) 22 (1913), (von 31. V.). Ajello, Rend. del Reale Accademia delle scienze di Napoli (3) 18 (1912), p. 25—28 (vgl. auch II A 2, Nr. 56—59).

418) Prytz, Tidsskrift for Opmaalings og Matrikulvalsem. 1895, p. 383—92.

419) Runge, Zeitschrift für Vermessungswesen 24 (1895), p. 321 ff.

420) Klerit, Dinglers polytechnisches Journal 305 (1897).

421) Petrovitch, Bull. de la soc. math. de France 27 (1899), p. 200—205.

422) Jakob, Le calcul mécanique, Paris 1911 (s. auch die Literaturangaben).

423) Galle, Mathematische Instrumente, Leipzig 1912.

424) Láška, Sitzungsberichte d. kgl. böhm. Gesellschaft d. Wiss. (Math.-Nat. Klasse) 1 (1890), p. 222—25.

425) Sandström, Windströme im Gullmarfjord, Svenska Hydrographisk Biologiska Kommissionens skrifter, Gotenburg 1905.

der Meteorologie wird die *Methode der Kurven gleicher Neigung* (*Isoklinen, Isogonen*)⁴²⁶) verwandt. Sie läßt sich zur Integration gewöhnlicher Differentialgleichungen erster Ordnung verwenden. Ist $F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0$ die gegebene Gleichung, so zeichnet man die Kurven gleicher Neigung $F(x, y, a) = 0$. Um die Isogonen mit kurzen Richtungslinien in großer Zahl zu versehen und dadurch die Konstruktion der Integralkurven zu erleichtern, hat *Söderberg*⁴²⁶) einen Apparat konstruiert. Eine Abänderung desselben für Karten in Kegelprojektion gibt *Bjerkness* an. Einfacher schneidet man die Isoklinen nach *d'Ocagnes* Vorschlag⁴²⁸) mit der Direktrix $F(xyy)$, projiziert die Schnittpunkte auf die y -Achse und verbindet die Projektionen mit einem Pol. Diese Verbindungslinien geben die zugehörigen Richtungen. Die Ordinate des Anfangspunktes kann als Integrationskonstante dienen. Gehören zu ihr mehrere Richtungen, so erhält man eine entsprechende Zahl von Integralkurven. An der Hand der Kurven gleicher Neigung lassen sich die Singularitäten der Integrale von Differentialgleichungen erster Ordnung sehr gut diskutieren.⁴²⁷) Eine große Zahl von Kurvenbildern hat *Sandström*⁴²⁹) unter Benutzung des Apparates von *Söderberg* gezeichnet.

Die Integralkurven erhält man dadurch, daß man Kurven einzeichnet, die auf jeder Isokline möglichst die vorgeschriebene Neigung haben (Fig. 30). *Solin*⁴²⁷) schlägt vor, die Ecken des umschriebenen Polygons möglichst in die Mitte zwischen die Schnittpunkte mit den Kurven gleicher Neigung zu legen. *d'Ocagne*⁴²⁸) gibt eine Methode, um die Integralkurven durch Parabelbogen zweiter Ordnung anzunähern, die darauf beruht, daß die Parallelen zur Y -Achse durch die Berührungspunkte und den Schnittpunkt der Tangenten äquidistant sein müssen. Das Nähere gibt Fig. 26.

c) Sehr häufig wird auch die für Differentialgleichungen zweiter Ordnung besonders bequeme, allerdings nicht rein graphische *Methode der Krümmungsradien* angewandt. Die Gleichung wird dabei so umgeformt, daß der Krümmungsradius der Integralkurve als Funktion des Ortes und der Richtung erscheint; die Kurve wird dann Stück

426) *Bjerknes*, Dynamische Meteorologie und Hydrographie II, Braunschweig 1913, Kap. VII, p. 59—64.

427) *Massau* I, Buch V, Kap. III u. IV. Angewandt auf den Fall, wo die Gleichung der Isoklinen $x^3y^3 = x - y$ ist. *Solin*, Über graphische Integration, Prag 1872. Angewandt auf die Gleichung $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$. *Nehls*²⁵⁷).

428) *d'Ocagne*, Calcul graphique et Nomographie Paris 1908, Nr. 41—43.

429) *Sandström*, Annalen der Hydrographie und der maritimen Meteorologie 1909, p. 242—254.

für Stück aus Kreisbogen zusammengesetzt.⁴³⁰⁾ Die Methode benutzen z. B. Thomson für die Kapillaritätsgleichung⁴³¹⁾ und für gewisse Fälle des Drei-Körperproblems⁴³²⁾, Wiechert⁴³³⁾ zur Bestimmung des Weges der Erdbebenwellen aus der Laufzeitkurve, Lancheester⁴³⁴⁾ zur Bestim-




Fig. 26.




Fig. 27.

mung der Bahnkurve eines Aeroplans usw. Man vermag, wenn man bei einiger Übung für die Krümmungsradien passende Mittelwerte wählt, eine in den meisten Fällen ausreichende Genauigkeit zu erzielen. Wegen der Schnelligkeit der Ausführung ist die Methode sehr brauchbar, besonders in der von Boys⁴³⁵⁾ angegebenen Form für die Kapillaritätsgleichung. Hier handelt es sich nämlich, wenn P die Punkte der Kurve, M die Mittelpunkte der Krümmungskreise und N die Schnitte der Normalen mit der Rotationsachse sind, um die Gleichung:

$$(210) \quad \frac{1}{P_2 M_2} = \frac{1}{P_1 M_1} + \frac{1}{P_1 N_1} - \frac{1}{P_1 N_2} + \beta(y_2 - y_1).$$

Boys stellt nun die Strecke PN durch ein Lineal dar, auf dem eine Skala für $\frac{1}{PN}$ angebracht ist. Dadurch wird die Bestimmung von $P_2 M_2$ aus $P_1 N_1$ sehr erleichtert. Der Drehpunkt wird durch einen kleinen Dreifuß festgelegt, dessen einer Fuß auf den betreffenden Punkt der Skala des Lineales, dessen beiden andere Füße auf das Papier gesetzt werden.

430) Nach Cranz, Lehrbuch der Ballistik 1, p. 174, 75 soll diese Methode zur Konstruktion der Ballistischen Kurven schon von Poncelet, Leçons de mécanique industrielle II, Metz 1828/29, p. 55 und Didion, Traité de balistique Paris 1848, 1860, p. 196 angewandt worden sein.

431) Thomson, Popular lectures and adresses I, p. 1 ff.

432) Lord Kelvin, Brit. Ass. Rep. Edinb. 62 (1892), p. 648—52. Philosophical Magazine (5) 34 (1892), p. 443—448.

433) Wiechert u. Zöppritz, Über Erdbebenwellen I, § 20, Gött. Nachr. 1907.

434) Lancheester, Aerodnetics Chap. III, London 1908, deutsch von C. u. A. Runge, Leipzig 1911.

435) C. V. Boys, Phil. Mag. V, 36 (1893), p. 75. Nature 48 (1893), p. 116.

Vereinfacht hat *Meißner*⁴³⁶⁾ diese Methode dadurch, daß er statt der Punktkoordinaten x, y Linienkoordinaten u, p einführt, die mit x, y durch die Gleichung

$$(211) \quad x \cdot \cos u + y \cdot \sin u - p = 0$$

zusammenhängen. Man erhält so für jede Funktion $p(u)$ unendlich viele Gerade, die eine Kurve C umhüllen, durch deren Verlauf $p(u)$




Fig. 28.

bestimmt ist. Da $p'(u)$ der Nullpunktsabstand der Normalen im Berührungspunkte der Geraden $p(u)$ mit der Kurve C ist, dasselbe für $p''(u)$ hinsichtlich $p'(u)$ und der entsprechenden Kurve C' gilt usw., so sieht man, daß der Krümmungsradius der Kurve C

$$(212) \quad \rho(u) = p''(u) + p(u)$$

ist, daß also hier der Zusammenhang von ρ mit den Ableitungen wesentlich einfacher ist als bei gewöhnlichen Punktkoordinaten.

Für die Ausführung empfiehlt es sich, die Winkeländerungen immer gleich zu nehmen, falls nicht besondere Gründe eine Änderung nötig erscheinen lassen. Man zeichnet zunächst mit ρ_0 einen Bogen mit der Winkelöffnung Δu , für den so gefundenen Punkt berechnet man ρ_1^* und ersetzt den ersten Bogen durch einen solchen mit dem Radius $\frac{\rho_0 + \rho_1^*}{2}$, das wiederholt man, bis keine Änderung mehr eintritt. *Meißner* deutet an wie sich die Methode auf Differentialgleichungen höherer Ordnung übertragen läßt.

d) Zur graphischen Integration spezieller Differentialgleichungen gibt es natürlich noch besondere Methoden, die auf speziellen Eigenschaften der betreffenden Integralkurven beruhen. Insbesondere lassen sich alle die Eigenschaften von Kurven, die zur Konstruktion von Apparaten zum Zeichnen der Kurven gedient haben, auch zur graphischen Integration der zugehörigen Differentialgleichungen verwenden.⁴³⁷⁾ Ferner sei auf die graphischen und numerischen Methoden der Ballistik hingewiesen.⁴³⁸⁾

436) *Meißner*, Schweizer Bauzeitung 62 (1913), Nr. 15, 16.

437) Z. B. *Schimmack*, Ein kinematisches Prinzip und seine Anwendung zu einem Katenographen, Zeitschr. Math. Phys. 52 (1905), p. 341–47; *Schilling*, Über neue kinematische Modelle, Zeitschr. Math. Phys. 44 (1899), 51 (1904) und 54 (1906); ferner Jahresber. d. Deutsch. Math.-Ver. XI (1902).

438) *Cranz*, Lehrbuch der Ballistik 1, Leipzig 1910.

16. Eine Reihe mehr rechnerischer Methoden suchen in aufeinanderfolgenden Intervallen möglichst viele Glieder der in eine Taylor'sche Reihe entwickelten Lösung darzustellen.

a) *Ältere Methoden.* Die ältesten Versuche dieser Art, die allerdings den ganzen Verlauf der Kurve durch eine Reihe darstellen wollen, ohne sich weiter um deren Konvergenz zu kümmern, suchen, wie es z. B. *Newton*⁴³⁹), *Leibniz*⁴⁴⁰), *Kästner*⁴⁴¹), *Euler*⁴⁴²) u. a. tun, die Lösung in einer Potenzreihe darzustellen, deren Konstanten man durch Einsetzen in die Gleichung und Nullsetzen der Koeffizienten der einzelnen Potenzen von x nacheinander bestimmt. Diese Methode ist von *Lagrange*⁴⁴³) auf die Entwicklung der Lösung in einen Kettenbruch übertragen worden. Ähnlich verfährt auch *Kramp*⁴⁴⁴), der vorschlägt, den ganzen Verlauf der Integralkurve durch eine Reihe

$$(213) \quad y = \varphi(x) = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + \dots + Rx^m$$

darzustellen und die Koeffizienten der Reihe dadurch zu bestimmen, daß man diesen Wert von y und die daraus gebildeten Werte y' , y'' , etc. in die gegebene Gleichung

$$(214) \quad F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

einsetzt; man erhält so eine Gleichung zwischen den Größen x, A, B, \dots, R . In diese setzt man der Reihe nach für passend gewählte ε statt x die Werte $a, a + \varepsilon, a + 2\varepsilon$, etc. ein. So kann man $m - n + 1$ Gleichungen zwischen den Koeffizienten A, B, C, \dots erhalten, aus denen diese berechnet werden können, wenn man noch die n durch die Anfangswerte gegebenen Bedingungen hinzunimmt. Man erhält so eine angenäherte Lösung für die Umgebung des Punktes $x = a$, die den vorgeschriebenen Anfangsbedingungen genügt. *Kramp* zeigt die Genauigkeit seiner Methode an einer Reihe von Gleichungen erster

439) *Newton*, Brief an Oldenburg vom 24. X. 1676 siehe: *Gerhardt*, Briefwechsel von G. W. Leibniz mit Mathematikern, Berlin 1899. Ferner *Newton*, Principia philosophiae naturalis Buch II, vgl. auch *Poincaré*, Wissenschaft und Methode, deutsch von F. u. L. *Landemann*, Leipzig 1914, p. 264.

440) Z. B. *Leibniz*, Acta eruditorum 1693, abgedruckt, Oswalds Klassiker Nr. 162, p. 19 ff.

441) *Kästner*, Anfangsgründe der Analysis des Unendlichen (1. Aufl. 1761) 2. Aufl., Göttingen 1770, p. 404—27. *Kästner* teilt § 465 mit, daß in Briefen aus dem Jahre 1733 und 36 von *Nikolaus Bernoulli* an *Stirling* und *Cramer* diese Methode angegeben werde.

442) *Euler*, Institutionum calculi integralis Vol. 1, Teil 2, Kap. 7, § 655, Petersburg 1768 (3. Aufl. 1824); Vol. 2, Teil 1, Kap. 7 und 8 (3. Aufl. 1827).

443) *Lagrange*, Nouveaux mémoires de l'Acad. roy. à Berlin 1776, p. 236—64.

444) *Kramp*, Annales de mathématique de Gergonne 10 (1819/20), p. 1—33.

Ordnung, die sich auch in geschlossener Form integrieren lassen.⁴⁴⁵) Angewandt ist diese Methode sonst wohl kaum.

Etwas anders verfahren *Euler*⁴⁴⁶), *Lacroix*⁴⁴⁷) u. a., die die höheren Ableitungen in einem Punkte mittels der Gleichung durch die ev. als Anfangsbedingungen gegebenen niederen Ableitungen bestimmen und für die Lösung eine Taylorsche Reihe ansetzen.

b) *Methode von Runge-Heun-Kutta*. Die einfachste Methode, die wirklich in Intervalle teilt, ist die *Cauchysche* Differenzenmethode⁴⁴⁸), die die Gleichung $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ einfach durch die Differenzgleichung $\Delta y = f(x, y) \Delta x$ ersetzt (vgl. II A 4a (*P. Painlevé*) Gewöhnliche Differentialgleichungen; Existenz der Lösungen, Nr. 3—8). Präzisiert und vereinfacht ist diese Methode, die ursprünglich zum Existenzbeweis dient, von *Lipschitz*⁴⁴⁹); daß man sie zur Berechnung verwenden kann, zeigt z. B. *Painlevé*.⁴⁵⁰) Ein durchgerechnetes Beispiel findet sich bei *d'Adhémar*⁴⁵¹); zur graphischen Konstruktion verwendete sie *Froude*⁴⁵²), *Picciatti*⁴⁵³) u. a. Häufig findet man diese Methode in der Technik.⁴⁵⁴) Sie ist dadurch wesentlich verbessert worden, daß man eine Reihe der im vorigen Abschnitt besprochenen Quadraturformeln auf die Differentialgleichungen übertragen hat.⁴⁵⁵) Eine Reihe so gefundener Formeln geben *Runge*⁴⁵⁶), *Heun*⁴⁵⁷) und *Kutta*⁴⁵⁸). Diese sind ursprünglich für

445) *Kramp*, Annales de mathématique de Gergonne 10 (1819/20), p. 317—41 und 361—79.

446) *Euler*, Institutionum calculi integralis Vol. 1, Petersburg 1768 (3. Aufl. 1824) Abschnitt II, Kap. 7, § 656—67; Vol. 2 (3. Aufl. 1827) Kap. 12, p. 282—98.

447) *Lacroix*, Integralrechnung, p. 284—96.

448) *Cauchy*, Leçons (herausgegeben von Moigno) 1844 als Vorlesung über die Integralrechnung übersetzt von Schnuse, Braunschweig 1876, insbesondere Vorlesung 25—28, p. 279—323.

449) *Lipschitz*, Lehrbuch der Analysis II, Differential- und Integralrechnung, Bonn 1880, p. 500 ff., s. a. *Picard*, Traité d'Analyse II, Paris 1905, p. 322 ff.

450) *Painlevé*, Paris C. R. 128 (1899), p. 1505—8.

451) *Montessus et d'Adhémar*, Calcul numérique, Paris 1911, p. 218—20.

452) *Froude*, Transactions of the Institution of Naval Architects 16 (1875), p. 57—70.

453) *Picciatti*, Il Politecnico 41 (1893), p. 493—503, 537—545.

454) Z. B. *Keller*, Berechnung gewölbter Platten. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1912, p. 1988 ff. (Forschungsarbeiten 124). Berechnung von Radscheiben, Schweizerische Bauzeitung 1909, p. 307; Die Turbine 1909, p. 88, *Fankhauser*, Die Festigkeit von kegel- und kugelförmigen Böden und Deckeln. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 58 (1914), p. 840—44, 922—28.

455) S. a. *Durand*, Annals of Mathematics 12 (1898), p. 110—117.

456) *Runge*, Math. Ann. 46 (1895), p. 167—78. Diese Methode ist eine Erweiterung der *Simpsonschen* Regel.

die numerische Auswertung gedacht⁴⁵⁹⁾, lassen sich aber auch sehr gut graphisch verwenden. Besonders brauchbar ist eine der von Kutta aufgestellten Formeln⁴⁶⁰⁾. Ist $y' = f(xy)$, so setzt man

$$\begin{aligned}
 \Delta'y &= f(xy) \cdot \Delta x, \\
 \Delta''y &= f(x + \frac{1}{2}\Delta x, y + \frac{1}{2}\Delta'y) \cdot \Delta x, \\
 \Delta'''y &= f(x + \frac{1}{2}\Delta x, y + \frac{1}{2}\Delta''y) \cdot \Delta x, \\
 \Delta^{(4)}y &= f(x + \Delta x, y + \Delta'''y) \Delta x, \\
 p &= \frac{1}{2}(\Delta'y + \Delta^{(4)}y), \quad q = \frac{1}{2}(\Delta''y + \Delta'''y), \\
 \Delta y &= q + \frac{1}{3}(p - q).
 \end{aligned}
 \tag{215}$$

Die graphische Ausführung dieser Methode zeigt Fig. 29. Die graphische Methode ist besonders dann zu empfehlen, wenn man die Richtungen in jedem beliebigen Punkte zeichnerisch leicht erhalten kann. Hat man so den Punkt $x + \Delta x$, $y + \Delta y$ konstruiert, so fährt man in gleicher Weise fort.⁴⁶¹⁾ Allgemeine Untersuchungen über Aufstellung derartiger Formeln hat neuerdings Runge⁴⁶²⁾ angestellt. Eine große Mannigfaltigkeit von




Fig. 29.

457) Heun, Zeitschr. Math. Phys. 45 (1900), p. 23—38 sucht die Gaußschen Formeln zu verallgemeinern.

458) Kutta, Zeitschr. Math. Phys. 46 (1901), p. 435—52 und Dissertation, München 1901.

459) Vgl. auch W. F. Sheppard, A Method for Extending the Accuracy of certain Mathematical Tables. Proceedings of the London Mathematical Society XXXI (1899), p. 423—48.

460) Koch, Über die praktische Anwendung der Runge-Kuttaschen Methode zur numerischen Integration von Differentialgleichungen. Diss. Göttingen 1909.

461) Ein ähnlicher Gedanke findet sich in Nehls, Über graphische Integration § 10. Dort wird die Integration von

$$\frac{dy}{dx} = f(x) + \varphi(y) = y_1$$

so vorgenommen, daß

$$\Delta y = y_1 \Delta x + y_1' \frac{\Delta x^2}{2} = (f(x) + \varphi(y))\Delta x + [f'(x) + \varphi'(y)(f(x) + \varphi(y))]\frac{\Delta x^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow [f(x) + f(x + \Delta x) + 2\varphi(y)]\frac{\Delta x}{2} + [f(x) + \varphi(y)]\left[\frac{\varphi(y + \delta) - \varphi(y)}{\delta}\right]\frac{\Delta x^2}{2}$$

gesetzt und das letzte Glied vernachlässigt wird. Ähnlich wird die Gleichung $\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot \varphi(y)$ behandelt.

462) Runge, Numerisches Rechnen. Autographiertes Vorlesungsheft, Göttingen 1912/13, p. 219—248.

Formeln haben dieselbe Genauigkeit wie die obige; sie geben die Glieder der Taylorsche Reihe, vierter Ordnung einschließlich richtig wieder.⁴⁶³⁾ Doch lassen sich die Formeln nicht so wählen, daß sämtliche Glieder fünfter Ordnung richtig dargestellt werden. Es läßt sich dies nur für einzelne erreichen z. B. für die von $\frac{\partial f}{\partial y}$ freien Glieder fünfter und sechster Ordnung. Die Formeln, die man so erhält, sind dann von Vorteil, wenn $f(x, y)$ sich mit y nur wenig ändert. An einem allgemeinen großen Gesichtspunkt fehlt es hier aber. Das Gesetz, nach dem sich der Fehler fortpflanzt, hat *Runge* aufgestellt.⁴⁶⁴⁾

*Kutta*⁴⁶⁵⁾ hat später gezeigt, daß der Ansatz sich auch auf Systeme von simultanen Differentialgleichungen erster Ordnung ausdehnen läßt und damit auch auf gewöhnliche Differentialgleichungen beliebiger Ordnung, die sich stets in ein System simultaner Gleichungen erster Ordnung verwandeln lassen. Graphisch hat man dann die obige Zeichnung gleichzeitig in ebensoviel Ebenen durchzuführen, als Gleichungen vorhanden sind.

Verwandt sind diese Methoden z. B. von *Boltze*⁴⁶⁶⁾ bei der Berechnung der Grenzschichten an Rotationskörpern in Flüssigkeiten mit kleiner Reibung, von *Koch*⁴⁶⁰⁾ auf Kapillaritätskurven und auf einen Fall des Dreikörperproblems, von *Hackett*⁴⁶⁷⁾ auf das Problem dreier Punkte, die einander mit konstanter Geschwindigkeit verfolgen (Formel von *Runge*), von *Hort*^{467*)} auf die Untersuchung des Bewegungsverlaufes in Einzylindermaschinen (ebenfalls Formel von *Runge*) von *Huber* und *Fuchs*⁴⁶⁸⁾ zur Berechnung der Hauptspannungstrajektorien bei der Deformation zweier aufeinander gepreßter Kreiszyylinder (eine der *Heun*-schen Formeln).

c) *Methoden der Differenzenrechnung.* Möglichst gut in Intervallen die Reihenentwicklung der Lösung anzunähern, versuchen auch die auf den Formeln von § 10 beruhenden, vielfach in der Himmelsmechanik angewandten Methoden. Es kommt bei diesen vor allem darauf an,

⁴⁶³⁾ *Kutta* gibt in der ⁴⁶⁸⁾ zitierten Arbeit Absatz V genauer an, wie sich die Abweichungen auf die einzelnen Glieder von der fünften Ordnung verteilen. Nicht die obige Formel, sondern eine Formel, die die Werte für $\frac{\Delta x}{2}$, $\frac{\Delta x}{3}$ und $\frac{2\Delta x}{3}$ benutzt, gibt die bessere Annäherung.

⁴⁶⁴⁾ *Runge*, Göttinger Nachrichten 1905, p. 252—57.

⁴⁶⁵⁾ *Emden*, Gaskugeln, Leipzig 1907, p. 92.

⁴⁶⁶⁾ *Boltze*, Dissertation, Göttingen 1908.

⁴⁶⁷⁾ *Hackett*, John Hopkins Univ. Circ. 208 (1908) Nr. 7, p. 135—37.

^{467*)} *Hort*, Die Differentialgleichungen des Ingenieurs, Berlin 1914, p. 135—63.

⁴⁶⁸⁾ *Huber* und *Fuchs*, Physikalische Zeitschrift 15 (1914), p. 298—303.

den Anfang des Schemas festzulegen. Dazu lößt man die Differentialgleichung nach der höchsten vorkommenden Ableitung, etwa der n^{ten} , auf und berechnet mit den gegebenen Anfangswerten für dieselbe einen angenäherten Wert. Diesen benutzt man zur vorläufigen Herstellung eines Differenzschemas, aus dem man nun nach den in Nr. 10 gegebenen Formeln verbesserte Werte der abhängigen Variablen ausrechnet. Diese führt man in die entsprechend umgeformte Differentialgleichung ein und findet einen neuen Wert für die n^{te} Ableitung, den man wiederum zur Herstellung eines Differenzschemas benutzt. Dies setzt man so lange fort, bis keine Änderung mehr eintritt. Beim nächsten Integralwert verfährt man genau so und geht so Schritt für Schritt weiter. Die besondere Form der Gleichung erleichtert dabei oft die Rechnung wesentlich. Beispiele zu dieser Methode finden sich in den in Nr. 10 angeführten Lehrbüchern.

17. Asymptotische Integration. Sehr brauchbar für die angenäherte Berechnung eines Integrales können unter Umständen die *Methoden der asymptotischen Integration* sein. Hängen in einer linearen Differentialgleichung die Koeffizienten der verschiedenen Ableitungen außer von der unabhängigen Variablen x noch von einem Parameter b ab, so besteht das Problem der asymptotischen Integration darin, Funktionen von x und b zu suchen, die, wenn $|b|$ groß gegenüber dem a wird, die gesuchten Integrale immer besser annähern. Der einfachste Fall

$$y'' + (b + a(x))y = 0$$

findet sich schon bei *Liouville*⁴⁶⁹) behandelt. Allgemein haben *Horn*⁴⁷⁰), *Schlesinger*⁴⁷¹), *Birkhoff*⁴⁷²) und *Love*⁴⁷³) diesen Fall behandelt, während *Blumenthal* die Methode nach der Seite der praktischen Anwendbarkeit ausgestaltet hat.⁴⁷⁴) Er betrachtet z. B. eine Gleichung

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + (a_n(x) + b^n)y = 0,$$

integriert statt dessen $y^{(n)} + b^n y = 0$ und schätzt den Fehler, der von der Größenordnung $\left| \frac{e^{\lambda x}}{b} \right|$ ist, wo λ eine Wurzel von $\lambda^n + b = 0$ ist, nach einem auf *Liouville* zurückgehenden Verfahren ab. Für gewisse Punkte, in denen oft gerade durch Bedingungen das gesuchte Integral fest-

469) *Liouville*, J. de math. 2 (1837).

470) *Horn*, Ann. Math. 52 (1899), p. 271—92, 340—62.

471) *Schlesinger*, Ann. Math. 63 (1907), p. 277—300.

472) *Birkhoff*, Transactions of the american mathematical society 9 (1908), p. 219—31.

473) *Love*, Amer. Journ. of math. 36 (1914), p. 151—60 (Literaturangaben).

474) *Blumenthal*, Arch. Math. Phys. (3) 19 (1912), p. 136—47.

gelegt ist, gilt bisweilen die gefundene Darstellung nicht. Wie man sich da auf verschiedene Art helfen kann, führt *Blumenthal* in verschiedenen Arbeiten aus, in denen er seine Methode auf asymptotische Darstellung der Kugelfunktionen⁴⁷⁴), Berechnung der Spannung in einer Kugelschale⁴⁷⁵) und auf das Turbulenzproblem anwendet.⁴⁷⁶)

18. Methode der sukzessiven Approximation (vgl. II A 4a (*P. Painlevé*) Gewöhnliche Differentialgleichungen; Existenz der Lösungen, Nr. 9 u. 10). a) *Graphische Methode*. Ausgehend von der Methode der sukzessiven Approximation, die *Picard*⁴⁷⁷) und *Lindelöf*⁴⁷⁸) zum Beweise der Existenz der Lösungen einer gewöhnlichen Differentialgleichung benutzen, hat *Runge*⁴⁷⁹) eine Methode angegeben, bei Differentialgleichungen erster Ordnung auf graphischem Wege aus einer Näherungskurve, die etwa nach einer der obigen Methoden gefunden sein kann, durch sukzessive Verbesserung die Lösung mit der graphisch erreichbaren Genauigkeit zu finden. Ist y die Lösung der Differentialgleichung $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$, y_x die x^{te} Näherung, ε_x der Fehler derselben, und gehen alle Näherungen durch den Punkt x_0, y_0 , so wird y_x so bestimmt, daß

$$(216) \quad \frac{dy_x}{dx} = f(x, y_{x-1})$$

ist, also

$$(217) \quad y - y_x = \int_{x_0}^{x_1} \frac{f(x, y) - f(x, y_{x-1})}{y - y_{x-1}} (y - y_{x-1}) dx \\ \leq D(x_1 - x_0) \int_{x_1 - x_0}^{\varepsilon_{x-1}} \frac{dx}{x_1 - x_0} = D(x_1 - x_0) \cdot \text{Mittelwert } \varepsilon_{x-1},$$

wo $D = \max \frac{f(x, y) - f(x, y_{x-1})}{y - y_{x-1}}$ in dem betrachteten Teile der xy -Ebene ist. Dabei ist D kleiner, höchstens gleich dem größten Werte von $\frac{df}{dy}$. Damit dieser Ausdruck nicht zu groß werde, kann man bei jeder Integration das Koordinatensystem entsprechend legen.⁴⁸⁰) Die Ausführung

475) *Blumenthal*, Zeitschr. Math. Phys. 62 (1913—14), p. 343—58.

476) *Blumenthal*, Sitzungsberichte der math.-phys. Klasse der kgl bayrischen Akademie der Wissenschaften 1913, p. 563—95.

477) *Picard*, J. de math. 1890 usw. vgl. *Picard*, Traité d'Analyse 2. Aufl. Paris 1905, Kap. XI, III.

478) *Lindelöf*, J. de math. (4) 10 (1894), p. 117—28.

479) *Runge*, Jahresber. d. Deutsch. Math.-Ver. 16 (1907), p. 270—72.

480) *v. Sanden*, Praktische Analysis, Leipzig 1914, p. 156; Archiv für Elektrotechnik 2 (1914), Heft 7, p. 288—98.

im einzelnen zeigt Fig. 30.⁴⁸¹) Wenn die Maßstäbe für x und y einander gleich genommen sind, so bilden die Isoklinen

$$(218) \quad f(x, y) = \text{Const.}$$

und die jeder Isokline zugehörige Richtung die Daten, die ganz unab-




Fig. 30.

hängig davon sind, wie die Koordinatenachsen gewählt werden. Das Verfahren konvergiert, wenn $D(x_1 - x_0) < 1$ ist. Dann ist

$$(219) \quad |\varepsilon_n| \leq (D(x_1 - x_0))^{n-1} \max |\varepsilon_1|.$$

Falls zwei aufeinanderfolgende Näherungskurven nicht merklich voneinander abweichen, ist die Lösung mit der Genauigkeit der Zeichnung gefunden. Ist $\frac{dy_n}{dx} = f(x, y_n) + F_n$, so gilt als Fehlerfortpflanzungsgesetz

$$(220) \quad |\varepsilon_n| \leq \max |F_k| e^{D(x-x_0)} |x - x_0|.$$

Auch diese Methode läßt sich auf Systeme von simultanen linearen Differentialgleichungen und Differentialgleichungen beliebig hoher Ord-

481) Die Fig. 30 zeigt zwei aufeinanderfolgende Näherungskurven der Gleichung $\frac{dy}{dx} = \frac{2ax}{x^2 + y^2}$.

nung übertragen. Haben wir z. B. die drei Gleichungen

$$(221) \quad \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= f(x, y, z, t), \\ \frac{dy}{dt} &= g(x, y, z, t), \\ \frac{dz}{dt} &= h(x, y, z, t), \end{aligned}$$

so benutzt man die drei Ebenen xt , yt und zt , die man sich auch mit gemeinsamer t -Achse übereinander gelegt denken kann. Man zeichnet nun von ersten Approximationen $x_1(t)$, $y_1(t)$ und $z_1(t)$ ausgehend, in den drei Ebenen die Kurven mit den Ordinaten

$$f(x_1(t), y_1(t), z_1(t), t) \text{ usw.}$$

integriert sie graphisch und findet die zweiten Approximationen

$$x_2(t), y_2(t) \text{ und } z_2(t),$$

mit denen man neue Kurven f , g und h zeichnet usw. Die Funktionen f , g , h können dabei in mannigfacher Weise auch graphisch z. B. durch Nomogramme⁴⁸²⁾ gegeben sein.

b) *Numerische Methoden*. Auch rechnerisch wird die Methode zur Aufsuchung einer Funktionenreihe verwandt, die das Integral approximiert, so z. B. von *Davidoglou*⁴⁸³⁾ zur Berechnung des Integrales von $\frac{d^4 y}{dx^4} = \varphi(x) \cdot y$. Systematisch aber hat *Cotton* diese Methode entwickelt, ausgehend von einer Reihe von Arbeiten von *Severini* über die angenäherte Integration von Differentialgleichungen erster Ordnung⁴⁸⁴⁾, wie über Systeme von solchen Gleichungen mit willkürlichem Parameter⁴⁸⁵⁾. Er geht davon aus, daß ein ähnliches System von Gleichungen eine der gesuchten Lösung C_x benachbarte Lösung C_y gibt⁴⁸⁶⁾, die man anstatt der von *Picard-Lindelöff* benutzten Konstanten als Ausgangsfunktion benutzt. Wie man solche angenäherten Lösungen für bestimmte lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung finden kann, zeigt z. B. *de Sparre*⁴⁸⁷⁾. Um eine solche Lösung C_x kann man ein

482) Betreffs der Methoden der Nomographie sei verwiesen auf die beiden Werke: *d'Ocagne*, *Traité de Nomographie*, Paris 1899 und *d'Ocagne*, *Calcul graphique et Nomographie*, Paris 1908 und die dort angegebene Literatur.

483) *Davidoglou*, Paris C. R. 130 (1900), p. 692—695, 1241—1243.

484) *Severini*, *Rendiconti del Reale Istituto Lombardo* (2) 31 (1898), p. 950 ff. und (2) 32 (1899), p. 1427—37.

485) *Severini*, *Rendiconti del Reale Istituto Lombardo* (2) 33 (1900), p. 825—839.

486) *Cotton*, *Acta mathematica* 31 (1908), p. 107—126.

487) *de Sparre*, *Rend. d. R. Accad. dei Lincei* (5) 7, 2 (1898), p. 111—117 und *Bru. Soc. sc.* 23 B (1899), p. 176—187.

Gebiet G konstruieren, das die exakte Integralkurve sicher enthält. Die Dimensionen δ von G sind Funktionen der unabhängigen Variablen t ; und man findet die Dominanten Δ zu diesen Dimensionen δ durch Integration eines Systems linearer Differentialgleichungen

$$\frac{d\Delta_i}{dt} = a_{i,1}\Delta_1 + a_{i,2}\Delta_2 + \dots + a_{i,n}\Delta_n + b_i,$$

deren Koeffizienten dominant zu denjenigen sind, die sich aus dem gegebenen Gleichungssystem mittels der *Lipschitzschen* Bedingungen konstruieren lassen, und wo b_i dominant zum Fehler der angenäherten Lösung des benachbarten Gleichungssystemes

$$b'_i = \frac{dy_i}{dt} - f_i(t, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

ist, also Null wird, wenn dasselbe sich exakt lösen läßt.⁴⁸⁸⁾ Man kann bei dieser Art der Abschätzung den verschiedenen Vorzeichen der Koeffizienten nicht Rechnung tragen und erhält daher ein meist zu großes Gebiet.

Wesentlich besser wird die Gebietsabschätzung, wenn man die von *Cauchy* angegebene Methode benutzt, von einem vollständig gegebenen Lösungssystem der homogenen Differentialgleichung zu dem der inhomogenen überzugehen.⁴⁸⁹⁾ Sind die x_i die gesuchten Lösungen des Systems

$$(222) \quad \frac{dx_i}{dt} - (A_{i,1}x_1 + A_{i,2}x_2 + \dots + A_{i,n}x_n) = h_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n),$$

wo die $A_{i,x}$ so bestimmt sind, daß sie gleich oder nahe gleich $\frac{df_i}{dx_x}$ nach der Substitution der angenäherten Lösung y_i sind, und ist $g_i(t)$ definiert durch

$$(223) \quad \frac{dy_i}{dt} - (A_{i,1}y_1 + A_{i,2}y_2 + \dots + A_{i,n}y_n) = g_i(t),$$

so gilt für den Fehler die Gleichung

$$(224) \quad \frac{d\delta_i}{dt} - (A_{i,1}\delta_1 + A_{i,2}\delta_2 + \dots + A_{i,n}\delta_n) = h_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n) - g_i(t) = B_i(t).$$

Sind ferner $\varphi_{x,1}(t, \alpha) \dots \varphi_{x,n}(t, \alpha)$ n Systeme von Lösungen der homogenen Gleichung, so daß $\varphi_{x,x}(\alpha, \alpha) = 1$, $\varphi_{x,k}(\alpha, \alpha) = 0$ ist, und sind die $\Phi_{x,i}$ den $\varphi_{x,i}$, die β_i den B_i dominant, so erhält man eine wesentlich engere obere Fehlergrenze, wenn man

$$(225) \quad \Delta_x t = \int_{t_0}^t [\beta_1(\alpha)\Phi_{x,1}(t, \alpha) + \beta_2(\alpha)\Phi_{x,2}(t, \alpha) + \dots + \beta_n(\alpha)\Phi_{x,n}(t, \alpha)] d\alpha$$

setzt.⁴⁹⁰⁾

488) *Cotton*, Paris C. R. 140 (1905), p. 494—496.

489) *Cotton*, Paris C. R. 141 (1905), p. 177—179.

490) *Cotton*, Paris C. R. 146 (1909), p. 274—276.

Besser⁴⁹¹) noch wendet man sukzessive Approximation an, um aus einer angenäherten Integralkurve C_y eine neue C_y' zu finden, nebst einem engeren Gebiet G_2 , das auch die exakte Integralkurve enthalten muß. Dazu wertet man jeden Faktor unter dem Integrale

$$(226) \quad \delta_x(t) = \int_{t_0}^t [B_1(\alpha)\varphi_{x,1}(t, \alpha) + \dots + B_n(\alpha)\varphi_{x,n}(t, \alpha)] d\alpha$$

aus. Allerdings ist B_i nicht genau bekannt, aber leicht zu schätzen, wenn man roh G kennt. Setzt man B_i' für B_i ein, und ist

$$(227) \quad |B_i - B_i'| = |h_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n) - h_i(t, y_1^I, y_2^I, \dots, y_n^I)| \\ = \Xi_i(t) < \tau_{i,1}\Delta_1^I + \tau_{i,2}\Delta_2^I + \dots + \tau_{i,n}\Delta_n^I$$

wo $\tau_{i,x} = \frac{\partial h_i}{\partial x_x}$ ist, so wird die Korrektur für die Werte y_x^I

$$(228) \quad \delta_x^I = \int_{t_0}^t [B_1'(\alpha)\varphi_{x,1}(t, \alpha) + \dots + B_n'(\alpha)\varphi_{x,n}(t, \alpha)] d\alpha,$$

und zur Berechnung der Grenze G_2 hat man

$$(229) \quad |\delta_x - \delta_x^I| < \int_{t_0}^t [\Xi_1(\alpha)\Phi_{x,1}(t, \alpha) + \dots + \Xi_n(\alpha)\Phi_{x,n}(t, \alpha)] d\alpha = \Delta_x^{II}(t).$$

So kann man fortfahren und weitere Korrekturen an dem Näherungswert anbringen. Die so gefundenen Reihen konvergieren in einem bestimmten Gebiet.⁴⁹¹) Cotton zeigt die praktische Durchführung einer solchen Integration an der Gleichung des sphärischen Pendels; nur der letzte Fall gibt hier eine ausreichende Genauigkeit.⁴⁹²)

Ähnlich verfährt Bärwald⁴⁹³); er bringt die Gleichung auf die Form

$$(230) \quad y^{(n)} + Ay^{(n-1)} + \dots + Ay = F(y^{(n-1)}, y^{(n-2)} \dots y, x),$$

wo die A Konstante oder Funktionen von x sind, und integriert zunächst die homogene Gleichung, indem er $F = 0$ setzt. Diesen Lösungswert y_0 setzt er in F ein, erhält so eine Funktion von x auf der rechten Seite. Die nicht homogene Gleichung integriert er nach der Lagrangeschen Methode⁴⁹⁴) der Variation der Konstanten und verfährt mit dem Lösungswert y_1 genau wie mit y_0 . Ausführlich untersucht

491) Cotton, Bulletin de la société math. de France 36 (1908), p. 225—246.

492) Cotton, Ann. de Grenoble 21 (1909), p. 99—115.

493) Bärwald, Arkiv för Matematik, Astronomi och Fysik 9 (1913), Nr. 20 (15 S.).

494) Lagrange, Nouv. Mem. de l'Acad. de Berlin 1783 (Ges. Abh. V. p. 492—514).

er Genauigkeit und Fehler. Derartige Methoden werden in der Physik z. B. gelegentlich verwandt.⁴⁹⁵⁾

Die Methode der sukzessiven Approximation wurde von *Sibarini*⁴⁹⁶⁾ u. a. auf partielle Differentialgleichungen von parabolisch-hyperbolischem Typ und von *Picard*⁴⁹⁷⁾ und *Lalesco*⁴⁹⁸⁾ auch auf Integralgleichungen übertragen. Sicher wird sich auch anschließend an diese Untersuchungen eine Methode entwickeln lassen, die nicht nur die Existenz der Lösungen in einem gewissen Bereich nachzuweisen gestattet, sondern auch erlaubt, dieselben numerisch oder graphisch anzunähern.^{498a)}

c) *Methoden der Himmelsmechanik.* Die ältesten, mit großer Mühe und viel Scharfsinn ausgebildeten Methoden zur angenäherten Integration gewöhnlicher Differentialgleichungen sind von der theoretischen Astronomie zur Behandlung des Störungsproblems entwickelt. Hier können wir nur kurz darauf hinweisen. Ausführlicheres findet sich im sechsten Band der Enzyklopädie. Ferner ist die Literatur für die Zeit von 1868—98 von *Whittaker*⁴⁹⁹⁾ zusammengestellt, und die Hauptmethoden sind von *Poincaré*⁵⁰⁰⁾ auf ihre Konvergenz untersucht worden, der sie zur Behandlung des folgenden, das n Körperproblem enthaltenden sog. allgemeinen Problems der Dynamik verwendet: Ein mechanisches System hänge von einem Parameter μ ab und sei auf die kanonischen Veränderlichen x_1, x_2, \dots, x_n und y_1, y_2, \dots, y_n bezogen. Die Energie F enthalte die Zeit nicht explizit und habe als Funktion von μ, x_i, y_i folgende drei Eigenschaften.

1) F sei an der Stelle $\mu = 0$ nach ganzen positiven Potenzen von μ entwickelbar, $F = F_0 + \mu F_1 + \mu^2 F_2 \dots$,

2) F habe in bezug auf x_1, x_2, \dots, x_n die Periode 2π ,

3) F_0 hänge nicht von x_1, x_2, \dots, x_n ab.

Es sind die kanonischen Bewegungsgleichungen der Mechanik zu behandeln

$$(231) \quad \frac{dx_i}{dt} = \frac{\partial F}{\partial y_i} = Y_i(x, \mu), \quad \frac{dy_i}{dt} = -\frac{\partial F}{\partial x_i}.$$

495) Z. B. *Routh*, Dynamik der Systeme starrer Körper (deutsch von *Schapp*) 2, Leipzig 1898, p. 258—66; *Plank, Debye* usw., Vorträge über die kinetische Theorie der Materie und der Elektrizität, Leipzig 1914, p. 22.

496) *Sibarini*, Lombardo Rend. del R. Istituto (2) 42 (1909), p. 375—390.

497) *Picard*, Paris C. R. 139 (1904), p. 245—48.

498) *Lalesco*, Journ. de math. (6) 4 (1908), p. 125—202.

498a) Vgl. z. B. *Treffitz*, Über die Kontraktion kreisförmiger Flüssigkeitsstrahlen. Dissertation Straßburg 1914.

499) *Whittaker*, Report of the British Association 1899, p. 121—159.

500) *Poincaré*, Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste 1—3, Paris 1892—1898.

Alle diese Methoden versuchen die exakte Lösung $\varphi_i(t, \mu)$ bis auf Glieder p^{ter} Ordnung durch eine Funktion $\varphi_i^{(p)}(t, \mu)$ zu approximieren, die für $t = 0$ mit $\varphi_i(t, \mu)$ zusammenfällt, und die bis auf Glieder von mehr als p^{ter} Ordnung der Bewegungsgleichung genügt; d. h. an der Stelle $\mu = 0$ ist $\frac{\partial \varphi_i^{(p)}}{\partial t} = Y_i(\varphi_x^{(p)}, \mu)$ nach Potenzen von $\mu^{\frac{1}{n}}$ ($n \geq 0$) entwickelbar und durch $\mu^{p+\frac{1}{n}}$ teilbar.

Von älteren Methoden, die noch heute meist benutzt werden, seien die von *Lagrange*⁵⁰¹), *Laplace*⁵⁰²), *Poisson*⁵⁰³) usw. entwickelten erwähnt, die den Ansatz

$$(232) \quad \varphi^{(p)} = \varphi_0(t) + \mu \varphi_1(t) + \dots + \mu^p \varphi_p(t)$$

machen. Während diese älteren Methoden den Nachteil haben, daß in ihnen die sog. Säkularglieder, d. h. Glieder, in denen t außerhalb der periodischen Funktionen steht, auftreten, ist es der Vorzug der neueren, daß diese Glieder fehlen. Die ersten wichtigeren Arbeiten in dieser Richtung stammen von *Delaunay*⁵⁰⁴), *Hill*⁵⁰⁵), *Newcomb*⁵⁰⁶) u. a. Die umfassendste Methode ist von *Gylden* angegeben, der die durch verschiedene Umformungen erhaltenen Gleichungen schließlich auch durch sukzessive Approximation löst.⁵⁰⁷) Einfacher ist die Methode von *Lindstedt*⁵⁰⁸), der den Ansatz

$$(233) \quad \varphi^{(p)} = \varphi_0(t) + \mu \varphi_{p,1}(\mu, t) + \mu^2 \varphi_{p,2}(\mu, t) + \dots + \mu^p \varphi_{p,p}(\mu, t).$$

Diese Reihe, die sich auf die von *Lagrange* zurückführen läßt, ist im allgemeinen anwendbar. Um die bei nahezu kommensurablen Umläufen auftretenden kleinen Nenner zu vermeiden, macht *Bohlin*⁵⁰⁹) den Ansatz

$$(234) \quad \varphi^{(p)} = \varphi_0(t) + \mu^{\frac{1}{2}} \varphi_{p,1}\left(t, \mu^{\frac{1}{2}}\right) + \dots + \mu^p \varphi_{p,2p}\left(t, \mu^{\frac{1}{2}}\right)$$

501) *Lagrange*, Prix de l'Académie Royale des sciences de Paris 1766/72, Werke, Band 6 Z. B., p. 227—331.

502) *Laplace*, Mécanique céleste 1, Paris 1796.

503) *Poisson*, Mém. de l'Acad. de Paris 13 (1835), p. 209—335.

504) *Delaunay*, Théorie du mouvement de la Lune, Paris 1860/67.

505) *Hill*, Am. Journ. of Math. 1 (1878), p. 5—27, 129—48, 245—51; Acta Math. 8 (1886), p. 1—36 usw.

506) *Newcomb*, Smithsonian contribution to Knowledge 1874.

507) *Gylden*, Zahlreiche Arbeiten, insbesondere kämen hier in Betracht: Acta mathematica 1, 9, 15, 17 usw.

508) *Lindstedt*, Mém. de l'Acad. de St. Pétersbourg 31 (1882), Nr. 4.

509) *Bohlin*, Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar 14 (1888), Nr. 5. Nova acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis (3) 17, 2 (1898), Nr. 2, p. 1—225. Astronomika Jakttagelser och undersökningar Stokholm 1908/12; Arch. Mat. Astr. och Fysik (8) 35 (1913) (28 Seiten).

wo aber wiederum bei gewissen Gliedern die Konvergenz gefährdende große Faktoren vorkommen.

Diese Methoden liefern meist semikonvergente Reihen. Daß man mit derartigen Reihen rechnen kann, hat *Poincaré* gezeigt⁵¹⁰); er findet, daß für $0 \leq t \leq \tau(\mu)$, wo $\lim_{\mu=0} \tau(\mu) = a$ ist, für den Fehler

$$(235) \quad \xi_i = \varphi_i(\mu, t) - \varphi_i^{(p)}(\mu, t)$$

die Ungleichung

$$(236) \quad |\xi_i| < a(e^{b(\mu)t} - 1)\mu^{p+\frac{1}{n}}$$

gilt, wo $a > 0$ und $\lim_{\mu=0} b(\mu) > 0$ ist, und daß

$$(237) \quad \lim_{\mu=0} \frac{\varphi_i(t, \mu) - \varphi_i^{(p)}(t, \mu)}{\mu^p} = 0$$

ist. Allgemein wird der Fehler mit μ kleiner, doch wird nicht immer für unendlich wachsende p auch bei kleinem μ der Fehler Null. Obige Methoden lassen sich natürlich auch auf andere Probleme wie die der Störungstheorie anwenden. Unter anderen hat das *Horn* an der Theorie der kleinen, aber endlichen Schwingungen von Systemen mit einem Freiheitsgrad allgemein auseinandergesetzt.⁵¹¹) Ein ähnliches Verfahren hat *Korteweg* zur Behandlung der Lichtemission benutzt⁵¹²); *Behrens*⁵¹³) hat ein Problem aus der Turbinentheorie, *Burkhardt*⁵¹⁴) das Problem der Schwingungen unter Einfluß einer dem Quadrat der Geschwindigkeit proportionalen Dämpfung nach diesen Methoden behandelt.

III. Graphische und numerische Integration partieller Differentialgleichungen.

19. Bei partiellen Differentialgleichungen mit reeller Charakteristik (vgl. II A 5 (*E. v. Weber*) Partielle Differentialgleichungen, Nr. 43—48) ist die Methode der Integration durch aufeinanderfolgende Elemente nur anwendbar, wenn die Anfangskurven analytisch sind, was in den Fällen, die für die Praxis von Bedeutung sind, oft nicht der Fall ist. Unstetigkeiten der Anfangskurve und ihrer Ableitungen pflanzen sich aber nach *Monge*, *Ampère*, *Cauchy*, *Darboux*, *Lie*⁵¹⁵)

510) Z. B. *Poincaré*, Acta mathem. 8 (1886), p. 295—344.

511) *Horn*, Zeitschr. Math. Phys. 47 (1902), p. 400—428; 48 (1903), p. 400—434; 49 (1903), p. 246—69.

512) *Korteweg*, Amsterd. Verhandl. 5 (1897) (32 Seiten); franz. arch. néerl. (2) 1 (1898), p. 229—60.

513) *Behrens*, Zeitschr. Math. Phys. 59 (1911), p. 337—390.

514) *Burkhardt*, Zeitschr. Math. Phys. 63 (1914), p. 303—11.

515) *Monge*: Application de l'Analyse à la Géométrie, 5. Aufl. Paris 1850
Encyklop. d. math. Wissensch. II 3.

und andern längs der Charakteristiken entsprechender Ordnung fort. *Massau*⁵¹⁶⁾ hat eine Methode ausgearbeitet, durch *approximative Integration die Charakteristiken zu finden* und so das reguläre Integral anzunähern durch ein Polyeder, dessen Kanten Charakteristiken, dessen Facetten reguläre Integrale sind. Die Methode läßt sich auf alle Gleichungen und Gleichungssysteme mit zwei unabhängigen Variablen beliebiger Ordnung mit reeller Charakteristik anwenden, nur wächst die Zahl der von einem Punkt ausgehenden Charakteristiken mit der Ordnung der Gleichung und der Zahl der abhängigen Unbekannten. Im einzelnen ist folgendes zu bemerken.

a) Die lineare Differentialgleichung

$$F \equiv Ap + Bq - C = 0 \quad \left(p = \frac{\partial z}{\partial x}, \quad q = \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

hat eine Charakteristik nullter Ordnung

$$(238) \quad \frac{dx}{A} = \frac{dy}{B} = \frac{dz}{C},$$

die Charakteristik erster Ordnung ist bestimmt durch

$$(239) \quad \frac{dx}{A} = \frac{dy}{B} = \frac{dz}{C} = - \frac{dp}{\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} p} = - \frac{dq}{\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} q}$$

usw. Die Änderungen der Variablen lassen sich schrittweise längs der Charakteristiken bestimmen. Sind A , B und C nicht rationale Funktionen, so treten Besonderheiten auf, z. B. Gebiete mit doppelter Überdeckung und solche mit imaginärer Charakteristik.

Für die allgemeine Gleichung erster Ordnung $F(x, y, z, p, q)$ gibt es eine Charakteristik nullter Ordnung nur dann, wenn sie in lineare Faktoren zerlegt werden kann. Die erster Ordnung bestimmt sich durch

$$(240) \quad \frac{dx}{\frac{\partial F}{\partial p}} = \frac{dy}{\frac{\partial F}{\partial q}} = \frac{dz}{\frac{\partial F}{\partial p} p + \frac{\partial F}{\partial q} q} = - \frac{dp}{\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} p} = - \frac{dq}{\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} q}.$$

Das ist ein System gewöhnlicher simultaner linearer Differentialgleichungen, aus dem sich zu gegebenen Anfangswerten x_0, y_0, z_0, p_0 , die y, z, p, q als Funktionen von x nach einer der oben gegebenen

von *Liouville* besorgt (unveränderter Abdruck der von *Monge* besorgten 4. Aufl. 1809). Insbesondere Anhang S. 421—473 De l'intégration aux différences partielles du premier ordre entre trois variables. Die Literatur findet man in dem Artikel über partielle Differentialgleichungen von *E. von Weber*, Encyclopädie d. math. Wiss. II A 5, p. 294—399.

516) *Massau*, Mémoire sur l'intégration graphique des équations aux dérivées partielles. Gand 1900, 1902, 1903. Besonders werden hier auch Rückkehrkante, Enveloppe und andere Singularitäten der Charakteristiken diskutiert.

Methoden finden lassen. Indem man die Anfangsbedingung durch genügend kleine Kurvenstücke ersetzt, die mit einer Unstetigkeit in der zweiten Ableitung ineinander übergehen, können die Charakteristiken dabei so eng gelegt werden, daß die Integralfläche durch sie genügend approximiert wird. Unstetigkeiten in der Tangente der Anfangskurve geben zwei Integralflächen, die durch einen Pseudokegel von Charakteristiken verbunden sind. Auch hier kann es Gebiete mit imaginären Charakteristiken geben.

b) Von den **Differentialgleichungen zweiter Ordnung** sind die linearen

$$(241) \quad Rr + Ss + Tt = U$$

am wichtigsten $\left(r = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, s = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, t = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)$. Sind R, S, T, U Funktionen von x, y, z, p, q , so gelten für die Charakteristiken erster Ordnung die beiden Gleichungen

$$(242) \quad \begin{aligned} Rdy^2 - Sdx dy + Tdx^2 &= 0, \\ Rdp dy + Tdq dx &= U dx dy. \end{aligned}$$

Die erste der beiden Gleichungen hat nur dann zwei reelle voneinander verschiedene Wurzeln λ und μ , wenn $S^2 - 4RT > 0$ d. h. die Gleichung vom hyperbolischen Typ ist.⁵¹⁷⁾ In diesem Falle gibt es zwei Scharen von Charakteristiken; die erste ist bestimmt durch

$$(243) \quad dy = \lambda dx, \quad dz = p dx + q dy; \quad \frac{dp}{dx} + \mu \frac{dq}{dx} = \frac{U}{R}, \quad z = \varphi(x).$$

Für die zweite gilt

$$(244) \quad \delta y = \mu \delta x, \quad \delta z = p \delta x + q \delta y; \quad \frac{\delta p}{\delta x} + \lambda \frac{\delta q}{\delta x} = \frac{U}{R}, \quad z = \varphi_1(x).$$

Die Funktionen $\varphi(x)$ und $\varphi_1(x)$ werden durch die näheren Bedingungen des Problems bestimmt. Das Integral kann man entweder mit Hilfe einer Schar von Charakteristiken approximieren, wobei man Streifen erhält, oder man kann beide Scharen benutzen, so daß man ein Polyeder erhält, dessen Kanten Charakteristiken sind. Man nimmt dann die Bogenstücke für y, z, p, q so klein, daß sie angenähert als Gerade betrachtet werden können. Aus dem Punkte $A_1(x_1, y_1, z_1, p_1, q_1)$ und $A_2(x_2, y_2, z_2, p_2, q_2)$ ist dann $A_3(x_3, y_3, z_3, p_3, q_3)$ zu bestimmen (Fig. 31). Dazu ersetzt *Massau* die Differentialgleichungen durch Diffe-

517) Ist die Gleichung parabolisch, d. h. $S^2 - 4RT = 0$, so gibt es nur eine Schar von Charakteristiken, auf die sich obige Methode auch anwenden läßt. Nur wenn die Gleichung elliptisch ist ($S^2 - 4RT < 0$), läßt sich natürlich die Methode nicht verwenden, da dann die Charakteristiken imaginär sind. Siehe die folgenden Abschnitte.

renzungsgleichungen und bestimmt graphisch oder rechnerisch

$$\begin{aligned}
 x_3 y_3 \text{ aus } y_3 - y_1 &= \lambda_1(x_3 - x_1), & (y_3 - y_2) &= \mu_2(x_3 - x_2), \\
 p_3 q_3 \text{ ,, } (p_3 - p_1) + \mu_1(q_3 - q_1) &= \frac{U_1}{R_1}(x_3 - x_1), \\
 (245) \quad (p_3 - p_2) + \lambda_2(q_3 - q_2) &= \frac{U_2}{R_2}(x_3 - x_2), \\
 z_3 \text{ ,, } (z_3 - z_1) &= (p_1 + \lambda_1 q_1)(x_3 - x_1) \text{ oder} \\
 & (z_3 - z_2) = (p_2 + \mu_2 q_2)(x_3 - x_2).
 \end{aligned}$$

Man führt dann die Zeichnung resp. Rechnung nochmal mit Mittelwerten aus den so berechneten und denen im Punkte A_1 resp. A_2 aus und wiederholt das, bis keine Änderung mehr eintritt. Die beiden letzten Gleichungen führen bis auf Größen von höherer als der zweiten Ordnung auf denselben Wert z_3 .⁵¹⁸⁾




Fig. 31.

Ein Spezialfall ist der, daß λ und μ von p und q nicht abhängen, dann hat man eine Charakteristik nullter Ordnung. Sind λ und μ außerdem noch von z unabhängig, wie das insbesondere für konstante Koeffizienten der Fall ist, so ist ihre Projektion auf die xy -Ebene unabhängig von den Anfangsbedingungen. Für einen einfachen Fall dieser Art

hat Runge⁵¹⁹⁾ eine der obigen ähnliche, aber bedeutend genauere Methode gegeben. Es handelt sich in Polarkoordinaten um die Gleichung

$$(246) \quad \frac{\partial^2 \chi}{\partial w^2} + \frac{\partial^2 \chi}{\partial \theta^2} \left(\frac{1}{w^2} - \frac{1}{c^2} \right) + \frac{\partial \chi}{\partial w} \left(\frac{w}{w^2} - \frac{w}{c^2} \right) = 0,$$

deren Charakteristiken bestimmt sind durch

$$(247) \quad \frac{d\theta}{dw} = \pm \sqrt{\frac{1}{c^2} - \frac{1}{w^2}},$$

eine Gleichung, die sich durch bekannte Funktionen integrieren läßt. Diese Charakteristiken werden als neue krummlinige Koordinaten eingeführt, so daß die Gleichung die Form

$$(248) \quad \frac{\partial^2 \chi}{\partial \alpha \partial \beta} = \mp \left(\frac{\partial \chi}{\partial \alpha} + \frac{\partial \chi}{\partial \beta} \right) K$$

erhält, die, falls man z. B. nur das obere Vorzeichen berücksichtigt und die Länge der Quadratseite mit $2h$ bezeichnet, bis auf Glieder

⁵¹⁸⁾ Massau⁵¹⁶⁾ Nr. 23.

⁵¹⁹⁾ Steichen, Beiträge zur Theorie der zweidimensionalen Bewegungsvorgänge in einem Gase, das mit Überschallgeschwindigkeit strömt. Diss. Göttingen 1909.

vierter Ordnung in h ersetzt werden kann durch

$$(249) \quad \chi_{22} = \frac{\chi_{21} + \chi_{12}}{1 + 2hK_m} - \chi_{11} \frac{1 - 2hK_m}{1 + 2hK_m} \quad (\text{Fig. 32}).$$

Die Genauigkeit der Rechnung prüft *Runge* dadurch, daß er sie für ein Netz durchführt, dessen Maschen statt $2h$ nur die Seitenlänge h haben. Für den einzelnen Schritt ist der begangene Fehler von vierter Ordnung; für das Netz daher von der dritten Ordnung. Auch *Massau* selbst hat seine Methode in der weiter oben angegebenen Form für einen Spezialfall angewandt.⁵²⁰⁾

Handelt es sich um nicht-lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung, so kann man für solche von der Form

$$(250) \quad rt - s^2 + Hr + 2Ks + Lt + M = 0$$

(Gleichungen von *Monge* und *Ampère*) Charakteristiken erster Ordnung finden, deren graphische Behandlung genau so wie bei den linearen Gleichungen ist. Für allgemeine Gleichungen zweiter Ordnung muß man Charakteristiken zweiter Ordnung benutzen. Die graphische Behandlung ist auch dann noch wie oben, nur daß man für jeden Punkt elf Gleichungen anstatt der obigen sechs erhält.

c) Ein System zweier simultanen linearen Differentialgleichungen

$$(251) \quad \begin{aligned} Ap + Bq + Cp_1 + Dq_1 &= E, \\ A_1p + B_1q + C_1p_1 + D_1q_1 &= E_1, \end{aligned}$$

wo A, B, \dots, E_1 Funktionen von x, y, z, z_1 sind, hat zwei Scharen von Charakteristiken nullter Ordnung auf jeder der beiden zugehörigen Integralflächen.

$$(252) \quad \begin{aligned} dy &= \lambda_1 dx; & dz + a_1 dz_1 &= b_1 dx; & z &= \varphi_1(x), \\ \delta y &= \lambda_2 \delta x; & \delta z + a_2 \delta z_1 &= b_2 \delta x; & z &= \varphi_2(x), \end{aligned}$$

wo λ_1 und λ_2 die Wurzeln der Gleichung

$$(253) \quad \frac{A dy - B dx}{C dy - D dx} = \frac{A_1 dy - B_1 dx}{C_1 dy - D_1 dx}$$

sind und wo

$$(254) \quad a = \frac{CD_1 - C_1D}{AB_1 - A_1B} \cdot \frac{A dy - B dx}{C dy - D dx} = \frac{CD_1 - C_1D}{AB_1 - A_1B} \cdot \frac{A_1 dy - B_1 dx}{C_1 dy - D_1 dx}$$

⁵²⁰⁾ *Massau*, Note sur l'équation des cordes vibrantes. Mons 1905, vgl. auch *Monge*⁵¹⁵⁾ Anhang II.




Fig. 32.

und

$$(255) \quad b dx = - E \frac{A_1 dy - B_1 dx}{AB_1 - A_1 B} + E_1 \frac{A dy - B dx}{A B_1 - A_1 B}$$

ist. Die graphische oder rechnerische Ausführung ist wie bei den Gleichungen zweiter Ordnung. Bei konstanten Koeffizienten lassen sich die Gleichungen integrieren. Die Projektionen der Charakteristiken werden dann parallele Gerade und die Facetten Ebenen. *Massau*⁵²¹⁾ hat diese Methoden auf die variierte Bewegung fließenden Wassers und auf das Problem des Erddruckes angewandt.

20. Zur Integration der partiellen Differentialgleichungen mit imaginären Charakteristiken sind eine Reihe verschiedener Methoden angegeben, von denen hier zunächst die *Graphischen Methoden* folgen mögen, und zwar geordnet nach der Art, wie sie die gesuchte Lösung approximieren.

a) *Methoden, die alle Randbedingungen approximieren.* Eine sehr einfache Methode der graphischen Integration partieller linearer homogener Differentialgleichungen rührt von *Maxwell*⁵²²⁾ her. Hat man auf irgendeine Weise zwei voneinander unabhängige Lösungen $u_1 = c$ und $u_2 = k$ der gegebenen Gleichung gefunden, die beliebigen verschiedenen Randbedingungen genügen, so zeichnet man die Liniensysteme $u_1 = c$, $u_2 = k$ ein, indem man c immer um dasselbe Δc , k um dasselbe Δk wachsen läßt. Zeichnet man in dieses Parallelogrammnetz die Diagonalen ein, so haben diese die Gleichung $u_1 \pm \frac{\Delta c}{\Delta k} u_2 = C$ und sind somit wieder Lösungen der gegebenen Differentialgleichung. Man sucht nun durch passende Kombination der verschiedenen Lösungen brauchbare Randbedingungen zu erhalten. Diese Methode ist mehrfach von englischen Physikern angewandt auf die Gleichung $\Delta u = 0$ ⁵²³⁾ und $\Delta u + \frac{1}{k} \frac{\partial u}{\partial x} = 0$ ⁵²⁴⁾, um die Potentialströmung um schiffs- oder fischähnliche Körper zu erhalten. Als Ausgangslösungen benutzte man dabei besonders

$$(256) \quad y = b \quad \text{und} \quad y = \arctg \frac{a-x}{y} + \arctg \frac{a+x}{y}.$$

Ferner wird sie zur Konstruktion der Kraftlinien elektrischer und magnetischer Felder gelegentlich verwandt, so z. B. von *Mallik*⁵²⁵⁾.

521) *Massau*⁵¹⁹⁾ insbesondere die Mitteilungen 2 und 3.

522) *Maxwell*, On a Method of Drawing the Theoretical Forms of Faradays Lines of Force without Calculation. Report of the British Association 1856.

523) *Rankine*, On plane water-lines in two dimensions (Phil. Transact. of the Royal Society, Vol. 154, 1864, p. 369—391 und auch Phil. Transact. 1872).

524) *Taylor*, On ship-shaped stream forms. Transaction of the inst. of Naval Architects 1894, p. 384—405.

b) *Methoden, die eine Randbedingung streng erfüllen und das Integrationsnetz durch endliche Stücke approximieren.* Andere Methoden gehen davon aus, wenigstens auf einer Seite die Randbedingungen streng zu erfüllen, während die Bedingungen an den andern Begrenzungen nur mit möglichster Genauigkeit approximiert werden. *Runge*⁵²⁶⁾ hat eine derartige Methode zur Integration der Gleichung $\Delta u = 0$ angegeben, um die Flüssigkeitsströmung über ein Wehr darzustellen.⁵²⁷⁾ Als gegeben wird die freie Oberfläche des Wassers angenommen, die eine Linie $u = \text{konst.}$ ist. Die Geschwindigkeit auf ihr ist dann eine Funktion der Höhe und somit durch Integration das Potential v auf ihr bestimmbar. Daraus läßt sich das Stromlinienbild eindeutig herstellen, als Begrenzung im Innern wird eine Stromlinie gewählt, die sich dem Wehr passend annähert. *Mises*⁵²⁸⁾ dagegen konstruiert die Strömung des Wassers in einer Turbine so, daß er eine der einen Begrenzung $u = c$ naheliegende Stromlinie passend annimmt, dann die Strom- und Potentiallinien konstruiert bis zum andern Rande $u = c$. Fällt mit diesem keine Stromlinie zusammen, so korrigiert er, ebenso wie *Runge*, die erste angenommene Stromlinie passend. Das wird fortgesetzt, bis das Zusammenfallen erreicht ist. Das Verfahren ist auch auf die nicht-wirbelfreie Bewegung, sowohl in ebenen, meridionalen, wie axialsymmetrischen Schichten anwendbar; im letzteren Falle werden die Durchstoßpunkte der Stromlinien mit der Meridianebene dargestellt. Selbst für zähe Flüssigkeiten würde sich, wenn man nächst dem Rande drei Stromlinien annimmt, die Konstruktion theoretisch durchführen lassen, doch scheint die praktische Ausführbarkeit sehr umständlich zu sein.

Diese Methoden sind, was die Konstruktion des Integrationsnetzes anbetrifft, dadurch charakterisiert, daß sie die durch die Gleichung vorgeschriebene Bedingung für endliche Stücke möglichst genau zu befriedigen suchen. *Runge*⁵²⁹⁾ betrachtet auf einer Kurve $v = \text{konst.}$

525) *Mallik*, Lines of Force due to given Static Charges. Philosophical Magazine (6) 22 (1911), p. 177—90.

526) *Blasius*, Funktionentheoretische Methoden in der Hydrodynamik. Zeitschr. Math. Phys. 58, 1910, S. 90—110.

527) Der Vorschlag, bei Strömung über ein Wehr die Strömungslinien durch zeichnerische Methoden aufzusuchen, ist wohl zuerst von *Forchheimer* gemacht. Encyklopädie d. math. Wissenschaften IV, Art. 20, S. 414; *Blasius*, Zeitschr. Math. Phys. 59 (1910), p. 43—44.

528) *v. Mises*, Theorie der Wasserräder. Zeitschr. Math. Phys. 57 (1909), p. 1—120.

529) *Runge*, Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1911, p. 431—448.

entsprechend den Werten $u - \delta, u, u + \delta$ die drei Punkte A, B, C und auf der durch B gehenden Kurve $u = \text{konst.}$ die weiteren Punkte




Fig. 33.

D und E entsprechend $v - \delta$ und $v + \delta$. Verbindet man dann A mit C und D mit E und halbiert diese Strecken in F und G , so geht bis auf Glieder vierter Ordnung in δ die Verbindungslinie GF durch B , und es ist mit derselben Genauigkeit $BF = BG$. Dreht man dann den Vektor AC um den Punkt B , nach $D'E'$, so daß $D'E'$ senkrecht auf AC steht, so fällt bis auf Glieder dritter Ordnung $D'E'$ mit DE zusammen. Will man auch hier eine Genauigkeit bis zu Gliedern vierter Ordnung erreichen, so muß man die

den Werten $u + \frac{\delta}{2}$ und $u - \frac{\delta}{2}$ entsprechenden Punkte A' und C' zur Hilfe nehmen; zieht man AC , parallel $A'C'$ und macht $AC_1 = 2A'C'$, so ist der Vektor $|EE'| = \frac{1}{3}|CC_1|$, und diese beiden Vektoren stehen bis auf Glieder vierter Ordnung senkrecht aufeinander. Neuerdings wurden diese Betrachtungen von *Treffitz*^{498a)} auf die Gleichung

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

erweitert und zur Konstruktion des Strömungsbildes eines aus kreisrunder Öffnung fließenden Flüssigkeitsstrahles benutzt.

Die Methode von *Mises* ist weniger genau, ermöglicht jedoch die nicht wirbelfreie Bewegung zu behandeln und integriert daher die Differentialgleichung

$$(257) \quad \frac{\partial}{\partial x} f(xy) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} f(xy) \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

Aus nebenstehender Figur 34 erkennt man für ebene Strömung⁵³⁰⁾, daß

$$(258) \quad \Delta \vartheta = \frac{a a_1}{ab} - \frac{b b_1}{bc} = \left[\left(\frac{1}{f(xy)_{m_1}} \right) - \left(\frac{1}{f(xy)_{m_2}} \right) \right] \frac{\Delta v}{\Delta u} = \frac{ab \cdot a a_1}{\Delta} \left(\frac{\partial c}{\partial n} - \frac{c}{\rho} \right) + \frac{2\lambda}{\Delta} ab \cdot a a_1$$

ist. *Mises* bezeichnet den Ausdruck $\frac{\Delta \vartheta}{ab \cdot a a_1}$ als spezifische Form-

530) *Mises*, Theorie der Wasserräder, § 5, 4.

differenz. Da dieser in seinem Falle der Wirbelstärke λ proportional ist, so hat er ein Netz zu konstruieren, derart, daß längs der Stromlinien $u = \text{konst.}$, die spezifische Formdifferenz konstant ist. Bei dieser Konstruktion geht er von den Stromlinien in genügender Entfernung von der Turbine, die er auf beiden Seiten als bekannt annimmt, aus, so daß Anfangs- und Endpunkt der einzelnen Stromlinien festgelegt sind.




Fig. 34.

Bei der meridionalen Strömung wird $\frac{a a_1}{r \cdot ab}$ als Form bezeichnet, dann ist die spezifische Formdifferenz τ , die durch $r \cdot ab \cdot a a_1$ dividierte Änderung dieses Quotienten

$$(259) \quad \tau = \frac{2}{\Delta u} \frac{\lambda}{r}.$$

Ist endlich bei der axialsymmetrischen Bewegung die Gleichung der Leitflächen

$$(260) \quad f(rz) = k,$$

so gilt für die Stromlinien die Gleichung

$$(261) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial z} = -r \left(\frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial n}{\partial z} - \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial n}{\partial r} \right) + r^2 F(u) = 2 r \lambda_m$$

wo λ_m die senkrecht zur Meridianebene stehende Wirbelkomponente ist und wo

$$(262) \quad n(rz) = r \left(\frac{\partial f}{\partial r} \cdot \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial u}{\partial r} \right) + r^2 \omega$$

(ω Winkelgeschwindigkeit der rotierenden Leitflächen) ist. Ist nun σ der Inhalt der von den f - und u -Linien, σ' der von den f - und n -Linien eingeschlossenen Parallelogramme, so ist die spezifische Formdifferenz

$$(263) \quad \tau + \frac{1}{r\sigma'} \frac{\Delta f \Delta n}{\Delta u} = \frac{F(u)}{\Delta u}$$

und

$$(264) \quad n - r^2 \omega = r \frac{\Delta f \Delta u}{\sigma} \quad 531)$$

Mit Hilfe dieser Gleichungen lassen sich die Meridiankurven der n -Flächen zeichnen.

Indem *Mises*⁵³²⁾ eine Betrachtung von *Runge*⁵³³⁾, die sich auf gewöhnliche Differentialgleichungen bezieht, überträgt, gewinnt er einen Überblick über die Konvergenz seines Verfahrens.

531) *Mises*, Theorie der Wasserräder, § 14 findet sich ein durchgeführtes Beispiel.

532) *Mises*, Theorie der Wasserräder, § 5, 6.

533) *Runge*, Math. Ann. 44 (1894), p. 437—48.

c) Eine Methode, die alle Randbedingungen streng erfüllt und durch endliche Stücke approximiert, findet sich z. B. bei Richardson.⁵³⁴⁾ Er zeichnet die u - und v -Linien nach Gutdünken ein und verbessert durch Probieren so, daß das Seitenverhältnis der entstehenden Rechtecke möglichst genau stimmt. Ähnlich verfährt Lehmann⁵³⁵⁾, um den Kraftlinienverlauf in Luft zu bestimmen, der




Fig. 35.

der Gleichung $\Delta u = 0$ genügt. Zur Festlegung des u, v -Netzes benutzt er die Mittellinien der Maschen. Dabei wird die vierte gesuchte Seite schrittweise festgelegt, so daß $aa = \frac{1}{4}ab$, dann $\alpha g = \frac{1}{4}\alpha\beta$ und endlich $gc = \frac{1}{2}gf$ gemacht wird, wobei der Bogen durch die Sehne ersetzt wird, um das Abmessen mit dem Zirkel machen zu können. Nun werden Flächenstücke betrachtet, die begrenzt sind durch 2 Linien $v = c_1, v = c_2$ und zwei Linien $u = x_1, u = x_2$. Versuchsweise wird eine Linie $v = \frac{c_1 + c_2}{2}$ eingezeichnet; diese wird nun so lange sinngemäß verschoben, bis sie von den für die beiden entstehenden Streifen nach obiger Methode getrennt konstruierten Linien $u = x_1 + \frac{c_2 - c_1}{2}, u = x_1 + 2 \frac{c_2 - c_1}{2}$ usw. in denselben Punkten getroffen wird; dabei müssen sich natürlich alle Linien orthogonal schneiden. Dann wird eine weitere Unterteilung eingezeichnet usw. Kennt man c_1, c_2 und x_1, x_2 , was freilich meist nicht der Fall ist, so hat man, da $x_2 = x_1 + n \frac{c_2 - c_1}{2}$ — bei n Quadraten in jedem Streifen — sein muß (n wird im allgemeinen keine ganze Zahl sein), ein Maß für die Genauigkeit der Zeichnung. Betreffs Vereinfachung durch Aufsuchen von Symmetrielinien, Durchführung der Konstruktion bei einspringenden Ecken, und ins Unendliche gehenden Feldern usw. sei auf die Arbeit selbst verwiesen.⁵⁸⁰⁾ Das so konstruierte Netz läßt sich nun entweder nach der Methode von Runge⁵²⁹⁾ oder dadurch verbessern, daß man ein genau konstruierbares u_1, v_1 -Netz einer der Gleichung $\Delta u = 0$ genügenden Funktion herstellt; das sich dem gesuchten Netz an einer Stelle anschmiegt; dieses Netz wird auf das vorläufig kon-

534) L. F. Richardson: A Freehand Graphic way of the determining Stream Lines and Equipotentials. Phil. Mag. 1908, 6. Serie, Vol. XII. Die Arbeit ist auch insofern interessant, als Richardson zeigt, in welcher Weise sich für räumliche Probleme bei gewissen Symmetrien das Seitenverhältnis der Rechtecke bestimmt. Z. B. zeigt er, wie man auf einem Stück der Kugelfläche, das man durch Merkatorprojektion abbildet, die Gleichung $\Delta u = 0$ integrieren kann. Ferner geht er auf Verhältnisse ein, bei denen Schraubensymmetrie herrscht.

535) Th. Lehmann: Graphische Methoden zur Bestimmung des Kraftlinienverlaufes in der Luft. Elektrotechn. Zeitschr. 1909, S. 995 ff und S. 1019 ff.

struierte Netz entsprechend aufgelegt und dann die Linien $u - u_1$; $v - v_1$ bezogen. Die so entstehenden Maschen müssen wieder quadratisch sein. Ist das nicht der Fall, so muß man entsprechende Korrekturen vornehmen.⁵³⁶) Die Methode läßt sich für die Integration der Gleichung

$$(265) \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(f(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(f(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$$

verallgemeinern.

d) *Methoden, die die Randbedingungen streng erfüllen und das Netz infinitesimal approximieren.* Runge hat eine Methode angegeben zur Integration der Differentialgleichung

$$(266) \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(f(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(f(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$$

und der adjungierten

$$(267) \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{f(x, y)} \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{f(x, y)} \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0,$$

die unter *strenger Erfüllung der Randbedingungen* den beiden Differentialgleichungen durch *sukzessive Approximation im Infinitesimalen* zu genügen sucht. Die von den u - und v -Kurven gebildeten Rechtecke haben das Seitenverhältnis

$$\lim \frac{\Delta a}{\Delta b} = f(x, y) \frac{du}{dv}.$$

Man zeichnet nun unter Erfüllung der gegebenen Randbedingungen ein Kurvennetz ein, das nach Möglichkeit in den endlichen Rechtecken der vorgeschriebenen Bedingung genügt, entnimmt dann längs einer Kurve $v = \text{konst.}$ aus der Zeichnung die Werte $\frac{1}{f(x^I, y^I)} \left(\frac{dv}{db} \right)^I$, die man als Funktion der Bogenlänge graphisch integriert, so erhält man

$$(268) \quad u^{II} = \int_{a_0}^{a_1} \frac{1}{f(x^I, y^I)} \left(\frac{dv}{db} \right)^I da^I.$$

Die so bestimmten Punkte geben einen Anhalt für die Korrektur der Kurven $u = \text{konst.}$ Nach dieser Korrektur verfährt man genau so für die Kurven $v = \text{konst.}$ usw. Man kann sich auch auf die Korrektur der einen Kurvenschar beschränken und die andere Schar nur orthogonal dazu legen. Wenn dann ρ^I der Krümmungsradius⁵³⁷⁾




Fig. 36.

536) *Rottsieper*, Graphische Lösung einer Randwertaufgabe der Gleichung $\Delta u = 0$, Dissertation Göttingen 1914.

537) Methoden zur Bestimmung des Krümmungsradius gibt z. B. *Bjerknes*, Dynamische Meteorologie und Hydrographie, II. Kap. IX § 82 (Deutsch von *Kirchner*) Braunschweig 1913.

von u^I ist, so ist

$$(269) \quad u^{II} = c \int_{a_0}^a \frac{1}{f(x^I, y^I)} e^{\int_{a_0}^a \frac{1}{G^I} da^I} da^I,$$

wo c so zu bestimmen ist, daß $u_1^{II} = u_0^{II}$ den vorgeschriebenen Wert hat. Meist sind die u - und v -Kurven in genügender Entfernung von der zu untersuchenden Stelle bekannt, bisweilen liegt auch an der betrachteten Stelle aus Symmetriegründen eine der Kurven $v = \text{konst.}$ fest. Konvergenzbetrachtungen über das Verfahren fehlen noch ganz. In den ausgeführten Fällen

$$(270) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \pm \frac{1}{y} \frac{\partial u}{\partial y} = 0^{538}) \quad \text{und} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \pm \frac{3}{y} \frac{\partial u}{\partial y} = 0^{539})$$

war die Konvergenz gut.⁵⁸¹⁾

Runge gibt für die Differentialgleichung $\Delta u = 0$ noch eine andere graphische Methode⁵²⁹⁾, um bei einem einfach zusammenhängenden Bereich die *Greensche Funktion zu konstruieren* und damit Randwertaufgaben zu lösen. Zunächst wird angenommen, daß die *Greensche Funktion* G gegeben ist, die an einem bestimmten Punkte im Innern des Bereiches logarithmisch unendlich wird und auf dem Rande verschwindet. Sie bildet den reellen Teil einer analytischen Funktion $G + G_1 i$. Diese wird graphisch dargestellt durch ein Netz von Linien $G_1 = \text{konst.}$ und $G = \text{konst.}$ die „Quellstromlinien“ und die „Zirkulationsstromlinien“. Sind die Werte einer Funktion f , die der Gleichung $\Delta u = 0$ im Innern genügt, auf dem Rande gegeben, so ist der Wert in dem Punkte, wo G logarithmisch unendlich wird, dargestellt durch

$$(271) \quad \frac{1}{2\pi} \int f dG_1$$

integriert über den Rand. Wenn man also die Werte von G_1 auf dem Rande kennt, so braucht man nur die Werte von f als Ordinaten zur Abszisse G_1 aufzutragen und erhält den Wert von f als Mittelwert. Es wird dann ferner gezeigt, wie dieselbe Figur auch den Wert von f in jedem beliebigen andern Netzpunkte des Bereiches liefert. Man führt zu dem Ende statt G_1 eine andere Veränderliche G_1^* ein, eine Funktion von G_1 , die sich aus der konformen Abbildung eines Kreises auf sich selbst ergibt. Graphisch besteht diese Transformation darin, daß auf die Abszissenachse eine gewisse Skala gelegt wird, die längs

538) Jäger: Graphische Integrationen in der Hydrodynamik. Dissertation Göttingen 1909.

539) Willers: Die Torsion eines Rotationskörpers um seine Achse. Zeitschr. Math. Phys. 55 (1907), p. 225—63.

ihr verschoben werden kann. Mechanisch läßt sie sich zugleich mit der Integration mittels eines von *Rottsieper*⁵³⁶) konstruierten Integrators ausführen.

Das Verfahren, durch das man das Kurvennetz $G = \text{const.}$ und $G_1 = \text{const.}$ findet, besteht darin, daß zunächst nach Gutdünken ein Netz in den Bereich eingezeichnet und dieses durch Anwendung des obigen Satzes sukzessive verbessert wird.

Angewandt ist dies Verfahren von *v. Sanden*⁵⁴⁰) zur Berechnung des Auftriebs, den Platten erfahren, die in der Nähe des Erdbodens dem natürlichen Winde ausgesetzt sind, und von *Rottsieper*⁵³⁶) zur Berechnung der Spannungen in einem um seine Längsachse verwundenen Stabe von kreuzförmigem Querschnitt, ein Problem, das *Runge*⁵⁴⁹) noch auf andere Weise behandelt hat. *v. Sanden* wie *Rottsieper* berichten über mit dem Verfahren gemachte Erfahrungen und über Einzelheiten der Ausführung.

Eine ähnliche Methode hat *Deutsch*⁵⁴¹) zur Berechnung der elektrischen Kapazität zweier paralleler Zylinder anschließend an die Untersuchungen von *Neumann*⁵⁴²) über die Methode des arithmetischen Mittels entwickelt (vgl. II A 7b (*H. Burkhardt* und *W. F. Meyer*) Potentialtheorie, und II A 7c (*A. Sommerfeld*) Randwertaufgaben in der Theorie der partiellen Differentialgleichungen). Er geht von mathematisch leicht berechenbaren logarithmischen Potentialen aus, die auf einer die gegebene Begrenzung annähernden Kurve konstant sind. Wie sich derartige Potentialfunktionen für komplizierte Bereiche angeben lassen, zeigt *Rottsieper*⁵³⁶). Man berechnet die sich so auf der Kontour ergebenden Potentialwerte und verbessert diese Werte nach dem Mittelwertsatz von *Neumann* so lange, bis mit genügender Genauigkeit das Potential auf der ganzen Kontour den gleichen Wert hat.

Schließlich sei noch erwähnt, daß auch das *Schwarzsche* alternierende Verfahren⁵⁴³) bei entsprechend begrenzten Gebieten (z. B. kreuzförmige Begrenzung) sich gut zur graphischen oder numerischen Lösung der Gleichung $\Delta u = 0$ eignet⁵³⁶).

21. Zur numerischen Integration partieller Differentialgleichungen hat man Methoden, die zur Quadratur oder zur Integration gewöhnlicher Gleichungen dienen, übertragen. So benutzt *Biermann*⁵⁴⁴)

540) *v. Sanden*, Zeitschr. Math. Phys. 61 (1913), p. 225—245.

541) *Deutsch*, Archiv für Elektrotechnik 2 (1914), p. 435—42.

542) *Neumann*, Untersuchungen über das logarithmische und Newtonsche Potential, Leipzig 1877, Kap. 5.

543) *Schwarz*, z. B. Gesammelte mathematische Abhandlungen 2, Berlin 1890, p. 133—71. Siehe auch die eben genannten Referate II A 7b und c.

eine Erweiterung der von ihm zur Kubatur aufgestellten Formeln des Abschnitts- und Tangentenprismas zur genäherten Integration der Gleichung $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \varphi(x, y, z)$.

a) *Übertragung der Methoden von Runge-Heun-Kutta.* Gans⁵⁴⁵⁾ überträgt die von Runge⁵⁴⁶⁾ gegebene Formel auf partielle Gleichungen beliebiger Ordnung und gibt die Formeln zur Integration der Gleichungen erster und zweiter Ordnung. Wie die Formeln von Runge nähern auch seine Formeln bis einschließlich der Glieder dritter Ordnung die in eine Taylorsche Reihe entwickelte Lösung an. Es liegt nun nahe, die ein Glied weiter annähernde Kuttasche Formel⁵⁴⁷⁾ zu übertragen, was unabhängig von Runge⁵⁴⁶⁾ und Willers⁵⁴⁷⁾ geschah.

Runge faßt die partielle Differentialgleichung als System von unendlich vielen gewöhnlichen Gleichungen mit unendlich vielen Variablen und erhält dadurch eine unmittelbare Übertragung der Formeln (215). Man kann aber auch z. B. zur Integration von $\frac{\partial z}{\partial y} = f(x, y, z, \frac{\partial z}{\partial x})$, falls man $u = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z'} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ nimmt, setzen:

$$(272) \left\{ \begin{array}{l} \Delta^I z = f(x, y, z, \frac{\partial z}{\partial x}) \Delta y, \\ \Delta^{II} z = f(x, y + \frac{\Delta y}{2}, z + \frac{\Delta' z}{2}, \frac{\partial z}{\partial x} + u \frac{\Delta y}{2}) \Delta y, \\ \Delta^{III} z = f(x, y + \frac{\Delta y}{2}, z + \frac{\Delta^{II} z}{2}, \frac{\partial z}{\partial x} + (u + \frac{du \Delta y}{dy} \frac{\Delta y}{2}) \frac{\Delta y}{2}) \Delta y, \\ \Delta^{IV} z = f(x, y + \Delta y, z + \Delta^{III} z, \frac{\partial z}{\partial x} + (u + \frac{du \Delta y}{dy} \frac{\Delta y}{2} + \frac{\partial^2 u \Delta^2 y}{\partial y^2} \frac{\Delta y}{2}) \frac{\Delta y}{2}) \Delta y, \\ S = \frac{\Delta' z + \Delta^{IV} z}{2} \quad T = \frac{\Delta^{II} z + \Delta^{III} z}{2} \quad \Delta z = \frac{2T + S}{3}. \end{array} \right.$$

Den Fehler, der von fünfter Ordnung ist, kann man durch direkte Berechnung bestimmen, doch müßte man dann mindestens die sämtlichen fünften Ableitungen bilden; besser ist es, zur Fehlerabschätzung die Rechnung auch mit halben Intervallen durchzuführen; der Fehler ist dann etwa $\frac{1}{16}$ der Differenz. Da sich die Formeln auf Systeme linearer Gleichungen übertragen lassen, ist damit auch die Möglichkeit gegeben, partielle Differentialgleichungen höherer Ordnung zu integrieren; doch müssen an der Ausgangsbegrenzung z. B. für Gleichungen zweiter Ordnung die Funktion selbst und eine Ableitung gegeben sein, wie das

544) Biermann, Monatshefte Math. Phys. 20 (1909), p. 321—326.

545) Gans, Zeitschr. Math. Phys. 48 (1903), p. 394—399.

546) Runge, Numerisches Rechnen. Autographierte Vorlesung, Göttingen 1912/13, p. 248—252.

547) Nicht veröffentlicht.

etwa beim Problem der schwingenden Saite der Fall ist, während sich auf Probleme, wie sie meist bei der Gleichung $\Delta u = 0$ auftreten, diese Methode im allgemeinen nicht anwenden läßt.

b) Eine *andere Methode ersetzt die Differentialgleichung durch eine Differenzengleichung*. Man überzieht das Integrationsgebiet mit einem Netz quadratisch gelegener Punkte und wendet auf die Funktionswerte in diesen die durch eine Differenzengleichung ersetzte Differentialgleichung an. Man erhält so für jeden Punkt eine Gleichung, die den Funktionswert in dem Punkte mit denen der benachbarten Punkte oder mit den Grenzwerten verbindet. Von *Richardson*⁵⁴⁸⁾ und von *Runge*⁵⁴⁹⁾ ist diese Methode auf lineare Gleichungen angewandt worden. *Richardson* betrachtet die sämtlichen aufgestellten Gleichungen gleichzeitig und entwickelt eine Methode, aus einem die Gleichungen annähernd erfüllenden Funktionssystem sie besser befriedigende Werte abzuleiten. Angewandt hat er seine Rechnungen zur Bestimmung der Spannungen in einem Staudamm. *Runge* geht bei der Aufstellung der Gleichungen von einer Begrenzung aus, führt die Funktionswerte in der ersten bzw. ersten und zweiten parallelen Punktreihe als Unbekannte ein und gibt immer die Funktionswerte einer zu dieser parallelen Reihe von Netzpunkten als Funktionen der Werte in den vorhergehenden Reihen an. Auf diese Weise bekommt er schließlich nur so viel Gleichungen, als Netzpunkte parallel zu dieser Begrenzung in einer bzw. zwei Reihen liegen. Im einzelnen ergeben sich dabei bedeutende Vereinfachungen. Auch *Runge* bestimmt nicht gleich die endgültigen Werte, sondern erst angenäherte Werte, die er dann verbessert. Angewandt hat er seine Methode auf Berechnung der Spannung bei Torsion zylindrischer Stäbe.

c) *Methode von Rayleigh-Ritz*. Die besonders für physikalische und technische Probleme wichtigste Integrationsmethode ist von *Rayleigh*⁵⁵⁰⁾ angegeben und unabhängig davon von *Ritz*⁵⁵¹⁾ systematisch ausgebildet. *Rayleigh*⁵⁵²⁾ benutzt diese Methode z. B. zur Berechnung der Schwingungen am offenen Ende einer Pfeife.⁵⁵³⁾ Sie läßt sich in gleicher Weise zur Integration gewöhnlicher wie partieller Differential-

548) *Richardson*, Philosophical transactions of the Royal Society of London A 210 (1910), p. 307—357.

549) *Runge*, Zeitschr. Math. Phys. 56 (1908), p. 225—232.

550) *Rayleigh*, Philosophical Magazine (5) 47 (1899), p. 566—72.

551) *Ritz*, Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1908. p. 236—48. Journ. f. Math. 135 (1908), p. 1—61.

552) *Rayleigh*, Philosophical Magazine (6) 22 (1911), p. 225—229.

553) *Rayleigh*, Theorie of Sound (z. B. II. Anhang 1, p. 291—295), London 1878 u. Philosophical Transactions 161 (1870), p. 77—118.

gleichungen verwenden, je nachdem man es mit von einer oder mehreren Variablen abhängigen Problemen zu tun hat; Bedingung ist nur, daß sich die Aufgabe als Variationsproblem darstellen läßt. Die Methode geht nämlich nicht von der Differentialgleichung mit den Randbedingungen aus, sondern von einem in der Hauptsache mit der potentiellen Energie des im Gleichgewicht befindlichen, isolierten Systems zusammenfallenden Integrale, aus dem nach dem Prinzip der kleinsten Wirkung, also durch Variation die Gleichungen nebst Randbedingungen gewonnen werden können.⁵⁵⁴⁾ Für elastische Probleme ist das Variationsprinzip nach *Lorenz*⁵⁵⁵⁾ der Satz von *Castigliano*⁵⁵⁶⁾ über die kleinste Formänderungsarbeit. Hier muß der Ausdruck $L_t - 2L_a$ einen ausgezeichneten Wert haben⁵⁵⁷⁾, wo L_t die elastische Energie des Systems als Funktion der Deformationsgrößen, L_a die Summe aus den halben Produkten der äußeren Kräfte und der Verschiebung ihrer Angriffspunkte ist.⁵⁵⁸⁾ Die Methode von *Ritz* besteht nun darin, die gesuchte Lösung durch eine Reihe $w_n = \sum_1^n a_i P_i$ zu approximieren, wo die P_i Funktionen sind, die den Rand- und Symmetriebedingungen genügen, während die konstanten Koeffizienten a_i so bestimmt werden, daß die potentielle Energie als Funktion der a_i ein Minimum wird. Diese Bedingung liefert im allgemeinen für jede Annäherungsfunktion w_n ein System von n linearen nicht homogenen Gleichungen mit

⁵⁵⁴⁾ Bei den Arbeiten von *Ritz*⁵⁵¹⁾ ist zu beachten, daß der eigentliche Ausdruck für die elastische Deformationsarbeit

$$\iint \frac{E' h^2}{3} \left[\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right)^2 - 2(1-\nu) \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right)^2 \right) \right] dx dy$$

ist, wie ihn *Ritz* auch in der Annalenarbeit benutzt hat. Der Ausdruck

$$\iint \frac{E' h^2}{2} \left[\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right]^2 dx dy,$$

der in den oben zitierten Arbeiten benutzt wird, ist nur dann richtig, wenn

$$\iint \left[\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] dx dy = 0$$

ist, wo der Klammerausdruck das Krümmungsmaß $\frac{1}{\rho_1 \rho_2}$ angibt. Dies ist in dem dort behandelten Problem der eingespannten Platte tatsächlich der Fall.

⁵⁵⁵⁾ *Lorenz*, Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 57 (1913), p. 543—545. Physik. Zeitschr. 14 (1913), p. 71—74.

⁵⁵⁶⁾ *Castigliano*, Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino 27 (1875). Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino 10 (1875), p. 380—423; 11 (1876), p. 127—286.

⁵⁵⁷⁾ *Pöschl*, Physik. Zeitschr. 14 (1913), p. 410—412.

⁵⁵⁸⁾ v. *Karman*, Physik. Zeitschr. 14 (1913), p. 253, 254.

nicht verschwindender Determinante, deren Koeffizienten sich durch Quadraturen bestimmen. *Ritz* hat gezeigt, unter Benutzung von Untersuchungen von *Hilbert*⁵⁵⁹⁾ und *Levi*⁵⁶⁰⁾, daß abgesehen von einigen für die Praxis kaum in Betracht kommenden Fällen⁵⁶¹⁾, bei wachsendem n die Reihe der w_n gegen einen Grenzwert konvergiert, und daß dieser die gesuchte Funktion ist. Letzteres hat *Jäger*⁵⁶¹⁾ noch etwas allgemeiner gezeigt. Die Methode ergibt also ein konvergentes Verfahren zur Integration.⁵⁶²⁾ Das Verfahren von *Ritz* hängt eng mit der Methode zur Behandlung statisch unbestimmter Fachwerke von *Mohr* zusammen.⁵⁶³⁾ Da fast alle in der Technik vorkommenden Gleichgewichtsprobleme sich aus einem Variationsproblem ableiten lassen, ist die Methode von *Ritz* außerordentlich brauchbar, und zahlreiche Probleme, besonders der Elastizitätstheorie, sind mittels derselben behandelt. So behandelt *Ritz*⁵⁶⁴⁾ selbst die rechteckige Platte, mit der sich dann weiter *Lorenz*⁵⁶⁵⁾, der allerdings nur ein Glied bestimmt, *Nadai*⁵⁶⁶⁾, *Kalähne*⁵⁶⁷⁾ und *Timoschenko*⁵⁶⁸⁾ beschäftigen. Letzterer hat insbesondere für eine Reihe von Problemen die kritische Belastung bestimmt.⁵⁶⁹⁾ Weiter behandelt *Nadai* die kritische Beanspruchung bei kreisrunden Platten.^{569*)} Ähnlich bestimmt *Stodola*⁵⁷⁰⁾ die kritische Umlaufgeschwindigkeit für die Transversalschwingungen von Dampfturbinenrädern. In den letzterwähnten Fällen erhält man zur Bestimmung der a_i ein System von n homogenen linearen Gleichungen, die also nur Werte von a_i liefern, falls die Determinante verschwindet.

559) *Hilbert*, Mathem. Ann. 59 (1904), p. 161—86 u. Festschrift d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, math.-phys. Klasse, Berlin 1901.

560) *Levi*, Rendiconti del circolo mathematico di Palermo 22 (1906), p. 293—360, 387—394.

561) *Jäger*, Paris C. R. 158 (1914), p. 1160, 1161.

562) *Pöschl*, Sitzgsb. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Wien 121, II 2 a (1912), p. 1235—60.

563) *Mohr*, Zeitschr. des Ingen.- u. Architektenvereins zu Hannover 20 (1874), p. 509—526, 21 (1875), p. 17—38.

564) *Ritz*, Ann. d. Physik (4) 28 (1909), p. 737—786.

565) *Lorenz*, Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ingen. 57 (1913), p. 623—625.

566) *Nadai*, Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ingen. 58 (1914), p. 487—494, 540—550.

567) *Kalähne*, Grundzüge der math.-phys. Akustik 2, Leipzig 1913.

568) *Timoschenko*, Annales des Ponts et Chaussées (9) 15 (1913), p. 496—566, 16 (1913), p. 73—123 u. 372—412 auch die dort zitierte Literatur.

569) *Hager*, Berechnung ebener rechteckiger Platten mittels trigonometr. Reihen, Berlin-München 1911 scheint ähnliche Gedanken zu verfolgen.

569*) *Nadai*, Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ingen. 59 (1915), p. 169—174.

570) *Stodola*, Revue de mécanique 34 (1914), Nr. 3, p. 244—263; Schweizerische Bauzeitung 1914, p. 251.

Diese Bedingung liefert dann gerade die kleinste kritische Belastung bzw. Umlaufzeit.

Ferner sind nach dieser Methode behandelt: die Biegung krummer, dünnwandiger Rohre⁵⁷¹), die Spannung in zylindrischen Behältern mit veränderlicher Wandstärke⁵⁷²), in mit Versteifungsringen versehenen Rohren⁵⁷³), in rotierenden Scheiben von variabler Dicke⁵⁷⁴), in zylindrischen Hängeböden bei unvollkommener Einspannung⁵⁷⁵), in flachen Kugelschalen⁵⁷⁶), das Problem der Geschwindigkeitsverteilung in einem Rohr mit quadratischem Querschnitt⁵⁷⁷) usw.

22. Experimentelle Methoden. Schließlich sei noch erwähnt, daß man auch versucht hat, gewissermaßen experimentell partielle Differentialgleichungen zu lösen; so hat Förster⁵⁷⁸) die Greensche Funktion für die Gleichung $\Delta u = 0$, in dem Fall, wo an einem Teil des Randes $u_1 = c_1$, $u_2 = c_2$ usw., an einem anderen $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ ist, durch Messung elektrischer Ströme bestimmt. Dabei stellt er das Gebiet durch eine entsprechend von Leitern und Nichtleitern begrenzte Kupfersulfatlösung dar und benutzt den bekannten Neumannschen Mittelwertsatz.⁵⁴²) Wiegardt⁵⁷⁹) hat durch Ausmessen einer dünnen deformierten elastischen Platte, eine angenäherte Lösung der Gleichung $\Delta \Delta u$ für bestimmte Randbedingungen zu finden versucht.⁵⁸⁰)⁵⁸¹)

571) v. Karman, Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ingen. 55 (1911), p. 1889—1895.

572) Pöschl, Armierter Beton 5 (1912), p. 169—175, 210—217, 328, 360. Pöschl u. Terzaghi, Berechnung von Behältern nach neuen analytischen und graphischen Methoden, Berlin 1913 (80 Seiten).

573) Albenga, Atti della R. Accad. delle scienze di Torino 49 (1914), p. 289—97.

574) Pöschl, Zeitschr. für das gesamte Turbinenwesen 10 (1913), p. 70—72, 90—92.

575) Pöschl, Zeitsch. d. öster. Ingen.- u. Architektenvereins 64 (1912), p. 550—52.

576) Federhofer, Sitzgsber. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Wien 121, II 2 a p. 2143—2161.

577) Paschoud, Paris C. R. 159 (1914), p. 158—160.

578) Förster, Archiv für Elektrotechnik 2 (1914), p. 175—81.

579) K. Wiegardt: Über ein neues Verfahren, verwickelte Spannungsverteilungen in elastischen Körpern auf experimentellem Wege zu finden. Mitteilungen des Vereins deutscher Ingenieure, Berlin 1908.

580) Auf räumliche Probleme mit Rotationssymmetrie ist diese Methode neuerdings von Kuhlmann, Archiv für Elektrotechnik 3 (1915), p. 203—25 übertragen.

581) Flügel, Zeitschrift für das gesamte Turbinenwesen 12 (1915), p. 73—77, 89—91, 100—103 bestimmt mittels eines ganz ähnlichen Verfahrens den Verlauf der Strömung idealer Flüssigkeiten in Kreisrädern.

II C3. NEUERE ENTWICKLUNG DER POTENTIALTHEORIE. KONFORME ABBILDUNG.*)

VON

L. LICHTENSTEIN
in BERLIN.

In den siebzehn Jahren seit dem Erscheinen des Artikels II A 7 b von *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer* ist die Potentialtheorie durch neue weittragende Methoden bereichert und in ihren Grundlagen befestigt worden. Es erschien darum notwendig, sowohl die Hauptsätze der allgemeinen Potentialtheorie als auch die von *H. A. Schwarz*, *C. Neumann* und *H. Poincaré* begründeten älteren Theorien erneut einer Besprechung zu unterziehen (zweiter und dritter Abschnitt). In dem ersten, einleitenden Abschnitte werden, um die Wege für dieses Referat und einen späteren Artikel über partielle Differentialgleichungen vom elliptischen Typus zu ebnet, die wichtigsten benutzten Begriffe, Bezeichnungen und Abkürzungen in einheitlicher Weise festgelegt. Die neueren Methoden bilden neben der allgemeinen Theorie der konformen Abbildung den Inhalt des letzten, vierten Abschnittes, sofern sie nicht, wie die sich der linearen Integralgleichungen bedienenden Verfahren, in dem dritten Abschnitte Platz gefunden haben.

Die im dritten und hauptsächlich im vierten Abschnitte zur Darstellung gelangende konforme Abbildung gehört in den meisten Arbeiten der älteren Schule sowie in zahlreichen Untersuchungen der neueren Zeit *methodisch* in das Gebiet der Potentialtheorie hinein. Eine eingehende Darstellung der Potentialtheorie unter Ausschluß der konformen Abbildung und die Zusammenfassung dieser in einem besonderen Artikel würde daher nicht gut ausführbar sein. Das Referat über die konforme Abbildung würde seinerseits natürlich unvollständig bleiben, wollte man die neuerdings ausgebildeten independenten funktionentheoretischen und Kontinuitätsmethoden an dieser Stelle außer Betracht lassen. In der vorliegenden Darstellung sind darum die verschiedenen Richtungen tunlichst dem historischen Entwicklungsgange folgend gleichmäßig berücksichtigt worden.

*) Für die Mitwirkung bei der Korrektur dieses Referates und für verschiedene Verbesserungs- und Ergänzungsvorschläge bin ich außer der Redaktion den Herren *Bieberbach*, *Carathéodory*, *Courant*, *Hilb* und *Koebe* zum größten Danke verpflichtet.

Inhaltsübersicht.

I. Definitionen und Bezeichnungen.

1. Allgemeines über zwei- und dreidimensionale Gebiete.
2. Spezielle Klassen zwei- und dreidimensionaler Gebiete.
3. Ortsfunktionen.
4. Allgemeines über unendlichvielblättrige schlichtartige Gebiete.

II. Allgemeine Sätze der Potentialtheorie.

5. Definition der Potentialfunktion.
6. Potential einer einfachen Belegung.
7. Potential einer Doppelbelegung.
8. Logarithmisches Potential einer ebenen Flächenbelegung.
Potential einer Volumladung.
9. *Newtonsches* Potential einer einfachen Linienbelegung.
10. *Greensche* Formeln. Allgemeine Eigenschaften der Potentialfunktionen.
11. Die *Cauchy-Riemannschen* Differentialgleichungen.

III. Besondere Methoden für einzelne Klassen zwei- und dreidimensionaler Gebiete. Spezielle Theorie der konformen Abbildung.

12. Die erste und die zweite Randwertaufgabe.
Problemstellung und Unitätssätze.
13. Explizite Lösung der ersten Randwertaufgabe für die Kreisfläche und den Kugelkörper.
 - a) Die *Poissonschen* Integrale.
 - b) Entwicklungssatz. Folgerungen.
14. Kreisringfläche. Entwicklungssatz. Folgerungen.
15. Positive Potentialfunktionen.
16. Die Sätze von *Harnack*.
17. Methode des arithmetischen Mittels.
 - a) Allgemeine Ansätze und Resultate von *C. Neumann* und *G. Robin*.
 - b) Grundlegende Wendung durch *H. Poincaré*.
 - c) Weiterführung der *Poincaréschen* Methoden.
 - d) Zurückführung auf eine lineare Integralgleichung.
18. Verhalten der Lösung des ersten Randwertproblems am Rande des Definitionsgebietes.
19. Lösung der ersten Randwertaufgabe als Potential einer einfachen Belegung.
20. Stetig gekrümmte Gebiete. *Greensche* Funktion. *Greensche* Formel.
21. Stetig gekrümmte Gebiete. *Greensche* Funktionen zweiter Art.
22. Konforme Abbildung einfach zusammenhängender Gebiete der Klasse B in \mathfrak{E} auf ein Kreisgebiet.
23. Gebiete der Klasse D in \mathfrak{E} . Konforme Abbildung.
24. Kombinatorische Methoden.
 - a) Alternierendes Verfahren. Drei Grundtypen von Aufgaben.
 - b) Ebene Gebiete der Klasse E und M . Das erste Randwertproblem.
 - c) Gebiete der Klasse E und M in \mathfrak{E} . Konforme Abbildung auf analytische Gebiete. Das zweite Randwertproblem.
 - d) Lösungen mit vorgeschriebenen Periodizitätsmoduln.
 - e) Zweidimensionale Gebiete auf einer Fläche im Raume. Konforme Abbildung auf ebene Gebiete.

- f) Gebiete in \mathbb{C}_m . Existenzsätze der *Riemannschen* Theorie.
 - g) Weitere Anwendungen des alternierenden Verfahrens.
 - h) Strömungspotential. Abbildung auf ein Schlitzgebiet.
 - i) Gemischte Randbedingungen.
 - j) Weitere kombinatorische Methoden.
25. Kreispolygonflächen: Polyeder.
26. Konvexe Gebiete. Rundungsschranke. Bedingungen für die Schlichtheit einer Abbildung.
27. Konforme Abbildung mehrfach zusammenhängender Gebiete.
28. Das dritte Randwertproblem.
29. Weitere Randwertaufgaben.
30. Die *Poisson'sche* Differentialgleichung.
31. Einzelbetrachtung besonderer Gebiete.
32. Wirkliche Bestimmung der Lösung von Randwertaufgaben. Besondere Ansätze.
33. Lösung in Abhängigkeit von der Begrenzung.
- IV. Umfassende Methoden. Allgemeine Theorie der konformen Abbildung.**
34. Leitgedanken. Heuristisches.
35. *H. A. Schwarz*, Zur Theorie der Abbildung.
36. Ergebnisse von *A. Harnack*. Méthode de balayage von *H. Poincaré*.
37. *H. Poincaré*, Sur un théorème de la théorie générale des fonctions.
38. Einfach zusammenhängende schlichte Gebiete. *Greensche* Funktion. Konforme Abbildung auf ein Kreisgebiet.
39. Auflösung des ersten Randwertproblems in der Ebene.
40. Einfach zusammenhängende Gebiete der allgemeinsten Natur.
 - a) *H. Poincaré*, Sur l'uniformisation des fonctions analytiques.
 - b) *P. Koebe*, Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven.
41. Zweidimensionale schlichtartige Gebiete der allgemeinsten Natur.
42. Strömungspotential.
43. Das iterierende Verfahren von *P. Koebe*.
44. Konforme Abbildung eines p -fach zusammenhängenden Gebietes in \mathbb{C} auf ein Vollkreisgebiet.
45. Variationsmethoden.
 - a) Allgemeines.
 - b) Die ersten Arbeiten von *D. Hilbert*.
 - c) Auflösung des ersten Randwertproblems in der Ebene und im Raume.
 - d) Strömungspotential. Der *Hilbert'sche* Ansatz.
Konforme Abbildung auf ein Schlitzgebiet.
46. Kontinuitätsmethode im Gebiete der konformen Abbildung.
47. Funktionentheoretische Richtung.
48. Abbildung des Randes.
 - a) Besondere Klassen schlichter Gebiete.
 - b) Allgemeine Theorie.
49. Variable Gebiete.

Literatur.

Ältere Literatur vgl. bei *H. Burkhardt* und *W. Franz Meyer*, Potentialtheorie, II A 7 b, p. 465—466. Öfter genannt werden im folgenden namentlich:
A. Harnack, Die Grundlagen der Theorie des logarithmischen Potentials und

der eindeutigen Potentialfunktion in der Ebene, Leipzig 1887 (abgekürzt, *A. Harnack*, Grundlagen).

- A. Korn*, Lehrbuch der Potentialtheorie, zwei Bände, Berlin 1899 (*A. Korn*, Potentialtheorie).
H. Poincaré, Théorie du potentiel Newtonien, 1894/95, réd. par *E. Le Roy* et *C. Vincent*, Paris 1899 (*H. Poincaré*, Potentiel).

Weitere Literatur:

- O. Hölder*, Beiträge zur Potentialtheorie, Inaugural-Dissertation, Stuttgart 1882.
G. Holzmüller, Einführung in die Theorie der isogonalen Verwandtschaften und der konformen Abbildungen, verbunden mit Anwendungen auf mathematische Physik, Leipzig 1882.
C. Neumann, Über die Methode des arithmetischen Mittels, zwei Abhandlungen, Leipzig 1887/88 (Aus dem 13. und 14. Bande der „Abh. d. Kgl. Sächs. Ges. d. Wiss.“ Nr. IX und XIII). (*C. Neumann*, Abhandlungen).
 — Vorlesungen über *Riemanns* Theorie der *Abelschen* Integrale, zweite Auflage, Leipzig 1887 (*C. Neumann*, *Abelsche* Integrale).
A. H. Schwarz, Gesammelte mathematische Abhandlungen, zwei Bände, Berlin 1890 (*H. A. Schwarz*, Ges. Abh.) [1910].
E. B. Christoffel, Gesammelte mathematische Abhandlungen, zwei Bände, Leipzig
F. Klein, Über *Riemanns* Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer Integrale, Leipzig 1882 (*F. Klein*, Algebraische Funktionen).
 — *Riemanns*che Flächen (lith.), Göttingen 1892.
 — Über die hypergeometrische Funktion (lith.), Göttingen 1894.
L. Schlesinger, Handbuch der Theorie der linearen Differentialgleichungen, zwei Bände, Leipzig 1895—1898.
R. Fricke und *F. Klein*, Vorlesungen über die Theorie der automorphen Funktionen, Leipzig und Berlin, Bd. I, 1897; Bd. II, 1900 bis 1912 (*R. Fricke* und *F. Klein*, Automorphe Funktionen).
É. Picard, Traité d'Analyse, zweite Auflage, Paris, Bd. I, 1901; Bd. II, 1905; Bd. III, 1908 (*É. Picard*, Traité).
A. Korn, Fünf Abhandlungen zur Potentialtheorie, Berlin 1902 (*A. Korn*, Abhandlungen).
J. Hadamard, Leçons sur la propagation des ondes et les équations de l'hydrodynamique, Paris 1903 (*J. Hadamard*, Leçons).
E. R. Neumann, Studien über die Methoden von *C. Neumann* und *G. Robin* zur Lösung der beiden Randwertaufgaben der Potentialtheorie, Leipzig 1905 (*E. R. Neumann*, Studien).
V. Volterra, Leçons sur l'intégration des équations différentielles aux dérivées partielles professées à Stockholm, Upsala 1906; zweite Auflage 1914.
R. d'Adhémar, Exercices et leçons d'Analyse, Paris 1908.
 — L'équation de *Fredholm* et les problèmes de *Dirichlet* et de *Neumann*, Paris 1909.
A. Wangerin, Theorie des Potentials und der Kugelfunktionen, Bd. I, Leipzig 1909.
H. Poincaré, sechs Vorträge über ausgewählte Gegenstände aus der reinen Mathematik und mathematischen Physik, Leipzig 1910.
 — Leçons de mécanique céleste, Bd. III, Paris 1910.
J. Horn, Einführung in die Theorie der partiellen Differentialgleichungen, Leipzig 1910 (*J. Horn*, Partielle Differentialgleichungen).
J. Plemelj, Potentialtheoretische Untersuchungen, Leipzig 1911 (*J. Plemelj*, Untersuchungen).

- F. Prym* und *G. Rost*, Theorie der Prymschen Funktionen I. Ordnung, Leipzig 1911 (*F. Prym* und *G. Rost*, Prymsche Funktionen).
- D. Hilbert*, Grundzüge einer allgemeinen Theorie der linearen Integralgleichungen, Leipzig 1912 (*D. Hilbert*, Grundzüge).
- H. Weber*, Die partiellen Differentialgleichungen der mathematischen Physik, fünfte Auflage, Braunschweig, Bd. I, 1910; Bd. II, 1912 (*H. Weber*, Partielle Differentialgleichungen).
- E. R. Neumann*, Beiträge zu einzelnen Fragen der höheren Potentialtheorie, Leipzig 1912 (*E. R. Neumann*, Beiträge).
- W. F. Osgood*, Lehrbuch der Funktionentheorie, zweite Auflage, Leipzig 1912, Bd. I.
- É. Goursat*, Cours d'Analyse mathématique, zweite Auflage, Paris, Bd. I, 1910; Bd. II, 1911; Bd. III, erstes Heft 1913, zweites Heft 1914 (*É. Goursat*, Cours).
- L. Lewent*, Konforme Abbildung, mit einem Beitrag von *W. Blaschke*, Leipzig 1912.
- E. Study*, Vorlesungen über ausgewählte Gegenstände der Geometrie:
 1. Heft, Ebene analytische Kurven und zu ihnen gehörige Abbildungen, Leipzig 1911.
 2. Heft, Konforme Abbildung einfach-zusammenhängender Bereiche. Herausgegeben unter Mitwirkung von *W. Blaschke*, Leipzig 1913.
- H. Weyl*, Die Idee der Riemannschen Fläche, Leipzig 1913.
- G. Herglotz*, Über die analytische Fortsetzung des Potentials ins Innere der anziehenden Massen, Leipzig 1914.
- L. Bieberbach*, Einführung in die konforme Abbildung, Berlin und Leipzig 1915 (*L. Bieberbach*, Konforme Abbildung).
- T. Carleman*, Über das Neumann-Poincarésche Problem für ein Gebiet mit Ecken, Inaugural-Dissertation, Upsala 1916.

I. Definitionen und Bezeichnungen.

1. Allgemeines über zwei- und dreidimensionale Gebiete. Se (M) eine Punktmenge in einer schlichten (d. h. einfach bedeckten) Ebene (in \mathfrak{E}) oder auf einem die Gesamtebene oder einen Teil dieser nach Art einer geschlossenen Riemannschen Fläche ganz oder zum Teil mehrfach überdeckenden flächenhaften Gebilde (in \mathfrak{E}_m). Dieses kann (eine endliche Anzahl im Innern gelegener) Windungspunkte (endlicher Ordnung) haben.¹⁾ Besteht eine allseitige Umgebung eines Punktes P von (M) aus lauter Punkten der Menge, so ist P ein „innerer“ Punkt.

Eine Punktmenge (M) wird „Gebiet“ genannt, wenn 1^o) alle ihre Punkte innere Punkte sind, 2^o) zwei beliebige ihrer Punkte durch einen geradlinigen Streckenzug (von endlicher Seitenzahl), dessen alle Punkte der Menge angehören, verbunden werden können.²⁾ Es sei (M')

1) Die Ebene \mathfrak{E} sowie jedes im Unendlichen einfache Blatt vom \mathfrak{E}_m wird durch einen „unendlich fernen Punkt“ geschlossen gedacht. Hängen im Unendlichen mehrere Blätter der Fläche \mathfrak{E}_m zusammen, so wird diesen ein unendlich ferner Punkt (Windungspunkt) zugeordnet.

2) Wir nennen also „Gebiet“, was gelegentlich „offenes Gebiet“ genannt wird. Die Begriffe „das Gebiet“ und „das Innere des Gebietes“ sind völlig in-

die erste Ableitung von (M) .³⁾ Die Menge $(M' - M)$ ist die Begrenzung oder der Rand S von T .⁴⁾

Hat die Entfernung der Punkte eines Gebietes von dem Koordinatenursprung eine endliche obere Grenze, so heißt das Gebiet „beschränkt“.⁵⁾ Ist T ein beschränktes Gebiet in \mathfrak{E} , ist ferner S sein Rand, so wird die Punktmenge $\Theta - (T + S)$, unter Θ die Gesamtheit der Punkte von \mathfrak{E} verstanden, das „Äußere“ von T und, wenn sie ebenfalls ein Gebiet darstellt, das „Außengebiet“ T_a von T genannt. Im letzteren Falle wird T gelegentlich als das „Innengebiet“ (T_i) bezeichnet.⁶⁾

Die abgeschlossene Punktmenge $T + S$ wird „Bereich“ genannt. Vgl. den Artikel von L. Zoratti und A. Rosenthal Nr. 10.

In einer ganz ähnlichen Weise werden die Begriffe „Gebiet“, „beschränktes Gebiet“ und „Bereich“ im Raume erklärt.⁷⁾

haltsgleich. Das gleiche gilt von den Ausdrücken: „ein Punkt des Gebietes T “, „ein Punkt im Innern von T “, oder noch kürzer, „ein Punkt in T “.

Es sei bemerkt, daß wir die Bezeichnung „Kreis“ und „Kugel“ für die *Kreislinie* und *Kugelfläche* vorbehalten. Das von einem Kreise (mit $C, C_1, C', C^*, \mathfrak{C}$ usf. bezeichnet) begrenzte endliche Flächenstück (in \mathfrak{E}) heißt „Kreisfläche“ oder „Kreisgebiet“ (entsprechend mit $K, K_1, K', K^*, \mathfrak{K}$ usf. bezeichnet). In ähnlichem Sinne sprechen wir von dem „Kugelkörper“. Ein geschlossener, sich selbst nicht durchschneidender geradliniger Streckenzug (von endlicher Seitenzahl) in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m heißt „Polygon“. Ein von ihm begrenztes endliches oder unendliches Gebiet nennen wir eine „Polygonfläche“ oder ein „Polygonebiet“. In Übereinstimmung mit der Definition eines Gebietes wird nirgends von Punkten „im Innern eines Kreises“ oder allgemeiner „einer Kurve“ gesprochen.

3) Bei der Bildung von (M') hat man sich eine Umgebung eines jeden unendlich fernen Punktes oder Windungspunktes durch Vermittelung einer Funktion von der Form $z^{-\frac{1}{m}}$ ($m \geq 1$) oder $z^{\frac{1}{m}}$ ($m > 1$) auf ein beschränktes schlichtes Gebiet übertragen zu denken. Außer wenn (M) aus der Gesamtheit der Punkte der Ebene \mathfrak{E} oder einer geschlossenen Riemannschen Fläche \mathfrak{R} besteht (geschlossenes Gebiet), ist (M') von (M) verschieden.

4) Auch unendlich ferne Punkte können zum Rande eines Gebietes gehören. Windungspunkte am Rande werden nur bei Betrachtung der konformen Abbildung von Kreispolygonflächen (Nr. 25) eingeführt. Sie bleiben im übrigen ausgeschlossen. Ein Gebiet in $\mathfrak{E}, \mathfrak{E}_m$ oder im Raume wird im folgenden in der Regel mit T, T_1, T', T^*, Θ u. dgl., sein Rand entsprechend mit S, S_1, S', S^*, Σ u. dgl. bezeichnet.

5) Dies entspricht ganz dem allgemeinen Begriff einer beschränkten Punktmenge.

6) Allgemeiner sprechen wir, wenn $\Theta - (T + S)$ in eine endliche Anzahl von Gebieten zerfällt, von den zu T gehörigen Außengebieten. Eins von diesen enthält den unendlich fernen Punkt.

7) Auch den Raum denken wir uns durch einen unendlich fernen Punkt geschlossen. Raumverzweigungen werden im allgemeinen nicht zugelassen.

Wir sagen, eine Eigenschaft gelte „in T “ (auch „im Innern von T “), wenn sie in allen Punkten von T gilt. Soll die Berandung S mit einbezogen werden, so sagen wir, die betrachtete Eigenschaft gelte „in T und auf S “ (auch „im Innern und auf dem Rande von T “), kürzer „in $T + S$ “, oder „im Bereiche $T + S$ “. Ist ein Bereich $T_1 + S_1$ in T gelegen, so besteht S_1 aus lauter Punkten von T . Ist dagegen ein Gebiet T_1 in T enthalten, so kann S_1 Punkte mit S gemeinsam haben.

Ein Gebiet in \mathfrak{E}_m heißt (nach *P. Koebe*) „schlichtartig“, wenn es durch jedes in ihm gelegene Polygon zerstückelt wird.

Ein schlichtes oder schlichtartiges berandetes Gebiet wird „ p -fach zusammenhängend“ genannt, wenn sein Rand aus p „Komponenten“ besteht.^{8) 4)} Ist die Anzahl der Randkomponenten unendlich, so heißt T „unendlichvielfach zusammenhängend.“⁹⁾

Sei T ein nicht schlichtartiges berandetes Gebiet in \mathfrak{E}_m , das durch $q + 1$ ($q \geq 1$) einander nicht schneidende Polygone allemal zerstückelt wird, während es ein System¹⁰⁾ von q Polygonen gibt, das T nicht zerstückelt. Ist p die Anzahl der Randkomponenten von T , so nennen wir $T \dots$ „ $(p + 2q)$ -fach zusammenhängend.“⁴⁾

2. Spezielle Klassen ebener und räumlicher Gebiete. Unter einer „einfachen Kurve in \mathfrak{E} “ verstehen wir eine Punktmenge, die, durch stereographische Projektion auf eine Kugel übertragen, umkehrbar eindeutig und stetig auf den Einheitskreis C abgebildet werden kann. Sie wird, wenn sie beschränkt ist, „Jordansche Kurve“ genannt; das von ihr begrenzte beschränkte Gebiet heißt „Jordansches Gebiet“. Die Koordinaten x und y der Punkte einer Jordanschen Kurve lassen sich als stetige Funktionen der Bogenlänge t von C mit der Periode 2π darstellen. Ein zusammenhängender, mehr als einen Punkt enthaltender Teil einer Jordanschen Kurve wird „Jordansches Kurvenstück“ genannt. Eine „einfache Kurve in \mathfrak{E}_m “ heißt eine Punktmenge in \mathfrak{E}_m , die folgende Eigenschaften hat: 1. Sie kann, auf eine ganz oder teilweise mehrfach überdeckte Kugel übertragen, umkehrbar eindeutig und stetig auf C abgebildet werden. 2. Sie enthält keinen Windungspunkt. 3. Sie kann aus einer endlichen Anzahl an-

8) Vgl. *F. Hausdorff*, Grundzüge der Mengenlehre, Leipzig 1914, S. 351 ff. An der bezeichneten Stelle ist nur von beschränkten Gebieten in \mathfrak{E} die Rede. Bei nicht beschränkten Gebieten ist die Vorschrift der Fußnote 5) zu beachten.

9) „Mehrfach zusammenhängende“ Gebiete haben eine endliche Zusammenhangszahl > 1 .

10) Und darum auch unendlichviele Systeme.

einandergereihter Stücke einfacher Kurven in \mathfrak{E} zusammengesetzt werden.¹¹⁾

Sei S eine rektifizierbare *Jordansche* Kurve. Die von einem willkürlichen Anfangspunkte ab gemessene Länge eines Bogens der Kurve wird in der Regel mit s ¹²⁾ bezeichnet. Sein Endpunkt wird ebenfalls s genannt. Den wachsenden s soll der positive Umlaufssinn des von S begrenzten beschränkten Gebietes T entsprechen: dieses bleibt dabei links liegen. Außer höchstens in einer Menge von Punkten vom *Lebesgueschen* Maße Null, hat S eine bestimmte Tangente.¹³⁾ Ist in s eine Normale vorhanden, so wird diese, *in das Innere von T gerichtet*, mit (n) , oder, wenn der Fußpunkt hervorgehoben werden soll, mit (n_s) bezeichnet.

Auf S möge eine stetige Folge reeller Werte gegeben sein. Als Funktion der Bogenlänge betrachtet, sei diese mit $\varphi(s)$ bezeichnet. Offenbar ist $\varphi(l) = \varphi(0)$, unter l die Länge von S verstanden.¹⁴⁾

Die vorstehenden Festsetzungen werden in leicht ersichtlicher Weise auf ein mehrfach zusammenhängendes, von lauter beschränkten rektifizierbaren einfachen Kurven in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m begrenztes Gebiet übertragen.⁴⁾ So wird z. B. in naheliegender Abkürzung für die Gesamtheit der auf den einzelnen Komponenten von S gegebenen stetigen Wertfolgen die Bezeichnung $\varphi(s)$ gebraucht.

Im ähnlichen Sinne werden wir allgemeiner etwa von einer auf S gegebenen (nicht notwendig beschränkten) integrierbaren¹⁵⁾ Funktion $\varphi(s)$ sprechen.

Sei \mathfrak{S} eine *beschränkte* rektifizierbare einfache Kurve in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m . Ihre Gleichungen mögen

$$x = x(\mathfrak{s}), y = y(\mathfrak{s}), (x(\mathfrak{s} + l) = x(\mathfrak{s}), y(\mathfrak{s} + l) = y(\mathfrak{s}))$$

heißen, unter \mathfrak{s} die Bogenlänge verstanden. Sind die Funktionen $\frac{dx}{d\mathfrak{s}}, \frac{dy}{d\mathfrak{s}}$ stetig, so sagen wir, \mathfrak{S} habe eine stetige Tangente oder gehöre der Klasse A an.¹⁶⁾

11) Beschränkte einfache Kurven (insbesondere *Jordansche* Kurven) bilden in dem folgenden die Regel.

12) Nach Bedarf auch mit t oder σ .

13) *H. Lebesgue*, Leçons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives, Paris 1904, p. 125—129.

14) Läßt man beliebige reelle Werte der Bogenlänge zu (entsprechend wiederholten Umläufen um S), so wird $\varphi(s)$ eine periodische Funktion mit der Periode l .

15) Im üblichen Sinne oder nach *Lebesgue*.

16) Sei \mathfrak{S} eine Kurve der Klasse A in \mathfrak{E} , P ein Punkt auf \mathfrak{S} , (n) die Normale in P . Es läßt sich ein Wert $\delta > 0$ angeben, so daß derjenige Teil von \mathfrak{S} , der

© kann in eine endliche Anzahl von Stücken zerlegt werden, so daß in einem jeden entweder y eine eindeutige Funktion von x ist, die eine stetige Ableitung hat, oder x eine ebensolche Funktion von y darstellt.

Sind auch noch $\frac{d^2x}{d\bar{s}^2}$, $\frac{d^2y}{d\bar{s}^2}$ vorhanden und stetig, so sagen wir, © sei stetig gekrümmt oder gehöre der Klasse B an.¹⁷⁾

Gehören alle Komponenten des Randes eines einfach oder mehrfach zusammenhängenden Gebietes in © oder ©_m der Klasse A , B oder B' an, so heißt dieses ein Gebiet der Klasse A , B oder B' .¹⁷⁾

Erfüllt die Kurve © der Klasse A eine Beziehung der Form $\theta < \bar{\delta}\Delta^\lambda$, $0 < \lambda < 1$ ($\bar{\delta}$ konstant), so gehört sie der Klasse Ah an. Die Ableitungen $\frac{dx}{d\bar{s}}$, $\frac{dy}{d\bar{s}}$ genügen Ungleichheiten von der Form

$$\left| \frac{d}{d\bar{s}}x(\bar{s} + h) - \frac{d}{d\bar{s}}x(\bar{s}) \right|, \left| \frac{d}{d\bar{s}}y(\bar{s} + h) - \frac{d}{d\bar{s}}y(\bar{s}) \right| < \delta_1 |h|^2, \\ (\delta_1 \text{ konstant}).$$

Gelten analoge Beziehungen für $\frac{d^2x}{d\bar{s}^2}$, $\frac{d^2y}{d\bar{s}^2}$, so ordnen wir © der Klasse Bh zu.

Einen abgeschlossenen, doppelpunktlosen (Windungspunkte nicht enthaltenden) Bogen einer (reellen) analytischen Linie in © oder ©_m

im Innern der Kreisfläche vom Halbmesser δ um P enthalten ist, von einer jeden zu (n) parallelen Geraden in einem und nur einem Punkte geschnitten wird, und zwar, wie auch P auf © gewählt sein mag. Vgl. *É. Goursat*, loc. cit. 20) und *L. Lichtenstein*, Jahresber. der Deutschen Math. Ver. 21 (1912), p. 167—173.

17) Gelegentlich werden in der Potentialtheorie (beschränkte) Kurven © mit stetiger Tangente (in ©) betrachtet, die so beschaffen sind, daß, unter Δ die längs © gemessene Entfernung zweier Punkte der Kurve, θ den von den zugehörigen Innennormalen eingeschlossenen Winkel, δ' eine geeignete Konstante verstanden, $\theta < \delta'\Delta$ ist. Außer höchstens in einer Punktmenge (N) vom Lebesgueschen Maße Null, sind $\frac{d^2x}{d\bar{s}^2}$, $\frac{d^2y}{d\bar{s}^2}$ vorhanden. In den Punkten der Menge © — (N) hat © eine bestimmte Krümmung $k \leq \delta'$. Kurven dieser Art werden wir als Kurven der Klasse B' (in ©) bezeichnen. Eine einfache Kurve in ©_m gehört der Klasse B' an, wenn sie sich in eine endliche Anzahl aneinandergereichter Stücke von Kurven der Klasse B' in © zerlegen läßt. Dieser Klasse gehören insbesondere Kurven mit stetiger Tangente an, die eine beschränkte (nicht notwendig stetige) Krümmung haben.

Sei © eine Kurve der Klasse B oder B' in ©, P ein Punkt auf ©. Es läßt sich ein Wert $\delta'' > 0$ angeben, so daß jeder Kreis um P vom Halbmesser $\leq \delta''$ die Kurve in zwei Punkten trifft, dies zwar, wie auch P auf © gewählt sein mag. (Vgl. *L. Lichtenstein*, loc. cit. 16.) Dort werden Kurven der Klasse B in © betrachtet.)

Diese sowie die in der Fußnote 16) angegebene Eigenschaft der Kurven der Klasse B' werden manchmal als besondere Voraussetzungen eingeführt.

nennen wir regulär, wenn er singularitätenfrei ist. Er läßt sich über seine beiden Endpunkte analytisch fortsetzen.

Sind alle Randkomponenten eines einfach oder mehrfach zusammenhängenden Gebietes in \mathfrak{G} oder \mathfrak{G}_m (geschlossene) analytische und reguläre Linien, so soll dieses ein Gebiet der Klasse C heißen. Der Klasse $D(L$ oder $M)$ wird ein Gebiet in \mathfrak{G} oder \mathfrak{G}_m zugeordnet, wenn es vom endlichen Zusammenhang ist und wenn jede Komponente des Randes aus einer endlichen Anzahl Stücke analytischer und regulärer Linien (oder statt dessen der Kurven der Klasse A oder B) besteht, die Ecken oder nach innen gerichtete Spitzen einschließen. Die von je zwei Nachbarseiten eingeschlossenen Winkel sind somit > 0 und $\leq 2\pi$. Liegen auch nach außen gerichtete Spitzen vor, so sprechen wir von einem Gebiete der Klasse $E(N$ oder $Q)$.¹⁸⁾

Es sei jetzt S eine (geschlossene) Jordansche Fläche, die folgende Eigenschaften hat: Man kann eine endliche Anzahl zusammenhängender Stücke $\Sigma_1, \dots, \Sigma_m$ von S angeben, so daß jeder Punkt der Fläche dem Innern von mindestens einem Σ_k angehört.¹⁹⁾ Von einem jeden Teilgebiete Σ_k wird angenommen, daß es durch Vermittelung einer Transformation $x = x_k(v, \omega)$, $y = y_k(v, \omega)$, $z = z_k(v, \omega)$, unter x_k, y_k, z_k ($k = 1, \dots, m$) gewisse nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetige Funktionen verstanden, umkehrbar eindeutig auf ein ebenes Gebiet bezogen werden kann. Eine weitere Voraussetzung ist, daß die Jacobischen Determinanten $\frac{\partial x_k(v, \omega)}{\partial(v, \omega)}$, $\frac{\partial y_k(v, \omega)}{\partial(v, \omega)}$, $\frac{\partial z_k(v, \omega)}{\partial(v, \omega)}$ nicht gleichzeitig verschwinden. Die Fläche S kann in eine endliche Anzahl Teile zerlegt werden, so daß in einem jeden entweder z als eine eindeutige, nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetige Funktion von x und y , oder etwa y als ebensolche Funktion von x und z dargestellt werden kann. Die Fläche S bezeichnen wir als eine Fläche der Klasse A . Sie hat augenscheinlich eine stetige Tangentialebene.

Haben die vorhin eingeführten Funktionen x_k, y_k, z_k ($k = 1, \dots, m$) auch noch stetige partielle Ableitungen zweiter Ordnung, so sprechen wir von einer Fläche der Klasse B .²⁰⁾

Gelegentlich werden Flächen der Klasse A betrachtet, die so beschaffen sind, daß, wenn Δ die geradlinige Entfernung zweier Punkte

18) Es sei darauf hingewiesen, daß bei den vorhin betrachteten Klassen on Gebieten punktförmige Randkomponenten ausgeschlossen sind.

19) „Dachziegelartige Überdeckung“ von S durch Σ_k ($k = 1, \dots, m$).

20) Der in der Fußnote 16) angegebene Satz gilt mutatis mutandis im Raume (vgl. *É. Goursat*, Bull. de la Soc. math. de France 38 (1910), p. 139—144).

der Fläche, θ den von den zugehörigen Normalen eingeschlossenen Winkel bezeichnet, $\theta < \delta_2 \bar{\Delta}$ (δ_2 konstant) ist. Flächen dieser Art ordnen wir der Klasse B' zu. Gilt statt $\theta < \delta_2 \bar{\Delta}$ eine Beziehung der Form $\theta < \delta_3 \bar{\Delta}^\lambda$, $0 < \lambda < 1$ (δ_3 konstant), so wird S der Klasse Ah zugeordnet. Die Funktionen x_k, y_k, z_k ($k = 1, \dots, m$) können so gewählt werden, daß $\frac{\partial x_k}{\partial \nu}, \frac{\partial x_k}{\partial \omega}, \dots$ Beziehungen von der Form

$$\left| \frac{\partial}{\partial \nu} x_k(\nu + l, \omega + l') - \frac{\partial}{\partial \nu} x_k(\nu, \omega) \right| < \delta_4 (|l| + |l'|)^2 (\delta_4 \text{ konstant})$$

genügen. Können x_k, y_k, z_k so gewählt werden, daß sie stetige partielle Ableitungen zweiter Ordnung haben, die der soeben hingschriebenen Ungleichheit analoge Beziehungen erfüllen, so gehört S der Klasse Bh an.

Flächen der Klasse A , die analytisch und regulär sind, ordnen wir der Klasse C zu. Die Funktionen x_k, y_k, z_k ($k = 1, \dots, m$) können hier analytisch und regulär angenommen werden.

Besteht der Rand eines dreidimensionalen Gebietes T aus einer endlichen Anzahl Komponenten, die sämtlich Flächen der Klasse $A(B, B', Ah$ oder $Bh)$ sind, so soll T ein Gebiet der Klasse $A(B, B', Ah$ oder $Bh)$ heißen. Sind alle Komponenten Flächen der Klasse C , so wird T der Klasse C zugeordnet. Besteht jede Randkomponente aus einer endlichen Anzahl einander nirgends berührender Stücke der Flächen der Klasse C , so soll T der Klasse D angehören. Die Begrenzung S hat in diesem Falle eine endliche Anzahl Kanten und räumlicher Ecken. In diesen läuft allemal eine endliche Anzahl Flächenstücke zusammen; die Flächenwinkel sind sämtlich von Null verschieden. Sind unter sonst gleichen Bedingungen die einzelnen Bestandteile jeder Randkomponente Flächenstücke der Klasse Ah , so sollen S und T der Klasse Lh angehören.²¹⁾

In Verallgemeinerung der durch stereographische Projektion von \mathfrak{E} auf eine Riemannsche Kugel gewonnenen Gebiete werden zweidimensionale über einer beliebigen²²⁾ Fläche der Klasse Ah ausgebreitete Gebiete eingeführt. Auch kann man der Betrachtung Flächen der Klasse D , allgemeiner Flächen, die eine derartige dachziegelartige Überdeckung zulassen, daß jedes der überdeckenden Flächenstücke auf ein Gebiet in \mathfrak{E} konform abgebildet werden kann (Nr. 24e), zugrunde legen. Dies trifft z. B. bei Flächen zu, die aus einer endlichen Anzahl Stücke der Klasse C bestehen, wobei, im Gegensatz zu der vorhin

21) Im Gegensatz zu zweidimensionalen Gebieten werden hier (ebenso wie bei Gebieten der Klasse D) Randstücke, die einander berühren, nicht zugelassen.

22) Gelegentlich ganz oder teilweise mehrfach überdeckten.

eingeführten Festsetzung, einzelne Teile einander längs *in sich zurücklaufender* Kanten berühren können.²³⁾ Von hier aus gelangt man naturgemäß zu über \mathfrak{G} oder \mathfrak{G}_m ausgebreiteten Gebieten mit endlich vielen „Rückkehrfalten“ sowie zu Gebieten, die sich über die *beiden Seiten* von \mathfrak{G} (\mathfrak{G}_m) erstrecken.²⁴⁾ Als regulatives Prinzip bei dieser und ähnlichen Verallgemeinerungen erscheint wieder die Forderung, daß sich T von einer endlichen Anzahl Gebiete (in \mathfrak{G} , \mathfrak{G}_m , \mathfrak{G}^* , \mathfrak{G}_m^*) dachziegelartig überdecken läßt, die sich einzeln auf schlichte Gebiete konform abbilden lassen (Nr. 24 e). Es steht so beispielsweise nichts im Wege, Gebiete über den einseitigen Flächen²⁵⁾ zu betrachten.

Für viele funktionentheoretische Fragen, insbesondere in der Theorie der algebraischen Funktionen, sind *geschlossene* Flächen, etwa der Klasse Ah oder D von besonderer Wichtigkeit.

In der Ebene der komplexen Variablen z sei ein einfach zusammenhängendes Gebiet Θ gegeben, dessen Rand Σ aus einer endlichen Anzahl Stücke analytischer und regulärer Kurven besteht (Gebiet der Klasse E). Die einzelnen Seiten der Berandung seien in geeigneter Reihenfolge durch analytische und reguläre Substitutionen A_1, \dots, A_n paarweise einander zugeordnet. Die Reihenfolge sei so gewählt, daß, wenn man die zusammengehörigen Seitenpaare nach einer Faltung der Ebene zusammenheftet, sich eine geschlossene Fläche im Raume ergibt. Für eine jede in $\Theta + \Sigma$, mit etwaiger Ausnahme der Ecken und Spitzen sowie möglicherweise einer endlichen Anzahl weiterer Punkte, reguläre analytische Funktion, die in den zusammengehörigen Punktpaaren des Randes dieselben Werte annimmt, hat Θ den Charakter eines „ideal“ geschlossenen Gebietes, d. h. eines Gebietes ohne Rand. Die einzelnen Seitenpaare von Σ sind durch die Substitutionen A_1, \dots, A_n „ideal“ miteinander verbunden.^{25 a)} Der Begriff eines ideal geschlossenen Gebietes ist für den allmählichen Ausbau des Begriffes einer *Riemannschen* Mannigfaltigkeit von großer Wichtigkeit gewesen.

23) In räumlichen Ecken sollen sich diese Flächen jedoch wie Flächen der Klasse D verhalten.

24) Die beiden Seiten der Fläche hängen längs einer endlichen Anzahl einfacher Kurven oder Kurvenstücke zusammen. Gebiete dieser Art werden wir der Einfachheit halber künftig als Gebiete in \mathfrak{G}^* oder \mathfrak{G}_m^* bezeichnen.

25) Z. B. dem *Möbiusschen* Bande, Werke, II, p. 484—485 und p. 519—521 (Vgl. auch *H. Weyl*, die Idee der *Riemannschen* Fläche, Leipzig 1913, p. 26—27.)

25 a) Flächenstücke, die durch analytische Substitutionen ideal verbunden sind und in einer Ebene liegen oder auf Polyedern ausgebreitet sind, die aus Stücken von Ebenen und Kugelflächen bestehen, kommen schon bei *H. A. Schwarz* vor. Vgl. *H. A. Schwarz*, Gesammelte Abhandlungen, 2, p. 161. S. ferner *R. Dedekind*, J. f. Math. 83 (1877), p. 274. — Spezielle ideal geschlossene Gebiete in \mathfrak{G}_m hat noch früher *Riemann* betrachtet. (Vgl. die Fußnote 25 b)

F. Klein, der seit 1878 als erster „ideal“ geschlossene Gebiete systematisch betrachtete, spricht von einem „Fundamentalbereich“. (Vgl. *R. Fricke*, II B 4 Nr. 14.)^{25 b)} Die ideal geschlossenen Gebiete, von denen das vorhin betrachtete Gebiet nur ein *Beispiel* darstellt, sind namentlich in der Theorie der automorphen Funktionen und der linearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung von grundlegender Bedeutung. Dort werden die verbindenden Substitutionen durch lineare gebrochene Funktionen vermittelt.^{25 c)}^{25 d)}

25 b) Siehe *F. Klein*, a) Neue Beiträge zur *Riemannschen* Funktionentheorie, *Math. Ann.* 21 (1883), p. 141—218 *passim.*, insbes. p. 141—155 sowie die vorläufigen Mitteilungen: b) *Math. Ann.* 19 (1882), p. 159—160; c) a. a. O. p. 565 bis 568; d) *Math. Ann.* 20 (1882), p. 49—51. Man vergleiche ferner e) *F. Klein*, *Riemannsche* Flächen, und die vorbereitenden Ausführungen in der Schrift f) *Über Riemanns* Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer Integrale, Leipzig 1882, insbes. p. 61—63. Von großer Wichtigkeit ist die in der zuletzt genannten Schrift p. 72—82 angebaute Betrachtung symmetrischer Flächen. Nach *H. A. Schwarz* kann man jedes berandete Gebiet T (etwa der Klasse C in \mathfrak{C}) zu einer geschlossenen Fläche erweitern. Man schließt an T das Gebiet T' an, das aus der Gesamtheit der Punkte besteht, die auf der Rückseite von T liegen. Das Gebiet $T + T' + S$ ist geschlossen und symmetrisch. Vgl. *F. Klein*, loc. cit. f) p. 79.

In der Hauptarbeit a) finden sich p. 149—151 weitere spezielle Beispiele ideal geschlossener Gebiete, darunter 1. die „*Riemannsche* Parallelogrammfigur“ (vgl. *B. Riemann*, *Gesammelte mathematische Werke* und wissenschaftlicher Nachlaß, 2. Aufl. 1892, *Theorie der Abelschen Funktionen*, Nr. 12, p. 119—122) und 2. das von $2p$ -Kurven der Klasse C begrenzte $2p$ -fach zusammenhängende Gebiet (der Klasse C) in \mathfrak{C} . (In dem besonderen Falle, wenn die Begrenzung aus lauter Kreisen besteht, sind diese Gebiete zuerst von *F. Schottky*, *J. f. Math.* 83 (1877), p. 300—351, betrachtet worden.) Weitere Ausführungen und Ergänzungen gibt *F. Klein* in der Abhandlung, *Über den Begriff des funktionentheoretischen Fundamentalbereiches*, *Math. Ann.* 40 (1891), p. 130—139. Der Begriff (auch der Name) eines Fundamentalpolygons ist übrigens von *Klein* schon einige Jahre vor dem Erscheinen der an erster Stelle zitierten Hauptarbeit eingeführt worden. Man vgl. *F. Klein*, *Math. Ann.* 14 (1879), p. 111—172.

25 c) Ein Fundamentalbereich Θ braucht keineswegs stets über einer schlichten Ebene ausgebreitet zu sein. Es können Verzweigungspunkte in Θ , in den Ecken der Randkurve sowie in Punkten, die bei beliebig oft wiederholter Anwendung der Grundsubstitutionen nicht erreicht werden, vorliegen.

25 d) *F. Klein* hat als erster frei im Raume gelegene geschlossene Flächen als „*Riemannsche* Flächen“ aufgefaßt und der Theorie der algebraischen Funktionen zugrunde gelegt. (Vgl. *F. Klein*, loc. cit. 25 b) f.) Den ersten Anstoß zu dieser Auffassung hat eine gelegentliche Bemerkung von *F. Prym* (1874) gegeben (vgl. *F. Klein*, loc. cit. 25 b) f) p. IV). Schon frühzeitig hat *Klein* den Begriff einer *Riemannschen* Fläche wesentlich verallgemeinert. Vgl. *F. Klein*, *Math. Ann.* 7 (1874), p. 558—566; 10 (1876), p. 398—446 sowie loc. cit. 25 b) a) p. 146—149 und p. 153—155; f) p. 61—63, ferner *F. Klein*, *Riemannsche* Flächen, Wintersemester, zweiter Teil Ia. B. Siehe auch die Ausführungen des

3. Ortsfunktionen.²⁶⁾ Sei T irgendein beschränktes Gebiet in $\mathfrak{E}(\mathfrak{E}_m)$ oder im Raume, T^* ein Gebiet, das $T + S$ enthält. Auf S sei eine beliebige stetige Wertfolge gegeben. Nach *H. Lebesgue* kann man (in unendlich mannigfaltiger Weise) eine in T^* stetige Funktion bestimmen, die auf S die nämlichen Werte annimmt.²⁷⁾ Ist S eine einfache Kurve, so kann man die Randwerte auf den Einheitskreis C verpflanzen. Man erhält so, unter t die Bogenlänge auf C verstanden, eine stetige Funktion $f(t)$ mit der Periode 2π . Ist die durch Verpflanzung gewonnene Funktion $f(t)$ abteilungsweise stetig, so wollen wir auch die Randfunktion abteilungsweise stetig nennen.²⁸⁾ Eine in einem ebenen oder räumlichen Bereiche $T + S$ der Klasse C ²⁹⁾ erklärte Funktion F nennen wir abteilungsweise stetig, wenn sich $T + S$ in eine endliche Anzahl Bereiche zerlegen läßt, so daß in jedem von diesen F nach Festsetzung geeigneter Randwerte zu einer stetigen Funktion wird. Eine in einem beliebigen Gebiete T ³⁰⁾ erklärte Funktion nennen wir abteilungsweise stetig, wenn sie in jedem in T enthaltenen Bereiche der Klasse C abteilungsweise stetig ist. Sie heißt beschränkt, wenn ihr absoluter Betrag unterhalb einer endlichen Schranke liegt.

Zur Vereinfachung werden bei Ortsfunktionen von zwei oder drei unabhängigen Variablen, wenn es auf die Richtung, in bezug auf die differenziert wird, nicht ankommt, partielle Ableitungen erster und zweiter Ordnung künftig mit D_1 und D_2 bezeichnet.

Es sei $f(x, y)$ eine in einem beschränkten Bereiche $T + S$ der Klasse A in \mathfrak{E} erklärte Funktion. Ist

Textes über Fundamentalbereiche und die Fußnote 25^{b)}. Bei *Klein* handelt es sich immer nur um geschlossene Gebiete. Durch Randsubstitutionen verbundene Flächenstücke kommen als Bestandteile nicht geschlossener Gebiete allgemeiner Natur (Nr. 4) wohl erst bei *Koebe* vor. Vgl. *P. Koebe*, Gött. Nachr. 1908, p. 337 bis 358 (p. 338—339, Fußnote). Über die Entwicklung des Begriffes einer allgemeinen *Riemannschen* Mannigfaltigkeit siehe *H. Weyl*, Die Idee der *Riemannschen* Fläche, Vorwort sowie p. 1—68, insbes. p. 34—36. Man vergleiche hierzu Nr. 4, insbes. die Fußnote 43) sowie die Ausführungen der Nr. 47 p. 359—360.

26) In diesem Abschnitte ist ausschließlich von reellen Funktionen die Rede. Wenn nicht das Gegenteil ausdrücklich vermerkt wird, sind diese eindeutig erklärt.

27) *H. Lebesgue*, Rend. del Circ. mat. di Palermo 24 (1907), p. 371—402 [p. 379—380]. Dort werden Gebiete in \mathfrak{E} betrachtet.

28) Diese Festsetzung läßt sich in leicht ersichtlicher Weise auf mehrfach zusammenhängende Gebiete in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m übertragen, deren Randkomponenten lauter einfache Kurven sind.

29) Mit Ausschluß einer endlichen Anzahl Stücke von Kurven (Flächen) der Klasse C .

30) Mit Ausschluß abzählbar vielen Stücken von Kurven (Flächen) der Klasse C , die sich nur am Rande häufen können.

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < c_1 \varrho_{12}^\lambda, \quad 0 < \lambda < 1, \quad \varrho_{12}^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$$

(c_1 konstant),

unter $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ zwei Punkte in $T + S$ verstanden, so sagen wir, $f(x, y)$ genüge in $T + S$ einer Hölderschen, kürzer einer H -Bedingung (auch einer H -Bedingung mit dem Exponenten λ). Die vorstehende Ungleichheit ist, wie leicht ersichtlich, einer Ungleichheit

$$|f(x + h_1, y + h_2) - f(x, y)| < c_2 (|h_1| + |h_2|)^\lambda \quad (c_2 \text{ konstant})$$

äquivalent. Gilt diese Beziehung für einen bestimmten Wert des Exponenten λ , so gilt sie (nötigenfalls nach einer Änderung des konstanten Faktors) für alle kleineren positiven λ .

Eine Funktion $f(x, y)$ genügt in T einer H -Bedingung mit dem Exponenten λ , wenn sie diese in jedem Bereiche $T' + S'$ in T erfüllt. Konvergiert T' gegen T , so kann c_1 dabei über alle Grenzen wachsen.³¹⁾

Ganz analoge Festsetzungen wollen wir bei Funktionen mit drei unabhängigen Variablen treffen.³²⁾

Es sei T ein beschränktes einfach oder mehrfach zusammenhängendes Gebiet in \mathfrak{E} und (x, y) ein Punkt in T ; $f(x, y)$ sei eine in T und auf S stetige Funktion, die partiellen Ableitungen $D_1 f$ seien in T stetig. Die partielle Ableitung in einer Richtung (l), die mit der x -Achse einen Winkel α einschließt, hat den Wert

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \alpha.$$

Es sei jetzt s ein Punkt auf S , in dem S eine bestimmte Tangente oder zwei getrennte Tangenten (eine Ecke) hat. Konvergiert $\frac{\partial}{\partial l} f(x, y)$ bei der Annäherung an s längs einer beliebigen S in s nicht berührenden Geraden G in T gegen einen bestimmten endlichen, von G unabhängigen Grenzwert, und zwar auf jeder abgeschlossenen Menge der Geraden G gleichmäßig, so sagen wir, in s sei die partielle Ableitung $\frac{\partial f(s)}{\partial l}$ vorhanden.³³⁾

31) Läßt sich im Gegensatz hierzu für c_1 eine obere Schranke angeben, so genügt, zu mindest wenn T der Klasse C angehört, $f(x, y)$ in $T + S$ einer H -Bedingung mit dem Exponenten λ . Vgl. *Ch. H. Müntz*, Journ. f. Math. 139 (1910), p. 5—32 [p. 8—9]. Dort wird ein Kreisbereich betrachtet.

32) Die zuletzt betrachteten Ungleichheiten sind in die Potentialtheorie von *O. Hölder* eingeführt worden (vgl. *O. Hölder*, Beiträge zur Potentialtheorie, Stuttgart 1882). In der Theorie der trigonometrischen Reihen einer Veränderlichen ist eine analoge Beziehung bereits früher von *R. Lipschitz* betrachtet worden. Der Einfachheit halber werden wir uns auch bei Funktionen einer Variablen der abkürzenden Bezeichnung einer H -Bedingung bedienen.

33) Diese ist, was künftig nicht besonders hervorgehoben werden soll, endlich. Um Mißverständnisse zu vermeiden, sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß im

Es sei T ein beschränktes Gebiet der Klasse A und es sei etwa $\frac{\partial f(s)}{\partial x}$ für alle s auf S vorhanden, es möge ferner $\frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$ sich seinem Grenzwerte auf S gleichmäßig nähern. Eine Funktion, die in T gleich $\frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$, auf S gleich $\frac{\partial f(s)}{\partial x}$ ist, ist in dem Bereiche $T + S$ stetig. Wird im folgenden von einer Funktion $f(x, y)$ behauptet, sie sei in $T + S$ nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetig, so besagt dies, daß sich $\frac{\partial f}{\partial x}$ und $\frac{\partial f}{\partial y}$ wie vorhin auseinandergesetzt verhalten. Es genügt hierzu, daß die partiellen Ableitungen $\frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$ und $\frac{\partial}{\partial y} f(x, y)$ bei der Annäherung an den Rand längs der Normalen an S gleichmäßig konvergieren.

Es sei wie vorhin T ein beschränktes einfach oder mehrfach zusammenhängendes Gebiet in \mathfrak{E} und es möge S in s eine bestimmte Tangente haben. Es sei (x, y) ein Punkt in T auf (n) ; seine Entfernung von s sei gleich h . Unter der Ableitung der Funktion $f(x, y)$ in der Richtung der Innennormale (n) in s , kürzer der „Normalableitung“, mit $\frac{\partial f}{\partial n}$, $\frac{\partial f(s)}{\partial n}$, auch $\frac{\partial f}{\partial n_s}$ bezeichnet, verstehen wir den als vorhanden vorausgesetzten Grenzwert $\lim_{h=0} \frac{\partial}{\partial n} f(x, y)$. Wie leicht ersicht-

lich, ist

$$\frac{\partial f(s)}{\partial n} = \lim_{h=0} \frac{f(x, y) - f(s)}{h}.$$

Es sei T ein beschränktes Gebiet der Klasse A in \mathfrak{E} und $f(x, y)$ eine in T und auf S stetige Funktion, die in T stetige partielle Ableitungen erster Ordnung hat. Wir sagen, $f(x, y)$ habe eine auf S „stetige Normalableitung“, wenn $\frac{\partial f(s)}{\partial n}$ existiert und $\frac{\partial}{\partial n} f(x, y)$ gegen $\frac{\partial f(s)}{\partial n}$ gleichmäßig konvergiert. Dies kann eintreten, auch wenn $\frac{\partial f(s)}{\partial x}$, $\frac{\partial f(s)}{\partial y}$ nicht vorhanden sind.

Es sei T insbesondere einfach zusammenhängend. Wir werden gelegentlich neben in $T + S$ erklärten stetigen Funktionen weitere Funktionen zu betrachten haben, die in dem Außengebiete T_∞ mit Einschluß des Randes und höchstens mit Ausnahme des unendlich fernen Punktes stetig sind. Die Randwerte werden dann entsprechend

folgenden von Bezeichnungen wie $\lim_{x \rightarrow \infty} u_x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ u. dgl. kein Gebrauch gemacht wird. Ist ein Grenzwert vorhanden, so ist damit zugleich ausgesagt, daß er auch endlich ist.

34) Und darum überhaupt alle $D_1 f$.

etwa mit $f(s^+)$ und $f(s^-)$, die Werte der Normalableitungen, falls diese vorhanden sind, mit $\frac{\partial}{\partial n} f(s^+)$, $\frac{\partial}{\partial n} f(s^-)$ bezeichnet.³⁵⁾

Analoge Festsetzungen gelten für Gebiete auf \mathfrak{E}_m und im Raume.³⁶⁾

4. Allgemeines über unendlichvielblättrige schlichtartige Gebiete. Eine Folge von Gebieten $T_n (n = 1, 2, \dots)$ der Klasse D (allgemeiner etwa der Klasse E oder Q) in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m heißt „ineinandergeschachtelt“, $T_1 < T_2 < T_3 < \dots$, wenn T_n für alle n in T_{n+1} liegt, während es Punkte von T_{n+1} gibt, die in T_n nicht enthalten sind; T_n und T_{n+1} können Teile des Randes gemeinsam haben. Ist dies für keinen Wert von n der Fall, so sind die Gebiete im „engeren Sinne ineinandergeschachtelt“.

Jedes Gebiet T in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m , das mindestens einen Randpunkt hat, kann als Limes einer Folge ineinandergeschachtelter Gebiete $T_n (n = 1, 2, \dots)$ der Klasse C dargestellt werden. Jeder Bereich in T ist von einem gewissen n an in allen T_n enthalten.³⁷⁾

Es sei $T_1 < T_2 < T_3 < \dots$ eine Folge ineinandergeschachtelter Gebiete in \mathfrak{E}_m , deren Blätterzahl mit n ins Unendliche wächst.³⁹⁾

Wir sagen, die Folge $T_n (n = 1, 2, \dots)$ definiert eine (unendlichvielblättrige) Punktmannigfaltigkeit $\mathfrak{X} = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$, die aus der Gesamt-

35) Es gilt dabei die Definitionsgleichung $\frac{\partial}{\partial n} f(s^-) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\partial}{\partial n} f(x, y)$, unter $\frac{\partial}{\partial n}$ die Ableitung in der Richtung der Innennormale, h die Entfernung des Punktes (x, y) auf (n) in T_n von s verstanden.

36) Die Umgebung eines jeden unendlich fernen Punktes oder Windungspunktes hat man sich durch Vermittelung einer Funktion von der Form $z^{-\frac{1}{m}}$ ($m \geq 1$) oder $z^{\frac{1}{m}}$ ($m > 1$) auf die Fläche eines Kreises übertragen zu denken.

37) Ist d_n das Maximum des Abstandes eines Randpunktes des Gebietes T_n von S , so ist $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$. Vgl. z. B. *W. S. Osgood, Funktionentheorie*, p. 156—158.

38) Gebiete $T_n (n = 1, 2, \dots)$ kann man übrigens im engeren Sinne ineinandergeschachtelt wählen. Über den allgemeineren Begriff des „Kernes“ einer Folge von Gebieten vergleiche bei *C. Carathéodory, loc. cit. 577*) (Nr. 47).

39) Auch die Zahl der Windungspunkte in T_n , oder der Höchstwert ihrer Ordnung (oder auch beides) können mit n zugleich unendlich werden. Folgen ineinander geschachtelter Gebiete $T_1 < T_2 < \dots$, die so beschaffen sind, daß die Blätterzahl von T_n für alle n unterhalb einer festen Schranke liegt, während die Zahl der Windungspunkte für $n = \infty$ unendlich wird, werden, da sie bei schlichtartigen Gebieten nicht vorkommen, an dieser Stelle nicht näher betrachtet. Das Gebiet $\mathfrak{X} = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ hat in diesem Falle eine endliche Anzahl von Blättern, jedoch unendlichviele Windungspunkte (endlicher Ordnung).

heit der Punkte besteht, die für ein (und darum unendlichviele) n in einem Gebiete der Folge enthalten sind. Die Folgen $T_1 < T_2 < \dots$ und $T'_1 < T'_2 < \dots$ definieren dieselbe Mannigfaltigkeit \mathfrak{X} , wenn jedem n ein n^* , jedem ν ein ν^* zugeordnet werden kann, so daß T_n in T_{n^*} und T'_ν in T_{ν^*} enthalten ist. Alle Punkte von \mathfrak{X} sind innere Punkte der Mannigfaltigkeit. Zwei Punkte von \mathfrak{X} können durch einen geradlinigen Streckenzug von endlicher Seitenzahl, dessen sämtliche Punkte der Mannigfaltigkeit angehören, verbunden werden. Man ist darum berechtigt, \mathfrak{X} als ein (unendlichvielblättriges) Gebiet zu bezeichnen.⁴⁰⁾

Ein Gebiet \mathfrak{X} heißt „schlichtartig“, wenn es durch jedes in ihm gelegene Polygon zerstückelt wird. Notwendig und hinreichend ist hierfür, daß alle T_n schlichtartig sind.

Es mögen zunächst die ein *schlichtartiges* Gebiet \mathfrak{X} bestimmenden Gebiete der Folge T_n ($n = 1, 2, \dots$) im engeren Sinne ineinandergeschachtelt sein. Sei $S_n^{(j)}$ irgendeine Komponente von S_n . Das Gebiet $T_{n+1} - T_n$ zerfällt in eine endliche Anzahl Teile $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2, \dots, \mathcal{O}_\nu$. Eine Komponente $S_{n+1}^{(j)}$ von S_{n+1} sei jetzt so gewählt, daß $S_n^{(j)}$ und $S_{n+1}^{(j)}$ beide dem Rande desselben Teilgebietes, etwa \mathcal{O}_j , angehören. Es gibt mindestens eine *unendliche* Folge $S_n^{(j)}$ ($n = 1, 2, \dots$). Jede Folge dieser Art bestimmt per definitionem eine Komponente

$$S^{(j)} = (S_1^{(j)}, S_2^{(j)}, \dots)$$

„des Randes“ von \mathfrak{X} .⁴¹⁾ Man kann \mathfrak{X} stets in der Form $\mathfrak{X} = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{T}_n$ darstellen, so daß alle Folgen $\bar{S}_n^{(j)}$ ($n = 1, 2, \dots$) unendlich sind („kanonische Darstellung“).

Ein „einfacher Weg in \mathfrak{X} “ heißt eine Punktmenge, deren in T_n gelegener Teil für alle n , von einem bestimmten an, ein Stück einer einfachen Kurve, oder eine einfache Kurve schlechthin (geschlossener Weg) darstellt. Trifft ein einfacher Weg alle $S_n^{(j)}$ von einem bestimmten n an, so sagen wir, er „endigt an der Randkomponente $S^{(j)}$ “.

40) Unendlichvielblättrige Gebiete sind zuerst von *H. A. Schwarz* (in mündlichen Mitteilungen an *F. Klein* und *H. Poincaré*) betrachtet worden (vgl. den Artikel II B 4 von *R. Fricke* Nr. 39). In der Literatur treten sie zuerst in einer gegen *H. A. Schwarz* verallgemeinerten Auffassung bei *H. Poincaré* loc. cit. 434) auf (Nr. 37). Man vergleiche ferner *H. Poincaré* loc. cit. 453), *P. Koebe*, loc. cit. 437), *R. Courant*, loc. cit. 547). Gebiete dieser Art werden wir in der Folge mit $\mathfrak{X}, \mathfrak{X}_1, \mathfrak{X}', \mathfrak{X}^*$ u. dgl. bezeichnen.

41) Die so definierten Randkomponenten brauchen keineswegs einen Rand im eigentlichen (anschaulichen) Sinne des Wortes zu bilden. Vgl. die Fußnote ⁵⁹⁵⁾.

„Windungspunkte unendlich hoher Ordnung“ von \mathfrak{X} sind offenbar stets Randpunkte des Gebietes.

Endigt ein einfacher Weg beiderseits am Rande von \mathfrak{X} , so heißt er „Querschnitt“. (Vgl. *C. Carathéodory* loc. cit. 599, a) p. 314—315, b) p. 325—326. Dort werden beschränkte Gebiete in \mathfrak{E} betrachtet.)

Wir nennen das Gebiet $\mathfrak{X} \dots p$ -fach zusammenhängend, wenn sein Rand p Komponenten hat. Notwendig und hinreichend hierzu ist, wenn die Darstellung $\mathfrak{X} = \lim_{n=\infty} T_n$ kanonisch ist, daß alle T_n von einem n an p -fach zusammenhängend sind. Ist das Gebiet $\mathfrak{X} \dots p$ -fach zusammenhängend, so wird es durch p Querschnitte allemal zerstückelt, während es Systeme von $(p - 1)$ Querschnitten gibt, die \mathfrak{X} zusammenhängend lassen.

Läßt sich eine kanonische Darstellung der vorhin genannten Art für kein p gewinnen, so heißt \mathfrak{X} unendlichvielfach zusammenhängend. Eine unendliche Folge von Randkomponenten

$$S^{(m)} = (S_1^{(m)}, S_2^{(m)}, \dots) \quad (m = 1, 2, \dots)$$

„konvergiert“ gegen eine „Häufungskomponente“ $S^{(h)} = (S_1^{(h)}, S_2^{(h)}, \dots)$, wenn jedem N eine Zahl $\mu(N)$ zugeordnet werden kann, so daß für alle $m > \mu(N) \dots S_l^{(m)} = S_l^{(h)}$ ($l = 1, \dots, N$) gilt. Eine Randkomponente $S^{(j)} = (S_1^{(j)}, S_2^{(j)}, \dots)$ heißt isoliert, wenn es keine Folge $S^{(m)}$ ($m = 1, 2, \dots$) gibt, die gegen $S^{(j)}$ konvergiert. Hierzu ist, wenn die Darstellung $\mathfrak{X} = \lim_{n=\infty} T_n$ kanonisch ist, notwendig und hinreichend, daß von einem $n = N$ ab $S_n^{(j)}$ und $S_{n+1}^{(j)}$ allemal die vollständige Begrenzung eines (zweifach zusammenhängenden) Gebietes bilden. Es gibt, wenn \mathfrak{X} unendlichvielfach zusammenhängend ist, mindestens eine Häufungskomponente.

Die den Rand und die Zusammenhangszahl betreffenden Festsetzungen lassen sich in ähnlicher Weise treffen, wenn die ein schlichtartiges Gebiet \mathfrak{X} bestimmenden Gebiete T_n ($n = 1, 2, \dots$) schlechthin ineinandergeschachtelt sind.⁴²⁾

In naheliegender Verallgemeinerung der vorstehenden Betrachtungen werden Folgen ineinandergeschachtelter Gebiete $T_1 < T_2 < \dots$ über Flächen der Klasse Lh , oder in \mathfrak{E}^* (\mathfrak{E}_m^*) eingeführt. Das Gebiet $\lim_{n=\infty} T_n$ kann Rückkehrfalten haben, ganz oder teilweise über den beiden Seiten einer Fläche (insbesondere einer Ebene), oder auch über einer einseitigen Fläche ausgebreitet sein. Die Gebiete T_n können auch aus

42) Wie leicht ersichtlich, kann man übrigens von der Folge T_n ($n = 1, 2, \dots$) in unendlich mannigfaltiger Weise zu einer anderen Folge von Gebieten

$$T'_n \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (\lim_{n=\infty} T'_n = \mathfrak{X})$$

übergehen, die im engeren Sinne ineinandergeschachtelt sind.

einer endlichen Anzahl untereinander ideal verbundener Teile bestehen. (Vgl. die Ausführungen der Nr. 2 über ideal geschlossene Gebiete sowie die Betrachtungen der Nr. 47 p. 358.)

Alle diese besonderen Arten von Gebieten ordnen sich dem allgemeinen Begriffe einer *Riemannschen* Mannigfaltigkeit (nach *H. Weyl*, „*Riemannschen* Fläche“) unter. In der Nr. 47 p. 359—360 wird nach *Koebe* (*J. f. Math.* 147 (1917), p. 67—101 (p. 70—73)) eine allgemeine Definition der *Riemannschen* Mannigfaltigkeit gegeben. Man vergleiche hierzu *P. Koebe*, loc. cit. 457) p. 198 insb. die Fußnote ¹⁾; *Annali di Mat.* (3) 21 (1913), p. 57—64 (p. 60—61); *Phys. Zeitschr.* 13 (1912), p. 1064; *H. Weyl*, Die Idee der *Riemannschen* Fläche, Leipzig 1913, p. 16—77; *L. Bieberbach*, *Math. Ann.* 78 (1918), p. 312—331.⁴³⁾

Der Übersichtlichkeit halber sollen jetzt die wichtigsten bisher benutzten Bezeichnungen kurz zusammengestellt werden.

\mathfrak{E} bezeichnet eine schlichte Ebene.

\mathfrak{E}_m ist eine ganz oder teilweise mehrfach überdeckte Ebene (p. 181). Die Klasse $A(B)$ umfaßt einfach oder mehrfach (d. h. endlich vielfach) zusammenhängende Gebiete in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m , deren sämtliche Randkomponenten (beschränkte) einfache Kurven (p. 183) mit stetiger Tangente (Krümmung) sind.

Die Klasse C umfaßt Gebiete der Klasse A , deren sämtliche Randkomponenten geschlossene analytische und reguläre Linien sind.

Die Klassen $D(L, M)$ umfassen einfach oder mehrfach zusammenhängende Gebiete in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m , deren alle (beschränkten) Randkomponenten aus einer endlichen Anzahl Stücke analytischer und regulärer Linien (Kurven mit stetiger Tangente, stetiger Krümmung) bestehen und keine nach außen gerichteten Spitzen haben. Kommen auch noch nach außen gerichtete Spitzen vor, so gehören die fraglichen Gebiete entsprechend in die Klassen $E(N, Q)$ hinein.

Gebiete der Klasse A_h sind Gebiete der Klasse A , deren sämt-

43) Eine von einer Folge ineinandergeschachtelter Gebiete elementarer Natur unabhängige Definition über der schlichten Ebene ausgebreiteter allgemeiner Gebiete, namentlich einfach zusammenhängender unendlichvielblättriger Gebiete gibt *W. Blaschke*. Vgl. *E. Study*, loc. cit. 148). Ebendort findet sich p. 17—19 der Beweis der Äquivalenz der fraglichen Definition (einfach zusammenhängender Gebiete) mit derjenigen des Textes. Gebiete von höherem Zusammenhang bleiben dem Programm der Schrift gemäß außer Betracht. Eine Erklärung der Zusammenhangszahl, sofern diese > 1 ist, wird darum nicht gegeben.

Auch bei *Weyl* und *Bieberbach* wird der Begriff der Zusammenhangszahl lediglich für einfach zusammenhängende Gebiete erklärt. Auch *Koebe* betrachtet in der im Text an erster Stelle genannten ausführlichen Arbeit nur einfach zusammenhängende Mannigfaltigkeiten.

liche Randkurven überdies den Ungleichheiten von der Form

$$\left| \frac{d}{ds} x(\xi + h) - \frac{d}{ds} x(\xi) \right|, \quad \left| \frac{d}{ds} y(\xi + h) - \frac{d}{ds} y(\xi) \right| < \delta_1 |h|^\lambda$$

$$(0 < \lambda < 1)$$

genügen.

Näheres über Gebiete der Klassen B' , Bh vergleiche p. 185.

Im Raume umfaßt die Klasse $A(B)$ einfach oder mehrfach zusammenhängende Gebiete, deren sämtliche (beschränkte) Randkomponenten geschlossene Flächen mit stetiger Normale (Krümmung) sind (p. 186).

Die Klasse C umfaßt Gebiete der Klasse A , deren sämtliche Randkomponenten geschlossene analytische und reguläre Flächen sind.

Näheres über die Flächen der Klassen B' , Ah , Bh , D , Lh vergleiche p. 187.

II. Allgemeine Sätze der Potentialtheorie.⁴⁴⁾

5. Definition der Potentialfunktion. Eine in einem beschränkten Gebiete T in \mathfrak{E} , oder im Raume nebst ihren partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung stetige Lösung der Differentialgleichung

$$(1) \quad \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \text{ in der Ebene,}$$

$$(2) \quad \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \text{ im Raume}$$

wird eine in T reguläre Potentialfunktion genannt.⁴⁵⁾

Ist T ein Gebiet in \mathfrak{E} oder im Raume, das den unendlich fernen Punkt enthält, so wird darüber hinaus festgesetzt, daß in \mathfrak{E}

$$(3) \quad \lim_{R=\infty} u(x, y) = c, \quad \lim_{R=\infty} R D_1 u = 0, \quad (c \text{ konstant}), \quad R^2 = x^2 + y^2,$$

im Raume

$$(4) \quad \lim_{R=\infty} u(x, y, z) = c, \quad \lim_{R=\infty} R^2 D_1 u = 0, \quad (c \text{ konstant}), \quad R^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

gilt. Ist für hinreichend große R in \mathfrak{E}

$$(5) \quad u = M \log \frac{1}{R} + \text{eine reguläre Potentialfunktion,}$$

⁴⁴⁾ Geschichtliches vergleiche den Artikel II A 7 b von *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer* Nr. 1—5.

⁴⁵⁾ In der Ebene spricht man gelegentlich von dem logarithmischen, im Raume von dem *Newton'schen* Potential. Es erscheint zweckmäßiger, die Bezeichnung „Potential“ ausschließlich für das Potential einer bestimmten Belegung zu reservieren. Bei einer Volumladung z. B. genügt das Potential im Innern des mit Masse belegten Gebietes nicht der *Laplace'schen*, sondern unter bestimmten Voraussetzungen der *Poisson'schen* Differentialgleichung (Nr. 8).

im Raume

$$(6) \quad u = \frac{M}{R} + \text{eine reguläre Potentialfunktion,}$$

so heißt M „die Gesamtmasse“ von u .⁴⁶⁾

Nach *C. Neumann* (vgl. *E. R. Neumann*, Beiträge, p. XII) ist die Bedingung (3) erfüllt, sobald $\lim_{R \rightarrow \infty} u(x, y) = c$ ist. Im Raume folgt aus $\lim_{R \rightarrow \infty} u(x, y, z) = c$ nur, daß die Funktionen $R^2 D_1 u$ beschränkt sind.^{46*)}

46) Wir folgen der Darstellung von *J. Plemeľj*, Untersuchungen, p. 3—5, die von der herkömmlichen (vergleiche etwa bei *C. Neumann*, Abhandlungen, I. Abhandlung, p. 725—731; *A. Korn*, Potentialtheorie I, p. 180—181; II, p. 128 bis 129; *J. Plemeľj*, Monatshefte f. Math. u. Phys. 15 (1904) p. 337—412 [p. 366 bis 371]) abweicht und in mancher Hinsicht Vorteile bietet. Andere gegenüber den üblichen vereinfachten Festsetzungen hat *E. R. Neumann* vorgeschlagen. (*E. R. Neumann*, Beiträge, p. 5—10.) Voraussetzungen über das Verhalten von $D_1 u$ im Unendlichen werden dabei ganz vermieden. Aus der im vorstehenden schlechthin als Potentialfunktionen bezeichneten Klasse von Funktionen werden in der Literatur (namentlich der älteren) öfter bestimmte Arten als „Fundamentalfunktionen“, „harmonische Funktionen“, „vollständige“ sowie „allgemeine Potentialfunktionen“ usw. je nach dem Verhalten im Unendlichen und am Rande des Definitionsgebietes (das von dem Regularitätsgebiete verschieden sein kann) herausgehoben (vgl. z. B. *C. Neumann*, a. a. O.; *A. Korn*, Potentialtheorie, passim; *E. R. Neumann*, a. a. O.). In dem vorliegenden Referat wird von jenen Bezeichnungen nirgends Gebrauch gemacht.

46*) Der Beweis läßt sich nach einer mündlichen Mitteilung von *Koebe* z. B. wie folgt führen. Die Funktion $v = u - c$ verschwindet im Unendlichen und nimmt auf einer Kugel C von hinreichend großem Radius eine stetige Folge von Werten $\varphi(s)$ an. Es sei v' die durch das *Poissonsche* Integral (Nr. 13) für das unendliche von C begrenzte Gebiet K_α unter Zugrundelegung der Randwerte $\varphi(s)$ dargestellte Potentialfunktion. Die Differenz $v' - v$ ist sowohl auf C als auch im Unendlichen gleich Null. Sie verschwindet darum in K_α identisch. Aus dem *Poissonschen* Integral folgt aber leicht, daß die Funktionen $R^2 D_1 u$ beschränkt sind.

Man kann übrigens auch anders vorgehen.

Daß aus $\lim_{R \rightarrow \infty} u(x, y, z) = c$ nicht notwendig $\lim_{R \rightarrow \infty} R^2 D_1 u = 0$ folgt, zeigt das einfache Beispiel $u = \frac{1}{R}$.

In der Ebene führt die folgende Überlegung rasch zum Ziele.

Es sei $x' = \frac{x}{R^2}$, $y' = \frac{y}{R^2}$, $u'(x', y') = u(x, y)$. Die Funktion $u'(x', y')$ ist in einer Kreisfläche \mathfrak{K} um den Koordinatenursprung stetig und mit etwaiger Ausnahme des Mittelpunktes regulär. Sie ist darum in \mathfrak{K} regulär (Nr. 14) und gestattet eine Entwicklung von der Form $u'(x', y') = \sum_{n=0}^{\infty} R'^n (b_n \cos n\varphi + a_n \sin n\varphi)$ ($R'^2 = x'^2 + y'^2$, $x' = R' \cos \varphi$, $y' = R' \sin \varphi$). Man schließt hieraus leicht, daß, in der Tat, $\lim_{R \rightarrow \infty} R D_1 u = 0$ ist.

Sei T jetzt ein Gebiet in \mathfrak{E}_m . Die vorstehende Definition einer regulären Potentialfunktion bedarf noch einer Ergänzung, wenn T Windungspunkte hat. Ist $s_0 = x_0 + y_0 i$ ein Windungspunkt p -er Ordnung, so wird gefordert, daß $u(x, y)$, in die Ebene z' den Gleichungen $z' = (z - s_0)^{\frac{1}{p+1}}$, $u'(x', y') = u(x, y)$ ⁴⁷⁾ gemäß verpflanzt, sich in der Umgebung des Koordinatenursprunges⁴⁸⁾ der Ebene z' regulär verhält. Die Ausdehnung der Definition auf unendlichvielblättrige Gebiete der Art \mathfrak{X} ist naheliegend, bei der Ausdehnung auf eine beliebige *Riemannsche* Mannigfaltigkeit sind die Ergebnisse der Nr. 24e zu berücksichtigen.

6. Potential einer einfachen Belegung.⁴⁹⁾ Sei T ein Gebiet der Klasse B in $\mathfrak{E}^{50)}$. Es bezeichne $\mu(s)$ eine auf S erklärte stetige Funktion⁵¹⁾, (x, y) einen nicht auf S gelegenen Punkt, r_s, r_t, r_{st} entsprechend Entfernungen der Punktepaare $(x, y), s; (x, y), t; s, t$.

Das Integral

$$(1) \quad V(x, y) = \int_S \mu(t) \log \frac{1}{r_t} dt$$

bezeichnet man als Potential einer einfachen Schicht oder Belegung. Ihre Dichte ist $\mu(s)$, $\int_{s_0}^s \mu(t) dt$ ist die auf dem Bogen $(s - s_0)$ ausgebreitete Masse.⁵²⁾

In einer ganz analogen Weise wird das *Newtonsche* Potential einer einfachen Flächenbelegung im Raume

$$(3) \quad V(x, y, z) = \int_S \mu(t) \frac{1}{r_t} dt$$

47) Oder, wenn ein unendlich ferner Punkt Verzweigungspunkt ist, den Gleichungen $z' = z^{\frac{1}{p+1}}$, $u'(x', y') = u(x, y)$ gemäß.

48) Oder des unendlich fernen Punktes.

49) Vgl. den Artikel II A 7 b von *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer* Nr. 5.

50) Allgemeiner könnte man T von der Klasse A oder N annehmen.

51) Allgemeiner eine nicht notwendig beschränkte, integrierbare Funktion (im üblichen Sinne oder nach *Lebesgue*).

52) Eine für manche Zwecke nützliche Verallgemeinerung hat *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 17—18, angegeben. Sei $\chi(s)$ eine auf S erklärte stetige Funktion. Das *Stieltjes'sche* Integral (2) $V'(x, y) = \int_S \log \frac{1}{r_t} d\chi(t)$ kann als loga-

rithmisches Potential einer auf S verteilten einfachen Schicht aufgefaßt werden. Die auf $(s - s_0)$ ausgebreitete Masse hat den Wert $\chi(s) - \chi(s_0)$.

definiert, unter S eine Fläche der Klasse B , unter dt das Flächenelement, $\mu(t)$ die Dichte der Belegung verstanden.⁵³⁾

Das Verhalten des Potentials einer einfachen Schicht und seiner partiellen Ableitungen auf der belegten Kurve oder Fläche und in deren Nachbarschaft bildet den Gegenstand einer bis in die neueste Zeit heranreichenden langen Reihe von Arbeiten. Die ersten über die klassischen Ergebnisse beträchtlich hinausgehenden Resultate dieser Art sind von *O. Hölder* und *A. Liapounoff* abgeleitet worden.⁵⁴⁾ Ihre Untersuchungen sind vorbildlich geworden. Die Ergebnisse von *Hölder* und *Liapounoff* sind namentlich von *A. Korn* und *J. Plemelj* weitergeführt und vervollkommen worden.⁵⁵⁾ Von *Korn* ist insbesondere eine Reihe hinreichender Bedingungen für die Existenz (und Stetigkeit) gewisser partieller Ableitungen angegeben und bewiesen worden. Diesen Arbeiten parallel laufen die etwa 1899 begonnenen Veröffentlichungen von *H. Pettrini*, die auf die Auffindung notwendiger und zugleich hinreichender Bedingungen hinzielen. Seine Ergebnisse hat *Pettrini* in zwei außerordentlich eingehenden, umfangreichen Abhandlungen zusammenge-

53) Allgemeiner kann man T etwa von der Klasse A voraussetzen sowie Kanten und räumliche Ecken zulassen. Nach *Plemelj* kann man ferner der Betrachtung ein Integral $V(x, y, z) = \int_S \frac{1}{r_i} d\chi(t)$ zugrunde legen.

54) Vgl. *O. Hölder*, Beiträge zur Potentialtheorie, Inaug.-Diss. Stuttgart 1882, p. 1—71 [p. 20—20]; *A. Liapounoff*, a) Journ. de Math. (5) 4 (1898), p. 241—311 (vorl. Mitt. C. R. 125 (1897), p. 694—696; p. 808—810); b) Commun. de la Soc. math. de Kharkow 1902. *Hölder* legt seinen Untersuchungen Gebiete der Klasse Ah (im Raume) zugrunde. Auch *Liapounoff* betrachtet loc. cit. a) zum Teil Gebiete dieser Art.

55) *J. Plemelj*, Monatshefte f. Math. u. Phys. 15 (1904), p. 337—411 [p. 337 bis 362]; *A. Korn*, a) Potentialtheorie; b) C. R. 30 (1900), p. 1238—1241; c) Abhandlungen, Abh. 1 u. 2; d) Münch. Ber. 33 (1903), p. 3—26; e) Münch. Ber. 36 (1906), p. 3—36; f) Ann. de l'Éc. Norm. (3) 24 (1907), p. 9—75 [p. 12—30], wo die wichtigsten Ergebnisse (für das Newtonsche Potential) zusammengefaßt sind; g) Nova Acta, Abh. d. Kais. Leop.-Carol. Deutschen Ak. d. Nat. 88 Nr. 2 (1908), p. 151—173 [154—157]; h) Über Minimalflächen, deren Randkurven wenig von ebenen Kurven abweichen, Ber. Abh. 1909, Anhang, p. 1—37 [6—32]; i) Math. Ann. 75 (1914), p. 497—544 [p. 499—502]. In den vorstehenden Arbeiten wird meist zugleich das Verhalten des Potentials einer Doppelbelegung (Nr. 7) sowie einer ebenen oder räumlichen Massenverteilung (Nr. 8) untersucht. Im Gegensatz zu den Annahmen des Textes macht *Korn* die weitere einschränkende Voraussetzung, daß die (ebenen oder räumlichen) Randkomponenten mit einer jeden Geraden, die sie trifft, nur eine endliche Anzahl Punkte gemeinsam haben.

faßt.⁵⁶⁾ Bevor wir auf diese näher eingehen, wollen wir einige für die Anwendungen wichtigen Sätze wiedergeben.

1. Die Normalableitungen $\frac{\partial}{\partial n} V(s^+)$, $\frac{\partial}{\partial n} V(s^-)$ sind stetig. In der Ebene ist ferner

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial n} V(s^+) - \frac{\partial}{\partial n} V(s^-) &= -2\pi\mu(s), \\ \frac{\partial}{\partial n} V(s^+) + \frac{\partial}{\partial n} V(s^-) &= 2 \int_S \mu(t) \frac{\partial}{\partial n_s} \left(\log \frac{1}{r_{st}} \right) dt. \end{aligned} \quad (57)$$

2. Es ist

$$|V(s) - V(t)| < \text{Max } |\mu(s)| (A|r_{st}| |\log r_{st}| + A') \quad (A, A' \text{ konstant}). \quad (58)$$

3. Ist

$$\mu(s) - \mu(t) < B r_{st}^\lambda, \quad 0 < \lambda < 1 \quad (B \text{ konstant}),$$

so hat V im Innern und auf dem Rande sowohl des Innen-, als auch jedes Außengebietes stetige partielle Ableitungen erster Ordnung.⁵⁹⁾ Die Ableitung in der Richtung der Tangente geht durch S stetig durch, die anderen Ableitungen erster Ordnung erleiden auf S einen Sprung. Für alle (x_1, y_1) , (x_2, y_2) in $T + S$ ist ferner

$$\begin{aligned} (3^*) \quad |D_1 V(x_1, y_1) - D_1 V(x_2, y_2)| &< (c_1(\lambda)B + c_2(\lambda) \text{Max } |\mu(s)|) d_{12}^\lambda, \\ d_{12}^2 &= (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2, \quad c_1(\lambda) > 0, \quad c_2(\lambda) > 0. \end{aligned}$$

Eine ganz analoge Beziehung gilt im Raume.⁶⁰⁾

56) *H. Petrini*, a) *Acta Math.* 31 (1908) p. 127—332; b) *Journ. de Math.* (6) 5 (1909), p. 127—223. Die älteren Arbeiten sind zumeist in den Öfversigt af Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar veröffentlicht.

57) Im Raume gelten analoge Formeln. Den Beweis vgl. etwa bei *J. Plemešj*, loc. cit. 56) p. 349—353. Für das logarithmische Potential gibt *J. Plemešj*, Untersuchungen, p. 24—25 eine besonders einfache Ableitung an. Vgl. ferner *É. Picard*, *Ann. de l'Éc. Norm.* (3) 23 (1906), p. 503—508 sowie einen Beweis von *G. Darboux* bei *J. Horn*, *Part. Diffgl.*, p. 293—298. Der Satz 1 gilt übrigens auch bei Gebieten der Klasse Ah .

58) Dieser Satz gilt, auch wenn $\mu(s)$ lediglich beschränkt und integrierbar ist. *A. Korn*, *Potentialtheorie* 1, p. 388—389; loc. cit. 55) f), p. 13—14 gibt einen analogen etwas weniger weit reichenden Satz an. Auf der rechten Seite der Ungleichheit steht bei *Korn* ein Ausdruck von der Form $\text{Max } |\mu(s)| A(\lambda) r_{st}^\lambda$ ($\lambda > 0$ beliebig klein). In der zuletzt angegebenen Fassung gilt der Satz 2. bei Gebieten der Klasse Ah . Der Wert λ ist dann der Höldersche Exponent von S .

59) Vgl. *O. Hölder*, loc. cit. 54) [p. 36—42]. *Hölder* beweist die Existenz der partiellen Ableitungen am Rande bei Gebieten der Klasse Ah im Raume. Daß der Grenzübergang gleichmäßig ist, folgt aus Betrachtungen von *Hölder* fast unmittelbar. Man vergleiche ferner *A. Liapounoff*, loc. cit. 54) a), p. 255—260, und *A. Korn*, loc. cit. 55) a) sowie c) *Abh.* 1. Auch *Liapounoff* betrachtet Gebiete der Klasse Ah im Raume.

60) Vgl. *A. Korn*, loc. cit. 55) f), p. 15, wo Gebiete im Raume, sowie loc. cit. 55) h), p. 7—14, wo Kreisgebiete betrachtet werden. Der Satz (3*) gilt übrigens bei Gebieten der Klasse Ah .

4. Es sei T ein ebenes Gebiet der Klasse C ; $[\mu(s)]^2$ sei im *Lebesgueschen* Sinne integrierbar. Abgesehen höchstens von einer Menge (N) von Randpunkten vom Maße Null, sind $\frac{\partial}{\partial x}V(s)$, $\frac{\partial}{\partial y}V(s)$, $\frac{d}{ds}V(s)$ vorhanden. Sie stellen auf der Menge $S - (N)$ Funktionen dar, die nebst ihren Quadraten im Sinne von *Lebesgue* integrierbar sind. Es ist schließlich $\int_{s_0}^s \frac{d}{dt}V(t)dt = V(s) - V(s_0)$.⁶¹⁾

5. Sei T ein Gebiet der Klasse Bh , λ_1 der zugehörige *Höldersche* Exponent. Ist $\frac{d}{ds}\mu(s)$ vorhanden und ist

$$\left| \frac{d}{ds}\mu(s) - \frac{d}{dt}\mu(t) \right| < C\gamma_{st}^{\lambda_2}, \quad 0 < \lambda_2 < 1 \quad (C \text{ konstant}),$$

so sind D_2V im Innern und auf dem Rande des Innen- und jedes Außengebietes vorhanden und stetig. Es ist ferner für alle (x_1, y_1) und (x_2, y_2) in $T + S$

$$\left| D_2V(x_1, y_1) - D_2V(x_2, y_2) \right| < \left(c_3(\lambda')C + c_4(\lambda') \text{Max} \left| \frac{d}{ds}\mu(s) \right| \right) d_{12}^{\lambda'}, \\ \lambda' = \text{Min}(\lambda_1, \lambda_2).$$
⁶²⁾

Ein ähnlicher Satz gilt im Raume. Analoge Sätze lassen sich für Ableitungen höherer Ordnung aufstellen.⁶³⁾

Ist T ein Gebiet der Klasse C und ist $\mu(s)$ analytisch und regulär, so sind $V(x, y)$ und $V(x, y, z)$ in $T + S$ sowie im Innern und auf dem Rande jedes Außengebietes, höchstens mit Ausnahme des unendlich fernen Punktes (in der Ebene) analytisch und regulär.⁶⁴⁾

61) L. Lichtenstein, Journ. f. Math. 141 (1912), p. 12—42 [p. 29—34]; 142 (1913), p. 189—190 leitet den Satz 4. für ein Kreisgebiet ab. Durch eine geeignete konforme Abbildung gelangt man zu der allgemeineren Aussage des Textes.

62) A. Korn, loc. cit. 55 h), p. 7—14 [22—24]. An der bezeichneten Stelle wird ein Kreisgebiet betrachtet.

63) E. Schmidt, Schwarz-Festschrift, p. 365—383, beweist den folgenden, etwas weniger weit reichenden Satz: Haben $x(s)$, $y(s)$ (im Raume $x(v, \omega)$, $y(v, \omega)$, $z(v, \omega)$) (Nr. 2) stetige Ableitungen bis zur Ordnung $k + 1$ ($k \geq 2$) einschließlich, hat $\mu(s)$ stetige Ableitungen der ersten k Ordnungen, so sind D_1V, \dots, D_kV in $T + S$ sowie in allen Außenbereichen stetig. (Es genügt übrigens die Ableitungen der höchsten Ordnung abteilungsweise stetig vorauszusetzen.) A. a. O. finden sich Ausdrücke für den Sprung der partiellen Ableitungen auf S . Man vergleiche weiter A. Korn, Potentialtheorie 1, p. 45—51.

64) Dieser Satz rührt von H. Bruns, Inaugural-Dissertation, Berlin 1871; Journ. f. Math. 81 (1876), p. 349—356 her. Einen einfachen Beweis hat E. Schmidt, Math. Ann. 68 (1910), p. 107—118 gegeben.

Wie bereits erwähnt, hat *H. Petrimi* im Gegensatz zu den bis jetzt besprochenen Untersuchungen sich zur Aufgabe gestellt, möglichst umfassende notwendige und zugleich hinreichende Kriterien für die Existenz und Stetigkeit partieller Ableitungen des Potentials aufzufinden. Die auf das Potential einer einfachen Belegung sich beziehenden Resultate erstrecken sich sowohl auf geschlossene Kurven (Flächen), als auch auf Stücke von diesen. Das mit Masse belegte Gebilde kann Ecken und Spitzen (konische Punkte) haben. Das Verhalten der partiellen Ableitungen wird sowohl auf dem Träger der Belegung selbst, als auch bei der Annäherung an diesen, insbesondere an etwaige Endpunkte (im Raume Randlinien, auch Ecken oder Spitzen auf diesen) untersucht. Als charakteristisches Beispiel betrachten wir das folgende *Petrinische* Ergebnis:

Das mit Masse belegte Gebilde S sei ein beschränktes Gebiet in der Ebene $z = 0$, die Koordinaten des Punktes s in S seien mit x_0 und y_0 bezeichnet, $\mu(s)$ sei beschränkt und integrierbar. Damit die partielle Ableitung $\lim_{h=0} \frac{1}{h} [V(x_0 + h \cos \varphi, y_0 + h \sin \varphi, 0) - V(x_0, y_0, 0)]$ in derjenigen Richtung l_s , die mit der x -Achse den Winkel φ einschließt, existiert, ist nach *Petrini* notwendig und hinreichend, daß der Grenzwert $\lim_{\delta=0} \int_{S-S_0} \mu(t) \frac{\partial}{\partial l_s} \left(\frac{1}{r_{st}} \right) dt$ existiert. Unter S_0 ist die Fläche eines Kreises um (x_0, y_0) vom Halbmesser δ zu verstehen.^{65) 66)}

65) Es sei $\bar{f}(w) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\sqrt{w^2+t^2}}}{\sqrt{w^2+t^2}} dt = \log \frac{1}{w} +$ eine reguläre Funktion gesetzt. Die Funktion $\bar{f}(kR)$, ($R^2 = x^2 + y^2$) genügt der Differentialgleichung $\Delta u - k^2 u = 0$ und spielt in ihrer Theorie dieselbe Rolle, wie die Funktion $\log \frac{1}{R}$ in der Theorie der *Laplaceschen* Gleichung. Im Raume entspricht ebenso der Funktion $\frac{1}{R}$ ($R^2 = x^2 + y^2 + z^2$) der Ausdruck $\frac{e^{-kR}}{R}$. Die Integrale $\int_S \mu(t) \bar{f}(kr_t) dt$, $\int_S \mu(t) \frac{e^{-kr_t}}{r_t} dt$

werden als verallgemeinerte Potentiale einer einfachen Linien- oder Flächenbelegung bezeichnet. Ihre Eigenschaften sind denjenigen der im Text betrachteten Potentiale analog. Vgl. *C. Neumann*, Allgem. Unters. über das *Newtonsche* Prinzip der Fernwirkung, Leipzig 1896, p. 252; *S. Zaremba*, Ann. de l'Éc. Norm. (3) 16 (1899), p. 427—464; Ann. de Toulouse (2) 3 (1901), p. 5—21; Journ. de Math. (5) 8 (1902), p. 59—117 [61]; ebendort (5) 10 (1904), p. 395—444 [405—410]; Bull. de l'Acad. d. Sc. de Cracovie 1905, p. 69—168 [77—86]; *A. Korn*, loc. cit. 55). c) Abh. 5 [p. 8—18]; *A. Hoborski*, Prace matematyczno-fizyczne, Warschau, 20 (1909), p. 1—141 [5—36].

66) Weitere Literatur über das Potential einer einfachen Belegung: *H. Poincaré*, Potentiel, p. 92—117; p. 119; *T. Lalesco*, Bull. de Sc. Math. (2) 31 (1907),

7. **Potential einer Doppelbelegung.**⁶⁷⁾ Es sei T ein Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} oder im Raume, $\nu(s)$ eine auf S erklärte stetige Funktion.⁶⁸⁾ Die Integrale

$$W(x, y) = \int_S \nu(t) \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\log \frac{1}{r_t} \right) dt, \quad W(x, y, z) = \int_S \nu(t) \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\frac{1}{r_t} \right) dt$$

bezeichnet man als Potentiale von Doppelschichten oder Doppelbelegungen.

1. W ist in $T + S$ sowie in jedem Außenbereiche stetig. In der Ebene ist

$$(1) \quad W(s^+) - W(s^-) = 2\pi\nu(s),$$

$$(2) \quad W(s^+) + W(s^-) = 2 \int_S \nu(t) \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\log \frac{1}{r_{st}} \right) dt = 2W(s).^{69)}$$

Die Normalableitungen $\frac{\partial}{\partial n} W(s^+)$ und $\frac{\partial}{\partial n} W(s^-)$ sind im allgemeinen nicht vorhanden. Indessen es gilt der Satz:

2. Es bezeichnen $s^{+\varepsilon}$ und $s^{-\varepsilon}$ die Punkte in T und in einem Außengebiete auf der Normalen (n) in s , deren Entfernung von s den Wert ε hat. Es gilt dann

$$\lim_{\varepsilon=0} \left[\frac{\partial}{\partial n} W(s^{+\varepsilon}) - \frac{\partial}{\partial n} W(s^{-\varepsilon}) \right] = 0.$$

Der Grenzübergang ist für alle s auf S gleichmäßig. Ist somit eine der beiden Normalableitungen $\frac{\partial}{\partial n} W(s^+)$, $\frac{\partial}{\partial n} W(s^-)$ vorhanden, so existiert auch die andere und ist der ersteren gleich.⁷⁰⁾

p. 77—79; *G. Pucciano*, Rend. del Circ. Mat. di Palermo 23 (1907), p. 347—393; 28 (1909), p. 97—112; Atti del 4. Congr. Int. dei Mat. Roma 2 (1909), p. 150—155; *M. Olivo*, Atti del R. Ist. Veneto di sc. lett. ed arti (8) 70 (1913), p. 519—546; *T. Carleman*, Über das Neumann-Poincarésche Problem für ein Gebiet mit Ecken. Inaug.-Diss. Upsala 1916, p. 1—7.

67) Vgl. den Artikel II A 7 b von *H. Burkhardt* und *F. W. Meyer* Nr. 6.

68) Allgemeiner kann man T etwa von der Klasse Ah oder Q annehmen. Die Dichte der Belegung $\nu(s)$ kann eine beliebige, nicht notwendig beschränkte, integrierbare Funktion sein (im üblichen Sinne oder nach *Lebesgue*).

69) Im Raume gilt eine ganz analoge Formel. Vgl. etwa *A. Korn*, Potentialtheorie 1, p. 34—36 sowie p. 73; 2, p. 26—28 sowie p. 61; *J. Plemelj*, loc. cit. 55) p. 355—357 sowie namentlich, Untersuchungen, p. 22. S. ferner *J. Horn*, Partielle Differentialgleichungen, p. 289—293; *É. Goursat*, Cours 3, p. 175—178. Der Satz 1. gilt unverändert bei Gebieten der Klasse Ah . Ist T ein Gebiet der Klasse Q in \mathfrak{E} , s ein Eckpunkt ($\alpha\pi$ der eingeschlossene Winkel), so ist (2) durch $W(s^+) + W(s^-) = 2W(s) + 2\pi(1 - \alpha)\nu(s)$ zu ersetzen.

70) Den ersten Beweis dieses Satzes verdankt man *A. Tauber*, Monatshefte f. Math. u. Phys. 8 (1897), p. 79—86 sowie 9 (1898), p. 74—88 [p. 77—83] (eine

3. Es ist

$$|W(s) - W(t)| < \text{Max } |\nu(s)| (c_1 |r_{st}| |\log r_{st}| + c_2) \quad (c_1, c_2 \text{ konstant}).^{71)}$$

4. Setzt man entsprechend

$$\overline{W}(s) = \int_S \nu(t) \frac{\partial}{\partial n_s} \left(\log \frac{1}{r_{st}} \right) dt, \quad \overline{W}(s) = \int_N \nu(t) \frac{\partial}{\partial n_s} \left(\frac{1}{r_{st}} \right) dt,$$

so findet man

$$|\overline{W}(s) - \overline{W}(t)| < \text{Max } |\nu(s)| (c_3 |r_{st}| |\log r_{st}| + c_4) \quad (c_3, c_4 \text{ konstant}).^{72)}$$

5. Ist

$$|\nu(s) - \nu(t)| < Ar_{st}^\lambda, \quad 0 < \lambda < 1 \quad (A \text{ konstant}),$$

so ist $\frac{d}{ds} W(s)$ vorhanden und stetig. Ferner ist

$$\left| \frac{d}{ds} W(s) - \frac{d}{dt} W(t) \right| < c'(\lambda) Ar_{st}^\lambda \quad (c'(\lambda) > 0).^{73)}$$

6. Ist $\frac{d}{ds} \nu(s) = \nu'(s)$ vorhanden und stetig, ist ferner

$$|\nu'(s) - \nu'(t)| < Br_{st}^\lambda, \quad 0 < \lambda < 1 \quad (B \text{ konstant}),$$

so sind $D_1 W$ sowohl in $T + S$, als auch in jedem Außenbereiche vorhanden und stetig. Es ist ferner beispielsweise für alle (x_1, y_1) und (x_2, y_2) in $T + S$:

$$|D_1 W(x_1, y_1) - D_1 W(x_2, y_2)| < (c''(\lambda)B + c'''(\lambda) \text{Max } |\nu'(s)|) d_{12}^\lambda \\ (c''(\lambda) > 0, c'''(\lambda) > 0).^{74)}$$

Darstellung gibt *J. Horn*, loc. cit. 69), p. 298—302) und *A. Liapounoff*, loc. cit. 54) a), p. 293—299. Vgl. ferner *J. Plemelj*, loc. cit. 55), p. 358—360. Hinreichend für die Existenz der Normalableitungen ist in der Ebene beispielsweise die Beziehung $|\nu(s') + \nu(s'') - 2\nu(s)| < \bar{c}e^{1+\beta}$, (\bar{c}, β konstant und > 0), unter s' und s'' die beiden von (n) um e entfernten Punkte auf S verstanden. Vgl. *A. Liapounoff*, loc. cit. 54) a), p. 293—299. Im Raume gilt ein ganz analoger Satz.

71) *J. Plemelj*, loc. cit. 55), p. 361—362. Einen analogen, weniger weit reichenden Satz hat früher *A. Korn*, loc. cit. 55b) bewiesen. Bei *Korn* steht auf der rechten Seite der Ungleichheit ein Ausdruck von der Form $\bar{c}_1 \text{Max } |\nu(s)| r_{st}^{\frac{1}{2}}$. *Liapounoff* hat diesen, loc. cit. 54) b) durch $\bar{c}_1(\lambda) \text{Max } |\nu(s)| r_{st}^\lambda (\lambda > 0)$ ersetzt. In der zuletzt angegebenen Fassung gilt der Satz 4. bei Gebieten der Klasse A_h ; der Wert λ ist der Höldersche Exponent der Kurve (Fläche) S .

72) *J. Hadamard*, Leçons, p. 19—22; *J. Plemelj*, loc. cit. 55), p. 353—354. Gehört T der Klasse A_h an, so tritt rechter Hand $c_3 r_{st}^\lambda$ ein, unter λ den Hölderschen Exponenten von S verstanden. Vgl. *J. Hadamard* a. a. O., p. 22. (Einen etwas weniger weit reichenden Satz gibt *A. Liapounoff*, loc. cit. 54) a), p. 260—265 an.)

73) *A. Korn*, loc. cit. 55) f), p. 19—22.

74) *A. Korn*, loc. cit. 55) f), p. 17—18; *O. D. Kellogg* beweist (Trans. of the Amer. Math. Soc. 9 (1908), p. 38—50) den folgenden Satz: Ist T ein Gebiet der

Ein ganz analoger Satz gilt im Raume. Ähnliche Sätze lassen sich für Ableitungen höherer Ordnung aufstellen.⁷⁵⁾

7. Ist P ein Gebiet der Klasse C und ist $v(s)$ analytisch und regulär, so ist W in $T + S$ und jedem Außenbereiche analytisch und regulär.⁷⁶⁾ Notwendige und hinreichende Bedingungen sehr umfassender Natur für die Existenz und Stetigkeit von $D_1 W$ hat *H. Petrimi* in den in der Nr. 6 genannten Arbeiten angegeben. Insbesondere gelingt es *Petrini*, notwendige und hinreichende Bedingungen für die Existenz von $\frac{\partial}{\partial n} W(s^+)$ aufzufinden.^{77) 78) 79)}

8. **Logarithmisches Potential einer ebenen Flächenbelegung. Potential einer Volumladung.⁸⁰⁾** Es sei T ein beschränktes Gebiet

Klasse Ah , sind $v(s)$ und $v'(s)$ stetig und konvergiert der als vorhanden vorausgesetzte Grenzwert

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_s^{s+\epsilon} \left| \frac{v'(s+t) - v'(s-t)}{t} \right| dt$$

für $\eta = 0$ gleichmäßig gegen Null, so sind $D_1 W$ in $T + S$ vorhanden und stetig. Vgl. hierzu *O. D. Kellogg*, *Trans. of the Amer. Math. Soc.* 13 (1912), p. 109—132. Dort werden analoge Sätze für höhere Ableitungen bewiesen.

75) *E. Schmidt* beweist loc. cit. 63) den folgenden, etwas weniger weit reichenden Satz: Haben $x(s), y(s), v(s)$ (im Raume $x(v, \omega), y(v, \omega), z(v, \omega), v(s)$) stetige Ableitungen bis zur Ordnung $k + 1$ ($k \geq 2$) einschließlich, so sind $D_j W$ ($j = 1, \dots, k$) in $T + S$ und in jedem Außenbereiche vorhanden und stetig. Es genügt übrigens die Ableitungen D_{k+1} abteilungsweise stetig vorauszusetzen.

76) Dieser Satz rührt von *H. Bruns* her, loc. cit. 64). Einen einfachen Beweis hat *E. Schmidt*, loc. cit. 64) gegeben.

77) *H. Petrimi*, loc. cit. 56), a) p. 310—320; b) p. 211—222.

78) Die Ausdrücke $\int_S v(t) \frac{\partial}{\partial n_t} (\bar{f}(kr_t)) dt$, $\int_S v(t) \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\frac{e^{-kr_t}}{r_t} \right) dt$ werden als

verallgemeinerte Potentiale einer auf einer Kurve oder Fläche ausgebreiteten Doppelschicht bezeichnet. Ihre Eigenschaften sind denjenigen der Funktionen W analog. Wegen Literatur vergleiche die Fußnote 65).

79) Spezielle *Newtonsche* Potentiale der Form $\int_S v(t) \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{r_t} \right) dt$ kommen bei

G. Herglotz, Über die analytische Fortsetzung des Potentials ins Innere der anziehenden Massen, Leipzig 1914 [p. 23—24], andere Doppelbelegungen besonderer Art bei *A. Wangerin*, *Abh. d. kais. Leop. Carol. Deutschen Akad. der Naturf.*, Halle 1915, Bd. 100, Nr. 1 [p. 33—35] vor. Ebendort [p. 38—40] werden Potentiale gewisser dreifacher Flächenbelegungen betrachtet.

Weitere Literatur: *H. Poincaré*, *Potential*, p. 215—259; *G. Pucciano*, loc. cit. 66); *M. Olivo*, loc. cit. 66).

80) Vgl. den Artikel II A 7 b von *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer* Nr. 1, 2, 8.

in \mathbb{E} oder im Raume, K ein Kreisgebiet (Kugelkörper), das $T + S$ enthält, q eine in $K + C$ erklärte beschränkte, integrierbare Funktion.

1. Die Funktionen

$$P(\xi, \eta) = \int_T q(x, y) \log \frac{1}{\rho} dx dy,$$

$$(\rho^2 = (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2) \text{ in der Ebene,}$$

$$P(\xi, \eta, \zeta) = \int_T q(x, y, z) \frac{1}{\rho} dx dy dz,$$

$$(\rho^2 = (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2) \text{ im Raume,}$$

die Integrale, falls S nicht integrierbar ist, als „innere Integrale“ aufgefaßt, sind nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung im Endlichen stetig. Es ist beispielsweise

$$\frac{\partial}{\partial \xi} P(\xi, \eta) = \int_T q(x, y) \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\log \frac{1}{\rho} \right) dx dy. \text{⁸¹⁾}$$

2. Für alle $(\xi_1, \eta_1), (\xi_2, \eta_2)$ in $T + S$ ist

$$|D_1 P(\xi_1, \eta_1) - D_1 P(\xi_2, \eta_2)| < \{q\} (A_1 \delta_{12} |\log \delta_{12}| + A_2),$$

$$\delta_{12}^2 = (\xi_1 - \xi_2)^2 + (\eta_1 - \eta_2)^2, \quad (A_1, A_2 \text{ konstant}). \text{⁸²⁾}$$

Im Raume gilt eine ganz analoge Formel.

Sind q und $D_1 q$ in T stetig, so sind, wie bereits *C. F. Gauß* gezeigt hatte, in T auch $D_2 P$ vorhanden und stetig. Es ist ferner in der Ebene $\Delta P = -2\pi q$, im Raume $\Delta P = -4\pi q$. Nach *O. Hölder* genügt es für die Existenz der Ableitungen $D_2 P$ im Punkte (ξ_0, η_0) in T , wenn

$$q(\xi_0 + h', \eta_0 + h'') - q(\xi_0, \eta_0) < c(|h| + |h''|)^\lambda, \quad 0 < \lambda < 1 \text{ (} c \text{ konstant)}$$

ist.⁸³⁾ Ist q eine Funktion von x oder von y allein, so genügt bereits,

81) *O. Hölder*, Beiträge zur Potentialtheorie, Inaugural-Dissertation, Stuttgart 1882, p. 1—71 [6—8]. Einen besonders einfachen Beweis gibt *E. Schmidt*, loc. cit. 63) p. 368—372. Vgl. ferner *H. Petrini*, loc. cit. 56) und *D. Pompeiu*, Annaes scientificos da Ac. polyt. do Porto, Bd. 8, Nr. 4, 1913, p. 226—241.

In $T + S$ ist (im Raume) $|P| \leq 2\pi \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{\frac{2}{3}} \{q\}$, $|D_1 P| \leq 4\pi \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{\frac{1}{3}} \{q\}$, unter v das (innere) Volumen, $\{q\}$ die obere Grenze von $|q|$ verstanden. (Man vergleiche hierzu *E. Schmidt*, loc. cit. 63), p. 368—372.)

82) *U. Dini*, Acta math. 25 (1902), p. 185—230 [p. 192—196].

83) *O. Hölder*, loc. cit. 81) p. 9—19. Allgemeiner genügt es vorauszusetzen, daß q in (ξ_0, η_0) stetig ist, das Integral

$$J(h) = \int_0^h \frac{|q(\xi, \eta) - q(\xi_0, \eta_0)|}{\rho_0} d\rho_0, \quad \rho_0^2 = (\xi - \xi_0)^2 + (\eta - \eta_0)^2,$$

genommen längs eines jeden durch (ξ_0, η_0) gelegten Halbstrahles eine bestimmte

wenn diese in (ξ_0, η_0) stetig ist.⁸⁴⁾ Im allgemeinen reicht die Stetigkeit von q in (ξ_0, η_0) nicht aus, um die Existenz von $D_2 P$ zu gewährleisten.⁸⁵⁾ Notwendige und zugleich hinreichende Kriterien sind zuerst von *Petrini* angegeben worden. Sei q in (ξ_0, η_0) stetig. Damit $\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} P(\xi_0, \eta_0)$ und $\frac{\partial^2}{\partial \eta^2} P(\xi_0, \eta_0)$ existieren, ist nach *Petrini* notwendig und hinreichend, daß, unter K^* das Gebiet $(x - \xi_0)^2 + (y - \eta_0)^2 < h^2$ verstanden,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{T-K^*} q(x, y) \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \left(\log \frac{1}{\rho} \right) dx dy$$

existiert. Es gilt $\Delta P(\xi_0, \eta_0) = -2\pi q(\xi_0, \eta_0)$.⁸⁶⁾

Einen Satz, der über die Existenz von $D_2 P(\xi_0, \eta_0)$ in einem vorgegebenen Punkte in T zwar nicht zu entscheiden vermag, jedoch über die Verteilung der Stellen, in denen $D_2 P(\xi, \eta)$ existieren, Aufschluß gibt, hat *L. Lichtenstein* angegeben:

Sei K ein $T + S$ enthaltendes Kreisgebiet und $q(x, y)$ eine in $K + C$ erklärte nebst ihrem Quadrate im *Lebesgueschen* Sinne integrierbare Funktion. Außer höchstens in einer Punktmenge (M) vom Maße Null, sind $D_2 P$ vorhanden. Auf der Menge $T - (M)$ sind $D_2 P$ nebst ihrem Quadrate im *Lebesgueschen* Sinne integrierbar. In jedem Punkte von $T - (M)$ ist $\Delta P = -2\pi q$.⁸⁷⁾

3. Ist q in (ξ_0, η_0) stetig, so gilt nach *Petrini*

$$\lim_{h=0} \frac{1}{h} \left\{ \frac{\partial}{\partial \xi} P(\xi_0 + h, \eta_0) - \frac{\partial}{\partial \xi} P(\xi_0, \eta_0) + \frac{\partial}{\partial \eta} P(\xi_0, \eta_0 + h) - \frac{\partial}{\partial \eta} P(\xi_0, \eta_0) \right\} \\ = -2\pi q(\xi_0, \eta_0).^{88)}$$

Bedeutung hat und $J(h)$ für $h=0$ gleichmäßig gegen Null konvergiert. Siehe *U. Dini*, loc. cit. 82), p. 197—204. Vgl. hierzu *E. Morera*, Reale Ist. Lomb. di sc. e lett. Rend. (2) 20 (1887), p. 543. Analoge Sätze gelten im Raume.

84) *H. Petrinì*, loc. cit. 56) b), p. 134—137.

85) *H. Petrinì*, loc. cit. 56) b), p. 137—138.

86) *H. Petrinì*, loc. cit. 56) b), p. 131—133, im Raume loc. cit. 56) a), p. 129 bis 134. Vgl. ferner *T. J. F. A. Bromwich*, Proc. of the London. Math. Soc. (2) 3 (1905), p. 435—470. *Petrini* nimmt übrigens allgemeiner an, daß q lediglich auf jedem Halbstrahle durch (ξ_0, η_0) stetig ist, und gibt ferner notwendige und hinreichende Bedingungen für die Existenz und Stetigkeit von $D_2 P(\xi, \eta)$.

87) *L. Lichtenstein*, loc. cit. 61), p. 34—42. Die partielle Ableitung $\frac{\partial^2 P}{\partial \xi \partial \eta}$ wird dabei in einer von der üblichen teilweise abweichenden Art erklärt. Ein ganz analoger Satz gilt höchst wahrscheinlich im Raume.

88) *H. Petrinì*, loc. cit. 56) b), p. 137. Dort findet sich auch eine Reihe allgemeinerer Beziehungen. Analoge Sätze gelten im Raume. Siehe *H. Petrinì*, loc. cit. 56) a), p. 182. Man vergleiche hierzu *S. Zaremba*, loc. cit. 117).

4. Es möge jetzt T insbesondere der Klasse B angehören. Ist in $T + S$

$$|q(x_1, y_1) - q(x_2, y_2)| < N d_{12}^\lambda, \quad 0 < \lambda < 1,$$

$$d_{12}^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2, \quad (N \text{ konstant})$$

so ist $D_2 P$ in T und auf S stetig. Ferner ist in $T + S$

$$|D_2(\xi, \eta)| < \alpha_1(\lambda)M + \beta_1(\lambda)N,$$

$$|D_2(\xi_1, \eta_1) - D_2(\xi_2, \eta_2)| < (\alpha_2(\lambda)M + \beta_2(\lambda)N) \delta_{12}^{\lambda-1}, \quad M = \text{Max } |q|,$$

$$\delta_{12}^2 = (\xi_1 - \xi_2)^2 + (\eta_1 - \eta_2)^2.$$

Ein ganz ähnlicher Satz gilt im Raume.

5. Analoge Sätze lassen sich für partielle Ableitungen höherer Ordnung aufstellen. Gehört T der Klasse C an und ist q in T und auf S analytisch und regulär, so ist P sowohl in $T + S$, als auch in jedem Außenbereiche, in der Ebene im allgemeinen mit Ausnahme des unendlich fernen Punktes, analytisch und regulär.⁸⁹⁾

Mit der analytischen Fortsetzung des logarithmischen Potentials einer homogenen Flächenbelegung, deren Begrenzung algebraisch ist, sowie mit dem analogen Problem für Volumladungen, die von gewissen algebraischen Rotationsflächen begrenzt sind, hat sich in der neuesten Zeit *G. Herglotz* beschäftigt.⁹¹⁾ Bei dem zweidimensionalen Problem läßt sich das Potential in den Außengebieten als Potential geeigneter homogener einfacher und doppelter Linienbelegungen, zu denen im allgemeinen noch gewisse Massenpunkte hinzutreten, auffassen. Die Lage der anziehenden Punkte und Linien hängt aufs engste mit der Lage der ordentlichen und außerordentlichen Brennpunkte des algebraischen Randes zusammen. Im Raume gelten ähnliche Beziehungen.⁹²⁾

89) *A. Korn*, loc. cit. 55) f), p. 29—30; loc. cit. 55) h), p. 25—32.

90) Dieser Satz rührt von *H. Bruns* her, loc. cit. 64). Einen einfachen Beweis hat *E. Schmidt*, loc. cit. 64), p. 118, gegeben. Spezielle Entwicklungen zur analytischen Fortsetzung vergleiche II A 7b Nr. 9.

91) *G. Herglotz*, loc. cit. 79). Man vergleiche ferner die gleichzeitigen Untersuchungen von *A. Wangerin*, loc. cit. 79) sowie Abh. d. kais. Leop. Carol. Deutschen Akad. der Naturf., Halle 1917, Bd. 102 Nr. 3. Dort finden sich p. 3 Hinweise auf die einschlägigen Arbeiten von *C. Neumann* aus den Jahren 1907—1909.

92) Weitere Literatur: *J. G. Leathem*, Proc. of the London math. Soc. (2) 8 (1910), p. 200—212; *C. W. Oseen*, Rend. del Circolo Mat. di Palermo, 38 (1914), p. 167—179.

Sei T ein mit Masse erfülltes, beschränktes Gebiet (etwa der Klasse O). Betrachtungen darüber, welche Änderungen der Massendichte die Anziehung des Körpers im Außenraume nicht beeinflussen (Bestimmung der Massenverteilung von der Anziehung Null) hat *P. Pizzetti*, Atti della R. Acc. dei Lincei, Rend. (5) 18, p. 211—215 angestellt. Man vergleiche ferner *G. Lauricella*, ebendort (5) 20, p. 99—107 sowie *U. Crudeli*, am gleichen Ort (5) 21, p. 407—411; p. 822—825.

9. Newtonsches Potential einer einfachen Linienbelegung.

Es sei Γ ein Stück einer doppelstetigen analytischen und regulären Kurve (oder auch einer Kurve allgemeinerer Natur) in \mathfrak{E} oder im Raume. Mit dem Verhalten des Integrals $\int_{\Gamma} \chi(t) \frac{1}{r_i} dt$, unter $\chi(t)$ eine

auf Γ erklärte analytische und reguläre (oder auch gewissen Stetigkeitsbedingungen allgemeineren Charakters genügende) Funktion verstanden, beschäftigen sich *H. Poincaré*⁹³), *T. Levi-Civita*⁹⁴), *A. Viterbi*⁹⁵), *G. Pavanini*⁹⁶), *U. Cisotti*⁹⁷), *A. Tonolo*⁹⁸). *G. Piccati*^{98a}) bestimmt das Newtonsche Potential einer unbegrenzten homogenen Schraubenlinie.

10. Greensche Formeln. Allgemeine Eigenschaften der Potentialfunktionen.⁹⁹) Sei T ein beschränktes Gebiet der Klasse Q in \mathfrak{E} ; $U(x, y)$ und $V(x, y)$ mögen in $T + S$ nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetige Funktionen bezeichnen. In T sollen überdies $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 U}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}$ vorhanden und stetig sein. Es ist dann

$$(1) \quad - \int_T \left(\frac{\partial U}{\partial x} \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial y} \frac{\partial V}{\partial y} \right) dx dy - \int_S U \frac{\partial V}{\partial n} ds = \int_T U \Delta V dx dy,$$

$$(2) \quad \int_T (U \Delta V - V \Delta U) dx dy = - \int_S \left(U \frac{\partial V}{\partial n} - V \frac{\partial U}{\partial n} \right) ds. \quad 100)$$

Ganz analoge Formeln gelten für Gebiete der Klasse B oder D im Raume.

Mit dem Ausdruck $\int_T \int_T q(x, y, z) q(\xi, \eta, \zeta) \frac{1}{\rho} dx dy dz d\xi d\eta d\zeta$ („Potential von T auf sich selbst“) beschäftigt sich *O. Hölder*, loc. cit. 81), p. 51—66. Über den „Körper größter Anziehung“ vergleiche II A 7b Fußnote 113). (Für die neuere Literatur sei auf, Fort. d. Math., verwiesen.)

93) *H. Poincaré*, Potentiel, p. 32—39 sowie p. 121—132; Acta Math. 22 (1899), p. 89—178.

94) *T. Levi-Civita*, Rend. della R. Acc. dei Lincei (5) 17 (1908), p. 3—15; p. 413—426; p. 535—551; Rend. del Circ. Mat. di Palermo 33 (1912), p. 354—374.

95) *A. Viterbi*, Rend. del R. Ist. Lomb. (2) 42 (1908), p. 913—928.

96) *G. Pavanini*, Rend. della R. Acc. dei Lincei (5) 19 (1910), p. 394—401.

97) *U. Cisotti*, Rend. del Circolo Mat. di Palermo 31 (1911), p. 201—233 (p. 204—211).

98) *A. Tonolo*, Math. Ann. 72 (1912), p. 78—106.

98a) *G. Piccati*, Atti della R. Acc. dei Lincei, Rend. (5) 13 (1904), p. 595 bis 603.

99) Vergleiche das Referat II A 7b von *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer* Nr. 12 sowie den Artikel II A 2 von *A. Voß* Nr. 47.

100) Vgl. etwa *C. Jordan*, Cours d'Analyse, 2. Auflage, Bd. 2, p. 132—136. Dort werden rektifizierbare Randkurven betrachtet, die mit einer jeden Geraden $x = \text{const.}$ oder $y = \text{const.}$, die sie trifft, nur eine endliche Anzahl Strecken oder

Es möge jetzt T der Klasse B (in \mathfrak{E}) angehören. Die Beziehung (2) gilt nach einer Bemerkung von *A. Liapounoff* für jedes Paar in $T + S$ stetiger Funktionen U, V , wenn $D_1 U, D_1 V, D_2 U, D_2 V$ in T ; $\frac{\partial U}{\partial n}, \frac{\partial V}{\partial n}$ auf S vorhanden und stetig sind.^{101) 102)}

Die Existenz stetiger Normalableitungen kann übrigens durch folgende etwas weniger weitgehende Voraussetzungen ersetzt werden: Die Ableitungen $\frac{\partial U}{\partial n}(x, y), \frac{\partial V}{\partial n}(x, y)$ sind beschränkt, die Normalableitungen $\frac{\partial U}{\partial n}(s), \frac{\partial V}{\partial n}(s)$ sind, außer höchstens in einer Menge von Punkten auf S vom Maße Null, vorhanden. Ganz analoge Sätze gelten für Gebiete der Klasse B im Raume.¹⁰³⁾

Punkte gemeinsam haben. Weitergehende nahe verwandte Sätze finden sich in der Fußnote 103) angegeben. In einzelnen Punkten (x_k, y_k) des Randes (z. B. in den Eckpunkten) dürfen $\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}$ einer Beziehung von der Form

$$\left| \frac{\partial U}{\partial x} \right|, \left| \frac{\partial U}{\partial y} \right|, \left| \frac{\partial V}{\partial x} \right|, \left| \frac{\partial V}{\partial y} \right| < \frac{\text{Const.}}{r_k^\mu} \quad (0 < \mu < 1, r_k^2 = (x - x_k)^2 + (y - y_k)^2)$$

gemäß unendlich werden. Vgl. *W. F. Osgood* und *E. H. Taylor*, loc. cit 598), p. 278—279.

101) Die Existenz von $\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y}$ und $\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y}$ wird nicht vorausgesetzt.

102) *A. Liapounoff*, loc. cit. 54) a), p. 285—286. Vgl. ferner *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 9—10.

103) Weitreichende Sätze über die Gültigkeit der Formel

$$(1^*) \quad \int_T \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy = \int_S u dy - v dx,$$

aus der (1) durch die Substitution: $u = U \frac{\partial V}{\partial x}, v = U \frac{\partial V}{\partial y}$ formell hervorgeht, geben *P. Montel*, Thèse, Ann. de l'Éc. Norm. (3) 24 (1907), p. 233—334 [p. 283—293]; *Ch. J. de la Vallée Poussin*, Bull. de l'Ac. roy. de Belgique 1910, Nr. 11, p. 768 bis 798 [790—792], *Ida Barney*, Amer. Journ. of Math. 36 (1914), p. 137—150, (daselbst am Schluß die ältere Literatur) und *W. Groß*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 27 (1916), p. 70—120 [p. 75—79] an. *W. Groß* zeigt durch ein verallgemeinerungsfähiges Verfahren, daß es genügt, vorauszusetzen, daß T beschränkt und endlich vielfach zusammenhängend und S rektifizierbar ist, daß ferner u und v in T und auf S stetig und $\frac{\partial u}{\partial x}$ und $\frac{\partial v}{\partial y}$ vorhanden (vgl. die Fußnote 33) und im *Lebesgueschen* Sinne integrierbar (sommable) sind. Die Integrale rechter Hand sind als *Stieltjessche* Integrale aufzufassen. Nach *de la Vallée Poussin* genügt es übrigens anzunehmen, daß in $T + S$ die Funktion u in bezug x , die Funktion v in bezug auf y endliche im *Lebesgueschen* Sinne integrierbare Derivierte (nombres dérivées) habe. Außer höchstens in einer Menge (M) vom Maße Null, sind dann $\frac{\partial u}{\partial x}$ und $\frac{\partial v}{\partial y}$ vorhanden. Das Doppelintegral ist über $T - (M)$ zu erstrecken. Nach *Ida Barney* gilt der Satz (1*) für gewisse nicht rektifizier-

Es möge T wie zuletzt ein beschränktes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} bezeichnen; $U(x, y)$ sei eine in $T + S$ stetige, in T reguläre Potentialfunktion, die auf S etwa eine stetige Normalableitung hat. Aus (2) folgt in bekannter Weise für alle (x, y) in T

$$(3) \quad U(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_S \left\{ U(t) \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\log \frac{1}{r_t} \right) - \frac{\partial U}{\partial n_t} \log \frac{1}{r_t} \right\} dt.$$

Im Raume tritt unter dem Integralzeichen $\frac{1}{r_t}$ für $\log \frac{1}{r_t}$, vor diesem $\frac{1}{4\pi}$ für $\frac{1}{2\pi}$ ein.¹⁰⁴⁾ Analoge Formeln gelten für reguläre Potentialfunktionen in Gebieten, die den unendlich fernen Punkt enthalten. Aus diesen folgt, daß die Ausdrücke:

$$\begin{aligned} &\text{in der Ebene } R^2 D_1 U \quad (R^2 = x^2 + y^2), \\ &\text{im Raume } R^3 D_1 U \quad (R^3 = x^2 + y^2 + z^2) \end{aligned}$$

beschränkt sind.¹⁰⁵⁾ Aus (3) schließt man in bekannter Weise, daß jede Potentialfunktion in ihrem Regularitätsgebiete analytisch und regulär ist.¹⁰⁶⁾

Sei $U(x, y)$ eine in einem Kreisgebiete K vom Halbmesser h um (x_0, y_0) reguläre, in $K + C$ stetige Potentialfunktion. Von (3) ausgehend findet man durch einen geeigneten Grenzübergang

bare Randkurven. Weitere Literatur: *C. Poli*, Torino Atti, 49 (1914), p. 248—260; *L. Lichtenstein*, Arch. der Math. u. Phys. (3) 27 (1918), p. 31—37. Hier wird für Gebiete der Klasse A im Raume eine zu (1*) analoge Formel abgeleitet. Von den drei Funktionen u, v und w wird vorausgesetzt, daß sie in einem $T + S$ enthaltenden Gebiete stetig sind und endliche, im *Lebesgueschen* Sinne integrierbare Derivierte entsprechend in bezug auf x, y und z haben.

104) Führt man rechter Hand für $U(t)$ und $\frac{\partial U}{\partial n_t}$ die sich aus (3) ergebenden Ausdrücke in geeigneter Weise ein, so gewinnt man neue Darstellungsformeln für U . Vgl. *H. Petrini*, Archiv für Mat., Astr. und Fys. 8, Nr. 24 sowie 9, Nr. 17.

105) Dies besagt mehr als die Definitionsbeziehungen der Nr. 5. Vgl. *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 14.

106) Vgl. das Referat von *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer* II A 7 b Nr. 12. Ist bekannt, daß U und $D_1 U$ in einem Gebiete T in \mathfrak{E} stetig sind, daß ferner $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}$, außer höchstens in einer Punktmenge (M) vom Flächenmaße Null, existieren, in $T - (M)$ beschränkt sind und die Beziehung $\Delta U = 0$ erfüllen, so ist U eine in T reguläre Potentialfunktion. Ein analoger Satz gilt im Raume. Vgl. *P. Montel*, loc. cit. 103), p. 233—234. Ebendort findet sich eine Reihe weitergehender Sätze.

$$(4) \quad U(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi h} \int_{\mathcal{C}} U(t) dt. {}^{107)}$$

Sei T ein ebenes oder räumliches Gebiet der Klasse B und U eine in T und auf S stetige, in T reguläre Potentialfunktion, es möge ferner etwa $\frac{\partial}{\partial n} U(s)$ auf S existieren und sich stetig verhalten, dann ist, wie aus (1) geschlossen werden kann,

$$(5) \quad \int_S \frac{\partial U}{\partial n} ds = 0. {}^{108)}$$

Man findet ferner

$$(6) \quad \int_T \left[\left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = - \int_S U \frac{\partial U}{\partial n} ds,$$

Aus (4) kann geschlossen werden, daß eine Potentialfunktion, außer wenn sie sich auf eine Konstante reduziert, in ihrem Regularitätsgebiete weder Maximum, noch Minimum annehmen kann. {}^{109)}

Die *W. Thomsonsche* Transformation

$$x' = \frac{x}{R^2}, \quad y' = \frac{y}{R^2}, \quad U'(x', y') = U(x, y) \text{ in der Ebene,}$$

$$x' = \frac{x}{R^2}, \quad y' = \frac{y}{R^2}, \quad z' = \frac{z}{R^2}, \quad U'(x', y', z') = RU(x, y, z) \text{ im Raume}$$

führt eine in einer Kreisfläche um den Koordinatenursprung reguläre Potentialfunktion U in eine Potentialfunktion U' über, die in einem unendlichen von einem Kreise begrenzten Gebiet (im Raume im allgemeinen mit Ausschluß des unendlich fernen Punktes) regulär ist (vgl. *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer* II A 7 b Nr. 16; *Poincaré*, Potentiel, p. 192—200.) Man schließt unter Zuhilfenahme der *Thomsonschen* Transformation fast unmittelbar, daß eine in der gesamten Ebene oder im Raume (mit Einschluß des unendlich fernen Punktes) reguläre Potentialfunktion sich auf eine Konstante reduziert. {}^{110)}) Eine in \mathcal{C} oder im Raume erklärte, im Endlichen reguläre, positive (und a fortiori beschränkte)

107) Vgl. *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 175—210 [181—185]. Im Raume gilt eine analoge Formel.

108) Ist T ein ganz im Innern des Regularitätsgebietes gelegenes Gebiet der Klasse N in \mathcal{C} oder der Klasse A im Raume, so gilt auch jetzt noch $\int_S \frac{\partial U}{\partial n} ds = 0$.

109) Auch nicht in dem weiteren, durch die Zeichen \geq oder \leq bestimmten Sinne. Auch der unendlich ferne Punkt macht keine Ausnahme. Vgl. *J. Plemelj*, Untersuchungen p. 15—17.

110) Vgl. bsp. bei *J. Plemelj*, Untersuchungen p. 15—17, wo sich noch einige weitergehende Sätze finden.

Potentialfunktion ist eine Konstante. (Vgl. *É. Goursat*, Cours 3, p. 185, p. 260.)

Weitere allgemeine Eigenschaften zwei- und dreidimensionaler Potentialfunktionen, insbesondere grundlegende Entwicklungssätze vergleiche Nr. 13 und 14, insbesondere die Fußnoten 149) und 153) bis 159).

Das analytische Verhalten der Potentialfunktionen im Raume ist demjenigen in der Ebene vielfach analog.¹¹¹⁾

Besteht zwischen den Ableitungen $D_1 u$ einer Potentialfunktion im Raume eine Gleichung, so ist diese nach *J. Weingarten*, wenn man $\frac{\partial u}{\partial x'}$, $\frac{\partial u}{\partial y'}$, $\frac{\partial u}{\partial z'}$ als Koordinaten eines Punktes im Raume deutet, die Gleichung einer Minimalfläche.¹¹²⁾

Allgemeine Untersuchungen über die Reduktion dreidimensionaler Potentialfunktionen auf Funktionen von zwei unabhängigen Veränderlichen sind von *T. Levi-Civita* und *U. Amaldi* unter Benutzung der Methoden der Theorie kontinuierlicher Transformationsgruppen durchgeführt worden.¹¹³⁾

11. Die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen.¹¹⁴⁾ Sei $u(x, y)$ eine in einem beschränkten, einfach zusammenhängenden Ge-

111) Vgl. *Poincaré*, Potentiel, p. 200—203, wo das Verhalten im Unendlichen untersucht wird, sowie namentlich *P. Appell*, Acta Math. 4 (1884), p. 313—374 [p. 313 bis 346], wo u. a. ein Analogon zu dem *Mittag-Lefflerschen* Satze über meromorphe Funktionen abgeleitet wird, ferner *P. Appell*, Acta Math. 8 (1886), p. 265—294. Dort findet sich eine analytische Darstellung von Potentialfunktionen, die sich in Räumen regulär verhalten, deren Begrenzung aus Stücken von Kugelflächen besteht. Man vergleiche überdies *L. de Sanctis*, Annali di Mat. (3) 4 (1900), p. 161—197. Betrachtungen über allgemeine und gewisse partikuläre Lösungen der Differentialgleichung $\Delta u = 0$ im Raume finden sich bei *E. T. Whittaker*, Math. Ann. 57 (1903), p. 333—355. Nach *Whittaker* läßt sich jede Potentialfunktion im Raume in der Form

$$\int_0^{2\pi} f(z + ix \cos u + iy \sin u, u) du$$

darstellen. Man vergleiche hierzu *A. L. Dixon*, Mess. of Math. 33 (1903/4), p. 172—76 sowie *G. N. Watson*, Mess. of Math. 36 (1906/7), p. 98—106. Weiteres über das analytische Verhalten dreidimensionaler, insbesondere mehrdeutiger Potentialfunktionen siehe bei *A. C. Dixon*, Proc. of the London Math. Soc. (2) 1 (1903/04), p. 415—436.

112) *J. Weingarten*, Gött. Nachr. 1890, p. 313—335. Man vergleiche hierzu *G. Frobenius*, Gött. Nachr. 1891, p. 323—338 sowie *F. Schottky*, Berl. Sitzungsber. 1909, p. 1152—1157.

113) *T. Levi-Civita*, Mem. della R. Acc. d. sc. di Torino (2) 49 (1899), p. 105 bis 152; *U. Amaldi*, Rend. del. Circ. Mat. di Palermo 16 (1902), p. 1—45. Siehe ferner loc. cit. 411).

114) Vgl. II A 7 b Nr. 8, II B 1 Nr. 2, 3 und 19. Siehe ferner den Artikel von *L. Bieberbach* über Funktionentheorie, wo beim Begriff des analytischen Charakters diese Dinge besprochen werden

biete T in \mathfrak{C} reguläre Potentialfunktion. Durch die Gleichungen

$$(1) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

wird $u(x, y)$ eine bis auf eine willkürliche Konstante bestimmte, in T reguläre, zu $u(x, y)$ „konjugierte“ Potentialfunktion $v(x, y)$ zugeordnet; $u(x, y) + iv(x, y)$ ist eine in T reguläre analytische Funktion der komplexen Veränderlichen $x + iy$.

Sei $u(x, y)$ und $v(x, y)$ ein Paar in T erklärter, nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetiger, den *Cauchy-Riemannschen* Differentialgleichungen (1) genügender Funktionen. Wie bereits *B. Riemann* gezeigt hat, sind $u(x, y)$ und $v(x, y)$ in T reguläre Potentialfunktionen; sie haben darum stetige partielle Ableitungen aller Ordnungen.¹¹⁵⁾ Ersetzt man also die Differentialgleichung $\Delta u = 0$ durch das System (1), so gewinnt man den Satz, daß $u(x, y)$ analytisch und regulär ist, sowie man voraussetzt, daß $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$ vorhanden und stetig sind.

Man kann bei der Definition der Potentialfunktion partielle Ableitungen zweiter Ordnung auch dadurch entbehrlich machen, daß man von geeigneten Integraleigenschaften ausgeht. Diese Bemerkung gilt sowohl in der Ebene, als auch im Raume.

Sei T ein beschränktes Gebiet in \mathfrak{C} oder im Raume. Ist u eine in T nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetige Funktion und ist $\int_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0$, unter C einen beliebigen Kreis (Kugel) in

T verstanden, so ist u eine in T reguläre Potentialfunktion.¹¹⁶⁾

Sei u eine in T stetige Funktion. Ist der Mittelwertsatz (4) Nr. 10 erfüllt, so ist u eine in T reguläre Potentialfunktion.¹¹⁷⁾

115) *B. Riemann*, Inaugural-Dissertation, Ges. Math. Werke, p. 3—48 [23—24].

116) Vgl. *P. Koebe*, Sitzungsber. d. Berl. Math. Ges. 5 (1906), p. 39—42; *M. Bôcher*, Proc. of the Amer. Ac. of. Arts and Sciences Bd. 41, Nr. 26 (1906), p. 577—583.

117) *P. Koebe*, loc. cit. 116). Eine modifizierte und teilweise erweiterte Fassung findet sich bei *E. E. Levi*, Rendiconti della R. Acc. dei Lincei (5) 18 (1909), p. 10—15 und *H. Lebesgue*, Bull. de la Soc. math. de France 40 (1912), p. *16—*17. Nach *M. Plancherel*, Ann. de l'Éc. Norm. (3) 31 (1914), p. 223—262 [p. 245] (vgl. auch *W. Blaschke*, Leipz. Ber. 68 (1916), p. 3—7) genügt es bereits, wenn in T

durchweg $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho^2} \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(\xi + \rho \cos \theta, \eta + \rho \sin \theta) d\theta - u(\xi, \eta) \right\} = 0$ ist. Einen

verwandten Satz hat übrigens beträchtlich früher *S. Zaremba*, Rend. del Circ.

Wie neuere Untersuchungen gezeigt haben, lassen sich die *Riemannschen* Voraussetzungen nicht unbeträchtlich reduzieren. Nach *É. Goursat* genügt es anzunehmen, daß $u(x, y)$ und $v(x, y)$ sich in T stetig verhalten sowie dort bestimmte, den Gleichungen (1) genügende partielle Ableitungen erster Ordnung haben, und daß überdies der Satz von der vollständigen Differentiierbarkeit

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy, \quad dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

gilt. In der Symbolik der Funktionentheorie lauten diese Voraussetzungen einfacher: Ist $f(z)$ in T stetig und ist $\frac{d}{dz}f(z)$ daselbst vorhanden, so ist $f(z)$ in T analytisch und regulär.¹¹⁸⁾

Nach *P. Montel* kann man statt dessen von den Voraussetzungen ausgehen, daß u und v in T stetig sind, $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$ in T existieren sowie beschränkt sind und die Gleichungen (1), alles mit Ausnahme einer gewissen Menge von Punkten vom Maße Null, erfüllen.¹¹⁹⁾

Ein anderes System von Voraussetzungen hat *Ch. de la Vallée Poussin* angegeben. Die Funktionen $u(x, y)$ und $v(x, y)$ sind in T stetig und haben daselbst endliche (nicht notwendig beschränkte), im *Lebesgueschen* Sinne integrierbare Derivierte (außer höchstens in einer Punktmenge vom Maße Null, sind alsdann $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$ gewiß vorhanden). Außer höchstens in einer Nullmenge sind die Gleichungen (1) erfüllt.¹²⁰⁾

Ist $f(z)$ stetig, ist für alle (x, y) in T und alle positiven, hinreichend kleinen h der Ausdruck

$$\begin{aligned} \mu(z, h) &= \frac{1}{h} [i\delta_x f(z) - \delta_y f(z)], \quad \delta_x f(z) = f(z+h) - f(z), \\ \delta_y f(z) &= f(z+ih) - f(z) \end{aligned}$$

Mat. di Palermo 19 (1905), p. 140–150 angegeben. Ist u in T stetig und ist daselbst $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} [f(x+h, y) + f(x-h, y) + f(x, y+h) + f(x, y-h) - 4f(x, y)] = 0$, so ist in $T \dots \Delta u = 0$.

118) *É. Goursat*, Acta Math. 4 (1884), p. 197–200; Trans. of the Amer. Math. Soc. 1 (1900), p. 14–16; *E. H. Moore*, ebendort, p. 499–506; *A. Pringsheim*, Trans. of the Amer. Math. Soc. 2 (1901), p. 413–421; Münch. Ber. 33 (1903), p. 673–682; Bibl. Math. (3) 1 (1900), p. 433–479; *L. Heffter*, Gött. Nachr. 1902, p. 115–140; 1903, p. 312–316; 1904, p. 196–200.

119) *P. Montel*, loc. cit. 103), p. 293–295. Dort finden sich noch andere, zum Teil äquivalente, zum Teil allgemeiner gefaßte Aussagen. In einer späteren Note, C. R. 156 (1913), p. 1820–1822, gibt *Montel* ohne Beweis einen über den vorstehenden erheblich hinausgehenden Satz an.

120) *Ch. de la Vallée Poussin*, loc. cit. 103), p. 793–798.

beschränkt, ist ferner

$$\lim_{h=0} \mu(z, h) = 0,$$

so ist $f(z)$ eine in T reguläre analytische Funktion.¹²¹⁾ Die Zahl der reellen Grenzwerte, deren Existenz in jedem Punkte vorausgesetzt wird, die sonst vier beträgt, wird hier auf zwei reduziert.

Sei T ein Jordansches Gebiet in der Ebene der komplexen Variablen $z = x + iy$. Durch Vermittlung der in $T + S$ stetigen Funktionen

$$x' = x'(x, y), \quad y' = y'(x, y)$$

sei T auf ein Jordansches Gebiet T' in der Ebene der Variablen $z' = x' + iy'$ umkehrbar eindeutig und stetig bezogen. Es sei weiter bekannt, daß die Abbildung „streckentreu“ ist, d. h. daß in allen Punkten z_0 in T der Grenzwert

$$\lim_{z=z_0} \left| \frac{z' - z'_0}{z - z_0} \right|$$

vorhanden und von Null verschieden ist. Bleibt endlich der Umlaufsinn erhalten, so ist, wie *H. Bohr* neuerdings bewiesen hat, z' eine in T reguläre analytische Funktion von z . Die Abbildung ist konform.^{122) 123)}

Im Raume entsprechen den konjugierten Potentialfunktionen gewisse Funktionen von Linien im Sinne von *V. Volterra*.^{124) 125) 126)}

121) *L. Lichtenstein*, C. R. 150 (1910), p. 1109; Sitzungsber. d. Berl. Math. Ges. 9 (1910), p. 84—100 [p. 84—96].

122) Vgl. *H. Bohr*, Math. Zeitschr. 1 (1918), p. 403—420. S. auch *H. Rademacher*, Math. Zeitschrift 3 (1919).

123) Systematische Betrachtungen über „winkeltreue“ und „streckentreue“ Abbildung an einem Punkte und in der Ebene sind einige Jahre früher von *R. Remak* angestellt worden. Vgl. *R. Remak*, Rend. del Circ. Mat. di Palermo 38 (1914), p. 193—246.

124) *V. Volterra*, Leçons sur l'intégration des équations différentielles aux dérivées partielles, Upsala 1906. Man vergleiche ferner *A. C. Dixon*, The Quarterly Journal of pure and appl. Math. 35 (1904), p. 283—296 sowie *M. Lagally*, Münch. Ber. 1914, p. 157—190.

125) Weitere Literatur über die *Cauchy-Riemannschen* Differentialgleichungen und den *Cauchyschen* Integralsatz: *C. Pucciano*, Giorn. di Mat. 47 (1909), p. 55—64; *D. Pompéiu*, Nouv. Ann. de Math. (4) 10 (1910), p. 221—227; C. R. 153 (1911), p. 624—626; Wiener Ber. 120 (1911), p. 1249—1252; *F. Schottky*, Berlin Sitzgsber. 1915, p. 790—98; Journ. f. Math. 146 (1916), p. 234—244.

126) Über die analytische Fortsetzung von Potentialfunktionen durch das komplexe Gebiet hindurch vgl. *E. Study*, Math. Ann. 63 (1906), p. 239—245; 66 (1909), p. 331—336; Vorlesungen über ausgewählte Gegenstände der Geometrie, 1. Heft; Ebene analyt. Kurven und zu ihnen geh. Abbild., Leipzig 1911, p. 105—113. Allgemeine Betrachtungen über konforme Abbildung und Krümmung finden sich bei *A. Vöβ*, Münch. Ber. 37 (1907), p. 77—112.

III. Besondere Methoden für einzelne Klassen zwei- und dreidimensionaler Gebiete.

Spezielle Theorie der konformen Abbildung.

12. Die erste und die zweite Randwertaufgabe. **Problemstellung und Unitätssätze.** Es sei T irgendein berandetes Gebiet in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m . Auf dem Rande S von T sei eine beliebige stetige Wertfolge gegeben.¹²⁷⁾ Die Aufgabe, die etwa vorhandenen in $T + S$ stetigen, in T regulären Potentialfunktionen, die auf S diese Werte annehmen, zu bestimmen, bezeichnet man als die erste Randwertaufgabe der Potentialtheorie. Sie kann nicht mehr als eine Lösung haben. Wären u_1 und u_2 zwei verschiedene Lösungen, so müßte nach *C. Neumann* $u_1 - u_2$ auf S verschwinden und, da (Nr. 10) ein Extremum in T ausgeschlossen ist, identisch gleich Null sein.¹²⁸⁾

Sei T insbesondere ein von einer endlichen Anzahl einfacher Kurven begrenztes Gebiet. Die Randfunktion kann jetzt allgemeiner abteilungsweise stetig¹²⁹⁾ angenommen werden. Von der zu bestimmenden Potentialfunktion wird gefordert, sie sei beschränkt, in jedem die Unstetigkeitspunkte auf S nicht enthaltenden Bereiche in $T + S$ stetig und in T regulär. Die Randwertaufgabe hat auch jetzt nicht mehr als eine Lösung.¹³⁰⁾

Sei noch spezieller T ein beschränktes, einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B (oder Ah) in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m . Man kann jetzt die Randwerte $f(s)$ im *Lebesgueschen* Sinne integrierbar annehmen. Es sei (ξ, η) irgendein Punkt in T und es möge $G(\xi, \eta; x, y)$ die auf S verschwindende *Greensche* Funktion von T bezeichnen

127) Die Umgebung der unendlich fernen Punkte hat man sich hierbei, sofern diese auf S liegen, durch stereographische Projektion auf die *Riemannsche* Kugel übertragen zu denken. Windungspunkte auf S werden, wie bereits erwähnt, (vgl. die Fußnote 4) im allgemeinen nicht zugelassen.

128) Sei T insbesondere vom endlichen Zusammenhang. Der *Unitätssatz* gilt unverändert, wenn über das Verhalten der nun als beschränkt voraussetzenden Lösung u in endlich vielen Punkten A_j ($j = 1, \dots, n$) der nicht punktförmigen Komponenten von S keinerlei Festsetzungen vorliegen. In jedem die Ausnahmepunkte nicht enthaltenden Bereiche in $T + S$ soll die Lösung wie vorhin stetig sein. Es genügt noch allgemeiner voraussetzen, daß, unter P einen Punkt in T verstanden, (in der Ebene) $\lim_{A_j P = 0} \frac{u(P)}{\log A_j P} = 0$ ist. *S. Zaremba*

(Bull. de l'Ac. des Sc. de Cracovie 1909, p. 501—504) teilt für diesen Satz einen völlig elementaren Beweis mit. (Eine Darstellung findet sich bei *É. Goursat*, Cours, 3, p. 205—206). Man vergleiche ferner *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 41—42.

129) Oder auch nur beschränkt und bis auf eine endliche Anzahl Punkte stetig.

130) Vergleiche die Fußnote 128). Für das Kreisgebiet ist dieser Satz auf einem anderen Wege zuerst von *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 190—201, bewiesen worden. Siehe ferner *É. Picard*, Traité 2, p. 48—49.

(Nr. 20). Für hinreichend kleine δ sind die Kurven S_δ ,

$$G(\xi, \eta; x, y) = \delta$$

geschlossene, doppelpunktlose, analytische und reguläre Linien. Die gesuchte Lösung soll in T regulär sein und, außer höchstens in einer Menge von Randpunkten vom Maße Null, bei der Annäherung an S längs der orthogonalen Trajektorien der Schar S_δ gegen $f(s)$ konvergieren. Verlangt man schließlich, daß $\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{S_\delta} |u| ds = \int_S |f| ds$ gilt,

so kann das Problem auch jetzt nicht mehr als eine Lösung haben.¹³¹⁾

Im Raume wird das erste Randwertproblem, wenn die Randwerte durchweg stetig sind, genau so wie in der Ebene gestellt. Der Unitätssatz von *C. Neumann* gilt ohne jede Änderung. Es sei T insbesondere ein Gebiet der Klasse B und es mögen die vorgeschriebenen Randwerte abteilungsweise stetig sein.¹³²⁾ Die Schlußweise von *S. Zaremba* liefert auch jetzt noch in der einfachsten Weise den Unitätssatz.¹³³⁾

Es sei T ein Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m , das nicht beschränkt zu sein braucht, $f(s)$ eine auf S erklärte, der Bedingung $\int_S f(s) ds = 0$ genügende stetige Funktion. Die Aufgabe, die etwa vorhandenen in T und auf S stetigen, in T regulären (eindeutigen) Potentialfunktionen $u(x, y)$ zu bestimmen, die auf S stetige Normalableitung haben und der Bedingung $\frac{\partial u(s)}{\partial n} = f(s)$ genügen, bildet das zweite Randwertproblem der Potentialtheorie.¹³⁴⁾ Ist $f(s)$ abteilungsweise stetig, so wird man $\frac{\partial}{\partial n} u(x, y)$ beschränkt annehmen und über-

131) Vgl. *M. Plancherel*, Bull. des Sc. Math. (2) 34 (1910), p. 111—114 sowie *O. D. Kellogg*, Transc. of the Amer. Math. Soc. 13 (1912), p. 109—132 (p. 127—132).

Abgesehen von jener Nullmenge, konvergiert die Lösung bei der Annäherung an S längs einer beliebigen S nicht berührenden Geraden in T gegen $f(s)$. Ist $f(s)$ beschränkt, so genügt es, um die Unität zu gewährleisten, $u(x, y)$ beschränkt vorauszusetzen.

132) Auch im Raume braucht man übrigens die Randfunktion nicht notwendig beschränkt anzunehmen. Um nur das einfachste zu erwähnen, so dürfte das Kriterium von *M. Plancherel* loc. cit. 131), wenn $f(s)$ etwa in isolierten Punkten oder längs einer endlichen Anzahl von stetig gekrümmten Kurven auf S unendlich wird, sinngemäß übertragen, eine hinreichende Unitätsbedingung liefern.

133) Vgl. *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 42 (Fußnote)

134) Die Beziehung $\int_S f(s) ds = 0$ entspricht der Integralbeziehung (5) der

Nr. 10. Es genügt übrigens $\frac{\partial}{\partial n} u(x, y)$ beschränkt anzunehmen. Daß der Grenzübergang $\lim \frac{\partial}{\partial n} u(x, y) = \frac{\partial u(s)}{\partial n} = f(s)$ auf S gleichmäßig ist, wird sich nachträglich von selbst ergeben.

dies festsetzen, daß $\frac{\partial}{\partial n}u(x, y)$ sich dem Grenzwerte $\frac{\partial u(s)}{\partial n}$ auf jedem die Unstetigkeitspunkte von $f(s)$ nicht enthaltenden abgeschlossenen Bogen von S gleichmäßig nähern soll. Hat das Problem überhaupt eine Lösung, so erhält man alle Lösungen durch Hinzufügung einer willkürlichen Konstanten.¹³⁵⁾

Die vorstehende Definition der zweiten Randwertaufgabe läßt sich auf ebene Gebiete der Klasse \mathcal{A} und allenfalls der Klasse \mathcal{N} ausdehnen (Nr. 2). Beachtet man aber, daß unter geeigneten Voraussetzungen $\frac{\partial u(s)}{\partial n} = -\frac{\partial v(s)}{\partial s}$ ist, so findet man, daß das zweite Randwertproblem, sofern das (beschränkte) Gebiet T einfach zusammenhängend ist, im wesentlichen denselben Grad der Allgemeinheit, wie das erste erlangt, wenn man es so faßt:

Es ist eine in T reguläre Potentialfunktion $u(x, y)$ zu bestimmen, die so beschaffen ist, daß die konjugierte Potentialfunktion $v(x, y)$ auf S eine bis auf eine additive Konstante vorgeschriebene stetige Wertfolge annimmt. Das zweite Randproblem läßt sich demnach in der Ebene auf das erste zurückführen.¹³⁶⁾ Nach Bestimmung von $v(x, y)$ hat nunmehr eine Untersuchung des Verhaltens der Werte u und $\frac{\partial u(s)}{\partial n}$ auf S einzusetzen.

Eine ganz analoge Bedeutung und Allgemeinheit hat das zweite Randproblem im Raume. Im Gegensatz zu dem zweidimensionalen Falle läßt es sich hier nicht in einer so unmittelbaren Weise auf die erste Randwertaufgabe zurückführen.

13. Explizite Lösung der ersten Randwertaufgabe für die Kreisfläche und den Kugelkörper. a) *Die Poissonschen Integrale.*¹³⁷⁾ Es mögen u und φ Polarkoordinaten in einer Ebene bezeichnen. Sei C

135) Vgl. etwa bei *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 43. Man kann allgemeiner $f(s)$ beschränkt und im *Lebesgueschen* Sinne integrierbar voraussetzen. Man wird dann $\frac{\partial}{\partial n}u(x, y)$ beschränkt annehmen und, außer höchstens auf einer Punktmenge vom Maße Null, $\lim \frac{\partial}{\partial n}u(x, y) = \frac{\partial u(s)}{\partial n} = f(s)$ festsetzen. Das zweite Randwertproblem hat übrigens auch dann noch einen Sinn, wenn $f(s)$ eine gewissen Bedingungen genügende nicht beschränkte Funktion ist.

136) Ist T ein mehrfach zusammenhängendes Gebiet in \mathbb{E} und hat T keine punktierten Randkomponenten, so hat $v(x, y)$ vorgeschriebene Periodizitätsmoduln und auf jeder Randkomponente bis auf je eine additive Konstante vorgegebene Werte. Alle Konstanten, bis auf eine, bestimmen sich aus der Forderung, daß $u(x, y)$ eindeutig sein soll. Vgl. z. B. *J. Hadamard*, Leçons, p. 11—13. Die Zurückführung mehrdeutiger Potentiale auf eindeutige vgl. Nr. 24 d.

137) Vgl. das Referat II A 7 b von *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer* Nr. 19, 20 und 21. In den Fußnoten 133) bis 145) a. a. O. findet sich die ältere Literatur,

der Kreis um den Anfangspunkt vom Halbmesser R ; R und θ seien laufende Koordinaten eines Punktes auf C , $f(\theta)$ eine stetige Funktion mit der Periode 2π . Für diejenige in K und auf C stetige, in K reguläre Potentialfunktion $u(r, \varphi)$, die auf C den Wert $f(\theta)$ annimmt, hat *S. Poisson* den Ausdruck

$$(1) \quad u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\varphi - \theta) + r^2} f(\theta) d\theta$$

abgeleitet. In seinen grundlegenden Arbeiten über die Differentialgleichung $\Delta u = 0$ hat *H. A. Schwarz* durch Betrachtungen, die seitdem vorbildlich geworden sind, als erster streng bewiesen, daß $u(r, \varphi)$ auf C tatsächlich den Wert $f(\theta)$ annimmt.¹³⁸⁾ Durch (1) ist die erste Randwertaufgabe für ein Kreisgebiet unter der Voraussetzung, daß die Randwerte stetig sind, vollständig gelöst; sie hat keine weiteren Lösungen (Nr. 12). Das gleiche beweist *Schwarz*, wenn $f(\theta)$ abteilungsweise stetig ist, unter der weiteren Annahme, daß $u(r, \varphi)$ in K beschränkt namentlich die Arbeiten von *C. Neumann*, *F. Prym* und *H. A. Schwarz*. Man vergleiche ferner *U. Dini*, *Annali di Mat.* (2) 5 (1871/73), p. 305—345. Von den neueren Arbeiten sind zunächst die Abhandlung von *U. Dini*, *Acta Math.* 25 (1902), p. 185 bis 230 sowie eine Reihe von Aufsätzen von *C. Neumann* in den *Leipz. Berichten*, 1906 bis 1915, namentlich 64 (1912), p. 273—339 sowie p. 340—398, zu nennen. Zusammenhängende Darstellungen finden sich u. a. bei *É. Picard*, *Traité*, Bd. I, p. 268—275, Bd. II, p. 15—17; *W. F. Osgood*, *Funktionentheorie*, p. 633—641; *H. Weyl*, *Die Idee der Riemannschen Fläche*, p. 82—91; *É. Goursat*, *Cours*, 3, p. 183—189. Eine eingehende Theorie des *Poissonschen* Integrals (1) geben ferner *F. Prym* und *G. Rost* (*Prymsche Funktionen*, p. 1—47).

138) *H. A. Schwarz*, a) *Berl. Monatsber.* 1870, p. 767—795; *Ges. Abh.* 2, p. 144—171; b) *Journ. f. Math.* 74 (1872), p. 218—253; *Ges. Abh.* 2, p. 175—210. An dem zuletzt genannten Ort finden sich p. 184 und 189 Notizen über ältere Beweise der *Poissonschen* Integrale. Die Abhandlungen von *H. A. Schwarz* enthalten unter anderem eine systematische Theorie der Potentialfunktionen in der Ebene: Darstellung durch unendliche Reihen, analytische Fortsetzung usw. Von prinzipieller Wichtigkeit ist die Bemerkung, daß sich das *Poissonsche* Integral (1) auf die *Gaußsche* Mittelwertformel (4) Nr. 10 zurückführen läßt. Es genügt hierzu K durch eine lineare Substitution derart auf sich selbst zu beziehen, daß (r, φ) in den Anfangspunkt übergeht. Vgl. *M. Bôcher*, *Bull. of Amer. Math. Soc.* (2) 4 (1897/98) sowie *Annals of Math.* (2) 7 (1906); man vergleiche ferner die unter 106) zitierte Note von *P. Koebé*.

Geometrische Betrachtungen im Anschluß an das *Poissonsche* Integral gibt *G. Darboux*, *Bull. des Sc. math.* (2) 34 (1910), p. 287—300. Das *Poissonsche* Integral (1) findet sich, aus den allgemeinen *Fredholmschen* Auflösungsformeln (Nr. 17d) abgeleitet, bei *J. Plemelj*, *Untersuchungen*, p. 68—69. Weitere Literatur: *T. Boggio*, a) *Rend. del Circ. Mat. di Palermo* 22 (1906), p. 220—232; *H. Villat*, *Bull. de la Soc. math. de France* 39 (1911), p. 443—456; *Ann. de l'Éc. Norm.* (3) 28 (1911), p. 203—311; *T. Boggio*, b) *Atti d. R. Acc. d. Sc. di Torino* 47 (1911), p. 22—37; *W. Küstermann*, *Bull. of the Amer. Math. Soc.* (21) 2 (1914/15), p. 120—123; *W. Groß*, *Math. Zeitschr.* 2 (1918), p. 242—294; ebendort 3 (1919).

und in jedem die Unstetigkeitspunkte von $f(\theta)$ nicht enthaltenden Bereiche in $K + C$ stetig ist. Die Lösung ist wieder durch (1) gegeben.¹³⁹⁾

Es sei Σ ein Stück einer Kurve der Klasse A , das zwei Punkte P und Q auf C verbindet, abgesehen von seinen Endpunkten ganz in K verläuft und C nicht berührt. Es sei $u_0(r, \varphi)$ diejenige beschränkte, in K reguläre Potentialfunktion, die auf dem einen Kreisbogen (PQ) gleich 1, auf $C - (PQ)$ gleich 0 ist. Ist $u_0 = \text{Max } u(r, \varphi)$ auf Σ , so ist $u_0 < q < 1$ (der *Schwarzsche Hilfssatz*).¹⁴⁰⁾

Der *Schwarzsche* Beweis des *Poissonschen* Integrals (1) läßt sich (wenn die Randfunktion stetig ist) ohne weiteres auf den Fall eines Kugelkörpers übertragen.¹⁴¹⁾

Setzt man in (1) vor dem Integral das Zeichen $-$, so erhält man das *Poissonsche* Integral für das unendliche von C begrenzte Gebiet K_a . Die Funktion $u(x, y)$ ist dann diejenige in $K_a + C$ stetige, in K_a reguläre Potentialfunktion, die auf C die Werte $f(\theta)$ annimmt. Im Raume erhält man auf diese Weise das *Poissonsche* Integral für das von einer Kugel C begrenzte unendliche Gebiet K_a , d. h. diejenige in $K_a + C$ stetige, im Unendlichen verschwindende, in K_a (im allgemeinen mit Ausschluß des unendlich fernen Punktes) reguläre Potentialfunktion, die auf C die vorgeschriebenen Werte annimmt.

Eine Reihe weitgehender Resultate über das *Poissonsche* Integral (1) hat *P. Fatou* unter Zuhilfenahme des *Lebesgueschen* Integralbegriffes abgeleitet.¹⁴²⁾ Wir heben zunächst die folgenden Sätze hervor:

139) *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 190—200.

140) *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 156 und p. 190—200. Der Beweis von *Schwarz* gilt für alle einfach zusammenhängenden Gebiete der Klasse A , sobald für diese das erste Randwertproblem bei durchweg stetigen Randwerten gelöst ist (vgl. *É. Picard*, *Traité*, 2, p. 57 sowie weiter unten Nr. 24a Fußnote 282). *Schwarz* zerlegt allgemeiner C in $2p$ zusammenhängende Bögen C_1, \dots, C_{2p} , nimmt $f(\theta)$ auf C_{2j-1} ($j = 1, \dots, p$) gleich 1, auf C_{2j} ($i = 1, \dots, p$) gleich 0 an; Σ verbindet zwei beliebige Teilpunkte von C . Darüber hinaus läßt *Schwarz* mehrfach zusammenhängende Gebiete und gewisse Gebiete mit Ecken und Spitzen zu.

Betrachtungen über das Verhalten einer in einem ebenen Bereiche der Klasse D oder E beschränkten und bis auf endlich viele Randpunkte stetigen, im Innern regulären Potentialfunktion in der Umgebung der Ecken oder Spitzen, wenn die Folge der Randwerte dort einen Sprung erleidet, finden sich bei *H. A. Schwarz*, Ges. Abh., 2, p. 152—154. Man vergleiche hierzu *A. Harnack*, *Grundlagen*, p. 12—20.

141) Auch diese Formel ist zuerst von *S. Poisson* angegeben worden. Einen nach *Schwarz* geführten Beweis findet man beispielsweise bei *C. Jordan*, *Cours d'Analyse* 2 (1894), p. 217—218 und *É. Picard*, *Traité* 1, p. 161—167.

142) *P. Fatou*, *Acta math.* 30 (1906), p. 335—400. Dieser ausführlichen Arbeit sind verschiedene Noten in den *C. R.* vorausgegangen.

1. Sei $f(\theta)$ eine beliebige im *Lebesgueschen* Sinne integrierbare Funktion ($f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$). Bekanntlich ist, außer höchstens auf

einer Menge (M) vom Maße Null, $f(\theta_0) = \lim_{h=0} \frac{1}{h} \int_{\theta_0}^{\theta_0+h} f(\tau) d\tau$. Nach *Fatou*

konvergiert $u(r, \varphi)$ bei der Annäherung an (R, θ_0) längs einer beliebigen C nicht berührenden Geraden in K gegen $f(\theta_0)$ allemal, wenn θ_0 der Menge $C - (M)$ angehört.¹⁴³⁾ Ist insbesondere $f(\theta)$ beschränkt, so ist $u(r, \varphi)$ die einzige beschränkte, in K reguläre Potentialfunktion, die auf C , außer höchstens auf einer gewissen Nullmenge, die Werte $f(\theta)$ annimmt (Nr. 12).¹⁴⁴⁾

2. Ist in (R, θ_0) die Ableitung $f'(\theta_0)$ vorhanden, so konvergiert $\frac{\partial}{\partial \varphi} u(r, \varphi)$ bei der vorerwähnten Annäherung an den Rand gegen $f'(\theta_0)$.¹⁴⁵⁾

3. Es sei $f(\theta)$ stetig und es möge $v(r, \varphi)$ eine zu $u(r, \varphi)$ konjugierte Potentialfunktion bezeichnen. Eine notwendige und hinreichende Bedingung für das Vorhandensein des Grenzwertes $\lim_{r=R} v(r, \theta_0)$ ist, daß

$\lim_{\varepsilon=0} \int_{\varepsilon}^{\pi} [f(\theta_0 + \theta) - f(\theta_0 - \theta)] \cotg \frac{\theta}{2} d\theta$ existiert. Es ist

$$v(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\varphi - \theta) + r^2} g(\theta) d\theta,$$

$$(2) \lim_{r=R} v(r, \theta_0) = g(\theta_0) = -\frac{1}{2\pi} \lim_{\varepsilon=0} \int_{\varepsilon}^{\pi} [f(\theta_0 + \theta) - f(\theta_0 - \theta)] \cotg \frac{\theta}{2} d\theta$$

$$+ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(\theta) d\theta. \quad (146)$$

143) *P. Fatou*, loc. cit. 142), p. 339—363 und 373.

144) *P. Fatou*, loc. cit. 142), p. 349. Man vergleiche *M. Plancherel*, loc. cit. 131).

145) *P. Fatou*, loc. cit. 142), p. 346 und 357. Aus den Ergebnissen von *Fatou* läßt sich leicht der folgende Satz ableiten: (I) Ist $f(\theta)$ stetig, $f'(\theta)$ nach *Lebesgue* integrierbar und in θ_0 stetig, ist ferner

$$\int_{\theta_0}^{\theta} f'(\theta) d\theta = f(\theta) - f(\theta_0) \quad (\theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 + 2\pi)$$

und existiert der Grenzwert $\lim_{\varepsilon=0} \int_{\varepsilon}^{\pi} [f(\theta_0 + \theta) - f(\theta_0 - \theta)] \cotg \frac{\theta}{2} d\theta$, so ist die

Normalableitung $-\lim_{r=R} \frac{\partial}{\partial r} u(r, \theta_0)$ vorhanden. Die Sätze 2. und (I) enthalten insbesondere gewisse Resultate von *U. Dini*, loc. cit. 137), p. 221—229.

146) *P. Fatou*, loc. cit. 142), p. 360. Man vergleiche auch *J. Plemelj*,

Ist $|f(\theta + h) - f(\theta)| < \text{Const.} |h|^\lambda$ ($0 < \lambda < 1$), so ist auch
 $|g(\theta + h) - g(\theta)| < \text{Const.} |h|^\lambda$.¹⁴⁷⁾

Monatshefte f. Math u. Phys. 19 (1908), p. 205—210; C. Neumann, Leipz. Ber. 65 (1915), p. 144—183 sowie W. Groß, Monatsh. f. Math. u. Phys. 28 (1917), p. 238—242. D. Hilbert nimmt (Gött. Nachr. 1904, p. 213—259 [p. 250—255], Grundzüge, p. 73—77) $f'(\theta)$ und $f''(\theta)$ stetig an und leitet die wichtigen Umkehrungsformeln ab:

$$u(s) = \frac{1}{2\pi R} \int_C v(t) \cotg \frac{t-s}{2R} dt + \frac{1}{2\pi R} \int_C u(t) dt,$$

$$v(s) = -\frac{1}{2\pi R} \int_C u(t) \cotg \frac{t-s}{2R} dt + \frac{1}{2\pi R} \int_C v(t) dt.$$

Diese Formeln sind in den älteren Ergebnissen von Tauber als Spezialfälle enthalten. Vgl. A. Tauber, Monatsh. f. Math. u. Phys. 2 (1891), p. 79—118. Siehe auch A. Pringsheim, Münch. Ber. 30 (1900), p. 37—100.

Entsprechende Formeln für beliebige beschränkte Gebiete der Klasse B finden sich bei D. Hilbert, Gött. Nachr. 1905, p. 1—32 [p. 1—5]; Grundzüge, p. 81—86. Man vergleiche ferner O. Kellogg, Math. Ann. 58 (1904), p. 441—456 sowie Bull. of the Amer. Math. Soc. (2) 13, p. 168—170 und Ch. Haseman, Inaugural-Dissertation, Göttingen 1907 sowie Math. Ann. 66 (1909), p. 285—272.

Es genügt übrigens vorauszusetzen, daß $f(\theta)$ im Lebesgueschen Sinne integrierbar und nur in θ_0 stetig ist (vgl. L. Lichtenstein, loc. cit. 61), p. 27—28).

147) Anders geartete Sätze hat Lichtenstein angegeben: (II) Ist $[f(\theta)]^2$ nach Lebesgue integrierbar, so konvergiert $v(r, \theta)$ bei der Annäherung an den Rand längs einer beliebigen C nicht berührenden Geraden in K, außer höchstens in einer gewissen Nullmenge (M), gegen einen endlichen Wert $g(\theta_0)$. Das Integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} [g(\theta_0)]^2 d\theta_0 \text{ existiert [L. Lichtenstein, loc. cit. 61], p. 23].}$$

(III) ist $f(\theta)$ stetig, $[f'(\theta)]^2$ im Lebesgueschen Sinne integrierbar und

$$\int_{\theta_0}^{\theta} f'(\theta) d\theta = f(\theta) - f(\theta_0),$$

so ist, außer höchstens in einer gewissen Menge der Punkte θ_0 vom Maße Null, der Grenzwert $\lim_{\substack{r=R \\ \varphi=\theta_0}} \frac{\partial}{\partial r} u(r, \varphi) = \chi(\theta_0)$ bei der Annäherung an (R, θ_0) längs einer

beliebigen C nicht berührenden Geraden in K vorhanden. Das Integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} [\chi(\theta_0)]^2 d\theta_0 \text{ existiert. [L. Lichtenstein a. a. O., p. 25—26 sowie Journ. f. Math. 142 (1913), p. 189—190].}$$

(IV) Sei $f(\theta)$ nach Lebesgue integrierbar. In allen

Punkten θ_0 , in denen $f(\theta_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{\theta_0}^{\theta_0+h} f(\tau) d\tau$ ist, ist

$$\lim_{\substack{r=R \\ \varphi=\theta_0}} (R-r) \frac{\partial}{\partial r} u(r, \varphi) = 0, \quad \lim_{\substack{r=R \\ \varphi=\theta_0}} (R-r) \frac{\partial}{\partial \varphi} u(r, \varphi) = 0.$$

Mit Rücksicht auf eine spätere Anwendung sei noch der folgende Satz von *Fatou* erwähnt: 4. Ist $f(z) = f(re^{i\varphi})$ eine in K reguläre und beschränkte Funktion, so ist, außer höchstens in einer Menge von Punkten θ_0 vom Maße Null, $\lim_{r=R} f(re^{i\theta_0})$ vorhanden.¹⁴⁸⁾

b) *Entwicklungssatz. Folgerungen.* Ist $f(\theta)$ im *Lebesgueschen* Sinne integrierbar, so folgt aus (1) die Entwicklung

$$(3) \quad u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) d\theta + \frac{1}{\pi} \sum_n \frac{r^n}{R^n} (\cos n\varphi \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta + \sin n\varphi \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta) = \frac{b_0}{2} + \sum_n \frac{r^n}{R^n} (b_n \cos n\varphi + a_n \sin n\varphi).^{149)}$$

Es ist weiter

Ist $f(\theta)$ stetig, so ist der Grenzübergang gleichmäßig. Ist $f(\theta)$ beschränkt, so sind auch die Ausdrücke hinter dem Limeszeichen beschränkt. Vgl. *A. Liapounoff*, loc. cit. 54) a), p. 266—267; *S. Zaremba*, Bull. de l'Ac. des Sc. de Cracovie 1905, p. 70—78; *A. Hoborski*, loc. cit. 65); *L. Lichtenstein*, Ber. d. Berl. Mat. Ges. 8 (1909), p. 125—133 sowie loc. cit. 61), p. 20—22. Weitere Sätze über das Verhalten der partiellen Ableitungen des *Poissonschen* Integrals (1) auf C finden sich bei *P. Fatou*, loc. cit. 142) passim; *J. W. Lindeberg*, Ann. de l'Éc. Norm. (3) 18 (1901), p. 127—142; *U. Dini*, loc. cit. 137); *L. Lichtenstein*, loc. cit. 61), p. 17—20 sowie Ber. d. Berl. Math. Ges. 8 (1909), p. 125—133 (dort handelt es sich namentlich um partielle Ableitungen höherer Ordnung); *A. Korn*, loc. cit. 55) h) [p. 15—24]).

148) *P. Fatou*, loc. cit. 142), p. 366—368. Allgemeiner ist dort (in der vorhin benutzten Schreibweise) $\lim_{\substack{r=R \\ \varphi=\theta_0}} f(re^{i\varphi}) = \lim_{r=R} f(re^{i\theta_0})$ (vgl. *E. Study*, Vor-

lesungen über ausgewählte Gegenstände der Geometrie, 2. Heft, Konforme Abbildung einfach-zusammenhängender Bereiche, herausgegeben unter Mitwirkung von *W. Blaschke*, Leipzig 1913, p. 50—55). Nach *C. Carathéodory* muß, wenn $f(z)$ nicht konstant ist, die Menge der Limeswerte auf jedem Bogen von C mindestens drei verschiedene Werte enthalten (*Math. Ann.* 73 (1913), p. 305—320 [p. 307—312]). Dort sowie *Gött. Nachr.* (1913), p. 509—518 [p. 513—518] findet sich auch ein Beweis des *Fatouschen* Satzes).

149) Schon *H. A. Schwarz* folgerte hieraus gewisse Sätze über die *Fourierschen* Reihen stetiger Funktionen. Umgekehrt führen die Elemente der Theorie *Fourierscher* Reihen zu einem vollständigen Beweise der *Poissonschen* Integraldarstellung (1) (vgl. z. B. *H. Lebesgue*, Leçons sur les séries trigonométriques, Paris 1906, p. 48—54). Weitere an (3) anschließende Entwicklungen (analytische Fortsetzung, natürliche Grenze usw.) finden sich beispielsweise bei *É. Picard*, *Traité* 2, p. 51 u. ff.; *F. W. Osgood*, Funktionentheorie, p. 641 u. ff.; p. 655 u. ff.; *É. Goursat*, Cours 3, p. 192—195. Über die analytische Darstellung regulärer Potentialfunktionen in der Ebene vergleiche *M. Bôcher*, Trans. of the Amer. Math. Soc. 10 (1909), p. 271—278.

$$(4) \quad v(r, \varphi) = v(0, \varphi) + \frac{1}{\pi} \sum_n^{1 \dots \infty} \frac{r^n}{R^n} \left(-\cos n\varphi \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta \right. \\ \left. + \sin n\varphi \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta \right).$$

Das „Dirichletsche Integral“

$$D_K(u) = \lim_{K' \rightarrow K} \int_{K'} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy^{150)}$$

konvergiert, auch wenn $f(\theta)$ stetig ist, im allgemeinen nicht.¹⁵¹⁾ Eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß $D_K(u)$ einen end-

lichen Wert hat, ist, daß $\sum_n^{1 \dots \infty} n(a_n^2 + b_n^2)$ konvergiert. Ist sie erfüllt,

so ist

$$D_K(u) = \lim_{r=R} \int_0^{2\pi} u \frac{\partial u}{\partial r} r d\varphi = \sum_n^{1 \dots \infty} n(a_n^2 + b_n^2).^{152)}$$

Ist $f(\theta)$ stetig, so ist $D_K(u)$ vorhanden, wenn es auch nur eine in K und auf C stetige Funktion $\bar{u}(r, \varphi)$ gibt, die in K stetige partielle Ableitungen erster Ordnung besitzt und auf C den Wert $f(\theta)$ annimmt, so daß $D_K(\bar{u})$ existiert.

Es ist $D_K(\bar{u}) \geq D_K(u)$, wobei das Gleichheitszeichen nur für $\bar{u} = u$ gilt.¹⁵³⁾

Viele der im vorstehenden angegebenen Sätze lassen sich auf

150) Unter K' die Kreisfläche um den Koordinatenursprung vom Radius $R' < R$ verstanden.

151) *F. Prym*, Journ. f. Math. 73 (1871), p. 340—364, abgedruckt in *F. Prym* und *G. Rost*, *Prymsche Funktionen*, p. 227—250 [p. 246—250]; *J. Hadamard*, Bull. de la Soc. math. de France 34 (1906), p. 135—139.

152) *J. Hadamard*, loc. cit. 151), p. 136; $f(\theta)$ braucht dabei nicht notwendig stetig zu sein. Um so weniger wird im allgemeinen die Normalableitung $-\lim_{r=R} \frac{\partial u(r, \varphi)}{\partial r}$ existieren.

153) Dieser Satz folgt fast unmittelbar aus den Betrachtungen von *J. Hadamard*, loc. cit. 151). Siehe ferner *S. Zaremba*, Bull. de l'Acad. des Sc. de Cracovie 1909, p. 197—264 [p. 206—208], wo der analoge Satz im Raume betrachtet wird. (Eine Darstellung findet sich bei *H. Weyl*, Die Idee der Riemannschen Fläche, p. 84—86.) Man vergleiche hierzu die allgemeinen Ergebnisse von *S. Zaremba* a. a. O., p. 125—195 [p. 150—151]. Einen Beweis für das Kreisgebiet gibt weiter *R. Courant*, Math. Ann. 72 (1912), p. 517—550 [p. 523—524]. In einer späteren Arbeit, Journ. f. Math. 144 (1914), p. 190—211 [p. 194—195] beweist *Courant* denselben Satz mit elementaren Mitteln für beliebige beschränkte Gebiete in \mathfrak{C} (Nr. 34).

den Kugelkörper übertragen. Durchgeführt sind diese Betrachtungen nur zum Teil.¹⁵⁴⁾

Aus dem *Poissonschen* Integral (1) werden verschiedene wichtige Ungleichheiten abgeleitet. *H. A. Schwarz* findet z. B.

$$|u(r, \varphi) - u(0, \varphi)| \leq \frac{4}{\pi} \text{Max } |f(\theta)| \text{Arc sin } \frac{r}{R}.^{155)}$$

14. Kreisringfläche. Entwicklungssatz. Folgerungen. Eine in einem Kreisringgebiete $R_2 < r < R_1$ reguläre Potentialfunktion läßt sich daselbst (auf eine einzige Weise) in der Form

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2} (B_0 + B_0' \log r) \\ (1) + \sum_n^{1 \dots \infty} \{ (A_n r^n + A_{-n} r^{-n}) \sin n\varphi + (B_n r^n + B_{-n} r^{-n}) \cos n\varphi \}$$

darstellen. Die unendliche Reihe rechter Hand konvergiert für $R_2 < R_2' \leq r \leq R_1' < R_1$ unbedingt und gleichmäßig.¹⁵⁶⁾ Ist insbesondere $u(r, \varphi)$ für $0 < r < R_1$ regulär, so gilt die Entwicklung für alle positiven $r < R_1$. Ist $u(r, \varphi)$ überdies in einem Gebiete $0 < r \leq R_1' < R_1$ beschränkt, so findet man $A_{-m} = B_{-m} = 0$ ($m \geq 1$), $B_0' = 0$. Eine in einem beschränkten Gebiete T in \mathfrak{E} beschränkte, außer höchstens in isolierten Punkten, reguläre Potentialfunktion, ist mithin in T regulär.¹⁵⁷⁾ In ähnlicher Weise wird der folgende Satz bewiesen: Ist $u(r, \varphi)$ im Innern und auf dem Rande einer Kreisfläche K , außer höchstens in ihrem Mittelpunkte, regulär, ist $D_K(u)$ vorhanden, so ist $u(r, \varphi)$ in K regulär.¹⁵⁸⁾ Ist allgemeiner $|r^\mu u(r, \varphi)| < C, \mu > 0$ (C kon-

154) Der *Schwarzsche* Hilfssatz ist von *A. Korn* auf dreidimensionale Gebiete (der Klasse B) übertragen worden. Vergleiche die Fußnote 281).

155) *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 175—210 [p. 190]. Andere Ungleichheiten geben *C. Neumann*, *Abelsche* Funktionen, p. 412—417; *F. Schottky*, Journ. f. Math. 117 (1897), p. 225—253, wo allgemeiner mehrfach zusammenhängende Gebiete der Klasse C in \mathfrak{E} betrachtet werden; *G. Darboux*, loc. cit. 141 [p. 297] (siehe auch *T. Boggio*, loc. cit. 141) b); *F. Prym* und *G. Rost*, *Prymsche* Funktionen, p. 31—47 an.

Im Zusammenhang hiermit stehen grundlegende Ungleichheitsbeziehungen der Theorie analytischer Funktionen, die von *J. Hadamard*, *E. Borel*, *E. Landau*, *C. Carathéodory*, *F. Schottky*, *E. Lindelöf*, *P. Koebe* und anderen Forschern angegeben worden sind.

156) Vgl. z. B. *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 204—210. Analoge Entwicklungen im Raume (auch für unendliche, von einer Kugel begrenzte Gebiete) siehe *Poincaré*, Potentiell, p. 204—210.

157) *H. A. Schwarz*, loc. cit. 156), p. 209. Im Raume vergleiche *Poincaré*, Potentiell, p. 211.

158) *D. Hilbert*, Über das *Dirichletsche* Prinzip, Festschrift zur Feier des 150-jährigen Bestehens der Kgl. Ges. der Wiss. zu Göttingen, Berlin 1901, abgedruckt in den Math. Ann. 59 (1904), p. 161—186 [p. 184—186]. Unter $D_K(u)$ ist

stant), so enthält (1) nur eine endliche Anzahl Glieder mit negativem Exponenten. Ist die Funktion $u(r, \varphi)$ für $0 < r < R_1$ regulär und wird sie für $r = 0$ entweder gleich $+\infty$ oder $-\infty$, so ist

$$u(r, \varphi) = k \log r + \text{eine reguläre Potentialfunktion} \quad (k \neq 0).^{159)}$$

Auch für die Lösung der ersten Randwertaufgabe in einem Kreisringgebiete läßt sich eine Reihenentwicklung unter Zuhilfenahme trigonometrischer Funktionen angeben.¹⁶⁰⁾

der als vorhanden vorausgesetzte Grenzwert

$$\lim_{\substack{K_0=0 \\ K-K_0=c_0}} \int_{K-K_0}^K \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy$$

o eine Kreisfläche um den Mittelpunkt von K zu verstehen.

159) *M. Bôcher*, Bull. of Amer. Math. Soc. (2) 9 (1903), p. 455—465.

160) Vgl. *C. Neumann*, Journ. f. Math. 59 (1861), p. 335—366; *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 175—210 [p. 204—210]; *É. Picard*, *Traité* 2, p. 105—108; *F. Prym* und *G. Rost*, *Prymsche Funktionen*, p. 78—91, wo von einem kombinatorischen Verfahren Gebrauch gemacht wird (Nr. 24 a) Fußnote 316); *É. Goursat*, *Cours* 3, p. 190—191. Man vergleiche ferner *U. Dini*, Ann. di Math. (2) 4 (1870/71), p. 159—174; *H. Villat*, C. R. 152 (1911), p. 680—682; 153 (1911), p. 518—520; *Xenia*, *Hommage internationale à l'Université de Grèce*, Athènes 1912, p. 359—380; Journ. de Math. (6) 7 (1911), p. 353—408; Ann. de l'Éc. Norm. (3) 28 (1911), p. 203—311; (3) 29 (1912), p. 127—197; Red. del. Circ. Mat. di Palermo 33 (1912), p. 134—175; *U. Dini*, ebendort 36 (1913), p. 1—28. In den neun zuletzt genannten Arbeiten wird von den elliptischen Funktionen Gebrauch gemacht.

Eine eingehende Behandlung des Kreisringgebietes gibt unter durchgehender Benutzung elliptischer Funktionen, zum Teil in Ausführung früherer Mitteilungen neuerdings *H. Villat*, Acta Math. 40 (1915), p. 101—178. Es werden u. a. explizite Ausdrücke für eine im Gebiete $R_2 < r < R_1$ reguläre analytische Funktion $u + iv$ gegeben, wenn 1. auf $C_2 (r = R_2)$ und $C_1 (r = R_1) u$ (das erste Randwertproblem), 2. auf C_2 und $C_1 \dots \frac{\partial u}{\partial n}$ (das zweiten Randwertproblem), 2. auf $C_2 \dots u$, auf $C_1 \dots v$, 4. auf $C_2 \dots u$, auf $C_1 \dots \frac{\partial u}{\partial n}$, 5. auf C_2 , , auf $C_1 \dots \frac{\partial u}{\partial n}$ vorgeschriebene Werte haben. (Man vergleiche hierzu namentlich *U. Dini* an dem zuletzt a. O.) Ferner werden gewisse Sätze von *P. Fatou* und *L. Lichtenstein* (Nr. 13) auf ein Kreisringgebiet übertragen. *U. Dini* gibt in seinen Arbeiten zugleich explizite Formeln für die Lösung des ersten Randwertproblems für das von zwei konzentrischen Kugeln begrenzte Volumen. Nach *P. Koebe*, Leipz. Ber. 65 (1913), p. 210—213 läßt sich die Lösung des ersten Randwertproblems für das Kreisringgebiet durch elementare Abbildungen auf das *Poissonsche* Integral zurückführen. Das gleiche gilt für die Fläche eines Rechtecks und einer Ellipse (man vergleiche hierzu Nr. 47 Fußnote 592).

15. Positive Potentialfunktionen.^{160a)} Damit die unendliche Reihe

$$(1) \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} r^k (a_k \cos k\varphi + \bar{a}_k \sin k\varphi) = \Re f(z)$$

eine für $r < 1$ reguläre und positive Potentialfunktion darstellen kann, muß wie *C. Carathéodory* gezeigt hat, der Punkt a_k, \bar{a}_k ($k = 1, \dots, n$) des $2n$ -dimensionalen Raumes für alle n im Innern oder auf der Begrenzung des kleinsten konvexen $2n$ -dimensionalen Körpers K_{2n} liegen, der die sphärische Normalkurve $x_k = \cos k\theta, \bar{x}_k = \sin k\theta$ ($k = 1, \dots, n$) ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) enthält.¹⁶¹⁾ Jedes Gebiet K_{2n} ist die „Projektion“ des nächstfolgenden Gebietes K_{2n+2} .

Eine von *Carathéodory* angegebene Umkehrung dieses Satzes lautet: Liegt der Punkt $a_1, \bar{a}_1, \dots, a_n, \bar{a}_n$ im Innern oder auf dem Rande von K_{2n} , so gibt es mindestens eine für $r < 1$ konvergierende Reihe der Form (1), die mit der Zahl $\frac{1}{2}$ beginnt, $a_1, \bar{a}_1, \dots, a_n, \bar{a}_n$ zu $2n$ ersten Koeffizienten hat und eine für $r < 1$ reguläre positive Potentialfunktion darstellt.¹⁶²⁾ Liegt der Punkt a_1, \dots, \bar{a}_n auf dem Rande, so ist die Funktion $f(z)$ vollkommen bestimmt und zwar rational.

160a) Vgl. den Artikel von *L. Bieberbach* über Funktionentheorie.

161) Vgl. *C. Carathéodory*, a) *Math. Ann.* 64 (1907), p. 95—115; b) *Rend. del Circ. Mat. di Palermo* 32 (1911), p. 193—217; c) *C. Carathéodory* und *L. Fejér*, an dem zuletzt a. O., p. 218—239. Siehe ferner d) *O. Toeplitz*, a. a. O., p. 191—192; *E. Fischer*, a. a. O., p. 240—256; f) *J. Schur*, *Berl. Sitzungsber.* 1912, p. 4—15; g) *Journ. f. Math.* 147 (1917), p. 205—232; 148 (1918), p. 122—145; h) *G. Frobenius*, *Berl. Sitzungsber.* 1912, p. 16—31; i) *G. Herglotz*, *Leipz. Ber.* 63 (1912), p. 501—511; k) *F. Rieß*, *Ann. de l'Éc. Norm.* (3) 28 (1911), p. 33—62; l) *Les systèmes d'équations linéaires à une infinité d'inconnues*, Paris 1913, p. 171—180; m) *Journ. f. Math.* 146 (1915), p. 83—87; n) *L. Fejér*, *Journ. f. Math.* 146 (1915), p. 53—82; o) *G. Hamel*, *Math. Ann.* 78 (1918), p. 257—269; p) *O. Szász*, *Math. Zeitschr.* 1 (1918), p. 149—162; q) *Math. Zeitschr.* 1 (1918), p. 163—183. Man vergleiche ferner *G. Pick*, loc. cit. 163). Für die Begrenzung von K_{2n} gibt *Carathéodory* eine Parameterdarstellung mittelst trigonometrischer Polynome. Nach *O. Toeplitz* ist in den Punkten der Begrenzung

$$D_n(1, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 0,$$

$$D_k = \begin{vmatrix} 1, & \alpha_1, & \alpha_2, & \dots, & \alpha_k \\ \alpha_{-1}, & 1, & \alpha_1, & \dots, & \alpha_{k-1} \\ \cdot & & & & \\ \cdot & & & & \\ \cdot & & & & \\ \alpha_{-k}, & \alpha_{-(k-1)}, & \dots, & & 1 \end{vmatrix}, \quad \alpha_v = a_v + i\bar{a}_v, \quad \alpha_{-v} = a_v - i\bar{a}_v.$$

Im Innern von K_{2n} ist $D_k(1, \alpha_1, \dots, \alpha_k) > 0$ ($k = 1, \dots, n$), auf dem Rande

$$D_k(1, \alpha_1, \dots, \alpha_k) \geq 0 \quad (k = 1, 2, \dots, (n-1)).$$

Damit die Reihe $\Re f(z)$ für $r < 1$ konvergiere und daselbst positiv sei, ist notwendig (und hinreichend), daß für alle $n \dots D_n(1, \alpha_1, \dots, \alpha_n) \geq 0$ ist (vgl. *O. Toeplitz*, loc. cit. d).

162) *C. Carathéodory*, loc. cit. 161) b).

Jedem Punkte z in dem Einheitskreise ordnet nach *G. Pick* die Gesamtheit der durch (1) erklärten Funktionen $f(z)$ ein Kreisgebiet zu.¹⁶³⁾

Ein anderer Umkehrungssatz lautet: Liegt der Punkt $a_1, \bar{a}_1, \dots, a_n, \bar{a}_n$ für jedes n im Innern oder auf dem Rande von K_{2n} , so konvergiert (1) für $r < 1$ und stellt eine für $r < 1$ reguläre positive Potentialfunktion dar.^{163) 164)}

Die vorstehenden Sätze benutzen *C. Carathéodory* und *L. Fejér* zur Beantwortung verschiedener Fragen über Maxima und Minima von Potentialfunktionen.¹⁶⁵⁾

Einen Abschätzungssatz über positive Potentialfunktionen im Raume gibt *G. Pick*¹⁶⁶⁾ an.

16. Die Sätze von A. Harnack. Sei T ein beschränktes Gebiet in $\mathbb{C}(\mathbb{C}_m)$ oder im Raume. Aus der Tatsache, daß eine Potentialfunktion in ihrem Regularitätsgebiete weder Maximum noch Minimum haben kann, ergibt sich unter Zuhilfenahme der *Poissonschen* Integrale der folgende wichtige Satz:

1. Sei $u_j (j = 1, 2, \dots)$ eine Folge in T und auf S stetiger, in T regulärer Potentialfunktionen, die auf S gleichmäßig konvergiert. Sie konvergiert alsdann in dem Bereiche $T + S$ gleichmäßig. Die Funktion $u = \lim_{j \rightarrow \infty} u_j$ ist eine in $T + S$ stetige, in T reguläre Potentialfunktion. Die partiellen Ableitungen $D_n u_j (n \geq 1)$ konvergieren in jedem Bereiche in T gleichmäßig gegen $D_n u$.¹⁶⁷⁾

Da jede stetige Funktion einer oder mehrerer Variablen durch analytische Funktionen dieser Variablen beliebig gleichmäßig approximiert werden kann, so kann man das erste Randwertproblem grundsätzlich als gelöst betrachten, wenn es gelingt, dieses für gewisse besonders einfache Randfunktionen zu erledigen. So könnte man bei ebenen Gebieten der Klasse A die Randfunktion $f(s)$ analytisch annehmen.

2. Sei u_1, u_2, \dots eine unendliche Folge in T regulärer, nicht

163) *G. Pick*, Math. Ann. 77 (1915), p. 7—23. Dasselbst eine Verallgemeinerung der im Text besprochenen Ergebnisse. Man vergleiche ferner *G. Pick*, Math. Ann. 77 (1915), p. 1—6; 78 (1918), p. 270—275.

164) Ist unter den Voraussetzungen des Satzes etwa $D_p(1, \alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0$ so ist $D_{p+k} = 0 (k = 1, 2, \dots)$ und es gibt nur eine Funktion $f(z)$ dieser Art; $f(z)$ ist rational.

165) Vgl. loc. cit. 161) c). Hierzu ferner *T. H. Gronwall*, Annals of Math. (2) 16 (1914), p. 77—81.

166) *G. Pick*, Jahresb. d. Deutschen Math. Ver. 24 (1915), p. 329—332. Man vergleiche ferner *G. Pick*, Math. Zeitschr. 1 (1918), p. 44—51.

167) *A. Harnack*, Grundlagen, p. 65—67. Vgl. etwa *É. Picard*, Traité 2, p. 59—60; *É. Goursat*, Cours 3, p. 189—190.

negativer Potentialfunktionen. Ist die Reihe $\sum_j^{1, \dots, \infty} u_j$ auch nur in einem Punkte in T konvergent, so konvergiert sie in jedem Bereiche in T gleichmäßig und zwar gegen eine in T reguläre Potentialfunktion.¹⁶⁸⁾

Zur Auflösung des ersten Randwertproblems hat *C. Neumann* Anfang der siebziger Jahre eine Methode ersonnen, die für die Entwicklung der Potentialtheorie im Laufe der Zeit von der größten Wichtigkeit geworden ist. Die von *C. Neumann* angegebene „Methode des arithmetischen Mittels“ sucht die Lösung in der Form des Potentials einer Doppelbelegung zu gewinnen. Dies gelingt, wie spätere Untersuchungen gezeigt haben, z. B. für alle Gebiete der Klasse Ah .

17. Methode des arithmetischen Mittels. a) *Allgemeine Ansätze und Resultate von C. Neumann und G. Robin.*¹⁶⁹⁾ Es sei T ein ebenes Gebiet der Klasse B . Die Gesamtheit der m Außengebiete ($m \geq 1$) heiße T_a . Eins von diesen enthält den unendlich fernen Punkt. Auf S sei eine abteilungsweise stetige (allgemeiner im *Lebesgueschen* Sinne integrierbare) Wertfolge $f(s)$ gegeben. *C. Neumann* stellt sich die Aufgabe¹⁷⁰⁾, zwei Doppelbelegungen $\frac{1}{\pi} \nu_1(s)$ und $\frac{1}{\pi} \nu_2(s)$ auf S so zu bestimmen, daß die zugehörigen Potentialfunktionen

$$(1) \quad \frac{1}{\pi} \int_S \nu_1(t) \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\log \frac{1}{r_t} \right) dt, \quad \frac{1}{\pi} \int_S \nu_2(t) \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\log \frac{1}{r_t} \right) dt$$

entsprechend auf der Innen- und der Außenseite von S den Wert $f(s)$ annehmen. In einer völlig analogen Weise wird das *Neumannsche* Problem im Raume erklärt.¹⁷¹⁾

Die besondere Wichtigkeit des *Neumannschen* Ansatzes beruht darin, daß er die Lösung in einer Form liefert, aus der sich verschiedene ihrer Eigenschaften leicht ablesen lassen. So ist die *Neumannsche* Methode, außer bei ebenen Gebieten der Klasse C , D und E , bis jetzt die

168) *A. Harnack*, loc. cit. 167), p. 67—68. Eine Darstellung gibt u. a. *É. Picard*, *Traité* 2, p. 59—61. Vgl. ferner *É. Goursat*, *Cours* 3, p. 191—192.

Nützliche Hilfssätze über unendliche Folgen nicht negativer Potentialfunktionen gibt *S. Johansson*, *Acta Soc. Sc. Fenn.* Bd. 40 Nr. 2, p. 1—29 [p. 1—7, sowie Bd. 41 Nr. 2, p. 1—39 [p. 1—8] an.

169) Vgl. das Referat II A 7 b von *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer* Nr. 27. Dort findet sich in den Fußnoten 170) bis 181) die ältere Literatur. Siehe namentlich *G. Kirchhoff*, *Acta Math.* 14 (1890/91), p. 179—183. Man vergleiche ferner die von *D. Hilbert* in seinen Vorlesungen mitgeteilten Bemerkungen bei *E. R. Neumann*, *Math. Ann.* 55 (1901), p. 1—52. Siehe ferner *H. Liebmann*, *Münch. Ber.* 1914, p. 369—376.

170) Zuerst *Leipz. Ber.* 22 (1870), p. 49—56, abgedruckt in den *Math. Ann.* 11 (1877), p. 568—566.

171) Vor dem Integralzeichen tritt in diesem Falle der Faktor $\frac{1}{2\pi}$ ein.

einzigste, die weitgehende Aufschlüsse über das Verhalten partieller Ableitungen der Lösung am Rande liefert. Dieser Vorteile seines Verfahrens war sich *C. Neumann* voll bewußt. Das Bestreben, die Lösung des ersten Randwertproblems in einer für die Diskussion geeigneten Form zu gewinnen, war überhaupt von Anfang an ein leitender Gedanke seiner Untersuchungen.¹⁷²⁾

Es möge das Gebiet T insbesondere einfach zusammenhängend und konvex sein.¹⁷³⁾ Um Vorstellungen zu fixieren, nehmen wir es räumlich an. *C. Neumann* beweist unter Benutzung einer dem Gebiete eigentümlichen „Konfigurationskonstanten“ $\alpha < 1$, daß die unendliche Reihe

$$(2) \quad (\omega_0 - \omega_1) + (\omega_2 - \omega_3) + \dots,$$

$$f_j(s) = \frac{1}{2\pi} \int_S f_{j-1}(t) \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\frac{1}{r_{st}} \right) dt \quad (j=1, 2, \dots), \quad \omega_j(x, y, z) = \frac{1}{2\pi} \int_S f_j(t) \frac{\partial}{\partial r_t} \left(\frac{1}{r_t} \right) dt,$$

$$f_0(s) = f(s)$$

in T und auf S gleichmäßig konvergiert und auf S den Wert $f_0(s) - N$ annimmt, unter N einen bestimmten von $f_0(s)$ und S abhängigen Wert verstanden. Eine analoge Entwicklung erhält man für das Außengebiet.

Es hat einer langen Reihe von Untersuchungen benötigt, bis die Konvergenz der *Neumannschen* Reihen und damit die Anwendbarkeit der Methode für Gebiete von hinreichend allgemeiner Natur, insbesondere für Gebiete der Klasse B sichergestellt war. Insbesondere sind, worauf wir bald zurückkommen werden, durch die Theorie linearer Integralgleichungen Zusammenhänge von überraschender Eleganz und Durchsichtigkeit aufgedeckt worden. Bekanntlich war es das *Neumannsche* Problem in der *Poincaréschen* Fassung

172) Vgl. *C. Neumann*, Abhandlungen. In der zweiten dieser beiden Abhandlungen nimmt *C. Neumann* die Untersuchung des Verhaltens partieller Ableitungen der Lösung am Rande in Angriff.

173) Den fundamentalen Untersuchungen von *C. Neumann* liegen gewisse konvexe, einfach zusammenhängende Gebiete, deren Begrenzung auch gewisse sprungweise Unstetigkeiten (Kanten, Ecken u. dgl.), aufweisen kann, die aber nicht „zweisternig“ sein dürfen, zugrunde. Dies besagt, daß die Tangenten (Tangentialebenen) von S nicht alle durch den einen oder den anderen von zwei festen Punkten (wie etwa bei einem Rechteck oder Doppelkegel) hindurchgehen sollen.

Allgemeiner kann man sowohl in der Ebene, als auch im Raume der Betrachtung ein System von endlich vielen Gebieten der Klasse B ohne gemeinsame Randpunkte zugrunde legen. Der „Außenraum“ zerfällt in eine Anzahl von Gebieten, von denen das den unendlich fernen Punkt enthaltende mehr als eine Randkomponente hat und somit mehrfach zusammenhängend ist.

(Nr. 17b), das für *J. Fredholm* eine Veranlassung zu seiner bahnbrechenden Entdeckung gab.¹⁷⁴⁾ Eine sehr vollständige und tiefgehende Behandlung des *Neumannschen* und des damit eng verwandten *Robinschen* Problems auf dieser Basis verdankt man *J. Plemelj*.¹⁷⁵⁾

Im Anschluß an *C. Neumann* hat *G. Robin* das Problem der elektrischen Verteilung auf leitenden Flächen behandelt.¹⁷⁶⁾ Dieses Problem bildet einen Spezialfall der allgemeineren Randwertaufgabe, die in der Ebene wie folgt lautet:

Es sind zwei einfache Belegungen $\frac{1}{\pi}\mu_1(s)$ und $\frac{1}{\pi}\mu_2(s)$ so zu bestimmen, daß die zugehörigen Potentiale

$$(3) \quad \frac{1}{\pi} \int_S \mu_1(t) \log \frac{1}{r_t} dt, \quad \frac{1}{\pi} \int_S \mu_2(t) \log \frac{1}{r_t} dt$$

entsprechend in T und in T_a die Normalableitung gleich $f(s)$ haben. Im Raume gilt eine analoge Problemstellung.

b) *Die grundlegende Wendung durch H. Poincaré.* Einen Wendepunkt in der Entwicklung des *Neumannschen* und des *Robinschen* Problems bezeichnet das Erscheinen einer berühmten Abhandlung von *H. Poincaré*.¹⁷⁷⁾ Vor allem erweitert *Poincaré* die Fragestellung durch die Einführung eines Parameters. Es handelt sich nun um die Bestimmung des Potentials einer Doppelschicht W sowie des Potentials einer einfachen Belegung V , so daß einmal

$$(1) \quad \frac{1}{2} (W(s^+) - W(s^-)) + \frac{\lambda}{2} (W(s^+) + W(s^-)) = \pi f(s),$$

das andere Mal

$$(2) \quad -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial n} V(s^+) - \frac{\partial}{\partial n} V(s^-) \right) + \frac{\lambda}{2} \left(\frac{\partial}{\partial n} V(s^+) + \frac{\partial}{\partial n} V(s^-) \right) = \pi f(s)$$

gilt. Für $\lambda = 1$ geben (1) und (2) als Randbedingungen entsprechend

$$W(s^+) = \pi f(s), \quad \frac{\partial}{\partial n} V(s^-) = \pi f(s),$$

für $\lambda = -1$

$$W(s^-) = -\pi f(s), \quad \frac{\partial}{\partial n} V(s^+) = -\pi f(s).$$

Das Gebiet T wird, und dies ist wesentlich, nicht mehr als konvex

174) *J. Fredholm*, Oefversigt af Kongl. Svenska Vet. Akad. Förh. 57 (1900), p. 39–46; C. R. 134 (1902), p. 219–222; p. 1561–1564; Acta math. 27 (1903), p. 365–390.

175) *J. Plemelj*, loc. cit. 55) sowie Monatsh. für Math. und Physik 18 (1907), p. 180–211, ferner, Untersuchungen, passim.

176) Vgl. *G. Robin*, Ann. de l'École Normale 3 (3), Supplément, p. 3–58; C. R. 104, p. 1834–1836; C. R. 106, p. 413–416; Oeuvres 1, Paris 1899.

177) *H. Poincaré*, La méthode de *Neumann* et le problème de *Dirichlet*, Acta math. 20 (1897), p. 59–142 (gedruckt Ende 1895).

vorausgesetzt.¹⁷⁸⁾ Angenommen wird nur, daß T ein einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B ist, und daß es eine umkehrbar eindeutige Abbildung des Gesamtraumes auf sich selbst,

$$x' = x'(x, y, z), \dots; \quad x = x(x', y', z'), \dots$$

gibt, die den unendlich fernen Punkt ungeändert läßt und S einer Kugel zuordnet. Die Funktionen

$$(3) \quad x'(x, y, z), \dots; \quad x(x', y', z'), \dots$$

haben stetige Ableitungen erster und zweiter Ordnung. Setzt man für kleine Werte von $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}, \dots$ $\frac{1}{x} = \xi' \left(\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z} \right), \dots,$

$\frac{1}{x} = \xi \left(\frac{1}{x'}, \frac{1}{y'}, \frac{1}{z'} \right), \dots$ so haben auch $\xi', \eta', \zeta'; \xi, \eta, \zeta$ stetige Ableitungen der beiden ersten Ordnungen. Im Unendlichen sind die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung der Funktionen (3) gleich Null, außer $\frac{\partial x}{\partial x'}, \frac{\partial y}{\partial y'}, \frac{\partial z}{\partial z'}, \frac{\partial x'}{\partial x}, \frac{\partial y'}{\partial y}, \frac{\partial z'}{\partial z}$, die dort den Wert 1 haben.¹⁷⁹⁾

Poincaré entwickelt nun die Lösung nach Potenzen von λ , bildet die zu den Potentialen $\omega_0, \omega_1, \omega_2, \dots$ gehörigen *Dirichletschen* Integrale des Innen- und des Außengebietes und gelangt durch Überlegungen, die mit der von *H. A. Schwarz* zuerst in seiner berühmten Festschrift angewandten Schlußweise¹⁸⁰⁾ mannigfaltige Berührungspunkte haben, daneben aber auch eine Reihe neuer Hilfsmittel einführen, zu dem fundamentalen Satze, daß die *Neumannschen* und die *Robinschen* Reihen gleichmäßig konvergieren, sofern die Funktion $f(s)$ nebst ihren Ableitungen bis zu einer gewissen endlichen Ordnung stetig ist.¹⁸¹⁾

178) *Poincaré* betrachtet übrigens ausschließlich den (schwierigeren) Fall des Raumes.

179) Ob die Voraussetzung, T gehöre der Klasse B an, zur Durchführung aller von *Poincaré* angedeuteten Überlegungen genügt, erscheint nicht ganz sicher.

180) Vgl. *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 1, p. 223—269. Siehe auch II A 7 c Nr. 10.

181) *Poincaré* nimmt der Einfachheit halber die Existenz und Stetigkeit der Ableitungen aller Ordnungen an. Eine wesentliche Rolle spielen bei *Poincaré* die beiden folgenden Sätze:

1. Ist V das Potential einer beliebigen auf S ausgebreiteten einfachen Belegung, so ist

$$(4) \quad M_1 \leq \frac{D_T(V)}{D_{T_\alpha}(V)} \leq M_2 \quad (M_1, M_2 \text{ konstant}).$$

Ist die Masse der Belegung gleich 0, so ist $M_1 > 0$, sonst gilt $M_1 = 0$.

2. Ist W das Potential einer auf S ausgebreiteten Doppelbelegung, die so beschaffen ist, daß $D_T(W)$ und $D_{T_\alpha}(W)$ existieren, so ist

$$(5) \quad 0 < M_3 \leq \frac{D_T(W)}{D_{T_\alpha}(W)} \leq M_4 \quad (M_3, M_4 \text{ konstant}).$$

In dem VI. Kapitel seiner Abhandlung führt *Poincaré* die „Fundamentalfunktionen“ ein, d. h. Potentiale einfacher Belegungen, die für eine bestimmte, abzählbar unendliche Menge reeller Werte von λ Beziehungen genügen, die man erhält, wenn man in (2) die Funktion $f(s)$ gleich Null setzt. Sodann werden Reihenentwicklungen willkürlicher Funktionen nach den „Fundamentalfunktionen“ betrachtet.¹⁸²⁾

c) *Weiterführung der Poincaréschen Methoden.*¹⁸³⁾ Die im vorstehenden besprochene Arbeit von *Poincaré* ist der Ausgangspunkt einer langen Reihe von Untersuchungen anderer Forscher geworden. Als erste haben *E. Le Roy*¹⁸⁴⁾, *W. Stekloff*¹⁸⁵⁾ und *A. Korn*¹⁸⁶⁾ die *Poincaréschen* Ideen weiter entwickelt. Unter der Annahme, das räumliche einfach zusammenhängende Gebiet T sei in bezug auf wenigstens einen seiner Punkte konvex¹⁸⁷⁾, d. h. jeder durch diesen Punkt ge-

Bei dem Beweise der Ungleichheiten (5) nimmt *Poincaré* an, daß die Existenz der Lösung des ersten Randwertproblems bereits feststeht. Diese Voraussetzung liegt somit auch seinen Ergebnissen über die *Neumannschen* Reihen zugrunde. Bei der Betrachtung der *Robinschen* Reihen kann man demgegenüber Annahmen dieser Art entbehren.

182) Dieser Teil der *Poincaréschen* Abhandlung enthält keinerlei strenge Beweise, begnügt sich vielmehr mit einer allgemeinen Übersicht über die zu erwartenden Gesetzmäßigkeiten.

183) Vgl. das Referat II A 7 b von *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer* Nr. 27, Fußnoten 175) bis 178).

184) *E. Le Roy*, Ann. de l'Éc. Norm. (3) 15 (1898), p. 9—178. Vgl. p. 285.

185) Vgl. *W. Stekloff*, C. R. 125 (1897), p. 1026—1029, woselbst noch konvexe Flächen betrachtet werden, sowie namentlich C. R. 128 (1899), p. 588—591 und p. 808—810. Hier werden Flächen der Klasse B' betrachtet; die *Poincarésche* Beziehung (4) (Fußnote 181) wird postuliert, worauf ohne weitere Einschränkungen mit Hilfe des *Robinschen* Verfahrens die Existenz der natürlichen Belegung sowie der *Poincaréschen* Fundamentalfunktionen bewiesen und das zweite Randwertproblem gelöst wird. In der Note C. R. 130 (1900), p. 396—399 (s. hierzu auch C. R. 130 (1900), p. 480—483) beweist *Stekloff* für räumliche Gebiete der gleichen Natur die Gültigkeit der *Neumannschen* Reihen, sofern die Randfunktion gewissen Stetigkeitsbedingungen genügt. Das erste Randwertproblem wird darauf für schlechthin stetige Randwerte erledigt. Man vergleiche schließlich *A. Stekloff*, C. R. 130 (1900), p. 826—827; p. 1599—1601 und C. R. 131 (1900), p. 870—873; p. 1182—1185 sowie *A. Korn*, C. R. 130 (1900), p. 557; p. 1238—1240 und C. R. 131 (1900), p. 26—27. Ausführliche vervollkommnete Darstellung seiner Untersuchungen gibt *Stekloff* in den Arbeiten Ann. de l'Éc. Norm. (3) 19 (1902), p. 191—259; p. 455—490 sowie Ann. de Toulouse (2) 2 (1900), p. 207—272; (2) 6 (1904), p. 351—475.

186) *A. Korn*, Potentialtheorie 1 und 2 passim, in vervollkommneter Form loc. cit. 55) c) Abh. 1. Siehe ferner *A. Korn*, Math. Ann. 53 (1900), p. 593—608 sowie *C. Neumann*, Math. Ann. 54 (1901), p. 1—48.

187) In der schlichten Ebene sogar für ein beliebiges beschränktes einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B .

zogene Halbstrahl S in einem und nur einem Punkte treffe, beweist Korn nach Poincaré die Konvergenz der Neumannschen und der Robin'schen Reihen, ohne die Existenz der Lösung vorauszusetzen. Dies gelingt dadurch, daß das Neumannsche Problem auf das Robin'sche zurückgeführt wird. Eine Poincarésche Transformation wird explizite angeben.

Von der Funktion $f(s)$ wird lediglich vorausgesetzt, daß sie abteilungsweise stetig ist. Damit sind auch das erste und das zweite Randwertproblem für einfach zusammenhängende, in bezug auf einen Punkt konvexe Gebiete erledigt.¹⁸⁸⁾ Durch kombinatorische Methoden (Nr. 24a) gelangt sodann Korn auch im Raume zu der Lösung der beiden Randwertprobleme für beliebige Gebiete der Klasse B .

Den ersten vollständigen Beweis für die Gültigkeit der Methode des arithmetischen Mittels hat unter Zugrundelegung beliebiger Gebiete der Klasse B in \mathfrak{E} oder im Raume für beliebige abteilungsweise stetige Randwerte S. Zaremba gegeben.¹⁸⁹⁾

Wesentlich ist bei Zaremba die Betrachtung verallgemeinerter Potentiale einfacher und doppelter Belegungen (Nr. 6), für die zugleich Sätze gewonnen werden, die denjenigen der Neumann-Poincaréschen und Robin-Poincaréschen Theorie ganz analog sind. Sie leisten in der Theorie der Differentialgleichung $\Delta u - k^2 u = 0$ dasselbe, wie jene in der Theorie der Differentialgleichung $\Delta u = 0$. Im übrigen lehnt sich der Beweis an die klassische Schlußweise der Poincaréschen Palermo-Arbeit an.¹⁹⁰⁾ Neben dem Konvergenzbeweis der eigentlichen und verallgemeinerten Neumann-Robin'schen Reihen liefern die Zaremba'schen Untersuchungen einen Existenzbeweis der Poincaréschen Fundamentalfunktionen.¹⁹¹⁾

188) Loc. cit. 55) c) Abh. 2 gibt Korn einen Beweis der Gültigkeit der Neumannschen Methode für einfach oder mehrfach zusammenhängende Gebiete der Klasse M (ohne Spitzen). Die Randfunktion $f(s)$ hat hierbei gewissen besonderen Bedingungen zu genügen. Über die Auflösung des ersten und des zweiten Randwertproblems, wenn T über \mathfrak{E}_m ausgebreitet ist, vergleiche im Anschluß hieran bei A. Korn, C. R. 135 (1902), p. 94—95 sowie p. 231—232.

189) Eine erste Mitteilung findet sich im Bulletin de l'Ac. d. Sc. de Cracovie 1901, p. 171—189; vollständig durchgeführt ist die Methode für den Fall des Raumes in der Abhandlung Journ. de Math. (5) 8 (1902), p. 59—177. Man vgl. ferner S. Zaremba, Ann. de l'Éc. Norm. (3) 16 (1899), p. 427—464; (3) 20 (1903), p. 9—26 sowie loc. cit. 195). Siehe auch A. Korn, loc. cit. 55) c) 5 Abh.

190) H. Poincaré, Rend. del Circolo Mat. di Palermo 8 (1894), p. 57—156. Vgl. ferner den Artikel II A 7 c von A. Sommerfeld Nr. 10.

191) Entscheidend für den Erfolg ist der folgende Hilfsatz von Zaremba. Es seien $H_\nu(s)$ ($\nu = 1, 2, \dots$) gegebene auf S erklärte abteilungsweise stetige Funk-

Einen auf den *Zarembaschen* Hilfssatz (vgl. die Fußnote ¹⁹¹) und die *Poincarésche* Schlußweise gestützten vollständigen Beweis der Gültigkeit der *Neumann-Robinschen* Methode hat ¹⁹²) *A. Korn* geliefert. ¹⁹³) In einer späteren Abhandlung ¹⁹⁴) gibt *Korn* einen anderen von dem *Zarembaschen* Hilfssätze unabhängigen, sich wie alle diese Untersuchungen an die *Poincarésche* Palermo-Arbeit anlehrende Beweisführung.

Von besonderer Wichtigkeit ist eine 1904 erschienene Abhandlung von *Zaremba*. ¹⁹⁵) In dieser wird der Betrachtung ein beliebiges beschränktes Gebiet der Klasse M (ohne Spitzen) in \mathbb{C} zugrunde gelegt. Es sei θ irgendein von zwei Nachbarseiten von S eingeschlossener Winkel, $0 < \theta < 2\pi$. Im Gegensatz zu *Korn* ¹⁹⁶) werden über die Randfunktion keine wesentlich einschränkenden Annahmen gemacht; sie wird einfach abteilungsweise stetig vorausgesetzt. ¹⁹⁷) Auch jetzt geht *Zaremba* von den verallgemeinerten Potentialen aus und beweist außer der Gültigkeit der eigentlichen und verallgemeinerten *Neumannschen* und *Robinschen* Reihen, unter anderem, daß für alle Werte des Parameters λ , so daß

$$|\lambda| < R = \text{Min} \frac{\pi}{|\pi - \theta|}$$

ist, die Lösungen des *Neumann-Poincaréschen* und *Robin-Poincaréschen* Problems meromorphe Funktionen von λ darstellen. ¹⁹⁸) ¹⁹⁹)

tionen und $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ reelle Konstanten. Wir setzen (im Raume) $V_r = \int_S H_r(t) \frac{dt}{r_t}$,

$V = \sum_r^{1 \dots p} \alpha_r H_r$. Bei hinreichend großem p kann man es durch geeignete Wahl der Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ erreichen, daß

$$\frac{1}{1 + L_p} \leq \frac{D_T(V)}{D_{T\alpha}(V)} \leq 1 + L_p, \quad L_p = \frac{c^2}{\sqrt{(p-1)^2}}$$

wird, unter c^2 einen nur von S abhängigen Wert verstanden.

¹⁹²) Noch vor dem Erscheinen der unter ¹⁸⁹) zitierten ausführlicheren Arbeiten von *Zaremba*.

¹⁹³) loc. cit. 55) c) 5. Abh. Diese Arbeit enthält auch gewisse Entwicklungssätze nach *Poincaréschen* Fundamentalfunktionen.

¹⁹⁴) loc. cit. 55) g).

¹⁹⁵) Journ. d. Math. (5) 10 (1904), p. 395—444; vorläufige Mitteilung, C. R. 137 (1903), p. 39—40.

¹⁹⁶) Vgl. die Fußnote ¹⁸⁸).

¹⁹⁷) Auch gewisse weitere Unstetigkeiten werden zugelassen. Die einzelnen Seiten der Randlinie nimmt übrigens *Zaremba* von der Klasse B' an.

¹⁹⁸) Einen übersichtlichen Beweis der *Zarembaschen* Resultate gibt *T. Carleman*, Über das *Neumann-Poincarésche* Problem für ein Gebiet mit Ecken, Inaug.-Diss. Upsala 1916, p. 8—16. A. a. O. [p. 31—39] werden auch Gebiete im Raume betrachtet (vgl. die Fußnote ²⁹⁶).

Durch ein mit dem *Zarembaschen* verwandtes Verfahren wird von *R. Bär*

Eine weitere von der *Fredholmschen* Methode unabhängige Behandlungsweise des *Neumannschen* und des *Robinschen* Problems hat *E. R. Neumann* geliefert.²⁰⁰⁾ *E. R. Neumann* legt seinen Untersuchungen in der an der drittletzten Stelle zitierten ausführlichen Arbeit Gebiete der Klasse *B* (im Raume) zugrunde und führt als neues Hilfsmittel die mit den *Greenschen* Funktionen (Nr. 20) nahe zusammenhängenden „Polarfunktionen“ ein. Insbesondere wird so die Existenz des Potentials der natürlichen Belegung (Nr. 17d) erschlossen. Daß dieses sich als Potential einer einfachen Belegung darstellen läßt, wird, wie früher von *W. Stekloff* (loc. cit. 185), unter Zuhilfenahme des „*Poincaréschen* Prinzips“ bewiesen.²⁰¹⁾ In den „Beiträgen“ wird später die Existenz der natürlichen Belegung in der Ebene ohne dieses Hilfsmittel dargetan.

d) *Zurückführung auf eine lineare Integralgleichung.* Es sei *T* ein beschränktes Gebiet der Klasse *B* in \mathbb{C} . Aus den Formeln der Nr. 6 und 7 folgt nach *J. Fredholm*

die am Rande verschwindende *Greensche* Funktion $G(\xi, \eta; x, y)$ (Nr. 20) für Gebiete der Klasse *M* (ohne Spitzen) gewonnen. (*R. Bär*, Über *Greensche* Randwertaufgaben bei der Schwingungsgleichung, Inaug.-Diss., Würzburg 1915, p. 1 bis 37 [p. 1—8].) Für die *Greensche* Funktion der Differentialgleichung $\Delta u - k^2 u = 0$ wird unter Zuhilfenahme des verallgemeinerten Potentials einer Doppelbelegung eine zu (1) Nr. 17d analoge Integralgleichung aufgestellt, die sich für hinreichend große k^2 durch sukzessive Approximationen auflösen läßt. Zur Bestimmung von $G(\xi, \eta; x, y)$ erhält man sodann eine der *Fredholmschen* Theorie zugängliche Integralgleichung. In ähnlicher Weise lassen sich sowohl die zu der zweiten und der dritten Randwertaufgabe (Nr. 21 und 28) gehörigen *Greenschen* Funktionen bestimmen [p. 18—21], als auch alle drei vorhin erwähnten Randwertprobleme selbst erledigen. A. a. O. [p. 21—25] werden einige weitere Randwertaufgaben betrachtet (Nr. 29).

Man vergleiche ferner *O. D. Kellogg*, loc. cit. 146, p. 451—456.

199) Die zugehörige Integralgleichung (Nr. 17d) ist im allgemeinen eine Integralgleichung mit singulärem Kerne. Siehe *J. Blumenfeld* und *W. Mayer*, Wiener Berichte 123 (1914), p. 2011—2047 [p. 2045—2047], wo eins der beiden von einer Lemniskate mit Doppelpunkt und aufeinander senkrechten Ästen begrenzten beschränkten Gebiete betrachtet wird. Man vergleiche ferner *T. Carleman*, Über das *Neumann-Poincarésche* Problem für ein Gebiet mit Ecken-Inaug. Diss. Upsala 1916, passim. *Carleman* betrachtet beliebige Gebiete der Klasse *M* (ohne Spitzen) und gibt, gestützt auf die Theorie der singulären Integralgleichungen, zum ersten Male eine Behandlung des *Neumann-Poincaréschen* Problems für alle Werte des Parameters λ .

200) *E. R. Neumann*, Mat. Ann. 55 (1901), p. 1—52 sowie 56 (1903), p. 49 bis 113; kurze Mitteilungen: Gött. Nachr. 1899, p. 291—201 sowie 1902, p. 242—258; ausführliche Darlegung und Weiterführung: Studien, passim; Beiträge p. 1 bis 42 sowie p. 155—188.

201) *E. R. Neumann* bezeichnet so den in der Fußnote 181) unter 1. genannten Satz für den Fall, daß die Gesamtmasse der Belegung verschwindet.

$$(1) \quad \begin{aligned} \nu(s) + \frac{\lambda}{\pi} \int_S \nu(t) \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\log \frac{1}{r_{st}} \right) dt &= f(s), \\ \mu(s) + \frac{\lambda}{\pi} \int_S \mu(t) \frac{\partial}{\partial n_s} \left(\log \frac{1}{r_{st}} \right) dt &= f(s). \end{aligned} \quad 202)$$

Ganz analoge Formeln gelten im Raume.²⁰³⁾ Das *Neumann-Poincaré*-sche sowie das *Robin-Poincaré*-sche Problem einerseits, die Auflösung der beiden zueinander adjungierten Integralgleichungen (1) andererseits sind zwei völlig äquivalente Probleme.

Der Kern $\frac{1}{2\pi} \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\frac{1}{r_{st}} \right)$ ist „symmetrisierbar“, der Kern $\frac{1}{\pi} \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\log \frac{1}{r_{st}} \right)$ ist mit einem solchen nahe verwandt.²⁰⁴⁾ ²⁰⁵⁾

202) *J. Fredholm*, loc. cit. 174). Man vergleiche ferner *J. Plemelj*, loc. cit. 175), namentlich, Untersuchungen, pássim sowie *O. D. Kellogg*, Trans. of the Amer. Math. Soc. 9 (1908), p. 51—66 (*Kellogg* betrachtet übrigen Gebiete der Klasse *Ah* (in \mathfrak{E}), *Plemelj* diejenigen der Klasse *B*). Eine kurze Darstellung findet sich bei *J. Horn*, Partielle Differentialgleichungen, p. 304—312 und *É. Goursat*, Cours 3, p. 507—518.

203) Der Kern $\frac{1}{\pi} \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\log \frac{1}{r_{st}} \right)$ ist stetig. Im Raume wird der entsprechende Kern $\frac{1}{2\pi} \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\frac{1}{r_{st}} \right)$ für $s = t$ wie $\frac{1}{r_{st}}$ unendlich. Der zweite iterierte Kern ist auch hier stetig. Die Integralgleichungen des Problems sind in der Ebene und im Raume der *Fredholm*-schen Methode zugänglich (übrigens auch wenn *T* der Klasse *Ah* angehört).

204) Die wesentliche Symmetrieeigenschaft findet sich beispielsweise bei *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 27.

205) Vgl. *J. Blumenfeld* und *W. Mayer*, Wiener Ber. 123 (1914), p. 2011 bis 2047. Die von *J. Marty* (C. R. 150 (1910), p. 515—518; 603—606; 1031—1033; 1499—1502) nach dem Vorbild der *E. Schmidt*-schen Theorie der Integralgleichungen mit symmetrischem Kerne durchgeführte Theorie der Integralgleichungen mit symmetrisierbarem Kerne liefert, wie die Verfasser zeigen, sinngemäß durchgebildet, sowohl im Raume, als auch in der Ebene die Existenz der singulären Werte des Parameters λ und der Nulllösungen der Gleichungen (1). Die zugehörigen Potentiale einer einfachen Belegung sind die *Poincaré*-schen Fundamentalfunktionen. Man gewinnt gleichzeitig unter anderem gewisse, von *Poincaré* postulierte Entwicklungssätze (Nr. 17 b).

Ein ähnliches Verfahren hat *A. Korn*, Rend. del. Circ. Mat. di Palermo 35 (1913), p. 317—323 angegeben. *Korn* ordnet die vorliegenden Integralgleichungen einer Klasse der Integralgleichungen mit „pseudosymmetrischem Kerne“ zu, deren Theorie er in Anschluß an die Methoden der *Poincaré*-schen Palermo-Arbeit (II A 7 c Nr. 10) entwickelt hatte (C. R. 153 (1911), p. 171—173; 327—328; 539—541; 156 (1913), p. 1965—1967; Tôhoku math. Journ. 1 (1912), p. 159—186; 2 (1912), p. 117—136; Archiv d. Math. u. Phys. 25 (1916), p. 148—172; 27 (1918), p. 97—120). Man gewinnt wieder die Existenz der Eigenwerte und der *Poincaré*-schen Fundamentalfunktionen sowie gewisse Entwicklungssätze. Wie bereits in der Nr. 17 c

Nach *J. Plemelj* läßt sich die Gültigkeit der *Neumannschen* und der *Robinschen* Reihen aus der *Fredholmschen* Theorie fast unmittelbar ableiten.²⁰⁶⁾ Ein außerordentlicher Vorteil dieses Verfahrens ist darin zu erblicken, daß Konvergenzbetrachtungen sich nunmehr fast völlig vermeiden lassen.²⁰⁷⁾ Die Lösungen der beiden Integralgleichungen (1) lassen sich in einfacher Weise aufeinander zurückführen.²⁰⁸⁾ Die singulären Parameterwerte sind sämtlich reell und dem absoluten Betrage nach ≥ 1 . Sie sind einfache Pole des lösenden Kernes $H(s, t)$.²⁰⁹⁾

Der dem absoluten Betrage nach kleinste singuläre Wert ist $\lambda = -1$. Der Wert $\lambda = 1$ ist nicht singulär, wenn, wie vorausgesetzt werden soll, T einfach zusammenhängend ist. In der Umgebung des Wertes $\lambda = -1$ kann in der Ebene

$$(2) \quad H(s, t) = \frac{m(s)}{1 + \lambda} + \mathfrak{H}(s, t), \quad (\mathfrak{H}(s, t) \text{ regulär}), \quad \int_S m(t) dt = 1$$

gesetzt werden.²¹⁰⁾ Das Potential

$$\Gamma(x, y) = \int_S m(t) \log \frac{1}{r_t} dt$$

erwähnt, sind zum Teil beträchtlich früher, unabhängig von der allgemeinen Theorie der linearen Integralgleichungen, gewisse Existenz- und Entwicklungssätze von *W. Stekloff*, *A. Korn*, *S. Zaremba* und *E. R. Neumann* abgeleitet worden. Eine Theorie der symmetrisierbaren Integralgleichungen unter besonderer Berücksichtigung der Integralgleichungen (1) gibt neuerdings *T. Carleman*, loc. cit. 198) p. 147—166. Man vergleiche die dieser umfangreichen Arbeit gewidmeten Ausführungen der Fußnoten 198) und 199).

206) *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 46—68. Eine erste Darstellung hat *Plemelj* bereits in der unter 55) zitierten Arbeit gegeben. In der neuen Darstellung vertritt *Plemelj* mit vollem Erfolge den Standpunkt, daß es zur Durchführung der Methode, insbesondere zur Aufstellung der Integralgleichungen (1) und zum Nachweise der Äquivalenz des Ausgangsproblems mit der sich nunmehr ergebenden Aufgabe nur ganz elementarer Hilfsmittel der Potentialtheorie bedarf. Von den in den Nr. 6 und 7 angegebenen Hilfsmitteln werden nur die wenigsten gebraucht.

207) In allen Einzelheiten sind die fraglichen Entwicklungen von *Plemelj* an dem am Anfang der Fußnote 206) bezeichneten Ort für den zweidimensionalen Fall angegeben worden. Sie lassen sich auch in dem Falle des Raumes vollständig durchführen. Vgl. *J. Plemelj*, loc. cit. 55. Siehe auch Fußnote 214).

208) *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 48—50; *J. Blumenfeld* und *W. Mayer*, loc. cit. 205) passim. Über den Zusammenhang der *Neumannschen* und der *Robinschen* Methode siehe ferner die Nr. 17c besprochenen Arbeiten von *W. Stekloff*, *A. Korn*, *S. Zaremba* und *E. R. Neumann*.

209) *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 52—53. Man vergleiche ferner *T. Carleman*, loc. cit. 198) p. 26. Dort werden Gebiete der Klasse M (ohne Spitzen) betrachtet.

210) Wir betrachten im folgenden ausführlicher nur den zweidimensionalen Fall.

nimmt auf S einen konstanten Wert an. Seine Masse ist wegen (2) gleich 1; $\Gamma(x, y)$ stellt augenscheinlich die Lösung eines fundamentalen Problems der Elektrostatik dar.²¹¹⁾

Die „natürliche Belegung“ $m(s)$ ist die (einzige) der Beziehung (2) gemäß normierte Lösung der Integralgleichung

$$(3) \quad m(s) = \frac{1}{\pi} \int_S m(t) \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\log \frac{1}{r_{st}} \right) dt. \quad 212)$$

Setzt man

$$(4) \quad \begin{aligned} h_0(s, t) &= \frac{1}{\pi} \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\log \frac{1}{r_{st}} \right), \quad h_{k+1}(s, t) = \int_S h_k(s, \theta) h_0(\theta, t) d\theta, \\ f_0(s) &= f(s), \quad f_k(s) = \int_S f_{k-1}(t) h_0(t, s) dt, \end{aligned}$$

so ist in jedem Bereiche $|\lambda| \leq \bar{\lambda} < 1$ gewiß

$$(5) \quad H(s, t) = \sum_k^{0 \dots \infty} (-1)^k \lambda^k h_k(s, t).$$

Aus (2) und (5) folgt für alle λ in einem Kreisgebiete um den Koordinatenursprung vom Radius > 1

$$(6) \quad \mathfrak{H}(s, t) = \sum_k^{0 \dots \infty} (-1)^k \lambda^k [h_k(s, t) - m(s)],$$

mithin

$$(7) \quad m(s) = \lim_{k \rightarrow \infty} h_k(s, t). \quad 213)$$

211) Das analoge Potential im Raume löst das Problem der elektrischen Verteilung eines isolierten leitenden Körpers. Neuere von der *Fredholmschen* Theorie unabhängige Behandlung dieses Problems findet sich bei *A. Liapounoff*, loc. cit. 54) a); *A. Korn*, Potentialtheorie, passim; *F. R. Neumann*, Studien, passim. Vgl. ferner *E. R. Neumann*, Beiträge, p. 155—188, wo natürliche Belegungen in der Ebene betrachtet werden.

Den Zusammenhang der „natürlichen Belegung“ $m(s)$ mit der *Greenschen* Funktion (Nr. 20) vgl. etwa bei *A. Korn*, Potentialtheorie 2, p. 285—297. Dort findet sich im Anschluß an *C. Neumann* ein Beweis, daß $m(s) > 0$ ist.

212) Auch im Raume ist nach *A. Korn*, Münch. Ber. 31 (1901), p. 425—434, $m(s) > 0$.

213) Legt man der Betrachtung ein System von n getrennt liegenden einfach zusammenhängenden Gebieten der Klasse B zugrunde, so gibt es n linear unabhängige Lösungen $m^{(1)}(s), \dots, m^{(n)}(s)$ von (3). Sie sind die „natürlichen Belegungen“. Das Potential $\Gamma_k(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_S m^{(k)}(t) \log \frac{1}{r_t} dt$, unter S die Gesamtheit der Randkurven $S_k (k = 1, \dots, n)$ verstanden, hat auf einer jeden Randkurve einen konstanten Wert. Es ist ferner $\int_{S_k} m^{(k)}(t) dt = 1, \int_{S_j} m^{(k)}(t) dt = 0 (j \neq k)$.

(*J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 56—57.) Ebenso erledigt sich der allgemeinere
Encyklop. d. math. Wissensch. II 3.

Durch sehr einfache, der soeben skizzierten analoge Überlegungen werden nunmehr die *Neumannschen* und *Robinschen* Reihen abgeleitet. Im Raume erfordert der Umstand, daß der Kern $\frac{1}{2\pi} \frac{\partial}{\partial n_i} \left(\frac{1}{r_{st}} \right)$ für $s = t$ unendlich wird, einige ergänzende Betrachtungen.²¹⁴⁾

Es liege ein System von n einfach zusammenhängenden beschränkten Gebieten der Klasse B vor. Ohne jegliche Schwierigkeit ergibt sich auf diesem Wege die Lösung der beiden Aufgaben:

1. Es ist ein Leiterpotential V im Außengebiete zu bestimmen, das auf jeder Randkurve eine vorgegebene Masse hat.

2. Es ist ein Leiterpotential im Außengebiete zu bestimmen, das eine gegebene Gesamtmasse und auf jeder Randkurve einen vorgegebenen konstanten Wert hat.²¹⁵⁾

Durch die vorstehenden Betrachtungen ist insbesondere das erste und das zweite Randproblem für beschränkte und nicht beschränkte Gebiete der Klasse B (Ah) in \mathfrak{E} oder im Raume unter Zugrundelegung abteilungsweise stetiger (allgemeiner beschränkter und im Lebesgueschen Sinne integrierbarer) Randwerte oder Werte der Normalableitung erledigt.²¹⁶⁾

18. Verhalten der Lösung des ersten Randwertproblems am Rande des Definitionsgebietes. Es sei T ein beschränktes Gebiet der

Fall, wenn wenigstens ein Gebiet des Systems mehrfach zusammenhängend ist. Alsdann ist auch der Wert $\lambda = 1$ singular. Vgl. *J. Plemelj*, loc. cit. 55) p. 383 bis 389, wo der dreidimensionale Fall betrachtet wird.

214) Vgl. *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 66—67, wo in bekannter Weise die Anwendbarkeit der *Fredholmschen* Methode gezeigt wird. Daß man auch im Raume, wie in der Ebene, auf die *Neumannschen* und *Robinschen* Reihen geführt wird, bedarf darüber hinaus eines Nachweises, der sich jedoch ohne Schwierigkeit führen läßt.

215) *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 63—65 sowie loc. cit. 55), p. 389—392, wo analoge Probleme im Raume betrachtet werden. Man vergleiche hierzu die von der *Fredholmschen* Theorie unabhängige Behandlung bei *S. Zaremba*, Bull. de l'Acad. de Sc. de Cracovie 1902 sowie die in der Nr. 17c wiederholt genannten Arbeiten von *A. Liapounoff*, *W. Stekloff*, *A. Korn*, *S. Zaremba* und *E. R. Neumann*. Einen vollständigen Existenzbeweis der Lösung des allgemeinen elektrostatischen Problems im Raume gibt *J. Plemelj*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 18 (1907), p. 180—211 [p. 188—193]; dort p. 194—199 findet sich auch die Lösung des Problems der stationären elektrischen Strömung. Allgemeine Betrachtungen über die mathematischen Probleme der Elektrostatik, der Theorie des Magnetismus und der Elektrodynamik finden sich nebst zahlreichen Beispielen bei *H. Weber*, Part. Diff. d. Math. Phys. 1, p. 319—527. Man vergleiche ferner die beiden Artikel V 15 und V 17, passim.

216) Vgl. etwa *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 66. Auch gewisse nicht beschränkte Randfunktionen können zugelassen werden. Vgl. z. B. *J. Plemelj*, loc. cit. 55) p. 374.

Klasse B in \mathfrak{E} . Aus den Formeln und Resultaten der Nr. 7 und 17 ergeben sich wichtige Sätze über das Verhalten der Lösung des ersten Randwertproblems und ihrer Ableitungen am Rande. Untersuchungen dieser Art sind zuerst von *C. Neumann* in Angriff genommen worden.²¹⁷⁾ Sie sind später namentlich von *A. Liapounoff*²¹⁸⁾ und *A. Korn*²¹⁹⁾ gefördert worden.

1. Ist $f(s)$ stetig und ist ferner

$$|f(s) - f(t)| < Ar_{st}^\lambda, \quad 0 < \lambda < 1 \quad (A \text{ konstant}),$$

so ist in $T + S$

$$|u(x_1, y_1) - u(x_2, y_2)| < c_1(\lambda) A d_{12}^\lambda, \quad d_{12}^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2. \quad 220)$$

2. Sind $f(s)$ und $\frac{df}{ds} = f'(s)$ stetig und ist überdies

$$|f'(s) - f'(t)| < Br_{st}^\lambda, \quad 0 < \lambda < 1 \quad (B \text{ konstant}),$$

so sind $D_1 u$ in $T + S$ stetig und genügen der Beziehung

$$|D_1 u(x_1, y_1) - D_1 u(x_2, y_2)| < c_2(\lambda) B d_{12}^\lambda. \quad 221) \quad 222)$$

3. Es sei jetzt T ein Gebiet der Klasse Bh . Der Höldersche Exponent von S heiße λ . Sind $f(s)$, $f'(s)$ und $\frac{d^2 f}{ds^2} = f''(s)$ stetig und ist

$$|f''(s) - f''(t)| < Cr_{st}^\lambda,$$

so sind $D_2 u$ in $T + S$ stetig und genügen der Beziehung

217) Vgl. *C. Neumann*, Abhandlungen [2. Abh., passim].

218) *A. Liapounoff*, loc. cit. 54) a).

219) *A. Korn*, Potentialtheorie, passim; *Math. Ann.* 53 (1900), p. 593—608 sowie loc. cit. 55) d), p. 15—20; f), p. 23—26. Vergleiche ferner *S. Zaremba*, *Bulletin de l'Ac. d. Sc. de Cracovie* 1905, p. 69—168; 1910, p. 313—344; *A. Hobborski*, loc. cit. 65).

220) *A. Korn*, loc. cit. 55) f), p. 23—25. Dieser Satz gilt übrigens auch bei beschränkten Gebieten der Klasse Ah (vom Exponenten λ).

221) *A. Korn*, loc. cit. 55) f), p. 25. Damit, wenn $f(s)$ stetig vorausgesetzt wird, $\frac{\partial u(s)}{\partial n}$ existiere und sich auf S stetig verhalte, ist notwendig und hinreichend, daß $\int_S f(t) \frac{\partial}{\partial n_t} \left(\log \frac{1}{r_{st}} \right) dt$ auf S stetige Normalableitung hat. Vgl.

A. Liapounoff, loc. cit. 54) a), p. 284—293 sowie p. 299. *Liapounoff* betrachtet übrigens den analogen Satz im Raume.

222) *O. D. Kellogg* betrachtet loc. cit. 202) Gebiete der Klasse Ah und beweist den Satz: Sind $f(s)$ und $f'(s)$ stetig und konvergiert der Ausdruck

$$\lim_{\eta=0} \int_{-\eta}^{\eta} \left| \frac{f'(s+t) - f'(s-t)}{t} \right| dt \text{ für } \eta=0 \text{ gleichmäßig gegen Null, so sind } D_1 u$$

in $T + S$ vorhanden und stetig. (Man vergleiche hierzu *O. D. Kellogg*, loc. cit. 224).)

$$|D_2 u(x_1, y_1) - D_2 u(x_2, y_2)| < c_3(\lambda) C d_{12}^\lambda. \text{ }^{223}$$

Analoge Sätze gelten für partielle Ableitungen höherer Ordnung²²⁴, zweidimensionale Gebiete auf \mathfrak{E}_m und im Raume.

Unter Zuhilfenahme der konformen Abbildung (Nr. 22) lassen sich die in der Nr. 13 für das Kreisgebiet angegebenen Sätze auf beliebige Gebiete der Klasse B oder Bh (in \mathfrak{E}) ausdehnen. Insbesondere gilt der *Schwarzsche* Hilfssatz (Nr. 13) für alle einfach zusammenhängenden Gebiete der Klasse B (in \mathfrak{E}).²²⁵

Besteht (in der Ebene) ein Stück der Begrenzung aus einem Bogen Σ einer analytischen und regulären Kurve und ist auf diesem $f(s)$ analytisch und regulär, so läßt sich nach *H. A. Schwarz* u über Σ hinaus analytisch fortsetzen.²²⁶ Ist insbesondere Σ ein Kreisbogen und u auf Σ gleich 0, so entsprechen den in bezug auf Σ konjugierten Punkten entgegengesetzt gleiche Werte von u . Analytisch fortsetzbar ist u natürlich auch, wenn $\frac{\partial u(s)}{\partial n}$ auf Σ analytisch und regulär ist. Ist Σ ein Kreisbogen und $\frac{\partial u(s)}{\partial n} = 0$, so nimmt u in den konjugierten Punkten gleiche Werte an.

Analoge Sätze gelten im Raume.

19. Lösung des ersten Randwertproblems als Potential einer einfachen Belegung. Sei T ein beschränktes einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} . Die im vorstehenden besprochenen Methoden liefern die zu einer vorgegebenen Randfunktion $f(s)$ gehörigen Lösungen des ersten Randwertproblems in dem Innen- und dem Außengebiet in der Form

$$\int_S f(t) P_1(x, y; t) dt \quad \text{und} \quad \int_S f(t) P_2(x, y; t) dt,$$

223) *A. Korn*, loc. cit. 55) f), p. 25.

224) Vgl. *O. D. Kellogg*, Trans. of the Amer. Math. Soc. 13 (1912), p. 109—123; dort werden überdies die in den Fußnoten 74) und 222) angegebenen Sätze verallgemeinert. Man vergleiche hierzu die älteren Ergebnisse von *P. Painlevé*, C. R. 112 (1891), p. 653—657.

225) Der Beweis kann (in der Ebene) auch ohne konforme Abbildung geführt werden (vgl. Nr. 24 a Fußnote 282)). Im Raume ist das Analogon des *Schwarzschen* Hilfssatzes von *A. Korn* unter Zuhilfenahme der *Neumannschen* Reihe für alle in bezug auf einen Punkt konvexen Gebiete der Klasse B (Potentialtheorie, 1; loc. cit. 55) c) Abh. I) abgeleitet worden. Der *Kornsche* Beweis gilt nach Nr. 17 für alle (räumlichen) Gebiete der Klasse B .

226) *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 66—68 sowie p. 149—151. Vgl. ferner *É. Picard*, Traité, 2, p. 298—301. *W. F. Osgood*, Funktionentheorie, p. 665—673 sowie II B 1 Nr. 20.

unter P_1 und P_2 zwei ganz bestimmte, voneinander verschiedene Funktionen verstanden.²²⁷⁾ Untersuchungen von *C. Neumann* machten es wahrscheinlich, daß es möglich sein dürfte, diese Lösungen unter Zuhilfenahme einer einzigen Funktion von der Form $P(x, y; t)$ zu beherrschen.²²⁸⁾ Wird die Aufgabe so allgemein gefaßt, so läßt sie sich ohne wesentliche Schwierigkeiten lösen.²²⁹⁾ Wird jedoch darüber hinaus verlangt, die Lösung in der Form des Potentials einer einfachen Belegung darzustellen, so liegt die Sache anders.

Die so gestellte Aufgabe ist ohne Einschränkung nicht lösbar; in der Ebene hat in der Tat (Nr. 6) die Randfunktion eine im Sinne von *Lebesgue* quadratisch integrierbare Ableitung, sobald die Belegungsdichte auch nur quadratisch integrierbar ist.²³⁰⁾ ²³¹⁾

Nach *E. R. Neumann* lassen sich die *C. Neumanns*chen Reihen im Raume als Potentiale einer einfachen (übrigens für das Innen- und das Außenproblem derselben) Belegung erst nach Abtrennung der ersten beiden Glieder darstellen.²³²⁾ Ein zum Teil weiter reichendes Resultat gewinnt *J. Plemelj* für den Fall der Ebene durch Ein-

227) Im Raume gelten zwei völlig analoge Formeln; P_1 und P_2 hängen mit den *Green*schen Funktionen des Innen- und des Außengebietes (Nr. 20) eng zusammen.

228) Vgl. *C. Neumann*, Leipz. Ber. 58 (1906), p. 483—559. Näheres über die bezüglichen, zum Teil weit zurückliegenden Untersuchungen von *C. Neumann* findet sich bei *E. R. Neumann*, Rend. del Circ. Mat. di Palermo 24 (1907), p. 333 bis 370 [p. 333—343] sowie, Beiträge, insbesondere p. VII, Fußnote *).

229) Vgl. *J. Plemelj*, Untersuchungen, passim.

230) Die Frage, ob sich die Lösung des ersten Randwertproblems als Potential einer einfachen Belegung darstellen läßt, ist (für räumliche Gebiete) bereits von *A. Liapounoff*, loc. cit. 54) a) erörtert worden.

231) Notwendige und hinreichende Bedingungen dafür, daß sich eine in einem Kreisbereiche stetige, in seinem Innern reguläre Potentialfunktion als Potential einer einfachen Belegung mit quadratisch integrierbarer Dichte darstellen läßt, gibt *É. Picard*, C. R. 148 (1909), p. 1563—1568; Rend. del Circ. Mat. di Palermo 29 (1910), p. 79—97 [p. 93—97] an. Vgl. ferner *L. Lichtenstein*, loc. cit. 61).

232) Vgl. *E. R. Neumann*, a) Rend. del Circ. Mat. di Palermo 24 (1907), p. 333 bis 370. (Die allgemeinen Ergebnisse dieser und einiger seiner anderen Arbeiten wendet *E. R. Neumann* zum Schluß auf den besonderen Fall eines Kugelkörpers an. Für alle in Betracht kommenden Funktionen werden geschlossene Ausdrücke gewonnen); b) Beiträge, passim [insbesondere p. 43—89]. Dort wird p. 117—154 der besondere Fall eines Kreisgebietes, einer Ellipsenfläche und eines Kugelkörpers betrachtet. Von weiteren Ergebnissen dieser umfangreichen Arbeit seien die Beziehungen der „Grundrestbelegungen“ ebener und räumlicher Gebiete, die durch Transformation mittelst reziproker Radien auseinander hervorgehen, hervorgehoben [p. 90—116]. Man vergleiche hierzu auch *C. Neumann*, Leipz. Ber. 62 (1910), p. 87—169 [p. 151—159].

führung der *Stieltjesschen* Integrale (Nr. 6). Es gibt eine nur von S abhängige symmetrische Funktion $Q(s, t)$, so daß, wenn man

$$u(x, y) = \int_S \log \frac{1}{r_t} d\chi(t), \quad \chi(s) = \int_S Q(s, t) df(t)$$

setzt, $u(x, y)$ auf $S^{(k)}$ ($k = 1, \dots, m$), unter $S^{(k)}$ die Komponenten von S verstanden, die Werte $f(s) - N^{(k)}$ ($N^{(k)}$ konstant) annimmt. Damit diese Darstellung möglich sei, muß $f(s)$ gewisse Stetigkeitsbedingungen erfüllen; es genügt z. B. wenn $f(s)$ einer *Hölderschen* Bedingung genügt.^{233) 234) 234*)}

20. Stetig gekrümmte Gebiete. Greensche Funktion. Greensche Formel.²³⁵⁾ Es sei T ein beschränktes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} und (ξ, η) ein Punkt in T . Die Sätze der Nr. 17d gewährleisten die Existenz derjenigen, außer in (ξ, η) (dem Aufpunkte), in $T + S$ stetigen, in T regulären, auf S verschwindenden Potentialfunktion $G(\xi, \eta; x, y)$, die sich in der Umgebung von (ξ, η) wie

$$(1) \log \frac{1}{\rho} + \text{eine reguläre Potentialfunktion, } (\rho^2 = (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2)$$

verhält; $G(\xi, \eta; x, y)$ wird die zu dem ersten Randwertproblem gehörige *Greensche* Funktion, auch *Greensche* Funktion schlechthin²³⁶⁾ genannt.²³⁷⁾

233) Vgl. *J. Plemelj*, Untersuchungen, passim.

234) Daß die Lösung des zweiten Randwertproblems, sofern sie existiert, sich sowohl in dem Innen- als auch in dem Außengebiet als das Potential einer und derselben Doppelbelegung darstellen läßt, ist einleuchtend. Eine Bestimmung der Dichte der Belegung findet sich bei *E. R. Neumann*, Beiträge, p. 43—66.

234*) Man vergleiche im Anschluß an die Ausführungen dieser Nummer die Nr. 29 p. 233 besprochenen Arbeiten von *H. Poincaré* und *R. Bär*.

235) Vgl. den Artikel II A 7 b von *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer* Nr. 18; *S. Zaremba*, Bull. de la Soc. math. de France, 24 (1896), p. 19—24; *É. Goursat*, Cours 3, p. 217—224; p. 270—271.

236) Gelegentlich auch *Riemansche Greensche* Funktion.

237) Gelegentlich wird übrigens $g(\xi, \eta; x, y) = G(\xi, \eta; x, y) - \log \frac{1}{\rho}$ als *Greensche* Funktion bezeichnet.

Handelt es sich insbesondere um die Kreisfläche K vom Halbmesser R um den Koordinatenursprung, so ist

$$G(\xi, \eta; x, y) = \log \frac{\rho' d}{\rho R}, \quad \rho'^2 = (\xi' - x)^2 + (\eta' - y)^2, \quad d^2 = \xi^2 + \eta^2,$$

unter (ξ', η') den zu (ξ, η) in bezug auf C konjugierten Punkt verstanden. Die *Greensche* Funktion des Kugelkörpers vom Halbmesser R um den Koordinatenursprung ist in analoger Bezeichnungsweise $G(\xi, \eta, \zeta; x, y, z) = \frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho'} \frac{R}{d}$. Explizite Darstellung der *Greenschen* Funktion einer Ellipsenfläche und des Außengebietes der Ellipse gibt u. a. *E. R. Neumann* (Beiträge, p. 140—151) an. Weitere daran

Den Sätzen der Nr. 18 zufolge sind $D_1 G$ auf S stetig.²³⁸ Der Greensche Satz (2) Nr. 10, der hier anwendbar ist, liefert die Beziehung

(3) $G(x_1, y_1; x_2, y_2) = G(x_2, y_2; x_1, y_1)$, unter $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ zwei beliebige voneinander verschiedene Punkte in T verstanden.²³⁹ Setzt man für (ξ, η) auf S und alle (x, y) in $T + S \dots G(\xi, \eta; x, y) = 0$, so ist nunmehr G für alle voneinander verschiedenen Punktepaare (ξ, η) und (x, y) in $T + S$ erklärt.²⁴⁰

Es sei (ξ, η) wieder ein Punkt in T . Für alle (x, y) in T ist $G(\xi, \eta; x, y) > 0$. Wesentlich ist ferner die Bemerkung, daß

$$\frac{\partial}{\partial n_t} G(\xi, \eta; t) > 0$$

ist.²⁴¹ Für alle (ξ, η) und (x, y) in $T + S$ ist

$$(4) \quad |G(\xi, \eta; x, y)| < \left| \log \frac{1}{\rho} \right| + A_0 \quad (A_0 \text{ konstant}).^{242}$$

In Gebieten der Klasse Bh ist der Nr. 18 zufolge auch $D_2 G$ auf S stetig.²⁴³

anknüpfende Betrachtungen finden sich bei $G. Wiarda$, Über gewisse Integralgleichungen erster Art, besonders aus dem Gebiete der Potentialtheorie, Inaugural-Dissertation, Marburg 1915.

238) Das Zeichen D_1 (wie später D_2) bezieht sich hier wie in den Ungleichheiten (2) und (5) zunächst auf das Variabelnpaar (x, y) . In jedem (ξ, η) nicht enthaltenden Bereiche $\bar{T} + \bar{S}$ in $T + S$ ist

$$(2) \quad |D_1 G(\xi, \eta; x_1, y_1) - D_1 G(\xi, \eta; x_2, y_2)| < A_1 d_{12}^\lambda, \quad 0 < \lambda < 1, \\ d_{12}^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2.$$

($A_1 > 0$ hängt von \bar{T} und λ ab).

239) Den ersten strengen Beweis für Gebiete der Klasse B (im Raume) hat $A. Liapounoff$, loc. cit. 54) a), p. 307, gegeben.

240) Zur Vereinfachung wird, wenn (x, y) in den Punkt t auf S fällt, für $G(\xi, \eta; x, y)$ kürzer $G(\xi, \eta; t)$ gesetzt. Was der Ausdruck $G(s, t)$ bedeutet, ist ohne weiteres klar.

241) $C. Neumann$, loc. cit. 217), zweite Abhandlung, p. 662—705 und $A. Korn$, Potentialtheorie 2, p. 348—354, bewiesen diesen Satz unter gewissen weiteren einschränkenden Voraussetzungen über die Natur der Randkurve. Der Satz gilt indessen allgemein. Vgl. $L. Lichtenstein$, Math. Ann. 67 (1909), p. 559—575 [p. 561—563], wo ein beliebiges einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B betrachtet wird, sowie $O. D. Kellogg$, loc. cit. 224), p. 121—123, wo allgemeiner (mehrfach zusammenhängende) Gebiete der Klasse Ah in \mathfrak{E} betrachtet werden. Ein ganz analoger Satz gilt bei Gebieten der Klasse Ah im Raume. Vgl. $L. Lichtenstein$, Berliner Sitzungsberichte, vorgelegt am 17. 10. 1918.

242) Vgl. z. B. $H. Poincaré$, loc. cit. 190), p. 62—65.

243) In jedem Bereiche $\bar{T} + \bar{S}$ ist ferner

$$(5) \quad |D_2 G(\xi, \eta; x_1, y_1) - D_2 G(\xi, \eta; x_2, y_2)| < A_2 d_{12}^\lambda,$$

unter λ den Hölderschen Exponenten von S , unter A_2 einen von \bar{T} und λ abhängigen positiven Wert verstanden.

Ganz analoge Sätze gelten in unendlichen Gebieten sowie im Raume. Für $\log \frac{1}{\varrho}$ tritt im Raume in (1) und (4) der Ausdruck $\frac{1}{\varrho}$ ein. Es gilt ferner in der Ebene

$$(6) \quad |D_1 G(\xi, \eta; x, y)| < A_3 \frac{1}{\varrho} \quad (A_3 > 0 \text{ konstant}),$$

im Raume

$$(7) \quad |D_1 G(\xi, \eta, \xi; x, y, z)| < A_4 \frac{1}{\varrho^2} \quad (A_4 > 0 \text{ konstant}).^{244}$$

Den vorstehenden Formeln kann man wegen (3) analoge Ungleichheiten für die partiellen Ableitungen in bezug auf ξ und η zur Seite stellen. Ähnliche Sätze gelten für die Differentialquotienten höherer Ordnung.

Es sei s_0 ein Punkt auf S (in \mathfrak{E}); C_1 und C_0 seien zwei Kreise um s_0 vom Halbmesser d_1 und $d_0 < d_1$, K_1 und K_0 seien die von ihnen begrenzten Kreisscheiben, \mathfrak{R}_1 und \mathfrak{R}_0 die entsprechend T und K_1 , T und K_0 gemeinsamen Gebiete. Jedem $\varepsilon > 0$ läßt sich nach Festsetzung von d_1 ein Wert d_0 so zuordnen, daß für alle (ξ, η) im Innern und auf dem Rande von \mathfrak{R}_0 sowie alle (x, y) im Innern und auf dem Rande von $T - \mathfrak{R}_1$

$$(8) \quad G(\xi, \eta; x, y) < \varepsilon$$

gilt.²⁴⁵ Ein ganz analoger Satz gilt im Raume.

Das Gebiet T (in \mathfrak{E}) wird jetzt der Einfachheit halber einfach zusammenhängend vorausgesetzt. Es mögen S_1 und S_2 Parallelkurven von S entsprechend in T und T_a in einem Abstände δ , der so klein ist, daß die beiden Kurven doppel­punktlos ausfallen, bezeichnen. Ist (ξ, η) ein Punkt in dem von S und S_1 begrenzten Ringgebiete τ , (ξ', η') sein Spiegelbild in bezug auf S , so ist für alle (ξ, η) im Innern und auf dem Rande von τ und alle (x, y) in $T + S$

$$(8^*) \quad G(\xi, \eta; x, y) = \log \frac{\varrho'}{\varrho} + \text{eine stetige Funktion von } (\xi, \eta) \text{ und } (x, y).^{246}$$

244) Beim Beweise wird man sich im Raume der Betrachtungen der Nr. 17 bedienen. In der Ebene erscheint es einfacher, zunächst durch konforme Abbildung (Nr. 22) zu einem Gebiete der Klasse C (wenn T einfach zusammenhängend ist, zu einem Kreisgebiete) überzugehen.

245) Vgl. z. B. A. Paraf, Ann. de Toulouse 6 (1892), H, p. 1—75.

246) Durch die Formel (8*) ist das asymptotische Verhalten der Greenschen Funktion, wenn (ξ, η) und (x, y) sich demselben Punkte auf S nähern, charakterisiert. Weiter reichende Sätze geben P. Lévy, Bull. des Sc. Math. (2) 34 (1910), p. 186—190; C. R. 158 (1914), p. 1008—1010 sowie J. Hadamard, C. R. 185 (1914), p. 1010—1011 an. Nach P. Lévy ist in Gebieten der Klasse C in \mathfrak{E}

Alle vorhin angegebenen Sätze lassen sich auf schlichtartige Gebiete der Klasse B in \mathfrak{E}_m sinngemäß übertragen (Nr. 24f).²⁴⁷⁾

Es sei T ein beschränktes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} ; es sei ferner $f(s)$ eine auf S erklärte abteilungsweise stetige Funktion und u diejenige beschränkte, in T reguläre Potentialfunktion, die auf S den Wert $f(s)$ annimmt. Es gilt die Fundamentalformel

$$(9) \quad u(\xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \int_S f(t) \frac{\partial}{\partial n_t} G(\xi, \eta; t) dt.$$

Sie läßt sich, wenn $\frac{df(s)}{ds}$, $\frac{d^2f(s)}{ds^2}$ vorhanden und stetig sind, da dann auch (Nr. 18) $D_1 u$ auf S stetig sind, leicht aus der Greenschen Formel (2) Nr. 10 ableiten. Trifft die zuletzt genannte Voraussetzung nicht zu, so wird man $f(s)$ durch analytische Funktionen approximieren und Grenzwertsätze der Nr. 16 anwenden. Liegt ein schlichtartiges Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E}_m vor, so wird man dieses auf ein schlichtes Gebiet konform abbilden (Nr. 24f). Man findet auf diese Weise, daß die Formel (9) auch jetzt noch gilt.

Über die Greensche Funktion eines beliebigen beschränkten einfach zusammenhängenden Gebietes vergleiche weiter unten Nr. 38.²⁴⁹⁾

$$G(\xi, \eta; x, y) = \log \frac{1}{\rho} - \frac{1}{2\pi} \int_S \frac{\partial}{\partial n_t} (\log \rho_t \cdot \log r_t) dt +$$

eine in $T + S$ analytische und reguläre Funktion von (ξ, η) , (x, y) . Mit ρ_t (r_t) wird hier die Entfernung der Punkte (ξ, η) und t ((x, y) und t) bezeichnet.

247) Ist (ξ, η) ein Windungspunkt m -ter Ordnung, so ist in der Umgebung von (ξ, η)

$$(8^{**}) \quad G(\xi, \eta; x, y) = \frac{1}{m+1} \log \frac{1}{\rho} + \text{eine reguläre Potentialfunktion.}$$

248) Im Raume ist

$$(10) \quad u(\xi, \eta, \zeta) = \frac{1}{4\pi} \int_S f(t) \frac{\partial}{\partial n_t} G(\xi, \eta, \zeta; t) dt.$$

249) Die Formel (10) ist zum ersten Male (für durchweg stetige Randwerte) von *A. Liapounoff*, loc. cit. 54) a), p. 307—311, auf anderem Wege streng bewiesen worden. Ist T insbesondere ein Kreisgebiet oder Kugelkörper, so sind die Formeln (9) und (10) mit den *Poissonschen* Integralen der Nr. 13 identisch. Ist T ein beliebiges einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m , so kann man umgekehrt (9) aus dem *Poissonschen* Integral durch konforme Abbildung gewinnen. Sie gilt daher jedesmal, wenn $f(s)$ im *Lebesgueschen* Sinne integrierbar ist und die Unität der Lösung feststeht (vgl. *G. D. Kellogg*, loc. cit. 224), p. 125—127). Die Beziehungen (9) und (10) lassen sich ferner aus den Gleichungen (1) Nr. 17 d unter Zuhilfenahme der *Fredholmschen* Umkehrformeln ableiten (vgl. *J. Plemelj*, loc. cit. 55), passim; Untersuchungen, passim). Die Formel (9) gilt übrigens unverändert bei ebenen Gebieten beträchtlich allgemeinerer Natur (Nr. 24c).

Weitere Literatur: *G. Léry*, C. R. 152 (1911), p. 843—844 sowie Ann. de l'Éc.

21. Stetig gekrümmte Gebiete. Greensche Funktionen zweiter Art.²⁵⁰ Es sei T ein beschränktes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{C} und (ξ, η) ein Punkt in T . Die Sätze der Nr. 17 d sichern die Existenz einer Greenschen Funktion zweiter Art $G^{\text{II}}(\xi, \eta; x, y)$ (der Neumannschen „charakteristischen Funktion“), die folgende Eigenschaften hat: Sie ist diejenige, außer in (ξ, η) , in T und auf S stetige, in T reguläre Potentialfunktion, die sich in (ξ, η) wie $\log \frac{1}{\rho} +$ eine reguläre Potentialfunktion verhält und auf S den Bedingungen

$$(1) \quad \frac{\partial}{\partial n_i} G^{\text{II}}(\xi, \eta; t) = \frac{2\pi}{l},$$

$$(1^*) \quad \int_S G^{\text{II}}(\xi, \eta; t) dt = 0$$

genügt. Unter l wird die Gesamtlänge von S verstanden.²⁵¹ Die Greensche Formel (2) Nr. 10 liefert den Reziprozitätssatz

$$(2) \quad G^{\text{II}}(x_1, y_1; x_2, y_2) = G^{\text{II}}(x_2, y_2; x_1, y_1).$$

Die partiellen Ableitungen $D_1 G^{\text{II}}$ sind auf S stetig.²⁵² Gehört T der Klasse Bh an, so sind auch $D_2 G^{\text{II}}$ auf S stetig.²⁵³ In einer ganz analogen Weise wird die Greensche Funktion zweiter Art für unendliche Gebiete und im Raume erklärt. Für (1) tritt im Raume

$$(4) \quad \frac{\partial}{\partial n_i} G^{\text{II}}(\xi, \eta; t) = \frac{4\pi}{D},$$

unter D den Flächeninhalt von S verstanden, ein.²⁵⁴

Norm. (3) 32 (1915), p. 49—136 (Greensche Funktion eines von einer algebraischen Kurve begrenzten Gebietes) und A. Viterbi, Rend. del R. Ist. Lomb. dei sc. e. lettere (2) 47 (1914/15), p. 763—796.

250) Vgl. die in der Fußnote 235) angegebene Literatur, ferner D. Hilbert, Gött. Nachr. 1905, p. 1—32 [p. 3—8]; Grundzüge, p. 83—88; J. Plemelj, loc. cit. 175).

251) Gelegentlich wird $G^{\text{II}} - \log \frac{1}{\rho}$ als die Greensche Funktion zweiter Art bezeichnet.

252) Hier sowie in den Formeln (3), (5) und (6), beziehen sich die Zeichen D_1, D_2 zunächst auf die Variablen x und y . In jedem (ξ, η) nicht enthaltenden Bereiche $\bar{T} + \bar{S}$ in $T + S$ ist

$$(3) \quad |D_1 G^{\text{II}}(\xi, \eta; x_1, y_1) - D_1 G^{\text{II}}(\xi, \eta; x_2, y_2)| < A_\lambda d_{12}^\lambda, \\ 0 < \lambda < 1 \quad (A_\lambda > 0 \text{ von } \bar{T}, \lambda \text{ abhängig}).$$

253) Und genügen in $\bar{T} + \bar{S}$ einer Hölderschen Bedingung mit dem Exponenten λ (dem Hölderschen Exponenten von S).

254) Die zu dem zweiten Randwertproblem gehörige Greensche Funktion eines Kreisgebietes gibt U. Dini, Annali di Mat. pura ed applicata (5) 2 (1871), p. 305—345; diejenige eines Kugelvolumens C. A. Bjerknes, Acta Soc. Sc. Christiania (1871); Beltrami, Bol. mem. 3 (1873), p. 370—371 an. Vgl. ferner J. Hadamard, Leçons, p. 44—47 und H. Weber, Part. Diff. d. Math. Phys. 1, p. 480—483. Hadamard

Für alle (ξ, η) und (x, y) in $T + S$ ist in der Ebene

$$(5) \quad |G^{II}| < 2 \left| \log \frac{1}{\varrho} \right| + A_4, \quad |D_1 G^{II}| < \frac{A'_4}{\varrho},$$

im Raume

$$(6) \quad |G^{II}| < \frac{2}{\varrho} + A_5 \left| \log \frac{1}{\varrho} \right| + A'_5, \quad |D_1 G^{II}| < \frac{A''_5}{\varrho^2},$$

($A_4, A'_4, A_5, A'_5, A''_5$ konstant).

Es sei $f(s)$ eine abteilungsweise stetige, der Beziehung $\int_S f(s) ds = 0$ genügende Funktion auf S . Für diejenigen beschränkten, in T regulären Potentialfunktionen u , deren Normalableitung auf S den Wert $f(s)$ hat, erhält man unter Zuhilfenahme des Greenschen Satzes (2) Nr. 10 den Ausdruck

$$(7) \quad u(\xi, \eta) = -\frac{1}{2\pi} \int_S G^{II}(\xi, \eta; t) f(t) dt + \frac{1}{l} \int_S u(t) dt. \quad 255)$$

Die Funktion G^{II} kann durch andere „Greensche Funktionen“ ersetzt werden.

Es seien (ξ, η) , (ξ', η') , (x', y') drei verschiedene Punkte in T . *F. Klein* betrachtet diejenige, außer in (ξ, η) und (ξ', η') , in $T + S$ stetige, in T reguläre Potentialfunktion $K(\xi, \eta; \xi', \eta'; x', y'; x, y)$, die sich in (ξ, η) und (ξ', η') entsprechend wie $\log \frac{1}{\varrho} +$ eine reguläre Potentialfunktion und $-\log \frac{1}{\varrho} +$ eine reguläre Potentialfunktion verhält und überdies den Bedingungen

$$(8) \quad K(\xi, \eta; \xi', \eta'; x', y'; x', y') = 0, \quad \frac{\partial K}{\partial n_i} = 0$$

genügt.²⁵⁶⁾ Läßt man (ξ', η') gegen (ξ, η) konvergieren, so wird man auf das von *Klein* zuerst systematisch betrachtete „Strömungspotential“ $\Re(\xi, \eta; x, y)$ geführt, das sich in (ξ, η) wie

$$\Re \left[\frac{1}{z - \xi} + (z - \xi) \Re(z - \xi) \right], \quad z = x + iy, \quad \xi = \xi + i\eta$$

verhält und überdies der Randbedingung

$$(9) \quad \frac{\partial}{\partial n_i} \Re(\xi, \eta; t) = 0$$

gibt a. a. O. p. 47 einen Ausdruck für die Greensche Funktion zweiter Art des Außenraumes eines Kugelvolumens; ebendort wird p. 47–53 das von zwei konzentrischen Kugeln eingeschlossene Gebiet betrachtet.

255) In einem unendlichen Gebiete sowie im Raume gelten analoge Ausdrücke. Die Theorie der Nr. 17d führt auf analoge Formeln. Vgl. *J. Plemelj*, Untersuchungen, p. 99–100.

256) Vgl. *F. Pockels*, Über die partielle Differentialgleichung $\Delta u + k^2 u = 0$ usw., Leipzig 1891, p. 253; *J. Hadamard*, Leçons, p. 35–37. S. ferner *F. Klein*, Riemannsche Flächen 1, p. 4–16. An der bezeichneten Stelle betrachtet *Klein* lediglich geschlossene Flächen, so daß die Bedingung $\frac{\partial K}{\partial n_i} = 0$ nicht vorkommt.

genügt.²⁵⁷) (24 h) *E. R. Neumann* ersetzt die Bedingung (1*) durch

$$(10) \quad \frac{\partial}{\partial n_i} N(\xi, \eta; t) = 2\pi m(t), \quad \int_S N(\xi, \eta; t) m(t) dt = 0,$$

unter $m(s)$ die natürliche Belegung (Nr. 17 d) verstanden.²⁵⁸) *W. Stekloff* bedient sich einer Funktion $S(\xi, \eta; x, y)$, die, außer in (ξ, η) , in $T + S$ stetig, in T analytisch und regulär ist, sich in (ξ, η) wie $\log \frac{1}{\rho} +$ eine analytische und reguläre Funktion verhält und den Bedingungen

$$(11) \quad \Delta S = \frac{2\pi}{P}, \quad \frac{\partial}{\partial n_i} S(\xi, \eta; t) = 0, \quad \int_T S(\xi, \eta; x, y) dx dy = 0$$

($P =$ Flächeninhalt von T) genügt.²⁵⁹)

In ähnlicher Weise werden *Greensche* Funktionen zweiter Art unendlicher Gebiete, Gebiete in \mathfrak{G}_m , oder allgemeiner auf einer Fläche der Klasse Lh (insbesondere geschlossener Gebiete) und Gebiete im Raume erklärt. Sie erfüllen sämtlich eine Symmetriebeziehung und führen auf gewisse, zu (7) analoge, Integralformeln.

Einen Ausdruck für das asymptotische Verhalten der Funktion $G^{II}(\xi, \eta; x, y)$ in der Nachbarschaft des Randes gab *E. E. Levi* an.²⁶⁰) Für alle (ξ, η) im Innern und auf dem Rande von τ (vgl. p. 248) sowie alle (x, y) in T und auf S ist

$$(12) \quad G^{II}(\xi, \eta; x, y) = \log \frac{1}{\rho\varrho} + \text{eine stetige Funktion von } (x, y) \text{ und } (\xi, \eta).^{261)}$$

Ein zum Teil weiter reichendes Resultat hat *U. Cisotti*, von den Formeln der *Robin-Fredholmschen* Theorie ausgehend, abgeleitet.²⁶²) Es gilt, unter σ einen Punkt auf S (im Raume) verstanden,

$$G^{II}(\sigma; x, y, z) = \frac{2}{r_\sigma} - \frac{C}{2} \log(r_\sigma + h) + \psi(x, y, z).$$

In dieser Formel bezeichnen: r_σ den Abstand der Punkte (x, y, z) und

257) Vgl. *F. Klein*, Algebraische Funktionen, passim; *Riemannsche* Flächen 1, p. 4—16. An den bezeichneten Stellen betrachtet *Klein* lediglich Strömungen auf geschlossenen Flächen, so daß die Randbedingung (9) nicht vorkommt.

258) *E. R. Neumann*, Beiträge.

259) *W. Stekloff*, Ann. de l'Éc. Norm. (3) 19 (1902), p. 191—259; p. 455—490 [p. 247—248] Man vergleiche ferner *D. Hilbert*, Gött. Nachr. 1904, p. 213—259 sowie Grundzüge, p. 39—81, wo in Verallgemeinerung der Beziehungen (11) gewisse „*Greensche* Funktionen im erweiterten Sinne“ betrachtet werden.

260) *E. E. Levi*, Gött. Nachr. 1908, p. 249—252.

261) Aus (12) folgt insbesondere $G^{II}(s, t) = 2 \log \frac{1}{r_{st}} +$ eine stetige Funktion von s und t .

262) *U. Cisotti*, Rend. del. Circolo Mat. di Palermo 31 (1911), p. 201—233.

σ , C die Summe der Hauptkrümmungsradien in σ , h die Projektion des Vektors ($\sigma \rightarrow x, y, z$) auf die Innennormale, $\psi(x, y, z)$ eine in $T + S$ stetige Funktion.²⁶³⁾

Es sei λ ein nicht singulärer Wert des in (1) Nr. 17d auftretenden Parameters. Sowohl die *Neumann-Poincarésche* als auch die *Robin-Poincarésche* Randwertaufgabe sind eindeutig lösbar. Für die Lösungen lassen sich Integralausdrücke, die zu (9) Nr. 20 analog sind, angeben.²⁶⁴⁾

Durch Aufstellung der *Greenschen* Funktion (Nr. 20) ist zugleich die Aufgabe gelöst, ein beschränktes, einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B (oder Ah) in \mathfrak{E} auf ein Kreisgebiet konform abzubilden.

22. Konforme Abbildung einfach zusammenhängender Gebiete der Klasse B in \mathfrak{E} auf ein Kreisgebiet.²⁶⁵⁾ Es sei T ein beschränktes einfach zusammenhängendes Gebiet in einer schlichten Ebene. Die Aufgabe, T auf das Gebiet $|Z| < 1$ konform abzubilden, so daß einem Punkte $\xi = \xi + i\eta$ in T der Kreismittelpunkt, einer willkürlich vorgeschriebenen Richtung durch ξ die Richtung der wachsenden x entspricht, kann, wie *H. Poincaré* gezeigt hat, nicht mehr als eine Lösung haben.²⁶⁶⁾

Man findet leicht, daß $Z(z) = e^{-(U+iV)}$ gesetzt werden kann, unter U die zu T gehörige *Greensche* Funktion $G(\xi, \eta; x, y)$ verstanden.²⁶⁷⁾

263) *Cisotti* setzt $\psi = \psi_1 + \psi_2$. Dabei bezeichnet ψ_1 einen expliziten analytischen Ausdruck, ψ_2 eine nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung in $T + S$ stetige Funktion.

Weitere Sätze finden sich bei *P. Lévy*, loc. cit. 246). Bei Gebieten der Klasse C in \mathfrak{E} gilt nach *P. Lévy* die Formel

$$G^{II}(\xi, \eta; x, y) = \log \frac{1}{\varrho} + \frac{1}{2\pi} \int_S \frac{\partial}{\partial n_t} (\log \varrho_t \cdot \log r_t) dt + \text{eine in } T + S$$

analytische und reguläre Funktion von (ξ, η) und (x, y) .

264) Vgl. *J. Plemelj*, loc. cit. 55), p. 392 u. ff. Dort werden gewisse weitere „*Greensche* Funktionen“ eingeführt.

265) „Konform“ bedeutet in diesem Referat, wenn nichts anderes vermerkt wird, stets: „eindeutig umkehrbar und konform“.

Literatur: *W. F. Osgood* II B 1 Nr 19; *A. Korn*, Potentialtheorie 2, p. 265—275; *É. Picard*, Traité 2, p. 301—305; *W. F. Osgood*, Funktionentheorie, p. 673—676; p. 681—687; *É. Goursat*, Cours 3, p. 212—217.

266) *H. Poincaré*, Acta math. 4 (1884), p. 200—312 [p. 231—232]. Nicht wesentlich hiervon verschieden ist der Beweis bei *C. Carathéodory*, Math. Ann. 72 (1912), p. 107—144 [p. 111].

267) Vgl. etwa *É. Picard*, Traité 2, p. 301—302. Die *Greensche* Funktion $G(\xi, \eta; x, y)$ wird für beliebige beschränkte Gebiete in \mathfrak{E} genau so wie in der Nr. 20 für Gebiete der Klasse B definiert.

Es möge jetzt insbesondere T der Klasse B (oder Ah) angehören. Der Nr. 20 zufolge ist in $T \dots U(x, y) = G(\xi, \eta; x, y) > 0$. Ferner ist auf S (Nr. 20)

$$(1) \quad \frac{\partial}{\partial n} U(s) = -\frac{\partial}{\partial s} V(s) > 0.$$

Die Gleichung $U(x, y) = a > 0$ stellt eine geschlossene, doppel-
punktlose, analytische und reguläre Kurve Σ dar. Das von Σ begrenzte,
beschränkte Gebiet Θ enthält den Punkt ξ . Auf Σ ist die Normalab-
leitung $\frac{\partial U}{\partial \nu} > 0$.²⁶⁸ Darum ist auf Σ durchweg

$$(2) \quad \frac{\partial V}{\partial \sigma} < 0.$$

In der Ebene Z entspricht Σ umkehrbar eindeutig der Kreis um den
Koordinatenursprung vom Halbmesser e^{-a} . Man überzeugt sich so
leicht, daß $Z(z)$ in der Tat T auf die Fläche K des Einheitskreises C
konform abbildet. Wegen (1) entsprechen aber auch S und C einander
umkehrbar eindeutig und stetig. Die Ableitung $\frac{dZ}{dz}$ ist auch noch auf
 S stetig. In $T + S$ ist $\left| \frac{dZ}{dz} \right| > 0$. Es gilt ferner (wenn T der Klasse
 B angehört)

$$(3) \quad \left| \frac{d}{dz} Z(z_1) - \frac{d}{dz} Z(z_2) \right| < c'(\lambda) |z_1 - z_2|^\lambda$$

$$(0 < \lambda < 1).$$

Gehört T der Klasse Bh an, so ist auch $\frac{d^2 Z}{dz^2}$ auf S stetig. Ist λ der
Höldersche Exponent von S , so ist in $T + S$

$$(4) \quad \left| \frac{d^2}{dz^2} Z(z_1) - \frac{d^2}{dz^2} Z(z_2) \right| < c_2(\lambda) |z_1 - z_2|^\lambda.$$

Analoge Sätze gelten für Ableitungen höherer Ordnung.²⁶⁹

Enthält S einen Bogen einer analytischen und regulären Kurve,
so läßt sich $Z(z)$ über diesen hinaus analytisch fortsetzen.²⁷⁰

268) Die zu Θ gehörige in ξ unendliche Greensche Funktion ist nämlich
gleich $G(\xi, \eta; x, y) - a$.

269) Die Gleichungen von S mögen $x = x(s)$, $y = y(s)$ heißen. Sind die
Funktionen $x(s)$ und $y(s)$ nebst ihren Ableitungen bis zur Ordnung m ($m > 1$)
einschließlich stetig, während $\frac{d^m x}{ds^m}$, $\frac{d^m y}{ds^m}$ einer H -Bedingung mit dem Exponenten

λ genügen, so sind $\frac{d^k Z}{dz^k}$ ($k = 1, \dots, m$) auf S stetig. Ferner ist in $T + S$

$$(5) \quad \left| \frac{d^m}{dz^m} Z(z_1) - \frac{d^m}{dz^m} Z(z_2) \right| < c_m(\lambda) |z_1 - z_2|^\lambda.$$

Man vergleiche hierzu die älteren Ergebnisse von P. Painlevé, loc. cit. 224)

270) Vgl. H. A. Schwarz, Ges. Abh. 2, p. 149—151. Siehe ferner loc. cit.
288) (Nr. 24b). Ein ganz analoger Satz gilt, wenn der Rand eines einfach zu-
sammenhängenden Gebietes in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m (oder selbst eines unendlich vielblättrigen

Liegt ein einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} , das den Punkt $z = \infty$ enthält, vor, so wird dieses zuvörderst durch eine lineare gebrochene Substitution in ein beschränktes Gebiet transformiert.

Konforme Abbildung eines einfach zusammenhängenden Gebietes der Klasse B in \mathfrak{E}_m auf ein Kreisgebiet vergleiche Nr. 24f, funktionentheoretische Behandlungsweise Nr. 47.

Mehrfach zusammenhängende Gebiete der Klasse B in \mathfrak{E} lassen sich durch wiederholte Anwendung der im vorstehenden betrachteten Abbildung in unendlich mannigfaltiger Weise auf Gebiete der Klasse C konform abbilden. Das Verhalten der die Abbildung vermittelnden Funktion auf S ist demjenigen der Funktion $Z(z)$ analog.

23. Gebiete der Klasse D in \mathfrak{E} . Konforme Abbildung. Es sei T ein einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse D in der Ebene z . Wendet man auf T in geeigneter Reihenfolge eine Anzahl passend gewählter elementarer konformer Abbildungen von der Form

$$(1) \quad Z = Z_1^{\frac{1}{\alpha}}, \quad Z_1 = z + \sum_k^{2, \dots, \infty} A_k z^k, \quad 2 \geq \alpha > 0;$$

$$(2) \quad Z = \left(z^{\frac{1}{\alpha}} - z^* \right)^{\alpha}$$

mit explizite angebbaren Koeffizienten A_k ($k = 2, 3, \dots$) und Konstanten α und z^* ²⁷¹⁾ an, so läßt sich T auf ein Gebiet \bar{T} der Klasse B' konform abbilden.²⁷²⁾ Hierdurch ist nach Nr. 22 zugleich die konforme Abbildung von T auf ein Kreisgebiet gewonnen. Augenscheinlich ist die Abbildung auch noch auf S umkehrbar eindeutig und stetig. In Verallgemeinerung gewisser Resultate von *H. A. Schwarz* (Nr. 25) zeigt sich hierbei, daß die die Abbildung vermittelnde Funktion $F(z)$ sich in der Umgebung einer Ecke z_0 vom Öffnungswinkel $\alpha\pi$ in der Form

$$(3) \quad F(z) = (z - z_0)^{\frac{1}{\alpha}} f_1(z), \quad (4) \quad \frac{dF(z)}{dz} = (z - z_0)^{\frac{1}{\alpha}-1} f_2(z),$$

$$f_1(z), f_2(z) \text{ stetig, } f_2(z_0) \neq 0$$

Gebietes) einen Bogen einer analytischen und regulären Kurve enthält, sonst aber beliebig beschaffen ist. Vgl. *P. Koebe*, Gött. Nachr. 1907, p. 633–669 [p. 657–668] (Nr. 40b); *C. Carathéodory*, Schwarz Festschrift, Berlin 1914, p. 19–41 [p. 32–36]; *P. Koebe*, Journ. f. Math. 145 (1915), p. 177–223 [p. 205–209] (Nr. 47).

²⁷¹⁾ $\alpha\pi$ bezeichnet jedesmal den von zwei Nachbarseiten der Begrenzung eingeschlossenen Winkel.

²⁷²⁾ Vgl. *L. Lichtenstein*, Journ. f. Math. 140 (1911), p. 100–119 [p. 100–110]. Die Begrenzung \bar{S} von \bar{T} besteht aus Stücken einander berührender analytischer und bis auf die Endpunkte regulärer Linien. In den Berührungspunkten erleidet die von Null verschiedene Krümmung von \bar{S} einen Sprung.

darstellen läßt. Ist α irrational, so läßt sich leicht zeigen, daß für alle m

$$\frac{d^m F}{dz^m} = (z - z_0)^{\frac{1}{\alpha} - m} \cdot \text{stetige Funktion}$$

gesetzt werden kann.²⁷³⁾

Weitere Entwicklungen zur konformen Abbildung von Ecken und Spitzen vergleiche Nr. 24c und 48a.

Die bisher betrachteten Methoden zur Lösung der ersten und der zweiten Randwertaufgabe, insbesondere die Methode des arithmetischen Mittels, sind in ihrer Anwendbarkeit auf Gebiete in \mathfrak{E} beschränkt. Für die Behandlung der Gebiete in \mathfrak{E}_m , namentlich für die *Riemannsche* Theorie der algebraischen Funktionen haben sich die zuerst von *H. A. Schwarz* und *C. Neumann* systematisch betrachteten kombinatorischen Methoden, vor allem das *Schwarzsche* alternierende Verfahren als grundlegend erwiesen.

24. Kombinatorische Methoden.²⁷⁴⁾ a) *Alternierendes Verfahren. Drei Grundtypen von Aufgaben.* Es seien T_1 und T_2 zwei beschränkte, einfach zusammenhängende Gebiete der Klasse B in \mathfrak{E} , deren Randkurven S_1 und S_2 einander in zwei Punkten schneiden (nicht berühren). Die beiden Gebiete haben ein Gebiet \bar{T} gemeinsam. Den Entwicklungen der Nr. 17 gemäß hat die Randwertaufgabe in T_1 und T_2 eine und nur eine Lösung, dies zwar wie auch die (abteilungsweise stetigen) Randwerte auf S_1 und S_2 gewählt sein mögen. *H. A. Schwarz* bestimmt nun diejenige im Innern und auf dem Rande S^* von $T^* = T_1 + T_2 - \bar{T}$ stetige, in T^* reguläre Potentialfunktion, die auf S^* eine beliebig vorgegebene stetige Wertfolge $f(s)$ ²⁷⁵⁾ annimmt, durch das folgende, von ihm so benannte „alternierende Verfahren“.²⁷⁶⁾

273) Vgl. *L. Lichtenstein*, loc. cit. 272), p. 108—110.

Dieser Satz gilt fraglos für alle $\alpha (> 0)$, läßt sich jedoch für rationale α auf dem a. a. O. angegebenen Wege nicht beweisen.

W. F. Osgood und *E. H. Taylor* leiten die Formel (3) auf einem anderen Wege ab (vgl. *Trans. of the Amer. Math. Soc.* 14 (1913), p. 277—298 [p. 282—283]). Nach *Osgood* und *Taylor* ist auch $f_1(z_0) \neq 0$.

274) Vgl. *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer* II A 7 b Nr. 28. Dort finden sich Angaben über die ältere Literatur, insbesondere über die Untersuchungen von *R. Murphy* und *H. Lipschitz*.

275) Die Voraussetzung, T_1 und T_2 seien einfach zusammenhängend, ist für das Gelingen des Verfahrens nicht wesentlich.

276) *H. A. Schwarz*, a) *Vierteljahr. d. Naturfor. Ges. in Zürich*, 15. Jahrg., p. 272—286; *Ges. Abh.* 2, p. 133—143; b) *Berl. Monatsber.* 1870, p. 767—795; *Ges. Abh.* 2, p. 144—171; c) *Math. Ann.* 21 (1883), p. 157—160; *Ges. Abh.* 2, p. 303—306. Eine Darstellung des alternierenden Verfahrens geben u. a. *A. Harnack*, *Grundlagen*, p. 109—113; *J. Riemann*, *Thèse*, Paris 1888;

Es sei S_{12} derjenige Teil von S_1 , der in $T_2 + S_2$ liegt; desgleichen sei S_{21} der in $T_1 + S_1$ gelegene Teil von S_2 . Nach Schwarz werden zwei Folgen beschränkter, entsprechend in T_1 und T_2 regulärer Potentialfunktionen u'_k, u''_k ($k = 1, 2, \dots$) gebildet, so daß, unter $\bar{f}(s)$ eine beliebige auf S_{12} erklärte stetige, sich $f(s)$ stetig anschließende Wertfolge verstanden, auf $S_1 - S_{12} \dots u'_k = f(s)$, auf $S_2 - S_{21} \dots u''_k = f(s)$ ($k = 1, 2, \dots$), auf $S_{12} \dots u'_k = \bar{f}(s)$, $u'_k = u''_{k-1}$ ($k > 1$), auf $S_{21} \dots u''_k = u'_k$ ($k = 1, 2, \dots$) gilt. Die Folgen u'_k, u''_k konvergieren entsprechend in $T_1 + S_1$ und $T_2 + S_2$ gleichmäßig. In $\bar{T} + \bar{S}$ ($\bar{S} = S_{12} + S_{21}$) ist $\lim_{k \rightarrow \infty} u'_k = \lim_{k \rightarrow \infty} u''_k$. Setzt man $u = \lim_{k \rightarrow \infty} u'_k$ in $T_1 + S_1$, $u = \lim_{k \rightarrow \infty} u''_k$ in $T_2 + S_2$, so ist u die Lösung der Randwertaufgabe. Der Beweis beruht wesentlich auf dem Schwarzschen Hilfssatz (Nr. 13 p. 221).²⁷⁷⁾

In ähnlicher Weise läßt sich mit *C. Neumann* das erste Randwertproblem für das Gebiet \bar{T} auflösen. Es sei $\varphi(s)$ eine auf \bar{S} erklärte stetige Funktion. Wir bilden, unter $\bar{\varphi}(s)$ eine beliebige stetige, sich $\varphi(s)$ stetig anschließende Funktion auf $S_1 - S_{12}$ verstanden, zwei Folgen beschränkter, entsprechend in T_1 und T_2 regulärer Potentialfunktionen u'_k, u''_k ($k = 1, 2, \dots$), so daß zunächst u'_1 auf S_{12} gleich φ , auf $S_1 - S_{12}$ gleich $\bar{\varphi}$, ferner

auf $S_{21} \dots u''_k = \varphi - u'_k$, auf $S_2 - S_{21} \dots u''_k = 0$ ($k = 1, 2, \dots$),
 auf $S_{12} \dots u'_k = \varphi - u''_{k-1}$, auf $S_1 - S_{12} \dots u'_k = 0$ ($k = 2, 3, \dots$)
 gilt. Jede der beiden Funktionenfolgen konvergiert in $\bar{T} + \bar{S}$ gleichmäßig; $u = \lim_{k \rightarrow \infty} u'_k + \lim_{k \rightarrow \infty} u''_k$ ist die Lösung der Randwertaufgabe.²⁷⁸⁾

Es sei T ein beschränktes einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} , S' eine Kurve der Klasse B in T , T' das von S'

A. Korn, Potentialtheorie, passim; *É. Picard*, Traité, 2, p. 81–88 sowie p. 508 bis 546; *W. F. Osgood*, Funktionentheorie, p. 689–703; *É. Goursat*, Cours 3, p. 207–212. Man vergleiche ferner *C. Neumann*, Abelsche Integrale, p. 432–471 [p. 446–452] sowie die II A 7 b Nr. 28 zitierten älteren Arbeiten von *C. Neumann*.

277) Auf T_1 und S_{21} angewandt, lautet dieser etwa so. Ist u_0 diejenige beschränkte, in T_1 reguläre Potentialfunktion, die auf $S_1 - S_{12}$ gleich 0, auf S_{12} gleich 1 ist, so ist auf S_{21} gewiß $u_0 < q < 1$.

278) Vgl. *C. Neumann*, Leipz. Ber. 22 (1870), p. 264–321; *A. Korn*, Potentialtheorie 2, p. 224–226. Der Konvergenzbeweis stützt sich wieder wesentlich auf den Schwarzschen Hilfssatz. Eine auf einem verwandten Gedanken beruhende („disjunktive“) Methode zur Lösung der ersten Randwertaufgabe für ein von endlich vielen Kreisen begrenztes Gebiet in \mathfrak{E} gibt *C. Neumann*, Abelsche Integrale, p. 436–446, an. Durch ein verwandtes Verfahren gewinnen *F. Prym* und *G. Rost* die Lösung des ersten Randwertproblems für ein Kreisringgebiet (*Prymsche Funktionen*, p. 78–91).

begrenzte beschränkte Gebiet, S'' eine Kurve der Klasse B in T'' . Das von S und S'' begrenzte beschränkte Gebiet heiße T^* . Ist das erste Randwertproblem für T' und T^* gelöst, so läßt sich die Lösung derselben Aufgabe für das Gebiet T durch ein zu dem zuerst betrachteten völlig analoges Verfahren („der gürtelförmigen Verschmelzung“) bestimmen.²⁷⁹⁾

In ähnlicher Weise lassen sich unendliche Gebiete behandeln.²⁸⁰⁾

Ist einmal das Analogon des *Schwarzschen* Hilfssatzes im Raume bewiesen, so macht eine Übertragung der vorstehenden Ergebnisse auf räumliche Gebiete keine Schwierigkeiten. Beides ist von *A. Korn* durchgeführt worden.^{281) 282) 283)}

279) Der Name rührt von *C. Neumann* her. Der Beweis ist diesmal besonders einfach und stützt sich auf die elementare Tatsache der Nichtexistenz eines Extremums im Regularitätsgebiete. Man vergleiche *H. A. Schwarz*, loc. cit. 276, passim; *C. Neumann*, *Abelsche Integrale*, p. 452—454; *A. Korn*, *Potentialtheorie* 1, p. 306—309; 2, p. 226—227.

280) Vgl. *H. A. Schwarz*, loc. cit. 276), passim; *A. Korn*, *Potentialtheorie* 2, p. 226—227.

281) Vgl. *A. Korn*, *Potentialtheorie* 1, p. 295—299 sowie p. 299—320; loc. cit. 55) c) 1. Abh.

282) Die eingangs eingeführten Voraussetzungen über T_1 und T_2 kann man durch die folgenden weiter reichenden ersetzen: 1. Das erste Randwertproblem hat für jedes dieser Gebiete eine Lösung. 2. S_1 und S_2 haben zwei Punkte P_1 und P_2 gemeinsam und in diesen je eine, oder zwei Tangenten (einen Eckpunkt). Außer in P_1 und P_2 braucht die Existenz der Tangenten nicht vorausgesetzt zu werden. 3. Der Bogen $S_{1,2}(S_{2,1})$ liegt in $T_2 + S_2(T_1 + S_1)$ und berührt $S_2(S_1)$ nicht. Das Gebiet $T_1 + T_2 - \bar{T}$ hat in P_1 und P_2 je eine Ecke oder allenfalls eine nach innen gerichtete Spitze. In der Tat läßt sich der *Schwarzsche* Hilfssatz jetzt ähnlich wie in der Nr. 13 beweisen.

Analoge Bemerkungen gelten im Raume.

283) Es mögen $T_k (k = 1, \dots, n)$ beschränkte Gebiete in \mathbb{C} bezeichnen, die so beschaffen sind, daß 1. das erste Randwertproblem in einem jeden Gebiete gelöst werden kann (weshalb (Nr. 45c) jedenfalls Punkte als Randkomponenten ausgeschlossen sind), 2. zwei verschiedene Randkomponenten höchstens endliche viele Punkte miteinander gemeinsam haben, 3. diese Punkte allemal nur zwei Randkomponenten angehören, 4. die Gesamtheit der Punkte, die in einem (oder mehreren) T_k liegen, ein Gebiet T bildet. Sei f_1 eine in $T + S$ stetige Funktion. Es liegt die Frage nahe, ob das erste Randwertproblem in T (Randfunktion f_1) wie folgt gelöst werden kann: Man bestimme die zu f_1 als Randfunktion gehörige Lösung u_1 der ersten Randwertaufgabe in T_1 , sodann die zu f_2 gehörige Lösung u_2 in T_2 ($f_2 = f_1$ in $T - T_1$, $f_2 = u_1$ in T_1), zu f_3 gehörige Lösung u_3 in T_3 ($f_3 = f_2$ in $T - T_2$, $f_3 = u_2$ in T_2) usw., wobei auf T_n jedesmal T_1 folgt. Nach *H. Lebesgue* (*Rend. del Circolo Mat. di Palermo* 24 (1907), p. 371 bis 402 [p. 399—402] (Nr. 45c) ist die Folge $f_k (k = 1, 2, \dots)$ in $T + S$ gleichmäßig konvergent: $u = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k$ ist die Lösung des Randwertproblems. Die Ergebnisse von

Lebesgue gelten übrigens unter noch allgemeineren Voraussetzungen. (Vgl. a. a. O.). Auch in dem besonderen Falle von zwei Gebieten der Klasse B reicht das *Lebesgue-*

b) *Ebene Gebiete der Klasse E und M.* Das erste Randwertproblem. Die Bemerkungen der Fußnote 282) gestatten eine wiederholte Anwendung der Nr. 24a betrachteten Verfahren. Das Schwarzsche alternierende Verfahren führt bei einmaliger Anwendung auf ein Gebiet der Klasse M in \mathfrak{E} mit zwei einspringenden Ecken (die eingeschlossenen Winkel $\alpha_1, \alpha_2 > \pi$ und $< 2\pi$), die Nr. 24a an zweiter Stelle betrachtete Methode auf ein Gebiet derselben Klasse mit zwei nach außen gewandten Ecken ($\alpha_1, \alpha_2 > 0$ und $< \pi$). Von hier aus kann man zur Auflösung des ersten Randwertproblems für beliebige Gebiete T der Klasse M in \mathfrak{E} gelangen. Es genügt hierzu T von einer endlichen Anzahl Gebiete der Klasse B , oder der soeben erwähnten Elementargebiete mit nur zwei Ecken in geeigneter Weise „dachziegelartig“ zu überdecken (Nr. 2 Fußnote 19) und diese durch alternierendes Verfahren sukzessive miteinander zu verschmelzen (vgl. *W. F. Osgood*, II B 1 Nr. 27, insbesondere die Fig. 6 und 7 sowie *W. F. Osgood*, Funktionentheorie, p. 697—699).^{284) 285)}

In einer ganz ähnlichen Weise kann man im Raume vorgehen. Man findet so die Lösung des ersten Randwertproblems für räumliche Gebiete der Klasse Lh ²⁸⁶⁾ und beliebige stetige Randwerte.

Es sei S ein einfach zusammenhängendes Flächenstück der Klasse B , dessen Randlinie auf einer anderen, die erste nicht berührenden Fläche der gleichen Klasse liegt (somit die Schnittlinie zweier Flächen dieser Art darstellt). Man kann durch ein alternierendes Verfahren diejenige stetige, außer auf S , überall (auch im Unendlichen) reguläre Potentialfunktion bestimmen, die auf dem doppelt

sche Resultat insofern über das Schwarzsche hinaus, als die Randkurven nunmehr einander berühren dürfen. *Lebesgue* bedient sich bei seinen Untersuchungen der Hilfsmittel der Variationsmethoden (Nr. 45 c). Diese spielen auch bei gewissen verwandten Betrachtungen von *S. Zaremba* (loc. cit. 543) b) und c) eine Rolle. Man vergleiche auch die Bemerkungen von *R. Courant*, loc. cit. 556), p. 549—550. Über den Zusammenhang des alternierenden Verfahrens mit der *Poincaréschen* Méthode der balayage vergleiche Nr. 36.

284) An der bezeichneten Stelle werden übrigens Gebiete der Klasse D betrachtet, die angewandte Methode ist von der im Text angegebenen verschieden. Man vergleiche hierüber die Ausführungen weiter unten.

285) Das erste Randwertproblem für Gebiete der Klasse M (ohne Spitzen) in \mathfrak{E} läßt sich nach *S. Zaremba* durch *Neumannsche* Reihen (Nr. 17 c, insbesondere Fußnote 198) direkt auflösen. Das soeben auseinandergesetzte indirekte Verfahren leistet insofern mehr, als nunmehr auch einspringende Spitzen zugelassen werden können.

286) *A. Korn* gewinnt so die Lösung des ersten Randwertproblems für räumliche Gebiete der Klasse B , indem er von Gebieten der gleichen Klasse, die in bezug auf einen Punkt konvex sind, ausgeht. Vgl. Nr. 17 c.

gezählten Flächenstücke S eine vorgeschriebene stetige Wertfolge annimmt.²⁸⁷⁾

Bereits um die Mitte der siebziger Jahre war *H. A. Schwarz* zu einer vollständigen Auflösung des ersten Randwertproblems für Gebiete der Klasse E in \mathfrak{E} oder \mathfrak{E}_m gelangt. Es seien $x = \Re_1(t)$, $y = \Re_2(t)$ Gleichungen eines (doppelpunktlosen) analytischen und regulären Kurvenstückes Σ in \mathfrak{E} (vgl. Nr. 2). Durch Vermittelung der Funktion $z_1(t) = \Re_1(t) + i\Re_2(t)$ läßt sich ein in der komplexen z -Ebene gelegenes, Σ enthaltendes Gebiet auf ein Gebiet der t -Ebene konform abbilden, so daß Σ einem Stück der Achse des Reellen entspricht.²⁸⁸⁾ Man kann mithin gewiß ein Gebiet der Klasse D in T angeben, dessen Rand einen zusammenhängenden Teil einer Seite der Begrenzung von T (mit Einschluß eines ihrer Endpunkte) mit S gemeinsam hat und auf ein Kreissegment, also auch auf eine Kreisfläche konform abgebildet werden kann. Liegen nach außen gerichtete Spitzen nicht vor, so läßt sich T von einer endlichen Anzahl Elementargebiete, für die das erste Randwertproblem gelöst werden kann, in geeigneter Weise dachziegelartig überdecken. Das alternierende Verfahren (Nr. 24a, erste Grundform) führt zu einer vollständigen Lösung der ersten Randwertaufgabe (vgl. *Osgood*, II B 1 Nr. 21). Für den Fall, daß nach außen gerichtete Spitzen vorkommen, liegen Veröffentlichungen von *H. A. Schwarz* nicht vor. (Vgl. übrigens Nr. 24c, insbesondere die Fußnote 289.) Sind die Krümmungsradien der beiden Nachbarseiten von S in dem Scheitel der Spitze voneinander verschieden, so läßt sich ein geeignetes Elementargebiet, von einer Kreisbogenspitze in der Ebene t ausgehend, bestimmen (vgl. *Osgood*, II B 1 Nr. 21 Fig. 8).

c) *Gebiete der Klasse E und M in \mathfrak{E} . Konforme Abbildung auf analytische Gebiete. Das zweite Randwertproblem.* Es sei T ein einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse E oder M in \mathfrak{E} . Den Ausführungen der Nr. 24b gemäß ist die Existenz der zu T gehörigen *Greenschen Funktion* $G(\xi, \eta; x, y)$ sichergestellt. Außer in den Ecken

287) Vgl. die Fußnote 326) (Nr. 24i).

288) Vgl. *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 149—151; *É. Picard*, *Traité* 2 p. 297—301. Siehe ferner *Osgood*, II B 1 Nr. 20. Die konjugiert komplexen Werten von t entsprechenden Punkte der Ebene z_1 nennt *Schwarz* „symmetrisch“. Die Symmetriebeziehung ist von der Wahl des Parameters t unabhängig.

Untersuchungen über durch analytische Funktionen vermittelte („konforme“) Beziehungen analytischer und regulärer Kurven sind neuerdings von *E. Kasner*, Fifth intern. Congr. of Math., Cambridge 1 (1913), p. 81—87; Trans. of the Amer. Math. Soc. 16 (1915), p. 333—349 und *G. A. Pfeiffer*, Amer. Journ. of Math. 37 (1915), p. 395—430 angestellt worden.

und Spitzen ist auch jetzt noch $\frac{\partial}{\partial n} G(\xi, \eta; s)$ vorhanden, stetig und > 0 .

Durch Vermittlung der Funktion

(1) $Z = Z(z) = e^{-(\sigma + i\nu)} (U(x, y) = G(\xi, \eta; x, y), V$ zu U konjugiert) wird $T + S$ auf den Bereich $K + C$ ($|Z| \leq 1$) konform abgebildet. Der Beweis läuft dem in der Nr. 20 angedeuteten völlig parallel.

Wegen $\frac{\partial}{\partial n} G(\xi, \eta; s) > 0$ wird S , höchstens mit Ausnahme der Ecken und Spitzen, auf den Einheitskreis umkehrbar eindeutig und stetig bezogen. Für Gebiete der Klasse E hat *H. A. Schwarz* gezeigt, daß auch Ecken und Spitzen keine Ausnahme bilden.²⁸⁹⁾ Einen von diesem ganz verschiedenen Beweis gibt *É. Picard*.²⁹⁰⁾ Die folgende einfache Überlegung rührt von *P. Koebe* her und stellt eine Modifikation der *Picard'schen* Schlußweise dar.²⁹¹⁾ Das Gebiet T möge etwa in P eine einzige Ecke haben. Wegen $\frac{\partial}{\partial n} G(\xi, \eta; s) > 0$ entspricht S (nach Fortnahme von P) in der Ebene Z gewiß ein zusammenhängender (offener) Kreisbogen C^* . Es sei $C - C^*$ ebenfalls ein Kreisbogen und es sei $\bar{T} + \bar{S}$ irgendein einfach zusammenhängender Bereich in $K + C$, dessen Rand $C - C^*$ (Endpunkte eingeschlossen) enthält. Konvergiert $\bar{T} + \bar{S}$ gegen $C - C^*$, so muß das \bar{T} in der Ebene z entsprechende Gebiet gegen P konvergieren. Die Funktion $z(Z)$ hätte auf $C - C^*$ einen konstanten Wert, was ausgeschlossen ist. Es ist also $C - C^*$ ein Punkt. Man findet zugleich, daß $Z(z)$ auch in P stetig ist.

Dieser Beweis gilt für alle Gebiete der Klasse E , M oder Q ²⁹²⁾ in \mathfrak{E} .

289) Den Beweis hat *Schwarz* in seinen Vorlesungen an der Berliner Universität wiederholt vorgetragen, jedoch nicht veröffentlicht.

290) Vgl. *É. Picard*, *Traité* 2, p. 305—307, zuerst im Jahre 1888 in den Pariser Vorlesungen mitgeteilt. (Man vergleiche auch *W. F. Osgood*, *Funktionentheorie*, p. 673—676 sowie p. 681—687.) Eine andere Fassung gibt *C. Carathéodory*, *Schwarz Festschrift*, Berlin 1914, p. 19—41 [p. 37—38]. *Carathéodory* betrachtet Ecken, deren Seiten, außer höchstens im Eckpunkte selbst, analytisch und regulär sind, in diesem aber je eine stetige Tangente haben. Seine Betrachtungen gelten für Gebiete der Klasse Q . Man vergleiche ferner *P. Koebe*, *Journal f. Math.* 145 (1915), p. 177—223 [p. 209—212]. *C. Carathéodory* beweist an gleicher Stelle den (von ihm erweiterten) Satz von *P. Painlevé* (*C. R.* 112 (1891), p. 653 bis 657), daß in einem Punkte, in dem die Randkurve eine oder zwei Tangenten hat (der eingeschlossene Winkel > 0 und $\leq 2\pi$), die Abbildung „quasikonform“ ist (vgl. Nr. 48a, insbesondere die Fußnote 595). Dort findet sich auch ein Hinweis auf gewisse neue Ergebnisse von *W. Groß*.)

291) Vgl. *P. Koebe*, *Gött. Nachr.* 1907, p. 633—669 [p. 666—667].

292) Das letztere, sobald die Existenz der *Greenschen* Funktion erbracht ist (Nr. 38).

Wie in der Nr. 22 ist hiermit zugleich gezeigt, daß jedes mehrfach zusammenhängende Gebiet der Klasse E , M oder Q^{293}) in \mathfrak{E} auf ein Gebiet der Klasse C in \mathfrak{E} konform abgebildet werden kann. Da die Greensche Funktion der konformen Abbildung gegenüber invariant ist, so gilt insbesondere der Reziprozitätssatz (3) Nr. 20 für alle Gebiete der Klasse E , M oder Q^{293}). Da auch der Ausdruck $\frac{\partial}{\partial n_i} G(\xi, \eta; t) dt$ invariant bleibt, so gilt die Fundamentalformel

$$(2) \quad u(\xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \int_S f(t) \frac{\partial}{\partial n_i} G(\xi, \eta; t) dt$$

für alle Gebiete der Klasse E , M oder Q^{293}) in \mathfrak{E} und beliebige abteilungsweise stetige $f(s)^{293}$.

Es sei T ein Gebiet der Klasse E , M oder Q^{293}) Um das zweite Randwertproblem unter Zugrundelegung beliebiger abteilungsweise stetiger Werte der Normalableitung zu erledigen, erscheint es am einfachsten, T auf ein Gebiet der Klasse C in \mathfrak{E} konform abzubilden. Für diesen ist sodann das zweite Randwertproblem aufzulösen. Die neuen Werte der Normalableitung sind unbedingt integrierbar und, außer höchstens in einer endlichen Anzahl isolierter Punkte $P_j (j = 1, \dots, n)$, abteilungsweise stetig. Die Lösung (Nr. 17) erscheint in der Form des Potentials einer einfachen Belegung, deren Dichte unbedingt integrierbar und, außer in $P_j (j = 1, \dots, n)$, abteilungsweise stetig ist. Ob die Lösung selbst in jenen Punkten stetig ist, kann erst eine weitere Untersuchung zeigen.²⁹⁴) Bei einem Gebiete der Klasse M^{295}) führt übrigens nach S. Zaremba die Robinsche Methode direkt zum Ziele (Nr. 17c). Die Lösung ist in $T \dashv S$ stetig.

Eine vollständige Behandlung des zweiten Randwertproblems in dreidimensionalen Gebieten mit Kanten und körperlichen Ecken, z. B. den Gebieten der Klasse D , liegt zur Zeit nicht vor. Eine Lösungsmöglichkeit dürften die Variationsmethoden sowie die Untersuchungen von S. Zaremba, R. Bär und T. Carleman²⁹⁶) bieten.

d) *Lösungen mit vorgeschriebenen Periodizitätsmoduln.* Unter den weiteren Problemen, die durch alternierendes Verfahren gelöst werden

293) Das Integral rechter Hand ist unbedingt konvergent. Man vergleiche die Fußnote 249).

294) Bei Gebieten der Klasse D ist dies den Sätzen der Nr. 23 zufolge gewiß der Fall (vgl. L. Lichtenstein, loc. cit. 272), p. 110—112).

295) Ohne (nach innen gerichtete) Spitzen.

296) Vgl. R. Bär, loc. cit. 199), p. 18—19 und T. Carleman, loc. cit. 198), p. 31—38. Carleman betrachtet a. a. O. Gebiete (im Raume), deren Rand aus

können, sei zunächst die Bestimmung derjenigen in einem mehrfach zusammenhängenden Gebiete T der Klasse B (allgemeiner der Klasse E oder M) in \mathfrak{E} regulären Potentialfunktion genannt, die auf S vorgeschriebene Werte²⁹⁷⁾ annimmt und vorgegebene Periodizitätsmoduln hat.²⁹⁸⁾ Im übrigen läßt sich dieses Problem durch Subtraktion eines geeigneten Ausdruckes von der Form $\sum_h A_h \operatorname{arctg} \frac{y - \beta_h}{x - \alpha_h}$ auf die Bestimmung einer eindeutigen Potentialfunktion zurückführen.²⁹⁹⁾ Anders verhält es sich bei dem analogen Problem auf \mathfrak{E}_m oder im Raume; hier leistet das alternierende Verfahren wesentliche Dienste.³⁰⁰⁾

e) *Zweidimensionale Gebiete auf einer Fläche im Raume. Konforme Abbildung auf ebene Gebiete.* Es sei \mathfrak{S} ein einfach zusammenhängendes Gebiet auf einer Fläche der Klasse Ah :

$$(1) \quad x = x(\nu, \omega), \quad y = y(\nu, \omega), \quad z = z(\nu, \omega),$$

$$(2) \quad dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = E d\nu^2 + 2F d\nu d\omega + G d\omega^2.$$

Man kann in unendlich mannigfaltiger Weise nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetige Funktionen

$$(3) \quad \xi = U(\nu, \omega), \quad \eta = V(\nu, \omega)$$

bestimmen, so daß \mathfrak{S} durch $\xi + i\eta$ auf ein Gebiet \mathfrak{O} der Ebene (ξ, η) konform abgebildet wird. Dies besagt, daß $dl^2 = \psi(\nu, \omega)[d\xi^2 + d\eta^2]$ gesetzt werden kann und im Innern und auf dem Rande von \mathfrak{S} die Funktion ψ stetig und > 0 ist. Die partiellen Ableitungen $D_1 \xi, D_1 \eta$

einer endlichen Anzahl Flächenstücke der Klasse B besteht, die einander nirgends berühren. Körperliche Ecken sind ausgeschlossen.

297) Ist $f(s)$ eine Randfunktion, so gilt $f(s + l) = f(s) + c$, unter l die Länge der jeweiligen Randkomponente, unter c eine Konstante verstanden; $f(s)$ kann etwa stetig vorausgesetzt werden.

298) H. A. Schwarz, Math. Ann. 21 (1883), p. 157—160; Ges. Abh. 2, p. 303 bis 306; É. Picard, Traité 2, p. 508—513.

299) Vgl. J. Riemann, Thèse, Paris 1888; É. Picard, Traité 2, p. 513.

300) Doppelperiodische Greensche Funktion in \mathfrak{E} führt M. Mason, Trans. of the Amer. Math. Soc. 6 (1905), p. 159—164 ein. Dreifach periodische Potentialfunktionen im Raume sind von P. Appell, Acta Math. 4 (1884), p. 313—374 [p. 347—371] untersucht worden. Man vergleiche ferner P. Appell, Acta Math. 8 (1886), p. 265—294; Rend. del Circ. Mat. di Palermo 22 (1906), p. 361—370. Doppelperiodische Potentialfunktionen im Raume betrachtet Isabella Crespi, Giorn. di Matem. 145 (1907), p. 129—152.

sind in diesem Bereiche stetig und genügen einer *Hölder*schen Bedingung. Auch $\psi(\nu, \omega)$ genügt einer *H*-Bedingung.³⁰¹⁾

Es sei jetzt \mathfrak{S} ein über einer Fläche der Klasse *D* ausgebreitetes einfach zusammenhängendes Gebiet, das eine und nur eine Kante³⁰²⁾ enthält. Die an die Kante anschließenden Seitenflächen heißen \mathfrak{S}_1 und \mathfrak{S}_2 . Es seien $\xi_1 = \xi_1 + i\eta_1$ und $\xi_2 = \xi_2 + i\eta_2$ Funktionen, durch deren Vermittlung zwei sich längs eines Bogens Σ der Kante schneidende Stücke der (über Σ fortgesetzt gedachten) Seitenflächen \mathfrak{S}_1 und \mathfrak{S}_2 derart auf ebene Gebiete abgebildet werden, daß Σ allemal ein Stück der Geraden $\eta = 0$ entspricht. Aus der von *C. F. Gauß* entwickelten Theorie³⁰³⁾ folgt, daß ξ_2 auf einem zusammenhängenden Stück der Geraden $\eta = 0$ und einer Umgebung dieses als eine analytische und reguläre Funktion von ξ_1 aufgefaßt werden kann: $\xi_2 = \Phi(\xi_1)$. Durch Vermittlung der Funktionen ξ_2 auf \mathfrak{S}_2 , $\Phi(\xi_1)$ auf \mathfrak{S}_1 wird ein auf beiden Seiten von Σ ausgebreiteter Bereich in \mathfrak{S} auf einen ebenen Bereich konform abgebildet.³⁰⁴⁾

301) Die Funktionen ξ und η genügen den simultanen partiellen Differentialgleichungen vom elliptischen Typus

$$(4) \quad \frac{\partial \eta}{\partial \nu} = \left[F \frac{\partial \xi}{\partial \nu} - E \frac{\partial \xi}{\partial \omega} \right] \frac{1}{\Pi}, \quad \frac{\partial \eta}{\partial \omega} = \left[G \frac{\partial \xi}{\partial \nu} - F \frac{\partial \xi}{\partial \omega} \right] \frac{1}{\Pi}, \quad \Pi = \sqrt{EF - G^2}.$$

Liegt insbesondere eine Fläche der Klasse *B* vor, so genügen ξ und η der sich selbst adjungierten partiellen Differentialgleichung zweiter Ordnung vom elliptischen Typus

$$(5) \quad \Delta_1 \xi = \frac{\partial}{\partial \nu} \left\{ \left[G \frac{\partial \xi}{\partial \nu} - F \frac{\partial \xi}{\partial \omega} \right] \frac{1}{\Pi} \right\} + \frac{\partial}{\partial \omega} \left\{ \left[-F \frac{\partial \xi}{\partial \nu} + E \frac{\partial \xi}{\partial \omega} \right] \frac{1}{\Pi} \right\} = 0, \quad \Delta_2 \eta = 0.$$

Für Flächenstücke der Klasse *C* ist die Möglichkeit der konformen Abbildung auf schlichte Gebiete bereits von *C. F. Gauß* bewiesen worden (Werke 4, p. 193 bis 216). In dem besonderen Falle, daß die Funktionen (1) stetige partielle Ableitungen der drei ersten Ordnungen haben und die Ableitungen dritter Ordnung der *Hölder*schen oder, allgemeiner, einer verwandten *Dinischen* Bedingung genügen, folgt diese Möglichkeit aus den Untersuchungen von *E. E. Levi* (Rend. del. Circolo Mat. di Palermo 24 (1907), p. 275—317) und *D. Hilbert*, Gött. Nachr. 1910, p. 1—65 [p. 8—34]; Grundzüge, p. 219—242. Für Flächenstücke der Klasse *B'* ist der Beweis von *L. Lichtenstein* gegeben worden (Berl. Abh. 1911, Anhang). Einen anderen Beweis hat *A. Korn* für Flächenstücke der Klasse *Bh* geliefert (Schwarz Festschrift 1914, p. 215—229). In dem Umfange des Textes ist der betrachtete Satz neuerdings von *L. Lichtenstein* bewiesen worden (Bulletin de l'Acad. de Sc. de Cracovie 1916, p. 192—217).

302) Daher gewiß keine räumliche Ecke.

303) Vgl. loc. cit. 301).

304) Die Abbildung ist auch längs der Kante konform. Der im Text angedeutete Beweis geht auf *H. A. Schwarz* zurück, dem die Möglichkeit der fraglichen konformen Abbildung schon im Jahre 1870 bekannt war. Vgl. *H. A. Schwarz*, Berl. Monatsberichte 1870, p. 767—795; Ges. Abh. 2, p. 144—171

In ähnlicher Weise wird man vorgehen, wenn mehrere Kanten vorliegen. Enthält \mathfrak{S} eine räumliche Ecke, so bietet eine konforme Abbildung auf ein schlichtes Gebiet in \mathfrak{E} Schwierigkeiten, die erst durch *P. Koebe* überwunden worden sind. Die eindeutig umkehrbare Beziehung von \mathfrak{S} und \mathfrak{O} ist jetzt überall stetig und, außer in dem Eckpunkt selbst, konform. Mit dem besonderem Falle, wenn die in der Ecke zusammenstoßenden Flächen ebene oder sphärische Flächen sind, hat sich bereits *H. A. Schwarz* beschäftigt.³⁰⁵⁾ Für körperliche Ecken, deren Seitenflächen der Klasse C angehören, ist die Möglichkeit der erwähnten konformen Abbildung zuerst von *P. Koebe* bewiesen worden (Nr. 41).³⁰⁶⁾

Jede Fläche S der Klasse D (und voraussichtlich auch Lh) läßt sich mithin von einer endlichen Anzahl Gebiete, deren jedes auf eine Kreisfläche konform abgebildet werden kann, dachziegelartig überdecken. Es sei \mathfrak{S}^* ein über S ausgebreitetes einfach zusammenhängendes Gebiet, dessen Begrenzung mit den Kanten endlich viele Punkte oder Bögen gemeinsam hat und aus einer endlichen Anzahl Stücke von Kurven mit stetiger Tangente besteht, die Ecken, jedoch keine Spitzen miteinander einschließen.³⁰⁷⁾ Durch alternierendes Verfahren läßt sich \mathfrak{S}^* auf die Fläche eines Einheitskreises in einer schlichten Ebene konform abbilden. Hiermit ist auch die erste und die zweite Randwertaufgabe der Differentialgleichung $\Delta_2 u = 0$ ³⁰⁸⁾ für das Gebiet \mathfrak{S}^* erledigt.

[p. 161—162]. Einen anderen Beweis gibt *R. König*, *Math. Ann.* 71 (1911), p. 184 bis 205 [185—189] an. Der betrachtete Satz gilt voraussichtlich auch bei Gebieten, die über Flächen der Klasse Lh ausgebreitet sind. Der Beweis wäre indessen anders zu führen.

305) Vgl. die Andeutungen von *H. A. Schwarz*, a) *Journ. f. Math.* 70 (1869), p. 105—120; *Ges. Abh.* 2, p. 65—83 [p. 80—83]; b) *Berl. Monatsber.* 1870, p. 767 bis 795; *Ges. Abh.* 2, p. 144—171 [p. 167].

306) *P. Koebe*, *Gött. Nachr.* 1908, p. 359—360 sowie loc. cit. 582) d) p. 95—103 [s. die Ausführungen der Nr. 47 p. 360—361]. Vgl. ferner *R. König*, *Gött. Nachr.* 1910, p. 130—132 sowie loc. cit. 304). Diese Beweise gelten wahrscheinlich unverändert, auch wenn die Seitenflächen der Klasse Ah angehören, sowie erst die am Schluß der Fußnote 304) behauptete Möglichkeit feststeht.

307) Die Berandung Σ^* von \mathfrak{S}^* wird durch eine (endliche) Anzahl Gleichungen von der Form $v = v(\omega)$ oder $\omega = \omega(v)$ bestimmt. Es wird vorausgesetzt, daß die Funktionen $v(\omega)$ und $\omega(v)$ stetige, der *Hölder*schen Bedingung genügende Ableitung haben, und überdies Σ^* keinen körperlichen Eckpunkt von S enthält.

308) Vgl. *H. A. Schwarz*, *Ges. Abh.* 2, p. 144—174 [p. 161—162]. *Schwarz* betrachtet ein über einer Fläche der Klasse D ausgebreitetes Gebiet, dessen Rand aus einer endlichen Anzahl Stücke analytischer und regulärer Kurven besteht. Die Möglichkeit der konformen Abbildung einer körperlichen Ecke wird postuliert. In dem allgemeineren Falle einer Fläche der Klasse Lh erscheint es bei der

Es sei s_0 ein Punkt auf einer Seitenfläche von S und $\xi = \xi + i\eta$ eine Funktion, durch deren Vermittlung ein s_0 enthaltendes Gebiet auf S auf ein schlichtes Gebiet in \mathfrak{E} konform abgebildet wird. Wir setzen $\xi(s_0) = \xi_0$.

Ist die Fläche S schlichtartig, so kann man sie auf eine Kugel derart konform abbilden, daß drei vorgeschriebenen Punkten auf S ebenso viele vorgegebene Punkte der Kugel entsprechen.³⁰⁹⁾

Der Beweis ist erbracht, sobald die Existenz einer auf S , außer in s_0 , regulären Lösung U der Differentialgleichung $\Delta_2 u = 0$, die sich in der Umgebung von s_0 wie $\Re \left[\frac{1}{\xi - \xi_0} + (\xi - \xi_0) \mathfrak{P}(\xi - \xi_0) \right]$ verhält, feststeht. Der Existenzbeweis läßt sich nach der Methode der gürtelförmigen Verschmelzung, in einer von der Nr. 24a auseinandergesetzten abweichenden Gestalt, durchführen.³¹⁰⁾ Das Potential U ist als „Strömungspotential“ zuerst von *F. Klein* systematisch betrachtet worden.³¹¹⁾

Ist V die zu U konjugierte Lösung der Gleichung $\Delta_2 u = 0$, so wird S durch Vermittlung der Funktion $U + iV$ auf die schlichte Ebene, mit Einschluß des unendlich fernen Punktes, konform abgebildet. Von hier aus gelangt man durch stereographische Projektion auf die Einheitskugel. Allgemeiner läßt sich in derselben Weise die Existenz einer auf S , außer in $s_j (j = 1, \dots, m)$, regulären Lösung der Differentialgleichung $\Delta_2 u = 0$ dartun, die in der Umgebung von s_j sich

Formulierung der Randwertaufgabe notwendig, die Gleichung $\Delta_2 u = 0$ durch die simultanen Differentialgleichungen (4) zu ersetzen, dies weil die Existenz der Ableitungen $D_2 \xi$, $D_2 \eta$ nicht feststeht. Längs der Kanten werden, auch wenn S der Klasse D angehört, $D_2 u$ im allgemeinen sich sprungweise ändern. In den körperlichen Ecken wird u schlechthin stetig vorausgesetzt.

309) Vgl. die Fußnote 308). Ein anderes Verfahren zur konformen Abbildung geschlossener, schlichtartiger Gebiete, insbesondere geschlossener, schlichtartiger *Riemannscher* Flächen auf eine Kugel findet sich bei *P. Koebe*, loc. cit. 582) d) p. 77—83. Man vergleiche die Ausführungen der Nr. 47 p. 360 und 363.

310) Vgl. *H. A. Schwarz*, loc. cit. 276), insb. Ges. Abh. 2, p. 167—171. Man vergleiche ferner *H. A. Schwarz*, Math. Ann. 21 (1883), p. 157—160; Ges. Abh. 2, p. 303—306, wo die Existenz *Abelscher* Integrale erster Art auf einer geschlossenen *Riemannschen* Fläche bewiesen wird, und *C. Neumann*, *Abelsche Integrale*, p. 432—471 [p. 466—471] (die *Schwarzsche* Methode findet sich unter anderem bei *É. Picard*, *Traité* 2, p. 508—522 und 538—546 im Zusammenhang dargestellt). Man vergleiche ferner *W. F. Osgood*, II B 1 Nr. 22. Die Methode der gürtelförmigen Verschmelzung läßt sich auch durch ein von *L. Lichtenstein* angegebenes verallgemeinerungsfähiges Verfahren ersetzen (vgl. Nr. 24j).

311) Vgl. *F. Klein*, *Algebraische Funktionen*, passim; *Riemannsche* Flächen 1, p. 4—16.

wie $\Re \left[\sum_k^{1\dots k_j} \frac{A_{jk} + B_{jk}i}{(\xi - \xi_j)^k} + (A_j + B_j i) \log (\xi - \xi_j) \right]$ verhält, sofern nur $\sum_j (A_j + B_j i) = 0$ ist.

f) *Gebiete in \mathfrak{G}_m . Existenzsätze der Riemannschen Theorie.* Sei T ein einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{G}_m oder \mathfrak{G}_m^* (p. 188). Wiederholte Anwendung des alternierenden Verfahrens liefert die Lösung des ersten Randwertproblems.³¹²⁾ Man gewinnt so ferner die Greensche Funktion $G(\xi, \eta; x, y)$ des Gebietes T und die konforme Abbildung dieses auf ein Kreisgebiet. Jedes beliebige mehrfach zusammenhängende schlichtartige Gebiet in \mathfrak{G}_m läßt sich durch Hinzufügung einer Anzahl weiterer Gebiete zu einem einfach zusammenhängenden ergänzen, folglich auf ein schlichtes Gebiet konform abbilden.³¹³⁾ Die Sätze der Nr. 20 lassen sich in naheliegender Weise auf schlichtartige Gebiete in \mathfrak{G}_m übertragen.

Es sei \Re eine über der z -Ebene ausgebreitete geschlossene Riemannsche Fläche. Durch eine weitere Ausgestaltung der Nr. 24a) bis e) besprochenen Methoden gelangt man zu einer der wichtigsten Anwendungen der kombinatorischen Methoden, nämlich zu einem Beweise der auf \Re bezüglichen Riemannschen Existenzsätze und damit zu einer Begründung der Riemannschen Theorie der algebraischen Funktionen (vgl. *W. F. Osgood*, II B 1 Nr. 22, *W. Wirtinger*, II B 2 Nr. 12). Statt einer geschlossenen Riemannschen Fläche kann man der Betrachtung eine beliebige geschlossene Fläche S der Klasse D (und voraussichtlich auch Lh) zugrunde legen (*W. F. Osgood*, II B 1 Nr. 22).³¹⁴⁾

Es sei $s_j (j = 1, \dots, m)$ wie vorhin eine Anzahl von Punkten auf S . Es sei $W_0 = U_0 + iV_0$ irgendeine auf S erklärte, bis auf jene Punkte,

wo sie sich wie $\sum_k^{1\dots k_j} \frac{A_{jk} + B_{jk}i}{(\xi - \xi_j)^k}$ verhält, reguläre eindeutige Funktion.

Durch Vermittelung von W_0 wird S auf eine über der $U_0 + iV_0$

312) Enthält T Windungspunkte, so wird man sich bei der „dachziegelartigen“ Überdeckung auch mehrblättriger, etwa von einem mehrfach umfahrenen Kreise begrenzter Teilgebiete, bedienen. Etwa vorhandene Faltungslinien werden als Kanten aufgefaßt.

313) Vgl. z. B. *P. Koebe*, Jahresb. d. Deutschen Math. Ver. 15 (1906), p. 142—153 [p. 150—153]. Dort finden sich p. 152 entsprechende Sätze über nichtschlichtartige Gebiete.

314) Vgl. *F. Klein*, Algebraische Funktionen, ferner *F. Klein*, Riemannsche Flächen; *É. Picard*, Traité 2, p. 508—546; *R. Fricke* und *F. Klein*, Automorphe Funktionen 1.

Ebene ausgebreitete geschlossene *Riemannsche* Fläche \mathfrak{R} umkehrbar eindeutig und stetig und, bis auf die körperlichen Ecken und Windungspunkte, konform abgebildet. Randwertprobleme der Theorie der Differentialgleichung $\Delta_2 u = 0$ auf S werden hierdurch auf analoge Aufgaben der Gleichung $\Delta u = 0$ auf \mathfrak{R} zurückgeführt.

Ist W_1 eine andere Funktion auf S vom gleichen Charakter, so ist $f(W_0, W_1) = 0$, unter f eine ganze rationale Funktion mit konstanten Koeffizienten verstanden. Jeder geschlossenen Fläche der hier betrachteten Art entspricht eine Klasse algebraischer Funktionen. Näheres über die sich daran anschließenden Betrachtungen findet sich in der unter ³¹⁴⁾ an erster Stelle zitierten Schrift von *F. Klein*.

Existenzbeweis *Abelscher* Integrale auf geschlossenen *Riemannschen* Flächen und damit eine Begründung der Theorie algebraischer Funktionen durch Variationsbetrachtungen vergleiche Nr. 45, funktionentheoretische Begründung Nr. 47.

g). *Weitere Anwendungen des alternierenden Verfahrens.* Durch geeignete Ausgestaltung des dem alternierenden Verfahren zugrunde liegenden methodischen Gedankens läßt sich ein Existenzbeweis verschiedener Klassen im Sinne von *B. Riemann* durch ihre Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen erklärter Potential- und analytischer Funktionen erbringen. Hervorzuheben sind namentlich ein Existenzbeweis der zu einem vorgegebenen Fundamentalbereich gehörigen automorphen Potentialfunktionen³¹⁵⁾ und ein Beweis der Fundamentalsätze der Theorie der *Prymschen* Funktionen.³¹⁶⁾ Anwendungen in der neueren Theorie der konformen Abbildung vergleiche Nr. 40.

h) *Strömungspotential. Abbildung auf ein Schlitzgebiet.* Es sei T

315) Vgl. *R. Fricke*, II B 4 Nr. 14; *R. Fricke* und *F. Klein*, Automorphe Funktionen 2, p. 8—14 und *E. Phragmén*, Acta Math. 14 (1890/91), p. 225—232 (p. 228—229). Siehe ferner *F. Klein*, Math. Ann. 24 (1883), p. 141—218 passim; *E. Ritter*, Gött. Nachr. 1892, p. 233 u. ff.; Math. Ann. 41 (1892), p. 1—82; 45 (1894), p. 473—544; 46 (1895), p. 200—248; *L. Schlesinger*, Handbuch der Theorie der linearen Differentialgleichungen, Bd. II 1, p. 323—335. (Doppeltperiodische Potentiale s. bei *É. Picard*, Traité 2, p. 537—538).

Ein anderer Beweis der Existenz automorpher Potentialfunktionen mit beliebiger Grenzkreisgruppe findet sich bei *S. Johansson*, Acta soc. sc. Fenn. 41 Nr. 2 (1912), p. 1—39.

316) Vgl. *F. Prym* und *G. Rost*, *Prymsche* Funktionen, p. 92—152. *Prym* und *Rost* bedienen sich des in geeigneter Weise ausgestalteten alternierenden Verfahrens zur Bestimmung von analytischen Funktionen durch gewisse Randbedingungen, in die der reelle und der imaginäre Teil der zu bestimmenden Funktion gleich eutig eingehen. Vgl. *Frym* und *Rost* a. a. O. p. 103 ff. Eine andere sich der Variationsmethoden bedienende Behandlungsweise gibt *O. Haupt*, Math. Ann. 77 (1915), p. 24—64 [p. 44—48 sowie p. 59—60] (vgl. Nr. 45 d).

ein Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} . Das mit T kongruente, auf der anderen Seite der Ebene gelegene Gebiet heie T_* . Denkt man sich T und T_* lngs des Randes S zusammenhngend, so kann man $T + T_* + S$ als ein geschlossenes Gebiet in \mathfrak{E}^* (p. 188) auffassen. Es seien $\xi = \xi + i\eta$, $z = x + iy$ irgendwelche Punkte in T ,

$$\xi_* = \xi_* + i\eta_*, \quad z_* = x_* + iy_*$$

die mit ihnen zusammenfallenden Punkte in T_* . Wie vorhin kann man durch alternierendes Verfahren eine, auer in ξ und ξ_* , in $T + T_* + S$ regulre Potentialfunktion bestimmen, die sich in ξ und ξ_* entsprechend wie $\Re \frac{1}{z - \xi}$ und $\Re \frac{1}{z_* - \xi_*}$ verhlt. Es gilt $u(x, y) = u(x_*, y_*)$, daher auf $S \dots \frac{\partial u(s)}{\partial n} = 0$.³¹⁷⁾

Allgemeiner knnte man annehmen, da T in \mathfrak{E}_m liegt und der Klasse D angehrt.

Wir wollen an der zuletzt erwhnten Annahme festhalten und berdies voraussetzen, da T schlichtartig ist. Wegen $\frac{\partial u(s)}{\partial n} = 0$ ist die zu u konjugierte Potentialfunktion v eindeutig. Durch Vermittlung der Funktion $Z = u + iv$ wird T auf ein von geradlinigen Strecken (Schlitzen) parallel zur Achse des Reellen begrenztes Gebiet in \mathfrak{E} , das den unendlich fernen Punkt enthlt, abgebildet.³¹⁸⁾

i) *Gemischte Randbedingungen.* Es sei T ein schlichtartiges zweifach zusammenhngendes Gebiet der Klasse B ³¹⁹⁾ in \mathfrak{E}_m . Eine weitere Anwen-

317) Vgl. *P. Koebe*, Math. Ann. 69 (1910), p. 1—81 [p. 43—46] (vgl. Nr. 24 i). Die Auffassung des Gebietes $T + T_* + S$ als einer geschlossenen Flche geht auf *H. A. Schwarz* zurck. (Vgl. die Funote 25^b.)

318) Das Bildgebiet mu berall gleichvielblttrig sein. Da der unendlich ferne Punkt jedenfalls einfach bedeckt ist, so ist das Bildgebiet schlicht. Vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 478), p. 348. Der betrachtete Abbildungssatz (fr Gebiete der Klasse C in \mathfrak{E}) findet sich bereits erwhnt bei *F. Schottky*, Journ. f. Math. 83 (1877), p. 300—351 (p. 330). Man vergleiche weiter *F. Schottky*, Journ. f. Math. 117 (1897), p. 225—253 [p. 244—250], wo T auf ein von einer Anzahl konzentrischer Kreisbgen begrenztes Gebiet in \mathfrak{E} abgebildet wird. Lt man den Mittelpunkt durch eine lineare Transformation ins Unendliche rcken, so gelangt man zu der im Text betrachteten Abbildung. Man vergleiche ferner *F. Cecioni*, Rend. del Circolo Mat. di Palermo 25 (1908), p. 1—19 und die Darstellung bei *W. F. Osgood*, Annals of Math. (24) 2 (1913), p. 143—162 [p. 145—148]. Vom Standpunkte der Variationsmethoden behandeln die Aufgabe *D. Hilbert*, Gtt. Nachr. 1909, p. 314—323 und *E. Courant*, Inaugural-Dissertation, Gttingen 1910, p. 1—44, abgedruckt in den Math. Ann. 71 (1912), p. 145 bis 183 (Nr. 45 d). Eine funktionentheoretische Behandlung dieser und einer Reihe verwandter Abbildungsaufgaben (unter Ausschaltung des Integralbegriffs) gibt *Koebe* in einer vor kurzem erschienenen Arbeit. Vgl. loc. cit. 582) e).

319) Allgemeiner der Klasse D (oder M ohne Spitzen).

derung des alternierenden Verfahrens bietet die Bestimmung derjenigen beschränkten, in T regulären Potentialfunktion $u(x, y)$, die den Bedingungen: $u(s) = f_1(s)$ auf S_1 , $\frac{\partial u(s)}{\partial n} = f_2(s)$ auf S_2 genügt, unter S_1 und S_2 die beiden Komponenten von S , unter f_1 und f_2 abteilungsweise stetige Funktionen verstanden. Es sei $v(x, y)$ irgendeine in $T + S$ stetige, in T reguläre, der Bedingung $\frac{\partial v(s)}{\partial n} = f_2(s)$ auf S_2 genügende Potentialfunktion. Die Differenz $u - v = w$ bestimmt sich durch alternierendes Verfahren als diejenige beschränkte in $T + T_* + S_2$ reguläre Potentialfunktion, die auf der doppelt zu zählenden Randkurve S_1 den Wert $f_1(s) - v(s)$ annimmt.³²⁰⁾

Es sei T ein einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse D in \mathfrak{E}_m . Die Randkurve S denken wir uns in endlich viele Bögen (S') der ersten und (S'') der zweiten Kategorie zerlegt. Gesucht wird eine beschränkte, in T reguläre Potentialfunktion $u(x, y)$, so daß auf S' (etwaige Sprungstellen von $f(s)$ ausgenommen) $u(s) = f(s)$, auf S'' (die Endpunkte sowie etwaige Ecken ausgenommen) $\frac{\partial u(s)}{\partial n} = 0$ ist. Unter $f(s)$ wird eine abteilungsweise stetige Funktion verstanden. Durch Hinzunahme des (mit T längs S'' zusammenhängenden) Gebietes T_* wird die Aufgabe auf die Auflösung des ersten Randwertproblems in $T + T_* + S''$ zurückgeführt. Sie hat nur eine Lösung.³²¹⁾

320) T und T_* sind jetzt nur längs S_2 zusammenhängend zu denken.

321) Vgl. *P. Koebe*, Journ. f. Math. 133 (1910), p. 192—253 [p. 211—216]. Es sei T ein beschränktes Gebiet der Klasse D in \mathfrak{E} . Ist auf S'' (Endpunkte sowie etwaige Ecken ausgenommen) $\frac{\partial u(s)}{\partial n} = \varphi(s)$ vorgeschrieben ($\varphi(s)$ abteilungsweise stetig), so wird zuvörderst $u = U - w$ gesetzt: $\Delta w = 0$, $\frac{\partial w(s)}{\partial n} = \varphi(s)$ auf S'' (vgl. *P. Koebe* a. a. O.). Die zuletzt eingeführten Randbedingungen kann man auch so fassen: Auf S' (etwaige Sprungstellen von $f(s)$ ausgenommen) ist $u(s) = f(s)$, auf jedem Bogen von S'' ist $v(s) = \bar{f}(s) + \text{const.}$, unter $v(s)$ die zu $u(s)$ konjugierte Potentialfunktion, unter $\bar{f}(s)$ eine vorgegebene stetige Funktion, die eine abteilungsweise stetige Ableitung hat, verstanden. Vgl. hierzu *V. Volterra*, Ann. di Mat. (2) 11 (1883), p. 1—55 sowie die kritischen Bemerkungen von *H. A. Schwarz*, Fortschr. d. Math. 15, p. 358—364. Eine andere Behandlung des zuletzt erwähnten Problems für einfach zusammenhängende Gebiete der Klasse C in \mathfrak{E} findet sich im Anschluß an *D. Hilbert* (Verh. des 3. intern. Congr. d. Math. in Heidelberg 1904, p. 233—240; Gött. Nachr. 1905, p. 1—32 [p. 1—3]; Grundzüge, p. 81—83) bei *Ch. Haseman*, Inaugural-Dissertation, Göttingen 1907; Math. Ann. 66 (1909), p. 258—272. Mit dem besonderen Falle eines Kreisgebietes beschäftigt sich *C. Neumann*, Leipz. Ber. 61 (1909), p. 156—170, eines Rechteck- und eines Kreisgebietes *H. Villat*, C. R. 153 (1911), p. 758—761; Acta Math. 40 (1915), p. 101—178 [p. 149—176]. Weitere Literatur: *A. Signorini*, Anali di Matematica (3) 25 (1916), p. 263—279.

Es sei insbesondere T ein beschränktes Gebiet der Klasse D in \mathfrak{E} .

Auf ähnliche Weise wird die Existenz einer, außer in einem Punkte (ξ, η) in T , in $T + S$ stetigen, in T regulären Potentialfunktion $G^*(\xi, \eta; x, y)$ bewiesen, die sich in (ξ, η) wie $\log \frac{1}{\rho}$ verhält und den Bedingungen $G^*(\xi, \eta; s) = 0$ auf S' , $\frac{\partial}{\partial n_s} G^*(\xi, \eta; s) = 0$ auf S'' genügt. Für die Lösung $u(x, y)$ der in der Fußnote ³²¹⁾ genannten Aufgabe gewinnt man den Ausdruck

$$u(\xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathfrak{S}} f(t) \frac{\partial}{\partial n_t} G^*(\xi, \eta; t) dt - \frac{1}{2\pi} \int_{\mathfrak{S}''} \varphi(t) G^*(\xi, \eta; t) dt. \quad 322)$$

Die im vorstehenden besprochene Methode ist im Raume nicht anwendbar. Gehört zu einer Randkomponente, die alle der Klasse B angehören mögen, allemal eine Randbedingung einer Art, so gewinnt man die Lösung ohne Mühe z. B. durch das Nr. 24 j skizzierte Verfahren von *L. Lichtenstein*.³²³⁾ Schwieriger ist der Fall, wenn auf einzelnen Randflächen Bedingungen beiderlei Art vorkommen.³²⁴⁾ Unter gewissen einschränkenden Voraussetzungen über $f(s)$ ist die Existenz der Lösung von *S. Zaremba* dargetan worden.³²⁵⁾ *Zaremba* bestimmt zunächst eine einfache Belegung auf S , deren Dichte auf S'' einen vorgegebenen Wert hat, und deren Potential auf S' verschwindet. Diese Aufgabe ist der anderen äquivalent, eine durchweg stetige, außer auf dem doppelt zu zählenden Flächenstück S' überall (auch im Unendlichen) reguläre Potentialfunktion zu bestimmen, die auf S'

322) Außer in den Endpunkten $s^{(v)}$ von S' und S'' sind $\frac{\partial G^*}{\partial x}$, $\frac{\partial G^*}{\partial y}$ auf S stetig. In der Umgebung von $s^{(v)}$ ist, sofern $s^{(v)}$ nicht zugleich eine Ecke oder eine Spitze ist, z. B. $\frac{\partial G^*}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{r_{ss^{(v)}}}} \times$ eine stetige Funktion.

Ist $s^{(v)}$ ein Eckpunkt (der eingeschlossene Winkel $= \alpha\pi$), so gilt z. B.

$$\frac{\partial G^*}{\partial x} = \frac{1}{(r_{ss^{(v)}})^{1-\frac{1}{2\alpha}}} \cdot \text{eine stetige Funktion.}$$

Vgl. *L. Lichtenstein*, Journ. f. Math. 143 (1913), p. 51—105 [p. 93—105], wo allgemeinere lineare partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung betrachtet werden.

323) *S. Zaremba* gibt, Bull. de l'Ac. d. Sc. de Cracovie 1910, p. 313—344 [p. 341—344], ein anderes der *Neumann-Robinschen* Methode verwandtes Verfahren an.

324) Vgl. die Bemerkungen von *J. Hadamard*, Leçons, p. 55—57.

325) Vgl. *S. Zaremba*, loc. cit. 323).

eine vorgegebene stetige Wertfolge annimmt.³²⁶) Nachdem die zu der zuletzt erwähnten Randwertaufgabe gehörige *Greensche* Funktion gebildet worden ist, wird das Problem auf die Auflösung einer *Fredholm'schen* Integralgleichung zurückgeführt.³²⁷)

j) *Weitere kombinatorische Methoden*. Die Nr. 24a besprochene Methode der gürtelförmigen Verschmelzung läßt sich durch das folgende von *L. Lichtenstein* angegebene verallgemeinerungsfähige Verfahren ersetzen: Es sei $f(s)$ der vorgegebene Randwert der Lösung. Wir setzen $X(s) = u(x, y)$ auf S' und $Y(s) = u(x, y)$ auf S'' . Die Formel (9) Nr. 20, angewandt auf T' und T^* , liefert in leicht ersichtlicher Bezeichnungsweise die Gleichungen

$$(1) \quad \begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{2\pi} \int_{S'} f(t) \frac{\partial}{\partial n_t} G^*(s, t) dt + \frac{1}{2\pi} \int_{S''} Y(t) \frac{\partial}{\partial n_t} G^*(s, t) dt, \\ Y(s) &= \frac{1}{2\pi} \int_{S'} X(t) \frac{\partial}{\partial n_t} G'(s, t) dt. \end{aligned}$$

Die Beziehungen (1) bilden ein System simultaner Integralgleichungen mit stetigen Kernen zur Bestimmung von $X(s)$ und $Y(s)$. Das Problem ist damit im wesentlichen gelöst. Die Methode läßt sich (zum Teil modifiziert) auf verschiedene andere Randwertprobleme, wie z. B. gewisse Aufgaben mit gemischten Randbedingungen (Nr. 24i), anwenden und auf die allgemeinsten linearen partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung vom elliptischen Typus ausdehnen. In ähnlicher Weise läßt sich ferner der Existenzbeweis des Strömungspotentials auf einer geschlossenen Fläche (Nr. 24h), der automorphen Potentiale des *Schottkyschen* Typus usw. gewinnen.³²⁸)

326) *Zaremba* findet sie durch ein besonders geartetes alternierendes Verfahren.

327) Eine ganz andere auf dem Gebrauch geeigneter Reihenentwicklungen beruhende Behandlung der Randwertaufgabe mit gemischten Randbedingungen ist von *M. Brillouin* skizziert worden (C. R. 150 (1910), p. 460—464 sowie p. 611—614). Die Methode von *Brillouin* dürfte sich auf verschiedene weitere Randwertprobleme der mathematischen Physik ausdehnen lassen. In einer C. R. 161 (1915), p. 437—440 erschienenen Note teilt *Brillouin* ein auf demselben Prinzip beruhendes Verfahren zur Lösung des ersten und des zweiten Randwertproblems für das vorhin betrachtete, von dem doppelt zu zählenden Flächenstück S' begrenzte Gebiet mit.

328) Vgl. *L. Lichtenstein*, Prace Mat. Fiz., Warschau, 21 (1910), p. 7—16; Bull. de l'Ac. de Sc. de Cracovie 1911, p. 219—254; Journ. f. Math. 143 (1918), p. 51—105.

Ein Verfahren, das sich funktionentheoretisch begründen läßt und geeignet ist, das alternierende Verfahren bei manchen Problemen der konformen Abbildung zu ersetzen, das insbesondere gestattet, einfach zusammenhängende Gebiete in \mathfrak{E}_m auf Gebiete in \mathfrak{E} abzubilden, ist neuerdings von *C. Carathéodory* angegeben worden (Nr. 47 p. 358—359).³²⁹⁾ Als wesentliches Hilfsmittel erscheint dabei das *Schwarzsche* Spiegelungsprinzip.

Dasselbe leistet ein auf einer ganz anderen Grundlage beruhendes um dieselbe Zeit bekanntgegebenes Verfahren von *Koebe*, das, worauf *Koebe* besonderen Wert legt, sich potenzreihentheoretisch begründen läßt.³³⁰⁾

25. Kreispolygonflächen. Polyeder.³³¹⁾ Es sei T ein einfach zusammenhängendes, von einem Kreispolygon begrenztes Gebiet in \mathfrak{E}_m . Zur Bestimmung einer Funktion $z = z(Z')$, durch deren Vermittlung T auf die Halbebene $\Im(Z') > 0$ konform abgebildet wird, gibt *H. A. Schwarz* eine Differentialgleichung dritter Ordnung

$$(1) \quad \{z, Z'\} = \frac{d^2}{dZ'^2} \log \frac{dz}{dZ'} - \frac{1}{2} \left(\frac{d}{dZ'} \log \frac{dz}{dZ'} \right)^2 = F(Z')$$

an, unter $F(Z')$ eine bis auf eine Anzahl zu bestimmender Konstanten bekannte rationale Funktion verstanden.^{332) 333)}

329) *C. Carathéodory*, Schwarz Festschrift, Berlin 1914, p. 19—41 [p. 32 bis 41]. Eine Darstellung findet sich bei *L. Bieberbach*, Konforme Abbildung, p. 120—126 sowie bei *P. Koebe*, loc. cit. 582) d) p. 75—77.

330) Vgl. *P. Koebe*, Leipziger Berichte 1914, p. 67—75.

331) Vgl. *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer*, II A 7 b Nr. 26; *W. F. Osgood*, II B 1 Nr. 21, *R. Fricke*, II B 4 und *E. Hilb*, II B 5 passim.

332) *H. A. Schwarz*, a) Journ. f. Math. 70 (1869), p. 105—120; Ges. Abh. 2, p. 65—83 [p. 78—80], b) Journ. f. Math. 70 (1869), p. 121—126; Ges. Abh. 2, p. 84—101, c) Journ. f. Math. 75 (1873), p. 292—335; Ges. Abh. 2, p. 211—259.

Die *Schwarzsche* Derivierte $\{z, Z'\}$ läßt sich in der Umgebung eines Eckpunktes $z_1 = z(Z'_1)$ (der eingeschlossene Winkel = $\alpha\pi$) in der Form

$$\frac{1}{2} \frac{1 - \alpha^2}{(Z' - Z'_1)^2} + \frac{\delta_{-1}}{Z' - Z'_1} + \delta_0 + \delta_1(Z' - Z'_1) + \dots \quad (\delta_{-1}, \delta_0, \delta_1, \dots \text{ reell})$$

darstellen. Eine analoge Entwicklung gilt in der Umgebung eines Windungspunktes der Ordnung $m (\geq 1)$ in T (für α tritt dabei $m+1$ ein, $\delta_{-1}, \delta_0, \dots$ erhalten komplexe Werte).

333) Mit mehrfach zusammenhängenden Gebieten in \mathfrak{E} , die von Kreispolygonen, insbesondere Vollkreisen begrenzt sind, beschäftigt sich *F. Schottky*, loc. cit. 352), p. 331—351 (vgl. Nr. 27). Man vergleiche ferner das fundamentale Fragment von *B. Riemann*, Ges. Math. Werke, p. 440—444.

Die Funktion $z(Z')$ kann man als den Quotienten von zwei linear unabhängigen Lösungen einer linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung der Fuchs'schen Klasse auffassen. Als singuläre Punkte erscheinen dabei die Ecken und Spitzen der Randkurve S sowie die Windungspunkte; den letzteren entsprechen außerwesentlich singuläre Punkte (Nebenpunkte nach *F. Klein*).³³⁴ Ist S ein Kreisbogendreieck in \mathfrak{E} , so ist $z(Z')$ der Quotient zweier linear unabhängigen Lösungen der hypergeometrischen Differentialgleichung.³³⁵

Ist S insbesondere ein geradliniges Polygon, so vereinfacht sich die Betrachtung. Von *E. B. Christoffel* und *H. A. Schwarz* sind für $z(Z')$ Integralformeln angegeben worden.³³⁶

Für die Funktion $z(Z)$, durch deren Vermittlung T auf eine Kreisfläche K vom Radius R in der Ebene Z konform abgebildet wird, erhält man, wenn der Bereich $T + S$ beschränkt ist und keinen Windungspunkt enthält³³⁷, den Ausdruck

$$(2) \quad z(Z) = C_1 + C_2 \int_0^Z (Z - RZ_1)^{-2\lambda_1} \dots (Z - RZ_n)^{-2\lambda_n} dZ,$$

unter $z(RZ_k)$ ($|Z_k| = 1, k = 1, \dots, n$) die Eckpunkte, $2\pi\lambda_k$ ($k = 1, \dots, n$) die beim Umfahren des Polygons im positiven Sinne aufeinanderfolgenden Außenwinkel, C_1 und C_2 komplexe Konstanten verstanden. Ist T konvex, so sind alle λ_k positiv; in allen Fällen ist

334) Dies gilt auch, wenn, entgegen der allgemeinen Festsetzung der Nr. 1, Windungspunkte auf S vorkommen. Liegen Windungspunkte in $T + S$ nicht vor, so ist die Differentialgleichung (1) reell.

335) Vgl. *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 80. Man vergleiche ferner *F. Klein*, Über die hypergeometrische Funktion, Leipzig 1894, passim; *L. Schlesinger*, Handbuch der Theorie der linearen Differentialgleichungen, Bd. II 2, p. 32—49.

336) Vgl. *E. B. Christoffel*, Ann. di Mat. (2) 1 (1868), p. 89—103; (2) 4 (1870/71), p. 1—9; Gött. Nachr. 1870, p. 283—298; p. 359—369; 1871, p. 435—453; Ges. Abh. 1 und 2); *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 70—76. An der zuletzt genannten Stelle gibt *Schwarz* insbesondere eine Anzahl spezieller Beispiele. Die fraglichen Resultate sind im Frühjahr 1864 im mathematischen Seminar der Berliner Universität vorgetragen und im August 1866 durch *K. Weierstraß* der Berliner Akad. der Wiss. mitgeteilt worden.

Eine Darstellung findet sich bei *G. Darboux*, Theorie des surfaces 1; *H. Weber*, Partielle Differentialgleichungen 1. Man vergleiche ferner *E. Study* loc. cit. 148), p. 72—94.

337) Dabei die Ebene z doch sehr wohl teilweise mehrfach überdecken kann.

$\sum_k^{1 \dots n} \lambda_k = 1.$ ³³⁸) Die Zahl der verfügbaren reellen Konstanten ist $n + 4$, die der Bestimmungsstücke des Polygons S beträgt $n + 1$. Gibt man die Werte $z(Z)$ und $\text{Arg} \frac{dz}{dZ}$ für $Z = 0$ vor, so sind alle diese Konstanten, da $z(Z)$ nunmehr festliegt, eindeutig bestimmt. Ist T die Fläche eines ebenen Dreiecks, so macht die Ermittlung von Z_1, Z_2, Z_3 keine Schwierigkeiten. Auch wenn T von drei Kreisbögen begrenzt ist, deren Halbmesser nicht alle unendlich groß sind, lassen sich die Konstanten der Differentialgleichung ohne Auflösung transzendenter Gleichungen angeben.^{338a}) Für die Fläche eines geradlinigen Polygons ist die Möglichkeit der Konstantenbestimmung unabhängig von dem alternierenden Verfahren von *H. A. Schwarz* für $n = 4$ bewiesen worden.³³⁹) Für alle n ist ein Beweis *H. A. Schwarz* von *K. Weierstraß* mitgeteilt worden.³⁴⁰) Ein vollständiger Beweis ist in den Arbeiten von *L. Schläfli* und *E. Phragmén* enthalten.³⁴¹) Einen anderen sich einer Kontinuitätsmethode bedienenden Beweis hat neuerdings *L. Bieberbach* veröffentlicht.³⁴²) (Vgl. Nr. 46 p. 352.)

Eine zu (2) analoge Formel gilt nach *H. A. Schwarz* für die Funktion $z(Z)$, durch deren Vermittlung die Ebene Z auf ein schlichtartiges Polyeder konform abgebildet wird.³⁴³)

Es ist $z(Z) = C \int_0^Z \Pi(Z - Z_\nu)^{\alpha_\nu - 1} dZ + C''$, unter $z(Z_\nu)$ ($\nu = 1, \dots, n$)

die Ecken, α, π die Summe der in $z(Z_\nu)$ zusammenstoßenden Kanten-

338) Die Formel (2) gilt auch, wenn der unendliche ferne Punkt ein Eckpunkt (etwa z_1) ist. Sind die zugehörigen Polygonseiten parallel, so ist $\lambda_1 = \frac{1}{2}$, andernfalls ist $\lambda_1 > \frac{1}{2}$. *C. Carathéodory*, Ann. de la soc. sc. de Bruxelles 37 (1913), p. 5—14 [p. 5—6] und *E. Study*, loc. cit. 336), p. 77—83 betrachten nach Zulassung des unendlich fernen Eckpunktes (konvexe) Polygone mit weniger als drei Seiten. In allen Fällen ($n = 2, 1, 0$) gilt die Formel (2).

338a) Vgl. *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 80.

339) Vgl. *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 77.

340) Vgl. *H. A. Schwarz*, loc. cit. 339). Dieser Beweis ist nicht veröffentlicht worden.

341) Vgl. *L. Schläfli*, Journ. f. Math. 78 (1874), p. 63—80; *E. Phragmén*, Acta math. 14 (1890), p. 225—232 [p. 229—232], wo eine in den Betrachtungen von *Schläfli* geliebene Lücke ausgefüllt ist.

342) Vgl. *L. Bieberbach*, Gött. Nachr. (1913), p. 552—564; Rend. del. Circ. Mat. di Palermo 38 (1914), p. 98—112 [p. 102—104].

343) *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 6, p. 81—83. Das Polyeder hat man sich dabei auf die Ebene z zu einem „Netz“ ausgebreitet zu denken. Die Abbildung ist stetig und bis auf die Ecken konform.

winkel, C' und C'' komplexe Konstanten verstanden. Entspricht $Z = \infty$ keiner Ecke des Polyeders, so ist $\sum_r^{1 \dots n} (\alpha_r - 1) = -2$.

Einen vollständigen, von dem alternierenden Verfahren unabhängigen Beweis für die Möglichkeit der Konstantenbestimmung führt *H. A. Schwarz* für den besonderen Fall eines Tetraeders nach einem Kontinuitätsverfahren aus.³⁴⁴) Handelt es sich insbesondere um reguläre Polyeder, so lassen sich die Konstanten vollständig bestimmen.³⁴⁵)

26. Konvexe Gebiete. Rundungsschranke. Bedingungen für die Schlichtheit einer Abbildung. Es sei $z(Z)$ eine in dem Kreisgebiete $K \dots |Z| < R$ reguläre Funktion. Damit K durch $z(Z)$ auf ein konvexes Gebiet konform abgebildet wird, ist nach *E. Study* notwendig und hinreichend, daß in K die Funktion

$$(1) \quad \Phi(Z) = 1 + Z \frac{d}{dZ} \left(\log \frac{dz}{dZ} \right)$$

sich regulär verhalte und

$$(2) \quad \Re \Phi(Z) > 0$$

sei. Ist $\Re \Phi(Z)$ für $|Z| < R$ nicht durchweg > 0 , so gibt es einen Wert $R_1 < R$, die „Rundungsschranke“ der Potenzreihe nach *E. Study*, so daß die Bedingung (2) für $|Z| < R_1$ erfüllt ist. Allen Kreisen $|Z| = R_2 < R_1$ entsprechen in der Ebene z konvexe (analytische und reguläre) Kurven.³⁴⁶)

Es seien die $(n + 2)$ ersten Koeffizienten $a_0, a_1 \neq 0, \dots, a_{n+1}$ einer Potenzreihe $z(Z) = \sum a_k Z^k$ gegeben. *C. Carathéodory* zeigt, daß man ein und nur ein System von Werten a_{n+2}, a_{n+3}, \dots bestimmen kann, so daß K durch $z(Z)$ auf das Gebiet eines konvexen Polygons mit nicht mehr als n Seiten konform abgebildet wird.³⁴⁷) Es sei $z(Z)$ irgendeine in dem Gebiete $|Z| < R$ konvergierende Potenzreihe mit den gleichen $(n + 2)$ ersten Koeffizienten, \bar{R} ihre Rundungsschranke.

344) *H. A. Schwarz*, Journ. f. Math. 70 (1869), p. 121—136; Ges. Abh. 2, p. 84—101. Vgl. II B 3 Nr. 7 b.

345) *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 82 sowie p. 248—254.

346) Vgl. *E. Study*, Proc. of the fifth int. Congress of Math., Cambridge 1913, p. 122—125 sowie loc. cit. 336), p. 103—121. *Study* betrachtet konvexe Gebiete der Klasse *C*. Nach *C. Carathéodory*, loc. cit. 338), p. 5—14 gilt dieser Satz bei beliebigen (selbst sich ins Unendliche erstreckenden) konvexen Gebieten. Nach *G. H. Gronwall*, C. R. 162 (1916), p. 316—318, ist für schlicht abbildende Funktionen $\frac{R_1}{R} \geq 2 - \sqrt{3}$. Das Gleichheitszeichen gilt nur bei der Funktion

$$\frac{Z}{\left(1 - e^{2i} \frac{Z}{R}\right)^2} \quad (\alpha \text{ reell}).$$

347) *C. Carathéodory*, loc. cit. 338).

Es ist stets $\bar{R} \leq R$. Der Wert $\bar{R} = R$ entspricht der soeben erwähnten Polygonfläche.

Ein Verfahren zur Bestimmung der Scheitel der Bildkurven $z(\rho e^{i\varphi})$ (ρ konstant) gibt *G. Pick* an.³⁴⁸⁾

Es sei $z(Z) = Z + a_2 Z^2 + \dots$ eine für $|Z| < 1$ konvergierende Potenzreihe. *A. Hurwitz* hat hinreichende Bedingungen dafür angegeben, daß das durch $z(Z)$ entworfene Bild des Kreisgebietes $|Z| < 1$ über der Ebene z einfach ausgebreitet ist.³⁴⁹⁾ Eine notwendige und hinreichende Bedingung leitet neuerdings *L. Bieberbach* ab.³⁵⁰⁾

27. Konforme Abbildung mehrfach zusammenhängender Gebiete.³⁵¹⁾ Während zwei einfach zusammenhängende Gebiete etwa der Klasse B in \mathfrak{E} stets aufeinander konform abgebildet werden können, bedarf es hierzu, wenn der Grad des Zusammenhängens p größer als 1 ist, des Erfülltseins besonderer Bedingungen.³⁵²⁾

Es seien T und T' zwei entsprechend von den Vollkreisen S_1 und S_2 ; S_1' und S_2' begrenzte Gebiete in \mathfrak{E} . Damit T auf T' konform abgebildet werden kann, ist notwendig und hinreichend, daß das Doppelverhältnis der vier Punkte, in denen S_1 und S_2 von irgendeinem Orthogonalkreise geschnitten werden, dem entsprechend gebildeten Wert für S_1' und S_2' gleich sei. Liegen insbesondere Kreisringflächen vor, so müssen diese ähnlich sein.³⁵³⁾

348) *G. Pick*, Rend. del Circ. Mat. di Palermo 37 (1914), p. 341—344.

349) *A. Hurwitz*, Verh. d. ersten intern. Kongr. in Zürich 1898, p. 109 u. ff. Vgl. auch *J. W. Alexander*, Ann. of Math. (2) 17 (1915), p. 12—22.

350) Vgl. *L. Bieberbach*, a) Berl. Sitzungsber. 38 (1916), p. 940—955. *Bieberbach* drückt die fragliche notwendige und hinreichende Bedingung so aus: Es gibt eine unendliche Folge beschränkter, einfach zusammenhängender $2(j-1)$ -dimensionaler Gebiete B_j ($j = 2, 3, \dots$), so daß durch $z(Z)$ das Kreisgebiet $|Z| < 1$ dann und nur dann auf ein schlichtes Gebiet abgebildet wird, wenn der Punkt $\alpha'_2, \alpha''_2; \dots; \alpha'_j, \alpha''_j$ ($\alpha_k = \alpha'_k + i\alpha''_k$) für alle j im Innern oder auf dem Rande von B_j enthalten ist. Die Begrenzung von B_j wird nicht näher charakterisiert. Unter den Einzelresultaten der Arbeit sei zunächst die Beziehung $|\alpha_2| \leq 2$ hervorgehoben. Die einzige das Gebiet $|Z| < 1$ schlicht abbildende Funktion, für die $|\alpha_2|$ den Wert 2 hat, ist $\frac{Z}{1 - Ze^{i\alpha_2}}$ (α konstant). *Bieberbach* vermutet, daß überhaupt $|\alpha_k| \leq k$ gilt. [Man vergleiche a. a. O. sowie b) Math. Zeitschr. 2 (1918), p. 158 bis 170; c) ebendort 3 (1919), wo verschiedene weitere Ergebnisse abgeleitet werden]. Es sei ferner der folgende Satz genannt: Bildet die Funktion $z + \sum \alpha_n \frac{1}{z^n}$ das Gebiet $|z| > 1$ auf ein schlichtes Gebiet ab, so ist $\sum n |\alpha_n|^2 \leq 1$.

351) Vgl. I B 1 Nr. 23 sowie die Bemerkungen am Schluß der Nr. 22 des vorliegenden Referates.

352) *F. Schottky*, Inaugural-Dissertation, Berlin 1875, abgedruckt in dem J. f. Math. 83 (1877), p. 300—351.

353) Eine notwendige und hinreichende Bedingung gab zuerst *F. Schottky*.

Zwei von p ($p \geq 2$) Vollkreisen begrenzte schlichte Gebiete T und T' können, wenn überhaupt, nur durch Vermittlung einer linearen Funktion aufeinander konform abgebildet werden.³⁵⁴⁾

Es sei jetzt T ein beliebiges p -fach zusammenhängendes Gebiet etwa der Klasse C in \mathfrak{E} . Nach *F. Schottky* kann man in unendlich mannigfaltiger Weise Paare in $T + S$ stetiger, in T bis auf polare Unstetigkeiten regulärer, eindeutiger, auf S reeller analytischer Funktionen $u(z)$ und $v(z)$ bestimmen, so daß jede beliebige Funktion dieser Art sich durch u und v rational mit reellen Koeffizienten ausdrücken läßt. Die Funktionen u und v sind durch eine algebraische Gleichung vom Range $p - 1$ mit reellen Koeffizienten, $G(u, v) = 0$, verbunden. Zwei zu beliebigen Funktionenpaaren $u, v; u', v'$ der im vorstehenden gekennzeichneten Art gehörige charakteristische Gleichungen lassen sich durch eine reelle birationale Transformation ineinander überführen.³⁵⁵⁾ Zwei p -fach zusammenhängende Gebiete T_1 und T_2 der Klasse C in \mathfrak{E} lassen sich dann und nur dann aufeinander entweder konform oder konform mit Umlegung der Winkel abbilden, wenn ein Paar (und darum auch jedes beliebige Paar) charakteristischer Gleichungen von T_1 und T_2 durch eine reelle birationale Transformation zusammenhängt.³⁵⁶⁾

Journ. f. Math. 83 (1877), p. 300—351 [p. 325—326] an. Ebendort p. 327—328 wird das gleiche Problem für das von zwei konfokalen Ellipsen begrenzte Gebiet erledigt. Die im Text mitgeteilte Fassung rührt von *Koebe* her. Vgl. *P. Koebe*, Ber. d. Deutschen Math. Ver. 15 (1906), p. 142—153 [p. 142—144]. Eine auf methodische Einheitlichkeit (vgl. Nr. 47) hinzielende eingehende Behandlung des Kreisringgebietes (auch der Fälle, wenn einer der beiden Kreise oder alle beide in Punkte, darunter auch den unendlich fernen Punkt, ausarten) findet sich bei *P. Koebe*, Journ. f. Math. 145 (1914), p. 177—223 [p. 195—200].

354) Vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 353), p. 145—149. Werden nämlich T und T' , die beschränkt vorausgesetzt werden können, an allen inneren Begrenzungskreisen gespiegelt, die sich ergebenden erweiterten Vollkreisgebiete T_1 und T'_1 in der gleichen Weise behandelt und dieses Verfahren ins Unendliche fortgesetzt, so läßt sich der Variabilitätsbereich von z und z' über die von den äußeren Kreisen von T und T' begrenzten beschränkten Gebiete Θ und Θ' mit Ausschluß je einer (für $p > 2$) nicht abzählbaren Punktmenge (M) und (M') ausdehnen. Die Funktion $z'(z)$ ist in Θ stetig, in $\Theta - (M)$ regulär. Durch eine Anwendung des *Cauchyschen Integralsatzes* auf das durch j Spiegelungen gewonnene Gebiet T_j und durch Übergang zur Grenze, $j = \infty$ wird gezeigt, daß $z'(z)$ in Θ regulär und darum linear ist. (Man vergleiche hierzu die Ausführungen der Nr. 43, wo analoge Unitätsbeweise besprochen werden.)

355) *F. Schottky*, loc. cit. 353).

356) *F. Schottky*, loc. cit. 353), p. 320—323. Eine ausführliche Darstellung der *Schottkyschen* Arbeit gibt *R. Le Vavasseur*, Ann. de Toulouse (2) 4 (1902), p. 45—100. Eine vereinfachte Ableitung der im Text besprochenen

Weiteres über die fundamentalen Ergebnisse von *F. Schottky* vergleiche *Osgood*, II B 1 Nr. 23.

Nach *Schottky* hängt ein schlichtes Gebiet T der Klasse C , dessen Rand ϱ Komponenten hat, von $3\varrho - 3$ wesentlichen reellen Konstanten ab.³⁵⁷⁾ Von ebenso vielen wesentlichen Parametern hängt das allgemeinste von ϱ Vollkreisen begrenzte Gebiet \mathfrak{R} in \mathfrak{E} ab. Es ist darum zu erwarten, daß T auf ein Gebiet der Art \mathfrak{R} sich wird konform abbilden lassen. *Schottky* formuliert dieses neue Problem als ein Problem der Theorie linearer Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit algebraischen Koeffizienten.³⁵⁸⁾ Der vollständige Beweis für die Möglichkeit der fraglichen konformen Abbildung ist erst in der neueren Zeit von *P. Koebe* erbracht worden (vgl. Nr. 44, wo sich auch weiteres über die konforme Abbildung mehrfach zusammenhängender Gebiete findet).

28. Das dritte Randwertproblem.³⁵⁹⁾ Es sei T ein Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} . Es mögen $f(s)$ und $g(s)$ abteilungsweise stetige Funktionen auf S bezeichnen.³⁶⁰⁾ Das dritte Randwertproblem beschäftigt sich mit der Bestimmung der etwa vorhandenen beschränkten, in T regulären Potentialfunktionen, die beschränkte Ableitung $\frac{\partial}{\partial n} u(x, y)$ haben und auf S , außer in den Unstetigkeitspunkten von f und g , der Beziehung $\frac{\partial u(s)}{\partial n} + f(s) u(s) = g(s)$ genügen.^{361) 363)} Setzt man

$$u(x, y) = \int_S \theta(t) \log \frac{1}{r_t} dt^{362)},$$

Schottkyschen Resultate findet sich bei *É. Picard*, *Traité* 2, p. 545—546 sowie *Ann. de l'Éc. Normale* (3) 30 (1913), p. 483—487.

357) *F. Schottky*, loc. cit. 352), p. 322. Das gleiche gilt, wenn T ein beliebiges schlichtartiges Gebiet in \mathfrak{E}_m ist, dessen Rand ϱ Komponenten hat.

358) *F. Schottky*, loc. cit. 353), p. 331—351. Man vergleiche hierzu das fundamentale Fragment von *B. Riemann*, *Ges. Math. Werke*, p. 440—444.

359) Vgl. *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer*, II A 7 b Nr. 17 und 18; *É. Goursat*, *Cours* 3, p. 518—525.

360) Allgemeiner kann man $f(s)$ und $g(s)$ beschränkt und im *Lebesgueschen* Sinne integrierbar annehmen. Auch können gewissen Bedingungen genügende nicht beschränkte Funktionen zugelassen werden.

361) Sind f und g der Fußnote 360) gemäß gewählt, so ist eine gewisse Nullmenge von Punkten auf S auszuschließen.

362) Sind f und g abteilungsweise stetig, so konvergiert, wie sich nachträglich zeigt, $\frac{\partial}{\partial n} u(x, y)$ gegen $\frac{\partial u(s)}{\partial n}$ auf jedem von Unstetigkeiten freien Bogen von S gleichmäßig.

363) Der Einfachheit halber wird angenommen, daß es keine einfache Belegung auf S gibt, deren Potential in T identisch verschwindet. Sollte, wie beim

so erhält man die Integralgleichung

$$(1) \quad \theta(s) = \frac{1}{\pi} \int_S \theta(t) \frac{\partial}{\partial n_s} \left(\log \frac{1}{r_{st}} \right) dt \\ + \frac{1}{\pi} f(s) \int_S \theta(t) \log \frac{1}{r_{st}} dt - \frac{1}{\pi} g(s).^{364}$$

Entweder hat das eingangs gestellte Problem eine und nur eine Lösung³⁶⁵), oder das zugehörige homogene Problem

$$\frac{\partial u(s)}{\partial n} + f(s) u(s) = 0$$

hat eine endliche Anzahl linear unabhängiger Lösungen. Im ersteren Falle existiert die zugehörige Greensche Funktion $\mathfrak{G}(\xi, \eta; x, y)$.

Es ist

$$(2) \quad \frac{\partial}{\partial n_s} \mathfrak{G}(\xi, \eta; s) + f(s) \mathfrak{G}(\xi, \eta; s) = 0, \\ \mathfrak{G}(x_1, y_1; x_2, y_2) = \mathfrak{G}(x_2, y_2; x_1, y_1).^{366}$$

Ist die homogene Randwertaufgabe lösbar, so gibt es eine Greensche Funktion „im erweiterten Sinne.“³⁶⁷)

In einer ganz analogen Weise wird man im Raume vorgehen. Den Betrachtungen der Nr. 21 gemäß ist

Einheitskreise, diese Annahme nicht zutreffen, so würde man zuvörderst eine Transformation $x' = \alpha x$, $y' = \alpha y$ ($0 < \alpha \neq 1$) vornehmen. Vgl. L. Lichtenstein Ber. d. Berl. Math. Ges. 9 (1909), p. 19—28 [p. 22].

364) Vgl. É. Picard, Rend. del Circ. Mat. di Palermo 22 (1906), p. 241—259 [p. 250]; J. Plemelj, Monatsh. f. Math. u. Phys. 18 (1907), p. 180—211 [p. 199—211]; L. Lichtenstein, loc. cit. 363; É. Goursat, Cours 3, p. 518—519; T. Carleman, loc. cit. 198), p. 27—31. Carleman betrachtet Gebiete der Klasse M (ohne Spitzen) in \mathfrak{G} . Was die ältere Behandlungsweise des dritten Randwertproblems betrifft, vergleiche z. B. A. Korn, loc. cit. 55) c), Abh. 3; W. Stekloff, Ann. de l'Éc. Norm. (3) 19 (1902), p. 191—259; p. 455—490 [p. 218—232]. Sie geht von dem Randwertproblem

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \lambda f u = g \quad (\lambda \text{ ein reeller Parameter, } f < 0)$$

aus und bedient sich der im Anschluß an die Poincarésche Palermoarbeit (loc. cit. 190)) ausgebildeten Methoden. Explizite Formeln für u ($f < 0$ konstant) in einem Kreisgebiete gibt T. Boggio, loc. cit. 141) b) an.

365) Dies trifft z. B. zu, wenn $f(s) \leq 0$, $\int_S f(s) ds \neq 0$ ist.

366) Genügen f und g einer Hölderschen Bedingung mit dem Exponenten λ , so sind $D_1 u$ auf S vorhanden und stetig und genügen in $T + S$ einer H -Bedingung mit dem gleichen Exponenten. Auch $\frac{\partial \mathfrak{G}}{\partial x}$, $\frac{\partial \mathfrak{G}}{\partial y}$ genügen in jedem (ξ, η) nicht enthaltenden Bereiche derselben Bedingung (L. Lichtenstein, loc. cit. 363), p. 23).

367) L. Lichtenstein, loc. cit. 363), p. 26.

$$(3) \quad u(\xi, \eta) = -\frac{1}{2\pi} \int_s G^{\text{II}}(\xi, \eta; t) \frac{\partial u}{\partial n} dt + \frac{1}{l} \int_s u(t) dt,$$

darum

$$(4) \quad u(s) = \frac{1}{2\pi} \int_s \left[G^{\text{II}}(s, t) f(t) + \frac{1}{l} \right] u(t) dt - \frac{1}{2\pi} \int_s G^{\text{II}}(\xi, \eta; t) g(t) dt.$$

Diese Integralgleichung könnte ebenfalls zum Ausgangspunkte der Theorie genommen werden.³⁶⁸⁾

Es möge jetzt das der Betrachtung zugrunde liegende Gebiet T der Klasse D angehören. Geht man durch konforme Abbildung zu einem Gebiete T' der Klasse C über, so gewinnt man für $u'(x', y') = u(x, y)$ eine Randbedingung von der Form $\frac{\partial u'(s')}{\partial n'} + j(s') u'(s') = k(s')$. Die Funktionen $j(s')$ und $k(s')$ sind, außer in den Bildpunkten der Ecken, abteilungsweise stetig und genügen in der Umgebung der ausgeschlossenen Punkte s' Ungleichheiten von der Form $|j(s')|, |k(s')| < C |s' - \bar{s}'|^{\alpha-1}$ (C konstant, $\alpha\pi =$ dem Öffnungswinkel der Ecke \bar{s}). Auch jetzt wird man von der Integralgleichung (1) ausgehen und gelangt bei einiger Vorsicht zu analogen Existenz- und Unitätssätzen.³⁶⁹⁾

Eine vollständige Behandlung des dritten Randwertproblems in räumlichen Gebieten mit Kanten und körperlichen Ecken liegt zur Zeit nicht vor. Einen Weg zur Lösung dürften unter geeigneten Voraussetzungen die Variationsmethoden (Nr. 45) sowie die Untersuchungen von *S. Zaremba*, *R. Bär* und *T. Carleman* bieten.³⁷⁰⁾

368) Vgl. *D. Hilbert*, Gött. Nachr. 1904, p. 213—259 [p. 255—256]. Dieser Weg empfiehlt sich namentlich, wenn es sich um nicht schlichtartige Gebiete handelt.

369) Vgl. *L. Lichtenstein*, loc. cit. 272) [p. 112—119]. Ebenso wird man vorgehen, wenn ein beliebiges schlichtartiges Gebiet der Klasse D in \mathfrak{E}_m vorliegt. Ist T nicht schlichtartig, so kann man sich mit Vorteil der in geeigneter Weise modifizierten kombinatorischen Methode von *L. Lichtenstein* (Nr. 24j) bedienen. Das gleiche gilt, wenn S aus mehreren Komponenten besteht, und auf einigen von diesen die Randbedingung $u = \varphi$, oder $\frac{\partial u}{\partial n} = \psi$, auf den übrigen die Bedingung $\frac{\partial u}{\partial n} + fu = g$ vorgeschrieben ist. Eine andere Möglichkeit, das dritte Randwertproblem für Gebiete der Klasse M (ohne Spitzen) in \mathfrak{E} aufzulösen, bietet die Methode von *S. Zaremba* und *R. Bär*. Vgl. *R. Bär*, loc. cit. 198), p. 19—21. In gleicher Weise läßt sich allgemeiner das Randwertproblem

$$\frac{\partial u(s)}{\partial n} + f(s) u(s) + \int_s K(s, t) u(t) dt = g(s) \quad (K(s, t) = K(t, s) \text{ stetig})$$

behandeln (*R. Bär*, a. a. O., p. 21—22. S. auch *T. Carleman*, loc. cit. 198), p. 38 bis 41). Eine vollständige Behandlung des dritten Randwertproblems für Gebiete der Klasse M (ohne Spitzen) in \mathfrak{E} hat neuerdings *T. Carleman* geliefert. Vgl. *T. Carleman*, loc. cit. 364).

370) Vgl. *R. Bär*, loc. cit. 198) sowie namentlich *T. Carleman*, loc. cit. 198), p. 31—38.

Es sei T ein einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} . Wie in der Nr. 24i, möge S in Bögen S' und S'' zerfallen. Auf S' sei die Randbedingung $u(s) = \varphi(s)$, auf S'' die Bedingung

$$\frac{\partial u(s)}{\partial n} + f(s)u(s) = g(s)$$

(f, g, φ abteilungsweise stetig) vorgeschrieben. Man gewinnt jetzt zur Bestimmung von $u(s)$ auf S'' die Integralgleichung

$$(5) \quad \begin{aligned} u(s) &= F(s) + \frac{1}{2\pi} \int_{S'} f(t)u(t) G^*(s, t) dt - \frac{1}{2\pi} \int_{S''} g(t) G^*(s, t) dt, \\ F(s) &= \frac{1}{2\pi} \int_{S'} \varphi(t) \frac{\partial}{\partial n_t} G^*(s, t) dt. \end{aligned}$$

Die Integralgleichung (5) ist der *Fredholmschen* Methode zugänglich. In ähnlicher Weise wird man verfahren, wenn T der Klasse D in \mathfrak{E} angehört.

29. Weitere Randwertaufgaben. Die bis jetzt betrachteten Randbedingungen sind zumeist als besondere Fälle in der Formel

$$(1) \quad h(s) \frac{\partial u(s)}{\partial n} + f(s)u(s) = g(s)$$

enthalten. Betreffs einer Verallgemeinerung durch Hinzunahme eines Gliedes von der Form $\int_S K(s, t)u(t) dt$ linker Hand vergleiche die Fußnote³⁶⁹.

R. Bär löst für einfach zusammenhängende Gebiete der Klasse B in \mathfrak{E} das Randwertproblem

$$u(s) = \frac{\partial}{\partial n} u\left(s + \frac{l}{2}\right),$$

= Länge von S) auf.³⁷¹

Es möge jetzt T ein einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse C in \mathfrak{E} bezeichnen. *H. Poincaré* bestimmt diejenige in $T + S$ stetige, in T reguläre Potentialfunktion $u(x, y)$, die auf S der Bedingung

$$(3) \quad \frac{\partial u(s)}{\partial n} + k(s) \frac{\partial u(s)}{\partial s} + l(s)u(s) = g(s)$$

genügt, unter $k(s), l(s), g(s)$ analytische und reguläre Funktionen verstanden.³⁷²)

371) *R. Bär*, loc. cit. 198), p. 22—24. Dort findet sich auch die allgemeinere Randwertaufgabe

$$(2) \quad u\left(s + \frac{l}{2}\right) = \frac{\partial u(s)}{\partial n} + \int_S \Lambda(s, t)u(t) dt, \quad \frac{\partial}{\partial n} u\left(s + \frac{l}{2}\right) = u(s) \quad \left(0 \leq s \leq \frac{l}{2}\right)$$

($\Lambda(s, t) = \Lambda(t, s)$ stetig).

372) *H. Poincaré*, Sechs Vorträge aus der reinen Mathematik und mathe-

Die Lösung wird als Potential einer einfachen Belegung angesetzt. Ihre Dichte genügt einer Integralgleichung zweiter Art, deren Kern für $s = t$ wie $k(s) \frac{1}{r_{st}} + l(s) \log \frac{1}{r_{st}}$ unendlich wird. Nach einer Iteration und einer Umformung unter Benutzung der Integrationswege im Komplexen gelangt man von hier aus zu einer der *Fredholmschen* Theorie zugänglichen Integralgleichung.

R. Bär macht zur Bestimmung der auf dem Rande verschwindenden *Greenschen* Funktion eines Gebietes der Klasse C in \mathfrak{E} den Ansatz

$$(4) \quad G(\xi, \eta; x, y) = \log \frac{1}{\rho} - \int_S \mu(t) \log \frac{1}{r_t} dt$$

und erhält für $\int_0^1 \mu(t) dt = \bar{\mu}(s)$ eine Integralgleichung zweiter Art, die im Anschluß an die soeben erwähnten Untersuchungen von *Poincaré* gelöst wird.³⁷³⁾

Es sei T' ein einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} , $T + S$ ein Bereich der Klasse B in T' ; es sei ferner (ξ, η) ein Punkt in T . *É. Picard* behandelt das folgende Problem: Es sind die etwa vorhandenen, in jedem (ξ, η) nicht enthaltenden Bereiche in $T + S$ und in $T' - T + S'$ stetigen, außer vielleicht am Rande, regulären Potentialfunktionen u und u' zu bestimmen, die so beschaffen sind, daß u sich in (ξ, η) wie $\log \frac{1}{\rho}$ verhält und folgende Randbedingungen erfüllt sind:

matischen Physik, Leipzig 1910, Zweiter Vortrag, p. 15—19; *Leçons de mécanique céleste* 3 (1910), p. 251—261. Man vergleiche hierzu *A. Blondel*, *C. R.* 152 (1911), p. 1287—1290, wo speziell das Kreisgebiet betrachtet wird.

373) *R. Bär*, loc. cit. 198), p. 11—18.

Die Randwertaufgabe (3) läßt sich, worauf auch *Poincaré* hinweist, leicht mit Hilfe eines im Anschluß an *D. Hilbert* von *O. D. Kellogg*, loc. cit. 146), angegebenen Verfahrens erledigen. Es genügt, T von der Klasse B , die Funktion $k(s)$ nebst ihrer Ableitung stetig, $l(s)$, $g(s)$ etwa schlechthin stetig vorauszusetzen. Randwertaufgaben verwandter Natur sind von *D. Hilbert*, Verhandlungen des 3. intern. Congr. in Heidelberg 1904, p. 233—240; *Gött. Nachr.* 1905, p. 1—32; Grundzüge, p. 81—108 und im Anschluß daran von *Ch. Haseman*, loc. cit. 146, betrachtet worden. Es handelt sich zunächst um die Bestimmung einer in einem einfach zusammenhängenden Gebiete der Klasse C in \mathfrak{E} analytischen und regulären Funktion $f(z) = U + iV$, wenn auf S

$$(5) \quad a(s)U(s) + b(s)V(s) + c(s) = 0$$

gilt, unter a , b , c auf S erklärte, bis auf eine endliche Anzahl Punkte, nebst ihren Ableitungen erster Ordnung stetige, gewissen weiteren Einschränkungen unterworfenen Funktionen verstanden; $f(z)$ wird auf S nicht notwendig überall

$$(7) \quad \begin{aligned} \frac{\partial u'}{\partial n'} &= h(s') u'(s') \text{ auf } S', \\ -k_1(s) \frac{\partial u}{\partial n} &= -k_2(s) \frac{\partial u'}{\partial n} = q(s)(u' - u) \text{ auf } S. \end{aligned}$$

Die Funktionen $h(s')$, $k_1(s)$, $k_2(s)$, $q(s)$ sind stetig und positiv. *Picard* setzt $u = \log \frac{1}{\rho} + \int_s^{\mu(t)} \frac{dt}{r_t}$, $u' = \int_{s+S'}^{\mu'(t)} \frac{dt}{r'_t}$ und erhält zur Bestimmung von μ und μ' ein System von zwei der *Fredholm*schen Theorie zugänglichen Integralgleichungen.³⁷⁴⁾

Probleme der mathematischen Physik führen vielfach auf die Bestimmung von Funktionen, die in verschiedenen Gebieten denselben oder verschiedenen Differentialgleichungen genügen und an den gemeinsamen Randkurven oder Randflächen durch geeignete Verknüpfungsgleichungen zusammenhängen.^{375) 376)} In diese Gruppe von Aufgaben fallen die bereits Nr. 17b erwähnten Probleme von *Neumann-Poincaré* und *Robin-Poincaré*.

Es sei T ein einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse C im Raume. *É. Le Roy* betrachtet Potentialfunktionen u und u_α , die entsprechend in $T + S$ und in dem Außenbereiche $T_\alpha + S$ stetig, in T und T_α regulär sind und auf S den Bedingungen

$$(8) \quad u(s^+) = u_\alpha(s^-), \quad \frac{\partial}{\partial n} u(s^+) - \frac{\partial}{\partial n} u_\alpha(s^-) = \lambda k(s) u(s^+) + g(s)$$

(λ reell, $k(s) > 0$, $g(s)$ stetig)

stetig ausfallen. Des weiteren werden unter gewissen Voraussetzungen zwei in T analytische und reguläre Funktionen $f(z)$ und $f^*(z)$ bestimmt, wenn auf S

$$(6) \quad a_\nu U + b_\nu V + a_\nu^* U^* + b_\nu^* V^* + c_\nu = 0 \quad (\nu = 1, 2)$$

gilt. Die Lösung wird unter Zuhilfenahme der in der Fußnote 146) angegebenen Umkehrungsformeln gewonnen. Auf ähnliche Weise gelingt die Bestimmung eines Paares in T und T_α analytischer und regulärer Funktionen $f(z)$ und $f_\alpha(z)$, wenn auf S eine Beziehung von der Form $f_\alpha(s) = c(s) f(s)$ (*Hilbert* a. a. O., vergleiche auch *J. Plemelj*, loc. cit. 146), p. 210), oder $f_\alpha(s) = c(\sigma) f(\sigma(s))$ (*Haseman* a. a. O.) vorgeschrieben ist. Durch einen weiteren Ausbau seiner Methode gelingt *D. Hilbert* die Lösung des *Riemann*schen Problems der Bestimmung der Funktionensysteme mit vorgeschriebener Monodromiegruppe, Gött. Nachr. 1905, p. 1—32; Grundzüge p. 81—108. (Man vergleiche hierzu *J. Plemelj*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 19 (1908), p. 211—246 sowie *E. Hilb*, II B 5 Nr. 14.)

374) *É. Picard*, C. R. 156 (1913), p. 1119—1124. Es handelt sich hier um das Problem des thermischen Gleichgewichts zweier Medien mit Wärmeausstrahlung und Temperatursprung. Man vergleiche ferner *É. Picard*, Rend. del Circ. Mat. di Palermo 37 (1914), p. 249—261 sowie C. R. 142 (1906), p. 861—865.

375) Vgl. die Bemerkungen von *A. Sommerfeld*, II A 7c, p. 505—508.

376) Man vergleiche als Beispiel die Behandlung des allgemeinen elektrostatischen Problems bei *J. Plemelj*, loc. cit. 215). Weitere Beispiele finden sich bei *H. Weber*, Partielle Differentialgleichungen, 1, p. 319—527; 2, p. 168—198 sowie p. 438—450. Siehe ferner u. a. V 24 Nr. 58—70.

genügen.³⁷⁷⁾ Diese und andere analoge Aufgaben, insbesondere das durch Einführung eines Parameters erweiterte dritte Randwertproblem sollen in einem weiteren Referat über partielle Differentialgleichungen vom elliptischen Typus besprochen werden.

Eine Randwertaufgabe besonderer Art behandelt *O. Hölder*. Sind $f(s)$ und $g(s)$ beliebige auf dem Einheitskreise C erklärte stetige Funktionen, so gibt es im allgemeinen keine in einem Gebiete

$$0 < R^2 < x^2 + y^2 < 1, \text{ oder } 1 < x^2 + y^2 < R^2$$

reguläre Potentialfunktionen, so daß auf $C: u(s) = f(s)$, $\frac{\partial u(s)}{\partial n} = g(s)$ wäre. *Hölder* gibt notwendige und hinreichende Bedingungen dafür an, daß in jedem der beiden Kreisringgebiete bei vorgegebenem R eine Potentialfunktion dieser Art existiert.³⁷⁸⁾ ³⁷⁹⁾ ^{379*)}

377) *É. Le Roy*, Ann. de l'Éc. Norm. (3) 15 (1898), p. 9—178. Man vergleiche hierzu *S. Zaremba*, Ann. de l'Éc. Norm. (3) 20 (1903), p. 9—26 sowie *T. Levi-Civita*, Bull. de l'Ac. de Cracovie, 1902, p. 263—270.

378) *O. Hölder*, Leipz. Ber. 63 (1911), p. 477—500

379) Weitere Literatur: *T. Carleman*, loc. cit. 198), p. 38—41; *H. A. v. Beckh Widmansteller*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 23 (1912), p. 240—256, wo, in Verallgemeinerung gewisser Betrachtungen von *W. Wirtinger*, Ansätze zur Behandlung der Randwertaufgabe: $\Delta u = 0$ in der Fläche des Einheitskreises,

$$Px^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2Qxy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + Ry^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = F$$

auf seinem Rande, angegeben werden. Unter P, Q, R, F werden stetige, gewissen Bedingungen genügende Funktionen verstanden. Man vergleiche hierzu *M. Bottasso*, Atti della R. Acc. delle Sc. di Torino 50 (1915), p. 417—440.

379*) *O. Blumenthal* behandelt neuerdings das Gleichgewicht einer rechteckigen Membran T von der Breite $2b$ und der Länge a , die an einer Breitseite festgehalten, an der anderen frei ist und deren beide Längsseiten von elastischen, durch stetige Kräfte senkrecht zur Membran beanspruchten und in einem beliebigen Punkte ($c \leq a$) gestützten Balken gebildet werden. Das Problem wird auf die Bestimmung derjenigen in $T + S$ stetigen, in T regulären Potentialfunktion w zurückgeführt, die an den Längsseiten Randbedingungen von der Form

$$\frac{\partial w}{\partial n} = G(x) + \lambda \int_0^a Q(\xi, x) w(\xi) d\xi,$$

an den Breitseiten $x = 0$ und $x = a$ der Form $w = 0$ und $\frac{\partial w}{\partial n} = 0$ genügt. Der Ausdruck $Q(\xi, x)$ ist eine stetige, nicht symmetrische Funktion, die für alle x , als Funktion von ξ aufgefaßt, eine aus zwei Geradenstücken bestehende gebrochene Linie darstellt. Die Aufgabe, die sich auch auf eine Integralgleichung mit unsymmetrischem Kern zurückführen ließe, wird durch einen *Fourier*-Ansatz gelöst. Die Eigenwerte werden als Wurzeln einer transzendenten Gleichung mittels einer asymptotischen Methode bestimmt. Es wird das Vorhandensein

30. Die Poissonsche Differentialgleichung. Es sei T ein beschränktes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E}_m , $p(x, y)$ eine in $T + S$ stetige, in T einer H -Bedingung genügende Funktion. Es gibt eine und nur eine in $T + S$ stetige Funktion u , so daß $D_1 u$ und $D_2 u$ in T stetig sind, in $T \dots \Delta u = p$, auf $S \dots u(s) = \varphi(s)$ ($\varphi(s)$ abteilungsweise stetig) gilt.³⁸⁰) Man findet (in \mathfrak{E} am einfachsten von der Greenschen Formel (2) Nr. 10 ausgehend)

$$(1) \quad u(\xi, \eta) = -\frac{1}{2\pi} \int_T p(x, y) G(\xi, \eta; x, y) dx dy + \frac{1}{2\pi} \int_S \varphi(t) \frac{\partial}{\partial n_i} G(\xi, \eta; t) dt.$$

Von besonderer Wichtigkeit ist die auf S verschwindende Lösung

$$(2) \quad \bar{u}(\xi, \eta) = -\frac{1}{2\pi} \int_T p(x, y) G(\xi, \eta; x, y) dx dy.³⁸¹)$$

1. In $T + S$ ist

$$(3) \quad |D_1 \bar{u}(x_1, y_1) - D_1 \bar{u}(x_2, y_2)| < A'(\lambda) \text{Max} |p| d_{12}^\lambda \quad (0 < \lambda < 1) \\ d_{12}^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2.$$

2. Gehört T der Klasse Bh an und ist λ der zugehörige Hölder-sche Exponent, ist ferner in $T + S \dots |p(x_1, y_1) - p(x_2, y_2)| < N d_{12}^\lambda$, so sind $D_2 u$ in $T + S$ stetig. Es gilt ferner daselbst

von unendlich vielen negativen und unendlich vielen komplexen Eigenwerten mit negativem Realteil festgestellt. Sonstige Eigenwerte können nur in endlicher Anzahl vorhanden sein. (Vgl. O. Blumenthal, Math. Zeitschr. 3 (1919).

380) Ist das Gebiet T schlicht, so wird man zum Beweise am einfachsten

$$u(\xi, \eta) = -\frac{1}{2\pi} \int_T p(x, y) \log \frac{1}{\rho} dx dy + U(\xi, \eta) \text{ setzen. Ist } T \text{ schlichtartig, so}$$

kann man durch konforme Abbildung zu einem schlichten Gebiete übergehen.

Andernfalls wird man etwa, wenn \bar{T} irgendein Gebiet der Klasse B bezeichnet,

$$\text{das } T + S \text{ enthält, } u(\xi, \eta) = -\frac{1}{2\pi} \int_T p(x, y) \bar{G}(\xi, \eta; x, y) dx dy + U(\xi, \eta) \text{ setzen,}$$

unter \bar{G} die zu \bar{T} gehörige Greensche Funktion verstanden. Der Existenz- und Unitätssatz gelten bei beliebigen mehrfach (und selbst unendlichvielfach) zusammenhängenden beschränkten Gebieten in \mathfrak{E}_m , deren Rand keine punktartigen Komponenten hat (Nr. 39 und 45 c).

381) Die Formel (1) gilt unverändert auch noch, wenn T der Klasse Q angehört. Ein analoger Ausdruck ergibt sich bei einem Gebiet der Klasse B im Raume. Die Formel (2) gilt für alle beschränkten einfach oder mehrfach zusammenhängenden Gebiete in \mathfrak{E}_m , deren Rand keine punktartigen Komponenten hat. Vgl. L. Lichtenstein, Ber. d. Berl. Math. Ges. 15 (1916), p. 92—96. Dort werden beschränkte, einfach zusammenhängende Gebiete in \mathfrak{E} betrachtet.

$$(4) \quad |D_2 \bar{u}(x_1, y_1) - D_2 \bar{u}(x_2, y_2)| < \{A_1 \text{Max } |p| + A_2 N\} d_{12}^\lambda \\ (A_1 > 0, A_2 > 0 \text{ konstant}).^{382)}$$

Analoge Sätze gelten für partielle Ableitungen höherer Ordnung sowie im Raume.

Ist p eine abteilungsweise stetige, oder allgemeiner beschränkte und im *Lebesgueschen* Sinne integrierbare Funktion, so sind $D_1 \bar{u}$, sofern T der Klasse B angehört, immer noch in $T + S$ stetig und genügen der Beziehung (3). Genügt p in einem Punkte in T einer der in der Nr. 8 angegebenen Bedingungen, so hat \bar{u} dort stetige partielle Ableitungen zweiter Ordnung und genügt der Differentialgleichung (5) $\Delta u = p$. Ist $[p(x, y)]^2$ in T im *Lebesgueschen* Sinne integrierbar, so hat $\bar{u}(x, y)$ nach *L. Lichtenstein* in T , außer höchstens auf einer gewissen Menge von Punkten vom Maße Null, partielle Ableitungen $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ und genügt der Differentialgleichung (5) (vgl. Nr. 8).³⁸³⁾

31. Einzelbetrachtung besonderer Gebiete. Spezielle Untersuchungen über die Kreisfläche, Kreisringfläche sowie den Kugelkörper sind ihrer besonderen Wichtigkeit wegen in den Abschnitten Nr. 13 und 14 eingehend besprochen worden. (Vgl. überdies die Fußnoten 237 und 254.) Untersuchungen über das Gebiet einer Ellipse sind in der neueren Zeit von *C. Neumann*³⁸⁴⁾, *E. R. Neumann*³⁸⁵⁾, *J. Plemelj*³⁸⁶⁾, *G. Wiarda*³⁸⁷⁾, *G. Léry*³⁸⁷⁾, *J. Blumenfeld* und *W. Mayer*²⁰⁵⁾ angestellt worden. Mit dem Ellipsoidkörper beschäftigen sich *G. Morera*, *C. Somigliana*, *A. Wangerin*, *G. Wiarda* und *S. Brodetsky*.³⁸⁸⁾ Die Anziehung und

382) Vgl. *A. Korn*, loc. cit. 55) h), p. 31—32; *Ch. H. Müntz*, loc. cit. 31) [p. 9—20]. Man beachte insbesondere die Bemerkung auf p. 20.

383) *L. Lichtenstein*, loc. cit. 61), p. 34—42. Weitere Literatur: *A. Paraf*, loc. cit. 245); dort sowie bei *É. Picard*, *Acta math.* 25 (1902), p. 121—137, findet sich insbesondere die Darstellung der Lösung \bar{u} im Kreisgebiete durch trigonometrische Reihen. Man vergleiche ferner *U. Dini*, loc. cit. 137); *L. Lichtenstein*, *Math. Ann.* 67 (1909), p. 559—575 [p. 559—565]; *W. Oseen*, *Rend. del Circolo Mat. di Palermo* 38 (1914), p. 167—179.

384) *C. Neumann*, *Leipz. Ber.* 62 (1910), p. 87—169 [p. 103—108].

385) *E. R. Neumann*, *Beiträge*, p. 140—151 (a. a. O. wird auch das Außengebiet einer Ellipse betrachtet).

386) *J. Plemelj*, *Untersuchungen*, p. 71—74; p. 88—90; p. 95—97.

387) *G. Léry*, a) *C. R.* 142 (1906), p. 951—953; b) ebendort p. 1406—1407 sowie c) *C. R.* 152 (1911), p. 834—844. *Léry* stellt die *Greensche* Funktion einer Ellipsenfläche als das Potential einer gewissen unendlichen Menge von Massenpunkten dar. Dieses Resultat ist später unabhängig von *E. R. Neumann*, *Beiträge*, p. 125—141 angegeben worden (Vgl. auch *G. Wiarda*, loc. cit. 237).)

388) *G. Morera*, *Atti della R. Acc. della Sc. di Torino* 39, p. 252—258; p. 258—261; 41, p. 520—531; p. 538—541; *Torino Mem.* (2) 55 (1905), p. 1—25; *Atti della R. Acc. dei Lincei, Rendiconti* (5) 15, p. 669—678; (5) 17, p. 378—390;

das Potential hyperboloidischer Schalen bestimmt *E. Steinitz*.³⁸⁹⁾ Mit der Anziehung eines homogenen Körpers, der von zwei Tripeln konfokaler Flächen zweiten Grades begrenzt ist, die durch zwei gegebene Punkte als Gegenecken hindurchgehen, beschäftigt sich *F. de Salvert*.³⁹⁰⁾ mit der Anziehung eines homogenen Kugelsegmentes *G. W. Hill*.³⁹¹⁾ Das von zwei Kreisbögen begrenzte einfach zusammenhängende Gebiet haben *C. Neumann* und *T. Carleman* betrachtet.³⁹²⁾ Eine neue Behandlung des Potentials und der Anziehung homogener Polyeder gibt *P. Appell*.^{392a)}

Über ebene Gebiete, die von algebraischen Kurven begrenzt sind, liegen Arbeiten von *G. Léry*.³⁹³⁾ und *G. Herglotz*.³⁹⁴⁾ vor. *G. Léry* betrachtet die Greensche Funktion und weist u. a. auf die Bedeutung der Brennpunkte hin. *Herglotz* bestimmt allgemein das logarithmische Potential des mit homogener Masseschicht belegten Gebietes und zeigt, daß sich dieses stets auf das Potential gewisser einfacher und doppelter Linienbelegungen sowie einzelner Massenpunkte zurückführen läßt. Die Lage dieser Massen hängt innig mit der Lage der ordentlichen und außerordentlichen Brennpunkte des algebraischen Randes zusammen. Ins einzelne durchgeführt ist die Theorie für bizirkuläre Kurven vierter Ordnung. Als Grenzfälle ergeben sich Sätze über Inversionskurven einer Ellipse

C. Somigliana, Rend. del Circ. Mat. di Palermo 31 (1911), p. 387—391; *A. Wangerin*, Ber. d. Deutschen Math. Ver. 23 (1914), p. 389—391; *G. Wiarda*, loc. cit. 237, p. 57—63; *S. Brodetsky*, The quarterly Journ., 46 (1915), p. 297—317 gibt eine direkte Ableitung der bekannten Formeln für das Potential eines homogenen Ellipsoidkörpers. A. a. O. finden sich auch allgemeine Formeln für das Potential homogener konvexer Körper mit einer Symmetrieebene. Potential gewisser nicht homogener Ellipsoidkörper gibt *G. Prasad*, Mess. of Math. 30 (1900/01), p. 8—15 an. Es sei zuletzt auf die Behandlung des Ellipsoidkörpers bei *H. Poincaré*, Figures d'équilibre d'une masse fluide, Paris 1902, p. 113—192, insbes. p. 136—142, und bei *C. Jordan*, Cours d'Analyse, Bd. 3, 2. Aufl., Paris 1896, p. 422—435 hingewiesen.

389) *E. Steinitz*, Journ. f. Math. 129 (1905), p. 294—316.

390) *F. de Salvert*, Annales de la soc. sc. de Bruxelles 21 und 30, auch als Monographie bei Gauthier-Villars, Paris, erschienen. Für spezielle Lagen des angezogenen Punktes werden explizite Formeln angegeben.

391) *G. W. Hill*, Amer. Journ. 29 (1907), p. 345—362.

392) Vgl. *C. Neumann*, Leipz. Ber. 62 (1910), p. 307—367, wo namentlich die natürliche Belegung bestimmt wird, und *T. Carleman*, loc. cit. 198), p. 47—86. Weitere spezielle Gebiete siehe bei *C. Neumann*, a. a. O., p. 368—376 sowie Leipz. Ber. 63 (1911), p. 240—248. Man vergleiche überhaupt die in den Jahren 1906—1917 a. a. O. veröffentlichten Abhandlungen von *C. Neumann*.

392a) Vgl. *P. Appell*, Rend. del Circ. Mat. di Palermo 35 (1913), p. 79—81.

393) Vgl. *G. Léry*, loc. cit. 387) a) b) c) sowie Ann. de l'Éc. Norm. (3) 32 (1915), p. 49—136.

394) Vgl. *G. Herglotz*, loc. cit. 79).

sowie einer Hyperbel, die gewisse von *C. Neumann* entdeckte Theoreme umfassen.³⁹⁵) An gleicher Stelle wird das *Newtonsche* Potential homogener, von bizirkularen, symmetrischen Flächen vierter Ordnung begrenzter Rotationskörper behandelt. Das *Newtonsche* Potential homogener Körper, deren Begrenzung aus Rotationsellipsoiden durch Inversion an einem beliebigen Punkte der Umdrehungsachse entsteht, bestimmt *A. Wangerin*.³⁹⁶)

Das *Newtonsche* Potential einer homogenen Kreisscheibe und einer homogenen Halbkugel sowie gewisser nichthomogener Belegungen der beiden Gebiete hat *T. J. P. A. Bromwich* ermittelt.³⁹⁷)

Das erste Randwertproblem für das von der Hälfte einer Lemniskate mit Doppelpunkt begrenzte beschränkte Gebiet wird unter Zugrundelegung der *Neumann-Fredholmschen* Theorie von *J. Blumenfeld* und *W. Mayer* erledigt.²⁰⁵)

Eine (zweidimensionale) *Greensche* Funktion (im erweiterten Sinne) der Kugelfläche hat *E. Zermelo* angegeben.³⁹⁸) Mit den *Greenschen* Funktionen des Körpers eines unbegrenzten geraden Kreiszylinders beschäftigen sich *P. Lévy* und *G. Bouligand*.³⁹⁹)

Eine Formel für die *Greensche* Funktion des zwischen zwei paral-

395) *C. Neumann*, Leipz. Ber. 59 (1907), p. 278—312; 60 (1908), p. 53—56 sowie p. 240—247. Siehe auch *H. Liebmann*, ebendort, p. 378—386.

396) *A. Wangerin*, loc. cit. 91). Dort werden noch weitere Sonderfälle behandelt. Durch Spezialisierung werden Ausdrücke für das Potential des Körpers, das durch Rotation einer Kreisfläche um eine Tangente entsteht, gewonnen (zuerst von *H. Bruns*, Inaugural-Dissertation, Berlin 1871, bestimmt).

397) *T. J. P. A. Bromwich*, Proc. of the London Math. Soc. (2) 12 (1912/13), p. 100—125. Die Verteilung der Elektrizität auf einer leitenden elliptischen Platte, insbesondere einer Kreisscheibe findet sich bei *H. Weber*, Partielle Differentialgleichungen 1, p. 338—342. Man vergleiche auch *R. Gans*, Zeitschrift f. Math. und Phys. 53, p. 434—437.

398) *E. Zermelo*, Zeitschr. f. Math. und Phys. 47 (1902), p. 201—237. Die fragliche *Greensche* Funktion ist eine auf der Kugelfläche, außer in einem vorgegebenen Punkte, wo sie logarithmisch unendlich wird, analytische und reguläre Lösung der Differentialgleichung $\Delta_2 u = \text{Const.}$ Man vergleiche hierzu *J. Hadamard*, Leçons, p. 50—52; *D. Hilbert*, Gött. Nachr. 1904, p. 241—242; Grundzüge, p. 65—66.

Die (zweidimensionale) *Greensche* Funktion einer Kugelkalotte gibt *V. Amato*, Giornale di Mat. 44 (1906), p. 18—24, an.

399) *P. Lévy*, C. R. 154 (1912), p. 1405—1407; Rend. del Circ. Mat. di Palermo 34 (1912), p. 187—219, betrachtet die *Greensche* Funktion erster und zweiter Art. *G. Bouligand*, C. R. 156 (1913), p. 1361—1363, betrachtet einige Eigenschaften der *Greenschen* Funktion erster Art, insbesondere ihren Zusammenhang mit der *Greenschen* Funktion des Normalschnittes. Man vergleiche die Bemerkungen von *J. Hadamard* zu der vorstehenden Note (C. R. 156 (1913), p. 1364).

lenen Ebenen eingeschlossenen seitlich unbegrenzten Körpers gibt *T. Boggio*, für den Körper eines rechteckigen Parallelepipeds *L. Orlando* an.⁴⁰⁰⁾

Mit dem Problem des elektrischen Gleichgewichts eines Systems von zwei leitenden Kugeln beschäftigen sich im Anschluß an eine ältere *Poissonsche* Behandlung des gleichen Gegenstandes *J. B. Goebel*, *M. Lange* und *G. Darboux*.⁴⁰¹⁾ Spezielle in das Gebiet der Potential-

400) *T. Boggio*, Rend. del R. Ist. Lomb. (2) 42 (1909), p. 611—624. *L. Orlando*, Rend. del Circ. Mat. di Palermo 19 (1905), p. 62—65. Eine Auflösung der beiden ersten Randwertprobleme für den Körper eines rechteckigen Parallelepipeds gibt *P. Alibrandi*, Giorn. di Mat. 41 (1913), p. 230—241, an. Es sei an dieser Stelle auf die älteren umfassenden Untersuchungen von *P. Appell*, loc. cit. 300, hingewiesen. *Appell* gibt allgemein einen Ausdruck für eine *Greensche* Funktion zweiter Art des Körpers eines Polyeders an, das so beschaffen ist, daß die durch unbegrenzt wiederholte Spiegelung entstehenden Polyeder nicht ineinander eindringen.

Das elektrische Feld in Systemen von regelmäßig angeordneten Punktladungen bestimmen *P. P. Ewald*, Inaug.-Diss., München 1912; *M. Born*, Dynamik der Kristallgitter, Leipzig 1915 und *E. Madelung*, Phys. Zeitschrift 19 (1918), p. 524—532.

In diesem Zusammenhang sei ferner eine Arbeit von *M. Hafsn*, Math. Ann. 69 (1910), p. 517—537, genannt. *Hafsn* bestimmt u. a. für spezielle Werte der Randfunktion die Lösung des ersten Randwertproblems 1. in dem von einer (doppelt zu zählenden) Kreisfläche begrenzten (dreidimensionalen) Gebiete, 2. in einem Raumbegriebe, das von zwei doppelt zu zählenden parallelen Kreisflächen, deren Mittelpunkte auf einer auf diesen Flächen senkrechten Geraden liegen, begrenzt ist. Man gewinnt so insbesondere eine strenge Lösung des Kondensatorproblems.

401) *J. B. Goebel*, Journ. f. Math. 124 (1902), p. 157—164; 125 (1903), p. 267—281; *M. Lange*, Journ. f. Math. 132 (1907), p. 69—80; *G. Darboux*, Bull. des sc. math. (2) 31 (1907), p. 17—28.

Goebel behandelt insbesondere den auch schon von *Poisson* betrachteten Fall zweier sich berührenden Kugeln. *Lange* bestimmt die Verteilung der Elektrizität auf zwei einander nicht umschließenden und nicht berührenden leitenden Kugeln in einem in bezug auf die Verbindungsgerade der Mittelpunkte symmetrischen Felde. Hieran anschließend wird die elektrische Verteilung auf drei leitenden Kugeln, deren Mittelpunkte auf einer Geraden liegen, behandelt.

Mit der *Poissonschen* Theorie hat sich auch *E. R. Neumann* beschäftigt. Vgl. Leipz. Ber. 48 (1896), p. 634—648; Journ. f. Math. 120 (1899), p. 60—98; p. 277—304. In diesen Arbeiten wird unter anderem die Verteilung der Elektrizität auf einer schlichtartigen leitenden Fläche bestimmt, die aus Teilen von drei Kugeln besteht, von denen eine auf den beiden anderen orthogonal ist.

Weitere Literatur: *T. J. I. A. Bromwich*, Mess. of Math. 35 (1905/06), p. 1—12; *E. W. Barnes*, Quarterly Journ. 35 (1904), p. 155—175; *A. Guillet et Aubert*, C. R. 155 (1912), p. 708—711; *F. Schmidt*, Beiträge zur Verteilung der Elektrizität auf zwei leitenden Kugeln, insbesondere für den Fall der Berührung, Inaugural-Dissertation, Halle 1912, p. 1—46. Ältere Literatur zum Problem der zwei Kugeln vgl. V 15 Nr 13.

theorie fallende Randwertaufgaben der mathematischen Physik finden sich u. a. bei *H. Weber*, Partielle Differentialgleichungen, 1, p. 319—527; 2, p. 168—198; p. 438—450 sowie *C. Jordan*, Cours d'Analyse, Bd. 3, zweite Auflage, Paris 1896, p. 380—458.^{401a)}

Explizite Formeln für die konforme Abbildung spezieller einfach zusammenhängender Gebiete in \mathbb{C} auf ein Kreisgebiet sowie spezieller schlichtartiger Polyeder auf eine Kugel finden sich in großer Zahl in den Abhandlungen von *H. A. Schwarz*.⁴⁰²⁾ Man vergleiche ferner *G. Holzmüller*, Einführung in die Theorie der isogonalen Verwandtschaft und der konformen Abbildung mit Anwendung auf mathematische Physik, Leipzig 1882, sowie die in der Literaturübersicht angeführten Bücher über konforme Abbildung von *L. Lewent*, *L. Bieberbach* und *E. Study*. Verschiedene Beispiele sind von *T. Levi-Civita*, *U. Cisotti* und *H. Villat* bei Behandlung hydrodynamischer Probleme betrachtet worden.⁴⁰³⁾

Explizite Formeln für die konforme Abbildung des Gebietes, das übrig bleibt, wenn man aus einer Halbebene eine unendliche Anzahl von Halbkreisflächen, deren geradliniges Randstück allemal auf der reellen Achse liegt, entfernt, auf eine Halbebene gibt unter gewissen einschränkenden Voraussetzungen *G. Cassel*.⁴⁰⁴⁾

Mit der konformen Abbildung des von zwei aufeinander senkrechten geradlinigen Schlitzten begrenzten zweifach zusammenhängenden Gebietes in \mathbb{C} auf ein Kreisringgebiet beschäftigen sich *E. Bähr*⁴⁰⁵⁾ und *J. Thomae*.⁴⁰⁶⁾ ⁴⁰⁷⁾

Besondere durch elliptische Funktionen ausführbare konforme Abbildungen vgl. bei *R. Fricke*, II B 3 Nr. 76.

401a) Weitere Literatur: *H. Petrini*, Arkiv för Mat. Bd. 11 (1916) Nr. 13.

402) *H. A. Schwarz*, Ges. Abh. 2, p. 65—83; p. 84—101; p. 102—107; p. 211 bis 259; p. 320—326.

403) Vgl. etwa *T. Levi-Civita*, Rend. del Circ. Mat. di Palermo 23 (1907), p. 1—3; *U. Cisotti*, ebendort, 25 (1908), p. 145—179; *H. Villat*, loc. cit. 160.

404) *T. Cassel*, Acta math. 15 (1891), p. 33—44. Der besondere Fall, wenn die Zahl der Kreise endlich ist, ist bereits früher von *H. Weber*, Gött. Nachr. 1886, p. 359—370, betrachtet worden.

405) *E. Bähr*, Inaugural-Dissertation, Jena 1905.

406) *J. Thomae*, Leipz. Berichte 58 (1906), p. 172—191.

407) Mit weiteren besonderen Fällen beschäftigen sich *F. Lindemann*, Münch. Ber. 24 (1894), p. 403—422; 25 (1895), p. 219—237; 26 (1896), p. 401—424; *J. Goetiler*, Münch. Ber. 30, p. 165—185; *F. J. Müller*, Abbildung eines Sphäroidstreifens auf die Ebene, Inaugural-Dissertation, Würzburg; *L. Wayland Dowling*, Ann. of Math. (2) 6, p. 69—85; *J. Nauenberg*, Die konforme Abbildung eines Flächenstückes, das von einer algebraischen Kurve $2n$ Ordnung begrenzt wird, Inaugural-Dissertation, Erlangen.

32. Wirkliche Bestimmung der Lösung von Randwertproblemen. Besondere Ansätze. Für die wirkliche Bestimmung der Lösung eines Randwertproblems kommen vor allem Reihenentwicklungen in Frage. Für eine Anzahl ebener und räumlicher Gebiete einfacher Natur gelingt es, unendliche Reihen aufzustellen, die sich für die Darstellung der Lösung besonders eignen und namentlich in der mathematischen Physik eine große Rolle spielen. Die zum Teil weit ausgebildete Theorie bildet den Gegenstand einer besonderen Lehre von den Reihenentwicklungen der Potentialtheorie.⁴⁰⁸⁾ ⁴⁰⁹⁾ Eine ähnliche Rolle, wie die Kugelfunktionen für den Kugelkörper spielen bei einem beliebigen dreidimensionalen Gebiete der Klasse B die wiederholt erwähnten von *H. Poincaré* eingeführten Fundamentalfunktionen (Nr. 17).⁴¹⁰⁾ ⁴¹¹⁾

Für die wirkliche Berechnung der Lösung der beiden ersten Randwertaufgaben hat *S. Zaremba* das folgende einfache Verfahren angegeben.⁴¹²⁾ Es sei T ein beschränktes, der Einfachheit halber einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} . Es sei (x_0, y_0) ein beliebig gewählter fester Punkt. Man geht von der unendlichen Folge regulärer Potentialfunktionen

$$u(x, y) = \frac{1}{2} [\{ (x - x_0) + i(y - y_0) \}^{h+1} + \{ (x - x_0) - i(y - y_0) \}^{h+1}],$$

$$u(x, y) = \frac{1}{2^i} [\{ (x - x_0) + i(y - y_0) \}^{h+1} - \{ (x - x_0) - i(y - y_0) \}^{h+1}]$$

aus, setzt

$$(h = 0, 1, \dots)$$

408) Es handelt sich hier vor allem um Entwicklungen, die nach den Kugel- und verwandten Funktionen fortschreiten. Man vergleiche *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer*, II A 7 b Nr. 14, 20, 21, 22; *A. Wangerin*, II A 10; *M. Bôcher*, Reihenentwicklungen der Potentialtheorie, Leipzig 1894 (weitere Ausführung einer Göttinger Preisschrift, 1893); *E. Hilb*, Math. Ann. 63 (1907), p. 38—83 sowie den Artikel über allgemeine Reihenentwicklungen von *E. Hilb* und *O. Szász*.

409) Man vergleiche hierzu auch die in der Fußnote 388) genannten Arbeiten von *G. Morera* und *C. Somigliana*.

410) Vgl. z. B. *J. Blumenfeld* und *W. Mayer*, loc. cit. 205).

411) Für die wirkliche Berechnung der Lösung erscheint es vom Vorteil, die *Laplacesche* Gleichung in besonderen Fällen auf einfachere Differentialgleichungen zurückzuführen. Man vergleiche in diesem Zusammenhang loc. cit. 113) sowie *A. Wangerin*, Berl. Monatsber. 1878, p. 152—166; *E. R. Haentzschel*, Inaugural-Dissertation, Berlin 1893; *F. H. Safford*, Archiv der Math. u. Phys. (3) 13 (1906), p. 223—226; *R. Forster*, Archiv der Math. u. Phys. (3) 22 (1914), p. 314 bis 319 sowie p. 319—322; *O. Tedone*, Atti del 4. Congr. Intern. dei Mat. 3 (1909), p. 158—168.

412) *S. Zaremba*, Bull. de l'Acad. des Sc. de Cracovie 1909, p. 125—195. Die Ergebnisse von *Zaremba* enthalten als Spezialfall die etwas später veröffentlichten Resultate von *S. Bernstein*, C. R. 148 (1909), p. 1306—1308.

$$v_1 = c_{1,0} + c_{1,1}u_1, \quad v_k = c_{k,0} + \sum_{j=1}^{k-1} c_{k,j}v_j + c_{k,k}u_k \quad (k = 2, 3, \dots)$$

und bestimmt $c_{k,j}$ so, daß

$$\int_S v_k ds = 0, \quad \int_S v_k \frac{\partial v_k}{\partial n} ds = -1 \quad (k = 1, 2, \dots), \quad \int_S v_j \frac{\partial v_k}{\partial n} ds = 0 \quad (j \neq k)$$

gilt. Jede in $T + S$ stetige, in T reguläre Potentialfunktion u , die so beschaffen ist, daß das *Dirichletsche* Integral $D_T(u)$ existiert (Nr. 45), läßt sich in eine unendliche Reihe

$$u = \frac{1}{l} \int_S u ds - \sum_k^{1 \dots \infty} v_k \int_S u \frac{\partial v_k}{\partial n} ds \quad (l = \text{Länge von } S)$$

entwickeln. Diese konvergiert in jedem Bereiche in T unbedingt und gleichmäßig⁴¹³⁾ und dürfte zumindest, wenn T und die vorgeschriebenen Randwerte geeigneten Stetigkeitsbedingungen genügen, eine praktisch brauchbare Darstellung der Lösung bilden. In ähnlicher Weise wird man vorgehen, wenn T mehrfach zusammenhängend ist oder den unendlich fernen Punkt enthält. Auch gewinnt man auf diesem Wege fast unmittelbar eine Darstellung der Lösung des zweiten Randwertproblems. Analoge Entwicklungen gelten im Raume.

Die vorstehenden Betrachtungen von *Zaremba* berühren sich mit einigen späteren Ansätzen von *M. Brillouin*.⁴¹⁴⁾

Eine ganz andere Methode zur rechnerischen Bestimmung der Lösung von Randwertaufgaben ist von *W. Ritz* vorgeschlagen worden. Wir kommen auf diese in einem anderen Zusammenhange weiter unten (Nr. 45) zu sprechen.

Ein Verfahren, das wenigstens im Prinzip gestattet, die konforme Abbildung ausgedehnter Klassen einfach zusammenhängender beschränkter Gebiete in \mathfrak{C} auf ein Kreisgebiet rechnerisch mit beliebiger Annäherung durchzuführen, ist neuerdings von *L. Bieberbach* angegeben worden (Nr. 47 p. 358). Auch die neueren Quadratwurzelverfahren (Nr. 47, p. 353—356) kommen für diesen Zweck in Betracht.

Es ist zu erwarten, daß, zumindest bei gewissen speziellen Gebieten, die *Cauchysche* Integrationsmethode (Ersatz der Differentialgleichung durch eine Differenzgleichung und Übergang zur Grenze) sich auf die *Laplace'sche* Differentialgleichung wird übertragen lassen.⁴¹⁵⁾

413) Ohne notwendigerweise in $T + S$ zu konvergieren.

414) Vgl. *M. Brillouin*, loc. cit. 327) sowie C. R. 161 (1915), p. 775—778.

415) Vgl. *G. Fubini*, Rend. del. Circolo Mat. di Palermo 17 (1903), p. 222 bis 235 [p. 235], wo die Fläche eines Rechtecks betrachtet wird, sowie *J. Le Roux*, C. R. 156 (1913), p. 437—440; p. 670—672 sowie Journ. de Math.

33. Lösung in Abhängigkeit von der Begrenzung. Es sei $T_n (n = 1, 2, \dots)$ eine unendliche Folge beschränkter Gebiete der Klasse B in \mathfrak{C} , die gegen ein Gebiet T derselben Natur konvergieren. (Ist d_n Maximum des Abstandes eines Randpunktes des Gebietes T_n von S , so ist $\lim d_n = 0$.) Es sei K^* ein Kreisgebiet, das T und $T_n (n = 1, 2, \dots)$ enthält, f eine in K^* erklärte stetige Funktion, u und u_n die entsprechend in $T + S$ und $T_n + S_n$ stetigen, in T oder T_n regulären Potentialfunktionen, die auf S bzw. S_n gleich f sind.

Aus den Entwicklungen der Nr. 17 läßt sich leicht die Beziehung $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u$ (der Grenzübergang in jedem Bereiche in T gleichmäßig) ableiten: Die Lösung des ersten Randwertproblems ändert sich mit dem Gebiete stetig. Eine Reihe sehr weit gehender Sätze verwandter Natur wird weiter unten, Nr. 49 (siehe auch Nr. 34), besprochen. An dieser Stelle wollen wir zunächst in aller Kürze auf gewisse auf *J. Hadamard* zurückgehende Ansätze hinweisen, die mit den bekannten Betrachtungen der *Volterra*schen Theorie der Funktionen von Linien zusammenhängen.

Es sei etwa T ein beschränktes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{C} , \bar{T} ein variables Gebiet derselben Natur, das gegen T konvergiert. Bis auf unendlich kleine Größen höherer Ordnung ist in T

$$(1) \quad G(\xi, \eta; x, y) - \bar{G}(\xi, \eta; x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_S \frac{\partial}{\partial n_i} G(\xi, \eta; t) \frac{\partial}{\partial n_i} G(x, y; t) \delta n_i dt,$$

unter (ξ, η) und (x, y) beliebige Punkte in T , unter δn_i den als unendlich klein vorausgesetzten Abstand des Punktes t auf S von \bar{S} verstanden.⁴¹⁶⁾ Liegt eine von einem Parameter α stetig abhängende Schar von Gebieten der Klasse B vor, so ist nach (1), sobald gewisse leicht angebbare Bedingungen erfüllt sind,

$$(2) \quad \frac{\partial}{\partial \alpha} G(\xi, \eta; x, y) = - \frac{1}{2\pi} \int_S \frac{\partial}{\partial n_i} G(\xi, \eta; t) \frac{\partial}{\partial n_i} G(x, y; t) \frac{\partial n_i}{\partial \alpha} dt.$$

Ist die *Greensche* Funktion eines Gebietes der Schar bekannt, so bietet die Formel (2) eine Möglichkeit dar, diese für ein beliebiges Gebiet der Schar zu bestimmen. Schaltet man etwa zwischen ein

(6) 10 (1914), p. 189—230. Weitere Literatur: *E. E. Levi*, I problemi dei valori al contorno per le equazioni lineari totalmente ellittiche alle derivate parziali, Mem. della Soc. ital. delle Science (3) 16 (1909), p. 1—112 [p. 1—16]; *A. Viterbi*, Rend. del R. Istit. Lomb. di Sc. e Lett. (2) 47 (1914/15), p. 763—796.

416) Vgl. etwa *J. Hadamard*, Leçons sur le Calcul des Variations, Paris 1910, p. 303—305. Dort findet sich p. 307—312 eine Formel für

$$G^{\Pi}(\xi, \eta; x, y) - \bar{G}^{\Pi}(\xi, \eta; x, y).$$

Kreisgebiet und ein beliebiges einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} eine geeignete stetige Schar von Gebieten ein, so kann man auf diesem Wege u. a. eine neue Auflösung des ersten Randwertproblems gewinnen.⁴¹⁷⁾

Der soeben skizzierte methodische Gedanke läßt sich auch wie folgt anders durchführen.

Es sei T ein Gebiet der Klasse Bh in \mathfrak{E} , T' das durch die Transformation

$$(3) \quad \xi = x + \varepsilon \mathfrak{P}_1(x, y), \quad \eta = y + \varepsilon \mathfrak{P}_2(x, y),$$

unter \mathfrak{P}_1 und \mathfrak{P}_2 beständig konvergierende Potenzreihen verstanden, für einen dem absoluten Betrage nach hinreichend kleinen Wert des reellen Parameters ε aus T abgeleitete Gebiet (der Klasse Bh). Die Differentialgleichung

$$(4) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} =$$

geht vermöge (3) in eine Differentialgleichung

$$(5) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varepsilon \mathfrak{P}_3 \left(x, y, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \varepsilon \right)$$

über, unter $\mathfrak{P}_3(x, y, p, q, r, s, t, \varepsilon)$ eine für hinreichend kleine $|\varepsilon|$, alle (x, y) in $T + S$ und alle p, q, r, s, t reguläre Funktion ihrer acht Argumente verstanden. Es sei $f'(s')$ eine nebst ihren Ableitungen erster und zweiter Ordnung stetige Funktion auf S' , und es möge $\frac{d^2 f'(s')}{ds'^2}$ einer H -Bedingung genügen. Der Funktion $f'(s')$ wird durch (3) eine Funktion $f(s)$ derselben Natur auf S zugeordnet. Die Auflösung des ersten Randwertproblems der Potentialtheorie in T' (Randwerte $f'(s')$) ist der Bestimmung derjenigen in $T + S$ stetigen, in T regulären Lösung der Differentialgleichung (5), die auf S gleich $f(s)$ ist, äquivalent. Die zuletzt erwähnte Aufgabe läßt sich, wenn das erste Randwertproblem der Potentialtheorie in T als gelöst angenommen wird, für hinreichend kleine ε etwa durch sukzessive Approximationen auf-

417) Vgl. die Andeutungen von *J. Hadamard*, loc. cit. 416), p. 251 sowie seine eingehenden Ausführungen über die *Greensche* Funktion der Gleichung $\Delta \Delta u = 0$ (*J. Hadamard*, Mémoire sur le problème d'analyse relatif à l'équilibre des plaques élastiques encastrées, Mémoires présentés par divers savants à l'Acad. des Sc. 33 (1908), p. 1—128). Man vergleiche ferner *P. Lévy*, Sur les équations intégrales différentielles définissant des fonctions de lignes, Thèse, Paris 1911, p. 1—120, abgedruckt im Journ. de l'Éc. polyt. (2) 17 (1913), p. 1—120; Rend. del Circ. Mat. di Palermo 33 (1912), p. 281—312; 34 (1912), p. 187—229; 37 (1914), p. 113—168, ferner eine lange Reihe von Arbeiten von *V. Volterra* und seinen Schülern.

lösen.⁴¹⁸) Man gewinnt damit eine Darstellung der Lösung für eine Schar von Gebieten in einer Umgebung von T .⁴¹⁹)

Es ist zu erwarten, daß man, wenn nötig, nach einer mehrfachen Wiederholung des soeben besprochenen Verfahrens, zumindest unter gewissen Voraussetzungen, beispielsweise von einem Kreisgebiete zu einem beliebig vorgegebenen Gebiete allgemeinerer Natur gelangen wird.

IV. Umfassende Methoden. Allgemeine Theorie der konformen Abbildung.

34. Leitgedanken. Heuristisches. Es sei T ein beschränktes Gebiet in \mathbb{C} (\mathbb{C}_m) oder im Raume; es sei f eine in $T + S$ stetige Funktion. Es sei T_n ($n = 1, 2, \dots$) irgendeine Folge ineinandergeschachtelter Gebiete der Klasse B , die gegen T konvergieren (vgl. Nr. 4, insb. die Fußnote 37). Es möge u_n diejenige in $T_n + S_n$ stetige, in T_n reguläre Potentialfunktion bezeichnen, die auf S_n gleich f ist. Den Sätzen der Nr. 12 zufolge kann es höchstens eine in $T + S$ stetige, in T reguläre Potentialfunktion u geben, die auf S den Wert f annimmt. Ist u vorhanden, so läßt sich aus Stetigkeitsgründen jedem $\varepsilon > 0$ ein $n(\varepsilon)$ zuordnen, so daß für $n > n(\varepsilon)$ auf $S_n \dots |u - f| < \varepsilon$, daher in $T_n + S_n \dots |u - u_n| < \varepsilon$ wird. Es gilt mithin

$$(1) \quad u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n.$$

In jedem Bereiche in T ist der Grenzübergang gleichmäßig.

Bei unendlich vielblättrigen Gebieten (wie bei den zweidimensionalen Gebieten der allgemeinsten Natur überhaupt) hat man sich, sofern es sich um das erste Randwertproblem handelt, durch Fragestellungen der Theorie der konformen Abbildung und der automorphen Funktionen veranlaßt, auf die Bestimmung von Potentialfunktionen beschränkt, die in einem vorgeschriebenen Punkte (ξ_0, η_0) in T_1 eine

418) Vergleiche *A. Korn*, loc. cit. 55) h) sowie, Schwarz Festschrift, Berlin 1914, p. 215—229; *Ch. H. Müntz*, loc. cit. 31). Siehe ferner *S. Bernstein*, *Math. Ann.* 62 (1906), p. 253—271; 69 (1910), p. 82—136; *L. Lichtenstein*, *Monatshefte f. Math. u. Physik* 28 (1917), p. 3—51.

419) In der in der Fußnote 418) an zweiter Stelle genannten Arbeit führt *Korn* das erste Randwertproblem für das Gebiet der Ellipse

$$\xi^2(1 - \varepsilon) + \eta^2 = 1 \quad (\varepsilon < 1)$$

auf die Auflösung der ersten Randwertaufgabe der Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varepsilon \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

für das Gebiet des Einheitskreises zurück. Hier führen die sukzessiven Approximationen für alle $\varepsilon < 1$ zum Ziele.

gewisse vorgegebene Unstetigkeit aufweisen und am Rande verschwinden.⁴²⁰⁾ Augenscheinlich ist auch jetzt noch, falls u existiert,

$$(2) \quad u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n,$$

sofern u_n in (ξ_0, η_0) die vorgeschriebene Unstetigkeit hat und auf S_n verschwindet.

Wir kehren zu den eingangs eingeführten Annahmen zurück. Es mögen überdies $D_1 f$ in T stetig sein und es möge das „Dirichletsche Integral“

$$D_T(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{T_n} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy$$

existieren. Für alle n ist $D_{T_n}(u_n)$ vorhanden und $\leq D_{T_n}(f) \leq D_T(f)$. Ist u vorhanden, so folgt aus (1) leicht

$$(3) \quad D_{T_n}(u) = \lim_{m \rightarrow \infty} D_{T_n}(u_{n+m}); \quad D_{T_n}(u_{n+m}) \leq D_{T_{n+m}}(u_{n+m}) \leq D_T(f).$$

Also ist $D_T(u)$ vorhanden und $\leq D_T(f)$. Das Gleichheitszeichen gilt nur, wenn $u \equiv f$ ist.⁴²¹⁾

Für die Auflösung des ersten Randwertproblems ergeben sich hiernach zunächst die beiden folgenden Wege.

1. Man bestimmt wie vorhin die approximierenden Potentialfunktionen u_n . Hat die Aufgabe eine Lösung u , so muß der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ existieren. Es gilt $u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$. Es dürfte also möglich sein, zumindest wenn T und f gewissen Voraussetzungen genügen und die Folge T_n ($n = 1, 2, \dots$) in geeigneter Weise gewählt ist, die Beziehungen $u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ und $u = f$ auf S zu beweisen.

2. Es sei f so gewählt, daß $D_1 f$ in T stetig sind und $D_T(f)$ existiert. Es sei \bar{u} irgendeine in $T + S$ stetige Funktion, so daß $D_1 \bar{u}$ in T stetig sind, auf $S \dots \bar{u} = f$ ist und $D_T(\bar{u})$ existiert.

Die untere Grenze aller Werte $D_T(\bar{u})$ heiße d . Man geht von einer Folge wie \bar{u} beschaffener Funktionen $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots$ aus, so daß $\lim_{n \rightarrow \infty} D_T(u^{(n)}) = d$ gilt. Hat das Randwertproblem eine Lösung, so ist $D_T(u) = d$.

Man wird darum versuchen, von der Folge $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots$ durch geeignete Operationen zu u zu gelangen (Nr. 45).

Analoge Ansätze bieten sich bei der zweiten und der dritten Randwertaufgabe. Auch liegt es nahe, in manchen Fällen Gebietsfolgen einzuführen, die das gegebene Gebiet von außen approximieren.

⁴²⁰⁾ Dies besagt, daß jedem $\delta > 0$ ein $n(\delta)$ zugeordnet werden kann, so daß für alle $n > n(\delta)$ in $\mathfrak{X} - T_n \dots |u| < \delta$ ist.

⁴²¹⁾ Vgl. loc. cit. 153), namentlich R. Courant, Journ. f. Math. 144 (1914), p. 190—211 [p. 194—195].

Liegen vorgeschriebene, wenn auch nur logarithmische Unstetigkeiten (in der Ebene) vor, so ist $D_{T_n}(u)$ nicht mehr vorhanden. Man wird in diesem Falle versuchen, nach Abtrennung eines geeigneten Summanden, zu einer Funktion überzugehen, deren *Dirichletsches* Integral einen endlichen Wert hat. Die neue zu bestimmende Funktion braucht nicht notwendig der Gleichung $\Delta u = 0$ zu genügen (Nr. 45 d).

Insbesondere wird man die vorhin angedeuteten Methoden auf die Bestimmung der *Greenschen* Funktion $G(\xi, \eta; x, y)$ und des Strömungspotentials $\mathfrak{R}(\xi, \eta; x, y)$ ⁴²²⁾ anwenden (Nr. 40, 42 und 45 d). Handelt es sich um ein einfach zusammenhängendes Gebiet⁴²³⁾, so wird man, wenn $G(\xi, \eta; x, y) = U(x, y)$ vorhanden ist, erwarten, daß dieses durch Vermittlung der Funktion $e^{-(U+V)}$ (V zu U konjugiert) auf die Fläche des Einheitskreises konform abgebildet wird. Liegt noch spezieller ein beschränktes Gebiet T in \mathfrak{E}_m vor, so entsteht die weitere Aufgabe, zu untersuchen, ob und wann $T + S$ umkehrbar eindeutig und stetig auf $K + C$ bezogen wird. Liegt dieser Fall vor, so läßt sich das erste Randwertproblem, wie leicht ersichtlich, auf die erste Randwertaufgabe in K zurückführen und mithin vollständig erledigen.⁴²⁴⁾

Geht man von dem Strömungspotentiale aus, so wird man in Verallgemeinerung der elementaren Ergebnisse der Nr. 24 h eine Abbildung auf ein „Schlitzgebiet“ erwarten.

Über die funktionentheoretischen Methoden der konformen Abbildung vgl. Nr. 47, über die Kontinuitätsmethode Nr. 46.

35. H. A. Schwarz, Zur Theorie der Abbildung. Die vorhin skizzierten Betrachtungen sind seit dem Erscheinen der grundlegenden Abhandlung von *H. A. Schwarz, Zur Theorie der Abbildung*⁴²⁵⁾, mit steigendem Erfolge angewandt worden. In dieser Arbeit stellt sich

422) Die am nächsten liegende Definition von \mathfrak{R} wäre:

$$\mathfrak{R}(\xi, \eta; x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} K_n(\xi, \eta; x, y),$$

unter (ξ, η) einen Punkt in T_1 , unter K_n das Strömungspotential in T_n verstanden, sofern dieser Grenzwert existiert. Diese Definition nimmt *P. Koebe* zum Ausgangspunkt (Nr. 42). Eine andere allgemeine Definition vergleiche Nr. 42 und 45 d.

423) Das im übrigen von der allgemeinsten Natur sein kann.

424) Gelingt es, die konforme Abbildung von T auf K auf einem von den unter 1. und 2. angegebenen Verfahren unabhängigen Wege zu erhalten (vgl. Nr. 47), so gewinnt man ein neues Verfahren zur Auflösung des ersten Randwertproblems. Dieser Gedanke läßt sich auch auf mehrfach zusammenhängende Gebiete ausdehnen. Vgl. die Fußnoten 592) und 160).

425) Programm d. eidg. polyt. Schule in Zürich f. d. Schuljahr 1869—1870; Ges. Abh. 2, p. 108—132.

H. A. Schwarz die Aufgabe, irgendein beschränktes, einfach zusammenhängendes konvexes Gebiet T in der Ebene z auf die Fläche K des Einheitskreises C in der Ebene Z konform abzubilden.⁴²⁶ Es sei z_0 ein Punkt in T . Das Gebiet T wird durch eine Folge von Gebieten T'_n ($n = 1, 2, \dots$) ($T'_n + S'_n > T'_{n+1} + S'_{n+1}$), deren Rand allemal aus Strecken parallel zu der x - oder der y -Achse besteht, von außen approximiert. Es sei $z'_n(Z)$ diejenige Funktion, durch deren Vermittlung K auf T'_n konform abgebildet wird, sodaß $z'_n(0) = z_0$, $\frac{dz'_n(0)}{dZ}$ reell und > 0 ist.

Unter fast ausschließlicher Verwendung funktionentheoretischer Hilfsmittel beweist nun *Schwarz*, daß die Funktionen $z'_n(Z)$ in K gegen eine daselbst reguläre Funktion $z(Z)$ gleichmäßig konvergieren. Durch Vermittlung von $z(Z)$ wird K auf T konform abgebildet. Der Beweis stützt sich wesentlich auf den folgenden einfachen Hilfssatz:

Es sei $f(Z)$ eine für $|Z| < 1$ reguläre und für $|Z| \leq 1$ stetige, den Bereich $|Z| \leq 1$ schlicht abbildende Funktion. Ist $f(0) = 0$ sowie für $|Z| = 1$, $\varrho_1 \leq |f(Z)| \leq \varrho_2$, so ist für $|Z| \leq 1 \dots \varrho_1 |Z| \leq |f(Z)| \leq \varrho_2 |Z|$.⁴²⁷

Die Ergebnisse von *Schwarz* liefern insbesondere einen Existenzbeweis der zu T gehörigen *Greenschen* Funktion $G(\xi, \eta; x, y)$, indessen nicht ohne weiteres auch die Lösung des ersten Randwertproblems.⁴²⁸

426) Weitere Voraussetzungen bezüglich der Randkurve S werden nicht gemacht; sie kann darum z. B. unendlich viele Ecken haben.

427) *C. Carathéodory* teilt (*Math. Ann.* 72 (1912), p. 107—144 [p. 110]) im wesentlichen nach *H. Poincaré* (*Acta Math.* 4 (1884), p. 201—312 [p. 231—232]) einen funktionentheoretischen Beweis für den folgenden von ihm als das „*Schwarzsche Lemma*“ bezeichneten, dem Hilfssatze des Textes nahe verwandten Satz mit: Es sei $f(Z)$ im Gebiete $|Z| < 1$ regulär und es sei daselbst $|f(Z)| \leq 1$. Ist $f(0) = 0$, so ist entweder $f(Z) = e^{i\alpha} Z$ (α konstant), oder es ist für $|Z| < 1$, $|f(Z)| < |Z|$. Offenbar ist dann auch $|f'(0)| < 1$. In derselben Abhandlung [p. 111—118] sowie loc. cit. 290) [p. 21—25], an letzter Stelle zum Teil unter Benutzung einer brieflichen Mitteilung von *J. Plemelj*, gibt *Carathéodory* eine Reihe wichtiger Verallgemeinerungen dieses für die Theorie der konformen Abbildung außerordentlich nützlichen Satzes. Nach einer anderen Richtung gehende Verallgemeinerungen finden sich bei *E. Lindelöf*, *Acta Soc. Sc. Fenn.* 35 (1908) Nr. 7, p. 1—35. *W. Blaschke*, *Leipz. Berichte* 67 (1915), p. 194—200 [p. 198 sowie p. 200], betrachtet den allgemeineren Fall, daß $f(Z)$ in dem Gebiete $|Z| < 1$ mehrere (auch unendlich viele) vorgegebene Nullstellen hat. Man vergleiche ferner *G. Pick*, *Mat. Ann.* 77 (1915), p. 1—6 sowie *P. Koebe*, *Acta Math.* 40 (1915), p. 251—290 [p. 262—266].

428) Ist $G(\xi, \eta; x, y)$ einmal bestimmt, so läßt sich auf einem Umwege auch die Lösung des ersten Randwertproblems gewinnen (Nr. 39). Vgl. *L. Lichtenstein*, *Ber. d. Berl. Math. Ges.* 15 (1916), p. 92—96.

Die Bedeutung der betrachteten Abhandlung von *H. A. Schwarz* beruht einmal in der scharfen Trennung zwischen dem Problem der konformen Abbildung des Inneren eines Gebietes auf das Innere einer Kreisfläche und dem Problem des Anschlusses dieser Abbildung an den Rand, sodann in der Benutzung einer Folge approximierender Gebiete.

Beide methodischen Gedanken kommen an dieser Stelle zum ersten Male vor.

36. Ergebnisse von A. Harnack. Méthode de balayage von H. Poincaré. Es sei T ein beschränktes, einfach zusammenhängendes Gebiet in \mathfrak{C} und T_n ($n = 1, 2, \dots$) eine Folge ineinander geschachtelter Polygonflächen, die gegen T konvergieren. Es sei (ξ, η) ein Punkt in T_1 und $G_n(\xi, \eta; x, y)$ die zu T_n gehörige Greensche Funktion. Offenbar ist in $T_n \dots G_n > 0$, darum auf S_n für alle $p \dots G_{n+p} - G_n > 0$, folglich in $T_n + S_n \dots G_{n+p} > G_n$. Die unendliche Reihe $(G_2 - G_1) + (G_3 - G_2) + \dots$ ist dem *Harnackschen* Satze über positive Potentialfunktionen (Nr. 16) zufolge, wegen der Existenz einer leicht angebbaren Majorante, gleichmäßig konvergent. Gelingt es nachzuweisen, daß $\lim_{n=\infty} G_n(\xi, \eta; x, y) = G(\xi, \eta; x, y)$ in $T + S$, außer im Punkte (ξ, η) , stetig ist und auf S verschwindet, so ist $G(\xi, \eta; x, y)$ die zu T gehörige Greensche Funktion. Die vorstehenden Überlegungen stammen von *A. Harnack* her.⁴²⁹⁾ Es sei P ein Punkt auf S und es sei möglich, eine Polygonfläche Θ anzugeben, deren Begrenzung Σ mit $T + S$ nur den Punkt P gemeinsam hat, während T in Θ liegt. Ist Γ die zu Θ gehörige Greensche Funktion (Nr. 24 b), so zeigt nunmehr *Harnack*, daß $G \leq \Gamma$, mithin in $P \dots G = 0$ ist. Damit ist beispielsweise die Existenz der Greenschen Funktion für alle Gebiete der Klasse N ohne nach innen gerichtete Spitzen, die indessen durch eine elementare konforme Abbildung leicht zu eliminieren sind, erwiesen.⁴³⁰⁾

Das Verfahren läßt sich auf den Raum ausdehnen.

Es sei T ein beschränktes Gebiet in \mathfrak{C} oder im Raume, K ein Kreisgebiet (Kugelkörper), das $T + S$ enthält, f eine in $K + C$ stetige

429) *A. Harnack*, Grundlagen, p. 116—121. Vgl. auch *A. Harnack*, Leipz. Ber. 38 (1886), p. 144—169.

430) Ist z die (einzige) nach innen gekehrte Spitze von S , so wende man z. B. die durch die Funktion $\sqrt{z - z_0}$ vermittelte Abbildung an. Man kann sich auch einer Polygonfläche Θ bedienen, die in z_0 einen Winkel $\alpha\pi \geq 2\pi$ einschließt. Ist $\alpha > 2$, so überdeckt $\Theta + \Sigma$ die Ebene teilweise mehrfach. Majoranten dieser Art benutzt häufig *P. Koebe* in seinen Arbeiten zur Theorie der Uniformisierung. *A. Paraf* bedient sich des von einer Ellipse und der Verbindungsgeraden ihrer Brennpunkte begrenzten zweifach zusammenhängenden Gebietes (vgl. *A. Paraf*, loc. cit. 431); *É. Picard*, Traité 2, p. 100—101.

Funktion. Zur Bestimmung derjenigen in $T + S$ stetigen, in T regulären Potentialfunktion u , die auf S gleich f ist, hat Poincaré zuerst im Jahre 1887 ein bemerkenswertes Verfahren angegeben (*H. Burkhardt* und *W. F. Meyer*, II A 7 b Nr. 31).⁴³¹⁾ Das Wesen der Methode läßt sich wie folgt zusammenfassen. Man darf vor allem in $K + C$ die Funktionen $f, D_1 f, D_2 f$ stetig und $\Delta f \leq 0$ voraussetzen.⁴³²⁾ Es sei:

$$\text{in der Ebene } \Phi(\xi, \eta) = -\frac{1}{2\pi_K} \int_K \Delta f \log \frac{1}{\rho} dx dy,$$

$$\text{im Raume } \Phi(\xi, \eta, \zeta) = -\frac{1}{4\pi_K} \int_K \Delta f \frac{1}{\rho} dx dy dz.$$

In T ist augenscheinlich $\Delta(\Phi - f) = 0$. Das Gebiet T wird nun durch abzählbar unendlichviele Kreisflächen (Kugelkörper) K_n ($n = 0, 1, 2, \dots$), die sich nur in der Umgebung des Randes häufen, ausgeschöpft. Man ordne sie in eine Reihe $K^{(n)}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) so an, daß jedes Individuum unendlich oft vorkommt, etwa $K_0, K_1, K_0, K_1, K_2, K_0, \dots$. Es wird nun eine Folge in T stetiger Funktionen $u^{(n)}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) durch die folgenden Festsetzungen bestimmt: $\Delta u^{(0)} = 0$ in $K^{(0)}$, $u^{(0)} = \Phi$ in $K - K^{(0)}$; $\Delta u^{(1)} = 0$ in $K^{(1)}$, $u^{(1)} = u^{(0)}$ in $K - K^{(1)}$; $\Delta u^{(2)} = 0$ in $K^{(2)}$, $u^{(2)} = u^{(1)}$ in $K - K^{(2)}$ usf.⁴³³⁾ Es ist $u^{(0)} \geq u^{(1)} \geq u^{(2)} \geq \dots$. Die Folge $u^{(n)}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) konvergiert in jedem Bereiche in T gleichmäßig gegen eine daselbst reguläre Potentialfunktion. Die Funktion $u = \lim_{n \rightarrow \infty} u^{(n)} = \Phi + f$ ist die Lösung der Randwertaufgabe.

Man kann diese, wie man sieht, gewinnen, ohne andere Hilfsmittel als die Poissonschen Integrale zu benutzen. Poincaré faßt, von $u^{(0)}$

431) Vgl. *H. Poincaré*, C. R. 104 (1887), p. 44–46; Amer. Journ. of Math. 12 (1890), p. 211–294 [p. 216–227]; Potentiel, p. 260–288. Poincaré legt seinen Betrachtungen das Newtonsche Potential zugrunde. Auf das logarithmische Potential ist sein Verfahren von *A. Paraf* übertragen worden, Annales de Toulouse 6 (1892), H, p. 1–75; siehe auch *É. Picard*, Traité 2. p. 89–108.

432) Der Nr. 16 gemäß darf man f in $K + C$ analytisch und regulär voraussetzen. Es sei in einem Teile Θ_1 von $K \dots \Delta f < 0$, in $K - \Theta_1$ hingegen $\Delta f > 0$. Wir setzen $\Delta f = \psi_1 - \psi_2$; $\psi_1 = \Delta f$ in Θ_1 , $\psi_2 = 0$ in $K - \Theta_1$; $\psi_2 = -\Delta f$ in $K - \Theta_1$, $\psi_2 = 0$ in Θ_1 . Es sei (in \mathfrak{E})

$$f_1 = -\frac{1}{2\pi_K} \int_K \psi_1 \log \frac{1}{\rho} dx dy, \quad f_2 = -\frac{1}{2\pi_K} \int_K \psi_2 \log \frac{1}{\rho} dx dy.$$

Es gilt $\Delta f_s = \Delta[f - (f_1 - f_2)] = 0$. Die Funktion f_s kann als bekannt gelten. Die Funktionen $f_1, f_2, D_1 f_1, D_1 f_2, D_2 f_1, D_2 f_2$ sind stetig, ferner ist $\Delta f_1 \leq 0$, $\Delta f_2 \leq 0$. Es genügt, das Randwertproblem unter Zugrundelegung der Funktionen f_1 und f_2 aufzulösen.

433) In dieser Fassung erscheint die Balayage-Methode mit dem alternierenden Verfahren verwandt.

ausgehend, alle $u^{(n)}$ als Potentiale gewisser Massenbelegungen auf und geht von $u^{(n)}$ zu $u^{(n+1)}$ über, indem er die in $K^{(n)}$ befindlichen Massen durch geeignete auf $C^{(n)}$ verteilte Massen ersetzt („balayage“ von $K^{(n)}$). Die Balayage-Methode führt auf eine in T reguläre Potentialfunktion, wie die Begrenzung des (als beschränkt vorausgesetzten) Gebietes (und damit zugleich sein Zusammenhang) auch beschaffen sei. Ob u die Randbedingung erfüllt, bedarf einer besonderen Untersuchung.

Eine Anwendung der Balayage-Methode auf unendlichvielblättrige Gebiete vgl. Nr. 40.

37. H. Poincaré, Sur un théorème de la théorie générale des fonctions. Betrachtungen von Harnack (Nr. 36) berühren sich mit den fundamentalen Entwicklungen der Poincaréschen Abhandlung, Sur un théorème de la théorie générale des fonctions.⁴³⁴)

In Verallgemeinerung der zuerst von H. A. Schwarz Anfang der achtziger Jahre in mündlichen Mitteilungen an F. Klein und H. Poincaré angegebenen Idee einer zu einer geschlossenen Riemannschen Fläche gehörigen Überlagerungsfläche, führt Poincaré eine zu einem System beliebiger analytischer Funktionen $f_1(z), \dots, f_m(z)$ gehörige Überlagerungsfläche \mathfrak{X} durch folgende Festsetzungen ein: Ein in der schlichten Ebene z geschlossener Weg Γ , auf dem f_1, \dots, f_m sich regulär verhalten, gilt auf \mathfrak{X} dann nur und nur dann als geschlossen, wenn: 1. alle Funktionen f_1, \dots, f_m nach Umlauf von Γ zu den Ausgangswerten zurückkehren, 2. Γ durch stetige Deformation auf einen Punkt reduziert werden kann, ohne daß unterdessen die Eigenschaft 1. aufhört zu gelten. Das Gebiet \mathfrak{X} ist einfach zusammenhängend. Gelingt es \mathfrak{X} auf ein Gebiet in \mathfrak{E} konform abzubilden, so ist damit, wie zuerst H. A. Schwarz in dem einfachsten Falle einer algebraischen Funktion bemerkt hat, eine Uniformisierung der Funktionen $f_1(z), \dots, f_m(z)$ geleistet.⁴³⁵)

Es sei $z = z(Z)$ irgendeine automorphe Funktion mit Grenzkreis (Einheitskreis) in der Ebene Z . Durch Vermittlung der inversen Funktion $Z = Z(z)$ wird ein gewisses über der z -Ebene ausgebreitetes Gebiet \mathfrak{X}_0 auf die Fläche des Einheitskreises konform abgebildet. Die Funktion $U_0 = \log \frac{1}{|Z|}$

434) Bull. de la soc. math. de France, 11 (1883), p. 112—125.

435) Vgl. die historischen Bemerkungen bei P. Koebe, Math. Ann. 67 (1909) p. 145—224 [p. 147] sowie das Referat von R. Fricke, II B 4 Nr. 39 [p. 455—456]. Dort findet sich auch näheres über das Problem der Uniformisierung, insbesondere über die Normierung der uniformisierenden Variablen. Was die Konstruktion der Überlagerungsfläche betrifft, vergleiche u. a. P. Koebe, Journal für Math. 1910 (138), p. 192—253; 1911 (139), p. 251—292; H. Weyl, loc. cit. 560) p. 1—68 L. Bieberbach, Math. Ann. 78 (1918), p. 312—331.

ist eine in \mathfrak{X}_0 , außer in dem Punkte $\xi = z(0)$, reguläre positive Potentialfunktion; die Funktion $z = z(Z)$ wird so gewählt, daß ξ in das Innere der zu f_1, \dots, f_m gehörigen Riemannschen Fläche \mathfrak{X} fällt. Es sei $\overline{\mathfrak{X}}^*$ eine zu f_1, \dots, f_m, Z gehörige Überlagerungsfläche. Als Ortsfunktion auf $\overline{\mathfrak{X}}^*$ aufgefaßt, ist U_0 eine, außer in $\xi = (\xi, \eta)$ und im allgemeinen (abzählbar) unendlichvielen hierzu homologen Punkten, reguläre, positive Potentialfunktion.

Als solche sei sie mit \overline{U}^* bezeichnet.

Poincaré bedient sich an der betrachteten Stelle einer Funktion $z(Z)$, die drei Werte ausläßt.⁴³⁶) Die Scheitel des Fundamentalpolygons liegen sämtlich auf dem Grenzkreise.

Das Gebiet $\overline{\mathfrak{X}}^*$ wird (Nr. 4) als Grenze einer Folge ineinandergeschachtelter Gebiete $\overline{T}_1, \overline{T}_2, \dots$ der Klasse D dargestellt. Es sei $\overline{G}_n(\xi, \eta; x, y)$ die zu \overline{T}_n gehörige klassische Greensche Funktion. Es ist, da \overline{U}^* für alle n auf \overline{S}_n positiv ist, $\overline{G}_1 < \overline{G}_2 < \dots < \overline{U}^*$. Durch Vermittlung der Funktion $\tau = e^{-(G^* + i\overline{H}^*)}$ ($G^* = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{G}_n$, \overline{H}^* zu \overline{G}^* konjugiert), wird, wie *Poincaré* zuletzt zeigt, $\overline{\mathfrak{X}}^*$ auf ein Gebiet in \mathfrak{E} konform abgebildet. Offenbar ist $|\tau| \leq 1$.⁴³⁷) Wird von den drei ausgelassenen Punkten abgesehen, so werden durch die Beziehungen $z = F_0(\tau)$, $f_1(z) = F_1(\tau)$, \dots , $f_m(z) = F_m(\tau)$ die Funktionen f_1, \dots, f_m uniformisiert.

Wenngleich das Problem der Uniformisierung beliebiger analytischer (ja selbst algebraischer) Funktionen in der betrachteten Arbeit von *Poincaré* in wesentlichen Stücken unerledigt blieb, so ist doch diese Abhandlung, durch die weiten Perspektiven, die sie der Forschung eröffnete, für die Folge von der größten Wichtigkeit geworden.⁴³⁸)

38. Einfach zusammenhängende schlichte Gebiete. Greensche Funktion. Konforme Abbildung auf ein Kreisgebiet. Es sei T ein beschränktes, einfach zusammenhängendes Gebiet in \mathfrak{E} . Der erste vollständige Existenzbeweis der zu T gehörigen Greenschen Funktion ist in Weiterverfolgung der Gedanken von *Poincaré* und *Harnack* von *W. F. Osgood* gegeben worden.⁴³⁹) Die Funktion $G(\xi, \eta; x, y)$ wird ähnlich wie bei *Harnack* gebildet. Wesentlich ist nur der Beweis, daß $G(\xi, \eta; x, y)$ auf S verschwindet.

Es seien a, b, c drei beliebige Punkte auf S . Längs des Kreisbogens von a über b nach c denken wir uns in der Ebene z einen

436) Sie wird mit Hilfe der elliptischen Modulfunktion gebildet.

437) Ob durch das Bild von $\overline{\mathfrak{X}}^*$ in der Ebene τ die Fläche des Einheitskreises ausgefüllt wird, wird von *Poincaré* nicht weiter untersucht.

438) Vgl. die Fußnote 435).

439) *W. F. Osgood*, Trans. of the Amer. Math. Soc. 1 (1900), p. 310--314.

Schnitt \mathfrak{S} gelegt. Es sei $Z_1(z)$ eine Funktion, durch deren Vermittlung das von dem doppelt gezählten Bogen \mathfrak{S} begrenzte (nicht beschränkte) Gebiet in der z -Ebene auf die Fläche eines Kreisbogenvierseits in der Ebene Z_1 , das aus einem Kreisbogensdreieck mit paarweise einander berührenden Seiten durch Spiegelung an einer Seite entsteht, konform abgebildet wird, so daß die Eckpunkte einander entsprechen (Nr. 25). Durch Vermittlung der Funktion $z(Z_1)$ wird das Innere der dem Vierseit umschriebenen Kreisfläche K_1 auf das Innere eines Gebietes \mathfrak{X}_0 abgebildet, das in a, b, c sowie den unendlichvielen durch fortgesetzte Spiegelung hieraus entstehenden Punkten Windungspunkte unendlich hoher Ordnung hat.⁴⁴⁰ Es sei $T_1(X_1, Y_1) = G_1(\Xi_1, H_1; X_1, Y_1)$ die zu K_1 gehörige Greensche Funktion. Die Funktion $t(x, y) = T_1(X_1, Y_1)$ ist in \mathfrak{X}_0 , außer in (ξ, η) , regulär und positiv und wird in (ξ, η) wie $\log \frac{1}{\rho}$ unendlich. Ist $(x^{(n)}, y^{(n)})$ ($n = 1, 2, \dots$) irgendeine Folge von Punkten, die gegen a, b oder c konvergieren, so ist $\lim_{n \rightarrow \infty} t(x^{(n)}, y^{(n)}) = 0$. Man sieht jetzt leicht ein, daß in $T \dots G(\xi, \eta; x, y) \leq t(x, y)$, darum

$$\lim_{n \rightarrow \infty} G(\xi, \eta; x^{(n)}, y^{(n)}) = 0$$

ist. Für das Gelingen des Beweises ist wesentlich allein, daß \mathfrak{X}_0 in a einen Windungspunkt unendlich hoher Ordnung hat und, wenn man irgendeinen Punkt in T in ein bestimmtes Blatt von \mathfrak{X}_0 versetzt, T ganz in das Innere von \mathfrak{X}_0 fällt. Es genügt darum, statt \mathfrak{X}_0 die zu $\log(z - a)$ gehörige Riemannsche Fläche \mathfrak{X}^0 zu betrachten und den durch $|z - a| < d$ ($d >$ größte Sehne von T) bestimmten Teil von \mathfrak{X}^0 auf die Fläche eines Einheitskreises K' in der Ebene z' abzubilden, was durch elementare Funktionen gelingt. Das Gebiet T wird hierdurch auf ein Gebiet T' konform abgebildet. Es gilt

$$G(\xi, \eta; x, y) = G'(\xi', \eta'; x', y').$$

Mit der einzigen Ausnahme desjenigen Punktes a' , der a entspricht, liegt $T' + S'$ in K' . Der Punkt a' ist von außen geradlinig erreichbar. Nach *Harnack* ist $\lim_{z' \rightarrow a'} G'(\xi', \eta'; x', y') = 0$, also ist auch

$$\lim_{z \rightarrow a} G(\xi, \eta; x, y) = 0.⁴⁴¹$$

Damit ist die Existenz der Greenschen Funktion bewiesen. Durch Betrachtungen, die den in der Nr. 22 durchgeführten analog sind, läßt sich jetzt zeigen, daß durch Vermittlung der Funktion $Z = e^{-G-iH}$

440) Die Funktion $z(Z_1)$ hängt mit der von *Poincaré* benutzten elliptischen Modulfunktion (Nr. 37) eng zusammen.

441) *W. F. Osgood*, Funktionentheorie, p. 699–703.

(H zu G konjugiert) das Innere des Gebietes T auf das Innere eines Einheitskreises konform abgebildet wird.

Es sei bereits bekannt, daß das Bild Θ von T schlicht ist. Man kann sich dann auch des folgenden schon früher von *P. Koebe* angegebenen Verfahrens bedienen⁴⁴²) (vgl. Nr. 40b). Augenscheinlich liegt kein Punkt von Θ außerhalb der Fläche $K \dots |Z| \leq 1$. Daß K von Θ vollständig ausgefüllt wird, zeigt *Koebe* so. Es sei A der dem Koordinatenursprung am nächsten liegende Punkt des Randes Σ von Θ . Das Gebiet Θ ist ein Teil des Gebietes Π , das man erhält, wenn man aus einem Blatte der zu $\sqrt{Z-A}$ gehörigen *Riemannschen* Fläche eine über K gelegene Kreisfläche entfernt. Ist $\omega^*(X, Y)$ die zu Π gehörige, im Punkt $Z=0$ des übrig gebliebenen Blattes unendliche, elementar darstellbare *Greensche* Funktion, so ist

$$0 \leq G(\xi, \eta; x, y) = \omega(X, Y) \leq \omega^*(X, Y).$$

In A ist mithin $\omega = 0$. Darum ist $|A| = 1$.

Weitere Beweise des vorhin betrachteten Abbildungssatzes vgl. Nr. 40 und 45.

Aus $G_n(x_1, y_1; x_2, y_2) = G_n(x_2, y_2; x_1, y_1)$ folgt durch Grenzübergang $\dot{G}(x_1, y_1; x_2, y_2) = G(x_2, y_2; x_1, y_1)$. Die Beziehungen (4) und (8) Nr. 20 gelten auch jetzt noch.⁴⁴³)

Wir nehmen jetzt, was keine Einschränkung der Allgemeinheit bedeutet, an, daß das Gebiet T den Koordinatenursprung in seinem Innern enthält. Der Abstand dieses Punktes von S sei d . Es sei $P(z_0)$ ein Punkt auf S , so daß $|z_0| = d$ ist. Wir setzen

$$G(0, 0; x, y) = \log \frac{1}{r} + a + g(x, y), \quad r^2 = x^2 + y^2, \quad g(0, 0) = 0.$$

Zwischen a und d besteht nach *P. Koebe* ein Zusammenhang folgender Art: Einer jeden Zahl d^* läßt sich ein Wert a^* zuordnen, so daß für alle $d \leq d^*$ auch $a \leq a^*$ ist. Ist $d > 1$, so ist $a > 0$. Ist T in der Fläche K des Einheitskreises enthalten (und dabei von K selbst verschieden), so ist $a < 0$.⁴⁴⁴)

442) *P. Koebe*, Gött. Nachr. 1907, p. 633—699 [p. 644].

443) Durch die im Text besprochenen Betrachtungen von *Osgood* ist, wie man ohne Schwierigkeit sieht, die Existenz der *Greenschen* Funktion für beschränkte mehrfach und selbst unendlichvielfach zusammenhängende Gebiete in \mathfrak{E} , die keine Punkte zu Randkomponenten haben,argetan.

Die *Greensche* Funktion eines von unendlichvielen Kreisen begrenzten beschränkten Gebietes in \mathfrak{E} findet sich bei *S. Johansson*, Acta soc. Sc. fenn. Bd. 41, Nr. 2 (1912), p. 1—39 (p. 13—14).

444) Vgl. *P. Koebe*, Math. Ann. 67 (1909), p. 145—224 [p. 208—216], ferner *R. Fricke* und *F. Klein*, Automorphe Funktionen 2, p. 458—464; *W. F. Osgood*, Funktionentheorie, p. 726—730; *E. Study* loc. cit. 148), p. 21—26. Dieser Satz

39. Auflösung des ersten Randwertproblems in der Ebene.

Das erste Randwertproblem ist unter Zugrundelegung eines beliebigen beschränkten, einfach, mehrfach oder selbst unendlich vielfach zusammenhängenden ebenen Gebietes, das keine punktförmige Randkomponenten hat, zuerst von *H. Lebesgue* durch Variationsbetrachtungen gelöst worden (Nr. 45 c).⁴⁴⁵⁾

Zu demselben Resultat führt auch die folgende an die Methoden der Nr. 38 anknüpfende Überlegung.⁴⁴⁶⁾

Es sei T ein beschränktes, etwa einfach zusammenhängendes Gebiet in \mathbb{E} oder im Raume, T^* ein Gebiet der Klasse B , das $T + S$ enthält, f eine willkürliche analytische und reguläre Funktion in T^* . Der Nr. 16 gemäß ist das erste Randwertproblem als erledigt zu betrachten, sobald es gelingt, diejenige in $T + S$ stetige, in T reguläre Potentialfunktion u zu bestimmen, die auf S gleich f ist. Wir bilden (Nr. 34) die Folge $u_n (n = 1, 2, \dots)$, setzen $u_n = f + U_n$ und erhalten $\Delta U_n = F = -\Delta f$, $U_n = 0$ auf S_n . Es sei $F = \bar{F} - \overline{\bar{F}}$, $\bar{F} \geq 0$, $\overline{\bar{F}} \geq 0$ ⁴⁴⁷⁾, $U_n = \bar{U}_n - \overline{\bar{U}_n}$, $\Delta \bar{U}_n = \bar{F}$, $\Delta \overline{\bar{U}_n} = \overline{\bar{F}}$, $\bar{U}_n = \overline{\bar{U}_n} = 0$ auf S_n . Für alle n ist nunmehr

$$\bar{U}_n \leq 0, \quad \overline{\bar{U}_n} \leq 0,$$

darum für alle p in $T_n \dots \bar{U}_n - \overline{\bar{U}_{n+p}} \geq 0$, $\bar{U}_n - \overline{\bar{U}_{n+p}} \geq 0$. Die Folgen $\bar{U}_n, \overline{\bar{U}_n} (n = 1, 2, \dots)$ sind nicht zunehmend. Man beweist leicht, daß sie in jedem Bereiche in T gleichmäßig konvergieren.

Hat das erste Randwertproblem eine Lösung, so ist diese (Nr. 34) einfach gleich $f + \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{U}_n - \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{\bar{U}_n}$. Daß $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{U}_n$ auf S verschwindet, läßt sich, wenn T ein ebenes Gebiet ist, wie in der Nr. 38, durch den Übergang zu der *Riemannschen* Fläche \mathfrak{X}^0 und die konforme Abbildung auf T' zeigen.⁴⁴⁶⁾ Steht übrigens die Existenz der *Greenschen* Funktion $G(\xi, \eta; x, y)$ einmal fest, so läßt sich, wie bereits in Nr. 35

steht mit einigen anderen von *P. Koebe* angegebenen Sätzen, insbesondere dem wichtigen „Verzerrungssatz“ (Nr. 43) im Zusammenhang. *Koebe* nimmt an, daß in dem im Text zuletzt erwähnten Falle ($T < K$) die genaue obere Schranke α^* demjenigen Gebiete entsprechen wird, das man erhält, wenn man K längs der Normale von P auf C aufschneidet (vgl. hierzu *E. Study* loc. cit. 148), p. 22–23). Die *Koebesche* Vermutung ist von *L. Bieberbach* als richtig nachgewiesen worden. Vgl. *L. Bieberbach*, *Math. Ann.* 77 (1916), p. 153–172.

445) Die Resultate von *Lebesgue* gelten mutatis mutandis wohl auch für den Raum.

446) Vgl. *L. Lichtenstein*, *Berichte der Berl. Math. Ges.* 15 (1916), p. 92–96.

447) Die Funktionen \bar{F} und $\overline{\bar{F}}$ können in $T^* + S^*$ stetig und abteilungsweise analytisch angenommen werden.

angedeutet, diejenige der Lösung des ersten Randwertproblems hieraus leicht erschließen.^{448) 449)}

Im Raume erfordert der Nachweis, daß auf $S \dots \lim_{n=\infty} U = 0$ ist, andere Hilfsmittel (Nr. 45c).

Das von *Poincaré* in der Nr. 37 besprochenen Abhandlung behandelte Problem ist, nachdem mittlerweile *Hilbert*⁴⁵⁰⁾ erneut die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand hingelenkt hatte, nach Vorbereitungsarbeiten von *T. Broden*⁴⁵¹⁾ und *S. Johansson*⁴⁵²⁾ im Jahre 1907 unabhängig voneinander von *H. Poincaré* und *P. Koebe* gelöst worden.

In dem jetzt folgenden Abschnitte werden wir vor allem die Ergebnisse von *Poincaré* und *Koebe*, soweit sie in das Gebiet der konformen Abbildung hineingehören, eingehend besprechen.

40. Einfach zusammenhängende Gebiete der allgemeinsten Natur.

a) *H. Poincaré, Sur l'uniformisation des fonctions analytiques.*⁴⁵³⁾

In dem ersten Teile der vorliegenden Abhandlung kehrt *Poincaré* zu den Ideen seiner Arbeit vom Jahre 1883 zurück (Nr. 37). Das Fundamentalpolygon der Funktion $z(Z)$ wird jetzt ganz im Innern der Fläche des Einheitskreises (Grenzkreises) gewählt. Man könnte nun wieder die Funktionen G_n (Nr. 37) bilden und wie in der ersten Arbeit schließen, daß in $\mathfrak{X}^* \dots \lim_{n=\infty} \bar{G}_n = \bar{G}^*$ existiert. *Poincaré* bedient sich statt dessen der in geeigneter Weise ausgestalteten Balayage-Methode (Nr. 36).⁴⁵⁴⁾ Der Punkt ξ wird im Innern der Kreisfläche $K^{(0)}$ (Nr. 36) gewählt, die Funktion $u^{(0)}$ wird außerhalb $K^{(0)}$ gleich 0, in $K^{(0)} + C^{(0)}$ gleich der in ξ unendlichen, auf $C^{(0)}$ verschwindenden *Greenschen* Funktion gesetzt; $u^{(0)}$ ist das logarithmische Potential einer

448) Vgl. *L. Lichtenstein*, loc. cit. 446) p. 95—96.

449) In ähnlicher Weise gewinnt man die Lösung des ersten Randwertproblems für beschränkte mehrfach und selbst unendlichvielfach zusammenhängende Gebiete in \mathfrak{E}_m , die keine Punkte zu Randkomponenten haben.

450) In seinem Pariser Vortrage, *Mathematische Probleme*, Gött. Nachr. 1900, p. 253—297 [p. 290—291], abgedruckt im Archiv der Math. (3) 1 (1901), p. 44—63, p. 213—237.

451) *T. Broden*, Bemerkung über die Uniformisierung analytischer Funktionen, Lund 1905.

452) *S. Johansson*, a) *Acta Soc. Sc. Fenn.* 33, Nr. 7 (1905), p. 1—29; b) *Math. Ann.* 62 (1906), p. 177—183; c) ebendort p. 184—193. In diesen Arbeiten wird die Uniformisierung algebraischer Kurven angestrebt. Die Betrachtungen von *Johansson* sind a. a. O. nicht in allen Punkten stichhaltig. (Vgl. *P. Koebe*, Gött. Nachr. 1907, p. 177—190 (p. 189); loc. cit. 464) p. 148.)

453) *Acta mathematica* 31 (1907), p. 1—63.

454) Um jeden Windungspunkt in \mathfrak{X}^* wird dabei ein von einer mehrfach umfahrenen Kreislinie umschlossenes Gebiet abgegrenzt. Diese Gebilde bilden neben weiteren geeigneten schlichten Kreisgebieten die Folge K_n ($n = 1, 2, \dots$).

punktförmigen Belegung = 1 in ξ und einer auf $C^{(0)}$ verteilten negativen Linienbelegung von der Gesamtmasse -1 . Bei der Durchführung des Auskehrprozesses bleibt die in ξ befindliche Masse unberücksichtigt. Da $\bar{U}^* = \log \frac{1}{|Z(z)|}$ durchweg positiv ist, so ist, wie sich leicht zeigen läßt, für alle $n \dots u^{(n)} < \bar{U}^*$. Die Folge $u^{(0)}, u^{(1)}, \dots$ konvergiert. Es sei (1) $\lim_{n=\infty} u^{(n)} = \bar{G}^*(\xi, \eta; x, y)$. Sind $G_n(\xi, \eta; x, y)$ ($n = 1, 2, \dots$) die in analoger Weise für eine Folge von Gebieten T_n ($n = 1, 2, \dots$), ($\lim_{n=\infty} T_n = \bar{\mathfrak{X}}^*$, T_n von einer endlichen Anzahl Bögen der Kreise $C^{(k)}$ begrenzt) gebildeten Funktionen, so ergibt sich nunmehr leicht die Grenzbeziehung (2) $\bar{G}^* = \lim_{n=\infty} G_n$. Durch Vermittlung der Funktion (3) $\tau = e^{-(\bar{G}^* + i\bar{H}^*)}$ (\bar{H}^* konjugiert zu \bar{G}^*) wird $\bar{\mathfrak{X}}^*$ auf die Fläche des Einheitskreises in der Ebene τ konform abgebildet. Daß das Bild die Fläche $|\tau| \leq 1$ voll ausfüllt, beweist Poincaré einmal in Anlehnung an Osgood (Nr. 38), das andere Mal ohne Zuhilfenahme der Modulfunktion. Durch die Beziehungen $z = F_0(\tau)$, $f_1(z) = F_1(\tau)$, \dots , $f_m(z) = F_m(\tau)$ werden die Funktionen f_1, \dots, f_m uniformisiert, wobei Ausnahmestellen nicht mehr vorkommen.

Die Funktionen F_0, F_1, \dots, F_m bleiben bei linearen Substitutionen einer gewissen unendlichen Gruppe $(\tau, \frac{\alpha_v \tau + \beta_v}{\gamma_v \tau + \delta_v})$ ($v = 1, 2, \dots$), die den Einheitskreis in sich überführen, invariant. Der Riemannschen Fläche $\bar{\mathfrak{X}}$ der Funktionen f_1, \dots, f_m entspricht in der Ebene τ die Fläche eines Fundamentalpolygons \mathcal{J} mit paarweise linearer Zuordnung der Ränder.

Ist das unendliche Produkt $\prod (\frac{\alpha_v \tau + \beta_v}{\gamma_v \tau + \delta_v})$ konvergent, so existiert die zu $\bar{\mathfrak{X}}$ (Nr. 37) gehörige, in ξ logarithmisch unendliche Greensche Funktion $G(\xi, \eta; x, y)$. Es ist

$$(4) \quad G(\xi, \eta; x, y) = \log \frac{1}{\left| \prod (\frac{\alpha_v \tau + \beta_v}{\gamma_v \tau + \delta_v}) \right|}.$$

Das vorstehende (notwendige und hinreichende Kriterium) kann auf die Form gebracht werden: die Reihe $\sum \frac{1}{(\gamma_v \tau + \delta_v)^2}$ muß konvergieren. Oder, wenn man mit h den Flächeninhalt einer um τ in \mathcal{J} beschriebenen Kreisfläche, mit h_v ($v = 1, 2, \dots$) den Inhalt der homologen Gebiete bezeichnet, die Reihe $\sum \sqrt{h_v}$ muß konvergieren.

Ist $\sum \sqrt{h_v}$ konvergent, so wird $\bar{\mathfrak{X}}$ durch Vermittlung der Funktion $e^{-(G + iH)}$ auf die Fläche des Einheitskreises abgebildet. Um auch den

Fall zu erledigen, wenn die Reihe $\sum \sqrt{h_n}$ divergiert, schlägt *Poincaré* einen anderen Weg ein.

Es sei $\mathfrak{R} + \mathfrak{C}$ ein Kreisbereich in $\bar{\mathfrak{X}}$, der ξ nicht enthält. Durch direkte potentialtheoretische Betrachtungen beweist *Poincaré*, daß der im vorstehenden wiedergegebene Balayage-Prozeß im Gebiete $\bar{\mathfrak{X}}_1 = \bar{\mathfrak{X}} - (\mathfrak{R} + \mathfrak{C})$ konvergiert und zu einer auf dem Rande \mathfrak{C} von \mathfrak{R} verschwindenden (*Greenschen*) Funktion $\gamma_1(\xi, \eta; x, y)$ führt. Nunmehr wird aus $\bar{\mathfrak{X}}_1$ durch einen von \mathfrak{C} ausgehenden, ξ nicht treffenden Querschnitt ein einfach zusammenhängendes Gebiet $\bar{\mathfrak{X}}_2$ abgeleitet. Das Balayage-Verfahren liefert, auf $\bar{\mathfrak{X}}_2$ angewandt, eine bestimmte Funktion $\gamma_2(\xi, \eta; x, y)$.⁴⁵⁵⁾ Durch Vermittlung der Funktion $e^{-(\gamma_2 + i\chi_2)}$ (χ_2 zu γ_2 konjugiert) wird $\bar{\mathfrak{X}}_2$ auf die Fläche des Einheitskreises konform abgebildet. Dem aus \mathfrak{C} und den beiden Rändern der Schnittlinie bestehenden Linienzuge entspricht ein (offener) Bogen des Einheitskreises. Ist dieser Bogen $< 2\pi$, so läßt sich $\bar{\mathfrak{X}}_1$ auf die Fläche eines Kreisringes, $\bar{\mathfrak{X}}$ auf diejenige des Einheitskreises konform abbilden. Ist aber jener Bogen $= 2\pi$, so gewinnt man entsprechend als Bild von $\bar{\mathfrak{X}}_1$ eine Kreisfläche mit Ausschluß des Mittelpunktes, als Bild von $\bar{\mathfrak{X}}$ die Gesamtebene mit Ausschluß des unendlich fernen Punktes. Für das $\bar{\mathfrak{X}}_1$ betreffende Resultat gibt *Poincaré* mehrere zum Teil indirekte Beweise. Der Übergang von $\bar{\mathfrak{X}}_1$ zu $\bar{\mathfrak{X}}$ wird mit *H. A. Schwarz* durch gürtelförmige Verschmelzung vollzogen.⁴⁵⁶⁾

b) *P. Koebe*, Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven.⁴⁵⁷⁾ Es sei $\mathfrak{X} = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ irgendein über der z -Ebene ausgebreitetes (nicht geschlossenes) einfach zusammenhängendes Gebiet.⁴⁵⁸⁾ Es sei $P(\xi, \eta)$ ein Punkt in T_1 , u_n diejenige auf S_n verschwindende *Greensche* Funktion von T_n , die sich in der Umgebung von P wie $\log \frac{1}{\rho} + c_n + \dots$, ($\rho^2 = (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2$) verhält. In T_n ist für alle n und $p \dots u_n > 0$, $u_{n+p} - u_n > 0$. Darum ist $c_1 < c_2 < c_3 < \dots$. Läßt \mathfrak{X} etwa drei Punkte der z -Ebene unbedeckt, so konvergiert die Folge u_n in jedem (ξ, η) nicht enthaltenden Bereiche $\bar{T} + \bar{S}$ in \mathfrak{X}

455) Bei der Bildung von γ_2 wird γ_1 als Majorante benutzt.

456) Der Gedanke, sich durch Herausschneiden eines einfach zusammenhängenden Teilgebietes eine Randlinie zu verschaffen, kommt, angewandt auf eine geschlossene *Riemannsche* Fläche, zuerst bei *H. A. Schwarz* vor (Nr. 24 e.). Vgl. loc. cit. 310).

457) Gött. Nachr. 1907, p. 191—210.

458) Mit *Koebe* legen wir der Betrachtung ein unendlichvielblättriges Gebiet zugrunde. Seine Methode und ihre Ergebnisse gelten für beliebige nicht geschlossene einfach zusammenhängende *Riemannsche* Mannigfaltigkeiten.

gleichmäßig. Es sei $u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$, v die zu u konjugierte Potentialfunktion. Durch Vermittlung der Funktion $Z = e^{-(u+iv)}$ wird \mathfrak{X} auf die Fläche eines Einheitskreises konform abgebildet (Nr. 37 und 38).⁴⁵⁹⁾ Ist die Folge c_n konvergent, so konvergiert u_n dem *Harnackschen* Satze über positive Potentialfunktionen zufolge wie vorhin in $\bar{T} + \bar{S}$ gleichmäßig, auch wenn die *Poincarésche* Bedingung nicht erfüllt ist. Auch jetzt gilt der gleiche Abbildungssatz. Auf einen Beweis der zuletzt genannten Eigenschaft geht *Koebe* an der betrachteten Stelle nicht näher ein.

Ist aber $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{c_n} = 0$, so läßt sich \mathfrak{X} auf die ganze Ebene mit Ausschluß des unendlich fernen Punktes abbilden. Nimmt man den Fall einer geschlossenen *Riemannschen* Fläche (Nr. 24 e) hinzu, so findet man wie vorhin (Nr. 40 a), daß jedes einfach zusammenhängende Gebiet entweder: 1. auf eine Kreisfläche (Kugelkalotte), 2. auf eine Ebene mit Ausschluß des unendlich fernen Punktes (punktierte Kugel), oder schließlich 3. auf eine geschlossene Ebene (Kugel) konform abgebildet werden kann.⁴⁶⁰⁾

Das vorstehende Kriterium ist von *P. Koebe* angegeben worden, der den Abbildungssatz unabhängig von *Poincaré* aufgestellt und bewiesen hat.⁴⁶¹⁾ (Weitere Kriterien von zum Teil spezieller Natur vgl. die Fußnote 469.)

459) Das gleiche gilt offenbar, wenn es gelingt, \mathfrak{X} auf ein Gebiet \mathfrak{X}^* konform abzubilden, das die *Poincarésche* Bedingung erfüllt. In der Note, Zur Uniformisierung der algebraischen Kurven, Gött. Nachr. 1907, p. 410—414 beweist *P. Koebe* mit Bezugnahme auf die in der Fußnote 452) zitierten Arbeiten von *Johansson* auf diesem Wege gewisse mit der Uniformisierung algebraischer Kurven vom Range ≤ 2 zusammenhängende Abbildungssätze.

460) Die unter 2. und 3. genannten Gebiete werden durch die *Riemannschen* Flächen erschöpft, die zu den Umkehrungen meromorpher bzw. rationaler Funktionen gehören (vgl. *E. Study* loc. cit. 148), p. 11—12).

461) *P. Koebe*, Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven, Gött. Nachr. 1907, p. 191—210, vorgelegt am 11. Mai 1907. Die in der Nr. 40 a besprochene Abhandlung von *H. Poincaré* erschien im November 1907 (gedruckt im März 1907). In späteren Arbeiten hat *Koebe* für den fraglichen Satz eine Reihe weiterer Beweise gegeben (s. weiter unten). Über die Bedeutung dieser Untersuchungen für die Theorie der Uniformisierung beliebiger, insbesondere algebraischer Funktionen vergleiche das Referat von *R. Fricke*, II B 4 Nr. 39. Die besonderen, die Uniformisierung reeller algebraischer Kurven betreffenden Sätze sind von *Koebe* von den vorliegenden Betrachtungen unabhängig schon früher bewiesen worden (Gött. Nachr. 1907, p. 177—190, ausführliche vertiefte Darstellung später *Math. Ann.* 67 (1909), p. 145—244 [p. 206—213]. Das Gebiet \mathfrak{X} (die einfach zusammenhängende Überlagerungsfläche der in geeigneter Weise zer-

Es sei also $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{c_n} = 0$ und es möge U_n diejenige, außer in (ξ, η) , in T_n und auf S_n stetige, in T_n reguläre, auf S_n verschwindende Potentialfunktion, die in (ξ, η) sich wie $\Re \frac{1}{z - \xi}$ verhält, bezeichnen. In jedem Bereiche in \mathfrak{X} , der (ξ, η) nicht enthält, ist die Folge U_n gleichmäßig konvergent. Der sehr einfache Beweis stützt sich wesentlich auf den folgenden, auch an sich wichtigen Hilfssatz: Es sei Θ ein beschränktes Gebiet in \mathfrak{C} , das den Nullpunkt enthält, $\tilde{\Theta}$ die Gesamtheit aller beschränkten Gebiete in \mathfrak{C} , die den Punkt $z = 0$ enthalten und auf Θ derart konform abgebildet werden können, daß der Nullpunkt in sich selbst übergeht und das Vergrößerungsverhältnis für $z = 0$ den Wert 1 hat. Es gibt dann eine Kreisfläche vom Halbmesser $R_1 > 0$, die in allen $\tilde{\Theta}$ enthalten ist.⁴⁶²⁾

schnittenen Riemannschen Fläche der Kurve) hat hier gewisse Symmetrieeigenschaften, wodurch die Aufstellung einer Majorante für u_n wesentlich erleichtert wird. Eine Darstellung dieser Betrachtungen gibt *R. Fricke*, Automorphe Funktionen, 2, p. 469—483, insbes. 2, p. 472—478.

462) *P. Koebe*, loc. cit. 461), S. 204—205; dort findet sich auch eine andere Fassung desselben Satzes. Vgl. ferner *P. Koebe*, Math. Ann. 67 (1909), p. 145—224 [p. 215—216] und loc. cit. 582d) [p. 88—95]. Wie *Koebe* ferner (Math. Ann. 69 (1910), p. 1—81 [„Hilfssatz III“, p. 48—50]) gezeigt hat, liegt das Bild Σ' eines beliebigen ganz im Innern von Θ enthaltenen *Jordanschen* Kurvenstückes Σ bei allen möglichen Abbildungen $\tilde{\Theta}$ im Innern einer festen Kreisfläche vom Radius R_2 . Dieser hängt nur von Θ und Σ ab. Einen Beweis des betrachteten Satzes gibt auch *S. Johansson*, Acta soc. sc. Fenn., Bd. 40, Nr. 1 (1910), p. 1—32 [p. 4 bis 9]. Man vergleiche ferner *E. Study*, loc. cit. 148), p. 122—124.

Der „Hilfssatz III“ ist bei *Koebe* a. a. O. ein Ausgangspunkt beim Beweise des sog. Verzerrungssatzes (Nr. 42, insb. die Fußnote 494), er kann aber andererseits unschwer aus jenem abgelesen werden. Die fraglichen Sätze hängen mit den Untersuchungen, die im Anschluß an den *Picardschen* Satz in den letzten 14 Jahren von *E. Landau*, *C. Carathéodory*, *F. Schottky*, *E. Lindelöf* und anderen *Mathematikern* durchgeführt worden sind, eng zusammen. Vgl. *P. Koebe*, Jahresber. der Deutschen Math.-Ver. 19 (1910), p. 339—348 [p. 347—348]. Wie *E. Landau* neuerdings gezeigt hat, läßt sich der im Text genannte *Koebesche* Satz aus dem *Picard-Landauschen* Satze mit Leichtigkeit ableiten. Vgl. *E. Landau*, Darstellung und Begründung einiger neuerer Ergebnisse der Funktionentheorie, Berlin 1916, p. 14—110 [p. 100]. *J. Plemelj*, Monatshefte f. Math. u. Phys. 23 (1912), p. 297—304 [p. 303—304] nimmt speziell für Θ eine Kreisfläche vom Radius R und findet $R_1 > \frac{R}{10}$ (s. auch *E. Landau* a. a. O., p. 98—99).

R. Fricke findet $R_1 > \frac{-1 + \sqrt{2}}{4} R$ (Automorphe Funktionen, 2, p. 500). *Koebe* spricht (Math. Ann. 67 (1909), p. 215, Fußnote ***) die Vermutung aus, daß $R_1 = \frac{R}{4}$ sein dürfte. Diese Vermutung ist von *L. Bieberbach*, Math. Ann. 77

Es sei $\lim_{n=\infty} U_n = U$. Die Funktion $\frac{1}{U+i\sqrt{V}}$, unter V eine zu U konjugierte Funktion verstanden, liefert die gewünschte Abbildung. Der Beweis verläuft indirekt und stützt sich, wie an einer analogen Stelle bei *Poincaré*⁴⁶³), auf die Resultate von *Osgood* (Nr. 38).

Seinem ersten Beweise des Abbildungssatzes gab *Koebe* später eine ins einzelne ausgearbeitete, teilweise abgeänderte Fassung.⁴⁶⁴) In dem ersten Hauptfalle wird der *Harnacksche* Satz über positive Potentialfunktionen nicht benutzt. Es führt vielmehr eine vertiefte Betrachtung der konvergenten Folge $c_1 < c_2 < c_3 < \dots$ auf eine Abschätzung der Differenz $u_{n+\nu} - u_n$, durch die sowohl die gleichmäßige Konvergenz der Folge u_n klar hervortritt, als auch evident wird, daß durch Vermittlung von $e^{-(u+i\nu)}$ das Gebiet \mathfrak{X} auf die Fläche des Einheitskreises konform abgebildet wird. Auch in dem zweiten Hauptfalle wird der Beweis des Abbildungssatzes im einzelnen durchgeführt. Die Resultate von *Osgood* werden diesmal nicht gebraucht.

Einen in Einzelheiten von den vorerwähnten verschiedenen, die in der Fußnote 170) erwähnten Hilfssätze wesentlich benutzenden Beweis hat *S. Johansson* geliefert.⁴⁶⁵) Eine Modifikation des ersten

(1916), p. 153—172 bestätigt worden. Man vergleiche ferner *L. Bieberbach*, loc. cit. 350; *G. Faber*, Münch. Ber. 1916, p. 39—42; *G. H. Gronwall*, C. R. 162 (1916), p. 249—252 sowie p. 316—318; *G. Pick*, loc. cit. 494) sowie Wiener Ber. 126 (1917), S. 247—263. Im Zusammenhang mit dem im Text betrachteten Hilfssätze stehen einige Sätze über die konforme Abbildung einfach zusammenhängender konvexer Gebiete bei *E. Study*, loc. cit. 148), p. 116—121.

463) loc. cit. 453) p. 32—35.

464) *Math. Ann.* 67 (1909), p. 145—224 [p. 205—224]. Eine Darstellung findet sich bei *E. Study*, loc. cit. 148), p. 27—34. Ein in allen wesentlichen Punkten auf *Koebeschen* Methoden beruhender, ins einzelne ausgearbeiteter Beweis des *Poincaré-Koebeschen* Satzes findet sich bei *G. Fubini*, *Introduzione alla teoria dei gruppi discontinui e delle funzioni automorphe*, Pisa 1908, p. 367—392 und *W. F. Osgood*, *Funktionentheorie*, p. 710—747. Eine eingehende Darstellung widmet dem speziell auf das Haupt- und Grenztheorem bezüglichen *Koebeschen* Betrachtungen *R. Fricke*, *Automorphe Funktionen*, 2, p. 439—494.

465) *S. Johansson*, loc. cit. 494), p. 9—14. Dort findet sich p. 18—32 ein anderer Beweis des Satzes von *Poincaré* und *Koebe*. Es sei (ξ', η') ein von (ξ, η) verschiedener Punkt in T_1 , u'_n die in (ξ', η') logarithmisch unendliche, auf S_n verschwindende *Greensche* Funktion von T_n . *Johansson* zeigt, daß $\lim_{n=\infty} (u_n - u'_n)$

in allen Fällen existiert. Durch Vermittlung der Funktion $e^{-(\omega+i\bar{\omega})}$ ($\omega = \lim_{n=\infty} (u_n - u'_n)$,

$\bar{\omega}$ zu ω konjugiert) wird \mathfrak{X} auf das von einem doppelt zu zählenden Bogen des Einheitskreises, der sich auch auf einen Punkt reduzieren kann, begrenzte unendliche Gebiet in \mathfrak{E} konform abgebildet.

Koebeschen Beweises gibt ferner *J. Plemelj*.⁴⁶⁶⁾ In dem ersten Hauptfalle findet *Plemelj*, wenn $\lim_{n=\infty} c_n = c$ gesetzt wird, durch eine überaus einfache Betrachtung die Ungleichheiten

$$u_{n+v} - u_n < [\beta + (c - c_n)] \sqrt{c - c_n} \text{ in } T_n \text{ und } u < [\beta + (c - c_n)] \sqrt{c - c_n} \\ \text{in } \mathfrak{X} - (T_n + S_n).$$

Die erste Ungleichheit gibt ein Maß dafür, wie rasch u_n gegen u konvergiert. Aus der zweiten folgt leicht, daß \mathfrak{X} durch $e^{-(u+iv)}$ in der Tat auf die Fläche des Einheitskreises konform abgebildet wird.

In einer kürzlich erschienenen Abhandlung (loc. cit. 582d) [p. 83—95]) teilt *Koebe* eine neue auf funktionentheoretischer Basis (unter Ausschaltung des Integralbegriffes) gestellte Bearbeitung seines ersten Beweises mit. Die beim Beweise gebrauchten Hilfssätze werden sämtlich auf das *Schwarzsche* Lemma zurückgeführt.

Im engen Anschluß an die *Poincarésche* Abhandlung (Nr. 40a) gibt *Koebe* in einer zweiten Mitteilung, Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven⁴⁶⁷⁾, einen zweiten Beweis des Abbildungssatzes. Wie bei *Poincaré* wird aus \mathfrak{X} eine Kreisfläche \mathfrak{R} herausgeschnitten. Sodann wird unter Zuhilfenahme des *Harnackschen* Satzes über positive Potentialfunktionen die Konvergenz der Folge u'_n ($u'_n =$ der zu $T_n - (\mathfrak{R} + \mathfrak{C})$ gehörigen, in ξ unendlichen *Greenschen* Funktion) in $\mathfrak{X}' = \mathfrak{X} - (\mathfrak{R} + \mathfrak{C})$ auf indirektem Wege erschlossen. Es sei $\lim_{n=\infty} u'_n = u'$. Nunmehr wird zu der zu \mathfrak{X}' gehörenden einfach zusammenhängenden Überlagerungsfläche $\overline{\mathfrak{X}'}$ übergegangen. Ist \bar{u}'_n ($n = 1, 2, \dots$) eine der Folge u'_n ($n = 1, 2, \dots$) des ersten *Koebeschen* Beweises analoge Folge von *Greenschen* Funktionen auf $\overline{\mathfrak{X}'}$, so ist für diese die Funktion u' eine Majorante. Durch Vermittlung der Funktion $\bar{z}' = e^{-(\bar{u}' + i\bar{v}'}$, ($\bar{u}' = \lim_{n=\infty} \bar{u}'_n$, \bar{v}' zu \bar{u}' konjugiert) wird $\overline{\mathfrak{X}'}$ auf die Fläche des Einheitskreises $\overline{K'}$ abgebildet.⁴⁶⁸⁾ Der Fläche \mathfrak{X}' entspricht hierbei ein einfach zusammenhängendes Teilgebiet II von $\overline{K'}$, dessen Begrenzung einen Bogen $\overline{\mathfrak{S}'}$ des Einheitskreises $\overline{C'}$ sowie zwei durch eine $\overline{K'}$ in sich selbst überführende lineare Substitution aufeinander bezogenen Linien enthält (II ist ein im Sinne von *F. Klein* geschlossener zweifach zusammenhängender Fundamentalbereich).

Je nachdem $\overline{\mathfrak{S}'} <$ oder $= \overline{C'}$ ist, ist jene Substitution hyper-

466) *J. Plemelj*. loc. cit. 462).

467) *Gött. Nachr.* 1907, p. 633—669.

468) Augenscheinlich liegt kein Punkt des Bildes $\overline{\mathfrak{O}'}$ von $\overline{\mathfrak{X}'}$ außerhalb $\overline{K'}$. Daß $\overline{\mathfrak{O}'}$ die Fläche $\overline{K'}$ voll ausfüllt, zeigt *Koebe* nach dem in der Nr. 38 wiedergegebenen Verfahren.

bolisch oder parabolisch. Durch geeignete elementare Funktionen wird nunmehr \mathfrak{X} auf die Fläche eines Kreisringes, oder eines aus einer Kreisfläche durch Ausschluß des Mittelpunktes entstandenen Gebietes abgebildet. Durch gürtelförmige Verschmelzung gelangt man endlich von hier aus wie bei *Poincaré* (Nr. 40a) zu dem Hauptsatze der Theorie.⁴⁶⁹⁾

Der Fall einer punktierten Ebene (Kugel) erscheint in demjenigen einer Kreisfläche (Kugelkalotte) als Grenzfall enthalten, sobald man nicht den Halbmesser des Kreises, sondern das Vergrößerungsverhältnis im Kreismittelpunkt bei der Normierung festhält, etwa gleich 1 annimmt. Setzt man, unter u_n die Potentiale des ersten *Koebeschen* Beweises verstanden, $u_n^* = u_n - c_n$, so ist die Folge u_n^* stets konvergent. Durch Vermittlung der Funktion $e^{-(u^* + iv^*)}$ ($u^* = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n^*$, v^* zu u^* konjugiert) wird \mathfrak{X} auf eine Kreisscheibe vom endlichen oder unendlich großen Radius konform abgebildet.⁴⁷⁰⁾ Bei den weiter unten besprochenen, im Anschluß an *D. Hilbert* ausgebildeten Variationsmethoden erscheinen die beiden Hauptfälle, dank der von vornherein zweckmäßig gewählten Normierung stets als nur quantitativ verschiedene (Nr. 42 und 45 d. Man vergleiche ferner die Ausführungen der Nr. 41).

Einen anderen, an *Poincaré* anknüpfenden Beweis des *Poincaré-Koebeschen* Satzes hat *S. Johansson*⁴⁷¹⁾ gegeben. Bezeichnet man mit

469) Die Alternative $\bar{\mathfrak{C}} <$ oder $= \bar{\mathfrak{C}}$, oder, was dasselbe besagt, hyperbolische oder parabolische Substitution bildet ein (freilich indirektes) Kriterium zur Unterscheidung der beiden Hauptfälle. Enthält der Rand des Gebietes \mathfrak{X} ein *Jordansches* Kurvenstück \mathfrak{S} , so läßt sich \mathfrak{X} stets auf eine Kreisfläche konform abbilden, wobei \mathfrak{S} ein Kreisbogen entspricht. Für diesen Satz gibt *Koebe* loc. cit. 467) S. 657—668 vier verschiedene Beweise. Bei den beiden ersten wird der Abbildungssatz als bekannt angenommen und es wird ferner vorausgesetzt, daß \mathfrak{S} der Klasse *E* angehört (in den Eckpunkten und Spitzen wird dabei übrigens nur die Existenz der Tangenten gefordert). *Koebe* zeigt insbesondere, daß die die Abbildung vermittelnde Funktion über die regulären Stücke von \mathfrak{S} hinaus fortgesetzt werden kann. Die beiden anderen Beweise sind von dem Hauptsatze unabhängig und liefern eine Majorante für die Funktionen u_n des ersten *Koebeschen* Beweises, auch wenn \mathfrak{X} vom mehrfachen oder selbst unendlich hohen Zusammenhange ist. (Einen Beweis dieses Satzes gibt auch *H. Poincaré*, loc. cit. 453), p. 46—48.) Weitere Ausführungen über die Alternative — punktierte Kugel oder Kugelkalotte — finden sich bei *P. Koebe*, Journ. f. Math. 139 (1911), p. 251—292 [p. 280—289]; s. hierzu auch die Bemerkungen bei *E. Study*, loc. cit. 148), p. 35—37. Man vgl. ferner *S. Johansson*, loc. cit. 465).

470) Vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 457) p. 206—207; *J. Plemelj*, loc. cit. 462), p. 302—304.

471) *S. Johansson*, Acta soc. sc. Fenn., Bd. 40, Nr. 2 (1910), p. 1—29.

γ_1 wieder die zu $\bar{\mathfrak{X}}_1$ gehörige Greensche Funktion (Nr. 40a), so gilt $\alpha = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial \gamma_1}{\partial n} ds \leq 1$. Ist $\alpha < 1$, so läßt sich $\bar{\mathfrak{X}}_1$ auf das von einem Kreise und einem kreisförmigen Schlitz um den Koordinatenursprung begrenzte beschränkte Gebiet, oder auch auf die Fläche eines Kreisringes konform abbilden. Ist $\alpha = 1$, so gehen jene Gebiete in eine punktierte Kreisfläche über. Der Beweis stützt sich wesentlich auf einige von *Johansson* angegebene, auch an sich interessante Hilfssätze. Zu \mathfrak{X} wird wieder durch gürtelförmige Verschmelzung übergegangen.

41. Zweidimensionale schlichtartige Gebiete der allgemeinsten Natur. In einer dritten Mitteilung über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven⁴⁷²⁾ beweist *Koebe*, daß ein beliebiges schlichtartiges einfach oder mehrfach, auch unendlichvielfach zusammenhängendes Gebiet der allgemeinsten Natur auf ein Gebiet in \mathfrak{E} konform abgebildet werden kann.

Es sei $\mathfrak{X} = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ (Nr. 4) ein beliebiges über der z -Ebene ausgebreitetes schlichtartiges Gebiet.⁴⁷³⁾ Es sei $Z_n(z)$ eine Funktion, durch deren Vermittlung T_n auf ein Gebiet F_n in der Ebene Z konform abgebildet wird. Es wird angenommen, daß $Z = 0$ außerhalb F_n liegt und $Z_n(z)$ in der Umgebung eines bestimmten Punktes z_0 in T_1 eine Entwicklung von der Form $\frac{1}{z-z_0} +$ eine reg. Funkt. gestattet. Existenz beliebig vieler Funktionen dieser Art steht den Betrachtungen der Nr. 24 gemäß fest. Aus der Folge $Z_n(z)$ ($n = 1, 2, \dots$) läßt sich eine Teilfolge aussondern, die in jedem Bereiche in \mathfrak{X} , der z_0 nicht enthält, gleichmäßig konvergiert. Die Grenzfunktion $Z(z)$ vermittelt die Abbildung von \mathfrak{X} auf ein schlichtes Gebiet F .

Der Hilfssatz der ersten Mitteilung ist der folgenden Aussage gleichwertig: Es sei $\bar{\Phi}$ irgendein einfach zusammenhängendes Gebiet in der Ebene Z , das den Punkt $Z = \infty$ enthält. Der Punkt $Z = 0$ soll außerhalb $\bar{\Phi}$ liegen. Es sei $\bar{\Phi}'$ irgendein Gebiet von gleichen Eigenschaften, das auf $\bar{\Phi}$ konform abgebildet werden kann, so daß im Unendlichen die Entwicklung $Z' = Z + \mathfrak{P}\left(\frac{1}{Z}\right)$ gilt. Die Begrenzung von $\bar{\Phi}'$ liegt dann in einer Kreisfläche um den Koordinatenursprung, deren Halbmesser nur von $\bar{\Phi}$ abhängt.⁴⁷⁴⁾ Es sei jetzt K^*

472) Gött. Nachr. 1908, p. 337—358. Siehe auch *C. R.* 148 (1909), p. 824 bis 828.

473) Die folgenden Betrachtungen gelten mutatis mutandis für beliebige schlichtartige *Riemannsche* Mannigfaltigkeiten.

474) *P. Koebe*, loc. cit 472), p. 348.

ein Kreisgebiet um z_0 in T_1 . Durch $Z_1(z)$ möge K^* auf Φ_1 , durch $Z_n(z)$ auf Φ_n abgebildet werden. Dem soeben genannten Hilfssatze zufolge ist auf C^* für alle $n \dots |Z_n(z)| < \mu$ (μ konstant). Diese Beziehung gilt offenbar für alle z in $T_n - (K^* + C^*)$.

Der Konvergenzbeweis stützt sich auf den folgenden zuerst von *P. Montel* angegebenen und bewiesenen Satz: Aus jeder Folge von Funktionen $f_n(z)$, die in einem Gebiete \mathfrak{X} regulär sind und einer Ungleichheit $|f_n(z)| < M$ genügen, läßt sich eine Teilfolge aussondern, die in jedem Bereiche in \mathfrak{X} gleichmäßig konvergiert.⁴⁷⁵⁾ Aus $Z_n(z)$ ($n = 1, 2, \dots$) läßt sich wegen $|Z_n(z)| < \mu$ demnach eine Teilfolge $Z^{(n)}(z)$ ($n = 1, 2, \dots$) extrahieren, die, wie man leicht sieht, in jedem z_0 nicht enthaltenden Bereiche in \mathfrak{X} gleichmäßig konvergiert. Die Grenzfunktion ist von einer Konstanten verschieden; sie bildet \mathfrak{X} auf ein schlichtes Gebiet F ab.

Ist insbesondere \mathfrak{X} einfach zusammenhängend, so wird F entweder aus der ganzen Ebene mit Ausschluß des einen Punktes $Z=0$, oder eines Punktkontinuums bestehen. In dem zuletzt genannten Falle läßt sich F auf eine Kreisfläche konform abbilden (Nr. 38). Man gewinnt so den Satz von *H. Poincaré* und *P. Koebe* (Nr. 40) wieder.⁴⁷⁶⁾ Als eine Anwendung der vorstehenden Ergebnisse gibt *Koebe* in aller Kürze ein Verfahren zur konformen Abbildung der Oberfläche einer analytischen körperlichen Ecke auf ein ebenes Gebiet an.⁴⁷⁷⁾ Eine ausführliche, auf funktionentheoretische Basis gestellte Darlegung eines anderen Verfahrens enthält eine spätere Arbeit von *Koebe* (loc. cit. 582d) p. 95—103. Vgl. Nr. 47, p. 360—361).

42. Das Strömungspotential. Eine Normierung der Abbildungsfunktion wird auf dem in der Nr. 41 skizzierten Wege erst gewonnen, wenn über $Z_n(z)$ geeignete weitere Bestimmungen getroffen werden. Zu besonders bemerkenswerten Ergebnissen gelangt man, wie

475) *P. Montel*, Ann. de l'Éc. Norm. (3) 24 (1907), p. 233—334 [p. 298—302]; Leçons sur les séries de polynomes à une variable complexe, Paris 1910, p. 1—128 [p. 20—25]. Für diesen oder vielmehr einen unwesentlich allgemeineren Satz gibt *Koebe*, loc. cit. 472), p. 349—353 (vgl. auch Math. Ann. 69 (1910), p. 1 bis 81 [p. 71—75]) einen anderen, an gewisse auf *Ascoli* zurückgehende Konvergenzsätze (Nr. 45) sich anlehenden Beweis.

476) loc. cit. 472), p. 354—357 gibt *Koebe* noch eine andere mit dem *Montelschen* Satze und der „gürtelförmigen Verschmelzung“ operierende Methode. Ist die Zusammenhangszahl endlich, so läßt sich, wie *Koebe* a. a. O. zeigt, der Abbildungssatz auch durch ein geeignetes kombinatorisches Verfahren aus den Resultaten der Nr. 40b ableiten.

477) Gött. Nachr. 1908, p. 359—360.

Koebe, durch gewisse Aufstellungen von *Hilbert*^{477a)} veranlaßt, in einer vierten Mitteilung über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven⁴⁷⁸⁾ zeigt, wenn man für $Z_n = U_n + iV_n$ diejenige in T_n , außer in z_0 , reguläre Funktion wählt, die sich in z_0 wie $\frac{1}{Z - z_0} + (Z - z_0)\mathfrak{P}(Z - z_0)$ verhält und überdies so beschaffen ist, daß V_n auf jeder einzelnen Randlinie einen konstanten Wert hat.⁴⁷⁹⁾ Durch Vermittlung von Z_n wird T_n auf ein schlichtes Gebiet abgebildet, das von einer endlichen Anzahl zur Achse des Reellen paralleler Strecken begrenzt ist und den unendlich fernen Punkt enthält (Nr. 24 h). Der Gedankengang der dritten Mitteilung läßt sich jetzt nicht ohne weiteres anwenden. Indessen zeigt *Koebe* durch elementare Abschätzungen, daß in $T_n - (K^* + C^*)$ für alle $n \dots |U_n| < \mu'$ (μ' konstant) ist.⁴⁸⁰⁾ Aus einem dem *Montelschen* analogen Konvergenzsätze für Potentialfunktionen folgt, daß aus U_n ($n = 1, 2, \dots$) eine Teilfolge $U^{(n)}$ ($n = 1, 2, \dots$) extrahiert werden kann, die in jedem Bereiche in $\mathfrak{X} - (K^* + C^*)$ und daher auch in jedem z_0 nicht enthaltenden Bereiche in \mathfrak{X} gleichmäßig konvergiert. Die Grenzfunktion U verhält sich in z_0 wie $\Re\left(\frac{1}{Z - z_0} + (Z - z_0)\mathfrak{P}(Z - z_0)\right)$ und erfüllt die folgende, von *Hilbert* angegebene Minimumsbeziehung (Nr. 45 d). Es sei w irgendeine in $\mathfrak{X} - (K^* + C^*)$ nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetige, ferner auch noch auf C^* stetige und dort verschwindende Funktion, die so beschaffen ist, daß das *Dirichletsche* Integral $D_{\mathfrak{X} - (K^* + C^*)}(w)$ existiert. Alsdann ist $D_{\mathfrak{X} - (K^* + C^*)}(U + w) > D_{\mathfrak{X} - (K^* + C^*)}(U)$. Durch diese Eigenschaft, die sich übrigens zu $D_{\mathfrak{X} - (K^* + C^*)}(U + w) = D_{\mathfrak{X} - (K^* + C^*)}(U) + D_{\mathfrak{X} - (K^* + C^*)}(w)$ verschärfen läßt, und das vorhin gekennzeichnete Verhalten in z_0 ist U vollständig bestimmt. Hieraus folgt aber, daß $U = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n$ gesetzt werden kann.

Die Existenz des Potentials U , des Strömungspotentials, ist durch die im vorstehenden angedeuteten Betrachtungen für die allgemeinsten, nicht notwendig schlichtartigen Gebiete bewiesen. An der gleichen Stelle gibt *Koebe* noch einen andern, von dem *Montelschen* Satze unabhängigen Existenzbeweis des Strömungspotentials. Dieser Beweis

477^a) Vgl. *D. Hilbert*, Gött. Nachr. 1909, p. 314—323 (s. Nr. 45 d, p. 338 bis 339).

478) *P. Koebe*, Gött. Nachr. 1909, p. 324—361.

479) Auf S_n ist $\frac{\partial U_n}{\partial n} = 0$. Die Funktion U_n ist durch diese Festsetzungen völlig bestimmt (Nr. 24 h).

480) *P. Koebe*, loc. cit. 478), p. 328. Vgl. ferner *P. Koebe*, C. R. 148 (1909), p. 824—828 sowie Journ. f. Math. 133 (1910), p. 192—253 [p. 233—235].

geht von einer zweiten Fassung des *Hilbertschen* Variationsproblems (Nr. 45 d) aus und berührt sich vielfach mit analogen Betrachtungen von *R. Courant*. Er findet seinen Platz in dem Abschnitt über die Variationsmethoden (Nr. 45 d).⁴⁸¹⁾

Ist das Gebiet \mathfrak{X} schlichtartig, so wird es durch Vermittlung der Funktion $Z = U + iV$ auf ein Gebiet \mathfrak{P} der Z -Ebene konform abgebildet, das den unendlich fernen Punkt enthält und von lauter zur Achse des Reellen parallelen Strecken begrenzt ist.⁴⁸²⁾ Dies besagt, im Einklang mit den Ausführungen der Nr. 4, daß $\mathfrak{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathfrak{P}_n$ gesetzt werden kann, unter $\mathfrak{P}_n (n = 1, 2, \dots)$ gewisse schlichte, den unendlich fernen Punkt enthaltende Gebiete verstanden, so daß, wenn man mit m_n den Höchstwert der Schwankung von V_n auf den einzelnen Randkomponenten von \mathfrak{P}_n bezeichnet, $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = 0$ ist.⁴⁸³⁾

Der vorstehende Satz ist zuerst von *D. Hilbert* ausgesprochen⁴⁸⁴⁾ und in dem besonderen Falle eines endlich vielfach zusammenhängenden Gebietes bewiesen worden.⁴⁸⁵⁾ Der allgemeine Fall eines unendlichvielfach zusammenhängenden Gebietes ist von *P. Koebe* und *R. Courant* erledigt worden. Ihre Beweise stützen sich wie derjenige von *Hilbert* wesentlich auf die *Hilbertsche* Minimumeigenschaft der Funktion U . Sie sollen weiter unten (Nr. 45 d) besprochen werden. Nach *Koebe* hat die Berandung des Gebietes \mathfrak{P} den Inhalt Null. Sie läßt sich mit anderen Worten in eine endliche Anzahl getrennter einfach zusammenhängender Gebiete der Klasse C von beliebig kleinem Gesamtflächeninhalt einschließen.⁴⁸⁶⁾

In ähnlicher Weise kann man nach *Koebe* eine Abbildung eines beliebigen schlichtartigen Gebietes \mathfrak{X} auf ein den unendlich fernen Punkt

481) Das gleiche gilt für eine spätere, modifizierte Fassung dieses Beweises. Vgl. *P. Koebe*, Journ. f. Math. 138 (1910), p. 192—253 [p. 207—242].

482) Jede einzelne Strecke kann sich auf einen Punkt reduzieren.

483) Vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 478), p. 348—349 sowie loc. cit. 481), p. 207—209, insbes. p. 208. Dort finden sich noch andere Fassungen für den Begriff eines „Schlitzgebietes“.

484) *D. Hilbert*, Gött. Nachr. 1909, p. 314—323.

485) In der im Sommersemester 1909 gehaltenen Vorlesung über konforme Abbildung. Vgl. *P. Koebe*, Gött. Nachr. 1910, p. 59—74 [p. 60]. Für einfach zusammenhängende Gebiete hat schon früher *P. Koebe* einen (indirekten) Beweis gegeben [loc. cit. 457), p. 206—207]. Vgl. die Ausführungen am Schluß der Nr. 40 b.

486) *P. Koebe*, loc. cit. 478), p. 352—353; loc. cit. 481), p. 211 und p. 241 bis 242. Vgl. auch *R. Courant*, Inaugural-Dissertation, Göttingen 1910, p. 1—41 [p. 33—34]; Math. Ann. 71 (1912), p. 145—183 [p. 169—173]. Eine charakteristische Eigenschaft einfach zusammenhängender Schlitzgebiete hat *L. Bieberbach*

enthaltendes Gebiet in \mathfrak{E} gewinnen, dessen Rand entweder aus lauter geradlinigen Strecken, die verlängert durch den Koordinatenursprung hindurchgehen, oder aus lauter Kreisbögen um den Anfangspunkt besteht. Es seien $O_1(\xi_1, \eta_1)$ und $O_2(\xi_2, \eta_2)$ zwei von den Windungspunkten verschiedene Punkte in \mathfrak{X} . In dem zuerst genannten Falle lautet die Unstetigkeitsbedingung für U wie folgt. In der Umgebung von (ξ_1, η_1) und (ξ_2, η_2) ist $U = \log \frac{1}{\rho_1} +$ eine reguläre Potentialfunktion und $U = -\log \frac{1}{\rho_2} +$ eine reguläre Potentialfunktion. Es gilt ferner $Z(z) = e^{U+iV}$. In dem anderen Falle ist in (ξ_1, η_1) und $(\xi_2, \eta_2) \dots U = \operatorname{arctg} \frac{y - \eta_1}{x - \xi_1} +$ eine reguläre Potentialfunktion und $U = -\operatorname{arctg} \frac{y - \eta_2}{x - \xi_2} +$ eine reguläre Potentialfunktion. Es gilt ferner $Z(z) = e^{i(U+iV)}$ 487) Auch hier gilt der Satz von dem Verschwinden des Inhaltes der Berandung des schlichten Bildbereiches.

Wie bereits erwähnt, ist die Existenz des Strömungspotentials U und damit auch eines konjugierten Potentials V für das allgemeinste nicht notwendig schlichtartige Gebiet \mathfrak{X} sichergestellt. *D. Hilbert* hat einen Satz über die durch die Funktion $U + iV$ vermittelte konforme Abbildung angegeben. Neben den Randstrecken endlicher Länge treten nunmehr, von der negativen Seite aus dem Unendlichen kommend, Strecken auf, deren Ufer paarweise einander zugeordnet sind. Gewisse diese Strecken kreuzende Wege sind unter Überspringen der eingeschlossenen Flächenstreifen fortzusetzen. 488)

43. Das iterierende Verfahren von P. Koebe. 488a) Seit Anfang 1908 hat *Koebe* ein vielseitiger Anwendungen fähiges Verfahren ausgebildet, das sich rein funktionentheoretisch begründen läßt und von ihm als ein „Grenzübergang durch iterierendes Verfahren“ bezeichnet worden

angegeben. Unter allen einfach zusammenhängenden Gebieten in \mathfrak{E} , die den unendlich fernen Punkt enthalten und aufeinander durch Vermittlung von Funktionen der Form $f(z) = z + a_0 + a_1 \frac{1}{z} + \dots$ konform abgebildet werden können, ist das Schlitzgebiet dadurch ausgezeichnet, daß das Maximum der Entfernung zweier Randpunkte den höchsten Wert hat. Vgl. *L. Bieberbach*, *Math. Ann.* 77 (1916), p. 153—172. Dort finden sich noch weitere Sätze ähnlicher Natur.

487) *P. Koebe*, loc. cit. 478), p. 354—360. Bei Gebieten der Klasse C in \mathfrak{E} ist diese Abbildung zuerst von *F. Schottky* betrachtet worden. Siehe etwa loc. cit. 155) passim.

488) *D. Hilbert* loc. cit. 484), p. 319—320. In dem besonderen Falle eines Gebietes vom endlichen Geschlecht ist der fragliche Satz in vervollständigter Gestalt neuerdings von *R. Courant* bewiesen worden. Vgl. *R. Courant*, *Math. Zeitschrift* 3 (1909).

488a) Vgl. *R. Fricke*, II B 4 Nr. 39, p. 459—460.

ist.⁴⁸⁹⁾ Das Wesen der Methode wollen wir an dem folgenden, der Uniformisierungstheorie algebraischer Kurven entnommenen Beispiele auseinandersetzen. Es sei \mathfrak{R} eine geschlossene *Riemannsche* Fläche vom Range $p > 1$. Auf \mathfrak{R} möge ein System von p einander nicht treffender, \mathfrak{R} nicht zerstückelnder Rückkehrsnitte Σ_k ($k = 1, \dots, p$) gegeben sein.⁴⁹⁰⁾ Es handelt sich darum, das durch Aufschneiden von \mathfrak{R} längs Σ_k ($k = 1, \dots, p$) gebildete $2p$ -fach zusammenhängende schlichtartige Gebiet \mathcal{O} auf ein Gebiet T in der Ebene Z derart konform abzubilden, daß den doppelt zu zählenden Kurven Σ_k Randkomponenten entsprechen, die durch lineare Substitutionen aufeinander bezogen sind; den auf \mathfrak{R} koinzidierenden Punkten der Begrenzung von \mathcal{O} sollen Punktepaare entsprechen, die durch jene lineare Substitutionen aufeinander bezogen sind.⁴⁹¹⁾ Den Betrachtungen der Nr. 24f gemäß läßt sich Φ auf ein von p Kurvenpaaren $L_{11}, L'_{11}; L_{12}, L'_{12}; \dots; L_{1p}, L'_{1p}$ begrenztes $2p$ -fach zusammenhängendes Gebiet \mathcal{O}_1 der Klasse C in der Ebene z , das den unendlich fernen Punkt enthält, abbilden. Die Randlinien von \mathcal{O}_1 sind einander paarweise regulär analytisch zugeordnet. Diese Zuordnung ist also durch konforme Abbildung in eine lineare Zuordnung umzuwandeln.

Die die Abbildung vermittelnde Funktion $Z(z)$ ist, sofern überhaupt vorhanden, bis auf eine lineare Substitution vollkommen bestimmt. Es sei $Z'(z)$ eine andere Lösung des Problems. Durch Vermittlung von $Z'(Z)$ läßt sich T auf ein weiteres Gebiet T' mit linearer Ränderzuordnung abbilden.

Unter Zuhilfenahme der noch unbekanntem Randsubstitutionen läßt sich der Variabilitätsbereich von Z auf die ganze Ebene mit Ausnahme einer nicht abzählbaren Menge von Punkten von der Mächtigkeit des Kontinuums ausdehnen. Diesem Gebiete entspricht ein ebenso beschaffenes Gebiet in der Ebene Z' . Hieraus läßt sich

489) *P. Koebe*: a) Gött. Nachr. 1908, p. 112—116; b) Gött. Nachr. 1909, p. 68—76; c) Gött. Nachr. 1910, p. 180—189; d) Math. Ann. 69 (1910), p. 1—81 [p. 60—65]; e) Math. Ann. 72 (1912), p. 437—516; f) Jahresb. d. Deutsch. Math. Ver. 19 (1910), p. 339—348; g) a. a. O. 21 (1912), p. 157—163; h) Atti del IV. Congresso intern. dei Mat., Roma 2 (1909), p. 25—30.

490) Der Einfachheit halber werden Σ_k als Kurven der Klasse D vorausgesetzt.

491) Über die Bedeutung dieses Problems für die Theorie der Uniformisierung algebraischer Kurven vgl. das Referat von *R. Fricke*, II B 4 Nr. 39 sowie *R. Fricke* und *F. Klein*, Automorphe Funktionen, passim; ferner *P. Koebe*, loc. cit. 489) a, b, c, d, e; Math. Ann. 75 (1914), p. 42—129; *R. Courant*, a) Inaugural-Dissertation, Göttingen 1910, p. 1—44 [p. 34—41]; b) Math. Ann. 71 (1912), p. 145—183 [p. 174—180].

durch geeignete Benutzung des *Cauchyschen* Integralsatzes folgern, daß $Z'(Z)$ eine lineare Funktion sein muß. Das Verfahren ist dem in der Nr. 27 besprochenen *Koebeschen* Unitätsbeweise analog.⁴⁹²⁾ Für sein Gelingen ist der folgende von *Koebe* angegebene fundamentale „Verzerrungssatz“ wesentlich.⁴⁹³⁾

Es sei $\varphi(z)$ irgendeine im Gebiete $|z| < R$ reguläre, dieses auf ein schlichtes, den unendlich fernen Punkt nicht enthaltendes Gebiet abbildende Funktion. Sind z_1 und z_2 zwei beliebige Punkte in dem Kreisbereiche $|z| \leq \varrho < R$, so gibt es einen nur von ϱ abhängigen positiven Wert $q(\varrho) > 1$, so daß

$$\left| \frac{d\varphi(z_1)}{dz} \right| < q(\varrho) \left| \frac{d\varphi(z_2)}{dz} \right|$$

gilt. Für die Kreisfläche $|z| < R$ kann man allgemeiner irgendein beschränktes Gebiet \mathcal{G} , für den Kreisbereich $|z| \leq \varrho < R$ einen in \mathcal{G} gelegenen Bereich \mathcal{G}' setzen.⁴⁹⁴⁾ Aus dem Verzerrungssatze leitet

492) Vgl. *P. Koebe*: loc. cit. 489) b) p. 70—71; c) p. 186—187; d) p. 26 bis 39; Journ. f. Math. 138 (1910), p. 192—253 [p. 247—253]. Einen anderen Unitätsbeweis gab *R. Courant*, loc. cit. 491) a) p. 37—40 an. (Vgl. die Ausführungen am Schluß dieser Nummer.)

493) Im vorliegenden Falle genügt übrigens bereits ein Spezialfall des Verzerrungssatzes („Verzerrungssatz für lineare Funktionen“, vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 489) d) p. 26—27).

494) *P. Koebe*, loc. cit. 489) b) p. 73—74 leitet den Verzerrungssatz indirekt mit Hilfe des *Montelschen* Konvergenzsatzes ab. Einen direkten Beweis gibt *Koebe* loc. cit. 489) d) p. 46—52 (dort sowie Journ. f. Math. 138 (1910), p. 248 finden sich einige wichtige naheliegende Folgerungen des Verzerrungssatzes), für lineare Funktionen a. a. O. p. 26—27. Man vergleiche schließlich *P. Koebe*, loc. cit. 582) f.) Eine Darstellung findet sich bei *E. Study* loc. cit. 148), p. 121—127. Einen weiteren Beweis, zugleich eine Schranke für $q(\varrho)$ geben *S. Johansson*, Acta soc. sc. Fenn. Bd. 40, Nr. 1 (1910), p. 1—32 [p. 15—17]; *R. Fricke*, Automorphe Funktionen, 2, dritte Lieferung (1912), p. 496—518; *L. Bieberbach*, Konforme Abbildung, p. 85—94; *J. Plemelj* (in einem Vortrage auf der Wiener Jahresversammlung der Deutschen Math.-Ver. 1913, nicht veröffentlicht, vgl. hierüber bei *G. Pick*, an dem weiter unten a. O. p. 64) und *G. Pick*, Leipz. Ber. 68 (1916), p. 58—64. *Plemelj* und *Pick* geben für $q(\varrho)$ Formeln an, in denen nur noch eine numerische Konstante unbekannt bleibt. Diese Konstante läßt sich nach *Bieberbach* aus seinen in der Fußnote 350) besprochenen Resultaten ableiten. Vgl. *L. Bieberbach*, loc. cit. 350) a) p. 946 Fußnote 2). Die genauen Schranken für $q(\varrho)$ sind unabhängig hiervon von *G. H. Gronwall* angegeben worden, wobei eine Vermutung von *Pick* ihre Bestätigung fand. (Vgl. *G. H. Gronwall*, C. R. 162 (1916), p. 249—251.) *Gronwall* beweist den folgenden Satz: Es sei $w = z + a_2 z^2 + \dots$ eine für $|z| < 1$ reguläre analytische Funktion, durch deren Vermittlung das Gebiet des Einheitskreises auf ein schlichtes Gebiet T konform abgebildet wird. Es gilt

$$(*) \quad \frac{1 - |z|}{(1 + |z|)^2} \leq \left| \frac{dw}{dz} \right| \leq \frac{1 + |z|}{(1 - |z|)^2}, \quad \frac{|z|}{(1 + |z|)^2} \leq |w| \leq \frac{|z|}{(1 - |z|)^2}.$$

Koebe insbesondere den folgenden bemerkenswerten Satz ab: Auf der Einheitskugel seien unendlichviele, einander nicht überdeckende Gebiete $\Theta^{(1)}, \Theta^{(2)}, \Theta^{(3)}, \dots$, die alle auf $\Theta^{(1)}$ konform abgebildet werden können, gegeben. Es sei $L^{(1)}$ irgendein Stück einer rektifizierbaren Kurve ganz im Innern von $\Theta^{(1)}$. Bezeichnen $l^{(1)}, l^{(2)}, \dots$ die Längen seiner Bilder in $\Theta^{(1)}, \Theta^{(2)}, \dots$, so ist die Reihe $\sum_k l_k^2$ konvergent.⁴⁹⁵⁾

Der vorstehende Satz läßt sich übrigens auch aus dem in der Nr. 45 d besprochenen Hilfssatze von *R. Courant* und *P. Koebe* herleiten.

Ist $p = 1$, so läßt sich das eingangs gestellte Abbildungsproblem, dem der Charakter einer Grundaufgabe zukommt, durch Vermittlung

Die Gleichheitszeichen gelten nur für

$$w = \frac{z}{(1 - e^{i\alpha} z)^2} \quad \text{und} \quad z = \pm |z| e^{-\alpha i}.$$

Ist T konvex, so ist

$$(**) \quad \frac{1}{(1 + |z|)^2} \leq \left| \frac{dw}{dz} \right| \leq \frac{1}{(1 - |z|)^2}, \quad \frac{|z|}{1 + |z|} \leq |w| \leq \frac{|z|}{1 - |z|}.$$

Die Gleichheitszeichen gelten hier für

$$w = \frac{z}{1 - e^{i\alpha} z}, \quad z = \pm |z| e^{-\alpha i}.$$

Weitere Entwicklungen finden sich bei *G. H. Gronwall*, C. R. 162 (1916), p. 316—318.

Einen Beweis der Beziehungen (*) und (**) hat kürzlich *K. Löwner* veröffentlicht (Leipz. Ber. 69 (1917), p. 89—106). Dort finden sich noch einige allgemeinere Betrachtungen. Sätze über die konforme Abbildung einer Kreisfläche auf ein schlichtes in einer Kreisfläche oder einer Halbebene gelegenes Gebiet, welche verschiedene im vorstehenden sowie in der Fußnote 462) genannten Sätze als besondere Fälle enthalten, hat neuerdings *G. Pick* angegeben (Wien. Ber. 126 (1917), p. 247—263).

Man vergleiche weiter *L. Bieberbach*, Archiv d. Math. u. Physik (3) 21 (1912), p. 155—161 [p. 158]; Math. Ann. 77 (1916), p. 153—172 und *E. Landau*, loc. cit. 462), p. 98—103. Weitere Literatur: *W. F. Osgood*, Annals of Math. (2) 14 (1913), p. 143—162. Man vergleiche ferner die Ausführungen der Fußnote 462).

Es sei $f(z)$ eine Funktion, durch deren Vermittlung das Gebiet $|z| > 1$ auf ein schlichtes, den unendlich fernen Punkt enthaltendes Gebiet abgebildet wird. Für den Quotienten $\left| \frac{f'(z)}{f'(\infty)} \right|$ leitet *K. Löwner* genaue Abschätzungsformeln ab. Vgl. *K. Löwner*, Math. Zeitschr. 3 (1919). Eine Anwendung der Verzerrungssätze auf ein hydrodynamisches Problem findet sich bei *Ph. Frank* und *K. Löwner*, Math. Zeitschr. 3 (1919).

495) Die Summe der Quadrate der Längen der Randkurven von $\Theta^{(k)}$ ($k=1, 2, \dots$) (sofern diese rektifizierbar sind), kann dabei beliebig stark divergieren. Sind $\Theta^{(k)}$ einfach zusammenhängend, so gilt der vorstehende Satz natürlich ohne jede Einschränkung. Vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 489) b) p. 74; d) p. 52—53. Dort findet sich p. 27—29 derselbe Satz für lineare Abbildungsfunktionen. Für den im Text betrachteten Unitätsbeweis genügt übrigens dieser Spezialfall des allgemeinen Satzes. Vgl. ferner *P. Koebe*, Journ. f. Math. 138 (1910), p. 248—249; *W. F. Osgood*, loc. cit. 494), p. 156—162.

eines elliptischen Integrals erster Art und einer Exponentialfunktion leicht auflösen.⁴⁹⁶⁾ Auf das von L_{11} und L'_{11} begrenzte, Φ_1 enthaltende zweifach zusammenhängende Gebiet werde nun eine Abbildung dieser Art angewandt. Wir wollen sie dadurch zu einer völlig bestimmten machen, daß wir festsetzen, drei bestimmte Punkte in Φ_1 behalten ihre Lage. Das Gebiet Φ_1 möge hierdurch in ein Gebiet Φ_2 übergehen. Seine Randlinien heißen $L_{21}, L'_{21}; \dots; L_{1p}, L'_{2p}$. Von diesen sind L_{21} und L'_{21} linear, die übrigen Kurvenpaare analytisch aufeinander bezogen. Man löst jetzt die Grundaufgabe unter Bevorzugung des Kurvenpaares L_{22}, L'_{22} auf und gewinnt das Gebiet Φ_3 : $L_{31}, L'_{31}; \dots; L_{3p}, L'_{3p}$. Das Verfahren wird unter jedesmaliger Bevorzugung eines anderen Kurvenpaares ins Unendliche fortgesetzt.⁴⁹⁷⁾ Das Gebiet Φ_n konvergiert gegen ein Gebiet T , das die Aufgabe löst. Der Beweis stützt sich wesentlich auf den Verzerrungssatz. Man findet, daß das iterierende Verfahren wie eine geometrische Reihe konvergiert.⁴⁹⁸⁾

Das soeben betrachtete Abbildungsproblem gestattet noch eine andere Behandlung. Durch passendes Zusammenheften unendlich vieler Exemplare der Fläche Θ wird ein schlichtartiges unendlichvielfach zusammenhängendes Gebiet \mathfrak{X} gebildet. Den Ergebnissen der Nr. 41 zufolge läßt sich dieses auf ein schlichtes Gebiet Ψ konform abbilden. Dem Übergang von Θ zu einem anderen Exemplare Θ_k in \mathfrak{X} entsprechen gewisse, eine Gruppe bildende Abbildungen von Ψ auf sich selbst. Durch eine dem vorstehend skizzierten Unitätsbeweise analoge Überlegung wird gezeigt, daß die Abbildungen der Gruppe durch lineare Substitutionen vermittelt werden.

496) Vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 489) d) p. 61.

497) Auf L_{pp}, L'_{pp} folgt $L_{p+1,1}, L'_{p+1,1}$.

498) Vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 489) c) p. 189. Dort finden sich auch Anwendungen des iterierenden Verfahrens auf einige weitere durch die Uniformisierungstheorie algebraischer Funktionen dargebotene Probleme der konformen Abbildung. Das folgende Problem sei hervorgehoben. Es sei ein p -fach zusammenhängendes Gebiet T der Klasse C in \mathfrak{G} gegeben. Auf jeder Randkomponente von T wird eine endliche Anzahl Punkte A_j willkürlich markiert. Jedem Punkte A_j ist eine ganze Zahl $q_j \geq 2$ zugeordnet; sie kann auch ∞ gesetzt werden. Es wird eine Abbildung von T auf ein p -fach zusammenhängendes Gebiet T' in \mathfrak{G} gesucht, die folgende Eigenschaften hat. Jede Komponente von T' ist ein Kreisbogenpolygon mit Orthogonalkreis, der in Ausnahmefällen punktförmig oder imaginär werden kann. Die Punkte A_j sollen in die Eckpunkte A'_j des Polygons übergehen. Der in A'_j eingeschlossene Winkel soll gleich $\frac{\pi}{q_j}$ sein. Bemerkenswert hierbei ist das Auftreten unendlich vieler Grenzkreise bei Ausübung des Spiegelungsprozesses, wie bei noch allgemeineren *Kleinschen* Fundamentaltheoremen (vgl. *R. Fricke*, II B 4).

Damit ist der Satz bewiesen.⁴⁹⁹⁾

*R. Courant*⁵⁰⁰⁾ bedient sich in seiner späteren Behandlung des Problems zur Abbildung der Fläche \mathfrak{X} auf ein schlichtes Gebiet der Funktion $Z = U + iV$, unter U das in der Nr. 42 betrachtete Strömungspotential verstanden.⁵⁰¹⁾ Die soeben besprochene charakteristische Eigenschaft der Abbildung wird aus der Tatsache gefolgert, daß es, bis auf einen konstanten Summanden, nur eine in \mathfrak{X} , mit Ausnahme des Punktes z_0 , reguläre, sich in z_0 wie $\frac{1}{z - z_0} + \mathfrak{B}(z - z_0)$ verhaltende eindeutige analytische Funktion $f = f_1 + if_2$ gibt, wenn überdies verlangt wird, daß $D_{\mathfrak{X}-K^*-C^*}(f_1)$ eine bestimmte Bedeutung hat.

44. Konforme Abbildung eines p -fach zusammenhängenden Gebietes in \mathfrak{G} auf ein Vollkreisgebiet. Eine wichtige Anwendung der in der Nr. 43 besprochenen Methoden bildet der zuerst von *P. Koebe* geführte Beweis für die Möglichkeit, ein gegebenes p -fach ($p \geq 2$) zusammenhängendes schlichtartiges Gebiet auf ein von p Vollkreisen begrenztes Gebiet in \mathfrak{G} konform abzubilden.⁵⁰²⁾ Den Ergebnissen der Nr. 40 und 41 zufolge bildet es keine Einschränkung der Allgemeinheit, das gegebene Gebiet schlicht und von der Klasse \mathcal{D} voranzusetzen.⁵⁰³⁾ Die Aufgabe läßt, wenn von einer linearen Substitution abgesehen wird, nicht mehr als eine Lösung zu (Nr. 27). Der Fall $p = 2$ ist in der Nr. 27 besprochen worden. Der besondere

499) Seinen Beweis hat *Koebe* zum ersten Male in der Sitzung der Gött. Math. Ges. am 25. 2. 1908 bekannt gegeben. S. die Ber. der Deutschen Math.-Ver. 17 (1908), Anhang, p. 50. Ausführliche Darstellungen vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 489) b) p. 71—74; loc. cit. 489) d) p. 42—60 (a. a. O. [p. 60—65] Ausführungen über den Zusammenhang des iterierenden Verfahrens mit der Methode der Überlagerungsfläche); eine kürzere Darlegung s. Journ. f. Math. 138 (1910), p. 246—249. Man vergleiche ferner die in den Einzelheiten abweichenden Bearbeitungen bei *R. Fricke* und *F. Klein*, Automorphe Funktionen, 2, dritte Lieferung, p. 495 bis 552 und *W. F. Osgood*, loc. cit. 494) sowie die Ausführungen bei *L. Bieberbach*, Arch. d. Math. u. Phys. (3) 21 (1912), p. 155—161 [p. 158—160].

500) *R. Courant*, Inaugural-Dissertation, Göttingen 1910, p. 1—44 [p. 34—41]; Math. Ann. 71 (1912), p. 145—183 [p. 174—180].

501) Der Punkt z_0 (Nr. 42) wird außerhalb der Rückkehrsnitte auf \mathfrak{R} angenommen.

502) Jeder einzelne Kreis kann sich auf einen Punkt (darunter den unendlich fernen Punkt) reduzieren.

503) Jede einzelne Randkomponente des gegebenen Gebietes kann sich auf einen Punkt reduzieren. Augenscheinlich kann man indessen punktförmige Stücke der Begrenzung außer Betracht lassen.

Fall eines in bezug auf die Achse des Reellen symmetrischen Gebietes, dessen Randkomponenten sämtlich Punkte auf der Achse des Reellen haben, ist von *Koebe* im Jahre 1907 noch vor dem Beweise des *Poincaré-Koebeschen* Abbildungssatzes erledigt worden.⁵⁰⁴⁾ Jedes dreifach zusammenhängende schlichte Gebiet der Klasse D läßt sich auf eine von drei Stücken der Achse des Reellen begrenzte Ebene konform abbilden. Damit ist dieser Fall auf den vorerwähnten zurückgeführt^{504*)}. Den allgemeinen Fall $p \geq 3$ erledigt *Koebe* einmal unter Benutzung einer Überlagerungsfläche, das andere Mal durch iterierendes Verfahren. Es möge der Einfachheit halber das in der Ebene z gegebene Gebiet T den unendlich fernen Punkt enthalten. Ist etwa \mathcal{O} das gesuchte von p Kreisen begrenzte Gebiet in der Ebene Z , so kann der Variabilitätsbereich von Z durch fortgesetzte Spiegelung über die ganze Ebene, mit Ausnahme einer gewissen Menge von Punkten, ausgedehnt werden. Der Veränderlichen z wird dabei ein vollkommen bestimmtes schlichtartiges Gebiet \mathfrak{X} zugewiesen, das aus unendlichvielen kongruenten Exemplaren von T besteht, die paarweise längs einer Randkomponente zusammengeheftet sind und dort also eine geschlossene Faltungslinie bilden.⁵⁰⁵⁾ Den Betrachtungen der Nr. 41 gemäß läßt sich \mathfrak{X} auf ein schlichtes Gebiet Π konform abbilden. Dem Gebiete T entspricht dabei, wie unter Zuhilfenahme des Verzerrungssatzes durch Betrachtungen, die den in der Nr. 43 ange deuteten analog sind, gezeigt wird, ein von Vollkreisen begrenztes Gebiet.

R. Courant bildet zunächst T auf ein von p der Achse des Reellen parallelen Strecken begrenztes Gebiet ab und gewinnt durch Zusammen-

504) Jahresb. d. Deutsch. Math. Ver. 16 (1907), p. 116–130. Die Aufgabe wird auf die Abbildung eines in bezug auf die Achse des Reellen symmetrischen, aus unendlichvielen aneinander gehefteten Halbebenen bestehenden einfach zusammenhängenden Gebietes auf eine Halbebene zurückgeführt. Für die wie in der Nr. 40b zu bildende *Greensche* Funktion wird eine Majorante angegeben. (Vgl. die Fußnote 461.)

504*) Vgl. loc. cit. 504), p. 120. In der in der Fußnote 582) an fünfter Stelle zitierten neuesten Arbeit beweist *Koebe* auf einem anderen Wege, daß jedes dreifach zusammenhängende Gebiet T in \mathcal{E} ohne punktförmige Randkomponenten durch drei analytische und in T reguläre Querschnitte in zwei zu einander im analytischen Sinne in bezug auf diese Querschnitte symmetrische einfach zusammenhängende Teile zerlegt werden kann. Vgl. den Schluß des § 6. Dieser Satz ist von dem im Text zuletzt betrachteten Satz nicht wesentlich verschieden.

505) Wie *Koebe* loc. cit. 489) f) p. 342–343 bemerkt, kann man das Gebiet \mathfrak{X} statt dessen über die beiden in geeigneter Reihenfolge unendlich oft durchlaufenen Seiten der Ebene z ausbreiten.

heften eine von Faltungslinien freie Überlagerungsfläche.⁵⁰⁶) Die weiteren Entwicklungen sind den am Schluß der Nr. 43 besprochenen Betrachtungen ähnlich.

Es seien $S_1^{(1)}, \dots, S_p^{(1)}$ die Randkomponenten von $T = T^{(1)}$ und es sei $T_1^{(1)}$ das von $S_1^{(1)}$ begrenzte unendliche Gebiet. Das „iterierende Verfahren“ von *Koebe* läßt sich kurz so beschreiben. Man bildet $T_1^{(1)}$ auf ein von einem Kreise begrenztes unendliches Gebiet derart ab, daß in dem unendlich fernen Punkte die Entwicklung

$$Z = z + \frac{1}{z} \mathfrak{P}\left(\frac{1}{z}\right)$$

gilt. Dabei geht $T = T^{(1)}$ in ein Gebiet $T^{(2)}$, das von $S_1^{(2)}, \dots, S_p^{(2)}$ begrenzt ist, über. Das Gebiet $T^{(2)}$ wird sodann, unter Bevorzugung der Randkomponente $S_1^{(2)}$, wie vorhin $T^{(1)}$, behandelt. Das Verfahren wird ins Unendliche fortgesetzt und liefert in der Grenze das gesuchte Vollkreisgebiet.⁵⁰⁷)

Wie *Koebe* bemerkt, ist das vorliegende Problem dem in der Nr. 43 betrachteten nahe verwandt. Spiegelt man nämlich $T^{(2)}$ an $S_1^{(2)}$, so gewinnt man, wenn, wie vorausgesetzt werden soll, T der Klasse C angehört, ein $2(p-1)$ -fach zusammenhängendes Gebiet mit analytischer Ränderzuordnung, das auf ein Gebiet mit linearer Ränderzuordnung abgebildet werden soll.⁵⁰⁸)

In den Untersuchungen von *P. Koebe* und *R. Courant* ist auch der folgende *Koebesche* Satz enthalten. Läßt ein p -fach zusammenhängendes Gebiet der Klasse C in \mathfrak{C} eine unendliche Folge analytischer Spiegelungen zu, die Spiegelungen eines von Kreisen begrenzten Gebietes im Sinne der Analysis Situs äquivalent sind, so ist das betrachtete Gebiet ein Vollkreisgebiet. Ein analoger Satz gilt für $2p$ -fach zusammenhängende Gebiete in \mathfrak{C} mit analytischer Zuordnung von Randlinienpaaren.⁵⁰⁹)

In dieselbe Gruppe von Sätzen gehört auch der folgende Satz. Läßt sich ein *Jordanscher* Bereich $T + S$ auf den zugehörigen Außenbereich $T' + S$ derart stetig und in T konform, unter Umlegung der Winkel, abbilden, daß alle Punkte auf S in sich selbst übergehen, so ist T ein Kreisgebiet, die Abbildung ist eine Transformation durch reziproke Radien. Gilt die betrachtete Beziehung nur für eine gewisse (beider-

506) *R. Courant*, Inaugural-Dissertation, Göttingen 1910, p. 41—44; *Math. Ann.* 71 (1912), p. 145—183.

507) *P. Koebe*, *Journ. f. Math.* 138 (1910), p. 250—252.

508) *P. Koebe*, loc. cit. 507) p. 250—251.

509) *P. Koebe*, loc. cit. 507), p. 252—253.

seitige) Umgebung von S , so ist T ein Gebiet der Klasse C , die Abbildung eine *Schwarzsche Spiegelung an S* .⁵¹⁰⁾

Als Desideratum stellt *Koebe* die Abbildung eines beliebigen unendlichvielfach zusammenhängenden Gebietes \mathcal{G} in \mathfrak{E} auf ein von lauter Kreisen begrenztes Gebiet auf.⁵¹¹⁾ Ist \mathcal{G} insbesondere ein von unendlichvielen in bezug auf die Achse des Reellen symmetrischen Kurven⁵¹²⁾, die sämtlich reelle Punkte haben, begrenztes Gebiet, so läßt sich ein Beweis für die Möglichkeit der gewünschten Abbildung nach Angaben von *Koebe* durch die in der Nr. 40 b Fußnote 461) angedeuteten Betrachtungen gewinnen.⁵¹³⁾ Eine Abbildung der vorgenannten Art existiert ferner, wie neuerdings bewiesen worden ist, wenn die einzelnen Komponenten der Begrenzung nur eine Häufungskomponente und zwar einen Häufungspunkt haben und wenn überdies gewisse metrische Bedingungen erfüllt sind.⁵¹⁴⁾

45. Variationsmethoden. a) *Allgemeines*. Es sei T ein beschränktes, einfach zusammenhängendes Gebiet in \mathfrak{E} und u diejenige in T und auf S stetige, in T reguläre Potentialfunktion, die auf S gleich einer vorgegebenen stetigen Funktion $f(x, y)$ ist. Ist das „*Dirichlet'sche Integral*“

$$D_T(u) = \int_T \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy$$

vorhanden, so ist $D_T(u) < D_T(\bar{u})$, unter \bar{u} irgendeine von u verschiedene, in T und auf S stetige Funktion verstanden, die in T abteilungsweise stetige partielle Ableitungen erster Ordnung hat⁵¹⁵⁾, auf

510) *P. Koebe*, Journ. f. Math. 145 (1915), p. 177—223 [p. 219—221].

511) *P. Koebe*, loc. cit. 489) h) p. 30. Jeder einzelne Kreis kann sich insbesondere auf einen Punkt reduzieren.

512) Der Klasse D , sofern die betrachtete Komponente der Berandung keine Häufungskomponente ist.

513) Vgl. *A. Fischer*, Über die konforme Abbildung symmetrischer unendlichvielfach zusammenhängender schlichter Bereiche, Inaugural-Dissertation, Jena 1915, p. 1—33.

514) Vgl. *K. Georgi*, Über die konforme Abbildung gewisser nicht symmetrischer unendlichvielfach zusammenhängender schlichter Bereiche auf Kreisbereiche, Inaugural-Dissertation, Jena 1915, p. 1—44.

515) Allgemeiner könnte man voraussetzen, daß $\left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial x} \right)^2, \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right)^2$ in T im *Lebesgueschen* Sinne integrierbar sind, während die unbestimmten Integrale $\int \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} dx, \int \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} dy$, höchstens mit Ausnahme gewisser Nullmengen von Geraden $y = y^*, x = x^*$, existieren und gleich $u + \text{Const.}$ sind. Vgl. *B. Levi*, loc. cit. 529) a) [p. 301—303]; *G. Fubini*, loc. cit. 532) a) [p. 65].

S mit $f(x, y)$ übereinstimmt und überdies so beschaffen ist, daß $D_T(\bar{u})$ existiert (Nr. 34).

Die Funktion u ist somit die Lösung eines bestimmten Variationsproblems. Auch bei manchen anderen Randwertproblemen ist die Lösung zugleich Lösung einer gewissen Aufgabe der Variationsrechnung. Auch wenn vorgeschriebene Unstetigkeiten vorliegen, läßt sich nicht selten aus der Lösung der Randwertaufgabe diejenige eines Variationsproblems ableiten.

Bekanntlich glaubte *B. Riemann* nach dem Vorgange von *C. F. Gauß*, *W. Thomson* und *P. G. Lejeune-Dirichlet* aus dem Vorhandensein einer unteren Grenze des Integrals $D_T(u)$ unmittelbar auf die Existenz der Potentialfunktion u schließen zu können (II A 7 b Nr. 23 bis 25). Nachdem *K. Weierstraß* nachdrücklich darauf hingewiesen hat, daß diese meist mit dem Namen „*Dirichletsches Prinzip*“ bezeichnete Schlußweise nicht als beweiskräftig angesehen werden kann⁵¹⁶), hielt man es lange Zeit für unmöglich, aus den Variationsbeziehungen für die Existenz der Lösung bindende Schlüsse zu ziehen. Erst *D. Hilbert* war es am Anfang dieses Jahrhunderts gelungen, auf die Minimalbeziehungen einen strengen Existenzbeweis der Lösung zu gründen. An die Arbeiten von *Hilbert* schließt eine lange Reihe von Arbeiten anderer Mathematiker an; heute gehören Variationsmethoden zu den einfachsten und weittragendsten Hilfsmitteln der Analysis.

Der Grundgedanke der Variationsmethoden läßt sich am einfachsten an Hand des eingangs betrachteten Beispiels erläutern. Für alle \bar{u} ist $D_T(\bar{u}) > 0$. Die Werte $D_T(\bar{u})$ haben also eine endliche untere Grenze d . Aus der Gesamtheit (Ω) der Funktionen \bar{u} wird eine Folge $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots$ ausgesondert, so daß (1) $D_T(\bar{u}_n) \geq d$, (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} D_T(\bar{u}_n) = d$ ist. Jede Folge \bar{u}_n dieser Art wird eine „Minimalfolge“ genannt. Nunmehr wird meist durch geeignete Operationen, unter wesentlicher Benutzung der Beziehungen (1) und (2) eine neue Minimalfolge $u_n (n = 1, 2, \dots)$ abgeleitet, die in T , oder in T und auf S gegen eine Funktion u gleichmäßig konvergiert. Von dieser Funktion wird bewiesen, daß sie der Beziehung $D_T(u) = d$ genügt, somit das Variationsproblem auflöst. In T verhält sich die Funktion u nebst ihren partiellen Ableitungen der beiden ersten Ordnungen stetig und genügt der Differentialgleichung $\Delta u = 0$. Sie erfüllt, zumindest wenn T gewissen einschränkenden Bedingungen genügt, die Randbedingung,

516) Vgl. *H. Burkhardt* und *W. F. Meyer*, II A 7 b die Fußnote 157). Einfache Beispiele, welche die Unzulässigkeit des „*Dirichletschen Prinzips*“ beleuchten, gibt *J. Hadamard*, *Leçons*, p. 9–11 an. Vgl. auch *G. Fubini*, loc. cit. 532) a) p. 59,

ist also die Lösung der Randwertaufgabe. Mitunter wird nicht $u(x, y)$, sondern ein Doppelintegral über $u(x, y)$ als Grenze einer gleichmäßig konvergierenden Funktionenfolge abgeleitet. Die Lösung ergibt sich zuletzt etwa durch wiederholte Differentiation.

In analoger Weise läßt sich eine Reihe anderer sehr allgemeiner Randwertaufgaben der Potentialtheorie behandeln. Je nach den besonderen Rand- oder Unstetigkeitsbedingungen⁵¹⁷⁾ wird das zugeordnete Variationsproblem und die Funktionenklasse (Ω) verschieden ausfallen.

Es wird auch heute noch manchmal behauptet, durch die jetzt zu besprechenden Arbeiten sei das „Dirichletsche Prinzip“ gerettet worden. Dies ist natürlich nicht der Fall; der Weierstraßsche Einwand besteht nach wie vor zu recht. Es erscheint darum nicht richtig, die vorliegenden Verfahren unter dem Namen „Methoden des Dirichletschen Prinzips“ zusammenzufassen. Das Kennzeichnende der betrachteten Methoden ist lediglich die Benutzung einer geeigneten Minimalfolge als Operationsbasis und ein möglichst weitgehender Gebrauch der Beziehungen (1) und (2) bei der Beweisführung.

Der soeben skizzierte Gedankengang läßt sich im einzelnen in verschiedener Weise durchführen. Im allgemeinen stellt das Vorhandensein einer Randbedingung eine Erschwerung dar. Wie schon *F. Prym* und später *J. Hadamard* bemerkt haben, hat das Dirichletsche Integral $D_T(u)$, unter u die Lösung des Randwertproblems verstanden, nicht immer einen Sinn.⁵¹⁸⁾ Die Randfunktion $f(x, y)$ muß demnach, damit $D_T(u)$ existiere, gewissen über die bloße Stetigkeit hinausgehenden Einschränkungen genügen⁵¹⁹⁾ (Nr. 34). Wie wir ferner bereits gesehen haben, hat bei beschränkten, mehrfach zusammenhängenden Gebieten das erste Randwertproblem nicht notwendig eine Lösung (Nr. 45c). So hat die Aufgabe, eine in dem Gebiete $0 < x^2 + y^2 < 1$ reguläre Potentialfunktion zu bestimmen, die auf dem Einheitskreise gleich 1, für $x = y = 0$ gleich 0 wäre, keine Lösung.⁵²⁰⁾ Auch nach dieser Richtung hin sind also Einschränkungen nötig.⁵²¹⁾ Endlich bedarf der Nachweis, daß die Grenzfunktion u den Randbedingungen genügt, in der Regel einer besonderen Untersuchung. Im Interesse der Einheitlichkeit erscheint es wünschenswert, auch diesen Teil der

517) Bei unendlichvielblättrigen Gebieten können Randbedingungen (wie bei geschlossenen Riemannschen Flächen) auch ganz fehlen.

518) Vgl. loc. cit. 151) und 152).

519) Vgl. p. 226 sowie loc. cit. 153).

520) Vgl. *S. Zaremba*, loc. cit. 543) c) p. 199—200.

521) Vgl. *H. Lebesgue*, loc. cit. 535) a) (vgl. 45c)

Betrachtung möglichst unter alleiniger Benutzung der Beziehungen (1) und (2) zu führen.

Vom Standpunkte der Methodik wird man naturgemäß danach streben, die Betrachtung in allen Einzelheiten auf den Boden der Variationsgedanken zu stellen. Man wird insbesondere versuchen, von der Benutzung bekannter Lösungen des ersten Randwertproblems für spezielle Gebiete abzusehen. Die so weit gehende methodische Reinheit darf allerdings, wenn das Ergebnis befriedigen soll, nicht auf Kosten der Einfachheit und Übersichtlichkeit erkaufte sein. Die Lösung u wird man als Grenze einer in T oder noch besser in $T + S$ gleichmäßig konvergierenden Minimalfolge zu bestimmen suchen. Demgegenüber dürfte ein Übergang über die Integrale $\int \bar{u} dx dy$ mit nachträglicher Differentiation als ein Umweg erscheinen.

Was die Existenz einer Folge \bar{u}_n betrifft, so bedarf diese, wenn man sich auf das *Zermelosche* Auswahlprinzip stützt, keines Beweises. In manchen Fällen gelingt es übrigens, eine Folge \bar{u}_n zu bilden, ohne den Gedankenkreis der Minimalbetrachtungen zu verlassen.⁵²²⁾

b) *Die ersten Arbeiten von D. Hilbert.* Die Grundgedanken seiner Methode hat *Hilbert* zuerst in einem auf einer Jahresversammlung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung gehaltenen Vortrage an dem Beispiele der geodätischen Linie und des ersten Randwertproblems für ein einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{E} skizziert.⁵²³⁾ Betrachten wir kurz das an zweiter Stelle genannte Beispiel.

Von der Randfunktion wird vorausgesetzt, daß sie stetig ist und stetige Ableitungen der beiden ersten Ordnungen hat. Es gibt dann eine Folge \bar{u}_n ($n = 1, 2, \dots$) in T und auf S nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetiger, in T abteilungsweise analytischer Funktionen, so daß $\lim_{n \rightarrow \infty} D_T(\bar{u}_n) = d$ ist. Nach *Hilbert* wird von \bar{u}_n zu einer anderen Minimalfolge $\bar{\bar{u}}_n$ ($n = 1, 2, \dots$) übergegangen derart, daß die Funktionen $\bar{\bar{u}}_n$ sich in T und auf S wie \bar{u}_n verhalten, während für alle $n \dots$ (1) $|D_1 \bar{\bar{u}}_n| < M_1$ (M_1 konstant), darum auch (2) $|\bar{\bar{u}}_n| < M_2$ (M_2 konstant) gilt.

Nummehr wird aus $\bar{\bar{u}}_n$ unter Zuhilfenahme des bekannten Diagonalverfahrens eine Teilfolge u_n ($n = 1, 2, \dots$) ausgesondert, die in allen Punkten in T mit rationalen Koordinaten konvergiert. Aus (1)

522) Vgl. weiter unten die Betrachtungen von *R. Courant*, *P. Koebe* und *W. Ritz*.

523) Jahresb. d. Deutsch. Math. Ver. 8 (1900), p. 184ff., abgedruckt in dem Journ. f. Math. 129 (1905), p. 63—67.

ergibt sich nach einem auf *Ascoli* zurückgehenden Konvergenzsatz, daß die Folge u_n in T und auf S gleichmäßig konvergiert.⁵²⁴⁾ Die Grenzfunktion u ist die Lösung der Randwertaufgabe.

Eine an ein anderes Beispiel anknüpfende ausführliche Darlegung seines Verfahrens hat *Hilbert* in der Festschrift zur Feier des 150jährigen Bestehens der Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen im Jahre 1901 gegeben.⁵²⁵⁾

Es sei \mathfrak{R} eine geschlossene *Riemannsche* Fläche, \mathfrak{C} ein aus Strecken, die teils der x -, teils der y -Achse parallel sind, bestehendes Polygon, das \mathfrak{R} nicht zerstückelt und durch keinen Verzweigungspunkt hindurchgeht. Das Gebiet, das entsteht, wenn man \mathfrak{R} längs \mathfrak{C} zerschneidet, heiße \mathfrak{R}^* . Gesucht wird diejenige in \mathfrak{R}^* und auf dem (doppelt zu zählenden Linienzuge \mathfrak{C}) reguläre Potentialfunktion, die beim Übergang durch \mathfrak{C} einen Sprung gleich 1 erleidet. Die Menge (Ω) besteht hier aus der Gesamtheit der in $\mathfrak{R}^* + \mathfrak{C}$ stetigen, abteilungsweise analytischen Funktionen \bar{u}_n , die beim Übergang durch \mathfrak{C} einen Sprung gleich 1 erleiden. Die Funktionen \bar{u}_n werden nötigenfalls durch Hinzufügung geeigneter Konstanten so normiert, daß $(3) \int_{\Sigma} \bar{u}_n dx = 0$ wird, unter Σ eine feste, zu der x -Achse parallele Strecke verstanden.

Es sei (L) die Gesamtheit aller ein schlichtes, beschränktes Gebiet in \mathfrak{R}^* begrenzenden Rechtecke, deren Ecken rationale Koordinaten haben und deren Seiten den Koordinatenachsen parallel sind. Diese Menge ist abzählbar; sie kann also zu einer Folge L_1, L_2, \dots geordnet werden. Die Flächen dieser Rechtecke heißen A_1, A_2, \dots . Nun zeigt *Hilbert*, daß für alle n

$$(4) \quad \left| \int_{A_k} \bar{u}_n dx dy \right| < \bar{M}_k \quad (\bar{M}_k \text{ konstant})$$

ist. Unter Zuhilfenahme des vorhin erwähnten *G. Cantorschen* Diagonalverfahrens kann man darum aus \bar{u}_n eine Teilfolge \bar{u}_n aussondern, so daß für alle k der Grenzwert

$$(5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_k} \bar{u}_n dx dy$$

524) Der fragliche Satz lautet etwa so. Es sei T_0 ein beschränktes Gebiet der Klasse B in \mathfrak{C} und $v_n (n=1, 2, \dots)$ eine Folge von Funktionen, die in $T_0 + S_0$ nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetig sind. Für alle n sei ferner $|D_1 v_n| < A$ (A konstant). Ist nun die Folge v_n in jedem Punkte einer in $T_0 + S_0$ überall dichten Menge konvergent, so konvergiert sie in T_0 und auf S_0 überall und zwar gleichmäßig. Siehe *D. Hilbert*, loc. cit. 525) p. 165—166. Man vergleiche hierzu *Ascoli*, *Memorie della R. Acc. dei Lincei* 18 (1883), p. 521—586 sowie *Arzelà*, *Memorie delle R. Acc. dell' Ist. di Bologna* (5) 5 (1893), p. 225—248.

525) Abgedruckt in den *Math. Ann.* 59 (1905), p. 161—186. Man vergleiche hierzu das Referat II A 8 a von *E. Zermelo* und *H. Hahn*, Nr. 6.

existiert. Es sei L irgendein Rechteck der Menge (L) und es sei (a, b) einer seiner Eckpunkte. Das von L begrenzte beschränkte Gebiet heie \mathcal{A} . Wie sich zeigen lt, liegt der absolute Betrag des Integrals $\int \bar{u}_n ds$, erstreckt ber irgendeine der x - oder der y -Achse parallele Strecke in L , fr alle n unterhalb einer endlichen Schranke. Aus dem *Ascolischen* Konvergenzsatz wird darum geschlossen, da die Folge

$$(6) \quad \bar{u}_n^* = \iint_a^y \bar{u}_n dx dy \quad (n = 1, 2, \dots)$$

im Innern und auf dem Rande von \mathcal{A} gleichmig konvergiert. Ist

$$(7) \quad u^* = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{u}_n^*, \text{ so ist, wie zuletzt gezeigt wird,}$$

$$(8) \quad u(x, y) = \frac{\partial^2 u^*}{\partial x \partial y}$$

die Lsung des Problems. Eine wesentliche Rolle spielt bei der Ableitung dieses Schlulergebnisses der Satz: Ist ξ irgendeine in \mathcal{A} und auf L nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetige, abteilungsweise analytische, auf L verschwindende Funktion, so ist

$$(9) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathcal{A}} \left\{ \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \bar{u}_n}{\partial x} + \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \bar{u}_n}{\partial y} \right\} dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} D(\xi, \bar{u}_n) = 0.$$

Diese Gleichung entspricht der Forderung des Verschwindens der ersten Variation.⁵²⁶⁾

An die *Hilbertsche* zweite Abhandlung schliet sich eine betrchtlich spter entstandene Arbeit von *W. Ritz* an.⁵²⁷⁾ Sei T ein einfach zusammenhngendes Gebiet in \mathfrak{E} . Die Gleichung seiner Randkurve S heie $F(x, y) = 0$. Es wird angenommen, da in $T + S \dots F'$ und $\frac{\partial^{m+n} F}{\partial x^m \partial y^n}$ ($m, n = 0, 1, 2$) sich stetig verhalten, in $T \dots F' \neq 0$ ist, auf S schlielich $\frac{\partial F}{\partial x}$ und $\frac{\partial F}{\partial y}$ nicht identisch verschwinden. Das erste Randwertproblem fhrt *Ritz* zunchst auf die Bestimmung derjenigen in $T + S$ nebst ihren partiellen Ableitungen

526) Den bergang von (9) zu (8) siehe *E. Zermelo* und *H. Hahn*, II A 8 a Nr. 6. Man vergleiche ferner *M. Mason*, *Math. Ann.* 61 (1905), p. 450—452.

527) *W. Ritz* a) *Gtt. Nachr.* 1908, p. 236—243; *Oeuvres*, p. 251—264; b) *Journ. f. Math.* 135 (1909), p. 1—61; *Oeuvres*, p. 192—250. Auer dem ersten Randwertproblem der Potentialtheorie fr gewisse beschrnkte Gebiete in \mathfrak{E} werden a. a. O. Aufgaben der Elastizittstheorie sowie gewisse eindimensionale Variationsprobleme betrachtet. Man vergleiche ferner *W. Ritz* c) *Annalen der Physik* (4) 28 (1909), p. 737—786; *Oeuvres*, p. 265—316. Eine Darstellung findet sich bei *H. Poincar*, *Leons de Mcanique Cleste*, Paris 1910, p. 297—303.

erster Ordnung stetigen, in T regulären, auf S verschwindenden Funktion w zurück, die den Ausdruck

$$(10) J^* = D_T(w) - 2 \int_T w f(x, y) dx dy \quad (f(x, y), D_1 f \text{ in } T + S \text{ stetig})$$

zum Minimum macht. Nunmehr wird die Existenz einer unendlichen Folge in $T + S$ nebst ihren Ableitungen $\frac{\partial^{m+n}\psi_k}{\partial x^m \partial y^n}$ ($m, n = 0, 1, 2$) stetigen, auf S verschwindenden Funktionen ψ_k ($k = 1, 2, \dots$) postuliert, so daß $\sum_k^{1\dots p} a_k \psi_k$ für alle p , nur wenn $a_k = 0$ ($k = 1, \dots, p$) ist, identisch verschwindet und jede nebst ihren Ableitungen $\frac{\partial^{m+n}\Pi}{\partial x^m \partial y^n}$ ($m, n = 0, 1, 2$) in $T + S$ stetige, auf S verschwindende Funktion Π sich durch einen Ausdruck der Form $\sum_k^{1\dots p} a_{kp} \psi_k$ beliebig gleichmäßig approximieren läßt, während zugleich in $T + S$ gleichmäßig

$$\frac{\partial^{m+n}\Pi}{\partial x^m \partial y^n} = \lim_{p \rightarrow \infty} \left[\sum_k^{1\dots p} a_{kp} \frac{\partial^{m+n}\psi_k}{\partial x^m \partial y^n} \right]$$

gilt.

Sodann wird in J^* für w der Ausdruck $\sum_k^{1\dots p} a_k \psi_k$ eingesetzt und es wird dasjenige System $a_k^{(p)}$ ($k = 1, \dots, p$) bestimmt, das den gewonnenen Ausdruck zum Minimum macht. Die Folge $w_p = \sum_k^{1\dots p} a_k^{(p)} \psi_k$ ($p = 1, 2, \dots$) ist eine Minimalfolge des Problems. Die Integrale $\int_T w_p dx, \int_S w_p dy$ konvergieren in $T + S$ gleichmäßig. Von hier aus wird zu der Lösung des Ausgangsproblems wie bei *Hilbert* übergegangen. Das wesentliche und namentlich für die Anwendungen wichtige der *Ritzschen* Methode besteht in der expliziten Darstellung einer Minimalfolge.⁵²⁸⁾

c) *Auflösung des ersten Randwertproblems in der Ebene und im Raume.* Bei dem von *Hilbert* in seiner zweiten Arbeit behandelten

528) Das Verfahren von *Ritz* ist seither vielfach zur angenäherten Behandlung verschiedener Probleme der Elastizitätstheorie und der Festigkeitslehre herangezogen worden. Ein sich mit der *Ritzschen* Methode berührendes Verfahren zur Auflösung gewisser nichtlinearer ein- und mehrdimensionaler Existenzprobleme der Variationsrechnung hat *L. Lichtenstein* angegeben. Vgl. *L. Lichtenstein*, C. R. 157 (1913), p. 689—672; Journ. f. Math. 145 (1914), p. 24—85; C. R. 157 (1913), p. 1508—1511; Acta math. 40 (1914), p. 327—360. Der Konvergenzbeweis wird a. a. O. auf einem ganz anderen Wege geführt.

Problem lag eine eigentliche Randbedingung nicht vor; der in der ersten Veröffentlichung beschrittene Weg dürfte sich aber nur bei Gebieten spezieller Natur als gangbar erweisen. In der Verfolgung der von *Hilbert* gegebenen Anregung ist man indessen bald dazu gelangt, das erste Randwertproblem für allgemeinere Klassen ebener Gebiete und schließlich mit *H. Lebesgue* für die schlechthin allgemeinsten beschränkten einfach und mehrfach zusammenhängenden ebenen Gebiete durch Variationsbetrachtungen aufzulösen.

B. Levi bestimmt die Lösung des ersten Randwertproblems für ein beschränktes einfach zusammenhängendes Gebiet T in \mathbb{C} , dessen Rand S mit einer jeden Geraden, die ein (im übrigen beliebig kleines) festes Kreisgebiet in T trifft, nur zwei Punkte gemeinsam hat.⁵²⁹⁾ Die Randkurve S ist rektifizierbar und hat darum, außer höchstens in einer Menge der Randpunkte vom Maße Null, eine bestimmte Tangente. Die vorgeschriebene Randfunktion $\varphi(s)$ soll stetig sein und eine beschränkte Ableitung erster Ordnung haben.

Aus der Minimalfolge \bar{u}_n gewinnt *B. Levi* durch zweimalige Anwendung eines geeigneten Prozesses der Mittelwertbildung eine neue in T und auf S gleichmäßig konvergierende Minimalfolge. Die Grenzfunktion ist die gesuchte Potentialfunktion. Der Beweis stützt sich wesentlich auf den seitdem viel gebrauchten *B. Levischen* Hilfssatz: Sind \bar{u}_1 und \bar{u}_2 zwei Funktionen aus (Ω) und ist

$$(1) \quad D_T(\bar{u}_1) < d + \varepsilon, D_T(\bar{u}_2) < d + \varepsilon, \text{ so ist } (2) \quad D_T(\bar{u}_1 - \bar{u}_2) < 4\varepsilon.^{530)}$$

Der Erfolg des *B. Levischen* Verfahrens hängt ganz wie derjenige der zweiten *Hilbertschen* Methode vor allem mit dem Übergange zu gewissen Doppelintegralen über \bar{u}_n zusammen.⁵³¹⁾ Dieser Übergang ist hier in einer anderen Weise durchgeführt, so daß das nachträgliche Differenzieren vermieden wird.

Die Betrachtungen lassen sich vereinfachen, wenn man mit *G. Fubini* von einer Minimalfolge \bar{u}_n ausgeht, die so beschaffen ist, daß, wenn man $D_T(\bar{u}_n) = d + \frac{\varepsilon_n}{6}$ setzt, $1 > \varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \dots$ ist, und die Reihe

529) *B. Levi*, Rend. del Circ. Mat. di Palermo a) 22 (1906), p. 293—360; b) ebendort p. 387—394.

530) *B. Levi*, loc. cit. 529) a) p. 425—426; *G. Fubini*, loc. cit. 531) a) p. 64; *S. Zaremba*, loc. cit. 543) c) p. 241; *H. Weyl*, Die Idee der Riemannschen Fläche, Leipzig 1913, p. 101. Die von *B. Levi* und *G. Fubini* gegebenen Beweise liefern übrigens nur $D_T(\bar{u}_1 - \bar{u}_2) < 6\varepsilon$.

531) Vgl. *G. Fubini*, loc. cit. 532) a) p. 70—71. Siehe ferner *G. Fubini*, Atti della R. Acc. dei Lincei, Rendiconti (5) 19 (1910), p. 796—801. Man vergleiche hierzu die weiter unten besprochene Methode von *S. Zaremba*.

$\sum_n \varepsilon_n^{\frac{1}{2}}$ konvergiert.⁵³²) Sowohl bei der von *B. Levi* betrachteten Randwertaufgabe, als auch bei dem von *Hilbert* in der zweiten Arbeit untersuchten Problem konvergiert nunmehr die Folge \bar{u}_n in T (auf \mathfrak{R}), außer höchstens in einer Menge von Punkten, die auf einem jeden Kurvenstücke der Klasse C in T (auf \mathfrak{R}) vom Maße Null ist, gegen eine stetige Funktion u . Für diese gilt $D_T(u) = d$.

Die Entwicklungen von *B. Levi* und *G. Fubini* lassen sich auf gewisse allgemeinere partielle Differentialgleichungen vom elliptischen Typus zweiter und höherer Ordnung übertragen.⁵³³)

Wir gehen nunmehr zur Besprechung der grundlegenden Untersuchungen von *H. Lebesgue* über, durch die das erste Randwertproblem in der Ebene für einfach, mehrfach und selbst unendlich-vielfach zusammenhängende Gebiete zum ersten Male vollständig erledigt wurde.⁵³⁴) Seine Methode dürfte auch im Raume zu einer vollständigen Lösung des ersten Randwertproblems führen. In der Ebene leistet übrigens das in der Nr. 39 besprochene Verfahren das gleiche. *Lebesgue* legt seinen Betrachtungen⁵³⁵) ein beliebiges beschränktes einfach, mehrfach oder unendlich vielfach zusammenhängendes Gebiet T in \mathfrak{E} zugrunde, das so beschaffen ist, daß jeder Punkt, um den sich in beliebiger Nähe Kurven der Klasse C beschreiben lassen, die ganz in T liegen, auch selbst T angehört⁵³⁶), und beweist vor allem den folgenden fruchtbaren Konvergenzsatz:

Es sei Φ eine auf S erklärte stetige Wertfolge; \bar{U}_n ($n = 1, 2, \dots$) sei eine unendliche Folge von Funktionen, die in $T + S$ stetig und

532) *G. Fubini*, Rend. del Circ. Mat. di Palermo a) 23 (1907), p. 58—84; b) 23 (1907), p. 300—301. Diesen Arbeiten sind einige kürzere Notizen vorausgegangen.

In der Arbeit, *Annali di Mat. pura ed applicata* (3) 14 (1908), p. 113—141 behandelt *Fubini* das zweite Randwertproblem (im Raume). Allgemeine Bemerkungen über die Variationsmethoden vgl. bei *G. Fubini*, *Annali di Mat. pura ed applicata* (3) 15 (1908), p. 121—129.

533) Vgl. *B. Levi*, loc. cit. 529) b) p. 390—394; *G. Fubini*, loc. cit. 532) a) p. 78—84.

534) Eine andere sich ebenfalls der Variationsmethoden bedienende Lösung, die mit der *Lebesgueschen* Berührungspunkte hat, hat später *R. Courant* gegeben (siehe weiter unten p. 345).

535) Ausführliche Darstellung a) Rend. del Circ. Mat. di Palermo 24 (1907), p. 371—402; in Einzelheiten abweichende kurze Darlegung b) C. R. 144 (1907) p. 316—318 sowie c) p. 622—623. Weitere Bemerkungen zu dem ersten Randwertproblem: d) C. R. 154 (1912), p. 335—337; e) C. R. 155 (1912), p. 699—701.

536) Gebiete, die Punkte zu Randkomponenten haben, werden also von der Betrachtung ausgeschlossen. Einschränkungen ähnlicher Art müßte man bei Behandlung des ersten Randwertproblems im Raume einführen.

monoton und auf S gleich Φ sind.⁵³⁷) Es wird ferner vorausgesetzt, daß \bar{U}_n in T stetige partielle Ableitungen erster Ordnung haben⁵³⁸) und so gewählt sind, daß für alle $n \dots$ (3) $D_T(\bar{U}_n) < H_0$ (H_0 konstant) ist. Alsdann läßt sich aus \bar{U}_n eine Teilfolge aussondern, die in $T + S$ (gegen eine stetige Funktion) gleichmäßig konvergiert.⁵³⁹)

Der Beweis wird indirekt geführt. Es wird mit *Hilbert* aus \bar{U}_n eine Folge extrahiert, die in allen rationalen Punkten von T konvergiert. Sollte diese Folge nicht in $T + S$ gleichmäßig konvergieren, so müßte, wie durch eine einfache Überlegung gezeigt wird, die Wertfolge $D_T(\bar{U}_n)$ ($n = 1, 2, \dots$) beliebig große Werte annehmen können.

Es sei jetzt $\varphi(x, y)$ eine in $T + S$ stetige Funktion, die in T stetige Ableitungen erster Ordnung hat und so beschaffen ist, daß das *Dirichletsche* Integral $D_T(\varphi)$ existiert. *Lebesgue* betrachtet die Gesamtheit (Ω) der in $T + S$ stetigen und monotonen Funktionen \bar{u}_n , die so beschaffen sind, daß, höchstens mit Ausnahme gewisser Nullmengen von Punkten und Linien, $D_1 \bar{u}_n$ sich in T stetig verhalten, auf $S \dots \bar{u}_n = \varphi$ ist und $D_T(\bar{u}_n)$ existiert.⁵⁴⁰) Es sei \bar{u}_n eine Folge aus (Ω), so daß $\lim_{n=\infty} D_T(\bar{u}_n)$ gleich der unteren Grenze der Werte $D_T(\bar{u})$ ist.

Aus \bar{u}_n läßt sich, dem vorhin besprochenen *Lebesgueschen* Hilfsatzes gemäß, eine gleichmäßig konvergierende Teilfolge u_n aussondern. Es sei $u = \lim_{n=\infty} u_n$. Aus einem zuvor bewiesenen Unitätssatze folgt, daß jede zu \bar{u} analoge Teilfolge aus (Ω) gegen u gleichmäßig konvergiert. Ersetzt man jetzt u_n in einer beliebigen Kreisfläche \mathfrak{K} in T durch diejenige in $\mathfrak{K} + \mathfrak{C}$ stetige, in \mathfrak{K} reguläre Potentialfunktion, die auf

537) Es sei $\Theta + \Sigma$ irgendein Bereich in $T(T + S)$. Eine in $T(T + S)$ stetige Funktion wird „in $T(T + S)$ monoton“ genannt, wenn ihre obere und untere Grenze in $\Theta + \Sigma$ stets den entsprechenden Werten auf Σ gleich sind. Eine in $T + S$ stetige, in T monotone Funktion ist in $T + S$ monoton. Offenbar ist für alle $n \dots |\bar{U}_n| < H_1$ (H_1 konstant).

538) Gewisse Mengen von Punkten oder Kurvenstücken können ausgenommen werden.

539) Ist für alle $n \dots |\bar{U}_n| < H_1$, ohne daß alle \bar{U}_n auf S dieselben Werte annehmen, so konvergiert auch jetzt noch eine Teilfolge in jedem Bereiche in T gleichmäßig. Die Voraussetzungen des Textes kann man nach *Lebesgue* auch dahin abändern, daß \bar{U}_n in $T + S$ stetig, jedoch nur in \bar{T}_n ($\lim_{n=\infty} \bar{T}_n = T$) monoton sind, wenn darüber hinaus angenommen wird, daß für alle $n \dots |\bar{U}_n| < H_1$ und auf $S \dots \bar{U}_n = \Phi$ ist, ohne daß an der Aussage des Textes sonst irgendetwas zu ändern wäre.

540) Daß die Menge (Ω) existiert, wird besonders bewiesen.

\mathfrak{E} gleich u_n ist, so überzeugt man sich leicht, daß u die Lösung des Randwertproblems darstellt.

Damit ist das erste Randwertproblem für die schlechthin allgemeinsten beschränkten Gebiete in \mathfrak{E} , die den vorhin erwähnten Bedingungen genügen, erledigt (vgl. Nr. 39).⁵⁴¹⁾ ⁵⁴²⁾ Ein ganz analoger Satz gilt voraussichtlich im Raume von drei oder mehr Dimensionen.

Ein besonders einfaches Verfahren zur Lösung des ersten Randwertproblems hat *S. Zaremba*⁵⁴³⁾ gegeben. Es sei T wie vorhin ein beschränktes Gebiet in \mathfrak{E} und φ eine auf S erklärte stetige Funktion, Es wird vorausgesetzt, daß es in $T + S$ stetige Funktionen \bar{u} gibt, die in T stetige partielle Ableitungen erster Ordnung haben, auf S mit φ übereinstimmen und so beschaffen sind, daß $D_T(\bar{u})$ existiert. Die Gesamtheit dieser Funktionen bildet die Menge (Ω) . Jedem Punkte (ξ, η) in T wird nun ein Wert ρ willkürlich, jedoch so zugeordnet, daß die Kreisfläche k_ρ vom Radius ρ um (ξ, η) ganz in T liegt. Setzt man

541) Der Übergang zu einer schlechthin stetigen Funktion φ sowie zu Gebieten, die den unendlich fernen Punkt enthalten, macht nicht die geringsten Schwierigkeiten (Nr. 16).

542) Es möge in T eine unendliche Folge von Gebieten \bar{T}_n , die der vorhin genannten Bedingung genügen und so beschaffen sind, daß jeder Punkt von T mindestens einem \bar{T}_n angehört, gegeben sein. Es wird vorausgesetzt, daß Randlinien S_n eine nirgends dichte Punktmenge bilden, die auf jedem Kreise in T , höchstens mit Ausnahme von abzählbar vielen, reduzierbar ist, sowie daß zwei beliebige Randlinien \bar{S}_k und \bar{S}_j nur endlich viele Punkte gemeinsam haben; diese gehören jedesmal auch nur jenen beiden Randlinien an. Es sei f eine in dem Bereiche $T + S$ stetige Funktion. Die Gebiete \bar{T}_n seien irgendwie so in eine Reihe \bar{T}_n geordnet, daß jedes \bar{T}_n unendlich oft vorkommt.

Es sei jetzt f_k ($k = 1, 2, \dots$) eine Folge in $T + S$ stetiger Funktionen, so daß $f_1 = f$ in $T - \bar{T}_1$, $\Delta f_1 = 0$ in \bar{T}_1 ; $f_2 = f_1$ in $T - \bar{T}_2$, $\Delta f_2 = 0$ in \bar{T}_2 usf. gilt. Die Folge f_k konvergiert in jedem Bereiche in T gleichmäßig gegen diejenige in $T + S$ stetige, in T reguläre Potentialfunktion, die auf S gleich f ist. Dieser Satz stellt eine weitgehende Verallgemeinerung des *Schwarzschen* alternierenden Verfahrens (Nr. 24a) dar. Er steht ferner, wie leicht ersichtlich, in naher Beziehung zu der *Poincaréschen* Méthode de balayage (Nr. 36). Vgl. *H. Lebesgue*, loc. cit. 535) a) p. 399—402. Das *Lebesguesche* Ergebnis enthält gewisse Resultate von *S. Zaremba*, loc. cit. 543) b) und c) und *R. Courant*, loc. cit. 556) p. 549—550 über das alternierende Verfahren und die Méthode de balayage. In dem besonderen Falle, wenn die Anzahl der Teilgebiete \bar{T}_k endlich ist, konvergiert die Folge f_k in $T + S$ gleichmäßig.

543) *S. Zaremba*, a) Atti del 4. Congr. Intern. dei Mat. 2 (1909), p. 194—199; b) Bull. de l'Acad. de Sc. de Cracovie 1909, p. 197—264; c) Acta mat. 34 (1911), p. 293—316. *Zaremba* nimmt T einfach oder mehrfach zusammenhängend und im *Jordanschen* Sinne quadrierbar an. Es genügen wohl die von *Lebesgue* eingeführten Voraussetzungen.

$$u_n(\xi, \eta) = \frac{1}{\pi \varrho^2} \int_{K_\varrho} \bar{u}_n(x, y) dx dy,$$

so konvergiert die Folge u_n in jedem Bereiche in T gleichmäßig gegen eine in T reguläre Potentialfunktion u . Es gilt $D_T(u) = d$. Der Beweis stützt sich auf die *B. Levische* Ungleichheit und den Hilfsatz: Ist F eine in T und auf S stetige, auf S verschwindende Funktion, die in T , außer auf einer abzählbaren Menge von Kreisen, die sich nur am Rande häufen können, stetige Ableitungen erster Ordnung hat, und ist $D_T(F)$ vorhanden, so ist $\int_T F^2 dx dy \leq L^2 D_T(F)$

unter L den Höchstwert des Abstandes zweier Punkte in $T + S$ (den Durchmesser des Bereiches $T + S$) verstanden. Gibt es in (Ω) eine Funktion w , so daß $D_T(w) = d$ gilt, so ist $u = w$. Des weiteren beweist *Zaremba*, daß, wenn h irgendeine in T reguläre Potentialfunktion bezeichnet, so daß $D_T(h)$ existiert, und f irgendeine Funktion aus (Ω) ist, $D_T(f, h) = D_T(u, h)$ gilt. Diese Beziehung ist als Ersatz für die Randbedingung gedacht. Daß u diese tatsächlich erfüllt, beweist *Zaremba* für gewisse spezielle Gebiete und zwar unter Zuhilfenahme einer Vergleichsfunktion, so beispielsweise im Raume in jedem Punkte des Randes, den man als Spitze eines Kreiskegels annehmen kann, der sonst ganz außerhalb T liegt.

Daß u auf S gleich φ ist, ließe sich wohl am bequemsten nach dem Verfahren von *R. Courant*, loc. cit.⁵⁵⁷), von der Beziehung $D_T(u) = d$ ausgehend, zeigen.

d) *Strömungspotential. Der Hilbertsche Ansatz. Konforme Abbildung auf ein Schlitzgebiet.* In einem bei Gelegenheit der Anwesenheit von *H. Poincaré* in der Göttinger Math. Gesellschaft gehaltenen Vortrage hat *Hilbert* sein Verfahren in einer modifizierten Gestalt auf die Bestimmung des Strömungspotentials angewandt und damit den Variationsmethoden einen neuen aussichtsreichen Weg gewiesen.⁵⁴⁴)

Es sei \mathfrak{X} ein beliebiges über der Ebene z ausgebreitetes endlich- oder unendlichvielblättriges Gebiet. Es sei $z_0 = x_0 + iy_0$ ein von einem Windungspunkte verschiedener Punkt in \mathfrak{X} und K^* das von einem Kreise C^* um z_0 von hinreichend kleinem Radius begrenzte beschränkte Gebiet. Als Strömungspotential wird diejenige in \mathfrak{X} , außer in z_0 , reguläre Potentialfunktion U bezeichnet, die sich in z_0 wie

$$(1) \quad \Re \left(\frac{1}{z - z_0} + (z - z_0) \mathfrak{P}(z - z_0) \right)$$

544) *D. Hilbert*, Gött. Nachr. 1909, p. 314—323.

verhält, wenn überdies $D_{\mathfrak{X}-K^*-C^*}(U) \leq D_{\mathfrak{X}-K^*-C^*}(U_0)$ ist, unter U_0 eine beliebige in \mathfrak{X} und auf C^* nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetige, auf C^* mit U übereinstimmende Funktion verstanden.⁵⁴⁵⁾

Die Bestimmung des Strömungspotentials läßt sich nach *Hilbert* auf die Lösung des folgenden Variationsproblems zurückführen. Es ist diejenige in \mathfrak{X} nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetige Funktion U zu bestimmen, die dem Doppelintegral

$$(2) \quad \int_{\mathfrak{X}} \left\{ \left(\frac{\partial U}{\partial x} - \alpha \right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial y} - \beta \right)^2 \right\} dx dy$$

den kleinsten Wert erteilt; α und β bezeichnen bestimmte, außerhalb eines gewissen beschränkten Gebietes der Klasse C um z_0 identisch verschwindende, in \mathfrak{X} nebst ihren partiellen Ableitungen erster Ordnung stetige Funktionen. Die Existenz der Lösung und damit des Strömungspotentials kann mit *Hilbert* in ähnlicher Weise wie in der Nr. 45 b diejenige eines *Abelschen* Integrals erster Art erschlossen werden.⁵⁴⁶⁾

Es sei $\mathfrak{X} = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$; es sei z_0 ein Punkt in T_1 und $U^{(n)}$ das zu T_n gehörige, in z_0 wie (1) unendliche Strömungspotential. In seiner Anfang 1910 erschienenen Dissertation beweist *R. Courant* den folgenden Satz:

Die Folge $U^{(n)}$ ($n = 1, 2, \dots$) ist in jedem z_0 nicht enthaltenden Bereiche in \mathfrak{X} gleichmäßig konvergent. Die Grenzfunktion ist das zu \mathfrak{X} gehörige Strömungspotential.⁵⁴⁷⁾ Der Beweis stützt sich wesentlich auf den folgenden wichtigen Hilfssatz:

Es sei $u(x, y)$ eine für alle (x, y) in der Kreisfläche $K(|z - z_0| < R)$ reguläre Potentialfunktion. Ist $D_K(u) < A^2$ (A konstant), so ist für alle (x, y) im Gebiete $K'(|z - z_0| < R' < R)$

545) Gilt $D_{\mathfrak{X}-K^*-C^*}(U) \leq D_{\mathfrak{X}-K^*-C^*}(U_0)$ für eine spezielle Kreisfläche K^* , so gilt sie für jedes beliebige Kreisgebiet um z_0 in K^* . Vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 478) p. 333 Fußnote 1).

546) Im engen Anschluß an *Hilbert* gibt *R. König* (Gött. Nachr. 1910, p. 130—132; Math. Ann. 71 (1911), p. 189—205) ein Verfahren zur konformen Abbildung der Oberfläche einer analytischen körperlichen Ecke auf ein ebenes Gebiet. (Vgl. Nr. 24 e die Fußnote 306.) Der reelle Teil der die fragliche Abbildung vermittelnden Funktion wird als die Lösung eines Variationsproblems, das dem im Text betrachteten analog ist, bestimmt. Durch eine besondere Überlegung wird sodann gezeigt, daß die konjugierte Lösung der Differentialgleichung $\Delta_1 u = 0$ sich auch noch in dem Eckpunkt stetig verhält.

547) *R. Courant*, a) Inaugural-Dissertation, Göttingen 1910, p. 1—44 [p. 26 bis 29]; b) Math. Ann. 71 (1912), p. 145—183 [p. 166—169].

$$(3) \quad \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 < A^2 C(R', R),$$

unter $C(R', R)$ eine nur von R' und R abhängige Funktion verstanden. Für alle $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ in K' ist

$$(4) \quad |u(x_1, y_1) - u(x_2, y_2)| < AC'(R', R).^{548)}$$

Die Funktionen $U^{(n)}$ denkt sich dabei *Courant* ganz wie vorhin U durch eine aus den Variationsmethoden resultierende Konstruktion bestimmt. Demgegenüber bestimmt *P. Koebe* (loc. cit.⁴⁷⁸) die approximierenden Strömungspotentiale als Lösungen einer Randwertaufgabe $\frac{\partial U^{(n)}}{\partial n} = 0$ (Nr. 24h) und gewinnt unter Benutzung des soeben betrachteten Hilfssatzes das gesuchte Strömungspotential durch die Grenzbeziehung $U = \lim_{n \rightarrow \infty} U^{(n)}$. (Man vergleiche die Betrachtungen der Nr. 42 sowie *P. Koebe*, loc. cit.⁴⁷⁸) passim.)

Eine mit der vorstehenden verwandte Auffassung vertritt *Koebe* in einer späteren Darstellung. (Journ. f. Math. 138 (1910), p. 192 bis 253 (p. 207—229). Durch kombinatorische Methoden wird diejenige in $T_n - K^* + S_n$ stetige, in $T_n - K^* - C^*$ reguläre Potentialfunktion U_n^* bestimmt, die auf C^* beliebige vorgeschriebene Werte annimmt und auf dem Rest der Begrenzung der Bedingung $\frac{\partial U_n^*}{\partial n} = 0$ genügt. In jedem Bereiche in $\mathfrak{X} - K^* - C^*$ ist die Folge U_n^* gleichmäßig konvergent. Es sei $U^* = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n^*$. Von U^* aus gelangt man zu dem Strömungspotential U durch gürtelförmige Verschmelzung.

Es sei V eine zu U konjugierte Potentialfunktion. Betrachten wir die durch $Z = U + iV$ vermittelte konforme Abbildung von \mathfrak{X} .

548) Vgl. *R. Courant*, loc. cit. 547) a) p. 23—26; b) p. 525—526 sowie *P. Koebe*, loc. cit. 478), p. 339—340; loc. cit. 507), p. 222—223). Dem fraglichen Hilfssatz gibt *Courant* noch die folgende allgemeinere Fassung: Es sei $\varphi(z)$ irgendeine in einem beschränkten Gebiete Θ (in \mathbb{C}) reguläre analytische Funktion. Ist der innere Flächeninhalt des durch $\varphi(z)$ vermittelten Bildgebietes $< \tau$, sind z_1 und z_2 zwei Punkte in Θ' , unter Θ' ein nebst seinem Rande in Θ enthaltenes Gebiet verstanden, so ist der Abstand (5) $|\varphi(z_1) - \varphi(z_2)| < \gamma \tau$, wobei γ einen nur von Θ und Θ' abhängenden Wert bezeichnet. Man vergleiche ferner *T. H. Gronwall*, *Annals of Math.* (2) 16 (1914), p. 72—76. *Gronwall* betrachtet die zu u gehörige, in K reguläre analytische Funktion $f(z)$ und findet, $R = 1$ gesetzt,

$$|f(z) - f(z_0)| \leq \sqrt{\frac{D_K(u)}{\pi}} \sqrt{\log \frac{1}{1 - |z|^2}}, \quad D_K(u) = \int_K |f'(z)|^2 dx dy$$

sowie

$$|f'(z)| \leq \sqrt{\frac{D_K(u)}{\pi}} \cdot \frac{1}{1 - |z|^2}.$$

In seiner vierten Mitteilung über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven zeigt *Koebe* vor allem, daß, wenn der Rand von \mathfrak{Z} ein Stück \mathfrak{S} einer Kurve der Klasse E enthält, U sich auf dieser stetig und, Ecken und Spitzen ausgenommen, regulär verhält. Auf einem jeden regulären Bogen von \mathfrak{S} ist ferner $\frac{\partial U}{\partial n} = 0$. In (isolierten) Randpunkten verhält sich U regulär.⁵⁴⁹⁾

Durch Vermittlung der Funktion $Z_n = U_n + iV_n$ wird T_n auf ein von einer endlichen Anzahl zur Achse des Reellen paralleler Strecken begrenztes, den unendlich fernen Punkt enthaltendes schlichtes Gebiet abgebildet (Nr. 24h). Aus $Z = \lim_{n=\infty} Z_n$ folgt, daß \mathfrak{Z} durch Vermittlung von Z auf ein Gebiet \mathfrak{P} abgebildet wird, daß die Ebene nirgends mehrfach bedeckt. Auf indirektem Wege wird nun, wie übrigens schon bei dem Beweise der zuletzt genannten Sätze, unter Benutzung der *Hilberts*chen Minimumseigenschaft, gezeigt, daß $\mathfrak{P} = \lim_{n=\infty} \mathfrak{P}_n$ und $\lim_{n=\infty} m_n = 0$ (Nr. 42 p. 318) ist, womit der Abbildungssatz bewiesen ist.⁵⁵⁰⁾ Die den Inhalt der Begrenzungsmannigfaltigkeit betreffende Eigenschaft der Abbildung (Nr. 42 p. 318) wird einmal unter Benutzung der Beziehung $U = \lim_{n=\infty} U_n$, das andere Mal aus der Minimumseigenschaft von U direkt abgeleitet.⁵⁵¹⁾

Während so die Haupteigenschaften der Funktion Z durch eine Verknüpfung verschiedener methodischer Gedanken erschlossen wurden, unternimmt es *Koebe*, im Anschluß an *Hilbert* an einer anderen Stelle⁵⁵²⁾, wie gleichzeitig mit ihm *Courant* (s. weiter unten), diese als eine Folge der fundamentalen *Hilberts*chen Minimumsbeziehung darzustellen. Dies hat *Koebe* allgemein, *Courant*, ohne Zurückgreifen auf die Beziehung $U = \lim_{n=\infty} U_n$, in dem besonderen Falle einfach und mehrfach zusammenhängender Gebiete durchgeführt. Wie schon erwähnt (Nr. 42), hat diesen Weg in dem besonderen Falle einfach und mehrfach zusammenhängender Gebiete bereits *D. Hilbert* in seiner Vorlesung über konforme Abbildung (Sommersemester 1909) eingeschlagen. *Koebe* schließt wie folgt:

549) *P. Koebe*, loc. cit. 478) p. 343—355. Die Beziehung $\frac{\partial U}{\partial n} = 0$ gilt übrigens auch noch, wenn \mathfrak{S} der Klasse B angehört. Vgl. hierzu auch *P. Koebe*, loc. cit. 507), p. 236—237.

550) *P. Koebe*, loc. cit. 478) p. 347—352.

551) Vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 486).

552) Vgl. *P. Koebe*, Gött. Nachr. 1910, p. 59—74 sowie loc. cit. 481) p. 238—242.

Es liege zunächst ein einfach zusammenhängendes Gebiet vor. Offenbar gibt es keine geschlossene oder beiderseits ins Unendliche mündende Linie $U = U^{(0)}$ ($U^{(0)} = \text{konstant}$), die z_0 nicht enthält. Sonst könnte bei einer geeigneten Wahl von K^* der Ausdruck $D_{\mathfrak{X}-K^*-C^*}(U)$ dadurch verkleinert werden, daß man U in einem Teile von \mathfrak{X} durch $U^{(0)}$ ersetzt. Aus gleichem Grunde muß $|U|$ in $\mathfrak{X} - K^* - C^*$ eine endliche obere Schranke haben, ferner müssen vielfache Punkte auf $U = U^{(0)}$ dort ausgeschlossen sein. Die Linien $U = U^{(0)}$ und $V = V^{(0)}$ ($V^{(0)}$ konstant) sind mithin in jedem Bereiche in \mathfrak{X} , der z_0 nicht enthält, regulär. Die ersteren verlaufen von z_0 entweder nach z_0 zurück oder nach dem Rande. Die Annahme, daß eine Linie $V = V^{(0)}$ einen z_0 nicht treffenden geschlossenen oder beiderseits ins Unendliche verlaufenden Zug bildet, führt, wie die Untersuchung einer geeigneten speziellen Variation zeigt, auf einen Widerspruch. Durch jeden Punkt in \mathfrak{X} geht eine und nur eine Linie $V = \text{Const.}$, die beiderseits in z_0 , oder einerseits in z_0 , anderseits in den Rand einmündet. Die Untersuchung einer speziellen Variation zeigt, daß die Annahme, es gebe mehr als zwei Linien $V = \text{Const.}$ der zuletzt genannten Art, widersinnig ist. Das Bild des Gebietes \mathfrak{X} ist demnach die von einer endlichen Strecke parallel zu der Achse des Reellen oder von einem Punkte begrenzte Ebene.

In ähnlicher Weise wird von *Koebe* der allgemeine Fall eines mehrfach oder unendlichvielfach zusammenhängenden schlichtartigen Gebietes behandelt. Mit *Hilbert* wird dabei aus den Variationsbeziehungen selbst erschlossen, daß V eindeutig ist, was bei einem einfach zusammenhängenden Gebiete selbstverständlich ist.

Wie bereits erwähnt, ist die Abbildungseigenschaft der Funktion $U + iV$ auch von *R. Courant* als direkte Folge der Minimumeigenschaft nachgewiesen worden.⁵⁵³⁾ *Courant* betrachtet zunächst ein beschränktes einfach zusammenhängendes Gebiet T in \mathfrak{E} und beweist unter Zuhilfenahme spezieller Variationen direkt, daß

$$(6) \quad |V(P_1) - V(P_2)| < g(\varepsilon), \quad \lim_{\varepsilon=0} g(\varepsilon) = 0$$

gilt, unter P_1 und P_2 zwei beliebige Punkte in T , deren Abstand von S kleiner ist als ε , verstanden. Da die Funktion V eindeutig und das Bildgebiet schlicht ist, so besteht dieses aus der gesamten von einer zu der Achse des Reellen parallelen Strecke begrenzten Ebene.⁵⁵⁴⁾ Bildet man dieses auf die Fläche des Einheitskreises ab, so gewinnt

553) *R. Courant*, loc. cit. 547).

554) Der Rand kann sich hier nicht auf einen Punkt reduzieren, da sonst die Funktion $z(Z)$ konstant sein würde.

man das *Osgoodsche* Resultat (Nr. 38). Den allgemeineren Fall eines beliebigen mehrfach zusammenhängenden schlichtartigen Gebietes erledigt *Courant* durch Betrachtung der Linien $U = \text{Const}$. Im Gegensatz zu *Koebe*, der bei diesen Betrachtungen eine Zurückführung ad absurdum bevorzugt, wird wie vorhin durch geeignete spezielle Variationen direkt gezeigt, daß V auf jeder Randkomponente konstant ist. Ist das Gebiet insbesondere einfach zusammenhängend, so gewinnt man den Abbildungssatz von *H. Poincaré* und *P. Koebe*. Den Fall eines unendlichvielfach zusammenhängenden Gebietes erledigt *Courant* in ähnlicher Weise unter Zuhilfenahme der Beziehung $\mathfrak{X} = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$. Die Ungleichheit (6) wird in geeigneter Weise auf die zu T_n gehörenden Potentiale $V^{(n)}$ angewendet. Durch einen Grenzübergang erhält man eine analoge Ungleichheit für V und damit den zu beweisenden Satz.⁵⁵⁵⁾

Es sei T ein den unendlich fernen Punkt enthaltendes Gebiet in \mathbb{C} , dessen sämtliche Randkomponenten aus Strecken bestehen, die der Achse des Reellen parallel sind. Jede einzelne Strecke kann sich auch auf einen Punkt reduzieren.

Zwei Gebiete dieser Art kann man, wenn sie von endlichem Zusammenhang sind, nur dann durch Vermittlung einer Funktion, die im Unendlichen sich wie

$$(*) \quad z_1(z) = z + \frac{1}{z} \Re \left(\frac{1}{z} \right)$$

verhält, aufeinander abbilden, wenn sie zusammenfallen ($z_1(z) = z$). Ein analoger Satz gilt, wie *Koebe* durch ein Beispiel zeigt, für unendlich vielfach zusammenhängende Gebiete nicht. (Vgl. *P. Koebe*, Gött. Nachr. 1918, vorgelegt am 17. 12. 1917). Dort wird ein von Strecken, die zu der Achse des Reellen parallel und in bezug auf diese symmetrisch sind sowie von gewissen Punkten auf der y -Achse begrenztes unendlich vielfach zusammenhängendes Gebiet T_1 durch Vermittlung einer sich im Unendlichen wie (*) verhaltender Funktion auf ein Gebiet T_2 abgebildet, dessen Berandung aus einer nicht abzählbaren Menge von Punkten auf der y -Achse besteht. Der Inhalt der beiden Begrenzungsmanifoldigkeiten S_1 und S_2 hat den Wert Null. Der lineare äußere Inhalt von S_2 ist von Null verschieden, derjenige der Projektion von S_1 auf die y -Achse ist gleich Null.

Aus der Gesamtheit der Schlitzgebiete hebt *Koebe* die Klasse der

555) Bei *P. Koebe*, loc. cit. 552) wird, wie bereits erwähnt, das Zurückgreifen auf die Beziehung $U + iV = \lim_{n \rightarrow \infty} (U_n + iV_n)$ auch in dem Falle eines unendlichvielfach zusammenhängenden Gebietes vermieden.

„minimalen“ Schlitzgebiete durch folgende Festsetzungen heraus. Es sei (\mathcal{C}) irgendein Gebiet der Klasse C , das S enthält. Das von Σ und S begrenzte Teilgebiet von T heie T^* . Es sei w irgendeine in jedem Bereiche in $T^* + \Sigma$ abteilungsweise analytische, auf Σ verschwindende Funktion, die berdies so beschaffen ist, da $D_{T^*} w$ existiert. Dann ist T ein minimales Schlitzgebiet, wenn

$$(**) \quad D_{T^*}(x + w) \geq D_{T^*}(x) = F^*$$

gilt, unter F^* den inneren Flcheninhalt von T^* verstanden. Ist T_n^* ($n = 1, 2, \dots$) eine Folge von Gebieten der Klasse C , die gegen T^* konvergieren, so lt sich die Bedingung (***) auf die Form bringen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{S_n^*} w dy = 0.$$

Zwei minimale Schlitzgebiete lassen sich aufeinander durch Vermittlung einer Funktion, die sich im Unendlichen wie (*) verhlt, nur dann abbilden, wenn sie zusammenfallen. Jedes Gebiet, das durch ein Strmungspotential entworfen wird, ist ein minimales Schlitzgebiet. Jedes Schlitzgebiet T hat die Eigenschaft, da seine Berandung den Inhalt Null hat. Diese Bedingung gengt indessen nicht, um ein minimales Schlitzgebiet zu charakterisieren. Eine hinreichende (und wahrscheinlich auch notwendige) Bedingung bildet die Forderung, da die Projektion von S auf die y -Achse berdies den linearen Inhalt Null haben soll. Das vorhin betrachtete Gebiet T_1 ist ein minimales Schlitzgebiet, das Gebiet T_2 ist es nicht.

In seiner 1912 erschienenen Habilitationsschrift hat *Courant* ein neues Verfahren zur Lsung der Randwertaufgaben der Potentialtheorie fr Gebiete allgemeiner Natur angegeben.⁵⁵⁶⁾ Es mge sich etwa um das erste Randwertproblem in einem von einer endlichen Anzahl Strecken parallel der x - oder der y -Achse begrenzten einfach zusammenhngenden Gebiete T in \mathfrak{C} handeln. Es sei K^* eine $T + S$ enthaltende Kreisflche, φ eine in K^* erklrte analytische und regulre Funktion. Die Menge (Ω) besteht aus allen Funktionen, die in $T + S$ stetig sind, auf S mit φ bereinstimmen und einer Reihe weiterer Bedingungen gengen, durch die insbesondere die Existenz von $D_T(\bar{u})$ gewhrleistet wird. Das Gebiet T wird nun in passender Weise in eine endliche Anzahl Rechteckgebiete zerlegt. Es sei jetzt \bar{u}_n ($n = 1, 2, \dots$) eine Minimalfolge. *Courant* ersetzt \bar{u}_n im Innern

556) Vgl. *R. Courant*, *Math. Ann.* 72 (1912), p. 517—550 (Voranzeige Gtt. Nachr. 1910, p. 154—160).

eines jeden Rechteckgebietes A durch diejenige in $A + L$ stetige, in A reguläre Potentialfunktion, die auf dem Rande L von A mit \bar{u}_n übereinstimmt. Aus der neuen „normierten“ Folge \bar{u}_n wird endlich durch einen Auswahlprozeß eine gegen die gesuchte Potentialfunktion konvergierende Minimalfolge extrahiert. Zu allgemeineren Gebieten gelangt man über eine Folge approximierender Gebiete durch einen geeigneten Grenzübergang.

Eine wesentlich vereinfachte Gestalt erhielt die vorstehende Methode in einer zwei Jahre später erschienenen Arbeit von *Courant*.⁵⁵⁷⁾ Es sei T irgendein beschränktes Gebiet in \mathfrak{E} und φ eine in T und auf S stetige Funktion, die im Innern von T abteilungsweise stetige partielle Ableitungen erster und zweiter Ordnung hat; die etwa vorhandenen Unstetigkeitslinien sind der x - oder der y -Achse parallel; das *Dirichletsche* Integral $D_T(\varphi)$ existiert. Das Gebiet T wird irgendwie in abzählbar unendlichviele Rechteckflächen A , deren Seiten den Koordinatenachsen parallel sind, zerlegt, so daß die Eckpunkte sich nur am Rande häufen. Die Menge (Ω) besteht aus der Gesamtheit der Funktionen, die in $T + S$ sich wie φ verhalten und auf S gleich φ sind. Ist \bar{u}_n ($n = 1, 2, \dots$) eine Minimalfolge, so wird wie vorhin zu einer normierten Folge übergegangen. Diese ist in jedem in einer Rechteckfläche A enthaltenen Bereiche gleichmäßig konvergent. Die einzelnen Grenzfunktionen schließen sich zu einer in T regulären Potentialfunktion u zusammen. Es ist $D_T(u) = d$. Nunmehr zeigt *Courant* durch Betrachtung des Integrals $D_T(u)$ auf direktem Wege, daß u in $T + S$ stetig ist und auf einer jeden Randkomponente, die aus mehr als einem Punkte besteht, den Wert φ annimmt. Damit ist das *Lebesguesche* Resultat (Nr. 45c) noch einmal gewonnen. Zugleich ergibt sich eine interessante Abschätzung für die Geschwindigkeit, mit der u gegen den Randwert konvergiert.⁵⁵⁸⁾

Wie das *Lebesguesche* Verfahren (Nr. 45c), so liefert auch die vorliegende Methode voraussichtlich die vollständige Lösung des ersten Randwertproblems für die allgemeinsten beschränkten Gebiete im Raume von drei und mehr Dimensionen. In ähnlicher Weise lassen sich Existenzsätze der *Riemannschen* Theorie algebraischer Funktionen sowie die Existenz des Strömungspotentials beweisen.⁵⁵⁹⁾

Wie *H. Weyl* gezeigt hat, läßt sich das Verfahren von *Zaremba*

557) *R. Courant*, Journ. f. Math. 144 (1914), p. 190–211.

558) *R. Courant*, loc. cit. 557) p. 203.

559) In der zuletzt betrachteten Abhandlung bedient sich dabei *Courant* des von *H. Weyl* angegebenen Ansatzes (s. weiter unten).

(Nr. 45c) auf die Bestimmung des Strömungspotentials anwenden.⁵⁶⁰⁾ Den Hilbertschen Ansatz ersetzt Weyl durch den folgenden einfacheren Ansatz:

Es sei K_0 eine schlichte Kreisfläche um z_0 vom Halbmesser α_0 ; ihr Rand heie C_0 . Es sei (Ω) die Gesamtheit der Funktionen \bar{u} , die in $K_0 + C_0$ und in jedem Bereiche in $\mathfrak{X} - K_0$ stetig sind, auf C_0 einen Sprung gleich (7) $\Phi = \frac{x - x_0}{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} + \frac{x - x_0}{\alpha_0^2}$ erleiden, in \mathfrak{X} stetige partielle Ableitungen erster Ordnung haben und berdies so beschaffen sind, da $D_{\mathfrak{X}}(\bar{u})$ existiert.

Unter den Funktionen \bar{u} ist nun diejenige zu bestimmen, die $D_{\mathfrak{X}}(\bar{u})$ den kleinsten Wert erteilt. Ist u diese Funktion, so ist

$$(8) \quad U = \begin{cases} u & \text{in } \mathfrak{X} - K_0, \\ u + \Phi & \text{in } K_0 \end{cases}$$

das in z_0 unendliche Strmungspotential.

Ein ganz analoger Ansatz fhrt zum Beweise der Riemannschen Existenzstze.

Wie O. Haupt gezeigt hat, lt sich in hnlicher Weise die Theorie der Prymschen Funktionen begrnden.⁵⁶¹⁾

Zum Schlu des Abschnittes ber Variationsmethoden sei der folgende krzlich von T. Carleman bewiesene Satz erwhnt. Unter allen unbegrenzten Zylinderkondensatoren, deren beide Randflchen vorgegebenen Inhalt des Normalschnittes haben, hat derjenige die kleinste Kapazitt, der aus zwei konzentrischen geraden Kreiszyllindern besteht. (Vgl. T. Carleman, Math. Zeitschrift 1 (1918), p. 208—212.)

46. Kontinuittmethode im Gebiete der konformen Abbildung. Es seien Ω' und Ω'' zwei Mengen zweidimensionaler Gebiete, die so beschaffen sind, da 1. ein beliebiges Gebiet T' aus Ω' auf ein und nur ein Gebiet der Menge Ω'' , etwa auf T'' , vorgegebenen Bedingungen gem konform abgebildet werden kann, 2. ein beliebiges Gebiet aus Ω'' , wenn berhaupt, dann hchstens auf ein Gebiet der Menge Ω' konform abgebildet werden kann. Hngen sowohl Ω' als auch Ω'' von p reellen Parametern stetig ab⁵⁶²⁾, so wird man erwarten, da die Aussage 2. sich zur Behauptung der Mglichkeit, ein beliebiges Gebiet aus Ω'' auf ein Gebiet der Mannigfaltigkeit Ω' konform abzu-

560) H. Weyl, Die Idee der Riemannschen Flche, Leipzig 1913, p. 78—107.

561) Siehe O. Haupt, Math. Ann. 77 (1915), p. 24—64 [p. 44—48 sowie p. 59—60]. Vgl. die Funote 316.)

562) Die Menge Ω' hngt von den Parametern stetig ab, heit nichts anderes, als da die Individuen von Ω' sich mit den Parametern stetig ndern.

bilden, wird steigern lassen. Diese im wesentlichen auf einer Abzählung der Konstanten beruhende heuristische Schlußweise bedarf natürlich in jedem Falle erst einer strengen Begründung.

Im allgemeinen wird sich, was vor allem in jedem besonderen Falle festgestellt werden muß, T'' mit T' stetig ändern. Da auch Ω' und Ω'' von ihren Parametern stetig abhängen, so wird man versuchen, von der Analogie zu der bekannten Eigenschaft stetiger Funktionen geleitet, zu zeigen, daß umgekehrt jedem beliebigen Gebiete T'' ein T' entspricht. Dieser Kernpunkt der ganzen Betrachtung wird, je nach der besonderen Natur von Ω' und Ω'' , auf verschiedenen Wegen zu erweisen sein.

Es mögen jetzt Ω' und Ω'' Gebiete sein.⁵⁶³⁾ Eine besondere Rolle wird, wie zunächst zu erwarten ist, ihrer Berandung zufallen, wobei in jedem besonderen Falle zu entscheiden ist, ob auch den Randpunkten bestimmte Individuen entsprechen oder nicht, somit ob man mit abgeschlossenen oder offenen Kontinuen in dem p -dimensionalen Raume R_p zu tun hat.

Auf Kontinuitätsbetrachtungen beruhende Beweisordnungen im Gebiete der konformen Abbildung sind bereits von *K. Weierstraß* und *H. A. Schwarz* (Nr. 25) angewandt worden.⁵⁶⁴⁾

Von der größten Bedeutung wurde die von *F. Klein* so benannte Kontinuitätsmethode jedoch erst, seitdem *F. Klein* und *H. Poincaré* diese zum Beweise der Fundamentaltheoreme der Uniformisierungstheorie algebraischer Funktionen herangezogen haben.⁵⁶⁵⁾ Der Grund-

563) Unter Ω' und Ω'' werden die als Gebiete vorausgesetzten Mengen der in Betracht kommenden Parameterwerte im Raume R_p von p Dimensionen verstanden.

564) Man vergleiche ferner die Betrachtungen von *L. Schläfli* und *E. Phragmén*, loc. cit. 341).

565) Vgl. das Referat über automorphe Funktionen und Modulfunktionen von *R. Fricke*, IIB 4 Nr. 37. Dort finden sich nähere Angaben über die Arbeiten von *L. E. J. Brouwer* und die ersten Arbeiten von *P. Koebe*. Siehe *L. E. J. Brouwer*, Gött. Nachr. 1912, p. 603—604; p. 803—806; *P. Koebe*, Gött. Nachr. 1912, p. 879—886. Man vergleiche ferner die Untersuchungen von *E. Ritter*, loc. cit. 315); *R. Fricke*, Automorphe Funktionen 2, p. 283—438; Verhandl. über automorphe Funktionen auf der Jahresvers. Deutsch. Naturforsch. u. Ärzte in Karlsruhe 1911 (Ber. d. Deutsch. Math. Ver. 21 (1912), p. 153—164) sowie die historischen und kritischen Bemerkungen bei *P. Koebe*, Math. Ann. 75 (1914), p. 42 bis 129 [p. 43—51]. Über weitere mit der Kontinuitätsmethode zusammenhängende Fragen der Theorie linearer Differentialgleichungen und automorpher Funktionen vergleiche das Referat IIB 5 von *E. Hilb*, namentlich Nr. 14 b und Nr. 17 [an der zuerst genannten Stelle finden sich Angaben über die einschlägigen Arbeiten von *L. Schlesinger*]; *F. Klein*, Ausgewählte Kapitel aus der Theorie der linearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung, II. Vorlesungen,

gedanke der von den beiden Autoren in Aussicht genommenen Methoden sowie der neuerdings von Erfolg gekrönten Untersuchungen von *L. E. J. Brouwer* und *P. Koebe* läßt sich mit *Koebe* bequem an der folgenden, auf *Poincaré* zurückgehenden Aufgabe erläutern.⁵⁶⁶⁾

Die Fläche des Einheitskreises $|Z| < 1$ soll derart auf die Fläche eines von vier Orthogonalkreisen des Einheitskreises $|\bar{z}| < 1$ gebildeten Vierseits Π konform abgebildet werden, daß den Spitzen $-1, -i, +1, \beta = e^{i\omega}$ ($0 < \omega < \pi$) die Punkte $-1, -i, +1, \alpha = e^{i\nu}$ ($0 < \nu < \pi$) entsprechen. Der Punkt α ist vorgegeben, β ist natürlich, falls die Abbildung sich überhaupt als möglich erweist, erst zu bestimmen.

Einem irgendwie vorgegebenen β ($0 < \omega < \pi$) entspricht gewiß ein und nur ein α ($0 < \nu < \pi$).

Man zeigt, daß α sich mit β stetig ändert, sowie daß zu einem α höchstens ein β gehört. Dem (offenen) Halbkreis $0 < \omega < \pi$ entspricht also ein (offener) Bogen des Halbkreises $0 < \nu < \pi$. Um zu zeigen, daß dieser den Halbkreis $0 < \nu < \pi$ ganz ausfüllt, womit das Problem gelöst sein wird, betrachtet *Poincaré* die beiden Grenzfälle $\beta = 1$ und $\beta = -1$, d. h. das spitzwinklige Dreieck mit den Ecken $-1, -i, +1$, denen offenbar $\alpha = 1$ und $\alpha = -1$ entspricht, und beweist, daß $\alpha(\beta)$ sich noch in den Endpunkten des Halbkreises $0 < \omega < \pi$ stetig verhält. Hier werden abgeschlossene Kontinuen der Betrachtung zugrunde gelegt. Bei der Anwendung auf das allgemeine Grenzkreistheorem⁵⁶⁷⁾ führt dieses Verfahren wegen der Notwendigkeit, den Rand der Polygonmännigfaltigkeit (Grenzpolygone) zu erforschen, auf beträchtliche Schwierigkeiten.

Im Gegensatz zu *H. Poincaré* sucht *F. Klein* aus dem Verhalten der Abbildung im Innern der beiden Männigfaltigkeiten allein zwingende Schlüsse zu ziehen (Methode der offenen Kontinuen⁵⁶⁸⁾). Diese Methode, welche von der von *Poincaré* als unentbehrlich hingestellten Erforschung des Randes von \mathcal{Q}' und \mathcal{Q}'' absieht, wurde erst in neuerer Zeit von *P. Koebe* völlig herausgearbeitet und im vollen Umfange zur

gehalten im Sommersemester 1891 (lith., nicht im Buchhandel); Über Lineare Differentialgleichungen der zweiten Ordnung, Göttingen 1894 (lith.); *E. Hilb*, Gött. Nachr. 1908, p. 231–235; 1909, p. 230–234; Math. Ann. 66 (1908), p. 215 bis 256; 68 (1910), p. 24–74; Schwarz Festschrift, 1904, p. 98–115.

566) Vgl. *H. Poincaré*, Acta Math. 4 (1884), p. 201–312; *L. Schlesinger*, Handbuch der Theorie der linearen Differentialgleichungen, Leipzig 1898, Bd. II 2, p. 255–258; *P. Koebe*, loc. cit. 565 d), p. 44–45.

567) Das übrigens von *H. Poincaré* allein betrachtet wurde.

568) *F. Klein*, Math. Ann. 21 (1883), p. 141–218. Die Andeutungen von *Klein* erstrecken sich auf alle von ihm aufgestellten Fundamentaltheoreme.

Durchführung gebracht. Als ein wesentliches Hilfsmittel benutzt *Koebe* den von ihm entdeckten Verzerrungssatz (Nr. 43, p. 321).⁵⁶⁹⁾ In dem vorhin betrachteten *Poincaréschen* Beispiele gestattet dieser Satz den Schluß, daß, wenn den in einem (offenen) Intervalle $0 < \nu_1 < \nu < \nu_2 < \pi$ enthaltenen Werten von ν überhaupt Werte von ω entsprechen, diese in einem gewissen (offenen) Intervalle $0 < \omega_1 < \omega < \omega_2 < \pi$ enthalten sein müssen. Hieraus folgt aber leicht, ohne daß man es nötig hat, die Randpunkte überhaupt zu betrachten, daß die Aufgabe eine (und nur eine) Lösung hat.

In der in der Fußnote 569) unter d) zitierten Arbeit gibt *Koebe* eine ausführliche Darstellung seiner Methode für alle *Kleinschen* Fundamentaltheoreme der Uniformisierungstheorie der algebraischen Flächen unter Voranstellung des bereits Nr. 43 betrachteten Problems der konformen Abbildung eines $2p$ -fach zusammenhängenden Gebietes Φ der Klasse C in \mathfrak{E} mit analytischer und regulärer Ränderzuordnung auf ein ebensolches Gebiet mit linearer Ränderzuordnung.⁵⁷⁰⁾

Die Hauptpunkte der *Koebeschen* Beweisführung sind: Jedes Individuum Φ der Menge \mathcal{Q}' aller $2p$ -fach zusammenhängenden Gebiete der Klasse C in \mathfrak{E} (mit analytischer und regulärer Ränderzuordnung) läßt sich durch eine stetige Änderung der Randkurven und der Begrenzungs substitutionen, ohne \mathcal{Q}' zu verlassen, in jedes beliebige andere Individuum der Menge \mathcal{Q}' überführen (Existenz einer „Überführungslinie“). Es sei φ dasjenige p -fach zusammenhängende Gebiet das aus Φ entsteht, wenn man jedes Paar zusammengehöriger Randkurven durch einen Querschnitt verbindet. Durch ein geeignetes *Abelsches* Integral erster Art wird φ auf ein gewisses p -fach zusammenhängendes mehrblättriges Gebiet Π abgebildet, das $(2p - 2)$ Win-

569) Vgl. *P. Koebe*, a) *Jahresb. d. Deutsch. Math.-Ver.* 21 (1912), p. 157—163; b) *Gött. Nachr.* 1912, p. 879—886; c) *Leipz. Ber.* 64 (1912), p. 59—62, wo das Wesen der Methode an dem besonders einfachen Beispiele der konformen Abbildung eines Rechteckes auf eine Halbebene auseinandergesetzt wird; d) *Math. Ann.* 75 (1914), p. 42—129; e) *Gött. Nachr.* 1916, vorgelegt am 9. 12. 1916; f) *Gött. Nachr.* 1917, vorgelegt am 7. 12. 1917; g) *Math. Zeitschrift* 2 (1918), p. 198—236; h) *Gött. Nachr.* 1917, vorgelegt am 26. 10. 1917. Hier wird ein Kontinuitätsbeweis für den Fundamentalsatz der Algebra geliefert.

570) Diese Aufgabe stellt eine besondere Einkleidung des Problems dar, eine algebraische Kurve nach Vorgabe eines Schnittsystems der zugehörigen *Riemannschen* Fläche durch automorphe Funktionen des *Schottkyschen* Typus zu uniformisieren („Rückkehrschnitttheorem“, vgl. *R. Fricke*, II B 4 Nr. 36). Die Grundgedanken der Methode finden sich in der loc. cit. 569) unter b) genannten Arbeit zusammengefaßt.

Der Einfachheit halber wird angenommen, daß alle Φ den unendlich fernen Punkt enthalten.

dungspunkte erster Ordnung hat. Von diesen liegt einer im Koordinatenursprung. Die Begrenzung von Π besteht aus p parallelogrammartigen Rahmen, deren je vier Seiten überkreuz durch p feste und p mit Φ veränderliche Substitutionen der Form $(z, z + \alpha)$ (α konstant) verbunden sind („Riemannsche Parallelogrammfigur“). Das Gebiet Π hängt in einer Umgebung der betrachteten Lage von Φ von $6p - 6$ reellen Parametern stetig ab und ändert sich mit Φ zugleich ebenfalls stetig.

Es sei Ψ ein „normiertes“ Gebiet der Art Φ , dessen Randkomponenten paarweise durch Substitutionen der Form

$$z' = \mu_1 z, \quad \frac{z' - a_k}{z' - b_k} = \mu_k \frac{z - a_k}{z - b_k} \quad (k = 2, \dots, p, a_2 = 1)$$

zusammenhängen (ein Individuum der Menge Ω'). Ist Θ die zu Ψ gehörige Riemannsche Parallelogrammfigur, so hängen deren Parameter von den $6p - 6$ reellen Parametern der Substitutionen in der Umgebung der betrachteten Lage stetig ab. Aus dem Unitätssatze (Nr. 43) wird geschlossen, daß die beiderseitigen Parameter einander umkehrbar eindeutig zugeordnet sind.

Aus dem fundamentalen, als Desideratum für den Kontinuitätsbeweis von R. Fricke auf dem 3. intern. Math.-Kongr. zu Heidelberg 1904 formulierten Satze von L. E. J. Brouwer über die Invarianz des Gebietes folgt nunmehr, daß einer allseitigen Umgebung von Ψ eine allseitige Umgebung von Θ entspricht.⁵⁷¹⁾

Es sei jetzt $\Phi_0 (= \Psi_0)$ ein Gebiet aus Ω'' . Wir denken uns dieses mit Φ durch eine Überführungslinie $\bar{\Omega}$ verbunden. Ist Φ^* ein Gebiet auf $\bar{\Omega}$, das auf ein Gebiet Ψ^* der Menge Ω' konform abgebildet werden kann, so haben alle Gebiete auf $\bar{\Omega}$ in einer Umgebung von Φ^* dieselbe Eigenschaft. Dies ergibt sich aus dem zuletzt betrachteten Satze durch einen Übergang von Ψ^* und Φ^* zu den zugehörigen (im wesentlichen identischen) Riemannschen Parallelogrammfiguren. Da $\Phi_0 = \Psi_0$ ist, so müßte es nunmehr, falls der zu beweisende Abbildungssatz nicht richtig sein sollte, auf $\bar{\Omega}$ ein Gebiet Φ geben, in dessen beliebiger Nähe auf $\bar{\Omega}$ Gebiete (in Ω') liegen, die auf geeignete Gebiete in Ω' abbildbar sind, während das gleiche für Φ selbst nicht gilt. Dieses ist indessen, wie unter wesentlicher Benutzung des Verzerrungssatzes gezeigt wird, nicht möglich. Damit ist der Beweis erbracht. Nachträglich wird gezeigt, daß auch zwei Individuen der Menge Ω' durch eine Überführungslinie in Ω' verbunden werden kön-

571) Koebe zeigt übrigens, daß sich mengentheoretische Betrachtungen an dieser Stelle umgehen lassen (loc. cit. 569 d) p. 82), indem er die von F. Klein postulierte analytische Abhängigkeit der Parameter nachweist.

nen, so daß auch \mathcal{Q}' ein Gebiet (in einem Raume von $6p - 6$ Dimensionen) darstellt.

An gleicher Stelle behandelt *Koebe* eingehend unter anderem das Hauptkreistheorem sowie die allgemeinen *Kleinschen* Fundamentaltheoreme (vgl. *R. Fricke*, II B 4 Nr. 36 und 37).⁵⁷²⁾ In der in der Fußnote 569) unter b) genannten Note skizziert *Koebe* einen auf Kontinuitätsbetrachtungen beruhenden Beweis einer Verallgemeinerung des Parallelschlitztheorems für mehrfach zusammenhängende Gebiete in \mathfrak{C} (Nr. 24h), dahingehend, daß jeder einzelne Schlitz nunmehr eine vorgegebene Richtung erhält.⁵⁷³⁾ Ausführliche Darlegung bringt die in der Fußnote 569) unter g) zitierte vor kurzem veröffentlichte Abhandlung von *Koebe*. Wesentliche Verallgemeinerungen des zuletzt genannten Abbildungssatzes finden sich in den in der Fußnote 569) unter e) und f) zitierten Arbeiten von *Koebe* angedeutet. Hier handelt es sich um die konforme Abbildung eines mehrfach zusammenhängenden Gebietes in \mathfrak{C} auf ein ebensolches Gebiet, wobei eine jede Randkomponente in ein gewisses sternförmiges (geradliniges oder spiralliniges), allgemeiner baumartig verästeltes Liniensystem übergeht. Man vergleiche ferner *P. Koebe*, Leipziger Berichte 1914, p. 67—75, wo (p. 73—74) ein Beweis für die Möglichkeit der konformen Abbildung einer geschlossenen schlichtartigen *Riemannschen* Fläche auf eine Kugel durch Kontinuitätsbetrachtungen (auf rein funktionentheoretischem Wege, unter Ausschaltung des Integralbegriffes) angegeben wird.^{573a)}

Einen auf Kontinuitätsbetrachtungen gegründeten Beweis des Satzes, daß jedes einfach zusammenhängende Polygonegebiet in \mathfrak{C} auf ein Kreisgebiet konform abgebildet werden kann, gibt *L. Bieberbach*⁵⁷⁴⁾ (Nr. 25).

Die Mannigfaltigkeit \mathcal{Q}' aller schlichten Polygonflächen, auf die eine Kreisfläche vom Halbmesser R um den Punkt $Z=0$ durch die Funktion

$$z(Z) = \int_0^{Z_1 \dots Z_n} \prod_k \left(1 - \frac{Z}{Z_k}\right)^{-2\lambda_k} dZ, \lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1, |Z_k| = R \quad (k=1, \dots, n),$$

572) *P. Koebe*, loc. cit. 569) d) p. 98—129.

573) Dieser Abbildungssatz läßt sich übrigens auch, worauf *Koebe* a. a. O. zum Schluß ebenfalls hinweist, durch kombinatorische Methoden (im allgemeinen Falle unter Heranziehung gewisser von *Prym* herrührenden Gedanken) erledigen.

573a) Aus der in der Fußnote 569) unter c) genannten Note von *Koebe* sei noch die Verallgemeinerung der Grenzkreisuniformierung zu dem Problem der konformen Abbildung einer beliebigen einfach oder mehrfach zusammenhängenden berandeten, oder auch einer geschlossenen *Riemannschen* Fläche auf ein konvexes Grenzkreis-polygon hervorgehoben, wobei jetzt die Winkelsummen der einzelnen Eckenzyklen nicht mehr wie im Uniformierungsfalle genaue Teile von 2π zu sein brauchen.

574) Vgl. *L. Bieberbach*, Gött. Nachr. 1913, p. 552—564; Rend. del Circolo Mat. di Palermo, 38 (1914), p. 98—112 [p. 102—104].

($Z_l - Z_k = 0$ nur für $l = k$) ($z(0) = 0, \frac{dz(0)}{dZ} = 1$) konform abgebildet wird (Formelpolygonflächen), hängt bei vorgegebenen Außenwinkeln $2\pi\lambda_1, \dots, 2\pi\lambda_n$ und variablem R von $(n + 1)$ reellen Parametern stetig ab. Von ebenso vielen reellen Parametern hängt die Menge Ω'' der nicht degenerierten Polygonflächen in \mathbb{C} , die $2\pi\lambda_1, \dots, 2\pi\lambda_n$ zu Außenwinkeln haben und $z = 0$ enthalten, stetig ab. Augenscheinlich sind Ω' und $\Omega'' \dots (n + 1)$ -dimensionale Gebiete und es gilt $\Omega' \leq \Omega''$. Sollte $\Omega' < \Omega''$ sein, so müßte Ω' in Ω'' mindestens einen Grenzpunkt haben. Diesem entspricht kein Formelpolygon, da die gegenteilige Annahme im Widerspruch mit dem *L. E. J. Brouwerschen* Satze von der Invarianz des Gebietes stehen würde. Wendet man jetzt den *Carathéodoryschen* Satz über Folgen beschränkter Gebiete mit von Null verschiedenem Kern (Nr. 47) an, so kommt man wieder zu einem Widerspruch. Offenbar steht auch dieser (den Verzerrungssatz nicht benutzende) Beweis auf dem Boden der Methode der offenen Kontinuen.

47. Funktionentheoretische Richtung. Es sei T ein einfach zusammenhängendes Gebiet der Klasse B in der Ebene z , das den Koordinatenursprung enthält. Die Bestimmung einer in T regulären, für $z = 0$ verschwindenden Funktion $Z(z)$, durch deren Vermittlung T auf die Fläche K des Einheitskreises C konform abgebildet werden kann, wird in der Potentialtheorie auf ein Randwertproblem zurückgeführt (Nr. 22).

In der neueren Zeit ist die Theorie der konformen Abbildung durch Methoden bereichert worden, die sich ausschließlich der funktionentheoretischen Hilfsmittel bedienen, so daß von einem Übergang durch ein Randwertproblem abgesehen werden kann.

Es ist vor allem einleuchtend, daß die Potentialtheorie in der Ebene sich ohne weiteres in die Funktionentheorie einordnen läßt. Die meisten Randwertaufgaben der Theorie des logarithmischen Potentials lassen sich auf die Bestimmung gewisser regulärer oder mit vorgeschriebenen Unstetigkeiten behafteter analytischer Funktionen, deren reeller und imaginärer Teil auf dem Rande des Definitionsbereiches vorgegebenen Bedingungen genügen, zurückführen.

Aus dem *Cauchyschen* Integralsatze folgt in der einfachsten Weise der *Gaußsche* Mittelwertsatz, aus diesem durch eine lineare Substitution, die eine vorgegebene Kreisfläche in sich selbst zurückführt, das *Poissonsche* Integral.⁵⁷⁵⁾

575) Einen anderen von *W. Blaschke* angegebenen Weg, der ebenfalls von dem *Cauchyschen* Integralsatze zu dem *Poissonschen* Integral führt, teilt *G. Pick*, *Math. Ann.* 77 (1915), p. 7—23 [p. 8—10] mit. Dort findet sich auch eine von *G. Pick* angegebene Verallgemeinerung des *Poissonschen* Integrals.

Von hier aus führt der Weg über die *Schwarzschen* Resultate zu den Ergebnissen von *Koebe*, ohne daß von den partiellen Ableitungen zweiter Ordnung und der Differentialgleichung $\Delta u = 0$ Gebrauch gemacht wird. Auch läßt sich, von dem *Cauchyschen* Integralsatze ausgehend, für $\Im\left(\frac{Z(z)}{z}\right)$ auf S ohne weiteres eine lineare Integralgleichung ableiten, die der bei der Behandlung des zweiten Randwertproblems in der klassischen Theorie (Nr. 17 d) auftretenden Integralgleichung adjungiert ist.⁵⁷⁶⁾

Neuerdings sind von *C. Carathéodory*, *P. Koebe* sowie *L. Bieberbach* Methoden ausgearbeitet worden, bei denen von den Ansätzen der Theorie der Randwertprobleme, selbst in einer funktionentheoretischen Einkleidung, kein Gebrauch gemacht wird.^{576a)} Das Gebiet T wird durch eine Folge von Gebieten T_n ($n = 1, 2, \dots$) approximiert, die durch spezielle elementare Funktionen (z. B. eine Folge von Quadratwurzeloperationen oder elliptische Funktionen) auf die Fläche des Einheitskreises konform abgebildet werden können. Zu $Z(z)$ wird sodann durch einen Grenzprozeß übergegangen. Die wesentlichen Hilfsmittel von *Carathéodory* sind der Satz von *P. Montel* (Nr. 41) und der *Cauchysche* Integralsatz. Demgegenüber bedient sich *Koebe* in strenger Durchführung der *Weierstraßschen* Ideen lediglich potenzreihentheoretischer Hilfsmittel unter gänzlicher Ausschaltung des Integralbegriffes.

Es sei T_n ($n = 1, 2, \dots$) eine Folge von Gebieten in \mathbb{C} , die sämtlich in einer Kreisfläche $|z| \leq M$ enthalten sind und den Punkt $z = 0$ enthalten. Gibt es keine Kreisfläche um $z = 0$, die von einem bestimmten n an in allen T_n enthalten ist, so sagen wir mit *C. Carathéodory*, der Kern der Gebietsfolge besteht aus dem einzigen Punkte $z = 0$. Andernfalls ist der Kern das größte $z = 0$ enthaltende Gebiet, das die Eigenschaft hat, daß jeder in ihm gelegene Bereich von einem bestimmten n an in allen T_n enthalten ist. Ist der Kern der Gebietsfolge T_n ($n = 1, 2, \dots$) zugleich Kern jeder Teilfolge T_{n_k} ($k = 1, 2, \dots$), so sagen wir, die Folge T_n konvergiert gegen ihren Kern. Es sei $z_n(Z)$ eine Funktion, durch deren Vermittlung T_n auf die Fläche des Einheitskreises in der Ebene Z konform abgebildet wird ($z_n(0) = 0$, $\frac{dz_n(0)}{dZ}$ reell und > 0).

576) Vgl. *L. Lichtenstein*, Arch. d. Math. u. Phys., 25 (1916), p. 179—180. Ist allgemeiner der Wert $\Re(\bar{Z}(z))$ einer in T regulären Funktion auf S vorgegeben, etwa gleich $\varphi(s)$, so erhält man, wenn z. B. $\varphi'(s)$ vorhanden und stetig ist, zur Bestimmung von $\Im(\bar{Z}(z))$ auf S eine lineare Integralgleichung.

576a) In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf die in der Nr. 35 besprochene Abhandlung von *H. A. Schwarz* hingewiesen.

Damit die Funktionen $z_n(Z)$ in jedem in dem Gebiete $|Z| < 1$ gelegenen Bereiche gleichmäßig konvergieren, ist notwendig und hinreichend, daß die Folge T_n gegen ihren Kern konvergiert. Durch Vermittlung der für $|Z| < 1$ regulären Funktion $z(Z) = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n(Z)$ wird der Kern T (sofern dieser > 0 ist) auf die Fläche des Einheitskreises konform abgebildet ($z(0) = 0, \frac{dz(0)}{dZ}$ reell und > 0).⁵⁷⁷⁾

Ein ganz analoger Abbildungssatz gilt, wenn die (einfach zusammenhängenden) Gebiete der Folge nicht mehr schlicht, sondern endlich oder unendlich vielblättrig sind, dabei nach wie vor einer Ungleichheit $|z| < M$ genügen.⁵⁷⁸⁾

Es sei $T + S$ irgendein einfach zusammenhängender Bereich in der Kreisfläche $|z| < 1$. Gelingt es, eine Folge von Gebieten T_n einfacher Natur anzugeben, die T zum Kern haben und gegen diesen konvergieren, so ist, wenn die Funktionen $z_n(Z)$ bekannt sind, die Möglichkeit der konformen Abbildung von T auf die Fläche des Einheitskreises bewiesen. *Carathéodory* bestimmt $z(Z)$ auf folgendem elementaren Wege. Es möge zunächst ein von T verschiedenes Gebiet T^* existieren, dessen Rand S enthält.⁵⁷⁹⁾ Es sei p_j ($j = 1, 2, \dots$) ($|p_j| < 1$) irgendeine Folge von Punkten in T^* , die sich gegen jeden Punkt von S häufen. Man kann eine Folge rationaler Funktionen $z_j(Z)$ explizite angeben, so daß: 1. durch Vermittlung von $z_j(Z)$ die Kreisfläche $|Z| < 1$ auf ein über der z -Ebene ausgebreitetes 2^j -blättriges Gebiet T_j , das in p_1, \dots, p_j Windungspunkte hat und von dem 2^j mal durchlaufenen Kreise $|z| = 1$ begrenzt ist, derart abgebildet wird, daß $z_j(0) = 0, \frac{dz_j(0)}{dZ}$ reell und > 0 ist; 2. die Gebiete T_j das Gebiet T zum Kern

577) *C. Carathéodory*, *Math. Ann.* 72 (1912), p. 107—144 [p. 120—126]. Der Beweis stützt sich auf gewisse aus dem *Schwarzschen Lemma* (Nr. 35) abgeleitete Ungleichheiten, dann aber vor allem auf den in der Nr. 41 angegebenen Satz von *P. Montel*. Der vorliegende Satz von *Carathéodory* berührt sich mit den Nr. 41 besprochenen Ergebnissen von *Koebe*, bei denen gleichfalls von dem *Montelschen Satze* Gebrauch gemacht wird. Man vergleiche hierzu ferner *P. Koebe*, loc. cit. 489 d) p. 68—77.

578) *C. Carathéodory*, loc. cit. 577) p. 126—131. Wie *L. Bieberbach*, *Gött. Nachr.* 1913, p. 552—564 gezeigt hat, kann man bei diesen Betrachtungen das *Schwarzsche Lemma* ganz entbehren und die Betrachtungen auf den *Montelschen Satz* allein stützen. Vgl. die Fußnote 632).

579) T läßt sich in diesem Falle sowohl durch Folgen ineinander geschachtelter Gebiete der Klasse C als auch durch Folgen von Gebieten derselben Natur, die alle T enthalten, beliebig annähern. Die fragliche Bedingung ist beispielsweise erfüllt, wenn T ein *Jordansches Gebiet* ist. Sie ist hingegen nicht erfüllt, wenn man z. B. für T eine längs eines Halbmessers aufgeschnittene Kreisfläche wählt.

haben und gegen diesen konvergieren. Die Funktion $z(Z)$ erscheint damit als die Grenzfunktion einer Folge rationaler Funktionen. Da jedes beschränkte einfach zusammenhängende Gebiet T in \mathfrak{E} als Kern einer Folge einfach zusammenhängender Gebiete der Klasse C aufgefaßt werden kann, die gegen T konvergieren, so ist nunmehr der *Osgoodsche* Satz (Nr. 38) auf einem neuen Wege bewiesen.

Von anderen Sätzen der *Carathéodoryschen* Arbeit sei an dieser Stelle der folgende erwähnt: Jede Punktmenge, die die vollständige Begrenzung eines beschränkten Gebietes in \mathfrak{E} ist und zugleich in der Begrenzung eines von diesem verschiedenen Gebietes in \mathfrak{E} enthalten ist (insbesondere jede *Jordansche* Kurve) liegt ganz im Innern von Streifen, die durch zwei Niveaulinien einer und derselben Potentialfunktion gebildet sind. Die Differenz der Werte der Potentialfunktion auf diesen beiden Niveaulinien kann beliebig klein gemacht werden.⁵⁸¹⁾

Durch die im vorstehenden geschilderten Untersuchungen von *Carathéodory* angeregt, hat *Koebe* eine von ihm als „Schmiegungsverfahren“ bezeichnete, überaus einfache Methode der konformen Abbildung angegeben.⁵⁸²⁾

Es sei zunächst T_1 ein beschränktes einfach zusammenhängendes Gebiet in \mathfrak{E} , das ohne wesentliche Einschränkung als in dem Gebiete $|z| < 1$ enthalten, vorausgesetzt werden kann.⁵⁸³⁾ Wir nehmen an, daß T_1 den Punkt $z = 0$ enthält. Es sei h_1 die Entfernung des Koordinatenursprunges von S_1 und p_1 ein Punkt auf S_1 , so daß $p_1 = h_1 e^{i\vartheta_1}$ gilt. Durch Vermittelung der Funktion $z(\bar{z}) = \bar{z} \frac{\bar{z} - q_1 e^{i\vartheta_1}}{q_1 \bar{z} - e^{i\vartheta_1}}$, $q_1 = \frac{2\sqrt{h_1}}{1 + h_1}$ wird das Gebiet $|\bar{z}| < 1$ auf ein über der Ebene z ausgebreitetes, be-

580) *C. Carathéodory*, loc. cit. 577) p. 139—143.

581) *C. Carathéodory*, loc. cit. 577) p. 143. Eine Verallgemeinerung des *Montelschen* Satzes führt in ähnlicher Weise zu einem neuen Beweise des *Poincaréschen* Satzes über die konforme Abbildung von Gebieten, die drei Punkte der Ebene unbedeckt lassen. (*C. Carathéodory*, loc. cit. 577) passim, insb. p. 132).

582) Vgl. *P. Koebe*, a) Voranzeige, *Gött. Nachr.* 1912, p. 844—848; ausführliche Darlegung b) *Journ. f. Math.* 145 (1914), p. 177—223; c) *Acta Math.* 40 (1915), p. 251—290. Weitere Abhandlungen derselben Serie: d) *Journ. f. Math.* 147 (1917), p. 67—104; e) *Acta math.* 41 (1918), p. 305—344; f) *Math. Zeitschrift* 2 (1918), p. 198—286. Es sei in diesem Zusammenhang auf *Poincaré*, loc. cit. 427) und *Schlesinger*, *Journ. f. Math.* 105 (1889); 110 (1892); *Annales de l'École Normale* 20 (1903) verwiesen. Vgl. das einschlägige Zitat bei *Koebe*, *Journ. f. Math.* 145 (1914), p. 177—223 (p. 179, Fußnote *).

583) Jedes einfach zusammenhängende Gebiet in \mathfrak{E} , dessen Begrenzung aus mehr als einem Punkte besteht, läßt sich durch elementare Funktionen auf ein Gebiet dieser Art abbilden (*P. Koebe*, loc. cit. 582), b) 182—183; *C. Carathéodory*, Schwarz Festschrift, Berlin 1914, p. 19—41 [p. 29—30]).

schränktes, zweiblättriges Gebiet abgebildet, das in p_1 einen Windungspunkt erster Ordnung hat und von dem doppelt umlaufenen Kreise $|z| = 1$ begrenzt ist. Durch Vermittlung eines geeigneten Zweiges der Funktion $\bar{z}(z)$ wird T_1 auf ein schlichtes Gebiet T_2 abgebildet, das den Nullpunkt enthält und offenbar ganz im Innern des Gebietes $|\bar{z}| < 1$ enthalten ist. Es gilt $\bar{z}(0) = 0$, $\frac{d\bar{z}(0)}{dz}$ reell und > 0 . Es sei h_2 die Entfernung des Koordinatenursprungs von S_2 und p_2 ein Punkt auf S_2 , so daß $p_2 = h_2 e^{i\vartheta_2}$ ist. Von T_2 gelangt man nach einer Wiederholung des Verfahrens zu T_3 , von T_3 zu T_4 , T_5 usw. Durch elementare Überlegungen (im wesentlichen durch Betrachtung geeigneter Greenscher Funktionen) beweist Koebe, daß $h_1 < h_2 < \dots$, $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 1$

ist, somit S_n sich immer näher dem Einheitskreise anschmiegt. Dieses Resultat läßt sich auch mit Carathéodory aus einer elementaren, auf Plemelj zurückgehenden Abschätzung gewinnen.⁵⁸⁴) Daß das Koebesche Verfahren zur Abbildung von T_1 auf K führt, ergibt sich jetzt aus dem folgenden, in dieser Fassung von Carathéodory formulierten Satze:

Es sei T ein beschränktes, einfach zusammenhängendes Gebiet in der Ebene z und $z_n(Z)$ ($n = 1, 2, \dots$) eine Folge von Funktionen, durch deren Vermittlung T auf eine Folge von Gebieten Θ_n in der Ebene Z abgebildet wird. Es wird vorausgesetzt, daß $z_n(0) = 0$, $\frac{dz_n(0)}{dZ}$ reell und > 0 ist, sowie daß Θ_n in der Kreisfläche $|Z| < 1$ enthalten ist und den Kreis vom Halbmesser δ_n um den Koordinatenursprung enthält. Endlich ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = 1$.

Alsdann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n(Z) = z(Z)$ vorhanden. Der Grenzübergang ist in jedem Bereiche $|Z| \leq \vartheta < 1$ gleichmäßig. Durch Vermittlung von $z(Z)$ wird T auf die Fläche des Einheitskreises konform abgebildet.⁵⁸⁵)⁵⁸⁶)

Eine andere Behandlung des Koebeschen Verfahrens hat L. Bieberbach angegeben.⁵⁸⁷)

584) C. Carathéodory, loc. cit. 583) p. 29—31.

585) C. Carathéodory, loc. cit. 583) c) p. 25—29.

586) Eine andere Beweisordnung des Schmiegeungsverfahrens unter Zuhilfenahme eines erweiterten Schwarzschen Lemmas findet sich bei P. Koebe, loc. cit. 582) c) p. 261—266 — hier unter Anwendung auch auf mehrfache und unendlichvielfach zusammenhängende schlichte Gebiete. A. a. O. wird auch der Fall vorgeschriebener relativer Verzweigung der Abbildungsfunktion behandelt. Vgl. p. 272—286.

587) Vgl. L. Bieberbach, Konforme Abbildung, p. 94—108. Wesentliche Dienste bei dem Konvergenzbeweise leisten hier die folgenden Hilfssätze: Es sei

Er gibt auch eine weitere Beweisordnung an, um auf funktionentheoretischem Wege ein beschränktes Gebiet T in \mathfrak{E} auf eine Kreisfläche konform abzubilden. Das Gebiet T wird als Grenze einer Folge ineinandergeschachtelter Polygonflächen T_n aufgefaßt. Es sei $Z_n(z)$ ($Z_n(0) = 0$, $\frac{d}{dz} Z_n(0)$ reell und > 0) eine Funktion, durch deren Vermittlung T_n auf K konform abgebildet wird. Durch elementare Betrachtungen unter Benutzung der in der Fußnote 587) genannten Hilfssätze wird gezeigt, daß $\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n(z)$ existiert und die erwünschte Abbildung vermittelt.⁵⁸⁸⁾

Es sei T ein beschränktes, einfach zusammenhängendes Gebiet in \mathfrak{E} , dessen Rand in dem Rande eines von T verschiedenen Gebietes in \mathfrak{E} enthalten ist. Die in der Fußnote 587) besprochenen Hilfssätze benutzt *Bieberbach*, um die Funktion $Z(z)$ ($Z(0) = 0$, $\frac{d}{dz} Z(0) = 1$),

$f(z) = a_1 z + a_2 z^2 + \dots$ eine in dem Bereiche $|z| \leq R$ reguläre nichtlineare Funktion. Der Flächeninhalt des durch $f(z)$ entworfenen Bildbereiches ist gleich

$\Phi = \int_K |f'(z)|^2 dx dy = \pi \sum_{n=1}^{\infty} n |a_n|^2 R^{2n}$. Er ist, sofern $a_1 \neq 0$ ist, sicher größer als $\pi |a_1|^2 R^2$. Ist aber $a_1 = \dots = a_{n-1} = 0$, so ist $\Phi \geq n \pi |a_n|^2 R^2$.

Ist der Inhalt des Bildbereiches höchstens um ε von πR^2 verschieden, ist ferner $|a_1| = 1$, so ist $|f(z) - z| < \sqrt{\frac{\varepsilon}{\pi}} \frac{1}{1 - \rho}$ (*L. Bieberbach*, Rend. del. Circolo Mat. di Palermo 38 (1914), p. 98—112 [p. 105]). Aus dieser, oder vielmehr einer hierzu analogen etwas allgemeineren Ungleichheit folgt insbesondere der Satz: Es sei $f_n(z)$ ($n = 1, 2, \dots$) eine Folge von Funktionen, die sich in der Kreisfläche $|z| < R$ regulär verhalten. Es sei $f_n(0) = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dz} f_n(0) = 1$. Die Inhalte der durch $f_n(z)$ entworfenen Bildbereiche mögen gegen πR^2 konvergieren. Alsdann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = z$. Der Grenzübergang ist in jedem in der Kreisfläche $|z| < R$ enthaltenen Bereiche gleichmäßig.

Ein Gegenstück zu dem eingangs betrachteten Hilfssätze bildet der folgende von *Bieberbach*, Berliner Sitzungsber. 38 (1916), p. 940—955 [p. 941—944], angegebene Satz: Es sei T ein einfach zusammenhängendes Gebiet in der Ebene z , das den unendlich fernen Punkt enthält. Es sei $z'(z)$ eine in T reguläre Funktion, die für $z = \infty$ eine Entwicklung von der Form $z' = z + \alpha_1 \frac{1}{z} + \dots$ gestattet und T auf ein schlichtes Gebiet T' abbildet. Der innere Inhalt des Gebietes $\mathfrak{E} - T' - S'$ erreicht seinen Höchstwert, wenn T' das Außengebiet eines Kreises ist. (Vgl. hierzu *G. Faber*, Münchener Ber. 1916, p. 39—42.)

Neue Sätze über die Grenzen der Flächenvergrößerung bei konformer Abbildung enthält die neueste Arbeit von *G. Hamel*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 29 (1918), p. 48—64.

588) Vgl. *L. Bieberbach*, a) Verh. d. Schw. Naturforsch. Ges., 96. Jahresvers. (1913), 2. Teil, p. 131—132; b) Rend. del. Circ. Mat. di Palermo 38 (1914), p. 98—112 [p. 100—104]. Die funktionentheoretische Bestimmung der Funktionen $Z_n(z)$ (nach der Kontinuitätsmethode) vergleiche Nr. 46.

durch deren Vermittlung T auf ein Kreisgebiet um den Koordinatenursprung konform abgebildet wird und deren Existenz bereits feststeht, durch Polynome anzunähern. Unter allen Polynomen der Form $P(z) = z + \sum_k^{2 \dots n} a_k z^k$ wird dasjenige $P_n(z)$ bestimmt, das den Ausdruck $\int_T |P'|^2 dx dy$ zum Minimum macht. Die Folge $P_n(z)$ ($n = 1, 2, \dots$) konvergiert in jedem Bereiche in T gleichmäßig gegen $Z(z)$.⁵⁸⁹⁾

Nachdem durch die im vorstehenden besprochenen Untersuchungen das Problem der konformen Abbildung eines beschränkten schlichten Gebietes auf ein Kreisgebiet erledigt ist, gestattet ein von *C. Carathéodory* angegebenes Verfahren jedes einfach zusammenhängende Gebiet T in \mathfrak{E}_m auf funktionentheoretischem Wege auf die Fläche eines Kreises abzubilden.⁵⁹⁰⁾ Dasselbe leistet ein auf einer ganz anderen Grundlage beruhendes, um dieselbe Zeit bekanntgegebenes Verfahren von *Koebe*, das, worauf *Koebe* besonderen Wert legt, sich potenzreihentheoretisch begründen läßt.^{590*)}

Carathéodory löst zunächst die folgende spezielle Aufgabe. Es seien K_1 und K_2 zwei Kreisflächen, die in je zwei einfach zusammenhängende, etwa der Klasse D angehörende Gebiete T_{11}, T_{12} und T_{21}, T_{22} , deren Rand allemal einen Bogen des Kreises C_1 oder C_2 enthält, zerfallen. Die Endpunkte dieser Kreisbögen heißen P_1, Q_1 und P_2, Q_2 . Bekannt ist eine in T_{12} erklärte reguläre Funktion $z_2 = z_2(z_1)$, durch deren Vermittlung T_{12} auf T_{21} derart konform abgebildet wird, daß die Punkte P_1, P_2 einerseits, Q_1, Q_2 andererseits einander entsprechen. Hierdurch werden T_1 und T_2 (ideal) zu einem einzigen (einfach zusammenhängenden) Gebiete Θ zusammengeschlossen. Es handelt sich darum, Θ auf ein Kreisgebiet konform abzubilden, d. h. zwei entsprechend in K_1 und in K_2 erklärte reguläre Funktionen $Z_1(z_1), Z_2(z_2)$ zu bestimmen, so daß $Z_2(z_2(z_1)) = Z_1(z_1)$ gilt und die durch Z_1 und Z_2 entworfenen Bilder $T'_{11}, T'_{12} = T'_{21}, T'_{22}$ von $T_{11}, T_{12}, T_{21}, T_{22}$ so beschaffen sind, daß $T'_{11} + T'_{12} + T'_{22} = T'_{11} + T'_{21} + T'_{22}$ das Gebiet eines Kreises darstellt. Die Bestimmung der Funktionen Z_1 und Z_2 gelingt durch wiederholte Anwendung einer *Schwarz*schen Spiegelung und einer darauf folgenden Abbildung eines einfach zusammenhängenden schlichten Gebietes auf eine Kreisfläche.

Jedes einfach zusammenhängende Gebiet T in \mathfrak{E}_m kann man,

589) *L. Bieberbach*, loc. cit. 588), p. 107—112.

590) *C. Carathéodory*, loc. cit. 583), p. 32—37 [Nr. 24.]. Eine Darstellung findet sich bei *L. Bieberbach*, Konforme Abbildung, p. 120—126 sowie bei *P. Koebe*, loc. cit. 582 d)), p. 75—77.

590*) Vgl. *P. Koebe*, Leipziger Ber. 1914, p. 67—75.

wie man leicht sieht, in eine endliche Anzahl miteinander ideal zusammenhängender Kreisflächen in \mathfrak{G} umwandeln. Durch sukzessives Verschmelzen dieser gelangt man zu der gewünschten Abbildung von T auf das Gebiet eines Einheitskreises. Die schrittweise Erweiterung des abgebildeten Gebietes muß man natürlich so vornehmen, daß man stets ein einfach zusammenhängendes Gebiet vor sich hat.

Jedes berandete schlichtartige Gebiet in \mathfrak{G}_m kann nunmehr auf ein schlichtes Gebiet abgebildet werden. Die in der Nr. 41 besprochenen Entwicklungen von *P. Koebe* führen von hier aus auf einem rein funktionentheoretischen Wege zur Abbildung eines beliebigen (nicht geschlossenen) schlichtartigen Gebietes auf ein schlichtes Gebiet, insbesondere zu dem *Poincaré-Koebeschen* Satze und der Abbildung einer mit p Rückkehrschnitten versehenen *Riemannschen* Fläche \mathfrak{R} vom Range $p \geq 1$ auf ein $2p$ -fach zusammenhängendes schlichtes Gebiet \bar{T} mit linearer Ränderzuordnung (Nr. 43). Der Quotient zweier zu \bar{T} gehörigen *Poincaré*-schen Θ -Reihen gleicher Dimension führt auf \mathfrak{R} verpflanzt zu einer zu \mathfrak{R} gehörigen algebraischen Funktion, womit die *Riemannsche* Theorie algebraischer Funktionen auf funktionentheoretischem Wege begründet wird.⁵⁹¹⁾

In einer dritten Abhandlung zur Theorie der konformen Abbildung (loc. cit. 582) d) gibt *Koebe* unter Zugrundelegung einer ideal zusammenhängenden *Riemannschen* Mannigfaltigkeit u. a. eine Bearbeitung seiner in der Nr. 40b besprochenen Untersuchungen über die konforme Abbildung einfach zusammenhängender Gebiete, diesmal unter Ausschaltung des Integralbegriffs. *Koebe* erklärt (vgl. auch *P. Koebe*, loc. cit. 457) sowie *Annali di Matematica* (3) 21 (1913) S. 57—64; *H. Weyl*, Die Idee der *Riemannschen* Fläche, passim); eine „*Riemannsche* Mannigfaltigkeit“ (bei *Weyl* „Fläche“) als den Inbegriff \mathfrak{X}^* einer endlichen oder abzählbar unendlichen Anzahl von Elementarbereichen D_l ($l = 1, 2, \dots$) in \mathfrak{G} oder auf Flächen der Klasse C , die von je drei analytischen und regulären Kurvenstücken begrenzt sind, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Gewisse Kantenpaare hängen durch analytische und reguläre Substitutionen gegensinnig miteinander zusammen. 2. Betrachten wir alle Kanten, die einen Eckpunkt gemeinsam haben. Es muß möglich sein, die beteiligten, per definitionem „die vollständige Umgebung

⁵⁹¹⁾ Vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 582) a), p. 847—848; c) p. 287—290. Eine wesentlich andere, ebenfalls funktionentheoretische Begründung mit Hilfe der Theorie linearer Integralgleichungen gibt *J. Plemelj*, *Monatsh. f. Math. u. Phys.* 19 (1908), p. 211—246 [p. 244—245]. Ältere Literatur (*Thomae*, *Schlesinger*) findet sich bei *Koebe* loc. cit. 582) c) p. 255, Fußnote 1) angegeben.

jener Ecke bildenden“ Elementarbereiche D_{n_1}, \dots, D_{n_k} allemal derart auf gewisse Dreiecksbereiche $\Delta_{n_1}, \dots, \Delta_{n_k}$ konform abzubilden, daß einander paarweise entsprechende Punkte der Kanten von D_{n_1}, \dots, D_{n_k} in ebensolche Punktepaare der Kanten von $\Delta_{n_1}, \dots, \Delta_{n_k}$ übergehen und $\Delta_{n_1}, \dots, \Delta_{n_k}$ in richtiger Reihenfolge aneinander gereiht, die vollständige Umgebung eines Punktes ergeben („Eckpunktsbedingung“). 3. Durch die eingangs erörterte Zuordnung der Kanten wird \mathfrak{X}^* zu einem (ideal zusammenhängenden) Gebiet. Ist die Anzahl der Elementarbereiche endlich, so ist das Gebiet \mathfrak{X}^* geschlossen (vgl. Nr. 4, insbes. die Fußnote 43). Jedes analytische Gebilde ist eine „Riemannsche Mannigfaltigkeit“ kann („trianguliert“ werden). (Siehe H. Weyl, Die Idee der Riemannschen Fläche, p. 30—34.)

Im Gegensatz zu den früheren Darstellungen betrachtet Koebe jetzt auch geschlossene Gebiete. Es sei \mathfrak{R} eine schlichtartige geschlossene Riemannsche Fläche (allgemeiner, ideal zusammenhängende „Riemannsche Mannigfaltigkeit“). Man denke sich aus \mathfrak{R} einen Punkt entfernt und das entstandene berandete Gebiet T als Grenze einer Folge ineinander geschachtelter Gebiete, etwa der Klasse $C: T_1 < T_2 < \dots$ dargestellt. Es sei z_0 ein Punkt in T_1 und $Z^{(n)}(z)$ diejenige in T_n , außer in z_0 , reguläre Funktion

$$Z^{(n)}(z) = \frac{1}{z - z_0} + (z - z_0) \mathfrak{P}^{(n)}(z - z_0),$$

durch deren Vermittelung T_n auf das Außengebiet eines Kreises in der Ebene Z konform abgebildet wird. Die Folge $Z^{(n)}(z)$ ($n = 1, 2, \dots$) konvergiert, wie unter wesentlicher Benutzung des Schwarzschen Lemmas gezeigt wird, gegen eine Funktion $Z(z)$, durch deren Vermittelung \mathfrak{R} auf die geschlossene Ebene der Variablen Z konform abgebildet wird. (Eine andere funktionentheoretische Behandlung des gleichen Problems — auch hier unter Ausschaltung des Integralbegriffs — findet sich bei P. Koebe, Leipziger Berichte 1914, p. 67—75 (p. 73 bis 74).)

In derselben Abhandlung (p. 95—103) gibt Koebe ein ohne Benutzung des Integralbegriffes durchgeführtes Verfahren zur konformen Abbildung der Oberfläche einer analytischen körperlichen Ecke auf ein schlichtes Gebiet an. Es wird angenommen, daß die einzelnen an der Bildung der Ecke beteiligten Flächenstücke sich über den Eckpunkt hinaus analytisch fortsetzen lassen, daß die von den Normalen an je zwei Nachbarflächen in dem Eckpunkt eingeschlossenen Winkel von Null verschieden sind und die Summe der Flächenwinkel einen von Null verschiedenen Wert hat. Die Aufgabe wird zunächst auf das folgende neue Problem zurückgeführt: In der Ebene z ist ein von

zwei sich im Punkte $z = 0$ unter einem von Null verschiedenen Winkel schneidenden analytischen und regulären Kurvenstücken Σ_1 und Σ_2 und etwa einem Kreisbogen Σ_3 begrenztes Gebiet $\overline{\mathcal{O}_0}$ gegeben. Die Kurvenbögen Σ_1 und Σ_2 sind durch eine analytische und reguläre Transformation

$$z' = az + bz^2 + cz^3 + \dots \quad (|a| = 1)$$

umkehrbar eindeutig aufeinander bezogen. Der Bereich $\mathcal{O}_0 + \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3$ ist so auf eine vollständige Umgebung $\overline{\mathcal{O}}$ des Koordinatenursprunges in der Ebene \bar{z} stetig und, bis auf den Punkt $z = 0$, konform abzubilden, daß die Punkte $z = 0$ und $\bar{z} = 0$ einander entsprechen und den korrespondierenden Punkten Σ_1 und Σ_2 die gleichen Punkte in $\overline{\mathcal{O}}$ entsprechen.

Koebe betrachtet nun das aus \mathcal{O}_0 durch Übereinanderlagerung unendlich vieler Exemplare \mathcal{O}_k ($k = \dots - 2, -1, 0, 1, 2, \dots$) des gleichen Winkelraumes entstehende ideale einfach zusammenhängende Gebiet und bildet dieses auf eine ganze oder halbe Ebene einer Variablen ξ ab. Durch eine Substitution von der Form $Z = e^{\frac{2\pi i}{c} \xi}$ oder $Z = \xi^{\log c}$ wird erreicht, daß \mathcal{O}_0 auf ein von zwei konzentrischen Kreisen, die sich, allgemein zu reden, auch auf Punkte reduzieren können, begrenztes Gebiet Π derart abgebildet wird, daß den zusammengehörigen Punkten von Σ_1 und Σ_2 dieselben Punkte in Π entsprechen. Der äußere Begrenzungskreis ist von einem Punkte verschieden. Sonst wäre $\frac{1}{Z}$ als Funktion von z betrachtet, wie man sich leicht überzeugt, eine Konstante. Daß im Gegensatz hierzu der innere Begrenzungskreis sich auf einen Punkt reduziert, wird durch besondere Überlegungen bewiesen.

Wie *Koebe* bemerkt, bleibt seine Methode anwendbar, auch wenn man allgemeiner $0 < |a| \neq 1$ voraussetzt.

Durch die im vorstehenden skizzierten Betrachtungen wird bewiesen, daß die „Eckpunktsbedingung“ eine Folge der übrigen Bedingungen ist.

Wie *Koebe* zeigt, kann man mit Hilfe des Schmiegungsverfahrens: 1. die zu einem beliebigen mehrfach zusammenhängenden schlichten Gebiete T gehörige einfach zusammenhängende Überlagerungsfläche auf ein Kreisgebiet konform abbilden⁵⁹²), 2. die konforme Abbildung

592) *P. Koebe*, loc. cit. 582) c). Die Lösung des ersten Randwertproblems läßt sich damit, wie leicht ersichtlich, auf das *Poissonsche* Integral zurückführen. (vgl. die Fußnote 160). A. a. O. werden noch gewisse andere nicht umkehrbar eindeutige konforme Zuordnungen mehrfach zusammenhängender, insbesondere „punktierter“ Gebiete auf eine Kreisfläche erledigt. Man vgl. hierzu *F. Schottky*, Berl. Sitzungsber. (1907), p. 919–923; (1908), p. 119–128.

eines beliebigen zweifach zusammenhängenden Gebietes auf ein Kreisringgebiet durchführen. (Vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 582 b) p. 195—205.)

In einer vierten vor kurzem erschienenen Abhandlung zur Theorie der konformen Abbildung (loc. cit. 582 e) führt *Koebe* auf funktionentheoretischem Wege (unter Ausschaltung des Integralbegriffs) eine Reihe spezieller Abbildungen mehrfach zusammenhängender schlichter Gebiete, die man ohne Einschränkung der Allgemeinheit von der Klasse C annehmen kann, durch. Es handelt sich um die Abbildung auf Normalgebiete, deren Rand aus einer Anzahl geradliniger, konzentrischer kreisförmiger oder auch gewisser spiralförmiger Schlitze besteht und überdies einen oder zwei mit den Kreisschlitzen konzentrische Kreise enthalten kann. Die geradlinigen Schlitze sind nach dem Kreismittelpunkt (Koordinatenursprung) gerichtet oder den Koordinatenachsen parallel. Sie können insbesondere den Koordinatenursprung oder den unendlich fernen Punkt oder beide zugleich enthalten. *Koebe* behandelt 39 verschiedene Arten von Normalgebieten. Die Abbildung auf ein jedes Normalgebiet vorgeschriebenen Typus ist im wesentlichen nur in einer Weise möglich. Sie wird wie folgt gewonnen. Das gegebene Gebiet T (oder ein aus T durch Hinzunahme seiner Rückseite in gewisser Weise entstehende Gebiet \tilde{T}) in der Ebene z wird, wie soeben auseinandergesetzt wurde, in unendlich-eindeutiger Weise auf die obere Halbebene in einer Ebene ξ abgebildet. Dem Gebiet T entspricht dabei umkehrbar eindeutig ein gewisser von Abschnitten der Achse des Reellen und Halbkreisen begrenzter Fundamentalebenebereich in der Ebene ξ . Es sei $f(z) = \varphi(\xi)$ eine die gesuchte Abbildung vermittelnde Funktion. Die Funktion $\varphi(\xi)$ wird unter Zuhilfenahme von unendlichen Reihen gewonnen, die den von *H. Weber* (loc. cit. 404) und in allgemeinerer Weise von *F. Schottky*, Journ. f. Math. 101 (1887), p. 227—272, untersuchten Reihen analog sind.

Eine von den bisher betrachteten verschiedene, rein potenzreihen-theoretisch begründete Beweisführung für die in den Nr. 41 und 42 besprochenen Sätze skizziert *Koebe* in der mehrfach erwähnten Note, Zur Theorie der konformen Abbildung und der Uniformisierung, Leipziger Berichte 1914, p. 67—75. Insbesondere gelingt es *Koebe* auf diesem Wege (ohne Benutzung der *Hilberts*chen Minimumeigenschaft) die Möglichkeit der Abbildung jedes einfach oder mehrfach zusammenhängenden schlichtartigen Gebietes auf ein Schlitzgebiet zu beweisen.

Sei T ein beschränktes, zweifach zusammenhängendes Gebiet etwa der Klasse C in \mathbb{C} , das außen von einem Kreise um den Koordinatenursprung vom Radius R_a begrenzt ist. Es sei r_g der größte, r_k der kleinste Wert der Entfernung des Koordinatenursprungs von den Punkten

der inneren Randkomponente von T und r_a und r_j , die Radien der Begrenzungskreise eines Kreisringgebietes, auf das T konform abgebildet werden kann. Es gilt

$$\frac{R_a}{r_j} \leq \frac{r_a}{r_j} \leq \frac{R_a}{r_k}.$$

Diese Ungleichheit, die in der Theorie der zweifach zusammenhängenden Gebiete in \mathfrak{C} dieselbe Rolle spielt, wie das *Schwarzsche Lemma* in der Theorie der einfach zusammenhängenden Gebiete, ist von *C. Carathéodory* in seiner im Sommersemester 1916 an der Göttinger Universität gehaltenen Vorlesung über konforme Abbildung angegeben und auf funktionentheoretischem Wege bewiesen worden. Sie gestattet, wie *Carathéodory* an gleicher Stelle gezeigt hat, eine einfache funktionentheoretische Erledigung der konformen Abbildung einer geschlossenen schlichtartigen *Riemannsches Fläche* \mathfrak{R} auf eine Kugel.^{592^a)}

Eine Beweisordnung des Nr. 40 besprochenen Uniformisierungstheorems den Prinzipien der *Weierstraßschen* Funktionentheorie gemäß, gibt in einer vor kurzem erschienenen Arbeit *L. Bieberbach*.^{592^b)} Seine Betrachtungen erstrecken sich, wie diejenigen der zuletzt be-

592^a) Es sei wieder T das Gebiet, das entsteht, wenn aus \mathfrak{R} ein (von den Verzweigungspunkten verschiedener) im Endlichen gelegener Punkt P entfernt wird. Es sei \mathfrak{R}_n das Gebiet eines Kreises um P vom Halbmesser $k_n = \frac{\mathfrak{R}}{2^n}$ ($\mathfrak{R} > 0$) und es sei $T_n = \mathfrak{R} - \mathfrak{R}_n - \mathfrak{C}_n$. Es gilt $T = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$. Man denke sich T_n durch Vermittlung einer Funktion $Z_n(z)$ auf ein Kreisgebiet K_n in der Ebene Z derart konform abgebildet, daß ein fester Punkt P_0 in T in den Koordinatenursprung fällt und das Vergrößerungsverhältnis in P_0 den Wert 1 hat. Ist ϱ_n der Radius von K_n , so gilt $\varrho_1 < \varrho_2 < \varrho_3 < \dots$. Daß (*) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\varrho_n} = 0$ ist, zeigt *Carathéodory* wie folgt. Es sei im Gegensatz zu (*) $\lim_{n \rightarrow \infty} \varrho_n = R$. Wir wählen einen Wert μ so groß,

daß etwa $\varrho_{\mu+1} > \frac{2}{3}R$ ausfällt und das durch die Funktion $Z_{\mu+1}(z)$ entworfene Bild S^* von \mathfrak{C}_μ auch noch außerhalb der Kreisfläche \bar{K} um den Koordinatenanfangspunkt mit dem Radius $\frac{2}{3}R$ liegt. Dies ist, wie sich durch geeignete Abschätzungen zeigen läßt, stets möglich. Bilden wir jetzt das von $C_{\mu+1}$ und S^* begrenzte beschränkte Gebiet auf ein Kreisringgebiet B konform ab, so muß der Modul von B nach dem vorhin erwähnten Satze kleiner als $\frac{R}{\frac{2}{3}R} = \frac{3}{2}$ sein.

Auf \mathfrak{R} entspricht jedoch B ein Kreisringgebiet mit den Radien $\frac{k}{2^\mu}$ und $\frac{k}{2^{\mu+1}}$, mithin dem Modul 2, was einen Widerspruch darstellt. Es ist demnach in der Tat $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\varrho_n} = 0$.

592^b) Vgl. *L. Bieberbach*, *Math. Ann.* 78 (1908), p. 312—331.

sprochenen *Koebeschen* Arbeit, auf beliebige „*Riemannsche* Mannigfaltigkeiten“, wobei besonderes Gewicht auf die Ausschaltung topologischer Betrachtungen gelegt wird. Der Beweis stützt sich auf die in der Fußnote 587) besprochenen Hilfssätze und das *Schwarzsche Lemma* und benutzt nicht die zum Verzerrungssatze führenden *Koebeschen* Hilfssätze. (Diese können übrigens in der einfachsten Weise aus dem in dem dritten Absatze der Fußnote 587) mitgeteilten *Bieberbachschen* Satze gefolgert werden. Vgl. z. B. *G. Faber*, loc. cit. 462.)^{592°)}

Neben dem *Carathéodoryschen* Verfahren der Kreisscheibenanhängung (erste Grundaufgabe), das hier die Form einer Anhängung von Elementarbereichen erhält, spielt der folgende Abbildungssatz (zweite Grundaufgabe) eine wesentliche Rolle: Aus einem Kreisgebiet K wird dadurch ein (ideal zusammenhängendes) Gebiet Θ gebildet, daß zwei in einem Punkte zusammenstoßende Kreisbögen aufeinander umkehrbar eindeutig, analytisch und regulär bezogen sind. Das Gebiet Θ kann auf eine punktierte Kreisfläche, oder doppelt punktierte Ebene (das letztere, wenn die beiden Bögen den Kreis ausfüllen) konform abgebildet werden. Zum Beweise wird die zu Θ gehörige „Überlagerungsfläche“ $\Theta^* = \lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n$ durch geeignete Verbindung unendlichvieler kongruenter Exemplare von Θ (was ohne topologische Betrachtungen erfolgen kann), gebildet und der in der Fußnote 592°) angegebene Konvergenzsatz auf die Folge Θ_n ($n = 1, 2, \dots$) angewandt.

Liegt nun eine beliebige „*Riemannsche* Mannigfaltigkeit“ vor, so werden die einzelnen in unendlicher Anzahl von Exemplaren vorliegend

592°) Aus den in der Fußnote 587) besprochenen Hilfssätzen wird der folgende, bei allen weiteren Betrachtungen allein noch benutzte Konvergenzsatz abgeleitet, der sich mit entsprechenden Konvergenzsätzen von *Koebe* berührt. (Vgl. *P. Koebe*, loc. cit. 457), p. 206—207.) Es sei eine unendliche Folge schlichter, einfach zusammenhängender Gebiete T_n ($n = 1, 2, \dots$), die sämtlich den Nullpunkt enthalten, gegeben. Durch Vermittlung einer für $z = 0$ verschwindenden, in T_n regulären Funktion $f_n(z)$ ($n = 1, 2, \dots$) sei T_n auf T_{n+1} , oder ein Gebiet in T_{n+1} , durch Vermittlung einer weiteren regulären Funktion $Z_n(z)$ ($Z_n(0) = 0, \frac{dZ_n(0)}{dz} = 1$) auf die Kreisfläche $|Z| < R_n$ konform abgebildet. Ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{R_n}$ vorhanden (≥ 0), so ist die Folge Z_{n+p} ($p = 1, 2, \dots$), auf T_n verpflanzt, in jedem Bereiche in T_n gleichmäßig konvergent. Jeder Bereich in T_n , von dem die Funktionen der Folge $f_n, f_{n+1}(f_n), f_{n+2}(f_{n+1}(f_n)), \dots$ eine schlichte Abbildung liefern, wird durch die Grenzfunktion $Z(z)$ schlicht abgebildet. Für hinreichend hohe n enthält das von $Z(z)$ entworfene Bild von T_n jeden Bereich im Gebiet $\frac{1}{Z} > \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{R_n}$.

gedachten Elementarbereiche in geeigneter Reihenfolge miteinander verbunden und jedesmal die erste oder die zweite Grundaufgabe zur Anwendung gebracht. Der Konvergenzsatz (Fußnote 592^c) auf die sich hierbei ergebende Folge abbildender Funktionen angewandt, liefert den zu beweisenden Uniformisierungssatz.^{592^d)}

48. **Abbildung des Randes.**⁵⁹³⁾ a) *Besondere Klassen schlichter Gebiete.* Es sei T ein beschränktes einfach zusammenhängendes Gebiet in der Ebene der Variablen z , das den Koordinatenursprung enthält. Den Betrachtungen der Nr. 38 zufolge gibt es eine und nur eine Funktion $Z = Z(z)$ ($Z(0) = 0$, $\frac{dZ(0)}{dz}$ reell und > 0), durch deren Vermittelung T auf die Fläche des Einheitskreises K in der Ebene Z konform abgebildet werden kann. Man darf im allgemeinen nicht fordern, daß $Z(z)$ sich in $T + S$ stetig verhält, vielmehr ist dies eine Eigenschaft, die in jedem besonderen Falle entweder erfüllt ist oder nicht.⁵⁹⁴⁾ Sie gilt, wie wir bereits gesehen haben, in allen Gebieten der Klasse Q (Nr. 24c). Gehört T der Klasse B (oder auch nur Ah) an, so ist die Ableitung $\frac{dZ}{dz}$ in $T + S$ vorhanden und stetig und genügt einer H -Bedingung. Ferner ist in $T + S \dots \left| \frac{dZ}{dz} \right| > 0$. Nach *H. A. Schwarz* läßt sich $Z(z)$ über ein analytisches und reguläres Stück der Begrenzung analytisch fortsetzen (Nr. 22).^{594^a)}

In einer Ecke, deren Seiten (den Eckpunkt z_0 eingeschlossen) analytisch und regulär sind und einen Winkel $\alpha\pi > 0$ einschließen, ist

592^d) Weitere Literatur: *P. Montel*, C. R. 164 (1917), p. 879—881.

593) Es sei \mathfrak{X} ein über einer Ebene ausgebreitetes unendlichvielblättriges einfach zusammenhängendes Gebiet, das auf ein Kreisgebiet K konform abgebildet werden kann. Im allgemeinen kann bei \mathfrak{X} von einem Rande im *eigentlichen Sinne des Wortes* nicht die Rede sein (vgl. die Fußnote 41). Punktfolgen in K , die gegen C konvergieren, können in \mathfrak{X} Folgen von Punkten entsprechen, deren Häufungsstellen Mengen bilden, die nicht ohne weiteres als Kontinuen anzusprechen sind. (Vgl. *E. Study*, loc. cit. 148, p. 37—39.) Es empfiehlt sich darum, sich zunächst mit der Betrachtung beschränkter Gebiete in \mathfrak{C} zu begnügen (Beispiele für Eigentümlichkeiten, die solche Gebiete bieten können, finden sich z. B. bei *E. Study*, loc. cit. 148, p. 40—44). Eine Theorie der Gebiete der Art \mathfrak{X} vom Standpunkte der Analysis situs steht noch fast ganz aus. Erst wenn diese ins einzelne durchgearbeitet sein wird, wird die Frage der Abbildung des Randes eine konkrete Bedeutung gewinnen können.

594) *H. A. Schwarz* hat als erster ausdrücklich die konforme Abbildung (des Innern) eines einfach zusammenhängenden (konvexen) Gebietes auf die Fläche eines Einheitskreises betrachtet (Nr. 35). Daß die Abbildung, sofern sie überhaupt möglich ist, durch die obige Bedingung im wesentlichen vollständig bestimmt ist, hat *H. Poincaré* gezeigt. (Vgl. loc. cit. 427.)

594^a) Vgl. die Fußnoten 270) und 288).

$\frac{dZ}{dz} = (z - z_0)^{\frac{1}{\alpha} - 1} f(z)$ ($f(z)$ in z_0 stetig, $|f(z_0)| \neq 0$) (Nr. 23). Gehört T der Klasse A an, so entsprechen Kurvenstücken der Klasse A in T , die von einem Punkte P auf S ausgehen, ebensolche Kurven in der Ebene Z . Die Abbildung ist auch noch auf S winkeltreu. Gehört T der Klasse N an, so gilt die vorstehende Aussage, außer in den Ecken und Spitzen, ohne Änderung. In einem Eckpunkt P oder in einer nach innen gekehrten Spitze (der eingeschlossene Winkel $\alpha\pi > 0$) ist die Abbildung in der Bezeichnungsweise von C. Carathéodory „quasikonform“: der von zwei beliebigen in P^* einmündenden Kurven der Klasse A in T eingeschlossene Winkel wird bei der Abbildung mit dem Faktor $\frac{1}{\alpha}$ multipliziert.⁵⁹⁵⁾

b) *Allgemeine Theorie.* In seinem Enzyklopädie-Artikel über Funktionentheorie⁵⁹⁶⁾ spricht W. F. Osgood die Vermutung aus, bei der konformen Abbildung eines von einer Jordanschen Kurve S begrenzten Gebietes T in \mathfrak{E} auf eine Kreisfläche K dürfte der Bereich $T + S$ umkehrbar eindeutig und stetig auf $K + C$ bezogen sein. In einer im Jahre 1903 erschienenen Note⁵⁹⁷⁾ gibt weiter Osgood ohne nähere Begründung eine Reihe von Sätzen über das Verhalten der Abbildung am Rande eines beliebigen beschränkten, einfach zusammenhängenden Gebietes in \mathfrak{E} bekannt. Einen Beweis enthält die erst 1913 mit E. H. Taylor gemeinsam veröffentlichte Abhandlung „Conformal Transformations on the boundaries of their regions of definition“.⁵⁹⁸⁾ Wir werden auf diese weiter unten zu sprechen kommen. Kurz vorher erschienen zwei Arbeiten von C. Carathéodory, in denen gleichsam als Abschluß der in der Nr. 47 besprochenen Untersuchungen eine allgemeine Theorie beschränkter einfach zusammenhängender Gebiete ent-

595) Für konvexe Gebiete der Klasse A ist dieser Satz zuerst von P. Painlevé, loc. cit. 224) bewiesen worden. Man vergleiche ferner E. A. Hintikka, Über das Verhalten der Abbildungsfunktion auf dem Rande des Bereiches in der konformen Abbildung, Inaugural-Dissertation, Helsingfors 1912, p. 1—36. In dem Umfange des Textes ist der Beweis fast ohne jede Rechnung durch geometrische Betrachtungen von C. Carathéodory, loc. cit. 583), p. 38—41 geliefert worden. Nach einer Bemerkung von Carathéodory ist die Abbildung in einer Ecke auch dann noch quasikonform, wenn die Randkurve in dem Eckpunkte selbst zwei Tangenten hat, im übrigen aber eine beliebige Jordansche Kurve ist. Weitergehende Sätze gibt neuerdings W. Groß, Math. Zeitschrift 3 (1919).

596) W. F. Osgood, II B1 Nr. 19, p. 56 (abgeschlossen im August 1901).

597) W. F. Osgood, Bull. of the Amer. Math. Soc. 9 (1903).

598) W. F. Osgood and E. H. Taylor, Trans. of the Amer. Math. Soc. 14, Nr. 2, p. 277—298, April 1913.

wickelt wird.⁵⁹⁹⁾ Neben vielen anderen Resultaten werden hier alle *Osgoodschen* Sätze bewiesen. Eine eingehende Behandlung widmete ferner diesen und verwandten Fragen in einer um diese Zeit erschienenen Schrift über konforme Abbildung einfach zusammenhängender Gebiete *E. Study*.⁶⁰⁰⁾

Die *Carathéodorysche* Behandlungsweise der Begrenzung ist rein mengentheoretisch und von der Theorie der konformen Abbildung unabhängig.⁶⁰¹⁾ In der zweiten der in der Fußnote 599) zitierten Arbeiten wird teils von den begrifflichen Definitionen aus, teils auf konstruktivem Wege die Theorie der Primenden (vgl. den Artikel von *L. Zoratti* und *A. Rosenthal* über die Punktmengen Nr. 13) entwickelt und in Wechselwirkung mit *E. Study* deren Einteilung in vier Arten durchgeführt; des weiteren werden die Fragen der Erreichbarkeit und Vielfachheit weit gefördert. Wir beschränken uns auf die Besprechung der wichtigsten Resultate über die Abbildung des Randes.

Sei T ein *Jordansches* Gebiet. Es sei z_k ($k = 1, 2, \dots$) eine Folge von Punkten in T , die gegen einen Punkt P auf S konvergieren. Die zugehörigen Punkte Z_k ($k = 1, 2, \dots$) der Ebene Z konvergieren gegen einen Punkt auf C . Dieses zeigt *Carathéodory* indirekt auf folgendem Wege.⁶⁰²⁾

Augenscheinlich können Z_k ($k = 1, 2, \dots$) keinen Häufungspunkt in K haben. Es mögen sich nun aus Z_k ($k = 1, 2, \dots$) zwei Teilfolgen aussondern lassen, die gegen zwei verschiedene Punkte Π_1 und Π_2 auf C konvergieren. Dem *Fatouschen* Satze 4. Nr. 13⁶⁰³⁾ zufolge läßt sich auf jedem der beiden von Π_1 und Π_2 begrenzten Kreisbogen gewiß je ein Punkt Π_3 und Π_4 angeben, so daß $z(Z)$ längs der Radien $O\Pi_3$ und $O\Pi_4$ gegen bestimmte voneinander und von P verschiedene Punkte P' und P'' konvergiert. Dem Linienzuge $\Pi_3 O\Pi_4$

599) *C. Carathéodory*, *Math. Ann.* 73 (1913): a) p. 305—320; b) p. 323—370, *H. A. Schwarz* zum 70. Geburtstag, den 25. Januar 1913, gewidmet. Die Hauptresultate sind von *Carathéodory* auf der Karlsruher Naturforscherversammlung im September 1911 vorgetragen worden. Dort machte auch *E. Study* Mitteilungen von seinen parallel laufenden Untersuchungen. Über das Verhältnis seiner und der *Study'schen* Untersuchungen spricht sich *Carathéodory* loc. cit. a) p. 305 Fußnote *) sowie b) p. 324 aus. Vgl. hierzu *E. Study*, loc. cit. 600) Vorwort.

600) *E. Study*, Vorlesungen über ausgewählte Gegenstände der Geometrie. 2. Heft. Konforme Abbildung einfach zusammenhängender Bereiche. Herausgegeben unter Mitwirkung von *W. Blaschke*, Leipzig 1912, p. 1—142 [p. 37—71].

601) Eine Ausnahme bilden nur die Sätze XXIII und XXIV seiner zweiten Arbeit.

602) *C. Carathéodory*, loc. cit. 599) a) p. 317—320.

603) Und der *Carathéodory'schen* Ergänzung (s. die Fußnote 148) hierzu.

entspricht ein in P' und P'' endender Querschnitt von T . Durch diesen wird T in zwei Teilgebiete T' und T'' zerlegt. Wie leicht ersichtlich, enthält T' oder T'' nur endlich viele Punkte der Folge z_k ($k = 1, 2, \dots$); entweder Π_1 oder Π_2 ist kein Häufungspunkt. Wir sind auf einen Widerspruch gekommen.

Aus dem vorstehenden Satze leitet dann *Carathéodory* ohne Mühe das weitere endgültige Resultat ab; die Bereiche $T + S$ und $K + C$ sind durch konforme Abbildung von T auf K umkehrbar eindeutig und stetig aufeinander bezogen.

An diesen Satz knüpfen gewisse funktionentheoretische Resultate von *L. Fejér* an.⁶⁰⁴) *Fejér* beweist unter anderem den bemerkenswerten Satz: Die für $|Z| < 1$ reguläre Potenzreihe $z(Z) = \sum_k^{1 \dots \infty} a_k Z^k$ ist für $|Z| \leq 1$ gleichmäßig konvergent.⁶⁰⁵)

Es sei jetzt T irgendein beschränktes einfach zusammenhängendes Gebiet in \mathfrak{C} und z_k ($k = 1, 2, \dots$) eine Folge von Punkten, die gegen ein Primende E_g konvergieren. Die Folge Z_k ($k = 1, 2, \dots$) konvergiert gegen einen Punkt des Kreises. Der Beweis läßt sich ganz wie vorhin führen. Für den Punkt P tritt jetzt irgendein Punkt auf S ein, gegen den eine das Primende E_g definierende Folge von Querschnitten konvergiert (irgendein „Hauptpunkt“ von E_g). Von hier aus gelangt man zu einem Hauptsatze der *Carathéodory'schen* Theorie: Die Primenden des Gebietes T und die Randpunkte des Kreises C entsprechen einander umkehrbar eindeutig und stetig. Jeder Folge von Punkten in T , die gegen ein Primende E_g konvergiert, entspricht eine gegen das Bild von E_g konvergierende Punktfolge in K .⁶⁰⁶)

Die Menge von Punkten, in denen $\lim_{R=1} z(Re^{i\Phi})$ existiert, ist dem *Fatouschen* Satze 4. Nr. 13 zufolge auf C vom *Lebesgueschen* Maße 2π . Hieraus wird unter anderem erschlossen, daß 1. die Menge der Punkte auf C , denen Primenden erster und zweiter Art in T ent-

604) *L. Fejér*, a) C. R. 156 (1913), p. 46—49; b) Schwarz-Festschrift, Berlin 1914, p. 42—53. Eine Darstellung findet sich bei *E. Landau*, loc. cit. 462) p. 59—60.

605) Nach *Fejér*, loc. cit. 604) b), p. 49—50 konvergiert $\sum_k^{1 \dots \infty} a_k Z^k$, wenn T ein beliebiges beschränktes, einfach zusammenhängendes Gebiet in \mathfrak{C} bezeichnet, auf C in den Punkten einer gewissen Menge vom Maße 2π . Aus dem *Abelschen* Satze folgt, daß in diesen Punkten $\lim_{R=1} z(Re^{i\Phi})$ existiert. Im Gebiete T entsprechen ihnen darum Primenden erster und zweiter Art (vgl. die Ausführungen weiter unten).

606) *C. Carathéodory*, loc. cit. 599), p. 350 sowie p. 351 Fußnote *).

sprechen, das Maß $2\pi^{607}$) und 2. auf einem jeden Bogen von C die Mächtigkeit des Kontinuums hat.⁶⁰⁸) Damit das Gebiet T ein Jordansches Gebiet sei, ist notwendig und hinreichend, daß seine Begrenzung aus lauter einfachen und erreichbaren Punkten besteht.⁶⁰⁹)

In welcher Weise erreichbare und nicht erreichbare Punkte eines Primendes verschiedenen gegen das Bild von E_g konvergierenden Punktfolgen in K entsprechen, hat *Carathéodory* nicht näher untersucht.

Study hält es für wahrscheinlich, daß einem beliebigen Halbmesser des Kreises C in T ein (analytisches) Kurvenstück entspricht, das die Gesamtheit der Hauptpunkte⁶¹⁰) eines Primendes approximiert.⁶¹¹) Die gleiche Punktmenge wird, wie *Koebe* mit Hilfe seines Verzerrungssatzes zeigt, gewonnen, wenn man sich dem Endpunkte jenes Halbmessers auf einer beliebigen Kreissehne nähert.⁶¹²)

Ein Teil der *Carathéodory*schen Resultate ist auf einem ganz anderen Wege von *W. F. Osgood* und *E. H. Taylor* abgeleitet worden.⁶¹³) Durch rein potentialtheoretische Betrachtungen wird gezeigt, daß die zu der *Greenschen* Funktion von T konjugierte Potentialfunktion bei der Annäherung an einen (erreichbaren) Punkt des Randes längs eines *Jordanschen* Kurvenstückes in T gegen einen bestimmten Wert konvergiert.⁶¹⁴) Aus diesen Resultaten wird dann im wesentlichen alles weitere abgeleitet. Die Methode ist also direkt. Sie bedient sich im

607) Vgl. die Fußnote 615).

608) *C. Carathéodory*, loc. cit. 599) b) p. 365.

609) *C. Carathéodory*, loc. cit. 599) b) p. 366. Derselbe Satz wird auf anderem Wege bei *W. F. Osgood* and *E. H. Taylor* bewiesen (loc. cit. 598), p. 295). Man vergleiche hierzu die Ausführungen von *E. Study*, loc. cit. 600), p. 37—71.

610) „Die Kernmenge“ nach *Study*. Randpunkte und erreichbare Punkte des Randes heißen bei *Study* „Grenz“- und „Randpunkte“.

611) Vgl. *E. Study*, loc. cit. 600) p. 65 (Hypothese).

612) Vgl. loc. cit. 600), p. 127.

613) *W. F. Osgood* und *E. H. Taylor*, loc. cit. 598). Die beiden Autoren untersuchen das Verhalten der die Abbildung vermittelnden Funktion vor allem in den Primenden erster und zweiter Art, d. h. den Primenden, die einen erreichbaren Punkt haben (übrigens ohne den Begriff eines Primendes zu benutzen). Primenden ohne erreichbare Punkte kommen implizite erst in dem Schlußsatz V nebst dem Korollar (p. 296—297) vor. Den *Carathéodory*schen Hauptsatz über die umkehrbar eindeutige und stetige Zuordnung der Punkte des Kreises und der Primenden des Gebietes T schließt die Theorie von *Osgood* und *Taylor* nicht ohne weiteres ein. Das gleiche ist von dem Satze über das Maß der den Primenden erster und zweiter Art auf C entsprechenden Punkte (übrigens bezüglich aller noch zu besprechenden Theorien) zu sagen.

614) *W. F. Osgood* und *E. H. Taylor*, loc. cit. 598) p. 291.

Gegensatz zu der *Carathéodory*schen Theorie lediglich des klassischen Integralbegriffes.⁶¹⁵⁾

Eine überraschend einfache Behandlungsweise des Randes beschränkter, einfach zusammenhängender Gebiete in \mathfrak{C} ist von *P. Koebe* angegeben worden.⁶¹⁶⁾ *Koebe* geht von dem folgenden Hilfssatze aus. Es sei $F(Z)$ eine in K erklärte beschränkte, singularitätenfreie analytische Funktion, Σ_k ($k = 1, 2, \dots$) eine Folge analytischer und regulärer Kurvenstücke, die einen Bogen Σ von C gleichmäßig approximieren. Nimmt $F(Z)$ auf Σ_k ($k = 1, 2, \dots$) Werte an, die mit wachsendem k gegen eine Konstante gleichmäßig konvergieren, so ist $F(Z)$ selbst eine Konstante.

Durch eine elementare konforme Abbildung kann man erreichen, daß Σ sich mit der unteren Hälfte des Kreises C deckt und die Endpunkte von Σ_k ($k = 1, 2, \dots$) auf der Achse des Reellen liegen. Die Konstante darf man gleich Null annehmen. Die in K reguläre Funktion $\Phi(Z) = F(Z)\bar{F}_1(Z)$; $\{F_1(Z) = [F(\bar{Z})]; \bar{Z}, [\bar{F}_1(Z)]$ zu Z und $F_1(Z)$ konjugiert komplex} konvergiert auf den aus den Linien Σ_k und ihren Spiegelbildern gebildeten geschlossenen Linien für $k = \infty$ gegen Null. Wie leicht zu sehen ist, ist $\Phi(Z) = 0$, darum auch $F(Z) = 0$.⁶¹⁷⁾ Sei jetzt $P(z_0)$ ein erreichbarer Punkt auf S und L ein in P mündendes *Jordansches* Kurvenstück in T . In der Ebene Z entspricht S ein *Jordansches*, etwa in Π auf C mündendes Linienstück \mathfrak{S} . Andernfalls müßte \mathfrak{S} längs eines Stückes von C unendlich oft entlang streichen, $z(Z)$ auf \mathfrak{S} gegen z_0 konvergieren, darum $z(Z)$ identisch gleich z_0 sein.⁶¹⁸⁾ In ähnlicher Weise werden auf indirektem Wege ohne jede Rechnung die Hauptsätze über die Ränderzuordnung abgeleitet.⁶¹⁹⁾

615) In der Note, Zur Ränderzuordnung bei konformer Abbildung, Gött. Nachr. 1913, p. 509—518 gibt übrigens *Carathéodory* unter Benutzung eines Gedankens von *E. Schmidt* einen von der *Lebesgueschen* Theorie unabhängigen Beweis des hier in Frage kommenden Spezialfalles des *Fatouschen* Satzes.

616) *P. Koebe*, a) Gött. Nachr. 1913, p. 286—288, b) Journ. f. Math. 145 (1915), p. 177—223.

617) *P. Koebe*, loc. cit. 616) b) p. 212—213. Einen anderen Beweis skizziert *Koebe* loc. cit. 616) a) p. 287—288. Der im Texte wiedergegebene Beweis berührt sich mit gewissen Betrachtungen von *E. Lindelöf*, loc. cit. 627). Einen weiteren Beweis vergleiche bei *C. Carathéodory*, loc. cit. 615) p. 509—512. Einen analogen Hilfssatz gab *R. Courant*, loc. cit. 557), p. 207—208 an. (Die Voraussetzung, daß $F(Z)$ in K beschränkt ist, wird dort durch die Annahme ersetzt, daß K durch $F(Z)$ auf ein Gebiet vom endlichen inneren Flächeninhalte abgebildet wird.) Eine Erweiterung gibt neuerdings *W. Groß*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 29 (1918), p. 3—37, an. Vgl. auch *W. Groß*, Math. Zeitschr. 3 (1919).

618) *P. Koebe*, loc. cit. 616) b) p. 215.

619) Vgl. die analogen Ausführungen bei *R. Courant*, loc. cit. 557), p. 207 bis 211.

Es mögen z_1 und z_2 zwei Punkte in T bezeichnen. Es sei $E(z_1, z_2)$ die untere Grenze der Länge aller von z_1 nach z_2 führenden geradlinigen Streckenzüge in T . Nach *Koebe* läßt sich jedem $\varepsilon > 0$ ein $\nu(\varepsilon) > 0$ zuordnen, so daß $|Z_1 - Z_2| < \varepsilon$ wird, sofern z_1 und z_2 in T der Beziehung $E(z_1, z_2) < \nu(\varepsilon)$ gemäß, im übrigen jedoch willkürlich gewählt sind („Gleichmäßige Stetigkeit“ der Funktion $Z(z)$).⁶²⁰⁾

Einen ganz anderen, ebenfalls indirekten Weg beschreitet *R. Courant*.⁶²¹⁾ Es sei S eine *Jordansche* Kurve. Die zunächst nur in T erklärte Funktion $Z(z)$ ist dort „gleichmäßig stetig“: Jedem $\varepsilon > 0$ läßt sich ein $\delta(\varepsilon) > 0$ zuordnen, so daß Punktepaaren z, z' in T , die der Ungleichheit $|z - z'| < \delta(\varepsilon)$ genügen, Punktepaare Z, Z' in K entsprechen derart, daß $|Z - Z'| < \varepsilon$ gilt.⁶²²⁾ Wäre dies nämlich nicht der Fall, ließen sich also (gegen S konvergierende) Punktepaare z_n, z'_n finden, so daß $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - z'_n| = 0$, $|Z_n - Z'_n| > \alpha$ (α konstant) wäre, so müßte, wie eine Betrachtung der Kurven $U = U(z_n)$, $U = U(z'_n)$, ($Z = U + iV$) zeigt, das *Dirichletsche* Integral

$$\int_T \left| \frac{dZ}{dz} \right|^2 dx dy$$

divergieren.⁶²³⁾ Die punktweise umkehrbar eindeutige und stetige Beziehung der Bereiche $T + S$ und $K + C$ ist eine fast unmittelbare Folge dieses Satzes.⁶²⁴⁾ In ähnlicher Weise läßt sich der wiederholt erwähnte allgemeine *Carathéodorysche* Satz über die Zuordnung der Primenden eines beschränkten, einfach zusammenhängenden Gebietes T und der Punkte auf C beweisen.⁶²⁵⁾ Die Beschaffenheit des Randes von T läßt sich übrigens nach einer Bemerkung von *Courant* auch von der Abbildung des Innern von T auf K aus, auf Grund der Sätze über die Zuordnung erreichbarer Punkte erforschen.⁶²⁶⁾ Man kann so zu den von *Carathéodory* auf mengentheoretischem Wege gewonnenen Resultaten gelangen.⁶²⁶⁾

620) *P. Koebe*, loc. cit. 616) b), p. 221—222. Mit diesem Satze steht ein von *W. F. Osgood*, loc. cit. 597) angegebenes „physical law“ in enger Beziehung.

621) *R. Courant*, Gött. Nachr. 1914, p. 101—109.

622) *Courant* betrachtet übrigens, was unwesentlich ist, die Abbildung auf ein Schlitzgebiet.

623) Die *Courantsche* Betrachtungsweise ist mit der anderen Zwecken dienenden Betrachtungsweise von *H. Lebesgue* (Nr. 45 c) verwandt.

624) Vgl. die Andeutungen von *R. Courant*, loc. cit. 621), p. 102; loc. cit. 557, p. 211.

625) *R. Courant*, loc. cit. 557) p. 211.

626) Im einzelnen durchgeführt wurde dieser Gedankengang von *P. Koebe*, loc. cit. 616) b) p. 217—219 und *E. Lindelöf*, loc. cit. 627) b) (vgl. die weiteren Ausführungen im Text).

Eine sehr bemerkenswerte funktionentheoretische Behandlungsweise des Randes ist von *E. Lindelöf* vorgeschlagen worden.⁶²⁷⁾ *Lindelöf* geht von dem von ihm bereits früher vielfach mit Erfolg benutzten elementaren Satze aus: Es sei $f(z)$ eine in einem einfach zusammenhängenden Gebiete T in \mathfrak{C} reguläre Funktion. Sei z_0 ein willkürlicher Punkt auf S und es sei ε eine beliebig kleine positive Zahl. Läßt sich ε und z_0 ein Wert $\nu(\varepsilon, z_0) > 0$ so zuordnen, daß für alle z in T , die der Ungleichheit $|z - z_0| < \nu(\varepsilon, z_0)$ genügen, $|f(z)| < M + \varepsilon$ ist, so ist in $T \dots |f(z)| \leq M$. Das Gleichheitszeichen gilt nur, wenn $f(z)$ in T konstant ist.

Sei $Z = Z(z)$ eine Funktion, durch deren Vermittlung T auf die Fläche des Einheitskreises $|Z| < 1$ konform abgebildet wird. Sei q die Entfernung des Punktes $z(0)$ von S , L der Durchmesser von T . Ist z ein Punkt in T und ist seine Entfernung von S kleiner als $\varrho^* < q$, so ist

$$(1) \quad |1 - Z(z)| < \frac{2 \log \frac{L}{q}}{\log \frac{L}{q} + \log \frac{L}{\varrho^*}}.$$

Dieser Satz stellt eine Verschärfung des Satzes $\lim_{\varrho^* \rightarrow 0} |Z(z)| = 1$ dar.

Zum Beweise wird, wenn $z = a$ ein Punkt P auf S ist, derjenige Teil der zu $\log(z - a)$ gehörigen *Riemannschen* Fläche, der der Beziehung $|z - a| \leq L$ genügt, durch Vermittlung der Funktion

$$(2) \quad \bar{Z}(z) = \frac{\log\left(\frac{z-a}{L} e^{-i\beta}\right) + \log \frac{L}{d}}{\log\left(\frac{z-a}{L} e^{-i\beta}\right) - \log \frac{L}{d}} \quad (z(0) = a + d e^{i\beta})$$

auf die Fläche K des Einheitskreises abgebildet. Das Gebiet T wird dabei auf ein Gebiet in K abgebildet. Durch Anwendung des eingangs genannten Hilfssatzes auf $\frac{\bar{Z}(z)}{Z(z)}$ und einige einfache Umformungen gewinnt man die zu beweisende Beziehung. Unter Zuhilfenahme weiterer elementarer Hilfssätze zeigt sodann *Lindelöf*, daß für alle hinreichend kleinen $\varrho^* (< q)$ die Schwankung σ der Funktion $\text{Arctang} \frac{Y}{X}$ längs eines beliebigen *Jordanschen* Kurvenstückes in dem der Kreisfläche $|z - a| < \varrho^*$ und T gemeinsamen Gebiete der Ungleichheit

$$(3) \quad \sigma < 4 \text{ Arc tang } \sqrt{\frac{2 \log \frac{L}{q}}{\log \frac{L}{\varrho^*}}}$$

627) *E. Lindelöf*, a) C. R. 158 (1914), p. 245–247, b) Acta societatis scientiarum Fennicae, Bd. 46, Nr. 4 (1915).

genügt. Augenscheinlich ist $\lim_{\rho^* \rightarrow 0} \sigma = 0$. Aus den Ungleichheiten für $|1 - Z(\rho)|$ und σ folgen nun nacheinander die Sätze:

Ist P ein erreichbarer Punkt von S , so entspricht einem in a mündenden *Jordanschen* Kurvenstücke \mathfrak{S} in T ein in einen bestimmten Punkt Z_a auf C mündendes *Jordansches* Kurvenstück \mathfrak{L} in K . Im allgemeinen konvergiert $z(Z)$ bei der Annäherung der Veränderlichen Z an Z_a in K nicht gegen einen bestimmten Wert. Die Gesamtheit der Häufungsstellen von $z(Z)$ bildet ein Kontinuum (das sich jedoch auch auf einen Punkt reduzieren kann). *Lindelöf* zeigt, daß dieses Kontinuum ein *Primende* erster oder zweiter Art ist. Dabei entsprechen allen möglichen in Z_a mündenden *Jordanschen* Kurvenstücken im Innern des Winkelraumes $\left| \arg \frac{Z_a}{Z_a - Z} \right| \leq \frac{\pi}{2} - \varepsilon_0$ (ε_0 beliebig klein) in T nach a führende *Jordansche* Kurvenstücke. Sind a_1 und $a_2 \neq a_1$ zwei erreichbare Punkte auf S , \mathfrak{S}_1 und \mathfrak{S}_2 nach a_1 und a_2 führende *Jordansche* Kurvenstücke in T , so münden \mathfrak{L}_1 und \mathfrak{L}_2 in zwei verschiedene Punkte von C ein. Ist T ein *Jordansches* Gebiet, so ist $Z(z)$ in T und auf S stetig und ordnet Punkte auf S und C einander umkehrbar eindeutig zu. Bei einem beliebigen beschränkten, einfach zusammenhängenden Gebiete sind erreichbare Punkte $z = a$ auf S und ihre Bilder Z_a auf C überall dicht verteilt. Einem jeden nicht zur Menge der Z_a gehörenden Punkte $*Z$ auf C läßt sich wie vorhin durch die Gesamtheit der Häufungsstellen von $z(Z)$ ein Kontinuum auf S zuordnen. Dieses ist ein *Primende* dritter oder vierter Art. Bleibt ein nach $*Z$ führendes *Jordansches* Kurvenstück \mathfrak{L} im Innern des Winkelraumes $\left| \arg \frac{*Z}{*Z - Z} \right| \leq \frac{\pi}{2} - \varepsilon_0$ (ε_0 beliebig klein), so umfaßt die Menge der Häufungsstellen von $z(Z)$ auf \mathfrak{L} nach *Lindelöf* alle Hauptpunkte des $*Z$ zugeordneten Primendes und keinen einzigen Nebenpunkt. Damit und durch den vorhin genannten Satz über die Primenden erster und zweiter Art wird insbesondere die *Studysche* Vermutung⁶²⁸⁾ als zutreffend erwiesen.^{628*)}

49. Variable Gebiete. Betrachtung einer Folge von Gebieten, die gegen ein Gebiet T oder \mathfrak{T} konvergieren, ist, wie sich wiederholt

628) Vgl. *E. Study*, loc. cit. 611).

628*) Einen anderen Beweis dieses Satzes gibt neuerdings *W. Groß* in einer zur Zeit (im September 1918) in Veröffentlichung begriffenen größeren Arbeit. Vgl. *W. Groß*, *Math. Zeitschrift* 2 (1918), p. 242–294. In dieser Arbeit sowie in den weiteren Arbeiten (vgl. Monatshefte f. Math. u. Phys. 29 (1918), p. 3–47; *Math. Zeitschrift* 3 (1919), über die nicht mehr im Zusammenhang referiert werden konnte, findet sich eine größere Anzahl weiterer Ergebnisse (vgl. die Fußnote 595) Weitere Literatur; *P. Montel* C. R. 164 (1917), p. 879–881.

gezeigt hat, eins der wichtigsten Mittel zur Behandlung der Randwertaufgaben der Potentialtheorie und der Probleme der konformen Abbildung. Die auf diesem Wege gewonnenen Ergebnisse lassen sich jedesmal als Konvergenzsätze deuten. Doch sind T_n dabei in der Regel Gebiete spezieller Natur. Faßt man das erste Randwertproblem für beschränkte Gebiete der allgemeinsten Natur in \mathfrak{C} als gelöst auf, so gewinnt man, wie in der Nr. 34 angedeutet wurde, mit der größten Leichtigkeit einen allgemeinen Satz über das Verhalten der Lösung bei einer stetigen Änderung des Gebietes. Das gleiche gilt, wenn T einfach zusammenhängend ist, für die konforme Abbildung von T auf K . In diesem Abschnitte werden einige hierher gehörige weitgehende Sätze besprochen. Es handelt sich dabei, sei es um unendlichvielblättrige Gebiete, sei es um gleichmäßige Konvergenz im Innern und auf dem Rande gewisser Gebiete, sei es um besondere Abschätzungen. Meist liefert die Methode zugleich einen Existenzbeweis der Lösung oder der Abbildung.

Ein sehr allgemeiner Satz dieser Art ist von *H. Lebesgue* bewiesen worden.⁶²⁹⁾ Es sei T_n ($n = 1, 2, \dots$) eine Folge beschränkter Gebiete in \mathfrak{C} , die gegen ein ebenfalls beschränktes Gebiet T konvergieren.⁶³⁰⁾ Es sei K^* eine T und T_n ($n = 1, 2, \dots$) enthaltende Kreisfläche, φ_n ($n = 1, 2, \dots$) eine in $K^* + C^*$ gleichmäßig konvergierende Folge stetiger Funktionen, u_n die zu φ_n gehörige Lösung des ersten Randwertproblems in T_n . Die Funktionen u_n in T_n , φ_n in $K^* + C^* - T_n$ konvergieren in $T + S$ gleichmäßig gegen u , die zu $\varphi = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n$ in T gehörige Lösung.⁶³¹⁾

Einen sehr weitgehenden allgemeinen Satz über veränderliche Gebiete in \mathfrak{C} haben wir in der Nr. 47 kennen gelernt. Es ist der *Carathéodorysche* Satz über die Abbildung des Kernes einer Folge einfach zusammenhängender beschränkter Gebiete.⁶³²⁾

629) *H. Lebesgue*, loc. cit. 535) a) p. 398—399.

630) T und T_n erfüllen die in der Nr. 45c gegebene *Lebesguesche* Bedingung. Das Maximum des Abstandes der Punkte des Randes S_n von S konvergiert mit $\frac{1}{n}$ zugleich gegen Null. Die Gebiete T_n können, auch wenn T unendlichvielfach zusammenhängend ist, eine endliche Zusammenhangszahl haben.

631) *Lebesgue* gibt seinem Satze eine geometrische Fassung. Der Beweis stützt sich wesentlich auf den in der Nr. 45c besprochenen Hilfssatz.

632) *L. Bieberbach* [Gött. Nachr. 1913, p. 552—564 (p. 558—559)] hat den *Carathéodoryschen* Satz wie folgt verallgemeinert: Es sei T_n ($n = 1, 2, \dots$) eine Folge einfach zusammenhängender, gleichmäßig beschränkter Gebiete in der Ebene z , die alle den Punkt $z = 0$ enthalten und gegen ihren (von Null verschiedenen) Kern \odot konvergieren. Durch Vermittlung der Funktionen $\bar{Z}_n(z)$ ($\bar{Z}_n(0) = 0$) ($n = 1, 2, \dots$) mögen T_n ($n = 1, 2, \dots$) auf Gebiete \bar{T}_n ($n = 1, 2, \dots$) in der Ebene \bar{Z} , die

In der in der Schwarz-Festschrift veröffentlichten Arbeit gibt *Carathéodory* einen in jenem Satze als Spezialfall enthaltenen Konvergenzsatz an (Nr. 47).⁶³³⁾ Der Beweis benutzt wesentlich einige von *Carathéodory* angegebene Abschätzungen und berührt sich mit gewissen Betrachtungen von *Plemelj* und *Koebe* (Nr. 40b). Er ist von einem Auswahlverfahren unabhängig.

Es sei T ein einfach zusammenhängendes, beschränktes Gebiet in G , dessen Rand in der Begrenzung eines von T verschiedenen Gebietes enthalten ist. Es sei $z(Z)$ eine Funktion, durch deren Vermittlung K auf T konform abgebildet wird ($z(0) = 0$, $\frac{dz(0)}{dZ}$ reell und > 0). Um $z(Z)$ durch die in gleicher Weise normierte Abbildungsfunktion $z^*(Z)$ eines Gebietes T^* mit beliebiger Genauigkeit zu approximieren, genügt es, das Maximum des Abstandes eines Punktes auf S^* von S hinreichend klein zu wählen. Die Gestalt von S^* ist dabei völlig gleichgültig.⁶³⁴⁾

Einen weiteren auf *Carathéodory* zurückgehenden allgemeinen Konvergenzsatz gibt *R. Courant* an.⁶³⁵⁾

Es sei T_n ($n = 1, 2, \dots$) eine Folge *Jordanscher* Gebiete, die sämtlich eine feste Kreisfläche um den Punkt $z = 0$ enthalten und gegen ein *Jordansches* Gebiet T_0 „gleichmäßig konvergieren“.⁶³⁶⁾ Es seien $Z_n^*(z)$ ($n = 0, 1, \dots$) Funktionen, durch deren Vermittlung gleichfalls gleichmäßig beschränkt sind, konform abgebildet werden. Damit $Z_n(z)$ ($n = 1, 2, \dots$) in jedem Bereiche in Θ gleichmäßig konvergieren, ist notwendig und hinreichend, daß Gebiete \bar{T}_n ($n = 1, 2, \dots$) gegen ihren Kern $\bar{\Theta}$ konvergieren. Durch Vermittlung der Funktion $\bar{Z}(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{Z}_n(z)$ wird, sofern $\bar{\Theta}$ von Null verschieden ist, Θ auf $\bar{\Theta}$ konform abgebildet.

Wie bereits erwähnt (vgl. die Fußnote 578), benutzt *Bieberbach* als das einzige Hilfsmittel den *Montel'schen* Satz (Nr. 41, p. 316), während *Carathéodory* daneben gewisse von ihm aus dem *Schwarz'schen* Lemma abgeleiteten Ungleichheiten anwendet.

633) Für das Kreisgebiet tritt hierbei, was unwesentlich ist, ein festes beschränktes einfach zusammenhängendes Gebiet T ein.

634) *C. Carathéodory*, loc. cit. 577), p. 136. Eine andere Fassung dieses Satzes findet sich bei *L. Bieberbach*, loc. cit. 588) b) p. 104—107. Für den Fehler der Abbildung gibt *Bieberbach* explizite eine obere Schranke an.

635) *R. Courant*, loc. cit. 621) p. 106.

636) Dies besagt folgendes: Die Randkurve S_n ist mit der Menge der Punkte identisch, deren Entfernung von S_n für $n = \infty$ gegen Null konvergiert. Es sei P irgendein Punkt auf S_0 ; P_1 und P_2 seien zwei beliebige Punkte in T_0 , deren Abstand von P kleiner als ε ist; P_1 und P_2 lassen sich durch einen geradlinigen Streckenzug verbinden, der für hinreichend großes n in allen T_n liegt und dessen Länge unterhalb einer von n , P_1 und P_2 unabhängigen, mit ε gegen Null konvergierenden Schranke liegt.

$T_n + S_n$ ($n = 0, 1, \dots$) auf Schlitzbereiche in der Ebene Z^* der Bedingung $\lim_{z \rightarrow 0} \left(Z_n^*(z) - \frac{1}{z} \right) = 0$ gemäß konform abgebildet werden.

Die Funktionen $Z_n^*(z)$ ($n = 1, 2, \dots$) konvergieren in jedem den Punkt $z = 0$ nicht enthaltenden Bereiche in T_0 gleichmäßig gegen $Z_0^*(z)$. Ist z_1, z_2, \dots irgendeine Folge von Punkten (z_k in T_k oder auf S_k), die gegen z_0 (in T_0 oder auf S_0) konvergiert, so ist $\lim_{k \rightarrow \infty} Z_k^*(z_k) = Z_0^*(z_0)$. Den Beweis führt *Courant* indirekt durch Betrachtung der *Dirichletschen* Integrale

$$\int_{T_n - K_0 - C_0} \left| \frac{d}{dz} Z_n^*(z) \right|^2 dx dy,$$

unter K_0 ein Kreisgebiet um den Punkt $z = 0$ verstanden. Der vorstehende, ebenso wie der Nr. 48 b) p. 371 besprochene *Courantsche* Satz gilt unverändert bei mehrfach zusammenhängenden beschränkten Gebieten in \mathfrak{E} , deren alle Randkomponenten *Jordansche* Kurven sind. Ein ganz analoger Satz gilt, wenn T_n ($n = 0, 1, \dots$) einfach zusammenhängend sind, für die in der üblichen Weise normierten Funktionen $Z_n(z)$ ($n = 0, 1, \dots$), die T_n ($n = 0, 1, \dots$) auf die Fläche des Einheitskreises abbilden. Die Umkehrfunktionen $z_n(Z)$ ($n = 1, 2, \dots$) konvergieren in dem Gebiete $|Z| \leq 1$ gleichmäßig gegen $z_0(Z)$.⁶³⁷

Es sei noch der folgende von *Carathéodory* angegebene Satz genannt:

Es sei T_t eine für $0 \leq t \leq 1$ erklärte einparametrische Schar einfach zusammenhängender beschränkter, $z = 0$ enthaltender Gebiete in \mathfrak{E} . Damit die T_t auf K abbildende Funktion $z_t(Z)$ ($z_t(0) = 0, \frac{d}{dZ} z_t(0)$ reell und > 0) für jeden Wert von Z ($|Z| < 1$) stetig von t abhängt, ist notwendig und hinreichend, daß: 1. jedem Bereiche $\bar{T} + \bar{S}$ in T_t , der $z = 0$ enthält, ein Wert $\varepsilon > 0$ zugeordnet werden kann, so daß $\bar{T} + \bar{S}$ in T_τ enthalten ist, sofern $|t - \tau| < \varepsilon$ ist, 2. wenn ein $z = 0$ enthaltender Bereich $\bar{T} + \bar{S}$ in T_{t_1}, T_{t_2}, \dots enthalten ist, $\bar{T} + \bar{S}$ auch in T_θ liegt, unter θ einen beliebigen Häufungspunkt der Folge t_1, t_2, \dots verstanden.⁶³⁸

Eine Reihe spezieller Sätze über konforme Abbildung veränderlicher Gebiete sowie über Potentialfunktionen in diesen wird bei der Durchführung der Kontinuitätsmethode abgeleitet (Nr. 46). So beweist *P. Koebe* (auf zwei verschiedene Arten) einen Satz über die stetige Änderung der zu einem $2p$ -fach zusammenhängenden Fundamentalgebiete in \mathfrak{E} mit paarweise analytischer und regulärer Zuordnung

637) *R. Courant*, loc. cit. 621), p. 108—109.

638) *C. Carathéodory*, loc. cit. 577), p. 138—139.

der Randkomponenten zugehörigen *Abelschen* Integrale bei einer stetigen Änderung des Gebietes.⁶³⁹⁾ Man vergleiche ferner *P. Koebe*, loc. cit. 489)d) p. 68—77. In diesem Zusammenhang sind noch die Arbeiten von *E. Ritter* über das Verhalten automorpher Funktionen bei einer kleinen Änderung des Fundamentalbereiches zu erwähnen.⁶⁴⁰⁾

639) Das Fundamentalgebiet ist dabei als eine ideal geschlossene Fläche vom Range p zu betrachten. Vgl. *P. Koebe*, Math. Ann. 75 (1914), p. 42—129 [p. 61—71]. Der eine direkte Beweis stützt sich wesentlich auf den *Courant-Koebeschen* Hilfssatz (Nr. 45 d), der andere ist indirekt und benutzt den *Montelschen* Konvergenzsatz (Nr. 41 p. 316).

640) Vgl. *E. Ritter*, Math. Ann. 45 (1894), p. 473—544; 46 (1895), p. 200—248.

(Abgeschlossen im Mai 1918.)

Die seit August 1914 erschienenen ausländischen Arbeiten konnten nur zum Teil berücksichtigt werden.

II C 4. NEUERE UNTERSUCHUNGEN ÜBER FUNKTIONEN VON KOMPLEXEN VARIABLEN.*)

VON

LUDWIG BIEBERBACH

IN FRANKFURT A. M.

Inhaltsübersicht.

Grundlagen der Theorie.

1. Definition des analytischen Charakters einer Funktion.
2. Der Fundamentalsatz der Funktionentheorie.
3. Die Integralformel.
4. Erweiterungen.
5. Begriff der analytischen Funktion.
6. *Riemannsche* Mannigfaltigkeiten.
7. Uniformisierung.
8. Begriff der singulären Stelle.
9. Begriff der Umgebung einer singulären Stelle.
10. Eindeutige isolierte Singularitäten.
11. Mehrdeutige isolierte Singularitäten.
12. Der Monodromiesatz.
13. Verteilung der Singularitäten bei eindeutigen Funktionen.

Der Picardsche Satz.

14. Der *Picardsche* Satz.
15. „Elementare“ Methoden.
16. Der *Landausche* Satz.
17. Verallgemeinerungen.
18. Der *Schottkysche* Satz.
19. Erweiterungen.

Weiteres über das Verhalten in der Nähe wesentlich singulärer Stellen.

20. Grundbegriffe.
21. Geradlinige Annäherung an singuläre Stellen.

*) Dieser Artikel will den 1900 abgeschlossenen *Osgoodschen* Artikel (II B 1) bis 1920 weiterführen. Diese Aufgabe zwang mich, häufig vor 1900 zurückzugreifen. Die ausländische Literatur der Kriegsjahre habe ich leider nicht immer einsehen können, so daß ich in dieser Hinsicht manchmal aus zweiter Hand schöpfen mußte. Wenn ich auch nicht hoffen darf, peinlichste Vollständigkeit erreicht zu haben, so glaube ich doch, daß mein Aufsatz ein einigermaßen treffendes Bild vom augenblicklichen Stande der Theorie gibt. Die Theorien der konformen Abbildung habe ich allerdings mit Rücksicht auf den Artikel *Lichtenstein* (II C 3) nur eben streifen dürfen. Viele wertvolle Ratschläge gaben mir während der Korrekturen *Faber*, *Hardy*, *Hartogs*, *Hellinger*, *Ostrowski*, *Pólya*, *Rosenthal*, *Szász*. Ich erwähne das mit aufrichtigem Dank.

22. Sätze von *W. Groß*.
23. Werteverteilung in Winkelräumen.
24. Ränderzuordnung bei konformer Abbildung.
25. Der *Fatousche* Satz.

Ganze transzendente Funktionen.

26. *Weierstraß*.
27. *Laguerre*.
28. *Poincaré*. *Hadamard*. *Borel*.
29. Grundbegriffe.
30. Ordnung und Koeffizienten.
31. Ordnung und Grenzexponent.
32. Ausnahmefälle.
33. Bestimmung des Geschlechtes aus den Koeffizienten.
34. Das Geschlecht von Summe und Ableitung.
35. Funktionen unendlicher Ordnung und Funktionen der Ordnung Null.
36. Beziehungen zwischen dem Maximalbetrag einer ganzen Funktion und dem Betrag des größten Gliedes ihrer Potenzreihenentwicklung.

Analytische Fortsetzung.

37. Die erste Methode *Mittag-Lefflers*.
38. Methode der konformen Abbildung.
39. Modifikation der Methode durch *Painlevé*.
40. Der Hauptstern als Konvergenzstern.
41. Zurückführung auf die Summation der geometrischen Reihe.
42. Integraldarstellungen.
43. Eine neue Methode *Mittag-Lefflers*.
44. Verallgemeinerungen.

Zusammenhang zwischen den Koeffizienten eines Funktionselementes und den Singularitäten der durch dasselbe definierten Funktion.

45. Die Singularitäten auf dem Konvergenzkreis.
46. Der *Hadamardsche* Multiplikationssatz.
47. Der Satz von *Leau*.
48. Sätze von *Lindelöf*.
49. Rekurrierende Reihen.
50. Untersuchungen von *Darboux*.
51. Die Lage der Pole.

Die Potenzreihen an der Konvergenzgrenze.

52. Der *Abelsche* Grenzwertsatz.
53. Die *Hölderschen* und die *Cesàroschen* Mittel.
54. Weitere Summationsmethoden.
55. Beziehungen zwischen den verschiedenen Summationsmethoden.
56. Das Wachstum der Funktion bei Annäherung an die Konvergenzgrenze.

Reihen analytischer Funktionen.

57. Eigenschaften der Summen konvergenter Reihen von analytischen Funktionen.
58. Der *Vitalische* Satz.
59. Weiteres über Reihen analytischer Funktionen.

Funktionenfamilien.

- 60. Die *Taylor*koeffizienten beschränkter Funktionen.
- 61. *Jensens* Verallgemeinerung des *Schwarzschen* Lemmas.
- 62. Die Funktionen $M(r)$, $\mu(r)$, $\mathfrak{M}(r)$.
- 63. Schwankungen.
- 64. Schlichte Familien.
- 65. Familien, die schlicht und zugleich beschränkt sind.
- 66. Konvexe Familien.

Arithmetische Eigenschaften analytischer Funktionen.

- 67. Arithmetische Eigenschaften analytischer Funktionen.

Analytische Funktionen von mehreren komplexen Variablen.

- 68. Definition des analytischen Charakters einer Funktion.
- 69. Die Konvergenz der Potenzreihen in zwei komplexen Veränderlichen.
- 70. Die singulären Stellen der analytischen Funktionen von zwei komplexen Veränderlichen.
- 71. Meromorphe Funktionen.
- 72. Implizite Funktionen.
- 73. Analytische Abbildungen.

Literatur.

- L. Bianchi*, Lezioni sulla teoria delle funzioni di variabile complessa e delle funzioni ellittiche, Pisa 1901.
- L. Bieberbach*, Einführung in die konforme Abbildung, Berlin 1915.
- O. Blumenthal*, Principes de la théorie des fonctions entières d'ordre infini, Paris 1910.
- E. Borel*, Leçons sur la théorie des fonctions, Paris 1898; 2. Aufl. Paris 1915.
- , Leçons sur les fonctions entières, Paris 1900.
- , Leçons sur les séries divergentes, Paris 1901.
- , Leçons sur les séries à termes positifs, Paris 1902.
- , Leçons sur les fonctions méromorphes, Paris 1903.
- , Leçons sur la théorie de la croissance, Paris 1910.
- , Leçons sur les fonctions monogènes uniformes d'une variable complexe, Paris 1917.
- P. Boutroux*, Leçons sur les fonctions définies par les équations différentielles du premier ordre, Paris 1908.
- H. Burkhardt*, Einführung in die Theorie der analytischen Funktionen einer komplexen Veränderlichen, 3. Aufl., Leipzig 1908.
- P. Dienes*, Leçons sur les singularités des fonctions analytiques, Paris 1913.
- T. S. Fiske*, Functions of a complex variable, New York 1906.
- W. B. Ford*, Studies on divergent series and summability, New York 1917.
- A. R. Forsyth*, Theory of functions of a complex variable, 3^d ed. Cambridge 1918.
- , Lectures introductory to the theory of functions of two complex variables, Cambridge 1914.
- E. Fouet*, Leçons élémentaires sur les fonctions analytiques, 2. Aufl., Bd. I (Paris 1907), Bd. II (Paris 1910).
- J. Hadamard*, La série de Taylor et son prolongement analytique (Coll. Scientia), Paris 1901.

- G. H. Hardy*, Ordres of infinity. The infinitarcalculus of *Paul Du Bois Reymond*, Cambridge 1910.
- J. Harkness* and *J. Morley*, A treatise on the theory of functions, London 1893.
- , Introduction to the theory of analytic functions, London 1898.
- G. Kowalewski*, Die komplexen Veränderlichen und ihre Funktionen, Leipzig 1911.
- K. Knopp*, Funktionentheorie (Sammlung Goeschel), Bd. I, 1. Aufl. Leipzig 1913, 2. Aufl. Leipzig 1918; Bd. II, 1. Aufl. Leipzig 1913, 2. Aufl. Leipzig 1920.
- E. Landau*, Darstellung und Begründung einiger neuerer Ergebnisse der Funktionentheorie, Berlin 1916.
- E. Lindelöf*, Le calcul des résidus, Paris 1905.
- Th. M. MacRobert*, Functions of a complex variable, London 1917.
- P. Montel*, Leçons sur les séries de polynomes à une variable complexe, Paris 1910.
- N. Nielsen*, Elemente der Funktionentheorie, Leipzig 1911.
- W. F. Osgood*, Lehrbuch der Funktionentheorie, Bd. I, 1. Aufl. Leipzig 1907, 2. Aufl. Leipzig 1912, 3. Aufl. Leipzig 1920.
- , Topics in the theory of functions of several variables. The Madison Colloquium 1913, New York 1914.
- S. Pincherle*, Lezioni sulla teoria delle funzioni, Bologna 1899.
- J. Petersen*, Vorlesungen über Funktionstheorie, Kopenhagen 1898.
- S. E. Sawitsch*, Theorie der Funktionen einer komplexen Veränderlichen, St. Petersburg 1906.
- O. Stolz* und *J. A. Gmeiner*, Einleitung in die Funktionentheorie, Leipzig 1904.
- G. Vivanti*, Theorie der eindeutigen analytischen Funktionen, deutsch von *A. Gutzmer*, Leipzig 1906.
- G. N. Watson*, Complex integration and Cauchy's theorem, Cambridge tracts Nro. 15 (1914).
- H. Weyl*, Die Idee der Riemannschen Fläche, Leipzig 1913.
- E. T. Whittaker* and *G. N. Watson*, A course of modern analysis. An introduction of infinite series and of analytic functions with an account of the principal transcendental functions, Cambridge 1902. 2. Aufl. 1915, 3. Aufl. 1920.
- L. Zoratti*, Leçons sur le prolongement analytique, Paris 1911.

Grundlagen der Theorie.

1. Definition des analytischen Charakters einer Funktion.

Man hat zwei wesentlich verschiedene Ausgangspunkte für die Definition des analytischen Charakters einer in einem Bereiche der komplexen z -Ebene eindeutig erklärten Funktion zu unterscheiden. An den allgemeinen Dirichletschen Funktionsbegriff knüpft die nach *Cauchy* und *Riemann* benannte Erklärung an: Analytisch heißen diejenigen eindeutigen Funktionen, welche an jeder Stelle einen Differentialquotienten besitzen. Im Sinne der von *Weierstraß*¹⁾ und *Méray* vertretenen Auffassung liegt es, den analytischen Charakter durch die Entwickelbarkeit in Potenzreihen zu erklären. Daß beide Definitionen

1) Bei *Weierstraß* scheint dieser Begriff des analytischen Charakters einer in einem gegebenen Bereiche eindeutig erklärten Funktion nicht vorzukommen.

gleichwertig sind, ist eine bekannte Folge des *Cauchyschen* Integralsatzes.²⁾ Indem aber sein Beweis zu verschiedenen Zeiten ein mehr oder weniger großes Ausmaß an Voraussetzungen nötig machte, wechselte die Fassung der *Cauchy-Riemannsches* Definition. So glaubte man bis 1884 (und länger), dazu noch die Stetigkeit des Differentialquotienten voraussetzen zu müssen. Erst *Goursat* erkannte, daß die Stetigkeit nicht besonders vorausgesetzt werden muß (näheres weiter unten). Daß auch an der so entstehenden Fassung der Definition noch Abstriche gemacht werden können, werden wir weiter unten sehen.

Unserer heutigen an der reellen Funktionentheorie geschulten Auffassung liegt wohl die *Cauchy-Riemannsches* Definition näher als die *Weierstraßsche*. Daß *Weierstraß* dieser gleichwohl den Vorzug gab, hängt wohl mit den folgenden Umständen eng zusammen: *Weierstraß* war die *Cauchy-Riemannsches* Definition durchaus geläufig. Hat er sie doch schon 1841^{2,1)}, also rund 10 Jahre vor *Cauchy* und *Riemann* zum Ausgangspunkt eines Beweises für den *Laurentschen* Satz genommen, den er also auch zwei Jahre vor *Laurents* Veröffentlichung besaß. Aber zu einer exakten Begründung der Integration im komplexen Gebiet ist von da noch ein weiter Weg. Die Art, wie *Weierstraß* in dieser Abhandlung im komplexen Gebiet vorsichtig integriert, läßt deutlich erkennen, daß er sich schon damals über die Schwierigkeiten eines Aufbaues der Integralrechnung im komplexen Gebiet klar gewesen sein muß. Tatsächlich sind dieselben ja auch erst lange nach dieser Zeit, in der sich *Weierstraß* seine Grundanschauungen bildete, überwunden worden. Ein genauer Begriff des Kurvenintegrals im komplexen Gebiet hätte wohl *Weierstraß* zur Verfügung stehen können, wenn auch die endgültige Fassung erst die zweite Auflage von *Jordans* *Cours d'analyse* (1896) brachte. Hingegen die bis zu *Pringsheims* Beweis von 1900 (oder *Goursats* Beweis von 1884) üblichen Beweise des *Cauchyschen* Integralsatzes mochten wohl einen exakten Denker

2) Man vgl. auch *Pringsheims* Übersetzung dieser Methode ins „Integrallose“. A. *Pringsheim*, a) Über die Entwicklung eindeutiger analytischer Funktionen in Potenzreihen, Münch. Ber. 1895, p. 75–92; b) Über Vereinfachungen in der elementaren Theorie der analytischen Funktionen, Math. Ann. 47 (1896), p. 121–154; c) Elementare Funktionentheorie und komplexe Integration, Münch. Ber. 1920, p. 145–182. — Falls die Punktmenge, in welcher $f(z)$ betrachtet wird, kein Gebiet ist, so gibt es darin unter Umständen differenzierbare nicht analytische Funktionen, deren Gesamtverlauf gleichwohl durch Angabe der Funktionswerte in gewissen Punktmengen bestimmt ist. Vgl. dazu z. B. *E. Borel*, *Leçons sur les fonctions monogènes uniformes d'une variable*, Paris 1917.

2, 1) *K. Weierstraß*, Darstellung einer analytischen Funktion einer komplexen Veränderlichen, deren absoluter Betrag zwischen zwei gegebenen Grenzen liegt, Münster 1841. Zuerst veröffentlicht in: *Gesammelte Werke* Bd. I, p. 51–66.

nicht zur Nacheiferung locken. Die Frage indessen, ob *Weierstraß* bei ernstlichem Willen die namentlich, wenn auch nur anscheinend, im Gebiete der analysis situs liegenden Schwierigkeiten hätte überwinden können, scheint mir müßig. Denn die arithmetische Veranlagung trieb *Weierstraß* ganz von selbst in eine andere Richtung, in der dazu noch die Linie des geringsten Widerstandes lag. Dazu kam der prägnante Charakter, den die Definition des analytischen Gebildes, der analytischen Funktion, der Prozeß der analytischen Fortsetzung (namentlich gegenüber den etwas unbestimmteren Darlegungen *Riemanns*³⁾) erhielt. So lag es nahe, die Reihenlehre von vornherein zum Ausgangspunkt zu wählen, weil so der ganze Bau eine große innere Geschlossenheit erhielt.

Für uns Heutige fallen die Hemmungen weg. Der Integralbegriff und die Integralsätze sind in einfachster voll befriedigender Weise begründet. Dazu erscheint ein Aufbau der Infinitesimalrechnung ausgehend von der *Riemanns*chen Definition natürlicher, einfacher und durchsichtiger. Zwar halten auch wir an der *Weierstraß*ischen Definition des analytischen Gebildes fest, doch machen wir geltend, daß es gerade die komplexe Integration ist, die allorts, auch in der Theorie der analytischen Fortsetzung, die schönsten Ergebnisse und die elegantesten Methoden gezeitigt hat. Wer auf sie verzichtet, beraubt sich eines der zugkräftigsten Hilfsmittel. Darum legen wir unserer Darstellung die *Cauchy-Riemanns*che Definition zu grunde. Wir können das um so eher tun, als bereits in II C 1 (*Pringsheim* u. *Faber*) die für den *Weierstraß*schen Standpunkt in Betracht kommenden Reihensätze ausführlich dargestellt sind.⁴⁾

2. Der Fundamentalsatz der Funktionentheorie ist der Cauchy'sche Integralsatz. Er wird am besten so formuliert:

Eine geschlossene rektifizierbare Kurve \mathcal{C} gehöre einem einfach zusammenhängenden Bereiche⁵⁾ an, in welchem $f(z)$ eindeutig und von

3) Siehe z. B. *Riemanns* Gesammelte mathematische Werke, 2. Aufl. (1892), p. 88—89.

4) *Osgood* hat in Selected topics in the general theory of functions, Bull. Am. math. Soc. (2) 5 (1898), p. 59—87 auf einen dritten Ausgangspunkt hingewiesen. Man erkläre als analytisch diejenigen Funktionen, für welche das $\int f(z) dz = 0$ ist immer dann, wenn es über eine geschlossene Kurve eines gegebenen einfach zusammenhängenden Bereiches erstreckt wird. Dann lehrt der Satz von *Morera* die Übereinstimmung dieser Definition mit der üblichen. Vgl. auch *Morera*, Sulla definizione di funzione di una variabile complessa, Atti di Torino 37 (1902), p. 99—102.

5) Darunter wird wie üblich eine Punktmenge verstanden, zu der mit jedem Punkt auch eine gewisse Umgebung desselben gehört, in der je zwei Punkte

analytischem Charakter ist. Dann ist

$$\int_{\mathfrak{C}} f(z) dz = 0.$$

Während die älteren Beweise dieses Satzes (II B 1 (*Osgood*), Nr. 3) die Stetigkeit der Ableitung von $f(z)$ voraussetzen müssen, hat eine auf *Goursat*⁶⁾ zurückgehende Beweisanordnung die Möglichkeit gegeben, mit der bloßen Existenz der Ableitung auszukommen, den Satz also in der eben ausgesprochenen Fassung zu beweisen. Eine kaum noch zu überbietende klassische Einfachheit hat der Beweis des Hauptsatzes durch *A. Pringsheim*⁷⁾ erhalten⁸⁾. Doch erst allmählich, einem bekannten Trägheitsgesetz folgend, verschafft er sich Eingang in die Lehrbücher⁹⁾ und in das Bewußtsein der wissenschaftlichen Welt. Man kann den Integralsatz auf Fälle ausdehnen, wo die geschlossene Kurve \mathfrak{C} nicht dem Inneren, sondern dem Rande des Regularitätsbereiches angehört. Das leistet die *Goursatsche* Fassung des Beweises.¹⁰⁾¹¹⁾ Auf Grund der *Weierstraßschen* Definition der analytischen Funktion hat

einen sie verbindenden Polygonzug besitzen und deren Randpunkte eine zusammenhängende Menge bilden, eine Menge also, die sich nicht in zwei punktfremde abgeschlossene Teilmengen zerlegen läßt.

6) *E. Goursat*, a) Démonstration du théorème de *Cauchy*, Acta math. 4 (1884), p. 197—200; b) Sur la définition générale des fonctions analytiques d'après *Cauchy*, Trans. Am. math. Soc. 1 (1900), p. 14—16.

7) *A. Pringsheim*, a) Über *Goursats* Beweis des *Cauchyschen* Integralsatzes, Trans. Am. math. Soc. 2 (1901), p. 413—421; b) Zur Geschichte des *Taylorischen* Lehrsatzes, Bibl. math. (3) 1 (1900), (p. 433—479) p. 477—479; c) a. a. O. 8 e).

8) Man vgl. ferner: a) *E. H. Moore*, A simple proof of the fundamental *Cauchy-Goursat* theorem, Trans. Am. math. Soc. 1 (1900), p. 499—506; b) *L. Heffter*, Zur Theorie der reellen Kurvenintegrale, Gött. Nachr. 1902, p. 115—140; c) *L. Heffter*, Zum Beweis des *Cauchy-Goursatschen* Integralsatzes, Ebd. 1903, p. 312—316; d) *L. Heffter*, Über die von einem Integrationsweg von vornherein unabhängige Definition des bestimmten Integrales im zweidimensionalen Gebiet, Ebd. 1904, p. 196—200; e) *A. Pringsheim*, Der *Cauchy-Goursatsche* Integralsatz und seine Übertragung auf reelle Kurvenintegrale, Münch. Ber. 33 (1903), p. 673—682; f) *F. Schottky*, Über den geometrischen Begriff der Funktion einer komplexen Veränderlichen, Berlin. Ber. 1915, p. 790—798; g) *F. Schottky*, Über das *Cauchysche* Integral, J. f. Math. 146 (1916), p. 234—244.

9) Vgl. z. B. *H. Burkhardt*, Einführung in die Theorie der analytischen Funktionen einer komplexen Veränderlichen, 3. Aufl., Leipzig 1908 oder *K. Knopp*, Funktionentheorie, Bd. 1, Sammlung Goesch. Auch *Osgood* hat für die Darstellung in seinem Lehrbuch Kenntnis von den neueren Beweismethoden genommen.

10) Man vgl. z. B. die Darstellung bei *O. Stolz*, Grundzüge der Differential- und Integralrechnung II, Leipzig 1896, p. 217 ff.

11) Man vgl. ferner die spezielleren Untersuchungen von *A. Pringsheim*, Über den *Cauchyschen* Integralsatz, Münch. Ber. 25 (1895), (p. 39—72) p. 71.

kürzlich *Pringsheim*^{11a)} den Hauptsatz, den Residuensatz und andere wichtige Sätze abgeleitet.^{11b)}

3. Die Integralformel ist eine bekannte Folgerung aus dem Integralsatz. Sie lautet bekanntlich so: Wenn die geschlossene orientierte Kurve \mathcal{C} einem einfachzusammenhängenden Bereiche angehört, in welchem $f(z)$ eindeutig und von analytischem Charakter ist, und wenn sie die Stelle z einmal in positivem Sinne^{11c)} umschließt, dann gilt die Darstellung¹²⁾

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z}.$$

In den meisten Lehrbüchern pflegt die Sache so dargestellt zu werden, als handle es sich um eine unmittelbare Folgerung aus dem Integralsatz. Wenn das richtig sein soll, so muß man zu mindest aber den Integralsatz so allgemein formulieren, wie dies z. B. *O. Stolz*¹⁰⁾ getan hat. Denn sonst ist die gewöhnlich herangezogene Hilfskurve gar nicht unter den Kurven enthalten, für die der Integralsatz bewiesen wurde. Denn sie enthält ein doppelt durchlaufenes Stück, liegt somit nicht im Inneren eines einfach zusammenhängenden Regularitätsbereiches von $f(z)$. Aber selbst wenn man wie *K. Knopp*⁹⁾ durch Einschaltung zweier doppelt durchlaufenen Hilfsgeraden diesen Übelstand, auf den ich ihn aufmerksam machte, vermeidet, so krankt die Beweisanordnung doch noch immer daran, daß die Autoren eine anschauliche Vorstellung, keine begriffliche Fassung, des Umlaufssinnes

11a) *A. Pringsheim*, Elementare Funktionentheorie und komplexe Integration, Münch. Ber. 1920, p. 145—182. Vgl. auch *A. Pringsheim*, Zur Theorie der synektischen Funktionen, Münch. Ber. 1896, p. 167—182.

11b) Vgl. auch *A. Kneser*, Die elementare Theorie der analytischen Funktionen und die komplexe Integration, Münch. Ber. 1920, p. 65—81.

11c) Damit ist gemeint, daß bei Durchlaufung der Kurve im vorgeschriebenen Sinne $\log(\xi - z)$ genau um $2\pi i$ zunimmt.

12) Wenn $\varphi(\xi)$ auf der rektifizierbaren Randkurve \mathcal{C} von B stetig ist, so stellt bekanntlich das Integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

eine in B analytische Funktion dar, deren unter Umständen in irgend einem Sinne existierende Randwerte aber mit $\varphi(\xi)$ nicht übereinzustimmen brauchen. Indessen bestehen gewisse Beziehungen, mit welchen sich die folgenden Arbeiten befassen: a) *M. Hamburger*, Über das Cauchysche Integral, Sitzungsber. Berl. math. Ges. 2 (1903), p. 17—25; b) *J. Plemelj*, Ein Ergänzungssatz zur Cauchyschen Integraldarstellung analytischer Funktionen, Randwerte betreffend, Monatsh. Math. Phys. 19 (1908), p. 205—210; c) *D. Pompéju*, Sur les fonctions représentées par des intégrales définies, Ann. sc. d. Ac. d. Porto 5 (1910), p. 214—219 (dazu *E. Borel*, a. a. O. 138 c), p. 3, Fußnote 1); d) *W. Gross*, Eine Bemerkung zum Cauchyschen Integral, Monatsh. Math. Phys. 28 (1917), p. 238—242.

benutzen. Daher liegt es nahe, den Beweis dadurch zu führen, daß man durch $\log(\xi - z)$ den Bereich auf einen schlichten einfach zusammenhängenden Hilfsbereich abbildet, in dem dann die übliche Hilfskurve wieder geschlossen liegt. (Näheres im ersten Band meines demnächst erscheinenden Lehrbuches der Funktionentheorie.) Die Beweisanzordnung von *Schottky*⁸⁾ bietet besondere Vorteile.

4. Erweiterungen. Man kann in mannigfacher Weise die *Cauchy-Riemannsches* Definition noch erweitern, an den gemachten Annahmen mannigfache Abstriche vornehmen. Immer handelt es sich darum festzustellen, daß Teile der gemachten Annahmen sich aus dem Rest derselben erschließen lassen. Der älteste in diese Richtung zielende Satz ist der *Riemannsches* über hebbare Unstetigkeiten:

Wenn eine Funktion in der Umgebung einer Stelle eindeutig, analytisch und beschränkt ist, so existiert ein Grenzwert von $f(z)$ bei Annäherung an diese Stelle. Wenn man die Funktion an der kritischen Stelle dadurch erklärt, daß man sie diesem Grenzwert gleichsetzt, so ist die neue Funktion auch an der kritischen Stelle selbst analytisch geworden.¹³⁾

Es liegt auf der Hand, daß man auch endlichviele solche kritische Stellen, ja unendlichviele zulassen kann. Näheres darüber wird in Nr. 13 bei Besprechung der singulären Stellen gesagt werden.

Man pflegt häufig die vorausgesetzte Differenzierbarkeit durch das Bestehen der *Cauchy-Riemannsches* Differentialgleichungen auszudrücken. Natürlich folgen diese Differentialgleichungen aus der Differenzierbarkeit von $f(z)$. Aber aus dem Bestehen dieser Differentialgleichungen folgt noch nicht ohne weiteres die Differenzierbarkeit von $f(z)$. Denn die partiellen Ableitungen enthalten nur Grenzübergänge in zwei bestimmten Richtungen, während in der Ableitung $f'(z)$ ein allgemeinerer Grenzübergang steckt. Erst aus der vollständigen Differenzierbarkeit^{13a)} von Real- und Imaginärteil folgt die Existenz der Ableitung $f'(z)$. Diese vollständige Differenzierbarkeit folgt z. B. aus der Stetigkeit dieser partiellen Ableitungen als Funktionen der beiden Variablen x und y ($z = x + iy$). Ob sie schon aus der Stetigkeit dieser partiellen Ableitungen als Funktionen einer jeden *einzelnen* der beiden Variablen folgt, scheint eine noch offene Frage zu sein.¹⁴⁾ In

13) Viele der älteren Beweise sind mißlungen. Neuere siehe unter 45).

13a) D. h. $|\varphi(x, y) - (x - x_0)\varphi_x(x_0, y_0) - (y - y_0)\varphi_y(x_0, y_0)|$
 $< \varepsilon \{|x - x_0| + |y - y_0|\}$

für jedes positive ε bei genügend kleinen

$|x - x_0|$ und $|y - y_0|$.

14) *L. Heffter*, a. a. O. 8b), p. 132.

diese Richtung zielt allerdings ein Satz, den *Montel*¹⁵⁾ gewonnen hat: Die eindeutige Funktion $w = f(z)$ ($w = u + iv$, $z = x + iy$) sei in einem Bereiche B beschränkt. Die vier partiellen Ableitungen u_x , u_y , v_x , v_y sollen überall mit Ausnahme einer Menge vom Maße Null existieren, beschränkt sein und den *Cauchy-Riemannschen* Differentialgleichungen genügen. Dann ist $f(z)$ von analytischem Charakter. Aus dem *Montelschen* Satze würde also z. B. folgen, daß $f(z)$ analytisch ist, wenn es in einem Bereiche B eindeutig und stetig erklärt ist, wenn dazu der Differentialquotient $f'(z)$ überall mit Ausnahme einer Menge vom Maße Null existiert und zudem beschränkt ist.¹⁶⁾

In anderer Richtung liegt ein schönes Ergebnis von *H. Bohr*¹⁷⁾. Aus der Existenz von

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

folgt offenbar die Existenz sowohl von

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right|$$

als von

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \arg \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Eine Funktion, für die der erste Grenzwert existiert, möge streckentreu, eine, für die der zweite existiert, möge winkeltreu heißen. *H. Bohr* hat bemerkt, daß nicht alle streckentreuen Funktionen analytisch oder zu analytischen konjugiert sind. Setzt man aber noch voraus, daß $f(z)$ eine schlichte Abbildung eines Bereiches vermittelt, daß sie eindeutig und streckentreu ist und daß bei der Abbildung der Umlaufssinn erhalten bleibt, dann ist $f(z)$ analytisch. (Vgl. hierzu auch II C 3 (*Lichtenstein*), Nr. 11.)¹⁸⁾

15) *P. Montel*, a) Sur les suites infinies de fonctions, Ann. Éc. Norm. (3) 24 (1907), (p. 233—334) p. 298—334; b) Sur les différentielles totales et les fonctions monogènes, Paris C. R. 156 (1913), p. 1820—1822.

16) Weitere Untersuchungen in ähnlicher Richtung rühren von verschiedenen Autoren her: a) *L. Lichtenstein*, α) Sur la définition générale des fonctions analytiques, Paris C. R. 150 (1910), p. 1109—1110; β) Über einige Integrabilitätsbedingungen zweigliedriger Differentialausdrücke mit einer Anwendung auf den *Cauchyschen* Integralsatz, Sitzber. Berl. math. Ges. 9 (1910), p. 84—100; b) *Ch. de la Vallée-Poussin*, Réduction des intégrales doubles de *Lebesgue*. Application à la définition des fonctions analytiques, Ac. r. de Belgique, Bull. de la classe des sc. 1910, Nr. 11, p. 793—798; c) *H. Rademacher*, Bemerkungen zu den *Cauchy-Riemannschen* Differentialgleichungen und zum *Moreraschen* Satz, Math. Ztschr. 4 (1919), p. 177—185.

17) *H. Bohr*, Über streckentreue und konforme Abbildung, Math. Ztschr. 1 (1918), p. 403—420. Einen einfacheren Beweis gab *H. Rademacher*, Über streckentreue und winkeltreue Abbildung, Math. Ztschr. 4 (1919), p. 131—138.

18) Mit solchen Fragen hat sich schon vorher *R. Remak* befaßt: Über

5. Begriff der analytischen Funktion. Die Vorstellung oder der Begriff der analytischen Fortsetzung spielte sowohl bei *Riemann* wie bei *Weierstraß* eine beherrschende Rolle. Während er aber bei *Riemann* und seinen Nachfolgern mehr als eine zur Vorstellung der *Riemannschen* Fläche hinführende nicht ins einzelne ausgeführte Idee auftritt, hat *Weierstraß* diese Vorstellung mit voller begrifflicher Schärfe durchdrungen. Sie hat ihn zum Begriff der analytischen Funktion geführt, der auch bei *Riemann* aber mehr in anschaulicher als begrifflicher Klarheit auftritt. Der Ausgangspunkt liegt immer in der Bemerkung, daß zwei in einem Bereiche analytische Funktionen dann durchweg übereinstimmen, wenn dies nur in einer Punktmenge zutrifft, welche einen dem Bereichinneren angehörigen Häufungspunkt besitzt. Daraus ergibt sich nun wieder das Streben, eine in einem Bereiche definierte analytische Funktion wenn möglich auch über diesen Bereich hinaus zu verfolgen. Diesem Bestreben hat *Weierstraß* eine präzise Fassung gegeben durch seinen Begriff der analytischen Fortsetzung. Wenn eine analytische Funktion in einem Kreise durch ihre Potenzreihenentwicklung gegeben ist, so ist es möglich, daß die Entwicklung derselben Funktion an einer vom Mittelpunkt des Kreises verschiedenen Stelle des Kreises noch in Stellen konvergiert, die dem ersten Kreise nicht mehr angehören. Dann wird durch die neue Entwicklung eine Fortsetzung der gegebenen Funktion erklärt. Jede der Entwicklungen stellt ein *Funktionselement* dar. Man sagt, das zweite Element gehe aus dem ersten durch unmittelbare analytische Fortsetzung hervor. Den eben beschriebenen Prozeß kann man iterieren, um so immer neue Elemente zu erhalten. Ihre Gesamtheit erschöpft die analytische Funktion. Man überzeugt sich leicht, daß jedes der Elemente alle übrigen bestimmt.

Unter einer analytischen Funktion versteht man also die Gesamtheit der Funktionselemente, die man aus einem derselben durch Iteration des Prozesses der unmittelbaren analytischen Fortsetzung erhalten kann.

Durch eine Erweiterung des Begriffes „Funktionselement“ gelangt man von hier zum *analytischen Gebilde*. Man kann kurz sagen, es gehe aus der analytischen Funktion dadurch hervor, daß man die Stellen rationalen und die Stellen algebraischen Charakters mit in Betracht zieht. Ein solches allgemeines Element erscheint so entweder in einer der Formen $w = \mathfrak{P}(\sqrt[n]{z} - a)$, $\mathfrak{P}\left(\sqrt[n]{\frac{1}{z}}\right)$, wo $\mathfrak{P}(\sqrt[n]{z})$ eine Potenzreihe in $\sqrt[n]{z}$ (n ganzzahlig) mit endlich vielen negativen Potenzen

winkeltreue und streckentreue Abbildung an einem Punkt und in der Ebene, Rend. di Palermo 38 (1914), p. 193—246.

ist, oder aber in der allgemeineren Gestalt der Parameterdarstellung

$$w = \mathfrak{P}(t), \quad z = \mathfrak{Q}(t),$$

wo jede der beiden Potenzreihen nach ganzen Potenzen von t fortschreitet und nur endlich viele negative Potenzen von t enthält. Durch unmittelbare Fortsetzung eines solchen allgemeineren Elementes erhält man nur polfreie Elemente. Daher bedarf auch der Begriff der analytischen Fortsetzung einer gewissen Erweiterung, wenn man wieder sagen will, daß alle Elemente eines analytischen Gebildes durch analytische Fortsetzung aus einem derselben entstehen. Es reicht nicht aus, diesen Begriff wieder als Iteration des Prozesses der unmittelbaren Fortsetzung zu erklären. Vielmehr gehört ein Element dann und nur dann dem durch ein Element erklärten analytischen Gebilde an, wenn es ein reguläres Element gibt, das aus beiden durch Iteration des Prozesses der unmittelbaren Fortsetzung erhalten werden kann.¹⁹⁾

6. Riemannsche Mannigfaltigkeiten. Das ist die begrifflich scharfe Fassung einer Vorstellung, die auch die *Riemannsche* Theorie beherrscht. Namentlich liegt sie der Idee der *Riemannschen* Fläche zugrunde. Ursprünglich waren diese Gebilde für *Riemann* weiter nichts als anschauliche Hilfsmittel. Und mehr bedeuteten sie auch zunächst für seine Nachfolger nicht, auch wenn diese wie z. B. *Koenigsberger* die Idee der *Riemannschen* Fläche aus dem *Weierstraßschen* Prozeß der analytischen Fortsetzung heraus entwickelten. Doch wurde damit eine Auffassung vorbereitet, die mit der Zeit mehr und mehr in den Vordergrund gerückt wurde, und die neuerdings durch *Weyl*¹⁹⁾ ihre begrifflich scharfe Fassung erhalten hat. Das ist die Erkenntnis, daß die Einführung der *Riemannschen* Fläche weiter nichts bedeutet als die Hervorhebung gewisser geometrischer Eigenschaften der analytischen Funktionen. Damit werden die allgemeinen geometrischen Methoden, namentlich die der Topologie für die Funktionentheorie verfügbar. Und das ist ein Umstand, den sich bereits *Riemann* selbst zunutze gemacht hat, z. B. bei seiner Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer Integrale. In mehr und mehr bewußter Weise hat nach ihm *Klein* das geometrische Moment in den Vordergrund geschoben, freilich wohl auch mit dem Bewußtsein, daß die wirklich begrifflich scharfe Durchführung der anschaulich so bestechenden Gedankengänge mit Notwendigkeit zu erheblichen Schwierigkeiten führen mußte. Aus dieser Wurzel ist eine ganze geometrische Funktionentheorie erwachsen, die sich namentlich an die Lehre von der konformen Abbildung anschließt. Der Umstand endlich, daß man *Rie-*

19) Zum Ganzen: *H. Weyl*, Die Idee der *Riemannschen* Fläche, 1913.

mannsche Flächen auch losgelöst von ihrer Entstehung aus einer analytischen Funktion betrachten kann, legte die umgekehrte Frage nahe, ob jede *Riemannsche* Fläche als *Riemannsche* Fläche einer bestimmten Funktion angesehen werden kann.

Bevor wir den in unseren Zeitraum fallenden Lösungen dieses Hauptproblems uns zuwenden, müssen wir einen Blick auf die Entwicklung des Begriffes der *Riemannschen* Fläche selbst werfen.

Schon bei *Riemann* treten neben den mehrblättrigen Flächen durch Ränderzuordnung geschlossene Flächen auf. Auch der Begriff des funktionentheoretischen Fundamentalbereiches, weist ganz in diese Richtung. Dann kommen, auf eine mündliche Bemerkung *Pryms* zurückgehend, *Kleins* frei im Raume gelegene *Riemannsche* Flächen in Betracht.²⁰⁾ Endlich tritt bei *Klein* zuerst die allgemeine Vorstellung der *Riemannschen* Fläche (besser der *Riemannschen* Mannigfaltigkeit) hervor.²⁰⁾ Aus diesen Elementen hat *H. Weyl*²²⁾ unter Heranziehung der *Koenigsbergerschen* Erzeugung der *Riemannschen* Flächen aus dem *Weierstraßschen* Begriff der analytischen Funktion und des analytischen Gebildes heraus einen einheitlichen Aufbau der Theorie der *Riemannschen* Flächen geschaffen, dessen strenge Begründung ein oft gefühltes Bedürfnis befriedigt. Man hat also drei Sorten von *Riemannschen* Gebilden zu unterscheiden: die *Riemannschen* Felder²³⁾, die *Riemannschen* Flächen, die *Riemannschen* Mannigfaltigkeiten. Versteht man unter der Umgebung eines Funktionselementes diejenigen Elemente, die man aus demselben durch unmittelbare analytische Fortsetzung erhalten kann, so überzeugt man sich leicht, daß die Gesamtheit aller Elemente einer ana-

20) *F. Klein*, a) Über *Riemanns* Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer Integrale, Leipzig 1882; b) Neue Beiträge zur *Riemannschen* Funktionentheorie, Math. Ann. 21 (1883), p. 141—248; c) Über den Begriff des funktionentheoretischen Fundamentalbereiches, Math. Ann. 40 (1892), p. 130—139. Schon früh hat *E. Beltrami* analytische Funktionen auf krummen Flächenstücken betrachtet. Er hat so den *Kleinschen* Standpunkt vorbereitet. Vgl. *E. Beltrami*, Delle variabili complesse sopra una superficie qualunque, Ann. di mat. (2) 1 (1867/68), p. 329—366.

21) *P. Koebe*, a) Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven III, Gött. Nachr. 1908, p. 337—358; b) Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung III: Der allgemeine Fundamentalsatz der konformen Abbildung nebst einer Anwendung auf die konforme Abbildung der Oberfläche einer körperlichen Ecke, J. f. Math. 147 (1917), p. 67—103.

22) *H. Weyl*, a) a. a. O. 19); b) Strenge Begründung der Charakteristiken-theorie auf zweiseitigen Flächen, Jahresber. d. Deutsch. Math.-Ver. 25 (1916), p. 265—278.

23) Die Benennung rührt von *R. Fricke* her, Die elliptischen Funktionen und ihre Anwendungen, Leipzig 1916, p. 24.

lytischen Funktion eine Fläche ausmachen in dem von *H. Weyl* präzise festgelegten Sinn.²⁴⁾ Man muß nur statt Element der Funktion Punkt der Fläche sagen, muß also nur die Benennung ändern und die Umgebung eines Punktes in der eben angegebenen Weise erklären, um aus einer analytischen Funktion die zugehörige *Riemannsche* Fläche zu erhalten. Unter der Koordinate eines so erklärten Flächenpunktes versteht man das Funktionselement, das dem Punkt entspricht. Durch die Funktion $w = f(z)$ wird die Umgebung eines jeden Flächenpunktes auf ein schlichtes Gebiet der z -Ebene abgebildet. Wegen dieser Beziehung zur analytischen Funktion $w = f(z)$ heißt die *Riemannsche Fläche* „über der z -Ebene ausgebreitet“. Mit *Fricke* bezeichne ich diese Art von *Riemannschen* Flächen als *Riemannsche Felder*.

Durch Hinzunahme der Elemente rationalen und algebraischen Charakters gelangt man vom *Riemannschen* Felde zur *Riemannschen* Fläche. In dem damit gegebenen Sinne wollen wir fortan dies Wort gebrauchen. Auch sie erscheint über der z -Ebene ausgebreitet. Da aber bei der Darstellung der Elemente durch z gebrochene Potenzen auftreten, erscheint es zweckmäßig, Parameterdarstellungen der Elemente einzuführen: Durch die gewöhnlichen Potenzreihen $z = z(t)$ und $w = w(t)$ wird ein Funktionselement definiert, wenn diese Reihen nur endlich viele negative Potenzen enthalten, und einen Konvergenzkreis von nicht verschwindendem Radius gemeinsam haben. Natürlich liefern alle Reihenpaare, die auseinander durch umkehrbar eindeutige umkehrbar analytische Parametertransformation hervorgehen, dasselbe Element. Elemente werden fortgesetzt, indem man die Reihenpaare einer geeignet gewählten Parameterdarstellung fortsetzt.^{24a)} Die Gesamtheit der so erhaltenen Elemente macht wieder das analytische Gebilde aus. Sagt man wieder statt „Element der Funktion“ „Punkt der *Riemannschen* Mannigfaltigkeit“ und erklärt die Umgebung eines Punktes durch die durch unmittelbare Fortsetzung aus dem entsprechenden Elemente hervorgehenden Elemente, so erhält man den Begriff der *Riemannschen* Mannigfaltigkeit, bei der also wegen der Parameterdarstellung keine unmittelbare Beziehung auf eine z -Ebene vorhanden ist. Die Umgebung eines jeden Punktes derselben erscheint also durch das zugehörige Element auf ein schlichtes Stück der t -Ebene abgebildet. Daher nennt man t einen lokalen uniformisierenden Parameter oder kurz Ortsparameter der Mannigfaltigkeit. Eine jede so erhaltene Mannigfaltigkeit kann nach *Weyl*¹⁹⁾ trianguliert werden; d. h. man kann die ganze Mannigfaltigkeit in dreieckige Elemente zerlegen, die keine

24) *H. Weyl*, a. a. O. 19), dazu eine Berichtigung, *Math. Ann.* 77 (1916), p. 349.

24 a) Vgl. die Bemerkung am Ende der Nr. 5 dieses Aufsatzes.

inneren Punkte gemein haben. Wir sahen nämlich gerade, daß jedes Element bei bestimmt gewählter Parameterdarstellung die schlichte Abbildung eines bestimmten Stückes der Mannigfaltigkeit auf einen Bereich der Parameterebene liefert. Man kann nun abzählbar viele solche Elemente in geeigneter Parameterdarstellung auswählen, die in ihrer Gesamtheit schlichte Abbildungen der ganzen Mannigfaltigkeit liefern. Man kann es so einrichten, daß jedem Element ein schlichtes Dreieck der Parameterebene entspricht. Die Seitenpaare der verschiedenen Dreiecke erscheinen durch umkehrbar eindeutige analytische Abbildung einander zugeordnet. An diese Betrachtung schließt sich die *Koebesche*²¹⁾ Formulierung des Begriffes der *Riemannschen Mannigfaltigkeit* an.

Die Ortsparameter dienen auch zur Erklärung des Begriffes einer auf der Fläche oder auf der Mannigfaltigkeit analytischen Funktion. Wenn eine Funktion in der Umgebung einer Stelle der Mannigfaltigkeit erklärt ist, so heißt sie dort von analytischem Charakter, wenn sie als analytische Funktion eines zur Stelle gehörigen Ortsparameters aufgefaßt werden kann.

So gibt also jede analytische Funktion Anlaß zur Einführung der eben betrachteten zweidimensionalen geometrischen Gebilde. Man kann aber nun von vornherein derartige zweidimensionale Mannigfaltigkeiten betrachten, losgelöst von ihrer Beziehung auf bestimmte analytische Funktionen, aus welchen sie entstanden waren. Nur muß für jeden Punkt der Fläche festgelegt sein, was man unter einer in seiner Umgebung auf der Fläche analytischen Funktion verstehen soll. Die allgemeinste Fassung erhält diese Vorstellung in dem Begriff der *Riemannschen Mannigfaltigkeit*, den im wesentlichen *Klein*²⁰⁾ entdeckt hat. Man kann mit *Koebe*²¹⁾ so erklären: Man denke sich in der komplexen t -Ebene eine abzählbare Menge von schlichten Dreiecken, welche durch je drei noch in den Ecken analytische Kurven begrenzt sind. Die Ränder derselben sollen paarweise durch umkehrbar eindeutige analytische Abbildungen einander zugeordnet sein. Durch diese Zuordnungen schließen sich die dreieckigen Elemente zu einer zusammenhängenden zweidimensionalen Mannigfaltigkeit, der *Riemannschen Mannigfaltigkeit* zusammen. Man erkennt, wie alle bisher betrachteten Mannigfaltigkeiten als spezielle Fälle in dieser Vorstellung enthalten sind. Man kann aber auch den Begriff der *Riemannschen Mannigfaltigkeit* auf kreisförmige *Wcierstraßsche* Elemente aufbauen, statt ihn wie *Koebe* von dreieckigen Elementen ausgehend zu erklären. Man hat dann etwa so zu verfahren: In der komplexen z -Ebene sei eine abzählbare Menge schlichter oder endlichvielblättriger Kreisscheiben gegeben. Zwischen denselben wird durch gewisse umkehrbar eindeu-

tige analytische Abbildungen ein Zusammenhang hergestellt. Wenn so zwei Elemente verbunden erscheinen, so geschieht es auf folgende Weise. Von jedem der beiden Elemente ist durch eine zwei seiner Randpunkte verbindende analytische Kurve ein sichelförmiges Gebiet abgegrenzt. Durch umkehrbar eindeutige analytische Abbildung sind diese sichelförmigen Stücke paarweise aufeinander bezogen. Doch muß für diese Zuordnungen noch die Gruppeneigenschaft bestehen: Wenn zwei einem Element zugehörige Sichel ein Stück gemeinsam haben, das also durch zwei Abbildungen auf zwei verschiedene andere Elemente bezogen ist, so sollen diese beiden Elemente in Sichel aufeinander bezogen sein, welchen die Bilder jenes gemeinsamen Stückes angehören. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß zwecks Berücksichtigung des Unendlichen auch das Äußere gewisser Kreise herangezogen werden muß.

Diese Begriffsbildung führt mit Notwendigkeit zu dem Grundproblem der *Riemannsches* Funktionentheorie hin, nämlich zu der Frage, ob jede so zu bildende *Riemannsches* Mannigfaltigkeit als *Riemannsches* Mannigfaltigkeit einer analytischen Funktion aufgefaßt werden kann, oder ob diejenigen *Riemannsches* Mannigfaltigkeiten, für welche das zutrifft, etwa noch besonderen Bedingungen genügen müssen. Daß dies nicht so ist, daß vielmehr jede *Riemannsches* Mannigfaltigkeit als *Riemannsches* Mannigfaltigkeit analytischer Funktionen aufgefaßt werden kann, ist ein Satz, den *Klein* als erster aussprach, den aber erst *Koebe*²¹⁾ in voller Allgemeinheit zu beweisen vermochte. Bald darauf hat auch *L. Bieberbach*²⁵⁾ einen Beweis des Satzes geliefert, dessen prinzipieller Fortschritt gegenüber dem *Koebesches* darin besteht, daß er unter Vermeidung aller topologischen Hilfsmittel vollständig im Rahmen der *Weierstraßsches* Theorie geführt wird.

Man wird bemerken, daß durch diese Begriffsbildungen und Gedankengänge sich eine Einordnung der *Riemannsches* Ideen in die *Weierstraßsches* Theorie anbahnt. Zu *Weierstraß'* Zeiten mußte allerdings ein Aufbau der Theorie auf so vagen Ideen fast als wissenschaftlich ungenügend erscheinen und ich möchte aus mancher Andeutung schließen, daß *Weierstraß* sogar von noch schärferer Auffassung nicht zu weit entfernt war. Indessen muß man zugeben, daß ihr wie allem, wofür sich *Riemann* und sein Nachfolger *Klein* einsetzten, ein Zug ins Große anhaftet. Und es ist in der Tat eine Erkenntnis von großer prinzipieller Bedeutung, daß gewisse funktionentheoretische Wahrheiten als Spezialfälle allgemeinerer geometrischer

25) *L. Bieberbach*, Über die Einordnung des Hauptsatzes der Uniformisierung in die *Weierstraßsches* Funktionentheorie, *Math. Ann.* 78, (p. 312—334) p. 314.

Wahrheiten aufgefaßt werden können. Aber daraus möchte ich doch nicht den Schluß ziehen, daß es *einzig richtig* ist, derartige Sätze wie z. B. die über das Geschlecht mit rein geometrischen Methoden zu beweisen. Vielmehr sehe ich eine wichtige Aufgabe der Weiterentwicklung der Theorie und der weiteren Verschmelzung *Riemann-Kleinschen* Schwunges mit *Weierstraßscher* Herbe darin, auch Geschlechtsätze, überhaupt alles, was heute noch topologisches Denken oder gar topologische „Anschauung“ zu erfordern scheint, den Methoden der Analysis zugänglich zu machen. Das ist eine Aufgabe, die bisher erst zu einem Teil in der Theorie der Uniformisierung²⁵⁾ gelöst ist. Auf diesem Wege ist dann wohl auch ein einfacherer Aufbau der Theorie zu erhoffen — ähnlich wie in der Theorie der elliptischen Funktionen — einfacher als er in der *Weylschen* geometrischen Theorie bisher vorliegt.

Man wird weiter bemerken, daß durch die Parallelisierung der Begriffe „*Riemannsche* Fläche“ und „analytische Funktion“ das *Riemannsche* Hauptproblem auch ein für die *Weierstraßsche* Auffassung durchaus verständliches und wichtiges wird. Aber für die *Riemannsche* Auffassung spielt doch dieses Problem eine viel größere Rolle. Es liegt ja im Zuge der *Riemannschen* Theorie, eine Funktion zunächst einmal durch ihren Gesamtverlauf, ihren Verzweigungscharakter, ihre singulären Stellen zu definieren und dann erst nach der speziellen Werteverteilung zu fragen, die mit solchen Bedingungen verträglich ist. Nach wie vor aber bleibt es Grundproblem der *Weierstraßschen* Theorie, eine Funktion, die durch ein erstes Element gegeben ist, in ihren Schicksalen zu verfolgen, also Methoden zu entwickeln, welche es erlauben, aus den Koeffizienten des ersten Elementes auf den Gesamtverlauf zu schließen. Während nun die *Riemannsche* Theorie kaum irgendwo so weit gediehen ist, die Frage zu beantworten, welche Koeffizienteneigenschaften das erste Element haben muß, wenn die *Riemannsche* Fläche der zugehörigen Funktion diese oder jene Eigenschaft haben soll, so ist die *Weierstraßsche* Theorie wenigstens in einigen Fällen dazu gediehen, das Problem der Fortsetzung eines Elementes restlos zu lösen, so daß man manchmal aus den Koeffizienteneigenschaften auf die Struktur der *Riemannschen* Fläche oder auf die Lage der Singularitäten schließen kann. Weit ist man dagegen in der näheren Untersuchung eines einzelnen Zweiges gediehen. Die *Riemannsche* Theorie hinwieder hat in der Lösung des Uniformisierungsproblems schöne Triumphe gefeiert, ferner in der Theorie der algebraischen Funktionen den Wettbewerb mit anderen Theorien ausgehalten und sich in der Lehre von den automorphen Funktionen bewährt. Schon diese Beispiele zeigen, daß die *Riemannschen* Frage-

stellungen sämtlich auch für die *Weierstraßsche* Theorie wichtig sind, während die *Weierstraßschen* vielleicht einem Anhänger der *Riemannschen* Theorie minder wichtig erscheinen mögen. Aber wie dem auch sei, die Gegensätze schwinden immer mehr und die Funktionentheorie ist auf dem besten Wege ein einheitlicher Bau zu werden. Hält es doch bei vielen Fragen heute schon schwer, zu entscheiden, ob das nun Fragen der *Riemannschen* oder der *Weierstraßschen* Theorie sind. Darum soll auch in diesem Berichte weiter nicht mehr geschieden werden.

7. Uniformisierung. Das Problem der Uniformisierung ist das der eindeutigen Parameterdarstellung der analytischen Funktionen. Wenn also $w = f(z)$ eine analytische Funktion ist, so sollen zwei eindeutige Funktionen $z(t)$ und $w(t)$ derart gefunden werden, daß für alle t : $w(t) = f(z(t))$ ist und daß man durch Elimination von t aus den Elementenpaaren rationalen Charakters der beiden Funktionen $z(t)$ und $w(t)$ alle Elemente algebraischen Charakters der Funktion $f(z)$ erhält. Wie aus dem Artikel II B 4 (*Fricke*, Nr. 36) näher zu ersehen ist, hat zunächst *Klein* im algebraischen Fall die Überzeugung von der Lösbarkeit dieses Problems gewonnen und hat auch die ersten Beweisansätze geliefert. Daß das Problem auch für allgemeinere analytische Funktionen mindestens eine Lösung besitzt, hat *Poincaré*²⁶⁾ im Jahre 1883 zunächst für den Spezialfall gezeigt, wo die Funktion $w = f(z)$ drei Werte ausläßt. Der Beweis des allgemeinen Satzes gelang erst im Jahre 1907 ungefähr gleichzeitig *Poincaré*²⁷⁾ und *Koebe*²⁸⁾. Wir brauchen hier nur in großen Zügen auf diese Dinge einzugehen, weil in dem schon erwähnten Artikel über automorphe Funktionen und in dem Artikel II C 3 (*Lichtenstein*) über konforme Abbildung ganz ausführlich darüber gehandelt ist.

Der ursprüngliche *Poincarésche* Ansatz, der auf eine mündliche durch *Klein* am 14. Mai 1882 brieflich an *Poincaré* übermittelte Äußerung von *H. A. Schwarz* zurückgeht, zerlegt das Problem in zwei Teile, einen topologischen und einen funktionentheoretischen. Im topologischen Teil wird die *Riemannsche* Fläche der Uniformisierungstranzendenten als Überlagerungsfläche aus der *Riemannschen* Fläche von $w = f(z)$ aufgebaut, d. h. es wird diejenige *Riemannsche*

26) *H. Poincaré*, Sur un théorème de la théorie générale des fonctions, S. M. F. Bull. 11 (1883), p. 112—125. Auch den algebraischen Stigmatafall behandelt *Poincaré* als erster.

27) *H. Poincaré*, Sur l'uniformisation des fonctions analytiques, Acta. math. 31 (1907), p. 1—64.

28) *P. Koebe*, Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven, Gött. Nachr. 1907, p. 197—210.

Fläche konstruiert, auf welcher alle relativ zur *Riemannsches* Fläche von $w = f(z)$ unverzweigten Funktionen eindeutige Funktionen des Ortes sind. Diese Fläche erweist sich als einfachzusammenhängend. Und damit ist das Problem der Uniformisierung auf die Frage zurückgeführt, ob eine solche unendlichvielblättrige einfachzusammenhängende Fläche, ähnlich wie dies seit *Riemann* für die schlichten Bereiche allgemein bekannt war, auf die Fläche eines Kreises umkehrbar eindeutig konform abgebildet werden könne.

Dieser Ansatz birgt eine Menge von Worten und anschaulichen Vorstellungen, die erst nach 1907 ihre volle begriffliche Klärung gefunden haben.

Zunächst die *Überlagerungsfläche*. Eine *Riemannsches* Fläche heißt Überlagerungsfläche einer gegebenen, wenn jede auf der gegebenen eindeutige Funktion auch auf der neuen Fläche eindeutig ist. Solcher Flächen gibt es natürlich eine reiche Menge. Unter allen diesen hebt der *Schwarzsche* Ansatz eine als besonders wichtig hervor; das ist die, auf welcher nicht nur alle auf der gegebenen Fläche schon im ganzen eindeutigen Funktionen, sondern auch alle die eindeutig sind, welche nur in der Umgebung einer jeden Stelle der gegebenen Fläche eindeutig sind. Auch sie sind auf der Überlagerungsfläche jetzt eindeutige Funktionen des Ortes. Man kann das auch so ausdrücken: Die Umgebung einer jeden Stelle der *Riemannsches* Fläche von $w = f(z)$ kann auf ein schlichtes Flächenstück abgebildet werden. $t = t(z)$ sei eine Funktion, die das leistet. Man nennt dann t einen lokalen uniformisierenden Parameter. Setzt man $t = t(z)$ über die *Riemannsches* Fläche von $w = f(z)$ fort, so wird im allgemeinen nicht die Umgebung einer jeden Stelle durch $t = t(z)$ schlicht abgebildet werden, ja im allgemeinen kann man $t(z)$ gar nicht über die ganze Fläche analytisch fortsetzen. Der Uniformisierungssatz aber behauptet, daß es Funktionen $t(z)$ gibt, welche diese Eigenschaften besitzen. $t(z)$ muß dann also eine schlichte Abbildung der ganzen *Riemannsches* Fläche von $f(z)$ liefern. Schon das Beispiel des elliptischen Integrals erster Gattung zeigt aber, daß diese Abbildung im allgemeinen nicht umkehrbar eindeutig sein kann, wie bei den Flächen der unikursalen Kurven. $t(z)$ ist daher eine auf der Fläche mehrdeutige, wenn auch in der Umgebung einer jeden Stelle eindeutige Funktion, deren *Riemannsches* Fläche also eine Überlagerungsfläche der gegebenen sein muß. Es war ein glücklicher Gedanke, unter allen möglicherweise in Betracht kommenden Überlagerungsflächen eine zu suchen, auf der alle relativ zur Fläche von $w = f(z)$ unverzweigten Funktionen eindeutig sind. Denn auf ihr ist jedenfalls auch eine jede Uniformisierungsfunktion eindeutig. Man kommt damit nämlich um ein

näheres Eingehen auf den möglichen Gesamtverlauf der Uniformisierungsfunktion herum. Allerdings ist es dann wieder ein besonderer Glücksfall, daß die so gefundene Fläche wirklich auf einen schlichten Bereich konform abgebildet werden kann. Aber die Erkenntnis, daß die so gefundene Fläche einfach zusammenhängend sei, konnte hier den Glauben an den Erfolg stärken.

Die Konstruktion der Fläche, die begriffliche Fassung der Vorstellung „einfach zusammenhängend“, sind allerdings wieder Probleme für sich, die erhebliche Schwierigkeiten boten. *Koebe*²⁹⁾ und seine Vorgänger gehen z. B. stets von der fertigen Fläche von $f(z)$ aus, zerschneiden dieselbe und bauen dann aus der zerschnittenen Fläche die Überlagerungsfläche auf. Wesentlich einfacher ist die Erklärung und Konstruktion, welche *H. Weyl*³⁰⁾ gibt. Direkt aus dem Begriff der monogenen analytischen Funktion heraus hat *Bieberbach*²⁵⁾ die Überlagerungsfläche konstruiert.

Die Überlagerungsfläche ist einfach zusammenhängend: Diese Vorstellung ist erst durch *H. Weyl*³¹⁾ begrifflich gefaßt worden. Der Begriff wird dort losgelöst von den funktionentheoretischen Eigenschaften hingestellt. Man kann ihn auch — und das erscheint mir zweckentsprechender — im Anschluß an die Abbildung der Fläche entwickeln. Dann heißt eine Fläche einfach zusammenhängend, wenn sie auf einen schlichten einfach zusammenhängenden Bereich konform abbildbar ist.³²⁾

Bei der Abbildung der Überlagerungsfläche auf die schlichte Fläche eines Kreises können mehrere Fälle eintreten. Es kann die Vollebene herauskommen. Dann muß aber schon die ursprüngliche Fläche geschlossen und vom Geschlecht Null sein. Sie fällt dann mit allen ihren Überlagerungsflächen zusammen. Oder aber es kommt ein Kreis mit unendlichem Radius heraus, also etwa die Vollebene mit Ausschluß des unendlich fernen Punktes. Dahin gehören als wichtiger Fall z. B. die algebraischen Kurven vom Geschlechte Eins und auch gewisse transzendente unikursale Kurven. Schließlich kann ein Kreis von endlichem Radius zum Vorschein kommen. Bei der Abbildung der Überlagerungsfläche kommen also noch Fallunterscheidungen herein und das war gerade die Schwierigkeit, die *Poincaré* 1883 noch nicht überwinden konnte. Die Methoden von *Poincaré* und *Koebe* benutzen reichlich Sätze und

29) *P. Koebe*, a) Über die Uniformisierung der algebraischen Kurven I, *Math. Ann.* 67 (1909), p. 145—244; b) Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven II. Die zentralen Uniformisierungsprobleme, *J. f. Math.* 139 (1911), p. 251—292.

30) *A. a. O.* 19), p. 50 u. 51.

31) *A. a. O.* 19), p. 47.

32) Diese Fassung bei *Bieberbach a. a. O.* 25).

Hilfsmittel der Potentialtheorie. Einen ersten Schritt zur Vermeidung derselben macht *Plemelj*³³⁾. Ganz beseitigt erscheinen sie zuerst bei *Koebe*³⁴⁾ auf Kosten einer verstärkten Inanspruchnahme topologischer Hilfsmittel, und bei *Bieberbach*³⁵⁾, der den Beweis mit den Mitteln der Funktionentheorie allein führt.

Den auf den *Poincaréschen* Ansatz aufgebauten Methoden reihen sich noch einige andere Verfahrensweisen an. Die älteste ist die gleichfalls von *H. A. Schwarz*^{34,1)} ersonnene Methode des Linienelementes, die auf eine Randwertaufgabe der Differentialgleichung $\Delta u = e^u$ hinausläuft. Neben den älteren Arbeiten von *Picard* und *Poincaré* sind hier neuerdings *Bieberbach*³⁵⁾ und *Lichtenstein*³⁶⁾ zu nennen. (Vgl. auch II B 4, *Fricke*.)

Eine weitere ist die älteste von *Klein* ersonnene, von *Klein* und *Poincaré* verwendete, von *Koebe* ausgebildete Kontinuitätsmethode³⁷⁾; das Schmiegunungsverfahren³⁸⁾ reiht sich an. Während aber diese drei

33) *J. Plemelj*, Die Grenzkreisuniformisierung analytischer Gebilde, Monatsh. Math. Phys. 23 (1912), p. 297—304.

34) *P. Koebe*, a) Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven, Gött. Nachr. 1908, p. 337—358; b) Zur Theorie der konformen Abbildung und Uniformisierung, Leipzig. Ber. 66 (1914), p. 67—75. Vgl. auch Note 36) und 37).
34,1) Gött. Nachr. 1889, p. 560—561.

35) *L. Bieberbach*, a) $\Delta u = e^u$ und die automorphen Funktionen, Gött. Nachr. 1912, p. 599—602; b) $\Delta u = e^u$ und die automorphen Funktionen, Math. Ann. 77 (1916), p. 173—212.

36) *L. Lichtenstein*, a) Intégration de l'équation $\Delta u = ke^u$ sur une surface fermée, C. R. 157 (1913), p. 1508—1511; b) Integration der Differentialgleichung $\Delta_2 u = ke^u$ auf geschlossenen Flächen, Acta math. 40 (1915), p. 1—34; c) Die Methode des Bogenelementes in der Theorie der Uniformisierungstranszendenten mit Grenz- oder Hauptkreis, Gött. Nachr. 1917, p. 141—148; d) Bemerkung zu der Note: Die Methode des Bogenelementes in der Theorie der Uniformisierungstranszendenten mit Grenz- oder Hauptkreis, Gött. Nachr. 1917, p. 426. Vgl. ferner *P. Koebe*^{37b)}.

37) *P. Koebe*, a) Begründung der Kontinuitätsmethode im Gebiete der konformen Abbildung und Uniformisierung (Voranzeige), Gött. Nachr. 1912, p. 879—886; b) Dass. zweite Mitteilung, Gött. Nachr. 1916, p. 266—269; c) Zur Begründung der Kontinuitätsmethode, Leipzig. Ber. 64 (1912), p. 59—62; d) Über die Uniformisierung der algebraischen Kurven IV, Math. Ann. 75 (1914), p. 42—129.

38) *P. Koebe*, Über eine neue Methode der konformen Abbildung und Uniformisierung, Gött. Nachr. 1912, p. 844—848.

Weiter vgl. man die folgenden Arbeiten, welche alle mehr oder weniger spezielle Fragen mit besonderen Methoden behandeln: *S. Johannson*, a) Über die Uniformisierung Riemannscher Flächen mit endlicher Anzahl Windungspunkte, Acta Soc. sc. Fennicae 33 (1905), Nr. 7; b) Ein Satz über die konforme Abbildung einfach zusammenhängender Riemannscher Flächen auf den Einheitskreis, Math. Ann. 62 (1906), p. 177—183; c) Beweis der Existenz linearer polymorpher Funktionen vom Grenzkreistypus auf Riemannschen Flächen, Math. Ann. 62 (1906),

letzten genannten Verfahren auf den Fall der algebraischen Funktionen zugeschnitten sind, ist die *Hilbertsche* Methode des *Dirichletschen* Prinzips für die Uniformisierung der allgemeinen analytischen Funktionen geeignet³⁹⁾.

Letzthin hat *Bieberbach*²⁵⁾ eine neue Methode entwickelt, die man etwa als Methode der sukzessiven Uniformisierung bezeichnen könnte. *Bieberbach* knüpft an den *Weierstraßschen* Aufbau der analytischen Funktion an, und konstruiert die uniformisierende Funktion als Grenzfunktion von lokalen uniformisierenden Parametern, die ihre uniformisierende Kraft sukzessive über immer mehr durch die Fortsetzung aneinandergereihte Funktionselemente erstrecken. Jeder Anfügung eines neuen Elementes der zu uniformisierenden Funktion folgt eine Änderung des uniformisierenden Parameters auf dem Fuß, derart daß der neue Parameter eine eindeutige Darstellung aller bis dahin aneinandergereihten Elemente liefert.

Der so behandelte Satz wird am besten als Hauptsatz der Uniformisierung bezeichnet. Er beweist die Möglichkeit der Uniformisierung mit dem Zusatz, daß die Aufgabe so gelöst werden kann, daß gleichzeitig alle auf dem Gebilde $w = f(z)$ unverzweigten Funktionen mit-uniformisiert werden und daß dabei die uniformisierende Funktion selbst zu diesen unverzweigten Funktionen gehört. Diese Aufgabe kann, abgesehen von umkehrbar eindeutigen Substitutionen des Parameters, nur auf eine Weise gelöst werden. Diese Unität ist dabei wesentlich durch die auf die uniformisierende Kraft sich beziehende Bedingung gewährleistet. Läßt man diese fallen, so sind noch eine große Zahl anderer Lösungen möglich, Lösungen, bei welchen die uniformisierende

p. 184—193; d) Zur Theorie der Uniformisierung *Riemannscher* Flächen, Acta Soc. Fennicae 40 (1910), Nr. 2.

P. Koebe, a) Über die Uniformisierung reeller algebraischer Kurven, Gött. Nachr. 1907, p. 177—190; b) Zur Uniformisierung der algebraischen Kurven, Gött. Nachr. 1907, p. 410—414; c) Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven II, Gött. Nachr. 1907, p. 633—669.

39) a) *D. Hilbert*, Zur Theorie der konformen Abbildung, Gött. Nachr. 1909, p. 314—323; b) *P. Koebe*, Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven, Gött. Nachr. 1909, p. 324—361; c) *P. Koebe*, Über die *Hilbertsche* Uniformisierungsmethode, Gött. Nachr. 1910, p. 59—74; d) *P. Koebe*, Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven I. Das allgemeine Uniformisierungsprinzip, J. f. Math. 138 (1910), p. 192—353; e) *R. Courant*, Über die Anwendung des *Dirichletschen* Prinzips auf die Probleme der konformen Abbildung, Diss. Göttingen 1910; f) *R. Courant*, Zur Begründung des *Dirichletschen* Prinzips, Gött. Nachr. 1910, p. 154—160; g) *R. Courant*, Über die Methode des *Dirichletschen* Prinzips, Math. Ann. 72 (1912), p. 512—550; h) *H. Weyl*, a. a. O. 19), p. 73 ff.; i) *R. Courant*, Über die Existenztheoreme der Potential- und Funktionentheorie, J. f. Math. 144 (1914), p. 190—211.

Funktion durch ihre (größere oder kleinere) uniformisierende Kraft festgelegt werden kann, und noch allgemeinere Lösungen, bei welchen auch dies nicht möglich ist. Die Frage nach der Aufzählung aller möglichen Uniformisierungen ist kaum in Angriff genommen. Die wichtigsten sind zweifellos die schon von *F. Klein*⁴⁰⁾ formulierten Lösungen. Dahin gehören die Funktionen, welche dadurch charakterisiert sind, daß alle in gegebener Weise relativ zu $w = f(z)$ verzweigten Funktionen und nur diese eindeutig werden, daß also die uniformisierende Funktion selbst zu der zu uniformisierenden Funktionsklasse gehört. Zu seiner Lösung stehen fast alle vorhin aufgezählten Methoden zur Verfügung. Wegen der weiteren von *Klein* formulierten Probleme sei auf Artikel II B 4 (*Fricke*) verwiesen. *Bieberbach*⁴¹⁾ hat bei zwei Gelegenheiten Beispiele gegeben, die zeigen, daß mit diesen *Kleinschen* Problemen lange nicht alle Uniformisierungsprobleme erschöpft sind. *Koebe*⁴²⁾ hat aber durch sein allgemeines Uniformisierungsprinzip gezeigt, daß die volle Aufzählung im Grunde ein topologisches Problem ist: die Aufzählung aller derjenigen Überlagerungsflächen, welche eine schlichte konforme Abbildung zulassen. Man kann sehr wohl dies topologische Problem als rein gruppentheoretisches Problem formulieren. Bei der Aufzählung aller relativ zu $w = f(z)$ unverzweigten Uniformisierungsfunktionen läuft es darauf hinaus, diejenigen Untergruppen der zu $w = f(z)$ gehörigen Grenzkreisgruppe anzugeben, deren Fundamentalbereich eine Ränderzuordnung aufweist, die durch schlichte Abbildung vollzogen werden kann.

8. Begriff der singulären Stelle. Den Begriff des singulären Punktes einer analytischen Funktion haben nicht alle Verfasser unserer Epoche mit der wünschenswerten Klarheit erfaßt. Ich halte einzig und allein die folgende Definition für richtig: *Wenn die Glieder einer Kette von regulären Elementen $\mathfrak{B}(z - a)$ der Funktion $w = f(z)$ durch unmittelbare Fortsetzung auseinander hervorgehen, derart daß ihre Mittelpunkte einen einzigen Häufungspunkt haben, und ihre Konvergenzradien^{42,1)} gegen Null konvergieren,*

40) *F. Klein*, Neue Beiträge zur Riemannschen Funktionentheorie, Math. Ann. 21 (1883), p. 141—218.

41) *L. Bieberbach*, a) Zur Theorie der automorphen Funktionen, Diss. Göttingen 1910; b) a. a. O. 25).

42) *P. Koebe*, a) Über ein allgemeines Uniformisierungsprinzip, Atti del IV congresso internaz. dei mat. vol II. Roma 1909, p. 25—30; b) Sur un principe général d'uniformisation, Paris C. R. 148 (1909), p. 824—828; c) a. a. O. 39d). Vgl. auch *J. Kaufmann*, Zur Theorie der konformen Abbildung, Diss. Basel 1917.

42,1) Diese sind auf der Kugel zu messen. Ich verstehe darunter den auf der Kugel gemessenen Abstand des Entwicklungsmittelpunktes vom Rand des Konvergenzkreises.

so definiert diese Kette eine singuläre Stelle. Die z -Koordinate des Häufungspunktes ist ihre z -Koordinate. Man sagt auch, sie liege über der betreffenden Stelle der z -Ebene. Die sie bestimmende Kette nennen wir Elementarkoordinate der singulären Stelle. Wann zwei nicht identische Ketten denselben singulären Punkt festlegen, wird hernach erklärt werden. Verbindet man die Mittelpunkte je zweier aufeinanderfolgender Kreise der Kette durch einen Jordanschen Kurvenbogen, der den von beiden Kreisen gebildeten Bereich nicht verläßt, so macht die Gesamtheit dieser Kurvenbogen eine einzige Kurve aus. Man sagt, die Fortsetzung erfolge längs dieser Kurve oder, diese Kurve führe zu dem singulären Punkt hin. Diese Erklärung der singulären Punkte zeigt, daß sie als uneigentliche oder ideale Elemente oder uneigentliche ideale Punkte der Riemannschen Fläche aufzufassen sind. Man gelangt nämlich zu den eigentlichen, den regulären Stellen, durch Ketten, deren Elementmittelpunkte sich auch in einer einzigen Stelle häufen, deren Konvergenzradien aber nicht gegen Null, sondern gegen einen anderen Grenzwert streben. Daß man jede solche reguläre Kette — im Sinne der gleich zu erörternden Gleichheitsdefinition — durch eine endliche ersetzen kann, ändert nichts an der Tatsache, daß es eben solche unendliche Ketten gibt.

Ist z. B. eine eindeutige Funktion vorgelegt, so sind nach dieser Definition nicht alle Grenzpunkte des Definitionsbereiches also im allgemeinen auch nicht alle Häufungspunkte der singulären Punkte selbst singuläre Punkte, sondern nur die durch Jordankurven erreichbaren Grenzpunkte treten als Koordinaten der singulären Punkte auf. Man hat also scharf zwischen Grenzpunkten des Definitionsbereiches, singulären Punkten und Koordinaten von singulären Punkten zu unterscheiden. Trotzdem gibt es Darstellungen⁴³⁾, die mehr oder weniger klar die hier gegebene Erklärung zugrunde legen, in einem Atem aber erklären, die Menge der singulären Punkte sei abgeschlossen.

Aber von solchen Inkonsequenzen ganz abgesehen, ist eine Definition, welche die singulären Punkte einer eindeutigen Funktion mit den Grenzpunkten des Existenzbereiches identifizieren wollte, aus vielen Gründen höchst unzumutbar.

1. Sie entspricht wenig dem Geist der Weierstraßschen^{43a)} Erklärung der analytischen Funktion, weil sie nicht an den Begriff der analytischen Fortsetzung anknüpft. Während aber Ketten von Funktionselementen,

43) So L. Zoratti, Leçons sur le prolongement analytique, Paris 1911.

43a) Gleichwohl hat sich Weierstraß gelegentlich derselben bedient. Eine eigentliche Theorie der singulären Punkte hat indessen Weierstraß nicht gegeben. Vgl. z. B.: Einige auf die Theorie der analytischen Funktionen mehrerer Veränderliche sich beziehende Sätze, § 3.

deren Mittelpunkte nur einen einzigen Häufungspunkt haben, deren Konvergenzradien aber nicht gegen Null streben, zu einem Funktionselement hinführen, betrachtet unsere Definition Ketten, deren Konvergenzradien gegen Null streben. Im Begriff der „Kette mit einem einzigen Häufungspunkt“ sind also die Begriffe „reguläre Stelle“ und „singuläre Stelle“ vereinigt.

2. Eine Definition aber, die bei eindeutigen Funktionen singuläre Stellen und Grenzstellen des Definitionsbereiches identifiziert, läßt sich nicht auf mehrdeutige Funktionen übertragen, weil da erst die Erklärung des Grenzpunktes zu geben wäre. Man hat da ja nicht ohne weiteres eine größere Fläche zur Verfügung, die an sich zwar nichts mit der Funktion zu tun hat, von der aber der Existenzbereich, also jetzt die *Riemannsche Fläche*, ein Teilbereich ist.

3. Schon bei eindeutigen Funktionen erfordern die Grenzpunkte eine ganz andere Behandlung, als die spezielle Sorte derselben, die als Koordinaten unserer singulären Stellen auftreten.

4. Viele Beispiele drängen direkt zu unserer Definition hin, so z. B. nach *Hurwitz*⁴⁴⁾ die Betrachtung der Umkehrfunktionen der ganzen Funktionen. Die nicht algebraischen singulären Stellen derselben entsprechen den Grenzwerten, die man bei kurvenmäßiger Annäherung an den wesentlich singulären Punkt der ganzen Funktion erhalten kann.

Der Begriff der singulären Linie kann bei den allgemeinen analytischen Funktionen so gefaßt werden: Jede Kette von Funktionselementen definiert eine singuläre Linie, wenn die Radien dieser Elemente gegen Null streben, ohne daß dabei die Mittelpunkte der Kettenglieder einen Grenzwert haben. Die Projektion der Kurve auf die z -Ebene wird von den Häufungspunkten der Elementmittelpunkte gebildet.

9. Begriff der Umgebung einer singulären Stelle. Sie besteht aus Funktionselementen, die wie folgt erhalten werden. Wenn der singuläre Punkt die Koordinate a hat, so nehme man eine Umgebung dieser Stelle in der z -Ebene und eine Kette, die zu dieser Stelle hinführt. Den Teil dieser Kette, der nur Elemente über Punkten dieser Umgebung enthält und in a endigt, bezeichne man mit L und nehme nun alle Elemente, die man von den Elementen der Kette aus erhalten kann, wenn man sie längs Kurven fortsetzt, die ganz in dieser Umgebung verlaufen. Die Gesamtheit dieser Elemente heißt eine *Umgebung der singulären Stelle*. Zwei durch verschiedene Ketten definierte singuläre

44) *A. Hurwitz*, Sur les points critiques des fonctions inverses, Paris C. R. 143 (1906), p. 877—879 und 144 (1907), p. 63—65.

Stellen werden dann als identisch angesehen, wenn alle ihre Umgebungen identisch sind. Man kann etwas präziser die Definition der singulären Stelle nun also so fassen: Was in der vorigen Nummer als singuläre Stelle bezeichnet wurde, werde richtiger singuläre Kette genannt. Eine singuläre Stelle wird dann der Inbegriff aller der singulären Ketten, die im eben bezeichneten Sinne eine Umgebung gemeinsam haben.

Gibt es eine Umgebung der Koordinate a derart, daß kein ihr angehöriger Weg, von einem Element einer a definierenden Kette aus, zu einer anderen singulären Stelle, als eben der über a gelegenen hinführt, so heißt diese singuläre Stelle *isoliert*. Besitzt eine singuläre Stelle eine Umgebung, in der zu jeder Koordinate höchstens ein Element gehört, so heißt die singuläre Stelle *eindeutig*, sonst *mehrdeutig*.

10. Eindeutige isolierte Singularitäten. Sie zerfallen in Pole und wesentlich singuläre Stellen. Das ist bekanntlich eine direkte Folge des Satzes über die hebbaren Unstetigkeiten: Wenn $f(z)$ im Bereiche B eindeutig ist, und auf allen den Punkt a nicht treffenden Wegen fortsetzbar ist, wenn sie außerdem beschränkt ist, so besitzt sie bei Annäherung an a einen Grenzwert b und wird auch in diesem Punkte regulär, wenn man in a die Erklärung ändert und $f(a) = b$ setzt. In unserer Epoche haben sich verschiedene Verfasser⁴⁵⁾ mit diesem Satz beschäftigt. Neuerdings hat er durch *Phragmén* und *Lindelöf*⁴⁶⁾ eine

45) *W. F. Osgood*, Some points in the elements of the theory of functions, Bull. Am. math. Soc. (2) 2 (1896), p. 296—302; *E. Landau*, On a familiar theorem of the theory of functions, Bull. Am. math. Soc. (2) 12 (1906), p. 155—156; *D. R. Curtiss*, A proof of the theorem concerning artificial singularities, Ann. of math. (2) 7 (1906), p. 161—162; *M. Bôcher*, An other proof of the theorem concerning artificial singularities, Ann. of math. (2) 7 (1906), p. 163—164.

46) *E. Phragmén*, Sur une extension d'un théorème classique de la théorie des fonctions, Acta math. 28 (1904), p. 351—368. Die Arbeit enthält noch eine Reihe ähnlicher Sätze. In einer späteren Arbeit: *E. Phragmén* und *E. Lindelöf*, Sur une extension d'un principe classique de l'analyse et sur quelques propriétés des fonctions monogènes dans le voisinage d'un point singulier, Acta math. 31 (1908), p. 381—406 sind diese Fragen wieder aufgenommen. Die Beweise sind dort vereinfacht und die Sätze sind auf eine allgemeinere Grundlage gestellt. Sie fließen alle aus dem folgenden Prinzip: Die Funktion $f(z)$ sei in dem Bereiche B eindeutig und regulär. Ihr absoluter Betrag möge am Rande mit Ausnahme gewisser Stellen den folgenden Bedingungen genügen: Wenn z hinreichend nahe am Rande liegt, so gelte, wie klein auch das positive ε gewählt sein möge, die Ungleichung

$$|f(z)| < C + \varepsilon.$$

In den Ausnahmepunkten aber soll folgendes gelten: Es soll eine im Bereiche reguläre und von Null verschiedene Funktion $w(z)$ geben, die folgende Eigenschaften hat: In B ist $|w(z)| < 1$. In hinreichender Nähe der Ausnahmepunkte

wesentliche Vertiefung erfahren. Ich erwähne nur den folgenden Satz: Wenn $f(z)$ in der Umgebung von $z = 0$ eindeutig ist, wenn es für $|\arg z| < \frac{\alpha}{2}$ in dieser Umgebung der Bedingung

$$|f(z)| < C_1 e^{\left|\frac{1}{z}\right|^K}$$

genügt, wenn dabei $K\alpha < \pi$ gilt, wenn für alle anderen z der Umgebung

$$|f(z)| < C_2$$

ist, so ist $f(z)$ bei geeigneter Erklärung von $f(0)$ auch im Punkte $z = 0$ regulär.

Während in einem Pole von $f(z)$ die Funktion $\frac{1}{f(z)}$ regulär bleibt, kommt nach Weierstraß⁴⁷⁾ $f(z)$ in der Umgebung einer wesentlich singulären Stelle jedem Wert beliebig nahe. Der Picardsche Satz stellt sogar fest, daß die Funktion jeden Wert mit höchstens einer Ausnahme unendlich oft annimmt. (Näheres weiter unten.)

11. Mehrdeutige isolierte Singularitäten. Sie zerfallen in endlich vieldeutige, die durch eine geeignete Wurzeloperation zu eindeutigen regulären oder singulären Stellen gemacht werden können und in transzendente. Besitzt die Funktion bei Annäherung an die singuläre Stelle einen Grenzwert (endlich oder unendlich) d. h. weicht sie in hinreichend naher Umgebung (siehe Nr. 9 dieses Artikels) der singulären Stelle beliebig wenig von einem festen Wert ab, so liegt eine außerwesentliche oder logarithmische Singularität sonst eine wesentliche Singularität vor. Zu ihrer näheren Charakterisierung dient die Betrachtung ihres Wertevorrates oder ihres Unbestimmtheitsbereiches.⁴⁸⁾ (Näheres wird Nr. 20 ff. angegeben werden.)

12. Der Monodromiesatz. Längs eines jeden in einem einfach zusammenhängenden Bereiche B verlaufenden Weges sei die Funktion $f(z)$ fortsetzbar. Dann ist sie im Bereiche B eindeutig und regulär. Der Satz besagt also, daß eine in einem einfach zusammenhängenden

gilt für jedes positive ε und für jedes positive σ die Ungleichung

$$|w^\sigma(z)f(z)| < C + \varepsilon.$$

Unter diesen Voraussetzungen gilt in ganz B die Ungleichung

$$|f(z)| \leq C$$

und dabei steht gleich nur dann, wenn $f(z)$ eine Konstante ist.

47) K. Weierstraß, Zur Theorie der eindeutigen analytischen Funktionen, Berl. Abh. 1876, p. 11 = Werke Bd. 2, p. 77—124 (§ 8).

48) P. Painlevé, Sur les singularités des fonctions analytiques et en particulier des fonctions définies par des équations différentielles, Paris C. R. 131 (1900), p. 489—492. Ferner: Notice sur les travaux scientifiques de M. Painlevé, Paris 1900.

Bereiche B mehrdeutige Funktion in diesem Bereiche Singularitäten besitzen muß.⁴⁹⁾

13. Verteilung der Singularitäten bei eindeutigen Funktionen.

Die Frage nach den Punktmengen, welche als Singularitätenmengen eindeutiger Funktionen auftreten können, ist durch den Satz völlig gelöst, daß jeder beliebige Bereich Existenzbereich einer analytischen Funktion sein kann. Die Singularitäten sind nämlich die erreichbaren Randpunkte des Existenzbereiches. Für eindeutige Funktionen wurde der Satz zuerst durch *Mittag-Leffler*⁵⁰⁾ bewiesen. Eine andere Frage ist die, ob an den einzelnen singulären Stellen auch die Natur der Singularität beliebig vorgeschrieben werden kann. Hierüber existieren bisher nur sehr spezielle Untersuchungen.⁵¹⁾ Eng damit zusammen hängt die Frage, ob und wie man eine gegebene Funktion so als Summe zweier anderer darstellen kann, daß die eine an einer gegebenen Teilmenge der Singularitätenmenge der anderen singulär, die andere daselbst regulär ist.⁵²⁾ Dahin gehört auch der *Satz von Cousin*⁵³⁾: Wenn zwei Bereiche A und B den Bereich C gemeinsam haben und wenn $f(z)$ in A , $g(z)$ in B eindeutig und analytisch ist, die Differenz $f(z) - g(z)$ aber in C regulär ist, so gibt es eine in A und B erklärte eindeutige

49) Der Satz rührt von *Weierstraß* her. Vgl. *O. Stolz* u. *J. Gmeiner*, Einleitung in die Funktionentheorie, Leipzig 1910, wo der von *Weierstraß* in seinen Vorlesungen gegebene Beweis zu finden ist. Neuerdings hat sich *Osgood* mit ihm beschäftigt: On a gap in the ordinary presentation of the *Weierstraß* theory of functions, Am. M. S. Bull. (2) 10 (1904), p. 294—301. Einen Beweis gibt *A. Pringsheim*, Über eine charakteristische Eigenschaft sogenannter Treppensysteme und deren Anwendung auf einen Fundamentalsatz der Funktionentheorie, Münch. Ber. 1915, p. 27—66. Einen sehr einfachen Beweis enthält der erste Band meines demnächst erscheinenden Lehrbuches der Funktionentheorie.

50) *Mittag-Leffler*, Sur la représentation analytique des fonctions monogènes uniformes d'une variable indépendante, Acta math. 4 (1884), p. 1—79. Verschiedene Autoren haben neuerdings den Satz auf mehrdeutige Funktionen ausgedehnt und haben bewiesen, daß ein jedes *Riemannsches* Flächenstück als Existenzbereich gewisser analytischer Funktionen aufgefaßt werden kann. *Koebe*, Fonction potentielle et fonction analytique ayant un domaine d'existence donnée à un nombre quelconque (fini ou infini) de feuillets, Paris C. R. 148 (1909), p. 1446—1448; *E. Freundlich*, Analytische Funktionen mit beliebig vorgeschriebenem unendlichblättrigem Existenzbereich, Diss. Göttingen 1910; *Osgood*, Lehrbuch der Funktionentheorie, 2. Aufl. Leipzig 1912, p. 748—753.

51) *Mittag-Leffler*, a. a. O. 50); *G. Faber*, Über analytische Funktionen mit vorgeschriebenen Singularitäten, Math. Ann. 60 (1905), p. 379—397. *Faber* dehnt die Untersuchungen auf mehrdeutige singuläre Stellen aus.

52) *G. Faber*, a. a. O. 51); *A. Haar*, Über analytische Funktionen mit singulärer Linie, Gött. Nachr. 1914, p. 115—123.

53) *P. Cousin*, Sur les fonctions de n variables complexes, Acta math. 19 (1894), p. 1—61. Vgl. auch *E. Phragmén*, a. a. O. 46).

analytische Funktion $F(z)$, für die $F(z) - f(z)$ in A , $F(z) - g(z)$ in B regulär ist.

Bei eindeutigen Funktionen kann die Singularitätenmenge nach rein mengentheoretischen Gesichtspunkten klassifiziert werden. Wir betrachten die Menge der Grenzpunkte des Existenzbereiches. 1. Die Menge sei abzählbar. Dann ist jeder Punkt erreichbar, und die Menge besteht also aus lauter singulären Punkten. In beliebiger Nähe eines jeden derselben liegen isolierte Singularitäten. Für jede von einem Pole verschiedene Singularität gilt daher der *Picardsche Satz*. Daher ist auch auf solche Funktionen der Satz von den hebbaren Unstetigkeiten übertragbar.

2. Die Menge enthalte perfekte Bestandteile. Dann kann man sich mit Rücksicht auf das eben Gesagte auf den Fall beschränken, daß die Menge selbst perfekt ist. Als solche kann sie dann punkthaft sein oder kontinuierliche Bestandteile enthalten.

Es sei also zunächst die Menge der Grenzpunkte *perfekt und punkthaft*. Wir teilen sie nach ihrem *Flächenmaß* (Null oder positiv) sowie nach ihrem *Umfang* ein. Damit ist folgendes gemeint. Man betrachte eine Folge von endlich vielen Kreisen um die Punkte der Menge. l_a sei die untere Grenze der Gesamtlänge dieser Kreise, falls ihr Durchmesser d nicht übertrifft. Bei Verkleinerung von d nimmt l_a nicht zu, und es sei $\lim_{a \rightarrow 0} l_a = l$. Dann heißt l *Umfang* der Menge.

Er kann Null, endlich oder unendlich sein. Mit Hilfe der Integralformel kann man auf den ersten Fall leicht den Satz von den hebbaren Singularitäten übertragen, und damit gilt für diese Singularitäten wieder der Satz von *Weierstraß* und daher, wie man mit Hilfe der Modulfunktion sieht, auch der Satz von *Picard*.

Ist der Umfang endlich und von Null verschieden, so kann man nur noch zeigen, daß die Funktion an den singulären Stellen nicht stetig sein kann.⁵⁴⁾ Man kann aber schon Funktionen angeben, die in der vollen Ebene beschränkt sind, deren Singularitäten aber eine derartige perfekte diskontinuierliche Menge ausmachen.⁵⁵⁾

Ist schließlich der Umfang unendlich, so kann man nach *Pompéju*⁵⁶⁾ und *Goloubeff*⁵⁶⁾ Beispiele von Funktionen bilden, die in der

54) P. Painlevé, Notice sur les travaux scientifiques de M. Painlevé, Paris 1900; L. Zoretti, a. a. O. 43), p. 80.

55) A. Denjoy, Sur les fonctions analytiques uniformes à singularités discontinues non isolées, Paris C. R. 150 (1900), p. 32—34.

56) D. Pompéju, Sur la continuité des fonctions de variables complexes, Ann. de Toulouse (2) 7 (1903), p. 264—315. Zoretti versuchte in seiner These: Sur les fonctions analytiques uniformes, qui possèdent un ensemble parfait discon-

ganzen Ebene stetig und doch nicht konstant sind und deren Singularitäten unter den Punkten der Menge enthalten sind.⁵⁷⁾

Sind in der Randmenge des Existenzbereiches kontinuierliche Bestandteile enthalten, so ist wieder eine große Mannigfaltigkeit von Fällen möglich. Erst wenige davon sind untersucht. Ich will nur von dem Fall reden, wo eine isolierte Linie von Singularitäten da ist. Ältere Untersuchungen verfolgen hauptsächlich das Ziel, Beispiele dafür zu geben, daß solche Fälle möglich sind. Heutzutage zweifelt niemand mehr an ihrem häufigen Vorkommen. Ja man weiß sogar, daß unter allen im Einheitskreis konvergierenden Potenzreihen diejenigen am häufigsten vorkommen, die nicht über diesen Kreis hinaus fortsetzbar sind.⁵⁸⁾⁵⁹⁾

tinu de points singuliers, *J. de math.* (6) 1 (1905), p. 1—51 das Gegenteil zu beweisen. *W. Goloubeff*, Sur les fonctions à singularités discontinues, *Paris C. R.* 158 (1914), p. 1407—1409.

57) Mit den Fragen dieses Abschnittes befassen sich noch eine ganze Reihe weiterer Arbeiten von *Pompéju* und von *Denjoy*: *D. Pompéju*, a) Sur les fonctions de variables complexes, *Paris C. R.* 134 (1902), p. 1195—1197; b) Sur les singularités des fonctions analytiques uniformes, *Paris C. R.* 139 (1904), p. 914—915; c) Sur les singularités des fonctions analytiques uniformes, *Paris C. R.* 149 (1909), p. 103—105; d) Sur les singularités discontinues des fonctions analytiques uniformes, *Paris C. R.* 149 (1909), p. 1050—1051; e) Sur la représentation des fonctions analytiques par des intégrales définies, *Paris C. R.* 149 (1909), p. 1355—1357; f) Sur les singularités des fonctions analytiques uniformes, *Paris C. R.* 149 (1910), p. 454—455; g) Sur les singularités des fonctions analytiques uniformes, *Rend. di Palermo* 29 (1910), p. 306—307; h) Sur un exemple de fonction analytique partout continue, *Am. J. of math.* 32 (1910), p. 327—332; i) Sur les singularités des fonctions analytiques uniformes, *Enseignement math.* 12 (1910), p. 18—20; k) Sur les fonctions analytiques uniformes, *Nieuw archief voor wiskunde* (2) 9 (1910), p. 172—175; l) Sur les fonctions de variables complexes, *Paris C. R.* 153 (1911), p. 624—626.

A. Denjoy, Sur les fonctions analytiques uniformes, qui restent continues sur un ensemble parfait discontinue de singularités, *Paris C. R.* 148 (1909), p. 1154—1156; *P. Painlevé*, Observations au sujet de la communication précédente, *Paris C. R.* 148 (1909), p. 1156—1157; *A. Denjoy*, Sur les fonctions analytiques uniformes à singularités discontinues, *Paris C. R.* 149 (1909), p. 258—260; *A. Denjoy*, Sur les singularités discontinues des fonctions analytiques uniformes, *Paris C. R.* 149 (1909), p. 386—388.

58) Ansätze von *Borel*, a) Sur les séries de *Taylor*, *Paris C. R.* 123 (1896), p. 1051—1052; b) Sur les séries de *Taylor*, *Acta math.* 21 (1897), p. 243—248; c) Sur les séries de *Taylor* admettant leur cercle de convergence comme coupure, *J. de math.* (5) 2 (1896), p. 441—451; *A. Pringsheim*, Über Funktionen, welche in gewissen Punkten endliche Differentialquotienten jeder endlichen Ordnung aber keine *Taylor*sche Reihenentwicklung besitzen, *Math. Ann.* 44 (1894) [p. 41—56] p. 50—51; *E. Fabry*, a) Sur les séries de *Taylor*, *Paris C. R.* 124 (1897), p. 142—143 und *Bd.* 125 (1897), p. 1086—1089; b) Sur les séries de *Taylor*, qui

Der Picardsche Satz.

14. Der Picardsche Satz. Eine glückliche Idee führte im Jahre 1879 *E. Picard* zu einer wesentlichen Vertiefung des *Weierstraßschen* Satzes, daß eine jede in der Umgebung einer wesentlich singulären Stelle eindeutige und meromorphe Funktion daselbst jedem Wert beliebig nahe kommt. Eine Anwendung der elliptischen Modulfunktion ließ ihn erkennen, daß die Funktion alle Werte mit höchstens zwei Ausnahmen wirklich annimmt. Zunächst allerdings^{60a)} gelang der Beweis nur für ganze Funktionen und führte so zu dem heute oft als *kleiner Picardscher Satz* bezeichneten Theorem. Erst etwas später^{60c)} gelang ihm der Beweis des *großen Picardschen Satzes*, wonach eine jede in der Umgebung einer wesentlich singulären Stelle eindeutige und meromorphe Funktion daselbst jeden Wert mit höchstens zwei Ausnahmen wirklich annimmt. (Unendlich wird dabei als Wert gezählt, so daß eine in der Umgebung der betreffenden Stelle reguläre Funktion nur noch einen endlichen Ausnahmewert besitzen kann.)

Der Grundgedanke des *Picardschen* Beweises wird am besten am *kleinen Picardschen Satz* erläutert. Mit $\omega(v)$ sei diejenige elliptische

ont une infinité de points singuliers, Acta math. 22 (1899), p. 65—87; *L. Leau*, Recherches sur les singularités d'une fonction définie par un développement de Taylor, J. de math. (5) 5 (1899), p. 365—425. Eine wirkliche und entgeltliche Klärung dieser Angelegenheit gab erst *G. Pólya*, Über die Potenzreihen, deren Konvergenzkreis natürliche Grenze ist, Acta math. 41 (1917), p. 99—118; *F. Hausdorff*, Zur Verteilung der fortsetzbaren Reihen, Math. Ztschr. 4 (1919), p. 98—103. Dagegen: *Fréchet*, Les fonctions prolongeables, Paris C. R. 165 (1917), p. 669—670.

59) Noch sei erwähnt, daß *Fredholm* [siehe bei *Mittag-Leffler*, a) Sur une transcendante remarquable découverte par *M. Fredholm*, Paris C. R. 110 (1890), p. 627—629; b) Sur une transcendante remarquable trouvée par *M. Fredholm*, Acta math. 15 (1891), p. 279—280; *A. Hurwitz*, Über die Entwicklung der allgemeinen Theorie der analytischen Funktionen in neuerer Zeit, Verh. d. I. internat. Math.-Kongr. in Zürich 1897, Leipzig 1898, (p. 91—112) p. 109] ein Beispiel einer Funktion gegeben hat, die samt allen Ableitungen auf der natürlichen Grenze noch stetig ist. Zu dieser Frage vgl. man noch: *A. Pringsheim*, Zur Theorie der *Taylor*schen Reihe und der analytischen Funktionen mit beschränktem Existenzbereich, Math. Ann. 42 (1893), p. 153—184. Auch schlicht abbildende derartige Funktionen kennt man als explizite Potenzreihen. *Fredholm*, a. a. O. und *Osgood*, a) Example of a single-valued function with a natural boundary, whose inverse is also single valued, Am. Math. Soc. Bull. (2) 4 (1898), p. 417—424; b) Supplementary note on a single-valued function whose inverse is also single valued, Am. Math. Soc. Bull. (2) 5 (1898), p. 17—18.

60) *E. Picard*, a) Sur une propriété des fonctions entières, Paris C. R. 88 (1879), p. 1024—1027; b) Sur les fonctions entières, Paris C. R. 89 (1879), p. 662—665; c) Sur les fonctions analytiques uniformes dans le voisinage d'un point singulier essentiel, Paris C. R. 89 (1879), p. 745—747; d) Mémoire sur les fonctions entières, Ann. Éc. Norm. (2) 9 (1880), p. 145—166.

Modulfunktion bezeichnet, welche bei $\nu = 0, 1, \infty$ Verzweigungspunkte unendlich hoher Ordnung besitzt und die ihre *Riemannsche* Fläche auf die Halbebene $\Im(\omega) > 0$ abbildet. Wenn nun eine ganze Funktion $f(z)$ die Werte $0, 1, \infty$ nicht annähme, so wäre auch $\omega\{f(z)\}$ eine in der Umgebung eines jeden endlichen z -Wertes eindeutige und reguläre Funktion also nach dem Monodromiesatz (Nr. 12) selbst eine ganze Funktion, welche aber nur Werte mit positivem Imaginärteil annehmen könnte. Daher ist nach dem *Weierstraßschen* Satz $\omega\{f(z)\}$ also auch $f(z)$ eine Konstante. Der Schluß also, daß $\omega\{f(z)\}$ wieder eine in der Umgebung von ∞ eindeutige Funktion ist, beruht auf dem Monodromiesatz, setzt also die Kenntnis eines einfach zusammenhängenden Bereiches voraus, in dem die Funktion von rationalem Charakter ist. Daher kann der Monodromiesatz beim Beweis des großen *Picardschen* Satzes keine Verwendung finden. Denn da hat man nur einen zweifach zusammenhängenden Bereich zur Verfügung. Bei diesem Sachverhalt liegt es daher nahe, statt der schlichten Umgebung des unendlichen Punktes ein daselbst unendlich oft gewundenes und darum wieder einfach zusammenhängendes *Riemannsches* Flächenstück einzuführen, dann wird somit $\omega\{f(\xi)\}$ eine in einer Halbebene der t -Ebene eindeutige Funktion, die keinen Wert von negativem Imaginärteil annimmt. In diesem Ansatz stimmen zahlreiche Beweise des großen *Picardschen* Satzes überein. Zur weiteren Ausbeutung dieses Gedankens hat man mannigfache weitere Beweisgründe ins Feld geführt. Ich halte den von *Lindelöf*⁶¹⁾ gegebenen Beweis, der sich auf das *Schwarzsche* Lemma stützt (vgl. Nr. 60), für den naturgemähesten.⁶²⁾

15. „Elementare“ Methoden. Diesen mit Hilfe der Modulfunktion geführten Beweisen steht eine andere Gruppe von Unter-

61) *E. Lindelöf*, a) Mémoire sur certaines inégalités dans la théorie des fonctions monogènes et sur quelques propriétés nouvelles de ces fonctions dans le voisinage d'un point singulier essentiel, Acta Soc. Fenn. 35 (1908), Nr. 7; b) Sur le théorème de *M. Picard* dans la théorie des fonctions monogènes, C. R. du congrés des math. tenu à Stockholm 1909, p. 112—136.

62) Weitere Beweise bei *Picard*, a. a. O. 60). Ferner in traité d'analyse, 2. Aufl. Bd. II, p. 231, III, p. 365; *A. Hurwitz*, Über die Anwendung der elliptischen Modulfunktion auf einen Satz der allgemeinen Funktionentheorie, Zürich. Vierteljahrsschr. 49 (1904), p. 242—253; *E. Landau*, Über den *Picardschen* Satz, Zürich. Vierteljahrsschr. 51 (1906), p. 252—318; *F. Schottky*, Über zwei Beweise des allgemeinen *Picardschen* Satzes, Berlin. Sitzber. 1907, p. 823—840; *P. Montel*, Sur les familles des fonctions analytiques, qui admettent des valeurs exceptionnelles dans un domaine, Ann. Éc. Norm. (3) 29 (1912), p. 487—535; *Osgood*, a) Lehrbuch der Funktionentheorie, 2. Aufl. (1912), p. 709; b) Zum Beweise des *Picardschen* Satzes. Eine Ergänzung, Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913), p. 35—36.

suchungen gegenüber, deren Autoren sich darum bemühen, auch ohne das zugkräftige Mittel der Modulfunktion den Beweis zu bezwingen. Wenn dies an sich auch von minderer Bedeutung ist, so haben doch die dabei gewonnenen Methoden zu einer wesentlichen Verschärfung des *Picardschen Satzes* bei ganzen Funktionen endlicher Ordnung geführt, und diese haben wieder nützliche Anwendung bei der Verallgemeinerung des *Picardschen Satzes* auf gewisse Klassen mehrdeutiger Funktionen gefunden (vgl. Nr. 19 u. Nr. 32). Hier sei nur kurz erwähnt, daß *Borel*⁶³⁾ 1896 den kleinen, *Schottky*⁶⁴⁾ 1904 den großen *Picardschen Satz* ohne Verwendung der Modulfunktion bewiesen hat.⁶⁵⁾

16. Der Landausche Satz. Unter den zahlreichen *Landauschen* Veröffentlichungen verdient die Arbeit von 1904⁶⁶⁾, welche sich jener elementaren Methoden bedient — wenigstens was ihr Ergebnis anlangt — besonderes Interesse. *Landau* beweist dort eine wesentliche Verschärfung des kleinen *Picardschen Satzes*: Wenn eine analytische Funktion $f(z)$ durch eine Potenzreihe

$$a_0 + a_1 z + \dots$$

mit $a_1 \neq 0$ gegeben ist, so gibt es eine nur von a_0 und a_1 abhängende, von den übrigen Koeffizienten völlig unabhängige Funktion $R(a_0, a_1)$, so daß im Kreise $|z| < r$ ($r > R(a_0, a_1)$) entweder eine Nullstelle oder eine Einsstelle oder eine Singularität der Funktion $f(z)$ liegt. Bei ganzen Funktionen liegt also schon in diesem Kreise eine Nullstelle oder eine Einsstelle.

Auch bei diesem Satz hat sich bald die Überlegenheit der die elliptische Modulfunktion benutzenden Methoden gezeigt. Denn schon *Landau selbst*⁶⁶⁾ konnte den Satz mit Hilfe dieser Funktion in wenigen Zeilen beweisen. Auch liefert die Verwendung dieser Funktion

63) *E. Borel*, a) Démonstration élémentaire d'un théorème de *M. Picard* sur les fonctions entières, Paris C. R. 122 (1896), p. 1045—1048; b) Leçons sur les fonctions entières, Note I, Paris 1900.

64) *F. Schottky*, Über den *Picardschen Satz* und die *Borelschen Ungleichungen*, Berlin. Sitzber. 1904, p. 1244—1262 und 1906, p. 32—36.

65) Weiter sind hier zu nennen: *F. Schottky*, a. a. O. 62). Ferner *F. Schottky*, Problematische Punkte und die elementaren Sätze, die zum Beweise des *Picardschen Satzes* dienen, J. f. Math. 147 (1917), p. 161—172; *Landau*, a. a. O. 62); *E. Lindelöf*, a. a. O. 61b); *A. Kraft*, Über ganze transzendente Funktionen von unendlicher Ordnung, Diss. Göttingen 1913. *A. Wiman*, a. a. O. 127).

66) *E. Landau*, Über eine Verallgemeinerung des *Picardschen Satzes*, Berlin. Ber. 1904, p. 1113—1133.

Schranken für $R(a_0, a_1)$, ja die genaue Bestimmung von $R(a_0, a_1)$.⁶⁷⁾

Man findet so

$$R(a_0, a_1) = \frac{2 |\Im [\omega(a_0)]|}{|a_1 \|\omega'(a_0)\|} = \frac{2 \varphi(a_0)}{|a_1|}.$$

Mit der durch *Landau* mit $\varphi(a_0)$ bezeichneten Funktion befassen sich eine Reihe Arbeiten⁶⁸⁾ namentlich zu dem Zwecke, handliche Abschätzungen dieser Funktion zu gewinnen. So findet *A. Hurwitz*

$$|\varphi(a_0)| \leq 11 |a_0|^{\frac{2}{3}} |a_0 - 1|^{\frac{1}{2}}.$$

Diese Abschätzung gestattet es *Landau*⁶²⁾, der sie erneut einfacher gewinnt und verallgemeinert, den großen *Picardschen Satz* aus dem *Landauschen* zu erschließen.

Die angegebenen Gedankengänge ermöglichen es natürlich auch für den Fall, daß a_1 und einige weitere Koeffizienten von $f(z)$ verschwinden, analoge Sätze zu gewinnen. Man erhält dann eben eine Schranke, die von a_0 und dem ersten weiteren nicht verschwindenden Koeffizienten abhängt.

Man kann natürlich auch die *Carathéodorysche* Abschätzung dahin interpretieren, daß sie eine Schranke für den ersten Koeffizienten a_1 derjenigen Funktionen liefert, die in $|z| < 1$ regulär sind und in diesem Kreise die Werte Null und Eins nicht annehmen. Dieser Umstand legt die Frage nahe, ob man nicht ähnliche Schranken auch für die weiteren Koeffizienten gewinnen kann, also überhaupt die Frage nach den Koeffizienten derjenigen in $|z| < 1$ regulären Funktionen, die in diesem Kreise die Werte Null und Eins auslassen. Vermöge der elliptischen Modulfunktion hängt diese Frage eng zusammen mit dem *Carathéodoryschen Problem*, die Koeffizienten derjenigen Potenzreihen anzugeben, welche im Einheitskreis einen positiven Realteil besitzen. So wurde denn auch die Lösung dieser Frage im Zusammenhang mit diesem Problem von *Carathéodory* und *Fejér*⁶⁹⁾ gefunden.

67) *C. Carathéodory*, Sur quelques généralisations du théorème de *M. Picard*, Paris C. R. 141 (1905), p. 1213—1215. Die wirkliche Ausrechnung gibt erst *Landau*, a. a. O. 62).

68) *A. Hurwitz*, a. a. O. 62); *E. Landau*, a. a. O. 62); *P. Bernays*, Zur elementaren Theorie der *Landauschen* Funktion $\varphi(a_0)$, Zürich. Vierteljahrsschr. 58 (1913), p. 203—238; *Gronwall*, Sur un théorème de *M. Picard*, Paris C. R. 155 (1912), p. 764—766.

69) *C. Carathéodory* und *L. Fejér*, Über den Zusammenhang der Extreme von harmonischen Funktionen mit ihren Koeffizienten und über den *Picard-Landauschen Satz*, Rend. di Palermo 32 (1911), p. 218—239. Vgl. auch *O. Toeplitz*, a. a. O. 295).

17. Verallgemeinerungen. *Carathéodory*⁶⁷⁾ hat dadurch eine Verallgemeinerung des *Landauschen* Satzes erzielt, daß er statt der Modulfunktion eine andere Dreiecksfunktion heranzieht. So erhält man etwa folgenden Satz:

Wenn die Funktion

$$f(z) = a_0 + a_1 z + \dots$$

im Kreise $|z| < r$ meromorph sein soll, und zwar so, daß die Ordnung einer jeden Nullstelle ein Vielfaches von m , die Ordnung jeder Einsstelle ein Vielfaches von n , die Ordnung eines jeden Poles ein Vielfaches von p ist, und wenn dabei

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{p} < 1$$

gilt, so gibt es eine nur von a_0 und a_1 abhängige Schranke, die r nicht übersteigen kann.^{69a)}

Durch ähnliche Schlüsse hat *Carathéodory*⁷⁰⁾ noch allgemeinere Sätze gewonnen, die ohne Konstantenbestimmung schon *Landau*⁷¹⁾ vorher angegeben hatte. Ich führe nur einen derselben an:

Wenn die Funktion

$$f(z) = z^k + \beta_1 z^{k+1} + \dots \quad (k \geq 1)$$

für $|z| < r$ regulär und von $(-1)^m$ verschieden ist, und wenn die Ordnungen aller ihrer von Null verschiedenen Nullstellen Vielfache von m sind, so kann r eine gewisse Schranke $\sqrt[k]{A_m}$ nicht übersteigen. Dabei ist

$$A_m = \frac{16 \cdot \Gamma^m \left(1 - \frac{1}{m}\right) \cdot \Gamma^{2m} \left(1 + \frac{1}{2m}\right)}{\Gamma^m \left(1 + \frac{1}{m}\right) \cdot \Gamma^{2m} \left(1 - \frac{1}{2m}\right)}.$$

Nach *Landau*⁷¹⁾ kann man hieraus einen interessanten Schluß ziehen:

Wenn k und l zwei teilerfremde ganze Zahlen sind ($l > 1$), und wenn die Reihe

$$z^k + \beta_1 z^{k+l} + \beta_2 z^{k+2l} + \dots$$

für $|z| < r$ konvergent und von -1 verschieden sein soll, dann muß

$$r < (A_m)^{\frac{1}{kl}}$$

sein. Das merkwürdige an diesem Satz ist, daß die an den Koeffizienten angebrachten Lücken den sonst noch vorhandenen zweiten

69a) Vgl. auch *Montel*, Sur quelques généralisations des théorèmes de *M. Picard*, Paris C. R. 155 (1912), p. 1000—1003.

70) *C. Carathéodory*, Sur quelques applications du théorème de *Landau-Picard*, Paris C. R. 144 (1907), p. 1203—1206.

71) *E. Landau*, Sur quelques généralisations du théorème de *M. Picard*, vnn. *Éc. Norm.* (3) 24 (1907), p. 179—204.

Ausnahmewert ersetzen. Dahin gehören namentlich auch die ungeraden Funktionen. Und hier leuchtet ja sofort ein, daß mit dem Ausnahmewert -1 noch ein weiterer Ausnahmewert $+1$ gekoppelt ist. Ebenso ist es in den anderen Fällen.

Der Landausche Satz stellt sich als eine Verallgemeinerung des kleinen Picardschen Satzes dar. Nach einem früheren Versuche von Landau⁷²⁾ hat Carathéodory⁷³⁾ auch dem großen Picardschen Satze eine ähnliche Vertiefung gegeben. Hier gilt der folgende Satz: Wenn $f(z)$ für $0 < |z| < r$ regulär und von Null und Eins verschieden ist, dann gibt es eine von $f(z)$ und r unabhängige Zahl $\alpha \neq 0$ derart, daß für $0 < |z| < \alpha \cdot r$ entweder $|f(z)| > 2$ oder $|f(z)| < \frac{1}{2}$ gilt.

18. Der Schottkysche Satz. Um eine weitere Entdeckung aus diesem Fragenkreise hat Schottky⁶⁴⁾ die Wissenschaft bereichert. Er hat folgenden Satz gefunden:

$$\text{Wenn} \quad f(z) = a_0 + a_1 z + \dots$$

im Kreise $|z| < r$ die Werte Null und Eins ausläßt und sich dort regulär verhält, dann gibt es eine nur von a_0 und ϱ ($\varrho < 1$) abhängige Zahl $K(a_0, \varrho)$ derart, daß

$$|f(z)| < K(a_0, \varrho)$$

ist für $|z| < \varrho \cdot r$.

Auch hier läßt sich der Beweis mit Hilfe der Modulfunktion leicht erbringen. So gelingt auch die wirkliche Bestimmung von $K(a_0, \varrho)$ ⁷³⁾. Beim Beweis zeigt sich auch, daß $K(a_0, \varrho)$ eine stetige Funktion von a_0 ist, solange a_0 die Werte $0, 1, \infty$ vermeidet. Es gibt daher eine Zahl $\lambda(\varepsilon, \omega, \varrho)$ derart, daß

$$|f(z)| < \lambda(\varepsilon, \omega, \varrho)$$

ist für $|z| < \varrho \cdot r$, solange $|a_0| > \varepsilon$, $|a_0 - 1| > \varepsilon$ und $|a_0| < \omega$ ist Landau hat gefunden, daß hier die auf ε bezügliche Bedingung wegfallen kann.⁷⁴⁾ Man hat also den Satz:

$$\text{Wenn} \quad f(z) = a_0 + a_1 z + \dots$$

72) C. Carathéodory, Sur le théorème général de M. Picard, Paris C. R. 154 (1912), p. 1690—1693.

73) C. Carathéodory, a. a. O. 67.

74) E. Landau in H. Bohr und E. Landau, Über das Verhalten von $\zeta(s)$ und $\zeta_k(s)$ in der Nähe der Geraden $\sigma = 1$, Gött. Nachr. 1910, p. 303—330. Weitere Beweise gaben Bernays in C. Carathéodory und E. Landau, Beiträge zur Konvergenz von Funktionenfolgen, Berl. Ber. 1913, p. 587—613; ferner P. Lévy, Remarques sur le théorème de M. Picard, Bull. de la Soc. math. de France 40 (1912), p. 25—39; G. Pick, Über eine Eigenschaft der konformen Abbildung kreisförmiger Bereiche, Math. Ann. 77 (1916), p. 1—6.

in $|z| < r$ regulär ist und die Werte Null und Eins ausläßt, so gilt

$$|f(z)| < \lambda(\omega, \varrho)$$

in $|z| < \varrho \cdot r$, falls $|a_0| < \omega$ ist.

*P. Lévy*⁷⁵⁾ hat hieran noch verschiedene Einzeluntersuchungen angeschlossen. So hat er z. B. gefunden, daß $K(\alpha_0, \varrho)$ zwischen zwei Schranken

$$\frac{K_1(\alpha_0)}{1-\varrho} \quad \text{und} \quad \frac{K_2(\alpha_0)}{1-\varrho}$$

liegt.⁷⁶⁾

Aus dem *Schottky*schen Satze folgert man nach *Landau*⁶²⁾ leicht:

Es sei

$$f(z) = a_0 + a_1 z + \dots$$

in $|z| < r$ regulär und von Null verschieden und nur an p Stellen gleich Eins. Dann liegt $|f(z)|$ für $|z| < \varrho r$ unterhalb einer nur von a_0 und p abhängigen Schranke.

Eine weitere Behauptung von *Boutroux*⁷⁷⁾, der übrigens den *Schottky*schen Satz selbständig wiedergefunden hat, wurde von *Landau*⁶²⁾ widerlegt.

19. Erweiterungen: *E. Picard*⁷⁸⁾ hat 1883 folgende Verallgemeinerungen seines Satzes gefunden:

Zwischen zwei eindeutigen analytischen Funktionen kann nur dann eine algebraische Gleichung von einem Eins übertreffenden Geschlecht bestehen, wenn dieselben keine isolierten wesentlichen Singularitäten aufweisen.

Carathéodory^{78,1)} hat kürzlich den eben genannten und den großen *Picard*schen Satz als Spezialfälle eines viel allgemeineren Satzes erkannt.

*Picard*⁷⁹⁾ hat auch den *Landau*schen Satz erweitert: Wenn zwi-

75) *P. Lévy*, a) Sur une généralisation des théorèmes de *M. Picard*, *Landau* et *Schottky*, Paris C. R. 153 (1911), p. 658—660; b) a. a. O. 74).

76) Das ist also viel schärfer als die Abschätzung, welche *Schottky*, a. a. O. 64) und *E. Lindelöf*, a. a. O. 61b) auf „elementarem“ Wege hier gefunden haben.

77) *P. Boutroux*, Propriétés d'une fonction holomorphe dans un cercle ou elle ne prend pas les valeurs 0 et 1. Bull. de la soc. math. de France 34 (1906), p. 30—39, Paris C. R. 141 (1905), p. 305—308.

78) *E. Picard*, a) Sur une proposition concernant les fonctions uniformes d'une variable liées par une relation algébrique, Bull. des sciences math. (2) 7 (1883), p. 107—116; b) Démonstration d'un théorème général sur les fonctions uniformes liées par une relation algébrique, Acta math. 11 (1887), p. 1—12.

78,1) *C. Carathéodory*, Über eine Verallgemeinerung der *Picard*schen Sätze, Berl. Sitzber. 1920, p. 202—209.

79) *E. Picard*, a) Sur un théorème général relatif aux fonctions uniformes d'une variable liées par une relation algébrique, Paris C. R. 154 (1912), p. 98 bis 101; b) Sur les systèmes de deux fonctions uniformes d'une variable liées

schen zwei um $t = 0$ meromorphen Funktionen

$$z = a_0 + a_1 t + \dots$$

$$\omega = b_0 + b_1 t + \dots$$

eine algebraische Gleichung vom Geschlecht größer als Eins bestehen soll, so können beide Funktionen zugleich nur in einem Kreise $|t| > r$ meromorph sein, dessen Radius eine gewisse nur von a_0 und a_1 abhängende Schranke nicht übersteigt. Bemerkenswert ist, daß hier keinerlei Annahmen über Ausnahmewerte gemacht werden müssen.

Rémoundos hat in zahlreichen Arbeiten die *Picardschen* Sätze auf gewisse Klassen mehrdeutiger Funktionen ausgedehnt. Seine Thèse^{80a)} enthält z. B. den folgenden schon von *Painlevé* vermuteten Satz:

Wenn eine Funktion $\omega(z)$ durch eine Gleichung

$$f(\omega, z) = \omega^\nu + A_1(z)\omega^{\nu-1} + \dots + A_\nu(z) = 0$$

mit ganzen, aber nicht durchweg rationalen Koeffizienten erklärt ist, so gibt es höchstens 2ν Ausnahmewerte ω_k , für welche die Gleichung $f(\omega_k, z) = 0$ nur endlichviele Wurzeln hat.

Ferner gibt *Rémoundos* Ausdehnungen des *Landauschen* Satzes auf algebraische und andere endlichvieldeutige Funktionen. Auch ge-

par une relation algébrique, Bull. de la soc. math. de France 40 (1912), p. 201—205; c) Sur les couples de fonctions uniformes d'une variable correspondant aux points d'une courbe algébrique de genre supérieure à l'unité, Rend. di Palermo 33 (1912), p. 254—258.

80) G. Rémoundos, a) Sur les zéros d'une classe de fonctions transcendentes, Ann. de la fac. des sc. de Toulouse (2) 8 (1906), p. 1—72; b) Une nouvelle généralisation du théorème de M. Picard sur les fonctions entières, Paris C. R. 136 (1903), p. 953—955; c) Sur les zéros d'une classe de fonctions transcendentes, Bull. de la soc. math. de France 32 (1904), p. 44—50; d) Sur les zéros d'une classe de fonctions transcendentes multiformes, Paris C. R. 138 (1904), p. 344—346; e) Paris C. R. 155 (1912), p. 818—820 und p. 1592—1595; 138 (1904), p. 1574 bis 1575; f) Généralisation d'un théorème de M. Landau, Bull. de la soc. math. de France 41 (1913), p. 19—24, p. 340—346; g) Paris C. R. 157 (1913), p. 542—545; h) Sur les familles de fonctions multiformes admettant des valeurs exceptionnelles dans un domaine, Acta math. 37 (1914), p. 241—300; i) Sur les fonctions entières et algébroides, généralisation du théorème de M. Picard dans la direction de M. Landau, Ann. Éc. Norm. 30 (1903), p. 377—393; k) Paris C. R. 157 (1913), p. 694—697; l) Le théorème de M. Picard et les fonctions algébroides, Rend. di Palermo 35 (1913), p. 217—224; m) Extension d'un théorème de M. Borel aux fonctions algébroides multiformes, Rend. di Palermo 32 (1911), p. 267—277; n) Sur le module maximum des fonctions algébroides, Bull. de la soc. math. de France 39 (1911), p. 304—309; o) Sur les fonctions ayant un nombre fini des branches, Paris C. R. 141 (1905), p. 618—620 und J. de math. (6) 2 (1906), p. 87—107; p) Sur la croissance des fonctions multiformes, Paris C. R. 143 (1906), p. 391—393 und J. de math. (6) 3 (1907), p. 267—298.

wisse Sorten von unendlichvieldeutigen Funktionen werden herangezogen. Aber kein Resultat ist so bemerkenswert, daß es hier angeführt werden müßte. Häufig sind die Beweise nur skizziert und unvollständig, wie bei der folgenden Behauptung: Die Ausnahmewerte einer ganzen transzendenten Gleichung $f(\omega, z) = 0$ treten nur in abzählbarer Menge auf und häufen sich nirgends im endlichen. Die Ergebnisse von *Sire* und *Iversen*⁸¹⁾ lassen die Richtigkeit der Behauptung zweifelhaft erscheinen.

Weiteres über das Verhalten in der Nähe wesentlich singulärer Stellen.

20. Grundbegriffe. Zur weiteren Untersuchung der singulären Stellen sind verschiedene Begriffe eingeführt worden, die wir im Anschluß an *W. Groß*⁸²⁾ erklären wollen. Unter einem *Einschnitt* der Funktion $f(z)$ versteht man einen *Jordanschen* Kurvenbogen, der die Mittelpunkte einer eine singuläre Stelle definierenden Kette verbindet. Wir sagen, er endige in dieser Stelle. Unter dem *Wertebereich dieses Einschnittes* werde der Durchschnitt der Wertemengen verstanden, welche die Funktion auf beliebigen an die singuläre Stelle anstoßenden Teilbogen des Einschnittes annimmt. Unter dem *Häufungsbereich des Einschnittes* werde die Menge derjenigen Werte verstanden, welchen die Funktion auf dem Einschnitt in beliebiger Nähe des singulären Punktes nahekommt. Besteht der Häufungsbereich aus nur einem Wert, so heißt dieser *Konvergenzwert* der Funktion längs des Einschnittes. Unter dem *Wertebereich einer singulären Stelle* (auch *Unbestimmtheitsbereich*⁴⁸⁾ genannt) versteht man die Vereinigungsmenge, der Wertebereiche aller zu der singulären Stelle hinführenden Einschnitte. Analog wird der Häufungsbereich und der Konvergenzbereich der singulären Stelle erklärt. Der Durchschnitt der Häufungsbereiche aller zu einer singulären Stelle hinführenden Einschnitte heißt *Bereich der Hauptpunkte*.

81) *J. Sire*, Sur la puissance de l'ensemble des points singuliers transcendents des fonctions inverses des fonctions entières, Bull. de la soc. math. de France 41 (1913), p. 148—160; *F. Iversen*, Sur une fonction entière, dont la fonction inverse présente un ensemble de singularités transcendentes de la puissance du continu, Oefversigt af Finska vet. soc. Förhandlingar 58 Afd. A 3 (1915).

82) *W. Groß*, a) Über die Singularitäten analytischer Funktionen, Monatsh. Math. Phys. 29 (1918), p. 3—47. Ein Teil des erwähnten Satzes findet sich schon bei *Iversen*⁹⁵⁾; b) Zum Verhalten analytischer Funktionen in der Umgebung singulärer Stellen, Math. Zeitschr. 2 (1918), p. 242—294; c) Zum Verhalten der konformen Abbildung am Rande, Math. Zeitschr. 3 (1919), p. 43—64.

Ich betrachte nun die Struktur der hier eingeführten Mengen. Ein wesentliches Hilfsmittel bei der Untersuchung ist der *Großsche*^{82,1)} Satz über den Stern^{82,2)} der Umkehrfunktion einer meromorphen Funktion. Jeder Stern einer Umkehrfunktion einer meromorphen Funktion erfüllt darnach die ganze Ebene mit Ausschluß einer Menge vom Maße Null. *Groß*^{82,3)} hat einen analogen Satz auch für die Umkehrfunktionen solcher Funktionen bewiesen, die nur in einem gewissen Bereiche meromorph sind.

Was nun die verschiedenen Mengen anbetrifft, so gibt es im Einheitskreis meromorphe Funktionen, für die der Wertebereich des Punktes $z = 1$ eine beliebige meßbare Menge enthält und sich von ihr nur um eine Nullmenge unterscheidet. Jede abgeschlossene zusammenhängende Menge kann als Häufungsbereich des Punktes $z = 1$ für eine im Einheitskreis meromorphe Funktion auftreten. Jede abgeschlossene Menge kann als Menge der Hauptpunkte auftreten.

Die nichtalgebraischen Singularitäten der Umkehrfunktion einer in der ganzen Ebene meromorphen Funktion werden (wie schon *Hurwitz*⁴⁴⁾ andeutete und *Iversen*^{93,*)} ausführlich darlegte) durch die Konvergenzwerte der nach dem unendlichfernen Punkte führenden Einschnitte geliefert. Jeder Ausnahmewert einer ganzen Funktion ist Konvergenzwert eines zweckmäßig gewählten Einschnittes.^{82,5)}

21. Geradlinige Annäherung an singuläre Stellen. Ältere Untersuchungen haben sich namentlich mit den Wertemengen usw. bei geradliniger Annäherung an singuläre Stellen befaßt. Während in der Nähe eines Poles ein in allen Richtungen gleichmäßiges Anwachsen der Funktion stattfindet, gilt ein Gleiches nicht für die Umgebung isolierter wesentlich singulärer Stellen eindeutiger Funktionen. Schon der Umstand, daß in der Umgebung einer solchen Stelle $f(z)$ jeden Wert mit höchstens einer Ausnahme wirklich annimmt, steht dem entgegen. Gleichwohl bieten sich in verschiedenen Beispielen recht verschiedene Erscheinungen dar. Wir denken an die Funktion e^z , die längs jeder Geraden der rechten Halbebene gegen unendlich, in der linken Halbebene gegen Null strebt, sofern nur diese Geraden nicht der imaginären Achse parallel sind. Auf diesen letzteren Geraden strebt die Funktion keinem bestimmten Grenzwert zu, sondern nimmt

82,1) Im allgemeinen erfüllt die Bildkurve einer jeden Geraden die Ebene überall dicht; *Borel*, Paris C. R. 155 (1913), p. 201.

82,2) Vgl. die Erklärung dieses Begriffes auf p. 446.

82,3) Vgl. dazu auch *Valiron*, Démonstration de l'existence, pour les fonctions entières, de chemins de détermination infinie, Paris C. R. 166 (1918), p. 382—384.

eine Wertmenge an, die jeden Punkt einer leicht anzugebenden Kreis-
peripherie zum Häufungspunkt hat: Häufungsbereich des Einschnittes
ist also ein Kreis. Darin prägt sich eine allgemeine von Hurwitz⁸⁴)
gefundene Gesetzmäßigkeit aus. Wenn ∞ eine isolierte singuläre
Stelle von $f(z)$ ist, so strebt die Funktion auf jedem nach ∞ ziehenden
Einschnitt entweder einem bestimmten Grenzwert zu, oder aber
der Häufungsbereich des Einschnittes ist eine perfekte zusammen-
hängende Menge.⁸⁵)

Wenn auch das Maximum $M(r)$ von $|f(z)|$ für $|z| = r$ mit
wachsendem r nach unendlich strebt, so kann es doch vorkommen,
daß die Funktion auf keiner einzigen Geraden, $\varphi = c$ ($z = re^{i\varphi}$) gegen
unendlich strebt. Das ist z. B. bei

$$e^{te^{te^z}} \text{ und bei } e^{-ze^z}$$

der Fall, Funktionen, welche auf keiner einzigen Geraden der ganzen
Ebene gegen unendlich konvergieren. *H. von Koch*⁸³) hat darauf hinge-
wiesen, daß $z + e^z$ auf allen Geraden $\varphi = c$ gegen unendlich strebt, so daß
also die meromorphe Funktion $\frac{1}{z + e^z}$ auf allen diesen Geraden gegen
Null strebt. Es gibt auch ganze Funktionen, die dies eigentümliche
Verhalten zeigen. *Malmquist*⁸⁴) hat auf Veranlassung von *Mittag-
Leffler* zuerst ein Beispiel einer ganzen Funktion gebildet, die auf
allen Geraden $\varphi = c$ mit der einzigen Ausnahme $\varphi = 0$ gegen Null
strebt. *E. Lindelöf*⁸⁵) und *Mittag-Leffler*⁸⁶) haben weitere Beispiele
solcher Funktionen angegeben. Ist $E(z)$ eine solche Funktion, also z. B.

$$E(z) = \sum_0^{\infty} \left\{ \frac{z}{\log(v+2)} \right\}^v,$$

so ist nach *Mittag-Leffler*

$$E(z) \cdot e^{-E(z)}$$

eine Funktion, die auf *allen* Geraden den Konvergenzwert Null hat.
*Sire*⁸¹) gab zuerst ein Beispiel einer ganzen Funktion, die auf ge-

83) *H. von Koch*, Sur une classe remarquable de fonctions entières et
transcendantes, Arkiv för mat. astr. och fys. 1 (1903), p. 627—641.

84) *J. Malmquist*, Étude d'une fonction entière, Acta math. 29 (1905),
p. 203—215.

85) *E. Lindelöf*, Sur la détermination de la croissance des fonctions en-
tières définies par un développement de Taylor, Bull. des sc. math. (2) 27 (1903),
p. 213—226.

86) *G. Mittag-Leffler*, a) Sur une classe de fonctions entières, Verh. des
III. internat. Math.-Kongr. zu Heidelberg 1904, Leipzig 1905, p. 258—264; b) Sur
la représentation arithmétique des fonctions analytiques générales d'une variable
complexe, Atti del IV. congr. internaz. dei mat. Roma 1908, p. 75—85.

eigneten Geraden Konvergenzwerte besitzt, deren Gesamtheit die Mächtigkeit des Kontinuums besitzt. *Iversen*⁸¹⁾ gab ein einfacheres Beispiel dieser Art. *Groß*⁸⁷⁾ fügte hinzu, daß der Konvergenzbereich des unendlichfernen Punktes bei gewissen ganzen Funktionen die ganze Ebene erfüllen kann.

H. Bohr^{87,1)} hat folgenden Satz bewiesen: $f(z)$ sei in dem Bereich $x > 0$, $|y| < w(x)$, wo $w(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow \infty$, eindeutig und regulär mit $|f(z)| > k > 0$. Dann gibt es eine stetige Funktion $\varphi(x)$, so daß für alle $x > 0$ stets $|f(x)| < \varphi(x)$ gilt.

So sind mannigfache Beispiele mannigfacher Vorkommnisse gefunden. Aber eine allgemeine Untersuchung der auf den Geraden $\varphi = c$ möglichen Wertebereiche steht noch aus. So ist namentlich die Frage noch offen, ob diese Konvergenzwerte stetig von φ abhängen können. Gleichwohl sind eine ganze Reihe von Gesetzmäßigkeiten für diese Konvergenzwerte bekannt. Namentlich *E. Lindelöf*⁸⁸⁾, *F. Iversen*⁹³⁾ und *W. Groß*⁸⁹⁾ verdankt man gesicherte Ergebnisse in dieser Richtung:

Wenn $f(z)$ in $\varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2$, $|z| > R$ eindeutig und regulär ist und auf $\varphi = \varphi_1$ und auf $\varphi = \varphi_2$ denselben Konvergenzwert a besitzt, so ist die Funktion entweder im Winkelraum beschränkt und strebt dann für alle $\varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2$ gleichmäßig gegen a oder aber sie nimmt im Winkelraum jeden Wert mit höchstens einer Ausnahme unendlich oft an. Strebt sie aber auf $\varphi = \varphi_1$ und auf $\varphi = \varphi_2$ gegen verschiedene Grenzwerte, so tritt stets der letztere Fall ein. Wenn L eine dem Winkelraum angehörige Kurve ist, die ins Unendliche führt und wenn auf ihr $f(z)$ gegen a strebt, während $f(z)$ im Winkelraum beschränkt ist, oder doch die Werte Null und Eins ausläßt, so strebt die Funktion in jedem inneren Teilwinkelraum gleichmäßig gegen a . Ist insbesondere L die eine Grenze $\varphi = \varphi_1$, so strebt $f(z)$ gleichmäßig gegen a in jedem an $\varphi = \varphi_1$ anschließenden inneren Teilwinkelraum (einschließlich $\varphi = \varphi_1$). Ist $f(z)$

87) *W. Groß*, Eine ganze Funktion, für die jede komplexe Zahl Konvergenzwert ist, Math. Ann. 79 (1918), p. 201—208.

87,1) *H. Bohr*, En funktionsteoretisk Bemaerkning, Nyt tidsskrift f. Mat. 1916.

88) *E. Lindelöf*, a) a. a. O. 61 a); b) Sur un principe général d'analyse et ses applications à la théorie de la représentation conforme, Acta Soc. s. Fennicae 46 (1915), Nr. 4. Aus diesem Satz folgt insbesondere, daß die Randfunktion einer in $|z| < 1$ regulären beschränkten Funktion keine sprunghaften Unstetigkeiten haben kann. Dieser Satz ist indessen schon länger bekannt. Vgl. *A. Pringsheim*, a. a. O. 222), p. 96—98; *P. Fatou*, a. a. O. 95), p. 363. Einen sehr einfachen Beweis hierfür gab *Fejér* bei *F. Riesz*, a. a. O. 299), p. 153, Fußn. 1). Eine zusammenfassende Darstellung über die Randfunktion geben *F. u. M. Riesz*, Über die Randwerte einer analytischen Funktion, 4. Congrès des math. scand. à Stockholm 1916, p. 27—44. Für den im Text angeführten Satz und seine Erweiterung auf meromorphe Funktionen gaben *F. Iversen*⁹³⁾ und *W. Groß*⁸⁹⁾ weitere Beweise.

auf einer einem Teilwinkelraum angehörigen Kurve beschränkt, und läßt sie im Teilwinkelraum die Werte Null und Eins aus, so liegt $f(z)$ im ganzen Teilwinkelraum unter derselben Grenze. Strebt aber $f(z)$ auf L gegen Unendlich, während es wieder im Winkelraum die drei Werte Null, Eins, Unendlich ausläßt, so strebt es in jedem inneren Teilwinkelraum gleichmäßig gegen Unendlich.

22. Sätze von W. Groß. *W. Groß*^{82a) 82b)} hat diesen Satz wiedergefunden und noch beträchtlich verallgemeinert:

$f(z)$ sei im Gebiete G und an dessen Rand mit Ausnahme des Punktes P meromorph. Der Häufungsbereich des Punktes P möge einen Punkt aus einem der Komplementärgebiete enthalten, welche durch den auf den Rand bezüglichen Häufungsbereich von P bestimmt sind. Dann enthält der Häufungsbereich alle Punkte dieses Komplementärgebietes und alle mit Ausnahme einer Menge vom Maße Null werden in G unendlich oft angenommen.

*Groß*⁹⁶⁾ hat weiter den folgenden von *Zoretti*⁹⁶⁾ vermuteten Satz bewiesen: Jede Funktion mit beschränktem Existenzbereich, welche nur Singularitäten besitzt, in welchen sie verschwindet^{88, 1)}, ist identisch Null. Auf Grund dieses Satzes hat *Groß*^{82b)} das vorige Ergebnis dahin ergänzt, daß $f(z)$ in G sogar alle Werte mit Ausnahme einer punkthaften Menge unendlich oft annimmt. Ist endlich G einfach zusammenhängend, so gibt es höchstens zwei Ausnahmewerte.

23. Werteverteilung in Winkelräumen. In diesem Zusammenhang muß auch wieder der Satz von *Phragmén*⁴⁶⁾ Erwähnung finden, den ich so aussprechen will: Eine ganze^{88, 2)} Funktion der Ordnung ρ (vgl. Nr. 29) kann nicht in einem Winkelraum, dessen Öffnung $\pi\left(2 - \frac{1}{\rho}\right)$ übersteigt, beschränkt sein. Bei der *Mittag-Lefflerschen* Funktion

$$E_{\frac{1}{\rho}}(z) = \sum_0^{\infty} \frac{z^{\nu}}{\Gamma\left(1 + \frac{\nu}{\rho}\right)}$$

wird diese Schranke übrigens gerade erreicht. Auch die Winkelräume, in welchen eine ganze Funktion der Ordnung ρ ein schwächeres Wachstum zeigen kann, als es dieser Ordnung entspricht, haben eine nur beschränkte Öffnung. Damit hängt es zusammen⁸⁹⁾, daß eine solche Funktion in einem jeden, diese Öffnung übersteigenden Winkelraum

88, 1) Sie soll also auf jedem in einer singulären Stelle endigenden Einschnitt den Konvergenzwert Null haben.

88, 2) Es ist nur Bequemlichkeit, wenn ich den Satz nur für ganze Funktionen ausspreche. Er gilt auch für die Umgebung isolierter wesentlich singulärer Stellen.

89) *L. Bieberbach*, Zwei Sätze über das Verhalten analytischer Funktionen in der Umgebung wesentlich singulärer Stellen, *Math. Ztschr.* 2 (1918), p. 158—170.

einzelne Werte mehrfach annimmt, während die Funktion

$$z + E_{\frac{1}{\rho}}(z)$$

einen Winkelraum der Öffnung $\pi\left(2 - \frac{1}{\rho}\right)$ schlicht abbildet. Funktionen einer $\frac{1}{\rho}$ nicht übersteigenden Ordnung können in keinem einzigen Winkelraum wie rationale Funktionen wachsen, ganz im Einklang mit einem Satz von *Wiman* (p. 436). *Bieberbach*⁹⁰⁾ hat weiter folgenden Satz gefunden: Es gibt Polynome eines jeden Grades und ganze Funktionen einer jeden Ordnung unter $\frac{1}{\rho}$, deren sämtliche Null- und Einsstellen auf der positiven reellen Achse liegen. Ist aber $f(z)$ eine ganze Funktion, deren Ordnung ρ zwischen $\frac{1}{2}$ und 1 liegt, so können passende Winkelräume der Öffnung $\frac{1}{\rho}\pi$ einschließlich des Randes von Null- und Einsstellen frei bleiben. In jedem größeren Winkelraum aber nehmen diese Funktionen alle Werte bis auf höchstens eine Ausnahme unendlich oft an. Wenn endlich die Ordnung größer oder gleich Eins ist, so können passende Winkelräume der Öffnung $\pi\left(2 - \frac{1}{\rho}\right)$ einschließlich des Randes zwei oder mehr Ausnahmewerte zulassen. In jedem größeren Winkelraume aber werden wieder alle Werte mit höchstens einer Ausnahme unendlich oft angenommen.^{90,1)}

Nach einem weiteren Satz von *Phragmén* und *Lindelöf*⁴⁶⁾ ist eine jede Funktion der Ordnung ρ in einem Winkelraum einer unter $\frac{\pi}{\rho}$ bleibenden Öffnung beschränkt, sobald sie am Rande desselben beschränkt ist. Hält man dies mit dem *Lindelöfschen* Satz der Nr. 21 zusammen, so sieht man, daß der Winkel zweier Geraden, auf welchen eine Funktion der Ordnung ρ gegen verschiedene endliche Grenzwerte strebt, mindestens $\frac{\pi}{\rho}$ sein muß. Daraus folgt, daß zwei Strahlen, auf welchen die Funktion gegen verschiedene endliche Grenzwerte strebt, nicht aneinander stoßen können. Es muß zwischen ihnen ein Winkelraum bleiben, dessen Öffnung mindestens $\frac{\pi}{\rho}$ beträgt. Es kann also höchstens 2ρ Winkelräume oder Strahlen mit endlichen Grenzwerten geben.^{90,2)} In jedem der frei bleibenden Winkelräume muß die Funktion

90) L. Bieberbach, Über eine Vertiefung des *Picard'schen* Satzes bei ganzen Funktionen endlicher Ordnung, *Math. Ztschr.* 3 (1919), p. 175—190.

90,1) Für jede ganze Funktion lassen sich stets beliebig schmale Winkelräume angeben, in welchen sie alle Werte mit höchstens einer Ausnahme annehmen. Vgl. *G. Julia*, Une propriété générale des fonctions entières, *Paris C. R.* 168 (1919), p. 502—504.

90,2) *G. Valiron*, Sur les chemins de détermination des fonctions entières, *Bull. soc. math. Fr.* 45 (1917), p. 153—161, dehnt dies Resultat auf krummlinig begrenzte Winkelräume von konstanter Öffnung aus.

jeden Wert mit höchstens einer Ausnahme wirklich annehmen. Eventuell kann sie in jedem Teilwinkelraum desselben gegen unendlich streben.⁹¹⁾

Bemerkt man mit *Hurwitz*⁴⁴⁾, daß die Grenzwerte, die auf beliebigen Kurven bei Annäherung an unendlich erhalten werden können, gerade die nicht algebraischen Singularitäten der Umkehrungsfunktion liefern, so kommt man zu der noch unbewiesenen Vermutung von *Denjoy*⁹²⁾, daß die Umkehrungsfunktion einer ganzen Funktion endlicher Ordnung höchstens $2\varrho + 1$ Singularitäten nicht algebraischen Charakters haben kann.^{90, 3)}

Endlich führe ich (als Spezialfall eines allgemeineren) den folgenden Satz von *Phragmén* und *Lindelöf*⁴⁶⁾ an, der das Wachstum im Inneren eines Winkelraumes mit dem am Rande in Beziehung setzt. $f(z)$ besitze in einem Winkelraum die Ordnung ϱ , so daß für jedes $\varepsilon > 0$

$$\limsup_{r \rightarrow \infty} \frac{\log |f(re^{i\varphi})|}{r^{\varrho + \varepsilon}} = 0$$

ist. An den Rändern $\varphi = \varphi_1$ und $\varphi = \varphi_2$ eines Teilwinkelraumes, dessen Öffnung kleiner als $\frac{\pi}{\varrho}$ ist, sei

$$\limsup_{r \rightarrow \infty} \frac{\log |f(re^{i\varphi_k})|}{r^{\varrho}} = h_k. \quad (k = 1, 2)$$

90, 3) In einer im Arkiv för mat. astr. och fys. erscheinenden Arbeit hat *T. Carleman* $5\varrho + 1$ bewiesen.

91) *Boutroux* behauptet, daß sich zwischen zwei Endlichkeitsräume stets ein Unendlichkeitsraum lagere. Vgl. *P. Boutroux*, Sur l'indétermination d'une fonction uniforme au voisinage d'une singularité transcendante, Ann. de l'Éc. norm. sup. (3) 25 (1908), p. 319—370, und Paris C. R. 142 (1906), p. 499—501. Ferner: Sur l'inversion des fonctions entières, Atti del IV congr. internaz. dei mat. Roma 1909, Bd. I, S. 31—35; Sur les points critiques transcendants et sur les fonctions inverses des fonctions entières, Paris C. R. 145 (1907) p. 708—710, und p. 1406—1408. Sur les singularités transcendantes des fonctions inverses des fonctions entières, Paris C. R. 149 (1909), p. 255—258. Die Ergebnisse von *Sire*⁸¹⁾ lehren, daß diese Unendlichkeitsräume, wenn sie überhaupt immer vorhanden sein sollten, beliebig schmal sein können.

92) *A. Denjoy*, Sur les fonctions entières de genre fini, Paris C. R. 145 (1907) p. 106—108.

93) *F. Iversen*, a) Recherches sur les fonctions inverses des fonctions méromorphes, Diss. Helsingfors 1914; b) Sur quelques propriétés des fonctions monogènes au voisinage d'un point singulier, Oefversigt af Finska Vet. Soc. Förh. 58 (1916), Afd. A. Nr. 25; c) Sur quelques fonctions entières qui admettent des valeurs asymptotiques finies, Oefversigt af Finska Vet. Soc. Förh. 61 (1919), Afd. A. Nr. 1; d) Sur les valeurs asymptotiques des fonctions méromorphes et les singularités transcendantes de leurs inverses, Paris C. R. 166 (1918), p. 156. *G. Rémondos*, a) Sur les points critiques transcendants, Ann. de la fac. des sc. de Toulouse (2) 9 (1908), p. 177—182; b) Sur la classification des points transcendants des inverses des fonctions entières ou méromorphes, Paris C. R. (1917), p. 331.

Ferner sei $H(\varphi) = A \cos \varphi + B \sin \varphi$, $H(\varphi_1) = h_1$, $H(\varphi_2) = h_2$.
Dann ist für $\varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2$

$$\limsup_{r \rightarrow \infty} \frac{\log |f(re^{i\varphi})|}{r^\rho} \leq H(\varphi).$$

24. Ränderzuordnung bei konformer Abbildung. In engem Zusammenhang mit den hier besprochenen Dingen stehen die Untersuchungen von *Study*, *Carathéodory*, *Lindelöf* u. a. über die Ränderzuordnung bei konformer schlichter Abbildung^{93,1)}. Dabei spielt auch der Satz von *Schwarz*⁹⁴⁾ eine Rolle: Ist $f(z)$ oberhalb der reellen Achse in einem an dieselbe anschließenden Bereiche regulär und eindeutig, und strebt sie bei Annäherung an die reelle Achse gleichmäßig einem konstanten Werte zu, so ist sie überhaupt eine Konstante. Natürlich läßt sich dieser Satz sofort auf die Annäherung an einen analytischen Kurvenbogen verallgemeinern. Nimmt man den Satz von *Carathéodory* hinzu, wonach die schlichte Abbildung eines von einer Jordankurve begrenzten Bereiches auf einen Kreis auch auf dieser Kurve noch stetig ist, so läßt sich der Satz auch für die Annäherung an *Jordansche* Kurvenbogen aussprechen.

25. Der Fatousche Satz. In engem Zusammenhang mit der Frage der Ränderzuordnung steht auch der *Fatousche* Satz⁹⁵⁾. Eine im Einheitskreis reguläre beschränkte Funktion ist in allen Peripheriepunkten mit Ausnahme einer Nullmenge dreiecksstetig, d. h. sie strebt einem bestimmten Grenzwerte zu, wenn man sich dem Punkte längs eines Einschnittes nähert, der einem Teildreiecke des Kreises angehört. Verschwindet aber eine beschränkte Funktion in einer Punktmenge,

93,1) Man vgl. die in II C 3 (*Lichtenstein*), Nr. 48 angegebene Literatur. Dazu kommen noch die Arbeiten von *Groß*⁹²⁾.

94) *H. A. Schwarz*, Zur Integration der Differentialgleichung $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ unter vorgeschriebenen Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen, Berl. Monatsb. 1870, p. 764—795 und Ges. Abh., Bd. II, p. 144—171. Man vgl. ferner *Koebe*, Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung I, J. f. Math. 145 (1915), p. 177—223. *W. Groß*⁹²⁾ hat diesen Satz verallgemeinert.

95) *P. Fatou*, Série trigonométrique et série de Taylor, Acta math. 30 (1906), p. 335—400. Ein eleganter Beweis findet sich bei *Carathéodory*, Über die gegenseitige Beziehung der Ränder bei der konformen Abbildung des Inneren einer *Jordanschen* Kurve auf einen Kreis, Math. Ann. 73 (1913), p. 305—320; ferner vgl. *E. Study*, Vorlesungen über ausgewählte Gegenstände der Geometrie, Heft II, herausgegeben unter Mitwirkung von *W. Blaschke*, 1913, p. 50. Überhaupt gehören in diesen Zusammenhang auch die Untersuchungen über das Randverhalten bei schlichter Abbildung^{93,1)}. *Fatou* dehnte seinen Satz auf die Annäherung an beliebige analytische Linien aus. Sur les lignes singulières des fonctions analytiques, Bull. de la soc. math. de France 41 (1913), p. 113—119. Für rektifizierbare Linien gibt ihn *Denjoy*, Paris C. R. 168 (1919), p. 387.

deren Inhalt Null übertrifft, so ist sie wahrscheinlich identisch Null.⁹⁶⁾ Natürlich genügt statt der Beschränktheit auch die Bedingung, daß die Funktion ein Kontinuum von Werten ausläßt.⁹⁷⁾

Ganze transzendente Funktionen.

26. Weierstraß. Dem vorigen Abschnitt reiht sich die Theorie der ganzen transzendenten Funktionen an. Denn auch sie ist ja in vielen Stücken eine Theorie des isolierten wesentlich singulären Punktes.

Den Ausgangspunkt der Theorie bildet die Abhandlung von *Weierstraß*⁹⁷⁾ aus dem Jahre 1876, in welcher er durch schon vorher bekannte Beispiele, wie die Γ -Funktion und die trigonometrischen Funktionen angeregt, die Produktdarstellung der ganzen rationalen Funktionen auf die ganzen transzendenten Funktionen überträgt. Er fand den Ausdruck

$$f(z) = e^{g(z)} \cdot z^m \cdot \prod \left\{ \left(1 - \frac{z}{a_i}\right) e^{\frac{z}{a_i} + \frac{1}{2} \left(\frac{z}{a_i}\right)^2 + \dots + \frac{1}{k_i} \left(\frac{z}{a_i}\right)^{k_i}} \right\}, \quad |a_n| \leq |a_{n+1}|.$$

Dabei bedeutet $g(z)$ eine weitere ganze Funktion. Die k_i sind so zu wählen, daß

$$\sum \left| \frac{z}{a_i} \right|^{k_i + 1}$$

konvergiert. Wesentliche Änderungen hat der *Weierstraß*sche Beweis nie erfahren. Neuerdings hat ihn *A. Pringsheim*⁹⁸⁾ durch Vermeidung komplexer Logarithmen noch ein wenig elementarer gefaßt. Die weitere Entwicklung hat sich zunächst hauptsächlich mit dem Fall beschäftigt, wo $g(z)$ rational ist und wo die k_i unter einer festen Grenze liegen. Das sind die Funktionen von endlichem Geschlecht.

27. Laguerre. Dieser Begriff des endlichen Geschlechtes ist zuerst von *Laguerre*⁹⁹⁾ 1882 verwendet worden. Weder er noch seine Nachfolger haben stets genau die heute übliche Definition benutzt. Wir erklären jetzt so: Die ganze Zahl k sei so gewählt, daß

$$\sum \left| \frac{z}{a_i} \right|^k$$

96) *P. Fatou*, a. a. O. 95), p. 394. Vgl. auch: *L. Zoratti*, a. a. O. 43); *W. Groß*, a) Zur Theorie der Differentialgleichungen mit festen kritischen Punkten, *Math. Ann.* 78 (1918), p. 332—342; b) a. a. O. 82); *M. u. F. Riesz*, a. a. O. 88).

97) *K. Weierstraß*, Zur Theorie der eindeutigen analytischen Funktionen, *Berl. Abh.* 1876, p. 11—60, *Ges. Werke* Bd. II, p. 77—124.

98) *A. Pringsheim*, Über die *Weierstraß*sche Produktdarstellung ganzer transzendenten Funktionen und über bedingt konvergente unendliche Produkte, *Münch. Ber.* 1915, p. 387—400.

99) *E. Laguerre*, Sur quelques équations transcendentes, *Paris C. R.* 94 (1883), p. 160—163, *Oeuvres* I, p. 167—170.

divergiert und daß

$$\sum \left| \frac{z}{a_i} \right|^{k+1}$$

konvergiert. In der obigen Produktdarstellung können dann alle $k_i = k$ gewählt werden. Die ganze Funktion $g(z)$ sei rational und besitze den Grad g . Dann heißt die größere der beiden Zahlen k und g das Geschlecht der Funktion. Kann aber die ganze Funktion nicht in dieser Weise dargestellt werden, so heißt sie von unendlichem Geschlecht.

Laguerre hat nach zwei Richtungen hin die Theorie über *Weierstraß* hinaus fortgeführt. Einmal hat er die Analogie zur Algebra weiter verfolgt und Sätze über Wurzelrealität übertragen. Es ist ja bekannt, daß hier mit einer Funktion zusammen nicht auch die Ableitung lauter reelle Wurzeln zu besitzen braucht.¹⁰⁰⁾ *Laguerre* hat klar erkannt¹⁰¹⁾, wenn auch nicht lückenlos bewiesen¹⁰²⁾, wie hier der Satz lauten muß:

Eine reelle ganze Funktion vom Geschlechte p möge außer reellen genau q komplexe Wurzeln besitzen. Dann besitzt ihre Ableitung außer den durch Vielfachheit und *Rolleschen* Satz bedingten reellen Wurzeln höchstens noch $p + q$ weitere reelle oder komplexe Nullstellen. Von einem gewissen Modul an sind nach *Leau*^{151b)} die nach *Rolle* vorhandenen die einzigen reellen Nullstellen^{102, 1)}. Zahlreiche weitere Arbeiten schließen sich diesem Fragekreis an.¹⁰³⁾

100) Beispiele findet man bei *E. Borel*, a. a. O. 63 b), p. 30 und bei *O. Perron* im Arch. Math. Phys. 22 (1914), p. 362.

101) *E. Laguerre*, a) a. a. O. 99); b) Sur le genre de quelques fonctions entières, Paris C. R. 98 (1884), p. 79—81; Oeuvres I, p. 178—180; c) Sur quelques points de la théorie des équations numériques, Acta math. IV (1884), p. 97—120; Oeuvres I, p. 184—206.

102) Einen ausführlichen Beweis findet man bei *E. Borel*, a. a. O. 63 b).

102, 1) *L. Leau*^{151b)} hat den Satz auf einige Klassen von Funktionen mit unendlich vielen komplexen Nullstellen ausgedehnt.

103) *E. Laguerre*, Sur la théorie des équations numériques, J. de math. (3) 3 (1883), p. 99—146; Oeuvres I, p. 3—47; *E. Cesàro*, a) Sur les fonctions holomorphes de genre quelconque. Paris, C. R. 99 (1884), p. 26—27; b) Sur un théorème de *M. Laguerre*, Nouv. Ann. de math. (3) 4 (1885), p. 321—327. Weitere Arbeiten von *Bassi*, *Vivanti*, *Maillet*, *Jaggi*, *Dell' Agnola*, *Puzyna*, *De Sparre*, *Frenzel* usw. mit mehr formalem Inhalt, findet man bei *Vivanti* Theorie der eindeutigen analytischen Funktionen. Deutsch von *A. Gutzmer*, Leipzig 1906, zusammengestellt. Ferner *Bálint*, Math. és term. értesítő 31 (1913); *J. L. W. V. Jensen*, Recherches sur la théorie des équations, Acta math. 36 (1913), p. 181—195; *G. Pólya*, a) Algebraische Untersuchungen über ganze Funktionen vom Geschlecht Null und Eins, J. f. Math. 145 (1915), p. 224—249; b) Bemerkung zur Theorie der ganzen Funktionen, Jahresber. d. D. Math.-Ver. 25 (1915), p. 392—400; c) Über die Nullstellen gewisser ganzer Funktionen, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 352—382; d) Geometrisches über die Verteilung der Nullstellen gewisser ganzer

Viele derselben beziehen sich nicht auf den allgemeinen Fall, sondern machen die spezielle Annahme, daß das $g(z)$ in der Weierstraßschen Produktdarstellung sich auf eine Konstante reduziert. Solche Funktionen heißen *kanonisch* oder *primitiv*. Da aber die gefundenen Kriterien für die Wurzelrealität sich z. B. auf die Koeffizienten der Potenzreihenentwicklung beziehen, die Bedingung kanonisch aber an die Weierstraßsche Produktdarstellung anknüpft, so vermißt man ein Koeffizientenkriterium für kanonische Funktionen. Diese Lücke hat Maillet¹⁰⁴) ausgefüllt. Er gelangt zu Formeln für die Potenzsummen der reziproken Wurzeln, die den algebraischen analog sind. Im Zusammenhang damit steht auch das gesuchte Kriterium. Für den Fall, daß der Grenzexponent (Erklärung weiter unten) nicht ganzzahlig ist und den Wert ρ hat, findet man: Die Funktion

$$\sum a_n z^n$$

ist dann und nur dann kanonisch, wenn

$$a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$$

ist, wo $k = [\rho]$ bedeutet. Daß man den Grenzexponenten seinerseits aus den Koeffizienten ermitteln kann, werden wir bald sehen. Die erwähnten Arbeiten liefern weiter Methoden zur Berechnung von $g(z)$.

Viele der Arbeiten fassen die ganzen Funktionen als gleichmäßige Grenzfunktionen einer Polynomenfolge auf. Dahin gehört auch schon ein Satz von Laguerre¹⁰⁵), wonach eine solche Folge mit lauter reellen Nullstellen nur eine ganze Grenzfunktion besitzen kann, die aus einer Funktion des Geschlechtes 1 durch Multiplikation mit einem Exponentialfaktor zweiten Grades $e^{\gamma z^2}$ entsteht ($\gamma < 0$).^{107a}) Haben alle Nullstellen das gleiche Vorzeichen, so ist die Grenzfunktion, wenn überhaupt ganz, eine des Geschlechtes Null, multipliziert mit einem Exponentialfaktor ersten Grades $e^{\gamma z}$. Diese Sätze sind erst neuerdings durch Lindwart¹⁰⁶) vollständig bewiesen worden. Der Satz wurde

transzendenter Funktionen, Münch. Ber. 1920, p. 285—290; J. Grommer, Ganze transzendente Funktionen mit lauter reellen Nullstellen, J. f. Math. 144 (1914), p. 114—166 (= Diss. Göttingen 1914). Ålander, a) Sur le déplacement des zéros des fonctions entières par leur dérivation, Diss. Upsala 1914; b) Sur les zéros extraordinaires des dérivées des fonctions entières réelles, Arkiv för mat. astr. och fys. 11 (1916), Nr. 15; c) Sur les zéros des dérivées des fonctions rationelles et d'autres fonctions méromorphes, Arkiv för mat. astr. och fys. 14 (1920), Nr. 23.

104) E. Maillet, Sur les fonctions entières et quasientières, J. de math. (5) 8 (1902), p. 329—386.

105) E. Laguerre, Sur les fonctions de genre zéro et du genre un, Paris C. R. 95 (1882); Oeuvres p. 174—177.

106) E. Lindwart, Über eine Methode von Laguerre zur Bestimmung des Geschlechtes einer ganzen Funktion, Diss. Göttingen 1914.

auch noch insofern vertieft, als *Lindwart* und *Pólya*¹⁰⁷⁾ erkannten, daß es genügt, vorauszusetzen, daß die betreffenden Polynomfolgen in einem Teilkreis der Ebene gleichmäßig gegen eine nichtkonstante Grenzfunktion konvergieren, während die *Laguerreschen* Sätze (nicht gleichmäßige) Konvergenz gegen eine ganze Funktion in der ganzen Ebene verlangen.^{108), 108, 1)}

*J. Grommer*¹⁰⁸⁾ hat aus der Algebra die bekannten Bedingungen für die Realität sämtlicher Nullstellen übertragen.^{108, 2)}

Ich komme zur zweiten folgenschweren *Laguerreschen* Entdeckung. Der Anfang, den er machte, ist zwar auf den ersten Blick unscheinbar, aber die ganze weitere Entwicklung hat davon ihren Ausgang genommen. Unter Verwendung des *Cauchyschen* Integralsatzes hat *Laguerre*¹⁰⁹⁾ gefunden, daß eine ganze Funktion sicher höchstens vom Geschlecht p ist, wenn

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{z^p} \frac{f'(z)}{f(z)} \right| = 0$$

ist. Das ist insofern der Keim zu den weiteren mit *Poincaré* 1883 einsetzenden Fortschritten, als darin zum ersten Male eine Beziehung zwischen dem Geschlecht und dem Wachstum der ganzen Funktionen angedeutet ist. Für die Funktionen nämlich, welche der *Laguerreschen* Bedingung genügen, ist auch

$$|f(z)| < e^{\varepsilon |z|^{p+1}}$$

für jedes positive ε von einem gewissen $|z|$ an.

28. *Poincaré*. *Hadamard*. *Borel*. Im gleichen Jahre 1883 und im gleichen Bande des Bulletin de la société mathématique de France hat *Poincaré* zwei grundlegende Arbeiten veröffentlicht, die über Uni-

107) *E. Lindwart* und *G. Pólya*, Über den Zusammenhang zwischen der Konvergenz von Polynomfolgen und der Verteilung ihrer Wurzeln, Rend. di Palermo 37 (1914), p. 297—304. *G. Pólya*, a) Über Annäherung durch Polynome mit lauter reellen Wurzeln, Rend. di Palermo 36 (1913), p. 297—395; b) Über Annäherung durch Polynome, deren sämtliche Wurzeln in einen Winkelraum fallen, Gött. Nachr. 1913, p. 326—330. Vgl. auch *R. Jentzsch*, a. a. O. 273).

108) Man vgl. weiter *M. Petrovitch*, Sur certaines transcendentes entières, Bull. de la soc. math. de France 34 (1906), p. 165—177.

108,1) Die ganzen Funktionen, welche als Grenzen von Polynomen aus nur reellen Nullstellen auftreten können, besitzen charakteristische funktionentheoretische und algebraische Eigenschaften. *G. Pólya* u. *J. Schur*, Über zwei Arten von Faktorenfolgen in der Theorie der algebraischen Gleichungen, Crelles J. 144 (1914), p. 89—113.

108,2) Gewisse Vereinfachungen des Beweises hat *N. Kritikos*, Über ganze transzendente Funktionen mit reellen Nullstellen, Math. Ann. 81 (1920), p. 97—118 erzielt.

109) *E. Laguerre*, Sur la détermination du genre d'une fonction transcendante, Paris C. R. 94 (1882), p. 635—638; Oeuvres I, p. 171—173.

formisierung und die über ganze Funktionen.¹¹⁰⁾ *Poincaré* hat das *Laguerresche* Resultat dahin vervollständigt, daß für alle Funktionen des Geschlechts p und beliebige $\varepsilon > 0$ stets

$$\lim_{z \rightarrow \infty} e^{-\varepsilon |z|^{p+1}} \cdot |f(z)| = 0$$

ist. Ferner hat *Poincaré* schon die Beziehungen des Geschlechts zu den Koeffizienten der Funktion zu untersuchen begonnen. Er hat nämlich gezeigt, daß für die Koeffizienten einer Funktion $\sum a_n z^n$ vom Geschlecht p stets

$$a_m \cdot \Gamma\left(\frac{m+h+1}{p+1}\right) \rightarrow 0 \quad (\text{für } m \rightarrow \infty \text{ und beliebiges } h > 0)$$

gilt.

Zehn Jahre lang war dies der Stand der Theorie, da erschien 1893 eine bahnbrechende Arbeit von *J. Hadamard*¹¹¹⁾. Er hat, wie weiterhin näher ausgeführt wird, die *Poincaréschen* Sätze umgekehrt.

Bahnbrechend wirkte weiter eine Arbeit von *E. Borel*¹¹²⁾. Darin wird die Beziehung zum *Picardschen* Satze hergestellt und dieser gleichzeitig vertieft.

Das sind die Hauptzüge, aus welchen eine große Zahl von Mathematikern in zum Teil nicht minder eigenartigen Beiträgen das heutige Gesamtbild der Theorie der ganzen Funktionen endlicher Ordnung herausgearbeitet haben. Wir wenden uns nun der systematischen Darstellung der Theorie zu.

29. Grundbegriffe. Zu dem schon erwähnten Begriffe *Geschlecht* trage ich noch nach, daß einzelne Mathematiker sich anderer Begriffsnamen bedienen. So findet man bei *Schaper*¹¹³⁾ und *Pringsheim*¹¹⁴⁾ die Benennung *Höhe*, bei *Vivanti*¹⁰³⁾ den Ausdruck *Rang*. Den Grad der Funktion $g(z)$ in der *Weierstraßschen* Produktdarstellung will ich (bei geeigneter Normierung) kurz *Grad* der Funktion nennen. Dann sind die Funktionen nullten Grades die schon erwähnten kanonischen oder primitiven Funktionen. Ferner spielt der *Grensexponent* (*ordre réelle*

110) *H. Poincaré*, Sur les fonctions entières, Bull. de la soc. math. de France 11 (1883), p. 136—144.

111) *J. Hadamard*, Etude sur les propriétés des fonctions entières et en particulier d'une fonction considérée par *Riemann*, J. de math. (4) 9 (1893), p. 171—215.

112) *E. Borel*, Sur les zéros des fonctions entières, Acta math. 20 (1897), p. 357—396.

113) *H. v. Schaper*, Über die Theorie der *Hadamardschen* Funktionen und ihre Anwendung auf das Problem der Primzahlen, Diss. Göttingen 1898.

114) *A. Pringsheim*, Elementare Theorie der ganzen transcendenten Funktionen von endlicher Ordnung, Math. Ann. 58 (1904), p. 257—342.

der Franzosen) eine wichtige Rolle. Falls es eine Zahl ρ gibt von der Art, daß, unter a_i die Nullstellen der ganzen Funktion verstanden, für jedes $\varepsilon > 0$ die Reihe

$$\sum \left| \frac{1}{a_i} \right|^{\rho + \varepsilon}$$

konvergiert und die Reihe

$$\sum \left| \frac{1}{a_i} \right|^{\rho - \varepsilon}$$

divergiert, so ist ρ der Grenzexponent. Er kann natürlich ein Konvergenz- und ein Divergenzexponent sein, je nach dem Verhalten, das

$$\sum \left| \frac{1}{a_i} \right|^{\rho}$$

selbst zeigt. Der Grenzexponent einer Zahlenfolge hängt selbstredend eng mit dem einfachsten der *Bertrandschen* Konvergenzkriterien zusammen. Der Grenzexponent hat nämlich dann und nur dann den Wert ρ , wenn für jedes $\varepsilon > 0$ von einem gewissen n an

$$|a_n| > n^{\frac{1}{\rho} - \varepsilon}$$

gilt, und wenn außerdem für jedes $\varepsilon > 0$ und gewisse beliebig große n noch

$$|a_n| < n^{\frac{1}{\rho} + \varepsilon}$$

bleibt. Hiernach liegt eine von *Lindelöf*¹¹⁵⁾ und fast gleichzeitig von *P. Boutroux*¹¹⁶⁾ eingeführte Verallgemeinerung des Grenzexponenten nahe.

Wir kommen zu den aufs Wachstum der Funktion bezüglichen Ordnungsbegriffen. Eine Funktion heißt von der *Ordnung* μ (ordre apparent der Franzosen) wenn für jedes $\varepsilon > 0$ von einem gewissen $|z| = r$ an

$$|f(z)| < e^{r^{\mu + \varepsilon}}$$

ist und wenn es gleichzeitig beliebig große r gibt, für welche

$$\text{Max}_{|z|=r} |f(z)| > e^{r^{\mu - \varepsilon}}$$

ist. Hiernach ist also z. B. eine Funktion $e^{\rho(z)}$ vom Grade μ genau von der Ordnung μ . Man erkennt, wie der Begriff „Ordnung“ den Begriff „Grad“ der ganzen rationalen Funktionen verallgemeinert. Alle Funktionen, für die es ein derartiges endliches μ gibt, heißen von endlicher Ordnung, die anderen sind von unendlicher Ordnung. Falls die zweite der bei der Erklärung des Ordnungsbegriffes benutzten Ungleichungen auch von einem gewissen $|z|$ an für *alle* z erfüllt ist, so

115) *E. Lindelöf*, Mémoire sur la théorie des fonctions entières de genre fini, Acta soc. sc. Fenn. 31 (1902). Vgl. auch *G. Valiron*, Sur les fonctions entières d'ordre fini, Paris C. R. 156 (1913), p. 1138—1141.

116) *P. Boutroux*, Sur quelques propriétés des fonctions entières, Acta math. 28 (1903), p. 97—224.

haben wir es mit einer *Funktion von regelmäßigem Wachstum* zu tun.^{116,1)}

Die Funktionen einer gegebenen Ordnung μ kann man noch in verschiedene Typen einteilen.¹¹⁴⁾ Gibt es ein endliches $\gamma > 0$, so daß

$$|f(z)| < e^{(\gamma + \varepsilon)r^\mu}$$

ist von einem gewissen r an, und daß

$$\text{Max}_{|z|=r} |f(z)| > e^{(\gamma - \varepsilon)r^\mu}$$

ist für gewisse beliebig große r bei beliebig gegebenem $\varepsilon > 0$, so haben wir eine Funktion vom *Normaltypus* γ vor uns. Ist aber für jedes $\varepsilon > 0$ von einem gewissen r an

$$|f(z)| < e^{\varepsilon r^\mu}$$

so liegt der *Minimaltypus* der Ordnung μ vor, und wenn für jedes $\gamma > 0$ und gewisse beliebig große z noch

$$\text{Max}_{|z|=r} |f(z)| > e^{\gamma r^\mu}$$

ist, so haben wir den *Maximaltypus* der Ordnung μ .

Der vorhin erwähnten Verallgemeinerung des Grenzexponenten geht eine gleichfalls von *E. Lindelöf* und *P. Boutroux* eingeführte Verallgemeinerung des Ordnungsbegriffes parallel. Sie ziehen nämlich neben der Exponentialfunktion noch

$$e^{r^\mu \cdot \log^{\alpha_1} r \cdot \log^{\alpha_2} r \dots \log^{\alpha_k \pm \varepsilon} r}$$

als Vergleichsfunktion heran.

30. Ordnung und Koeffizienten. Ihren Ausgang nimmt hier die Entwicklung von der schon erwähnten *Poincaréschen* Entdeckung über die Koeffizienten einer Funktion vom Geschlecht p . Die Einführung des Ordnungsbegriffes hat zu einer Verschärfung geführt. *Hadamard* lehrte umgekehrt aus den Koeffizienten die Ordnung bestimmen. Während *Poincaré* sich auf Eigenschaften des *Laplaceschen* Integrales stützt, haben die Beweise unter den Händen von *Hadamard*¹¹⁷⁾, *E. Lindelöf*⁸⁵⁾¹¹⁵⁾

116,1) Bei Funktionen von unregelmäßigem Wachstum gilt sogar in unendlich vielen r -Intervallen

$$|f(z)| < e^{r^\mu - \varepsilon}.$$

Man vgl. *R. Mattson*, Sur la croissance du module d'une fonction entière, Arkiv for mat. astr. och fysik. 6 (1910), Nr. 10. Beispiele von Funktionen mit unregelmäßigem Wachstum konstruiert *Borel*, Sur quelques fonctions entières, Rend. di Palermo 23 (1907), p. 320—323.

117) *J. Hadamard*, a) a. a. O. 111); b) Sur les fonctions entières, Bull. de la soc. math. de France 24 (1896), p. 186—187.

und A. Pringsheim¹¹⁸⁾ eine außerordentlich kurze und elegante Gestalt erhalten. Der Gipfel des Erreichbaren ist wohl durch E. Lindelöf⁸⁵⁾ gegeben. Eine Modifikation des Lindelöfschen Beweises bietet A. Pringsheim (a. a. O.¹¹⁴⁾, p. 337 ff.). Ein durch diese Untersuchungen sicher gestellter Satz lautet:

Aus $|f(z)| < e^{\frac{\alpha + \varepsilon}{e^\mu} r^\mu}$ ($\alpha > 0$, $\varepsilon > 0$) von einem gewissen $|z| = r$ an folgt für die Koeffizienten von $f(z) = \sum c_n z^n$: $\sqrt[n]{|c_n|} < \left(\frac{\alpha + \varepsilon}{n}\right)^\mu$ von einem gewissen n an und umgekehrt.

Aus $\text{Max } |f(z)| > e^{\frac{\alpha - \varepsilon}{e^\mu} r^\mu}$ für gewisse beliebig große $|z| = r$ folgt $\sqrt[n]{|c_n|} > \left(\frac{\alpha - \varepsilon}{n}\right)^\mu$ für gewisse beliebig große n und umgekehrt.

E. Lindelöf⁸⁵⁾ hat unter Vervollständigung eines Versuches von E. Maillet¹¹⁹⁾ eine Ergänzung dieses Satzes angegeben. Der Zusatz bezieht sich natürlich immer nur auf die zweite Hälfte: Damit die dort gegebene Abschätzung nicht nur für gewisse große r , sondern von einem gewissen r an immer erfüllt sei, ist notwendig und hinreichend, daß die für die Koeffizienten angegebene Abschätzung für unendlich viele Werte n_0, n_1, \dots von n erfüllt sei, welche der Bedingung

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{n_{k+1}}{n_k} = 1 \quad \text{genügen.}$$

Dem so für die Normaltypen ausgesprochenen Satz stehen analoge für Funktionen der Ordnung μ überhaupt und für Lindelöf-Boutroux'sche Ordnungstypen an der Seite. Auch für die Minimaltypen lassen sich genauere Resultate finden.

Falls die vorgelegte Funktion lauter positive Koeffizienten hat, so gehen diese für das Maximum der Koeffizienten gefundenen Ergebnisse in Aussagen über das asymptotische Verhalten der Funktion selbst auf der positiven reellen Achse über.¹²⁰⁾

118) A. Pringsheim, a) Zur Theorie der ganzen transcendenten Funktionen, Münch. Ber. 32 (1902), p. 163—192 und p. 295—304; b) Zur Theorie der ganzen transcendenten Funktionen von endlichem Rang, Münch. Ber. 33 (1903), p. 101—130, c) a. a. O. 114).

119) E. Maillet, Sur les fonctions entières et quasientières à croissance régulière et les équations différentielles, Ann. de la fac. des sc. de Toulouse (2) 4 (1902), p. 447—469.

120) E. le Roy, Valeurs asymptotiques de certaines séries procédant suivant les puissances entières et positives d'une variable réelle, Bull. des sc. math. (2) 24 (1900), p. 245—268; E. Lindelöf, a. a. O. 115); P. Boutroux, a. a. O. 116); G. Valiron, Sur le calcul approché de certaines fonctions entières, Bull. soc. math. Fr. 42 (1914), p. 252—264; Denjoy, a. a. O. 147, 1).

31. Ordnung und Grenzexponent. Den Ausgangspunkt bildet hier die *Poincarésche* Entdeckung, daß

$$\lim_{z \rightarrow \infty} |f(z)| e^{-\varepsilon|z|^{p+1}} = 0$$

ist für Funktionen vom Geschlechte p , bei beliebig gegebenem positiven ε . Die Einführung des Grenzexponenten und der Ordnung erlaubt eine Verschärfung des Resultates.¹²¹⁾ Gleichzeitig ergibt sich eine Umkehrung.

Zunächst die Verschärfung: Primitive Funktionen des Grenzexponenten ρ sind höchstens von der Ordnung ρ . Genauer gesagt liefern elementare Abschätzungen das folgende Ergebnis: Die primitive Funktion $f(z)$ sei vom Geschlechte p und es sei $p < \sigma \leq p + 1$. Gilt dann

$$\limsup_{v \rightarrow \infty} v \left| \frac{1}{a_v} \right|^\sigma \leq g, \quad \text{wo } g \geq 0,$$

so ist für jedes $\varepsilon > 0$ und alle genügend großen $|z|$

$$|f(z)| < e^{(C_\sigma \sigma + \varepsilon)|z|^\sigma}$$

C_σ bedeutet dabei eine passende nur von σ abhängende positive Zahl. Die Funktion gehört also höchstens dem Normaltypus an. Ist insbesondere

$$\lim_{v \rightarrow \infty} v \left| \frac{1}{a_v} \right|^\sigma = 0,$$

so gehört die Funktion höchstens dem Minimaltypus an. Das ist namentlich dann der Fall, wenn ρ Konvergenzexponent ist. Denn dann kann man $\sigma = \rho$ wählen.

Ist die Funktion $f(z) = e^{g(z)}$

vom Grade g , und besitzt der höchste Koeffizient in $g(z)$ den Wert a , so ist $f(z)$ vom Typus $|a|$ der Ordnung g .

Damit gewinnt man dann zunächst das Resultat, daß Funktionen eines endlichen Geschlechtes stets von endlicher Ordnung sind und zwar gilt z. B. die Abschätzung

$$|f(z)| < e^{\lambda + \varepsilon}$$

wo λ die größere der beiden Zahlen Grad und Grenzexponent bedeutet.

Sind nun aber auch umgekehrt alle Funktionen von endlicher Ordnung von endlichem Geschlecht? Für diese Fragestellung hat *Hadamard* bahnbrechend gewirkt.

Zunächst ergibt sich, daß nirgends verschwindende Funktionen

121) *J. Hadamard*, a) Théorème sur les séries entières, Paris C. R. 124 (1897), p. 492; b) Sur les séries entières, Procès verbaux de la soc. des sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1897, p. 110—112; c) Théorème sur les séries entières, Acta math. 22 (1898), p. 55—63; *E. Lindelöf*, a. a. O. 115); *A. Pringsheim*, a. a. O. 114).

endlicher Ordnung stets von der Form $e^{g(z)}$ mit ganzem rationalem $g(z)$ sind. Ordnung und Grad stimmen hier also überein. Das ergibt sich als unmittelbare Folgerung aus einem *Hadamardschen* Satz über den Realteil analytischer Funktionen.¹²²⁾

Weiter aber gilt es nun aus der bekannten Ordnung der Funktion einen Schluß auf den Grenzexponenten der Nullstellen zu ziehen. Dies gelingt *Hadamard* durch eine Abschätzung der Anzahl der Nullstellen, welche eine Funktion gegebener Ordnung in einem gegebenen endlichen Bereich haben kann. Sein Beweis ist zuerst durch *Schou*¹²²⁾ vereinfacht, dann sein Resultat durch *Lindelöf*¹¹⁵⁾ aus dem Satz von *Jensen* (p. 505), von *Pringsheim*¹¹⁴⁾ gar durch ganz elementare Abschätzungen gewonnen worden. Man schließt nämlich, daß

$$\sum \left| \frac{1}{a_i} \right|^{\mu + \varepsilon}$$

für jedes $\varepsilon > 0$ konvergiert, wenn die Funktion $f(z)$ der Ordnung μ unendlich viele Nullstellen a_i besitzt. Genauer gesagt findet man folgendes durch *Pringsheim*¹¹⁴⁾ besonders scharf herausgearbeitetes Resultat:

Für jede Funktion der Ordnung μ mit unendlich vielen Nullstellen gilt

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \nu \left| \frac{1}{a_\nu} \right|^{\mu + \delta} = 0 \quad \text{für jedes } \delta > 0.$$

Für jede Funktion vom Normaltypus der Ordnung μ gilt

$$\limsup_{\nu \rightarrow \infty} \nu \left| \frac{1}{a_\nu} \right|^\mu \leq g \quad (g \text{ endlich}).$$

Für jede Funktion vom Minimaltypus der Ordnung μ gilt

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \nu \left| \frac{1}{a_\nu} \right|^\mu = 0.$$

Für *primitive* Funktionen liest man nun aus dem Gesagten folgende Ergebnisse ab:

a) Ordnung und Grenzexponent μ stimmen überein.

b) Ist weiter μ nicht ganzzahlig, so gehört die Funktion dann

$\alpha)$ dem Minimaltypus an, wenn $\lim_{\nu \rightarrow \infty} \nu \left| \frac{1}{a_\nu} \right|^\mu = 0$

$\beta)$ dem Normaltypus an, wenn $\limsup_{\nu \rightarrow \infty} \nu \left| \frac{1}{a_\nu} \right|^\mu > 0$

$\gamma)$ dem Maximaltypus an, wenn $\limsup_{\nu \rightarrow \infty} \nu \left| \frac{1}{a_\nu} \right|^\mu = \infty$ ist.

122) *Schou*, a) Sur la théorie des séries entières, Paris C. R. 125 (1897), p. 763—764; b) Beweis for en sätning af *Hadamard*, Nyt. tidskrift for math. 8 B (1897), p. 5—6.

123) *P. Boutroux*, a. a. O. 116); *A. Pringsheim*, a. a. O. 114); *A. Wiman*, Sur le cas d'exception dans la théorie des fonctions entières, Arkiv for mat. astr. och fys. 1 (1903), p. 327—345.

Wie bei ganzzahligem μ der Satz zu modifizieren ist, hat nach verschiedenen Vorbereitungen¹²³⁾ erst *Lindelöf*¹²⁴⁾ erschöpfend dargelegt.

Zur Übertragung dieser Sätze auf nicht primitive Funktionen hat man eine *Abschätzung der primitiven nach unten* nötig. Auch sie wurde durch *Hadamard*¹¹¹⁾ entdeckt. Er fand: -

Auf unendlich vielen Kreisen $|z| = r$ beliebig großer Radien gilt für die primitive Funktion $f(z)$ des Grenzexponenten ρ die Abschätzung

$$|f(z)| > e^{-r^\rho + \varepsilon} \quad (\varepsilon > 0)$$

Ist ρ Konvergenzexponent, so ist nach *Lindelöf*¹²⁵⁾ sogar

$$|f(z)| > e^{-\varepsilon r^\rho}. \quad (\varepsilon > 0)$$

Wie leicht zu erkennen ist, lassen sich ähnliche Sätze bei beliebigen ganzen Funktionen endlicher Ordnung aussprechen. Ihre schärfste Fassung haben sie durch *E. Lindelöf*¹²⁶⁾ und *J. E. Littlewood*¹²⁵⁾ erhalten. Sie beweisen, daß

$$m_i(r) > \left(\frac{1}{m_a(r)}\right)^h$$

für unendlich viele gegen unendlich wachsende $|z| = r$ und für jede ganze Funktion der Ordnung ρ und beliebiges $h > 0$ gilt, wofern man unter $m_i(r)$ das Minimum, unter $m_a(r)$ das Maximum von $|f(z)|$ für $|z| = r$ versteht. Insbesondere gilt also auf unendlich vielen Kreisen

$$|f(z)| > e^{-r^\rho + \varepsilon}.$$

Daß $m_i(r) > m_a(r)^{-1-\varepsilon}$ für beliebig große r , hat *Wiman*¹²⁷⁾ für Funktionen unendlichen Geschlechts ohne Nullstellen bewiesen und für beliebige ganze Funktionen vermutet.

Verschiedene Autoren haben versucht, solche Abschätzungen auf das ganze Gebiet zu übertragen, das von der unendlichen Ebene übrig bleibt, wenn man die Nullstellen durch gewisse Kreise ausschließt. Als Vorläufer sind hier *Boutroux* und *Maillet*¹²⁸⁾ zu nennen. Doch entnahm *Maillet* der von ihm weitergeführten *Borelschen* Methode nicht alles,

124) *E. Lindelöf*, Sur les fonctions entières d'ordre entier, Ann. Éc. Norm. (3) 22 (1905), p. 369—395.

125) *E. Lindelöf*, Quelques théorèmes nouveaux sur les fonctions entières, Paris C. R. 133 (1901), p. 1279—1282; ferner a. a. O. 115).

126) *E. Lindelöf*, Sur un théorème de *M. Hadamard* dans la théorie des fonctions entières, Rend. di Palermo 25 (1908), p. 228—234.

127) *A. Wiman*, Über den Zusammenhang zwischen dem Maximalbetrage einer analytischen Funktion und dem größten Betrage bei gegebenem Argument der Funktion, Acta math. 41 (1916), p. 1—28.

128) *P. Boutroux*, a. a. O. 116); *E. Maillet*, Sur les fonctions entières et quasientières, J. de math. (5) 9 (1902), p. 329—386.

was sie liefern konnte. Das tat erst *Rémoundos*¹²⁹⁾, während *Wiman*¹³⁰⁾ und *Lindgren*¹³¹⁾ daran anknüpften, daß das von *Maillet* angegebene Resultat meist trivial ausfällt. Sie nahmen die Frage erneut auf und fanden:

Schließt man die Nullstelle α_i durch einen Kreis vom Radius $|\alpha_i|^{-k}$ ($k > 0$ beliebig, aber von α_i unabhängig) aus, so gilt im Restbereich

$$|f(z)| > e^{-r^\rho + \varepsilon}$$

für beliebiges $\varepsilon > 0$ und genügend großes r .

Diese Abschätzung bleibt bestehen, wenn man statt dieser Kreisscheiben auf jedem Kreis $|z| = r$ geeignet gewählte Bogen von einer Gesamtlänge kleiner als e^{-r^α} ($0 < \alpha < \varepsilon$) wegläßt. (*Rémoundos*¹²⁹⁾.)

Bei Funktionen einer Ordnung $\rho < \frac{1}{2}$ hat *Wiman*¹³²⁾ entdeckt und später *Lindelöf*¹³³⁾ einfacher bewiesen¹³³⁾, daß auf unendlich vielen beliebig großen Kreisen sogar

$$|f(z)| > e^{r^\rho - \varepsilon}$$

bleibt. *Valiron* und *Littlewood*¹³⁴⁾ geben dem Satz über Funktionen vom Grenzexponenten Null eine schärfere Fassung. Eine weitere Verschärfung des *Hadamardschen* Satzes für $\rho < 1$ vermutet *Littlewood* und beweist *Wiman*¹³⁵⁾.

129) *G. Rémoundos*, Sur les fonctions entières de genre fini, Bull. de la soc. math. de France 32 (1904), p. 314—316.

130) *A. Wiman*, a. a. O. 123).

131) *B. Lindgren*, Sur le cas d'exception de *M. Picard* dans la théorie des fonctions entières, Upsala 1903.

132) *A. Wiman*, a) Über die angenäherte Darstellung von ganzen Funktionen, Arkiv för mat. astr. och fysik. 1 (1903), p. 105—111; b) Sur une extension d'un théorème de *M. Hadamard*, Arkiv för mat. astr. och fysik (2) (1905), p. 14.

133) Ein anderer Beweis bei *F. Wiener*, Elementare Beiträge zur neueren Funktionentheorie, Diss. Göttingen 1911.

134) *Valiron*, a) Sur les fonctions entières d'ordre nul, Math. Ann. 70 (1911), p. 471—498; b) Sur les fonctions entières d'ordre nul et d'ordre fini et en particulier les fonctions à correspondance régulière, Thèse Toulouse 1914; c) Le théorème de *M. Picard* pour les fonctions entières d'ordre nul, Nouv. Ann. (4) 11 (1911), p. 145—151; d) Sur les fonctions entières d'ordre nul, Nouv. Ann. (4) 11 (1911), p. 448—461; e) Sur les fonctions entières d'ordre nul, Paris C. R. 156 (1913), p. 534—536; f) Sur la croissance des fonctions entières d'ordre nul, Nouv. Ann. (4) 13 (1913), p. 97—110; g) Sur la dérivée logarithmique de certaines fonctions entières, Nouv. Ann. (4) 11 (1911), p. 498—508; *J. E. Littlewood*, On the asymptotic approximation to integral functions of zero order, Proc. of the London math. soc. (2) 5 (1907), p. 361—410; *A. Wahlund*, Sur le module minimum des fonctions entières d'ordre nul, Arkiv för mat. astr. och fys. (8) 1914, Nr. 6.

135) *J. E. Littlewood*, A general theorem on integral functions of finite order, Proc. of the London math. soc. (2) 6 (1908), p. 189—204; *A. Wiman*, Ganze Funktionen der Höhe Null, Math. Ann. 76 (1915), p. 197—211.

Wir kehren zur ersten Fassung des *Hadamardschen* Satzes zurück um seine Bedeutung für die Beziehung zwischen Grenzexponent und Ordnung bei den allgemeinen Funktionen endlicher Ordnung darzulegen.

Sei nun eine beliebige Funktion der Ordnung μ vorgelegt, so ergibt sich zunächst, daß sie von endlichem Geschlecht ist. Denn einmal kann wegen der Konvergenz von

$$\sum \left| \frac{1}{a_i} \right|^{\mu + \varepsilon}$$

ihr primitiver Bestandteil keinen größeren Grenzexponenten als μ haben. Hieraus findet man eine untere Abschätzung für den primitiven Bestandteil und daraus eine obere Abschätzung für den Exponentialfaktor, der sich damit nach dem *Hadamardschen* Satze als von endlichem Grade erweist. Gleichzeitig führt dieser Gedankengang zu den folgenden Resultaten:

Bei nicht ganzzahliger Ordnung bleiben die vorhin für primitive Funktionen ausgesprochenen Ergebnisse unverändert bestehen. Das Geschlecht ist also eindeutig zu $[\mu]$ bestimmt.

Bei ganzzahliger Ordnung μ indessen sind die Ergebnisse etwas andere. *Lindelöf*¹²⁴⁾ gibt sie in folgender Form an:

a) Wenn die Funktion dem Minimaltypus der Ordnung μ angehört, so ist ihr Grenzexponent gleich μ und ihr Grad höchstens μ . Ihr Geschlecht ist also μ oder $\mu - 1$, je nachdem, ob μ Divergenz- oder Konvergenzexponent ist. Weiter gilt:

$$(A) \limsup_{\nu \rightarrow \infty} \nu \left| \frac{1}{a_\nu} \right|^\mu = 0 \quad \text{und} \quad \limsup_{\nu \rightarrow \infty} \left| \alpha_0 + \frac{1}{\mu} \sum_1^\nu \left(\frac{1}{a_k} \right)^\mu \right| = 0. \quad 135a)$$

Wenn umgekehrt eine Funktion von höchstens μ^{tem} Grade den Grenzexponent μ besitzt, und wenn dazu die Gleichungen (A) gelten, so ist ihre Ordnung dem Grenzexponenten gleich, und sie gehört dem Minimaltypus dieser Ordnung an.

b) Wenn eine Funktion dem Normaltypus der Ordnung μ angehört, so ist sie entweder vom Grade μ und hat einen Grenzexponenten, der μ nicht übertrifft, oder aber ihr Grenzexponent ist gleich μ und ihr Grad nicht über μ . In beiden Fällen ist ihr Geschlecht μ . Die beiden vorhin angegebenen limites superiores (A) sind endlich und verschwinden nicht gleichzeitig. Sind umgekehrt für eine Funktion von höchstens μ -tem Grade die eben genannten Ergebnisse zutreffend, so gehört sie dem Normaltypus der Ordnung μ an.

135a) Wenn $e^{\rho(z)}$ der Exponentialfaktor der Funktion ist, so sei

$$g(z) = \alpha_0 z^\mu + \alpha_1 z^{\mu-1} + \dots + \alpha_\mu,$$

α_0 also der Koeffizient der μ^{ten} Potenz.

c) Wenn $f(z)$ vom Maximaltypus der Ordnung μ ist, so wird ihr Grenzexponent gleich μ . Mindestens einer der beiden limites superiores (A) ist unendlich. Wenn umgekehrt bei einer Funktion μ^{ten} Grades vom Grenzexponenten μ die eben erwähnten Ergebnisse zutreffen, so gehört sie dem Maximaltypus der Ordnung μ an.

Im Falle der Minimaltypen und Maximaltypen nicht ganzzahliger Ordnung konnten¹³⁶⁾ durch Heranziehen der verallgemeinerten Ordnungstypen noch genauere Resultate gewonnen werden. Wenn nämlich bei gegebenem $\varepsilon > 0$ und nicht ganzzahligem ρ von einem gewissen $|z| = r$ an

$$|f(z)| < e^{r^\rho (\log r)^{\alpha_1} \dots (\log_k r)^{\alpha_k + \varepsilon}}$$

ist, so ist auch

$$|\alpha_n| > [n(\log n)^{-\alpha_1} \dots (\log_k n)^{-\alpha_k - \varepsilon}]^{\frac{1}{\rho}}$$

von einem gewissen n an und umgekehrt.

Wenn ferner für ein gegebenes $\varepsilon > 0$ und gewisse beliebig große r

$$\text{Max } |f(z)| > e^{r^\rho (\log r)^{\alpha_1} \dots (\log_k r)^{\alpha_k - \varepsilon}}$$

gilt, so ist auch für gewisse beliebig große n

$$|\alpha_n| < [n(\log n)^{-\alpha_1} \dots (\log_k n)^{-\alpha_k + \varepsilon}]^{\frac{1}{\rho}}$$

und umgekehrt. Bei Funktionen von regelmäßigem Wachstum gelten diese Abschätzungen für *alle* genügend großen r und n (Borel^{63b)}).

Im Falle ganzzahliger Ordnung ist eine solche weitere Theorie jedoch zunächst nicht möglich. Dies sieht man schon durch Vergleich der beiden Funktionen:

$$\sin \frac{\pi z}{2} \quad \text{und} \quad \frac{1}{\Gamma(z)}$$

ein. Ihre Nullstellen haben die gleichen absoluten Beträge und doch gehören die beiden Funktionen verschiedenen Typen der Ordnung eins an. Erst Lindelöf¹²⁴⁾ hat Ergebnisse gewonnen, welche den vorhin angegebenen entsprechen.

32. Ausnahmefälle. Wir haben im Laufe dieses Abschnittes eine Reihe von Fällen kennen gelernt, wo die zu bestimmende Größe durch die gemachten Angaben noch nicht eindeutig festgelegt war. Diese zunächst unschön wirkenden Fälle haben im weiteren Verlauf der historischen Entwicklung zu den tiefsten Resultaten geführt. Es zeigt sich nämlich, daß auch in den erwähnten Ausnahmefällen im allgemeinen die zu bestimmende Größe eindeutig festgelegt ist, daß nur unter gewissen Umständen ein anderer Wert herauskommen kann. Der Grund

¹³⁶⁾ E. Lindelöf, a. a. O. 115), 124); P. Boutroux, a. a. O. 116); A. Wiman, a. a. O. 123).

ist schließlich der, daß es nicht ausreicht, die Nullstellen allein zu betrachten, man muß noch die Verteilungsdichte der Stellen, wo ein anderer gegebener Wert angenommen wird, mitheranziehen. Darauf deutet schon der *Picardsche* Satz hin. Mit ihm stehen auch die jetzt darzulegenden Ergebnisse in engstem Zusammenhang.

*E. Lindelöf*¹³⁷⁾ und *A. Pringsheim*¹³⁴⁾ haben den folgenden *Borelschen*¹³⁸⁾ Satz bewiesen:

$f(z)$ sei vom Normaltypus der ganzzahligen Ordnung μ , $q(z)$ und $r(z)$ seien von niedrigerer Ordnung oder doch wenigstens von niedrigerem Typus als $f(z)$, (z. B. Konstanten gleich). Dann sind die Funktionen $q \cdot f + r$ von gleicher Ordnung und von gleichem Typus wie $f(z)$. Unter allen diesen Funktionen gibt es höchstens eine, deren Grenzexponent kleiner als μ ist. (D. h. wenn $q_1 \cdot f + r_1$ und $q_2 \cdot f + r_2$ zwei solche Funktionen sind, so ist $q_1 r_2 - q_2 r_1 = 0$.) Führt man also z. B. einen Grenzexponenten für die Nullstellen und einen Grenzexponenten für die Einstellen ein, so kann nur der eine der beiden kleiner als μ sein. Man erkennt gleichzeitig hierin eine wesentliche Verschärfung des *Picardschen* Satzes, insofern als nicht nur die eine Stellensorte in unendlicher Anzahl, sondern sogar mit einer bestimmten minimalen Verteilungsdichte genommen werden muß.

Ist $f(z)$ eine Funktion von regelmäßigem Wachstum der nicht ganzzahligen Ordnung μ , so zeigen auch die Nullstellen von $f(z) - x$ für alle x mit endlich vielen Ausnahmen ein regelmäßiges Wachstum, d. h. man hat für die Beträge dieser Nullstellen $r_n(x)$

$$n^{\frac{1}{\mu} - \varepsilon} < |r_n(x)| < n^{\frac{1}{\mu} + \varepsilon}$$

für alle $n > N(\varepsilon)$. Ist aber μ ganz, so kann für eine x -Menge vom Umfang Null (vgl. p. 407) der Satz Ausnahmen erleiden.^{138,1)}

*E. Lindelöf*¹³⁴⁾ hat eine Verallgemeinerung dieses Satzes gefunden. Wenn $f(z)$ vom Normaltypus ist, so kann für höchstens eine der Funktionen $q \cdot f + r$ der

$$\limsup_{v \rightarrow \infty} \frac{v}{|a_v|^\mu} = 0$$

sein. Wenn weiter $f(z)$ vom Maximaltypus ist, so kann für höchstens

137) *E. Lindelöf*, Sur un cas particulier du théorème de *M. Picard* relatif aux fonctions entières, Arkiv för mat. astr. och fysik 1 (1903), p. 101—104.

138) *E. Borel*, a) a. a. O. 112); b) a. a. O. 63 b); c) Leçons sur les fonctions entières, Paris 1900.

138,1) *J. Sire*³⁷⁵⁾ und *G. Valiron*, Sur les zéros des fonctions entières d'ordre fini, Rend. di Palermo 43 (1918/19), p. 255—268.

eine der Funktionen $g \cdot f + r$ der

$$\limsup_{\nu \rightarrow \infty} \frac{\nu}{|a_\nu|^\mu} \text{ endlich sein.}$$

*A. Wiman*¹³⁸⁾ hat sich den Unentschiedenheiten in der Bestimmung des Geschlechtes zugewandt. Er hat da in gewissen Fällen einen ähnlichen Ausnahmesatz gefunden. *A. Wiman* überträgt nämlich den *Borelschen* Ausnahmesatz auf die verallgemeinerten *Lindelöfschen* Ordnungstypen. Hier bestehen ja auch gewisse Unbestimmtheiten. Er fand, daß für diese im allgemeinen der gleiche Satz gilt, wie bei nicht ganzzahliger Ordnung:

Wenn $f(z)$ vom Minimaltypus der ganzzahligen Ordnung μ ist, und $g(z)$ einer niedrigeren Ordnung angehört, so wird höchstens für eine der Funktionen $f + g$ der p. 437 angegebene *Lindelöfsche* Satz unrichtig.¹³⁹⁾ Bei speziellen Funktionen haben *Hardy*¹⁴⁰⁾ und *Barnes*¹⁴¹⁾ die asymptotische Verteilung der Nullstellen untersucht und damit schon vorab Beispiele zur allgemeinen Theorie geliefert.

*E. Lindelöf*¹²⁴⁾ hat die *Wimanschen* Resultate bis zur vollen

139) Vgl. auch *P. Boutroux*, a) Sur les zéros des fonctions entières d'ordre entier, Paris C. R. 139 (1904), p. 351—353; b) Sur les fonctions entières d'ordre entier, Verh. d. dritten internat. Math. Kongr. Heidelberg 1904, p. 253—257.

140) *G. H. Hardy*, a) On the roots of the equation $\frac{1}{\Gamma(x+1)} = c$, Proc. of the London math. soc. (2) 2 (1904), p. 1—7; b) On the zeros of certain classes of integral *Taylor* series. On the integral function $\sum_0^\infty \frac{x^{\Phi(n)}}{\{\Phi(n)\}!}$, Proc. of the London math. soc. (2) 2 (1904), p. 332—339; b) dasselbe II: On the integral function $\sum_0^\infty \frac{x^n}{n!(n+a)^s}$, a. a. O. (2) 2, p. 401—431; c) On the zeros of the integral function $x - \sin x$, Mess. of math. 31 (1902), p. 161—165; d) On the zeros of certain integral functions, Mess. of math. 32 (1902), p. 36—45; e) The asymptotic solution of certain transcendental equations, Quart. J. 35 (1904), p. 261—282; f) Note on an integral function, Mess. of math. 34 (1904), p. 1—2; g) On the zeros of a class of integral functions, a. a. O., p. 97—101; h) On the integral function $\varphi_{\alpha, \alpha, \beta}^{(x)} = \sum_0^\infty \frac{x^n}{(n+a)^{\alpha n + \beta}}$, Quart. J. 37 (1906), p. 369—378.

141) *E. W. Barnes*, a) A memoir on integral functions, Phil. Trans. Roy. soc. (A) 199 (1901), p. 411—500; b) On the classification of integral functions, Cambr. Phil. Trans. 19 (1904), p. 322—355; c) The asymptotic expansion of integral functions of multiple linear sequence, Trans. of Edinburgh 100 (1904), p. 426—439; d) The asymptotic expansion of integral functions of finite non zero ordre, Proc. of the London math. soc. (2) 3 (1905), p. 273—295; e) The asymptotic expansion of integral functions defined by *Taylor* series, Phil. Trans. Roy. soc. (A) 206 (1906), p. 249—297.

Analogie mit dem *Borelschen* Ausnahmefall verallgemeinert. Ob aber ganz allgemein für die Unbestimmtheit des Geschlechtes ein ähnlicher Ausnahmesatz wie für den Grenzexponenten besteht, ist noch nicht bekannt. Nur für gewisse Funktionen von regelmäßigem Wachstum kann man bisher folgendes behaupten:

Wenn die ganzen Funktionen q und r von niedrigerer Ordnung oder doch wenigstens von niedrigerem Typus als $f(z)$ sind, und wenn μ die ganzzahlige Ordnung von $f(z)$ ist, so gibt es unter den Funktionen $q \cdot f + r$ höchstens eine, deren Geschlecht nur $\mu - 1$ ist.

33. Bestimmung des Geschlechtes aus den Koeffizienten. Diese Frage ist durch die vorausgegangenen Betrachtungen mit erledigt. Denn wir haben gelernt, aus den Koeffizienten auf die Ordnung und auf den Typus der Ordnung zu schließen. Und wir haben gesehen, wie man aus der Ordnung auf das Geschlecht schließen kann. Einige dabei auftauchende minderwichtige Einzelfragen haben *Lindelöf*¹³⁷⁾ und *Fabry*¹⁴²⁾ behandelt. Hier müssen ferner die Arbeiten von *Maillet*¹³⁸⁾, *Frenzel*¹⁴³⁾, *Puzyna*¹⁴⁴⁾ und *Jaggi*¹⁴⁵⁾ Erwähnung finden, da sie die Mittel zur Berechnung der äußeren Exponentialfaktoren enthalten.

34. Das Geschlecht von Summe und Ableitung. Diese Fragen gehören zu den ältesten der Theorie. Sie haben schon *Laguerre* beschäftigt und stehen an der Spitze der *Poincaréschen* Arbeit von 1883.

Die Ordnung der Summe zweier Funktionen kann höchstens der größeren der beiden Ordnungen gleich sein. Es ist daher selbstverständlich, daß das *Geschlecht der Summe* kleiner sein kann als das der Summanden. Aber es kann merkwürdigerweise auch größer sein und zwar höchstens um eine Einheit. Das rührt her von der bei den Ausnahmefällen besprochenen Unbestimmtheit des Geschlechtes beim Minimaltypus einer ganzzahligen Ordnung. Die ersten dahin zielenden Beispiele gaben *Boutroux*¹¹⁶⁾ und *Lindelöf*¹¹⁵⁾. Sie betrachten Funktionen des Geschlechtes $p - 1$, deren Summe gleichwohl das Geschlecht p hat.

142) *E. Fabry*, a) Sur le genre des fonctions entières, Bull. de la soc. math. de France 30 (1902), p. 165—176; b) Sur le genre des fonctions entières, Paris C. R. 140 (1905), p. 1010—1013.

143) *C. Frenzel*, Die Darstellung der eindeutigen analytischen Funktionen durch unendliche Produkte und Partialbruchreihen, Ztschr. f. Math. u. Phys. 24 (1897), p. 316—343.

144) *J. v. Puzyna*, Über den *Laguerreschen* Rang einer eindeutigen analytischen Funktion mit unendlich vielen Nullstellen, Monatsh. Math. Phys. 3 (1892), p. 1—15.

145) *E. Jaggi*, a) Relations entre les zéros et coefficients d'une fonction entière, Nouv. Ann. (4) 1 (1901), p. 16—19; b) Sur les zéros des fonctions entières, Nouv. Ann. (4) 2 (1902), p. 218—226.

Daß selbst die Zufügung einer Konstanten das Geschlecht erhöhen kann, haben *Wiman*¹⁴⁶⁾ und *Fabry*¹⁴²⁾ durch Beispiele erhärtet.

Die nach unseren Darlegungen evidente Tatsache, daß die Ordnung einer *Ableitung* der Ordnung der ursprünglichen Funktion gleich ist, klärt auch hier wesentlich die Sachlage. Ein besonderes Licht fällt darauf noch durch das erwähnte *Wimansche* Beispiel, das lehrt, daß die Ableitung einer Funktion vom Geschlecht p ausnahmsweise das Geschlecht $p - 1$ haben kann.

L. Leau^{151b)} und *G. Valiron*^{134b)} haben es unternommen, die sich aus speziellen Annahmen über die Regelmäßigkeit in der Verteilung der Nullstellen ergebenden Verschärfungen in der Theorie festzustellen.

35. Funktionen unendlicher Ordnung und Funktionen der Ordnung Null. Viele der genannten Arbeiten enthalten auch besondere Darlegungen über die Funktionen unendlicher Ordnung und der Ordnung Null. Indessen haben erst *Kraft*⁶⁵⁾, *Blumenthal*¹⁴⁷⁾ und *Denjoy*^{147, 1)} eine volle Theorie der Funktionen *unendlicher Ordnung* entwickelt.

Für eine besondere Theorie der Funktionen *nullter Ordnung* kommen die Arbeiten von *Lindelöf*⁶⁵⁾, *Zöllich*¹⁴⁸⁾, *Mattson*¹⁴⁹⁾, *Littlewood*¹³⁴⁾, *Valiron*¹³⁴⁾, *Wiman*¹³⁷⁾ in Betracht. Ich hebe hervor, daß bei diesen ja stets primitiven Funktionen Ausnahmefälle nicht vorkommen. Auch zeigen sie gewisse Einfachheiten in ihrem Wachstum.

36. Beziehungen zwischen dem Maximalbetrag einer ganzen Funktion und dem Betrag des größten Gliedes ihrer Potenzreihenentwicklung. Wenn für alle m

$$m(r) = \text{Max}_{m=1,2,\dots} |a_m| r^m < S(r)$$

ist, so ist nach *Borel*¹¹²⁾ 63b)

$$M(r) < (S(r))^{1+\alpha}$$

(unter $M(r)$ das Maximum von $|f(z)|$ auf dem Kreise $|z| = r$ ver-

146) *A. Wiman*, a) a. a. O. 123; b) Sur le genre de la dérivée d'une fonction entière et sur le cas d'exception de *M. Picard*, Paris C. R. 138 (1904), p. 137—139.

147) *O. Blumenthal*, a) Principes de la théorie des fonctions entières d'ordre infini, Paris 1910; b) Über ganze transcendente Funktionen, Jahresber. d. D. Math.-Ver. 16 (1907), p. 97—109.

147,1) *A. Denjoy*, Sur les produits canoniques d'ordre infini, J. de math. (6) 6 (1910), p. 1—136.

148) *H. Zöllich*, Beiträge zur Theorie der ganzen transzendenten Funktionen der Ordnung Null, Diss. Halle 1908.

149) *R. Mattson*. a) Contribution à la théorie des fonctions entières, Upsala 1905; b) Sur les fonctions entières d'ordre zéro, Rend. di Palermo 33 (1912) p. 91—107.

standen) bei beliebigem aber festem $\alpha > 0$ für unendlich viele beliebig große r erfüllt. Und das gilt für alle $r < R$ bis auf r -Intervalle, welche im Vergleich zu R für große R verschwindend klein sind. Da nun nach *Hadarnard* für das Maximum $A(r)$ des Realteils

$$|a_n| r^n < 4A(r) - 2\Re(a_0)$$

für alle r gilt, so gilt also auch

$$M(r) < (A(r))^{1+\alpha}$$

für unendlich viele r . Andererseits ist ja $A(r) < M(r)$.

$$\text{Also wird } A(r) < M(r) < (A(r))^{1+\alpha}.$$

Das gleiche gilt für $B(r)$, das negative Minimum des Realteils. Daher findet *Borel*

$$(A(r))^{1-\alpha} < B(r) < (A(r))^{1+\alpha}.$$

für unendlich viele r . Für einen Maximalbetrag $M_1(r)$ der ersten Ableitung folgt hieraus

$$(M(r))^{1-\alpha} < M_1(r) < (M(r))^{1+\alpha}$$

für unendlich viele r . *Valiron*^{149,1)} bemerkt, daß für ganze Funktionen endlichen Geschlechts das Verhältnis von $\log M(r)$ zu $\log m(r)$ gegen 1 strebt.

Diese Untersuchungen hat *A. Wiman*¹⁵⁰⁾ wieder aufgenommen. Er hat auch die *Borelschen* Resultate zum Teil auf nicht ganze Funktionen übertragen^{150,1)}, insbesondere auf solche, die auf dem Konvergenzkreis im *Hadarnardschen* Sinn (siehe p. 488) unendlich hohe Ordnung haben. *G. Pólya*¹⁵¹⁾ hat das Prinzip der *Wimanschen* Überlegungen klarer herausgearbeitet.^{151,1)} Man findet z. B.

$$M(r) < S(r)[\log S(r)]^{\frac{1}{\alpha} + \epsilon}$$

für unendlich viele beliebige große r und beliebiges $\epsilon > 0$. Insbesondere

149,1) a. a. O. 134b). Ferner: *G. Valiron*, Sur quelques théorèmes de *M. Borel*, Bull. soc. math. Fr. 42 (1914), p. 247—252.

150) *A. Wiman*, Über den Zusammenhang zwischen dem Maximalbetrag einer analytischen Funktion und dem größten Gliede der zugehörigen *Taylor'schen* Reihe, Acta math. 37 (1904), p. 305—326.

150,1) Dazu auch: *Valiron*, Sur la croissance du module maximum des séries entières, Bull. soc. math. Fr. 44 (1916), p. 45—64.

151) *G. Pólya*, Über den Zusammenhang zwischen dem Maximalbetrag einer analytischen Funktion und dem größten Gliede der zugehörigen *Taylor'schen* Reihe, Acta math. 40 (1916), p. 311—319.

151,1) Vgl. auch *Valiron*, a) Sur le maximum du module des fonctions entières, Paris C. R. 166 (1918), p. 605—608; b) Les propriétés générales des fonctions entières et le théorème de *M. Picard*, Paris C. R. 167 (1918), p. 988—991.

darf hier für $S(r)$ der Betrag $m(r)$ des größten Gliedes gewählt werden. Borels entsprechende Formel

$$M(r) < [S(r)]^{1+\alpha}$$

gilt nach *Wiman* auch für alle Funktionen, welche auf dem Konvergenzkreis unendlich hohe Ordnung besitzen. Daß für die gleichen Funktionen auch

$$M(r) < [A(r)]^{1+\alpha}$$

gilt, hat gleichfalls *A. Wiman* gezeigt. Er hat sogar¹²⁷⁾ die weit schärfere Abschätzung $M(r) < A(r)(1 + \alpha)$ gewonnen.

Pólya^{151c)} hat ein weiteres *Wimansches*¹²⁷⁾ Ergebnis so formuliert: Zu jeder ganzen Funktion $f(z)$ läßt sich eine Folge z_1, z_2, \dots mit wachsenden absoluten Beträgen und $z_n \rightarrow \infty$ so bestimmen, daß 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n f'(z_n)}{n, f(z_n)} = 1$ und 2. $|f(z_n)| = M(|z_n|)$. Dabei ist n_n die Nummer desjenigen Gliedes der *Maclaurinschen* Reihe von $f(z)$, die für $z = z_n$ den größten absoluten Betrag hat.

Diese Untersuchungen *Wimans* scheinen von grundlegender Bedeutung werden zu sollen. Das lehren auch die Arbeiten *Pólyas*^{151d)} über ganze Funktionen, welche algebraischen Differentialgleichungen genügen. Insbesondere kann keine Funktion nullter Ordnung einer algebraischen Differentialgleichung erster Ordnung genügen. Die Frage, ob das bei beliebigen algebraischen Differentialgleichungen auch so ist, läßt *Pólya* noch unerledigt. *Wiman* selbst¹²⁷⁾ folgerte aufs neue einen schon von *Perron*^{151e)} gefundenen Satz, wonach eine ganze transzendente Funktion, welche einer linearen Differentialgleichung m ter Ordnung mit rationalen Koeffizienten genügen soll, von rationaler Ordnung $\geq \frac{1}{m}$ sein muß; *Wiman* fügt hinzu, daß sie dem Normaltypus ihrer Ordnung angehören muß. Durch diese Sätze ist ein neues sehr versprechendes Arbeitsgebiet angeschnitten worden. *Pólya* weist auf die nahe Analogie der Fragestellung zum *Liouvilleschen*

151 a) *E. Borel*, Contribution à l'étude des fonctions méromorphes, Ann. Éc. Norm. (3) 18 (1901), p. 211—239.

151 b) *L. Leau*, Étude sur les fonctions entières orientées d'ordre réel non entier, Ann. Éc. Norm. (3) 18 (1906), p. 33—120.

151 c) *G. Pólya*, Zur Untersuchung der Größenordnung ganzer Funktionen, die einer Differentialgleichung genügen, Acta math. 42 (1920), p. 309—316.

151 d) *G. Pólya*, α) Über das Anwachsen von ganzen Funktionen, die einer Differentialgleichung genügen, Zürich. Vierteljahrsschr. 61 (1916), p. 531—545; β) a. a. O. 151 c).

151 e) *O. Perron*, Über lineare Differentialgleichungen mit rationalen Koeffizienten, Acta math. 34 (1910), p. 139—163.

Approximationssatz über algebraische Zahlen hin. Zu den Sätzen kommt noch ein anderer auf p. 514 zu erwähnender von Hurwitz^{152,1)} und Pólya^{151a)}.

Einiges über ganze Funktionen enthalten natürlich auch die Abschnitte über den Picard'schen Satz und über die Singularitäten. Auf meromorphe Funktionen hat namentlich Borel^{151a)} die Theorie der ganzen Funktionen ausgedehnt.

Analytische Fortsetzung.

37. Die erste Methode Mittag-Lefflers. Wie wir schon p. 389 sahen, ist eine analytische Funktion in ihrem Gesamtverlauf durch ein einzelnes Funktionselement völlig bestimmt. Das stellt uns naturgemäß vor die Aufgabe, die Eigenschaften dieser Funktion in Zusammenhang zu bringen mit den Koeffizienten desjenigen Funktionselementes, das die Funktion definiert. Auch im vorigen Abschnitt haben wir im Grunde von der Lösung einer derartigen Aufgabe berichtet. Nun soll es sich aber um Funktionselemente mit *endlichem* Konvergenzkreis handeln. Hier wird die Fülle der Probleme reicher. Man kann die Funktion im Inneren des Konvergenzkreises untersuchen, man kann nach ihrem Verhalten bei Annäherung an den Rand fragen, man kann die Berechnung der Funktion außerhalb des ersten Elementes verlangen. Das sind lauter Fragen, die wir weiterhin zu behandeln haben. Ich will damit beginnen, auseinanderzusetzen, welche Methoden man ersonnen hat, um durch einen einzigen Ausdruck die Funktion in einem möglichst weiten Teil ihres Existenzbereiches darzustellen. Dazu verwendet man die linearen Mittelbildungen. Es ist gerade das Problem der analytischen Fortsetzung, durch das man auf die Wichtigkeit dieser Dinge erst aufmerksam wurde. Auch die Methode der arithmetischen Mittel hängt, wie wir später sehen werden, mit unserer Frage zusammen, insofern als man sie brauchen kann, um in gewissen Punkten des Konvergenzkreises die Funktion darzustellen. Aber niemals führen diese einfachsten linearen Mittel zu einer Darstellung der Funktion im Äußeren des Konvergenzkreises. Es ist daher nötig, zu allgemeineren linearen Mittelbildungen zu greifen. Am nächsten liegt es natürlich, den Prozeß der analytischen Fortsetzung durch Aneinanderhängen von Funktionselementen selbst zur Lösung der Aufgabe zu verwenden. Aber Borel¹⁵²⁾ hat 1895 entdeckt, daß man andere Darstellungen finden kann, die in einem weiteren Bezirk als es durch

152) E. Borel, Sur la sommation des séries divergentes, Paris C. R. 121 (1895), p. 1125—1127. Weitere Literatur siehe weiter unten.

ein einziges weiteres Funktionselement möglich ist, die Funktion darstellen, Ausdrücke, die auch einfacher sind, als die, welche man durch mehrmalige Ausführung des Prozesses der unmittelbaren analytischen Fortsetzung erhält, insofern als dieselben nur einen Grenzübergang enthalten.

Die damit eingeleiteten Bestrebungen sind in den Händen *Mittag-Lefflers* zu einer umfassenden Theorie geworden, die in der Einfachheit und dem Konvergenzbereich der Ausdrücke weit über das *Borelsche* Ergebnis hinausgehen. *Mittag-Lefflers* erste Arbeiten reichen bis ins Jahr 1882 zurück. Seiner damals erschienenen Abhandlung¹⁵³⁾ kann man schon die Möglichkeit der Existenz solcher Darstellungen entnehmen. Ihre wirkliche Angabe ist aber erst von 1898 an in die Wege geleitet worden.

Mittag-Lefflers erste Methode knüpft unmittelbar an den Prozeß der analytischen Fortsetzung durch Aneinanderreihen von Funktionselementen an. Es ist *Mittag-Leffler* gelungen, denselben durch passende Wahl der Elemente rechnerisch zu verfolgen. Er erhielt so nach einigen Zwischenstufen eine Reihe von Polynomen $\sum P_n(z)$ mit

$$P_n(z) = \sum_1^n C_k s_k(z) = \sum_1^n d_k^{(n)} a_k z^k.$$

Dabei ist $\mathfrak{P}(z) = \sum a_n z^n$
die fortzusetzende Reihe. Die

$$s_k(z) = \sum_1^k a_n z^n$$

sind ihre Partialsummen. Die Koeffizienten C_k und $d_k^{(n)}$ sind universelle Konstanten, die also von der darzustellenden Funktion $f(z)$ nicht abhängen. Die Polynomreihe konvergiert jedenfalls in allen inneren Punkten des „Hauptsternes“ A gleichmäßig und stellt dort einen Zweig der durch das Funktionselement $\mathfrak{P}(z)$ bestimmten analytischen Funktion $f(z)$ dar. Dieser Hauptstern, welcher seit *Mittag-Leffler* in allen diesen Untersuchungen eine beherrschende Rolle spielt, wird so erhalten: Auf jedem von $z = 0$ ausgehenden Halbstrahl markiere man den $z = 0$ nächstgelegenen singulären Punkt. Die zwischen $z = 0$ und diesem nächsten singulären Punkt gelegene Strecke gehöre dem Stern an, der weitere Punkte mit diesem Halbstrahl nicht gemeinsam hat. Allgemein versteht man unter einem Stern mit dem Mittelpunkt $z = 0$ einen Be-

153) G. Mittag-Leffler, Fullständig analytisk framställning af hvarje entydig monogen funktion, hvars singulära ställen utgöra en värde mängd af första slaget, Oefversigt af K. Vet. Förh. 1882, p. 11—45.

reich der von jeder Geraden durch $z = 0$ nur in einer einzigen Strecke geschnitten wird, und für den $z = 0$ ein innerer Bereichspunkt ist.

Als einfachste durch diese Methode zu gewinnende Darstellung von $f(z)$ kann diese gelten:

$$f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_0^m \lambda_1 \sum_0^m \lambda_2 \dots \sum_0^m \lambda_n \frac{1}{\lambda_1! \lambda_2! \dots \lambda_n!} f(o)^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)} \left(\frac{z}{n}\right)^{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n}$$

Hier ist $m = n\omega(n)$ gesetzt und $\omega(n)$ bedeutet irgendeine positive mit n über alle Grenzen wachsende Funktion. Man kann also z. B. $m = n^2$ setzen.¹⁵⁴⁾

38. Methode der konformen Abbildung. Wenn ein $z = 0$ enthaltender, einfach zusammenhängender Bereich B bekannt ist, in dem $f(z)$ regulär ist, so kann man ihn durch eine $z = 0$ festlassende Abbildung auf einen Kreis vom Radius Eins um diesen Punkt umkehrbar eindeutig und konform abbilden.

$z = \varphi(\eta)$, $\eta = \varphi^{-1}(z)$ vermittele die Abbildung. Dann kann man

$$f(z) = f\{\varphi(\eta)\}$$

in eine für $|\eta| < 1$ konvergente Reihe $\mathfrak{F}(\eta)$ entwickeln, so daß man in B die Darstellung

$$f(z) = \mathfrak{F}\{\varphi^{-1}(z)\}$$

hat. *Lindelöf*¹⁹⁰⁾ hat diesen Gedanken systematisch verfolgt und den Nutzen vieler einfacher Abbildungen, wie z. B. der *Eulerschen* Reihentransformation und anderer für die Ausführung der analytischen

154) *G. Mittag-Leffler*, a) Om en generalisering af potensserien, C. R. de l'ac. de Stockholm 55 (1898), p. 135—138; b) Om den analytiska framställningen af en allmän monogen function, Oefversigt af kgl. Vet. Akad. Förhandl. Stockholm 55 (1898), p. 247—282 u. p. 375—385; c) Sur la représentation d'une branche uniforme de fonction analytique, Paris C. R. 128 (1899) p. 1212—1215; d) Sur la représentation analytique d'une branche uniforme d'une fonction analytique, Acta math. 23 (1900), p. 43—62; e) Sulla rappresentazione analitica di un ramo uniforme di una funzione monogena, Atti di Torino 34 (1899), p. 481—491; f) On the analytical representation of a uniform branch of monogenic function, Trans. of the Cambridge phil. Soc. 18 (1900), p. 1—11; g) Fonction analytique et expression analytique. Une application de la théorie des séries n fois infinies. Sur une extension de la série de *Taylor*, Congrès internat. des math. Paris 1901, p. 273—276; h) Sur la représentation d'une branche uniforme d'une fonction monogène, Acta math. 24 (1901), p. 183—204; i) Über eine Verallgemeinerung der *Taylor*schen Reihe, Gött. Nachr. 1900, p. 194—205; k) On multiply infinite series and on an extension of *Taylor* series, Proc. of the London math. soc. (1) 32 (1900), p. 72—79; l) Über die analytische Darstellung eines eindeutigen Zweiges einer analytischen Funktion, Münch. Sitzungsber. 1915, p. 109—164.

Fortsetzung, für die Kenntnis der Lage der Singularitäten, für die numerische Berechnung der Funktion dargetan. Elliptische Integrale und hypergeometrische Differentialgleichung bieten ihm namentlich dankbare Beispiele. Seine Untersuchungen berühren sich da aufs engste mit der Landenschen Transformation bei elliptischen Integralen, und mit den Überlegungen, durch die Mittag-Leffler (Acta 15), Hamburger (J. f. Math. 83) u. a. der numerischen Integration der linearen Differentialgleichungen beizukommen suchten.

Später hat der Lindelöfsche Grundgedanke zu den Faberschen Polynomen geführt (p. 499). Auch bei den jetzt hier weiter zu besprechenden Untersuchungen hat der Grundgedanke in etwas anderer Wendung seine Fruchtbarkeit bewiesen.

Die zweite Methode¹⁵⁵⁾ von Mittag-Leffler ist der ersten vorhin dargelegten an Tragweite und Durchsichtigkeit bei weitem überlegen. Bei ihr spielen gewisse den Hauptstern approximierende Nebensterne eine Rolle. Sie werden durch Verwendung erzeugender Figuren erhalten. Eine solche wird durch einen endlichen einfachzusammenhängenden Bereich G geliefert, welcher die Strecke $0 \leq z < 1$ enthält. Unter $z \cdot G$ werde dann der Bereich verstanden, der aus denjenigen Punkten besteht, deren Koordinaten aus den Koordinaten der Punkte von G durch Multiplikation mit z hervorgehen. Läßt man nun z , mit $z = 0$ beginnend, einen Halbstrahl $\varphi = \text{const.}$ durchlaufen ($z = r e^{i\varphi}$), so gibt es eine obere Grenze der Punkte des Halbstrahles, für die $z \cdot G$ ganz dem Hauptstern angehört. Sie sei $O(\varphi) \cdot e^{i\varphi}$. Der Nebenstern bestehe nun aus den Punkten der Vektoren von $z = 0$ bis $z = O(\varphi) \cdot e^{i\varphi}$. Es handelt sich nun zunächst um die Summation der Potenzreihe im Nebenstern. Man gewinnt hier folgendes Resultat:

Man kann Polynome

$$\mathfrak{Q}_n(z) = l_0^{(n)} a_0 + l_1^{(n)} a_1 \cdot z + \dots + l_n^{(n)} a_n \cdot z^n$$

angeben, deren Koeffizienten $l_k^{(n)}$ von der Funktion $f(z) = \sum a_k z^k$ unabhängig sind, und die also allein durch die erzeugende Figur G bestimmt sind, derart, daß die Reihe $\sum \mathfrak{Q}_n(z)$ in jedem abgeschlossenen

155) G. Mittag-Leffler, a) a. a. O. 154 c); b) Sur la représentation analytique d'une branche uniforme d'une fonction monogène, Acta math. 24 (1900), p. 205—244; c) Sur le terme complémentaire de mon développement de la branche uniforme d'une fonction monogène dans le cas, où ce développement possède une étoile de convergence, Oefversigt af kgl. Vet. akad. Förhandl. 58 (1901), p. 785—790; d) Sur la représentation analytique d'une branche uniforme d'une fonction monogène, Acta math. 26 (1902), p. 353—391; e) a. a. O. 154 l); f) Sur une formule de M. Fredholm, Paris C. R. 132 (1901), p. 751—753.

Teilbereich des Nebensternes S gleichmäßig konvergiert, und daß in ganz S die Gleichung

$$f(z) = \sum \mathfrak{Q}_n(z) \quad \text{gilt.}$$

Von hier ausgehend kann man dann mit Leichtigkeit zu einer ebensolchen Darstellung im Hauptstern übergehen. Man denke sich dazu eine Folge erzeugender Figuren G_α , die sich beim Grenzübergang $\alpha \rightarrow 0$ auf die Strecke $0 \leq z \leq 1$ zusammenziehen sollen. Dazu gehören Nebensterne S_α , die dann den Hauptstern approximieren und gehören Polynomreihen

$$\sum \mathfrak{Q}_n^{(\alpha)}(z),$$

welche in S_α die Funktion $f(z)$ darstellen. Dann hat man natürlich in ganz A :

$$f(z) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \sum_0^\infty \mathfrak{Q}_n^{(\alpha)}(z).$$

Von dieser Darstellung kann man dann durch geläufige Prozesse zu einer Polynomreihe der oben für S angegebenen Gestalt gelangen, welche dann in ganz A die Funktion $f(z)$ darstellt.

Besonders einfach wird die Herleitung, wenn die erzeugende Figur G den Punkt $z = 1$ im Inneren enthält. Man kann dann etwa von der Integraldarstellung

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(z \cdot \varphi(\eta))}{\eta - 1} d\eta$$

ausgehen^{155,1)}, wenn man dabei das Integral über eine den Kreis $|\eta| < 1$ einmal in positivem Sinne umlaufende Kurve erstreckt. Entwickelt man dann $\frac{1}{\eta - 1}$ nach Potenzen von $\frac{1}{\eta}$ und integriert gliedweise, so hat man sofort das gewünschte Resultat.

Wenn aber zufällig der Punkt $z = 1$ auf dem Rande der erzeugenden Figur liegt, so ist noch eine besondere Überlegung nötig. Wenn der Rand der Figur aus einer eckenfreien analytischen Kurve besteht, geht noch alles unmittelbar. Wenn aber eine Ecke auftritt, so sind Zusatzüberlegungen nötig, die zuerst *Phragmén*¹⁵⁶⁾ anstellte. Auf einem anderen Wege gelangte *M. Riesz*¹⁵⁷⁾ zum Ziel.

155,1) $z = \varphi(\eta)$ bilde $|\eta| < r (r > 1)$ auf die erzeugende Figur ab, und es sei $\varphi(0) = 0$, $\varphi(1) = 1$.

156) *E. Phragmén* bei *Mittag-Leffler*, a. a. O. 155 b).

157) *M. Riesz*, Sur un problème d'*Abel*, Rend. di Palermo 30 (1910), p. 339—345. Dazu vgl. man auch *Mittag-Leffler*, Sur un problème d'*Abel*, Rend. di Palermo 30 (1910), p. 337—338 und a. a. O. 154 l), p. 161—163. Man vgl. ferner eine Bemerkung von *Bieberbach*, a. a. O. 25). Vgl. auch p. 485 dieses Artikels.

Als numerisch einfachstes Beispiel ist dieses anzusehen: Erzeugende Figur sei das durch

$$z = 1 - (1 - \eta)^\alpha$$

erhaltene Bild von $|\eta| < 1$. Der zugehörige Stern S_α konvergiert für $\alpha \rightarrow 0$ gegen den Hauptstern. Für die Koeffizienten des Polynoms $L_n(z)$ findet man die folgenden Werte

$$j_0^{(n)} = 0$$

$$j_k^{(n)} = \frac{k}{1!} \cdot \frac{\alpha(1-\alpha) \cdots (n-1-\alpha)}{n!} + \frac{k(1-k)}{2!} \frac{2\alpha(1-2\alpha) \cdots (n-1-2\alpha)}{n!} + \dots \\ + \frac{k(1-k) \cdots (k-1-k)}{k!} \frac{k\alpha \cdot (1-k\alpha) \cdots (n-1-k\alpha)}{n!}.$$

Zahlreiche weitere Beispiele enthalten die angegebenen¹⁵⁵⁾ Arbeiten von *Mittag-Leffler*.¹⁵⁶⁾

Die nach dieser Methode für Nebensterne zu gewinnenden Ausdrücke haben alle diesen Nebenstern als Konvergenzstern, d. h. sie konvergieren wohl in ihrem Inneren aber nirgends außerhalb desselben. Auch über die Konvergenz am Rande des Nebensternes liegen einige Resultate vor. Es finden da wieder die schon erwähnten Methoden von *Phragmén* und *Riesz* Verwendung.

39. Modifikation der Methode durch Painlevé.¹⁵⁹⁾ Dieser sucht nicht erst Entwicklungen in Nebensternen zu gewinnen, sondern er geht direkt auf den Hauptstern los. Er führt dazu den Grenzübergang, den *Mittag-Leffler* zuletzt ausführt, schon etwas früher durch. Dabei gelangt er zunächst zu dem folgenden allgemeinen Satz:

Wenn $F(t)$ eine für $0 \leq t \leq 1$ reguläre analytische Funktion bedeutet, deren Entwicklung bei $t = 0$ durch

$$F(t) = \sum \alpha_n t^n$$

gegeben sei, so kann man Polynome

$$L_n(t) = \sum_1^n \lambda_k^{(n)} \alpha_k t^k$$

angeben, deren Koeffizienten $\lambda_k^{(n)}$ von $F(t)$ unabhängig sind, derart, daß

158) Dazu kommt noch *I. Fredholm*, Sur la méthode de prolongement analytique de *M. Mittag-Leffler*, Oefversigt af kgl. Vet. Akad. Förhandl. 58 (1911), p. 203—205.

159) *P. Painlevé*, a) Sur le développement d'une branche uniforme de fonction analytique, Paris C. R. 128 (1899), p. 1277—1280; b) Sur le développement d'une branche uniforme d'une fonction analytique en série de polynomes, Paris C. R. 129 (1899), p. 27—31; c) Sur le développement des fonctions analytiques. Note 1 zu *E. Borel*, Leçons sur les fonctions de variables réelles, Paris 1905.

für $0 \leq t \leq 1$ gleichmäßig
$$F(t) = \sum L_n(t)$$

gilt. Wendet man dies dann auf die Funktion $F(t) = f(zt)$ an und trägt dann $t = 1$ ein, so erhält man eine in jedem Teilbereich des Hauptsternes gleichmäßig konvergente Polynomreihe für $f(z)$.

40. Der Hauptstern als Konvergenzstern. Man kann sich fragen, ob für solche oder für andere nach der *Mittag-Lefflerschen* Methode gewonnene Entwicklungen der Hauptstern in dem Sinne Konvergenzstern ist, daß für keine Funktion im Äußeren des Sternes Konvergenz herrscht, sei es gegen die analytische Fortsetzung des im Sterne dargestellten Funktionszweiges, sei es gegen eine andere Funktion. Daß dies nicht der Fall ist, ist der Inhalt eines allgemeinen von *Borel*¹⁶⁰⁾ für Polynomreihen bewiesenen, von *Phragmén*¹⁶¹⁾ auf Reihen ganzer Funktionen ausgedehnten Satzes. Wenn irgend eine derartige Summationsmethode gegeben ist, so kann man immer eine Funktion $f(z)$ so wählen, daß nach Einsetzen ihrer Koeffizienten in die Reihe ganzer Funktionen diese in passenden Punkten außerhalb des Sternes noch konvergent bleibt. Das hindert natürlich nicht, daß für andere Summationsmethoden, deren Reihenglieder $L_n(z)$ nicht ganze analytische Funktionen sind, der Hauptstern Konvergenzstern sein kann. Beispiele dieser Art erhält man bei der Approximation des Hauptsternes durch Nebensterne ganz unmittelbar.

41. Zurückführung auf die Summation der geometrischen Reihe. Bekanntlich bietet die *Cauchysche* Integralformel ein Mittel, um aus der Möglichkeit einer Potenzreihenentwicklung für $\frac{1}{1-z}$ zu schließen, daß sich alle analytischen Funktionen in Potenzreihen entwickeln lassen. Hat man nun in irgend einem $z = 0$ enthaltenden Stern eine Polynomentwicklung oder eine andere Reihen- oder Integraldarstellung von $\frac{1}{1-z}$, so kann man daraus sofort nach dem gleichen Schlußverfahren auf eine solche Entwicklung von $f(z)$ in einem anderen leicht angebbaren Stern schließen. Das hat schon *Mittag-Leffler*¹⁵⁵⁾ 1882 erkannt. *Borel*¹⁶²⁾ und *Phragmén*¹⁶³⁾ haben es erneut gefunden. Der Gedanke ist naheliegend aber von großer Fruchtbarkeit. Sei nämlich \mathcal{C} eine einfache rektifizierbare Kurve, welche $z = 0$ in positivem

160) *E. Borel*, Leçons sur les séries divergentes, Paris 1901.

161) *E. Phragmén* bei *Mittag-Leffler*, a. a. O. 1541).

162) *E. Borel*, Addition au mémoire sur les séries divergentes, Ann. Éc. Norm. (3) 16 (1899), p. 132—134.

163) *E. Phragmén*, Sur une extension d'un théorème de *M. Mittag-Leffler*, Paris C. R. 128 (1899), p. 1434—1437.

Sinne umläuft, und die einen einfachzusammenhängenden Teil des Hauptsternes begrenzt. Dann gilt die Darstellung

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathfrak{C}} \frac{f(\xi)}{1 - \frac{z}{\xi}} \frac{d\xi}{\xi}.$$

Wenn nun irgendeine in einem Stern S von $\frac{1}{1-z}$ gleichmäßig konvergente Darstellung von $\frac{1}{1-z}$ bekannt ist, so kann man diese auf $\frac{1}{1-\frac{z}{\xi}}$ anwenden, jedesmal dann, wenn für alle ξ auf \mathfrak{C} und für alle z aus dem Inneren von \mathfrak{C} der Punkt $\frac{z}{\xi}$ dem Sterne S angehört. Man kann dies auch so ausdrücken, daß alle Sterne ξS die Kurve \mathfrak{C} enthalten müssen. Da man nun die Kurve \mathfrak{C} beliebig nahe an den Rand des Hauptsternes heranlegen kann, so schließt man daraus, daß man durch gliedweises Integrieren eine Darstellung erhält, welche in einem Stern S' gilt. Man erhält diesen aus S , indem man alle Sterne αS bildet, wobei unter α irgend eine Ecke des Hauptsternes von $f(z)$ verstanden sein soll. S' ist dann einfach der Durchschnitt der Sterne αS . Hat man also insbesondere eine Darstellung von $\frac{1}{1-z}$ in dem Hauptstern von $\frac{1}{1-z}$, so erhält man eine Entwicklung von $f(z)$ in seinem Hauptstern. Diese Methode schien lange zwar gedanklich sehr einfach, aber es schien schwierig, geeignete Darstellungen für $\frac{1}{1-z}$ zu finden. Später aber hat gerade diese Methode numerisch sehr schöne Resultate gezeitigt. So hat *Le Roy*¹⁶⁴⁾ diese Darstellung gefunden:

$$\frac{1}{1-z} = \lim_{t \rightarrow 1} \sum_0^{\infty} \frac{\Gamma(nt+1)}{\Gamma(n+1)} z^n.$$

Diese liefert

$$f(z) = \lim_{t \rightarrow 1} \sum_0^{\infty} \frac{\Gamma(nt+1)}{\Gamma(n+1)} a_n z^n,$$

eine im Hauptstern gültige Darstellung. Überhaupt erhält man immer aus der Entwicklung von $\frac{1}{1-z}$ die von $f(z)$, in dem man statt des allgemeinen Gliedes z^n der geometrischen Reihe das allgemeine Glied der Potenzreihe für $f(z)$, also $a_n z^n$, einträgt.

164) *E. Le Roy*, Sur les séries divergentes et les fonctions définies par un développement de Taylor, Ann. de Toulouse (2) 2 (1900), p. 317—430.

*E. Lindelöf*¹⁶⁵⁾ hat durch Residuenbetrachtung die Darstellung

$$f(z) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{z^n}{n^{\alpha n}}$$

abgeleitet.¹⁶⁶⁾

Insbesondere lehren diese Sätze, daß man Folgen von ganzen Funktionen $\Phi_n(z)$ finden kann, die in jedem Teilbereich des Sternes $f(z)$ gleichmäßig approximieren. *Fejér*^{166a)} hat bemerkt, daß man die $\Phi_n(z)$ so wählen kann, daß die n ersten Glieder ihrer *Maclaurinschen* Reihe mit der von $f(z)$ übereinstimmen.

42. Integraldarstellungen. Sei

$$f(z) = \sum a_n z^n$$

eine um $z = 0$ reguläre Funktion, so ist

$$F(z) = \sum \frac{a_n}{n!} z^n$$

eine ganze Funktion. Kümmert man sich zunächst nicht um Konvergenzfragen, so zeigt eine formale Rechnung sofort, daß

$$f(z) = \int_0^{\infty} e^{-a} F(az) da$$

ist. Aber welches ist der Konvergenzbereich dieser bereits von

165) *E. Lindelöf*, a) Une application de la théorie des résidus au prolongement analytique des séries de *Taylor*, Paris C. R. 135 (1902), p. 1315—1318; b) Sur l'application de la théorie des résidus au prolongement analytique des séries de *Taylor*, J. d. math. (5) 9 (1903), p. 213—221; c) Le calcul des résidus Paris 1905. Vgl. auch *P. Dienes*, Math.ész. termész. ért. 27 (1909), p. 58—63.

166) Darstellungen für $\frac{1}{1-z}$ findet man in den folgenden Arbeiten: *E. Lindelöf*, Sur le prolongement analytique, Bull. de la soc. math. d. France 29 (1901), p. 157—166. *E. Goursat*, Sur quelques développements de $\frac{1}{1-z}$ en séries de polynomes, Bull. d. sc. math. (2) 27 (1903), p. 226—232. *E. Borel*, Sur le prolongement analytique de la série de *Taylor*, Bull. de la soc. math. de France 28 (1907), p. 200 und a. a. O. 160. *L. Leau*, Sur les points singuliers situés sur le cercle de convergence et sur la sommation des séries divergentes, Paris C. R. 127 (1898), p. 607—609. *G. Faber*, Über polynomische Entwicklungen, Math. Ann. 57 (1903), p. 389—408. *H. F. Baker*, An expansion of $\frac{1}{1-z}$ by means of polynomials, Proc. of the London math. soc. (2) 9 (1910), p. 122—125. Ferner werde an die allgemeine *Runge'sche* Methode, Acta math. 6 (1887), p. 229—244 erinnert.

166a) *L. Fejér*, Eine Bemerkung zur *Mittag-Lefflerschen* Approximation einer beliebigen analytischen Funktion innerhalb des Sterngebietes, Acta math. 35 (1911), p. 67—71.

*Laplace*¹⁶⁷⁾ und *Abel*¹⁶⁸⁾ angegebenen Integraldarstellung? Sie würde offenbar eine weitere Verallgemeinerung des Summationsverfahrens durch lineare Mittelbildung liefern. Diesen Bereich hat zuerst *E. Borel*¹⁶⁹⁾ angegeben. Es ist der *Borelsche Stern*. Man erhält ihn, wenn man auf jedem Halbstrahl, der $z = 0$ mit einer Ecke des Hauptsternes verbindet, in diesem Eckpunkt eine senkrechte Gerade zeichnet. Die Punkte der Ebene, welche mit $z = 0$ auf derselben Seite aller dieser Geraden liegen, machen den Konvergenzstern dieser *Borelschen* exponentiellen Summation aus. Dieser Stern enthält also stets den Konvergenzstern der um $z = 0$ geltenden *Taylor'schen* Entwicklung im Inneren. Daß die Darstellung jedenfalls im *Borelschen Stern* gültig ist, kann man unmittelbar an Hand der in der vorigen Nummer besprochenen allgemeinen Methode einsehen. Offenbar gilt nämlich in der Halbebene $\Re(z) < 1$ die für jeden Teilbereich gleichmäßig konvergente Darstellung

$$\frac{1}{1-z} = \int_0^{\infty} e^{a(z-1)} da.$$

Das Integral ist dabei über $a > 0$ zu erstrecken. Setzt man dies in die *Cauchy'sche* Integralformel ein, und beachtet, daß man die Integrationsreihenfolge wegen der gleichmäßigen Konvergenz vertauschen darf, so erhält man ohne weiteres unser Resultat, und die damals gegebene Konstruktion des Konvergenzsternes führt gerade zum *Borelschen Stern*. Wir merken noch an, daß man auf diese Weise auch leicht eine Integraldarstellung des Unterschiedes zwischen $f(z)$ und $\int_0^a e^{-a} F(az) da$ erhalten kann. Man findet nämlich¹⁷⁰⁾

$$f(z) = \int_0^a e^{-a} F(az) da + \frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(yz)}{y-1} e^{a\left(\frac{1}{y}-1\right)} dy.$$

167) *Laplace*, Théorie analytique des probabilités (1812) u. Oeuvres 7, p. 89 ff.

168) *N. H. Abel*, Sur les fonctions génératrices et leurs déterminantes, Oeuvres II, p. 67—81.

169) *E. Borel*, a) Sur la généralisation de la notion de limite et sur l'extension aux séries divergentes sommables du théorème d'*Abel* sur les séries entières, Paris C. R. 122 (1896), p. 73—74; b) Application de la théorie des séries divergentes sommables, Paris C. R. 122 (1896), p. 805—807; c) Sur la région de sommabilité d'un développement de *Taylor*, Paris C. R. 123 (1896), p. 548—549; d) Les séries absolument sommables, les séries *M* et le prolongement analytique, Paris C. R. 131 (1900), p. 830—832; e) Le prolongement analytique et les séries sommables, Math. Ann. 55 (1900), p. 74—80; f) Fondements de la théorie des séries divergentes sommables, J. de math. (5) 2 (1896), p. 103—122; g) Mémoire sur les séries divergentes, Ann. Éc. Norm. (3) 16 (1899), p. 132—134; h) a. a. O. 160.

170) *G. Mittag-Leffler*, a. a. O. 155 d).

Dabei ist das zweite Integral über die Randkurve eines die Punkte $y = 0$ und $y = 1$ enthaltenden schlichten einfachzusammenhängenden Bereiches zu erstrecken.

Daß also das *Laplacesche* Integral zum mindesten im *Borelschen* Stern konvergiert, war leicht einzusehen. Daß dieser Stern nun aber in dem präzisen p. 451 angegebenen Sinn Konvergenzstern der Darstellung sei, hat schon *Borel* behauptet, aber erst *Phragmén*¹⁷¹⁾ bewiesen. *Borel*¹⁷²⁾ hat weiter gezeigt, daß im Inneren des Sternes sogar absolute Konvergenz herrscht, derart, daß auch die Integrale

$$\int_0^{\infty} e^{-a} \left| \frac{d^{\lambda}}{da^{\lambda}} \{F(az)\} \right| da \quad (\lambda = 0, 1, 2, \dots)$$

absolut konvergieren. Das *Laplacesche* Integral kann in eine Reihe umgeformt werden, die gleichfalls den *Borelschen* Stern als Konvergenzstern hat.^{172,1)} Man findet so die Darstellung

$$f(z) = \lim_{a \rightarrow \infty} e^{-a} \sum_0^{\infty} s_n(z) \frac{a^n}{n!}$$

wobei $s_n(z)$ die n^{te} Partialsumme der *Maclaurinschen* Reihe von $f(z)$ ist. Diese Reihendarstellung konvergiert jedoch¹⁷³⁾ nur in einem Teil derjenigen Randpunkte des *Borelschen* Sterns, in welchen die Integraldarstellung noch gültig bleibt. Man kann aber auch eine Reihendarstellung angeben, die stets gleichzeitig mit der Integraldarstellung konvergiert. Das ist die folgende¹⁷⁴⁾

$$f(z) = \lim_{a \rightarrow \infty} e^{-a} \sum_0^{\infty} s_n(z) \frac{a^{n+1}}{(n+1)!}$$

Man kann die eben dargestellte *Borelsche* Methodé auf allgemeinere den Hauptstern besser als der *Borelsche* Stern approximierende Nebensterne verallgemeinern. Bevor wir dazu übergehen, wird es gut sein, auf den ziemlich engen Zusammenhang dieser *Borelschen* Methode auch mit der Methode der konformen Abbildung hinzuweisen. Der *Borelsche* Stern besitzt eine erzeugende Figur. Das ist der über

171) *E. Phragmén*, Le domaine de convergence de l'intégrale infinie

$\int_0^{\infty} F(az) e^{-a} da$, Paris C. R. 132 (1901), p. 1396—1399.

172) *E. Borel*, a. a. O. 169 d) u. 160).

172,1) Wegen des Beweises vgl. man auch *G. H. Hardy*¹⁷³⁾ und *O. Perron*, a) Zur Theorie der divergenten Reihen, Math. Ztschr. 6 (1920), p. 158—160; b) Beitrag zur Theorie der divergenten Reihen, Math. Ztschr. 6 (1920), p. 286—310.

173) *G. H. Hardy*, Researches in the theory of divergent series and divergent integrals, Quart. J. of math. 35 (1904), p. 31—66.

174) *Mittag-Leffler*, a. a. O. 155 d).

dem Durchmesser $0 \leq z \leq 1$ errichtete Kreis. Sei dieser K und sei z ein innerer Punkt des *Borelschen* Sterns, so ist $f(zt) = F(t)$ in einem mit K konzentrischen etwas größeren Kreis der t -Ebene regulär. Integriert man über einen solchen Kreis K' , so findet man die Darstellung:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{K'} \frac{f(z\tau)}{\tau-1} d\tau.$$

Denn es ist ja $F(1) = f(z)$. Kennt man nun eine im Äußeren von K , also auch auf K' gleichmäßig konvergente Darstellung von $\frac{1}{\tau-1}$, so kann man sie ins Integral eintragen und daraus eine Darstellung von $f(z)$ ableiten. Durch die Abbildung $\frac{1}{\tau} = \xi$ geht aber das Äußere von K gerade in die Halbebene $\Re(\xi) < 1$ über, in der wir eine Darstellung von $\frac{1}{1-\xi}$ durch ein *Laplacesches* Integral kennen. So gelangen wir zu dem *Borel-Laplaceschen* Integral.

Zugleich haben wir damit einen Fingerzeig, wie wir zu Darstellungen in allgemeineren Sternen kommen können. Es sei ein solcher Stern gegeben mit einer die Strecke $0 \leq z \leq 1$ enthaltenden erzeugenden Figur. Dieselbe werde durch die Funktion $z = \varphi(\xi)$ auf einen mit K konzentrischen Kreis abgebildet, so daß gleichzeitig noch $\varphi(0) = 0$ und $\varphi(1) = 1$ gilt. Sei K' wieder ein mit K konzentrischer etwas größerer Kreis, der aber noch in jenem Bildkreis liege. Dann findet man die Integraldarstellung:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{K'} \frac{f(z \cdot \varphi(\xi))}{\xi-1} d\xi.$$

Verfährt man mit dieser genau wie oben weiter, so erhält man allgemeinere Darstellungen von $f(z)$.

Wenn jedoch die erzeugende Figur die Punkte 0 und 1 auf dem Rande hat, so versagen diese Überlegungen. Es müssen ganz neue Betrachtungen angewendet werden. Diese hat wieder *Mittag-Leffler*¹⁷⁵⁾ allerdings nur für eine spezielle Klasse von Sternen B_α angestellt. Diese Sterne erlauben allerdings eine beliebig genaue Approximation des Hauptsternes. Sie enthalten den *Borelschen* Stern als speziellen Fall.¹⁷⁶⁾ Die erzeugende Figur ist der Bereich K^α . Er wird aus dem

175) *G. Mittag-Leffler*, a) Une généralisation de l'intégrale de *Laplace-Abel*, Paris C. R. 136 (1903), p. 537—539; b) Sur la nouvelle fonction $E_\alpha(z)$, Paris C. R. 137 (1903), p. 554—558; c) Sur la représentation analytique d'une branche uniforme d'une fonction monogène, Acta math. 29 (1905), p. 101—181.

176) Weniger weitreichende Verallgemeinerungen der *Borelschen* Methode versuchten *Borel*, *Hanni* und *Servant*. Doch erst die Entdeckung der Funktionen $E_\alpha(z)$ durch *Mittag-Leffler* brachte die Bemühungen zum Abschluß. Man ver-

Kreis K der ξ -Ebene erhalten durch die Abbildung $z = \xi^\alpha$. Für $\alpha \rightarrow 0$ konvergiert der zugehörige Stern gegen den Hauptstern. Für $\alpha = 1$ fällt er mit dem *Borelschen* zusammen. Man überzeugt sich mit einem Blick, daß man den Stern auch mit Hilfe der zu K^α reziproken Figur $\frac{1}{K^\alpha}$ erhalten kann, in der Weise, wie p. 452 Sterne konstruiert wurden. Sei nämlich $\frac{1}{K^\alpha}$ zugleich die Bezeichnung für den auf derselben Seite wie der Nullpunkt liegenden durch $\frac{1}{K^\alpha}$ begrenzten Bereich, und β irgendein Randpunkt des Hauptsternes. Dann ist B_α der Durchschnitt aller Bereiche $\beta \frac{1}{K^\alpha}$. Kann man somit eine in $\frac{1}{K^\alpha}$ gleichmäßig konvergente Darstellung von $\frac{1}{1-z}$ finden, so hat man damit nach p. 452 eine in B_α gleichmäßig konvergente Darstellung von $f(z)$. *Mittag-Leffler* hat nun gefunden, daß man eine solche Darstellung erhält, wenn man, statt wie *Borel* die Exponentialfunktionen zu verwenden, von der ganzen Funktion:

$$E_\alpha(z) = \sum_0^\infty \frac{z^\nu}{\Gamma(1 + \alpha\nu)}$$

Gebrauch gemacht. Es gilt nämlich in $\frac{1}{K^\alpha}$ die Darstellung

$$\frac{1}{1-z} = \int_0^\infty e^{-a^\alpha} E_\alpha(az) (da^\alpha)$$

und diese liefert für $f(z)$ die Darstellung:

$$f(z) = \int_0^\infty e^{-a^\alpha} F_\alpha(az) da^\alpha,$$

wo

$$F_\alpha(z) = \sum_0^\infty a_\nu \frac{z^\nu}{\Gamma(1 + \alpha\nu)}, \quad f(z) = \sum_0^\infty a_\nu z^\nu.$$

Mittag-Leffler hat weiter gezeigt, daß für die so gefundenen Darstellungen die Sterne B_α Konvergenzsterne sind. Man kann auch ähnlich wie bei der *Borelschen* Methode von der Integraldarstellung zu Reihendarstellungen übergehen. Die hier Platz greifenden Überlegungen haben endlich *Mittag-Leffler* zu einer neuen allgemeinen und sehr weittragenden Methode geführt, der wir uns nun zuwenden.

gleiche *Borel*, a. a. O. 169b), 169f), 169g); *L. Hanni*, Monatsh. Math. Phys. 12 (1901), p. 267—289; Acta math. 29 (1905), p. 25—58, Monatsh. Math. Phys. 14 (1903), p. 105—124; *Servant*, Essai sur les séries divergentes, Ann. de Toulouse (2) 1 (1899), p. 117—175. *E. Schöll*(182,1) hat durch Iteration der *Borelschen* Mittel eine beliebig genaue Approximation des Hauptsternes erzielt.

43. Eine neue Methode Mittag-Lefflers. Man kann sowohl bei der *Borelschen Methode* wie bei der Methode der konformen Abbildung leicht Restintegrale angeben. Von diesen ausgehend kann man die eben genannten Entwicklungen gleichfalls ableiten. Die Integrale sind nämlich über eine 0 und 1 enthaltende Kurve zu erstrecken. Zerlegt man sie in zwei Einzelintegrale über Kurven, die nur je einen dieser Punkte umschließen, so liefert das eine die Funktion $f(z)$, das andere das endliche Integral oder auch die abbrechende Reihe je nach dem weiteren Verlauf der Rechnung. *Mittag-Leffler*^{175c)} hat nun allgemeinere derartige Integrale vorgenommen. In ihnen spielt eine noch zu bestimmende Funktion $E(z)$ eine gewisse Rolle. Die Form der Integrale ist so gewählt, daß sie sich auf das bei der *Borelschen Methode* auftretende Restintegral reduzieren, sowie man für $E(z)$ die Exponentialfunktion nimmt. Unter den sich darbietenden Möglichkeiten möge nur noch eine näher besprochen werden.¹⁷⁶⁾ Man gehe aus von dem Integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(z\xi)}{\xi-1} \frac{E\left(\frac{a}{\xi}\right)}{E(a)} d\xi,$$

erstreckt in positivem Sinn über eine einfach geschlossene Kurve, welche die Punkte 0 und 1 umschließt. Man gewinnt daraus durch die oben angegebene Überlegung ohne weiteres die folgende Relation:

$$f(z) = \sum_0^{\infty} s_K(z) \frac{E^{(K+1)}(a)}{(K+1)!} \frac{a^{K+1}}{E(a)} + \frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(z\xi)}{\xi-1} \frac{E\left(\frac{a}{\xi}\right)}{E(a)} d\xi,$$

wo das Integral über eine nur noch $\xi = 0$ umschließende Kurve zu erstrecken ist. Alles kommt nun darauf an, die ganze Funktion $E(z)$ so zu wählen, daß in einem gewissen Stern der z -Ebene das Restintegral beim Übergang $a \rightarrow \infty$ gegen Null strebt. Je nach der Wahl von $E(z)$ kann man verschiedene Sterne erhalten. Nimmt man aber $E(z) = E_\alpha(z)$, so erhält man wieder den Stern B_α .

Man kann auch $E(z)$ so wählen, daß man eine im Hauptstern gültige Darstellung von $f(z)$ erhält. Dazu reicht es nach *Dienes*¹⁷⁷⁾ hin, eine ganze Funktion mit positiven Koeffizienten zu wählen, welche auf jedem von der positiven reellen Achse verschiedenen Halbstrahl bei Annäherung an den unendlich fernen Punkt der Null zustrebt, und zwar gleichmäßig in jedem nicht an die positive reelle Achse heranreichenden Winkelraum. Die Wichtigkeit dieser Funktionen

177) Man vergleiche dazu auch *P. Dienes*, Leçons sur les singularités des fonctions analytiques, Paris 1913.

für die Frage hatte schon *Mittag-Leffler*^{175 c)} erkannt. *Malmquist*⁸⁴⁾ gab zuerst eine derartige Funktion an. *E. Lindelöf*^{85) 165 c)} gab die Funktion

$$\sum_0^{\infty} \left(\frac{z}{\log(n+2)} \right)^n$$

an. Ein weiteres Beispiel gab *Mittag-Leffler*^{175 b)}. *E. Lindelöf*^{165 e)} zeigte weiter, daß die ganzen Funktionen mit positiven Koeffizienten C_n brauchbar sind, wenn $C_n = \varphi(n)$ ist, und wenn $\varphi(z)$ eine in der Halbebene $\Re(z) > 0$ reguläre analytische Funktion bedeutet, für welche $|\varphi(\rho e^{i\psi})| < e^{\varepsilon \rho}$ ist für jedes $\varepsilon > 0$ und für $\frac{\pi}{2} \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}$, falls nur ρ hinreichend groß ist.

Über die Konvergenz am Rande des Hauptsternes liegen Untersuchungen von *Dienes*¹⁷⁸⁾ vor.

44. Verallgemeinerungen. Schon *Mittag-Leffler* hat gelegentlich^{154 d)} auf die Möglichkeit hingewiesen, statt des geradlinig begrenzten Hauptsternes Kurvensterne zu verwenden. Zu ihrer Erzeugung hat man statt der vom Mittelpunkt ausgehenden Halbstrahlen andere Kurvenscharen zu verwenden.¹⁷⁹⁾ Von verschiedenen Seiten sind solche Überlegungen ins Einzelne durchgeführt worden. *Painlevé*¹⁵⁹⁾ hat sich ausführlich damit befaßt, und *Phragmén*¹⁶³⁾ hat noch allgemeinere derartige sternartige Bereiche herangezogen.

*H. von Koch*¹⁸⁰⁾ und *Painlevé*¹⁸¹⁾ haben zuerst die Untersuchungen auf den Meromorphiestern ausgedehnt, d. h. auf den Stern, in dem nur durchweg rationaler Charakter von $f(z)$ verlangt wird. Die erhaltenen Polynomreihen konvergieren natürlich nicht mehr durchweg gleichmäßig. Die Pole der Funktion sind durch unendlich werdende Reihensumme gekennzeichnet. *Mittag-Leffler*¹⁸²⁾ ist in zwei Noten

178) a) *Dienes*, a. a. O. 177); b) *P. und V. Dienes*, Recherches nouvelles sur les singularités des fonctions analytiques, Ann. Éc. Norm. (3) 28 (1911), p. 389—457.

179) *G. Mittag-Leffler*, Sopra le funzioni $E_a(z)$, Atti dei Lincei (5) 13 (1904), p. 3—5.

180) *H. von Koch*, a) Applications nouvelles de la fonction exponentielle, Bih. till Svenska Vet. Akad. Förrh. 1902; b) Sur le prolongement analytique d'une série de *Taylor*, Acta math. 27 (1902), p. 79—104; c) Sur le prolongement d'une série de *Taylor*, Arkiv for mat. astr. och phys. 12 (1907), Nr. 11.

181) *P. Painlevé*, Sur le développement des fonctions analytiques en séries de polynomes, Paris C. R. 135 (1902), p. 11—15.

182) *G. Mittag-Leffler*, a) Un nouveau théorème général de la théorie des fonctions analytiques, Paris C. R. 138 (1904), p. 881—884; b) Une nouvelle fonction entière, Paris C. R. 138 (1904), p. 941—942.

noch etwas weiter gekommen. Doch scheint der allgemeinste der Methode zugängliche Fall noch nicht erreicht zu sein.^{182,1)}

Zusammenhang zwischen den Koeffizienten eines Funktionselementes und den Singularitäten der durch dasselbe definierten Funktion.

45. Die Singularitäten auf dem Konvergenzkreis. Wenn ρ der Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum a_n z^n$ ist, so folgt aus dem *Cauchy*-schen Konvergenzkriterium $\frac{1}{\rho} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$.

Einen Zusammenhang zwischen Konvergenzradius und $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ hat ebenfalls bereits *Cauchy*¹⁸³⁾ angegeben. Wenn nämlich $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = a$ existiert, so ist $\rho = a$.¹⁸⁴⁾ Im allgemeinen liegt ρ zwischen

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad \text{und} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

Tiefer führt der folgende Satz: Wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \alpha$ existiert, so ist α ein singulärer Punkt.¹⁸⁵⁾

Die Wurzel der Beweismethode, die diesen und ähnliche Sätze liefert, liegt in der folgenden Bemerkung: Wenn $|z| = 1$ der Konver-

182,1) Weitere Literatur über analytische Fortsetzung: *A. Buhl*, a) Sur une extension de la méthode de *M. Borel*, Paris C. R. 144 (1907), p. 710—712; b) Sur de nouvelles applications de la méthode des résidus, Bull. des sc. math. 31 (1907), p. 152—158; c) Sur la sommabilité des séries de *Laurent*, Paris C. R. 145 (1907), p. 614—617; d) Sur de nouvelles formules de sommabilité, Bull. des sc. math. 31 (1907), p. 340—346; e) Sur les séries de polynômes *Tayloriens*, Paris C. R. 146 (1908), p. 575—578; f) Sur la représentation des fonctions méromorphes par des séries de polynômes *Tayloriens*, Bull. des sc. math. 32 (1906), p. 198—207; *A. Costable*, Sur le prolongement analytique d'une fonction méromorphe, Enseignement math. 10 (1908), p. 377—390; *E. Schöll*, Beiträge zur Theorie der analytischen Fortsetzung in elementarer Behandlungsweise, Diss. München 1914.

183) *A. L. Cauchy*, Analyse algébrique 1821, p. 289 = Oeuvres sér. II Bd. 3, p. 240.

184) Vgl. auch *E. Bortolotti*, Sul raggio di convergenza delle serie di potenze, Mém. acc. Modena (3) 4 (1901), p. 16—20.

185) *E. Fabry*, Sur les points singuliers d'une fonction donnée par son développement en série et sur l'impossibilité du prolongement analytique dans des cas très généraux, Ann. Éc. Norm. (3) 13 (1896), p. 107—114; *J. Hadamard*, La série de *Taylor* et son prolongement analytique, Paris 1901, p. 25.

genzkreis der Reihe $\Sigma a_n z^n$ ist, so ist $z = 1$ singularär, wenn für irgend ein b zwischen 0 und 1

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{f^{(n)}(b)}{n!} \right|} = \frac{1}{1-b}$$

ist. $z = 1$ aber ist regulär, wenn für ein solches b

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{f^{(n)}(b)}{n!} \right|} < \frac{1}{1-b}$$

ist. Ohne vorherige Umformung kann man jedoch selten dies Kriterium verwerten. Einer dieser seltenen Fälle liegt bei dem Satze von *Vivanti-Dienes*¹⁸⁶⁾ vor. Er lautet: *Wenn die Koeffizienten a_n der Bedingung $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ genügen und bei ihrer Deutung in einer Gaußschen Zahlenebene bis auf endlich viele einem Winkelraum angehören, dessen Scheitel der Koordinatenursprung ist, und dessen Öffnung weniger als π beträgt, so ist $z = 1$ singularärer Punkt der Funktion $\Sigma a_n z^n$.*

Für weitere Untersuchungen läßt sich das Kriterium auf eine handlichere Form bringen. Sie beruht auf der Einsicht, daß man von der Reihe, welche $f^{(n)}(b)$ darstellt, nur eine endliche, allerdings mit n über alle Grenzen wachsende Zahl von Gliedern beizubehalten braucht. Diese Zahl, das ist wesentlich, hängt von der Wahl der Funktion $f(z)$ nicht ab. Daraus entnimmt *Hadamard*¹⁸⁶⁾ sofort, daß eine Potenzreihe, für welche die Lücken zwischen den nichtverschwindenden Koeffizienten groß genug sind, über ihren Konvergenzkreis nicht fortgesetzt werden kann. Das ist der einfachste Fall eines allgemeinen *Lückensatzes*, dessen Beweis zwar von dem genannten Kriterium ausgeht, aber noch wesentlich tiefer schürfen muß. Der allgemeine Lückensatz lautet:

186) *G. Vivanti*, Sulle serie di potenze, *Rivista di matematica* 3 (1893), p. 111—114. Hier kommt der Satz zuerst ohne Beweis für positive Koeffizienten vor. Einen ersten Beweis für diesen Fall gab *A. Pringsheim*, Über Funktionen, welche in gewissen Punkten endliche Differentialquotienten jeder endlichen Ordnung, aber keine *Taylor*sche Reihenentwicklung besitzen, *Math. Ann.* 44 (1894), p. 41—56. Den inneren Grund deckt erst der Beweis von *E. Landau* auf: *E. Landau*, Über einen Satz von *Tschebychef*, *Math. Ann.* 61 (1905), p. 527—550. Einen etwas allgemeineren Fall behandelt *J. Hadamard*, Essai sur l'étude des fonctions données par leurs développements de *Taylor*, *J. de math.* (4) 8 (1892), p. 101—186. Die Erweiterung auf die Form des Textes gab *Dienes*, Essai sur les singularités des fonctions analytiques, *J. de math.* (6) 5 (1909), p. 327—413. Den vorhin erwähnten *Landau*schen Beweis übertrug *Fekete* auf diesen allgemeinen Fall. *Fekete*, Sur les séries de *Dirichlet*, *Paris C. R.* 150 (1910), p. 1033—1036. Vgl. auch die Darstellung bei *E. Landau*, Darstellung und Begründung einiger neuerer Ergebnisse der Funktionentheorie, Berlin 1916.

Eine Potenzreihe $\Sigma a_m z^{m\nu}$, für welche $\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{m_\nu}{\nu} = \infty$ gilt, kann nicht über ihren Konvergenzkreis hinaus fortgesetzt werden.¹⁸⁷⁾

Dieser Satz begreift alle schon vorher von anderer Seite (Weierstraß $\Sigma a^n z^{b^n}$ ($a > 0$), Fredholm⁵⁹⁾ $\Sigma a^n z^{n^2}$) angegebenen Beispiele von Funktionen in sich, deren natürliche Grenze der Einheitskreis ist.

Natürlich ist das Auftreten von Lücken keine notwendige Bedingung für Nichtfortsetzbarkeit. Das zeigen Beispiele verschiedener Autoren.¹⁸⁸⁾ Am deutlichsten kommt es jedoch in einer von *Polya*¹⁸⁹⁾ bewiesenen *Fatouschen*⁹⁴⁾ Vermutung zum Ausdruck:

Für jede vorgelegte Reihe $\Sigma a_n z^n$ mit endlichem Konvergenzkreis läßt sich eine Folge von Zahlen $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots$, deren jede entweder $+1$ oder -1 ist, so bestimmen, daß die Reihe $\Sigma \varepsilon_n a_n z^n$ nicht über ihren Konvergenzkreis hinaus fortgesetzt werden kann.

Statt bei der Herleitung der Kriterien für singuläre und für reguläre Punkte von der unmittelbaren Aneinanderreihung der Funktionselemente auszugehen, kann man auch die *Eulersche* Transformation verwenden.¹⁹⁰⁾ Sie besteht in der Substitution

$$z = \frac{\xi}{1-\xi}, \quad \xi = \frac{z}{1+z}.$$

187) In dieser allgemeinen Form gab den Satz zuerst *E. Fabry*¹⁸⁵⁾ an. Ein Beweis wurde durch *G. Faber* erbracht. *G. Faber*, a) Über Reihenentwicklungen analytischer Funktionen, Diss., München 1903; b) Über Potenzreihen mit unendlich vielen verschwindenden Koeffizienten, Münch. Ber. 36 (1906), p. 581—583; c) a. a. O. 190 b). *A. Pringsheim* hat den Beweis vereinfacht: *A. Pringsheim*, Über einige funktionentheoretische Anwendungen der *Eulerschen* Reihentransformation, Münch. Ber. 1912, p. 11—92. Den Spezialfall $\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{m_{\nu+1} - m_\nu}{m_\nu} > 0$ gab bereits *Hadamard*¹⁸⁶⁾. Die Verallgemeinerung zu

$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{m_{\nu+1} - m_\nu}{\sqrt{m_\nu}} > 0$ fand *E. Borel*^{188c)}. Vgl. auch Lösung der Aufg. 520, Arch. Math. Phys. 27 (1918), p. 90. Die im Text angegebene Bedingung besagt, daß die Wahrscheinlichkeit, einen von Null verschiedenen Koeffizienten zu treffen, Null ist. *Fabry*¹⁸⁵⁾ und *Faber*^{187b)} haben Beispiele dafür gegeben, daß $\overline{\lim} \frac{m_\nu}{\nu} = \infty$ nicht ausreicht. Es gibt Fälle, wo dann auf dem Konvergenzkreis nur eine singuläre Stelle liegt.

188) *E. Fabry*, a. a. O. 185); *E. Borel*, a. a. O. 58 a); *Leau*, Sur le cercle de convergence des séries, Paris C. R. 127 (1898), p. 711—712 und p. 794; *E. Le Roy*, Sur les points singuliers d'une fonction défini par un développement de *Taylor*, Paris C. R. 187 (1898), p. 948—950; *G. N. Watson*, The singularities of functions defined by *Taylor* series, Quart. J. 42 (1911), p. 41—53.

189) *G. Pólya* und *A. Hurwitz*, Zwei Beweise eines von Herrn *Fatou* vermuteten Satzes, Acta math. 40 (1916), p. 179—183. Vgl. ferner *F. Hausdorff*, a. a. O. 58).

190) *E. Lindelöf*, a) Sur la transformation d'*Euler* et la détermination des

Sie führt die Halbebene $\Re(\xi) < \frac{1}{2}$ in den Kreis $|z| < 1$ über. Dabei entsprechen sich $\xi = \frac{1}{2}$ und $z = 1$. Daher ist die Funktion $f\left(\frac{\xi}{1-\xi}\right)$ zum mindesten im Kreise $|\xi| < \frac{1}{2}$ regulär. Ob der Konvergenzkreis größer ist oder nicht, hängt davon ab, ob $z = 1$ für $f(z)$ singulär ist oder nicht. Da aber

$$f\left(\frac{\xi}{1-\xi}\right) = (1-\xi) \sum_0^{\infty} \xi^{\lambda} \left(\sum_0^{\lambda} \binom{\lambda}{\nu} a_{\nu} \right) \xi^{\lambda}$$

ist, so hat man den Satz:

$$z = 1 \text{ ist singulär, wenn } \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \sqrt[\lambda]{\left| \sum_0^{\lambda} \binom{\lambda}{\nu} a_{\nu} \right|} = 2,$$

$$z = 1 \text{ ist regulär, wenn } \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \sqrt[\lambda]{\left| \sum_0^{\lambda} \binom{\lambda}{\nu} a_{\nu} \right|} < 2$$

ist. Hieraus kann man durch einige Rechnung die folgende hinreichende Bedingung für die Singularität ableiten: $z = 1$ ist sicher dann singulär, wenn man $0 < \vartheta < 1$ so wählen kann, daß

$$\limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \left| a_{\lambda} + \sum_1^{\vartheta \lambda} \frac{\lambda! \lambda!}{(\lambda-\nu)! (\lambda+\nu)!} (a_{\lambda-\nu} + a_{\lambda+\nu}) \right|^{\frac{1}{\lambda}} \geq 1$$

ist. Diese Bedingung kann man auch aus

$$\limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \sqrt[\lambda]{\left| \frac{f^{(\lambda)}(b)}{\lambda!} \right|} = \frac{1}{1-b}$$

ableiten. Sie spielt eine besondere Rolle beim Beweis des Lückensatzes.

*E. Fabry*¹⁹⁰⁾ ist von der *Eulerschen* Transformation ausgehend zu einer Abschätzung des Hauptsternes gelangt, die also als Spezialfall Bedingungen für die Regularität auf einem Bogen des Konvergenzkreises enthält. *Fabry* und *Leau* haben mit den hier dargelegten Methoden Spezialfälle der in der nächsten Nummer zu besprechenden Sätze gewonnen.

Verwandt mit der Frage nach der Lage der Singularitäten auf dem Konvergenzkreis ist die andere nach der Lage der Singularitäten auf dem Hauptstern. Auch hierzu bieten die bisher erwähnten Arbeiten von *Hadamard*, *Fabry*, *Servant* Methoden. Zu erwähnen sind

points singuliers d'une fonction définie par son développement de Taylor, Paris C. R. 126 (1898), p. 632—634; b) Remarques sur un principe général de la théorie des fonctions, Acta soc. sc. Fenn. 84 (1898), Nr. 7; *E. Fabry*, a) Sur les séries de Taylor, Paris C. R. 125 (1897), p. 1086—1089; b) Sur les points singuliers d'une série de Taylor, J. de math. (5) 4 (1898), p. 317—358; *A. Pringsheim*, a. a. O. 187; *G. Faber*, a) a. a. O. 187; b) Über die Nichtfortsetzbarkeit gewisser Potenzreihen, Münch. Ber. 34 (1904), p. 63—74.

auch noch einige russische Arbeiten von *Brajtzev* in Warschau, Polit. Inst. 1907—1913.

46. Der Hadamardsche Multiplikationssatz. Die Bestimmung des Hauptsternes ist identisch mit der Aufgabe, den Konvergenzbereich einer im Hauptstern gültigen Polynomentwicklung aus den Koeffizienten des die Funktion definierenden Funktionselementes direkt zu bestimmen. Doch hat diese Methode bisher zu keinen Resultaten von größerer Bedeutung geführt.¹⁹¹⁾

Die Untersuchungen, welchen wir uns jetzt zuwenden, beziehen sich ebensowenig wie Konvergenzkriterien auf beliebige Reihen. Sie werden vielmehr für gewisse Reihentypen die Bestimmung des Hauptsternes leisten. Darüber hinaus werden sie oft über den ganzen weiteren Verlauf der Funktion Aufschluß geben.

Ich beginne mit einigen elementaren Bemerkungen. Wenn man die Singularitäten von $f(z)$ und $g(z)$ kennt, so sind damit auch die Singularitäten von $f(z) + g(z)$, $f(z) - g(z)$, $f(z) \cdot g(z)$, $\frac{f(z)}{g(z)}$, $f'(z)$, $\int f(z) dz$ und in gewissem Umfang auch die von $f\{g(z)\}$ bekannt. Dahin gehört auch die Bemerkung, daß die Addition einer ganzen Funktion an den im Endlichen gelegenen Singularitäten nichts ändert. Das hat Anlaß zu einigen interessanten Resultaten gegeben. Ich nenne den Satz von *Borel*¹⁹²⁾, daß man zu jeder Potenzreihe eine andere mit rationalen Koeffizienten konstruieren kann, so daß sich die durch beide dargestellten Funktionen nur um eine ganze Funktion unterscheiden. Dahin gehören auch verschiedene Untersuchungen¹⁹³⁾ über gleichsinguläre Potenzreihen, d. h. Reihenpaare, deren Differenz einen größeren Konvergenzradius hat als jede der Reihen.

Tiefer als diese naheliegenden Bemerkungen führt der *Hadamardsche Multiplikationssatz*.¹⁹⁴⁾ Ich spreche ihn so aus: *Die am Rande des*

191) Vgl. indessen *Servant*, Sur les points singuliers d'une fonction définie par une série de *Taylor*, Paris C. R. 128 (1899), p. 80—83. Vgl. *Borel*, a. a. O. 160), p. 141.

192) *E. Borel*, Leçons sur la théorie des fonctions méromorphes, Paris 1903, p. 36.

193) *S. Pincherle*, Confronto delle singolarità delle funzioni analitiche, Rend. Acc. Bologna Nuova serie 2 (1897/98), p. 77—78 und Rend. Acc. Lincei (4) 32 (1887), p. 310—315. *G. H. Hardy*, On a class of analytic functions, Proc. Lond. math. Soc. (2) 3 (1905), p. 441—460.

194) *J. Hadamard*, Un théorème sur les séries entières, Acta math. 22 (1898), p. 55—63; *E. Borel*, Sur les singularités des séries de *Taylor*, Bull. de la soc. math. de France 26 (1898), p. 238—248; *G. Faber*, Bemerkungen zu einem funktionentheoretischen Satz des Herrn *Hadamard*, Jahresber. d. D. Math.-Ver. 16 (1907), p. 285—298; *Petrovitch*, Un problème sur les séries, Ann. nouv. (3) 15 (1896), p. 58—63; *P. Montel*, Leçons sur les séries de polynomes, Paris 1910, p. 34 ff.

Hauptsternes von $a(z) = \sum a_n z^n$ gelegenen Singularitäten seien α_v , die am Rande des Hauptsternes von $b(z) = \sum b_n z^n$ gelegenen Singularitäten seien β_v . Dann sind die am Rande des Hauptsternes von $f(z) = \sum a_n \cdot b_n z^n$ gelegenen Singularitäten unter den Punkten $\alpha_v \cdot \beta_v$ enthalten.

Man kann diesen Satz sicher in mancher Hinsicht auf die Singularitäten der übrigen Funktionszweige ausdehnen. Aber abschließende Resultate liegen da nicht vor. Zum Beispiel weiß man, daß in den anderen Zweigen auch 0 und ∞ zu den Singularitäten zählen können. Eine Stelle $\alpha_v \cdot \beta_v$, die nur auf eine Weise als Produkt $\alpha_v \cdot \beta_v$ dargestellt werden kann, ist sicher singular; $\alpha_v \cdot \beta_v$ ist eine eindeutige Singularität, falls dies für alle $\alpha_v \cdot \beta_v$ zutrifft, deren Produkt diese Stelle liefert. Der Beweis aller dieser Sätze beruht auf der *Parsevalschen* Integraldarstellung

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int a(t)b\left(\frac{z}{t}\right) \frac{1}{t} dt.$$

Dabei soll der Integrationsweg $t = 0$ einmal im positiven Sinn umlaufen und samt z so gewählt sein, daß für alle t des Weges $\frac{z}{t}$ dem Hauptstern von $b(z)$ angehört.

*Hurwitz*¹⁹⁵⁾ hat die Sätze erweitert und namentlich Fälle angegeben, wo an die Stelle der Multiplikation eine Addition der Singularitäten tritt. Er stützt sich dabei auf die Betrachtung gewisser Doppelintegrale. *Agnola*¹⁹⁶⁾ hat zu dem gleichen Zweck an das Integral

$$\int f(u) \varphi(z - u) du \quad \text{angeknüpft.}^{197)}$$

47. Der Satz von Leau. Wir wenden uns zur Besprechung einiger Typen von Funktionen, deren Hauptstern sich bestimmen läßt. Der allgemeine Charakter der Sätze ist es, aus den Eigenschaften von

195) *A. Hurwitz*, Sur un théorème de M. *Hadamard*, Paris C. R. 128 (1899), p. 350—353; *E. Schöll*^{182, 1)} hat den *Hurwitzschen* Satz aus dem *Hadamardschen* abgeleitet.

196) *C. A. dell' Agnola*, Estensione di un teorema di *Hadamard*, Atti dell' ist. Veneto 58₂ (1898—99), p. 525—531 und p. 669—677.

197) Spezielle Fälle und weitere Bemerkungen bei folgenden Autoren: *E. Lugaro*, Intorno alle singularità di una funzione dipendente da quelle di piu funzione date, Periodico matematico (3) 1 (1904), p. 105—123; *S. Pincherle*, a) A proposito di un recente teorema del signore *Hadamard*, Rend. Acc. di Bologna nuova serie 3 (1898—99), p. 67—75; b) Sulle singularità di una funzione che dipende da due funzioni date, Rend. Acc. Lincei (5) 8₁ (1899), p. 228—232; *A. Pringsheim*, a. a. O. 187; *G. Faber*, Über die Fortsetzbarkeit gewisser *Taylor*-scher Reihen, Math. Ann. 57 (1903), p. 369—388; *M. Beke*, a) Untersuchungen aus der Theorie der analytischen Funktionen (ungarisch), Math. és Term. ért. 34 (1916), p. 1—61; b) Beiträge zu der *Hadamardschen* und der *Hurwitzschen* Composition der Potenzreihen (ungarisch), ebenda 35 (1917), p. 87—119.

$f(z) = \sum a(n)z^n$ auf die von $F(z) = \sum \varphi[a(n)]z^n$ zu schließen. $\varphi(x)$ ist dabei eine analytische Funktion mit gewissen näher anzugebenden Eigenschaften. Hier faßt man auch die Koeffizienten $a(n)$ als Werte einer analytischen Funktion $a(x)$ für ganzzahlige x auf.

Ich betrachte nun einzelne Fälle.

1) $\varphi(x)$ sei eine ganze Funktion. Die hier bislang erhaltenen Resultate sind im wesentlichen in einem Satz von *Leau*¹⁹⁸⁾ zusammengefaßt. Derselbe läßt sich als eine Verallgemeinerung des *Hadamard*-schen Satzes ansehen. Wenn nämlich $\varphi(x)$ eine ganze rationale Funktion von x ist, so gibt schon der *Hadamard*-sche Satz über die Funktion Aufschluß. Von hier gelangt man durch einen Grenzübergang zum Satz von *Leau*: $z = 1$ sei die einzige endliche Singularität von $f(z)$. Ferner sei $(z - 1)^m f(z)$ in der Umgebung von $z = 1$ beschränkt. Dann ist $z = 1$ auch die einzige Singularität von $F(z)$, welche im Hauptstern von $\frac{1}{1-z}$ liegt, wenn

a) $\varphi(x)$ eine ganze Funktion von niedrigerer Ordnung als $\frac{1}{m-1}$ ist für den Fall $m > 1$, d. h. wenn von einem gewissen $|x|$ an

$$|\varphi(x)| < |e|^{\varepsilon|x|^\delta}$$

ist für ein $\delta < \frac{1}{m-1}$ und ein beliebig gegebenes $\varepsilon > 0$.^{198,1)}

b) $\log n \cdot \sqrt[m]{|d_n|} \rightarrow 0$ für $m = 1$.

c) $\varphi(x)$ irgendeine ganze Funktion für $m < 1$.

Wenn ferner $z = 1$ eine eindeutige Singularität von $f(z)$ ist, so ist $z = 1$ auch eine eindeutige Singularität von $F(z)$.

Leau hat diesen Satz noch nach verschiedenen Richtungen erweitert. Zunächst läßt er allgemeinere Singularitäten als die mit $\frac{1}{(z-1)^m}$ vergleichbaren zu. Ferner werden Funktionen $F(z)$ mit mehreren isolierten Singularitäten betrachtet. Seien diese α_n , so sind die Singularitäten von $F(z)$ unter den α_n , ihren doppelten, dreifachen usw. Produkten und den Häufungspunkten dieser enthalten. Eventuell kommt noch in anderen Zweigen der Punkt 0 hinzu.

198) E. Leau, a) Extension d'un théorème de M. Hadamard à l'étude des séries de Taylor, Bull. de la soc. math. de France 26 (1898), p. 267—270; b) a. a. O. 58). Ferner Désaint, a) Théorèmes généraux sur les points singuliers de fonctions données par une série de Taylor, J. de math. (5) 8 (1902), p. 448 bis 451; b) Les séries de Taylor et la représentation exponentielle, Ann. Éc. Norm. (3) 21 (1904), p. 415—448.

198,1) Ob diese Aussage auch noch für Funktionen $\varphi(x)$ vom Minimaltypus der Ordnung $m - 1$ zutrifft, ist im allgemeinen Fall noch unentschieden. In dem gleich zu erwähnenden Spezialfall $\alpha_n = n$ trifft sie zu.

Als wichtiger Spezialfall ist $a_n = n$ zu nennen. Ein darauf bezüglich Satz ist unabhängig von dem *Leauschen* von verschiedenen Autoren¹⁹⁹⁾ behandelt und über den aus diesem zu entnehmenden Inhalt hinaus erweitert worden. Dahin gehört der *Satz von Wigert*: Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß die Reihe $f(z) = \sum_1^{\infty} c_n z^n$ eine ganze Funktion von $\frac{z}{1-z}$ definiert, besteht darin, daß die c_n sich in der Form $\varphi(n)$ darstellen lassen. Dabei bedeutet $\varphi(x)$ eine ganze Funktion, die höchstens dem Minimaltypus der Ordnung Eins angehört. Ist sie rational^{199a)}, so ist auch $f(z)$ rational. Ist sie transzendent, so ist auch $f(z)$ transzendent.

Verallgemeinerung. Wenn $a(x)$ von höherer Ordnung als dem Minimaltypus der Ordnung Eins ist, so kann man zu Abschätzungen des Hauptsternes gelangen. *Le Roy, Faber, Pringsheim, Lindelöf* u. a.²⁰⁰⁾ haben mit verschiedenen Methoden hier verschieden scharfe Resultate gewonnen.

48. Sätze von Lindelöf. Wir wollen zunächst $\varphi(x)$ in anderer Weise als in der vorigen Nummer spezialisieren. Ich wähle nämlich

2) $a_n \rightarrow \infty$, $\varphi(x)$ holomorph für genügend große $|x|$. Bisher ist nur $a_n = n$ behandelt. Hier gilt der folgende Satz²⁰¹⁾:

199) Den Nachweis, daß die Bedingung des Satzes hinreicht, gab *Leau*⁵⁸⁾ auch noch unabhängig von seinem Hauptsatz. Auch ist dieser Teil des Satzes in den Untersuchungen von *Le Roy*¹⁶⁴⁾ enthalten. Daß die Bedingung notwendig ist, zeigten zuerst *S. Wigert* und *F. Carlson*. Vgl. *F. Carlson*, Sur une classe de séries de Taylor, Upsala 1914; *S. Wigert*, Sur les fonctions entières, Oefversigt af K. Vet. Ak. Förh. 57 (1900), p. 1001—1011. Später gab *Faber*¹⁸⁷⁾ 197) einen neuen unabhängigen Beweis, den *Pringsheim*¹⁸⁷⁾ in etwas anderer Fassung wiederholt hat. Vgl. ferner *E. Lindelöf*, a. a. O. 200); *G. H. Hardy*, On two theorems of *F. Carlson* and *S. Wigert*, Acta math. 42 (1920), p. 327—339; *M. Riesz*, Sur le principe de *Phragmén-Lindelöf*, Proc. Camb. Phil. Soc. 20 (1920), p. 205—209.

199 a) Diesen Teil des Satzes sieht man sofort ein, wenn man beachtet, daß für $f_p(z) = \sum n^p z^n$ stets $f_{p+1}(z) = z f_p'(z)$ gilt.

200) *E. Lindelöf* gibt die Resultate als Spezialfälle noch viel allgemeinerer Sätze: *E. Lindelöf*, a) Quelques applications d'une formule sommatoire générale, Acta Soc. Fennicae 31 (1902), Nr. 3 und a. a. O. 165 c); b) Sur une formule sommatoire générale, Acta math. 27 (1903), p. 305—311; *W. B. Ford*, a) Sur la fonction définie par une série de *Mac-Laurin*, J. de math. (5) 9 (1903), p. 223—232; b) A theorem on the analytic extension of power series, Bull. of the Am. math. soc. (2) 16 (1910), p. 507—510; *F. Carlson*, a. a. O. 199; *S. Wigert*, Sur une certaine classe de séries de puissances, Arkiv for mat. astr. och fys. 12 (1917), Nr. 7. Die Untersuchungen von *Desaint*, Sur quelques théorèmes de la théorie des fonctions, Ann. Éc. Norm. (3) 14 (1897), p. 311—378, widersprechen den hier angeführten gesicherten Tatsachen. *G. H. Hardy*, a. a. O. 199).

201) In dieser allgemeinen Fassung folgt der Satz aus Entwicklungen von *Le Roy*¹⁶⁴⁾, *Leau*⁵⁸⁾: Sur les fonctions définies par un développement de Taylor,

$\sum \varphi(n)z^n$ hat im Endlichen nur die singulären Punkte 0, 1.

3) $a_n \rightarrow \infty$, $\varphi(x)$ sei vom Charakter einer ganzen rationalen Funktion für große $|x|$. Wir wollen diesen Fall in die gleich jetzt zu besprechenden Untersuchungen mit einbeziehen.^{215, 1)} Es ist bisher auch nur $a_n = n$ behandelt.

4) In der Funktion $f(z) = \sum a(n)z^n$

sei $a(x)$ eine in einer Halbebene $\Re(x) > \alpha$ reguläre Funktion, die für $x \rightarrow \infty$ gewisse asymptotische Bedingungen erfüllt. Wir verlangen z. B., daß bei gegebenem $\varepsilon > 0$ von einem gewissen $|x|$ an

$$|a(x)| < e^{\varepsilon|x|}$$

gleichmäßig gilt, in der Halbebene $\Re(x) > \alpha$. Dann ist $z = 1$ die einzige Ecke des Hauptsternes von $f(z)$. Dies Resultat haben *Le Roy*²⁰²⁾ und *E. Lindelöf*^{165c) 200)} mit verschiedenen Methoden gewonnen.²⁰³⁾

Die sehr weittragenden Methoden, welche *Lindelöf* angibt, beruhen auf der Anwendung allgemeiner Summenformeln. Die eine führt zu der Integraldarstellung:

$$f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{a(x)z^x dx}{e^{2i\pi x} - 1}.$$

Als Halbebene ist dabei $\Re(x) \geq 0$ genommen. Die andere führt zu der Erkenntnis, daß für den Verlauf der Funktion $f(z) = \sum a(n)z^n$ im wesentlichen der von

$$J(z) = \int_0^{\infty} a(x)z^x dx$$

Paris C. R. 128 (1899), p. 804—805. *Faber*^{187) 197)} und *Pringsheim*¹⁸⁷⁾ haben Teile bewiesen. Die allgemeine Fassung ergibt sich aus den gleich zu erwähnenden Resultaten von *Lindelöf*.

202) *Le Roy*¹⁶⁴⁾ gibt noch Andeutungen für den allgemeinen Fall, wo an Stelle der Halbebene ein anderer, die positive reelle Achse enthaltender Winkelraum tritt. Er behauptet, auch hier lägen alle singulären Punkte auf der positiven reellen Achse jenseits $+1$. Indessen scheint ein Beweis dafür noch nicht vorzuliegen. Erwähnt sei nur, daß *E. Fabry*¹⁸⁵⁾ gezeigt hat, daß $+1$ der einzige singuläre Punkt auf dem Konvergenzkreis ist.

203) Hierher gehören auch die Untersuchungen von *E. W. Barnes*, The asymptotic expansion of $\sum_0^n \frac{x^n}{n!(n+\vartheta)}$ and the singularities of $g(x, \vartheta) = \sum_0^n \frac{x^n}{n+\vartheta}$,

Quart. J. 37 (1906), p. 289—313; vgl. auch *B. Svensson*, Etudes sur les fonctions définies par une série de Taylor, Diss. Lund 1908; *Lindelöf* und *Wigert* haben auch andere Wachstumsbedingungen für $a(x)$ untersucht. Vgl. *S. Wigert*, Sur une certaine classe de séries de puissances, Arkiv for mat. astr. och fys. 12 (1917), Nr. 7. Es kommt dabei nur $|a(x)| < e^{\alpha|x|}$ und $\alpha < \pi$ in Betracht, weil schon von $\alpha = \pi$ an der Einheitskreis singuläre Linie sein kann.

bestimmend ist. Andere als die bei diesem Integral auftretenden Singularitäten sind auch bei $f(z)$ in keinem Zweige vorhanden. Über die Lage dieser Singularitäten gewinnt man Aufschluß, wenn man die für $a(x)$ gemachten Voraussetzungen noch etwas erweitert. Wir wollen annehmen, die Funktion $a(x)$ sei holomorph für $\Re(x) > 0$; ferner gebe es zu jedem positiven Zahlenpaar ε, ψ_0 eine andere Zahl R so, daß für $(z = \rho e^{i\psi})$ $|\psi| < |\psi_0|$ und $\rho > R$ die Funktion $f(z)$ holomorph ist und der Bedingung

$$|f(\rho e^{i\psi})| < e^{\varepsilon \rho}$$

genügt. Dann läßt sich $J(z)$ verfolgen und man kommt zu dem Resultat, daß dann $0, 1, \infty$ die einzigen singulären Stellen von

$$f(z) = \sum_0^{\infty} a(n) z^n \quad \text{sind.}$$

In den allgemeinen Sätzen *Lindelöfs*, deren wichtigste hier aufgeführt wurden, sind so gut wie alle seither über analytische Fortsetzung gewonnenen Resultate enthalten, soweit sie nicht schon aus dem Satz von *Leau* folgen. Sie umfassen namentlich fast alle speziellen Fälle, welche *Mellin*²⁰⁴⁾ und *Le Roy* mit ähnlichen Integraldarstellungen behandelt haben. Bei *Le Roy* sind es Integrale der Form

$$\int \psi(x) A(x, z) dx,$$

insbesondere das Integral

$$f(z) = \int_0^1 \varphi(x) \frac{dx}{1-xz},$$

aus dem die Resultate fließen. Dies letztere leistet namentlich dann gute Dienste, wenn es gelingt, eine Funktion $\varphi(x)$ anzugeben, mit der sich die Darstellung

$$a_n = \int_0^1 \varphi(x) x^n dx$$

gewinnen läßt. Auch *Hadamard*¹⁸⁶⁾ hat schon solche Fälle behandelt²⁰⁵⁾. Die einzige Ecke des Hauptsternes ist stets $+1$. Ist $\varphi(x)$ analytisch und sind $0, 1, \infty$ ihre einzigen Singularitäten, so ist $f(z)$ nur bei 1 und ∞ singulär. Oft erlauben es auch diese Methoden, über die Natur der Singularitäten Aufschluß zu gewinnen. (*Lindelöf, Le Roy,*

204) *H. J. Mellin*, Verschiedene Arbeiten in den *Acta math.* 28 (1904), p. 37—64, Bd. 25 (1902), p. 139—184. In den *Acta soc. Fennicae* 20 (1895), 22 (1896), 24 (1899), 29 (1902), 31 (1902).

205) *G. H. Hardy*, a) A method for determining the behaviour of certain classes of power series near a singular point on the circle of convergence, *Proc. Lond. math. Soc.* (2) 3 (1905), p. 381—389; b) On the singularities of functions defined by power series, *Proc. Lond. math. Soc.* (2) 5 (1907), p. 197—205.

Hardy.) *Carlson*¹⁹⁹⁾ gibt in seiner Dissertation Verallgemeinerungen und, was wichtiger ist, Umkehrungen *Lindelöfscher* Resultate.

Wie man sieht, bezieht sich fast alles auf Funktionen mit eineckigem Stern.^{205, 1)} Für allgemeinere Funktionen liegen nur wenige Resultate vor. Es kommt dabei wesentlich die Bemerkung in Betracht, daß solche Funktionen durch Summation anderer mit eineckigen Hauptsternen erhalten werden. Dazu kommen die schon erwähnten Abschätzungen der Hauptsterne, sowie die oben erwähnte Verallgemeinerung des Satzes von *Leau*.

49. Rekurrierende Reihen. Neben diesen Fällen, wo die Koeffizienten a_n der Funktion $\Sigma a_n z^n$ als bestimmte analytische Funktionen $a(n)$ gegeben sind, hat man noch verschiedene Fälle untersucht, in welchen die Koeffizienten gewissen Rekursionsgesetzen, z. B. linearen Differenzgleichungen genügen. Dahin gehören namentlich die aus der Algebra bekannten Sätze über rekurrente Reihen. Funktionstheoretisch ausgedrückt enthalten dieselben die *Bedingungen dafür, daß eine Reihe $\Sigma a_n z^n$ eine rationale Funktion darstellt*. Dafür ist notwendig und hinreichend, daß es eine endliche Anzahl von Zahlen $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ gibt derart, daß für alle hinreichend großen ν die Relationen

$$\alpha_0 a_\nu + \alpha_1 a_{\nu+1} + \dots + \alpha_n a_{\nu+n} = 0$$

gelten. $\alpha_0 z^n + \alpha_1 z^{n-1} + \dots + \alpha_n$ ist dann der Nenner der durch die Reihe dargestellten rationalen Funktion. Man kann die Bedingung auch dahin aussprechen, daß die Determinanten

$$D_i^{(n)} = \begin{vmatrix} a_i & a_{i+1} & \dots & a_{i+n} \\ a_{i+1} & a_{i+2} & \dots & a_{i+n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i+n} & a_{i+n+1} & \dots & a_{i+2n} \end{vmatrix}$$

von einem gewissen i an alle verschwinden müssen. Man kann mit *Pólya*²⁰⁶⁾ hieraus schließen, daß $\Sigma a_k z^k$ dann und nur dann eine rationale Funktion darstellt, wenn unter den Determinanten $D_{k-1}^{(k)}$ und $D_k^{(k)}$ nur endlich viele ungleich Null sind.

205, 1) Notwendige und hinreichende Bedingungen dafür, daß die sämtlichen Singularitäten einer Funktion auf einer Strecke liegen, gaben auch *Jensen* und *Wigert*: Eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß die Singularitäten einer gegebenen *Taylor*schen Reihe auf einer geradlinigen Strecke liegen, (dänisch); *Nyt tidskrift for mat.* 21 (1910); *S. Wigert*, Sur un théorème de la théorie des fonctions analytiques, *Arkiv for mat. astr. och fys.* 5 (1909), Nr. 8.

206) *G. Pólya*, Über Potenzreihen mit ganzzahligen Koeffizienten, *Math. Ann.* 77 (1916), p. 497—513. Vgl. auch *G. Pólya*, Arithmetische Eigenschaften der Reihenentwicklungen rationaler Funktionen, *Crelles J.* 151 (1921).

*Perron*²⁰⁷⁾ und *Van Vleck*²⁰⁸⁾ haben im Anschluß an *Poincaré*²⁰⁹⁾ lineare Differenzgleichungen mit nicht konstanten Koeffizienten betrachtet. Aber ihre Untersuchungen haben nicht viel mehr als die Bestimmung des Konvergenzradius der in Betracht kommenden Reihen geliefert.

*Fatou*²¹⁰⁾ untersucht folgenden Fall: $\vartheta(u)$ sei in einem Bereich B der u -Ebene analytisch und eindeutig. Es gelte $a_n = \vartheta(a_{n-1})$ und es werde die Funktion $f(z) = \sum a_n z^n$ untersucht. $\vartheta(u) - u$ habe nur eine Nullstelle α im Bereiche B . Ferner sei in einem gewissen Kreis um α : $|\vartheta(u) - \alpha| < k|u - \alpha|$ ($0 < k < 1$) Dann gilt $\vartheta(a_n) \rightarrow \alpha$ für $n \rightarrow \infty$ und für jedes a_0 aus jenem Kreis um α . Unter diesen Voraussetzungen ist $f(z)$ eine in der ganzen Ebene meromorphe Funktion, welche als Quotient zweier Funktionen vom Geschlecht Null aufgefaßt werden kann. Setzt man $a = \vartheta'(\alpha)$, so kann $\prod_0^{\infty} (1 - a^n z)$ als Nenner benutzt werden.

50. Untersuchungen von Darboux. *Darboux*²¹¹⁾ hat im Jahre 1878 einen Zusammenhang zwischen den Singularitäten auf der Konvergenzgrenze einer Potenzreihe und dem asymptotischen Verhalten ihrer Koeffizienten gefunden und z. B. zur Untersuchung des Verhaltens der *Legendreschen* Polynome für große Gradzahlen verwendet. Er fand folgenden Satz: Es sei k eine reelle Zahl und α ein Punkt auf der Konvergenzgrenze von $f(z) = \sum a_n z^n$. Ferner gelte in der Umgebung von $z = \alpha$ eine Darstellung $f(z) = \varphi(z)(z - \alpha)^k + \psi(z)$, in der $\varphi(z)$ und $\psi(z)$ um $z = \alpha$ regulär sind. In den übrigen Punkten ihres Konvergenzkreises sei $f(z)$ regulär. Dann gelten Abschätzungen wie die folgende^{211,1)}:

$$a_n = \frac{\varphi(\alpha) k(k-1) \dots (k-n+1)}{\alpha^{n-k} n!} \left| 1 + o\left(\frac{1}{n}\right) \right| + O\left(\frac{1}{|\alpha|^n \cdot n^{\Re(k)+2}}\right).$$

207) *O. Perron*, Über die *Poincarésche* lineare Differenzgleichung, J. f. Math. 137 (1910), p. 6—64; vgl. auch *O. Perron*, Über einen Satz des Herrn *Poincaré*, J. f. Math. 136 (1909), p. 17—37.

208) *E. B. van Vleck*, On linear criteria for the determination of the radius of convergence of a power series, Trans. of the Am. math. soc. 1 (1900), p. 293—309.

209) *H. Poincaré*, Sur les équations linéaires aux différentielles ordinaires et aux différences finies, Am. Journ. 7 (1885), p. 203—263.

210) *P. Fatou*, Sur une classe remarquable de séries de *Taylor*, Ann. Éc. Norm. (3) 27 (1910), p. 43—53; *Lattès*, a) Sur la convergence des relations de récurrence, Paris C. R. 150 (1910), p. 1106—1109; b) Sur les séries de *Taylor* à coefficients récurrents, Paris C. R. 150 (1910), p. 1413—1415; c) Sur les suites récurrentes non linéaires et sur les fonctions génératrices de ces suites, Ann. de Toulouse (3) 3 (1913), p. 13—124.

211) *G. Darboux*, Mémoire sur l'approximation des fonctions de très grands nombres, et sur une classe étendue de développements en séries, J. de math. (3)

Dieses Ergebnis ist von den verschiedensten Seiten verallgemeinert worden. Denn es bietet aus mehr als einem Grunde ein erhebliches Interesse dar, und zwar nicht nur wegen der darin enthaltenen Beziehungen zwischen den Singularitäten einer Funktion und den Koeffizienten ihrer *Taylorentwicklung*. Es kommt auch die Anwendung auf das asymptotische Verhalten noch anderer Funktionen als der *Legendreschen* Polynome und das Interesse dieser Dinge für die *Himmelsmechanik in Betracht*.²¹²⁾

Den weitestgehenden Satz über Funktionen mit algebraisch logarithmischen Singularitäten hat unter Weiterführung der Untersuchungen von *Nörlund*²¹³⁾ *Perron*²¹⁴⁾ angegeben, und auf das Verhalten der hypergeometrischen Funktion beim Anwachsen eines oder mehrerer Parameter angewandt.²¹⁵⁾ *L. Fejér*²¹⁶⁾ hat Unbestimmtheitsstellen auf der Konvergenzgrenze herangezogen. Sein Resultat wurde von *Perron*²¹⁵⁾ erweitert unter gleichzeitiger Vereinfachung des Beweises.^{215,1)}

51. Die Lage der Pole. Alle diese Autoren erschließen aus der Natur der Singularitäten notwendige Bedingungen für die Koeffizien-

4 (1878), p. 5—56 und p. 377—416. Vgl. auch *O. Perron*, Über das Verhalten von $f^{(\nu)}(x)$ für $\lim \nu = \infty$, wenn $f(x)$ einer linearen homogenen Differentialgleichung genügt, Sitzber. München (1913), p. 355—382.

211, 1) Mit *Landau* drücke ich durch die Schreibweise $\varphi(x) = O(f(x))$ aus, daß $\left| \frac{\varphi(x)}{f(x)} \right|$ für große x beschränkt ist, während $\varphi(x) = o(f(x))$ bedeutet, daß $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\varphi(x)}{f(x)} = 0$ ist.

212) *H. Poincaré*, Leçons de mécanique céleste II, p. 157 und Les méthodes nouvelles de mécanique céleste I, p. 280. Man vergleiche weiter Arbeiten von *Hamy* im Bull. astr. 1893, im J. de math. (4) 2 (1890), (4) 10 (1894), (6) 4 (1908) und Paris C. R. 144 (1892) und 125 (1897). Ferner *Flamme*, Thèse, Paris 1887, und *Féraud*, Thèse, Paris 1897, und *Coculesco*, Thèse, Paris 1895. Vgl. auch II A 12 (*Burkhardt*).

213) *T. E. Nörlund*, Fractions continues et différences réciproques, Acta math. 34 (1911), p. 1—108.

214) *O. Perron*, Über das infinitäre Verhalten der Koeffizienten einer gewissen Potenzreihe, Arch. Math. Phys. (3) 22 (1914), p. 329—340.

215) *O. Perron*, Über das Verhalten der hypergeometrischen Funktion bei unbegrenztem Wachstum eines oder mehrerer Parameter, Sitzber. Heidelberg I, 1916, Nr. 9 und II, 1917, Nr. 1.

215, 1) Weitere Untersuchungen bei *G. Faber*, Über das Verhalten analytischer Funktionen an Verzweigungsstellen, Münch. Ber. 1917, p. 263—284; *G. H. Hardy*, Oscillating *Dirichlet's* integrals, Quart. J. of math. 44 (1913), p. 1—40, p. 242—263; *M. Kuniyeda*, Note on asymptotic formulæ for oscillating *Dirichlet's* integrals, Quart. J. of math. 48 (1918), p. 113—135.

216) *L. Fejér*, a) Sur une méthode de *M. Darboux*, Paris C. R. 147 (1908), p. 1040—1042; b) Asymptotikus értékek meghatározásáról, Math. és term. ért. 1909), p. 1—33.

ten der Potenzreihe. Es war das große Verdienst von *Hadamard*¹⁸⁶⁾, daß er 1892 die Betrachtung umkehrte und lehrte, wie man aus dem Verhalten der Koeffizienten auf die Natur der Singularitäten schließen kann. Besonders die Lage der Pole ist es, die bisher interessiert hat. Er knüpft dabei außer an *Darboux* noch an andere ältere Untersuchungen an.

Der einfachste hierher gehörige Satz ist dieser:

Dafür daß $f(z)$ als einzige Singularität auf dem Konvergenzkreis einen einfachen Pol bei $z = \alpha$ hat, ist notwendig und hinreichend, daß es eine positive Zahl $k < 1$ gibt, so daß von einem gewissen n an,

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{1}{\alpha} \right| < k^n \quad \text{bleibt.}$$

Dem entspricht ja auch der Satz, daß stets $\frac{a_n}{a_{n+1}} \rightarrow \alpha$ strebt, wenn der Pol α die einzige Singularität auf dem Konvergenzkreis ist.²¹⁷⁾

Die allgemeinen Untersuchungen von *Hadamard* knüpfen an die schon erwähnte Theorie der rekurrierenden Reihen an. Auch bei ihnen spielen die schon angegebenen Determinanten $D_i^{(n)}$ die Hauptrolle. Noch deutlicher als bei den rationalen Funktionen tritt hier im allgemeinen Fall die Beziehung zur Funktion $D_n(z) = \Sigma D_i^{(n)} z^i$ hervor. Setzt man $f_0(z) = f(z) = \Sigma a_n z^n$ und für $n \geq 1$ allgemein

$$f_n(z) = \frac{f_{n-1}(z) - a_{n-1}}{z},$$

so hat man die Integraldarstellung:

$$D_n(z) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\mathfrak{C}_1} \dots \int_{\mathfrak{C}_n} \begin{vmatrix} f_0(t_1) & f_1(t_1) & \dots & f_n(t_1) \\ f_1\left(\frac{t_2}{t_1}\right) & f_2\left(\frac{t_2}{t_1}\right) & \dots & f_{n+1}\left(\frac{t_2}{t_1}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n\left(\frac{z}{t_n}\right) & f_{n+1}\left(\frac{z}{t_n}\right) & \dots & f_{2n}\left(\frac{z}{t_n}\right) \end{vmatrix} \frac{dt_1}{t_1} \dots \frac{dt_n}{t_n}.$$

Ähnlich wie bei dem *Parsevalschen* Integral von p. 465, auf dem der Beweis des *Hadamardschen* Multiplikationssatzes beruht, ist dabei \mathfrak{C}_1 ein Integrationsweg, der $t_1 = 0$ so nahe umschließt, daß in und auf ihm nur Regularitätsstellen von $f_0(t_1)$ und von $f_1\left(\frac{t_2}{t_1}\right)$ liegen, während t_2 den Integrationsweg \mathfrak{C}_2 durchläuft. Dieser umschließt seinerseits $t_2 = 0$ so nahe, daß er nur Regularitätsstellen von $D_2(t_2)$ und von $f_2\left(\frac{t_3}{t_2}\right)$ umschließt, während t_3 auf \mathfrak{C}_3 variiert usw. *Hadamard* selbst benutzt keine derartige Integralstellung, zumal er wie *Schaper*¹¹³⁾ nur

²¹⁷⁾ Wohl zuerst bei *J. König*, Über eine Eigenschaft der Potenzreihen, *Math. Ann.* 23 (1884), p. 447–450.

die Produkte der absoluten Beträge der Pole untersucht. Ähnlich wie beim *Hadamard'schen* Produktsatz sind aber hier die am Rande des Hauptsternes von $D_n(z)$ liegenden Singularitäten unter den $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_n$ enthalten, wenn die α die Ecken des Hauptsternes von $f(z)$ sind.²¹⁸⁾ In dem Produkt $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_n$ kann dabei jeder Pol von $f(z)$ so oft auftreten, als seine Vielfachheit beträgt (während die anderen Singularitäten beliebig oft auftreten können), wenn anders die Stelle $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_n$ wirklich singulär für $D_n(z)$ sein soll.

Aus dieser Integraldarstellung für $D_n(z)$ liest man sehr leicht die *Hadamard'schen* Sätze über die Lage der Pole von $f(z)$ ab. Ich stelle die wichtigsten hier zusammen:

R_n sei der Konvergenzradius von $D_n(z)$, R_0 der von $f(z)$ selbst. R_n ist dann und nur dann größer als R_0^n , wenn $f(z)$ auf seinem Konvergenzkreis höchstens n Pole und keine weiteren Singularitäten hat. Die genaue Zahl der Pole stimmt mit der Nummer derjenigen Funktion $D_n(z)$ überein, bei der das Kriterium zum ersten Male erfüllt ist.

Dann und nur dann ist

$$\frac{R_n}{R_{n-1}} \geq l,$$

wenn $f(z)$ im Kreise $|z| < l$ höchstens n Pole und keine weiteren Singularitäten hat. Die Anzahl ist genau gleich n , wenn n die kleinste Zahl ist, für welche die Ungleichung gilt.

Dann und nur dann, wenn

$$\frac{R_n}{R_{n-1}} \rightarrow l$$

gilt für $n \rightarrow \infty$, hat $f(z)$ im Kreise $|z| < l$ nur Pole, während jeder größere Kreis auch andere Singularitäten enthält.

Dann und nur dann, wenn von $n = k$ an stets $\frac{R_n}{R_{n-1}} = l$ bleibt, hat $f(z)$ im Kreise $|z| < l$ genau k Pole, während jeder größere Kreis auch andere Singularitäten enthält.

Dann und nur dann, wenn $R_n \rightarrow \infty$ für $n \rightarrow \infty$, ist die Funktion $f(z)$ meromorph in der ganzen Ebene. Sie hat dann und nur dann endlich viele (k) Pole, wenn von $n = k$ an $R_n = \infty$ ist.

Hadamard hat weiter eine Methode ausgearbeitet, welche die Koordinaten der Pole und ihre Hauptteile zu berechnen erlaubt. Sie läuft auf die Bestimmung eines Polynoms $P_n(z)$ heraus, von der Art, daß $P_n(z) \cdot f(z)$ einen größeren Konvergenzradius hat als $f(z)$. Die Heranziehung der Funktion $D_n(z)$ vereinfacht auch diese Entwicklungen, wenn man beachtet, daß $D_{n-1}(z)$ auf dem Konvergenzkreis

218) Eine andere Integraldarstellung gibt A. Hurwitz¹⁹⁵⁾ an.

nur den einen Pol $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_{n-1}$ besitzt, wenn mit $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_{n-1}$ die Pole von $f(z)$ auf dem Konvergenzkreis erschöpft sind.^{218,1)}

Hadamard hat daran anschließend weiter die Frage behandelt, wann durch Multiplikation mit einem Polynom die Ordnung (siehe p. 489) der Funktion auf dem Konvergenzkreis erniedrigt werden kann. Damit gewinnt man in gewissem Umfang eine Methode zur Bestimmung auch anderer Singularitäten als Pole.^{218,2)}

Die Potenzreihen an der Konvergenzgrenze.

52. Der Abelsche Grenzwertsatz. *Abel*²¹⁹⁾ hat die Aufgabe gestellt, das Verhalten einer durch eine Potenzreihe dargestellten Funktion bei Annäherung an eine Stelle der Konvergenzgrenze zu bestimmen.

Schon vorher hat *Abel*^{219,1)} die genannte Aufgabe in dem speziellen Fall gelöst, daß die Reihe in dem zu untersuchenden Punkt des Konvergenzkreises noch konvergiert. Der später sogenannte *Abelsche Grenzwertsatz* besagt, daß dann die Reihe auf dem ganzen, zu dem Punkte hinziehenden Radius des Konvergenzkreises gleichmäßig konvergiert, daß also die Funktion bei radialer Annäherung an diesen Punkt einen Grenzwert besitzt, welcher durch die Reihensumme dargestellt wird. *O. Stolz*^{219,2)} hat später den Satz dahin verallgemeinert, daß die Reihensumme sogar in einem ganzen Dreieck stetig ist, dessen eine Ecke in dem zu untersuchenden Peripheriepunkt liegt und dessen andere beide Ecken dem Inneren des Konvergenzkreises angehören. Ein neuer

218, 1) Vgl. auch *P. Dienes* a. a. O. 186) und Sur les singularités des fonctions analytiques en dehors du cercle de convergence, Paris C. R. 148 (1909), p. 694—698.

218, 2) Vgl. auch *V. Dienes*, Sur les points critiques logarithmiques, Paris C. R. 148 (1909), p. 1087—1090 und p. 1290; *P. und V. Dienes*, Sur les singularités algébro-logarithmiques, Paris C. R. 149 (1909), p. 972—974; *P. und V. Dienes*, Recherches nouvelles sur les singularités des fonctions analytiques, Ann. Éc. Norm. (3) 28 (1911), p. 389—457.

219) *N. H. Abel*, Théorèmes et problèmes, J. f. Math. 2 (1827), p. 286, Werke I, p. 618.

219, 1) *N. H. Abel*, Recherches sur la série $1 + \frac{m}{1}x + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^3 + \dots$, J. f. Math. 1 (1826), p. 311—339; Werke I, p. 219—250.

219 2) *O. Stolz*, a) Beweis einiger Sätze über Potenzreihen, Zeitschr. Math. Phys. 20 (1875), p. 369—376; b) Nachtrag zur Mitteilung in Bd. XX dieser Ztschr., p. 369: Beweis einiger Sätze über Potenzreihen, Ztschr. Math. Phys. 29 (1884), p. 127—128.

besonders durchsichtiger Beweis rührt von *A. Pringsheim*²²⁰⁾ her. Bei Annäherung an den Peripheriepunkt längs Wegen, welche keinem solchen Dreieck angehören, braucht kein Grenzwert zu existieren.^{220,1)}²²¹⁾

In *Abels* Nachlaß (Werke Bd. II, p. 203) fand sich endlich noch eine Untersuchung, die in gewissen Fällen, nämlich bei eigentlich divergenten Reihen, schließen läßt,²²²⁾ daß bei jener radialen Annäherung an die Stelle eigentlicher Divergenz die Funktion dem Betrage nach über alle Grenzen wächst. Die damit angeregte Sorte von Untersuchungen berühren wir später erneut. Zunächst wollen wir bei den an den Grenzwertsatz anschließenden Forschungen stehen bleiben.

Abel hat durch seinen Grenzwertsatz zum ersten Male einer uneigentlich divergenten (oszillierenden) Reihe eine Summe beigelegt. Es ist eine für das folgende wichtige Fragestellung, inwieweit es möglich ist, den heute nach *Cauchy* benannten Summenbegriff einer Reihe (Summe gleich Limes der Partialsummen) so zu verallgemeinern, daß gewisse im *Cauchyschen* Sinne nicht konvergente Reihen eine Summe erhalten, und daß der neue Summenbegriff eine Verallgemeinerung des *Cauchyschen* wird, d. h. daß im *Cauchyschen* Sinne konvergente Reihen bei Anwendung des neuen Summenbegriffes die gleiche Summe erhalten, die ihnen im *Cauchyschen* Sinne zukam. Bei *Abel* selbst ist diese Frage noch nicht gestellt. Gleichwohl ist sein Grenzwertsatz ein Beitrag zu ihrer Lösung. Die Fragestellung selbst tritt zum ersten Male bei *Frobenius*²²³⁾ auf.

Im Sinne der *Abelschen Summationsmethode* heißt s die Summe der Zahlen

$$a_0, a_1, a_2, \dots,$$

wenn bei radialer Annäherung

$$s = \lim_{\varepsilon \rightarrow 1} \sum_0^{\infty} a_n \varepsilon^n$$

gilt. Damit das einen Sinn hat, muß also die Folge der a_n so beschaffen sein, daß die angegebene Potenzreihe für $|\varepsilon| < 1$ konvergiert.

220) *A. Pringsheim*, Über zwei *Abelsche* Sätze, die Stetigkeit von Reihensummen betreffend, Münch. Ber. 1897, p. 343—356.

220,1) Wegen eines einfachen Beispielles siehe: *G. H. Hardy* u. *J. E. Littlewood*, a) a. a. O. 224 a), p. 475; Beweis dazu *G. H. Hardy*, a. a. O. 320), p. 150; b) *Abels theorem and its converse*, Proc. Lond. math. Soc. (2) 18 (1918), (p. 205—235) p. 207.

221) Verschiedene Autoren haben die Überlegungen auf gewisse andere Reihentypen verallgemeinert. *Fejér*, Math. Ann. 58; *Bromwich*, Math. Ann. 65; *Hardy*, Math. Ann. 64 und Proc. Lond. math. Soc. (2) 4; *C. N. Moore*, Am. Trans. 8.

222) Vgl. dazu *A. Pringsheim*, Über das Verhalten der Potenzreihen auf dem Konvergenzkreise, Münch. Ber. 30 (1900), p. 37—100.

223) *G. Frobenius*, Über die *Leibnizsche* Reihe, J. f. Math. 89 (1866), p. 262—264.

Der *Abelsche* Grenzwertsatz besagt, daß für konvergente Reihen der *Abelsche* Summenbegriff mit dem *Cauchyschen* koinzidiert.

Ein Spezialfall der *Abelschen* ist die von *Hardy* und *Littlewood*²²⁴⁾ so genannte *Eulersche Summationsmethode*. Sie nennt s die Summe der a_0, a_1, \dots , wenn $\sum a_n z^n$ in $z = 1$ regulär ist und dort den Wert s besitzt.

53. Die Hölderschen und die Cesàroschen Mittel. Das *Abelsche* Problem ruhte lange. Erst im Jahre 1880 hat es durch *Frobenius*²²⁵⁾ eine entschiedene Förderung erfahren. *Frobenius* betrachtet neben dem Grenzwert der Partialsummen (*Cauchyscher* Summenbegriff) den Grenzwert der arithmetischen Mittel der Partialsummen und erklärt durch ihn die Summe einer unendlichen Reihe. Daß sich für den Fall einer konvergenten Reihe der neue Summenbegriff mit dem alten deckt, wird am besten einem *Cauchyschen* Grenzwertsatz entnommen (siehe I A 3 (*Pringsheim*), p. 74 ff.). Hiernach ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_1 + s_2 + \dots + s_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$$

jedesmal dann, wenn der Grenzwert auf der rechten Seite existiert.

*O. Hölder*²²⁵⁾ hat im Jahre 1883 durch Iteration der arithmetischen Mittel die nach ihm benannten Mittel eingeführt. Auch sie sind Verallgemeinerungen des *Cauchyschen* Summenbegriffes, der sich als Mittel nullter Ordnung darstellt, während die arithmetischen Mittel als *Höldersche* Mittel erster Ordnung aufzufassen sind.

*Cesàro*²²⁶⁾ hat zunächst für die Zwecke der Reihenmultiplikation im Jahre 1890 die arithmetischen Mittel in etwas anderer Weise verallgemeinert. Man kann die *Cesàroschen* Mittel so erklären: Man bilde

$$\frac{\sum_0^{\infty} a_n z^n}{(1-z)^{\nu+1}} = \sum_0^{\infty} S_n^{(\nu)} z^n$$

224) *G. H. Hardy* und *J. E. Littlewood*, a) Contributions to the arithmetic theory of series, Proc. of the Lond. math. soc. (2) 11 (1912), (p. 411—478) p. 413 Fußnote; b) Tauberian theorems concerning series of positive terms, Mess. of math. (2) 42 (1913), p. 191—192; a) a. a. O. 220,1) b). Die ältere Literatur gebraucht die Benennung *Eulersche Summationsmethode* für das hier als *Abelsche* Methode bezeichnete Verfahren. Vgl. auch: *H. Burkhardt*, Über den Gebrauch divergenter Reihen in der Zeit von 1750—1860, Math. Ann. 70 (1911), p. 169—206

225) *O. Hölder*, Grenzwerte von Reihen an der Konvergenzgrenze, Math. Ann. 20 (1882), p. 535—549.

226) *E. Cesàro*, Sur la multiplication des séries, Bull. des sc. math. (2) 14 (1890), p. 114—120.

und setze

$$\frac{1}{(1-z)^{\nu+1}} = \sum A_n^{(\nu)} z^n.$$

Dann ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^{(\nu)}}{A_n^{(\nu)}} = s$$

die Erklärung der *Cesàroschen* Mittel ν^{ter} Ordnung, falls dieser Grenzwert existiert. (Man sieht, wie für $\nu = 0$ der *Cauchysche*, für $\nu = 1$ der *Frobeniussche* Summenbegriff herauskommt.) *Cesàro* hatte zunächst wohl nur ganze positive ν im Auge. Bewußt haben nicht ganze und auch negative $\nu > -1$ erst *Hadamard*¹⁸⁶⁾, *Knopp*²²⁷⁾ und *Chapman*²²⁸⁾ herangezogen. Da stets

$$A_n^{(\nu)} \sim \frac{n^\nu}{\Gamma(\nu+1)}$$

ist, so ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^{(\nu)} \Gamma(\nu+1)}{n^\nu}$$

eine oft verwendete, mit der vorhin angegebenen gleichwertige Erklärung der *Cesàroschen* Mittel ν^{ter} Ordnung. Daß für konvergente Reihen die *Cesàroschen* Mittel genau die *Cauchysche* Summe liefern, folgt aus einem von *Cesàro*²²⁹⁾ herrührenden Grenzwertsatz, den wir gleich in der etwas allgemeineren von *E. Lasker*²³⁰⁾ und *A. Pringsheim*²³¹⁾ gegebenen Fassung anführen: $\sum b_n z^n$ habe lauter positive Koeffizienten und besitze den Konvergenzradius 1. Außerdem sei $\sum b_n$ divergent. Dann gilt für $f(z) = \sum a_n z^n$ stets dann bei radialer Annäherung

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{\sum a_n z^n}{\sum b_n z^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n},$$

wenn der Grenzwert rechts existiert. Daher ist namentlich²³²⁾

$$\lim_{z \rightarrow 1} f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\sum S_n^{(\nu)} z^n}{\sum A_n^{(\nu)} z^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^{(\nu)}}{A_n^{(\nu)}}.$$

Stets zieht die *Cesàrosche* Summierbarkeit zu irgendeiner Ordnung die Summierbarkeit zu jeder höheren Ordnung und zur gleichen Summe nach sich. Die *Abelsche* Summierbarkeit ergibt sich als Folge der *Cesàroschen*. Diese Verallgemeinerung des *Abelschen* Grenzwertsatzes läßt sich auch für die *Stolz*sche Verallgemeinerung desselben erreichen, welcher die Stetigkeit in einem Dreieck behauptet. Dazu ist nur eine

227) *K. Knopp*, Grenzwerte von Reihen bei Annäherung an die Konvergenzgrenze, Diss. Berlin 1907.

228) *S. Chapman*, On non integral order of summability of series and integrals, Proc. Lond. math. Soc. (2) 9 (1910), p. 369–409. *Cesàrosche* Mittel unendlich hoher Ordnung siehe bei *G. H. Hardy* u. *S. Chapman*, Quart. J. of math. 42 (1911), p. 181–215.

229) *E. Cesàro*, Démonstration d'un théorème de *M. Appell*, Mathesis (2) 3 (1893), p. 241–243.

entsprechende von *E. Lasker*²³⁰⁾ und *A. Pringsheim*²³¹⁾ angegebene Verallgemeinerung des *Cesàroschen* Grenzwertsatzes nötig.

Die Fragen nach notwendigen sowohl wie nach hinreichenden Bedingungen für *Cesàrosche* Summierbarkeit sind noch wenig geklärt. Ziemlich an der Oberfläche liegt die Tatsache, daß für eine (C, k) , d. h. mit *Cesàroschen* Mitteln k^{ter} Ordnung summierbare Reihe $a_n = O(n^k)$ sein muß.²²⁶⁾ Etwas tiefer liegt die notwendige Bedingung²³³⁾ $a_n = o(n^k)$.^{211, 1)} Dahin gehört ferner ein Satz von *H. Bohr*²³⁴⁾ und *M. Riesz*²³⁵⁾, wonach $\sum \frac{a_n}{n}$ von $(k-1)^{\text{ter}}$ Ordnung summierbar ist, stets dann, wenn Σa_n von k^{ter} Ordnung summierbar ist. *Chapman*²²⁸⁾ hat dies dahin erweitert, daß die Annahme ausreicht, daß die Mittel k^{ter} Ordnung von Σa_n beschränkt seien. Hierher gehören gewisse Resultate über die Summabilitätsgeraden *Dirichletscher* Reihen. *Hardy*²³⁶⁾ hat seine Verallgemeinerung des *Mac-Laurinschen* Konvergenzkriteriums zu einem Summabilitätskriterium erweitert.

Dahin gehören endlich Sätze, die aus der Summierbarkeit von Σa_n auf die von $\Sigma a_n f_n(z)$ schließen lassen, wenn die $f_n(z)$ gewisse Eigenschaften haben.²²¹⁾

*Littlewood*²³⁷⁾ und *H. Bohr*²³⁸⁾ gaben Beispiele von Reihen, für welche die Mittel nicht einer einzigen Ordnung existieren, und die gleichwohl nicht eigentlich divergieren.

230) *E. Lasker*, Über Reihen an der Konvergenzgrenze, Phil. Trans. of London 196 (1901), p. 431—477.

231) *A. Pringsheim*, Über den Divergenzcharakter gewisser Potenzreihen an der Konvergenzgrenze, Acta math. 28 (1904), p. 1—30.

232) Die *Abelsche* Summierbarkeit ist also eine Folge der *Cesàroschen*. Dies ergibt sich auch schon aus einer viel älteren Untersuchung von *Appell*, Sur certaines séries ordonnées par rapport aux puissances d'une variable. Paris C. R. 87 (1878), p. 689—692. Es steht auch schon als Folge viel allgemeinerer Sätze bei *Hadarnard*. (Die *Appellschen* Sätze hinwiederum ergeben sich als unmittelbare Folgerung aus dem *Cesàroschen* Grenzwertsatz.) *Knopp* hat zuerst die beherrschende Bedeutung des *Cesàroschen* Grenzwertsatzes hervorgehoben.

233) *T. J. Bromwich*, Introduction to the theory of infinite series, London 1908, § 128; *S. Chapman*, a. a. O. 228), p. 379.

234) *H. Bohr*, Über die Summabilität *Dirichletscher* Reihen, Gött. Nachr. 1909, p. 217—262.

235) *M. Riesz*, Sur les séries de *Dirichlet*, Paris C. R. 148 (1909), p. 1658—1660.

236) *G. H. Hardy*, Theorems connected with *Mac-Laurin's* test for the convergence of series, Proc. of the Lond. math. soc. (2) 9 (1910), p. 126—144.

237) *J. E. Littlewood*, The converse of *Abel's* theorem on power series, Proc. Lond. math. Soc. (2) 9 (1910), p. 434—448; vgl. auch *E. Landau*, Über einen Satz des Herrn *Littlewood*, Rend. di Palermo 35 (1913), p. 265—276.

238) *H. Bohr* bei *E. Landau*, a. a. O. 186), p. 38.

Die *Cesàroschen* und die *Hölderschen* Mittel besitzen die gleiche Tragweite, d. h. wenn die *Cesàroschen* Mittel k^{ter} Ordnung existieren und die Summe s liefern, so existieren auch die *Hölderschen* Mittel k^{ter} Ordnung und liefern die gleiche Summe und umgekehrt. Das ist der Inhalt des nach seinen Entdeckern benannten *Knopp-Schneeschen* Satzes²³⁹⁾. Den kürzesten sachgemähesten Beweis gab *J. Schur*²⁴⁰⁾ 241).

54. Weitere Summationsmethoden. Namentlich für die Zwecke der *Dirichletschen* Reihen hat *M. Riesz*²⁴²⁾ eine neue Summationsmethode eingeführt. Er setzt

$$C_w^{(\nu)} = \sum_0^{(\omega)} a_m \left(1 - \frac{\lambda(m)}{\lambda(\omega)}\right)^\nu.$$

Wenn dann $\lim_{\omega \rightarrow \infty} C_w^{(\nu)} = s$ ist, so heißt s die Summe der Reihe $\sum a_n$. Man sagt, sie sei $(R\lambda\nu)$ summierbar. Dabei bedeutet $\lambda(\omega)$ eine positive mit ω monoton über alle Grenzen wachsende Funktion. ν ist die Ordnung der Summierbarkeit. Für $\lambda(\omega) = \omega$ stimmen die *Rieszschen* Mittel ν^{ter} Ordnung mit den *Cesàroschen* Mitteln ν^{ter} Ordnung überein. Es ist für die Methode wesentlich, ω durch beliebige nicht nur durch ganzzahlige Werte gegen unendlich streben zu lassen.

Die *Cesàroschen*, die *Hölderschen* und die *Rieszschen* Mittel sind Spezialfälle der allgemeinen linearen Mittelbildungen. Auch bei der *Mittag-Lefflerschen* Theorie der analytischen Fortsetzung lernten wir solche linearen Mittel kennen.²⁴³⁾ Ich hebe noch die *Borelschen* Mittel

239) *K. Knopp* a. a. O. 227); *W. Schnee*, Die Identität der *Hölderschen* und *Cesàroschen* Grenzwerte, *Math. Ann.* 67 (1909), p. 110—125.

240) *J. Schur*, Über die Äquivalenz der *Hölderschen* und *Cesàroschen* Mittelwerte, *Math. Ann.* 74 (1913), p. 447—458. Dazu vgl. *K. Knopp*, Bemerkung zu der vorstehenden Arbeit des Herrn *J. Schur*, *Math. Ann.* 74 (1913), p. 459—461. Ferner vgl. dazu *E. Landau* a. a. O. 186); *A. Pringsheim*, Über die Äquivalenz der sogenannten *Hölderschen* und *Cesàroschen* Grenzwerte und die Verallgemeinerung eines beim Beweise benutzten Grenzwertsatzes, *Münch. Ber.* 1916, p. 209—224.

241) Weitere Beweise gaben *W. B. Ford*, On the relation between the sum formula of *Hölder* and *Cesàro*, *Amer. J.* 32 (1910), p. 315—326; *B. Ottolenghi*, Coesistenza é identità dei limiti di *Hölder* é di *Cesàro*, *Padua* 1911; *G. Faber*, Über die *Hölderschen* und *Cesàroschen* Grenzwerte, *Münch. Ber.* 1913, p. 519—531.

242) *M. Riesz*, a) Sur la sommation des séries de *Dirichlet*, *Paris C. R.* 149 (1909), p. 18—21; b) Une méthode de sommation équivalente à la méthode des moyennes arithmétiques, *Paris C. R.* 152 (1911), p. 1651—1654.

243) *O. Toeplitz*, Über allgemeine lineare Mittelbildungen, *Prace mat. fis.* 22 (1911), p. 113—119, hat sich mit der allgemeinen Frage der Äquivalenz linearer Mittel befaßt. *T. Kojima*, On generalized *Toeplitz* theorems on limit and their applications, *Tôhoku M. J.* 12 (1917), p. 291—326. Zur ganzen Fragestellung: *N. E. Nörlund*, Sur une application des fonctions permutables, *Lunds Univ.*

hervor, weil sie viel behandelt worden sind.²⁴⁴⁾ Bezeichnet man mit s_n die n^{te} Partialsumme der a_n , so ist die *Borelsche* Summe durch den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sum \varepsilon_n \frac{x^n}{n!}}{\sum \frac{x^n}{n!}} = s \quad (x > 0)$$

erklärt. Aus einem unmittelbaren Analogon zu dem p. 478 erwähnten *Cesàroschen* Satz ergibt sich sofort, daß auch diese Mittel zu einer Verallgemeinerung des *Cauchyschen* Summenbegriffes führen. Der in Betracht kommende Grenzwertsatz lautet: Wenn $\sum a_n \varepsilon^n$ und $\sum b_n \varepsilon^n$ zwei ganze Funktionen sind, und wenn die b_n positiv sind, so gilt bei Annäherung durch positive x stets:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sum a_n x^n}{\sum b_n x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n},$$

wenn der zweite Grenzwert existiert.^{244,1)}

55. Beziehungen zwischen den verschiedenen Summationsmethoden. Im *Abelschen* Grenzwertsatz sowie seinen Verallgemeinerungen, ferner im *Knopp-Schneeschen* Satz haben wir schon eine Reihe von Beziehungen zwischen den verschiedenen Mittelbildungen kennen gelernt. Das allerdings noch lange nicht abgeschlossene Studium dieser Beziehungen hat zu einer Reihe von Sätzen geführt, die wir jetzt darlegen wollen.

Cesàro \rightarrow *Cesàro*. Es handelt sich um die Beziehungen zwischen der Konvergenz der *Cesàroschen* Mittel verschiedener Ordnungen. Mit den Mitteln k^{ter} Ordnung konvergieren, wie schon erwähnt, alle Mittel höherer Ordnung zur gleichen Summe. Natürlich kann man nicht umgekehrt aus der Konvergenz der Mittel k^{ter} Ordnung auf die Konvergenz der Mittel niedrigerer Ordnung schließen, solange man nicht besondere Voraussetzungen über die Reihenglieder hinzunimmt. Man kann nämlich zu jeder Ordnung Reihen angeben, die genau zu dieser Ordnung und zu keiner niedrigeren summierbar sind.²⁴⁵⁾

*Kronecker*²⁴⁶⁾ gab schon die notwendigen und hinreichenden Be-

Årsskrift. Avd. 2, Bd. 16, Nr. 3 (1919); *O. Perron*, Beitrag zur Theorie der divergenten Reihen, Math. Ztschr. 6 (1920), p. 286—310.

244) *E. Borel*, a. a. O. 152), 169 a), 169 b), 58 a), 169 e). Die mangelhaften Beweise *Borels* hat *G. H. Hardy*¹⁷⁵⁾ in Ordnung gebracht.

244,1) Für Erweiterungen dieses Satzes vgl. *Dienes*, a. a. O. 177); *G. Valiron*, a) a. a. O. 120); b) Remarques sur la sommation des séries divergentes par les méthodes de *M. Borel*, Rend. di Palermo 42 (1917), p. 267—284.

245) Für ganzzahlige Ordnung schon bei *Cesàro*²²⁶⁾.

246) *L. Kronecker*, Quelques remarques sur la détermination des valeurs moyennes, Paris C. R. 103 (1876), p. 980—987.

dingungen für die Konvergenz einer nach arithmetischen Mitteln summierbaren Reihe Σa_n an. Das ist dann und nur dann der Fall, wenn die arithmetischen Mittel von na_n gegen Null streben. Man kann dies sofort dahin erweitern (ein Beitrag dazu bei *Knopp*²⁴⁷), daß aus der Konvergenz der Mittel k^{ter} Ordnung die der Mittel nullter Ordnung, also die Konvergenz im *Cauchyschen* Sinne dann und nur dann folgt, wenn die Mittel erster Ordnung von na_n gegen Null streben. Und dies läßt sich dahin erweitern, daß aus der (C, k) die (C, r) mit $r < k$ dann und nur dann folgt, wenn die $(C, r + 1)$ von na_n gegen Null streben. Insbesondere folgt aus $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$ und der Summierbarkeit $(C, 1)$ die Konvergenz von Σa_n . *Hardy*²⁴⁸) zeigte z. B. für diesen speziellen Fall, daß schon $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ statt $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$ ausreicht, und *Landau*²⁴⁹) hat dies dahin erweitert, daß sogar die einseitige Beschränktheit von na_n bei reellen a_n ausreicht. Erwähnung verdient noch ein Satz von *Hardy* und *Littlewood*²²⁴), daß aus $(C, 1)$ und

$$n \frac{a_n - a_{n-1}}{a_n} = O(1)$$

stets $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$ und $(C, 0)$ von Σa_n folgt.

Cesàro \rightarrow *Abel*. Der *Abelsche* Grenzwertsatz in seiner Verallgemeinerung auf *Cesàrosche* Mittel schließt aus der Konvergenz der Mittel k^{ter} Ordnung auf die Existenz und die Äquivalenz der *Abelschen* Mittel. Gerade auf dieser schon oben behandelten Tatsache beruht die funktionentheoretische Bedeutung der *Cesàroschen* Mittel, als ein Verfahren zur Berechnung der *Abelschen* Grenzwerte, also zur Untersuchung des Verhaltens der Funktion bei Annäherung an eine Stelle auf der Peripherie des Konvergenzkreises.

Abel \rightarrow *Cesàro*. Will man umgekehrt aus der Existenz der *Abelschen* Mittel auf die der *Cesàroschen* schließen, so kommt man wieder nicht ohne besondere weitere Voraussetzungen über die Reihenglieder aus. *Littlewood*²³⁷) hat ohne Beweis ein Beispiel einer Reihe gegeben, die nach *Abel* summierbar ist, die aber nach *Cesàro* zu keiner Ordnung summierbar ist. Insbesondere kann man also nicht ohne besondere Annahmen über die a_n auf die Konvergenz von Σa_n schließen (z. B. $\Sigma(-1)^n x^{2n}$

247) *K. Knopp*, Eine notwendige und hinreichende Konvergenzbedingung, Rend. di Palermo 25 (1907), p. 237—252.

248) *G. H. Hardy*, Theorems relating to the summability and convergence of slowly oscillating series, Proc. Lond. math. Soc. (2) 8 (1909), p. 301—320.

249) *E. Landau*, Über die Bedeutung einiger neuerer Grenzwertsätze der Herren *Hardy* und *Axer*, Prace mat. fis. 21 (1910), p. 97—177.

bei $x \rightarrow 1$). Nicht einmal die Annahme $a_n \rightarrow 0$ reicht dazu aus.²⁵⁰⁾ *Littlewoods* Beispiel würde zeigen, daß aus $a_n \rightarrow 0$ nicht einmal die Konvergenz eines (C, r) folgt. Wohl aber zieht nach *Pringsheim*²⁵²⁾ $a_n \geq 0$ für alle n und $\Sigma a_n z^n \rightarrow a$ für $z \rightarrow 1$ nach sich, daß $\Sigma a_n = a$ im *Cauchyschen* Sinn. Tiefer liegt der *Satz von Tauber*²⁵¹⁾. Aus $\Sigma a_n z^n \rightarrow a$ für $z \rightarrow 1$ (radial) und $\frac{a_1 + 2a_2 + \dots + na_n}{n+1} \rightarrow 0 \dots$ für $n \rightarrow \infty$, also insbesondere z. B. aus $na_n \rightarrow 0$ folgt die Konvergenz $\Sigma a_n = a$ im *Cauchyschen* Sinn. (Man beachte die Ähnlichkeit dieses Satzes mit dem von *Kronecker*, den wir p. 481 erwähnten. In beiden ist eine Hauptbedingung die, daß das arithmetische Mittel der na_n gegen Null geht.) *Landau*²⁵³⁾ hat einen analogen Satz für nichtradiale geradlinige Annäherung, *Hardy* und *Littlewood*²⁵⁴⁾ sogar für Annäherung auf gewissen den Konvergenzkreis berührenden Kurven angegeben. Angeregt durch gewisse bei *Cesàro* \rightarrow *Cesàro* angeführte Ergebnisse gelangte *Littlewood*²⁵⁷⁾ zunächst zu der Erkenntnis, daß man beim *Tauberschen* Satz schon mit $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ auskommt. *Hardy* und *Littlewood*²⁵³⁾ gelangten sogar zum Nachweis der Gültigkeit des *Tauberschen* Satzes bei einseitiger Beschränktheit von na_n und reellen a_n . Endlich sind *Hardy* und *Littlewood*^{253, b)} zu dem folgenden diese Entwicklungen abschließenden Satz gelangt: Wenn $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ ist, dann ist die notwendige und hinreichende Bedingung für die *Cauchysche* Konvergenz von $\Sigma a_n = A$ die, daß $\Phi(z) = \frac{1}{1-z} \sum \frac{a_n}{n+1} (1-z^{n+1}) \rightarrow A$ wenn $z \rightarrow 0$ auf irgendeinem Weg, oder auch die, daß dies längs allen Wegen zutrifft. Wenn $\Sigma a_n z^n \rightarrow A$, so gilt auch $\Phi(z) \rightarrow A$, aber nicht umgekehrt.

250) *A. Pringsheim*, Über die Divergenz gewisser Potenzreihen an der Konvergenzgrenze, Münch. Ber. 31 (1901), p. 505—524; *L. Fejér*, Über gewisse Potenzreihen an der Konvergenzgrenze, Münch. Ber. 1910, Nr. 3, p. 1—17; *J. E. Littlewood*, a. a. O. 237; *N. Lusin*, a) Über eine Potenzreihe, Rend. di Palermo 32 (1911), p. 386—390; b) Über einen Fall der *Taylor'schen* Reihen, Mosk. math. Samml. 23 (1912), p. 295—302. Die beiden Abhandlungen stimmen überein. Das *Lusinsche* Beispiel zeigt sogar, daß eine Reihe $\Sigma a_n z^n$ mit $a_n \rightarrow 0$ in jedem Punkt des Einheitskreises divergieren kann.

251) *A. Tauber*, Ein Satz aus der Theorie der unendlichen Reihen, Monatsh. Math. Phys. 8 (1897), p. 273—277; man vgl. auch *A. Pringsheim*²²³⁾.

252) *E. Landau*, Über die Konvergenz von einigen Klassen von unendlichen Reihen am Rande des Konvergenzgebietes, Monatsh. Math. Phys. 18 (1907), p. 8—28.

253) *G. H. Hardy* u. *J. E. Littlewood*, a) *Tauberian* theorems concerning power series and *Dirichlet's* series whose coefficients are positive, Proc. Lond. math. Soc. (2) 13 (1914), p. 174—191; b) a. a. O. 220, 1) b).

Man kann auch unter Zuhilfenahme der Koeffizientendifferenzen *Abel*→*Cesàro*-Sätze angeben. So kann man nach *Hardy* und *Littlewood* in dem letzten unter *Cesàro*→*Cesàro* angegebenen Satze die vorausgesetzte $(C, 1)$ durch die Summierbarkeit nach *Abel* ersetzen.

In noch anderer Form gibt *Fejér*²⁵⁴⁾ Bedingungen für *Abel*→*Cesàro*. Sein Ergebnis lautet in einer von *Hardy-Littlewood*^{254, 1b)} gegebenen Verallgemeinerung¹⁸⁶⁾: Aus der Konvergenz von $\sum n^p |a_n|^{p+1}$ ($p > 0$) in Verbindung mit *Abelscher* Summierbarkeit $\lim_{x \rightarrow 1} \sum a_n x^n = a$ folgt die Konvergenz $\sum a_n = a$.

Die Sätze dieses Abschnittes sind im Grunde bisher lauter Sätze *Abel*→*Cauchy*. Von Sätzen *Abel*→*Cesàro* bei höherer als der nullten Ordnung ist bisher nur wenig bekannt. Der folgende liegt schon ziemlich tief, obwohl er nur das Analogon zu dem einfachen oben gegebenen *Pringsheimschen* Satze ist (p. 483). Dieser Satz kann so ausgesprochen werden: Wenn die Partialsummen der reellen a_n einseitig beschränkt sind, und wenn $\sum a_n$ nach *Abelschen* Mitteln summierbar ist und dabei die Summe a besitzt, d. h. wenn $\lim_{x \rightarrow 1} \sum a_n x^n = a$ ist, so ist

die Reihe auch nach arithmetischen Mitteln erster Ordnung zur gleichen Summe summierbar.^{254, 1)} *Littlewood*²³⁷⁾ zeigte: Sind die (C, r) von $\sum a_n$ beschränkt und existiert $\lim_{x \rightarrow 1} \sum a_n x^n$, so ist $\sum a_n$ mit $(C, r + 1)$ summierbar.

Weiter weiß man noch, daß nicht einmal aus $a_n \rightarrow 0$ in Verbindung mit *Abelscher* Summierbarkeit die *Cesàrosche* Summierbarkeit folgt. (*Littlewood*²³⁷⁾.)

Euler→*Cesàro*: Hier wünscht man also aus der Regularität der Funktion $\sum a_n z^n$ bei $z = 1$ auf die Summierbarkeit von $\sum a_n$ zu schließen. Daß dazu noch weitere Voraussetzungen über die a_n nötig sind oder über den Bereich, in dem die Funktion regulär ist, ist allgemein bekannt. Beispiele liefern ja schon die Ableitungen von $\sum (-1)^n z^n$. Weiter gibt es Potenzreihen, die in $z = 1$ regulär sind, deren Koeffizienten-

254) L. Fejér, a) La convergence sur son cercle de convergence d'une série de puissances effectuant une représentation conforme du cercle sur le plan simple, Paris C. R. 156 (1913), p. 46—49; b) Über die Konvergenz der Potenzreihe an der Konvergenzgrenze in Fällen der konformen Abbildung auf die schlichte Ebene, Festschrift für H. A. Schwarz (1914), p. 42—53.

254, 1) Hardy u. Littlewood, a) a. a. O. 253) a); b) Some theorems concerning Dirichlet series, Mess. of math. (2) 43 (1914), p. 134—147; vgl. auch Landau, a. a. O. 186). Der im Text angegebene Satz erscheint bei Hardy-Littlewood in anderer Fassung. Dort handelt es sich um die tiefe Erkenntnis, daß man die *Lasker-Pringsheimschen* Sätze von p. 478 bzw. p. 488 über das Wachstum der Funktionen umkehren kann, wenn die $a_n \geq 0$ sind.

summe dort aber zu keiner Ordnung summierbar ist. So ist z. B. nach p. 467 $\Sigma(-1)^r g(v)z^r$ bei $z = 1$ regulär, wenn $g(v)$ vom Minimaltypus der Ordnung Eins ist. Natürlich reichen hier alle die Voraussetzungen aus, die es erlaubten, aus der Existenz der *Abelschen Mittel* auf die *Cesàrosche* Summierbarkeit zu schließen. Aber es ist zu erwarten, daß man angesichts der in der *Eulerschen* Summierbarkeit liegenden gegenüber der bloßen *Abelschen* Summierbarkeit verstärkten Voraussetzung mit weniger Zusatzannahmen über die Koeffizienten auskommen kann. Das ist in der Tat der Fall. Der wichtigste hierher gehörige Satz ist der von *Fatou*. Er entspricht genau dem Satz von *Tauber*. *Fatou*²⁵⁵⁾ hat entdeckt, daß für eine bei $z = 1$ reguläre Reihe $\Sigma a_n z^n$ mit $a_n \rightarrow 0$ die Σa_n konvergiert. Dies ist eine Verallgemeinerung des weniger scharfen *Hadamardschen* Satzes¹⁸⁶⁾, der $a_n = o(n^\varepsilon)$ für ein $\varepsilon < 0$ statt $a_n \rightarrow 0$ verlangt. Den schwierigen *Fatouschen* Beweis hat *M. Riesz*²⁵⁵⁾ durch zwei weitere einfachere ersetzt. Namentlich der zweite Beweis ist sehr kurz. *M. Riesz* hat auch einige weitere *Hadamardsche* Sätze verschärft und gefunden, daß aus $a_n = o(n^r)$ die Konvergenz der Mittel r^{ter} Ordnung folgt²⁵⁶⁾. Schon *Hadamard* hat gesehen, daß es bei diesen Koeffizientenvoraussetzungen nur einer geringeren Annahme als der Regularität der Funktion bedarf, um die Summierbarkeit erschließen zu können. An allen Punkten negativer Ordnung bleibt nämlich das Resultat richtig. (Vgl. p. 490.)

In anderer Richtung liegt ein nicht minder wichtiger Satz von *M. Riesz*¹⁵⁷⁾. In einem den Konvergenzkreis enthaltenden Kreisbogen-dreieck, das nur eine Ecke mit der Konvergenzkreisperipherie gemeinsam hat, und dessen Rand denselben unter von Null verschiedenen Winkeln trifft, sei $f(z)$ analytisch und einschließlich des Randes stetig. Dann konvergiert die $f(z)$ darstellende Potenzreihe gleichmäßig auf dem ganzen Konvergenzkreis. *O. Szász* hat bemerkt, daß das gleiche

255) *M. Riesz*, a) Über einen Satz des Herr *Fatou*, J. f. Math. 140 (1911), p. 89—94; b) Neuer Beweis des *Fatouschen* Satzes, Gött. Nachr. 1916, p. 62—65; c) Sätze über Potenzreihen, Arkiv for mat. astr. och fys. 11 (1916), Nr. 12. Zum *Fatouschen* Satz vgl. auch: *W. H. Young*, On restricted *Fourier* series and the convergence of power series, Proc. London math. Soc. (2) 17 (1919), p. 353—366.

256) Ein Analogon dieses Satzes fehlt bei den *Abelschen* Mitteln. Wohl aber gibt *Dienes*, a. a. O. 177) (vgl. auch Paris C. R. 153 (1911), p. 802—805) an, daß statt der Regularität im Punkte $z = 1$ schon die Stetigkeit der Funktion in dem durch $z = 1$ erweiterten Kreise genüge, eine Annahme also, die etwas mehr besagt wie *Abelsche* Summierbarkeit. Allerdings könnte der Satz nur für $r = 0$ gelten. Denn nach *Fejér*²⁵⁰⁾ gibt es Reihen mit $a_n \rightarrow 0$, welche im abgeschlossenen Einheitskreise stetig sind, und die doch in einer überall dichten Menge von Peripheriepunkten divergieren.

für ein Kreisbogen- $3n$ -Eck gilt, das in n Ecken die Peripherie trifft. Ein Teil des *Riesz*schen Resultates ist in einem älteren Satze von *Pringsheim*²⁵⁷⁾ enthalten. Dieser läßt z. B. $z = 1$ die einzige Singularität von $f(z)$ in $|z| < R$ mit $R > 1$ sein. Ist $|f(z)|$ außerdem z. B. beschränkt in diesem Bereich, so konvergiert $\mathfrak{P}(z)$ auf $|z| = 1$ mit eventueller Ausnahme von $z = 1$ selbst.

Cesàro→*Euler*: Der Lückensatz p. 461/62 lehrt, daß etwa hier vorhandene Sätze von ganz anderer Art sein müßten als die bisher besprochenen.

Bevor wir weitergehen, sei indessen noch auf Untersuchungen hingewiesen, die mit dem bisher Besprochenen in gewissem Maß verwandt sind. An Stelle von Stetigkeit oder Regularität der Randfunktion treten dort gewisse allgemeinere Eigenschaften derselben. Ferner wird nicht nur die Frage der Konvergenz, sondern auch die der absoluten Konvergenz am Rande betrachtet. Es zeigt sich z. B., daß eine Potenzreihe an der Konvergenzgrenze ausnahmslos und gleichmäßig konvergieren kann, ohne doch absolut zu konvergieren.^{222) 320)} Doch möchte ich diesen Untersuchungen keine nähere Darlegung widmen, da sie eher der Reihenlehre als der Funktionentheorie angehören.

Cesàro→*Borel*: Zwar kann man, wie schon oben bemerkt, aus der Konvergenz einer Reihe auf ihre Summierbarkeit im *Borel*schen Sinne schließen. Aber die Konvergenz der *Cesàro*schen Mittel einer höheren Ordnung erlaubt den gleichen Schluß nur unter gewissen weiteren Annahmen über die Koeffizienten.²⁵⁸⁾

Borel→*Cesàro*: Hier gelten analoge Sätze wie bei *Abel*→*Cesàro*. *Hardy* und *Littlewood*²⁵⁸⁾ haben diesen Fragen eine ausführliche Untersuchung gewidmet. Ohne besondere Annahmen über die Koeffizienten lassen sich keine Schlüsse ziehen. Eine solche Bedingung ist etwa $a_n = O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$. Anders wie bei *Abel-Cesàro* gelten hier auch analoge

Sätze für Mittel höherer Ordnung. Aus $S_n^{(k-1)} = o\left(n^{k-\frac{1}{2}}\right)$ folgt die Summierbarkeit k^{ter} Ordnung für eine nach *Borel* summierbare Σa_n .

257) *A. Pringsheim*, Über Potenzreihen auf dem Konvergenzkreis und *Fouriersche* Reihen, Münch. Ber. 1895, (p. 337—394), p. 346.

258) *G. H. Hardy*, a) a. a. O. 173); b) Further researches in the theory of divergent series and integrals, *Cambr. phil. trans.* 21 (1908), p. 1—48; c) a. a. O. 248); *Bromwich*, a. a. O. 233), p. 319; *G. H. Hardy* und *J. E. Littlewood*, a) The relation between *Borel*s and *Cesàro*s methods of summation, *Proc. Lond. math. Soc.* (2) 11 (1912), p. 1—16; b) Theorems concerning the summability of series by *Borel*'s exponential method, *Rend. di Palermo* 41 (1916), p. 36—53. Vgl. auch *M. Fujiwara*, Ein Satz über die *Borel*sche Summation, *Tôh. Math. J.* 17 (1920), p. 339—343. *G. Doetsch*, Eine neue Verallgemeinerung der *Borel*schen Summabilitätstheorie der divergenten Reihen, *Diss. Göttingen* 1920.

Auch Koeffizientendifferenzenkriterien sind von *Hardy* und *Littlewood*²⁵⁴⁾ angegeben worden.

Euler→*Borel*: Es wurde schon anlässlich der analytischen Fortsetzung p. 454 festgestellt, daß die *Borelschen* Mittel in allen regulären Peripheriepunkten konvergieren. Statt der Regularität genügen auch gewisse Stetigkeitsannahmen, um die Konvergenz der *Borelschen* Mittel zu sichern.²⁵⁹⁾

Borel→*Abel*: Aus der *Borelschen* Summierbarkeit folgt stets die *Abelsche* zur gleichen Summe.²⁶⁰⁾

Abel→*Borel*: Hier sind keinerlei Sätze bekannt.

Wegen der Beziehung der *Riesz*schen Mittel zu den hier behandelten vergleiche man den Abschnitt über *Dirichletsche* Reihen.

56. Das Wachstum der Funktion bei Annäherung der Variablen an die Konvergenzgrenze. Wir knüpfen nun wieder an einen schon p. 476 erwähnten Satz von *Abel* an, wonach stets dann $\mathfrak{P}(z) = \sum a_n z^n$ bei radialer Annäherung an $z = 1$ über alle Grenzen wächst, wenn die Reihe $\sum a_n$ nur Glieder mit einerlei Vorzeichen hat und divergiert. Hieran schließen sich eine Menge von Arbeiten an, die es sich zur Aufgabe machen, aus der Art der Divergenz von $\sum a_n$ auf die Art des Wachstums von $\mathfrak{P}(z)$ für $z \rightarrow 1$ zu schließen. Daß ein solcher Zusammenhang besteht, hat *Appell*²³²⁾ entdeckt. Seine Resultate wurden dann namentlich durch *Pringsheim*²³¹⁾ auf allgemeinere Reihen und auf nicht nur radiale Annäherung erweitert. Dabei hat dann wieder ein in seiner einfachsten Form auf *Cesàro*²²⁹⁾ zurückgehender Satz sich den an *Appell* anschließenden Methoden überlegen gezeigt. Diese letzteren benutzen gewisse Integralabschätzungen und wurden von *Le Roy*¹⁶⁴⁾ bei allgemeineren Reihentypen verwendet.

Schon die vorhin angeführten Sätze *Cesàro*→*Abel* lassen sich in der jetzt von uns gewollten Weise interpretieren. Aus der p. 478 gegebenen Anwendung des *Cesàroschen* Grenzwertsatzes und der zweiten Definition der *Cesàroschen* Mittel schließt man nämlich leicht auf einen allgemeinen zuerst von *Appell* angegebenen Satz, und zwar gleich in der allgemeinen Fassung, die ihm auf *Appells* Anregung *Soudée*²⁶¹⁾ und unabhängig davon *Cesàro*²²⁹⁾ gegeben haben. Das Resultat ist dieses:

259) *P. Dienes*, a. a. O. 177).

260) *E. Phragmén*, a. a. O. 176); *G. H. Hardy*, a) a. a. O. 173); b) The uniform convergence of *Borels* integral, *Mess. of math.* 40 (1911), p. 161—165; *E. Landau*, Auszug aus einem Briefe des Herrn *Landau* an den Herausgeber, *Acta math.* 42 (1911), p. 95—98.

261) *Soudée*, Solution de la question 1624, *Nouv. Ann.* (3) 2 (1893), p. 4—6.

Es sei $k > 0$ und $r \geq -1$. Ferner sei

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^{(r)}}{n^{k+r}} = g.$$

Dann ist

$$\lim_{z \rightarrow 1} \left\{ (1-z)^k \cdot \sum_0^{\infty} a_n z^n \right\} = g \cdot \Gamma(k+r+1)$$

bei radialer Annäherung. Das hier gegebene Resultat ist schon etwas allgemeiner als das von den genannten Autoren zunächst gewonnene Ergebnis. Denn diese ließen nur Reihen mit positiven Gliedern zu.^{261,1)} Wir haben uns ja auch schon auf die von *Pringsheim* und *Lasker* herrührende Verallgemeinerung des *Cesàroschen* Satzes gestützt. Doch haben diese Forscher den Satz auch auf nicht radiale Annäherung im *Stolz*schen Dreieck erweitert. Sie finden:

Falls die Reihe $\sum a_n z^n$ in einer Punktmenge, welche $z = 1$ als Häufungspunkt besitzt, gleichmäßig divergiert, d. h. falls es eine Zahl $\alpha > 0$ gibt, so daß in dieser Punktmenge

$$\frac{|\sum a_n z^n|}{\sum |a_n z^n|} > \alpha$$

bleibt, so folgt aus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = g$$

daß

$$\frac{\sum b_n z^n}{\sum a_n z^n} \rightarrow g$$

strebt, falls z durch jene Punktmenge gegen 1 rückt. Gleichzeitig folgt die gleichmäßige Divergenz von $\sum b_n z^n$ in der gleichen Punktmenge.

Also auch die Annahme, daß $a_n > 0$ sei, ist gefallen. Man kann den Satz somit auf viel allgemeinere Vergleichsreihen $\sum a_n z^n$ mit bekanntem Wachstum anwenden. Eine Fülle derartiger Fälle hat *A. Pringsheim*²³¹⁾ angegeben. Vgl. auch *K. Knopp*.²²⁷⁾

Zum Studium des Wachstums einer Funktion bei Annäherung an die Konvergenzgrenze ihrer Potenzreihe hat *Hadamard*¹⁸⁶⁾ den Begriff *der Ordnung auf dem Konvergenzkreis* geschaffen. Die Einführung dieses Begriffes knüpft an die Beobachtung an, daß durch Differenzieren, durch Integrieren sowie durch Multiplizieren der Funktion mit z die Lage der endlichen und von Null verschiedenen singulären Stellen nicht geändert wird. Auch die *Riemannschen* Differentiationen und Integrationen nicht ganzzahliger Ordnung besitzen diese Eigenschaft. (Vgl. II A 2 (Voß).) Der einfachste hierher gehörige Prozeß ist

$$D^\alpha f(z) = a_0 + \sum_1^{\infty} \frac{a_n}{n^\alpha} z^n.$$

261,1) Für $a_n \geq 0$ sind aber auch^{264 1)} diese Sätze umkehrbar.

Dabei ist

$$f(z) = a_0 + \sum_1^{\infty} a_n z^n$$

in $z = 0$ regulär. Die Funktion $D^\alpha f(z)$ hat durchweg an denselben Stellen ihre Singularitäten wie $f(z)$. Nur können in den anderen Zweigen noch bei $z = 0$ neue Singularitäten auftreten oder vorhandene verschwinden. Das gleiche gilt von $z = \infty$. Auf alle Fälle aber behalten die Ecken des Hauptsternes ihre Lage. Für positive α erklärt der Prozeß eine Art Integration, für negative α eine Art Differentiation.

Eine auf einem Kurvenbogen $z = z(t)$ z.B. auf $|z| = 1$ stetige Funktion heißt nach *Hadamard* daselbst von *beschränkter Spannung* (à écart fini), wenn — unter t einen auf der Kurve variablen Parameter, unter a, b die Parameterwerte zweier Kurvenpunkte verstanden — stets

$$\left| n \int_a^b f\{z(t)\} \sin ntdt \right| \quad \text{und} \quad \left| n \int_a^b f\{z(t)\} \cos ntdt \right|$$

beschränkt sind, für alle ganzzahligen n und für alle a, b auf der Kurve. Die obere Grenze dieser beiden Ausdrücke heißt *Spannung*. Wir wenden dies insbesondere auf das Verhalten einer Funktion auf ihrem Konvergenzkreise an. Dieser sei der Kreis $|z| = 1$. Die Funktion sei $f(z) = \sum a_n z^n$. Dann gilt folgende Aussage: $\sum |a_n|$ sei konvergent, und es gelte $na_n \log n \rightarrow 0$. Dann ist $f(z)$ auf $|z| = 1$ stetig und von beschränkter Spannung. Wenn umgekehrt $f(z)$ auf $|z| = 1$ stetig und von beschränkter Spannung ist, so ist $\sum \frac{|a_n|}{n^\varepsilon}$ für jedes $\varepsilon > 0$ konvergent, und es ist für jedes $\varepsilon > 0$ auch $n \log n \frac{a_n}{n^\varepsilon} \rightarrow 0$.

Im allgemeinen zerfallen die Zahlen α in zwei Klassen, je nachdem ob $D^\alpha f(z)$ auf dem Konvergenzkreis $|z| = 1$ stetig und von beschränkter Spannung ist, oder nicht. Wenn nämlich $D^\alpha f(z)$ von beschränkter Spannung ist, so gilt nach dem eben angeführten Satz für $h > 0$ von $D^{\alpha+h} f(z)$ das gleiche. Ist aber $D^\alpha f(z)$ nicht von beschränkter Spannung, so ist dies für $h < 0$ auch nicht mit $D^{\alpha+h} f(z)$ der Fall. Es gibt daher eine Zahl ω , welche beide Klassen voneinander trennt. Diese heißt die *Ordnung* von $f(z)$ auf dem Konvergenzkreis. Aus dem vorhin angeführten Satze entnimmt man

$$\omega = 1 + \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log |a_n|}{\log n}.$$

Der Begriff der Ordnung läßt sich wie der der Spannung auf Kreisbogen und dann auch auf einzelne Punkte ausdehnen. In einem Bogen des Kreises $|z| = 1$ heißt $f(z)$ von der Ordnung ω , wenn ω der Schnitt ist zwischen denjenigen Zahlen α , für die $D^\alpha f(z)$ von beschränkter

Spannung ist, und den Zahlen α , für die das nicht der Fall ist. Da offenbar bei Verkleinerung der Bogens die Ordnung der Funktion auf demselben nicht zunehmen kann, so hat sie bei unbegrenzter Verkleinerung des einen Punkt z_0 enthaltenden Bogens einen Grenzwert. Dieser heißt Ordnung im Punkte z_0 . Die Ordnung auf einem Bogen ist daher die obere Grenze der Ordnungen seiner Punkte. In einem regulären Punkt ist die Ordnung $-\infty$.

Der Begriff der Ordnung steht in enger Beziehung zum Wachstum der Funktion bei Annäherung an einen Punkt. Diese Beziehung wird durch den folgenden Satz gegeben.

Ist ω_1 die Ordnung von $f(z)$ auf dem abgeschlossenen Bogen (a, b) und ist $\omega_1 < \omega$ und $\omega > 0$, so gilt gleichmäßig auf dem ganzen Bogen

$$\lim_{\varrho \rightarrow 1} (1 - \varrho)^\omega f(\varrho e^{i\vartheta}) = 0^{261a)}$$

und

$$\lim_{\varrho \rightarrow 1} (1 - \varrho)^\omega S(\varrho) = 0$$

$S(\varrho)$ bedeutet dabei die Spannung von $f(z)$ auf dem Bogen

$$|z| = \varrho, \quad \arg a \leq \arg z \leq \arg b.$$

Ist umgekehrt

$$\limsup_{\varrho \rightarrow 1} |(1 - \varrho)^\omega f(\varrho e^{i\vartheta})| < A \quad \text{und} \quad \limsup_{\varrho \rightarrow 1} |(1 - \varrho)^\omega S(\varrho)| < A$$

für $\arg a \leq \vartheta \leq \arg b$, so ist auf dem Bogen die Ordnung höchstens ω .

Dazu tritt noch der Begriff des *Wachstums*. r heißt der Grad des Wachstums bei einer bestimmten Art der Annäherung an $z = 1$, wenn r der Schnitt ist zwischen denjenigen Werten α , für die

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)^\alpha f(z) = 0$$

ist und den Werten α , für die

$$\limsup_{z \rightarrow 1} |(z - 1)^\alpha f(z)| = \infty$$

ist. Beispiele zur Erläuterung der Beziehungen zwischen Ordnungs- und Wachstumsbegriffen, die sich ganz und gar nicht decken, geben *Borel*²⁶²⁾ 186), *Fabry*^{262a)}. Der letztere hat diese Fragen eingehend untersucht.

261 a) Diese Aussage läßt sich etwas verschärfen: Nach *Pringsheim*²²²⁾ folgt aus

$$\frac{s_n}{n^p} \rightarrow 0 \quad \text{auch} \quad \lim_{\varrho \rightarrow 1} (1 - \varrho)^p \sum_1^\infty a_\nu \varrho^\nu = 0.$$

Dabei ist

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

262) *E. Borel*, Leçons sur les séries à termes positifs, Paris 1902.

262 a) *E. Fabry*, Ordre des points singuliers d'une série de Taylor, Acta math. 36 (1912), p. 69—104.

Reihen analytischer Funktionen.

57. Eigenschaften der Summen konvergenter Reihen von analytischen Funktionen. Der *Weierstraßsche* Doppelreihensatz (II B 1 (*Osgood*), p. 21) hat zu den mannigfaltigsten Untersuchungen Anlaß gegeben. Schon *Weierstraß*²⁶³) selbst erkannte, daß eine Reihe in verschiedenen Gebieten gleichmäßig konvergieren und in ihnen Zweige verschiedener analytischer Funktionen darstellen kann.

Diese Erscheinung kommt in den bald folgenden Untersuchungen *Runges*¹⁶⁶) erneut zur Geltung, und *Borel*²⁶⁴) hat dies Vorkommnis als direkte Folge der Existenz mehrdeutiger Funktionen erkannt.²⁶⁵) Weiter gab *Runge*²⁶⁶) ein Beispiel einer Reihe analytischer Funktionen, welche zwar nicht gleichmäßig konvergiert, aber doch eine analytische Funktion darstellt. *Runge*¹⁶⁶) hat folgenden Satz bewiesen, der bei seinen Überlegungen eine hervorragende Rolle spielt:

B_1 und B_2 seien zwei einfach zusammenhängende Bereiche mit von Null verschiedener Entfernung voneinander. Im Inneren und am Rande eines jeden derselben sei je eine reguläre analytische Funktion $f_1(z)$ und $f_2(z)$ gegeben. Dann gibt es ein Polynom, das in B_1 um weniger als ε von $f_1(z)$ und in B_2 um weniger als ε von $f_2(z)$ abweicht. So erhalten wir eine Folge von Polynomen, die in jedem der Bereiche gegen die dort vorgeschriebene Grenzfunktion $f_1(z)$ oder $f_2(z)$ konvergiert.

Dies Prinzip dient *Runge* zum Beweis des Satzes, daß man jede in einem einfach zusammenhängenden Bereich reguläre eindeutige analytische Funktion in eine gleichmäßig konvergente Polynomreihe entwickeln kann.

Ferner gelingt es mit Hilfe dieses Prinzips, ein Beispiel einer Reihe analytischer Funktionen anzugeben, die nicht gleichmäßig konvergiert und doch eine analytische Summe besitzt.

Aus diesen Beobachtungen sind im Laufe der Zeit zwei Fragestellungen erwachsen:

1. Welche Funktionen können durch Reihen analytischer Funktionen dargestellt werden?
2. Wann stellt eine konvergente Reihe analytischer Funktionen eine analytische Funktion dar?

²⁶³) *K. Weierstraß*, Zur Funktionenlehre, Monatsber. kgl. Akad. Berlin 1880, p. 719—743 (Werke II, p. 201—230).

²⁶⁴) *E. Borel*, Leçons sur la théorie des fonctions, Paris 1898, p. 58.

²⁶⁵) Man vgl. auch *H. von Koch*, Remarques sur quelques séries de polynomes, Bull. de la soc. math. de France 34 (1906), p. 269—274.

²⁶⁶) *C. Runge*, Zur Theorie der analytischen Funktionen, Acta math. 6 (1884), p. 245—248.

Der erste, der die Frage 1 allgemein in Angriff nahm, war *Osgood*²⁶⁷). Er bewies: Wenn $\sum f_n(z)$ in einem Gebiet G konvergiert, so enthält es ein Teilgebiet, in dem die Reihe gleichmäßig konvergiert. Die Teilgebiete gleichmäßiger Konvergenz liegen also überall dicht. Eine konvergente Reihe analytischer Funktionen stellt also stets eine stückweise analytische Funktion dar. Daß die Summe tatsächlich in verschiedenen Gebieten verschiedenen analytischen Funktionen angehören kann, zeigte erst *Montel*²⁶⁸) an einem Beispiel. Man kann dasselbe so einrichten²⁶⁹), daß unendlich viele Teilgebiete mit vorgeschriebenen Summen herauskommen. Ja *Montel* hat das Beispiel sogar so eingerichtet, daß die Summe stetig wird, ohne durchweg analytisch zu sein.

Für die Stetigkeit der Reihensumme ist nach *Arzelà*^{269,1)} und *Severini*²⁷⁰) die gleichmäßige Konvergenz in jedem einzelnen Punkte^{270,1)} notwendig und hinreichend. Darunter versteht man folgendes: Zu jeder Stelle z_0 , zu jedem $\varepsilon > 0$ und zu jedem n kann man ein $\delta(\varepsilon, n)$ so bestimmen, daß für jedes h mit $|h| < \delta(\varepsilon, n)$ $|s_n(z_0 + h) - s(z_0 + h)| < \varepsilon$ ist. *Severini*²⁷⁰) hat darüber hinaus erkannt, daß die Reihensumme dann und nur dann analytisch ist, wenn sie stetig ist und über jede geschlossene rektifizierbare Kurve gliedweise integriert werden kann.^{271,1)} Daß die gliedweise Integrierbarkeit über nicht geschlossene Kurven zwar notwendig aber nicht hinreichend ist, hat *Montel*²⁶⁹) an einem Beispiel gezeigt. *Montel* hat sich weiter mit der Art der Konvergenz in den verschiedenen Punkten des Konvergenzgebietes befaßt.

267) *W. F. Osgood*, Note on the functions defined by infinite series whose terms are analytic functions of a complex variable with corresponding theorems for definite integrals, *Ann. of math.* (2) 3 (1901), p. 25—34.

268) a. a. O. 15).

269) *P. Montel*, Sur les séries des fonctions analytiques, *Bull. d. sc. math.* (2) 30 (1906), p. 189—192. Vgl. auch a. a. O. 194).

269,1) *Arzelà*, Sulle serie dei funzioni I, *Mem. dell. R. Acc. d. sc. di Bologna ser. V t. 8* (1899).

270) *C. Severini*, Sulle serie di funzioni analitiche, *Foggia* 1903.

270,1) Diesen Begriff hat *A. Pringsheim*, Über die notwendigen und hinreichenden Bedingungen des *Taylor*schen Lehrsatzes für Funktionen einer reellen Variablen, *Math. Ann.* 44 (1894) (p. 57—83), p. 82 eingeführt. Vgl. ferner *A. Pringsheim*, Über singuläre Punkte gleichmäßiger Konvergenz, *Münch. Ber.* (1919) p. 419—430. Hier zeigt *Pringsheim* weiter, daß bei konvergenten Reihen analytischer Funktionen isolierte Punkte gleichmäßiger Konvergenz nicht auftreten können, daß vielmehr aus der gleichmäßigen Konvergenz in einem inneren Punkt des Konvergenzbereiches die gleichmäßige Konvergenz in einer Umgebung dieses Punktes folgt.

271,1) Wegen einer Bedingung für den analytischen Charakter vgl. auch *J. Wolff*, Über Folgen analytischer Funktionen, *Math. Ann.* 81 (1920), p. 48—51.

Er teilte sie in reguläre und in irreguläre ein. Die regulären Punkte besitzen eine Umgebung gleichmäßiger Konvergenz, die irregulären nicht. Diese letzteren bilden natürlich zusammen mit dem Rand eine einfach zusammenhängende und nirgends dichte Menge. Auf jeder perfekten Teilmenge des Konvergenzbereiches ist die Reihensumme punktweise unstetig. Über das Verhalten in der Umgebung eines irregulären Punktes kann man dem *Stieltjes*schen Satz und seinen Verallgemeinerungen wichtige Ergebnisse entnehmen. Vgl. Nr. 58. Der *Stieltjes*sche Satz lehrt nämlich, daß in der Umgebung eines irregulären Punktes die Partialsummen nicht beschränkt sein können, und seine Verallgemeinerung lehrt, daß die Partialsummen in der Umgebung eines irregulären Punktes nicht zwei verschiedene Werte auslassen können. Man hat so das folgende Ergebnis²⁷¹⁾:

Die irregulären Punkte sind identisch mit denjenigen unter den gemeinsamen Häufungspunkten der Lösungsstellen von $s_n(z) = a$ und $s_n(z) = b$ (a und b zwei beliebige Werte), welche von unendlicher Ordnung sind²⁷²⁾, ($s_n(z) = \sum_1^n f_n(z)$). Damit ist gemeint, daß in jedem die Stelle umgebenden Kreise die obere Grenze für die Anzahl der Wurzeln von $s_n(z) = a$ oder von $s_n(z) = b$ unendlich ist. Andernfalls nämlich bildeten die $s_n(z)$ eine in der Umgebung des irregulären Punktes normale Familie, die also gleichmäßig konvergieren müßte entgegen der Definition des irregulären Punktes.

Für den Fall, daß die $s_n(z)$ die n -ten Abschnitte einer Potenzreihe sind, hat *R. Jentzsch*²⁷³⁾ einen wesentlich weiter gehenden Satz

271) *P. Montel*, a) Sur les points irréguliers des séries convergentes de fonctions analytiques, Paris C. R. 145 (1907), p. 910—913; b) a. a. O. 194; c) a. a. O. 62; Sur les fonctions analytiques qui admettent deux valeurs exceptionnelles dans un domaine, Paris C. R. 153 (1911), p. 996—998; d) Sur l'indétermination d'une fonction uniforme dans le voisinage de ses points essentiels, Paris C. R. 153 (1911), p. 1455—1456. *Vitali*, Sopra le serie di funzioni analitiche, Ann. di mat. (3) 10 (1904), p. 65—82. *C. Severini*, a) Sulle successioni infinite di funzioni analitiche, Atti del IV. cong. internaz. dei mat. Roma 1909, Bd. II, p. 182—193; b) Sulle serie di funzioni analitiche, Rend. Acc. dei Lincei 12 (1903), p. 97—105 und p. 257—259; c) Sulle successioni infinite di funzioni analitiche, Atti dell. Acc. Gioenia di Catania (5) 1 (1907); d) Sulle serie di funzioni analitiche, Atti del reale Ist. Veneto 63 (1904), p. 1241—1255 und 64 (1905), p. 1609—1613; e) Sulla convergenza uniforme delle successioni di funzioni analitiche, Atti dell. Acc. Gioenia di Catania (5) 5 (1912).

272) Statt der Konstanten a und b kann man zwei reguläre Funktionen $a(z)$ und $b(z)$ nehmen. *Montel*^{271c)}.

273) *R. Jentzsch*, a) Untersuchungen zur Theorie der Folgen analytischer Funktionen, Diss. Berlin 1914 und Acta math. 41 (1918), p. 219—251; b) Fort-

gefunden. Er hat gezeigt, daß die Stellen, für die $s_n(z) = a$ ist, schon für sich allein einen jeden Punkt des Konvergenzkreises zum Häufungspunkt haben. Vermutungsweise hat dies schon vorher *Montel*²⁷¹⁾ ausgesprochen.

Zwar können auch nicht gleichmäßig konvergente Reihen analytische Funktionen darstellen, ja man kann sogar durch Polynomreihen eindeutige Funktionen in mehrfach zusammenhängenden Bereichen, ja im ganzen Existenzbereich darstellen. (*Montel*¹⁹⁴⁾.) Indessen ist die Frage nach Kriterien, die erkennen ließen, ob die oben für analytische Summen angegebenen Bedingungen bei einer solchen Reihe erfüllt sind oder nicht, nirgends angeschnitten worden. Vielmehr hat sich die an den klassischen *Weierstraßschen Satz* anschließende *Literatur* darauf beschränkt, Kriterien für gleichmäßige Konvergenz zu gewinnen.

58. Der Vitalische Satz. Nächst dem bekanntesten aus der absoluten Konvergenz fließenden Kriterium für gleichmäßige Konvergenz ist wieder als erstes ein Ergebnis von *Runge*¹⁶⁶⁾ zu nennen: Die gleichmäßige Konvergenz am rektifizierbaren Rande eines einfach zusammenhängenden Bereiches zieht die gleichmäßige Konvergenz im Inneren nach sich, ein Satz, der unmittelbar aus dem *Cauchyschen Integralsatz* fließt, und der zur Folge hat, daß die Bereiche gleichmäßiger Konvergenz nur dann mehrfach zusammenhängend sein können, wenn in den Löchern Singularitäten der Reihenglieder liegen. *Montel*¹⁵⁾ hat an einem Beispiel gezeigt, daß Konvergenz am Rande *ohne* gleichmäßige Beschränktheit am Rande noch nicht auf die Konvergenz im Inneren zu schließen erlaubt.

Konvergenz und gleichmäßige Beschränktheit im Bereiche zieht die gleichmäßige Konvergenz nach sich. Einen ersten Fortschritt hierüber hinaus erzielte *Stieltjes*²⁷⁴⁾. Er nimmt die Teilsummen in *B* gleichmäßig beschränkt an und setzt voraus, daß die Reihe in einem *Teilbereich* gleichmäßig konvergiert. Dann herrscht gleichmäßige Konvergenz im *ganzen* Bereich. *Osgood*²⁶⁷⁾ kommt mit gleichmäßiger Beschränktheit und bloßer Konvergenz in einer überall dichten Teilmenge aus. *Porter*²⁷⁵⁾

gesetzte Untersuchungen über die Abschnitte von Potenzreihen, *Acta math.* 41 (1918), p. 253—270. Ein anderer Beweis bei *Landau*, a. a. O. 186). Man vgl. auch *Lukács*, *Arch. Math. Phys.* (3) 23 (1914), p. 34—35; *Lindwart* und *Pólya*, a. a. O. 107).

274) *T. J. Stieltjes*, Brief an *Hermite* vom 14. und 16. II. 1894, *Corr. d'Hermite* et de *Stieltjes* II, p. 369, Paris 1905. Ferner: *Recherches sur les fractions continues*, *Ann. fac. sc. Toulouse VIII* (1894) 7 (p. 1—122), p. 56 oder *Savants étrangers* 32, Paris 1902, Nr. 102.

275) *Porter*, On functions defined by an infinite series of analytic functions of a complex variable, *Ann. of math.* (2) 6 (1909), p. 45—48.

zeigte bald darauf, daß statt der überall dichten Menge eine Menge genügt, deren Häufungspunkte eine geschlossene dem Bereiche angehörige rektifizierbare Kurve erfüllen. So weit war die Entwicklung gediehen, als eine Kreuzung mit einer namentlich durch *Arzelà*²⁷⁶⁾ ausgebauten Gedankenkette eintrat. Ich meine den Satz, daß sich aus jeder gleichmäßig stetigen Folge analytischer Funktionen mindestens eine gleichmäßig konvergente Teilfolge herausheben läßt. Da offenbar eine gleichmäßig beschränkte Folge analytischer Funktionen auch gleichmäßig stetig ist, so hatte *Vitali*²⁷⁷⁾ leichte Mühe, den nach ihm benannten Satz zu entdecken:

*Eine gleichmäßig beschränkte Folge regulärer analytischer Funktionen konvergiert jedenfalls dann in einem Bereiche gleichmäßig, wenn sie in einer Punktmenge konvergiert, welche einen dem Bereich angehörigen Häufungspunkt besitzt.*²⁷⁸⁾

*W. Blaschke*²⁷⁹⁾ hat den *Vitalischen* Satz verallgemeinert. Der Häufungspunkt darf auch am Rande liegen. Doch müssen die Konvergenzpunkte hinreichend langsam dem Rande zustreben. Für den Fall, daß $|z| < 1$ der Bereich ist, ist notwendig und hinreichend, daß $\sum_1^{\infty} (1 - |z_n|)$ divergiert, wo z_n die Konvergenzpunkte sind.

Beim Beweise des *Vitalischen* Satzes spielt die Möglichkeit, daß man aus jeder Teilfolge eine gleichmäßig konvergente herausgreifen kann, eine wesentliche Rolle. An diesem Punkte setzen weitere Verallgemeinerungen ein. Man braucht nämlich nicht besonders anzunehmen, daß die ausgewählte Funktionenfolge gegen eine endliche Grenzfunktion konvergiert.

Man nennt nun eine Funktionenfolge von der Art, daß man aus jeder Teilfolge eine gleichmäßig konvergente Teilfolge herausgreifen

276) *C. Arzelà*, a) *Sulle serie di funzioni analitiche*, Rend. della R. Acc. di Bologna 1902; b) *Note on series of analytic functions*, Ann. of math. (2) 5 (1904), p. 51—63.

277) *Vitali*, a) *Sulle serie di funzioni analitiche*, Rend. del. R. ist. Lombard. (2) 36 (1903), p. 771—774; b) a. a. O. 271).

278) Weitere Beweise findet man an folgenden Stellen: *Porter*, Concerning series of analytic functions, Ann. of math. (2) 6 (1904), p. 190—192. *C. Carathéodory* und *E. Landau*, a. a. O. 74); *E. Lindelöf*, Démonstration nouvelle d'un théorème fondamentale sur les suites des fonctions monogènes, Bull. de la soc. math. de France 41 (1913), p. 171—178; *R. Jentzsch*, a. a. O. 273); *C. Severini*, a. a. O. 271), *Montel*, a. a. O. 15).

279) *W. Blaschke*, Eine Erweiterung des Satzes von *Vitali* über Folgen analytischer Funktionen, Leipz. Ber. 67 (1915), p. 194—200. Dazu kann man auch vergleichen: *E. Landau*, Über die *Blaschkesche* Verallgemeinerung des *Vitalischen* Satzes, Leipz. Ber. 70 (1918), p. 156—159.

kann, nach *Fréchet*²⁸⁰) kompakt, nach *Montel*⁶²) normal. (Vgl. Art. *Borel-Rosenthal*.) So hat man den Satz: Falls eine normale Funktionenfolge in einem Bereiche regulär ist und an unendlich vielen Stellen mit Häufungspunkt im Bereichinneren konvergiert, so konvergiert sie gleichmäßig im ganzen Bereiche.

Mit Hilfe der elliptischen Modulfunktion erkennt man leicht, daß z. B. die Familie derjenigen Funktionen, die zwei gegebene Werte auslassen, normal ist.⁶²) Falls die Gleichungen $f_n(z) = 0$ und $f_n(z) = 1$ für kein n mehr als p Wurzeln besitzen, so ist die Familie quasinormal, d. h. es gibt eine Teilfolge, die gleichmäßig gegen eine endliche oder quasiunendliche Grenzfunktion konvergiert. Quasiunendlich heißt eine Funktion, die überall außer an endlich vielen Stellen unendlich ist. Wenn insbesondere die $f_n(z)$ gar keine Nullstellen haben, so ist die Familie normal. Die Punkte also, in welchen eine quasiunendliche Folge endlich bleiben kann, sind unter den Punkten zu suchen, die Häufungspunkte von Null- und von Einsstellen zugleich sind. Wenn also weiter eine quasinormale Familie in einem nicht zu dieser Kategorie gehörigen Punkte beschränkt ist, und wenn weiter die gemeinsamen Häufungspunkte und die Punkte unendlicher Ordnung mit dem Bereichsrande keine zusammenhängende Menge bilden, so ist die Familie normal und gleichmäßig beschränkt. Wenn eine quasinormale Familie einen Wert ausläßt, so ist sie normal (*Montel*⁶²)).

Der Satz läßt sich noch dahin verallgemeinern, daß statt der festen Ausnahmepunkte variable genommen werden. Sie dürfen aber nicht zu dicht zusammenkommen. Z. B. soll bei festem γ stets

$$|a_n| < \gamma, |b_n| < \gamma, |a_n - b_n| > \frac{1}{\gamma}$$

sein. Statt der Modulfunktion können andere Dreiecksfunktionen genommen werden.

Wegen Ausdehnung der Sätze auf mehrdeutige Funktionen siehe *Koebe*³⁴), *Carathéodory*⁷⁰), *Boutroux*²⁸¹), *Rémoundos*²⁸¹).

59. Weiteres über Reihen analytischer Funktionen. In einer klassischen Arbeit¹⁶⁶) vom Jahre 1884 hat *C. Runge* bewiesen, daß

280) *Fréchet*, Sur quelques points du calcul fonctionnel, Rend. di Palermo 22 (1906), p. 1—74.

281) *P. Boutroux*, a) Fonctions multiformes à une infinité de branches, Ann. de l'Éc. norm. sup. (3) 22 (1905), p. 441—469; b) Sur les fonctions limites des fonctions multiformes, Rend. di Palermo 24 (1907), p. 209—222; c) Leçons sur les fonctions définies par les équations différentielles du premier ordre, Paris 1908; *G. Rémoundos*, a) Sur les familles des fonctions algébroides, Paris C. R. 156 (1913), p. 862—865; b) Sur les séries et les familles de fonctions algébroides dans un domaine, Paris C. R. 156 (1913), p. 1141—1144.

man jede beliebige in einem einfach zusammenhängenden Bereiche eindeutige und analytische Funktion in eine im Inneren gleichmäßig konvergente Reihe von Polynomen entwickeln kann. Wie schon p. 491 hervorgehoben wurde, gelingt dies dadurch, daß *Runge* zunächst aus der *Cauchyschen* Integralformel auf eine Darstellung durch eine Reihe rationaler Funktionen schließt. Diese Überlegung liefert sogar eine gleichmäßig konvergente Darstellung in einem beliebig vielfach zusammenhängenden Regularitätsbereich. Von da gelangt er dann durch Verschieben der Pole der Reihenglieder zu einer Polynomreihe. *Montel*¹⁹⁴⁾ hat bemerkt, daß man durch diese Überlegung sogar zu einer Polynomentwicklung in einem beliebigen auch mehrfach zusammenhängenden Regularitätsbereich gelangen kann, eine Darstellung, die allerdings dann nicht mehr gleichmäßig konvergiert. (Siehe auch p. 494.)

Dieses weitgehende *Rungesche* Resultat ist von verschiedenen Autoren auf verschiedene Weise in mehr oder weniger weitem Umfange wieder gewonnen worden. Zunächst von *Painlevé*²⁸²⁾ für konvexe Bereiche, dann von *Hilbert*²⁸³⁾ für beliebige einfach zusammenhängende Bereiche. Zu erwähnen sind auch die Untersuchungen von *Appell* (*Acta* 1 und *Annales* 21). Ferner ist hinzuweisen auf die oben schon behandelten *Mittag-Lefflerschen* in verschiedenen Sterngebieten konvergenten Polynomreihen.²⁸⁴⁾

Man hat versucht, die Polynomentwicklungen mit der *Lagrange*-schen Interpolationsformel in Zusammenhang zu bringen. In gewisser Weise kann man schon die *Hilbertschen* Entwicklungen als Lösungen eines solchen Interpolationsproblem es auffassen. Dabei werden die Stellen, an welchen gegebene Daten benutzt werden, festgehalten und in den Punkten die Übereinstimmung einer wachsenden Zahl von Ableitungen verlangt. Sucht man aber die Übereinstimmung dadurch zu gewinnen, daß man nur die Funktionswerte in einer wachsenden Zahl von Punkten benutzt, so erhält man ohne gewisse geeignete Vorsichtsmaßregeln keine in einem gegebenen Bereiche konvergente Darstellung. Die Wahl der Interpolationsstellen ist durch die Gestalt des Bereiches bedingt.²⁸⁵⁾ Von *L. Fejér*²⁸⁵⁾ rührt der folgende Satz her: Wenn $f(z)$

282) *P. Painlevé*, Sur les lignes singulières des fonctions analytiques, *Ann. de Toulouse* (1) 2 (1888), p. 1—130.

283) *D. Hilbert*, Über die Entwicklung einer beliebigen analytischen Funktion einer Variablen in eine unendliche nach ganzen rationalen Funktionen fortschreitende Reihe, *Gött. Nachr.* 1897, p. 63—70.

284) Endlich noch zwei Arbeiten von *Painlevé*, *Paris C. R.* 1898.

285) *Ch. Méray*, Observations sur la légitimité de l'interpolation, *Ann. l'Éc. norm. sup.* (3) 1 (1884), p. 165—176; *C. Runge*, Über empirische Funktionen und

in einem einfach zusammenhängenden Bereiche B und auf seinem voraussetzungsgemäß von einer Jordankurve gebildeten Rande regulär ist, so konvergieren die *Lagrangeschen* Interpolationspolynome sicher dann in B und auf seinem Rande gleichmäßig gegen $f(z)$, wenn man die Interpolationsstellen alle am Rande wählt, und wenn dieselben dort regelmäßig verteilt sind. Regelmäßig verteilt aber heißen n Randpunkte, wenn man das Äußere der Jordankurve so umkehrbar eindeutig und analytisch auf das Innere eines Kreises abbilden kann, daß dabei die n Punkte in die n Ecken eines regelmäßigen n Ecks übergehen. *G. Faber*²⁸⁵⁾ hat die Frage für in B gelegene Interpolationsstellen zum Abschluß gebracht. Seien $z_1^{(n)} \dots z_n^{(n)}$ die Interpolationsstellen des n^{ten} Polynoms $L_n(z)$, so wird dann und nur dann jedes in B reguläre $f(z)$ durch die $L_n(z)$ gleichmäßig approximiert, wenn die Kurven $|z - z_1^{(n)}| |z - z_2^{(n)}| \dots |z - z_n^{(n)}| = C$ den Bereichrand gleichmäßig approximieren.

Man kann auch von gegebenen Interpolationsstellen ausgehen und fragen, für welche Funktionen die zu diesen Stellen gehörigen Interpolationsformeln konvergieren.²⁸⁶⁾

Versucht man das Interpolationsproblem namentlich bei ganzen transzendenten Funktionen zu behandeln, so wird man — wie bei Polynomen — auf die Frage geführt, ob man eine ganze Funktion bestimmen kann, die an unendlich vielen sich nur im Unendlichen häufenden Stellen gegebene Werte annimmt, und inwieweit die Funktion durch diese Werte bestimmt ist. Der einfachste Weg zur Lösung der ersten Aufgabe ist wohl dieser: Man konstruiere zunächst irgendeine ganze Funktion $F(z)$, welche an den gegebenen Stellen a_n verschwindet. Alsdann nach *Mittag-Leffler* eine Partialbruchreihe, die an den Stellen a_n einfache Pole mit den Residuen $\frac{A_n}{F'(a_n)}$ hat. Diese sei $\Phi(z)$. Dann ist $F(z) \cdot \Phi(z)$ eine ganze Funktion, die an den Stellen a_n die Werte A_n annimmt.²⁸⁷⁾

Schon diese ganze Herleitung zeigt, daß die Funktion durch die Werte A_n nicht bestimmt ist. Man kann ja auch eine beliebige ganze

die Interpolation zu äquidistanten Ordinaten, *Ztschr. Math. Phys.* 46 (1901), p. 224—243; *L. Fejér*, Interpolation und konforme Abbildung, *Gött. Nachr.* 1918, p. 319—331. *G. Faber*, Über *Tschebycheffsche* Polynome, *Crelles J.* 150 (1920), p. 74—106.

286) *I. Bendixson*, Sur une extension à l'infini de la formule de l'interpolation de *Gauss*, *Acta math.* 9 (1887), p. 1—34; *G. Faber*, Beitrag zur Theorie der ganzen Funktionen, *Math. Ann.* 70 (1911), p. 48—68.

287) *C. Guichard*, Sur les fonctions entières, *Ann. Éc. Norm.* (3) 1 (1884), p. 427—432; *P. E. B. Jourdain*, On the general theory of functions, *J. f. Math.* 128 (1905), p. 169—210; *A. Pringsheim*, a. a. O. 187), p. 27.

Funktion zufügen, die an allen Stellen a_n verschwindet. Man kann aber hoffen, etwa durch Wachstumsbeschränkungen für die Funktion $f(z)$ diese Möglichkeiten auszuschließen und die Lösung eindeutig zu machen. In dieser Richtung hat *F. Carlson*²⁸⁸⁾ das folgende schöne Ergebnis gewonnen: Wenn $f(z)$ langsamer wächst, als es dem Normaltypus π der Ordnung Eins entspricht, oder präziser, wenn $|f(z)| < A \cdot e^{k|z|}$ ($k < \pi$) für große z , dann kann $f(z)$ nur dann für alle ganzzahligen z verschwinden, wenn es identisch Null ist. *Pólya*³⁴⁵⁾, *Valiron*^{288,1)} und *F. Carlson*^{288,2)} behandeln die Frage nach dem kleinstmöglichen Wachstum der interpolatorischen Funktion.

*L. Tonelli*²⁸⁹⁾ hat unter Anlehnung an einen *Tschebycheff*'schen Gedanken gezeigt, daß unter allen Polynomreihen, welche ein und dieselbe Funktion darstellen, eine am besten konvergent ist. Dabei approximiert ein Polynom $P_n(z)$ vom Grade n im Bereiche B am besten von allen Funktionen n -ten Grades die Funktion $f(z)$, wenn das Maximum von $|f(z) - P_n(z)|$ in B möglichst klein wird. Es gibt genau ein Polynom n -ten Grades mit dieser Eigenschaft.

*G. Faber*²⁹⁰⁾ hat in mehreren Arbeiten das Problem, eine gegebene Funktion in einem gegebenen Bereiche durch eine Polynomreihe darzustellen, auf sehr einfache Weise von der Integralformel aus gelöst und ergänzt. Er hat gezeigt, daß man in mannigfaltiger Weise einem gegebenen einfach zusammenhängenden Bereiche eine Folge von Polynomen $P_n(z)$ zuordnen kann, derart, daß jede im Bereiche reguläre Funktion in eine gleichmäßig konvergente Reihe $\sum a_n P_n(z)$ entwickelt werden kann. Wie bei einer Potenzreihe ($P_n(z) = z^n$) hängen also die $P_n(z)$ nicht von der darzustellenden Funktion $f(z)$ ab und sind

288) *F. Carlson*, a. a. O. 199); *S. Wigert*, Sur un théorème concernant les fonctions entières, Arkiv for mat. astr. och fys. 11 (1916), Nr. 21. Vgl. auch *S. Wigert* und *H. Cramer*, Un théorème sur les séries de *Dirichlet* et son application, Arkiv for mat. astr. och fys. 13 (1918/19), Nr. 22 (p. 1—14), p. 11. Vgl. auch *G. Pólya*, a. a. O. 345). Ferner neuerdings *G. H. Hardy*, On two theorems of *F. Carlson* and *S. Wigert*, Acta math. 42 (1920), p. 327—339; *M. Riesz*, a. a. O. 199).

288,1) *G. Valiron*, Sur l'interpolation des fonctions entières, Bull. soc. math. Fr. 44 (1916), p. 103—119; *F. Carlson*, Sur les séries de coefficients binomiaux, Nova acta R. soc. Sc. Ups. (4) 4 (1915), Nr. 3.

289) *L. Tonelli*, I. polinomi d'approssimazione de *Tschebycheff* III, Annali di mat. (3) 15 (1909), p. 108—119.

290) *G. Faber*, a) a. a. O. 166), 187); b) Über polynomische Entwicklungen, Math. Ann. 64 (1907), p. 116—135; c) Über Reihen nach *Legendres*chen Polynomen, Jahresber. d. D. Math.-Ver. 16 (1907), p. 103—115; d) *K. Rieder*, Polynomische Entwicklungen von Funktionen einer Variablen, Diss. Basel 1911; e) *M. Krafft*, Zur Theorie der *Fabers*chen Polynome und ihrer zugehörigen Entwicklungen, Diss. Marburg 1915; f) *G. Faber*, a. a. O. 285).

durch den Bereich allein, in dem die Entwicklung gelten soll, bestimmt. Lediglich die Koeffizienten a_n hängen von der Wahl der darzustellenden Funktion ab. Bewiesen ist dies allerdings bis jetzt nur für solche einfach zusammenhängende Bereiche, deren Grenze von einer geschlossenen analytischen Kurve gebildet wird. Durch Grenzübergang zu allgemeineren Bereichen gelang *Faber* nur ein schöner Beweis des *Runge*-schen Satzes von der Möglichkeit einer Polynomentwicklung. Die Analogie mit den Potenzreihen hat *Faber* noch weiter verfolgen können. Auf der Konvergenzgrenze (bei den *Legendreschen* Polynomen z. B. eine Ellipse mit den Brennpunkten ± 1) liegt stets mindestens eine singuläre Stelle usw. Z. B. kann man auch aus der Verteilung der Singularitäten von $\sum a_n z^n$ auf die von $\sum a_n P_n(z)$ schließen.

Funktionenfamilien.

60. Die Taylorkoeffizienten beschränkter Funktionen. Daß beschränkte Familien analytischer Funktionen normal sind, lehrt der Satz von *Vitali*. Das älteste Ergebnis über beschränkte Familien ist im sogenannten *Schwarzschen Lemma* niedergelegt:²⁹¹⁾ Wenn $f(z)$ mit $f(0) = 0$ in $|z| < 1$ regulär ist, und wenn in diesem Kreise $|f(z)| < 1$ gilt, so ist auch $|f(z)| \leq |z|$ in $|z| < 1$, und das Gleichheitszeichen kann hier nur dann vorkommen, wenn $f(z)$ eine ganze lineare Funktion ist. Der Satz regelt das Wachstum einer beschränkten Funktion im Einheitskreis und entspricht also dem *Schottkyschen* Satz bei der Familie der Funktionen, welche in $|z| < 1$ die Werte 0 und 1 auslassen, und dem Verzerrungssatz bei den Familien derjenigen Funktionen, welche den Einheitskreis schlicht abbilden.

Die in den Voraussetzungen des *Schwarzschen* Lemmas liegende Beschränkung kann leicht durch lineare Transformation von z oder der Funktion selbst beseitigt werden. Überhaupt ist konforme Abbildung das Mittel, durch das man weitgehende Folgerungen aus dem *Schwarzschen* Lemma ziehen kann, und das seine große Fruchtbarkeit bedingt. So gelangt man auf diesem Wege zu dem sogenannten *Lindelöfschen Prinzip*, das allerdings sein Entdecker auf anderem Wege auch für mehrfach zusammenhängende Bereiche gewonnen hat.²⁹²⁾ Das *Lindelöfsche* Prinzip lautet: B_1 und B_2 seien zwei be-

291) *H. A. Schwarz*, Zur Theorie der Abbildung (1869), Ges. Abh. II (p. 108—132), p. 109. Wegen eines einfachen Beweises vgl. man z. B. *Carathéodory*, a. a. O. 332). Eine neue Formulierung gibt *Pick*, a. a. O. 74).

292) a. a. O. 61a). Die Spezialisierung dieses Prinzips führt zu einer Menge von Sätzen, die zum Teil schon vor diesem Prinzip anderweitig bekannt waren. Ich nenne hier nur die folgenden Arbeiten, will aber vorab bemerken, daß auch

liebige Bereiche, G_1 und G_2 seien ihre mit bestimmten Aufpunkten gebildeten *Greenschen* Funktionen. Es sei weiter eine in B_1 reguläre Funktion gegeben, welche den Bereich B_1 auf einen über B_2 ausgebreiteten Bereich abbildet und dabei den Aufpunkt von B_1 in den von B_2 überführt. Dann wird das Innere der *Greenschen* Niveaulinie $G_1 = \lambda$ durch diese Funktion auf einen über dem Inneren der Niveaulinie $G_2 = \lambda$ gelegenen Bereich abgebildet. Beim *Schwarzschen* Lemma, das auch als Spezialfall dieses Satzes aufgefaßt werden kann, sind die Niveaulinien eben konzentrische Kreise.

Das Lemma enthält gleich dem *Cauchyschen* Koeffizientensatz eine Aussage über die Koeffizienten derjenigen Potenzreihen $f(z) = a_1 z + a_2 z^2 + \dots$, für die $|f(z)| < 1$ gilt in $|z| < 1$. Es muß nämlich nach dem Lemma $|a_1| \leq 1$ sein, und gleich gilt nur für ganze lineare Funktionen. Daß die übrigen Koeffizienten ähnlichen Bedingungen genügen, hat *Carathéodory* entdeckt, und durch ihn und durch an die seinigen anschließende Arbeiten sind diese Bedingungen des näheren bekannt geworden. *Carathéodorys* Arbeiten²⁹³⁾ beziehen sich allerdings auf Funktionen, welche im Einheitskreis nur Werte mit positivem Realteil annehmen. Doch ist dies kein wesentlich anderes Problem, wie auch schon *Carathéodory* angegeben und *J. Schur*²⁹⁴⁾ näher ausgeführt hat. *Carathéodory* hat den folgenden Satz gefunden: Wenn die Funktion $f(z) = 1 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots$ in $|z| < 1$ regulär ist und dort einen positiven Realteil besitzt, so müssen (a_1, a_2, \dots, a_n) die Koordinaten eines Punktes sein, der einem gewissen konvexen Körper K_n des $2n$ -dimensionalen Raumes angehört. Der Körper ist als kleinster die Kurve

die später zu besprechenden *Jensenschen* Verallgemeinerungen des *Schwarzschen* Lemmas mit dem *Lindelöfschen* Prinzip zusammenhängen. *J. Hadamard*, Sur les fonctions entières de la forme $e^{G(z)}$, Paris C. R. 114 (1892), p. 1053—1055; *E. Borel*, a. a. O. 63 a); *F. Schottky*, a. a. O. 64); *E. Landau*, a) a. a. O. 62); b) Beiträge zur analytischen Zahlentheorie, Rend. di Palermo 26 (1908), p. 191—193; *C. Carathéodory*, Elementarer Beweis für den Fundamentalsatz der konformen Abbildungen, *Schwarzfestschrift* 1914, p. 19—41; *P. Koebe*, Über das *Schwarzsche* Lemma und einige damit zusammenhängende Ungleichheitsbeziehungen der Potentialtheorie und Funktionentheorie, Math. Ztschr. 6 (1920), p. 52—84.

293) *C. Carathéodory*, a) Über den Variabilitätsbereich der Koeffizienten von Potenzreihen, welche gegebene Werte nicht annehmen, Math. Ann. 64 (1907), p. 95—115; b) Über den Variabilitätsbereich der *Fourierschen* Konstanten von positiven harmonischen Funktionen, Rend. di Palermo 32 (1911), p. 193—217.

294) *J. Schur*, Über Potenzreihen, die im Innern des Einheitskreises beschränkt sind, J. f. Math. 147 (1917), p. 205—232 und 148 (1918), p. 122—145. Vgl. auch *G. Hamel*, Eine charakteristische Eigenschaft beschränkter analytischer Funktionen, Math. Ann. 78 (1918), p. 257—269.

$$a_k = 2e^{-ki^2} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

enthaltender konvexer Körper charakterisiert. Wenn umgekehrt die Koeffizienten einer Potenzreihe dieser Bedingung genügen, so stellt sie eine in $|z| < 1$ reguläre Funktion mit positivem Realteil dar. Gehört (a_1, a_2, \dots, a_n) dem Rande von K_n an, so ist die Funktion durch (a_1, a_2, \dots, a_n) eindeutig bestimmt und ist eine rationale Funktion von dieser Form:

$$\sum_1^n \lambda_j \frac{e^{i\vartheta_j} + z}{e^{i\vartheta_j} - z} \left(\lambda_j \geq 0, \sum_1^n \lambda_j = 1 \right).$$

*Toeplitz*²⁹⁵) hat bald darauf erkannt, daß die K_n von algebraischen Flächen begrenzt sind, und daß man K_n durch die Bedingung charakterisieren kann, daß die *Hermite*sche Form mit der Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ \bar{a}_1 & 2 & \bar{a}_1 & \dots & a_{n-1} \\ \bar{a}_2 & \bar{a}_1 & 2 & \dots & a_{n-2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \bar{a}_n & \bar{a}_{n-1} & \bar{a}_{n-2} & \dots & 2 \end{pmatrix}$$

nicht negativ sei. So gelangt man zu dem folgenden Satz, den in seiner vollständigen Form erst *G. Herglotz*²⁹⁶) ausgesprochen hat:

$f(z) = a_0 + a_1 z + \dots$ ist dann und nur dann in $|z| < 1$ konvergent und stellt dort eine Funktion mit positivem Realteil dar, wenn die Determinanten

$$\begin{vmatrix} 2a'_0 & a_1 & \dots & a_n \\ \bar{a}_1 & 2a'_0 & \dots & a_{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \bar{a}_n & \bar{a}_{n-1} & \dots & 2a'_0 \end{vmatrix} \quad (a_0 = a'_0 + ia''_0)$$

entweder alle wesentlich positiv sind oder doch von der ersten Verswindenden an alle verschwinden. Der zweite Fall tritt nur dann ein, wenn $f(z)$ eine wohlbestimmte rationale Funktion ist, deren Partialbruchzerlegung schon vorhin angegeben wurde, der man aber nach *J. Schur* die folgende Form geben kann:

$$f(z) = \frac{1 - \varphi(z)}{1 + \varphi(z)} \quad \varphi(z) = \varepsilon \prod_1^n \frac{z + w_\nu}{1 + \bar{w}_\nu z} \quad (|w_\nu| < 1, |\varepsilon| = 1).$$

Dies Ergebnis übte natürlich einen starken Reiz auf die Algebraiker

295) *O. Toeplitz*, Über die *Fouriersche* Entwicklung positiver Funktionen, Rend. di Palermo 32 (1911), p. 191—192.

296) *G. Herglotz*, Über Potenzreihen mit positivem reellen Teil im Einheitskreis, Leipz. Ber. 63 (1911), p. 501—511.

aus, und so sehen wir denn bald eine Reihe rein algebraischer Beweise entstehen.²⁹⁷⁾

*J. Schur*²⁹⁴⁾ hat durch einen bekannten kettenbruchähnlichen aus dem *Schwarz*schen Lemma gespeisten Algorithmus das Problem $|f(z)| < 1$ in $|z| < 1$ direkt in Angriff genommen. Er gelangte zu folgendem Satz:

$$f(z) = \frac{a_0 + a_1 z + \dots}{b_0 + b_1 z + \dots}$$

ist dann und nur dann in $|z| < 1$ regulär mit einem Betrage unter Eins, wenn die Determinanten

$$\delta_n = \begin{vmatrix} \bar{b}_0 & 0 & \dots & 0 & a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ \bar{b}_1 & \bar{b}_0 & \dots & 0 & 0 & a_0 & \dots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ \dots & \dots \\ \bar{b}_{n-1} & \bar{b}_{n-2} & \dots & \bar{b}_0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ \bar{a}_0 & 0 & \dots & 0 & b_0 & b_1 & \dots & b_{n-2} & b_{n-1} \\ \bar{a}_1 & \bar{a}_0 & \dots & 0 & 0 & b_0 & \dots & b_{n-3} & b_{n-2} \\ \dots & \dots \\ \bar{a}_{n-1} & \bar{a}_{n-2} & \dots & \bar{a}_0 & 0 & 0 & \dots & 0 & b_0 \end{vmatrix}$$

entweder alle wesentlich positiv sind oder doch von der ersten verschwindenden an alle verschwinden. Dieser letztere Fall tritt nur für die im vorigen Satz mit $\varphi(z)$ bezeichneten rationalen Funktionen ein. Von einer neuen Seite her hat *O. Szász*²⁹⁸⁾ das Problem in Angriff genommen. Er bringt wie *Toeplitz* und *Schur* den Wertevorrat einer Potenzreihe mit dem Wertevorrat gewisser Bilinearformen in Zusammenhang und bestimmt die Stützgeraden am Koeffizientenraum der in $|z| < 1$ beschränkten Potenzreihen.

Im engen Zusammenhang mit diesen Ergebnissen steht das folgende von *Carathéodory* und *Fejér*⁶⁹⁾ gelöste Problem: Die $n + 1$ ersten Koeffizienten der Reihe $f(z) = \sum a_n z^n$ seien gegeben, gefragt wird nach dem kleinsten Wert, den die obere Grenze der absoluten Beträge von $f(z)$ für alle $|z| < 1$ annehmen kann. Dies Minimum des Maximums wird für eine eindeutig bestimmte rationale Funktion erreicht,

297) *E. Fischer*, Über das *Carathéodory*sche Problem, Potenzreihen mit positivem reellen Teil betreffend, *Rend. di Palermo* 32 (1911), p. 240—256; *G. Frobenius*, Ableitung eines Satzes von *Carathéodory* aus einer Formel von *Kronecker*, *Sitzber. kgl. Akad. Berlin* 1912, p. 16—31; *J. Schur*, Über einen Satz von *Carathéodory*, *Sitzber. kgl. Akad. Berlin* 1912, p. 4—15; *F. Riesz*, Über ein Problem von *Carathéodory*, *J. f. Math.* 146 (1916), p. 83—87.

298) *O. Szász*, a) Ungleichungen für die Koeffizienten einer Potenzreihe, *Math. Ztschr.* 1 (1918), p. 163—183; b) Über Potenzreihen und Bilinearformen, *Math. Ztschr.* 4 (1919), p. 163—176.

die in $|z| < 1$ an n Stellen verschwindet und am Rande konstanten absoluten Betrag hat.²⁹⁹⁾

*G. Pick*³⁰⁰⁾ hat noch folgenden Satz gefunden: Die sämtlichen in $|z| < 1$ regulären Funktionen $\sum a_n z^n$, welche daselbst einen positiven Realteil haben und in den ersten n Koeffizienten übereinstimmen, ordnen jedem festen Wert von z einen Kreis zu. Dieser ist der Ort der Werte, welche die verschiedenen Funktionen in jenem Punkte z annehmen. *Pick* hat auch die Resultate von *Carathéodory* und *Fejér* insofern erweitert, als er statt der Ableitungen von $z = 0$ die Werte an n verschiedenen Stellen in Betracht zog. Für diese müssen n von ihm angegebene Relationen erfüllt sein. Auch der Satz von der Kreisscheibe überträgt sich auf diesen Fall. Für $n = 1$ hat *Pick*⁷⁴⁾ seine Sätze noch direkt aus dem *Schwarzschen* Lemma gewonnen.

Im Prinzip enthalten die Untersuchungen von *Carathéodory* und *Schur* über die Koeffizienten beschränkter Potenzreihen alles, was sich über dieselben sagen läßt, und jeder weitere Koeffizientensatz muß eine Folge dieser notwendigen und hinreichenden Bedingungen sein. Für die jetzt zu besprechenden *Landauschen* Ergebnisse über die Koeffizientensumme beschränkter Potenzreihen hat dies *J. Schur* in seiner zweiten Arbeit²⁹⁴⁾ gezeigt.

Der von *Landau*³⁰¹⁾ bewiesene Satz lautet:

Für $|z| < 1$ sei $f(z)$ regulär, und es gelte $|f(z)| \leq 1$ in $|z| < 1$. Mit s_n werde die Summe $a_0 + a_1 + \dots + a_n$ bezeichnet. Dann ist für die Menge aller dieser $f(z)$ die obere Grenze von $|s_n|$ durch

299) Vgl. dazu: *T. H. Gronwall*, On analytic functions of constant modulus on a given contour, *Ann. of math.* (2) 14 (1913), p. 72—80. Eine neue Lösung enthält die Arbeit: *T. H. Gronwall*, On the maximum modulus of an analytic function, *Ann. of math.* (2) 16 (1914/15), p. 77. *F. Riesz*, der gleichfalls eine neue Lösung gibt, erkannte den engen Zusammenhang des Problems mit dem anderen: Von einer Potenzreihe, die eine in $|z| \leq 1$ reguläre Funktion darstellen soll, sind die $n + 1$ ersten Koeffizienten gegeben. Die übrigen sollen so bestimmt werden, daß $|z| = 1$ auf eine Kurve möglichst kleiner Länge abgebildet wird. Die Lösung wird durch eine eindeutig bestimmte ganze rationale Funktion höchstens $2n^{\text{ten}}$ Grades geliefert. Vgl. *F. Riesz*, Über Potenzreihen mit vorgeschriebenen Anfangsgliedern, *Acta math.* 42 (1920), p. 145—171.

300) *G. Pick*, a) Über die Beschränkungen analytischer Funktionen, welche durch vorgegebene Funktionswerte bewirkt werden, *Math. Ann.* 77 (1916), p. 7—23; b) Über die Beschränkungen analytischer Funktionen durch vorgegebene Funktionswerte, *Math. Ann.* 78 (1918), p. 270—275. Vgl. auch die Behandlung des Problems durch *R. Nevanlinna*, Über beschränkte Funktionen, die in gegebenen Punkten vorgeschriebene Werte annehmen, *Ann. acad. Fennicae A* 13 (1919), Nr. 1.

301) *E. Landau*, Abschätzung der Koeffizientensumme einer Potenzreihe, *Arch. Math. Phys.* (3) 21 (1913), p. 42—50 und p. 250—255 und (3) 24 (1916), p. 250—260.

$$G_n = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2n-1}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}\right)^2 = O(\log n)$$

gegeben. Diese obere Grenze wird nur für die Funktion

$$f(z) = e^{i\gamma} \frac{z^n \cdot \sum_0^n \binom{-\frac{1}{2}}{\nu} \left(-\frac{1}{z}\right)^\nu}{\sum_0^n \binom{-\frac{1}{2}}{\nu} (-z)^\nu} \quad (\gamma \text{ reell})$$

erreicht.³⁰²⁾

Nachdem erst *Fejér*²⁵⁰⁾ erkannt hatte, daß die Menge der $|s_n|$ für eine einzelne beschränkte Funktion nicht beschränkt zu sein braucht^{302a)}, hat *Bohr*³⁰³⁾ gezeigt, daß es Funktionen gibt, für die

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|s_n|}{G_n} = 1$$

ist. Für jedes $|f(z)| < 1$ ist nach *Bohr* weiter

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (G_n - |s_n|) = \infty.$$

Die Frage, ob $s_n = o(\log n)$ ist, ist erst zum Teil erledigt.³⁰¹⁾

Schon *Steffensen*³⁰⁴⁾ bemerkte, daß die Menge der

$$t_n = \frac{|s_0 + s_1 + \dots + s_n|}{n+1}$$

für jede einzelne beschränkte Funktion beschränkt ist. *Fejér*³⁰⁵⁾ zeigte, daß die Menge dieser arithmetischen Mittel sogar unter Eins liegt, wenn der Betrag von $f(z)$ unter Eins bleibt. Nur für $f(z) \equiv e^{i\gamma} \cdot z$ wird $|s_0 + s_1 + \dots + s_n| = n + 1$.

Neuerdings hat *O. Szász*²⁹⁸⁾ durch seine Bestimmung der Stützebenen des Koeffizientenraumes alle diese Untersuchungen auf eine einheitliche Basis gestellt und auch die Untersuchung von $|a_0| + |a_1| + \dots + \dots + |a_n|$ in die Wege geleitet.

302) Für $n = 1$ hat dies vor *Landau* schon *Pompéju* gefunden: *Pompéju*, Sur une relation d'inégalité dans la théorie des fonctions holomorphes, Arch. Math. Phys. (3) 19 (1911), p. 224—228. Weitere Vorläufer sind *E. Fabry*, Paris C. R. 149 (1900), p. 767—768 und *Hansen*. Vgl. auch *Landau* 186).

302a) Nicht einmal die Stetigkeit im abgeschlossenen Einheitskreis zieht die Beschränktheit der $|s_n|$ nach sich. Wohl aber zieht nach *Fatou*⁹⁵⁾ die Regularität in $z = 1$ zusammen mit der Beschränktheit im Einheitskreis die Beschränktheit der $|s_n|$ nach sich.

303) *H. Bohr*, Über die Koeffizientensumme einer beschränkten Potenzreihe, Gött. Nachr. 1916, p. 276—291 und 1917, p. 119—128.

304) *J. E. Steffensen*, Über Potenzreihen insbesondere solche, deren Koeffizienten zahlentheoretische Funktionen sind, Rend. di Palermo 38 (1914), p. 376—386.

305) *L. Fejér*, a. a. O. 250). Man vgl. dazu *O. Szász*, a. a. O. 298), Fußnote 2. Vgl. auch *Landau*³⁰¹⁾.

61. Jensens Verallgemeinerung des Schwarzischen Lemmas. *Jensen*³⁰⁶⁾ hat folgende Verallgemeinerung des *Schwarzischen Lemmas* gefunden: Wenn $|f(z)| < M$ bleibt für $|z| < R$ und für z_0, z_1, \dots, z_n in diesem Kreis verschwindet, so ist

$$|f(z)| \leq M \cdot \left| \frac{R(z-z_0)}{R^2-\bar{z}_0 z} \right| \cdot \left| \frac{R(z-z_1)}{R^2-\bar{z}_1 z} \right| \cdot \dots \cdot \left| \frac{R(z-z_n)}{R^2-\bar{z}_n z} \right|,$$

und das Gleichheitszeichen steht hier nur für die Funktionen

$$f(z) \equiv e^{i\varphi} \cdot M \prod_0^n \frac{R(z-z_k)}{R^2-\bar{z}_k z}.$$

Setzt man in der letzten Abschätzung $z = 0$, so erhält man

$$|f(0)| \leq M \frac{|z_0 \cdot z_1 \cdot \dots \cdot z_n|}{R^{n+1}}.$$

Ihrer Herleitung nach gilt diese Abschätzung zunächst nur für solche Werte von R , welche alle $|z_0|, |z_1|, \dots, |z_n|$ übertreffen. Aber *Liindelöf*¹¹⁵⁾ hat bemerkt, daß die Abschätzung für alle R gilt. Man entnimmt ihr also eine Abschätzung für das Produkt der $n+1$ ersten Nullstellen. Diese hat *Jensen* schon 1895³⁰⁷⁾ angegeben. Nach *Hurwitz*³⁰⁸⁾ findet sie sich für Polynome schon bei *Jacobi*. Für die $n+1$ ersten η -Stellen z_0, z_1, \dots, z_n gilt nach *Landau*³⁰⁹⁾

$$|z_0 \cdot z_1 \cdot \dots \cdot z_n| \geq \frac{M|f(0) - \eta|}{|M^2 - \eta f(0)|} \cdot R^{n+1}.$$

Auch diese Abschätzung ergibt sich aus einer allgemeineren von *Jensen*

$$M \left| \frac{f(z) - \eta}{M^2 - \eta f(z)} \right| \leq \left| \frac{R(z-z_0)}{R^2-\bar{z}_0 z} \right| \cdot \dots \cdot \left| \frac{R(z-z_n)}{R^2-\bar{z}_n z} \right|,$$

wenn man in ihr $z = 0$ einträgt. Bildet man sie für die kleinste η -Stelle z_0 allein und geht zur Grenze $z \rightarrow z_0$ über, so findet man eine Abschätzung für die Ableitung

$$|f'(z)| \leq \frac{R}{M} \cdot \frac{M^2 - |f(z)|^2}{R^2 - |z|^2}.$$

306) *J. L. W. V. Jensen*, Untersuchungen über eine Klasse fundamentaler Ungleichungen in der Theorie der analytischen Funktionen I, (dänisch), Kgl. Dansk. Vidensk. Selsk. skr. nat. og math. afd. (8) 23 (1916), p. 203—228. Übers. ins Englische *Ann. of math.* (2) 21 (1919). Man vgl. auch *Carathéodory* und *Fejér*, *Remarques sur le théorème de M. Jensen*, *Paris C. R.* 145 (1907), p. 163—165.

307) *J. L. W. V. Jensen*, Sur un nouvel et important théorème de la théorie des fonctions, *Acta math.* 22 (1899), p. 359—364. Für diesen Satz wurden zahlreiche Beweise gegeben. *E. Goursat*, Sur un théorème de *M. Jensen*, *Bull. des sc. math.* (2) 26 (1902), p. 298—302. *G. Mittag-Leffler*, Sur le théorème de *M. Jensen*, *Bull. soc. math. Fr.* 32 (1904), p. 1—4.

308) Bei *E. Landau*³⁰⁹⁾.

309) *E. Landau*, Über eine Aufgabe aus der Funktionentheorie, *The Tôhoku math. J.* 5 (1914), p. 97—116.

Insbesondere also wird

$$|f'(0)| \leq \frac{M^2 - |f(0)|^2}{M \cdot R}.$$

Für die Gesamtheit aller Funktionen, die in $|z| < R$ regulär sind und dort der Bedingung $|f(z)| < M$ genügen, findet man also die Schranke

$$|f'(z)| \leq \frac{RM}{R^2 - |z|^2}.$$

Sie wird für die Funktion $\frac{M \cdot R(z-r)}{R^2 - rz}$

auf $|z| = r$ erreicht. Auch für die zweite und die ungeraden höheren Ableitungen hat *O. Szász*^{309a)} genaue Schranken angegeben, in die wie in die vorige der Wert $|f(z)|$ nicht eingeht.

Nach *Wiener*³¹⁰⁾ findet man:

$$|f^{(n)}(0)| < n! \frac{M^2 - |f(0)|^2}{M R^n}.$$

Nach *Landau*³¹¹⁾ gilt weiter für

$$f(z) = \sum a_n z^n$$

$$|z_0 \cdot z_1 \cdots z_n| \geq \frac{|a_0| R^{n+1}}{\sqrt{\sum_0^\infty |a_k|^2 R^{2k}}}$$

eine Formel, die für $n = 0$ zuerst *Petrovitch*³¹²⁾ angab. Sie gibt also eine Abschätzung für die Lage der Nullstellen, die nur von den Koeffizienten der Potenzreihe nicht vom Maximum ihres absoluten Betrages oder dgl. abhängt. Das Hereinziehen des Realteils gibt zu weiteren Abschätzungen Anlaß, die auch *Jensen*³⁰⁶⁾ behandelt hat. Ich erwähne nur die folgende, welche die meisten in den oben³²²⁾ erwähnten Arbeiten enthaltenen Abschätzungen in sich begreift. Man hat für die kleinste Nullstelle z_0

$$|f(z)| \leq \frac{|R^2 - \bar{z}_0 z|}{R|z - z_0|} |f(z) - 2N|,$$

wenn $f(z)$ für $|z| < R$ regulär ist und daselbst $|\Re f(z)| < N$ gilt.

Die vorhin angegebenen Abschätzungen von $f^{(n)}(0)$ sind natürlich Verschärfungen des *Cauchyschen* Koeffizientensatzes. Sie ist auch für

309a) *O. Szász*, Ungleichheitsbeziehungen für die Ableitungen einer Potenzreihe, die eine im Einheitskreise beschränkte Funktion darstellt, *Math. Ztschr.*

310) Bei *H. Bohr*, A theorem concerning power series, *Proc. Lond. math. Soc.* (2) 13 (1914), p. 1–5.

311) *E. Landau*, Sur quelques théorèmes de *M. Petrovitch* relatifs aux zéros des fonctions analytiques, *Bull. soc. math. Fr.* 33 (1905), p. 251–261. Vgl. auch 309).

312) *M. Petrovitch*, Remarques sur les zéros de fonctions entières, *Bull. soc. math. Fr.* 32 (1904), p. 65–67.

den einzelnen Koeffizienten von $\sum a_n z^n$ schärfer als die, welche aus der bekannten *Gutzmerschen*³¹³⁾ Verschärfung

$$\sum |a_n|^2 R^{2n} \leq M^2$$

des Koeffizientensatzes fließt. Denn dieser liefert nur

$$|f^{(n)}(0)| \leq n! \frac{\sqrt{M^2 - |f(0)|^2}}{R^n}.$$

62. Die Funktionen $M(r)$, $\mu(r)$, $\mathfrak{M}(r)$. Es mögen hier noch einige Untersuchungen Platz finden, die zwar nicht eigentlich hierher gehören, die aber bisher auch sehr schlecht Platz hätten finden können. $M(r)$ sei das Maximum des absoluten Betrages von $f(z)$ für $|z| \leq r$. *Hadamard*^{117b)} und davon unabhängig *Blumenthal*³¹⁴⁾ und *Faber*³¹⁵⁾ fanden, daß $\log M(r)$ eine konvexe Funktion von $\log r$ ist. Weitere Beweise gaben *Hadamard*³¹⁶⁾ und *E. Landau*¹⁸⁶⁾, der den Satz *Dreikreisesatz* nennt. *Blumenthal* hat weiter bewiesen, daß $M(r)$ stetig ist und aus Bogen analytischer Kurven besteht. Die einzelnen Bogen können unter von Null verschiedenen Winkeln zusammenstoßen. Das beobachtet man schon bei Polynomen dritten Grades sowie nach *Hardy*³¹⁷⁾ bei Funktionen^{317a)}

$$e^{a_0 z^2 + a_1 z^2 + a_2 z + a_3}.$$

Der Mittelwert $\mu(r)$. *Hardy*³¹⁸⁾ hat gezeigt, daß auch

$$\mu(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\varphi})| d\varphi \quad \text{und} \quad \mu_\delta(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\varphi})|^\delta d\varphi \quad (\delta > 0)$$

monoton wächst und dem Dreikreisesatz genügt. *Landau* gab einen neuen Beweis.³¹⁹⁾ Der Satz ist gleichbedeutend damit, daß die Länge

313) *A. Gutzmer*, Ein Satz über Potenzreihen, *Math. Ann.* 32 (1888), p. 596—600.

314) *O. Blumenthal*, a) a. a. O. 147b); b) Sur le mode de croissance des fonctions entières, *Bull. soc. math. Fr.* 35 (1907), p. 97—109.

315) *G. Faber*, Über das Anwachsen analytischer Funktionen, *Math. Ann.* 63 (1907), p. 549—551.

316) *J. Hadamard*, Notice sur les travaux scientifiques, Paris 1912.

317) *G. Hardy*, The maximum modulus of an integral function, *Quart. J.* 41 (1909), p. 1—9.

317a) *Valiron* hat $M(r)$ bei ganzen Funktionen vom Geschlecht Eins oder Zwei sehr genau untersucht. Vgl. *Valiron*, Maximum du module des fonctions entières de genre un et deux, *Nouv. Ann.* (4) 12 (1912), p. 193—212.

318) *G. H. Hardy*, The mean value of the modulus of an analytic function, *Proc. Lond. math. Soc.* (2) 14 (1915), p. 269—277. Vgl. auch *P. Csillag*, Über die Beziehung zweier auf Potenzreihen bezüglichen Konvergenzkriterien (ungarisch), *Math. és. phys. lapok* 26 (1917), p. 74—80; *F. Riesz*, a. a. O. 299).

319) *E. Landau*, Neuer Beweis eines *Hardyschen* Satzes, *Arch. Math. Phys.* (3) 25 (1916), p. 173—178. Vgl. auch *E. Hille*, Über die Variation der

der durch eine in $|z| \leq R$ analytischen Funktion erhaltenen Bildkurve von $|z| = r < R$ mit r zugleich wächst und dem Dreiecksatz genügt. Die gleichen Eigenschaften besitzt auch der Inhalt.

Die Majorante $\mathfrak{M}(r) = \sum |a_n| r^n$. Wenn $f(z)$ regulär und $|f(z)| < 1$ ist für $|z| < 1$, so braucht die Majorante $\mathfrak{M}(r)$ in $|z| < 1$ nicht einmal beschränkt zu sein. Hardy³²⁰) hat ihr Wachstum etwas näher untersucht und fand

$$\mathfrak{M}(r) = o\left(\frac{1}{\sqrt{1-r}}\right).$$

Diese Untersuchungen wurden von J. Schur, M. Riesz, F. Wiener, H. Bohr in einem wesentlichen Punkt ergänzt.³¹⁰) Sie fanden, daß $\mathfrak{M}(\frac{1}{3}) \leq 1$ ist, daß es aber für jedes $r > \frac{1}{3}$ Funktionen gibt, für die $\mathfrak{M}(r) > 1$ ist.

63. Schwankungen. Nach Vorstufen bei Schottky und Landau haben Landau, Toeplitz und Hartogs³²¹) folgenden Satz gefunden: Wenn $f(z) = \sum a_n z^n$ in $|z| < 1$ regulär ist, und D die Schwankung der Funktion am Rande bedeutet, so ist $|a_1| \leq \frac{1}{2} D$, und nur für $a_0 + a_1 z$ kann $|a_1| = \frac{1}{2} D$ sein. Poukka³²²) hat für die weiteren Koeffizienten a_n dieselbe Abschätzung $|a_n| \leq \frac{1}{2} D$ bewiesen. Hier wird die Schranke nur für $a_0 + a_n z^n$ erreicht. Diese Ergebnisse legen die Frage nach den notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Koeffizienten einer Potenzreihe mit gegebener Schwankung nahe. Indessen ist da mehr als das eben Erwähnte noch nicht bekannt.

Bezeichnet man mit E die Schwankung von $\Re f(z)$ auf $|z| = 1$, so fand Landau³²¹) weiter $|a_1| \leq \frac{2}{\pi} E$. Der Faktor $\frac{2}{\pi}$ kann durch keinen kleineren ersetzt werden. Von Schottky³²¹) rührt

$$|f(z_1) - f(z_2)| \leq D \frac{2}{\pi} \arcsin \left| \frac{1 - z_1 \bar{z}_2}{z_1 - z_2} \right|$$

für $|z_1| < 1$, $|z_2| < 1$ her.

Bogenlänge bei konformer Abbildung von Kreisbereichen, Arkiv for mat. astr. och fys. 11 (1916), Nr. 27.

320) G. H. Hardy, A theorem concerning Taylor series, Quart. J. 44 (1913), p. 147—160.

321) F. Schottky, Über die Wertschwankungen der harmonischen Funktionen zweier reellen Veränderlichen und die Funktionen eines komplexen Argumentes, J. f. Math. 117 (1897), p. 225—253; E. Landau, Über einige Ungleichheitsbeziehungen in der Theorie der analytischen Funktionen, Arch. Math. Phys. (3) 11 (1906), p. 31—36; E. Landau und O. Toeplitz, Über die größte Schwankung einer analytischen Funktion in einem Kreise, Arch. Math. Phys. (3) 11 (1907), p. 302—307. In dieser Arbeit findet sich ein Beitrag von F. Hartogs.

322) K. A. Poukka, Über die größte Schwankung einer analytischen Funktion in einem Kreise, Arch. Math. Phys. (3) 12 (1907), p. 251—254.

64. Schlichte Familien. $f(z)$ heißt in $|z| < 1$ schlicht, wenn $f(z)$ dort keinen Wert mehr als einmal annimmt. Auf diese Familie ist erst durch die Arbeiten *Koebes*, insbesondere seinen für die Zwecke der Uniformisierung aufgestellten Verzerrungssatz die Aufmerksamkeit gelenkt worden. Diesen *Verzerrungssatz* hat *Koebe* 1909 entdeckt.³²³⁾ Erst *Plemelj*³²⁴⁾ hat eine scharfe Fassung dieses Satzes vorgetragen, die unabhängig davon *Gronwall*³²⁵⁾ und *Pick*³²⁶⁾ wieder fanden, und die *Pick* zuerst vollständig bewiesen hat. In dieser scharfen Fassung lautet der Verzerrungssatz:

Wenn $f(z) = z + a_2 z^2 + \dots$ für $|z| < 1$ schlicht und regulär ist, so gilt

1. für irgend zwei Stellen z_1 und z_2 aus dem Kreise $|z| \leq r < 1$

$$\left(\frac{1-r}{1+r}\right)^4 \leq \left|\frac{f'(z_1)}{f'(z_2)}\right| \leq \left(\frac{1+r}{1-r}\right)^4,$$

2. in $|z| < r$

$$\frac{r}{(1+r)^2} \leq |f'(z)| \leq \frac{r}{(1-r)^2}.$$

Die Schranken werden nur für

$$\frac{z}{(1 - e^{i\varphi} z)^2}$$

erreicht. Bei *Pick* blieben die hier mit 2 und 4 bewerteten Exponenten noch unbestimmt. Ihre Bestimmung gelingt erst *Bieberbach*³²⁷⁾ auf Grund seines Flächensatzes und eines *Faberschen*³²⁸⁾ Kunstgriffes.

323) *P. Koebe*, Über die Uniformisierung der algebraischen Kurven durch automorphe Funktionen mit imaginärer Substitutionsgruppe, Gött. Nachr. 1909, p. 68—76. Ferner a. a. O. 29 b).

324) *J. Plemelj*, Über den Verzerrungssatz von *P. Koebe*, Verh. d. Ges. D. Natf. u. Ärzte 85 (1913) Abtlg. III, p. 163.

325) *Gronwall*, Sur la déformation dans la représentation conforme, Paris C. R. 162 (1916), p. 249—252.

326) *G. Pick*, Über den *Koebeschen* Verzerrungssatz, Leipz. Ber. 1916, p. 58—64.

327) *L. Bieberbach*, Über die Koeffizienten derjenigen Potenzreihen, welche eine schlichte Abbildung des Einheitskreises vermitteln, Sitzber. kgl. Akad. Berlin 1916, p. 940—955. Das Verhalten des Flächeninhaltes bei konformer Abbildung betrachtet auch *G. Hamel*, Über Funktionen von beschränktem mittleren Quadrat und über die Grenzen der Flächenvergrößerung bei konformer Abbildung Monatsh. Math. Phys. 29 (1918), p. 48—64. Indessen ist sein Ergebnis eine leichte Folgerung aus dem ersten Flächensatz, den *L. Bieberbach*, Zur Theorie und Praxis der konformen Abbildung, Pal. Rend. 38 (1914), p. 98—112, aufgestellt hat. Vgl. dazu auch: *A. Winternitz*, Über zwei von *Hamel* herrührende Extremumsätze der Funktionentheorie, Monatsh. Math. Phys. 30 (1920), p. 123—128.

328) *G. Faber*, Neuer Beweis eines *Koebe-Bieberbachschen* Satzes über konforme Abbildung, Münch. Ber. 1916, p. 39—42.

Neuerdings hat *R. Nevanlinna*^{328,1)} den Verzerrungssatz als unmittelbare Folge des Flächensatzes erkannt. Der Flächensatz lautet:

Wenn $f(z) = z + a_0 + \frac{\alpha_1}{z} + \dots$ eine schlichte Abbildung von $|z| > 1$ vermittelt, so ist $\sum n |\alpha_n|^2 \leq 1$. Diese Ungleichung bedeutet weiter nichts, als daß der äußere Inhalt der Komplementärmenge des Bildbereiches positiv oder Null sein muß. Ein Spezialfall findet sich bei *Faber*³²⁸⁾; ein einfacherer Beweis bei *Pick*.³²⁹⁾ Allgemeine Sätze über $|z| > 1$ gibt *Löwner*.^{335b)}

*Bieberbach*³²⁷⁾ hat weiter gezeigt, daß $f(z) = z + a_2 z^2 + \dots$ den Kreis $|z| < 1$ dann und nur dann schlicht abbildet, wenn ihr n -ter Repräsentant (a_2, a_3, \dots, a_n) für jedes n einen Punkt eines gewissen einfach zusammenhängenden algebraisch begrenzten Bereiches bestimmt. Die Bestimmung der Ränder ist noch nicht allgemein gelungen. Immerhin ist $|a_2| \leq 2$ die genaue Schranke für a_2 , die nur für

$$\frac{z}{(1 - e^{i\varphi} z)^2}$$

erreicht wird, ein Satz, auf dem auch die Koeffizientenbestimmung in der *Pickschen* Verzerrungsformel beruht. Das sind also Untersuchungen, die denjenigen von *Carathéodory* und *Schur* über beschränkte Familien durchaus analog sind. Eine weitere Parallele sind auch die Untersuchungen von *Carathéodory* und *Fejér*⁶⁹⁾ über die Koeffizienten der Null und Eins vermeidenden Familie. Einen Beitrag zum Koeffizientenproblem enthält auch der Satz von *Fejér*²⁵⁴⁾, wonach eine in $|z| < 1$ schlichte Funktion, welche $|z| < 1$ auf einen von einer *Jordankurve* begrenzten Bereich abbildet, eine in $|z| \leq 1$ gleichmäßig konvergente Potenzreihenentwicklung besitzt.

Aus dem Flächensatz bzw. der Abschätzung 2. auf p. 510 kann leicht der folgende von *Koebe*³³⁰⁾ herrührende Satz gefolgert werden³³¹⁾:

Wenn $f(z)$ für $|z| < 1$ regulär und schlicht ist, so hat der Null nächstgelegene Randpunkt von $z = 0$ eine Entfernung, die nicht kleiner als $\frac{1}{4}$ sein kann, und die nur für $\frac{z}{(1 - e^{i\varphi} z)^2}$ gleich $\frac{1}{4}$ wird.

328,1) *R. Nevanlinna*, Über die schlichten Abbildungen des Einheitskreises, Övers. av Finska Vet. Förh. Bd. 62 (1919/20), Avd. A, Nr. 7.

329) *G. Pick*, Über die konforme Abbildung eines Kreises auf ein schlichtes und zugleich beschränktes Gebiet, Wien. Ber. 1917 Abtlg. IIa 126, p. 247—263.

330) *P. Koebe*, a. a. O. 28).

331) *G. Faber*, a. a. O. 328); *L. Bieberbach*³²⁷⁾. Vgl. auch *L. Bieberbach*, Math. Ann. 72 (1912), p. 107—144. Vgl. auch *L. Bieberbach*, Math. Ann. 77 (1916), p. 153—172, wo ein anderer Beweis versucht wurde. *G. Faber*, Über Potentialtheorie und konforme Abbildung, Münch. Ber. 1920, p. 49—64, gibt einen neuen Beweis und eine Reihe weiterer neuer Sätze.

Jede Folge von schlichten Funktionen $a_1 z + \dots$, für die $|a_1|$ und $\frac{1}{|a_1|}$ beschränkt sind, ist eine normale Familie; jede Grenzfunktion ist wieder schlicht. Das lehrt der Verzerrungssatz in Verbindung mit dem Satz von *Rouché*. Auf solche Folgen von Funktionen bezieht sich ein Satz von *Carathéodory*.³³²⁾

Neuerdings hat *Bieberbach*³³³⁾ dem Verzerrungssatz einen *Drehungssatz* an die Seite gestellt. Er beweist: Wenn $f(z) = z + a_2 z^2 + \dots$ in $|z| < 1$ schlicht und regulär ist, so gilt

$$|\arg f'(z)| \leq 2 \log \frac{1+|z|}{1-|z|} \quad (\arg f'(0) = 0)$$

eine Schranke, die noch verschärft werden kann. Der Beweis beruht auf der leicht aus $|a_2| \leq 2$ fließenden Ungleichung

$$\left| \frac{f''(z)}{f'(z)} (1 - z\bar{z}) - 2\bar{z} \right| \leq 4,$$

die nach *R. Nevanlinna*^{328, 1)} auch die ganze Lösung des Verzerrungsproblems enthält. (Vgl. auch II C 3 (*Lichtenstein*), Nr. 47.)

65. Familien, die schlicht und beschränkt zugleich sind. Die Untersuchung läuft in vielen Stücken der bei den schlichten Familien parallel. Den Anstoß gab auch hier ein Satz von *Koebe*^{39) 29b)}, den er beim Hauptkreistheorem der Uniformisierung verwendete: Wenn der schlichte Bereich B ganz dem Inneren des Einheitskreises angehört und den Nullpunkt enthält, und d der Abstand seines nächsten Randpunktes vom Mittelpunkt ist, dann kann B durch eine Funktion, die bei Null verschwindet und dort die Ableitung Eins besitzt, auf einen Kreis abgebildet werden, dessen Radius kleiner ist als $\frac{4d}{(1+d)^2}$. Diese Schranke wird nur dann erreicht, wenn es sich um die Abbildung eines Bereiches handelt, der aus dem Kreis $|z| < 1$ durch radiale Aufschlitzung von einem Punkte des Betrages d bis zum Rande des Einheitskreises entsteht.³³⁴⁾

*Pick*³²⁹⁾ hat diese Untersuchungen wieder aufgenommen und zunächst den eben ausgeführten Satz auf folgende Form gebracht:

332) *C. Carathéodory*, Untersuchungen über die konforme Abbildung von festen und veränderlichen Gebieten, *Math. Ann.* 72 (1912), p. 107—144. Vgl. auch *L. Bieberbach*, Über einen Satz des Herrn *Carathéodory*, *Gött. Nachr.* 1915, p. 552—560.

333) *L. Bieberbach*, Aufstellung und Beweis eines Drehungssatzes für schlichte und konforme Abbildungen, *Math. Ztschr.* 4 (1919), p. 295—305. *P. Koebe*, Zum Verzerrungssatz der konformen Abbildung, *Math. Ztschr.* 6 (1920), p. 311—312 hat auf Grund einer älteren Ungleichungsbeziehung^{29a)} zwischen Real- und Imaginärteil einer analytischen Funktion eine weniger scharfe Abschätzung aus dem Verzerrungssatz gewonnen. *R. Nevanlinna*^{328, 1)} hat *Bieberbachs* Beweis wesentlich verkürzt.

334) *Bieberbach*, a. a. O. 331), *Math. Ann.* 77.

Wenn $f(z)$ für $|z| < 1$ schlicht ist, und wenn dort $|f(z)| < R$ gilt, wenn „am Rand“ außerdem $|f(z)| \geq r$ ist, so ist

$$(R + r)^2 \leq 4R^2r.$$

Das Gleichheitszeichen kann nur dann stehen, wenn es sich um die Abbildung von $|z| < 1$ auf den von r bis R aufgeschlitzten Kreis vom Radius R handelt. Weiter hat *Pick* das Analogon des Verzerrungssatzes gewonnen.

66. Konvexe Familien. Dahin gehört vor allem *Study's* Rundungsschranke³⁵⁾: Die Potenzreihe $f(z) = a_0 + a_1z + \dots$ kann in einem Kreise $|z| < \varrho$, für den $\varrho > \left| \frac{a_1}{a_2} \right|$ ist, nicht regulär und konvex zugleich sein, d. h. denselben auf einen konvexen Bereich abbilden; und

$$a_0 + \frac{e^{i\varphi} \cdot z}{(1 - e^{i\varphi} \cdot z)^2}$$

sind die einzigen Funktionen, die für $|z| < \left| \frac{a_1}{a_2} \right| = 1$ konvex sind.

*Gronwall*³²⁵⁾ hat angegeben, daß für jede $|z| < 1$ schlichte und reguläre Funktion $f(z)$ die Rundungsschranke nicht kleiner als $2 - \sqrt{3}$ sein kann. Für $\frac{z}{(1-z)^2}$ wird diese Schranke gerade erreicht. Ein Beweis für diese Angabe läßt sich nach *R. Nevanlinna*^{328,1)} sehr leicht aus der am Ende von Nr. 64 angegebenen Abschätzung ablesen. Wie ich neuerdings gefunden habe, wird ein fast doppelt so großer Kreis stets auf einen Stern abgebildet.

Die Frage nach den Koeffizienten konvexer Funktionen ist gleichfalls durch die Untersuchungen von *Study* erledigt. Die Funktion $f(z)$ ist nämlich dann und nur dann für $|z| < 1$ konvex, wenn

$$\Re \left(1 + \frac{zf''(z)}{f'(z)^2} \right) \geq 0$$

ist. Bei Anwendung auf $1 + \frac{zf''(z)}{f'(z)^2}$ erledigen also die *Carathéodory-Schurschen* Untersuchungen über Funktionen mit positivem Realteil auch das Koeffizientenproblem der konvexen Funktionen. *K. Löwner*³³⁵⁾ hat bemerkt, daß sämtliche Koeffizienten einer in $|z| < 1$ konvexen Funktion dem Betrage nach nicht über Eins liegen. *Löwner* hat weiter das Analogon zum Verzerrungsgesetz hergeleitet.

335) *K. Löwner*, a) Untersuchungen über die Verzerrung bei konformen Abbildungen des Einheitskreises $|z| < 1$, die durch Funktionen mit nicht verschwindender Ableitung geliefert werden, Leipz. Ber. 1917, p. 89–106; b) Über Extremumsätze bei der konformen Abbildung des Äußeren des Einheitskreises, Math. Ztschr. 3 (1919), p. 65–77. Vgl. ferner: *E. Frank*, Beiträge zur konformen Abbildung, Diss. Frankfurt 1919.

Ich erwähne noch einen Satz von *Carathéodory*³³⁶): Man kann die Koeffizienten a_0, a_1, \dots, a_n der Funktion $\Sigma a_n z^n$ mit der selbstverständlichen Einschränkung $a_1 \neq 0$ beliebig vorgeben und dann noch die anderen so bestimmen, daß die Reihe ihren Konvergenzkreis auf ein konvexes Polygon abbildet. Man kann sie sogar auf eine einzige Weise so bestimmen, daß das Polygon höchstens n Seiten besitzt.

Arithmetische Eigenschaften analytischer Funktionen.

67. Arithmetische Eigenschaften analytischer Funktionen.
*E. Strauß*³³⁷) hat 1887 zu beweisen versucht, daß eine analytische Funktion, die für alle rationalen Werte des Argumentes rational ist, eine rationale Funktion sei. Aber *Weierstraß*³³⁸) gab alsbald ein Beispiel einer ganzen transzendenten Funktion an, die für alle rationalen Werte rational wird. *Staeckel*³³⁸) hat diese Fragestellung wieder aufgenommen und in wesentlichen Punkten gefördert. Zunächst fand er ein allgemeines Prinzip, das auch den *Weierstraß*schen Fall in sich schloß. Er zeigte, daß man stets ganze Funktionen angeben kann, die in einer gegebenen abzählbaren Menge nur Werte annehmen, die einer gleichfalls gegebenen dichten Menge angehören. *Hilbert*³³⁹) fand, daß eine algebraische Funktion, die für alle rationalen Werte des Argumentes rationale Werte annimmt, rational ist. *Staeckel*³⁴⁰) gab weiter eine Funktion an, die samt ihrer Umkehrung an allen algebraischen Stellen algebraische Werte annimmt, ohne selbst algebraisch zu sein. Er legt die weitere Frage vor, ob es transzendente Funktionen gibt, die an algebraischen Stellen samt allen ihren Ableitungen algebraische Werte annehmen. *Faber*³⁴¹), der *Staeckel*s Untersuchungen wieder aufnahm und weiter vertiefte, bejahte diese Frage. *Faber* zeigte weiter, daß man jede ganze Funktion mit beliebiger Genauigkeit durch andere

336) *C. Carathéodory*, Sur la représentation conforme des polygones convexes, Ann. de Bruxelles 57 (1913), p. 1—10.

337) *E. Strauß*, Eine Verallgemeinerung der dekadischen Schreibweise nebst funktionentheoretischer Anwendung, Acta math. 11 (1887), p. 13—18.

338) Bei *P. Staeckel*, Über arithmetische Eigenschaften analytischer Funktionen, Math. Ann. 46 (1895), p. 513—520, und Nouv. Ann. (3) 18 (1899), p. 53—64.

339) *D. Hilbert*, Über die Irreduzibilität ganzer rationaler Funktionen mit ganzzahligen Koeffizienten, J. f. Math. 110 (1892), (p. 104—129) p. 129.

340) *P. Staeckel*, a) Arithmetische Eigenschaften analytischer Funktionen, Acta math. 25 (1902), p. 372—384; b) Sur quelques propriétés arithmétiques des fonctions analytiques, Paris C. R. 128 (1899), p. 225—227 und p. 805—808; c) Arithmetische Eigenschaften analytischer Funktionen, Jahresber. d. D. Math.-Ver. 11 (1902), p. 183—184.

341) *G. Faber*, Über arithmetische Eigenschaften analytischer Funktionen, Math. Ann 58 (1904), p. 545—557.

ganze Funktionen approximieren kann, die samt ihren Ableitungen an allen algebraischen Stellen algebraische Werte annehmen. Daß man ganze Funktionen mit beliebig gegebenen Nullstellen und rationalen Koeffizienten angeben kann, hat *Hurwitz*³⁴²⁾ gezeigt, so daß also der Begriff der Irreduzibilität im Gebiet der ganzen transzendenten Funktionen seinen Sinn verliert.

Der berühmte *Satz von Eisenstein*³⁴³⁾ lautet: Wenn eine Potenzreihe $\sum a_n z^n$ mit rationalen Koeffizienten einer algebraischen Gleichung genügt, so gibt es eine ganze Zahl K , so daß die Koeffizienten von $\sum a_n K^n z^n$ mit Ausnahme von a_0 alle ganze Zahlen werden. *Hurwitz*^{343, 1)} und *G. Pólya*^{151 d)} haben ihm einen Satz über die Lösungen algebraischer Differentialgleichungen zur Seite gestellt.

*Borel*³⁴⁴⁾ fand als Anwendung von *Hadamards* Untersuchungen über die Lage der Pole folgenden Satz: Wenn eine für $|z| \leq 1$ meromorphe Funktion in der Umgebung von $z = 0$ durch eine Potenzreihe mit ganzen rationalen Koeffizienten dargestellt wird, so ist sie notwendig rational. Natürlich genügt es nicht, nur für $|z| < 1$ die

342) *A. Hurwitz*, Über beständig konvergente Potenzreihen mit rationalen Zahlenkoeffizienten und vorgeschriebenen Nullstellen, *Acta math.* 14 (1891), p. 211—215.

343) *G. Eisenstein*, Über eine allgemeine Eigenschaft der Reihenentwicklungen aller algebraischen Funktionen, Berlin. Sitzber. 1852, p. 441—443. Vgl. auch den Beweis von *Heine*, Über die Entwicklung von Wurzeln algebraischer Gleichungen, *J. f. Math.* 48 (1854), p. 267—275. In dieser Arbeit wird noch die oft nützliche Bemerkung bewiesen, daß eine algebraische Funktion, die durch eine Potenzreihe mit ganzzahligen Koeffizienten dargestellt ist, stets auch einer algebraischen Gleichung mit ganzen Koeffizienten genügt. Ferner *Hermite*, Sur un théorème d'*Eisenstein*, *Proc. of the London math. soc.* 7 (1876), p. 173—175 und *Cours professée à la fac. des sc. de Paris* 1891. Dort finden sich auch in nicht ganz präziser Weise gewisse Ergebnisse von *Tchebychef* über die Reihen, welche elementare Funktionen darstellen. Vgl. auch *R. Sutak*, Ein neuer Beweis eines *Eisensteinschen* Satzes, *Math.-nat. Ber. aus Ungarn* 12 (1894), p. 1—10. Ferner *R. Schwarz*, Der *Eisensteinsche* Satz über die Koeffizienten der Reihenentwicklungen algebraischer Funktionen, *Diss.*, Tübingen 1908; *L. Koenigsberger*, Über den *Eisensteinschen* Satz von dem Charakter der Koeffizienten der Reihenentwicklungen algebraischer Funktionen, *J. f. Math.* 130 (1906), p. 259—269; *H. von Koch*, a) Sur une propriété arithmétique du développement en série de *Taylor* d'une fonction algébrique, *Arkiv for math. astr. och fys.* 1 (1903), p. 629—641; b) Sur une extension du théorème d'*Eisenstein*, *Arkiv for math. astr. och fys.* 1 (1903), p. 643—650.

343, 1) *A. Hurwitz*, Sur le développement des fonctions satisfaisant à une équation différentielle algébrique, *Ann. Éc. Norm.* (3) 6 (1889), p. 327—332.

344) *E. Borel*, Sur une application d'un théorème de *M. Hadamard*, *Bull. des sc. math.* 18 (1894), p. 22—25; *G. Valiron*, Sur le développement de *Taylor* d'une fonction méromorphe, *Nouv. ann.* (4) 11 (1911), p. 18—20.

Funktion meromorph voraussetzen, denn $\sum a_n z^n$ und $\sum [a_n] z^n$ haben in $|z| < 1$ die gleichen Singularitäten.

Borel^{138c)} hat weiter den Fall betrachtet, daß die Reihe die Gestalt $f(z) = \sum \frac{b_n}{c_n} z^n$ mit ganzzahligen b_n und c_n besitzt, wofern die c_n nur endlichviele verschiedene Primfaktoren enthalten, und $\sqrt[n]{|c_n|}$ beschränkt ist. $f(z)$ kann nicht meromorph sein. *Valiron*³⁴⁴⁾ betrachtet sogar einen Fall mit unendlichvielen Primfaktoren.

*Pólya*³⁴⁵⁾ verallgemeinert den *Borel*schen Satz für den Fall, daß die gegebene Funktion in der ganzen Ebene nur eine wesentliche Singularität hat. Auch dann kann ihre Entwicklung um $z = 0$ nicht nur ganzzahlige Koeffizienten besitzen. Noch allgemeiner ist der folgende Satz von *Pólya*³⁴⁶⁾: Wenn $f(z)$ für $|z| < R$ und $R > 1$ abgesehen von endlichvielen Singularitäten regulär und eindeutig ist und ganzzahlige Koeffizienten besitzt, so ist $f(z)$ rational. *Pólya* hat aus seinem eben erwähnten Satz den folgenden Schluß gezogen: Die singulären Punkte einer eindeutigen Funktion sollen keinen endlichen Häufungspunkt besitzen, und die Koeffizienten der Potenzreihenentwicklung sollen rationale Zahlen sein. Die Funktion ist rational, wenn ihre Potenzreihe der *Eisensteinschen* Bedingung genügt, und sie ist transzendent, wenn ihre Potenzreihe der *Eisensteinschen* Bedingung nicht genügt. *Pólya*²⁰⁶⁾ hat weiter die folgende Vermutung ausgesprochen: Wenn $\sum a_n z^n$ ganze Koeffizienten hat und den Einheitskreis als Konvergenzkreis besitzt, so ist dieser entweder natürliche Grenze oder die Funktion ist rational. Wie ich höre, hat *Carlson* diese Vermutung kürzlich bewiesen.

*Pólya*³⁴⁵⁾ hat Untersuchungen über das Wachstum der ganzen transzendenten Funktionen angestellt, welche für ganzzahlige Werte des Argumentes stets ganzzahlige Werte annehmen, und hat gefunden, daß das Wachstum nicht beliebig langsam sein kann. Vielmehr muß

$$\limsup_{r \rightarrow \infty} \frac{M(r)}{2^r} \geq 1$$

sein, wenn die Funktion $f(z)$ kein Polynom sein soll. Gibt es eine positive Zahl k so, daß $\frac{M(r)}{2^r \cdot r^k}$ für $r \geq 1$ beschränkt bleibt, so folgt aus der Ganzzahligkeit der Werte $f(0), f(1), \dots$, daß

$$g(z) = P(z) \cdot 2^z + \varphi(z)$$

ist, wo $P(z)$ und $\varphi(z)$ Polynome sind.

345) *G. Pólya*, a) Über ganzwertige ganze Funktionen, Rend. di Palermo 40 (1914), p. 1—16; b) Über ganze ganzwertige Funktionen, Gött. Nachr. 1920, p. 1—10. Vgl. auch *G. H. Hardy*, On a theorem of Mr. *G. Pólya*, Proc. of the Cambr. Phil. Soc. 19 (1920), p. 60—63; *E. Landau*, On Mr. *Hardy*'s extension of a theorem of Mr. *Pólya*, Proc. of the Cambr. Phil. Soc. 19 (1920), p. 14—15.

346) a. a. O. 206).

Von *Fatou*^{346,1)} rührt der folgende Satz her: Wenn eine algebraische Funktion eine Potenzreihenentwicklung mit ganzzahligen Koeffizienten und einem Konvergenzradius gleich Eins besitzt, so ist sie rational, und alle ihre Pole liegen bei Einheitswurzeln.³⁴⁷⁾

Von *Fatou*⁹⁵⁾ rührt weiter der folgende Satz her: Wenn eine Potenzreihe nur endlichviele verschiedene Koeffizienten hat, so ist entweder die durch sie dargestellte Funktion rational, oder sie hat auf dem Konvergenzkreis singuläre Punkte, in deren Umgebung keine Abschätzung der Form

$$|f(z)| < \frac{K}{|z-a|^\alpha}$$

gilt.

*R. Jentzsch*³⁴⁸⁾ fand die folgenden Sätze: Hat $\sum a_n z^n$ nur endlichviele verschiedene Koeffizienten und auf dem Einheitskreis nur endlichviele Singularitäten und ist die dargestellte Funktion in einem etwas größeren Kreis eindeutig, so ist $f(z)$ rational mit lauter einfachen Polen, die bei Einheitswurzeln liegen. Diesen Satz verschärft *Carlson*.³⁴⁸⁾

Wenn $\sum a_n z^n$ aus $\sum b_n z^n$ durch Vorzeichenänderung der Koeffizienten erhalten wird und wenn beide Reihen auf dem Konvergenzkreis nur isolierte Singularitäten besitzen und in einem etwas größeren Kreise eindeutig sind, so gehen die auf dem Konvergenzkreis gelegenen singulären Stellen der einen durch Multiplikation mit Einheitswurzeln aus denjenigen der anderen hervor. Für diesen Satz von *Jentzsch* hat *Pólya*³⁴⁹⁾ einen neuen Beweis gegeben.

*Fatou*⁹⁵⁾ vermutete, daß man durch Vorzeichenänderung der Koeffizienten eine jede Reihe in eine andere verwandeln kann, die keine Fortsetzung über ihren Konvergenzkreis zuläßt. *Hurwitz* und *Pólya*¹⁸⁹⁾ haben diese Vermutung bewiesen.

Analytische Funktionen von mehreren komplexen Variablen.

68. Definition des analytischen Charakters einer Funktion.

Man kann hier wie bei den analytischen Funktionen einer Variablen von der Potenzreihendefinition oder von einer in Richtung des *Di-*

346,1) *P. Fatou*, a) a. a. O. 95); b) Sur les séries entières à coefficients entiers, Paris C. R. 138 (1904), p. 342—344.

347) Vgl. auch *O. Szász*, Über arithmetische Eigenschaften gewisser unendlicher Zahlenfolgen und zugehöriger Potenzreihen, Arch. Math. Phys. (3) 26 (1917), p. 125—132.

348) *R. Jentzsch*, Potenzreihen mit endlichvielen verschiedenen Koeffizienten, Math. Ann. 78 (1918), p. 276—285; *F. Carlson*, Über Potenzreihen mit endlichvielen verschiedenen Koeffizienten, Math. Ann. 79 (1919), p. 237—245.

349) *G. Pólya*, Über Potenzreihen mit endlichvielen verschiedenen Koeffizienten, Math. Ann. 78 (1918), p. 286—293.

richtlichen Funktionenbegriffes liegenden Erklärung ausgehen. Die Verbindung zwischen beiden Definitionen liefert wieder die Integralformel, und der Nachweis, daß man jede im Sinne der zweiten Definition in der Umgebung einer Stelle ξ_1, ξ_2 analytische Funktion $f(z_1, z_2)$ in eine nach Potenzen von $z_1 - \xi_1$ und $z_2 - \xi_2$ fortschreitende absolut konvergente Reihe $\mathfrak{P}(z_1 - \xi_1, z_2 - \xi_2)$ entwickeln kann.

Man stelle die folgende Definition an die Spitze:

Eine in einem Bereiche des z_1, z_2 -Raumes³⁵⁰⁾ eindeutig erklärte Funktion $f(z_1, z_2)$ heißt darin von analytischem Charakter, wenn sie 1. eine stetige Funktion der beiden Variablen ist und wenn 2. an jeder Stelle des Bereiches die partiellen Ableitungen $\frac{\partial f}{\partial z_1}$ und $\frac{\partial f}{\partial z_2}$ existieren.

In dieser Definition sind nicht alle darin angeführten Bedingungen voneinander unabhängig. Als erster hat *Osgood*³⁵¹⁾ gezeigt, daß neben der Existenz der beiden partiellen Ableitungen statt der geforderten Stetigkeit die Beschränktheit von $f(z_1, z_2)$ ausreicht, daß also die Stetigkeit eine Folge der Differenzierbarkeit und der Beschränktheit ist. Daß auch die Beschränktheit selbst eine Folge der Differenzierbarkeit ist, hat erst *Hartogs*³⁵²⁾ gelehrt. Man hat daher den Satz, daß eine eindeutige Funktion $f(z_1, z_2)$, die in jeder einzelnen der beiden Variablen analytisch ist, im Sinne der an die Spitze gestellten Definition eine analytische Funktion der beiden komplexen Variablen ist.

Was die Erklärung durch Potenzreihen anlangt, so kann man sich fragen, ob nicht überhaupt eine jede *Mac-Laurinsche* Reihe, d. h. eine nach homogenen Polynomen

$$q_n(z_1, z_2) = a_0 z_1^n + a_1 z_1^{n-1} z_2 + \dots + a_n z_2^n$$

n -ten Grades fortschreitende konvergente Reihe im Konvergenzbereich eine analytische Funktion darstellt, also absolut konvergiert als Potenzreihe in z_1, z_2 . In der Tat hat dies *Hartogs*^{352a)} bewiesen.³⁵³⁾

350) Damit ist folgendes gemeint: Es sei $z_1 = x_1 + iy_1$ und $z_2 = x_2 + iy_2$. Dann meine ich einen Bereich in dem vierdimensionalen Raum der x_1, x_2, y_1, y_2 .

351) *W. F. Osgood*, Note über analytische Funktionen mehrerer Veränderlicher, *Math. Ann.* 52 (1899), p. 462—464.

352) *F. Hartogs*, Zur Theorie der analytischen Funktionen mehrerer unabhängiger Veränderlicher, insbesondere über die Darstellung derselben durch Reihen, welche nach Potenzen einer Veränderlichen fortschreiten, *Math. Ann.* 62 (1906), p. 1—88. Vgl. auch *W. F. Osgood*, Zweite Note über analytische Funktionen mehrerer komplexer Veränderlicher, *Math. Ann.* 53 (1900), p. 461—464.

352a) a. a. O. 352), § 11.

353) Dies Resultat von *Hartogs* ist einigen Verfassern, die das gleiche Problem interessierte, unbekannt geblieben. So erklären sich wohl die nicht

Von der an die Spitze gestellten Definition aus gewinnt man leicht den *Cauchyschen* Integralsatz und die Integralformel durch zweimalige Anwendung der für Funktionen einer Variablen geltenden Beziehungen. Das Ergebnis lautet (vgl. auch II B 1 (*Osgood*)):

$B(z_1)$ sei ein Bereich der z_1 -Ebene und α_1 eine ihm angehörige rektifizierbare Kurve, die z_1 einmal in positivem Sinne umkreise.

$B(z_2)$ sei ebenso ein Bereich der z_2 -Ebene und α_2 eine ihm angehörige rektifizierbare Kurve, die z_2 einmal in positivem Sinne umkreise. Dann gilt

$$f(z_1, z_2) = \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^2 \int_{\alpha_1} d\xi_1 \int_{\alpha_2} \frac{f(\xi_1, \xi_2)}{(\xi_1 - z_1)(\xi_2 - z_2)} d\xi_2.$$

$f(z_1, z_2)$ soll dabei eine in dem Bereich:

$$z_1 \text{ aus } B(z_1), \quad z_2 \text{ aus } B(z_2)$$

eindeutige analytische Funktion sein.

Es braucht nicht näher erörtert zu werden, wie man aus dieser Integralformel die Potenzreihenentwicklung

$$f(z_1, z_2) = \mathfrak{B}(z_1 - a_1, z_2 - a_2)$$

oder auch die Verallgemeinerung der *Laurentschen* Reihe erschließt.³⁵⁴⁾

69. Die Konvergenz der Potenzreihen in zwei komplexen Veränderlichen. Am eingehendsten hat diese Fragen *Hartogs*³⁵⁵⁾ untersucht. Seine Ergebnisse gelten zum Teil auch für Reihen in mehr als zwei Veränderlichen. Doch wollen wir uns in diesem Artikel wie bisher so auch weiter darauf beschränken, die Ergebnisse der Theorie an dem Beispiel der Funktionen von zwei komplexen Veränderlichen zu entwickeln. Das muß bei einer Theorie, die noch so im Flusse ist wie die hier darzustellende, genügen.

Ich betrachte zunächst die Potenzreihen selbst. Das sind also

zum Ziel gelangten Versuche von *Dulac* und *E. Levi*. Vgl. *H. Dulac*, Sur les séries de *Mac-Laurin* de plusieurs variables, *Acta math.* 31 (1908), p. 95–106; *E. Levi*, Serie di *Taylor* di funzioni analitiche di più variabile, *Rend. dei Lincei* (5) 21 (1912), p. 816–822. Es ist auch bei den Autoren eine Verschiedenheit der Benennung, die es vielleicht erklärt, daß die späteren Autoren bei *Hartogs* ihr Problem nicht wieder erkannten. Diese Erklärung ist um so wahrscheinlicher, als nicht einmal der Referent in den „Fortschritten der Mathematik“ der *Hartogs* (*F. d. M.* 36 (1905), p. 483–486) sowohl wie später *Levi* (*F. d. M.* 43 (1912), p. 512) referierte, das *Hartogs*sche Problem bei *Levi* wiedererkannte.

354) *Hartogs*³⁵⁵⁾ hat die „integrallose“ *Pringsheim*sche Umsetzung dieser Methode verwendet.

355) *F. Hartogs*, a) Beiträge zur elementaren Theorie der Potenzreihen und der eindeutigen analytischen Funktionen zweier Veränderlichen, *Diss. München* 1904; b) a. a. O. 352).

Doppelreihen³⁵⁶) $\mathfrak{B}(z_1 - a_1, z_2 - a_2)$. Für die Funktionentheorie ist namentlich der *Bereich der absoluten Konvergenz* wichtig. Denn *Hartogs* hat gezeigt, daß die Stellen lediglich bedingter Konvergenz niemals einen Bereich erfüllen. Allerdings liegen sie auch nicht wie bei Potenzreihen einer Veränderlichen alle am Rande des Bereiches der absoluten Konvergenz. Außerhalb desselben können noch gewisse zwei-dimensionale Mengen bedingter Konvergenz liegen. Ob die Werte, die dort die konvergente Reihe liefert, etwas mit der Fortsetzung der durch die Reihe definierten analytischen Funktion zu tun haben, scheint noch nicht geklärt. Was nun den Bereich der absoluten Konvergenz betrifft, so ist er von der Form

$$|z_1 - a_1| < r_1, \quad |z_2 - a_2| < r_2, \quad r_2 = \varphi(r_1).$$

Hier ist $\varphi(r_1)$ eine Funktion von gleich näher anzugebenden Eigenschaften. Man nennt r_1 und r_2 zwei assoziierte Konvergenzradien. $\varphi(r_1)$ ist eine in einem Intervall $0 < r_1 < R_1$ erklärte stetige, bei wachsendem r_1 niemals zunehmende Funktion. $\log \varphi(r_1)$ ist außerdem eine konvexe Funktion von $\log r_1$. *Hartogs*³⁵²) und *Faber*³⁵⁷)

356) Wegen einer allgemeinen Theorie der unendlichen Doppelreihen vergleiche man *A. Pringsheim*, a) Elementare Theorie der unendlichen Doppelreihen, Münch. Sitzber. 27 (1897), p. 101—152; b) Zur Theorie der zweifach unendlichen Zahlenfolgen, Math. Ann. 53 (1899), p. 289—321; c) Vorlesungen über Zahlenlehre 2 (1916), p. 449—514; *F. London*, Über Doppelfolgen und Doppelreihen, Math. Ann. 53 (1899), p. 322—370.

357) Der auf die Stetigkeit und Monotonie bezügliche Teil dieses Satzes wurde schon von *Weierstraß* in Vorlesungen 1880/1881 angegeben. Ich entnehme diese Bemerkung dem schönen Bericht von *Osgood*, Topics in the theory of functions of several complex variables, Am. math. soc. colloquium lectures Vol. IV, The Madison colloquium 1913, Newyork 1914, p. 111—230. Vgl. ferner: *Ad. Meyer*, Om Kontinuitet hos Konvergensområden, Stockholm ac. förh. öfver. 40 (1883), Nr. 9, p. 15—31; *E. Pringsheim*, Om Konvergensområdet hos potensserier af två variabler, Stockholm Ac. förh. öfver. 40 (1883), Nr. 10, p. 17—26. Den auf die Konkavität bezüglichen Teil hat zuerst *E. Fabry* angegeben. Vgl. *F. Fabry*, Sur les rayons de convergence d'une série double. Paris C. R. 134 (1902), p. 1190—1192. *Fabry* stützt sich dabei auf gewisse ältere Überlegungen von *E. Lemaire*, Sur les séries entières à plusieurs variables indépendantes, Bull. des sc. math. 36 (1896), p. 186—292. *Lemaire* gibt dort die Parameterdarstellung

$$\frac{1}{r_1} = \limsup_{\mu + \nu \rightarrow \infty} \mu + \nu \sqrt{|\alpha_{\mu\nu}| \Re^{\nu}}, \quad r' = \Re \cdot r \quad (0 < \Re < \infty)$$

für die assoziierten Radien. Der Beweis von *Fabry* wurde durch *Hartogs* vereinfacht. Vgl. *F. Hartogs*, Über neuere Untersuchungen auf dem Gebiete der analytischen Funktionen mehrerer Variablen, Jahresber. d. D. Math.-Ver. 16 (1907), [p. 223—240] p. 232. Gleichzeitig mit *Hartogs* hat auch *G. Faber* einen Beweis gegeben. Vgl. *G. Faber*, Über die zusammengehörigen Konvergenzradien von Potenzreihen mehrerer Veränderlichen, Math. Ann. 61 (1905), p. 289—324.

haben weiter gezeigt, daß die angegebenen Eigenschaften für $\varphi(r)$ charakteristisch sind.

Von besonderer Wichtigkeit für die Theorie sind weiter die von *Hartogs* so genannten Zeilen- und Kolonnenreihen. Das ist weiter nichts als eine nach Potenzen von z_1 bzw. von z_2 geordnete Potenzreihe $\mathfrak{P}(z_1, z_2)$. Es genügt also, die Zeilenreihen $\mathfrak{P}(z_1, z_2)$ zu betrachten. Die für die Wichtigkeit dieser Zeilenreihen grundlegende Tatsache ist in dem folgenden Satz von *Hartogs*³⁵⁸⁾ ausgesprochen:

Für die absolute Konvergenz der Doppelreihe $\mathfrak{P}(z_1 - a_1, z_2)$ in einem Kreisgebiete $|z_1 - a_1| < r_1$, $|z_2| < r_2$ ist die gleichmäßige Konvergenz der zugehörigen Zeilenreihe $\Sigma f_\nu(z_1)z_2^\nu$ in dem gleichen Kreisgebiet notwendig und hinreichend.

Die z_2 -Werte nun aber, für welche die Zeilenreihe in einem gegebenen z_1 -Bereich hinsichtlich z_1 gleichmäßig konvergiert, machen wieder einen Kreis $|z_2| < r_2$ aus.

Der Bereich, in dem überhaupt eine Zeilenreihe eine analytische Funktion darstellen kann, ist auf Grund des ersten der eben genannten beiden Sätze näher wie folgt zu charakterisieren³⁵⁹⁾: Eine gegebene analytische Funktion $f(z_1, z_2)$ läßt sich in einem Regularitätsbereich B nur dann durch eine Zeilenreihe $\Sigma f_\nu(z_1)z_2^\nu$ darstellen, wenn ihre Fortsetzung auch noch für die Stellen (z_1, Kz_2) eindeutig und regulär ist. Dabei soll (z_1, z_2) irgendeine Stelle aus B_1 und K irgendeine komplexe Zahl sein, deren Betrag eins nicht übersteigt.³⁶⁰⁾

Die Zeilenreihen sind insbesondere für die Untersuchungen von *Hartogs* über die Singularitäten der analytischen Funktionen von mehreren unabhängigen Variablen wichtig geworden. Ein Haupthilfsmittel bei diesen Überlegungen ist nämlich der jetzt einzuführende Radius der gleichmäßigen Konvergenz: R_{z_2} . Diejenigen z_2 -Werte näm-

358) *F. Hartogs*, a. a. O. 355 a), p. 34.

359) *F. Hartogs*, a. a. O. 352), p. 27. Der Beweis stützt sich u. a. auf eine Grundeigenschaft der Reihen $\Sigma f_\nu(z_1)z_2^\nu$, die auch beim Beweis des Satzes, daß alle mit partiellen Ableitungen erster Ordnung versehenen Funktionen analytisch sind, eine große Rolle spielt. Folgendes ist die Eigenschaft: Die Koeffizienten $f_\nu(z_1)$ der Reihe $\Sigma f_\nu(z_1)z_2^\nu$ mögen in einem Bereiche $B(z_1)$ regulär sein. Die Reihe möge für $z_2 = a_2$ in $B(z_1)$ konvergieren, ferner für $z_2 = b_2$ ($\neq 0$) in $B(z_1)$ gleichmäßig konvergieren. Dann konvergiert sie auch für alle $|z_2| < |a_2|$ in $B(z_1)$ gleichmäßig. Seinen Beweis³⁶²⁾ hat *Hartogs* später noch vereinfacht. Vgl. *F. Hartogs*, Über den Beweis eines Satzes aus der Theorie der analytischen Funktionen mehrerer Veränderlichen, Schwarzestschrift 1914, p. 54—60.

360) Wegen der Zeilenreihen vgl. man auch *W. F. Osgood*, Note on the functions defined by infinite series whose terms are analytic functions, *Annals of math.* (2) 3 (1901), p. 25—34.

lich, für die $\Sigma f_v(z_1)z_2^v$ in einer wenn auch noch so kleinen Umgebung von $z_1 = a_1$ hinsichtlich z_1 gleichmäßig konvergiert, erfüllen einen gewissen Kreis, dessen Radius R_{a_1} ist. *Hartogs*^{35a)} hat die folgenden Grundeigenschaften dieser Funktion R_{z_1} entdeckt. Wenn die Koeffizienten $f_v(z_1)$ der Zeilenreihe $\Sigma f_v(z_1)z_2^v$ in dem Bereiche $B(z_1)$ regulär sind, so ist in diesem Bereiche $\log R_{z_1}$ nicht kleiner als diejenige ebene Potentialfunktion, die in $B(z_1)$ regulär ist, und am Rande dieses Bereiches mit $\log R_{z_1}$ übereinstimmt. Wenn insbesondere R_{z_1} in $B(z_1)$ stetig ist und stetige partielle Ableitungen der beiden ersten Ordnungen besitzt, so kann man das auch so aussprechen: In jedem Punkte des Gebietes $B(z_1)$ gilt die Ungleichung

$$\frac{\partial^2 \log R_{z_1}}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \log R_{z_1}}{\partial y_1^2} \leq 0 \quad (z_1 = x_1 + iy_1).$$

Unter der Annahme, daß R_{z_1} die genannten Differenzierbarkeitsbedingungen erfüllt, hat *Hartogs* weiter gezeigt, daß diese Ungleichung für R_{z_1} charakteristisch ist. Es ist aber keineswegs immer R_{z_1} stetig oder differenzierbar, wie die Untersuchungen von *Hartogs* des näheren ergeben.

70. Die singulären Stellen der analytischen Funktionen von zwei komplexen Veränderlichen. Ich werde erst einige Sätze angeben, die als Analoga zu bekannten Sätzen bei Funktionen einer komplexen Veränderlichen erscheinen. Alsdann werde ich ausführlicher bei den Sätzen verweilen, die typisch Neues bieten. Überhaupt lege ich im ganzen Artikel keinen Wert darauf, zu viel von mehr oder weniger naheliegenden Übertragungen oder Verallgemeinerungen zu reden.

Zunächst gilt es, den Begriff der singulären Stellen zu fassen. Ich will die bei einer Veränderlichen gegebene Begriffsbestimmung sinngemäß übertragen. Funktionselement soll wieder eine einzelne Potenzreihe $\mathfrak{P}(z_1, z_2)$ heißen. Ihr Konvergenzbereich heiße der Bereich $|z_1| < r_1, |z_2| < r_2$, wo also r_1 der zu r_2 assoziierte Konvergenzradius ist. a_1, a_2 sei irgendeine weitere Stelle desselben. Man setze das gegebene Element in eine Reihe $\mathfrak{P}(z_1 - a_1, z_2 - a_2)$ um. Wenn dann der Konvergenzbereich des neuen Elementes stellenweise über den des alten hinausreicht, so liefert es in diesen Bereichen die Fortsetzung des alten. Bildet man nun wieder eine Kette solcher Elemente, so kann der Fall eintreten, daß ihre Mittelpunkte einen Grenzwert besitzen, während die Konvergenzradien gegen Null streben. „Konvergenzradius“ eines Elementes möge dabei der Radius der größten Kugel um den Mittelpunkt des Elementes heißen, welche im Konvergenzbereich Raum hat.

Als ersten Satz führe ich nun diesen an: Am Rande eines jeden Konvergenzbereiches liegt mindestens eine singuläre Stelle. Man erkennt diesen zuerst von *Hartogs*^{355 a)} angegebenen Satz als unmittelbare Folge der Integralformel. Ihr entnimmt man auch am bequemsten den schon von *Hurwitz*⁵⁹⁾ angegebenen Satz, daß eine analytische Funktion von mehreren komplexen Veränderlichen keine isolierten singulären Stellen besitzen kann. Präziser formuliert lautet der Satz so:

Eine analytische Funktion von zwei komplexen Veränderlichen sei für alle Stellen der Umgebung einer Stelle $z_1 = a_1$, $z_2 = a_2$ regulär und eindeutig. Dann ist sie auch in dieser letzten Stelle selbst regulär. Der in die Voraussetzungen aufgenommene Zusatz „eindeutig“ kann übrigens auch wegbleiben.

Hartogs hat wesentliche Verallgemeinerungen dieses Satzes entdeckt.³⁵⁵⁾ Die bequemste Herleitung ergibt sich wieder mit Hilfe der Integralformel³⁶¹⁾. Man sieht nämlich leicht ein, daß man die Integralformel schon ansetzen kann, wenn nur $f(z_1, z_2)$ regulär und eindeutig ist, sobald z_1 dem Rande eines Bereiches $B(z_1)$ und z_2 dem Inneren oder Rande eines Bereiches $B(z_2)$ angehört und auch regulär und eindeutig ist, sobald z_2 ein beliebiger festgewählter Punkt aus $B(z_2)$ oder von seinem Rande ist und z_1 dem Bereich $B(z_1)$ angehört. Die so gewonnene Integralformel stellt dann aber in dem ganzen Bereich [z_1 aus $B(z_1)$, z_2 aus $B(z_2)$] eine reguläre analytische Funktion dar, die mit $f(z_1, z_2)$ identisch sein muß. Insbesondere ist hierin der folgende Satz enthalten: Wenn $f(z_1, z_2)$ am Rande eines Bereiches

$$[z_1 \text{ aus } B(z_1), z_2 \text{ aus } B(z_2)]$$

regulär und eindeutig ist, so gilt das auch im Inneren, also eine eminente Vertiefung des Satzes, daß es keine isolierten Singularitäten gibt. Auch hier kann der Zusatz eindeutig aus der Voraussetzung wegbleiben. Man kann den Satz auch auf beliebige Bereiche des vierdimensionalen z_1, z_2 -Raumes übertragen.³⁶¹⁾

Ich hebe eine Folgerung besonders hervor³⁶¹⁾: Wenn in der Ebene $z_1 = a_1$ singuläre Stellen liegen, wenn sich aber um dieselben ein Bereich abgrenzen läßt, auf dessen Rand $f(z_1, z_2)$ für $z_1 = a_1$ regulär ist, dann enthält jede Nachbarebene $z_1 = a_1 + \varepsilon$ singuläre Stellen, für welche z_2 dem genannten Bereich angehört. Ich habe den Satz gleich allgemein ohne Eindeutigkeitsvoraussetzungen ausgesprochen, weil er im Falle der Mehrdeutigkeit sehr einfach zu beweisen ist, während er sich für den Fall der Eindeutigkeit aus dem

361) *F. Hartogs*, Einige Folgerungen aus der *Cauchyschen* Integralformel bei Funktionen mehrerer Veränderlichen, Münch. Sitzber. 36 (1906), p. 223—242.

vorher Angeführten ergibt. Ist zudem in der Ebene $z_1 = a_1$ nur eine singuläre Stelle $z_2 = a_2$ gelegen, so sind die z_2 -Koordinaten der in den Nachbarebenen gelegenen singulären Stellen stetige Funktionen von z_1 .

E. E. Levi³⁶²) hat aus diesem Satz diese Folgerung gezogen: Sei (a_1, a_2) eine reguläre Stelle der Funktion $f(z_1, z_2)$. Man betrachte die Entfernungen $|s_1 - a_1|^2 + |s_2 - a_2|^2$ der singulären Punkte (s_1, s_2) von diesem regulären. Dann kann diese Entfernung für keinen singulären Punkt ein relatives Maximum haben. Denn sonst denke man sich durch einen solchen maximal entfernten singulären Punkt eine Kugel mit dem Mittelpunkt (a_1, a_2) gelegt. In dem singulären Punkt (s_1, s_2) betrachte man ihre dreidimensionale Tangentialebene. Dieselbe enthält mindestens eine zweidimensionale Ebene mit einer Gleichung von der Form $A_1(z_1 - s_1) + A_2(z_2 - s_2) = 0$. Alle benachbarten zweidimensionalen Ebenen $A_1(z_1 - s_1) + A_2(z_2 - s_2) = \varepsilon$ enthalten dann nach Hartogs auch singuläre Stellen in der Nähe von (s_1, s_2) . Darunter gibt es aber auch Ebenen, die ganz außerhalb der Kugel verlaufen.

Eine wesentliche Vertiefung erfahren alle diese Sätze, wenn man den Begriff des *Regularitätsradius* mit heranzieht. Das ist die in der vorigen Nummer mit R_{z_1} bezeichnete Zahl. Zunächst gilt der Satz³⁶²): Wenn der Punkt $z_1 = a_1$ eine Umgebung besitzt, in welcher die Koeffizienten $f_v(z_1)$ von $\sum f_v(z_1)z_2^v$ eindeutig und regulär sind, so besitzt der durch diese Reihe dargestellte Funktionszweig mindestens eine singuläre Stelle (a_1, a_2) , für welche $|a_2| = R_{a_1}$ ist, aber keine, für welche $|a_2| < R_{a_1}$ ist. Man nennt daher am besten R_{a_1} den *Regularitätsradius* (hinsichtlich von z_1) an der Stelle $(a_1, 0)$. Jeder Satz über R_{z_1} ist somit zugleich ein Satz über die Lage von Singularitäten. Mit Hilfe dieser Funktion hat Hartogs³⁶³) den analytischen Charakter der Singularitätenmannigfaltigkeiten bewiesen. Präziser formuliert lautet sein Satz so: Wenn $f(z_1, z_2)$ in der Umgebung der singulären Stelle (a_1, a_2) in der Ebene $z_1 = a_1$ eindeutig und regulär ist, so enthält, wie schon oben erwähnt, jede Nachbarebene $z_1 = \text{const.}$ eine singuläre Stelle $(z_1, \varphi(z_1))$. Dabei ist nun aber nicht nur, wie schon bewiesen, $\varphi(z_1)$ eine stetige, sondern sogar eine *analytische Funktion*. Von den Polen her war das längst geläufig (seit Weierstraß), womit

362) E. E. Levi, *Studi sui punti singolari essenziali delle funzioni analitiche di due o più variabile complesse*, *Annali di matematica* (3) 17 (1910), p. 61—87.

363) F. Hartogs, *Über die aus den singulären Stellen einer analytischen Funktion von mehreren Veränderlichen bestehenden Gebilde*, *Acta math.* 32 (1909), p. 57—59.

denn die spärlichen Kenntnisse über Singularitäten, die man vor den bahnbrechenden Arbeiten von *Hartogs* hatte, wesentlich erschöpft sind.³⁶⁴⁾

*E. E. Levi*³⁶⁵⁾ hat in zweifacher Hinsicht die Forschungen von *Hartogs* etwas weitergeführt. Er hat einmal neben den Begriff des Regularitätsradius den Begriff des *Rationalitätsradius* gestellt: (a_1, a_2) sei ein regulärer Punkt von $f(z_1, z_2)$. $P_{a_1}(R_0)$ sei der Radius des größten Kreises $z_2 - a_2 < r_2$, in welchem $f(a_1, z_1)$ von rationalem Charakter ist. Dann heißt P_{a_1} der auf z_1 bezügliche Rationalitätsradius der Stelle (a_1, a_2) . Für diese Größe hat *Levi* wesentlich die gleichen Eigenschaften nachgewiesen, wie wir sie beim Regularitätsradius kennen lernten. Er hat somit für die Lage der wesentlich singulären Stellen die gleiche Gesetzmäßigkeit nachgewiesen, die *Hartogs* für die Gesamtheit aller singulären Stellen entdeckt hat.³⁶⁶⁾

Weiter hat *Levi* Ergebnisse über die Gestalt des Regularitätsbereiches und des Rationalitätsbereiches einer Funktion von zwei komplexen Veränderlichen gewonnen. Wenn *Weierstraß*³⁶⁷⁾ angegeben hatte, ein solcher Bereich unterliege keinerlei Bedingungen, so wurde dies schon durch die Bemerkung widerlegt, daß isolierte Singularitäten nicht vorhanden sind. Die Ergebnisse von *Levi* lassen vollends in der Frage nach der Gestalt der Existenzbereiche ein schwieriges Problem erkennen. Das Resultat von *Levi* kann dahin zusammengefaßt werden, daß eine jede Tangentialhyperebene an die als analytisch angenommene Grenzfläche eines Existenzbereiches einer eindeutigen Funktion die Fläche in der Umgebung des Berührungspunktes durchsetzt. Man kann dies Ergebnis, das sich natürlich sofort aus dem vorhin erwähnten *Levischen* Entfernungssatz ergibt, auch in Gestalt einer Differentialungleichung formulieren. *Blumenthal*³⁶⁸⁾ hat sie so ausgesprochen: Zu jedem Punkt der Grenzfläche werde die lineare Kom-

364) Manchmal kann man die Lage der benachbarten Singularitäten gleich bestimmt angeben. Dahin gehört der folgende Satz von *Hartogs*: Ist $f(z_1, z_2)$ in $|z_1| < r_1, |z_2| < r_2$ regulär und besitzt dieser Funktionszweig eine singuläre Stelle (a_1, a_2) , für welche $|a_1| = r_1, |a_2| < r_2$ ist, so sind alle Stellen (a_1, z_2) ($|z_2| < r_2$) singuläre Stellen; a. a. O. 355 a), § 19 und 352), § 6.

365) *E. E. Levi*, a) a. a. O. 364); b) *Sulle ipersuperficie dello spazio a 4 dimensioni che possono essere frontiere del campo di esistenza di una funzione analitica di due variabile complesse*. *Ann. di matematica* (3) 18 (1911), p. 69—79.

366) Vgl. auch *F. Hartogs*, Über die Bedingungen, unter welchen eine analytische Funktion mehrerer Veränderlicher sich wie eine rationale verhält, *Math. Ann.* 70 (1911), p. 207—222.

367) *K. Weierstraß*, Über $2r$ -fach periodische Funktionen, *J. f. Math.* 89 (1880) (p. 1—8); *Werke II* (p. 125—133), p. 129—130.

368) *O. Blumenthal*, Bemerkungen über die Singularitäten analytischer Funktionen mehrerer Veränderlicher, *Festschrift für H. Weber 1912*, p. 11—22.

bination $Z_1 \equiv A_1 z_1 + A_2 z_2 + A_3 \equiv X_1 + i Y_1 = 0$ so gewählt, daß $X_1 = 0$ die Gleichung der Tangentialebene in diesem Punkt wird, und daß $X_1 > 0$ stets nach derselben Seite der Fläche weist.

$$Z_2 \equiv X_2 + i Y_2 = 0$$

sei eine beliebige linear unabhängige andere Kombination. Dann darf

$$\frac{\partial^2 X_1}{\partial X_2^2} + \frac{\partial^2 X_1}{\partial Y_2^2}$$

längs der Mannigfaltigkeit sein Vorzeichen nicht wechseln. Ist der Ausdruck irgendwo von Null verschieden, so kann eine Funktion, deren Existenzbereich durch die Fläche in der Nähe dieses Punktes begrenzt wird, nur auf der Seite der Fläche existieren, wo der Differentialausdruck positiv ist.

Levi hat weiter gezeigt, daß damit die einzigen lokalen Bedingungen der Grenzfläche gegeben sind. *Blumenthal* aber erkannte, daß die Bedingung noch nicht hinreicht, um eine Hyperfläche im großen als Grenzfläche eines Existenzbereiches zu kennzeichnen.

Man kann in dem Satz von dem Fehlen isolierter Singularitäten und seinen Erweiterungen eine Verallgemeinerung des *Riemannsches* Satzes über hebbare Unstetigkeiten sehen. *Indessen* fällt dabei auf, daß keinerlei Voraussetzung, wie Beschränktheit der Funktion, gemacht werden muß. *Kistler*³⁶⁹⁾ hat weiter bemerkt: $f(z_1, z_2)$ sei in der Umgebung von (a_1, a_2) eindeutig, regulär und beschränkt außer auf der zweidimensionalen analytischen Fläche $z_2 = \varphi(z_1)$. Dann kann das nur eine hebbare Unstetigkeit sein. Ebenso ist $f(z_1, z_2)$ über eine dreidimensionale analytische Fläche hinweg analytisch fortsetzbar, wie *Osgood*³⁵⁷⁾ bemerkt, wofern sie nur stetig darüber hinaus fortgesetzt werden kann.

71. Meromorphe Funktionen. Rationale Funktionen können neben Polen noch eine andere Art von Singularität in einzelnen Punkten aufweisen. Natürlich sind die Pole auf algebraischen Kurven aufgereiht. Wo diese aber die Kurven der Nullstellen treffen, tritt ein besonderes Vorkommnis ein. In der Umgebung solcher Stellen, die man zum Unterschied von den Polen außerwesentlich singuläre Stellen zweiter Art nennt, kommt die Funktion nämlich einem jeden Wert beliebig nahe. In dieser Erscheinung liegen die Schwierigkeiten begründet, die sich einer Übertragung bekannter Sätze über Funktionen rationalen Charakters einer Variablen auf Funktionen mehrerer Variablen entgegenstellen. Ich führe einige solche Sätze an:

369) *Kistler*, Über Funktionen mehrerer komplexer Veränderlicher, Diss. Göttingen 1907.

Eine Funktion, die überall von rationalem Charakter ist, ist rational.³⁷⁰⁾ Das Wort „überall“ bedarf hier einer näheren Interpretation, hinsichtlich des Verhaltens im Unendlichen. Es ist gemeint, daß die Funktion rationalen Charakter zeige als Funktion einer jeden einzelnen Variablen bei festgehaltener anderer. Somit besteht hier das Unendlichferne aus zwei zweidimensionalen Mannigfaltigkeiten: $z_1 = \infty, z_2$ beliebig und $z_2 = \infty, z_1$ beliebig. z_1 -Ebene und z_2 -Ebene sind dabei im üblichen funktionentheoretischen Sinn als projektive Geraden aufzufassen.

Man kann das Unendliche des Raumes aber auch im projektiven Sinne als eine unendlichferne (komplexe) Gerade, also als zweidimensionale des vierdimensionalen Raumes einführen. Auch dann ist der Satz richtig, wie *W. F. Osgood*³⁷¹⁾ bewiesen hat.

Eine jede im Endlichen meromorphe Funktion läßt sich als Quotient zweier ganzen Funktionen darstellen.³⁷²⁾

Ob sich jede in einem gegebenen Bereich meromorphe Funktion als Quotient zweier daselbst regulärer darstellen läßt, ist noch unentschieden.³⁷³⁾

Weitere Untersuchungen beschäftigen sich mit der Übertragung der Produktzerlegung ganzer Funktionen. Unter einer Primfunktion

370) *K. Weierstraß* hat den Satz ohne Beweis angegeben, vgl. *K. Weierstraß*, a. a. O. 367), p. 129.

Einen Beweis gab erst *Hurwitz*, Beweis des Satzes, daß eine einwertige Funktion beliebig vieler Variablen, welche überall als Quotient zweier Potenzreihen dargestellt werden kann, eine rationale Funktion ihrer Argumente ist. *J. f. Math.* 95 (1883), p. 201—207.

371) *W. F. Osgood*, A condition that a function in a projective space be rational, *Trans. of the Am. math. soc.* 13 (1912), p. 159—163; *D. Jackson*, Note on rational functions of several complex variables, *Crelles J.* 146 (1916), p. 185—188.

372) *K. Weierstraß* hat diesen Satz zuerst 1879 ausgesprochen und bemerkt, er werde sehr schwer zu beweisen sein. Vgl. *K. Weierstraß*, Einige auf die Theorie der analytischen Funktionen mehrerer Veränderlichen sich beziehende Sätze. *Abhandlungen aus der Funktionenlehre* 1886 (p. 105—163), p. 138, Werke II (p. 135—188), p. 163. Den ersten Beweis gab *H. Poincaré*, Sur les fonctions de deux variables, *Acta math.* 2 (1883), p. 97—113. Einen durchsichtigeren einfachen Beweis gab *P. Cousin*, Sur les fonctions des variables complexes, *Acta math.* 19 (1895), p. 1—61.

373) Zu dem diesbezüglichen Beweisversuch von *Kistler* 369) vgl. man die Kritik von *Hartogs* 357). *Cousin* hat den Satz für den Fall bewiesen, daß der Bereich so aussieht: z_1 aus $B(z_1)$, z_2 aus $B(z_2)$. Wie aber *Gronwall* im *Bull. of the Am. math. soc.* (2) 20 (1914), p. 173—174 bemerkt, muß man dabei im allgemeinen gemeinsame zweidimensionale Nullmannigfaltigkeiten von Zähler und Nenner in Kauf nehmen, entgegen der Behauptung von *Cousin*, daß nur in einzelnen Punkten Zähler und Nenner zugleich verschwinden können. Dieser Zusatz ist nur richtig, wenn $B(z_1)$ und $B(z_2)$ einfach zusammenhängend sind.

versteht man eine ganze Funktion, die sich nicht als Produkt zweier ganzer Funktionen darstellen läßt, welche beide Nullstellen besitzen. *Gronwall* und *Hahn*³⁷⁴⁾ haben unabhängig voneinander gezeigt, daß eine ganze Funktion als Produkt von Primfunktionen dargestellt werden kann. Die Nullstellen einer ganzen Funktion können auch auf folgende Weise beliebig vorgegeben werden. Man kann sie entweder durch die betreffenden Funktionen geben, die dann eventuell um Exponentialfaktoren geändert in die Produktzerlegung eingehen, oder aber man kann sich auch auf folgenden Satz von *Cousin*³⁷⁵⁾ beziehen: Wenn die Funktion $f_1(z_1, z_2)$ in einem Bereich z_1 aus $B_1(z_1)$, z_2 aus $B_1(z_2)$ regulär und eindeutig ist, wenn im Bereiche: z_1 aus $B_2(z_1)$, z_2 aus $B_2(z_2)$ das Gleiche für $f_2(z_1, z_2)$ gilt, wenn weiter in dem Durchschnitt beider Bereiche sowohl $\frac{f_1}{f_2}$ wie $\frac{f_2}{f_1}$ regulär sind, dann gibt es eine Funktion $f_3(z_1, z_2)$, die in beiden Bereichen regulär und eindeutig ist, und für die im ersten Bereich $\frac{f_3}{f_1}$ und $\frac{f_1}{f_3}$, im zweiten Bereich $\frac{f_3}{f_2}$ und $\frac{f_2}{f_3}$ regulär sind.

Wann aber kann eine analytische Mannigfaltigkeit Nullmannigfaltigkeit sein? *Hahn*³⁷⁴⁾ gab zuerst Bedingungen dafür an. *Hartogs*³⁷⁷⁾ hat das Problem als einfache Umkehrung des *Weierstraß*schen Vorbereitungsatzes erkannt und demnach die Bedingungen ganz einfach gefaßt.

Sire^{375a)} hat begonnen, eine Theorie der ganzen Funktionen zu entwickeln, die der analogen Theorie bei einer Variablen zu folgen versucht.

72. Implizite Funktionen. An der Spitze steht der Satz, den man heute meist den *Weierstraß*schen Vorbereitungsatz nennt³⁷⁶⁾. Er

³⁷⁴⁾ *Gronwall*, Om system af linjöra totale differentialekationer sörs kildt sådana mod Impersodiska Koefficienter, Thesis Upsala 1898. *Hahn*, Über Funktionen zweier komplexer Veränderlicher, Monatsh. Math. Phys. 16 (1905), p. 29—44.

³⁷⁵⁾ *J. Sire*, a) Sur les fonctions entières de deux variables d'ordre apparent total fini, Rend. di Palermo 31 (1911), p. 1—91; b) Sur les fonctions entières de deux variables d'ordre apparent total fini et à croissance régulière par rapport à l'une des variables, J. de math. (6) 9 (1913), p. 1—37. Vgl. auch *E. Borel*, Sur les fonctions entières de plusieurs variables et les modes de croissance, Paris C. R. 132 (1901); *A. Wiman*, Note über die ganzen Funktionen zweier Veränderlichen, Arkiv för mat. astr. och fys. 1 (1903), p. 113—116; *L. Baumgartner*, Beiträge zur Theorie der ganzen Funktionen von zwei komplexen Veränderlichen, Monatsh. Math. Phys. 25 (1914), p. 3—69.

³⁷⁶⁾ Der Satz kommt zuerst bei *Cauchy*, Exercices d'analyse (2) 1841, p. 65, vor. Dann gab ihn *Weierstraß* von 1860 an in Vorlesungen (vgl. Werke II, p. 135). Weitere Beweise gaben *H. Poincaré*, Thèse 1879, p. 6; *Stickelberger*, Über einen Satz des Herrn *Noether*, Math. Ann. 30 (1887), p. 401—409; *E. Goursat*, Démonstration élémentaire d'un théorème de *Weierstraß*, Bull. soc. math. de France 36 (1908), p. 209—215; *F. Hartogs*, a) Über die elementare Herleitung des *Weier-*

lautet: $F(w, z_1, z_2)$, sei in der Umgebung von $z_1 = z_2 = w = 0$ regulär und eindeutig. Ferner sei $F(0, 0, 0) = 0$, aber es sei $F(w, 0, 0) \neq 0$. Alsdann gibt es eine ganze Zahl $l > 0$, und l in der Umgebung von $z_1 = z_2 = 0$ reguläre Funktionen $A_1(z_1, z_2) \dots A_l(z_1, z_2)$, so daß man

$$F(w, z_1, z_2) = (w^l + A_1 w^{l-1} + \dots + A_l) \Phi(w, z_1, z_2)$$

schreiben kann, wo $\Phi(w, z_1, z_2)$ eine in der Umgebung der Stelle $z_1 = z_2 = w = 0$ reguläre Funktion ist, für die $\Phi(0, 0, 0) \neq 0$ gilt.

Dieser Satz macht die Untersuchung der Funktionselemente impliziter Funktionen zu einer Aufgabe, die nahezu der Theorie der algebraischen Funktionen angehört.

Das Problem der lokalen Uniformisierung einer analytischen Funktion hat für die Umgebung einer Kurve durch *Halphen*³⁷⁷, für die Umgebung einer einzelnen Stelle durch *Black* seine Lösung gefunden.^{377, 1} (Vgl. auch II B 1 (*Osgood*), p. 107, sowie II C 6 (*Jung*)).

73. Analytische Abbildungen. Während im Gebiete einer komplexen Variablen analytische, d. h. winkeltreue Abbildung und analytische Funktion zusammenfallen, tritt hier neben das Studium einzelner analytischer Funktionen das Studium analytischer Abbildungen, d. h. der Paare voneinander unabhängiger analytischer Funktionen. Ein der Winkeltreue entsprechendes einfaches geometrisches Merkmal gibt es nicht.

$$w_1 = f_1(z_1, z_2),$$

$$w_2 = f_2(z_1, z_2),$$

seien zwei analytische Funktionen, für die

straßschen Vorbereitungssatzes, Münch. Ber. 1909, Nr. 3; b) Bemerkung dazu, Münch. Ber. 1909, p. 29*; *A. Brill*, Über den *Weierstraßschen* Vorbereitungssatz, Math. Ann. 69 (1910), p. 538—549; *Bliß*, A new proof of *Weierstraß's* theorem concerning the factorisation of power series, Bull. Am. math. soc. (2) 16 (1910), p. 356—359; *Mac Millan*, A new proof of the *Weierstraß's* theorem concerning the factorisation of power series, Bull. Am. math. soc. (2) 17 (1910), p. 116—120; *Fields*, The complementary theorem, Am. J. of math. 32 (1910), p. 1—16; *G. Dumas*, Elementare Herleitung des *Weierstraßschen* Vorbereitungssatzes, Münch. Ber. 39 (1904).

³⁷⁷ *Halphen*, Sur les lignes singulières des surfaces algébriques, Ann. di mat. (2) 9 (1878—1879), p. 68—105. Vgl. auch *K. Hensel*, Über eine neue Theorie der algebraischen Funktionen zweier Variablen, Acta math. 23 (1900), p. 339—416; *H. Jung*, Darstellung der Funktionen eines algebraischen Körpers zweier unabhängiger Veränderlichen x, y in der Umgebung einer Stelle $x = a, y = b$, J. f. Math. 133 (1908), p. 289—314.

^{377, 1} *C. W. Black*, The parametric representation of the neighborhood of a singular point of an analytic surface, Proc. of the Am. Ac. of arts and sciences, vol. 37 (1902), p. 289—330. Vgl. auch *Jung*.³⁷⁷

$$0 = f_1(0, 0),$$

$$0 = f_2(0, 0)$$

gilt, und es sei für

$$\Delta(z_1, z_2) = \frac{\partial f_1}{\partial z_1}, \frac{\partial f_1}{\partial z_2}$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial z_1}, \frac{\partial f_2}{\partial z_2}$$

$\Delta(0, 0) \neq 0$ Dann vermitteln die beiden Funktionen eine umkehrbar eindeutige Abbildung der Umgebung von $z_1 = 0, z_2 = 0$ auf eine Umgebung von $w_1 = 0, w_2 = 0$.

Wenn aber $\Delta(0, 0) = 0$ ist, geschieht die Abbildung auf eine volle n blättrige Umgebung von $w_1 = w_2 = 0$. Diese Zahl n ist dabei wie folgt bestimmt: $F_1(z_1, z_2)$ und $F_2(z_1, z_2)$ seien die homogenen Polynome niedrigsten Grades in der *Mac Laurinschen* Reihe für $f_1(z_1, z_2)$ und $f_2(z_1, z_2)$. Ihre Grade seien ν_1 und ν_2 . Dann ist $n = \nu_1 \cdot \nu_2$. Die „Blätter“ hängen längs einer einzigen analytischen zweidimensionalen Fläche $\varphi(z_1, z_2) = 0$ zusammen, deren Punkte also allein nicht n fach bedeckt sind.^{378) 379)} Man erkennt in diesen Sätzen die Übertragung des Satzes von der Gebietstreue.

Einiges ist auch bekannt für den Fall, daß die Abbildung nicht durch eindeutige Funktionen definiert ist, sondern durch zwei allgemeinere Gleichungen

$$F_1(w_1, w_2, z_1, z_2) = 0,$$

$$F_2(w_1, w_2, z_1, z_2) = 0$$

378) H. Poincaré a. a. O. 376); G. A. Bliß, a) A generalisation of Weierstraß preparation theorem for a power series in several variables, Trans. of the Am. math. soc. 13 (1912), p. 133—145; b) Four lectures on fundamental existence theorems, Am. math. soc. colloquium lectures III, The Princeton colloquium (1909), New-York 1913, p. 71; Poincaré (*mécanique céleste* I, p. 72) behauptet, daß man jedes Gleichungssystem auf ein Gleichungssystem zurückführen kann, das ganz und rational von den Unbekannten abhängt. Dieser Fassung des Satzes hat sich Mac Millan zugewendet; vgl. Mac Millan, A reduction of a system of power series to an aequivalent system of polynomials, Math. Ann. 72 (1912), p. 157—179. Dazu vgl. aber die Kritik von Bliß a. a. O. 376). Kistler a. a. O. 369); Clements, a) Implicit functions defined by equations with vanishing *Jacobian*, Bull. of the Am. math. soc. (2) 18 (1912), p. 451—456; b) Implicit functions defined by equations with vanishing *Jacobian*, Trans. of the Am. math. soc. 14 (1913), p. 325—342; c) Singular point transformations in two complex variables, Annals of math. (2) 15 (1913), p. 1—19; Dines, Concerning two recent theorems on implicit functions, Bull. Am. math. soc. (2) 19 (1913), p. 165—166. p. 464.

379) Vgl. ferner zu dieser Frage: Dederick, On the charakter of a transformation in the neighborhood of a point where its *Jacobian* vanishes, Trans. of the Am. math. soc. 14 (1913), p. 143—148; Urner, Certain singularities of point transformations in space of three dimensions, Trans. of the Am. math. soc. 13 (1912), p. 232—264.

zwischen z_1, z_2 und w_1, w_2 . Der älteste hierher gehörige Satz stammt von *Weierstraß*³⁸⁰⁾.

Neuerdings haben sich verschiedene amerikanische Mathematiker den Problemen zugewandt. Ich erwähne vor allem einen Satz von *Bliß*³⁷⁸⁾.

$$\begin{aligned} & \text{Die beiden Funktionen } F_1(w_1, w_2, z_1, z_2), \\ & F_2(w_1, w_2, z_1, z_2) \end{aligned}$$

sollen in der Umgebung von $z_1 = z_2 = w_1 = w_2 = 0$ regulär sein. Entwickelt man

$$\begin{aligned} & F_1(0, 0, z_1, z_2), \\ & F_2(0, 0, z_1, z_2) \end{aligned}$$

nach *Mac Laurin*, so seien ν_1 und ν_2 die Grade der homogenen Polynome niedrigster Ordnung in der Entwicklung. Setzt man dann wieder $n = \nu_1 \nu_2$, so gehören zu jedem Wert von w_1, w_2 aus der Umgebung von $(0, 0)$ n im allgemeinen voneinander verschiedene Werte aus der Umgebung von $z_1 = z_2 = 0$.³⁷⁴⁾ Wenn aber eine der Funktionen

$$\begin{aligned} & F_1(0, 0, z_1, z_2), \\ & F_2(0, 0, z_1, z_2) \end{aligned}$$

identisch verschwindet, so kann z_1 oder z_2 in der Umgebung von $w_1 = w_2 = 0$ beliebigen Werten beliebig nahe kommen. Das lehrt z. B. die Abbildung

$$\begin{aligned} & w_1 - w_2 z_1 = 0, \\ & w_1 - z_2 = 0. \end{aligned}$$

Das folgt aber auch aus dem erwähnten Satz von *Weierstraß*³⁸⁰⁾. Der Satz von der Gebietstreue wird dann nur aufrechterhalten werden können, wenn man den Gebietsbegriff geeignet verallgemeinert.

Man kann die eben erwähnten Sätze auch auf den Fall ausdehnen, daß die Zahl der Gleichungen und Unbekannten übereinstimmt, die Zahl der unabhängigen Variablen aber beliebig ist.³⁸¹⁾

*H. Poincaré*³⁸²⁾ hat das Hauptproblem der analytischen Abbildung in Angriff genommen, nämlich die Frage nach den Bedingungen, unter welchen zwei gegebene Bereiche aufeinander analytisch abbildbar sind.^{382,1)} Er hat erkannt, daß ganz und gar nicht zwei beliebige einfach zusammenhängende Bereiche aufeinander abgebildet werden können. Wenn

380) *K. Weierstraß*, Allgemeine Untersuchungen über $2n$ -fach periodische Funktionen von n Veränderlichen, Werke III (p. 53—114), p. 79—80.

381) Für den Fall, daß sie Eins ist, hat *Mac Millan* Beispiele diskutiert. *Mac Millan*, A method for determining the solutions of a system of analytic functions in the neighborhood of a branch point, Math. Ann. 72 (1912), p. 180—202.

382) *H. Poincaré*, Les fonctions analytiques de deux variables et la représentation conforme, Rend. di Palermo 23 (1907), p. 185—220.

382, 1) Hierüber wird demnächst *K. Reinhardt* in den Math. Ann. interessante Untersuchungen veröffentlichen.

es nämlich möglich sein soll, zwei gegebene analytische dreidimensionale Flächen analytisch aufeinander abzubilden, so müssen gewisse Differenzialausdrücke für beide den gleichen Wert haben. Als speziellen schönen Satz aus diesen grundlegenden Untersuchungen hebe ich den folgenden hervor: Jede auf der ganzen Oberfläche reguläre Abbildung der Kugel $|z_1|^2 + |z_2|^2 < 1$ auf sich wird durch lineare Funktionen vermittelt. (Bei einer Variablen leistet auch die auf $|z| = 1$ reguläre Funktion $w = z^2$ eine Abbildung von $|z| < 1$ auf sich selbst.)

Dieser Satz macht beispielsweise die Übertragung des Quadratwurzelverfahrens der konformen Abbildung auf analytische Abbildungen unmöglich, wiewohl man mancherlei andere Sätze, wie das *Schwarzsche* Lemma und dgl., übertragen kann.³⁸³⁾ *K. Reinhardt*^{382, 1)} hat an konkreten Fällen gezeigt, daß ein dem *Riemannschen* analoger Abbildungssatz hier *nicht* gilt: $\{|z_1| < 1, |z_2| < 1\}$ kann z. B. nicht auf $|z_1|^2 + |z_2|^2 < 1$ abgebildet werden.

383) Einige weitere Arbeiten, die meist Übertragungen enthalten; *Baker*, a) Elementary proof of a theorem for functions of several variables, Proc. London math. Soc. 34 (1902), p. 296—306; b) On functions of several variables, Proc. London math. Soc. (2) 1 (1903/04), p. 14—36; *P. Boutroux*, Remarques sur les singularités transcendentes des fonctions de deux variables, Bull. soc. math. Fr. 39 (1911), p. 296—304; *T. J. Bromwich* u. *G. H. Hardy*, Some extensions to multiple series of *Abel's* theorem on the continuity of power series, Proc. London math. Soc. (2) 2 (1904), p. 161—189; *T. J. Bromwich*, Various extensions of *Abel's* lemma, Proc. London math. Soc. (2) 6 (1908), p. 58—76; *W. B. Ford*, On the analytic extension of functions defined by double power series, Trans. Am. math. Soc. 8 (1906), p. 260—274; *Forsyth*, Simultaneous complex variables and their geometrical representation, Mess. of math. (2) 40 (1910), p. 113—134; *G. H. Hardy*, a) On the convergence of certain multiple series, Proc. London math. Soc. (2) 1 (1903/4), p. 124—128; b) The singular points of certain classes of several variables, Proc. London math. Soc. (2) 5 (1907), p. 342—360; c) A function of two variables, Quart. J. 45 (1913), p. 85—113; *H. Holzberger*, Über das Verhalten von Potenzreihen mit zwei und drei Veränderlichen an der Konvergenzgrenze, Monath. Math. Phys. 25 (1914), p. 179—266; *D. Jackson*, Non essential singularities of functions of several complex variables, Annals of math. (2) 17 (1915), p. 172—179; *T. Levi-Civita*, Sulle funzioni di due o più variabile complesse, Rend. dei Lincei 14 (1905), p. 492—499; *G. Mittag-Leffler*, Analytische Darstellung monogener Funktionen von mehreren unabhängigen Variablen, Jahresber. d. D. Math.-Ver. 9 (1901), p. 74—77; *C. W. Oseen*, Eine Bemerkung über die analytische Fortsetzung von Funktionen mehrerer Variablen, Arkiv for mat. astr. och fys. 3 (1907), Nr. 21; *P. Painlevé*, Sur le développement des fonctions analytiques de plusieurs variables, Paris C. R. 129 (1899), p. 92—95; *G. Rémoundos*, Contribution au problème de la représentation uniforme des surfaces, Bull. soc. math. Fr. 39 (1911), p. 79—84; *L. Sauvage*, Premiers principes de la théorie générale des fonctions de plusieurs variables, Ann. Fac. sc. Marseille 14 (1904), p. 1—70.

(Abgeschlossen am 1. Dezember 1920.)

II C 5. ARITHMETISCHE THEORIE DER ALGEBRAISCHEN FUNKTIONEN.

VON

K. HENSEL*)

IN MARBURG A. L.

Inhaltsübersicht.

I. Der Körper $K(z)$ der rationalen Funktionen von z .

1. Untersuchung der rationalen Funktionen von z für eine Stelle dieser Variablen.
2. Der Körper $\bar{K}(\mathfrak{p})$ aller zur Stelle \mathfrak{p} gehörigen Potenzreihen und der Unterkörper $K(\mathfrak{p})$ der zu \mathfrak{p} gehörigen konvergenten Potenzreihen.
3. Untersuchung der rationalen Funktionen von z für alle Stellen der ganzen Kugelfläche. Die rationalen Divisoren.

II. Der Körper $K(u, z)$ der algebraischen Funktionen einer Variablen.

4. Allgemeine Sätze über die algebraischen Funktionen.
5. Untersuchung der Funktionen des Körpers $K(u, z)$ in der Umgebung einer Stelle \mathfrak{p} der unabhängigen Variablen.
6. Die Grundgleichung ist für den Bereich $\bar{K}(\mathfrak{p})$ irreduktibel.
7. Allgemeiner Fall: Die Grundgleichung zerfällt innerhalb $\bar{K}(\mathfrak{p})$ in mehrere irreduktible Faktoren.
8. Die dem Körper $K(u, z)$ zugeordnete *Riemannsche* Kugelfläche \mathfrak{R}_z .
9. Direkte Berechnung der zu einer Stelle \mathfrak{p} gehörigen Wurzelzyklen. Das zu \mathfrak{p} gehörige Diagramm.
10. Untersuchung der algebraischen Funktionen des Körpers für alle Stellen der *Riemannschen* Kugelfläche \mathfrak{R}_z . Die algebraischen Divisoren.
- 10a. Die arithmetischen Begründungen des Punktbegriffes.
11. Untersuchung der Funktionen des Körpers $K(u, z)$ in bezug auf ihre Teilbarkeit durch einen beliebigen Divisor.
12. Die algebraischen Systeme und ihre Elementarteiler.
13. Die eindeutigen Transformationen des Körpers $K(u, z)$ in den ihm gleichen $K(y, x)$ bei beliebiger Annahme der unabhängigen Variablen x .
14. Die Einteilung der algebraischen Divisoren in Klassen.
15. Die Divisorenscharen und ihre Invarianten.
16. Die ganzen Divisoren einer Klasse Q .

III. Die zu dem Körper $K(y, x)$ gehörigen Abelschen Integrale.

17. Die *Abelschen* Integrale.
18. Die Differentiale der Elemente des Körpers K und die zugehörigen Divisoren.
19. Die Differentialklasse W .

*) Die mit [O] bezeichneten Anmerkungen sowie die gleichbezeichnete Nr. 10a rühren von Herrn *A. Ostrowski* her.

20. Die Fundamentalaufgabe in der Theorie der *Abelschen* Integrale. Der *Riemann-Rochsche* Satz.
21. Die Elementarintegrale erster, zweiter und dritter Gattung.
22. Spezialisierung für die Integrale mit rationalem Integranden.

IV. Die zum Körper $K(y, x)$ gehörigen algebraischen Kurven.

23. Die ebenen algebraischen Kurven und ihre singulären Punkte.
24. Der zur Kurve \mathcal{C} gehörige Divisor der Doppelpunkte.
25. Auflösung der Singularitäten einer Kurve.
26. Die zu einer Gleichung $F(x, y)$ gehörigen Funktionenringe.
27. Darstellung der zum Körper K gehörigen Kurven durch homogene Koordinaten.
28. Die Differentialteiler einer Divisorenschar und ihre Anwendung in der Geometrie. Die *Plückerschen* Formeln.
29. Theorie der algebraischen Raumkurven.

V. Die Klassen algebraischer Gebilde.

30. Die Hauptkurve eines Körpers und ihre *Weierstraßpunkte*.
31. Die Normalgleichungen und die Moduln der algebraischen Körper.
32. Die Normalgleichungen und die Moduln der allgemeinen Körper vom Geschlecht p .

VI. Algebraische Relationen zwischen *Abelschen* Integralen.

33. Algebraische Normierung der Fundamentalintegrale erster und zweiter Gattung.
34. Die Integrale dritter Gattung und der Satz von der Vertauschung von Parameter und Argument.
35. Einteilung aller Wege auf einer *Riemannschen* Fläche in Klassen.
36. Die Fundamentalsysteme von Periodenwegen für eine *Riemannsche* Fläche.
37. Die Periodenrelationen der Integrale erster und zweiter Gattung.
38. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Fundamentalsystemen von Periodenwegen.
39. Die Perioden der Integrale zweiter und dritter Gattung als Funktionen ihrer Unstetigkeitspunkte.
40. Die Primfunktionen. Zerlegung der Funktionen des Körpers in Primfunktionen.
41. Das *Abelsche* Theorem als Additionsprinzip der Integrale.
42. Die aus dem *Abelschen* Theorem folgenden Reduktionsprobleme.
43. Das Umkehrproblem für die *Abelschen* Integrale.

VII. (Anhang.) Arithmetische Theorie der algebraischen Zahlen.

44. Der Körper $K(1)$ der rationalen Zahlen und der Körper $K(p)$ der p -adischen Zahlen
45. Die algebraischen Zahlkörper und die ihnen isomorphen rationalen Kongruenzkörper.
46. Untersuchung der rationalen Kongruenzkörper für den Bereich einer Primzahl p . Ihre Reduktion auf die p -adischen Kongruenzkörper.
47. Die p -adischen Kongruenzkörper und die ihnen isomorphen Körper $K(\mathfrak{P})$ der π -adischen algebraischen Zahlen.
48. Der zu einer vorgelegten Gleichung $F(x) = 0$ zugehörige *Galoissche* π -adische Zahlkörper $K(\mathfrak{P})$.

Literatur.

(Die hier angeführten Abhandlungen und Werke werden im Text und in den Anmerkungen nur mit der Angabe der Abkürzung und der Seitenzahl zitiert.)

R. Dedekind und *H. Weber*, Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen, J. f. Math. 92 (1882), p. 181—290 („*D.-W.*“).

H. Weber, Lehrbuch der Algebra, Bd. III, 5. Buch, p. 623—707. Braunschweig 1908, F. Vieweg & Sohn („*W.*“).

Bringt sämtliche Resultate von *D.-W.* mit vereinfachter Begründung der Idealtheorie. Wird nur im Abschnitt (10a) über die Grundlegung des Punktbegriffes zitiert.

L. Kronecker, Über die Discriminante algebraischer Funktionen einer Variablen, J. f. Math. 91 (1881), p. 301—334 („*Discr.*“).

L. Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Festschrift zu Herrn Ernst Eduard Kummers fünfzigjährigem Doktorjubiläum. Berlin 1882, G. Reimer. Auch J. f. Math. 92 (1882), p. 1—122 („*Festschrift*“).

A. Brill und *M. Nöther*, Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit. Jahresber. d. deutsch. Math.-Ver. 3 (1894), p. 109—566 und p. I—XXIII Vorrede („*B.-N.*“).

Geht auf die arithmetische Theorie zwar nicht ein, bespricht jedoch eingehend die *Kroneckerschen* Untersuchungen über die Diskriminante. Bringt außerdem einen Bericht über die *Weierstraßsche* Vorlesung aus dem Jahre 1869 (als „*V. 1869*“ zitiert), in der der Begriff der *ganzen* algebraischen Funktion stark benutzt wird, und den zeitlich ersten, zusammenhängenden (wenn auch äußerst knapp gehaltenen) Bericht über die spätere *Weierstraßsche* Theorie (1873) als „*V. 1873*“ zitiert, die auf *B.* und *H.-L.* von Einfluß gewesen ist.

H. F. Baker, *Abels* theorem and the allied theory including the theory of the theta funktion. Cambridge 1897 („*B.*“).

K. Hensel und *G. Landsberg*, Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen und ihre Anwendung auf algebraische Kurven und *Abelsche* Integrale. Leipzig 1902, Teubner („*H.-L.*“).

Der Inhalt der ersten Vorlesungen ist auch besonders erschienen: *K. Hensel*, Zur Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen und der *Abelschen* Integrale, Math. Ann. 54 (1901), p. 437—497. Dieser Aufsatz wird nicht besonders zitiert werden.

C. Weierstraß, Vorlesungen über die Theorie der *Abelschen* Transcendenten, Gesammelte mathematische Werke, Bd. IV (1902).

Wird zum Vergleich mit den Methoden und Resultaten der arithmetischen Theorie herangezogen.

E. Noether, Die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen in ihrer Beziehung zu den übrigen Theorien und zu der Zahlkörpertheorie, Deutsch. Math.-Ver. 28 (1914), p. 182—203 („*E. N.*“).

Gibt eine kurze Darstellung der Grundlagen der verschiedenen Theorien und eine Vergleichung der verschiedenen arithmetischen Theorien untereinander und mit der geometrischen Theorie der algebraischen Funktionen.

K. Hensel, Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen, Math. Ztschr. 5 (1919), p. 118—131. Vgl. Anm. 5 dieses Artikels.

—, Theorie der algebraischen Zahlen, Leipzig 1908 (*H. I.*).

K. Hensel, Zahlentheorie, Berlin 1913 (H. II).

—, Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 433 bis 452 (H. III).

In diesen Werken ist die im Anhang erwähnte Theorie der rationalen und algebraischen Zahlen ausführlich dargestellt.

Es werden hauptsächlich nur die Abhandlungen zitiert, welche die Methoden der arithmetischen Theorie benutzen. Für die übrige Literatur, die sich auf die im Referat berührten Fragen bezieht, vgl. *B.-N.*, II B 2 (*Wirtinger*), III C 4 (*Berzolari*), III C 8 (*Rohn*), III C 9 (*Segre*), III C 10 (*Zindler*) [O].

I. Der Körper $K(z)$ der rationalen Funktionen von z .

1. Untersuchung der rationalen Funktionen von z für eine Stelle dieser Variablen. Die Gesamtheit aller rationalen Funktionen

$$Z = \varphi(z)$$

einer komplexen Variablen mit beliebigen reellen oder komplexen Koeffizienten bildet einen Körper¹⁾, dessen Elemente sich durch die elementaren Rechenoperationen wieder erzeugen.

Jedem Werte $z = \alpha$ bzw. $z = \infty$ der unabhängigen Variablen ordnen wir eindeutig eine Stelle zu.²⁾ Geometrisch entspricht jeder endlichen Stelle $\alpha = a + ib$ ein Punkt der komplexen Zahlenebene oder durch stereographische Abbildung derselben ein Punkt p der sog. Einheitskugel \mathfrak{K} vom Durchmesser eins; der Stelle $z = \infty$ entspricht der Südpol p_∞ dieser Kugel. Die geometrische Repräsentation dient

1) Die erste Körperdefinition bei *Dedekind* (Zahlkörper), (*Lejeune-Dirichlet*, Vorles. über Zahlentheorie, 2. Aufl., Braunschweig (1871), für Funktionenkörper *Kronecker* (Rationalitäts- und Gattungsbereiche), Festschrift, p. 6. Andere wesentlich allgemeinere Körperdefinitionen geben *D.-W.*, p. 185, *Weber*, Math. Ann. 43 (1893), p. 526—527, *Steinitz*, J. f. Math. 137 (1910), p. 172.

Es sind eigentlich zwei verschiedene Körperbegriffe, mit denen die Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen operiert. Einmal sind es Körper der algebraischen Funktionen einer bestimmten festen Veränderlichen z (*Kronecker*) — solchen Körpern entsprechen dann n -blättrige über der z -Ebene oder der z -Kugel ausgebreitete *Riemannsche* Flächen. Oder es wird kein Element des Körpers ausgezeichnet, so daß nur zwischen konstanten und nicht konstanten Elementen zu unterscheiden ist, und der Körper wird durch die rationalen Relationen (mit beliebigen konstanten Koeffizienten) bestimmt, die zwischen seinen Elementen bestehen (*D.-W.*, *H.-L.*, *Steinitz*). Genauer, ein Körper algebraischer Funktionen einer Variablen ist gegeben, wenn zu jedem Paar nicht konstanter Elemente aus ihm ein irreduzibles Polynom von zwei Veränderlichen gegeben ist, das verschwindet, sobald für die Veränderlichen jene Elemente eingesetzt werden. Diesem letzten implizite bereits bei *D.-W.* vorkommenden Körperbegriff entspricht der Begriff der absoluten *Riemannschen* Fläche, für den sich bei *D.-W.* eine arithmetische Definition findet (s. 10a). [O]

2) II B 1 (*Osgood*), Nr. 8. [O]

hier wie im Folgenden nur zur einfachen Veranschaulichung; die folgenden Untersuchungen und Beweise sind von ihr unabhängig. Die dem Werte $z = \alpha$ bzw. $z = \infty$ zugeordnete Stelle soll im Folgenden ebenso wie der zugehörige Punkt der Kugeloberfläche \mathfrak{K} durch \mathfrak{p} bzw. \mathfrak{p}_∞ bezeichnet werden.

Jede Funktion Z des Körpers $K(z)$ besitzt in einer beliebigen Stelle \mathfrak{p} ($z = \alpha$) einen eindeutig bestimmten Zahlenwert $Z(\mathfrak{p})$, welcher $0, \infty, c$ sein kann; hier wie im Folgenden bedeutet c einen bestimmten endlichen von Null verschiedenen Wert. Im ersten bzw. im zweiten Falle heißt \mathfrak{p} eine *Nullstelle* bzw. ein *Pol*; ist dagegen $Z(\mathfrak{p}) = c$, so heißt Z eine *Einheit* oder eine *Einheitsfunktion für die Stelle* \mathfrak{p} und wird kurz durch $E(\mathfrak{p})$ oder $E(z | \alpha)$ bzw. $E(\mathfrak{p}_\infty)$ oder $E(z | \infty)$ bezeichnet.

Z heißt eine *ganze Funktion für die Stelle* \mathfrak{p} , wenn $Z(\mathfrak{p})$ endlich ist, ist $Z(\mathfrak{p}) = \infty$, ist also \mathfrak{p} ein Pol für Z , so nennt man sie eine *für \mathfrak{p} gebrochene Funktion*.³⁾ Die Summe, die Differenz und das Produkt von ganzen Funktionen ist wieder ganz. Eine ganze oder gebrochene Funktion Z heißt durch eine andere U *für die Stelle* \mathfrak{p} *teilbar*, wenn der Quotient $\frac{Z}{U}$ dort ganz ist. Die Einheitsfunktionen, und sie allein, sind in *jeder* ganzen Funktion enthalten. Ist sowohl Z durch U als auch U durch Z für \mathfrak{p} teilbar, so heißen Z und U für \mathfrak{p} *äquivalent*, und dies ist stets und nur dann der Fall, wenn sie sich um eine Einheitsfunktion multiplikativ unterscheiden.

Eine ganze Funktion $p(z)$ heißt eine *Primfunktion* für die Stelle \mathfrak{p} , wenn sie dort eine Nullstelle hat und nicht in ein Produkt von Faktoren derselben Art zerlegt werden kann. Eine solche Primfunktion ist z. B.

$$p = z - \alpha \text{ für die endliche Stelle } (z = \alpha)$$

$$p = \frac{1}{z} \text{ für die unendlich ferne Stelle } (z = \infty).$$

Alle Primfunktionen für eine und dieselbe Stelle sind einander äquivalent.

Ist p eine Primfunktion, so läßt sich jede andere Funktion Z auf eine einzige Weise in der Form

$$(1) \quad Z = \varepsilon p^q$$

darstellen, wo q eine ganze Zahl, und ε eine Einheit bedeutet. Der Exponent q , welcher offenbar von der Wahl der Primfunktion un-

3) Ganz analog nennt man in der Zahlentheorie einen reduzierten Bruch $\frac{a}{b}$ *ganz* in bezug auf eine Primzahl p , wenn b mit p teilerfremd ist, *gebrochen* in bezug auf p , wenn b durch p teilbar ist. Ebenso heißt eine Zahl a durch eine andere b teilbar in bezug auf p , wenn $\frac{a}{b}$ ganz in bezug auf p ist. Vgl. Nr. 44 dieses Referates. [O]

abhängig ist, soll die *Ordnungszahl von Z für die Stelle \mathfrak{p}* heißen. Es besteht also für jede Funktion Z und für jede endliche oder die unendlich ferne Stelle eine Gleichung:

$$(1a) \quad Z = (z - \alpha)^{\varrho} E(z | \alpha), \text{ bzw. } Z = \left(\frac{1}{z}\right)^{\varrho} E(z | \infty).$$

Die allgemeinste Primfunktion für die betr. Stelle ergibt sich aus diesen Gleichungen für $\varrho = 1$. Die Ordnungszahl von Null ist gleich $+\infty$ zu setzen. Die Stelle \mathfrak{p} ist eine Nullstelle oder ein Pol für Z , je nachdem ϱ positiv oder negativ ist.

Man ordnet nun jeder Stelle \mathfrak{p} einen *Divisor* zu, welcher ebenfalls durch \mathfrak{p} bezeichnet werde, und zwar soll die Teilbarkeit einer Funktion Z durch \mathfrak{p} durch die folgende Definition charakterisiert werden.

Eine Funktion Z ist durch \mathfrak{p}^{ϱ} teilbar, wenn sie im zugehörigen Punkte \mathfrak{p} mindestens die Ordnungszahl ϱ besitzt, wenn sie also für jene Stelle mindestens durch die ϱ^{te} Potenz der zugehörigen Primfunktion teilbar ist. Z heißt *genau* durch \mathfrak{p}^{ϱ} teilbar, wenn sie in \mathfrak{p} genau die Ordnungszahl ϱ hat.

Sind Z und Z' genau durch \mathfrak{p}^{ϱ} und $\mathfrak{p}^{\varrho'}$ teilbar, so ist ZZ' und $\frac{Z}{Z'}$ genau durch $\mathfrak{p}^{\varrho+\varrho'}$ und $\mathfrak{p}^{\varrho-\varrho'}$ teilbar.

Man nennt die so definierten Divisoren *Primteiler*, weil ein Produkt ZZ' dann und nur dann durch \mathfrak{p} teilbar ist, wenn mindestens einer der Faktoren \mathfrak{p} enthält.

Zwei Funktionen Z und Z' heißen modulo \mathfrak{p}^{ϱ} *kongruent*, wenn ihre Differenz mindestens durch \mathfrak{p}^{ϱ} teilbar ist. Zwei solche Funktionen heißen für den Bereich von \mathfrak{p} *gleich*, wenn sie für jede noch so hohe Potenz von \mathfrak{p} kongruent sind; zwei rationale Funktionen sind dann und nur dann für den Bereich von \mathfrak{p} gleich, wenn sie identisch sind.

Jede Funktion Z des Körpers $K(z)$ ist für den Bereich einer beliebigen Stelle \mathfrak{p} gleich einer eindeutig bestimmten Potenzreihe

$$Z = A_{\varrho} p^{\varrho} + A_{\varrho+1} p^{\varrho+1} + \dots \quad (\mathfrak{p})$$

mit konstanten Koeffizienten A_{ν} , welche beliebig weit rational berechnet werden können; der Exponent ϱ des Anfangsgliedes ist gleich der Ordnungszahl von Z . Für eine endliche bzw. für die unendlich ferne Stelle gelten so Entwicklungen:

$$(2) \quad \begin{aligned} Z &= A_{\varrho} (z - \alpha)^{\varrho} + A_{\varrho+1} (z - \alpha)^{\varrho+1} + \dots & (\mathfrak{p}) \\ Z &= B_{\sigma} \left(\frac{1}{z}\right)^{\sigma} + B_{\sigma+1} \left(\frac{1}{z}\right)^{\sigma+1} + \dots & (\mathfrak{p}_{\infty}) \end{aligned}$$

Die Reihen (2) sind aber nicht bloß für den Bereich der Stelle \mathfrak{p} gleich Z , sondern sie stellen, wie nun leicht bewiesen werden kann^{3a)},

3a) Vgl. z. B. *H.-L.*, p. 8—10.

die Werte von Z auch der Größe nach mit jeder vorgegebenen Genauigkeit für alle Werte von z innerhalb eines Kreises auf der Kugelfläche \mathfrak{K} mit dem Mittelpunkte \mathfrak{p} dar, dessen Peripherie durch den nächsten Pol von Z geht. Man nennt diese Reihen *die zur Stelle \mathfrak{p} gehörigen Funktionenelemente von Z* . Eine allgemeine analytische Funktion, welche in einer endlichen Umgebung eines Punktes \mathfrak{p} gleich einer Potenzreihe (2) ist, besitzt, wie man sagt, an dieser Stelle *rationalen Charakter*. Die rationalen Funktionen sind also analytische Funktionen, welche an einer jeden Stelle rationalen Charakter besitzen; umgekehrt folgt aus den Elementen der Funktionentheorie, daß jede solche analytische Funktion dem Körper $K(z)$ angehört.

2. Der Körper $\bar{K}(\mathfrak{p})$ aller zur Stelle \mathfrak{p} gehörigen Potenzreihen und der Unterkörper $K(\mathfrak{p})$ der zu \mathfrak{p} gehörigen konvergenten Potenzreihen. Wir betrachten die Gesamtheit *aller* Potenzreihen für die Stelle \mathfrak{p} :

$$(3) \quad Z = a_0(z - \alpha)^0 + a_{\varrho+1}(z - \alpha)^{\varrho+1} + \dots$$

bzw.

$$(3') \quad Z = a_0\left(\frac{1}{z}\right)^0 + a_{\varrho+1}\left(\frac{1}{z}\right)^{\varrho+1} + \dots$$

Wenn man den Begriff der Gleichheit für den Bereich von \mathfrak{p} wie oben und die Addition und Multiplikation von zwei solchen Reihen wie gewöhnlich definiert, so bilden auch sie einen Körper $\bar{K}(\mathfrak{p})$, von dem der Körper der rationalen Funktionen ein Teilkörper ist; denn eine Reihe (3) oder (3') stellt dann und nur dann eine *rationale* Funktion dar, wenn ihre Koeffizienten $a_0, a_{\varrho+1}, \dots$ einer Rekursionsformel genügen. Auch für diesen größeren Körper $\bar{K}(\mathfrak{p})$ gelten genau die einfachen Gesetze, welche vorher für den Körper $K(z)$ der rationalen Funktionen für diese Stelle ausgesprochen wurden. Auch für ihn ist $p = z - \alpha$ bzw. $\frac{1}{z}$ eine Primfunktion, und jede andere Funktion des Körpers $K(\mathfrak{p})$ läßt sich in der Form (3) bzw. (3') eindeutig darstellen.

Einen Teilkörper von $\bar{K}(\mathfrak{p})$ bildet nun der Bereich $K(\mathfrak{p})$ aller derjenigen Potenzreihen (3) bzw. (3'), welche einen *endlichen Konvergenzbereich* besitzen, also der Bereich aller zu \mathfrak{p} gehörigen Funktionenelemente, welche dort rationalen Charakter haben, derselbe werde kurz *der Körper der Potenzreihen in \mathfrak{p}* genannt. Der letzte Absatz des vorigen Paragraphen zeigt, daß die rationalen Funktionen nicht bloß dem Körper $\bar{K}(\mathfrak{p})$, sondern auch seinem Unterkörper $K(\mathfrak{p})$ angehören.

3. Untersuchung der rationalen Funktionen von z für alle Stellen der ganzen Kugelfläche. Die rationalen Divisoren. Die Einführung der den einzelnen Punkten \mathfrak{p} der Kugelfläche \mathfrak{K} zugeordneten

Primteiler leitet naturgemäß über zu der Betrachtung der allgemeinen aus ihnen zusammengesetzten Divisoren. Es seien $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_r$ beliebige Punkte der Kugelfläche \mathfrak{K} und zugleich auch die ihnen zugeordneten Primteiler; sind ferner h_1, h_2, \dots, h_r beliebige positive oder negative ganze Zahlen, oder auch Null, so sagen wir:

Eine Funktion Z des Körpers $K(\mathfrak{z})$ ist für den Bereich der Stellen $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_r$ durch den Divisor

$$q = \mathfrak{p}_1^{h_1} \mathfrak{p}_2^{h_2} \dots \mathfrak{p}_r^{h_r}$$

teilbar, wenn sie allgemein im Punkte \mathfrak{p}_i mindestens die Ordnungszahl h_i besitzt, wenn also Z für jede dieser Stellen \mathfrak{p}_i mindestens durch die h_i te Potenz der zugehörigen Primfunktion \mathfrak{p}_i teilbar ist. Z ist ein *ganzes Vielfaches* oder ein *Multiplum* von q , wenn sich Z außerdem noch auf der ganzen Fläche \mathfrak{K} mit Einschluß von \mathfrak{p}_∞ , falls dieser Primteiler nicht in q vorkommt, regulär verhält, also sonst keine Pole besitzt. q heißt ein *ganzer* oder ein *gebrochener Divisor*, je nachdem keiner oder wenigstens einer seiner Exponenten negativ ist.

Die Summe $q = h_1 + h_2 + \dots + h_r$ der Exponenten von q heißt die *Ordnung* jenes Divisors. Sind

$$q = \mathfrak{p}_1^{h_1} \mathfrak{p}_2^{h_2} \dots \mathfrak{p}_r^{h_r}, \quad r = \mathfrak{p}_1^{k_1} \mathfrak{p}_2^{k_2} \dots \mathfrak{p}_r^{k_r}$$

zwei beliebige Divisoren (in denen auch einige Exponenten Null sein können), so nennt man

$$\mathfrak{p}_1^{h_1+k_1} \mathfrak{p}_2^{h_2+k_2} \dots \mathfrak{p}_r^{h_r+k_r} \quad \text{und} \quad \mathfrak{p}_1^{h_1-k_1} \mathfrak{p}_2^{h_2-k_2} \dots \mathfrak{p}_r^{h_r-k_r}$$

bzw. das *Produkt* und den *Quotienten* von q und r und bezeichnet sie durch qr und $\frac{q}{r}$. Sind q und r die Ordnungszahlen von q und r ,

so sind die entsprechenden Zahlen für qr und $\frac{q}{r}$ bzw. $q+r$ und $q-r$.

Dann kann man alle Regeln und Definitionen der Arithmetik auf die Multiplikation und die Division dieser Divisoren ausdehnen. Jeder Divisor q läßt sich als Quotient $\frac{\mathfrak{z}}{\mathfrak{n}}$ zweier ganzen Divisoren darstellen, welche der *Zähler* und der *Nenner* von q heißen, und diese Darstellung heißt *reduziert* oder *nicht reduziert*, je nachdem \mathfrak{z} und \mathfrak{n} gewisse Primteiler gemeinsam enthalten oder nicht. Ebenso ergibt sich der Begriff des *größten gemeinsamen Teilers* $\mathfrak{d} = (q_1, q_2, \dots, q_\mu)$ mehrerer ganzer oder gebrochener Divisoren genau wie in der reinen Arithmetik.

Zu jeder rationalen Funktion Z gehört ein Divisor

$$q_Z = \frac{\mathfrak{z}_Z}{\mathfrak{n}_Z} = \mathfrak{p}_1^{h_1} \mathfrak{p}_2^{h_2} \dots \mathfrak{p}_r^{h_r},$$

dessen Zähler in der reduzierten Form durch die Nullstellen, dessen

Nenner durch die Pole von Z eindeutig bestimmt ist. So ist z. B. für jeden Linearfaktor $z - \alpha$ bzw. $\frac{1}{z}$

$$z - \alpha = \frac{p_\alpha}{p_\infty}, \quad \frac{1}{z} = \frac{p_\infty}{p_0}.$$

Da eine rationale Funktion durch ihre Pole und Nullstellen bis auf eine multiplikative Konstante bestimmt ist, so kann man

$$Z = q_z = e \frac{nz}{dz}$$

setzen, wenn man unter e den Anfangskoeffizienten der Entwicklung von Z in der Umgebung eines ein für alle Male festgewählten Punktes \bar{p} (etwa von p_∞) versteht. Dann gehört zu dem Produkte bzw. dem Quotienten zweier Funktionen Z und Z' das Produkt $q_z \cdot q_{z'}$ bzw. der Quotient $\frac{q_z}{q_{z'}}$ seiner Divisoren.

Da eine rationale Funktion ebenso viele Nullstellen wie Pole besitzt, so ist die Ordnung eines jeden zu einer Funktion Z gehörigen Divisors q_z gleich Null, und umgekehrt zeigt man leicht, daß zu jedem Divisor der Ordnung Null stets eine und nur eine Funktion des Körpers gehört.

Hieran schließt sich die Einteilung aller Divisoren in *Klassen*, welche für die hier betrachteten rationalen Divisoren sehr einfach ist, aber für das höhere Gebiet der algebraischen Divisoren von großer Wichtigkeit wird. Wir rechnen alle rationalen Divisoren $Z = q_z$ in eine Klasse E , die sogenannte *Einheits- oder Hauptklasse*, welche einem Elemente Z des rationalen Körpers $\mathfrak{K}(z)$ gleich sind. Die Hauptklasse enthält also alle und nur die Divisoren nullter Ordnung. Allgemeiner nennen wir zwei Divisoren q und q' *äquivalent* und rechnen sie in eine Klasse Q , wenn ihr Quotient $\frac{q}{q'}$ ein Divisor der Hauptklasse oder also einer Funktion des Körpers gleich ist. Hieraus ergibt sich sofort, daß zwei Divisoren q und q' dann und nur dann in dieselbe Klasse gehören, wenn sie von gleicher Ordnung sind.

Es gibt unendlich viele Divisorenklassen, nämlich für jeden ganzzahligen Wert der Ordnungszahl eine einzige; z. B. gehört zur Ordnungszahl 1 die Klasse A , deren Divisoren $(p q_z)$ alle einem beliebigen Primteiler p äquivalent sind; sie enthält überhaupt alle Primteiler, und diese sind die einzigen *ganzen* Divisoren dieser Klasse.

Sind Q und R zwei Divisorenklassen, q und r irgendwelche Divisoren derselben, so sind alle Produkte qr die sämtlichen Divisoren einer einzigen neuen Klasse, welche durch QR bezeichnet werde; und ebenso bilden alle Quotienten $\frac{q}{r}$ eine andere Klasse, welche $\frac{Q}{R}$ ge-

nannt wird. Die Hauptklasse E ist die einzige, durch deren Multiplikation und Division eine beliebige Klasse Q nicht geändert wird, für welche also stets $QE = \frac{Q}{E} = Q$ ist. Ist A die oben charakterisierte Divisorenklasse erster Ordnung, so sind alle Divisorenklassen in der Reihe:

$$\dots, A^{-2}, A^{-1}, E, A, A^2, \dots$$

enthalten.

II. Der Körper $K(u, z)$ der algebraischen Funktionen einer Variablen.

4. Allgemeine Sätze über die algebraischen Funktionen. Aufgabe der Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen ist die Untersuchung aller rationalen Funktionen $U = \varphi(u, z)$ der beiden Variablen u und z mit konstanten Koeffizienten unter der Voraussetzung, daß u Wurzel einer Gleichung n^{ten} Grades

$$(4) \quad f(u, z) = u^n - a_{n-1}(z)u^{n-1} + \dots \pm a_0(z) = 0$$

mit rationalen Funktionen von z als Koeffizienten ist. Man kann eine beliebig gegebene Funktion $f(u, z)$ auf rationalem Wege in ihre irreduktiblen Faktoren zerlegen; deshalb kann und soll gleich vorausgesetzt werden, daß $f(u, z)$ irreduktibel ist.⁴⁾

Jeder Stelle \mathfrak{p} der unabhängigen Variablen ($z = \alpha$, bzw. $z = \infty$) entsprechen stets n gleiche oder verschiedene Zahlenwerte u_1, u_2, \dots, u_n von u ; u ist also eine n -deutige Funktion von z . Jede symmetrische Funktion von u_1, u_2, \dots, u_n ist eine rationale Funktion von z .

Die Gesamtheit aller Funktionen $U = \varphi(u, z)$ bildet einen Körper $K(u, z)$. Jede Größe U dieses Körpers genügt ebenfalls einer sog. Hauptgleichung n^{ten} Grades

$$(4a) \quad F(U, z) = U^n - b_{n-1}(z)U^{n-1} + \dots \pm b_0(z) = 0,$$

deren linke Seite entweder selbst irreduktibel oder die Potenz einer irreduktiblen Funktion ist; jedes Element $U = \varphi(u, z)$ von $K(u, z)$ ist also auch eine n -deutige Funktion von z , und zwar hängen für jede Stelle \mathfrak{p} von z die n konjugierten Zahlen U_i mit den Zahlen u_i durch die Gleichungen $U_i = \varphi(u_i, z)$ zusammen. Speziell heißt

$$(5) \quad n(U) = b_0(z) = U_1 U_2 \dots U_n$$

die Norm von U ; es bestehen die Gleichungen

$$(5a) \quad n(UV) = n(U)n(V), \quad n\left(\frac{U}{V}\right) = \frac{n(U)}{n(V)}.$$

4) Vgl. I B 1 b. 5.

Ferner heißt das Determinantenquadrat:

$$(6) \quad d(U) = |1, U_i, U_i^2, \dots, U_i^{n-1}|^2 = \prod_{i < k} (U_i - U_k)^2 \quad (i, k = 1, 2, \dots, n)$$

die *Diskriminante* von U .

Ist $d(U)$ nicht identisch Null, so heißt U eine *primitive Funktion* des Körpers; nur in diesem Falle ist die Hauptgleichung $F(U, z) = 0$ selbst irreduktibel.

Es seien endlich $U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)}$ n Funktionen des Körpers $K(u, z)$, und es mögen allgemein:

$$(7) \quad U_i^{(1)}, U_i^{(2)}, \dots, U_i^{(n)} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

die konjugierten Zahlenwerte derselben für irgendeinen Wert von z bedeuten. Dann heißt das allgemeinere Determinantenquadrat:

$$(8) \quad d(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)}) = |U_i^{(1)}, U_i^{(2)}, \dots, U_i^{(n)}|^2$$

die *Diskriminante des Systems* $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$. Die n Funktionen $U^{(i)}$ sind dann und nur dann rational abhängig, d. h. zwischen ihnen besteht eine homogene lineare Gleichung

$$c_1 U^{(1)} + c_2 U^{(2)} + \dots + c_n U^{(n)} = 0$$

mit rationalen nicht sämtlich verschwindenden Koeffizienten $c_i(z)$, wenn ihre Diskriminante identisch Null ist.

Jede Funktion U des Körpers $K(u, z)$ kann auf eine einzige Weise in der Form:

$$(9) \quad U = c_0 + c_1 u + c_2 u^2 + \dots + c_{n-1} u^{n-1}$$

mit rationalen Funktionen von z als Koeffizienten dargestellt werden, Daher heißt das System $(1, u, \dots, u^{n-1})$ eine *Basis* des Körpers $K(u, z)$. Allgemeiner bildet das System $(1, U, \dots, U^{n-1})$ eine Basis des Körpers, wenn U eine primitive Funktion, also $d(U) \not\equiv 0$ ist, und das Gleiche gilt für jedes System $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$, dessen Elemente rational unabhängig sind, dessen Diskriminante $d(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ also nicht Null ist.⁵⁾

5) Die Entwicklungen von Nr. 4 werden bei *H.-L.* unter Benutzung konjugierter Zahlenwerte einer Funktion durchgeführt. Da bei *D.-W.* auf Benutzung der Reihenentwicklungen verzichtet wird und die Möglichkeit, für jeden Wert von z den Funktionen des Körpers gewisse Werte beizulegen, erst am Schlusse der Untersuchung begründet wird, muß dort auf mehr formale Betrachtungen zurückgegriffen werden, die ähnlich durchgeführt werden wie in der Idealtheorie. (Vgl. z. B. *Dirichlet-Dedekind*, Vorlesungen über Zahlentheorie, 4. Aufl. 1894, p. 487 ff.)

Ist η_1, \dots, η_n eine Basis, und ζ eine beliebige Funktion des Körpers, so lassen sich die Produkte $\zeta\eta_1, \dots, \zeta\eta_n$ durch die Basis (η_i) so darstellen:

$$\zeta\eta_k = \sum_{i=1}^{i=\eta_k} y_{ki} \eta_i \quad (k = 1, \dots, n), \text{ wo } y_{ki} \text{ rationale Funktionen von } z \text{ sind. An die}$$

5. Untersuchung der Funktionen des Körpers $K(u, z)$ in der Umgebung einer Stelle der unabhängigen Variablen. In der Umgebung einer endlichen oder der unendlich fernen Stelle $\mathfrak{p}(z = \alpha$ oder $z = \infty)$ der Variablen z sind die Koeffizienten $a_i(z)$ der Grundgleichung (4) in nach ganzen Potenzen der Entwicklungsfunktion $p(z - \alpha$ bzw. $\frac{1}{z})$ fortschreitende Potenzreihen entwickelbar, d. h. sie gehören dem umfassenderen Körper $\bar{K}(\mathfrak{p})$ der Potenzreihen in \mathfrak{p} an. Während nun die linke Seite $f(u, z)$ der Grundgleichung im Körper $K(z)$ der rationalen Funktionen von z als unzerlegbar vorausgesetzt werden konnte, ist sie dies in dem weiteren Bereich $\bar{K}(\mathfrak{p})$ der Potenzreihen in \mathfrak{p} im allgemeinen nicht, sondern sie zerfällt in ein Produkt von unter sich verschiedenen unzerlegbaren Faktoren, deren Koeffizienten $c_i(\mathfrak{p})$ für die Umgebung der Stelle \mathfrak{p} rationalen Charakter haben, ohne doch rationale Funktionen von z zu sein. Auch hier gibt es ein rationales endliches Verfahren, um diese Zerlegung mit jeder vorgegebenen Genauigkeit zu machen, und

sich daraus für ξ ergebende Hauptgleichung:

$$(-1)^n \varphi(\xi) = \begin{vmatrix} y_{11} - \xi & y_{12} & \dots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} - \xi & \dots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \dots & y_{nn} - \xi \end{vmatrix} = 0,$$

deren Unabhängigkeit von der Wahl der Basis aus dem Multiplikationssatz der Determinanten folgt, knüpfen die weiteren Definitionen an. Die Norm $n(\xi)$ von ξ definieren *D.-W.* als die Determinante $|y_{ik}|$ ($i, k = 1, \dots, n$). Es folgt dann, daß für jede rationale Funktion t von z $\varphi(t) = n(t - \xi)$ ist. Die Spur $s(\xi)$ von ξ wird als $y_{11} + y_{22} + \dots + y_{nn}$ definiert. (Die Funktion $\varphi(t)$ stimmt mit der Funktion $(t - \xi)(t - \xi_1) \dots (t - \xi_{n-1})$ überein, wo ξ_1, \dots, ξ_{n-1} die zu ξ konjugierten Funktionen sind.) Alle Eigenschaften der Funktionen $\varphi(t)$, $n(\xi)$, $s(\xi)$ werden nun durch entsprechende Wahl der Basis (η_i) bewiesen. Die Diskriminante eines Systems von n Funktionen (η_i) ($i = 1, \dots, n$) wird durch die Gleichung:

$$\Delta(\eta_1, \dots, \eta_n) = |S(\eta_i \eta_k)| \quad (i, k = 1 \dots n)$$

definiert, ohne Benutzung der konjugierten Basen. Die Diskriminante einer Funktion U wird als $\Delta(1, U, \dots, U^{n-1})$ definiert. Die Ausdrücke aller dieser Größen durch konjugierte Werte einer Funktion werden bei *D.-W.* erst nach Einführung der absoluten *Riemannschen* Fläche abgeleitet, p. 243–247 (§ 16. Konjugierte Werte und konjugierte Punkte). [O]

In der Abhandlung „Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen“, *Math. Ztschr.* 5 (1919), p. 118–131, führt *Hensel* diese Theorie auf diejenige der Kongruenzkörper $K(u, \text{mod } f(u, z))$ aller modulo $f(u, z)$ ganzen rationalen Funktionen von u mit in z rationalen Koeffizienten für $f(u, z)$ als Modul zurück. Die in Nr. 5–7 gegebene Darstellung der Theorie knüpft an diese Arbeit an.

sie ist nur auf eine einzige Art möglich. Somit kann und soll die Untersuchung zunächst auf den einfachsten Fall beschränkt werden, daß die linke Seite der Grundgleichung $f(u, z)$ selbst nicht bloß für den Bereich $K(z)$ der rationalen Funktionen, sondern auch für den Bereich $\bar{K}(p)$ der Potenzreihen in p irreduktibel ist.

6. Die Grundgleichung ist für den Bereich $\bar{K}(p)$ irreduktibel. Wir betrachten zuerst die Gesamtheit aller rationalen Funktionen $U = \varphi(u, p)$ von u , deren Koeffizienten Potenzreihen in p sind modulo $f(u, z)$. Auch sie bilden einen Körper $\bar{K}(u, p)$, welcher aus dem Körper $\bar{K}(p)$ der konvergenten oder nicht konvergenten Potenzreihen in p durch Hinzunahme oder Adjunktion des einen Elementes u hervorgeht. Jede dieser Funktionen U läßt sich modulo $f(u, z)$ auf eine einzige Weise in der Form:

$$(10) \quad U = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + \dots + a_{n-1} u^{n-1}$$

mit Koeffizienten in $\bar{K}(p)$ darstellen. Die rationalen Funktionen von u und z , d. h. die Funktionen des Körpers $K(u, z)$, bilden einen Teilkörper dieses Körpers, alle für diesen gefundenen Ergebnisse gelten demnach auch für den Körper $K(u, z)$. Jede Funktion U genügt wieder einer Hauptgleichung

$$(11) \quad F(U, p) = U^n - b_{n-1}(p)U^{n-1} + \dots \pm b_0(p) = 0,$$

deren Koeffizienten Potenzreihen in p sind, und welche in $\bar{K}(p)$ entweder selbst irreduktibel oder die Potenz einer irreduktiblen Funktion ist. Durch die Voraussetzung der Irreduktibilität der Grundgleichung für den Bereich $\bar{K}(p)$ gestalten sich die folgenden Überlegungen sehr einfach.

Auch hier werde dem Werte $z = \alpha$ bzw. $z = \infty$, welchem im Körper der rationalen Funktionen von z die Stelle p bzw. p_∞ entspricht, im Körper $K(u, z)$ der rationalen Funktionen von u und z eindeutig eine einzige Stelle \mathfrak{P} bzw. \mathfrak{P}_∞ zugeordnet. Dieselbe Stelle ordnen wir auch jenem Werte von z für den größeren Körper $\bar{K}(u, p)$ der rationalen Funktionen von u mit Potenzreihen in p als Koeffizienten zu.

Ein Element U heißt *algebraisch ganz* oder *gebrochen*, je nachdem alle Koeffizienten $b_i(p)$ seiner Hauptgleichung (11) ganz sind oder nicht. Aus der Irreduktibilität der Grundfunktion $f(u, z)$ folgt dann der Fundamentalsatz:

Ein Element U des Körpers $K(u, p)$ ist algebraisch ganz oder gebrochen, je nachdem seine Norm $n(U) = b_0(p)$ ganz oder gebrochen ist.

Hieraus ergeben sich sofort die Sätze, daß die Summen, die Diffe-

renzen und die Produkte von ganzen Elementen wieder ganz sind, daß diese also einen Ring im Körper $\bar{K}(u, \mathfrak{p})$ bilden. Von zwei beliebigen Elementen U und V heißt das erste durch das zweite *teilbar*, wenn $\frac{U}{V}$ ganz, wenn also $n(U)$ durch $n(V)$ teilbar ist, sie heißen *äquivalent*, wenn ihre Normen gleiche Ordnungszahl haben. Ein Element ε heißt *eine Einheit*, wenn $n(\varepsilon)$ eine Einheit ist. Äquivalente Elemente unterscheiden sich hiernach um eine multiplikative Einheit ε .

Unter den ganzen Elementen gibt es solche, deren Norm eine positive aber möglichst kleine Ordnungszahl hat; jedes solche Element π heißt eine *Primfunktion* für den Körper $\bar{K}(u, \mathfrak{p})$ oder die ihnen zugeordnete Stelle \mathfrak{P} . Jedes andere Element U ist eindeutig in der Form $\varepsilon\pi^a$ darstellbar, wo ε eine Einheit bedeutet; die von der Auswahl von π unabhängige ganze Zahl a heißt *die Ordnungszahl* von U für die Stelle \mathfrak{P} . Im Körper $\bar{K}(u, \mathfrak{p})$ hört also das Element p auf, eine Primfunktion zu sein; an seine Stelle tritt das Element π oder irgendein äquivalentes $\pi' = \varepsilon\pi$.

Zwei Elemente U und U' heißen modulo \mathfrak{P}^e *kongruent*, wenn sie modulo π^e kongruent sind, wenn also $U - U'$ durch π^e algebraisch teilbar ist; sie heißen *für die Stelle \mathfrak{P} gleich*, wenn sie für jede noch so hohe Potenz von \mathfrak{P} kongruent sind. Dies ist stets und nur dann der Fall, wenn jene beiden Elemente nicht verschieden sind.

Jedes ganze Element U ist modulo \mathfrak{P} einer einzigen endlichen Konstanten c kongruent, nämlich derjenigen Zahl c , für welche $n(c - U)$ durch p teilbar ist. Allgemeiner ist jedes ganze oder gebrochene Element für eine beliebige Potenz \mathfrak{P}^r von \mathfrak{P} einer einzigen Reihe

$$c_a\pi^a + c_{a+1}\pi^{a+1} + \dots + c_{r-1}\pi^{r-1}$$

mit konstanten Koeffizienten kongruent.

Wir betrachten nur den Körper $\bar{K}(\mathfrak{P})$ aller Potenzreihen

$$(12) \quad c_a\pi^a + c_{a+1}\pi^{a+1} + \dots + c_r\pi^r + \dots$$

in π mit konstanten Koeffizienten, gleichgültig, ob sie in einer endlichen Umgebung der Stelle \mathfrak{P} konvergieren oder nicht, bezeichnen die Reihe der Elemente $c_a\pi^a, c_a\pi^a + c_{a+1}\pi^{a+1}, \dots$ als *ihre Näherungswerte* und nennen zwei solche Reihen wieder *kongruent modulo \mathfrak{P}^r* , wenn alle ihre Näherungswerte modulo \mathfrak{P}^r kongruent sind. Wir nennen sie *gleich für den Bereich von \mathfrak{P}* , wenn sie für jede Potenz von \mathfrak{P} kongruent, wenn sie also identisch sind. Endlich soll ein Element U von $\bar{K}(u, \mathfrak{p})$ und eine solche Potenzreihe *gleich* genannt werden, wenn sie für jede noch so hohe Potenz von \mathfrak{P} kongruent sind.

Dann ist jedes Element des Körpers $\overline{K}(u, p)$ einer einzigen Potenzreihe von $\overline{K}(\mathfrak{P})$ gleich und umgekehrt, diese beiden Körper sind also identisch.

Hieraus folgt nun, daß jede Primfunktion π ein primitives Element innerhalb $\overline{K}(u, p)$ ist, und daß $n(\pi) = pE(p)$ von der ersten Ordnung ist. Die Primfunktionen sind also vollständig durch den folgenden wichtigen Satz charakterisiert:

Eine algebraische Funktion π ist stets und nur dann für den algebraischen Körper $\overline{K}(u, p)$ eine Primfunktion, wenn ihre Norm $n(\pi)$ für den rationalen Körper $\overline{K}(p)$ eine Primfunktion ist.

Hieraus folgt sofort der allgemeinere Satz:

Besitzt $U = \varepsilon \pi^a$ in der Stelle \mathfrak{P} die Ordnungszahl a , so hat $n(U)$ in der zugeordneten Stelle p die gleiche Ordnungszahl.

Unter den äquivalenten Primfunktionen kann man π stets so auswählen, daß es der einfachsten Gleichung

$$(13) \quad \pi^n - (z - \alpha) = 0 \quad \text{bzw.} \quad \pi^n - \frac{1}{z} = 0$$

genügt. Die n konjugierten Werte dieser Primfunktion sind also

$$(13a) \quad \pi_i = w^i(z - \alpha)^{\frac{1}{n}} \quad \text{bzw.} \quad \pi_i = w^i\left(\frac{1}{z}\right)^{\frac{1}{n}} \quad (i = 0, 1, \dots, n - 1)$$

wo w eine primitive n^{te} Einheitswurzel bedeutet. Im Folgenden wird meistens *diese* Primfunktion benutzt werden.

Es sei nun U ein beliebiges Element des Körpers $K(u, p)$ und $F(U, p) = 0$ die zugehörige Hauptgleichung n^{ten} Grades, ferner möge für die Primfunktion $\pi = (z - \alpha)^{\frac{1}{n}}$ bzw. $\left(\frac{1}{z}\right)^{\frac{1}{n}}$

$$U_1 = c_a \pi^a + c_{a+1} \pi^{a+1} + \dots \quad (\mathfrak{P})$$

die Darstellung von U für den Bereich von \mathfrak{P} sein und es bedeuten:

$$\begin{aligned} U_i &= c_a \pi_i^a + c_{a+1} \pi_i^{a+1} + \dots \\ &= c_a w^{i a} \pi^a + c_{a+1} w^{i(a+1)} \pi^{a+1} + \dots \quad (\mathfrak{P}) \quad (i = 2, 3, \dots, n) \end{aligned}$$

die $n - 1$ zu U_1 konjugierten Potenzreihen, welche alle die gleiche Ordnungszahl a besitzen.⁶⁾ Dann zerfällt die linke Seite der Hauptgleichung im Körper $\overline{K}(\mathfrak{P})$ eindeutig in das Produkt der n Linearfaktoren:

$$(14) \quad F(U, p) = (U - U_1)(U - U_2) \dots (U - U_n) \quad (\mathfrak{P}).$$

Aus diesem Grunde sollen dem Elemente U für den Bereich der Stelle

⁶⁾ An die Reihenentwicklungen knüpft die Definition der *Ordnungszahl* einer algebraischen Funktion an einer bestimmten Stelle zuerst *Weierstraß* an. V. 1873. B.-N., p 381; H.-L., p. 141—145. [O]

§ diese n Potenzreihen U_i zugeordnet und als *die n konjugierten Wurzeln* der Gleichung $F(U, p) = 0$ für den Bereich jener Stelle bezeichnet werden. Dieselben sind stets und nur dann voneinander verschieden, wenn U ein primitives Element ist, und es ist $n(U) = U_1 \dots U_n$.

Betrachtet man an Stelle des Körpers $\bar{K}(u, p)$ aller modulo $f(u, z)$ ganzen rationalen Funktionen von u mit konvergenten oder nicht konvergenten Koeffizienten in $\bar{K}(p)$ nur den Bereich $K(u, p)$ der rationalen Funktionen von u mit *konvergenten* Potenzreihen in p als Koeffizienten, so bilden auch diese einen Körper, also einen Teilkörper von $\bar{K}(u, p)$, wenn die Grundfunktion $f(u, z)$ auch innerhalb $K(p)$ unzerlegbar ist; auch dieser enthält den zu untersuchenden Körper $K(u, z)$ der rationalen Funktionen von z und u als Teilkörper. Jedes Element U dieses Körpers $K(u, p)$ genügt einer Hauptgleichung $F(U, p) = 0$ mit *konvergenten* Koeffizienten, deren linke Seite für den Bereich von \mathfrak{P} ebenfalls in das Produkt der n konjugierten Linearfaktoren (14) zerfällt. Dann kann man wieder durch Majorantenbildung den Nachweis führen^{6a)}, daß in diesem Falle die n konjugierten Wurzeln U_1, U_2, \dots, U_n *konvergente* Potenzreihen sind. Diese Reihen stellen auch die n konjugierten Wurzeln der Gleichung $F(U, p) = 0$ für alle Werte von z in einer endlichen Umgebung der Stelle u dar. Man nennt sie *die zur Stelle \mathfrak{P} gehörigen Funktionselemente für die algebraische Funktion U* .

Geometrisch betrachtet können diese Werte der algebraischen Funktion U in der Umgebung der Stelle \mathfrak{P} eindeutig auf n Blättern ausgebreitet werden, welche in einem n -blättrigen Verzweigungspunkte zusammenhängen, der jetzt ebenfalls durch \mathfrak{P} bezeichnet werde. So entspricht dann dem Punkte p auf der einblättrigen Kugelfläche \mathfrak{K} dieser n -blättrige Verzweigungspunkt \mathfrak{P} eindeutig.

7. Allgemeiner Fall: Die Grundgleichung zerfällt innerhalb $K(p)$ in mehrere irreduktible Faktoren. Es werde jetzt der allgemeinste Fall betrachtet, daß die Grundgleichung innerhalb des Körpers $K(p)$ der konvergenten Potenzreihen für p reduktibel sei; dann zerfällt sie in ein eindeutig bestimmtes Produkt irreduktibler Faktoren. Es sei:

$$(15) \quad f(u, z) = f_1(u, p) f_2(u, p) \dots f_\nu(u, p)$$

diese Zerlegung, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu$ seien die Grade der ν irreduktiblen Faktoren in u . Dann folgt aus der Anwendung der soeben gefun-

6 a) H.-L., p. 68—73. Im Gegensatz zu „E. N.“, p. 184, glaube ich, daß auch diese Majorantenmethode als rein arithmetische anzusehen ist; hierauf werde ich an anderer Stelle zurückkommen.

denen Ergebnisse auf die einzelnen irreduktiblen Gleichungen, daß die n Wurzeln der Grundgleichung in ν Zyklen

$$(16) \quad u_1^{(1)}, \dots, u_{\lambda_1}^{(1)}; u_1^{(2)}, \dots, u_{\lambda_2}^{(2)}; \dots; u_1^{(\nu)}, \dots, u_{\lambda_\nu}^{(\nu)}$$

zerfallen; jeder Zyklus enthält die Wurzeln von je einem dieser irreduktiblen Faktoren. Allgemein können die Wurzeln $u_1^{(i)}, u_2^{(i)}, \dots, u_{\lambda_i}^{(i)}$ von $f_i(u, \mathfrak{p}) = 0$ in konjugierte Potenzreihen entwickelt werden, welche

nach ganzen Potenzen von $(z - \alpha)^{\frac{1}{\lambda_i}}$ bzw. $\left(\frac{1}{z}\right)^{\frac{1}{\lambda_i}}$ fortschreiten und höchstens eine endliche Anzahl von Gliedern mit negativem Exponenten enthalten. Diese Reihen stellen λ_i unter den n Wurzeln der Grundgleichung für eine endliche Umgebung der Stelle \mathfrak{p} dar und sind in dieser Umgebung (eventuell mit Ausnahme des Punktes \mathfrak{p} selbst) stetige Funktionen ihres Argumentes. Genau dasselbe gilt für die Wurzeln der Hauptgleichung $F(U, z) = 0$, der ein beliebiges Element U des Körpers $K(u, z)$ genügt und deren linke Seite für den Bereich von \mathfrak{p} in gleicher Weise zerfällt.

Wir ordnen nun der Stelle \mathfrak{p} im rationalen Körper $K(z)$ die ν Stellen $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_\nu$ in dem algebraischen Körper $K(u, z)$ zu, entsprechend den ν für den Bereich $K(\mathfrak{p})$ irreduktiblen Faktoren $f_i(u, \mathfrak{p})$ der Grundgleichung bzw. den ν Zyklen $u_1^{(i)}, u_2^{(i)}, \dots, u_{\lambda_i}^{(i)}$ ihrer Wurzeln, und sagen allgemein, daß jede Funktion U des Körpers $K(u, z)$ in der Umgebung der Stelle \mathfrak{P}_i die λ_i konjugierten Darstellungen besitzt, welche aus einer unter ihnen:

$$(17) \quad U = a_{\varrho_i}(z - \alpha)^{\frac{\varrho_i}{\lambda_i}} + a_{\varrho_i+1}(z - \alpha)^{\frac{\varrho_i+1}{\lambda_i}} + \dots$$

durch Ersatz der Wurzel $(z - \alpha)^{\frac{1}{\lambda_i}}$ durch ihre konjugierten $w_i^a(z - \alpha)^{\frac{1}{\lambda_i}}$ für $a = 0, 1, \dots, (\lambda_i - 1)$ hervorgehen.⁷⁾ Jeder dieser Stellen \mathfrak{P}_i ordnen wir endlich einen gleichbezeichneten Primteiler \mathfrak{P}_i zu und setzen fest, daß U genau durch $\mathfrak{P}_i^{\varrho_i}$ teilbar heißen soll, wenn U in der Stelle \mathfrak{P}_i die Ordnungszahl ϱ_i besitzt. Diese Stelle ist eine ein- oder mehrfache Nullstelle oder ein Pol, je nachdem ϱ_i eine positive oder negative Zahl ist. Speziell ist der der Stelle \mathfrak{p} zugeordnete Linearfaktor $z - \alpha$ bzw. $\frac{1}{z}$ genau durch $\mathfrak{P}_i^{\lambda_i}$ teilbar. Geometrisch können die Werte der algebraischen Funktion U in der Umgebung der Stelle \mathfrak{P}_i eindeutig

7) Der Gedanke, die Definition der Stelle des algebraischen Gebildes an die Reihenentwicklungen zu knüpfen, rührt von Weierstraß her. V. 1873, B.-N., p. 379; Baker, Math. Ann. 45 (1892); die Benutzung der für den Bereich $K(\mathfrak{p})$ irreduktiblen Faktoren der Grundgleichung wird durch zahlentheoretische Analogie nahe gelegt. Vgl. Hensel, Theorie der algebraischen Zahlen, Leipzig, p. 168 ff. [O]

auf die λ_i Blätter ausgebreitet werden, welche in einem λ_i -blättrigen Verzweigungspunkte, der jetzt ebenfalls \mathfrak{P}_i genannt werde, zusammenhängen. So entspricht dann dem Punkte \mathfrak{p} auf der einblättrigen Kugelfläche eindeutig das System der ν Verzweigungspunkte $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_\nu$ von je $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu$ Blättern, oder dem rationalen Primteiler \mathfrak{p} das System der ν algebraischen Primteiler $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_\nu$. Man sagt, ein Primteiler \mathfrak{P} besitzt die *Verzweigungsordnung* $\lambda - 1$, wenn in dem zugehörigen Punkte \mathfrak{P} λ Blätter zusammenhängen, oder wenn der zugeordnete irreduktible Faktor der Grundgleichung vom λ^{ten} Grade ist. Es gibt nur eine endliche Anzahl von Primfaktoren einer positiven Verzweigungsordnung; alle übrigen Punkte heißen *regulär*; für sie schreitet die eine zugehörige Potenzreihe $U(\mathfrak{P})$ nach *ganzen* Potenzen des Linearfaktors $z - \alpha$ bzw. $\frac{1}{z}$ fort; sie gehört also selbst dem Körper $K(\mathfrak{p})$ der konvergenten Potenzreihen in \mathfrak{p} an.

8. Die dem Körper $K(u, z)$ zugeordnete Riemannsche Kugelfläche \mathfrak{R}_2 .⁸⁾ Man kann die Werte, welche u oder eine beliebige Funktion U von $K(u, z)$ für alle Werte der unabhängigen Variablen annimmt, eindeutig und im allgemeinen stetig entweder auf n unendlich nahe untereinander gelagerten komplexen Zahlenebenen oder, was anschaulicher ist, auf n unendlich nahen ineinander liegenden konzentrischen Einheitskugeln $\mathfrak{R}_1, \mathfrak{R}_2, \dots, \mathfrak{R}_n$ ausbreiten. Diese letzteren mögen in der Einheitskugel \mathfrak{R} für die unabhängige Variable z und konzentrisch zu dieser liegen. Es sei nun $\mathfrak{p}^{(i)}$ ein Punkt von \mathfrak{R} , welchem n reguläre Punkte $\mathfrak{P}_1^{(i)}, \mathfrak{P}_2^{(i)}, \dots, \mathfrak{P}_n^{(i)}$ entsprechen, und diese mögen durch die genau unter $\mathfrak{p}^{(i)}$ liegenden Punkte von $\mathfrak{R}_1, \mathfrak{R}_2, \dots, \mathfrak{R}_n$ repräsentiert werden; ferner sollen die zugehörigen Potenzreihen $u(\mathfrak{P}_1^{(i)}), u(\mathfrak{P}_2^{(i)}), \dots, u(\mathfrak{P}_n^{(i)})$ sämtlich regulär sein. Denkt man sich nun in bekannter Weise diejenigen Punkte, welche Verzweigungsstellen und Polen von u entsprechen, durch kleine Kreise ausgeschlossen, und diese Kreise durch Schnitte verbunden, setzt man dann jene n Funktionselemente simultan über diese n zerschnittenen Kugelflächen analytisch fort und heftet sie endlich in geeigneter Weise zusammen, so erhält man den Wertevorrat von u eindeutig und, mit Ausnahme der Pole, auch stetig auf der so gewonnenen *Riemannschen Kugelfläche* \mathfrak{R}_2 ausgebreitet. Die n -blättrige *Riemannsche Fläche* \mathfrak{R}_2 wird jetzt von der einblättrigen Fläche \mathfrak{R} so umhüllt, daß die jedem Punkte \mathfrak{p} von \mathfrak{R} zugeordneten Punkte $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_\nu$ von \mathfrak{R}_2 genau untereinander und unter \mathfrak{p} liegen. Jede Funktion U von $K(u, z)$ ist dann auf der *Riemannschen Fläche* \mathfrak{R}_2 eindeutig und bis auf eine endliche Anzahl

8) Vgl. II B 1, Nr. 11—12, 22; II B 2, Nr. 4—6. [O]

von Polen auch stetig, und umgekehrt gehört jede analytische Funktion, welche diese Eigenschaften besitzt, dem Körper $\mathfrak{K}(u, z)$ an.

Die n -blättrige Kugelfläche \mathfrak{K}_z ist dann und nur dann *zusammenhängend* im Sinne der Analysis Situs, wenn die Grundgleichung n^{ten} Grades für u innerhalb des Körpers $K(z)$ irreduktibel ist⁹⁾; und allein in diesem Falle wird durch sie u als eine einzige analytische Funktion von z definiert.

9. Direkte Berechnung der zu einer Stelle p gehörigen Wurzelzyklen.¹⁰⁾ Das zu p gehörige Diagramm. Die direkte Auffindung der zu einer Stelle $p(z = \alpha$ bzw. $z = \infty)$ gehörigen Wurzelzyklen $u(\mathfrak{P}_i)$ wird durch eine Erweiterung des sogenannten *Newtonschen Diagramms* wesentlich erleichtert. Sei:

$$(18) \quad f(u, z) = A_0(z) + A_1(z)u + \dots + A_n(z)u^n = 0$$

die Grundgleichung für $K(u, z)$, und es sei allgemein für die Stelle p :

$$(19) \quad A_i(z) = a_i(z - \alpha)^{\varepsilon_i} + \dots \text{ bzw. } A_i(z) = a_i\left(\frac{1}{z}\right)^{\varepsilon_i} + \dots$$

Dann fixieren wir in bezug auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem die n Punkte:

$$\mathfrak{U}_0 = (0, \varrho_0), \mathfrak{U}_1 = (1, \varrho_1), \dots, \mathfrak{U}_n = (n, \varrho_n).$$

Man verbinde dann den letzten Punkt \mathfrak{U}_n mit demjenigen Punkte \mathfrak{U}_i , welcher von \mathfrak{U}_n aus gesehen am tiefsten, und, falls es deren mehrere geben sollte, außerdem möglichst entfernt von \mathfrak{U}_n liegt, und ziehe die Sehne $\mathfrak{U}_n\mathfrak{U}_i$; hierauf mache man von \mathfrak{U}_i aus dieselbe Konstruktion und fahre so lange fort, bis \mathfrak{U}_0 erreicht ist. So erhält man ein nach unten konvexes Polygon $\mathfrak{U}_n\mathfrak{U}_i\mathfrak{U}_s \dots \mathfrak{U}_0$, durch welches das Punktsystem nach unten begrenzt wird. Dann gehören zu jeder dieser Begrenzungssehnen etwa zu $\mathfrak{U}_i\mathfrak{U}_s$ genau $t - s$ Wurzeln $\ln u(\mathfrak{P}) = e_0^{(i)}(z - \alpha)^{\varepsilon_0} + e_1^{(i)}(z - \alpha)^{\varepsilon_1} + \dots$, deren Anfangsexponenten ε_0 alle dieselben und zwar gleich der Steigung $-\frac{\varrho_t - \varrho_s}{t - s}$ der betreffenden Sehne sind; die $t - s$ Anfangskoeffizienten $e_0^{(i)}$ sind die $t - s$ von Null verschiedenen Wurzeln der Gleichung:

$$(20) \quad \varphi(e) = a_t e^t + \dots + a_k e^k + \dots + a_s e^s = 0.$$

In dieser Gleichung sind $a_t, \dots, a_k, \dots, a_s$ die Anfangskoeffizienten derjenigen Gleichungskoeffizienten $A_i(z)$ in (18), für welche die zugehörigen Diagrammpunkte $\mathfrak{U}_i, \dots, \mathfrak{U}_k, \dots, \mathfrak{U}_s$ auf der betreffenden Begrenzungssehne $\mathfrak{U}_i\mathfrak{U}_s$ liegen.

9) Der Satz stammt von *Puiseux* her. Vgl. II B 1, Anm. 58. [O]

10) Vgl. II B 2, Nr. 2—3. [O]

Durch Fortsetzung desselben Verfahrens kann man das zweite Glied $e_1^{(2)}(z - \alpha)^{e_1}$ einer beliebigen Wurzel u_i berechnen usw., und die Konvergenz der n so sich ergebenden Potenzreihen $u(\mathfrak{P})$ vollständig nachweisen.¹¹⁾ Für jeden der ν für die Stelle \mathfrak{p} irreduktiblen Faktoren $f_i(u, \mathfrak{p})$, deren Wurzeln einem Verzweigungspunkte entsprechen, besitzt das zugehörige *Newtonsche* Diagramm eine einzige Seite, und die zugehörige Funktion $\varphi_i(e)$ hat die Form:

$$(21) \quad \varphi_i(e) = (e^{l_0} - e_0^{l_0})^\delta = 0$$

wo $l_0 \delta = \lambda_i$ ist.¹²⁾

10. Untersuchung der algebraischen Funktionen des Körpers für alle Stellen der Riemannschen Kugelfläche \mathfrak{K}_r . Die algebraischen Divisoren. Es seien wie in Nr. 3 $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_r$ r beliebige Punkte der Kugelfläche \mathfrak{K}_r und zugleich die ihnen zugeordneten Primteiler; sind ferner h_1, h_2, \dots, h_r beliebige ganze Zahlen einschließlich Null, so stellen wir genau dieselbe Definition wie a. a. O. für die Teilbarkeit einer algebraischen Funktion U durch den algebraischen Teiler oder Divisor:

$$(22) \quad \mathfrak{D} = \mathfrak{P}_1^{h_1} \mathfrak{P}_2^{h_2} \dots \mathfrak{P}_r^{h_r}$$

auf. Auch hier heißt die Zahl $q = h_1 + h_2 + \dots + h_r$ die *Ordnung* von \mathfrak{D} , und \mathfrak{D} heißt ein *ganzer Divisor*, wenn alle Exponenten nicht negativ sind; sonst wird \mathfrak{D} ein *gebrochener Divisor* genannt. Wir definieren das Produkt $\mathfrak{D}\mathfrak{R}$ und den Quotienten $\mathfrak{D}/\mathfrak{R}$ zweier Divisoren

11) H.-L. (1902), p. 47—77.

12) Allgemeiner kann man jedem Polynom

$$f(u, z) = A_0(z) + A_1(z)u + \dots + A_n(z)u^n$$

in u mit Potenzreihen von z als Koeffizienten durch die oben entwickelte Konstruktion ein Diagramm zuordnen. Dann gilt der Satz von *Dumas* (Thèse Paris [1904], p. 13): *Das Diagramm eines Produktes von zwei oder mehreren Polynomen in u entsteht aus den Diagrammen der einzelnen Faktoren, wenn man die einzelnen Seiten dieser Diagramme nach steigenden Neigungen anordnet und dann mit ihnen die Figur bildet, die zur Konstruktion ihrer geometrischen Summen dient.* Läßt man bei den Polynomen in u nur solche Potenzreihen als Koeffizienten zu, die nach *ganzen* Potenzen von z fortschreiten, so gelten die weiteren Sätze (*G. Dumas*, ebenda p. 16): Jedes Polynom, dessen Diagramm gebrochen ist, ist *reduzibel*. Jeder Seite des Diagramms entspricht ein Teiler des Polynoms, dessen Diagramm aus nur einer Seite von derselben Neigung und Länge besteht, und, bis auf eine Potenzreihe von z als Faktor, nur ein solcher Teiler. Die Sätze bleiben bestehen, wenn man den Potenzreihen, die als Koeffizienten auftreten, die Bedingung auferlegt, einen nicht verschwindenden Konvergenzbereich zu besitzen. Diese Sätze verwendet dann *Dumas* zur Ableitung von Reihenentwicklungen. Ein älteres Verfahren von *Brill* (Münch. Ber. 21 [1892], p. 207) beruht ebenfalls auf sukzessiver Zerlegung der linken Seite der Grundgleichung. [O]

genau wie in Nr. 3. Jeder gebrochene Divisor läßt sich dann wieder als Quotient $\Omega = \frac{\delta}{n} = \frac{\delta g}{n g}$ zweier ganzer Divisoren in der reduzierten oder auch in einer mit dem beliebigen ganzen Divisor g erweiterten Form darstellen. Auch der Begriff der *Teilbarkeit* eines Divisors durch einen anderen sowie der *des größten gemeinsamen Teilers* $\mathfrak{D} = (\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_r)$ mehrerer ganzer oder gebrochener Divisoren wird genau ebenso wie in der reinen Arithmetik definiert. Dieser größte gemeinsame Teiler ist dann und nur dann ganz, wenn das Gleiche für alle Divisoren Ω_i gilt.

Ist \mathfrak{P} ein beliebiger algebraischer und p der ihm zugeordnete rationale Divisor, so wollen wir p die *Norm* von \mathfrak{P} nennen und dieses Verhältnis durch die Gleichung $p = n(\mathfrak{P})$ ausdrücken; allgemeiner verstehen wir unter der Norm eines beliebigen algebraischen Divisors $\Omega = \mathfrak{P}_1^{h_1} \mathfrak{P}_2^{h_2} \dots \mathfrak{P}_r^{h_r}$ den zugeordneten rationalen Divisor:

$$(23) \quad q = n(\Omega) = p_1^{h_1} p_2^{h_2} \dots p_r^{h_r}.$$

Die Ordnung eines algebraischen Divisors ist also stets gleich derjenigen seiner Norm.

Zu jedem Elemente U des Körpers $K(u, z)$ gehört ein algebraischer Divisor:

$$(24) \quad \Omega_U = e \frac{\mathfrak{z}_U}{\mathfrak{n}_U} = e \mathfrak{P}_1^{h_1} \mathfrak{P}_2^{h_2} \dots \mathfrak{P}_k^{h_k},$$

dessen Zähler \mathfrak{z}_U durch die Nullstellen, dessen Nenner \mathfrak{n}_U durch die Pole von U eindeutig bestimmt ist.¹³⁾ Einem beliebigen Linearfaktor $z - \alpha = \frac{p_\alpha}{p_\infty}$ des rationalen Körpers entspricht z. B. der algebraische Divisor:

$$z - \alpha = \frac{\prod \mathfrak{P}_i^{(\alpha) l_i}}{\prod \mathfrak{P}_k^{(\infty) m_k}},$$

wenn allgemein zur Stelle p_α die l_i -blättrigen Verzweigungspunkte $\mathfrak{P}_i^{(\alpha)}$, zur Stelle p_∞ die m_k -blättrigen Verzweigungspunkte $\mathfrak{P}_k^{(\infty)}$ gehören. Durch Angabe ihres Divisors ist eine Funktion U bis auf eine Einheit, d. h. eine multiplikative Konstante e bestimmt; unter dieser wollen wir in naturgemäßer Verallgemeinerung der auf p. 541 gegebenen Vorschrift den Anfangskoeffizienten der Entwicklung von U in der Umgebung eines ein für alle Male festen regulären Punktes \mathfrak{P}_0 verstehen. Dann gehört zu dem Produkte bzw. dem Quotienten zweier Elemente von $K(u, z)$ das Produkt bzw. der Quotient seiner Divisoren. Ferner gehört zu der Norm von U , d. h. zu dem Produkte

13) Vgl. die Darstellung der Funktionen des Körpers durch Polygonquotienten bei D.-W., p. 247—248. [O]

$U_1 U_2 \dots U_n$ die Norm $q = n(\mathfrak{Q})$ des zugehörigen Divisors, so daß die Gleichung besteht $U_1 \dots U_n = e_1 \dots e_n q$. Da nun jede rationale Funktion von z allein, also auch $n(U)$, ebensoviele Nullstellen als Pole besitzt, d. h. die Ordnungszahl Null hat, so gilt dasselbe auch von jedem Divisor \mathfrak{Q}_U .

Alle zu Elementen des Körpers $K(u, z)$ gehörigen Divisoren haben mithin die Ordnungszahl Null, diese Funktionen besitzen also ebensoviele Nullstellen als Pole.

Die Anzahl ν_U der Pole oder der Nullstellen von U heißt *der Grad* dieser Funktion¹⁴⁾; so ist z. B. jeder Linearfaktor $z - \alpha$, bzw. $\frac{1}{z}$ innerhalb des Körpers n^{ten} Grades $K(z, u)$ vom n^{ten} Grade; dann gilt der allgemeine Satz: Eine Funktion ν^{ten} Grades nimmt jeden reellen oder komplexen Wert an genau ν Stellen der *Riemannschen Fläche* \mathfrak{R}_ν an.

10 a. Die arithmetischen Begründungen des Punktbegriffes. Während die im Vorigen gegebene Darstellung der Theorie vom Punkt- oder Primdivisorenbegriff ausgeht, der durch die Theorie des Kongruenzkörpers sichergestellt wird, erscheint dieser Begriff in der ursprünglichen in *D.-W.* gegebenen Begründung der arithmetischen Theorie als einer der hauptsächlichsten Zielpunkte der ganzen Entwicklung. In dieser Darstellung fußt die Definition des *Punktes der absoluten Riemannschen Fläche* auf der mit Hilfe rein algebraischer und arithmetischer Prinzipien zu entwickelnden *Idealtheorie*, wobei allerdings die meisten Beweise zu reinen Existenzbeweisen werden.

D. und *W.* definieren den Punkt der zum Körper K gehörigen *absoluten Riemannschen Fläche* durch folgende Forderungen, bei denen der *invariante*, von jeglicher Auszeichnung bestimmter Funktionen des Körpers K unabhängige Charakter dieses Begriffes unmittelbar einleuchtet: Wenn jedem Element $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ von K ein Zahlenwert $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0, \dots$ so zugeordnet werden kann, daß $\alpha_0 = \alpha$ ist, falls α konstant ist, und allgemein $(\alpha \pm \beta)_0 = \alpha_0 \pm \beta_0$, $(\alpha\beta)_0 = \alpha_0\beta_0$, $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)_0 = \frac{\alpha_0}{\beta_0}$ wird (zu den Zahlenwerten wird dabei auch ∞ gerechnet), so ordnen wir jeder solchen Zuordnung einen *Punkt der absoluten Riemannschen Fläche* von K zu und sagen, das Element α von K nehme in diesem Punkt den Wert α_0 an.¹⁵⁾

Um nun den Umfang des hiermit eingeführten Punktbegriffes

14) Über die Definition des Grades einer algebraischen Funktion vgl. *Weierstraß* V. 1873, B.-N., p. 381; *D.-W.*, p. 242—243; *H.-L.*, p. 156. [O]

15) *D.-W.*, p. 236.

genauer zu beschreiben, zeichnen wir ein nicht konstantes Element z von K aus. Jedes Element von K ist dann eine ganze oder gebrochene, rationale oder algebraische Funktion von z . Dabei ist jede gebrochene Funktion von z als Quotient von zwei ganzen Funktionen darstellbar. Als ein *Ideal* in z bezeichnen wir dann jede Gesamtheit von ganzen Funktionen aus K , die mit zwei Elementen α und β zugleich auch jedes Element $x\alpha + y\beta$ enthält, wo x, y beliebige ganze Elemente von K sind.¹⁶⁾ Unter dem Produkt von zwei Idealen \mathfrak{a} und \mathfrak{b} verstehen wir das aus möglichst vielen Elementen bestehende Ideal, das alle Produkte der Funktionen aus \mathfrak{a} und \mathfrak{b} enthält, unter dem Einheitsideal E , das aus allen ganzen Elementen von K bestehende Ideal. Eine im Ideal \mathfrak{a} enthaltene Funktion heißt durch \mathfrak{a} teilbar, zwei Funktionen, deren Differenz in \mathfrak{a} enthalten ist, *modulo* \mathfrak{a} kongruent. Es gilt nun der folgende Fundamentalsatz: *Ideale, die sich nicht als Produkt von zwei weiteren, von E verschiedenen Idealen darstellen lassen — Primideale — haben die charakteristische Eigenschaft, daß nach ihnen jede ganze Funktion von K einer Konstante kongruent ist. Jedes Ideal \mathfrak{a} ist auf eine einzige Weise als ein Potenzprodukt von endlich vielen Primidealen darstellbar.*¹⁷⁾ —

Unter den vielen Folgerungen aus diesem Satz heben wir nur eine hervor: Ist uns ein beliebiges Primideal \mathfrak{p} gegeben, so ist jede Funktion f von K durch eine positive, verschwindende oder negative ganze Potenz von \mathfrak{p} genau teilbar. Sind f_1 und f_2 durch die α^{te} bzw. β^{te} Potenz von \mathfrak{p} genau teilbar, so sind $f_1 f_2$ und $\frac{f_1}{f_2}$ genau durch die $(\alpha + \beta)^{\text{te}}$ bzw. $(\alpha - \beta)^{\text{te}}$ Potenz von \mathfrak{p} teilbar.¹⁸⁾ Eine Funktion, die genau durch die 0^{te} Potenz von \mathfrak{p} teilbar ist, ist modulo \mathfrak{p} einer endlichen von Null verschiedenen Konstante kongruent. Ersetzen wir nun jede Funktion f von K , je nachdem sie durch eine positive, negative oder die nullte Potenz von \mathfrak{p} genau teilbar ist, bzw. durch $0, \infty$ oder die ihr modulo \mathfrak{p} kongruente Konstante, so erhalten wir einen Punkt im oben definierten Sinne. Und so erzeugt jedes Primideal \mathfrak{p} einen Punkt \mathfrak{P} der absoluten *Riemannschen* Fläche von K . Alle diese Punkte haben die Eigenschaft, daß in ihnen das vorher ausgezeichnete Element von K den Wert ∞ nicht annimmt. Hat umgekehrt ein Punkt diese Eigenschaft, so bildet die Gesamtheit aller ganzen Funktionen von K , die in ihm verschwinden, ein Primideal, durch das umgekehrt dieser Punkt erzeugt wird. Nimmt

16) D.-W., p. 206 ff.

17) D.-W., p. 215—217.

18) D.-W., p. 239—241.

aber ε in einem Punkt den Wert ∞ an, so braucht man nur statt ε ein anderes, in diesem Punkt nicht unendlich werdendes Element von K auszuzeichnen, etwa $\frac{1}{\varepsilon}$, um dem Punkte ein Primideal zuordnen zu können.¹⁹⁾

Unter einem *Polygon* wird ein symbolisch aufzufassendes Potenzprodukt aus gewissen Punkten

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{P}^r \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_i^{r_i} \quad (r \geq 0, r_1 \geq 0, \dots, r_i \geq 0)$$

verstanden.²⁰⁾ Polygone entsprechen ganzen Divisoren. Bildungen, die gebrochenen Divisoren entsprechen, verwenden *D.-W.* nicht. — Die Äquivalenz der Idealtheorie mit der Divisorentheorie wird durch den folgenden Satz dargetan: Wird in K ein nicht konstantes Element ε ausgezeichnet, so bildet die Gesamtheit aller ganzen Funktionen aus K , die durch einen bestimmten ganzen Divisor (in dessen Punkten ε nicht unendlich wird) teilbar sind, ein Ideal, und so erhält man alle Ideale in ε . Zur Begründung der Idealtheorie für Funktionenkörper schlagen *D.-W.* einen ähnlichen Weg ein, wie *Dedekind* in seiner Begründung der Idealtheorie²¹⁾, wobei sich jedoch die ganze Deduktion viel einfacher gestaltet. Die von *Kronecker*²²⁾ gegebene und später von *König*²³⁾ weiter ausgeführte Begründung der Idealtheorie bezieht sich von vornherein sowohl auf Zahlen- als auch auf Funktionenkörper. In einer späteren Darstellung verwendet *Weber*²⁴⁾, um zu der Punktdefinition zu kommen, eine Ausgestaltung der *Kroneckerschen* Methode, die Theorie der *Funktionale*. Einen verwandten Weg schlägt *Wellstein*²⁵⁾ ein.

Auch weitere zahlentheoretische Untersuchungen der Idealtheorie sind auf Funktionenkörper übertragen worden. *R. König* untersucht insbesondere die hyperelliptischen Funktionenkörper und wendet die Ergebnisse auf die Untersuchung der quadratischen Formen mit rationalen Funktionen von ε als Koeffizienten an.²⁶⁾ *Rehfeld*²⁷⁾ beweist die Existenz einer Zahl, die der Klassenanzahl in der Idealtheorie analog

19) *D.-W.*, p. 239.

20) *D.-W.*, p. 241.

21) *Dirichlet-Dedekind*, Vorl. ü. Z., 4. Aufl. (1894), p. 493 ff.

22) *Kronecker*, Festschrift p. 48 ff.

23) *König*, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen. Leipzig 1908, Teubner.

24) *Weber*, Lehrb. d. Algebra, Bd. III, p. 640 ff.

25) *Wellstein*, Jahresb. d. D. M.-V. 19 (1904), p. 112—116.

26) *R. König*, Wiener Monatshefte 23 (1912), p. 321—346; *J. f. Math.* 142 (1912), p. 191—210.

27) *Rehfeld*, Straßb. Diss. 1904.

ist. Wie aus dem *Riemann-Rochschen* Satz leicht folgt, ist diese Zahl das Geschlecht p des Körpers. Für die hyperelliptischen Körper s. *König*.²⁸⁾ *M. Lerch*²⁹⁾ gibt eine charakteristische Eigenschaft der Gattungen vom Geschlecht 0 an. [O]

11. Untersuchung der Funktionen des Körpers $K(u, z)$ in bezug auf ihre Teilbarkeit durch einen beliebigen Divisor. Die Grundlage für die ganze Theorie der algebraischen Funktionen bildet die vollständige Lösung der Frage nach allen Funktionen des Körpers, welche durch einen beliebig gegebenen Divisor $\Omega = \mathfrak{P}_1^{r_1} \mathfrak{P}_2^{r_2} \dots \mathfrak{P}_v^{r_v}$ teilbar sind.

a) *Es sei zuerst $\Omega = \mathfrak{P}^r$, und \mathfrak{P} entspreche einem n -blättrigen Verzweigungspunkte.*

In diesem einfachstem Falle, auf den sich alle anderen leicht reduzieren lassen, ist die Grundgleichung $f(u, z) = 0$ für den zu \mathfrak{P} gehörigen Bereich $K(\mathfrak{p})$ irreduktibel, wenn $\mathfrak{p} = \mathfrak{P}^n$ der zu \mathfrak{P} zugeordnete rationale Divisor ist. Es sei π irgend eine Primfunktion für den

Bereich von \mathfrak{P} (etwa $\pi = (z - \alpha)^{\frac{1}{n}}$ bzw. $(\frac{1}{z})^{\frac{1}{n}}$); dann können offenbar alle Multipla von \mathfrak{P}^r für die Stelle \mathfrak{P} auf eine einzige Weise homogen und linear durch die Basis:

$$(25) \quad (\pi^r, \pi^{r+1}, \dots, \pi^{r+n-1})$$

mit *ganzen* Koeffizienten des Bereiches $K(\mathfrak{p})$ d. h. in der Form:

$$(25a) \quad w = u_1 \pi^r + u_2 \pi^{r+1} + \dots + u_n \pi^{r+n-1}$$

dargestellt werden, deren Koeffizienten u_i rationalen Charakter für die Stelle \mathfrak{p} haben und von nicht negativer Ordnung sind. Ein solches System heißt ein *Fundamentalsystem für den Divisor \mathfrak{P}^r* , und die Form w heißt für unbestimmte u eine *Fundamentalform für den Divisor \mathfrak{P}^r* , weil aus ihr durch Spezialisierung der Unbestimmten alle und nur die Multipla von \mathfrak{P}^r erhalten werden. Die Gleichung n^{ten} Grades

$$(25b) \quad G(w) = (w - w_1)(w - w_2) \dots (w - w_n),$$

deren Wurzeln die n konjugierten Fundamentalformen sind, heißt die *Fundamentalgleichung für \mathfrak{P}^r* , da sie alle und nur die Gleichungen ergibt, denen die Multipla von \mathfrak{P}^r genügen, wenn man für u_1, \dots, u_n alle ganzen Größen des Körpers $K(\mathfrak{p})$ einsetzt. Ebenso ergibt die sog. *Diskriminante der Fundamentalgleichung für \mathfrak{P}^r*

$$(25c) \quad \Delta^{(r)}(w) = \prod_{i>k} (w_i - w_k)^2$$

28) Sächs. Ber. 63 (1911), p. 360—361.

29) *M. Lerch*, Wiener Monatshefte 2 (19), p. 465—468.

bei denselben Spezialisierungen der Unbestimmten die Gleichungsdiskriminanten für alle Multipla von \mathfrak{P}^r . Das System (25) ist nicht das einzige Fundamentalsystem für die Multipla von \mathfrak{P}^r . Irgend ein anderes System $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ von Vielfachen des Divisors \mathfrak{P}^r ist dann und nur dann ein Fundamentalsystem für denselben, wenn es aus dem obigen durch eine lineare Transformation:

$$(26) \quad U^{(i)} = \sum u_k^{(i)} \pi^{r+k-1} \quad (i, k = 1, 2, \dots, n)$$

mit ganzen Koeffizienten $u_k^{(i)}$ hervorgeht, deren Determinante $|u_k^{(i)}|$ durch \mathfrak{p} nicht teilbar ist.

Es sei nun $(U_k^{(1)}, U_k^{(2)}, \dots, U_k^{(n)})$ für $k = 1, 2, \dots, n$ das zu $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ gehörige System, welches aus den n^2 zu \mathfrak{p} gehörigen konjugierten Entwicklungen besteht, und

$$(27) \quad d(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)}) = |U_k^{(1)}, \dots, U_k^{(n)}|^2$$

die Diskriminante dieses Systems. Dann folgt aus dem soeben erwähnten Satze, daß die Diskriminanten aller Fundamentalsysteme durch dieselbe Potenz \mathfrak{p}^D des zugehörigen rationalen Divisors teilbar sind, daß man also jenen Teiler nur für das besonders einfache System (25) zu bestimmen braucht.

Berechnet man nun die Diskriminante

$$(28) \quad |\pi_i^r, \pi_i^{r+1}, \dots, \pi_i^{r+n-1}|^2 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

des Systems $(\pi^r, \pi^{r+1}, \dots, \pi^{r+n-1})$ unter der Voraussetzung $\pi_i = w^i (z - \alpha)^{\frac{1}{n}}$ $w = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, so ergibt sich leicht der Wert $(z - \alpha)^{2r+n-1}$. Also ist die in der Diskriminante irgend eines Fundamentalsystems für \mathfrak{P}^r enthaltene Potenz $D_r(\mathfrak{P})$ von \mathfrak{p}

$$(29) \quad D_r(\mathfrak{P}) = \mathfrak{p}^{2r+(n-1)} = n(\mathfrak{P}^r)^2 n(\mathfrak{P}^{n-1}),$$

wo der erste Faktor nur von dem Exponenten r des Divisors, der zweite nur von der Natur des Körpers abhängt. Jedes andere System $(U^{(1)}, \dots, U^{(n)})$ von n Vielfachen von \mathfrak{P}^r ist dann und nur dann ein Fundamentalsystem für diesen Divisor, wenn seine Diskriminante *genau* durch $D_r(\mathfrak{P})$ teilbar ist.

Ebenso leicht kann man die Potenz von \mathfrak{p} bestimmen, welche für unbestimmte u_1, u_2, \dots, u_n in der Diskriminante $\Delta^{(r)}(w)$ der Fundamentalgleichung enthalten ist. In der Tat kann man auch hier von der besonders einfachen Fundamentalform (25a) ausgehen. Berücksichtigt man dann, daß

$$(30) \quad \begin{aligned} \Delta^{(r)}(w) &= n(F'(w_1)) = n(\Pi(w_1 - w_h)) \\ &= n(\Pi(u_1 \pi^r (1 - w^{hr}) + u_2 \pi^{r+1} (1 - w^{(h+1)r}) + \dots)) \end{aligned}$$

ist, so ergibt sich ohne weiteres der Satz:

Die Diskriminante der Fundamentalgleichung für den Divisor \mathfrak{P}^r ist für unbestimmte u , genau durch

$$(31) \quad p^{r(n-1) + ((n,r)-1)}$$

teilbar, wenn (n, r) den größten gemeinsamen Teiler von n und r bedeutet.

Im Falle $r = 0$ handelt es sich um die Darstellung aller für den Bereich von \mathfrak{P} ganzen algebraischen Funktionen. Hier ist die Diskriminante des Fundamentalsystems p^{n-1} , d. h. genau gleich dem Teiler der Diskriminante der Fundamentalgleichung.

b) Es sei $\mathfrak{D} = \mathfrak{P}_1^{r_1} \mathfrak{P}_2^{r_2} \dots \mathfrak{P}_r^{r_r}$, und die Primteiler $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_r$ gehören alle zu demselben rationalen Primteiler p .

Diese Untersuchung kann leicht auf die vorige zurückgeführt werden mit Hilfe des allgemeinen Satzes:

Man kann im Körper $K(u, p)$ stets eine Funktion finden, welche an den zu p gehörigen Stellen $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_r$ beliebig vorgegebene Entwicklungen besitzt.

Wir nehmen der Einfachheit wegen an, daß dem Punkte p drei bzw. a -, b - und c -blättrige Verzweigungspunkte $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \mathfrak{P}_3$ entsprechen, und es sei $\mathfrak{D} = \mathfrak{P}_1^r \mathfrak{P}_2^s \mathfrak{P}_3^t$. Es seien ferner $\pi^{(0)}$ und π zwei nach dem vorigen Satz bestimmte Funktionen, welche im Bereiche von \mathfrak{P}_1 bzw. gleich 1 und $(z - \alpha)^{\frac{1}{a}}$ sind, während sie in der Umgebung von \mathfrak{P}_2 und \mathfrak{P}_3 gleich Null sind. Es mögen ferner $\rho^{(0)}$ und ρ für \mathfrak{P}_2 und $\sigma^{(0)}$ und σ für \mathfrak{P}_3 bzw. die Werte 1, $(z - \alpha)^{\frac{1}{b}}$ und 1, $(z - \alpha)^{\frac{1}{c}}$ haben und für die beiden anderen Punkte Null sein. Dann erkennt man wieder unmittelbar, daß die $a + b + c = n$ Elemente:

$$(32) \quad \pi^r, \pi^{r+1}, \dots, \pi^{r+a-1}; \rho^s, \rho^{s+1}, \dots, \rho^{s+b-1}; \sigma^t, \sigma^{t+1}, \dots, \sigma^{t+c-1}$$

ein Fundamentalsystem für alle Multipla von $\mathfrak{D} = \mathfrak{P}_1^r \mathfrak{P}_2^s \mathfrak{P}_3^t$ innerhalb des Bereiches $K(u, p)$ bilden, d. h. alle und nur diese Multipla sind eindeutig in der Form:

$$(32a) \quad w = u_1 \pi^r + \dots + u_a \pi^{r+a-1} + v_1 \rho^s + \dots + v_b \rho^{s+b-1} \\ + w_1 \sigma^t + \dots + w_c \sigma^{t+c-1}$$

mit ganzen Koeffizienten des Körpers $K(p)$ darstellbar. Die Diskriminante dieses Fundamentalsystems wird identisch gleich dem Produkte der drei Diskriminanten: $d(\pi^r, \pi^{r+1}, \dots, \pi^{r+a-1}) = p^{2r+(a-1)}, \dots$, welche zu $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \mathfrak{P}_3$ gehören; es ergibt sich also sofort die Gleichung:

$$(32b) \quad D(\mathfrak{D}) = D(\mathfrak{P}_1^r) D(\mathfrak{P}_2^s) D(\mathfrak{P}_3^t) = n(\mathfrak{D}^2) n(\mathfrak{P}_1^{a-1} \mathfrak{P}_2^{b-1} \mathfrak{P}_3^{c-1}).$$

Ein anderes System $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$, von Vielfachen von \mathfrak{D} ist dann und nur dann ein Fundamentalsystem für \mathfrak{D} in der Umgebung der Stelle \mathfrak{p} , wenn dasselbe *genau* durch $D(\mathfrak{D})$ teilbar ist. Jedes rational unabhängige System $(\eta^{(1)}, \eta^{(2)}, \dots, \eta^{(n)})$ des Körpers $K(u, z)$ kann durch eine endliche Anzahl von rationalen Elementartransformationen in ein Fundamentalsystem $(U^{(1)}, \dots, U^{(n)})$ für \mathfrak{D} übergeführt werden; die Diskriminanten $d(\eta^{(1)}, \dots, \eta^{(n)})$ und $d(U^{(1)}, \dots, U^{(n)})$ unterscheiden sich dann *nur* um eine Potenz des zugehörigen Linearfaktors mit ganzzahligem Exponenten.

Die Untersuchung der einzelnen Differenzen, aus denen die Diskriminante der Fundamentalgleichung besteht, ergibt für diese den Teiler

$$(33) \quad \Delta_{\mathfrak{D}}(w) = \mathfrak{p}^{\sum r(a-1) + (n, a) - 1 + 2 \sum \alpha b \cdot m} \left(\frac{r}{a}, \frac{s}{b} \right)$$

wo $m \left(\frac{r}{a}, \frac{s}{b} \right)$ jedesmal den kleineren der beiden Brüche $\frac{r}{a}$ und $\frac{s}{b}$ bezeichnet.

c) Die Ideale des Körpers $K(z, u)$ und die zugehörigen Fundamentalsysteme.

Es sei nun $\mathfrak{D} = \mathfrak{P}_1^{r_1} \mathfrak{P}_2^{r_2} \dots \mathfrak{P}_n^{r_n}$ ein beliebiger ganzer oder gebrochener Divisor, dessen zugehörige Punkte aber alle im Endlichen liegen. Dann bildet die Gesamtheit aller Elemente des Körpers, welche durch \mathfrak{D} teilbar und außerdem für alle *im Endlichen liegenden* Punkte regulär sind, einen Bereich $I(\mathfrak{D})$, ein sog. *Ideal*.³⁰⁾ Sind $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ irgendwelche Elemente dieses Ideales, so gehört offenbar jede Funktion

$$(34) \quad U = u_1 U^{(1)} + u_2 U^{(2)} + \dots + u_n U^{(n)}$$

ebenfalls zu $I(\mathfrak{D})$, wenn u_1, u_2, \dots, u_n beliebige ganze rationale Funktionen von z sind. Sind in der Form (34) alle Elemente von $I(\mathfrak{D})$ enthalten, so heißt $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ ein *Fundamentalsystem für dieses Ideal*. Ein System ist dann und nur dann ein Fundamentalsystem für $I(\mathfrak{D})$, wenn ihm diese Eigenschaft für die Umgebung einer jeden im Endlichen liegenden Stelle \mathfrak{p} zukommt. Hierdurch ist ein Mittel gegeben, um ein beliebiges rational unabhängiges System durch eine endliche Anzahl rationaler Transformationen in ein Fundamentalsystem $(U^{(1)}, \dots, U^{(n)})$ für ein beliebig gegebenes Ideal $I(\mathfrak{D})$ umzuformen und außerdem mit Hilfe von (b) die Diskriminante dieses Fundamentalsystems zu bestimmen. Um dieses Resultat einfach schreiben zu können, bezeichnen wir durch:

$$(35) \quad \mathfrak{B} = \Pi \mathfrak{P}_a^{a-1}$$

³⁰⁾ Vgl. D.-W., p. 206 f. [O]

das über alle im Endlichen liegenden Punkte \mathfrak{P}_a erstreckte Produkt, in welchem also nur die Verzweigungspunkte mit einem von Null verschiedenen Exponenten vorkommen. Dann ist jede Diskriminante $d(U^{(1)}, \dots, U^{(n)})$ des Ideales $I(\mathfrak{Q})$ genau durch den Divisor

$$(36) \quad n(\mathfrak{Q}^2 \mathfrak{B})$$

teilbar und enthält sonst keinen endlichen Divisor \mathfrak{p} . Entsprechen dem Punkte \mathfrak{p}_∞ lauter reguläre Punkte, so ist der obige Divisor:

$$(37) \quad \mathfrak{B}_z = \Pi \mathfrak{P}_a^{a-1},$$

der sog. *Verzweigungsteiler von $K(u, z)$* in Bezug auf die unabhängige Variable z , das über *alle* Verzweigungspunkte \mathfrak{P}_a erstreckte Produkt. Dann ergibt sich für die Diskriminante $D(\mathfrak{Q}) = D(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ eines beliebigen Fundamentalsystems für $I(\mathfrak{Q})$ die wichtige Darstellung

$$(38) \quad D(\mathfrak{Q}) = \frac{n(\mathfrak{Q}^2 \mathfrak{B}_z)}{\mathfrak{p}_\infty^{2q+w}},$$

wenn q die Ordnung von \mathfrak{Q} , und

$$(38a) \quad w = w_z = \sum (a - 1)$$

die sog. *Verzweigungsordnung* die Ordnung des Verzweigungsteilers \mathfrak{B}_z ist.³¹⁾

Ist speziell $\mathfrak{Q} = 1$, also $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ ein Fundamentalsystem für die sog. ganzen, d. h. *die* Funktionen des Körpers, welche im Endlichen überall endlich sind, so ist $D(1) = \frac{n(\mathfrak{B}_z)}{\mathfrak{p}_\infty^w}$; da aber andererseits jedes Element $U_k^{(i)}$, also auch die Determinante $|U_k^{(i)}|$ in der Umgebung der *regulären* Punkte $\mathfrak{P}_z^{(\infty)}$ nach ganzen Potenzen von $\frac{1}{z}$ fortschreitet, so besitzt $|U_k^{(i)}|^2$ in der Umgebung von \mathfrak{p}_∞ eine gerade Ordnungszahl; also ergibt sich der Satz:

Für jeden algebraischen Körper $K(u, z)$ ist die Ordnungszahl $w_z = \sum (a - 1)$ des Verzweigungsteilers stets eine gerade Zahl.³²⁾

31) Vgl. *D-W.*, p. 223 f.; *H-L.*, p. 219—221. [O]

32) Ist $\mathfrak{Q} = 1$, so entsteht das *Fundamentalsystem für ganze Größen (Kronecker, Discr. 309)* oder die *Basis (D-W., p. 194) des Körpers*. Mit der wirklichen Herstellung der Minimalbasis beschäftigen sich zahlreiche Untersuchungen (sowohl *Kronecker, Discr. 309*), als auch *D-W.*, p. 193 geben nur Existenzbeweise). Die erste auf der allgemeinen Eliminationstheorie beruhende Methode ist von *Kronecker* in der Festschrift (§ 6, p. 16—19) angedeutet und später von *König* (s. Fußnote 23), *Allg. Th.*, p. 499—502) ausführlich dargestellt worden. In ihr wird das Problem auf Systeme linearer Gleichungen zurückgeführt mit Hilfe des Satzes, daß die Resultante eines Gleichungssystems, dessen Lösungen eine lineare Schar bilden, linear sein muß. Ein direktes Verfahren zur Zurückführung des Problems

12. Die algebraischen Systeme und ihre Elementarteiler. Die Gesamtheit aller durch ein beliebiges rational unabhängiges System $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ mit ganzen Funktionen u_i von z als Koeffizienten, d. h. in der Form

$$(39) \quad U = u_1 U^{(1)} + u_2 U^{(2)} + \dots + u_n U^{(n)}$$

darstellbaren Funktionen des Körpers $K(u, z)$ bildet einen Teilbe-

auf lineare Gleichungen gibt *Hensel* (J. f. Math. 109, 1892), in korrigierter Form (J. f. Math. 111, 1893), *Mertens* (Wiener Ber. 102 II, 1893), *Hensel* (Acta Math. 18, 1894) — die in der letzten Arbeit gegebene Methode stellt etwas modifiziert und mit Beispielen *Baker* (B. p. 105—112) dar. — *König*²³⁾ (p. 514—526). Die letzte Methode führt zu solchen Funktionen des Fundamentalsystems, die rational mit rationalen Koeffizienten durch x, u ausdrückbar sind, falls die Zahlenkoeffizienten der Grundgleichung rational sind. — Die Methoden von *Hensel* (Act. Math. 18) lösen das Problem unter Benutzung der *Formen*, wobei sich das sog. *absolute Fundamentalsystem* ergibt, bei dem auch der unendlich ferne Punkt nicht ausgezeichnet ist. Die Methoden von *Hensel* und *Mertens* beruhen auf der von *Hensel* gegebenen „rationalen“ Definition der Teilbarkeit durch gebrochene Potenzen einer Primfunktion. Durch direkte Einführung gebrochener Potenzen rationaler Funktionen (Wurzelfunktionen) gelangt *Laut* (Dissert. Tübingen 1913) zu einer einfachen Lösung des Problems. Später hat *Hensel* [J. f. Math. 115 (1895), Berl. Ber. (1895) p. 933] Fundamentalsysteme in bezug auf den Primteiler $x - a$ eingeführt. Unter Benutzung solcher besonderer Fundamentalsysteme hat dann *Landsberg* [Gött. Nachr. 1895, Math. Ann. 50 (1899) p. 336—350] Methoden für die Konstruktion absoluter Fundamentalsysteme abgeleitet. In der ersten dieser Abhandlungen wird die Irreduzibilität der Grundgleichung nicht vorausgesetzt, und das erhaltene Fundamentalsystem ergibt dann ein einfaches Kriterium für die Irreduzibilität der Grundgleichung. Die Methode der zweiten Arbeit beruht nur auf den Reihenentwicklungen.

Allgemeiner wird die Konstruktion des Fundamentalsystems für ein beliebiges Ideal, worin die Konstruktion einer Minimalbasis als spezieller Fall enthalten ist, mit Hilfe der Reihenentwicklungen bei *H.-L.* p. 215 ausgeführt (1902), desgleichen bei *G. Dumas*, Thèse (Paris 1904), p. 68—71.

Endlich sei noch das Buch von *H. Stahl*, Abriß einer Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen, Leipzig 1911, erwähnt, wo im § 10 ein allgemeiner Ausdruck für ganze Funktionen (unter gewissen Voraussetzungen über die Singularitäten der Grundkurve) gegeben und im § 14 zur Aufstellung der Minimalbasis angewandt wird. Zur Aufstellung der Minimalbasis kann auch die *Thomésche* Methode der Singularitätenauflösung⁽⁵⁸⁾ angewandt werden.

Einige spezielle Körper betrachtet *Baur* (J. f. Math. 116, 1896) hyperelliptische Körper [Math. Ann. 41 (1893), p. 491], kubische Körper [ebd. 43 (1893), p. 505], *K. Fischer* (Dissert. Berlin, J. f. Math. 117, 1896) gibt allgemeine Methoden für kubische und biquadratische Körper in Anlehnung an die ersten Arbeiten von *Hensel*.

Den Aufbau einer Fundamentalbasis untersucht *Baker* (Proc. Lond. M. S. 26 (1895), B. 47—57) mit Hilfe des *Riemann-Rochschen* Satzes. *Klein* (R. F. I, p. 122—129) bespricht die Zusammensetzung eines absoluten Fundamentalsystems. Vgl. endlich noch *Weierstraß*, V. 1873; *B.-N.*, p. 433. [O]

reich desselben, welcher ein *Modul* genannt wird.³³⁾ Jenes System $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ heißt eine *Basis des Moduls*. Jedes Ideal ist ein spezieller Modul.

Zwei Systeme $(U^{(i)})$ und $(V^{(i)})$ heißen *äquivalent*, wenn sie Basen desselben Moduls sind, wenn sie also durch eine umkehrbare lineare Transformation mit *ganzen* rationalen Koeffizienten ineinander übergeführt werden können. Bildet man die zu einer Basis gehörige algebraische Matrix $(U_k^{(1)}, U_k^{(2)}, \dots, U_k^{(n)})$ und sucht nach den Vorschriften der Determinantentheorie ihre sog. *Determinantenteiler*, d. h. die größten gemeinsamen Teiler $d_1(z), d_2(z), \dots, d_n(z)$ ihrer Unterdeterminanten erster, zweiter, \dots n^{ter} Ordnung und aus ihnen die sog. *Elementarteiler*:

$$(40) \quad e_1(z) = d_1(z), \quad e_2(z) = \frac{d_2(z)}{d_1(z)}, \quad \dots \quad e_n(z) = \frac{d_n(z)}{d_{n-1}(z)},$$

so sind dies Produkte von Potenzen der rationalen Divisoren \mathfrak{p} mit ganzen oder gebrochenen Exponenten, und aus der Definition äquivalenter Systeme folgt sofort der Satz:

Äquivalente Systeme besitzen dieselben Elementarteiler.

Es sei \mathfrak{p} ein im Endlichen liegender Punkt der einblättrigen Kugelfläche \mathfrak{R} , zu welchem auf der n -blättrigen Fläche \mathfrak{R}_z die Verzweigungspunkte $\mathfrak{P}_a, \mathfrak{P}_b, \dots, \mathfrak{P}_c$ von a, b, \dots, c Blättern gehören. Sind dann $\mathfrak{p}^{\varepsilon_1}, \mathfrak{p}^{\varepsilon_2}, \dots, \mathfrak{p}^{\varepsilon_n}$ die in den Elementarteilern $e_1(z), e_2(z), \dots, e_n(z)$ enthaltenen Potenzen von \mathfrak{p} , so sind die Exponenten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ rationale Brüche, deren kleinste positive Reste, abgesehen von der Reihenfolge, die Bruchsequenzen:

$$\left(0, \frac{1}{a}, \frac{2}{a}, \dots, \frac{a-1}{a}; 0, \frac{1}{b}, \frac{2}{b}, \dots, \frac{b-1}{b}; \dots, 0, \frac{1}{c}, \frac{2}{c}, \dots, \frac{c-1}{c}\right)$$

bilden. Mit Benutzung dieser Tatsache kann man mit Hilfe eines beliebigen algebraischen Systems, z. B. von $(1, u_i, u_i^2, \dots, u_i^{n-1})$ die Verzweigung der zugehörigen *Riemannschen* Fläche aus dem Koeffizienten der Grundgleichung direkt finden.³⁴⁾ So ergibt sich z. B. der Satz:

Besitzen in der allgemeinen kubischen Gleichung:

$$u^3 + a(z)u + b(z) = 0$$

die rationalen Funktionen $a(z), b(z), \Delta(z) = 4a^3 + 27b^3$ für eine endliche oder die unendlich ferne Stelle $\mathfrak{p}(z = a, \text{ bzw. } z = \infty)$ die Ordnungszahlen α, β, δ , so wird die Verzweigung im Punkte \mathfrak{p} durch

33) Eingehendere Untersuchung der Funktionsmoduln geben *D.-W.* 194—206. Die Determinanten- und Elementarteiler der den Moduln zugehörigen Basissysteme werden jedoch erst von *Hensel* herangezogen, *J. f. Math.* 115, p. 254 ff. [O]

34) *Hensel*, *Berlin Sitzber.* 1895, p. 993; *Hensel*, ebd. p. 1103; *H.-L.*, p. 188 ff. [O]

den Nenner des kleineren unter den Brüchen $\frac{a}{2}$ und $\frac{b}{3}$ so bestimmt, daß er angibt, wie viele unter den drei Blättern dort zusammenhängen. Ist aber $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$, so wird dieselbe Frage durch den Nenner von $\frac{b}{2}$ entschieden.⁸⁵⁾

Jedes System $(U^{(1)}, U^{(2)} \dots U^{(n)})$ kann durch eine endliche Anzahl von rationalen Elementartransformationen in ein äquivalentes $(V^{(1)}, V^{(2)}, \dots V^{(n)})$ übergeführt werden, dessen n Elemente durch möglichst hohe Potenzen eines beliebig gegebenen rationalen Divisors p algebraisch teilbar sind, und zwar sind dies diejenigen n Potenzen $p^{\epsilon_1}, p^{\epsilon_2}, \dots p^{\epsilon_n}$, welche in den Elementarteilern des algebraischen Systems $(U_i^{(1)}, U_i^{(2)}, \dots U_i^{(n)})$ enthalten sind. Ein solches System $(V^{(i)})$ heißt *normal in bezug auf die Stelle* p . Die Determinanten $|U_k^{(i)}| = |V_k^{(i)}|$ sind genau durch $p^{\epsilon_1 + \epsilon_2 + \dots + \epsilon_n}$ teilbar.⁸⁶⁾

Dieses Resultat benutzen wir zur Lösung der folgenden Fundamentalaufgabe für die Theorie und die Anwendung der algebraischen Funktionen:

Es sollen alle linear unabhängigen Multipla eines beliebig gegebenen ganzen oder gebrochenen Divisors Ω innerhalb des Körpers $K(u, z)$ gefunden werden.

35) Hensel, Berlin Sitzber. 1895, p. 1103; für dreiblättrige Flächen vgl. Baur, Math. Ann. 46 (1895), p. 31—61; J. f. Math. 119 (1898), p. 171—174. Ein ähnlicher einfacher Satz besteht für die Verzweigung der allgemeinen vierblättrigen Kugelfläche. Hensel, ebd. [O]

36) Der Begriff einer *Normalbasis*, d. h. einer Minimalbasis, die in bezug auf den unendlich fernen Punkt normal ist, wird bei *D.-W.* (p. 255—258) auf eine andere Weise mit einem Existenzbeweis eingeführt. Die Konstruktion einer solchen gibt Mertens (Wien. Sitzber. 1893, 2a, p. 437), ein kürzeres Verfahren mit denselben Hilfsmitteln Laut (Dissert. Tübingen 1913). Alle übrigen in der Fußnote 32) erwähnten Arbeiten, die sich mit der Konstruktion eines *absoluten Fundamentalsystems* für ganze Formen beschäftigen, ergeben zugleich auch Normalbasen [Baur, Math. Ann. 49 (1897), p. 73—82], wenn in den Formen der absoluten Fundamentalsysteme eine der Variablen gleich 1 gesetzt wird. Dazu ist auch Hensel [J. f. Math. 115 (1895), p. 254—294] zu vergleichen.

Die im Text gegebene Definition der normalen Systeme kommt zuerst bei Hensel (J. f. Math. 105, p. 334) vor. In einigen späteren Abhandlungen von Hensel (J. f. Math. 115, 117) und Fischer (J. f. Math. 117) wird die Bezeichnung *kanonisch* gebraucht. Für die Transformation eines Systems in ein in bezug auf eine endliche oder unendlich ferne Stelle kanonisches gibt Hensel [J. f. Math. 115 (1895), p. 254—294] rationale Methoden. Zu vergleichen ist auch *H.-L.*, p. 169—173. Jedes System ist einem solchen äquivalent, welches in bezug auf alle *endlichen* Stellen normal ist [Hensel, J. f. Math. 117 (1895), p. 129—139]; für die Körper 3 und 4. Grades ist die Transformation vollständig durchgeführt bei L. Fischer [Dissert. Berlin oder J. f. Math. 117 (1895), p. 1—23]. [O]

Es werde angenommen, was eventuell durch eine Transformation $z' = \frac{1}{z - \alpha}$ leicht erreicht werden kann, daß der unendlich fernen Stelle keine Verzweigungspunkte entsprechen, und daß Ω keinen der n Primateiler $\mathfrak{P}_i^{(\infty)}$ enthält. Dann sei $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ ein Fundamentalsystem für das Ideal $I(\Omega)$, welches in bezug auf die Stelle \mathfrak{p}_∞ normal ist. Es mögen nun:

$$\mathfrak{p}_\infty^{r_1}, \mathfrak{p}_\infty^{r_2}, \dots, \mathfrak{p}_\infty^{r_s}$$

die in den algebraischen Funktionen $U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)}$ enthaltenen Potenzen von \mathfrak{p}_∞ sein, und diese seien so geordnet, daß $r_1 \geq r_2 \geq \dots \geq r_n$ ist. Ist dann r_s der letzte nichtnegative unter diesen Exponenten, so sind nur diese ersten Funktionen $U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(s)}$ wirklich Vielfache von Ω , die $n - s$ letzten sind es nicht, da diese noch außerdem die Primateiler $\mathfrak{P}_i^{(\infty)}$ mindestens einmal im Nenner haben. Allgemeiner ist eine Funktion:

$$U = u_1 U^{(1)} + u_2 U^{(2)} + \dots + u_s U^{(s)}$$

dann und nur dann ein Multiplum von Ω , wenn allgemein u_i eine beliebig ganze Funktion des r_i^{ten} Grades von z ist.

Unter den soeben gemachten Voraussetzungen bilden also die:

$$(41) \quad N = (r_1 + 1) + (r_2 + 1) + \dots + (r_s + 1)$$

algebraischen Funktionen:

$$U^{(i)}, z U^{(i)}, \dots, z^{r_i} U^{(i)} \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

ein vollständiges System linear unabhängiger Multipla des Divisors Ω .³⁷⁾

Zu jedem rational unabhängigen Systeme $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ gehört ein anderes, das sog. *komplementäre System* $(\tilde{U}^{(1)}, \tilde{U}^{(2)}, \dots, \tilde{U}^{(n)})$, dessen Elemente demselben Körper $K(u, z)$ angehören³⁸⁾ Dasselbe ist dadurch charakterisiert, daß die beiden dazugehörigen Matrizen $(U_k^{(1)}, U_k^{(2)}, \dots, U_k^{(n)})$ und $(\tilde{U}_k^{(1)}, \tilde{U}_k^{(2)}, \dots, \tilde{U}_k^{(n)})$ reziproke Systeme werden, wenn in einem von ihnen Zeilen und Kolonnen vertauscht werden. Aus diesem Zusammenhang ergeben sich sofort die wichtigsten zwischen zwei komplementären Systemen bestehenden Beziehungen: Ist das System $(U^{(i)})$ für eine Stelle \mathfrak{p} normal und sind $\mathfrak{p}^{\epsilon_1}, \dots, \mathfrak{p}^{\epsilon_n}$ die in

37) S. H.-L., p. 223; G. Dumas, Thèse, p. 71—72. „Die Frage der Aufstellung aller Multipla eines gegebenen Divisors innerhalb eines Körpers bildet den Kernpunkt aller algebraischen Theorien“ (B.-N., p. 410). In der Weierstraßschen Vorlesung von 1869 (B.-N., p. 410—414) wird diese Frage unter Benutzung der Kroneckerschen Fundamentalsysteme für ganze Größen des Körpers behandelt. [O]

38) D.-W., p. 217—223; Hensel, J. f. Math. 117 (1896), p. 33. [O]

den einzelnen Elementen enthaltenen Potenzen von \mathfrak{p} , so ist auch das komplementäre System für \mathfrak{p} normal, und seine Elemente enthalten die Potenzen $\mathfrak{p}^{-\epsilon_1}, \mathfrak{p}^{-\epsilon_2}, \dots, \mathfrak{p}^{-\epsilon_n}$. Hieraus folgt sofort der Satz: Die Elementarteiler des komplementären Systems sind gleich den reziproken Elementarteilern des ursprünglichen in umgekehrter Reihenfolge.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage, unter welcher Bedingung ein System $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ ein Fundamentalsystem für ein Ideal $I(\mathfrak{Q})$ ist, und welches in diesem Falle der zugehörige Divisor \mathfrak{Q} ist. Diese Frage wird vollständig durch die folgenden beiden Sätze beantwortet:

1. Ein algebraisches System $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ ist dann und nur dann ein Fundamentalsystem für ein Ideal, wenn seine Diskriminante genau gleich $\frac{n(\mathfrak{Q}^2 \mathfrak{B})}{\mathfrak{p}_\infty^{2a+n}}$ ist, wenn $\mathfrak{Q} = (U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ den größten gemeinsamen Teiler der n Elemente $U^{(i)}$ bedeutet, und zwar ist alsdann der zum Ideale gehörige Divisor gleich \mathfrak{Q} .

2. Ein algebraisches System ist dann und nur dann ein Fundamentalsystem für ein Ideal, wenn es für jede endliche Stelle \mathfrak{p} einem anderen äquivalent ist, welches entsprechend den an jener Stelle übereinanderliegenden Verzweigungspunkten $\mathfrak{P}_a, \mathfrak{P}_b, \dots, \mathfrak{P}_c$ in lauter Fundamentalsysteme $(\pi^r, \dots, \pi^{r+a-1}; \varrho^s, \dots, \varrho^{s+b-1}; \dots; \sigma^t, \dots, \sigma^{t+c-1})$ zerfällt. Ist dies der Fall, so ist der zugehörige Divisor $\mathfrak{Q} = \prod \mathfrak{P}_a^r$, wo das Produkt nur über diejenigen Primfaktoren \mathfrak{P}_a, \dots erstreckt zu werden braucht, für welche die bezüglichen Exponenten r, \dots von Null verschieden sind.³⁹⁾

Aus diesen beiden Sätzen erschließt man unmittelbar das folgende wichtige Theorem:

Ist $(U^{(1)} \dots U^{(n)})$ ein Fundamentalsystem für einen Divisor \mathfrak{Q} , so ist auch das komplementäre System $(\tilde{U}^{(1)}, \dots, \tilde{U}^{(n)})$ ein Fundamentalsystem und zwar für den zu \mathfrak{Q} komplementären Divisor $\tilde{\mathfrak{Q}}$, welcher mit \mathfrak{Q} durch die Gleichung

$$(42) \quad \mathfrak{Q} \tilde{\mathfrak{Q}} = \frac{1}{\mathfrak{B}_0}$$

zusammenhängt; hier bedeutet wieder \mathfrak{B}_0 den Verzweigungsteiler $\prod \mathfrak{P}_a^{a-1}$ für alle endlichen Verzweigungspunkte.⁴⁰⁾

39) *H.-L.*, p. 218; derartige Bedingungen für Minimalbasen zuerst bei *Hensel*, *J. f. Math.* 115, p. 267, für Normalbasen in homogener Form, ebd. p. 287. Eine ähnliche Charakterisierung des Fundamentalsystems für Integrale 1. Gattung gibt ebenfalls in homogener Form *Hensel*, *J. f. Math.* 117, p. 37. [O]

40) *H.-L.*, p. 231. Ein entsprechendes Resultat, jedoch spezieller (für Fundamentalsystemen des Körpers) bei *D.-W.*, p. 227. [O]

13. Die eindeutigen Transformationen des Körpers $K(u, z)$ in den ihm gleichen $K(y, x)$ bei beliebiger Annahme der unabhängigen Variablen x .⁴¹⁾

Ist x eine beliebige nichtkonstante Funktion des Körpers $K(u, z)$, so kann man stets durch ein endliches rationales Verfahren ein anderes Element desselben Körpers so auswählen, daß alle Elemente des Körpers $K(u, z)$ auch rationale Funktionen von x und y sind, daß also $K(u, z) = K(y, x)$ ist.

Ist n_x der Grad von x , so kann und muß man nämlich y innerhalb $K(u, z)$ so auswählen, daß y einer irreduktiblen Gleichung des n_x ten Grades mit rationalen Funktionen von x als Koeffizienten genügt. Der so transformierte Körper $K(y, x)$ ist also stets von dem Grade n_x der beliebig gewählten unabhängigen Veränderlichen, und die neue Grundgleichung:

$$(43) \quad F(y, x) = 0$$

ist in bezug auf x und y bzw. vom Grade n_y und n_x . Jede Größe des Körpers genügt dann einer irreduktiblen Gleichung mit rationalen Koeffizienten in x , deren Grad gleich n_x oder gleich einem Teiler von n_x ist. Zwischen zwei beliebigen Elementen ξ und η des Körpers $K(u, z)$ besteht immer eine irreduktible Gleichung $F(\xi, \eta) = 0$, deren Grade in ξ und η bzw. gleich n_η und n_ξ oder einem Teiler dieser Zahlen sind. Der aus ihnen gebildete Körper $K(\eta, \xi)$ ist dann und nur dann gleich $K(u, z)$, wenn jene beiden Gradzahlen ihren größten Wert haben. Aus diesem Resultat folgt sofort der allgemeine Satz, der die Grundlage der Theorie der algebraischen Kurven bildet:

Ist

$$x_0 = \frac{\mathfrak{A}_0}{\mathfrak{A}_3}, \quad x_1 = \frac{\mathfrak{A}_1}{\mathfrak{A}_3}, \quad x_2 = \frac{\mathfrak{A}_2}{\mathfrak{A}_3}$$

die Divisorendarstellung von drei beliebigen nichtkonstanten Elementen des Körpers $K(u, z)$, so besteht zwischen ihnen stets eine homogene Gleichung

$$(43a) \quad F(x_0, x_1, x_2) = 0,$$

deren Grad n gleich dem Grade der von ihrem größten gemeinsamen Teiler befreiten Zählerdivisoren $\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$ ist; diese Gleichung ist in bezug auf x_0 von dem Grade n_0 der Funktion $\frac{x_1}{x_2} = \frac{\mathfrak{A}_1}{\mathfrak{A}_2}$, und das Entsprechende gilt von den Graden n_1 und n_2 für x_1 und x_2 .

41 D.-W., p. 232—235. Über die Beziehungen zum Riemannschen Klassenbegriff vgl. II B 2, Nr. 9—10. [O]

Jede nicht konstante Größe x des Körpers kann als unabhängige Variable für den Körper gewählt werden, und zu jeder gehört eine n_x -blättrige *Riemannsche* Kugelfläche \mathfrak{K}_x , auf welcher nun alle und nur die Funktionen des Körpers eindeutig und bis auf ihre Pole auch stetig ausgebreitet sind. Da die einzelnen Punkte \mathfrak{P} und ihre Umgebungen unabhängig von der Wahl der Kugelfläche definiert sind, so folgt, daß je zwei solche zu demselben Körper gehörigen Kugelflächen in der Weise eindeutig umkehrbar aufeinander bezogen sind, daß die Umgebungen entsprechender Punkte einander eindeutig zugeordnet sind. Hieraus folgt weiter, daß die algebraischen Divisoren und die Gesetze ihrer Teilbarkeit, ferner die Definition der ganzen und der gebrochenen Divisoren usw. in bezug auf den Körper invariant sind, dagegen sind z. B. die Begriffe des Moduls, des Ideales, des Verzweigungsteilers u. a. m. von der Wahl der unabhängigen Variablen z , d. h. von der *Riemannschen* Fläche \mathfrak{K}_z , abhängig. Speziell ist der zur unabhängigen Variablen x gehörige Verzweigungsteiler gleich $\mathfrak{Z}_x = \prod \mathfrak{P}_x^{n_x - 1}$, wenn das Produkt auf alle Verzweigungspunkte der Kugelfläche \mathfrak{K}_x ausgedehnt wird.

Existiert in dem Körper $K(u, z)$ speziell ein Element $\xi = c \frac{\mathfrak{P}}{\mathfrak{P}'}$ vom ersten Grade und wählt man dieses als unabhängige Variable, so werden alle anderen Elemente η dieses Körpers rationale Funktionen von ξ ; der algebraische Körper $K(u, z)$ ist dann gleich dem rationalen Körper $K(\xi)$. Alle Kugelflächen \mathfrak{K}_z des Körpers sind dann eindeutig auf die zu ξ gehörige einblättrige Kugelfläche \mathfrak{K}_ξ abgebildet.

14. Die Einteilung der algebraischen Divisoren in Klassen. Wie in Nr. 3 rechnen wir in dem algebraischen Körper $K(u, z)$ alle auch ihren multiplikativen Konstanten nach bestimmten Divisoren $U = \mathfrak{D}_U$ in eine Klasse E oder (1), die sogenannte *Haupt- oder Einheitsklasse*, welche einem Elemente U des Körpers gleich sind. Es ist also

$$(44) \quad E = (1) = (U, U', U'', \dots).$$

Diese Klasse enthält somit unendlich viele, nämlich so viele Divisoren, als es Elemente U, U', \dots des Körpers gibt. Alle Divisoren der Hauptklasse haben hiernach die Ordnung Null, und sie erzeugen sich durch die elementaren Rechenoperationen wieder. Jedoch gehört hier im allgemeinen nicht jeder Divisor der Ordnung Null zur Hauptklasse; dies ist vielmehr dann und nur dann der Fall, wenn der algebraische Körper $K(u, z)$ einem rationalen Körper $K(\xi)$ gleich ist oder, was dasselbe ist, wenn wenigstens ein Quotient $\frac{\mathfrak{P}}{\mathfrak{P}'}$ zweier Primteiler der Hauptklasse angehört.

Allgemeiner nennen wir zwei Divisoren \mathfrak{D} und \mathfrak{D}' *äquivalent* und rechnen sie in *eine und dieselbe Klasse* Q , wenn ihr Quotient $\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{D}'} = \mathfrak{D}_U$ eine Größe U des Körpers oder ein Divisor \mathfrak{D}_U der Hauptklasse E ist. Man erhält also alle und nur die Divisoren einer Klasse Q , wenn man alle Elemente (U, U', \dots) des Körpers mit einem beliebig ausgewählten Divisor \mathfrak{D}_0 der Klasse Q , dem sogenannten *Multiplikator* für diese Klasse multipliziert, d. h. es ist

$$(45) \quad Q = \mathfrak{D}_0(U, U', \dots) = (\mathfrak{D}_0 U, \mathfrak{D}_0 U', \dots).$$

Alle Divisoren der Klasse Q haben somit dieselbe Ordnung q , welche daher die *Ordnung jener Klasse* genannt wird. Man kann den Multiplikator \mathfrak{D}_0 innerhalb Q ganz beliebig und speziell auch stets so auswählen, daß er beliebig gegebene Primfaktoren nicht enthält.

Sind Q und R zwei Divisorenklassen, und durchlaufen \mathfrak{D} und \mathfrak{R} alle Elemente derselben, so gehören alle Produkte $\mathfrak{D}\mathfrak{R}$ und nur sie in eine und dieselbe neue Klasse, welche durch QR bezeichnet wird, und ebenso sind alle Quotienten $\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{R}}$ die sämtlichen Divisoren einer Klasse $\frac{Q}{R}$. Sind q und r die Ordnungen von Q und R , so haben QR und $\frac{Q}{R}$ die Ordnungszahlen $q + r$ und $q - r$. Die Haupt- oder Einheitsklasse E ist die einzige, durch deren Multiplikation und Division eine beliebige Klasse Q nicht geändert wird.⁴²⁾

Zu einer wesentlich allgemeineren Auffassung der Äquivalenz und der Klasseneinteilung der algebraischen Divisoren, welche für die geometrischen Anwendungen der Theorie von großer Bedeutung ist, gelangt man durch die folgenden Betrachtungen:

Alle Divisoren \mathfrak{D} bilden eine Gruppe, welche kommutativ, also eine *Abelsche Gruppe* G ist, und dasselbe gilt für jede Untergruppe von G , z. B. für die Gesamtheit aller der soeben bestimmten Divisorenklassen. Es sei nun

$$M = (\mathfrak{M}_0, \mathfrak{M}_1, \dots)$$

eine beliebige Untergruppe von G , so sollen zwei Divisoren \mathfrak{D} und \mathfrak{D}' jetzt in allgemeinerem Sinne *äquivalent in bezug auf* M heißen,

42) *D.-W.*, p. 248—250 (§ 18), *H.-L.*, p. 250 f.; bei der Vergleichung der Resultate ist jedoch zu beachten, daß bei *D.-W.* Polygone nur *ganzen* Divisoren entsprechen, so daß zu den dort betrachteten Polygonklassen Divisorenklassen gehören, in denen wenigstens ein *ganzer* Divisor vorkommt. Ähnliches gilt von den *Polygonscharen*. Dementsprechend gestalten sich die obigen Sätze bei *D.-W.* komplizierter. [O]

wenn sie sich nur um ein Element von M unterscheiden, so daß also die Äquivalenz

$$\mathfrak{D} \sim \mathfrak{D}' (M)$$

eine Gleichung $\mathfrak{D} \stackrel{!}{=} \mathfrak{D}' M$ vertritt. Bei dieser allgemeineren Definition ordnen sich alle untereinander in bezug auf M äquivalenten Divisoren zu Klassen (E_M, Q_M, R_M, \dots) , und auch für diese Klasseneinteilung gelten genau die früheren Gesetze. Die Hauptklasse E_M ist hier die Gruppe M , und auch hier bestimmt das Produkt je zweier Elemente von zwei Klassen Q_M und R_M alle Elemente einer neuen Klasse, welche jetzt mit $Q_M R_M$ bezeichnet werden möge. Ebenso gehört zu jeder Klasse Q_M eine reziproke Klasse Q_M^{-1} , welche mit ihr multipliziert die Hauptklasse M erzeugt.

Wählt man für M speziell die Klasse E der zu den Funktionen U von $K(u, z)$ gehörigen Divisoren \mathfrak{D}_U , so erhält man genau die vorige Klasseneinteilung, die wir auch im folgenden zunächst immer benutzen werden. Es sei nun aber A irgendeine dieser Divisorenklassen, und es bedeute jetzt

$$M = (\dots A^{-2}, A^{-1}, E, A, A^2, \dots)$$

die durch diese Klasse und ihre Potenzen konstituierte Untergruppe von G , welche also ihrerseits die Klasse E als Teiler enthält. Dann entspricht der Einteilung der Divisoren \mathfrak{D} in bezug auf M die Zusammenfassung aller der früheren Divisorenklassen Q in eine größere Klasse Q_M , welche sich von Q nur um eine Potenz von A unterscheiden.

15. Die Divisorenscharen und ihre Invarianten.⁴³⁾ Sind $\mathfrak{D}_{U_1}, \mathfrak{D}_{U_2}, \dots, \mathfrak{D}_{U_\mu}$ μ beliebige Divisoren der Hauptklasse, c_1, c_2, \dots, c_μ beliebige Konstanten, so ist

$$(46) \quad \mathfrak{D}_U = c_1 \mathfrak{D}_{U_1} + c_2 \mathfrak{D}_{U_2} + \dots + c_\mu \mathfrak{D}_{U_\mu}$$

ebenfalls ein eindeutig bestimmter Divisor der Hauptklasse, nämlich derjenige, welcher der Funktion

$$(46a) \quad U = c_1 U_1 + c_2 U_2 + \dots + c_\mu U_\mu$$

entspricht. Derselbe ist durch den größten gemeinsamen Teiler $\mathfrak{D} = (\mathfrak{D}_{U_1}, \mathfrak{D}_{U_2}, \dots, \mathfrak{D}_{U_\mu})$ der \mathfrak{D}_{U_i} ebenfalls teilbar, also in der Form $\mathfrak{D}_U = \mathfrak{D} \mathfrak{G}$ darstellbar, wo der ganze Divisor \mathfrak{G} von den Konstanten c_1, c_2, \dots, c_μ abhängt. Man kann die Konstanten c_i auf unendlich viele Arten so bestimmen, daß \mathfrak{G} beliebig gegebene Primteiler $\mathfrak{P}^{(1)}, \mathfrak{P}^{(2)}, \dots, \mathfrak{P}^{(r)}$ nicht enthält. μ Divisoren der Hauptklasse heißen

⁴³⁾ Vgl. *D.-W.*, p. 250–252 (§ 19), wo jedoch nur Polygonscharen, d. h. Scharen ganzer Divisoren betrachtet werden (für die hier gegebenen Betrachtungen vgl. *H.-L.*, p. 452f.). [O]

linear unabhängig, wenn zwischen ihnen keine lineare homogene Gleichung:

$$c_1 \mathfrak{D}_{\nu_1} + c_2 \mathfrak{D}_{\nu_2} + \cdots + c_\mu \mathfrak{D}_{\nu_\mu} = 0$$

mit konstanten Koeffizienten besteht.

Wenn wir festsetzen, daß eine zwischen Divisoren bestehende Gleichung richtig bleiben soll, wenn man sie mit einem von Null verschiedenen Divisor multipliziert oder durch ihn dividiert, so erkennt man, daß jede homogene Gleichung vom ersten oder auch von höherem Grade zwischen Divisoren der Hauptklasse für die ihnen in einer beliebigen Klasse Q zugeordneten Divisoren ebenfalls erfüllt ist, und umgekehrt besteht zwischen Divisoren einer und derselben Klasse dann und nur dann eine homogene Gleichung, wenn sie auch für die zugeordneten Funktionen der Hauptklasse erfüllt ist. Sind speziell $\mathfrak{D}_0, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_\mu$ beliebige Divisoren einer Klasse Q , so stellt jede homogene lineare Funktion:

$$\mathfrak{D} = c_0 \mathfrak{D}_0 + c_1 \mathfrak{D}_1 + \cdots + c_\mu \mathfrak{D}_\mu$$

einen eindeutig bestimmten Divisor derselben Klasse dar, welcher in der Form $\mathfrak{D}\mathfrak{G}$ geschrieben werden kann, wo $\mathfrak{D} = (\mathfrak{D}_0, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_\mu)$ ist und \mathfrak{G} einen von den c_i abhängigen ganzen Divisor bedeutet. Die Divisoren ($\dots \mathfrak{D}_i \dots$) heißen *linear unabhängig*, wenn zwischen ihnen keine homogene lineare Gleichung mit nicht sämtlich verschwindenden Koeffizienten besteht. Man kann jedes System (\mathfrak{D}_i) durch ein System unabhängiger Divisoren ersetzen.

Für alle möglichen Werte der Konstanten c_i erhält man alle Divisoren \mathfrak{D} einer *Divisorenschar* \mathfrak{S} , welche durch die *Basis* $(\mathfrak{D}_0, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_\mu)$ von linear unabhängigen Elementen vollständig bestimmt ist. Diese Schar bleibt ungeändert, wenn man ihre Basis durch eine umkehrbare lineare Transformation

$$\mathfrak{D}_i = \sum c_{ik} \mathfrak{D}'_k \quad (i, k = 0, 1, \dots, \mu)$$

mit konstanten Koeffizienten in eine *äquivalente Basis* transformiert. Diese Tatsache liefert gleich die zu einer solchen Schar gehörigen $(\mu + 1)$ invarianten *Verzweigungsteiler*, welche in allen Anwendungen dieser Theorie von grundlegender Bedeutung sind.

Man kann nämlich die Basis (\mathfrak{D}_i) von vornherein in eine äquivalente Basis $(\bar{\mathfrak{D}}_i)$ transformieren, welche für eine beliebig gegebene Stelle \mathfrak{P} *regulär* ist, in welcher nämlich jedes folgende Element durch eine höhere Potenz von \mathfrak{P} teilbar ist, als das vorhergehende. Sind nun

$$(47) \quad \mathfrak{P}^{\alpha_0}, \mathfrak{P}^{\alpha_0 + \alpha_1}, \dots, \mathfrak{P}^{\alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\mu}$$

die in $\bar{\mathfrak{D}}_0, \bar{\mathfrak{D}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{D}}_\mu$ enthaltenen Potenzen von \mathfrak{P} , so sind die Exponenten $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_\mu$ nur von dem Systeme (\mathfrak{D}_i) abhängige ein-

deutig bestimmte ganze Zahlen, von denen die μ letzten sämtlich positiv sind, während α_0 positiv, Null oder negativ sein kann. Für jeden Punkt \mathfrak{P} erhält man so ein System von Exponenten $(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_\mu)$, welches der Schar $\mathfrak{S} = (\mathfrak{D}_0, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_s)$ zugeordnet ist. Wir bezeichnen nun die über alle Punkte \mathfrak{P} erstreckten $\mu + 1$ Produkte:

$$(47 a) \quad \mathfrak{B}_0 = \prod \mathfrak{P}^{\alpha_0}, \quad \mathfrak{B}_1 = \prod \mathfrak{P}^{\alpha_1-1}, \quad \mathfrak{B}_2 = \prod \mathfrak{P}^{\alpha_2-1}, \dots, \\ \mathfrak{B}_\mu = \prod \mathfrak{P}^{\alpha_\mu-1}$$

als die zu der Schar \mathfrak{S} gehörigen Verzweigungsteiler nullter, erster, ... μ ter Ordnung. Sie sind die wichtigsten Invarianten der höheren Geometrie. Nur der Verzweigungsteiler nullter Ordnung \mathfrak{B}_0 , der größte gemeinsame Teiler aller Divisoren $(\mathfrak{D}_0, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_s)$, ist im allgemeinen gebrochen, alle anderen sind endliche ganze Divisoren. Ist speziell $\mu = 1$, so treten nur die beiden Verzweigungsteiler $\mathfrak{B}_0 = (\mathfrak{D}_0, \mathfrak{D}_1)$ und \mathfrak{B}_1 auf; dieser letztere ist, wie eine einfache Überlegung zeigt, der Verzweigungsteiler \mathfrak{B}_x der zu der Funktion $x = \frac{\mathfrak{D}_0}{\mathfrak{D}_1}$ gehörigen Riemannschen Fläche \mathfrak{R}_x .

Sind ferner:

$$(48) \quad x_0 = \frac{\mathfrak{A}_0}{\mathfrak{A}}, \quad x_1 = \frac{\mathfrak{A}_1}{\mathfrak{A}}, \quad x_2 = \frac{\mathfrak{A}_2}{\mathfrak{A}}$$

drei beliebige nicht konstante Elemente des Körpers und $\Phi(x_0, x_1, x_2) = 0$ die zwischen ihnen bestehende homogene Gleichung n ten Grades, so besteht dieselbe Gleichung $\Phi(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2) = 0$ zwischen den drei einander äquivalenten Divisoren, welche oben die Zähler von x_0, x_1, x_2 bilden.

Umgekehrt folgt jetzt sofort aus (43 a) auf p. 567: sind

$$(48 a) \quad \mathfrak{A}_0 = \mathfrak{D}\mathfrak{G}_0, \quad \mathfrak{A}_1 = \mathfrak{D}\mathfrak{G}_1, \quad \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{D}\mathfrak{G}_2$$

drei beliebige ganze oder gebrochene Divisoren einer und derselben Klasse und $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)$ ihr größter gemeinsamer Teiler, so besteht zwischen ihnen stets eine homogene Gleichung

$$(48 b) \quad \Phi(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2) = 0,$$

deren Grad n gleich dem Grade der Divisoren $\mathfrak{G}_0, \mathfrak{G}_1, \mathfrak{G}_2$ ist, und diese Gleichung steigt z. B. in \mathfrak{A}_0 bis zum Grade n_0 von $\frac{\mathfrak{A}_1}{\mathfrak{A}_2} = \frac{\mathfrak{G}_1}{\mathfrak{G}_2}$ an.

16. Die ganzen Divisoren einer Klasse \mathfrak{Q} bilden einen Teilbereich derselben, den sogenannten Integritätsbereich der Klasse \mathfrak{Q} . In jeder Klasse gibt es stets eine endliche Anzahl von linear unabhängigen Divisoren $\mathfrak{G}_1, \mathfrak{G}_2, \dots, \mathfrak{G}_N$, durch welche alle und nur die ganzen Divisoren in der Form:

$$\mathfrak{G} = c_1 \mathfrak{G}_1 + c_2 \mathfrak{G}_2 + \dots + c_N \mathfrak{G}_N$$

mit konstanten Koeffizienten dargestellt werden können. Die Zahl $N = \{Q\}$ der linear unabhängigen ganzen Divisoren innerhalb Q wird die *Dimension* dieser Klasse genannt.⁴⁴⁾ Die Aufstellung eines solchen Systemes und die Bestimmung der Dimension $\{Q\}$, eine Hauptaufgabe der ganzen Theorie, wird folgendermaßen einfach gelöst:

Ist \mathfrak{D}_0 ein Multiplikator für die Klasse Q , und sind $U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(N)}$ die zu $\mathfrak{G}_1, \mathfrak{G}_2, \dots, \mathfrak{G}_N$ zugeordneten Elemente der Hauptklasse, so bilden die $U^{(i)} = \frac{\mathfrak{G}_i}{\mathfrak{D}_0}$ ein vollständiges System linear unabhängiger Multipla des zu \mathfrak{D}_0 reziproken Divisors $\overline{\mathfrak{D}_0} = \frac{1}{\mathfrak{D}_0}$ innerhalb des Körpers $K(u, z)$; also können diese Vielfachen $U^{(i)} = \frac{\mathfrak{G}_i}{\mathfrak{D}_0}$ und damit auch die Divisoren $\mathfrak{G}_i = U^{(i)}\mathfrak{D}_0$ nach der p. 565, Nr. 12 auseinandergesetzten Methode rational gefunden werden. Aus diesen Betrachtungen ergeben sich leicht die Folgerungen:

Ist Q eine Divisorenklasse von der Ordnung q , deren Dimension mindestens gleich zwei ist, so kann man auf rationalem Wege eine nicht konstante Größe x innerhalb $K(u, z)$ finden, deren Grad $n_x \leq q - \{Q\} + 2$ ist. Legt man diese als unabhängige Variable zugrunde, so geht $K(u, z)$ in einen Körper von derselben Ordnung n_x über. Man kann so den Grad des Körpers stets mindestens auf $(p + 1)$ erniedrigen, wenn p das in (54a) p. 577 definierte *Geschlecht des Körpers* ist.

Eine Verallgemeinerung dieses Satzes ist das folgende wichtige Theorem:

Die Anzahl aller linear unabhängigen Multipla eines beliebigen Divisors \mathfrak{D} innerhalb einer Divisorenklasse R ist gleich der Dimension $\left\{\frac{R}{\mathfrak{Q}}\right\}$ der Klasse $\frac{R}{\mathfrak{Q}}$, wenn Q die Klasse von \mathfrak{D} bedeutet; sie ist also von der Wahl des Divisors \mathfrak{D} innerhalb seiner Klasse unabhängig. Ist also speziell Q von höherer oder von gleicher Ordnung wie R , so ist diese Anzahl stets gleich Null, es sei denn, daß $Q = R$ ist; alsdann ist sie gleich Eins.

Es sei endlich Q eine beliebige Klasse, und $\mathfrak{D} = (\mathfrak{G}_1, \mathfrak{G}_2, \dots, \mathfrak{G}_\mu)$ der größte gemeinsame Teiler aller ihrer ganzen Divisoren; dann heißt Q eine Klasse vom Teiler \mathfrak{D} ; ist $\mathfrak{D} = 1$, so wird Q eine *primitive Klasse* genannt. Es sei D die Klasse von \mathfrak{D} , so ist $Q = D\overline{Q}$ und \overline{Q} ist eine primitive Klasse. Dann bestehen für die Dimensionen von \overline{Q} und D die Gleichungen⁴⁵⁾:

$$(49) \quad \{\overline{Q}\} = \{Q\}, \quad \{D\} = 1.$$

44) D.-W., p. 254.

45) D.-W., p. 255.

III. Die zu dem Körper $K(y, x)$ gehörigen Abelschen Integrale.

Eine der wichtigsten Anwendungen der soeben entwickelten Theorie ist die Untersuchung der Integrale algebraischer Differentiale. Hier ist sie im wesentlichen identisch mit der vollständigen Betrachtung einer bestimmten Divisorenklasse, der sogenannten *Differentialklasse*.

17. Die Abelschen Integrale. Sind ξ und ξ_ξ zwei beliebige Elemente des Körpers $K(y, x)$, so wird durch die Differentialgleichung:

$$(50) \quad \frac{d\omega}{d\xi} = \xi_\xi \quad (d\omega = \xi_\xi d\xi)$$

eine neue analytische Funktion $\omega = \int \xi_\xi d\xi$ bis auf eine additive Konstante eindeutig definiert, welche *ein zu dem Körper $K(y, x)$ gehöriges Abelsches Integral* genannt wird.⁴⁶⁾ Durch gliedweise Integration der für eine endliche Umgebung einer gegebenen Stelle $\mathfrak{P}(\xi = \xi_0)$ gleichmäßig konvergierenden Potenzreihe für $\xi_\xi d\xi$ überzeugt man sich, daß sich ein *Abelsches Integral* in der Umgebung einer beliebigen Stelle \mathfrak{P} stets in der Form darstellen läßt:

$$(51) \quad \omega(\mathfrak{P}) = \rho \lg \pi + \psi(\pi),$$

wo π eine zu \mathfrak{P} gehörige Primfunktion, etwa $(\xi - \xi_0)^{\frac{1}{\alpha}}$ bzw. $\left(\frac{1}{\xi}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$ ist, und $\psi(\pi)$ wieder dem Körper $K(u, \mathfrak{p})$ der konvergenten Potenzreihen für \mathfrak{P} angehört, also höchstens eine endliche Anzahl negativer Potenzen von π enthält. Nur für eine endliche Anzahl von Stellen ist $\rho \geq 0$; diese heißen *logarithmische Stellen* von ω , und der Koeffizient ρ wird das *Residuum des Differentiales $d\omega$ für die Stelle \mathfrak{P}* genannt.

Ist ω_0 die zu der Stelle \mathfrak{P} gehörige Integrationskonstante, welche von dem Integrationswege abhängt, so soll wieder $\omega - \omega_0$ *durch den Divisor \mathfrak{P}^σ genau teilbar* heißen, wenn die Entwicklung der Differenz $\omega - \omega_0$ in der Umgebung der Stelle \mathfrak{P} im früheren Sinne die Ordnungszahl σ besitzt, oder für diese Stelle durch die σ^{te} Potenz der zugehörigen Primfunktion genau teilbar ist.

Beginnt jedoch diese Entwicklung speziell mit $\lg \pi$, so sagen wir, daß $\omega - \omega_0$ *durch $\lg \mathfrak{P}$ genau teilbar* ist, und in diesem Falle müssen wir, wie man leicht einsieht, $\omega - \omega_0$ eine unendlich kleine aber negative Ordnungszahl zuschreiben. Ein Integral ω heißt *regulär*

46) Vgl. *D.-W.*, p. 259 ff., wo eine von Kontinuitätsbetrachtungen freie Einführung der Differentialquotienten gegeben wird. Für die hier gegebene Einführung vgl. *H.-L.*, p. 269 f. und p. 287 f. [O]

an der Stelle \mathfrak{P} , wenn $\omega - \omega_0$ genau durch die erste Potenz des Primteilers \mathfrak{P} teilbar ist.

Alle zum Körper K gehörigen Integrale bilden einen in sich abgeschlossenen Bereich von im allgemeinen transzendenten Funktionen. Die Erforschung ihrer Eigenschaften und die Darstellung aller Integrale durch möglichst einfache unter ihnen ist die Aufgabe dieses dritten Abschnittes. An Stelle dieser Integralfunktionen ω selbst untersuchen wir ihre Differentiale $d\omega$, die sogenannten *Abelschen Differentiale*, und stellen sie zunächst durch die sie vollständig bestimmenden und von der Wahl der Integrationsvariablen ξ unabhängigen *Differentialteiler* dar. Hierzu führen die folgenden Betrachtungen:

18. Die Differentiale der Elemente des Körpers K und die zugehörigen Divisoren. Es seien ξ und η zwei beliebige nicht konstante Elemente von K und $F(\xi, \eta) = 0$ die zwischen ihnen bestehende irreduzible Gleichung. Dann folgt aus der Gleichung $\frac{d\eta}{d\xi} = -\frac{F'_\xi}{F'_\eta}$, daß das Verhältnis irgend zweier Differentiale $d\eta$ und $d\xi$ ebenfalls eine Größe des Körpers, also gleich einem Divisor der Hauptklasse ist, dessen Bestimmung unsere nächste Aufgabe bildet. Aus der Entwicklung von ξ und η in der Umgebung einer beliebigen Stelle \mathfrak{P} ergibt sich nun zunächst der Satz:

Sind ξ_0 und η_0 die zu ξ und η in ihrer Entwicklung in der Umgebung von \mathfrak{P} gehörigen konstanten Glieder und sind die Differenzen $\xi - \xi_0$ und $\eta - \eta_0$, bzw. durch \mathfrak{P}^d und \mathfrak{P}^e teilbar, so ist der Differentialquotient $\frac{d\eta}{d\xi}$ genau durch \mathfrak{P}^{e-d} teilbar, d. h. es ist

$$(52) \quad \frac{d\eta}{d\xi} = \Pi \mathfrak{P}^{e-d},$$

wenn die Multiplikation über alle Punkte \mathfrak{P} erstreckt wird.

Derselbe Divisor kann auf andere Weise dargestellt werden: Ist nämlich \mathfrak{R}_ξ die zu ξ gehörige Kugelfläche, sind \mathfrak{B}_ξ und n_ξ der Verzweigungsteiler von \mathfrak{R}_ξ und der Nenner von ξ , haben ferner \mathfrak{R}_η , \mathfrak{B}_η und n_η dieselbe Bedeutung für das Element η , so kann das Produkt in (52) auch in der Form $\frac{\mathfrak{B}_\eta}{n_\eta^2} : \frac{\mathfrak{B}_\xi}{n_\xi^2}$ dargestellt werden, d. h. es besteht der Satz⁴⁷⁾:

Sind ξ und η zwei beliebige Größen des Körpers K , so besteht immer die Gleichung:

$$(52 \text{ a}) \quad \frac{d\eta}{d\xi} = \frac{\mathfrak{B}_\eta}{n_\eta^2} : \frac{\mathfrak{B}_\xi}{n_\xi^2}.$$

47) D.-W., p. 263—264. [O] H.-L., p. 292.

Ordnen wir daher jedem Differentiale $d\xi$ des Körpers den algebraischen Divisor:

$$(52 \text{ b}) \quad w_\xi = \frac{\mathfrak{B}_\xi}{n_\xi^2}$$

zu, so ist das Verhältnis $\frac{d\xi}{w_\xi}$ für alle Elemente des Körpers dasselbe; und jedes Differential $d\xi$, welches zu einem Elemente ξ von $K(x, y)$ gehört, ist so durch den zugehörigen Divisor w_ξ vollständig bestimmt.

Schreiben wir jetzt ein beliebiges *Abelsches* Differential in einer der Formen $d\omega = \xi_\xi d\xi = \xi_\eta d\eta$, indem wir das eine Mal ξ , das andere Mal η als Integrationsvariable wählen, so ergibt sich für das Verhältnis der beiden Integranden ξ_ξ und ξ_η

$$\frac{\xi_\xi}{\xi_\eta} = \frac{d\eta}{d\xi} = \frac{w_\eta}{w_\xi}.$$

Also ist der algebraische Divisor:

$$(53) \quad \begin{aligned} w_\omega &= \xi_\xi w_\xi = \xi_\eta w_\eta \\ &= \xi_\xi \cdot \frac{\mathfrak{B}_\xi}{n_\xi^2} = \xi_\eta \cdot \frac{\mathfrak{B}_\eta}{n_\eta^2} \end{aligned}$$

von der Wahl der Integrationsvariablen ganz unabhängig und allein durch das Differential $d\omega$ vollständig bestimmt; daher wird der Divisor w_ω der zu $d\omega$ gehörige Differentialteiler⁴⁸⁾ genannt, und so ist auch allgemein jedes *Abelsche* Differential $d\omega$ ebenso wie vorher jedes zu einem Elemente von K gehörige Differential vollständig durch den zugehörigen Divisor w_ω bestimmt.

Durch den Differentialteiler w_ω ist das Verhalten des Integrales ω an jeder Stelle \mathfrak{P} eindeutig bestimmt. Durch geeignete Spezialisierung der Integrationsvariablen für die zu untersuchende Stelle ergibt sich nämlich leicht der Satz:

Ist \mathfrak{P} ein d -facher Divisor des zu $d\omega$ gehörigen Differentialteilers w_ω , so ist die zum Punkte \mathfrak{P} gehörige Differenz $\omega - \omega_0$ durch \mathfrak{P}^{d+1} oder durch $\lg \mathfrak{P}$ genau teilbar, je nachdem $d \geq -1$ oder $d = -1$ ist.

Ist also allgemein $\omega - \omega_0$ in einem Punkte \mathfrak{P} von der Ordnung ϱ , so ist der zugehörige Differentialteiler durch das über alle Punkte \mathfrak{P} zu erstreckende Produkt

$$(53 \text{ a}) \quad w_\omega = \prod \mathfrak{P}^{\varrho-1}$$

definiert, wenn für diejenigen Punkte, für welche ϱ negativ unendlich klein ist (vgl. Nr. 17) diese Zahl durch Null ersetzt wird.

48) *D.-W.*, p. 268. [O] *H.-L.*, p. 294.

19. Die Differentialklasse W . Betrachtet man alle *Abelschen* Differentiale ($d\omega = \xi_\xi d\xi$, $d\omega' = \xi'_\xi d\xi, \dots$) des ganzen Körpers K , so sind die zugehörigen Differentialteiler ($w_\omega, w_{\omega'}, \dots$) äquivalente Divisoren, wie aus den Gleichungen $\frac{w_\omega}{w_{\omega'}} = \frac{\xi_\xi}{\xi'_\xi} \dots$ unmittelbar folgt. Sie bilden also die sämtlichen Divisoren einer Klasse W , der sogenannten *Differentialklasse*, ebenso wie die Elemente von $K(u, z)$ die sämtlichen Divisoren der Hauptklasse ausmachen. Die Ordnung dieser Klasse ist gleich derjenigen irgend eines Divisors $\frac{\mathfrak{D}_\xi}{n_\xi}$, also gleich

$$(54) \quad w_\xi - 2n_\xi = 2p - 2,$$

wenn die ganze Zahl:

$$(54 a) \quad p = \frac{1}{2} w_\xi - n_\xi + 1,$$

das sogenannte *Geschlecht des Körpers* $K(u, z)$, als wichtigste Invariante der ganzen Theorie in die Untersuchung eingeführt wird. Es ergibt sich hier ohne weiteres, daß das Geschlecht von der Wahl der Variablen ξ innerhalb des Körpers ganz unabhängig ist.

Als Multiplikator für den Übergang von der Hauptklasse zur Differentialklasse kann man irgend einen Divisor $\frac{\mathfrak{D}_\xi}{n_\xi}$ von W wählen. Dieser Festsetzung entspricht dann die Wahl von ξ als Integrationsvariablen.

20. Die Fundamentalaufgabe in der Theorie der *Abelschen Integrale* kann nun auch analog wie in Nr. 16, p. 573 folgendermaßen ausgesprochen werden:

Es soll ein vollständiges System linear unabhängiger Differentiale ($d\omega_1, d\omega_2, \dots, d\omega_\mu$) gefunden werden, deren Divisoren w_{ω_i} Multipla eines beliebig gegebenen Divisors \mathfrak{D} sind, für welche also:

$$w_{\omega_i} = \mathfrak{D} \mathfrak{G}_{\omega_i}$$

ist, wenn die \mathfrak{G}_{ω_i} ganze Divisoren bedeuten. Oder, was dasselbe ist, es sollen alle *Abelschen* Integrale mit vorgeschriebenen Nullstellen, Polen oder logarithmischen Punkten gefunden werden.

Nach dem allgemeinen Satze auf p. 573 ist diese Anzahl der linear unabhängigen Differentialteiler für alle Divisoren \mathfrak{D} einer Klasse Q dieselbe, nämlich gleich der Dimension $\left\{ \frac{W}{Q} \right\}$ der sogenannten *Ergänzungsklasse zu Q* : $Q' = \frac{W}{Q}$. Die hier gestellte Aufgabe ist also identisch mit der Frage nach der Dimension zweier Klassen Q und Q' der Ordnungen q und q' , für welche $QQ' = W$, also $q + q' = 2p - 2$ ist. Diese Frage wird vollständig beantwortet durch die folgende Beziehung

zwischen den Ordnungs- und Dimensionszahlen zweier Ergänzungsklassen, den sogenannten *Riemann-Rochschen Satz*⁴⁹⁾:

Sind Q und Q' zwei beliebige Ergänzungsklassen, so ist stets:

$$(I) \quad \{Q\} - \frac{q}{2} = \{Q'\} - \frac{q'}{2}$$

$$(II) \quad \{Q'\} = \{Q\} - q + p - 1.$$

Von diesen Gleichungen ist jede eine Folge der anderen. Wählt man, was auf das Resultat ohne Einfluß ist, die unabhängige Variable ξ innerhalb K sowie die beiden Divisoren \mathfrak{D} und \mathfrak{D}' innerhalb Q und Q' geeignet aus, so ist der *Riemann-Rochsche Satz* eine unmittelbare einfache Folgerung aus der Beziehung zwischen einem Fundamentalsystem $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ für die Multipla des Divisors $\frac{1}{\mathfrak{D}n_\xi}$ und seinem komplementären Systeme $(\check{U}^{(1)}, \check{U}^{(2)}, \dots, \check{U}^{(n)})$, welches nach (42) ein Fundamentalsystem für die Multipla von $\frac{1}{\mathfrak{D}'n_\xi}$ wird, wenn eben \mathfrak{D} und \mathfrak{D}' so ausgewählt sind, daß $\mathfrak{D}\mathfrak{D}' = \frac{\mathfrak{D}_\xi}{n_\xi^2}$ ist.⁵⁰⁾

Wählt man für \mathfrak{D} irgend einen Divisor \mathfrak{D}_U der Hauptklasse oder setzt man ganz speziell $\mathfrak{D} = 1$, so ergibt sich als Folgerung:

Die Anzahl aller linear unabhängigen Integrale, deren Divisor w_∞ ein Multiplum einer beliebigen Funktion des Körpers $K(u, z)$ ist,

49) Die entsprechenden Entwicklungen bei *D.-W.*, p. 273—281 gestalten sich noch sehr unübersichtlich infolge der Beschränkung auf Klassen mit einer Dimension ≥ 1 . [O]

50) *H.-L.*, p. 301 f. Die Beziehung zwischen dem *Riemann-Rochschen Satz* und dem zu einem Fundamentalsystem für ganze Größen komplementären System haben zuerst *D.-W.* erkannt (*D.-W.*, p. 274—281). An allgemeinere Fundamentalsysteme (für Formen) knüpft die Untersuchung des *Riemann-Rochschen Satzes* erst *Landsberg* (*Math Ann.* 50 (1898), p. 333—380) an. Mit dem so aufgefaßten *Riemann-Rochschen Satz* stimmt sachlich das „Complementary theorem“ vollständig überein, in dem die *Fieldssche* Theorie der algebraischen Funktionen gipfelt (*J. C. Fields*, *Theorie of the algebraic functions of a complex variable* 1906); vereinfachte Darstellungen *Phil. Trans. A.* 212 (1913), p. 339—373, *International Congress of Mathematicians* (Proceed. Cambridge 1913, Vol. I, p. 312). Darin entspricht die *Inzidenzbasis* (basis of coincidences) dem Exponentensystem eines beliebigen Divisors; ist R eine beliebige Funktion des Körpers, (m_i) das Exponentensystem des entsprechenden Divisors, so sind zwei Inzidenzbasen komplementär in bezug auf die durch R gegebene Inzidenzbasis (m_i) , wenn das Produkt der entsprechenden Divisoren \mathfrak{D} und \mathfrak{D}_1 gleich $R \frac{\mathfrak{D}_z}{n_z^2}$ ist, wo z die unabhängige Variable bezeichnet. (Dann sind offenbar die Klassen von \mathfrak{D} und \mathfrak{D}_1 Ergänzungsklassen.) Und das „Complementary theorem“ gibt die Beziehung zwischen den Dimensionen der durch \mathfrak{D} und \mathfrak{D}_1 teilbaren Funktionenscharen. [O]

speziell also auch die Anzahl der unabhängigen allenthalben endlichen Integrale (*Integrale erster Gattung*), ist stets gleich dem Geschlechte p des Körpers.

Setzt man zweitens $\Omega = \frac{1}{n_\omega}$, wo n_ω einen beliebigen *ganzen* Divisor bedeutet, so ergibt sich:

Die Anzahl aller linear unabhängigen Differentiale, deren Differentialteiler einen gegebenen Nenner besitzt, ist stets gleich $\nu + p - 1$, wenn ν den Grad von n_ω bedeutet.

Aus der in Nr. 12 (p. 565) angegebenen Vorschrift ergibt sich nun ein endliches rationales Verfahren zur wirklichen Aufstellung eines vollständigen Systemes von linear unabhängigen Differentialen, deren Divisor ein Multiplum von Ω ist. Wendet man dieses auf den Fall $\Omega = 1$, also auf die Differentiale erster Gattung an, so ergibt sich folgende Vorschrift: Es möge an der Stelle p_∞ kein Verzweigungspunkt liegen. Ist dann $(U^{(1)}, U^{(2)}, \dots, U^{(n)})$ ein Fundamentalsystem für die ganzen algebraischen Funktionen von $K(u, z)$, welches für die Stelle p_∞ normal ist, und bedeutet $(\tilde{U}^{(1)}, \tilde{U}^{(2)}, \dots, \tilde{U}^{(n)})$ das komplementäre System, so ist dieses nach Nr. 12 (p. 566) ein ebenfalls für p_∞ normales Fundamentalsystem für die Multipla von $\frac{1}{\partial_x}$. Ist daher allgemein $\tilde{U}^{(i)}$ für p_∞ von der Ordnung \bar{q}_i , so bilden die

$$p = \sum_1^n \bar{q}_i - n + 1 = \frac{w}{2} - n + 1$$

Elemente

$$\tilde{U}^{(i)}, x \tilde{U}^{(i)}, \dots, x^{\bar{q}_i - 2} \tilde{U}^{(i)} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

ein vollständiges System linear unabhängiger Multipla von $\frac{n^2}{\partial_x}$, d. h. ein vollständiges System von Integranden erster Gattung.⁵¹⁾

21. Die Elementarintegrale erster, zweiter und dritter Gattung. Aus dem *Riemann-Rochschen* Satze folgt sofort, daß die Differentialklasse W primitiv ist.

51) Diese Darstellung der Integrale erster Gattung mit Hilfe der zur Normalbasis komplementären gehen zuerst *D-W.*, p. 271–273, homogen *Hensel*, *J. f. Math.* 109 (1892), p. 37; 8. f. *Math.* 117 (1896), p. 29–41; inhomogen *Baker*, *Math. Ann.* 45 (1894), p. 115 ff., *B.* 67; homogen *Landsberg*, *Math. Ann.* 50, p. 356–360, *inhomogen H.-L.*, p. 298–300. *Baur* führt die Rechnungen für hyperelliptische [*Math. Ann.* 41 (1893), p. 491] und kubische [*Math. Ann.* 43 (1893), p. 505] und besondere [*Math. Ann.* 46 (1895)] Körper durch. Über die *Bakersche* Darstellung der Integrale zweiter und dritter Gattung durch die zur Normalbasis komplementären s. *Baker*, *Math. Ann.* 44 (1894), p. 127. [O]

Man kann also stets ein Integral erster Gattung finden, welches sich in einer beliebig gegebenen Stelle \mathfrak{P} regulär verhält.

Diesem Satze kann man ebenfalls mit Hilfe des *Riemann-Roch*-schen Satzes die folgende Verallgemeinerung geben:

Ist $\mathfrak{N} = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \dots \mathfrak{P}_\nu$, ein beliebiger ganzer Divisor, dessen Ordnung ν größer als Eins ist, so ist die Divisorenklasse $(\mathfrak{N}W)$ stets primitiv, d. h. die ganzen Divisoren dieser Klasse sind teilerfremd. Dagegen besitzt für $\nu = 1$ die Klasse $(\mathfrak{P}W)$ stets den Teiler \mathfrak{P} .

Da man somit, falls $\nu > 1$ ist, in jeder Klasse $(\mathfrak{N}W)$ stets auch ein zu \mathfrak{N} teilerfremdes Element finden kann, so existiert auch stets ein Integral, dessen Differentialteiler in der reduzierten Form gleich $\frac{\mathfrak{G}}{\mathfrak{N}}$ ist. Dagegen gibt es niemals einen Differentialteiler, welcher die reduzierte Form $\frac{\mathfrak{G}}{\mathfrak{P}}$ besitzt.

In der primitiven Differentialklasse W von der Dimension p existieren genau p linear unabhängige teilerfremde ganze Divisoren oder Differentialteiler erster Gattung $(\mathfrak{G}^{(1)}, \mathfrak{G}^{(2)}, \dots, \mathfrak{G}^{(p)})$. Ist ferner \mathfrak{P}_0 ein für alle Male fest, aber sonst beliebig angenommener Punkt, und \mathfrak{P}_1 irgendein von \mathfrak{P}_0 verschiedener Divisor, so existiert innerhalb W ein sog. *Differentialteiler dritter Gattung*, welcher die reduzierte Form $\frac{\mathfrak{G}_{01}}{\mathfrak{P}_0 \mathfrak{P}_1}$ hat. Endlich existieren für jeden Primteiler \mathfrak{P} die Differentialteiler zweiter Gattung $\frac{\mathfrak{G}_2}{\mathfrak{P}^2}, \frac{\mathfrak{G}_3}{\mathfrak{P}^3}, \dots, \frac{\mathfrak{G}_\mu}{\mathfrak{P}^\mu}, \dots$

Dann zeigt man wörtlich ebenso, wie bei der Partialbruchzerlegung rationaler Funktionen, daß man jeden Divisor $\frac{\mathfrak{N}}{\mathfrak{P}}$ der Klasse W als homogene lineare Funktion dieser Differentialteiler erster, zweiter und dritter Gattung mit konstanten Koeffizienten darstellen kann, und aus dem *Riemann-Roch*-schen Satz folgt sofort, daß diese Darstellung auch nur auf eine einzige Weise möglich ist. Nennen wir die zu den elementaren Differentialteilern gehörigen Integrale *die Elementarintegrale erster, zweiter und dritter Gattung*, so folgt aus der vorigen Partialbruchzerlegung von w_ω durch Multiplikation mit $\frac{n_x^2}{\mathfrak{P}_x}$ und Integration:

Jedes *Abelsche* Integral kann auf eine einzige Weise als Summe von Elementarintegralen erster, zweiter und dritter Gattung dargestellt werden.⁵²⁾

52) *D.-W.*, p. 281—284. [O]

22. Spezialisierung für die Integrale mit rationalem Integranden. Ist der Körper $K(x, y)$ speziell vom Geschlecht Null, ist er also gleich dem rationalen Körper $K(z)$, so ist für ihn $\mathfrak{Z}_z = 1$, und zu jedem Integrale

$$\omega = \int \xi_z dz$$

mit rationalem Integranden gehört der Differentialteiler $w_\omega = \frac{\xi_z}{n_z} = \frac{\delta_\omega}{n_\omega}$ von der (-2) ten Ordnung. Die Differentialklasse $W = \left(\dots \frac{\xi_z}{n_z} \dots \right)$ besteht also aus allen und nur den Divisoren, deren Nenner zwei Primfaktoren mehr enthält als der Zähler. Hieraus folgt schon, daß es hier keine Integrale erster Gattung gibt, und daß die zu den Normalintegralen zweiter und dritter Gattung gehörigen Differentialteiler $\frac{1}{p^q}$ und $\frac{1}{pp'}$ sind, wobei $q > 1$ ist, und p einem endlichen oder dem unendlich fernen Punkte entsprechen kann. Für den rationalen Körper ergiebt sich so der folgende Satz:

Unter den Integralfunktionen rationaler Differentiale gibt es keine Integrale erster Gattung; die Elementarintegrale zweiter Gattung sind hier rationale Funktionen von z , nämlich:

$$-\frac{1}{q-1} \int \frac{dz}{(z-\alpha)^q} = \frac{1}{(z-\alpha)^{q-1}} \quad \text{oder} \quad (q+1) \int z^q dz = z^{q+1}.$$

Nur das Elementarintegral dritter Gattung ist transzendent, nämlich

$$(\alpha - \alpha') \int \frac{dz}{(z-\alpha)(z-\alpha')} = \lg \frac{z-\alpha}{z-\alpha'} \quad \text{oder} \quad \int \frac{dz}{z-\alpha'} = \lg(z-\alpha'),$$

je nachdem der Punkt $z = \alpha$ im Endlichen liegt oder der unendlich ferne Punkt ist.

IV. Die zum Körper $K(y, x)$ gehörigen algebraischen Kurven.

23. Die ebenen algebraischen Kurven und ihre singulären Punkte. Es sei wieder ein beliebiger Körper $K(u, z)$ gegeben; x, y seien irgend zwei nicht konstante Elemente desselben, und es sei

$$(55) \quad F(x, y) = 0$$

die zwischen ihnen bestehende irreduktible Gleichung, welche in bezug auf x den Grad m , für y den Grad n haben möge; ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit können wir x und y so gewählt voraussetzen, daß $K(y, x) = K(u, z)$ ist. Die Gesamtheit aller jene Gleichung befriedigenden reellen und komplexen Wertsysteme bezeichnen wir als *ein algebraisches Gebilde* und interpretieren es durch das geometrische Bild einer zu dem Körper gehörigen ebenen algebraischen Kurve \mathfrak{C} .

Jedem Punkte \mathfrak{P} der Riemannschen Fläche \mathfrak{R}_x oder \mathfrak{R}_y bzw. dem ihm zugeordneten Primteiler \mathfrak{P} entspricht dann ein endlicher oder unendlich ferner Punkt $P(x = a, y = b)$ der Kurve \mathfrak{C} . Umgekehrt gehört ein Punkt $P(a, b)$ der xy -Ebene stets und nur dann der Kurve \mathfrak{C} an, wenn die Zählerdivisoren \mathfrak{z}_{x-a} und \mathfrak{z}_{y-b} der beiden Linearfaktoren $x - a, y - b$ einen gemeinsamen Teiler besitzen. Haben diese Divisoren nur einen einzigen Primteiler \mathfrak{P} gemeinsam, entsprechen sich also P und \mathfrak{P} eindeutig, so heißt $P = (a, b)$ ein *regulärer Punkt der Kurve* \mathfrak{C} . Ist dagegen dieser gemeinsame Teiler:

$$(56) \quad \mathfrak{R} = (\mathfrak{z}_{x-a}, \mathfrak{z}_{y-b}) = \mathfrak{P}_1^{\alpha_1} \mathfrak{P}_2^{\alpha_2} \dots \mathfrak{P}_x^{\alpha_x}$$

von höherer als der ersten Ordnung, so entspricht den x Punkten $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_x$ der Kugelflächen \mathfrak{R}_x oder \mathfrak{R}_y derselbe Kurvenpunkt P ; dieser heißt dann ein *nicht regulärer oder singularer Punkt von* \mathfrak{C} .

Und zwar heißt $P = (a, b)$ ein *k-facher Kurvenpunkt*, wenn \mathfrak{z}_{x-a} und \mathfrak{z}_{y-b} einen Divisor k^{ter} Ordnung \mathfrak{R} gemeinsam haben. Ist a oder b gleich unendlich, so tritt $\frac{1}{x}$ an die Stelle von x oder $\frac{1}{y}$ an die Stelle von y , also \mathfrak{n}_x bzw. \mathfrak{n}_y an die Stelle von \mathfrak{z}_{x-a} bzw. \mathfrak{z}_{y-b} . Enthält dieser Teiler \mathfrak{R} x voneinander verschiedene Primteiler $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_x$, so gehen von dem zugehörigen Kurvenpunkte P x verschiedene *Äste* oder *Zweige* aus; die Kurve \mathfrak{C} besitzt in P eine *x-zweigige Singularität*.

Die dem Kurvenpunkte P zugeordneten Stellen $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_x$ entsprechen auf den Riemannschen Flächen \mathfrak{R}_x und \mathfrak{R}_y bzw. den Werten $x = a$ und $y = b$. Ist z. B. in (56) $\alpha_1 > 1$, so ist \mathfrak{P}_1 sowohl auf \mathfrak{R}_x als auch auf \mathfrak{R}_y mindestens ein α_1 -blättriger Verzweigungspunkt, und die Verzweigungsteiler \mathfrak{B}_x und \mathfrak{B}_y haben den gemeinsamen Teiler $\mathfrak{P}_1^{\alpha_1 - 1}$.

Ein endlicher Punkt $P = (a, b)$ ist dann und nur dann ein *k-facher Kurvenpunkt*, wenn in ihm alle Ableitungen $\frac{\partial^{g+h} F}{\partial x^g \partial y^h}$ verschwinden, für welche $g + h < k$ ist, aber mindestens eine Ableitung k^{ter} Ordnung von Null verschieden ist, wenn also in der Entwicklung:

$$(57) \quad F(x, y) = u_0 + u_1 + \dots + u_{k-1} + u_k \dots$$

nach steigenden Potenzen von $x - a$ und $y - b$ die homogenen Aggregate u_0, u_1, \dots, u_{k-1} der $0, 1, \dots, (k - 1)^{\text{ten}}$ Dimensionen identisch verschwinden, u_k aber nicht Null ist. Insbesondere ist P dann und nur dann ein *vielfacher Kurvenpunkt*, wenn die drei Funktionen $F(x, y), \frac{\partial F(x, y)}{\partial x}, \frac{\partial F(x, y)}{\partial y}$ in P verschwinden.

Jede Funktion $t_\lambda = (y - b) - \lambda(x - a)$ des Körpers $K(x, y)$ enthält ebenfalls den Divisor $\mathfrak{R} = \mathfrak{P}_1^{\alpha_1} \dots \mathfrak{P}_x^{\alpha_x}$; jeder Strahl des Strahlenbüschels $t_\lambda = 0$ mit dem Träger P trifft also jeden der den Primteilern zugeordneten in P sich schneidenden Äste mindestens in α_i in P koinzidierenden Punkten. Unter ihnen gibt es einen einzigen Strahl $t_{\lambda_i} = 0$, für welchen die Funktion t_{λ_i} mindestens durch $\mathfrak{P}_i^{\alpha_i+1}$ teilbar ist; dieser heißt *die Tangente in P* des zu \mathfrak{P}_i gehörigen Kurvenzweiges.

Besitzt also \mathcal{C} in P eine x -zweilige Singularität, so hat sie dort x verschiedene oder zusammenfallende Tangenten t_1, t_2, \dots, t_x .

Die x Richtungskoeffizienten λ_i dieser Tangenten sind die Wurzeln der Gleichung k^{ten} Grades

$$(58) \quad u_k(1, \lambda) = c_0 + c_1 \lambda + \dots + c_k \lambda^k = 0,$$

wo $u_k(x - a, y - b)$ das Aggregat der Glieder k^{ter} Dimension in (57) ist. Dann und nur dann, wenn diese Gleichung keine gleichen Wurzeln besitzt, ist P ein k -facher Punkt mit getrennten Tangenten; alsdann besitzt $\mathfrak{R} = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \dots \mathfrak{P}_k$ keine mehrfachen Primfaktoren. Für $k = 2$ erhält man so den Doppelpunkt mit getrennten Tangenten.

24. Der zur Kurve \mathcal{C} gehörige Divisor der Doppelpunkte. Zur vollständigen Charakterisierung eines beliebigen singulären Punktes führt die Zerlegung der beiden Funktionen $\frac{\partial F}{\partial x}$ und $\frac{\partial F}{\partial y}$ des Körpers $K(x, y)$ in ihre Primfaktoren, von denen wegen der zwischen ihnen bestehenden Gleichung:

$$(59) \quad - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = \frac{dy}{dx} = \frac{\mathfrak{B}_y}{\mathfrak{B}_x} = \frac{\mathfrak{n}_y^2}{\mathfrak{n}_x^2}$$

nur einer, etwa $\frac{\partial F}{\partial y}$ zu untersuchen ist.

Durch direkte Untersuchung der Nullstellen und Pole dieser Funktion ergeben sich in Verbindung mit (59) leicht die beiden Gleichungen:

$$(60) \quad - \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\mathfrak{D} \mathfrak{B}_y}{\mathfrak{n}_x^{m-2} \mathfrak{n}_y^2}, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\mathfrak{D} \mathfrak{B}_x}{\mathfrak{n}_x^2 \mathfrak{n}_y^{m-2}}.$$

Der durch diese Gleichungen vollständig bestimmte *ganze* Divisor \mathfrak{D} heißt *der zu \mathcal{C} gehörige Divisor der Doppelpunkte*, weil er alle und nur die zu singulären Punkten von \mathcal{C} gehörigen Primfaktoren in einer von der Art der Singularität abhängigen Multiplizität enthält⁵³);

53) Den Divisor der Doppelpunkte haben zuerst *D-W.*, p. 267, als *Polygon der Doppelpunkte* eingeführt, wobei jedoch von den im Unendlichen liegenden Singularitäten abgesehen wird. [O]

eine leichte Betrachtung zeigt speziell, daß für einen gewöhnlichen Doppelpunkt \mathfrak{D} genau durch das Produkt der beiden zugehörigen Primfaktoren teilbar ist. Dieser Divisor spielt in der Kurventheorie eine ähnlich wichtige Rolle, wie der Verzweigungsteiler in der Theorie der *Riemannschen* Flächen; er hängt aber von *beiden* Elementen x und y ab und bleibt nur bei *linearen* Transformationen:

$$x = \frac{\alpha\xi + \beta}{\gamma\xi + \delta}, \quad y = \frac{\alpha'\eta + \beta'}{\gamma'\eta + \delta'}$$

unverändert. Man kann \mathfrak{D} auch als Nenner der zu dem Differentiale:

$$(61) \quad d\varphi = \frac{dx}{F'_y} = -\frac{dy}{F'_x} = \frac{n_x^{m-2} n_y^{-2}}{\mathfrak{D}}$$

gehörigen Differentialteiler definieren.

Da die Ordnung irgend eines Differentialteilers nach (54) gleich $2p - 2$ ist, so folgt hieraus, daß die Ordnung $2d$ von \mathfrak{D} stets eine gerade Zahl ist, und zwar ist

$$(62) \quad d = (m - 1)(n - 1) - p,$$

während sich aus (60) die Gleichungen

$$(62a) \quad d = (m - 1)n - \frac{1}{2}w_y = (n - 1)m - \frac{1}{2}w_x$$

ergeben, weil Zähler und Nenner von F'_x und F'_y von gleicher Ordnung sind. Aus (62) geht hervor, daß die Maximalzahl $(m - 1)(n - 1)$ von Doppelpunkten nur für Kurven vom Geschlecht Null, d. h. für sog. *Unicursalkurven*, erreicht wird.

Es sei jetzt $P = (a, b)$ ein endlicher Punkt von $\mathfrak{C}, \mathfrak{P}_1$ einer der Punkte $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_v$ der *Riemannschen* Fläche \mathfrak{R}_x , welcher der Stelle p_a ($x = a$) zugeordnet ist. Wir fragen jetzt, welche Potenz von \mathfrak{P}_1 in dem Divisor \mathfrak{D} der Doppelpunkte enthalten ist, vorausgesetzt, daß der Stelle p_a kein Pol von y entspricht. Es sei dann:

$$(63) \quad F(y, x) = F_1(y)F_2(y) \dots F_v(y)$$

die Zerlegung von $F(y, x)$ für den Bereich der Stelle p_a . Sind dann $y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(v)}$ je eine Wurzel aus den zu $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_v$ gehörigen Wurzelzyklen⁵⁴), so besitzt

$$(63a) \quad \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_{y=y^{(i)}} = F_1'(y^{(1)})F_2'(y^{(1)}) \dots F_v'(y^{(1)})$$

im Punkte \mathfrak{P}_1 von \mathfrak{R}_x dieselbe Ordnungszahl, wie die Funktion:

$$(63b) \quad D(F_1)R(F_1, F_2) \dots R(F_1, F_v)$$

in dem zugeordneten Punkte p der einblättrigen Kugelfläche, wenn $D(F_1)$ die Diskriminante von $F_1(y)$, und allgemein $R(F_i, F_k)$ die Eliminationsresultante von $F_i(y)$ und $F_k(y)$ bedeutet.

54) Literatur zur Theorie der Zyklen s. B.-N., p. 381 ff.; III C 4, Nr. 14, 16. [O]

Ist nun \mathfrak{P}_1 ein α_1 -blättriger Verzweigungspunkt, also $F_1(y)$ vom α_1 -ten Grade, so ist $D(F_1)$ durch $\mathfrak{p}^{\alpha_1-1+2l_1}$, also $F_1'(y^{(1)})$ durch $\mathfrak{P}_1^{\alpha_1-1}\mathfrak{P}_1^{2l_1}$ teilbar, wo l_1 eine nicht negative ganze Zahl bedeutet. Ist ferner allgemein für $i \geq k$ $l_{ik} = l_{ki}$ die Ordnungszahl der Eliminationsresultante $R(F_i(y), F_k(y))$, so gibt dieselbe Zahl die Ordnung von $F_i(y^{(k)})$ für \mathfrak{P}_k und von $F_k(y^{(i)})$ für \mathfrak{P}_i an; l_{ik} ist immer eine nicht negative ganze Zahl, und stets und nur dann Null, wenn die zu \mathfrak{P}_i und \mathfrak{P}_k gehörigen Wurzelzyklen $y^{(i)}$ und $y^{(k)}$ verschiedene Anfangsglieder besitzen.

Also enthält $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\mathfrak{D}\mathfrak{Z}_x}{\mathfrak{n}_x^m \mathfrak{n}_y^{\beta-2}}$ den Primteiler \mathfrak{P}_1 genau in der Potenz $\mathfrak{P}_1^{\alpha_1-1+2l_1+l_2+\dots+l_1\nu}$, und das Entsprechende gilt für die ν anderen Teiler \mathfrak{P}_i . Beachtet man nun, daß \mathfrak{Z}_x genau durch $\mathfrak{P}_i^{\alpha_i-1}$ teilbar ist, während nach dem Vorhergehenden \mathfrak{n}_x und \mathfrak{n}_y keinen Faktor \mathfrak{P}_i enthalten, so ergibt sich leicht die folgende vollkommen übersichtliche Darstellung des Divisors der Doppelpunkte:

$$(64) \quad \mathfrak{D} = \prod_{g \leq h}^{(P)} (\mathfrak{P}_g \mathfrak{P}_h)^{l_{gh}},$$

wo das Produkt nur auf die singulären Punkte P der Kurve und jedesmal nur auf die Primteiler $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_x$ zu erstrecken ist, welche den x Zweigen von P entsprechen.⁵⁵⁾

Es ist leicht, die Ordnungszahlen l_{gh} durch die Exponenten der Reihenentwicklungen von y_1, y_2, \dots, y_n für die Stelle \mathfrak{p}_a auszudrücken: Es seien \mathfrak{P}_1 und \mathfrak{P}_2 für \mathfrak{K}_x Verzweigungspunkte der α_1 -ten und α_2 -ten Ordnung und

$$(65) \quad y^{(1)} - b = \lambda^{(1)}(x - a)^{\frac{b_1}{\alpha_1}} + \dots, \quad y^{(2)} - b = \lambda^{(2)}(x - a)^{\frac{b_2}{\alpha_2}} + \dots$$

je eine der zu \mathfrak{P}_1 und \mathfrak{P}_2 gehörigen konjugierten Wurzelzyklen von y . Ist also allgemein π_i die zu \mathfrak{P}_i gehörige Primfunktion, so ist für den Bereich dieses Punktes:

$$\pi_i \sim (x - a)^{\frac{1}{\alpha_i}} \sim (y - b)^{\frac{1}{\beta_i}}, \quad \text{d. h. } x - a \sim \pi_i^{\alpha_i}, \quad y - b \sim \pi_i^{\beta_i},$$

und es ist:

$$(66) \quad (x - a, y - b) \sim \Pi \mathfrak{P}_i^{m(\alpha_i, \beta_i)},$$

wo hier wie im folgenden $m(\alpha_i, \beta_i)$ die kleinere der beiden Zahlen α_i, β_i bedeutet. Ebenso ergibt sich für den gemeinsamen Teiler der beiden Verzweigungsdivisoren:

$$(66a) \quad (\mathfrak{Z}_x, \mathfrak{Z}_y) \sim (\Pi \mathfrak{P}_i^{\alpha_i-1}, \Pi \mathfrak{P}_i^{\beta_i-1}) \sim \frac{(x - a, y - b)}{\mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \dots \mathfrak{P}_x}.$$

55) Vgl. B.-N., p. 381—388. [O]

Ferner ist jede der Differenzen $y_1^{(1)} - y_i^{(1)}$ des ersten Wurzelzyklus mindestens durch $(x - a)^{\frac{b_1}{a_1}}$, jede Differenz $y_1^{(1)} - y_k^{(2)}$ von je einer zu \mathfrak{P}_1 und \mathfrak{P}_2 gehörigen Wurzel mindestens durch $(x - a)^{m\left(\frac{b_1}{a_1}, \frac{b_2}{a_2}\right)}$ teilbar. Da nun $F_1'(y_1)$ aus $a_1 - 1$ Differenzen der ersten, $F_2'(y_1)$ aus a_2 Differenzen der zweiten Art besteht, so folgt sofort, daß l_{11} mindestens gleich $(a_1 - 1)(b_1 - 1)$, l_{12} mindestens gleich $m(a_1 b_2, a_2 b_1)$ ist. Hieraus ergeben sich die folgenden Sätze:

Jeder gemeinsame Teiler \mathfrak{P}_1 von \mathfrak{Z}_x und \mathfrak{Z}_y ist auch in \mathfrak{D} enthalten.

Denn unter dieser Voraussetzung sind a_1 und b_1 beide größer als Eins, also $l_{11} > 0$.

Der kleinste Wert, welchen l_{11} erhalten kann, ist Null, und dies tritt dann und nur dann ein, wenn $m(a_1, b_1) = 1$, also a_1 oder b_1 gleich Eins ist, oder, was dasselbe ist, wenn $(x - a, y - b)$ genau durch die erste Potenz von \mathfrak{P}_1 teilbar ist.

Der kleinste Wert, welchen l_{12} für einen regulären Punkt P annehmen kann, ist Eins, und das tritt dann und nur dann ein, wenn $m(a_1 b_2, a_2 b_1) = 1$, wenn also $m(a_1, b_1) = m(a_2, b_2) = 1$ ist, und wenn außerdem $\frac{dy}{dx}$, d. h. die Steigung der Tangente, in \mathfrak{P}_1 und \mathfrak{P}_2 verschiedene Werte hat. Alsdann ist also $(x - a, y - b)$ genau durch $\mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2$ teilbar, und $(\mathfrak{Z}_x, \mathfrak{Z}_y)$ enthält diese Primfaktoren gar nicht; nur einer der beiden Punkte \mathfrak{P}_1 und \mathfrak{P}_2 kann also ein Verzweigungspunkt für \mathfrak{R}_x oder für \mathfrak{R}_y sein.

Hieraus und aus (64) folgt das Fundamentaltheorem:

Der Divisor der Doppelpunkte \mathfrak{D} enthält jeden zu einem x -zweiligen singulären Punkte $P_k = (a, b)$ gehörigen Primteiler \mathfrak{P} mindestens in der $(x - 1)^{\text{ten}}$ Potenz, und diese untere Grenze wird dann und nur dann erreicht, wenn $\mathfrak{R} = (\mathfrak{Z}_{x-a}, \mathfrak{Z}_{y-b}) = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \cdots \mathfrak{P}_x$ keine gleichen Primteiler besitzt, und wenn außerdem P_k lauter verschiedene Tangenten hat. In diesem Falle soll P_k ein *gewöhnlicher singulärer Punkt* genannt werden.

Liegen die Doppelpunkte und Verzweigungspunkte der Kurve \mathfrak{C} alle im Endlichen, und ist $D(F)$ die Diskriminante der Kurvengleichung $F = 0$, so folgt aus (60) die Gleichung:

$$(67) \quad D(F) \sim N(F'(y)) = N(\mathfrak{D} \mathfrak{Z}_x) = N(\mathfrak{D}) N(\mathfrak{Z}_x).$$

Jede zum Körper $K(x, y)$ gehörige Gleichungsdiskriminante besteht also aus zwei Faktoren, von denen der erste:

$$(67a) \quad N(\mathfrak{D}) = \left\{ \prod_{(P)} (x - a)^{\sum_{g \leq h} l_{gk}} \right\}^2$$

quadratisch ist; dieser, der sog. *außerwesentliche Diskriminantenteiler*, ist die Idealnorm des Divisors \mathfrak{D} der Doppelpunkte, der zweite, der *wesentliche Diskriminantenteiler*, ist die Idealnorm des Verzweigungsteilers, ihre Grade sind $2d$ und w_x . Sind die beiden Voraussetzungen nicht erfüllt, so treten in jenen Faktoren Graderniedrigungen ein. Dieser Satz ist eine unmittelbare Folgerung aus dem entsprechenden (60) für die Divisoren, während jener aus diesem nicht erschlossen werden kann.⁵⁶⁾

25. Auflösung der Singularitäten einer Kurve. Unter einer *regulären Kurve* verstehen wir eine Kurve mit lauter gewöhnlichen im Endlichen liegenden singulären Punkten. Für diese und nur für sie ist der Divisor der Doppelpunkte durch das über alle k -fachen Punkte

56) Die Begriffe des *wesentlichen* und des *außerwesentlichen Diskriminantenteilers* sind von *Kronecker* eingeführt worden (Discr. p. 313, s. auch Festschrift p. 22. Von dem dort entwickelten Begriff der Diskriminante der Gattung ist der Begriff des wesentlichen Diskriminantenteilers ein spezieller Fall). Bei *D.-W.*, p. 194 wird der wesentliche Diskriminantenteiler unter dem Namen der *Körperdiskriminante* eingeführt.

Ist y eine ganze algebraische Funktion n . Grades von x , und f_0, f_1, \dots, f_{n-1} eine Fundamentalbasis für die ganzen Größen von $K(y, x)$, so ist die Diskriminante Δ des Systems (f_0, \dots, f_{n-1}) der wesentliche Diskriminantenteiler von y ; es ist dann:

$$d(1, y, \dots, y^{n-1}) = \Delta R^2,$$

wo die ganze rationale Funktion R von x offenbar der Diskriminante der Substitution gleich ist, durch die die Basen $(1, y, \dots, y^{n-1})$ und $(f_0, f_1, \dots, f_{n-1})$ zusammenhängen. R^2 ist der außerwesentliche Diskriminantenteiler von y . Δ ist der *größte gemeinsame Teiler* der Diskriminanten aller ganzen Größen von $K(y, x)$. Über die Fundamentaldiskriminante (Diskriminante der Fundamentalgleichung) s. Nr. 19.

Der außerwesentliche Diskriminantenteiler der Gleichung $F(y, x) = 0$, der eine ganze algebraische Funktion y von x genügt, läßt sich auch charakterisieren als der größte von U, V unabhängige Teiler von

$$N\left(U \cdot \frac{\partial F(y, x)}{\partial y} + V \cdot \frac{\partial F(y, x)}{\partial x}\right).$$

Kronecker untersucht weiter die Verallgemeinerung der obigen Begriffsbildungen auf reduzible Gleichungen (Discr., p. 315—319) sowie auf die gebrochenen Größen der Körper (Discr., p. 327—329).

In der *Weierstraßschen* Vorlesung von 1869 (*B.-N.*, p. 375—376) werden die Begriffe des wesentlichen und des außerwesentlichen Diskriminantenteilers an die irreduzible Gleichung, der eine, im allgemeinen gebrochene Funktion des Körpers genügt, angeknüpft und mit Hilfe der Reihenentwicklungen analysiert. *Klein*, R. F. I, p. 118—121, bespricht die geometrische Bedeutung des wesentlichen und des außerwesentlichen Diskriminantenteilers. Vgl. außerdem für die geometrische Bedeutung des Diskriminantenteilers *B.-N.*, p. 389, 391. [O]

P_k erstreckte Produkt:

$$(68) \quad \mathfrak{D}(\mathfrak{C}) = \prod_{(P_k)} (\mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \dots \mathfrak{P}_k)^{l-1} \quad (\mathfrak{D}, \mathfrak{n}_x) = 1$$

dargestellt.

In jedem Körper K gibt es unendlich viele primitive Elementenpaare (ξ, η) , deren Gleichung $G(\xi, \eta) = 0$ eine reguläre Kurve ergibt. Dieser Satz folgt unmittelbar aus dem anderen, daß jede Kurve durch eine endliche Anzahl von rationalen Elementartransformationen umkehrbar eindeutig in eine reguläre Kurve übergeführt werden kann. In der Tat zeigt man leicht, daß durch geeignete Elementartransformationen der Exponent irgend eines Primteilers \mathfrak{P}_1 von \mathfrak{D} auf Null reduziert werden kann, und daß bei jenen Transformationen zu \mathfrak{D} nur solche Faktoren $(\mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \dots \mathfrak{P}_l)^{l-1}$ hinzutreten, welche l -fachen Punkten mit getrennten Tangenten entsprechen. Dieses Verfahren, welches als *Auflösung der Singularitäten* bezeichnet wird, kann auch dazu dienen, für die ursprüngliche Kurve den Divisor der Doppelpunkte zu berechnen.⁵⁷⁾

Anstatt aber die Singularitäten einer vorgelegten Kurve $F(y, x) = 0$ so sukzessive durch passend gewählte Abbildungen auf andere Kurven aufzulösen, kann man direkt zeigen, daß man unter Festhaltung von x die andere Variable y auf unendlich viele Arten durch ein anderes primitives Element η des Körpers so ersetzen kann, daß die neue Kurve $\Phi(\eta, x) = 0$ der anderen eindeutig entspricht und sogar nur gewöhnliche im Endlichen liegende Doppelpunkte hat, daß also jedem ihrer einzelnen Punkte P nur ein Teiler zweiten Grades $(\mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2)$ entspricht, \mathfrak{D} also lauter verschiedene Primfaktoren enthält.

Zu diesem Zwecke wähle ich den Grad q von η beliebig, aber größer als w_x und schreibe den Nenner $\mathfrak{n}_\eta = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \dots \mathfrak{P}_q$ beliebig aber so vor, daß auf der Riemannschen Fläche \mathfrak{R}_x die zugehörigen Punkte $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_q$ und ihre in Bezug auf x konjugierten Punkte unverzweigt, und daß auch keine zwei von ihnen einander konjugiert sind. Dann kann man auf unendlich viele Arten einen Zähler \mathfrak{z}_η so bestimmen, daß die der Variablen $\eta = \frac{\mathfrak{z}_\eta}{\mathfrak{n}_\eta}$ zugehörige Kurve $\Phi(\eta, x) = 0$ nur Doppelpunkte im Endlichen besitzt.

In der Tat, sei $(\eta^{(1)}, \eta^{(2)}, \dots, \eta^{(n)})$ ein für die Stelle $(x = \infty)$ reguläres Fundamentalsystem für das Ideal $\mathcal{J}\left(\frac{1}{\mathfrak{n}_\eta}\right)$, so sind die Ordnungszahlen $-\sigma_i$ der Elemente $\eta^{(i)}$ für die Stelle $(x = \infty)$ sämtlich ne-

57) Literaturangaben zu dieser ersten Lösungsmethode bei B.-N., p. 376—380. [O]

gative ganze Zahlen; alle Elemente η mit dem Nenner n_η sind also in der Form:

$$(69) \quad \eta = u_1 \eta^{(1)} + u_2 \eta^{(2)} + \dots + u_n \eta^{(n)}$$

enthalten, wo allgemein der Koeffizient

$$u_i = u_i^{(0)} + u_i^{(1)}x + \dots + u_i^{(\sigma_i)}x^{\sigma_i}$$

eine ganze Funktion des σ_i^{ten} Grades von x mit unbestimmten Koeffizienten ist. Durch zweckmäßige Wahl der höchsten Koeffizienten $u_i^{(\sigma_i)}$ erreicht man zunächst, daß η für die Stelle ($x = \infty$) endliche und voneinander verschiedene Werte enthält, daß also hier kein singulärer Punkt von \mathfrak{C}_η auftritt.

Sei nun $\Phi(\eta, x) = 0$ die Gleichung, der die Form (69) zunächst für unbestimmte u_i genügt, und

$$(70) \quad \Phi(\eta, x) = \Phi_1(\eta, x) \Phi_2(\eta, x) \dots \Phi_\nu(\eta, x)$$

die Zerlegung ihrer linken Seite in irreduzible Faktoren für den Bereich einer beliebigen endlichen Stelle \mathfrak{p} ($x = \alpha$), so folgt aus der Gleichung:

$$(70a) \quad \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \eta} \right)_{\eta = \eta_1} = \Phi_1'(\eta_1, x) \Phi_2(\eta_1, x) \dots \Phi_\nu(\eta_1, x)$$

durch Diskussion der rechts auftretenden Linearfaktoren, daß für *unbestimmte* u_i alle ν oben in (64) auftretenden Exponenten $l_{11}, l_{12}, \dots, l_{1\nu}$ Null sind, daß also alle unendlich vielen Kurven $\Phi(\eta, x) = 0$ nicht etwa einen *festen* Doppelpunkt gemeinsam haben können. Ferner geht ebenfalls aus der Untersuchung der einzelnen Linearfaktoren von (70a) hervor, daß, falls es durch zweckmäßige Wahl einer Konstanten $u_x^{(i)}$ bewirkt ist, daß die Kurve $\Phi = 0$ an einer bestimmten Stelle einen singulären Punkt hat, die übrigen stets so gewählt werden können, daß der zugehörige Primdivisor \mathfrak{P} ein einfacher Teiler von \mathfrak{D} ist, also einem gewöhnlichen Doppelpunkt entspricht.

Geht man also in der Gleichung (70a) zur Norm über und beachtet (67), so ergibt sich für unbestimmte $u_i^{(x)}$ eine Gleichung:

$$(71) \quad D(\Phi) = N(\mathfrak{D}_\Phi) N(\mathfrak{B}_x) = U^2(u_x^{(i)}) N(\mathfrak{B}_x),$$

und nach dem oben Bewiesenen ist $U(u_x^{(i)}) = \sqrt{N(\mathfrak{D}_\Phi)}$ eine primitive rationale Form, welche für unbestimmte $u_x^{(i)}$ keinen einzigen quadratischen Faktor besitzt. Wählt man also, was auf unendlich viele Arten geschehen kann, diese Konstanten so, daß auch für sie $U(u_x^{(i)})$ nur ungleiche Linearfaktoren hat, so besitzt für das so bestimmte η die Kurve $\Phi(\eta, x) = 0$ wirklich lauter gewöhnliche Doppelpunkte.⁵⁸⁾

58) Die Auflösung der Singularitäten einer ebenen Kurve ist zuerst von *Kronecker* gegeben, jedoch erst 1881 veröffentlicht worden (Discr., p. 301—305, 326, vgl. auch *B.-N.*, p. 370—375). Durch die von *Kronecker* veröffentlichte Methode,

26. Die zu einer Gleichung $F(x, y)$ gehörigen Funktionenringe. Sind x und y zwei beliebige Elemente des Körpers K , so konstituiert die Gesamtheit $R(x, y)$ aller ganzen rationalen Funktionen von x und y einen Teilbereich von K , welcher nach *Dedekind* eine *Ordnung*, nach *Hilbert* ein *Ring* genannt wird. Die Addition, Subtraktion und Multiplikation der Funktionen eines Ringes liefert wieder Elemente desselben; für die Division ist dies im allgemeinen nicht der Fall. Ist

$G(x, y) = \frac{\beta_G}{n_G}$ die Zerlegung eines solchen Ringelementes in seine Prim-

faktoren, so bestimmt der Zähler das Schnittpunktsystem der Kurve $G = 0$ mit der Grundkurve $F = 0$; die Untersuchung solcher Schnittpunktsysteme führt mit Notwendigkeit auf die Betrachtung von Funktionsringen. Die Frage, ob ein gegebenes Element η des Körpers $K(x, y)$ dem Ringe $R(x, y)$ angehört oder nicht, wird durch den folgenden wichtigen Satz beantwortet:

Wenn die zwischen x und y bestehende irreduktible Gleichung $F(x, y) = 0$ in bezug auf jene Variablen bzw. vom m^{ten} und n^{ten} Grade ist, und \mathfrak{D} den Divisor ihrer Doppelpunkte bedeutet, so gehört jedes Multiplum von \mathfrak{D} dem Ringe $R(x, y)$ an. Allgemeiner gehört auch jedes Multiplum von $\frac{\mathfrak{D}}{n_x^\mu n_y^\nu}$ für $\mu < m$ und $\nu < n$ ebenfalls zu $R(x, y)$, und zwar ist es in bezug auf x und y bzw. vom μ^{ten} und ν^{ten} Grade.

Der Beweis beruht auf dem wichtigen Hilfssatze, welcher später (Nr. 41) auch für den Beweis des *Abelschen* Theorems von grundlegender Bedeutung ist:

Ist der Nenner einer Funktion

$$(72) \quad \varphi = \frac{\mathfrak{B}_\varphi}{\mathfrak{B}_x n_x^\mu}$$

das Produkt aus dem Verzweigungsteiler \mathfrak{B}_x und einer nicht negativen Potenz von n_x , so ist ihre Spur eine ganze Funktion μ^{ten} Grades von x .

die sich im wesentlichen mit der im Text zuletzt angegebenen deckt, werden jedoch im allgemeinen nur die im Endlichen liegenden singulären Punkte aufgelöst, da in ihr als neue Variable für y eine ganze Funktion von x eingeführt wird. Die im Text angegebene Methode zuerst bei *H.-L.*, p. 402–409. Die *Kroneckersche* Methode benutzt die Reihenentwicklungen nicht und kann daher zum Existenzbeweis für Reihenentwicklungen verwendet werden. Die von *Weierstrass* mit Hilfe von Reihenentwicklungen erhaltenen Resultate gebraucht *Thomé* (*J. f. Math.* 126, p. 95) zur Auflösung der Singularitäten. [O]

Ist zum Beispiel:

$$(72a) \quad u = \int \varphi dx$$

irgendein Integral erster Gattung, also $\varphi = \frac{\mathfrak{G}n^2}{\mathfrak{B}_x}$, so folgt aus der Gleichung:

$$(72b) \quad \varphi \cdot \frac{\partial F}{\partial y} = \mathfrak{G} \frac{n^2}{\mathfrak{B}_x} \cdot \frac{\mathfrak{D}\mathfrak{B}_x}{n_x n_y^{n-2}} = \mathfrak{G} \cdot \frac{\mathfrak{D}}{n_x^{m-2} n_y^{n-2}} = g(x, y)$$

daß dieses Produkt eine ganze Funktion des Ringes, daß also jeder Integrand erster Gattung in der Form:

$$(72c) \quad \varphi = \frac{g(x, y)}{F'_y}$$

dargestellt werden kann, deren Zähler eine ganze Funktion des $(m-2)$ ten Grades in x , des $(n-2)$ ten in y ist, welche durch \mathfrak{D} teilbar ist, so daß die sog. *adjungierte* Kurve $g(x, y) = 0$ in diesem präziseren Sinne durch die singulären Punkte der Grundkurve hindurchgehen muß, wenn $\frac{g}{F'_y}$ einen Integranden erster Gattung liefern soll.

27. Darstellung der zum Körper K gehörigen Kurven durch homogene Koordinaten. Nach (48)ff., p. 572, besteht zwischen drei beliebigen linear unabhängigen äquivalenten Divisoren $\mathfrak{D}_0 = \mathfrak{M}\mathfrak{A}_0$, $\mathfrak{D}_1 = \mathfrak{M}\mathfrak{A}_1$, $\mathfrak{D}_2 = \mathfrak{M}\mathfrak{A}_2$ stets eine homogene irreduktible Gleichung:

$$(73) \quad \Phi(\mathfrak{D}_0, \mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2) = 0$$

mit konstanten Koeffizienten, deren Dimension gleich dem Grade n der Klasse $A = (\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)$ ist, und welche z. B. in bezug auf \mathfrak{D}_0 bis zum Grade von $\frac{\mathfrak{D}_1}{\mathfrak{D}_2}$ ansteigt, usw. Sind speziell:

$$(74) \quad x_0 = \frac{\mathfrak{A}_0}{\mathfrak{A}}, \quad x_1 = \frac{\mathfrak{A}_1}{\mathfrak{A}}, \quad x_2 = \frac{\mathfrak{A}_2}{\mathfrak{A}}$$

drei beliebige, linear unabhängige Elemente des Körpers, welche so ausgewählt sind, daß $K(x_0, x_1, x_2) = K(x, y)$ ist, und ist $F(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2) = 0$ die zwischen ihnen bestehende irreduktible Gleichung, so ist auch

$$F(x_0, x_1, x_2) = 0$$

die Gleichung einer algebraischen Kurve des Körpers $K(x, y)$ in homogenen Koordinaten, bezogen auf das Koordinatendreieck ($x_0 = 0, x_1 = 0, x_2 = 0$), dessen Seiten die Grundkurve in denjenigen Punkten schneiden, welche den Primteilern von $\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$ zugeordnet sind. Ist $G(x_0, x_1, x_2) = 0$ eine andere Kurve m ten Grades, so liefert der ganze Divisor mn ten Grades $G(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)$ die mn Schnittpunkte dieser Kurve mit der Grundkurve $F(x_0, x_1, x_2) = 0$. Speziell bestimmen die Divisoren der Schar $c_0\mathfrak{A}_0 + c_1\mathfrak{A}_1 + c_2\mathfrak{A}_2$ die Schnittpunkte aller Geraden

$c_0x_0 + c_1x_1 + c_2x_2 = 0$ der Ebene mit der Grundkurve. Einer Transformation:

$$(75) \quad \mu y_i = \sum_k a_{ik} x_k \quad (i, k = 0, 1, 2)$$

der homogenen Koordinaten mit nicht verschwindender Determinante $|a_{ik}|$ entspricht die Substitution:

$$(75a) \quad \mathfrak{B}_i = \sum_k a_{ik} \mathfrak{A}_k,$$

bei welcher die Basis $(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)$ der Divisorenschar $c_0\mathfrak{A}_0 + c_1\mathfrak{A}_1 + c_2\mathfrak{A}_2$ durch die äquivalente Basis $(\mathfrak{B}_0, \mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2)$ ersetzt wird.

Sind allgemeiner vier linear unabhängige Funktionen x_0, x_1, x_2, x_3 innerhalb K so gegeben, daß

$$K(x_0, x_1, x_2, x_3) = K(x, y)$$

ist, so entspricht jedem Punkte \mathfrak{P} der Riemannschen Fläche ein Punkt P einer algebraischen Raumkurve R mit den Tetraederkoordinaten (x_0, x_1, x_2, x_3) , und diese Beziehung ist im allgemeinen, d. h. mit Ausnahme einzelner Punkte eindeutig. Ist allgemein:

$$x_i = \frac{\mathfrak{A}_i}{\mathfrak{A}}$$

die Divisorendarstellung jener vier Funktionen, deren Zähler also ganze teilerfremde Divisoren derselben Klasse A sind, und ist n die Ordnung von A , so schneidet jede Fläche $G(x_0, x_1, x_2, x_3) = 0$ die Kurve R in allen und nur den Punkten, welche dem Divisor: $G(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \mathfrak{A}_3)$ entsprechen. Speziell schneidet jede Ebene $c_0x_0 + c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 = 0$ diese Kurve in den n Punkten, welche dem ganzen Divisor n^{ter} Ordnung $c_0\mathfrak{A}_0 + c_1\mathfrak{A}_1 + c_2\mathfrak{A}_2 + c_3\mathfrak{A}_3$ zugeordnet sind. Die Kurve R hat also die Ordnung n .

Sind endlich ganz allgemein: $\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_s$ ($s + 1$) linear unabhängige Divisoren einer Klasse A und x_0, x_1, \dots, x_s die ihnen bei irgendeiner Wahl des Multiplikators \mathfrak{A} zugeordneten Funktionen des Körpers, so wird durch die Proportion:

$$x_0 : x_1 : \dots : x_s = \mathfrak{A}_0 : \mathfrak{A}_1 : \dots : \mathfrak{A}_s,$$

eine Kurve R_s im Raume von s Dimensionen bestimmt. Diese Kurve kann in keinem Raum niedrigerer Dimension gelegen sein, weil zwischen den x_i keine lineare homogene Gleichung besteht; ihre Ordnung ist, wie genau wie vorher bewiesen wird, gleich der Ordnung der Klasse A , vorausgesetzt, daß der Körper $K(x_0, x_1, \dots, x_s)$ gleich $K(x, y)$ ist.

Die Divisoren $(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_s)$ können ebenso wie vorher im Falle der ebenen Kurve durch lineare Gleichungen von der Form:

$$\mathfrak{B}_i = \sum_k a_{ik} \mathfrak{A}_k$$

transformiert werden. Eine solche Substitution entspricht einer Ver-

legung des Koordinatentetraeders oder einer kollinearen räumlichen Abbildung der Kurve.⁵⁹⁾

Wir beschäftigen uns zunächst mit den ebenen Kurven des Körpers $K(x, y)$, bemerken aber, daß die hier abgeleiteten Resultate auch auf die Kurven in höheren Mannigfaltigkeiten ausgedehnt werden können.

Ein Punkt $P = (a_0, a_1, a_2)$ der Ebene liegt stets und nur dann auf der Grundkurve, wenn die drei Determinanten der Matrix

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ \mathfrak{A}_0 & \mathfrak{A}_1 & \mathfrak{A}_2 \end{pmatrix}$$

einen gemeinsamen Teiler \mathfrak{R} enthalten. P ist ein k facher κ -zweigiger Punkt der Kurve, wenn \mathfrak{R} von der k^{ten} Ordnung ist und κ verschiedene Primfaktoren enthält, wenn also

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{P}_1^{h_1} \mathfrak{P}_2^{h_2} \dots \mathfrak{P}_\kappa^{h_\kappa}$$

und $h_1 + h_2 + \dots + h_\kappa = k$ ist.

Man erhält die zu den κ Zweigen von P zugehörigen Tangenten, wenn man in dem Büschel

$$\begin{vmatrix} b_0 + \lambda c_0 & b_1 + \lambda c_1 & b_2 + \lambda c_2 \\ a_0 & a_1 & a_2 \\ x_0 & x_1 & x_2 \end{vmatrix} = 0$$

59) Es werde hier kurz auf den Zusammenhang der Kleinschen Formentheorie mit der Divisorentheorie eingegangen: Ist $z = \frac{\mathfrak{D}_1}{\mathfrak{D}_2}$ die unabhängige Variable, und spaltet man sie in einen Quotienten von x_1 und x_2 , so daß $z = \frac{x_1}{x_2}$ ist, so verschwindet x_1 in allen Punkten von \mathfrak{D}_1 , x_2 in allen Punkten von \mathfrak{D}_2 . Ist \mathcal{A} die Klasse von \mathfrak{D}_1 und \mathfrak{D}_2 , so entspricht jedem ganzen Divisor von \mathcal{A} ($r > 0$) eine Form r^{ter} Dimension, die gerade in den Punkten jenes Divisors verschwindet. Jede Funktion des Körpers ist dann als Quotient von zwei ganzen Formen darstellbar. Läßt sich ein ganzer Divisor ganz und rational in $\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2$ darstellen, so ist die entsprechende Form rational in x_1, x_2 . Den übrigen Divisoren der Klassen \mathcal{A} entsprechen algebraische Formen. Benutzt man die Formentheorie und unterscheidet nicht zwischen rationalen und algebraischen Formen, so kommt dies auf die Auszeichnung der Klasse \mathcal{A} hinaus. Unterscheidet man zwischen rationalen und algebraischen Formen, so wird die Teilschar $c_1 \mathfrak{D}_1 + c_2 \mathfrak{D}_2$ von \mathcal{A} ausgezeichnet. Vgl. für die Einführung der Formentheorie Hensel, Jahresber. d. D. M. V., 1 (1892), p. 4, J. f. Math. 109 (1892), p. 56, Acta Math. 18 (1894), p. 247 ff. und besonders Klein, R. F. I., p. 100—101, 114—117, 122—136, 142—148. Ebenda p. 173—185 behandelt Klein auch rationale und algebraische Formen mit mehr als zwei Variablen. Im Anschluß daran behandelt dann Klein die Fragestellung, sämtliche Kurven, die zur vorgegebenen Riemannschen Fläche (oder arithmetisch zum vorgegebenen Körper) gehören, herzustellen und zu untersuchen. R. F. I., p. 179—181; II p. 63—66, 78 ff., p. 115—117. [O]

der durch P gehenden Strahlen den Parameter λ so bestimmt, daß der Divisor:

$$\left| \begin{array}{ccc} b_0 + \lambda c_0, & b_1 + \lambda c_1, & b_2 + \lambda c_2 \\ a_0 & , & a_1 & , & a_2 \\ \mathfrak{A}_0 & , & \mathfrak{A}_1 & , & \mathfrak{A}_2 \end{array} \right|$$

je einen der κ Primteiler $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_\kappa$ öfter als \mathfrak{K} enthält.

Sind $\mathfrak{B}_{\mathfrak{A}_1:\mathfrak{A}_2}, \mathfrak{B}_{\mathfrak{A}_2:\mathfrak{A}_0}, \mathfrak{B}_{\mathfrak{A}_0:\mathfrak{A}_1}$ die zu den Körperfunktionen $\frac{\mathfrak{A}_1}{\mathfrak{A}_2}, \frac{\mathfrak{A}_2}{\mathfrak{A}_0}, \frac{\mathfrak{A}_0}{\mathfrak{A}_1}$ gehörigen Verzweigungsteiler, so ist allgemein:

$$(76) \quad \frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{\overline{\mathfrak{D}} \mathfrak{B}_{\mathfrak{A}_{i+1}:\mathfrak{A}_{i+2}}}{\mathfrak{A}_i^{n-1}} \quad (i \equiv 0, 1, 2 \pmod{3})$$

$$(76a) \quad \frac{\partial F(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)}{\partial \mathfrak{A}_i} = \overline{\mathfrak{D}} \mathfrak{B}_{\mathfrak{A}_{i+1}:\mathfrak{A}_{i+2}},$$

wo hier wie im folgenden die Indizes stets durch ihre kleinsten Reste modulo 3 zu ersetzen sind. Der so bestimmte ganze Divisor $\overline{\mathfrak{D}}$ ist der Divisor der Doppelpunkte im projektiven Sinne.

Ein Kurvenpunkt P ist nämlich dann und nur dann singulär, wenn seine Primfaktoren \mathfrak{P}_i in $\overline{\mathfrak{D}}$ vorkommen, und sie treten auch hier in einer bestimmten von der Beschaffenheit der Singularität abhängigen Multiplizität auf.

Da jeder der Verzweigungsteiler \mathfrak{B} vom Grade $2(p + n - 1)$ ist, und die in (76a) links stehenden Divisoren den Grad $n(n - 1)$ besitzen, so ergibt sich für den halben Grad \bar{d} von $\overline{\mathfrak{D}}$ die Gleichung:

$$(77) \quad \bar{d} = \frac{1}{2}(n - 1)(n - 2) - p, \quad p = \frac{1}{2}(n - 1)(n - 2) - \bar{d}.$$

Für den Fall gewöhnlicher Doppelpunkte ist \bar{d} die Anzahl derselben, und man erhält also das Geschlecht der Kurve, wenn man die Anzahl der wirklich vorhandenen Doppelpunkte von der Maximalzahl $\frac{1}{2}(n - 1)(n - 2)$ abzieht, welche eine irreduktible Kurve n^{ter} Ordnung haben kann.

Ist $C = (c_0, c_1, c_2)$ ein beliebiger Punkt der Ebene, also

$$(78) \quad \Delta_C(F) = c_0 \frac{\partial F}{\partial x_0} + c_1 \frac{\partial F}{\partial x_1} + c_2 \frac{\partial F}{\partial x_2} = 0$$

die Gleichung der ersten Polare von C in bezug auf die Grundkurve, so wird ihr Schnittpunktssystem mit der Grundkurve durch den Zählerdivisor von $\Delta_C(F)$

$$(78a) \quad c_0 \frac{\partial F}{\partial \mathfrak{A}_0} + c_1 \frac{\partial F}{\partial \mathfrak{A}_1} + c_2 \frac{\partial F}{\partial \mathfrak{A}_2} = \overline{\mathfrak{D}}(c_0 \mathfrak{B}_{\mathfrak{A}_1:\mathfrak{A}_2} + c_1 \mathfrak{B}_{\mathfrak{A}_2:\mathfrak{A}_0} + c_2 \mathfrak{B}_{\mathfrak{A}_0:\mathfrak{A}_1})$$

repräsentiert, und aus dieser Darstellung folgt der Satz:

Das Netz aller ersten Polaren schneidet auf der Grundkurve Punktsysteme aus, welche einen festen, dem Divisor $\overline{\mathfrak{D}}$ genau entsprechenden Bestandteil besitzen.

Der Divisor $\overline{\mathfrak{D}}$ der Doppelpunkte kann als Nenner eines auf die Kurve bezüglichen Differentialteilers definiert werden: Aus der Auflösung der beiden Gleichungen:

$$x_0 \frac{\partial F}{\partial x_0} + x_1 \frac{\partial F}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial F}{\partial x_2} = 0, \quad dx_0 \frac{\partial F}{\partial x_0} + dx_1 \frac{\partial F}{\partial x_1} + dx_2 \frac{\partial F}{\partial x_2} = 0$$

folgt nämlich, daß das Differential:

$$(79) \quad dM = \frac{x_1 dx_2 - x_2 dx_1}{\frac{\partial F}{\partial x_0}} = \frac{x_2 dx_0 - x_0 dx_2}{\frac{\partial F}{\partial x_1}} = \frac{x_0 dx_1 - x_1 dx_0}{\frac{\partial F}{\partial x_2}}$$

zu dem Differentialteiler $\frac{\mathfrak{A}^{n-3}}{\mathfrak{D}}$ gehört, wenn \mathfrak{A} der Generalnenner von x_0, x_1, x_2 ist. Bedeuten also (a_0, a_1, a_2) beliebige Konstanten, so folgt aus den vorigen Gleichungen der allgemeinere Ausdruck für dasselbe Differential:

$$(79a) \quad dM = \frac{\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ x_0 & x_1 & x_2 \\ dx_0 & dx_1 & dx_2 \end{vmatrix}}{a_0 \frac{\partial F}{\partial x_0} + a_1 \frac{\partial F}{\partial x_1} + a_2 \frac{\partial F}{\partial x_2}} \sim \frac{\mathfrak{A}^{n-3}}{\mathfrak{D}}.$$

Aus dieser Darstellung ergibt sich einmal, daß der Divisor $\frac{\mathfrak{A}^{n-3}}{\mathfrak{D}}$, also auch sein Nenner, der Divisor der Doppelpunkte, bei beliebiger linearer Transformation des Koordinatensystemes ungeändert bleibt, weil dasselbe von dem Ausdrucke (79a) von dM gilt. Ferner folgt aus derselben Gleichung sofort, daß das allgemeinste auf die Kurve $F=0$ bezügliche Abelsche Integral in der von *Aronhold* eingeführten Form:

$$(80) \quad I = \int \theta(x_0, x_1, x_2) \frac{\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ x_0 & x_1 & x_2 \\ dx_0 & dx_1 & dx_2 \end{vmatrix}}{a_0 \frac{\partial F}{\partial x_0} + a_1 \frac{\partial F}{\partial x_1} + a_2 \frac{\partial F}{\partial x_2}} = \int \theta(x_0, x_1, x_2) dM$$

dargestellt werden kann, in welcher θ eine beliebige ganze oder gebrochene Funktion der $(n-3)$ ten Ordnung ist; denn so wird der zugehörige Differentialteiler

$$(80a) \quad dI \sim \frac{\theta(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)}{\mathfrak{D}}$$

von dem akzessorischen Nenner \mathfrak{A} unabhängig.

Die Übertragung der in Nr. 26 gefundenen Resultate auf die durch die Gesamtheit aller ganzen homogenen Funktionen von x_0, x_1, x_2 konstituierten Funktionenringe ergibt leicht das folgende Resultat:

Eine Funktion des Körpers, welche ein Vielfaches des Divisors $\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{A}^r}$ ist, ist als ganze homogene Funktion r ter Ordnung von (x_0, x_1, x_2) darstellbar,

oder in anderer Form ausgesprochen:

Bedeutet A die Klasse der ganzen Divisoren $(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)$, so kann jeder Divisor der Klasse A , welcher ein Multiplum von \mathfrak{D} ist, als ganze homogene Funktion ν^{ter} Ordnung von $\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$ dargestellt werden.⁶⁰⁾

Eine homogene Gleichung ν^{ter} Ordnung $\Phi_\nu(x_0, x_1, x_2) = 0$, deren Zählerdivisor $\Phi_\nu(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)$ durch \mathfrak{D} teilbar ist, stellt eine durch die Doppelpunkte der Grundkurve hindurchgehende Kurve dar, welche auch hier eine zu jener *adjungierte Kurve* genannt wird.

Ist wieder A die durch die Zählerdivisoren $(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)$ von (x_0, x_1, x_2) konstituierte Klasse, so heißt von zwei ganzen Divisoren \mathfrak{R} und \mathfrak{S} jeder *ein Rest* des anderen, in bezug auf die Grundkurve $F(x_0, x_1, x_2) = 0$, wenn das Produkt $\mathfrak{D}\mathfrak{R}\mathfrak{S}$ ein Divisor irgendeiner der Klassen A^m , also nach dem soeben angegebenen Satze in der Form $\mathfrak{P}_m(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)$ einer ganzen homogenen Funktion irgendeiner m^{ten} Ordnung von $(\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)$ darstellbar ist. Dann ist also das dem Divisor $\mathfrak{D}\mathfrak{R}\mathfrak{S}$ entsprechende Punktsystem der vollständige Schnitt der Grundkurve und der adjungierten Kurve $\mathfrak{P}(x_0, x_1, x_2) = 0$.

Die auf p. 570 eingeführte Klasseneinteilung der algebraischen Divisoren modulo A gibt ein Mittel, die Beziehungen aller Reste in bezug auf die Grundkurve einfach auszusprechen: Sind nämlich \overline{D}_A, R_A, S_A die Klassen, welche alle zu $\mathfrak{D}, \mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ modulo A äquivalenten Divisoren enthalten, so besteht zwischen ihnen die Gleichung:

$$(81) \quad R_A S_A = \overline{D}_A^{-1}.$$

Von zwei solchen Klassen R_A und S_A soll jede die *Residualklasse* der anderen genannt werden. Zwei ganze Divisoren \mathfrak{R} und \mathfrak{R}' heißen nun *korresidual*, wenn sie beide Reste eines und desselben Divisors \mathfrak{S} sind. Dies ist dann und nur dann der Fall, wenn \mathfrak{R} und \mathfrak{R}' beide der Residualklasse R_A zu der durch \mathfrak{S} bestimmten Klasse S_A angehören.

Die Gesamtheit aller zu einem beliebigen Divisor R korresidualen Divisoren bilden alle ganzen Divisoren der zugehörigen Klasse R_A .

Hieraus folgt unmittelbar der Satz, welcher eine der fruchtbarsten Quellen für die Ergründung der Eigenschaften der auf höheren algebraischen Kurven gelegenen Punktgruppen bildet:

Sind vier ganze Divisoren $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}', \mathfrak{S}, \mathfrak{S}'$ so beschaffen, daß durch die drei zu den Divisoren $\mathfrak{R}\mathfrak{S}, \mathfrak{R}'\mathfrak{S}, \mathfrak{R}'\mathfrak{S}'$ gehörigen Punktgruppen

⁶⁰⁾ Zur Fragestellung in der Sprache der Formentheorie vgl. *Klein*, R. F. I, p. 175–179. [O]

je eine adjungierte Kurve bestimmt wird, so wird auch durch $\mathfrak{R}'\mathfrak{S}'$ eine adjungierte Kurve festgelegt.

Unter dieser Voraussetzung sind nämlich \mathfrak{R} und \mathfrak{R}' korresidual zu \mathfrak{S} , und \mathfrak{S} und \mathfrak{S}' korresidual zu \mathfrak{R} .

28. Die Differentialteiler einer Divisorenschar und ihre Anwendung in der Geometrie. Die Plücker'schen Formeln.⁶¹⁾ Sind (x_0, x_1, x_2) die homogenen Punktkoordinaten einer ebenen Kurve, so sind die Linienkoordinaten ihrer Tangente im Punkte $P = (x_0, x_1, x_2)$ die drei Unterdeterminanten zweiter Ordnung der Matrix:

$$(82) \quad \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ \frac{dx_0}{d\xi} & \frac{dx_1}{d\xi} & \frac{dx_2}{d\xi} \end{pmatrix},$$

wenn ξ irgendeine Funktion des Körpers ist, welche wir als unabhängige Variable wählen; denn diese Linie verbindet ja P mit einem benachbarten Kurvenpunkte. Soll P ein Wendepunkt der Kurve sein, so muß für ihn:

$$(82a) \quad \Delta = \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ \frac{dx_0}{d\xi} & \frac{dx_1}{d\xi} & \frac{dx_2}{d\xi} \\ \frac{d^2x_0}{d\xi^2} & \frac{d^2x_1}{d\xi^2} & \frac{d^2x_2}{d\xi^2} \end{vmatrix} = 0 \quad \text{sein.}^{62)}$$

Sind allgemeiner (x_0, x_1, x_2, x_3) die homogenen Koordinaten des Punktes P einer Raumkurve R , so sind die *Plücker'schen* Linienkoordinaten ihrer Tangente in P , d. h. der Verbindungslinie von P mit einem benachbarten Kurvenpunkte proportional den sechs Determinanten zweiter Ordnung der Matrix:

$$(82b) \quad \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ \frac{dx_0}{d\xi} & \frac{dx_1}{d\xi} & \frac{dx_2}{d\xi} & \frac{dx_3}{d\xi} \end{pmatrix}.$$

Ebenso sind die homogenen Koordinaten ihrer Schmiegungebene in P , welche durch P und zwei benachbarte Kurvenpunkte hindurchgeht, die vier Unterdeterminanten dritter Ordnung der Matrix:

$$(82c) \quad \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ \frac{dx_0}{d\xi} & \frac{dx_1}{d\xi} & \frac{dx_2}{d\xi} & \frac{dx_3}{d\xi} \\ \frac{d^2x_0}{d\xi^2} & \frac{d^2x_1}{d\xi^2} & \frac{d^2x_2}{d\xi^2} & \frac{d^2x_3}{d\xi^2} \end{pmatrix}.$$

61) Die Methoden dieses Abschnittes wurden teilweise *H.-L.*, p. 438—459 angegeben. Vollständig dargelegt *Hensel*, Über die Invarianten algebraischer Körper, *J. f. Math.* 149 (1919), p. 125—146.

62) *G. Landsberg* (*J. f. Math.* 131 [1906], p. 152 ff.) gibt die Divisorendarstellung der *Hesseschen* Determinante, die zur Kurve gehört, und vergleicht sie mit der Divisorendarstellung von Δ . [O]

Soll endlich die Schmiegeebene in P vier konsekutive Punkte mit R gemeinsam haben, soll sie also eine Wendeberührungsebene der Kurve sein, so muß für P die Gleichung:

$$(82d) \quad \left| \frac{d^i x_k}{d\xi^i} \right| = 0 \quad (i, k = 0, 1, 2, 3)$$

erfüllt sein.

Genau entsprechende Überlegungen gelten für algebraische Kurven im Raume von s Dimensionen. Die hier auftretenden Funktionen (82)—(82d) gehören alle dem Körper $K(x, y)$ an, unterscheiden sich aber von den früher betrachteten dadurch, daß sie auch die Ableitungen der in ihnen auftretenden Funktionen enthalten.

Um die allgemeinsten Funktionen dieser Art zu umfassen, legen wir $(s + 1)$ Funktionen des Körpers (x_0, x_1, \dots, x_s) zugrunde; ist dann ξ irgendeine nicht konstante Funktion desselben, so betrachten wir eine beliebige, z. B. eine ganze rationale Funktion der $(s + 1)(s + 1)$ Funktionen der folgenden Matrix:

$$(82e) \quad \left(\frac{d^\lambda x_i}{d\xi^\lambda} \right) = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & \dots & x_s \\ \frac{dx_0}{d\xi} & \frac{dx_1}{d\xi} & \dots & \frac{dx_s}{d\xi} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{d^s x_0}{d\xi^s} & \frac{d^s x_1}{d\xi^s} & \dots & \frac{d^s x_s}{d\xi^s} \end{pmatrix} \quad \left(\begin{array}{l} \lambda = 0, 1, \dots, s \\ i = 0, 1, \dots, s \end{array} \right),$$

welche durch

$$(82f) \quad F\left(\left(\frac{d^\lambda x_i}{d\xi^\lambda}\right)\right)$$

bezeichnet werde, während der zugehörige Divisor $\mathfrak{D}_\xi(x_0, x_1, \dots, x_s)$ genannt werden soll. Allgemeiner untersuchen wir den größten gemeinsamen Teiler:

$$(82g) \quad \mathfrak{D}_\xi(x_0, x_1, \dots, x_s) = \left(F^{(k)}\left(\frac{d^\lambda x_i}{d\xi^\lambda}\right) \right) \quad (k = 1, 2, \dots)$$

mehrerer derartiger Funktionen.

Alle hier zu betrachtenden Divisoren \mathfrak{D} besitzen die folgenden drei Eigenschaften, durch deren Benutzung ihre Bestimmung sehr erleichtert wird:

1) Sie sind Invarianten für die lineare Transformation der Elemente x_i , d. h. bei jeder umkehrbaren Koordinatentransformation

$$y_i = \sum a_{ix} x_x$$

bleibt \mathfrak{D}_ξ ungeändert, oder es ist

$$(83) \quad \mathfrak{D}_\xi(x_0, x_1, \dots, x_s) = \mathfrak{D}_\xi(y_0, y_1, \dots, y_s).$$

2) Sie sind Differentiationsinvarianten: Ersetzt man nämlich die Differentiationsvariable ξ durch ein anderes Element η des Kör-

pers, so bleibt \mathfrak{D} ungeändert, d. h. es ist

$$(84) \quad \mathfrak{D}_\xi(x_0, x_1, \dots, x_s) = \mathfrak{D}_\eta(x_0, x_1, \dots, x_s).$$

3) Sie sind homogen von der nullten Dimension in bezug auf die x_i ; ersetzt man nämlich jedes x_i durch μx_i , wo μ ein beliebiges Element des Körpers ist, so wird:

$$(85) \quad \mathfrak{D}_\xi(\mu x_0, \mu x_1, \dots, \mu x_s) = \mathfrak{D}_\xi(x_0, x_1, \dots, x_s).$$

Jeder nicht homogene Divisor $\mathfrak{D}_\xi(x_0, \dots, x_s)$ kann offenbar durch die Substitution $x_i = \frac{\bar{x}_i}{\bar{x}_{s+1}}$ ($i = 0, 1, \dots, s$) in einen homogenen Divisor von $\bar{x}_0, \dots, \bar{x}_s, \bar{x}_{s+1}$ verwandelt werden.

Um nun die in $\mathfrak{D}_\xi(x_i)$ enthaltene Potenz eines beliebigen Primteilers \mathfrak{P} zu bestimmen, kann man, falls \mathfrak{D} eine Transformationsinvariante ist, das System (x_0, x_1, \dots, x_s) durch ein äquivalentes reguläres System $(\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_s)$ für diesen Punkt ersetzen (S. Nr. 15) und dann den Divisor $\mathfrak{D}_\xi(\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_s)$ untersuchen. Ist zweitens $\mathfrak{D}_\xi(\delta_i)$ eine Differentiationsinvariante, so kann man außerdem die Differentiationsvariable ξ durch eine Primfunktion π für diese Stelle ersetzen, d. h. den Divisor $\mathfrak{D}_\pi(\delta_i)$ betrachten. Außerdem ist aber der Divisor $\mathfrak{D}_\xi(x_i)$ bei dieser zweiten Voraussetzung von der Differentiationsvariablen ξ ganz unabhängig; es kann also \mathfrak{D} auch als abhängig von den Differentialen $(d^x x_i)$ allein angesehen werden. Ist endlich $\mathfrak{D}_\xi(x_i)$ außerdem homogen von der nullten Dimension, also $\mathfrak{D}_\xi(\mu x_i) = \mathfrak{D}_\xi(x_i)$, und ersetzt man alle Elemente x_i durch die zugehörigen Divisorenquotienten $\frac{\mathfrak{D}^{(i)}}{\mathfrak{D}_0}$, so ist \mathfrak{D}_ξ von dem Generalnenner \mathfrak{D}_0 ganz unabhängig, da bei der Wahl eines anderen Nenners $\mathfrak{D}_0' \ x_i' = \frac{\mathfrak{D}^{(i)}}{\mathfrak{D}_0'} = \mu x_i$ wird, wo $\mu = \frac{\mathfrak{D}_0'}{\mathfrak{D}_0}$ ein Element des Körpers ist. Unter dieser Voraussetzung kann also jener Divisor als abhängig allein von jenen Zählerdivisoren angesehen und durch $\mathfrak{D}_\xi(\mathfrak{D}^{(0)}, \mathfrak{D}^{(1)}, \dots, \mathfrak{D}^{(s)})$ bezeichnet werden.

Diese Betrachtungen werden jetzt angewendet auf den größten gemeinsamen Teiler:

$$\left(\left(\begin{array}{cccc} x_0 & x_1 & \dots & x_s \\ \frac{dx_0}{d\xi} & \frac{dx_1}{d\xi} & \dots & \frac{dx_s}{d\xi} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{d^l x_0}{d\xi^l} & \frac{d^l x_1}{d\xi^l} & \dots & \frac{d^l x_s}{d\xi^l} \end{array} \right) \right) = \left(\left(\frac{d^x x_i}{d\xi^x} \right) \right) \quad \begin{array}{l} (i = 0, 1 \dots s) \\ (x = 0, 1 \dots l) \end{array}$$

aller Determinanten $(l + 1)^{\text{ter}}$ Ordnung der $(l + 1)$ reihigen Matrix $\left(\frac{d^x x_i}{d\xi^x} \right)$. Derselbe ist, wie unmittelbar ersichtlich, eine Transformations-

invariante; er besitzt aber noch nicht die beiden letzten Invarianteneigenschaften. Ersetzt man nämlich die Differentiationsvariable ξ durch eine andere η , so multipliziert sich jene Matrix hinten mit einem Dreieckssystem, dessen Elemente von den Ableitungen erster, zweiter Ordnung von ξ und η abhängen und dessen Determinante gleich

$\left(\frac{d\xi}{d\eta}\right)^{\frac{l(l+1)}{2}}$ ist. Hieraus folgt, daß $\left(\left(\frac{d^x x_i}{d\xi^x}\right)\right) d\xi^{\frac{l(l+1)}{2}}$ auch die zweite Invarianteneigenschaft besitzt. Ersetzt man endlich die x_i durch μx_i , so multipliziert sich jene Matrix hinten mit einem neuen Dreieckssystem von der Determinante μ^{l+1} ; jener Divisor ist also homogen von der $(l+1)$ ten Dimension, und es wird nach Division mit \mathfrak{Z}_0^{l+1} , wo $\mathfrak{Z}_0 = (x_0, x_1, \dots, x_s)$ den größten gemeinsamen Teiler der Elemente x_i bedeutet, homogen von der nullten Dimension.

Also besitzen die $s+1$ Divisoren

$$(86) \quad \Delta_i(x_0, x_1, \dots, x_s) = \frac{\left(\left(\frac{d^x x_i}{d\xi^x}\right)\right) d\xi^{\frac{l(l+1)}{2}}}{\mathfrak{Z}_0^{l+1}} \quad \left(\begin{matrix} i, l = 0, 1, \dots, s \\ x = 0, 1, \dots, l \end{matrix} \right)$$

alle drei Invarianteneigenschaften. Sie können also auch in der folgenden Form geschrieben werden

$$(86a) \quad \Delta_i(\mathfrak{Q}^{(0)}, \mathfrak{Q}^{(1)}, \dots, \mathfrak{Q}^{(s)}) = \left(\left(\begin{matrix} \mathfrak{Q}^{(0)}, & \mathfrak{Q}^{(1)}, & \dots, & \mathfrak{Q}^{(s)} \\ d\mathfrak{Q}^{(0)}, & d\mathfrak{Q}^{(1)}, & \dots, & d\mathfrak{Q}^{(s)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ d^l \mathfrak{Q}^{(0)}, & d^l \mathfrak{Q}^{(1)}, & \dots, & d^l \mathfrak{Q}^{(s)} \end{matrix} \right) \right),$$

$(l = 0, 1, \dots, s)$

wenn $\mathfrak{Q}^{(0)}, \mathfrak{Q}^{(1)}, \dots, \mathfrak{Q}^{(s)}$ die Zählerdivisoren von x_0, x_1, \dots, x_s bedeuten.

Um nun zu untersuchen, welche Potenz eines beliebigen Primteilers \mathfrak{P} in $\Delta_i(x_i)$ enthalten ist, werde das System (x_i) durch ein äquivalentes reguläres System (δ_i) und zugleich die Differentiationsvariable ξ durch eine Primfunktion π für die Stelle \mathfrak{P} ersetzt. Dann enthält der zu $d\pi$ gehörige Divisor \mathfrak{P} nicht, alle Determinanten $(l+1)$ ter Ordnung der Matrix $\left(\frac{d^x \delta_i}{d\pi^x}\right)$ enthalten \mathfrak{P} mindestens so oft wie ihre erste Determinante $|\delta_i^{(x)}|$ ($i, x = 0, 1, \dots, l$), und dieser Exponent von \mathfrak{P} kann leicht durch die Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i$ ausgedrückt werden, aus denen sich die Ordnungszahlen von $\delta_0, \delta_1, \dots$ in Nr. 15 zusammensetzen. Hieraus ergibt sich sofort die folgende Darstellung jener Determinantenteiler:

$$(87) \quad \left(\left(\frac{d^x x_i}{d\xi^x}\right)\right) d\xi^{\frac{l(l+1)}{2}} = \mathfrak{Z}_0^{l+1} \mathfrak{Z}_1^i \dots \mathfrak{Z}_i \quad \left(\begin{matrix} i = 0, 1, \dots, s \\ x = 0, 1, \dots, l \end{matrix} \right),$$

wo $\mathfrak{Z}_1, \mathfrak{Z}_2, \dots, \mathfrak{Z}_i$ die Verzweigungsteiler (47a) der Schar (x_i) sind.

Diese Gleichungen liefern ein einfaches Mittel, die Verzweigungsdivisoren $\mathfrak{Z}_1, \mathfrak{Z}_2, \dots, \mathfrak{Z}_s$ der Schar (x_i) selbst durch die Invarianten Δ_ν darzustellen: in der Tat folgt ja aus (87) unmittelbar:

$$(88) \quad \mathfrak{E}_i = \frac{((d^\nu x_i))}{((d^{\nu-1} x_i))} = \mathfrak{Z}_0 \mathfrak{Z}_1 \cdots \mathfrak{Z}_i \quad (\nu = 0, 1, \dots, l)$$

$$\mathfrak{Z}_i = \frac{\mathfrak{E}_i}{\mathfrak{E}_{i-1}} = \frac{\Delta_i(x_i)}{\Delta_{i-1}(x_i)}.$$

Aus den letzten Gleichungen geht hervor, daß die Verzweigungsteiler $\mathfrak{Z}_1, \mathfrak{Z}_2, \dots, \mathfrak{Z}_i$ ebenfalls alle drei Invarianteneigenschaften haben, während die \mathfrak{E}_i zwar auch homogen, aber von der ersten Dimension sind. Man nennt die Quotienten $\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_s$ der Determinantenteiler der Matrix $(d^\nu x_i)$ die *Differentialteiler nullter, erster, ... s-ter Ordnung* der Funktionenschar (x_0, x_1, \dots, x_s) ; es ergibt sich also der Satz:

Man erhält den Verzweigungsteiler l -ter Ordnung einer Funktionenschar, wenn man den Differentialteiler l -ter Ordnung durch den nächstvorhergehenden dividiert.

So gehört z. B. zu der Determinante $\begin{vmatrix} x_0 & x_1 \\ dx_0 & dx_1 \end{vmatrix}$ der Divisor $\mathfrak{Z}_0^2 \mathfrak{Z}_1$. Setzt man hier $x_0 = 1, x_1 = x$, so wird $\mathfrak{Z}_0 = (1, x) = \frac{1}{n_x}, \mathfrak{Z}_1 = \mathfrak{Z}_x$, und man findet so wieder (vgl. p. 576 (52b)), daß dem Differentiale $dx = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 0 & dx \end{vmatrix}$ eines beliebigen Elementes x der Divisor $\mathfrak{D}_{dx} = \frac{\mathfrak{Z}_x}{n_x^2}$ entspricht.

Nun seien allgemein für einen bestimmten Index l $D_i^{(l)}$ alle $\binom{s+1}{i+1}$ Determinanten $(l+1)$ -ter Ordnung der $(l+1)$ -reihigen Matrix

$$(89) \quad (d^\nu x_i) = \left(\frac{d^\nu x_i}{d\xi^\nu} \right) d\xi^{\frac{l(i+1)}{2}} \quad \begin{matrix} (i = 0, 1, \dots, s) \\ (\nu = 0, 1, \dots, l) \end{matrix}$$

in irgend einer Reihenfolge; ebenso werden die zugehörigen Divisoren bezeichnet. Da zu $d\xi$ ein Divisor $2(p-1)$ -ten Grades gehört, und die Determinanten $\left| \frac{d^\nu x_i}{d\xi^\nu} \right|$ alle zur Hauptklasse gehören, so sind alle Divisoren $D_i^{(l)}$ äquivalent und von der Ordnung $l(l+1)(p-1)$. Ferner seien $\mathfrak{X}_i^{(l)}$ die aus $D_i^{(l)}$ nach Division mit dem zugehörigen größten gemeinsamen Teiler $((d^\nu x_i))$ sich ergebenden ganzen Divisoren. Dann heißen diese $\binom{s+1}{i+1}$ ganzen äquivalenten Divisoren $\mathfrak{X}_i^{(l)}$ die *Tangentialkoordinaten l -ter Ordnung* der zur Schar (x_0, x_1, \dots, x_s) gehörigen s -dimensionalen Raumkurve, weil sie, wie gleich noch näher dargelegt wird, die naturgemäße Verallgemeinerung der Tangential- oder Linienkoordinaten einer ebenen Kurve sind. Nach (89) bestehen dann die Gleichungen:

$$(90) \quad D_i^{(l)} = (d^l x_i) \cdot \mathfrak{X}_i^{(l)} = \mathfrak{Z}_0^{l+1} \mathfrak{Z}_1^l \cdots \mathfrak{Z}_i \mathfrak{X}_i^{(l)}.$$

Sind also w_0, w_1, \dots, w_s und n_0, n_1, \dots, n_s die Gerade der Verzweigungsteiler \mathfrak{B}_i und der Tangentialkoordinaten \mathfrak{X}_i , so ist $n_0 = n$, $n_s = 0$, $w_0 = -n_0 = -n$, und aus der Vergleichung der Grade beider Seiten von (90) folgen die nachstehenden Gleichungen, welche für $s = 2$ die Verallgemeinerung der *Plückerschen Formeln* auf den Fall ganz beliebiger Singularitäten ergeben:

$$(91) \quad n_i + (l + 1)w_0 + lw_1 + \dots + w_i = l(l + 1)(p - 1)$$

oder:

$$(92) \quad (n_i - n_{i-1}) + (w_0 + w_1 + \dots + w_i) = 2l(p - 1)$$

oder endlich:

$$(93) \quad \begin{aligned} 2(p - 1) &= n_1 - 2n_0 && + w_1 \\ &= n_2 - 2n_1 + n_0 && + w_2 \\ &= n_3 - 2n_2 + n_1 && + w_3 \\ &\dots && \dots \\ &= -2n_{s-1} + n_{s-2} && + w_s \end{aligned}$$

Für den speziellen Fall $s = 2$ sind $x_0 = \frac{\mathfrak{X}_0}{\mathfrak{X}}$, $x_1 = \frac{\mathfrak{X}_1}{\mathfrak{X}}$, $x_2 = \frac{\mathfrak{X}_2}{\mathfrak{X}}$ die homogenen Koordinaten einer ebenen algebraischen Kurve, der Grad $n = n_0$ gleich der Ordnung der äquivalenten teilerfremden ganzen Divisoren \mathfrak{A}_i . Dann ist, wie eine sehr einfache geometrische Betrachtung zeigt, \mathfrak{B}_1 der Divisor der Rückkehrpunkte, also w_1 die Anzahl derselben, \mathfrak{B}_2 der Divisor der Wendepunkte, also w_2 ihre Anzahl; endlich sind $n_0 = n$ und n_1 die Ordnung und die Klasse der Kurve, während $n_2 = 0$, $w_0 = -n$ ist.

Die Formeln (91) gehen hier in die beiden fundamentalen, jetzt aber für jede Singularität gültigen *Plückerschen Formeln* über

$$(94) \quad \begin{aligned} w_1 &= 2p - 2 + 2n - n_1 \\ w_2 &= 3(2p - 2 + n) - 2w_1 = 3(n_1 - n) + w_1, \end{aligned}$$

aus denen die beiden dualen Formeln in bekannter Weise gefunden werden können.

29. Theorie der algebraischen Raumkurven.^{62a)} Im Falle $s = 3$ seien $x_0 = \frac{\mathfrak{X}_0}{\mathfrak{X}}$, $x_1 = \frac{\mathfrak{X}_1}{\mathfrak{X}}$, $x_2 = \frac{\mathfrak{X}_2}{\mathfrak{X}}$, $x_3 = \frac{\mathfrak{X}_3}{\mathfrak{X}}$ die homogenen Koordinaten einer Raumkurve n^{ter} Ordnung $C_n^{(p)}$ vom Geschlechte p ; dann haben also die äquivalenten Divisoren \mathfrak{A}_i die Ordnung $n_0 = n$. Ein Punkt $P = (a_0, a_1, a_2, a_3)$ gehört stets und nur dann der Kurve an,

62a) *M. H. Reimers* (Dissert. Kiel 1915) untersucht mit den Methoden der arithmetischen Theorie die Charakteristiken: 1. der ebenen Schnitte der Tangentenflächen von algebraischen Raumkurven, 2. der Perspektivkegel von algebraischen Raumkurven. [O]

wenn die Determinanten der Matrix

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ \mathfrak{A}_0 & \mathfrak{A}_1 & \mathfrak{A}_2 & \mathfrak{A}_3 \end{pmatrix}$$

einen gemeinsamen Teiler haben. Derselbe ist ein singulärer Punkt, wenn jener Divisor von höherer als der ersten Ordnung ist. Während zu einem Körper K im allgemeinen keine singularitätenfreien ebenen Kurven gehören, gibt es für ihn immer doppelpunktfreie Raumkurven. Hier ist \mathfrak{Z}_1 der Divisor der stationären Punkte oder der Rückkehrpunkte, \mathfrak{Z}_2 der Divisor der stationären Berührungsgerechten oder der stationären Tangenten, \mathfrak{Z}_3 der Divisor der stationären Schmiegungebenen, oder der Wendeberührungsebenen; die Zahlen w_1, w_2, w_3 geben also im regulären Falle die Anzahlen jener stationären Elemente an, während für allgemeine Kurven diese Gebilde in der durch $\mathfrak{Z}_1, \mathfrak{Z}_2, \mathfrak{Z}_3$ charakterisierten Multiplizität zu zählen sind. Ferner bedeutet hier $n_0 = n$ den Grad der Kurve, d. h. die Anzahl der Kurvenpunkte auf einer beliebigen Ebene, n_1 ist der sog. Rang derselben, d. h. die Anzahl der Kurventangenten, welche durch eine beliebige Gerade gehen; n_2 gibt die Klasse der Kurve, nämlich die Anzahl ihrer Schmiegungebenen durch irgendeinen Punkt im Raume; n_3 ist gleich Null.

Die Spezialisierung der Gleichungen (91) für $s = 3$ liefert hier die drei unabhängigen Verallgemeinerungen der Plückerschen Formeln:

$$\begin{aligned} n_1 &= 2(p-1) + 2n - w_1 \\ (95) \quad n_2 &= 6(p-1) + 3n - 2w_1 - w_2 \\ 0 &= 12(p-1) + 4n - 3w_1 - 2w_2 - w_3, \end{aligned}$$

und auch sie gelten für jede Raumkurve mit beliebigen Singularitäten.⁶³⁾

Zur Bestimmung des Divisors \mathfrak{D} der Doppelpunkte einer Raumkurve $C_n^{(p)}$ führen die folgenden Betrachtungen: Projiziert man diese Kurve von einem beliebigen Punkte des Raumes auf eine Ebene, so erhält man eine ebene Kurve \mathfrak{C}_0 , welche ihrerseits einen Divisor der Doppelpunkte \mathfrak{D}_0 besitzt. Dieser besteht aus zwei Teilen: einem, der mit dem Projektionszentrum variiert und den sog. scheinbaren Doppelpunkten von $C_n^{(p)}$ bei dieser Projektion entspricht, während der andere Teil \mathfrak{D} von den wahren Singularitäten der Raumkurve abhängt und somit völlig unveränderlich ist. Dieser letztere ist somit der größte gemeinsame Teiler der Divisoren $\mathfrak{D}_0, \mathfrak{D}_1, \dots$ der Doppelpunkte, welche zu allen Projektionen der Kurve gehören. Es gilt nun der folgende Satz:

63) Vgl. hierzu *H.-L.*, p. 465.

Der Divisor \mathfrak{D} der Doppelpunkte einer Raumkurve kann stets als größter gemeinsamer Teiler der zu zweien ihrer Projektionen gehörigen Doppelpunktsdivisoren \mathfrak{D}_0 und \mathfrak{D}_1 dargestellt werden.

Auf dieser Tatsache beruht nun ein Satz, der eine direkte Verallgemeinerung des über Funktionsringe auf p. 596 ausgesprochenen ist und dessen Beweis auch unmittelbar auf diesen reduziert werden kann:

Sind $\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \mathfrak{A}_3$ vier ganze linear unabhängige Divisoren einer Klasse A von der Ordnung n , und ist \mathfrak{D} der zugehörige Divisor der Doppelpunkte, so kann jeder durch \mathfrak{D} teilbare Divisor der Klasse A' als ganze homogene Funktion ν^{ter} Ordnung von $\mathfrak{A}_0, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \mathfrak{A}_3$ dargestellt werden, vorausgesetzt, daß der Exponent ν oberhalb einer bestimmten unteren Grenze

$$(96) \quad \nu_0 = 2(n - 3) - \frac{2(p - 1 + \delta)}{n}$$

liegt, wo 2δ die Ordnung des Divisors \mathfrak{D} ist.

Oder in anderer Form:

Liegt ν oberhalb der Grenze ν_0 , so kann jede durch \mathfrak{D} teilbare Funktion des Körpers, deren Nenner die ν^{te} Potenz des Divisors \mathfrak{A} ist, stets als ganze homogene Funktion ν^{ter} Ordnung von (x_0, x_1, x_2, x_3) dargestellt werden.

Besitzt die Raumkurve nur gewöhnliche Doppel- oder Rückkehrpunkte, so ergibt sich aus dieser Tatsache unmittelbar der folgende Satz:

Liegt ν oberhalb der soeben angegebenen Grenze ν_0 , so ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß eine Fläche ν^{ter} Ordnung die Raumkurve $C_n^{(\nu)}$ enthält, durch ein System von $(\nu n - \delta - p + 1)$ linearen unabhängigen Gleichungen für die Koeffizienten der Flächengleichung gegeben.⁶⁴⁾

Und da die Gleichung einer Fläche ν^{ter} Ordnung $\frac{(\nu+1)(\nu+2)(\nu+3)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$

Koeffizienten besitzt, so folgt weiter:

Die Gesamtheit aller Flächen ν^{ter} Ordnung, welche durch eine gegebene Raumkurve der Ordnung n und des Geschlechtes p hin-

64) Dieser Satz (für hinreichend große ν) folgt sofort aus dem *Riemann-Rochschen* Satz, findet sich jedoch zum erstenmal ausgesprochen und vollständig bewiesen bei *G. Castelnuovo*, Palermo Rendiconti VII (1893), p. 89—110. Mit der Bestimmung einer möglichst niedrigen Grenze ν_0 , von der an er gilt, beschäftigen sich *M. Noether*, Ann. di Mat. (2) V (1871), p. 1—15, Berl. Abh. (1882); *Picard et Simart*, Théorie des fonctions algébriques de deux Variables indépendantes, t. I (Paris 1897), p. 223—235; *H.-L.*, p. 466—476. [O]

durchgelegt werden können, bildet bei hinreichend großem ν eine Schar der Dimension:

$$(97) \quad N = \frac{(\nu + 1)(\nu + 2)(\nu + 3)}{1 \cdot 2 \cdot 3} - \nu n + p + \delta - 1,$$

d. h. alle Flächen der Schar können aus N von ihnen linear komponiert werden.

Hiernach kann jede Raumkurve als vollständiger Schnitt von N geeignet gewählten Flächen ν^{ter} Ordnung definiert werden. Die kleinste Anzahl von Flächen, welche eine gegebene Raumkurve ausschneiden, ist im allgemeinen größer als zwei.⁶⁵⁾ (So kann z. B. schon eine singularitätenfreie Raumkurve vierter Ordnung vom Geschlechte Null nicht als Durchschnitt zweier Oberflächen zweiten Grades dargestellt werden, da nur eine einzige solche Fläche diese Kurve enthält.)

V. Die Klassen algebraischer Gebilde.

30. Die Hauptkurve eines Körpers und ihre Weierstraßpunkte.

Der genaueren Untersuchung aller algebraischen Kurven, welche zu demselben Körper oder zu derselben Kurvenklasse gehören, legen wir die Betrachtung der sog. *Hauptkurve* H des Körpers, nämlich derjenigen Kurve im Raume von $p - 1$ Dimensionen zugrunde, deren homogene Koordinaten durch die Gleichungen:

$$(98) \quad x_1 : x_2 : \dots : x_p = \mathfrak{W}_1 : \mathfrak{W}_2 : \dots : \mathfrak{W}_p = dw_1 : dw_2 : \dots : dw_p$$

bestimmt sind, wenn die (\mathfrak{W}_i) ein Fundamentalsystem für die ganzen Divisoren der Differentialklasse W , also die (w_i) das System der zugehörigen Integrale erster Gattung bezeichnet. Ihre Bedeutung beruht darauf, daß sie offenbar invarianten Charakter bei jeder birationalen Transformation des Gebildes besitzt. Jede durch Kollineation unzerstörbare Eigenschaft der Hauptkurve ergibt somit eine wesentliche Eigenschaft des algebraischen Gebildes.

Ist der Körper nicht hyperelliptisch, so ist die Hauptkurve stets vom Geschlechte p des Körpers und von der Ordnung $2p - 2$; sie besitzt keinen einzigen singulären Punkt. Jedes zum Körper gehörige algebraische Gebilde ist auf die Kurve H ebenso wie auf die *Riemannsche* Fläche eindeutig bezogen. Ist dagegen der Körper hyperelliptisch, und ist

$$u^2 = f_{2p+2}(z)$$

seine Grundgleichung, so entsprechen jedem Punkte von H zwei über-

65) *G. Landsberg*, J. f. Math. 131 (1904), p. 155 ff., stellt eine einfache Raumkurve durch eine einzige Gleichung, die Gleichung ihres Sekantenkomplexes dar und gibt ein Verfahren zur Aufstellung dieser Gleichung. [O]

einanderliegende Punkte der zugehörigen zweiblättrigen *Riemannschen* Fläche \mathfrak{R}_p . Infolgedessen ist hier das Geschlecht der Hauptkurve gleich Null, da ihre Koordinaten in dem Unterkörper $K(x)$ rational sind, und ihre Ordnung ist nun gleich $(p - 1)$.

Zerlegt man nun nach (87) die zu der Schar $(\mathfrak{W}_1, \dots, \mathfrak{W}_p)$ gehörige Differentialdeterminante $\Delta(\mathfrak{W})$, deren Divisor der Klasse $W^{\frac{1}{3}p(p+1)}$ angehört, so erhält man die Gleichung:

$$(99) \quad \Delta(\mathfrak{W}) = \begin{vmatrix} \mathfrak{W}_1 & \mathfrak{W}_2 & \dots & \mathfrak{W}_p \\ d\mathfrak{W}_1 & d\mathfrak{W}_2 & \dots & d\mathfrak{W}_p \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ d^{p-1}\mathfrak{W}_1 & d^{p-1}\mathfrak{W}_2 & \dots & d^{p-1}\mathfrak{W}_p \end{vmatrix} = \mathfrak{Z}_1^{p-1} \mathfrak{Z}_2^{p-2} \dots \mathfrak{Z}_{p-2} \mathfrak{Z}_{p-1} = \prod_{\mathfrak{P} \in \mathfrak{R}} \mathfrak{P}^\alpha.$$

Die den Primteilern von $\Delta(\mathfrak{W})$ entsprechenden Punkte \mathfrak{P} sollen die *Weierstraß-Punkte* des Körpers, und ihre Ordnungszahlen α das *Gewicht* derselben heißen. Ist allgemein \mathfrak{Z}_i durch $\mathfrak{P}^{\alpha_i - 1}$ genau teilbar, so folgt aus (99)

$$(99a) \quad \alpha = (p - 1)(\alpha_1 - 1) + (p - 2)(\alpha_2 - 1) + \dots + (\alpha_{p-1} - 1)$$

und, da der Divisor von $\Delta(\mathfrak{W})$ der Klasse $W^{\frac{1}{3}p(p+1)}$ angehört, so ergibt sich aus derselben Gleichung für die Summe der Gewichte aller *Weierstraßpunkte*:

$$(99b) \quad \sum \alpha = (p - 1)p(p + 1).$$

Jeder Körper, dessen Geschlecht größer ist als 1, besitzt also immer *Weierstraßpunkte*; nur diese haben positives Gewicht.

Eine andere Charakterisierung der *Weierstraßpunkte* liefert unmittelbar die Anwendung des *Riemann-Rochschen* Satzes zur Bestimmung der Dimensionen $\{\mathfrak{P}\}$, $\{\mathfrak{P}^2\}$, ... der Divisorenklassen, welche äquivalent den Potenzen \mathfrak{P} , \mathfrak{P}^2 ... eines beliebig gegebenen Primteilers sind, oder, was dasselbe ist, der Ordnungszahlen aller Funktionen des Körpers, welche nur in \mathfrak{P} unendlich werden. In dem Systeme dieser Ordnungszahlen fehlen nämlich stets genau so viele als die Geschlechtzahl p des Körpers angibt (*Weierstraßscher* Lückensatz). Sind nun $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_p$ diese fehlenden Ordnungszahlen, so ist allgemein:

$$(100) \quad \begin{aligned} \varrho_1 &= 1, \quad \varrho_2 = \alpha_1 + 1, \quad \varrho_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + 1, \dots, \\ \varrho_p &= \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{p-1} + 1. \end{aligned}$$

Für jeden gewöhnlichen Punkt der Fläche ist also stets $\varrho_i = i$, d. h. es gibt für sie keine Funktionen erster, zweiter ... p^{ter} Ordnung, während alle höheren Ordnungszahlen auftreten. Die *Weierstraßpunkte*

sind dagegen die einzigen, für welche nichtkonstante Funktionen $\frac{\mathcal{G}}{\mathfrak{P}^q}$ existieren, deren Exponent q kleiner als $p + 1$ ist.

Für einen hyperelliptischen Körper vom Geschlechte p sind die $2p + 2$ Verzweigungspunkte die einzigen *Weierstraßpunkte*, und jeder von ihnen hat das Gewicht $\frac{1}{2}p(p - 1)$. Für diese Punkte fehlen die p Ordnungszahlen $1, 3, 5, \dots (2p - 1)$. Für alle anderen Körper ist das Gewicht jedes *Weierstraßpunktes* kleiner als $\frac{1}{2}p(p - 1)$, ihre Anzahl also stets größer als $2p + 2$. Elliptische und rationale Körper haben keine *Weierstraßpunkte*.

Im allgemeinen tritt ein Primfaktor \mathfrak{P} nur in der ersten Potenz in $\Delta(\mathfrak{B})$ auf, und es kann als eine Besonderheit betrachtet werden, wenn $\Delta(\mathfrak{B})$ einen mehrfachen Teiler enthält. Für einen einfachen Teiler fehlen also die Ordnungszahlen $(1, 2, \dots, p - 1, p + 1)$. Ein Körper, welcher nur die gewöhnlichen, durch den Wert von p bedingten Besonderheiten darbietet, heißt ein *ordinärer Körper*. Ein solcher hat also $(p - 1)p(p + 1)$ verschiedene *Weierstraßpunkte* \mathfrak{P} vom Gewichte Eins, und für jeden von ihnen gibt es in K eine Funktion mit dem p -fachen Pole \mathfrak{P} , aber keine Funktion von niedriger Ordnung.

Unterwirft man ein algebraisches Gebilde $F(z, u) = 0$ durch die umkehrbaren Gleichungen $z' = \varphi(z, u)$, $u' = \psi(z, u)$ einer Abbildung, so kann der Fall eintreten, daß das transformierte Gebilde $F(z', u') = 0$ mit dem ursprünglichen übereinstimmt. Man nennt eine solche Abbildung eine *Transformation des Gebildes in sich*.

Diese Transformationen führen jeden *Weierstraßpunkt* notwendig wieder in einen solchen über, da ja jede Funktion $\frac{\mathcal{G}}{\mathfrak{P}^q}$, in welcher $q < p + 1$ ist, in eine andere $\frac{\mathcal{G}'}{\mathfrak{P}'^q}$ derselben Art übergeht.

Die Gesamtheit aller dieser Transformationen bildet offenbar eine Gruppe G . Ferner bilden alle diejenigen unter ihnen, welche alle *Weierstraßpunkte* in Ruhe lassen, eine Untergruppe U von G , und zwischen G und U besteht eine Gleichung:

$$G = U \cdot V,$$

wo V ein Komplex von Transformationen ist, bei denen die *Weierstraßpunkte* auf lauter verschiedene Weisen untereinander vertauscht werden. Da es überhaupt nur eine endliche Anzahl von Vertauschungen dieser Punkte gibt, so folgt jetzt, daß die Anzahl aller Transformationen eines Gebildes in sich dann und nur dann endlich ist, wenn das Gleiche für die Anzahl derjenigen unter ihnen gilt, welche alle *Weierstraßpunkte* in Ruhe lassen.

Aus der bloßen Tatsache nun, daß die Anzahl dieser Punkte $\geq 2(p+1)$ ist, folgt nun, daß jene letzte Anzahl gleich zwei oder gleich eins sein muß, und hieraus ergibt sich der merkwürdige Satz:

Ein algebraisches Gebilde vom Geschlecht $p > 1$ besitzt stets nur eine endliche Anzahl von Transformationen in sich.

Bei der genaueren Untersuchung der Hauptkurve H eines algebraischen Körpers handelt es sich vor allem um die Frage, welche Flächen diese vollständig enthalten, bzw. wie sich H als vollständiger Schnitt algebraischer Flächen darstellen läßt. Arithmetisch betrachtet reduziert sich diese Frage auf die andere, wie groß die Anzahl der unabhängigen Relationen einer beliebigen r^{ten} Ordnung zwischen den p ganzen Divisoren der Differentialklasse W ist.

Nun folgt aus p. 604 (96), daß für ein hinreichend großes r alle ganzen Divisoren der Klasse W^r als ganze homogene Funktionen r^{ten} Grades jener Fundamentaldivisoren ($\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_p$) darstellbar sind. Es ist aber sehr bemerkenswert, daß in diesem Falle jene untere Grenze für den Exponenten r die kleinstmögliche wird; es gilt nämlich der folgende von *Nöther*⁶⁶⁾ herrührende wichtige Satz:

Ist der Körper K nicht hyperelliptisch, so kann jeder ganze Divisor der Klasse W^r als ganze homogene Funktion r^{ten} Grades der p Fundamentaldivisoren W_i der Klasse W ausgedrückt werden.

Um diesen Satz zu beweisen, beachten wir zunächst, daß die Dimension einer beliebigen Klasse W^r nach dem *Riemann-Rochschen* Satze stets gleich $(2r-1)(p-1)$ ist, sobald $r > 1$ ist. Andererseits gehören die $\binom{p+r-1}{r}$ ganzen Divisoren:

$$\mathfrak{B}_1^{h_1} \mathfrak{B}_2^{h_2} \dots \mathfrak{B}_p^{h_p} \quad (h_1 + h_2 + \dots + h_p = r)$$

stets derselben Klasse an. Kann man also aus ihnen $(2r-1)(p-1)$ unabhängige Divisoren auswählen, so ist der *Nöthersche* Satz in seinem vollen Umfang bewiesen. Diese Aufgabe kann aber stets gelöst werden, und zwar geschieht dies zunächst für die beiden ersten Klassen W^2 und W^3 durch ein direktes Verfahren. Nehmen wir dann an, die Frage sei bereits für die Klassen W^2, W^3, \dots, W^r gelöst, wo $r \geq 3$ ist, so kann sie folgendermaßen für die nächste Klasse W^{r+1} entschieden werden:

Es seien \mathfrak{B}_α und \mathfrak{B}_β irgend zwei ganze teilerfremde Divisoren der Klasse W , und es sei (\mathfrak{C}_r) ein System von $(2r-1)(p-1)$ Fundamentaldivisoren der Klasse W^r . Bilden wir dann die beiden Reihen:

$$(101) \quad \mathfrak{B}_\alpha(\mathfrak{C}_r) \quad \text{und} \quad \mathfrak{B}_\beta(\mathfrak{C}_r),$$

66) Math. Ann. 17 (1880), p. 263—284. [O].

so gehören die Elemente dieser Systeme zur Klasse W^{r+1} und sind nach dem Vorhergehenden ganze homogene Funktionen $(r+1)^{\text{ter}}$ Ordnung von $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_p$. Soll nun ein Divisor zu jeder der beiden Scharen (101) gehören, so muß er sowohl durch \mathfrak{B}_α , als auch durch \mathfrak{B}_β , also auch durch ihr Produkt teilbar und somit in der Schar:

$$(101a) \quad \mathfrak{B}_\alpha \mathfrak{B}_\beta (\mathfrak{S}_{r-1})$$

enthalten sein, wenn \mathfrak{S}_{r-1} ein System von $(2r-3)(p-1)$ Fundamentaldivisoren der Klasse W^{r-1} bedeutet. Vereinigt man also jetzt die beiden Scharen (101) in der Art, daß ihr größter gemeinsamer Teiler (101a) nur einmal auftritt, so erhält man im ganzen $(2r+1)(p-1)$ linear unabhängige Elemente, und diese bilden somit ein Fundamentalsystem für die Klasse W^{r+1} w. z. b. w.

Hieraus folgt, daß für jedes $r > 1$

$$(102) \quad \tau_r = \binom{p+r-1}{r} - (2r-1)(p-1)$$

linear unabhängige homogene Gleichungen r^{ter} Ordnung zwischen den Divisoren $(\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_p)$ bestehen, und ebenso groß ist die Dimension der Schar von Flächen r^{ter} Ordnung, welche die Hauptkurve enthalten.

31. Die Normalgleichungen und die Moduln der algebraischen Körper. Ein Körper K ist durch zwei geeignet gewählte Elemente x, y oder durch die zwischen ihnen bestehende Gleichung $f(x, y) = 0$ vollständig bestimmt. Alle anderen den Körper definierenden Gleichungen $g(z, u) = 0$ sind umkehrbar eindeutig auf diese bezogen. Alle so ineinander transformierten Gleichungen rechnen wir mit *Riemann* in eine *Klasse*. Ist die Gleichung $f(x, y) = 0$ irgendwie durch Bedingungen charakterisiert, welche von der Wahl der Grundgleichung unabhängig sind, so nennt man sie eine *Normalgleichung*; sie enthält, wenn das Geschlecht und die etwaigen Besonderheiten des Körpers gegeben sind, eine bestimmte Anzahl stetig veränderlicher unabhängiger Parameter, welche *die Moduln der Klasse* genannt werden. Eine der Hauptaufgaben der Theorie besteht darin, die Anzahl der Moduln zu bestimmen. Die soeben durchgeführten Untersuchungen führen in vielen Fällen zu einer einfachen Lösung derselben.

a) *Die Körper vom Geschlechte drei und vier.* Ist zunächst das Geschlecht des Körpers gleich drei, so ist seine Hauptkurve eine singularitätenfreie ebene Kurve vierter Ordnung, und jede solche Kurve entspricht umgekehrt einem bestimmten Körper dieses Geschlechtes als Hauptkurve. Die Untersuchung der projektiven Eigenschaften dieser ebenen Kurven ist hiernach völlig äquivalent der Analyse beliebiger

nichthyperelliptischer Körper vom Geschlechte drei. Nun enthält aber jene Gleichung 15 Konstanten, von denen aber nur $15 - 9 = 6$ wesentlich sind, da man die Variablen noch linear transformieren kann; sie sind also die Moduln des algebraischen Gebildes. Zwei Gebilde mit verschiedenen Moduln sind dann im allgemeinen nicht ineinander birational transformierbar.

Die adjungierten Kurven, deren Schnittpunktsysteme den Differentialteilern entsprechen, sind hier die Geraden der Ebene. Der Körper enthält hier keine Funktionen zweiter, aber unendlich viele dritter Ordnung. Man findet sie alle, wenn man durch einen beliebigen Kurvenpunkt zwei beliebige Gerade hindurchlegt. Jedem solchen Geradensystem entspricht eine Divisorenklasse von der Ordnung drei und der Dimension zwei, nämlich die Ergänzungsklasse der zu \mathfrak{P} gehörigen Klasse P .

Die Hauptkurve eines Körpers vom Geschlecht vier ist eine doppelpunktfreie Raumkurve sechster Ordnung:

$$x_1 : x_2 : x_3 : x_4 = \mathfrak{W}_1 : \mathfrak{W}_2 : \mathfrak{W}_3 : \mathfrak{W}_4.$$

Durch sie geht nach (102) eine einzige unzerlegbare Fläche zweiter und eine dritter Ordnung, und zwar bildet sie den vollständigen Durchschnitt derselben. Die Untersuchung derjenigen Körper vom Geschlecht vier, welche nicht hyperelliptisch sind, ist also völlig äquivalent der Ergründung der projektiven Eigenschaften derjenigen Raumkurven sechster Ordnung, welche der Schnitt zweier Flächen von zweiter und dritter Ordnung ohne besondere Lagenbeziehungen sind.

Hier gibt es aber zwei wesentlich verschiedene Arten nichthyperelliptischer Körper vom Geschlechte vier, je nachdem die zugehörige Fläche zweiter Ordnung eine ordinäre Fläche, also ein Hyperboloid, oder ein Kegel ist. Im ersten Falle zerfällt die Klasse W in zwei eindeutig bestimmte voneinander verschiedene Ergänzungsklassen A und B der dritten Ordnung und der zweiten Dimension, im zweiten fallen jene beiden Klassen zusammen, W ist also das Quadrat einer eindeutig bestimmten Klasse derselben Art. Im ersten Falle gehen durch jeden Punkt \mathfrak{P} der Hauptkurve zwei und nur zwei voneinander verschiedene und niemals zusammenfallende Trisekanten dieser Kurve hindurch, welche die beiden erzeugenden Geraden des Hyperboloides durch \mathfrak{P} sind; arithmetisch werden diese Geraden durch die beiden durch \mathfrak{P} teilbaren Divisoren $\mathfrak{A}_1 - \lambda \mathfrak{A}_2$ und $\mathfrak{B}_1 - \mu \mathfrak{B}_2$ dargestellt, welche zu den beiden Ergänzungsklassen $A = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2)$ und $B = (\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2)$ gehören. Da in diesem Fall zwei verschiedene Klassen dritter Ordnung existieren, so gibt es in K zwei Funktionen dritter Ordnung x und y ,

welche durch eine *irreduktible* Gleichung zusammenhängen, die in bezug auf jede Variable von drittem Grade ist, und sie kann als Normalkurve für diesen Fall zugrunde gelegt werden. Man erkennt leicht, daß sie 9 wesentliche Konstanten oder Moduln besitzt.

Im zweiten Falle geht durch jeden Punkt \mathfrak{P} der Hauptkurve eine einzige Trisekante derselben, welche die diesem entsprechende Kegelkante ist, und sie gehört zu dem \mathfrak{P} enthaltenden Divisor $\mathfrak{U}_1 - \lambda \mathfrak{U}_2$ der Klasse $\mathcal{A} = (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2)$. Da hier nur eine Klasse dritter Ordnung existiert, so gelangt man zu einer Normalgleichung, wenn man aus K eine Funktion dritter und eine geeignet normierte Funktion sechster Ordnung auswählt. Die Gleichung, durch welche diese zusammenhängen, hat die Form

$$y^3 + a_4(x)y + b_6(x) = 0,$$

und ihre Diskriminante hat verschiedene Wurzeln; umgekehrt charakterisiert jede solche Gleichung einen derartigen Körper. Diese Gleichung besitzt acht wesentliche Konstanten oder Moduln.

b) *Die rationalen elliptischen und hyperelliptischen Gebilde.* Die Körper $K(z, u)$ und $K(x, y)$ mögen zunächst beide das Geschlecht Null haben, und es seien

$$z = r(t), \quad u = s(t) \quad \text{bzw.} \quad x = R(\tau), \quad y = S(\tau)$$

die Ausdrücke der Funktionen durch je eine Funktion t und τ ersten Grades von $K(z, u)$ bzw. $K(x, y)$; sind beide Körper also gleich, so hängen diese Funktionen ersten Grades notwendig durch eine lineare Gleichung

$$t = \frac{\alpha\tau + \beta}{\gamma\tau + \delta}$$

zusammen; umgekehrt können aber auch offenbar irgend zwei rationale Gebilde durch eine derartige Substitution stets ineinander transformiert werden; die Anzahl der Moduln ist hier also gleich Null und es gilt der Satz:

Jedes algebraische Gebilde vom Geschlechte Null kann durch unendlich viele Transformationen, welche von drei willkürlichen Parametern abhängen, in jedes andere Gebilde derselben Art übergeführt werden.

Ein hyperelliptischer Körper ist dadurch charakterisiert, daß er eine Funktion zweiter Ordnung enthält. Wählt man sie zur unabhängigen Variablen, so kann man die andere so wählen, daß

$$(103) \quad u^2 = (z - e_1)(z - e_2) \dots (z - e_{2p+2})$$

wird. Dann ist:

$$(103a) \quad z = \frac{\mathfrak{z}}{n_2}, \quad u = \frac{\mathfrak{z}_p}{n_2^{p+1}},$$

und die Gleichung (103) läßt sich schreiben:

$$(103b) \quad \mathfrak{z}_z^2 = (\mathfrak{z}_z - e_1 n_z) (\mathfrak{z}_z - e_2 n_z) \dots (\mathfrak{z}_z - e_{2p+2} n_z) = G(\mathfrak{z}_z, n_z).$$

Ist nun $p > 1$, so folgt aus dem *Riemann-Rochschen* Satze, daß die Klasse zweiter Ordnung $A = (\mathfrak{z}_z, n_z)$, welcher Zähler und Nenner von z angehören, von der Dimension zwei ist, und daß sie die einzige Klasse zweiter Ordnung ist. Jede andere Funktion zweiter Ordnung z' hängt also mit z durch eine Gleichung:

$$(104) \quad z' = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta},$$

$$(104a) \quad \begin{aligned} \mathfrak{z}_{z'} &= \alpha \mathfrak{z}_z + \beta n_z \\ n_{z'} &= \gamma \mathfrak{z}_z + \delta n_z \end{aligned}$$

zusammen. Ist daher ein zweites hyperelliptisches Gebilde vom Geschlechte p durch die entsprechende Gleichung

$$\mathfrak{z}_{z'}^2 = (\mathfrak{z}_{z'} - e_1' n_{z'}) (\mathfrak{z}_{z'} - e_2' n_{z'}) \dots (\mathfrak{z}_{z'} - e_{2p+2}' n_{z'}) = G'(\mathfrak{z}_{z'}, n_{z'}),$$

charakterisiert, so ist dann und nur dann $K(z, u) = K(z', u')$, wenn z' mit z durch eine Gleichung (104) zusammenhängt, wenn also $G(\mathfrak{z}_z, n_z)$ und $G'(\mathfrak{z}_{z'}, n_{z'})$ durch die Substitution (104a) ineinander übergehen. Das ist aber bekanntlich dann und nur dann der Fall, wenn die Verzweigungspunkte $(e_1', e_2', \dots, e_{2p+2}')$ so angeordnet werden können, daß die $2p - 1$ Doppelverhältnisse (e_1, e_2, e_3, e_h) und (e_1', e_2', e_3', e_h') einander gleich sind. Es besteht also der Satz (der auch für $p = 1$ richtig bleibt):

Die Anzahl der Moduln der hyperelliptischen Gebilde vom Geschlechte p ist stets gleich $2p - 1$.

Im Falle $p = 1$ tritt der wesentliche Unterschied ein, daß es hier nicht nur eine, sondern unendlich viele verschiedene Klassen zweiter Ordnung und zweiter Dimension gibt, es ist also hier nicht notwendig, daß $z' = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$ sein muß, wenn $K(z, u) = K(z', u')$ sein soll. Man zeigt aber auch hier, daß dann und nur dann zwei durch die Gleichungen

$$(105) \quad \begin{aligned} u^2 &= C(z - e_1)(z - e_2)(z - e_3)(z - e_4) \\ u'^2 &= C'(z' - e_1')(z' - e_2')(z' - e_3')(z' - e_4') \end{aligned}$$

definierte Körper $K(z, u)$ und $K(z', u')$ einander gleich sind, wenn die beiden Doppelverhältnisse (e_1, e_2, e_3, e_4) und (e_1', e_2', e_3', e_4') gleiche Werte haben. Ist das der Fall, so geht also auch sicher der eine Körper in den anderen durch die obige lineare Transformation über; nur gibt es hier außer dieser noch unendlich viele andere Transformationen, welche den unendlich vielen verschiedenen Divisorenklassen

von der Ordnung und der Dimension zwei entsprechen. Zu dem vorigen Theorem tritt also im Falle $p = 1$ noch der folgende Satz hinzu:

Ein algebraisches Gebilde vom Geschlechte Eins besitzt unendlich viele Transformationen in sich, welche von *einem* veränderlichen Parameter abhängen.

e) *Die ordinären Körper vom Geschlecht $p \geq 3$.* Ist K ein ordinärer Körper vom Geschlecht p , so ist zwar seine Hauptkurve von invarianter Beschaffenheit, sie ist aber, da sie im $(p - 1)$ -dimensionalen Raume liegt, nicht direkt zur Aufstellung einer Normalgleichung verwendbar. Man gelangt aber zu einer solchen, wenn man auf der Hauptkurve $(p - 3)$ Punkte willkürlich aber fest auswählt und vermöge eines durch sie hindurchgelegten Büschels ebener Mannigfaltigkeiten diese Kurve in eine Ebene projiziert. So ergibt sich als Projektionskurve eine ebene Kurve der $(p + 1)$ ^{ten} Ordnung vom Geschlechte p mit $\frac{1}{2}p(p - 3)$ gewöhnlichen Doppelpunkten; und umgekehrt beweist man leicht, daß jede solche Kurve einen ordinären Körper vom Geschlecht p definiert. Aus der einfachen Abzählung der wesentlichen Konstanten dieser Normalkurve ergibt sich der wichtige, auch für $p = 2$ gültige von *Riemann* zuerst aufgestellte Satz:

Eine Klasse algebraischer Gebilde vom Geschlecht p ohne jede Besonderheit besitzt $3p - 3$ Moduln.

32. Die Normalgleichungen und die Moduln der allgemeinen Körper vom Geschlecht p . Es sei jetzt allgemein K ein nichtordinärer Körper, \mathfrak{P}_∞ einer seiner *Weierstraßpunkte*. Wir betrachten dann alle Funktionen von K , deren Nenner eine Potenz von \mathfrak{P}_∞ ist; es sei n die kleinste positive unter den vorhandenen Ordnungszahlen, $r + n$ sei eine spätere, welche in der Reihe der Ordnungszahlen an $(h + 1)$ ^{ter} Stelle stehen möge, und zwar sei sie die kleinste Zahl dieser Reihe, welche zu n teilerfremd ist. Sind dann x und y zwei Funktionen des Körpers, welche die Divisorendarstellung

$$(106) \quad x = \frac{\mathfrak{P}_x}{\mathfrak{P}_\infty^n}, \quad y = \frac{\mathfrak{P}_y}{\mathfrak{P}_\infty^{n+r}}$$

besitzen, so sind sie durch eine irreduktible Gleichung vom Geschlechte p

$$(107) \quad F\left(\begin{matrix} (n+r) & (n) \\ x & y \end{matrix}\right) = 0$$

verbunden. Diese Kurve besitzt ferner genau $\frac{1}{2}(n - 1)(r + n - 1) - p$ Doppelpunkte im Endlichen. Umgekehrt definiert jede solche Gleichung einen Körper dieser Art vom Geschlechte p , und x, y besitzen die Darstellung (106). Bringt man nun durch geeignete Normierung von

λ_x und λ_y möglichst viele von den Konstanten von $F(x, y)$ in Fortfall und reduziert man ferner die Konstantenzahl dadurch, daß man der Kurve die obige Zahl von Doppelpunkten erteilt, so erhält man wieder durch Abzählung die Anzahl der übrigbleibenden wesentlichen Konstanten, und zwar ergibt sich der Satz:

Es sei für ein algebraisches Gebilde vom Geschlecht p die Gesamtheit der zu einem beliebigen Weierstraßpunkte \mathfrak{P}_∞ gehörigen vorhandenen Ordnungszahlen bekannt; n sei die kleinste positive unter ihnen, $n + r$ aber die nächste, welche zu n relativ prim ist, und es stehe $r + n$ in jener Reihe an $(h + 1)$ ter Stelle. Dann ist die Anzahl der Moduln des Gebildes gleich

$$p - 3 + 2n + r - h.$$

Folgerungen: α) Besitzt das Gebilde wenigstens einen regulären Weierstraßpunkt \mathfrak{P}_∞ , so ist für ihn die Reihe der vorhandenen Ordnungszahlen $(0, p, p + 2, p + 3 \dots)$. Also ist für ihn $n = p$, und wenn $p + r$ die erste zu p teilerfremde Zahl ist, so ist $h = r$; also besteht der Satz:

Besitzt das algebraische Gebilde auch nur einen regulären Weierstraßpunkt, so ist die Anzahl seiner Moduln gleich $3p - 3$.

β) Ist für einen Weierstraßpunkt \mathfrak{P}_∞ die Reihe der vorhandenen Ordnungszahlen

$$(0, p, p + 1, \dots, p + g - 1, p + g + 1, \dots),$$

wo $g > 1$ ist, so ist wieder $n = p$, $r = 1$, also $h = 2$, und die Zahl der Moduln wird daher $3p - 4$.

γ) Ist das Gebilde hyperelliptisch, so wird jene Reihe:

$$(0, 2, 4, \dots, 2p, 2p + 1, 2p + 2, \dots),$$

also $n = 2$, $n + r = 2p + 1$, $h = p + 1$, also ergibt sich wieder die Anzahl der Moduln gleich $2p - 1$.

δ) Enthält das Gebilde einen Weierstraßpunkt mit der Ordnungszahl drei, so läßt sich die Reihe der für diesen Punkt vorhandenen Ordnungszahlen folgendermaßen schreiben:

$$0, 3, 6, \dots$$

$$3\mu_1 + 1, 3\mu_1 + 4, 3\mu_1 + 7, \dots$$

$$3\mu_2 + 2, 3\mu_2 + 5, 3\mu_2 + 8, \dots$$

Die Anwendung des allgemeinen Satzes auf diese Reihe ergibt, daß die Zahl der Moduln in diesem Falle gleich $p + 2\mu_1$ oder gleich $p + 2\mu_2 + 1$ ist, je nachdem $\mu_1 \leq \mu_2$ oder $\mu_1 > \mu_2$ ist.

An eine charakteristischere Eigenschaft des Körpers knüpft die folgende Methode zur Aufstellung einer Normalgleichung an: Als un-

abhängige Variable x nimmt man eine Funktion der niedrigsten Ordnung μ , welche in K überhaupt auftritt, und wählt dann das andere Element y so aus, daß $K(x, y) = K$ wird. Aus dem *Riemann-Roch*-schen Satze ergibt sich dann, daß die Klasse A des Zählers und Nenners von x notwendig die Dimension zwei hat, und daß für ordinäre Körper ihre Ordnung μ gleich $\frac{p}{2} + 1$ oder $\frac{p+3}{2}$ sein muß, je nachdem p gerade oder ungerade ist. Im ersten Falle existiert nur eine endliche Anzahl, im zweiten einfach unendlich viele solche Divisorenklassen der Dimension zwei und der Ordnung μ .

In welcher Weise dann die abhängige Variable y ausgewählt werden kann, werde für den Fall $\mu = 3$ unter der Annahme ausgeführt, daß das Gebilde nicht hyperelliptisch ist, wohl aber auf eine dreiblättrige *Riemannsche* Fläche bezogen werden kann, wobei jetzt $p > 4$ vorausgesetzt werden kann.

In der eindeutig bestimmten Klasse $A = (\mathfrak{A}, \mathfrak{A}')$ der niedrigsten Ordnung 3, wähle man $x = \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{A}'}$ so aus, daß $\mathfrak{A}' = \mathfrak{P}_1^{(\infty)} \mathfrak{P}_2^{(\infty)} \mathfrak{P}_3^{(\infty)}$ drei verschiedene Primfaktoren enthält. Es sei dann r der kleinste Exponent, für welchen $\{A^r\} > r + 1$ ist. Wählen wir dann von dieser Klasse $y = \frac{\mathfrak{A}_r}{\mathfrak{A}'^r}$ so aus, daß der Zähler \mathfrak{A}_r von den $r + 1$ Potenzprodukten $(\mathfrak{A}^r, \mathfrak{A}^{r-1}\mathfrak{A}', \dots, \mathfrak{A}'^r)$ linear unabhängig ist, so hängen x und y durch eine in y kubische irreduktible Gleichung $F(y, x) = 0$ zusammen, und es ist $K(x, y) = K$. Durch geeignete Bestimmung des Zählers \mathfrak{A}_r von y kann man erreichen, daß diese Gleichung die Form erhält:

$$F(y, x) = y^3 + a_{2r}(x)y + b_{3r}(x) = 0.$$

Ist $(1, \xi^{(1)}, \xi^{(2)})$ ein normales Fundamentalsystem dieses Körpers für die Stelle $(x = \infty)$, so sind die Ordnungszahlen von $\xi^{(1)}$ und $\xi^{(2)}$ gleich $-r$ und $-(r + s)$, wo $0 \leq s \leq r$ ist. Umgekehrt bestimmt eine solche Gleichung dann und nur dann einen Körper vom Geschlecht p , bei Beschränkung auf gewöhnliche Singularitäten, wenn diese Kurve $\tau = (r - s)$ gewöhnliche Doppelpunkte hat. Bestimmt man nun die in $a_{2r}(x)$ und $b_{3r}(x)$ vorhandenen Koeffizienten so, daß die Kurve in τ beliebig gegebenen Punkten je einen Doppelpunkt hat, und beseitigt man von den dann in dieser Gleichung auftretenden Konstanten so viele, wie sich durch Normierung der Variablen x und y fortschaffen lassen, so ergibt sich als Schlußresultat der folgende Satz:

Wenn in einem Körper vom Geschlechte $p > 4$ keine Funktionen zweiter, wohl aber solche der dritten Ordnung existieren, so gibt es eine und nur eine Divisorenklasse A der Ordnung drei und

der Dimension zwei und eine bestimmte Potenz von A mit möglichst niedrigem Exponenten r , deren Dimension größer als $r + 1$ ist. Setzt man dann:

$$p = 2r + s - 2,$$

so ist $r \geq s \geq 0$, und die Klasse des algebraischen Gebildes ist durch $p + 2r$ resp. $p + 2r - 1$ Moduln charakterisiert, je nachdem s positiv oder Null ist. Die Zahl der Moduln wird möglichst groß, nämlich $2p + 1$, wenn r seinen Maximalwert $\frac{p}{2} + 1$ bzw. $\frac{p+1}{2}$ annimmt, also $s = 0$ bzw. 1 wird.

VI. Algebraische Relationen zwischen Abelschen Integralen.

33. Algebraische Normierung der Fundamentalintegrale erster und zweiter Gattung. Aufgabe dieses Abschnittes ist es, durch direkte algebraische Methoden Einblick in die Periodizität der Abelschen Integrale und in die Zusammenhangsverhältnisse der zum Körper K gehörigen Riemannschen Flächen zu gewinnen. Hier sind die algebraischen Tatsachen festzustellen, welche den Sätzen der Analysis situs und den geometrischen Theoremen entsprechen, mit deren Hilfe sonst die topologischen Eigenschaften der Riemannschen Flächen erkannt und ihre Zerschneidung geleistet wird.⁶⁷⁾

Für diese Untersuchungen wählen wir, was stets durch eine birationale Transformation erreicht werden kann, die unabhängige Variable $z = \frac{\delta_s}{\mathfrak{P}_\infty^n}$ so, daß sie als Nenner nur die Potenz eines Primdivisors besitzt, daß also die zugehörige Riemannsche Fläche \mathfrak{R}_s im Unendlichen einen einzigen n -blättrigen Verzweigungspunkt \mathfrak{P}_∞ besitzt.

Die Gesamtheit aller ganzen algebraischen Funktionen von z , welche also nur in \mathfrak{P}_∞ unendlich groß werden, bildet das Ideal $I(1)$ aller Multipla des Divisors 1. Es seien

$$(\xi^{(0)}, \xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n-1)}) \quad \text{und} \quad (\eta^{(0)}, \eta^{(1)}, \dots, \eta^{(n-1)})$$

⁶⁷⁾ Derartige Methoden sind zuerst von Weierstraß in seinen Vorlesungen verwendet, jedoch erst bei *B.-N.* (1894), p. 426—429 in äußerst knapper Form skizziert worden. Die ihnen zugrunde liegende Form des Satzes von der Vertauschbarkeit des Argumentes und des Parameters bei den Integralen dritter Gattung rekonstruiert Baker (1897) (*B.* 185—186) und gibt zugleich eine einfachere Form des Satzes (*B.* 194), bei der die von Weierstraß benutzte von $p + 2$ Stellen des Gebildes abhängige Funktion durch eine nur von zwei Stellen des Gebildes abhängende ersetzt wird. Unter Benutzung der Bakerschen Form des Satzes wird der Weierstraßsche Gedanke bei *H.-L.* durchgeführt. Für die Weierstraßsche Durchführung vgl. Weierstraß, Vorlesungen, p. 304 ff. [*l'*]

ein für \mathfrak{K}_∞ normales Fundamentalsystem für diese ganzen Funktionen und sein komplementäres System, welches dann ebenfalls für \mathfrak{K}_∞ normal ist; durch diese beiden Systeme denken wir uns in der Folge die ganzen algebraischen Funktionen des Körpers einerseits und die *Abel*-schen Integrale andererseits dargestellt.

Betrachtet man nun die Ordnung des Unendlichwerdens aller ganzen Funktionen im Punkte \mathfrak{K}_∞ , so treten nach dem *Weierstraß*-schen Lückensatze nicht alle positiven ganzen Zahlen als Ordnungen dieser Funktionen auf, sondern es fehlen stets p , also genau so viele als es verschiedene Integrale erster Gattung gibt. Bezeichnet man nun diese fehlenden Ordnungszahlen nach ihrer Größe geordnet durch

$$q_1, q_2, \dots, q_p$$

so kann man, wie eine einfache Diskussion zeigt^{67a)}, ein System von p unabhängigen Integralen erster Gattung

$$w_1, w_2, \dots, w_p$$

rein algebraisch so normieren, daß allgemein w_i in \mathfrak{K}_∞ die positive Ordnungszahl q_i besitzt. Man kann es sogar erreichen, daß in der Entwicklung von w_i im Bereiche von \mathfrak{K}_∞ die Glieder der höheren Ordnungen $q_{i+1}, q_{i+2}, \dots, q_p$ sämtlich den Koeffizienten Null haben. Durch diese Festsetzungen sind dann die w_i eindeutig festgelegt.

Ferner kann man nun p Integrale zweiter Gattung mit dem einzigen Pole $\mathfrak{K}_\infty, (t_1, t_2, \dots, t_p)$ so bestimmen, daß sie in diesem Punkte in den Ordnungen q_1, q_2, \dots, q_p unendlich werden, so daß also jedes Produkt $w_i t_i$ in \mathfrak{K}_∞ endlich und von Null verschieden wird. Durch diese Festsetzung sind die Integrale t_i nur bis auf eine homogene lineare Funktion von Integralen erster Gattung bestimmt; ihre vollständige Normierung behalten wir uns vor.

Jedes andere zu \mathfrak{K}_2 gehörige Integral zweiter Gattung, welches also nur polare Unstetigkeiten hat, ist dann auf eine einzige Weise als Summe einer Funktion des Körpers und einer homogenen linearen Funktion dieser $2p$ Fundamentalintegrale erster und zweiter Gattung darstellbar.⁶⁸⁾ Man bezeichnet daher die Reihe $(t_1, t_2, \dots, t_p, w_1, w_2, \dots, w_p)$ derselben, oder, wenn allgemein $w_i = t_{p+i}$ gesetzt wird, die Reihe

$$(107a) \quad t_1, \dots, t_p, t_{p+1}, \dots, t_{2p}$$

als ein *Fundamentalsystem für die allgemeinen Integrale zweiter Gat-*

67a) Vgl. *H.-L.*, p. 564—570.

68) *D.-W.* (p. 289—290) beweisen die lineare Ausdrückbarkeit aller Differentiale erster und zweiter Gattung durch $2p$ geeignet gewählte auf rein algebraischem Wege. [0]

tung; dasselbe ist ein irreduktibles System solcher Integrale, weil keine lineare Verbindung von ihnen gleich einer Funktion des Körpers sein kann. Jedes andere Fundamentalsystem für diese Integrale geht aus diesem durch eine umkehrbare lineare Substitution mit konstanten Koeffizienten hervor.

34. Die Integrale dritter Gattung und der Satz von der Vertauschung von Parameter und Argument. Um zu einer einheitlichen Darstellung der Integrale dritter Gattung zu gelangen, welche in unserer Theorie eine Hauptrolle spielt, führen wir die folgende algebraische Funktion der beiden unabhängigen Variablen z und \bar{z} ein:

$$(108) \quad \theta(\mathfrak{P}, \overline{\mathfrak{P}}) = \frac{\bar{\xi}_0 \eta_0 + \bar{\xi}_1 \eta_1 + \dots + \bar{\xi}_{n-1} \eta_{n-1}}{z - \bar{z}}.$$

Hier sind \mathfrak{P} und $\overline{\mathfrak{P}}$ zwei verschiedene unabhängig veränderliche Punkte der Fläche \mathfrak{R}_z , und die in θ auftretenden Funktionen hängen von $\overline{\mathfrak{P}}$ oder von \mathfrak{P} ab, je nachdem sie überstrichen oder nicht überstrichen sind. Diese Funktion ist also in rationaler Weise von den beiden Variablensystemen (z, u) und (\bar{z}, \bar{u}) abhängig, ist also eine Größe des Körpers $K(z, u, \bar{z}, \bar{u})$. Eine einfache Zerlegung von $\theta(\mathfrak{P}, \overline{\mathfrak{P}})$ in seine Primfaktoren zeigt dann, daß ein Elementarintegral dritter Gattung mit den logarithmischen Stellen \mathfrak{P}_1 und \mathfrak{P}_2 und den zugehörigen Residuen -1 und $+1$ in einer der folgenden beiden Formen darstellbar ist:

$$(109) \quad \omega_{\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2} = \int dz (\theta(\mathfrak{P}, \mathfrak{P}_2) - \theta(\mathfrak{P}, \mathfrak{P}_1)) = \int dz \int_{\mathfrak{P}_1}^{\mathfrak{P}_2} \frac{d\theta(\mathfrak{P}, \overline{\mathfrak{P}})}{d\bar{z}} d\bar{z}.^{69)}$$

Der Satz von der Vertauschung von Parameter und Argument ist bei dieser Auffassung die Folge einer algebraischen Identität, welche sich folgendermaßen aussprechen läßt:

Normiert man die bis jetzt nur bis auf Integrale erster Gattung bestimmten Integrale t_1, t_2, \dots, t_p in geeigneter Weise, so bleibt der Differentialausdruck:

$$(109a) \quad D(\mathfrak{P}, \overline{\mathfrak{P}}) = \frac{d}{d\bar{z}} \theta(\mathfrak{P}, \overline{\mathfrak{P}}) d\bar{z} dz + \sum_1^p dw_i(\mathfrak{P}) \cdot dt_i(\overline{\mathfrak{P}}),$$

welcher für das Argument \mathfrak{P} ein Differential zweiter Gattung mit dem einzigen und einfachen Pole \mathfrak{P} darstellt, bei der Vertauschung des Argumentes \mathfrak{P} und des Parameters $\overline{\mathfrak{P}}$ ungeändert.

Wir können nunmehr zu der Integralform des Vertauschungs-

69) Diese Form des Integrals dritter Gattung und die daraus folgende für die Integrale 2. Gattung ist von *Baker* gegeben worden [Math. Ann. 45 (1894); p. 67]. Vgl. *H.-L.*, p. 576—587. [O]

satzes von Parameter und Argument dadurch übergehen, daß wir die veränderlichen Punkte \mathfrak{P} und $\bar{\mathfrak{P}}$ auf zwei bestimmten Wegen s und σ fortrücken lassen, von denen der erste s sich von \mathfrak{P}_1 nach \mathfrak{P}_2 , der zweite σ von Ω_1 nach Ω_2 erstrecken mögen, und sodann den Differentialausdruck $D(\mathfrak{P}, \bar{\mathfrak{P}})$ über diese beiden Wege integrieren. Machen wir zuerst die Voraussetzung, daß sich die Wege s und σ nicht schneiden, so ergibt sich jenes Theorem aus dem folgenden Satze:

Das Integral:

$$(110) \int_{\mathfrak{P}_1}^{\mathfrak{P}_2} d\bar{\omega}_{\Omega_1 \Omega_2} = \int_{\mathfrak{P}_1}^{\mathfrak{P}_2} \{ \theta(\mathfrak{P}, \Omega_2) - \theta(\mathfrak{P}, \Omega_1) \} dz + \sum_{k=1}^p \int_{\mathfrak{P}_1}^{\mathfrak{P}_2} dw_k \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} dt_k$$

bleibt ungeändert, wenn man $(\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2)$ mit (Ω_1, Ω_2) vertauscht, oder kürzer, es ist

$$(110a) \int_{\mathfrak{P}_1}^{\mathfrak{P}_2} d\bar{\omega}_{\Omega_1 \Omega_2} = \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} d\bar{\omega}_{\mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2}.$$

Die gleiche Eigenschaft besitzt auch jedes Elementarintegral dritter Gattung, welches aus dem vorigen durch Hinzufügung einer Summe

$$\sum_{i,k=1}^p s_{i,k} \int_{\mathfrak{P}_1}^{\mathfrak{P}_2} dw_i \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} dw_k$$

entsteht, wenn das Koeffizientensystem symmetrisch ist.⁷⁰⁾ Außer diesen Integralen gibt es aber keine andere Elementarintegrale dritter Gattung, welche die Vertauschung der Argumente $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2$ und der Parameter Ω_1, Ω_2 gestatten.

Dieses Theorem wird modifiziert, wenn die Integrationswege s und σ sich schneiden.⁷¹⁾ Setzen wir allgemein die Differenz

$$(111) \int_s d\bar{\omega}_{\Omega_1 \Omega_2} - \int_{\sigma} d\bar{\omega}_{\mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2} = I(s, \sigma),$$

so ist $I(s, \sigma)$ nach (110a) gleich Null, wenn s und σ getrennt verlaufen. Beachten wir die leicht erweisbaren Sätze, daß, wenn man s oder σ in zwei beliebige Teile zerlegt,

$$(112) \begin{aligned} I(s' + s'', \sigma) &= I(s', \sigma) + I(s'', \sigma), \\ I(s, \sigma' + \sigma'') &= I(s, \sigma') + I(s, \sigma''), \quad I(s, \sigma) = -I(\sigma, s) \end{aligned}$$

ist, so braucht jener Wert nur für zwei unendlich kleine sich kreuzende Wegstrecken (s_0, σ_0) berechnet zu werden; nun erhält man für diese $I(s_0, \sigma_0) = \mp 2\pi i$ je nachdem der Übergang von s_0 über σ_0

70) Vgl. B., p. 194. [O]

71) Vgl. B., p. 187. [O]

vom rechten zum linken oder vom linken zum rechten Ufer erfolgt. Im ersten Fall soll jener Übergang *ein positiver*, im zweiten *ein negativer* genannt werden. Hieraus ergibt sich dann der allgemeine Satz: es ist stets:

$$(113) \quad \int_{(s)} d\bar{\omega}_{\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2} - \int_{(\sigma)} d\bar{\omega}_{\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2} = 2\pi i(s, \sigma),$$

wo (s, σ) der Überschuß der Anzahl der positiven über die Anzahl der negativen Übergänge von s über σ bedeutet. Diese Zahl (s, σ) , welche kurz *die Anzahl der Übergänge* genannt werde, heißt nach *Kronecker die Charakteristik der beiden Wege s und σ* . Es ist besonders wichtig, daß sich die Charakteristik durch Integrale längs des einen und des andern Weges ausdrückt; so erhalten wir ein Mittel, um die Zusammenhangsverhältnisse der Flächen \mathfrak{R} , ohne Hilfe der *Analysis situs* zu finden. In dieser Auffassung haben wir jene Gleichungen vollständig zu diskutieren und gelangen so zum Verständnisse der der *Riemannschen Fläche* eigentümlichen Zusammenhangsverhältnisse.

Setzen wir in der Gleichung (113) die Wege s und σ beide als geschlossen voraus, so stellt (s, σ) die Charakteristik zweier Periodenwege dar, und die in ihr auftretenden Integrale dritter Gattung fallen fort. Dann ergibt sich die wichtige Periodenrelation:

$$(114) \quad t_1^{(s)} w_1^{(\sigma)} + \dots + t_p^{(s)} w_p^{(\sigma)} - w_1^{(s)} t_1^{(\sigma)} - \dots - w_p^{(s)} t_p^{(\sigma)} = 2\pi i(s, \sigma),$$

wenn z. B. $\int_{\sigma} dt_{\alpha} = t_{\alpha}^{(\sigma)}$ gesetzt wird.

Es sei nun zunächst s ein solcher geschlossener Weg, daß für ihn alle $2p$ Perioden $t_{\alpha}^{(s)}$ und $w_{\alpha}^{(s)}$ Null sind. Dann besitzt auch jedes Integral mit polaren Unstetigkeiten, erstreckt über s , den Wert Null. Ein solcher Weg werde äquivalent Null gesetzt und ein *Nullweg* genannt. Ist ferner σ ein ebenfalls geschlossener sonst aber beliebiger Weg, so ist stets $(s, \sigma) = 0$; jeder geschlossene Weg σ überschreitet also s ebensooft von rechts nach links, wie von links nach rechts.

Ist zweitens $\sigma = \widehat{\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2}$ ungeschlossen, so folgt aus (113), daß $(s, \sigma) = \frac{1}{2\pi i} \int (\theta(\mathfrak{P}, \mathfrak{D}_2) - \theta(\mathfrak{P}, \mathfrak{D}_1)) dz$ nur von \mathfrak{D}_1 und \mathfrak{D}_2 , nicht

aber von σ abhängig ist, und daß dieses Integral nur einen von den drei Werten $0, +1, -1$ haben kann. Hieraus folgt, daß man alle Punkte der Fläche in bezug auf s eindeutig in zwei Klassen, die *inneren* und die *äußeren Punkte von s* einteilen kann.

Durch jeden Nullweg s wird die Fläche \mathfrak{R} in zwei getrennte Teile geteilt, welche aus den inneren und den äußeren Punkten von s bestehen. Ist $p = 0$, so ist jeder geschlossene Weg ein Nullweg.

35. Einteilung aller Wege auf einer Riemannschen Fläche in Klassen. Ich betrachte nun die Gesamtheit aller Wege a auf \mathfrak{R} , von denen jeder aus einer endlichen Anzahl von getrennten oder zusammenhängenden Wegstücken besteht, die in beliebiger Reihenfolge, aber festgesetzter Richtung, durchlaufen werden. Unter der Summe $a + b$ zweier Wege verstehe ich den Weg, welcher aus den Wegstrecken von a und b besteht. Für die so definierte Verknüpfungsoperation bestehen dann die drei Grundgesetze der Addition, nämlich das kommutative und das assoziative Gesetz:

$$a + b = b + a, \quad a + (b + c) = (a + b) + c,$$

sowie das Gesetz von der unbeschränkten und eindeutigen Subtraktion, daß nämlich, wie auch die Wege a und b gegeben sind, stets ein einziger Weg $x = b - a$ existiert, für welchen $a + x = b$ ist.

Sind speziell a und b geschlossene Wege, so kann ihre Summe $a + b$, falls sie sich schneiden, direkt, falls sie sich nicht schneiden, durch Hinzufügung eines zweimal in entgegengesetzter Richtung durchlaufenen Weges c wieder in einen geschlossenen Weg $a + c + b - c$ verwandelt werden.

Für alle Wege auf \mathfrak{R} , stelle ich nun die folgende Äquivalenzdefinition auf:

Zwei Wege a und b heißen *äquivalent* ($a \sim b$) und werden in dieselbe Klasse K gerechnet, wenn sie sich nur um einen Nullweg n unterscheiden, wenn also $a - b = n$ ist. Hiernach sind speziell alle Nullwege untereinander äquivalent; die durch sie gebildete Klasse K_0 soll *die Hauptklasse* genannt werden.

Hiernach sind zwei Wege a und b stets und nur dann äquivalent, wenn sie sich zu einem geschlossenen Wege ergänzen und wenn für sie die $2p$ Gleichungen:

$$(115) \quad \int_a^a dt_\alpha = \int_b^b dt_\alpha \quad (\alpha = 1, 2, \dots, 2p)$$

sämtlich erfüllt sind, wo hier, wie im folgenden, die p Integrale erster Gattung w_β gleich $t_{p+\beta}$ gesetzt sind. Für die Äquivalenz geschlossener Wege a und b sind somit allein diese $2p$ Gleichungen (115) notwendig und hinreichend. Da die Differenz äquivalenter Wege immer geschlossen ist, so brauchen im folgenden nur die geschlossenen Wege untersucht zu werden.

Ein System (s_1, s_2, \dots, s_m) von geschlossenen Wegen heißt *unabhängig*, wenn ein aus ihnen linear mit ganzzahligen Koeffizienten zusammengesetzter Weg

$$s = x_1 s_1 + x_2 s_2 + \dots + x_m s_m$$

nur dann äquivalent Null ist, wenn alle x_i verschwinden. Allein dann ist $s \sim 0$, wenn die auf dem Wege s gebildeten Perioden von t_1, \dots, t_{2p} verschwinden, wenn also die Koeffizienten x_1, \dots, x_m die $2p$ Gleichungen:

$$(116) \quad \int_{(s)} dt_\alpha = x_1 t_{\alpha 1} + x_2 t_{\alpha 2} + \dots + x_m t_{\alpha m} = 0$$

$$(\alpha = 1, 2, \dots, 2p)$$

erfüllen, in denen allgemein

$$(116a) \quad \int_{(s_\beta)} dt_\alpha = t_{\alpha\beta} \quad \left(\begin{array}{l} \alpha = 1, 2, \dots, 2p \\ \beta = 1, 2, \dots, m \end{array} \right)$$

gesetzt ist. Jene Gleichungen besitzen stets und nur dann überhaupt keine von Null verschiedene Lösung, wenn der Rang des Koeffizientensystems

$$(116b) \quad T = (t_{\alpha\beta}) \quad \left(\begin{array}{l} \alpha = 1, 2, \dots, 2p \\ \beta = 1, 2, \dots, m \end{array} \right)$$

gleich m ist. In diesem Falle sind also die m Wege sicher unabhängig.

Zunächst zeige ich nun, daß man stets $2p$ Wege (s_1, \dots, s_{2p}) so auswählen kann, daß sie linear unabhängig sind. In der Tat kann man an Stelle von (t_1, \dots, t_{2p}) irgend ein anderes Fundamentalsystem $(\tau_1, \dots, \tau_{2p})$ zugrunde legen, welches mit jenem durch eine Substitution

$$\tau_h = \sum a_{hk} t_k + \varphi_h \quad (h, k = 1, 2, \dots, 2p)$$

zusammenhängt, in der die φ_h algebraische Funktionen und die a_{hk} beliebige Konstanten von nichtverschwindender Determinante sind. Alsdann hängen die Periodendeterminanten $|\tau_{hk}|$ und $|t_{hk}|$ durch die Gleichung

$$|\tau_{hk}| = |a_{hk}| |t_{hk}|$$

zusammen. Durch eine solche Transformation und durch geeignete Wahl von $(s_1, s_2, \dots, s_{2p})$ kann man nun erreichen, daß für das Fundamentalsystem $(\tau_1, \dots, \tau_{2p})$ das zugehörige Periodensystem (τ_{hk}) ein Dreieckssystem wird, welches unterhalb der Diagonale nur Nullen, in der Diagonale aber lauter von Null verschiedene Glieder hat, so daß also $|\tau_{hk}|$ und somit auch $|t_{hk}|$ nicht Null ist, und damit ist unsere Behauptung bewiesen.

Auf jeder *Riemannschen* Fläche vom Geschlecht p gibt es somit $2p$ unabhängige Periodenwege.

Für ein solches Wegesystem $(s_1, s_2, \dots, s_{2p})$ ist nun nicht bloß die Periodendeterminante $|t_{gh}|$, sondern auch die ganzzahlige Determinante

$$(117) \quad C = |c_{gh}| = |(s_g, s_h)|$$

aller Charakteristiken der Wege s_h aufeinander von Null verschieden. In der Tat bestehen ja zwischen den Perioden für je zwei beliebige

Wege s_α und s_β die Gleichungen:

$$(118) \quad t_{1\alpha}t_{p+1,\beta} + t_{2\alpha}t_{p+2,\beta} + \dots + t_{p\alpha}t_{2p,\beta} - t_{p+1,\alpha}t_{1\beta} - \dots - t_{2p,\alpha}t_{p\beta} \\ = -2\pi i c_{\alpha\beta}.$$

Führen wir also das alternierende Hauptsystem:

$$E = \begin{pmatrix} 0, E_p \\ -E_p, 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \dots 0 & 1 \dots 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 \dots 0 & 0 \dots 1 \\ -1 \dots 0 & 0 \dots 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 \dots -1 & 0 \dots 0 \end{pmatrix}$$

ein und bezeichnen wie gewöhnlich durch \bar{T} das zu $T = (t_{\alpha\beta})$ konjugierte System, so lassen sich alle diese Gleichungen in die eine Systemgleichung:

$$(118a) \quad \bar{T}ET = -2\pi i C$$

zusammenfassen, und aus ihr folgt durch Übergang zu den Determinanten, da $E^2 = -1$ und $|\bar{T}| = |T|$ ist:

$$(118b) \quad |T|^2 = (2\pi i)^{2p} |c_{gh}|^2;$$

es ist also wirklich $|c_{gh}| = |(s_g, s_h)| \geq 0$. Hieraus folgt speziell der Satz:

Ein Periodenweg s ist stets und nur dann kein Nullweg, wenn man wenigstens einen andern Weg s' finden kann, welcher mit ihm eine von Null verschiedene Charakteristik (s, s') hat.

Nummehr zeigt man leicht, daß mit diesem unabhängigen System (s_1, \dots, s_{2p}) jeder andre Periodenweg s_0 ein abhängiges System bildet, d. h. daß man $2p + 1$ nicht sämtlich verschwindende *ganze* Zahlen x_0, x_1, \dots, x_{2p} so bestimmen kann, daß der Weg:

$$(119) \quad \bar{s} = x_0 s_0 + x_1 s_1 + \dots + x_{2p} s_{2p} \sim 0$$

ist. In der Tat ist ja hierfür notwendig und hinreichend, daß die $2p$ Gleichungen:

$$(119a) \quad \int_{(\bar{s})} d t_\alpha = t_{\alpha 0} x_0 + t_{\alpha 1} x_1 + \dots + t_{\alpha, 2p} x_{2p} = 0$$

eine von (0) verschiedene ganzzahlige Lösung haben. Da aber auch das Koeffizientensystem $(t_{\alpha 0}, t_{\alpha\beta})$ vom Range $2p$ ist, so hat das Gleichungssystem, abgesehen von Proportionalitätsfaktoren eine einzige Lösung. Multipliziert man nun diese Gleichungen allgemein mit $t_{p+1,\beta}, \dots, t_{2p,\beta}, -t_{1\beta}, \dots, -t_{p\beta}$ und addiert sie, so ergeben sich für $\beta = 1, 2, \dots, 2p$ bei Beachtung der Periodenrelationen (118) für die-

selben x_0, x_1, \dots, x_{2p} die ganzzahligen Gleichungen:

$$c_{\beta 0}x_0 + c_{\beta 1}x_1 + \dots + c_{\beta, 2p}x_{2p} = 0,$$

deren ganzzahliges Koeffizientensystem $(c_{\beta\gamma})$ auch vom Range $2p$ ist, also auch nur eine einzige jetzt natürlich ganzzahlige Lösung besitzt; und da dieses Gleichungssystem eine Folge des vorigen ist, so hat letzteres dieselbe ganzzahlige Lösung $(x_0, x_1, \dots, x_{2p})$.

Hiernach kann also jeder Weg s_0 auf \mathfrak{R} durch dieses unabhängige System (s_1, \dots, s_{2p}) eindeutig in der Form:

$$(120) \quad s_0 = r_1s_1 + r_2s_2 + \dots + r_{2p}s_{2p}$$

mit den rational gebrochenen Koeffizienten $r_i = -\frac{x_i}{x_0}$ dargestellt werden, wenn hier wie im folgenden eine solche symbolische Gleichung nur eine andre Schreibweise für die obige ganzzahlige homogene Äquivalenz (119) bedeutet. Ein solches unabhängiges Wegsystem $(s_1, s_2, \dots, s_{2p})$ soll daher eine *Basis von Periodenwegen* genannt werden.

Ist (120) die Darstellung eines beliebigen Weges s_0 durch die Basis (s_1, \dots, s_{2p}) , so bestehen für die Perioden $\int_{(s_0)} dt_h = t_{h0}$ der Differentiale dt_h für jenen Weg und für die Charakteristiken (s_0, s_h) desselben Weges in bezug auf die Fundamentalwege s_h genau dieselben Gleichungen:

$$(120a) \quad t_{h0} = r_1t_{h1} + r_2t_{h2} + \dots + r_{2p}t_{h,2p}$$

und

$$(120b) \quad (s_0, s_h) = r_1(s_1, s_h) + \dots + r_{2p}(s_{2p}, s_h) \text{ d. h. } c_{0h} = r_1c_{1h} + \dots + r_{2p}c_{2p,h}.$$

36. Die Fundamentalsysteme von Periodenwegen für eine Riemannsche Fläche. Ist $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m)$ ein beliebiges System von Wegen, welches mit der Basis $(s_1, s_2, \dots, s_{2p})$ durch das rationale Substitutionssystem $R = (r_{\alpha\beta})$ ($\alpha = 1, 2, \dots, 2p$) ($\beta = 1, 2, \dots, m$) zusammenhängt, so folgt aus den vorigen Betrachtungen unmittelbar der Satz:

Die Anzahl der in $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m)$ enthaltenen linear unabhängigen Wege ist gleich dem Range des Systems $(r_{\alpha\beta})$. Dieses ist also dann und nur dann wieder eine Basis, wenn $m = 2p$ und $|r_{\alpha\beta}| \geq 0$ ist.

Sind ferner $\int_{(\sigma_\beta)} dt_\alpha = \tau_{\alpha\beta}$ die Perioden der Differentiale dt_α für die

Wege σ_β , so hängt auch das System $\mathfrak{T} = (\tau_{\alpha\beta})$ für das Wegsystem (σ_β) mit dem Periodensystem $T = (t_{\alpha\beta})$ für die Wege (s_β) durch die Gleichung

$$(121) \quad \mathfrak{T} = T\bar{R}, \quad \bar{R} = T^{-1}\mathfrak{T}$$

zusammen und da nach (117) auf p. 622 $|T| \geq 0$ ist, so haben T und R gleichen Rang; somit ergibt sich also der Satz:

Ist $(\sigma_1, \dots, \sigma_m)$ ein System geschlossener Wege und $T = (t_{\alpha\beta})$ das zugehörige Periodensystem der $2p$ Fundamentalintegrale für diese, so ist die Zahl der im Systeme (σ_i) enthaltenen linear unabhängigen Wege gleich dem Range von (T) . Also bilden diese stets und nur dann eine Basis für die Periodenwege, wenn $m = 2p$ und $|T| \geq 0$ ist.

Es sei nun $(s_1, s_2, \dots, s_{2p})$ eine beliebige Basis von Periodenwegen, und es mögen:

$$s = x_1 s_1 + x_2 s_2 + \dots + x_{2p} s_{2p}, \quad \sigma = y_1 s_1 + y_2 s_2 + \dots + y_{2p} s_{2p}$$

zwei beliebige geschlossene Wege auf \mathfrak{R} sein; dann besteht nach (120b) auf p. 624 für die Charakteristik von s und σ die folgende Gleichung:

$$(122) \quad (s, \sigma) = \sum_{g, h} (s_g, s_h) x_g y_h = \sum c_{gh} x_g y_h,$$

sie ist also eine bilineare alternierende Form der Zahlensysteme (x_i) und (y_i) , deren Koeffizientensystem aus allen Charakteristiken je zweier Wege der Basis (s_i) besteht; dieselbe soll *die Charakteristikenform für jene Basis* genannt werden.

Ersetzt man die Basis (s_i) durch irgend eine andere (\bar{s}_i) , welche aus jener durch eine Substitution $(k_{\alpha\beta})$ hervorgeht, so geht die zugehörige Charakteristikenform über in

$$(s, \sigma) = \sum \bar{c}_{gh} \bar{x}_g \bar{x}_h,$$

deren Koeffizientensystem mit dem vorigen durch die Gleichung:

$$(123) \quad (\bar{c}) = (\bar{k})(c)(k)$$

zusammenhängt.

Zwei Basissysteme (s_1, \dots, s_{2p}) und $(\bar{s}_1, \dots, \bar{s}_{2p})$ sollen *äquivalent* heißen, wenn sich die Wege des einen durch die andre Basis *ganz-zahlig* ausdrücken, oder was dasselbe ist, sobald sich aus ihnen durch Addition und Subtraktion dieselben Wege ableiten lassen. Dies ist dann und nur dann der Fall, wenn das Substitutionssystem (k) ganz-zahlig und unimodular ist, d. h. wenn die Determinante $|k| = \pm 1$ ist. Nennen wir also ganzzahlige bilineare Formen wie gewöhnlich *äquivalent*, wenn sie durch dieselbe ganzzahlige unimodulare Substitution für beide Variablensysteme ineinander übergehen, so ergibt sich der Satz:

Zu äquivalenten Fundamentalsystemen (s_i) und (\bar{s}_i) gehören äquivalente Charakteristikenformen und umgekehrt.

Bekanntlich kann man nun jede alternierende Form von $2p$ Variablen durch elementare umkehrbare ganzzahlige Transformationen auf die folgende äquivalente reduzierte Form bringen:

$e_1(\bar{x}_1\bar{y}_{p+1} - \bar{x}_{p+1}\bar{y}_1) + e_2(\bar{x}_2\bar{y}_{p+2} - \bar{x}_{p+2}\bar{y}_2) + \dots + e_p(\bar{x}_p\bar{y}_{2p} - \bar{x}_{2p}\bar{y}_p)$,
 wo die positiven Koeffizienten e_1, e_2, \dots, e_p dadurch eindeutig bestimmt sind, daß die Elementarteiler des ursprünglichen Systems der Reihe nach

$$e_1, e_1, e_2, e_2, \dots, e_p, e_p$$

sind. Jedes e_i ist also ein Teiler des folgenden e_{i+1} . Das Koeffizientensystem dieser reduzierten Form ist daher gleich

$$\begin{pmatrix} 0, & D \\ -D, & 0 \end{pmatrix},$$

wo 0 und D das Nullsystem und das Diagonalsystem p^{ter} Ordnung mit den Diagonalgliedern e_1, e_2, \dots, e_p ist.

Jede Basis $(s_1, s_2, \dots, s_{2p})$ mit den Elementarteilern e_1, e_2, \dots, e_p ist also einer andern Basis $(\bar{s}_1, \dots, \bar{s}_{2p})$ äquivalent, deren Charakteristikenform $\sum e_g(\bar{x}_g\bar{y}_{p+g} - \bar{x}_{p+g}\bar{y}_g)$ reduziert ist und dieselben Elementarteiler besitzt. Zwei Basen sind also dann und nur dann äquivalent, wenn ihre Charakteristikenformen dieselben Elementarteiler besitzen.

Das zu (s_1, \dots, s_{2p}) äquivalente reduzierte Periodensystem $(\bar{s}_1, \dots, \bar{s}_{2p})$ ist also dadurch charakterisiert, daß jeder seiner Wege mit nur einem einzigen anderen eine von Null verschiedene Charakteristik besitzt, daß nämlich allgemein:

$$(\bar{s}_\alpha, \bar{s}_{p+\alpha}) = -(\bar{s}_{p+\alpha}, \bar{s}_\alpha) = e_\alpha \quad (\alpha = 1, 2, \dots, p)$$

ist, während alle anderen Charakteristiken Null sind. Ist endlich $s = x_1\bar{s}_1 + x_2\bar{s}_2 + \dots + x_{2p}\bar{s}_{2p}$ ein beliebiger Weg, für welchen die x_i also auch rationale Brüche sein können, so bestimmen sich diese Koeffizienten aus der Charakteristikenform $(s, \sigma) = \sum e_g(\bar{x}_g\bar{y}_{p+g} - \bar{x}_{p+g}\bar{y}_g)$ für $\sigma = \bar{s}_{p+g}$ bzw. \bar{s}_g

$$(s, \bar{s}_{p+g}) = e_g x_g, \quad (s, \bar{s}_g) = -e_g x_{p+g}.$$

Jene Zahlen x_i fallen daher stets und nur dann ganz aus, wenn für diesen Weg die $2p$ Kongruenzen:

$$(s, \bar{s}_g) \equiv (s, \bar{s}_{p+g}) \equiv 0 \pmod{e_g}$$

sämtlich erfüllt sind. Sind also die Elementarteiler e_g sämtlich gleich Eins, ist also die Charakteristikenform die bilineare Einheitsform, so erhält jeder beliebige Periodenweg ganzzahlige Koeffizienten.

Mit Hilfe der bisher durchgeführten Transformation einer beliebigen Basis (s_i) auf die reduzierte Form (\bar{s}_i) zeige ich nun endlich, daß man für jede Riemannsche Fläche auch eine reduzierte Basis:

$$(s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(p)}; s^{(p+1)}, s^{(p+2)}, \dots, s^{(2p)})$$

finden kann, deren Charakteristikenform die Einheitsform wird, deren Elementarteiler also alle gleich Eins sind. Ein solches System und jedes ihm äquivalente soll ein *Fundamentalsystem* für \mathfrak{R} heißen. Durch ein solches System ist nach der soeben gemachten Bemerkung jeder andere Schnitt s *ganzzahlig* homogen d. h. durch Addition und Subtraktion darstellbar. Hiernach bilden also alle geschlossenen Schnitte auf \mathfrak{R} einen endlichen Modul der Ordnung $2p$, dessen Fundamentalsystem ein solches System $(s^{(i)})$ ist.

Um die Existenz solcher reduzierten Fundamentalsysteme zu beweisen, ist nur notwendig, zu zeigen, daß es Basissysteme gibt, für welche die Wege $(s^{(1)}, \dots, s^{(2p)})$ sich nicht selbst durchsetzen, die zugehörige Charakteristikenform aber reduziert ist und die Elementarteiler Eins besitzt. Nur die letzte dieser Forderungen bedarf noch der Erläuterung; ihre Erfüllbarkeit ergibt sich ohne weiteres aus dem folgenden leicht beweisbaren Satze:

Ist a ein Periodenweg, welcher nicht zur Hauptklasse gehört und sich nicht durchsetzt, so gibt es stets einen zweiten b , für welchen die Charakteristik $(a, b) = +1$ ist.⁷²⁾

Mit Benutzung dieses Satzes kann man nun allein mit Hilfe der vorher entwickelten Theoreme ein Fundamentalsystem auffinden.

Für ein solches ist dann jeder Periodenweg s auf \mathfrak{R} eindeutig in der Form:

$$(123a) \quad s = x_1 s_1 + x_2 s_2 + \dots + x_{2p} s_{2p}$$

darstellbar, worin die x_i ganze Zahlen, nämlich die Charakteristiken

$$(123b) \quad x_i = (s, s_{p+i}), \quad x_{p+i} = -(s, s_i) \quad (i = 1, 2, \dots, p)$$

sind, und für jedes Integral erster oder zweiter Gattung, welches auf diesem Wege s erstreckt wird, ergibt sich die Gleichung:

$$\int_{(s)} dt = x_1 \int_{(s_1)} dt + x_2 \int_{(s_2)} dt + \dots + x_{2p} \int_{(s_{2p})} dt.$$

Jede Periode eines solchen Integrales ist also eine ganzzahlige lineare Verbindung seiner $2p$ Hauptperioden für die Wege s_1, \dots, s_{2p} , deren Koeffizienten angeben, wie oft der Integrationsweg die Hauptschnitte s_i im positiven bzw. negativen Sinne überschreitet.

72) Vgl. B.-N., p. 428—429. [O]

37. Die Periodenrelationen der Integrale erster und zweiter Gattung. Bei der Wahl eines beliebigen Fundamentalsystems (s_i) von Periodenwegen geht die Charakteristikenform $\sum c_{ik} x_i y_k$ in die alternierende Einheitsform $\sum \varepsilon_{ik} x_i y_k$, also das System $C = (c_{ik})$ ihrer Charakteristiken in das alternierende Einheitssystem $E = \begin{pmatrix} 0, & E_p \\ -E_p, & 0 \end{pmatrix} = (\varepsilon_{ik})$ über. Ist also jetzt $T = (t_{ik})$ das zum Fundamentalsystem (s_i) gehörige Periodensystem, so geht die Gleichung $\bar{T} E T = -2\pi i C$ in die einfachere über:

$$(124) \quad \bar{T} E T = -2\pi i E.$$

Man kann diese Gleichung auf eine andre Form bringen, wenn man sie vorn mit E multipliziert und beachtet, daß $E^2 = -1$ ist; aus der dann sich ergebenden Gleichung $(E \bar{T})(E T) = 2\pi i$ folgt nämlich, daß $(E \bar{T})$ und $\frac{1}{2\pi i}(E T)$ reziprok also miteinander vertauschbar sind, und hieraus ergibt sich leicht

$$(125) \quad T E \bar{T} = -2\pi i E.$$

Man erhält so die beiden Sätze:

Die alternierende Hauptform $\sum \varepsilon_{ik} x_i y_k$ geht sowohl durch die kongruenten Transformationen:

$$x_\alpha = \sum t_{\alpha\beta} \bar{x}_\beta, \quad y_\alpha = \sum t_{\alpha\beta} \bar{y}_\beta$$

als auch durch ihre konjugierten:

$$x_\alpha = \sum t_{\beta\alpha} \bar{x}_\beta, \quad y_\alpha = \sum t_{\beta\alpha} \bar{y}_\beta$$

bis auf den Faktor $-2\pi i$ in sich selbst über.

Die beiden Systemgleichungen (124) und (125) fassen je $p(2p-1)$ bilineare Relationen zwischen den $4p^2$ Perioden $t_{\alpha\beta}$ der Fundamentalintegrale erster und zweiter Gattung t_1, t_2, \dots, t_{2p} zusammen; die erste liefert nämlich ausgeführt die Gleichungen:

$$(126) \quad \sum_{k=1}^p (t_{k\alpha} t_{p+k, \beta} - t_{p+k, \alpha} t_{k\beta}) = -2\pi i \varepsilon_{\alpha\beta} \\ (\alpha, \beta = 1, 2, \dots, 2p),$$

von denen jede diejenigen Perioden aller $2p$ Hauptintegrale enthält, welche sich auf eine bestimmte Kombination zweier Wege s_α und s_β beziehen; die zweite ergibt dagegen die Gleichungen:

$$(126a) \quad \sum_{k=1}^p (t_{\alpha k} t_{\beta, p+k} - t_{\alpha, p+k} t_{\beta k}) = -2\pi i \varepsilon_{\alpha\beta} \\ (\alpha, \beta = 1, 2, \dots, 2p);$$

jede dieser Relationen enthält die sämtlichen $2p$ Perioden je zweier

Hauptintegrale t_α und t_β . Die beiden Formelsysteme (124) und (125) werden gewöhnlich als die *Weierstraßsche* und die *Riemannsche* Form der Bilinearrelationen zwischen den Perioden der Integrale erster und zweiter Gattung unterschieden, weil die erste sich bei dem *Weierstraßschen* Verfahren der Ableitung aus dem Vertauschungssatze, die zweite bei der *Riemannschen* Methode der Randintegration als die ursprünglichere einstellt; beide Formen sind aber, wie wir soeben gesehen haben, völlig miteinander äquivalent. Im elliptischen Gebilde liefern diese Relationen die eine Gleichung

$$(126b) \quad \eta_2 \omega_1 - \eta_1 \omega_2 = 2\pi i$$

für die Perioden der elliptischen Integrale erster und zweiter Gattung, welche die *Legendresche Relation* genannt wird.

Geht man in der Gleichung (124) zu den Determinanten über, so ergibt sich $|T|^2 = (-2\pi i)^{2p}$, und eine leichte Determinantenbetrachtung zeigt, daß die Wurzelausziehung

$$(127) \quad |T| = |t_{\alpha\beta}| = (-2\pi i)^p$$

ergibt.

38. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Fundamentalsystemen von Periodenwegen. Ist (s_α) ein Fundamentalsystem von Periodenwegen und (σ_α) ein anderes, so hängen die Wege σ_α mit dem ersten Systeme durch ganzzahlige Gleichungen:

$$(128) \quad \sigma_\alpha = \sum_{(\beta)} m_{\beta\alpha} s_\beta$$

zusammen, deren Koeffizienten

$$m_{\beta\alpha} = (\sigma_\alpha, s_{\beta+\alpha}), \quad m_{p+\beta, \alpha} = -(\sigma_\alpha, s_\beta) \\ (\beta = 1, 2, \dots, p)$$

sind. Das Koeffizientensystem $M = (m_{\beta\alpha})$ muß gewissen leicht angebbaren notwendigen und hinreichenden Bedingungen genügen, wenn auch (σ_α) ein Fundamentalsystem sein soll. Sind nämlich wieder $T = (t_{\alpha\beta})$ und $\mathbb{T} = (\tau_{\alpha\beta})$ die zu (s_α) und (σ_α) gehörigen Periodensysteme der Fundamentalintegrale (t_i) , so folgt ja aus (128), daß $\mathbb{T} = TM$, daß also, da $|\mathbb{T}| = |T| = (-2\pi i)^p$ ist,

$$|M| = +1$$

sein muß. Diese Bedingung für (M) ist aber nur eine Folge aus einer andern sehr viel inhaltsreicheren. Da nämlich für beide Systeme $\bar{T}ET = \bar{\mathbb{T}}E\mathbb{T} = -2\pi iE$ sein muß, so ergibt sich für $\mathbb{T} = TM$ leicht:

$$\bar{M}EM = ME\bar{M} = E,$$

wo die zweite Gleichung aus der ersten, genau wie im vorigen Paragraphen in (125), hergeleitet wird.

Hängen also zwei Fundamentalsysteme (σ_α) und (s_α) durch die Gleichungen (128) zusammen, so geht die Charakteristikenform $E(x, y)$ sowohl durch die unimodularen Substitutionen:

$$(129) \quad x_\alpha = \sum m_{\alpha\beta} \bar{x}_\beta, \quad y_\alpha = \sum m_{\alpha\beta} \bar{y}_\beta$$

als auch durch die konjugierten Substitutionen:

$$(129a) \quad x_\alpha = \sum m_{\beta\alpha} \bar{x}_\beta, \quad y_\alpha = \sum m_{\beta\alpha} \bar{y}_\beta$$

in sich über.

Es besteht also für die $4p^2$ Substitutionskoeffizienten $m_{\alpha\beta}$ je ein System von $p(2p - 1)$ Bedingungsgleichungen, die man analog, wie vorher, in die äquivalenten Formen setzen kann

$$(130) \quad \begin{aligned} \sum (m_{\alpha k} m_{\beta, p+k} - m_{\alpha, p+k} m_{\beta k}) &= \varepsilon_{\alpha\beta} \\ \sum (m_{k\alpha} m_{p+k, \beta} - m_{p+k, \alpha} m_{k\beta}) &= \varepsilon_{\alpha\beta} \end{aligned} \quad (\alpha, \beta = 1, 2, \dots, 2p);$$

aus ihnen folgt die Gleichung $|M| = +1$ genau ebenso wie im vorigen Abschnitte. Für $p = 1$ liefern jene Gleichungen *nur* die Bedingung $|M| = 1$.

Die hier als notwendig begründete Bedingung $\bar{M}EM = E$ ist aber auch hinreichend dafür, daß die beiden Systeme (s) und (σ) äquivalent sind. Ist nämlich (s) ein Fundamentalsystem, also $\bar{T}ET = -2\pi iE$, M ein beliebiges ganzzahliges System, für welches $\bar{M}EM = E$ ist, und setzt man $T = TM$, so ergibt sich für T ohne weiteres die Gleichung $\bar{T}ET = -2\pi iE$, welche (nach p. 628) aussagt, daß die Wege $\sigma_\alpha = \sum_{(s)} m_{\beta\alpha} s_\beta$ ebenfalls ein Fundamentalsystem bilden.

Den Übergang von dem Periodensystem T zu T durch die Gleichungen $T = TM$ bezeichnet man als *lineare Transformation der Perioden*; hierbei bezieht sich der Ausdruck „linear“ darauf, daß die Determinante $|M|$ den Wert Eins hat. Eine Transformation der Perioden, deren Determinante gleich n ist und bei welcher die Charakteristikenform $E(x, y)$ in ihr n -faches übergeht, heißt *von der n ten Ordnung*; solche Transformationen und die ihnen entsprechenden Zerschneidungen ergeben sich, wenn die Punkte der *Riemannschen Fläche mehrdeutig* aufeinander bezogen werden.^{72a)}

39. Die Perioden der Integrale zweiter und dritter Gattung als Funktionen ihrer Unstetigkeitspunkte. Eine weitere Anwendung der Vertauschungsformel entscheidet die Frage, in welcher Weise die Perioden eines Integrales zweiter oder dritter Gattung mit veränderlichen Unstetigkeitspunkten von diesen abhängen.

Wenden wir zunächst auf das elementare Integral zweiter Gattung mit dem Pole \mathfrak{P} die Gleichung (110) unter der Voraussetzung

^{72a)} Vgl. II B 7, Nr. 9 ff.

an, daß der Weg $\mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2$ ein Periodenweg s_α ist, so ergeben sich die $2p$ Gleichungen:

$$(131) \quad \int_{(s_\alpha)} dt_{\overline{\mathfrak{P}}} = \sum_{k=1}^p (t_{k\alpha} dt_{p+k}(\overline{\mathfrak{P}}) - t_{p+k,\alpha} dt_k(\overline{\mathfrak{P}})), \quad (\alpha=1, 2, \dots, 2p).$$

Die sämtlichen Perioden des Elementarintegrals $t_{\overline{\mathfrak{P}}}$ mit dem einfachen Pole $\overline{\mathfrak{P}}$ sind lineare Kombinationen der für den Punkt $\overline{\mathfrak{P}}$ gebildeten Differentiale der $2p$ Fundamentalintegrale t_1, t_2, \dots, t_{2p} .

Nach der gleichen Methode bestimmen wir die zyklischen Perioden des Elementarintegrals dritter Gattung und finden die folgenden Gleichungen:

$$(131 a) \quad \int_{(\sigma)} d\overline{\omega}_{\Omega_1 \Omega_2} = \sum_{k=1}^p \left(t_{k\alpha} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} dt_{p+k} - t_{p+k,\alpha} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} dt_k \right),$$

falls der Weg σ von Ω_1 nach Ω_2 keinen der Periodenwege s_α schneidet; auf dieselbe Weise ergeben sich die logarithmischen Perioden $\int_{(k)} d\overline{\omega}_{\Omega_1 \Omega_2}$ gleich $\pm 2\pi i$.

Alle zyklischen Perioden des Elementarintegrals dritter Gattung mit den Unstetigkeitspunkten Ω_1 und Ω_2 und den Residuen -1 und $+1$ sind also lineare Kombinationen der $2p$ Fundamentalintegrale t_1, t_2, \dots, t_{2p} , wenn dieselben von Ω_1 nach Ω_2 auf einem Wege σ erstreckt werden, der keinen der Periodenwege s_1, s_2, \dots, s_{2p} schneidet; sie sind also, als Funktionen der Unstetigkeitspunkte betrachtet, Integrale zweiter Gattung; die logarithmischen Perioden sind $\pm 2\pi i$.

Hieraus folgt, daß das Integral

$$(132) \quad \overline{\omega}_{\Omega_1 \Omega_2} = \overline{\omega}_{\Omega_1 \Omega_2} + \sum_1^p (c_k t_{p+k} - c_{p+k} t_k),$$

in welchem $\int_{\Omega_1}^{\Omega_2} dt_k = c_k, \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} dt_{p+k} = c_{p+k}$ gesetzt ist, gar keine zyklischen Perioden besitzt, weil sich diese wegen (131 a) alle fort-heben; und da das Analoge natürlich auch von einem Integrale mit beliebig vielen logarithmischen Stellen und auch von jedem Integrale mit bloß polaren Unstetigkeiten gilt (vgl. p. 617), so erhalten wir den Satz:

Jedes beliebige *Abelsche* Integral ω läßt sich durch Hinzufügung eines Integrals t mit einem einzigen Pole \mathfrak{P}_∞ , der von den logarithmischen Stellen von ω verschieden ist, seiner zyklischen Perioden berauben.

Die logarithmischen Perioden des Integrales bleiben dabei ungeändert. Sind also die Residuen von ω durchweg ganze Zahlen m_v , so besitzt das in der angegebenen Weise reduzierte Integral $\bar{\omega} = \omega + t$ nur noch Perioden der Form $2\pi i m_v$; die Exponentialfunktion:

$$(133) \quad e^{\bar{\omega}(\mathfrak{P})} = \Pi_0(\mathfrak{P})$$

ist also eine eindeutige Funktion des Ortes auf der *Riemannschen* Fläche.

40. Die Primfunktionen. Zerlegung der Funktionen des Körpers in Primfunktionen. Nach den bisher abgeleiteten Resultaten sind wir nun instande, mit Hilfe der Integrale dritter Gattung Funktionen mit einfacher Nullstelle und einfachem Pole zu bilden, welche aber natürlich im allgemeinen nicht mehr eindeutig auf \mathfrak{R} sind, sondern bei Fortsetzung längs eines geschlossenen Weges konstante Faktoren erhalten.

Ist nämlich zunächst $w(\mathfrak{P}) = C_1 w_1 + C_2 w_2 + \dots + C_p w_p$ ein beliebiges Integral erster Gattung, so ist

$$(134) \quad E(\mathfrak{P}) = e^{w(\mathfrak{P})}$$

eine Funktion, welche auf der ganzen *Riemannschen* Fläche regulär ist und weder Null- noch Unendlichkeitsstellen hat; diese sollen daher als *transzendente Einheitsfunktionen* bezeichnet werden. Ferner ist die Exponentialfunktion

$$(135) \quad \Pi\left(\mathfrak{P}, \frac{\mathfrak{D}_2}{\mathfrak{D}_1}\right) = e^{\bar{\omega}_{\mathfrak{D}_1 \mathfrak{D}_2}(\mathfrak{P})},$$

deren Exponent das vorher bestimmte Integral dritter Gattung mit den Unstetigkeitspunkten $\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2$ und den Residuen $-1, +1$ ist, dem Divisor $\frac{\mathfrak{D}_2}{\mathfrak{D}_1}$ zugeordnet, da sie nur in \mathfrak{D}_2 eine Nullstelle und nur in \mathfrak{D}_1 einen Pol erster Ordnung besitzt, in allen anderen Punkten aber eine reguläre Einheitsfunktion ist. Deswegen heiße Π eine zum Divisor $\frac{\mathfrak{D}_2}{\mathfrak{D}_1}$ gehörige Primfunktion. Sowohl die Einheits- als die Primfunktionen sind auf \mathfrak{R} nicht eindeutig, sondern sie multiplizieren sich bei Fortsetzung längs eines Periodenweges mit einem Faktor e^c , wenn c der zugehörige Periodizitätsmodul des Exponenten ist. Hierbei bleiben aber bei den Primfunktionen die logarithmischen Perioden außer Betracht, da für sie c ein Multiplum von $2\pi i$ ist.

Ist endlich

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1^{\mu_1} \mathfrak{D}_2^{\mu_2} \dots \mathfrak{D}_h^{\mu_h} \quad (\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_h = 0)$$

irgendein Divisor nullter Ordnung und \mathfrak{D}_0 ein beliebiger Hilfspunkt, so ist die allgemeinste im gleichen Sinne zu \mathfrak{D} gehörige Funktion:

$$(136) \quad P(\mathfrak{P}) = E(\mathfrak{P}) \Pi \left(\mathfrak{P}, \frac{\mathfrak{D}_1}{\mathfrak{D}_0} \right)^{\mu_1} \cdot \Pi \left(\mathfrak{P}, \frac{\mathfrak{D}_2}{\mathfrak{D}_0} \right)^{\mu_2} \dots \Pi \left(\mathfrak{P}, \frac{\mathfrak{D}_h}{\mathfrak{D}_0} \right)^{\mu_h} \\ = e^{\mu_1 \bar{w}_{\mathfrak{D}_0 \mathfrak{D}_1} + \mu_2 \bar{w}_{\mathfrak{D}_0 \mathfrak{D}_2} + \dots + \mu_h \bar{w}_{\mathfrak{D}_0 \mathfrak{D}_h} + c_1 w_1 + c_2 w_2 + \dots + c_p w_p},$$

weil sie offenbar in \mathfrak{D}_0 die Ordnungszahl Null hat und daher genau dem Divisor \mathfrak{D} entspricht.⁷³⁾

Ich untersuche nun, unter welchen Bedingungen \mathfrak{D} zur Hauptklasse gehört. Dann muß es möglich sein, die Konstanten C_i so zu bestimmen, daß die den Fundamentalperioden s_α entsprechenden Multiplikatoren e^{c_α} sämtlich gleich 1, ihre Exponenten c_α also Multipla von $2\pi i$ werden. Es müssen also nach (131a) für diese Exponenten die folgenden Gleichungen bestehen:

$$c_\alpha = \sum_{k=1}^p (t_{k\alpha} Q_k - t_{p+k,\alpha} Q_{p+k}) = 2\pi i n_\alpha,$$

wo die n_α ganze Zahlen sind und allgemein

$$Q_k = \mu_1 \int_{\mathfrak{D}_0}^{\mathfrak{D}_1} dt_{p+k} + \mu_2 \int_{\mathfrak{D}_0}^{\mathfrak{D}_2} dt_{p+k} + \dots + \mu_h \int_{\mathfrak{D}_0}^{\mathfrak{D}_h} dt_{p+k}, \\ Q_{p+k} = \mu_1 \int_{\mathfrak{D}_0}^{\mathfrak{D}_1} dt_k + \mu_2 \int_{\mathfrak{D}_0}^{\mathfrak{D}_2} dt_k + \dots + \mu_h \int_{\mathfrak{D}_0}^{\mathfrak{D}_h} dt_k - C_k$$

ist; durch Auflösung dieser Gleichungen mit Hilfe der allgemeinen Periodenrelationen (126a) ergeben sich leicht die Bedingungen:

$$Q_k = - \sum_{\alpha=1}^p n_\alpha t_{p+k, p+\alpha} + \sum_1^p n_{p+\alpha} t_{p+k, \alpha}, \quad (k = 1, 2, \dots, p) \\ Q_{p+k} = - \sum_1^p n_\alpha t_{k, p+\alpha} + \sum_1^p n_{p+\alpha} t_{k, \alpha},$$

73) Derartige „multiplikative“ Funktionen, sowie allgemeiner Funktionensysteme, die sich beim Durchlaufen geschlossener Wege auf der *Riemannschen* Fläche linear substituieren, sind Gegenstand selbständiger Untersuchungen gewesen, insbesondere von *E. Ritter* (Gött. Nachr. 1893/4/5; Math. Ann. 44, 47), der die Formentheorie benutzt und die in geeigneter Weise verallgemeinerten Sätze über Basissysteme heranzieht, und in der letzten Zeit von *R. König*, der auf die homogene Schreibweise verzichtet und die Divisorensymbolik benutzt (vgl. das Referat von *R. König* in den Münch. Ber. 1918, p. 47 ff, wo die anderen Arbeiten zitiert werden). Über andere bezügliche Untersuchungen vgl. die Literaturangaben in den *König*-chen Arbeiten, sowie *B.*, p. 393–442.

In diesen Untersuchungen gelingt es, auf die multiplikativen Funktionen und allgemeinen Funktionenscharen eine Reihe von Sätzen der Theorie der algebraischen Funktionen auszudehnen, insbesondere den *Riemann-Rochschen* Satz, Partialbruchzerlegung der Integrale usw. [O]

von denen die p ersten ein System von notwendigen Bedingungen für die Zugehörigkeit von \mathfrak{D} zur Hauptklasse liefern, während die p letzten dann die p Konstanten C_i bestimmen. Die rechten Seiten dieser Gleichungen sind aber die zusammengehörigen Perioden der Integrale $t_{p+1}, t_{p+2}, \dots, t_{2p}, t_1, t_2, \dots, t_p$, genommen auf einem und demselben Periodenwege

$$s = n_1 s_1 + n_2 s_2 + \dots + n_{2p} s_{2p},$$

für welchen nach (123 b) die Charakteristiken $(s, s_\alpha) = n_\alpha$ sind. Bezeichnen wir also im folgenden wieder die Integrale erster Gattung t_{p+1}, \dots, t_{2p} , die hier wieder in eine bevorzugte Stellung rücken, wie früher durch w_1, \dots, w_p und ihre Perioden $t_{p+k, p+i}$ durch $-\omega_{ki}$, die Perioden $t_{p+k, i}$ durch $+\omega_{ki, p+i}$, so kann dieses Resultat in dem folgenden Fundamentalsatz zusammengefaßt werden:

Wenn für einen Divisor \mathfrak{D} der Ordnung Null die p Summen von Integralen erster Gattung:

$$(137) \quad Q_k = \mu_1 \int_{\Omega_0}^{\Omega_1} dw_k + \mu_2 \int_{\Omega_0}^{\Omega_2} dw_k + \dots + \mu_n \int_{\Omega_0}^{\Omega_k} dw_k$$

$$(k = 1, 2, \dots, p)$$

ein System zusammengehöriger Periodizitätsmoduln für einen und denselben geeignet gewählten Periodenweg $s = n_1 s_1 + \dots + n_{2p} s_{2p}$ bilden, so daß die Gleichungen

$$(137 a) \quad Q_k = \int_{(s)} dw_k \quad (k = 1, 2, \dots, p)$$

sämtlich erfüllt sind, so gehört dieser Divisor zur Hauptklasse.

Die Umkehrbarkeit dieses Satzes wird sich aus dem *Abelschen* Theorem ergeben.

Während die hier benutzten Primfunktionen, abgesehen von Polen, regulär aber nicht eindeutig sind, kann man dem Vorgange von *Weierstraß* folgend an ihrer Stelle auch solche Primfunktionen einführen, welche auf \mathfrak{R} durchweg eindeutig sind und dafür eine wesentliche Singularität nach Art der Exponentialfunktion besitzen, die beim Übergang zum Logarithmus zu einer polaren Unstetigkeit wird. Man kann nämlich nach der Bemerkung am Schluß des vorigen Paragraphen zu $\bar{w}_{\Omega_1 \Omega_2}$ ein solches Integral zweiter Gattung mit dem Pole \mathfrak{P}_∞ hinzufügen, daß $\bar{w}_{\Omega_1 \Omega_2} = \bar{w}_{\Omega_1 \Omega_2} + t$ gar keine zyklischen Perioden besitzt, so daß also

$$e^{\bar{w}_{\Omega_1 \Omega_2}} = \Pi_0 \left(\mathfrak{P}, \frac{\Omega_2}{\Omega_1} \right)$$

auf \mathfrak{R} eindeutig ist. Dasselbe gilt von einem Produkte

$$(138) \quad P_0 = \Pi_0 \left(\mathfrak{P}, \frac{\Omega_1}{\Omega_0} \right)^{\mu_1} \dots \Pi_0 \left(\mathfrak{P}, \frac{\Omega_h}{\Omega_0} \right)^{\mu_h},$$

und dieses besitzt in $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_h$ Nullstellen oder Pole, hat aber überdies noch in \mathfrak{P}_∞ eine wesentliche Singularität von der Art, daß sein Logarithmus daselbst wie ein Integral zweiter Art unendlich wird. Will man dann aus dem Komplex der so erhaltenen Funktionen die Größen von der Hauptklasse aussondern, so hat man die Bedingung dafür aufzustellen, daß die singuläre Stelle bei \mathfrak{P}_∞ fortfällt. Auch hierfür ergeben sich p Gleichungen, da es p eigentliche Integrale zweiter Gattung gibt.

41. Das Abelsche Theorem als Additionsprinzip der Integrale.

Zum *Abelschen* Theorem in seiner allgemeinsten Gestalt führt die folgende einfache Betrachtung: Es seien $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \mathfrak{A}_2 \dots \mathfrak{A}_r$ und $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \mathfrak{B}_2 \dots \mathfrak{B}_r$ zwei beliebige äquivalente ganze Divisoren und also $x = \frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{A}}$ eine algebraische Funktion r^{ter} Ordnung. Ist dann \mathfrak{R}_x die zugehörige r -blättrige *Riemannsche* Fläche, \mathfrak{R}_x die einblättrige Kugelfläche, so entsprechen jedem Punkte p ($x = a$) auf \mathfrak{R}_x die r Punkte $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_r$ auf \mathfrak{R}_x , speziell gehören zum Punkte $p = \infty$ und $p = 0$ die Punkte \mathfrak{A}_i und \mathfrak{B}_i ; jedem Wege etwa von ∞ nach 0 entsprechen die r kongruenten genau untereinander verlaufenden Wege, welche bei geeigneter Bezeichnung von \mathfrak{A}_i nach \mathfrak{B}_i führen.

Ist nun für x als unabhängige Variable

$$d\omega = \xi_x \cdot dx$$

die Darstellung eines ganz beliebigen *Abelschen* Differentiales und sind $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ die r konjugierten Werte von ξ_x , so besteht für die Spur $S(\xi_x)$ eine Gleichung

$$S(\xi_x) = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_r = R(x),$$

wo $R(x)$ eine bestimmte rationale Funktion von x bedeutet. Multipliziert man diese Gleichung mit dx , integriert sie rechts zwischen ∞ und 0 auf einem beliebigen Wege, welchem links die kongruenten Wege von \mathfrak{A}_i nach \mathfrak{B}_i entsprechen, so ergibt sich das allgemeine *Abelsche* Theorem in der Gleichung:

$$(139) \quad \int_{\mathfrak{A}_1}^{\mathfrak{B}_1} d\omega + \int_{\mathfrak{A}_2}^{\mathfrak{B}_2} d\omega + \dots + \int_{\mathfrak{A}_r}^{\mathfrak{B}_r} d\omega = \int_{\infty}^0 R(x) dx.$$

Nach dem *Abelschen* Theorem können also Integrale mit gleichem Integranden durch das Integral einer rationalen Funktion summiert werden, sobald die Vereinigung ihrer unteren und ihrer oberen Grenzen zwei ganze Divisoren derselben Klasse liefert.

Ich spezialisiere das *Abelsche Theorem* zunächst für die drei Hauptfälle, daß $d\omega$ ein Integral erster, zweiter oder dritter Gattung ist. In diesen Fällen liefert der Hilfssatz (72) über die Spur von Funktionen des Körpers unmittelbar die folgenden Resultate:

1. Für Integrale erster Gattung ist stets:

$$(139 a) \quad \int_{\mathfrak{A}_1}^{\mathfrak{B}_1} dw + \int_{\mathfrak{A}_2}^{\mathfrak{B}_2} dw + \cdots + \int_{\mathfrak{A}_r}^{\mathfrak{B}_r} dw = 0,$$

wenn wie immer die Integrale auf übereinander verlaufenden Wegen in der Fläche \mathfrak{R}_x geleitet werden.

2. Ist zweitens $t_\mu = \int \xi dx$ ein Elementarintegral zweiter Gattung mit dem μ -fachen Pole \mathfrak{D} , welcher auf \mathfrak{R}_x ein α -blättriger Verzweigungspunkt sein mag, und ist q der Wert, welchen x in \mathfrak{D} annimmt, so folgt aus demselben Hilfssatz fast unmittelbar, daß die Summe

$$(139 b) \quad \int_{\mathfrak{A}_1}^{\mathfrak{B}_1} dt_\mu + \int_{\mathfrak{A}_2}^{\mathfrak{B}_2} dt_\mu + \cdots + \int_{\mathfrak{A}_r}^{\mathfrak{B}_r} dt_\mu$$

eine ganze Funktion des $\left[\frac{\mu}{\alpha}\right]^{\text{ten}}$ Grades von $\frac{1}{q}$ ist, deren Koeffizienten durch die des Hauptteiles der für die Umgebung von \mathfrak{D} geltenden Reihenentwicklung von ξ bestimmt sind.

3. Ist endlich $\bar{\omega}_{12} = \int \xi dx$ ein Elementarintegral dritter Gattung mit den logarithmischen Stellen \mathfrak{D}_1 und \mathfrak{D}_2 und den Residuen -1 und $+1$, so liefert dieser Hilfssatz sofort die Gleichung:

$$(139 c) \quad \int_{\mathfrak{A}_1}^{\mathfrak{B}_1} d\bar{\omega}_{12} + \int_{\mathfrak{A}_2}^{\mathfrak{B}_2} d\bar{\omega}_{12} + \cdots + \int_{\mathfrak{A}_r}^{\mathfrak{B}_r} d\bar{\omega}_{12} = \lg \frac{q_2}{q_1},$$

wenn q_1 und q_2 die Werte sind, welche x in \mathfrak{D}_1 und \mathfrak{D}_2 annimmt.

Die bisher in diesem Abschnitt aufgestellten Integralsätze waren an die Bedingung geknüpft, daß alle Integrationswege $l_h = \overline{\mathfrak{A}_h \mathfrak{B}_h}$ in \mathfrak{R}_x übereinanderlaufen, daß diese Wege also auf einer anderen Fläche \mathfrak{R}_h in ganz bestimmter Weise von \mathfrak{A}_h nach \mathfrak{B}_h geführt werden. Es ist leicht, sich von dieser Beschränkung freizumachen: Erstreckt man nämlich diese Integrale in einer Fläche \mathfrak{R}_z auf beliebigem Wege λ_h von \mathfrak{A}_h nach \mathfrak{B}_h , so tritt zu den Gleichungen des *Abelschen Theorems* in jedem Falle nur eine Periode hinzu, und es ist wesentlich, sich klarzumachen, daß die ganzen Zahlen, welche die spezielle Periode charakterisieren, bei allen Integralen erster und zweiter Gattung allein von den Integrationswegen, nicht aber von den Integranden abhängen, daß also bei Anwendung des *Abelschen Theorems* auf ein System

von Integralen die auftretenden Perioden sich sämtlich auf den gleichen Weg beziehen und daher dasselbe Koeffizientensystem erhalten.

Für Integrale erster Gattung kann man somit das allgemeinste *Abelsche* Theorem in der folgenden Form aussprechen, in welcher es die genaue Umkehrung des Fundamentalsatzes (137) ist:

Ist $\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1^{\mu_1} \mathfrak{D}_2^{\mu_2} \dots \mathfrak{D}_h^{\mu_h}$ ein Divisor der Hauptklasse, so bilden die p Summen von Integralen erster Gattung:

$$(140) \mu_1 w_k(\mathfrak{D}_1) + \dots + \mu_h w_k(\mathfrak{D}_h) = n_1 \omega_{k1} + n_2 \omega_{k2} + \dots + n_{2p} \omega_{k,2p} \\ (k = 1, 2, \dots, p)$$

ein System zusammengehöriger Periodizitätsmoduln der Integrale w_1, w_2, \dots, w_p .

Hiernach und nach (137) bilden diese p Gleichungen die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß ein Divisor der Ordnung Null der Hauptklasse angehört.

Um diesen Satz und die aus ihm zu ziehenden Folgerungen einfacher aussprechen und übersehen zu können, wollen wir zwei beliebige Zahlensysteme (a_1, a_2, \dots, a_p) und (b_1, b_2, \dots, b_p) *longruent* nennen $((a_k) \equiv (b_k))$, wenn sich je zwei entsprechende Elemente a_k und b_k nur um zusammengehörige Perioden $\int_{(a)} dw_k$ der p Integrale erster Gattung unterscheiden, wenn also die p Gleichungen:

$$a_k = b_k + n_1 \omega_{k1} + n_2 \omega_{k2} + \dots + n_{2p} \omega_{k,2p} \quad (k = 1, 2, \dots, p)$$

für dasselbe ganzzahlige System n_1, n_2, \dots, n_{2p} erfüllt sind. Solche Kongruenzen können offenbar addiert und subtrahiert werden. Dann nehmen die Gleichungen (140) des *Abelschen* Theorems die einfachere Form an:

$$(140 a) \quad \mu_1 w_k(\mathfrak{D}_1) + \mu_2 w_k(\mathfrak{D}_2) + \dots + \mu_h w_k(\mathfrak{D}_h) \equiv 0.$$

Wir wollen zweitens durch eine einfache Modifikation die Beschränkung auf Divisoren der Ordnung Null beseitigen. Wählen wir als untere Grenze der Integrale w_1, w_2, \dots, w_p (wie in Nr. 33) den Punkt \mathfrak{P}_∞ , und ist P_∞ seine Klasse, so sind dieselben Gleichungen (140 a) für einen beliebigen Divisor \mathfrak{D} dann und nur dann erfüllt, wenn \mathfrak{D} einer der Klassen P_∞^c , also der durch P_∞ erweiterten Hauptklasse ($\dots P_\infty^{-2}, P_\infty^{-1}, 1, P_\infty, P_\infty^2, \dots$) angehört, weil die dann hinzutretenden

bzw. fortfallenden Integrale $\int_{\mathfrak{P}_\infty} dw$ kongruent Null sind.

Betrachten wir nun ganz allgemein einen Divisor

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1^{\mu_1} \mathfrak{D}_2^{\mu_2} \dots \mathfrak{D}_h^{\mu_h}$$

einer ganz beliebigen Klasse so möge für ihn

$$(140\text{ b}) \quad \mu_1 w_k(\mathfrak{D}_1) + \dots + \mu_h w_k(\mathfrak{D}_h) \equiv v_k \quad (k = 1, 2, \dots, p)$$

sein. Dann heie $(v_k) = (v_1, \dots, v_p)$ das dem Divisor \mathfrak{D} entsprechende Wertsystem. Dann entspricht also nach dem Abelschen Theorem der durch P_∞ erweiterten Hauptklasse das Wertsystem $(0, \dots, 0)$. Sind ferner \mathfrak{D} und \mathfrak{D}' zwei beliebige Divisoren, (v_k) und (v'_k) ihre Wertsysteme, so entsprechen den Divisoren $\mathfrak{D}\mathfrak{D}'$ und $\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{D}'}$ die Wertsysteme $(v_k + v'_k)$, und $(v_k - v'_k)$, und \mathfrak{D} und \mathfrak{D}' sind stets und nur dann in bezug auf die Klasse P_∞ äquivalent, wenn $(v_k) \equiv (v'_k)$ ist. Sieht man also kongruente Wertsysteme als nicht wesentlich verschieden an, so entspricht jeder Klasse relativ äquivalenter Divisoren ein und nur ein Wertsystem. Jede solche Klasse wird durch ein System von p Zahlen (v_1, v_2, \dots, v_p) charakterisiert. Hier ist aber zu bemerken, da das Wertsystem (v_k) , welches einem Divisor von nicht verschwindender Ordnung entspricht, von der Auswahl des Punktes \mathfrak{P}_∞ abhängig ist und bei Veränderung dieses Punktes sich ebenfalls ändert; allein für die Divisoren der Ordnung Null ist das entsprechende Wertsystem (v_k) wegen der Gleichung $\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_h = 0$ von der Auswahl von \mathfrak{P}_∞ unabhängig.

42. Die aus dem Abelschen Theorem folgenden Reduktionsprobleme. Das Abelsche Theorem ermöglicht nun die vollständige Lösung der folgenden Fundamentalaufgabe:

Es sei ein ganz beliebiger Divisor der Ordnung d

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1^{\mu_1} \mathfrak{D}_2^{\mu_2} \dots \mathfrak{D}_h^{\mu_h} \quad (\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_h = d)$$

und ein Primteiler \mathfrak{P}_∞ gegeben. Dann sollen die zugehörigen p Integralsummen:

$$s_i = \mu_1 \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{D}_1} dw_i + \dots + \mu_h \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{D}_h} dw_i$$

durch p andere Integralsummen:

$$\sigma_i = \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{P}_1} dw_i + \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{P}_2} dw_i + \dots + \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{P}_q} dw_i$$

mit gleicher unterer Grenze und möglichst wenigen Summanden so ersetzt werden, da allgemein $s_i \equiv \sigma_i$, da also bei geeignet gewählten Integrationswegen $s_i = \sigma_i$ wird.

Sind D und P_∞ die zu \mathfrak{D} und \mathfrak{P}_∞ gehörigen Klassen, so stimmt diese Aufgabe mit der folgenden überein:

Es soll die kleinste Potenz P_∞^e von P_∞ so bestimmt werden, da

$$\{DP_\infty^e\} = 1$$

ist. Ist nämlich diese Bedingung erfüllt und $q = d + e$ die Ordnung der Klasse DP_∞^e , so gibt es in dieser einen einzigen ganzen Divisor $\mathfrak{G} = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \dots \mathfrak{P}_q$, für welchen $\mathfrak{D} \mathfrak{P}_\infty^e = \mathfrak{D} \mathfrak{P}_\infty^{q-d} \sim \mathfrak{G}$, also

$$\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{P}_\infty^d} \sim \frac{\mathfrak{G}}{\mathfrak{P}_\infty^q}$$

ist, und aus dieser Äquivalenz folgen nach dem *Abelschen* Theorem die p Kongruenzen $s_i \equiv \sigma_i$ und umgekehrt. Wir haben hiernach nur noch die Ordnung q von \mathfrak{G} zu bestimmen und dann diesen Divisor selbst darzustellen.

Aus dem *Riemann-Rochschen* Satze ergibt sich zunächst unmittelbar, daß q gleich p oder kleiner als p sein muß, und daß der letzte Fall nur ausnahmsweise auftreten kann, weil die obere Grenze p z. B. immer dann erreicht wird, wenn \mathfrak{D} aus p willkürlich ausgewählten Primteilern besteht.

Eine beliebige Anzahl von *Abelschen* Integralen erster Gattung läßt sich also stets in eine Summe von nur p , im allgemeinen aber nicht in eine Summe von weniger als p Integralen mit fester unterer Grenze zusammenfassen.

Die wirkliche Darstellung des zu \mathfrak{D} gehörigen Divisors $\mathfrak{G} = \mathfrak{P}_1 \dots \mathfrak{P}_p$ brauchen wir nur in den beiden Hauptfällen durchzuführen, in denen $\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 \mathfrak{D}_2 \dots \mathfrak{D}_r$ ein ganzer Divisor mit beliebigen Primfaktoren oder aber der reziproke eines solchen ist; einmal nämlich kommen diese Fälle vorzugsweise bei den Anwendungen in Betracht, und zweitens kann der allgemeinste Fall leicht auf diese reduziert werden. In diesen beiden Fällen sind zu den p Integralsummen:

$$s_i = \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{D}_1} dw_i + \dots + \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{D}_r} dw_i$$

die Summen

$$\sigma_i = \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{P}_1} dw_i + \dots + \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{P}_p} dw_i$$

so hinzuzufügen, daß die p Kongruenzen

$$s_i - \sigma_i \equiv 0 \quad \text{bzw.} \quad s_i + \sigma_i \equiv 0 \quad (i = 1, 2, \dots, p)$$

erfüllt sind. Ferner erkennt man leicht, daß die erste Reduktionsaufgabe durch zweimalige Lösung der zweiten gelöst werden kann. Ist nämlich $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 \mathfrak{R}_2 \dots \mathfrak{R}_p$ zuerst für \mathfrak{D} so bestimmt, daß für seine Integralsummen ρ_i $s_i + \rho_i \equiv 0$ ist, und bestimmt man weiter zu \mathfrak{R} den Divisor $\mathfrak{G} = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \dots \mathfrak{P}_p$ so, daß seine Integralsummen σ_i die Kongruenzen $\rho_i + \sigma_i \equiv 0$ erfüllen, so folgt durch Subtraktion jener beiden Systeme, daß wirklich $s_i - \sigma_i \equiv 0$ ist. Wir wollen daher nur

den zweiten Fall untersuchen, obwohl der erste auch direkt leicht behandelt werden kann.⁷⁴⁾

Sind nun r beliebige Punkte $\mathfrak{D}_i = (z_i, u_i)$ gegeben, und sind die p Punkte $\mathfrak{P}_k = (\xi_k, \eta_k)$ so zu bestimmen, daß die p Kongruenzen $s_i + \sigma_i \equiv 0$ erfüllt sind, so ist diejenige Funktion

$$\psi(z, u) = \frac{\mathfrak{D}_1 \dots \mathfrak{D}_r \cdot \mathfrak{P}_1 \dots \mathfrak{P}_p}{\mathfrak{P}_\infty^{r+p}} = \frac{\mathfrak{D} \cdot \mathfrak{G}}{\mathfrak{P}_\infty^{r+p}}$$

zu bestimmen, welche ein Multiplum von $\frac{\mathfrak{D}_1 \dots \mathfrak{D}_r}{\mathfrak{P}_\infty^{r+p}}$ ist.

Ist nun $r \geq p - 1$ oder r ganz beliebig, aber \mathfrak{P}_∞ nicht gerade ein *Weierstraßpunkt*, so ist nach dem *Riemann-Rochschen* Satze $\{\mathfrak{P}_\infty^{r+p}\} = r + 1$; es gibt dann also genau $r + 1$ linear unabhängige Funktionen $\psi^{(0)}, \psi^{(1)}, \dots, \psi^{(r)}$ mit dem Nenner $\mathfrak{P}_\infty^{r+p}$, welche leicht aus dem zu \mathfrak{P}_∞ gehörigen normalen Fundamentalsystem zu finden sind. Also ist die gesuchte Funktion $\psi = C_0 \psi^{(0)} + C_1 \psi^{(1)} + \dots + C_r \psi^{(r)}$, wo nur die Konstanten C_i so zu wählen sind, daß $\psi(\mathfrak{D}_i) = 0$ ist. Setzt man also zur Abkürzung allgemein $\psi^{(h)}(\mathfrak{D}_i) = \psi_i^{(h)}$, so ist die gesuchte Funktion ψ durch die Gleichung:

$$\psi = \begin{vmatrix} \psi^{(0)} & \psi^{(1)} & \dots & \psi^{(r)} \\ \psi_1^{(0)} & \psi_1^{(1)} & \dots & \psi_1^{(r)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_r^{(0)} & \psi_r^{(1)} & \dots & \psi_r^{(r)} \end{vmatrix}$$

eindeutig bestimmt, falls nur die Matrix $(\psi_i^{(h)})$ vom Range r ist, und der Übergang zur Norm ergibt $n(\mathfrak{G}) = \frac{n(\psi)}{n(\mathfrak{D})}$; d. h.:

$$\frac{n(\psi)}{(z - z_1) \dots (z - z_r)} = \chi_0 z^p + \chi_1 z^{p-1} + \dots + \chi_p = \chi_0 (z - \xi_1) \dots (z - \xi_p);$$

die Zerlegung dieses Quotienten in seine Linearfaktoren liefert die z -Koordinaten ξ_k der p gesuchten Punkte \mathfrak{P}_k . Zu ihrer Bestimmung bedarf man also der Auflösung einer Gleichung p^{ten} Grades, deren Koeffizienten rational von $\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \dots, \mathfrak{D}_r$ abhängen. Die zugehörigen Werte η_k folgen aus den Gleichungen $\psi(\xi_k, \eta_k) = 0$. Die Anwendung dieser Betrachtungen auf die Gleichung $u^2 = 4z^3 - g_2 z - g_3$ liefert z. B. das Additionstheorem für die \wp -Funktion.

43. Das Umkehrproblem für die Abelschen Integrale. Durch die Auseinandersetzungen von Nr. 41 Ende ist festgestellt worden, daß jedem beliebigen Divisor $\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1^{\mu_1} \mathfrak{D}_2^{\mu_2} \dots \mathfrak{D}_h^{\mu_h}$ durch die p Gleichungen:

$$(141) \quad \mu_1 \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{D}_1} dw_i + \mu_2 \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{D}_2} dw_i + \dots + \mu_h \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{D}_h} dw_i \equiv v_i \quad (i = 1, 2, \dots, p)$$

⁷⁴⁾ Vgl. *H.-L.*, p. 685–691.

ein Wertsystem (v_1, \dots, v_p) zugeordnet wird, welches nur nach seinem Kongruenzwert modulo der Perioden in Betracht kommt, und daß solchen Divisoren, welche im eigentlichen Sinne oder auch nur in bezug auf die Klasse P_∞ von \mathfrak{P}_∞ äquivalent sind, kongruente Wertsysteme entsprechen.

Durch die letzten Entwicklungen aber hat sich ergeben, daß jeder beliebige Divisor durch einen und im allgemeinen auch nur einen ganzen Divisor der Ordnung p : $\mathfrak{G} = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \dots \mathfrak{P}_p$, das obige System (141) also durch folgendes:

$$(141a) \quad \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{P}_1} dw_i + \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{P}_2} dw_i + \dots + \int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{P}_p} dw_i \equiv v_i \quad (i = 1, 2, \dots, p)$$

ersetzt werden kann. Man kann also die Untersuchung auf *die ganzen Divisoren der Ordnung p* beschränken; jeder derselben konstituiert aber eine Klasse, deren Dimension nach dem *Riemann-Rochschen* Satze im allgemeinen gleich Eins und nur dann größer als Eins ist, wenn \mathfrak{G} in einem ganzen Differentialteiler enthalten ist; es entsprechen also verschiedenen Divisoren \mathfrak{G} und \mathfrak{G}' im allgemeinen auch verschiedene Systeme (v_i) und (v'_i) .

Es entsteht nun die Frage, ob umgekehrt zu jedem Wertsystem (v_i) ein ganzer Divisor \mathfrak{G} der Ordnung p gefunden werden kann, so daß die Gleichungen (141 a) erfüllt sind; ist dies aber der Fall, so ist nach unseren Ergebnissen das Punktsystem $(\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_p)$ im allgemeinen auch *eindeutig* bestimmt. Das so sich ergebende Problem heißt das *Jakobische Umkehrproblem*^{74a)} und bildet die naturgemäße Verallgemeinerung des Umkehrproblems der elliptischen Integrale; denn dies besteht ja darin, aus der Gleichung

$$\int_{\mathfrak{P}_\infty}^{\mathfrak{P}} dw \equiv v \pmod{\omega_1, \omega_2}$$

die Größen des Körpers $K(z, u)$, welche sämtlich eindeutige Funktionen von \mathfrak{P} sind, als Funktionen von v darzustellen; wie dies auf die elliptischen, so führt das allgemeine Problem auf die sogenannten *Abelschen* Funktionen.

Die Antwort auf die obengestellte Frage fällt bejahend aus; der Beweis erfolgt entweder durch direkte Integration des Systems von Differentialgleichungen:

$$dw_i(\mathfrak{P}_1) + dw_i(\mathfrak{P}_2) + \dots + dw_i(\mathfrak{P}_p) = dv_i, \quad (i = 1, 2, \dots, p)$$

welches ja mit dem System (141 a) im wesentlichen gleichwertig ist,

74a) II B 7, Nr. 1.

oder durch Aufstellung und Benutzung der sogenannten *Jacobischen* oder *Thetafunktionen* von p Variablen v_1, v_2, \dots, v_p . Die Ausführung dieser Untersuchung liegt außerhalb der Grenzen dieser Darstellung, welche mit der Einordnung des transzendenten Umkehrproblems in den Bereich der algebraischen Fragestellungen ihren Abschluß finden soll.

VII. (Anhang.) Arithmetische Theorie der algebraischen Zahlen.

44. Der Körper $\mathbb{R}(1)$ der rationalen Zahlen und der Körper $K(p)$ der p -adischen Zahlen.⁷⁵⁾ Die in I und II auseinandergesetzten Prinzipien führen auch zu einer vollständigen Theorie der rationalen und algebraischen Zahlen. Als Aufgabe der ersteren kann die Aufsuchung der Beziehungen bezeichnet werden, welche zwischen den rationalen Zahlen einerseits und einer beliebig angenommenen festen Grundzahl andererseits bestehen, welche letztere gleich als eine Primzahl p vorausgesetzt werden kann.

Alle rationalen Zahlen $A = \frac{a}{b}$ bilden einen Körper $\mathbb{R}(1)$. Eine solche Zahl heißt *ganz* oder *gebrochen* in bezug auf p oder *modulo* p , je nachdem in ihrer reduzierten Darstellung $\frac{a}{b}$ der Nenner p nicht enthält oder durch p teilbar ist.⁷⁶⁾ A heißt durch B *teilbar*, wenn $\frac{A}{B}$ modulo p ganz ist. Eine Zahl ε heißt eine *Einheit*, wenn ε und $\frac{1}{\varepsilon}$ modulo p ganz sind. Jede Zahl A ist eindeutig in der Form εp^α darstellbar, wo ε eine Einheit bedeutet; α heißt die *Ordnungszahl* von A . Die Ordnungszahl eines Produktes bzw. eines Quotienten ist die Summe bzw. die Differenz seiner Komponenten. Eine Zahl A heißt durch p^e *teilbar*, wenn ihre Ordnungszahl α wenigstens gleich e ist; zwei Zahlen sind *kongruent modulo* p^e , wenn ihre Differenz durch p^e teilbar ist. Zwei Zahlen heißen *gleich für den Bereich von* p , wenn sie für jede noch so hohe Potenz von p kongruent, wenn sie also identisch sind.

Die rationalen Zahlen bilden nun einen Teilbereich des folgenden Zahlenreiches. Jede Zahlgröße:

$$A = a_\alpha p^\alpha + a_{\alpha+1} p^{\alpha+1} + \dots,$$

deren Koeffizienten $a_\alpha, a_{\alpha+1}, \dots$ modulo p ganze rationale Zahlen $\frac{a}{b}$ sind, welche beliebig weit berechnet werden können, wird eine *p -adische*

75) Vgl. Nr. I dieses Referates.

76) Vgl. Anm. 3.

Zahl genannt, und die rationalen Zahlen $a_\alpha p^\alpha$, $a_\alpha p^\alpha + a_{\alpha+1} p^{\alpha+1}$, \dots heißen ihre *Näherungswerte*. Zwei Zahlen A und A' sind *kongruent modulo p^e* , wenn *fast alle* ihre Näherungswerte modulo p^e kongruent sind; sie sind *gleich für den Bereich von p* , wenn sie für jede noch so hohe Potenz von p kongruent sind. Bei dieser Definition der Gleichheit und der gewöhnlichen Festsetzung über die Addition und die Multiplikation p -adischer Zahlen bilden diese einen Zahlkörper $K(p)$ welcher dem in Nr. 3 eingeführten Körper $\bar{K}(p)$ aller konvergenten und nicht konvergenten Potenzreihen für die Stelle p völlig entspricht.

Jede rationale Zahl $A = \frac{a}{b}$ von $\mathfrak{K}(1)$ ist nun einer einzigen p -adischen Zahl $a_e p^e + a_{e+1} p^{e+1} + \dots$ gleich; also ist wirklich $\mathfrak{K}(1)$ ein Teilkörper von $K(p)$, und zwar derjenige, in welchem die Koeffizienten a_e, a_{e+1}, \dots jedesmal linearen Rekursionsformeln genügen. Die arithmetische Untersuchung der rationalen Zahlen für den Bereich von p fällt hiernach mit derjenigen der p -adischen Zahlen zusammen, und diese kann genau ebenso geführt werden, wie dies in Nr. 2 für die Potenzreihen des Körpers $\bar{K}(p)$ für die Stelle p ($z = \alpha$) geschieht.

Hier werden noch die folgenden Bemerkungen hinzugefügt: Ist p eine beliebige *ungerade* Primzahl, so enthält der Körper $K(p)$ $p - 1$ ($p - 1$)^{te} Einheitswurzeln und keine andere Einheitswurzel. Im Körper $K(2)$ ist nur die zweite Einheitswurzel -1 vorhanden. Für ein ungerades p ist jede p -adische Zahl A eindeutig in der Form $A = p^\alpha w^\beta (1 + p)^\gamma$ darstellbar, in welcher w eine primitive ($p - 1$)^{te} Einheitswurzel ist, α die Ordnungszahl von A und β , der sog. *Index* von α , eine der Zahlen $0, 1, \dots, p - 1$ bedeutet; endlich ist γ eine ganze p -adische Zahl; für $p = 2$ ist $A = 2^\alpha (-1)^\beta 5^\gamma$ die entsprechende dyadische multiplikative Darstellung von A . Das Exponentensystem (α, β, γ) wird der *Logarithmus von A für den Bereich von p* genannt.

45. Die algebraischen Zahlkörper und die ihnen isomorphen rationalen Kongruenzkörper.⁷⁷⁾ Der Gegenstand der Theorie der algebraischen Zahlen in ihrem allgemeinsten Umfange ist die Untersuchung der Teilbarkeitseigenschaften aller algebraischen Zahlen eines durch die Wurzel einer ganzzahligen Gleichung definierten Zahlkörpers. Hierzu würde noch die Betrachtung der Größenbeziehungen treten, welche zwischen denselben Zahlen bestehen; diese zweite Untersuchung kann ganz ebenso wie die erste durchgeführt werden, auf sie soll in der folgenden kurzen Darstellung nicht besonders eingegangen werden.

77) Vgl. Nr. II dieses Referates.

Es sei $F(x) = 0$ eine im Körper $\mathfrak{R}(1)$ aller rationalen Zahlen irreduzible Gleichung n^{ten} Grades und ξ eine Wurzel derselben in irgendeinem Erweiterungskörper $\mathfrak{R}(\xi)$; dann ist $\mathfrak{R}(\xi)$ einstufig isomorph dem Kongruenzkörper $K(x, \text{mod } F(x)) = K(x, 1)$ aller modulo $F(x)$ ganzen rationalen Funktionen von x mit rationalen Zahlkoeffizienten für diese Funktion als Modul, und dieser kann und soll daher statt $\mathfrak{R}(\xi)$ weiter untersucht werden.

Die oben gestellte Aufgabe der Theorie der algebraischen Zahlen ist nun vollständig gelöst, wenn man die Teilbarkeitsbeziehungen aller Zahlen von $\mathfrak{R}(\xi)$ oder, was dasselbe ist, aller Funktionen von $K(x, 1)$ zu einer beliebigen reellen Primzahl p kennt; sie sollen daher im folgenden untersucht werden.

46. Untersuchung der rationalen Kongruenzkörper für den Bereich einer Primzahl p . Ihre Reduktion auf die p -adischen Kongruenzkörper. Bei dieser Untersuchung können und sollen nun die rationalen Zahlkoeffizienten aller Funktionen von $K(x, 1)$ nach Potenzen von p entwickelt, d. h. durch die ihnen gleichen p -adischen Zahlen ersetzt werden. Dann bildet der Bereich $K(x, 1)$ einen Teilkörper des größeren Bereiches

$$(142) \quad R(x, p) = R_p(x, \text{mod } F(x))$$

aller modulo $F(x)$ ganzen Funktionen von x mit *beliebigen* p -adischen Koeffizienten in der Weise, daß jedes Element von $K(x, 1)$ einem solchen von $R(x, p)$ gleich ist, während umgekehrt jedes Element von $R(x, p)$ der Grenzwert einer Folge von Elementen von $K(x, 1)$ ist. Es kann und soll daher statt des Zahlkörpers $\mathfrak{R}(\xi)$ bzw. des Kongruenzkörpers $K(x, 1)$ dieser Bereich $R(x, p)$ auf die Teilbarkeits-eigenschaften seiner Elemente untersucht werden.

Dieser neue größere Bereich $R(x, p)$ unterscheidet sich nun von seinem Teilkörper $K(x, 1)$ ganz wesentlich dadurch, daß im rationalen Körper $\mathfrak{R}(1)$ $F(x)$ unzerlegbar ist, während dieser Modul in dem größeren Körper $K(p)$ im allgemeinen in ein Produkt von eindeutig bestimmten Primfaktoren mit p -adischen Koeffizienten zerfällt, welche aber immer voneinander verschieden sind. Es sei nun

$$(143) \quad F(x) = f_1(x, p) \cdot f_2(x, p) \cdots f_\nu(x, p) \quad (p)$$

jene Zerlegung von $F(x)$ in p -adische Primfaktoren und $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu$ seien ihre Grade. Dann ist der Bereich $R(x, p)$ ein Kongruenzring, welcher sich in einfacher Weise auf die ν p -adischen Kongruenzkörper:

$$(143a) \quad K_i(x, p) = K_i(x, \text{mod } f_i(x, p)) \quad (i = 1, 2, \dots, \nu)$$

aller in bezug auf je ein $f_i(x, p)$ ganzen rationalen Funktionen von x , modulo $f_i(x, p)$ betrachtet, reduziert.

Sind nämlich $1_1, 1_2, \dots, 1_\nu$ ν Funktionen des Ringes $R(x, p)$, welche so gewählt sind, daß allgemein:

$$(144) \quad 1_i \equiv 1 \pmod{f_i(x, p)} \quad 1_i \equiv 0 \pmod{f_k(x, p)} \quad (i \geq k)$$

ist, und welche durch das Euklidische Teilerverfahren unmittelbar bestimmt werden können, so ist jedes Element $v(x)$ von R eindeutig in der Form:

$$(144a) \quad v \equiv v_1 \cdot 1_1 + v_2 \cdot 1_2 + \dots + v_\nu \cdot 1_\nu = (v_1, v_2, \dots, v_\nu) \pmod{F(x)}$$

darstellbar, wo allgemein $v_i \equiv v \pmod{f_i(x, p)}$ der Wert von v im Ringe $K_i(x, p)$ ist, und umgekehrt gehört zu jedem System (v_1, v_2, \dots, v_ν) , dessen Elemente in den Körpern $K_i(x, p)$ ganz beliebig angenommen sind, ein einziges Element $v = (v_1, v_2, \dots, v_\nu)$, welches allgemein in $K_i(x, p)$ gerade den Wert v_i hat.

Sind ferner $v = (v_i)$, $w = (w_i)$ zwei beliebige Elemente von R in dieser Darstellung, so ergeben sich für die Summe, Differenz, Produkt und Quotient derselben die entsprechenden Darstellungen:

$$v \pm w = (v_i \pm w_i), \quad vw = (v_i w_i), \quad \frac{v}{w} = \left(\frac{v_i}{w_i}\right);$$

die letzte Gleichung besteht aber dann und nur dann, wenn $\frac{v}{w}$ wirklich dem Ringe R angehört, wenn nämlich alle Komponenten w_i des Nenners von Null verschieden sind. Durch diese Darstellung $v = (v_i)$ aller Elemente von R wird also der ganze Ring einstufig isomorph auf das System $(K_1(x, p), \dots, K_\nu(x, p))$ der ν Kongruenzkörper $K_i(x, p)$ abgebildet, wenn für zwei Elemente (v_i) und (w_i) die Addition und die Multiplikation durch die Gleichungen:

$$(144b) \quad (v_i) + (w_i) = (v_i + w_i), \quad (v_i) \cdot (w_i) = (v_i w_i)$$

definiert wird. Hierdurch ist die allgemeine Aufgabe der arithmetischen Theorie der algebraischen Zahlen vollständig auf die Untersuchung der Teilbarkeitseigenschaften aller Elemente eines p -adischen Kongruenzkörpers

$$(145) \quad K(x, p) = K(x, \text{mod } f(x, p))$$

zurückgeführt, zu der ich jetzt übergehe.

47. Die p -adischen Kongruenzkörper und die ihnen isomorphen Körper $K(\mathfrak{P})$ der π -adischen algebraischen Zahlen.⁷⁸⁾ Es sei λ der Grad des unzerlegbaren Moduls $f(x, p)$ in (145), es sei also $K(x, p)$ vom λ^{ten} Grade. Ist dann $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_\lambda)$, etwa $(1, x, \dots, x^{\lambda-1})$, irgendeine Basis für $f(x, p)$, so lehrt das in der Anm. 5 auseinandergesetzte Verfahren, daß jedes Element v des Körpers einer Gleichung λ^{ten} Grades:

$$(146) \quad g(t) = (-1)^\lambda |b_{i\lambda} - \delta_{i\lambda} t| = t^\lambda - b_1 t^{\lambda-1} + \dots + (-1)^\lambda b_\lambda = n(t - v)$$

78) Vgl. Nr. 6 dieses Referates.

mit p -adischen Koeffizienten, der sog. *Hauptgleichung* genügt, deren linke Seite irreduzibel oder die Potenz einer irreduziblen Funktion $g_0(t)$ ist, je nachdem v ein primitives Element von $K(x, p)$ ist oder nicht.

Ich nenne nun das Element v *algebraisch ganz* oder *gebrochen*, je nachdem seine Hauptgleichung $g(t)$ ganze p -adische Koeffizienten hat oder nicht. Dann besteht der folgende Fundamentalsatz:

Ein Element v des Körpers $K(x, p)$ ist algebraisch ganz oder gebrochen, je nachdem seine Norm $n(v) = b_\lambda$ eine ganze oder eine gebrochene p -adische Zahl ist.⁷⁹⁾

Durch diesen Satz wird die Untersuchung der ganzen Elemente von $K(x, p)$ und die Behandlung aller Fragen der Teilbarkeit in diesem Körper außerordentlich einfach und durchsichtig, denn man braucht nur die für die p -adischen Zahlen $n(v)$, $n(w)$, ... geltenden Definitionen und Sätze auf die zugehörigen Elemente v , w , ... zu übertragen. So ergibt sich unmittelbar, daß die Summe und das Produkt ganzer Elemente wieder ganz ist, daß also die ganzen Elemente von $K(x, p)$ einen Ring bilden. Von zwei Elementen v und w heißt das erste durch das zweite *teilbar*, wenn $\frac{v}{w}$ ganz, wenn also $n(v)$ durch $n(w)$ teilbar ist; sie heißen *äquivalent*, wenn außerdem auch $\frac{w}{v}$ ganz ist, wenn also $n(v)$ und $n(w)$ äquivalent sind, d. h. gleiche Ordnungszahl haben. Ein Element ε heißt eine *Einheit*, wenn $n(\varepsilon)$ eine p -adische Einheit ist. Alle Einheiten ε , ε' , ... bilden eine Gruppe, da sie sich durch Multiplikation und Division wiedererzeugen. Äquivalente Elemente v und w unterscheiden sich also nur durch einen Einheitsfaktor.

Da die Norm jedes ganzen Elementes, welches keine Einheit ist, eine positive Ordnungszahl besitzt, so muß es mindestens ein solches π geben, für welches die Ordnungszahl von $n(\pi)$ positiv und möglichst klein ist. Jedes solche Element soll eine *Primzahl* im Körper $K(x, p)$ heißen und die Ordnungszahl f ihrer Norm $n(\pi) = \varepsilon p^f$ werde ihr *Grad* genannt. Der Körper $K(x, p)$ erhält unendlich viele solche Primzahlen π , π' , ..., aber alle sind untereinander äquivalent; ist also π eine unter ihnen, so sind alle anderen und nur sie in der Form $\pi' = \varepsilon \pi$ enthalten. Allgemeiner ist jedes ganze oder gebrochene Element v eindeutig in der Form $v = \varepsilon \pi^a$ darstellbar, wo a eine bestimmte ganze Zahl bedeutet, welche dann und nur dann nicht negativ ist, wenn v algebraisch ganz ist. a heißt *die Ordnungszahl von v*.

79) Vgl. Nr. 5 dieses Referates und H. III, S 438 ff.

Die Ordnungszahl eines Produktes (Quotienten) zweier Elemente v und w ist also die Summe (Differenz) der Ordnungszahlen seiner beiden Komponenten. Hat $v = \varepsilon \pi^a$ die Ordnungszahl a , so ist af diejenige ihrer Norm. Ist also speziell $p = \varepsilon \pi^e$, ist also e die Ordnungszahl der Primzahl p im Körper $K(x, p)$, so besitzt $n(p) = p^f$ die Ordnungszahl ef , es ist also $\lambda = ef$. Die Zahl e soll im folgenden die *Ordnung der Primzahl π* genannt werden. Das Produkt ef der Ordnung und des Grades der Primzahl π ist also stets gleich dem Grade λ des Körpers $K(x, p)$. Ein Element v heißt durch π^e teilbar, wenn $n(v)$ durch $n(\pi^e) \sim p^{fe}$ teilbar ist; also ist v dann und nur dann durch jede noch so hohe Potenz von π teilbar, wenn $n(v) = 0$ ist. Dann ist aber die Hauptgleichung für v $g(t) = n(t - v) = t^\lambda$, d. h. es ist $v^\lambda = 0$ also $v = 0$. Ein Element $v = v_1 x_1 + \dots + v_\lambda x_\lambda$ ist also dann und nur dann durch jede noch so hohe Potenz von π teilbar, wenn es Null ist, wenn also alle seine Koeffizienten v_i Null sind. Zwei Elemente v und v' sind mithin stets und nur dann für jede noch so hohe Potenz von π kongruent, wenn sie gleich sind.

Im Körper $K(x, p)$ verliert die reelle Zahl p ihren Primzahlcharakter stets und nur dann, wenn $e > 1$ ist, und an ihre Stelle tritt in jedem Falle die zugehörige Primzahl π oder jede ihr äquivalente, während p äquivalent der Primzahlpotenz π^e wird. Die Untersuchung der Teilbarkeitsbeziehungen der Elemente v des Kongruenzkörpers $K(x, p)$ wird also vollständig durch diejenige jener Elemente zu einer Primzahl π ersetzt, zu der ich jetzt übergehe.

Diese Untersuchung erfordert zunächst eine vollständige Übersicht über alle *ganzen* Elemente γ des Kongruenzkörpers $K(x, p)$. Man kann durch ein direktes endliches Verfahren stets eine solche Basis $(x_1, x_2, \dots, x_\lambda)$ von lauter ganzen Elementen finden, daß alle und nur die ganzen Elemente jenes Körpers in der Form $(c_1 x_1 + \dots + c_\lambda x_\lambda)$ mit *ganzen* p -adischen Koeffizienten dargestellt sind; jedes solches System (x_i) heißt ein *Fundamentalsystem* für diesen Körper.

Alle diese ganzen Größen γ bilden nun modulo π betrachtet einen endlichen Kongruenzkörper $K(\gamma, \text{mod } \pi)$ vom Grade f ; derselbe enthält also genau f modulo π unabhängige Elemente (x_1, x_2, \dots, x_f) , während zwischen je $f + 1$ Elemente (x_0, x_1, \dots, x_f) eine lineare Kongruenz $c_0 x_0 + c_1 x_1 + \dots + c_f x_f \equiv 0 \pmod{\pi}$ besteht. Jedes System (x_1, \dots, x_f) von f unabhängigen Elementen heißt auch hier ein *Fundamentalsystem* jenes Kongruenzkörpers. Man kann aus einem Fundamentalsystem (x_1, \dots, x_λ) für alle ganzen Elemente von $K(x, p)$ stets f , etwa (x_1, \dots, x_f) so auswählen, daß sie ein Fundamentalsystem für den Kongruenzkörper $K(\gamma, \pi)$ bilden. Dann bilden die $\sigma = p^f \sim n(\pi)$

Elemente $\varepsilon = c_1 x_1 + \dots + c_f x_f \quad (c_i = 0, 1 \dots p - 1)$

ein vollständiges Restsystem $(\varepsilon^{(0)}, \varepsilon^{(1)}, \dots, \varepsilon^{(\sigma-1)})$ modulo π .

Die Elemente v des Kongruenzkörpers $K(x, p)$ stimmen nun in ihrer Gesamtheit überein mit dem Körper $K(\mathfrak{P})$, der sog. π -adischen Zahlen, welcher folgendermaßen definiert ist: Jede Zahlgröße:

$$(147) \quad \alpha = \varepsilon_a \pi^a + \varepsilon_{a+1} \pi^{a+1} + \dots,$$

deren Entwicklungszahl π eine beliebige Primzahl von $K(x, p)$ ist und deren Koeffizienten $\varepsilon_a, \varepsilon_{a+1}, \dots$ ganze Elemente desselben Körpers sind, welche beliebig weit berechnet werden können, soll eine π -adische Zahl genannt werden; die Elemente von $K(p, x)$

$$(147a) \quad \varepsilon_a \pi^a, \quad \varepsilon_a \pi^a + \varepsilon_{a+1} \pi^{a+1}, \quad \dots$$

heißen ihre Näherungswerte. Zwei π -adische Zahlen α und α' sind kongruent modulo π^f oder modulo \mathfrak{P}^f , wenn fast alle ihre Näherungswerte modulo π^f kongruent sind; sie sind gleich für den Bereich von \mathfrak{P} , wenn sie für jede noch so hohe Potenz von \mathfrak{P} kongruent sind. Wird die Entwicklungszahl π fest gewählt, und werden die Koeffizienten ε_k auf ein und dasselbe Restsystem modulo π beschränkt, so heißt die Reihe (147) die *reduzierte Darstellung von α* , und jede π -adische Zahl ist einer einzigen reduzierten gleich. Bei dieser Definition der Gleichheit und der gewöhnlichen Festsetzung über die Addition und die Multiplikation π -adischer Zahlen bilden diese einen Zahlkörper $K(\mathfrak{P})$, welcher dem in (12) eingeführten Körper $\bar{K}(\mathfrak{P})$ aller konvergenten und nicht konvergenten Potenzreihen für den Punkt \mathfrak{P} der Riemannschen Fläche völlig entspricht.

Man beweist nun direkt, daß jedes Element v des Kongruenzkörpers $K(x, p)$ einer einzigen π -adischen Zahl γ gleich ist, welche ihre π -adische Entwicklung genannt werde, und daß auch umgekehrt jede π -adische Zahl gleich einem Elemente von $K(x, p)$ ist. Also ist der zu untersuchende Kongruenzkörper $K(x, p)$ dem Körper $K(\mathfrak{P})$ der π -adischen Zahlen einstufig isomorph; der letztere kann daher jetzt an Stelle von $K(x, p)$ weiter untersucht werden.

Der Körper $K(\mathfrak{P})$ der π -adischen Zahlen ist ein algebraischer Erweiterungskörper vom $ef = \lambda^{\text{ten}}$ Grade über dem Körper $K(p)$ der p -adischen Zahlen. In ihm sind alle $(p^f - 1)^{\text{ten}}$ Einheitswurzeln w^v ($v = 0, 1 \dots p^f - 2$) enthalten, wo w eine solche primitive π -adische Einheitswurzel bedeutet. Außer diesen kann $K(\mathfrak{P})$ höchstens noch p^q -te Einheitswurzeln enthalten, deren Wurzelexponent eine Potenz von p ist. Die $\sigma = p^f$ Zahlen $(0, 1, w, \dots, w^{p^f-2})$ bilden ein vollständiges Restsystem modulo \mathfrak{P} ; deshalb heißt der durch w bestimmte Körper

$K(w)$ der zu $K(\mathfrak{P})$ gehörige *Koeffizientenkörper*. Derselbe ist ein algebraischer Körper f^{ten} Grades über $K(p)$, während $K(\mathfrak{P})$ ein Körper e^{ten} Grades über $K(w)$ ist.

Im Körper $K(w)$ ist die Primzahl π ein primitives Element. Ist e nicht durch p teilbar, so kann π stets so ausgewählt werden, daß es in $K(w)$ einer einfachsten *reinen* Gleichung e^{ten} Grades

$$(148) \quad \pi^e - w^d p = 0$$

genügt, daß also die Entwicklungszahl der π -adischen Zahlen abgesehen von einer Einheitswurzel die e^{te} Wurzel aus p ist.⁸⁰⁾

Die π -adischen Zahlen unterscheiden sich also nur dadurch von den p -adischen Zahlen, daß ihre Reihen nicht nach ganzen, sondern im allgemeinen nach gebrochenen Potenzen $\pi \sim p^{\frac{1}{e}}$ von p fortschreiten, und daß ihre Koeffizienten nicht $(p-1)^{\text{te}}$, sondern $(p^f-1)^{\text{te}}$ Einheitswurzeln sind. Ihrer Natur und ihrem arithmetischen Verhalten nach stimmen beide Zahlkörper genau überein.

48. Der zu einer vorgelegten Gleichung $F(x) = 0$ zugehörige Galoissche π -adische Zahlkörper.⁸¹⁾ Die bisher gefundenen Ergebnisse können jetzt zur Bildung eines solchen Erweiterungskörpers $K(\mathfrak{P})$ von π -adischen Zahlen benutzt werden, daß in ihm die linke Seite $f(x)$ der vorgelegten Gleichung vollständig, d. h. in ein Produkt $(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n)$ von n Linearfaktoren zerfällt.

Zerlegen wir nämlich die Funktion $f(x)$ wie in (142) im Körper $K(p)$ in das eindeutig bestimmte Produkt von ν verschiedenen p -adischen Primfaktoren:

$$(149) \quad f(x) = f_1(x, p) \cdots f_\nu(x, p), \quad (p)$$

und sind diese schon alle vom ersten Grade, ist also $\nu = n$, so ist die gestellte Aufgabe bereits durch den Körper $K(p)$ gelöst. Ist dagegen $\nu < n$, so sei etwa der Grad λ_1 von $f_1(x, p)$ größer als Eins. Dann sei der zugehörige Kongruenzkörper des λ_1^{ten} Grades $K_p(x, \text{mod } f_1(x, p))$ gleich dem algebraischen π_1 -adischen Körper $K(\mathfrak{P}_1)$ vom λ_1^{ten} Grade, dessen Primzahl π_1 die Ordnung e_1 und den Grad f_1 haben möge, so daß $e_1 f_1 = \lambda_1$ ist. Zerlegt man nun die Grundfunktion $f(x)$ in dem Oberkörper $K(\mathfrak{P}_1)$ von $K(p)$ weiter in ihre Primfaktoren, so erhält man eine neue Zerlegung:

$$(149a) \quad f(x) = f_1^{(1)}(x, \pi_1) \cdots f_{\nu_1}^{(1)}(x, \pi_1), \quad (\mathfrak{P})$$

welche darin besteht, daß sich jeder der p -adischen Faktoren $f_i(x, p)$ jetzt noch weiter, und zwar wieder in lauter verschiedene π_1 -adische

80) Vgl. p. 547 (13) und (13a) dieses Referates.

81) Vgl. Nr. 7 dieses Referates und II. III, p. 446 ff.

Faktoren spaltet. Die Anzahl ν_1 aller dieser Faktoren ist sicher größer als ν , da von jenen ν ersten Primfaktoren jedenfalls der erste $f_1(x, p) = (x - x_1)\bar{f}_1(x, \pi_1)$ sich mindestens in zwei π_1 -adische Faktoren zerlegen läßt. Ist jetzt $\nu_1 = n$, so zerfällt $f(x)$ innerhalb $K(\mathfrak{P}_1)$ vollständig in Linearfaktoren, und die Aufgabe ist gelöst.

Es sei jetzt auch $\nu_1 < n$, und $f^{(1)}(x, \pi_1)$ sei irgendeiner dieser ν_1 irreduziblen π_1 -adischen Faktoren $f_i^{(1)}(x, \pi_1)$, dessen Grad λ_2 größer als 1 ist; dann ist der zugehörige Kongruenzkörper $K_{\pi_1}(x, \text{mod } f^{(1)}(x, \pi_1)) = K(x, \pi_1)$ aller modulo $f^{(1)}(x, \pi_1)$ ganzen Funktionen von x mit π_1 -adischen Koeffizienten ebenfalls vom λ_2 -ten Grade, und man zeigt nun genau ebenso wie vorher, daß derselbe gleich einem Körper $K(\mathfrak{P}_2)$ von π_2 -adischen Zahlen vom Grade λ_2 über $K(\mathfrak{P}_1)$ ist; ist also e_2 die Ordnung, f_2 der Grad einer Primzahl π_2 innerhalb dieses Körpers, so ist $e_2 f_2 = \lambda_2$. In bezug auf den Körper $K(p)$ ist $K(\mathfrak{P}_2)$ ein algebraischer Erweiterungskörper vom Grade $\lambda_1 \lambda_2$, und für ihn sind $e_1 e_2$ und $f_1 f_2$ Ordnung und Grad der Primzahl π_2 .

In diesem größeren Erweiterungskörper $K(\mathfrak{P}_2)$ zerfällt die Funktion $f(x)$ noch weiter, da sich jetzt von dem vorher irreduziblen Faktor $f^{(1)}(x, \pi_1)$ noch mindestens ein Linearfaktor $(x - \alpha_2)$ abspaltet. Durch Fortsetzung dieses Verfahrens ergibt sich also nach einer endlichen Anzahl von Schritten ein π -adischer Zahlkörper $K(\mathfrak{P})$ der Art, daß in ihm $f(x)$ vollständig in Linearfaktoren zerfällt, daß also in ihm die Gleichung $f(x) = 0$ genau n eindeutig bestimmte π -adische Wurzeln hat.

Für jede Primzahl p erhält man so einen *Galoisschen* Körper π -adischer Zahlen $K(\mathfrak{P})$, innerhalb dessen die *Galoissche* Theorie gilt und hier vollständigen Aufschluß über die arithmetischen Eigenschaften aller algebraischen Zahlen liefert. Es ergibt sich endlich der Satz, daß jede Gleichung $F(x) = 0$ in jedem p -adischen Zahlkörper $K(p)$ *algebraisch* auflösbar ist.⁸²⁾

82) *H. III*, p. 451—452.

II C 6. ARITHMETISCHE THEORIE DER ALGEBRAISCHEN FUNKTIONEN ZWEIER UNABHÄNGIGEN VERÄNDERLICHEN.

VON

HEINRICH W. E. JUNG

IN HALLE A. D. SAALE.

Inhaltsübersicht.

I. Einleitung.

II. Der Körper der algebraischen Funktionen zweier Veränderlichen.

1. Die Darstellung der Funktionen des Körpers in der Umgebung einer Kurve.
2. Die Darstellung der Funktionen des Körpers in der Umgebung einer Stelle.
3. Die Stellen des Körpers.

III. Primteiler und Divisoren.

4. Die Primteiler erster Stufe.
5. Einteilung der Primteiler erster Stufe in zwei Arten.
6. Die Primteiler zweiter Stufe.
7. Divisoren, Divisorenklassen.
8. Grad und Geschlecht einer Klasse.
9. Birationale Transformation.
10. Fundamentalsysteme für die Vielfachen eines Divisors.

IV. Die Zeuthen-Segresche Invariante und das numerische Geschlecht.

11. Die Fläche F .
 12. Die Zeuthen-Segresche Invariante.
 13. Das numerische oder arithmetische Geschlecht.
-

Literatur.

- Beppo Levi*, Sulla riduzione delle singularità puntuali delle superficie algebriche dello spazio ordinario per trasformazioni quadratiche, Ann. di Mat. (2) 26 (1897), p. 219—253.
- , Risoluzione delle singularità puntuali delle superficie algebriche, Torino Atti 33 (1897), p. 66—86.
- , Intorno alla composizione dei punti generici delle linee singolari delle superficie algebriche, Ann. di Mat. (3) 2 (1899), p. 127—138.

Beppo Levi, Sulla trasformazione dell' intorno di un punto per una corrispondenza birazionale fra due spazi, Torino Atti 35 (1900), p. 20—33.

—, Sur la résolution des points singuliers des surfaces algébriques, Paris C. R. 134 (1902), p. 222—225.

—, Sur la théorie des fonctions algébriques de deux variables, Paris C. R. 134 (1902), p. 642—644.

G. H. Halphen, Sur les lignes singulières des surfaces algébriques, Ann. di Mat. (2) 9 (1878), p. 68—105.

Kurt Hensel, Über die Theorie der algebraischen Funktionen zweier Variablen, Jahresber. d. D. Math.-Ver. 7 (1899), p. 58—61 = *Hensel A*.

—, Über eine neue Theorie der algebraischen Funktionen zweier Variablen, Jahresber. d. D. Math.-Ver. 8 (1900), p. 221—331 = *Hensel B*.

—, Über eine neue Theorie der algebraischen Funktionen zweier Variablen, Acta Math. 23 (1900), p. 339—416 = *Hensel C*.

Hensel A und *B* sind kurze Referate.

C. W. M. Black, The parametric representation of the neighborhood of a singular point of an analytic surface, Proc. of Am. Ac. 37 (1902), p. 281—330 = *Black*.

G. Landsberg, Zur Theorie der algebraischen Funktionen zweier Veränderlicher, Berl. Ber. 1 (1900), p. 296—302 = *Landsberg*.

H. W. E. Jung, Primteiler algebraischer Funktionen zweier unabhängiger Veränderlichen und ihr Verhalten bei birationalen Transformationen, Pal. Rend. 26 (1908), p. 113—127 = *Jung A*.

—, Der *Riemann-Rochsche* Satz für algebraische Funktionen zweier Veränderlichen, Jahresber. d. D. Math.-Ver. 18 (1909), p. 267—339, und Berichtigung dazu, ebenda 19 (1910), p. 172—176 = *Jung B*.

—, Darstellung der Funktionen eines algebraischen Körpers zweier unabhängiger Veränderlichen x, y in der Umgebung einer Stelle $x = a, y = b$, J. f. Math. 133, p. 289—314 = *Jung C*.

—, Kurvenscharen auf einer algebraischen Fläche, J. f. Math. 133 (1910), p. 77—95 = *Jung D*.

—, Über die *Zeuthen-Segresche* Invariante, Pal. Rend. 34 (1912), p. 225—277 = *Jung E*.

—, Über die ausgezeichneten Kurven algebraischer Flächen, J. f. Math. 142 (1912), p. 61—117 = *Jung F*.

—, Über die kanonische Klasse einer auf einer algebraischen Fläche liegenden algebraischen Kurve, Schwarz-Festschrift 1914, p. 166—167 = *Jung G*.

—, Über algebraische Flächen, J. f. Math. 150 (1919), p. 47—78 = *Jung H*.

—, Über die Differentialinvarianten algebraischer Flächen, Math. Ztschr. 8 (1920), p. 182—221 = *Jung J*.

G. Castelnuovo und *F. Enriques*, Art. III C 6 b in dieser Encyclopädie = *E*.

I. Einleitung.

Die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen zweier Veränderlichen ist noch nicht so weit ausgebaut wie die entsprechende Theorie bei den Funktionen einer Veränderlichen. Vor allem fehlen eingehendere Untersuchungen über die Integrale. Die folgende Über-

sicht enthält im wesentlichen nur die Auseinandersetzung der Methoden und der Grundbegriffe. Im übrigen sei auf die angegebene Literatur verwiesen.

II. Der Körper der algebraischen Funktionen zweier Veränderlichen.

1. Die Darstellung der Funktionen des Körpers in der Umgebung einer Kurve. Der Körper besteht aus allen rationalen Funktionen dreier Größen x, y, z , zwischen denen eine irreduktible algebraische Gleichung

$$(1) \quad G(x, y, z) = 0$$

besteht. Er heiße $K(x, y, z)$. Deuten wir x, y, z als kartesische Koordinaten, so wird durch (1) eine algebraische Fläche G definiert. Es sei $A(x, y)$ ein irreduktibles Polynom, also $A = 0$ die Gleichung einer Kurve A in der xy -Ebene. Für die Darstellung der Funktionen des Körpers $K(x, y, z)$ in der Umgebung von A , d. h. für solche Werte von x, y , für die $|A(x, y)|$ hinlänglich klein ist, hat *Hensel* folgendes bewiesen.¹⁾

Wir nehmen an, daß $A(x, y)$ von y wirklich abhängt. Sollte das nicht der Fall sein, so wäre im folgenden x mit y zu vertauschen. Ist y_0 eine Wurzel von $A(x, y) = 0$, so läßt sich z und damit jede Funktion R des Körpers K nach steigenden Potenzen von $y - y_0$ entwickeln mit Koeffizienten, die algebraische Funktionen von x sind. Statt nach Potenzen von $y - y_0$ kann man auch nach solchen von A entwickeln, was aus den *Henselschen* Ergebnissen sofort folgt, da man $y - y_0$ nach Potenzen von $A(x, y)$ entwickeln kann, wobei die Koeffizienten algebraische Funktionen von x werden.

Über die Entwicklungen gilt folgendes²⁾:

a) Es kann höchstens eine endliche Zahl von negativen Potenzen von $y - y_0$ vorkommen.

b) Im allgemeinen schreitet die Entwicklung nach ganzen Potenzen von $y - y_0$ fort. Nur für eine endliche Zahl von Kurven $A(x, y) = 0$ gibt es Entwicklungen, die nach ganzen Potenzen einer gebrochenen Potenz von $y - y_0$ fortschreiten.

c) Die Koeffizienten sind sämtlich Funktionen eines bestimmten algebraischen Körpers der einen Veränderlichen x , der entweder der durch $A(x, y) = 0$ definierte Körper oder ein Körper über diesem ist.

1) *Hensel* A, B, C.

2) *Hensel* C. Diese Entwicklungen finden sich schon bei *Halphen* am oben angegebenen Orte.

d) Die Entwicklung von z schreite nach ganzen Potenzen von $(y - y_0)^{\frac{1}{\alpha}}$ fort. Der Korper der Koeffizienten sei vom Relativgrade σ in bezug auf den durch $A(x, y) = 0$ definierten Korper. Man erhalt dann aus der Entwicklung im ganzen $\alpha\sigma$ konjugierte, indem man die α -te Wurzel aus $y - y_0$ durch ihre anderen Werte ersetzt und die Koeffizienten durch die $\sigma - 1$ ihnen relativ zum Korper $A = 0$ konjugierten Funktionen. Diese $\alpha\sigma$ Entwicklungen sind nicht notwendig voneinander verschieden. Es gibt aber immer eine algebraische Funktion e von x folgender Art. Setzt man $e^\alpha(y - y_0) = \eta$ und schreibt die Entwicklung von z als Potenzreihe von η , so werden die Koeffizienten Funktionen eines Relativkorpers uber dem Korper $A = 0$ von einem Relativgrade τ derart, da die $\alpha\tau$ konjugierten Entwicklungen voneinander verschieden sind. Es heit τ die Koeffizientenordnung.

e) Es sei der Grad der Gleichung (1) in z gleich n . Ist $n = \tau\alpha$, so gibt es nur die eine Entwicklung fur z mit ihren konjugierten fur die Umgebung der Kurve A . Ist $n < \tau\alpha$, so gibt es mindestens noch eine weitere Entwicklung, jedenfalls aber nur eine endliche Zahl. Jede dieser Entwicklungen stellt z in der Umgebung einer auf der Flache G liegenden Kurve dar, deren Projektion auf die xy -Ebene die Kurve A ist. Schreitet die zugehorige Entwicklung nach ganzen Potenzen von $(y - y_0)^{\frac{1}{\alpha}}$ fort, so heit die auf G liegende Kurve eine Verzweigungskurve in bezug auf x, y von der Verzweigungsordnung $\alpha - 1$.

f) Es sei (a, b) ein auf der Kurve A liegender Punkt, und es sei y_0 in der Umgebung von (a, b) eine gewohnliche Potenzreihe von $x - a$. Dann kann es sein — und nur fur eine endliche Zahl von Punkten (a, b) ist es nicht so —, da sich die Reihen fur z verwandeln lassen in gewohnliche Potenzreihen von $x - a, y - b$. Ist

$$(2) \quad z = \mathfrak{P}(x - a, y - b)$$

eine solche Reihe, und ist $\mathfrak{P}(0, 0) = c$, so gibt uns (2) die Umgebung des Punktes (a, b, c) der Flache G . Es ist jedoch i. a. nicht fur alle Punkte von G moglich, aus den *Henselschen* Reihenentwicklungen Darstellungen zu gewinnen, die uns die ganze Umgebung des betreffenden Punktes liefern. Die Untersuchungen von *Hensel* bedurfen daher einer Erganzung.

2. Die Darstellung der Funktionen des Korpers in der Umgebung einer Stelle. a) Es sei P ein Punkt der Flache G . Er habe die Koordinaten a, b, c . Dann kann man die Gleichung

$$G(x, y, z) = 0$$

für die Umgebung von P in der Form auflösen, daß man hat

$$x - a = \mathfrak{P}_1(u, v), \quad y - b = \mathfrak{P}_2(u, v), \quad z - c = \mathfrak{P}_3(u, v),$$

wo $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \mathfrak{P}_3$ gewöhnliche Potenzreihen von zwei Parametern u, v sind, die für $u = v = 0$ verschwinden. Eine endliche Zahl derartiger Darstellungen genügt, um alle Stellen von G in einer genügend klein gewählten Umgebung von P zu erhalten. Dieser Satz ist bewiesen von *B. Levi*³⁾ und *C. W. M. Black*⁴⁾.

Der Beweis von *Black* läßt sich leicht so umformen, daß zugleich folgt, daß die Hilfsgrößen u, v als Funktionen des Körpers $K(x, y, z)$ gewählt werden können. *Black* selbst legt darauf keinen Wert, da er sich nicht auf algebraische Funktionen beschränkt. Man braucht nur die Gleichung (β) in § 2, S. 304 in der *Blackschen* Arbeit in der Form anzunehmen

$$\varphi(x, y) = p(x, y)^n E(x, y).$$

Darin ist E eine Einheit für $x = y = 0$, und $p(x, y)$ ist eine ganze rationale Funktion von x, y , die für $x = y = 0$ verschwindet, in der aber die Glieder erster Dimension vorkommen. Man hat dann zu setzen

$$p(x, y) = x_1,$$

woraus sich x als gewöhnliche Potenzreihe von x_1 und y ergibt

$$x = \mathfrak{P}(x_1, y).$$

Diese Substitution ist statt der Gleichung (δ) von *Black* zu verwenden. Alles andere bleibt ungeändert.

b) Es sei P ein Punkt der xy -Ebene mit den Koordinaten a, b . Dann kann man die Gleichung

$$G(x, y, z) = 0$$

in der Form auflösen, daß man hat

$$x - a = \mathfrak{P}_1(u, v), \quad y - b = \mathfrak{P}_2(u, v),$$

wo \mathfrak{P}_1 und \mathfrak{P}_2 gewöhnliche, für $u = v = 0$ verschwindende Potenzreihen von u, v sind, während z entweder auch eine gewöhnliche Potenzreihe von u, v wird oder der Quotient zweier solchen. Es genügt eine endliche Anzahl solcher Darstellungen, um alle Werte von z für eine hinlänglich klein gewählte Umgebung von P zu erhalten. Dieser Satz ist von *H. W. E. Jung*⁵⁾ bewiesen. Er ist in dem unter a) angegebenen enthalten. Man kann daher auch hier u und v als

3) *Levi* A—F.

4) *Black*.

5) *Jung* C. Während *Levi* und *Black* die Singularitäten der Fläche G mit Hilfe von Transformationen von x, y, z auflösen, benutzt *Jung* nur Transformationen der unabhängigen Veränderlichen x, y .

Funktionen des Korpers wahlen, was in der Arbeit von Jung nicht bewiesen ist, obwohl das in der Einleitung gesagt ist. Das kommt daher, da der Schlu der Arbeit wahrend des Druckes geandert ist.

3. Die Stellen des Korpers $K(x, y, z)$. Mit Benutzung einer Darstellung von x, y, z in der Nr. 2 angegebenen Form mit Hilfe zweier Parameter u, v lassen sich alle Funktionen des Korpers $K(x, y, z)$ darstellen als gewohnliche Potenzreihen von u, v oder als Quotienten solcher. Die Gesamtheit dieser Darstellungen definiert eine Stelle des Korpers mit ihrer Umgebung. An der Stelle selbst kann eine Funktion aus $K(x, y, z)$ unbestimmt sein, wie z. B. die Funktion $\frac{u}{v}$ an der Stelle $u = v = 0$. Die Stellen des Korpers $K(x, y, z)$ sind, im Unterschiede zu den Stellen eines algebraischen Korpers einer Veranderlichen, nicht vollstandig bestimmt. Zunachst kann man irgend r (≥ 2) Funktionen des Korpers auswahlen, von denen zwei voneinander unabhangig sein mussen, und festsetzen, da an jeder Stelle diese Funktionen oder ihre reziproken Werte gewohnliche Potenzreihen der Hilfsgroen u, v werden, so da die ausgewahlten Funktionen an keiner Stelle unbestimmt sind.⁶⁾ Betrachtet man einen algebraischen Korper und nicht eine algebraische Flache, so wird man zweckmaig zwei voneinander unabhangige Funktionen auszeichnen und diese dann als unabhangige Veranderliche betrachten, da es sich um einen Korper von zwei unabhangigen Veranderlichen handelt. Betrachtet man aber die algebraische Flache $G(x, y, z) = 0$, so wird man die drei Groen x, y, z auszeichnen und die Stellen des Korpers so definieren, da x, y, z an keiner Stelle unbestimmt werden. Dann namlich entspricht jeder Stelle des Korpers ein ganz bestimmter Punkt der Flache. Man kann dann aber auch noch einen Schritt weiter gehen. Sind x', y', z' die Ebenenkoordinaten einer Beruhungsebene von G , so kann man die Stellen des Korpers auch so definieren, da auer x, y, z auch x', y', z' an keiner Stelle unbestimmt werden, so da jeder Stelle des Korpers sowohl ein bestimmter Punkt wie auch eine bestimmte Beruhungsebene entspricht.

Da die Stellen ganz verschieden sind, je nachdem, welche Groen man bei ihrer Definition auszeichnet, zeigt schon folgendes einfache Beispiel. Es sei der Korper definiert durch

$$G \equiv yz - x^2 = 0.$$

Nehmen wir x, y als unabhangige Veranderliche, so konnen wir fur die Umgebung von $x = 0, y = 0$ setzen

$$(3) \quad x = u, \quad y = v, \quad z = \frac{u^2}{v}.$$

⁶⁾ Jung H, Kap. I, § 4.

Nehmen wir dagegen y, z als unabhängige Veränderliche, so können wir für die Umgebung von $y = 0, z = 0$ setzen

$$(4) \quad \begin{array}{lll} \text{I. } x = uv, & y = v, & z = u^2v; \\ \text{II. } x = uv, & y = u^2v, & z = v. \end{array}$$

Man kann I benutzen etwa für $\left| \frac{y}{z} \right| > 1, |z| < 1$ und II für $\left| \frac{y}{z} \right| \leq 1, |z| < 1$. Sowohl die Darstellung (3) wie auch (4) geben uns unter anderem die ganze Umgebung des Punktes $x = y = z = 0$. In (3) wird z für $u = v = 0$ unbestimmt, während in (4) z immer bestimmt ist, so daß die durch (3) und (4) definierten Stellen wesentlich verschieden sind.

Aber selbst, wenn wir einige Funktionen des Körpers ausgewählt haben und die Stellen so definieren, daß diese Funktionen überall bestimmte Werte haben, ist diese Definition nicht eindeutig. Es sei z. B. der Körper $K(x, y, z)$ der Körper der rationalen Funktionen von x, y . Die Umgebung des Punktes x, y können wir darstellen durch die Gleichungen $x = u, y = v$.

Wir können sie aber auch darstellen durch die beiden Gleichungspaare

$$\begin{array}{ll} \text{I. } x = uv, & y = v; \\ \text{II. } x = v, & y = uv, \end{array}$$

indem wir I etwa gelten lassen für $\left| \frac{y}{x} \right| > 1, |x| < 1$ und II für $\left| \frac{y}{x} \right| \leq 1, |x| < 1$. Im ersten Falle haben wir nur eine Stelle im Punkte $x = y = 0$, im zweiten unendlich viele. Denn jeder Stelle $u = u_1, v = 0$ des Körpers entspricht die Stelle $x = y = 0$, wenn u_1 irgendeine endliche Zahl ist.

Diese Willkürlichkeit in der Definition der Stellen hat ihre Nachteile, aber auch ihre Vorteile. Hat man z. B. auf der Fläche G eine Kurve mit irgendwelchen mehrfachen Punkten, so kann man *allein durch andere Definition der Stellen* die Kurve verwandeln in eine Kurve ohne mehrfache Stellen, wovon auch die italienischen Mathematiker häufig Gebrauch machen. Es kommt das daher, daß eine Veränderung in der Definition der Stellen nichts anderes ist als eine birationale Transformation. Und wenn man bedenkt, daß bei einer solchen Transformation Punkte der Fläche G in Kurven und Kurven in Punkte übergehen können, so sieht man, daß die Willkürlichkeit in der Definition der Stellen in der Natur der Sache liegt.

III. Primteiler und Divisoren.

4. Die Primteiler erster Stufe.⁷⁾ Es sei \mathfrak{P} ein algebraischer Korper einer Veranderlichen, der zum Korper $K(x, y, z)$ in folgender Beziehung steht. Jeder Funktion aus $K(x, y, z)$ entspreche eine und nur eine Funktion aus \mathfrak{P} . Jede Gleichung, die zwischen Funktionen aus $K(x, y, z)$ besteht, bestehe auch zwischen den ihnen entsprechenden Funktionen aus \mathfrak{P} . Es heit dann \mathfrak{P} ein *Primteiler erster Stufe von* $K(x, y, z)$. Den ubergang von $K(x, y, z)$ zu \mathfrak{P} druckt man so aus, da man sagt, man setzt $\mathfrak{P} = 0$. Ist R eine Funktion aus $K(x, y, z)$, der im Korper \mathfrak{P} die Zahl 0 entspricht, die also fur $\mathfrak{P} = 0$ identisch null wird, so sagt man R ist durch \mathfrak{P} teilbar, oder \mathfrak{P} ist in R enthalten. Sind die Funktionen R und S beide durch \mathfrak{P} teilbar, und wird der Quotient $R : S$ fur $\mathfrak{P} = 0$ weder identisch null noch unendlich, so sagt man, R und S werden fur $\mathfrak{P} = 0$ von derselben Ordnung null, oder sie enthalten \mathfrak{P} in derselben Potenz. Wird aber $R : S$ fur $\mathfrak{P} = 0$ zu null, so sagt man, R enthalt \mathfrak{P} in hoherer Potenz als S . Nun gibt es immer eine durch \mathfrak{P} teilbare Funktion T aus $K(x, y, z)$ von der Art, da keine Funktion aus $K(x, y, z)$ \mathfrak{P} in niedrigerer Potenz enthalt als T .

Ist dann R irgendeine Funktion des Korpers, die fur $\mathfrak{P} = 0$ zu null wird, die also durch \mathfrak{P} teilbar ist, so mu unter den Funktionen $R : T, R : T^2, R : T^3, \dots$ eine vorkommen, die fur $\mathfrak{P} = 0$ weder null noch unendlich wird. Denn erstens mu $R : T^l$ fur genugend groes ganzzahliges l fur $\mathfrak{P} = 0$ gleich unendlich werden. Ist zweitens $R : T^{l+1}$ die *erste* Funktion der Reihe, die fur $\mathfrak{P} = 0$ unendlich wird, und ist $R : T^l$ fur $\mathfrak{P} = 0$ null, so wurde $R : T^l$ eine Funktion des Korpers sein, die fur $\mathfrak{P} = 0$ von geringerer Ordnung null wird als T . Es wird also $R : T^l$ fur $\mathfrak{P} = 0$ weder identisch null noch unendlich. Wir sagen: R ist durch \mathfrak{P}^l teilbar oder \mathfrak{P} ist in R in der l -ten Potenz enthalten. Wenn R fur $\mathfrak{P} = 0$ unendlich wird und $R \cdot T^l$ fur $\mathfrak{P} = 0$ weder null noch unendlich, so sagen wir, R ist durch \mathfrak{P}^{-l} teilbar, oder R enthalt \mathfrak{P} in der Potenz $-l$.

Es entspricht z. B. jeder *Hensel'schen* Entwicklung von z nach Potenzen eines irreduktiblen Polynoms $A(x, y)$ ein Primteiler erster Stufe. Ist namlich etwa

$$(5) \quad z = a_0 + a_1 A^{\frac{1}{\alpha}} + a_2 A^{\frac{2}{\alpha}} + \dots$$

eine solche Entwicklung, wo die Koeffizienten a_i algebraische Funktionen von x sind, so konnen wir mit Hilfe dieser Entwicklung jede

7) Jung A, Jung F, Nr. 1.

Funktion des Körpers $K(x, y, z)$ in eine nach steigenden Potenzen von $A^{\frac{1}{\alpha}}$ fortschreitende Potenzreihe entwickeln, deren Koeffizienten algebraische Funktionen von x sind. Setzen wir in diesen Entwicklungen $A = 0$, so gehen die Funktionen des Körpers K über in algebraische Funktionen von x , und zwar in Funktionen des zur Reihe (5) gehörenden Koeffizientenkörpers. Wir erhalten so aus K einen zur Entwicklung (5) gehörenden Primteiler \mathfrak{P} erster Stufe. Eine Funktion R aus K ist dann durch \mathfrak{P}^2 teilbar, wenn ihre Entwicklung nach steigenden Potenzen von A mit der λ -ten Potenz von $A^{\frac{1}{\alpha}}$ beginnt. Man kann jeden Primteiler \mathfrak{P} erster Stufe auf diese Art definieren, wenn man nur die unabhängigen Veränderlichen passend wählt. Sie müssen so angenommen werden, daß sie nicht beide für $\mathfrak{P} = 0$ konstant werden.

5. Die Einteilung der Primteiler erster Stufe in zwei Arten.⁸⁾

Es gilt der Satz: *Jede Funktion des Körpers $K(x, y, z)$ enthält unendlich viele Primteiler erster Stufe.*

Nehmen wir z. B. den Körper $K(x, y)$ der rationalen Funktionen von x, y . Es sei a irgendeine ganze positive Zahl. Wir setzen in die rationalen Funktionen von x, y statt y ein $x^a \xi$, entwickeln nach steigenden Potenzen von x und lassen dann x zu null werden. Es gehen auf diese Art die rationalen Funktionen von x, y über in rationale Funktionen von ξ . Wir erhalten so einen algebraischen Körper der einen Veränderlichen ξ , der ein Primteiler erster Stufe des Körpers $K(x, y)$ nach der in Nr. 4 angegebenen Definition ist. Wir bezeichnen ihn mit \mathfrak{P}_a . Wir erhalten so unendlich viele Primteiler $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \mathfrak{P}_3, \dots$. Durch alle diese Primteiler ist y teilbar, und zwar enthält y \mathfrak{P}_a genau in der a -ten Potenz.

Die hierdurch entstehende Schwierigkeit ist von ganz anderer Art als in der Theorie der algebraischen Zahlen. Dort besteht die Schwierigkeit darin, die Primteiler so zu definieren, daß eine eindeutige Zerlegbarkeit der Zahlen in Primteiler gewährleistet ist. Hier lassen sich die Primteiler, wie in Nr. 4 angegeben, einfach definieren, und es ist auch für jeden Primteiler zu definieren, wie oft er in einer Funktion enthalten ist. Die Schwierigkeit ist hier praktischer Art. Jede Funktion enthält unendlich viele Primteiler, die man bei der Zerlegung der Funktion nicht alle explizit angeben kann. Da tritt der glückliche Umstand ein, daß man die Primteiler in zwei Arten teilen kann in der Weise, daß jede Funktion nur eine endliche Zahl von Primteilern der einen Art enthält und eindeutig in Primteiler dieser Art

8) Jung A, § 2, Jung F, Nr. 2.

zerlegt werden kann, und da weiter die Primteiler der anderen Art, die in der Funktion enthalten sind, durch die der einen mitbestimmt sind.

a) *Die Primteiler erster Art.* Es liegt nahe, die Primteiler erster Art geometrisch zu definieren. Definiert $G(x, y, z) = 0$ den Korper $K(x, y, z)$, so kann man $G = 0$ als Gleichung einer algebraischen Flache auffassen, indem man x, y, z als kartesische Punktkoordinaten deutet. Man kann dann einen Primteiler \mathfrak{P} von der ersten Art nennen, wenn ihm auf G eine Kurve entspricht, wenn also fur $\mathfrak{P} = 0$ die drei Groen x, y, z nicht alle drei konstant werden. Oder, wenn man nur zwei Groen, etwa x, y , auszeichnen will, die man dann als unabhangige Veranderliche auffassen kann, so kann man \mathfrak{P} einen Primteiler erster Art nennen, wenn fur $\mathfrak{P} = 0$ nicht x und y beide konstant werden, wenn also \mathfrak{P} auf G eine Kurve entspricht, deren Projektion auf die xy -Ebene kein Punkt ist. Aber es zeigt sich, da eine derartige Definition nicht das Wesen der Sache trifft, wie folgendes Beispiel zeigt. Beschrankt man sich auf diese Primteiler, die also, gleich null gesetzt, x und y nicht beide konstant werden lassen, so kann ein Doppeldifferential unendlich werden, ohne da es lang eines Primteilers unendlich wird. Man hat also kein ubersichtliches Kriterium dafur, da ein Doppeldifferential von der ersten Gattung ist. Z. B. wird das Doppeldifferential

$$\frac{dx dy}{z} = \frac{dx dy}{\sqrt{x^4 - y^4}}$$

fur keinen Primteiler der angegebenen Art unendlich, wird aber trotzdem im Punkte $x = y = z = 0$ unendlich. Man hat namlich — unter anderem — die Darstellung

$$(6) \quad x = u, \quad y = uv, \quad z = u^2 \sqrt{1 - v^4},$$

woraus folgt

$$\frac{dx dy}{z} = \frac{du dv}{u \sqrt{1 - v^4}},$$

so da das Differential fur $u = 0$ unendlich wird, d. h. fur $x = y = z = 0$. Nun wird durch $u = 0$ ein Primteiler definiert. Setzt man namlich in alle rationalen Funktionen von x, y, z fur x, y, z die Werte (6) ein, entwickelt nach steigenden Potenzen von u und setzt dann $u = 0$, so werden die Funktionen des Korpers $K(x, y, z)$ rationale Funktionen von v und $\sqrt{1 - v^4}$, also Funktionen eines algebraischen Korpers einer Veranderlichen. Man wird den so definierten Primteiler mit zu den Primteilern erster Art rechnen wollen. So kommt man zu folgender Definition der Primteiler erster Art.

Zunachst sind die Stellen des Korpers zu definieren. Wir betrachten dann eine Funktion R des Korpers in der Umgebung einer

Stelle S , wo sie null wird. Sie habe unter Benutzung der zur Stelle S gehörenden Hilfsgrößen u, v die Darstellung

$$R = \frac{L(u, v)}{H(u, v)},$$

wo L und H gewöhnliche Potenzreihen von u, v sein sollen, und wo L für $u = v = 0$ verschwinden soll. Wir nehmen an, daß L und H in der Umgebung von $u = v = 0$ keinen gemeinsamen Faktor haben. Wir können L in Faktoren zerlegen, die gewöhnliche für $u = v = 0$ verschwindende Potenzreihen von u, v sind, und die sich nicht weiter in derselben Art zerlegen lassen. Das wird sofort klar, wenn man nach dem *Weierstraßschen* Vorbereitungssatze $L(u, v)$ darstellt in der Form

$$L(u, v) \equiv E(u, v)l(u, v),$$

wo E eine Einheit für die Stelle $u = v = 0$ ist, d. h. eine Potenzreihe von u, v , die für $u = v = 0$ nicht verschwindet, während l eine ganze rationale Funktion von v ist, in der der Koeffizient der höchsten Potenz gleich 1 ist, während die anderen Koeffizienten gewöhnliche Potenzreihen von u sind, die für $u = 0$ verschwinden. Ist $k(u, v)$ ein nicht weiter zerlegbarer Faktor von L , so wird durch $k = 0$ ein Primteiler \mathfrak{P} erster Stufe definiert. Denn es wird für $k = 0$ auch $R = 0$, so daß zu der Gleichung $G(x, y, z) = 0$ noch eine algebraische Gleichung hinzukommt. Es kann sein, daß noch andere Faktoren von L denselben Primteiler \mathfrak{P} definieren. Das Produkt aller \mathfrak{P} definierenden Faktoren von L , jeden in der ersten Potenz genommen, nenne ich die *zugeordnete Funktion von \mathfrak{P} für die Stelle S* und bezeichne es mit $\mathfrak{P}(u, v)$. Die zugeordnete Funktion soll nur bestimmt sein bis auf eine Einheit für die Stelle $u = v = 0$ als Faktor. Es kann also nach dem *Weierstraßschen* Vorbereitungssatz $\mathfrak{P}(u, v)$ auch immer als ganze rationale Funktion von v angenommen werden. Haben wir die Hilfsgrößen u, v als Funktionen des Körpers $K(x, y, z)$ gewählt, so besteht zwischen ihnen für $\mathfrak{P} = 0$ eine irreduktible rationale Gleichung $p(u, v) = 0$, und es kann dann $\mathfrak{P}(u, v)$ nichts anderes sein als der größte gemeinsame Teiler von $l(u, v)$ und $p(u, v)$.

Ist \mathfrak{P}' ein in R in positiver Potenz enthaltener Primteiler, und definiert keiner der Faktoren von $L(u, v)$, gleich null gesetzt, den Primteiler \mathfrak{P}' , so setzen wir die zugeordnete Funktion von \mathfrak{P}' für die Stelle S gleich 1.

Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Es sei die Fläche G definiert durch

$$G \equiv (z - x)^2 - y^2(1 + x) = 0.$$

Aus $G = 0$ folgt dann für die Umgebung von $x = y = 0$

$$z = x \pm y\sqrt{1 + x}.$$

Wir haben also im Punkte $x = y = z = 0$ zwei Stellen S_1 und S_2 von G , die definiert sind durch

$$S_1: x = u, \quad y = v, \quad z = u + v\sqrt{1+u} = u + v + \frac{1}{2}uv - \frac{1}{8}u^2v + \dots,$$

$$S_2: x = u, \quad y = v, \quad z = u - v\sqrt{1+u} = u - v - \frac{1}{2}uv + \frac{1}{8}u^2v + \dots$$

Wir betrachten die Stelle S_1 und wahlen $R = yz$. Es wird dann $H = 1$ und

$$L(u, v) = v(u + v\sqrt{1+u}) = v(u + v + \frac{1}{2}uv + \dots).$$

Wir haben also $l(u, v) = v\{v + u(1+u)^{-\frac{1}{2}}\}$.

Es hat hier l zwei Faktoren $k_1 = v$ und $k_2 = v + u(1+u)^{-\frac{1}{2}}$. Der durch $k_2 = 0$ definierte Primteiler heie \mathfrak{P} . Fur $\mathfrak{P} = 0$ wird $z = 0$, so da wegen $G = 0$ zwischen $u = x$, $v = y$ fur $\mathfrak{P} = 0$ die Gleichung besteht

$$p(u, v) \equiv v^2(1+u) - u^2 = 0.$$

Es ist hier k_2 der grote gemeinsame Teiler von p und l , also die zugeordnete Funktion von \mathfrak{P} fur die Stelle S_1 . Durch $k_1 = 0$ wird ein von \mathfrak{P} verschiedener Primteiler \mathfrak{P}_1 definiert. Denn fur $\mathfrak{P}_1 = 0$ wird y zu null, fur $\mathfrak{P} = 0$ aber nicht.

Ein anderes Beispiel ist folgendes: Es sei $K(x, y, z)$ der Korper $K(x, y)$ der rationalen Funktionen von x, y . Wir betrachten die Stelle S , $x = y = 0$. Wir haben einfach zu setzen

$$x = u, \quad y = v.$$

Es sei $R \equiv (y - x)(y^2 - x^2 - x^3)$, also in der Umgebung von S , $H = 1$ und $L(u, v) \equiv (v - u)(v^2 - u^2 - u^3) \equiv l(u, v)$.

Hier hat l drei Faktoren k_1, k_2, k_3 .

$$k_1 = v - u, \quad k_2 = v - u(1+u)^{\frac{1}{2}}, \quad k_3 = v + u(1+u)^{\frac{1}{2}},$$

wo wir uns fur $(1+u)^{\frac{1}{2}}$ die Potenzreihe gesetzt zu denken haben. Es wird durch $k_1 = 0$ ein Primteiler \mathfrak{P}_1 definiert, dem geometrisch die Gerade $y = x$ entspricht. Durch $k_2 = 0$ und $k_3 = 0$ wird derselbe Primteiler \mathfrak{P}_2 definiert, dem geometrisch die Kurve $y^2 - x^2 - x^3 = 0$ entspricht. Es ist

$$\mathfrak{P}_1(u, v) = v - u, \quad \mathfrak{P}_2(u, v) = v^2 - u^2 - u^3.$$

Wir nennen jetzt einen Primteiler von der ersten Art, wenn er auch nur fur eine Stelle eine von 1 verschiedene zugeordnete Funktion hat.

Es gilt dann der Satz⁹⁾:

Jede Funktion des Korpers $K(x, y, z)$ lat sich auf eine und nur eine Art in eine endliche Zahl von Primteilern erster Art zerlegen,

9) Jung A, § 3.

und zwei Funktionen, die dieselben Primteiler erster Art in derselben Potenz enthalten, unterscheiden sich höchstens durch einen konstanten Faktor.

Es genügt also, die Primteiler erster Art anzugeben. Damit ist nicht gemeint, daß die Funktion keine anderen Primteiler enthält, kann auch nicht gemeint sein, da ja jede Funktion unendlich viele Primteiler enthält.

Ferner gilt:

Hat man für die Funktion R des Körpers $K(x, y, z)$ die Zerlegung

$$R = \mathfrak{P}_1^{e_1} \mathfrak{P}_2^{e_2} \dots \mathfrak{P}_\mu^{e_\mu}$$

in Primfaktoren, und ist $\mathfrak{P}_\alpha(u, v)$ die zugeordnete Funktion von \mathfrak{P}_α für eine Stelle S , so ist

$$R = \mathfrak{P}_1(u, v)^{e_1} \mathfrak{P}_2(u, v)^{e_2} \dots \mathfrak{P}_\mu(u, v)^{e_\mu} E(u, v)$$

die Darstellung von R in der Umgebung von S durch die Hilfsgrößen u, v . Dabei ist E eine Einheit für die Stelle S .

Die Primteiler erster Art teilen wir wieder in zwei Arten.¹⁰⁾ Ist \mathfrak{P} ein solcher Primteiler, so werden für $\mathfrak{P} = 0$ entweder x und y beide konstant oder nicht. Im ersten Fall heißt \mathfrak{P} *Punktprimteiler*, im zweiten Falle *Kurvenprimteiler*.¹¹⁾

b) *Die Primteiler zweiter Art*.¹²⁾

Jeder Primteiler \mathfrak{B} zweiter Art gehört zu einer bestimmten Stelle, etwa zur Stelle S . Sind u, v die Hilfsgrößen, durch die wir die Funktionen des Körpers $K(x, y, z)$ in der Umgebung von S darstellen, so können wir \mathfrak{B} so definieren:

Wir setzen:

$$\bar{v} = a_1 u^{\frac{\alpha_1}{\beta'}} + a_2 u^{\frac{\alpha_2}{\beta'}} + \dots + a_{v-1} u^{\frac{\alpha_{v-1}}{\beta'}} + t u^{\frac{\beta''}{\beta'}},$$

wo die Exponenten von u positive rationale Zahlen mit dem Hauptnenner β' sind, wo $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_{v-1} < \beta''$ und wo die a_x konstant sind, während t ein Parameter ist. Stellt man alle Funktionen aus $K(x, y, z)$ durch u, v dar, setzt dann $v = \bar{v}$, ordnet nach Potenzen von u und setzt dann $u = 0$, so gehen alle Funktionen aus $K(x, y, z)$ in rationale Funktionen von t [oder in Konstante] über. Wir erhalten so eine Abbildung von $K(x, y, z)$ auf einen Körper \mathfrak{B} vom Geschlechte 0, der ein Primteiler zweiter Art von $K(x, y, z)$ ist. \bar{v} heißt die \mathfrak{B} definierende Funktion. Es gelten die Sätze:

10) Jung A, § 2.

11) Die Primteiler, die Hensel mit Hilfe seiner Reihenentwicklungen definiert, sind die Kurvenprimteiler (vgl. Hensel C, § 15).

12) Jung A, § 2, Nr. 2, Jung F, Nr. 3.

1. Ist R eine Funktion aus $K(x, y, z)$, und stellen wir R in der Umgebung von S durch u, v dar, setzen dann $v = \bar{v}$ und entwickeln nach steigenden Potenzen u , so ist R genau durch \mathfrak{B}^λ teilbar, wenn das Anfangsglied die λ^{te} Potenz von $u^{\frac{1}{\beta'}}$ enthalt. Diese Definition stimmt mit der in Nr. 4 gegebenen uberein. Denn aus der Theorie der algebraischen Funktionen einer Veranderlichen folgt, da es immer eine rationale Funktion T von u, v gibt, so da $T(u, \bar{v})$ genau durch die erste Potenz von $u^{\frac{1}{\beta'}}$ teilbar wird. Da aber u und v rationale Funktionen von x, y, z sind, so ist T eine Funktion des Korpers $K(x, y, z)$, und diese wird fur $\mathfrak{B} = 0$ von moglichst niedriger Ordnung null. Und man definiert: Ist \mathfrak{P} ein durch S gehender Primteiler erster Art, und beginnt die Entwicklung von $\mathfrak{P}(u, \bar{v})$ nach steigenden Potenzen von u mit der μ^{ten} Potenz von $u^{\frac{1}{\beta'}}$, so sagt man, \mathfrak{P} ist durch \mathfrak{B}^μ teilbar. *Die Primteiler zweiter Art sind also in denen erster Art enthalten und durch diese mitbestimmt.*

2. Ist der Hauptnenner der Exponenten $\frac{\alpha_1}{\beta'}, \frac{\alpha_2}{\beta'}, \dots, \frac{\alpha_{v-1}}{\beta'}$ gleich δ , und ist $\beta' = \varepsilon\delta$, so sind die Funktionen des Korpers \mathfrak{B} rationale Funktionen von

$$\tau = t^\varepsilon,$$

und es ist τ selbst eine Funktion des Korpers \mathfrak{B} .

Man setzt¹³⁾

$$(7) \quad \text{Norm}(v - \bar{v}) = B(u, v; \tau),$$

wobei die Norm in bezug auf die zu \bar{v} konjugierten Entwicklungen zu bilden ist. Es ist die Norm B eine ganze rationale Funktion von u, v und τ . Sie heit die *Eichfunktion* von \mathfrak{B} . Ihr Grad in u, v ist (β', β'') . Die Zahl $\beta = \beta' + \beta'' - 1$ heie die *Ordnung* von \mathfrak{B} .

6. Die Primteiler zweiter Stufe.¹⁴⁾ Jeder Primteiler erster Stufe ist ein algebraischer Korper einer Veranderlichen. Die Primteiler, die zu den Stellen eines solchen Korpers gehoren, heien Primteiler zweiter Stufe des Korpers $K(x, y, z)$. Ist im besonderen \mathfrak{P} ein Primteiler erster Art, und ist $\mathfrak{P}(u, v)$ seine zugeordnete Funktion fur eine Stelle S , durch die \mathfrak{P} geht, so gibt die Gleichung $\mathfrak{P}(u, v) = 0$ fur v eine oder mehrere Losungen, die fur $u = 0$ verschwindende gewohnliche Potenzreihen von u oder einer gebrochenen Potenz von u sind. Ist etwa v_1 eine solche Losung, und schreitet v_1 nach ganzen Potenzen von u^α

13) Jung F, Nr. 3, Schlu.

14) Jung B, § 3.

fort, so ordnen wir v_1 einen Primteiler zweiter Stufe \mathfrak{p}_1 zu, indem wir definieren, der Primteiler erster Art \mathfrak{Q} ist durch \mathfrak{p}_1^2 teilbar, wenn $\mathfrak{Q}(u, v_1)$ durch $u^{\frac{\lambda}{\alpha}}$ teilbar ist. Man kann so für jeden Primteiler [zweiter Stufe] von \mathfrak{P} bestimmen, ob und in welcher Potenz er in \mathfrak{Q} enthalten ist. Das Produkt aller in \mathfrak{Q} aufgehenden solchen Primteiler, jeden in der in \mathfrak{Q} enthaltenen Potenz genommen, sei mit \mathfrak{q} bezeichnet. Man sagt dann: \mathfrak{Q} geht für $\mathfrak{P} = 0$ in \mathfrak{q} über. Ist $\mathfrak{Q} = \mathfrak{Q}_1^{\alpha_1} \mathfrak{Q}_2^{\alpha_2} \dots \mathfrak{Q}_r^{\alpha_r}$ ein Produkt von Primteilern erster Art, und geht \mathfrak{Q}_1 für $\mathfrak{P} = 0$ über in \mathfrak{q}_1 , so geht \mathfrak{Q} für $\mathfrak{P} = 0$ über in $\mathfrak{q}_1^{\alpha_1} \mathfrak{q}_2^{\alpha_2} \dots \mathfrak{q}_r^{\alpha_r}$. Ist im besonderen \mathfrak{Q} eine Funktion aus $K(x, y, z)$, so erhalten wir so die Zerlegung von \mathfrak{Q} in Primteiler des Körpers \mathfrak{P} .

Man kann für jede Stelle S , durch die \mathfrak{P} geht, bestimmen, durch welche Potenz der zu S gehörenden Primteiler von \mathfrak{P}

$$\frac{1}{du} \frac{\partial \mathfrak{P}}{\partial v} \quad \text{oder} \quad \frac{1}{dv} \frac{\partial \mathfrak{P}}{\partial u} \quad (14a)$$

teilbar ist. Das Produkt aller dieser Primteiler, jeder in der festgestellten Potenz genommen, sei bezeichnet mit $\mathfrak{d}_{\mathfrak{P}}$. Es heißt $\mathfrak{d}_{\mathfrak{P}}$ der *Divisor der mehrfachen Stellen von \mathfrak{P}* . Seine Ordnung ist immer endlich und immer gerade. Sie sei bezeichnet mit $2\sigma_{\mathfrak{P}}$.

7. Divisoren, Divisorenklassen.¹⁵⁾ Ein Produkt von irgendwelchen Primteilern, jeden in irgendeiner positiven oder negativen ganzzahligen Potenz genommen, heißt *Divisor*. Kommen keine negativen Potenzen von Primteilern in ihm vor, so heißt er *ganz*. Ist \mathfrak{Q} ein Divisor erster Art, enthält also \mathfrak{Q} nur Primteiler erster Art, und ist \mathfrak{b} ein Divisor zweiter Art, so ist $\mathfrak{Q}\mathfrak{b}^{-1}$ ganz, wenn \mathfrak{Q} durch \mathfrak{b} teilbar ist. Ist \mathfrak{r} ein Divisor zweiter Stufe, dessen Primteiler zum Körper \mathfrak{P} einer Veränderlichen gehören, so ist $\mathfrak{Q}\mathfrak{r}^{-1}$ ganz, wenn \mathfrak{Q} durch \mathfrak{r} teilbar ist, wenn also für $\mathfrak{P} = 0$ der Divisor \mathfrak{Q} in einen durch \mathfrak{r} teilbaren Divisor des Körpers \mathfrak{P} übergeht.

Ebenso wie bei algebraischen Funktionen einer Veränderlichen heißen zwei Divisoren *äquivalent* (\sim), wenn ihr Quotient eine Funktion des Körpers ist. Alle zueinander äquivalenten Divisoren bilden eine *Klasse*. Jede Klasse ist durch irgendeinen in ihr enthaltenen Divisor vollkommen bestimmt. Ist \mathfrak{Q} ein Divisor, so wird die Klasse, der \mathfrak{P} angehört, mit (\mathfrak{Q}) bezeichnet. Sind \mathfrak{Q}_1 und \mathfrak{Q}_2 zwei Divisoren erster Stufe, so heißt die Klasse $(\mathfrak{Q}_1, \mathfrak{Q}_2)$ das Produkt und die Klasse $\left(\frac{\mathfrak{Q}_1}{\mathfrak{Q}_2}\right)$ der Quotient der Klassen (\mathfrak{Q}_1) , (\mathfrak{Q}_2) .

14*) Da $\mathfrak{P} = 0$, so ist $d\mathfrak{P} = \frac{\partial \mathfrak{P}}{\partial u} du + \frac{\partial \mathfrak{P}}{\partial v} dv = 0$ oder $\frac{1}{du} \frac{\partial \mathfrak{P}}{\partial v} = -\frac{1}{dv} \frac{\partial \mathfrak{P}}{\partial u}$.

15) Jung B, § 8.

Die Klasse, der die Funktionen des Korpers $K(x, y, z)$ angehoren, heit *Hauptklasse*. Eine zweite besondere Klasse ist die *kanonische Klasse*. Sie wird folgendermaen definiert. Ist S irgendeine Stelle des Korpers $K(x, y, z)$, und sind u, v die Hilfsgroen, so wird

$$dx dy = \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right) du dv = \mathfrak{G}(u, v) du dv,$$

wo \mathfrak{G} eine gewonliche Potenzreihe von u, v ist. Ist $\mathfrak{G}(u, v)$ keine Einheit fur die Stelle $u = v = 0$, so lat sich \mathfrak{G} als Produkt von zugeordneten Funktionen von Primteilern erster Art darstellen, $\mathfrak{G} = \mathfrak{P}_1^{\alpha_1} \mathfrak{P}_2^{\alpha_2} \dots \mathfrak{P}_v^{\alpha_v}$. Man sagt dann, $dx dy$ ist durch $\mathfrak{P}_1^{\alpha_1} \mathfrak{P}_2^{\alpha_2} \dots \mathfrak{P}_v^{\alpha_v}$ teilbar. Macht man diese berlegung fur alle Stellen S , so erhalt man einen Divisor, durch den $dx dy$ teilbar ist. Dieser hat die Form

$$(8) \quad \mathfrak{R} = \frac{\mathfrak{S}_{xy}}{\mathfrak{L}^2 \mathfrak{M}^2},$$

wo $\mathfrak{L}, \mathfrak{M}$ die Nenner von x, y sind, wahrend \mathfrak{S}_{xy} ein ganzer Divisor ist. Die Klasse (\mathfrak{R}) heit die *kanonische Klasse* des Korpers $K(x, y, z)$.

uber die in \mathfrak{S}_{xy} enthaltenen Primteiler gilt folgendes:

a) Ist \mathfrak{P} ein Punktprimteiler, so ist er mindestens in der ersten Potenz in \mathfrak{S}_{xy} enthalten.

b) Ist \mathfrak{P} ein Kurvenprimteiler von der Verzweigungsordnung $\alpha - 1$, so ist \mathfrak{P} genau in der $(\alpha - 1)$ -ten Potenz in \mathfrak{S}_{xy} enthalten.

Der Divisor \mathfrak{S}_{xy} heit *Verzweigungsdivisor* von $K(x, y, z)$ in bezug auf xy . Es gilt der Satz: Das Differential $R dx dy$, wo R eine Funktion aus $K(x, y, z)$ ist, wird dann und nur dann nirgends unendlich, wenn

$$R = \frac{\mathfrak{L}^2 \mathfrak{M}^2}{\mathfrak{S}_{xy}} \mathfrak{G},$$

wo \mathfrak{G} ein ganzer Divisor der kanonischen Klasse ist.¹⁶⁾

Zwei Klassen, deren Produkt gleich der kanonischen Klasse ist, heien *Erganzungsklassen*.

Sind $\mathfrak{S}_{yz}, \mathfrak{S}_{zx}$ die Verzweigungsdivisoren in bezug auf yz, zx und ist \mathfrak{N} der Nenner von z , so bestehen die Gleichungen¹⁷⁾

$$(9) \quad \frac{\partial G}{\partial x} = \frac{\mathfrak{D} \mathfrak{S}_{yz}}{\mathfrak{L}^{l-2} \mathfrak{M}^m \mathfrak{N}^n}, \quad \frac{\partial G}{\partial y} = \frac{\mathfrak{D} \mathfrak{S}_{zx}}{\mathfrak{L}^l \mathfrak{M}^{m-2} \mathfrak{N}^n}, \quad \frac{\partial G}{\partial z} = \frac{\mathfrak{D} \mathfrak{S}_{xy}}{\mathfrak{L}^l \mathfrak{M}^m \mathfrak{N}^{n-2}},$$

wo (l, m, n) der Grad von $G(x, y, z)$ in x, y, z ist. Der durch diese Gleichungen definierte Divisor \mathfrak{D} ist ganz in bezug auf die Kurvenprimteiler, aber nicht notwendig ganz in bezug auf die Punktprim-

16) Landsberg A, Jung A. Bei Landsberg sind die Punktprimteiler nicht berucksichtigt. E, Nr. 11. Dort werden vom kanonischen System ausgezeichnete Kurven abgesondert.

17) Jung, uber den Doppelkurvendivisor einer algebraischen Flache, Jahresbericht der D. Math.-Ver. 19 (1910) S. 199.

teiler. Er wird null längs der mehrfachen Kurven von G und heißt der *Divisor der mehrfachen Kurven von G* .

Über \mathfrak{D} gilt der Satz:

Ist eine Funktion des Körpers $K(x, y, z)$ darstellbar in der Form

$$H = \frac{\mathfrak{D}\mathfrak{H}}{\mathfrak{G}^l \mathfrak{M}^\mu \mathfrak{N}^\nu},$$

wo \mathfrak{H} ein ganzer Divisor ist, so ist H als ganze rationale Funktion von x, y, z darstellbar, und zwar, wenn $\lambda \geq l - 1$, $\mu \geq m - 1$, $\nu \geq n - 1$ als ganze rationale Funktion vom Grade (λ, μ, ν) in x, y, z .

Aus (9) folgt, daß die kanonische Klasse auch durch den Divisor

$$\mathfrak{D}^{l-2} \mathfrak{M}^{m-2} \mathfrak{N}^{n-2} \mathfrak{D}^{-1}$$

definiert werden kann.

8. Grad und Geschlecht einer Klasse.¹⁸⁾ Ist \mathfrak{P} ein Primteiler erster Art und \mathfrak{D} ein Divisor erster Stufe erster Art, der \mathfrak{P} nicht enthält, so wird die Ordnung des Divisors q , in den \mathfrak{D} für $\mathfrak{P} = 0$ übergeht, mit $(\mathfrak{P}, \mathfrak{D})$ bezeichnet und die Zahl der Schnittpunkte von \mathfrak{P} und \mathfrak{D} genannt. Ist $\mathfrak{D}_1 \sim \mathfrak{D}_2$, und gehen \mathfrak{D}_1 und \mathfrak{D}_2 für $\mathfrak{P} = 0$ in q_1 und q_2 über, so ist $q_1 \sim q_2$. Es gehen also die Divisoren einer Klasse (\mathfrak{D}) für $\mathfrak{P} = 0$ über in die Divisoren einer Klasse (q) des Körpers \mathfrak{P} . Daher ist auch $(\mathfrak{P}, \mathfrak{D})$ gleich der Ordnung der Klasse, in die (\mathfrak{D}) für $\mathfrak{P} = 0$ übergeht, so daß $(\mathfrak{P}_1, \mathfrak{D}_1) = (\mathfrak{P}_1, \mathfrak{D}_2)$, wenn $\mathfrak{D}_1 \sim \mathfrak{D}_2$. Es hat also $(\mathfrak{P}, \mathfrak{D})$ auch eine Bedeutung, wenn \mathfrak{P} in \mathfrak{D} enthalten ist. Sind \mathfrak{P}_1 und \mathfrak{P}_2 zwei Primteiler erster Art, so ist $(\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2) = (\mathfrak{P}_2, \mathfrak{P}_1)$. Sind \mathfrak{D}_1 und \mathfrak{D}_2 zwei Divisoren erster Art, und ist in Primteiler zerlegt

$$\mathfrak{D}_1 = \mathfrak{P}_1^{\alpha_1} \mathfrak{P}_2^{\alpha_2} \dots \mathfrak{P}_r^{\alpha_r}, \quad \mathfrak{D}_2 = \mathfrak{P}_1^{\beta_1} \mathfrak{P}_2^{\beta_2} \dots \mathfrak{P}_r^{\beta_r},$$

so setzt man

$$(10) \quad (\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2) = (\mathfrak{D}_2, \mathfrak{D}_1) = \sum \alpha_k \beta_k (\mathfrak{P}_k, \mathfrak{P}_1).$$

Ist $\mathfrak{D}_1 \sim \mathfrak{D}'_1$, $\mathfrak{D}_2 \sim \mathfrak{D}'_2$, so ist $(\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2) = (\mathfrak{D}'_1, \mathfrak{D}'_2)$. Man nennt $(\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2)$ die *Zahl der Schnittpunkte der Divisoren $\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2$* . Es ist hiernach $(\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2)$ auch definiert, wenn \mathfrak{D}_1 und \mathfrak{D}_2 gemeinsame Primteiler haben.

Im besonderen heißt $(\mathfrak{D}, \mathfrak{D})$ der *Grad der Klasse (\mathfrak{D})*.

Es sei \mathfrak{P} ein Primteiler erster Art, $\mathfrak{d}_{\mathfrak{P}}$ sei sein Divisor der mehrfachen Stellen.

Unter den Klassen des Körpers \mathfrak{P} ist von besonderer Bedeutung die kanonische Klasse (k). Es fragt sich, welche Klasse von $K(x, y, z)$

18) Jung D.

fur $\mathfrak{P} = 0$ in (k) ubergeht. Es gilt der Satz¹⁹⁾: *Ist (\mathfrak{R}) die kanonische Klasse von $K(x, y, z)$, so geht die Klasse $(\mathfrak{R}\mathfrak{P}\mathfrak{d}_{\mathfrak{P}}^{-1})$ fur $\mathfrak{P} = 0$ in die kanonische Klasse von \mathfrak{P} uber.* Da der Grad dieser Klasse gleich $2\pi_{\mathfrak{P}} - 2$ ist, wenn $\pi_{\mathfrak{P}}$ das Geschlecht von \mathfrak{P} ist, so folgt

$$(11) \quad 2\pi_{\mathfrak{P}} - 2 = (\mathfrak{P}, \mathfrak{P}\mathfrak{R}) - 2\sigma_{\mathfrak{P}},$$

wenn $2\sigma_{\mathfrak{P}}$ die Ordnung von $\mathfrak{d}_{\mathfrak{P}}$ ist.

Hiernach definiert man als *Geschlecht einer Klasse (\mathfrak{Q})* , wo \mathfrak{Q} ein Divisor erster Art ist, die Zahl

$$(12) \quad \bar{\pi}_{\mathfrak{Q}} = \frac{1}{2}(\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}\mathfrak{R}) + 1.$$

Wenn \mathfrak{Q} ein ganzer Divisor aus (\mathfrak{Q}) ist, so ist $\bar{\pi}_{\mathfrak{Q}}$ identisch mit dem *virtuellen Geschlecht* der \mathfrak{Q} auf der Flache G entsprechenden Kurve.

Nach *M. Noether* heit das Geschlecht $p^{(1)}$ der kanonischen Klasse das Kurvengeschlecht der Flache G und der Grad der kanonischen Klasse, eine auch von *M. Noether* eingefuhrte Zahl, wird mit $p^{(2)}$ oder auch mit $\omega - 1$ bezeichnet. Es ist $p^{(1)} = \frac{1}{2}(\mathfrak{R}, \mathfrak{R}^2) + 1 = (\mathfrak{R}, \mathfrak{R}) + 1$, so da sich sehr einfach die *Noethersche Gleichung* $p^{(2)} = p^{(1)} - 1$ ergibt.

9. Birationale Transformation.²⁰⁾ Sind ξ, η irgend zwei Funktionen des Korpers $K(x, y, z)$, die nicht konstant sind und zwischen denen keine Gleichung besteht, so konnen wir ξ, η geradesogut als unabhangige Veranderliche wahlen wie x, y . Es gibt immer eine Groe ζ aus $K(x, y, z)$, so da alle Funktionen aus $K(x, y, z)$ auch als rationale Funktionen von ξ, η, ζ dargestellt werden konnen, wo zwischen ξ, η, ζ eine irreduktible Gleichung $\Gamma(\xi, \eta, \zeta) = 0$ besteht. Es sind die Korper $K(x, y, z)$ und $K(\xi, \eta, \zeta)$ miteinander identisch. Den Ubergang von einem zum andern nennt man *birationale Transformation*.

Bei der birationalen Transformation *bleiben die Primteiler invariant*, sowohl die erster wie zweiter Stufe. Aber die *Einteilung* der Primteiler erster Stufe in zwei Arten ist *nicht invariant*, da diese abhangt von der Definition der Stellen und damit von der Wahl der unabhangigen Veranderlichen. Man nennt diejenigen Primteiler, die in bezug auf $K(x, y, z)$ und $K(\xi, \eta, \zeta)$ von verschiedener Art sind, *ausgezeichnete Primteiler* oder *Fundamentalprimteiler fur die Transformation*. Ihre Zahl ist immer endlich. Man nennt ferner diejenigen Primteiler erster Art von $K(x, y, z)$, die uberhaupt bei irgendeiner Transformation in einen Primteiler zweiter Art ubergehen konnen, *ausgezeichnete Primteiler von $K(x, y, z)$* . Ihnen entsprechen auf der Flache G die ausgezeichneten Kurven. Es seien $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\lambda$ diejenigen Primteiler

19) Jung B und Jung G; E, Nr. 12, 13. Hier zeigt sich besonders deutlich, wie viel einfacher die Definitionen mit Hilfe der arithmetischen Theorie werden.

20) Jung A und Jung F.

erster Art von $K(x, y, z)$, die in bezug auf $K(\xi, \eta, \zeta)$ von der zweiten Art sind. Sie seien als Primteiler von $K(\xi, \eta, \zeta)$ bezeichnet mit $a_1, a_2, \dots a_\mu$. Es seien $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots \mathfrak{B}_\mu$ die Primteiler erster Art von $K(\xi, \eta, \zeta)$, die in bezug auf $K(x, y, z)$ von der zweiten Art sind. Sie seien als solche bezeichnet mit $b_1, b_2, \dots b_\mu$. Ist \mathfrak{P} irgendein Primteiler erster Art von $K(x, y, z)$, so bezeichnet man mit $s(\mathfrak{P})$ das Produkt der in \mathfrak{P} enthaltenen Primteiler $b_1, b_2, \dots b_\mu$, jeden in der Potenz genommen, in der er in \mathfrak{P} enthalten ist. Die entsprechende Bedeutung habe $s(\mathfrak{Q}')$, wenn \mathfrak{Q}' ein Primteiler erster Art in bezug auf $K(\xi, \eta, \zeta)$ ist.

Ist \mathfrak{P} ein Primteiler erster Art in bezug auf $K(x, y, z)$ und nicht einer der ausgezeichneten Primteiler \mathfrak{A}_α , so bezeichnen wir \mathfrak{P} als Primteiler von $K(\xi, \eta, \zeta)$ mit \mathfrak{P}' . Es gelten dann folgende Transformationsgleichungen

$$(13) \quad \frac{\mathfrak{A}_k}{s(\mathfrak{A}_k)} = a_k, \quad \frac{\mathfrak{B}_k}{s(\mathfrak{B}_k)} = b_k, \quad \frac{\mathfrak{P}}{s(\mathfrak{P})} = \frac{\mathfrak{P}'}{s(\mathfrak{P}')}.$$

Wenn die Klasse (\mathfrak{R}) oder eine ihrer positiven Potenzen einen ganzen Divisor enthält, so ist $s(\mathfrak{A}_k) = s(\mathfrak{B}_k) = 1$.²¹⁾

Es sei $A_k(u, v; \tau)$ die Eichfunktion von a_k und $B_k(u, v; \sigma_k)$ die von b_k . Die Ordnung von A_k in (u, v) sei (α'_k, α''_k) , die bei B_k sei (β'_k, β''_k) . Setzt man

$$(14) \quad \alpha_k = \alpha'_k + \alpha''_k - 1, \quad \beta_k = \beta'_k + \beta''_k - 1, \\ a = a_1^{\alpha_1} a_2^{\alpha_2} \dots a_\mu^{\alpha_\mu}, \quad b = b_1^{\beta_1} b_2^{\beta_2} \dots b_\mu^{\beta_\mu},$$

so geht die Klasse $(\mathfrak{R}b)$ über in die Klasse $(\mathfrak{R}'a)$, wenn (\mathfrak{R}) die kanonische Klasse von $K(x, y, z)$ und (\mathfrak{R}') die von $K(\xi, \eta, \zeta)$ ist. Hieraus folgt dann leicht der Satz, daß jeder ganze Divisor der Klasse (\mathfrak{R}) durch alle ausgezeichneten Kurven des Körpers $K(x, y, z)$ teilbar sein muß.

Es sei noch bemerkt, daß sich die Zahl der Schnittpunkte von zwei Primteilern a_k, a_l oder b_k, b_l so definieren läßt, daß die Zahl der Schnittpunkte zweier aus Primteilern erster Art von $K(x, y, z)$ und aus Primteilern b_k zusammengesetzten Divisoren gleich der Zahl der Schnittpunkte derjenigen Divisoren ist, in die sie beim Übergang zu $K(\xi, \eta, \zeta)$ übergehen. Dabei ist die Zahl der Schnittpunkte eines Divisors erster Art von $K(x, y, z)$ mit einem der Primteiler b_k und ebenso die Zahl der Schnittpunkte eines Divisors erster Art von $K(\xi, \eta, \zeta)$ mit einem Primteiler a_k gleich null zu setzen. So folgt z. B. aus $(\mathfrak{R}b) = (\mathfrak{R}'a)$

$$(15) \quad (\mathfrak{R}, \mathfrak{R}) + (b, b) = (\mathfrak{R}', \mathfrak{R}') + (a, a).$$

²¹⁾ Jung F, Nr. 8.

Wenn die Klasse (\mathfrak{R}) oder eine ihrer positiven Potenzen einen ganzen Divisor enthalt, so folgt hieraus²²⁾

$$(16) \quad (\mathfrak{R}, \mathfrak{R}) + \lambda = (\mathfrak{R}', \mathfrak{R}') + \mu,$$

wo λ die Zahl der a_k und μ die der b_k ist.

10. Fundamentalsysteme fur die Vielfachen eines Divisors.²³⁾

Es seien $\mathfrak{L}, \mathfrak{M}$ die Nenner von x und y . Es sei \mathfrak{D} irgendein \mathfrak{L} und \mathfrak{M} nicht enthaltender Divisor erster Art. Man kann sich die Aufgabe stellen, alle Funktionen aus $K(x, y, z)$ zu bestimmen, die in der Form darstellbar sind

$$(17) \quad \frac{\mathfrak{D}\mathfrak{G}}{\mathfrak{L}^i\mathfrak{M}^j},$$

wo \mathfrak{G} ein ganzer Divisor ist. Wir nennen die Funktionen der Form (17) Vielfache von \mathfrak{D} . Wenn aber \mathfrak{G} nur ganz ist in bezug auf Kurvenprimteiler, so nennen wir sie unvollstandige Vielfache von \mathfrak{D} .

Es gelten die Satze:

Man kann n Funktionen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ des Korpers $K(x, y, z)$ so finden, da alle unvollstandigen Vielfachen von \mathfrak{D} und nur diese sich in der Form darstellen lassen

$$g_1\xi_1 + g_2\xi_2 + \dots + g_n\xi_n,$$

wo die g_α ganze rationale Funktionen von x, y sind. Die Funktionen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ heien ein *Fundamentalsystem fur die Vielfachen von \mathfrak{D}* .

Das zum System (ξ_{kl}) reziproke und adjungierte System ist Fundamentalsystem fur die unvollstandigen Vielfachen von $\mathfrak{S}_{xy}\mathfrak{D}^{-1}$.

Wahrend sich aus den entsprechenden Satzen bei den algebraischen Funktionen einer Veranderlichen sehr einfach der *Riemann-Rochsche Satz* ergibt, ist das hier nicht der Fall.

IV. Die Zeuthen-Segresche Invariante und das numerische Geschlecht.

11. Die Flache F .²⁴⁾ Es seien $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \mathfrak{A}_3, \mathfrak{A}_4$ vier linear unabhangige zueinander aquivalente ganze Divisoren und \mathfrak{A}_0 sei irgendein Divisor der Klasse (\mathfrak{A}_α) . Es sind dann

$$x_1 = \frac{\mathfrak{A}_1}{\mathfrak{A}_0}, \quad x_2 = \frac{\mathfrak{A}_2}{\mathfrak{A}_0}, \quad x_3 = \frac{\mathfrak{A}_3}{\mathfrak{A}_0}, \quad x_4 = \frac{\mathfrak{A}_4}{\mathfrak{A}_0}$$

Funktionen des Korpers K und ebenso die Quotienten $x_1 : x_4, x_2 : x_4, x_3 : x_4$. Zwischen diesen besteht also eine irreduzible algebraische Gleichung, so da die x_α einer homogenen Gleichung

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0$$

22) *Jung* F, Nr. 9.

23) *Hensel* A; *Jung* B.

24) *Jung* H, Kap. I, § 2–4; *Jung* J, I und II.

genügen. Deuten wir die x_α als homogene Punktkoordinaten, so wird hierdurch eine algebraische Fläche F definiert, und umgekehrt läßt sich jede algebraische Fläche in dieser Weise definieren. Wir können und wollen annehmen, daß der Körper K mit dem Körper der rationalen Funktionen von $x_1 : x_4, x_2 : x_4, x_3 : x_4$ übereinstimmt.

Es seien x'_1, x'_2, x'_3, x'_4 die Ebenenkoordinaten der Tangentialebenen von F , und es sei $x'_\alpha = \frac{\mathfrak{U}'_\alpha}{\mathfrak{U}'_0}$, wo \mathfrak{U}'_α ganze Divisoren ohne gemeinsame Teiler sein sollen. Durch passende Definition der Stellen des Körpers $K(x, y, z)$ kann man erreichen, daß weder die \mathfrak{U}_α noch die \mathfrak{U}'_α an einer Stelle gleichzeitig verschwinden. Es entspricht dann jeder Stelle von $K(x, y, z)$ eineindeutig eine Stelle von F und eine Berührungsebene. Ist ferner \mathfrak{B} ein Primteiler zweiter Art des Körpers $K(x, y, z)$, so werden für $\mathfrak{B} = 0$ sowohl die Verhältnisse der \mathfrak{U}_α wie die der \mathfrak{U}'_α konstant, so daß jedem Primteilen zweiter Art ein bestimmter Punkt und eine bestimmte Tangentialebene entspricht.

Es sei jetzt \mathfrak{B} ein Primteiler erster Art. Dann sind folgende vier Fälle möglich:

- I. Für $\mathfrak{B} = 0$ werden weder die Verhältnisse der \mathfrak{U}_α noch die der \mathfrak{U}'_α konstant.
- II. Für $\mathfrak{B} = 0$ werden die Verhältnisse der \mathfrak{U}_α konstant, aber nicht die der \mathfrak{U}'_α .
- III. Für $\mathfrak{B} = 0$ werden die Verhältnisse der \mathfrak{U}_α nicht konstant, wohl aber die der \mathfrak{U}'_α .
- IV. Für $\mathfrak{B} = 0$ werden sowohl die Verhältnisse der \mathfrak{U}_α wie die der \mathfrak{U}'_α konstant.

Wir lassen in allen vier Fällen dem Primteiler \mathfrak{B} eine Kurve auf der Fläche F entsprechen, die wir auch mit \mathfrak{B} bezeichnen. Im Falle I ist \mathfrak{B} eine wirkliche Kurve, und die Berührungsebenen von F in ihren Punkten sind im allgemeinen voneinander verschieden. Im Falle II entspricht dem Primteiler \mathfrak{B} ein Punkt H der Fläche F , die Kurve \mathfrak{B} ist *in einem Punkt kondensiert*, aber die Berührungsebenen von F in den Stellen der Kurve \mathfrak{B} sind im allgemeinen voneinander verschieden. Sie bilden einen Kegel h mit der Spitze H . Es ist H ein isolierter singulärer Punkt von F , und der Kegel h ist der Berührungskegel von F in H . Im Falle III ist \mathfrak{B} eine wirkliche Kurve, aber die Berührungsebenen von F in den Stellen von \mathfrak{B} fallen alle zusammen in eine Ebene H' . Diese Ebene berührt also F längs \mathfrak{B} . Wir sagen in diesem Falle: \mathfrak{B} ist *in eine Ebene kondensiert*. Der Fall III entspricht dem Falle II dual. Im Falle IV ist die Kurve \mathfrak{B} in einem Punkt H kondensiert und die Berührungsebenen von F in den Stellen

von \mathfrak{P} fallen alle in eine Ebene H' zusammen. Die Kurve \mathfrak{P} ist gleichzeitig kondensiert und ebene Beruhrenskurve. Der Punkt H kann in diesem Falle ein gewohnlicher Punkt der Flache F sein. Trotzdem ist es am einfachsten, auch in diesem Falle dem Primteiler \mathfrak{P} eine Kurve auf F entsprechen zu lassen.

12. Die Zeuthen-Segresche Invariante.²⁵⁾ Es sei $c_1\mathfrak{G}_1 + c_2\mathfrak{G}_2$ ein Kurvenbuschel auf einer algebraischen Flache F . Ihre Ordnung sei n , ihre Klasse n' . Es sei δ die Anzahl der Kurven des Buschels mit Doppelpunkt. Das Geschlecht einer allgemeinen Kurve des Buschels sei π , und die Zahl der festen Punkte des Buschels sei N . Dann ist

$$J = \delta - 4\pi - N$$

nach *Zeuthen* und *Segre* eine Invariante der Flache F , d. h. sie ist unabhangig von der Wahl des Kurvenbuschels. Sie heit die *Zeuthen-Segresche Invariante*. Es entsteht die Frage, wie sind δ und N zu definieren, wenn zugelassen wird, da unter den Kurven des Buschels irgendwie zerfallende vorkommen und wenn Kurven des Buschels irgendwelche Singularitaten haben. Diese Frage ist von *Jung* vollstandig beantwortet.

Es sei \mathfrak{G} irgendeine Kurve des Buschels. Es sei \mathfrak{G}' die Kurve, die alle in \mathfrak{G} enthaltenen Primkurven, aber jede nur einmal, enthalt. Es werde gesetzt

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{P}_{\mathfrak{G}}^* \mathfrak{G}'.$$

Naturlich ist nur fur eine endliche Zahl von Kurven \mathfrak{G} die Kurve $\mathfrak{P}_{\mathfrak{G}}^*$ von 1 verschieden. Es bedeute $\nu(\mathfrak{G}')$ die Zahl der Zweige von \mathfrak{G}' , die durch die mehrfachen Stellen von \mathfrak{G}' gehen, $\rho(\mathfrak{G}')$ die Zahl dieser Stellen. ν_α, ρ_α seien dieselben Zahlen fur eine allgemeine Kurve \mathfrak{G}_α des Buschels. Es sei ferner $\pi(\mathfrak{G}')$ das Geschlecht von \mathfrak{G}' und $2\sigma(\mathfrak{G}')$ die Ordnung des Divisors der mehrfachen Stellen von \mathfrak{G}' . Es seien $\pi_\alpha, 2\sigma_\alpha$ dieselben Zahlen fur eine allgemeine Kurve \mathfrak{G}_α . Das Geschlecht $\pi(\mathfrak{G}')$ soll, wenn etwa $\mathfrak{G}' = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \dots \mathfrak{P}_r$, wo die \mathfrak{P}_α Primkurven vom Geschlechte π_α sind, definiert sein durch

$$\pi(\mathfrak{G}') - 1 = \sum_{\alpha=1}^r (\pi_\alpha - 1):$$

Es sei weiter $z_S(\mathfrak{G}')$ die Zahl der Schnittpunkte von $\frac{\partial \mathfrak{G}'}{\partial u} = 0$, $\frac{\partial \mathfrak{G}'}{\partial v} = 0$ in einer mehrfachen Stelle S von \mathfrak{G}' und

$$z(\mathfrak{G}') = \sum_S z_S(\mathfrak{G}'),$$

wo die Summe uber alle mehrfachen Stellen von \mathfrak{G}' zu erstrecken ist, und es bedeute δ_α dieselbe Zahl fur eine allgemeine Kurve \mathfrak{G}_α des Buschels.

25) E, Nr. 14. *Jung*, E, H und K, Kap. VI.

Wir setzen dann

$$(18) \left\{ \begin{aligned} \delta(\mathfrak{G}) &= 2\pi_a - 2 + \nu_a - \varrho_a - \{2\pi(\mathfrak{G}') - 2 + \nu(\mathfrak{G}') - \varrho(\mathfrak{G}')\} \\ &= \nu_a - \varrho_a - 2\sigma_a - \{\nu(\mathfrak{G}') - \varrho(\mathfrak{G}') - 2\sigma(\mathfrak{G}')\} \\ &\quad + 2(\mathfrak{B}_{\mathfrak{G}}^*, \mathfrak{G}_a) - (\mathfrak{B}_{\mathfrak{G}}^*, \mathfrak{B}_{\mathfrak{G}}^*) + (\mathfrak{B}_{\mathfrak{G}}^*, \mathfrak{R}) \\ &= z_a - z(\mathfrak{G}') + 2(\mathfrak{B}_{\mathfrak{G}}^*, \mathfrak{G}_a) - (\mathfrak{B}_{\mathfrak{G}}^*, \mathfrak{B}_{\mathfrak{G}}^*) + (\mathfrak{B}_{\mathfrak{G}}^*, \mathfrak{R}). \end{aligned} \right.$$

Hier ist \mathfrak{G}_a eine allgemeine Kurve des Büschels und \mathfrak{R} eine Kurve der kanonischen Klasse. Es ist dann in der Definitionsformel für die *Zeuthen-Segresche* Invariante zu setzen

$$(19) \quad \delta = \sum_{\mathfrak{G}} \delta(\mathfrak{G}),$$

wo die Summe über alle Kurven \mathfrak{G} des Büschels zu erstrecken ist.

Ferner hat man zu setzen

$$(20) \quad N = 2(\nu_a - \varrho_a) + f,$$

wo f die Zahl der festen Stellen des Büschels ist.

Für das Verhalten von J bei birationaler Transformation gilt:

$$\text{Es ist} \quad J + (\mathfrak{R}, \mathfrak{R})$$

invariant bei birationaler Transformation, wo (\mathfrak{R}) die kanonische Klasse ist.

13. Das numerische oder arithmetische Geschlecht p_a von F .²⁶⁾

$$\text{Es ist} \quad (\mathfrak{R}, \mathfrak{R}) + J = 12p_a + 8,^{27)}$$

wo p_a das arithmetische Geschlecht von F ist. Da J jetzt für beliebige Flächen und Kurvenbüschel definiert ist, so ergibt sich die Möglichkeit, p_a für Flächen mit beliebigen Singularitäten zu berechnen. Man findet folgendes:

a) Es seien H_1, H_2, \dots, H_s die isolierten singulären Punkte der Fläche F . Es sei $\mathfrak{A}^{(\omega)}$ ein durch H_a gehender ebener Schnitt von F ohne besondere Lage. Es bedeute \mathfrak{C}_a die Kurve, die alle Primkurven von $\mathfrak{A}^{(\omega)}$ enthält, aber jede nur in der ersten Potenz und es werde $\mathfrak{A}^{(\omega)} = \mathfrak{B}^{(\omega)}\mathfrak{C}_a$ gesetzt. Ist \mathfrak{Q} irgendeine ganze Kurve, die keine Primkurve in höherer als der ersten Potenz enthält, so verstehen wir unter $2\sigma(\mathfrak{Q})$ die Ordnung ihres Divisors der mehrfachen Stellen, unter $\nu(\mathfrak{Q})$ die Zahl der Zweige von \mathfrak{Q} , die durch die mehrfachen Stellen gehen, und unter $\varrho(\mathfrak{Q})$ die Anzahl der mehrfachen Stellen, und wir setzen

$$(21) \quad \mu(\mathfrak{Q}) = 2\sigma(\mathfrak{Q}) - \nu(\mathfrak{Q}) + \varrho(\mathfrak{Q}).$$

26) *Jung* G, ferner Arbeiten von *Jung* in den Mitteilungen der Math. Ges. in Hamburg 5, Heft 1 (1911), p. 20; 5, Heft 2 (1913), p. 82; 5, Heft 5 (1916), p. 194.
27) E, Nr. 14.

Wir setzen weiter

$$(22) \quad h_\alpha = (\mathfrak{B}^{(\alpha)}, \mathfrak{R}) - (\mathfrak{B}^{(\alpha)}, \mathfrak{B}^{(\alpha)}) + \mu(\mathfrak{C}_\alpha)$$

und

$$(23) \quad h = \sum_{\alpha=1}^s h_\alpha.$$

Ferner sei \mathfrak{R}_0 die von in Punkte kondensierten Kurven befreite Rückkehrkurve \mathfrak{R} , und es sei in Primkurven zerlegt

$$\mathfrak{R}_0 = \mathfrak{R}_1^{\rho_1} \mathfrak{R}_2^{\rho_2} \dots \mathfrak{R}_k^{\rho_k}.$$

Es bedeute r_α den Rang von \mathfrak{R}_α , d. h. die Zahl der durch eine beliebige Gerade gehenden Tangenten von \mathfrak{R}_α . Wir setzen

$$(24) \quad r = \sum_{\alpha=1}^k \rho_\alpha r_\alpha.$$

Es ist dann

$$(25) \quad 12(p_\alpha + 1) = (\mathfrak{R}, \mathfrak{R}) - 4(p - 1) - n + n' + h + r,$$

wo p das Geschlecht eines allgemeinen ebenen Schnittes ist. Sind h' , r' die den Zahlen h , r dual entsprechenden, und ist p' das Geschlecht eines allgemeinen Berührungskegels, so ist auch

$$(26) \quad 12(p'_\alpha + 1) = (\mathfrak{R}, \mathfrak{R}) - 4(p' - 1) - n' + n + h' + r'.$$

Man kann der Formel für p_α verschiedene Formen geben. Z. B.

$$(27) \quad \begin{cases} 6p_\alpha = (n - 1)(n - 2)(n - 3) - 4b(n - 3) - c(n - 1) \\ \quad + (\mathfrak{D}, \mathfrak{D}) + (\mathfrak{D}, \mathfrak{R}) + \frac{1}{2}(\mathfrak{R}, \mathfrak{R}) + \frac{1}{2}(h + r). \end{cases}$$

Für den Fall, daß F an Singularitäten nur eine Doppelkurve hat, wird $h = 0$, $\mathfrak{R} = 1$, $r = 0$, und es läßt sich $(\mathfrak{D}, \mathfrak{D})$ berechnen. Man erhält dann die bekannte Formel für p_α . Im allgemeinen Fall ist die Bestimmung von $(\mathfrak{D}, \mathfrak{D})$, $(\mathfrak{R}, \mathfrak{R})$, $(\mathfrak{R}, \mathfrak{D})$ als Funktionen von n noch nicht gelungen.

b) Verwendet man nichthomogene Koordinaten, so erhält man für p_α folgende Formel. Es sei $G(x, y, z) = 0$ die Gleichung der Fläche G . Sie sei in x, y, z vom Grade (l, m, n) . Es habe G an Singularitäten nur eine Doppelkurve vom Geschlechte π mit τ dreifachen Punkten, ferner irgendwelche isolierte Doppelpunkte und t dreifache isolierte Punkte. Ebenen senkrecht zur x, y, z -Achse mögen die Doppelkurve in d', d'', d''' Punkten schneiden. Dann ist²⁸⁾

$$(28) \quad \begin{cases} p_\alpha = (l-1)(m-1)(n-1) - (l-2)d' - (m-2)d'' - (n-2)d''' \\ \quad + \pi + 2\tau - t - 1. \end{cases}$$

²⁸⁾ Jung, Mitteil. d. Math. Ges. in Hamburg 5, Heft 1, p. 21. Dort steht durch einen Fehler in der Berechnung 3τ statt 2τ .

Verbesserungen zu II C 3, L. Lichtenstein.

- p. 229 Z. 3 v. u. $D_n(1, \alpha_1, \dots, \alpha_n) > 0$ statt $D_n(1, \alpha_1, \dots, \alpha_n) \geq 0$.
- p. 230 Z. 1 v. u., p. 231 Z. 1 v. o. des Haupttextes: positiver statt nicht negativer.
- Zu Nr. 21 und 22: *P. Lévy* hat seine Ergebnisse über das asymptotische Verhalten der *Greenschen* Funktionen am Rande des Definitionsgebietes ausführlich in *Acta Math.* 42 (1919), p. 207—267 veröffentlicht. Nach *P. Lévy* bedarf die Formel von *Cisotti* (p. 252) einer Verbesserung.
- Zu der Arbeit von *Bieberbach*, p. 363, 592b) vgl. Bemerkungen von *Bieberbach* in dem Autoreferat *F. d. M.* 46 (1916—1918), p. 548, sowie eine demnächst in den *Math. Ann.* 90 erscheinende Arbeit von *Rados*.
- p. 372 Formel (1): $1 - |Z|$ statt $|1 - Z(z)|$.
- p. 375, 636): Durchmesser statt Länge. Vgl. *R. Courant*, *Gött. Nachr.* 1922, p. 69—70.

Berichtigungen zu II C 4, L. Bieberbach.

- p. 385 Z. 4 v. o. lies: müssen^{6, 1)} statt müssen. Zuzufügen 6, 1). Einige derselben kommen mit geringeren Voraussetzungen aus und sind in ihrem bewußten Abweichen von dem *Riemannschen* Beweisgang als Vorläufer des modernen Beweises anzusehen: *C. J. Malmsten*, *Svenska Akads. Förhandl.* Bd. 6 Nr. 3 (1865), *G. Mittag-Leffler*, a) *Svenska Vet. Akads. Översikt* 1873, b) Beweis für den *Cauchyschen* Satz *Gött. Nachr.* 1875, p. 65—73, *Briot et Bouquet*, *Théorie des fonctions elliptiques* 2. ed., Paris 1875, p. 128—132.
- p. 410 Note 62) zuzufügen: *P. Montel*, a. a. O. 77, 1); *G. Julia*, a. a. O. 81, 1); *G. Valiron*, a. a. O. 151 c) und Le théorème de M. Picard et les généralisations de M. Borel, *Paris C. R.* 168 (1920), p. 167—169.
- p. 412 Note 68 lies α statt α_0 .
- p. 413 Mitte lies 1 statt $(-1)^m$; Z. 3 v. u. lies $r \leq (A_p)^{\frac{1}{k+1}}$; Z. 2 v. u. hinter sein einfügen: Das ist die wahre Schranke. Note 69a) zuzufügen: *P. Montel*, a. a. O. 77, 1).
- p. 415 Z. 5 v. o. lies $\log K(\alpha_0, \varrho)$ statt $K(\alpha_0, \varrho)$. Am Schluß von 18. zuzufügen: *P. Montel*^{77, 1)} hat gezeigt, daß sich die *Borelsche* Methode⁶³⁾ zu einem Beweis des *Schottkyschen* Satzes verwenden läßt. Zuzufügen 77, 1) *P. Montel*, *Sur les familles normales des fonctions analytiques*, *Ann. Éc. norm.* (3) 33 (1916), p. 223—302. Vgl. hierzu ferner die in 62) und 65) genannten Arbeiten sowie: *De la Vallée Poussin*, *Démonstration simplifiée du théorème fondamental de M. Montel sur les familles normales de fonctions*, *Ann. of math.* (2) 17 (1915), p. 5.

- p. 416 Z. 3 v. u. zuzufügen: Er hat ihn später^{80q)} auf die Umgebung einer wesentlich singulären Stelle ausgedehnt. Die Zahl der Ausnahmewerte ist da $\text{Min}(3\nu, 2\nu^2)$. Note 80: Zuzufügen q): Paris C. R. 170 (1920), p. 1557—1560; 171 (1920), p. 157—159; *Th. Varopoulos*, Paris C. R. 171 (1920), p. 991—992.
- p. 417. Ende von 19. zuzufügen: *G. Julia*^{81, 1)} hat gezeigt, daß es bei jeder ganzen Funktion beliebig schmale an passende Kurven angelehnte Winkelräume gibt, in welchen die Funktion jeden Wert mit höchstens einer Ausnahme unendlich oft annimmt. Das Hilfsmittel der Untersuchung ist die Theorie der normalen Familien. Mit ihrer Hilfe hat *Julia* entsprechende tiefgreifende Untersuchungen auch über den Wertevorrat angestellt, den eine ganze Funktion in gewissen gegen unendlich sich häufenden diskreten Gebieten annimmt. Sie gehen aus einem derselben durch Multiplikation mit gewissen Zahlen σ_i hervor, für die $|\sigma_i| \rightarrow \infty$ gilt. Zuzufügen: 81, 1) *G. Julia*, Paris C. R. 168—170 und ausführlicher: Sur quelques propriétés nouvelles des fonctions entières ou méromorphes. I, II, III, Ann. ec. norm. III 36 (1919), p. 93—125; 37 (1920), p. 165—218; 38 (1921), p. 165—181.
- p. 422 Note 90 zuzufügen: Nahe damit verwandte Untersuchungen finden sich gleichzeitig bei *G. Valiron*, Remarques sur le théorème de M. Picard, Bull. sc. math. (2) 44 (1921), p. 91—104.
- p. 424 Note 95 zuzufügen: Zu dieser letzteren Arbeit vgl. man die Bemerkungen von *Fatou*, Paris C. R. 168 (1919), p. 501—502.
- p. 425 Z. 1 v. o. Das Wort wahrscheinlich ist zu streichen. Am Ende von 25. ist zuzufügen: *F.* und *M. Riesz*⁸⁸⁾ zeigen die Existenz der Randwerte bis auf eine Nullmenge für Funktionen $f(z)$, deren $\int_0^{2\pi} |f(re^{i\varphi})| d\varphi$ im Einheitskreis beschränkt ist. Note 96 zuzufügen: Hier ist der Satz endlich bewiesen.
- p. 428 Note 107 zuzufügen: *P. Montel*, a. a. O. 77, 1).
- p. 442. 35. Z. 2 hinter Arbeiten einfügen: insbesondere die von *Borel*.¹¹²⁾ Z. 5 lies: entwickelt.^{147, 2)} Zuzufügen 147, 2) *G. Rémoumes*, Paris C. R. 170 (1920), p. 829—832. *Th. Varopoulos*, Paris C. R. 171 (1920), p. 613—614.
- p. 443 Z. 4 lies *Hadamard* (Paris C. R. 104, p. 1053; *Borel*, fonct. entières, p. 3/4); lies: $A(r)$ der positiven Werte. Z. 5 lies: $|a_m| r^m \leq 4 \text{Max}(0, A(r)) - 2\Re(a_0)$. Z. 8 lies: $A(r) \leq M(r)$. Z. 9 lies: $A(r) \leq M(r)$. 151, 1) zuzufügen c) Les théorèmes généraux de M. Borel dans la théorie des fonctions entières, Ann. Éc. norm. III 37 (1920), p. 219—253.
- p. 445 Ende von 36. zuzufügen: Aus seiner Theorie der normalen Funktionenfamilien hat *P. Montel*^{77, 1)} die Theorie der ganzen Funktion endlicher Ordnung entwickelt.
- p. 464 Note 194 zuzufügen: *J. Soula*, Paris C. R. 171 (1920), p. 541—543.
- p. 465 Z. 10 v. o. lies: singulär, wenn die α, β isoliert sind.
- p. 466 am Ende des kursiv gedruckten zuzufügen: *J. Soula*¹⁹⁸⁾ hat gezeigt, daß man in c) statt einer ganzen Funktion irgendeine bei $x=0$ und bei den $x = a^{(n)}$ reguläre Funktion nehmen kann. Note 198 anzufügen: *J. Soula*, Paris C. R. 171 (1920), p. 614—616.
- p. 468 Note 202. Die hier erwähnte Behauptung ist, wie Herr *Pólya* bemerkt hat, unrichtig.
- p. 479 Z. 10—12 v. o. der Satz „Chapman . . . seien“ ist zu streichen.

- p. 492 Z. 2 v. u. lies: gezeigt. ^{271, 1)} Zuzufügen 271, 1) Notwendige und hinreichende Bedingungen für den analytischen Charakter der Reihensumme hat auch *J. Wolff* angegeben. Paris C. R. 169 (1919), p. 566—569.
- p. 495 Z. 4 v. o. lies: einer, im Anschluß an *Hilberts* ^{275, 1)} Arbeiten über das *Dirichletsche* Prinzip (1900) namentlich . . . Zuzufügen 275, 1) Hier tritt der Gedanke der Auswahlkonvergenz zum ersten Male auf.
- p. 501 am Ende des ersten Absatzes anzufügen: *C. Carathéodory* ²⁹²⁾ gibt ein dem *Schwarzschen* analoges Lemma an für den Fall, daß $f(z)$ statt einem inneren Punkt zwei Randpunkte, z. B. $+1$ und -1 , festläßt. $f(z)$ nimmt dann in jedem zur reellen Achse symmetrischen Kreisbogenzweieck mit den Ecken 1 und -1 nur Werte aus dieser Sichel an. *G. Julia* ^{292, 1)} endlich betrachtet den Fall, wo $f(z)$ nur einen Randpunkt, z. B. $+1$, festläßt. Dann gilt folgendes Lemma: $w = f(z)$ sei in $|z| < 1$ regulär. Es sei daselbst $|f(z)| < 1$, $f(z) = 1$ und es existiere $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ für $|1+h| < 1$, dann ist $\frac{1 - w\bar{w}}{|1 - \bar{w}|^2} \geq \frac{1}{|f'(1)|} \frac{1 - z\bar{z}}{|1 - \bar{z}|^2}$. Zuzufügen 292, 1) *G. Julia*, a) Mémoire sur l'itération des fonctions rationnelles, J. de math. (8) 1 (1918), p. 47—245. b) Extension nouvelle d'un lemme de Schwarz, Acta math. 42 (1920), p. 349—355.
- p. 503 Z. 4 v. u. lies: gegeben, und nicht alle Null.
- p. 504 Z. 1 v. o. lies: $m \leq n$ statt n .
- p. 505 Mitte lies: ist durch *Bohr* ³⁰³⁾ im negativen Sinn erledigt. ³⁰¹⁾
- p. 506 Mitte lies: 1899 statt 1895. Streiche: Nach *Hurwitz*. Lies: Sie findet sich . . . *Jacobi*. ³⁰⁹⁾ Streiche Note 308.
- p. 509 in der letzten Formel sind unter dem arcsin Zähler und Nenner zu vertauschen.
- p. 526 Ende von 70. anzufügen: *G. Julia* hat gezeigt, daß die hier für den Regularitätsbereich einer analytischen Funktion angegebenen Eigenschaften auch denjenigen Bereichen zukommen, in welchen Familien von analytischen Funktionen mehrerer Variablen normal sein können. Hier erweisen sich jene Eigenschaften sogar als hinreichend zur Charakterisierung solcher Bereiche. ^{309, 1)} Zuzufügen 369, 1) *G. Julia*, Sur les familles de fonctions de plusieurs variables, Paris C. R. 170 (1920), p. 791—793, 875—877, 1040—1042, 1234—1236, 1363—1365.
- p. 527 Z. 12 lies: zweidimensionale Ebene.
- p. 530 Z. 10 v. u. einzuschalten: „Ihre Resultante sei von Null verschieden.“
- p. 531 Z. 11 v. o. hinter Entwicklung einzufügen: „Deren Resultante sei von Null verschieden.“ Z. 1 v. u. hinter Bereiche einschalten: „durch am Rande noch reguläre Funktionen“.
- p. 532 Note 383 hinter der Arbeit von *T. Levi-Civita* einschalten: *C. Segre*, Le rappresentazioni reali delle forme complesse e gli enti iperalgebraici, Math. Ann. 40 (1892), p. 413—467. *E. Study*, Sugli enti analitici, Pal. Rend. 21 (1906), p. 345—359. Die drei letztgenannten Arbeiten enthalten Sätze über analytische Mannigfaltigkeiten, die bei *Study* zu voller Allgemeinheit ausgereift erscheinen. Dieser Arbeit, welche in Verallgemeinerungen der *Schwarzschen* Spiegelungssätze gipfelt, wohnt eine besondere grundlegende Bedeutung inne.