

Die
Pflanzenzucht im Walde.

Ein Handbuch
für
Forstwirthe, Waldbesitzer und Studierende
von

Hermann Fürst,
F. bayr. Forstmeister und Direktor der Forstlehranstalt Aschaffenburg.

Mit 40 in den Text eingedruckten Holzschnitten.

Springer-Verlag
Berlin Heidelberg GmbH
1882.

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Im Juli 1882 erscheint:

Die Lehren der Forstwissenschaft.
Ein Leitfaden
für den Unterricht der Forstleuten und zum Selbstunterricht für Forstgehilfen,
Forster, Waldbesitzer und Gutsverwalter.

Von Th. Ebermayer,
Kgl. Bayr. Forstmeister.

Dritte, umgearbeitete und verbesserte Auflage.
Mit 28 in den Text gedruckten Holzschnitten.

Preis ca. 2 M 80 ö.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Die
Pflanzenzucht im Walde.



Die
Pflanzenzucht im Walde.

Ein Handbuch
für
Forstwirthe, Waldbesitzer und Studierende
von

Hermann Fürst,
f. bayr. Forstmeister und Direktor der Forstlehranstalt Aschaffenburg.

Mit 40 in den Text eingedruckten Holzschnitten.



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH

1882.

ISBN 978-3-662-36048-4 ISBN 978-3-662-36878-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-36878-7

Weimar. - Hof-Druckerei.

Vorwort.

Zu den wichtigsten Aufgaben eines Revierverwalters gehört wohl allenfalls die Erziehung des zahlreichen und mannigfaltigen Pflanzmaterials, dessen unser Forstbetrieb in seiner gegenwärtigen Gestaltung bedarf. Sie gehört aber auch zu dessen dankbarsten Aufgaben, da der Erfolg einer richtigen Lösung alsbald in die Augen springt; ein tüchtiger Pflanzenzüchter genannt zu werden, ist mit Recht ein Stolz des Forstmannes, und der Zustand der Saatkämpe und Forstgärten eines Forstbezirkes liefert einen nicht unwichtigen Beitrag zur Bezeichnung der Tüchtigkeit und Thätigkeit des einschlägigen Verwaltungs- und Schutzbeamten.

So wird denn heut zu Tage viel Geld, viel Zeit und Arbeitskraft auf Saat- und Pflanzenhäusern verwendet, zahlreiche tüchtige Praktiker suchen gemeinsam mit den Männern der Wissenschaft nach den Mitteln und Wegen, die Pflanzenerziehung möglichst einfach, billig und zweckmäßig zu gestalten, und wir werden wenige Hefte unserer (leider allzu zahlreichen!) forstlichen Zeitschriften zur Hand nehmen, ohne irgend welche auf die Pflanzenerziehung bezügliche Mittheilung zu finden. Aber diese oft werthvollen Mittheilungen und Fingerzeige kommen, eben in Folge der Zersplitterung unserer Tagesliteratur, häufig nur einem kleinen Theil unserer Praktiker in die Hand, oder sie werden zwar von denselben gelesen, verschwinden aber mit der meist nur cirkulirenden Zeitschrift dem Leser aus der Grinnerung, so daß ihre Wirkung und Anwendung nur beschränkt sind.

Der Verfasser hat sich nun die Aufgabe gestellt, jenes reiche Material unserer Journal-Literatur in Verbindung mit jenem, welches in unseren Lehrbüchern des Waldbauens, wie in Spezialwerken über einzelne Holzarten niedergelegt ist, zu sammeln und an der Hand einer

zwanzigjährigen Praxis und Thätigkeit im Forstdienst, sowie der im akademischen Forstgarten dahier gemachten Erfahrungen, Versuche und Beobachtungen zu sichten und systematisch geordnet zu einem Werke zusammenzustellen, welches als Handbuch der Pflanzenerziehung sowohl dem Anfänger und Privatwaldbesitzer zur Belehrung und Anleitung, wie dem Mann der Praxis zum Nachschlagen bei so manchen sich aufdrängenden Fragen dienen soll. Durch möglichst reichlichen Literatur-Nachweis soll dabei auch die Gelegenheit geboten werden, sich durch Benutzung der Quellen über so manchen Gegenstand noch eingehender zu informiren, als sich dies durch das vorliegende Buch ohne übergrößen Umfang desselben ermöglichen lässt.

Letztern so weit thunlich zu beschränken und hiedurch das Werkchen auch dem minder bemittelten Fachgenossen zugänglich zu machen, war das weitere Bestreben des Verfassers.

Das Buch selbst aber sei hiemit der freundlichen Aufnahme aller Fachgenossen empfohlen! Möge es im Stande sein, eine unzweifelhaft bestehende Lücke in unserer Fachliteratur entsprechend auszufüllen, möge es dem Anfänger Belehrung, dem Manne der Praxis Rath in zweifelhaften Fällen bieten, Anregung zur Prüfung, zu vergleichenden Versuchen geben und dadurch unserem Wald, unserer Wissenschaft von Nutzen sein.

Für Mittheilung von Erfahrungen jeder Art, für Berichtigungen und Belehrungen — sei es durch unsere Tagesliteratur, sei es direkt an seine Adresse — wird der Verfasser allen Fachgenossen in hohem Grade dankbar sein und dieselben, wenn es dem Büchlein gelingen sollte, sich eine bleibendere Stätte zu erringen, entsprechend zu verwerthen suchen.

Aschaffenburg, im Mai 1882.

Der Verfasser.

In h a l t.

	Seite
Einleitung	1
Erster Theil.	
Allgemeine Grundsätze und Regeln der Pflanzenerziehung.	
I. Abschnitt.	
Die Pflanzenzucht überhaupt.	
§ 1. Bedeutung der Pflanzenzucht im Forsthaushalt	2
§ 2. Verschiedene Arten der zur Verwendung kommenden Pflanzen	3
§ 3. Gewinnung des nötigen Pflanzmaterials	5
§ 4. Verwendung der Ballen- und ballenlosen Pflanzen im Kulturbetrieb	6
§ 5. Saatkampf, Pflanzkampf, Forstgarten	7
§ 6. Wandernde Saat- und Pflanzkämpe oder ständige Forstgärten	8
II. Abschnitt.	
Die Vorbereitungen zur Pflanzenzucht.	
1. Kapitel. Auswahl des Platzes.	
§ 7. Allgemeine Grörterungen	11
§ 8. Lage	12
§ 9. Boden	13
§ 10. Boden-Neigung	16
§ 11. Bisherige Benutzung	17
§ 12. Umgebung	17
§ 13. Gestalt	19
§ 14. Größe	20
2. Kapitel. Bearbeitung des Bodens.	
§ 15. Allgemeine Grörterungen	21
§ 16. Entfernung des Bodenüberzuges	22
§ 17. Tiefe der Bodenbearbeitung	22
§ 18. Zeit der Bodenbearbeitung	24
§ 19. Art und Weise der Bodenbearbeitung	25
§ 20. Planiren und Terrassiren	27

3. Kapitel. Verbesserung des Bodens, Düngung.	Seite
§ 21. Allgemeine Erörterungen	28
§ 22. Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Bodens — Melioration	29
§ 23. Verbesserung der chemischen Eigenschaften des Bodens — eigentliche Düngung	30
§ 24. Hülfsmittel zur Düngung	32
a) Thierischer Dünger	33
b) Pflanzendünger	34
c) Mineralischer Dünger	39
d) Mengedünger	41
§ 25. Wahl des Dünghemmels	43
§ 26. Zeitpunkt, in welchem die Düngung einzutreten hat	45
§ 27. Nötige Düngermenge	46
§ 28. Ausführung der Düngung	48
§ 29. Kosten der Düngung	50
4. Kapitel. Einfriedigung der Forstgärten und Kämpe.	
§ 30. Nothwendigkeit und Entbehrlichkeit	52
§ 31. Verschiedene Arten der Einfriedigung	53
§ 32. Gräben und Mauern	54
§ 33. Hölzerne Einfriedigungen	55
§ 34. Drahtzäune	59
§ 35. Lebende Einfriedigungen (Hecken)	62
§ 36. Transportable Einfriedigungen	63
§ 37. Verschluß der Forstgärten	65
§ 38. Dauer der verschiedenen Einfriedigungen	66
§ 39. Kosten der Einfriedigung	67
5. Kapitel. Eintheilung und innere Einrichtung des Forstgartens.	
§ 40. Eintheilung durch Wege	70
§ 41. Beete und Länden (Gewannen)	72
§ 42. Sonstige Einrichtungen: Hütten, Brunnen u. dgl.	74

III. Abschnitt.

Die Pflanzenzucht im Saatbeet.

1. Kapitel. Die Ansaat der Saatbeete.

§ 43. Allgemeine Erörterungen	76
§ 44. Bedeutung und Auswahl des Saatgutes	77
§ 45. Untersuchung der Keimkraft	79
§ 46. Erhaltung der Keimkraft, Beförderung und Verzögerung des Keimens .	81
§ 47. Zeit der Aussaat	83
§ 48. Vorbereitung zur Aussaat; Vollsaat und Rillensaat	85
§ 49. Entfernung der Rillen von einander	86
§ 50. Breite der Rillen	87
§ 51. Tiefe der Rillen	88
§ 52. Richtung der Rillen	90
§ 53. Herstellung der Rillen	90
§ 54. Bestimmung der nötigen Samemenge	95
§ 55. Die Ansaat selbst; Säevorrichtungen	96
§ 56. Bedeckung des Samens	102

2. Kapitel. Schutz und Pflege der Saatbeete.	Seite
§ 57. Allgemeine Grörterungen	104
§ 58. Schutz des Samens gegen Trockenheit	104
§ 59. Schutz der Pflanzen gegen Trockenheit	109
§ 60. Schutz der Saatbeete gegen Frost im Allgemeinen	113
§ 61. Schutz gegen Spät-, Früh- und Winterfrost	114
§ 62. Schutz der Pflanzen gegen das Aussrieren (Barfrost)	116
§ 63. Schutz der Saatbeete gegen Regengüsse	118
§ 64. Schutz der Saatbeete gegen Engerlinge	119
§ 65. Schutz der Saatbeete gegen sonstige Feinde aus der Klasse der Insekten	122
§ 66. Schutz der Saatbeete gegen Mäuse	123
§ 67. Schutz der Saatbeete gegen Vögel	126
§ 68. Schutz der Saatbeete gegen Haarwild jeder Art	129
§ 69. Schutz und Pflege der Saatbeete gegenüber dem Unkraut	130
§ 70. Pflege der Saatbeete durch Bodenbearbeitung: Lockern und Anhäufeln	134
§ 71. Pflege zu dichter Saaten durch Ausschneiden oder Durchrupfen	138
§ 72. Pflege der Saatbeete durch Zwischendüngung	140

IV. Abschnitt.**Die Pflanzenerziehung im Pflanzbeet.****1. Kapitel. Die Verschulung der Pflanzen.**

§ 73. Allgemeine Grörterungen	141
§ 74. Saatschule und Pflanzschule — Zusammenhang beider	143
§ 75. Alter und Stärke der zu verschulenden Pflanzen	145
§ 76. Dauer des Verbleibens der Pflanzen in der Pflanzschule	147
§ 77. Zweckmäßige Zeit zur Vornahme der Verschulung	148
§ 78. Zurichtung des Bodens und der Beete für die Verschulung	149
§ 79. Ausheben der zu verschulenden Pflanzen	151
§ 80. Behandlung der Pflanzen nach dem Ausheben: Beschneiden, Anschlämmen	153
§ 81. Entfernung der Pflanzen und Pflanzreihen beim Einschulen	155
§ 82. Die Ausführung der Verschulung selbst	157
§ 83. Wiederholte Verschulung — Heisterzucht	163

2. Kapitel. Schutz und Pflege der Pflanzbeete.

§ 84. Allgemeine Gesichtspunkte	166
§ 85. Schutz der Pflanzbeete gegen Trockenheit	167
§ 86. Schutz der Pflanzbeete gegen Frostbeschädigungen jeder Art	169
§ 87. Schutz der Pflanzbeete gegen Regengüsse	170
§ 88. Schutz der Pflanzbeete gegen Thiere jeder Art	170
§ 89. Pflege der Pflanzbeete durch Entfernung des Unkrauts, durch Lockern und Düngung	171
§ 90. Pflege der Pflanzen durch Beschneiden der Reste	173

V. Abschnitt.**Die Kosten der Pflanzenerziehung.**

§ 91. Die Faktoren derselben	178
§ 92. Beeinflussung der Kosten durch den Wirthshafter	180
§ 93. Feststellung der Pflanzenerziehungskosten; Vergleichbarkeit derselben . . .	182
§ 94. Kosten der Bodenbearbeitung	184

**

§ 95. Kosten der Ansaat und Verschülung	185
§ 96. Kosten der Reinigung und Lockerung	187
§ 97. Gesamtkosten der Pflanzenerziehung	188

Zweiter Theil.

Spezielle Regeln für Erziehung der einzelnen Holzarten im Saat- und Pflanzbeet.

§ 98. Allgemeine Erörterungen	193
---	-----

I. Abschnitt.

Die Laubhölzer.

§ 99. Die Eiche	194
§ 100. Die Rothbuche	213
§ 101. Die Esche	221
§ 102. Der Ahorn	225
§ 103. Die Ulme	229
§ 104. Die Erle	231
§ 105. Die Edelkastanie	235
§ 106. Die Akazie	238
§ 107. Die Hainbuche	240
§ 108. Die Birke	242
§ 109. Die Linde	243

II. Abschnitt.

Die Nadelhölzer.

§ 110. Die Weißtanne	245
§ 111. Die Fichte	251
§ 112. Die Föhre	262
§ 113. Die Lärche	272
§ 114. Die Schwarzkiefer	278
§ 115. Die Weymouthskiefer	280



Übersicht der vorzugsweise benutzten Literatur (nebst Angabe der gebrauchten Abkürzungen).

A. Zeitschriften.

- Allgemeine Forst- und Jagdzeitung**, herausgegeben von Prof. Dr. Lorey und Prof. Dr. Lehr (früher von Dr. G. Heyer). (Allgem. F.- u. J.-Z.)
- Monatschrift für das Forst- und Jagdwesen**, jetzt (seit 1879) **Forstwissenschaftliches Centralblatt**, herausgegeben von Prof. Dr. Baur. (Monatschr. f. d. F.- u. J.-W.)¹⁾
- Tharander forstliches Jahrbuch**, herausgegeben von Geh. Oberforstrath Dr. Judeich (Thar. forstl. Jahrb.)
- Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen**, herausgegeben von Oberforstmeister Dr. Danelmann. (Zeitschr. f. F.- u. J.-W.)
- Forstliche Blätter**. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, herausgegeben von Oberforstmeister Grunert und Oberforstmeister Dr. Borggreve. (Forstl. Bl.)
- Centralblatt für das gesamte Forstwesen**, herausgegeben von Prof. G. Hempel. (Centralbl. f. d. F.-W.)
- Kritische Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft**, herausgegeben von Oberforstmeister Dr. Pfeil, fortgesetzt von Prof. Dr. Nördlinger. (Krit. Bl.)
- Aus dem Walde**. Mittheilungen in zwanglosen Heften von Forstdirektor Dr. Burkhardt. (A. d. Walde.)
- Forstliche Mittheilungen**, herausgegeben vom K. Bayerischen Ministerialforstbureau. (Forstl. Mitth.)
- Mittheilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Österreichs** von Prof. Dr. v. Seckendorff. (Seckendorff, Mitth.)

¹⁾ Aus Zweckmäßigkeitssgründen, zur Vermeidung von Verwechslungen, haben wir auch für die 3 letzten Jahrgänge die angegebene Bezeichnung angewendet.

B. Selbstdndige Werke.

- Burkhardt**, Säen und Pflanzen nach forstlicher Praxis. 5. Aufl. 1880.
- Heyer**, Waldbau. 3. Aufl. 1878.
- Gäyer**, Waldbau. 1. Aufl. 1880.
- Stumpf**, Waldbau. 4. Aufl. 1870.
- Pfeil**, Die deutsche Holzzucht. 1860.
- Fischbach**, Lehrbuch der Forstwissenschaft. 3. Aufl. 1877.
- Fischbach**, Praktische Forstwirthschaft. 1879.
- Hek**, Der Forstschutz. 1880.
- Schmitt**, Anlage und Pflege der Fichtenpflanzschulen. 1875.
- Gewig**, Die Weistanne im Schwarzwald. 1868.
- Dreßler**, Die Weistanne. 1878.
- v. Alemann, Ueber Forstkulturwesen. 2. Aufl. 1861.
- v. Schütz, Die Pflege der Eiche. 1870.
- v. Manteuffel, Die Eiche. 2. Aufl. 1874.
- Geyer, Die Erziehung der Eiche zum Hochstamm. 1870.
- Reuß, Die Lärchenkrankheit. 1870.
- v. Bannewitz, Anbau der Lärche, echten Kastanie und Akazie. 1855.
- Fischbach, H., Ueber die Lockerung des Waldbodens. 1858.
- Genth, Doppelte Riesen. 1874.



Einleitung.

Die Lehre von der Erziehung unserer Holzpflanzen wird sich naturgemäß theilen in allgemeine Grundsätze und Regeln, welche für die Pflanzenzucht im Wald überhaupt gelten, und in spezielle Regeln für die Erziehung der einzelnen Holzarten. Demgemäß wird sich denn auch unser Werkchen theilen in einen allgemeinen und einen speziellen Theil.

Im allgemeinen, von der Pflanzenerziehung überhaupt handelnden Theil werden wir, nachdem im ersten, einleitenden Abschnitt die Bedeutung der Pflanzenzucht, die verschiedenen Arten von Pflanzen und Methoden der Erziehung derselben kurze Besprechung gefunden, zunächst von den Vorbereitungen für die Pflanzenzucht zu reden haben: von der Auswahl des Platzes für Saatbeet oder Forstgarten, der Bearbeitung des Bodens, dessen Verbesserung und Düngung; ferner von der etwa nöthigen Einfriedigung der Pflanzschule und endlich von deren Eintheilung und innerer Einrichtung.

Die beiden nächsten Abschnitte werden sodann die Pflanzenerziehung durch Saat und durch Verschulung zu behandeln und einerseits die Ausführung der Ansaat und resp. Verschulung, anderseits Schutz und Pflege der Saat- und Pflanzbeete zu erörtern haben. — Ein letzter Abschnitt endlich hat die Kosten der Pflanzenerziehung, deren Faktoren und den Einfluß des Wirthschafters auf diese Kosten zu behandeln.

Aufgabe des zweiten, speziellen Theiles aber wird es sein, die Art und Weise der Erziehung der einzelnen Holzarten, wie sie unter Berücksichtigung der Eigenthümlichkeiten einer jeden sich in der forstlichen Praxis herausgebildet hat, unter möglichster Bezugnahme auf die Erörterungen des allgemeinen Theiles darzustellen.

Erster Theil.

Allgemeine Grundsätze und Regeln der Pflanzenzucht.

I. Abschnitt.

Die Pflanzenzucht überhaupt.

§ 1.

Bedeutung der Pflanzenzucht im Forsthaushalt.

Wie bekannt hat die Forstkultur in diesem Jahrhundert an Wichtigkeit und Ausdehnung stetig zugenommen, und mancherlei Gründe lassen sich hiefür angeben.

Die nächste Veranlassung hiezu ist jedenfalls in der großen Verbreitung der künstlichen Verjüngung an Stelle der natürlichen zu suchen, zunächst eine Folge des massenhaften Anbaues des Nadelholzes an Stelle des Laubholzes, sei es, weil auf dem durch Streunutzung heruntergekommenen Boden eine Nachzucht des Laubholzes überhaupt nicht mehr möglich war, sei es, weil man mit Hülfe der raschwüchsigen, nutzhölzreichen Nadelhölzer eine höhere Rentabilität der Waldungen zu erzielen hoffte. Aber auch bei der Verjüngung der Nadelholzbestände, der Fichte und selbst der Tanne, gab man um des einfachen, sicherer Verfahrens willen an vielen Orten dem künstlichen Anbau den Vorzug vor der früher geübten natürlichen Verjüngung; und selbst bei der Buchenwirthschaft hat das Bestreben, dem Buchenwald nutzhölzliefernde Laub- und Nadelhölzer beizumischen, der Forstkultur ausgedehnten Eingang verschafft. Endlich aber hat das Bestreben, Deichländereien überhaupt durch Anbau mit Holz nutzbar zu machen, wie intensive Bestandspflege durch den sich mehr und mehr verbreitenden Unterbau der Lichthölzer, der Forstkultur eine stets wachsende Ausdehnung gegeben.

Mit der zunehmenden Bedeutung des Forstkulturwesens und dessen intensiverem und rationellerem Betrieb ist aber die ursprünglich dominirende Saat mehr und mehr zurück und dafür die Pflanzung in den

Vordergrund getreten. Noch im Jahre 1854 konnte Carl Heyer¹⁾ sagen, die Zahl der Forstwirthe, welche die Saat vorzügen, sei die überwiegende, während im Jahr 1876 Wagener²⁾ bereits die Anwendung der Saat als Zeichen einer zurückgebliebenen Wirthschaft charakterisiren zu sollen glaubte. Geht letzteres Urtheil in dieser Allgemeinheit auch zu weit und gibt es auch heute noch eine nicht geringe Anzahl von Fällen, in denen die Saat ihre volle Berechtigung hat, — Vorsaaten in Bestandslücken und gesichteten Bestandspartien, Unterstützung der natürlichen Verjüngung, Nachzucht empfindlicher Holzarten unter Schutzbestand, Begründung von Eichenhorsten im Buchenwald u. dgl. m. — so behauptet die Pflanzung doch gegenwärtig fast allenthalben die erste und wichtigste Stelle im Kulturbetrieb und mit ihr auch die Pflanzenerziehung. Die Beschaffung eines guten, zweckentsprechenden und billigen Pflanzmaterials in hinreichender Menge gehört an den meisten Orten — wie wir dies schon im Vorwort betont haben, — zu den wichtigsten Aufgaben des Revierverwalters; ja vielfach, so z. B. in Bayern, wünscht man von ihm die Erziehung einer über den eigenen Bedarf hinausgehenden Pflanzmenge zur Deckung des Bedarfes der Privatwaldbesitzer, und erwartet hiervon nicht mit Unrecht eine Hebung des vielfach heruntergekommenen Zustandes der Privatwaldungen.

§ 2.

Beschiedene Arten der zur Verwendung kommenden Pflanzen.

Das Pflanzmaterial, dessen unser heutiger Kulturbetrieb bedarf, ist nach den örtlichen Verhältnissen ein außerordentlich verschiedenes, wie nach Holzart, so nach Alter und Stärke. Von der einjährigen Fohrenpflanze mit nur wenige Centimeter hohem Stämmchen bis zum kräftigen 2 und 3 Meter hohen Eichenheister finden wir Pflanzen jeder Größe und Stärke in Verwendung, wobei allerdings der beim Pflanzbetrieb gültige Grundsatz, mit Rücksicht auf die Kosten Pflanzen stets nur in der absolut nöthigen Stärke und also je kleiner, je lieber zu benützen, eine rasche Abnahme in der Zahl der zur Verwendung kommenden stärkeren Pflanzen zur Folge hat.

Fassen wir unser Pflanzmaterial also näher ins Auge, so haben wir dasselbe zunächst zu unterscheiden nach dem Alter und der dadurch bedingten Größe.

Von Nadelholzpflanzen, deren Zahl jene der zur Verwendung

¹⁾ Waldbau 1. Aufl. S. 49.

²⁾ Regelung des Forstbetriebs, S. 398.

kommenden Laubholzpflanzen ums Vielfache¹⁾ übersteigt, deren Erziehung auf vielen Revieren fast ausschließlich in Anwendung kommt und selbst auf keinem Laubholzrevier heut zu Tage gänzlich mehr entbehrt werden kann, kommen vorzugsweise nur 2 Sortimente in Verwendung. 1 bis 3jährige Saatshulpflanzen und 3—6jährige Mittelpflanzen, wie sie durch Verschulung im Pflanzbeet erzogen oder etwa mit Ballen gewonnen werden. Noch stärkere Pflanzen werden nur ausnahmsweise und vereinzelt da und dort zur Ausfüllung einzelner kleiner Lücken als starke Ballenpflanzen aus natürlichen Anslügen oder Saaten ausgehoben und in unmittelbarer Nähe verwendet; auch der bisweilen benützte Lärchenheister gehört zu diesen Ausnahmen!

Mannigfacher sind die zur Verwendung kommenden Laubholzpflanzen. Auch hier kommen 1—3jährige Saatshulpflanzen zur Verwendung, doch in verhältnismäßig geringerer Zahl; ein großer Theil derselben wird ein-, ja selbst zweimal verschult und liefert die bis zu 1 m hohe Bodenpflanze, den bis 2 m hohen Halbheister, den starken 3, ja 4 m hohen Heister, wie sie die Nachbesserung in den Schlägen des Hoch- und Niederwaldes, die Oberholz-Nachzucht des Mittelwaldes, die Be pflanzung von Hutweiden und dergl. verlangen. — Wird das Stämmchen bei der Be pflanzung unmittelbar über dem Boden abgeschnitten, so entsteht die Stummel- oder Stuhpflanze, wie sie (namentlich von Eiche und Edelkastanie) zur Anlage und Bevollständigung von Niederwaldungen mit gutem Erfolg angewendet wird. Ja selbst die kaum aufgegangene Keimpflanze findet bisweilen, wenn auch nur zur Einschulung ins Pflanzbeet, Anwendung mit gutem Erfolg. Der Steckling endlich, wie er bei Weichhölzern (Weiden und Pappeln) verwendet wird, ist als Pflanze überhaupt kaum zu betrachten und wird erst durch seine Anwurzelung zu einer solchen; im Pflanzbeet erzieht man wohl aus Stecklingen kräftige und bewurzelte Söhlinge.

In Weiterem werden wir ballenlose und Ballenpflanze, Einzel- und Büschelpflanze zu unterscheiden haben.

Die weitaus größte Zahl von Pflanzen wird jetzt aus Saatbeeten oder nach vorheriger Verschulung aus Pflanzbeeten gewonnen und ohne Ballen, also mit nackten Wurzeln als Einzelpflanze verwendet. Diese ballenlosen Pflanzen steht gegenüber die Ballenpflanze, deren

¹⁾ In den Staatswaldungen Bayerns sind in den Perioden
1855—1861 jährlich 2 458 000 Laubholz- und 58 006 000 Nadelholzpflanzen,
1861—1867 " 1 941 000 " 43 757 000
durchschnittlich zur Verwendung gekommen. (Forststatistische Mittheilungen der bavar. Forstverwaltung S. 20.)

Burzeln mit einem je nach der Größe der Pflanzen und nach deren Bewurzelung größeren oder kleineren Erdballen umgeben sind; den Gegen-
satz zur Einzelpflanze aber bilden die Büschelpflanzen, bei welchen eine kleinere oder größere Zahl von Pflanzen in einem gemeinsamen Ballen dicht stehend verwendet werden.

Auf einen weiteren Unterschied je nach der Erziehung oder Gewinnung — künstlich erzogene Pflanzen und Wildlinge — wird uns der folgende § führen.

§ 3.

Gewinnung des nöthigen Pflanzmaterials.

Die ursprünglichste und naheliegendste Methode der Pflanzenbeschaffung war jedenfalls die Entnahme der Pflanzen aus natürlichem Anflug, die Verwendung von Wildlingen, später die Entnahme aus Saaten; doch ist auch die künstliche Erziehung von Pflanzen in eigens dazu bestimmten und zugerichteten Saatkämpen eine sehr alte, wie denn schon eine Forstdordnung von 1651 die Anlage von Eichen-, Buchen- und Tannenkämpen durch Pflügen und Ansäen vorschreibt.¹⁾ Immerhin aber sind diese letzteren bis in unser Jahrhundert die Ausnahme und die erstgenannten Pflanzengewinnungs-Arten die Regel gewesen, mit welcher sich bei der ausgedehnten Anwendung der Saat gegenüber der seltener geübten Pflanzung auskommen ließ. Die allgemeinere Anwendung dieser letzteren aber, der dadurch bedingte außerordentlich große Pflanzenbedarf, die gesteigerten Anforderungen an die Qualität der Pflanzen einerseits, die fehlenden natürlichen Anflüge und Saatkulturen anderseits haben jene früheren Arten der Pflanzengewinnung sehr in den Hintergrund treten lassen, die künstliche Erziehung der Pflanzen vielfach zur selbst ausschließlichen Regel gemacht.

Bei Beantwortung der Frage: wie gewinnen wir gegenwärtig unser Pflanzmaterial? werden wir zunächst unterscheiden müssen zwischen der Ballenpflanze und der ballenlosen Pflanze.

Die Ballen- (und Büschel-) Pflanze wird entweder aus natürlichen Anflügen und Verjüngungen oder dicht stehenden Saatkulturen entnommen oder auf besonders dazu bestimmten, leicht bearbeiteten und ziemlich dicht besäten Flächen gewonnen, endlich, wenn auch um des größeren Kostenaufwandes willen nur seltener, in Pflanzschulen eigens erzogen.

Die ballenlose Pflanze dagegen gewinnen wir nur ausnahmsweise

¹⁾ Bernhard, Forstgeschichte. I. Theil. S. 241.

aus natürlichen Verjüngungen (so Buchen zu Unterpflanzungen), öfter aus dicht stehenden Niesensaaten, denen das entbehrliche Material entnommen wird. Auch durch Ansaat von Stocklöchern und Grabenaufwürfen sucht man wohl da und dort auf einfache und billige Weise Pflanzen zu erziehen; ein lockerer oder gelockerter Boden, welcher das Ausheben der Pflanzen ohne Verlust der feinen Saugwurzeln gestattet, ist hier ebenso Bedingung, wie für die Ballenpflanze ein etwas bindender Boden. Weitaus die überwiegende Menge ballenloser Pflanzen aber wird unver schult oder verschult in Saat- und Pflanzkämpen und Forstgärten erzogen, und es behaupten diese Pflanzen vielfach selbst der Billigkeit, noch mehr aber der Qualität nach den entschiedenen Vorrang vor Wildlingen und Pflanzen aus Saatkulturen.

Bisweilen werden wohl auch schwache Wildlinge ohne Ballen ausgehoben und in Pflanzschulen eingeschult (s. § 111, die Tanne).

§ 4.

Verwendung der Ballen- und ballenlosen Pflanzen im Kulturbetrieb.

Welchen Werth, welche Bedeutung hat nun die Ballenpflanze, welchen die ballenlose für unsern Kulturbetrieb, und in welchem Maß finden hienach beide Verwendung? — das wird die nächste sich aufdrängende Frage sein.

Die Versezung einer Pflanze mit der die Wurzeln allseitig umgebenden Erde, mit dem Ballen, erscheint jedenfalls als das schonendste und sicherste Verfahren, und in der That läßt, wenn die Größe des Ballens mit der Größe der Pflanze und resp. deren Wurzelbau in richtigem Verhältniß steht, das Gediehen von Ballenpflanzen nichts zu wünschen übrig; die versezte Pflanze wächst, zweckentsprechende Behandlung bei der Verpflanzung vorausgesetzt, meist ohne jedes Stocken und Kümmern fort. So war denn auch die Ballenpflanzung die ursprünglichste und lange Zeit die beliebteste Pflanzmethode, die auch heut zu Tage noch da und dort ihre Berechtigung hat, in manchen Fällen das letzte Mittel zur Aufforstung einer mißlichen Blöße ist; sie ist namentlich noch dann von Bedeutung, wenn stärkere Nadelholzpflanzen (Föhren und Fichten) zur Verwendung kommen sollen, welche gegen Wurzelverlust und Wurzelbeschädigung viel empfindlicher sind, als Laubholzpflanzen — wir erinnern hier beispielsweise an die Behandlung (richtiger Mißhandlung!), welche sich Obstbäume gefallen lassen müssen!

Die Verwendung der Büschelpflanze, früher für die Fichte namentlich im Harz in ziemlicher Ausdehnung üblich, hat so mancherlei Schattenseiten, daß sie keine größere Verbreitung gewinnen konnte — im Gegen-

theil, die Büschelpflanze hat vielfach der stufigen Einzelpflanze wieder das Feld räumen müssen und ist überhaupt nur unter besonders mißlichen Verhältnissen, so bei unbeschränktem Weidegang, starkem Wildstand u. dgl. noch da und dort am Platz und in Anwendung.

Der ausgedehnteren Anwendung der so manche Vortheile bietenden Ballenpflanzung aber stehen zahlreiche Hindernisse im Weg: in erster Linie die viel höheren Kosten, welche Stechen, Transport, Einpflanzen erheischen, ferner ungünstige Bodenbeschaffenheit, welche entweder das Stechen oder den weiteren Transport erschwert, ja selbst unmöglich macht (steiniger, verwitterter oder zu leichter Boden). Tiefgehende oder weitausstreichende Wurzelbildungen treten insbesondere auf ärmerem Boden der Gewinnung in so ferne hindernd in den Weg, als entweder übergroße Ballen nötig werden oder bedeutender Wurzelverlust für die Pflanzen nicht zu vermeiden ist. Das Ausstechen von Ballen in größerer Zahl aus Ansätzen oder Ansäaten wird dieser nicht selten geradezu verderblich, die Erziehung von Ballenpflanzen durch Verschulung aber, für die Fichte früher namentlich in Thüringen sehr in Anwendung,¹⁾ ist immerhin etwas kostspielig.

Alle diese Verhältnisse haben in Verbindung mit dem großen Pflanzenbedarf der Gegenwart die Ballenpflanze mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt, und die ballenlose Pflanze, unverschult oder verschult im Saat- und Pflanzbeet erzogen, behauptet unbedingt den ersten Platz, um so mehr, als die Fortschritte im Gebiete des Forstkulturwesens innerhalb der letzten Jahrzehnte die Erziehung guten und billigen Pflanzmaterials und dessen Verwendung mit sehr gesichertem Erfolg gelehrt haben.

Die Erziehung ballenloser Pflanzen in Saat- und Pflanzgärten wird es daher vor Allem sein, welche uns hier zu beschäftigen hat, wenn auch der Erziehung von Ballenpflanzen, soweit eine solche noch stattfindet, die entsprechende Rücksicht geschenkt werden soll.

§ 5.

Saatkamp, Pflanzkamp, Forstgarten.

Die Erziehung der nötigen Pflanzen kann nun erfolgen auf kleineren, in der Regel auf den Kulturlächen oder in deren nächster Nähe gelegenen Flächen, die lediglich zur Anzucht 1 — 3 jähriger unverschulter Pflanzen (vorwiegend Madelholzpflanzen) bestimmt sind, meist nur für zere Zeit benutzt werden und den Namen Saatkämpe oder Saatschulen

¹⁾ Allg. F. u. F.-B. 1862. S. 285.

führen. Dienen dieselben auch zur Erziehung verschulter Pflanzen, so nennt man die dazu bestimmten Beete Pflanzbeete im Gegensatz zu den Saatbeeten, und die ganze, aus Saat- und Pflanzbeeten bestehende Anlage Pflanzkamp oder Pflanzschule, und zwar spricht man bei nur ein- oder zweimaliger Benützung von wandernden Saat- und Pflanzkämpen.

Größere zur dauernden Pflanzenzucht bestimmte Flächen nennt man dagegen Pflanzgärten oder Forstgärten; dieselben enthalten dann angejägte Saatbeete und fast immer auch Pflanzbeete voll verschulter Pflanzen, meist verschiedener Art und Stärke, sind solid eingefriedigt und haben den Bedarf eines größeren Bezirks — Reviers oder Schutzbezirkes — zu decken.

§ 6.

Wandernde Saat- und Pflanzkämpe oder ständige Forstgärten?

Die Frage, ob es zweckmäßiger sei, die nöthigen Pflanzen in zahlreichen, kleineren Saat- und Pflanzkämpen, die nur wenige Jahre benützt werden sollen, oder in größeren, dauernd benützten Forstgärten zu erziehen, ist schon vielfach ventiliert worden und jede Seite dieser Frage hat ihre Vertreter und Vertheidiger gefunden; es dürfte sich also wohl lohnen, derselben etwas näher zu treten.¹⁾

Eine absolut und für alle Fälle richtige Antwort auf jene Frage giebt es nun wohl nicht, und sowohl kleinere, wandernde wie größere und ständige Pflanzschulen haben je nach der Holzart, wie nach lokalen Verhältnissen ihre entschiedene Berechtigung.

Wenn es sich um die Erziehung von Pflanzen handelt, welche wie Föhren, Fichten, Erlen, eines Schutzes durch Einfriedigung vielfach entbehren können; wenn die erstmalige Bodenbearbeitung leicht und billig auszuführen ist, also auf mehr sandigem oder wenig lehmigem, stein- und wurzelfreiem Boden; wenn in Folge günstiger Boden- und Terrainverhältnisse passende Dertlichkeiten allenthalben zur Verfügung stehen: dann wird die Anlage kleiner Saat- und Pflanzkämpe direkt auf den größeren Kulturlächen oder in deren nächster Nähe wohl am Platze sein. Es ist jederzeit von Vortheil, die nöthigen Pflanzen in unmittelbarer Nähe der Kulturlächen zu haben. Unter steter, spezieller Aufsicht des die Kultur überwachenden Forstbediensteten werden die Pflanzen, stets nur in der momentan nöthigen, sofort zu verwendenden Menge, ausgehoben, die Arbeit des Verpackens, wie die Gefahr des Vertrocknens in

¹⁾ Vergl. hierüber: Allg. F.- u. J.-B. 1866. S. 165 u. 208.

Folge mangelhafter Verpackung fallen weg; verschulsten Pflanzen kann man beim Ausheben möglichst viel Muttererde an den Wurzeln hängen lassen, während dieselbe bei weiterem Transport abgeschüttelt wird oder zur Erleichterung derselben abgeschüttelt werden muß, und die Kosten des Transports, (die für kleine Pflanzen allerdings gering sind), werden erspart. Von wesentlicher Bedeutung sind letztere aber bei Ballen- und Büschelpflanzen, und Pflanzbeete, in welchen solche Pflanzen erzogen werden sollen, legt man unter allen Umständen in möglichster Nähe des Verwendungsortes an.

Noch manche weitere Gründe werden für Wanderkämpe und gegen große Forstgärten, gegen zu große Konzentrierung der Pflanzenerziehung ins Feld geführt: die Kosten der Einfriedigung, welche bei ersteren vielfach erspart werden können, der Düngung, welche ganz oder theilweise erspart werden soll;¹⁾ die stärkere Verunkrautung, welcher ständige Pflanzgärten gegenüber den Wanderkämpen auf frischem Boden allmählich unterliegen.²⁾

Es wird betont, daß es Aufgabe jedes Försters sein soll, das für seinen Auffichtsbezirk nöthige Pflanzmaterial möglichst selbst erziehen zu helfen, dann werde er auch das größte Interesse an sorgfältiger Verwendung haben.³⁾ — Ebenso dürfte zu erwähnen sein, daß passende Plätze für kleine Pflanzkämpe leichter zu finden sind, als für größere Pflanzgärten, daß sich für erstere der so wohlthätige Seitenschutz durch vorliegende Bestände in höherem Grad beschaffen und erhalten läßt, als für letztere; daß endlich Kalamitäten — Insekten, Krankheiten (Schütte) u. dgl. — bei einer größern Anzahl kleinerer Pflanzschulen voraussichtlich doch nicht so verderblich auftreten und wenigstens einen Theil der letzteren verschonen werden.

Nicht wenige Stimmen dagegen sprechen für thunlichst konzentrierten Betrieb der Pflanzenerziehung, welche dann, auf die passendsten Plätze verlegt, vom Revierverwalter am leichtesten überwacht werden könne.⁴⁾ Am weitesten geht hierin wohl E. Heyer,⁵⁾ der zunächst die Gründe gegen ständige Forstgärten unter Hinweis auf die Billigkeit guter Düngung, auf die geringen Transportkosten für ballenlose Pflanzen, auf die Leichtigkeit guter Verpackung, für nicht stichhaltig erklärt und der Verschiedenheit des Standortes zwischen Forstgarten und Kulturplatz jede

¹⁾ Monatsschr. f. d. F.- u. S.-W. 1868. S. 343.

²⁾ Krit. Bl. L. 1. S. 121.

³⁾ Zeitschr. f. F.- u. S.-W. Bd. 6. S. 255.

⁴⁾ das. Bd. 8. S. 404.

⁵⁾ Allg. F.- u. S.-B. 1866. S. 205.

Bedeutung abspricht, wenn ersterer nicht etwa in entschieden milderem Klima liegt, als letzterer; sodann die Vortheile ständiger Forstgärten hervorhebt: die nur einmal aufzuwendenden Kosten für Rodung, Planirung oder Terrassirung der betreffenden Fläche, für Verbesserung der physikalischen Eigenschaften, für Einfriedigung und Hütte, dann die leichtere Ueberwachung. Heyer will die Konzentration so weit als möglich treiben, förmliche Holzpflanzen-Magazine anlegen, einen großen Forstgarten für ganze Waldkomplexe, für eine ganze Provinz; unter Hinweis auf die Erfolge großer Handelsgärtnerien glaubt er, daß auf solche Weise die besten und billigsten Pflanzen erzogen, viel Lehrgeld erspart, die besten Geräthe angewendet würden, das Lokalpersonal Entlastung fände u. s. f.

Wenn nun auch zugegeben werden muß, daß von diesen Anschauungen manche als richtig anzuerkennen sind — auch Burkhardt stimmt theilweise zu, betont auch noch, daß größere Forstgärten mehr Gelegenheit zu wissenschaftlichen und praktischen Versuchen und Beobachtungen geben¹⁾ — so werden doch nur Wenige so weit gehen wollen, wie Heyer! Es wäre allerdings sehr bequem, wenn der Revierverwalter im Frühjahr einfach seinen Bestellzettel an das „Pflanzenmagazin“ sendete — aber schon die genaue Bestimmung der Zahl der nöthigen Pflanzen jeder Gattung würde manche Schwierigkeit bieten, ebenso die gute Verpackung, der oft weite Transport in entlegene Waldungen, das rechtzeitige Eintreffen, ganz abgesehen davon, daß mit der Pflanzenerziehung dem thätigen Wirthschafter eines der dankbarsten Arbeitsgebiete entzogen würde. Und so ist jener Gedanke Heyers wohl kaum irgendwo realisiert worden; die Erziehung des nöthigen Pflanzenbedarfs in jedem Revierbezirk wird die Regel bleiben, der aushülfswise Bezug von Pflanzen aus einem andern Revier dadurch jedoch nicht ausgeschlossen sein.

Dass größere und ständige, eine längere Reihe von Jahren benutzte Forstgärten manche Vorzüge bieten und vielfach sehr am Platz, ja unbedingt nöthig sind, soll damit in keiner Weise in Abrede gestellt werden, und wir haben oben deren Vorzüge schon kennen gelernt. Insbesondere werden dieselben zur Laubholzzucht und bei stärkeren Wildständen um der nöthigen soliden Einfriedigung willen nicht entbehrt werden können, und ebenso macht kostspieliger Bodenumbruch längere Benutzung wünschenswerth. Düngemittel verschiedener Art werden gegen die sonst unvermeidliche Vermagerung des Bodens helfen und in rechter Quantität und Art angewendet, den erwünschten Erfolg haben — benutzt ja auch der

¹⁾ Säen u. Pflz. S. 71.

Handelsgärtner fort und fort denselben Platz zur Erziehung seiner Gewächse.

So werden denn Saatkamp wie Forstgarten ihre Stelle in der Pflanzenzucht behaupten, und jeder von beiden unter gewissen Verhältnissen und Bedingungen seine entschiedene Berechtigung haben.

II. Abschnitt.

Die Vorbereitungen zur Pflanzenzucht.

1. Kapitel.

Auswahl des Platzes.

§ 7.

Allgemeine Erörterungen.

Die Auswahl eines passenden Platzes zur Anlage eines Saatkampes, eines Forstgartens, kann unter günstigen Verhältnissen mit sehr wenig Schwierigkeiten verbunden sein, unter ungünstigen dem Wirthschafter viel Sorgen und Zweifel erregen. Eine ganze Reihe von Faktoren sind es, die der Würdigung bedürfen, und die Nichtbeachtung des einen oder andern rächt sich oft schwer durch Erziehung mangelhaften Pflanzmaterials, durch vergeblichen Aufwand von Geld, Zeit und Mühe. Insbesondere ist es die Auswahl eines (meist größern) Platzes für Anlage eines ständigen Forstgartens, welche ganz besonders erwogen sein will, da sich Fehler hier viel schwerer rächen, als der Mißgriff, der etwa bei Auswahl der Dertlichkeit für einen kleinen Wanderkamp gemacht wurde. Zudem soll ein solch ständiger Pflanzgarten oft zur Erziehung mehrerer, in ihren Ansprüchen an Boden, Schutz &c. sehr verschiedener Holzarten dienen, wodurch die Auswahl wesentlich erschwert werden kann.

Die Faktoren aber, welche bei Auswahl des Platzes zu beachten sind, und die wir nun näher ins Auge fassen wollen, sind: Lage, Boden, Terraingestaltung, bisherige Benutzung, Umgebung; auch die Gestalt, welche der neuen Anlage gegeben werden soll, wie deren Größe spielt schon bei der Auswahl des Platzes, zumal in coupirtem Terrain, eine Rolle.

Nicht selten wird es schwer fallen, einen Platz ausfindig zu machen, der alle wünschenswerthen Eigenschaften zeigt, allen Ansprüchen genügt: dann heißt es eben Licht- und Schattenseiten gegen einander abwägen, wobei wieder die Rücksicht auf die vorzugsweise anzuziehende Holzart in den Vordergrund tritt. So wird man für Tannen der geschützten Lage des Saatbeets besondern Werth beilegen, für Föhren dem tiefgründigen und lockern Boden u. s. f.

§ 8.

L a g e.

Die zweckmäßige Lage einer Pflanzschule ist von großer Bedeutung, und Schmitt¹⁾ sagt mit Recht, daß derselben vielfach höherer Werth beizulegen sei, als der Güte des Bodens. Letzterer läßt sich bezüglich seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften verbessern, während ungünstigen Einflüssen in Folge der Lage viel schwieriger zu begegnen ist.

Mancherlei Rücksichten sind es nun, die hiebei ins Auge zu fassen und denen, so weit sie sich eben unter den gegebenen Verhältnissen vereinen lassen, Rechnung zu tragen ist.

So erscheint es zunächst wünschenswerth, daß der Pflanzgarten nicht allzu entfernt liege vom Wohnsitz des ihn beaufsichtigenden Forstbediensteten, des Försters oder Oberförsters — derselbe kann nie zu oft in seine Saatschule, seinen Forstgarten kommen! Die Ueberwachung ist erleichtert, Schäden und Gefährdungen werden sofort im Entstehen und ersten Auftreten bemerkt, mancherlei Arbeiten des Schutzes und der Pflege (so z. B. Auflegen und Entfernen von Schuhgittern u. s. f.) mit leichter Mühe im rechten Augenblick vorgenommen. — Auch große Entfernung von den Ortschaften, welche die nöthigen Arbeiter stellen, ist aus naheliegenden Gründen unerwünscht.

Ebenso wünschenswerth ist namentlich für den größeren und ständig benutzten Forstgarten die leichte Zugänglichkeit für Fuhrwerk, die Nähe also eines guten Weges. Die Beifuhr von Düngematerial jeder Art, die Abfuhr von Pflanzen verursachen andernfalls Schwierigkeiten und erhöhte Kosten, und es wird dieser Punkt ganz besonders auch bei jenen Gärten zu beachten sein, welche Pflanzen in großer Menge und zum Verkauf an Private liefern sollen.

Die Nähe der Kulturorte ist nur dann von hervorragender Wichtigkeit, wenn es sich um Erziehung von Ballenpflanzen handelt; bei ballenlosen Pflanzen ist der Transport so billig, daß diese Rücksicht zu-

¹⁾ Fichtenpflanzschulen S. 22.

rücktritt; daß übrigens diese Nähe unter allen Umständen manche Vortheile bietet, haben wir oben (§ 6) bereits hervorgehoben.

Von großer Bedeutung ist bei der Lage eines Forstgartens die möglichste Abhaltung schädlicher atmosphärischer Einflüsse, der Wirkungen von Hitze und Frost.

Um den Einwirkungen der Hitze und der dadurch hervorgerufenen Trockenheit zu begegnen, werden wir keine gegen Süd und West geneigte Lage wählen, sondern der nördlichen, nordöstlichen oder nordwestlichen Neigung den Vorzug geben. Das in solchen Lagen etwas später als an der Südseite eintretende Erwachen der Vegetation bringt zugleich einigen Schutz gegen Spätfröste mit sich, und auch für den Kulturbetrieb überhaupt hat dies spätere Regewerden der Vegetation um des größeren Zeitraums willen, der dadurch für die beste Kulturzeit gegeben ist, seine Vortheile.

Dem Spätrost aber, diesem gefährlichen Feind so vieler unserer Holzgewächse, beugen wir, abgesehen von dem Schutz, welchen ein umgebender Holzbestand gewährt (s. § 12) und von den später zu erörternden künstlichen Schutzmitteln, vor Allem auch durch richtige Auswahl des Platzes für unsere Pflanzschule vor. Sogenannte Frostlagen, Mulden, Einbeugungen, enge Thäler sind absolut zu vermeiden, überhaupt die Lage lieber etwas hoch, als zu tief zu wählen. Lokale Erfahrungen hinsichtlich der den Spätfrösten ausgesetzten Dertlichkeiten werden hier den besten Fingerzeug geben.

In einem Verwaltungsbezirk, dessen Waldungen sehr verschiedene Höhenlagen haben, kann bei konzentriertem Betrieb der Pflanzenzucht auch die Frage herantreten, ob man die Pflanzen für die Hohllagen in einem in tieferer, milderer Lage befindlichen Forstgarten erziehen könne, nachdem hier die Pflanzen oft schon zu treiben beginnen, ehe in jenen Hohllagen mit der Kultur begonnen werden kann. Durch frühzeitiges Ausheben der Pflanzen und Einschlagen an kühlem, schattigem Ort lässt sich allerdings diesem, namentlich bei Laubhölzern und der Lärche bedenklichen früheren Treiben vorbeugen, doch dürfte es vielfach angezeigt sein, diesem Faktor bei Anlage der Pflanzschule etwas Rechnung zu tragen, eventuell eben zwei Pflanzschulen, in höherer und in tieferer Lage, anzulegen.

§ 9.

Boden.

Daß neben der Lage der Boden von größter Wichtigkeit für den Erfolg der Pflanzenzucht sein müsse, bedarf wohl keiner weiteren Erörterung, und zwar sind es die chemische Zusammensetzung, der Gehalt desselben an Pflanzennährstoffen, wie seine physikalische Beschaffenheit:

Lockerheitsgrad, Frische, Tiefgründigkeit, welche hiebei in Betracht kommen; durch das Zusammenwirken dieser beiden Faktoren ist die größere oder geringere Güte des Bodens bedingt.

Man war nun früher vielfach der Ansicht, der Boden auf welchem man die Pflanzen erziehe, müsse möglichst jenem des künftigen Verwendungsortes gleichen, und eine in gutem Boden erzogene Pflanze werde bei ihrer Versetzung auf schlechteren Boden kümmern,¹⁾ in höherem Grad wenigstens kümmern, als eine nur auf mittelgutem Boden erzogene. Dieser Ansicht entsprechend vermied man, wo es sich um Erziehung von Pflanzen für geringe Standorte handelte, bei Auswahl des Platzes für die Pflanzschule absichtlich den guten Boden und wählte geringern.

Von dieser Ansicht ist man jetzt wohl allgemein abgekommen und hat die Überzeugung gewonnen, daß auf gutem Boden erzogene, möglichst normal bestäigte und bewurzelte Pflanzen unter allen Verhältnissen die beste Garantie für das Gedeihen einer Kultur bieten.²⁾ „Der beste Kiefernbaum ist nicht zu gut dazu“ sagt Burkhardt³⁾ bei Besprechung der Erziehung von Kiefern pflanzen — und keiner Pflanze mutthen wir ja bez. des Bodens mehr zu, als der Kiefer.⁴⁾ — Es ist insbesondere ins Auge zu fassen, daß geringer Boden die Pflanzen nötigt, sich durch tiefgehende und weitaus greifende Wurzeln die nötige Nahrung zu verschaffen, die beim Ausheben theilweise verloren gehen müssen — solcher Wurzelverlust thut aber dem freudigen Gedeihen der Pflanzen stets Eintrag.

Wir werden daher bei der Wahl eines Platzes zur Pflanzenerziehung stets möglichst nach einem guten Boden greifen, einem Boden, der hinreichend kräftig ist und dabei günstige physikalische Eigenschaften —

¹⁾ Cotta, Waldbau. 6. Aufl. S. 294.

v. Lips, Waldbau. S. 344.

²⁾ v. Manteuffel, die Eiche. S. 79.

³⁾ Burkhardt, S. u. Pfl. S. 293.

⁴⁾ Es dürfte hier vielleicht die von Neuß und Möller gemachte Beobachtung (v. Seckendorff, Mitth. aus d. österr. Versuchswesen. Bd. II. S. 186) zu erwähnen sein, nach welcher 3jährige, auf Granitsand erzogene und auf Thonschiefer verschulte Pflanzen ein viel ungünstigeres Verhalten durch stärkern Abgang und geringere Entwicklung zeigten, als eben so alte auf Thonschiefer erzogene und gleichzeitig auf dasselbe Pflanzbeet verschulte Pflanzen. Einjährige Pflanzen dagegen, im Granit erzogen und auf Thonschiefer verschult, zeigten keinerlei Rückgang. Im Bd. II. S. 330 ist allerdings konstatiert, daß die Entwicklung jener ersten Pflanzen von Jahr zu Jahr besser wurde, so daß der Unterschied am Ende des 2. Jahres gegenüber den auf Thonschiefer erzogenen nur ein geringer mehr war. — Eine irgend sichere Schlusfolgerung läßt sich unseres Erachtens aus diesem vereinzelten Versuch nicht ziehen.

entsprechenden Grad von Bindigkeit, Gründigkeit und Feuchtigkeit — zeigt, Eigenschaften, die ja wieder mit dem mineralischen Ursprung und der chemischen Zusammensetzung des Bodens in engem Zusammenhang stehen. Dabei ist aber günstigen physikalischen Eigenschaften jedenfalls eine größere Bedeutung beizulegen, als dem momentanen Gehalt an Pflanzennährstoffen; einem Mangel an letztern lässt sich durch entsprechende Düngung jederzeit leichter abhelfen, als ungünstiger physikalischer Beschaffenheit des Bodens.

Was die Bindigkeit des Bodens betrifft, so wird ein lehmiger Sand- oder sandiger Lehmboden stets den strengerem Lehmb- und Thonböden vorzuziehen sein. Letztere sind schwerer zu bearbeiten und zu lockern, trocknen im Frühjahr zur Zeit des Säens und Verschulzens nur langsam ab und stellen dadurch der Arbeit manche Hindernisse in den Weg, leiden auch in Folge der in den oberen Schichten sich haltenden Feuchtigkeit mehr durch Auffrieren. Im Sommer dagegen leidet solch schwerer Boden durch Hartwerden und Aufreißsen, ist meist stark zur Verunkrautung geneigt und stellt doch wieder dem Ausjäten größere Schwierigkeiten in den Weg, indem die Unkrautwurzeln, statt sich mit ausziehen zu lassen, abreissen und alsbald aufs Neue ausschlagen.¹⁾ — Ebenso aber werden wir zu leichten Sandboden um des allzu raschen Austrocknens, wie des geringen Nährstoffgehaltes willen zu vermeiden suchen; am ersten ist derselbe wohl noch für die Erziehung einjähriger Föhren zulässig.

Die Forderungen an die Tiefgründigkeit des Bodens werden verschieden sein je nach den Holzarten, um deren Anzucht es sich handelt, nach der Stärke, die wir unsere Pflanzen erreichen lassen wollen; ein zur Erziehung von Eichen, vielleicht gar von Heistern bestimmter Pflanzkamp bedarf selbstverständlich eines tiefgründigeren Bodens, als eine Fichtenpflanzschule. Flach gründigen Boden wird man unter allen Umständen zu vermeiden suchen, da derselbe durch Austrocknen, Auffrieren, baldige Erschöpfung leidet, eine große Tiefgründigkeit aber eben so wenig fordern, da zu tiefs gehende Wurzeln für die künftige Verpflanzung ungünstig sind. — Undurchlassender Untergrund gibt im Frühjahr in Folge der stagnirenden Feuchtigkeit leicht Veranlassung zum Auffrieren des Bodens.

¹⁾ Mit der Aufforderung G. Heyers (Allg. J.- u. J.-Btg. 1866. S. 208), dort, wo Eingerlingschaden droht, auf starken Thongehalt zu sehen, ja selbst plastischen Thon zu wählen, wird man sich kaum einverstanden erklären können; die anderweitigen Nachtheile überwiegen doch wohl jenen einzigen Vortheil!

Die Frage nach der Tiefe der Bodenbearbeitung (§. § 17) wird uns übrigens auf dies Thema nochmals zurückführen.

Der natürliche Feuchtigkeitsgrad des Bodens endlich sei ein mäßiger; eigentlich trockne Böden sind wenigstens für manche Holzart fast eben so ungünstig, wie dies im Allgemeinen feuchter Boden ist, der durch starken Gras- und Unkrautwuchs viele Reinigungskosten verursacht, durch Auffrieren den Pflanzen Nachtheil bringt. Ein frischer Waldboden wird allen Holzarten am zuträglichsten sein, und nur zu Erlen-Saat- und Pflanzschulen wählt man gerne Dertlichkeiten mit höherem Feuchtigkeitsgrad, während wir bei Föhrensacatbeeten in Sandgegenden allerdings auch bisweilen mit leichtem, trockenem Sandboden vorlieb nehmen müssen.

§ 10.

Boden-Neigung.

Hat man in der Auswahl des Platzes freie Hand, so wählt man gerne ebenes oder doch nur sanft geneigtes Terrain für die Pflanzschule und gibt letzterem bei einer Neigung gegen Nord, Nordost, Nordwest sogar den Vorzug vor der ganz ebenen Lage, indem hier, abgesehen von den in § 8 erwähnten Vorzügen (Schutz gegen Austrocknen durch Einwirkung der Sonne), doch ein leichteres Abtrocknen nach anhaltendem Regen, nach Schneeabgang stattfindet, die Feuchtigkeit nicht stagnirt. — Stärkere Neigung des Bodens sucht man jedoch zu vermeiden, da hier einerseits Beschädigungen durch Abschwemmen des Bodens bei heftigern Regengüssen zu fürchten sind, anderseits auch die Bodenbearbeitung durch das nöthige Terrassiren theurer, die Tiefe der Bodenbearbeitung in den Terrassen auch eine sehr verschiedene wird.¹⁾ Auch Schutzgräben zum Auffangen des Wassers sind meist nicht zu umgehen und verursachen Kosten. Um ersten erscheint solch starker geneigtes Terrain noch für Verschulungsbeete zulässig, in minderem Maße für die durch Abschwemmen gefährdeteren Saatbeete.

Ist man genötigt, solch stärker geneigtes Terrain zu wählen, so gibt man der Anlage wenigstens in der Richtung der Wasserlinie mit Rücksicht auf die sonst steigende Gefahr der Beschädigung durch Abschwemmen keine zu große Ausdehnung. Burkhardt²⁾ empfiehlt in solchem Falle auch Zwischenstreifen unarbeiteten Bodens, welche die Gewalt des Wassers brechen (vergl. § 20).

¹⁾ Allg. F.- u. J.-Btg. 1860. S. 217.

²⁾ S. u. Pflz. S. 357.

§ 11.

Bisherige Benutzung.

Auch die bisherige Bestockung oder Benutzung der betreffenden Fläche ist wohl ins Auge zu fassen. Alte, durch langes Bloßliegen vermagerte oder verunkrautete Böden vermeidet man gerne, und ebenso hat bisheriges Ackerland Manches gegen sich; zur Benutzung des letztern wird man namentlich bei Aufsärrung angekaufter größerer Ackerflächen leicht veranlaßt, da die erstmalige Bearbeitung des Bodens eine sehr leichte und billige ist — allein einerseits pflegen solche verlassene Felder sehr ausgebaut zu sein, anderseits hat man auf denselben in der Regel einen harten Kampf mit massenhaftem Unkraut, namentlich auch der eben so lästigen als schwer zu vertilgenden Quecke zu bestehen, und es vergehen meist mehrere Jahre, bis man den Boden etwas rein von Unkraut bringt. Dagegen sagt Burkhardt,¹⁾ daß bisheriges Weideland mit guter Grasnarbe nicht zu verschmähen sei.

Um besten pflegen neu ausgestockte Flächen inmitten älterer Bestände ihren Zweck zu erfüllen, da hier der Boden seine volle Fruchtbarkeit besitzt und vollkommen unkrautfrei zu sein pflegt, so daß wenigstens in den ersten Jahren Düngung und Reinigung sehr geringe Kosten verursachen. — Frische oder doch durch längeres Bloßliegen noch nicht vermagerte Windbruchlöcher inmitten eines Bestandes, durch Wegnahme einzelner Stämme nöthigenfalls vergrößert oder regulirt, werden vielfach mit gutem Erfolg benutzt und bieten dabei den weitern Vortheil allseitigen Schutzes (s. § 12).

§ 12.

Umgebung.

Endlich werden wir auch der Umgebung unserer neuen Pflanzschule einige Rücksicht bei Auswahl des Platzes schenken. G. Heyer²⁾ warnt um der Mäuse willen vor der Nähe der Felder, um der Engerlinge willen vor jener von Eichenstockschlägen. Pflanzgärten in Mitte junger Schläge wird man um des massenhaft einfliegenden Unkrautsamens, wie um des fehlenden Seitenbeschutzes willen vermeiden. Letzterem aber möchten wir eine ganz besondere Bedeutung beilegen³⁾ — dem Schutz durch einen auf der Süd- und Westseite vorstehenden alten Bestand gegen die austrocknende Sonne, wie auf der Nord- und Ostseite durch, wenn

¹⁾ S. u. Pfl. S. 72.

²⁾ Allgem. J.-u. J.-Z. 1866. S. 207.

³⁾ Forstl. Mittb. XI. 119.

Fürst. Pflanzenzucht im Walde.

auch jüngere Bestände gegen kalte und austrocknende Windströmungen. Namentlich bei Holzarten, welche gegen Frost und Hitze empfindlicher sind — Tannen, Fichten — springt die Wirkung dieses Seitenschutzes oft in augenfälligster Weise hervor.

Um vollkommensten genießen diesen allseitigen Schutz Pflanzgärten inmitten von Beständen, auf Windbruch- oder eigens gerodeten Flächen, denen wir im vorigen § bereits das Wort geredet haben. Gayer¹⁾ will zwar Vorstände von hohem Holz auf der Nord- und Ostseite um der oft empfindlichen Folgen der Reflexion (des Brennens) willen entfernt wissen, doch haben wir solche Folgen weder früher in eigener Praxis, noch in neuerer Zeit bei Beobachtung zahlreicher, inmitten alter glattrindiger Buchenbestände des Spessarts gelegener Forstgärten wahrnehmen können. — Jüngere Bestände, Mittelhölzer, erfüllen übrigens den Schutz gegen austrocknende Winde in vollkommenster Weise, ohne die von Gayer (auch Nördlinger) erwähnte, also doch wohl vorkommene obige Gefährdung im Gefolg zu haben.

Selbstverständlich darf dieser Seitenschutz nicht in einen Seitendruck übergehen, der Schutzbestand darf nicht zu nahe an das Pflanzbeet heranrücken, seine Traufe darf nicht auf dasselbe fallen; namentlich bei Lichthölzern, Eichen, Föhren, macht sich zu starker Seitenschatten sofort bemerklich. Gegen das Stehenlassen einiger Stämme auf der Fläche selbst als eine Art Schutzbestand, wie man dies wohl da und dort namentlich in Tannen- und Buchenpflanzkämpfen sieht, möchten wir uns absolut aussprechen! Seitenschutz ist jeder Pflanze wohlthätiger, als direkte Ueberschirmung, durch welche zuviel Licht, sowie die schwächeren atmosphärischen Niederschläge abgehalten werden, und das freudige Gediehen obiger Schathölzer auf kleinen Blößen, ihr kümmerlicher Wuchs, ja ihr gänzliches Fehlen unter der Schirmfläche starker Bäume ist hiefür der deutlichste Beweis.²⁾

Solchem Fingerzeig der Natur dürfen wir ja bei Auswahl des Platzes nur folgen, unsere Pflanzbeete unter entsprechendem Seitenschutz anlegen, so werden wir die Vortheile des Schutzes ohne die Nachtheile der Ueberschirmung und der Traufe erlangen. — Dass solche im Pflanzbeet stehende Bäume die Bearbeitung und regelmäßige Eintheilung ebenfalls wesentlich erschweren und hindern, sei noch beigefügt als ein weiterer Grund gegen dieselben.

¹⁾ Waldbau. S. 416.

²⁾ Vergl. Fischbach, Lehrbuch der Forstw., S. 111, welcher für, und Burkhardt, Säen u. Pfl. S. 399.

Heyer, Waldbau, S. 179, welche gegen solchen Schutzbestand sich aussprechen.

Die unmittelbare Nähe von Wasser beim Pflanzgarten wird in den meisten Lehrbüchern als wünschenswerth oder selbst absolut nöthig bezeichnet — so will Gayer¹⁾ Forstgärten nur da angelegt haben, wo direkte Bewässerung möglich. Man wird hier aber wohl unterscheiden müssen zwischen kleineren (Nadelholz) Saat- und Pflanzkämpen und größeren Forstgärten. Erstere können des Wassers in der Nähe wohl entbehren, da man das Gießen der Saaten oder Pflanzen soviel als möglich vermeidet und die geringe Menge von Wasser, die man vielleicht zum Anschlämmen u. dgl. bedarf, doch überall beigeschafft werden kann. Für große Pflanzgärten dagegen, wo dieser Wasserbedarf ein bedeutender sein kann, das Gießen zur Erhaltung werthvoller Holzarten auch wohl eher Platz greift, ist die Nähe von Wasser allerdings sehr wünschenswerth, und man wird dann auch finden, daß solche größere Anlagen fließendes Wasser in der Nähe, außerdem Brunnen oder Cisternen haben.

Eine eigentliche Bewässerung der Gärten, wie sie G. Heyer und Bonhausen empfehlen (vergl. § 42 u. 58) gehört übrigens nach unseren Erfahrungen zu den Seltenheiten.

§ 13.

G e s t a l t.

Bei der Erwägung, welche Gestalt wir unserem Saatkamp oder Forstgarten geben wollen, wird zunächst die Nothwendigkeit oder Entbehrlichkeit einer soliden, also kostspieligen Einfriedigung eine wesentliche Rolle spielen.

Ist eine Einfriedigung entbehrlich, wie dies ja namentlich für Nadelholz nicht selten der Fall, so sind wir bezüglich der Gestalt, die wir unserer Anlage geben wollen, nicht gebunden, können uns ganz nach Terrain, Seitenschutz u. s. w. richten und wählen dann nicht selten die Form eines langgestreckten Rechtecks; so also namentlich in stärker geneigtem Terrain, in welchem dann die lange Seite des Rechtecks horizontal am Berge hin gelegt wird, oder längs einer Bestandswand, welche Seitenschutz gegen die Sonne geben soll. Ebenso wird man durch geringe Breite des Pflanzbeets im Innern der Bestände, auf Lücken, für empfindliche Holzarten — Tannen, Buchen — die wohlthätige Wirkung allseitigen Seitenschutzes am vollständigsten erreichen.

Ist aber eine solide Einfriedigung nöthig, so werden wir trachten müssen, dieselben mit möglichst geringen Kosten herzustellen, ihr eine im Verhältniß zur eingefriedigten Fläche möglichst geringe Länge zu geben.

¹⁾ Waldbau. S. 416.

Den kleinsten Umfang hat bei gleicher Fläche der Kreis, dann das regelmäßige Polygon, die aber beide sehr erklärlicher Weise unverwendbar für die Gestalt eines Pflanzgartens sind, und man wird für letztere daher die nächst günstige geometrische Figur — das Quadrat, nach diesem das Rechteck mit nicht zu großem Unterschied in der Länge der beiden zusammenstoßenden Seiten wählen. In diesem Fall ist die Differenz in der Länge des einzufriedigenden Umfanges gegenüber dem Quadrat eine geringe; so würde z. B. ein Hektar in Quadratform einen Umfang von 400 Meter, in Rechteckform mit Seiten von 125 und 80 m Länge einen solchen von 410 m haben. Ein solches Opfer kann man anderweitigen Vortheilen (Seitenschutz!) wohl bringen!

Unter allen Umständen aber stecke man die Figur genau rechtwinklig ab — selbst ein kleiner Fehler in dieser Beziehung macht sich in unangenehmer Weise bei der Eintheilung etc. bemerklich.

§ 14.

G r ö ß e.

Die Größe eines anzulegenden Saatkamps oder Forstgartens hängt von mancherlei Verhältnissen ab.

In erster Linie ist die Gesamtfläche der in einem Verwaltungsbezirk anzulegenden Pflanzschulen abhängig von Betriebsart und Verjüngungsmethode. Im Allgemeinen wird der Plänterwald weniger künstliche Nachhülfe erfordern, als der schlagweise Hochwaldbetrieb, ebenso der Mittel- und Niederwald; die natürliche Verjüngung bedarf zu den allerdings nie fehlenden Nachbesserungen geringere Pflanzemengen, als der Kahlschlagbetrieb mit nachfolgender Pflanzung, welch letztere, wie Eingangs schon berührt, jetzt fast allenthalben an Stelle der Saat getreten ist. Durch Betriebsart, Umtrebszeit, Verjüngungsweise im Zusammenhalt mit der Größe des Verwaltungsbezirkes wird die Größe der durchschnittlich alljährlich zu kultivirenden Fläche bestimmt werden.

In Weiterem wird auf die Gesamtgröße der Pflanzschulen eines Reviers von wesentlichem Einfluß sein das Alter und die Stärke der zu verwendenden Pflanzen, ob man 1-, 2-, 3jährige Saatschulpflanzen, ob man verschulte Pflanzen und in welchem Alter verwendet. Mit jedem Jahr, welches die Pflanzen länger in der Saat- oder Pflanzschule stehen, wächst die Fläche der letzteren um ein Beträchtliches (wenn auch nicht in direktem Verhältniß, da man kleinere Pflanzen stets in viel engerem Verband pflanzt, als stärkere), und starke Heister, die etwa alljährlich in gewisser Zahl zur Verfügung stehen sollen, erfordern verhältnismäßig sehr große Pflanzschulen.

Auch der Umstand, ob die im Frühjahr von Pflanzen geräumte Fläche sofort wieder benutzt wird oder bis zum nächsten Frühjahr liegen bleibt, wie dies Schmitt¹⁾ sehr befürwortet, ist von nicht unwesentlichem Einfluß auf die Größe der Fläche der Forstgärten.

Verhältnisse besonderer Art: Auflösung von erworbenen Debländereien, von Windbruchflächen u. dgl. machen eine zeitweise Vergrößerung der Pflanzschulen über das gewöhnliche Maß nötig. — Ebenso ist der Umstand, ob man auch Pflanzen zum Verkauf erziehen will und soll, ob zu letzterem entsprechende Gelegenheit gegeben ist, von Einfluß.

Erfahrungszahlen endlich über die auf einer Flächeneinheit zu erziehende Pflanzenmenge, je nach Holzart, Alter, Erziehungsweise wesentlich verschieden, bestimmen unter Berücksichtigung des stets auch stattfindenden Abgangs an unbrauchbarem Material im Zusammenhange mit obigen Verhältnissen und Erwägungen die Größe der zur Pflanzenzucht nötigen Gesamtfläche.

Bezüglich der Größe der einzelnen Pflanzschulen eines Reviers werden jene Erwägungen maßgebend sein, die wir gelegentlich der Frage: ständige oder wandernde Pflanzkämpe (§ 6), erörtert haben; die ersten pflegen stets größer zu sein, als letztere.

Nicht aus dem Auge dürfte aber zu verlieren sein, daß der für die Pflanzen so wohlthätige Seitenschutz mit zunehmender Größe der Pflanzschule abnimmt, ja theilweise ganz verloren geht.

2. Kapitel.

Bearbeitung des Bodens.

§ 15.

Allgemeine Grörterungen.

Hat man einen zur Pflanzschule tauglichen Platz ausgewählt und nach Bestimmung von Größe und Gestalt abgesteckt, so ist die nächste Aufgabe die zweckentsprechende Zurichtung des Bodens. In welcher Weise ist der etwa vorhandene Bodenüberzug zu beseitigen, wie am besten zu verwenden? Wie tief soll der Boden bearbeitet werden, in welcher Weise und zu welcher Zeit soll diese Bearbeitung stattfinden, wie ist die Oberfläche des Pflanzbeets zu gestalten, welche Rücksichten sind etwa auf die gleichzeitige Verbesserung des Bodens zu nehmen? —

¹⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 29, 118.

diese Fragen werden dabei an uns herantreten und nach den örtlichen Verhältnissen, der anzuziehenden Holzart in verschiedener Weise zu beantworten sein.

§ 16.

Entfernung des Bodenüberzuges.

Nach dem, was wir in § 11 über die Auswahl des Platzes gesagt haben, werden wir es bei unserer Pflanzschulfläche zu thun haben mit einer Bodendecke von Laub, Nadeln oder Moos, wenn es sich um eine zu rohende bestockte Fläche handelt, oder etwa mit einem Rasenüberzug bei Auswahl einer Dödfläche, nur ausnahmsweise aber mit einem Überzug von Heidelbeer- oder Heidekraut. Jeder Überzug aber muß, da er der späteren Bearbeitung des Bodens und Zurichtung der Beete hindernd in den Weg tritt, beseitigt werden.

Wird ein Stück eines Bestandes für die neue Anlage gerodet, so läßt man die vorhandene Laub-, Nadel- oder Moosdecke zusammenrechnen und setzt dieselbe nicht selten, eventuell mit Kalk zum Zweck rascherer Zersetzung, zu sog. Komposthaufen an. Erst dann erfolgt die Entfernung des Bestandes unter möglichst gründlicher Rodung sämtlicher Stöcke und Wurzeln, welche außerdem bei der späteren Bearbeitung des Bodens hinderlich werden. Bei der Rodung ist übrigens das Obenaufbringen des rohen Bodens zu vermeiden, beziehungsweise derselbe sofort wieder zum Ausfüllen der Stocklöcher zu benutzen.

Eine Rasendecke wird flach abgeschält und entweder nach vorherigem Trocknen der Plaggen zu Rasenäschre verbrannt oder zum Zweck der Verwertung, der Gewinnung sog. Rasenerde in Haufen gesetzt (s. § 24); wo, wie später beschrieben, der Boden rajolt wird, da bringt man wohl auch den Rasen auf die Sohle der Rajolgräben in der Absicht, durch seine Verwertung den Boden zu düngen.

Stärkere Bodenüberzüge von Heidelbeer- oder Heidekraut werden mit ihrem ganzen Wurzelsfilz abgeschält und ebenfalls, etwa in Verbindung mit Rasenplaggen, zu Äsche zum Zweck der Düngung verbrannt.

§ 17.

Tiefe der Bodenbearbeitung.

Von nicht geringer Wichtigkeit ist die richtige Beantwortung der Frage, wie tief der Boden zu bearbeiten sei. Jede über das Maß der Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit hinausgehende Tiefe der Bearbeitung ist eine unter Umständen nicht unbedeutende Geldverschwendug, während anderseits eine zu seichte Bodenbearbeitung sich durch minder günstige

Wurzelbildung und Pflanzenentwicklung, durch leichteres Austrocknen des Bodens und Ausfrieren der Pflanzen rächen kann.

Absolute Zahlen über die nothwendige Tiefe der Bodenbearbeitung lassen sich unserer Ansicht nach nicht geben; die Beschaffenheit des Bodens, des Untergrundes, vor Allem auch die anzuziehende Holzart, die Stärke, welche die Pflanzen erreichen sollen, sprechen ein gewichtiges Wort mit. Wie weit die Ansichten über die nothwendige Bodentiefe auseinandergehen, mögen die Angaben G. Heyers und Fischbachs beweisen, von denen ersterer¹⁾ ganz allgemein für ständige Forstgärten eine 75—100 Centimeter tiefe Bodenlockerung durch Räjolung verlangt, während der letztere²⁾ sich für Saat Schulen mit einer 10—20, für Pflanzschulen mit einer 15—30 cm tiefen Bodenbearbeitung (nur für Kiefern verlangt er größere Tiefe) begnügt. Das Richtige dürfte für die weitaus meisten Fälle in der Mitte liegen, eine Bodenbearbeitung, wie sie Heyer fordert, viel zu kostspielig und auch für die stärksten Eichenheister überflüssig sein, dagegen die von Fischbach angegebene untere Grenze von nur 10 resp. 15 cm sich doch in den meisten Fällen als zu gering erweisen und mancherlei Nachtheile nach sich ziehen. Eine einigermaßen tiefe, durchschnittlich etwa 25—30 cm betragende Bodenlockerung gewährt den Vortheil, daß Regen- und Schneewasser leichter und tiefer in den Boden einsinken; dadurch wird einerseits dem oft so nachtheiligen Auffrieren des Bodens einigermaßen vorgebeugt, da dieses bei größerem Feuchtigkeitsgehalt der oberen Bodenschichten auftritt, wie anderseits dem allzu raschen Austrocknen im Sommer. Das tiefer eingedrungene Wasser verdunstet langsamer, steigt aber beim Austrocknen der oberen Schichten wieder in die Höhe und kommt so den Pflanzen zu gut.³⁾ — Schwerer Boden wird eine tiefere Lockerung wünschenswerth machen, als an sich leichter und lockerer; ebenso ist bei festerem Untergrund flachgründigen Bodens eine entsprechende Lockerung des erstern aus obigen Gründen wünschenswerth und bietet den weiteren Vortheil, daß die Verwitterung desselben befördert, also Nährstoffe aufgeschlossen werden, die bei wiederholter Benutzung der Fläche durch Mischung mit den oberen Schichten den Boden kräftigen.

Es leuchtet ferner ein, daß die Tiefe der Bodenbearbeitung durch das Pflanzmaterial, welches man erziehen will, bis zu gewissem Grade bedingt ist: für die flachwurzelnde Fichte wird eine geringere Bodentiefe

¹⁾ Allg. F.- u. S.-B. 1866. S. 208.

²⁾ Lehrb. der Forstwissenschaft. S. 111, 116.

³⁾ Forstl. Mittb. XI. 121.

genügen, als für Eiche und Föhre, und ein Heisterkamp wird stets tiefere Bodenbearbeitung bedingen, als ein Saatbeet für Nadelholzpflanzen irgend welcher Art. — Ebenso aber, wie die Wurzelbildung der anzuziehenden Pflanzen von Einfluß auf die nöthige Tiefe der Bodenlockerung, so wird anderseits durch letztere auch wieder die Bildung der Wurzeln mehr oder weniger beeinflußt. In tiefer Bodenlockerung, bei der etwa noch der bessere Boden oder Düngemittel in die unteren Schichten gebracht wurden, hat man ein Mittel gefunden, Pflanzen mit sehr tiefgehender Bewurzelung — einjährige Föhren zur Be pflanzung trockner Sandböden — zu erziehen; auch bei Eichen macht sich zu tiefe Bodenbearbeitung namentlich auf geringerem Boden durch eine zu lange Pfahlwurzel in lästiger Weise fühlbar.¹⁾ In minder tiefer Bodenlockerung wird man daher auch ein Mittel haben, dieser bei der Be pflanzung oft geradezu hinderlichen, allzu tief gehenden Wurzelbildung entgegen zu wirken, und durch gründliche Lockerung der oberen Bodenschichten in Verbindung mit guter D ü n g u n g derselben ein minder tiefgehendes, aber nm so reicher verzweigtes Saug- und Seitenwurzel-System hervorrufen.²⁾

Die Besprechung der einzelnen Holzarten im zweiten Theile dieses Werckhens wird uns auf diese Frage wiederholt zurückführen.

§ 18.

Zeit der Bodenbearbeitung.

Jede zu einer neuen Pflanzschule bestimmte Fläche pflegt man zweckmäßiger Weise einer wiederholten Bearbeitung zu unterziehen, und ganz besonders nothwendig erscheint dies, wenn man es mit etwas bindenderem Boden zu thun hat.

Die erstmalige gröbere Bearbeitung wird im Sommer oder Herbst durch rauhes Umhacken, bisweilen auch durch Pflügen (§. § 19), vorgenommen und hiemit zwar die in § 20 näher besprochene Arbeit des Planirens oder Terrassiren verbunden, die Oberfläche dagegen absichtlich grob schollig belassen, damit dieselbe während des Winters den atmosphärischen Einflüssen und insbesondere den Einwirkungen des Frostes möglichst ausgesetzt sei. Durch letzteren wird der Boden so mürbe, daß er im Frühjahr mit Leichtigkeit zerfällt, weshalb, wie oben berüht, bei bindendem Boden diese Bodenbearbeitung vor Winter von besonderer Bedeutung ist; außerdem aber vermag die Winterfeuchtigkeit in den gelockerten Boden viel reichlicher und tiefer einzudringen, als in den ungelockerten.

¹⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. §. 73.

²⁾ Seckendorff, forstl. Versuchsw. II. Bd. §. 345.

Ist der Boden stark verunkrautet, so soll die erste Bearbeitung schon im Vor Sommer geschehen, damit das untergearbeitete Unkraut verwes — im Winter findet bei der geringen Temperatur eine Verwesung nicht statt und das Unkraut kommt bei der zweiten Bearbeitung im Frühjahr in demselben Zustand wieder heraus, in welchem es untergebracht wurde.¹⁾

Die zweite, feinere, gartenmäßige Bearbeitung (mit dem Spaten) findet im Frühjahr statt und soll womöglich der Benutzung einige Zeit vorausgehen, damit der Boden sich wieder hinreichend sezen kann, da stärkeres Sezen desselben nach der Saat oder Verschulung manchen Mißstand nach sich zieht.

Wird eine Fläche wiederholt benutzt, so ist es zwar ebenfalls wünschenswerth, wenn auch minder nothwendig, daß dieselbe gleichfalls schon im Herbst grob umgehakt werde, was aber durch die auf derselben stehenden und erst im Frühjahr zur Verwendung kommenden Pflanzen häufig unmöglich gemacht wird, so daß man sich mit einer einmaligen Bearbeitung im Frühjahr begnügen muß. Die von Schmitt²⁾ empfohlene einjährige Brache solcher Flächen ermöglicht deren doppelte Bearbeitung, im Herbst und im Frühjahr.

§ 19.

Art und Weise der Bodenbearbeitung.

Die doppelte Bearbeitung des Bodens pflegt in verschiedener Weise zu geschehen.

Die erstmalige Bearbeitung im Sommer oder Herbst kann durch Pflügen, Umhacken oder eigentliches Rajolen (Rölen) stattfinden und wird man jene Methode wählen, bei welcher der Zweck hinreichend tiefer Lockerung und gleichzeitiger möglichster Säuberung des Bodens von Steinen, Wurzeln, Unkraut mit den geringsten Kosten erreicht werden kann.

Am billigsten wird bei völlig ebenem und einer Planirung nicht bedürftigem, von Wurzeln und Steinen freiem Boden das Pflügen kommen, jedoch vorzugsweise nur bei Verwendung von bisherigem Weide-land nach vorherigem Abschälen der Grasnarbe, von Ackerland oder dem steinsfreien Sandboden der Ebene Anwendung finden können. Auch setzt das Pflügen eine nicht zu geringe Größe der betreffenden Fläche voraus.

Vielf häufiger wird das Umhacken des ausgewählten und von seinem etwaigen Ueberzug befreiten Platzes mit der Rodehacke stattfinden, wobei

¹⁾ Allg. F. u. J.-Z. 1880. S. 41.

²⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 26.

alle Steine und Wurzeln sorgfältig entfernt werden. Ein eigentliches Wenden des Bodens in der Weise, daß hiebei die bisherige obere Bodenschicht in die Tiefe käme, findet hiebei nicht statt, wäre bei guter oberer Bodenschicht sogar ein Fehler, wohl aber erfolgt ein meist vortheilhaftes Mengen der oberen und untern Bodenschichten. Die Tiefe, bis zu welcher der Boden auf solche Weise gut bearbeitet werden kann, beträgt 30 bis höchstens 40 cm; soll der Boden in besonderen Fällen noch tiefer gelockert werden oder will man ein völliges Stürzen desselben vornehmen, so muß man zu dem eigentlichen Räjolen greifen.

Diese sehr gründliche, aber auch theuerste Bodenbearbeitung erfolgt nun in der Weise¹⁾), daß man längs einer Seite des umzuarbeitenden Platzes einen Graben von vielleicht 30 cm Tiefe zieht, die Erde bei Seite wirft und nun die Grabensohle entsprechend tief lockert; auf dieselbe wird nun das Erdreich aus dem nächsten, neben dem ersten zu ziehenden Graben geworfen, sodann dessen Sohle gelockert und so fortgeschritten. Ist der Boden in den verschiedenen Schichten von durchaus gleicher Güte oder gar die untere Bodenschicht die bessere (Sandboden), so stürzt man auch wohl den Boden vollständig, indem man den ersten Graben gleich in der vollen Tiefe, in welcher der Boden gelockert werden soll — 40 bis 50 cm — aushebt, in denselben die Erde des nächsten Grabens wirft und so bis zum Ende fortfährt. — Will man den etwa aus Räsen bestehenden Bodenüberzug nicht zu Asche brennen, so wird er tief untergegraben; er verwest und wirkt hiedurch düngend.

Zur Erziehung lang bewurzelter Föhrenjährlinge hat man bei tiefer Bodenlockerung wohl auch den guten oberen Boden absichtlich in die Tiefe gebracht, um hiedurch gleichsam die Wurzeln in die Tiefe zu locken, lang bewurzelte Pflanzen zu erziehen. Solche Jährlinge mit langen fadenförmigen Wurzeln haben sich aber nicht sonderlich bewährt, sind auch schwer ohne Krümmung der Wurzeln zu verpflanzen;²⁾ in dem magern Oberboden aber kümmert nicht selten der Keimling und erwächst dann nie zur kräftigen Pflanze.³⁾

Eine billige Bearbeitung des Bodens dadurch erzielen zu wollen, daß man die betr. Fläche ein oder zwei Jahre lang zur landwirtschaftlichen Benutzung, namentlich zum Hackfrüchtebau, abgibt, ist um der Schwächung der Bodenkraft willen wohl stets zu widerrathen.⁴⁾

¹⁾ E. Heyer in d. Allg. F.- u. J.-B. 1866. S. 208.
Forstl. Mitth. XI. 121.

²⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 293.

³⁾ Krit. Blätter. L. a. S. 121.

⁴⁾ Allg. F.- u. J.-B. 1872. S. 228.

Bei größeren Flächen steckt man zweckmäßig die dann nöthigen breiteren Hauptwege vor der erstmaligen Bearbeitung des Bodens ab und schließt sie von derselben aus, indem man lediglich die obere Bodenschicht in der den Wegen zu gebenden Tiefe abhebt und zur Planirung des übrigen Terrains verwendet.

Die zweite Bodenbearbeitung im Frühjahr erfolgt mit dem Spaten in gartenmäßiger Weise unter nochmaliger Reinigung von Steinen, Wurzeln, Unkraut &c. und Zerkleinern aller größern Erdschollen, wobei ein 20—25 cm tiefes Umstechen in der Regel vollständig genügen wird.

Hand in Hand mit der ersten, häufiger mit der zweiten Bearbeitung des Bodens pflegt die Verbesserung der chemischen und physikalischen Eigenschaften des Bodens durch Beimengung von düngenden Stoffen oder von solchen zu geschehen, welche lockern oder bindend wirken sollen. Das Kapitel über die Düngung und insbesondere der von der Ausführung der Düngung handelnde § 28 enthalten hierüber das Nähere.

§ 20.

Planiren und Terrassiren.

Gleichzeitig mit der erstmaligen Bearbeitung des Bodens geschieht das Einebnen der Fläche, das Planiren und, wo nöthig, das Terrassiren.

Bei ebenen oder sanft geneigten Flächen sucht man die Oberfläche des Kamps möglichst in eine, horizontale oder gleichmäßig geneigte Ebene zu legen, vorhandene Vertiefungen oder Erhöhungen also zu beseitigen. Dadurch, daß man beim Umlacken stets von den tiefer gelegenen Punkten ausgehend die Erde auf diese zuzieht, wird schon viel geschehen können; bei größeren Erhebungen und Vertiefungen wird aber ein umständlicheres Abgraben und Auffüllen nicht zu vermeiden sein. Dabei hüte man sich aber, rohen Boden obenauf zu bringen, sondern räume erst die gute Erde bei Seite, grabe soweit nöthig ab und benütze den abgegrabenen rohen Boden nur zum Ausfüllen größerer Vertiefungen; dann aber bringe man da wie dort gute Erde obenauf, wie solche namentlich auch bei dem Ausheben der breitern Wege, oft in ziemlicher Menge, gewonnen werden kann. — Nicht selten sieht man diese Vorsicht versäumt und die Folgen treten in der Entwicklung der Pflanzen (bei Fichten auch sehr prägnant in der gelblichen Färbung der Nadeln) zu Tage; auf den abgehobenen Stellen, wo nun roher Boden obenauf liegt, kümmern die Pflanzen, in den mit gutem Boden ausgefüllten Vertiefungen nebenan zeigen sie vorzügliche Entwicklung! —

An steileren Gehängen, zu deren Benützung man im Berglande wohl hier und da genöthigt ist, wird zur Vermeidung des Abschwemmens eine terrassenartige Bearbeitung und Zurichtung des Terrains nöthig. Die einzelnen Beete werden staffelförmig horizontal gelegt, selbst mit leichter Neigung gegen die an der Bergseite gelegenen schmalen Zwischenwege zu, nach welchen dann das Regenwasser absießt, um dort in den Boden einzusinken. — Auch bei dem Terrassiren hat man sich, namentlich in stärker geneigtem Terrain, vor dem Obenaufbringen des rohen Untergrundes bei starkem Abgraben zu hüten.

Nach Burkhardt¹⁾ lässt man bei solch stärkerer Neigung des Gehänges, die allerdings thunlichst zu vermeiden ist, zweckmäßig die bearbeiteten Streifen mit unbearbeiten wechseln, auf welch letztere Steine, Wurzeln, später das ausgejätete Unkraut geworfen werden; diese unbearbeiteten Streifen mit ihrer Decke bieten guten Schutz gegen das Abschwemmen.

3. Kapitel.

Verbesserung des Bodens, Düngung.

§ 21.

Allgemeine Erörterungen.

Trotz aller Sorgfalt, mit welcher wir den Platz für unsern Saatkampf, unsern Forstgarten auswählen, hat der Boden daselbst nicht immer alle jene physikalischen und chemischen Eigenschaften, welche zur gedeihlichen Pflanzenerziehung nothwendig sind, oder er hat sie wenigstens nicht in dem wünschenswerthen Maße. Es können die Verhältnisse eines Waldes so gestaltet sein, daß eine Dertlichkeit, deren Boden allen Anforderungen entspricht, nicht zu fest oder nicht zu locker ist, überhaupt nicht zur Verfügung steht, oder es können die Vorzüge der Lage, deren Wichtigkeit wir oben ja besonders hervorgehoben haben, so bedeutende sein, daß wir über den einen oder andern Mangel in der Qualität des Bodens wegsehen. Es wird ferner ein ursprünglich nahrungsreicher Boden durch die auf ihm erzogenen Pflanzen seiner löslichen Nährstoffe nach und nach beraubt und dadurch zur Erziehung gesunder, kräftiger Pflanzen untauglich werden, wenn wir ihm nicht zu Hülfe kommen.

Eine solche Hülfe geben wir nun dem von Haus aus nicht nährungskräftigen oder dem seiner Nährstoffe beraubten Boden durch eine ent-

¹⁾ Säen u. Pflz. S. 357.

sprechende Düngung, durch Beimischung von Stoffen, welche die nöthigen Pflanzennährmittel in löslicher Form enthalten. Wir geben aber unter Umständen dem Boden auch Stoffe bei, welche vorwiegend nur dessen physikalische Eigenschaften verbessern sollen — so z. B. dem bindenden Boden Sand — und sprechen dann nur von einer Melioration des Bodens. In vielen Fällen wirken aber die zweckmäßig gewählten Stoffe, die wir dem Boden beimengen, in beiden Richtungen, düngend und verbessern, so z. B. die Beigabe guter Walderde auf zu lockerem oder zu bindendem Boden.

In den folgenden Paragraphen werden wir nun von der Melioration und Düngung unserer Saatbeete und Forstgärten eingehender zu reden und namentlich jene Stoffe zu besprechen haben, welche zu der viel häufiger vorkommenden eigentlichen Düngung Anwendung finden. Die richtige Wahl derselben, die anzuwendende Menge, die entsprechende Zeit, die Art und Weise der Ausführung sind weitere Gegenstände der Betrachtung in diesem für die Praxis wichtigen, nicht selten vielleicht zu wenig beachteten Kapitel.

§ 22.

Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Bodens — Melioration.

Wir haben in § 9 die Anforderungen, welche wir an die physikalischen Eigenschaften eines Bodens, an Bindigkeit, Tiefgründigkeit und Feuchtigkeitsgrad stellen, eingehend besprochen und betont, daß denselben bei Auswahl des Platzes größere Wichtigkeit beizulegen sei, als dem momentanen Gehalt des Bodens an Pflanzennährstoffen, aus dem einfachen Grunde, weil einem Mangel an letzteren viel leichter abzuhelfen ist, als ungünstiger physikalischer Beschaffenheit.

Mangelnder Tiefgründigkeit wird sich überhaupt nicht abhelfen lassen, da das Aufführen von Boden sich stets zu kostspielig erweisen wird; übrigens wird dies der vielleicht seltenste Mangel sein, an dem unsere Saatgärten leiden.

Ueberflüssiger Feuchtigkeit wird man durch Gräben, eventuell selbst durch Drainage abhelfen, feuchte Bläze aber um des Unkrautes und der Frostgefahr willen an sich vermeiden. Zu große Trockenheit des Bodens hängt in der Regel mit zu großer Dönerheit zusammen und wird dann beiden Nebeln gleichzeitig abgeholfen; ist sie freilich durch die Lage (zu starke Einwirkung der Sonne) bedingt, so läßt sich kaum abhelfen.

Der Bindigkeitsgrad pflegt es unter den physikalischen Eigenschaften des Bodens am öftesten zu sein, der uns bei sonst günstigen Verhältnissen der Lage und des Bodens unseres neu anzulegenden Pflanz-

gartens am wenigsten entspricht, sei es, daß der Boden zu schwer, zu bindig und in Folge dessen zur Krustenbildung, zum Auffrieren im Frühjahr, zum Aufreißen im Sommer geneigt ist, sich schwerer lockern und reinigen läßt, sei es, daß er zu leichter Sandboden ist und in Folge dessen zu rasch austrocknet.

Im ersten Falle, bei zu großer Bindigkeit, wenden wir zunächst mechanische Hülsmittel an: wiederholte Bearbeitung und Lockerung, dann aber das so wirksame Auffrieren des im Herbst grobschollig umgearbeiteten Bodens (§. § 18). Die wohl auch als Lockerungsmittel empfohlene Ueberlassung des Bodens zum ein- oder zweijährigen Bau von Hackfrüchten haben wir schon oben (§ 19) als minder zweckmäßig und nicht empfehlenswerth bezeichnet.

Wollen und können wir aber zur Beimengung lockerner Stoffe greifen, so wählen wir hiezu Sand, der natürlich nur lockend wirkt, während Humus oder mit vielen humosen Stoffen gemengte Walderde zugleich auch düngende Wirkung hat, und ihm ähnlich wirken Rasenrasche, Kompost, leichter Torf.

Ist dagegen der Boden zu locker, ein Fall, der in den ausgedehnten Kiefernrevieren sandiger Ebenen nicht selten vorkommt, so wirkt abermals der Humus, gute Walderde günstig auf die Bindigkeit und damit auch auf die Fähigkeit des Bodens, die Feuchtigkeit länger zu halten, ein; auch Stalldünger, Mergel, Rasenerde wirken in ähnlicher Weise, sämmtliche Substanzen aber zugleich düngend, was bei solch lockerem Sandboden sich übrigens ohnehin nötig erweisen wird.

Es geht sonach die Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Bodens in vielen Fällen mit einer eigentlichen Düngung Hand in Hand; eine ausschließliche Melioration durch Beiführen anderer Stoffe, also z. B. von Sand, sucht man um der Kostspieligkeit willen stets zu vermeiden.

§ 23.

Verbesserung der chemischen Eigenschaften des Bodens — eigentliche Düngung.

Darüber, daß eine Düngung der wiederholst benutzten Saatbeete, der ständigen Forstgärten, stattfinden müsse, wenn beide ihren Zweck: die Lieferung kräftiger Pflanzen — erfüllen sollen, besteht gegenwärtig wohl nirgends mehr ein Zweifel. Dem einfachsten Praktiker sagen dies die kümmernden Pflanzen in seinem ausgebauten Saatbett, und schon ehe uns die Wissenschaft zu Hilfe kam und uns nähere Belehrung über den Grund dieser Erscheinung und die anzuwendenden Gegenmittel

gab, hatte der Praktiker durch Düngung dem Nebel abzuholzen gesucht und bei Wahl der richtigen Mittel auch abgeholfen.

Insbesondere sind es die ständigen Forstgärten, welche ohne entsprechende Düngung nicht bestehen können; aber auch Wanderkämpe bedürfen auf armem Boden selbst gleich vor der ersten Benutzung eine Düngung, sollen kräftige Pflanzen erzogen werden.

Die Frage nun, mit welchen Stoffen eine Düngung am erfolgreichsten und billigsten vorgenommen werde, lag nahe und Wissenschaft wie Praxis haben sich eingehend mit derselben beschäftigt.¹⁾ Eine ausführlichere Behandlung dieses wichtigen Themas dürfte daher auch hier am Platz sein.

Zunächst galt es wohl zu ermitteln, welche Nährstoffe und in welchen Mengen dem Boden durch die Pflanzen entzogen werden; die Beantwortung dieser Frage mußte ja maßgebend sein für die Wahl der anzuwendenden Dungstoffe. Die Agrikulturchemie, die ihre Kräfte in erster Linie der Landwirthschaft zugewendet hatte, nahm sich allmählich auch mehr und mehr der Forstwirthschaft an und die für letzteren wichtigen Untersuchungen wurden vorwiegend von den an den Forstakademien thätigen Chemikern vorgenommen; ihnen verdanken wir denn auch in erster Linie die Antwort auf obige Fragen.

Diese geht nun auf Grund vorgenommener Aschenanalysen dahin, daß es vorzugsweise Kalk, Kali, Magnesia, Phosphorsäure, Schwefelsäure und Natron sind, welche durch die Pflanzen dem Boden entzogen werden, Stoffe also, welche — wenn wir etwa vom Kalk auf stark kalkhaltigen Bodenarten abssehen — sich im Boden stets nur in geringerer Menge vorzufinden pflegen, deren Verbrauch sich daher bei fortgesetztem Entzug rasch erschöpfen muß. Diese Erschöpfung wird um so früher eintreten müssen, je geringere Tiefe die von den Wurzeln durchzogene Erdschicht hat, je weniger von obigen Stoffen, je weniger mineralische Kraft der Boden überhaupt besitzt; sie wird später erfolgen, wenn durch Mischung der unteren, mineralisch noch kräftigen Bodenschichten mit den oberen bereits ausgesogenen den Wurzeln neue Nahrung zugeführt werden kann.

Auch über die Quantität jener Stoffe, welche durch Holzarten verschiedener Art, verschiedenen Alters dem Boden entzogen werden, haben uns die Untersuchungen unserer Chemiker Aufschluß gegeben. Allerdings zeigen die Resultate der desfallsigen Analysen und Berechnungen nicht

¹⁾ Vergl. hierüber neben Anderem

Zeitschr. f. J.- u. J.-W. II. 323. IV. 37.

Monatsschr. f. d. J.-W. 1874. S. 289.

Allg. J. u. J.-B. 1872. S. 228.

unwesentliche Abweichungen, die Dulk¹⁾) dadurch erklärt, daß eben der Aschengehalt der Pflanzen in ziemlich weiten Grenzen abhängig ist von der Zusammensetzung des Bodens, und daß es den Anschein habe, als ob die Pflanzen bei dem Mangel eines Nährstoffes im Boden genötigt seien, um so größere Mengen eines andern, in reicherem Maße vorhandenen aufzunehmen.

Wir müssen darauf verzichten, die Resultate jener Untersuchungen hier eingehender mitzutheilen — die Konstatirung der Thatsachen und der Hinweis auf jene Literatur mögen hier genügen. Um jedoch wenigstens einigen Anhalt über die durch Pflanzenzucht dem Boden entzogenen Nährstoffe unsern Lesern zu geben, mögen nachstehende Zahlen und Untersuchungen von Dulk und Schüze hier Aufnahme finden.

Nach Dulk²⁾ werden dem Boden jährlich pro ha entzogen

durch 1 jähr. Kiefern 1 jähr. Fichten 4j. verschulte Fichten

an Phosphorsäure	11,1	8,0	8,9 Kilogr.
Kalk	19,5	33,5	17,0 "
Magnesia	3,4	2,1	3,0 "
Kali	23,5	15,6	10,6 "

Ein Blick auf diese Zahlen, insbesondere auf die bedeutenden Mengen von Kali und Phosphorsäure, welche dem Boden entzogen werden, belehrt uns jedenfalls über die Nothwendigkeit kräftiger Düngung der wiederholt benutzten Pflanzbeete!

Außer diesen Mineralstoffen wird dem Boden jedoch auch Stickstoff entzogen, und zwar in ziemlicher Menge; Schüze³⁾ hat dieselbe auf den bedeutenden Betrag von 24 Kilogr. pro ha und Jahr durch 1jährige Föhren bestimmt, wobei er allerdings darauf hinweist, daß alle atmosphärischen Niederschläge Stickstoffverbindungen (Salpetersäure und Ammoniak) enthalten, wodurch wenigstens theilweise Ersatz geboten wird.

§ 24.

Hülfsmittel zur Düngung.

Nachdem der vorige Abschnitt uns über die Nothwendigkeit der Düngung, wie über jene Stoffe, welche dem Boden durch die Holzpflanzen vorzugsweise entzogen werden, belehrt hat, haben wir nun zunächst jene Stoffe kennen zu lernen, welche im Forsthaushalt überhaupt als Düngemittel angewendet werden können und bisher angewandt wurden. Wir

¹⁾ Monatsschr. f. d. F.- u. J.-W. 1874. S. 289.

²⁾ Monatsschr. f. d. F.- u. J.-W. 1874. S. 289.

³⁾ Zeitschr. f. d. F.- u. J.-W. IV. S. 38.

folgen bei deren Aufzählung wohl am besten Dankelmanns¹⁾ klarer und übersichtlicher Eintheilung und Erörterung; derselbe unterscheidet

- a) Thierischen Dünger,
- b) Pflanzen-Dünger,
- c) Mineral-Dünger,
- d) Menge-Dünger.

Außerdem aber kann man die Düngemittel noch unterscheiden als vollständige, welche alle den Pflanzen nöthigen Stoffe, einschließlich des Stickstoffes, enthalten, und unvollständige, welche nur einen oder einige dieser Stoffe dem Boden geben; zu welcher dieser beiden Arten die nachbenannten Düngemittel gehören, gibt die Zusammensetzung eines jeden leicht zu erkennen.

a) Thierischer Dünger.

Zu demselben gehören Stalldünger, Abtrittsdünger, Fauche, Knochenmehl und Guano.

Stalldünger wirkt einigermaßen verschieden nach der Thierart, von welcher er stammt. Am besten wirkt der Dünger des Rindvieches, insbesondere auf leichterem Boden, dessen physikalische Eigenschaften durch guten verrotteten Stalldünger zugleich eine Besserung erfahren. Rindviehdünger empfiehlt insbesondere auch Schmitt²⁾ auf Grund langjähriger Erfahrungen und hält diese Düngung mit Rücksicht auf ihre Nachhaltigkeit und Wirksamkeit in allen Fällen, wo der Transport nicht besondere Schwierigkeiten bereitet, für die beste und relativ billigste. — Roßdünger ist bekanntlich ein hitziger Dünger, zerlegt sich rasch und wird besonders für schwere und kalte Böden empfohlen; ihm ähnlich verhält sich der Schafmist, während Schweinemist stickstoffarm und geringwertig ist. — Rindviehdünger gehört insbesondere auch durch seinen Stickstoffgehalt zu den vollständigsten Düngemitteln.

Auch die Pferchedüngung gehört hierher, die sich nicht selten auf billige Weise wird beschaffen lassen und namentlich durch den Harn der Schafe günstig wirkt; doch muß der Pferch mehrere Nächte auf derselben Stelle bleiben, wenn die Wirkung eine genügende sein soll. Nach dem Pferchen soll, um den Verlust des Ammoniak zu vermeiden, der Boden sofort gepflügt oder leicht umgehackt werden, und überstreuen mit Gyps nach erfolgtem Unterbringen ist ebenfalls von Vortheil als ein Mittel zur Bindung des Ammoniaks.³⁾

¹⁾ Zeitschr. f. d. J.- u. J.-W. II. S. 323.

²⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 45.

³⁾ Allg. J.- u. J.-B. 1880. S. 43.

Abtrittdünger, dessen Verwendung vorzugsweise nur in der Nähe größerer Ortschaften in Frage kommen wird, hat bis jetzt wohl wenig Verwendung in Forstgärten gefunden. In fester Form (als Budrette) mit Kompost gemischt verwandte ihn v. Manteuffel mit gutem Erfolg in seinen Pflanzgärten; die Anwendung flüssiger Fäkalstoffe in einer sehr ausgebauten Pflanzschule nächst Stuttgart zeigte für alle Holzarten — Eschen, Eichen, Akazien, Tannen, Fichten — sehr guten Erfolg, nur Lärchen gingen zu Grund.¹⁾

Auch die Fauche ist hierher zu rechnen und dadurch, daß sie die Nährstoffe in löslichster Form erhält, ein rasch wirkendes Düngemittel,²⁾ das aber bis jetzt wohl auch nur ausnahmsweise Verwendung gefunden hat. Das Uebergießen von Komposthaufen, die oben zur Aufnahme der Fauche vertieft sind, trägt jedenfalls zur Erhöhung der Wirksamkeit des Kompostes wesentlich bei und ist vielleicht die zweckmäßigste Art ihrer Anwendung.³⁾

Knochenmehl, durch Dämpfung von thierischem Fett befreit, besteht vorwiegend aus phosphorsaurem Kalk und ist daher ein unvollständiges Düngemittel, wirksam und angezeigt für einen an Phosphorsäure (und Kalk) armen Boden. In der Landwirtschaft vielfach angewendet, ist dasselbe allenthalben leicht beziehbar. — Am besten wirkt dasselbe in Verbindung mit andern Düngemitteln: Kompost, Rasenerde u. dgl., durch welche die dem Knochenmehl fehlenden Nährstoffe dem Boden zugeführt werden — also in Mengedüngern.

Guano ist ein sehr konzentriertes und darum mit Vorsicht anzuwendendes Düngemittel, dabei kostspielig und in seiner Wirkung nach Nördlingers Versuchen⁴⁾ sehr wechselnd. Seine Zusammensetzung ist nach den mannigfachen im Handel vorkommenden Arten verschieden, Phosphorsäure und Kali sind jederzeit die Hauptbestandtheile desselben. Die Anwendung im Forstgarten ist bis jetzt eine beschränkte gewesen und der Guano dann stets nur als ein Bestandtheil von Mengedüngern benutzt worden.

b) Pflanzendünger.

Der Pflanzendünger entsteht durch Verbrennung oder Verwesung vegetabilischer Stoffe; in letzterem Falle können diese Stoffe entweder in bereits verfaultem und zerseptem Zustand in den Boden gebracht werden, oder in noch grünem Zustand (Gründüngung). Die wichtigsten Düng-

¹⁾ Monatsschr. f. d. F.-W. 1877. S. 328.

²⁾ Allg. F.-u. F.-B. 1872. S. 230.

³⁾ In solcher Weise findet die Fauche im akademischen Forstgarten dahier Verwendung.

⁴⁾ Krit. Blätter. LI. 2. S. 201.

mittel dieser Kategorie sind: Rasenasche, Holzasche, Torfasche; Humus, meist in Gestalt guter Walderde (Dammererde) verwendet, Rasenerde; Lupinen, als Gründüngung angewendet.

Unter den durch Verbrennung gewonnenen Düngemitteln stellen wir billig die Rasenasche als das wichtigste und seit Jahren bei der Pflanzenzucht in ausgedehntem Maße angewendete Mittel obenan. Dieselbe wurde namentlich von dem Oberförster Biermanns zu Höven zuerst in größerem Maßstabe in den Saatbeeten wie bei Kulturen zur Anwendung gebracht, diese Anwendung und deren Erfolge von demselben im Jahr 1845 auf der Versammlung süddeutscher Forstwirthe zu Frankfurt veröffentlicht, und spielt die Rasenasche seitdem im Forstbetrieb eine ziemlich bedeutende Rolle als Düngemittel in Forstgärten, weniger bei der Ausführung von Kulturen, bei welchen sie Biermanns gleichfalls in ausgedehnter Weise verwendete.¹⁾

Diese Rasenasche wird nun gewonnen durch Verbrennen des frisch abgeschälten Bodenüberzuges (samt anhängender dünner Bodenschwarze) nach vorheriger guter Trocknung. Biermanns¹⁾ benützte in erster Linie Rasen hiezu und erklärt die aus Rasen von mineralisch kräftigem Boden gewonnene Asche als die beste, jene aus Heidelbeerüberzug gemischt mit Gräsern noch als eine gute, die Asche aus Heidelbeer und Heide als die mindest kräftige, eine Abstufung, die auch jetzt noch von vielen als die richtigste anerkannt wird. E. Heher dagegen erklärt²⁾ gerade die letztere als das werthvollste und billigste Material und stellt jene aus Rasen in die zweite Reihe.

Die Gewinnung selbst wird an den eben angegebenen Orten und namentlich von Heher genau beschrieben. Die im August und spätestens September abgeschälten Rasen- oder Heidelbeer-Blätter werden zum Trocknen auf die schmale Kante, die Erde nach außen, paarweise gegen einander gestellt, nach dem Trocknen durch Klopfen möglichst von anhängender Erde befreit — was insbesondere auch Heß auf Grund seiner Versuche für wichtig erklärt³⁾ — und sodann in größeren oder kleineren Meilern mit Hülfe von etwas dürrem Holz und Reisig verbrannt. Die kleineren Meiler, wie sie vielfach zur Anwendung kommen, werden meist in ziemlich einfacher Weise konstruiert, die Rasen nicht zu dicht angesetzt, mit etwas Reisig behufs leichteren Ansteckens gemischt, gut mit Rasen gedeckt und unter entsprechender Aufsicht gebrannt. Große Meiler, wie

¹⁾ Forstl. Mitth. I. 1. (Darstellung des Biermanns'schen Kulturverfahrens.)

²⁾ Allg. F.- u. J.-B. 1864. S. 219.

³⁾ Centralbl. 1875. S. 38.

sie E. Heyer empfiehlt,¹⁾ bis 3 m Durchmesser und 4 m Höhe sind natürlich kunstreicher anzusehen, erhalten eine Art Gerüst durch 4 mit Hülfe von Stangen gebildete Feuerkanäle und in der Mitte eine mit Reisig zu umbindende Quandelstange. Das Material wird unter entsprechendem Wechsel von lockeren Substanzen — Heidelbeer, Heide, Reisig — und dichtem Material — Rasenplagge, Kompostmasse — angelegt, gut mit Rasen gedeckt und dann von den 4 Feuerungskanälen aus zugleich angezündet. Ein solch großer Meiler glüht 6 bis 12 Wochen, bedarf jedoch nur Anfangs der Ueberwachung, des Nachfüllens und dann Verschließens der Kanäle und des Ueberdeckens mit Rasen, wo das Feuer durchbrechen will; später genügt öfteres Nachsehen.

Die auf solche Weise gewonnene Asche besteht nun aus der Asche der verbrannten vegetabilischen Substanzen, gemischt mit der an den Plaggen hängen gebliebenen Erde, auch kleineren Steinen und nur verholzten Pflanzenresten, welch beide leichtere Beimischungen durch Sieben der Masse entfernt werden können. — Die Wirkung dieser Rasenasche beruht nicht nur auf den in der eigentlichen Pflanzenasche enthaltenen löslichen Nährstoffen, sondern auch darauf, daß die beigemischte Erde durch das Glühen aufgeschlossen, in löslicheren Zustand versetzt wird, und darin liegt auch vor Allem wohl der Grund, weshalb sich Rasenasche von gutem, thonigem Boden kräftiger erweist, als solche von ärmerem Sandboden.²⁾ Bei dem oben empfohlenen gründlichen Abklopfen der Erde von den Plaggen handelt es sich um Entfernung des Uebermaßes derselben, da sonst die eigentliche Asche einen allzu geringen Bruchtheil der Rasenasche bilden würde.

Die so gewonnene Rasenasche soll jedoch nie sofort zur Verwendung kommen, sondern erst durch Liegen wenigstens bis zum kommenden Frühjahr — Heyer empfiehlt sogar 2—3 Jahre! — ihre ätzenden Wirkungen etwas verlieren. Man bewahrt sie an trocknen Orten in gut mit Rasen gedeckten Haufen oder mit Lehm ausgeschlagenen Gruben³⁾ auf und verhindert durch gute Deckung das Abschwemmen oder Auslaugen durch Regenwasser. Zur Düngung wird sie sich empfehlen für bindenden oder doch etwas lehmigen Boden, für Sandboden nur dann, wenn sie von kräftigem Boden stammt und nicht etwa von Heidekrautplaggen auf magerem Sandboden; in letzterem Falle würde ihr Einfluß insbesondere auf die physikalischen Eigenschaften des Bodens kein günstiger sein.

¹⁾ Allg. J.- u. J.-B. 1864. S. 219.

²⁾ Zeitschr. f. J.- u. J.-W. II. 337. Forstl. Mittb. I. 7.

³⁾ Centr.-Blatt. 1876. S. 644.

Holzasche enthält alle mineralischen Nährstoffe der Holzpflanzen in löslicher Form, nach Liebig¹⁾ insbesondere auch phosphorsaure Salze in ziemlichen Mengen, welch letztere jedoch nach der Holzart, von welcher die Asche stammt, verschieden sind: so enthält die Eichenholzasche nur 4 bis 5, Fichten- und Tannenholzasche 9 bis 15, Buchenholzasche bis 20 Prozent phosphorsaure Salze, und letztere ist daher zur Düngung am werthvollsten. Auch der Reichthum der Holzasche an Kali ist von Bedeutung, dieselbe daher stets als ein gutes Düngemittel zu erachten, nach Dankelmann jedoch ihre Wirkung bei unvermischter und stärkerer Anwendung auf Sandboden eine ungünstige, in Folge vielleicht allzugroßer Kalimengen, welche im minder absorptionsfähigen Sandboden durch das Bodenwasser den Wurzeln zugeführt werden.

Die Holzasche wird seltener rein, in der Regel gemischt mit andern Düngemitteln, namentlich auch mit Kompost, angewendet, und verdient, weil überall leicht zu erhalten und rasch wirksam, ganz besondere Beachtung und Verbreitung.

Weniger dungkräftig ist die an Phosphorsäure und Alkalien ärmere Torfasche, und ihre Anwendung auch aus naheliegenden Gründen eine seltner. Auch Torf selbst wird als Düngemittel angewendet, jedoch nicht leicht allein, sondern in Verbindung mit andern Substanzen als Kompost, weshalb wir denselben unter den Mengedüngern noch erwähnen werden.

Nächst der Rasenasche ist nun jedenfalls Humus und bez. die durch dessen Vermischung mit den oberen Bodenschichten entstehende Dämmerde eines der am öftesten zur Anwendung kommenden Düngemittel. Der Humus wirkt nicht nur düngend durch die in ihm in löslicher Form enthaltenen Pflanzennährstoffe, durch die sich entwickelnde und das Wasser sättigende Kohlensäure — kohlensäurehaltiges Wasser aber wirkt bekanntlich viel lösender auf verschiedene Nährstoffe — sondern namentlich auch durch Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Bodens; bindender Boden wird durch ihn lockerer, zu lockerer Boden bindender und wasserhaltiger. Das Vermögen des Bodens, Nährstoffe festzuhalten, wird durch den Humus gesteigert, dessen Absorptionsfähigkeit für Wasserdampf und Ammoniak erhöht. — Humusdüngung allein bezeichnet Bonhausen²⁾ jedoch als eine immerhin schwache, nicht immer ausreichende Düngung. Hier würde sich also Verstärkung der letztern durch Beimengung von Holzasche empfehlen.

¹⁾ Centr.-Blatt. 1878. S. 636.

²⁾ Allgem. F.-u. F.-Z. 1880. S. 42.

Der noch ausgebreiteteren Anwendung der Dammerde steht vielfach die etwas mißliche Folge der Gewinnung entgegen, da ihre Entnahme aus Beständen diese letztern unter allen Umständen schädigt, zumal auf an sich armen Bodenarten. Man sucht sie daher lieber aus Bodeneinsenkungen und Mulden, in denen das Wasser humose Theile zusammen geschwemmt hat, aus den Seitengräben der Wege am Fuß von Gehängen, von Flächen, welche behufs Weganlagen ausgestockt werden müssen, möglichst waldunschädlich zu gewinnen, setzt sie auch, wenn etwa noch viel unverwestes Laub darunter sein sollte, behufs besserer Verwesung erst ein oder zwei Jahre in Haufen.

Die ebenfalls von Biermanns¹⁾ empfohlene Rasenerde wird durch flaches Abschälen des Rasens und Ansetzen der Rasenplaggen in Haufen, die Oberfläche der Rasenplaggen gegen einander gekehrt, gewonnen; man läßt die Rasen verfaulen, sucht etwa auch die Verwesung durch Umstechen der Haufen zu befördern. Die Wirkung der Rasenerde, vor Allem auch bedingt durch die Güte des Bodens, von welchem die Rasen stammen, wird im Verhältniß zu ihrer Quantität stets eine minder energische sein als jene der Rasenasche, mit welcher man sie auch gemischt hat; im Ganzen ist ihre Anwendung wohl eine beschränktere geblieben.

Um so häufiger wird dagegen der s. g. Kompost angewendet, welcher, in so weit er nur durch Verwesung vegetabilischer Stoffe, insbesondere des beim Ausjäten anfallenden Unkrautes entsteht, hier abzuhandeln sein würde. Da er aber meist durch Mischung vegetabilischer und mineralischer Substanzen hergestellt wird, so reihen wir ihn wohl zweckmäßiger den Mengedüngern an.

Gerberlohe, welche durch einjähriges Liegen in Haufen und zeitweiliges Begießen mit Fauche in ein für humusarme Böden passendes Düngemittel verwandelt werden soll²⁾), wird in unseren von Städten und Märkten meist entfernt liegenden Waldungen wohl nur ausnahmsweise Verwendung finden.

Die Gründüngung, durch Anbau der Lupine auf armem Sandboden landwirtschaftlich vielfach und mit gutem Erfolg angewendet, hat auf ähnlichen Dertlichkeiten auch im Forstbetrieb auf Kulturflächen, der Föhrenpflanzung vorausgehend, versuchsweise stattgefunden. Für Forstgärten wird sie keine größere Bedeutung haben können, da sie nicht intensiv genug wirkt, und man greift daher lieber gleich zu kräftigeren Düngemitteln. Selbstverständlich kann die Gründüngung dem Boden

¹⁾ Forstl. Mitth. I. S. 8.

²⁾ Centralbl. 1880. S. 529.

auch nie Ersatz für früher entzogene mineralische Nährstoffe gewähren, sondern lediglich humusbildend wirken, daher Mineral-Düngung neben einer etwaigen Düngung durch die nicht zu spät im Herbst untergebrachte Lupinen-Düngung stattfinden müßte.

Bonhausen erwähnt¹⁾ auch eine andere Art der Gründüngung mit vor der Samenreife abgeschnittenem Gras und saftigem Unkraut, welches behufs rechtzeitiger Verwehung am besten bei der erstmaligen Bearbeitung im Sommer untergebracht werden soll, und hebt hervor, daß eine derartige Gründüngung den Boden an Humus und Mineralstoffen bereichere.

c) Mineraldünger.

Man unterscheidet natürliche, in der Natur vorkommende Mineraldünger, wie Gyps, Mergel, Kalk, Phosphorit, Alraumsalze, und künstliche, in chemischen Fabriken hergestellte: Phosphate, Nitrat, Kalisalze u. s. w. — Im Forsthaushalt haben bisher vorzugsweise nur die drei erstgenannten natürlichen Mineraldünger, insbesondere Gyps und Kalk in Mischung mit Kompost Anwendung gefunden, künstliche Mineraldünger aber wurden, namentlich in unvermischttem Zustand, nur wenig benutzt.²⁾ Der Grund hierfür liegt nahe: abgesehen von dem oft doch etwas umständlichen Bezug setzt die richtige Verwendung solcher chemischer Präparate doch mehr chemische Kenntnisse voraus, als die Mehrzahl der Forstwirthe besaß und (der früheren Ausbildung nach) besitzen konnte; die Anwendung eines einzelnen solchen Mineraldüngers ohne vorherige Bodenanalyse konnte ganz erfolglos sein, sei es, daß der betreffende Stoff schon im Boden genügend vorhanden war oder daß dessen Zuführung bei dem Mangel eines andern wichtigen Nährstoffs nicht fördernd wirken konnte; ja manche Salze wirkten bei stärkerer Anwendung möglicher Weise sogar schädlich. Düngungsversuche, lediglich mit dem einen oder andern Mineraldünger angestellt, mußten sich daher nicht selten als erfolglos erweisen, den betreffenden Stoff in Mißkredit bringen, und der Praktiker griff darum immer wieder lieber zu seinen bewährten Hausmitteln, zu Dammerde und Rasenäsche, zu Kompost und Stallmist.

Eine rationelle Anwendung von Mineraldüngern, entweder in geeigneter Mischung unter sich oder mit Dammerde, Kompost u. dgl., kann dagegen zu sehr günstigen Resultaten führen, und zahlreiche Versuche sind in dieser Richtung schon angestellt worden und werden allenthalben angestellt.

¹⁾ Allg. F.- u. J.-B. 1880. S. 42.

²⁾ Zeitschr. f. F.- u. J.-W. IV. S. 37.

Betrachten wir nun die einzelnen Mineraldünger und deren Bestandtheile näher.

Mergel, ein Gemenge von kohlensaurem Kalk und Thon, wird bekanntlich in der Landwirthschaft sehr vielfach in Anwendung gebracht, während diese letztere im Forsthaußt eine beschränktere ist. Auf sandigem Boden ist die Wirkung eine in doppelter Richtung günstige, indem einerseits diesem der Regel nach kalkarmem Boden dies wichtige Pflanzennährmittel zugeführt, anderseits durch den Thon dessen Bindigkeit und resp. Fähigkeit, die Feuchtigkeit festzuhalten, erhöht wird. Die Transportkosten werden der Verwendung nicht selten hindernd im Wege stehen, da zu geringe Quantitäten nur wenig wirken können; auch ist die Düngung nur mit Mergel eine unvollständige.

Viel häufiger findet wohl der *Negkalk* (gebrannter Kalk) Verwendung und zwar vor Allem bei der Kompostbereitung, da er als vor treffliches Zersetzungsmittel vegetabilischer Stoffe wirkt; wir werden bei der Besprechung der Mengedünger auf denselben zurückkommen.

Gyps führt dem Boden Kalk und Schwefelsäure zu, und wird sich auf kalkarmen Böden günstig erweisen; doch findet auch er gleich dem Negkalk vorzugsweise nur in Mischung mit andern Düngern Anwendung.

Phosphorit, *Abrasumsalze*, *Chilisalpeter*, *Superphosphat* und sonstige chemische Präparate werden nach Schütze¹⁾ stets am besten in Mischungen angewendet, da jeder dieser Stoffe allein nur eine unvollständige Düngung ergeben würde; als eine solche Mischung, welche sämtliche wichtigen Pflanzennährstoffe — so also Kali, Kalk, Magnesia, Phosphorsäure, Schwefelsäure und Stickstoff enthalten würde, bezeichnet Schütze ein Gemenge von

Gereinigter schwefelsaurer Kalimagnesia,

Superphosphat oder Knochenmehl und

Natron- oder Ammoniak-Salpeter,

wobei dann zweckmäßig noch Kalk in Gestalt von Gyps oder gebranntem Kalk beigefügt würde.

Auch die Steinkohlenasche wurde als Düngemittel und zwar namentlich bei Gartenkultur²⁾ schon angewendet und wird der Erfolg gerühmt; die düngende Wirkung derselben ist zwar nur eine mäßige, dagegen wirkt sie auf schwerem, bindendem Boden sehr günstig durch Lockerung desselben und kann, weil nun fast allenthalben kostenlos

¹⁾ Zeitschr. f. J.- u. J.-B. IV. S. 37.

²⁾ Centralblatt. 1880. S. 279.

zur Verfügung stehend, wohl auch in unsren Forstgärten Anwendung finden. Dieselbe soll vor der Benutzung durch Siebe von den gröbren Brocken befreit werden und sodann unter öfterem Umstechen einige Monate an der Luft liegen.

d) **Mengedünger, Kompost,**

ein im Forsthaushalt zur Düngung der Forstgärten seit langer Zeit und in ausgedehntem Maß angewendetes Material, besteht aus den mannigfachsten organischen und mineralischen Substanzen, welch erstere vor der Verwendung erst verwesen sollen, vielfach unter Einwirkung der letztern Unkraut aller Art, insbesondere also das bei Reinigung der Pflanzgärten sich ergebende Material, Laub und Nadeln, Sägespäne, selbst Torf, gemischt mit Kalk, Straßenkoth, Grabenaushub bilden das Material der Komposthaufen, während dem zur Verwendung fertigen Kompost zur Verstärkung der Wirkung wohl noch Asche, chemische Präparate &c. zugesetzt werden.

Die Güte und Wirksamkeit des Kompostes wird nun erklärlicher Weise in hohem Grad bedingt sein durch die verwendeten Stoffe, die mehr oder weniger sorgfältige Zubereitung, den Grad der Zersetzung der organischen Substanzen. Während Fischbach¹⁾ den Kompost, wie er namentlich durch das faulende Unkraut hergestellt wird, als den theuersten Dünger bezeichnet, der nur wenig Nahrungsstoffe enthalte, durch das östere Umarbeiten der Haufen sehr theuer werde und leicht die Verunkrautung der damit gedüngten Beete nach sich ziehe, wird von Anderen guter Kompost als ein vorzügliches Düngemittel gerühmt,²⁾ so insbesondere auch von Forstmeister Meier in Uslar, der folgende Anweisung zur Herstellung guten Kompostes gibt:³⁾

Die erste, etwa 15 cm hohe Schichte organischer Masse, als Rasen, Heidelbeerfilz, Unkraut, Sägespäne &c., wird mit einer dünnen Lage ungelöschten Kalkes überstreut, hierauf eine zweite eben so starke Lage der erstgenannten organischen Substanzen geschichtet, der wieder eine Kalkschichte folgt, u. s. f.; auf diese Weise wird ein meilerförmiger, oben jedoch nicht zugespitzter sondern zur Aufnahme des Regenwassers vertiefter Haufen angesetzt und allenthalben mit sorgfältig angeklopfter Erde bedeckt. Die Lösung des Kalks beginnt nach wenig Tagen und ist ebenfalls in einigen (2—4) Tagen beendet. Während dieser Zeit soll der Haufen täglich ein paar Mal kontrollirt und sollen alle in der Erddecke ent-

¹⁾ Allg. F. u. J.-B. S. 217.

²⁾ Zeitschr. f. F. u. J.-W. II. S. 340; Allg. F. u. J.-B. 1862. S. 231.

³⁾ Krit. Blätter. L. 1. S. 134.

stehenden Risse sorgfältig zugedeckt werden, damit Wärme, Wasserdampf und Ammoniak nicht entweichen. Nach 4—6 Wochen zum ersten Mal und dann in entsprechenden Zwischenräumen noch einige Male wird der im Frühjahr angelegte Haufen umgelegt und liefert dann bis zum kommenden Frühjahr einen sehr guten Dünger. — Bei Anwendung von gelöschtem Kalk oder nur kalkhaltigen Bodens als Zwischenlage dauert natürlich die Zersetzung viel länger, mehrere Jahre, und auf solche Komposthaufen, auf denen sich gerne Unkraut aller Art ansiedelt und die zur Vertilgung des letztern ein oftmaliges Umarbeiten bedürfen, mag sich Fischbachs oben angeführtes Urtheil beziehen. —

Im bayerischen Forstamt Freising werden Komposthaufen in der Weise angelegt,¹⁾ daß eine etwa 30 cm hohe Schicht von vegetabilischen Resten jeder Art mit einer 4—6 cm hohen Schichte Torfmulle bedeckt, letztere stark mit Kalkstaub überstreut, dann Rasenasche etwa 8 cm hoch aufgebracht und diese mit Stafffurter Salz in dünner Schichte überdeckt wird. Eine Schichte Walderde macht den Schluß; im Nachsommer wird der Haufen umgestochen, im Frühjahr durchgeworfen und verwendet. Durch solchen Kompost sollen sowohl der verbrauchte Humusgehalt des Bodens, wie dessen mineralische Bestandtheile ersetzt, dessen Frische und Feuchtigkeit erhalten werden.

Auch durch Mischung von Sägespänen von Schneidemühlen, die mitten im Wald liegend dies Material oft in Menge bieten, mit Lehmkalk soll sich nach Meier²⁾ ein guter Kompost bereiten lassen, doch erfordert der Prozeß der Zersetzung mehrere Jahre.

Straßenkoth, mechanisch fein zertheilte mineralische Stoffe gemengt mit dem Koth der Zugthiere, liefert unter Umständen ein sehr gutes Düngemittel, sei es rein, sei es in Mischung mit vegetabilischen Stoffen im Kompost. Das Material, mit welchem die betreffenden Straßen beschottert sind, wird auf die Güte des Düngers von großem Einfluß sein, und kann z. B. der Abraum von Basaltstraßen³⁾ für sandigen Boden nicht bloß düngend, sondern in Folge seines Thongehaltes auch physikalisch verbessernd wirken. Dagegen würde der Koth von Kalkstraßen für Saatbeete auf Kalkboden nahezu werthlos sein!

Mengedünger anderer Art kann aber auch hergestellt werden durch anderweite Mischung animalischen, vegetabilischen und mineralischen Düngers, wobei die Stoffe in fein zertheiltem, daher leicht zu mengendem

¹⁾ Monatschr. f. d. J.-W. 1881. S. 75.

²⁾ Krit. Blätter. L. 1. S. 134.

³⁾ Solcher Abraum wurde im hiesigen Forstgarten mit sehr gutem Erfolg verwendet.

Zustand sich befinden. So hat Bonhausen¹⁾ Versuche angestellt mit einem aus Holzasche, Knochenmehl und Chilisalpeter, dann einem aus beiden ersten Stoffen und Peruguano (im Verhältniß von 5 : 1/2 : 1) hergestellten Mengedünger; beide Arten desselben erwiesen sich als sehr wirksam, insbesondere aber die letztere, was Bonhausen dem Stickstoffgehalt desselben zuschreibt. Eine andere Art von Mengedünger (nach Schütze), welche nur aus Mineralstoffen besteht, haben wir oben unter den Mineraldüngern schon erwähnt.

Die Wirkung solcher Mengedünger, welche die Pflanzennahrung in sehr löslicher Form enthalten, ist eine rasche, was unter Umständen (bei Düngung kümmernder Pflanzenbeete) von großer Bedeutung, und sie werden in solchem Falle ohne weitere Zusätze angewendet.

Häufig aber verstärkt man, wie schon berührt, die Wirkung von Kompost, Walderde, Rasenerde durch Beigabe von kräftiger wirkenden Düngemitteln, wie Holzasche, Knochenmehl, Superphosphat, Guano &c. in entsprechender Weise, den Boden dadurch in vollständigster und chemisch wie physikalisch verbessernder Weise düngend.

§ 25.

Wahl des Düngemittels.

Wenn es sich um Beantwortung der Frage handelt, welches von den vielen, im vorigen § erwähnten Düngemitteln in einem gegebenen Fall am zweckmäßigsten zur Anwendung komme, so werden wir in erster Linie die Eigenschaften unseres Bodens ins Auge zu fassen und uns klar zu machen haben, ob derselbe nur eine Verbesserung seiner chemischen oder zugleich eine solche seiner physikalischen Eigenschaften bedürfe. Der Fall, daß nur letztere zu verbessern sind, wird der seltnere, jener, daß eine Verbesserung in beiden Richtungen wünschenswerth erscheint, der häufigere sein; denn wenn ein Boden ursprünglich auch vollkommen entsprechende Grade von Bindigkeit und Frische besitzt, so geht doch insbesondere die letztere mit der Konsumirung des ursprünglich vorhandenen Humusgehaltes bei längerer Benutzung mehr oder weniger verloren und damit auch die günstige Einwirkung, die der Humus durch Absorption von Ammoniak und Wasser aus der Luft äußerte; ein Ersatz der konsumirten humosen Theile erscheint daher häufig wünschenswerth, ja geboten, ein Ersatz der durch die wiederholte Benutzung der Pflanzenbeete dem Boden entzogenen mineralischen Nährstoffe aber unter allen Umständen nöthig.

¹⁾ Allgem. F. u. F.-B. 1872. S. 228.

Ist nun neben der Düngung eine Verbesserung der fehlenden oder theilweise verloren gegangenen günstigen physikalischen Eigenschaften des Bodens nöthig, so sind Dammerde, Rasenrasche, Rasenerde, Kompost, Stalldünger jene Düngemittel, welche eine Wirkung nach beiden Seiten zeigen und welche deshalb auch die ausgedehnteste Verwendung gefunden haben und finden. Dabei wird man noch möglichst den Eigenschaften des zu düngenden Bodens Rechnung tragen, indem man z. B. den hizigen, rasch sich zersehenden Kuhmist vorzugsweise für schweren, kalten Boden, Kuhmist für leichteren Boden verwendet, indem man ferner dem Sandboden lieber die physikalisch so günstig wirkende Dammerde oder gute Rasenerde, bindendem Boden die lockende Rasenrasche beigeibt. — Die genannten Dünger sind, wie wir wissen, vollständige, alle Pflanzennährstoffe enthaltende Düngemittel; ihre Wirkung kann bei den chemisch nur schwächer und langsamer wirkenden, so bei Dammerde, Rasenerde, Kompost, soweit nöthig durch Beifügung chemisch kräftig wirkender Mittel — Asche, Knochenmehl, Mineraldünger verschiedener Art — jederzeit erhöht und beschleunigt werden, wie schon oben bemerkt.

Handelt es sich aber lediglich um Zuführung von Pflanzennährstoffen, dann würde auf die Frage, welche derselben wohl zuzuführen seien, am sichersten eigentlich eine Bodenanalyse antworten. Bonhausen verwirft jedoch,¹⁾ und sicherlich mit Recht, dieselbe als viel zu umständlich und kostspielig, um so mehr, als ihre Gültigkeit doch nur von geringer Dauer sein, die Zusammensetzung des Bodens und resp. dessen Gehalt an Nährstoffen sich doch mit jeder Pflanzernte ändern würde, und gibt der praktischen Erwägung, dem praktischen Versuch den Vorzug. Er wie Schütze²⁾ empfehlen, nie einen unvollständigen, nur einzelne Nährstoffe enthaltenden Dünger, wie Gips, Kalk, Knochenmehl, sondern stets Mengedünger von verschiedener Zusammensetzung, wie wir sie im vorigen § angegeben, in Anwendung zu bringen.

Die praktische Erwägung aber, von der wir eben gesprochen, wird sich dabei doch auf wissenschaftlicher Grundlage zu bewegen haben: dem gebildeten Forstmann werden seine chemischen und mineralogischen Kenntnisse sagen, welche Pflanzennährstoffe der betr. Boden in Folge seines Ursprungs in reicher, welche er in geringer Menge enthält, und während er dem durch Verwitterung des Buntsandsteines, des Gneizes entstandenen Boden eine reichliche Kalkdüngung in dem Mengedünger gibt,

¹⁾ Allgem. F. u. F.-B. 1872. S. 228; 1880. S. 44.

²⁾ Zeitschr. f. F. u. F.-W. IV. S. 37 ff.

weiß er, daß solche auf dem Verwitterungsboden des Dolomits unnöthig ist; weiß, daß diesem letzteren eine Düngung mit kalireichen Stoffen viel nöthiger ist, als dem Verwitterungsprodukte des Basaltes oder Diorits. Die Wissenschaft ist's, die ihn bei seinen Düngungsversuchen vor direkten Mißgriffen und Fehlern schützt!

In Weiterem empfiehlt Bonhausen,¹⁾ bei Auswahl des Düngers wohl ins Auge zu fassen, ob die Wirkung desselben eine sofortige sein soll, wie z. B. bei der Erziehung einjähriger Pflanzen, bei Zwischen-düngung, oder ob eine langsamere und nachhaltigere Wirkung wünschenswerth erscheint, wie in den Verschulungsbeeten, den Heisterkämpen. In ersterem Fall wird die Anwendung eines Düngemittels, welches die Pflanzen-nährstoffe in löslichster Form enthält — so Asche oder Mengedünger aus Asche, Knochenmehl und Guano — zu empfehlen sein, in letzterem gute Komposterde, deren Nährstoffe theilweise erst durch die fortschreitende Verwesung frei werden. Unter allen Umständen wird aber zweckmäßig neben ersterem Dünger in entsprechendem Wechsel auch der letztere verwendet werden, da sonst die humosen Stoffe in nachtheiliger Weise aus dem Boden ent-schwinden.

§ 26.

Zeitpunkt, in welchem die Düngung einzutreten hat.

Durch die Düngung sollen der betr. Fläche nicht nur jene Stoffe ersetzt werden, welche ihr durch die Pflanzenzucht entzogen wurden, sondern es soll auch der Boden überhaupt so reich an löslichen Pflanzennährstoffen gemacht werden, daß wir möglichst kräftige Pflanzen erziehen. Es ist dabei wohl ins Auge zu fassen, daß die von der oft außerordentlich großen Zahl der Pflanzen dem Boden entzogene Nährstoffmenge überhaupt keine geringe ist, wie wir oben (§ 23) nachgewiesen haben, und daß diese Nährstoffe einer meist nur wenig tiefen Bodenschicht entzogen werden.

Entsprechende Düngung zu rechter Zeit ist also von großer Bedeutung, und wir dürfen mit der Düngung nicht etwa zuwarten, bis die Pflanzen durch gelbliche Farbe der Nadeln und Blätter, kleine Knospen und kümmernden Wuchs uns den Nahrungsmangel augenscheinlich dokumentiren. Jeder wiederholten Benutzung eines Saat- oder Pflanzbeetes hat unbedingt eine Düngung voran zu gehen, und wenn auch ein auf frischem, kräftigem Boden neu angelegtes Saatbeet das erste Mal der Düngung vielleicht entbehren könnte — und darin findet man ja einen nicht unwesentlichen Vortheil der Wanderkämpe (vergl. § 6) — so wird

¹⁾ Allgem. J.- u. J.-B. 1872. S. 228; 1880. S. 44.

sich doch auch in diesem Fall eine mäßige Düngung, etwa mit der auf der betr. Fläche gewonnenen Rasenrasche, als nützlich erweisen. Minder kräftige Böden aber bedürfen jedenfalls schon vor der ersten Benutzung eine hinreichende Düngung, wenn das Resultat ein günstiges sein soll, und diese Düngung muß erklärlicher Weise um so kräftiger ausfallen, zu je schwächerem Boden wir uns bei der Auswahl des Platzes bequemen müssten.

Rechtzeitige Düngung vor der Benutzung des Beets, vor dessen Ansaat oder Besetzung mit verschulften Pflanzen ist sonach Regel — doch kommt es in Folge eines Uebersehens in dieser Richtung oder bei längerem Stehen der Pflanzen in den Saat- oder Pflanzbeeten (so z. B. bei der Erziehung dreijähriger unverschulter Fichten) wohl vor, daß in dem mit Pflanzen besetzten Beet Nahrungsmangel eintritt, sich im Habitus der Pflanzen dokumentirt. In diesem Falle hat auch auf dem bestockten Beet eine Düngung, Zwischendüngung, da und dort wohl auch Kopfdüngung genannt, einzutreten, und erweist sich mit den rechten (leicht löslichen) Düngemitteln in richtiger Weise ausgeführt, von gutem und raschem Erfolg.

Ueber die Jahreszeit, in welcher im einen oder andern Fall die Düngung zur Ausführung gelangt, werden wir weiter unten (§ 28) zu sprechen haben.

§ 27.

Nöthige Düngermenge.

Welche Quantitäten von den verschiedenen Düngemitteln pro Ar oder Hektar anzuwenden seien, darüber lassen sich theils nur annähernde Zahlen, für solche Dünger aber, deren Zusammensetzung eine sehr verschiedene ist, wie Rasenrasche, Kompost und ähnliche, nicht einmal diese geben. Die natürliche Zusammensetzung des Bodens, dessen größere oder geringere Erschöpfung an Nährstoffen und Humus, der Zeitraum, für welchen die Düngung ausreichen soll, sind hiebei erklärlicher Weise bestimmend, und der Praktiker muß eben hier gar oft auf dem Wege des Versuchs das Richtige für seine konkreten Verhältnisse zu finden suchen. — Es ist ferner — nach Bonhausens¹⁾ Ansicht — im Auge zu behalten, daß es nicht genügt, dem Boden etwa soviel Mineralstoffe zurückzugeben, als nach Ausweis von Aschenanalysen demselben durch die Pflanzenzucht bei läufig entzogen wurde, sondern wesentlich mehr, wenn die Pflanzen freudig gedeihen sollen, da ja bei Weitem nicht aller Dünger sofort den Pflanzen

¹⁾ Allg. F. u. J.-B. 1880. S. 42.

zu Gute kommt. (Bei regelmässiger Düngung im ständigen Forstgarten muß aber doch wohl ein nachhaltiger Ersatz der entzogenen Stoffe genügen, da die langsam lösslich werdenden Stoffe der ersten Düngung der zweiten Pflanzengeneration zu Gute kommen u. s. f.)

So sehr nun auch eine hinreichend kräftige Düngung zu empfehlen ist, so nachtheilig kann sich — abgesehen von dem unnützen Kostenaufwand — auch eine zu starke Düngung erweisen. E. Heyer¹⁾ warnt vor einer solchen, die übertriebene, schwammig gewachsene, empfindliche Pflanzen erzeuge, die durch Frost, Hitze, Wild zu leiden hätten; namentlich aber vermag ein Nebermaß stark wirkender mineralischer Dünger geradezu schädlich auf die Vegetation einzutreten — so tötete nach Nördlingers Mittheilung²⁾ eine stärkere Düngung mit Staßfurter Kalisalz geradezu die Pflanzen, und auch Dankelmann und Schüze warnen, wie schon früher berührt, vor gar zu starker Kalidüngung namentlich auf leichterem Boden.

Einigen Anhalt bezüglich der zu verwendenden Düngermengen mögen nachstehende Mittheilungen geben:

Schmitt³⁾ erklärt 200 Ctr. Stalldünger (Rindviehdünger) = 20 Wagenladungen pro Hektar für eine ausreichende Düngung für Fichten-Saat- und Pflanzbeete, fordert aber um der nachhaltigen Wirkung und nöthigen grössern Nährstoffmenge willen das doppelte Quantum, wenn die Pflanzen 3 Jahre im Pflanzbeet stehen sollen.⁴⁾ — Eine Wagenladung auf je 5 Ar dürfte aber für eine sehr mäßige Düngung zu reichen sein!

Dankelmann⁵⁾ bezeichnet 32 Fuder Röhmist als eine ausreichende Düngung pro Hektar, bemerkt jedoch, daß bei längerer derartiger Düngung sich der Mangel an Phosphorsäure bemerklich gemacht habe, dem durch Beigabe von Knochenmehl abgeholfen werden könne.

Dammerde wird in dem Eberswalder Forstgarten zur alljährlichen Düngung der zur Erziehung einjähriger Föhren bestimmten Beete in etwa 3 cm hoher Schichte aufgebracht, es werden also 3 cbm pro Ar verwendet.

Bezüglich der Anwendung von Mergel bemerkt Dankelmann, daß

¹⁾ Allg. F.- u. J.-B. 1866. S. 209.

²⁾ Krit. Blätter. LI. 2. S. 205.

³⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 41.

⁴⁾ Nach Dulks Angaben (§. 23) scheint der Entzug an Nährstoffen durch 2jährige Fichtenpflanzen im Saatbeet pro Jahr in Folge der viel grössern Zahl derselben ebenso groß zu sein, als jener durch 2 Jahr im Pflanzbeet stehende verschulte Pflanzen.

⁵⁾ Zeitschr. f. F.- u. J.-W. II. 332.

schon eine $1\frac{1}{2}$ cm hohe Schicht (also $1\frac{1}{2}$ cbm pro ar) entsprechend beigemischt sich auf Sandboden von günstigem Erfolg zeigen werde.

Der durch Bonhausen empfohlene Mengedünger (§. § 24), zusammengesetzt aus 5 Theilen Holzasche, 1 Theil Guano, $\frac{1}{2}$ Theil Knochenmehl, soll nach seiner Angabe in einem Quantum von ca. 26 Ctr. pro ha — also 20 Ctr. Asche, 4 Ctr. Guano und 2 Ctr. Knochenmehl — die entsprechende Düngung bieten.¹⁾

Von einem von Schmitt empfohlenen Kunstdünger, aus Guano oder Knochenmehl und Kalidünger hälftig gemischt, werden für Saatbeete pro ha 5 Ctr., für Verschulungsbeete 10 Ctr. als nöthig erklärt.

Schütze endlich bezeichnet²⁾ bei einer Düngung mit Kalisalzen, Superphosphat, Natronsalpeter, Ammoniakalz ein Quantum von 4 Ctr. als das Maximum, welches pro ha in Anwendung kommen dürfe.

§ 28.

Ausführung der Düngung.

Die nöthige Düngung geht in den meisten Fällen der Ansaat oder Verschulung voraus, kann aber auch auf den schon mit Pflanzen besetzten Beeten als Zwischendüngung stattfinden, wenn das Aussehen der Pflanzen auf Nahrungsman gel schließen lässt, und wird demgemäß in verschiedener Weise erfolgen.

Im ersten Falle, bei der vorausgehenden Düngung, wird man sich zunächst darüber entscheiden müssen, ob man den Dünger in die oberste Bodenschicht oder in die Tiefe bringen oder endlich den als Wurzelraum dienenden Boden mehr gleichmäßig damit durchmengen will. Die zu erziehende Holzart, die Benutzung der Fläche als Saat- oder Pflanzbeet werden hiefür zunächst maßgebend sein. Handelt es sich um Erziehung der schon im ersten Jahr tiefgehende Wurzeln treibenden Eiche oder Föhre, so wird man den Boden jedenfalls auf größere Tiefe zu düngen haben, als wenn man bloß einjährige Fichten zum Zweck der Verschulung erziehen will, in welchem Fall eine sehr seichte Düngung genügt. Saatbeete werden stets in der oberen, dem Keimling und der jungen Pflanze den ersten Wurzelraum bietenden Schicht entsprechend zu düngen sein — auch bei Eiche und Föhre nicht bloß in der Tiefe —, Verschulungsbeete eine tiefer gehende Düngung verlangen, um so tiefer, je stärker die Pflanzen im Pflanzbeet werden sollen.

Im Allgemeinen ist es bekanntlich erwünscht, wenn die Pflanzen im

¹⁾ Allgem. J.- u. J.-B. 1880. S. 43.

²⁾ Zeitschr. f. J.- u. J.-B. IV. S. 37.

Saat- und Pflanzbeet keine zu tief gehenden Wurzeln erlangen, da durch solche das spätere Verpflanzen erschwert wird, und man düngt daher den Boden nicht gerne zu tief, um dadurch eine reiche Seiten- und Saugwurzelbildung in den nahrhaften oberen Bodenschichten hervorzurufen. — Eine Ausnahme besteht hinsichtlich der einjährigen Föhren, bei denen man zur Sicherung des Gedeihens der auf leichtem, rasch austrocknendem Sandboden zu verwendenden Pflanzen gerne die Entwicklung der Pfahlwurzel befördert; dies geschieht neben tiefer Bodenlockerung durch tiefgehende Düngung, selbst durch vorzugsweise Düngung der untern Bodenschichten, in welche man hiedurch die Wurzeln gleichsam hinabzulocken sucht. (Vergl. § 17.) Jedes Uebermaß in dieser Richtung ist jedoch ebenfalls von Uebel, da zu lange Wurzeln beim Einpflanzen Schwierigkeiten bereiten, verkrümmt oder umgestülpt werden.¹⁾

Auch die Art des zur Anwendung kommenden Düngemittels wird für die Tiefe des Unterbringens von Einfluß sein. Stalldünger soll etwas tiefer untergegraben werden, damit die Pflanzenwurzeln nicht in direkte Berührung mit ihm kommen,²⁾ während Rasenasche, Kompost, Humus mit der ganzen den Wurzelraum bildenden Bodenschichte gemengt, leicht lösliche Düngersorten — Mengedünger aus Knochenmehl, Guano u. dgl. — nur seicht eingehäckelt werden; dem Regen wird es überlassen, die Nährstoffe in gelöstem Zustand in die Tiefe zu führen.

In den meisten Fällen wird die Düngung mit der zweiten, im Frühjahr stattfindenden Bodenbearbeitung verbunden und nur da, wo man etwa zur Erziehung langer Wurzeln den Dünger in größere Tiefe bringen will, oder wenn das Düngematerial erst im Boden verwesen soll — Gründüngung — geschieht die Düngung bei der erstmaligen Bodenbearbeitung im Sommer oder Herbst.³⁾

Die Unterbringung des Düngers geschieht nun beim Stallmist in ähnlicher Weise, wie in der Gärtnerei, durch Untergraben mit dem Spaten; Kompost, Dammerde werden gleichmäßig über die zu düngende Fläche ausgetragen und beim Umgraben mit dem Boden tüchtig vermischt, die leicht löslichen Düngemittel aber, wie schon oben berührt, erst nach dem zweitmaligen Umgraben des Bodens oben auf gestreut und nun durch leichtes Einhacken oder kräftiges Einrechen mit der oberen Bodenschichte tüchtig gemengt. Aehnlich verfuhr auch Biermanns mit der Rasenasche, als einem ebenfalls leicht löslichen Dungmittel.

¹⁾ Vergl. Burkhardt, Säen u. Pfl. S. 293.

²⁾ Zeitschr. f. F.- u. F.-W. II. S. 332.

³⁾ Geht die Beeteinteilung der Düngung voraus, so erspart man auch das Düngen der schmalen Seitenwege, welche immerhin 20 % der Fläche einnehmen.

Bonhausen¹⁾ düngt mit dem von ihm empfohlenen Mengedünger (§. v.) einige Tage vor beabsichtigter Saat und begießt die Beete, wenn während dieser Tage Regen ausbleibt, um hiedurch die Lösung des Düngers zu befördern, dessen ährende Wirkung zu vermeiden. In letzterer Beziehung ist überhaupt bei Anwendung stark wirkender Düngemittel besondere Vorsicht nöthig, nie soll der Same mit demselben in direkte Berührung kommen und ein einfaches Ausstreuen solcher Düngemittel in die Saattrillen ist daher durchaus unzulässig.²⁾ So wendet auch Bonhausen,³⁾ um jeder übeln Wirkung vorzubeugen, von seinem Mengedünger vor der Saat nur etwa die Hälfte des normalen Quantum an und düngt im Sommer nach.

Eine solche Nachdüngung, sowie die schon oben (§ 26) erwähnte Zwischendüngung in mit Pflanzen besetzten Beeten, in welchen Nahrungsmangel sichtlich eingetreten oder zu befürchten ist, führt man dann durch Einstreuen des entsprechenden leicht löslichen und rasch wirkenden Düngemittels zwischen die Pflanzenreihen und nicht zu nahe an diese hin aus und mischt dasselbe durch Einhäckeln mit dem Boden. Selbstverständlich ist diese Zwischendüngung thunlichst im Frühjahr auszuführen, so daß mit beginnender Wachstumsperiode den Pflanzen die zugeführten Nahrungsstoffe sofort zu Gute kommen, eine rasche Lösung derselben durch die Frühjahrsfeuchtigkeit erfolgt. — Auch bei solcher Zwischendüngung ist bez. der stark wirkenden Düngemittel die nöthige Vorsicht zu beachten — wir weisen auf den schon in § 27 erwähnten Versuch in Hohenheim hin, bei welchem eine starke Zwischendüngung mit Staßfurter Kalisalz vollständiges Absterben der Pflanzen zur Folge hatte.

§ 29.

Kosten der Düngung.

So wenig, als sich über die Quantität der anzuwendenden Düngemittel bestimmte, für alle Fälle passende Zahlen geben lassen, eben so wenig erklärlicher Weise über die, neben der verwendeten Quantität noch durch mancherlei lokale Verhältnisse bedingten Kosten der Düngung. So werden z. B. bei der Rasanasche die durch die ortsbüliche Höhe des Tagelohns bedingten Kosten der Gewinnung, beim Stalldünger jene des Ankaufs und des oft weiten Transportes zu den Pflanzgärten, bei Anwendung von Mergel, Straßenkoth fast nur die Transportkosten aus-

¹⁾ Allg. F. u. J.-B. 1872. S. 230.

²⁾ Zeitschr. f. F. u. J.-W. IV. S. 47.

³⁾ Allgem. F. u. J.-B. 1872. S. 230.

schlaggebend sein, während die Kosten der chemischen Düngemittel fast lediglich durch den allenthalben nahezu gleichen Ankaufspreis bedingt sind.

Der Literatur sind denn auch über die Kosten der Düngung nur wenige Angaben zu entnehmen.

Nach größeren und sorgfältig ausgeführten Versuchen von Heß¹⁾ kam der Hektoliter guter Rassenasche (aus möglichst von Erde befreiten Plaggen gebrannt) durchschnittlich auf 45—65 Pfennige zu stehen. — Nach Bonhausens Angabe²⁾ sind, wenn Lupinendüngung angewendet werden will, zur Aussaat pro ha $1\frac{1}{2}$ Etr. à 10 Mark nötig. — Schmitt³⁾ gibt den Preis einer Wagenladung (10 Etr.) Stalldünger inkl. Transports zum Pflanzbeet im Schwarzwald auf 7—8 Mark an, und da er hiemit 5 ar düngt, so käme die Düngung pro ar auf 1,40 bis 1,60 Mark.

Einige Angaben über die Preise chemischer Düngungsmittel sind als Anhalt über die Kosten der Düngung unsern Fachgenossen vielleicht nicht unerwünscht.

In der chemischen Fabrik Heufeld (Oberbayern) kostet

Gedämpftes Knochenmehl	pro 100 Kilogr.	15	Mark
Knochenmehl-Superphosphat	" 100	17	"
Kali-Superphosphat	" 100	16	"

Die chemische Fabrik von Silbermann in Augsburg offerirt:

Superphosphat	pro 100 Kilogr.	14—17	Mark
(Je nach dem Gehalt an löslicher Phosphorsäure.)			
Knochenmehl (desgleichen)	" 100	" 12—16	"
Kali-Ammoniaik-Superphosphat	" 100	" 18	"
Kali-Superphosphat	" 100	" 14,60	"

Endlich beträgt der Preis für Chilifalpeter pro 100 Kilogr. etwa 45 Mark, für Peruguano 26 Mark, doch ist namentlich der Preis des letztern je nach dem garantirten Gehalt an löslichen Nährstoffen, an Stickstoff, Phosphorsäure, Kali, verschieden.

¹⁾ Centralbl. 1875. S. 38.

²⁾ Allgem. F.- u. J.-B. 1880. S. 42.

³⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 41.

4. Kapitel.

Einfriedigung der Forstgärten und Kämpe.

§ 30.

Nothwendigkeit und Entbehrlichkeit.

Die Beantwortung der Frage, ob ein Saatkampf, ein Pflanzbeet einzufriedigen sei, oder ob die meist nicht unbedeutenden Kosten einer Umzäunung erspart werden können, wird in erster Linie von lokalen Verhältnissen im Zusammenhange mit den zu erziehenden Holzarten abhängen. — Einfriedigungen sollen unsere Anlagen vor Allem gegen die vierfüßige Thierwelt schützen, gegen Weidevieh, Hochwild, Sauen, Rehe, Hasen, während ein Schutz gegen Menschen nur in minderem Maße nöthig ist — gegen eine beabsichtigte boshaftre Beschädigung schützt keinerlei Zaun! Es wird sonach in jedem Einzelfall zu erwägen sein, in wie weit eine Gefährdung des Saat- und Pflanzkampfes durch Weidevieh, durch den vorhandenen Wildstand besteht und in wie weit insbesondere wieder die zu erziehenden Holzarten durch Wild bedroht erscheinen.

Weidevieh sollte zwar nur unter guter Aufsicht im Walde weiden; allein eine einzige sich verlaufende Kuh kann insbesondere durch Bertreten in unseren Saatbeeten so unangehme Zerstörungen anrichten, daß wir da, wo Waldweide noch stattfindet, wenigstens durch eine einfache Verlängerung, einen sogenannten Weidzaun, uns gegen solche Gefahr schützen werden — so namentlich unsere etwa auf einer Windbruchlücke inmitten eines alten, der Hut geöffneten Bestandes gelegenen Pflanzkämpe.

Um gefährlichsten für jede Kampsanlage sind Hochwild und Sauen, erstere im Winter fast jede Holzart annehmend, die aus dem Schnee hervorragenden Gipfeltriebe verbeißend, letztere durch ihr Brechen im gelockerten Boden gefährlich — so daß, wo die eine oder andere dieser Wildarten als Standwild vorhanden ist, eine feste Einfriedigung sich wohl stets als nöthig erweisen wird. Minder gefährlich sind Rehe und Hasen, bei welchen die anzubauenden Holzarten maßgebend sind für den nöthigen oder entbehrlichen Schutz.

Laubhölzer bedürfen nun eines solchen Schutzes zumeist, und nur Erlen und etwa Eichen können desselben entbehren; dagegen unterliegen die Ahorne, Eschen, Hainbuchen, Linden dem Verbeißen durch Rehe und Hasen, am meisten aber ist die Akazie gefährdet, die offenbar eine Lieblingsspeise der Hasen (und Kaninchen) ist. Von den Nadelhölzern sind die Tannen bekanntlich am meisten bedroht, ihre kräftigen

Endknospen bilden eine Lieblingsspeise der Rehe während die übrigen Nadelhölzer durch Rehe nur ausnahmsweise, durch Hasen fast gar nicht bedroht sind.

Die Frage der Einfriedigung steht mit jener über die Zweckmäßigkeit bleibender Forstgärten oder wandernder Saat- und Pflanzkämpe in engem Zusammenhang. Wo man durch die eben besprochenen Verhältnisse genöthigt ist, die Pflanzen durch dichte Einfriedigungen gegen das Wild zu schützen, da wird man in den hohen Kosten, welche solche Einfriedigungen verursachen, einen Grund zur Anlage bleibender Forstgärten finden; und ebenso wird man da, wo man ständigen Forstgärten überhaupt den Vorzug gibt, dieselben zum Schutz gegen Mensch und Thier selbst bei minder bedrohten Holzarten einfriedigen. Die Entbehrlichkeit einer solchen Schutzbvorrichtung giebt nicht selten den Ausschlag für die Wahl kleinerer, wandernder Kämpe; diese letzteren, vorzugswise für die Fichte und Föhre im Gebrauch, erhalten in der Regel keine oder nur eine höchst einfache Einfriedigung. Wo besondere Verhältnisse, wie stärkerer Hochwildstand, auch für sie bessern Schutz nöthig machen, greift man wohl zu den transportablen Kulturgattern, die nach Ausnutzung eines Kamps bei dem nächsten aufgestellt werden.

§ 31.

Verschiedene Arten der Einfriedigung.

Die Einfriedigung der Pflanzgärten kann nun in sehr mannigfacher Weise erfolgen und wird je nach den Thiergattungen, gegen welche ein Schutz nöthig ist, wie nach der Dauer, welche sie haben soll, eine bald einfachere, bald solidere, ebenso aber auch nicht selten eine nach dem im konkreten Fall zur Verfügung stehenden oder billig zu beschaffenden Material verschiedene sein.

Was die Thiere betrifft, gegen welche unsere Saatkämpe zu schützen sind, so genügt gegen Weidevieh die einfachste Art der Einfriedigung, da dasselbe weder durch solche kriechen, noch sie überfliehen kann; Graben und Wall oder einfache Verlanderung erweisen sich hier meist schon als ausreichend. Gegen Hasen und Kaninchen ist eine dichte, aber wenig hohe Einfriedigung geboten, gegen Rehe und Hochwild eine hinreichend hohe, gegen Schwarzwild eine genügend feste Einfriedigung nöthig. — Je nach dem zur Verwendung kommenden Material unterscheiden wir, außer den Gräben, die da und dort genügen, noch Trockenmauern aus Plaggen oder Steinen, hölzerne Einfriedigungen der verschiedensten Konstruktion, in neuerer Zeit vielfach auch Drahtzäune; Einfriedigungen durch lebende Hecken und in direktem Gegensatz zu diesem

fest mit dem Boden verbundenen Material die oben schon genannten transportablen Gatter — eine reiche Auswahl von Einfriedungsmitteln steht uns zur Verfügung und soll in nachstehenden Paragraphen kurze Besprechung finden.¹⁾

Eine sehr wesentliche Rolle wird bei der Wahl der Einfriedungsart in den meisten Fällen neben der Zweckmäßigkeit der Kostenpunkt spielen, und jene Umzäunung, durch welche der angestrebte Zweck in billigster Weise erreicht wird, den Vorzug verdienen. Dass hierbei nicht allein die momentanen erstmaligen Kosten, sondern auch die Rücksicht auf die Dauer und die Unterhaltskosten sehr in die Wagschale fallen, ist selbstverständlich, und werden wir daher neben dem Kostenpunkt auch die Frage der Dauer in den Kreis unserer Besprechungen zu ziehen haben.

Ausnahmsweise — in vielbesuchten Waldungen, in der Nähe größerer Städte, Badeorte u. s. f. — bringt man wohl auch der Aesthetik ein Opfer und sucht dem Zaun unbeschadet seiner Solidität auch ein gefälliges Ansehen zu geben, so durch Anwendung des Rautenzaunes, der Drahtgitter und dergleichen.

§ 32.

Gräben und Mauern.

Gräben von geringen Dimensionen, aber mit möglichst senkrecht abgestochenen Wänden dienen als Schutz gegen die Einwanderung von Mäusen und Werren und werden in dem Kapitel über den Schutz unserer Saat- und Pflanzbeete Erwähnung finden. Dagegen werden namentlich in Heidegegenden, wo der Boden von geringem Werth, die Arbeit im leichten Sandboden eine billige, Gräben von größerer Breite und Tiefe — bis zu 1,2 m breit und 0,7 m tief — insbesondere zum Schutz gegen Weidevieh und Schafherden hergestellt.²⁾ Die Grabenerde, auf die Seite des zu schützenden Grundstücks geworfen, bildet zugleich einen den Schutz verstärkenden Wall. Ein solcher Wall wird aber auch noch hergestellt durch abgestochene Plaggen (Soden), die nach Art von Bausteinen auf einander gelegt werden; mit solchen Plaggen wird der Wall entweder nur auf einer, besser auf beiden Seiten versehen und dann zwischen die beiden Wände der Grabenaushub geworfen, wobei man die Stärke des Wallen nach oben abnehmen lässt, demselben also eine entsprechende Böschung gibt. Burkhardt gibt die Sohlenbreite eines

¹⁾ Wir weisen hier insbesondere auf die vortreffliche Behandlung dieses Gegenstandes in Burkhardts Säen und Pflanzen und in Heyers Waldbau hin, denen wir auch die betreffenden Abbildungen uns theilweise zu entlehnen erlaubten.

²⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 504.

solchen Wallen auf 1,2 m, die Kronenbreite auf 0,6 m bei 1,2 m Höhe an.

Zum Schutz gegen Rehe und Hasen wendet man auch einen Besatz des Grabenaufwurfs mit Dornenbunden an,¹⁾ welche in schräger Stellung, halb liegend, halb stehend, auf den Aufwurf gestellt und mittels leichter, senkrecht eingeschlagener Pfähle befestigt werden, wobei ein Pfahl jedesmal zwei Bunde fasst.


Wo Steinmaterial in reicher Menge zur Verfügung steht, als sogenannte Besesteine kostenlos zur Hand liegt oder bei Rodung der Kampfläche angefallen ist, da setzt man bisweilen auch Trockenmauern an, denen man aber wohl nie eine das Saatbeet hinreichend schützende Höhe geben kann. Durch Säulen, welche zwischen die Steine eingesezt werden, und Querlatten lässt sich letzterem Mangel dann abhelfen.

§ 33.

Hölzerne Einfriedigungen.

Weitaus am häufigsten finden wir in unsren Waldungen hölzerne Einfriedigungen in Anwendung, zu welchen ja der Wald selbst das Material in billiger und bequem zu beziehender Weise darbietet; ist es doch nicht selten sehr geringwerthiges, ja da und dort überhaupt schwer verwertbares Durchforstungsmaterial, welches bei den Einfriedigungen Verwendung findet.

Die einfachste Art der hölzernen Einfriedigung ist die nur zum Schutz gegen Weidevieh, Fuhrwerk &c. dienende sogenannte Verlängerung, — bestehend aus längeren Stangen, welche in etwa 1 m Höhe zwischen je 2 schwachen Pfosten mit hölzernen Nägeln befestigt sind. — Etwas solider ist schon der Waidhag²⁾ (Figur 1), aus 16—20 cm starken, in 3—4 m Abstand in den Boden eingerammten meterhohen Pfosten bestehend, an welchen 2 parallel laufende Querstangen mittels hölzerner Nägel befestigt oder durch Löcher in den Pfosten geschoben sind. Auch er dient nur zum Schutz gegen Weidevieh.




Figur 1.

¹⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 504.

²⁾ Heher, Waldbau. S. 183.


Der Pallisadenzaun, Pfahlzaun (Figur 2) besteht aus hinreichend langen und starken, im Durchforstungsweg



Figur 2.

gewonnenen Nadelholzstangen, zum Schutz gegen Rehe 1,5 m, gegen Hochwild bis 2 m über dem Boden lang, welche so dicht neben einander, daß kein Hase durchschlüpfen kann, in den Boden eingelassen und in 1 bis 1,3 m Höhe durch eine aufgenagelte Latte fest verbunden werden. Bei der Anfertigung dieses Zaunes, welcher allerdings da, wo jenes Stangenmaterial gut verwerthbar ist, in seiner Anlage ziemlich theuer kommen kann, empfiehlt G. Heyer¹⁾ das Einsetzen der also auf 2—2,5 m abgelängten Pallisaden in einen etwa 0,5 m tiefen Graben, der dann wieder eingefüllt wird, wobei man die Stangen durch festes Einstampfen der Erde befestigt. — Früher sah man wohl, wie um Wildparke, so auch in Forstgärten solche Pallisadenzäune von gerissenem Eichenholz; jetzt werden solche aus naheliegenden Gründen wohl nirgends mehr hergestellt.

Die gebräuchlichsten Holzzäune um unsere Forstgärten sind wohl



Figur 3.


die Flechzäune, und zwar jene mit senkrechter Stellung der Flechtruten, an vielen Orten auch Spriegelzäune genannt (Figur 3). Bei

¹⁾ Waldbau. S. 183.

deren Anfertigung werden in Entfernungen von 3—4 m hinreichend starke, runde oder leicht beschlagene, zur Erhöhung der Dauer etwa unten angekohlte Säulen von 2—2,5 m Höhe fest in den Boden eingesetzt, nachdem dieselben vorher an 3 Stellen zum Einziehen der Querstangen durchlocht wurden. Sind diese Querstangen, Durchforstungsstäben von Hopfenstäben-Stärke, nach vorheriger Entrindung eingezogen, so werden die Flechtruten (Spriegel, Etterruten, Hannichel), Stängchen in der Stärke von Bohnenstecken und in Fichten-, Föhren- oder Tannenzunghölzern bei der ersten Durchforstung als noch grünes Material gewonnen (bereits abgestorbene Stangen besitzen nicht mehr die nötige Biegsamkeit), eingeflochten und dicht an einander gerückt, so daß kein Hase durchschlüpfen oder unten durchkriechen kann. Die Flechtruten werden entweder alle in gleicher Höhe abgeschnitten oder, wenn sie sich etwas kurz sind, oder das Überstiehen von Hochwild zu fürchten ist, in voller Länge belassen, allerdings auf Kosten des gefälligeren Aussehens.

Da diese Baunart dem Wind viel Fläche darbietet, Beschädigungen durch Stürmen ausgekehrt ist, zumal wenn die Säulen nach langerem Stehen anfangen am Fuß schadhaft zu werden, so bringt man in ungeschützteren Lagen auf der dem Wind entgegen gesetzten Seite einzelne Streben an, verstärkt auch die schadhaften Säulen durch neben eingerammte starke Pfosten.

Auch horizontale Flechtung läßt sich anwenden; bei derselben erspart man die stärkeren Säulen und kann geringwerthigeres und schwächeres Flechtmaterial, Reisig jeder Art und Länge, in Anwendung bringen, bedarf aber eine größere Anzahl von Pfählen.
Nebenstehende




Figur 4.

Abbildung (Fig. 4) versinnlicht wohl am einfachsten die Anfertigung dieser Bäune. Sie sind billiger herzustellen als die vorigen, aber auch minder haltbar und leicht zu übersteigen.


Statt die Bohnenstöcken einzuflechten, nagelt man sie auch mit entsprechend langen Stiften auf zwei durch die vertikalen Säulen gezogenen oder an denselben mit starken Holznägeln befestigten Querstangen (Brusthölzer) in einer das Durchschlüpfen von Hasen hindernden Entfernung senkrecht fest (Fig. 5) und stellt dadurch den senkrechten Stangenzaun her;

oder man lässt die Stängchen sich unter entsprechendem Winkel kreuzen,



Figur 6.


Stangenzäune mit horizontal liegenden Stangen (Figur 7) dienen



Figur 7.

vorzugsweise zum Schutz gegen größeres Wild, werden überhaupt mehr als Einfriedigung für Wildparke als für Forstgärten angewendet. Die Stangen, acht bis elf an der Zahl, je nachdem es sich um den Schutz nur gegen Rehe oder auch gegen Hochwild handelt, werden unten enger zusammengekütt, um das Durchkriechen zu verhindern, nach oben aber in wachsender Entfernung aufgenagelt. Sollte ein solcher Zaun auch gegen Hasen schützen, so müßten die Stangen unten sehr eng beisammen liegen — aber jeder stärkere Schneefall würde denselben das Durchkriechen weiter oben ermöglichen. Durch eine Verbindung des horizontalen und vertikalen Stangenzaunes — durch Herstellung eines niederen senkrechten

Zaunes mit höheren Säulen, an welche so genannte Sprunglat ten genagelt werden (Fig. 8), kann man Schutz gegen jede Wildart geben und die größeren Kosten des senkrechten Stangenzaunes nicht unwesentlich verringern.



Figur 8.

§ 34.

Drahtzäune.

An Stelle hölzerner Zäune werden schon seit längerer Zeit Draht-Einfriedigungen angewendet, und zwar zunächst zum Schutz von Kulturen in Wildparken oder bei starkem Wildstand überhaupt, wie auch zur Einfriedigung ganzer Thiergärten.¹⁾ Aber auch zum Schutz unserer Forstgärten finden Drahtzäune verschiedener Art Anwendung und eine Erwähnung derselben erscheint hier am Platze.

Die zu erst erwähnten Zwecken hergestellten (aber auch für Forstgärten verwendeten) Drahtzäune bestehen jederzeit aus einer kleineren oder größeren Zahl horizontal gespannter Drähte, welche in angemessener, von unten nach oben wachsender Entfernung mit Klammernägeln

¹⁾ Thiergarten bei Arnlsen (Allg. F. u. F.-B. 1858, S. 370).


an Säulen befestigt und straff angezogen sind. Die Zahl der Drähte und deren Entfernung ist verschieden und reichen nach Witte's Angaben¹⁾ 5—6 Drähte, in Entfernungen von 20, 20, 20, 20, 25, 30 cm gespannt, zum Schutz gegen Hochwild aus, da nach seinen Erfahrungen dasselbe die Drahtzäune nicht leicht überfällt. Soll dagegen ein Forstgarten durch einen solchen Drathzaun gegen das Eindringen jedes Wildes, selbst der Hasen, geschützt werden, so sind eine ziemlich große Zahl von Drähten nöthig, welche in der Nähe des Bodens sehr eng gezogen werden müssen. Häß²⁾ wandte bei dem akademischen Forstgarten in Gießen 14 Drähte an, die er in folgenden Entfernungen spannte: 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12, 12, 16, 12, 18 cm, in einem zweiten Falle 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 15, 15 cm, so daß die Gesamthöhe in ersterem Falle 1,50 m, in letzterem 1,41 m betrug. Der verwendete Draht war 3—4 mm stark, überkupfert und die erstmalige Herstellung des Zaunes eine ziemlich kostspielige (1,75 — 1,90 Mark pro m). Werden diese hohen Anlagekosten auch durch die längere Dauer des Drahtzaunes gegenüber dem Holzzaun allmählich ausgeglichen, so werden sie doch ein Hinderungsgrund für dessen häufigere Anwendung sein, und möchten wir denselben mit Rücksicht auf die mit wechselnder Temperatur sich ändernde Spannung des Drahtes als einen minder sicheren Schutz gegen das Durchkriechen der Hasen betrachten.

Mit gutem Erfolg und unter manchen Verhältnissen auch mit entschiedenem finanziellen Vortheil können die nehartig geflochtenen Draht einfriedigungen zum Schutz der Forstgärten angewendet werden. Diese Drahtgitter, aus verzinktem Draht bestehend, 1 m hoch und in Rollen von beliebiger Länge käuflich, sind so eng geflochten, daß für Hasen ein Durchschlüpfen nicht möglich ist; sie werden an nur 10—12 cm starke Pfähle, — nur die Eckäulen müssen entsprechend stärker sein, — deren Höhe über dem Boden etwa 1,5 m beträgt und die 4—5 m von einander entfernt stehen, mittelst einfacher Klammernägel befestigt und zum Schutz gegen Roth- und Rehwild dann noch mit zwei starken Drähten (altem Telegraphendraht), die an den Pfosten mit eben solchen Nägeln befestigt werden, überspannt. (Figur 9.) Die Anwendung einer solchen Einfriedigung empfiehlt sich besonders dann, wenn die allmähliche Vergrößerung eines neu angelegten Forstgartens oder ein Schutz für Wanderkämpe beabsichtigt ist. In ersterem Fall bringt man — während man den übrigen Theil des Forstgartens etwa mit einem Flechtzaun versieht — die Drahtgitter auf jener oder jenen Seiten an, nach welchen hin man

¹⁾ Zeitschr. f. F.- u. J.-W. I. S. 247.

²⁾ Suppl. zur Allg. F.- u. J.-Z. Heft IX. S. 64.

den Garten vergrößern will, und kann dieselben dann seinerzeit mit sehr geringen Kosten wegnehmen und hinausrücken.¹⁾ Ebenso lässt sich mit



Figur 9.

der Verlegung der ausgenützten Wandlerkämpe die Draht einfriedigung leicht weiter transportiren. Das Drahtgitter kostet etwa 1 Mark pro Quadratmeter und sind dessen Bezugsquellen namentlich den Jagdzeitungen zu entnehmen, in welchen sich dasselbe in verschiedener Maschenweite, je nach den Zwecken, häufig angeboten findet.

Eine Verbindung von Draht- und Holzzaun ist der von Oberförster Sachse in Groß-Schönebeck empfohlene Drahtspriegelzaun.²⁾ Zur Herstellung desselben werden 2,4 m lange, 16 cm starke Kiefernpfosten in 3 m Entfernung 0,8 m tief in den Boden fest eingesezt und sodann 4 Drähte — 4 mm starker, verzinkter Eisendraht — in 40 cm Entfernung von einander, so daß der untere Draht 20 cm vom Boden abstehet, mittels einfacher Klammern an diesen Pfosten befestigt und straff angezogen; die Eckpfosten sind hierbei mit hinreichend starken Streben zu schützen. In diese Drähte, welche also die Querhölzer des gewöhnlichen Flechtzaunes ersetzen, werden nun 2 m lange, 3—4 cm starke Flechtruten — Spiegel — dicht eingeflochten. Sachse röhmt diesem Zaun, welcher gegen jede Wildart den nöthigen Schutz bietet, nach, daß derselbe wegen des federnden Drahtes vom Wind nicht leicht gedrückt oder geworfen wird, und daß abgefaulste Pfosten leicht ersetzt werden können, ohne daß dadurch die anstoßenden Theile des Zaunes Noth leiden, was bei dem gewöhnlichen hölzernen Flechtzaun nicht der Fall ist.

¹⁾ An dem im Jahr 1878 dahier neu angelegten akademischen Forstgarten wurde dieser Drahtzaun in angegebener Weise verwendet und sehr zweckmäßig befunden.

²⁾ Zeitschr. f. F.- u. F.-W. XI. 93.

§ 35.

Lebende Einfriedigungen (Hecken).

Lebende Zäune, Hecken, werden wohl am wenigsten zur Umfriedigung von Forstgärten verwendet. Sie bedürfen geraume Zeit, bis sie den entsprechenden Schutz gewähren, verlangen stete, sachverständige Pflege, wenn sie dieser Anforderung dauernd entsprechen, nicht durch Absterben der untern Zweige lückig werden sollen, und zeigen trotz aller Sorgfalt nicht selten doch solche, den Hasen Zugang gestattende Lücken.

Da es sich bei Anlage eines Forstgartens stets um Herstellung sofortigen Schutzes handeln wird, so ist man genötigt, zunächst einen Holzzaun herzustellen und neben demselben die Hecke anzulegen, die nach Schadhaftwerden des ersteren den Schutz des Gartens übernehmen soll. Schon hieraus geht hervor, daß man lebende Einfriedigungen nur bei jenen Forstgärten überhaupt in Anwendung bringen wird, deren Benutzung voraussichtlich eine sehr lang andauernde ist, da nur in diesem Fall sich die Anlage und Pflege einer Hecke rentiren wird — und da solche bestimmte Voraussicht doch vielfach fehlt, so ergibt sich hiervon auch die Beschränkung der Anwendbarkeit von Hecken überhaupt.

Wir glauben uns deshalb bezüglich derselben hier auch kurz fassen zu dürfen.

Als Material für Hecken dienen Weißdorn, Fichte und Weißbuche. Bei Weißdorn werden die Pflanzen 12—15 cm weit gesetzt, tief am Boden abgeschnitten und von den erscheinenden Ausschlägen nur zwei belassen, die mit jenen der links und rechts stehenden Pflanzen gitterartig verbunden oder an einen lichten Lattenzaun angebunden werden; dies gitterartige Verbinden wird alljährlich fortgesetzt. Ahnlich werden Weißbuchenzäune behandelt. Bei Fichten verwendet man kleine, recht „rauhfüßige“ Pflanzen, die auf 12 cm Entfernung gesetzt werden, und schneidet rechtzeitig Höhe- und Seitentriebe zurück, damit die Hecke an der Erde dicht und buschig bleibt, die Stämmchen sich nicht in Folge der Beschattung der untern Astte durch die oberen am Fuße reinigen. Das wichtigste Mittel für die Pflege der Hecken, für die Erhaltung eines dichten, das Durchkriechen kleiner Thiere (Hasen) verhindernden Fußes liegt in dem alljährlichen Scheeren derselben mittels der Heckscheere, in der entsprechenden Beschränkung der Breite derselben, da eine zu große Breite neben dem Einnehmen eines zu großen Raumes auch das Auslichten des Fußes zur Folge hat. Nach Heyers¹⁾ Angabe

¹⁾ Waldbau. S. 190.


hält eine rationell angelegte und behandelte Fichtenhecke über fünfzig Jahre lang aus; in Folge der nöthigen Pflege kommen die Hecken aber trotzdem nicht so billig zu stehen, als man zu glauben geneigt ist.

Fichtenhecken schatten übrigens ziemlich stark und die Pflanzen zeigen in deren unmittelbarer Nähe nicht selten ein Zurückbleiben im Wuchs; jedenfalls wird man unmittelbar an dieselben nur Saat- und Pflanzbeete von Schatholzarten legen, denen jener Schutz allerdings sogar wohlthätig sein kann.

§ 36.

Transportable Einfriedigungen.

Die transportablen Kulturgatter, Hürdengatter, Hordenzäune dienen in erster Linie zum längere oder kürzere Zeit nothwendigen Schutz der Kulturen wie des Feldes da, wo ein stärkerer Wildstand solchen Schutz nöthig macht; sie werden aber auch mit Vortheil zum Schutz wandlernder Saat- und Pflanzbeete verwendet und sind daher hier zu erwähnen.




Figur 10.

Ein solches Hürdengatter (Figur 10) besteht nach Forstmeister Beurmanns Beschreibung¹⁾ aus drei vertikalen stärkeren Rahmstücken, von circa 2—2,3 m Höhe; dieselben werden durch eine Anzahl schwächerer Stangen, welche 3,5—4,5 m lang sind, verbunden und um ein seitliches Verschieben zu verhindern, dem Gatter einen größeren Halt zu geben, wird schräg von einem Rahmenstück zum andern die sogenannte Windlatte aufgenagelt. Bei ebenem Terrain rechtwinklig zusammengesetzt, muß dagegen bei geneigtem Terrain das Gatter verschoben werden, da die

¹⁾ Aus dem Walde. I. S. 131. S. auch Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 510.

beiden Rahmenstücke stets senkrecht stehen, die Querhölzer stets parallel dem Boden laufen. Die Zahl der Querstangen und deren Entfernung ist je nach der Wildart verschieden; für Hochwild genügen etwa acht, soll aber auch Schutz gegen das Durchkriechen von Rehen und Sauen gegeben werden, so mehrt man ihre Zahl bis elf, und rückt die untern näher zusammen. — Die um Saatkämpe gestellten Hürden werden dadurch aufrecht und zusammen gehalten, daß man dicht vor die Verbindungsstelle je zweier Hürden einen Pfahl schlägt, und durch je zwei Wieden die Hürden mit demselben und gleichzeitig mit einander zusammenbindet, und den Hürden zugleich wechselseitig schräge Stützen gibt.

Aehnlich sind die von Heß¹⁾ beschriebenen Hordenjäne (Figur 11), wie sie in Thüringen zum Schutz der Wanderkämpe angewendet wurden.



Figur 11.

Derselbe hebt als besonders praktisch, weil die leichte Zerlegbarkeit und Transportirung ermöglichen, jene Konstruktion hervor, bei welcher die Querhölzer mit den Vertikalhölzern nicht durch Nägel fest verbunden, sondern lediglich mit den zugespitzten Enden in eingebrohte Löcher eingelassen sind. Das oberste Querholz aber geht durch das Vertikalholz und wird durch beiderseits vorgestckte Pföbchen gehalten; zieht man letztere heraus, so zerfällt die Horde in ihre einzelnen

¹⁾ Allgem. J.-u. J.-B. 1862. S. 295.

Stücke und wird nun mit Leichtigkeit an den Ort der Verwendung transportirt.


Beim Aufstellen werden die Pfähle mit ihren zugespitzten Enden in den Boden getrieben und wird entweder zur Vermehrung der Haltbarkeit ein weiterer Pfahl in der Mitte der circa 4 m langen Horde eingeschlagen, an den man einige Querhölzer mit Wieden bindet; oder man schlägt, wenn die Gatter keine stärkeren und zugespitzten Vertikalsäulen haben, an der Verbindungsstelle einen hinreichend starken Pfahl in den Boden, an den die Horden gebunden werden. Durch Streben erhalten dieselben eine weitere Befestigung und Schutz gegen das Umwerfen durch Wild und Wind.

Gegen Hasen geben diese Horden nur ungenügenden Schutz; man muß zu diesem Behuf die untern Stangen sehr nah zusammenrücken, bei tieferen Schneelagen schlüpfen aber dann die Hasen durch die oberen, weiteren Zwischenräume; dadurch ist die Anwendung dieser für Wanderkämpe praktischen Einfriedigung eine auf die minder schutzbedürftigen Nadelholzkämpe beschränkte geblieben.

§ 37.

Verschluß der Forstgärten.

Der Verschluß der um die Saalbeete und Forstgärten hergestellten Einfriedigungen richtet sich nach der Art der letzteren, wie nach lokalen Verhältnissen — in letzterer Beziehung insbesondere darnach, ob er auch hinreichende Sicherung gegen das unbefugte Eindringen von Menschen bieten soll. In den meisten Fällen wird letztere Sicherung nicht nöthig sein, denn beabsichtigte *boßhafte* Beschädigungen eines Forstgartens werden auch durch solch festen Verschluß nicht verhindert; will man aber doch einen solchen, so ist eine mit eisernen Angeln und einem Vorlegeschloß versehene Thüre nicht zu umgehen. In den meisten Fällen aber begnügt man sich mit Angeln von zähen Fichtenwieden und einem einfachen hölzernen Riegel oder richtet die Thüre so ein, daß sie in hölzernen Haken hängt und leicht ausgehoben werden kann, nebenstehende Abbildung (Fig. 12) stellt eine von Schütz¹⁾ beschriebene einfache und zweck-



Figur 12.

¹⁾ Die Pflege der Eiche. §. 73.

Fürst, Pflanzenzucht im Walde.

mäßige solche Thüre dar. — Auch eine Art hölzernen Schlosses — weniger dem Verderben und der Entwendung ausgesetzt als ein eisernes — ist da und dort im Gebrauch und wurde ein solches von Lorey¹⁾ beschrieben. Zweckmäßig ist es, in Angeln laufende Thüren so zu richten, daß sie geöffnet von selbst zufallen.

Bei der einfachsten Art der Einfriedigung, dem Waidzaun, werden lediglich an einer Stelle ein paar Stangen zum Zurückziehen in den durchlochten Säulen eingerichtet und auf diese Weise der Eingang hergestellt. Bei transportablen Gattern wird letzterer durch seitliches Verschieben einer nur durch Binden an einen Pfahl befestigten Horde gewonnen.

Bei nur einigermaßen größeren Forstgärten ist die Anbringung mehrerer Thüren, mindestens von zwei sich gegenüberliegenden, zu empfehlen. Die Arbeiter, welche Unkraut hinaus, Kompost, Humus &c. herein zu schaffen haben, ersparen hiendurch unter Umständen viel Zeit; für Fuhrwerke wird die Möglichkeit, den Garten ohne Umkehren zu verlassen, gewonnen.

§ 38.

Dauer der verschiedenen Einfriedigungen.

Bei der Wahl der einen oder anderen Einfriedigungsart wird, wie schon oben berührt, die Frage nach deren Dauerhaftigkeit eine sehr wichtige und nicht selten entscheidende Rolle spielen, da mit ihr jene bez. des Kostenpunktes aufs Innigste zusammen hängt. Eine anscheinend sehr billige Einfriedigung kann bei kurzer Dauer eine in Wirklichkeit theure werden, wie umgekehrt eine ursprünglich kostspieligere in Folge langer Dauer, geringer Reparaturkosten zu einer verhältnismäßig billigen.

In den meisten Fällen verlangen wir von unsrern Einfriedigungen möglichst lange Dauer — jedoch nicht immer; legt man z. B. behufs Aufforstung größerer neu acquirirter Felder &c. einen Forstgarten an, der nach vollzogener Kultur wieder eingehen soll, so wird der oft nur fürzere Zeitraum, innerhalb dessen letztere bewerkstelligt werden soll, ins Auge zu fassen und die Solidität des Zaunes dieser Zeit einigermaßen anzupassen sein. Man wird dann keine zu starken Säulen und Querhölzer wählen, das Imprägniren unterlassen, transportable Einfriedigungen wählen u. dgl. m.

In erster Linie wird das verwendete Material die Dauer der Einfriedigung bedingen. Wir haben oben der sehr langen Dauer gut gepflegter Hecken Erwähnung gethan, und eben solche werden gut konstruirte Trockenmauern zeigen; ihnen schließen sich wohl die Drahtzäune an, wenn zu

¹⁾ Allg. F. u. J.-B. 1863. S. 362.

denselben gut verzinktes oder auf andere Weise gegen den Rost geschütztes Material verwendet wurde. Bei den hölzernen Zäunen ist von grösster Bedeutung die Art des verwendeten Materials — die Holzart, die Verhältnisse, unter denen das Holz aufgewachsen ist (Stangen aus Durchforstungsmaterial werden stets jenem von Schneebrechflächen vorzuziehen sein), das Alter u. s. w. Für die Säulen und Pfeilern ist neben diesen Momenten und neben deren Stärke der Boden, in welchen sie gesetzt wurden, ob feucht oder trocken, bindend oder locker, von wesentlichem Einfluß auf die Dauer. Durch Ankohlen der unteren, in und unmittelbar an den Boden kommenden Theile, durch Bestreichen mit Theer, imprägniren mit antiseptischen Stoffen lässt sich diese Dauer sehr erhöhen. Für ständige Forstgärten ist die Auswahl guten Materials zu den Säulen und Anwendung solcher konservirender Mittel von wesentlicher Bedeutung.

Bestimmte Zahlen über die Dauer der einen oder andern Art der oben beschriebenen hölzernen Einfriedigungen lassen sich nach dem eben Gesagten nicht wohl geben — sehen wir doch, wie in einem und demselben Zaune die eine Säule noch vollkommen gut ist, während die nächste, einem zweiten oder dritten Abschnitte des nämlichen Baumes entstammend, schon abgefaulst ist! Im Allgemeinen lässt sich nur etwa sagen, daß Pallisaden-Zäune mit ihrem stärkeren Material größere Dauer zeigen, daß Flechtzäune (Spriegelzäune) mit senkrechter Flechtung sich in Folge des leichtern Austrocknens (nach Regenwetter) länger zu halten pflegen als solche mit horizontaler Flechtung,¹⁾ bei welchen namentlich die untersten Lagen rasch faulen, und daß Zäune mit senkrecht oder rautenförmig aufgenagelten Stangen aus dem gleichen Grunde die dichteren Flechtzäune an Haltbarkeit übertreffen werden; daß endlich die Dauer eines hölzernen Zaunes 8 — 12 Jahre nicht übersteigen und derselbe auch während dieser Zeit manche Reparatur erheischen wird.²⁾ Für transportable Gatter gibt Burkhardt sogar die Dauer nur auf 5 — 6 Jahre an,³⁾ dank wohl dem Umstand, daß behufs leichteren Transportes auch zu den Rahmenstücken vorwiegend schwächeres Material Verwendung findet.

§ 39.

Kosten der Einfriedigung.

Obwohl dieselben, streng genommen, im Abschnitt V „Kosten der Pflanzenzucht“ zu besprechen wären, so haben wir es doch für zweckmässiger gehalten, Alles, was auf die Einfriedigungen Bezug hat,

¹⁾ Heyers Waldbau. S. 184.

²⁾ Heß i. d. Suppl. z. Allg. F.-u. J.-B. IX. S. 71; Böhr. f. J.-u. J.-W. XI. S. 93.

³⁾ Säen u. Pflanzen. S. 510.

im Zusammenhang abzuhandeln, und reihen daher die Besprechung der Kosten für dieselben schon hier an.

Die Kosten für die Einfriedigungen sind bisweilen reine Arbeitslöhne, so bei der Anwendung von Gräben, von Wällen aus Plaggen, von Trockenmauern — ja selbst bei hölzernen Zäunen kann der Werth des Holzes da, wo in waldreichen, gebirgigen Gegenden die schwächeren Sortimente schwer oder gar nicht absetzbar sind, ein so unbedeutender werden, daß er neben den Arbeitslöhnen verschwindet. Dagegen wird in Gegenden, wo jede Stange, jeder Bohnenstiel gut verwerthbar ist, der Holzpreis neben jenen Löhnen eine ziemlich bedeutende Rolle spielen; bei den geslochtenen Drahtzäunen endlich der Preis des anzukaufenden Flechtwerks in erster Linie stehen, der Arbeitslohn neben demselben sehr zurücktreten. Auch die Transportkosten für das Holzmaterial können da und dort ins Gewicht fallen.

Solchen Verhältnissen wird der denkende Revierverwalter Rechnung tragen, wenn es sich um die Wahl der einen oder andern Einfriedigungsart handelt; er wird da, wo das schwache Holz nahezu werthlos ist, stets den dann billigen Holzzaun wählen, bei hohem Preise der Kleinholzölzer, hohen Tagelöhnen dagegen den Drahtzaun meist vortheilhafter finden. — Es ergibt sich aber auch aus dem oben Gesagten, daß bei Vergleichung der Herstellungskosten von Einfriedigungen ganz gleicher, wie verschiedener Art stets 2 Faktoren — Arbeitslohn und Materialkosten — aus einander gehalten werden müssen, wenn diese Vergleichung einen Werth haben soll, daß Angaben über die Herstellungskosten eines Zaunes ohne Angabe der ortsbülichen Tagelöhne, der lokalen Holzpreise für weitere Kreise ohne Werth sein müssen.

Bei der Entscheidung über die zweckmäßigeren, weil billigere, Anwendung der einen oder andern Einfriedigungsart spricht aber noch ein dritter, sehr gewichtiger Faktor mit: die Dauer der hergestellten Einfriedigung, die Höhe der alljährlich oder periodisch nöthigen Reparaturkosten. Auch dieser Faktor ist ein höchst schwierig festzustellender, da die Güte des zu Pfosten, Querhölzern, Flechtruten verwendeten Holzmateriales, die Dertlichkeit, in welcher sich der eine oder andere Zaun befindet, auf die Dauer der Einfriedigung, wie auf die Höhe der Reparaturkosten von größtem Einfluß sind, letztere auch noch durch die Angriffe, denen der Zaun durch Menschen, Thiere, Wind u. s. f. ausgesetzt ist, bedingt werden. Wir verweisen bezüglich der für die Kostenfrage so wichtigen Dauer auf das im vorigen Paragraph Gesagte und wiederholen nur, wie schwierig es Angeichts aller dieser Verhältnisse ist, vergleichende Angaben von Werth für weitere Kreise über die An-

sagekosten der einen oder andern Zaunart und den Vorzug, den etwa die eine um ihrer Billigkeit willen vor der andern verdient, zu machen.

Im Allgemeinen wird unter gleichen Verhältnissen der stärkeres Holz erfordern Pallisadenzaun kostspieliger sein als die übrigen Holzzäune — auch die Transportkosten des Materials können bedeutend sein — der Flechtzaun billiger als der Zaun mit senkrecht aufgenagelten Stangen oder als der Rautenzaun, welcher der theuerste unter den hölzernen Zäunen letzterer Art sein dürfte. Drahtzäune ersetzen die grösseren erstmaligen Kosten durch lange Haltbarkeit und geringe Reparaturkosten; die in § 34 beschriebenen Drahtspiegelzäune gehören den Angaben des Oberförsters Sachse nach zu den nach Anfertigung und Dauer billigern Zaunarten.

Einige positive, der desfallsigen Literatur entnommene Angaben mögen folgen:

Nach Heyers Angabe¹⁾ kostete ein Spriegelzaun, wobei alles Holz $\frac{3}{4}$ Stunden weit beigefahren werden musste, inklusive Holzwerth (Taxe?) und bei 1,50 Mark Taglohn pro laufenden Meter 2,10 Mark.

Von einem in der Oberförsterei Großschönebeck hergestellten Drahtspiegelzaun²⁾ kam der laufende Meter inklusive Holzwerth (4,50 Mark pro Festmeter Säulenholz, 0,20 Mark pro Hundert Spiegel) auf nur 0,53 Mark pro Meter zu stehen. (Die Höhe des ortssüdlichen Tagelohns ist nicht angegeben.)

Nach Burkhardt's Mittheilungen³⁾ kostet bei einem Tagelohn von 2 Mark der laufende Meter

Spriegelzaun . . circa 40 Pfennig Arbeitslohn,

Rautenzaun . . . " 53 " "

Transportable Gatter " 13—24 "

Nach Hefz' Angaben⁴⁾ kamen bewegliche Hordenzäune von 4,5 m Länge bei dem allerdings sehr niedrigen Taglohn von 1 Mark durchschnittlich auf 42 Pfennig per Stück inklusive des (jedenfalls auch sehr niedrigen) Holzwerthes.

Über die Kosten gezogener Drahtzäune, welche Kosten allerdings sehr wesentlich durch die Zahl der Drähte und respektive dadurch bedingt sind, ob diese nur Schutz gegen grösseres Wild oder auch gegen Hasen gewähren sollen, macht ebenfalls Hefz genaue Mittheilungen⁵⁾. Nach

¹⁾ Waldbau. S. 184.

²⁾ Beitschr. f. F.= u. J.-W. XI. S. 93.

³⁾ Säen u. Pflanzen. S. 508 u. 510.

⁴⁾ Allg. F.= u. J.-B. 1862. S. 295.

⁵⁾ Suppl. zur Allg. F.= u. J.-B. IX. S. 71.

diesen kam der laufende Meter bei einem Tagelohn von 1,50—2 Mark, einem Holzpreis von 16 Mark pro Festmeter Nadelholz und 24 Mark pro Festmeter Laubholz (Eichen zu Säulen) inklusive Anföhren und Theeren auf 1,75 Mark, wobei 14 Drähte gezogen wurden und die ganze Arbeit unter etwas ungünstigen Verhältnissen ausgeführt werden mußte.

Viell geringer werden natürlich die Kosten bei einer nur geringen Zahl von Drähten, wie sie bei Parkeinfriedigungen oder zum Schutz von Saatbeeten gegen Hochwild etwa angewendet werden, sein; nach Wittes Angabe¹⁾ beliefen sie sich in Großschönebeck inkl. Holzwerth nur auf 30 Pfennig pro laufenden Meter.

Von den geflochtenen, 1 m hohen Drahtgittern, welche eine vollkommen hasendichte Einfriedigung bilden, kostet der laufende Meter Geslecht — gut verzinkter Draht — 1 Mark, und kam im hiesigen akademischen Forstgarten die Herstellung der Einfriedigung unter Anwendung dieses Drahtgitters, über welches noch 2 Telegraphendrähte gespannt wurden, auf 1,20 Mark pro laufender Meter; der Tagelohn, der hier sehr wenig ins Gewicht fällt, steht auf 1,70 Mark, die nur 15—20 cm starken Zwischenpfähle, an denen das Gitter befestigt ist, stehen in einer Entfernung von 5 m. Der Holzpreis ist bei solch geringem Material ebenfalls von kaum nennenswerthem Einfluß. An dem verzinkten Draht ist jetzt, nach Verlauf von drei Jahren noch keine Spur von Rost zu sehen, so daß die Einfriedigung als eine dauerhafte und billige, mit Rücksicht auf ihre leichte Versetzbarkeit bei Erweiterung oder Verlegung eines Gartens besonders zweckmäßige empfohlen werden kann.

(Es werden übrigens jene verzinkten Drahtgeslechte schon jetzt wesentlich billiger angeboten, so von der Drahtgitterfabrik Fr. Gloger in Schwedt a. Oder zu 60 Pfennig pro Quadratmeter bei einer für Hasen genügenden Maschenweite von 76 mm.)

5. Kapitel.

Eintheilung und innere Einrichtung des Pflanzgartens.

§ 40.

Eintheilung durch Wege.

Jede Anlage zur Erziehung von Pflanzen bedarf einer gewissen, durch Wege herzustellenden Eintheilung, die aber wieder je nach der Größe der betr. Fläche in verschiedener Weise gegeben wird.

¹⁾ Zeitschr. f. d. F.- u. J.-W. XI. S. 93.

Kleinere, nur zu vorübergehender Benutzung bestimmte Saat- und Pflanzkämpe, oft nur wenige Ar groß, wie wir sie namentlich zur Erziehung von Fichten- und Föhrenpflanzen nicht selten finden, sind in sehr einfacher Weise durch schmale Wege in eine Anzahl von Beeten oder Ländern von entsprechender Größe getheilt und können, wenn ohne Einfriedigung und also von allen Seiten leicht zugänglich, jeden breiteren Weg entbehren. Eingefriedigte oder etwa größere Kämpe erhalten einen breiteren, für Handkarren benutzbaren Mittelweg oder werden durch zwei solche, sich rechtwinklig kreuzende Wege gebviertheilt. Größere ständige Pflanzgärten dagegen bedürfen einer entsprechenden und systematischen Eintheilung durch eine Anzahl breiterer und schmäler Wege.

Die Mitte des Gartens durchschneidet ein Hauptweg, breit genug für ein Fuhrwerk, um hiedurch die Beifuhr von Erde und Dünger, die Abfuhr von Pflanzen möglichst zu erleichtern. Eine Anzahl von Seitenwegen, hinreichend breit etwa für einen zweirädrigen Handkarren oder doch einen gewöhnlichen Schubkarren zerlegt den Garten in weitere Haupttheile, Quartiere, und eben solche Wege lässt man wohl ringsum längs der Einfriedigung laufen; durch weitere, thunlichst schmale Wege, gerade breit genug, um von ihnen aus einer Person das Säen, Reinigen, Behacken &c. zu gestatten, werden die Quartiere endlich in Beete oder Länder zerlegt.

Bei ebenem Terrain ist diese Verlegung des Gartens eine ohne Schwierigkeit zu bewerkstelligende Arbeit: man sorge, daß die Wege sich gehörig rechtwinklig schneiden, denn jede auch nur geringe Abweichung vom rechten Winkel wird bei den späteren Arbeiten (dem Anfönen mit Hülfe von Saatbrettern, dem Verschulen) sehr lästig, und vermeide jedes Uebermaß von Wegen, insbesondere auch durch überflüssige Breite derselben, da hiedurch die bearbeitete und eingefriedigte Fläche zu stark reducirt wird, die Kosten sich also verhältnismäßig steigern. — Die breiten Wege steht man zweckmäßig schon vor dem Umarbeiten der Fläche — also nach Abräumung des Bodenüberzuges — ab und schließt dieselben von jeder tieferen Bearbeitung aus, hebt nur die obere, bessere Bodenschicht in entsprechender Tiefe ab und benutzt dieselbe beim Ebenen der übrigen Fläche (§ 20). Kann man diese Wege zur Zurückhaltung des Unkrautes mit Kies oder Sand überfahren, so ist dies zu empfehlen. Die schmalen Wege, insbesondere jene, welche die einzelnen Beete trennen, werden entweder nach vollständig gartenmäßiger Bearbeitung der betr. Fläche einfach nach der Schnur abgetreten, wie dies der Gärtner thut, oder sie werden (bei etwas bindendem oder feuchterem Boden) mit der Schaufel mehr oder minder tief ausgehoben und die

ausgehobene Erde auf die anstoßenden Beete vertheilt; diese ausgehobenen Wege wirken dann als seichte Entwässerungsgräben namentlich vorbeugend gegen das Aufsrieren des Bodens. Man behalte aber hiebei wohl im Auge, daß mit der Tiefe des Weges auch jederzeit dessen obere Breite wächst.

In geneigtem Terrain lege man möglichst alle Wege horizontal, namentlich alle breiteren und tieferen Wege, und vermeide längere oder tiefere Wege in der Richtung der Wasserlinie, da dieselben bei starkem oder anhaltendem Regen nur zu gern zu Wassergräben werden und Schaden bringen. Wo sich solche Wege nicht ganz vermeiden lassen, bringt man in entsprechenden kleineren Zwischenräumen Wasserableitungen (durch schräg eingelegte Schwellen) und kleine Fanggruben an.

Als Breite für einen Hauptweg mag etwa 1,8 m, für Seitenwege 1 m genügen, während die Wege zwischen den Beeten etwa 30—40 cm breit werden sollten, — letztere Zahl als Maximum bei auszuhebenden Wegen¹⁾.

Neben einer solchen regelmäßigen Eintheilung empfiehlt nun Schmitt²⁾ für seine Fichtenpflanzschulen eine ganz systematische Eintheilung in der Weise, daß z. B. zur Erziehung vierjähriger, im Alter von 2 Jahren verschulter Fichten der Garten in 3 Hauptquartiere zerlegt wird, von denen je eines stets ein Jahr brach liegt, die beiden andern mit 3 und 4jährigen Pflanzen besetzt sind. Eine kleinere Abtheilung jedes Quartiers gilt als Saatbeet zur Erziehung der zur Verschulung des betr. Quartiers nöthigen 2jährigen Pflanzen. — Eine solche Eintheilung wird da zweckmäßig, ja nöthig sein, wo nur Pflanzen von einer oder höchstens 2 Holzarten in bestimmter, jährlich gleichbleibender Zahl erzogen werden sollen; in Forstgärten und Pflanzkämpen, in welchen verschiedene Holzarten und diese wieder in wechselnder Zahl, verschiedenem Alter erzogen werden sollen, läßt sich diese Einrichtung nicht wohl durchführen.

§ 41.

Beete und Ländere (Gewannen).

Die Frage, ob man die von breiteren Wegen umschlossenen Quartiere in schmale Beete von 1—1,2 m Breite oder in größere, 4—6 m breite Ländere oder Gewannen, wie man sie wohl manchen Orts nennt, theilen soll, ist für die Saatbeete wohl allenthalben entschieden, für die Pflanzbeete aber findet sie verschiedene Beantwortung.

Seit man für Saatbeete beinahe durchaus die Rillensaat in Anwendung bringt, die früher (namentlich nach Biermanns) übliche breit-

¹⁾ 45—60 cm (Krit. Bl. L. 1. S. 136) ist entschieden zu viel.

²⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 99.

würfige Ansaat derselben verlassen hat (vergl. § 48), sind größere Saat-Länder nur für einzelne Holzarten mehr im Gebrauch und man sät auf Beete, deren Breite nicht größer sein soll, als daß man vom Seitenweg her bequem bis zur Mitte reichen — also ansäen, ausgräsen, durchrupfen kann. Diese Breite beträgt nun 1—1,2 m; Beete von geringerer Breite sind in Folge der dadurch verhältnismäßig größeren Wegfläche, welche nöthig wird, eine Raumverschwendung, Beete von größerer Breite unbequem und unpraktisch.

Nur für Eichensaatbeete, bei welchen, um der schon im ersten und zweiten Lebensjahr raschen Entwicklung der Pflanzen willen, die Saat-rillen in größerer Entfernung von einander gezogen werden — bis zu 30 cm —, bei welchen also ein Betreten der Beete zum Zweck der Reinigung und Lockerung ohne Beschädigung der jungen Pflanzen wohl möglich ist, wendet man meist größere zusammenhängende Saatbeetflächen ohne Unterbrechung durch Steige an.

Für Pflanzbeete dagegen findet man vielfach solche größere Länder in Verwendung, andernorts aber wieder nur Beete, und beide Verfahren haben ihre Vertheidiger, beide unter Umständen ihre entschiedene Berechtigung.

Für die größeren Länder wird die beträchtliche Raumersparniß geltend gemacht,¹⁾ welche in Folge des Wegfalles der zahlreichen Wege zwischen den Beeten möglich ist, der Wege, welche ursprünglich vielleicht jähmal angelegt allmälig, insbesondere gelegentlich des Ausgrasens, immer breiter zu werden pflegen. Diese Raumersparniß, mit welcher die Kosten für Bodenbearbeitung und Einfriedigung in engem Zusammenhang stehen, ist allerdings anscheinend nicht unbedeutend, da z. B. bei 1,2 m breiten Beeten und 30 cm breiten Steigen, schon $\frac{1}{5}$ der ganzen Fläche durch letztere für die Pflanzenzucht verloren geht, bei breiteren Zwischenwegen aber, wie man sie nicht selten trifft, der Verlust an nutzbarer Fläche noch größer ist.

Dagegen tritt Schmitt²⁾ entschieden für die Eintheilung in Beete bei der langamer sich entwickelnden Fichte — der Holzart, die jetzt wohl am meisten verschult wird — ein und erklärt hier die Ansicht von der Raumersparniß für irrig. Wo keine Steige sind, erscheint eine weitläufigere Verschulung, als sonst wohl nothwendig wäre, geboten, damit die Arbeiten des Ausgrasens, Bodenlockerns u. s. w. von den zwischen die Pflanzenreihen tretenden, in den Beeten sich bewegenden Arbeitern ohne Beschädigung der Pflanzen vorgenommen werden können; eine

¹⁾ Fischbach, Lehrb. der Forstw. S. 116.

²⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 31.

solche größere Entfernung der Pflanzreihen von einander, und betrage sie nur statt 15 cm deren 20, macht aber jene Ersparnis an Raum völlig illusorisch, ja letztere kann selbst ins Gegentheil umschlagen.

Wir möchten der Hauptsache nach letzterer Ansicht beistimmen, namentlich also für kleine, langsam sich entwickelnde und daher engere Verschulung zulassende Pflanzen, dann auf bindendem und unkrautwüchsigem Boden, dessen öfteres Betreten um des Festretens willen zu vermeiden ist; schon bei der Arbeit des Verschulens selbst lässt sich bei den größeren Ländern dieses Zusammentreten des vorher sorglich gelockerten Bodens nicht vermeiden, während bei der Beeteintheilung diese Arbeit von den Wegen aus geschehen kann. Die Anbringung von Schutzvorrichtungen, Schutzgittern, wie sie für die meisten Holzarten vortheilhaft, ist bei beitweiser Eintheilung erleichtert; auch der Werth, den die schmalen Wege als Entwässerungsgräbchen und Vorbeugungsmittel gegen das Auffrieren (s. § 62) haben können, dürfte ins Auge zu fassen sein. Auf geneigtem Terrain ist die Anwendung größerer Länder geradezu ein Fehler — hier erscheinen nur horizontal gelegte Beete als zweckmäßig.

Dagegen erscheint die Anwendung größerer Länder als zulässig und zweckmäßig auf minder bindendem Boden und bei Holzarten, welche — wie die Mehrzahl unserer Laubhölzer — mit Rücksicht auf ihre rasche Entwicklung ohnehin in weiterem Verband zu verschulen sind (siehe § 81). Für stärkere, zum Zweck der Erziehung von Heistern zum zweiten Male verschulte Pflanzen wählt man stets größere Länder ohne Beeteintheilung; alle Motive für letztere und gegen erstere fallen hier weg und tritt die Raumersparnis hier in ihr volles Recht.

§ 42.

Sonstige Einrichtungen: Hütten, Brunnen u. dergl.

In jedem größeren und ständigen Forstgarten sollte unbedingt eine einfach gebaute, verschließbare Hütte stehen, die einerseits zur Aufbewahrung der nöthigen Kulturwerkzeuge, Saatbretter, Häckchen u. s. w. dient, andererseits den Arbeitern wie dem die Aufsicht führenden Personal als Unterschlupf bei plötzlich eintretendem Regen dient. Eine solche einfache Hütte erscheint wohl in keiner Weise als Luxus; der Transport jener Geräthe, jede Unterbrechung der Arbeit durch das momentane Fehlen des einen oder andern Instrumentes wird vermieden, ebenso aber das oft nöthige Beenden der Arbeit, wenn die Arbeiter durch einen Regenguss bis auf die Haut durchnässt sind, während beim Vorhandensein eines schützenden Dödaches oft schon nach kurzer Pause die Arbeit wieder aufgenommen werden könnte.

Ein solches, wenn auch noch so einfaches Dach wird man aber zweckmäßig selbst bei kleineren oder nur kürzer benutzten Pflanzkämpen anbringen; das Material von geringen Stangen und etwa von Fichtenrinde zur Dachung läßt sich ja meist mit sehr geringen Kosten beschaffen, und von der Forderung der Verschließbarkeit, der Verschalung mit Brettern u. dergl. kann man absehen, so daß der Aufwand für eine solche Hütte ein sehr unbedeutender sein wird.

Über die Zweckmäßigkeit, ja selbst Nothwendigkeit, Wasser in einem größern Forstgarten oder wenigstens in dessen nächster Nähe zu haben, wurde bereits früher (§ 12) gesprochen. Fehlt fließendes Wasser, so legt man wohl im Forstgarten einen Brunnen oder eine Eisterne an, welch letzterer man durch Gräben das Regenwasser zuführen sucht. Heyer¹⁾ und Bonhausen²⁾ empfehlen sogar Vorrichtungen zur Bewässerung der Forstgärten aus nahe gelegenen Bächen oder mit Hilfe von Sammelteichen — doch wird sich die Möglichkeit der Anwendung des allerdings sehr günstig wirkenden und dem Biegeln in jeder Art vorzuziehenden Bewässerns immerhin an verhältnismäßig wenig Orten ergeben, vielfach auch an den Kosten scheitern. (Vgl. § 59.) — Für kleinere Saat- und Pflanzkämpe sind aber Brunnen und Eisternen wohl entbehrlich.

Außerhalb des Forstgartens, manchmal auch innerhalb desselben, findet man endlich Plätze reservirt zur Aufbewahrung von Düngemitteln, Rasenrasche, Komposterde, oder zum Ansetzen sogenannter Komposthaufen aus dem im Garten anfallenden Unkraut. Solche Lagerplätze (auch für die Schutzgitter während der Zeit ihrer Nichtbenutzung) legt man gerne etwas abseits in einem minder in die Augen fallenden Winkel, besser aber noch außerhalb der Einfriedigung, um den Raum im Innern des Gartens und dessen regelmäßige Eintheilung nicht zu beeinträchtigen, zunächst des Ausganges an.

Früher fand man wohl auch Anlagen, Ziergesträuche, selbst Blumenbeete in den Forstgärten, was jetzt wohl selten mehr vorkommen dürfte; ebenso vermeidet man Rondelle inmitten des Gartens, die sonst als Zierde nicht selten angelegt und mit irgend fremden Holzarten besetzt waren. Dieselben erschweren aber die regelmäßige Eintheilung und den Verkehr im Garten und bleiben besser weg. Die Kulturmittel pflegen heut zu Tage dem Forstmann so knapp zugemessen zu sein, daß sich ohnehin jeder Luxus verbietet — gut gehaltene und gepflegte Pflanzebeete werden auch ohne solch überflüssige Zuthaten das Auge des Sachverständigen erfreuen!

¹⁾ Waldbau. S. 190.

²⁾ Centralblatt 1877. S. 17.

III. Abschnitt.

Die Pflanzenzucht im Saatbeet.

1. Kapitel.

Die Ansaat der Saatbeete.

§ 43.

Allgemeine Erörterungen.

Die Bestellung der Saatbeete erfolgt entweder in der Absicht, die erzogenen Pflanzen in ein- bis höchstens dreijährigem Alter sofort zu Kulturen zu verwenden, oder sie in einem Alter von 1—2 Jahren — ein höheres Alter wird nur ausnahmsweise vorkommen — zur Erziehung kräftiger, gut bewurzelter Pflanzen zu verschulen. In der Art und Weise der Ansaat wird aber hierdurch ein Unterschied nicht begründet, nur etwa in der Stärke der Aussaat, der Menge des verwendeten Samens, indem man in ersterem Falle wohl etwas dünner sät; das Nachstehende gilt daher für beide Fälle, bezüglich der zu verwendenden Sameumengen enthält der § 54 die nöthigen Erörterungen.

Die bei der Ansaat zu beobachtenden Grundsätze und Maßregeln lassen sich nun als solche unterscheiden, welche für die Ansaat im Allgemeinen, für alle Holzarten oder doch für eine Anzahl derselben Gültigkeit haben, und als spezielle Regeln für die einzelnen Holzarten, auf deren Eigenthümlichkeiten sich gründend. Wir werden nun hier zunächst diese allgemeinen Grundsätze und Regeln besprechen, wobei sich allerdings eine Erwähnung der einzelnen Holzarten vielfach nicht vermeiden lassen wird; im zweiten, der speziellen Betrachtung der einzelnen Holzarten gewidmeten Theil werden wir dann das, was bei jeder derselben besonders zu beachten ist, unter Bezugnahme auf diesen allgemeinen Theil erörtern.

Als solche allgemeine Grundsätze und Regeln aber werden hier zu besprechen sein jene für die Auswahl des Saatgutes, die Prüfung, Erhaltung und Beförderung der Keimkraft, für die Zeit der Aussaat, die Art und Weise der Ausführung dieser letztern unter Erwähnung der hiebei etwa zu benutzenden Instrumente und Hüllsmittel; auch die allgemeinen Grundsätze über die zu verwendenden Samenmengen gehören hierher, während die Angabe der bei den einzelnen Holzarten üblichen Quantitäten Aufgabe des speziellen Theils unseres Werthens ist.

§ 44.

Bedeutung und Auswahl des Saatgutes.

Für den Erfolg unserer Saaten überhaupt wird die Anwendung eines möglichst guten und vollkommenen Samens von großer Bedeutung sein,¹⁾ von ganz besonderer Wichtigkeit aber erklärlicher Weise für unsere Saatbeete, und die Auswahl solchen Samens verdient jedenfalls alle Rücksicht seitens des Forstwirthes. Wir dürfen uns hier jedenfalls ein Beispiel nehmen an den Landwirthen, die bekanntlich der Beschaffung eines möglichst vollkommenen Saatgutes große Sorgfalt zuwenden, während seitens der Forstwirthe in dieser Richtung sehr wenig geschieht — wobei allerdings zugegeben werden muß, daß die Sache für uns entschieden schwieriger liegt, indem die Qualität des Samens, namentlich auch soweit dessen Abstammung in Betracht kommt, sich in der äußern Erscheinung vielfach nicht zu erkennen giebt.

Verschiedene gewichtige Stimmen haben sich schon für die sorgfältigere Auswahl des Samens erhoben: so in früherer Zeit von Berg und Nördlinger,²⁾ später Burkhardt³⁾ und in besonders eindringlicher Weise Reuß.⁴⁾ Letzterer hebt namentlich hervor, daß zwischen dem Momente, wo der Baum überhaupt zum ersten Mal Samen trägt, und jenem, wo er die Fähigkeit hiezu wieder theilweise oder völlig verliert, ein längerer oder kürzerer Abschnitt liegen müsse, innerhalb dessen der Baum den besten und keimfähigsten Samen trage, während vor und nach diesem Zeitraum der Samen des zu jungen oder überalten Baumes geringwerthiger sein müsse; daß es aber jedenfalls wünschenswerth sei, den Samen von gerade in jener Periode stehenden Stämmen zu gewinnen.

Frischer, vollkommen ausgereifter Samen von gesunden, kräftigen Stämmen in mannbarem Alter wird hienach jedenfalls als der beste zu betrachten sein; seine Größe und sein Gewicht geben weitere Aufhaltpunkte für seine Güte. Bei an sich größerem Samen, so vor Allem bei der Eichel, läßt der Größenunterschied sich schon nach dem Augenmaß leicht erkennen, bei kleineren Sämereien, so bei den Nadelhölzern wird man etwa das Gewicht von je 100 Körnern der einen oder andern vorliegenden Sorte vergleichen. Direkte Versuche Nördlingers und Baur's⁵⁾ hinsichtlich des Einflusses der Größe des Samens auf jene

¹⁾ S. Gayers Waldbau S. 370.

²⁾ Krit. Blätter XLI. 2. S. 230.

³⁾ Säen u. Pflz. S. 420.

⁴⁾ Die Lärchenkrankheit. S. 38, 63.

⁵⁾ Krit. Blätter XLI. 2. 101 u. Monatsschr. f. d. F.-W. 1880. S. 605.

der daraus erzogenen Pflanzen, mit Eicheln angestellt, ergaben als Resultat, daß große Eicheln größere Pflanzen lieferten als kleine Eicheln, ein Resultat, das uns nicht wundern kann, wenn wir an die größere Menge von Nahrungsstoffen denken, welche eben der größere Samen dem Keimling bietet.

In wie weit die sonstigen Eigenschaften des Mutterbaumes, wie Vollholzigkeit, Langwüchsigkeit, Drehwuchs¹⁾ u. s. f. sich durch den Samen fortzupflanzen vermögen, ob der Samen von Krüppelbeständen wieder Krüppelbestände erzeugt, darüber fehlen sichere Anhaltspunkte vielfach noch — wir sind auch hier dem Landwirth, der rasch den Erfolg wahrnehmen kann, gegenüber im Nachtheil! — Doch spricht die Vermuthung einigermaßen für solche Vererbung, ja es läßt sich letztere in einzelnen Fällen sogar nachweisen: so erwachsen aus dem Samen der am sogenannten Süntel in Hannover wachsenden, kürzschaftigen und krummastigen Süntelbuche wieder Bäume gleicher Art, und einen ähnlichen Fall berichtet Nördlinger²⁾ bezüglich der Eiche aus Ungarn. Auch Burkhardt³⁾ theilt Aehnliches bezüglich der Lärche aus Oldenburg mit, woselbst das aus dem Samen einiger besonders schönwüchsigen Lärchenbestände erzogene Pflanzmaterial sehr gesucht und hoch bezahlt wird. Unter allen Umständen wird man gut thun, den Samen, in so weit man ihn selbst sammelt, nur von möglichst vollkommenen Stämmen und Beständen zu verwenden, sichtlich kleinen und schlecht entwickelten Samen überhaupt nicht zu sammeln oder — wie bei Eicheln, Kastanien wohl möglich — auszuscheiden. Bei gekauftem Samen, der freilich im gegenwärtigen Kulturbetrieb eine große Rolle spielt, fehlt natürlich jeder Anhaltspunkt für die Abstammung des Samens.

Von Wichtigkeit ist ferner die Verwendung möglichst frischen Samens. Von einer Anzahl unserer Holzarten kommt überhaupt nur ganz frischer Samen zur Verwendung, so von Eiche, Buche, Tanne (auch Ulme, Birke), da der Samen sich nur bis zum nächsten, der Samenreife folgenden Frühjahr aufheben läßt, ohne entsprechende Vorsicht schon bis dahin leicht Noth leidet. Von andern Holzarten, so von unseren wichtigen Nadelhölzern Fichte, Föhre, Lärche, läßt sich derselbe zwar (glücklicher Weise) mehrere Jahre keimfähig aufbewahren, doch nimmt die Keimkraft mit jedem Jahre ab, das Laufen des Samens erfolgt ungleichmäßig, was wegen der gemeinsamen Hebung der Bodendecke durch den Samen bei der Keimung, der Wegnahme einer etwa gegebenen

¹⁾ Heyers Waldbau. S. 107.

²⁾ Krit. Blätter XLI. S. 231.

³⁾ Säen u. Pflz. S. 420.

Schutzdecke von Moos und Reisig (§. § 58) von Bedeutung sein kann, und man verwendet auch diese Sämereien so frisch als möglich. — Bei einer weitern Zahl von Holzarten keimt der Samen regelmä^ßig — so bei Esche, Weißbuche, Birkenkiefer — oder doch häufig — Ahorn, Linde — erst im zweiten Jahr, von diesem letztern Zeitpunkt an seine Keimkraft meist völlig verlierend und also nicht mehr verwendbar.

§ 45.

Untersuchung der Keimkraft.

Die Keimkraft des zu verwendenden Samens zu kennen, zu wissen, wie viel schlechte Körner unter je 100 Stück durchschnittlich seien, ist unbedingt nöthig. Diese Kenntniß wird uns davor bewahren, unsere sorgfältig zugerichteten Saatbeete mit allzu geringem Samen überaupt anzusäen, sie wird uns vor zu dichter Aussaat mit gutem, vor zu schwacher Aussaat mit nur mittelmäßigem Samen bewahren. Die Erforschung der Keimkraft ist daher unsere Aufgabe, und doppelt nöthig ist dieselbe bei angekauftem Samen, um uns vor Betrug zu schützen.

Bei vielen Holzarten ist diese Prüfung der Keimkraft keine schwierige Aufgabe. Das äußere Ansehen des Samens, seine Farbe, das vollständige Ausfüllen der Schale durch den Kern, ein einfacher Schnitt durch den Samen gibt uns den nöthigen Aufschluß; so der dann zu Tag tretende weiße und wohl schmeckende Kern der Buchel und Edelkastanie, der grüne, saftige Samenlappen des Ahorn, der wachsartige, blauweiße Kern der Esche, der weiße Kern und kräftige Terpentineruch des frischen Tannensamens. Selbst bei den kleineren Nadelholzsamen — Föhre, Fichte, Lärche — wenden wir, wenn es sich um ein sofortiges Urtheil über die Güte des Samens handelt, diese sogenannte Schnittprobe an, wenn auch mit minderer Sicherheit.

Am schwierigsten wird ohne speziellen Versuch stets die meist geringe Keimkraft des kleinen Samens der Erle, Birke, Ulme zu bestimmen sein. Berquetschen der ersteren mit dem Zingernagel, wobei sich bei keimfähigem Samen Spuren ölliger Feuchtigkeit zeigen, Borschneiden des letztern zur Untersuchung des Kerns dienen als Hülfsmittel.

Für die weitaus am meisten zur Ansaat — im Freien wie im Saatbeet gelangenden Nadelhölzer: Fichte, Föhre, Lärche, bestehen aber noch eine ganze Reihe genauerer Prüfungsmethoden für die Keimfähigkeit des Samens, die sich fast sämtlich darauf gründen, daß man durch Feuchtigkeit und Wärme den Samen zu raschem Keimen zu bringen sucht. Solche Methoden sind: die Lappentprobe (Einlegen der abgezählten

Körner zwischen stets mäßig feucht und warm gehaltene Wollenlappen), die der Lappenprobe nahe verwandte Flaschenprobe¹⁾) (die Wollenlappen, in welche der Same eingerollt ist, stecken im Hals einer halbgefüllten Flasche, mit dem untersten Ende in das Wasser tauchend), die Scherbenprobe (Einlegen der abgezählten Körner in einen Blumentopf mit lockerer, feucht gehaltener Erde). Weniger Werth hat die sogenannte Feuerprobe, bei welcher man die Körner einzeln auf die stark erhitzte Herdplatte wirft — die guten springen platzend in die Höhe die schlechten, keine Feuchtigkeit mehr enthaltenden, verkohlen einfach.

Zur Erleichterung dieser Prüfung der Keimkraft wurden eine Anzahl von Keimapparaten erfunden, deren genauere Beschreibung uns hier zu weit führen würde; doch mögen dieselben wenigstens Erwähnung finden, um dem Leser die Möglichkeit, sich über dieselben zu orientiren, zu geben. Es sind:

Die Keimplatte von Nobbe (Tharander Jahrbuch. 1870. S. 109, Gayers Waldbau. S. 374.)

Der Keimapparat von Weise (Zeitschr. f. J.-u. J.-B. VIII. S. 415).

Die Keimplatte von Hanemann (Allg. J.-u. J.-B. 1870. S. 153).

Steiners Keimapparat (Centralblatt. 1877. S. 146).

Bei allen Keimversuchen ist die Erhaltung mäßiger Feuchtigkeit von großer Bedeutung; zu große Feuchtigkeit bringt leicht das Verschimmeln des Samens mit sich, während durch Austrocknen der Lappen, Erde &c. der Keimprozeß unterbrochen oder ganz verhindert wird. Gleichmäßige höhere Wärme, wie sie z. B. in einem Gewächshaus besteht, erweist sich der raschen Keimung sehr förderlich; so gelangt z. B. der Föhrensamen im Maschinenraum der Keller'schen Klenganstalt zu Darmstadt in 4—5 Tagen zur Keimung, Dank der gleichmäßigen und relativ hohen Temperatur.

Im Uebrigen ist aber wohl im Auge zu behalten, daß im Saatbeet stets weniger Körner zur Keimung gelangen als bei den Keimproben, da die für die Keimung nöthigen und günstigen Faktoren dort nie für jedes Samenkorn in gleichem Maße gegeben werden können wie bei der Probe. — Keimproben ohne Beachtung der nöthigen Vorsicht und Sorgfalt ausgeführt haben natürlich keinen Werth, da sie stets zu geringe Resultate ergeben müssen. Es empfiehlt sich auch stets die gleichzeitige Bannahme mehrerer Keimproben mit dem Samen gleicher Art, deren Durchschnittsergebniß dann ein viel verlässlicheres Resultat giebt.

¹⁾ Aus d. Walde VI. S. 158.

§ 46.

Erhaltung der Keimkraft, Beförderung und Verzögerung des Keimens.

Für die Erhaltung der Keimkraft ist die Behandlung und Aufbewahrung des Samens vom Moment der Einsammlung an von großer Wichtigkeit. — Sofortiges gutes Abtrocknen aller etwa bei feuchtem Wetter gesammelten, durch Thau oder Reif benetzten Samen und Zapfen, dünnes Aufschütten auf trocknen Böden und öfteres Umstoßen bis zu erfolgter Abtrocknung gilt als Regel und wird von G. Heyer¹⁾ selbst für jene Eicheln und Bucheln gefordert, die zur sofortigen Aussaat im Herbst bestimmt sind. — Die Samen dürfen aber auch nicht zu stark austrocknen, ja die Eicheln und Bucheln werden bei der Überwinterung sogar angeneht,²⁾ um solches Austrocknen zu verhindern; bei Nadelholzjämen geschieht letzteres durch die Aufbewahrung in den Zapfen.

Die meiste Sorgfalt erfordern einerseits jene Sämereien, welche dem Verderben schon während des ersten Winters gerne ausgesetzt sind, wie Eiche, Buche, Tanne, dann jene, welche erst im zweiten Jahr keimen, wie Esche, Weißbuche. Wir werden bei Besprechung der einzelnen Holzarten die Aufbewahrungsmethoden der verschiedenen Samen kurz besprechen.

Vielfach sind auch Versuche angestellt worden, durch welche Mittel das Keimen der Samen beschleunigt werden könne, um dadurch denselben möglichst rasch über die Gefahren, welche ihnen durch Vögel, Mäuse, Trockenheit usw. in der Zeit zwischen Aussaat und Aufgehen drohen, hinwegzuholen. — Das gebräuchlichste Mittel hiezu ist nun das Einquellen des Samens in reinem oder mit gewissen Stoffen verseztem Wasser. So empfiehlt dies Burkhardt namentlich bezüglich durchwinterter Bucheln³⁾, die ähnlich wie die Gerste bei der Malzbereitung behandelt und durch Auffeuchtung, Aufschichten in Haufen, in denen sie sich erhitzten, und öfteres Umschaukeln so weit gebracht werden sollen, daß unmittelbar vor der Aussaat der Keim eben zum Vorschein kommt. G. Heyer empfiehlt⁴⁾ das Einquellen von Bucheln, Tannen, Eicheln im Frühjahr in der Weise, daß man den Samen 8 bis 12 Tage mit feuchtem Sand mengt, mit Fichtenreisig deckt und öfters angießt; eben so lange will er den Lärchensamen in Wasser einquellen lassen. — Ginge hende Versuche

¹⁾ Allg. F. u. F.-B. 1866. S. 209.

²⁾ Genth, doppelte Riesen. S. 48. 56. Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 137.

³⁾ Säen u. Pflz. S. 138.

⁴⁾ Allgem. F. u. F.-B. 1866. S. 210.

Fürst. Pflanzenzucht im Walde.

hat Bonhausen angestellt;¹⁾ derselbe wandte zuerst Chlorwasser, dann verdünnte Mineralsäuren — Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure — an, ersteres wie letztere mit gutem Erfolg, wenn die Verdünnung eine genügende war, indem andernfalls jene Säuren zerstörend auf die Keimkraft wirken. Günstigen Einfluß auf die Beschleunigung der Keimung sowohl, wie auf reichlicheres Keimen älteren Samens zeigte auch Kalkwasser. Die Wirkung all dieser Mittel beruht wohl auf dem raschen Mürbemachen der äußeren Hülle, wodurch dem Sauerstoff der Luft wie dem Wasser der Zutritt, dem Keim das Hervorbrechen erleichtert wird. Bonhausen empfiehlt Kalkwasser vor den Mineralsäuren, einerseits weil seine Herstellung sehr einfach (gebraunter Kalk wird mit Wasser übergossen, und bleibt dies so lange stehen, bis es alkalisch reagirt, gelbes Curcuma-Papier bräunt), andererseits eine schädliche Einwirkung desselben auf die Keimkraft nicht zu fürchten ist.

Ähnliche Versuche von Hefz²⁾ führten zu gleichen Resultaten und zeigten für in Chlorwasser oder Kalkwasser eingeweichte Fichten- und Föhrensamen die bedeutende Abkürzung des Keimprozesses von 5—6 Tagen. — Eingequollte Nadelholzsamene müssen jedoch vor der Aussaat durch Vermischung mit feiner trockener Erde so weit abgetrocknet werden, daß sie nicht an einander hängen, was die Aussaat und namentlich deren Gleichmäßigkeit erschweren würde. Auch darf die Aussaat eingequellten und also schon in der Keimung befindlichen Samens nicht bei zu trockenem Wetter und Boden erfolgen — eventuell muß durch Gießen und Decken nachgeholfen werden — da jede Unterbrechung des einmal begonnenen Keimprozesses nachtheilig wird, ja verderblich für die ganze Saat werden kann.

Dieser Umstand und die Erschwerung der Aussaat des eingequellten oder mit feuchtem Sand gemischten Samens ist wohl der Grund, weshalb das sonst manche Vortheile bietende Anquellen des Samens noch keine allgemeinere Anwendung gefunden hat. — Es haben sich jedoch gegen jene künstliche Reizmittel, durch welche nicht nur die Keimung beschleunigt, sondern auch ein reichlicheres Keimen älteren Samens bezweckt werden soll, auch Stimmen erhoben, so von Neuß,³⁾ welcher die Ansicht ausspricht, daß allerdings durch solche Reizmittel manches Korn noch zum Keimen werde gebracht werden, das außerdem versagt hätte, daß aber aus solchen Körnern der Hauptzweck nach nur schwächliche und minder-

¹⁾ Allgem. F.- u. F.-B. 1858. S. 461; 1860. S. 8.

²⁾ Centr.-Blatt. 1875. S. 463.

³⁾ Die Lärchenkrankheit. S. 73.

werthige Pflanzen erzeugt würden. „Schlechten Samen können solche Mittel nie gut machen, wohl aber guten verderben.“ — Ein von Dr. Möller mit Schwarzkiefern samen angestellter Versuch¹⁾ ergab für das Einquellen des Samens ebenfalls kein günstiges Resultat; kürzeres Einweichen — bis 24 Stunden — zeigte gar keinen Erfolg, längeres Einquellen — 36 bis 40 Stunden aber erwies sich direkt nachtheilig, indem dann statt 70 Prozent, wie beim nicht eingequellten Samen, nur 40—50 zur Keimung gelangten, ein Resultat, das jedenfalls zur Vorsicht mahnen dürfte.

Aber nicht nur befördern, auch etwas zurückhalten lässt sich die Keimung, und zwar durch stärkere Deckung des ausgesäten Samens mit Erde, bei Herbstsaaten auch durch dichtes Bedecken des gefrorenen Bodens während des Winters mit Reisig, das man nicht zu bald abnimmt. Eine solche spätere Keimung kann wünschenswerth sein bei Holzarten, welche wie Eiche und Buche durch Spätfriüste gefährdet sind; doch wird man sich in den meisten Fällen zweckmässiger durch Schutzgitter, Besticken der Beete mit Reisig u. dergl. helfen, eventuell auch bei Frühjahrsaat durch spätere Vornahme der Saat (siehe § 61).

§ 47.

Zeit der Ansaat.

Die Ansaat der Saatbeete kann entweder im Herbst oder im Frühjahr erfolgen, in letzterem wieder früher oder später; eine andere Saatzeit, im eigentlichen Sommer, wird nur bei der Ulme unmittelbar nach der Samenreife (Anfang Juni) zur Anwendung gebracht. Als Regel dürfte wohl gelten, daß alle Samen, welche beim Aufbewahren über Winter größere Mühe und Kosten verursachen und zugleich einer Gefährdung ihrer Keimkraft durch Austrocknen, Erhitzung &c. ausgesetzt sind, wo möglich alsbald nach der Reife im Spätherbst ausgesät werden, so Eiche, Buche, Tanne. Auch Erlen, Birken, Ahorn kann man noch im Herbst säen, und letzterer zumal keimt dann im Frühjahr sicherer und reichlicher als bei der Frühjahrsaat; wo man die Ulme nicht im Juni säet, wählt man auch die Herbstsaat. — Dagegen werden Fichten-, Föhren- und Lärchen-Samen, die leicht und sicher zu überwintern sind, häufig auch erst während des Winters und bis zum Frühjahr ausgesetzt werden, stets erst im Frühjahr gesät. In beiden Fällen folgen wir dem Fingerzeig der Natur, welche ja auch die erstgenannten Samen im Herbst, die letzteren im Frühjahr aussät.

¹⁾ Seckendorff, d. östr. Versuchsw. I. S. 118.

Droht aber in mäusereichen Jahren, zumal in Saatbeeten, welche nicht weit von Feldern abliegen, den Samen der Eiche, Buche, Kastanie die Gefahr des Verzehrt-werdens im Winterlager, so ist man genöthigt, diese Samen an geschütztem Ort zu überwintern und erst im Frühjahr auszuüben; ebenso kann der Bezug des Samens aus größerer Entfernung, das spätere Eintreffen desselben in Verbindung mit frühzeitigem Eintritt des Winters zur Frühjahrssaat nöthigen — so bei Tannensamen, ungarischen Eicheln. Der Wunsch, im frisch angelegten Saatbeet den Boden während des Winters tüchtig ausfrieren zu lassen, bindenden Boden dadurch entsprechend zu lockern, gibt ebenfalls nicht selten Veranlassung, die Frühjahrssaat statt der Herbstsaat anzuwenden, ebenso der Umstand, daß etwa die anzusägenden Beete noch mit den erst im Frühjahr zu verwendenden Pflanzen besetzt sind; — bei der mancherseits empfohlenen Brache der im Frühjahr abgeleerten Beete fällt dieser Grund allerdings weg.

Herbstsaaten pflegen stets früher aufzugehen als Frühjahrssamen, und die Heimlinge empfindlicher Holzarten leiden dann leicht durch Spätfröste — unter Umständen ebenfalls ein Grund zur Frühjahrssaat; doch läßt sich, wie am Schluß des vorigen Paragraphen angegeben, das Keimen der Herbstsaat auf künstliche Weise etwas verzögern.

Die Aussaat der Samen im Frühjahr nimmt man zweckmäßig nicht zu bald vor; bei mangelnder Luft- und Bodenwärme verzögert sich die Keimung doch und der länger liegende Samen ist dem Verzehren durch Vögel und sonstige Feinde längere Zeit ausgesetzt als bei späterer Saat. Letztere soll aber auch nicht zu spät erfolgen, da die im Mai nicht selten eintretende längere Trockenheit die Keimung gefährden kann; die Zeit von Mitte April bis Anfang Mai dürfte im Allgemeinen die beste Saatzeit sein, wobei rauhes Klima spätere Saat bedingt, mildes Klima frühere Saat gestattet. Schmitt¹⁾ empfiehlt nach seinen bei Fichtensaaten gemachten Erfahrungen für mittleres und rauhes Klima den Monat Mai für die Vornahme der Saat und theilt mit, daß auch Saaten im Juni noch guten Erfolg zeigten; doch werden so später Saat entstammende Pflänzchen in der Entwicklung stets hinter den früher aufgegangenen zurückbleiben.

Besondere Erwägung erfordert die Zeit der Aussaat jener schon mehr erwähnten Samen, welche eine ein Jahr dauernde Keimruhe besitzen, erst im zweiten Jahr keimen. Sät man dieselben sofort im Herbst oder Frühjahr nach der Samenreife aus, so ist zu fürchten, daß

¹⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 68.

die betreffenden Beete während des Sommers stark verunkrauteten oder daß beim Reinigen derselben der Same mit den Unkrautwurzeln herausgerissen wird; auch das Abschwemmen der bloß liegenden Beete während des Sommers ist wohl zu besorgen. Man hilft sich nun entweder durch ein Jahr dauerndes Einschlagen des Samens in Sand oder Erde, oder dadurch, daß man die alsbald angesäten Beete mit handhoher Nadel-schicht¹⁾ oder mit Laub, das durch aufgelegtes Reisig festgehalten wird, bedeckt und hiert durch das Erscheinen von Unkraut, wie das Abschwemmen des Bodens verhindert. Wir empfehlen dieses Verfahren insbesondere für Eschen-saatbeete.

§ 48.

Vorbereitung zur Aussaat; Vollsaat und Rillensaat.

Wir haben oben (§ 19) gehört, in welcher Weise die zweite Bearbeitung und Zurichtung der Saatbeete im Frühjahr geschieht; dieselbe ist eine völlig gärtnermäßige und erfolgt um so sorgfältiger, je kleiner der auszusärende Samen. Insbesondere erfordert die Anwendung von Sälattern, Saathrettern und dergleichen Vorrichtungen, die wir unten kennen lernen werden, gute Einebnung des Beetes, da sonst die eingedrückten Rillen ungleich tief werden, die Bedeckung des Samens dadurch auch leicht ungleich wird, was für den Erfolg der Saat von wesentlicher Bedeutung sein kann.

Der Boden selbst soll sich vor der Einsaat wieder etwas gesetzt haben und es ist daher gut, wenn die letzte Bearbeitung wenigstens einige Tage vor der Saat stattgefunden hat. Bonhausen empfiehlt,²⁾ den Boden im Frühjahr so zeitig als möglich herrichten zu lassen; die an der Oberfläche liegenden Unkrautsamen keimen, durch Bearbeitung mit dem Rechen sollen dann die Unkrautpflänzchen herausgerecht oder durch Obenaufliegen zum Vertrocknen gebracht werden und neue Samen in günstige Keimlage kommen. Diese Operation, mehrmals wiederholt, soll sehr günstigen Erfolg bezüglich der Verminderung des Unkrautes zeigen. — Erscheint der einige Zeit vor Ausführung der Saat zugerichtete Boden etwa in Folge starken Regens in der Oberfläche festgeschlagen oder durch den Regen gefolgte Trockenheit verkrustet, so hilft ein leichtes Überrechen beiden Mißständen ab.

Die Aussaat kann nun als Vollsaat oder als Rillensaat erfolgen. Früher war erstere vielfach im Gebrauch und Biermanns säte

¹⁾ Krit. Blätter. L. 1. §. 139.

²⁾ Allgem. F. u. F. B. 1880. §. 42.

seine Saatbeete stets voll an; — jetzt sind die Vortheile der Rillensaat so allgemein anerkannt, daß Vollsaaten wohl nur ausnahmsweise im Saatbeet vorkommen; eine solche Ausnahme gibt uns Burkhardt bezüglich der Erle an,¹⁾ Bonhausen empfiehlt die Vollsaat für Ulmen und Birken (auch Pappeln und Platanen).²⁾

Die Vortheile der Rillensaat aber bestehen in der viel sicherern gleichmäßigen Aussaat, in der leichteren Pflege der Pflanzen durch Entfernung des Unkrautes, Lockern des Bodens, Durchrupfen zu dichter Wuchs, der Möglichkeit einer Nachdüngung auf den Zwischenräumen, sowie der Verhinderung des Ausfrierens der Pflanzen durch Belegen dieser Zwischenräume mit Moos, schließlich in dem erleichterten Ausheben der Pflanzen gegenüber jenen im voll angesäten Beet. Auch dürfte es noch als Vortheil zu erwähnen sein, daß eine annähernde Bestimmung der vorhandenen Pflanzenzahl auf den durch Rillensaat bestellten Beeten viel leichter möglich ist, als bei der Vollsaat.

Während nun bei der Vollsaat, wo solche gleichwohl noch angewendet wird, das geebnete Beet breitwürfig und möglichst gleichmäßig besät, und der Samen dann durch Ueberstreuen mit feiner Erde, Rasenrasche re. entsprechend dick und ebenfalls möglichst gleichmäßig — was gleichfalls schwieriger als bei der Rillensaat zu bewerkstelligen ist — bedeckt wird, ist bei der Rillensaat ein entsprechendes *K*eimlager, die Saatrille zu beschaffen. Die Entfernung dieser Rillen von einander, deren zweckmäßigste Breite und Tiefe, ihre Richtung nach der Länge oder Breite der Beete und endlich die einfachste und sachgemäße Art ihrer Herstellung — dies Alles verschieden nach Holzart, wie nach dem Alter, welches die Pflanzen im Saatbeet erreichen sollen — werden uns nun in den nächsten Abschnitten zu beschäftigen haben.

§ 49.

Entfernung der Rillen von einander.

Bezüglich der Entfernung, in welcher die Saatrillen zu ziehen sind, werden zunächst die Holzart und deren raschere oder langsamere Entwicklung in den ersten Lebensjahren, dann das Alter und respektive die Größe, welche die Pflanzen im Saatbeet erreichen sollen, bestimmd sein, jedoch gehen auch unter sonst gleichen Verhältnissen die Ansichten der Pflanzenzüchter nicht unbedeutend auseinander.

¹⁾ Säen u. Pflz. S. 227.

²⁾ Allg. F.- u. F.-B. 1880. S. 46.

Als allgemein gültiger Grundsatz wird jedenfalls festzuhalten sein, daß jede zu große Entfernung der Rillen als Raumverschwendug auf unsren kostspieligen Saatbeeten ebenso von Uebel ist, wie ein zu enges Aneinanderlegen der Rillen, durch welches die Entwicklung der Pflanzen und namentlich die so vortheilhafte Lockerung des Bodens zwischen den Rillen gehemmt wird.

Als Minimum der Rillenentfernung dürfte jene der bayerischen Anleitung vom Jahr 1862,¹⁾ sowie die von Schmitt²⁾ empfohlene mit nur 10 cm zu betrachten sein, anwendbar für die Erziehung ein- und zweijähriger Nadelholzpflanzen; sie gestattet eben noch eine entsprechende Bodenlockerung mit schmalem Hækchen. Burkhardt³⁾ gibt für Fichten die Entfernung auf 22, Hęß⁴⁾ sogar auf 24—36 cm an; — wir möchten aber diese Entfernungen schon für überflüssig groß und eine solche von 10 bis höchstens 15 cm nach unsren Erfahrungen für Nadelhölzer als völlig genügend erachten. Für die sich schon im ersten Jahr oft sehr kräftig entwickelnden Laubhölzer — Eichen, Ahorne, Kastanien, Akazien — sind selbstverständlich größere Entfernungen, bis zu 25 und 30 cm, angezeigt, und das Gleiche wird da der Fall sein, wo selbst zur Saat nicht Beete, sondern größere Ländere gewählt werden. Hier muß der Abstand der Rillen so groß sein, daß der jätende und lockende Arbeiter sich ohne Beschädigung der Pflanzen zwischen den Saatrillen bewegen kann.

Neben der Holzart ist, wie oben erwähnt, die Zeit, welche die Pflanzen im Saatbeet stehen, die Stärke, welche sie in demselben erreichen sollen, von Einfluß auf die zu wählende Entfernung der Saatrillen; je länger diese Zeit dauert, je größer sonach die Pflanzen werden sollen, um so weiter wird man die Rillen behufs Gewährung des nöthigen Wachsraumes aus einander legen. So würde sich gegenüber der oben angegebenen Entfernung von 10—15 cm für ein- und zweijährige Fichten eine solche von 20 cm dort empfehlen, wo man kräftige dreijährige Pflanzen zur Verwendung ohne Verschulung erziehen will — und Aehnliches gilt natürlich für die übrigen Holzarten.

§ 50.

Breite der Rillen.

Wie über die Entfernung, so differiren die Ansichten auch über die Breite, welche den Saatrillen zu geben ist, nicht unwesentlich. Während man größere Samen — Eicheln, Bucheln, Kastanien — wohl fast

¹⁾ Forstl. Mitth. XI. S. 110.

²⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 63.

³⁾ Säen u. Pflz. S. 358.

⁴⁾ Allgem. F.- u. F.-B. 1866. S. 210.

allenfallsen in schmale Rillen, Same möglichst hinter Same, legt, werden die übrigen Laubhölzer, sowie die Nadelhölzer bald in schmale, bald in breitere Rillen gesät. Während Burkhardt¹⁾ z. B. für Fichten 8—9 cm breite Rillen, Bonhausen²⁾ solche von 10 cm Breite empfiehlt, macht Schmitt dieselben nur 3 cm breit und die schon mehrerwähnte bayrische Anleitung geht noch weiter, indem sie die knapp 3 cm breiten Rillen nicht voll ansät, sondern mit Hilfe des dazu eingerichteten Saatbretts (vergl. § 53) aus jeder solchen Rille eine ganz schmale Doppelrille macht, in diesen die Pflanzen dann möglichst einzeln stellend.

Wir geben auf Grund unserer eigenen Erfahrungen und Beobachtungen diesen schmalen Rillen entschieden den Vorzug vor den breiten. Wir sehen, daß in den letztern sich die Randpflanzen stets viel kräftiger entwickeln als die in der Mitte der Rille stehenden, im Luft- und Bodenraum beengten Pflanzen, und es liegt daher nahe, durch ganz schmale Rillen möglichst viele Randpflanzen zu erziehen. Breite Rillen, etwas dicht angefaßt und selbst nur zwei Jahre stehend, liefern stets sehr viel Ausschußmaterial; dünner Stand und kräftige Düngung werden diesen Nachtheil allerdings nicht unbedeutlich mindern, wie dies ein Versuch Bonhausens,²⁾ der die kümmernden Pflanzen in der Mitte breiter Rillen durch Begießen mit Mistjauche kurirte, beweist. Bonhausen bestätigt hiervon übrigens selbst das Zurückbleiben und Kümmern der Pflanzen in der Mitte der breiten Saatrille!

Als Vortheil der breiten Rille wird die größere Pflanzenmenge und die mindere Gefahr des Aufrierens geltend gemacht. Ersteres mag der Fall sein, aber die Pflanzen sind schwächer, enthalten, wie oben schon gesagt, viel Ausschuß; letzterer Gefahr aber läßt sich auch durch andere, bessere Schutzmittel vorbeugen.

§ 51.

Tiefe der Rillen.

Die Tiefe, welche den Rillen zu geben ist, steht in innigem Zusammenhang mit der Stärke der Bedeckung, welche der Samen erhalten soll. Indem wir die Rille entsprechend tief eindrücken oder ausheben und sodann nach erfolgter Einsaat wieder ausfüllen, haben wir die möglichst genaue Regulirung der Deckung in der Hand, in viel höherem Grad, als dies bei dem Uebererden einer Vollsäat der Fall ist. Wir werden daher hier die Frage: wie tief soll der Same zugesetzt werden?

¹⁾ Säen u. Pflz. S. 358.

²⁾ Allg. F.- u. J.-B. 1880. S. 46.

zu behandeln haben, da deren Beantwortung maßgebend ist für die Tiefe der herzustellenden Rillen.

Die Bedeckung soll das Austrocknen des Samens, des hervorbrechenden Keims, hindern, ihn gegen das Verzehren durch Vögel, das Verschwemmen durch Regengüsse schützen; eine entsprechende Bedeckung wirkt stets vortheilhaft, ja ist unbedingt nötig. Anderseits aber darf dieselbe auch den zur Keimung nötigen Luftzutritt und Luftwechsel im Boden nicht abhalten, und ein zu tiefes Decken des Samens kann dessen Keimen sehr erschweren, ja vollständig verhindern; kleine Samen, wie Birke, Ulme, sind hierin sehr empfindlich. — Die physikalische Beschaffenheit des Bodens und des zur Deckung benutzten Materials ist erklärlicher Weise von wesentlichem Einfluß auf die zulässige Stärke der Deckung — mit lockerem Boden, humoser Erde darf man stärker decken als mit bindenderem Boden, der als Deckungsmittel überhaupt möglichst vermieden werden sollte.

Die Praxis hat bezüglich der Stärke der Deckung, welche für die einzelnen Holzsämereien als die beste zu erachten ist, sich nach und nach ihre Regeln gebildet und gesammelt, und ist hiebei von dem Grundsatz ausgegangen, daß je größer der Samen, um so stärker auch seine Bedeckung sein dürfe, eine Regel, welche die nachfolgend mitgetheilten Versuche Baur's¹⁾ auch mit einer einzigen Ausnahme (bez. der Akazie) bestätigt haben.

Diese Versuche, im Hohenheimer Forstgarten mit großer Genauigkeit und Sorgfalt angestellt, haben nun folgende Stärke der Deckung, also Tiefe der Saatrillen — nur bei großen Samen, wie Eicheln und Kastanien ist die Stärke des Samens, also 1—2 em noch zuzugeben — mit entsprechend lockerem Material (durchgesiebte Erde) als die beste ergeben:

Für Eichen 3—6 Centimeter,

" Buchen	1—4	"
" Ahorn	1—2	"
" Akazie	4—5	"
" Erle	1/2—1	"
" Tanne	bis 2	"
" Fichte	1—1 1/2	Centimeter, mehr nur bei Deckung mit
" Föhre		sehr lockerem, humosem Boden;
" Lärche		
" Ulme	möglichst schwache Deckung; eine Decke von	
	1 1/2 em	verhindert bereits jedes Keimen.

¹⁾ Monatschr. f. d. F- u. J.-W. 1875. S. 337.

Für die Schwarzkiefer gibt ein Versuch Möllers¹⁾ eine Bodendecke bis zu 2 cm Stärke als das Richtigste an, während bei 4 em fast aller Samen ausblieb.

Die stärkere Deckung hat dabei stets ein späteres Keimen, ein das Maß des Zulässigen übersteigendes Decken zunächst viel geringere Pflanzenzahl, sowie schwächliche, kümmernde Pflanzen zur Folge; man wird sich daher unter allen Umständen vor Anfertigung zu tiefer Rillen, vor Ueberschreitung der durch obige Angaben bezeichneten Maxima der Tiefe zu hüten haben.

Zu seichte Rillen und damit zusammenhängend zu schwache Deckung des Samens erhöhen dagegen die Gefahr des Austrocknens, des Herausschwemmens des Samens bei Regen, des Verzehrens (der Nadelholzsamen) durch Vögel und sind daher ebenfalls zu meiden.

§ 52.

Richtung der Rillen.

Die Rillen können entweder in der Längsrichtung der Beete oder parallel der schmalen Kante gezogen werden. Im Allgemeinen wird man dieser letztern Richtung, welche das Eindrücken der Rillen, die Anwendung von Säevorrichtungen, das Behäckeln der Zwischenräume von den schmalen Wegen aus wesentlich erleichtert, den Vorzug geben und sieht sie auch in den meisten Saatbeeten angewendet.

Dagegen werden tiefere Rillen, welche für Eicheln, Kastanien, etwa auch Bucheln nöthig sind und die sich nicht eindrücken lassen, sondern mit Hacke, Rillenzieher, Pflug &c. nach der Schnur gezogen werden müssen, meist nach der Längsrichtung der Beete mit Rücksicht auf diese Art ihrer Herstellung, welche lange Riesen wünschenswerth macht, gelegt. — In vielen Fällen werden übrigens gerade bei diesen Holzarten die Saaten nicht auf Beete, sondern auf größere Ländere vorgenommen, wobei dann die Frage der Rillenrichtung gegenstandslos wird.

§ 53.

Herstellung der Rillen.

Dieselbe geschieht, wie wir eben schon berührt, auf doppelte Weise: durch Eindrücken mit Hülse von Saatlatten, Saatbrettern und ähnlichen Vorrichtungen für kleinere, minder tiefe Rillen bedürfende


¹⁾ Seckendorff, östr. Versuchsw. Bd. I. S. 119.

Samen, oder durch Anfertigung mit Haken, Pflug u. dgl. für größere Samen, welche eine stärkere Deckung und also tiefere Rillen verlangen.

Das einfachste Instrument zum Eindrücken von Saatrillen ist die Saatlatte, wie sie Schmitt für Fichten anwendet. Dieselbe ist eine Latte, deren Länge gleich der Beetbreite (1 bis 1,2 m), deren Breite gleich dem Abstand der Rillen (10 bis 15 cm), deren Dicke endlich gleich der Breite der einzudrückenden Rillen (ca. 3 cm). Die schmale Seite wird parallel zur schmalen Kante des Beets entsprechend tief durch zwei in den Zwischenwegen sich gegenüberstehende Arbeiter eingedrückt, die breite Seite der Latte gibt dann durch Umschlagen den Zwischenraum, dann folgt abermaliges Eindrücken u. s. f.

Sollen die Rillen breiter werden, so benutzt man zum Eindrücken eine Latte von entsprechender Breite, fügt etwa auch deren mehrere in dem der Rillenentfernung entsprechenden Abstand durch ein paar Querhölzer zusammen oder misst diesen Abstand jedesmal durch ein Hölzchen ab.

Als sehr zweckmäßig zum Eindrücken der Rillen kann das bayrische Saathrett¹⁾ empfohlen werden. Dasselbe (Fig. 13) besteht aus einem 26 cm breiten und etwa 3 cm starken Brett, dessen Länge der Beetseite entsprechend 1—1,2 m beträgt; auf dieses Brett sind nun zwei je 3 cm breite Hohlleisten in einer Entfernung von 10 cm aufgenagelt,



Figur 13.


während die Entfernung jeder Leiste von der betr. Längskante 5 cm beträgt.

Durch Auslegen dieses Brettes, welches bei den angegebenen Dimensionen für die Benutzung bei Fichten-, Föhren- und Lärchensaatbeeten bestimmt ist und durch andere Dimensionen des Brettes, der Leisten und des Abstands dieser letztern entsprechend modifiziert werden kann, auf das gut geebnete Beet und Auftreten zweier kräftiger Personen drücken sich nun zwei Doppelrillen hinreichend scharf dem Boden ein und zugleich markiert sich die Kante des Brettes auf der Bodenoberfläche deutlich genug,

¹⁾ Forstl. Mitth. XI. S. 123.

um Anhalt dafür zu geben, wie das Brett anstoßend wieder angelegt werden soll.

Dankelmann hat dies Saatbrett im Nürnberger Reichswald gesehen und dasselbe einigermaßen modifiziert im Eberswalder Forstgarten zur Anwendung gebracht¹⁾. Dieses modifizierte Saatbrett (Fig. 14) hat



Figur 14.

doppelte Breite wie das bayerische und auf der Unterseite 4 Paar Doppelrillen, welche dreikantig sind und sonach statt der runden Erhöhung des bayerischen Brettes einen scharfen Kamm zwischen den Doppelrillen herstellen; von letzteren werden sonach bei jedesmaligem Auflegen 4 zugleich eingedrückt. Dabei wird stets mit 2 abwechselnd aneinander zu stoßenden Saatbrettern gearbeitet, wodurch

die möglichste Einhaltung der stets senkrechten Richtung der Rillen zur Längskante des Saatbeets gesichert ist.

Dieses breite Brett mag auf sehr leichtem Sandboden ganz zweckmäßig sein, auf lehmigeren Böden werden sich aber in Folge der großen Fläche des Bretts die Saatrinnen vielfach viel minder scharf abdrücken, insbesondere aber ungleich tief werden, wenn das Beet nicht vollkommen eben ist. Bei dem schmäleren Brett mit nur zwei Leisten werden beide Nachtheile in minderem Maße hervortreten, bez. leichter überwunden werden.

Aehnlich dem bayerischen Saatbrett ist das Lang'sche Rillenbrett²⁾ welches einfache, nicht Doppelrillen, mittelst aufgenagelter vierkantiger Leisten eindrückt. Ein solches würde sich z. B. für die Saat von Ahorn, Eschen, Tannen empfehlen, und würden hiebei an Stelle der Hohlleisten 3 cm breite und etwa 2 cm starke glatte Leisten zu treten haben.


Wir möchten den Saatbrettern entschieden den Vorzug vor der Saatlatte geben, da durch dieselben stets 2 resp. 4 Rillen zu gleicher Zeit eingedrückt werden, deren Tiefe eine stets gleiche und von den Arbeitern unabhängige ist, endlich durch das Auftreten des Brettes gleich-

¹⁾ Zeitschr. f. F.- u. G.-W. V. S. 65.

²⁾ Krit. Blätter. XLVI. 1. S. 173.

zeitig der Boden etwas angedrückt und bei etwa frisch umgearbeitetem Boden dessen späterem Eezen vorgebeugt wird. — Lehmiger Boden muß jedoch auf der Oberfläche etwas abgetrocknet sein, da er sich sonst in die Hohlkehle und zwischen den Leisten zu stark anhängt, das scharfe Eindrücken der Rillen erschwert.

Auch Walzen werden zur Herstellung von Rillen benutzt, und Figur 15 stellt eine solche vor¹⁾), wie sie an einigen Orten in Böhmen



Figur 15.

angewendet wird. Die Walze von hartem Holz hat eine der Beetbreite von 1 m entsprechende Länge, einen Durchmesser von 40 cm und läuft zwischen zwei durch Querhölzer verbundenen, etwa 2 m langen Armen. Auf der Walze sind nun die 5 cm breiten, 1,5 cm hohen Rillenleisten in dem Rillenabstand entsprechender Entfernung angenagelt; ihre zweimalige Unterbrechung soll das Verschlämnen der Rillen verhüten, scheint uns aber überflüssig. Bei der Anwendung wird nun die Walze unmittelbar vor der Unsaat von zwei in den schmalen Wegen gehenden Arbeitern über die Beete geschoben, wobei ihre Schwere von etwa 80 Kilogramm zur erforderlichen Eindrückung der Rillen genügt. Auch hier erfolgt gleichzeitig ein entsprechendes Andrücken des frisch gelockerten Bodens, wie bei den Saatbrettern, auf dem ganzen Beet, und die Anfertigung der Rillen mag bei guter Führung der Walze durch die Arbeiter sehr rasch und präzis von statthen gehen.

¹⁾ Centr.-Blatt. 1879. S. 267.

Während die eben geschilderten Vorrichtungen zum Eindrücken der feuchten Saatrinnen, wie sie für die Nadelholz- und leichteren Laubholzsamen nöthig sind, dienen, werden die tieferen Saatrinnen für Eicheln, Kastanien, etwa auch Bucheln, die eine stärkere Bedeckung vertragen und selbst bedürfen, mittelst anderer Hülfsmittel gefertigt.

Das einfachste Instrument hiezu ist die gewöhnliche Haue, mittelst der man längs der gespannten Schnur ein entsprechend tiefes Gräbchen zieht; die Saatrillen werden in diesem Falle der Länge der Beete nach gelegt und die Schnur eventuell gleich auf möglichste Länge, über mehrere neben einander liegende Beentreihen oder Länder, gezogen, um den mit dem Weiterstecken der Schnur verknüpften jedesmaligen Zeitaufwand möglichst zu reduziren. — In ähnlicher Weise, wie die Haue, wendet



Figur 16.

Burkhardt²⁾ erwähnt auch ein für Eichen sowohl bei der Aussaat ins Freie (auf bisherige Felder), wie im Saatkamp anwendbares Steckbrett (Figur 17); durch Eindrücken eines Brettes, an welchem sich Zapfen von entsprechender Länge und Stärke in geeigneter Distanz, im Saatbeet also sehr nahe befinden, entsteht eine der Zapfenzahl entsprechende Anzahl von Stecklöchern von genau gleicher Tiefe. Das gegen



Figur 17.

die Anwendung eines solchen Steckbretts etwa geltend gemachte Bedenken, daß die Eichel hiebei nicht in die naturgemäße horizontale Lage komme, in Folge dessen entweder das Würzelchen oder das Stengelchen eine mißliche Krümmung um die Eichel machen müsse, scheint nach einem von uns angestellten desfallsigen Versuch in so fern unbegründet, als ein Unterschied in der Entwicklung der Pflanzen sich nicht wahrnehmen ließ. (Vergl. im II. Theil § 99, die Eiche.)

¹⁾ Forstl. Mitth. XI. S. 123.

²⁾ Säen u. Pflz. S. 62, s. auch Heyer, Waldbau, S. 146.

§ 54.

Bestimmung der nöthigen Samenmenge.

Die Angabe, welches Samenquantum pro Ar bei jeder einzelnen Holzart zu verwenden sei, wird im II. Theil unseres Werkchens, welcher sich die Besprechung der einzelnen Holzarten zur Aufgabe gemacht hat, erfolgen; hier haben nur die allgemeinen Gesichtspunkte, nach welchen dies Quantum zu bestimmen ist, ihren Platz zu finden.

Die Samenmenge, welche pro Flächeneinheit des Saatbeets zur Verwendung kommen soll und die bei allen kleineren Samen nach dem Gewicht (Kilogramm), bei einigen großen Samenarten nach dem Maß (Hektoliter) bestimmt wird, ist für eine Holzart nicht stets die gleiche.

In erster Linie kommt die Güte des Samens selbst in Betracht, wie sie etwa durch Keimproben festgestellt wurde; je geringwerthiger der Samen, um so dichter selbstverständlich die Saat. Holzarten, welche erfahrungsgemäß viel tauben Samen erzeugen, wie Lärchen, Ulmen, werden stets etwas dicht zu säen sein, während man den stets sehr keimkräftigen Samen der Akazie, Schwarzkiefer entsprechend dünner sät. Bei einigen Holzarten, deren Samen stets ein hohes Keimprozent besitzt, wie Eicheln, Kastanien, ist es die allerdings nicht unbedeutend schwankende Größe der Früchte, welche das nöthige Samenquantum bedingt und resp. modifizirt.

In Weiterem ist wohl ins Auge zu fassen, wie lange die erscheinenden Pflanzen bis zu ihrer Verschulung oder direkten Verwendung ins Freie im Saatbeet stehen sollen; je rascher letztere erfolgen, um so dichter wird man säen dürfen, und sonach für Fichten, welche einjährig verschult werden sollen, dichtere Saat anwenden dürfen, als wenn deren Verwendung in dreijährigem Alter ohne vorherige Verschulung beabsichtigt ist.

Die langsamere oder raschere Entwicklung der Pflanzen, je nach der Holzart, ist ebenso ein Faktor bei der Bestimmung der Samenmenge; die fast durchaus in den ersten Lebensjahren sich rascher entwickelnden Laubhölzer — man vergleiche Ahorn, Eiche, Esche mit Fichte und Tanne! — erfordern deshalb eine verhältnismäßig minder dichte Saat.

Erklärlicher Weise ist aber auch die angewendete Samenmenge und bezüglich der dadurch bedingte mehr oder minder dichte Stand der Pflanzen auf die Entwicklung der letztern nach Stamm und Wurzelbildung von großem Einfluß; ein dünner Stand pflegt (bis zu gewissen Grenzen) stets kräftigere Pflanzen und reichlichere, allseitigere Wurzelbildung zur Folge zu haben. So kann man z. B. beobachten, wie dicht stehende zwei- und dreijährige Fichten fast zu einer Pfahlwurzelbildung

genötigt werden, nachdem namentlich den in der Mitte breiterer Rillen befindlichen Pflanzen die Möglichkeit der Bildung von Seitenwurzeln durch ihre Nachbarn entzogen wird; für die spätere Verpfanzung ist dies geradezu als Mißstand zu betrachten. — Einen exakten Versuch über diesen Einfluß der Samenmenge auf Zahl und Entwicklung der Pflanzen, angestellt im Forstgarten zu Eberswalde, theilt Riedel mit.¹⁾ Hierach wurden auf vier gleichgroßen, je 31 Quadratmeter haltenden Flächen Kiefern angepflanzt und zwar mit Samenquantitäten, welche der Verwendung von 1,75 . . . 1,50 . . . 1,25 . . . 1 Kilogr. pro Ar entsprechen. Das Resultat war, daß zwar die Zahl der brauchbaren Pflanzen Hand in Hand ging mit der verwendeten Samenmenge — sie betrug 25479, 21531, 15549 und 15306 Pflanzen —, daß aber die geringeren Samenmengen viel kräftigere Pflanzen erzeugten: das Tausend derselben wog in obiger Reihenfolge 1,300 . . . 1,317 . . . 1,727 . . . 1,733 Kilogr.

Da es sich aber meist um Erziehung kräftiger Pflanzen mit guter Wurzelbildung handelt, so wird man einer mäßig dichten Saat, welche entsprechend viele und hinreichend kräftige Pflanzen liefert, den Vorzug geben.

Auch die Güte des Bodens, die mehr oder minder reichliche Düngung spricht hiebei wohl ein Wort mit, und dichte Saat auf schwächerem Boden wird stets ein unbefriedigendes Resultat geben.

Wie bei Ansaaten ins Freie, so wird auch bei der Ansaat von Saatbeeten die Saatmethode von nicht unwesentlichem Einfluß auf die nötige Samenmenge sein: zu der (seltener angewendeten) Vollsaat wird man mehr Samen verwenden als zur Rillensaat, und bei letzterer wird wieder die Breite und Entfernung der Rillen von großer Bedeutung sein. Durch letzteres Moment werden denn auch wohl die oft so abweichenden Angaben, welche wir in unserer Literatur über die zweckmäßig zu verwendenden Samenmengen finden, bedingt sein.

§ 55.

Die Ansaat selbst; Säevorrichtungen.

Das Einlegen des Samens in die Saatrillen, die Aussaat selbst, erfolgt nun bei größeren Samen, wie Eicheln, Bucheln, Tannensamen, stets aus der Hand, und ebenso können die mit größeren Flügeln versehenen Laubholzsamen, wie Ahorn, Esche, Ulme, nicht wohl anders gesät werden. Ebenso erfolgt die Vollsaat stets aus der Hand, ohne Säevorrichtungen.

Auch die kleineren Samen, so also jene von Fichte, Föhre, Lärche, wurden ursprünglich und werden vielfach noch jetzt in gleicher Weise gesät und es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß aufmerksame und


¹⁾ Zeitschr. f. d. F.- u. F.-W. XI. S. 114.

geübte Personen — man verwendet zum Säen fast ausschließlich die billigeren weiblichen Arbeitskräfte — eine ziemliche Gleichmäßigkeit in der Vertheilung des Samens, auf die es ja vor Allem ankommt, erzielen. Dagegen hängen diesem Ansäen aus der Hand auch wesentliche Schattenseiten an: vor Allem geht daselbe langsam und ist daher kostspielig; sind die Leute nicht geübt und aufmerksam, so wird die Saat ungleich, wie es denn überhaupt schwierig ist, eine Anzahl von Leuten zu gleich starkem Ansäen anzutreuen und abzurichten; insbesondere aber wird die Saat gern ungleich an kalten Tagen, wie sie Ende April, Anfang Mai nicht selten sind, indem dann die durch Frost steifen und minder empfindlichen Finger der Arbeiterinnen den Samen ungleich aussäßen lassen. Endlich ist auch das stete Niederkauern für die letzteren beschwerlich; dieselben treten und drücken dabei auch gerne die schmalen Zwischenwege ungebührlich breit.

Schon lange hat man sich daher mit dem Problem beschäftigt, einfache und zweckmäßige Apparate zur Ansaat insbesondere der in unsern Forstgärten in großer Menge zur Verwendung kommenden Nadelholzsamen zu konstruiren, und einfache, wie komplizirtere Vorrichtungen verdanken diesem Streben ihre Erfindung. Insbesondere ist es die Saat in schmale Rillen, welche solche Säevorrichtungen leicht anwendbar macht, während man breite Rillen wohl stets aus der Hand wird ansäen müssen.

Nachstehend mögen nun eine Anzahl solcher Apparate — mit Aus schluss solcher, die praktisch wenig anwendbar erscheinen — eine kurze Erwähnung und Beschreibung finden.

In der von E. Heyer¹⁾ angegebenen Methode, aus einem Blatt steifen Papiers, das entsprechend spitzwinklig zusammengefaltet ist, zu säen, können wir keinen rechten Vortheil erblicken. Eher ist dies schon der Fall bei der sogenannten Saatrinne, welche Verfasser vor Jahren im Steigerwald in Anwendung gesehen hat²⁾ (Figur 18). An ein etwa 10 cm breites Brett, dessen Länge gleich der Beetbreite, ist längs einer der langen Kanten eine schwache, etwa 3 cm



Figur 18.


¹⁾ Allgem. F.- u. J.-B. 1866. S. 210.

²⁾ Monatsschr. f. d. F.- u. J.-B. 1867. S. 138.

hohe Leiste rechtwinklig angenagelt; in die dadurch gebildete Rinne wird der Samen von den in den schmalen Wegen einander gegenüber stehenden Arbeitern eingestreut, — von jedem bis zur Mitte der Rinne — etwaige Ungleichheiten werden mit den Fingern ausgeglichen und sodann die schmale Leiste genau an die vorher schon eingedrückte Rille gelegt. Durch eine leichte Hebung des Brettes gleitet der Samen über die schmale Leiste in die Rille.

Der Apparat ist sehr einfach, dagegen die gleichmäßige Vertheilung des Samens in der Rille doch zeitraubender, als man glauben sollte.


Eine ebenfalls sehr einfache, aber praktische Vorrichtung ist in der Gegend von Aschaffenburg in Anwendung (Fig. 19). An einer Holzleiste, deren Querschnitt nebenan in natürlicher Größe gegeben ist, und deren Länge gleich der halben Beetbreite, ist längs der oberen Kante eine seichte Rinne eingeschnitten, eben tief genug, um die kleinen Samenkörner der Fichte, Föhre, Lärche, Korn an Korn aufnehmen zu können; zur



Figur 19.


bequemeren Handhabung befindet sich an der der Abrundung entgegengesetzten Seite ein etwa 10 cm langer Handgriff. Der Samen wird in einen hinreichend großen, feichten Kasten aus leichten Brettern geschüttet, und die Arbeiter, die je zwei einander gegenüber an einem Beete arbeiten, rücken denselben auf letzterem mit fort; aus dem Kasten wird nun der Samen mit jenem Saatholz gleichsam geschöpft, in der kleinen Rinne bleibt eben genug Samen liegen und gleitet von dem mit der abgerundeten Seite längs der vorher eingedrückten Rille angelegten Saatholz durch eine kleine Drehung leicht und sicher in diese. Das Ansäen der unter Anwendung des bayrischen Saatbretts eingedrückten Doppelrillen geht sehr rasch und völlig gleichmäßig vor sich. Die je nach Qualität des Samens wünschenswerthe schwächere oder stärkere Ansaat lässt sich durch Anwendung verschiedener Saathölzer mit feichter oder tieferer Rinne reguliren, und da das Stück derselben nur auf etwa 40 Pfennige kommt, so kann man ja leicht eine kleine Anzahl derselben vorrätig halten.

Als sehr einfach, zweckmäßig und arbeitsfördernd kann Verfasser nachfolgendes Saatbrett (Fig. 20) empfehlen. Zwei etwa 10—12 cm. breite mäßig starke Bretter, deren Länge wieder gleich der Breite der anzusärenden Beete, sind durch zwei oder drei innen angebrachte schmale Charniere so an einander befestigt, daß sie sich bis zu einem Winkel von etwa 90° öffnen können und dann das eine fest auf dem andern steht, beide mit einander eine geschlossene Rinne bilden, in welche der Samen eingestreut werden kann. Setzt man dann die Kante des Bretts in die eingedrückte Saatrinne und klappt die beiden Seitenbretter zusammen, so öffnet sich durch die Charniere die untere Kante so weit, daß der Samen (Fichten-, Föhren-, Lärchen-Samen) durch und in die Rille fällt.



Figur 20.

Das Einlegen des Samen in die durch beide Bretter gebildete Rinne erfolgt aber eben so rasch als gleichmäßig — und das ist der Vorzug des Apparates gegenüber der obenbeschriebenen Saattrinne — dadurch, daß man die innere Kante des aufsitzenden Brettes etwas abstumpft, wie dies nebenstehender Querschnitt (Fig. 21) durch den unteren Theil des Saatbretts (natürl. Größe) veranschaulicht. Wenn nun der eine der Arbeiter, die sich in den schmalen Wegen gegenüberstehen und mit je einer Hand das Brett halten, eine Prise Samen einlegt und durch die Rinne



Figur 21.


nach der andern Seite schiebt, woselbst der andere den Überschuß in seine aufgesteckte Schürze streift, so bleibt in der kleinen, durch die Abstumpfung der Kante gebildeten Vertiefung so viel Samen, als nöthig, in gleicher Vertheilung liegen, ja man hat durch leichteres oder festeres Aufziehen des Fingers beim Durchstreifen des Samens eine stärkere oder schwächere Einsaat, je nach Qualität des Samens, ganz in der Gewalt.

— Die Arbeit geht sehr rasch und sicher vor sich; eine weitere Vereinfachung dadurch erzielen zu wollen, daß man die Saatrolle selbst mit der scharfen Kante des Saatbretts eindrückt¹⁾, hat sich nicht als praktisch bewährt — das vorherige Eindrücken der Rillen mit dem sogen. bährischen Saatbrett fördert die Arbeit entschieden besser.

In einer von den bisher beschriebenen Methoden verschiedenen Weise sucht das Säehorn (Fig. 22) das Ziel einer möglichst gleichmäßigen

Saat zu erreichen. Dasselbe²⁾ besteht aus einem etwa 20 cm hohen elliptischen Blechgefäß, welches, mit einem Deckel zum Aufklappen versehen, unten ein Ausschüttrohr in schräger Richtung angelöhtet besitzt; dieses Ausschüttrohr, etwa 20 cm lang, enthält 4 sich allmählich verjüngende, durch sogen. Bajonettverschluß mit einander verbundene Tüllen, deren Ausflußöffnungen sich

allmälig von einem Durch-



Figur 22.

messer zu 4,5 cm auf 1 cm verkleinern. Ein angelöhteter Henkel erleichtert die Handhabung, die in der Weise erfolgt, daß man, nach Füllung des Blechgefäßes mit Samen und Regulirung der Ausflußöffnung, die zuerst nach oben gehaltene Spitze des Rohrs nach unten über die Rille senkt und nun, langsamer oder rascher längs derselben fahrend, je nachdem man dünner oder dicker säen will, den Samen in die Rille laufen läßt. Uebung und sichere Hand sind zu gutem Erfolg nöthig. — Da übrigens in der Regel nur die kleinen Nadelholzsamten mit dem Säehorn ausge säet werden, so erscheinen die großen Ausflußöffnungen als entbehrlich.


Eine praktische, rasch fördernde Säevorrichtung, bei welcher das Säehorn Anwendung findet, lernten wir vor nicht langer Zeit kennen³⁾;

¹⁾ Wie dies bei der vom Berf. im Jahre 1867 in der Monatsschr. für J.-u. J.-W. S. 138 gegebenen ersten Beschreibung empfohlen wurde.

²⁾ Zeitschr. f. J.- und J.-W. I. S. 454. (Dasselbe ist bei Gebr. Dittmar in Heilbronn um 3 Mark zu beziehen.)

³⁾ Auf dem bähr. Revier Obernburg.

folgende Figur (23) möge dieselbe versinnlichen. Die zwei Theile a und b sind durch je 3 Schrauben mit dem mittleren keilförmigen Stück c in der Weise fest verbunden, daß zwischen denselben hinreichender Raum zum leichten Durchfallen des Samens verbleibt; die Höhe des Keils c beträgt 2 cm die untere Breite desselben stimmt genau mit der Entfernung der Doppelrillen des bayrischen Saatbretts, welches zum Eindrücken der Rillen benutzt wird, so daß, wenn der bezüglich seiner Länge mit der Beetseite korrespondirende Apparat mittelst seiner 4 eisernen Füße ee¹⁾) genau auf die Rillen gesetzt wird, die Öffnungen ff über die beiden Doppelrillen kommen. Mit dem bez. der Öffnung entsprechend regulirten Säehorn fährt nun der (vorher auf einem unter den Apparat gelegten Tuch gehörig geschulte und dann zur Ansaat aller Saatbeete im ganzen Revierbezirk benutzte, von einem zweiten Arbeiter im genauen Aufsehen der Vorrichtung auf die Rillen unterstützte) Arbeiter längs der oberen Kante des Keils c, in der zwischen den Seitenheilen a und b verbliebenen Lücke hin, und der Samen rollt, gleichmäßig durch den Keil halbiert, durch die Lücken ff in die Rillen, die also beide gleichzeitig eingesät werden. — Die Arbeit fördert sehr rasch, wird bei einiger Uebung des Arbeiters gleichmäßig und nur beim Ansetzen des Säehorns, wie beim Absetzen ist Gewandtheit nöthig, damit hier der Same nicht zu dicht zu liegen kommt.



Figur 23.

Wie dicht zu säen sei, das hängt von den mancherlei Erwägungen ab, die wir in § 54 berührt haben. Im Allgemeinen kann man wohl behaupten, daß zu dichte Saaten öfter vorkommen, als zu dünne, und es ist dies auch gerade kein Fehler, wenn man zu rechter Zeit durch entsprechendes Durchrupfen hilft; eine zu dünn ausgefallene Saat aber läßt sich nicht mehr korrigiren! — Je größer der Samen, um so leichter läßt sich eine gleichmäßige und bezüglich der Dichte entsprechende Saat vornehmen — so insbesondere bei Eicheln und Kastanien, deren jede einzeln

¹⁾ Der ganze Apparat erhält an beiden Enden ein eisernes Beschläg, welches die drei Theile ebenfalls verbindet und die Füße trägt. Auf der Zeichnung läßt sich dasselbe nicht wohl darstellen.

in die Rille eingelegt wird; auch bei Ahorn-, Eschen-, Buchen-Samen hat die Vornahme der Saat in den eben berührten beiden Richtungen keine Schwierigkeit.

Auch bei der Saat ist man nicht selten genötigt, der Witterung etwas Rechnung zu tragen: bei trockenem Wetter drücken sich auf sandigem Boden die feichten Rillen oft schlecht ein, und man muß sich eventuell durch leichtes Ueberbrausen der Beete helfen. Bei nasser Witterung läßt sich auf stark lehmigem Boden nicht arbeiten, die Erde hängt sich an die Saatbretter und Latten, und einiges Abtrocknen des Bodens muß abgewartet werden.

Wird ausnahmsweise für ein Saatbeet die Vollsaat gewählt, so sind diese letztern Rücksichten auf die Witterung allerdings nicht nothwendig. Auf das gut geebnete Beet wird der Samen aus der Hand möglichst gleichmäßig oben auf gesät, wobei man jedenfalls gut thut, das Samenquantum pro Beet vorher durch Abwägen oder Messen zu bestimmen und die Ansaat dann etwa in der Weise, wie sie bei der Vollsaat im Freien von vorsichtigen Forstwirthen vorgenommen wird, auf zweimal mit je dem halben Samenquantum auszuführen. Man hat dann die gleichmäßige Vertheilung mehr in der Hand, während sonst die Saat nicht selten Anfangs zu dicht und gegen Ende zu dünn ausfällt.

§ 56.

Bedeckung des Samens.

Wie oben (§ 51) schon angeführt, ist der Samen durch eine entsprechende Bedeckung gegen Austrocknen, Verschwemmen, Vögel u. s. w. zu schützen. Wie stark diese Bedeckung sein soll, haben wir dortselbst im Zusammenhang mit der Frage nach der Tiefe, welche den Rillen zu geben ist, besprochen und werden uns daher hier auf das „womit“ und „wie“ des Deckens zu beschränken haben.

Zum Decken soll nun unter allen Umständen lockerer Boden genommen werden, um die bei Anwendung eines bindenderen Deckmittels nach Regen so leicht eintretende Krustenbildung zu verhindern, eine Bildung, die den kleineren Samenarten oft geradezu verderblich werden kann,¹⁾ zumal wenn etwa der Samen ungleichzeitig keimt, nicht mit vereinter Kraft die Decke zu heben und zu sprengen vermag. Ebenso begünstigt lockeres Deckmaterial den zur Keimung nöthigen Luftzutritt, und eine etwas stärkere Deckung wird minder nachtheilig sein als bei schwererem Deckmittel. — Dammerde, mit Humus gemischter Sand, gute

¹⁾ Krit. Blätter. LI. 2. S. 208.

Rasenrasche sind die besten Stoffe zum Decken, zumal durch sie dem keimenden Samen sofort auch eine reiche Nahrungsquelle zur Verfügung gestellt wird. Auch die hygrokopischen Eigenschaften humosen Bodens wirken jedenfalls vortheilhaft bei der Keimung mit. — Zu erwähnen wäre, daß auch Sägespäne schon mit Erfolg als Deckungsmittel verwendet wurden.¹⁾

Wo man also mit Dammerde und Rasenrasche düngt, wird man sich stets eine entsprechende Quantität dieses Materials zum Decken reserviren, außerdem entsprechendes Deckmaterial anderweit herbeischaffen.

Das Decken selbst erfolgt bei der breitwürfigen Ansaat durch möglichst gleichmäßiges Uebersieben, bei stärker zu deckenden Samen durch Ueberwerfen mit klarer, looser Erde, bei Rillensaaten aber mit der Hand durch Einstreuen des Deckmaterials in die Rillen; dabei trägt man dasselbe so stark auf, daß die gedeckten Rillen etwas erhaben erscheinen, und drückt dann, am einfachsten mit dem umgedrehten Saatbrett, dieselben etwas an. Dieses Andrücken des Deckmaterials an den Samen erweist sich als entschieden vortheilhaft, der letztere kommt mit jenem in innige Berührung, wird dadurch rascher Feuchtigkeit anziehen und keimen, während dem Verschwemmen des Deckmaterials durch das Andrücken ebenfalls vorgebeugt wird.

Die tieferen, mit Haue oder Rillenzieher gezogenen Rillen für Eicheln u. dgl. werden nicht selten durch einfaches Beizeihen der nach der Seite gezogenen, ausgehobenen Erde mittelst des Rechens gedeckt, was bei gutem und lockerem Boden wohl zulässig erscheint; bei schwererem, leicht verkrustendem Boden wird man auch hier gute, humose Walderde oder stark mit Rasenrasche gemengten Boden zweckmäßig zur Ausfüllung der Rillen anwenden.

Vor zu tiefen Saatrillen und damit zusammenhängender zu starker Deckung haben wir schon oben gewarnt — besser schwach, als zu stark gedeckt; je looser das Deckmaterial, um so stärker darf aber erklärlicher Weise die Decke sein.

Herbstsaaten empfiehlt G. Heyer etwas stärker zu decken,²⁾ da durch die vielen Niederschläge im Winter und Frühjahr ein Abspülen von Deckmaterial doch stets erfolgen werde.

Das weitere Decken der Saatbeete mit Laub, Reisig u. dgl. gehört in das Gebiet des Schutzes der Saatbeete gegen Trockenß, Abschwemmen u. s. f. und wird dem entsprechend im nächsten Kapitel besprochen werden.

¹⁾ Monatschr. f. d. F.-u. J.-B. 1875. S. 417.

²⁾ Allg. F.-u. J.-B. 1866. S. 210.

2. Kapitel.

Schutz und Pflege der Saatbeete.

§ 57.

Allgemeine Grörterungen.

Von dem Augenblick an, wo wir den Samen in die Erde legen, bis zu seinem nach kürzerer oder längerer Zeit erfolgenden Aufgehen drohen demselben mancherlei Gefahren, so das Aufzehren durch Mäuse und Vögel, das Vertrocknen nach vorher erfolgtem Quellen, das Verschwemmen durch Regengüsse. Neue Gefahren beginnen mit dem Erscheinen des jungen Pflänzchens: Spätfröste tödten die Keimlinge, beschädigen die ältern Pflanzen, Trockenheit lässt sie zu Grund gehen, Insekten verzehren Wurzeln und Blätter, Vögel gefährden die noch in der Samenhülle steckenden Kotyledonen der Nadelhölzer, größere Thiere verbeißen die Pflanzen. Der Baarfrost hebt uns jüngere und ältere Pflanzen aus dem Boden, das wuchernde Unkraut beeinträchtigt deren freudiges Gediehen — und möglichster Schutz gegen alle diese Gefährdungen ist daher eine weitere Aufgabe des Pflanzenzüchters.

Aber nicht bloß Schutz bedürfen unsere Pflanzen — sie wollen zu raschem und freudigem Gediehen auch eine sachgemäße Pflege, bald in höherem, bald in geringerem Grad je nach Holzart und Standort. Schon die rechtzeitige Entfernung des Unkrautes gehört einigermaßen mit in das Kapitel der Pflege, wie denn Schutz und Pflege nicht selten in einander greifen, so z. B. auch bei dem Anhäufeln, dem Begießen oder Bewässern; es gehören ferner zur Pflege die Lockerung des Bodens zwischen den Pflanzenreihen, das Durchrupsen zu dichter Wuchs, die Nachdüngung jener Beete, die durch ihren kümmernden Wuchs Nahrungs- mangel verrathen, das Beschneiden der Asten.

In den folgenden Abschnitten werden wir nun besprechen, in welcher Weise der nöthige Schutz, die wünschenswerthe Pflege den Saatbeeten am zweckmäßigenst gegeben werden. Vieles davon gilt erklärlicher Weise auch für die mit verschulften Pflanzen besetzten Pflanzbeete; — wir werden uns dort um so kürzer fassen, uns vielfach auf das hier Gesagte beziehen können.

§ 58.

Schutz des Samens gegen Trockenheit.

Starkes Austrocknen des Bodens als Folge anhaltender Luftwärme und austrocknender Ostwinde in Verbindung mit längere Zeit ausblei-

benden atmosphärischen Niederschlägen wird unsren Saaten gefährlich von dem Moment an, in welchem der Samen durch Wasseraufnahme zu laufen, anzuschwellen beginnt, bei künstlich gequelltem Samen daher vom Moment der Aussaat an, außerdem nach mehrtägigem Liegen des Samens im feuchten und durch die höhere Luftwärme des Frühjahrs gleichfalls erwärmten Boden. Bodenfeuchtigkeit und Bodenwärme bedingen das raschere oder langsamere Laufen des Samens. Ist dieses aber einmal erfolgt, so kann anhaltende Trockenheit das völlige Verderben des Samens nach sich ziehen, indem derselbe das zur Fortsetzung des Keimprozesses nötige Wasser sich von dem ausgetrockneten Boden nicht mehr zu verschaffen vermag; die etwa schon durchgebrochene Keimspitze, das zuerst erscheinende Würzelchen vertrocknen.

Nicht alle Samen sind der Gefahr, durch Trockenheit zu Grunde zu gehen, in gleichem Maß ausgesetzt; je kleiner der Samen, je schwächer sonach die Bedeckung, je geringer die natürliche dem Samen inwohnende Feuchtigkeit, um so größer ist die Gefährdung. Die tiefliegende, saftige Eichel hat unter der Trockenheit nahezu gar nicht zu leiden, der kleine Same der Ulme, Erle dagegen in hohem Grad.

Zunächst beugen wir nun solcher Gefahr vor durch nicht zu späte Saat (siehe § 47); Ende April, Anfang Mai pflegt der Boden noch reichlich Winterfeuchtigkeit auch in seinen oberen Schichten zu haben, atmosphärische Niederschläge treten häufig ein, während in der zweiten Hälfte des Mai anhaltend schönes, trocknes Wetter nicht selten ist. Gequellten Samen säen wir nur bei feuchtem Wetter, in feuchten Böden, eine Vorsicht, die bei ungequelltem Samen nicht nötig ist.

In Weiterem suchen wir insbesondere bei kleinem und also schwach gedecktem Samen dem Boden seine Feuchtigkeit durch eine Deckung zu erhalten — eine Deckung, die häufig zugleich als Schutz gegen andernweite Gefährdungen, wie Vögel, Regengüsse &c. dient. Als solche Deckungsmittel, die sofort nach beendigter Saat aufgelegt, nach erfolgter Keimung aber meist theilweise oder ganz entfernt werden, dienen Moos, Nadelholzäste, Besenpfriemen und Heide, Gras, Stroh, endlich Schutzzitter verschiedener Konstruktion.

Was nun den Werth dieser Schutzmittel anbelangt, so hätten wir zunächst gegen das insbesondere auch von E. Heyer empfohlene¹⁾ Moos mancherlei Bedenken, obwohl dasselbe den Zweck der Feuchterhaltung des Bodens gut zu erfüllen vermag. Das Decken ist nicht gerade billig, schwächere Niederschläge gelangen durch dasselbe gar nicht an den Boden,

¹⁾ Allg. F. u. J.-B. 1866. S. 211.

beim Trockenwerden wird das Moos oft stark verweht, muß durch aufgelegte Stangen oder Reste festgehalten werden, - und endlich ist der richtige Zeitpunkt des Wegnehmens bei dem doch meist etwas ungleich laufenden Samen schwer zu errathen: nimmt man dasselbe zu bald weg, so gehen die oben auf liegenden, eben keimenden Samen bei trockenem Wetter zu Grunde, entfernt man das Moos zu spät, so wachsen die Keimlinge spindelig in dasselbe hinein und insbesondere die Köpfchen der Nadelholzsamen werden abgerissen. Schaal¹⁾ konstatierte auch, daß sich Laufläfer in großer Menge unter dem Moos gesammelt und (insbesondere Harpalus tardus) die Samen verzehrt haben.

Der eben genannte (als erfahrner Forstwirth) bekannte Fachgenosse empfiehlt als vorzügliches Deckungsmittel *Stroh*,¹⁾ von welchem er etwa vier Bund pro Ar verwendet, und das zum Schutz gegen Wind mit leichten Stangen beschwert, nach der Keimung fast unversehrt abgenommen wird, also auch ein billiges Deckungsmaterial ist. Ihm reicht er Tannen- und Föhrenreisig, dann die Forstunkräuter an und bezeichnet als die schlechteste Deckung mit vollem Recht jene mit Fichtenästen, welche schon nach wenig warmen Tagen die Nadeln fallen lassen, keinen Schutz mehr gewähren, später aber durch starke Erhitzung dieser abgefallnen rothen Nadeln geradezu nachtheilig werden (Brennen). Besenpfrieme und Heide werden wohl stets mehr aus Hülfsweise zur Verwendung kommen, Tannen- und Föhrenreisig daher das gebräuchlichste Material sein, und da die Tanne an vielen Orten, die Föhre aber bekanntlich fast nirgends ganz fehlt, so kann man das allerdings etwas sperrige und daher minder gut deckende, aber die Nadeln lange haltende und zum nachherigen Bestücken der Beete gut verwendbare Föhrenreisig wohl als das gebräuchlichste Material bezeichnen.

Über die Verwendung abgesichelten grünen Grases, welches E. Heyer empfiehlt,²⁾ stehen uns keine Erfahrungen zur Seite; zur Saatzeit im April und Anfang Mai dürfte dasselbe in genügender Menge oft schwer aufzutreiben sein.

Bei allen diesen, in mäßig dicker Lage anzuwendenden Deckungsmitteln, deren Auflegen sich sofort an die Saat anzuschließen pflegt, hat man den richtigen Zeitpunkt für das Wegnehmen derselben im Auge zu behalten. Bei zu langem Liegenlassen wachsen die Keimlinge lang und spindelig in die Decke hinein, leiden bei deren Abnehmen Schaden oder fallen bei trockenem Wetter um; man nehme die Deckmittel daher rechtzeitig ab und schütze die zarten Keimpflänzchen durch Aufstecken des Reisigs (s. § 59).


¹⁾ Allg. F.- u. F.-B. 1865. S. 210.

²⁾ Allg. F.- u. F.-B. 1866. S. 211.

An Stelle der oben genannten Deckungsmittel sind in neuerer Zeit vielfach Schüggitter, Saatgitter einfacher oder solidierer Art getreten.

Solche Schüggitter werden nun am billigsten in der Weise angefertigt,¹⁾ daß man zwei genügend starke, gleichlange Lattenstücke oder Stängchen durch Querhölzer (als welche einfache Bohnenstecken genügen), deren Länge gleich der Beetbreite ist und also in der Regel 1,2 m beträgt, mittelst Nägel genügend fest verbindet. Diese Querhölzer sind etwa 30 cm von einander entfernt, ihre Zahl richtet sich nach der Länge des Schüggitters und diese wieder nach der Länge der Beete einerseits und der nöthigen leichten Transportfähigkeit der Gitter anderseits; im hiesigen Forstgarten beträgt deren Länge 5 m, für längere Beete nimmt man Gitter von halber Beetlänge. Dieses Gitter wird nun mit Material verschiedener Art, als Kiefernreisig, Besenpfriemen, Saalweiden- oder Birkenreisig u. dgl. hinreichend dicht durchzogen; Alles gibt die Herstellungskosten eines solchen Gitters von 1,80 Quadratmeter Deckfläche auf 75 Pfennig an.

Die von Schmitt²⁾ empfohlenen und angewendeten Saatgitter (Fig. 24) bestehen aus einem 15 cm hohen und 1,25 m langen Rahmen



Figur 24.

aus hinreichend starken, ordinären Brettern, über welchen querüber 1—1,2 m (je nach der Beetbreite) lange und 2 cm starke Lättchen in Zwischenräumen von je 2 cm aufgenagelt werden. Nur jene Gitter, welche an die Enden der Beete kommen, haben auch auf einer Breitseite ein Rahmenbrett. Die Kosten eines solchen Gitters gibt Schmitt für Material und Arbeitslohn auf 3 Mark an, jene im hiesigen Forstgarten kamen auf 70 Pfennig pro Quadratmeter, wovon 52 Pfennige auf das Material und 18 Pfennig auf den Arbeitslohn treffen.

Diese Schüggitter werden nun ersteres auf kurzen Gabeln in geringer Höhe über die Beete gelegt, letzteres mit seinem Rahmen auf dieselben gestellt, und beide haben unleugbare Vorzüge gegenüber den erstgenannten Deckungsmitteln, indem sie den Schutz gegen Hitze, wie alle sonstigen

¹⁾ Centralbl. 1880. S. 159.

²⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 57.

Gefährdungen des keimenden Samens in vollständiger Weise geben, ohne die oben berührten Gefahren des zu frühen oder zu späten Wegnehmens befürchten zu lassen, und zugleich, wie wir in den nächsten Paragraphen hören werden, zum Schutz der jungen und älteren Pflanzen gegen mancherlei schädliche Einwirkungen benutzt werden können. — Schaal hat allerdings bei einem Versuch mit Schmitt'schen Saatgittern sehr schlechte Erfolge erzielt,¹⁾ der Samen zeigte sich breitig erweicht und theilweise verschimmelt, doch dürften hier ganz besondere, mißliche Umstände obgewaltet haben, da die Erfolge Schmitt's bei langjähriger Anwendung stets günstig waren.

Die erstmaligen Anschaffungskosten der Schmitt'schen Saatgitter sind allerdings nicht gering, da ein zur Deckung einer Fläche von 1,25 Quadratmeter ausreichendes Gitter 3 Mark, sonach die für 1 Ar Saatbeetfläche nöthigen Gitter (wenn wir bei meterbreiten Beeten ein Biertheil der Fläche für Wege in Abzug bringen) auf 180 Mark zu stehen kommen, so daß für größere Saatbeete sehr bedeutende Kosten erwachsen würden; doch erscheint der Preis, den Schmitt für seine Gitter angibt, auch als ein verhältnismäßig sehr hoher. Ebenso werden dieselben auch nur bei größeren ständigen Pflanzgärten, woselbst die nöthige Vorsorge für ihre Aufbewahrung während des Winters getroffen werden kann, Anwendung finden; für kleinere Saatkämpe aber wird das Decken mit Reisig oder den ersterwähnten billigeren Schutzgittern wohl noch länger in Anwendung bleiben.

Schwerere und in Folge dessen stärker mit Erde gedeckte Samen (Eicheln, Kastanien) bedürfen einer weiteren schützenden Decke gegen Trockenheit nicht. —

In dem Decken der Beete, in der Abhaltung der Sonne und des austrocknenden Windes liegt ein Mittel zur Erhaltung der Feuchtigkeit, in dem Bießen haben wir ein solches zur Beschaffung derselben.

Das Bießen nun ist unbedingt nöthig, wenn nach bereits begonnenem Keimprozeß, nach der Aussaat gequellten Samens dieser letztere bei eintretender längerer Trockenheit nicht zu Grunde gehen soll. Außerdem vermeidet man die immerhin kostspielige Maßregel des Gießens so lange als möglich,²⁾ hat man aber einmal damit begonnen, so muß es auch fortgesetzt werden bis zu eintretendem Regenwetter. Unter allen Umständen aber setzt das Bießen das Vorhandensein des nöthigen

¹⁾ Allg. F.-u. F.-B. 1880. S. 437.

²⁾ Monatschrift f. d. F.-u. F.-W. 1863. S. 452.

Wassers im Pflanzarten oder doch in dessen nächster Nähe voraus, da sonst die Kosten zu bedeutend sind.

Ahnlich dem Verfahren der Gärtner gießt man am liebsten Abends, um die alsbaldige Verdunstung des Wassers durch Sonnenschein zu vermeiden, und verwendet gerne gestandenes und dadurch erwärmtes Wasser. Bonhausens in beiden Richtungen angestellte Versuche¹⁾ haben ein abschließendes Resultat noch nicht ergeben, scheinen aber auffallender Weise den bisherigen eben erwähnten Annahmen zu widersprechen.

Das Gießen erfolgt mit der Gießkanne und führt man, um das Festschlagen und Abschwemmen des Bodens zu vermeiden, die Brause dicht über dem Boden hin. Die Bildung einer lästigen Kruste auf letzterem ist bei thonigem Boden in solchem Falle nicht wohl zu vermeiden, um so nöthiger daher auf derartigem Boden Vorsicht bei Wahl des zum Decken des Samens benutzten Materials.

Die Möglichkeit, zum Zweck des Gießens die schützenden Saatgitter leicht wegnehmen und wieder aufzulegen zu können, ist jedenfalls auch ein Vorzug derselben gegenüber den andern Deckungsmitteln; auf letzteren bleibt beim Gießen ein Theil des Wassers hängen und verdunstet nutzlos, sie aber jedesmal wegzunehmen und wieder aufzulegen ist nicht wohl möglich.

§ 59.

Schutz der Pflanzen gegen Trockenheit.

Nicht bloß der keimende Same, sondern auch die frisch aufgegangenen, noch krautartigen Pflänzchen können durch trocknes, heiße Wetter getötet,²⁾ stärkere wenigstens in kümmernden Zustand gebracht werden. Die trockne, heiße Erde entzieht den Keimlingen und Pflänzchen nach Möller³⁾ die Feuchtigkeit sogar direkt, bietet ihnen unter allen Umständen keinen Erhalt für das durch Verdunstung verlorne Wasser, — so müssen sie kümmern und schließlich vertrocknen, je zarter und flachwurzelnder, desto rascher. Wir haben die frisch aufgegangenen Fichten in Masse absterben sehen, wo die Föhren und Schwarzkiefern nebenan freudig fortwuchsen! Auch auf die schwachen Pflanzen, namentlich in ihrem ersten Lebensjahr, werden sich unsere Schutzvorrichtungen daher vielfach zu erstrecken haben.

Zunächst schützen wir nun die frisch aufgegangenen Pflänzchen wieder durch eine Sonne und Wind abhaltende Vorrichtung, in vielen Fällen

¹⁾ Centralbl. 1877. S. 21.

²⁾ Zeitschr. f. J.- u. J.-W. I. S. 69.

³⁾ Allg. J.- u. J.-B. 1878. S. 416.

dadurch, daß wir das bisher zur Deckung benützte Reisig nach erfolgtem Aufkeimen des Samens nun zu beiden Seiten des Beetes mit nach der Mitte geneigter Spitze, eventuell hier gehalten durch eine über die Beetmitte auf Gabeln gelegte Stange, fest in den Boden stecken. Reisig, welches die Nadeln möglichst lange behält, also auch hier wieder das Föhrenreisig, ist deshalb als Deckmaterial zu empfehlen. Dieses Schutzreisig, anfänglich dichter gesteckt, wird allmählich und, nach hinreichender Erstärkung der Pflänzchen, am besten bei Regenwetter oder doch bei gedecktem Himmel ganz abgenommen.

Statt des oft etwas mißlichen Einstekens der Neste benützt man auch leichte Stangengerüste auf Gabeln, über welche man dann die Neste legt und dieselben etwa durch eine aufgelegte Stange gegen das Herunterwehen schützt.

An Stelle dieser beiden Arten der Deckung wendet man auch für die jungen Pflanzen Schutzgitter an, und zwar entweder die oben beschriebenen einfachen Gitter, aus einem mit Reisig durchflochtenen Stangengerüst bestehend, oder eigens konstruirte Pflanzgitter.

Die einfachen, bisher nur 15—20 cm über dem Saatbeet liegenden Schutzgitter werden mit Hülfe längerer Gabeln ganz allmählich höher gestellt, bei eintretendem nicht zu starkem Regen wohl auch ganz abgenommen, um den Pflanzen denselben möglichst zukommen zu lassen, bei Sonnenschein aber wieder aufgebracht. Hat man das Saatbeet unmittelbar am Hause (bei Försterswohnungen), so deckt man überhaupt Abends gerne auf, um atmosphärische Niederschläge jeder Art, Thau oder leichten Regen, den Pflanzen thunlichst zuzuführen. — Zu tiefes Hängen dieser Schutzgitter wird durch zu starke Entziehung von Licht (vielleicht auch von Luft?) nachtheilig, und man erhöht den Zwischenraum zwischen Boden und Decke allmählich auf 60—70 cm, bis schließlich die Deckung von den hinreichend erstärkten Pflänzchen ganz abgenommen wird.

Die von Oberförster Schmitt empfohlenen Pflanzgitter¹⁾ bestehen aus zwei Latten oder Stangen, an welchen schwache Lättchen oder Bohnenstecken von 1—1,2 m Länge (Beetbreite) in etwa 3 cm breiten Zwischenräumen querüber aufgenagelt sind. Diese Gitter werden an mit Haken versehenen Pfosten über dem Saatbeet in entsprechender, allmählich sich steigernder Höhe eingehängt. Die Anfertigungskosten eines solchen 1,25 m langen Gitters werden zu 1 Mark pro Stück angegeben.

¹⁾ Fichtenpflanzhäuser. S. 57.

Zur Abhaltung der Sonne und mehr noch der austrocknenden Winde hat Forstmeister Bando Schutzschirme in Anwendung gebracht,¹⁾ die sich im Choriner Forstgarten sehr gut bewährt haben. Er unterscheidet dabei Frontschirme, von Ost nach West laufend und daher gegen die Mittagssonne schützend, und Seitenschirme von Süd nach Nord gerichtet und daher als Schutz gegen die austrocknenden Ostwinde dienend. — Die Frontschirme, in parallelen, etwa 3—4 m entfernten Reihen verlaufend, werden dadurch hergestellt, daß reichlich 2 m lange entsprechend starke Baumstämmchen in Entfernung von je 2 m etwa 50 cm tief in den Boden gesetzt, deren Köpfe durch Stangen (Höpfenstangen) verbunden und dann auf beiden Seiten in Entfernung von je 30 cm mit Bohnenstücken benagelt werden, so daß zwischen letztere, die also um die Stärke der senkrechten Säulen auseinander stehen, das Schutkreisig — Wachholder, Besenpfriemen, Nadelholzreisig — eingeschoben werden kann. Hinter jedem solchen Schirm befinden sich, parallel mit demselben verlaufend, zwei Saatbeete, wobei man eventuell empfindlichere Holzarten in das dem Schirm zunächst liegende geschützte Beet bringt.

In ähnlicher Weise angefertigte, jedoch 25—30 m von einander entfernte Seitenschirme, rechtwinklig zu den Frontschirmen stehend und mit diesen durch übergenagelte Stangen behufs größerer Festigkeit verbunden, sollen den entsprechenden Schutz gegen austrocknende Winde bieten.

Diese immerhin etwas umständliche und kostspielige Einrichtung (die Kosten für die etwa fünf Jahre aushaltenden Bäume werden für einen 15 Ar großen Saatkamp auf 100 Mark angegeben) dürfte sich da als nothwendig und zweckentsprechend erweisen, wo man es mit leichtem, zum Austrocknen und selbst Verwehen geneigten Sandboden zu thun hat, — bei geschützt liegenden Pflanzgärten aber selbst da entbehrlich sein.

Zum Schutz gegen das Austrocknen dient ferner das Belegen der Räume zwischen den Saatrillen mit Moos, auch mit gespaltenem schlechtem Brügelholz²⁾ oder geringwerthigen Lattenstücken, selbst mit Steinen, wodurch nicht nur dem Austrocknen, sondern auch der Wirkung heftiger Regen und einigermaßen dem Unkrautwuchs entgegengewirkt wird. Bei Anwendung von Moos macht sich nur der Umstand in lästiger Weise geltend, daß dasselbe vor dem Lockern und Zäten stets in zeitraubender Weise entfernt und nachher wieder eingelegt werden muß, während dies bei Verwendung von Latten oder Brügeln sehr rasch geschehen kann, weshalb letztere vorzuziehen sein dürfen.³⁾ Auch das

¹⁾ Zeitschr. f. J.- u. J.-W. I. S. 69.

²⁾ Forstl. Mittb. XI. S. 128.

³⁾ Monatsschrift f. d. J.- u. J.-W. 1874. S. 87.

Anhäufeln der Pflanzenreihen, wobei zwischen denselben ein seichtes Gräbchen entsteht, wirkt günstig, indem das in letzterem sich sammelnde Regenwasser leichter und tiefer in den Boden dringt, in den angehäuften Pflanzenreihen aber die Erde langsamer austrocknet.

Das Begießen wird nach erfolgtem Aufgehen der Pflänzchen wohl noch seltener angewendet, als während der Keimungsperiode; dagegen empfehlen G. Heher¹⁾ und Bonhausen²⁾ in hohem Grad die Bewässerung der Pflanzgärten mit Hülse in der Nähe befindlichen fließenden Wassers oder selbst eines kleinen Sammelteiches.

G. Heher will die zwischen den Beeten befindlichen Pfade als Hülfsmittel benutzen; in diese horizontal gelegten Pfade soll das Wasser eingeleitet und soweit aufgestaut werden, daß es die Beete nicht überflutet, sondern nur von unten und von der Seite her eindringt, auf welche Weise eine Krustenbildung auf der Oberfläche verhindert wird. Auch schädliche Thiere, wie Mäuse, Maulwürfe und Werren, wird man gleichzeitig vertreiben.

Bonhausen empfiehlt eine Modifikation dieses Verfahrens, indem er nicht die Beetpfade, sondern ein eigentliches Grabensystem, bestehend aus Zuleitungsgräben und Staugräben, angewendet wissen will. Die Tiefe dieser horizontal gelegten Staugräben und deren Entfernung stehen in Verhältniß, — je größer die Tiefe, um so größer kann auch die Entfernung sein; auch die Bindigkeit des Bodens ist von Einfluß und lockerer Boden gestattet größeren Abstand der Gräben. Auch er will die Gräben nur bis auf etwa 3 cm unter ihren Rand angestaut und jedes Überfluthen der Beete vermieden haben. Bonhausen hebt als Vortheil neben den schon erwähnten Vortheilen der Bewässerung noch den dadurch vermehrten Luft- und Temperaturwechsel innerhalb des Wurzelbodenraums hervor als einen ebenfalls beachtenswerthen Faktor für das Gedeihen der Pflanzen. Nebrigens erklärt Bonhausen auch die einfache Überrieselung der Pflanzenbeete durch zugeleitetes Wasser für zulässig und vortheilhaft.

Obwohl die Vortheile einer zweckmäßigen Bewässerung einleuchtend sind, findet man dieselbe doch höchst selten angewendet; — Verfasser hat noch keinen Pflanzgarten mit Einrichtung zur Bewässerung gesehen! Der Grund mag doch vor Allem darin liegen, daß Forstgärten seltener fließendes Wasser in so unmittelbarer Nähe haben, daß dasselbe zur Bewässerung zu benutzen ist; — man vermeidet Mulden, Einbeugungen, Thalshöhlen, Niederungen um der Frostgefahr, des mit dem dort feuchteren

¹⁾ Waldbau. S. 190.

²⁾ Centralbl. 1877. S. 17.

Boden zusammenhängenden Graswuchses willen, und damit verzichtet man eben meist auch auf die Möglichkeit einer Bewässerung. Auch der Kostenpunkt (Sammelteiche!) mag eine Rolle spielen.¹⁾

Das Hauptmittel gegen Trockenheit liegt aber jedenfalls in der günstig gewählten Lage des Pflanzgartens an nördlichem oder nordöstlichem Gehänge, in dem Schutz durch die Umgebung: ältere, Schatten spendende Bestände an der Süd- und Westseite, jüngere Bestände als Schutz gegen austrocknende Winde an der Ost- und Nordostseite. Rings von Wald, von älteren Beständen umgebene Pflanzgärten werden stets weniger durch Trockenheit zu leiden haben, als solche, denen dieser natürliche Schutz fehlt, und die Saatkämpe eines und desselben Reviers zeigen in trocknen Sommern je nach ihrer Lage oft die wesentlichsten Verschiedenheiten im Aufgehen der Samen, der Entwicklung der Pflanzen.

§ 60.

Schutz der Saatbeete gegen Frost im Allgemeinen.

Mancherlei Beschädigungen sind es, die der Frost in verschiedenster Gestalt unsfern Saatbeeten zugefügt: als gefährlicher Spätfrost tödet er im Frühjahr die Keimlinge empfindlicher Holzarten und selbst schonjährige Pflanzen, versengt die jungen Triebe und bringt die Pflanzen dadurch im Wachsthum, in der normalen Entwicklung zurück, so daß sie zur gewünschten Zeit noch nicht verwendungsfähig sind; wiederholte Spätfrostbeschädigung hat selbst vollständige Verkrüppelung und Unbrauchbarkeit der Pflanzen zur Folge. Minder häufig und minder gefährlich überhaupt sind die im Herbst auftretenden Frühfroste, durch welche meist nur die noch unverholzten Triebspitzen getötet werden; die Schütte der Föhre schreibt man bekanntlich auch von manchen Seiten auf deren Konto. — Am wenigsten ist für unsere einheimischen Holzarten der Winterfrost zu fürchten, durch welchen nur bei intensivem Auftreten die sogenannten Johannistriebe mancher Holzarten getötet werden, während die meisten Pflanzen unversehrt bleiben.²⁾ In dem abnorm strengen Winter 1879/80 erfroren allerdings, abgesehen von fremden Holzarten, namentlich die bei uns als heimisch zu betrachtenden Akazien und Edelkastanien sehr vielfach, ja selbst Fichten und Tannen litten, namentlich in Folge des raschen Temperaturwechsels in den sehr

¹⁾ Heyer (Waldbau S. 193) macht übrigens selbst auf diese Schwierigkeiten, die der Bewässerung entgegen stehen, aufmerksam und wirft selbst die Frage auf, ob dieselbe allen Holzarten zuträglich sei.

²⁾ Monatsschr. f. F.- u. P.-W. 1880. S. 476.

kalten Nächten und durch Sonnenschein warmen Tagen, in manchen Dertlichkeiten¹⁾.

Sehr nachtheilig endlich tritt vielerorts, in Freisaaten wie in unsern Forstgärten, der sogenannte **Barfrost**, das Auffrieren des Bodens auf, jene Wirkung des Frostes, durch welche im Winter und Frühjahr das im Boden reichlich vorhandene Wasser gefriert, bei der Eisbildung den Boden und mit ihm die schwachen Pflanzen hebt; bei eintretendem Aufthauen des Bodens und Zurücksinken desselben bleiben dann die Pflanzen mit entblößten Wurzeln obenauf liegen.

Die folgenden Paragraphen sollen uns nun jene Mittel kennen lernen, welche uns gegen die schädlichen Einwirkungen dieser verschiedenen Arten von Frost zu Gebot stehen.

§ 61.

Schutz gegen Spät-, Früh- und Winterfrost.

Die gefährlichsten Feinde unserer Saatbeete sind die **Spätfroste**, um so gefährlicher, je später sie eintreten, je weiter also die Vegetation schon entwickelt ist; Spätfroste, welche in der zweiten Hälfte Mai eintreten, was leider nicht selten, richten wie allenthalben in der Vegetation, so auch unter unsrern Holzpflanzen große Verheerungen an, und Schutz gegen diesen oft eintretenden Feind ist daher wenigstens für empfindlichere Holzarten nicht zu entbehren, während die wenig empfindlichen solchen missen können. Während Eiche, Buche, Tanne, Edelkastanie, Esche, auch Fichte, gegen Spätfroste sehr empfindlich sind, ist dies bei andern Holzarten nur in geringem Maß der Fall, so bei Ahorn, Ulme, Linde, und wieder andere — Föhre, Schwarz- und Wehmoutskiefer, Hainbuche, Erle, Birke — leiden gar nicht durch dieselben. Auch die Zeit des Ausschlagns spielt bezüglich der Größe der Gefahr eine nicht unwesentliche Rolle: während die so empfindliche Eiche und Akazie durch ihren spätern Laubausbruch manchem Spätfrost entgehen, wird die sonst minder empfindliche Lärche in Folge ihres sehr frühen Ergrünens nicht selten von demselben beschädigt. — Dabei wirkt nach Nördingers Angabe²⁾ nicht jede Erniedrigung der Temperatur unter den Gefrierpunkt sofort schädlich, vielmehr ertragen viele sonst empfindliche Holzarten eine Temperatur von 2 bis 3 Grad trocknen Frostes ohne Nachtheil,

¹⁾ Der von Borggreve (Allgem. F.- und G.-Btg. 1870. S. 409) mitgetheilte Fall der Wurzelbeschädigung junger (2j.) Eichen durch strengen Winterfrost dürfte zu den Ausnahmen gehören.

²⁾ Krit. Blätter XLIII. 1. S. 151.

während die gleiche Temperatur in Verbindung mit Reif und insbesondere auch unter alsbalbiger Einwirkung der Sonne schädlich wird.

Als Schutz gegen Spätfrost wird nun angewendet: spätere Saat, um das zu frühe Erscheinen der Keimlinge zu verhindern, Wahl der Frühjahrsaat an Stelle der erfahrungsgemäß stets früher aufgehenden Herbstsaat; dichtes Bedecken der im Herbst angefroten Beete (Eicheln, Bucheln, Tannen) mit Reisig oder Laub nach eingetretenem starken Winterfrost, um durch diese Decke das Eindringen der die Keimung bedingenden Frühjahrswärme möglichst lange zurück zu halten. Dieses Decken der Beete wird auch für die ein- und zweijährigen Pflanzen als Schutz gegen Spätfrost und zum Zurückhalten der Vegetation empfohlen und sollen die verwendeten Nadelholzäste, Besenpflriemen u. dgl. zugleich Schutz gegen das Abäsen für uneingefriedigte Kämpe bieten.¹⁾

Auch das Überhalten von Schutzbäumen auf der Saatbeetfläche selbst hat man namentlich für Buchen und Tannen in Anwendung gebracht, doch haben wir uns schon oben (§ 12) hiegegen ausgesprochen. — Ebenso ist das stärkere Bedecken des Samens, um dadurch das Aufgehen desselben zu verzögern, ein etwas bedenkliches Mittel — man kann leicht des Guten zu viel thun!²⁾

Zweckmäßiger aber als die bisher genannten Mittel sind direkte Schutzaufrichtungen,³⁾ die Beschützung der jungen Pflänzchen durch Schutzmitter, durch Bestecken der Beete mit Reisig, kurz alle jene Vorrichtungen, die wir oben als Schutz gegen Trockenheit kennen gelernt haben. Dicht eingeflochtene Schutzmitter einfacher Art oder die Schmittischen Saat- und Pflanzmitter werden sich noch von besserer Wirkung erweisen, die Fröste noch vollständiger abhalten, als das Bestecken mit Reisig. Häufig wird man diese Mitter, die etwa Tags über abgenommen oder mit Hülfe von Gabeln nach einer Seite (der Sonneseite) aufgestellt waren, erst Abends bei hellem Himmel und drohender Frostgefahr wieder über die Beete decken.

Selbst die Bildung einer Rauchdecke, in neuerer Zeit bekanntlich vielfach zum Schutz der Weinberge angewendet, hat in Forstgärten schon Anwendung gefunden,⁴⁾ indem um dieselben angehäuftes Reisig in der Nacht bei eingetretenem Sinken des Thermometers unter den Gefrierpunkt angezündet wurde. Für andere Gärten wurde diese Bildung

¹⁾ Forstl. Mitth. XI. S. 129.

²⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 163.

³⁾ Krit. Blätter. XLIII. 1. S. 165.

⁴⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 89.

künstlicher Wölken in der Weise bewerkstelligt, daß man blecherne Schüsseln mit schwerem Theeröl gefüllt aufstellt und im gegebenen Augenblick mit Hilfe einer Hand voll Stroh oder Hobelspäne entzündete.¹⁾ Immerhin wird diese Art des Schutzes gegen Spätfrost nur ausnahmsweise in unsern Forstgärten durchführbar sein.

Ist aber Spätfrost mit Reisbildung eingetreten, so erweist sich bisweilen das Biegen der bereiften Pflanzen vor Sonnenaufgang mit kaltem Wasser als ein Rettungsmittel, indem hierdurch der Aufthaunungsprozeß — mit welchem erst die schädliche Wirkung des Frostes eintritt — wesentlich verlangsamt und mehr oder weniger unschädlich gemacht wird.²⁾

Wie gegen Trockenheit, so ist aber auch gegen Spätfröste die zweckmäßige gewählte Lage des Saatbeets eines der wichtigsten Sicherungsmittel: die Vermeidung von Frostlagen, die Wahl nördlich statt südlich oder westlich geneigten Terrains um des späteren Erwachens der Vegetation willen, endlich Seitenenschutz gegen rauhe Nord- und Ostwinde.

Bei sel tener und weniger schädlich als Spätfröste treten die herbstlichen Frühfröste auf; am ersten bringen sie wohl dann Schaden, wenn durch günstige feuchtwarme Witterung im September und Oktober die Vegetation zu längerer Fortsetzung ihrer Thätigkeit angeregt wird. Durch Frühfrost werden stets nur die jüngsten, noch nicht ausgereiften Theile der Jahrestriebe getötet. Decken mit Schutzmatten wird auch diesem Schaden vorbeugen, doch selten angewendet werden. Für seltene und werthvolle Laubholzgewächse nennt Nördlinger³⁾ das Abstreifen des Laubes zeitig im Herbst, wodurch die Vegetation zur Ruhe kommt, als ein Schutzmittel. — Welchen Einfluß die Frühfröste auf die sogenannten Schütte der Föhren haben, ist noch nicht endgültig festgestellt (siehe § 112).

Gegen den Winterfrost endlich, der, wie oben erwähnt, nur ausnahmsweise nachtheilig wird, pflegen wir keine Schutzmittel anzuwenden; das beste Schutzmittel in jeder Richtung ist für die Pflanzen eine Schneedecke, die selbst gegen den strengsten Frost schützt.

§ 62.

Schutz der Pflanzen gegen das Ausfrieren (Barfrost).

Das Auswintern, Ausfrieren der Pflanzen durch den sogenannten Barfrost ist eine Erscheinung, die in Forstgärten wie bei Kulturen im

¹⁾ Allgem. J.-u. J.-Btg. 1874. S. 211.

²⁾ Heß, Forstschutz. S. 514, 524.

³⁾ Krit. Blätter. XLIII. 1. S. 174.

Freien auf unbedecktem — einer Decke baren — Boden nicht selten auftritt, insbesondere aber auf dem gelockerten Boden unserer Saatbeete oft sehr lästig und schädlich wird. Nicht alle Holzarten leiden in gleichem Maße unter dieser Erscheinung, und die Wurzelbildung ist hierbei von grösstem Einfluss: die schon als einjährige Pflanze so tief wurzelnde Eiche, Föhre, Schwarzkiefer leiden nahezu gar nicht, die flach wurzelnde Fichte, die schwache Tanne aber sehr bedeutend und letztere beiden werden bei wiederholtem Auffrieren des Bodens mit nachfolgendem Aufthauen oft nahezu vollständig aus dem Boden gehoben und gehen bei eintretender Trockenheit zu Grunde; andere, minder seicht wurzelnde Holzarten leiden ebenfalls, wenn auch in minderem Maße.

Auch Boden und Lage sind von Einfluss auf das Auftreten des Barfrostes. Wasserhaltige und humose Böden, wie Moor- und Humusboden, aber auch gelockerter Kalk und Thonboden sind dem Auffrieren am meisten ausgesetzt, doch friert bei der überschüssigen Feuchtigkeit im Frühjahr auch der leichtere Lehmb- und Sandboden gerne und dann wohl in erhöhtem Maße auf. Ebenso sind Süd- und Westlagen durch das abwechselnde Thauen am Tag und Gefrieren bei Nacht dem Auffrieren sehr ausgesetzt, während Nordseiten weniger leiden,¹⁾ ein weiterer Grund, erstere bei Anlage eines Saatbeetes zu meiden.

Dem Barfrost beugen wir nun vor, indem wir im Herbst, etwa vom August an, die Lockerung des Bodens zwischen den Pflanzenreihen in unsern Forstgärten unterlassen, auch das noch erscheinende Unkraut belassen oder nur oberflächlich abschneiden, nicht ausziehen, um dadurch dem Boden möglichst Halt zu geben. — Etwa breitere und dichter ange setzte Rillen sind dem Auffrieren weniger ausgesetzt, weil die gleichsam in einander verflochtene Bewurzelung sich gegenseitig festhält; in solchen dichter angefertigten Rillen läge also ein Mittel gegen das Auffrieren, wenn nicht zu dichter Pflanzenstand wieder einen andern Nachtheil — zu schwache Pflanzen, zu viel Ausschuss — mit sich brächte.

Vertiefte Steige zwischen den Beeten dienen gleichsam als kleine Entwässerungsgräben für die obere, dem Auffrieren ausgesetzte Bodenschicht, wirken demselben also einigermaßen entgegen.

Von entschiedenem Nutzen ist ferner das rechtzeitige Belegen der Zwischenreihen zwischen den Pflanzenreihen mit Moos, Laub, Sägmehl, Kohlenstücke, fein gehacktem Reisig, bei breiten Zwischenräumen

¹⁾ Vergl. über Barfrost: Zeitschr. f. F.- u. G.-W. 1881. S. 604. — Heß, Forstschuß. S. 533. — Krit. Blätter. XLIII. 1. S. 151. L. 1. S. 146.

und auf feuchtem Boden wohl auch Deckung mit Bläggen¹⁾; durch solche Deckungsmittel wird dem Gefrieren des Bodens bei jedem auch nur leichten Frost und, wenn bei stark gefrorenem Boden aufgebracht, dem raschen Aufthauen entgegen gewirkt. Auch das Anhäufeln der Pflanzen im Herbst durch Anziehen der Erde an die Pflanzen von beiden Seiten her erweist sich als nützlich gegen das Auffrieren²⁾.

Ist aber gleichwohl die Erscheitung des Ausfrierens der Pflanzen eingetreten, so müssen dieselben alsbald und ehe die bloßliegenden Wurzeln austrocknen, wieder entsprechend angebrückt, event. die letzteren mit klarer Erde überdeckt werden, damit die Pflanzen wieder so tief stehen als vorher. Mit geringen Kosten lassen sich hiernach oft größere Pflanzenmengen retten.

§ 63.

Schutz der Saatbeete gegen Regengüsse.

Auch heftige Regengüsse, Platzregen, werden unsren Saatbeeten nicht selten nachtheilig, waschen von den frisch angepflanzten Beeten die leichte und lockere Decke, die wir unserm Samen gegeben haben, weg, schwemmen die kleinen Samen heraus und partienweise zusammen und richten namentlich in Forstgärten, welche auf geneigtem Terrain gelegen sind, durch Abschwemmen und Zerreissen der Beete und Wege nicht unbedeutenden Schaden an.

Gegen erstere Nachtheile — das Verschwemmen der Saatbeete, schützen wir dieselben durch Bedecken mit Reisig oder ähnlichem Material (§ 58), besser noch durch die mehr erwähnten Schutzgitter, welche diesen Schutz jedenfalls am vollständigsten geben, insbesondere besser schützen, als das nach erfolgter Keimung aufgesteckte Reisig.

Dem Abschwemmen des Bodens aber und Zerreissen der Beete und Wege in geneigtem Terrain wirken wir entgegen durch das Terrassiren der Fläche (§ 20), durch möglichste Vermeidung von Wegen in der Richtung der Wasserlinie oder, wo dies nicht zu vermeiden ist, durch links und rechts vom Weg angebrachte kleine Versieggruben in Verbindung mit Querriegeln, welche ersteren das Wasser zuweisen. Größere zusammenhängende Ländere, welche bei der Anlage von Saatbeeten überhaupt nur ausnahmsweise und bei einzelnen Holzarten angewendet werden (§. § 52), sind hier nicht zulässig, da sie viel mehr unter dem Abschwemmen leiden, als die horizontal gelegten Beete, deren Zwischenwege zugleich als kleine Wasserauffangräben dienen. — In stark geneigtem Terrain,

¹⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 359.

²⁾ Schmitt, Fichtenpflanzschulen. S. 86.

wie es wohl da und dort im Gebirg gewählt werden muß, wirken zwischenliegende unbearbeitete Horizontalstreifen, mit Gras und Unkräutern bewachsen, wie schon erwähnt, dem Abschwemmen ebenfalls entgegen.

Heftige Platzregen hüllen auf gelockertem lehmigen Boden die Nadel-pflänzchen, insbesondere die Fichten, oft weit hinauf durch die ausspringenden und an den nassen Pflänzchen, zwischen den Nadeln hängen bleibenden Erdtheilchen in einen dichten Ueberzug, die sogen. Erdhöschen ein¹⁾. Es ist erklärlich, daß diese Einhüllung der Nadeln nachtheilig wirken muß. Belegen der Zwischenräume mit irgend welchem Material, wie es zum Schutz der Saatbeete gegen Trockenheit geschieht, wirkt gleichzeitig auch diesem Ueberstand entgegen. — Wo diese Erdhöschen vorhanden, lassen sie sich übrigens nach einigen trocknen Tagen leicht beseitigen, indem beim Ueberfahren der Pflänzchen mit einem Stock oder Rechen die Erde staubartig wegfällt, so daß in rascher und fast kostenloser Weise geholfen werden kann.

§ 64.

Schutz der Saatbeete gegen Engerlinge.

Bekanntlich hat der Schaden, welcher durch Maikäfer und resp. durch deren Larven, die sogen. Engerlinge, den Waldungen zugeht, sich in den letzten Jahrzehnten an vielen Orten außerordentlich gesteigert und selbst zu Änderungen im Wirtschaftsbetrieb — zum Verlassen der Kahl-slagwirtschaft in Kiefernwaldungen und zur Anwendung der natürlichen Verjüngung — Veranlassung gegeben. Erklärlicher Weise ging mit diesen Beschädigungen der Jungwächse eine solche der Saat- und Pflanzbeete Hand in Hand. Der gelockerte Boden derselben bietet dem Käfer eine ebenso günstige Dertlichkeit zur Ablage seiner Eier, wie die zarten Pflanzenwurzeln den Engerlingen eine willkommene Nahrung, und so liegen denn an vielen Orten die Forstleute in hartem Kampf mit diesen Verderbern ihrer Kulturen, ihrer Forstgärten, und zahlreiche mehr oder minder wirksame Mittel finden sich in der forstlichen Literatur als Waffen in diesem Kampf mitgetheilt.

Als Vorbeugungsmittel gegen das Auftreten von Engerlingen räth uns E. Heher²⁾ die Anlage von Saatbeeten ferne von Eichenbeständen, insbesondere Eichenstockschlägen, die der Käfer besonders liebt und in deren Nähe er seine Brut absetzt. Auch Anlegung der Saatbeete in etwas größerer Meereshöhe — wo die Terrainverhältnisse des

¹⁾ Monatschr. f. d. F.-u. J.-W. 1863. 454.

²⁾ Allgem. F.-u. J.-B. 1865. S. 126.

Reviers dies ermöglichen, — erweist sich günstig, da sich der Käfer mehr in den tieferen Lagen aufhält. Ob dagegen die gleichfalls angerathene Wahl sehr bindenden, sittigen Bodens, der den Engerlingen das im Winter nöthige tiefere Eindringen in den Boden erschwert und selbst unmöglich macht und daher gemieden wird, nicht anderweite größere Nachtheile in einem Forstgarten nach sich zieht, erscheint uns doch kaum zweifelhaft!

Mit gutem Erfolg wurde ferner an verschiedenen Orten¹⁾ die Anbringung zahlreicher einfacher Staarenkästen an Bäumen rings um den Garten angewendet; die Staare führten einen wahren Vernichtungskrieg gegen die Maikäfer, so daß nur relativ wenige derselben zur Eierablage kamen.

Man suchte ferner dem Käfer möglichst zusagende Plätze zur Eierablage zu bieten, um dann die Brut vernichten zu können; Plätze von 1 Quadratmeter Größe wurden etwa 15 cm hoch mit Stuhmist und dieser 6 cm hoch mit lockerer Erde bedeckt²⁾ und sämmtliche Haufen wimmelten im Juli von kleinen Larven, — die aber, nach Altums Ansicht³⁾ nicht Mai- sondern Mistkäfer-Larven gewesen sein sollen! Letzteres dürfte aber wohl kaum der Fall bei dem aus Rasenstückchen gebildeten Komposthaufen gewesen sein, den G. Heyer⁴⁾ dick mit Engerlingslarven besetzt fand, und die auf einer Kultur gemachte Wahrnehmung, daß die Engerlinge sich in großer Zahl zwischen den umgekehrten Plaggen und der Bodendecke fanden,⁵⁾ dürfte doch auf die Ansetzung solcher Plaggenhaufen oder das Legen umgekehrter Plaggen zwischen die Pflanzreihen als ein Helfsmittel gegen die Engerlinge hinweisen.

Zu den Vorbeugungsmitteln gegen Engerlingschaden sind ferner die von Bando geschilderten, im Eberswalder Forstgarten angewendeten Steinästen⁶⁾ zu rechnen, welche nach erfolgtem Ausheben der Erde auf der zu der Saat bestimmten Fläche aus Bruchsteinen in Gestalt eines etwa 30 cm tiefen Steinkastens hergestellt werden, der Boden ohne Mörtelverbindung, um überschüssigem Regen- und Schneewasser den Abzug zu gestatten. Der so gebildete Steinkasten, der erklärlicher Weise jedem Engerling das Eindringen von der Seite her verwehrt und erfahrungsgemäß auch zur Eierablage seitens der Käfer nicht gewählt werde (warum?),

¹⁾ Allgem. F.-u. J.-B. 1865. S. 74, 102, 126.

²⁾ Zeitschr. f. F.-u. J.-W. I. S. 261.

³⁾ Altum, Forstzoologie. III. S. 108.

⁴⁾ Allgem. F.-u. J.-B. 1865. S. 126.

⁵⁾ Monatsschr. f. d. F.-u. J.-W. 1873. S. 281.

⁶⁾ Zeitschr. f. F.-u. J.-W. I. S. 76.

wird mit gesiebter Erde gefüllt und nun als Saatbeet benutzt. Ein solcher Keimkasten von etwa 25 Quadratmeter Größe kostete 45 Mark, wobei die Steine unmittelbar zur Hand waren. Größere Verbreitung wird dies kostspielige und umständliche Mittel, zu welchem nur große Gefährdung durch Engerlinge Veranlassung geben konnte, kaum finden.

Zum Schutz der Pflanzen gegen vorhandene Engerlinge hat man die Ansaat oder Pflanzung von Gartensalat zwischen den Pflanzreihen da und dort angewendet¹⁾ und will guten Erfolg gehabt haben, indem die Engerlinge die milchige Wurzel des Salats den Pflanzwurzeln vorzogen; auch Möhren hat man zu gleichem Zweck angepflanzt.

Eine ganze Reihe von Mitteln zweifelhaften Werthes findet sich noch in Hes' Forstschuß zusammengestellt,²⁾ so das Verbreiten getheerter Blätter auf den Beeten, das Einlegen kurz geschnittner Fichten- und Wachholderzweige in die Saatrisse (unter die Erde), deren spitze Nadeln die Engerlinge abhalten sollen, Gießen der Beete mit einer Abköhlung des Laubes von Juglans regia, ja selbst das Aussetzen lebendig eingefangener Maulwürfe — Mittel, die wohl alle nur da und dort versuchsweise angewendet wurden.

Schwierig ist nun erklärlicher Weise auch die Vertilgung vorhandener Engerlinge auf den bestockten Saatbeeten, und lässt sich das Sammeln derselben, dem beim Umgraben der Beete natürlich alle Sorgfalt zuzuwenden ist, hier nicht ohne Beschädigung der noch unverletzten Pflanzen ausführen. Doch schene man diese letztere nicht, sondern wo man die frische Thätigkeit der Engerlinge etwa an den etwas in den Boden gezogenen (einjährigen) noch nicht welken Pflänzchen wahrnimmt, da fahre man mit der Hand oder einer schmalen Schippe unter die Pflanzreihe und hebe den Uebelthäter heraus; die noch guten, unbefressenen Pflanzen drücke man wieder entsprechend an und wird der gestalt wenigstens einen Theil derselben retten.

Schwieriger ist natürlich an stärkeren Pflanzen die Thätigkeit von Engerlingen zu konstatiren, da hier nicht sofortiges Absterben, sondern allmähliches Kümmern eintritt und Hülse durch Auffinden des Engerlings zu spät kommt. Bei werthvollen Pflanzen unternimmt man wohl, wenn man im Garten überhaupt ein massenhafteres Auftreten von Engerlingen wahrnimmt, eine vorsichtige Revision der Wurzeln und deren Umgebung und sammelt die Feinde.

Das von Oberförster Witte konstruirte Engerlingseisen,³⁾ dazu

¹⁾ Forstl. Blätter. 1872. S. 23.

²⁾ S. 225.

³⁾ Altum, Forstzoologie. III. S. 112.

bestimmt, die oberflächlich an den Pflanzenwurzeln fressenden Engerlinge durch Erstechen zu töten, muß als äußerstes Mittel im Kampf gegen diese Feinde in den Saatbeeten betrachtet werden, da die Anwendung desselben eine umständliche und kostspielige, der Erfolg aber doch wohl nur ein theilweise ist, da schwächer oder momentan tiefer liegende Larven vielfach unverletzt bleiben werden. Dasselbe besteht aus einer 25 cm langen schmalen Eisenplatte, die an der einen Seite etwa 16 je 7 em lange gußeiserne Spalten, an der andern einen starken Holzstiel trägt, und wird, quer über die Saatreihen gesetzt (deren Pflanzen man bei Seite biegen kann), rückweise in den Boden gestoßen; eine besondere Vorrichtung ermöglicht das Herausziehen der Spalten, ohne etwa anhängende Wurzeln, Steine, Erde &c. mit herauszureißen. Das Eisen wird neben den durch die Spalten eingedrückten Löchern aufs Neue eingestoßen und so über das ganze Beet fortgefahrene; die verletzten Engerlinge gehen zu Grunde.

§ 65.

Schutz gegen sonstige Feinde aus der Klasse der Insekten.

Unter den Feinden aus der Klasse der Insekten, welche in unsern Saatbeeten schädlich auftreten, wäre zunächst noch die Werre (*Gryllus gryllotalpa*) zu nennen, welche zwar nicht die Pflanzenwurzeln verzehrt, dieselben jedoch bei dem Graben ihrer fingerstarken Gänge abbeißt, wo sie ihr hinderlich sind, außerdem auch durch das Heben der jungen Pflanzen in Saatbeeten sehr lästig werden kann, wenn sie, wie manchen Orts der Fall, in größerer Zahl auftritt.

Man vernichtet sie namentlich zur Paarzeit im Juni, indem man die durch einen schrillenden Ton sich lockenden, nahe unter der Erdoberfläche sitzenden Thiere durch einen Hackenschlag herauszuwerfen sucht. Mit gutem Erfolg soll auch das Eingraben von Blumentöpfen (zur Zeit der Paarung) in die Beetoberfläche — etwa 2 m von einander entfernt und mit dem Rand 3 cm unter der Oberfläche liegend — sich bewährt haben; von Topf zu Topf wird dann eine 4—5 cm hohe Latte fest auf den Boden aufgelegt, und die derselben entlang laufenden Werren stürzen in die Töpfe.¹⁾ Ebenso kann man mit Erfolg Töpfe in die schmalen Beethwege eingraben, und in den zur Abwehr gegen Mäuse gezogenen, gleichfalls mit Töpfen versehenen Gräben fangen sich nicht selten auch Werren. — Auch die Nester, die circa 10 cm tief liegen und mit Hülse der kreisförmigen Gänge zu denselben, welche nach Regenwetter oft etwas

¹⁾ Centraalblatt 1875. S. 95.

erhaben hervortreten, gefunden werden können, sucht man auf und zerstört sie. Durch Eingießen von Öl oder Petroleum in die Gänge und Nachschüttungen von Wasser sucht man endlich auch die Werren zum Herauskommen zu nöthigen.¹⁾

Auch Erdflöhe werden den Laubholzpfanzlingen bisweilen schädlich. Durch Bestreuen der Beete mit Asche oder Kalk, wie durch Begaschen mit einer Wermuthabkochung,²⁾ durch Begaschen mit sehr verdünnter Karbolsäure (1 Theil auf 100 Theile Wasser)³⁾ sucht man die kleinen Feinde zu vertreiben; mittelst Brettchen, welche mit Tischlerleim grundirt und dann mit Brumataleim überzogen sind, und welche in die Beete gestellt werden, sie zu fangen.

Auch die sonst nützliche Ameise kann in Saatbeeten durch Verzehren von Nadelholzsamen schädlich werden, wie dies im hiesigen Forstgarten beobachtet wurde, woselbst 2 Beete, mit Kiefern ange sät, durch Ameisen völlig zerstört wurden; es ging auch nicht ein Korn auf, und alle Samenkörner lagen aufgebissen und ausgefressen in den Rillen. Die anstoßenden Beete waren völlig intakt geblieben. — Ein Mittel gegen diese allerdings seltener Beschädigung dürfte kaum gegeben sein.

Als ein im Ganzen wenig bekannter Feind treten die Elateriden-Larven auf, welche die Nadelholzsamen verzehren,⁴⁾ Eicheln und Bucheln benagen, die zarten Pflanzenwurzeln abfressen, so daß bisweilen ganze Saattrillen vernichtet werden,⁵⁾ ohne daß dem Pflanzenzüchter die Ursache dieser Beschädigungen erklärlich ist. Mittel gegen diese Feinde stehen uns nicht zu Gebote, und auch die Vertilgung der in Kulturen wie in Saatbeeten an ein und zweijährigen Kiefern schädlich auftretenden Saatäule (*Agrotis valligera*) und ihrer sehr ähnlichen Gattungsgenossen durch Auftischen der theils oberirdisch, theils unterirdisch fressenden Raupen ist jedenfalls eine schwierige Arbeit.⁶⁾

§ 66.

Schutz gegen Mäuse.

In nicht geringem Grade werden bisweilen unsere Saaten und Saatbeete durch Mäuse gefährdet und mannigfach sind die Zerstörungen, welche diese kleinen Nagetiere anrichten. Zunächst sind die Samen durch

¹⁾ Bergl. Heß, Forstschuß. S. 335.

²⁾ Dasselb. S. 420.

³⁾ Centralblatt 1879. S. 158.

⁴⁾ Tharander Jahrb. 1879. S. 312.

⁵⁾ Altum, Forstzool. III. S. 133.

⁶⁾ Zeitschr. f. F. u. F.-W. VII. S. 114. IX. S. 19.

sie bedroht, obenan Eicheln, Bucheln, Kastanien, doch sind auch Zerstörungen von Fichten- und Föhrensaaten schon wiederholt beobachtet worden.¹⁾ Auch ein Venagen der Holzpflanzen — Buchen, Hainbuchen, Eschen, Eichen, Lärchen — kommt nicht selten vor, doch seltener als in unsern Schlägen; im Saatbeet fehlt eben jene dichte Grasfahrt oder Laubdecke, die den Mäusen zur erwünschten Deckung dient, und ihre Arbeit ist hier stets eine mehr unterirdische. So ist denn auch schon vielfach ein unterirdisches Abschneiden der Pflanzen in den Saatbeeten beobachtet worden, und mag der Grund zu dieser außerhalb der Forstgärten selten wahrgenommenen Erscheinung darin liegen, daß die Mäuse sich eben als Schutz flach im Boden hinstreichende Gänge anlegen, in diesen ihre Nahrung suchend. Auch das Abbeißen junger Pflanzen unmittelbar über dem Boden kommt vor, und dem Verfasser wurden einmal binnen wenig Tagen etwa 50 000 einjährige Fichten in einem zum Schutz gegen das Aufrieren mit Tannenästen dicht gedeckten Saatbeet abgebissen, wobei die Mäuse nur einen kleinen Theil des zarten Stengels verzehrten; die Schutzdecke hatte offenbar die Mäuse angezogen, ihnen erwünschte Deckung während ihrer Arbeit geboten.

Endlich können die Mäuse noch schädlich werden durch Unterwühlen des Bodens, wodurch die hohl gestellten Pflanzen eingehen.

Als Vorbeugungsmittel gegen Mäuse schaden in unsern Saatbeeten sind nun zu betrachten:²⁾ Die Vermeidung der Nähe des Feldes bei Anlegung eines Saatbeetes, um dem Einwandern der Mäuse entgegen zu wirken; das Betreiben der umgebenden Bestände mit Schweinen, soweit dies möglich, um Alte wie Brut thunlichst zu vernichten; Umziehen des Saatbeetes mit einem Graben, dessen Wände möglichst scharf und senkrecht abgestochen sind und in dessen Sohle in entsprechenden Entfernung Töpfe eingegraben sind, in welche die Mäuse stürzen. — Vor Allem wird man aber jede Herbstsaat mit Eicheln oder Bucheln unterlassen, wenn man das Vorhandensein von Mäusen in irgend nennenswerther Zahl wahrnimmt. — Das als Vorbeugungsmittel gegen Mäuse empfohlene Decken der ange säten Beete mit gehacktem Reisig oder Fichtenästen³⁾ müssen wir nach dem oben mitgetheilten Erlebniß als geradezu bedenklich bezeichnen. Auch E. Heher⁴⁾ empfiehlt ausdrücklich das Entfernen des Laubes von den Saatbeeten, da solches als Schutzmittel die Mäuse anziehe.

¹⁾ Vergl. „Altum, die Mäuse“, welcher Brochüre wir überhaupt manches nachstehend Erwähnte entnehmen.

²⁾ Allgem. F.- u. F.-Btg. 1865. S. 126.

³⁾ Heß, Forstschutz. S. 124.

⁴⁾ Allg. F.- u. F.-B. 1873. S. 34.

Als Vertilgungsmittel aber wird ausschließlich das Vergiften zu empfehlen sein, da das Fangen in Fällen in größerem Maßstab nicht wohl durchführbar ist. Als Vergiftungsmittel dienen Weizen, mit Strychnin oder Arsenik präparirt, oder sogenannte Phosphorpillen, die läufig zu haben sind und pro Kilogr. nur wenig über eine Mark kosten; mit Rücksicht auf ihre Gefährlichkeit für andere Thiere, wie auf Abhaltung von Feuchtigkeit, welch letztere den Phosphorpillen in wenig Tagen jede Schädlichkeit raubt,¹⁾ werden diese Giftmittel vorzugsweise nur in Drainröhren ausgelegt, deren Weite gerade das Einkriechen einer Maus gestattet. E. Heyer hat Körner aus Mehl und Weizenkörnern, mit Phosphor und Arsenik vermischt, angewendet und rühmt den Erfolg.²⁾

Die angegebenen Mittel zeigen sich nun zwar sehr wirksam, haben aber auch ihre Schattenseite, indem die mit Phosphor oder Arsenik vergifteten Mäuse, nach Lust und Wasser strebend, meist außerhalb ihrer Löcher verenden und dadurch Veranlassung zur Vergiftung nützlicher Thiere, wie Eulen, Wiesel etc., werden können. Es wurde nun neuerdings als ein diesem Uebelstand vorbeugendes Mittel die Anwendung von kohlensaurem Baryum empfohlen,³⁾ welches sofortige Lähmung der hintern Gliedmaßen bei den hiemit vergifteten Mäusen und also Absterben in den Gängen bewirkt. Aus einem derben Teig, durch Zusammenkneten von 1 Pfund Mehl mit ¼ Pfund ausgefalltem Baryum mit entsprechendem Wasserzusatz hergestellt, werden bohnengroße Stücke in noch weichem Zustand in die Mauslöcher geworfen.

Auch in der Weise hat man die Vergiftung bewerkstelligt, daß man eine Anzahl locher angesehelter, also willkommene Schlupfwinkel bietender Steinhaufen in den Pflanzgärten angebracht und die Giftmittel inmitten der Steinhaufen und dadurch geschützt gegen das Aufnehmen durch andere Thiere gelegt hat.⁴⁾ Auf ähnlichem Prinzip beruhen die sogenannten Mausehütten, kleine meterhohe Reisighaufen, dicht mit Rasen belegt und am Boden mit ausgestreutem Strychninweizen für die das Versteck auffsuchenden Mäuse versehen.⁵⁾

Fleißige Revision der Forstgärten während des Winters, um bei Einwanderung von Mäusen sofort eingreifen zu können, wird stets, namentlich aber bei Herbstsaaten mit bedrohten Sämereien zu empfehlen sein. —

¹⁾ Schaal auf der Wiesbadener Forstversammlung, f. Bericht S. 164.

²⁾ Allgem. F.- u. F.-B. 1874. S. 70.

³⁾ Allgem. F.- u. F.-B. 1879. S. 411.

⁴⁾ Monatschr. f. d. F.- u. F.-W. 1858. S. 43.

⁵⁾ Zeitschr. f. F.- u. F.-W. XIII. S. 62.

Auch des Maulwurfs sei hier gedacht, der uns zwar durch Verzehren von Egerlingen und Würmern im Saatbeet nützlich, durch Aufwerfen seiner Haufen aber, mit denen er Samen und schwache Pflanzen herauswirft, bisweilen so lästig wird, daß wir ihn trotz seines Nutzens mit Hülfe von Fallen oder durch Auflauern beim Aufwerfen zu vertilgen trachten.

§ 67.

Schutz gegen Vögel.

Aus der Vogelwelt sind es besonders die Häher, Finken und bisweilen auch Wildtauben, welche unsren Saaten vor oder unmittelbar nach dem Aufgehen schädlich werden, während das Auerwild durch Abäsen der Nadelholzknospen nachtheilig werden kann.

Der Häher macht sich in Saatbeeten, die mit Eicheln und Bucheln angehäuft wurden, in oft sehr lästiger Weise bemerkbar, zumal bei Herbstsaaten, bei welchen er bei offnem Boden seine Räubereien während des ganzen Winters fortsetzen kann; mit großer Sicherheit findet er selbst die gut mit Erde gedeckten Eicheln und sämmtliche Häher aus größerer Umgebung ziehen sich am Saatbeet zusammen. — Auflegen einer dichten Schicht Dornreisig ist wohl das beste Mittel zur Abhaltung dieses Feindes; eine andere dichte Decke, von Laub oder Reisig, hat leicht Gefahr durch Mäuse, sowie ein Vermöden¹⁾ des Samens im Winterlager zur Folge. Das vollständige Ebenrechnen der Beete,²⁾ damit der Häher die Saatrisse nicht finde, kann Angesichts der Sicherheit, mit welcher derselbe bekanntlich die im Walde eingestuften, durch den herbstlichen Laubfall nochmals gedeckten Eicheln findet, unmöglich von Wirkung sein! Bessern Erfolg dürfte das Ueberspannen der Beete mit Garnfäden haben,³⁾ ebenso die Erbauung einer einfachen Schießhütte von Fichtenreisig, von der aus man die einfallenden Häher theilweise erlegt, die andern aber gleichzeitig so scheu macht, daß sie nicht mehr beizugehen trauen.

Die Finken (Buchs- und Bergfinken), auch Zeisige, werden uns durch das Aufzehren der Samen von Fichte, Föhre, Lärche vor der Keimung, wie durch das Abbeißen der noch von der Samenhülle umschloffenen Kothledonen dieser Holzarten nach dem Aufgehen oft in hohem Grad lästig und schädlich. Bucheln und deren Kothledonen sind, wenn auch in minderem Maß, ebenfalls gefährdet. Wo Finken in

¹⁾ Allgem. J.-u. J.-B. 1865. S. 126.

²⁾ Monatschr. f. J.-u. J.-W. 1860. S. 59.

³⁾ Monatschr. f. J.-u. J.-W. 1860. S. 99.

größerer Menge einfallen, sind Schutzmaßregeln für Nadelholzsaatbeete unbedingt nöthig.

Das Bewachen der Saatbeete nach der Aussaat und bis zum Abstreifen der Samenhüllen ist eine kostspielige und nur etwa für größere Saatbeete anwendbare Maßregel und man sucht sich deshalb auf andere Weise zu helfen: durch Vogelscheuchen, Einweichen des Samens in den Vögeln schädliche oder widerliche Substanzen, Saatgitter, Neße u. dgl.

Als Vogelscheuchen werden ausgestopfte Raubvögel empfohlen,¹⁾ die jedoch nach anderweiter Mittheilung ihre Wirkung bald verlieren, so daß sich die Finken zuletzt auf den Scheuchen selbst niedersetzen!²⁾ Eine leicht herzustellende Vogelscheuche³⁾ besteht aus einer Flasche ohne Boden, die mittelst einer Schnur an einer längern, elastischen, fest in den Boden gestoßenen Stange befestigt ist; durch den Hals hängt an einer Schnur ein als Klöpfel dienender Nagel ins Innere der Flasche herab, am untersten Ende der Schnur aber ein schimmernder Streifen von Zink- oder Eisenblech, der, vom Wind bewegt, den Klöpfel zum Anschlagen bringt und durch sein Schimmern ebenfalls verscheuchend wirkt.

Das schon oben (beim Häher) erwähnte Überspannen der Beete mit Fäden, oder mit Schnüren, in welche weiße Federn eingeknüpft sind, wird mit gutem Erfolg angewendet, nach Hess' Versuchen⁴⁾ mit entschieden besserem Erfolg als das Bestecken der Beete mit Reisig, zwischen welches die Vögel hineinschlüpfen. Die Fäden selbst wurden 15—20 cm hoch kreuzweise über die Beete gespannt. Auch alte Neße wurden als Schutzmittel mit gutem Erfolg verwendet.⁵⁾

Man wandte ferner das Anfeuchten des anzusäsenden Samens mit stinkendem schwarzen Steinöl an,⁶⁾ ein Mittel, das helfen mag, die Aussaat aber jedenfalls zu einem auch für Menschen unangenehmen Geschäft macht. Gleicher gilt wohl von dem Einweichen des Samens in eine aus stinkendem französischen Öl, Wermuth und Salzsäure oder Kochsalz unter Wasserzusatz bereitete Flüssigkeit, welche Vögel und Insekten abhalten und zugleich die Keimkraft anregen soll.⁷⁾

In neuerer Zeit hat nun Pflanzschulbesitzer Booth in Flottbeck als sicheres Mittel zum Schutz der Nadelholzsämereien das Behandeln der-

¹⁾ Allg. F.- u. J.-B. 1862. S. 240.

²⁾ Allg. F.- u. J.-B. 1862. S. 405.

³⁾ Centralblatt 1879. S. 45.

⁴⁾ Centralblatt 1875. S. 534.

⁵⁾ Zeitschr. f. F.- u. J.-W. V. S. 70.

⁶⁾ Forstl. Blätter. 1873. S. 252.

⁷⁾ Allgem. F.- u. J.-B. 1860. S. 63.

selben mit rothem Mennig empfohlen¹⁾ und neuerdings, nachdem die Wirksamkeit des Mittels von einigen Seiten auf Grund angestellter Versuche bezweifelt worden,²⁾ das von ihm eingehaltene und mit bestem Erfolg angewendete Verfahren genau mitgetheilt.³⁾ — Der Samen wird zunächst ordentlich angefeuchtet, so daß jedes Korn naß ist, doch darf kein Wasser auf dem Boden des betreffenden Gefäßes, in welchem das Anfeuchten geschieht, stehen. Hierauf wird der Samen mit rothem Blei-Mennig bestreut und so lange umgerührt, bis jedes Samenkorn leicht mit demselben überzogen ist, was sich schnell vollzieht; alsdann wird der durch das trockene Mennigpulver schon ziemlich getrocknete Samen in der Sonne oder durch künstliche Wärme wieder vollständig getrocknet und verliert nun die krebsrothe Färbung nicht mehr. — Die Kosten sind nach Grüters Mittheilung⁴⁾ nicht bedeutend, indem zu 24 Pfund Samen etwa 6 Pfund Mennig à 1 Mark verwendet wurden, ein Quantum, das sich als hinreichend erwies.

Einen ganz vollständigen Schutz gewähren die § 58 beschriebenen Schmitt'schen Saatgitter, da hier bei dem nur 2 cm betragenden Abstand der Lättchen ein Hineinschlüpfen der Bögel von oben her eben so wenig möglich ist, als von der Seite her, woselbst der Rahmen dies verhindert. Minderen Schutz gewähren die an gleicher Stelle genannten einfacheren Gitter, unter welche die Bögel von der Seite her schlüpfen können; doch läßt sich wahrnehmen, daß sie dies nur mit Mißtrauen thun, wohl den Entzug der Möglichkeit sofortigen Aufstiegens scheuen, so daß solche Gitter, ziemlich niedrig gehängt, immerhin ziemlichen Schutz gewähren.

Wildtauben werden in Saatbeeten nur ausnahmsweise lästig und durch die gleichen Mittel (eventuell ein paar Schüsse) abzuhalten sein.

Auch gegen das (leider so selten gewordene) Auergeflüg werden wir nur ausnahmsweise unsere Saatschulen zu schützen haben. Haben allerdings einige Stütze sich einen Forstgarten als Aesungplatz erkoren, so kann der Schaden, den sie nach und nach durch das Abäsen der Knospen von Tannen, Fichten, Föhren verursachen, ein recht bedeutender werden. Die Beschädigung wird namentlich zur Winterszeit, bei Schnee, der die Aufnahme anderer Nahrung am Boden hindert, die Spiken der Holzpflänzchen aber noch herausragen läßt, bemerklich werden.⁵⁾ In

¹⁾ Zeitschr. f. J.- u. J.-W. IX. S. 548.

²⁾ Zeitschr. f. J.- u. J.-W. XII. S. 455, 576.

³⁾ Zeitschr. f. J.- u. J.-W. XIII. S. 60.

⁴⁾ Zeitschr. f. J.- u. J.-W. XII. S. 636.

⁵⁾ Heß, Forstschutz. S. 104.

Thüringen wandte man bei einigen besonders heimgesuchten Forstgärten das Ueberspannen der ganzen Gärten mit Draht in etwa 2 m Höhe und 70—80 cm Abstand der Drähte mit mäßigen Kosten und vollkommenem Erfolg an.¹⁾ — Auch Reisigeinlage zwischen die Beete und Pflanzenreihen zeigte sich als Hinderungsmittel für das Umherlaufen der Hühner von Erfolg.

§ 68.

Schutz gegen Haarwild jeder Art.

Der gegen das Wild nöthige Schutz wird sehr verschieden sein je nach der Holzart, respektive den Holzarten, die sich in einem Saatbeet oder Forstgarten vorfinden, wie nach dem Wildstand einer Gegend, den vorkommenden Wildarten.

Größere Forstgärten pflegen jederzeit so eingefriedigt zu sein, daß sie gegen Wild jeder Art — Hochwild, Rehwild, Sauen, Hasen — geschützt sind; die Art und Weise der Einfriedigung wird mit Rücksicht auf die Wildart gewählt werden; sie muß entsprechend hoch sein, wenn Hochwild, hinreichend fest, wenn Schwarzwild, genügend dicht, wenn Hasen abzuhalten sind (vergleiche § 30 ff.). Letztere können, wenn auch in noch so geringer Zahl vorhanden, bei der Anzucht gefährdeter Holzarten zu sehr dichten Einfriedigungen nöthigen; über die Gefährdung der einzelnen Holzarten haben wir schon im § 30 das Nöthige erwähnt.

Bei kleineren Pflanzschulen, Wanderkämpen, sucht man dagegen wo immer möglich die kostspielige Einfriedigung zu vermeiden, was da, wo weder Hochwild noch Sauen vorhanden, insbesondere bei Nadelholzkämpen wohl zulässig ist. Fichten und Töhlen zumal sind von Hasen fast gar nicht, von Rehen wenig bedroht, und von Laubhölzern sind es namentlich Erlen und Eichen, die von letzteren Wildarten wenig zu leiden haben. Er scheint eine Einfriedigung aber auch für solche kleine oder wandernde Kämpe geboten, so wendet man hier gerne die transportablen Einfriedigungen (siehe § 36) an.

Um aber ganz uneingefriedigten Saatshäuschen überhaupt oder den in denselben befindlichen Beeten mit gefährdeten Holzarten einigen Schutz gegen Rehe und Hasen zu geben, wendet man mancherlei Mittel: das Umziehen derselben mit Federlappen, leichte Stangengerüste (gegen Rehe), Verwittern der Saatbeetfläche mit stark riechenden Substanzen, Ueberspannen derselben mit getheerten Schnüren — während der Wintermonate, in welchen allein eine Gefahr für die Pflanzen durch das Wild besteht, an. Bei Eichenhaatbeeten bedarf der etwa schon im Herbst gesäte

¹⁾ Monatschr. f. J.- u. J.-W. 1876. S. 133.

Samen gleichfalls Schutz gegen das ihn begierig auffsuchende Roth-, Reh- und Schwarzwild.

Gegen Hasen sollen die Pflanzen auch mit gutem Erfolg durch das Umziehen der Beete mit Bast, etwa 15 cm hoch über dem Boden (oder Schnee!), geschützt werden können, indem die Hasen solche Schutzwehr nicht überspringen.¹⁾

§ 69.

Schutz und Pflege der Saatbeete gegenüber dem Unkraut.

In fast noch höherem Grad als durch die bisher besprochenen schädlichen Einflüsse der unorganischen Natur und durch die Feinde aus der Thierwelt sind unsere Saatbeete durch einen nie fehlenden, bald mehr, bald weniger lästigen Feind bedroht, dessen Bekämpfung jedoch eine sichere, wenn auch oft kostspielige ist: — durch das Unkraut. Die Beantwortung der Frage, wie diesem lästigen Feind vorzubeugen, wie er am besten und billigsten zu vertilgen sei, wird Gegenstand dieses Abschnittes sein.

Das in den Saatbeeten auftretende Unkraut, nach Art und Zahl außerordentlich verschieden je nach der mineralischen Zusammensetzung des Bodens, seiner natürlichen Feuchtigkeit, seiner bisherigen Benutzung, entzieht unsrer Pflanzen einen Theil der für sie bestimmten Nährstoffe des Bodens, der feineren atmosphärischen Niederschläge, insbesondere den Thau; es überwächst rasch die sich langsam entwickelnden Holzpflanzen, verdämmt und überlagert sie, beeinträchtigt deren Wurzelraum, hindert den Luftwechsel im Boden; in einem nur einigermaßen gepflegten Saatbeet darf daher Unkraut nie überhand nehmen.²⁾

Wie bei so manchem andern Feind unserer Waldungen und Pflanzenwelt werden wir auch bei dem Unkraut von der Verhütung, Vorbeugung gegen dessen rasches und massenhaftes Auftreten, und von der Vertilgung des trocken vorhandenen zu sprechen haben.

Dem übermäßig auftretenden Unkraut beugen wir nun vor durch zweckmäßige Auswahl des Platzes für unser Saatbeet, so zunächst durch Vermeiden zu frischen oder gar feuchten, zu Gras und Unkrautwuchs besonders geneigten Bodens. In bisherigen Feldern, die allerdings den Vortheil sehr billiger erstmaliger Bodenbearbeitung haben, hat man namentlich in den ersten Jahren einen sehr energischen Kampf mit dem

¹⁾ Krit. Blätter L. 1. S. 154.

²⁾ Vergl. die in Seckendorffs Mittheilungen aus dem österr. Versuchswesen Band II. S. 192 angegebenen Resultate der über die Einwirkung der Verunkrautung angestellten Versuche.

Unkraut zu führen, während frisch gerodete Waldböden meist in den ersten Jahren wenig Unkrautwuchs zeigen, weniger als schon länger unbestockt liegende Blößen. — Die Umgebung von jungen Schlägen mit starkem Unkrautwuchs macht sich im Saatbeet ebenfalls bemerklich, indem die leichten Samen vieler Unkräuter im Saatbeet anfliegen.

In Weiterem werden wir der Vermeidung rascher Verunkrautung durch Vertilgung etwa vorhandener Unkräuter bei der wiederholten Bearbeitung des Bodens alle Aufmerksamkeit zuwenden, deren auszülagsfähige Wurzeln (Quecken!) sorgfältig entfernen, den Rasen, welcher zum Zweck des Verfaulens und Düngens untergebracht werden soll, tief mit Erde überdecken, um dessen Durchwachsen nach oben zu hindern, da gerade solche durchwachsende Rasenplaggen beim Ausjäten die größten Schwierigkeiten bereiten.

Bonhausen empfiehlt, wie schon oben (§ 48) erwähnt, möglichst frühzeitiges Bearbeiten im Frühjahr vor der Saat, um die oben auf liegenden Unkrautsämereien nach erfolgter Keimung durch Unterarbeiten mit eisernen Rechen zu zerstören und andere solche Samen obenauf in günstige Keimlage zu bringen, die in gleicher Weise vor erfolgender Ansaat vernichtet werden sollen.

Entsprechende Vorsicht ist ferner nöthig bei Anwendung von Kompost, wenn zu letzterem das im Saatbeet ausgejäte Unkraut mit verwendet wurde, damit mit demselben nicht eine Menge keimfähigen Unkrautsamens ins Saatbeet gebracht wird, ein Nachtheil, der solchen Kompost vielfach in entschiedenen Mißkredit gebracht hat. Fischbach warnt¹⁾ geradezu vor ihm, als dem theuersten Dünger, ebenso Meier.²⁾ — Zwischenlagen ungelöschten Kalkes, welche eine rasche Versiegelung der organischen Substanz zur Folge haben, sind bei Herstellung solchen Unkrautkompostes jedenfalls auch aus diesem Grunde empfehlenswerth. Eben so wenig darf man auf den Kompostaufen das Unkraut wuchern und zur Samenreife gelangen lassen, wie wohl da und dort zu sehen! — Auch durch Straßenabbaum soll leicht Unkrautsamen in die Saatbeete gebracht werden.³⁾

Als Mittel gegen Überhandnahme des Unkrautes hat man mit Erfolg auch das Belegen der Zwischenräume zwischen den Saatstreifen mit Moos, dann mit geringwerthigen Latten oder (billiger) mit gespaltenen Stangen,³⁾ schlechterem Brügelholz, angewendet, durch welche

¹⁾ Allg. J.- u. J.-B. 1860. S. 217.

²⁾ Krit. Blätter L. 1. S. 133.

³⁾ Forstl. Mitth. XI. S. 128.

Mittel das Wachsthum des Unkrauts mechanisch zurückgehalten wird. Selbst Steine (Platten) hat man, wo solche in unmittelbarer Nähe vorhanden, schon dazu verwendet, und alle diese Deckungsmittel erweisen sich zugleich als günstig für Erhaltung der Feuchtigkeit, als Schutz gegen Verdunstung (s. § 58). Latten und Prügel lassen sich zum Zweck des Lockerns leicht abnehmen, was für ihre Anwendung gegenüber dem Moos spricht.


Trotz all dieser Vorsichtsmaßregeln werden wir in jedem Saatbeet bald mehr bald weniger Unkraut erscheinen sehen, es also mit dessen Vertilgung zu thun haben. Hier gilt nun als Regel: Zeitiges Beginnen mit dem Ausjäten im Frühjahr, um das Unkraut nie zu sehr erstarken zu lassen, da sonst mit dem in den Saatreihen selbst stehenden Unkraut nur zu leicht die schwachen Pflänzchen herausgerissen werden; Jäten wo möglich bei feuchtem Boden, damit die Wurzeln des Unkrautes mit herausgezogen werden, letzteres nicht bloß oberflächlich abgerissen werde, was sofortiges Wiederausschlagen vieler Wurzeln zur Folge zu haben pflegt, oder vorheriges Lockern des Bodens durch Behacken, wenn bei trockner Witterung das Unkraut entfernt werden muß; Wiederholung des Jäten, so oft sich das Unkraut in nennenswerther Weise zeigt; lehmtaliges Jäten etwa Anfang September, um eine nochmalige Lockerung des Bodens im Hinblick auf die Gefahr des Aufrierens zu vermeiden. Erscheint nach diesem lehmtaligen Jäten nochmals stärkeres Unkraut, so reißt oder schneidet man dasselbe nur oberflächlich ab, und ebenso muß man bisweilen verfahren, wenn bei anhaltender, das Jäten hindernder Trockenheit einzelnes Unkraut in den Pflanzreihen so stark geworden, daß durch dessen Ausziehen Pflänzchen mit herausgerissen werden könnten.

Das Jäten selbst, eine Arbeit, zu der stets nur die billigere Arbeitskraft von Weibern oder Kindern verwendet wird, geschieht meist einfach mit der Hand, unter Zuhilfenahme eines alten starken Messers, mit welchem tiefergehende Wurzeln herausgehoben oder schlimmsten Falles tief im Boden abgestochen werden, oder einer eigens hiezu konstruirten starken eisernen Gabel. Vorheriges Lockern des Bodens mit dem Jähköpfchen erleichtert die Arbeit wesentlich, namentlich bei lehmigerem Boden, und muß, wie schon oben erwähnt, auf letzterem bei trockner Witterung dem Ausgrasen unbedingt vorangehen, wenn diese Arbeit mit gutem Erfolg geschehen soll.

Die nicht unbedeutenden Kosten, welche das Ausjäten verursacht, haben zur Anwendung von mancherlei Instrumenten zur thunlichsten Erleichterung dieser Arbeit geführt; wir geben nachstehend die Beschreibung

einiger derselben und bemerken, daß dieselben alle gleichzeitig eine Lockerung des Bodens bewirken und resp. zum Zweck haben.


Der Fätkarst von Geyer (Fig. 25)¹⁾ ist ein dreizackiger eiserner Rechen, dessen 14 cm lange Zinken je 5 cm von einander abstehen; der



Figur 25.

Zwischenraum zwischen den einzelnen Saatrispen wird also bei Anwendung dieses Instrumentes mindestens 15 cm betragen müssen, damit die Pflanzenwurzeln nicht beschädigt werden.

Der Dreizack von Schöch (Fig. 26),²⁾ zur Reinigung der nur 12 cm breiten Zwischenräume in Nadelholzsaatbeeten bestimmt, bewirkt gleichzeitig die nöthige Lockerung des Bodens, und wird demselben eine ebenso rasche als gute Arbeitsleistung nachgerühmt. Die ganze Länge des Instrumentthens beträgt etwa 14 cm, jene des mittleren Zinkens 5 cm, während die beiden äußern etwas gekrümmten Seitenzinken nur 4 cm lang sind, die Entfernung der Spitzen dieser Seitenzinken von der Mittelzinke beträgt nur je 4 cm. Durch Hin- und Herschieben des Dreizacks wird der Boden zwischen den Pflanzreihen gelockert, das Unkraut ausgezogen und gleichzeitig ein Anhäufeln der Pflanzen bewirkt; bei trockenem Wetter kann man wohl das Unkraut liegen und vertrocknen lassen. — Für breitere Zwischenräume zwischen den Pflanz-



Figur 26.

¹⁾ Geyer, die Erziehung der Eiche. S. 36.

²⁾ Monatschr. f. d. F.- u. F.-W. 1864. S. 54.

reihen, wie sie für Eichensaaten (und Verschulungen) in Anwendung kommen, hat Schöch einen stärkern Dreizack und einen Fünfzack konstruiert, dessen Spannweite etwa 12 cm beträgt.

Bei diesen Instrumenten, wie bei dem die Aufgabe der Reinigung nur unvollkommen erfüllenden Fätepflug ist übrigens eine Nachhülfe mit der Hand zur Entfernung des unmittelbar an oder zwischen den Pflanzen, in den Saatstellen stehenden und besonders lästigen Unkrautes nicht wohl zu entbehren.

Das Reinigen der Saatbeete geschieht meist im Tagelohn und die Überwachung der Arbeiter bei dieser monotonen Arbeit gehört zu den lästigsten Aufgaben des Schutzpersonals; ohne solche Überwachung wird aber meist nachlässig und mit geringem Eifer gearbeitet, das Unkraut oberflächlich abgerissen statt ausgezogen; — die betreffenden Personen sind ja schließlich froh, wenn es bald wieder einen Verdienst durch Aussägen gibt. Verfasser hat daher dies Reinigen der Saat- und Pflanzkämpe auf seinem seinerzeitigen Revier meist in Accord gegeben, wobei die bei der früheren Taglohnarbeit erwachsenen Kosten den nötigen Anhalt gaben, und ist gut dabei gefahren. Die (weiblichen) Accordanten ließen das Unkraut nie überhand nehmen, benützten im eigenen Interesse jeden Regen zu sofortigem Fäten und fanden bei entsprechendem Fleiß befriedigenden Verdienst. Für große Forstgärten wird sich allerdings eine solche Veraccordirung schwerer durchführen und resp. die Ausgabe schwerer veranschlagen lassen als für kleinere Kämpe.

Die Kosten der Reinigung pro Flächeneinheit sind erklärlicher Weise nach den örtlichen Verhältnissen außerordentlich wechselnd, so daß den Angaben über solche wenig Werth beizulegen ist (s. übrigens § 97).

§ 70.

Pflege der Saatbeete durch Bodenbearbeitung: Lockern und Anhäufeln.

Jede Lockerung des Bodens ist gleichsam eine Düngung, ebenso aber auch von großer Bedeutung für die Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit. Durch dieselbe befördern wir die Verwitterung des Bodens, das Lösen werden der Mineralstoffe, ferner den für die Vegetation so günstigen Luftwechsel im Boden, die Absorption von Kohlensäure und Ammoniak; ermöglichen ferner das leichtere und tiefere Eindringen des Regenwassers, vermeiden das bei festem Boden leicht erfolgende seitliche Abfließen desselben, wirken also schon hiedurch dem Austrocknen des Bodens entgegen. In noch höherem Grad geschieht dies aber durch die Absorption von Wasserdampf aus der Luft, welche durch gelockerten Boden in viel reicherem Maß erfolgt als durch festen; und endlich befördern wir durch Lockerung

des Bodens das kapillare Aufsteigen des Wassers aus den tieferen Bodenschichten nach den oberen, welches in lockerem, größere Kapillarräume enthaltendem Boden reichlicher und rascher erfolgt als in festem. Es ist eine insbesondere bei landwirtschaftlichen Gewächsen leicht zu beobachtende und bekannte Thatsache, daß sich eine Lockerung des Bodens zur Zeit der Trockne für die durch Wassermangel leidenden Gewächse besonders günstig erweist.¹⁾

Direkte Versuche, wie sie Hefz²⁾ angestellt hat, ferner die vielfach so günstigen Resultate des Waldfeldbaues in Hessen, welche durch die forstlichen Zeitschriften ja allenthalben bekannt und vorwiegend auf die Lockerung und Bearbeitung des Waldbodens zurückzuführen sind, endlich die eigenen Erfahrungen, welche jeder schon einige Zeit wirthschaftende und aufmerksame Forstmann gemacht haben wird, stellen diese Vortheile der Bodenlockerung so außer Zweifel, daß in derselben eines der wichtigsten Mittel zur Beförderung des Wachsthums unserer Holzpflanzen, zur Pflege unserer Saatbeete und Pflanzschulen gefunden werden muß.

Fragen wir nun, wann, wie oft und wie eine Lockerung des Bodens in unsren Saatbeeten statt zu finden habe, so lassen sich die beiden ersten Fragen erklärlicher Weise nur allgemein beantworten.

Die erstmalige Lockerung der im Frühjahr frisch angesäten Beete, deren Boden also erst gründlich bearbeitet wurde, erfolgt, sobald der Forstwirth wahrnimmt, daß der Boden sich stark zusammengezogen hat oder gar oberflächlich verkrustet ist, wie dies durch längerem Regenwetter folgende Hitze leicht geschieht; bei den älteren Saatbeeten aber, deren Boden sich durch die Winterfeuchtigkeit stets stark zusammengezogen haben wird, nehmen wir diese erste Lockerung im Jahr sobald vor, als die Rücksicht auf die Gefahr des Auffrierens es gestattet, etwa Anfang Mai. In der Regel schließt sich die Lockerung und Reinigung der ältern Saat- und Pflanzbeete als letzte Arbeit an die Ansaat und Verschulung an, und wird während des Jahres nach Bedarf bald nur einmal, bald öfter wiederholt.

Das „Wie oft“ der Bodenlockerung ist aber zunächst durch die Bodenverhältnisse bedingt. Thoniger und überhaupt etwas bindenderer Boden wird das Lockern öfter nöthig machen als leichter Boden, und für lockeren Sandboden kann sogar eine einmalige Lockerung genügend sein. Von wesentlichem Einfluß ist ferner die Neigung des Bodens zu Gras- und Unkrautwuchs, da — wie schon im vorigen Paragraph erwähnt — das Reinigen der Saatbeete vielfach mit der Bodenlockerung Hand in Hand geht, mit denselben Instrumenten (Fätekarft, Dreizack) aus-

¹⁾ Vergl. H. Fischbach, die Lockerung des Waldbodens. S. 9.

²⁾ Centralblatt. 1875. S. 142.

geführt wird; namentlich bei bindigen Böden und längerer Trockenheit ist eine der Reinigung vorausgehende oder gleichzeitige Lockerung fast unumgänglich nötig, wenn man mit nachhaltigerem Erfolg ausgräben, die Unkrautwurzeln mit ausziehen will, und da bindige Böden stärkeren Gras- und Unkrautwuchs zu haben pflegen als sandige, so ergibt sich schon hiedurch die Nothwendigkeit einer öftren Lockerung der erstern von selbst. — Auch die Kostenfrage spielt wohl bei der Wiederholung der Bodenlockerung eine, wenn auch bescheidene Rolle.

Während man ein bloßes Fäten der Saatbeete — mit welchem durch das Ausziehen der Wurzeln des Unkrautes übrigens stets eine Bodenlockerung verbunden ist, — möglichst bei feuchtem Wetter, nach leichtem Regen vornimmt, wird man das Lockern des Bodens vorwiegend bei trockner Witterung vornehmen, da der trockene Boden besser zerfällt, die Wirkung eine größere ist.¹⁾ Aus dem gelockerten Boden läßt sich das Unkraut auch bei trockenem Wetter herausnehmen und nur das zwischen den Pflanzen, in den Saatrillen selbst stehende bereitet Schwierigkeiten, muß entweder oberflächlich abgerissen oder nach eingetretenem Regen nachgejätet werden.

Die letztmalige Bodenlockerung im Herbst soll gleichfalls — wie das Fäten — nicht zu spät stattfinden, damit der Boden sich wieder genügend sekt, der Gefahr des Aufrierens nicht zu sehr ausgesetzt ist. Mit dem Monat August schließt man das Lockern des Bodens ab und kann dies um so mehr thun, als zu dieser Zeit die Vegetation bereits der Hauptsache nach ihren Abschluß gefunden hat, eine Einwirkung des Lockerns auf dieselbe daher nicht mehr besteht.


Was die Frage betrifft, wie tief man lockern soll, so wird dieselbe dahin zu beantworten sein, daß ein etwa 10 bis 12 cm tiefes Lockern des Bodens vollständig zur Erreichung der Eingangs angeführten günstigen Einwirkungen genügt, ein tieferes Lockern aber bei geringer Entfernung der Saatstreifen auch nur schwer möglich ist.

Mit dem Lockern der Saatbeete wird nicht selten zugleich ein Anhäufeln der Pflanzenreihen von beiden Seiten her verbunden, und zeigt sich solches, im Herbst bei dem letzmaligen Lockern angewendet, von guter Wirkung gegen das Aufrieren der Pflanzen (siehe § 62). Auch als Mittel zur Erhaltung der Feuchtigkeit wird dies Anhäufeln empfohlen, indem einerseits die Feuchtigkeit sich in dem durch das beiderseitige Anhäufeln zwischen den Pflanzenreihen entstehenden Gräbchen sammelt und tiefer in den Boden dringt, andererseits die stärkere Erddecke an den Pflanzen dem Austrocknen mechanisch entgegenwirkt.

¹⁾ Forstl. Mitth. XI. S. 129.

Die Instrumente nun, mit denen die Lockerung des Bodens ausgeführt wird, sind:


Das gewöhnliche Gartenhäckchen, Fätehäckchen, dessen Blatt bezüglich seiner Breite einigermaßen im Verhältniß zu der Breite der Zwischenräume zwischen den Saatrillen stehen muß, für die geringen Zwischenräume von Nadelholzsaatrillen sehr schmal sein muß. Wir haben, um alle Wurzelbeschädigungen zu vermeiden, dasselbe mit nach unten schmäler werdendem Blatt anfertigen lassen (Fig. 27) und diese Modifikation zweckmäßig gefunden.



Figur 27.

Der im vorigen Paragraph schon beschriebene Dreizack, resp. Fünfzack, zur Lockerung und Reinigung gleichzeitig dienend, ebenso wie der Gehler'sche Fätkarft.

Der sog. bayerische Handpflug (Fig. 28),¹⁾ der neben einer allerdings nicht sehr tiefgehenden Bodenbearbeitung zugleich die Pflanzen



Figur 28.

anhäufelt, durch seine geringe Größe leicht transportabel ist und in der Waidtasche bequem mitgeführt werden kann, was bei Wanderkämpfen, resp. einer im Revier vorhandenen größeren Anzahl kleinerer Saatbeete von Bedeutung ist. Mittels einer Schraube kann er rasch an den bei jedem Saatbeet versteckten Stiel befestigt werden.

Nördlingers Reihenkultivator,²⁾ ein Pflug mit getrennten Scharen, welcher in der einen Stellung der lehtern als Häufelpflug wirkt, beim Versetzen der Scharen aber die Erde in der Mitte zusammen-

¹⁾ Forstl. Mitth. XI. S. 128.

²⁾ Krit. Blätter L. 1. S. 258.

schlägt; er hat unseres Wissens nur geringe Verbreitung gefunden, das Schicksal aller etwas komplizierteren Kultur-Instrumente getheilt.

Bei dem Lockern des Bodens mit der Hacke oder dem Dreizack, bei Anwendung des Handpfluges zeigt es sich, wie zweckmäßig es ist, die Rillen nicht nach der Längsrichtung des Beetes, sondern senkrecht zu dieser anzulegen. Die Arbeit erfolgt von den schmalen Zwischenwegen aus leicht und sicher, Beschädigungen der Pflanzen werden leicht vermieden und ebenso jedes Betreten der Beete. Wo aber letzteres, wie bei den häufig auf größern Ländern, ohne Beeteintheilung, angesäten Eichen (oder bei verschulften Pflanzen auf solchen Ländern), nicht zu vermeiden ist, da trage man Sorge, daß die Arbeiter bei dem Lockern sich entweder rückwärts bewegen, wie bei Anwendung des Drei- und Fünfsacks gut thunlich, oder daß das mit Vorwärtsbewegen verbundene Hacking von der noch nicht bearbeiteten Nachbarreihe aus geschehe, damit nicht der eben gelockerte Boden sofort wieder zusammen getreten werde. — Daß bei solch größeren Ländern die Zwischenräume zwischen den Saatrillen groß genug sein müssen, um ein Betreten derselben durch die Arbeiter zu gestatten, wurde bereits früher (§ 41) erwähnt.

Für voll angesäte Beete ist jede Pflege durch Bodenlockerung unmöglich — jedenfalls eine der bedeutendsten Schattenseiten dieses Verfahrens.

§ 71.

Pflege zu dichter Saaten durch Ausschneiden oder Durchrupfen.

Trotz aller Vorsicht, die wir auf Grund stattgehabter Keimproben bei Berechnung der Samenmenge anwenden, fallen doch nicht selten unsere Saaten zu dicht aus, sei es nun, daß besonders günstige Witterungsverhältnisse den ausgestreuten Samen zu möglichst vollständiger Keimung bringen, daß der gefürchtete und bei Bestimmung der Samenquantität in Betracht gezogene Abgang durch Trockenheit, Vogel u. s. f. nicht stattgefunden, sei es, daß unsere Arbeiter ungleichmäßig und also stellenweise zu dicht gesät haben. Jede zu dichte Saat hat aber die nachtheilige Folge, daß neben dem Zurückbleiben und Verkümmern zahlreicher Pflänzchen auch die dominirenden sich nicht so kräftig entwickeln, wie dies bei geringerer Pflanzenzahl der Fall sein würde; kümmerlicher Wuchs, schwache Endknospen, gelbliche Farbe sind die Folge dieser namentlich in Nadelholzsaatbeeten nicht seltenen Erscheinung, während bei größeren Samen eine gleichmäßige und nicht zu dichte Ansatz leichter auszuführen ist — so bei Eicheln, Bucheln, Ahorn.

Die eben berührten Nachtheile des dichten Standes machen sich aber am meisten dann geltend, wenn die Pflänzchen länger als ein Jahr im

Saatbeet stehen, während bei nur einjährigem Verbleiben in demselben jene Folgen minder hervortreten, eine Verdünnung nur bei sehr dichtem Stand nöthig erscheint.

Die nothwendige Hülfe aber geben wir durch rechtzeitige Verdünnung der Saat mittelst Ausziehen oder Ausschneiden des Übermaßes an Pflanzen. — Bei einer im ersten Lebensjahr stehenden Saat ist eine Ausscheidung zwischen den kräftigern und den zurückbleibenden Pflänzchen in der Art, daß wir beim Ausziehen nur die letztern entfernen, noch nicht eingetreten, wir müssen hier ziemlich summarisch verfahren und eben einfach eine Anzahl von Pflanzen aussreißen, am zweckmäßigsten in der Mitte der Rille, woselbst sich auch das Kümmern der Pflanzen am ersten und stärksten geltend macht, während die Randpflanzen wenigstens nach einer Seite hin freieren Wurzelraum haben, sich dadurch kräftiger entwickeln.

Zur Erleichterung und raschen Ausführung des Verdünns zu dichter 1- und 2jähriger Fichtensaaten wandte man auch ein Lineal an,¹⁾ das durch die in einer Rille stehenden Pflanzen in der Weise geschoben wird, daß jene Pflanzen, welche stehen bleiben sollen, auf einer, die zu entfernden Pflanzen auf der andern Seite des Lineals sich befinden. Die ersten werden durch Andrücken des Lineals nach der Seite gebogen, die letztern, aufrecht stehenden aber ausgerupft, was dann, ohne weitere Auswahl erfolgend, sehr rasch geht.

Wir können uns für dies Verfahren aber nicht aussprechen; für zweijährige Pflanzen, bei welchen sich der Unterschied zwischen stärkeren und zurückbleibenden schon deutlich markirt, halten wir dasselbe für zu summarisch, bei einjährigen aber rupfen wir, wie oben erwähnt, die zu entfernden Pflanzen möglichst aus der Mitte der Rille.

Dem bei dichtem Stand oft schon im Sommer des ersten Lebensjahres stattgehabten Durchrupfen, das man — wenn es zu dieser Zeit unterblieb — zweckmäßig im Frühjahr des zweiten Jahres mit der erstmaligen Reinigung des Beets und der Pflanzreihen von Unkraut verbündet (etwa im Mai), folgt bei Pflanzen, welche drei Jahre im Saatbeet stehen sollen, um dann unverschult verwendet zu werden, nicht selten ein nochmaliges Durchrupfen im Sommer des zweiten oder Frühjahr des dritten Jahres, und es kann sich diese Hülfe auch in Saatbeeten nöthig zeigen, die anfänglich nicht zu dicht stehend durch kräftige Entwicklung der Pflanzen im ersten und zweiten Lebensjahr in gedrängten Stand gekommen sind, ein Nachlassen im Wuchs für das dritte Lebens-

¹⁾ Allgem. F.- u. F.-B. 1860. S. 413

jahr befürchten lassen. Hier werden wir nun natürlich beim Durchrupfen minder summarisch verfahren; ein Unterschied zwischen stärkeren und geringeren Pflanzen wird sich schon sehr bemerkbar machen, und letztere sind es, die dann durch Ausziehen entfernt werden.

Statt des Ausziehens hat man auch wohl das Ausschneiden der überflüssigen Pflanzen mit der Scheere gewählt, um jede etwaige Lockerung der verbleibenden Pflanzen in ihren Wurzeln, jede Beschädigung der Letztern zu vermeiden. Diese Besorgniß dürfte aber, wenn das Ausziehen bei feuchtem Wetter und mit entsprechender Vorsicht geschieht, unbegründet sein und das rascher fördernde Ausrupfen dem umständlicheren Ausschneiden vorzuziehen sein.

Wir können das Durchrupfen zu dichter Saaten, insbesondere bei der Fichte, welche oft 2 und 3 jährig im Saatbeet erzogen und als unverschulte, kräftige Pflanze ins Freie versetzt wird, unsren Fachgenossen nicht genug empfehlen. Der Erfolg ist nach vergleichenden Versuchen, die wir in unserem akademischen Forstgarten angestellt haben, ein ganz auffallend günstiger, und man wird mit der Verdünnung nicht leicht zu weit gehen.¹⁾

Die als entbehrlich ausgerupften Pflänzchen wirft man am besten wohl einfach weg; ein vorsichtigeres Ausheben des Übermaßes und Einschulen desselben²⁾ wird sich wohl nur ausnahmsweise empfehlen und nur bei im Frühjahr erfolgendem Durchrupfen überhaupt ausführbar sein.

§ 72.

Pflege der Saatbeete durch Zwischendüngung.

Wenn Saatbeete einer wiederholten Benutzung ohne gründliche und rationelle Düngung unterstellt werden, so macht sich der Mangel an Nährstoffen durch kümmerliches Wachsthum, kleine Blätter, gelbe Färbung der Nadeln bemerklich. Bei Pflanzen, die einjährig zur Benutzung kommen sollen, läßt sich dem Nebelstand kaum mehr abhelfen, bei Pflanzen dagegen, welche zwei oder drei Jahre im Saatbeet stehen sollen, können wir durch eine sogenannte Zwischendüngung den Nahrungsmangel heben, den Pflanzen zu gedeihlichem Wachsthum verhelfen. Eine solche kann sich aber auch auf ursprünglich gut gedüngtem Boden bei etwas dichtem Pflanzenstand und längerem — dreijährigem — Verbleib im Saatbeet als nöthig oder doch vortheilhaft erweisen.

¹⁾ Zu weit gehend dürfte das Scheren der Nadelholzrispen in der Weise sein, daß die Pflanzen genau einzählig in der Reihe stehen. Allgem. F.-u. J.-B. 1866. S. 210.

²⁾ Forstl. Mittb. XI. S. 129.

Über die Ausführung einer solchen Zwischendüngung haben wir bereits im § 28 das Nöthige gesagt und weisen nur nochmals darauf hin, daß bei derselben stets rasch wirkende, also leicht lösliche Düngemittel — chemische Präparate, Asche, Fauche u. dgl., — nicht aber Kompost, Rasenerde und ähnliche langsamere sich zersetzende Materialien zu verwenden sind und daß die Düngung möglichst zeitig im Jahre zu erfolgen hat, wenn sie sich im selben Jahre noch von entsprechendem Erfolg zeigen soll.

IV. Abschnitt.

Die Pflanzenerziehung im Pflanzbeet.

1. Kapitel.

Die Verschulung der Pflanzen.

§ 73.

Allgemeine Erörterungen.

Wenn eine im Saatbeet erzogene Pflanze nicht kräftig und groß genug erscheint, um sofort zur Kultur ins Freie benutzt werden zu können — sei es, daß sie durch überwachsendes Gras und Unkraut, durch Frost und Hitze, durch Wild oder Weidevieh gefährdet würde, sei es, daß bei Nachbesserungen im Hoch- oder Niederwald die schon herangewachsene oder (als Stockauschlag) rasch heranwachsende Umgebung stärkeres Pflanzmaterial nöthig macht — so wird dieselbe aus dem stets mehr oder weniger dichten Stand des Saatbeets, der eine kräftige Entwicklung der Seitenwurzeln wie der Beauftragung für größere Pflanzen unmöglich macht, in eine nach allen Seiten freiere Stellung auf dem Pflanzbeet gebracht, um hier zu verstarken, Bewurzelung und Beauftragung allseitig auszubilden: sie wird verschult (umgeschult, umgelegt, verstopft).

Dieses Verschulen schwacher Pflanzen behufs Erziehung starker, kräftiger Pflänzlinge ist jedenfalls ein der Gärtnerie und Obstbaumzucht entlehntes Verfahren und wurde zunächst nur bei Laubhölzern — vor Allem wohl der Eiche — angewendet, um das zur Be pflanzung von Hütsflächen, Alleen u. dergl. nöthige Material zu erziehen. Jedemfalls

aber war die Anwendung der Verschulung bis vor wenig Jahrzehnten eine sehr beschränkte; sagt doch Hundeshagen noch 1828,¹⁾ „daß er von dem öftern Umlegen der Stämmchen noch nirgends guten Erfolg gesehen“ und Gwinner erwähnt 1841,²⁾ daß bei Nadelhölzern ein Versetzen in der Regel nicht stattfinde. Vergleichen wir mit diesen Aussprüchen die ausgedehnten Beete voll verschulter Pflanzen, Laub- wie Nadelhölzer, in unsrer jetzigen Pflanzgärten, so werden wir einen ganz außerordentlichen Umschwung und Fortschritt auch auf diesem Gebiet der Forstwirtschaft und respektive Pflanzenerziehung zu konstatiren haben.

Einen Fortschritt: denn die Vorzüge der verschulten Pflanzen gegenüber den unverschulten sind so in die Augen fallend, daß selbst das Auge des Laien sie erkennt. Die allseitige, gleichmäßige Bewurzelung und Beauftragung, der stufige Wuchs unterscheiden sie aufs Vortheilhafteste von der unverschulten Pflanze, welche im dichten Stand des Saatbeets genötigt war, ihre Wurzeln fast ausschließlich nach der Tiefe oder (als Randpflanze) nach einer Seite zu senden, welche ihren Höhentrieb auf Kosten der Seitenbeauftragung wie der Stärke des Stämmchens unverhältnismäßig strecken mußte oder in Folge zu dichten Standes in der Entwicklung überhaupt zurückblieb. — Das Gedeihen unsrer Kulturen hat durch die Anwendung verschulter Pflanzen außerordentlich an Sicherheit gewonnen, denn die stufig gewachsene, reichlich und allseitig bewurzelte Schulpflanze vermag allen Gefährdungen und namentlich dem größten Feind der Kulturen, der Trockenheit, viel sicherer zu widerstehen, als die minder vollkommene Saatbeetpflanze. Die Verschulung hat uns die Mittel an die Hand gegeben, den für die Verpflanzung in höherem Alter ungünstigen Wurzelbau mancher Holzarten, obenan der Eiche, durch Kürzung der Pfahlwurzel und Hervorrufung reicher Seitenbewurzelung in günstiger Weise umzugestalten; sie hat die kostspielige und für die das Pflanzmaterial liefernden Schläge oft verderblich gewordene Ballenpflanzung sehr in den Hintergrund gedrängt und den Anbau empfindlicher Holzarten — so vor Allem der Tanne — im Freien und ohne Schutzbestand erst recht ermöglicht, indem wir diese Holzarten im Schutz des Saat- und Pflanzbeets hinreichend erstarken lassen können. Die Mehrzahl unsrer Laubholzpflanzen, welche zur Verwendung gelangen, Eichen und Ahorn, Eschen und Ulmen, werden umgeschult; von den Nadelhölzern sind es Tanne und Fichte, deren Verschulung gegenwärtig in ausgedehntem Maße stattfindet, weniger die Lärche, fast gar nicht die Föhre, deren Verschulung jedoch in neuester Zeit auch für manche Ver-

¹⁾ Encyclopädie 1828. S. 354.

²⁾ Waldbau. 1841. S. 296.

hältnisse empfohlen wird; die Besprechung der einzelnen Holzarten wird uns auf dies Thema zurückführen.

Die Frage, wann beim Kulturbetrieb verschulzte Pflanzen nöthig, wann unverschulzte genügend seien, hat die Lehre vom Waldbau, haben die lokalen Verhältnisse zu beantworten; unser Handbuch soll nach getroffener Entscheidung hierüber nur lehren, wie die nöthigen, stärkeren oder schwächeren Pflanzen zu erziehen seien. Nur im Allgemeinen möchten wir noch hinzufügen, daß trotz der oben erwähnten Vorzüge verschulter Pflanzen die Anwendung der billigern, rascher erzogenen unverschulten Pflanzen in möglichst geringem Alter da angezeigt erscheinen wird, wo die im Eingang dieses Paragraphen angeführten Gründe für Verwendung stärkerer Pflanzen nicht bestehen, und daß mit der immerhin nicht unwesentliche Kosten verursachenden Verschulung insbesondere der Fichte vielfach wohl weiter gegangen wird, als unbedingt nöthig.¹⁾ Auch hier bewährt es sich, daß ein zu weit gehendes Generalisiren im Waldbau nichts tauge!

§ 74.

Saat- und Pflanzschule — Zusammenhang beider.

In sehr vielen Fällen finden wir die Pflanzschule mit der Saatschule, welche das zur Verschulung nöthige Material liefert, vereinigt, Saat- und Pflanzbeete unmittelbar neben einander gelegen, und es hat diese Vereinigung beider ihre ganz entschiedenen Vorzüge; Verpackung und Transport der jungen Pflänzchen wird erspart, die ausgehobenen Saatpflänzchen kommen oft schon nach wenig Minuten wieder in den Boden, die Arbeit greift rasch und sicher in einander. — Dagegen sind wohl auch die Fälle nicht allzu selten, in welchen die gegen Frost und Hitze, gegen Beschädigungen und Gefährdungen mancher Art zu schützenden Saatpflänzchen in einem einzigen, günstig gelegenen, gut eingefriedigten, ständig überwachten Forstgarten (etwa bei einer Försterwohnung gelegen) erzogen werden, während die Pflanzschulen in dem vielleicht parzellirten Revier zerstreut, eventuell in der Nähe der Kulturstadt sich befinden; so insbesondere in Fichtenrevieren, in denen die Pflanzkämpe meist einer Einfriedigung nicht mehr bedürfen, oder wo in denselben etwa Ballenpflanzen erzogen werden sollen, was nur in einmal zu benutzenden Wandlerkämpen geschehen kann.

Im Allgemeinen gilt für Auswahl einer Oberfläche zu einer ausschließlichen Pflanzschule dasselbe, was wir über die Wahl des Platzes

¹⁾ Bergl. die Mittheilungen des Oberförsters Pollak. Allgem. F. u. S.-B. 1880. S. 339.

für einen Forstgarten überhaupt gesagt; doch ist hier ein weniger milder, bindenderer Boden eher zulässig, als für die Saat, da die schon erstarckten einzuschulenden Pflanzen manche Hindernisse leichter überwinden, als die keimenden Samen, die aufgehenden Pflänzchen.

Die Größe der zur Verschulung zu bestimmenden Fläche wird durch die mannigfachsten Verhältnisse beeinflußt: die Menge der zur Ausführung der Kulturen alljährlich nöthigen verschulten Pflanzen, die Stärke, welche dieselben erreichen sollen, und hiedurch bedingt die Dauer ihres Verbleibens im Pflanzbeet, die Entfernung, in welcher je nach Holzart und Dertlichkeit die Pflanzen im Pflanzbeet zu stehen sind, endlich der erfahrungsgemäße (nicht unbedeutende) Abgang an eingehenden und untauglichen Pflanzen werden dem Wirthschafter hierbei maßgebend sein.

In engem Zusammenhang mit der Größe der Pflanzbeete, der Menge der alljährlich zu verschulden Pflanzen steht die Größe der Saatbeete, auf welchen diese Pflanzen erzogen werden sollen. Im Allgemeinen bemüht man dieselbe nicht zu gering, trägt etwaigen Gefährdungen und Kalamitäten Rechnung und hat lieber ein paar Tausend Pflanzen übrig als ein Tausend zu wenig, zumal ein etwaiger Ueberschüß doch meist anderweit verwerthbar, verkauflich, zu sein pflegt. Relativ am kleinsten wird die Fläche der Saatbeete sein, wenn die Pflanzen einjährig verschult werden, während deren Verschulung in zweijährigem Alter reichlich die doppelte, in dreijährigem (wie dies als Ausnahme bei Fichten in Hochlagen vorkommt) die dreifache Saatschulfläche nöthig macht; im Weiteren aber ist das Größenverhältniß von Saat- und zugehöriger Pflanzschule bedingt durch die Zeit, welche die Pflanzen in dem Pflanzbeet zu stehen haben — je länger dieselbe, um so geringer natürlich die nöthige Saatbeetfläche, wie denn z. B. die Erziehung von Heistern, welche 5—8 Jahre im Pflanzbeet stehen, erklärlicher Weise die verhältnismäßig kleinste Fläche für Saatbeete nöthig macht.

Auch der weitere Umstand ist für die Größe einer ständigen Pflanzschule von Bedeutung, ob die zu den Frühjahrskulturen abgeräumten Pflanzbeete nach sofortiger Umarbeitung und Düngung noch im gleichen Frühjahr wieder zur Verschulung benutzt werden oder ob sie ein Jahr lang brach liegen bleiben; in letzterem Fall erhöht sich z. B. bei zweijährigem Verbleiben der Pflanzen im Pflanzbeet die Größe der Pflanzschule um die Hälfte. — Auf das Verhältniß der Saatbeet- zur Pflanzbeetfläche wird die Brache selbst dann nicht immer ohne Einfluß sein, wenn auch bei den Saatbeeten je eine Jahresfläche brach liegt; für die Erziehung einjähriger Pflanzen z. B. würde in diesem Fall die

doppelte Fläche im Pflanzgarten zu bestimmen sein, für die Pflanzbeete im eben angeführten Fall nur um die Hälfte der sonst nöthigen Fläche mehr. Werden dagegen die Pflanzen zweijährig verschult und stehen zwei Jahre im Pflanzbeet, so ist die Brache auf das Größenverhältniß von Saat- und Pflanzschule ohne Einfluß.

Bestimmte Zahlen über dies letztere lassen sich also erklärlicher Weise nicht geben, die lokalen Verhältnisse und die Erfahrungen lassen den Wirthshafter wohl das Richtigste finden. Im Allgemeinen geben Schmitt¹⁾ und Gayer²⁾ an, daß zur Erziehung 3—4jähriger verschulter Pflanzen etwa der zehnte, 5- und 6jähriger Pflanzen der zwanzigste Theil der Pflanzschulfläche zu Saatbeeten zu verwenden sei.

§ 75.

Alter und Stärke der zu verschulenden Pflanzen.

Bezüglich des Alters und der Größe der zu verschulenden Pflanzen läßt sich der allgemeine Grundsatz aufstellen, daß es zweckmäßig sei, die Pflanzen in thunlichst geringem Alter, in der Regel also einjährig, zu verschulen, indem einerseits mit solch kleinen Pflanzen die Verschulung am leichtesten und billigsten auszuführen ist, anderseits die Pflanze durch diese frühzeitige Gewährung eines größern Standraumes zu rascher Entwicklung gebracht und die Absicht, kräftige Pflanzen zu erziehen, hiedurch in kürzester Zeit erreicht wird. Insbesondere gilt diese Verschulung einjähriger Pflanzen als Regel für jene Holzarten, welche schon im ersten Jahr eine bedeutendere Entwicklung, insbesondere auch der Pfahlwurzel, zeigen.

Man geht mit dem Alter der einzuschulenden Pflanzen sogar noch weiter herunter und verschult die eben erst aufgegangenen Keimplinge (in manchen Gegenden dann als „Krautpflanzen“ bezeichnet) mit gutem Erfolg — so von Eschen, Weißbuchen.

Dagegen werden auch zwei- und selbst dreijährige Pflanzen zur Verschulung verwendet, wenn in Folge ungünstiger Verhältnisse die Pflanzen im ersten Jahr sich nur sehr schwach entwickelt haben, wie dies z. B. bei der Fichte nicht selten, in rauhem Klima selbst regelmäßig der Fall ist, oder wenn die Entwicklung der betreffenden Holzart in den ersten Lebensjahren an sich eine sehr langsame ist, wie z. B. bei der Tanne.

Das Verschulen zu kleiner, zu schwach entwickelter Pflanzen ist

¹⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 64.

²⁾ Waldbau. S. 428.

an sich ein mißliches Geschäft und eine natürliche Ausscheidung der Pflanzen in kräftigere und geringere Exemplare hat dann noch nicht in solchem Maße stattgefunden, daß sie auch beim Verschulen entsprechend berücksichtigt werden könnte, wie dies doch wünschenswerth ist.

Eben so, wie das Verschulen zu kleiner, ist auch das Verschulen schon zu größer, im mehrjährigen dichten Saatbeetstand spindlig herangewachsener Pflanzen zu vermeiden — man wird aus solchem Material keine schönen, stufigen Pflanzen mehr erziehen und viel Abgang haben, und zudem ist die Einschulung solch größerer Pflanzen stets kostspieliger als jene kleiner Pflänzchen.

Für das Alter, in welchem zum Zweck der Erziehung von Heistern eine zweitmalige Verschulung statt zu finden hat, wird die Holzart und die mehr oder minder günstige Entwicklung der erstmals verschulsten Pflanzen maßgebend sein und dieselbe demgemäß nach zweit bis höchstens vierjährigem Stehen im Pflanzbeet einzutreten haben. —

Neben dem Alter ist es, wie oben erwähnt, die Stärke der Pflanzen im Saatbeet, welche für deren alsbaldige oder noch um ein Jahr zu verschiebende Verschulung bestimmend ist, und der durchschnittliche Entwicklungsgrad der Pflanzen eines Beetes wird hiebei den Ausschlag geben.

Unter den Pflanzen eines Saatbeetes werden sich jederzeit eine kleinere oder größere Zahl von zurückgebliebenen Pflänzchen finden, je dichter der Stand war, um so mehr. Solche Schwächlinge, die sich durch geringere Größe und schwache Knospen leicht kenntlich machen, werfe man rücksichtslos bei Seite — das Einschulen derselben muß als ein entschiedener Fehler bezeichnet werden, der nur bei seltneren und werthvolleren Holzarten oder durch Mangel an Verschulungsmaterial etwas entschuldigt werden kann. Solche Schwächlinge werden jederzeit ein Jahr länger im Pflanzbeet stehen müssen als kräftige Pflanzen, um geeignetes Pflanzmaterial für die Kultur zu liefern, und doch in der Regel an Qualität hinter den um ein Jahr später verschulten kräftigen Pflänzchen zurückbleiben. Noch mißlicher aber ist es, wenn solche schwache Pflanzen auf die gleichen Beete mit den kräftigeren verschult werden: hier kann man dann mit der Benutzung der Beete in große Verlegenheit kommen, indem sich auf demselben Beet seinerzeit verwendbares und noch zu geringes Material gleichzeitig vorfindet, das erstere oft dem letztern zu lieb ein Jahr zu lang im Pflanzbeet stehen muß.

Aber auch bei dem brauchbaren Pflanzmaterial bestehen auf ein und demselben Saatbeet oft sehr bedeutende Unterschiede in der Entwicklung, in höherem Grad bei den schon im ersten Lebensjahr sich stärker

entwickelnden Laubhölzern — so bei Ahorn, Ulme, Eiche — als bei den Nadelhölzern. Hier ist dann vor der Einschulung ein entsprechendes Sortieren sehr zu empfehlen,¹⁾ so daß auf ein und dasselbe Pflanzbeet möglichst gleich starke Pflanzen eingeschult werden; die Beete mit den stärkeren Pflanzen werden stets ein, selbst zwei Jahre vor den andern zu nützen sein, ein nicht zu unterschätzender Vortheil neben dem Vermeiden des Nachtheils, daß man einen Theil der Pflanzen, die kräftigen, zu stark werden lassen muß, oder einen andern, die schwächeren, in noch nicht genügend erstarcktem Zustand mit zu verwenden genötigt ist.

§ 76.

Dauer des Verbleibens der Pflanzen in der Pflanzschule.

Wie das Alter, in welchem die Verschulung vorgenommen wird, so ist auch die Dauer des Verbleibens der verschulten Pflanzen in den Pflanzbeeten eine verschiedene, bedingt durch Holzart, Entwicklung der Pflanzen, Verwendungszweck.

Als Minimum dieser Zeitdauer darf man wohl für die meisten Holzarten zwei Jahre betrachten, da ein nur einjähriges Stehen im Pflanzbeet meist verhältnismäßig geringen Erfolg zeigen, nicht jenen Unterschied in der Stärke, Bewurzelung und Beauftragung hervorrufen würde, der das immerhin kostspielige Verschulen rechtfertigt. Erst im zweiten Jahr pflegt die verschulte Pflanze sich besonders kräftig und stündig zu entwickeln, nachdem sie sich im ersten Jahr dem neuen Standort accommodirt, den ihr gebotenen Wurzelraum benutzt, unter dem allseitigen Einfluß des Lichtes die entsprechenden Seitenknospen ausgebildet hat. — Wir können sogar die Wahrnehmung machen, daß bisweilen die Stamm-entwicklung der unverschult gebliebenen Pflanzen bei nicht allzu dichtem Stande eine kräftigere ist als jene ihrer verschulten Altersgenossen im ersten Jahr, zumal wenn etwa eine Kürzung der Wurzel (Eiche!) mit dem Verschulen verbunden war oder der Verschulung unmittelbar anhaltende Trockenheit folgte, welche den versehrten Pflanzen das Anwachsen erschwerte. Im zweiten Jahre allerdings pflegen die verschulten Pflanzen dann das Versäumte reichlich einzuholen.

Eine Ausnahme bezüglich des oben angegebenen Minimums machen nur einige besonders schnellwüchsige Holzarten — Erlen, Akazien —, bei denen unter günstigen Umständen schon einjähriges Stehen im Pflanzbeet zu genügender Erstärkung der Pflanzen ausreicht; auch verschulte Föhren pflegt man nur ein Jahr im Pflanzbeet zu belassen.

¹⁾ Forstl. Blätter. 1879. S. 174. — Fischbach, Forstwissenschaft. S. 119.

Nicht selten aber werden die verschulsten Pflanzen auch drei und selbst vier Jahre im Pflanzbeet zu stehen haben, sei es, daß in Folge lokaler Verhältnisse, rauhen Klimas die Entwicklung überhaupt eine langsamere ist (Fichte), sei es, daß die betreffende Holzart an sich ein in der Jugend sehr langsames Wachsthum hat, wie die Tanne, sei es endlich, daß Pflanzen von besonderer Stärke zu Nachbesserungen in älteren Schlägen, wegen Ungunst der Kulturstorte und ähnlicher Gründe gewünscht werden. Auch Beschädigungen, etwa durch starken Spätfrost, können die Pflanzen in der Entwicklung derartig zurückwerfen, daß dieselben länger als sonst nöthig im Pflanzbeet stehen müssen.

In dem eben erwähnten Falle jedoch, daß Pflanzen von besonderer Stärke gewünscht werden, tritt bei Laubholzern zur Erziehung der sogenannten Halbheister oder Heister in der Regel eine zweite Verschulung ein, welche dann Gelegenheit gibt, eine nochmalige Sortirung und resp. Ausscheidung minder tauglicher Exemplare, Korrektur der Wurzeln und Gewährung entsprechenden Standraumes vorzunehmen. Die Dauer des Verbleibens dieser zum zweiten Mal verschulsten Pflanzen in der Heisterschule schwankt je nach Holzart und gewünschter Stärke etwa zwischen zwei und vier Jahren. — Für Nadelholzern findet eine zweimalige Verschulung im Forstbetrieb nicht statt.

§ 77.

Zweckmäßigste Zeit zur Vornahme der Verschulung.

Die richtigste Zeit zur Vornahme der Verschulung ist jedenfalls im Frühjahr vor dem Aufbrechen der Knospen. Gegen ein Verschulen im Herbst spricht zunächst die Gefahr des Ausfrierens, welcher die noch nicht angewurzelten Pflanzen in dem frisch gelockerten Boden ausgesetzt wären; Herbstkulturen pflegen aber auch um der kürzeren Tage willen verhältnismäßig theurer zu sein, und endlich werden nicht selten die zur Verschulung zu benutzenden Beete erst durch die Frühjahrskulturen leer. Im Sommer läßt sich zwar auch verschulen,¹⁾ und namentlich Fichten können im Juni mit schon ziemlich entwickelten Trieben noch mit gutem Erfolg verschult werden, während der letztere bei Laubholz sehr zweifelhaft sein wird; aber auch bei den weniger empfindlichen Nadelholzern ist man jedenfalls sehr von der Witterung abhängig, muß beim Verschulen selbst, wie bei eintretender Trockne gießen und wird gleichwohl bei anhaltender Hitze starken Abgang haben.

Beide Gefahren bestehen im Frühjahr nicht; man beginnt gerne

¹⁾ Allgem. F.- u. J.-S. 1866. S. 213. (Heyer.)

zeitig mit dem Verschulen, um die Bodenfeuchtigkeit und die im April häufigen Niederschläge den Pflanzen zu gute kommen zu lassen, und der April pflegt allenthalben der Hauptmonat für die Verschulungsarbeit zu sein; in rauheren Lagen verschiebt sich wohl die letztere in den Anfang bis selbst Mitte Mai. Fast überall läßt man zweckmäßiger Weise die Verschulung der minder dringenden Arbeit des Anhäns vorausgehen.

Wenn die Pflanzen schon etwas angetrieben haben, so schadet das bei Tanne und Fichte nichts, bei Laubhölzern und Lärchen aber sucht man dasselbe zu vermeiden, da eintretende Trockenheit bei diesen sehr nachtheilig einwirken kann. Wird die Verschulung dadurch, daß zuerst zahlreiche Kulturen auszuführen und zu denselben die Beete erst abzu-leeren sind, etwas lang hinausgeschoben, so hebt man wohl zweckmäßig die zu verschulenden Pflänzchen aus und schlägt sie an kühlem, schattigem Ort ein, wodurch das Treiben derselben zurückgehalten wird; es ist dies für empfindliche Holzarten zugleich ein Schutz gegen Spätfrostgefahr. —

Zu berücksichtigen sind bei Vornahme der Verschulung der Feuchtigkeitsgrad des Bodens und die Witterung, und beide können eine Verschiebung oder Unterbrechung der Arbeit nöthig machen. Bei bindendem Boden treten große Bodenfeuchtigkeit, Regenwetter, der Arbeit hinderlich in den Weg, der Boden ist schmierig und klumpig, die zarten Wurzeln können nicht entsprechend untergebracht werden, und die Arbeiter treten beim Arbeiten auf den größeren Ländern den erst gelockerten Boden stark zusammen. Bei lockerem Boden, Sandboden, ist dagegen entsprechende Feuchtigkeit willkommen, da bei zu trockenem Boden die zum Verschulen gezogenen Gräbchen oder eingestochenen Löcher nicht recht halten wollen, indem der trockene Boden stets nachrollt. — Etwas bewölkt oder gedeckter Himmel ist beim Verschulen stets willkommen, bei Sonnenschein und namentlich bei austrocknendem Ostwind aber besondere Vorsicht nöthig, um das rasch erfolgende Austrocknen der Wurzeln wie des Bodens (in den gezogenen Gräbchen oder Furchen) zu verhindern.

§ 78.

Burrichtung des Bodens und der Beete für die Verschulung.

Die Vorbereitung des Bodens für die Pflanzbeete erfolgt bei einer Neuanlage ganz in gleicher Weise wie für die Saatbeete, also durch hinreichend tiefes Umhauen oder Umgraben im Herbst, damit der Boden während des Winters tüchtig ausfriere und die Winterfeuchtigkeit reichlich aufnehme, und durch gartenmäßiges Umgraben mit dem Spaten im Frühjahr vor der Benutzung. Waren die Beete bisher schon

benutzt und wurden etwa erst im Frühjahr abgeleert, so findet natürlich letztere Bearbeitung allein statt. In Verbindung mit dieser Bearbeitung im Frühjahr erfolgt auch die etwa nöthige Düngung und sei hier wiederholt (vergl. § 25), daß es bei Düngung der Verschulungsbeete mehr auf nachhaltige als auf rasche Wirkung der Düngemittel ankommt, in um so höherem Grade, je länger die Pflanzen in den Pflanzbeeten verbleiben sollen. Rasen-Wische und -Erde, Humus, Kompost lassen sich also hier mit gutem Erfolg verwenden.

Bei der Zurichtung des Bodens im Früjahr wird man sich auch zu entscheiden haben, ob man zur Verschulung Beete oder größere sog. Ländere (Quartiere, Gewannen) verwenden will. Wir haben über das, was zu Gunsten der einen wie der andern spricht, uns schon früher (§ 41) geäußert und uns aus mancherlei Erwägungen für die Beete, als die in vielen Fällen vorzuziehende Eintheilung ausgesprochen. Die Entfernung, welche man den Pflanzreihen geben will und kann, spielt bei Lösung dieser Frage gleichfalls eine sehr bedeutende, oft entscheidende Rolle, indem größere Ländere eine sonst etwa zulässige engere Verschulung ausschließen — die Arbeiter müssen sich zum Zweck der Lockerung, Reinigung etc. zwischen den Reihen leicht bewegen können. — Heister dagegen, welche in ziemlich bedeutender Entfernung verschult werden müssen, wie rasch sich entwickelnde Laubhölzer überhaupt, werden auf größere Ländere verschult.

Eine nicht unwichtige Frage ist es, ob die im Frühjahr abgeleerten Beete thunlichst sofort wieder benutzt werden oder bis zum nächsten Frühjahr brach liegen sollen. Daß letzteres manche Vortheile gewährt, lässt sich nicht in Abrede stellen, und namentlich auf schwererem Boden, der etwa im Frühjahr beim Ausheben der Pflanzen stark zusammen getreten wurde, klumpig und grobschollig erscheint, wird ein Liegenlassen über Winter nach vorherigem Umarbeiten im Spätsommer unter gleichzeitigem tüchtigen Unterarbeiten des während des Jahres gewachsenen Unkrautes (das man aber nicht zur Samenreife gelangen lassen darf!) sich als zweckmäßig erweisen, zugleich die Vortheile der landwirthschaftlichen Brache bieten.

Dagegen lassen die nicht geringen Kosten, welche die erstmalige Bodenbearbeitung wenigstens an vielen Orten, dann die Einfriedigung unserer Forstgärten verursachen, nicht selten eine möglichst intensive Ausnutzung dieser letzteren als wünschenswerth erscheinen und in solchem Falle sucht man also das Brachliegen größerer Flächen zu vermeiden.¹⁾

¹⁾ Allg. F. u. J.-B. 1866. S. 214.

Dies kann nun, wo die oben geschilderte Beschaffenheit des Bodens ein Ausfrieren über Winter besonders wünschenswerth macht, dadurch geschehen, daß man die im Frühjahr zu verwendenden Pflanzen schon im Herbst aushebt, gut einschlägt und die abgeleerten Felder rauh umarbeitet. Auf minder bindendem Boden dagegen oder in schon länger benutzten Forstgärten, in welchen der Boden durch die öftere Bearbeitung und Düngung mit humosen Substanzen bereits mürbe geworden, unterliegt es auch keinem Anstand, die erst im Frühjahr geleerten Beete sofort unter gleichzeitiger Düngung umzugraben und, nachdem der Boden sich etwas gesetzt hat, zur alsbaldigen Verschulung zu benutzen.

§ 79.

Ausheben der zu verschulenden Pflanzen.


Bei Besprechung des Aushebens der Pflanzen zum Zweck der Verschulung werden wir unterscheiden müssen, ob wir es mit voll oder rillenweise angesäten Saatbeeten, mit einzuschulenden Wildlingen, mit kleinen oder mit stärkeren, zum zweiten Mal zu verschulenden Pflanzen zu thun haben.

Voll angesäte Saatbeete kommen, wie schon erwähnt, verhältnismäßig selten mehr vor; zum Ausheben der Pflanzen aus denselben benutzt man am besten eine starke eiserne Gabel (Mistgabel), um Wurzelbeschädigungen zu vermeiden, sticht am Rande beginnend größere Ballen heraus und zertheilt dieselben vorsichtig mit der Hand, die einzelnen Pflänzchen herauslösend.

Wesentlich erleichtert und mit der größten Schonung der Wurzeln, namentlich der so wichtigen feinen Saugwurzeln und Wurzelenden ermöglicht ist das Ausheben der rillenweise erzogenen Pflanzen. Das-selbe erfolgt, indem man am Ende eines Beetes beginnend durch Wegräumen der Erde längs einer Pflanzenreihe, jedoch zur Verhütung von Wurzelbeschädigungen in genügender Entfernung von derselben, einen kleinen Graben zieht, dessen Tiefe durch die mehr oder minder tiefe Bewurzelung der betreffenden Pflanzen bedingt ist; auf der andern Seite der Pflanzenreihe wird sodann ein Spaten hinreichend tief senkrecht eingestochen und mit Hülfe desselben die ganze Reihe nach und nach in jenen Graben gedrückt. Hierdurch entsteht nun gleich der nöthige Graben für die nächste Pflanzenreihe, bei der ebenso verfahren wird; den Spaten sticht man stets genau in der Mitte zwischen den Pflanzenreihen ein. Die losgelösten Pflanzenballen werden mit der Hand in kleinere Partien zertheilt und aus diesen durch vorsichtiges Abschütteln der Erde und Entwirren der oft vielfach verschlungenen Wurzeln die einzelnen Pflänzchen

gewonnen; diese letztern sortirt man am besten sogleich, indem man die Schwächlinge bei Seite wirft, eventuell auch die benutzbaren Pflanzen nochmals in stärkere und schwächere scheidet (vergl. § 75). Die brauchbaren Pflanzen bringt man in kleinen Partien sofort mit den Wurzeln in feuchtes Moos oder feuchte Erde und vermeidet namentlich bei trockner Witterung jedes auch nur kurze Bloßliegen der Wurzeln.¹⁾ Werden die Pflanzen nicht auf denselben Orte, wo sie erzogen wurden, eingeschult, so ist natürlich die sorgfältige Verpackung der Wurzeln in feuchtes Moos zur Verhinderung jedes Austrocknens während des Transportes doppelt nothwendig. Ueber das zu gleichem Zweck stattfindende Anschlämmen vergl. § 80. — Besondere Vorsicht erfordern selbstverständlich die gegen jede Beschädigung durch Druck, jedes Austrocknen besonders empfindlichen Keimlinge, wo solche verschult werden sollen.

Zum Ausheben kleiner Wildlinge — Keimlinge, wie ein- und zweijähriger Pflanzen, — wie solches nach geringen Samenjahren, bei



Figur 29.

je größer die Pflanzen, um so mehr Vorsicht wird beim Ausheben derselben zur Schonung der schon tiefer gehenden, weiter verzweigten Wurzeln nöthig sein, wobei allerdings zu bemerken ist, daß nicht alle Holzarten gleiche Empfindlichkeit gegen Beschädigung der Wurzeln oder gegen einiges Austrocknen zeigen — die Nadelhölzer stehen in beiden Richtungen oben an! Bei ihnen hat man es nun allerdings auch meist mit kleineren Pflanzen zu thun, die leichter zu behandeln sind, bei den Laubhölzern dagegen oft mit schon ziemlich starken Pflanzen da, wo es

¹⁾ Ueber die Folgen des kürzern oder längern Bloßliegens der Wurzeln, der Art der Feuchterhaltung u. s. w. vergl. die Versuche von Möller u. Neuß. (Secken-dorff, forstl. Versuchsw. Bd. II, S. 197).

²⁾ Vergl. § 110, die Weißtanne.

sich um Heisterzucht handelt. Solche stärkere, schon einmal verschulte Pflanzen werden mit besonderer Vorsicht, Pflanze um Pflanze, herausgestochen und wird sodann zum Zweck etwaiger Wurzelkorrekturen meist die anhängende Erde abgeschüttelt; sind aber solche Korrekturen nicht nöthig und bleiben die Pflanzen im selben Forstgarten, so lässt man auch hier möglichst viele Muttererde an den Wurzeln hängen, um hiedurch jedes Austrocknen zu verhüten, das Wiederanwurzeln zu befördern.¹⁾

§ 80.

Behandlung der Pflanzen nach dem Ausheben: Beschneiden, Anschlämmen.

Das Beschneiden der Wurzeln zu verschulender Pflanzen kann verschiedene Zwecke haben: entweder lediglich Entfernung beschädigter, gequetschter oder abgeschnundener Wurzeltheile, Herstellung einer glatten Schnittfläche an Stelle einer durch Zerreißung entstandenen Wunde, Kürzung zu langer die Verschulung erschwerender Wurzelstränge — oder Veränderung der Wurzelbildung überhaupt in einer die spätere Auspflanzung erleichternden Weise durch Kürzung der Pfahlwurzel und zu langer Seitenwurzeln und dadurch bewirkter reichlicher Entwicklung von Saug- und Faserwurzeln. Insbesondere dieser letztere Grund ist es, der das Kürzen der Wurzeln beim Verschulen rechtfertigt, ja nothwendig macht, während man beim Verpflanzen die Wurzeln stets möglichst unverkürzt zu erhalten suchen wird.²⁾

Ein Beschneiden der Wurzeln bei der erstmaligen Verschulung wird sich nur bei Pflanzen mit besonders starker Pfahlwurzelbildung als nöthig erweisen, so vor Allem bei der Eiche,³⁾ auch wohl bei der Tanne,⁴⁾ während die meisten übrigen Holzarten, auf gutem, in der oberen Schichte hinreichend gedüngtem Boden erzogen und in geringem Alter verschult, ein Beschneiden der Wurzeln nur ausnahmsweise und nur dann bedürfen, wenn ohne Kürzung der Wurzeln ein Umbiegen derselben beim Einschulen zu fürchten ist. So empfiehlt Schmitt⁵⁾ in diesem Fall selbst das Kürzen der Wurzeln zu verschulender Fichten, wenn dieselben eine Länge von etwa 10 cm überschreiten sollten. Das Beschneiden, welches am besten mit einer guten (Dittmar'schen) Baumscheere erfolgt, beschränkt sich sonst

¹⁾ Geyer verschult seine Heister mit Ballen (s. die Erziehung der Eiche zum Hochstamm).

²⁾ Bergl. hierüber forstl. Blätter 1878. S. 308. (Borggreve.)

³⁾ Bergl. hierüber § 100, die Eiche.

⁴⁾ Burkhard, A. d. Walde. IV. S. 67.

⁵⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 70.

auf ein mäßiges Einstußen der Pfahlwurzel, wobei man im erst erwähnten Falle (bei der Eiche) wohl im Auge zu behalten hat, daß einerseits der Pflanze die zum Anwachsen nöthigen Saugwurzeln verbleiben, und daß andererseits der an der Abschnittsfläche selbst sich bildende Kranz kräftiger Saugwurzeln bei der seinerzeitigen Verpflanzung gut benutzt werden kann, also nicht zu tief sitzt.¹⁾

Größere Bedeutung hat für alle Laubhölzer das Beschneiden der Wurzeln bei der zweiten, zur Erziehung von Heistern stattfindenden Verschulung; hier hat sich die Wurzelkorrektur auf Beseitigung aller zu tief gehenden, zu weit ausstreichenden und dadurch der künftigen Verpflanzung hinderlichen Wurzeln zu erstrecken — es soll ein an Saug- und Faserwurzeln reiches, möglichst konzentriertes Wurzelsystem ausgebildet werden, welches die seinerzeitige Verpflanzung des Heisters ins Freie mit thunlichst geringem Wurzelverlust gestattet.

Ein Beschneiden der Reste, des Gipfels wird bei erstmaligen Verschulungen fast stets entbehrlich sein und sich nur etwa auf Entfernung einer Gabelbildung des Stämmchens, eines schlaffen oder erfrornten Johannistriebes beschränken, bei Nadelhölzern überhaupt nur ausnahmsweise vorkommen. Auch bei der zweitmaligen Verschulung zum Zweck der Heisterzucht sucht man jedes stärkere Beschneiden der Reste gleichzeitig mit der Verschulung zu vermeiden — die desfallsige Pflege der Stammbildung soll in den Pflanzbeeten entweder der Verschulung vorausgehen oder in der Heisterschule nach erfolgtem Anwachsen des Stämmchens geschehen und erfolgt hier auch leichter als an den ausgehobenen Pflanzen. Ein späterer Abschnitt, die Pflege der verschulten Pflanzen, wird uns auf das Beschneiden der Reste zurückführen (siehe § 90).

Soll man die ausgehobenen Pflanzen anschlämmen oder nicht? Auch diese Frage findet eine verschiedene Beantwortung.

Wenn die Pflänzchen aus frischem oder feuchtem Boden ausgehoben, sorgfältig gegen das Austrocknen durch Bedecken der Wurzeln mit feuchtem Moos, feuchter Erde bewahrt und, wie dies in den meisten Fällen zu geschehen pflegt, sofort eingeschult werden, so ist jedes Anschlämmen der Wurzeln entbehrlich; die Pflanzenwurzeln bleiben in naturgemäßer Lage, kleben nicht in unnatürlicher Weise an einander, wie dies leicht Folge des Anschlammens, namentlich in etwas dickerem Lehmbrei, ist. Unter minder günstigen Umständen aber, namentlich bei Sonnenschein, austrocknendem Ostwinde, empfiehlt es sich allerdings, die Pflanzenwurzeln noch in besonderer Weise gegen das verderbliche Austrocknen der empfindlichen

¹⁾ Fischbach, Lehrb. d. Forstw. S. 119.

Saugwurzeln zu schützen, und dies geschieht vielfach durch das sogenannte Einschlämmen.

Dieses Einschlämmen erfolgt nun in der Weise, daß man in einem Gefäß oder einem Wasserloch einen dünnflüssigen Lehmbrei anröhrt, in welchem dann die in kleinere Partien so zusammengelegten Pflanzen, daß deren Wurzelstöcke alle in gleicher Ebene sich befinden, eingetaucht und hin und her bewegt werden, bis möglichst alle Wurzeln angefeuchtet, mit einer dünnen Lehmbreischicht überzogen sind; häufig werden dann die Wurzeln noch mit etwas trockener guter Erde oder Rasensäfte beworfen.¹⁾ Buttlar verwandte sogar zu diesem Einschlämmen einen dicken Lehmbrei, damit die etwas beschwertem Wurzeln einer Pflanze sich an einander legen, alle senkrecht herabhängen, wodurch deren Einsetzen in eingestochene verhältnismäßig enge Pflanzlöcher erleichtert wird.

Gegen das Einschlämmen der Pflanzenwurzeln namentlich mit dickerem Lehmbrei sprechen sich aber verschiedene Stimmen, so auch Burkhardt²⁾ aus, und gutes Zudecken der Pflanzen, eventuell auch tüchtiges Einnehen derselben durch Überbrausen mit der Gießkanne wird hinreichenden Schutz gegen das Austrocknen gewähren. Zur Arbeit des Einschulens selbst aber kann man die Pflanzen, insbesondere die kleinen Nadelholzpfänzchen, in kleine Gefäße — Kübel, Häfen — voll Wasser stellen, aus denen die diese Gefäße mit sich führenden Arbeiterinnen Pflänzchen um Pflänzchen herausziehen, und wird man hiedurch sein Ziel in sicherster und bester Weise erreichen.

§ 81.

Entfernung der Pflanzen und Pflanzreihen beim Einschulen.

In ähnlicher Weise und aus ähnlichen Gründen, aus welchen wir bei dem Kulturbetrieb fast stets die Pflanzung in Reihen, mit engerem Pflanzenabstand in den Reihen und größerer Entfernung dieser letzteren von einander ausführen, wählen wir auch bei der Verschulung fast ausnahmslos diese Stellung der Pflanzen; dieselbe gibt uns insbesondere die Möglichkeit, durch engern Stand in der Reihe eine größere Anzahl von Pflanzen auf derselben Fläche zu erziehen, während die breiteren Zwischenräume das Lockern des Bodens, eventuell das Betreten der Länder ohne Beschädigung der Pflanzen gestatten. — Nur bei der Erziehung von Heistern, bei welcher wir eine möglichst allseitig gleichmäßige Entwicklung des Pflanzlings anstreben, und bei der (immerhin selteneren) Erziehung

¹⁾ Allg. F = u. J.-B. 1866. S. 213.

²⁾ Säen u. Pflz. S. 295.

von Ballenpflanzen im Pflanzbeet geben wir dem Quadrat-Verband den Vorzug. — Wir werden sonach in den meisten Fällen zu bestimmen haben die Entfernung der Pflanzreihen von einander und die Entfernung der Pflanzen in den Reihen.

Beide Größen sind nun abhängig von mancherlei Faktoren. In erster Linie wird die Größe und Stärke, welche die zu verschulenden Pflanzen im Pflanzbeet erreichen sollen, für diese Entfernungen maßgebend sein, und je kleiner die Pflanzen zur Verwendung im Kulturbetrieb gelangen können, um so geringer werden wir bis zu gewisser Grenze deren Abstand im Pflanzbeet nehmen dürfen. Erklärlicher Weise spielt neben den lokalen Verhältnissen der Kulturorte hiebei die Holzart eine sehr wesentliche Rolle und im Allgemeinen wird man sagen können, daß die verschulten Laubhölzer als höhere, stärkere Pflanzen zur Verwendung kommen, als die Nadelhölzer, daher in größerem Abstand zu verschulen sind. Von den Nadelhölzern wird wieder die sich anfänglich stark in die Aeste breitende Tanne größere Abstände erfordern als die Fichte, wenn den Pflanzen ein genügender Entwicklungsräum gewährt werden soll; ebenso wird man der Lärche, wenn man sie überhaupt verschult, größeren Wachtraum gestatten müssen, da es sich dann bei ihr um Erziehung starker Pflanzen (zu Nachbesserungen, in Mittelwaldschläge) handelt.

Als allgemeine Grundsätze für die richtige Entfernung der Pflanzen und Pflanzreihen werden nun aufzustellen sein: das Vermeiden zu enger Verschulung, durch welche eine entsprechende Entwicklung der Pflanzen, insbesondere der wünschenswerthen Seitenbeastung gehindert, der Zweck der Verschulung also theilweise vereitelt würde, welche ferner der entsprechenden Lockerung des Bodens zwischen den Pflanzen hindernd in den Weg trate. Ebenso aber das Vermeiden einer zu weiten Verschulung; eine solche ist als eine Verschwendung zu betrachten, welche Angeichts der bedeutenden Kosten für Anlage und Unterhaltung der Forstgärten nicht zu rechtfertigen ist. Wenn man einen Reihen- oder Pflanzenabstand von 20 cm dort wählt, wo ein solcher von 15 cm zum gleichen Resultat geführt hätte, so erzieht man auf derselben Fläche um den vierten Theil Pflanzen weniger und nahezu in gleichem Verhältniß erhöhen sich daher die Kosten für Beschaffung des nöthigen Pflanzenquantums; — die Ausgaben für Bodenbearbeitung, Düngung, Einfriedigung, Pflege sind ja in beiden Fällen ganz gleich und nur jene für Verschulung in letzterem Falle etwas höher. In noch viel höherem Grade mehren sich natürlich die Kosten, wenn man in beiden Richtungen, bei der Entfernung der Pflanzen und Pflanzreihen, des Guten zu viel thut.

Als Minimum des Abstandes der Pflanzreihen von einander wird man, wenn die Verschulung auf Beete stattfindet, etwa 15 cm zu betrachten haben, eine Entfernung, welche noch gut hinreicht, um das Lockern des Bodens zwischen den Reihen mit dem Häckchen ohne Beschädigung der Pflanzen auszuführen; bei der Verschulung auf größere Länden muß dieser Reihenabstand wenigstens 20—25 cm betragen, um das Betreten der Beete den die Lockerung und Reinigung derselben besorgenden Arbeitern noch zu ermöglichen. Die geringste Entfernung von 15 cm wendet man meist nur bei der (allerdings in größter Menge zur Verschulung kommenden) Fichte, die in der Regel nur zwei Jahre im Pflanzbeet stehen soll, an; schon für Tannen, Weymouthskiefern, wählt man meist 20 cm, für die rascher sich entwickelnden Laubhölzer 25 und 30 cm Reihenabstand, und bei wiederholt verschulten Laubholzpflanzen, im Heisterkamp, steigt dieser Abstand bis auf 70, ja selbst 90 cm.

Als Minimum des Abstandes der Pflanzen in den Reihen betrachtet man meist 10 cm, Schmitt¹⁾ geht für Fichten bis auf 8 cm herunter und wir können nach eigenen Versuchen noch eine sehr befriedigende Entwicklung der Pflanzen bei diesem geringern Abstand konstatiren. Im Uebrigen sind dieselben Gründe, welche für größeren Pflanzabstand sprechen: rasche Entwicklung, längeres Verbleiben in der Pflanzschule — auch maßgebend für die Wahl des Pflanzabstandes in den Reihen, während natürlich die Wahl von Beeten oder Ländern hier ohne Einfluß ist. Vergleichende Versuche, die ja leicht anzustellen sind, und praktische Erwägungen werden den Wirthschafter das richtige Minimum, und um dieses handelt es sich ja vor Allem, finden lassen; bei Besprechung der einzelnen Holzarten werden wir der für dieselben üblichen Verschulungswerte speziell Erwähnung thun.

§ 82.

Die Ausführung der Verschulung selbst.


In der richtigen Erkenntniß, daß es Aufgabe des Forstwirthes sei, auf die Minderung der Kulturkosten in jedmöglicher Weise hinzuwirken, hat sich die Praxis seit Jahren bemüht, die immerhin kostspieligere Methode der Erziehung verschulter Pflanzen durch ein möglichst einfaches, rasch förderndes Verfahren, durch Anwendung mannigfacher Hülfsmittel so billig als möglich zu gestalten. Verschiedene Methoden der Verschulung, die wir nachstehend besprechen wollen, verdanken wir diesem Bestreben; gutes Neinandergreifen der Arbeit, geübte Arbeiter, Verwendung billiger Arbeitskräfte, endlich gute, ständige Auf-

¹⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 78.

sicht spielen sowohl bezüglich des Resultates, wie der Kosten all dieser Methoden erklärlicher Weise eine sehr bedeutende Rolle.

Fassen wir zunächst die Verschulung kleiner Pflanzen ins Auge, so geschah dieselbe zuerst, und geschieht wohl vielfach noch¹⁾, in einfachster Weise dadurch, daß nach der Schnur ein hinreichend tiefes Gräbchen in der Längsrichtung des Pflanzbeets gezogen, in dasselbe die Pflanzen in der gewählten Entfernung nach dem Augenmaß oder nach an der Schnur angebrachten Zeichen eingelegt und nun durch Beziehen der Erde mit der Hand eingepflanzt wurden.

Zur Herstellung des Gräbchens wurde die Haue (Breithaue), der Spaten oder auch ein sog. Rillenzeicher benutzt; letzterer, unseres Wissens zuerst von Biermanns empfohlen, ist ein löffelartiges Instrument von Eisen, etwa 12 cm lang und in der Mitte 6—8 cm breit, an einem hinreichend langen hölzernen Stiel befestigt.²⁾ An Stelle der genannten Werkzeuge trat mehrfach als zur raschen und gleichmäßigen Herstellung des Gräbchens geeigneter ein kleiner Handpflug von ver-



Figur 30.

schiedener Konstruktion. Der von einem Kulturaufseher Schmidt gefertigte³⁾ unterscheidet sich von jenem, welchen Oberförster Schmitt empfiehlt⁴⁾ (Fig. 30), im Wesentlichen dadurch, daß er auf der einen Seite ganz eben, mit dieser Seite eine senkrechte Erdwand herstellt und die Erde nur nach der andern

Seite auswirft, während letzterer (40 cm lang, 10 cm hoch mit 15 cm Spannweite zum Rillenauswurf) nach beiden Seiten auswirft.

Um aber mit dem Pflug eine gerade Furche über das Pflanzbeet zu ziehen, ist ein Anlegen desselben an ein durch seine Kante die Stelle der zu ziehenden Furche bezeichnendes Brett nöthig, und ein solches wird denn auch von beiden Erfindern benutzt; die Länge desselben ist gleich der Beetlänge oder Beetbreite, je nachdem man die Pflanzenreihen in

¹⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 360.


²⁾ Forstl. Mittl. I. S. 19. Siehe Figur 16 dieses Werckens.

³⁾ Allgem. F.-u. F.-Z. 1866. S. 321.

⁴⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 56.

der einen oder andern Richtung laufen lassen will. — Das ziehen der Furche erfolgt, wie aus Figur 30 hervorgeht, durch zwei Arbeiter, deren einer den Pflug an dem Stiel leitet, bez. dessen Abweichen von der Brettkante verhindert, denselben zugleich in den Boden drückt, während der andere mittels des angebrachten Strickes denselben vorwärts zieht.

Das hiebei benutzte Brett wird aber auch noch weiter benutzt, als sogenanntes Pflanzbrett (Fig. 31). Während nämlich dessen eine, glatte Kante gleichsam als Lineal für den Pflug dient, hat die andere in jenen Entfernung, in welchen die



Figur 31.

Pflänzchen in den Reihen verschult werden sollen, also von 10, 15, 20 cm, kleine, etwa 1—2 cm breite und tiefe Einschnitte; bei wechselnden Entfernung sind also mehrere solcher Bretter nötig. Die Breite des etwa 2 cm starken Brettes entspricht der Entfernung der Pflanzreihen, erspart also jedes weitere Abmessen.

Ist nach der glatten Kante die Furche gezogen (oder mit dem Spaten gefertigt), so wird das Brett umgedreht, die Kante mit den Einschnitten an letztere angelegt, in jeden Einschnitt ein Pflänzchen so eingehängt, daß dasselbe hinreichend tief — um des erfolgenden Sehens des Bodens willen etwas tiefer als bisher — in den Boden kommt, und nun die ausgeworfene Erde beigezogen und angedrückt. Die richtige Größe der Einschnitte, je nach Holzart und Stärke der Pflänzchen ist hiebei von Bedeutung; sind die Einschnitte zu groß, so rutschen die Pflänzchen leicht zu tief hinunter, sind sie zu eng, so zieht man bei dem Wegnehmen des Pflanzbrettes, das durch vorsichtiges Seitwärtschieben des Brettes erfolgt, leicht einzelne Pflänzchen wieder etwas heraus. — Das Wegnehmen des Brettes erfolgt erst, wenn man längs der glatten Kante sofort wieder die neue Furche gezogen hat, so daß die Arbeit also rasch in einander greift.

In ganz ähnlicher Weise erfolgt das Verschulen mit dem von Danckelmann¹⁾ geschilderten sogenannten Harzer Pflanzbrett, neben welchem man aber ein zweites Brett mit glatter Kante, das Trittbrett, benutzt. Längs dieser Kante wird zuerst ein Gräbchen von entsprechender Tiefe gezogen oder gestochken, dann das Pflanzbrett, dessen Kante die entsprechenden Einschnitte enthält, angelegt und die Verschulung wie oben geschildert vorgenommen. Nach erfolgtem Einpflanzen aber wird das


¹⁾ Zeitschr. f. d. F.- u. F.-W. V. S. 72.

Trittbrett hart an das Pflanzbrett gelegt und durch mehrmaliges kräftiges Auftreten die Erde in dem Pflanzgraben fest angedrückt.

In anderer, ebenfalls rasch fördernder Weise verschult man namentlich auf nur mäßig bindendem Boden, in eingestochene oder eingedrückte Pflanzlöcher. Jeder Arbeiter ist in ersterem Fall mit einem einfachen Sezholz von entsprechender Stärke versehen und sticht mit demselben an jener Stelle, welche durch die mit eingebundenen Zeichen versehene Pflanzschnur vorgezeichnet ist, ein nicht zu enges und hinreichend tiefes Pflanzloch, senkt ein Pflänzchen in dasselbe und drückt es durch seitliches Einstechen des Sezholzes fest. Die Pflanzenreihen laufen hiebei stets nach der Länge der Beete; an jeder Schnur arbeiten, je nach deren Länge, mehrere Personen in gleichen Abständen und die beiden Flügelmänner stecken, so oft eine Reihe fertig ist, mit Hülfe eines Maßes die Schnur weiter. Will man die Pflanzenreihen nach der Breite der Beete laufen lassen, so benutzt man zur Markirung der Pflanzstellen ein Brett von entsprechender Länge (1—1,2 m) und einer Breite gleich der Entfernung der Pflanzenreihen, an dessen Rand die Pflanzenabstände durch kleine Kerben markirt sind; an einem solchen Brett arbeiten je zwei in den schmalen Zwischenwegen sich gegenüber stehende Personen.

Rascher noch geht die Arbeit vor sich bei Anwendung eines Zapfenbrettes (Fig. 32), das namentlich für kleine Nadelholzpflanzen, ein- und zweijährige Fichten, empfehlenswerth ist. Die Länge dieses ent-

sprechend starken Brettes ist gleich der Beetbreite, seine Breite gleich der Entfernung der Pflanzenreihen, die




Figur 32.

Entfernung der genau längs der Brettmitte stehenden Zapfen gleich dem Pflanzenabstand in den Reihen. Stärke und Länge der stumpf konischen Zapfen ist durch die Größe der Pflanzen und resp. deren Wurzelbildung bedingt; für ein- und zweijährige Fichten wird eine Länge von 10—12 cm, ein oberer Durchmesser derselben von 3 cm genügen. Zwei Arbeiter, in den schmalen Beetwegen sich gegenüber stehend, legen das Brett längs der schmalen Kante am einen Ende des Beetes an und drücken bei leichterem Boden mit der Hand, bei schwererem durch Auftreten auf das Brett die Zapfen in den Boden, dadurch eben so viele Pflanzlöcher auf einmal anfertigend. Die auf dem frisch gelockerten und geebneten Beet sich scharf abdrückende Kante des Bretts gibt an, wo dasselbe aufs Neue anzulegen ist, eventuell arbeitet man auch mit zwei Zapfenbrettern, die stets abwechselnd neben einander angelegt werden, und erspart also jegliches

Abmessen. Die Pflanzerinnen, welche namentlich bei trockner Witterung den ersten Arbeiten sofort folgen, besorgen das Einpflanzen bei kleinen Pflänzchen lediglich mit den Fingern, bei etwas langwurzeligeren, auch auf bindenderem Boden mit dem Sezholz.

Zur Herstellung der Furchen kann auch ein starkes keilförmiges Brett benutzt werden, welches etwa 12 cm breit und 1—1,2 m (je nach der Beethöhe) lang, unten aber messerförmig zugespitzt ist¹⁾ (Figur 33); dasselbe wird in den Boden eingedrückt und mit Hülse zweier rechtwinklig eingesetzter Stöcke so hin und her bewegt, daß ein entsprechend breiter und tiefer Spalt entsteht, in welchen nun die Pflänzchen am besten unter Ausfüllen des Spaltes mit guter Erde eingepflanzt werden.



Figur 33.

Die Verschulung in Gräbchen hat gegenüber der Anwendung des Verschulens in eingestochene oder eingedrückte Löcher den Vorzug, daß die Wurzeln in möglichst naturgemäße Lage kommen, während bei letzterer Methode namentlich bei etwas engen Löchern oder langwurzeligen Pflanzen Verkrümmungen, Umstülplungen u. dgl. nur schwer ganz zu vermeiden sind. Am besten beugt man letzteren etwa noch dadurch vor, daß man die Arbeiter anweist, die Pflanzen zuerst etwas tiefer, als sie eingepflanzt werden sollen, in das Pflanzenloch zu senken und sodann wieder so weit nötig zu heben.

Als einige praktische Regeln für Ausführung der Verschulung mögen noch folgende hier eine Stelle finden:

Zu allen leichteren Arbeiten, insbesondere zum Einschulen selbst, wähle man weibliche Arbeitskräfte, Frauen und Mädchen, durch welche die Arbeit nicht nur billiger, sondern meist auch besser ausgeführt wird, indem denselben das Bücken oder Niederkauern minder schwer fällt als Männern. Steute Aufsicht durch Forstbedienstete oder tüchtige Vorarbeiter muß die Regel bilden und Aufgabe des betreffenden Aufsehers ist es vor Allem, für das gute Feinandergreifen der verschiedenen Arbeiten: Ausheben und Sortiren der Pflanzen, Fertigen der Furchen und Löcher und Einsetzen der Pflanzen — zu sorgen.

Das Zusammentreten des vorher sorglich gelockerten Bodens ist

¹⁾ Allgem. F.- u. J.-B. 1860. S. 413.

Fürst, Pflanzenzucht im Walde.

möglichst zu vermeiden, insbesondere bei an sich bindenderem Boden. Es ist eine entschiedene Schattenseite der größeren Ländere, daß bei denselben dies Betreten absolut nicht zu vermeiden ist, und nur etwa durch Benutzung von Brettern, welche längs der Pflanzreihen über das Beet gelegt werden, möglichst unschädlich gemacht werden kann. Ein wiederholtes Lockern läßt sich hier häufig nicht umgehen und hat den Nachtheil, daß man nun in ganz frisch gelockerten, sich mehr oder weniger stark sehenden Boden verschulen muß. Bei 1,2 m breiten Beeten — schmälere sind Raumverschwendungen in Folge der zahlreichern Zwischenwege, breitere unpraktisch — kann dagegen jedes Betreten vermieden werden, die Arbeit von den Zwischenwegen aus geschehen. Verschult man in der Längsrichtung des Beetes nach der Schnur, so beginnt man mit der Mittelreihe und setzt die Arbeit nach beiden Seiten hin fort; es ist dann nur etwa nöthig, vor Einschulen der letzten Pflanzreihe den vielleicht etwas zusammengedrückten Beetrand, von welchem letztere übrigens mindestens 5 cm, besser etwas mehr, entfernt bleiben soll, wieder etwas in Ordnung zu bringen.

Eben so leicht ist jedes Zusammen-Drücken oder Treten der Beete bei Anwendung des Zapfenbrettes oder Pflanzkeils zu vermeiden, wobei die Pflanzreihen quer über das Beet laufen; diese Richtung der Pflanzreihen, senkrecht zu den Zwischenwegen gewährt den weitern Vortheil, daß das Lockern des Bodens zwischen den Reihen mittelst des Häckchens, auch das Anhäufeln mittelst des kleinen Handpfluges, von jenen Wegen aus leichter erfolgt als bei Reihen, welche nach der Länge des Beetes verlaufen.

Legt man Werth auf besondere Accuratesse auch in der äußern Erscheinung des Forstgartens, so beginne man bei Anwendung letzterer Verschulungsmethoden in der Mitte des Beetes (von einer schmalen Kante zur andern gerechnet), die man sich eventuell gleich über eine ganze Reihe neben einander liegender Beete hin mit Hülfe der Schnur bezeichnet hat, und verschult von hier aus nach beiden Seiten hin. Die Abweichungen von der zur Kante des Beetes senkrechten Richtung, durch nicht ganz accurates Aneinanderstoßen oder Ansetzen der Zapfenbretter, oder kleine Fehler beim Messen der Abstände (beim Pflanzkeil) werden sich dann nie so summiren, nie so groß werden, als wenn mit der Arbeit an einem Ende des Beetes begonnen wird. — Das Gleiche gilt auch für Anwendung der Saatbretter zum Eindrücken von Rillen, und zwar in beiden Fällen in um so höherem Grade, je länger die Beete sind.

§ 83.

Wiederholte Verschulung — Heisterzucht.

Zu manchen Zwecken, so zur Be pflanzung von Hütungen, zur Rekrutirung des Oberholzes im Mittelwald, zur Anlage von Alleen und Be pflanzung der Schneußenränder in mehr parkartig behandelten Wäl dungen, namentlich aber auch zu manchen Kulturen im eigentlichen Wild park bedarf die Forstwirthschaft auch besonders großer und starker, 2 bis selbst 4 m hoher Pflanzen, sog. Heister. Sie verschafft sich dieselben durch nochmalige Verschulung der im Pflanzbeet erzogenen etwa meterhohen Pflanzlinge, unter Umständen sogar und wenn es sich um Erziehung besonders starker Heister handelt, durch zweimalige Verschulung derselben, und verwendet nur ganz ausnahmsweise solch starke Pflanzen aus natürlichen Anflügen, da deren Gedeihen stets ein zweifelhaftes zu sein pflegt. Sie wendet aber die Pflanzung von Heistern nur da an, wo sie eben durch die Verhältnisse absolut geboten erscheint, denn daß Heister in Folge der wiederholten Verschulung, der langjährigen Pflege, der großen Pflanzgartenfläche, welche die Heisterzucht beansprucht, ein sehr kostspieliges Pflanzmaterial sind, ist sehr erklärlich.

Ein guter Pflanzheister soll ein entsprechend konzentriertes, an Faserwurzeln reiches Wurzelsystem, ein stufig gewachsenes Stämmchen, das sich allein zu tragen im Stande ist, und eine möglichst gleichmäßige, nicht zu starke Krone haben. Je nach Höhe und Stärke unterscheidet man wohl den Halbheister, bis 2 m hoch, und den eigentlichen Heister (Vollheister) mit 3 und selbst 4 m Höhe.¹⁾

Die Holzarten, welche bei der Heisterzucht überhaupt in Frage kommen, sind: als Hauptholzarten die Eiche, dann Ahorn, Esche, Ulme, Linde und Pappel, letztere beide fast nur für Alleen und Anlagen und daher selten im eigentlichen Forstgarten zu finden; endlich die Rothbuche, im Hannöver'schen vielfach als Heister erzogen und benutzt in Folge besonderer Verhältnisse (namentlich bei Aufforstung sog. Hudewälder), sonst aber als Heister wohl eine seltene Erscheinung in unsern Pflanzschulen. Von den Nadelhölzern ist es ausschließlich die Lärche, welche ausnahmsweise als Heister erzogen und verwendet wird. Die Besprechung der einzelnen Holzarten wird uns auf deren Erziehung als Heister vielfach zurückführen; hier seien die allgemeinen Grundsätze und Regeln der Heisterzucht einer näheren Besprechung unterzogen.

¹⁾ Vergl. über Heisterzucht insbes. Burkhardt's treffliche Abhandlung in „Aus dem Walde V. S. 110“, der wir nachstehend bei Mangel eigener ausreichender Erfahrung vorwiegend folgen.

Die je nach ihrer Entwicklung ein- oder zwei-jährig verschulsten und hiebei im Falle starker Pfahl- oder Seitenwurzelbildung durch zweckmäßiges Kürzen derselben vorbereiteten Pflanzen werden, sollen sie zu Heistern erzogen werden, nach 2- bis 3-jährigem Stehen im Pflanzbeet — in welchem sie namentlich auch durch entsprechendes Beschneiden der Astte die nöthige Pflege genossen, als etwa meterhohe, kräftige Lohden abermals verschult. Der Zweck dieser nochmaligen Verschulung ist: Gewährung eines größern Wurzel- und Kronenraumes behufs kräftiger und stüfiger Entwicklung, zugleich aber Vornahme jener Wurzelkorrektur, durch welche die Bildung einer die seinerzeitige Auspflanzung möglichst sichernden und erleichternden Bewurzelung erreicht wird.

Man könnte etwa versucht sein, den ersten Zweck, die Gewährung eines größern Standraumes, billiger dadurch zu erreichen, daß man von den in etwa 30 cm Entfernung stehenden Pflanzenreihen der erstmaligen Verschulung je eine um die andere herausnimmt, hiwdurch die Entfernung der Pflanzreihen auf 60 cm bringt, und eben so in den Reihen je die zweite Pflanze heraushebt, und bisweilen, insbesondere bei Holzarten ohne Pfahlwurzelbildung (Ahorn, Esche) wird dies Verfahren wohl auch angewendet. Allein einerseits sind hiebei, zumal wenn die Pflanzen etwas eng verschult waren, Wurzelverletzungen schwer zu vermeiden, anderseits aber begibt man sich der Möglichkeit, die oben erwähnte Wurzelkorrektur vornehmen zu können, vor Allem aber der Möglichkeit, für die Heisterzucht nur die besten und gutwüchsigen Pflanzen aussuchen zu können, während alle minderwerthigen sofortige anderweitige Verwendung finden. — Der gleichen Vortheile würde man sich begeben, wenn man etwa gleich die erstmalige Verschulung in weitern Abständen vornehmen wollte; der zu weite Stand der schwachen Pflanzen würde auch minder günstigen Wuchs — zu starke Astentwicklung auf Kosten des Höhenwuchses — vielfach zur Folge haben.

Die Vorbereitung des Bodens zur Verschulung geschieht in gleicher Weise wie für Pflanzschulen, doch wird man einer genügend tiefen Lockerung besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden haben, und ebenso einer zweckmäßigen, ausreichenden und nachhaltigen Düngung. Heister auf schlecht gedüngtem Boden werden weit ausstreichende und für die spätere Verpflanzung mißliche Seitenwurzeln entwickeln, während guter Boden eine konzentriertere Wurzelbildung zur Folge hat.

Zur Erziehung von Heistern theilt man die hiezu bestimmte Fläche nicht in Beete, sondern in größere Quartiere; die für Beeteinteilung geltend gemachten Gründe fallen hier mehr oder weniger weg, ein Betreten zwischen den weit von einander abstehenden Pflanzreihen ist leicht

möglich, und die größere Entfernung, in welcher die Pflanzen zu setzen sind, macht die Anwendung von schmalen Beeten nicht wohl thunlich.

Das Ausheben der einzuschulenden Pflanzen erfolgt mit Rücksicht auf deren bedeutendere Größe in vorsichtiger Weise, am besten durch Eindrücken in einen neben der Pflanzenreihe gezogenen genügend tiefen Graben (§ 79), und jede einzelne Pflanze hat nun durch die Hand eines geübten und mit der Sache vollkommen vertrauten Arbeiters zu gehen, der die untauglichen bei Seite legt, die tauglichen durch Kürzung allzulanger Pfahl- oder Seitenwurzeln mit Messer oder Scheere zur Einschulung vorbereitet und hiebei zweckmäßig sogleich unter den für tauglich befundenen Pflanzen eine Sortirung nach der Stärke — etwa in zwei Klassen — aus den schon oben empfohlenen Gründen (siehe § 75) vornimmt. Ein Beschneiden oder Wegnehmen von Nesten soll hiebei nicht stattfinden, sondern theilweise und so weit nöthig bereits im vorhergehenden Jahr in dem Pflanzbeet stattgefunden haben, im Uebrigen erst im folgenden Jahr nach bereits erfolgtem Anwurzeln und Anwachsen des Pflänzlings stattfinden, so daß der letztere nicht im Moment der Verschulung noch mit zahlreichen Wunden bedeckt wird. Auch wird das Beschneiden des stehenden Pflänzlings leichter und richtiger erfolgen als jenes des ausgehobenen.

Durch Decken mit Erde oder feuchtem Moos schützt man die Wurzeln gegen Austrocknen; braucht man bei stärkeren Laubholzpflanzen auch nicht mit jener Menglichkeit zu verfahren, wie dies bei kleinen Nadelholzpflanzen nöthig ist, so wird doch entsprechende Sorgfalt sich auch hier lohnen, rascheres Anwachsen und besseres Gedeihen der Pflanzen zur Folge haben.

Die Entfernung, in welcher die Pflänzlinge wieder einzuschulen sind, wird je nach der Höhe und Stärke, welche sie bereits haben, wie insbesondere nach jener, welche sie in der Heisterschule erreichen sollen, zu bemessen sein, und zwischen 45 und 90 cm als dem Minimum und Maximum schwanken.¹⁾ Halbheister — respektive Pflanzen, welche zu solchen erzogen werden sollen, verschult man in einem Abstand von 45—60 cm, gewöhnliche Heister in einem solchen von 75 cm, und nur für sehr starke Heister, insbesondere bei einer dritten Verschulung, wählt man etwa den Abstand von 90 cm. Eine zu geringe Entfernung hat rüthenartiges, zu wenig stufiges Wachsthum zur Folge, und die Herausnahme eines Theiles der Pflanzen bei zu enger Verschulung in der Absicht, hiedurch den Wachsraum der übrigen zu beför dern, ist, wie oben erwähnt, meist mißlich; ein eben so wenig befriedigendes Resultat pflegt aber allzuweiter Stand kleiner Pflanzen zu geben.

¹⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 77.

Im Interesse allseitig gleichmäßiger Entwicklung der Heister stellt man die Pflanzen in Quadrat- oder Dreiecks-Verband, weicht also hier von der sonst üblichen reihenweisen Verschulung ab.

Um die zur Heisterzucht verwendete Fläche möglichst auszunutzen, kann man dieselbe gleichzeitig zur Erziehung kleiner schutzbedürftiger und schattenertragender Pflanzen benutzen. So empfiehlt Forstmeister Meier,¹⁾ unter die Eichen einjährige Tannen einzuschulen, und zwar zwischen je zwei Eichen eine Tanne und zwischen je zwei Heisterreihen nochmals eine Tannenreihe, um hiervon in 3—4 Jahren mit geringen Kosten sehr schöne Tannenpflänzlinge zu ziehen²⁾; Geyer erzieht in ähnlicher Weise Fichten.³⁾

Zur Vornahme der Einschulung selbst wird entweder nach der Schnur ein hinreichend tiefer Graben ausgehoben, was in dem gut gelockerten Boden rasch geht, und Pflanze um Pflanze in entsprechender Entfernung — bei minder gutem und bindenderem Boden wohl auch unter Anwendung guter Füllerde — eingepflanzt, oder es erfolgt, namentlich bei größerem Abstand, das Einsetzen in ein eigens für jede Pflanze ausgehobenes Pflanzloch, und wird der Zweck hiervon billiger erreicht.

Die Pflege des Heisterkampes geschieht durch Reinhalten von Unkraut, Lockerung des Bodens und kräftiges Behacken in ähnlicher Weise, wie bezüglich der Pflanzbeete überhaupt im nächsten Kapitel angegeben ist. Die Pflege der einzelnen Pflanzen aber erfolgt durch das Beschneiden der Krone und Seitenäste, eine Arbeit, die viel Umsicht und Verständniß erfordert und welcher wir weiter unten einen eigenen Abschnitt (siehe § 90) widmen.

2. Kapitel.

Schutz und Pflege der Pflanzbeete.

§ 84.

Allgemeine Gesichtspunkte.

Gleich den Saatbeetpflanzen bedürfen auch unsere im Saatbeet stehenden verschulten Pflanzen des Schutzes gegen die gar mancher-

¹⁾ Krit. Blätter L. 1. S. 152.

²⁾ Im Frankfurter Stadtwald haben wir dies Verfahren ebenfalls in Anwendung gefunden.

³⁾ Geyer, die Erziehung der Eiche. S. 32.

sei Gefahren, welche den Pflanzen überhaupt drohen und welche wir im vorigen Abschnitt bezüglich der Saatbeetpflanzen bereits besprochen haben; allerdings bedürfen sie diesen Schutz theilweise in minderem Maße als die zarten Keimlinge, die schwachen Saatpflänzchen. So wird Trockenheit die mit ihren Wurzeln doch schon tiefer in den Boden reichenden verschulften Pflanzen weniger gefährden, der Spätfrost dieselben zwar mehr oder weniger beschädigen, nicht leicht aber gleich dem empfindlichen Keimling mancher Holzarten tödten, und während der Engerling die einjährige Pflanze durch Befressen der Wurzel stets zum Absterben bringt, wird die kräftige Schulpflanze, der starke Heister eine mäßige Wurzelverletzung ohne schwereren Nachtheil überstehen. Je größer und stärker die Pflanze wird, um so weniger bedarf sie mehr des Schutzes, so also z. B. in der Heisterschule.

Eine entsprechende Pflege aber durch Entfernung des Unkrautes, Lockerung des Bodens, Düngung bei sichtbarem Nahrungsmangel bedarf unsere verschulften Pflanze von der einjährigen Fichte bis hinauf zum starken Heister, wenn sie sich in jener Weise entwickeln soll, wie es das Ziel des Pflanzenzüchters ist: rasch und kräftig und entsprechend gestaltet. Als ein besonderer und wichtiger Theil der Pflege tritt hier für Laubholz das Beschneiden der Stämmchen, die Kürzung und Entfernung überschüssiger tief angesezter Neste, Wegnahme von Doppelwipfeln u. dgl. zu jenen Arbeiten, welche wir als zur Pflege der Saatbeete gehörig kennen gelernt haben, hinzu, und zwar steigt die Bedeutung derartiger Pflege mit der Größe, welche die Pflanzen im Forstgarten erreichen sollen.

In Vielem werden wir uns in den nachstehenden Abschnitten auf das in dem Kapitel für Schutz und Pflege der Saatbeete Gesagte beziehen können und hier nur das zu erörtern haben, was für die Behandlung der Pflanzbeete eigenthümlich ist.

§ 85.

Schutz der Pflanzbeete gegen Trockenheit.

In viel minderem Maße als die Saatbeete, als die keimenden Samen oder zarten Pflänzchen, sind unsere verschulften Pflanzen durch Trockenheit gefährdet; die schon tiefere Bodenschichten erreichenden Wurzeln finden selbst bei länger ausbleibendem Regen, länger anhaltender Hitze, dort noch die nötige Feuchtigkeit. Doch gehen, je nach Boden- und Holzart, in diesem Falle immerhin eine kleinere und größere Anzahl der Pflanzen zu Grunde, während andere wenigstens eine schlechte Entwicklung zeigen, und ein nach Lage des Pflanzbeetes, natürlicher Frische

des Bodens, Art und Stärke der verschulten Pflanzen bald mehr, bald minder intensiver Schutz gegen Trockenheit, gegen die direkte Einwirkung der Sonne wird auch für die Pflanzbeete vielfach nötig sein.

Am meisten leiden wohl die verschulten Pflanzen durch Verschulung bei trockenem Wetter und Boden, und durch unmittelbar dieser Arbeit folgende anhaltende Wärme; zu dieser Zeit bedürfen sie daher auch am ersten besonderer Hilfe oder eines künstlichen Schutzes, um so mehr, je kleiner und flachwurzelnder sie sind. — Will und kann man bei trockner Witterung und mangelnder Bodenfeuchtigkeit die Verschulung nicht temporär aussetzen, weil etwa die Jahreszeit schon etwas weit vorgeschritten, so hält man einerseits die Pflanzwurzeln durch Einstellen in Wasser oder dünnen Lehmbrei reichlich naß und wendet anderseits, wenn möglich, auch ein tüchtiges Angießen der frisch verschulten Pflanzen an, wobei man bei Anwendung von Furchen und Gräbchen am besten in diese vor vollständiger Ausfüllung derselben mit Erde gießt, hiervon das Gießen wirksamer macht und Krustenbildung vermeidet.¹⁾

Als Schutz der frisch verschulten Pflanzen gegen die Einwirkung der Sonne dienen die in § 58 geschilderten Schutzgitter — Pflanzgitter — welche in gleicher Weise wie über die Saatbeete, und nur etwa entsprechend höher, über die Pflanzbeete gehängt werden. Unentbehrlich werden dieselben sein, wenn Kämme verschult werden, da dieselben gegen direkte Sonneneinwirkung sehr empfindlich sind, ihre Verschulung auch stets in eine etwas spätere Zeit fällt, die Gefährdung durch Hitze also in höherem Grad besteht. Pflanzen dagegen, welche schon ein Jahr im Pflanzbeet stehen, pflegen eines solchen Schutzes nicht mehr zu bedürfen, wenn gleich er sich ihnen bei anhaltender Hitze wohltätig erweist. Die im nächsten Paragraphen besprochene sogenannte Hochdeckung gewährt solchen Schutz sämtlichen Pflanzen eines Forstgartens.

Ein wiederholtes Begießen verschulter Pflanzen findet wohl nirgends statt, da die Kosten hiefür zu bedeutend sein würden; ein Bewässern derselben würde sich allerdings in trocknen Sommern für deren freudiges Gedeihen vortheilhaft erweisen, wird aber unseres Wissens nur selten angewendet (siehe § 59).

Die beste Sicherung aber gegen nachtheiliges Austrocknen des Bodens liegt, wie für Saatbeete, so auch hier in der zweckmäßigen und günstigen Lage des Pflanzbeetes, dem Schutz durch vorliegende Bestände gegen die Sonne, wie gegen austrocknende Ostwinde, dann in der natürlichen Frische des Bodens. Nicht zu seichte Bearbeitung des letzteren

¹⁾ Schmitt, Fichtenpflanzschulen. S. 81.

bei der Anlage und häufige Lockerung desselben zwischen den Pflanzreihen wirken gleichfalls günstig gegen Trockenheit.

§ 86.

Schutz gegen Frostbeschädigungen jeder Art.

Wie in den Saatschulen, so sind es auch in den Pflanzschulen Spätfrost, Frühfrost und Barfrost, ausnahmsweise der Winterfrost, welche je nach der Holzart bald mehr, bald minder schädlich auftreten.

Die beiden erstgenannten Frostarten, namentlich aber der Spätfrost, ziehen durch Tödtten des Gipfeltriebes die Bildung von Doppelwipfeln nach sich, eine Erscheinung, die wir namentlich bei Holzarten mit gegenständigen Knospen, also Ahorn und Esche, wahrnehmen, durch Tödtten der Seitentriebe aber struppigen, unschönen Wuchs; erzeugen bei wiederholtem Auftreten viel Ausschussmaterial, verzögern die Verwendbarkeit der Pflanzen und haben dadurch oft schwere Störungen im Kulturbetrieb zur Folge. Der Frühfrost, seltener und minder verderblich auftretend, tödtet die noch unverholzten Triebe, namentlich die sogenannten Johannistriebe mancher Holzarten.

Gegen den Spätfrost wenden wir ähnliche Mittel an, wie wir sie in § 61 bereits kennen gelernt: statt der späteren Saat spätere Verschulung der frühzeitig ausgehobenen und eine Zeit lang eingeschlagenen Pflanzen (§ 77) als Schutzmittel im ersten Jahr, und außerdem die schon vielfach erwähnten Pflanzgitter zur Zeit der Spätfrostgefahr im Monat Mai. Als einen intensiven Schutz der Pflanzen gegen Frost und Hitze empfiehlt Schmitt¹⁾ eine sogenannte Hochdeckung, welche namentlich den weiten Vortheil biete, daß ein Abdecken und Wiederauflegen der Gitter zum Zweck der Lockerung und Reinigung nicht nöthig sei.

Zum Zweck derselben werden entsprechend starke Pfosten von 2 m Höhe über der Erde in 4—5 m Entfernung im Boden befestigt und darüber ein Stangengerüst so angebracht, daß Astreißig auf dieselben gelegt werden kann, ohne durchzufallen, so daß hierdurch über der ganzen Pflanzschule gleichsam ein Schutzdach gebildet wird. Als Deckmaterial verwendet man das die Nadeln lange haltende Föhrenreißig, das durch leichte Stangen gegen das Abwehen geschützt und im Herbst herunter genommen wird.

Die etwas kostspielige und — wenn auch wohlthätige, aber

¹⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 88.

doch nicht absolut nöthige Einrichtung wird wohl nur ausnahmsweise Platz greifen.¹⁾

In der richtig gewählten Lage des Pflanzgartens und entsprechendem Seitenenschutz wird wie gegen Hitze, so auch gegen Spätfröste ein wenigstens theilweise wirksames Sicherungsmittel zu suchen sein.

Gegen die seltener auftretenden und minder schädlichen Frühfröste pflegen Mittel nicht zur Anwendung zu kommen.

Durch den Barfrost leiden insbesondere die schwachen und seichtbewurzelten verschulten Pflanzen, so ein- und zweijährige Fichten, und zwar oft noch in höherem Grad als die in den Rillen dichter beisammen stehenden Saatpflanzen, während tieferwurzelnde Holzarten — Schwarzkiefern, Eichen — dessen Wirkungen gar nicht ausgesetzt sind. Die für die Saatbeete in § 62 angegebenen Schutzmittel, dann Hülfsmittel nach eingetretener Beschädigung, werden auch in den Pflanzbeeten Platz zu greifen haben, und hat namentlich das sofortige Wiederandrücken der gehobenen Pflanzen oft in ziemlicher Ausdehnung zur Rettung derselben stattzufinden. — Die Wirkung, welche die nicht zu seichten Beetwege auf den Abzug des Wassers aus der obersten Bodenschicht und dadurch auf Verminderung des Auffrierens haben, kann in durch Barfrost gefährdeten Dertlichkeiten ein triftiger Grund für Wahl von Beeten an Stelle der größeren Länden bei der Verschulung sein.

§ 87.

Schutz gegen Regengüsse.

Auch durch Regengüsse werden Pflanzbeete in viel minderem Grad gefährdet sein als Saatbeete, zumal wenn in etwas stärker geneigtem Terrain die Anwendung größerer Felder zum Verschulen vermieden und beitweise Eintheilung unter entsprechender Terrassirung mit möglichst genauer Horizontallegung der Zwischenwege gewählt wird.

Die in § 63 erwähnten sog. Erdhöschen finden sich insbesondere an verschulten Fichten, die kleinen einzeln stehenden Pflänzchen nach heftigem Platzregen fast bis zum Gipfel einhüllend, auf gelockertem lehmigen Boden; dieselben werden in bereits angegebener Weise leicht beseitigt.

§ 88.

Schutz gegen Thiere jeder Art.

Von kleineren Thieren sind es insbesondere Engerlinge, Maulwürfsgrillen, Mäuse, welche unsere Pflanzbeete in ähnlicher Weise

¹⁾ Nach Schmitts Angabe sind solche Hochdeckungen in den Fichtenpflanzschulen der Stadt Billingen im Schwarzwald mit sehr gutem Erfolg zur Anwendung gekommen.

gefährden, wie dies oben bezüglich der Saatbeete näher besprochen wurde (vergl. § 64—66), und werden die Schutzmittel die gleichen sein. — Die Gefährdung durch Maulwurfsgrillen pflegt allerdings mit der zunehmenden Größe der Pflanzen abzunehmen und auch die vorwiegend manchem Samen gefährlichen Mäuse werden in Pflanzschulen weniger lästig — sehr lästig dagegen nicht selten die Engerlinge, denen man in den zwei und drei Jahre lang mit Pflanzen besetzten Pflanzbeeten nicht so gut beikommen kann, wie in den häufig alle Jahre umzugrabenden und hiebei von diesen Feinden zu säubernden Saatbeeten. Gehen stärkere Pflanzen auch durch Engerlingsfraß seltener ganz zu Grunde, indem doch einige Wurzeln verschont bleiben, so kümmern sie doch an den Folgen stärkerer Wurzelbeschädigung jahrelang, verkrüppeln auch wohl derart, daß sie zur Auspflanzung nicht mehr brauchbar sind.

Aus der Vogelwelt wird nur in seltenen Fällen eine Gefährdung unserer Pflanzbeete zu befürchten sein — durch das Auerochse, dessen wir in § 67 gedacht, auf welchen Abschnitt wir uns daher beziehen.

Gegen das Verbeissen durch Wild jeder Art, wo solches nach Wildstand und Holzart zu befürchten steht, muß durch Einfriedigungen oder die sonstigen in § 68 angegebenen Hülfsmittel Sorge getragen werden.

§ 89.

Pflege der Pflanzbeete durch Entfernung des Unkrautes, durch Lockerung und Düngung.

Vom Gras- und Unkrautwuchs sind die Pflanzbeete insbesondere im ersten Jahr nach der Verschulung noch in höherem Grad heimgesucht, während bei nicht zu weitläufiger Verschulung und kräftiger Entwicklung der Pflanzen die letztern durch ihre Beschirmung das Unkraut im zweiten und eventuell dritten Jahr schon mehr oder weniger zurückhalten und dann einer Pflege durch Reinigung der Beete nur in geringem Maß bedürfen. Zwischen verschulten Tannen, die mit ihren horizontal streichenden Nesten den Boden rasch decken, vermag nach zweijährigem Stehen im Pflanzbeet oft kein Grashalm mehr aufzukommen.

Durch Einlegen von Moos, Laub, gespaltenen Brügeln u. dgl. den Unkrautwuchs zurückhalten zu wollen, wie dies bei den Saatbeeten nicht selten geschieht, ist für die Pflanzbeete mit ihren größeren Pflanzenabständen weniger anwendbar und verhältnismäßig kostspielig, zumal dadurch das Lockern des Bodens erschwert, die vorherige Entfernung dieser Deckungsmittel nötig wird. Es gilt dies auch für Heisterbeete, in welchen man wohl den Boden zum Schutz gegen Trockenheit und Unkraut mit Laub dicht gedeckt hat; — Burkhardt macht darauf

aufmerksam, daß man hiedurch auch den Fraß der kleinen Nager, die in der Laubdecke willkommenen Unterschlupf finden, begünstigen kann.¹⁾

Die Reinigung der Pflanzbeete geschieht theils durch Fäten mit der Hand, meist aber in Verbindung mit der auch für verschulzte Pflanzen so vortheilhaften öfteren Lockerung des Bodens, welch letztere je nach der Reihenentfernung mit dem kleinen Fätehäckchen, dem Hoch'schen Dreizack (s. § 69) oder mit dem stärkern Fünfsack oder Fätekarst stattfindet. In Heisterlämpen wird man zu noch stärkeren (aber schmalen) Hauen greifen und verhältnismäßig tief lockern. Bei trockner Witterung wird es oft genügen, das Unkraut beim Behacken und Lockern einfach aus dem Boden auszureißen und liegen zu lassen, dessen Vernichtung durch Dürrwerden der Sonne zu überlassen; schon aus diesem Grunde ist die Lockerung bei trockner Witterung zu empfehlen.

Wie oft das Lockern vorzunehmen sei, wird von den Bodenverhältnissen, der Witterung (anhaltender Regen schlägt den Boden fest!), der Nothwendigkeit, das Unkraut zu entfernen, abhängig sein. Lieber lockere man zu oft, statt zu selten — allerdings ist der Kostenpunkt hiebei auch etwas zu berücksichtigen!

Unter allen Umständen möchten wir ein zweimaliges Behacken der Pflanzbeete alljährlich empfehlen; kräftige Entwicklung der Pflanzen im zweiten oder dritten Jahre, in Folge deren sich die Reihen nahezu schließen, kann demselben allerdings hindernd in den Weg treten.

Beim Lockern und Reinigen der zu Verschulungen kleiner Pflanzen nicht selten, zur Heisterzucht stets angewendeten größeren Länder (Quartiere) lasse man die in § 70 empfohlene Vorsicht bezüglich des Betretens der frisch gelockerten Streifen nicht außer Acht! Auch die übrigen in jenem Paragraphen berührten Maßregeln bezüglich der letzten Lockerung im Herbst, des Anhäufelns als Schutz gegen Auffrieren u. s. f. haben für schwächere verschulzte Pflanzen ihre volle Geltung.

Eine Zwischendüngung kann sich bei längerem Stand der Pflanzen im Pflanzbeet — für zwei Jahre sollte die vor der Verschulung dem Boden gegebene Düngung stets ausreichen! — wohl als nöthig erweisen und wird dann in ähnlicher Weise wie für Saatbeete (s. § 71) gegeben. Wo sich das Bedürfniß der Düngung im Habitus der Pflanzen geltend macht, wird ein rasch wirkender, leicht löslicher Dünger (Fauche, Mineraldünger) auch hier zweckmäßiger in Anwendung gebracht, als langsam wirkende Düngemittel, wie Humus, Rasenerde u. dgl., die wir für die Düngung vor der Verschulung empfohlen haben.

¹⁾ Aus dem Walde. V. S. 110.

§ 90.

Pflege der Pflanzen durch Beschneiden der Nesten.

Ein für Laubholz pflanzen nicht unwichtiger, ja für stärkere Pflanzen, bei der Heisterzucht, geradezu unentbehrlicher Theil der Pflege im Pflanzbeet ist das Beschneiden von Nesten und eventuell Gipfeln. Ein Beschneiden von Nadelholz pflanzen im Pflanzbeet findet wohl nur ganz ausnahmsweise statt und wird sich für starke Fichten- und Tannenpflanzen etwa auf Wegnahme eines Doppelwipfels beschränken,¹⁾ während die dem Laubholz ohnehin in mancher Beziehung sich nähernde Lärche bei der Erziehung zum Heister etwa an den Nesten pyramidal zugeschnitten wird.

Der Zweck des Beschneidens ist die Erziehung einer möglichst normal gewachsenen Pflanze mit kräftigem Gipfeltrieb und hinreichend zahlreichen, nicht zu starken und nicht zu tief ange setzten Seitenzweigen. Durch sach gemässes Abnehmen oder Kürzen der Nesten soll die Pflanze eine für ihre spätere Auspflanzung möglichst günstige und mit der gleichfalls durch Schnitt gelegentlich der jedesmaligen Verschulung korrigirten Bewurzelung in richtigem Verhältniss stehende Befestigung und Bekronung erhalten.

Die Nothwendigkeit, eine Pflege durch Beschneiden eintreten zu lassen, ergibt sich aber einerseits Angesichts der mannigfachen Missbildungen, die wir unsere Pflanzen im Pflanzbeet entwickeln sehen — Gabelbildungen, Krümmungen, tief ange setzte Nesten u. dgl. —, anderseits durch unsere Aufgabe, so viel als thunlich jede einmal mit Kosten er zogene und verschulte Pflanze für ihren Zweck tauglich zu machen, allen Ausschuss bei der seinerzeitigen Auspflanzung ins Freie möglichst zu vermeiden. — In unseren natürlichen Anslügen, unseren Saat- oder dichten Pflanzkulturen mit ihrer Pflanzenfülle bedürfen wir eines Beschneidens der Pflanzen nicht; manche Art der Missbildung, die wir in unseren Pflanzbeeten wahrnehmen, tritt dort an sich seltener auf — so verhindert der dichtere Stand eine zu starke, zu tief ange setzte Be festigung, der Gipfel drängt an sich zum Licht empor; jede nicht normale, missgebildete Pflanze aber geht in Wälde durch das Ueberwachsen seitens ihrer normalen Nachbarn zu Grunde, ohne Nachtheil, ja zum Besten für das Ganze. Anders im Pflanzbeet, wo der fehlende Schluss durch die Pflege ersehnt werden muß, wo jeder verschulte Pflänzling auch als tauglich erhalten bleiben soll.

Die Nothwendigkeit dieser Pflege und deren Maß ist aber eine sehr verschiedene nach der Holzart, wie nach Alter und Stärke, welche

¹⁾ Für die Tanne wird von einigen Seiten auch ein Stützen der Seitenäste empfohlen — s. § 110.

der Pflanzling im Wald erreichen soll. Nach der Holzart: die eine ist mehr zu starker Astbildung geneigt, während die andere selbst im geringeren Schluß schlank und ohne Seitenäste emporwächst. Zu den ersten gehört vor Allem die Eiche, in schon minderem Maße Ulme und Linde, während als Beispiel für letztere vor Allem Ahorn und Esche zu nennen sind. — Nach Alter und Stärke: je länger eine Pflanze im Pflanzbeet stehen, je stärker sie bis zu ihrer Verwendung werden soll, in um so höherem Grad wird sie auch der Pflege durch Beschneiden bedürfen, und während z. B. einjährig verschulte und dreijährig ausgesetzte Eichen des Beschneidens nur in geringerem Grad bedürfen, ist eine rationelle Eichenheisterzucht ohne wiederholtes und zweckgemäßes Beschneiden nicht denkbar.

Man hat die Notwendigkeit eines Beschneidens der Neste beim Versetzen einer stärkeren Pflanze auch damit begründet, daß — nachdem Wurzeln und Krone bezüglich ihrer Entwicklung jedenfalls in einem bestimmten Verhältniß stehen — jede Kürzung eines Theiles auch eine entsprechende Reduzierung des andern notwendig mache, die meist nicht zu umgehende Kürzung der Wurzeln also ein Einstußen der Neste erfordere, damit Wasseraufnahme durch die Wurzeln und Verdunstung durch die Blätter ins Gleichgewicht gebracht werden. (Revierförster Kropp bestreitet¹⁾ dies zwar, behauptet, daß die Pflanze durch Bildung kleinerer Blätter dies Gleichgewicht schon selbst herzustellen wisse, und tritt jedem stärkeren Beschneiden entgegen.) Wir haben nun hier nur von jenem Beschneiden der Neste zu reden, welches zum Zweck normaler Stammbildung in der Pflanzschule, nicht nach deren Verlassen stattfindet, und unsere Aufgabe in der Pflanzschule ist es jedenfalls, bei dem Verschulen auf eine Wurzelbildung, durch entsprechendes Beschneiden während des Stehens in der Pflanzschule auf eine Stamm- und Kronenbildung hinzuwirken, die bei dem Auspflanzen ins Freie eine möglichste Schönung beider Organe, der Wurzeln wie der Krone, gestattet.

Was die Zeit betrifft, zu welcher das Beschneiden vorzunehmen ist, so ist als günstigste Jahreszeit jedenfalls die Zeit der Vegetationsruhe zu betrachten; man kann wohl auch zu anderer Zeit schneiden, soll aber wenigstens aussetzen, so lange die Rinde sich leicht löst,²⁾ um Beschädigungen derselben zu vermeiden. Der entlaubte Pflanzling erscheint auch dem Auge am übersichtlichsten, erleichtert das Beschneiden wesentlich, und mit eintretendem Saft wird die Neuberwallung der am

¹⁾ Krit. Blätter. XLIII. 2. S. 132.

²⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 78.

Stämmchen befindlichen Schnittwunden sofort beginnen. — Manteuffel gibt dagegen an,¹⁾ daß Johanni die zweckmäßigste Zeit zum Schneiden sei, und das Gleiche findet sich auch noch andern Orts behauptet,²⁾ und zwar weil die Pflanzen sich verbluten würden, wollte man vor der Zeit des Saftsteigens schneiden, während im Sommer eine dicke, gummiaartige Ausscheidung alsbald die Wunde decke. (?) Bezuglich der Jahre, in welchen man die Ast- und Gipfel-Korrekturen vornimmt, ist zu beachten, daß man im Jahre der stattgehabten Verschulung nicht gerne schneidet, um den Pflänzling erst fest und gut einwurzeln zu lassen, daß man aber auch namentlich den stärkeren Heister rechtzeitig vor seiner Auspflanzung beschneidet, so daß bis zu dieser die Schnittflächen wieder überwallt sind, nicht aber denselben im Moment der Auspflanzung noch „mit Wunden überladet,” wie Burkhardt sich ausdrückt.³⁾

Als allgemeine Grundsätze und Regeln für Ausführung des Beschneidens dürften folgende gelten.⁴⁾

Das Beschneiden ist stets auf das absolut Nothwendige zu beschränken, jedes Übermaß zu vermeiden. — An Laubholzpflanzen, die nur einmal verschult und als etwa meterhohe Lohden ausgesetzt werden, ist in der Regel und mit Ausnahme der zur Astbildung besonders geeigneten Eiche wenig zu schneiden, die Arbeit beschränkt sich auf das Wegnehmen tief ange setzter und stärkerer Neste, auf das Zurückschneiden zu langer, eventuell den Gipfeltrieb beeinträchtigender Seitenäste, auf die Entfernung von Doppelwipfeln und Gabelbildungen, wie letztere insbesondere bei Holzarten mit gegenständigen Knospen (Ahorn, Esche) im Falle des Verkümmerns oder Erfrierens des Haupttriebes häufig entstehen. Ein Zurückschneiden des Wipfeltriebes wird nur bei unverhältnismäßig langem, rutenförmigem Wuchs desselben oder bei schlecht verholztem Johannistriebe nötig sein und erfolgt dann in einiger Höhe über einer kräftigen Seitenknospe, die dadurch zur Gipfelknospe wird. Schneidet man unmittelbar über der betreffenden Knospe, von welcher man den Wipfeltrieb erzielen möchte, so erfolgt nicht selten ein Eintrocknen derselben von der nahen Schnittfläche aus, während dies bei einiger Entfernung der letztern von der Knospe vermieden wird.⁵⁾ — Ein rutenförmiges Aufschneiden ist jedenfalls verwerflich; tief ange setzte Neste nehme man allerdings ganz weg und zwar glatt am

¹⁾ Die Eiche. S. 86.

²⁾ Krit. Blätter. XXIX. 1. S. 65.

³⁾ Burkhardt, Säen u. Pflanzen. S. 78.

⁴⁾ Vergl. Burkhardt, S. 78 ff. Erlaß des preuß. Fin.-Minist. (Allgem. F. u. J.-B. 1866. S. 269). Krit. Blätter XLVII. 2. S. 132 u. XLIX. 1. S. 60.

⁵⁾ Zeitschr. f. J.-u. J.-W. XI. S. 112.

Stamm, um die Ueberwallung zu befördern, weiter oben stehende Astete dagegen stuft man nur ein, um den stufigen Wuchs der Pflanze nicht zu beeinträchtigen, und nimmt dieses Einstuften ebenfalls nicht zu kurz über einer Knospe vor.

Zu viel ausgedehnterem Maß bedarf der zu erziehende kräftige Heister der Pflege mit Messer und Astscheere; mit deren Hülfe soll ein stufiger Stamm mit möglichst gleichmäßig nach allen Seiten entwickelter, nicht zu hoch ange setzte Krone erzogen werden. Einseitige und hoch ange setzte Krone bringt namentlich die Nachtheile mit sich, daß der Stamm durch die Belastung mit Schnee und Eis leicht zur Seite gebogen wird, daß der Wind das Stämmchen stärker angreift und in den Wurzeln lockert. Eine der Pyramidengestalt sich nähernde Form der Krone wird als die zweckmäßige betrachtet, auf sie soll durch den Schnitt hingewirkt werden; dabei ist der Schutz der Rinde durch die Astete, welcher bei solcher Art des Astschnitts erhalten wird, insbesondere für die gegen direkte Einwirkung der Sonne empfindliche Rinde mancher Holzarten, obenan der Buche, von Werth.


Auch in der Heisterschule ist übrigens das Maß der nöthigen Pflege durch Beschneiden ein nach der Holzart wesentlich verschiedenes, und Ahorn und Esche, beide vielfach als Heister erzogen, bedürfen auch hier derselben am wenigsten, die Eiche dagegen wohl am meisten.

Der Astschnitt nun hat tief ange setzte Astete ganz zu entfernen, ebenso ein Uebermaß dicht beisammen stehender Astete zu reduziren, im Uebrigen zu lange Astete entsprechend zu kürzen, die oberen stärker als

die untern, um eben jene (annähernde) Pyramidengestalt der Krone zu erreichen. Besonderes Augenmerk ist beim Astschnitt den Krümmungen des Schaftes zuzuwenden und auf deren Korrektur hinzuwirken; wo Astete sitzen, da findet ein stärkerer Nahrungszufluß, eine stärkere Holzbildung statt. So wird man (s. Fig. 34) durch Wegnahme der auf der äußern Seite einer Krümmung sitzenden Astete und Belassung der etwa auf der Innenseite stehenden die Krümmungen allmählich zu mindern und auszugleichen im Stande sein.¹⁾

Der Gipfelschnitt wird sich hauptsächlich auf Entwicklung gälicher oder gar quirsförmiger Triebe (Eiche!) zu beschränken haben, wobei

¹⁾ Vergl. Allgem. F.- u. J.-B. 1866. S. 269, welcher auch obige Abbildung entnommen ist.




Figur 34.


man den am besten verholzten, die kräftigsten Knospen tragenden Trieb stehen läßt. Ist der Endtrieb zu rutenförmig, so schneidet man ihn, in oben schon erwähnter Weise, entsprechend zurück. Haben sich bei versäumtem rechtzeitigen Schnitt schirmförmige Kronen gebildet, so kann man den Schirm mittelst einer Wiede so zusammen binden, daß alle Zweige in die Höhe stehen und in dieser Richtung fortwachsen; nach Jahresfrist löst man den Verband, sucht den passendsten Zweig aus und schneidet die übrigen mehr oder weniger weg. Falls ein tieffitzender, kräftiger Ast vorhanden ist, kann es sogar angezeigt sein, den abnormalen Gipfel ganz zu entfernen, den Seitenast mittelst einer Wiede in die Höhe zu biegen und so einen neuen Gipfel zu schaffen (Fig. 35)¹⁾. Durch sorgfältige Auswahl der in die Heisterschule zu bringenden Pflanzen, Ausscheiden aller minder schönen Exemplare und stets rechtzeitiges Beschneiden werden derartige umständlichere Manipulationen aber großenteils zu vermeiden sein.

Noch radikaler erscheint die Kur mißgebildeter Pflanzen, wenn man dieselben im Frühjahr kurz über dem Boden vollständig abschneidet, von den erscheinenden Stockausschlägen den kräftigsten unter Entfernung der übrigen beibehält und aus ihm eine gutwüchsige starke Lohde oder selbst einen Heister erzieht. Dies Verfahren ist unseres Wissens nur für die Eiche, und zwar nicht nur für schlechte Pflanzen, sondern für ganze Pflanzbeete, zur Anwendung gebracht worden, und werden wir bei der Besprechung dieser Holzart auf dasselbe zurückkommen.

Als Instrument bei dem Beschneiden der Pflanzen diente ursprünglich ein gekrümmtes Messer (Gartennmesser), in neuerer Zeit wird aber dazu fast ausschließlich die Astscheere verwendet. Der Vorzug dieses Instruments gegen-



Figur 35.



Figur 36.

1) Burkhhardt, Säen u. Pflz. S. 79.

Fürst, Pflanzenzucht im Walde.

über dem Messer besteht in der leichten, sichern Handhabung, dann in der Vermeidung jeder Rindenbeschädigung, wie jeder Lockerung der Pflanze, welch letztere bei schwächeren Pflanzen und größerer Stärke der weg zunehmenden Nesten mit Anwendung des Messers leicht verbunden ist. Die verbreitetste Art ist wohl die S. 177 (Fig. 36) abgebildete (Nr. 96 a des Preisverzeichnisses der Gebrüder Dittmar zu Heilbronn, à 6 Mark); dieselbe wird auch durch die oben erwähnte preußische Finanz-Ministerial-Befügung empfohlen. Mit derselben werden auch schon stärkere Nesten leicht entfernt, und wird bei solchen der Schnitt schräg, nicht senkrecht zur Axe geführt.

Eine besondere Art der Pflege, in ihrer Wirkung dem Schneiden ähnlich, ist das Ausbrechen überflüssiger Knospen, indem von den am Ende des Triebs dicht gehäuften Knospen (der Eiche) alle bis auf die kräftigste entfernt oder auch die Seitenknospen überhaupt zu Gunsten der kräftigeren Entwicklung der Endknospe theilweise ausgebrochen werden. Auch dieses — immerhin etwas umständliche und zeitraubende — Geschäft, das wohl nur in die Hände sehr geschulter Arbeiter gelegt werden darf, wird nur für die Eiche empfohlen¹⁾ und soll bei dieser Holzart noch nähere Erwähnung finden. — Ist man bei Holzarten mit gegenständigen Knospen (Ahorn, Esche) genötigt, den Gipfel zu entfernen, so bricht man zweckmäßig auch eine der beiden Endknospen aus, hiedurch der Gabelbildung vorbeugend.²⁾

V. Abschnitt.

Die Kosten der Pflanzenerziehung.

§ 91.

Die Faktoren derselben.

Die Frage nach den Kosten der Pflanzenerziehung hat von jeher das lebhafte Interesse der Forstwirthe erregt, wie dies die zahlreichen dessfallsigen Mittheilungen in der Literatur beweisen; es ist daher jedenfalls angezeigt, auch hier dieser Frage näher zu treten.

¹⁾ Allgem. F.- u. F.-B. 1866. S. 269.

²⁾ Fischbach, Lehrb. der Forstw. S. 119.

Diese Kosten nun setzen sich aus einer ganzen Reihe von Faktoren zusammen, als deren wichtigste wir nennen: Bearbeitung des Bodens, Einfriedigung, Düngung, Samenbeschaffung, Ansaat und Verschulung, Schutz und Pflege jeder Art — bei scharfer Rechnung, wie man sie heutzutage gern führt, selbst die Zinsen des Bodenkapitals. Von diesen Faktoren können wir einige als ständige, bei jeder Pflanzschule auftretende bezeichnen, so die Kosten für Bodenbearbeitung, Ansaat, Verschulung, Reinigung, während andere, so vor Allem die Kosten für Einfriedigung, auch jene für Düngung, von lokalen Verhältnissen abhängen, bei Wanderkämpfen häufig wegfallen.

Aber auch diese als ständig bezeichneten Ausgaben erwachsen je nach den örtlichen Verhältnissen in sehr verschiedener Höhe, und dürfen wir nur an die so außerordentlich wechselnden Kosten der erstmaligen Bodenbearbeitung erinnern. Ein bei den Kosten der Pflanzenerziehung, der Ausführung der oben aufgezählten Arbeiten vor Allem im Betracht kommender Faktor aber ist die Höhe des ortssüdlichen Tagelohns, der für die Höhe jener Kosten ausschlaggebend zu sein pflegt, dem gegenüber die übrigen Kosten, für Ankauf von Dünger, Samen &c., nahezu verschwinden können. Wenn wir unsren Dünger durch Brennen von Rasenasche, Ansehen von Komposthaufen, Sammeln von Dammerde selbst bereiten, unsren Samen selbst sammeln lassen, wie dies bei Laubholzfämereien, auch Tannensamen nicht selten geschieht, wenn wir endlich das Material zur Einfriedigung unsers Saatbeets nicht kaufen (Draht-einfriedigungen!), sondern es unsren Beständen entnehmen können, Material, welches vielleicht in der betreffenden Gegend kaum verwertbar gewesen wäre, dessen Preis wir also außer Ansatz lassen können, — dann sind unsere Pflanzenerziehungskosten reine Arbeitslöhne und direkt abhängig von deren ortssüdlicher Höhe, welche letztere bekanntlich außerordentlich schwankt. So finden wir in den von Gayer mitgetheilten Kulturstentarifen die Tagelöhe in der schlesischen Oberförsterei Kottwitz auf 1 Mark für Männer, 65 Pfennige für Frauen angegeben,¹⁾ während man andern Orts das Doppelte zahlt, und hienach können unter sonst gleichen Boden- &c. Verhältnissen die Kosten der Pflanzenerziehung zweier Reviere um 100 Prozent schwanken. Aber selbst wenn wir diese ortssüdlichen Löhne kennen, spielt noch die weitere Frage eine Rolle, ob wir im Stande sind, stets die relativ billigsten Arbeitskräfte wählen zu können, ob wir zu Arbeiten, die am zweckmäßigsten durch Frauen oder Kinder ausgeführt werden, nicht in Folge besonderer lokaler Verhältnisse Männer gegen viel höheren Lohn verwenden müssen.

¹⁾ Waldbau. S. 688.

Ein weiterer Faktor für die Höhe der Pflanzenerziehungs-Kosten, unsicherster Art zwar, aber doch nirgends ganz fehlend, oft schwer in die Wagsschale fallend, sind die Unfälle, die Beschädigungen mancher Art, von denen unsere Saatbeete und Forstgärten heimgesucht werden. Wie viele Millionen von Föhrenpflanzen sind wohl schon durch die Schüttie zu Grunde gegangen, wie manche hoffnungsvoll keimende Saat ist anhaltender Trockenheit erlegen, wie viele Eichel- und Buchelsaatbeete werden durch Mäuse, wie viele Nadelholzsaatbeete durch Vögel zerstört oder doch stark dezimiert! Auch der Engerling, dieser so schwer zu bekämpfende Feind unserer Saatbeete, der Spätfrost, durch den so manche hoffnungsvolle Pflanze verkrüppelt, seien nicht vergessen — alle diese bald seltener, bald öfter wiederkehrenden Beschädigungen aber dürfen wir nicht außer Acht lassen, wenn wir nach den Kosten der Pflanzenerziehung, nach durchschnittlichen Kostensätzen fragen, und müssen damit freilich einen höchst unsicheren Faktor in unsere Rechnung einführen.

§ 92.

Beeinflussung der Kosten durch den Wirthshafter.

Alle Kostenangaben und Kostenvergleichungen, die wir in unserer Literatur finden, haben als letzten Endzweck doch wohl die Absicht, Anhaltpunkte für eine möglichst billige Pflanzenproduktion zu geben; nicht hohe, sondern möglichst geringe Kostenbeträge pflegen mitgetheilt zu werden, der Mittheilenden sucht die Zweckmäßigkeit der von ihm angewandten Methode der Pflanzenerziehung durch diese Angaben zu beweisen. Der Forstwirth aber soll sich Angesichts solcher Mittheilungen fragen: wie stellen sich deine Ausgaben für Pflanzenzucht diesen Angaben gegenüber, warum sind erstere höher, in wie weit und mit welchen Mitteln kannst du sie reduzieren?

Die Ausgaben für Pflanzenerziehung sind nun theilweise durch die örtlichen Verhältnisse bedingt und ihre Aenderung liegt bis zu gewissem Grade außerhalb der Macht des Pflanzenzüchters. Die Kosten der Bodenbearbeitung sind abhängig von den lokalen Bodenverhältnissen, jene der Reinigung von der Neigung des Bodens zum Gras- und Unkrautwuchs; die Kosten der Einfriedigung lassen sich bei geringem Wildstand oft gänzlich ersparen, ein einziges Rudel Sauen im Revier kann zu sehr solider Einfriedigung jedes kleinen Kampes nöthigen, die Holzpreise, der mehr oder weniger weite Transport des zur Einfriedigung nöthigen Materials beeinflussen die Kosten der letzteren sehr bedeutend und sind doch vielfach gegebene und nicht zu ändernde Größen. Endlich ist die so einflußreiche Höhe des ortsbülichen Tagelohns eine gegebene

feste Größe, an der wir wenig oder nichts ändern können, und das Kapitel der Unfälle gehört wenigstens zum größern Theil wohl auch hierher.

Dagegen liegt es bei einer ganzen Reihe von Faktoren, ja bis zu gewissem Grade selbst bei den anscheinend festen, durch die örtlichen Verhältnisse bedingten, in der Hand des aufmerksamen und sachverständigen Wirthschäfers, die Kosten der Pflanzenerziehung wesentlich zu vermindern. Schon die richtige Auswahl des Platzes ist hiebei von großer Bedeutung, denn durch sie sind die Kosten für die Zurichtung des Bodens, für Schutz gegen Frost und Hitze, für Reinigung von Unkraut in nicht geringem Grade bedingt. Sorgfalt bei Auswahl des Saatgutes, Anwendung der zweckmäßigsten Methoden und Hülfsmittel zur Saat und Verschulung, zum Schutz der Pflanzen gegen Gefährdungen; zweckgemäße, weder zu kleine, noch zu große Entfernung der Saatstellen und Pflanzreihen; gute Eintheilung der Arbeit und Arbeitskräfte, endlich stete genügende Aufsicht: das sind die Bedingungen einer nach Maßgabe der Verhältnisse billigen Pflanzenzucht, und es springt in die Augen, daß dem Forstmann bezüglich der Einwirkung auf dieselben ein nicht geringer Spielraum gegeben ist. Jede zu tiefe Bearbeitung des Bodens, ein Räjolen desselben von 60 und 70 cm Tiefe da, wo ein 30—40 cm tiefes Umgraben genügt hätte; jeder überflüssige oder zu breite Weg innerhalb des umgearbeiteten und eingefriedigten Forstgartens; jede Verwendung eines kräftigen Mannes zu einer Arbeit, die eine Frau, ein Kind eben so gut ausgeführt haben würde, ist eine Verschwendug, welche die Kosten für Erziehung der einzelnen Pflanze in die Höhe drückt. Auch Sparsamkeit am unrechten Ort — an Kosten für Schutz und Pflege der Saatbeete — kann gerade den entgegengesetzten Erfolg haben statt des beabsichtigten!

Die Frage, welche Arbeiten bei der Pflanzenerziehung mit Vortheil in Accord gegeben werden können, wird hier auch zu erwägen und zu beantworten sein.

Jeder Accord soll beiden Parteien, dem Arbeitgeber wie dem Arbeitnehmer, gewisse Vortheile bieten: Dem ersten soll die ständige Beaufsichtigung der Tagelohnarbeiten erspart und trotzdem die Arbeit wo möglich billiger geliefert werden, letzterer will sich durch erhöhte Anspannung seiner Kräfte, Verwendung der ihm gelegensten Zeit, einen den gewöhnlichen Tagelohn übersteigenden Verdienst sichern. Letzteres geschieht aber nur zu leicht auf Kosten der Güte der Arbeit und es gilt daher bezüglich der Accordarbeiten wohl überall die Regel: nur solche Arbeiten zu veraccordiren, bezüglich deren sich die richtige und accordgemäße Ausführung nach Vollzug der Arbeit genügend kontrolliren läßt.

Bei Aufrechthaltung dieses Grundsatzes wird es aber eine nur beschränkte Zahl von Arbeiten bei der Pflanzenzucht sein, die sich zur Veraccordirung eignen. Am allgemeinsten greift letztere wohl Platz bei dem erstmaligen Umbruch des Bodens für einen neu anzulegenden Saatkamp oder Forstgarten; vielfach ist sie anwendbar und empfehlenswerth beim Jäten, worüber wir uns bereits in § 69 ausgesprochen haben. Das Ausheben, Zählen und Verpacken namentlich jener Pflanzen, welche verkauft werden, kann ebenfalls pro Hundert in Accord gegeben werden, und ebenso wird die Veraccordirung am Platz sein für Beifuhr von Material zur Einfriedigung, Düngemitteln, (Straßenabbaum, Humus), Herstellung von Umfassungsgräben. Wenn dagegen Forstrath Brecht empfiehlt,¹⁾ sogar das Beschneiden der Pflanzen im Pflanzbeet, das Einschulen (für Kulturen auch das Einpflanzen) zu veraccordiren, so können wir dem nicht zustimmen, da in ersterem Fall das Maß der Arbeitsleistung nur schwer bestimmbar, in letzterem die exakte Arbeitsleistung schwierig kontrollirbar sein dürfte.²⁾

Jeder Accord aber soll sich stützen auf vorherige genau kontrollirte Tagelohnarbeit, wobei die Kulturlohnrechnungen früherer Jahre häufig brauchbare Anhaltspunkte und Durchschnittszahlen geben werden; ohne solche Grundlage wird der Accord unsicher, der eine oder andere Konkurrent übervortheilt und zwar in der Mehrzahl der Fälle der Arbeitgeber von dem vorsichtigen Arbeiter, der einen ihm unsicher dünkenden Accord nicht eingeht! — Solche Vorsicht ist namentlich nöthig, wenn wir den Accord gleichsam im Vertragsweg mit unsren Waldarbeitern abschließen; öffentliche Konkurrenz und entsprechende Beteiligung an solcher stellen die entsprechenden Preise sicherer her.

§ 93.

Feststellung der Pflanzeerziehungskosten. Vergleichbarkeit derselben.

Die auch nur einigermaßen genaue Angabe der Kosten, welche die Erziehung von einem Hundert Pflanzen der einen oder andern Holzart, des einen oder andern Alters verursacht, ist oft eine schwierige Aufgabe.

In sehr vielen Fällen werden in demselben Saatbeet oder Forstgarten gleichzeitig Pflanzen der verschiedensten Art und Stärke erzogen — einjährige Föhren, zweijährige Lärchen, verschulte Fichten und Tannen

¹⁾ Monatschr. f. d. J.-u. J.-W. 1868. S. 19.

²⁾ In Gahers Waldbau, S. 699 ist bei dem Kulturlostenttarif des Reviers Alteglashütte in der Rheinpfalz hervorgehoben, daß alle Pflanzschularbeiten mit Ausnahme der ersten Bodenbearbeitung im Taglohn erfolgen.

u. s. f.; die Trennung der Arbeiten für jede Holzart, jedes Sortiment, die Repartirung der Kosten, die hienach jeder Pflanzengattung zur Last fallen, lässt sich aber in den meisten Fällen kaum durchführen, so namentlich bei jenen Kosten, welche durch Schutz und Pflege erwachsen. Welcher Kostenanteil wird z. B. bezüglich des erstmaligen Umbrochs, der Einfriedigung, der Hütte u. s. f. der einjährigen Föhrenpflanze, welcher der fünfjährigen Tanne oder dem achtjährigen Heister zuzurechnen sein? Solche, nur einmal in größerem Zwischenräumen erwachsende Ausgaben repartiren sich auf eine oft sehr große Pflanzenmenge und können dadurch für die Einheit von sehr geringer Bedeutung werden, bei einem Durchschnitt aus fürzerer Zeitperiode aber ziemlich bedeutend in die Wagtschale fallen; außer Acht lassen darf man sie wohl in keinem Fall! — Es sind ferner nur Durchschnittszahlen aus mehrjährigem Betrieb, welche Werth haben, denn nur dadurch kommt der oben erwähnte Faktor der Unfälle und Beschädigungen ebenfalls zur Geltung; es wird aber auch durch dieses Verlangen die Ermittlung solcher Kosten für jede einzelne Holzart nicht unwesentlich erschwert. Angeichts dieser Schwierigkeiten finden wir denn auch Angaben (siehe unten § 97), bei welchen die Kosten für auf denselben Saatkampf erzogene einjährige Föhren, zweijährige Lärchen und Fichten zusammengeworfen wurden und ein gemeinsamer Durchschnitt pro Hundert der erzogenen Pflanzen berechnet wird.

Mit viel größerer Sicherheit dagegen lassen sich Angaben über den Kostenaufwand pro Hundert Pflanzen dort machen, wo auf einer bestimmten, nicht zu kleinen Fläche nur eine Holzart von bestimmtem Alter erzogen wird — so einjährige Föhren, unverschulte oder verschulte Fichten, ein- oder zweijährige Eichen. Je näher Anlage eines Saatbeets und dessen Verlassen nach erfolgter Ausnutzung einander liegen, so daß alle Kosten mit Sicherheit in die auch hier nöthige Berechnung aus mehrjährigem Durchschnitt einbezogen werden können, mit um so größerer Sicherheit werden auch die gewünschten Kostenangaben zu ermitteln sein.

Was die Vergleichbarkeit der so ermittelten Kosten mit jenen anderer Dertlichkeiten und damit den praktischen Werth der Kostenangaben betrifft, so ist letzterer nur ein beschränkter, die Vergleichung nur mit Vorsicht zulässig. Was wir oben über die so zahlreichen und je nach den verschiedenen Dertlichkeiten und Verhältnissen im verschiedensten Maße einwirkenden Faktoren dieser Gesamtkosten gesagt haben, genügt vielleicht schon einigermaßen zur Begründung der eben ausgesprochenen Ansicht und namentlich wird man uns zugeben, daß jede Angabe über Pflanzenerziehungskosten ohne gleichzeitige Mittheilung der ortsbülichen

Tagelöhne fast ohne Werth ist. — Außer den Schwierigkeiten aber, welche wir bezüglich korrekter Angaben wenigstens für viele Verhältnisse oben nachgewiesen zu haben glauben, ist bei der Vergleichung der Kosten noch ein wichtiger und doch sehr schwer zu präzisirender Faktor ins Auge zu fassen — die Qualität der erzogenen Pflanzen! Zwischen zweijährigen Fichten, in schmaler Doppelrinne kräftig und stufig erwachsen, und solchen, die in breiten, dicht besäten Rissen auf gleich großer Fläche in doppelter und dreifacher Anzahl mit nahezu ganz gleichen Kosten — der einzige Unterschied ist vielleicht das höhere Samenquantum in letzterem Fall — erzogen wurden, ist eben ein himmelweiter Unterschied, eine Vergleichung beider bezüglich des Kostenaufwandes gewiß nicht zulässig! In § 54 haben wir mitgetheilt, wie auf gleichgroßen Flächen mit verschiedenem Samenquantum 15306 und 25479 taugliche einjährige Föhrenpflanzen erzogen wurden — aber erstere wogen 1733 Gramm, letztere nur 1300 Gramm pro Tausend; die Erziehungskosten aber verhalten sich natürlich nahezu wie 5 : 3 pro Tausend.

Endlich möchten wir noch darauf hinweisen, daß es einerseits meist ältere, erfahrene Pflanzenzüchter sind, welche, nachdem sie in früheren Jahren ihr Lehrgeld bezahlt, die Resultate ihrer Arbeit mittheilen, und daß anderseits nur günstige Resultate zur Veröffentlichung zu gelangen pflegen; wer mit oder ohne Verschulden minder günstige Resultate erzielt hat, pflegt solche nicht zu publizieren.

Damit soll jedoch insbesondere jenen Mittheilungen, welche Durchschnitte aus großen Zahlen, aus langjährigem Betrieb bieten, in keiner Weise zu nahe getreten werden; dieselben können, unter Beachtung der lokalen Verhältnisse mit den eigenen Erfahrungen verglichen, dem Pflanzenzüchter manche Anregung geben. Wir fügen nachstehend einige solche Mittheilungen aus der Literatur an und bemerken, daß die Kosten der Einfriedigung und Düngung im unmittelbaren Anschluß an die betreffenden Abschnitte in den §§ 29 und 39 besprochen wurden, da sie sich uns dort am zweckmäßigsten anzuschließen schienen.

§ 94.

Kosten der Bodenbearbeitung.

Nichts schwankt wohl mehr als die Höhe der Kosten für die erstmalige Bearbeitung des Bodens bei Anlage eines neuen Saatbettes. Neben dem überall einflußreichen Faktor der Tagelohns-Höhe, die hier besonders ins Gewicht fällt, da nur kräftige, die relativ höchsten Tagelöhne beziehende Männer zu dieser Arbeit Verwendung zu finden pflegen, ist es die natürliche Beschaffenheit des Bodens einerseits, die verlangte

Tiefe und Gründlichkeit der Bodenbearbeitung anderseits, welche ausschlaggebend für die Kosten sind. In ersterer Beziehung finden wir alle Übergänge vom eben gelegenen, stein- und wurzel-freien Sandboden zu dem schweren, steinigen, wurzeldurchzogenen Granitboden im Gebirge, dessen Lage an einem Gehänge vielleicht noch Terrassirung erheischt; in letzterer solche von der metertiefen Boden-Rajolung E. Heyers zu der nur 10 bis höchstens 30 cm tiefen Lockerung, mit welcher sich Fischbach begnügt (vergl. § 17); so kann es uns auch nicht wundern, wenn die Angaben über die Kosten bezüglich der Bodenbearbeitung außerordentlich schwanken — nach unserer Ansicht haben solche Angaben nur lokalen Werth.

Als Beleg für das Gesagte mögen einige solche Angaben dienen: Schmitt¹⁾ gibt als Kosten erstmaliger Bodenbearbeitung an: unter günstigen Verhältnissen 7 Mark, unter ungünstigen 12—15 Mark pro Ar bei 30—40 cm tiefem Umgraben, sowie einschließlich des Abräumens und Verbrennens des Bodenüberzuges; Tagelohn 2,50 Mark für den Mann.

Häß²⁾ gibt die Kosten für 24—36 cm tiefes Rajolen bei einem Tagelohn von nur 90 Pfennige bis 1 Mark an auf

1,26 Mark pro Ar unter günstigsten und

3,78 " " " unter ungünstigsten Verhältnissen.

Nach Duetsch³⁾ betrugen dieselben bei etwa 40 cm tiefer Bodenbearbeitung (die Höhe des ortssüblichen Tagelohns ist nicht angegeben) pro Ar durchschnittlich 2,60 Mark und in der schlesischen Oberförsterei Kottwitz⁴⁾ sinkt dieser Kostenbetrag bei 25 cm tiefer Bodenbearbeitung und einem Mannstagelohn von 1 Mark auf 1,17 Mark pro Ar!

§ 95.

Kosten der Ansaat und Verschulung.

Auch den Mittheilungen über Kosten der Ansaat ist meist nur beschränkter Werth beizulegen. Neben der Holzart ist die Entfernung der Rillen von einander, wodurch die Zahl der Rillen pro Ar bedingt ist, die Anwendung einfacher breiter oder schmaler Doppel-Rillen von sehr wesentlichem Einfluß auf die Höhe der Saatkosten, und die Angabe dieser Faktoren ist daher unbedingt nöthig, wenn es sich um die Ver-

¹⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 37.

²⁾ Allgem. F. u. J.-B. 1862. S. 285.

³⁾ Monatschr. f. F. u. J.-W. 1867. S. 323.

⁴⁾ Gayer, Waldbau. S. 687.

gleichung mit den andern Orts erwachsenen desfallsigen Ausgaben und um die Entscheidung handelt, welchen Einfluß die angewendeten Vorrichtungen zum Eindrücken der Rillen, zur raschen und gleichmäßigen Ansaat auf die Höhe dieser Kosten ausüben. Durch praktische Apparate — Saatbretter und Säeapparate — können diese Kosten jedenfalls wesentlich ermäßigt werden, was namentlich bei Holzarten, welche — wie die Föhre — in größter Menge fast nur im Saatbeet erzogen zu werden pflegen, wohl ins Gewicht fällt.

Nach dem oben schon erwähnten Kulturstenttarif der Oberförsterei Kottwitz kostet die Fichtenkampsaat in 15 cm entfernten Rillen pro Ar 1,40 Mark, im Revier Liepe¹⁾) bei gleicher Rillenentfernung unter Anwendung des Säehorns, aber exkl. Eindrücken der Rillen (Taglohn 1,20 und 0,60 Mark) nur 20—25 Pfennige. Nach Dankelmanns Mittheilungen²⁾) sind zur Ansaat von 1 Ar — Eindrücken der Rillen, Saat, Ueberziehen und Anwalzen — 1,2 Männertaglöhne nötig, wobei die Rillen 15 cm (von Mitte zu Mitte gerechnet) von einander entfernt und mittelst des Saatbretts eingedrückte Doppelrillen sind.

Bezüglich der Verschulung haben die ziemlich zahlreichen Kostenangaben, die wir in unserer Literatur finden, stets die Beantwortung der Frage im Auge: wieviel Pflanzen kann eine fleißige Arbeiterin in einem Tag verschulen? Die desfallsige Angabe bietet den großen Vorteil, daß sie unabhängig ist von dem schwankenden Faktor des ortssüblichen Taglohns, den dann Jeder, der sich für die Sache interessirt, erst selbst in die Rechnung einführt, und es wäre wünschenswerth, daß auch bei anderweitigen Kostenmittheilungen die Angabe möglichst in dieser Weise erfolgte (wie in dem oben berührten Fall auch durch Dankelmann bereits geschehen).

Die Zahl der von einer Person an einem Tage zu verschulenden Pflanzen ist in erster Linie durch Holzart und Stärke der Pflanzen bedingt: je kleiner die Pflanze, je schwächer und kürzer deren Wurzeln, um so rascher geht das Einschulen. Aber auch unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse finden wir doch sehr differirende Angaben, und es ist dies erklärlieh einerseits durch die angewendeten, mehr oder minder arbeitsfördernden Manipulationen, andererseits durch die lokalen Verhältnisse (leichter oder schwerer Boden), endlich auch dadurch, daß in einem Falle alle Hülfssarbeiten — Ausheben und Sortiren der Pflanzen, Anschlämmen u. dergl. — inbegriffen sind, im andern nicht.

¹⁾ Gayer, Waldbau. S. 690.

²⁾ Zeitschr. f. J.- u. J.-W. V. S. 65.

Wir entnehmen der Literatur einige Angaben:

Nach Hefz¹⁾) kann eine fleißige und geübte Person in einem Tag 1000—1200 (ausnahmsweise selbst 1500!) zweijährige Fichten in einem Tag verschulen, wobei sie das Ausheben, Anschlämmen, Abmessen der Reihen und Riesenziehen selbst besorgen muß — eine jedenfalls sehr hohe Arbeitsleistung! Nach Schmitts Angaben²⁾ dagegen würde das Maximum der in einem Tage von einer fleißigen Arbeiterin zu verschulenden solchen Pflanzen 1000 Stück betragen, bei minder geübten auf 800, selbst 600 sinken; mit diesen Zahlen stimmen unsere eignen Erfahrungen. Dandekmann³⁾ dagegen hat unter Anwendung des Harzer Trittbretts (siehe § 82) etwa 1200 Pflanzen als Resultat einer Tagesarbeit erhalten; nach dem Kulturfostentarif der Oberförsterei Karlsberg, Reinerz und Nesselgrund, mitgetheilt von Gayer,⁴⁾ würden dagegen nur 500 Stück einjährige Fichten in einem Tag verschult werden können — eine geringe Arbeitsleistung, welche bezüglich der angewendeten Manipulation wohl zu überlegen gibt.

Für stärkere Pflanzen sinkt die Zahl der mit einer Tagelohnsarbeit einzuschulenden Pflanzen sofort wesentlich; der zuletzt erwähnte Kulturfostentarif gibt z. B. an, daß von ein- und zweijährigen Ahornpflanzen 250 bis 300, von vier- und fünfjährigen nur 125 bis 170 Stück in einem Tage verschult werden können.

Die Verschulung gehört jedenfalls, gleich der Saat, zu jenen Kampf- arbeiten, bei welchen durch Anwendung zweckmäßiger Methoden, richtige Vertheilung und Verwendung der Arbeitskräfte, gute Leitung und Aufsicht ein bedeutender Einfluß auf die Höhe der Kosten in der Hand des Wirthschafters liegt!

§ 96.

Kosten der Reinigung und Lockerung.

Die Kosten für diese Arbeiten lassen sich in vielen Fällen nur schwer trennen, da Lockerung und Reinigung insbesondere bei Anwendung mancher Instrumente — Dreizack, Sätekarft — gleichzeitig ausgeführt werden. Auch hier werden sich Angebots der außerordentlichen Verschiedenheiten, die bezüglich der Neigung des einen oder andern Bodens zum Gras- und Unkrautwuchs, bezüglich der Lockerheit und Bindigkeit der zu Forstgärten verwendeten Bodenarten und des hiedurch bedingten

¹⁾ Allgem. F.- u. F.-B. 1862. S. 294.

²⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 83.

³⁾ Zeitschr. f. d. F.- u. F.-W. V. S. 74.

⁴⁾ Waldbau. S. 685.

Bedürfnisses nach Lockerung bestehen, Durchschnittszahlen von allgemeinem Werth kaum geben lassen. Gayer theilt einige solche Durchschnittszahlen mit;¹⁾ nach denselben betragen die Kosten für Fäten bei dem „zu Gras und Unkrautwuchs neigenden Gebirgsboden“ der Reviere Karlsberg, Reinerz und Nesselgrund pro Ar jährlich drei bis vier Mark (bei einem Männertagelohn von nur einer Mark), in der Oberförsterei Kottwitz jene für Reinigung und Lockerung nur 2,20 Mark (Frauentaglohn 65 Pfennig), und letzteren Betrag gibt auch Sturmfeuer²⁾ als einen Durchschnitt auf gutem grashübsigen Boden an. Schöch³⁾ hat mit Hülfe seines Drei- und Fünfzacks (siehe § 69) die Kosten für Reinigung und Lockerung seines Forstgartens auf sehr kräftigem, grashübsigem Boden auf den geringen Betrag von 1,90 Mark herabgedrückt — einen Betrag, den man wohl als das Minimum des für diese Zwecke nöthigen Aufwandes nach unsern Erfahrungen betrachten darf.

§ 97.

Gesamtkosten der Pflanzenerziehung.

Die Angaben über den zur Erziehung von je hundert oder tausend Pflanzen einer gewissen Art nöthigen Gesamtkostenaufwand, welche sich in unserer Literatur finden, erstrecken sich fast ausschließlich auf die Nadelhölzer, vor Allem die Fichte und Föhre, seltener schon die Lärche und Tanne. Der Grund hiefür ist einerseits in dem viel massenhafteren Anbau der erst genannten beiden Holzarten und insbesondere darin zu suchen, daß dieselben vielfach allein in Saatkämpfen und Forstgärten erzogen werden und dadurch die Möglichkeit und Gelegenheit zur Ermittlung richtiger Durchschnittszahlen geben, während von Laubhölzern fast nur die Eiche allein, mit Ausschluß anderer Holzarten, in Forstgärten erzogen wird; in welchem Maß aber Kostenangaben durch die Erziehung verschiedenen Pflanzmaterials im selben Forstgarten erschwert werden, haben wir oben (§ 93) berührt; anderseits liegt er wohl darin, daß bei jenen Nadelhölzern Saat und Ernte sehr nahe beisammen liegen, letztere der Saat bei der Föhre fast stets schon nach Jahresfrist, bei der Fichte nach 2—4 Jahren folgt, wodurch die Vergleichung in hohem Grad erleichtert wird. Auch der Umstand, daß Fichte und Föhre vielfach in Wandlerkämpfen erzogen und dadurch alle Kosten, vom ersten Hackenschlag zur Bodenbearbeitung bis zum Ausheben der letzten Pflanze,

¹⁾ Waldbau. S. 685 u. 688.

²⁾ Monatsschrift f. d. F.- u. J.-W. 1866. S. 294.

³⁾ Monatsschrift f. d. F.- u. J.-W. 1864. S. 54.

in die Berechnung einbezogen werden können, ist eine weitere Erleichterung für vollständige Angaben.

Minder leicht lassen sich solche Angaben schon bezüglich der Eiche machen; der schwankende, unter Umständen sehr hohe Preis des Saatgutes, die Erziehung derselben in längere Zeit benützten, eingefriedigten Eichelgärten, die längere Dauer dieser Erziehung, das im selben Garten zur Erziehung gelangende sehr ungleichmäßige Material von der einjährigen Pflanze bis zum Heister hinauf machen verlässige Angaben schwer.

Als Kostenangaben aus großen Durchschnitten mögen hier nun folgende angeführt sein:

Für die Föhre:

Dankelmann¹⁾ gibt die Kosten für Erziehung einjähriger Pflanzen im Choriner Forstgarten, also auf ständig benützter und durch alljährliche Düngung in Kraft erhalten Fläche auf 5 Pfennig pro Hundert an, wobei ein Männertagelohn von 1,50 Mark, ein Frauentagelohn von 0,80 Mark bezahlt wurde.

Nach Oberförster Schäffers (Buchwerder) Mittheilungen²⁾ haben diese Kosten bei der Erziehung von 87 358 Hundert solcher Pflanzen in Wunderkämpen auf sandigem, also leicht zu bearbeitendem Boden nur 3,45 Pfennig pro Hundert betragen. (Die Höhe des ortsblichen Tagelohns ist nicht angegeben.)

In der Oberförsterei Woidnig (Posen) ist die Höhe der Erziehungskosten für einjährige Föhren nach größerem Durchschnitt auf 10 Pfennige pro Hundert angegeben;³⁾ die Tagelohnsangabe fehlt auch hier. —

Wo die Schütte die einjährigen Föhren öfters heimsucht und ganze Saatbeete ruinirt, da werden sich die Erziehungskosten aus längerem Durchschnitt viel höher stellen!

Für die Fichte:

Für dieselbe gibt Fischbach⁴⁾ aus ebenfalls großen Durchschnitten folgende Erziehungskosten pro Hundert an:

zweijährige unverschulte Pflanzen	10—13	Pfennig
dreijährige do.	16—20	"
vierjährige do.	20—26	"
vierjährige verschulte	35—42	"
fünfjährige do.	40—48	"

¹⁾ Zeitschr. f. J.-u. J.-W. V. S. 71.

²⁾ Zeitschr. f. J.-u. J.-W. VI. S. 255.

³⁾ Gayer, Waldbau. S. 689.

⁴⁾ Monatschr. f. d. J.-u. J.-W. 1866. S. 401.

wobei als Tagelöhne 1,15 bis 1,40 Mark für den Mann, 70—90 Pfennig für die Frau bezahlt wurden.

Schmitt,¹⁾ dessen aus großen Durchschnitten und langjähriger Praxis gezogene Zahlen entschiedene Beachtung verdienen, gibt unter Einrechnung aller Kosten — auch jener für Kulturwerkzeuge, Einfriedigung und Arbeiterhütte, Verzinsung des Anlagekapitals — für verschulte Fichten folgende Kosten an:

vierjährige pro Hundert	50 bis 90	Pfennig	letztere Beträge für
fünfjährige " "	80 "	140 "	schwierigere Verhältnisse
sechsjährige " "		160 "	

wobei die Tagelöhne zu 1,20 bis 1,50 Mark (bei Rodung neuer Flächen zu 2,50 Mark) angegeben werden.

Für die Tanne:

Grebe²⁾ gibt an, daß die Kosten für Erziehung von fünfjährigen verschulten Tannenpflanzen (zwei Jahre im Saatbeet, drei Jahre im Pflanzbeet) unter Anwendung sogenannter Schutzschirme und bei einem Frauentalglohn von 80 Pfennig sich pro Hundert auf 60—75 Pfennig stellten.

Als Durchschnittszahlen aus großen, gemeinsam erzogenen Pflanzenmengen an Föhren, Fichten und Bärchen, welche ein, zwei und drei Jahre alt Verwendung fanden und für welche sich die Kosten nach Alter und Holzart nicht wohl trennen ließen, mögen noch einige Angaben, Beispiele besonders billiger Pflanzenerziehung, hier erwähnt werden.

Sturmfeder³⁾ hat auf 8 Ar Saatkampffläche in 4 Jahren 192000 Föhren und Fichten, ein- und zweijährig, mit einem durchschnittlichen Aufwand von 7 Pfennig pro Hundert erzogen.

Nach Duetsh⁴⁾ Mittheilungen kostete die Erziehung von 245000 Fichten und Föhren auf 13 Ar Saatbeetfläche pro Hundert nur 3 Pfennig, wobei allerdings Kosten für Einfriedigung, Düngung, Lockerung nicht erwuchsen und die Tagelöhne nur 1 Mark für den Mann, 72 Pfennig für eine Frau betrugen.

Krodel theilt mit,⁵⁾ daß bei der Erziehung großer Pflanzenmengen von drei- bis fünfjährigen Fichten, Weißtannen und Erlen, verschult und unverschult, und bei einem allerdings sehr niedrigen Tagelohn (60 bis

¹⁾ Fichtenpflanzschulen. S. 98.

²⁾ Aus d. Walde. Bd. IV. S. 78.

³⁾ Monatschr. f. d. J.- u. J.-W. 1866. S. 294.

⁴⁾ Monatschr. f. d. J.- u. J.-W. 1867. S. 323.

⁵⁾ Monatschr. f. d. J.- u. J.-W. 1867. S. 401.

90 Pfennig) das Hundert Pflanzen im Durchschnitt nur auf 20 Pfennig zu stehen kommt.

Besondere Schwierigkeiten bietet, wie nach dem in § 93 Gesagten wohl erklärliech, die Angabe der Kosten, welche die Erziehung eines Heisters verursacht, und Mittheilungen hierüber sind denn auch nur wenige zu finden. — Eine präzise Rechnung für die nach seiner Methode (vergl. § 99) erzogenen, dreimal verschulften Eichenheister stellt Geyer auf und berechnet die Kosten eines solchen zehnjährigen Hochstamms auf nur 13 Pfennige, einen jedenfalls als sehr mäßig zu bezeichnenden Aufwand! Die Preise, welche Händler für Heister zu stellen pflegen, be tragen oft das Fünf- und Sechsfache.

Zum Schluß dieses Abschnittes stellen wir noch in der Tabelle auf Seite 192 die Preistarife einiger Pflanzen-Handelsgeschäfte zusammen. Bei Würdigung dieser Tarife wird ins Auge zu fassen sein, daß einerseits solche Handelsgärten ein viel größeres Anlagekapital für Grund und Boden, Gebäude u. dergl. erfordern, anderseits für den Besitzer ein seiner Arbeit, seinem Risiko entsprechender Geschäftsgewinn erzielt werden muß, — Faktoren, die den Preis der Pflanzen wesentlich erhöhen müssen. Dagegen wirken wieder andere Momente günstig, preiserniedrigend: die große Menge der erzogenen Pflanzen, die Praxis und Erfahrung der Besitzer, die Anwendung aller Hülfsmittel in möglichst vollkommener Weise u. s. f. — Kurz alle jene Momente, welche G. Heyer für möglichste Konzentration der Pflanzenzuchtung ins Feld führt.¹⁾

¹⁾ Allg. F. u. J.-B. 1866. S. 205. (Siehe § 6 dieses Werckens.)

Allgemeine Grundsätze und Regeln der Pflanzenzucht.

Gattung	Alter	Fruchtbarkeits- zustand	Durchmesser= Baumstammesdurchmesser, Säulenheit (Holstein)	S. Hinsch, Forstverwalter a. D., Burg (R.-L. Siegen) (Prov. Brandenburg)		Baumfläche zu Wiesenbau
				Stammhöhe in cm	Pro Säule — Mutter	
Eiche (<i>Quercus pedunc. & sessilifl.</i>)	2	unverdorbt	15 — 30 40 — 70 150 — 200	6,00 22,00 20,00	8,00 17,00 80 — 150,00	3-jähr. 6,00 180,00
Rotbuche (<i>Fagus sylvatica</i>)	1	unverdorbt verdorbt	10 — 25 20 — 50 150 — 200	4,50 12,00 30,00	7,00 15,00 0,50 — 1 m 50,00	6,00
Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	1	verdorbt	20 — 40 50 — 100	7,00 20,00	3,00 3-jähr. 14,00	2-jähr. 6,00 3-jähr. 9,00
Fröbe (<i>Fraxinus excelsior</i>)	2	unverdorbt verdorbt	15 — 30 70 — 100	6,00 25,00	1 m hoch 50,00 8,50 16,00	350,00 8,00
Erle (<i>Alnus glutinosa</i>)	1	verdorbt	15 — 30	4,50	0,50 — 0,80 m 14,00	0,50 — 0,80 m 14,00
Ölkiefer (<i>Pinus sylvestris</i>)	3	verdorbt	40 — 65 100 — 150	12,00 30,00	11,00 25,00	1,60 — 2,00 m 150
Fichte (<i>Abies excelsa</i>)	1	starf	150	1,50	1,00	2,50 — 3 m 550
Fichte (<i>Abies pectinata</i>)	2	unverdorbt	5 — 20	1,10	2,50	0,25 — 0,40 m 12,00
Kiefer (<i>Larix europaea</i>)	3	verdorbt	10 — 30	2,50	0,50 — 1,00 m 16,00	1,50
Kiefer (<i>Pinus strobus</i>)	1	verdorbt	7 — 15	15,00	10,00	4-jähr. 18,00
	3	verdorbt	15 — 40	4,50	5,50	2-j. verdf. 12,00
	3	verdorbt	30 — 50	12,00	8,00	3-j. (start) 20,00
	3	verdorbt	200	18,00	16,00	
	1	"	5,00	300,00	300,00	
	3	verdorbt	7 — 20	15,00	15,00	
		"	20 — 50	15,00	15,00	

Zweiter Theil. Spezielle Regeln für Erziehung der einzelnen Holzarten im Saat- und Pflanzbeet.

§ 98.

Allgemeine Grörterungen.

Nachdem wir im ersten, allgemeinen Theil dieses Werkchens alle jene Grundsätze erörtert haben, welche für die Pflanzenzucht im Allgemeinen gelten, wird es nun Aufgabe dieses zweiten Theiles sein, die für Nachzucht der einzelnen Holzarten im Saat- und Pflanzbeet geltenden speziellen Regeln zu besprechen. Wir halten es hiebei nicht für unzweckmässig, zunächst die Bedeutung jeder derselben für den Pflanzkulturbetrieb, den Umfang, in welchem demgemäß ihre Nachzucht im Forstgarten erfolgt, einer kurzen Grörterung zu unterziehen und sodann erst anzugeben, wie diese letztere nach dem gegenwärtigen Stand der Praxis stattfindet, welche spezielle Maßregeln bei der Saat, der Verschulung, bei Schutz und Pflege durch die Eigenthümlichkeiten jeder Holzart bedingt werden. Es werden sich dabei einzelne Wiederholungen aus dem allgemeinen Theil nicht umgehen lassen, wenn wir für jede Holzart ein abgerundetes Bild ihrer Erziehung geben wollen, doch werden wir uns bemühen, diese Wiederholungen auf ein möglichst geringes Maß zu beschränken, so viel als möglich auf das im ersten Theil Gesagte zurückverweisen.

Die Eigenthümlichkeiten jeder Holzart aber, welche bei deren Anzucht im Forstgarten ins Auge zu fassen sind, denen bald mehr, bald weniger sorgfältig Rechnung zu tragen ist, wenn befriedigende Resultate erzielt werden sollen, werden folgende sein: Die Ansprüche an den Boden, dessen Frische, Güte, Lockerheit, an Schutz gegen Frost und Hitze, das Verhalten gegen Licht und Schatten — Verhältnisse, durch welche die Auswahl des Platzes für ein Saatbeet, die Zuweisung

der passendsten Dertlichkeit im größern Forstgarten bedingt wird; die Beschaffenheit des Samens, seine leichtere oder schwierigere Konser-
vierung, die Prüfung seiner Keimkraft, das nöthige Samenquantum pro Flächeneinheit; Zeit und Art seiner Aussaat, nöthige und resp.
zulässige Stärke der Bedeckung; Schutz und Pflege der Saat, der
jungen Pflanzen; zweckmäßige Zeit des Verbleibens im Saatbeet
bis zur Auspflanzung ins Freie oder zur Verschulung; Vornahme
dieser letztern, wiederholte Verschulung zum Zweck der Heisterzucht;
Pflege der Pflanzbeete und Heisterkämpe.

Es sind sonach eine nicht geringe Zahl von Faktoren, die der Pflanzenzüchter zu beachten hat, und denen wir in der nachstehenden Besprechung der einzelnen Holzarten unser Augenmerk zuzuwenden haben. Dabei wird es sich von selbst ergeben, daß jene Holzarten, welche im ausgedehntesten Maß Gegenstand des Anbaues in unseren Forstgärten sind, auch eine ganz besonders eingehende Besprechung finden — so Eiche,
Föhre, Fichte, — während die unwichtigeren, seltener erzogenen in Kürze abgehandelt werden, — so Hainbuche, Birke, Linde.

I. Abschnitt.

Die Laubholzer.

§ 99.

Die Eiche.

Die Eiche ist von allen Waldbäumen wohl der erste gewesen, dem Schutz und Pflege zu Theil geworden, für dessen Erhaltung und Nachzucht man Sorge getragen; ihre für Wild und Haustiere so hoch geschätzten Früchte, ihr treffliches und vielseitig verwendbares Holz waren es, denen sie solche Sorge zu danken hatte.

Auf mannigfachem Wege wurde und wird ihre Nachzucht angestrebt, und Saat wie Pflanzung, letztere von der einjährigen Pflanze bis zum 3 und selbst 4 Meter hohen Heister müssen zu derselben helfen; über keine Holzart ist in dieser Richtung wohl so viel geschrieben worden, steht uns eine so reiche Literatur zur Verfügung, als über die Eiche¹⁾.

¹⁾ Wir verweisen in dieser Richtung insbesondere auf die drei Spezialwerke:
von Schütz, die Pflege der Eiche. 1870;

Obwohl nun die Eiche durch ihre schon im ersten Lebensjahre beginnende starke Pfahlwurzelentwicklung der Verpflanzung manche Schwierigkeiten bereitet, die Verwendung von Wildlingen sehr erschwert, ein- und selbst zweimaliges Verschulen da nöthig macht, wo man stärkere Pflanzen verwenden will und muß: so war doch die Pflanzung der Eiche von jeher ein sehr verbreitetes Kulturverfahren und sog. Eichelgärtner fand man allenthalben in großer Ausdehnung, in Dertlichkeiten, wo sie am Platz, wie in solchen, wo sie ungeeignet und überflüssig waren¹⁾). Man strebte die Nachzucht der Eiche nicht selten in Dertlichkeiten an, für die sie nicht oder (bei gesunkenem Bodenkraft) nicht mehr paßte — es wurde vieler Orten ein Stück Eichen-Nothzucht getrieben! Die Mißerfolge blieben denn auch nicht aus und so manche ehemalige Eichenpflanzung liegt nun tief im Schoß einer Föhren- oder Fichtendickung begraben, in welcher nur einzelne Eichen-Fragmente von der früheren Kultur zeugen.

Mehr und mehr suchte man solche Fehler zu vermeiden, den Eichenanbau auf die besseren und unzweifelhaft geeigneten Dertlichkeiten zu beschränken; die Reinertragslehre mit ihren unerbittlichen Zahlen war der Nachzucht der Eiche mit ihren hohen Umltriebszeiten auch nicht sonderlich günstig und so hat die Eichenkultur in den letzten Jahrzehnten nicht unwe sentlich an Terrain verloren. Immerhin ist letzteres aber noch ein ziemlich ausgedehntes und noch sehen wir manch schönen Eichen-Horst und -Bestand entstehen, durch Saat wie durch Pflanzung.

Wo die Verhältnisse es gestatten, da gibt man bei der Nachzucht der Eiche insbesondere im Hochwald der Saat (Einstufung) jetzt meist den Vorzug als dem billigeren und naturgemäßeren Verfahren²⁾; das große Gebiet des Spessarts, berühmt durch seine Eichen, vermag zur Zeit auch nicht einen Eichelgarten aufzuweisen, wohl aber zahlreiche Eichenhorste jedes Alters, durch Einstufung mit bestem Erfolg begründet. Niemanden wird es heut zu Tage mehr einfallen, die Lücken in Buchenverjüngungen nach erfolgter Räumung mit Eichen auszupflanzen,

von Manteuffel, die Eiche. (2. Aufl.) 1874;

Geyer, die Erziehung der Eiche zum Hochstamm. 1870.

Auch Burkhardt (Säen u. Pflz. S. 1—98) bespricht sie sehr eingehend.

¹⁾ Die bahr. Regierung sah sich im Jahr 1862 zu der Verordnung veranlaßt: es sei der kostspielige Kulturluxus, welcher in vielen Revieren mit bleibenden Eichenpflanzgärtner noch immer getrieben werde, abzustellen, indem deren Zweck vielfach vollständiger und billiger durch Saat, oder durch kleine Saat- und Pflanz-Kampf-Anlagen erreicht werden könne. Forstl. Mitth. XI. S. 118.

²⁾ Die entgegengesetzte Ansicht spricht Manteuffel (die Eiche, S. 48) aus!

wie dies früher vielfach und sehr häufig mit mangelhaftem Erfolg geschah — das Nadelholz leistet uns hiezu sicherere und rentablere Dienste. Dagegen gibt es neben nicht wenig Vorteilshandlungen im Hochwald, welche der Pflanzung noch ein dankbares Feld bieten; so insbesondere bei stärkerem Wildstand oder im Wildpark, noch zahlreiche Mittel- und Niederwaldungen, vor Allem Eichenschädlaldungen, welche der Nachbesserung, der Rekrutirung des Oberholzes mittelst Pflanzung bedürfen, Hüttungen, die mit Eichenheistern besetzt werden sollen, — so ist die Eiche denn noch gar häufig und von allen Laubholzern wohl am meisten, Gegenstand des Anbaues im Forstgarten und wird es wohl auch bleiben. Ihre eingehendere Behandlung wird dadurch wohl gerechtfertigt.

Als Eigenthümlichkeiten der Eiche, welche bei deren Anzucht im Forstgarten vor Allem ins Auge zu fassen sind, erscheinen: der große, seine Saimekraft nur bei genügender Sorgfalt bis zum kommenden Frühjahr hinreichend bewahrende Samen, eine beliebte Nahrung für Mäuse, Hähner, Wild; die starke Pfahlwurzelentwicklung der jungen Pflanze schon im ersten Lebensjahr, das rasche Wachsthum der letzteren überhaupt auf dem ihr zugagenden, hinreichend frischen und kräftigen Boden; ihre Empfindlichkeit gegen Spätfröste; die Möglichkeit endlich, sie mit gutem Erfolg in jedem Alter, auch als starken Heister, zu verpflanzen.

Schon bei der Auswahl des Platzes für ein Eichenhaatbeet werden wir diese Eigenthümlichkeiten zu berücksichtigen haben: Dasselbe soll eine gegen Spätfröste möglichst geschützte Lage, einen frischen, kräftigen, hinreichend tiefgründigen Boden haben. Eine auf die verschiedenste Weise beantwortete Frage ist jene nach dem nothwendigen Maß der Tiefgründigkeit und bezüglich der Tiefe, bis zu welcher der Boden bearbeitet werden soll, um einerseits der jungen Pflanze genügendes Gedeihen zu sichern, anderseits einer übermäßigen, die seinerzeitige Auspflanzung und Verschulung erschwerenden Pfahlwurzelentwicklung entgegen zu wirken. Harnikell¹⁾ wählte für seine Eichenhaatbeete Boden mit thonigem Untergrund in 30—45 cm Tiefe, während Manteuffel²⁾ sandigen, humosen, tiefgründigen Lehmboden mit durchlassendem Untergrund und 45—60 cm tiefe Bearbeitung empfiehlt, E. Heyer³⁾ aber für Saat- und Pflanzbeete überhaupt eine noch tiefere Bearbeitung (75—100 cm) verlangt. Uns will weder die künstliche Beschränkung der Pfahlwurzelentwicklung durch thonigen Untergrund, noch eine zu tiefe Bodenlöcke-

¹⁾ Allgem. F.- u. J.-B. 1863. S. 365.

²⁾ Die Eiche. S. 80.

³⁾ Allgem. F.- u. J.-B. 1866. S. 208.

rung gefallen, welche diese Entwicklung geradezu begünstigt, — die von Schreiber¹⁾ ausgesprochene Ansicht, daß mäßige, etwa 30 cm tiefe Bodenlockerung und tüchtige Düngung dieser oberen Schichte sich als die vortheilhafteste Methode für Entwicklung eines guten Wurzelsystems — mäßige Pfahlwurzeln und zahlreiche Saugwurzeln — erweise, halten auch wir für die richtigste. Dieses Umgraben und dazu etwa wenig nahrhafter Boden erzeugt stets unverhältnismäßig lange, ungünstige Wurzelbildung und man kann es dann wohl erleben, daß zweijährige Eichen eine 60—70 cm lange Pfahlwurzel haben.

Besondere Sorgfalt wendet man der Auswahl des Saatgutes zu und verwendet gerne große, wohl ausgebildete Eicheln; angestellte Versuche²⁾ mit großen und kleinen Eicheln haben, wie wohl zu erwarten war, ergeben, daß erstere kräftigere Pflanzen lieferten. Da die Eicheln stets mit der Hand gelesen werden und hiebei die schon durch ihr äußeres Aussehen sich als schlecht, wurmstichtig, verklummt zeigenden zurückgelassen werden können, so ist die Beschaffung guter Eicheln für die Herbstsaaten nicht schwierig. Müssen dieselben aber bis zum Frühjahr aufbewahrt werden, so ist eine Sichtung derselben nötig, denn ohne Verlust an Keimkraft geht das Überwintern nicht ab. Das Aussießen der schlechten täuscht hiebei,³⁾ denn nicht wenige anscheinend gute Eicheln erweisen sich beim Durchschneiden als schlecht und unbrauchbar; am zweckmäßigsten dürfte das Scheiden der guten und schlechten mit Hilfe des Wassers sein: die schlechten und zu stark ausgetrockneten schwimmen oben auf. Mantefessel⁴⁾ bezeichnet zwar dies Mittel als unsicher, indem auch kleinere, keimfähige Eicheln nicht selten schwärmen; unsere eigenen Versuche zeigten sich aber der Methode günstig und auch Burkhardt⁵⁾ erklärt die obenauf schwimmenden mindestens für sehr verdächtig.

Das sicherste Mittel für Scheidung der guten von den schlechten Eicheln ist die für Frühjahrssamen zulässige und manchen Orts angewendete Ankeimung der Eicheln; man breitet dieselben auf ebenem, sonnigem Platz aus, deckt sie mit Laub oder einer alten Decke (Matte), und hält sie durch Angießen feucht. Sobald sie dann „den Keim im

¹⁾ Monatschr. f. d. J.-W. 1866. S. 435.

²⁾ Monatschr. 1880. S. 605. Krit. Blätter XLIX. 2. S. 101.

³⁾ Baur's Versuche (Monatschr. 1880. S. 605) mit sehr schönen überwinternten Eicheln ergaben ein Keimprozent von 73—80, obwohl bei der Sortirung derselben nach der Größe jedenfalls alle, durch ihr Aussehen sich als schlecht erweisende Samen beseitigt wurden.

⁴⁾ Die Eiche. S. 51.

⁵⁾ Säen u. Pflz. S. 52.

Munde haben", sät man sie ins Saatbeet, welch letzteres dann allerdings nicht zu trocken sein darf, event. feucht zu halten ist.

Man hat mit dem Abkeimen auch das Abkeimen in Verbindung gebracht, um hierdurch der Pfahlwurzel-Entwicklung entgegenzuwirken, indem man die Eicheln vor dem Legen bis 3 cm lange Keime treiben ließ und diese bis auf 1 cm Länge abschnitt.¹⁾ Unsre eigenen Versuche in dieser Richtung haben sich für dies Verfahren in so fern günstig erwiesen, als an Stelle einer Pfahlwurzel meist deren 2, ja 3 von etwas geringerer Länge, als jene der nebenan aus nicht abgekeimten Eicheln erzogenen Pflanzen, mit zahlreichen Saugwurzeln erschienen, also immerhin ein für die Verpfanzung günstigeres Wurzelsystem. Für den größeren Betrieb dürfte sich das Abkeimen aber doch als etwas umständlich erweisen, setzt auch Frühjahrssaat an Stelle der doch in sehr vielen Fällen vorzuziehenden Herbstsaat voraus, und der Gewinn ist, wie erwähnt, auch nur ein mäßiger. Das ungleichmäßig eintretende Keimen der überwinternten Eicheln — die eine zeigt oft erst die Keimspitze, während der Keim der andern schon mehrere Centimeter lang ist — erschwert die Anwendung des Abkeimens ebenfalls.

Um liebsten nimmt man die Aussaat der Eicheln im Herbst vor, um die Kosten und Gefahren der Überwinterung zu vermeiden; allein mancherlei Umstände: das Vorhandensein vieler Mäuse, nasse Herbstwitterung und früh eintretender Winter, spätes Eintreffen des etwa von auswärts bezogenen Saatgutes (es werden gegenwärtig bei ausbleibenden Mastjahren Saateicheln zur Bestellung der Saatbeete vielfach aus Ungarn und Slavonien bezogen!), endlich das etwa erst im Frühjahr erfolgende Räumen der zur Aussaat bestimmten Beete von ihrem Pflanzmaterial — nöthigen gleichwohl nicht selten zur Frühjahrssaat, ja es sind selbst Stimmen laut geworden, welche dieser letzteren unbedingt den Vorzug geben wollen,²⁾ indem man die aufbewahrten Eicheln leichter gegen alle Gefahren schützen könne, als die ausgesäten. Will oder muß die Frühjahrssaat angewendet werden, so ist eine sorgfältige Überwinterung der Eicheln zu möglichster Erhaltung der vollen Keimkraft nöthig, eine Sichtung des überwinterten Materials im Frühjahr nicht zu umgehen.

Zur Erhaltung der Keimfähigkeit ist es nun geboten, durch die Art und Weise der Aufbewahrung das Erhitzen der Eicheln und deren

¹⁾ Allgem. F.- u. J.-B. 1860. S. 449.

²⁾ Monatschr. f. d. F.- u. J.-W. 1870. S. 471.
Genth, Doppelte Riesen. 1874.

Kreimung im Winterlager zu verhindern, ebenso aber auch zu starkes Austrocknen. Das Keimen im Winterlager macht die Eicheln allerdings nicht zur Saat unbrauchbar, wenn die Kernstücke noch entsprechend frisch sind, und abgestoßene Keime ersezten sich wieder — man schneidet ja, wie oben erwähnt, bisweilen die Keime absichtlich ab; allein solche gekeimte Eicheln sind mit Vorsicht zu behandeln, dürfen nicht mehr trocken werden,¹⁾ und wenn die Keime weich, schwarzfleckig, faulig sind, so sind die betreffenden Eicheln natürlich unbrauchbar. Unsere beiden Eichelarten verhalten sich übrigens nach manchen Beobachtungen bezüglich des Aufbewahrens verschieden,²⁾ indem die Traubeneiche viel leichter keimt, viel mehr dem Verderben während des Winters ausgesetzt ist, als die Frucht der Stieleiche.

Gutes Abtrocknen nach dem Einsammeln ist für die zu überwinternden Eicheln von besonderer Wichtigkeit. Das Aufbewahren selbst geschieht nun in mannigfaltiger Weise: in Gruben oder Haufen, wobei die Eicheln mit Sand gemischt oder in wechselnden, nicht zu starken Lagen von Eicheln und Stroh aufgeschichtet und die Haufen mit einer Decke von Laub oder Nadelholzreisig gegen die Kälte geschützt werden; oder — nach der sogenannten Alemann'schen Methode³⁾ — durch Aufschütteten der Eicheln ohne jede Mischung in einem 0,30 m tiefen Graben auf trockenem Platz, welcher ein leichtes mit Stroh, Reisig u. dgl. gedecktes Giebeldach von der Höhe erhält, daß ein Mann gebückt darunter stehen kann. Die fußhoch aufgeschütteten Eicheln werden in dem Graben öfters umgeschaufelt, zu welchem Zweck ein reichlich meterlanges Stück desselben leer bleibt; bei eintretender strengerer Kälte werden die Giebel mit Strohbünden zugestellt und das Dach verstärkt. Kleine zu überwinternde Quantitäten schüttet man wohl einfach auf einer trocknen Tenne (nicht Bretterboden!) dünn auf, deckt sie mit Stroh und schaufelt sie von Zeit zu Zeit um. Schutz gegen Mäuse ist den zu überwinternden Eicheln sehr nöthig, und wird das Umlegen mit Wachholderreisig als sichereres Mittel empfohlen.⁴⁾ — Im Allgemeinen wird man jenen Methoden, bei welchen man sich jederzeit vom Zustand der Eicheln überzeugen kann, den Vorzug geben, also der oberirdischen Aufbewahrung vor jener in Gruben.

Eine ganz eigene Methode der Eichelaufbewahrung empfiehlt Genth,⁵⁾

¹⁾ Gayer, Forstbenutzung. 4. Aufl. S. 496.

²⁾ Monatschr. f. d. F.- u. F.-W. 1870. S. 471, und Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 51.

³⁾ Alemann, über Forstkulturwesen. 1861. S. 22.

⁴⁾ Geher, die Erziehung der Eiche. S. 24.

⁵⁾ Doppelte Riesen. S. 56.

der auf die Erhaltung entsprechender Feuchtigkeit in der Eichel besondern Werth legt. Derselbe schüttet die gesammelten Eicheln auf einer grafigen Fläche dünn auf und läßt sie so lange liegen, bis sie mit Wasser gesättigt sind, dann werden sie in weit geflochene Weidenkörbe eingefüllt, mit Stroh oder Sackleinen zugedeckt und in einem Raum zu ebner Erde mit gutem Luftzug eingestellt. Sobald die Eicheln anfangen, ihr Wasser zu verlieren, was sich in der matten Farbe und Vermindehung des Gewichts zu erkennen gibt, werden sie wieder auf eine grafige Fläche, selbst auf Schnee, ausgeschüttet, um sich wieder mit Wasser zu sättigen, ein Verfahren, das öfters wiederholt werden muß und dessen Erfolg Genth als vollkommen sicher bezeichnet.

Die Aussaat selbst geschieht jetzt wohl allenthalben in Rillen, nirgends mehr als Vollsaat. Mit Rücksicht auf die rasche Höhenentwicklung der jungen Eiche, welche im ersten Lebensjahre schon 30 cm und selbst mehr beträgt und eben so viel unter günstigen Verhältnissen im zweiten Jahr, werden die Rillen etwa 25 cm entfernt von einander gezogen. Diese Entfernung der Rillen gestattet leicht ein Betreten der Zwischenräume durch Arbeiter beim Reinigen und Lockern, und man wählt deshalb für die Eichesaat meist statt der Beete größere Ländere, um die hier entbehrlichen Zwischenwege zu ersparen. Die Rillen werden nach der Schnur mit einer leichten Haue oder dem Rillenzieher in entsprechender Tiefe — entsprechend der zu gebenden Bedeckung — gezogen und beträgt letztere nach Baur's Versuchen (§. § 51) am besten 3—6 cm; man wird sonach, mit Rücksicht auf die Stärke der Eichel, die Rillen 4—7 cm tief anfertigen und für leichteren Boden die größere, für schwereren die geringere Tiefe wählen. Das Decken erfolgt bei leichterem Boden durch Einziehen der seitlich der Rille aufgehäuften Erde mit hölzernem Rechen, bei schwerem Boden empfiehlt sich das Ausfüllen der Rille mit lockerer guter Erde, Dammerde u. dgl., während die ausgehobene Erde auf dem Zwischenraum mittels des Rechens vertheilt wird.

Das Einlegen der Eicheln in die Saattrille geschieht stets ohne weitere Säevorrichtung mit der Hand, Eichel an Eichel, bei sehr gutem Samen oder wenn die Eicheln zweijährig im Saatbeet werden sollen, wohl besser in Entfernungen von 2—3 cm, und mißt man hierbei dem wagrechten Einlegen der Eicheln von manchen Seiten besondern Werth bei. So giebt v. Schütz¹⁾ an, daß bei nach oben gerichteter Spitze, an welcher bekanntlich Stengelchen und Würzelchen hervorbrechen, die Wurzel sich erst mühsam nach unten krümmen müsse und sich schlechter entwickle,

¹⁾ Die Pflege der Eiche. S. 6. Vergl. auch Heyer, Waldbau. S. 146.

während bei nach unten gerichteter Spitze zwar die Wurzel eine normale Lage habe, der Stengel dagegen erst nach längerem Kampf verspätet und fadenförmig erscheine.¹⁾ Ein von uns hierüber angestellter vergleichender Versuch hat uns jedoch diese Befürchtungen als ungegründet erscheinen lassen; sowohl die mit der Spitze, wie die mit der Basis nach unten in den Boden gesteckten Eicheln zeigten in der Entwicklung der aus ihnen hervorgegangen Pflanzen keinerlei Zurückbleiben gegenüber den zur Vergleichung nebenan aus horizontal gelegten Eicheln erzogenen. Im ersten Fall zeigte das Stämmchen, in letzterem das Würzelchen eine durch das Herumwachsen um die Eichel entstandene leichte und wohl bald ganz verschwindende Krümmung, für das weitere Gedeihen der Pflanzen sicher ohne jeden Einfluß.

Die pro Ar nötige Samenmenge hängt von der oft außerordentlich verschiedenen Größe der Eicheln — nach Baur's Versuch²⁾ enthält ein Hektoliter großer Stieleicheln 11 500, mittlerer 14 900, kleiner 20 900 Stück, ein Hektoliter großer Traubeneicheln 26 300, kleiner 41 600 Stück, — der Entfernung der Saatrisse, dem engern oder weitern Legen der Eicheln ab und schwankt um deswillen sehr bedeutend. Das mag denn auch der Grund sein, weshalb sich Angaben über die pro Ar Saatbeetfläche nötige Samenmenge weder bei Burkhardt, noch in den der Eichenerziehung speziell gewidmeten Schriften von Schüz, Manteuffel, Geyer finden.

Geyer³⁾ giebt dieselbe auf 0,10—0,25 hl pro Ar an, also in ziemlich weiten Grenzen, offenbar mit Rücksicht auf oben berührte Verhältnisse; ähnlich ist die Angabe in Zudeichs Forstkalender, und würden, wenn wir das Gewicht eines Hektoliters Eicheln zu etwa 80 kg annehmen, pro Ar nur 8 bis 20 kg nötig sein. Nach unsern eigenen Versuchen bedürften wir pro Ar Saatfläche (also ohne Wege), bei einer Entfernung der Rillen von 30 cm, in welch letztere die Eicheln — schönes, großes Saatgut — in je 3 cm Entfernung eingelegt wurden, 37 kg, also ein viel höheres Quantum.

Was nun den Schutz der Saatbeete betrifft, so wäre zunächst zu erwähnen, daß bei fehlendem Hochwild- und geringem Rehstand Eichelsaatkämpe einer Einfriedigung wohl entbehren können; Hasen verbeißen die jungen Pflanzen nur selten und auch die Rehe ziehen andere Holz-

¹⁾ Wäre dies der Fall, dann würde das Einstufen der Eicheln mit dem Steckholz, dem von Burkhardt erwähnten Steckbrett als unzweckmäßig zu erklären sein.

²⁾ Monatsscr. f. d. F. u. F.-W. 1881. S. 607.

³⁾ Waldbau. S. 422.

arten vor.¹⁾ — Dagegen sind dieselben gegen Mäuse und H äher zu schützen, und es gilt dies vor Allem für die während des langen Winters durch beide Thiere gefährdeten Herbstsaaten; zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir auf das in § 66 und 67 Gesagte.

Oberförster Ahrends empfiehlt²⁾ das Decken der im Herbst ange-säten Beete mit Laub oder Nadelreisig, da sonst bei häufig wechselnder Temperatur — starkem Frost und mildem Wetter — die Eicheln im Winterlager gerne verdürben. Ebenso hat man auch durch Aufbringen einer solchen Decke nach eingetretenem starken Frost die Erwärmung des Bodens und mit derselben die Keimung zu verzögern gesucht, um die jungen Eichen in minderem Maß der Gefahr des Spätfrostes auszusezzen. In beiden Fällen ist aber nicht aus dem Auge zu verlieren, daß durch eine solche Laub- oder Reisigdecke die Mäusegefahr außerordentlich erhöht wird!

Gleichen Schutz gegen die Spätfrostgefahr sucht man durch etwas späte Frühjahrszaat — im Mai — zu erreichen, doch setzt dieselbe sehr sorgfältige Überwinterung der Eicheln voraus; die Pflänzchen erscheinen erst im Juni und sind dadurch für dieses Frühjahr allerdings vor jener Gefahr sicher. — Frühzeitig erscheinenden Herbstsaaten würde man den nöthigen Schutz durch Gitter oder Reisig geben. Gegen Trockenheit bedarf der tiefstliegende und selbst viel Feuchtigkeit enthaltende Samen eben so wenig besondern Schutzes, wie die sofort tief wurzelnde und durch die Rothyledonen kräftig ernährte junge Pflanze.

Die ein- und mehrjährigen Pflanzen leiden im Herbst und Winter nicht selten durch Frühfrost oder stärkeren Winterfrost, durch welche die nicht genügend verholzten sogenannten Johannistriebe getötet werden; doch ist der Nachtheil nur ein mäßiger, und übernimmt die oberste unversehrt gebliebene Seitenknospe die neue Gipfelbildung. Auch ein gänzliches Erfrieren der Wurzeln einjähriger Eichen durch anhaltenden starken Winterfrost bei fehlender Schneedecke wurde schon konstatirt³⁾ und Deckung des Bodens mit Laub würde als Mittel gegen diese, allerdings seltene, Beschädigung dienen. Durch Barfrost sind die tiefwurzelnden Eichenpflanzen in keiner Weise gefährdet.

Die Pflege der Eichensaatbeete beschränkt sich zunächst auf das Reinhalten von Unkraut und das für alle Pflanzen so wohlthätige wiederholte Lockern des Bodens zwischen den Pflanzenreihen. Merk-

¹⁾ In hiesiger Gegend werden bei ziemlich gutem Stand an Hasen die Eichenkämpe vielfach uneingefriedigt belassen.

²⁾ Burkhardt. A. d. Walde. III. S. 178.

³⁾ Allgem. F.- u. J.-Btg. 1870. S. 409.

würdiger Weise spricht sich Manteuffel¹⁾ gegen das Behacken der Saat- und Verschulungsbeete aus, „weil durch das Behacken die oberen Wurzeln der Pflanzen vielfach abgehauen werden, die öfters gelockerte Bodenoberfläche leicht austrocknet und hiedurch Veranlassung gegeben wird, daß sich die Pflanzen mehr nach unten hin bewurzeln“. Wir thieilen diese Besürchtungen nicht; — wäre insbesondere deren erste richtig, dann dürfte man die Saat- und Pflanzbeete der flachwurzelnden Eiche wohl noch viel weniger behacken! — Auch Einbringung einer dichten Laubdecke auf die Zwischenräume nach erstmaliger Reinigung und Bodenlockerung hat man zur Unterdrückung des Unkrautes, eventuell auch zum Frischherhalten des Bodens angewendet.

Um die jungen Eichen zu möglichst kräftiger Entwicklung zu bringen, wurde auch neuerdings das sogenannte *Pinciren* — Abschneiden des oberirdischen Keimes 5—6 Tage nach seinem Erscheinen — angewendet und auf der Pariser Weltausstellung zur Anschauung gebracht;²⁾ es soll sich hierdurch zuerst das Wurzelsystem kräftig ausbilden und mit dessen Hülfe sodann der nach einiger Zeit erscheinende neue Stengel sich sehr kräftig und üppig entwickeln. Nach andern Mittheilungen³⁾ hat sich dies Verfahren jedoch nicht bewährt, indem bei vergleichenden Versuchen die nicht pincirten Pflanzen entschieden kräftiger wurden. — Für den größern Forsthaushalt würde sich das Verfahren wohl ohnehin nicht gut ausführbar erweisen.

Ein Beschneiden der Neste findet in den Eichen-saatbeeten, in welchen die Pflanzen in der Regel ein bis höchstens zwei Jahre verbleiben, nicht statt und selbst das Abstoßen der erfrorenen Johannistriebe überläßt man zumeist der Natur. — Dagegen hat man eine für die Verpflanzung günstigere Wurzelbildung ohne die immerhin kostspieligere Verschulung dadurch zu erreichen gesucht, daß man zu Anfang des zweiten Lebensjahres der Pflanze die Pfahlwurzel auf eine Länge von etwa 10—15 cm durch Abstoßen mit scharfem Spaten von der Seite her kürzt. Die Urtheile über dies Verfahren sind verschieden: Laurop⁴⁾ versichert, gute Erfahrungen damit gemacht zu haben, Schreiber⁵⁾ dagegen tadeln dasselbe als ein unsicheres Verfahren, bei welchem ein Abschinden und Quetschen der Wurzeln, zumal wenn der Spaten nicht

¹⁾ Die Eiche. S. 85.

²⁾ Centralbl. 1879. S. 97.


³⁾ Centralbl. 1880. S. 381.

⁴⁾ Monatschr. f. d. F.- u. J.-W. 1861. S. 129.

⁵⁾ Monatschr. f. d. F.- u. J.-W. 1861. S. 296.

sehr scharf ist, nicht zu vermeiden sei; Burkhardt¹⁾ sagt jedenfalls sehr richtig: „in geschickter Hand sind damit gute Erfolge erzielt worden, andernfalls und mit stumpfem Instrument desto schlechtere“. —

Ein von uns angestellter Versuch, bei welchem den Eichen am Beginn des zweiten Lebensjahres, im April, mit scharfem Spaten die Pfahlwurzeln etwa 12—15 cm tief abgestoßen wurden, ergab ein sehr



Figur 37.

Pfahlwurzel einjährig verschulten Pflanzen (c) vielfach zeigten. — Auch die oberirdische Entwicklung der in obiger Weise behandelten Pflanzen ließ nichts zu wünschen übrig; die Bildung der Johannistriebe war zwar in den Reihen mit abgestoßenen Wurzeln etwas später erfolgt, so daß sie sich von den Reihen mit ungekürzten Wurzeln anfänglich deutlich unterschieden, bis zum Herbst war jedoch dieser Unterschied vollständig verschwunden. Den aus gleichem Beet genommenen und verschulten Pflanzen waren sie am Ende des ersten Jahres (1881) weit voraus.

Unbedingt wird sich dies Abstoßen der Wurzeln empfehlen, wenn

günstiges Resultat, wie nebige Figuren zeigen, einige der kräftigsten Pflanzen des betreffenden Saatbeets darstellend. An Stelle der in den Nachbarreihen am Ende des Jahres 50 bis selbst 70 cm langen, an Saugwurzeln ziemlich armen Pfahlwurzeln (a) war ein vorzügliches Seiten- u. Saugwurzelsystem (b) getreten, wie man sich ein solches für gesicherte Verpflanzung nur wünschen kann; ein Wurzelsystem, das viel günstiger erscheint, als jenes, welches die nebenan mit gekürzter

¹⁾ Säen u. Pflz. S. 74.

man durch irgend welche Veranlassung genötigt wäre, zweijährige Eichen noch ein Jahr im Saatbeet stehen zu lassen. Das obige Resultat würde vielleicht überhaupt die Frage nahe legen, ob sich durch sorgfältig ausgeführtes Abstoßen der Pfahlwurzeln einjähriger, nicht zu eng stehender Eichen kräftige, dreijährige Eichenpflanzen, wie sie zu manchen Kulturen wünschenswerth sind, nicht billiger und doch eben so gut erziehen ließen, als durch das immerhin theure Verschulung? —

Wo sich wächtere Eichenpflanzen genügen: zur Ausfüllung nicht zu kleiner Lücken im Nieder- und Mittelwald, zur Kulturausführung da, wo Hochwild (vor Allem Sauen) die sonst zulässige Saat unmöglich machen¹⁾ u. s. f. nimmt man dieselben ein- oder zweijährig aus den Saatbeeten und pflanzt sie, erstere oft und letztere immer mit gekürzten Wurzeln, ins Freie. Sind aber stärkere Pflanzen nöthig, so greift man zur Verschulung.

Die Verschulung der Eiche, theils zur Erziehung kräftiger, etwa meterhoher Lohdenpflanzen, theils zur Nachzucht starker, selbst 3—4 m hoher Heister, findet in ziemlich ausgedehntem Maße statt; neben der Gewährung eines größern Standraumes, dem allgemeinen Grund jeder Verschulung, ist es namentlich auch die Nothwendigkeit einer Korrektur der für die Verpflanzung in höherem Alter höchst ungünstigen Pfahlwurzelbildung der Eiche, welche zur ein- und selbst zweimaligen Verschulung nöthigt.


Für Tiefgründigkeit und sonstige Beschaffenheit des Bodens im Pflanzbeet, für Tiefe der Bodenbearbeitung gelten die gleichen Regeln wie für das Eichensaatbeet — mäßige Tiefe und fruchbarer oder gut gedüngter Boden. — Man verschult mit Rücksicht auf die Stärke, welche die Pflanzen bereits haben und im Pflanzbeet erreichen sollen, in Reihenabständen von 30—35 cm und Pflanzenabständen von 20—25 cm, und wählt zur Verschulung mit Rücksicht auf diesen größern Reihenabstand größere Länder an Stelle der Beete.

Den ausgehobenen, ein- oder zweijährigen Pflanzen — man zieht aber bei normaler Entwicklung die einjährigen vor — stützt man, um die Bildung von Seitenwurzeln an Stelle der die spätere Ausspflanzung außerordentlich erschwerenden Pfahlwurzel hervorzurufen, diese letztere mehr oder weniger stark ein. Neben Zulässigkeit, Grad, Erfolg dieses Einstüzens gehen die Ansichten der Eichenzüchter nicht unbedeutend auseinander.

¹⁾ Vor einigen Jahren mußte man im sog. Pfälzerwald die Einmischung der Eiche in die Buchenbestände durch horstweise Einpflanzung einjähriger Eichen erstreben, da das zahlreich gewordene Schwarzwild jede Saat vernichtete.

Aleemann¹⁾ will die Eichen überhaupt nur mit ganzer, unbeschädigter Pfahlwurzel verpflanzen, verwirft alles Einstuhen derselben, wodurch die Entwicklung der Pflanze, ihr Höhenwuchs vor Allem entschieden nothleiden müsse. Auch Schreiber²⁾ will die Pfahlwurzel möglichst erhalten wissen. Den schroffsten Gegensatz hierzu bildet wohl Manteuffel,³⁾ welcher den zweijährigen Saatpflanzen beim Verschulen die Pfahlwurzel bis auf 3 cm einkürzen will — ein doch gar zu radikales Verfahren! Die Mehrzahl der Eichenzüchter, so insbesondere auch Altmeister Burkhardt,⁴⁾ stuhen die Pfahlwurzel auf etwa 15 cm Länge zurück, beachten hiebei jedoch den Sitz des möglichst zu schonenden Hauptseitengewürzels und schneiden erst unterhalb desselben die Wurzel ab. Die Erfahrung zeigt denn auch, daß eine derartige Behandlung einerseits den Wuchs der Pflanze nur wenig beeinträchtigt, andererseits den gewünschten Erfolg — Herorufen mehrerer Seitenwurzeln an Stelle der einen Pfahlwurzel — mehr oder weniger erreichen läßt.

Mehr oder weniger — denn wie Schütz ganz richtig sagt⁵⁾, strebt die Pflanze, die verlorenen Theile möglichst rasch wieder zu ersetzen und die an der Abschnittsstäche erscheinenden 2—4 Seitenwurzeln streben gleichfalls wieder nach der Tiefe, so daß bei der seinerzeitigen Auspflanzung oder Verschulung in den Heisterkamp ein abermaliges Einstuhen nöthig wird. Schütz empfiehlt daher ein Umkrümmen



Figur 38.

der Pfahlwurzel, ja selbst ein knotenförmiges Verschlingen (Figur 38), wovon keinerlei üble Folgen für die Pflanze zu fürchten seien. Was sich Pflanzen bezüglich des Verkrümmens der Wurzeln ohne allzugroße Benachtheiligung ihres Wuchses bieten lassen, hat Borggreve durch seine mit zweijährigen Eichen angestellten Versuche⁶⁾ nachgewiesen.

— Immerhin aber werden jene zwei und mehr sich bildenden stärkeren Seitenwurzeln mit ihren zahlreichen Saugwurzeln selbst bei nochmaliger Kürzung sich günstiger verhalten,

als die eine Pfahlwurzel, insbesondere wenn letztere nicht zu lang belassen wurde, so daß diese Seitenwurzeln nicht zu tief sitzen, kein zu

¹⁾ Über Forstkulturwesen. S. 30, 34.

²⁾ Monatsschr. f. d. F.- u. J.-W. 1860. S. 435.

³⁾ Die Eiche. S. 83.

⁴⁾ Säen u. Pflz. S. 76.

⁵⁾ Die Pflege der Eiche. S. 78. Auch Manteuffel, die Eiche. S. 58.

⁶⁾ Forstl. Blätter. 1878. S. 306.


starkes Zurückschneiden bei dem seinerzeitigen Verpflanzen erfordern. Letzteres hat wohl Manteuffel im Auge, wenn er die Pfahlwurzel in so starker Weise, wie oben erwähnt, zurückschneidet, und das möchten wir auch der Ansicht Borggreves gegenüber geltend machen, welcher, die Bezeichnung eines Wurzelschnitts bei der Verschulung anerkennend, sagt:¹⁾ „Für einen Heister müssen wir ein sußtiefes Pflanzloch machen — es liegt also gar kein Grund vor, jungen Eichen mit zwei Fuß langen Pfahlwurzeln bei der Verschulung mehr als die Hälfte dieser Pfahlwurzel zu nehmen.“

Im Uebrigen möchten wir hier nochmals auf die viel günstigere Wurzelbildung beim Abstoßen der Pfahlwurzel gegenüber jener bei der Verschulung (Fig. 37) hinweisen. —

Auch darüber, welche Korrekturen mit Messer oder Scheere — die Dittmar'sche Astscheere ist wohl zu allen Ast- und Wurzelkorrekturen das zweckmäßigste Instrument! — an den Stämmchen der ein- oder zweijährigen Eichen vorzunehmen seien, gehen die Ansichten der Eichenzüchter nicht unwe sentlich auseinander. Burkhardt will²⁾ nur etwa schwächliche Johannistriebe, überzählige Gipfel wegnehmen, sonst aber an den kleinen Pflanzen möglichst wenig schneiden, während eine von der preußischen Regierung im Jahr 1865 veröffentlichte „Anleitung über das Verfahren bei dem Schneideln der Eiche in Pflanzkämpen“³⁾ (verfaßt bei der Regierung in Trier) ausspricht: „eine ganz sorgfältige Schneidelung der Eiche gerade in einjährigem Alter sei die Grundlage für die künftige Ausbildung des Stämmchens.“

Nach dieser Anleitung soll nun jede ausgehobene Pflanze vor dem Einschulen genau besichtigt und an derselben je nach Befund die eine oder andere der nachfolgenden Operationen vorgenommen werden:

1. Ein Ausbrechen der am Ende des Gipfeltriebes oft sehr gehäuft stehenden Seitenknospen, um dadurch die Entwicklung der Hauptknospe zu befördern, quirlartige Gipfelsbildung zu vermeiden. Die Knospen



Figur 39.

¹⁾ Forstl. Blätter. 1878. S. 306.

²⁾ Säen u. Pflz. S. 76.

³⁾ Allgem. F.- u. F.-Z. 1866. S. 270.

müssen zu dieser Operation gut ausgebildet sein, so daß sie sich leicht auslösen; bei Johannistrieben pflegt dies nicht der Fall zu sein.

2. Unreife Johannistriebe werden bis auf eine gute Seitenknospe zurückgeschnitten, und bei sehr gehäuftter Knospenbildung am Ende des Triebes schneidet man denselben ebenfalls oberhalb einer kräftigen Seitenknospe ab.

3. Ueberzählige Gipfeltriebe werden, unter Aussonderung der geeignetsten zum bleibenden Höhentrieb, entfernt oder zurückgestutzt. (Die Abbildungen Figur 39 sind jener Instruktion entnommen.)

Wir gehören zu jenen, welche gleich Burkhardt an den zu verschulden Eichen, namentlich den erst einjährigen, wenig zu schneiden finden und das Beschneiden als einen Theil der Pflege im Pflanzbeet betrachten. Insbesondere dürfte das Ausbrechen der Knospen denn doch ein zeitraubendes und mißliches Geschäft sein!

Das Einschulen der Pflanzen nach erfolgter Pfahlwurzelfürzung erfolgt entweder durch Einlegen in Gräbchen, welche nach einer Schnur mit der Haue hinreichend tief gezogen werden, und Festspringen mit der Hand, oder mit Hülfe eines genügend starken Seeholzes (Buttlar'schen Eisens), auch eines Keilspatens, wobei man sich zur Arbeitsförderung und um das Zusammentreten des gelockerten Bodens beim Arbeiten auf den Ländern zu vermeiden, zweckmäßig des § 82 beschriebenen Pflanzbrettes bedient.

Die Pflege, welche man den verschuldeten Eichen angedeihen läßt, beschränkt sich im ersten Jahre auf entsprechende Lockerung des Bodens und Reinigung der Beete von Unkraut; im zweiten und eventuell dritten Jahr dagegen, welches die Eiche im Pflanzbeet bringt, wird Angesichts der großen Neigung derselben zur Astverbreitung auf Kosten des Höhenwuchses, der Pflege durch richtiges Beschneiden ein ziemlich weites und dankbares Feld geboten sein. Während ihres Verbleibens im Pflanzbeet, welches sich nur ausnahmsweise über mehr als drei Jahre erstrecken wird, soll die Eiche jene Gestalt erhalten, welche man bei ihrer Verwendung ins Freie oder der Umschulung in den Heisterkamp fordert, so daß bei dem Verpflanzen oder Umschulen keinerlei Beschneiden nötig wird.

Es sind sonach (am besten mit Hülfe der Dittmar'schen Astscheere) starke und tiefangesetzte Seitenäste, sowie etwaige Doppelwipfel durch einen Schnitt hart am Stämmchen zu entfernen, schwächere Seitenäste zu kürzen und auf eine stufige Gestalt des Stämmchens hinzuwirken. Wir können bezüglich der Vornahme dieser Operationen auf das im § 90 Gesagte zurückverweisen — es bezieht sich dasselbe in erster Linie auf

die Eiche, als auf jene Holzart, bei welcher das Beschneiden am meisten nothwendig ist und zur Ausführung kommt.

Schutzmittel gegen Spätfröste, unter denen in rauheren Lagen die Eichen nicht selten leiden, lassen sich für die starken Pflanzen des Pflanzbeets nicht wohl mehr in Anwendung bringen; der beste Schutz, den die gegen Spätfröste empfindliche Eiche genießt, besteht in ihrem spät erfolgenden Ausschlagen, so daß es doch nur besonders spät eintretende Fröste sind, die sie gefährden.

Nach 2—3jährigem Stehen im Pflanzkampf und sonach in einem Gesamtalter von 3—5 Jahren wird die Eiche stets jene Höhe und Stärke erreicht haben, um entweder als kräftige Pflanze ins Freie verwendet werden zu können, oder um des abermaligen Umschulens, der Gewährung größeren Standraumes zu bedürfen, wenn es sich um Erziehung von Heistern handelt.

Bezüglich der allgemeinen Grundsätze und Regeln für Heistererziehung verweisen wir auf § 83 und bemerken, daß die früher häufiger betriebene Eichenheisterzucht Angesichts der bedeutenden Kosten, welche die Erziehung und Verwendung von Heistern verursacht, gegenwärtig aufs Nothwendigste beschränkt wird. Die Beplantung von Hüttplächen, die Ergänzung des Oberholzes im Mittelwald, die Ausfüllung einzelner Lücken am Bestandsrand¹⁾ sind es, für welche sich noch die Verwendung des Eichenheisters, des etwa 2 m hohen Halbheisters, des 3 bis selbst 4 m hohen Vollheisters empfehlen kann.

Nur ausnahmsweise²⁾ wird man Heister direkt aus Saaten oder natürlichem Aufschlag entnehmen können; die Pfahlwurzelbildung der Eiche steht dem entgegen und auch die Beastung und Bekronung solcher Wildlinge wird nur selten entsprechen. Wo Heister benutzt werden, wird dies fast immer geschehen mit Stämmchen, welche im Saatbeet erzogen, 1 oder 2jährig mit gekürzter Wurzel verschult und nach abermals 2 bis 3 Jahren unter nochmaliger Wurzelkorrektur in die Heisterschule gebracht wurden — ja zur Erziehung sehr starker Heister findet bisweilen selbst eine dritte Verschulung statt. — Heister dadurch erzielen zu wollen, daß man die Pflanzen gleich bei der erstmaligen Verschulung in weitem Verband einpflanzt, oder daß man von den enger verschulten Pflanzen je die zweite Reihe und Pflanze zur Gewährung des nöthigen größeren Standraumes aushebt, wie dies etwa für Ahorn und Esche geschieht, ist bei der Eiche nicht wohl zulässig:

¹⁾ Aus dem Walde. V. S. 130.

²⁾ Aus dem Walde. III. S. 178.

ihre große Neigung zur Astbildung spricht gegen ersteres, die wiederholt nothwendige Wurzelkorrektur gegen ersteres und letzteres Verfahren.

Bei der zweiten Umschulung wird man alle minder schönen Stämmchen zu anderweiter Verwendung ausscheiden, die zu stark nach der Tiefe oder Seite gehenden Seitenwurzeln einer entsprechenden, auf das nothwendige Maß beschränkten Kürzung unterwerfen, an den Stämmchen selbst aber möglichst wenig schneiden — das Beschneiden der Äste soll theils im Jahr vor der Umschulung, im Uebrigen aber nach erfolgter Anwurzelung im Heisterkamp erfolgen. Ueber die Entfernung, welche den Pflanzen zu geben ist, die Art des Einpflanzens u. dgl. mehr, ist bereits in § 83 das Nöthige gesagt.

Bezüglich der Pflege des Heisterkamps steht nun das für die Eiche geradezu unentbehrliche Beschneiden und mit Hülfe desselben die Heranbildung einer möglichst günstigen Bekronung obenan. Man sucht eine nicht zu hoch ange setzte, möglichst pyramidalen Bekronung zu erzeugen und vermeidet rutenförmiges Aufschneiden; Erziehung stufiger Stämmchen ist mit Rücksicht auf deren spätere Einzelstellung vor Allem im Auge zu behalten. Auch hier verweisen wir im Uebrigen auf § 90, welcher die Pflege der Pflanzen durch Beschneiden bespricht.

Im Weiteren sind die Heisterkämpe durch Reinigen von Unkraut und Lockern des Bodens zu pflegen; ersteres kann natürlich mit minderer Sorgfalt, als bei schwächeren Pflanzen, geschehen, das Lockern aber erfolgt tiefer, mit kräftiger Haue, und grobscholliger. Auch Laubestreudung zur Unterdrückung des Unkrautes, Feuchterhaltung des Bodens und etwa selbst Düngung wird von manchen Eichenzüchtern angewendet und der Erfolg gerühmt.¹⁾ Eine Zwischendüngung mit guter Walderde, Rasenashé oder Mineraldüngern, je nach der Beschaffenheit des Bodens, wird sich für längere Zeit im Heisterkamp stehende Pflanzen überhaupt nicht selten empfehlen.

Als einen Feind der Eichenpflanzschule bezeichnet Burkhardt²⁾ die Wühlmaus, welche selbst stärkere Pflanzen in der Erde abnagt und durch Fangen, Vergiften, Ausdampfen zu beseitigen ist; Schütz heilt mit,³⁾ daß die große Waldameise besonders die umgeschulten und sich dadurch spät entwickelnden Eichen heimsuche und jeden Blattkeim abnage, weiß aber keine Hülfe gegen diesen Feind. Maikäfer sind zu sammeln und zu vernichten.

¹⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 78. Schütz, d. Pflege d. Eiche. S. 69.

²⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 78.

³⁾ Schütz, Pflege d. Eiche. S. 72.

Je nach der Stärke und Höhe, welche der Heister erlangen soll, wird die Eiche 4—6 Jahre im Heisterkamp stehen und sonach ein Alter von 7—11 Jahren bis zu ihrer Verwendung erreichen. Einzelne Eichenzüchter¹⁾ nehmen sogar zur Erziehung starker Heister eine dritte Verschulung in meterweitem Verband vor, nachdem die Pflanzen drei Jahre in der Heisterschule gestanden. — Die Kosten der Heistererziehung erfahren hiedurch allerdings eine nochmalige nicht unbedeutende Steigerung.

Ein eigenthümliches Verfahren empfiehlt Oberförster Gehler²⁾. Den in einjährigem Alter verschulten Eichen soll nach zweijährigem Stehen im Pflanzbeet im Monat April das Stämmchen etwa 3 cm über dem Boden mit der Scheere scharf und glatt abgeschnitten, die Wundfläche aber sofort mit Steinkohlentheer überstrichen werden, um den Saftausfluß zu verhindern.

Theils auf der Abschnittsfläche, zwischen Holz und Rinde, theils unterhalb derselben erscheinen nun neue Triebe, welche Mitte Mai durch einen geübten Arbeiter bis auf den kräftigsten beseitigt werden; hiebei erhält ein an der Abschnittsfläche stehender Trieb um der schnelleren Überwallung willen, den Vorzug vor den tiefer unten am Wurzelhals erscheinenden. Dieses Beseitigen überflüssiger Triebe muß eventuell wiederholt werden, wenn nochmals Ausschläge erscheinen würden. Bis zum Herbst soll nun die Wunde vollständig überwallt sein, der belassene Trieb aber eine Länge von 90 cm und mehr besitzen.

Im darauffolgenden Frühjahr wird die so erzogene Pflanze zum zweiten Male verschult und zwar im Abstand von 60 cm im Quadrat; den Pflanzen werden beim Umschulen möglichst die Ballen belassen, die herausragenden Wurzeln aber zurückgeschnitten.

Nachdem die Pflanzen im zweiten und dritten Jahre nach dieser Verschulung die nöthige Pflege bezüglich der Kronenbildung während des Sommers durch Ausskneifen der Spitzen oder Umdrehen der entbehrlichen noch krautartigen Triebe — beides geschieht einfach mit der Hand und wird durch derartiges, rechtzeitiges Operiren jede Verwundung des Stammes vermieden — erhalten haben, werden sie nach abermals 3 Jahren, im Ganzen also siebenjährig, zum dritten Male verschult. Diese Verschulung erfolgt möglichst mit Ballen, unter abermaliger Wurzelkorrektur, in 1 m Quadratverband; die Pflanzen erfahren während der nächsten Jahre wieder die nöthige Pflege durch Beschneiden mit der Astscheere, und soll deren Krone etwa 1,20 m über

¹⁾ Gehler, die Erziehung der Eiche zum Hochstamm. 1870.

²⁾ Gehler, die Erziehung der Eiche zum Hochstamm; A. d. Walde. I. S. 81.

dem Boden beginnen und eine möglichst pyramidenförmige Gestalt erhalten, bis sie endlich nach abermals etwa 3 Jahren und sonach im Ganzen 10 jährig als starke 3—4 m hohe Vollheister thunlichst mit Ballen ausgepflanzt werden. Die Kosten eines so erzogenen Heisters gibt Geyer nur auf 13 Pfennige an.

Burkhardt spricht sich¹⁾ über den Werth dieses Verfahrens auf Grund seiner Wahrnehmungen etwas zweifelhaft aus: Die so erzogenen Pflanzen ersfreuen das Auge nach Wurzel, Stamm und Zweigen, nur darf man nicht nach dem Wurzelhalse sehen, woselbst sich eine verdächtige Aufreibung zeigt! — Diese Aufreibungen wurden in Burkhardts Gegenwart in einem Geyer'schen Pflanzkampf an 12jährigen, jedoch erst vor sechs Jahren gestummelten Heistern bei einer größeren Zahl (40) aufgeschnitten und zeigten sich nur 20% gesund, während die übrigen schadhaften Stellen an der überwallten Abbiebssfläche zeigten. Bei in jüngerem Alter gestummelten Pflanzen mag dies besser sein. — Ein im hiesigen Forstgarten angestellter Versuch mit der Geyer'schen Erziehungsmethode zeigt bis jetzt (nach 2 Jahren) einen nur wenig befriedigenden Erfolg, indem die Lohden bei mäßigem Wachsthum ebenfalls jene unschöne Aufreibung am Wurzelhals zeigen. —

Schließlich sei noch ein Feind der Eichenpflanze erwähnt, der erst seit neuerer Zeit beobachtet oder wenigstens erkannt worden ist: ein in den Eichenwurzeln wuchernder Pilz, von R. Hartig Rosellinia quercina, Eichenwurzeltödter, benannt.²⁾ Dieser Pilz, vorzugsweise im nordwestlichen Deutschland, neuerdings aber auch in Sachsen beobachtet,³⁾ befällt nach Hartigs Angabe vorzugsweise die Eichen im ersten Lebensjahr, oft auch im zweiten, selten im dritten; in Sachsen hat man ihn jedoch selbst an Eichenheistern konstatiert. Er entwickelt sich nur in feuchtem Boden, resp. feuchten Jahren; sein Mycelium wuchert in Gestalt weißer Fäden auf den Wurzeln der Eiche, sich von dem abgestorbenen Rindengewebe nährend und an noch unverkorkten Stellen, namentlich an der Spitze der Pfahlwurzel, in deren Inneres eindringend, deren Gewebe zerstörend. Die befallenen Pflanzen zeigen zuerst Kümmern und Absterben des Gipfeltriebes, später auch der unteren Blätter und Stammtheile; schwächere Pflanzen sterben ab, stärkere erholen sich theilweise und nach längerem Kümmern.

¹⁾ Aus d. Walde. V. S. 113.

²⁾ Hartig, Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut in München. 1880. Beitschr. f. F.- u. J.-W. VIII. S. 329.

³⁾ Bericht über die 27. Vers. des sächs. Forstvereins. S. 130.

Entfernung erkrankter Pflanzen und Isolirung der an dem Kümern und Absterben der Pflanzen kenntlichen Infektionsherde durch Stichgräben, welche, 20—30 cm von den erkrankten Pflanzen gezogen, das unterirdische Weiterwuchern des Mycels hindern, werden Gegenmittel sein, bei starker Infektion aber kann wohl auch das Verlassen des Kampfes in Frage kommen.

§ 100.

Die Rothbuche.

Die Buche war eine in früheren Zeiten den Saat- und Pflanzengärten fast völlig fremde Holzart. Ihre Verjüngung erfolgte ausschließlich auf natürlichem Wege, und wo man zur Schlagkompletirung Pflanzen bedurfte, da griff man zu jenen Ballen- oder Büschel-Pflanzen, welche die Schläge fast stets in reichster Fülle boten. Wollte man aber Buchen da oder dort auf künstlichem Wege unter Schutzbestand nachziehen, so wählte man in der Regel die Saat — und so bestand keinerlei Veranlassung, Buchen im Forstgarten zu erziehen.

Der infolge so vieler Kalamitäten, welche unsere reinen Nadelholzbestände in den letzten Dezennien heimgesucht haben, vieler Orten hervorgetretene Wunsch, die Buche jenen Beständen wieder mehr oder weniger beizumischen, dem Laubholz wieder größere Verbreitung zu verschaffen, mehr aber noch der eifrige Betrieb des Unterbaues von Eichen- und Föhrenbeständen, wozu eben keine Holzart geeigneter ist als die Buche, haben dem Anbau dieser letzteren in neuerer Zeit größere Ausdehnung gegeben, und zwar deren Anbau durch Pflanzung als dem rascheren und sichereren Verfahren.

Wo man schon zahlreiche Buchenbestände, wohlgelungene natürliche Verjüngungen im Revier hat, da wird man das zu obigen Zwecken nöthige Pflanzmaterial meist in einfachster und billigster Weise dem in Ueberzahl vorhandenen Aufschlage entnehmen, die Kosten der Erziehung von Buchenpflanzen ersparen können. Nicht überall ist aber diese Gelegenheit geboten, nicht immer sind die Verjüngungen so dicht, die Pflanzen so kräftig entwickelt, als wünschenswerth, und der Forstgarten muß die nöthigen Pflanzen liefern. So ist denn auch die Buche seit einiger Zeit Gegenstand der Nachzucht in letzterem; an manchen Orten ist dies schon länger der Fall und im Hannöver'schen zog man für bestimmte Verhältnisse seit Jahren Buchenheister. —

Legt man ein Saatbeet vorwiegend oder ausschließlich zur Erziehung von Buchenpflanzen an, so wird man eine möglichst geschützte Lage, am liebsten eine nicht zu große Blöße inmitten eines Bestandes,

mit Rücksicht auf den hiedurch der gegen Frost und Hitze so empfindlichen jungen Buche gebotenen Seitenschutz wählen, außerdem aber den Buchensaatbeeten wenigstens die geschütztesten Plätze in dem auch für andere Holzarten bestimmten Forstgarten zuweisen. Man hat Buchensaatbeete vielfach selbst in der Weise angelegt, daß man zur Erhaltung des Schutzes einzelne alte Buchen auf der zur Saatbeetanlage gerodeten Fläche stehen ließ, allein wir halten dies für unzweckmäßig aus mancherlei Gründen (§. 12), unter denen die nachtheilige Einwirkung der direkten Ueberschirmung zumal der dichtbelaubten Buche auf die jungen Pflanzen obenan steht.¹⁾ Licht von oben, Schutz von der Seite ist auch der Buche am zuträglichsten, und durch nicht zu breite Saatbeete im alten Bestand erreicht man Beides; wir haben selbst Abtheilungslinien, am Gehäng gelegen und daher nicht als Ablfuhrwege benutzt, mit gutem Erfolg für Buchensaatbeete benutzt gesehen.

Die Bodenbearbeitung braucht nur mäßig tief zu sein; eine solche von nur 9 cm, wie sie ein Buchenzüchter empfiehlt,²⁾ würden wir jedoch aus allgemeinen Gründen gegen jede zu seichte Bodenlockereung (siehe § 17) verwerfen, eine solche von 25—30 cm auch für die Buche empfehlen.

Wo Hochwild, Sauen, ein stärkerer Rehstand, da wird eine entsprechende Einfridigung des Buchenkampes nicht wohl entbehrlich sein; am wenigsten scheinen nach unseren Erfahrungen die Hasen den Buchenknospen gefährlich zu sein, so daß, wo bloß letztere Wildart oder ein geringer Rehstand vorhanden, auch die einfacheren Schutzmittel — Stangengerüste, Ueberspannen mit Schnüren, Verwittern &c. (siehe § 68) — genügen.

Der Auswahl entsprechenden Saatgutes wendet man selbstverständlich auch volle Aufmerksamkeit zu und es wird dies auch durch die leichte Erkennbarkeit der Keimfähigkeit durch die einfache Schnittprobe sehr unterstützt, zumal für die Herbstsaat, während im Frühjahr ein zu starkes Austrocknen des sonst guten Samens während des Winters und eine dadurch wesentlich verringerte Keimfähigkeit desselben zu fürchten ist. Es führt uns dies auf die zweckmäßigste Saatzeit für die Buche, wie auf die Frage der Ueberwinterung des Samens.

Im Allgemeinen wird man der Herbstsaat den Vorzug geben, da man hiedurch die Kosten der Ueberwinterung und den bei aller Sorgfalt kaum zu umgehenden Verlust eines Theiles der Keimkraft ver-

¹⁾ Forstl. Mitth. XI. S. 119.

²⁾ Allgem. F. u. F.-B. 1862. S. 322.

meidet. Dagegen ist die Buchel im Winterlager allerdings manchen Gefahren durch Mäuse, Häher, in schwerem Boden wohl auch durch Verstöcken, ausgesetzt, und die Pflanzen erscheinen im Frühjahr zeitiger, so daß sie durch die Spätfröste in höherem Maß gefährdet sind. Namentlich letzterer Grund hat vielfach Veranlassung zur Frühjahrsaat, und zwar zu später Saat im Frühjahr gegeben — Alemann¹⁾ sät seine Bucheln nach dem 10. Mai! Nach Konstatirung Wiese's²⁾ haben jedoch gegenüber dem guten Erfolg von Herbst- oder zeitig vorgenommenen Frühjahrsäaten späte Saaten im Frühjahr bei eintretender Trockne schlechten Erfolg, ja nicht selten bleiben dann die Bucheln ein volles Jahr im Boden liegen und keimen, wenn auch nur spärlich, erst im zweiten Jahr.³⁾ Auch stärkeres Decken, durch welches man das Keimen der im Herbst gesäten Bucheln etwa zurückzuhalten sucht, hat manches Bedenken gegen sich; am zulässigsten erscheint für Herbstsaaten das Decken der Beete mit Laub oder Nadelreisig nach eingetretenem Frost, um hiedurch das Eindringen der Wärme in den Boden im Frühjahr zu verzögern. Bei solcher Deckung ist aber doppelte Vorsicht gegen Mäuse, die unter der Decke ihr Geschäft der Samenzerstörung ungentirt und oft lange unentdeckt treiben, nöthig. — Im Uebrigen aber stehen uns ja im Saatbeet mancherlei Schutzmittel gegen Spätfröste zur Verfügung, und darum wird die Herbst- oder zeitige Frühjahrsaat meist den Vorzug verdienen.

Hat man sich aber für letztere entschlossen — Mäusejahre nöthigen uns dazu —, so ist die zweckgemäße Ueberwinterung der im Herbst gesammelten Bucheln unsere Aufgabe; dieselbe erfordert, gleich jener der Eicheln, viele Aufmerksamkeit, wenn die Keimfähigkeit nicht Noth leiden soll. Selbsterhöhung der etwa zu dicht aufeinander liegenden Bucheln, in Folge deren diese verstöcken, ist ebenso zu vermeiden, wie zu starkes Austrocknen, und auch das stärkere oder zu frühe Ankeimen vor der Saat ist bei der Empfindlichkeit des an der Luft sehr rasch vertrocknenden Keimes unerwünscht.

Mancherlei Methoden der Durchwinterung sind Angesichts dessen versucht und empfohlen worden,⁴⁾ theilweise die gleichen, wie für die Eicheln: so namentlich das Aufschütteten in nicht zu dicker Lage an gegen Nässe geschütztem, jedoch nicht zu trockenem Orte, auf mit Steinpflaster oder Lehmbeschlag versehenem Boden (Bretterböden verursachen leicht zu

¹⁾ Forstkulturwesen. S. 43.

²⁾ Allgem. F.- u. F.-B. 1866. S. 358.

³⁾ Allgem. F.- u. F.-Btg. 1865. S. 120; 1866. S. 358; Alemann, S. 42.

⁴⁾ Vergl. Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 137; Gayers Forstbenutzung. S. 495.

starkes Austrocknen) und Decken mit Stroh oder Matten, verbunden mit öfterem Umschaufeln, eine Methode, die neuerdings¹⁾ durch einen erfahrenen Samenhändler (Appel in Darmstadt) empfohlen wird. Auch die Alemann'sche Eichelhütte (s. § 100) wurde zur Durchwinterung der Buchel benutzt. Widersprechende, günstige²⁾ wie ungünstige³⁾ Urtheile hört man über das Durchwintern der Bucheln in Mischung mit feuchtem Sand wie mit trocknen Materialien, indem bei ersterer Methode Verstopfen oder zu frühes Keimen, bei letzterer zu starkes Austrocknen der Bucheln in dem einen oder andern Fall eingetreten ist.

Oberförster Genth⁴⁾ empfiehlt auf Grund seiner Erfahrungen folgende einfache Methode: Man lasse die Bucheln auf einem luftigen Boden, der keine Unterfeuerung hat, etwa 30 cm hoch ausschütteln und mit einer 2 cm dicken Strohmatte so überdecken, daß der Rand, des Luftranges wegen, am Boden frei bleibt. Vor dem Decken werden die Bucheln durch Überbrausen mit einer Gießkanne angefeuchtet und dies Verfahren alle 14 Tage wiederholt, bei trockenem Wetter noch öfter; bei feuchtem Wetter entfernt man die Strohmatte und schaufelt die Bucheln tüchtig um.

Das Erhalten der kastanienbraunen Farbe der Bucheln ist ein Zeichen, daß dieselben noch genügend Feuchtigkeit enthalten, während gelbbraune Färbung auf Austrocknen und damit auf Verlust der Keimkraft hindeutet.

Vor der Aussaat im Frühjahr wird mit Rücksicht auf das Austrocknen, welchem die Buchel während der Überwinterung so gerne ausgesetzt ist und welches, wenn nicht den vollständigen Verlust der Keimkraft, so bei minderem Austrocknen doch sehr verspätetes Aufgehen zur Folge hat, das Einweichen der Bucheln in Wasser oder das vollständige Anfeuern derselben — Malzen — empfohlen, letzteres zugleich als sicherstes Mittel, um sich von der Keimfähigkeit des Samens zu überzeugen. G. Heyer⁵⁾ empfiehlt das Mischen der Bucheln mit feuchtem Sand in einem 8—10 Tage lang liegenden, mit Reisig bedeckten und öfter angenehrten Haufen. Burkhardt⁶⁾ dagegen läßt den Sand weg, schüttet die Bucheln lediglich im Freien auf, sie stark begießend und öfter umschaufelnd, jede trockne Hitze im Innern der Haufen sorg-

¹⁾ Tharander Jahrb. Bd. 32. S. 69.

²⁾ Monatsschr. f. J.- u. J.-W. 1862. S. 52.

³⁾ Tharander Jahrb. Bd. 31. S. 79.

⁴⁾ Doppelte Riesen. S. 48.

⁵⁾ Allg. J.- u. J.-B. 1866. S. 210.

⁶⁾ Säen u. Pflz. S. 138.

fältig vermeidend; letztere werden mit alten Säcken oder Reisig gedeckt. Sobald die Bucheln den Keim zeigen oder wenigstens die ursprüngliche frische braune Farbe wieder erlangt haben, sollen sie mit entsprechender Vorsicht gegen das Austrocknen ausgesetzt werden. Schon angekeimte Bucheln sind bei der Empfindlichkeit des Keimes mit besonderer Sorgfalt zu behandeln.

Die Aussaat selbst nimmt man am besten in Rillen vor, welche quer über die Beete laufend, mit einer etwa 3 cm starken Saatlatte eingedrückt werden; die Entfernung dieser einfachen (nicht Doppel-Rillen) ist durch die Stärke bedingt, welche die Pflanzen im Saatbeet erreichen sollen, und wird eine solche von 15—20 cm meist die entsprechendste sein. Nach der bayrischen Anleitung vom Jahre 1862¹⁾ können die Rillen in einfacher Weise mit Rechen angefertigt werden, deren 3 cm breite Zinken 10 cm von einander abstehen; letztere Entfernung will uns jedoch etwas gering erscheinen. — Was die Tiefe der Rillen und resp. die durch letztere bedingte Stärke der Bedeckung betrifft, so haben die bereits erwähnten Versuche Baur's (§. § 51) eine Bedeckung von 2 cm Stärke als die günstigste ergeben, während eine solche von 5 cm sich bereits der Keimung sehr nachtheilig erwies, eine noch stärkere dieselbe fast vollständig verhinderte. Auch Burkhardt empfiehlt eine 2 bis 2,5 cm starke Bedeckung, die bei lockerem Boden und zur Verhütung zu frühen Keimens (bei Herbstsaat) etwas verstärkt werden kann. Nach einer Angabe Pfeils²⁾ soll allerdings eine selbst 9 cm starke Deckung ohne Nachtheil angewendet worden sein. (?)

Die Saat selbst erfolgt aus der Hand ohne Anwendung von Säevorrichtungen und läßt sich bei der Größe des Samens eine gleichmäßige Vertheilung des Samens leicht erzielen, eine zu dichte Saat vermeiden; in den etwa 3 cm breiten Rillen darf der Samen wohl so liegen, daß je zwei Bucheln neben einander und in der Längsrichtung Korn an Korn sich befinden. Das Decken geschieht durch Ausfüllen der eingedrückten Rillen mit guter Komposterde; sind die Rillen mit dem Rechen oder Häckchen gefertigt worden, so zieht man auch wohl die zur Seite liegende Erde mit hölzernem Rechen wieder bei, auf diese Weise deckend.

Als Samenbedarf gibt Burkhardt³⁾ pro Ar bei einem Rillenabstand von 0,3 m 10 Liter an, bei dem geringern Abstand aber,

¹⁾ Forstl. Mitth. XI.

²⁾ Krit. Blätter. XXIX. 1.

³⁾ Säen u. Pflz. S. 139.

welcher meist den Rillen gegeben wird, ist dieses Samenquantum entsprechend zu erhöhen, wie denn auch Zudeich¹⁾ dasselbe auf 0,2 bis 0,4 hl pro Ar angibt.

Schutz der Saaten. Herbstsaaten sind gegen Mäuse durch Gräben, eventuell durch Vergiftung, gegen Hähne durch eine Decke von Dornen zu schützen; besondere Sorgfalt erheischen dieselben aber im Frühjahr gegenüber den Spätfrösten, denen sie im höheren Grade ausgesetzt sind als die später keimenden Frühjahrssaat. Bei später Frühjahrssaat, die allerdings wieder anderweite Bedenken hat (s. o.), fällt die Frostgefahr im ersten Jahre allerdings ganz weg. — Am größten ist erklärlicher Weise die Spätfröstegefahr für die Keimlinge, welche durch eine Temperatur von —1 Grad wohl immer getötet werden; der empfindlichste Theil scheint hiebei der Stengel, namentlich an der Anheftungsstelle der Kotyledonen zu sein, und das Anhäufeln der Keimlinge bis an diese Stelle ist daher als ein Schutzmittel zu empfehlen. Auch durch eine Deckung der Räume zwischen den Rillen mit Laub, so daß nur der obere Theil der Kotyledonen sichtbar bleibt, hat man guten Schutz gegeben.²⁾ Außerdem wird man aber den Keimlingen stets den nöthigen Schutz gegen Spätfröste durch aufgestcktes Reisig, besser noch durch Schutzgitter bieten, und soll nach Pfeils Angabe³⁾ hiendurch bei genügend dichter Deckung selbst eine Temperatur bis —6 Grad unschädlich gemacht werden können. — Eine leichte Deckung (Pflanzgitter) wird sich da, wo Seitenbeschattung fehlt, auch gegen die grelle Einwirkung der Sonne im Hochsommer als nützlich erweisen.

Auch in den nächsten Jahren — älter als dreijährig läßt man die Buche im Saatbeet wohl nicht leicht werden — gibt man denselben im Frühjahr gerne durch Schutzgitter die nöthige Sicherung gegen Spätfröste, welche die kräftigere Pflanze wenn auch nicht tödten, so doch im Wuchs sehr zurücksezzen.

Als eine den Buchenkeimlingen drohende Gefahr dürfte hier auch die Kotyledonenkrankheit, hervorgerufen durch einen Pilz (*Phytophthora fagi*), zu erwähnen sein.⁴⁾ Die Keimlinge werden zuerst an der Anheftungsstelle der Kotyledonen am Stengel, allmählich aber

¹⁾ Forstkalender. 1882. S. 113.

²⁾ Allgem. F. u. F.-B. 1862. S. 322.

³⁾ Krit. Blätter. XXXV. 1.

⁴⁾ Siehe R. Hartigs Mittb. in Zeitschr. f. F. u. F.-B. VIII. S. 117. Monatschr. f. F. u. F.-B. 1879. S. 161. Untersuchungen a. d. forstbotanischen Institut in München. 1880.

durchaus schwarz und gehen unfehlbar zu Grunde. Mittel gegen diese Krankheit sind wenige anwendbar; durch vorsichtiges Ausziehen aller abgestorbenen oder sichtbar erkrankten Pflanzen lässt sich wohl ein Theil der übrigen Pflanzen des Kampes retten. Saatkämpe, in welchen die Krankheit aufgetreten, sollen für Buchensaat nicht mehr benutzt werden, da die Sporen mehrere Jahre keimfähig bleiben, die Krankheit sich also wiederholen würde. —

Im Uebrigen erhalten die Pflanzen im Saatbeet die nöthige Pflege durch Reinigen der Beete von Unkraut und Lockern der Räume zwischen den Rillen; ihre Entwicklung pflegt jener ihrer Altersgenossen im Besamungsschlag, Dank der Lockerung des Bodens, dem höheren Lichtgenuss stets nicht unwesentlich voraus zu sein. Man kann sie zu Unterpflanzungen wohl schon einjährig verwenden, nimmt aber lieber zweijährige, auch dreijährige kräftige Pflanzen.

Eine Verschulung der auf solche Weise erzogenen Buchen nimmt man wohl nur ausnahmsweise vor; zu Unterpflanzungen genügen die billigeren Saatbeetpflanzen, die ja durch den betreffenden Bestand gegen Graswuchs, Frost und Hitze geschützt sind, Buchenpflanzungen ins Freie aber, die stärkere, verschulte Pflanzen erfordern würden, pflegen zu den Ausnahmen zu gehören. Bedarf man aber in besonderen Fällen solche stärkere Pflanzen oder gar Heister, so verschult man die im Saatbeet erzogenen Pflanzen ein- oder zweijährig, schult etwa auch Wildlinge aus natürlichen Verjüngungen in solchem Alter ein, wählt den Abstand von 20 cm in den Reihen und 25—30 cm für die Entfernung letzterer von einander und lässt die Pflanzen je nach ihrer Entwicklung 2 bis 3 Jahre im Pflanzbeet stehen.

Man hat wohl auch Keimlinge¹⁾, die sich nach einer das Sammeln von Samen nicht ermöglichen Sprengmaß in größerer Zahl in den Beständen vorfinden, zur Deckung des Pflanzenbedarfs ausgehoben, sobald sie das erste Blattpaar getrieben haben, und sie eingeschult; dieselben bedürfen jedoch bei dem Ausheben, Transport und Einschulen großer Vorsicht, entsprechender Deckung durch Gitter zum Schutz gegen die Sonne, und eine derartige Manipulation wird daher stets kostspielig und nur unter besonderen Verhältnissen gerechtfertigt sein.

Noch seltener findet man die Buche als stärkere Pflanze, als Heister, im Forstgarten, und Süddeutschland zumal kennt einen Buchenheisterkamp wohl gar nicht. Wo man, wie dies z. B. im Spessarter Wildpark der Fall gewesen, mit Rücksicht auf die den schwächeren Pflanzen

¹⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 164.

durch das Wild drohenden Gefahren genöthigt war, zur Unterpflanzung der Eichenbestände starke, bis mannshohe Buchen zu verwenden, da gewann man solche aus älteren Verjüngungen durch sorgfältige Rodung und körpste die zu schwanken Pflänzlinge in einer Höhe von $1-1\frac{1}{2}$ m; der Erfolg dieser Kulturen war ein durchaus befriedigender, wenn auch nicht in Abrede gestellt werden kann, daß im Kamp erzogene Pflanzen von solcher Höhe eine raschere Entwicklung gehabt haben würden, — die Kosten aber wären auch unverhältnismäßig höher gewesen.

Häufiger wurde nach Burkhardt's Mittheilungen die Pflanzung mit Buchenheistern in Hannover angewendet: zur Be pflanzung von sog. Hudewaldungen, meist in Mischung mit der Eiche, auch zur Ausfüllung von Lücken in Hoch- und Niederwaldungen, und der Erfolg solcher Kulturen war vielfach ein sehr günstiger.¹⁾ Zu solchen Pflanzungen ins Freie sind nun starke Buchenpflanzen, die bisher in dichtem Schluß standen, wenig verwendbar; dieselben legen sich leicht zur Seite, die empfindliche Rinde der schwach beasteten Pflanzen wird durch die Einwirkung der Sonne gerne brandig; eine rauhe, tiefer herabgehende, die Rinde schützende Be astung ist daher wünschenswerth. Theilweise lieferten die Ränder der Verjüngungen taugliches Material, der Haupt sache nach erzog man sich dasselbe jedoch in der Heisterpflanzschule entweder durch wiederholte Verschulung von Saatbeetpflanzen oder durch Einschulung kräftiger Wildlinge aus Verjüngungen. Abstand der Pflanzen und Zeit des Stehens im Pflanz- und Heister-Kamp sind abhängig von der Stärke der Pflanzen beim Umschulen, wie derjenigen, welche die Heister erlangen sollen. Nach Burkhardt verschult man die einjährigen Saatbeetpflanzen in Reihen von 40 cm Abstand und 20 cm Pflanzen entfernung, und setzt die so erzogenen Pflanzen 3- bis 4jährig in etwa 70 cm Quadratverband in den Heisterkamp, wo sie weitere vier Jahre verbleiben.

Zu beschneiden ist an den Buchen weniger als an Eichen, die Erhaltung einer rauhen Be astung ist, wie oben erwähnt, geradezu nöthig; doch sind zu lange Seitenäste zu kürzen, und solche Korrekturen, durch welche man der Bekrönung eine pyramidenförmige Gestalt zu geben strebt, im Jahr vor der Verschulung resp. Auspflanzung vorzunehmen. An den Wurzeln werden beschädigte Theile, zu lange Seitenwurzeln entfernt resp. gekürzt, im Allgemeinen schneidet man auch hier nicht viel.

Im Ganzen aber wird der Buchenheister stets eine untergeordnete Rolle spielen, nur ausnahmsweise Verwendung finden, da in den meisten

¹⁾ Vergl. Burkhardt, A. d. Walde. V. S. 123; Säen u. Pflz. S. 164.

Fällen die Verwendung billiger Materials ebenfalls zum erwünschten Ziel führen wird.

§ 101.

Die Esche.

Die Esche, früher in unsrern Waldungen häufiger zu finden als jetzt, hat, wie Gayer richtig sagt,¹⁾ bezüglich ihrer Verbreitung der menschlichen Kunst wenig zu danken; für ihre Nachzucht ist in früherer Zeit nur wenig geschehen, der gleichalte Hochwaldbetrieb, die natürliche Verjüngung mittelst Dunkelschlag waren wohl geeignet, diese entschieden lichtbedürftige Holzart mehr und mehr zu verdrängen. In neuerer Zeit wendet man der werthvollen Esche, gleich dem Ahorn, größere Aufmerksamkeit zu, sucht sie dem Buchenholzwald in geeigneten Dertlichkeiten einzeln oder in kleinen Hörsten einzumengen, ihr im Nieder- und Mittelwald als Unterholz und Oberholz einen Platz zuzuweisen, so daß sie jetzt vielfach Gegenstand des forstlichen Anbaues geworden ist.

Dieser Anbau geschieht aber vorwiegend durch Pflanzung — im Nieder- und Mittelwald immer, im Hochwald in den meisten Fällen, da auch in diesem die beabsichtigte mäßige Einmischung hierdurch sicherer und entsprechender erreicht wird, als durch die Saat, — und deshalb finden wir die Esche in den Saat- und Pflanzbeeten unserer Forstgärten von der schwachen Saatpflanze bis zum kräftigen Heister, wie ihn etwa der Mittelwald verlangt, vor.

Die Wahl eines hinreichend frischen Bodens ist, bei dem bekannten Feuchtigkeitsbedürfniß der Esche, bei Auswahl des Platzes wohl zu beachten, der Versuch, sie auf trockenerem Boden zu erziehen, zu unterlassen. — Die Bodenbearbeitung braucht für die Esche, selbst wenn es sich um Erziehung stärkerer Pflanzen handelt, eine nur mäßig tiefe zu sein, 30—40 cm auch für den Heister nicht zu überschreiten.

Was nun die Saat derselben betrifft, so ist hier eine Eigenthümlichkeit der Esche ins Auge zu fassen: ihr Samen keimt fast ausnahmslos erst im zweiten Jahre nach der Reife und resp. Aussaat. Nach einer Mittheilung²⁾ soll derselbe zwar, im Herbst nach der Samenreife sofort mit Sand vermischt und über Winter in Gruben aufbewahrt, aus diesen letzteren aber im Frühjahr ins Saatbeet gebracht, alsbald aufgehen, nach einer weiteren Notiz³⁾ soll durch einstündiges Einweichen in heißem Wasser die lederartige Umhüllung des Samenkorns unbeschadet der

¹⁾ Waldbau. S. 115.

²⁾ Allgem. F.- u. J.-B. 1863. S. 275.

³⁾ Monatschr. f. F.- u. J.-W. 1858. S. 341.

Kreimkraft erweicht und dadurch gleichfalls Kreimung im ersten Frühjahr ermöglicht werden, — aber ersteres Verfahren scheint uns doch nur ausnahmsweise wirksam und letzteres hat nirgends weitere Empfehlung gefunden, ein von uns selbst angestellter Versuch zeigte das erwartete Resultat nicht, und die Kreimung des Eschensamens erst im zweiten Frühjahr nach der Samenreife erscheint daher als Regel. — Nach Pfeils¹⁾ Angabe¹⁾ würde der sofort nach eingetretener Samenreife im Herbst ausgesäte Samen vielfach schon im ersten Frühjahr keimen, der noch längere Zeit an den Bäumen hängende und dadurch stärker ausgetrocknete aber erst im zweiten. Durch alle die genannten Mittel bringt man aber doch nur einen Theil des Samens zum Keimen, der andere keimt im zweiten Jahre nach und eine derartig ungleich aufgehende Saat bringt so entschiedene Nachtheile mit sich, daß eine erst im zweiten Jahr gleichmäßig aufgehende Saat vorzuziehen ist.

Dieses lange Liegen des Samens bis zum Aufgehen hat aber die unangenehme Folge, daß die Saatbeete während des Sommers stark verunkrauteten, bei dem Reinigen derselben aber namentlich mit dem tiefer wurzelnden Unkraut der Samen leicht herausgerissen wird, ein Nachtheil, den alle im zweiten Jahre erst keimenden Samen mit sich bringen. Man schlägt deshalb den Samen in hinreichend tiefe Gruben an weder zu feuchtem noch zu trockenem Orte in der Weise ein, daß man handhohe Schichten von Samen, etwa mit einem Laub vermischt, mit eben so hohen Erdschichten wechselt und die letzte Schichte etwa 10 cm stark mit Erde deckt, hiwdurch das theilweise Keimen hindernd, oder man deckt die im ersten Frühjahr ange säten Beete mit einer dichten, durch aufgelegtes Reisig festgehaltenen Laub- oder Moosdecke, welche die Entwicklung von Unkraut verhindert.

Hat man den Samen in Gruben aufbewahrt, so nimmt man ihn im Frühjahr unmittelbar vor der Saat heraus, entfernt etwa durch Siebe die Erde zur Erleichterung der Saat und nimmt letztere sofort vor. Will man aber die Saat gleich im ersten Frühjahr vornehmen und den Samen in den Beeten ein Jahr liegen lassen, so bewahrt man den im Herbst gesammelten und entsprechend abgetrockneten Samen über Winter einfach in Säcken aufgehängt auf. — Die Keimprobe erfolgt beim Eschensamen lediglich durch die Schnittprobe, bei welcher sich das Samenkorn im Innern bläulich weiß und wachsartig zeigen muß.

Die Aussaat selbst erfolgt in Rillen, welche mit der Saatlatte

¹⁾ Deutsche Holzzucht. S. 283.

²⁾ Alemann, Forstkulturwesen. S. 46.

eingedrückt werden. Ueber die zweckmässigste Stärke der Deckung des Samens, wodurch die Tiefe der Rille bedingt wird, hat Baur bezüglich der Esche keine Versuche angestellt, eine solche von 1,5 bis 2 cm dürfte nach der Größe des Samens und unsern Erfahrungen die entsprechendste sein. Die Entfernung der Rillen — einfacher, etwa 3 cm breiter Rillen wird man bei beabsichtigter Verschulung der Pflanzen in einjährigem Alter zu 15 cm, bei zweijährigem Stehen derselben im Saatbeet zu 25 cm wählen. Die Saat selbst, welche ohne Hülfsmittel aus der Hand geschieht, darf so dicht vorgenommen werden, daß Korn an Korn liegt, und ist nach Burkhardt's Angabe bei 30 cm Rillenentfernung pro Ar ein Quantum von 3 Pfund nöthig, ein Quantum, das uns etwas gering scheinen will und der oben bezeichneten geringeren Rillenentfernung gemäß entsprechend erhöht werden muß, wenn diese gewählt wird.

Die ziemlich zeitig erscheinenden Keimpflanzen sind gegen Fröste sehr empfindlich und durch Reisig oder Schuhgitter entsprechend gegen dieselben zu schützen. Die jungen Pflanzen aber sind während des Winters durch Verbeißen seitens der Rehe und Hasen gefährdet und eine genügend dichte Einfriedigung daher nöthig.

Nur selten werden die Eschen unverschult, etwa als zweijährige Pflanzen, verwendet, in den meisten Fällen bedarf man zur Schlagkompletirung im Niederwald, zur Einpflanzung in den Hochwald stärkere Pflanzen, zumal die Esche stets auf frischen, zu Graswuchs geneigten Lokalitäten angepflanzt wird; man erzieht daher durch Verschulung meterhohe kräftige Pflanzen, nach Umständen aber noch viel stärkere Heister. Ihr Wurzelsystem, neben wenigen stärkeren Wurzeln eine große Zahl feinerer, vielverzweigter Wurzeln zeigend, macht ihr Verpflanzen in jedem Alter, jeder Stärke zu einer sehr sichern Manipulation.

Man verschult die Esche mit sehr gutem Erfolg schon als Keimling (Krautpflanze) nach dem Erscheinen des ersten Blattpaars, und kann solche Pflanzen nicht selten zahlreichem natürlichen Anflug in der Nähe alter Eschen entnehmen. Solche eingeschulte Keimlinge erreichen schon im ersten Lebensjahr eine ziemliche, die unverschulten Pflänzchen im Saatbeet wesentlich überragende Höhe und Stärke und der Gewinn durch das Einschulen solcher Pflanzen ist daher, Angesichts des langen Liegens des Samens und der damit verbundenen Umstände ein doppelter. Doch ist bei dem Versezten derselben ins Pflanzbeet, welches mit dem einfachen Sezholz rasch erfolgt, auf vorhandene entsprechende Bodenfeuchtigkeit zu sehen, für solche nöthigenfalls durch Gießen zu sorgen und bei eintretendem sonnigen Wetter den Pflänzchen der nöthige Schutz durch Gitter zu geben.

Außerdem verschult man vorzugsweise einjährige, kräftige Saatbeetpflanzen, bei geringer Entwicklung derselben wohl auch noch zweijährige, und zwar mit Rücksicht auf die rasche Entwicklung der Esche in nicht zu engem Verband, etwa von 20 auf 30 cm. Nach zwei-, höchstens dreijährigem Stehen im Pflanzbeet haben die mittlerweile bis meterhoch gewordenen Pflanzen jene Stärke erreicht, in der sie entweder in die Schläge ausgepflanzt oder zum Zweck der Heisterzucht nochmals in weiteren Verband verschult werden müssen. Letzterer wird sich nach der Stärke richten müssen, welche die Heister erreichen sollen, und hienach 0,50—0,70 m Quadratverband betragen, letzteres für die wenig zur Astverbreitung geneigte Esche wohl das Maximum; in einem Alter von sechs Jahren werden die Heister der raschwüchsigen Esche auf gutem Boden fast stets die nötige Stärke erreicht haben.

Ein Beschneiden der Wurzeln wird bei der Esche bei erstmaliger Verschulung überhaupt nicht, bei späterer nur in geringem Maße nötig sein, da die Wurzelbildung derselben weder eine tiefgehende noch weit ausstreichende ist. Deswegen erscheint es auch bei der Esche am ersten zulässig, stärkere Pflanzen dadurch zu erziehen, daß man im Pflanzbeet je die zweite Reihe und die zweite Pflanze in der Reihe nach etwa zweijährigem Stehen im Beet vorsichtig heraushebt, hiedurch den Standraum der verbleibenden Pflanzen vergrößernd. Auch findet sich bei der Esche in den Pflanzbeeten bei Weitem nicht so viel zur Heisterzucht untauglicher Ausschuß als bei der Eiche, — ein weiterer Grund für die Zulässigkeit dieses Verfahrens.

Eine Pflege der Pflanzbeete, des Heisterkampes durch Beschneiden der Aeste ist bei der geringen Neigung der jungen Esche zur Astverbreitung nur in beschränktem Maße nötig — nötig fast nur zur Be seitigung der in den Pflanzbeeten, wie auch an den schon stärkeren Stämmen bekanntlich so häufig auftretenden Gabel- oder Zwiller bildungen.¹⁾ Dieselben erscheinen stets als Folge des Verkümmerns oder Erfrierens der Mittelknospe, des Gipfeltriebes, an deren Stelle dann die beiden gegenständigen Seitenknospen oder - Triebe die Gipfelbildung zu übernehmen pflegen; die beiden Triebe wachsen dabei nicht selten längere Zeit in gleich starker Entwicklung fort, oder es wird bald der eine dominirend — um sich häufig schon nach nicht allzulanger Frist wieder zu gabeln! Ein Spätfrost hat oft die Folge, daß nahezu sämtliche Pflanzen eines Beetes sich gabeln, und hier wird es nun Aufgabe der Pflege sein, den schwächeren der beiden Triebe baldig durch einen

¹⁾ Vergl. Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 175.

sharpfchen Schnitt mit der Axtscheere zu entfernen, wodurch in wenig Jahren die Spuren jener Frostwirkung am Stämmchen verschwinden. Das rechtzeitige Ausbrechen einer Seitenknospe hat den gleichen Erfolg.

Stehen ältere Eschen in der Nähe des Forstgartens, so zeigt sich die erstere heimsuchende spanische Fliege (*Lyta vesicatoria*) wohl auch auf den Pflanzbeeten und muß durch fleißiges Absuchen entfernt werden.

§ 102.

Der Ahorn.

Der Ahorn (und zwar fassen wir unter dieser Bezeichnung zunächst den Berg- und Spitzahorn zusammen) zeigt manches mit der Esche Gemeinsame. Gemeinsam ist ihm mit jener das mehr vereinzelte oder horstweise Auftreten, das Lichtbedürfniß, das Verschwinden in den gleichaltrigen natürlichen Verjüngungen der Buche oder Nadelhölzer, gemeinsam aber auch die Verücksichtigung, welche diese edle Nutzholzart in neuerer Zeit als Mischholz im Hoch- wie im Niederwald findet. Aehnlich der Esche läßt sich aber auch der Ahorn sicherer und zweckmäßiger durch Pflanzung, als durch Saat in die Bestände einbringen, und darum sehen wir denn den Ahorn auch sehr vielfach als eine Holzart unserer Forstgärten. Dabei wird man den Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*) vorzugsweise im Berg- und Hügelland, den Spitzahorn (*A. platanoides*) in der Ebene, dem tiefer gelegenen Lande nachziehen; ¹⁾ beim Anbau beider im Forstgarten aber besteht kein wesentlicher Unterschied.

Dieser Anbau erfolgt nun wohl in den meisten Fällen durch Erziehung in Saatbeeten mit nachfolgender Verschulung, um dadurch meterhohe Lohden oder stärkere Heister zu erlangen; eine Verpflanzung ohne vorgängige Verschulung findet mit Rücksicht auf die durch Graswuchs, Wild, im Niederwald durch Ueberwachsen den schwächeren Ahornpflanzen drohenden Gefahren nur seltener, bei besonders günstiger Entwicklung der im Saatbett nicht zu dicht stehenden Pflanzen, in etwa 2jährigem Alter derselben statt.

Wie für Eschen — so auch für Ahornsaatbeete, welche mit Rücksicht auf die den Pflanzen durch Verbeißen drohende Gefahr wohl stets im gut eingefriedigten Forstgarten liegen, ist zu freudigem Gediehen ein frischer, kräftiger Boden nöthig. Stärkerer Seitenschatten ist zu vermeiden, da der Ahorn eine entschiedene Lichtpflanze ist, weshalb

¹⁾ In Süddeutschland, insbesondere in Bayern, wird der Bergahorn in viel reicherm Maß nachgezogen als der Spitzahorn, während der erstere in der norddeutschen Ebene ein Fremdling ist.

man für die Nachzucht des Ahorns die Beete unmittelbar an der Bestandswand vermeidet.

Eine Bodenbearbeitung von 30—40 cm Tiefe genügt für Saat- und Pflanzbeete.

Der im Oktober reifende Samen wird sehr häufig direkt seitens der Waldbesitzer gesammelt; in diesem Falle beachte man die Qualität des Saatgutes, sammle nicht schwach ausgebildeten, kleinen Samen von jungen Stämmchen, sondern nehme Rücksicht auf mannbare Mutterbäume und auf gut ausgebildete, kräftige Samen. Zumal bei dem starken, runden Korn des Bergahorns fallen oft die bedeutenden Größenunterschiede derselben ins Auge.

Die Aussaat des Samens, dessen Keimkraft durch die Schnittprobe leicht zu konstatiren ist, indem sich bei letzterer die saftigen grünen Rothledonen unter der braunen Hülle zeigen müssen, kann nun entweder im Herbst oder im Frühjahr erfolgen.

Die Herbstsaat hat den Vorzug, daß der ausgesäte, im Boden vor jedem stärkeren Austrocknen bewahrte Samen sicher und vollständig im Frühjahr keimt, während bei der Frühjahrsaat der trocken gewordene Samen nicht selten ganz oder theilweise erst im zweiten Jahr zur Keimung gelangt, in trockenen Jahrgängen nach unseren Erfahrungen selbst völlig zu Grunde geht. Insbesondere scheint der Samen des Spitzahorns bei Frühjahrsaat sehr häufig überzuliegen. Um diesem Übelstand vorzubeugen, ist es empfehlenswerth, die Saat schon im Herbst vorzunehmen und die in solchem Falle allerdings oft sehr zeitig im Frühjahr erscheinenden Keimpflanzen durch entsprechende Schutzvorrichtungen gegen die Spätfrostgefahr zu schützen; auch ein Decken der gefrorenen Beete mit Reisig wird ein Mittel gegen allzufrühe Keimung sein.

Hat man sich aber für die Frühjahrsaat entschieden, wozu der Umstand, daß die Beete erst dann leer werden, das erwünschte Ausfrieren des frisch umgearbeiteten Bodens, die drohende Gefahr für den Samen durch Mäuse, vor Allem aber die Sorge vor den Spätfrosten manchen Pflanzenzüchter veranlassen,¹⁾ dann muß, soll die Saat sicher aufkeimen, der Samen vor zu starkem Austrocknen geschützt werden. Ein erfahrener Laubholzzüchter²⁾ empfiehlt uns für diesen Fall öfteres Ueberbrausen des auf einem trocknen Ort aufbewahrten Samens oder Aufschütten des Samens einige Centimeter hoch im Wald und Bedecken derselben mit Laub. — Bezüglich zu später Frühjahrsaat bemerkt

¹⁾ Allgem. F.- u. J.-Z. 1863. S. 274 u. S. 370.

²⁾ Herr Oberförster Kaufmann zu Irtenberg bei Würzburg.

übrigens Pfeil¹⁾), daß die spät erscheinenden Pflanzen häufig nur mangelhaft verholzen und im Winter dann ganz oder theilweise erfrieren.

Die Aussaat selbst erfolgt in Rillen, welche wie bei der Esche mit der Saatlatte eingedrückt werden, und zwar mit Rücksicht auf die oft schon im ersten Jahre bedeutende Höhenentwicklung der Ahornpflanze²⁾ in einer Entfernung von 20—25 cm; die Rille wird etwa 3 cm breit und so tief eingedrückt, daß der Samen bei deren Auffüllung mit guter Erde eine Decke von 1—2 cm erhält. Nach den Versuchen Baur's ist dies die zweckmäßigste Stärke der Deckung, während eine solche von 3—4 cm die Keimung schon bedeutend beeinträchtigt. Baur weist hiebei noch darauf hin, wie für den Ahorn eine lockere, nicht zur Verkrustung geneigte Decke besonders nothwendig sei, indem, wenn diese letztere nach Regenwetter eintreten sollte, die langen Kottledonen nicht mit dem fortwachsenden Stengelchen aus dem Boden kommen können und abbrechen.

Das Säen erfolgt mit der Hand, da die starken Flügel Säevorrichtungen ausschließen, und je nach der untersuchten Qualität des Samens mehr oder minder dicht; etwas dünnere Saat bietet den Vorzug viel kräftigerer Pflanzenentwicklung im ersten Jahr! Burkhardt bezeichnet 3—4 Pfund als das nöthige Samenquantum pro Ar, von dem schwereren Samen des Bergahorns wird man etwas mehr bedürfen.

Was den Schutz der Saatbeete anbelangt, so können Mäuse dem Samen im Winterlager (oder Aufbewahrungsorte) gefährlich werden und sind die Saatbeete entsprechend im Auge zu behalten. Im Frühjahr ist es der Spätfröste, der die früh erscheinenden Keimpflanzen der Herbstsaat bedroht und deren Beschützung durch Schutzbretter nöthig macht, während in späteren Jahren die stärkeren Pflanzen minder empfindlich sind. Gegen das Verbeissen durch Rehe und Hasen ist Schutz durch hinreichend dichte Einfriedigung nothwendig.

Aehnlich wie bei der Buche tritt auch bei den Ahornkeimlingen eine Krankheit auf, veranlaßt durch einen Pilz (*Cercospora acerina*)³⁾, welcher zahlreiche schwarze Flecken auf den Kottledonen und ersten Laubblättern erzeugt, denen das Schwarzwerden und Absterben der ganzen Pflanze folgt. Die Wiederansaat eines mit solchen Pflanzen besetzten Beetes mit Ahornsamen wird jedenfalls zu meiden sein.

¹⁾ Deutsche Holzzucht. S. 257.

²⁾ In den Saatbeeten des hiesigen Forstgartens haben einjährige Ahorne in größerer Zahl eine Höhe von 40—50 cm erreicht.

³⁾ Centralblatt. 1880. S. 435.

Hartig, Untersuchungen aus dem forstbotan. Institut in München. 1880.

Bei kräftiger Entwicklung der Pflanzen wird man dieselben in der Regel einjährig, bei minder guter zweijährig verschulen und, wie schon oben erwähnt, nur ausnahmsweise kräftige Pflanzen aus der Saatschule direkt ins Freie verwenden. Namentlich zur Einpflanzung in Niederwaldschläge, zur Einsprengung in den Buchenhochwaldschlag nach bereits vollzogener Räumung des Oberholzes verwendet man lieber und mit sicherer Erfolge die durch Verschulung erzeugte meterhohe Lohdenpflanze.

Die Verschulung, bei welcher etwa zu lange Seitenwurzeln entsprechend gekürzt werden, erfolgt je nach der Größe der Pflanzen mit starkem Sägeholz oder in Pflanzlöcher, und zwar mit Rücksicht auf die rasche Höhenentwicklung der Pflanzen in etwa 30 cm Quadratverband, oder in 30 cm entfernten Reihen mit 20 cm Pflanzenentfernung. Gute Sortirung der in der Höhenentwicklung oft sehr verschiedenen Saatbeetpflanzen nach der Größe (siehe § 75) ist hiebei besonders zu empfehlen, ebenso ziemlich frühzeitige Verschulung mit Rücksicht auf das baldige Schwellen der Knospen und Antreiben der Pflanzen.

Eine Pflege durch Beschneiden ist bei den verschulten Ahornpflanzen nur in geringstem Maße nötig, da der Höhenwuchs ein sehr ausgeprägter, die Entwicklung von Seitenästen eine geringere ist; ja nicht selten, zumal bei etwas enger Verschulung, wiegt der erstere so bedeutend vor, daß die Pflanzen allzu schwank in die Höhe wachsen, sich kaum selbstständig tragen können. Nur Gabelbildungen, die in gleicher Art wie bei der Esche und aus gleichen Gründen nicht selten auftreten, sind rechtzeitig zu beseitigen.

Nach zwei-, längstens dreijährigem Stehen im Pflanzbeet hat der Ahorn unter normalen Verhältnissen jene Höhe von etwa 1 m erreicht, welche für seine Auspflanzung in die Schläge wünschenswerth erscheint. Wünscht man aber aus besondern Gründen — für Anlagen, Alleen, Wildparke &c. — starke Heister, so wird eine nochmalige Verschulung der Pflanzen unter Auswahl der bestwüchsigen Exemplare vorgenommen. Die Wurzeln der ausgehobenen Pflanzen werden einer nochmaligen Korrektur durch Beseitigung allzulanger Seitenwurzeln unterstellt und erstere sodann in einer Entfernung von 60 — 70 cm (Quadratverband) in hinreichend große Pflanzlöcher eingeschult. In einem Alter von 6 — 7 Jahren wird der Ahornheister wohl stets eine allen Anforderungen entsprechende Stärke und Höhe erreicht haben.¹⁾

¹⁾ Welch rasche Entwicklung der Ahorn unter günstigen Umständen haben kann, zeigten uns eine Anzahl von Spitzahornpflanzen im hiesigen akademischen Forstgarten, welche sehr vereinzelt auf einem Beet standen — dieselben waren im ersten

§ 103.

Die Ulme.

In viel minderem Maße als Ahorn und Esche ist die Ulme Gegenstand forstlichen Anbaues; sie ist überhaupt mehr eine südliche Holzart, die in Italien und Frankreich in größerer Verbreitung kommt, während sie bei uns vorwiegend nur in den Flussthälern und Niederungen auftritt, und zwar auch hier nur als Mischholz, wohl nur ausnahmsweise bestandsbildend. In vielen Dertlichkeiten, in denen sie früher vorkam, ist sie jetzt mehr oder weniger verschwunden, woran nach Burkhardt's Ansicht der große breitgeflügelte und leichte Samen, welcher nur schwer an den wunden Boden kommt, die der Ulme nachtheilige starke Beschattung in der natürlichen Buchenverjüngung, andern Orts der Unkrautwuchs oder überwachsende andere Holzarten die Schuld tragen.¹⁾

In geeigneten Dertlichkeiten, auf frischem kräftigen Boden in nicht zu rauher Lage, bemüht man sich wohl da und dort um Erhaltung und Nachzucht dieser schönen und werthvollen Holzart, sei es als Mischholz im Hochwald, sei es als kräftig vom Stöck ausgeschlagendes Unterholz im Mittel- und Niederwald; in Parkanlagen, zu Alleen wird die Ulme ebenfalls gerne verwendet. In allen diesen Fällen aber erfolgt die Nachzucht wohl nur durch die sichere Pflanzung mit im Forstgarten erzeugten und ein- selbst zweimal verschulften Pflanzen und resp. Heistern.

Der Anfang Juni reifende Samen wird am besten sofort nach der Einstellung ausgesätet, da bis zum Herbst oder gar zum Frühjahr aufbewahrter Samen durch Austrocknen einen nicht geringen Theil seiner an sich nicht großen Keimfähigkeit verliert. Unter dem fast alljährlich in großer Menge reifenden Ulmensamen findet sich sehr viel tauber Samen, der zuerst abfliegt; man vermeidet daher das Sammeln dieses zuerst abfliegenden Samens, sucht auch wohl den gesammelten Samen durch Aussieben und Schwingen von den tauben Körnern zu befreien.²⁾

Die Aussaat erfolgt mit Rücksicht auf die geringe, etwa durch Zerschneiden einer Anzahl Samenkörner zu prüfende Keimkraft, ziemlich dicht in flach eingedrückte, 3 cm breite und etwa 15 cm von einander

Jahr nach der im Frühjahr erfolgten Saat aufgegangen, die im zweiten Jahr nach gekeimten Pflänzchen aber erfroren —; sie erreichten als zweijährige unverschulte Pflanzen eine Höhe von durchschnittlich $1\frac{1}{2}$, theilweise selbst 2 Meter.

¹⁾ Säen u. Pflz. S. 188.

²⁾ Allgem. F. u. F.-B. 1863. S. 270.

entfernte Rillen, wo möglich bei feuchter Witterung; fehlt diese, so muß durch Gießen und Deckreißig das Saatbeet frisch erhalten werden. Man wird überhaupt gut thun, den Ulmensaatbeeten die frischesten und gegen das Austrocknen geschütztesten Theile des Forstgartens anzusegnen, also etwa die Beete nächst der gegen Süd und West schützend vorliegenden Bestandswand, was um so mehr zulässig, als Seitenbeschattung den jungen Pflanzen nicht nachtheilig wird. Bei anhaltender Trockne ohne die genannten Maßregeln keimt nach unsrern Erfahrungen kaum ein Korn im Laufe des Sommers auf, nach Burkhardt's Mittheilungen aber bisweilen im Frühjahr ein Theil des Samens nach. Dieses Feuchthalten der Saatbeete wird erklärlicher Weise ganz besonders bei der oft in sehr warme Witterung fallenden Sommersaat nöthig.

Kann man nicht im Sommer säen, so nehme man die Saat wenigstens im Herbst vor, damit der Samen während des Winters nicht noch weiter austrockne.

Das nöthige Quantum des sehr leichten Samens beträgt mit Rücksicht auf die geringe Keimkraft etwa 3 Pfund pro Ar.

Eben so nöthig als das Feuchthalten ist aber auch eine möglichst schwache Deckung des Samens mit Erde; nach Baur's mehrerwähnten Versuchen (s. § 51) ergab eine 1,5 cm starke Deckung mit Erde bereits vollständiges Versagen der Keimkraft, leichtes Uebersieben oder bloße Vermengung mit Erde dagegen gute Resultate. — Gerade diese schwache Erddecke macht anderweitigen Schutz gegen Austrocknen doppelt nöthig!

Die schon etwa nach 8—10 Tagen erscheinenden Pflänzchen erreichen unter günstigen Umständen noch im selben Jahr eine Höhe von 15 bis selbst 25 cm, verholzen dagegen bisweilen nur mangelhaft und leiden durch Früh- und Winterfröste; es wird dies selbst als Grund gegen die sonst wohl sehr übliche Sommersaat geltend gemacht.¹⁾

Ist die Saat gut ausgefallen, dicht aufgegangen und haben sich die Pflänzchen günstig entwickelt, so verschult man dieselben wohl schon im nächsten Frühjahr, kann die Verschulung aber auch ganz gut ins zweite Jahr verschieben. Die Ulme entwickelt anfänglich eine ziemlich tiefgehende Pfahlwurzel, die man beim Verschulen etwas kürzt; Pfeil²⁾ behauptet allerdings, daß eine mit gekürzter Wurzel verpflanzte Ulme keinen entsprechenden, zu Nutzholz geeigneten Schaft entwickle. (?)

Die Verschulung selbst erfolgt rasch und leicht mittelst des Sez-holzes in nicht zu engen Abständen, etwa von 20 auf 30 cm. Die

¹⁾ Allgem. F.- u. J.-Z. 1863. S. 275.

²⁾ Deutsche Holzzeit. S. 269.

Entwicklung der Pflanzen ist auf gut gedüngtem Boden von genügender Frische eine rasche und nach zweijährigem Stehen im Pflanzbeet haben dieselben in der Regel schon eine Höhe von beißufig 1 m und damit die Stärke zum Auspflanzen in die Schläge erreicht. Will man aber zu besonderen Zwecken, so namentlich zur Anlage von Alleen, in Parkanlagen, stärkere Heister erziehen, die sich ebenfalls noch mit Sicherheit verpflanzen lassen, so verschult man die besten Lohden nochmals in Abständen von 0,60—0,70 m, und erhält in einem Alter von 6—8 Jahren genügend starke Heister.

Was Schutz und Pflege der Ulmen-Saat- und -Pflanzbeete anbelangt, so ist das rauhe Blatt der Ulme gegen Spätfröste wenig empfindlich und nur etwa bei Anwendung der Frühjahrssaat sind die frisch aufgegangenen Pflänzchen durch Schutzhütter oder Neste gegen deren Einwirkung zu schützen. — Im Uebrigen läßt man denselben die nöthige Pflege durch Reinigung und Lockerung angediehen; die verschulten Pflanzen bedürfen aber auch entsprechenden Beschneidens, indem sie Neigung zur Gabelbildung und zur Entwicklung stärkerer Seitenäste nach den in unsern Pflanzgärten gemachten Wahrnehmungen zeigen. Im Heisterkamp ist diese Pflege noch weniger zu entbehren.

Erwähnt möge schließlich noch sein, daß es vorzugsweise die Feldulme (*Ulmus campestris*), weniger die Flatterulme (*Ulmus effusa*) ist, welche bei uns angebaut wird.

§ 104.

D i e E r l e .

Die Erle ist eine in unserem Forsthaushalt geradezu unentbehrliche Holzart; zahlreichere größere oder kleinere Flächen in unseren Waldungen würden schwer kultivirbar sein, keine oder nur sehr geringe Erträge an Stelle der oft sehr bedeutenden Nutzung geben, wenn uns nicht in der Erle eine Holzart zur Verfügung stände, die, auf feuchtem Boden vorzüglich gedeihend, selbst auf nassen Standort noch gutes Wachsthum zeigt und den eigentlichen Bruchboden auf oft ausgedehnten Flächen bedeckt. Es wird wenige Reviere geben, in welchen die Erle nicht in kleineren oder größeren Horsten auf nassen oder brüchigem Boden, in feuchten Mulden und Einsenkungen, am Rande der Wasserläufe vorkommt, und fast jeder Forstmann hat in geringerem oder höherem Grad mit ihrer Nachzucht zu thun. Ihr zu mancherlei Nutzholzzwecken, wie zur Pulverfabrikation gesuchtes und gut bezahltes Holz hat an nicht wenig Orten ihrem Anbau größere Ausdehnung verschafft, und die schnellwüchsige Erle gehört entschieden zu den finanziell rentabelsten Holzarten.

Ihr Anbau aber muß fast ausschließlich durch die Pflanzung geschehen, nachdem die Saat auf den für die Erle geeigneten feuchten, grasmühsigen Dertlichkeiten zu unsicher ist, die erscheinenden Pflänzchen durch Graswuchs, Aufrieren zu häufig wieder vernichtet werden. Zur Pflanzung taugliches Material findet sich nun zuweilen als natürlicher Anflug an Grabenrändern, Aufwürfen und ähnlichen Stellen vor und lassen sich solche Wildlinge zur Kultur benutzen; in den meisten Fällen aber wird man doch zu im Saatbeet erzogenen Pflanzen greifen müssen.

Die Erziehung von Erlenpflanzen in unseren auch für andere Holzarten bestimmten Forstgärten stößt bisweilen auf Schwierigkeiten, da die Erle wie zur Keimung, so zu freudigem Gedeihen der Pflanzen schon in frühester Jugend mehr Feuchtigkeit bedarf, als den meisten Holzarten zuträglich und mit Rücksicht auf Graswuchs und Aufrieren für unsere Forstgärten erwünscht ist.¹⁾ Man wird daher in den meisten Fällen gut thun, für die Erlenachzucht einen eigenen kleinen Saatkamp in geeigneter, hinreichend frischer oder feuchter Dertlichkeit anzulegen, und richtet hiebei sein Augenmerk auf frischen, sandig lehmigen Boden, der mäßig tief bearbeitet wird, sich aber mit Rücksicht auf die Gefahr des Aufrierens vor der Ansaat wieder tüchtig gesetzt haben soll, eventuell etwas angedrückt wird. Nach Burkhardt²⁾ beschafft man sich ein entsprechendes Saatbeet auch dadurch, daß man guten, frischen Waldboden lediglich oberflächlich reinigt, ebnet und mit etwas guter Erde (zur Beschaffung des Keimbeets) überwirft. Pfeil³⁾ hat sich einen geeigneten Saatplatz dadurch hergestellt, daß er eine feuchte Mulde zuerst mit Sand, dann mit besserem Boden entsprechend hoch ausfüllen ließ, sich hiendurch die wünschenswerthe Grundfeuchtigkeit sichernd. Etwas Seitenschutz gegen die Sonne durch einen vorstehenden Bestand ist erwünscht, eine Einfriedigung des Kamps nur ausnahmsweise nöthig, da Wild die Erle nicht angeht.

Der im Spätherbst reifende Erlen Samen wird durch Sammeln der Zäpfchen im November und Ausklingen im warmem Zimmer gewonnen; da nun die Keimkraft desselben schon binnen Jahresfrist zum großen Theil verloren geht, so ergibt sich hiendurch die Frühjahrs Saat mit frischem Samen von selbst als Regel. Mit selbst gewonnenem Samen stellt man in der Regel Keimproben nicht an, bei gekauftem sucht man sich durch Berdrücken auf dem Nagel zu überzeugen, ob er die

¹⁾ Jäger, Forstfulturwesen. S. 361.

²⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 227.

³⁾ Deutsche Holzzucht. S. 342.

nöthige Feuchtigkeit noch enthält, nicht durch längere Aufbewahrung zu stark ausgetrocknet ist. — Im Frühjahr durch Auffischen aus dem Wasser gesammelter Samen soll nach oberflächlichem Abtrocknen sofort ausgesät werden.

Die Aussaat selbst erfolgt bisweilen noch als Vollsaat ziemlich dicht auf die wie oben angegeben zugerichtete Saatbeetfläche, mit Rücksicht auf die bei feuchtem Boden doppelt nöthige Reinigung von dem zahlreich erscheinenden Gras und Unkraut aber wohl auch bei der Erde besser als Rillensaat, und wenden wir bei derselben gleichfalls das Doppelrillen herstellende Saatbrett an, durch welches auch zugleich das nöthige Festdrücken des Bodens erfolgt. Ebenso lässt sich zur Erzielung rascher und gleichförmiger Saat das Figur 13 abgebildete Saatbrett (§. § 55) verwenden und darf die Saat nicht zu dünn vorgenommen werden, da die Keimkraft des Samens eine nur mäßige. — Das Samenquantum ist darnach zu bemessen, ob man die Pflanzen etwa einjährig verschulen oder als zwei- und dreijährige Saatbeetpflanzen verwenden will, in welch letzterem Fall entsprechend dünner zu säen ist. In ersterem Fall wird man zur Rillensaat bei nur 10—12 cm Rillenentfernung 6 Pfund, bei Benutzung des Doppelrillenbretts nach unsern Versuchen selbst bis 9 Pfund pro Ar verwenden, in letzterem Fall bei einem Abstand der Rillen von etwa 25 cm kaum die Hälfte.

Die Bedeckung des kleinen Samens darf nur eine schwache sein, ja es genügt selbst eine bloße Vermischung mit der oberen Bodenschicht, wie sie selbst durch Saat im Winter auf den Schnee erzielt wird.¹⁾ Doch bringt solch geringe Deckung die Gefahr des Austrocknens in der Keimperiode in erhöhtem Maße mit sich, und bei der Empfindlichkeit des Samens hiegegen wird man lieber die nach Baur's Versuchen zulässige und zweckmäßige Deckung von 1 cm Stärke wählen, eine stärkere aber vermeiden; eine solche von 1,5 cm beeinträchtigte bereits die Keimung, eine solche von 3 em hinderte sie vollständig.

Von großer Bedeutung für den Erfolg der Saat ist ein entsprechendes Feuchthalten des Saatbeetes während der Keimperiode; durch aufgelegtes Nadelholzreisig oder durch Schutzwitter sucht man die vorhandene Bodenfeuchtigkeit zu erhalten und greift, wo letztere fehlt oder verloren ging, zur Gießkanne. Wird dies unterlassen, so keimt nach unsern Erfahrungen in trockenem Frühjahr und bei fehlendem Seiten- schutz kaum ein Korn; nach Burkhardt's Angabe läuft zwar nicht selten ein Theil des Samens im zweiten Jahr nach — aber als verunglückt ist die Saat doch zu betrachten!

¹⁾ Allgem. F.- u. F.-B. 1863. S. 369.

Die sich rasch entwickelnden jungen Erlen sind wenig Gefahren ausgesetzt: sie werden von Wild und Mäusen nicht angegangen, sind in feuchten Lagen von Engerlingen nicht bedroht, gegen Spätfröste fast ganz unempfindlich. Am ersten leiden sie etwa in Folge größerer Bodenfeuchtigkeit durch Auffrieren. — Als einen den Keimlingen speziell gefährlichen Feind bezeichnet Baur¹⁾ die Regenwürmer, welche dieselben in ihre Gänge ziehen und verzehren.

In den meisten Fällen wird man die Erle als unverschulte zwei- oder dreijährige Saatbeetpflanze verwenden können; sie erreicht in diesem Alter eine für die meisten Dertlichkeiten genügende Stärke. Sie im Saatbeet noch älter werden zu lassen — Pfeil, der sich gegen jedes Verschulen der Erle ausspricht, erklärt dies selbst bis zum 5. Lebensjahr für zulässig²⁾ — möchten wir für die schnellwüchsige Erle nicht empfehlen.

Sind aber die Pflanzen im Saatbeet verhältnismäßig dicht aufgegangen, für die beabsichtigten Kulturen aber kräftige, stärkere Pflanzen nötig, so verschult man die einjährigen Erlen mit bestem Erfolg, etwa im Verband von 15 auf 25 oder 30 cm und wird dann nach weiteren 2 Jahren bereits meterhohe, sehr kräftige Pflanzen haben; ja bei Verwendung kräftiger einjähriger Pflanzen und gutem, frischem Boden genügt oft schon einjähriges Stehen in der Pflanzschule zur Erziehung hinreichend starker Pflanzen. — Ergend welcher Wurzelkorrektur bedürfen die zu verschulenden Erlenpflanzen nicht und ebenso wenig ist irgend welche Pflege der Pflanzbeete durch Beschneiden der Reste nötig.

Eigentliche Erlenheister erzieht man wohl nirgends; bedarf man besonders starker Pflanzen, so verschult man die einjährigen Pflanzen in etwas weiterem Verband als oben angegeben, und lässt sie ein Jahr, höchstens zwei, länger in der Pflanzschule. Es geht dann beim Auspflanzen allerdings nicht ohne einigen Wurzelverlust ab, den aber die Erle auf zufagendem Standort leichtträgt. — Das Gedeihen derselben ist auf solchem ein außerordentlich sicheres. —

Das vorstehend Gesagte bezieht sich vorzugsweise auf die allgemein verbreitete Schwarzerle (*Alnus glutinosa*); doch bedingt, nach unseren Wahrnehmungen im hiesigen Forstgarten, die Anzucht der Weißerle (*A. incana*) keinerlei Abweichungen.

¹⁾ Monatschr. f. J.-W. 1875. S. 349.

²⁾ Krit. Blätter. XXXI. S. 79.

§ 105.

Die Edelkastanie.

Die Edelkastanie (*Castanea vesca*) hat bisher in unsren forstlichen Lehrbüchern nahezu keine Beachtung gefunden, und es ist der Grund hiefür wohl vorzugsweise in ihrem lokal eng begrenzten Vorkommen zu suchen; hatte sie doch innerhalb der deutschen Grenzenfahle ihr Gebiet lediglich in einem Theil der Rheinpfalz und war doch selbst dort dies Gebiet durch ihren Genossen, den Weinstock, nach und nach nicht unweesentlich eingeengt worden. Durch die Einverleibung Elsaß-Lothringens in das deutsche Reich ist aber die Kastanie in erhöhtem Maße ein deutscher Waldbaum geworden, da im Elsaß ziemlich bedeutende Flächen mit derselben bestockt sind, und Angesichts der hohen Erträge, welche der Kastanienniederwald durch die Verwendung der Stangen als Nebpfähle und Reifstangen zu liefern vermag,¹⁾ Angesichts der Fähigkeit der Kastanie, auch auf geringerem, oberflächlich vermagertem Boden noch hinreichend zu gedeihen, denselben durch reichen Laubabfall wieder zu verbessern, ist ihr Gebiet dorthin selbst in starkem Wachsen begriffen. Auch in der Rheinpfalz sucht man die edle Holzart möglichst zu verbreiten, und ihre eben erwähnten Eigenschaften lassen sie als zur Bestockung und Verbesserung der heruntergekommenen Vorberge des Pfälzerwaldes vielerorts sehr geeignet erscheinen. Das Klima und resp. die Höhenlage ziehen allerdings dieser Verbreitung der Kastanie in Pfalz und Elsaß, wie für das übrige Deutschland entsprechende Grenzen, die mit jenen für den Weinbau nahe zusammenhängen.

Eigentliche Kastanien-Hochwälder kommen in Deutschland kaum vor, die Kastanie wird fast ausschließlich als Niederwald, im kleinen Privatbesitz auch als Mittelwald oder Blänterwald behandelt — so ist von einer natürlichen Verjüngung und Nachzucht bei ihr nur wenig die Rede und die Neubegründung wie Vervollständigung von Kastanienbeständen erfolgt auf künstlichem Wege, durch Saat oder Pflanzung.

Die Saat wird aber im Ganzen nur wenig angewendet; der bekanntlich eßbare Samen ist theuer, hat unter den Nachstellungen der Mäuse, Häher, Eichhörnchen und des Wildes zu leiden, und namentlich wo Wildschweine vorkommen, ist derselbe in hohem Grad gefährdet; daher gibt man der Pflanzung den Vorzug, und wo ihr Anbau überhaupt betrieben wird, ist die Kastanie Gegenstand der Anzucht im Saatbeet.

¹⁾ Forstl. Blätter. 1877. S. 70.

Die Erziehung der Kastanienpflanzen¹⁾ erfolgt nun in Saatkämpen, für welche man guten, frischen Boden und eine namentlich gegen Spätfröste geschützte Lage aussucht, und die hinreichend tief rauolt und gut gedüngt werden; eine Bodenbearbeitung von etwa 40 cm Tiefe wird hierbei als zweckmäßig erachtet, zur Düngung aber namentlich kali reicher Dünger empfohlen. Ein Mengedünger, bestehend aus gleichen Gewichtstheilen Kali-Superphosphat, Knochenmehl und Humus, und angewendet in einer Quantität von 15 Kilogr. pro Ar hat sich insbesondere auf dem mineralisch armen Boden des Buntsandsteins bewährt. Auch Stalldünger wird mit sehr gutem Erfolg verwendet. — Wo einiger Wildstand vorhanden, sind die Saatkämpe entsprechend einzufriedigen, weshalb Wanderingkämpe minder am Platz sind.

Die Aussaat der Beete erfolgt mit Rücksicht auf die oben bereits erwähnten Gefahren, die dem Samen im Winterlager drohen, stets im Frühjahr, und werden die in günstigen Lagen fast alljährlich gedeihenden Früchte entweder in den Hüllen (Tigeln) oder durch Einschlagen in trocknen Sand, wobei Früchte und Sand in dünnen Lagen abwechseln, über Winter aufbewahrt.

Was die Auswahl des Samens anbelangt, so gibt man mit Rücksicht auf den Kostenpunkt der gewöhnlichen, kleineren Kastanie den Vorzug vor der größern sogenannten Marone. Das Saatmaterial ist stets aus zuverlässiger Quelle zu beziehen, weil die im Handel vorkommenden Früchte zur Verhütung des Keimens leicht gedörrt und dadurch natürlich zur Aussaat unbrauchbar werden.

Trotz guter Aufbewahrung beginnen die Kastanien gegen das Frühjahr zu nicht selten zu keimen. Während nun ein Kastanienzüchter²⁾ sorgfältige Schonung dieser Keime und frühzeitige Saat, vor Mitte April, welche sonst als die richtigste Zeit betrachtet wird, verlangt, keimt ein anderer³⁾ dieselben in der Art, wie es da und dort bei Eicheln geschieht, ab, nachdem sie etwa 3 cm lang getrieben haben, jedenfalls in der Absicht, hiedurch an Stelle der ziemlich entwickelten Pfahlwurzelbildung eine für die Verpflanzung günstigere Bewurzelung zu erzielen.

Die Aussaat selbst erfolgt, wie erwähnt, etwa Mitte April und zwar in mit der Hacke oder dem Rillenzieher gezogene, etwa 6 cm tiefe Rillen, deren Entfernung 15 bis 30 cm beträgt; erstere Entfernung ist

¹⁾ Vergl. hierüber die Aufsätze: Monatsschr. 1876. S. 489; 1877. S. 273; Forstl. Blätter. 1877. S. 70; Allgem. F.-u. F.-B. 1879. S. 205; dann Pannewitz, der Anbau der Lärche, süßen Kastanie &c. 1855.

²⁾ Allgem. F.-u. F.-B. 1879. S. 205.

³⁾ Oberförster Weidmann in Pannewitz, der Anbau der Lärche &c. S. 59.

jedoch nur zulässig, wenn die Verwendung einjähriger Pflanzen in Absicht liegt, während bei beabsichtigtem zwei oder gar drei Jahre dauerndem Verbleiben der Pflanzen im Saatbeet eine größere Entfernung der Rillen — bis zu 30 cm — zu wählen ist.

In die Rillen werden die Früchte einzeln in etwa 5 cm Entfernung eingelegt und sodann durch Beziehen der Erde mit dem Rechen 3 — 4 cm stark gedeckt. Oberförster Kaysing¹⁾ empfiehlt hiebei, sehr darauf zu achten, daß die Spitzen der Früchte nach unten liegen, wodurch eine günstigere Wurzelsbildung erzielt werde, während ein anderer erfahrener Kastanienzüchter, Oberförster Österheld,²⁾ diese Vorsicht nicht für nöthig hält.

Die Angabe des pro Ar nöthigen Samenquantums schwankt von $\frac{1}{2}$ bis $1\frac{1}{2}$ hl, wobei die Größe der Früchte, wie die Entfernung der Rillen von wesentlichem Einfluß sein werden. Der Unterschied in der Größe der Früchte macht sich in den verschiedenen Angaben über deren Zahl in einem Hektoliter geltend, welche nach einer Mittheilung 10000, nach einer anderen 15000 Stück beträgt.

Einige Wochen nach der Aussaat, während welcher Zeit die Saatbeete gegen Hähne und Mäuse zu schützen sind, keimen die Pflänzchen unter Rücklassung der Kotyledonen im Boden auf. Dieselben sind gegen Spätfröste empfindlich und durch Reisig oder Schutzgitter gegen dieselben zu sichern.

Bei entsprechender Pflege durch Lockerung des Bodens und Reinhalten von Unkraut können die Pflanzen schon im ersten Jahr auf gut gedüngtem Boden eine Höhe von 40 cm, und selbst mehr erreichen und dann sofort im nächsten Frühjahr zur Auspflanzung verwendet werden; bei geringerer Entwicklung bleiben sie ein weiteres Jahr im Saatbeet und gelangen also zweijährig zur Verwendung, in welchem Alter sie der Hauptmasse nach wohl stets die nöthige Stärke erreicht haben. Sie noch ein drittes Jahr im Saatbeet stehen zu lassen, ist mit Rücksicht auf die starke Entwicklung der Pfahlwurzel nicht zu empfehlen.

Sowohl unter den ein- wie zweijährig zur Verwendung bestimmten Pflanzen werden sich stets eine Anzahl minder gut entwickelter, zur Schlagnachbesserung noch zu schwacher Pflanzlinge finden, welche sodann in nicht zu engem Verband verschult, nach etwa zweijährigem Stehen im Pflanzbeet zur Benutzung kommen. Die Verschulung gilt sonach für die Edelkastanie als Ausnahme, nicht als Regel.

¹⁾ Monatsschrift f. d. J.- u. J.-W. 1876. S. 489 ff.

²⁾ Monatsschrift f. d. J.- u. J.-W. 1877. S. 273 ff.

Durch Frost stark beschädigte¹⁾ oder sonst krüppelhaft gewachsene Pflanzen schneidet man tief am Boden ab, worauf kräftige Lohden erscheinen, deren Zahl man durch Ausbrechen reduzirt. Die im Saat- und Pflanzbeet erzogenen Pflanzen werden überhaupt nicht selten als sogenannte Stuhenpflanzen verwendet, indem man das Stämmchen vor dem Einpflanzen mit scharfer Baumscheere etwa 2 cm über dem Wurzelstock abschneidet und, wenn nöthig, die Schnittfläche an den Rändern mit einem Messer etwas glättet. Andere nehmen das Stuhen erst vor, wenn die Pflanze bereits ein Jahr verpflanzt und entsprechend angewurzelt ist. — Der Erfolg der Stuhen hat sich vielfach als ein sehr günstiger gezeigt.

§ 106.

Die Akazie.

Die Akazie, seit mehr als 200 Jahren aus Nordamerika zu uns eingeführt und nun vollständig eingebürgert, wurde vielfach als eine auch für den Wald sehr werthvolle Holzart betrachtet und warm empfohlen.²⁾ Ihre Schnellwüchsigkeit, ihre Fähigkeit, kräftige Stock- und Wurzaussschläge zu liefern, ihre geringen Ansprüche an den Boden im Zusammenhalt mit der mannigfachen Verwendbarkeit ihres Holzes schienen ihr eine Zukunft unter unsern Waldbäumen zu sichern — allein so manche andere, mißliche Eigenschaften traten dem entgegen: so daß baldige Nachlassen im Wuchs, die ästige, vielfach gabliche Stammform, der schwache Laubschirm und Laubabfall, die spitzen, Aufarbeitung und Verwendung des Reisigs erschwerenden Stacheln. So ist sie ein verhältnismäßig seltener Guest in unseren Waldungen, unseren Forstgärten geblieben, um so häufiger aber in Anlagen, Alleen u. dgl. zu finden; doch ist sie namentlich auf ärmerem Sandboden, zur Bodenbefestigung an steilen Böschungen auch da und dort Gegenstand forstlichen Unbaues, so daß ihr auch hier ein Platzchen einzuräumen sein wird.

Der Unbau der Akazie erfolgt stets durch Pflanzung mit unverschulten und verschulften Pflanzen, da die Saat der Gefahr des Verbeißen durch Hasen, welche diese Holzart jeder anderen vorzuziehen scheinen, in hohem Grad ausgesetzt ist.

An den Boden stellt die Akazie auch im Saatbeet keine großen Anforderungen, doch düngt man im Interesse der Erziehung kräftiger

¹⁾ Der strenge Winterfrost 1879/80 ließ die einjährige, kräftigen Kastanienpflanzen des hiesigen Forstgartens bis zum Boden herab erfrieren.

²⁾ Vergl. das Schriftchen von Pannewitz, „der Anbau der Lärche, Kastanie u. Akazie“. 1855.

Pflanzen den etwa benützten geringeren Boden in entsprechender Weise. Seitenschutz ist für die gegen Trockenheit wenig empfindliche Akazie entbehrlich, voller Lichtgenuss aber Bedürfnis.

Der Samen der Akazie, fast alljährlich gedeihend, ist leicht zu gewinnen und aufzubewahren, behält seine Keimkraft auch mehrere Jahre; da man gleichwohl am liebsten frischen Samen verwendet und die Einfassung während des Winters erfolgt, so gilt die Frühjahrsaat als Regel.

Die Aussaat selbst erfolgt in Rillen, welche mit Rücksicht auf den raschen Wuchs, die bedeutende Höhenentwicklung, welche die Akazie schon im ersten Lebensjahr zu zeigen pflegt, in einer Entfernung von etwa 20 cm zu ziehen sind.

Die Tiefe der Rillen darf eine im Verhältniß zur geringen Größe des Samenkorns bedeutende sein; nach den schon mehrfach erwähnten Versuchen Baur's macht nämlich die Akazie eine merkwürdige Ausnahme von der sonst gültigen Regel, daß die Stärke des Samenkorns mit der zweitfähigsten Stärke der demselben zu gebenden Bedeckung in engem Zusammenhang stehe. Jene Versuche haben nämlich ergeben, daß der Akaziensamen eine verhältnismäßig starke Bedeckung — bis zu 7 cm! — nicht nur verträgt, sondern bei einer etwas starken Deckung (bis zur erwähnten Grenze) sogar reichlicher keimt, kräftigere Pflanzen entwickelt, als bei einer schwachen Deckung von 1—2 cm, wie sie etwa der Stärke des Korns entsprechen würde. Selbst bei einer 10 cm starken Decke gingen noch Pflanzen auf, wenn auch spärlicher.

Die Aussaat selbst erfolgt aus der Hand und darf mit Rücksicht auf den hohen Prozentsatz keimfähiger Körner, welchen frischer Samen zu haben pflegt, und auf die rasche Entwicklung der Pflanzen nicht zu dicht erfolgen; man erhält sonst viel schwachen Ausschlag neben den besseren, aber doch von diesem beeinträchtigten Pflanzen. Burkhardt¹⁾ rechnet $1\frac{1}{2}$ Kilogr. pro Ar bei 30 cm weit entfernten Rillen, ein Quantum, das nach unsern Versuchen etwas knapp bemessen ist; nach diesen letzteren würden bei so bedeutender Rillenentfernung immer noch $2\frac{1}{2}$ Kilogr. pro Ar treffen.

Das Aufgehen des Samens erfolgt rasch und sicher, die Saatbeete bedürfen weder des Bedeckens noch Bestäubens mit Reisig und während des Sommers nur der nöthigen Pflege durch Ausjäten und Lockern, während des Winters aber eines genügenden Schutzes gegen die Hasen durch hinreichend dichte Einfriedigung; letztere äßen sonst die einjährige

¹⁾ Säen u. Pflz. S. 483.

Pflanzen bis auf den Boden ab, und scheinen die Akazien jeder andern Holzart vorzuziehen. Durch Winterfrost werden die weniger verholzten Spalten der Pflanzen nicht selten gefördert, doch ist der Nachtheil für die Pflanzen kein großer, indem die oberste gut gebliebene Seitenknospe (eine eigentliche Terminalknospe zeigt die Akazie überhaupt nicht) im Frühjahr die Bildung des neuen Gipfeltriebes übernimmt, den erfrorenen Theil allmählich abstößend; doch kann man durch Zurückschneiden bis aufs gesunde Holz zweckmäßig helfen. — Geht der Frostschaden tief herab, was bei starker Kälte wohl der Fall, so empfiehlt Burkhardt das Setzen der Pflanzen bis auf die Wurzel und Erziehung einer neuen Pflanze aus einer Ausschlagslohe.

Durch Spätfröste ist die spät ausschlagende Akazie nur wenig und nur bei spätem Eintreten derselben gefährdet, in letzterem Falle allerdings gegen dieselben empfindlich.

Unter günstigen Verhältnissen, namentlich bei milder dichter Saat, erreichen die Pflanzen schon im ersten Lebensjahr eine Höhe von 40 cm und können dann meist im nächsten Frühjahr verwendet werden; war ihre Entwicklung minder kräftig oder bedarf man stärkerer Pflanzen, so läßt man sie noch ein Jahr im Saatbeet stehen (und ist, wenn letzteres schon ursprünglich in Absicht liegt, ein größerer Rillenabstand — bis 30 cm — zu empfehlen), oder man verschult die einjährigen Pflanzen.

Die in einem Abstand von 25—30 cm verschulften Pflanzen entwickeln sich meist schon binnen Jahresfrist zu genügender Stärke und erreichen eine Höhe bis zu 1,5 m; zwei Jahre im Pflanzbeet stehend werden sie bis 2 m und darüber hoch und entsprechend stark — es zeigt wohl keine Holzart eine so rasche Entwicklung in den ersten Jugendjahren, wie die Akazie. Das Ausheben und die Verpflanzung solch stärkerer Pflanzen geht wohl nicht ohne Wurzelverlust vor sich, doch ist die Akazie hiergegen wenig empfindlich.

Die Erziehung stärkerer Heister für Alleen, Schneisen u. dgl. geschieht durch weitständigere, eventuell zweimalige Verschulung unter entsprechendem Wurzelschnitt — Kürzen der oft ziemlich weit ausstreichenden Seitenwurzeln — und unter entsprechender Pflege der Stämmchen durch Entfernung tief ange setzter Neste, und genügen 4—5 Jahre zur Erziehung eines solchen Heisters.

§ 107.

Die Hainbuche.

Die Hain- oder Weißbuche hat bekanntlich für den Hochwald nur geringe Bedeutung, ist in demselben mehr geduldet als erstrebt und vor-

zugswise nur als Lückenbüßer für die Buche in kalten Frostlagen, in Mulden und Einbeugungen mit frischem Boden und österen Spätfrösten am Platz. Größer ist ihre Bedeutung im Niederwald, Dank ihrem trefflichen Brennholz, wie ihrer reichen Ausschlagsfähigkeit. Als Bodenschuhholz unter Eichen findet man sie da und dort, ja man gibt ihr bisweilen sogar den Vorzug vor der Rothbuche¹⁾), die andern Orts entschieden zu diesem Zweck höher geschäzt wird.

Im Ganzen wird die Hainbuche nur selten Gegenstand forstlichen Anbaues sein, man überlässt fast allenthalben ihre Nachzucht der Natur, welche da, wo die Hainbuche einmal vorhanden, durch frühzeitiges, oftes und reichliches Samenträgen auch zur Genüge für solche zu sorgen pflegt. Deshalb, und weil man das etwa benötigte Pflanzmaterial wohl vielfach den natürlichen Anflügen entnehmen kann, pflegt die Hainbuche ein seltener Gast in unseren Forstgärten zu sein, der wir um der Vollständigkeit willen gleichwohl einen Platz hier anweisen.

Der Samen der Hainbuche, stets frisch zu verwenden, keimt Dank seiner harten Samenschale wohl regelmäßig erst im zweiten Jahre und man wird ihn daher gleich jenem der Esche behandeln: ihn entweder in frischem Boden hinreichend tief eingeschlagen bis zum nächsten Herbst aufbewahren, oder die im ersten Frühjahr mit dem während des Winters gesammelten frischen Samen angesäten Beete mit Moos oder Laub, das durch aufgelegte Reste festgehalten wird, so dick decken, daß Gras- und Unkrautwuchs dadurch verhindert werden. — Die Aussaat nimmt man wohl am zweckmäßigsten in Rillen, welche mit der Saatlatte in Abständen von 10—12 cm eingedrückt werden, vor und gibt dem Samen eine mäßige Bedeckung; Burkhardt²⁾ empfiehlt 1½ cm — eigene Erfahrungen fehlen uns über die Hainbuchensaat.

Will man stärkere Pflanzen erziehen, so wird man die Saatbeetpflanzen ein- oder zweijährig verschulen. Wir haben solche stärkere Pflanzen dadurch rasch und in guter Qualität erzogen, daß wir die in Beständen, denen die Hainbuche beigemischt ist, in großer Menge vorhandenen Keimpflänzchen nach Erscheinen der ersten Laubblätter mit dem kleinen Heyerschen Hohlohrer ausschneiden und mit dem nur 4—5 cm im Durchmesser haltenden Vällchen im Verband von 10 auf 20 cm einschulen ließen. Mit Rücksicht auf die ersparten Saatkosten, die gewonnene Zeit und den guten Erfolg erscheint diese Art der Pflanzenbeschaffung

¹⁾ Beiträge zur Kenntniß der forstlichen Verhältnisse von Hannover (Festschrift zur X. deutschen Forstversammlung). S. 39.

²⁾ Säen u. Pflz. S. 197.

nicht zu theuer; das Einschulen der Keimlinge war aber nöthig, weil erfahrungsgemäß in den dicht geschlossenen Beständen bis zum Herbst oft kaum ein Pflänzchen mehr vorhanden war — sonst würden wir den jedenfalls minder sorgfältig zu behandelnden und ohne Ballen einzuschulenden einjährigen Pflanzen den Vorzug gegeben haben.

Die eingeschulten Keimlinge, welchen durch Schuhgitter der nöthige Schutz gegen die Einwirkung der Sonne gegeben wurde, wuchsen innerhalb drei Jahren zu kräftigen, durchschnittlich 50—60 cm hohen Pflanzen heran, wie sie zu Nachbesserungen im Nieder- und Mittelwald erwünscht sind.

Von dem Feind, der die Hainbuche im Freien oft so wesentlich bedroht, von den Mäusen, hat dieselbe im Forstgarten weniger zu fürchten, da die Mäuse hier der Deckung durch Gras und Laub entbehrend nur selten Pflanzen benagen, sondern nur unterirdisch zu arbeiten, dem Samen mancher Holzarten nachzugehen pflegen. — Gegen Fröste ist die Hainbuche bekanntlich ganz unempfindlich, bedarf also keinerlei Schutzes.

Auch stärkere Pflanzen kann man nach Burkhardt's Mittheilungen¹⁾ wohl einschulen, wenn die Erziehung von Heistern zu Kopfholzstämmen u. dgl. in Absicht liegt, ein im forstlichen Haushalt immerhin seltener Fall. Engerer Stand und entsprechendes Aufschneideln sind bei der zur Aftbildung geneigten Hainbuche dann nicht zu entbehren.

§ 108.

Die Birke.

Gleich der Hainbuche ist auch die Birke eine Holzart, die nur ausnahmsweise Gegenstand eigentlichen forstlichen Anbaues ist und noch seltener in unsern Forstgärten angetroffen wird; die Entfernung eines schädlichen Uebermaßes von Birken ist viel öfter Aufgabe des Forstmannes als ihre Nachzucht! Wo sie einmal vorhanden, da pflegt, Dank dem fast alljährlich in Menge produzierten und durch seine Leichtigkeit sich überall hin verbreitenden Samen dieser Holzart, Birkenanfall in großer Menge da zu erscheinen, wo Licht und wunder Boden dies gestatten, und diesem Anfall werden wir denn meist auch jene Pflanzen entnehmen können, die wir etwa als Schuhholz für empfindliche Holzarten, zur Bildung von sogenannten Feuermänteln in ausgedehnten Kiefernforsten und zu ähnlichen Zwecken bedürfen. Es ist dies ein weiterer Grund, weshalb die Birke in Saatkämpen und Forstgärten auch dort

¹⁾ Säen u. Pflz. S. 198.

nicht angebaut zu werden pflegt, wo zu den genannten Kulturen Birkenpflanzen nothwendig sind. — Wo man sie aber in Föhrenbestände, in Niederwaldschläge einzumischen wünscht, da greift man fast stets zur Saat, selten zur Pflanzung.

Wollte man in einem Saatbeet Birkenpflanzen erziehen, so würde sich Ansaat mit dem unmittelbar nach der Samenreife im Herbst gesammelten frischen Samen empfehlen, da die Keimkraft des Birkensamens sehr rasch verloren geht; man sät die gut geeigneten Beete voll an und überstreut den Samen so dünn mit Erde, daß er eben dem Auge entzweigt — jede einigermaßen stärkere Decke hindert das Keimen. Ein Schutzgitter zur Vermeidung des Verschwemmens des Samens durch Regengüsse wird zweckmäßig sein. Nach Burkhardt's Angabe¹⁾ liegt etwas ausgetrockneter Samen nicht selten ein Jahr im Boden, bis er keimt, was durch Herbstsaat mit frischem Samen vermieden werden wird.

Zur Erziehung stärkerer Pflanzen, wenn solche den Schlägen nicht entnommen werden können oder deren Wurzelbildung dort eine für die Verpflanzung sehr ungünstige, weit austreichende ist, wie das auf geringem Sandboden der Fall, verschult man die einjährigen Pflanzen, die man auch, jedenfalls sicherer als aus der immerhin etwas unsicheren Saat im Saatbeet, aus natürlichen Anflügen entnimmt. Es muß dies Einschulen zeitig im Frühjahr geschehen, da die Birke bekanntlich sich bald begründt; ein Versuch, schon etwas angetriebene Birken einzuschulen, ist uns vollständig mißglückt! Die Entwicklung der Pflanzen ist eine rasche, und nach 2—3 Jahren wird man Pflanzen von entsprechender Stärke erzogen haben. Schutz irgend welcher Art — gegen Frost, Trockenheit, Wild — bedürfen die Birken nicht und ihre Pflege erstreckt sich auf das gewöhnliche Fäten und Lockern.

In etwas höherem Alter und Heisterstärke läßt sich die Birke nicht mehr mit gutem Erfolg verpflanzen, und selbst wenn sie dabei nicht zu Grunde geht, so bleibt doch ihr Wuchs lange ein kümmerlicher.²⁾ Das beginnende Weißwerden der Rinde am unteren Stammtheil gilt bekanntlich als Zeichen, daß die Zeit der Verpflanzbarkeit vorüber sei.

§ 109.

Die Linde.

Die Linde hat forstlich nur geringe Bedeutung und diese letztere schwindet, wo sie bei uns in Deutschland noch besteht, mehr und mehr;

¹⁾ Säen u. Pflz. S. 207.

²⁾ Pfeil, deutsche Holzzucht. S. 313.

die in unseren Hochwaldungen da und dort noch vorhandenen ältern Linden verschwinden bei unsren regelmäßigen Verjüngungen im Dunkelschlag wie beim kahlen Abtrieb, und der verhältnismäßig geringe Werth des Holzes gibt auch keine Veranlassung, ihre Nachzucht anzustreben. Auch im Niederwald ist sie, obwohl reich ausschlagend und von langer Dauer des Stocks, um des geringen Holzwerthes willen lediglich geduldet — es ist nur die Holzzucht außerhalb des Waldes oder die Waldverschönerung, für welche sie eine, allerdings geradezu hervorragende Bedeutung hat: als Alleebaum, in Parkanlagen, als Einzelbaum im Dorf und Gehöfte finden wir die Linde allenthalben. So wird sie denn auch hier und da in mäßiger Zahl in unsren Forstgärten erzogen, mehr zum Verkauf, als zum eigenen Gebrauch; doch überlassen wir diese wohl besser dem Handelsgärtner, uns auf die Erziehung der eigentlichen Waldpflanzen beschränkend.

Stets handelt es sich aber bei der Linde um Erziehung starker Pflanzen, um Heisterzucht, wozu zweimalige Verschulung nothwendig ist. Der im Herbst zeitig gesammelte und sofort ausgefäte Samen keimt nach Pfeils Angabe¹⁾ im nächsten Frühjahr, während über Winter trocken aufbewahrter und im Frühjahr ausgesäter Samen stets erst im zweiten Jahr zu keimen pflegt.

Die aufgehenden Pflänzchen sind durch Gitter gegen Frost und Hitze zu schützen, erreichen im ersten Jahre eine Höhe bis zu 20 cm und werden dann im nächsten Jahr verschult. Mit gutem Erfolg haben wir auch Keimlinge, die unter alten Linden im frischen Waldboden in größerer Zahl erschienen, nach Her vorbrechen der ersten Laubblätter mit kleinen Bällchen eingeschult.²⁾

Die Stammbildung der jungen Pflanzen zeigte sich in unserem Forstgarten nicht sehr günstig, und Gabelbildung, wie starke seitliche Verästelung machten ziemliche Pflege durch Beschneiden nöthig. — Als etwa meterhohe Pflanzen werden sie sodann, etwa 4—5 jährig, in den Heisterkamp versetzt und erreichen dort unter entsprechender Pflege immerhin erst in 10—12 jährigem Alter jene bedeutendere Stärke, welche man für Alleeäume u. dgl. fordert. — Auch stärkere Wildlinge kann man wohl in den Heisterkamp einschulen und dadurch rascher zum Ziel kommen, ja selbst Wurzelbrut kann hiezu verwendet werden, und die leichte Verpflanzbarkeit der Linde lässt auch solche mit schwacher Bewurzelung noch Gedeihen finden.³⁾

¹⁾ Pfeil, deutsche Holzzucht. S. 291.

²⁾ Auch von Burkhardt empfohlen, siehe Säen u. Pflz. S. 479.

³⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 479.

II. Abschnitt.

Die Nadelhölzer.

§ 110.

Die Weißtanne.

Gleich der Rothbuche, der sie ja bezüglich ihres Verhaltens in manchen Stücken ähnelt, war auch die Weißtanne in den Forstgärten früher ein seltener Guest. Wo sie bereits im reinen oder gemischten Bestand vorhanden war, da überließ man die Sorge für ihre Nachzucht der Natur, und zwar meist mit gutem Erfolge, wenn die Verjüngung der Bestände in entsprechender Weise, auf dem Weg der raschern oder langameren Fäulschlagwirthschaft erfolgte. Wollte man einzelne Lücken mit Tannen auspflanzen, so griff man zur kräftigen Ballenpflanze, die sich in den Nachziehen, auf Blößen und Lücken in den ältern Beständen in jeder Zahl und Stärke vorsand; zur künstlichen Nachzucht aber, wo solche überhaupt stattfand, benützte man in der Regel die Saat unter Schutzbestand — und so war wenig Veranlassung zur Erziehung der Tanne im Forstgarten gegeben.

Das ist nun vielfach anders geworden! Die großen Kalamitäten, unter denen die Rivalin der Tanne im Mittelgebirg, die Fichte, in ihren künstlich durch Käthschlagbetrieb mit nachfolgender Kultur erzeugenen, ausgedehnten reinen Beständen durch Schneebrech, Windwurf, Borkenkäfer namentlich in den letzten Dezzennien gelitten hat, ließen den Werth der Tanne und einer Beimischung derselben in die Fichtenbestände in erhöhtem Maße erkennen, die Erzielung letzterer selbst zum Wirthschaftsgrundsatz in nicht wenigen Waldgebieten werden. Zur Ausfüllung der durch Schnee und Sturm entstandenen Lücken in Föhren- und Fichtenbeständen, zum Unterbau der sich frühzeitig lichtenden Föhrenbestände erschien ebenfalls die schattenertragende Tanne vielfach als die geeignete Holzart, und ebenso erkannte man ihren Werth als Nutzholz lieferndes Mischholz für die Buchenbestände.

Man sah aber auch, daß die Pflanzung meist rascher und sicherer als die Saat, ja in manchen Fällen allein zum gewünschten Ziele führe — so z. B. bei der Aufforstung der Windbruchflächen — und da Wildlinge dort, wo die Tanne erst eingebürgert werden sollte, gar nicht, andern Orts wenigstens nicht in der gewünschten Menge und

Qualität zur Verfügung stunden, so mußte man sich seinen Pflanzenbedarf künstlich erziehen, und in Folge dieser Verhältnisse sehen wir die Tanne jetzt vielfach in unseren Forstgärten, ihre Erziehung als eine Aufgabe des Forstverwalters.

Diese Aufgabe besteht nun meist in der Anzucht kräftiger verschulter Tannen, und es wird das Material für die Pflanzbeete entweder im Saatbeet erzogen oder, jedoch in minderer Maße, den natürlichen Anflügen entnommen. Fassen wir zunächst den ersten Fall ins Auge.

Für die Anlage eines Tannensaatbeets ist die Auswahl eines gegen Spätfrost, wie gegen die grelle Einwirkung der Sonne geschützten Platzes von besonderer Wichtigkeit. Bestandslücken, hinreichend groß, um direkte Über schirmung des Beetes und den Fall der Traufe auf dasselbe zu vermeiden, wählt man besonders gerne, obwohl man die Saatbeete auch ohne solchen Seitenschutz anlegen kann, in welch letzterem Fall jedoch Schutzvorrichtungen gegen Frost und Hitze nicht zu umgehen sind.¹⁾ Wir würden aber einen solch ungeschützten Platz nur im Rothfall wählen! Bezuglich der Anlage von Saatbeeten unter schützendem Oberstand, wie solche wohl auch geschieht, gilt das bei der Rothbuche hierüber Gesagte.

Die Bearbeitung des hinreichend frischen Bodens erfolgt in üblicher Weise unter Vermeidung zu tiefer Lockerung oder Düngung, um die Bildung einer zu starken Pfahlwurzel, zu welcher die junge Tanne geneigt ist, nicht noch mehr zu befürdern; 25–30 cm genügen stets.

Der Samen der Weißtanne, der vielfach auf den betreffenden Revieren selbst gesammelt wird, wodurch gute Qualität vor Allem gesichert erscheint, erhält sich nur bis zum kommenden Frühjahr keimfähig und bedarf zu möglichster Erhaltung dieser Keimfähigkeit einer aufmerksamen Behandlung während des Winters. Er ist namentlich vor Erhitzung, die durch dichtes Aufeinanderliegen leicht eintritt, zu bewahren, wird zu diesem Zweck in den allerdings leicht zerfallenden Zapfen oder mit deren Schuppen gemischt nicht zu dicht aufgeschüttet, durch anfänglich zugeführten Luftzug gut abgetrocknet und dann fleißig umgeschaufelt. — Die Keimkraft erprobt man einfach durch die Schnittprobe, bei welcher sich der frische, weiße Keim im Innern des stark nach Terpentin riechenden Samenkorns zeigen muß.

Angesichts der immerhin etwas umständlichen Überwinterung des Samens wendet man bei der Weißtanne gerne die Herbstsaat an, und

¹⁾ Vergl. über Tannenerziehung: Burkhardt, Aus dem Walde. IV. S. 67 (Grebe) und III. S. 168. (Forstrath Lang.)

kann dies um so eher thun, als der Samen im Winterlager weder durch Mäuse, noch durch Vögel bedroht ist; der starke Terpentingehalt scheint ein Schutz gegen die Thierwelt zu sein. Doch ist man bei Bezug des Samens von weiterher oder frühzeitig eintretendem Winter nicht selten zur Frühjahrssaat genötigt; Grebe empfiehlt solche bei anhaltend feuchtem Herbstwetter und schwerem Boden, und Gerwig¹⁾ bezeichnet die Frühjahrssaat als zweckmäßig wegen der Spätfröste, durch welche die sehr frühzeitig erscheinenden Keimlinge der Herbstsaat gefährdet sind.

Die Aussaat erfolgt in etwa 2 cm tiefe und 2 cm breite, mit der Saatlatte eingedrückte Rillen, deren Abstand bei der geringen Entwicklung der Tanne in den beiden ersten Lebensjahren nur etwa 12 cm zu betragen braucht, und wird der starke, von Flügeln, Schuppenresten u. dgl. möglichst gereinigte Samen aus der Hand — ohne Anwendung der hier entbehrlichen Säevorrichtungen — möglichst gleichmäßig und in der Güte des Samens entsprechender Menge eingestreut. E. Heher²⁾ läßt auch den Weißtannensamen bei der Frühjahrssaat zur Beförderung des Keimens acht Tage lang in feuchten Sand einschlagen. — Das nötige Samenquantum gibt Grebe³⁾ pro Ar auf 5—6 Pfund bei der nach unserer Meinung überflüssig großen Entfernung der Rillen von 21 cm an; bei dem von uns empfohlenen geringeren Abstand derselben wird sich dieser nach unsern Erfahrungen knapp bemessene Bedarf wesentlich erhöhen, bei Frühjahrssaat ohnehin etwas reichlicher zu bemessen sein, und ist die Angabe Zudeichs,⁴⁾ daß 8—12 Kilogr. pro Ar nötig seien, als richtig zu betrachten.

Eine Deckung des Samens zu 1—2 cm hat sich nach Baur's Versuchen für die Tanne als die der Keimung zuträglichste erwiesen, eine solche von 3 cm schon als sehr nachtheilig; nach Grebes Angabe dagegen wurde im Thüringer Wald eine Decke von 2,6 cm noch mit gutem Erfolg angewendet.

Zum Schutz gegen das Austrocknen deckt man die angesäten Beete mit Nadelholzreisig; die im Herbst besäten Beete aber deckt man in solcher Weise etwa nach eingetretenem stärkern Frost, um dadurch allzu früher Keimung entgegen zu wirken. Durch Aufstecken des Reisigs oder durch Schüttgitter aber schützt man die empfindlichen Keimlinge gegen Spätfröste, wie grelle Sonneneinwirkung und Trockenheit, welch letztere die schwachen Pflänzchen während des Sommers ebenfalls gefährdet, und wo der Seiten-

¹⁾ Die Weißtanne im Schwarzwald. S. 137.

²⁾ Allgem. F.- u. F.-B. 1866. S. 210.

³⁾ Aus d. Walde. IV. S. 67 ff.

⁴⁾ Forst- und Jagdkalender. 1882. S. 113.

schutz gegen Süd und West fehlt, da sind Schutzbretter, allmählich höher gestellt, oder Schutzhölzer, aus leichtem Stangengerüst mit Nadelholzreisig gedeckt, welch letzteres allmählich abgenommen und zuletzt gleich den Schutzbrettern ganz entfernt wird, zur Sicherung unserer Tannenpflänzchen nicht wohl entbehrlich.

Als einen Feind der keimenden Tannen nennt uns Dresler¹⁾ den Erdloch, einen Feind, gegen welchen uns nur mangelhafte Mittel zur Verfügung stehen (§. 65).

Im Übrigen pflegen wir unsere Tannensaatbeete, die wir auch im nächsten Frühjahr noch durch Schutzbretter gegen Spätfröste schützen, durch Fäten und Lokeren in gleicher Weise, wie die andern Holzarten. Pfeil²⁾ empfiehlt nach erfolgtem Aufgehen das Eindecken mit Moos, so daß nur die Nadeln heraussehen, als ein Verfahren, das sich durch Erhaltung der Bodenfrische für die junge Tanne besonders empfehle.

Nur ausnahmsweise werden die bekanntlich sich sehr langsam entwickelnden Tannenpflänzchen — Grebe gibt als Resultat angestellter Messungen die durchschnittliche mittlere Stammlänge der einjährigen Pflanze zu 5, der zweijährigen zu 12 cm an — im Alter von zwei oder drei Jahren direkt verwendet; es wäre dies nur etwa zu Unter-pflanzungen zulässig. In der Regel aber werden die Pflänzchen zu weiterer Erstärkung aus dem Saatbeet ins Pflanzbeet versetzt, und zwar im zweijährigen Alter; die einjährigen Pflanzen sind noch zu klein, die dreijährigen aber erschweren durch ihre schon tiefer gehende Pfahlwurzel die Verschulung.

In die ebenfalls wo möglich etwas geschützt liegenden Pflanzbeete verschult man die Pflänzchen am einfachsten mittelst des Seeholzes nach der Schnur, und erleichtert die Pfahlwurzelbildung der Tanne diese Art der Verschulung. Ist diese Pfahlwurzel etwas zu stark entwickelt, so empfiehlt sich sowohl zum leichteren Einschulen, wie behufs Erzielung günstigerer Wurzelbildung für die spätere Auspflanzung ein mäßiges Kürzen derselben. — Bei der Verschulung (wie später bei der Auspflanzung ins Freie) empfiehlt Gerwig³⁾ eine „an Aengstlichkeit grenzende Vorsicht“ bezüglich des Feuchterhaltens der Wurzeln. — Die Entfernung der Pflanzreihen wählt man mit Rücksicht auf dies etwas längere Verbleiben der Tanne im Pflanzbeet und auf die in den ersten Jugendjahren vorwiegende Entwicklung der Seitenäste nicht zu eng und jeden-

¹⁾ Die Weißtanne. S. 55.

²⁾ Deutsche Holzpflege. S. 524.

³⁾ Die Weißtanne im Schwarzwald. S. 132.

falls weiter, als bei der Fichte; wir würden den Verband von 12 bis 15 cm in den Reihen auf 20 cm Reihenabstand für den entsprechendsten, den von Gerwig empfohlenen von nur 6 cm in den Reihen (bei 24 cm Abstand) für einen etwas zu engen halten. Die Stärke, welche die Pflanzen im Verschulungsbett erreichen, die Zeit, die sie hienach in demselben verbleiben sollen, kann allerdings den geringern Abstand zulässig oder den größern nothwendig machen; in der Regel und bei normaler Entwicklung wird man die zweijährig verschulnten Pflanzen 3 bis höchstens 4 Jahre im Pflanzbett belassen und dadurch genügend starke Pflanzen erziehen, während 2 Jahre hiezu nur ausnahmsweise ausreichen. Eine nochmälige Verschulung zur Erziehung besonders starker Pflanzen¹⁾ erweist sich wohl als zu kostspielig und wird daher nur in besonderen Fällen Platz greifen können.

An Stelle der im Saatbeet erzogenen Pflanzen kann man auch mit gutem Erfolg Wildlinge einschulen²⁾, und zwar sowohl kleinere, zwei bis dreijährige, wie auch stärkere, bereits 25—30 cm hohe Pflanzen, welche zu besonderer Stärke herangezogen werden sollen. Mit ersten haben wir selbst mit bestem Erfolg manipulirt; die in den etwa durch Sturm etwas gelichteten alten Beständen nach reichen Samenjahren oft in großer Menge und kräftiger Entwicklung vorhandenen Pflänzchen (am besten die zweijährigen) werden mittelst eines kleinen Schippchens ohne Ballen herausgehoben, in mit feuchtem Moos belegten Körben gesammelt und alsbald wieder eingeschult. Wo die eben genannten Vorbedingungen gegeben sind, die Pflänzchen also nicht etwa zusammen gesucht werden müssen, sind solche Wildlinge entschieden billiger als die in Saatbeeten erzogenen Pflanzen. — Die stärkeren Wildlinge werden ebenfalls ohne Ballen ausgehoben, die Seitenzweige etwas zurückgestutzt und die Verschulung erfolgt sodann in mindestens 30 cm entfernten Reihen in einem Pflanzenabstand von etwa 12 cm.³⁾ Alle diese aus dem Bestandschuh in frei gelegene Saatbeete verschulnten Wildlinge bedürfen aber eines entsprechenden Schutzes, da — wie allen Pflanzen — so insbesondere den Tannen ein plötzlicher Übergang vom Schatten ins volle Licht sehr nachtheilig wird; im Pflanzbett sind sie allmählich an den freien Stand zu gewöhnen, und zu diesem Behuf

¹⁾ Bergl. Dresler, die Weißtanne. S. 59, und Monatschr. f. d. F.-u. F.-W. 1879. S. 10.

²⁾ Gerwig, die Weißtanne. S. 140.

³⁾ Aus d. Walde. III. S. 173. (Dieser Abstand von nur 12 cm, wie ihn Lang empfiehlt, dürfte für stärkere Wildlinge wohl etwas gering sein. Ein Kürzen der Pfahlwurzel wird nicht zu umgehen sein.)

gibt man ihnen nach dem Einschulen eine Art Hochdeckung, indem man etwa 70—100 cm hohe leichte Stangengerüste mit Tannenästen durchlicht und die zuerst dichtere Decke durch allmähliche Wegnahme der Äste lichtet, zuletzt aber ganz entfernt. Den am Rand liegenden Beeten gibt man durch eingestekte Äste an der Süd- und Westseite noch weiteren Schutz; wo genügender Seitenschutz durch vorliegende Bestände gegeben, kann dies unterbleiben.

Schutz und Pflege der Tanne im Pflanzbeet besteht neben dem Fäten und Lockern, das aber nach dem im zweiten Jahre meist schon erfolgenden Feindangreifen der Äste entbehrlich und resp. unthunlich wird, zunächst in möglichster Bewahrung vor Spätfrösten, gegen welche die Tanne ja bekanntlich sehr empfindlich ist. Dies bezwecken wir nun durch Anwendung von Schutzgittern, und deren Anwendung ist für die Tanne ganz besonders zu empfehlen. Die Verschulung in Beete (statt in Länden) erleichtert deren Verwendung. Günstig ist die Eigenthümlichkeit der Tanne, die Gipfelknospe erst spät und nach den Seitenknospen zu entwickeln, so daß häufig nur die Seitentriebe vom Frost getroffen werden. Haben aber die jungen Weißtannen durch Frost den Höhentrieb verloren und bilden sich in Folge dessen aus Seitenknospen mehrere Gipfel, so schneide man baldigst alle diese Triebe bis auf den dienlichst scheinenden sogleich mit der Scheere ab.¹⁾

Manchen Orts üblich ist auch das oben schon erwähnte Stuhen der Seitenäste sowohl beim Einschulen der stärkeren Wildlinge, wie auch der schon länger im Pflanzbeet stehenden Pflanzen; nach Langs Angaben²⁾ soll durch dies alljährlich wiederholte Verfahren eine dichte Verästelung, stufiges Wachsthum und kräftiger Höhentrieb erzielt werden. Auch Gerwig will dadurch den Höhenwuchs befördern. Dresler³⁾ wendet dies Stuhen der Seitenäste, wozu die Affscheere benutzt wird, nur dann an, wenn sich dieselben besonders stark entwickeln und in einander zu verschlechten drohen; nach unseren eigenen Erfahrungen würde dasselbe in den meisten Fällen entbehrlich sein. Im Thüringer Wald scheint man das Stuhen der Äste gleichfalls nicht anzuwenden.

Als ein bisweilen angewandtes Verfahren zur Erziehung billiger Tannenpflanzen, sei auch noch das von uns schon oben (§ 83) geschilderte hier nochmals kurz erwähnt; dasselbe besteht darin, daß man in Heisterschulen (Eichen) zwischen je 2 Heister eine Tanne, zwischen je 2 Heister-

¹⁾ Gerwig, die Weißtanne. S. 140.

²⁾ Aus d. Walde. III. S. 173.

³⁾ Die Weißtanne. S. 59.

reihen eine Tannenreihe einschult und hiedurch mit sehr geringen Kosten unter dem Schutz der Heister kräftige Tannen zieht.

§ 111.

Die Fichte.

Keine Holzart ist wohl in unsren Forstgärten, unsren Saatkämpen seit nun schon geraumer Zeit mehr zu Haus als die Fichte; Millionen von Fichtenpflanzen werden alljährlich in Deutschland verwendet, und nur die Föhre mag, seit die Pflanzung derselben mit Fährlingen so vielfach an Stelle der Saat getreten, sie vielleicht an Zahl der alljährlich erzogenen Pflanzen übertreffen.

Der Gründe für diese ausgedehnte Verwendung der Fichte sind viele: Zunächst ist das Verbreitungsgebiet der Fichte an sich ein sehr ausgedehntes, im Weiteren aber ist sie vielfach an Stelle der minder ertragstreichen, bezüglich des Bodens aber anspruchsvolleren Buche getreten, auch an Stelle der Tanne, wo man von der natürlichen Verjüngung abging oder, durch Windbruch gezwungen, abgehen mußte. Es wurde aber ferner, je länger je mehr, die Pflanzung die vorwiegende Methode der Fichtennachzucht. Die natürliche Verjüngung stieß auf manche Schwierigkeiten, durch die Ausbringung der großen Nutzholzmassen litten die Anflüge in hohem Grade, in den dem Wind exponirten Lagen erwies sich die natürliche Verjüngung oft geradezu unmöglich, und nirgends haben die Windstürme des letzten Jahrzehnts ärger gehauft, als in den Fichten = Angriffs- und = Nachzieben. Die künstliche Verjüngung durch Saat, früher in großer Ausdehnung angewendet, fand auf frischem Boden, in dem starken Gras- und Unkrautwuchs, wohl auch im Ausfrieren der Pflänzchen bedeutende Hemmnisse, während auf oberflächlich vermagertem Boden die noch dazu meist dicht stehenden Saaten lange kümmernten. Der dichte Stand der durch Saat entstandenen Dickungen und Stangenholzern führte schwere Beschädigungen durch Schneedruck und Schneebrock herbei — und so ist, Angesichts dieser Mißstände, mehr und mehr die Pflanzung bei der Fichte zur Herrschaft, ja fast zur Alleinherrschaft gelangt, die Erziehung entsprechender Fichtenpflanzen eine wichtige Aufgabe zahlreicher Forstwirthe geworden — eine Aufgabe, die wir durchaus nicht so gering schätzigen betrachten wollen, wie dies Genth¹⁾ thut.

Auch die Methode der Pflanzung hat aber seit einem Menschenalter bedeutende Wandelungen durchgemacht, und mit ihr die Aufgabe

¹⁾ Genth, Doppelte Riesen. S. 41.

des Pflanzenzüchters. — Nachdem man mit sogenannten gezogenen Pflanzen — Pflanzen, die aus dichten natürlichen Anflügen oft ziemlich schonungslos ausgezogen wurden — erklärlicher Weise vielfach geringen Erfolg gehabt, wandte man sich der Ballenpflanzung zu; das Material für dieselbe lieferten zunächst wohl natürliche Anflüge, später, bei größerem Bedarf, die immer noch ausgedehnten Saaten, auch wohl Saaten, auf kleineren Flächen speziell zum Zweck der Erziehung von Ballenpflanzen vorgenommen, bis man schließlich auch solche Pflanzen durch Verschulung erzog. — Der dichte Stand der Pflanzen in den Saaten führte beim Ausstechen der Pflanzen von selbst zu Büschelpflanzen, die eine Zeit lang an manchen Orten (Harz!) sehr in Ansehen standen.

Man glaubte überhaupt lange, die Fichte lasse sich nur mit Ballen verpflanzen; sagt doch Pfeil¹⁾ noch im Jahr 1858: „das dichte Gewirr der kleinen, zahlreichen Faserwurzeln bedingt das Ausheben und Versezgen mit der sie umgebenden Erde, die Ballenpflanzung, da es schwer und oft ganz unmöglich sein würde, die entblößten Wurzeln alle wieder in ihre natürliche Lage zu bringen.“ Auch Hesß spricht in seiner Schilderung des Kulturbetriebs in Thüringen²⁾ im Jahre 1862 nur von der Erziehung von Ballen- und Büschelpflanzen im Pflanzgarten, glaubt aber, daß künftig mehr ballenloses Material zur Verwendung kommen werde — eine Prophezeiung, die bekanntlich in vollstem Maße in Erfüllung gegangen ist. Doch wurden auch zu jener Zeit schon vielfach ballenlose, unverschulte Fichten verpflanzt, so namentlich in Bayern, und ebenso das Verschulen zur Erziehung kräftiger, mit bloßen Wurzeln zu verwendender Fichtenpflanzen angewendet,³⁾ welch letzteres Verfahren mittlerweile bekanntlich außerordentliche Verbreitung gefunden hat.

Die Aufgabe des Pflanzenzüchters ist nun bezüglich der Fichte: die Erziehung derselben im Saatbett zur Verschulung oder zu direkter Verwendung ins Freie; die Erziehung kräftiger verschulter Pflanzen im Pflanzbeet und endlich, wenn auch seltener, die Erziehung von Ballen- oder Büschelpflanzen durch Saat wie durch Verschulung. Betrachten wir die Lösung dieser Aufgabe in der angegebenen Reihenfolge.⁴⁾

Die Auswahl eines Platzes für ein Fichtensaatbett erfolgt nach

¹⁾ Deutsche Holzzucht. S. 471.

²⁾ Allgem. F.- u. F.-B. 1862. S. 285.

³⁾ Forstl. Mittb. XI. S. 114, 130.

⁴⁾ Wir verweisen bez. der Erziehung der Fichte insbesondere auf das schon oft citirte Werkchen: „Schmitt, Fichtenpflanzschulen.“

den im allgemeinen Theil gegebenen Regeln. Der Umstand, daß Fichten-saatbeete da, wo weder Hochwild noch Sauen vorhanden, einer Einfriedigung in der Regel nicht bedürfen, erleichtert die Auswahl des Platzes, da man bezüglich der Gestalt desselben freie Hand hat, statt eines größeren, in coupirem Terrain oft schwer zu findenden Platzes mehrere kleinere, besonders geeignete Dertlichkeiten verwenden kann. Auch Wanderkämpe werden in Folge dieses Umstandes nicht selten angewendet. — Seitenschuß gegen Süd und West ist der Fichte sehr wohlthätig, und Frostlagen sind mit Rücksicht auf die Spätfrostgefahr sorgfältig zu meiden. — Tiefgründigkeit des Bodens ist nicht nöthig, doch vermeidet man flachgründige und in Folge dessen rasch austrocknende und zum Auffrieren geneigte Böden auch bei der Wahl eines Saatbeetes für die schwurzelnde Fichte, und aus gleichen Gründen möchten wir uns gegen die allzu seichte Bodenbearbeitung von nur 12—15 cm, wie sie wohl da und dort üblich ist, aussprechen.

Den Fichtensamen beschaffen wir uns zum weitaus größten Theil durch Ankauf von Samenhandlungen, seltener durch eigenes Aussklengen oder aus ärztilichen Samendarren, und eine Prüfung der Keimfähigkeit ist daher nicht wohl zu umgehen, auch für selbst gewonnenen Samen zu empfehlen. Guter, frischer Fichtensamen zeigt eine Keimkraft, die 80 Prozent erreicht, ja übersteigt; mit jedem Jahr, welches der Samen aufbewahrt wird, sinkt dieselbe, und 3 bis 4 Jahre alter Samen zeigt meist so geringe Prozente, daß er zur Aussaat ins Saatbeet nicht mehr zu verwenden ist.

Die Keimkraft des Fichtensamens prüfen wir mittels der Lappen- oder Scherbenprobe oder in den § 45 angegebenen Keimapparaten. Sollen wir uns sofort ein Urtheil über seine Güte bilden, so nehmen wir die allerdings minder verlässige Schnittprobe zu Hilfe. Einen Samen, welcher 70 Prozent keimfähige Körner zeigt, erklären wir noch für einen guten, einen solchen unter 40 Prozent für einen schlechten Samen.

Die Aussaat erfolgt bei der Fichte jederzeit nur im Frühjahr, Ende April oder Anfang Mai, in rauhen Lagen selbst erst in der zweiten Hälfte des Mai. Ein Einquellen des Fichtensamens halten wir für unnöthig und überhaupt nur für zulässig, wenn das zum Gießen während der Keimperiode im Falle eintretender Trockenheit nöthige Wasser vorhanden ist; vollständiges Abtrocknen des Samens vor dem Aussäen ist aber nöthig, um das klumpenweise Zusammenkleben des Samens und in Folge dessen ungleichmäßige Saat zu vermeiden. Droht Gefahr durch Vögel, so wird sich die Anwendung der Mennige (§ 67) empfehlen.

Die Saat erfolgt fast ausschließlich in Rillen und ist die früher übliche Vollsaat allenfalls verlassen worden; selbst in den zur Erziehung von Büschelpflanzen bestimmten Pflanzkämpen wählt man nach Burkhardt's Mittheilungen¹⁾ erstere Art der Ansaat. Den von Burkhardt empfohlenen 8 cm breiten und 22 cm entfernten Rillen pflichten wir jedoch nicht bei, sondern halten die von Schmitt angewendeten nur 3 cm breiten und 10 cm von einander entfernten Rillen und die in Bayern üblichen, mit dem hier besonders zu empfehlenden Saathrett (§. 53) eingedrückten schmalen Doppelrillen mit 10 cm Abstand für zweckmäßiger. Jene breiten Rillen pflegen in der Mitte zu viel Ausschussmaterial zu liefern, wenn die Pflanzen länger als ein Jahr in ihnen stehen, während nur die Randpflanzen kräftige Entwicklung zeigen; der Rillenabstand von 22 cm aber dürfte ein unnötig großer sein. Schmale Rillen, näher zusammengerückt, werden stets eine größere Zahl kräftiger Pflanzen liefern.

Die Tiefe der Rillen und resp. die hiedurch bedingte Stärke der Bedeckung soll nach Baurs Versuchen 1—2 cm betragen, und ist eine Decke von 2 cm Stärke schon zu viel, wenn man mit schwererem Boden deckt — ein Deckungsmaterial, welches man nach dem in § 56 Gesagten jedoch stets zu vermeiden trachten wird.

Das Einlegen des Samens geschieht entweder mit der Hand, oder, im Interesse gleichmäßiger Saat, besser mittelst einer Säevorrichtung; wir können hierzu das einfache Saathrett zum Zusammenklappen (§ 55) in Verbindung mit dem oben erwähnten Trittbrett zur Erzeugung von Doppelrillen als rasch fördernd empfehlen.

Bezüglich des nöthigen Samenquantums finden wir in der Literatur sehr abweichende Angaben; so verlangt Schmitt²⁾ pro Ar durchschnittlich $2\frac{1}{2}$ Kilogr., die bayerische Instruktion vom Jahr 1862³⁾ 1 Kilogr., Oberförster Bultejus⁴⁾ bezeichnet 1,40 Kilogr., Dankermann⁵⁾ 1,5—2 Kilogr. als das entsprechende Quantum. Die bedeutende Differenz von $2\frac{1}{2}$ und 1 Kilogr. dürfte ihre Erklärung wohl darin finden, daß Schmitt lediglich Pflanzen zum Verschulen, die bayerische Instruktion aber vorzugsweise kräftige Saatbeetpflanzen zum sofortigen Auspflanzen ins Freie erziehen will; das längere, der Regel nach dreijährige

¹⁾ Säen u. Pflz. §. 355.

²⁾ Fichtenpflanzschulen. §. 64.

³⁾ Forstl. Mitth. XI. §. 123.

⁴⁾ Forstl. Blätter. 1879. §. 168.

⁵⁾ Zeitschr. f. d. F.- u. F.-W. V. §. 73.

Stehen im Saatbeet bedingt im letzteren Fall dünnere Saat, — und je nach seinen Zwecken wird der Pflanzenzüchter sich mehr dem oben bezeichneten Minimum oder Maximum zuneigen. Breite und Entfernung der Rillen, Güte des Samens sind selbstverständlich ebenfalls von Einfluß auf das zur Verwendung kommende Samenquantum.

Durch aufgelegtes Föhren- oder Tannenreisig, das nach erfolgtem Keimen und Aufgehen des Samens rechtzeitig aufgesteckt und allmählich entfernt wird, oder durch Schuh- und Deckgitter (weniger praktisch durch Moos) schützt man den Samen gegen Trockenheit, Abschwemmen durch Regengüsse und Aufzehrung durch Vögel, welch letztere dem Keimenden, wie dem bereits aufgegangenen Samen bis zum Moment des Abstreifens der Samenhülle sehr gefährlich werden. Der Anwendung der Mennige als Schutzmittel gegen Vögel haben wir schon oben gedacht. — Durch Mäuse ist der Fichtensamen nur wenig gefährdet.

Die nöthige Pflege der Saatbeete durch öfteres Reinigen von Unkraut und Lockern des Bodens mit dem Gartenhäckchen oder Dreizack erfolgt in der im „Allgemeinen Theil“ angegebenen Weise. Gegen das Aufvrieren, dem die flachwurzelnden Fichtenpflänzchen besonders ausgesetzt sind, sucht man dieselben durch das Anhäufeln der Rillen im Herbst, auch durch in die Zwischenräume eingelegtes Moos zu schützen, und drückt etwa gehobene Pflanzen und Pflanzenbüschel wieder als bald an. — Ein Decken der Saatbeete im Winter mit Reisig u. dgl. ist nicht nöthig; dagegen sind Schuhgitter im Frühjahr, zur Zeit der Spätfröste für die gegen letztere sehr empfindliche Fichte empfehlenswerth.

Eine Zwischendüngung wird, wenn die Beete vor der Ansaat hinreichend gedüngt wurden, bei den nur zwei Jahre im Saatbeet verbleibenden Pflanzen überflüssig sein, bei drei- oder gar vierjährigem Stehen im Saatbeet dagegen sich etwa zu Anfang des 3. Jahres sehr empfehlen.

Von großer Wichtigkeit ist aber noch für jene Saatbeete, deren Material nicht schon im ersten Jahr zur Verschulung gelangt, die rechtzeitige Pflege durch entsprechendes Durchrupfen der etwa zu dicht stehenden Saatrillen, eine Manipulation, die um so nothwendiger ist, je dichter die Pflanzen stehen, und je länger sie im Saatbeet verbleiben sollen. Es ist dieses kräftige Durchrupfen insbesondere ein Mittel, um schöne und etwas stufige Fichtenpflanzen bis zum Alter von drei Jahren — länger bleiben die Pflanzen nur ausnahmsweise, bei besonders langsamer oder durch Spätfröste beeinträchtigter Entwicklung im Saatbeet — auch ohne Verschulung zu erziehen, ein Mittel, das vielfach

wohl nicht energisch genug gehandhabt wird.¹⁾ Ueber die Art und Weise, wie das Durchrupsen zur Anwendung gebracht wird, besagt § 71 das Nähere und gilt das dort Gesagte insbesondere für Fichten Saatbeete.

In nicht wenig Fällen und insbesondere da, wo man es mit keinem stärkeren Gras- oder Unkrautwuchs zu thun hat, lassen sich kräftige unverschulte Fichten im Alter von zwei oder drei Jahren mit sehr gutem Erfolg zu Kulturen verwenden, und die Kostenersparung gegenüber der Anwendung verschulter Fichten ist bei den nicht unwesentlichen Kosten, welche die Verschulung verursacht, sowie bei den höheren Kosten, welche die Pflanzung größerer Pflanzen überhaupt veranlaßt, eine nicht geringe! Man ist, bestochen von den allerdings sehr günstigen Resultaten der Verschulung, der Verwendung verschulter Pflanzen, nicht selten mit letzterer zu weit gegangen²⁾ und glaubte selbst, unverschulte Fichten überhaupt nicht verwenden zu sollen, kommt aber jetzt vielfach hiervon zurück und läßt auch der unverschulten Pflanze ihr Recht.

In allen etwas mißlicheren Fällen aber: auf ungünstigerem Boden, bei starkem Graswuchs, größerer Bodenfeuchtigkeit, dann bei Lückenpflanzungen, bei welchen rasches An- und Fortwachsen besonders wünschenswerth erscheint, verdient dagegen die kräftige Schulpflanze den entschiedenen Vorzug, und die Verschulung der Fichte findet denn gegenwärtig auch die weiteste Ausdehnung.

Für Auswahl des Platzes und Tiefe der Bodenbearbeitung werden für Fichtenpflanzschulen die gleichen Regeln, wie für Fichten Saatbeete zu gelten haben. — Die Verschulung findet stets im Frühjahr statt, und zwar nimmt man dieselbe gerne zeitig vor, jedenfalls vor den Saatkulturen und ehe die Fichten angetrieben haben; letzteres ist zwar ohne Nachtheil bei genügend feuchter Witterung, bei eintretender längerer Trockne aber kann ziemlicher Abgang die Folge sein.


Die Frage, ob man zur Verschulung Beete oder Ländere (Gewannen) verwenden soll, ist gerade bei der Fichte noch sehr strittig, und finden die einen wie die andern ihre Vertheidiger. Indem wir auf das hierüber in § 41 Gesagte verweisen, bekennen wir uns für die Fichte als einen Anhänger der Beete, die zum Zweck des Lockerns und Reinigens nicht betreten werden müssen und in Folge dessen eine bei der Fichte mit Rücksicht auf ihre Entwicklung sehr wohl zulässige engere

¹⁾ Im hiesigen Forstgarten angestellte vergleichende Versuche ergaben auffallend günstige Resultate zu Gunsten kräftigen Durchrupsens.

²⁾ In Bayern wurde im Jahre 1862 durch Ministerial-Verfügung angeordnet, es sei das Verschulen der Fichten nicht weiter auszudehnen, als die Umstände absolut gebieten. (Forstl. Mitth. XI. S. 114.)

Verschulung, eine intensive Ausnutzung des Raumes gestatten, und hiernach die Ersparung an Wegfläche bei Anwendung größerer Ländere mehr als ausgleichen. Auch als Mittel gegen das Aufrieren, durch welches die Fichte im Pflanzbeet viel zu leiden hat, sind die als seichte Entwässerungsgräben dienenden Wege zwischen den Beeten oft von Vortheil. Selbstverständlich sind diese Wege jederzeit thunlichst schmal zu halten.

Was die Entfernung anbelangt, in welcher man verschulen soll, so gestattet die geringe Größe, in welcher die Fichte verschult wird, die mäßige, nur 30—40 cm betragende Höhe, in welcher sie das Pflanzbeet wieder verläßt, eine ziemlich enge Verschulung und nur die (seltnere) Erziehung besonders starker Pflanzen erfordert größere Pflanzenabstände. Für die gewöhnlich zur Anwendung kommenden drei- bis vierjährigen Pflanzen genügt ein Abstand der Pflanzreihen von 15 cm, bei Anwendung größerer Ländere ist, behufs Ermöglichung des Betretens derselben, ein solcher von mindestens 20 cm nöthig. Die Entfernung der Pflanzen in den Reihen wählt man meist zu 10 cm, Schmitt geht auf 8 cm herunter, und nicht selten sieht man noch geringere Entfernungen angewendet. Zu einem vergleichenden Versuch über den Einfluß dieser Entfernungen auf die Entwicklung der Pflanzen haben wir im hiesigen Forstgarten einjährige Fichten auf einem größern Land in Entfernung von 20 auf 10 cm verschult, auf einem anstoßenden Land¹⁾ aber die Verschulung der Pflanzen mit Hülfe eines Zapfenbrettes (s. § 82) vorgenommen, in dessen doppelter Zapfenreihe die 10 cm langen Zapfen in Entfernungen von 7 cm in der Reihe und 5 cm vom nächsten Zapfen



Figur 40.

der Nachbarreihe standen (s. Figur 40); die doppelten Pflanzreihen waren ebenfalls 20 cm von der nächsten Doppelreihe entfernt. Die Entwicklung dieser eng verschulten Pflanzen ließ nichts zu wünschen übrig und blieb hinter jener der in weitem Verband verschulten Pflanzen kaum in sichtbarer Weise zurück. — Jedenfalls bewies dieser Versuch, daß eine größere Pflanzenentfernung als jene von 15 auf 10 cm völlig überflüssig und ohne Einfluß auf die Entwicklung der Pflanzen ist, und spricht für Anwendung thunlichst geringer Entfernungen mit Rücksicht auf die dadurch erzielte Kostensparung.

¹⁾ Im akademischen Forstgarten werden zur Unterweisung der Studierenden erklälicher Weise Beete und Ländere zur Anwendung gebracht.

Was nun das Alter betrifft, in welchem die Fichte am zweckmäßigsten verschult wird, so liefern kräftig entwickelte einjährige Pflanzen entschieden die schönsten verschulten Pflanzen und möchten wir dieselben vor Allem empfehlen. Haben sich dagegen die Pflanzen im Saatbeet während des ersten Jahres in Folge ungünstiger Witterung nur schwach entwickelt, oder ist deren Entwicklung in Folge rauheren Klimas überhaupt eine langsame, so daß die Pflänzchen im ersten Jahr kaum einige Centimeter hoch werden, so verschult man die Fichten erst zweijährig, ja nach Schmitts Angabe unter besonders ungünstigen Verhältnissen selbst erst dreijährig. — Kräftig entwickelte zweijährige Pflanzen liefern bei der Verschulung meist minder stufige und weniger gut beastete Pflanzen und werden daher nur ausnahmsweise verwendet; namentlich gilt dies von solchen Pflanzen, die auf gutem Boden in etwas gedrängtem Stand spindlig empor gewachsen sind.

Die Verschulung von Fichtenkeimpflanzen, 3— $3\frac{1}{2}$ Monat nach deren Aufkleimen (also im August?), wie sie Pannewitz in Böhmen angewendet fand¹⁾ und wie sie nach einem von Gaher²⁾ mitgetheilten Kulturkostentarif auch in Schlesien bisweilen stattzufinden scheint, möchten wir mit Rücksicht auf das empfindliche Pflanzmaterial und die kritische Verschulungszeit für wenig praktisch und auch nicht für nöthig halten, sondern der Verwendung einjähriger Pflanzen den Vorzug geben.

Bei der Verschulung einjähriger Fichten werfe man rücksichtslos alle Schwächlinge weg — ein vorsichtiger Wirthschafter wird sich stets Saatbeete in der Größe anlegen, daß der Verschulungsbedarf reichlich gedeckt ist. Auch von den zweijährig zur Verwendung gelangenden Saatbeetpflanzen scheide man alle schlechtwüchsigen, doppelwipfligen, ebenso aber auch zu lange und spindelige Pflanzen aus.

Dem Frisch-Erhalten der Würzelchen wendet man natürlich die entsprechende Sorgfalt zu; die kleinen einjährigen Pflänzchen stellt man beim Verschulen zu diesem Zweck in kleine Wassergefäße, Häfen u. dgl., stärkere Pflanzen legt man in feuchtes Moos. — Anschlammnen der Wurzeln ist entbehrliech, ebenso jedes Beschneiden derselben, und nur bei zu langer Wurzelbildung ein Kürzen derselben angezeigt. Bei Anwendung des Zapfenbrettes wird es zweckmäßig sein, die Wurzeln der büschelweise zusammengelegten Pflanzen in einer der Länge der Zapfen (10 bis 12 cm) entsprechenden Weise zu kürzen, um das Umstülpen derselben zu vermeiden.

¹⁾ Monatschr. f. d. J.-W. 1866. S. 81.

²⁾ Waldbau. S. 686. (Oberförstereien Karlsberg, Reinerz, Nesselgrund.)

Die Verschulung selbst wird mit Hülfe der Schnur und des Sehholzes, des Pflanzbretts und des mehrerwähnten Zapfenbretts vorgenommen, und verweisen wir bezüglich derselben auf die ausführliche Besprechung in § 82.

Was nun Schutz und Pflege der verschulten Fichten anbelangt, so bedürfen dieselben zu ihrem Gedeihen zunächst der rechtzeitigen Entfernung des Unkrautes und öfterer Bodenlockerung, gleich allen andern Pflanzen. Sehr vortheilhaft erweist sich auch der Schutz gegen Spätfroste, durch welche die Fichtenpflänzchen oft schwer beschädigt, in ihrer Entwicklung um ein volles Jahr zurückgeworfen werden; ja durch wiederholte Frostbeschädigung verkrüppelt oft ein großer Theil der verschulten Pflanzen bis zur Unbrauchbarkeit. Schutzzitter erweisen sich als ein sehr empfehlenswerthes Mittel gegen diese Gefahr.

Eine Decke gegen Winterfrost ist nicht nöthig, da unter gewöhnlichen Verhältnissen die jungen Fichten selbst den strengsten Winterfrost gut ertragen; nur strenge Kälte bei Nacht im Wechsel mit verhältnismäßig hoher Temperatur am Tage, wie dies an klaren Wintertagen häufig der Fall, zeigt sich nachtheilig, hat Erfrieren der Nadeln zur Folge¹⁾.

Durch den Baarfrost werden namentlich schwächere verschulzte Fichten in Folge ihrer flachen Bewurzelung häufig gehoben, ja ausgezogen; durch etwas tieferes Einpflanzen, Anhäufeln im Herbst, Zwischendecke von Moos beugen wir der Beschädigung möglichst vor, durch Andrücken der gehobenen Pflanzen und Einstreuen von Erde zwischen die gehobenen Pflanzenreihen gleichen wir den eingetretenen Schaden wieder aus und retten dadurch mit geringem Aufwand oft große Pflanzemengen.

Als Folge heftiger Regengüsse zeigen namentlich die verschulten Fichtenpflänzchen nicht selten die sogenannten Erdhöschen, einen die Nadeln oft bis zur Spitze der Pflanze umhüllenden Erdüberzug, der nach erfolgtem Trockenwerden rasch und fast ohne Kosten durch Neubefahren der Pflanzen mit einem Stock beseitigt wird (§. § 63).

Eine Zwischendüngung wird, wenn die Pflanzen nicht über die normale Zeit von 2 Jahren im Pflanzbeet bleiben, nur dann nöthig sein, wenn das Beet vor der Verschulung nicht oder nicht genügend gedüngt wurde und die Pflanzen insbesondere durch gelbliche Färbung der

¹⁾ In dem bekannten Winter 1879/80, welchem so viele Koniferen zum Opfer fielen, haben auch die Fichten-Saat- und -Pflanzbeete viel gelitten, indem namentlich in sonnigen Lagen die aus der nur geringen Schneedecke hervorragenden Theile erfroren.

Nadeln den Nahrungsmangel dokumentieren; sie wird dann mit rasch wirkenden Düngemitteln in schon besprochener Weise gegeben.

Ein Beschnüren der Fichtenpflanzen findet nicht statt; bei durch Spätfroste beschädigten Pflanzen kann man etwa die dann häufige Doppelwipfelbildung durch Wegnahme des schwächeren Triebes beseitigen.

Die Zeit, welche die verschulnten Fichten im Pflanzbeet zu verbleiben haben, beträgt in der Regel zwei Jahre. Ein kürzeres, also nur einjähriges Stehen im Saatbeet zeigt verhältnismäßig wenig Erfolg, die Wirkung des größeren Standraumes kommt erst im zweiten Jahre zur vollen Geltung, zumal die verschulte Pflanze doch erst die Folgen des Vergehens überwinden, erst kräftig anwurzeln muß. Ein längeres Verbleiben im Pflanzbeet als zwei Jahre wird nur bei langsamem Entwicklung der Pflanzen (in rauhen Lagen), bei Beschädigung derselben durch Spätfrost oder bei Bedarf besonders starker Pflanzen zweckmäßig sein; in letzterem Fall würde man aber schon bei der Verschulung auf Gewährung eines entsprechenden Standraumes Bedacht zu nehmen haben. Über 3 Jahre wird man aber mit Rücksicht auf die starke horizontale Verbreitung, welche die Wurzeln der Fichte dann erlangen und welche schon im dritten Jahr eine die Verpfanzung erschwerende werden kann, nicht hinausgehen; namentlich auf ärmerem oder schwach gedüngtem Boden macht sich ein weites Ausstrecken der Seitenwurzeln bemerklich.

Unter günstigen Verhältnissen wird man sonach in 3 Jahren — 1 Jahr im Saatbeet, 2 im Pflanzbeet —, unter minder günstigen in 4 Jahren — 2 und 2 Jahre —, unter ungünstigen in 5 Jahren — 2 und 3 Jahre —, Pflanzmaterial von der nöthigen Stärke erziehen. Man wird annehmen können, daß auf kräftigem Boden erwachsene, einjährig verschulte Fichten in einem Alter von 3 Jahren (also nach zweijährigem Verbleiben im Pflanzbeet) eine durchschnittliche Höhe von 25—30 cm, im Alter von 4 Jahren eine solche von 35—45 cm erreichen werden; einzelne, unter besonders günstigen Umständen sogar eine größere Zahl von Pflanzen, überschreiten diese Grenzen oft nicht unbedeutend.

Wir haben endlich noch die Erziehung von Ballen- oder Büschelpflanzen kurz zu besprechen, eines Pflanzmaterials, das früher in sehr ausgedehntem Maß und manchen Orts (Harz, Thüringen) noch vor wenig Jahrzehnten ausschließlich zu den Fichtenkulturen Verwendung fand, in neuerer Zeit aber den ballenlosen, verschulten und unverschulten Pflanzen allenthalben mehr oder weniger hat weichen müssen.

Das ursprünglichste und auch jetzt noch zur Erziehung von Ballenpflanzen angewendete Verfahren besteht in entsprechend starker Ansaat einer mit Rücksicht auf den Zweck sorgfältig ausgesuchten, möglichst

stein- und wurzelfreien Fläche mit genügend bindendem Boden; thunlichste Nähe der betreffenden Kulturplätze ist mit Rücksicht auf Ersparung von Transportkosten besonders wichtig. Die ausgewählte Fläche wird vom Ueberzug befreit und der Boden nur oberflächlich verwundet oder aufgekratzt, der Samen durch Einrechen mit dem Schleppbusch oder durch Betreiben mit Schafen in den Boden gebracht. Die Entwicklung solcher Pflanzen ist natürlich eine wesentlich langsamere als in dem gelockerten Boden des Saatbeets, und die Pflanzen erreichen wohl stets ein Alter von 5 bis 6 Jahren, bis sie zur Verwendung tauglich sind.

Solche Flächen, etwas stärker angefertigt, liefern auch Büschelpflanzen, nicht selten mit mehr Pflanzen auf einem ausgestochenen Ballen als wünschenswerth, und werden dann die überzähligen Pflanzen weggeschnitten. Letzteres geschieht auch, wenn man nur Ballen mit einer kräftigen Pflanze wünscht.

Aber auch durch Verschulung hat man nicht selten Ballenpflanzen erzogen und namentlich war dies früher im Thüringer Wald in großer Ausdehnung der Fall,¹⁾ woselbst wir dies Verfahren im Jahr 1866 angewendet fanden. Die zweijährigen Pflanzen wurden in entsprechend umgegrabenen und zugerichteten Pflanzgärten („Stopfgärten“) auf zusammenhängende größere Ländere in Entfernung verschult, welche je nach der Größe, welche die 2 bis 4 Jahre im Stopfgarten bleibenden Pflanzen erreichen sollten, zwischen 15 und 25 cm Quadratverband wechselten. Der an sich bindende und nach der Verschulung nicht mehr gelockerte Boden — lästiges Unkraut wird ausgeschnitten — setzte sich wieder hinreichend fest zusammen, um nach 2—4 Jahren das Aussiechen der Pflanzen mit Ballen zu ermöglichen, wobei stets genau in der Mitte zwischen den Pflanzreihen einerseits, den Pflanzen anderseits eingestochen wurde. Jeder Stopfgarten war natürlich nur einmal zu benutzen, man hatte also Wanderkämpe, die, wo immer thunlich, unmittelbar an und auf den betreffenden Kulturflächen lagen und zum Schutz gegen Hochwild mit transportablen Gattern umstellt wurden.

Bei stärkerem Wildstand, in rauhen Lagen wendet man wohl auch jetzt noch Büschelpflanzung an, jedoch stets Büschel mit wenig Pflanzen (gegenüber den früheren Büscheln von 10 bis 20 Pflanzen in einem Büschel!), und erzielt solche Büschel mit je 3 Pflanzen auch durch Verschulung.²⁾ Doch wird diese Methode stets Ausnahme sein und bleiben, wie die Verwendung der Büschelpflanzen selbst.

¹⁾ Häß, Mittheilungen aus dem Kulturbetrieb im Thüringer Wald, Allgem. F.- u. J.-B. 1862. S. 285.

²⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 355.

§ 112.

Die Föhre.

Wie bezüglich ihrer Verbreitung in den deutschen Waldungen, so auch hinsichtlich ihrer Nachzucht in Saatkämpfen und Forstgärten ringt die Föhre mit der Fichte um den ersten Platz und nimmt denselben vielen Orts — so in den großen Kiefernforsten der norddeutschen Ebene, wie in nicht wenigen süddeutschen, auf Sandboden stehenden Waldungen — auch in beiden Richtungen ein. Der entschiedene Rückgang, in welchem sich so viele Privat- und Gemeindewaldungen und leider auch nicht wenige, durch Streuberechtigungen heruntergekommene Staatswaldungen befinden, hat ihr Gebiet in den letzten Jahrzehnten außerordentlich wachsen lassen, ihr in vielen Waldgebieten, denen sie früher fremd war (Spessart!) Eingang verschafft. — In den Forstgärten aber hat sie sich einen Platz erst seit den letzten Jahrzehnten errungen, denn bis vor 30 Jahren waren die Ansaat der Kulturstächen und die Pflanzung mit solchen Ansaaten entnommenen Ballenpflanzen bei Nachbesserungen oder in solchen Dertlichkeiten, wo die Saat wenig Aussicht auf Erfolg bot, die ausschließlich zur Anwendung kommenden Kulturmethoden für die Föhre, und letztere daher ein Fremdling in den Forstgärten. Jetzt dagegen ist bekanntlich die Pflanzung mit einjährigen, im Saatbeet erzogenen ballenlosen Pflanzen allgemein in Anwendung, ja neuerdings verschult man selbst Föhren, und die Erziehung geeigneter Föhrenpflanzen spielt daher jetzt eine ganz bedeutende Rolle im Kulturbetrieb, ist eine wichtige Aufgabe zahlreicher Forstwirthe.

In den meisten Fällen beschränkt sich diese Aufgabe auf die Erziehung von Jährlingen und erfordert im Ganzen wohl weniger forstliche Kunst als die Anzucht so mancher anderen Holzart; doch ist auch zur erfolgreichen und billigen Erziehung solcher Jährlinge mancherlei zu beachten. Die Verschulung der Jährlinge, um zweit- bis höchstens dreijährige kräftige Pflanzen zu erziehen, ist ein Produkt der Neuzeit, das als erfolgreich gerühmt wird, größere Verbreitung aber bis jetzt noch nicht gefunden hat. — Ein bitterer Feind der Föhrensaatbeete aber, die Schütte, diese „Kinderkrankheit“ der Föhre, bringt vielen Orts die Föhrenzüchter fast zur Verzweiflung und macht die sonst so einfache Nachzucht der nöthigen Pflanzen unsicher und theuer; seit lange schon bekannt, tritt diese Krankheit seit einigen Jahrzehnten in Freisaaten und Saatbeeten in großer Ausdehnung und Hestigkeit auf, und Millionen Pflanzen verfallen durch sie alljährlich dem Eingehen oder der Verkrüppelung. Wir werden bei Besprechung des Schutzes der Saatbeete gegen Gefährdungen auf sie zurückkommen.

Was nun die Anlage von Saatkämpen betrifft, so wird insbesondere bei der Föhre die Frage: ständige oder Wanderkämpe? verschieden beantwortet.¹⁾ Der Umstand, daß man in dem vorwiegend ebenen Terrain der Föhrenwaldungen allenthalben und fast auf jeder Hiebsfläche eine entsprechende Dertlichkeit für einen Saatkamp findet; daß die Kosten der erstmaligen Bearbeitung auf dem meist steinfreien, sandigen oder lehmigen Boden nicht bedeutend sind; daß die Kämpe zumeist eine Umfriedigung nicht bedürfen: all diese Umstände in Verbindung mit der Unnehmlichkeit, die Pflanzen auf der Kulturläche selbst oder doch in deren nächster Nähe zu haben, das Ausheben derselben in der momentan benötigten Menge durch den die Kultur beaufsichtigenden Forstbediensteten stets überwachen lassen zu können, die Verpackung zu ersparen, haben vielfach zu kleineren, einmal oder doch nur einigemale benutzten Wanderkämpen geführt. Auch die Schütte spielte hierbei eine Rolle: gestützt auf die Wahrnehmung, daß auf demselben Revier ein Saatkamp schüttete, der andere nicht, der in einem Saatkamp auftretenden Schütte aber meist alle Pflanzen zum Opfer fielen, wollte man mit Recht nicht Alles auf eine Karte setzen, sondern erzog die Pflanzen in verschiedenen Dertlichkeiten und wählte statt des einen großen — manche nicht zu leugnende Vortheile bietenden — Forstgartens eine Anzahl kleiner und dann meist wandernder Saatkämpe. Unter solchen Verhältnissen haben diese dann gewiß auch ihre Berechtigung.

Was nun die Auswahl des Platzes für einen Saatkamp betrifft, so hat man bei der wenig empfindlichen Föhre bezüglich der Lage ziemlich freie Hand, doch wählt man auch für sie gerne eine Dertlichkeit, die einigen Seitenschuß gegen Süd und West bietet,²⁾ ohne jedoch zu nahe an die Bestandswand heran zu rücken. Die Schütte ist auch bezüglich der Wahl des Platzes nicht selten ausschlaggebend gewesen: gestützt auf die Wahrnehmung, daß Pflanzen unter lichtem Oberstand selten und schwächer von der Schütte besäßen werden, legte man Föhrensaatbeete gerne auf mäßig großen Bestandslücken (Windbruchlöchern) an, um hiervon allseitigen Seitenschuß zu erzielen,³⁾ ja selbst unter lichtem Oberstand, unter welchem man nach Nördingers Angabe⁴⁾ zwar kein sehr kräftiges, aber doch gut verwendbares schüttefreies Pflanzmaterial erziehen kann.

¹⁾ Bergl. hierüber insbes. Zeitschr. f. F.- u. F.-W. VI. S. 255, VIII. S. 403.

²⁾ Zeitschr. f. F.- u. F.-W. VIII. S. 403.

³⁾ In der bayr. Oberpfalz galt dies als Vorschrift.

⁴⁾ Centralbl. 1878. S. 389.

Der Boden soll unter allen Umständen hinreichend locker und tiefgründig zur Ausbildung einer kräftigen Pfahlwurzel sein. Der Vortheil, den man mit der Jährlingspflanzung gegenüber der Saat insbesondere auf den trockneren Sandböden erreicht, besteht neben den sonstigen Vortheilen der Pflanzung vor Allem darin, daß die langbewurzelte einjährige Pflanze dem Vertrocknen im heißen Sommer leichter entgeht als der schwache Keimling; die Erziehung hinreichend lang bewurzelter Pflänzlinge ist daher in der Mehrzahl der Fälle von besonderer Wichtigkeit, und die Wahl eines an sich lockern, tiefgründigen und entsprechend tief bearbeiteten und gedüngten Bodens das Mittel zur Erreichung dieses Ziels. Manthat hiebei aber vielfach des Guten zu viel, sucht durch tiefe Rarolung und tiefes Unterbringen des guten Bodens oder des Düngematerials den Pflanzen sehr lange Wurzeln — bis zu 40 cm! — anzuerziehen.¹⁾ Solche Pflanzen sind aber schwer ohne Wurzelbeschädigung auszuheben und zu verpflanzen, leiden leicht durch Umstülpen oder verkrümpte Lage der Wurzeln beim Einpflanzen, und man begnügt sich besser mit kräftigen Pflanzen, deren Wurzeln etwa 20 — 25 cm lang sind; für minder leichten Boden ist eine Länge der Wurzeln von 15 cm schon ausreichend.

Der ausgewählte Boden soll durchaus nicht nahrungsarm sein, da sonst die Wurzeln lang und fadenförmig in die Tiefe gehen, die Pflanzen selbst aber schwächlich bleiben; Burkhardt empfiehlt ausdrücklich die Verwendung guten Bodens zu Föhrensaatbeeten. Die Menge von Nahrungsstoffen, die durch die einjährigen Föhren dem Boden bei kräftiger Entwicklung der Pflanzen entzogen werden, ist nach Ausweis angestellter Versuche (siehe § 23) keine geringe; wo also der Boden an sich nicht kräftig, wird schon bei der erstmaligen Benutzung, außerdem aber nach jedesmaliger Wiederholung derselben eine entsprechende Düngung einzutreten haben.

Die Bodenbearbeitung findet bei neuangelegten Kämpen auch bei der Föhre zweimal — im Herbst und Frühjahr — statt, und zwar auf eine Tiefe von etwa 30 cm; bei wiederholter Benutzung werden die Beete im Frühjahr nach erfolgter Verwendung der Pflanzen eben so tief umgegraben und gleichzeitig gedüngt, wobei sich für Sandböden namentlich eine Düngung mit guter, humoser Walberde empfiehlt, indem hiervon gleichzeitig deren physikalische Eigenschaften verbessert werden. — Wünschenswerth ist, daß der Boden sich vor der Unaat wieder genügend gesetzt hat, und ist dies nicht der Fall, so ist ein Andrücken,

¹⁾ Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 293.

bei sehr sandigem Boden selbst ein Antreten desselben zu empfehlen; hiедurch soll dem Trocken und Wehen des Bodens vorgebeugt und während der Keimperiode das kapillare Aufsteigen der Bodenfeuchtigkeit bis zu den Samen und Keimlingen gesichert werden.¹⁾

Die Aussaat des Föhrensamens erfolgt stets im Frühjahr und pflegt meist Ende April, in rauheren Lagen auch erst im Mai zu geschehen; auch hier finden wir wieder, daß der Schütte ein Einfluß auf die Saatzeit eingeräumt werden will. Schwappach gibt an,²⁾ daß die Infestation der Kiefernplanten durch die Sporen des Pilzes *Hysterium pinastri* Ende Mai, Anfang Juni erfolge, daß also, wenn um diese Zeit Primordialblätter noch gar nicht vorhanden, nur die im Herbst abfallenden Rothledonen infiziert werden können, und hält hienach die späte Saat für ein Vorbeugungsmittel gegen die Schütte einjähriger Föhren. Nördlinger dagegen, welcher die Schütte für eine Folge im Herbst eintretender Frühfröste hält, erklärt³⁾ es für sicher, daß späte Saaten mehr durch die Schütte leiden als frühe, weil die später erscheinenden Pflanzen dann im Herbst noch minder verholzt und gegen Frühfröste empfindlicher sind, so daß hienach frühe Saat angezeigt wäre. — Wir haben hier also zwei sich direkt entgegenstehende Angaben, denen gegenüber wohl an der oben angegebenen normalen Saatzeit festzuhalten sein wird, bis weitere Erfahrungen vorliegen!

Die Güte des meist aus Samenhandlungen bezogenen Samens, der seine Keimkraft gleich dem Fichtensamen mehrere Jahre mit allerdings ziemlich rascher Abnahme der Keimkraft erhält, erprobt man wie bei der Fichte angegeben, und stellt an seine Qualität nahezu die gleichen Anforderungen, einen Samen von 70 Prozent Keimkraft als guten, von 40—70 Prozent als mittelmäßigen, von weniger als 40 Prozent als geringen Samen bezeichnend. Samen, der schon drei Jahre alt ist, zeigt meist solch geringere Keimprozente und ist für Saatbeete nicht mehr zu empfehlen; älterer Samen keimt sehr ungleichmäßig und überliegt bisweilen ins nächste Jahr, und man wird daher stets möglichst frischen Samen verwenden.

Bezüglich des Anquellens des Samens gilt für die Föhre das Gleiche wie für die Fichte, und ebenso bezüglich der Art und Weise der Aussaat: Anwendung des Rillenbretts zur Herstellung schmaler Doppelrillen in 10—12 cm Entfernung, dann von Säevorrichtungen

¹⁾ Zeitschr. f. d. F.- u. J.-W. V. S. 67.

²⁾ Monatschr. f. d. F.- u. J.-W. 1879. S. 231.

³⁾ Centralbl. 1878. S. 391.

— Saatbrett oder Säehorn — welche bei den oft großen Flächen, welche zur Pflanzenerziehung angefertigt werden müssen, von besonderem Vortheil sind; leichtes Decken des Samens, 1—1,5 cm stark und nur bei leichtem, humosem Deckmaterial bis zu 2 cm stark.¹⁾

Die nötige Samenmenge beträgt pro Ar 1—1,75 Kilogr. ersteres wohl als Minimum, letzteres als Regel zu betrachten;²⁾ unsere eigenen Versuche erwiesen bei Anwendung des bayr. Saatbretts mit nur 10 cm entfernten Doppelrillen ein noch etwas höheres Quantum als nötig. Über den Einfluß der Samenmenge auf Zahl und Stärke der Pflanzen verweisen wir auf den in § 54 mitgetheilten Versuch von Riedel. Wollte man ausnahmsweise die Pflanzen im Saatbeet zweijährig werden lassen, so müßte man das Samenquantum natürlich mit Rücksicht auf die rasche Entwicklung der jungen Föhre bedeutend ermäßigen, will man nicht spindlige, schwache Pflanzen erziehen.

Den Samen schützt man durch Saatgitter, übergespannte Fäden, Reize und namentlich durch Einweichen in Mennige gegen Vögel, durch Gitter oder zuerst aufgelegtes, nach dem Aufgehen aufgestecktes Reisig Samen und Keimlinge gegen Trockenheit und Regengüsse, und verweisen wir bezüglich dieser Schutzmittel auf das in § 57 ff. hierüber Gesagte, ebenso bezüglich des Schutzes gegen die Engerlinge, welche in dem mehr lockern Boden und den trocknen Dertlichkeiten, die wir für Föhrensaatbeete häufig benutzen und benutzen müssen, zu den gefährlichsten Feinden der letzteren gehören. Die befressenen Pflanzen gehen unfehlbar zu Grunde. Auch Werren werden nicht selten in Föhrensaatbeeten lästig und sind zu bekämpfen. — Gegen Spätfröste und Aufrüttieren bedarf die frostharte und tiefwurzelnde Föhre keinen besondern Schutz.

Eine wichtige Frage aber ist: kann man die Saatbeete auch in irgend welcher Weise sicher gegen die so oft und so verheerend auftretende Schütte schützen?

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, uns hier ausführlich über diese Krankheit und deren wahrscheinliche Ursachen zu verbreiten; — es würde das zu weit führen und die darüber erwachsene, umfangreiche Literatur ist doch mehr oder weniger jedem Forstmann bekannt. Anderseits werden aber die etwa in Anwendung zu bringenden Verhütungsmittel mit der Ursache der Krankheit in so engem Zusammenhang stehen, daß die Erwähnung wenigstens der am meisten vertretenen theoretischen Erklärungen derselben nicht ganz zu umgehen ist.

¹⁾ Monatschr. f. d. F.- u. J.-W. 1875. S. 352.

²⁾ Zeitschr. f. d. F.- u. J.-W. V. S. 65; VIII. S. 403.

Wir ziehen von diesen Erklärungen, die nach und nach über das Wesen der Schütte aufgetaucht sind, drei in den Kreis unserer Erwägungen: die Frost-, die Pilz- und die Verdunstungs-Theorie.

Als Vertreter der erstenen erscheinen insbesondere Nördlinger,¹⁾ Alers²⁾ und Holzner;³⁾ dieselben betrachten vor Allem die im Herbst etwa eintretenden Frühfröste als Ursache der Schütte, ebenso aber auch stärkere Winterfröste, denen warmer Sonnenschein folgt. Wäre Frost die alleinige und wirkliche Ursache, so müßte Schutz durch umgebende Bestände, Seitenschutz, welcher die Sonne abhält, rechtzeitige Deckung der Beete mit Schutzzittern oder Nesten ein ziemlich unfehlbares Mittel sein — und viele Versuche mit Deckung der verschiedensten Art, hoch und niedrig, dichter und lichter, wurden denn auch gemacht.⁴⁾ Nördlinger selbst aber sagt von solch künstlichen Schutzhäuten, daß sie in einem Falle nützen, im andern nichts helfen, ja daß unter $\frac{1}{2}$ m über den Pflanzen angebrachten Gesichtsdecken die Schütte zuerst auftrat. Am besten soll sich stets der lichte Bestandschirm erweisen (s. o.); dies bestätigt auch Alers, glaubt aber, durch 1 m hoch über den Pflanzen aufgestellte Horden, durch welche die Pflanzen gegen den Einfluß der Sonne im Winter geschützt werden, die Schütte sicher fern halten zu können, wenn die Deckung im Herbst rechtzeitig und vor Eintritt der ersten Fröste angewendet wird.

Zu sichern Resultaten ist man, trotz der mannigfaltigen Versuche mit jeder Art von Deckung, bis jetzt nicht gelangt,⁵⁾ und der Umstand, daß zweijährige Föhren im Saatbeet fast unfehlbar schütten, läßt die Frosttheorie immerhin noch etwas zweifelhaft erscheinen.

Nach der von Göppert zuerst aufgestellten, insbesondere von Brantl⁶⁾ weiter verfolgten Pilztheorie ist es ein Pilz, *Hysterium pinastri*, dessen Sporen auf den Nadeln der Föhre keimen, dessen Mycelium in die Nadeln eindringend zwischen den chlorophyllhaltigen Zellen fortwächst, das Gewebe lockert und die ganze von ihm bewohnte Region der Nadel, schließlich diese selbst zum Absterben bringt. Dabei fällt die Infektion der Pflanze anfänglich nicht ins Auge und erst im Herbst macht sich dieselbe wahrnehmbar durch fleckiges Aussehen der Nadel, dem im Frühjahr das Absterben derselben folgt. — Der Pilz findet sich auch auf einzelnen

¹⁾ Centralbl. 1878. S. 389.

²⁾ Centralbl. 1878. S. 132.

³⁾ Beobachtungen über die Schütte der Kiefer. 1877.

⁴⁾ Centralbl. 1880. S. 156.

⁵⁾ Monatschr. f. d. F. u. J.-W. 1877. S. 327.

⁶⁾ Monatschr. f. d. F. u. J.-W. 1878. S. 325 u. 433.

Nadeln älterer Bäume, am meisten aber leiden jüngere Pflanzen und zumal die ein- und zweijährigen Föhren von demselben. Die klimatischen Verhältnisse, die Witterung insbesondere zur Zeit der Sporenreife, Ende Mai, Anfang Juni, sind jedenfalls auch von Einfluß auf das mehr oder weniger heftige Auftreten des Pilzes, der Schütte.

Als Vorbeugungsmittel gegen das Auftreten des Pilzes in den Saatbeeten würde aus dieser Theorie das Fernhalten alter, mit Pilzpolstern versehener Nadeln folgen — also das Decken mit Föhrenästen zu unterlassen sein und ebenso die Wiederbenutzung von Saatbeeten, in denen die jungen Föhren schütteten. (Saatbeete in lichten Föhrenbeständen, wie Nördlinger empfiehlt, müßten freilich von dem Pilz besonders leiden!) Wie schon oben erwähnt, hält Schwappach eine späte Saat, welche die Primordialblätter erst nach der Sporenreife erscheinen läßt, für ein Verhütungsmittel.

Auch über diese Theorie und über die auf Grund derselben anzuwendenden Vorbeugungsmittel gegen die Schütte scheinen die Akten noch nicht völlig geschlossen, nicht alle Erscheinungen der Schütte erklärt.

Die dritte Theorie, die Verdunstungs- oder Vertrocknungstheorie, betrachtet die Schütte als Folge eines Mißverhältnisses zwischen der Verdunstung durch die Nadeln und der Wasseraufnahme aus dem Boden. In ganz ähnlicher Weise, wie wir dies bei frisch versetzten Pflanzen im Sommer bei anhaltender Hitze und Trockenheit wahrnehmen, sehen wir auch im Spätherbst, Winter und Frühjahr eine plötzliche Bräunung der Nadeln, ein Vertrocknen derselben eintreten, wenn bei gefrorenem Boden, der eine Wasseraufnahme durch die Wurzeln nicht ermöglicht, die Nadeln durch Einwirkung der Sonne zu starker Verdunstung angeregt werden. Diese Theorie, zuerst von Ebermayer auf Grund seiner Beobachtungen aufgestellt,¹⁾ später wieder etwas in den Hintergrund gedrängt, wird neuerdings auch von R. Hartig für viele Fälle als Grund der sogenannten Schütte anerkannt.²⁾ Ein Schutz gegen die Einwirkung der Sonne durch eine Bestandswand, durch Decken der Beete mit Gittern oder Reisig müßte sich hier ebenfalls als zweckmäßig erweisen, wie bei der Frosttheorie. R. Hartig spricht sich übrigens an genanntem Ort auch dahin aus, daß das Hysterium pinastri bei den Erkrankungen der Föhrenpflanzen jedenfalls auch eine bedeutende Rolle spiele, die Schütte sich durch Infektion von kranken Beeten aus Fortpflanze.

¹⁾ Ebermayer, die phys. Einwirkungen des Waldes. S. 251.

²⁾ R. Hartig, die Baumkrankheiten. S. 127.

Was die Folgen der Schütte anbelangt, so werden die von derselben befallenen Pflanzen meist als für den Kulturbetrieb verloren zu betrachten sein. Ein großer Theil derselben stirbt gleich direkt ab, und zwar ein um so größerer, je dichter die Pflanzen standen, je schwächer also das einzelne Individuum war; die andern, welche sich erholt, wachsen meist zu kümmerlichen zweijährigen Pflanzen heran, deren Verwendung im nächsten Jahr einen jedenfalls sehr zweifelhaften, der Regel nach aber schlechten Erfolg hat. Häufig schütten sie im zweiten Jahr wieder und sind dann um so sicherer verloren.

Schüttelekranke einjährige Föhren, deren Knospen gesund und kräftig sind, können nach Alers' Ansicht¹⁾ und Erfahrungen dann mit Erfolg verpflanzt werden, wenn sofort nach der Pflanzung fruchtbares Wetter mit warmem Regen eintritt, so daß die Knospen sich rasch entwickeln und die Ernährung der jungen Pflanzen mit übernehmen. Gewagt ist bei der Unsicherheit, der man bezüglich des Wetters ausgesetzt ist, eine solche Verwendung jedenfalls, und man wird sich daher nur ausnahmsweise zu solcher entschließen.

Die Pflege der Föhrensaatbeete besteht in der nöthigen Reinigung und dem entsprechenden Lockern des Bodens, welch letzteres bei dem vielfach ohnehin lockeren Sandboden, der in einem großen Theil des eigentlichen Föhrengebietes zu den Saatbeeten verwendet werden muß, auf eine einmalige Auflockerung beschränkt werden kann, auf bindigerem Boden aber wiederholt erfolgt. — Sind die Saaten gar zu dicht aufgegangen, so ist ein baldiges Verdünnen derselben in der Weise, daß man in der Mitte der Rille eine Gasse durchrupft, zu empfehlen.

Länger als ein Jahr läßt man die Föhrenpflanzen zweckmäßiger Weise nicht im Saatbett stehen, nachdem erfahrungsgemäß die zweijährigen Saatbeetpflanzen fast stets schütten und dadurch zur Verwendung unbrauchbar werden, außerdem aber auch die Verpflanzung gesunder zweijähriger Saatbeetpflanzen erfahrungsgemäß geringern Erfolg zu haben pflegt als diejenige einjähriger Pflanzen. Die starke Wurzelentwicklung der erstern macht auch die Pflanzung schwieriger und kostspieliger.

Dagegen hat man in neuerer Zeit begonnen, auch die Föhre einjährig zu verschulen, um sie als kräftige, stufige zweijährige (oder selbst dreijährige) Pflanze nachwurzelig oder mit Ballen zu verwenden, und wird der Erfolg gerühmt. Wir werden uns daher auch mit der

¹⁾ Centralbl. 1878. S. 133.

zur Zeit allerdings mehr ausnahmsweise stattfindenden Verschulung der Föhre zu beschäftigen haben.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen reichen wir bekanntlich bei unseren Kulturen mit dem Föhrenjährling vollständig aus und die Verschulung würde hier als eine überflüssige und sehr kostspielige Maßregel zu betrachten sein; dagegen hat sich für ungünstige Standortsverhältnisse, sowie bei Nachbesserungen die verschulte und dadurch allseitig kräftig entwickelte Föhrenpflanze als ein sehr geeignetes Pflanzmaterial erwiesen, geeignet namentlich als Ersatz für die kostspieligere Ballenpflanzung,¹⁾ für welche in Revieren mit Sandboden zudem nicht selten das Material fehlt.

Die Verschulung, zu welcher kräftige Fährlinge mit etwa 20 cm langen Pfahlwurzeln verwendet werden — noch längere Wurzeln, welche ein normales Einschulen erschweren würden, stützt man entsprechend ein —, erfolgt im Verband von etwa 10 auf 15 cm nach der Pflanzleine mit Hilfe eines entsprechend langen und starken Setzholzes, und sollen die Pflanzen bis an die untersten Nadeln in den Boden kommen (eine Regel, die man bekanntlich auch bei dem Einpflanzen von Fährlingen gerne beachtet). Die Pflanzen entwickeln sich sehr kräftig und haben, nach einjährigem Stehen im Pflanzbeet mit entsprechender Vorsicht und namentlich mit sorgfältiger Bewahrung der Wurzeln gegen Austrocknen verpflanzt, nur geringen Abgang; doch wird die einfache Klemmpflanzung (mit Beil, Spaten, Buttlar'schen Eisen) sich für die mit reicher Bewurzelung versehenen Pflanzen nicht empfehlen, sondern Löcherpflanzung vorzuziehen sein,²⁾ und unbedingt ist letzteres nötig, wenn die Pflanzen ein zweites Jahr im Pflanzbeet verbleiben. Den verschulten Föhren wird auch nachgerühmt,³⁾ daß sie von der Schüttung verschont bleiben, was sich aber bei den in unserem Garten dahier verschulten Fährlingen nicht bewährt hat; dieselben schütteten vielmehr stark, entwickelten sich aber trotzdem der Mehrzahl nach kräftig.

In dem Beschneiden der Pfahlwurzeln einjähriger Pflanzen bis auf ein Dritttheil (!) ihrer Länge mit nachfolgender Verschulung will Revierförster Krause ein Mittel gegen die Schüttung gefunden haben;⁴⁾ zugleich sollen die Pflanzen bei geringer Entwicklung des Stämmchens ein sehr reiches Wurzelsystem erhalten und sich mit großer Sicherheit verpflanzen lassen. Eine so bedeutende Kürzung der Wurzeln will

¹⁾ Bergl.: Aus d. Walde. IV. S. 147; Zeitschr. f. F.-u. J.-W. XI. S. 329; Jahrb. des schles. F.-V. 1880. S. 24.

²⁾ Zeitschr. f. F.-u. J.-W. XI. S. 331.

³⁾ Zeitschr. f. F.-u. J.-W. IX. S. 555.

⁴⁾ Forstl. Blätter. 1876. S. 383.

uns aber doch bedenklich erscheinen; das Umbiegen der zu langen Pfahlwurzeln beim Einschulen wird auf solche Weise allerdings sicher vermieden! —

Die auf solche Weise meist auf leichtem Boden in obigem Verband erzogenen Pflanzen werden ballenlos verwendet — aber auch Föhrenballenpflanzen hat man schon durch Verschulung von Fährlingen erzogen.¹⁾ Der Boden muß dann etwas bindender sein und darf selbstverständlich nach der Verschulung nicht mehr behakt werden, auch soll das Unkraut nur ausgeschnitten, nicht ausgezogen werden; auf leichterem Boden verschult man selbst, um das Stechen von Ballen zu ermöglichen, ohne vorherige Lockerung nach einfacher Entfernung des Bodenüberzugs. Die Entfernung der Pflanzen muß für Erziehung von Ballenpflanzen etwas größer, etwa 16 cm im Quadrat, gewählt werden.

Solche durch Verschulung erzogene zwei- bis dreijährige Ballenpflanzen zeichnen sich durch kräftige Entwicklung vor den durch Saat erzogenen und daher meist in dichterem Stand erwachsenen aus. Selbstverständlich kann das Pflanzbeet nur einmal benutzt werden und wird eine derartige Pflanzenerziehung überhaupt eine etwas kostspielige sein.

Erwähnung möge auch hier noch das von Fischbach²⁾ geschilderte Verfahren der Bildung künstlicher Ballen für einjährige Föhren finden. Der Arbeiter nimmt die linke Hand voll guter Erde, legt mit der rechten Hand auf die geebnete Oberfläche ein Pflänzchen so, daß dessen Wurzeln gut ausgebreitet auf der Erde liegen, deckt dann mit der nun frei gewordenen Rechten eine zweite Hand voll Erde auf dieselben und formt unter mäßigem Drücken einen kleinen länglichen Ballen. — Daß solche Pflanzen sehr sicher anschlagen und für ungünstige Standörtlichkeiten das Gedeihen der Kultur sichern, läßt sich wohl denken; lange Wurzeln dürfen aber die Fährlinge erklächer Weise nicht haben, da dieselben sonst in einem solchen Ballen nicht unterzubringen sind.

Auch die Verwendung einjähriger Föhrenballenpflänzchen, auf nur oberflächlich durch Nebereggen gelockertem Boden mittels Saat erzogen und mit sehr kleinem, 4—8 cm im Durchmesser haltendem Ballen gestochen, wurde als sicheres, billiges und ebenfalls durch die Schütte minder gefährdetes Verfahren empfohlen.³⁾

In gleicher Weise erzieht man — mit Verwendung geringerer Samenmenge — stärkere, 3—4jährige Föhren-Ballenpflanzen zu

¹⁾ Zeitschr. f. F.- u. J.-W. IX. S. 555.

²⁾ Monatschr. f. d. F.- u. J.-W. 1871. S. 201.

³⁾ Monatschr. f. d. F.- u. J.-W. 1879. S. 388.

Nachbesserungen, zur Aufforstung besonders mißlicher Kulturländer. Weiter als vier Jahre läßt man solche Pflanzen jedoch nicht werden, indem sonst beim Stechen der Pflanzen die schon stark entwickelte Pfahlwurzel abgestochen werden muß, wodurch einerseits das Gedeihen der Pflanze beeinträchtigt, anderseits in Folge der durch das Abstoßen bedingten Prellung nicht selten das Zerfallen der Ballen bei minder bindendem Boden hervorgerufen wird.

§ 113.

Die Lärche.

Ursprünglich vorwiegend ein Baum des Gebirges, in Deutschland namentlich der Alpen, ist die Lärche seit etwa 100 Jahren durch Kultur fast über ganz Deutschland verbreitet worden. In der raschwüchsigen, ohne große Schwierigkeit anzubauenden Holzart glaubte man das beste Mittel zu sicherer und ertragreichere Aufforstung vieler Flächen, zur Nachbesserung von Lücken, zur Erziehung werthvollen Nutzholzes gefunden zu haben, und ausgedehnter Anbau war die Folge dieser Ansicht.

Aber nicht überall hat die Lärche diesen Hoffnungen entsprochen — im Gegentheil hat man vielen Orts recht bedauerliche Erfahrungen mit derselben gemacht. Der anfänglich freudige Wuchs der Pflanzen und Stämme ließ bald früher, bald später nach, dieselben überzogen sich mit Flechten, kümmeren und kränkeln, zuletzt absterbend und mißliche Lücken in den Beständen zurücklassend. Eine als „Lärchenkrankheit“ bezeichnete und insbesondere von Reuß¹⁾ näher besprochene Krankheit ließ dieselben oft in Menge frühzeitig absterben — kurz man fand sich vielfach enttäuscht und unterließ wohl den Anbau der werthvollen und immerhin in vielen Dertlichkeiten gedeihenden Holzart ganz, statt sich auf die Wahl der richtigen Dertlichkeit mit ihrer Nachzucht zu beschränken.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, näher anzugeben, welches die richtige Dertlichkeit für Nachzucht der Lärche und welches der rechte Platz für sie innerhalb unserer Bestände sei. In letzterer Beziehung möchten wir nur berühren, daß sie im Laub- und Nadelholz-Hochwald²⁾ als einzeln eingesprengte vorwüchsige Pflanze, bei der Verwendung zu Schlagnachbesserungen aber nur auf Lücken von solcher Größe, daß sie nicht durch Seitenbeschattung leidet, am Platze ist; daß sie im Mittel-

¹⁾ Die Lärchenkrankheit. 1870.

²⁾ Im Spessart wendet man der Einsprengung der Lärche in die Buchenschläge besonderes Augenmerk zu.

wald sich zum Oberholz vorzüglich eignet¹⁾) und hier größere Verbreitung verdient, als wohl bisher der Fall gewesen; daß sie endlich als vorwüchsiges Schutz- und Schirmholz zur Nachzucht empfindlicher Holzarten an ungeschützten Orten mit gutem Erfolg verwendet werden kann.

Wo es sich nun um Lärchenmachzucht handelt, da werden wir es stets mit künstlicher Nachzucht zu thun haben, wenn auch vielleicht da, wo ältere Lärchen stehen, sich im Lichtschlag des Hochwaldes oder auf den Lücken des Mittelwaldschlages einiger natürlicher Anflug zeigt.

Zu solch künstlicher Nachzucht wurde nun früher vielfach die Saat benutzt, sei es, daß man Plattenarten zur Einsprengung anwandte, oder in Nadelholzstreifensaaten je den dritten, vierten Streifen mit Lärchen samen ansäte, sei es — und dies war nach unsren Wahrnehmungen der häufigere Fall — daß man Fichten-, Föhren- und Lärchen samen in verschiedenem Verhältniß menge und gemeinsam aussäte.

Das eine, wie das andere Verfahren hatte aber entschiedene Nachtheile. Im ersten Fall überwuchsen die Lärchenstreifen ihre Nachbarn und insbesondere die Fichtenstreifen oft in solchem Maße, daß diese letztern im Wuchs stockten, während eine Entfernung der Lärchen doch nicht gut ohne Verursachung von Lücken zulässig war; im letzteren Falle dominirten ebenfalls die Lärchen entweder mehr, als wünschenswerth war, oder sie litten, vereinzelter stehend, in der dichten Umgebung der gleichalten Föhren unter Seitenbeschattung — kurz, die Resultate waren fast stets wenig günstig. So ist jetzt die Pflanzung als entschieden vorwiegende Kulturmethode für die Lärche in den Vordergrund getreten; die oben angegebenen Verwendungssarten der Lärche bedingen dieselbe ohnehin fast ausschließlich, und der Umstand, daß sich die Lärche bei entsprechender Vorsicht in jedem Alter, von der einjährigen Pflanze bis zum Geister hinauf, verpflanzen läßt, hat der Anwendung der Pflanzung noch weiteren Vorschub geleistet. Die Lärche zeigt in leicht erwähnter Beziehung, wie in ihrem alljährlichen Laubabwurf, ihrer Fähigkeit zur Entwicklung von Stammprossen eine entschiedene Aehnlichkeit mit den Laubhölzern.

Die Dertlichkeit für einen Saatkamp wird nach den allgemeinen Regeln gewählt und soll der Boden nicht zu gering sein — die Lärche ist entschieden anspruchsvoller als die Föhre. Seiten schutz ist wohlthätig, aber nicht unbedingt nöthig, Seiten druck unter allen Umständen bei der lichtfordernden Lärche zu meiden, und liegt ein Forstgarten unter

¹⁾ In den Mittelwaldungen bei Aschaffenburg (am sogen. Hahnenkamm) wird die hier auf dem kräftigen Gneusboden gut gedeihende Lärche mit Vorliebe als Oberbaum benutzt. Siehe auch Burkhardt, Säen u. Pflz. S. 416.

dem Seitenschutz eines älteren Bestandes, so werden wir der Lärche stets die von der Bestandswand entfernteren Beete zuweisen.

Die Bodenbearbeitung erfolgt nicht zu seicht, und dürfte eine Tiefe derselben von etwa 30 cm die entsprechende sein.

Der Samen der Lärche zeigt manche Eigenthümlichkeiten. Vor Allem besitzt er eine andern Holzarten gegenüber sehr geringe Keimkraft und mit einer solchen von 40 Prozent pflegt man schon zufrieden zu sein und 30 Prozent sind, zumal bei nicht ganz frischem Samen, nicht selten. Der Grund hiefür ist wohl theilweise darin zu suchen, daß die Lärche schon frühzeitig Samen zu tragen beginnt, ein großer Theil des von solchen jüngern Bäumen produzierten Samens aber taub ist, jedoch gleichwohl mit in den Handel gelangt.¹⁾ Bezüglich der Auswahl des Samens scheint überhaupt Vorsicht geboten; so weist Burkhardt²⁾ darauf hin, daß der ausgezeichnete Wuchs der oldenburgischen Lärchenbestände wohl der Sorgfalt zu verdanken sei, mit der man nur Samen möglichst vollkommener Mutterstämme benutze, und Neuß behauptet, daß die oben schon erwähnte Lärchenkrankheit, wie der bald nachlassende, schlechte Wuchs so vieler Lärchen überhaupt damit zusammenhänge, daß Samen von schlechten Beständen in unpassenden Dertlichkeiten gesammelt und in den Handel gebracht werde. Letzterer will daher Samen aus den Alpenregionen, in denen die Lärche ihre natürliche Heimath habe, verwendet wissen — während eine andere Stimme³⁾ gerade diesen Samen als für das übrige Deutschland unpassend bezeichnet, wo möglich nur Samen von bei uns normal erwachsenen Stämmen anwenden will. (Vergl. § 44.)

Die Keimkraft des Lärchensamens prüfen wir in gleicher Weise, wie jene des Föhren- oder Fichtensamens: durch Lappen- oder Scherbenprobe, in Keimapparaten.

Eine weitere Eigenthümlichkeit des Lärchensamens ist ferner sein ungleichmäßiges Laufen; bei etwas trockner Frühjahrs-Witterung pflegt viel Samen im zweiten Jahr nachzukeimen, und in dem auf den sehr trockenen Sommer des Jahres 1881 gefolgten feuchten Herbst hat hier der im Frühjahr gesäte Samen theilweise im August und September gekeimt. Burkhardt⁴⁾ und ebenso G. Heyer und andere Pflanzenzüchter empfehlen daher ein Einquellen des Samens in Wasser, rein oder mit etwas Kalk oder Salzsäure versezt, für den Lärchensamen ganz besonders

¹⁾ Neuß, die Lärchenkrankheit.

²⁾ Säen u. Pflz. S. 420.

³⁾ Monatsschr. f. d. F.- u. P.-W. 1867. S. 301.

⁴⁾ Säen u. Pflz. S. 419.

und darf der Samen längere Zeit, selbst bis zu 14 Tagen, im Wasser liegen; andern Orts schlägt man ihn zu gleichem Zweck in feuchte Erde ein. Oberförster v. Lassaulx beschreibt¹⁾ sein erprobtes Verfahren folgendermaßen: Der Samen wird in einem Gefäß mit Wasser über-gossen, bis letzteres über dem Samen steht; ist alles Wasser aufgesaugt, so schüttet man den Samen auf gedielen Boden, röhrt ihn täglich um und wenn sich die ersten Keimspitzen zeigen, nimmt man die Aussaat vor, nachdem man behufs leichteren, gleichmäßigen Säens und um das Ballen des nassen Samens zu vermeiden, den Samen mit feiner, trockner Erde gemischt.

Auf die Menge des pro Ar zu verwendenden Samens ist neben der geringen Keimkraft auch noch der Umstand von Einfluß, daß der Lärchensamen stets mit viel Schuppenresten (in Folge der jetzt üblichen Gewinnungsart) vermischt zu sein pflegt, ein Umstand, der ebenfalls Erhöhung des Samenquantums bedingt; in weiterem wird die Art und Weise der Aussaat — breitwürfig oder in Rillen —, in letzterem Fall die Entfernung der Rillen von einander von Einfluß auf die Samenmenge sein. Burkhardt gibt dieselbe für Vollsaat auf 4, für Rillensaat auf 2 Kilogr. pro Ar an, während unsere eigenen, noch nicht abgeschlossenen Versuche über die nötigen Samenquantitäten für die Aussaat mit dem bayr. Rillenbrett einen wesentlich höheren Bedarf ergaben.

Die Aussaat der Saatbeete erfolgt im Frühjahr, wobei zeitige Aussaat namentlich für den nicht angequellten Samen empfohlen wird, um demselben die Frühjahrsfeuchtigkeit zu sichern. Burkhardt empfiehlt breitwürfige Saat, bei welcher der gut bearbeitete Boden zuerst wieder etwas angedrückt und dann, nach erfolgter Aussaat der Samen bis zum Verschwinden mit guter Erde übersiebt wird. Beim Ausjäten soll dann zugleich der da oder dort zu dichte Pflanzenstand gelichtet und hiervor das Gedeihen der Pflänzchen gefördert werden.

Wenn nun gleich die breitwürfige Saat manchen Vortheil durch mehr vereinzelten Stand der Pflanzen bieten mag, so halten wir doch auch bei der Lärche die Vortheile der Rillensaat (siehe § 48) für überwiegend, haben dieselbe auch an den meisten Orten in Anwendung gefunden. Die Entfernung der Rillen wird einigermaßen dadurch bedingt, ob man die jungen Pflanzen ein- oder zweijährig verwenden will; im ersten Fall genügt eine Entfernung der Rillen von 10 — 15 cm, im andern wird eine solche von 20 — 25 cm vorzuziehen sein.

Das Eindrücken der Rillen — am besten schmaler Doppel-

¹⁾ Zeitschr. f. d. F.- u. J.-W. V. S. 85.

rollen — erfolgt in gleicher Weise wie bei Fichten und Föhren, und können zur Saat dieselben Säevorrichtungen in Anwendung kommen.

Das Decken des Samens erfolgt mit lockerer Erde oder mit Rasen-
asche etwa 1 cm stark; Baur¹⁾) gibt auf Grund seiner Versuche an, daß die Lärche gegen eine stärkere oder zur Verkrustung geneigte Decke empfindlich sei und eine schwächere Bedeckung als Fichte und Föhre liebe.

Ein Decken der angesäten Beete mit Nadelholzästen, die nach er-
folgtem Aufgehen zu beiden Seiten des Beetes aufgesteckt werden, oder mit Schutzgittern ist — wie zum Schutz gegen Vögel und Regengüsse — so zur Erhaltung der Feuchtigkeit sehr zu empfehlen und namentlich bei eingekohltem Samen nöthig.

Die Pflege der Lärchensaattöpfe erfolgt während des Sommers durch Fäten und Lockern. Durch Wild sind die jungen Lärchen während des Winters nur wenig gefährdet, und wo weder Hochwild, noch Sauen, lässt sich die Lärche mit Fichte und Föhre in uneingefriedigten Kämpen erziehen. Gegen Spätfröste ist die Lärche zwar nicht gerade empfindlich, aber doch auch nicht so unempfindlich, wie Fischbach angibt,²⁾ und nach Burkhardt's Mittheilung³⁾ ist es namentlich der im Moment des Laubausbruches, der ja sehr frühe erfolgt, eintretende Spätfrost, der sie schädigt, im Wuchs zurücksetzt; werden die Pflanzen daher nicht schon einjährig verpflanzt oder verschult, so ist die Anwendung von Pflanz-
gittern immerhin auch für die Lärche zu empfehlen.

Unter günstigen Umständen erreicht die junge Lärche schon im ersten Lebensjahr eine Höhe von 20—25 cm und kann entweder im Spät-
herbst — und ihr frühzeitiges Ausschlagen im Frühjahr lässt Herbst-
pflanzung für sie nicht selten als zweckmäßig erscheinen — oder im nächsten Frühjahr bereits zur Verwendung kommen. Häufiger aber lässt man sie 2 Jahre im Saatbett stehen, und geringe Entwicklung im ersten Jahr oder das Bedürfnis etwas kräftigerer Pflanzen nöthiger selbst hiezu; länger als 2 Jahre lässt man sie nicht im Saatbett, da die sich rasch entwickelnden Pflanzen sich gegenseitig zu sehr beeingen, sondern greift, wenn man noch stärkere, bis 1 m hohe Pflanzen wünscht, wie man sie etwa zur Einpflanzung in schon stärkere Laubholzschläge oder in Mittelwaldungen bedarf, zur Verschulung, die übrigens bei der Lärche in minderem Maß als bei Fichte und Tanne Platz zu greifen pflegt.

Zur Verschulung verwendet man wohl ausschließlich einjährige

¹⁾ Monatschr. f. d. J.-W. 1875. S. 355.

²⁾ Praktische Forstwirthschaft. S. 207.

³⁾ Säen u. Pflz. S. 414.

Pflanzen, die dann 2 Jahre im Pflanzbeet stehend zu meterhohen, kräftigen Pflanzen heranwachsen. Die Verschulung muß frühzeitig erfolgen, da deren Bornahme nach Aufbruch der Knospen bedenklich ist¹⁾ und bei eintretender trockner Witterung bedeutenden Abgang zur Folge haben kann — wir sehen auch hier wieder eine Verwandtschaft mit dem Laubholz! Durch frühzeitiges Ausheben der Pflanzen und Einschlagen derselben an kühlem, schattigem Ort kann man dem zu frühen Treiben, sowie der Spätfrostgefahr für dies Frühjahr vorbeugen (ein Verfahren, das auch unter Umständen für die Auspflanzung ins Freie zu empfehlen ist). — Die Verschulung darf mit Rücksicht auf die rasche Entwicklung der Lärche, namentlich auch auf deren kräftige, allseitige Beauftragung nicht zu eng erfolgen, etwa im Verband von 20 auf 30 cm; ja Burkhardt empfiehlt sogar 24 auf 36 cm.

Bei der Verschulung, die mit starkem Sezholz erfolgen kann, kürzt man nöthigenfalls die Pfahlwurzeln etwas, wenn dieselben allzulang entwickelt sind.

Die Pflege der Pflanzbeete bietet nichts Besonderes, erfolgt durch Reinigen von Unkraut und Lockern des Bodens im ersten Jahr, während im zweiten in Folge der raschen Entwicklung der Lärche ersteres nicht mehr nöthig und letzteres oft nicht mehr möglich sein wird. — Auch den Pflanzbeeten werden Spätfroste gefährlich, wenn sie intensiv und zur kritischen Zeit eintreten; sie sezen die Pflanzen im Wuchs zurück und zwei Jahre einander folgend bringen sie die Pflanzen fast zum Verkrüppeln. Schutzgitter werden auch gegen diese Gefahr in Anwendung gebracht werden können, doch geschieht dies, da die Lärche doch nicht zu den empfindlichsten Pflanzen gehört, bei verschulten Lärchen wohl seltener.

Noch stärkere Pflanzen, Lärchenheister, wird man nur ausnahmsweise im Forsthaushalt bedürfen; wo aber die Verwendung solch starken (und kostspieligen!) Materials aus besondern Rücksichten angezeigt erscheint, verschult man die im Pflanzbeet erzogenen dreijährigen, meterhohen Pflanzen unter Auswahl der schönsten und kräftigsten Stämmchen noch einmal in etwa 70 cm Quadratverband, kürzt hiebei zu weit ausstreichende Seitenwurzeln entsprechend ein und stuft zu lange Seitenäste, behandelt die Pflanzen also wie Laubholz-Pflanzlinge. Nach 2—3 jährigem Stehen im Heisterkamp haben dieselben die nöthige Höhe und

¹⁾ Fischbach, prakt. Forstwirtschaft. S. 207.

Auch wir haben mit etwas später Lärchen-Verschulung schlechte Erfahrungen gemacht!

Stärke erreicht und können bei entsprechender Vorsicht mit gutem Erfolg verpflanzt werden. — Unverschulte Lärchen von Heisterstärke, etwa aus alten Saatbeeten oder Saaten, zu verpflanzen, pflegt um der mangelhaften Wurzelbildung und fehlenden richtigen Befestigung willen selten guten Erfolg zu haben: das hatte wohl auch Pfeil im Auge, wenn er die Lärche als nur in ganz jugendlichem Alter verpflanzbar erklärt.¹⁾

§ 114.

Die Schwarzkiefer.

Die Heimath dieser Holzart ist bekanntlich eine sehr eng begrenzte: Niederösterreich, die Vorberge in Kärnten und Steiermark allein beherbergen sie in größerer Ausdehnung, während sie in den südlichen Alpenländern, in Kroatien und Dalmatien nur wenig mehr angetroffen wird.²⁾ Eine Reihe vorzüglicher Eigenschaften: große Genügsamkeit bezüglich des Standortes, insbesondere Gedeihen auch noch auf trockenem, heißem (Kalk) Boden, Unempfindlichkeit gegen Fröste, geringe Gefährdung durch Wild und Insekten, starker Nadelabwurf — haben aber schon seit längerer Zeit³⁾ die Aufmerksamkeit der Forstleute auf sie gelenkt, sie namentlich als eine Holzart erscheinen lassen, welche zur Aufforstung trockner, steiniger, flachgründiger Standorte besonders geeignet ist. Namentlich sind es die bei unvorsichtiger Abholzung so leicht verlödenden, so schwer wieder in Bestockung zu bringenden Kalkgehänge, für welche die kalkliebende Schwarzkiefer ein Mittel zur Wiederbestockung bietet, und so sehen wir denn dieselbe nun vielfach auch außerhalb der oben angegebenen natürlichen Grenzen ihrer Verbreitung angebaut. Fast ausschließlich ist es aber dann wohl die Pfianzung, welche zur Aufforstung angewendet wird, und so ist die Erziehung der Schwarzkiefer im Saat- oder Pfianzbeet da und dort Aufgabe des Forstmannes.

Bezüglich der Wahl der Dertlichkeit und Zurichtung der Saatbeete gelten die allgemeinen Regeln; auf Seitenshut irgend welcher Art ist bei der gegen Frost wie Hitze nahezu unempfindlichen Schwarzkiefer wenig Rücksicht zu nehmen, und da keinerlei Wild dieselbe gefährdet, so kann ihre Erziehung auch im uneingefriedigten Kamp erfolgen.

Der Samen der Schwarzkiefer, welcher wohl ausschließlich aus deren Heimath Niederösterreich bezogen wird, gehört nach unseren Erfahrungen zu den keimkräftigsten Samenarten; — auch Burkhardt gibt

¹⁾ Deutsche Holzzucht. S. 528.

²⁾ v. Seckendorff, Mitth. a. d. österr. Berl.-W. I. S. 116.

³⁾ Vergl. die Brochüre: Graf Uxküll-Gyllenbrand, die Schwarzkiefer. 1845.

deßsen Keimfähigkeit bei guter Behandlung auf 90 Prozent an. Es ist dies bei der Aussaat wohl zu beachten und zu dichte Saat im Interesse der kräftigen Entwicklung der Pflanzen zu vermeiden. Burkhardt rechnet 3,5 Kilogr. als das pro Ar zu verwendende Quantum, unsere eigenen Versuche ergaben einen Bedarf bis zu 5 Kilogr.

Die Aussaat der Schwarzkiefer erfolgt in gleicher Weise wie beim Föhrensamen: im Frühjahr, in eingedrückte Doppelrillen, deren Entfernung mit Rücksicht darauf, daß die Pflanzen fast stets einjährig verwendet oder verschult werden, 10—12 cm nicht zu übersteigen braucht, und mit einer $1\frac{1}{2}$ bis 2 cm starken Bedeckung mit gutem, lockerem Boden. Durch Schuhgitter oder Bedecken mit Nadelholzästen gibt man dem Samen den nöthigen Schutz gegen Trockenheit während der Keimperiode und gegen Vögel, gegen letztere etwa auch durch Mennige (§ 67). Fink¹⁾ empfiehlt späte Saat, im Mai, um durch rasches Aufgehen die Gefährdung des Samens durch Vögel zu vermindern — wir geben eben genannten Mitteln den Vorzug.

Ein Einquellen des Samens ist unmöglich, ja nach einem von Dr. Möller angestellten Versuch²⁾ scheint dasselbe für den Schwarzkiefern samen sogar leicht nachtheilig zu werden, indem bei 36—40 Stunden dauerndem Einweichen das Keimprozent von 70 auf circa 45 Prozent zurückging.

Die sich kräftig entwickelnden Pflanzen, die schon im ersten Lebensjahr eine tiefgehende Pfahlwurzel zeigen, hierin unserer gewöhnlichen Föhre gleichend, werden entweder einjährig ins Freie ausgepflanzt, oder wenn man stärkere, reichbewurzelte Pflanzen bedarf, verschult. Nur einigermaßen dicht stehend, zeigen sie außerdem im zweiten Jahr ihres Verbleibens im Saatbett schon einen ganz entschiedenen Rückgang in der Entwicklung; dagegen wachsen sie, im Abstand von etwa 15 auf 20 cm verschult und 2 Jahre im Pflanzbeet verbleibend, zu sehr kräftigen, stufigen Pflanzen heran, die mit gutem Erfolg ballenlos zur Be pflanzung ungünstiger Dertlichkeiten verwendet werden. Sie im Pflanzbeet noch stärker werden zu lassen, dürfte nicht räthlich erscheinen, ihre Be pflanzung nur kostspieliger und unsicherer machen.

Das Verschulen erfolgt mit starkem Sehholz und ist, bei den oft sehr langen Wurzeln, Bedacht auf das Vermeiden von Umstülplungen und Verkrümmungen derselben zu nehmen. Ein Einstüzen allzu langer Wurzeln wird zu empfehlen sein.

¹⁾ Allgem. F.-u. F.-B. 1873. S. 215.

²⁾ v. Seckendorff, Mitth. a. d. österr. Berl.-W. I. S. 118.

Die Pflege der Saat- und Pflanzbeete bietet keinerlei Besonderheiten; Schutz gegen Hitze, Spätfroste, Barfrost ist bei der gegen Temperaturextreme unempfindlichen, langwurzeligen Schwarzkiefer nicht nöthig.

Enthält der Boden, auf welchem man die Pflanzen erzieht, wenig Kälte, so dürfte sich eine Kalkdüngung vor der Ansaat oder Verschulung bei der eine besondere Vorliebe für Kalkboden zeigenden Schwarzkiefer besonders empfehlen.

§ 115.

Die Weymouthskiefer.

Dieser schöne Baum, zu Anfang des vorigen Jahrhunderts bei uns aus Nordamerika eingeführt und nun völlig acclimatisirt, ist entschieden die wichtigste unter den ausländischen Holzarten, die man in unsren deutschen Waldungen einzubürgern gesucht hat, und seine forstliche Bedeutung wird wohl vielfach noch zu wenig beachtet. Der geringe Werth des Holzes wird meist als Grund dieser Nichtbeachtung angegeben, — und doch ist die Verwendbarkeit desselben als Nutzhölz eine gar mannigfaltige,¹⁾ wenn auch von jener unserer einheimischen Nadelhölzer verschiedene; auch sonstige gute Eigenschaften mancher Art lassen sich zu Gunsten der Weymouthskiefer hervorheben, und sie hat denn auch schon manchen warmen Vertreter gefunden.²⁾ Ihre Schnellwüchsigkeit, ihre Genügsamkeit bezüglich der Bodengüte, ihre Unempfindlichkeit gegen Frost jeder Art stellen sie an die Seite der Föhre, vor welche sie aber die mindere Gefährdung durch Duft- und Schneebrech in höheren Lagen ein viel höheres Schattenerträgniß und in Folge letzterer Eigenschaft auch die Erhaltung eines dichteren Schlusses im reinen Horst oder Bestand voraus hat. Diese Eigenschaften, verbunden mit hoher Massenproduktion sind wohl geeignet, der Weymouthskiefer einen, wenn auch bescheidenen Platz in unserem deutschen Wald zu sichern; im Park hat sie sich denselben durch ihren Habitus, ihre zierliche Benadelung längst gesichert.

Vielfach haben, wie schon berührt, diese Vorteile denn auch bereits Anerkennung gefunden, und wir finden die Weymouthskiefer nicht selten als eine Bewohnerin unserer Forstgärten, da deren Anbau mit Rücksicht auf den theuern Samen, die Sicherheit der Verpflanzung und die

¹⁾ Burchardt, Säen u. Pflz. S. 427.

²⁾ Monatschr. f. d. F. u. F.-W. 1866. S. 251. Monatschr. f. d. F. u. F.-W. 1867. S. 294.

in der Regel bestehende Absicht, sie den Schlägen nur beizumischen, lediglich durch die Pflanzung zu geschehen pflegt.

Die Aussaat des nicht selten nur mäßige Keimprozente zeigenden starken Samens erfolgt stets im Frühjahr, und kann ganz in gleicher Weise wie bei der gewöhnlichen Föhre geschehen. Man sät ihn demnach in schmale Doppelrillen, die je 10—12 cm von der nächsten Doppelrille entfernt sind, und drückt die Rillen so tief ein, daß der Samen eine Bedeckung von 1,5—2 cm erhält; der Samen kann ebenfalls mittelst einfacher Säevorrichtungen — Saathrett — gesät werden und bedarf man pro Ar etwa das doppelte Quantum als bei der Föhre, Dank seiner viel bedeutenderen Größe. Der Samen keimt minder sicher als jener der Föhre, liegt bisweilen wenigstens theilweise ein volles Jahr bis zur Keimung im Boden, was in der Mischung alten und frischen Samens seinen Grund haben dürfte, und scheint vor Allem durch anhaltende Trockenheit in seiner Keimkraft beeinträchtigt zu werden, weshalb Erhaltung der Feuchtigkeit durch Decken mit Nesten, Stroh oder durch Anwendung von Schuhgittern angezeigt erscheint; durch diese Mittel wird gleichzeitig der Samen gegen Vögel geschützt. Auch die noch schwache Pflanze ist gegen Trockenheit empfindlicher als jene der Föhre, hinter welcher sie überhaupt im ersten Lebensjahr bezüglich der Entwicklung des Stämmchens und mehr noch der Wurzel nach unseren Erfahrungen etwas zurückbleibt.

Mit Rücksicht auf den wünschenswerthen Schutz gegen Trockenheit wird man den Weymouthskiefer-Saatbeeten im Forstgarten gerne einen gegen die grelle Einwirkung der Mittagssonne geschützten Platz zuweisen.

Bisweilen pflanzt man nun solche einjährige oder besser zweijährige Weymouthskiefern direkt aus dem Saatbeet ins Freie; öfter aber, und namentlich wenn man dieselben zur Lückenpflanzung in Schläge oder auf in der Oberfläche stark vermagerten Boden verwenden will, verschult man sie zur Erziehung kräftiger gut bewurzelter Pflanzen.

Zur Verschulung verwendet man am besten einjährige Pflanzen, die man mittelst des Sezholzes in Entferungen von 15 auf 15 oder 15 auf 20 cm einschult, was bei der noch geringen Wurzelentwicklung rasch und sicher vor sich geht. Sie schlagen leicht an, entwickeln im ersten Jahr einen nur mäßigen, im zweiten aber einen kräftigen Höhentreib nebst entsprechendem Astquirl und haben als drei- bis vierjährige, kräftige, zwischen 30 und 40 cm hohe Pflanzen in der Regel die zum Auspflanzen nötige und zweckmäßige Stärke erreicht. Doch lassen sich auch noch stärkere Weymouthskiefern ballenlos mit Erfolg verpflanzen.

Schutz und Pflege der Weymouthkiefer im Saat- und Pflanzbeet bieten keine Besonderheiten. Weder Spät- noch Winterfrost werden den Pflanzen gefährlich, und auch gegen Trockenheit sind die stärkeren Pflanzen nicht mehr empfindlich. Nach Murrhardts Angabe¹⁾ äsen die Rehe gern die jungen Triebe ab, was zur Erziehung der Pflanzen in genügend eingefriedigtem Kampf nöthigen kann, und außerdem fanden wir die verschulften Pflanzen in unserem Forstgarten von einer Rothack-Blattwespe (*Lyda campestris*) befallen, die durch Absuchen der Pflanzen ohne große Mühe zu entfernen war.

¹⁾ Monatschr. f. d. F. u. J.-W. 1866. S. 253. — Im Spessart haben wir derartige Beschädigungen an den ausgesetzten Weymouthkiefern nur selten bemerkt.



Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin N.,
Monbijouplatz 3.

Lehrbuch der Baumkrankheiten.

Von
Dr. Robert Hartig,

Professor an der Universität München.

Mit 186 Figuren auf 11 lithograph. Tafeln und 86 Holzschnitten.
Preis geb. 12 Mk.

Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut zu München.

Herausgegeben

von

Dr. R. Hartig,

Professor an der Universität zu München.

I.

Mit 9 lithographirten Tafeln und 3 Holzschnitten.
Preis geb. 14 Mk.

Naturgesetzliche Grundlagen des Wald- und Ackerbaues I. Physiologische Chemie der Pflanzen.

Zugleich

Lehrbuch der organischen Chemie und Agriculturchemie
für Forst- u. Landwirthe, Agriculturchemiker, Botaniker etc.

Von

Dr. Ernst Ebermayer,

Prof. a. d. Universität München.

I. Band: Die Bestandtheile der Pflanzen.
Preis 16 Mk.

Die gesammte Lehre der Waldstreu

mit Rücksicht auf die

chemische Statik des Waldbauers.

Unter Zugrundelegung der in den Königl. Staatsforsten Bayerns
angestellten Untersuchungen.

Von

Dr. Ernst Ebermayer,

Professor an der Königl. Bayr. Central-Forstlehranstalt zu Aschaffenburg.

Preis 11 Mk.

Die europäischen Borkenkäfer.

Für Forstleute, Baumzüchter und Entomologen.

Von

W. Eichhoff,

Kaiserl. Oberförster zu Mülhausen im Elsass.

Mit 109 Original-Abbildungen in Holzschnitt.
Preis 10 Mk.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin N.,
Monbijouplatz 3.

Lehrbuch der Forstwissenschaft.

Für Forstmänner und Waldbesitzer.

Von

Karl von Fischbach,

Fürstlich Hohenzollernscher Oberforstrath.

Dritte vermehrte Auflage.

Preis 10 Mf.

Praktische Forstwirthschaft.

Von

Karl von Fischbach,

Fürstlich Hohenzollernscher Oberforstrath.

Preis 8 Mf.

Die Lehren der Forstwissenschaft.

Ein Leitfaden

für den Unterricht der Forstleuten und zum Selbstunterricht für Forstgehilfen, Förster, Waldbesitzer und Gutsverwalter.

Von

Th. Ebermayer,

Königl. Bayr. Forstmeister.

Dritte, umgearbeitete und verbesserte Auflage.

Mit 28 in den Text gedruckten Holzschnitten.

(Unter der Presse.)

Leitfaden für das Preußische Jäger- und Förster-Examen

Ein Lehrbuch

für den Unterricht der Forstlehringe auf den Reihen, der gelernten Jäger bei den Bataillonen und zum Selbstunterricht der Forstausseher.

Von

G. Westermeier,

Königl. Preuß. Oberförster zu Faltenwald bei Stettin.

Mit 25 in den Text gedruckten Holzschnitten, einer Spurentafel,
5 Bestimmungstabellen und 10 Beilagen.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Preis 5 Mf. — Fest geb. 6 Mf.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer, Berlin N.,
Monbijouplatz 3.

**Die Douglas-Fichte und einige andere Nadelhölzer
namentlich aus dem nordwestlichen Amerika
in Bezug auf ihren forstlichen Anbau in Deutschland.**

Von

John Booth,

Besitzer der Flottweiler Baumschulen bei Hamburg.

Mit acht Photographien und einer Karte vom nordwestl. Amerika.

Eleg. geb. Preis 8 M.

**Die Naturalisation
ausländischer Waldbäume in Deutschland.**

Von

John Booth,

Besitzer der Flottweiler Baumschulen.

(Unter der Presse.)

Die Weißtanne

(*Abies pectinata D. C.*) im Schwarzwalde.

Von

Forstinspektor Friedrich Gerwig.

Preis 3 M.

Die Erziehung der Eiche

zum kräftigen und gut ausgebildeten Hochstamm
nach den neuesten Prinzipien.

Von

Oberförster C. Geyer.

Mit 12 lithographirten Tafeln.

Preis 3 Mark.

Die Pflege der Eiche.

Ein Beitrag zur Bestandespflege.

Von

Oberförster Ad. v. Schütz.

Mit 27 in den Text gedruckten Holzschnitten und 39 Zeichnungen
auf 6 Figurentafeln.

Preis 3 M. 75 ö.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.