

**Eine Kurzgefasste Operationslehre**

# **Augenärztliche Eingriffe**

**DR. J. MELLER**

 **Springer**

# AUGENÄRZTLICHE EINGRIFFE

EINE KURZGEFASSTE OPERATIONSLEHRE

HERAUSGEGEBEN VON

PROFESSOR DR. **J. MELLER**

VORSTAND DER I. UNIVERSITÄTS-AUGENKLINIK IN WIEN

VIERTE

NEUBEARBEITETE UND ERGÄNZTE AUFLAGE

MIT BEITRÄGEN VON

**J. BÖCK · K. KOFLER · A. PILLAT · L. SALLMANN**

MIT 261 ZUM TEIL FARBIGEN ABBILDUNGEN

IM TEXT UND AUF 2 TAFELN



SPRINGER-VERLAG WIEN GMBH 1938

ISBN 978-3-662-35827-6      ISBN 978-3-662-36657-8 (eBook)  
DOI 10.1007/978-3-662-36657-8

ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER ÜBERSETZUNG  
IN FREMDE SPRACHEN, VORBEHALTEN

COPYRIGHT 1921, 1931 AND 1938 BY SPRINGER-VERLAG WIEN  
URSPRÜNGLICH ERSCHIENEN BEI JULIUS SPRINGER IN VIENNA 1938  
SOFTCOVER REPRINT OF THE HARDCOVER 4TH EDITION 1938

## Aus dem Vorwort zur ersten Auflage.

Nam et ispa scientia potestas est.

Von Eigenschaften, die man haben müsse, um ein guter Wundarzt zu werden, wissen alte Schriftsteller dieses Faches eine ganze Reihe aufzuzählen. Manche von diesen Eigenschaften erscheinen uns selbstverständlich, andere gleichgültig oder überflüssig und nur wenige unerlässlich. Seltener wird darüber Auskunft gegeben, wie die Wundarzneikunde erlernt wird. Als Antwort finde ich in dem chirurgischen Handbüchlein von KEIL aus dem Jahre 1751 drei Punkte angeführt: 1. Durch treue und aufrichtige Lehrmeister, 2. durch fleißiges Bücherlesen und 3. durch die Erfahrung und Übung. Über den Unterricht selbst aber fehlen Angaben gänzlich. Auch BEER führt als Bedingung eine Reihe persönlicher Eigenschaften an und verlangt zwar, daß der Wundarzt alle erforderlichen medizinisch-chirurgischen Kenntnisse habe, ohne aber darauf einzugehen, wie er am besten in deren Besitz gelangen könne.

Im allgemeinen scheint dem systematischen Unterrichte dabei kein besonderer Wert beigemessen, sondern der Erfahrung und Übung der Hauptanteil an der Ausbildung zugeschrieben zu werden, indem diese beiden dem Schüler bei Vorhandensein geeigneter körperlicher und geistiger Eigenschaften im Laufe der Zeit die nötigen Kenntnisse beibrächten. So sagt auch FUCHS im Vorworte zur ersten Auflage seines Lehrbuches, das Operieren könne nur durch vieles Zusehen und durch eigene Übung erlernt werden.

Es dürfte daher nicht überflüssig sein, der Bedeutung des Unterrichtes in unserem Fache einige Worte zu widmen. Denn dem Unterrichte kommt auf die Entwicklung des Schülers mehr Einfluß zu als so manchen der allgemeinen Eigenschaften, die früher als Grundlage vorausgesetzt worden sind.

Das Operieren ist eine Fertigkeit, zu deren Erlangung sowie bei jeder anderen eine zweckentsprechende Unterweisung Grundbedingung ist. Was der einzelne nur mühsam von selbst herausfindet, was er nur erst nach vielen Mißgeschicken endlich von selbst erreicht, das macht oft ein Wort des Lehrers klar, und plötzlich sind alle Schwierigkeiten weggeräumt. Selbst eine außerordentliche Begabung einzelner zu irgendeiner Kunst läßt diese Bevorzugten nicht den Höhepunkt erreichen und zu Meistern werden, wenn der Lehrer fehlt.

Als Bedingung für eine erfolgreiche Ausbildung in der wundärztlichen Augenheilkunde muß eine gründliche allgemeine Vorbildung im ganzen Fache, in der Erkennung der Augenerkrankungen und in der Behandlung der Kranken verlangt werden. Die Ausbildung im Operieren hat daher den Schlußstein des augenärztlichen Studiums zu bilden und verlangt dann unvergleichlich weniger Zeit und Mühen, als wenn zu früh damit begonnen wird. Im Gegensatz dazu hat der Anfänger im Fache das Bestreben, sobald als möglich zu den Eingriffen zu-

gelassen zu werden. Diese müssen aber ungenügend ausfallen, wenn der Betreffende mit dem Organ noch nicht innig vertraut ist.

Eine mittelbare Betätigung an den Eingriffen als Gehilfe trägt wesentlich dazu bei, sich mit dem Organ in wundärztlicher Hinsicht hinreichend bekanntzumachen. Man wird um so schneller in der wundärztlichen Seite unseres Faches ausgebildet, zu einem je tüchtigeren Augenarzt man es schon vorher gebracht hatte.

Haben in solcher Weise allgemeine Fachbildung und zweckmäßiger Unterricht zusammengewirkt, so ist es fast immer schon nach den ersten paar Eingriffen entschieden, ob einer ein brauchbarer Wundarzt wird oder nicht. Es ist ein Fehler zu glauben, daß der eine zunächst einmal einige Dutzend Starausziehungen machen müsse, um den Eingriff zu beherrschen, oder der andere, weniger Geschickte, vielleicht die doppelte Zahl. Wer den Eingriff nicht nach den allerersten paar Fällen genügend gut macht, der ziehe seine Hand von diesem Fache für immer zurück.

Der Unterricht setzt sich wie in jeder anderen Kunst aus zwei Teilen zusammen, die beide gleich wichtig sind.

Der erste ist das richtige Vorzeigen, wie es gemacht werden soll, mit den entsprechenden erläuternden Begleitworten. Dazu eignet sich zunächst nicht der Eingriff am Kranken selbst. Eingriffe, die in wenigen Sekunden durchgeführt zu werden haben, erfordern Erklärungen, die sich über ebenso viele Stunden erstrecken. Als Beispiel sei der Starschnitt angeführt. Daraus ergibt sich schon die Notwendigkeit des Vortrages und des Vorzeigens am Leichen- oder Tierauge. Erst der Unterrichtete, der Wissende, wird dann dem Eingriffe des Meisters am Kranken mit Vorteil beiwohnen, die vielen Einzelheiten, die dieser befolgt, beobachten, auffassen und verwerten können und damit aus dem Zuschauen Nutzen für sich ziehen. Wer nicht unterrichtet worden ist, wird selbst bei guter Auffassungsgabe aus dem Zusehen nur wenig und dieses Wenige nur nach langer Zeit gewinnen, meist aber keinen Nutzen davon haben und je nach seiner seelischen Verfassung die Sache entweder für so einfach halten, als sie der durch die Meisterhand begründete glatte Verlauf erscheinen läßt oder aber das Gesehene als etwas Unerreichbares betrachten. Dieser wird von vornherein zaghaft an einen Eingriff schreiten und darauf vorbereitet sein, daß er mißlingt, jener aber um so mehr enttäuscht sein, je geringer er das Gesehene eingeschätzt hatte.

Der zweite, ebenso wichtige Teil des Unterrichts, der dem ersten folgt, sich teilweise aber schon in ihn einfügt, ist die Zergliederung der Fehler. Sie gehört zum Teil schon in den Vortrag über die richtige Ausführung des Eingriffes.

Es gibt zwei Arten von Fehlern:

Die einen haben ihre Ursache in dem Bau des Auges und sie kehren demgemäß mit unfehlbarer Regelmäßigkeit bei jedem Anfänger wieder. Die anderen sind mehr persönlicher Herkunft. Auch von diesen sind viele aus begrifflichen Gründen fast bei jedem Anfänger zu finden. (Schwerfälligkeit der Hand- und Fingerbewegungen, Fehler durch Hinlenken der ganzen Aufmerksamkeit auf *eine* Einzelheit des jeweiligen Eingriffes, wodurch die anderen, die gleichzeitig befolgt werden müssen, vernachlässigt werden usw.) Nur wenige sind ganz persönlichen Ursprunges, sozusagen Ausnahmefehler.

Die Fehler müssen in ihrem Zustandekommen klargelegt werden. Der Lehrer hat die Quelle aufzudecken, ihre Folgen zu erörtern und ausführlich durch Wort und Vorzeigen darzutun, wie sie vermieden werden.

Daß sich dazu nicht das Auge des Kranken auf dem Operationstisch eignet, braucht ein Arzt wohl nicht hervorzuheben. Ist der Fehler einmal am Kranken geschehen, dann ist es gewöhnlich zu spät.

Daraus ergibt sich also wieder die Notwendigkeit des Unterrichtes am Leichen- oder Tierauge. Um nämlich diesen zweiten Teil des Unterrichtes gründlich durchführen zu können, um außer den regelmäßig wiederkehrenden, weil allen gleichmäßig anhaftenden Fehlern namentlich auch die individuellen herauszufinden, gehört zum Unterricht auch das praktische Üben jedes einzelnen der Schüler in Gegenwart des kritisch beobachtenden Lehrers und der anderen Hörer.

Welcher klinische Lehrer würde dazu die Augen hilfeschender Kranker verwenden, selbst wenn sie ihm zu Tausenden zur Verfügung stünden? Wer sich frische Leichenaugen beschaffen kann, wird diese zum Unterrichte gewiß vorziehen. Eine Einspritzung durch die Lederhaut in den Glaskörperraum macht sie für den Eingriff genügend gespannt. Da sie aber selbst in großen Anstalten nur in geringer Anzahl erlangt werden können, kommen sie nur für die letzte Vorbereitungsstufe in Betracht.

Es reichen aber die Tieraugen (Schweinsaugen) trotz ihrer großen anatomischen Verschiedenheit vom menschlichen Auge zum Unterricht und zur vorbereitenden Ausbildung völlig hin. Ja sie sind gerade für die Einzelheiten, die eingehend gelernt und oft geübt werden müssen, vorzüglich geeignet. Alle die wichtigen, für den Anfänger so schwierig zu befolgenden Einzelheiten des Starschnittes (Messerhaltung und -führung, das Durchsetzen der vorderen Kammer, die Einzelheiten während des Ausstiches und unmittelbar darauf, die Anlage des Schnittes, das gleichzeitige Festhalten des Auges ohne Druck usw.) lassen sich daran ganz vorzüglich üben und erlernen, so daß der, der sie an diesen Augen ganz tadellos ausführen gelernt hat, sie am Menschenauge ebensogut macht, ja sie hier wegen des kleineren Umfanges des Auges sogar entschieden leichter findet.

Andere Einzelheiten aber, die sich an den Tieraugen aus anatomischen Gründen nicht so wie am lebenden Menschenauge ausführen lassen (wie z. B. die Ausschneidung der Regenbogenhaut, die wegen Starrheit dieser Haut im Tierauge nie vorbildlich gelingt), bedürfen keiner besonderen eingehenden Übung. Jeder nur halbwegs Geschickte macht sie nach entsprechender Vorbereitung auch das erstemal ohne Fehler.

Ganz besonders lehrreich gestaltet sich für so vorbereitete Schüler das Zusehen bei einem Eingriffe, den ein noch nicht zur Meisterschaft gelangter Arzt am Kranken ausführt. Ich möchte sagen, daß sie daraus mehr lernen als durch das Zusehen bei dem Meister selber. Sie wurden zu Kritikern erzogen, die nun jede kleinste Einzelheit mit Spannung verfolgen, die die Fehler schon in ihrem Entstehen, noch bevor sie als fertige Tatsachen erscheinen, erkannt haben und daher auch sofort wissen, warum sich etwas nicht in gewünschter Weise vollzog usw. Nach Beendigung des Eingriffes vervollständigt dann eine eingehende Besprechung des Verlaufes und besonders der Zwischenfälle den Unterricht.

Auf solche Weise vorbereitet, kann schließlich der Anfänger an die Operation eines Kranken mit ruhigem Gewissen und mit der sicheren Überzeugung gehen,

## VI

daß der Verlauf gut sein und dem Auge kein Schaden zugefügt werden wird. Es ist von großem Vorteil, wenn ihm dabei sein Lehrer assistiert, da dessen bewährte Führung dem Schüler beruhigende Sicherheit verleiht. Ich halte es für einen Fehler des Unterrichtes, dem Schüler als erstes Auge ein blindes anzuvertrauen, da daran nichts zu verlieren sei. Bekanntlich sind die Eingriffe an solchen Augen meistens schwieriger und oft überhaupt nicht regelrecht durchzuführen; man denke an die Iridektomie in einem durch Glaukom erblindeten Auge; namentlich sind aber solche Eingriffe fast immer mit ernsten Zwischenfällen verbunden. Auf den gewissenhaften Anfänger machen solche Ereignisse einen nachteiligen Eindruck und beeinflussen ihn für die folgenden Eingriffe nicht selten auf das ungünstigste.

Ich habe meinen Schülern nach einer Vorbereitung, die ich jeweilig für den Betreffenden als genügend erachtete, immer zuerst ein Auge anvertraut, bei dessen Operation keine außerordentlichen Zwischenfälle zu erwarten waren, und habe die Genugtuung, daß in keinem Falle der Eingriff mißlang oder dem Kranken geschadet wurde. Es ist ganz durch die Geschicklichkeit des einzelnen bestimmt, ob man ihn zuerst nur zu einfachen Eingriffen, wie Punktion der Vorderkammer u. dgl., zuläßt oder ihn sofort mit einer Starauszziehung betraut. Wichtig ist, daß man geeignete Kranke auswählt, durch deren ruhiges Verhalten und folgsames Benehmen alle überflüssigen Schwierigkeiten von dieser Seite ausgeschaltet werden.

Wenn nun auch dem Unterrichte eine ganz grundlegende Bedeutung für die Ausbildung von Wundärzten beizulegen ist, so braucht darüber gewiß nicht übersehen zu werden, wieviel die Begabung und die Möglichkeit ausgedehnter wundärztlicher Tätigkeit dazu beiträgt, bis zu welcher Stufe der Meisterschaft der einzelne gelangt. Bei einer kleinen Gruppe von Schülern versagt jeder Unterricht, es fehlt ihnen jede manuelle Geschicklichkeit und jede Begabung dazu. Der aufrichtige Lehrer wird sich nicht scheuen, in diesem Sinne sein offenes Urteil abzugeben und dadurch den Betreffenden unnütze Mühen und unausbleibliche Enttäuschungen zu ersparen.

Die große Mehrzahl kann zu ganz brauchbaren Wundärzten erzogen werden. Die vollendete Meisterschaft ist nur wenigen vorbehalten.

Das vorliegende Buch möge nach den hier niedergelegten Anschauungen beurteilt werden. Sein Hauptzweck ist der Unterricht in unserer Kunst. „Non eruditus, sed erudiendus, non docentibus, sed discentibus.“

Es setzt voraus, daß sich der Leser durch einen längeren Aufenthalt in einer chirurgischen und an einer Augenklinik Vorkenntnisse der Wundarzneykunde im allgemeinen und der wundärztlichen Augenheilkunde im besonderen angeeignet hat. Daher wurde von einem in ähnlichen Büchern als allgemeiner Teil geführten Abschnitt Abstand genommen.

Der Grundgedanke des Unterrichtes in der Verfassung des Buches war ferner auch dafür bestimmend, auf eine Zusammenstellung aller verschiedener Verfahren zu verzichten. Eine solche findet man in den bekannten großen Werken zur Genüge. Wer einmal operieren kann, braucht darin nur nachzulesen.

Es sind auch Gründe des Unterrichtes, warum einzelne Operationen ungleich ausführlicher behandelt sind als andere und warum dem Vorgehen selbst, d. h. den technischen Einzelheiten, auch ungleich eingehendere Darstellung zuteil ge-

worden ist, als z. B. den Anzeigen, den verschiedenen Abarten der Verfahren u. dgl. oder gar theoretischen Ausführungen; diese sind ganz ausgeschaltet worden.

J. MELLER.

## Vorwort zur vierten Auflage.

Die Jahre seit dem Erscheinen der 3. Auflage waren eine Zeit großen Fortschrittes in der wundärztlichen Augenheilkunde. Die Erfolge in der Behandlung der Netzhautablösung sind würdig, denen an die Seite gestellt zu werden, die durch GRAEFES Eingriff gegen den grünen Star erreicht worden sind. Zur Zeit des Erscheinens der 3. Auflage im Jahre 1931 waren die Verfahren gegen die Netzhautablösung erst in Entwicklung. Durch die unermüdlichen Arbeiten einer ganzen Reihe von Forschern scheint diese jetzt zu einem gewissen Abschluß gekommen zu sein. Die Elektrokoagulationsbehandlung hat sichtlich den Sieg über die anderen Verfahren davongetragen. Sie wird in dieser Auflage ausführlich bearbeitet, so daß es allen Augenärzten, wenn sie wundärztlich ausgebildet sind, möglich sein wird, diesen neuen Eingriff mit Erfolg auszuführen. Der schwierigen Aufgabe, das Verfahren eingehend und klar darzustellen, hat sich mein Assistent Dr. BÖCK mit Liebe und Eifer unterzogen.

Abweichend von dem bisher in den früheren Auflagen von mir vertretenen Grundsatz, nur Eingriffe zu bringen, die an meiner Klinik ausgeübt werden, habe ich ausnahmsweise auch das in der II. Wiener Augenklinik von Professor LINDNER geübte Verfahren der Unterminierung gegen Netzhautabhebung aufgenommen, um den Stoff von der wundärztlichen Seite aus nach Möglichkeit vollständig zu behandeln. Herr Dozent Dr. SALLMANN stellte mir in dankenswerter Weise diesen Beitrag zur Verfügung.

Noch eine zweite Ausnahme von dem früher erwähnten Grundsatz, nur selbst geübte Verfahren zu bringen, mache ich durch die Wiederaufnahme der Iridenceleisis, da eine Reihe von Wundärzten sie zu regelmäßigem Gebrauche herangezogen haben und damit zufrieden sind. Herr Professor PILLAT, der Vorstand der Grazer Universitäts-Augenklinik, hatte die Freundlichkeit, seine Erfahrungen darüber für das Buch zur Verfügung zu stellen.

Wenn ich nun noch außerdem einen ausschließlich dem Nasenarzt zukommenden Eingriff bringe, nämlich den Eingriff am Tränensack von der Nase aus, so bedeutet dies keine solche Ausnahme. Denn dieser Eingriff wird an der Klinik viel geübt und liefert so vollkommene Ergebnisse, daß sie die des TOTISCHEN Verfahrens übertreffen. Ich hielt es für wünschenswert, die Augenärzte auf dieses Verfahren besonders aufmerksam zu machen. Sie sollen die Nasenärzte veranlassen, sich damit vertraut zu machen. Durch die Aufnahme des Verfahrens in dieses Buch ist es ihnen allen leichter zugänglich gemacht, und einer der erfahrensten Ärzte auf diesem Gebiete, Professor K. KOFLER, hat die Bearbeitung in liebenswürdiger Weise übernommen.

Allen vier Herren, J. BÖCK, K. KOFLER, A. PILLAT und L. SALLMANN, spreche ich für ihre wertvolle Mitarbeit meinen aufrichtigen Dank aus. Auch den Assistenten meiner Klinik, Herrn Dozenten F. FISCHER und W. KREIBIG, gebührt mein Dank, da sie mir eine Reihe von Anregungen gaben und selbst verschiedene Seiten beisteuerten.

## VIII

Dem alten Grundsatz, alles so darzustellen, daß es auch der Anfänger verstehen und mit gutem Erfolge nachmachen kann, ist auch diese Auflage treu geblieben.

Bei Beurteilung der verschiedenen in dem Buche gebrachten Verfahren vergesse der Merker nicht, daß das Buch in alle Welt hinausgeht. Daher sind in ihm Verfahren enthalten, die wir hierzulande derzeit — im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten — nicht mehr ausführen, die aber in Ländern, wo z. B. das Trachom noch in voller Stärke wütet, zu den alltäglichen gehören.

Wenn nun die neue Auflage über den Rahmen der früheren hinausgeschritten und auf eine etwas breitere Grundlage gestellt worden ist, so will ich hoffen, daß sich dadurch den treuen Lesern der früheren Auflagen noch neue Anhänger anschließen werden.

Dem Verlage Springer danke ich bestens für sein jederzeit bereitwilliges Eingehen auf meine Wünsche und für die tadellose Ausstattung des Werkes.

Wien, Ostern 1938.

**J. MELLER.**

## Inhaltsverzeichnis.

Erstes Kapitel.		Seite
<b>Das Sondieren der Tränenwege. Eingriffe an den Tränenröhrchen. Die Ausschälung des Tränensackes</b> .....		1
Zweites Kapitel.		
<b>Die äußere Dakryocystorhinostomie. Der Eingriff am Tränensack von der Nase aus: Endonasale Dakryocystorhinostomie. Die Eingriffe an der Tränendrüse</b>		29
Drittes Kapitel.		
<b>Krampfektropium. Altersektropium</b> .....		50
Viertes Kapitel.		
<b>Narbenektropium und plastische Eingriffe an den Lidern. Lidersatz. Eingriffe gegen das Symblepharon. Frühplastik bei Verbrennungen und Verätzungen. Augenhöhlenplastik</b> .....		60
Fünftes Kapitel.		
<b>Eingriffe gegen die Einwärtskehrung des Lides und der Lidhaare</b> .....		98
Sechstes Kapitel.		
<b>Die Einschneidung des Lidwinkels (Kanthotomie). Die Lidwinkelplastik (Kanthoplastik). Tarsorrhaphie</b> .....		113
Siebentes Kapitel.		
<b>Ptoxis</b> .....		122
Achstes Kapitel.		
<b>Die Eingriffe gegen das Schielen</b> .....		135
Neuntes Kapitel.		
<b>Die Ausschälung des Augapfels (Enucleatio bulbi). Neurotomia optico-ciliaris. Die Ausweidung der Augenhöhle (Exenteratio orbitae). Eingriffe in der Augenhöhle</b> .....		161
Zehntes Kapitel.		
<b>Die Ausziehung des Greisenstares (Extractio cataractae)</b> .....		182
Elftes Kapitel.		
<b>Die Diszission. Die Linearextraction</b> .....		250
Zwölftes Kapitel.		
<b>Die Eingriffe gegen Drucksteigerung</b> .....		269

	Seite
Dreizehntes Kapitel.	
<b>Die optische Iridektomie. Abtragung des Vorfalles der Regenbogenhaut. Bindehautpflanzung. Eingriffe bei vorderer Synechie. Überpflanzung von Hornhaut aus optischen Gründen .....</b>	<b>324</b>
Vierzehntes Kapitel.	
<b>Über die wundärztliche Behandlung der Netzhautabhebung .....</b>	<b>341</b>
Fünfzehntes Kapitel.	
<b>Ausziehung von Fremdkörpern aus dem Augeninnern .....</b>	<b>375</b>
Sechzehntes Kapitel.	
<b>Verschiedene Eingriffe an der Hornhaut und Bindehaut, an den Lidern und am Glaskörper. Die Tätigkeit des Gehilfen. Die Betäubung .....</b>	<b>388</b>
<b>Sachverzeichnis.....</b>	<b>417</b>

## Erstes Kapitel.

# Das Sondieren der Tränenwege. Eingriffe an den Tränenröhrchen. Die Ausschälung des Tränensackes.

### Sondieren der Tränenwege.

**Anzeigen.** Das Sondieren des Tränen-Nasenganges wird heutzutage zu Unrecht viel seltener ausgeführt als früher einmal. Wenn es zu richtiger Zeit angewendet wird, d. h. wenn die ersten Erscheinungen von Tränenträufeln, besonders in der freien Luft, bemerkt werden, ohne daß schon gröbere Veränderungen an der Schleimhaut des Sackes und Ganges bestehen, wirkt es meist ausgezeichnet. Einige wenige Sondierungen genügen alsdann, die geringfügige Verengung des Tränenganges zu beheben und weiteren Veränderungen der Schleimhaut vorzubeugen. Leider wird von sehr vielen Augenärzten diese Gelegenheit versäumt und kostbare Zeit, Monate, ja Jahre, durch Verordnung der verschiedensten Augewässer gegen Bindehautkatarrh verloren.

Ist aber einmal der Gang schon in hohem Maße verengt oder gar undurchgängig, so daß die Sonde zunächst gewaltsam durchgestoßen werden muß, so ist der Erfolg des Sondierens schon von vornherein sehr zweifelhaft. Denn die dabei erfolgten Verletzungen heilen durch Narben, die fast immer wieder in kurzer Zeit den Gang verschließen. Daher haben ja auch die wiederholt empfohlenen Methoden der gewaltsamen Erweiterung durch ganz dicke Sonden nie Anhänger gefunden, ebensowenig wie die Verfahren, die verengten Stellen durch Einschneiden mit scharfen Instrumenten freizumachen.

Auch wenn die Tränensackschleimhaut schon stark verdickt ist und reichlich sezerniert, bedeutet die Behandlung mit Sondieren und Ausspülung meist nur verlorene Mühe. Ganz besonders gilt dies, wenn der Sack schon deutlich erweitert ist, seine Wände atonisch sind oder wenn er nach akuter Entzündung durchgebrochen ist.

Zur Behandlung der erkrankten Tränensackschleimhaut erweist sich für Auswaschungen  $\frac{1}{4}\%$ ige Lapislösung allen anderen Mitteln überlegen. Auch von Spülungen mit Optochinlösungen oder PREGLScher Jodlösung werden gute Erfolge gemeldet.

### Erkennung der Verengung.

Für das Erkennen von Verengungen im Tränen-Nasenkanal hat das Verfahren, gefärbte Lösungen, wie Fluorescein oder Collargol, Protargol oder Argyrol, in den Bindehautsack einzuträufeln, um aus ihrem mehr oder weniger raschen Erscheinen in der Nase einen Schluß zu ziehen, keine ausschlaggebende Bedeutung. Denn einerseits mag bei geringen Verengungen also gerade bei

solchen, wo das Sondieren am ehesten noch dauernd Abhilfe schaffen kann, die Lösung noch genügend rasch in die Nase kommen und damit ein normaler Gang vorgetäuscht werden, und andererseits kann das Nichterscheinen der Lösung in der Nase auch durch andere Umstände hervorgerufen sein, z. B. dadurch, daß der Tränensack und die Tränenröhrchen keine genügende Saugkraft entfalten. Demgemäß kann man durch das Erscheinen der Flüssigkeit in der Nase geringfügige, insbesondere beginnende Verengerungen des Ganges nie ausschließen.

Die Untersuchung auf eine Tränenangverengerung wird in der Weise durchgeführt, daß nach Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung in den Bindehautsack das untere Tränenröhrchen erweitert und der Ansatz einer mit 1%iger Cocain- oder Novocainlösung gefüllten ANELschen Spritze vorsichtig durch das Röhrchen bis in die Höhlung des Sackes vorgeschoben wird. Dabei zeigt es sich gelegentlich, daß ein epithelialer Verschluß des Tränenröhrchens die Ursache des Tränenträufelns war. Ist es mit der konischen Sonde gelungen, diesen Verschluß richtig zu durchbohren und den Weg in das Tränenröhrchen freizumachen, so ist damit allein schon das Tränenträufeln schlagartig beseitigt. Ist der Tränen-Nasengang frei, so bedarf es keines besonderen Druckes, um die Flüssigkeit durchzuspülen. Sie strömt aus der Nase des Untersuchten, wenn er den Kopf nach vorne gebeugt hält. Im Falle einer Verengerung erscheint die Flüssigkeit erst nach längerer Zeit und nur in geringen Mengen oder tropfenweise, während der größte Teil aus dem oberen Tränenröhrchen entweicht. Dieses ist immer der Fall, wenn der Gang vollständig verschlossen ist. Bei dem Versuche der Durchspülung darf nur mäßiger Druck verwendet werden, weil sonst die Flüssigkeit in das umliegende Gewebe gepreßt werden könnte. Glattes Durchfließen der Lösung schließt das Vorhandensein einer Verengerung nicht aus. Erst das Einführen der Sonde läßt sie erkennen. Ist der vollständige Verschluß oder eine Verengerung festgestellt, so wird die Sondierung begonnen, und zwar mit BOWMANS Sonde Nr. 1 oder 2. Gelingt es nicht, eine unempfindlich machende Lösung durchzuspülen, so ist die erste Sondierung ziemlich schmerzhaft. Beim zweiten Versuche aber können gewöhnlich schon einige Tropfen einer 3%igen Cocainlösung durch den Gang hinuntergelangen, wodurch die Sondierung schmerzlos wird.

Tränenträufeln ist nicht immer durch eine Verengerung der Tränenwege bedingt und beruht nicht immer auf mechanischen Ursachen. Es kann reflektorisch durch Erkrankungen der Bindehaut, der Tränenwege, der Nase usw. hervorgerufen sein, ja selbst auf zentralen Störungen beruhen.

Auch bei Tränensackblennorrhöe hat die Untersuchung mit der Durchspülung zu beginnen, um die Durchgängigkeit der Tränenwege zu prüfen. In der Mehrzahl der Fälle wird eine Verengerung gefunden werden, worauf die Behandlung, wie oben beschrieben, einzusetzen hat.

### Erweiterung des Tränenröhrchens.

BOWMANSche Sonden können nur eingeführt werden, nachdem das Tränenröhrchen vorerst mit einer konischen Sonde genügend erweitert worden ist. Die Tränenröhrchen beginnen im Tränenpünktchen und verlaufen mit einem kurzen Anfangsteil von hier zunächst senkrecht, das untere nach unten, das obere nach oben. Sie biegen dann im rechten Winkel nach einwärts, um in den Tränensack zu gelangen.

**Örtliche Betäubung.** Nach Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung in den Bindehautsack wird etwas Cocain in Substanz auf das untere Tränenpünktchen aufgelegt und das Lid abgezogen gehalten, bis sich die Kryställchen gelöst haben und die gesättigte Lösung in die Öffnung des Röhrchens eingedrungen ist. Nunmehr kann das Röhrchen schmerzlos mit der konischen Sonde gedehnt und erweitert werden.

Um die konische Sonde einführen zu können, zieht der Arzt das untere Lid, während er vor dem Kranken sitzt, etwas vom Auge ab und gleichzeitig ziemlich kräftig nach außen und spannt es dadurch genügend an; der Kranke blickt dabei nach oben (Abb. 1). Für das linke Tränenröhrchen verwendet der vor dem Kranken sitzende Arzt seine rechte Hand, für das rechte aber die linke, wenn er nicht vorzieht, sich für die Erweiterung dieses Tränenröhrchens hinter den Kranken zu stellen, um auch hier wieder die Sonde mit der rechten Hand einführen zu können. Die Sonde wird mit ihrer Spitze senkrecht auf das Tränenpünktchen aufgesetzt

und in das kurze Anfangsstück eingeführt, dann aber sofort waagrecht umgelegt (Abb. 2) und nun unter leichten Drehbewegungen langsam vorgeschoben, bis durch die innere Tränensackwand hindurch der Widerstand der knöchernen Tränensackgrube zu verspüren ist. Ist die Sonde wirklich durch das Tränenröhrchen hindurch in die Höhlung des Sackes vorgedrungen, so wird bei leichtem Hin- und Herbewegen der Sonde im Sinne von Rückziehen und Vorschieben die äußere Haut nicht eingezogen. Die Erweiterung des Tränenröhrchens darf mit keiner Gewaltanwendung vorgenommen werden, da die Spitze der Sonde leicht die Wand verletzt und einen falschen Weg anbahnt, der die spätere Sondierung sehr erschwert und eingespritzte Flüssigkeiten in das Unterhautzellgewebe eindringen läßt. Es ist empfehlenswert, konische Sonden verschiedener Dicken vorrätig zu halten. Nicht selten bedarf es zunächst haardünnere Sonden, um einmal den Eingang durch das winzige Pünktchen zu erlangen und auf diese Weise es zu ermöglichen,




Abb. 1. Einführen der konischen Sonde in das untere Tränenröhrchen. Das untere Lid wird vom Auge ab- und nach außen gezogen. Der Kranke blickt nach oben. Die Sonde wird senkrecht aufgesetzt.




Abb. 2. Zweiter Schritt zur Erweiterung des Tränenröhrchens mit der konischen Sonde. Die Sonde ist in die Richtung des Verlaufes des Röhrchens umgelegt und wird unter leichten Drehbewegungen bis an die mediale Wand des Sackes vorgeschoben.

dickere konische Sonden einführen zu können. Diese können den Eingang des Tränenröhrchens genügend erweitern, um Sonden von der Stärke Nr. 5 durchgleiten zu lassen.

Bei einiger Übung ist aus dem Widerstand, den die Spitze der konischen Sonde an der inneren Wand des Tränensackes findet, zu erkennen, ob die Schleimhaut des Sackes gesund ist oder ob und in welchem Grade sie verdickt ist. Bei normaler Schleimhaut fühlt sich der Knochen hart durch, während eine Verdickung der Schleimhaut ein Polstergefühl erzeugt.



Abb. 3. Einführung des WEBERSchen Messerchens in das untere Tränenröhrchen. Das Lid wird mit dem Finger nach außen gespannt, die Schneide des Messerchens ist nach oben und etwas nach hinten gerichtet.

**Schlitzung des Tränenröhrchens.** Es ist nicht nötig, ja nicht einmal empfehlenswert, das Tränenröhrchen zur Ausführung der Sondierung zu schlitzten. Das unversehrte Tränenröhrchen bildet eine sichere Führung für die BOWMANSche Sonde, entlang der diese in den Sack hineingleitet. Dagegen ist nach der Schlitzung des Tränenröhrchens nicht selten der Eingang in das ungeschlitzt gebliebene Endstück und damit in den Sack nur schwer zu finden. Gelegentlich gelingt es überhaupt nicht mehr, die Sonde einzuführen, wenn sich der Eingang im Anschluß an die Schlitzung durch Narbenbildung verengert hat. Das untere Tränenröhrchen sollte nur geschlitzt werden, wenn durch Auswärtsdrehung des unteren Tränenpunktes die Ableitung der Tränen gelitten hat und Tränenträufeln hervorgerufen wurde,

insbesondere wenn sich im Anschlusse daran das untere Lid nach auswärts zu drehen beginnt. Indem nämlich durch die Schlitzung das untere Tränenröhrchen in eine Furche verwandelt wird, die mit dem Bindehautsacke in offener Verbindung steht, wird die regelrechte Ableitung der Tränen wieder ermöglicht und damit eine der Hauptursachen der Auswärtsdrehung beseitigt, besonders wenn der Kranke darüber unterrichtet wird, die Tränen nie in der Richtung nach unten abzuwischen, sondern von unten nach oben, so daß dabei das Lid jedesmal gehoben und an das Auge gedrückt wird.

Eine seltene Anzeige für das Schlitzten des Tränenröhrchens ist durch Ansammlung von Pilzmassen im Tränenröhrchen gegeben, vorausgesetzt, daß es nicht gelingt, sie aus dem unversehrten Röhrchen herauszudrücken. Da der Tränenpunkt durch die Pilzmassen meist etwas erweitert ist, gelingt der kurze Einschnitt in den Anfangsteil des Röhrchens immer ohne jede Schwierigkeit.

Zur Ausführung der Schlitzung dient das WEBERSche Messerchen. Es wird in das mit der konischen Sonde erweiterte Tränenröhrchen eingeführt, bis sein geknöpftes Ende den Knochen der Sackgrube berührt. Die Schneide des Messers ist nach oben und etwas nach hinten gerichtet (Abb. 3). Das Lid wird mit dem

Finger nach außen gespannt, das Messerchen, während sein Knopf leicht gegen den Knochen gedrückt gehalten wird, aufgestellt (Abb. 4) und dadurch der äußere Anteil des Tränenröhrchens eingeschnitten. Die Blutung ist gering. Um ein Zusammenheilen der Wundränder zu verhindern, werden die Schnitt-ränder einige Tage hindurch mit einer Sonde gelüftet, bis sie mit Epithel überzogen sind.

Ein Aufschlitzen des Tränenröhrchens bis zur Einmündung in den Sack ist auf jeden Fall zu vermeiden. Meistens genügt es, nur den Anfangsteil zu schlitzen, besonders in den Fällen, wo nur der Eingang in das Röhrchen verengert ist.

Um das Verkleben der Wundränder von vorneherein unmöglich zu machen, kann ein winziges Stückchen aus der hintern Tränenröhrchenwand keilförmig, mit der Spitze des Keils entsprechend dem Tränenpunkte ausgeschnitten werden.

#### Sondierung des Tränen-Nasenganges.

**Örtliche Betäubung. Durchspülung des Sackes.** Vor dem Sondieren wird der Tränengang durch Durchspülen mit einer 3%igen Cocainlösung unempfindlich gemacht. Dazu dient die ANELsche Spritze. Die verwendbarste Form hat einen Ring auf jeder Seite. Zeigefinger und 3. Finger werden durch die Ringe gesteckt, während der Daumen den Kolben der Spritze niederdrückt. Der gekrümmte Ansatz der Spritze wird in senkrechter Richtung auf das vorher er-

weiterte Tränenpünktchen aufgesetzt, dann waagrecht umgelegt und bis in den Tränensack wie eine Sonde vorgeschoben. Bei gesundem Tränengang genügt leichter Druck auf den Kolben, um die Flüssigkeit durchzuspülen. Bei Verengung der Tränenwege tritt die Flüssigkeit nur langsam und in geringer Menge aus der Nase hervor, wenn der Untersuchte den Kopf nach vorne geneigt hat. Bei stärkerem Widerstand soll nicht versucht werden, die Flüssigkeit mit zu großer Gewalt durchzupressen. Sie entweicht entweder durch das obere Tränenröhrchen oder sie wird durch Rißstellen der Schleimhaut in das den Tränensack umgebende Gewebe gepreßt. Dadurch tritt eine Schwellung der Lider ein, die einige Tage anhält. Die Durchspülung des Tränensackes soll nie in liegender Stellung gemacht werden, besonders wenn als Spülflüssigkeit Cocain- oder Sublimatlösung verwendet wird, damit sie nicht bei frei durchgängigen Wegen in den Rachen fließen.

Außer zur Vorbereitung für das Sondieren zum Zwecke der örtlichen Betäubung gibt es auch noch andere Anzeigen zur Durchspülung des Sackes. So läßt die Durchspülung des Sackes bei einer Fistel in der Tränensackgegend feststellen, ob diese mit dem Sacke in Zusammenhang steht. Verwendet man zur




Abb. 4. WEBERsches Messerchen aufgestellt, das Tränenröhrchen eingeschnitten.

Durchspülung eine bläulich gefärbte Flüssigkeit, so kann man den Zustand wesentlich leichter erkennen.

Zur Sondierung werden die BOWMANSchen Sonden Nr. 1—6 verwendet. Die Spitze der mit 3%iger Cocainsalbe bestrichenen Sonde wird zunächst senkrecht auf die Mündung des erweiterten Tränenröhrchens aufgesetzt und nach dem Hineingleiten in den Anfangsteil des Tränenröhrchens waagrecht umgelegt, während die Haut des Lides nach außen gespannt wird. Ist das Ende der Sonde an dem Knochen der Tränensackgrube angelangt, so wird das Lid freigelassen und die Sonde bis zur Senkrechten aufgestellt. Ein leichter Druck nach unten genügt, sie in den Gang vorzuschieben, vorausgesetzt, daß keine Verwachsungen vorhanden sind. Während des Aufstellens von der waagrechten in die senkrechte Richtung muß die Spitze der Sonde in Berührung mit dem Knochen bleiben, entlang dem sie in den Tränengang hinuntergleitet. Wird diese Maß-




Abb. 5. Die BOWMANSche Sonde ist durch den Tränen-Nasengang eingeführt. Das Plättchen der Sonde kommt gerade an die Augenbraue zu liegen.

nahme nicht befolgt, so wird der Eingang nicht gefunden und ein falscher Weg erzeugt. Es ist ein gewöhnlicher Fehler des Anfängers, die Spitze der Sonde während des Aufstellens vom Knochen etwas zurückzuziehen. Wird aber anderseits die Sonde zur Sicherung der Lage ihrer Spitze, die den Drehpunkt abgibt, zu stark gegen den Knochen gepreßt, so wird dessen dünne Platte durchbohrt, wodurch die Sonde in einen falschen Weg gedrängt wird. Auch darf kein Versuch gemacht werden, die Sonde nach unten zu schieben, bevor sie die senkrechte Stellung erlangt hat, weil die Schiefstellung der Sonde zur Durchbohrung der inneren Wand des Tränensackes oder Tränenganges einschließlich des Knochens führen müßte. Befindet sich die Sonde in der richtigen Stellung, so können nur Verwachsungen Widerstand bieten, zu dessen Überwindung auch Gewalt angewendet werden darf. Ist einmal die Sonde in den Anfangsteil des Ganges eingedrungen, so bleibt sie frei stehen, wenn man sie aus der Hand läßt; ist sie noch nicht dahin vorgedrungen, so fällt sie um.

Ist die Sonde durch die ganze Länge des Ganges eingeführt, so liegt ihre Platte in der Höhe der Augenbraue (Abb. 5). Die Sonde hat ferner ihre leichte Krümmung, in die sie vorher gebracht wurde, beibehalten. Wurde sie aber auf falschem Wege vorgestoßen, so wird dies schon aus ihrer regelwidrigen Lage erkannt. Gewöhnlich lassen sich dann auch die rauen Ränder der Knochenöffnung, durch die die Sonde gestoßen wurde, fühlen.

Die Sondierung wird, je nach dem Grade der Verengung, mit den niederen Nummern, bei vollständiger Verwachsung mit Nr. 1 begonnen und wird jeden 2.—3. Tag wiederholt, wobei entsprechend den Fortschritten in der Erweiterung des Ganges allmählich stärkere Nummern verwendet werden. Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß gelegentlich eine dicke Sonde über die Schleimhautfalten leichter hinweggleitet als eine dünne. Der Durchtritt der Sonde wird durch Zu-

gabe von etwas Suprareninlösung zur Cocainlösung beim Durchspülen bedeutend erleichtert. Dadurch, daß sich die Blutgefäße der Wand zusammenziehen, wird das Lumen vergrößert und mehr Platz für den Durchgang der Sonde geschaffen. Die Sondierung soll langsam vorgenommen werden; blutige Durchtrennungen sind so viel als möglich zu vermeiden, denn sie geben durch die folgende Narbenbildung zu neuen Verwachsungen Anlaß.

Die Sonde soll mindestens eine Viertelstunde im Tränengang belassen werden. Sie kann aber auch viel länger, bis zu einer Stunde und mehr belassen werden. In Fällen, wo das Liegenlassen der Sonde im Kanal gut vertragen wird, dürfen auch Dauersonden zur Verwendung kommen, d. h. Sonden, deren oberes Ende rechtwinkelig abgebogen, auf die äußere Haut des unteren Lides zu liegen kommt. Dauersonden empfehlen sich besonders, um Stellen des Tränenröhrchens oder Ganges offen zu halten, die infolge von Verletzungen narbig verschlossen worden waren, und erst durch Einschneiden blutig wieder eröffnet worden sind. Durch wochenlanges Liegenlassen der Sonde — bei gelegentlichem Auswechseln und Durchspülen — vermag die Öffnung schließlich auf die Dauer erhalten zu bleiben.

Das Sondieren ist fortzusetzen, bis zum mindesten Sonde 4 ohne Widerstand durchgeht und die mit der ANELschen Spritze eingebrachte Flüssigkeit durch den Gang leicht abfließt. Ist dann das Tränenträufeln noch nicht beseitigt, so ist dies ein Beweis, daß trotz der gehörigen Durchlässigkeit des Ganges die Tränenableitung, vielleicht auch die Tränenabsonderung eine Störung erlitten hat. Die Tränenableitung hängt nicht allein von der freien Durchgängigkeit des Nasenganges ab, sondern wird zum guten Teil auch durch eine Tätigkeit des Sackes bewirkt. In solchen Fällen ist es zwecklos, die Sondierung fortzusetzen oder noch dickere Sonden zu gebrauchen.

Bei akut entzündlichen Zuständen darf nicht sondiert werden. Ist ferner die Tränensackerkrankung vergesellschaftet mit Erkrankungen des Knochens (Tuberkulose), so ist an Stelle der Sondierung Entfernung des Tränensackes angezeigt. Bei Gegenwart einer Geschwulst in der Tränensackgegend kann es geboten sein, durch eine Sondierung zu bestimmen, ob der Tränensack frei ist oder nicht. Seltene Anzeichen zur Durchspülung des Sackes können durch das Vorhandensein von Fisteln in der Tränensackgegend gegeben sein, um zu erfahren, ob sie mit dem Sacke in Zusammenhang stehen. Die Verwendung einer bläulich gefärbten Flüssigkeit zur Durchspülung erleichtert die Erkennung wesentlich.

**Hohlsonden.** Um zur Durchspülung des Sackes nach Herausnahme der BOWMANSchen Sonde nicht von neuem den Ansatz der ANELschen Spritze einführen zu müssen, werden Hohlsonden angewendet, an die die ANELsche Spritze angesetzt wird, während die Sonde noch im Tränen-Nasengang steckt. Wird die Flüssigkeit während des langsamen Herausziehens der Sonde eingespritzt, so bespült sie die Schleimhaut des ganzen Ganges besonders gründlich.

**Sondieren** durch das obere Tränenröhrchen. Manchmal ist es nicht möglich, die Sondierung auf die geschilderte Weise durch das untere Tränenröhrchen vorzunehmen, wenn es z. B. nach Verletzungen oder Verbrennungen durch Narbengewebe verschlossen ist. Die Sondierung hat dann durch das obere Tränenröhrchen stattzufinden. Dieses hat einen gleichartigen Verlauf wie das

untere, nämlich von dem Pünktchen im Lidrande an nach oben und dann im Bogen gegen den Tränensack zu. Nach Erweiterung mit der konischen Sonde wird 3%ige Cocainlösung mit Hilfe der ANELschen Spritze durchgespült. Die BOWMANSche Sonde wird schon vom Anfang an in der Richtung des Tränen-Nasenganges, d. h. senkrecht aufgestellt, eingeführt. Sie gleitet auf diese Weise hinter der vorderen Tränensackleiste in den Tränen-Nasengang hinein.

### Sondieren des Tränen-Nasenganges bei Neugeborenen.

Bei Neugeborenen besteht in seltenen Fällen ein, übrigens fast immer nur epithelialer, Verschuß des Ganges, wodurch das Bild einer Tränensackerkran- kung mit rasch folgender Erweiterung des Sackes eintritt. Manchmal gelingt es schon, durch wiederholtes Ausdrücken und Massage des Sackes in der Richtung von oben nach unten den Verschuß zu sprengen. Ist diese Behandlungsweise aber vergebens, so bringt fast immer eine einmalige Sondierung — am zweck- mäßigsten in allgemeiner Betäubung ausgeführt — Heilung. Das Einführen der Sonde ist nicht schwieriger als bei Erwachsenen. Nur der Abstand zwischen Tränenpunkt und Nasenboden ist kürzer und daher dringt die Sonde nicht mit einem so großen Anteil ihrer Länge ein, als es beim Erwachsenen der Fall ist. Um den Verschuß des Ganges an der Stelle der Einmündung in die Nase recht gründ- lich freizumachen, empfiehlt es sich, mit der eingeführten Sonde einige rührende Bewegungen zu machen.

Es ist ein oft gemachter Fehler, Wochen, ja Monate verstreichen zu lassen, bevor sondiert wird. Je eher sondiert wird, umso rascher verschwinden die Krankheitserscheinungen. Aber auch in veralteten Fällen genügt meistens *eine* Sondierung, den Abfluß freizumachen. Nur die Absonderung aus der nunmehr schon verdickten Schleimhaut des Sackes dauert noch einige Wochen an und erfordert ausgiebiges Massieren des Sackes mehrere Male täglich und die An- wendung von Tropfen, am besten  $\frac{1}{2}$ %ige Zinklösung gegen den durch die Sekretion des Sackes hervorgerufenen Bindehautkatarrh.

### Andere Eingriffe an den Tränenröhrchen.

#### a) Naht der Tränenröhrchen.

Wenn das Tränenröhrchen frisch zerrissen oder durchschnitten worden ist, so haben die beiden Enden miteinander zur Vereinigung gebracht zu werden, um die Ableitung der Tränen ungestört zu erhalten. Durch eine vom Tränen- punkte aus eingeführte konische Sonde, die bis zum lateralen Reißende in der Wunde vorgeschoben wird, wird dieser Teil des Tränenröhrchens etwas erweitert. Um das nasale Reißende zu finden, was manchmal schwierig ist, bringt man seine Öffnung mit 2 in diesem Wundlappen an der Bindehaut- und an der Haut- seite angesetzten Pinzetten zum Klaffen. Durch eine von hier bis in den Tränen- sack vorgeschobene konische Sonde wird das Lumen erweitert und deutlich sichtbar gemacht. Die beiden Reißenden werden nun in der Weise regelrecht aneinander gelagert, daß das eine Ende eines doppelt benadelten Seidenfadens von dem äußeren Reißende des Tränenröhrchens durch dieses hindurch zum Tränenpunkte herausgeleitet, das andere Fadenende von dem inneren Reißende aus einige Millimeter im Tränenröhrchen in der Richtung gegen den Tränensack

zu vorgeschoben und dann senkrecht nach oben durch die Haut ausgestochen wird (RAUPP). Wird dieser Faden dann über einem Bäuschchen zart geknüpft, so gleiten ihm entlang die beiden Enden des Tränenröhrchens bis zur Berührung aneinander und verheilen miteinander regelrecht. Einige feine Hautnähte und, wenn nötig, auch Bindehautnähte schließen die Wunde. Der im Tränenröhrchen liegende Faden wird nach einigen Tagen herausgenommen.

ELSCHNIG empfiehlt eine Haut- und eine Bindehautnaht, die in querer Richtung den Riß überbrücken, und sucht die richtige Annäherung und Vereinigung der beiden Reißenden des Tränenröhrchens beim Knüpfen dieser Fäden in der Weise zu erreichen, daß er vom Tränenpunkte aus eine dünne Fischbein- oder Kautschuksonde nach Aufsuchen des medialen Reißendes bis in den Tränensack einführt und diese Sonde fast eine Woche liegen läßt. Sie muß durch entsprechendes Anlegen des Verbandes und während des Verbandwechsels durch Festhalten mit einer Pinzette in ihrer Lage erhalten werden.

Ist die Verletzung, durch die das Tränenröhrchen zertrennt worden ist, alt, so muß zuerst die Narbe senkrecht durchgeschnitten und, wenn nötig, verdicktes Narbengewebe ausgeschnitten werden. Gelingt es, in der dadurch geschaffenen Wundfläche die Öffnungen des Tränenröhrchens zu finden, so kann in der oben beschriebenen Weise die Naht angelegt und im günstigsten Fall der regelrechte Abfluß der Tränen durch das wiederhergestellte Tränenröhrchen erreicht werden.

#### b) Plastik zur Wiederherstellung des zu weit gespaltenen unteren Tränenröhrchens.

Verfahren von BENJAMINS und VAN ROMUNDE.

Ist nach gelungener Dakryocystorhinostomie trotz offener Verbindung des Bindehautsackes mit der Nase noch immer Tränenträufeln vorhanden, weil das untere Tränenröhrchen früher einmal weit gespalten worden war, so kann nach diesem Verfahren durch eine Plastik das Tränenröhrchen wieder hergestellt werden.

**Verfahren. Örtliche Betäubung.** Einträufeln von 3%iger Cocainlösung in den Bindehautsack und Einspritzung einer kleinen Menge einer 1%igen Cocainlösung unter die Haut und Bindehaut um das Röhrchen herum.

Die Deckung der Rinne wird durch ein kleines, rechtwinkeliges Läppchen bewerkstelligt, welches aus der anschließenden Bindehaut gebildet wird (Abb. 6). Die Basis des Läppchens entspricht dem inneren Rande der Tränenröhrchenrinne. Diese Linie darf daher nicht verletzt werden. Sie bildet die Achse, um welche das kleine Bindehautläppchen nach außen umgeklappt wird. Der Punkt *c*, von wo der Bindehautschnitt nach *b* abgeht, soll  $\frac{1}{2}$  mm nasalwärts vom Ende der Rinne entfernt sein. Dadurch kommt ein neuer Tränenpunkt an der alten Stelle zustande. Der Punkt *a* kommt bei sehr weit gespaltenem Röhrchen auf die Karunkel zu liegen. Wird er nicht weit genug nach innen verlegt, so bleibt dort eine Fistel übrig.




Abb. 6.

Der vordere Rand der Rinne hat mit einer feinen Schere in seiner ganzen Länge angefrischt zu werden. An die dadurch erzeugte Wunde wird nun das nach außen umgeklappte Bindehautläppchen mit einigen Seidenfäden befestigt (Abb. 7). Leichter feuchter Verband. Entfernung der Nähte nach fünf Tagen. Die Bindehautwunde heilt von selbst.




Abb. 7.

### Die Ausschälung des Tränensackes.

**Anzeigen.** Der Tränensack hat bei chronischer Tränensackblennorrhö unbedingt ausgeschält zu werden, wenn er sich stark verdickt oder ausgedehnt hat, wenn der Tränen-Nasengang vollständig verwachsen ist oder eine Fistel besteht; ferner, wenn ein das Auge eröffnender Eingriff (insbesondere Star- ausziehung) vorgenommen werden soll; schließlich wenn eine eitrige Infiltration der Hornhaut (infizierte Erosion, Ulcus serpens u. dgl.) eingetreten ist. Die Kauterisation des Geschwüres allein würde nicht zu dem gewünschten Erfolge führen, da wegen der Absonderung aus dem erkrankten Tränensacke fortwährend Keime an die des Epithels beraubte Stelle gelangen und sie aufs neue anstecken.

Bei poliklinischen Kranken, die meist nicht Zeit zur langwierigen (und häufig erfolglosen) Sondenbehandlung haben, erweitert sich die Anzeige auf alle Fälle von chronischer Blennorrhö des Sackes, besonders dann, wenn schon eine Sondenbehandlung ohne Ergebnis durchgeführt worden war.

**Anatomie.** Vor Beginn des Eingriffes hat nach der Lage des Lidbändchens und der vorderen Leiste der Tränensackgrube Umschau gehalten zu werden.

Das Lidbändchen springt in der Fortsetzung der Lidspalte innen als wohlumschriebener Strang deutlich unter der Haut vor, wenn die Lider durch den an den äußeren Lidwinkel angelegten Finger waagrecht nach außen angespannt werden. Es nimmt seinen Ursprung von dem Knochen und befestigt daran die Lider, indem seine beiden Schenkel in die Lidknorpel übergehen. Der Tränensack liegt hinter diesem Gebilde, und zwar so, daß seine Kuppe ungefähr der Höhe des Lidbändchens entspricht und sein Körper sich nach unten davon erstreckt.

**Die vordere Tränenleiste, Crista lacrymalis anterior** (Abb. 8), gehört dem Stirnfortsatze des Oberkieferknochens an und verläuft in Fortsetzung des unteren Augenhöhlenrandes im Bogen nach innen oben. Sie bildet die vordere Grenze des Bettes für den Tränensack, der Tränensackgrube. In ihrer unteren Hälfte springt sie steil vor und ist gewöhnlich scharfrandig; die Tränensackgrube ist hier dementsprechend tief. Nach oben zu wird die Leiste flacher und verliert sich allmählich gegen den Nasenteil des Stirnbeines. Ihr oberer Teil hat eine fast senkrechte Richtung. Die nach vorne gerichtete Fläche des Stirnfortsatzes des Oberkiefers zeigt eine Höhlung, die unmittelbar nach innen von der Leiste oft zu einer ziemlich tiefen Grube wird. Die Grube kann irrtümlich für die Tränensackgrube gehalten werden.

Bei sehr mageren Menschen ist die Leiste gelegentlich durch die Haut sichtbar. Sie kann aber immer leicht durch das Betasten gefunden werden, indem

der Finger entlang dem unteren Augenhöhlenrande nach oben innen gleitet. Dabei zeigen sich große Verschiedenheiten in der Deutlichkeit ihres Nachweises, was auf die verschiedene Ausbildung der Leiste und auf die verschiedene Dicke der sie bedeckenden Gewebe zurückzuführen ist.

Manchmal sehr leicht als scharfer Kamm fühlbar, ist sie in anderen Fällen flacher und mehr abgerundet und wird dann besser mit der geschlossenen Pinzette aufgesucht, indem diese, unter leichtem Druck aufgesetzt, von der Seite des Nasenrückens gegen die innere Wand der Augenhöhle geführt wird. Je nach dem Grade der Neigung, die die Fläche des aufsteigenden Stirnfortsatzes des Oberkiefers und das Nasenbein zur Sagittalebene haben, und je nach der Höhe des Nasenrückens liegt sie entweder verhältnismäßig oberflächlich und ist dann leicht erreichbar, oder sie liegt tief und erschwert den Zugang zur Tränensackgrube.

Hinten wird die Tränensackgrube durch die dem Tränenbein angehörende hintere Tränenleiste (*Crista lacrymalis posterior*) begrenzt, ein sehr dünnes Knochenplättchen, das mit scharfem Rande vorspringt. Sie kommt für das Zurechtfinden nicht in Betracht und wird bei regelrechtem Verlaufe des Eingriffes nicht bloßgelegt.

**Verfahren.** Um den Tränensack unversehrt im ganzen entfernen zu können, muß er zunächst nach anatomischen Grundsätzen freigelegt werden. Dazu ist die Kenntnis der topographischen Anatomie dieser Gegend unerlässlich. Sie braucht aber nicht getrennt vorgetragen zu werden; mit ihrer Darstellung ergibt sich zugleich das Verfahren.

**Örtliche Betäubung.** Der Tränensack wird unter örtlicher Betäubung ausgeschält. Entsprechend eingeleitet, ist diese so gründlich, daß sich auch empfindliche Leute ruhig verhalten. Um nicht den Überblick in dem Gewebe durch die eingespritzte Flüssigkeit zu stören, werden nur kleine Mengen verwendet und dazu das Cocain vorgezogen. Eine geringe Beigabe einer Suprareninlösung genügt, eine hinreichende Blutleere zu erzeugen.

Nachdem durch einige Tropfen einer 3%igen Cocainlösung der Bindehautsack unempfindlich gemacht worden ist, wird mit der konischen Sonde das untere Tränenröhrchen erweitert und mit der ANELschen Spritze eine 1%ige Cocainlösung in den Sack eingespritzt. Um das Hineingeraten der Flüssigkeit durch die Nase in den Mund zu vermeiden, hat der Kranke dabei zu sitzen und den Kopf nach vorne zu neigen. Ist der Tränen-Nasengang vollständig verwachsen, so geht keine Flüssigkeit durch, sondern sie entweicht durch die Tränen-




Abb. 8. Knochen der Augenhöhle und der Tränensackgegend. *v. L.* vordere Leiste der Tränensackgrube; *T. G.* Tränensackgrube; *h. L.* hintere Leiste der Tränensackgrube.

röhrchen, besonders durch das obere. Diese Einspritzung dient auch zur Reinigung des Sackes; sonst ergießt sich das in ihm angesammelte Sekret beim Durchschneiden der Tränenröhrchen und des Ganges in die Umgebung. Erfahrungsgemäß tritt aber auch dabei fast nie eine ernste Entzündung der Wunde ein.

Der Inhalt einer PRAVAZschen Spritze, das ist 1 ccm einer 1%igen Cocainlösung mit etwas Suprareninbeigabe, genügt zur Einspritzung vollkommen. Die Mischung wird in der Weise bereitet, daß 8—9 Teilstriche der Spritze mit der Cocainlösung angesaugt und 1—2 Teilstriche Suprareninlösung (1 : 1000,0) dazu aufgezogen werden.

Das erste Drittel der Lösung wird unter die Haut gespritzt. Die Spitze der Nadel wird unter dem Lidbändchen eingestochen und langsam nach oben vorgeschoben. Dadurch wölbt sich die Tränensackgegend etwas vor. Eine leichte Massage bringt die Schwellung bald zum Verschwinden.

Das zweite Drittel wird in der Weise verwendet, daß die Spitze der Nadel oberhalb des Lidbändchens senkrecht bis auf den Knochen eingestochen und dann die Spritze um 90° nach vorn gedreht wird, so daß die Nadel gegen die Augenhöhle gerichtet ist. In dieser Richtung wird sie hart am Knochen wenige Millimeter vorgeschoben. Diese Einspritzung betrifft gerade die Gegend der Tränensackkuppe und die hier an den Tränensack und seine Grube herantretenden Zweigchen des Nervus nasociliaris.

Mit dem dritten Einstich soll die Gegend des Einganges in den Tränen-Nasengang erreicht werden. Unterhalb des Lidbändchens wird senkrecht gegen die Tränenleiste eingestochen, dann die Spritze aufgestellt und die Nadel etwas augenhöhlenwärts vorgeschoben. Sollte die Spitze der Nadel in den Tränensack eingedrungen sein und daher die eingespritzte Flüssigkeit aus dem Tränenröhrchen ausströmen, so wird die Nadel etwas zurückgezogen und in anderer Richtung wieder vorgeschoben.

Der Eingriff wird wenige Minuten darnach begonnen. Meist ist die Blutung so geringfügig, daß die Gewebe Schicht für Schicht anatomisch sauber bloßgelegt werden können. Nur der Hautschnitt blutet gelegentlich etwas stärker, wenn zufällig größere Venenstämmchen getroffen wurden. Die tieferen Teile sind stets genügend blutarm. Die angegebene Menge Suprareninlösung ( $\frac{1}{10}$  bis  $\frac{2}{10}$  ccm) reicht dazu vollkommen aus. Bei Verwendung so geringer Mengen ist kein schädlicher Einfluß zu befürchten, weder örtlich, wie z. B. Nekrose oder stärkere Nachblutung, noch im allgemeinen Befinden. Manchmal klagen die Leute über plötzliche Beklemmungszustände, Angstgefühle und Herzklopfen. Die Erscheinungen gehen in kürzester Zeit vorüber. Bei alten Leuten mit vorgeschrittener Arteriosklerose kann die Menge auf 1 Teilstrich herabgesetzt werden, ohne daß die örtliche Wirkung wesentlich vermindert wird. Aufträufeln der Lösung auf die Wunde hat dagegen fast gar keinen Erfolg. Sollte trotzdem einmal eine stärkere Blutung stören, so kann sie durch Einlegen von Stryphon-gaze in die Wunde rasch zum Stillstand gebracht werden.

Bevor nach Ausschälung des Sackes die Sonde in die Nase eingeführt wird, wird 1% Cocainlösung in die Wunde eingeträufelt, damit sie entlang der Sonde in den Tränengang kommt und die nachfolgende Auskratzung mit dem scharfen Löffel schmerzlos macht.

Mit dem hier beschriebenen Vorgehen zur örtlichen Betäubung werden so tadellose Erfolge, auch in bezug auf die Übersichtlichkeit und die Blutleere des Eingriffgebietes, erzielt, daß wir keinen Grund hatten, die für diesen Eingriff empfohlenen Einspritzungen in die Tiefe der Augenhöhle, die die Leitung im Bereiche des Nervus nasociliaris zu unterbrechen haben, anzunehmen. Außerdem halten wir es für einen besonderen Vorteil unserer Art der örtlichen Betäubung, daß sich der Eingriff ganz außerhalb der Augenhöhle abspielt.

**Hautschnitt.** Die Gegend wird durch einen Hautschnitt freigelegt, der 2—3 mm ober dem Lidbändchen beginnt und knapp (2—3 mm) nach innen vom Lidwinkel mit seiner oberen Hälfte fast senkrecht nach unten und mit seiner unteren Hälfte etwas gekrümmt nach außen, also ungefähr parallel zur




Abb. 9. Schnitt durch die Haut. Der Daumen der linken Hand (*L. D.*) drückt die Haut gegen den Knochen, ohne sie zu verziehen. Das Messer ist mit seiner Schneide senkrecht gegen den Knochen gerichtet. Der Schnitt verläuft nach unten und in leichter Krümmung etwas nach außen. Der seitliche Abstand vom Lidwinkel beträgt 3 mm.

Leiste, verläuft (Abb. 9). Da der innere Lidwinkel der Leiste ungefähr entspricht, liegt dieser Schnitt einige Millimeter nasenwärts von der vorderen Tränenleiste und damit vom Tränensack. Damit ist die Richtung gegeben, die beim weiteren Vordringen durch das Gewebe während des Fortschreitens des Eingriffes einzuhalten ist, um den Tränensack aufzufinden. Während der Schnitt geführt wird, wird die Haut in ihrer Lage festgehalten, indem man sie mit dem Daumen der linken Hand ober dem Lidwinkel gegen den Knochen drückt. Werden die Lider, um die Haut zu spannen, nach außen gezogen, so fällt der Schnitt nicht in die gewünschte Stelle. Das Messer zeichnet schon bei leichter Berührung der Haut den Verlauf des Schnittes vor. Um ihn bequemer zu vertiefen, kann die Haut dann in beliebiger Richtung angespannt werden.

Die Länge des Schnittes kommt nicht so sehr in Betracht. Es empfiehlt sich für den Anfänger, einen längeren Schnitt zu machen (etwa  $1\frac{1}{2}$  cm), da dadurch der Sack leichter zugänglich wird. Sonst genügt ein Schnitt von 1 cm Länge.

Je größer der seitliche Abstand des Schnittes vom inneren Lidwinkel ist, um so schwieriger wird es, den Sack freizulegen, da der Zugang zu ihm dadurch

abgerückt wurde. Wenn der Schnitt weiter nasenwärts angelegt wird, bildet sich bei der Heilung an seinem oberen Ende eine häßliche Hautfalte; ebenso wenn der Schnitt Halbmondform hat, d. h. seine obere Hälfte nicht geradlinig verläuft, sondern gegen das obere Lid bogenförmig abbiegt.

**Einlegen des Tränensackspiegels.** Nach Vollendung des Schnittes wird nur der *laterale* Schnitttrand mit dem Messer gegen die Leiste, d. h. also den Lidwinkel zu etwas unterminiert, so daß die Wunde bequem geöffnet und der Tränensackspiegel (nach MÜLLER) ohne Schwierigkeit eingelegt werden kann. Der innere Schnitttrand wird nicht abgelöst, da dabei größere Gefäße verletzt werden, die durch Blutungen stören, und der Tränensack nach außen vom Schnitte liegt. Außerdem ist dieser Hautwundrand so locker an seiner Unterlage befestigt, daß die Haken des Tränensackspiegels ohne weitere Vorbereitung sicher eingesetzt werden können. Der Tränensackspiegel bietet für den Eingriff große Vorteile; er ersetzt einen Gehilfen und trägt durch den Druck auf die angrenzenden Gewebe wesentlich zur Blutstillung bei. Er wird geschlossen eingeführt, wobei die Wundränder mit der Pinzette etwas emporgehoben werden, um die Haken darunter einzusetzen. Der Griff des Spiegels ist nach unten und etwas nach außen gerichtet. Die Lider bleiben während der ganzen Dauer des Eingriffes geschlossen. Die Haken des Spiegels müssen in den Wundrändern sicher verankert sein, damit sie nicht etwa plötzlich losschnellen und die Hornhaut verletzen. Die Ansteckungsgefahr ist bei Tränensackerkrankungen bekanntlich sehr groß.

**Die oberflächliche Fascie.** In der durch den Tränensackspiegel in die Breite gezogenen Wunde liegt eine zarte, dünne, weiße Haut bloß, die *oberflächliche Fascie*.

Sie ist in der Lidspaltenrichtung häufig durch eingelagerte Bindegewebszüge verdickt, die mit dem Lidbändchen in Zusammenhang stehen und von ihm ausstrahlen. Dieser oberflächliche Teil darf nicht mit dem eigentlichen Lidbändchen verwechselt werden. Dieses gehört tieferen Schichten an.

An Stelle des Messers, mit dem der Hautschnitt gemacht wurde, wird weiterhin eine kleine, etwas gekrümmte Schere verwendet. Ein Blatt von ihr soll spitz, das andere stumpf enden.

Eine mit der Hakenpinzette aufgehobene Falte der oberflächlichen Fascie wird mit dem spitzen Blatt der geöffneten Schere durchstochen und die Fascie in der ganzen Länge der Wunde von unten nach oben geschlitzt. Ist die oberflächliche Fascie besonders dünn, so wird sie nicht selten schon gleichzeitig mit der Haut durch das Skalpell durchtrennt, so daß dadurch schon der Muskel freigelegt wird.

**Der Muskel.** Wird darauf die Membran gegen beide Wundränder zurückgeschoben, so erscheint in der Wunde eine Lage roter Fasern, der Lidteil des Schließmuskels der Lider. (*Musc. orbic., Pars palpebralis.*) Diese Fasern entspringen vom Lidbändchen und bilden den oberflächlichen Teil dieses Muskels. Da durch die Durchtrennung der oberflächlichen Fascie der Widerstand vermindert wurde, zieht der Tränensackspiegel die beiden Wundränder kräftig auseinander; aus dem linienförmigen Schnitt wird eine rhombische, ziemlich breite Wundfläche, von der nur ein kleiner (nämlich der *laterale*) Teil der Lage des Tränensackes entspricht. Durch diese Verbreiterung des Eingriffgebietes ent-

steht die Gefahr, an falscher Stelle in die Tiefe zu dringen. Bevor daher die Muskelschicht durchtrennt wird, hat man sich über die Lage der vorderen Tränenleiste zu vergewissern. Dies geschieht, wie oben erwähnt, in der Weise, daß die geschlossene Pinzette in der unteren Hälfte der Wunde mit leichtem Druck gegen den Knochen vom nasalen zum temporalen Wundrande geführt wird, wobei sie über die hier immer scharf ausgeprägte Leiste deutlich springt. Da der Tränensack dahinter gelegen ist, ist damit die Stelle, wo die vorliegende Muskelschicht durchschnitten zu werden hat, genau bestimmt. Der nach innen davon gelegene Teil der Wunde bleibt weiterhin unberührt.

Genau entlang der Leiste oder etwas auswärts davon wird die Muskelschicht in gleicher Weise wie die oberflächliche Fascie mit der Schere geschlitzt. Die Muskelfasern werden mit der geschlossenen Schere nach beiden Seiten zurückgeschoben.

**Die tiefe Fascie.** Dadurch kommt im Grunde der Wunde eine derbe, weiße Membran zum Vorschein, die den Tränensack bedeckende *tiefe Fascie* (Abb. 10). Sie spannt sich von der vorderen auf die hintere Tränenleiste hinüber und überbrückt die Tränensackgrube, wodurch diese zu einem geschlossenen Bett für den Sack umgestaltet wird.

Nach oben, innen und unten geht dieses Gebilde in die Beinhaut der Umgebung über, an der hinteren Leiste aber verschmilzt es mit dem Septum orbitale, wodurch der Abschluß der Tränensackgrube gegen die Augenhöhle vervollständigt wird.

Die besonders verdickten oberen Teile dieser Fascie bilden einen vorspringenden, derben Strang, der in der oberen Wunddecke bloßliegt, das *Lidbändchen*, Ligamentum canthi internum.

Diese hier in der Wunde sichtbaren Fasern werden auch als vorderer Schenkel des Bändchens bezeichnet. Von ihm strahlen Faserbündel divergierend in den Lidknorpel des oberen und unteren Lides aus. Man pflegt daher auch zu sagen, das Lidbändchen sei Y-förmig; hinter dem waagrechten Ursprungsstrang liegt die Kuppe des Tränensackes, die beiden Schenkel des Y enthalten die Tränenröhrchen. Im Gegensatz dazu wird der an der hinteren Leiste haftende Teil der Fascie hinterer Schenkel des Lidbändchens genannt. Diese Einteilung, die auch wegen der Verschiedenheit der Ansätze der Muskelfasern nützlich ist, wird leicht verständlich,




Abb. 10. Der Muskel *M* ist durchtrennt und zur Seite geschoben. Die tiefe Fascie (*t.F.*) liegt bloß. Hinter ihr ist der Sack zu suchen. Im oberen Wundwinkel verlaufen in querer Richtung die Fasern des Lidbändchens. Die vordere Tränenleiste (*v.L.*) ist durchzusehen; sicher immer deutlich durchzufühlen.

wenn man einen Horizontalschnitt des Schädels betrachtet, der durch die Gegend des Lidbändchens geführt wurde. Durch Abziehen des Lides nach außen wird die tiefe Fascie winklig geknickt, so daß sie nunmehr mit der Tränensackgrube einen dreieckigen Raum begrenzt, dessen Basis die Grube ist und dessen beide Schenkel (vorderer und hinterer) die betreffenden Abschnitte des Lidbändchens sind. In dem Dreieck liegt der Durchschnitt des Tränensackes.

In diesem Zeitpunkte des Eingriffes ist weder die Leiste, wenn sie nicht gerade ungewöhnlich weit vorspringt, sichtbar, noch die Tränensackgrube. Um sich zurechtzufinden, wo beide liegen, tastet man abermals mit der Pinzette in der oben beschriebenen Weise.




Abb. 11. Einen Millimeter hinter, d. h. lateral von der vorderen Leiste (*v. L.*) wurde durch die tiefe Fascie ein Einschnitt in der ganzen Länge der Wunde gemacht und dadurch der bläulich-rote Sack (*S*) freigelegt. In der Abbildung erscheint das Lidbändchen noch nicht durchschnitten.

Indem die vordere Leiste ununterbrochen als Leitgebilde dient, wird ein Abirren zuweit medialwärts, wo nur die Beinhaut des Nasenrückens anstatt des Tränensackes freigelegt würde, vermieden und ebenso das Einschlagen einer falschen Richtung nach außen vom Sacke gegen die Augenhöhle zu.

#### Bloßlegung des Sackes.

Knapp nach außen (hinten) von der vorderen Leiste und ihr entlang wird mit der Schere die tiefe Fascie gespalten. Um dabei nicht die Wand des Tränensackes zu verletzen, der, mit der Fascie durch lockeres Zellgewebe verbunden, unmittelbar dahinter gelegen ist, wird mit der Hakenpinzette das Lidbändchen aufgefaßt, nach vor- und auswärts gezogen und da-

durch die Fascie vom Tränensack abgehoben. Diese wird mit dem spitzen Blatt der Schere etwas hinter der Leiste und einige Millimeter unterhalb des Bändchens durchstoßen. Die Schere hat dabei nur wenig geneigt zur Fascie angesetzt zu werden, weil bei steilem Eindringen Gefahr besteht, zu tief zu kommen und die Wand des Sackes zu schlitzeln. Der erste Schnitt wird außerdem nur kurz gemacht, so daß eine etwa entstandene Verletzung des Tränensackes nur geringfügig ist. Sie kann aber bei einiger Übung leicht vermieden werden, besonders wenn die Wand des Sackes verdickt ist. In der kleinen Wunde liegt die durch ihre meist etwas bläuliche Farbe auffällige Wand des Tränensackes bloß. Der Schnitt wird darauf durch die ganze Länge der Membran weitergeführt (Abb. 11), immer parallel zur Leiste, zuerst nach oben, wobei das Lidbändchen ungefähr in der Mitte seines waagrecht Schenkels durchtrennt wird, und darnach in der Richtung nach unten und im Bogen etwas nach außen, wobei durch entsprechende

Handdrehung die Blätter der gekrümmten Schere in die geeignete Lage gebracht werden. Immer wird das eine Blatt der Schere ganz flach hinter der Fascie eingeführt, um den Sack nicht zu verletzen.

Nach der Durchtrennung des waagrechten Teiles des Lidbändchens, wodurch, wie hier gleich vorweggenommen werden soll, die Form des Lidwinkels und die Lage der Lider für später keinen Schaden erleiden, klafft der Schnitt in der Fascie ziemlich stark, so daß ein beträchtlicher Teil der vorderen Tränensack-




Abb. 12. Die Pinzette zieht den lateralen Wundrand der Fascie (*l.F.*) vom Tränensacke (*S*) ab. Die geschlossene Schere durchtrennt die lockeren Gewebefasern zwischen Sack und Fascie und dringt nach rückwärts bis zum Knochen vor. *v.L.* vordere Tränenleiste.

wand in der Wunde deutlich sichtbar wird. Diese Wand ist jetzt wegen ihrer Verlötung mit der Fascie gespannt, besonders oben, wo sie sich in die Tränenröhrchen fortsetzt. Daher soll auch der erste Einschnitt in die Fascie nicht im Bereiche des Bändchens vorgenommen werden; denn dabei wird sehr leicht die gegen die Tränenröhrchen zu meist ziemlich dünne und stark gespannte Wand des Sackes verletzt, zumal da das Durchdringen der Schere durch das dicke Bändchen weniger überwacht werden kann.

Bei sehr tief gelegener Tränensackgrube mag an Stelle der Schere die Fascie mit einem GRAEFESCHEN Messer gespalten werden, das, mit der Schneide nach vorne gekehrt, unterhalb des Lidbandes flach angesetzt wird.

Dadurch, daß die Fascie nicht in ihrem Ansätze, das ist auf der Leiste, sondern etwas dahinter durchschnitten wird, gestaltet sich die nunmehr zu erfolgende

Ausschälung des Sackes, besonders seiner lateralen Wand, aus seinem Bette wesentlich einfacher und übersichtlicher.

Ist die Wand des Sackes stark verdickt, so wölbt sie sich in diesem Zeitpunkte manchmal bruchartig aus der Fascienwunde vor.

**Ausschälung des Sackes.** Nachdem der Sack auf die beschriebene Weise aufgefunden worden ist, kann nun an seine Ausschälung geschritten werden.

Der Sack ist im allgemeinen selbst nach lange dauernden Entzündungen nur durch ein lockeres Gewebe mit der tiefen Fascie verbunden. Straffe Ver-




Abb. 13. Aus der lateralen Wand des Tränensackes (*S*), die in ihrer unteren Hälfte von der tiefen Fascie (*L.F.*) abgelöst ist, treten oben die zu einem gemeinschaftlichen Strange verschmolzenen Tränenröhrchen (*R*) und begeben sich durch eine Öffnung der lateralen Fascie nach außen zu den Lidern.

lötungen umschließen nur seine Kuppe. Ziemlich innig haftet ferner seine innere Wand an der Beinhaut der Tränensackgrube. Auch die nahe der Kuppe aus dem Sack austretenden Tränenröhrchen sind von einem straffen Bindegewebe umspannen. Sie ziehen als ein ziemlich derber Strang nach außen durch die Fascie.

Zum leichteren Verständnis des Eingriffes unterscheidet man am besten nur zwei Wände des Tränensackes: Die laterale (orbitale), gegen die Fascie gerichtete, deren vorderer Teil durch den Einschnitt in die Fascie bloßgelegt wurde, und die innere oder mediale (nasale), die der Beinhaut der Tränensackgrube anliegt. Ich vermeide demgemäß ganz die Bezeichnung vordere und hintere Sackwand.

Die Ausschälung hat zwischen der Wand des Tränensackes und der umgebenden Fascie vorgenommen zu werden. Da in diesem Gewebe keine nennens-

werten Blutgefäße liegen, wird sie durch keine Blutung gestört. Um sie glatt durchzuführen, muß folgendes Vorgehen eingehalten werden:

Zuerst wird die untere Hälfte der lateralen Wand freigemacht. Zu diesem Zwecke wird der laterale Schnitttrand der tiefen Fascie mit einer Hakenpinzette aufgehoben und nach vorne und außen gezogen (Abb. 12). Dadurch werden, da der Sack an die Beinhaut der Tränensackgrube angelötet ist, die Gewebs-




Abb. 14. Das eine Blatt der kleinen gekrümmten Schere ist unter den aus dem Sack (*S*) hervorkommenden Tränenröhrenstrang (*R*) geschoben, das andere Scherenblatt liegt vor ihm. Die Schere wird mit ihrer konvexen Fläche an die laterale Fascie angedrückt, so daß die Tränenröhren knapp daran abgeschnitten werden.

fasern gespannt, die die laterale Sackwand mit der Fascie verbinden. Diese zarten Verbindungsfasern werden mit der geschlossenen Schere durch einige Striche durchtrennt, bis die Spitze der Schere rückwärts den Knochen berührt. Da die tiefe Fascie mit der hinteren Leiste fest verbunden ist, wird bei dieser Art zu unterminieren die Fascie von ihrem Ansatz nicht losgelöst. Indem der Sack von der abgezogenen Fascie freigemacht wurde, fällt er zusammen und sinkt in die Tränensackgrube zurück. Versucht man nun, fortschreitend von unten nach oben in gleicher Weise mit der geschlossenen Schere den Sack weiter abzulösen, so stellt sich ein derber Widerstand entgegen: die von einer bindegewebigen Hülle umgebenen Tränenröhren, die oben in Form eines Stranges den Sack verlassen und durch die Fascie durchtretend zu den Lidern ziehen (Abb. 13). Wird die geschlossene Schere mit Gewalt durch sie hindurch nach

oben geführt, so werden sie unregelmäßig zerrissen und dabei Teile ihrer Schleimhaut an der Fascie zurückgelassen. Nacheiterungen wären die Folge dieses Vorgehens.

Der Tränenröhrchenstrang hat daher so nahe als möglich an der Fascie und scharf durchschnitten zu werden. Zu diesem Behufe wird das eine Blatt der geöffneten Schere, deren gewölbte Seite an die Fascie angedrückt wird, unter den Strang geschoben und dieser knapp an der Fascie mit einem Schläge durch-




Abb. 15. Der Ansatz der tiefen Fascie an der vorderen Leiste (*v.L.*) wird mit der Pinzette nasenwärts abgezogen; die Spitze der geschlossenen Schere ist gegen den Knochen gerichtet und dringt oben zwischen Fascie und Tränensack (*S*) ein. Zur Erleichterung des Zuganges ist ein waagrecht kurzer Einschnitt in die Fascie angelegt.

trennt (Abb. 14). Darauf zieht sich auch der obere Teil des Sackes in die Grube zurück. An der Innenseite der Fascie ist die punktförmige Öffnung, durch die die vereinigten Tränenröhrchen hindurchzogen, deutlich sichtbar.

Nunmehr wird die mediale Wand abgelöst. Es wird oben begonnen, da hier wegen der Flachheit der Leiste der Weg zur inneren Wand frei zugänglich ist. Der an der Leiste zurückgelassene schmale Streifen der Fascie wird mit der Hakenpinzette gefaßt und gegen die Nase nach vorne umgelegt und die Spitze der geschlossenen Schere zwischen Fascie und Tränensack vorgeschoben (Abb. 15). Sollte der Fascienstreifen einmal etwas breiter sein, so genügt ein kleiner waagrecht, bis auf die Leiste reichender Einschnitt in ihn, um den Übergang der lateralen in die mediale Wand des Sackes freizulegen. Die geschlossene Schere, deren Höhlung nasalwärts gerichtet sein soll, schält nun mit einigen Strichen die innere Tränensackwand vom Knochen ab. Es braucht keine besondere Sorg-

falt verwendet zu werden, die Beinhaut zu erhalten. Ist der Zusammenhang zwischen beiden locker, so wird die Beinhaut zurückgelassen; ist er aber innig, so wird sie ohne Nachteil für den Knochen mit dem Sacke entfernt. Die Ablösung wird so weit als möglich nach rückwärts gegen die hintere Leiste fortgesetzt. Ist einmal die obere Hälfte frei, so gelingt es meist, die geschlossene Schere mit wenigen Strichen hinter den vorspringenden unteren Teil der Leiste, indem der Fascienansatz mit der Hakenpinzette aufgehoben wird, zwischen




Abb. 16. Der von beiden Seiten freigemachte Sack wird nahe seiner Kuppe (*K*), nun zum ersten Male, mit der Pinzette gefaßt und knapp an der Grenze seiner Wand durch scharfe Scherenschläge losgeschnitten. Der obere Wundrand wird durch ein Doppelhäkchen abgezogen (in die Abbildung aus Gründen der Übersicht nicht aufgenommen). *E* der quere Einschnitt in die tiefe Fascie.

Knochen und Sackwand nach unten vorzuschieben und dadurch den Sack bis in den Gang loszulösen.

Der Sack liegt nun frei in der Grube. Oben hängt nur noch seine Kuppe mit dem umgebenden Gewebe zusammen, unten setzt er sich in den Tränen- gang fort.

Der Sack wurde bis jetzt während des Eingriffes mit der Pinzette nicht berührt. Nur die umgebende Hülle wurde abgezogen und die Schere zwischen Fascie und Sack eingeführt. Dadurch wurde der Sack nicht in Gefahr gebracht, durch die Pinzette zerrissen zu werden, was bei morscher Beschaffenheit der Wand leicht der Fall sein könnte.

Ist der Sack einmal zertrümmert, dann ist eine saubere Ausschälung der ganzen Schleimhaut kaum mehr möglich; wenigstens läßt sie sich nicht mehr sicher überwachen. Ist aber der Sack einmal in der beschriebenen Weise frei-

gelegt, dann kann er, in seiner ganzen Dicke mit der Pinzette aufgefaßt, keinen Schaden nehmen, und selbst wenn er irgendwo einrisse, würde deswegen doch kein Schleimhautstückchen zurückgelassen werden.

Da die Kuppe mit dem umgebenden Gewebe fest verbunden ist, muß sie mit scharfen Schlägen der Schere ausgeschnitten werden. Zu diesem Behufe wird sie mit der Pinzette gefaßt und leicht vorgezogen, während der Gehilfe den oberen Wundrand mit einem Doppelhaken zurückhält, um einen freien




Abb. 17. Der von dem umgebenden Gewebe losgelöste Sack wird mit der Pinzette weit unten gefaßt und die senkrecht gehaltene Schere schneidet knapp an seiner vorderen Wand das noch anhaftende Gewebe bis in den knöchernen Gang hinein durch.

Einblick in diesen Wundwinkel herbeizuführen (Abb. 16). Wurde die Pinzette genau oben an der Kuppe des Sackes angesetzt, so kann das Gewebe unmittelbar ober ihr durchgeschnitten werden, ohne daß ein Teil der Schleimhaut in der Wunde zurückbleibt. Wird planlos in größerer Entfernung von der Kuppe eingeschnitten, so ist eine Blutung unvermeidlich. Diese tritt auch manchmal bei regelrechtem Vorgehen ein, stört aber in diesem Zeitpunkte des Eingriffes nicht mehr, da der Sack, bereits auf allen Seiten freigelegt, nicht mehr verlorengehen kann. Ist die Kuppe frei, so läßt sich der Sack, der gewöhnlich noch durch einige undurchtrennte Fasern in der Tiefe der Grube festgehalten wird, mit einigen Strichen der geschlossenen Schere gänzlich loslösen und nach vorne umlegen. Er muß nun noch so weit nach unten als möglich freigemacht werden. Zu diesem Zwecke wird er mit der Pinzette so weit unten als möglich gefaßt, während die Schere,

senkrecht von oben her mit vom Sacke abgewendeten Spitzen an seine Wand angelegt, vorne und zu beiden Seiten der Wand einige Schnitte führt, die den Sack bis zum Beginn des Tränenganges lostrennen (Abb. 17). Nachdem schließlich die senkrecht gehaltene Schere von vorne her in den knöchernen Anfangsteil des Ganges nach unten vorgeschoben worden ist, wird der Sack dort abgeschnitten und die Wunde tamponiert. Die Unversehrtheit der Wand des herausgenommenen Sackes läßt sich durch Einführen einer Sonde in seine Höhlung dartun. War der Sack aber am Eingange in den Nasengang vollständig verwachsen, so ist er eine geschlossene Blase, und seine Schleimhaut kommt erst zum Vorschein, wenn er aufgeschnitten wird.

In der Wundhöhle bilden die vordere Leiste und die knöcherne Sackgrube die mediale Begrenzung; temporal stellt die derbe, weiße, glatte, sehnigglänzende,




Abb. 18. Feld des Eingriffes nach vollendeter Ausschneidung. An der vorderen Leiste hängt noch der schmale zurückgelassene Saum der tiefen Fascie, an der der quere Einschnitt (*E*) noch sichtbar ist. Die Tränensackgrube (*T. G.*) ist leer. Die äußere Begrenzung wird von der an der hinteren Leiste festhaftenden tiefen Fascie (*t. F.*) gebildet. Hinter der vorderen Leiste ist die Sonde durch den Tränengang in die Nase eingeführt.

tiefe Fascie einen festen Abschluß gegen die Augenhöhle her (Abb. 18). Der Tränensack gehört somit nicht in den Bereich dieser, sondern liegt außerhalb davon.

Wird diese bindegewebige Scheidewand verletzt, indem auf der Suche nach dem Sacke der Fehler begangen wird, die Richtung gegen die Augenhöhle einzuschlagen, so verdeckt das in die Wunde vorquellende Fett den freien Überblick und stört bei dem Versuche, es wegzuschneiden, durch starke Blutung.

**Sondierung des Tränen-Nasenganges.** Zum Schlusse wird eine BOWMANSche Sonde in den Tränen-Nasengang eingeführt. Um den Eingang zu finden, hat sie knapp hinter der vorderen Leiste fast in senkrechter Richtung mit leichter Neigung nach außen unten an den Knochen angelegt und nach abwärts geschoben zu werden. Ist der Gang verwachsen, so muß sie durch das Narbengewebe durchgestoßen werden. Der Gang wird darauf mit einem scharfen Löffel erweitert und die darin befindliche Schleimhaut ausgekratzt, um eine Absonderung zu vermeiden. Auch wird damit eine Drainage der Wundhöhle geschaffen. Das leere Bett des Sackes hat mit dem scharfen Löffel nicht berührt zu werden.

Bevor die Wunde vernäht wird, reinigt man sie mit einer schwachen Sublimatlösung, wobei ein Eindringen der Flüssigkeit durch den eben eröffneten Gang in die Mundhöhle zu vermeiden ist.

**Die Naht.** Die Naht erfordert gewisse Vorsichtsmaßregeln. Die Haut dieser Gegend ist dünn, oft zerreilich, meistens an den Wundrndern eingerollt. Werden diese nicht genau aneinandergespat, so wird die Heilung per primam vereitelt und die groe Wundhhle mu durch Granulationen ausgefllt werden. Dadurch wird der Heilungsverlauf verzgert und auerdem die Narbe derber und auffallender; die zarte Narbe nach einer gut angelegten Naht und prima intentio ist dagegen kaum sichtbar.

Bei gewhnlicher Lnge der Wunde gengen 3 Nhte, bei kurzem Einschnitte zwei. Die Wunde wird durch je ein in den oberen und unteren Winkel eingelegtes spitzes, krummes Hkchen gestreckt und die mit dnnen, stark gebogenen Nadeln versehenen Seidenfden werden nahe den Wundrndern durchgefhrt. Darauf bringt der Gehilfe die beiden Wundrnder, die gewhnlich eingerollt sind, mit 2 Pinzetten in richtiger Stellung aneinander. Die geschlungenen Fden werden parallel zur Wunde gehalten und der Knoten an die Seite der Wunde verlegt. Zu starkes Zusammenziehen der Fden ist zu unterlassen, weil die Seide durch die zerreiliche Haut leicht durchschneidet. Die Fden werden kurz abgeschnitten.

Um einer Absonderung durch das Epithel der Trnenrhrchen vorzubeugen, knnen diese durch Einfhren des spitzen Endes eines Galvanokauters bei Rotglut verdet werden. Dies gilt insbesondere fr die Flle, wo spter ein das Augeninnere erffnender Eingriff ausgefhrt zu werden hat.

Bevor der Verband angelegt wird, hat nach der Unversehrtheit der Hornhautoberflche gesehen zu werden. Es wurde schon frher auf die Gefahr einer Hornhauterosion aufmerksam gemacht.

**Der Verband.** Das geschlossene Auge wird zunchst mit einem Gazelppchen bedeckt, damit kein Faden eines anderen Verbandstckes in die Lidspalte hineinragen und auf der Hornhaut reiben kann. Dann wird ein etwas eingefettetes, fest zusammengerolltes Gazebuschchen langsam mit zunehmender Kraft auf die Wunde gegen den Knochen gedrckt, um die Wundhhle zum Verschwinden zu bringen. Ein zweites darbergelegtes Buschchen sichert die Druckwirkung. ber die geschlossenen Lider werden schlielich einige Schichten lockerer Gaze gelegt und der ganze Verband mit 2 Streifen Paraplast festgehalten; der eine wird straff ber die Buschchen gespannt, um die Haut an den Knochen gedrckt zu halten, der andere hlt ohne Druck die Gaze ber den geschlossenen Lidern fest. Rollbindenverband. Druck auf die Hornhaut des Auges hat vermieden zu werden, da dadurch Epithelschdigungen zustande kommen, die den Boden fr schwere Infektionen abgeben. Das andere Auge bleibt frei.

**Die Nachbehandlung.** Der Verband wird schon am folgenden Tage abgenommen, um die Hornhaut zu besichtigen. Dabei darf aber die drckende Rolle von der Wunde nicht entfernt werden; es gengt, die Lider von der lateralen Seite her leicht zu ffnen.

Der 2. Verbandwechsel wird, wenn sonst alles in Ordnung ist, erst am 3. Tage vorgenommen. Am 4. Tage werden die Nhte entfernt, die Wunde ist

per primam geheilt. Die Stichkanäle werden mit Xeroform bestäubt oder für einen Tag mit englischem Pflaster verklebt.

Anders verläuft die Wundheilung, wenn sich wegen ungenügenden Druckes Blut in der Wundhöhle angesammelt hat. Es treten schon in den nächsten Tagen Schmerzen ein, die Wunde wird vorgebaucht, die Haut dunkelrot, auf Berührung empfindlich. Die Nähte müssen entfernt werden und die Wunde ist mit einer Knopfsonde zu sprengen, wodurch dem Sekret freier Abfluß verschafft wird. Die Wundhöhle wird mit einem eingeführten Gazestreifen drainiert. Unter feuchtem Verbande (mit BUROWScher Flüssigkeit) kleidet sich die Wundhöhle rasch mit Granulationen aus und vernarbt in kurzer Zeit.

**Ergebnisse.** Das Ergebnis des Eingriffes ist meist sehr befriedigend. Die Narbe ist in kurzer Zeit kaum sichtbar, der mit der Blennorrhöe beständig einhergehende Katarrh verschwindet regelmäßig bald und damit das Tränenträufeln — dieses wahrscheinlich aber auch durch einen nervösen Einfluß im Zusammenhange mit der Entfernung des Sackes. Wegen so häufiger gegenteiliger Behauptung muß besonders hervorgehoben werden, daß andauerndes störendes Tränenträufeln nach glatter Ausschälung eine Ausnahme, nicht die Regel ist. Bleibt nach dem Eingriffe der Katarrh und damit das Tränenträufeln bestehen, so ist dies fast ein sicheres Zeichen, daß Sackreste zurückgelassen worden sind. Meist läßt sich dann auch gelegentlich aus den Tränenröhrchen Sekret ausdrücken.

Besteht diese Ursache aber nicht und hält das Tränenträufeln auch noch nach Ablauf einiger Monate nach dem Eingriffe an, so kann es durch die Entfernung der unteren Tränendrüse beseitigt werden.

#### **Zwischenfälle und Fehler. Über das Auffinden des Sackes.**

Schon der Einschnitt wird häufig unrichtig gemacht. Der stark gekrümmte bogenförmige Schnitt, wie man ihn in den meisten Lehrbüchern abgebildet findet, ist durchaus verwerflich. Er entspricht weder mit seinem oberen noch mit seinem unteren Ende der Lage des Sackes und hinterläßt eine häßliche Hautfalte. Das Schwierige an dem Eingriffe ist, den Sack aufzufinden, außer er ist schon so ausgedehnt, daß er als Geschwulst durch die Haut sichtbar ist. Die vordere Tränenleiste muß — wie schon wiederholt hervorgehoben — während des ganzen Eingriffes als Leitgebilde dienen. Dabei muß stets die Richtung gegen den Knochen eingehalten werden. So vermeidet man einerseits, zu weit nasenwärts an der Beinhaut des Knochens nach dem Sacke zu suchen, anderseits in das Gewebe der Augenhöhle einzudringen. Dieses soll überhaupt nicht in Sicht kommen. Je sauberer der Sack ausgelöst wird, d. h. je genauer man sich entlang der Wand des Sackes hält, beständig zwischen dieser und der sie einhüllenden Fascie, desto glatter ist der Verlauf des Eingriffes. Wird aber in Ermangelung genauerer Kenntnisse über die Lage und Umgebung der Sack samt den anhaftenden Gewebsteilen herausgeschnitten, so versagen die Einspritzungen, die Blutung ist überreichlich, der Eingriff schmerzhaft und oft werden Sackreste in der Wunde zurückgelassen.

**Verletzung des Sackes.** Wird der Sack nicht im ganzen, sondern nur in einzelnen Stücken herausbefördert, so bleiben leicht einzelne Teile der Schleimhaut zurück, veranlassen von neuem eine Absonderung oder führen gar zur

Fistelbildung. Die Ursache dieses Mißlingens kann in einer ausnahmsweise eingetretenen starken Blutung gelegen sein, da diese ein tadelloses Vorgehen unmöglich macht, oder in einer außerordentlichen Zerreißlichkeit des Sackes oder aber in dem Umstande, daß die Vorderwand des Sackes durch eitrige Einschmelzung bei akuter Dakryocystitis schon früher zerstört worden war.

Auch bei sonst glattem Eingriffe kann der Fehler unterlaufen, daß die Spitze der Schere beim Öffnen der tiefen Fascie auch in die unmittelbar hinter ihr liegende vordere Tränensackwand eindringt. Wird der Fehler nicht sofort entdeckt, so wird die Wand beim weiteren Einschneiden der Fascie in der ganzen Länge mitgespalten und als Folge davon nur ein Teil des Sackes herausgeschält. Besonders die der tiefen Fascie anhaftende laterale Wand wird dabei nicht selten zurückgelassen. Die mediale Wand aufzufinden, gibt dagegen der starre Knochen und die Leiste ein sicheres Leitgebilde ab.

Auch sonst geschehen am häufigsten Fehler bei der Losschälung der lateralen Wand: diese wird nämlich entweder mit der Fascie zusammen ausgeschnitten, wodurch die Augenhöhle eröffnet und eine Infektion des Gewebes ermöglicht wird, oder sie wird mit der Fascie zurückgelassen und nur die mediale Wand entfernt.

Es wurde daher ausdrücklich empfohlen, bei der Ausschälung zuerst die laterale Wand freizumachen. Nur solange der Sack noch am Knochen der Grube festhaftet, kann durch Zug der Fascie nach außen das sie mit der lateralen Sackwand verbindende Bindegewebe angespannt und der richtige Weg zwischen beiden leicht gefunden werden.

Nicht selten konnte ich bei Säcken, die schon anderwärts erfolglos angegangen worden waren, die ganze äußere Wand unversehrt ausschälen. Auch die mit der bedeckenden Fascie fest verwachsene Kuppe des Sackes wird durch fehlerhaftes Abkappen oder Abreißen des Sackes unter ihr in der Wunde zurückgelassen.

Ist schon nach gut gelungener Ausschälung des Sackes die Wundhöhle genau zu besichtigen (um zu sehen, ob der Knochen gesund ist u. dgl.), so muß sie bei Herausbeförderung der Schleimhaut in Stücken um so eingehender gemustert werden. Das Auskratzen mit dem scharfen Löffel ist ganz ohne Wert. Sind Teile des Sackes zurückgeblieben, so wird die Wunde mit Gaze tamponiert und kurze Zeit zugewartet, bis die Blutung steht. Meist werden dann die Stellen, wo Reste der Wand haften geblieben sind, entdeckt. Die durch ihre blaßgraue Farbe und das sulzige Aussehen kenntlichen Stücke werden mit der Pinzette gefaßt und von ihrer Unterlage (Fascie, Knochen) mit der Schere sorgfältigst losgelöst. So gelingt es meistens, alle zu entfernen und eine Heilung per primam intentionem zu erzielen.

#### **Nachbehandlung bei zurückgelassenen Schleimhautresten.**

Wird die Wunde über zurückgelassenen Schleimhautresten vernäht, so wölbt das Sekret sie binnen kurzem vor und sprengt die Nähte. Oder die Wunde muß wegen Sekretstauung mit der Sonde eröffnet werden. Eine lang dauernde Eiterung folgt diesem Vorgange. Während dieser Zeit muß die Wunde durch Einlegen eines Gazestreifens offen erhalten werden. Ausspülungen mit schwacher Sublimatlösung oder mit 6%iger Wasserstoffsuperoxydlösung sind empfehlens-

wert. Die Wunde sofort auszukratzen, ist ganz verfehlt. Gerade in dem Zustande der Granulationsbildung sind in der Wunde keine Einzelheiten zu erkennen, und selbst wenn von dem scharfen Löffel der ausgiebigste Gebrauch gemacht wird, bleiben doch immer Schleimhautreste zurück. Mit ihm kann vielleicht die Schleimhaut, die an dem Knochen hängen blieb, entfernt werden, nicht aber die der lateralen Wand, da sie keine feste Unterlage hat und dem scharfen Löffel ausweicht. Wird bei solchen anderweitig mit wiederholtem Auskratzen behandelten Kranken nach Ablauf aller akut entzündlichen Erscheinungen eine regelrechte Ausschälung vorgenommen, so wird meist die laterale Tränensackwand, oft auch die Kuppe des Sackes gefunden. Diese können in einem Stücke herausgeholt werden, worauf Heilung per primam eintritt. Auch bei diesem Eingriffe soll nicht gleich mit dem ersten Schnitte bis zur vorderen Leiste eingedrungen, sondern — soweit es in dem Narbengewebe möglich ist — schichtweise vorgegangen werden. Die Cocain-Suprarenin-Infiltration bringt in dem starren Narbengewebe eine solche Blutleere hervor, daß jeder Schnitt überwacht werden kann. Die Sackwand hebt sich durch ihre bläuliche Farbe von dem weißen Narbengewebe recht deutlich ab und kann meist ganz leicht ausgeschält werden. Wurde dann noch durch genaue Besichtigung der Wunde festgestellt, daß keine Schleimhautreste zurückgeblieben sind, so darf die Wunde durch Nähte geschlossen werden.

Daß in diesen Fällen, ebenso wie bei der im folgenden Absatz beschriebenen Tränensackfistel, der Eingriff von der Nase aus vorzügliche Ergebnisse hat, wird später angeführt werden (siehe S. 33).

**Heilung der Tränensackfistel.** Wenn sich nach mißlungener Ausschälung oder nach eitriger Entzündung des Sackes eine Fistel gebildet hat, ist zur Entfernung der Sackreste ein langer Schnitt (2 cm) anzulegen, um einen bequemen Zugang zur Grube herzustellen. Die Fistel ist zu umschneiden. Der anfänglich nur durch die Haut geführte Schnitt wird nach Unterminierung der Wunde und Einlegen des Tränensackspiegels allmählich bis auf die Leiste vertieft. Das ganze in der Wunde bloßliegende Narbengewebe muß entfernt und die Tränensackgrube ausgeräumt werden. Sehr häufig gelingt es noch, lateral die Grenze zwischen Schleimhautresten und Fascie zu finden. Vom Auskratzen wird Abstand genommen und durch die Besichtigung der Wunde die Gewißheit zu erlangen versucht, daß nichts von der Schleimhaut zurückgeblieben ist. Auf Nähte muß, besonders nach mehreren Anfällen von Dakryocystitis, verzichtet werden, wenn die Haut zu zerreißlich ist. Ein locker eingeführter Gazestreifen hält die Wundhöhle offen. In ihr entwickeln sich bald Granulationen, die schließlich die Höhle ausfüllen. Die Narbe ist selbst nach diesen Vorgängen oft erstaunlich geringfügig. Hatte sich nach wiederholter Mißhandlung der Gegend durch Auskratzen ein Narbenektropium gebildet, so wird das Lid durch entsprechend schief von außen unten nach innen oben angelegte Nähte gehoben und in die richtige Stellung zurückgebracht.

**Tränensackektasie.** Von einem vorbildlichen Verfahren kann nicht mehr gesprochen werden, wenn sich der Tränensack so stark ausgedehnt hat, daß er sich als Geschwulst unter der Haut vorwölbt. Die darüberliegenden Gewebe werden dadurch so atrophisch, daß schon unmittelbar nach dem Hautschnitte die Wand des Sackes bloßliegt. Die Ausschälung unterscheidet sich dann nicht

von der einer anderen Geschwulst dieser Gegend. Der Sack soll dabei nicht verletzt werden, damit keine Schleimhautreste in der Wunde zurückbleiben.

**Tuberkulose des Tränensackes.** Tränensackerkrankungen tuberkulöser Natur — besonders bei Kindern — gestatten oft keine saubere Ausschälung, da die Wand des Sackes häufig durch tuberkulöse Infiltrationen zerstört und nicht selten auch der Knochen in Mitleidenschaft gezogen ist. Alles kranke Gewebe muß ausgeschnitten und der erkrankte Knochen entfernt werden; in die Wunde wird Jodoformgaze eingeführt und die Heilung per granulationem abgewartet. Der Natur der Sache gemäß erfolgt häufig eine Rezidive, meistens mit Fistelbildung, die von neuem einen Eingriff notwendig macht. Gerade mit Rücksicht auf die Schwierigkeit und Unsicherheit des Eingriffes bei Tuberkulose des Tränensackes sollte vorher immer zuerst der Versuch gemacht werden, wie es KUMER und SALLMANN zuerst empfohlen haben, zunächst von der Behandlung mit Radium Gebrauch zu machen. Damit gelingt es nämlich in einer beträchtlichen Zahl von Fällen, die Krankheitserscheinungen zur Heilung oder doch die Krankheit so weit zum Rückgang zu bringen, daß der Sack nunmehr ohne Schwierigkeit ausgeschält werden kann.

**Behandlung der akuten Dakryocystitis.** Bei beginnender akuter Dakryocystitis gelingt es manchmal, durch frühzeitiges und wiederholtes Einlegen von 5%igen Cocain-Adrenalin-Tampons in den unteren Nasengang dem weiteren Fortschreiten der eitrigen Entzündung Einhalt zu tun, indem das untere Ende des Tränen-Nasenganges durch Anschwellen der Schleimhaut frei wird und dadurch der Eiter abfließen kann. Eingeschnitten soll nur dann werden, wenn ein Durchbruch unvermeidlich erscheint. Sonst genügen zur Behandlung feuchte antiseptische Verbände (besonders mit Liq. Burowi). Es dauert gewöhnlich Wochen, bis die Entzündung vollkommen verschwunden ist. Erst wenn die Tränensackgegend wieder normal aussieht, auf Druck nicht mehr schmerzhaft ist, wird der Sack in regelrechter Weise ausgeschält. Wird der Eingriff noch vor Ablauf der akuten Eiterung versucht, so mißlingt er, weil es in dem infiltrierte Gewebe an jeder Übersicht mangelt und die starke Blutung aus den erweiterten Gefäßen sehr stört; außerdem aber besteht die große Gefahr, die eitrig-Entzündung durch die Eröffnung von Lymphgefäßen in die Umgebung zu verpflanzen und schwere eitrig-Entzündungen der Lider oder eine Orbitalphlegmone zu veranlassen.

Es ist falsch, in solchen Fällen schon nach kaum mehr als einer Woche die Tränensackschleimhaut durch Auskratzen mit dem scharfen Löffel entfernen zu wollen. Siehe darüber das auf S. 27 Gesagte.

Ein Tränensackabszeß wird mit einem spitzen Skalpell durch einen Schnitt eröffnet, der knapp unter dem Lidbändchen beginnt und sich über die Höhe der Vorwölbung in der Richtung der vorderen Leiste nach außen unten erstreckt. Das Messer wird bis an den Knochen der Tränensackgrube vorgestoßen und der Schnitt in der Schleimhaut bis zum Beginn des Tränenganges verlängert. Unter Drainage der Wunde wird abgewartet, bis alle akut entzündlichen Erscheinungen verschwunden sind. Die Heilung erfolgt ohne oder mit Fistelbildung. Erst dann wird die beschriebene Ausschälung vorgenommen.

## Zweites Kapitel.

### **Die äußere Dakryocystorhinostomie. Der Eingriff am Tränensack von der Nase aus: Endonasale Dakryocystorhinostomie. Die Eingriffe an der Tränendrüse.**

**Vorbemerkungen.** Um die Gefahren und Beschwerden der chronischen Tränensackerkrankung zu beseitigen, ohne durch Ausschälung des Tränensackes die Tränenableitungswege vollständig auszuschalten, wurden verschiedene Verfahren erdacht. Der Grundgedanke dieser Eingriffe ist, die nasale Wand des Tränensackes, den daran angrenzenden Knochen und die zugehörige Nasenschleimhaut auszuschneiden und dadurch Sackhöhle und Nasenhöhle breit zu verbinden. Es wird durch diesen Eingriff die Sackhöhle in die Hauptnasenhöhle einbezogen. Die laterale Wand des Sackes, in der die Einmündung der Tränenkanälchen gelegen ist, tritt an Stelle des gleich großen ausgeschnittenen Stückes Nasenschleimhaut.

#### **Äußere Dakryocystorhinostomie.**

(Verfahren nach TOTI.)

**Anzeigen.** Verschuß oder Verengerung des Tränen-Nasenganges, chronische Tränensackentzündung, insbesondere bei Erweiterung des Tränensackes.

**Gegenanzeigen.** Akute Tränensackentzündung, Verschuß oder Erkrankung der Tränenröhrchen. Beträchtlich vergrößertes vorderes Ende der mittleren Nasenmuschel, hochgradige Deviatio septi nasi.

**Allgemeine Bemerkungen.** Der Eingriff beginnt zwar in einer dem Augenarzt anatomisch und klinisch wohlvertrauten Gegend, er führt aber dann sogleich in ein Gebiet, wo der nicht rhinologisch Geschulte keine wundärztliche Erfahrung besitzt, und gerade in diesem Gebiete ist das tadellose Vorgehen entscheidend für den Erfolg. Das Verfahren von TOTI ist mit einem Wort ein rhinologischer Eingriff. Wird er von einem Augenarzt ausgeführt, so ist dieser gezwungen, den Nasenarzt schon vorher zu Rate zu ziehen, ob nicht von seiten der Nase eine Gegenanzeige für den Eingriff besteht. Auch nach dem gut durchgeführten Eingriff muß, wenn die Heilung nicht glatt erfolgt oder sich die Öffnung verschließt, der Nasenarzt die weitere Behandlung übernehmen.

**Örtliche Betäubung.** Zunächst wie zur Ausschälung des Tränensackes. Dann wird noch die Beinhaut im Bereiche des Eingriffgebietes unempfindlich gemacht, indem knapp am Knochen 2%ige Novoc.-Adr.-Lösung eingespritzt wird. In die Gegend des Agger nasi wird ein mit 20%iger Cocainlösung und Adrenalin ge-

tränkter Wattebausch gelegt. Ist die Schleimhaut blutleer geworden, so wird dann dort 1—2 ccm einer 2%igen Novocainlösung mit Adrenalin- oder Corbasilzusatz eingespritzt.



Abb. 19. TOTIS Dakryocystorhinostomie.  
v. L. vordere Tränenleiste; T. G. Tränensackgrube; h. L. hintere  
Tränenleiste; S. Tränensack (innere Wand).

### Der Eingriff.

1. *Der Hautschnitt* wird wie zur Tränensackausschälung, nur etwas weiter nasenwärts, geführt, so daß die Crista lacrimalis anterior temporal vom Schnitte zu liegen kommt. Auch ist der Schnitt länger zu machen. Man beginnt 1 cm oberhalb des inneren Lidbändchens und schneidet bis zur Höhe des unteren Augenhöhlenrandes, also bis in die Gegend des Beginnes des Tränen-Nasenganges. Der Schnitt wird

in einem Zuge bis zum Knochen geführt, den er nasenwärts von der vorderen Tränensackleiste erreichen soll, wobei auch das Periost durchschnitten wird. Nicht selten blutet es dabei so stark, daß Klemmen angelegt werden müssen.




Abb. 20. Nach TOTI.

1 Schnitt durch das Nasenbein; 2 Nasenschleimhaut; 3 Knochennaht zwischen Nasenbein und Oberkiefer; 4 äußere Fläche des Stirnfortsatzes; 5—6 Resektionslinie des Oberkiefer-Stirnfortsatzes; 7 Insertion des Lig. canth. int.; 8 vordere Tränenleiste; 9 zentraler Teil des auszuschneidenden Knochenstückes; 10 vordere Umrandung der auszuschneidenden hinteren Sackwand; 11 vordere Umrandung der auszuschneidenden Nasenschleimhaut; 12 Sackhöhle; 13 vordere Sackwand mit gemeinsamer Ausmündung der Kanälchen; 14 hintere Sackwand; 15 Knochennaht zwischen Oberkieferfortsatz und Tränenbein; 16 hintere Umrandung der Sackwandausschneidung; 17 hintere Umrandung der Nasenschleimhautausschneidung; 18 Resektionslinie des Tränenbeines vor der Basis der hinteren Tränenleiste; 19 Schnitt durch den hinteren Teil des Tränenbeines; 20 Knochennaht zwischen Tränenbein und der Lamina papyracea des Siebbeines; 21 hintere Tränenleiste.

2. *Bloßlegung der Tränensackgrube.* Die Gebilde der Tränensackgrube werden jetzt zusammen mit der Beinhaut stumpf vom Knochen abgelöst, so daß die Tränensackgrube bis zur hinteren Tränensackleiste freiliegt (Abb. 19).

Zur Übersicht der nun folgenden Teileingriffe diene Abb. 20.

3. *Freilegung der Nasenschleimhaut.* Während die Gebilde der Tränensackgrube mit einem Spatel zur Seite gehalten werden, wird mit Meißel und Hammer zuerst die vordere Tränensackleiste abgetragen und dann die Schleimhaut der lateralen Nasenwand dadurch freigelegt, daß man den jetzt bereits verdünnten Knochen im Bereiche der Tränensackgrube und der vorderen Tränensackleiste wegnimmt. Es wird also das Tränenbein und der Stirnfortsatz des

Oberkieferknochens abgemeißelt, wobei man ihn bis zum Beginne des Tränen-Nasenganges abtragen muß, damit sich dort nicht eine Sacktasche bilden kann.

4. *Einschneiden der Nasenschleimhaut.* Sie wird mit einem spitzen Messer I-förmig eingeschnitten (Abb. 21) und die hintere Wundlippe in zwei Nahtschlingen gefaßt (DUPUYS-DUTEMPS). Man verwendet dazu am besten eine zarte scharfe DESCHAMPSSche Nadel.

5. *Einschneiden der medialen Tränensackwand.* Mit einem spitzen Messer wird die entsprechende Öffnung durch die Beinhaut in die mediale Tränensackwand geschnitten, die bläulich durchschimmert. Auch dieser Schnitt hat I-Form. Es ist sorgfältig darauf zu achten, daß der Schnitt soweit als möglich gegen




Abb. 21. Das Knochenfenster ist ausgeißelt und ein I-förmiger Schnitt in die Schleimhaut geschnitten.

den Tränen-Nasengang zu geführt wird.

6. *Durchziehen der Nähte durch den hinteren Schnittrand des Tränensackes und Knüpfen der Fäden.* Die bereits durch die hintere Wundlippe der Öffnung in der Nasenschleimhaut gezogenen Fäden werden wieder in die DESCHAMPSSche Nadel eingezogen und mit ihrer Hilfe durch die hintere Lippe der Tränensackwunde gezogen (Abb. 22). Hierauf werden die Nähte geknüpft und so die beiden rückwärtigen Wundlippen miteinander vereinigt, wodurch der hintere Rand des Knochendefektes sofort mit Schleimhaut bedeckt wird.




Abb. 22. Naht durch die hinteren Wundlippen von Tränensack und Nasenschleimhaut. Die obere Naht ist schon geknüpft. Die DESCHAMPSSche Nadel hat eben den Tränensack durchbohrt und mit dem Fadenfänger wird der Faden vorgezogen.

7. *Vernähen der vorderen Schleimhautlippen.* In gleicher Weise werden die beiden vorderen Lippen durch 2 Nähte miteinander vereinigt und so die Verbindungsöffnung zwischen Tränensack und Nasenhöhle allseits mit Schleimhaut gedeckt.

8. *Wundversorgung.* Nach dem Abnehmen der Klemmen werden die Gefäße, falls sie noch bluten sollten, mit einer heißen Sonde berührt und dann die Hautwunde durch Knopfnähte verschlossen. Leichter Druckverband. In die entsprechende Nasenöffnung wird ein Gazetupfer eingeführt, der nur die Nasenöffnung verschließen soll.

**Zufälle während des Eingriffes.** In etwa 20% der Fälle reichen vordere Siebbeinzellen bis in die Gegend der Tränensackgrube. Sie und nicht die Nasenschleimhaut werden daher beim Anlegen der Knochenöffnung zuerst erreicht. Sie haben mit einer Zange völlig entfernt zu werden, bis in der freien Öffnung nur Nasenschleimhaut vorliegt. Nicht immer gelingt es, 2 Nähte durch die hinteren Wundlippen der Schleimhäute anzulegen. Man begnüge sich in Fällen von sehr dünner Schleimhaut mit *einer* Naht. Aber auch dort, wo es nicht möglich war, eine Naht durch die hintere Wundlippe zu legen, können wenigstens die vorderen Wundlippen durch Naht vereinigt werden; der Erfolg ist fast immer gut. Auch in Fällen, wo das Anlegen jeder Naht mißlang, kann der Erfolg gut sein.

**Nachbehandlung.** Der Verband wird jeden 2. Tag gewechselt. Der Gazetupfer in der Nasenöffnung wird am 2. Tag, die Hautnähte werden am 6. Tag entfernt. Um diese Zeit beginne man 2—3mal wöchentlich den Tränensack durchzuspülen. Ist er glatt durchspülbar und ist auch das Tränenträufeln verschwunden, so kann der Patient 2 Wochen nach dem Eingriffe aus der Behandlung entlassen werden. Ist aber 2 Wochen nach dem Eingriffe der Tränensack noch immer nicht einwandfrei durchspülbar und besteht noch immer Tränenträufeln, dann sind im Bereiche der Verbindung zwischen Nase und Tränensack Granulationen an den Wundflächen entstanden. Sie müssen ebenso von der Nase her behandelt werden wie Wucherungen, die nach dem endonasalen Verfahren auftreten.

Es kommt auch vor, daß sich Monate nach erfolgreicher äußerer Dakryocystorhinostomie die Öffnung wieder verschließt. Dies tritt insbesondere ein, wenn die Knochenöffnung zu klein angelegt worden war. Auch dann muß von der Nase her vorgegangen werden.

Ausnahmsweise stellen sich schwere Folgen im Heilverlauf ein: Eiterung in der und um die Wunde bis zur Phlegmone, Erysipel, entstellende Narben.

### **Der Eingriff am Tränensack von der Nase aus. (Endonasale Dakryocystorhinostomie.)**

Von

Prof. Dr. K. KOFLER, Wien.

**Einleitung.** Das ursprünglich von WEST-POLYAK angegebene Verfahren der endonasalen Tränensackoperation konnte wegen seiner technischen Schwierigkeiten keine allgemeine Verbreitung finden. Die schwere Zugänglichkeit des Eingriffgebietes und der mangelnde Aufblick darauf lassen zu oft den Eingriff fehlschlagen. HALLE suchte durch Resektion insbesondere der vordersten Partie des Septum cartilagineum diese Schwierigkeiten zu beheben. Durch diese Voroperation fällt der septale Widerstand im Bereiche der Apertur fort, das Nasenspeculum kann weiter gespreizt, tiefer eingeführt und ihm auch eine Einstellung unter einem weniger spitzen Winkel auf die laterale Nasenwand gegeben werden, lauter Vorteile, die zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit des Operationsgebietes und dadurch zur Vereinfachung der Tränensackoperation beitragen. Aber erst durch die von mir angegebene Abänderung des Verfahrens, nämlich der Anlage einer temporären Öffnung im Septum, wurde das Vorgehen

noch mehr erleichtert, ja der Eingriff für die Fälle, wo das Vestibulum auf der Seite des zu operierenden Tränensackes verengt ist, erst dadurch ermöglicht (Abb. 23).

**Anzeigen.** Alle Fälle von chronischer Tränensackentzündung und von einfachem Tränenträufeln infolge Verengerung des Ductus nasolacrimalis, bei denen die augenärztliche erhaltende Behandlung versagt hat und die in früheren Zeiten für die Ausschälung des Tränensackes bestimmt waren; ferner und insbesondere nach erfolglos ausgeführter Tränensackausschälung, wo Tränensackreste zurückgeblieben sind — es bildet sich da häufig um die Canaliculusmündungen eine kleine Höhle, so daß beim Durchspülen durch das untere Röhrchen das Spülwasser durch das obere Röhrchen zurückfließt: *positive* Canaliculusprobe; bei Tränensackfisteln; Verengerung der Tränenröhrchen kommt nur in Betracht, wenn sie im sacknahen Teile bestehen.

**Gegenanzeigen.** Im allgemeinen Kinder unter 14 Jahren; Tränenträufeln bei normaler Durchspülbarkeit des Tränensackes, komplette Verödung der Tränenröhrchen, ausgedehnte anderweitige Erkrankungen des Tränensackes, wie Lupus, Tuberkulose, Caries der Knochenwand, Carcinom usw.; akute Dakryocystitis wegen Unmöglichkeit, eine genügende Unempfindlichkeit und Blutleere zu erzielen und wegen der Gefahr des Verschleppens von Keimen durch die Venen- und Lymphbahnen in das Schädelinnere oder in die Augenhöhle.

**Keine Gegenanzeigen.** Greisenalter bei sonst gutem Gesundheitszustand; geschlitzte Tränenröhrchen, fibröse Schrumpfung des Sackes, atrophische Rhinitis und Ozaena; Eiterungen der Nebenhöhlen der Umgebung, wobei zu bemerken ist, daß bei eitriger Erkrankung des vorderen Siebbeins dieses in derselben Sitzung radikal ausgeräumt werden muß, insbesondere die den oberen Tränensackpol normalerweise überlagernden Aggerzellen, und daß bei gleichzeitig bestehender Stirnhöhleneiterung die Mündung dieser Höhle vollständig freigelegt zu werden hat.

**Eigenes Verfahren.** Der Eingriff wird in halbsitzender, halblierender Stellung des Kranken auf dem Operationstische ausgeführt, nie soll der Kranke auf einem Sessel sitzend operiert werden. 1 Tag Spitalsaufenthalt genügt.

Die für den Eingriff am Tränensack selbst verwendeten Instrumente sind die folgenden (Tafel I und II, 1—13):

1. Meine erst jüngst neu angefertigten Nasenspecula für transseptale Operationen, und zwar eines für die rechte und eines für die linke Nase (1);
2. eine Nasenpinzette (2);

Meller, Augenärztl. Eingriffe, 4. Aufl.






Abb. 23. Unrisszeichnung der verschiedenen Aufblickmöglichkeiten auf die Tränensackgegend.

*r. lat. N.* rechte laterale Nasenwand;  
*l. lat. N.* linke laterale Nasenwand;  
*S. m. d.* Sinus maxill. dexter; *C. n. d.* Cavum nasi dextrum; *T* Tränensack (*T. S.*); *A* Rand der knöchernen Apertur; *S* Septum nasi; *1* permaxillarer Aufblick auf den *T. S.*; *2* Aufblick auf den *T. S.* vom Vestibulum derselben Seite *ohne* Voroperation; *3* Aufblick auf den *T. S.* vom Vestibulum derselben Seite nach Operation des vorderen Septumabschnittes; *4* Aufblick auf den *T. S.* durch eine temporäre Septumöffnung vom Vestibulum der anderen Seite; *S<sub>1</sub>* die punktierte Linie zeigt die Verdrängungsmöglichkeit des vorderen Septumabschnittes nach der Septumoperation.



Tafel II.




9

11b


11a



10



12



13

3. mein Tränensackmesser (3);
4. das Raspatorium-Elevatorium nach FREER (4);
5. die Faßpinzette nach WEST (5);
6. der Siebbeinhaken nach HAJEK (6a) mit Griff nach HAJEK (6b);
7. ein flacher (7a), und einer am Ende leicht nach der konkaven Fläche gebogener, gerade geschliffener Hohlmeißel (7b), beide in den HAJEKschen Griff (6a) einzuspannen;




Abb. 24. Der Eingriff am Septum.  
*M. r.* Schleimhaut der rechten Septumseite; 1 primärer Septumschnitt, am Schluß der Operation vernäht mit 2 Seidennähten *a, b*; 2 oberer Drainageschnitt; 3 Schnitt durch die Schleimhaut der anderen Seite als zweite Drainage nicht vernäht; *K.* Knorpel von zirka 4 mm Breite zwischen Schnitt 1 und 3.

Dieser primäre Schnitt soll ganz nahe dem Limen nasi gemacht werden, soll sehr lang und nur wenig nach hinten ausgebogen sein. Schleimhaut und Perichondrium werden nunmehr vom darunterliegenden Knorpel abgelöst, dieser zirka 4—5 mm hinter der Stelle des primären Schleimhautschnittes und parallel mit diesem durchschnitten und dann die Schleimhaut der anderen Septumseite vom Knorpel abgelöst. Der entblößte Knorpel wird dann soweit nach oben reseziert, bis der Agger nasi und die darüber befindliche Partie der lateralen Nasenwand, i. e. der Anfangsteil der Fissura olfactoria, gut zu sehen ist. Eine etwa bestehende Septumdeformität wird natürlich unter einem korrigiert. Jetzt wird an derselben Stelle, an der der Knorpel durchschnitten wurde, auch die Schleimhaut der anderen Seite vom Nasendach bis zum Nasenboden, also der ganzen Länge nach durchschnitten. Durch das so entstandene Loch im Septum kann dann das Nasenspeculum durchgeführt und die Tränensackgegend ausgezeichnet, unter einem fast senkrechten Winkel zur Ansicht gebracht werden.

Nunmehr kann zu dem eigentlichen *Eingriffe am Tränensacke* geschritten werden.

8. selten ein Meißel nach WEST (8);
9. meine Septumzange oder die nach BRÜNINGS (9);
10. die konische und die geknöpfte Sonde nach BOWMAN;
11. das Spitzbistouri nach HALLE zum Spalten der medialen Tränensackwand (10);
12. meine Siebbeinstanzen, die zartere (*a*) und die massivere (*b*) (11);
13. ein gerades und ein am Ende nach oben gebogenes kleines Conchotom nach GRÜNWARD (12);
14. eine Nasenschere (13).

Vor dem Eingriffe am Tränensacke selbst hat die

#### *Anlage einer temporären Öffnung im Septum nasi*

vorgenommen zu werden.

**Örtliche Betäubung.** Wie bei der gewöhnlichen submukösen Septumresektion.

Der erste Schnitt am Septum wird *immer* auf der Nasenseite geführt, die dem zu operierenden Tränensack abgewendet ist (Abb. 24).

**Örtliche Betäubung.** Diese hat sowohl von der Nase als auch von außen her durch Einspritzungen vorgenommen zu werden. Durch einen entsprechenden Adrenalinzusatz zur Lösung wird für eine ausreichende Blutleere Sorge getragen.

*Vorgehen bei der örtlichen Betäubung von der Nase aus.* Nach dem Abdrängen der mittleren Muschel von der lateralen Nasenwand wird der mittlere Nasengang und die davor gelegene Partie der lateralen Nasenwand bis zum Rande der Apertur mit einem Cocain-Adrenalin-Gemisch (1 Teil 10%iges Cocain und 2 Teile Adrenalin) sorgfältig gepinselt, ein Wattebausch, mit dieser Mischung getränkt, in den mittleren Nasengang gelegt und danach eine 2%ige Novocain-Adrenalin-Lösung ungefähr derselben Zusammensetzung, wie sie zur Septumanästhesie verwendet wird, an 2 Stellen submukös injiziert, und zwar die 1. Injektion zirka 1 cm vor der Insertion der mittleren Muschel (Agger nasi), die 2. 1 cm vor der Umbiegungsstelle des vorderen Randes dieser Muschel in den unteren Rand, also knapp oberhalb der unteren Muschel (Abb. 25).

*Vorgehen bei der örtlichen Betäubung von der Haut aus.* Die 1. Injektion wird subperiostal, unterhalb der Crista lacrymalis anterior, gemacht, sodann wird die Nadel unterhalb des angespannten Canaliculus inferior eingestochen und zwischen Sack und knöcherner Fossa bis zum Ductus nasolacrymalis vorsichtig vorgeschoben, wobei ein Anstechen des Sackes nicht immer zu vermeiden ist. Die 3. und letzte Injektion wird oberhalb des oberen Canaliculus bis in die Nähe des oberen Tränensackpoles gemacht.

Durch diese Einspritzungen wird das ganze Gebiet nicht nur vollständig unempfindlich, sondern auch hinreichend blutleer gemacht, um den Eingriff ohne Störung durchführen zu können.

Die *allgemeine Betäubung* ist wegen der Behinderung des Operateurs einerseits, hauptsächlich aber wegen der fehlenden Blutleere im Eingriffsgebiete, die naturgemäß die Orientierung stark beeinträchtigt und dadurch nicht nur den Erfolg der Operation gänzlich in Frage stellen, sondern auch sonst noch verschiedene Gefahren heraufbeschwören kann, absolut zu widerraten.

### Der Eingriff.

#### 1. Auffindung der medialen Sackwand.

Der 1. Schnitt beginnt ein gutes Stück oberhalb des Agger nasi, verläuft fast horizontal nach vorne und 1 cm vor dem vorderen Rand der mittleren




Abb. 25. Schnittführung zur Tränensackoperation und Topographie des Operationsfeldes. N. Nasenbein; L. c. Lamina cribrosa; St. Stirnhöhle; B. Boden der Stirnhöhle von a—b sich erstreckend; m. M. mittlere Muschel; u. M. untere Muschel; m. N. mittlerer Nasengang; 2 u. 3 Novocaininjektionsstellen; 1-2-3 Schleimhautbogenschritt; 4-1 kleiner Schnitt vom mittleren Nasengang nach oben in den primären Schnitt mündend. Die punktierte Linie zeigt die ungefähre Ausdehnung des Operationsfeldes und seine topische Beziehung zum Boden der Stirnhöhle und zur Lamina cribrosa.




Abb. 26. Lappenablösung.  
K. Knocheninnenfläche des proc. nasofrontalis; L. Schleimhautperiostlappen.

uncinatus ab, so daß dessen vordere Fläche schleimhautentblößt ist. Man sieht jetzt an der ganzen schleimhautentblößten Stelle der lateralen Nasen-




Abb. 27. Tränensacklokalisierung.  
S. H. Siebbeinbaken in der Fossa lacrymalis (genaue Lokalisation des T. S.).

fast sehnig-weiß erscheinenden Tränensack (Abb. 28), insbesondere wenn man die Fingerkuppe von außen auf die Tränensackgegend legt und auf diese


Muschel unter einem scharfen Bogen nach abwärts bis zur unteren Muschel und endigt daselbst. Ein 2. kleiner Schnitt führt vom Ansatz der mittleren Muschel senkrecht nach oben und mündet in den vorigen Schnitt. Die so umschnittenene, vor und ober der Insertion der mittleren Muschel gelegene Partie der Schleimhaut wird nun von vorne nach hinten bis etwa zum Eingang in den mittleren Nasengang und von oben nach unten abgelöst, sodann mit der Westschen Faßpinzette breit gefaßt und langsam mit ziemlicher Kraft heruntergezogen, so daß der Lappen über die untere Muschel herunterhängt (Abb. 26). Wenn er auch ursprünglich von vorne nach hinten nur bis zur oben bezeichneten Stelle abgelöst wurde und daselbst, an der Grenze zwischen hinterem Rande des Processus nasofrontalis und vorderem Rande des Tränenbeines, leicht adhären ist, so reißt er beim Herunterziehen dennoch gewöhnlich viel weiter hinten am First des Processus

nasofrontalis und dahinter die meist rötlichblau aussehende Innenfläche des zarten Tränenbeines. Wenn man nun mit dem HAJEK'Schen Haken von vorne angefangen über die Innenfläche des ersteren Knochens mit einem seitwärts ausgeübten Druck langsam nach hinten tastet, fällt die Spitze des Hakens an der Grenze zwischen Processus nasofrontalis und Tränenbein hinein; es ist die Stelle, wo der Tränensack liegt (Abb. 27). Jetzt wird das Knochenloch ausgemeißelt, am besten so, daß der Processus nasofrontalis von unten angefangen entlang der Linie des 1. Schleimhautschnittes bis ober den Ansatz der mittleren Muschel hinauf durchgemeißelt und als ganzes Stück herausgehoben und entfernt wird. Nicht empfehlenswert ist es, den Knochen des Processus nasofrontalis in Lamellen oder kleineren Stücken auszumeißeln. Man sieht nun den


drückt. Dabei wird man auch immer einen dreieckigen Defekt in der *Crista lacrymalis anterior* tasten. Mit der Entfernung dieses Knochenstückes ist aber noch lange nicht alles getan. Der Sack ist auch noch nicht so mobil, weil er an seinem oberen Pole häufig noch von Aggerzellen überlagert und an seiner hinteren Peripherie vom Tränenbein bedeckt ist. Der *Processus uncinatus* und die den oberen Pol oft überlagernden Aggerzellen werden nun sorgfältig entfernt und das meist sehr dünne und dann für das Auge oft nur schwer sichtbare Tränenbein ebenfalls. Unter Umständen, aber selten, ist es notwendig, auch die *Bulla ethmoidalis* in die Operation einzubeziehen; jedenfalls gilt auch hier für den Rhinologen der Grundsatz, wenig eröffnete Siebbeinzellen immer ganz zu öffnen, da sie sonst zu eitern und üppige Granulationen zu bilden beginnen. Jetzt erst sieht man den Sack bis zu seiner oberen Kuppe hinauf ganz frei und bei Fingerdruck von außen gut und frei beweglich, ungleich besser als vorhin. Die komplette Freilegung des Sackes ist der heikelste und zugleich wichtigste Teil der Operation.

## 2. Ausschneidung der medialen Tränensackwand.

Nach vorheriger Einträufelung einer 1%igen Cocainlösung in den Bindehautsack wird nun zuerst die konische, dann die *BOWMANS*che Sonde durch den unteren oder oberen *Canaliculus* eingeführt, die mediale Wand des Sackes stark vorgestülpt, der Sack seiner ganzen Länge nach von oben bis unten mit dem *HALLE*schen Messer *vor* der Sondenvorwölbung gespalten (*Abb. 29*) und die so entstandenen 2 Wundlippen der medialen Sackwand radikal entfernt, die vordere mit meiner Siebbeinstanze, die hintere mit einem kleinen zarten *GRUENWALD*schen *Conchotom*. Nunmehr liegt die laterale Tränensackwand in ihrer ganzen Ausdehnung frei, und nahe dem oberen Pol sieht man die *Canaliculus*mündung frei nach allen Seiten (*Abb. 30*). Nirgends, mindestens 3 mm im Umkreis der *Canaliculus*mündung, darf ein Knochenrest oder ein Rest der medialen Tränensackwand zurückbleiben. Der ursprünglich gebildete, während der Operation über die untere Muschel hinunterhängende Schleimhautperiostlappen wird nun, damit er mit



*Abb. 28.* Ansicht des freigelegten Tränensackes.  
*T. S.* Tränensack im Knochenloch freiliegend.



*Abb. 29.* Eröffnung der medialen Tränensackwand.  
*lat. T. S. W.* laterale Tränensackwand nach Spaltung der medialen Tränensackwand sichtbar.

seinem oberen Rande der Canaliculismündung nicht zu nahe kommt, ein wenig gekürzt und reponiert (Abb. 31).




Abb. 30. Ansicht der lateralen Tränensackwand. C. Canaliculismündung; lat. T. S. W. laterale Tränensackwand, breit freiliegend nach Entfernung der medialen Tränensackwand.




Abb. 31. Ansicht des freibleibenden Teiles der lateralen Tränensackwand nach der Lappenreposition. lat. T. S. W. laterale Tränensackwand mit Canaliculismündung; L. Lappen reponiert.

### 3. Wundversorgung.

Die Tränensackwunde und das meist partiell, seltener total eröffnete vordere Siebbein werden nun locker tamponiert. Der Tampon wird durch die mittlere Muschel, oder wenn diese wegen ihrer Größe und der Gefahr des Zurückfederns reseziert werden mußte, durch die nachfolgende Septumtamponade in situ erhalten. Als Gaze verwende ich die vorzügliche Vioformgaze, die, zumindest innerhalb 2 Wochen, keinen üblen Geruch annimmt, also sich nicht zersetzt. Jodoformgaze ist zu vermeiden, da die Gefahr besteht, daß sie ein Jodoformekzem hervorruft, das zu früher und dann sich abträglich auswirkender Entfernung der Tamponade zwingt. Die Gaze soll auch gesäumt sein. Nach der Versorgung der Tränensackwunde wird das Septum nasi versorgt. Zuerst wird der sehr wichtige obere Drainageschnitt angelegt, und zwar in der Schleimhaut jener Nasenseite, die der Tränensackwunde abgekehrt ist, dann wird der primäre Schleimhautschnitt mit 2—3 Seidennähten genau vernäht, während der Schnitt in der dem Tränensack zugekehrten Septumschleimhaut als 2. Septumdrainage offen bleibt. Die Septumnähte sowie die Knorpelspange sichern uns vor einer bleibenden Septumperforation. Beide Septumseiten werden nun in der gewöhnlichen Weise tamponiert und ein kleiner Heftpflasterverband um den Naseneingang gelegt.

### 4. Die postoperative Reaktion.

Sie ist im Bereiche des inneren Augenwinkels meist äußerst geringfügig, oft kaum zu sehen, aber wohl nur dann, wenn der Eingriff genug zart und genau

gemacht wurde. Trotzdem sieht man manchmal, allerdings wohl selten, eine leichte Schwellung um den inneren Augenwinkel, gelegentlich auch mit Blutunterlaufung, harmlose Nebenerscheinungen, die auf kalte Umschläge in den ersten 24 Stunden und feuchtwarme in den nächsten 2 Tagen zurückgehen. Es bleibt nach dem Abklingen der Hautreaktion meist eine mehr minder große, umschriebene Vorwölbung der Haut im inneren Augenwinkel zurück, die wegen des Fehlens der knöchernen Unterlage durch das Aufquellen des Tränensacktampons bedingt ist und nach Entfernung desselben prompt verschwindet. Dieselbe Stelle bleibt auch durch einige Zeit leicht druckempfindlich.

### 5. Nachbehandlung.

Die Septumtamponade wird in der gewöhnlichen Weise nach einigen Tagen entfernt, die Tränensacktamponade aber erst nach 7—8 Tagen. Knapp vor der Entfernung des Tränensacktampons ist es vorteilhaft, vom Canaliculus aus den Sack reichlich mit einer  $\frac{1}{2}$ —1%igen Novocain- oder mit Kochsalzlösung durchzuspülen (nicht mit Paraffinum liquidum!), um den Tampon von der Unterlage besser zu lockern und dann leichter entfernen zu können. Gleich nach Entfernung der Tränensacktamponade wird die Wunde mit 5%igem Argent. nitr. vorsichtig tuschiert und, was wegen Verhinderung der Granulationsbildung sehr wichtig ist, das Vestibulum dieser Nasenseite durch 6—7 Tage mit einem kleinen Wattebausch verstopft getragen. In einer, längstens in  $1\frac{1}{2}$  Wochen vom Tage der Entfernung der Tränensacktamponade an, während welcher Zeit noch 2mal die Tränensackwunde mit 5%igem Argent. nitr. tuschiert wurde, ist keine weitere Nachbehandlung mehr nötig. Wenn sich auch oft 2—4 Wochen nach der Tamponentfernung einzelne zarte Krusten an der noch nicht völlig epithelisierten Wundstelle zeigen, so erfordert das keine unbedingte weitere Nachbehandlung mit Paraffinöltuschierungen oder Durchspülungen, sie gehen schließlich auch von selbst ab, wenn das betreffende Nasenloch ab und zu durch 1—2 Tage mit einem Wattebausch verstopft getragen wird, und bilden sich überhaupt nicht mehr, sobald die Epithelisierung abgeschlossen ist. Der Krustenabgang kann freilich in der ersten Zeit nach der Tamponentfernung durch Spülungen vom Canaliculus aus unterstützt werden, doch liegt, wie schon erwähnt, keine absolute Notwendigkeit hierfür vor. Ist die Nachbehandlung abgeschlossen, so sieht man in der Tränensackgegend eine von glattem Epithel überzogene, häufig mit kleinen Ausbuchtungen versehene Mulde, die hinten entweder von den nicht-eröffneten Siebbeinzellen begrenzt wird oder ohne Grenze in die dahinter befindlichen eröffneten Siebbeinzellen übergeht. An einer Stelle sieht man gewöhnlich die Canaliculismündung, eine kleine, fast sulzig aussehende Stelle mit einem Lichtreflex darauf, der sich beim Lidschlag bewegt. Ab und zu erscheint daselbst auch ein Tränentröpfchen oder beim Einträufeln von Fluorescein in den Bindehautsack ein Tröpfchen dieser farbigen Flüssigkeit.

### 6. Kontrolle.

Die Kontrolle wurde verschiedentlich durchgeführt. Die Besichtigung des Auges, der Vergleich mit dem anderen gesunden Auge, die subjektiven Angaben des Kranken, die Sondenuntersuchung, die Fluoresceinprobe und die Durchspülung wurden zur Überprüfung herangezogen. Wir konnten dabei sehr häufig

die bemerkenswerte Wahrnehmung machen, daß das in den Bindehautsack des operierten Auges eingeträufelte Fluorescein rascher verschwand als auf dem anderen, gesunden Auge. Die Dauer der Kontrolle betrug 10 Wochen bis zu mehreren Jahren.

### 7. Ergebnisse.

Der Erfolg des Eingriffes besteht in einem raschen Verschwinden aller Erscheinungen der Tränensackerkkrankung und einem ebenso raschen Keimfreiwerden des Bindehautsackes, wodurch jeder nachfolgende Eingriff am Auge früher ermöglicht und ebenso gefahrlos wird wie nach der Tränensackausschälung von außen. Der Hundertsatz der Heilungen, d. i. der restlosen und dauernden Wiederherstellung der Tränenabfuhr, betrug bei meinen bisher operierten, viele Monate und Jahre nachkontrollierten 210 Fällen 100%. Davon sind der weitaus größte Teil primäre Heilungen, ein kleiner Teil sekundäre Heilungen (1 Nachoperation) und 2 Fälle tertiäre Heilungen (2 Nachoperationen). Der Hundertsatz der Rückfälle nahm mit der Verbesserung der Technik und der Kenntnis ihrer Ursachen rasch ab und beträgt jetzt kaum 1% gegenüber 15—20% in der Zeit meiner ersten Eingriffe.

### 8. Fehler, Gefahren und Verwicklungen.

a) Möglichkeit des Abrutschens des Meißels vom Processus nasofrontalis. Eine der Gefahren besteht darin, daß beim Aufsetzen des Meißels auf den Knochen des Processus nasofrontalis unter einem allzu spitzen Winkel der Meißel beim Hämmern abrutschen und dann einen unvorhergesehenen Weg nehmen kann. Ich habe zwar bisher keine solche Komplikation erlebt, aber denkbar wäre sie immerhin. Aus diesem Grunde schon ist die transseptale Operation weniger gefährlich, eben weil unter einem fast senkrechten Winkel gemeißelt werden kann. Wenn man sich einerseits den anatomischen Aufbau des Nasendaches vergegenwärtigt, andererseits aber sich streng lateral von der mittleren Muschel hält, was gar keinen Schwierigkeiten begegnet, so kann beim Operieren vom Ansatz der mittleren Muschel angefangen bis nach oben zum Nasendach nichts Gefährliches passieren, weil dieses hier vom starken knöchernen Boden der Stirnhöhle gebildet wird, während die Lamina cribrosa viel weiter hinten beginnt und außerdem durch den obersten Anteil der mittleren Muschel vom Operationsfeld getrennt ist.

b) Verletzung der Orbitalwand mit Vorfall von Orbitalfett. Bei der Wegnahme des die hintere Peripherie des Sackes bedeckenden Teiles des Tränenbeines zu weit nach hinten über die Fossa lacrymalis hinaus oder aber bei zu tiefem Fassen des Processus uncinatus mit der Siebbeinstanze ist es möglich, nicht nur die Periorbita freizulegen, sondern sie auch zu verletzen und damit einen Vorfall des orbitalen Fettgewebes herbeizuführen. Insbesondere kann das trotz größter Vorsicht in jenen Fällen geschehen, bei denen nach einer fehlerhaft ausgeführten äußeren Tränensackexstirpation Epiphora weiterbesteht und auf Grund der positiven Canaliculusprobe die operative Freilegung der Canaliculismündung versucht wird. In diesen Fällen aber, wie überhaupt in allen Fällen, wo vorher schon operiert worden ist, stößt man bei der endonasalen Operation ab und zu auf narbige Verwachsungen von Tränensackresten mit der Periorbita oder dem Orbitalfett selbst. Ich habe einen kleinen Vorfall des orbitalen Fettgewebes 3mal bei solchen Anlässen und in früheren Jahren hier und da bei der einfachen

Entfernung des Processus uncinatus, wenn dieser mit der Stanze zu nahe seiner Basis gefaßt wurde, beobachten können, aber keinerlei weitere üble Folgen davon gesehen, wenn gut tamponiert und dem Patienten das Ausblasen und Ausschrauben der Nase eine Zeitlang streng untersagt wurde.

c) Synechiebildung zwischen dem unteren Teil der mittleren Muschel und der lateralen Nasenwand. Eine andere, mehr unwesentliche Komplikation ist die Synechiebildung zwischen dem unteren Teil der mittleren Muschel und der lateralen Nasenwand, wenn die mittlere Muschel etwa zu groß oder bei normaler Größe die Nase zu eng ist und sowohl ihre laterale Oberfläche als auch der Schleimhautperiostlappen mehr minder geschädigt wurde. Dieser Komplikation kann leicht dadurch begegnet werden, daß man den ursprünglich gebildeten Schleimhautperiostlappen zart behandelt, nicht zerfetzt und nicht etwa in Teilen, sondern in einem Stück von den Knochen der lateralen Nasenwand abzieht und während des Eingriffes ganz aus dem Bereich des Eingriffsfeldes bringt. Übrigens genügt auch die nachfolgende Tränensacktamponade, besonders wenn der Tampon tiefer herunterreicht, um ein Zurückfedern und eine Synechiebildung der mittleren Muschel mit der lateralen Nasenwand hintanzuhalten. Wenn aber das vordere Ende der mittleren Muschel stark vergrößert ist, so muß es, um den Eingriff am Tränensack nicht zu erschweren, gleich zu Anfang abgetragen werden.

d) Bleibende Perforation des Septum. Eine andere Komplikation, ebenfalls von geringer Bedeutung, die bei einiger Vorsicht leicht vermieden werden kann, ist die bleibende Perforation des Septum nasi.

e) Eiterung der vorderen Siebbeinzellen, verursacht durch Infektion unvollkommen eröffneter Zellen. Eiterung der vordersten obersten Siebbeinzellen mit leichten Kopfschmerzen kann auftreten, wenn diese Zellen verletzt und dann nicht genügend geöffnet worden waren; die nachträgliche gründliche Ausräumung derselben bringt rasche Heilung.

f) Äußere Verwicklungen. α) Stichabsceß in der Haut über dem Nasenbein infolge der Einspritzung kam nur 1mal vor und heilte nach kleinem Einschnitt rasch ab.

β) Bei Verwendung von Paraffinum liquidum zum Durchspülen durch den Canaliculus kann die Lösung unter die Haut des Lides eindringen und lang dauernde Schwellung und Rötung des Lides verursachen, ja selbst einen Paraffintumor hervorrufen. Daher ist von der Verwendung des Paraffins abzuraten, sondern nur Kochsalzlösung oder eine schwache Novocainlösung zu gebrauchen.

γ) Das Durchtreten von Luft beim Schneuzen durch die Canaliculi nach außen kann eintreten, wenn die Tränenröhrchen früher einmal geschlitzt worden waren. Die Erscheinung verschwindet mit der Zeit von selbst, belästigt nicht und zieht keine üblen Folgen nach sich.

Es sei noch besonders hervorgehoben, daß äußerlich eine Entstellung des Gesichtes nie zu sehen war, etwa eine Einziehung der Haut um die Tränensackegend durch Vernarbung od. dgl.

### 9. Ursache von Rückfällen.

a) Das Knochenloch im Processus nasofrontalis wurde vorne, vorne oben, aber besonders nach oben hin nicht groß genug angelegt. Der obere Pol des

Sackes blieb manchmal von einem Knochenrest überlagert, der untere Rand dieses Knochenstückchens kam zu nahe der Canaliculumündung zu liegen, es bildeten sich an ihm üppige Granulationen, die die Mündung des Canaliculus entweder unmittelbar verlegten oder durch Verklebung und schließlich Verwachsung mit schadhafte Stellen der Schleimhaut der lateralen Tränensackwand langsam zum Verschuß der Canaliculumündung führten.

b) Das die hintere Peripherie des Sackes bedeckende, oft nur schwer sichtbare Tränenbein ist nicht entfernt worden.

c) Nicht genügend radikale Entfernung der medialen Tränensackwand, besonders in der Nähe der Canaliculumündung.

d) Nicht genügend radikale Ausräumung weit vorgelagerter, besonders aber den oberen Pol des Tränensackes überlagernder oder diesem nahegelegener Siebeinzellen.

e) Als seltene Ursache ist zu erwähnen das Einheilen eines Tamponfadens in eine offenbar geschädigte kleine Stelle der lateralen Tränensackwand, der zur Bildung eines die Canaliculumündung verlegenden, zirka hanfkorngroßen Granulationspfropfens Veranlassung gibt. Die Entfernung des Fadens und die Wegnahme des Granulationspfropfens führt sofortige und dauernde Heilung herbei; daher ist nur gesäumte Gaze zur Tamponade zu verwenden.

f) Die Verklebung und Verwachsung der lädierten lateralen Oberfläche der mittleren Muschel mit lädierten Stellen der lateralen Tränensackwand. Daher ist darauf zu achten, bei der Spaltung und nachher bei der Entfernung der medialen Tränensackwand die laterale nicht oder so wenig als möglich zu verletzen, oder aber man reseziere einen Teil der gegenüberliegenden mittleren Muschel.

Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß dann kein Rezidiv zu erwarten ist, wenn nach Entfernung der medialen Tränensackwand die aus der Canaliculumündung herausragende Sonde nach allen Seiten frei beweglich ist, besonders aber nach oben nirgends mehr auf knöchernen Widerstand oder auf Reste der medialen Tränensackwand stößt und die Canaliculumündung im ganzen Umkreise von jedem Knochen- oder Schleimhautrand mindestens 3 mm weit entfernt ist.

#### *10. Beseitigung der Rückfälle.*

Die Beseitigung des Rezidivs richtet sich nun ganz nach der Ursache, und diese läßt sich in fast allen Fällen am besten durch eine von außen durch den Canaliculus eingeführte, vor- und rückwärts bewegte Knopfsonde feststellen. Am häufigsten wohl sieht man eine feste Narbenmembran, die durch den Sondenknopf bewegt werden kann. Wenn man nun gerade auf die Stelle der stärksten Bewegung einschneidet und die narbigen Wundlippen exakt und radikal entfernt, erzielt man völlige Heilung. Der sekundäre Eingriff zur Beseitigung des Rezidivs kann dann auch vom Vestibulum derselben Nasenseite aus erfolgen, erfordert meist keine Tamponade der ohnehin kleinen Wunde und nur eine kurz dauernde ambulatorische Nachbehandlung. Die Rezidive treten durchschnittlich in 6—8 Wochen auf, doch haben wir mit Rücksicht auf die Möglichkeit auch später auftretender Rezidive die Dauer der Kontrolle auf 10 Wochen bis zu mehreren Jahren ausgedehnt.

### **Allgemeine Bemerkungen über die Tränensackausschälung, die äußere und die endonasale Dakryocystorhinostomie.**

Die **Tränensackausschälung** ist ein Eingriff, der ausschließlich in das Gebiet der augenärztlichen Kunst gehört. Sie ist ein technisch schwieriger Eingriff, der zur tadellosen Ausführung genaue Kenntnisse und große Erfahrung verlangt. Jeder Fall bietet auch dem Erfahrenen eigene Schwierigkeiten. Diese sind gegeben durch die verschiedene Lage und Form der Crista, durch die verschiedene Form und Tiefe der Tränensackgrube, durch die wechselnde Dicke der oberflächlichen und tiefen Fascie, durch die verschiedene Dicke der Wand des Sackes, ferner durch so manche Nebenumstände, wie unerwartete Blutungen u. dgl. Der Eingriff erfordert auch vom Erfahrenen vollste Aufmerksamkeit und Momente sicherer Entscheidung, und hin und wieder, freilich nur ganz ausnahmsweise, kann es auch dem Geübtesten geschehen, daß er den Sack verletzt oder ihn nur in einzelnen Stücken herausbefördert. Aber der Eingriff hat den Vorteil, sich in örtlicher Betäubung bei voller Schmerzlosigkeit in kurzer Zeit durchführen zu lassen. Vom Einschnitt in die Haut bis zum Abtrennen des Sackes von dem Gange sind kaum 10 Minuten erforderlich, nicht selten noch weniger. Die Heilung ist in wenigen Tagen vollendet, die Narbe nach kurzer Zeit nicht sichtbar. Das Tränenträufeln, das begreiflicherweise in der ersten Zeit nach der Ausschälung stark war, verschwindet in den meisten Fällen innerhalb weniger Monate vollständig oder zeigt sich in durchaus mäßigem Grade nur bei Kälte und Wind im Freien.

Was als Nachteil der Ausschälung berichtet worden ist, kommt ausschließlich unzulänglicher Technik zu. Wer zu einer Ausschälung einen langen Einschnitt braucht, durch kaum zu beherrschende Blutung das ganze Gebiet beständig überschwemmt hat, wer von der großen Schmerzhaftigkeit und der langen Dauer des Eingriffes spricht, die Narkose erfordere, wer einen Drain braucht, um die Wunde durch Granulationen heilen lassen zu können oder über tief eingezogene Narben berichtet, die die Lider verziehen, der täte gut, zuerst zu lernen, wie der Eingriff gemacht wird, bevor er seine „Erfahrungen“ darüber der Allgemeinheit mitteilt.

Die **äußere Dakryocystorhinostomie** (Verfahren nach TOTI), ist ein Eingriff, der in seinen wichtigsten, für den tadellosen Erfolg ausschlaggebenden Teilabschnitten nicht mehr in den Bereich unserer Kunst, sondern in den der Rhinologie fällt. Unbedingte Voraussetzung für gute Erfolge sind daher nicht nur rhinologische Kenntnisse, sondern auch und insbesondere Beherrschung der operativen rhinologischen Technik. Die örtliche Betäubung der Nasenschleimhaut, das gelegentlich notwendige Abtragen des vorderen Endes der mittleren Muschel, die Eröffnung und saubere Entfernung von Siebbeinzellen sind Eingriffe, die dem Augenarzt nicht mehr zukommen. Dieser muß sich entweder vorerst, bevor er an einen solchen Eingriff geht, darin ausbilden oder muß zu dem Eingriffe selbst einen chirurgisch ausgebildeten Rhinologen beiziehen. Namentlich gehört die Nachbehandlung dem Nasenarzt zu, wenn die Heilung nicht glatt verläuft. Das alles fällt für den allgemein praktisch tätigen, alleinstehenden Augenarzt schon schwer ins Gewicht.

Die **TOTISCHE Dakryocystorhinostomie** ist ein viel größerer Eingriff als die Ausschälung des Sackes. Es muß eine große Bresche in den Knochen mit

Hammer, Meißel und Knochenzange gesetzt werden, sie dauert mindestens  $1\frac{1}{2}$  Stunde, meist aber 1— $1\frac{1}{2}$  Stunden, die örtliche Betäubung ist durchaus nicht immer tadellos, ja es kann geradezu allgemeine Betäubung notwendig werden. Infolgedessen kommt sie für eine Reihe von Kranken, namentlich für alte Leute, nicht in Betracht. Die Technik des Eingriffes ist noch schwieriger als die der Ausschälung des Sackes, insbesondere die Nähte der Schleimhautwundränder — und nur diese allein bringen die Gewähr, daß sich die Öffnung nicht wieder durch Narben verschließt — erfordern viel Zeit und große Übung. Mit der Möglichkeit von bösen Folgen (Eiterung, Erysipel) muß gerechnet werden, wenn sie auch nur Ausnahmefälle betreffen. Ganz besonders peinlich für den Arzt und Kranken wird die Lage, wenn nach Ausführung des so großen Eingriffes die versprochene ideale Heilung nicht eingetreten ist, vielleicht der Sack wieder absondert und nun unter schwierigsten Verhältnissen versucht werden muß, die Sackreste von außen in mühsamer Arbeit aufzufinden und auszuschälen.

Die Angaben der verschiedenen Wundärzte über den Hundertsatz an Idealheilungen haben keinen Wert. Sicher ist, daß der einzelne, der Gelegenheit hatte, an vielen Kranken die Technik des Eingriffes voll beherrschen zu lernen, was natürlich nur in großen Anstalten möglich ist, selbst über 90% an Dauerheilungen zu erreichen vermag.

Die **endonasale Dakryocystorhinostomie** endlich ist ein Eingriff, der gar nicht mehr in den Bereich der augenärztlichen Kunst fällt. Sie ist eine rein rhinologische Angelegenheit. Sie setzt nicht nur vollkommenste Beherrschung rhinologischer operativer Technik voraus, sondern verlangt geradezu ein ganz spezielles Einarbeiten in die Einzelheiten dieser Aufgabe. Auch der beste rhinologische Operateur muß sich erst all die vielen, für das Gelingen unentbehrlichen Einzelheiten zu eigen machen, wenn er gute Erfolge erzielen will. Dann aber sind sie, — wie ich aus meiner Klinik, wo KOFLER sich der Sache gewidmet hat, bestätigen kann — wirklich ausgezeichnet, d. h. es wird Dauerheilung mit freiem Tränenabfluß in allen Fällen erzielt, freilich manchmal erst nach einem 2. oder 3. Eingriff. Andererseits ist aber zu solchen Erfolgen auch der Augenarzt unentbehrlich. Denn er hat die Anzeige zum Eingriffe zu stellen, hat alle notwendigen Einzelheiten (z. B. Durchgängigkeit der Tränenröhrchen u. a.) zu überprüfen und bei der Nachbehandlung (Durchspülen) mitzuwirken. Nur engste Zusammenarbeit zwischen Augen- und Nasenarzt verbürgt den Erfolg.

Auch das endonasale Vorgehen ist ein viel größerer Eingriff als die Tränensackausschälung, auch sie dauert meist  $1\frac{1}{2}$  Stunden und stellt an den Kranken viel größere Anforderungen, so daß er für manche Kranken schon von vornherein nicht in Betracht kommt, ganz abgesehen von den durch örtliche Verhältnisse in der Nase abzulehnenden Fällen.

Es ist gewiß zuzugeben, daß die Dakryocystorhinostomie, die äußere sowohl wie die innere, geeignet sind, die besten Ergebnisse zu bringen, indem sie die Erscheinungen der Tränensackerkrankung beseitigen und eine tadellose Abfuhr der Tränen ermöglichen, somit das Tränenträufeln verhindern. Andererseits darf auch nicht übersehen werden, daß ihre Anzeigen beschränkter sind als für die Ausschälung und daß sie nur an größeren Anstalten mit Vorteil gepflegt werden können.

Für den praktisch tätigen Augenarzt ist auch heute noch die Tränensackausschälung allein zu empfehlen. Es ist ihm möglich, sich in seinen klinischen Studienjahren die Technik dieses Eingriffes in genügendem Maße anzueignen, um ihn mit Erfolg durchführen zu können. Die Ausschälung kann bei Kranken jeglichen Alters, auch bei alten, gebrechlichen Leuten (z. B. vor Starausziehung) gemacht werden. Nachträgliche Beschwerden über bleibendes und störendes Tränenträufeln gehören zur Ausnahme, wie immer wieder betont werden muß, nicht zur Regel.

### Ausschneidung der unteren Tränendrüse.

Die untere Tränendrüse ist der im oberen Lid gelegene Teil der Tränendrüse, der die Ausführungsgänge der orbitalen Drüse umgibt und sie bis zu ihrer Mündung in der oberen Übergangsfalte begleitet. Nasalwärts finden sich Ausführungsgänge nicht jenseits des äußeren Viertels des Lides. Der unterste Ausführungsgang liegt in der Höhe des äußeren Lidbändchens, manchmal auch etwas tiefer. Bei vielen Leuten kann die untere Tränendrüse am äußeren Ende des oberen Lides gesehen werden, wenn dieses etwas aufgehoben oder umgedreht wird, während der Untersuchte nach unten und einwärts blickt. Manchmal wölbt sie sich in Form einer kleinen lappigen Geschwulst vor.

**Anzeigen** für die Ausschneidung der unteren Tränendrüse. Der Eingriff ist angezeigt: 1. bei Tränenträufeln, wenn es nicht durch eine Tränensack-erkrankung bedingt ist und trotz Berücksichtigung aller möglichen Ursachen auf keine andere Weise beseitigt werden kann; 2. bei Tränenträufeln im Gefolge von Tränensack-erkrankungen, a) wenn trotz vollständiger Erweiterung des Tränen-Nasenganges durch Sondierung das Tränenträufeln weiter besteht, b) *nach* Tränensackausschälung, wenn das Tränenträufeln auch noch längere Zeit nachher nicht verschwunden ist, c) gleichzeitig mit der Tränensackausschälung, wenn das Tränenträufeln Hauptsymptom der Tränensack-erkrankung war, um die lästige Erscheinung mit Sicherheit zu beeinflussen, oder wenn die Tränensackausschälung an Kranken vorgenommen wurde, die von weit her gekommen sind und sich ein zweites Mal nur schwer einfinden könnten.

**Verfahren von DE WECKER.** Das obere Lid wird in der gewöhnlichen Weise mit dem Finger umgedreht, eine offene Schieberpinzette an der Grenze des äußeren und mittleren Drittels so angelegt, daß der eine Arm unter das Lid in die Übergangsfalte geschoben wird, der andere vorne auf den Lidknorpel zu liegen kommt, darauf die Pinzette geschlossen und das Lid ein zweites Mal umgedreht, indem die Pinzette nach oben umgelegt wird.

Wurde der Bindehautsack vorher gründlich cocainisiert, so schmerzt die doppelte Umdrehung des Lides nicht wesentlich. Zur örtlichen Betäubung wird  $\frac{1}{3}$  ccm einer 1%igen Cocainlösung unter die Bindehaut in das Gewebe zwischen Pinzettenspitze und äußeren Lidwinkel eingespritzt.

Die Drüse soll in *einem* Stück und nicht in Form einzelner Lappchen herausgenommen werden.

**Bindehautschnitt.** Die Bindehaut wird mit der kleinen gekrümmten Schere von der Spitze der Pinzette bis zum äußeren Lidwinkel in einer Länge von fast 1 cm ungefähr waagrecht eingeschnitten. Das durch die Einspritzung geschwollene Gewebe unter der Bindehaut wird durchtrennt und ebenso eine

Bindegewebsmembran, die die Tränendrüse einhüllt. Darauf erst wölben sich die Drüsenläppchen vor. Die untere Tränendrüse zeigt eine sehr verschieden starke Entwicklung. Manchmal sind die Läppchen sehr zahlreich und groß, manchmal sind ihrer nur wenige vorhanden und diese außerdem klein.

**Ausschälung der Drüse.** Sorgfältig wird die Bindehaut mit kleinen Scherenschlägen nach oben und unten, d. h. gegen den Lidknorpel und gegen die Bindehaut des Auges zu, abgelöst. Der Gehilfe hält die Bindehautwunde mit spitzen Doppelhäkchen auseinander (Abb. 32). Die Tränendrüse erscheint als ein kleiner Knoten in der Mitte der Wunde, wird mit der Pinzette gefaßt und mit der Schere von der orbitalen Tränendrüse abgeschnitten, wobei am nasalen Ende begonnen




Abb. 32. Ausschälung der Tränendrüse nach WECKER. Das obere Lid ist doppelt umgestülpt und wird durch eine im äußeren Drittel eingelegte Schieberpinzette von einem Gehilfen in dieser Stellung erhalten. Die Bindehaut (B) ist auf beiden Seiten von der Drüse abgelöst. Die Wunde wird mit Doppelhäkchen offen gehalten. In ihr liegt die Tränendrüse (Dr) als kleiner Knoten frei.

wird. Es sei besonders hervorgehoben, daß es nicht darauf ankommt, möglichst hoch in der Augenhöhle die Drüse abzuschneiden, sondern darauf, sie in ihrer ganzen Länge in der Richtung von außen nach innen auszuschälen, da nur so alle Ausführungsgänge der großen Drüse schließlich durchschnitten werden. Wieviel an Drüsengewebe abgetragen wird, ist gleichgültig, wenn nur in dem entfernten Drüsenteil alle Ausführungsgänge enthalten sind. Die weiße Membran, die nach der Ausschneidung im Grunde der Wunde bloßliegt, ist die Fascia tarsoorbitalis. Sie liegt vor der Drüse und steht daher der Ausschälung nicht im Wege. Ihre Verletzung könnte eine Ptosis zur Folge haben, da sie mit der Sehne des Lidhebers in Verbindung steht. Wurde aber die Pinzette an der Grenze des äußeren Drittels des Lides angelegt, so kann, selbst wenn eine Verletzung der Fascie durch zu tiefes Einschneiden zustande kommt, der Sehne des Muskels kein großer Schaden erwachsen.

Eine Verletzung der äußeren Haut oder des äußeren Geraden kann wohl nur bei ganz planlosem Vorgehen erfolgen. Die Blutung während des Eingriffes ist gering, stört aber trotzdem sehr; der zweite Gehilfe hat mit dem Tupfen vollauf zu tun. Eine Katgutnaht in der Richtung von oben nach unten durch die Ränder der Bindehautwunde genügt. Der Verband kann schon nach 24 Stunden entfernt werden.

**AXENFELDS Verfahren.** Anstatt das Lid doppelt umzustülpen, empfiehlt AXENFELD, das Gebiet in der Weise bloßzulegen, daß 2 stumpfe Doppelhaken außen an den Lidern angelegt werden (Abb. 33). Der untere wird unmittelbar unterhalb des äußeren Lidwinkels in den Rand des unteren Lides eingesetzt, der obere etwa  $\frac{1}{2}$  cm vom Lidwinkel entfernt in den Rand des oberen Lides. Die Haken werden dann stark auseinander und gleichzeitig nach außen und etwas nach hinten gezogen. Auf diese Weise wird die Kuppe der palpebralen Tränendrüse bloßgelegt und vorgedrängt. Das Verfahren ist gleich dem früher angegebenen: Längsschnitt durch die Bindehaut und Fascie, Freilegung der

Drüse zu beiden Seiten. Ist die Drüse in der Wunde sichtbar, so wird sie mit der Pinzette vorgezogen. Die Arme des AXENFELDSchen Péans werden möglichst tief entlang den beiden Seiten der Drüse eingeführt, das Instrument wird geschlossen und die Drüse unmittelbar davor mit der Schere abgetragen. Nähte brauchen nach AXENFELD nicht angelegt zu werden.

Das AXENFELDSche Verfahren hat den Vorteil, daß das etwas schmerzhaft doppelte Umstülpen des Lides entfällt, die freigelegte Oberfläche der Drüse unmittelbar vorliegt und keine unnatürliche Lage und Spannung der Gewebe hervorgerufen wird, wodurch Falten und Buchten vermieden werden, die am ehesten zu einer Verletzung der umgebenden Gewebe während des Eingriffes führen. Kleine, in der Wunde vorragende Drüsenläppchen oder Gewebsteilchen müssen sorgfältig entfernt werden, da sie durch Reizung der Bindehaut eine länger dauernde Entzündung erzeugen könnten.

**FRICKERS Verfahren.** FRICKER bedient sich eines Fadens, um die Drüse bloßzulegen. Nach Umstülpen des Lides wird mit einer mittelgroßen gebogenen Nadel ziemlich nahe der Mitte des Lides ein Faden durch den Lidknorpel geführt, der 2—3 mm von seinem freien Rande entfernt ist. Werden die beiden Enden des Fadens nach oben und einwärts gezogen, so wölbt sich die Tränenrüse deutlich vor.

**Ergebnisse** des Eingriffes. Nach Ausschneidung der Drüse ist das Auge gewöhnlich für mehrere Tage blutunterlaufen, da sich das ausgetretene Blut allmählich nach unten ausbreitet. Das obere Lid ist etwas geschwollen, aber die dadurch bedingte leichte Ptosis verschwindet bald. Das Endergebnis ist meist gut, doch wird gelegentlich das Tränenräufeln nur wenig vermindert. In solchen Fällen kann die Ausschälung der ganzen orbitalen Drüse wünschenswert erscheinen. Dies hat durch einen Einschnitt von der Haut aus vorgenommen zu werden.

Trockenheit der Bindehaut oder Hornhaut ist weder bei Entfernung der Lidrüse, noch der orbitalen Tränenrüse zu befürchten, da die Drüsen einer gesunden Bindehaut hinreichend absondern. Dagegen wird manchmal nach dem Eingriffe ein hartnäckiger und lang dauernder Katarrh der Bindehaut, der mit einer zähen schleimigen Absonderung einhergeht, beobachtet.

Von der Röntgenbestrahlung der Tränenrüse, die von verschiedenen Ärzten zur Beseitigung von Tränenräufeln empfohlen worden ist, habe ich nie einen Erfolg gesehen.




Abb. 33. Ausschälung der Tränenrüse nach AXENFELD. Die Lider werden durch zwei stumpfe Doppelhaken auseinandergehalten. Die Drüse (*Dr*) wird durch einen AXENFELDSchen Péan abgeklemmt. *B* Wundränder der Bindehaut.

### Drittes Kapitel.

## Krampfektropium. Altersektropium.

### Krampfektropium. (Ectropium spasticum.)

Der meist durch entzündliche Erkrankungen der Bindehaut oder Hornhaut hervorgerufene Lidkrampf führt bei jugendlichen Kranken zur Umkippung eines oder beider Lider nach außen. Der knorpelige Lidteil biegt in scharfem Winkel vom orbitalen Lidteil ab und die Bindehaut des Knorpels ist frei nach vorne gerichtet. Die damit gesetzten Kreislaufstörungen führen alsbald zu einem mächtigen Ödem der Lider und insbesondere der Bindehaut, so daß das klinische Bild recht auffallend wird: Die Lider sind durch quere, rote Wülste ersetzt, die sich von oben und unten so weit vorwölben, daß die Lidspalte durch sie ausgefüllt wird und vom Augapfel nichts zu sehen ist. Erst durch Einlegen von Lidlöffeln gelingt es, das Auge zu besichtigen. Es ist in den meisten Fällen nur oberflächlich erkrankt. (Skrofulöse Bindehautentzündung.)



Abb. 34. SNELLENSche Naht. Lage der Fäden. Ein je 3 mm langes Fadenstück liegt auf der Bindehaut entsprechend der stärksten Vorwölbung. Unter der Haut (gestrichelte Linie) gelangen die Fäden bis in die Gegend des unteren Augenhöhlenrandes.

Die Lider werden in ihre richtige Stellung zurückgeführt durch die SNELLENSche Naht (Abb. 34). Diese wird im oberen und unteren Lid in gleichartiger Weise angelegt. Das eine Ende des mit kräftigen langen flach gekrümmten Nadeln doppelt versehenen Fadens wird auf der Höhe der Vorwölbung an der Grenze

des inneren und mittleren Drittels durch die Bindehaut eingeführt und die Nadel unter der Haut bis jenseits vom Augenhöhlenrande geleitet und dort ausgestochen. 3 mm daneben wird mit dem zweiten Fadenende derselbe Vorgang eingehalten. Auf diese Weise kommt also eine Fadenschlinge auf die Kuppe der Bindehautvorwölbung zu liegen, während die beiden Fadenenden durch die Haut frei heraustreten. An der Grenze des mittleren und äußeren Drittels wird eine zweite Fadenschlinge in gleicher Weise angelegt. Die Schlingen liegen

demnach in der Bindehaut nahe dem gewölbten Knorpelrande (Abb. 35). Werden die beiden Enden jedes Fadens über einem kleinen Gazebäuschchen unter hinreichend starkem Anziehen geknüpft, so wird das Lid in die richtige Stellung zurückgeführt, indem der gewölbte Knorpelrand gegen den festen Punkt an der Ausstichstelle gezogen und der Knorpel dadurch zur Umdrehung gezwungen wird. Damit werden die Kreislaufstörungen ausgeschaltet und das Ödem verschwindet in kurzer Frist. Die Nähte bleiben mehrere Tage (zumindestens 3—4 Tage) liegen, können aber auch länger belassen werden. Jedenfalls soll bis zum Abklingen der Schwellung der Bindehaut gewartet werden, weil durch sie das Lid wiederum vom Auge abgedrängt werden würde. Die Zeit muß außerdem zur Behandlung der Augenkrankheit benützt werden, um durch die Beseitigung des Lidkrampfes eine Wiederkehr der Auswärtskehrung nach Entfernung der Naht hintanzuhalten. Da es sich fast immer um Kinder mit Conjunctivitis ekzematosa, katarrhalischer Sekretion der Bindehaut, Neigung zu Ekzem der Lidhaut u. dgl. handelt, wird auf einen Verband verzichtet, das Auge frei gelassen und nur die Bäuschchen werden mit einem schützenden Pflaster bedeckt.



Abb. 35. Senkrechter Durchschnitt durch das auswärtsgekehrte untere Lid mit eingelegter Naht.

### Altersektropium. (Ectropium senile.)

Das Ectropium senile des unteren Lides ist die Folge von Veränderungen sämtlicher Gewebe des Lides, die durch das Alter und durch lang dauernde Entzündungen der Bindehaut oder des Lidrandes entstanden sind. Die Bindehaut wurde durch chronische Entzündung verdickt, der Knorpel erweicht und in allen Ausmaßen vergrößert, die Haut infolge des Alters schlaff, der Lidrand verlängert und der in ihm lagernde Muskel geschwächt, so daß er nicht mehr imstande ist, das Lid an das Auge angedrückt zu erhalten. Das dadurch hervorgerufene Tränenträufeln trägt durch seinen schädlichen Einfluß auf die Haut des Lides und auch unmittelbar dadurch zum raschen Fortschreiten der Stellungsveränderung bei, daß der Kranke durch beständiges Wischen das Lid nach unten zieht. So sinkt dieses mehr und mehr vom Augapfel ab und zieht schließlich, nach unten hängend, in großem Bogen vom inneren zum äußeren Lidwinkel. Die SNELLENSche Naht kann daher bei diesem Zustande keinen dauernden Einfluß auf die Stellung des Lides nehmen. Nur eine ausgiebige Verkürzung vermag das Lid wieder entsprechend straff zu machen und an das Auge zurückzudrängen. Diese Erkenntnis ließ eines der ersten Verfahren entstehen: die Ausschneidung eines dreieckigen Stückes aus der ganzen Dicke des Lides. Die Basis dieses Dreieckes entsprach dem Lidrande und wurde in der Länge so bemessen, daß das Lid nach Vereinigung der Wunde durch mehrere Seidennähte auf die gewünschte Länge zurückgeführt wurde und dem Augapfel wieder gut anlag. Aber dieses einfache Verfahren hatte den großen Nachteil, daß oft ein Kolobom des Lides zurückblieb. Der Knorpel, der bei dieser

Krankheit fast immer weich und zerreilich ist, bietet fr die Nhte keinen gengenden Halt, so da sie zu schnell durchschneiden. Auerdem zerren die Fasern des Lidmuskels die Wundrnder auseinander und bringen sie zum Klaffen. So wurde bald davon Abstand genommen, da in vielen Fllen grere Kolobome der Lider, die nur sehr schwer zu beseitigen waren oder doch fast immer unschne Einkerbungen am Lidrande die Folge waren.

KUHNT empfahl zur Vermeidung dieses belstandes die intermarginale Spaltung des Lides in seiner Mitte und beschrnkte die Krzung auf den Bereich der hinteren Lidplatte, aus der allein das dreieckige Stck ausgeschnitten wurde. Die berschssige Hautfalte, die dabei als unschner Vorsprung am Lide brig blieb, suchte MLLER durch Verlngerung des intermarginalen Schnittes bis zum ueren Lidwinkel und durch schrge Vernhung der Haut mit dem freien Knorpelrande auszugleichen.

Auf der anderen Seite wurde von SZYMANOWSKI eine mittelbare Krzung des Hautteiles des Lides durch Ausschneiden eines dreieckigen Stckes der Haut aus der Gegend des ueren Lidwinkels versucht, wobei durch die Nhte das Lid nach auen gespannt und auch gehoben wurde. Da die schlaffe Haut aber wieder nachgibt, geht der anfnglich gute Erfolg des Eingriffes bald verloren.

Dagegen lt sich mit der gleichzeitigen Anwendung der beiden genannten Verfahren ein ausgezeichnetes Dauerergebnis erreichen. Das Verfahren setzt sich aus folgenden Teileingriffen zusammen:

#### **Spaltung des Lides im intermarginalen Saum.**

Darber seien zunchst einige allgemeine Bemerkungen vorausgeschickt. Das gesunde Lid zeigt an seinem freien Rande zwei Kanten, die hintere scharfe, dem Augapfel eng anliegende, wo die Bindehautflche des Lides und die Lidrandflche im rechten Winkel zusammenstoen, und die vordere abgerundete, wo die Lidrandflche in den Hautteil des Lides bergeht, mit dem Ursprunge der Lidhaare. Zwischen beiden Lidkanten breitet sich eine schmale Flche aus, in der eine feine Furche von grauer Farbe, der intermarginale Saum, parallel zum Lidrande, ziemlich knapp hinter der vorderen Lidkante verluft. Wird entlang dieser Linie die Schneide einer Lanze gefhrt, so dringt sie ohne wesentlichen Widerstand in das Lid ein und spaltet es in zwei Platten: in die vordere Lidplatte, bestehend aus der Haut und den Fasern des Lidmuskels (Haut-Muskelplatte), und in die hintere Lidplatte, bestehend aus dem Knorpel und der Bindehaut (Bindehaut-Knorpelplatte). In einer Reihe von Eingriffen hat das Lid im intermarginalen Saum gespalten zu werden. Es wird zu diesem Behufe vom Gehilfen ber eine in den Bindehautsack tiefeingefhrte Lidplatte angespannt, wobei durch einen entsprechenden Druck von vorne auf das Lid gegen die Platte das Lid festgehalten und der Lidrand etwas nach auwrts gekehrt wird, so da die Furche frei sichtbar wird. Zum Schnitte wird ein gewhnliches Lanzenmesser verwendet. Es wird ohne Druck mit seiner Spitze oder der seitlichen Schneide zunchst vorsichtig entlang dem Saum gefhrt, bis ein Klaffen der beiden Lidplatten entsprechend dem Schnitte das Eindringen an richtiger Stelle beweist. Die Verbindung der beiden Platten ist nur entlang dem freien Lidrande innig, im brigen locker; wenn einmal der richtige Weg gebahnt wurde, geht die Loslsung der beiden Platten voneinander leicht und schnell vonstatten.

Die erste Vorzeichnung des Schnittes mit der Lanze entlang dem Saum hat aber mit besonderer Vorsicht zu geschehen, um nicht durch ein Abweichen der Schneide von dieser Linie den freien Rand der vorderen oder hinteren Platte zu verletzen; denn dadurch würde die Gefahr einer dauernden Einkerbung oder Kolobombildung des Lides hervorgerufen werden.

**Örtliche Betäubung.** Um den reich mit sensiblen Nerven versehenen Lidrand unempfindlich zu machen, wird die 1%ige Cocainlösung zunächst unter die Haut des Lides eingespritzt. Von hier wird die Spitze der Nadel allmählich gegen den Lidrand vorgeschoben, bis sich unter dem Einflusse der in das hier starre Gewebe eindringenden Flüssigkeit der Lidrand weiß färbt. Durch Zusatz von 2 Teilstrichen ( $\frac{2}{10}$  ccm) Suprareninlösung (1 : 1000,0) zur Cocainlösung ( $\frac{8}{10}$  ccm) wird die Blutung sehr eingeschränkt, besonders wenn die Einspritzung nicht bloß, sondern auch in die intermarginale Gegend, sondern auch in den Knorpel selbst gemacht wird, was bei der beträchtlichen Verdickung und Weichheit seines Gewebes leicht gelingt.

Die hier beschriebene Art der Spaltung des Lides im intermarginalen Saume gestaltet sich bei dem Altersektropium infolge der Formveränderung des Lides etwas verschieden. Durch die Auswärtskehrung ist die hintere Lidkante völlig verschwunden und durch die Verdickung der Bindehaut und des Epithels bis zur Haargrenze die Linie des intermarginalen Saumes unkenntlich geworden; außerdem ist durch die Verlängerung der Gewebe ein Anspannen des Lides über

der Hornplatte nicht gut möglich. Es wird daher das verdickte Lid zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand gefaßt, wobei der Daumen auf der Hautseite, der Zeigefinger auf der Bindehaut liegt (Abb. 36). Dadurch wird das Lid festgehalten und durch den Druck genügend blutleer gemacht.

Anstatt ferner die Lanze in einem Zuge entlang dem intermarginalen Saume zu führen, was bei seiner Undeutlichkeit hier nicht getan werden kann, wird die Spitze der Lanze mit zur Lidfläche parallelen Fläche knapp hinter den Lidhaaren aufgesetzt und langsam in die Tiefe eingeführt, bis sie zu ihrer Basis eingedrungen ist und einen intermarginalen Schnitt von entsprechender Länge erzeugt hat. Indem dieser Vorgang noch an anderer Stelle wiederholt wird, kann der Lidrandschnitt beliebig verlängert werden. Wird dagegen versucht, den durch das erste Verschieben der Lanze zwischen die beiden Lidplatten erzeugten Schnitt seitlich in der Weise zu verlängern, daß die zwischen den beiden Lidplatten eingesenkte Lanze seitlich vorgeschoben wird, so gleitet sie




Abb. 36. Spaltung des Lides. Das Lid wird zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand gehalten. Die Lanze dringt mit ihrer Fläche parallel zur Fläche des Lides im intermarginalen Saume zunächst in der Mitte des Lides ein. Der Schnitt wird nach außen bis zum Lidwinkel fortgesetzt, wie die Linie andeutet.

häufig schräg von ihrer Richtung ab, entweder nach vorne in die Haut oder nach rückwärts in den freien Rand des Knorpels. Es ist daher die Ausführung des Schnittes durch wiederholtes Einsenken der Lanze vom Lidrande in die Tiefe das bessere Vorgehen. Die auf diese Weise erzeugten Teilschnitte im Bereiche des intermarginalen Saumes treffen zu einem langen Schnitte zusammen; einige zwischen ihnen übriggebliebene Fasern können leicht durchtrennt werden.

Bei dem zu beschreibenden Eingriffe ist ein intermarginaler Schnitt anzulegen, der etwas nach innen von der Mitte des Lides beginnt und sich bis zum äußeren Lidwinkel erstreckt.

Die Haut darf nicht verletzt werden, weil ein Kolobom die Folge wäre. Die Wurzeln der Lidhaare müssen geschont werden, weil diese sonst ausfallen. Ander-




Abb. 37. Zwei senkrecht gehaltene Pinzetten heben eine Falte (F) des Lidknorpels so auf, daß sie nach vorne vorspringt. So wird gemessen, wieviel vom Knorpel ausgeschnitten werden muß, damit er sich nach dem Verschuß der Wunde richtig an den Augapfel anlegt.

seits können Haarwurzeln, die infolge unrichtiger Schnittführung an der hinteren Lidplatte haften geblieben sind, später zu einer lästigen Trichiasis führen. Eine Verletzung des Knorpels hat weniger Bedeutung, namentlich wenn sie sich im Bereiche des auszuschneidenden Teiles ereignet; jenseits dieses Gebietes aber macht sie eine genaue Naht der Knorpelwunde unmöglich.

Die beiden Lidplatten werden bis zum unteren Rande des Knorpels voneinander freigemacht.

**Ausschneidung der Bindehaut-Knorpelplatte.** Die Länge des aus dem Lidknorpel auszuschneidenden dreieckigen Stückes hängt von dem Grade der Verlängerung des Lides ab. Wird zu wenig ausgeschnitten, so bleibt ein gewisser Grad von Auswärtskehrung zurück; wird zu

viel geopfert, so kann die Wunde durch Nähte nicht mehr geschlossen werden. Es ist daher in jedem Falle abzumessen, wieviel vom Knorpel ausgeschnitten zu werden hat, damit er sich nach Vernähung der Wunde innig an den Augapfel anlege.

Zu diesem Zwecke wird mit zwei anatomischen Pinzetten, die in lotrechter Richtung nahe dem Auge gehalten werden, eine Falte aus der Mitte des Knorpels aufgehoben (Abb. 37). Die Falte soll nach vorne vorspringen, damit sich der Knorpel hart an den Augapfel anlegen kann. Die Länge des auszuschneidenden Stückes schwankt von 5 bis über 10 mm. Das betreffende Stück wird genau aus der Mitte des Lides ausgeschnitten, indem mit einer kurzen geraden Schere zunächst von der medialen Seite her der Schnitt geführt und dann der laterale Schnitt hinzugefügt wird. Dieser kann entweder auch vom freien Lidrand gegen die Spitze des Dreieckes oder aber in umgekehrter Richtung von unten gegen den Lidrand zu gemacht werden. Die Ausschneidung beschränkt sich auf den Knorpel und die ihn bedeckende Bindehaut. Die Bindehaut darunter und die der Übergangsfalte wird davon nicht getroffen.

Die Blutung beim Durchschneiden des Knorpels ist bei richtiger Ausführung der vorher angegebenen Einspritzung gering. Ist sie ausnahmsweise stärker, so wird vorübergehend jeder Wundrand des Knorpels mit einer Schieberpinzette abgeklemmt.

**Ausschneidung der Haut.** Die Haut wird nach dem Vorschlage von SZYMANOWSKI der Gegend des äußeren Lidwinkels entnommen (Abb. 38). Der erste Schnitt wird vom Lidwinkel an nach außen und dabei nur wenig nach oben geleitet. Er soll so lang wie das aus dem Knorpel ausgeschnittene Stück oder etwas länger sein (*a b*). Der 2. Schnitt wird vom Lidwinkel an senkrecht auf diesen ersten geführt, d. h. also nach unten und etwas nach außen und ist gut 2mal so lang als der erste, so daß sein unteres Ende ungefähr senkrecht unter dem äußeren Ende des 1. Einschnittes liegt. Indem diese 2 Endpunkte beider Schnitte miteinander durch einen 3. Schnitt vereinigt werden, ist das gewünschte Hautstück umschrieben. Es wird ausgeschnitten. Die Haut des Lides wird darauf ausgiebig unterhöhlt, so daß sie frei beweglich nach außen gezogen werden und die Hautwunde bedecken kann. Die Wunden des Knorpels und der Haut werden durch Nähte verschlossen.

**Nähte durch den Knorpel.** Drei Seidennähte genügen zum Verschlusse der dreieckigen Knorpel-Bindehautwunde. Sie werden mit feinen, gekrümmten Nadeln angelegt. Da Seide dazu bevorzugt wird, haben die Knöpfe an die Bindehautseite des Lides verlegt zu werden, damit die Fäden nach vollendeter Heilung der Wunde herausgezogen werden können, denn über die vordere Seite des Knorpels wird die Haut zur Anheilung gebracht. Daraus ergibt sich die Richtung, in welcher die Nadel durch den Knorpel gestochen zu werden hat; wer doppelt armierte Fäden vorzieht, wird daher beide Nadeln in der Richtung von vorne nach hinten durchstechen; wer mit *einer* Nadel bewaffnete Fäden verwendet, wird auf der einen Seite die Nadel in der Richtung von der Bindehautseite zur vorderen Fläche des Knorpels, am anderen Wundrande die Nadel in entgegengesetzter Richtung von der vorderen Knorpelseite zur Bindehaut durchzustößen haben. Da der Knorpel bei dieser Erkrankung wenn auch dick, so doch weich und zerreißlich ist, soll die Nadel nicht zu knapp an dem Wundrande durchgeführt werden. Hat nämlich die Nadel oder der Faden einmal durchgeschnitten, so ist eine neuerliche Befestigung kaum mehr möglich. Die 1. Naht wird nahe der Spitze des Dreieckes angelegt und die Fadenenden werden nach oben gelegt, die 2. Naht in der Mitte des Knorpels und die Fadenenden waagrecht ausgebreitet, die 3. Naht, die für die genaue Wiederherstellung des Lidrandes von besonderer Bedeutung ist, hat nahe den freien Wunddecken des Knorpels angebracht zu werden und ihre Fadenenden werden nach unten geschlagen (Abb. 39). Dadurch, daß die Fäden, wie beschrieben, angeordnet werden, braucht beim




Abb. 38. Das abgemessene Stück des Lidknorpels ist bereits ausgeschnitten. Außen ist das Dreieck eingezeichnet, in dessen Bereiche die Haut entfernt wird.

Knüpfen nicht erst nach dem zugehörigen Ende gesucht zu werden. Man knüpft zuerst die an der Spitze des Dreieckes angelegte Naht. Die Wunde im Knorpel




Abb. 39. Das dreieckige Hautstück ist ausgeschnitten, die Haut des Lides losgelöst und nach unten geschlagen. Die drei Nähte durch den Lidknorpel liegen in der ihnen zukommenden Stellung. Die Lagerungsnaht (*a b*) des Lappens ist gleichfalls durchgezogen. Die Lidhaare sind an dem entsprechenden Teile ausgeschnitten.

etwas ungleicher Entfernung der beiden Stichöffnungen der letzten Naht vom Lidrande eintritt, so wird durch Abkappen der etwas vorspringenden einen Ecke mit einer feinen geraden Schere der Lidrand zu einer Geraden ausgeglichen.




Abb. 40. Nach dem Eingriffe. Das untere Lid liegt dem Auge tadellos an. Vier Nähte (*a, b, c, d, e*) genügen zum Verschlusse der Hautwunde. Über einer Perle wurde eine Naht (*f*) geknüpft, die den Knorpel mit der Haut vereinigt.

oberen Lides; ferner 2 Nähte bei *c* und *d*. Im Bereiche des Knorpels werden 1 oder 2 Nähte angelegt für den Fall, als die Haut des Lidrandes nicht von

wird dadurch sofort beträchtlich kleiner, die Wundränder nähern sich einander und schon beginnt sich der Knorpel nach einwärts zu stellen. Die Fäden haben beim Knüpfen steil nach oben gehalten zu werden, damit jeglicher Zug vermieden wird, durch den der Knorpel wieder vom Augapfel entfernt würde. Jedes Fadenpaar wird sofort nach dem Knüpfen abgeschnitten, da nach vollständigem Verschlusse der Wunde durch alle 3 Nähte, insbesondere die beiden tieferen ohne Abziehen des Lides vom Auge nicht mehr zugänglich sind. Dabei wäre aber ein Durchreißen der Nähte zu gewärtigen. Wegen der beträchtlichen Verdickung des Knorpels bei dieser Krankheit sind die beiden Wundränder ziemlich breit und legen sich gut aneinander, ohne daß sie durch den Gehilfen mit Pinzetten aneinandergehalten werden müßten. Sollten die beiden freien Ecken des Knorpels nicht in ganz gleicher Höhe zu liegen kommen, was bei

**Verschuß der Hautwunde.** Bevor die Lidhaut zur Deckung der Hautwunde hinübergezogen wird, hat in dem Gebiete des Lidrandes, das jenseits des äußeren Lidwinkels zu liegen kommt, ein schmales Streifchen mit den Lidhaaren ausgeschnitten zu werden. Die 1. Naht befestigt die Spitze des Lappens *a* in der Ecke *b* der Wunde. Die Naht wird unter genauer Anpassung der Wundränder sofort geknüpft. Die folgenden Nähte verstehen sich von selbst (Abb. 40). Eine Naht bei *e* vereinigt den oberen Rand des Lappens mit der Haut außerhalb des

selbst dem Knorpel tadellos anliegt. Insbesondere in den Fällen, wo die Haut etwas zu ausgiebig verkürzt wurde, kommt durch die Spannung der nach auswärts gezogenen Haut eine klaffende Spalte zwischen Knorpel und Haut zustande, die eine unmittelbare Verlötung beider unmöglich macht und zu einer Verunstaltung des freien Lidrandes führen würde. Dieser Übelstand wird durch eine Naht in der Weise behoben, daß beide Fadenenden in der Richtung von der Bindehaut zur Haut, ungefähr 1 mm unter dem Lidrande, in einer Entfernung von 2 mm voneinander durch den Knorpel und die Haut geführt und auf dieser über einem schmalen Gazebüschchen oder einer Glasperle geknüpft werden (*f*). Wenn wünschenswert, kann eine 2. Naht daneben angelegt werden.

Nach Vollendung des Eingriffes liegt das untere Lid in richtiger Länge enge dem Auge an und ist auch ein wenig gehoben.

**Verband.** Nach Einstreichen von Borsalbe in den Bindehautsack wird ein Verband angelegt, der auf den Hautlappen einen leichten Druck ausübt, um ihn mit dem unter ihm liegenden Gewebe in inniger Verbindung zu erhalten und Ansammlung von Blut oder Wundsekret zu verhindern. Wie bei allen den Lidrand betreffenden Nähten haben beide Augen zum Ausschluß von Lidbewegungen durch mehrere Tage unter Verband gehalten zu werden. Da außerdem bei Verschuß beider Augen durch ihre Aufwärtsrollung die Hornhaut hinter das obere Lid gelangt, wird sie durch die Knoten auf der inneren Seite des Unterlides nicht geschädigt. Übrigens erheben sich diese wegen der bedeutenden Verdickung und Schwellung der Bindehaut kaum über die Oberfläche. Der Verband soll aber schon am 1. Tage nach dem Eingriffe erneuert werden, um die Hornhaut in Augenschein zu nehmen und eine entsprechende Behandlung einzuleiten, falls sie wirklich geschädigt sein sollte. Nach 4 Tagen wird der Verband auf die behandelte Seite beschränkt, zu gleicher Zeit werden die Nähte aus dem Knorpel, am 5. Tage auch die der Haut entfernt. Gelegentlich schneidet die eine oder andere Naht des Knorpels vor der Heilung durch. Die klaffende Wunde schließt sich dann allmählich durch Granulationen. Abgesehen von einer Verzögerung des Heilungsverlaufes kommt aber diesem Zwischenfalle keine Bedeutung zu, da sich bei der Unversehrtheit der Lidhaut kein Kolobom dadurch bildet.

**Nachbemerkungen.** Der Erfolg des Eingriffes ist tadellos, vorausgesetzt, daß der Knorpel genügend verkürzt worden ist. Die Narbe ist nach kurzer Zeit kaum mehr zu entdecken.

Ein Hornhautgeschwür ist keine Gegenanzeige dieses Eingriffes. Es heilt vielmehr rasch von selbst ohne weitere Behandlung, nachdem die Hornhaut durch die richtige Stellung des Lides wieder bedeckt und geschützt worden ist.

Wurde zuviel vom Knorpel weggenommen, so schneiden bei der Weichheit seines Gewebes die Nähte durch, da die Spannung zu groß ist. Die Fäden sollen daher nicht zu nahe dem Wundrande, sondern weit genug davon entfernt durchgeführt werden, um genügend Halt zu finden. Aber selbst für den Fall, daß alle Knorpelnähte durchschneiden, entsteht kein Kolobom, da die vordere Lidplatte (Hautmuskel) unverletzt geblieben ist. Darin liegt der große Vorteil dieses vereinigten Verfahrens. Es geht aber daraus hervor, wie wichtig es ist, beim intermarginalen Schnitt die Haut des Lidrandes nicht zu verletzen. Bei alten Leuten ist die Haut oft sehr zerreißlich, so daß sich auch daraus Schwierigkeiten ergeben

können. Sollte der äußere Rand des Hautlappens, wie es gelegentlich vorkommt, schon beim Anfassen mit der Pinzette einreißen und abgetragen werden müssen, so wird diese unerwünschte Verkürzung des Hautlappens durch eine Unterhohlung der Haut jenseits des dreieckigen Ausschnittes ausgeglichen.

Der 1. Verband soll einen mäßigen Druck ausüben, da sich sonst hinter dem Hautlappen Blut ansammelt und die darauf folgende Entzündung zur vorzeitigen Entfernung der Hautnähte zwingt.

Bei Ausschneidung des dreieckigen Lappens wird der obere Schnitt nicht steil nach oben geführt, wie es SZYMANOWSKI bei seinem ursprünglichen Verfahren angegeben hat, sondern nur wenig nach oben abgelenkt, weil sich sonst die Haut des unteren Lides zu sehr über den Knorpel erhebt und die Vereinigung beider dadurch erschwert wird.

Bei zu starker Verkürzung übt die Haut nach Anlegung der Nähte einen solchen Druck auf den unteren Rand des Knorpels in der Richtung nach rückwärts (gegen das Auge zu) aus, daß der freie Lidrand nach außen umkippt und neuerlich ein Ektropium — allerdings anderer Art als vor dem Eingriffe — auftritt. In diesem Falle wird durch eine Naht nach SNELLEN das Lid in seine richtige Stellung zurückgeführt.

Da nach dem Eingriffe beide Augen verbunden werden müssen, werden bei beiderseitigem Ektropium beide Lider in derselben Sitzung verkürzt, um dem Kranken Zeit und die Verlängerung des Verschlusses beider Augen zu ersparen.

Ist die Auswärtskehrung nur gering, so genügt das ursprüngliche Verfahren von KUHNT mit der Änderung nach MÜLLER. Das Lid wird von seiner Mitte bis zum äußeren Lidwinkel im intermarginalen Saume gespalten, das entsprechend lange Stück des Knorpels ausgeschnitten und die Knorpelwunde, wie oben beschrieben, durch 3 Nähte geschlossen. Die den Hautrand mit dem Knorpel vereinigenden Nähte werden aber etwas schief angelegt, so daß sich an Stelle einer größeren Hautfalte — wie sie durch den Überschuß an Haut nach Verkürzung des Knorpels zustande kommen müßte, mehrere kleine Hautfalten bilden, die sich später abflachen und verschwinden.

Dieser Eingriff kann auch in der inneren Lidhälfte durchgeführt werden, wenn gerade diese allein, wie es beim beginnenden Ektropium gelegentlich der Fall ist, nach auswärts gekehrt ist, während die äußere Hälfte des Lides noch richtig steht.

Ein einfaches Verfahren, das aber nur bei Beginn der Stellungsänderung angewendet werden soll, ist die Verschorfung der Bindehaut im Bereiche der Auswärtskehrung. Nachdem das zu verschorfende Gebiet durch Einspritzung einer 1%igen Cocainlösung unter die Bindehaut unempfindlich gemacht worden ist, wird mit dem rotglühenden Thermokauter ein schmaler Streifen der bloßliegenden Bindehaut einige Millimeter vom Lidrande entfernt und diesem parallel tief verschorft. Die daraus entstehende Narbe übt einen solchen Zug auf das Lid aus, daß es sich aufrichtet. Die Verschorfung kann wiederholt werden, wenn der Lidrand die richtige Stellung noch nicht erreicht hat. Wird nur ein schmaler Streifen verbrannt, so besteht keine Gefahr, den Lidrand zu weit nach rückwärts zu drehen.

Es wurde schon auf S. 4 darauf hingewiesen, daß das Entstehen einer Auswärtsdrehung des unteren Lides durch Schlitzung des Tränenröhrchens verhindert werden kann. Wenn sich nämlich, wie so häufig, zuerst das Tränenpünktchen nach vorne dreht, so ist mit dem dadurch hervorgerufenen Tränenträufeln der ganze Vorgang eingeleitet, der über kurz oder lang zum Ektropium führt.

Wird aber durch die Schlitzung des Tränenröhrchens für die richtige Abfuhr der Tränen gesorgt und der Kranke gleichzeitig angewiesen, beim Abwischen des Lides die Richtung nach innen oben einzuhalten und dabei das Lid an das Auge anzudrücken, so bleibt das Lid in der richtigen Stellung erhalten.

**Lähmungsektropium (Ectropium paralyticum).**

Siehe Tarsorrhaphie.

## Viertes Kapitel.

# **Narbenektropium und plastische Eingriffe an den Lidern. Lidersatz. Eingriffe gegen das Symblepharon. Frühplastik bei Verbrennungen und Verätzungen. Augenhöhlenplastik.**

## **Narbenektropium.**

**Vorbemerkungen.** Die wundärztliche Beseitigung des Narbenektropiums setzt sich aus 2 Teileingriffen zusammen:

1. der Durchtrennung der Narbe, um das Lid freizumachen und es in seine richtige Stellung zurückzubringen und
2. der Deckung der Wunde mit Epithel, da diese sonst vernarben müßte, wodurch das Lid wieder in die falsche Stellung gezogen würde.

Der erste Schritt, die Durchtrennung der Narbe, wird immer nach den gleichen Grundsätzen ausgeführt. Die Verschiedenheit der einzelnen Verfahren liegt in der Art, wie die Wunde *gedeckt* wird.

Was den Zeitpunkt des Eingriffes anbelangt, so können darüber nur allgemeine Angaben gemacht werden: Zunächst ist es unser Bestreben, bei den in Betracht kommenden krankhaften Zuständen der Ausbildung eines Ektropiums vorzubeugen. Frische Verletzungen der Lider und ihrer Umgebung müssen daher einer sorgfältigen wundärztlichen Behandlung unterzogen werden. Diese hat insbesondere den Zweck zu verfolgen, die Bildung von Narben mit verlagernder Wirkung zu verhindern. Außer der Hintanhaltung und Bekämpfung von entzündlichen Vorgängen kommt in erster Linie die primäre Naht der Wunde in Betracht. Die vollständige Vernähung ist aber nur bei reinem Zustande der Wunde möglich. Eine entzündliche Infiltration oder eine primäre traumatische Nekrose der Wundränder und ihrer Umgebung schließen sie aus. Es ist in solchen Fällen unter antiseptischem Verband der richtige Zeitpunkt abzuwarten, bis sich die Wunde genügend gereinigt hat. Wird zu früh genäht, so wird der Erfolg dadurch vereitelt, daß sich nach Verschuß der Wunde die Entzündungserscheinungen steigern, die Absonderung sich staut und die Nähte durch Erweichung der Gewebe binnen kurzem durchschneiden. Die Wunde klappt dann ebenso wie früher. Ausgedehnte Verletzungen machen nicht selten schon wegen des bedeutenden Gewebsverlustes eine primäre Naht unmöglich, wie es bei einem guten Teil der Kriegsverletzungen der Lider der Fall ist. Dagegen gelingt es, trotz unreiner Wundverhältnisse oder traumatisch schwer geschädigter Wundränder nicht selten, durch die eine oder andere Naht, ohne die Wunde zu schließen, die Stellung eines Lides wesentlich zu verbessern, so daß es schließlich nicht oder doch viel weniger durch die Narbe verlagerter wird, als es sonst geschehen wäre.

Ist es nicht möglich gewesen, schon in der ersten Zeit (8—10 Tage) nach der Verletzung die Wundränder zu vernähen, so muß der Abschluß des Vernarbungsvorganges abgewartet werden, bevor ein Eingriff angezeigt ist. Denn erst nach Eintreten des Dauerzustandes kann abgeschätzt werden, wie weit der plastische Eingriff zu gehen hat, um das Lid dauernd richtigzustellen; auch ist erst dann die anatomische Beschaffenheit der Gewebe durch Verschwinden von Ödem und Infiltration eine solche, daß sich Eingriffe unter günstigen Vorbedingungen ausführen lassen. Die Zwischenzeit wird zu ausgiebiger Massage der jungen Narbe verwendet, wodurch oft ganz überraschende Besserungen erzielt werden, die den Eingriff zum Schlusse wesentlich einfacher gestalten. Wir nehmen daher im allgemeinen für die Frühplastik um so weniger Stellung, als wir in der Anlegung der feuchten Kammer ein Mittel haben, ein des Schutzes der Lider entbehrendes Auge beliebig lange vor Schädigung zu bewahren. Auch bei ausgedehnten Verbrennungen oder Verätzungen der Lider wird der Eingriff zur Beseitigung des Ektropiums erst unternommen, wenn die Vernarbung abgelaufen ist. Gelegentlich kommt unmittelbar nach der Schädigung ein umschriebener (Tarsorrhaphie) oder vollständiger Verschluß der Lidspalte in Betracht, um das Auge zu decken und die Abziehung des Lidrandes zu verhindern.

Durch die guten Erfolge, die mit der Röntgenbehandlung bei Caries erzielt werden, sind die plastischen Eingriffe, die früher durch diese Krankheit oft notwendig geworden waren, seltener geworden. Auch Fisteln können durch die Röntgenbehandlung zum Verschluß gebracht werden. Heilen sie aber nicht, so ist der kranke Knochen bloßzulegen, auszukratzen, gegebenenfalls der Sequester zu entfernen und zu warten, bis die Wunde unter Drainage mit Jodoformstreifen oder -stäbchen langsam ausgeheilt ist. Nur eine Tarsorrhaphie darf gleichzeitig damit ausgeführt werden, um die Hornhaut vor den Gefahren des Ektropiums zu schützen und außerdem durch die Vernähung eine Auswärtsdrehung der beiden Lidränder zu verhindern. Erst nach vollständiger Ausheilung der Caries wird gegen eine Stellungsveränderung der Lider durch einen plastischen Eingriff eingeschritten.

**Örtliche und allgemeine Betäubung.** Nicht nur kleinere plastische Eingriffe, sondern auch größere Lappenplastiken können unter Anwendung entsprechender Mengen einer 2%igen Novocain-Adrenalin-Lösung in örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Nur selten muß zur allgemeinen Betäubung geschritten werden.

### **Eingriff.**

*1. Teil. Die Durchtrennung der Narbe.* Mit einem Skalpell wird parallel dem Lidrande oder in Fällen, wo der Lidrand zugrunde gegangen ist, parallel der Haut-Bindehautgrenze 3 mm davon entfernt in der ganzen Länge der Verwachsung eingeschnitten, allmählich tiefer und tiefer, bis das Lid, frei beweglich geworden, leicht in seine richtige Lage zurückgebracht werden kann. Reichen die Verwachsungen bis an den Knochen, so wird dabei der Augenhöhlenrand freigelegt. Derbes, mit Gefäßen mangelhaft versehenes Narbengewebe wird ausgeschnitten, bis gesundes, lebhaft blutendes Gewebe vorliegt. Der Umstand, daß das Narbengewebe unter der Haut noch weiter in die Umgebung ausstrahlt, zwingt oft zu größeren Einschnitten als ursprünglich geplant, und zu ausgiebigen Unterminierungen der Ränder des Einschnittes, um freie Beweglichkeit des los-

gelösten Lides zu erzielen. Einige Bemerkungen über die Befestigung des losgelösten Lides in der neuen Stellung sollen noch später eingeschaltet werden.

2. *Teil des Eingriffes: Deckung der Wunde.* Durch die Lagerung des freigemachten Lides in seine richtige Stellung wird eine große Wundfläche geschaffen, die mit Haut bedeckt werden muß. In dieser Hinsicht gibt es 3 grundsätzlich verschiedene Verfahren:

- a) Hinüberziehen der benachbarten Haut durch Nähte,
- b) Deckung der Wunde durch ungestielte Hautlappen,
- c) Deckung der Wunde durch gestielte Hautlappen, entnommen der Umgebung der Wunde oder anderen Körperteilen (Arm).

a) Die Vernähung der Wunde ist nur möglich nach kleinen Einschnitten und bei gesunder Beschaffenheit der umgebenden Haut. Ist z. B. ein Abschnitt eines Lides durch eine schmale Narbe nach Caries des Augenhöhlenrandes nach auswärts gedreht und der Lidrand an den knöchernen Augenhöhlenrand angewachsen, so wird nach gründlicher Durchtrennung der Narbe und Rücklagerung des Lides in seine richtige Stellung die annähernd waagrecht angelegte Wunde durch 2 Wundhaken, die in der Mitte ihres oberen und unteren Randes eingelegt werden, zu einer senkrechten verzogen und durch waagrechte Nähte zu einer senkrechten Linie vernäht. Um zu diesem Zwecke die umgebende Haut von beiden Seiten heranziehen zu können, muß sie ausgiebig unterminiert werden. Die Nähte sind demgemäß senkrecht auf die Richtung des Narbenzuges angelegt. War z. B. der äußere Teil des oberen Lides an den Augenhöhlenrand angewachsen gewesen, so wird durch die Vernähung in querere Richtung, d. h. also senkrecht auf die frühere Zugrichtung der Narbe, das obere Lid entsprechend tiefergestellt und in der richtigen Lage dauernd erhalten.




Abb. 41. V—Y-Eingriff. Der durch den V-Schnitt umgrenzte Hautlappen rückt nach oben (Richtung des Pfeiles). Die Wunde wird zu einem Y vernäht.

**Der V—Y-Eingriff.** Nähte können auch in anderer Art zur Deckung der Wunde beitragen. Ist z. B. das untere Lid durch narbige Verkürzung der Haut (nach schwerer Blepharitis ulcerosa oder Ekzem) nach außen gedreht, so wird ein V-förmiger Schnitt angelegt mit nach unten gerichteter Spitze und einer breiten Öffnung des V am Lidrande, entsprechend der Ausdehnung der Narbe. Mit dem Skalpell wird der von dem V begrenzte narbige Hautlappen von der Spitze an bis in die Nähe des Lidrandes von seiner Unterlage abgeschält, wobei auch das übrige darunterliegende Narbengewebe ausgeschnitten wird. Wird nun das von dem Narbenzug befreite Lid in seine richtige Stellung zurückgebracht, so wird mit dem Lidrande der Lappen gehoben. Da sich der Lappen nach der Abtrennung von seiner Unterlage außerdem noch etwas zusammengezogen hat, wird der untere Teil der Wunde von ihm entblößt und es bleibt eine pfeilspitzenförmige Wunde unbedeckt. Diese wird nach Unterminierung der seitlichen Wundränder durch Nähte in der Weise geschlossen, daß oben die Wundränder mit den Rändern des Lappens vernäht werden, unten dagegen die Wundränder miteinander. Dadurch ergibt sich eine Y-Form der geschlossenen Wunde (Abb. 41). Das Lid bleibt dauernd gehoben und dem Augapfel angelegt.

b) Die Fälle, wo Nähte zum Ziele führen, sind selten. Denn die Haut der Umgebung reicht nicht zur Deckung einer großen Wunde aus und kann auch

dann nicht dazu verwendet werden, wenn sie nach Verätzungen oder durch Lupus narbig und dadurch unnachgiebig geworden ist. Meistens muß daher die nach der Durchtrennung der Narbe entstandene Wunde durch einen Hautlappen gedeckt werden. Dazu sind womöglich stiellose Lappen zu verwenden. Ganz abgesehen davon, daß in einem guten Teile der Fälle von Narbenektropium (Verätzungen, Lupus) gestielte Lappen aus der Haut der Umgebung aus den eben angeführten Gründen nicht gebildet werden können, sind es insbesondere Rücksichten auf das schönere Aussehen, die uns veranlassen, für die Pfropfung zarter stielloser Lappen auf die Wunde einzutreten. Während gestielte Lappen aus der Umgebung häufig als plumpe, unförmliche Wülste vorspringen und für lange entstellen, schmiegt sich der äußerst dünne, stiellose Lappen genau seiner Unterlage an, zeigt nach längerer Zeit eine Fältelung wie gesunde Lidhaut und unterscheidet sich nur durch seine etwas hellere Farbe von der Umgebung. Der Vorwurf aber, daß stiellose Lappen regelmäßig so weit schrumpfen, daß dadurch der Erfolg des Eingriffes vollständig vernichtet wird, trifft nicht zu. Wir haben bei zahlreichen Kranken Ober- und Unterlider mit stiellosen Lappen neu gebildet und sie noch nach Jahren in tadelloser Stellung gefunden — Fälle, wo die Verwendung der Haut aus der Umgebung wegen starker Narbenschumpfung nach Verätzung mit Vitriol und nach Verbrennung unmöglich gewesen wäre.

Um solche Dauererfolge zu erreichen, ist bei der **Überpflanzung stielloser Lappen** folgendes Vorgehen einzuhalten. Die erste Bedingung ist starke Überberichtigung. In den schweren, hier in Betracht kommenden Fällen ist das Ober- oder Unterlid in seiner ganzen Länge nach außen gekehrt und meist in der Gegend des Augenhöhlenrandes, das obere knapp an der Augenbraue angewachsen. Der Lidrand ist manchmal gut erhalten. Im ersten Schritte des Eingriffes wird, wie früher beschrieben, die Narbe durchtrennt und das Lid freigemacht. Mit einem Skalpell wird in der ganzen Länge der Narbe entlang dem Lidrande ein Einschnitt gemacht. Am oberen Lid verläuft dieser in der schmalen Zone zwischen Augenbraue und Lidrand, wenn das Lid bis dort hinaufgezogen ist. Ist kein Lidrand mehr vorhanden, so wird der Schnitt in einer Entfernung von 2—3 mm vom Rande der Bindehaut angelegt. Ist die Narbe vollständig durchtrennt und das harte Narbengewebe gründlich ausgeschnitten, so wird das nun frei bewegliche Lid weit über das andere Lid hinübergezogen, also das obere über das untere herunter, oder das untere Lid weit über das obere hinauf. Dies geschieht mit 3 kräftigen Fäden, die durch den Rand des freigemachten Lides durchgezogen und an der Wange (für das obere Lid) oder an der Stirne (für das untere Lid) befestigt werden. Beide Fadenenden werden durch die Haut geführt und über einem Bäuschchen Gaze geknüpft. Durch den Zug dieser Nähte bekommt die Wundfläche eine sehr bedeutende, die Größe eines Lides weit übertreffende Ausdehnung. Die bei der Durchschneidung auftretende Blutung wird durch Druck oder durch vorübergehendes Abklemmen mit Schiebern gestillt; diese werden nach einiger Zeit unter Abdrehen weggenommen. Größere Gefäße werden mit Katgut unterbunden; doch werden solche fast nie angetroffen. Die Wunde hat nach dem Zuziehen der Fäden gewöhnlich eine unregelmäßig stumpf-dreieckige Form und ihre Fläche ist gegen die Nasenseite zu und unterhalb des oberen Augenhöhlenrandes eingesenkt. Sie wird einstweilen mit einem mit warmer physiologischer Kochsalzlösung getränkten Tupfer bedeckt.

**Schaffung des Hautlappens.** Er wird aus der Haut der inneren Seite des Oberarmes genommen. Um ungefähr einen Anhaltspunkt über die Form des Lappens zu haben, wird ein Stück Guttaperchapapier in Form und Größe entsprechend der Wunde auf die Hautstelle gelegt, aus der der Lappen genommen werden soll. Nach gründlicher Reinigung der Haut mit Seife und Bürste und Abspülen mit physiologischer Kochsalzlösung spannt der Gehilfe die Haut des Armes in querer Richtung kräftig an. Da sie sich nach der Losschälung in dieser Richtung bedeutend zusammenzieht, muß der Lappen breiter angelegt werden, als das vorgeschchnittene Papier anzeigt. In der Längsrichtung des Armes braucht er dagegen nur um ein wenig größer bemessen zu werden. Der Lappen wird daher nicht sofort ganz umschnitten, sondern es wird zunächst nur der Länge des Armes nach ein Schnitt gemacht, von dessen Enden quere Einschnitte auf kurze Strecke abgehen. Darauf wird die Losschälung begonnen. Nur die obersten Epithelschichten werden in Form eines einzigen Lappens abgelöst. Dazu eignet sich am besten die Lanze. Sie wird flach, fast parallel auf die Haut aufgesetzt und dringt knapp unter den obersten Epithelschichten in streichenden Zügen vor. Allerdings geht die Arbeit ziemlich langsam vonstatten und erfordert volle Aufmerksamkeit. Ist schon ein schmaler Streifen freigemacht, so wird er mit einem gut ausgedrückten Kochsalztupfer so nach außen gerollt, daß immer die Umschlagstelle bloßliegt, entlang der weitergeschnitten wird unter entsprechender Verlängerung der queren Begrenzungsschnitte. Der Lappen wird in einer so oberflächlichen Schicht abgelöst, daß die Blutung nur aus den Spitzen der angeschnittenen Papillen in Form von Punkten eintritt. Der Lappen soll nicht gefenstert werden. Denn die Lücken, wenn auch anfänglich klein, vergrößern sich durch Zurückziehen der Schnittränder; diese rollen sich außerdem ein, so daß der Lappen nicht mehr genau an die Wundfläche angelegt werden kann. Bei raschem Ablösen gerät die Lanze zu tief, der Lappen wird dadurch dick und plump und hat außerdem den Nachteil, daß er sich viel mehr als gewünscht zusammenzieht. Erst nachdem das abgelöste Stück die notwendige Größe erreicht hat, wird es an der Stelle, wo es noch im Zusammenhange mit der übrigen Haut steht, abgeschnitten. Der Lappen wird sofort zwischen zwei Tupfer gelegt, die in warmer physiologischer Kochsalzlösung getränkt sind. Bevor er nämlich auf die Wunde gebracht wird, wird diese mit der Schneide der Lanze in verschiedener Richtung bestrichen, damit eine geringe Menge von Blut und Serum auf die Oberfläche austritt und der Lappen mit der Unterlage rasch verklebt. Man hüte sich aber vor tieferen Einschnitten, da durch eine Ansammlung von Blut der Lappen von der Wundfläche abgehoben würde.

**Anpassung des Lappens auf die Wundfläche.** Der auf dem Tupfer ausgebreitete Lappen wird mit seiner Wundfläche auf die Lidwunde gelegt, zunächst so, wie sich aus seiner Form von selbst ergibt. Nun wird die Mitte des Lappens gut auf die Unterlage gedrückt, am besten mit einer geschlossenen breiten Pinzette. Es ist besonders auch darauf zu achten, daß der Lappen über den verschiedenen Vertiefungen der Wunde nicht hohl zu liegen kommt, besonders im inneren Wundwinkel. Darauf folgt die genaueste Anpassung der Lappenränder. Da diese Neigung haben, sich einzurollen, werden sie mit Karlsbader Nadeln nach auswärts gedreht und so an die Ränder der Wundfläche angelagert, daß nicht der geringste Zwischenraum zwischen beiden übrigbleibt.

Ist der Lappen zu groß, so daß seine Ränder vorstehen, so werden sie mit einer Schere zurechtgeschnitten und auf die richtige Länge zurückgeführt. Diese Anpassung hat im ganzen Umkreise des Lappens vorgenommen zu werden. Nähte sind nicht zu empfehlen, doch werden gelegentlich eine oder mehrere Nähte angelegt, wenn der Lappen an einer Stelle keine Neigung zeigt, in der richtigen Lage zu verbleiben.

**Verband.** Der Lappen und seine Umgebung werden mit befettetem Gutta-perchapapier bedeckt und lockere trockene Gaze in solcher Menge sorgfältig daraufgelegt, daß ein leichter Druck ausgeübt wird. Zwei breite Pflasterstreifen befestigen die Gaze in ihrer Lage. Das andere Auge wird gleichfalls verbunden, um jede Bewegung der Lider auszuschließen. Eine darübergelegte Stärkebinde macht den Verband in kurzer Zeit steif. Die Wunde am Arm wird nicht vernäht; das Epithel bildet sich unter keimfreiem Salbenverband von den zwischen den Papillen übriggebliebenen Epithelinseln aus in kurzer Zeit wieder.

**Nachbehandlung.** Am 3. Tage nach dem Eingriffe wird der Verband das erstmal gewechselt. Bei gutem Verlaufe zeigt sich der Lappen in tadelloser Stellung. Da keine Wundfläche vorhanden ist, besteht nicht die geringste Absonderung. Der Lappen ist gewöhnlich ziemlich weiß, gelegentlich färben sich die obersten Epithellagen etwas dunkel, ohne daß deswegen eine Nekrose des Lappens zu befürchten wäre; in wenigen Tagen kommt darunter die zarte junge Hautschicht zum Vorschein. 2 Tage später wieder Verbandwechsel. Die Haltnähte haben bis dahin gewöhnlich durchgeschnitten und werden nun herausgezogen. Das Lid aber bleibt zunächst noch in derselben Stellung. Auf jeden Fall ist der Lappen schon genügend angeheilt, um durch eine Veränderung der Lidstellung nicht mehr verschoben werden zu können. Allmählich kehrt nun das Lid langsam in seine richtige Stellung zurück.

**Ergebnis.** Wie schon früher erwähnt, sind auch die Dauerergebnisse bei Einhaltung der angegebenen Vorsichtsmaßregeln in den meisten Fällen ausgezeichnet. Die Haut faltet sich allmählich wie gesunde Lidhaut und unterscheidet sich nur durch ihre blässere Farbe von der Umgebung.

Sind beide Lider auswärts gedreht, so wird zuerst das obere richtiggestellt und einige Wochen später das untere in gleicher Weise. Die Lappen werden lange Zeit hindurch mit Salben fett erhalten, damit die Haut geschmeidig wird.

Ist der Lappen nicht angeheilt, so ist er schon beim ersten Verbandwechsel grünlichschwarz verfärbt und durch eine starke übelriechende Absonderung von der in Granulation übergehenden Wunde abgehoben. Es bleibt alsdann nichts übrig als zu warten, bis die Vernarbung der Wunde abgeschlossen und der frühere Zustand zurückgekehrt ist, und dann denselben Eingriff von neuem zu versuchen. Bei tadellosem Vorgehen kommt aber dieses unangenehme Ereignis nur ganz ausnahmsweise vor.

**c) Deckung der Wunde durch gestielte Hautlappen. Anzeigen.** Auf diese Art muß die Wunde in den Fällen gedeckt werden, wo das Narbengewebe bis an den Knochen reicht, so daß dieser nach Durchtrennung der Narbe bloßliegt. Ungestielte Hautlappen können nur an einem mit Blutgefäßen genügend versorgten Gewebe anheilen und daher hier keine Verwendung finden. Außerdem bedarf es bei solchen Wunden mit tiefen Einsenkungen einer dickeren Gewebemasse zur Ausfüllung des Höhenunterschiedes. Narbentropien nach schweren,

mit Gewebenekrose einhergehenden Entzündungen, nach Ansteckung mit Milzbrand, nach ausgedehnten und tiefen Verletzungen der Lider stellen den Hauptanteil für die Plastik mit gestielten Hautlappen.

Die folgende Besprechung betrifft zunächst die Gruppe von Fällen, wo von dem Lide *nur die vorderen Schichten* zugrunde gegangen, der Lidknorpel und die Bindehaut aber erhalten geblieben sind.

Im unmittelbaren Anschluß daran wird der wundärztliche *Ersatz* eines Lides behandelt, wenn es in *allen* seinen Schichten an umschriebener Stelle oder in der ganzen Ausdehnung zerstört worden ist. Die Lappenbildung zum Ersatz eines Lides unterscheidet sich nämlich nicht grundsätzlich von der bei der vorigen Gruppe, sondern nur dadurch, daß auch für die fehlende hintere Lidplatte (Knorpel-Bindehautplatte) Ersatz geschaffen werden muß. Schwere Verletzungen der Lider mit Zerstörung der ganzen Lidgewebemasse, besonders häufig als Kriegsverletzungen in verschiedenen Einzelformen: völliges Fehlen des Lides durch Zerschmetterung, oft mit schweren Knochenverletzungen verbunden, auch mit Eröffnung der umgebenden Körperhöhlen (Stirn-Siebbein-Kieferhöhle, Gehirnverletzungen), Abreißen des Lides, besonders häufig des unteren von seinem inneren Ansatz, Zerreißen oder Zerschneidung eines Lides mit Bildung eines Koloboms, dessen Schenkel durch Narbenschrumpfung nach auswärts gekehrt und am Augenhöhlenrande angewachsen zu sein pflegen; wundärztliche Entfernung des ganzen Lides oder eines Teiles davon in der ganzen Dicke wegen bösartiger Neubildung bilden die Anzeigen für diese Eingriffe. Solange eine Neubildung in den Lidern nur die Haut angegriffen hat, so daß der Lidknorpel erhalten werden kann, unterscheidet sich die Plastik mit gestielten Lappen aus der Umgebung in nichts von der bei den Fällen der ersten Gruppe. Ist aber der Lidrand der Neubildung schon zum Opfer gefallen, wie es meistens der Fall ist, da sie gerade von ihm ausgehen, so ist ein Ersatz für das Lid zu schaffen. Die Abtragung der Geschwulst muß zur Entfernung aller Krankhaften mindestens in einer Entfernung von  $\frac{1}{2}$  cm vom sichtbaren Rand vorgenommen werden. Daher muß meist ein großer Teil des Lides, bei etwas mehr vorgeschrittener Geschwulst schon das ganze Lid geopfert werden. Kleine an den beiden Enden zurückgelassene Reste des Lides bieten keinen Vorteil. Die Schonung der Tränenröhrchen kommt nur dann in Betracht, wenn sie jenseits der in das Eingriffsgebiet fallenden Zone liegen. Es dürfte nicht durch Rücksichtnahme auf die Tränenröhrchen das Lid zu nahe dem Rande der Geschwulst abgetragen werden.

Ganz besonders gründlich müssen die Narben ausgeschnitten werden bei Fällen, die früher einer Strahlenbehandlung unterzogen worden waren. Sonst treten immer wieder Rückfälle ein, indem an irgendeiner Stelle der zurückgelassenen Narbe über kurz oder lang der Krebs von Neuem zu wuchern beginnt.

Es sei hier auch unserer Überzeugung Ausdruck verliehen, daß die Entfernung einer Lidgeschwulst durch gründliches Ausschneiden, wenn irgendwie möglich, der Bestrahlung vorzuziehen ist.

**Verfahren.** Die Lappen werden fast immer der benachbarten Haut entnommen. Das Verfahren, gestielte Lappen aus der Haut des Oberarmes zu verpflanzen (italienisches Verfahren) kommt nur für die seltenen Fälle in Betracht, wo keine brauchbare Haut in der Umgebung zur Verfügung steht und eine

Plastik mit ungestielten Lappen aus früher angeführten Gründen nicht möglich ist. Da aber selbst vernarbte Haut im Notfalle zu gestielten Lappen verwendet werden kann, kann dieses Verfahren fast immer umgangen werden. Es stellt an den zu Behandelnden jedenfalls hohe Anforderungen von Ausdauer, da der Arm solange in der Hebung durch einen unbeweglichen Verband am Kopfe festgehalten bleiben muß, bis der aus der Haut des Armes gebildete Lappen an die Lidwunde angeheilt ist.

Für die Bildung von Hautlappen aus der umgebenden Haut der Stirne, Schläfe oder Wange mögen folgende allgemeine Anhaltspunkte gegeben werden:

Der Lappen muß um ungefähr ein Drittel größer genommen werden, als die Wundfläche ist, die er zu bedecken hat, da sich die Haut schon beim Ablösen zusammenzieht und auch noch später eine Neigung hat zu schrumpfen; da sich ferner der Lappen ohne alle Spannung in die Wunde muß einfügen lassen.

Der Lappen hat die Form der Wunde nachzuahmen. Zu diesem Zwecke wird ein der Form der Wunde entsprechend zugeschnittenes Stück Guttaperchapapier auf die Stelle gelegt, aus der der Lappen zu entnehmen ist.

Ein breiter Stiel sichert die Ernährung des Lappens besser als ein schmaler.

Der Lappen für das obere Lid wird aus der Haut der Stirne oder Schläfe, für das untere Lid aus der Jochbein-Wangengegend entnommen.

Die Basis für einen für das obere Lid bestimmten Lappen hat etwas unterhalb der Lidspalte, für einen für das untere Lid bestimmten Lappen etwas oberhalb der Lidspalte angelegt zu werden; dadurch wird das obere Lid in der Richtung nach unten, das untere Lid in der Richtung nach oben gezogen, also im entgegengesetzten Sinne, als es die Narbe getan hat.

Der Lappen werde nicht zu dünn abgelöst, sondern mit Unterhautzellgewebe genommen, damit er durch den Gehalt an Blutgefäßen gegen Ernährungsstörungen geschützt ist.

Die mit dem Lappen zu bedeckende Wunde des Lides bedarf gleichfalls einer sorgfältigen Zubereitung. Alles überflüssige Narbengewebe, besonders das mit Blutgefäßen schlecht versorgte, wird ausgeschnitten, die Wunde nach Möglichkeit geebnet und die Blutung sorgfältig gestillt, wozu meist Druck genügt. Nur größere Gefäße werden abgedreht oder unterbunden. Die Ränder der Wunde sind zu unterminieren, wodurch sie teils auch zur Deckung der Wunde beitragen, soweit dies gestattet ist, ohne einen ungünstigen Einfluß auf die Lage des Lides zu nehmen, teils um zur Vernähung mit den Lappenrändern vorbereitet zu sein. Nach der Übertragung des Lappens auf die Wunde werden die Nähte angelegt. Bei zungenförmigen Lappen wird zuerst die Spitze an der ihr zukommenden Stelle der Wunde befestigt, bei eckigen Lappen die Ecken, worauf erst die anderen Nähte folgen. Die Ränder müssen genau angepaßt werden, indem sie vom Gehilfen mit anatomischen Pinzetten in die richtige Stellung gebracht werden. Denn die Ränder der Wunde zeigen nicht selten Neigung, wie die Lidhaut überhaupt, sich einzurollen.

Schließlich hat noch für die Deckung der Wunde Sorge getroffen zu werden, die durch die Entnahme des Lappens entstanden ist. Meist kann sie nach gründlicher Unterminierung der Ränder durch Nähte so verkleinert werden, daß der Rest der Vernarbung überlassen werden kann. Entspannungsschnitte leisten dabei oft wesentliche Dienste. Im Notfalle kann die Wunde nach THIERSCH gedeckt werden.

Die Lappen können nach ihrem Lageverhältnis zur Wunde und nach der zu ihrer Übertragung notwendigen Stellungsänderung in folgende Gruppen geschieden werden:




Abb. 42a. Lappenbildung nach CELSUS, Umrißzeichnung, V Gewebeerlust, L Lappen.




Abb. 42b. Nach der Vernähung.

**I. Drehlappen.** Die Achse des zu umschneidenden Lappens bildet einen Winkel mit der Achse der Wunde. Der losgelöste Lappen wird durch Drehung um diesen Winkel in die gewünschte Stellung über die Wunde gebracht.

1. Die Basis des Lappens schließt unmittelbar an die Lidwunde an, der Lappen liegt von dieser getrennt, meist ungefähr in einem rechten Winkel zur Wunde. Der losgelöste Lappen muß daher um eine durch seine Basis auf seine Fläche senkrecht gedachte Achse gedreht werden, um über die Wunde zu liegen zu kommen. Ein Beispiel eines vorbildlichen Verfahrens dieser Art ist die Lappenbildung nach FRICKE (siehe S. 74).




Abb. 43a. V-förmig umschnittener Gewebeerlust V mit der Bildung zweier seitlichen Gleitplatten (L). Umrißzeichnung.




Abb. 43b. T-förmige Vernähung.

Um die Blutversorgung im Lappen nicht abzusperren, soll die Drehung um diese Achse nicht über  $90^\circ$  betragen.

Die Drehung eines Lappens ist aber auch noch in einem anderen Sinne möglich: um eine durch seine Basis parallel zu ihr verlaufende Achse: *Umklappung* des Lappens. Bei der Drehung um diese Achse wird der Lappen aus seiner ursprünglichen Ebene herausgedreht und gelangt nach Drehung um  $180^\circ$  wieder in die Ausgangsebene zurück, wobei jetzt Oberfläche und Wundfläche verkehrt gerichtet sind: die Wundfläche nach vorne, die Epitheloberfläche nach rück-




Abb. 44a. Bildung eines Gleitlappens (L) mit Ausschneidung zweier seitlicher Hautdreiecke (v) bei überschüssiger Haut zur Deckung des Gewebeerlustes (V) (Verfahren von BURROW). Umrißzeichnung.




Abb. 44b. Nach der Vernähung



Abb. 45a. Bildung zweier Gleitlappen L zur Deckung des Substanzverlustes V.




Abb. 45b. Nach der Vernähung. Umrißzeichnung.

wärts. Solche Lappendrehungen werden angewendet zum Ersatze der Bindehaut und zur Auskleidung der Rückseite eines verwachsen gewesenen Lides mit Haut. Als ein Beispiel dieser Art sei genannt das Verfahren nach ROGMAN bei Verwachsung des Lides mit dem Auge (S. 91).

2. Der Lappen und seine Basis liegen in unmittelbarem Anschluß an die Wunde, so daß der Lappen nach der Loslösung nur um wenige Grade gedreht und etwas seitlich verschoben zu werden braucht, um auf die Wunde liegen

zu kommen. Vorbildliches Verfahren: Lappenbildung nach DIEFFENBACH (S. 77). Dabei kann sich der Lappen in seiner Form wesentlich von der Wunde unterscheiden, die er zu bedecken hat. So ist in dem genannten Verfahren die Wunde dreieckig, der Lappen viereckig. Die Art der Ortsveränderung des Lappens ist teils Drehung, teils Verschiebung.

3. Der Lappen und sein Stiel liegen beide von der Wunde völlig getrennt. Bei der Drehung des Lappens auf die Wunde überbrückt der Stiel die Haut zwischen seiner Einpflanzungsstelle und der Wunde. Nach der Anheilung wird der Lappen von seinem Stiel getrennt und dieser mit dem nicht zur Anheilung verwendeten Teil des Lappens in seine ursprüngliche Stelle zurückverpflanzt (siehe S. 80, Bildung einer Augenbraue durch einen Lappen der Kopfhaut).

**II. Gleitlappen.** 1. Der Lappen schließt unmittelbar an die Wunde an, der Stiel liegt auf der von der Wunde abgekehrten Seite des Lappens, also von der Wunde völlig getrennt. Der Lappen bleibt in seiner ursprünglichen Richtung, er wird nur über die Wunde gezogen. Vorbildliches Verfahren nach CELSUS (Abb. 42—45).

Unter anderem angewendet im Verfahren von KNAPP zum Ersatz eines Teiles des unteren Lides (Abb. 46a). Der Gewebeverlust des Lides wird durch gerade Schnitte viereckig gestaltet. Bildung zweier seitlicher Lappen  $L_1$  und  $L_2$ .  $L_1$  hat seine Basis in der Schläfengegend,  $L_2$  auf der Nase.  $L_1$  wird in der Weise gebildet, daß vom äußeren Lidwinkel ein Schnitt nach außen und etwas nach oben geführt wird, und ein 2. in der Fortsetzung der unteren Wundgrenze waagrecht nach außen und schließlich etwas nach unten abbiegend. Der ganze Lappen  $L_1$  wird durch Unterminierung gründlich beweglich gemacht. Der Nasenlappen ist viel kürzer und wird durch 2 waagrechte Schnitte in der Verlängerung des oberen und unteren Wundschnittes geschaffen. Die beiden Lappen werden dann über den Gewebeverlust hinübergezogen und ihre senkrechten Ränder miteinander vernäht (Abb. 46b).

Von J. IMRE wurde die Plastik mit Gleitlappen, die durch Bogenschnitt und unter Verwendung des BUROWSCHEN Dreieckes gebildet worden sind, ganz vorzüglich ausgearbeitet.




Abb. 46a. Deckung eines Gewebeverlustes (V) des unteren Lides durch zwei Gleitlappen ( $L_1$  und  $L_2$ ) nach KNAPP.




Abb. 46b. Nach der Vernähung.

## Verfahren nach IMRE.

**Anzeigen.** Das Verfahren eignet sich in ganz vorzüglicher Weise zur Deckung verschieden großer Defekte im Gesicht, an der Stirne und in der Schläfegegend.




Abb. 47.

An den Lidern beschränkt sich seine Verwendbarkeit auf kleinere Gewebeerluste oder auf Wundflächen an den Lidwinkeln. Dagegen eignet es sich nicht für den Vollersatz eines Lides oder zur Deckung größerer Gewebeerluste an den Oberlidern, wie weiter unten genauer ausgeführt wird.

der Geschwulst weit im Gesunden ohne Rücksicht auf die Größe des dadurch entstehenden Gewebeerlustes. Der Lappen wird anschließend an diese Wundfläche




Abb. 48.

**Verfahren.** Ausschneiden des Narbengewebes oder Umschneidung der Geschwulst weit im Gesunden ohne Rücksicht auf die Größe des dadurch entstehenden Gewebeerlustes. Der Lappen wird anschließend an diese Wundfläche an der Stelle gebildet, wo genügend Haut vorhanden ist und wo am wenigsten eine Verziehung der Lider zu befürchten ist. Dabei kommt in erster Linie die Wangenhaut, die Haut der Schläfe oder der Stirne in Betracht, doch läßt sich auch am Nasenrücken leicht ein größerer Hautlappen gewinnen, ohne daß dadurch eine Verziehung der Nase eintritt. Das auszuschneidende Gebiet wird in solcher Weise umgrenzt, daß der Lappenrand, der dadurch gebildet wird, gut paßt.

Die äußere Umgrenzung des Lappens wird mit einem ovalen Schnitt geformt

(Abb. 47). Dabei wird der Schnitt so geführt, daß der Halbmesser des Bogens immer kleiner wird, wodurch man die gute Beweglichkeit des Lappens erzielt. Läßt sich nach Ablösung dieses (Abb. 48) die Wundfläche noch nicht vollständig decken, so genügt es, den Hautschnitt etwas zu verlängern und damit den Stiel zu verschmälern (Abb. 47, b—c),




Abb. 49.

um die Wundfläche vollständig zu überkleiden. Der Lappen läßt sich meist ohne Schwierigkeiten durch entsprechende Verziehung in den Defekt einfügen. Nun wird der Lappen im Defekt mit Knopfnähten befestigt, und zwar zuerst die Spitze des Lappens an der ihr entsprechenden Stelle. Es empfiehlt sich, die Nähte von hier aus entlang der äußeren Begrenzung des Lappens mit dem

äußeren Wundrand soweit anzulegen, bis die Vereinigung dieser 2 Hautränder nur noch mit großer Spannung durchzuführen ist. Es bleibt gewöhnlich eine sichelförmige oder halbkreisförmige Stelle unbedeckt (Abb. 49), deren eine Spitze durch den Lappenstiel begrenzt ist. Diese Stelle läßt sich durch Ausschneiden eines BUROWSchen Dreiecks (Abb. 49, *DEF*) an dem konvexen Wundrand und durch Vernähen dieser Wundfläche soweit verkleinern, daß dadurch die beiden Wundränder annähernd gleich lang werden und sich leicht aneinanderlegen lassen (Abb. 50). Abb. 51 a, 51 b zeigen in gleicher Weise das Vorgehen bei der IMRESchen Lappenplastik. Abb. 51 a zeigt den Defekt und das ausgeschnittene BUROWSche Dreieck, Abb. 51 b zeigt den Lappen über den Defekt hinübergezogen und die Wundränder vernäht. Das Ausschneiden dieses Dreieckes in einem früheren Zeitpunkt ist nicht empfehlenswert, da sich die Größe des auszuschneidenden Hautstückes erst dann feststellen läßt, bis die Wundränder zum großen Teile miteinander vernäht sind. Bei größeren derartigen Lappen empfiehlt sich das Einlegen eines kurzen Gummidrains am tiefsten Punkte des Lappens für etwa 24 Stunden.




Abb. 50.




Abb. 51 a.




Abb. 51 b.

Der *Verband* kann ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen angelegt werden, ein besonderer Druck ist zu vermeiden. Die Nachbehandlung besteht in täglichem Verbandwechsel, um inzwischen gebildete Hämatome durch leichten Druck auf den Lappen entleeren zu können.

**Nachbehandlung.** Gleich nach dem Eingriffe soll künstliche Wärme durch den Verband hindurch angewendet werden (Thermophor, Profunduslampe). Die Nähte können zumeist schon am 3. oder 4. Tage vollständig entfernt werden. Nahteiterungen werden leicht durch Entfernung der Nähte und Jodieren beherrscht. Vorbeugend läßt man ferner täglich 1—2 Prontosiltabletten nehmen, da gerade die Fälle von Gesichtsepitheliomen so leicht an Erysipel erkranken.

Nach dem 4. oder 5. Tage schließen wir einen feuchten Verband mit Borwasser an, auf den der Hautlappen, der in dieser Zeit immer etwas gereizt ist, sehr gut anspricht. Auch kleinere Nahteiterungen oder Wundrandnekrosen lassen sich dadurch gut beeinflussen. Nach dem 10. Tage wird der Lappen zuerst nur vorsichtig, dann aber kräftig massiert, um zu verhüten, daß sich unter ihm derbe Narben bilden.

**Die Vorteile.** Die Vorteile dieses Verfahrens beruhen darauf, daß zumeist gleichartige Haut zur Deckung des Gewebeverlustes benutzt wird. Dadurch sind die zarten Narbenbildungen und das ganz ausgezeichnete kosmetische Ergebnis erklärt. Bei entsprechender Wahl des Lappens gelingt es auch, Gewebeverluste von mehreren Zentimetern im Durchmesser mit Gesichtshaut zu decken. Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, daß es für die verschiedensten Defekte verwendbar ist und durch kleine, unwesentliche Abänderungen geeignet ist, eine ganze Reihe von Verfahren, die bisher zur Beseitigung besonders geformter Gewebeverluste angegeben wurden, zu ersetzen.

**Die Nachteile** dieses Verfahrens werden durch seine besonderen Eigenheiten gegeben. Der ausgeschnittene Lappen zieht sich beträchtlich zusammen. Da er außerdem in ganzem Ausmaß aus seiner früheren Lage verschoben wird, kommt es zu beträchtlichen Zugwirkungen. Liegt nun der Lappen in einem allseits von Hauträndern umgrenzten Defekt, so paßt sich der Lappen sehr gut an und die Zugwirkungen verteilen sich gleichmäßig nach allen Seiten. Auch ein freier Lidrand kann auf *kürzere Strecken* mit einem derartigen Lappen gebildet werden, ohne daß störende Schrumpfungsvorgänge auftreten. Wenn aber ein derartiger Lappen die Haut für ein ganzes Lid ersetzen und damit auf längere Strecken frei endigen soll, so wird durch stärkere Schrumpfung senkrecht auf den Lidrand das Endergebnis verschlechtert. Auch zur Deckung größerer Gewebeverluste am Oberlide eignet sich dieser Lappen nur wenig, da der Hautvorrat für das Oberlid zu gering ist und auch mit 2 Lappen, von der Nase und vom äußeren Lidwinkel her nur kleinere Defekte zu decken sind.

2. Der Lappen und seine Basis sind von der Wunde völlig geschieden. Der Lappen wird durch Verschiebung auf die Wunde gebracht, wo er anheilt, während ihn der Stiel mit der von der Wunde entfernten Umgebung verbindet. Diese Brücke übersetzt ein Gebiet, das mit Haut überzogen ist, und verwächst daher dort nicht. Erst nach Anheilung des Lappens an die Wunde wird der Stiel des Lappens durchschnitten. Dieser ist somit von einem entfernten Orte auf die Wunde übertragen worden. Beispiel: Verfahren nach WICHERKIEWICZ zum Ersatz eines Lidteiles. Ein aus der Haut des Oberlides gebildeter Lappen, dessen Stiel an der Augenbraue gelegen ist, wird über die Lidspalte auf eine Wunde des Unterlides hinübergezogen und dort zur Anheilung gebracht. Nach der Durchschneidung des Stieles ist die Haut des oberen Lides dauernd ein Bestandteil des unteren Lides geworden. Eine solche Verwendung der Haut des oberen Lides ist nur bei reichlichem Hautüberschuß gestattet, da mit Rücksicht auf das Auge jede Verkürzung des oberen Lides vermieden zu werden hat. Denn diese hat größere Gefahren mit sich im Gefolge als Gewebeverluste des unteren Lides.

Nach dem Verfahren von WICHERKIEWICZ kann ferner ein Gewebeverlust des oberen Lides, sogar ein Kolobom, wenn es auf das Gebiet des Knorpels

beschränkt ist, durch einen Lappen ersetzt werden, der dem Unterlide entnommen wird und der, wenn notwendig, selbst alle Schichten des Unterlides enthält (Abb. 52). Bildung eines dreieckigen Lappens aus der ganzen Dicke des Unterlides, Spitze in der Nähe des Lidrandes, Basis in der Gegend des Augenhöhlenrandes. Der dadurch entstandene Gewebeverlust im Unterlide wird zu einer lotrechten Linie vernäht. Zur Verminderung der Spannung wurde vorher von seinen beiden unteren Ecken je ein kurzer waagrechter Schnitt geführt. Der Lidlappen wird nach oben gezogen und in das Kolobom eingenäht. Der Stiel wird nach Einheilung in einer Woche durchtrennt.

3. Eine besondere Art von Gleitlappen ist der *Brückenlappen*, d. h. der doppelt gestielte Lappen. Er kann entweder der Haut entnommen werden, die unmittelbar an den Gewebeverlust anschließt, oder einer anderen Stelle entlehnt und auf den Gewebeverlust von dort hinübergezogen werden. Beispiele:

Bei Verlust des Unterlides Bildung eines über 2 cm breiten Brückenlappens nach KUHN aus dem Lidreste und der unmittelbar angrenzenden Haut der obersten Wange;

oder für denselben Zustand Verfahren nach LANDOLT: Bildung eines Brückenlappens aus dem oberen Lide, Basis außen und innen, Herabziehen des Brückenlappens und Annähen seines unteren Randes an den Hautrand des Gewebeverlustes.

Oder: Bei Narbenektropium des oberen Lides, besonders wenn die Augenbraue durch die Narbe heruntergezogen und in die Augenhöhle hineingezogen

ist: Bildung eines Brückenlappens aus der Haut der Stirne oberhalb der Augenbraue durch 2 der Augenbraue parallele, bogenförmige Schnitte, Herabziehen des Brückenlappens auf die Wunde, die nach Durchschneidung der Narbe durch Rücklagerung des oberen Lides in seine richtige Stellung entstanden ist, nachdem ihre beiden Enden durch waagrechte Schnitte mit den Enden des unteren Schnittes der Stirnhaut verbunden worden sind. Einnähen des Lappens. Durch Vernähung der die Augenbraue enthaltenden Haut mit dem oberen Rande des durch die Entnahme des Stirnlappens gesetzten Gewebeverlustes wird die Augenbraue über den Augenhöhlenrand gehoben.

III. Gestielte Lappen können schließlich als **Wanderlappen** Verwendung finden (v. HACKER). Der freie Rand des Lappens wird zunächst, gewöhnlich nach Drehung um 180°, in einer passend angelegten Hautwunde zur Einheilung gebracht und dient später selbst als Stiel, nachdem der ursprüngliche Lappenstiel durchtrennt worden ist.

Auf diese Weise wechselt der Lappen das zweite Mal seinen Platz, daher der Name Wanderlappen. Beispiel: Wiederherstellung eines fehlenden Bindehautsackes nach L. MÜLLER: Bildung eines Lappens aus der Haut der Stirn, Basis oberhalb der Augenbraue, freier Rand an der Haargrenze. Drehung des Lappens




Abb. 52. Verfahren nach WICHERKIEWICZ zur Deckung eines Koloboms des oberen Lides. Bildung eines dreieckigen Lappens aus dem Unterlide (schwarze ausgezogene Linie).

(Umklappung) um  $180^\circ$  nach unten und Einnähung des freien Lappenrandes in eine im oberen Lide angelegte Wunde. Nach der Einheilung Durchtrennung des Lappenstieles und neuerliche Drehung des Lappens um  $180^\circ$  nach unten mit Einnähung an die hintere Fläche des Unterlides. Schließlich Abtrennung des Lappens vom Oberlide und Einnähung in die Augenhöhle.




Abb. 53. Lappenbildung nach FRICKE zur Deckung eines Hautverlustes am Ober- und Unterlide. *V* Gewebeverlust, *G* Abklatsch aus Guttaperchapapier, dem Gewebeverluste gleich groß zugeschnitten, wird vor Ausschneidung des Lappens auf die betreffende Stelle gelegt, um die Größe des Lappens besser beurteilen zu können. *L* zu umschneidender Lappen.

Nähte befestigen den Lappen in seiner neuen Stellung, so daß er die Lidwunde deckt. Die durch die Entnahme des Lappens erzeugte Wunde wird entweder nach Unterminierung ihrer Ränder durch Nähte wenigstens teilweise geschlossen und der Rest der Verheilung durch Granulation überlassen oder durch Überpflanzung von Epidermis nach THIERSCH oder durch ein ungestieltes Lämpchen bedeckt. Der am Stiele des Lappens durch die Drehung entstandene Wulst verflacht sich in einiger Zeit.

#### KREIBIGS Abänderung des Verfahrens von FRICKE.

**Anzeigen.** Die KREIBIGSchen Lappen eignen sich sehr gut für den Vollersatz der Lider. Für das Oberlid kommen die Fälle in Betracht, wo auch der Tarsus und die Bindehaut mit entfernt werden müssen und daher für die freie Lappentransplantation eine geeignete Unterlage fehlt. Für das Unterlid kommt eine freie Transplantation kaum in Frage, da durch das meist reichliche Bindehautsekret der Lappen zerstört werden kann. Es empfiehlt sich daher dieses Verfahren für alle Fälle von Vollersatz des Unterlides.

Als vorbildliche Verfahren seien einige der früher erwähnten Beispiele genauer beschrieben:

#### 1. Verfahren von FRICKE.

Bei einem langgestreckten Verlust von Haut am Ober- oder Unterlide wird ein Lappen aus der Umgebung gebildet, wie es beistehende Abbildung zeigt (Abb. 53). Die Basis des Lappens schließt sich an den Gewebeverlust an. Mit Rücksicht auf die Zusammenziehung der Haut nach ihrer Ablösung wird der Lappen um ungefähr ein Drittel größer genommen als der Gewebeverlust ist. Ein entsprechend breiter Stiel stellt die Ernährung des Lappens sicher. In derselben Absicht wird auch durch ausgiebige Unterminierung die Drehung des Lappens so leicht als möglich gemacht.

**Ausführung.** Das Narbengewebe oder die Geschwulst wird weit im Gesunden ausgeschnitten. Der nötigen Form entsprechend und etwa um ein Drittel größer wird aus der Stirnhaut ein Hautlappen mit dem Unterhautzellgewebe ausgeschnitten, dessen unterer Rand durch einen Schnitt knapp ober dem Brauenbogen gegeben ist, dessen oberer Rand in entsprechender Entfernung in der Stirnhaut verläuft. Dieser Lappen wird in geschwungener Form entsprechend dem Brauenbogen bis über den äußeren Lidwinkel geführt und von hier bogenförmig gegen das Ohr zu verlängert. Dabei werden die Schnitte so geführt, daß sich der Stiel des Lappens um fast die halbe Lappenbreite vergrößert. Es soll dabei versucht werden, den *unteren* Lappenschnitt bei einem Lappen für



Abb. 54.

das Oberlid in der Fortsetzung der Lidspalte zu legen, bei einem Lappen für das Unterlid den *oberen* Lappenschnitt in Fortsetzung der Lidspalte zu führen (Abb. 54).

Zur Deckung der rückwärtigen Fläche des Lappens, der das Oberlid zu ersetzen hat, genügt ein Vorziehen der Bindehaut der oberen Übergangsfalte. Auf sie wird der Hautlappen aufgelegt. Der neugeformte Lidrand wird durch die Vereinigung des unteren Lappenrandes mit dem Bindehautrand gebildet. Dabei wird die Bindehaut durch ganz zarte Nähte unmittelbar an die Epitheldecke des Lappenrandes befestigt. Beim Ersatz eines Unterlides soll dagegen nach Möglichkeit auch der Tarsus ersetzt werden. Zumeist kann ein kleiner Rest des Tarsus, der am äußeren oder inneren Lidwinkel übriggeblieben ist, nach Spaltung dieses Lidrestes in die Mitte des neuzubildenden Lides verlagert werden. Zu beiden Seiten dieses Tarsusstückes wird genügend Bindehaut aus den seitlichen Taschen vorgezogen und mit Nähten befestigt, so daß auf diese Weise dem neuen Lid genügend Stütze verschafft wird und gleichzeitig auch genügend Bindehaut zur Bildung einer neuen Übergangsfalte vorhanden ist. Der Hautlappen wird in den Defekt eingelegt und mit Knopfnähten befestigt. Auch hier wird am neugebildeten Lidrand die Bindehaut mit zarten Nähten am

Epithelrand des Lappens befestigt. Wir lassen diese Fäden am Lidrand lang, damit ihre Enden nicht in die Lidspalte gelangen und die Hornhaut aufscheuern. Die am äußeren Lidwinkel stehengebliebene Hautbrücke wird mit einem horizontalen Schnitt durchtrennt und wenn nötig durch Ausschneiden eines kleinen Streifens ganz entfernt. Der Defekt an der Stirne läßt sich durch Unterminieren der Ränder fast immer primär schließen. Der Brauenbogen wird dadurch wohl gehoben, doch sinkt er schon nach einigen Wochen fast an die normale Stelle herunter.

*Der Verband* soll einen Druck auf den Lappenstiel nach Möglichkeit vermeiden. Deshalb werden in der Umgebung des Stieles mehrere Lagen von Gaze gelegt und erst dann wird der Lappen mit einem größeren Gazestück überdeckt, so daß der Verband über dem Stiel hohl liegt.

**Nachbehandlung.** Auch hier empfiehlt sich die Anwendung künstlicher Wärme und Prontosil, ferner täglicher Verbandwechsel, um allfällig aufgetretene Hämatome rechtzeitig entfernen zu können. Die langbelassenen Fäden am Lidrande werden schon am 2.—3. Tage entfernt. Die übrigen Nähte am 4.—5. Tage. Gelegentlich stirbt das äußerste Spitzchen des Lappens ab. Nach 8—10 Tagen ist dieses meist nur wenige Millimeter lange Hautstückchen schwärzlich verfärbt. Erst dann wird dieses bereits gut abgegrenzte Hautstückchen ausgeschnitten, worauf der Defekt in ganz kurzer Zeit zuheilt. Auch hier empfiehlt sich das Einschalten eines feuchten Verbandes nach dem 4.—5. Tage. Vom 10. Tage an wird mit vorsichtiger Massage begonnen, die durch längere Zeit vom Kranken fortgesetzt werden soll.

**Vorteile.** Die Ergebnisse dieses Verfahrens sind sehr befriedigend. Durch die Abänderung im Verlaufe des Stieles kann die sonst beim FRICKESchen Lappen auftretende Knickung fast ganz vermieden werden. Ferner ist der ziemlich gestreckt verlaufende Lappen so lang, daß ein Hautmangel kaum jemals auftritt. Auch die starke Verziehung der Lidspalte, die wir sonst beim FRICKESchen Lappen sehen, der nahe dem äußeren Lidwinkel ausgeschnitten wird, fehlt hier. Ferner ist es durch dieses Verfahren möglich, Ober- und Unterlid vollständig zu ersetzen, eine Eigenschaft, die sonst für keine der geübten Lappenverfahren zutrifft. Auch ist es möglich, derartige Stirnlappen zu bilden, deren Stiel über der Nasenwurzel gelegen ist, wenn ein Gewebeverlust am inneren Lidwinkel oder am Nasenrücken zu decken ist.

**Die Nachteile.** Gelegentlich rollt sich der Lappen etwas stärker ein. Für gewöhnlich bleibt er aber vollkommen flach ausgebreitet, da einerseits der Zug in der Längsrichtung nicht sehr groß ist, andererseits aber der Umstand, daß die Innenseite des Lappens genügend gedeckt ist, schrumpfende Narben daselbst nicht entstehen läßt. Bei stärkerer Einrollung genügt ein kräftiges Massieren, um den Lappen wieder geschmeidig zu gestalten. Der Brauenbogen wird oft in ganz beträchtlicher Weise hochgehoben, doch verschwindet diese Verziehung von selbst durch Dehnung der Stirnhaut im Laufe weniger Wochen. Auch der dem FRICKESchen Lappen gemachte Vorwurf, der Unterschied der Haut des Lappens und der Haut der Umgebung sei störend, kann nicht bestätigt werden, da gerade die Stirnhaut sich in ganz ausgezeichneter Weise in die Umgebung der Lider einfügt.

## 2. Verfahren von DIEFFENBACH.

Die Wunde des Lides wird in Dreiecksform gebracht. Die Basis des Dreieckes entspricht dem Lidrande (Abb. 55). In der Verlängerung der Basis wird ein Schnitt nach außen schläfenwärts geführt, etwas länger als der Gewebeverlust, da sich der Lappen nach der Loslösung zusammenzieht. Von dem äußeren Ende des Schnittes wird ein anderer Schnitt nach unten geführt, parallel zu der äußeren Seite des Dreieckes und etwas länger als diese. Der so umgrenzte viereckige Lappen wird abgelöst. Seine Basis liegt nach abwärts. Nach genügender Unterminierung wird er auf den Gewebeverlust hinüberschoben und durch Nähte befestigt. Die an Stelle des Lappens zurückbleibende Wunde wird durch Nähte




Abb. 55. Lappenbildung nach DIEFFENBACH. Ausschneidung des Lides in Dreieckform (Basis  $b\ c$ ),  $b\ a$  waagrechtcr Schnitt nach außen.

nach guter Unterminierung soweit als möglich geschlossen, der Rest der Verheilung durch Granulation überlassen.

**Ersatz des Unterlides.** Soll der nach DIEFFENBACH gebildete Lappen zum Ersatze für ein gänzlich zerstörtes oder abgetragenes Unterlid verwendet werden, so ist das Verfahren mit dem von BÜDINGER, der Einpflanzung eines Ohrknorpelplättchens zum Ersatze des Lidknorpels zu verbinden. Der Hautlappen allein ist nicht geeignet, einen dem Unterlide halbwegs gleichwertigen Ersatz abzugeben. Da er aus Mangel einer knorpeligen Grundlage weich ist, sinkt er herunter und wird durch die Narbenbildung an das Auge herangezogen und angelötet, so daß, da auch die Bindehaut wesentlich verkürzt ist, die Beweglichkeit des Augapfels eine Einbuße erleidet. Außerdem wird die untere Hornhauthälfte durch die aus der Haut des Lappens hervorsprossenden Haare in kurzer Zeit getrübt.

### BÜDINGERS Verfahren der Ohrknorpelplastik.

Nachdem der Hautlappen nach DIEFFENBACH oder FRICKE gebildet und wie früher losgelöst worden ist, wird von der Rückseite des Ohres ein Lappen ausgeschnitten, der die Haut und den Knorpel enthält. Er soll die Länge des unteren Lides haben, einen geraden Rand, der dem Lidrande entspricht und einen zweiten

etwas gewölbten Rand, der den unteren Rand des Lidknorpels nachahmt. Entsprechend der Schmalheit des Tarsus im unteren Lide braucht nur ein schmales Knorpelstück aus dem Ohre entnommen zu werden, dagegen ist zur Deckung der




Abb. 56. Haut-Knorpel-lappen aus der hinteren Fläche des Ohres.

*K* Knorpel, *Hw* Haut, gesehen von der Wundfläche.

Wundfläche das Hautstück größer zu nehmen. Es wird also an der Hinterfläche des Ohres zunächst ein entsprechend langer senkrechter Schnitt durch die Haut gemacht. Diese zieht sich nach der Durchtrennung etwas zurück; erst dort, wo der Hautrand nun zu liegen kommt, wird der Ohrknorpel der Länge des Lidknorpels entsprechend eingeschnitten. Dieser Rand des Lappens bildet den neuen Lidrand. Nun wird das lockere Verbindungsgewebe vor dem Knorpel, d. h. also

zwischen Knorpel und Haut der vorderen Ohrfläche 3 mm weiter durchtrennt und dann von vorneher der Knorpel durchgeschnitten, ohne die Haut der hinteren Ohrfläche zu verletzen. Die Haut dieser Ohrseite wird dann noch etwa 5 mm weiter vom Knorpel abgelöst und schließlich mit einem schwach gewölbten Schnitte abgetrennt. Der abgelöste Lappen zeigt also, von der Wundseite her betrachtet, die Form wie Abb. 56 zeigt. Da der Ohrknorpel zu dick




Abb. 57. BÜDINGERS Ohrknorpelplastik. Der in Abb. 56 abgebildete Lappen ist hier auf den gestielten, zum Ersatze des Lides bestimmten Hautlappen an dessen Rückseite (d. h. Wundseite) so aufgenäht, daß die Haut (*H*) nach rückwärts gegen das Auge gerichtet ist. Der Lappen wird nun an die Stelle des Lides gebracht und so angenäht, daß  $b_1$  an *c* und  $a_1$  an *b* zu liegen kommt.

ist, werden mit dem flach angelegten Messer dünne Schichten davon abgetragen, bis er dem Lidknorpel an Dicke ungefähr gleichkommt. Dieser Lappen wird an den Lidspaltenbezirk des Hautlappens mit mehreren Nähten so befestigt (Abb. 57), daß die Wundflächen aneinander zu liegen kommen, d. h. die Haut des Ohrlappens (*H*) nach hinten gegen den Augapfel gerichtet ist und daß der gerade Rand an dem freien oberen Rande ( $a_1 b_1$ ) des gestielten Hautlappens zu liegen kommt. Damit der Rand durch die Nähte nicht eingekerbt wird, werden

die beiden Enden von 3 doppelt armierten Fäden von rückwärts her, 2 mm unter dem freien Rande durch die Haut und den Knorpel nach vorne durch den Lappen geführt und über einer Glasperle geknüpft. In ähnlicher Weise werden 1 oder 2 Nähte entsprechend dem unteren Rande des Hautknorpellappens nach vorne durchgeführt und geknüpft, um den Lappen an seine neue Unterlage gut anzupassen. Das Ohrknorpelplättchen ist allseitig von Haut umschlossen und ragt nirgends frei vor. Der auf diese Weise nun auch an seiner Hinterfläche mit Haut versehene gestielte Lappen wird nach entsprechender Drehung an die Ränder des Gewebeverlustes angenäht. Um die Hornhaut gegen die mechanischen Schäden des anfänglich harten Lappens zu schützen, der geeignet ist, Erosionen und Geschwüre der Hornhaut hervorzurufen, wird durch 2 oberhalb des Lidrandes in der Haut eingesetzte Nähte das obere Lid weit nach unten gezogen. Die beiden Enden jedes Fadens werden durch die Basis des herübergedrehten Lappens von hinten nach vorne durchgeführt, worauf erst der Lappen in seiner neuen Stellung befestigt wird. So liegt also jetzt das neue untere Lid zunächst dem oberen Lide auf. Die Wunde außen wird durch Nähte verkleinert, wie bei dem ursprünglichen DIEFFENBACHSchen Verfahren. Verband über beide Augen. Erster Verbandwechsel in 2 Tagen. Die Haltenähte des oberen Lides, die über Gazebäuschchen geknüpft wurden, bleiben liegen, bis sie durchschneiden, was in ungefähr 5—6 Tagen eintritt. Aber auch nachher hängt noch mehrere Tage hindurch das obere Lid herunter und bedeckt die Hornhaut. Bis es hinaufgeht, ist der Hautknorpellappen schon angeheilt und die Haut in der feuchten Umgebung so zart geworden, daß die Hornhaut keinen Schaden mehr erleidet. Der Lappen, der anfänglich für ein unteres Lid zu dick und wulstig erschien, wird später allmählich dünner und ahmt ein wimperloses unteres Lid recht gut nach, besonders dadurch, daß er wegen der knorpeligen Grundlage frei emporsteht und nicht durch Narbengewebe an den Augapfel herangezogen wird. Das Verfahren ist besonders dadurch wertvoll, daß die Beweglichkeit des Auges erhalten bleibt und ein tiefer Bindehautsack geschaffen wird; ferner auch dadurch, daß der überpflanzte Lappen frei von Haaren ist und daher zu keiner Reizung der Hornhaut Veranlassung gibt.

Aber nicht immer heilt der Knorpel ein. Wird er nekrotisch und stößt er sich samt seiner Hautdecke ab, so ist das Ergebnis des Eingriffes recht mäßig, indem alle die auf S. 77 angeführten Nachteile des einfach gebildeten DIEFFENBACHSchen Lappens in Erscheinung treten.

Die Überpflanzung des Ohrknorpel-Hautlappens kann auch in der Weise geschehen, daß er zunächst in den Gewebeverlust des Lides sorgfältig eingenäht und erst dann der Hautlappen hinübergelegt und befestigt wird.

Das Verfahren, aus der ganzen Dicke des Ohres im Bereiche des Helix einen Keil auszuschneiden und als Lidersatz zu verwenden, ist wegen der Krümmung und plumpen Gestalt des Ohrrandes weniger zu empfehlen. Auch geht die Anheilung nicht immer ohne Zwischenfälle vonstatten.

KNAPP verwendet den Haut-Ohrknorpellappen in der Weise, daß er bei genügend vorhandener Bindehaut die Haut des Ohrknorpellappens als Ersatz der Lidhaut nach vorne gerichtet einsetzt und durch Nähte befestigt, während der nach hinten gerichtete Knorpel mit der Bindehaut überzogen wird.

KUHNT bildet ein neues Unterlid unter Verwendung der Lidreste nebst der unmittelbar angrenzenden Haut der obersten Wange durch Bildung eines  $2\frac{1}{2}$ —3 cm breiten Brückenlappens. Dieser wird entsprechend gehoben, mit der Beinhaut des Augenhöhlenrandes vernäht und auf der dem Auge zugewendeten Seite mit einem Haut-Ohrknorpellappen versehen.

*Ersatz des Oberlides.*

Siehe KREIBIGS Verfahren S. 75.

LANDOLT versuchte ein oberes Lid aus dem unteren zu gewinnen, indem er den von der Narbe am oberen Augenhöhlenrande abgetrennten, auch an seiner Innenseite angefrischten Rest der oberen Übergangsfalte zwischen die beiden Blätter des gespalteten Unterlides einnäht. Nach Verheilung der Wunde durch Narbenbildung, die zu einer Dehnung aller betroffenen Gewebe führt, wird zugewartet und nach Monaten eine neue Lidspalte angelegt.

Ähnlich wie beim unteren Lide bildet KUHNT bei erhaltenem Augenhöhleenteil des oberen Lides das neue Lid durch einen Brückenlappen.

**Sonstige Anwendung der Verpflanzung eines Ohrknorpellappens.** Die Ohrknorpelplastik kann auch zum Ersatze des Lidknorpels und der Bindehaut herangezogen werden, wenn diese wundärztlich entfernt werden mußten, z. B. bei Abtragung wegen Tuberkulose oder bei der Beseitigung eines Symblepharon, indem dadurch die Wundfläche des Lides gedeckt wird.

**Ersatz der Augenbrauen und Wimpern.** Bei Verbrennungen und Verätzungen, auch bei schweren Verletzungen wird gelegentlich außer dem ganzen Lide auch die Gegend der Augenbraue so zerstört, daß keine Haare zurückbleiben. Entsprechend geschnittene gestielte Lappen aus der Kopfhaut, die einen Streifen Haare an dem einen Rand enthalten, können zur Neuschaffung einer Augenbraue dienen. Soll also neben der Augenbraue das obere Lid ersetzt werden, so wird die Stirnhaut zum Ersatz des Lides verwendet und der Lappen so geschnitten, daß er die Haargrenze in seinem oberen Rand enthält. Ist das Lid vorhanden und nur die Augenbraue zu bilden, so wird aus der Kopfhaut oberhalb des Ohres ein gestielter Lappen gebildet, der in den an Stelle der Augenbraue befindlichen oder dort angelegten Gewebeverlust hinübergedreht wird. Der Lappen wird später zurückgepflanzt und die Augenbraue durch geeignete Ausschneidungen entsprechend verschmälert.

Für das samt den Wimpern verlorene obere Lid kann aus der Augenbraue in der Weise für die Wimpern Ersatz geschaffen werden, daß aus der Stirnhaut durch 2 der Augenbraue parallele bogenförmige Schnitte ein entsprechend breiter Brückenlappen gebildet wird, wobei der untere Schnitt so angelegt wird, daß der obere Rand der Augenbraue mit in den Lappen einbezogen wird (HIRSCHBERG). Der untere Schnitt wird durch seitliche Schnitte mit den beiden Enden des Gewebeverlustes des Lides in Verbindung gebracht, der Brückenlappen vor der Augenbraue heruntergezogen und angenäht, die Augenbraue selbst, die in diesen Fällen durch die Narbe oft heruntergezogen war, mit dem oberen Rande des durch die Entnahme des Lappens entstandenen Gewebeverlustes vernäht und dadurch gehoben (siehe S. 73).

Zum Ersatz der Wimpern empfiehlt LEXER *freie* Transplantation von kleinen behaarten Hautstücken. Zur Entnahme eignet sich nach LEXER am besten die Haargrenze des Nackens, da dort die Haare zarter sind als an der übrigen Kopfhaut. Da die Haare die Kopfhaut schräg durchsetzen, muß das Messer entsprechend schräg geführt werden, damit nicht zu viele Wurzeln abgeschnitten werden. Der Streifen wird 1—2 mm breit geschnitten und in die Wunde am Lidrande eingelegt, welche, wenn nötig, zu diesem Zwecke eigens angelegt wird. Durch die Wundränder werden 2 Seidenfäden geführt und über dem transplantierten Lappen locker geknüpft. Die Haare müssen dann regelmäßig geschnitten werden. Diese Transplantation empfiehlt sich besonders auch, um an den Lidern, die durch Plastik neu gemacht worden sind, Wimpern herzustellen.

Auch die Augenbraue läßt sich durch ungestielte Lappen ersetzen. Es wird ein der Augenbraue in Länge und Breite entsprechender Defekt angelegt und in ihn ein ungestielter Lappen aus einer gut behaarten Stelle der Kopfhaut gebracht.

**Frische Kolobome.** Kolobome der Lider bei frischen Verletzungen haben sofort durch Naht geschlossen zu werden, wenn nicht eine schwere traumatische Schädigung der Wundränder mit ausgedehnter Nekrose oder eine Infektion diesem Vorgehen im Wege steht. Unebenheiten der Wundränder, gequetschte Gewebestückchen und Zacken werden mit der geraden Schere abgetragen und die Ränder zur genauen Anpassung geglättet. Ist die Wunde nicht mehr ganz frisch, so wird ein schmaler Streifen entlang den Kolobomschenkeln in der ganzen Dicke des Lides abgetragen, d. h. die Wunde angefrischt. Die Kolobome haben immer eine dreieckige Form mit dem Lidrande entsprechender Basis.

Die Vernähung des Koloboms wird in 2 Schichten vorgenommen. Die Wunde in der Bindehaut-Lidknorpelplatte mit ihrer Fortsetzung der Fascia tarso-orbitalis wird mit Catgut, darüber die Hautwunde mit Seidennähten verschlossen. Die genaue Anpassung der Lidflügel am freien Lidrande sichert eine durch den intermarginalen Saum geführte, mehrere Millimeter von dem Wundrande entfernt angelegte, kräftige Haltenaht aus Seide. Eine vorübergehende Zusammenziehung ihrer Fäden unterrichtet über die Durchstichpunkte der Catgutnähte im Lidknorpel, die in genau gleicher Entfernung vom Lidrande in beiden Lidflügeln liegen müssen. Auch sonst können in der Entfernung von mehreren Millimetern von den Wundrändern 1—2 kräftige Seidennähte durch die ganze Dicke beider Lidflügel durchgeführt und auf der Haut über Bäuschchen geknüpft werden, um die Gewebe des Lides herbeizuziehen und die Wunde zu entspannen. Dies ist um so notwendiger, je breiter der Gewebeverlust des Lides war, da durch die nach Vereinigung der Wundränder bestehende Gewebespannung die Nähte in Gefahr kommen, auszureißen. Ist die Gewebespannung sichtlich zu groß, so wird sie durch einen den äußeren Lidwinkel spaltenden, nach außen verlaufenden Schnitt (Kanthotomie) mit Unterminierung der an das Lid angrenzenden Haut herabgesetzt. Senkrechte Einschnitte durch die Haut in dieser Gegend entspannen viel ausgiebiger, werden aber nach Möglichkeit vermieden, da sie dauernde Narben hinterlassen. Verband über beide Augen bis zur vollständigen Heilung, also mindestens durch 4—5 Tage, ist eine unumgängliche Forderung, da sonst durch die Mitbewegung des genähten Lides mit den Lidern des offengehaltenen Auges die Nähte zu früh ausreißen.

Neuerdings empfahl LINDNER, den äußeren Lidband-Fascienapparat gründlich zu durchtrennen, um die Wunde zu entspannen. Es wird etwas nach außen vom äußeren Lidwinkel ein etwa  $\frac{1}{2}$  cm langer senkrechter Schnitt durch die Haut angelegt, der Lidwinkel mit einer starken Hakenpinzette gefaßt und medialwärts gezogen, so daß der Lidband-Fascienapparat kräftig angespannt wird. Diese Gewebestränge werden nun mit der Schere so durchschnitten, daß der Lidwinkel selbst bis zur Mitte der früheren Lidspalte verschoben werden kann. Dadurch werden die Wundränder so ausgiebig entspannt, daß der Lidrand mit Sicherheit fehlerfrei, kerbenlos verheilt.

Muß, wie es bei Kriegsverletzungen nicht selten der Fall ist, das schwerverletzte Auge entfernt werden, so sind auch bei großen Kolobomen Entspannungsschnitte überflüssig, da das Lid wegen des Mangels einer Unterlage nicht gespannt ist.




Abb. 58. Verfahren nach LANDOLT zur Deckung eines Gewebeverlustes an dem einen (hier inneren) Ende des Lides. Der Hautlappen ist schon über den Gewebeverlust hinüberschoben und angenäht. Dadurch hat sich außen aus einem Entspannungsschnitt eine dreieckige Wunde in der Haut gebildet.

Ist auch eine saubere Vernähung bei frischen Wunden mit Quetschung der Umgebung oder wegen Entzündungserscheinungen nicht möglich, so können doch durch die eine oder andere Lagerungsnaht die beiden Kolobomschenkel nicht selten teilweise, z. B. wenigstens von dem Wundwinkel an, aneinandergebracht werden, so daß das schließlich sich ergebende Kolobom doch wesentlich kleiner und leichter zu beheben ist, als wenn die Sache unbeeinflusst ihren Weg gegangen wäre.

Liegt das frische Kolobom nicht in der Mitte des Lides, sondern am äußeren oder inneren Ende, so wird die Vernähung in ähnlicher Weise durchgeführt.

Die Vernähung der frischen Kolobome gelingt leicht, wenn keine wesentlichen Gewebeverluste, sondern nur einfache Durchtrennungen gesetzt wurden. Aber auch Gewebeverluste, die ein Drittel der Lidbreite nicht übersteigen, können durch die früher geschilderten Entspannungsschnitte, noch durch Naht gedeckt werden.

Ein ausgiebiger, wenn auch frischer Gewebeverlust an dem einen Ende des Lides aber erfordert schon eine plastische Deckung, für die ein *Verfahren* LANDOLTS gute Dienste leistet. Es kann auch bei künstlich gesetzten Gewebeverlusten dieser Gegend (z. B. bei Entfernung bösartiger Neubildungen) in gleicher Weise verwendet werden. Der erhalten gebliebene Teil des Lides wird im intermarginalen Saume gespalten und das ganze Lid durch ausgiebige Unterminierung in seine beiden Blätter zerlegt. Ein vom Lidrande senkrecht durch die Haut an den dem Gewebeverluste entgegengesetzten Ende bis zur Augenbraue geführter Schnitt bildet aus der Lidhaut einen viereckigen Lappen, der durch Drehung und Verschieben über die klaffende Wunde gebracht wird, so daß die beiden Hautränder der Wunde nunmehr ohne Spannung vernäht werden können. Der ununterbrochene Verlauf des Lides ist damit schon hergestellt.

Denn über die Wunde spannt sich die Haut, und entsprechend dem Einschnitte durch die Haut am anderen Ende des Lides, der sich durch die Verschiebung des Lappens zu einer klaffenden dreieckigen Wunde umgestaltet hat, ist der Lidknorpel unversehrt geblieben (Abb. 58). Diese Wunde heilt durch Granulation und Narbenbildung, wodurch die Haut der Umgebung allmählich hinübergezogen wird.

**Alte Kolobome.** Sind die Ränder der Kolobomschenkel schon vernarbt, so werden sie durch Abtragung einer schmalen Zone mit der Schere angefrischt und nach den früher gegebenen Regeln vernäht. Bei Kolobomen, die auf das Gebiet des Lidknorpels beschränkt und nicht über 1 cm breit sind, gelingt die Vernähung besonders bei gleichzeitiger äußerer Kanthotomie mit Loslösung der Haut von ihrer Unterlage. Die Überbrückung des Koloboms durch ein aus dem Wundrande gebildetes Hautläppchen nach dem Vorschlage von PFLUGK trägt wesentlich dazu bei, zu verhindern, daß sich, wie sonst so häufig, trotz der Vernähung eine Kerbe oder kolobomartige Mulde am Lidrande bildet.

Bei weitergreifenden Kolobomen, die sich über die ganze Höhe des Lides erstrecken, verhindern meist Narbenstränge die gewünschte widerstandslose Annäherung der beiden Schenkel. Die Narben werden daher gründlich ausgeschnitten, in der Nähe des Augenhöhlenrandes ein waagrechter Schnitt zum mindesten durch die Fascie, wenn notwendig auch durch die Haut des Lides hinzugefügt und die Schenkel durch Nähte, wie früher beschrieben, vereinigt. Ist der Widerstand noch nicht überwunden, so gelingt dies nach dem Vorschlage KUHNTS dadurch, daß der ganze temporale Lidflügel beweglich gemacht wird. Dazu wird der äußere Lidwinkel gespalten und der Schnitt bis über  $1\frac{1}{2}$  cm über den Augenhöhlenrand hinaus verlängert; von dem Ende des Schnittes wird in einem Winkel von ungefähr  $40^\circ$  medialwärts verlaufend ein 2. Schnitt angelegt, im unteren Lide nach unten, im oberen Lide nach oben und der ganze Hautlappen bis zum Augenhöhlenrande von der Unterlage abgelöst; schließlich wird noch die Lidfascie von ihrem Ansatz am äußeren Augenhöhlenrande abgetrennt.

Eine leicht ovale Begrenzung der Kolobomschenkel, wie es KUHNTE empfiehlt, läßt unmittelbar nach der Naht den Lidrand an der Vereinigungsstelle etwas vorspringen. Auf diese Weise wird eine Einkerbung des Lidrandes hintangehalten, die sich sonst nach der Vernähung der Kolobomränder einzustellen pflegt.

Sind die Kolobomschenkel auch noch durch Narben nach auswärts gedreht und an dem Knochen angelötet, so müssen beide Lidflügel nach gründlicher Ausrottung der Narbe durch ausgiebige waagrechte Schnitte entlang dem Augenhöhlenrande vollständig freigemacht werden, um in die richtige Lage gebracht und zusammengenäht werden zu können. Die Wunde wird mit gestielten Lappen gedeckt. Der unter ihnen entstandene Hohlraum wird mit Fett, das aus der Seite des Oberschenkels entnommen wird, ausgefüllt.

Große Gewebeerluste mit Vernarbung an dem nasalen oder temporalen Rande des Lides erfordern nach Freimachung und Rücklagerung des Lides in seine richtige Stellung die Deckung der vorliegenden Spalte durch einen der Umgebung entnommenen gestielten Lappen. Seiner Hinterfläche wird ein Haut-Ohrknorpellappen angefügt, der mit dem Bindehaut-Tarsusrand des Lidflügels durch Nähte vereinigt wird.

Plastiken mit gestielten Lappen und gleichzeitiger Anwendung von Ohrknorpelplättchen zum Ersatz des Lidknorpels sind bei ausgedehnten traumatischen Kolobomen allen anderen Verfahren der Deckung vorzuziehen. Denn auf diese Weise kann genügend Haut herangeschafft werden, ohne die Nähte Spannungen auszusetzen, die sie zum vorzeitigen Durchschneiden bringen.




Abb. 59. Abreißung des unteren Lides von seinem inneren Ansätze. Ausschneidung eines Dreieckes im Narbengebiet nach dem Vorgehen von SZYMANOWSKI. Hinzufügen eines kleinen Einschnittes durch die Haut des Lides unter dem Lidrande und parallel dazu. Annähen der Lappenecke *a* in die innere obere Wundecke *b*.

**Abreißung des Lides von seinem Ansätze.** Eine der häufigsten Kriegsverletzungen des Lides ist die Abreißung, besonders des unteren Lides von seinem inneren Ansätze. In der Mehrzahl der Fälle wäre der Übelstand durch primäre Nähte gewiß zu beheben oder durch die eine oder andere Lagerungsnaht die schließliche Stellungsabweichung zum mindesten bedeutend zu verringern gewesen.

Im fertigen Zustande, wenn das innere Lidende unten am Augenhöhlerrande angewachsen ist, das Lid demnach vom äußeren Lidwinkel schräg nach innen unten zieht, wird es auf folgende Weise in die richtige Stellung zurückgebracht: Entlang der Grenze zwischen Bindehaut und Narbe vom inneren Ende des unteren Lides aufsteigend ein Schnitt zum Ansatz des Oberlides und darüber




Abb. 60. KUHNTsche Lidrandplastik. Umgrenzung der Geschwulst (*G*) durch einen bogenförmigen Hautschnitt (*Hs*).

noch einige Millimeter weiter hinaus nach oben innen. Von derselben Stelle aus ein 2. Schnitt nach unten und etwas nach innen und ein 3., annähernd senkrechter, der die Enden der beiden ersten verbindet (Abb. 59). Das durch diese Schnitte umschriebene Dreieck enthält die Narbe und hat daher auch je nach der Ausdehnung des Narbengewebes in den verschiedenen Fällen eine verschiedene Form zu bekommen. Das innerhalb des Dreieckes gelegene Narbengewebe wird ausgeschnitten, so daß eine entsprechend geformte Wundfläche zustande kommt. Das Lid wird gründlich von seinen Verwachsungen gelöst und

wird, nachdem es frei beweglich geworden ist, in die richtige Stellung zurückgeführt. Um durch die Nähte die gewünschte Lage des Lides zu erhalten, wird etwas unter dem Rande des unteren Lides parallel dazu vom Wundrande aus die Haut des Lides einige Millimeter weit eingeschnitten. Dadurch entsteht aus der Lidhaut ein Läppchen, dessen Spitze in dem inneren oberen Winkel der dreieckigen Wunde zuerst befestigt wird. Die übrigen Nähte ergeben sich dann von selbst. Das Lid schmiegt sich dabei in tadelloser Lage an den Augapfel an.

In sinngemäßer Umänderung kann dieser Eingriff bei allen Abreibungen der Enden beider Lider in Anwendung gebracht werden.

**KUHNTS Lidrandplastik.** Wenn bei der Entfernung von Lidrandgeschwülsten (Warzen mit Verdacht auf beginnende Entartung) der Lidrand in seiner ganzen Dicke ausgeschnitten werden muß, besteht die Gefahr, daß eine Kerbe zurückbleibt.

KUHNT ersann für diese Fälle die *Automarginoplastik*, indem er den an der Stelle des Eingriffes verbliebenen Rest des Lidknorpels verschieblich macht und seinen Wundrand zum Lidrande verwendet. Die Geschwulst wird zuerst auf der Hautseite bogenförmig umschnitten (Abb. 60), auf der Bindehautseite aber geradlinig, indem vom Lidrande 2 seitliche senkrechte Schnitte gegen den angewachsenen Rand des Lidknorpels geführt werden und jenseits der Geschwulst ein dem Lidrande paralleler Schnitt angelegt wird (Abb. 61). Nach Entfernung der auf diese Weise von den Schnitten umgrenzten Geschwulst wird die Bindehaut-Knorpelplatte des Lides in der Verlängerung der beiden seitlichen senkrechten Schnitte 1 cm weit gegen die Übergangsfalte zu durchtrennt und von der Hautmuskelplatte losgelöst. Passend angelegte Nähte vermögen dann diesen Lappen so zu heben,

daß er die Randlücke ausfüllt. Zu diesem Zwecke wird auf jeder Seite von einem doppelt armierten Faden eine Nadel durch den Wundrand des Lides von hinten nach vorne durchgeführt, ungefähr 1 mm von den begrenzenden Rändern entfernt, die 2. Nadel durch die Ecke des Bindehaut-Knorpellappens und dann durch die Haut an passender Stelle geleitet, ungefähr 2 mm vom Schnitttrande entfernt (Abb. 62). Beim Zusammenziehen der Fäden wird der Bindehaut-Knorpellappen so gehoben, daß er die Lücke genau ausfüllt. In 6—8 Tagen ist die Heilung eingetreten.

Bei bösartigen Neubildungen, die schon über den Lidrand auf die innere Seite des Lides übergreifen haben, bleibt allerdings bei wirklich gründlicher Entfernung vom Lidknorpel nichts mehr übrig, da nach unserer Anschauung der Schnitt in einer Entfernung von mindestens 5 mm vom Rande der Geschwulst im Gesunden gemacht zu werden hat, der Lidknorpel des unteren Lides aber diese Höhe nicht erreicht. Es kommen daher die für die Behandlung frischer Kolobome gegebenen Grundsätze in Geltung.




Abb. 61. Umgrenzung der Geschwulst auf der Bindehautseite (B) durch gerade Schnitte *a c*, *b d* und *c d* (ausgezogene Linien). Bildung eines Lappens (L) durch Schnitte (gestrichelte Linien) in Fortsetzung von *a c* und *b d*. Das Lid ist über eine Lidplatte (P) nach außen gedreht. Die Punkte bezeichnen die Durchstichstellen der Nähte.




Abb. 62. Nähte angelegt. Das eine Fadenende durch die Wunddecke des Lides, das andere durch die Ecke des Lappens und die Haut.

Ein ähnliches Verfahren, nämlich Bildung eines Gleitlappens aus der Bindehaut-Knorpelplatte, kann auch zum Ersatz des gegenüberliegenden Lides nach einem Verfahren von KÖLLNER angewendet werden. Es eignet sich besonders




Abb. 63. Lappenbildung aus der hinteren Platte des Oberlides nach KÖLLNER. Ausgezogene Linie *E* Bindehaut-Knorpelschnitt. Gewebeverlust im unteren Lide viereckig angelegt.

zum Ersatz eines in der Mitte des unteren Lides gelegenen Gewebeverlustes, der die ganze Dicke des Lides betrifft. Doch wurden von anderer Seite auch befriedigende Erfolge bei Ersatz des Oberlides mitgeteilt.

Nach KÖLLNER wird zum Ersatz des Unterlides folgendes Verfahren eingeschlagen:

Das obere Lid wird umgekehrt und über den GRÖNHOLMSCHEN Löffel ausgebreitet, 2 mm oberhalb des Lidrandes wird parallel zu diesem ein Schnitt gemacht von der Länge des Gewebeverlustes des unteren Lides oder etwas länger. Der Schnitt durchsetzt Bindehaut und Lidknorpel, zum mindesten dessen hintere Schichten. Von den beiden Enden dieses Schnittes werden nach oben senkrecht 2 Schnitte geführt, die über das Gebiet des Lidknorpels, den sie auch

durchsetzen, bis in die Übergangsfalte hineinreichen (Abb. 63). Es kann nun ein Bindehaut-Knorpellappen leicht von der vorderen Lidplatte abgeschält werden, der schürzenförmig von der oberen Übergangsfalte herabhängt. Das obere Lid wird in seine richtige Lage zurückgebracht. Der Lappen wird nun

herabgezogen und durch mehrere Nähte in den viereckig angelegten Gewebeverlust des unteren Lides eingenäht, sowohl an dem unteren Rande wie an den beiden seitlichen Rändern (Abb. 64). Damit ist für das untere Lid Bindehaut und Lidknorpel wiedergewonnen und die nach vorne sehende Wundfläche wird nun mit Epithel versehen, und zwar nach Belieben entweder nach THIERSCH oder mit ungestielten oder gestielten Lappen. Zu beiden Seiten wird die Lidspalte vorübergehend durch Nähte geschlossen, damit die Lidbewegungen die Heilung nicht stören. Verband über beide Augen. Nach 7—8 Tagen wird die Bindehautbrücke zwischen Ober-




Abb. 64. Lappen (*L*) des oberen Lides in den Gewebeverlust des unteren Lides eingenäht. Gestrichelte Linie im oberen Lide Stelle der Lappenentnahme. Zwei seitliche Nähte zum vorübergehenden Verschluss der Lidspalte.

und Unterlid durchschnitten und die Lidränder mit der Schere geglättet.

Das Verfahren kann auch bei Symblepharon des unteren Lides, also besonders nach Verätzungen und Verbrennungen angewendet werden und zeigt hier seine Überlegenheit in Fällen, wo schon Einpflanzungen von Epidermis und Schleimhautlappen ohne Erfolg versucht worden waren.

Auch ein freier Lappen, aus Tarsus und Bindehaut samt einem Stück der Übergangsfalte gebildet, kann nach v. BLASKOVICS verwendet werden, in den

Defekt des unteren Lides eingesetzt zu werden, z. B. nach Ausschneidung einer Geschwulst. Die Haut wird durch einen der Umgebung entnommenen gestielten Lappen ersetzt.

Ektropien mit schweren Läsionen der Knochen gehören schon mehr in die Hände des Chirurgen. Der Augenhöhlenrand wird nach LEXER am besten durch Knorpelspannen ersetzt, die aus dem Rippenbogen entnommen werden. Durch Einlagerung von Knorpel unter das Auge läßt sich auch der Boden der Augenhöhle wieder herstellen, wenn er durch Verletzung zerstört worden ist. Dadurch wird auch das Auge gehoben und gestützt und die ganze Lidspalte nach oben verschoben.

**Eingriffe gegen die Verwachsung der Lider mit dem Augapfel (Symblepharon) und bei Vernarbung des Augenhöhlengewebes.** Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, die der Heilung einer ausgedehnten Verwachsung der Lider mit dem Augapfel im Wege stehen, soll nach Möglichkeit getrachtet werden, die Verwachsung zu verhindern. Als das beste Mittel dazu ist die *Frühtransplantation* zu bezeichnen. Sie soll vorgenommen werden, bevor sich noch Granulationsgewebe gebildet hat. Es ist das Verdienst von PFALZ als erster schon im Jahre 1905 auf die guten Erfolge der freien Transplantation hingewiesen zu haben. PFALZ empfahl, schon am 3.—5. Tage nach der Verbrennung die Rückseite der Lider mit THIERSCHSchen Epidermisplatten zu decken. Dagegen verzichtete er auf eine Deckung der Defekte in der Bindehaut am Augapfel, weil sie überflüssig sei, da die benachbarte Bindehaut durch die Narbe über den Defekt von selbst hinübergezogen wird. Außerdem wirken Epidermisplatten am Auge durch ihr weißes trockenes Aussehen entstellend. Wichtig ist, das Stadium der Granulationsbildung gar nicht abzuwarten, weil aus ihr immer schrumpfendes Gewebe hervorgeht. Es wird also alles nekrotische Gewebe gründlich mit dem scharfen Löffel entfernt, für gute Blutstillung Sorge getragen und dann *ein* großer THIERSCHScher Lappen auf die hintere Seite der Lider gelegt und durch eine Matratzennaht in der Gegend der Übergangsfalte fixiert.

War das Bestreben von PFALZ darauf gerichtet zu verhindern, daß ein Symblepharon entstehe, so legte DENIG (1912) als erster zur Rettung der Hornhaut besonderen Wert auf die sofortige Überpflanzung der Lippenschleimhaut auf die Lederhaut am Limbus, wenn die Bindehaut des Augapfels schwer verätzt oder verbrannt worden war.

#### *Frühplastik der Bindehaut nach DENIG.*

**Anzeigen.** Schwere Verätzungen und Verbrennungen mit Nekrose der Bindehaut des Augapfels, wobei natürlich auch die Hornhaut meist unmittelbar schwer gelitten hat.

**Der Eingriff.** Sorgfältiges Abtragen der abgestorbenen Bindehaut des Augapfels, wenn nötig, rings um die Hornhaut herum. Auch das episklerale Gewebe muß, wenn es mitverätzt worden ist, entfernt und von der Lederhaut müssen einzelne Schichten abgetragen werden, wenn auch diese zugrunde gegangen sind. Entnahme von Lippenschleimhaut. Dazu verwenden wir die LÖWENSTEINSche Lippenklemme, erhältlich bei Fischer in Freiburg. Das Ausschneiden der Schleimhaut aus der Unterlippe ist dadurch wesentlich erleichtert. Denn sie wird gespannt und blutleer gemacht. Die Metallplatte (Abb. 65 a, 65 b) ist eiförmig gekrümmt

und überragt die Ebene des Metallringes beträchtlich. Nachdem die Schleimhaut durch Bepinselung mit 3%iger Cocainlösung unempfindlich gemacht worden ist, wird die Unterlippe eingeklemmt und sie sinkt durch die Schwere der Klemme genügend herab.

Die Platte ist 40 mm lang und 20 mm breit und genügt also meist für die Größe des zu gewinnenden Schleimhautstückes. Sollte der durch die Lippenklemme dargebotene Bezirk nicht genügend groß sein, so wird die Klemme gegen den anderen Mundwinkel zu weitergeschoben und auf diese Weise der Lappen genügend groß gewonnen. Die zugezogene Klemme macht die Schleimhaut völlig blutleer. Auch die Naht kann noch bei zugezogener Klemme angelegt werden, wenn man einen Saum der Schleimhaut innerhalb des Ringes übriggelassen hat. Mit dieser Klemme wird das mühsame Halten und die An-




Abb. 65a. LÖWENSTEINSche Lippenklemme.




Abb. 65b. Im Durchschnitte.

spannung der Lippe durch einen Gehilfen überflüssig. Der Lappen wird mit einer feinen, etwas gekrümmten Schere von den anhaftenden Fettläppchen befreit, so daß er zu einem dünnen Häutchen wird. Sonst bildet er später unschöne Wülste. Der Lappen muß größer gewählt werden als die

zu deckende Wunde, fast doppelt so groß. Mit einem Spatel wird der Lappen auf den Augapfel übertragen. Damit er sich nicht verschieben kann, sollen bei kleineren Lappen 1 Naht, bei Ringlappen 2 Nähte ihn an die Episklera befestigen. Die 1. Nadel eines doppelt bewaffneten Fadens wird zunächst durch die Episklera

dicht am Rande der erhalten gebliebenen Bindehaut und dann durch diese selbst, die 2. Nadel durch den peripheren Lappenrand durchgeführt und der Faden geknüpft. Der periphere Lappenrand wird dann durch einige Nähte an die stehengebliebene Augapfelbindehaut angenäht. Am limbalen Rande werden keine Nähte angelegt. Der Lappen darf den Limbus nicht überschreiten, sonst verwächst er mit der Hornhaut, wenn diese auch einen Gewebeerlust hat. Es ist daher vorerst vor dem Verband beim Blick des Kranken nach innen oben die Lage des Lappens zu überwachen und der hornhautwärts gelegene Rand des Lappens mit einer scharfen gebogenen Schere so zuzuschneiden, daß er über den Limbus nicht hinausragt. Doppelseitiger Verband durch 5 Tage. Aber jeden Tag Verbandwechsel und Reinigung des Bindehautsackes mit physiologischer Kochsalzlösung. Die Nähte werden erst nach 10 Tagen entfernt. Wird der Lappen abgestoßen, so kann eine neue Überpflanzung versucht werden.

**Ergebnisse.** Um ein richtiges Urteil zu gewinnen, muß man sich zunächst darüber klar sein, daß diesem Verfahren Grenzen gezogen sind. Ist nicht nur die Bindehaut, sondern auch die Sklera nekrotisch geworden, wie es besonders bei Ammoniakverätzungen der Fall ist, so kann der Schleimhautlappen nicht anheilen. Selbst schon eine Nekrose des episkleralen Gewebes macht die Aussichten auf eine Anheilung geringer. Immerhin kann auch in solchen Fällen

der Versuch gemacht werden, durch Abtragen der nekrotischen Gewebeschichten im Bereiche der Episklera und der vorderen Sklerallamellen die Überpflanzung zu ermöglichen. Ein Schaden wird dadurch gewiß nicht angerichtet.

Da man nun vor dem Eingriffe nicht erkennen kann, wie tief die Verätzung reicht, ob sie sich nur auf die Bindehaut beschränkt oder ob sie auch tiefere Lagen ergriffen hat, so wird in allen Fällen, wo eine ausgedehnte Nekrose der Bindehaut des Augapfels besteht, die Überpflanzung von Schleimhaut durchzuführen sein.

Die erhaltende Behandlung wird also in Zukunft nur bei leichten Verätzungen beizubehalten sein, wo die Bindehaut nur oberflächlich gelitten hat oder nur in geringem Umfange nekrotisch geworden ist.

Je früher die Lippenschleimhaut nach Ausschneiden der nekrotischen Bindehaut überpflanzt wird, um so besser das Ergebnis für das Auge. Die günstigsten Erfolge erzielt man, wenn der Eingriff schon 1—4 Stunden nach dem Unfalle ausgeführt wird; je längere Zeit verstreicht, um so weniger erfolgreich die Überpflanzung. Dies wird in der Weise erklärt, daß die Schädigung nicht nur durch die unmittelbare Wirkung des Ätzstoffes hervorgerufen sei, sondern daß sich in der verschorften Bindehaut noch immer Ätzmaterial befinde, das neuen Schaden anrichten könne. Dazu kommen noch die Ernährungsstörungen in der Hornhaut, die sich mit der Zeit in um so höherem Grade einstellen werden, je länger keine ernährnde Schleimhaut vorhanden ist.

Besonders Ärzte, die an Stellen tätig sind, wo es, wie besonders in chemischen Industriebetrieben, häufig zu Verätzungen der Augen kommt, treten immer mehr für das DENIGSche Verfahren ein. Nicht nur, daß viele Augen, die sonst als verloren zu gelten hatten, mit brauchbarem Sehvermögen gerettet werden, wird auch der Heilverlauf bedeutend abgekürzt. Der Zweck des Eingriffes ist, durch möglichst rasche Wiederherstellung einer von Capillaren durchsetzten Schleimhaut der Hornhaut wieder Nährstoffe zuzuführen und eine weitere Schädigung hintanzuhalten. Dazu ist freilich eine gewisse Zeit notwendig.

DENIG hat die Überpflanzung von Lippenschleimhaut auf die bloßgelegte Lederhaut um den Limbus herum auch für hartnäckigen *Pannus* warm empfohlen. Wir selbst haben nie Veranlassung gehabt, diesen Eingriff vorzunehmen, um eines *Pannus* Herr zu werden. Aus den Trachomländern liegen über die Wirksamkeit dieses DENIGSchen Eingriffes einander widersprechende Berichte vor.

Nach histologischen Untersuchungen von KREIKER scheinen die überpflanzten Mundschleimhautlappen nach einer vorübergehenden Einheilung in späteren, vielleicht Jahre beanspruchenden, chronisch-entzündlichen Vorgängen zugrunde zu gehen.

Ist nach Ablauf der Vernarbung das Lid mit dem Auge nur durch einzelne Stränge verlötet, so ist es angezeigt, diese zu durchtrennen, wenn die Beweglichkeit des Auges durch sie gestört wird (Doppeltsehen). Die Wunde muß gedeckt werden, damit die beiden Wundflächen nicht wieder zusammenheilen können. Bei schmalen Strängen reichen passend angelegte Nähte aus. Die angrenzende Bindehaut wird zu diesem Zwecke unterminiert, damit sie sich durch die Naht über die Wunde hinüberziehen läßt, wozu Entspannungsschnitte in der Umgebung von großem Vorteile sind.

Ist aber die Bindehaut in größerer Ausdehnung zerstört gewesen, d. h. das Symblepharon ein breites, so ist nicht genügend davon vorhanden, die Wunde zu decken. Dagegen gelingt die Deckung manchmal durch einen aus der Um-

gebung genommenen gestielten Bindehautlappen oder durch einen ungestielten Lappen, der aus einer passenden Stelle gewonnen wird, meistens aus der oberen Übergangsfalte oder aus der Bindehaut des anderen Auges desselben Kranken.

Die meisten Eingriffe gegen Symbblepharon erstrecken sich auf das Gebiet des unteren Lides. Ist z. B. ein innen oder außen unten bestehendes Symbblepharon durchtrennt worden, und muß der Gewebeverlust wegen seiner Größe auf plastische Weise gedeckt werden, so wird dies durch gestielte Bindehautlappen besorgt, die, in der Umgebung der Wunde gebildet, auf diese hinübergedreht und durch Nähte befestigt werden. Der durch die Entnahme der Lappen erzeugte neue Gewebeverlust wird der allmählichen Vernarbung überlassen, da er, jenseits der Wunde des Lides gelegen, keine Verwachsung von neuem veranlaßt; oder er wird durch Unterminierung und Naht nach Möglichkeit verkleinert.

Ist für gestielte Lappen aus der Umgebung nicht genügend Bindehaut zur Verfügung, so wird ein ungestielter Lappen verwendet, der aus der oberen Übergangsfalte ausgeschnitten wird. Einige zarte Seidennähte halten ihn in seiner neuen Stellung fest. Diese Entnahme ist nur dann möglich, wenn die Bindehaut der oberen Übergangsfalte nicht auch narbig verändert ist. Eine gesunde Übergangsfalte bietet reichlich Bindehaut für breite Lappen. Ist sie aber geschrumpft, so kann die Bindehaut mit sicherer Aussicht auf Einheilung dem anderen Auge des Kranken entnommen werden.

Pfropfungen mit Kaninchenschleimhaut sind wertlos. Wenn sie ausnahmsweise einheilt, so schrumpft sie nachträglich so stark, daß der Erfolg vollständig verlorengeht.

Bei allen diesen Verfahren kann aber nur die Wunde der Augapfelbindehaut gedeckt werden, da nicht genügend Bindehaut zur Verfügung steht, auch die Lidwunde zu versorgen. Wenn nun auch einseitige Deckung in den meisten Fällen halbwegs hinreicht, so ist es doch immerhin besser, beide Wunden mit Epithel bekleidet zu haben. Denn für den Fall, daß der eine Lappen nicht anheilt, kann sich doch kein Symbblepharon wieder bilden. Dann sprechen auch andere Gründe dafür: wird der Gewebeverlust am Lide nicht gedeckt, so dreht die schrumpfende Narbe das Lid allmählich nach einwärts, bis die Lidhaare die Hornhaut reizen, oder die aus der unbedeckten Wunde am Augapfel hervorgegangene Narbe schränkt die Beweglichkeit des Auges ein. Es wurden daher zahlreiche Verfahren erdacht, um auch die Wunde der Lidfläche plastisch zu decken. Sie bestanden wie die sämtlicher plastischer Eingriffe entweder in der Übertragung gestielter Lappen aus der Umgebung oder ungestielter Epidermis-lappen oder Schleimhautlappen (Lippen-Scheidenschleimhaut). Gelegentlich kann die ein Pseudopterygium bildende, auf den Augapfel hinübergezogene Bindehaut nach sorgfältiger Ablösung von der Anwachsungsstelle zur Deckung der Wunde auf der Lidseite verwendet werden, indem der Lappen auf die hintere Seite des Lides geschlagen und sein freier Rand mit einer Naht befestigt wird, während die Wundfläche auf der Lederhaut mit Mundschleimhaut versorgt wird.

Besonders bei totalem Symbblepharon des unteren Lides erscheint es als unabweislich, insbesondere die Lidwunde zu decken. Der Gewebeverlust der Augapfelbindehaut ist zu groß, als daß er in seiner Gänze von anderwärts her-

genommener Bindehaut bekleidet werden könnte. In diesen Fällen leistet eine zusammengesetzte Schleimhaut-Hautplastik sehr gute Dienste. Nach gründlicher Durchtrennung der Narbe und Bekleidung eines Teiles der Wunde am Auge durch einen aus der oberen Übergangsfalte entnommenen ungestielten Lappen oder einen Lappen von Lippenschleimhaut wird die Wunde am Lide durch einen Hautlappen gedeckt, der nach dem *Verfahren von ROGMAN* aus dem unteren Lide genommen wird (Abb. 66). Aus der Haut des unteren Lides wird ein Lappen ( $a b c d$ ) gebildet, dessen Stiel ( $a d$ ) gerade in der Höhe der neuen Übergangsfalte gelegen ist. Dieser Lappen ist so lang und so hoch als das Lid. Nun wird von der Tiefe der Übergangsfalte aus entsprechend der Linie  $a d$  das ganze Gewebe durchtrennt, so daß nur die Haut unversehrt bleibt. Durch diese Spalte wird der Lappen so hineingedreht, daß seine Wundfläche der Wunde des Lides zugekehrt ist und der Rand  $b c$  des Lappens mit dem Lidrande durch einige Nähte befestigt werden kann. Der Lappen heilt sicher ein, da er durch seinen Stiel mit der Umgebung in Zusammenhang steht. Die Wunde am Lide außen wird so gut als möglich vernäht. Zunächst aber bleibt eine Spalte offen, die von außen in den neuen Bindehautsack führt. Nach ungefähr 8 Tagen wird die Brücke durchtrennt, worauf sich die Spalte durch eine Narbe verschließt. Diese Abänderung ist dem ursprünglichen Verfahren von ROGMAN vorzuziehen, wonach später noch ein 2. Mal aus der übriggebliebenen Haut des Unterlides ein Lappen gebildet und durch die Spalte hineingedreht wurde, um die Wunde in der Augapfelbindehaut zu decken. Denn für diesen 2. Lappen ist zu wenig Lidhaut vorhanden.

Am gründlichsten wird ein totales Symblypharon des unteren Lides nach folgendem Verfahren beseitigt:

Durchtrennung der Narbe wie sonst mit dem Messer. Darauf Kanthotomie nach außen. Vom Ende des Hautschnittes wird nach unten und etwas nach außen ein 3 cm langer Schnitt geführt, von dem aus die Haut gegen das Lid zu abgelöst wird, so daß schließlich das ganze untere Lid als freier Lappen gegen die Nase zurückgeschlagen werden kann. Dabei wird bis unter das Gebiet der Narbe in das gesunde Gewebe eingedrungen. So wird eine große Wundfläche gebildet, die sich vom Limbus in einer Ebene bis zum Lidrande erstreckt. Nach den schon besprochenen Regeln wird ein entsprechend geformter großer zarter Lappen aus der Haut des Oberarmes gebildet und auf den Lidteil der Wundfläche übertragen. Der Lappen wird mit einigen feinen Nähten am Lidrande befestigt und ebenso unten mit Matratzennähten an der Stelle, die der Übergangsfalte entspricht. Die Wunde am Augapfel wird mit einem Lappen bedeckt, der




Abb. 66. Lappenbildung nach ROGMAN. Nach Durchtrennung der Verwachsung zwischen Augapfel und Unterlid wird aus der Haut des Unterlides der Lappen  $a b c d$  gebildet, der in  $a d$  seine Basis hat. Dieser Lappen wird durch eine Spalte so nach rückwärts gedreht, daß der Rand  $b c$  an den Lidrand angenäht werden kann und die Haut — die Bindehaut ersetzend — gegen den Augapfel gewendet ist. (Drehung des Lappens um 180 Grade.)

aus der Lippenschleimhaut gewonnen worden ist. Das Lid wird darauf in seine richtige Lage zurückgedreht und der Eingriff mit der Vernähung der ursprünglichen Wunden beendet. Verband über beide Augen. Erster Verbandwechsel nach 3 Tagen. Frühzeitiges Einlegen eines Kunstauges ist empfehlenswert, um eine Schrumpfung des neugebildeten Sackes zu verhindern.

Auch folgendes Verfahren ist geeignet, freien Raum in einer vernarbten Augenhöhle für ein Kunstauge zu schaffen:

Nach gründlicher Durchtrennung der Narbe und Freimachen des Oberlides wird ein gestielter Lappen aus der Schläfe durch einen am äußeren Ende des oberen Lides angelegten senkrechten Schnitt in die Augenhöhle hineingezogen, so daß seine Wundfläche mit der der Augenhöhle verwächst. Nähte halten ihn in der gewünschten Stellung fest. Die Wundfläche der hinteren Lidseite wird mit einem ungestielten Lappen (äußere Haut, Lippen- oder Scheidenschleimhaut) bedeckt, der durch Matratzennähte befestigt wird. Nach Einheilung des Schläfenlappens wird der Stiel durchtrennt und die Wunde verschlossen. Ein gleicher Eingriff wird in einigen Wochen am Unterlide vorgenommen, hinter das




Abb. 67. Platte zum Einlegen in den unteren Bindehautsack nach dem Verfahren nach HAITZ. (Nat. Größe.)

durch einen an seinem äußeren Ende angebrachten senkrechten Einschnitt ein gestielter Lappen aus der Jochbein-Wangengegend hineingedreht wird. Auch am unteren Lide wird die hintere Lidseite durch einen ungestielten Lappen gedeckt, damit das Lid durch die Narbenbildung an seiner hinteren Seite nicht nach einwärts gedreht wird. Volle Glaskörper werden unmittelbar nach dem Eingriffe eingelegt, um den gestielten Lappen gegen die Unterlage zu drücken und das Lid abgehoben zu erhalten.

Das Einlegen von ungestielten Lappen ohne vorherige Ablösung der Lider durch Kanthotomie und Anschlußschnitt ist weniger zu empfehlen, da bei dem beschränkten Raume der Einblick in die Wunde erschwert ist und der Lappen schlechterdings nicht angepaßt werden kann. Bessere Ergebnisse werden erzielt, wenn der ungestielte, der Innenfläche des Oberarmes entnommene Lappen mit seiner Epithelseite über eine Glaseinlage gelegt wird, die mit dieser Bedeckung nach Durchtrennung der Narbe hinter die Lider geschoben wird, wie es zuerst von MORTON und MAY gemacht worden war. Als besonders geeignet zum Einlegen in die Wundhöhle zwischen Auge und Lid empfiehlt HAITZ Celluloidplatten, die aus den überall käuflichen Augenklappen in richtiger Form und Größe leicht zugeschnitten werden können und den Vorteil haben, sich durch Auskochen keimfrei machen zu lassen. Für den unteren Fornix wählt man für die einzulegende Scheibe die Halbmondform, und indem man an ihrem dem Lidrande entsprechenden Rande 6 Nahtlöcher anbringt, kann sie durch Nähte am Lide befestigt werden. Man macht sie ungefähr 3 cm lang und in ihrer größten Höhe etwa 13 mm hoch (Abb. 67). Das Verfahren gestaltet sich also nach HAITZ so, daß zunächst die den Lidrand an das Auge heftende Narbe durchtrennt und daß unter Durchschneidung aller Stränge so weit mit dem Messer nach unten eingegangen wird, bis dieses allseits den Knochen berührt. Der aus der Innenfläche des Oberarmes ausgeschälte Hautlappen wird mit der Wundseite nach unten so aufs Auge gelegt, daß der obere Rand den Limbus berührt, während das Auge mit der Haltezange nach oben gezogen ist. Die vorbereitete Celluloid-

schale wird nun mit ihrer gehöhlten Fläche nach hinten, mit ihrem konvexen Rande nach unten auf den Lappen aufgelegt und mit den Fingern der rechten Hand angedrückt erhalten. Der Zeigefinger der linken wird von unten her unter den Lappen geschoben, das untere Lid so stark wie möglich nach außen gedreht, so daß es schließlich über die untere Kante der Platte hinübergleitet, gleichzeitig mit der unteren Lappenhälfte, die sich dabei nach oben umschlägt. Nunmehr schieben die Finger der rechten Hand Platte und den augenwärts gelegenen Lappenteil tief in die Tasche hinab. Während der obere Plattenrand andauernd niedergedrückt gehalten wird, wird die überpflanzte Haut mit einem Irisspatel geglättet. 3 Nähte mit doppelt benadeltem Faden befestigen schließlich den Plattenrand an den lidseitigen Lappenteil und Lidrand. Die Nadeln werden von der Rückseite der Platte durch die Nahtlöcher, den Lappenrand und durch das Lid gerade nach vorne geführt, so daß sie 3 mm unterhalb des Lidrandes in der Haut zum Vorschein kommen, wo sie über kleinen Gazebäuschchen geknüpft werden. Mit 2 feinen Seidenfäden wird der Limbusrand des Lappens mit den Resten der Bindehaut an der Hornhaut vereinigt. Einstreichen von Fett hinter die Platte. 3—4 Tage Verband über beide Augen, darauf einseitiger Verband. Entfernung der Platte und Nähte nach 8 Tagen.

Das Einlegen von Lappen, die über passend geformte Körper gelegt werden, dient auch zur Wiederherstellung eines verengten Bindehautsackes bei geschrumpftem oder fehlendem Auge, um das Tragen eines künstlichen Auges zu ermöglichen. Bei Kriegsverletzten bot sich dazu häufig Gelegenheit. Nachdem sämtliche Narbenstränge durchtrennt und die Lider freigemacht worden sind und der Augapfel ausgeschält und das Narbengewebe der Augenhöhle, soweit es mangelhaft mit Blutgefäßen versehen ist, ausgeschnitten worden ist, wird die große Wundfläche, die die beiden Hinterseiten der Lider und das freiliegende Höhlengewebe umfaßt, mit einem feinsten Hautlappen gedeckt, der der Innenfläche des Oberarmes entnommen worden ist. Einige Nähte befestigen ihn an die Wundränder im oberen und unteren Lid. Seine Anpassung auf das Gewebe, wo die Übergangsfalte wieder erstehen soll, sowie auf das bloßliegende Höhlengewebe besorgt eine Vollprothese, die in Form und Größe passend auszuwählen ist. MÜLLER in Wiesbaden liefert solche aus Glas geblasene Voll- und Schalenaugen von verschiedenster Form und Größe, mit entsprechenden geriffelten Greifflächen, die ein bequemes Anfassen mit Pinzetten gestatten. Auch durchlöchernte Kunstaugen, die durch die Öffnung einen Einblick auf die Beschaffenheit des eingepflanzten Lappens gewähren, können verwendet werden. Das entsprechend gewählte Auge wird durch die Lidspalte eingeführt und der Lappen, nach Verschuß der Lidspalte mit Heftpflaster, durch einen Verband an seine Unterlage angedrückt gehalten.

Verband über beide Augen. Auch nach Anheilung des Lappens hat das Auge andauernd getragen zu werden, damit sich der Sack nicht wieder verkleinere. Durch Einlegen größerer Körper kann er mit der Zeit sogar etwas ausgedehnt werden.

ESSER macht sich zuerst einen Abdruck der Wundtasche mit Stents composition und unwickelt die auf diese Weise gewonnene Moulage mit THIERSCHSchen Lappen, führt sie in die Wundtasche ein und vernäht die Wundränder darüber.

Um die Augenhöhle nach Wunsch zu formen und um namentlich zu verhindern, daß der eingelegte Körper durch das schrumpfende Narbengewebe herausgedrängt wird, wurden eigene Vorrichtungen ersonnen (BRUHN). Diese



Abb. 68.

werden an Kopf und Gebiß angebracht, so daß sie unbeweglich sind, und tragen an einem Balken, der gegen die Augenhöhle gerichtet ist, Kugelgelenke, durch die dem daran befestigten Kunstauge jede beliebige Stellung gegeben werden kann. Es ist damit ein dauerndes Hineindrücken des entsprechend geformten Körpers in die Augenhöhle gewährleistet, bis der Vernarbungsprozeß vollständig abgelaufen ist.

v. CSAPODY hat zu diesem Zwecke eine handliche Vorrichtung angegeben, welche geeignet ist, den Lappen in die Augenhöhle hineingedrückt zu halten.

v. CSAPODYs Verfahren der Höhlenplastik mit entzweigeteiltem Hautlappen.

v. CSAPODY vertritt den Vorteil der totalen Höhlenplastik gegenüber den Eingriffen, die nur auf einen größeren Abschnitt beschränkt bleiben. Der Leit-

gedanke des Eingriffes von CSAPODY zielt einerseits auf eine Anwachsung des Lappens an den knöchernen oberen und unteren Augenhöhlenrand und auf eine Beeinflussung der Schrumpfrichtung durch Einschneiden des Lappens auf dem Boden der Augenhöhle. Dadurch wird nämlich die Richtung der Schrumpfung gegen den Höhlenrand gelenkt.

**Werkzeuge.** Hergestellt bei der Firma Redl-Jonke, Budapest.

1. Eine Musterplatte aus Metall (Abb. 68) dient zur Umschneidung des Hautlappens.

2. Der Lappenspreizer (Abb. 69), über welchen der ausgeschnittene Hautlappen befestigt und gespannt wird, so daß dadurch die primäre elastische Schrumpfung des eben ausgeschnittenen Lappens ausgeglichen wird. So wird der Lappen in die vorbereitete Höhle eingelegt.



Abb. 69.

Der Lappenspreizer hat löffelartig geformte Endstücke. Der obere Löffel ist etwas größer als der untere. Die Kanten der Löffel sind abgerundet. Der Spreizer ist in 2 Teile zerlegbar; wird er entfernt, so werden die Löffel nach Öffnen der Schraube zueinander geschoben.

Der nach der Musterplatte ausgeschnittene Hautlappen bildet, auf den Spreizer aufgezogen, eine ununterbrochene Oberfläche, da die Musterplatte eigentlich die Projektion der Löffeloberfläche auf eine Ebene ist. Der Lappen kann daher die Höhle lücken- und faltenfrei bedecken.

**Das Verfahren.** 1. Die Augenhöhle wird vorbereitet.

Der Eingriff beginnt mit ausgiebiger Kanthotomie bis zum äußeren Orbitalrande, wobei die Lider gründlich freigemacht zu werden haben. Von diesem Schnitte aus wird unten und oben mit großer gebogener Schere der Tarsus samt Bindehaut in einer Entfernung von 3 mm vom Lidrand durchgeschnitten und der ganze narbig geschrumpfte Bindehautsack entfernt. Wird der Lidteil der




Abb. 70.

Tränendrüse freigelegt, so wird sie ausgeschnitten. Nun wird der Lappenspreizer in die Wundhöhle gelegt und zunächst die richtige Weite eingestellt. Die Löffel des Spreizers müssen oben und unten an dem knöchernen Augenhöhlenrande liegen. Der Spreizer wird nunmehr zusammengeschoben, um aus der Höhle entfernt werden zu können. Diese selbst wird mit Gaze ausgestopft.

2. Der Hautlappen wird aus dem Oberarm ausgeschnitten.

Die Musterplatte wird der Länge nach auf die haarlose Innenfläche des Oberarmes gelegt, nachdem zuvor die Haut durch Einspritzung von Novocain unempfindlich gemacht worden war. Die Haut wird in voller Dicke ausgeschnitten, aber die Fascie über dem Fettgewebe hat möglichst geschont zu werden. Der freipräparierte Lappen bleibt auf der Oberarmwunde liegen und wird ebenda auf den Lappenspreizer genäht. So bleibt die Wundfläche des Lappens bis zum letzten Moment ausschließlich mit eigenem Serum in Berührung und wird nur wenig abgekühlt.

Nachdem der Spreizer wieder in die richtige, früher bestimmte Weite gebracht worden ist, drückt ihn der Gehilfe auf die Mitte des Lappens. In dieser Lage wird der Lappen mit kräftigen Seidenfäden an den Spreizer angenäht, der untere Rand an den unteren Stiel des Spreizers, der obere Rand an den oberen Stiel. Die Fäden werden über den Löffelarmen geknotet. Um den Lappen in horizontaler Richtung anzuspannen, werden jetzt seitliche Nähte angelegt. Diese haben die seitlichen Ränder des Lappens in den beiden Augenwinkeln zu befestigen. Die Nähte werden in den Lappen eingesetzt, solange er noch an Ort und Stelle auf der Oberarmwundfläche ruht. Ein doppeltbewaffneter Faden wird in den Lappen zwischen den medialen Löffelrändern und einer zwischen den lateralen Löffelrändern mit durchgezogener Glasperle angelegt. Nunmehr




Abb. 71.

erst wird der Spreizer mit dem Lappen erstmalig vom Oberarme abgehoben und vor die mit 2 Löffeln weit aufgespreizte Augenhöhle übertragen (Abb. 70). Bevor man ihn jedoch in die Augenhöhle selbst einführt, wird zunächst die Naht des medialen Lappenrandes im medialen Lidwinkel durchgestochen. Erst jetzt wird das Instrument in die offengehaltene Augenhöhle versenkt, wobei der Spreizer vorübergehend etwas zusammengeschoben werden mag. Die beiden Löffel müssen an der knöchernen Augenhöhlenwand richtig sitzen, die Arme des Spreizers dürfen nicht zu fest an die Innenseite der Lider gedrückt werden.

Nun wird die Naht des lateralen Lappenrandes durch die Wundlippe des Canthus externus in der Gegend des Orbitalrandes ausgestochen. Die beiden Winkelnähte werden über einer Perle geknüpft und der Lappen dadurch in der Waagrechten ausgespannt. Nun wird der Spreizer so weit geöffnet, bis er den Lappen in senkrechter Richtung spannt. Die Schraube wird in dieser Stellung des Spreizers festgezogen. Die 2 Löffel müssen an den Rändern der Augenhöhle sitzen, nicht aber in die Augenhöhle sinken. Von besonderer Wichtigkeit sind

nun die Entspannungsschnitte, welche jetzt durch die Mitte des Lappens mit einem GRAEFESchen Messer gemacht werden (Abb. 71): mehrere in 3 Reihen angebrachte horizontale Einschnitte. Der Verschuß der Kanthotomiewunde beschließt den Eingriff, wobei die höhlennahe letzte Naht durch den lateralen Zipfel des Lappens geführt wird. Sollte der Lappenrand irgendwo zurückgerutscht sein, so wird eine feine Naht an dieser Stelle angelegt. Durch einen festen Tampon mit Xeroformgaze, der durch den Sperrteil des Instrumentes zurückgehalten wird, werden die freiliegenden Lappenteile gegen das Augenhöhlengewebe gedrückt und dadurch noch weiter gedehnt. Verband. Vereinigung der Armwunde mit MICHELSchen Klammern.

**Nachbehandlung.** Der Spreizer bleibt mindestens eine Woche liegen. Dann werden die Nähte entfernt und der Spreizer nach Öffnen der Schraube herausgenommen. Eine weitere Woche lang wird die Höhle fest ausgestopft, wobei besonders auf die Übergangsfalten und die Winkel zu achten ist. Vor Ablauf von 15 Tagen darf kein Kunstauge eingelegt werden. Droht sich die Augenhöhle bedenklich zu verengern, wird der Spreizer wieder für einige Zeit eingelegt.

**Ergebnisse.** Das Oberlid kann nach diesem Eingriffe nicht gehoben werden, aber das Kunstauge vermag das Lid genügend hoch zu halten. In einem größeren Hundertsatz der Fälle ist der Erfolg dauernd, das Gebiet der Höhle bleibt groß genug, um einem Kunstauge genügend Platz zu geben.

## Fünftes Kapitel.

# Eingriffe gegen die Einwärtskehrung des Lides und der Lidhaare.

(Entropium und Trichiasis.)

Die Einwärtsdrehung des Lides kommt bei Altersveränderungen seiner Gewebe (Erschlaffung der Haut, leichtere Verschiebbarkeit der Gewebe des Lides in sich) durch die Zusammenziehung des Schließmuskels zustande (Entropium senile). Ihre Entstehung wird u. a. durch den Druck eines Verbandes auf die Lidränder sehr begünstigt. Die hornhautwärts gedrehten Lidhaare erhöhen durch den auf das Auge ausgeübten Reiz den Krampf des Muskels, wodurch die Stellungsänderung dauernd wird. Der schmale Lidknorpel des unteren Lides setzt der Einwärtsrollung ein geringeres Hindernis entgegen als der breite des oberen. Daher tritt das sogenannte *Entropium spasticum* gerade im unteren Lide auf.

Dieser Krankheitszustand wird durch Eingriffe behoben, die auf den Lidrand einen Zug in lotrechter Richtung ausüben, wie dies durch Verkürzung der Lidhaut bei Ausschneidung waagrechter Falten oder durch Anlegung passender Nähte bewirkt wird (GAILLARDS *Naht*).

Auch Eingriffe, die in der Weise die Stellung des Lides beeinflussen und berichtigen, daß durch sie ein Druck auf den gewölbten Knorpelrand in der Richtung nach rückwärts ausgeübt wird, kommen hier in Betracht (v. GRAEFES *Verfahren*).

Oder der Lidrand wird dadurch in seine richtige Stellung zurückgedreht, daß der untere Rand des Knorpels verkürzt wird (L. MÜLLERS *Verfahren*. — Gruppe I).

Eine andere Ursache für die Entstehung der Einwärtsdrehung liegt in der trachomatösen Bindehautentzündung. Teilweise auch unter dem Einfluß der Muskelwirkung (SCHNABEL), besonders aber durch Veränderungen in der Haut (Erschlaffung und Faltenbildung), ferner durch die mechanischen Folgen der Schrumpfung der Bindehaut und die anatomischen Veränderungen des Lidknorpels (bindegewebige Verdickung nach lange dauernder Entzündung, besonders in seinen hinteren, der kranken Bindehaut benachbarten Schichten mit folgender Schrumpfung und dadurch hervorgerufener kahnförmiger Verkrümmung) wird die Lidrandfläche aufgestellt und schließlich nach einwärts gedreht, so daß die Lidhaare auf der Hornhaut schleifen und einen dauernden Reiz hervorrufen.

Unter den vielen, gegen diese Art von Entropium vorgeschlagenen Eingriffen vermögen die am besten den Fehler abzuschaffen, wo die gelockerte und erschlaffte Lidhaut zur dauernden Richtiglagerung an den gewölbten Rand des Lidknorpels angeheftet und dieser durch Ausschneidung des ihn verdickenden

und verhärtenden Narbengewebes geschmeidig gemacht wird, so daß er aus seiner verkrümmten Stellung in die richtige Lage zurückgebracht (gestreckt) werden kann. Dadurch kehren dann auch die Lidhaare in ihre richtige Stellung zurück (Verfahren von HOTZ-ANAGNOSTAKIS — Gruppe II).

Bei vorgeschrittenem Zustande dieser Erkrankung und Mitbeteiligung des Haarwurzelbodens gesellt sich zu den beschriebenen Veränderungen auch eine echte *Trichiasis* dazu, d. h. ein Mißwuchs der Lidhaare, indem diese nicht mehr in regelmäßiger Anordnung und Richtung aus dem vorderen Lidrande hervorkommen, sondern, oft verbogen und verstümmelt, in schräger Richtung durch den Lidknorpel nach rückwärts durchwachsen.

Die durch die angeführten Verfahren bewirkte Wiederherstellung der richtigen Lage des Lidknorpels und der Lidrandfläche genügt dann nicht mehr, die Einwärtskehrung der Lidhaare, die nun nicht mehr eine bloße Folge der Stellungsänderung des Lides, sondern unabhängig davon eine Folge ihres Mißwuchses ist, verschwinden zu machen. Es müssen Eingriffe ausgeführt werden, die eine ausgiebigere Änderung der Lidrandstellung herbeiführen (Tarsoplastik). Als solche Verfahren werden hier die von SNELLEN und PANAS beschrieben werden. Es handelt sich um Eingriffe, die zwar nicht mehr eigentlich die Ursache und die Art der Entstehung der Liderkrankung berücksichtigen, aber doch außer der Einwärtskehrung des Lidrandes auch der der Lidhaare, d. h. der *Trichiasis* ein Ende machen. Sie stellen somit eine *Verbindung von Entropium- und Trichiasis-eingriffen* dar (Gruppe III).

Völligen Verzicht auf die Heilung des Entropiums und seiner Ursachen leisten schließlich die Verfahren, die sich auf die Fortschaffung der Lidhaare aus der Umgebung des Auges beschränken, so daß die Hornhaut nicht mehr gereizt und geschädigt werden kann. Es wird durch sie die schädliche Wirkung der *Trichiasis* aufgehoben, ohne daß die falsche Stellung des Lides, das Entropium, geändert, noch auch der Mißwuchs als solcher beeinflußt wird (Gruppe IV).

Hierher gehören die Verfahren, durch die die Lidhaare ausgerottet werden (Abtragung des Haarzwiebelbodens nach FLARER) und durch die der Haarzwiebelboden vom Lidrande weggeschoben wird. Die dadurch entstehende Wunde wird mit Epithel bedeckt: Lidrandplastik. Dazu werden gestielte oder ungestielte Hautlappen oder Schleimhautlappen verwendet. Von den zahlreichen Eingriffen dieser Art werden im folgenden die STELLWAGSche Abänderung des FLARERSchen Verfahrens und die WALDHAUERSche Abänderung des JAESCHE-ARLTSchen Verfahrens kurz erwähnt, das Verfahren von SPENCER WATSON und die von v. MILLINGEN eingeführte Schleimhautplastik genauer beschrieben werden.

Alle diese Verfahren sind nur gegen die *Trichiasis* gerichtet und sind für jeden Mißwuchs der Lidhaare anwendbar, aus welcher Ursache er auch hervorgegangen ist. Besonders Ärzte, die in Ländern tätig sind, wo schwere und namentlich vernachlässigte Fälle von Trachom an der Tagesordnung sind, werden gerade von diesen Verfahren Gebrauch machen müssen, während sie in unseren Ländern kaum noch angewendet werden.

Zur Heilung des Hineinstehens einzelner Haare dient die *elektrolytische Epilation*, die zuletzt besprochen werden wird.

Eine Sonderstellung nimmt die *Ausschälung des Lidknorpels* nach KUHN bei Entropium durch Narbentrachom ein, die im Anhang beschrieben werden wird.

## I. Gruppe. Krampfentropium.

### Entropium spasticum (senile).

#### 1. Richtigstellung des Lides durch *unblutige Verkürzung der Haut in lotrechter Richtung*.

In Fällen eben entstandener (z. B. bei Starausziehung unter dem Verband) und vorübergehender Einwärtsdrehung des unteren Lides kann versucht werden, das Lid durch Pflasterstreifen in die richtige Stellung zurückzuführen und darin bis zum Verschwinden der Ursache zu erhalten. Zu bevorzugen ist BAIERSDORFS Paraplast, da es fast immer ohne Reizung der Haut oder Ekzembildung getragen wird. Vor Anlegen der Streifen wird die Haut sorgfältig abgetrocknet, da sonst das Pflaster nicht klebt. Die ungefähr 1 cm breiten und 2 cm langen Streifen werden knapp am Lidrande durch leichten Druck befestigt. Das Lid wird in die richtige Stellung gezogen und durch entsprechendes Festkleben des unteren Streifenendes an der Wange darin erhalten.




Abb. 72. GAILLARDSche Naht. An der höchsten Stelle des einwärtsgedrehten Lides liegt das 3 mm lange Fadenstück, dessen beide Enden unter der Haut bis zum unteren Augenhöhlenrand geführt sind.

Sollte das Pflaster nicht genügend gut kleben oder wegen einer Erkrankung der Lidhaut (nässendes Ekzem od. dgl.) nicht angewendet werden können, so leisten MICHELsche Klammern gute Dienste. Sie werden nach vorhergehender anästhesierender Injektion unter die Haut des Lides mit Hilfe einer eigenen Pinzette in senkrechter Richtung angelegt, die Lidhaut entsprechend verkürzend, und einige Tage belassen, bis die Ursache des Lidkrampfes behoben ist.

Sehr häufig verschwindet die Einwärtsdrehung bei diesen Kranken von selbst durch Weglassen des Verbandes. Zum Schutze gegen mechanische Schädigungen wird ein FUCHSSches Gitter, dessen Drahtnetz mit schwarzem Tuche überzogen ist, ohne Unterlegung von Verbandmaterial angewendet. Schon am Tage nach dem Eingriffe kann der Verband auf diesen mechanischen Schutz beschränkt und das Auge unbedeckt gelassen werden, wenn die Schnittwunde nicht klappt. Es besteht alsdann keine Gefahr für die Wunde, durch das Oberlid bei den reflektorischen Bewegungen aufgestellt zu werden.

2. Die Verkürzung der Haut durch die *Ausschneidung eines queren ovalen Hautstückes* übt einen Zug auf den Lidrand in senkrechter Richtung aus und stellt ihn richtig. Durch Aufheben einer Hautfalte mit dem Finger wird ungefähr gemessen, wieviel Haut entfernt werden muß, um das Lid in die richtige Stellung zu bringen. Es genügt meist ein Stück von  $\frac{3}{4}$  cm Höhe. Auf der untergelegten Hornplatte wird es nach Einspritzung von Cocainlösung unter die Haut mit Messer oder Lanze umschnitten und abgelöst. Die Wunde, deren oberer Rand knapp am Lidrand liegen muß, wird durch mehrere Nähte in senkrechter Richtung geschlossen. Die Narbe wird später völlig unsichtbar. Wegen der Nachgiebigkeit

und der sich bald einstellenden Dehnung der Haut taugt dieser Eingriff nur für Einwärtsdrehungen, die durch vorübergehende Ursachen hervorgerufen werden. Eine ausgiebige Dauerwirkung kann aber bei dem Wundverschluß durch Anlegen der Nähte nach dem Verfahren von HOTZ (siehe später) erzielt werden.

3. **GAILLARDS Naht** (Abb. 72) stellt das einwärtsgedrehte Lid durch eine *Faltenbildung* der Haut richtig, die eine vorübergehende Verkürzung in senkrechter Richtung herbeiführt. Zur Naht werden kräftige Seidenfäden verwendet, deren beide Enden mit langen, flach gekrümmten Nadeln versehen sind. Beide Nadeln werden, 3 mm voneinander entfernt, durch die Haut auf der Höhe der Krümmung des eingerollten Lides (d. i. ungefähr 3 mm vom Lidrande entfernt) eingestochen, unter der Haut in senkrechter Richtung bis zum unteren Augenhöhlenrand geführt und hier ausgestochen (Abb. 73). 2 Nähte solcher Art genügen: Eine an der Grenze des inneren und mittleren Drittels, die andere an der Grenze des mittleren und äußeren Drittels. Werden die beiden Enden jedes Fadens über einem Bäschchen Gaze geknüpft, nachdem auch unter die Fadenschlinge auf dem Lide ein Röllchen gebracht worden ist, so wird die Höhe des eingerollten Lides nach unten gezogen, eine Falte der Haut des unteren Lides abgeschnürt und dadurch der Lidrand aus seiner Stellung herausgedreht und vom Auge abgezogen. Nach 4—5 Tagen werden die Nähte entfernt, indem die Fadenschlinge über dem Röllchen durchschnitten und der Faden unten aus der Wunde gezogen wird.

4. Das **Verfahren nach GRAEFE** wirkt durch Verkürzung der Haut in waagrechtlicher Richtung.

Es wird ein dreieckiges Stück aus der Haut des Unterlides nach folgender Art ausgeschnitten (Abb. 74). Der erste Schnitt verläuft parallel mit dem Lidrande in einer Entfernung von 3 mm und ist 3 cm lang. Von den beiden Enden *bc* seines mittleren Drittels gehen nach unten konvergierend die beiden anderen Schnitte *be* und *ce*, ein gleichschenkeliges Dreieck *bce* bildend. Das so umschriebene Hautstück wird ausgeschnitten. Die seitlichen Wundränder werden etwas unterminiert.

Die 1. Naht vereinigt die beiden Wundwinkel *b* und *c* miteinander. Die Haut wird also in waagrechtlicher Richtung verkürzt und entsprechend dem unteren Rande des Lidknorpels angespannt. Dadurch wird dieser gegen das Auge gedrückt, während der freie Lidrand vom Auge weg nach vorne gedreht wird. Die Wunde wird durch 2 weitere waagrechte Nähte zu einer lotrechten Linie geschlossen.



Abb. 73. Senkrechter Durchschnitt durch das einwärtsgekehrte untere Lid mit eingelegtem Faden.




Abb. 74. GRAEFES Verfahren. 3 cm langer waagrechtlicher Hautschnitt *a d*, parallel dem Lidrande. 3 mm davon entfernt. Vom mittleren Drittel *bc* zwei nach unten zusammenlaufende Schnitte *be* und *ce*. Das durch sie umschriebene Hautstück wird ausgeschnitten. Nach Unterminierung Vernähung der beiden Ränder *be* und *ce* in waagrechtlicher Richtung.

Unmittelbar nach dem Eingriffe befindet sich das Lid in starker Auswärtsdrehung, und zwar so, daß der mittlere Teil des Lides pürzelförmig vorspringt; aber diese unschöne Stellung des Lides verschwindet innerhalb weniger Tage, da die Haut genügend nachgibt und das Lid wieder in die richtige Stellung zurückgleiten läßt. Liegt die 1. Naht zu nahe dem Lidrande, so hat sie gerade den entgegengesetzten Erfolg und erhöht das Entropium durch den Druck, den die angespannte Haut auf den freien Lidrand nach rückwärts gegen das Auge ausübt. Befindet sie sich aber zu weit unten, unterhalb des Lidknorpels, so hat sie keinen oder kaum einen Einfluß auf die Stellung des Lides. Der erste, dem Lidrande parallele Schnitt muß daher genau dem unteren Rande des Knorpels entsprechen und daher 3 mm vom Lidrande entfernt sein. Hat das Lid nach dem Eingriffe Neigung, was gelegentlich vorkommt, aus der Auswärtsstellung nach einwärts umzuzschnappen, so muß die Auswärtsstellung unter dem Verbande durch ein Gazebäuschchen aufrechterhalten werden, das in der Höhe des unteren Randes des Knorpels angelegt, diesen nach rückwärts gegen das Auge drückt. In 3—4 Tagen können die Nähte entfernt werden.

5. Das **Verfahren von L. MÜLLER** dreht den Lidrand nach außen durch Verkürzung des unteren Knorpelrandes.

**Örtliche Betäubung.** Nach Cocainisierung des Bindehautsackes Einspritzen einer kleinen Menge einer 1%igen Cocainlösung unter die Haut in der Mitte des Unterlides.

**Der Eingriff.** Das untere Lid wird nach außen gedreht, am besten mit einer Lidklemme, wie zu einer Hagelkorneröffnung verwendet, deren eines Blatt eine Platte, deren anderes Blatt ein ovaler Ring ist.

Man schneidet aus Bindehaut und Knorpel ein Dreieck aus, dessen Spitze ganz nahe dem freien Lidrande liegt, dessen Grundlinie vom unteren Knorpelrande gebildet wird. Die Spitze des Dreieckes bleibt eine Spur unter dem freien Lidrande, so daß dieser unversehrt bleibt. Die Grundlinie hat eine Länge von 4—5 mm. Sodann wird eine Naht angelegt, die die beiden Wundränder des Knorpels samt Bindehaut ganz nahe dem unteren Knorpelrande vereinigt. Verband für 1 Tag. Die Naht stößt sich von selbst ab.

**Ergebnisse.** Dauernde Heilung auch in hartnäckigen Fällen, wo andere Eingriffe versagt haben.

## II. Gruppe.

Als Vertreter dieser Gruppe sei das

### **Verfahren nach HOTZ-ANAGNOSTAKIS**

beschrieben.

**Örtliche Betäubung.** Der Bindehautsack wird durch Einträufeln von 3%iger Lösung von Cocain unempfindlich gemacht. Unter die Haut wird in der ganzen Länge des Lides  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  ccm einer 1%igen Cocainlösung mit Zusatz einiger Tropfen Suprareninlösung (1 : 1000,0) eingespritzt, wobei die Nadel auch in die tieferen Lidschichten (Muskel) geführt wird und bei dickem Knorpel auch in dessen Gewebe eingesenkt werden kann.

**Verfahren.** Wie bei allen Eingriffen, wo ein Schnitt in das Lid gemacht zu werden hat, wird unter das Lid die Hornplatte geschoben, um das Auge zu

schützen und eine feste Unterlage zu schaffen. Die Hornplatte wird vom Gehilfen gegen das Lid gedrückt, um es zu spannen und die Blutung durch den Druck zu verringern.

In der ganzen Länge des Lides wird mit einem Messer oder einer Lanze ein Schnitt durch die Haut gemacht, der, ungefähr 3 mm über dem Lidrande gelegen, gleichgerichtet mit ihm verläuft. Nach Ablösen der Haut von der Unterlage liegen in der Wunde die parallel zum Lidrande verlaufenden roten Fasern des Schließmuskels bloß. Sie werden durch Unterminieren der Haut in der ganzen Breite des Knorpels, vom Lidrande bis zum oberen Knorpelrande, bloßgelegt. Mit einer Hakenpinzette an dem einen Ende der Wunde in ihrer ganzen Breite zu einem Bündel aufgefaßt, werden sie mit der flach angelegten, kleinen gekrümmten Schere (Abb. 75) in einem Zuge bis zum anderen Wundende abgetragen. Die ganze Oberfläche des Knorpels wird dadurch bloßgelegt.

Dieser ist meist schwer erkrankt: er ist bedeutend verdickt, durch narbige Umwandlung hart und zeigt wegen einer kahnförmigen Verkrümmung eine gewölbte vordere Fläche. Die schöne Streifung, die die in einem gesunden Knorpel befindlichen MEIBOM'Schen Drüsen hervorrufen, fehlt. Diese sind größtenteils zugrunde gegangen und von ihnen sind nur noch unregelmäßige Reste übriggeblieben. Dieses unnütze, die Verkrümmung des Lides verursachende Narbengewebe wird ausgeschnitten und der Knorpel hinlänglich dünn gemacht. Zu diesem Zwecke wird ein feines Skalpell oder kräftiges GRAEFESCHES Messer mit seiner Fläche nur wenig geneigt zur vorderen Fläche des Lidknorpels knapp unter dessen oberen Rande angelegt (Abb. 76), und mit sägenden Bewegungen nach unten werden dünne Platten aus ihm herausgeschnitten. Der obere Rand soll unverdickt zurückbleiben, da er zur Befestigung der Nähte dient und sich um ihn das Lid in seine richtige Stellung zurückdrehen hat. Der untere Rand des Knorpels darf nicht verletzt werden.




Abb. 75. Ausschneidung der den Lidknorpel (K) bedeckenden Fasern des Schließmuskels (M). Die Pinzette faßt sie in der ganzen Höhe der Wunde am linken Ende des Schnittes, die kleine gekrümmte Schere wird knapp an den Knorpel angelegt und löst mit kleinen Schnitten den Muskel in der ganzen Länge des Lides ab.




Abb. 76. Das flach an die vordere Fläche des verdickten und gewölbten Knorpels (K) angelegte Messer schneidet dünne Platten aus ihm heraus. Der obere Knorpelrand und der Lidrand bleiben unberührt.

Es wird somit in der vorderen Fläche des Lidknorpels eine Furche angelegt, die ihn soweit verdünnt, daß er durch die Nähte leicht

nach auswärts gebogen werden kann. Eine Durchbohrung sollte dabei vermieden werden, da sonst der Knorpel beim Anziehen der Nähte an dieser Stelle winkelig abknickt. Auch kann es durch die Durchschnitsstelle zu Nachblutungen in den Bindehautsack kommen.




Abb. 77. Die drei Fäden sind angelegt. Sie gehen oben durch die Haut (o. H.), dann durch den oberen Rand des Knorpels (K), worin sie fest verankert sind und schließlich durch den unteren Hautrand (u. H.) ober den Lidhaaren.

**Anlegen der Nähte.** Die Nähte haben die Aufgabe, der Haut einen Stützpunkt am Knorpel zu geben und diesen aus seiner nach rückwärts verbogenen Stellung herauszudrehen, ihn zu „strecken“. Beides wird dadurch erreicht, daß der untere Wundrand der Haut an den oberen Rand des Knorpels angenäht und dauernd daran befestigt wird. Mit diesem Hautrande wird aber auch der freie Knorpelrand, der mit dem Lidrande innig verbunden ist, gegen den oberen Knorpelrand bewegt. Wegen des senkrechten Abstandes dieser beiden Punkte muß sich daher durch die Naht der untere Knorpelrand nach

vorne und oben biegen und durch die Befestigung des mit ihm innig verbundenen unteren Wundrandes der Haut an den oberen Rand des Knorpels dauernd in dieser Stellung erhalten bleiben.




Abb. 78. Senkrechter Durchschnitt durch das obere Lid nach Zusammenziehen der Naht. Die Hautwunde ist geschlossen, der Lidknorpel nach vorne gekrümmt. Die Lidhaare sind nach vorne und oben gerichtet.

Die Nähte, die durch die beiden Hautwundränder und den oberen Knorpelrand durchgeführt werden, werden in folgender Weise angelegt (Abb. 77):

Die mittlere Naht wird entsprechend der Mitte des Lides zunächst durch den oberen Wundrand der Haut geführt. Während dann der Gehilfe die Haut etwas zurückzieht, um den oberen Rand des Lidknorpels freizulegen, wird in diesem der Faden bei waagrechter Richtung der Nadel verankert, womöglich ohne Durchlöcherung der Bindehaut. Der Gehilfe läßt nun den oberen Wundrand der Haut wieder heruntersinken, so daß der Faden nunmehr an der dem oberen Hautstiche entsprechenden Stelle durch den unteren Rand der Hautwunde durchgeführt werden kann. Zu beiden Seiten dieser mittleren Naht wird je 1, bei langen Lidern werden je 2 Nähte in gleicher Weise angelegt.

Die mittlere Naht wird zuerst geknüpft. Der Gehilfe paßt die beiden Ränder der Hautwunde mit einer Hakenpinzette aneinander. Während der Faden angezogen wird, biegt sich der Knorpel mit dem freien Lidrande nach vorne und etwas nach oben, so daß er zunächst unter einer leichten Überberichtigung vom Auge absteht (Abb. 78). Die übrigen Nähte werden mit gleicher Vorsicht geknüpft und die Fadenenden knapp abgeschnitten.

**Verband.** Die geschlossenen Lider werden mit einem einfachen Verband bedeckt, der durch Unterlage eines mit Salbe bestrichenen Guttaperchapapiers an die Wunde anzukleben verhindert wird. Das andere Auge braucht nicht verbunden zu werden. Verbandwechsel wie bei jedem Eingriffe an den Lidern am nächsten Tage. Die Nähte werden nach 4 Tagen entfernt.

**Ergebnisse. Bemerkungen.** In der beschriebenen Weise ausgeführt, hat dieser Eingriff sehr zufriedenstellende Ergebnisse. Da der Lidrand dabei nicht berührt wird, bleibt seine richtige Form gewahrt, was für ein tadelloses Aussehen von großer Bedeutung ist. Auch darin liegt ein großer Vorteil des Verfahrens, daß der krankhaft schwere Knorpel durch die Ausschneidung eines großen Teiles seines Gewebes leicht gemacht wird. Dadurch wird namentlich auf eine trachomatöse Ptosis der beste Einfluß ausgeübt. Dazu kommt als weiterer Vorzug des Verfahrens der Umstand, daß die Stellung des Lides ohne Verkürzung berichtigt wird. Dies bedeutet gerade bei dem zur Deckung der Hornhaut sehr wichtigen Oberlide einen besonderen Vorteil, da durch die Narbenbildung in den Geweben des Lides nicht selten eine entschiedene Verkürzung des Gesamtlides eingetreten war.

Es soll nicht geleugnet werden, daß dem Verfahren auch einige Mängel anhaften. Da der Knorpel in der Mitte am breitesten ist und gegen beide Enden zu schmaler wird, macht sich der Einfluß des Eingriffes in der Mitte mehr geltend als an beiden Seiten. So ist gelegentlich die Stellungsverbesserung an beiden Enden des Lides nicht genügend. Es kann an dieser Stelle durch Ausschneidung eines schmalen Hautstreifens der Einfluß der Naht erhöht werden. Nur ausnahmsweise darf zu dem gleichen Zwecke an der betreffenden Stelle ein kurzer Einschnitt in den intermarginalen Saum gemacht werden, so daß durch die Naht die Hautplatte des Lides gehoben wird und die Lidhaare vom Auge entfernt werden. Die kleine Wunde im intermarginalen Saum wird der Vernarbung überlassen.

Sonst darf aber bei diesem Eingriffe kein Einschnitt in den intermarginalen Saum gemacht werden. Da nämlich dadurch die vordere (Haut-)Platte des Lides mit den Lidhaaren vom unteren Rande des Knorpels freigemacht wird, verliert die Naht jeglichen Einfluß auf die Stellung des Knorpels. Es würde dann durch das Zusammenziehen der Fäden nur eine Verschiebung der Haut mit dem Haarzwiebelboden erreicht, aber keine Vorwärtsrollung des unteren Knorpelrandes und Streckung des Knorpels bewirkt werden. Der verdickte und harte Knorpel bliebe also nach wie vor in der Richtung gegen die Hornhaut verkrümmt und schädigte sie durch das beständige Reiben. Die im intermarginalen Saum gesetzte Wunde käme ferner durch ein Narbengewebe allmählich zur Verheilung und auch dadurch würde das Endergebnis in ungünstiger Weise beeinflußt werden.

Die Naht kann unten außer durch den Hautwundrand auch durch das Gewebe des Knorpels knapp ober dem Lidrand durchgelegt werden, um die Sicherheit der Befestigung der Naht und ihren Einfluß auf die Streckung des Lidknorpels zu erhöhen. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn der Hautschnitt hoch angelegt worden war — entlang dem oberen Knorpelrande, wie es in dem ursprünglichen Verfahren vorgeschrieben war. Wird aber der Hautschnitt, wie hier beschrieben, näher an den Lidrand verlegt, so ist der schmale, an dem Lid-

rande zurückgelassene Hautsaum so innig mit dem unteren Knorpelrande verbunden, daß es genügt, den Faden durch die Haut allein durchzuziehen, um den Lidknorpel aufzurollen.

Die Naht soll aber nicht durch den intermarginalen Saum geführt werden, weil der Faden in den vorderen Lidrand eine Furche einschneidet und Haarwurzeln zerstört.

Wird der Eingriff mit gründlicher Verdünnung des Lidknorpels vorgenommen, so ist eine Wiederkehr der unrichtigen Lidstellung, die bei dem ursprünglichen Verfahren nichts Seltenes war, nicht zu befürchten. Bleibt der Knorpel dick, so ist die Naht meist nicht imstande, ihn zu strecken, und ferner kann durch Fortschreiten der narbigen Schrumpfung der gewonnene geringe Einfluß des Eingriffes wieder verlorengehen.

Im *unteren* Lide hat dieser Eingriff wegen der geringen Höhe des Knorpels einen schwächeren Einfluß als im oberen, er kann aber durch Ausschneidung eines schmalen Hautstreifens verstärkt werden.

Durch die muldenförmige Verdünnung des Knorpels nähert sich das beschriebene Verfahren in gewisser Beziehung denen der

### III. Gruppe: der Tarsoplastik.

1. SNELLENS Verfahren. Der Hautschnitt und die Ausschneidung der Muskelfasern werden in gleicher Weise wie bei dem HOTZschen vorgenommen. Aus dem bloßliegenden Lidknorpel wird ein keilförmiges Stück in der Weise




Abb. 79. SNELLENSches Verfahren. Aus dem Lidknorpel (K) wurde ein keilförmiges Stück (k) ausgeschnitten. Die Nähte sind angelegt. H Haut, M Muskel.

entfernt, daß mit einem Starmesser in der ganzen Länge des Knorpels zwei waagrechte, ungefähr 2—3 mm voneinander entfernte Schnitte angelegt werden, von denen der untere ungefähr 2 mm vom Lidrande entfernt ist. Sie durchsetzen das Gewebe des Knorpels in schräger Richtung, so daß sie sich nahe seiner hinteren Fläche treffen, ohne jedoch die Bindehaut zu verletzen.

Der auf diese Weise umschriebene Keil, dessen Fuß also nach vorne sieht und dessen Spitze gegen die Bindehaut gerichtet ist, wird ausgeschnitten. Die dadurch entstandene keilförmige Wunde (Abb. 79) wird durch eine Naht folgender

Art geschlossen: Beide Nadeln des doppelt armierten Seidenfadens werden durch den oberen Rand des Ausschnittes nahe der Mitte des Lides durchgeführt, dann in die untere Keilfläche eingestoßen und kommen durch die Haut knapp ober den Lidhaaren wieder zum Vorschein (Abb. 80). Werden die beiden Enden der Naht über einer Glasperle geknüpft, so wird der keilförmige Ausschnitt

zum Verschluß gebracht und dadurch der Lidrand nach vorne gedreht. Es werden 3 solche Nähte angelegt. Die Hautwunde wird durch mehrere Nähte geschlossen. Diese werden in 3—4 Tagen herausgenommen. Je breiter die Basis des Ausschnittkeiles gewählt wird, um so größer wird die Drehung, die der Lidrand beim Knüpfen der Nähte ausführt. Auf diese Weise können die verschieden hohen Grade des Fehlers in gewünschter Weise beseitigt werden.

2. Ein noch wirksamerer Eingriff ist das Verfahren von PANAS. Mit seiner Ausführung wird auf die Wiederherstellung normaler Lageverhältnisse des Knorpels und Lidrandes zwar verzichtet, aber der Einwärtskehrung des Lidrandes und der Lidhaare ein gründliches Ende bereitet.

Nach Einführung einer Hornplatte unter das durch die Einspritzung empfindungslos gemachte Lid durchtrennt ein Schnitt, der ungefähr 3 mm vom Lidrande mit einem Messer oder einer Lanze in der ganzen Länge des Lides gleichlaufend mit dessen Rand geführt wird, Haut und Fasern des Schließmuskels. Die Muskelfasern brauchen nicht ausgeschnitten zu werden. Der Knorpel wird bis zu seinem oberen Rande freigelegt. Unmittelbar oberhalb des Lidrandes und gleichlaufend damit wird mit dem Messer in der ganzen Länge des Lides ein Schnitt durch Knorpel und Bindehaut gemacht.

Der Schnitt möge an beiden Enden des Lides ganz wenig vom Lidrande abweichen, um dem Lappen eine etwas breitere Basis zu sichern.

Dadurch wird der Lidrand ein beweglicher Lappen, der nur an den beiden Lidwinkeln mit der Umgebung noch in Zusammenhang steht. Dieser Lappen hat durch Nähte in einer solchen Weise an der Vorderfläche des bloßliegenden Knorpels befestigt zu werden, daß er im rechten Winkel anheilt. 4 Nähte werden angelegt, deren Fäden mit dünnen, stark gekrümmten Nadeln doppelt versehen sind. Die eine Nadel wird in den Lidknorpel knapp oberhalb des Durchschnittees tief verankert, indem sie, gleichgerichtet mit dem Schnitttrande gehalten, in seine Gewebe eingeführt und knapp daneben wieder daraus hervorgestoßen wird. Ein Durchbohren der Bindehaut ist leicht zu vermeiden, da der Knorpel hinreichend dick ist. Sollte es aber doch geschehen, so hat dies keine Bedeutung, weil das kleine, auf der hinteren Lidfläche bloßliegende Fadestück sich so in die Bindehaut hineinzieht, daß die Hornhaut nicht geschädigt wird.




Abb. 80. Senkrechter Durchschnitt durch das obere Lid bei dem SNEELLESEN'Schen Verfahren. A keilförmiger Ausschnitt aus dem Lidknorpel (K). Die Naht (N) angelegt.




Abb. 81. Verfahren nach PANAS. Nach Anlegung des Haut- (H) Muskelschnittes (M) wurde der Lidknorpel (K) samt Bindehaut in der ganzen Länge des Lides auf der untergelegten Hornplatte durchgeschnitten. Der mittlere Faden ist bereits angelegt. Oben wurde er nahe am Wundrande des Knorpels (K) befestigt. Beide Enden des Fadens gehen nach unten zwischen Knorpel und Muskel und kommen im intermarginalen Saume hinter den Lidhaaren hervor. Über das eine Fadende ist eine Perle gezogen.

Nach dieser Befestigung des Fadens im Lidknorpel werden beide Fadenenden unten zwischen Muskel und Knorpel des freien Lidrandlappens durch- und im intermarginalen Saum herausgeführt (Abb. 81). In gleicher Weise werden die übrigen Nähte angelegt.

Während darauf durch den Gehilfen der Lidrandlappen mit 2 Pinzetten nach vorne gedreht und in die neue Stellung, nämlich senkrecht auf die Vorderfläche des Knorpels, gebracht wird, wird der mittlere, über eine Perle gezogene Faden geknüpft (Abb. 82). Er soll nicht stark zusammengezogen werden, damit die Perle auf den Lidrand keinen Druck ausübt, da dieser zu umschriebenem Gewebetod und Verlust von Lidhaaren führen kann; doch muß die Naht genügend angezogen werden, damit der Lappen sicher befestigt wird. In gleicher Weise




Abb. 82. Senkrechter Schnitt durch das obere Lid nach Beendigung des Eingriffes. Der jetzt senkrecht zur Lidfläche stehende Lidrand ist so an den Lidknorpel (K) angepaßt, daß von diesem nichts in der Lidspalte vorsteht und nur eine schmale Wundfläche, der Schnitttrand (S) des Knorpels unbedeckt bleibt.

werden die übrigen Nähte versorgt. Die Fäden werden kurz abgeschnitten. Die Hautwunde wird durch einige Nähte geschlossen und ein Salbenverband angelegt. Nach 4—5 Tagen werden die Nähte entfernt.

Der Eingriff wird im *unteren* Lide nach denselben Regeln vorgenommen.

**Ergebnis. Bemerkungen.** Durch das Verfahren nach PANAS werden auch die höchsten Grade von Entropium und Trichiasis endgültig beseitigt. Einer Wiederkehr des Zustandes ist mit Sicherheit vorgebeugt. Darin liegen seine großen Vorteile. Schönheitlich steht es dem Verfahren von HOTZ bedeutend nach. Werden die Fäden richtig angelegt, so fügt sich im allgemeinen der Lappen gut an, so daß die unnatürliche Stellung des Lidrandes — in einem rechten Winkel zum Knorpel — kaum auffällt. Bei nicht ganz tadelloser Ausführung führt aber der Eingriff zu einer häßlichen Entstellung. Werden nämlich die Nähte nicht knapp oberhalb des Durchschnittes durch den Knorpel befestigt, sondern einige Millimeter darüber, so wird der freie Lidrand über den oberen Wundrand des Knorpels emporgezogen und dieser ragt unbedeckt in der Lidspalte vor. Die unbedeckte Wundfläche heilt nur langsam unter Granulations- und Narbenbildung. Entsprechend der Verkrümmung des Knorpels ist auch diese Narbe wieder gegen die Hornhaut gerichtet und schädigt sie durch beständiges Reiben mit ihrer unebenen Oberfläche.

Eine schwere Verunstaltung des Lides erfolgt auch, wenn der Durchschnitt durch den Knorpel in zu großem Abstände vom Lidrande gemacht wird, da der vorwärts gedrehte freie Lidlappen wie der Schirm einer Kappe vorspringt und das Lid zu stark verkürzt wird.

Dem Verfahren kommen auch einige Nachteile zu, die nicht unterschätzt werden dürfen. Der Lappen, der im Verhältnis zu seiner Länge nur eine schmale Basis hat, ist in Gefahr, nekrotisch zu werden. Deswegen ist auf eine genaue Lagerung beim Knüpfen der Nähte zu achten, so daß der Lappen mit seiner Schnittwunde genau der vorderen Knorpelfläche angelagert und von hier aus bald ernährt wird. Wird durch zu starkes Anziehen der Nähte der Lappen zu stark gedreht, so daß seine schmale Schnittfläche frei nach unten sieht, so gerät er in Gefahr der Nekrose. Durch diese wird das Lid schwer entstellt und der

Zustand verschlechtert. Denn das obere Lid hat seinen Lidrand verloren und ist außerdem kürzer geworden, so daß sogar ein geringer Lagophthalmus die Folge sein kann.

Aber auch bei richtigem Verlaufe des Eingriffes wird das obere Lid verkürzt, und zwar um die Breite des Lappens, da er aus der Ebene des Lides herausgedreht und senkrecht darauf gestellt wird. Kurze Lider sollten daher diesem Verfahren nicht unterzogen werden.

**Anhang.** Ein wertvolles Verfahren zur Heilung des Entropiums, besonders des *unteren* Lides, ist die **Ausschälung des Knorpels nach KUHT**. Sie kann nur im Narbenstadium des Trachoms angewendet werden, da sich nur dabei die Bindehaut von dem geschrumpften und verkrümmten Knorpel leicht abschälen läßt, ohne durchlöchert zu werden. Solange die Bindehaut noch infiltriert ist, wären bei der Ablösung wiederholte Verletzungen unvermeidlich. Die Einwärtsdrehung wird durch den Eingriff für immer beseitigt und überdies auf den weiteren Verlauf des Trachoms der günstigste Einfluß genommen.

Nach Auswärtsrollung des Unterlides mit einer starken Pinzette wird durch Bindehaut und Knorpel 1 $\frac{1}{2}$  mm von der inneren Lidkante entfernt und damit gleichgerichtet ein Einschnitt gemacht, der sich vom Tränenpünktchen bis zum äußeren Lidwinkel erstreckt. Die Bindehaut wird mit flachen Messerzügen vom Knorpel abgelöst und auch seine vordere Fläche bis zum unteren Rande freigemacht, wo er von dem anhaftenden Gewebe abgetrennt wird. Durch den Schnitttrand der abgelösten Bindehaut werden 2—3 doppelt armierte Fäden gelegt, die Fadenschlingen ungefähr 2 mm breit, worauf die Nadeln durch den stehengebliebenen Knorpelrand geführt und durch die Haut nahe dem Lidrande ausgestochen werden. Die Fäden werden über Bäuschchen geknüpft und so weit angezogen, daß der Lidrand und mit ihm die Lidhaare in die richtige Stellung zurückkehren. Die Fäden werden nach unten geschlagen und mit Heftpflaster an der Haut befestigt. Sie können in 4—5 Tagen entfernt werden.

#### IV. Gruppe.

1. Verfahren von FLARER. Nach Spaltung des Lides im intermarginalen Saum wird die Haut mit einem Schnitte, der ungefähr 2 mm vom Lidrande entfernt und ihm gleichgerichtet ist, in der ganzen Länge des Lides durchtrennt und an beiden Enden des Lides der Hautschnitt mit dem intermarginalen Schnitt vereinigt. In dem so umschriebenen Hautlappen, der mit der kleinen gekrümmten Schere ausgeschnitten wird, sind alle Lidhaare enthalten. Feine Nähte schließen die schmale Wunde. Da dieses Verfahren alle Lidhaare opfert, kommt es nur für die schweren Fälle in Betracht, wo die meisten Lidhaare schon zugrunde gegangen und nur wenige, unregelmäßig aus dem Lidrande hervorstehende Haare übriggeblieben sind. Daher kommt auch die durch den Eingriff verursachte Entstellung, besonders im unteren Lide, nicht in Betracht.

v. STELLWAG deckte die durch die Ausschneidung des Hautstreifens entstehende Wunde mit diesem selbst, indem er ihn, um 180° gedreht, wieder auf die Wundfläche pflanzte. Nähte werden nicht angelegt. Verband über befettetes, auf die Wunde gelegtes Guttaperchapapier.

2. Das Verfahren von JAESCHE-ARLT. Durch einen intermarginalen Schnitt wird die Hautplatte vom Knorpel getrennt und darauf mit den ihr an-

haftenden Lidhaaren nach oben gezogen, indem aus dem oberen Lide ein sichelförmiges Hautstück ausgeschnitten und diese Wunde durch senkrechte Nähte verschlossen wird. Dadurch wird ein entsprechend breites Stück des Knorpels am Lidrande bloßgelegt, das mit dem ausgeschnittenen Hautstück bedeckt wird (WALDHAUER). Dieser Eingriff leidet wie alle auf den Lidrand erfolgten Hautüberpflanzungen an dem Übelstande, daß die in der Haut vorhandenen, feinen Wollhärchen immer wieder die Hornhaut reizen.




Abb. 83. Verfahren nach SPENCER WATSON. Intermarginaler Schnitt und die beiden Hautschnitte. Basis des Hautlappens mit den Lidhaaren bei *a*. Basis des oberen Hautlappens: *b*.

Die Kranken stehen diesem andauernden Fremdkörpergefühl im Auge machtlos gegenüber, weil die feinen Härchen kaum sichtbar sind, während sie sich vorher durch Ausziehen der großen Lidhaare immer vorübergehende Erleichterung verschaffen konnten. Abhilfe kann nur durch Ausschneidung der Hautlappen und durch Ersatz mit Schleimhaut geschaffen werden.

Hautverpflanzungen eignen sich daher nur zur Behandlung von krankhaften Zuständen der Lider, die sich jenseits des Hornhautbereiches eingestellt haben, sonst hat das Verfahren von HOTZ angewendet zu werden.

Die Beschreibung eines Verfahrens für Trichiasis, die auf die Gegend des äußeren Lidwinkels beschränkt ist, sei hier angeschlossen:

3. Das Verfahren von SPENCER WATSON. Nach intermarginalem Einschnitte in der Länge des betreffenden Gebietes wird durch die Haut gleichgerichtet mit dem Lidrande in einer Entfernung von 2 mm ein Hautschnitt gemacht, der am Lidwinkel in den intermarginalen Schnitt einmündet, indem er allmählich gegen den Lidrand ablenkt. Die Lidhaare kommen so in ein Lappchen zu liegen, dessen Stiel auf der vom Lidwinkel abgewendeten Seite liegt. Durch einen 2. gleichgerichteten, wieder fast 2 mm höher gelegenen Hautschnitt wird ein 2. Lappchen abgegrenzt, dessen Stiel auf die Seite des Lidwinkels verlegt wird (Abb. 83). Beide Lappchen werden durch Ablösen von der Unterlage




Abb. 84. Lappchen ausgetauscht.

frei beweglich gemacht und sodann so verschoben, daß das Lappchen mit den Lidhaaren nach oben zu liegen kommt, das obere Hautlappchen dagegen an den Lidrand angepaßt wird (Abb. 84). Nähte, je eine durch die Spitze der Lappchen gelegt, halten sie in ihrer neuen Lage fest, in der sie binnen wenigen Tagen angeheilt sind.

Das Verfahren taugt nur für Eingriffe auf kurzer Strecke, weil Lappen, die aus der ganzen Länge des Lides gebildet werden, für den schmalen Stiel zu lang sind und daher absterben.

4. Überpflanzung von Schleimhaut. Plastische Eingriffe sind insbesondere in den schweren Formen angezeigt, wo die Anordnung der Lidhaare bereits unregelmäßig ist und gewöhnlich auch Hornhauterkrankungen bestehen. Nur Schleimhaut soll zur Überpflanzung verwendet werden. Ärzte, die in trachomdurchseuchten Gegenden große Erfahrung gesammelt haben, bezeichnen gerade diese Art der Trichiasisoperation als die sicherste, die dauernde Heilung verbürgt. Wir aber verwenden sie wegen des ungenügenden kosmetischen Erfolges nur in Ausnahmefällen. Durch einen in der ganzen Länge des Lides oder aber bei umschriebener Trichiasis im Bereiche dieses Gebietes ausgeführten intermarginalen Schnitt mit folgender Unterminierung der Haut wird diese bis zum oberen Rande des Knorpels von ihm abgelöst. Da die Haut gewöhnlich ziemlich kurz ist, zieht sie sich von selbst vom Lidrande etwas zurück und wird durch einige feine Seidennähte an den Knorpel so befestigt, daß der Hautrand mit den Lidhaaren einige Millimeter oberhalb des Lidrandes zu liegen kommt. Dadurch bleibt ein entsprechend breiter Streifen der vorderen Knorpelfläche frei; auf ihn wird die Lippenschleimhaut verpflanzt. Der Lappen wird gewöhnlich der inneren Fläche der unteren Lippe entnommen. Durch das Bepinseln mit einer 3%igen Cocainlösung wird genügende Unempfindlichkeit erzeugt. Ein Lappen von gewünschter Größe wird umgrenzt und mit einigen Scherenschlägen herausgeschnitten. Die anhängenden Fettläppchen haben sorgfältig entfernt zu werden. Zu diesem Behufe wird das Läppchen mit seiner Schleimhautfläche auf einen mit warmer Kochsalzlösung getränkten Tupfer gelegt, und mit einer flach angelegten, kleinen, gekrümmten Schere werden die vorstehenden Fettläppchen sauber abgekappt, so daß nur die dünne Schleimhaut übrigbleibt. Sie wird mit ihrer Wundfläche auf den freiliegenden Knorpel gebracht und ihre Ränder werden genau angepaßt. Da das Läppchen sofort anklebt, brauchen keine Nähte angelegt zu werden. Dadurch wird eine mechanische Beschädigung des Läppchens vermieden. Mit Salbe bestrichenes Guttaperchapapier, das auf das Lid gelegt wird, verhindert ein Ankleben des Verbandes an das Läppchen. Darüber der gewöhnliche Verband. Die Lippenwunde wird genäht. Die Heilung erfolgt fast immer ohne Zwischenfall, und ungefähr 4—5 Tage nach dem Eingriffe wird von weiterem Verband Abstand genommen. Da sich die überpflanzten Läppchen durch ihre weiße Farbe immer auffällig von der Umgebung abheben, wird das Verfahren in unseren Ländern nur bei den schweren Formen von Liderkrankung angewendet, wo die Forderung der Erhaltung des Auges andere Rücksichten überwiegt.

5. Elektrolytische Epilation. Einzelne Lidhaare werden durch elektrolytische Zerstörung ihrer Wurzel ausgerottet. Die vollständige Empfindungslosigkeit der zu behandelnden Strecke des Lidrandes wird in der Weise erzielt, daß die durch die Haut eingedrungene Nadel der Spritze bis in den Lidrand vorgeschoben wird; dieser soll durch die Einspritzung (1%ige Cocainlösung) ganz weiß werden. Die Epilationsnadel, die an den negativen Pol des Stromes angeschlossen ist — der andere Pol wird mit einer auf der Stirne ruhenden feuchten Plattenelektrode in Verbindung gebracht — wird knapp neben dem Haar in die Haarwurzelscheide eingesenkt. Dies geschieht ohne fühlbaren Widerstand, wenn

die Nadel an richtiger Stelle eindringt. Ein kurzes Einwirken des Stromes —  $\frac{1}{2}$  Minute — von  $\frac{1}{2}$ —1 Milliampère Stärke erzeugt das Aufsteigen von Wasserstoffblasen aus der Haarwurzelscheide. Mit der Cilienpinzette kann darauf das Haar ohne Widerstand ausgezogen werden. Wer nicht kurzsichtig ist, bedient sich zum Einführen der Nadel mit Vorteil einer Lupe, um den Ausgang der Haarwurzelscheide zu sehen und die Nadel richtig einzuführen. Stärkere Ströme sind zu vermeiden, da sie eine umschriebene Nekrose des Lidrandes hervorrufen.

Die Epilation wird gewöhnlich auf mehrere Sitzungen ausgedehnt, da in einer Sitzung nur wenige Lidhaare behandelt werden können und nicht selten Lidhaare, deren Wurzelscheiden noch nicht behandelt worden waren, nachwachsen.

Auch das Verfahren der Elektrokoagulation eignet sich für solche Fälle.

## Sechstes Kapitel.

### Die Einschneidung des Lidwinkels (Kanthotomie). Die Lidwinkelplastik (Kanthoplastik). Tarsorrhaphie.

Durch die Kanthotomie wird die Lidspalte vorübergehend, durch die Kanthoplastik dauernd verlängert.

#### Kanthotomie.

**Anzeigen.** 1. Bei starker Absonderung der Bindehaut (Blennorrhöe, Trachom), wenn durch die Enge der Lidspalte die Behandlung erschwert und der Abfluß des Sekretes verhindert wird; 2. bei Kindern mit Lidkrampf und Ödem der Lider; 3. gelegentlich, um bei Eingriffen am Auge oder im Innern der Augenhöhle besseren Zutritt zu haben: z. B. vor Iridektomien, besonders bei kleiner




Abb. 85. Der äußere Lidwinkel wird mit Daumen und Zeigefinger auseinandergezogen und dabei auch nasal verschoben. Eine gerade Schere wird waagrecht eingeführt. Ihr stumpfes Blatt kommt rückwärts zu liegen.

Lidspalte (Kinder) und vergrößerten Augen (Buphthalmus), bei gewissen Eingriffen im hinteren Augenabschnitt, besonders bei den Eingriffen gegen Netzhautabhebung, zur leichteren Entfernung von Geschwülsten oder Fremdkörpern der Augenhöhle, vor der Ausweidung der Augenhöhle u. a.

**Örtliche Betäubung.** Nach Einträufeln von 3%iger Cocainlösung in den Bindehautsack Einspritzung von  $\frac{1}{2}$  ccm einer 1%igen Cocainlösung mit  $\frac{1}{10}$  ccm Suprareninlösung unter die Haut in der Gegend des äußeren Lidwinkels.

**Eingriff.** Mit dem Daumen und Zeigefinger, die auf die äußere Hälfte des Unter- und Oberlides aufgesetzt werden, wird die Haut im Bereiche des äußeren Lidwinkels angespannt. Die Lider werden dabei auseinander und gleichzeitig

in der Richtung gegen die Nase hin gezogen. Das stumpfe Blatt einer mittellangen geraden Schere wird im Bindehautsacke waagrecht nach außen hinter




Abb. 86. Schnittwunde nach der Einscheidung des äußeren Lidwinkels. Der Winkel *a* der Bindehautwunde wird mit dem Winkel *b* der Hautwunde durch eine Naht vereinigt. Je eine Naht darüber und darunter.

den Lidwinkel geschoben (Abb. 85) und dieser mit einem Scherenschlage in waagrechter Richtung durchtrennt. Wer den Scherenschlag auch auf dem linken Auge mit der rechten Hand ausführen will, muß, wenn er rechts neben dem Kranken sitzt, die rechte Hand stark dorsal beugen, um die Schere in die richtige Stellung zu bringen, oder der Schnitt muß von rückwärts vorgenommen werden. Die Blutung wird durch Druck gestillt. Die Wunde heilt in kurzer Zeit, ohne eine dauernde Erweiterung der Lidspalte zu hinterlassen. Nur eine zarte waagrechte Narbe bleibt außen als sichtbarer Rest übrig.

### Kanthoplastik.

**Anzeigen.** 1. Bei den ersten zwei Anzeigegruppen der Kanthotomie, wenn der Einfluß des Eingriffes länger als einige Tage dauern soll; 2. bei Krampf-




Abb. 87. Lidwinkelplastik nach KUHNT. Die Lidplatte ist unter den äußeren Lidwinkel geschoben. Die Richtung des Schnittes, der später zu machen ist, wurde durch Tintenpunkte am Kranken vorgezeichnet: *E E'*. Aus dem Unterlide wird ein Hautlappen (*L*) geschnitten, dessen Basis der äußeren Hälfte der vorgezeichneten Linie entspricht.

entropium, da durch den Scherenschlag der Schließmuskel seines Ansatzpunktes, des äußeren Lidbändchens, beraubt wird; 3. bei Ankyloblepharon; 4. bei Blepharophimosis.

**Örtliche Betäubung.** Wie zur Ausführung der Kanthotomie.

**Eingriff.** Um einen genügenden Erfolg zu erzielen, haben nach dem waagrechten Schnitte, der gleich dem der Kanthotomie ist, noch die Bindegewebezüge, die beide Lider an den Knochen befestigen, mit einer kleinen Schere durchtrennt zu werden, so daß die Lider, vollständig frei beweglich, gut voneinander abgezogen werden können. Die Dauerwirkung wird durch Nähte erreicht, die die Bindehaut mit der Haut vereinigen. Dadurch wird die

Wunde gedeckt. Nach dem Schnitt ist die Wunde beim Auseinanderziehen der Lider rhomboidal. Wird die Bindehaut genügend freigemacht, so kann sie nach

außen gezogen und die Ecke der Bindehautwunde (*a*) durch eine Naht mit der Ecke der Hautwunde (*b*) vereinigt werden. Je eine Naht oben und unten genügt zur Vereinigung der Längsseiten der Bindehaut- und Hautwunde (Abb. 86).

**KUHNTS Verfahren.** Wenn bei Trachom die Bindehaut stark geschrumpft ist, kann sie nicht an die Haut angenäht werden. Die Nähte reißen sofort oder in kürzester Zeit aus, so daß die Schnittwunde heilt und die Lidspalte auf ihre frühere Kürze zurückkehrt. Für solche Fälle — es sind gewöhnlich dringende Fälle, Augen, wo sich infolge des Trachoms schwere Infiltrationen der Hornhaut entwickelt haben, die bisher jeder Behandlung trotzen — eignet sich die von KUHNT beschriebene Abänderung der Kanthoplastik, die in folgender Weise ausgeführt wird:

Es wird zunächst die Linie des waagrechten Einschnittes mit einigen Tuschenpünktchen vorgezeichnet, die also in der geraden Verlängerung der Lidspalte vom äußeren Lidwinkel bis zum äußeren Augenhöhlenrande gelegen sind. Die JÄGERSche Hornplatte wird darauf unter den äußeren Lidwinkel geschoben, die Haut in der Richtung nach oben und außen angespannt und ein 2 mm breiter Hautlappen aus dem Unterlide umschnitten, wie die Abb. 87 zeigt. Die Basis dieses Lappens ist so gelegen, daß er nach Ausführung des Schnittes für die Kanthoplastik an dem oberen Wundrande hängt. Die Länge des Lappens entspricht beiläufig einem Drittel der Lidlänge; der Lappen muß etwas länger umschnitten werden, weil sich die Haut nach der Loslösung verkürzt. Die nach Ablösung des Lappens im Lide erscheinenden Muskelfasern werden ausgeschnitten. Darauf wird der waagrechte Schnitt nach außen gemacht wie bei der gewöhnlichen Kanthoplastik. Der anfänglich gebildete Hautlappen hängt nun frei an dem oberen Wundrande und ist so angelegt, daß er vom äußeren Wundwinkel einige Millimeter entfernt bleibt (Abb. 88). Nun werden durch Scherenschläge sämtliche Anhaftungen der Lider an dem Augenhöhlenrande gründlich durchtrennt, so daß die Lider ganz frei beweglich werden; die Bindehaut des Augapfels wird bis zur Hornhautgrenze unterminiert. Nach Stillung der Blutung werden die Wunden durch Nähte ge-




Abb. 88. Der Lappen (*L*) ist abgelöst. Er hat sich durch Zusammenziehen des Gewebes etwas verkürzt. Der äußere Lidwinkel ist durchgeschnitten. Daher dieselben Wunddecken in Haut (*b*) und Bindehaut (*a*) wie in Abb. 86. Nur hat sich hier der Winkel (*a*) gegen die Hornhaut verschoben, da sich die geschrumpfte Bindehaut zurückgezogen hat.




Abb. 89. Die Wunde des unteren Lides ist vernäht. Der Hautlappen (*L*) ist in den Wundwinkel der Bindehaut (*a*) eingepaßt worden.

Schnitt nach außen gemacht wie bei der gewöhnlichen Kanthoplastik. Der anfänglich gebildete Hautlappen hängt nun frei an dem oberen Wundrande und ist so angelegt, daß er vom äußeren Wundwinkel einige Millimeter entfernt bleibt (Abb. 88). Nun werden durch Scherenschläge sämtliche Anhaftungen der Lider an dem Augenhöhlenrande gründlich durchtrennt, so daß die Lider ganz frei beweglich werden; die Bindehaut des Augapfels wird bis zur Hornhautgrenze unterminiert. Nach Stillung der Blutung werden die Wunden durch Nähte ge-

geschlossen. 3 Nähte genügen für die Wunde am unteren Lide, eine 4. befestigt den temporalen Rand des Unterlides schräg nach außen nahe dem äußeren Wundwinkel. Der Hautlappen wird so in die Wunde eingelegt, daß seine Spitze in den Wundwinkel der Bindehaut unter sie geschoben oder mit einer Naht an ihr befestigt wird (Abb. 89).

Da in diesen Fällen gewöhnlich ein Entropium besteht, wird durch die Entnahme eines Hautlappens aus dem unteren Lide sehr günstig auf diesen Stellungsfehler eingewirkt. Würde das obere Lid einer Stellungsberichtigung bedürfen, so könnte der Lappen aus dem oberen Lide entnommen werden.

In schweren Fällen von Trachom ist der Einfluß dieses Eingriffes auf das Befinden und die weitere Behandlung der Erkrankung sehr günstig. Durch die Einheilung des Hautläppchens, die immer ohne Zwischenfall erfolgt, bleibt die Lidspalte dauernd ausgiebig erweitert. Die Nähte können nach wenigen Tagen entfernt werden.

### Tarsorrhaphie.

Die Tarsorrhaphie bezweckt, die Lidspalte kürzer zu machen. Der Eingriff beseitigt die Gefahren, die dem Auge durch einen Lagophthalmus drohen. Facialislähmungen, die voraussichtlich eine lange Zeit bestehen oder gar nicht mehr heilen werden, starker Exophthalmus infolge von Basedowscher Krankheit oder von Geschwülsten der Augenhöhle bilden die hauptsächlichsten Anzeigen dafür. Der Eingriff leistet auch bei einem durch angeborene Kürze der Lider verursachten Lagophthalmus beste Dienste; ferner dient er zur Beseitigung des Lähmungsentropiums, da durch ihn das hinuntergesunkene Lid gehoben wird. Auch zur Verhinderung eines Narbentropiums bei noch bestehender cariöser Fistel am Augenhöhlenrande ist der Eingriff sehr empfehlenswert. Obwohl an und für sich entstellend, so ist er doch in seltenen Fällen gerade aus Schönheitsgründen angezeigt: nämlich bei weiterem Offenstehen der Lidspalte nach Schieleingriffen oder bei einseitiger Vergrößerung des Augapfels (z. B. einseitiger hoher Kurzsichtigkeit) und dadurch verursachter Erweiterung der Lidspalte.

Die Tarsorrhaphie wird gelegentlich auch vor plastischen Eingriffen zur Richtigestellung des Lides gemacht.

### Äußere Tarsorrhaphie.

**Verfahren nach FUCHS.** Zuerst muß festgestellt werden, wie weit die Lidspalte verkürzt zu werden hat. Zu diesem Zwecke werden mit Daumen und Zeigefinger vom äußeren Lidwinkel her beide Lider zusammengehalten und die Lidspalte verkürzt, bis der Kranke, bei Aufforderung das Auge zu schließen, die Lidspalte vollständig oder fast ganz schließen kann.

Meistens genügen wenige Millimeter, doch wird auch bei schweren Fällen nicht über 8 mm hinausgegangen, um einer häßlichen einseitigen Verkürzung der Lidspalte vorzubeugen. Bei ungenügendem Erfolge muß derselbe Eingriff auch in der inneren Lidhälfte ausgeführt werden (siehe unten).

**Örtliche Betäubung.** Einspritzung von  $\frac{1}{2}$  ccm einer 1%igen Cocainlösung in das obere und untere Lid mit Einbeziehung des intermarginalen Saumes, um ihn schmerzlos einschneiden zu können.

**Die Schnitte.** An der gewünschten Stelle wird in die Haut des oberen und unteren Lides ein kleiner senkrechter Einschnitt gemacht, um am oberen und unteren Lid gleich weit vorzugehen und um anzumerken, wie weit die Vernähung reichen soll.

Zuerst wird ein intermarginaler Schnitt im unteren Lide geführt, der vom äußeren Lidwinkel bis zur bezeichneten Stelle reicht. Das Auge wird durch die Hornplatte geschützt. Der Schnitt wird mit der Lanze gemacht, die parallel zur Lidfläche gehalten wird, so daß weder die Haut noch rückwärts der Lidknorpel mit der Spitze verletzt werden kann. Der Gehilfe zieht die Haut des Lides nach außen und drückt die schräg gehaltene Hornplatte so nach vorwärts, daß das Lid gut gespannt ist. Durch einen leichten Druck mit dem Finger wird das Lid an der Unterlage festgehalten und die Spitze der Lanze auf den intermarginalen Saum aufgesetzt. Diese dringt leicht zwischen die beiden Platten des Lides ein und trennt sie voneinander. Dann wird an der Stelle der Marke, am Lidrande beginnend, durch die Haut ein 3 mm langer senkrechter Schnitt angelegt, wodurch ein kleiner Hautlappen (Abb. 90) aus dem Unterlide gebildet wird, an dessen, dem Lidrande entsprechender Seite sich noch die Lidhaare befinden. Diese werden zum Ausfallen gebracht, indem ihre Wurzeln mit einer an der Wundseite des Lappens flach angelegten Schere verletzt werden.

Ein intermarginaler Schnitt wie unten wird auch im Oberlide vom äußeren Lidwinkel bis zur Marke ausgeführt, ferner ein zum Lidrande parallel verlaufender

Schnitt in einem Abstand von ungefähr 2 mm in der Länge des intermarginalen Schnittes durch die Haut des Oberlides gemacht. Die Lanze unterminiert die auf diese Weise gebildete Hautbrücke, worauf mit 2 Scherenschlägen der Zusammenhang dieses Lappens von seiner Umgebung außen und innen durchtrennt wird. Auf diese Weise wird am oberen Lide eine Wundfläche geschaffen.

Der vom unteren Lide gebildete Lappen wird nun so befestigt, daß er diese Wundfläche bedeckt und mit ihr verheilt. Die Lidknorpel werden bei diesem Eingriffe nicht verletzt; der Knorpel des Unterlides schiebt sich hinter den des Oberlides.

**Nähte.** Zur Naht wird ein doppelt benadelter Faden verwendet. Beide Nadeln werden zuerst von der Bindehautseite aus nahe dem Lidrande durch das obere Lid geführt. Die beiden Stiche sind ungefähr 2 mm voneinander entfernt. Es kommt also auf die Bindehautseite des oberen Lides ein kurzes Fadenstück zu liegen. Dieses hat für das Auge keine Bedeutung, zumal da es mit der weiter medialwärts gelegenen Hornhaut nicht in Berührung kommt. Nunmehr wird jedes Fadenende durch die Basis des Lappens des unteren Lides geleitet, von der Wundseite zur Hautseite, in der gleichen Entfernung der Durch-




Abb. 90. Tarsorrhaphie nach FUCHS. Aus der Haut des unteren Lides wurde ein Läppchen (L) gebildet. Die Lidhaare sind abgetragen. Aus der Haut des oberen Lides wurde ein entsprechend langer Streifen ausgeschnitten. Der Faden ist bereits eingelegt: oben nahe am Lidrand, unten nahe der Basis des Läppchens.

stiche wie früher. Werden dann die beiden Fadenenden über einem kleinen Bäschchen Gaze geknüpft, so wird dadurch die Basis des Lappens an den Rand des oberen Lides gezogen und der Lappen kommt auf die Wundfläche des oberen




Abb. 91. Aussehen der Lidspalte nach Knüpfen der Fäden. Die beiden Fadenenden der zuerst angelegten Haltenaht sind über einem kleinen Bäschchen geknüpft.

Lides zu liegen. Mehrere feine Hautnähte vereinigen die Ränder des Lappens genau mit denen der Wunde am oberen Lid (Abb. 91). Über das Auge wird ein leichter Verband angelegt. Die Nähte können am 3. Tage entfernt werden. Das andere Auge braucht nicht verbunden zu werden.

**Ergebnisse.** Der Vorteil des Verfahrens liegt darin, daß die Lider miteinander flächenhaft verwachsen, wodurch ein Wiederaufgehen der Lidspalte — ein bei anderen Verfahren nicht seltenes Vorkommen — vermieden wird. Sein Nachteil ist, daß ein Teil des gesunden Lidhautrandes geopfert wird. Ergibt

sich wieder einmal die Möglichkeit, die Lidspalte aufzutrennen, so liegen zwar die freien Ränder des oberen und unteren Knorpels nach Durchtrennung der Haut sofort frei zutage und es kann der Wundrand in der Haut mit dem Rande




Abb. 92. Tarsorrhaphie nach ELSCHNIG. Intermarginaler Schnitt im oberen und unteren Lide vom äußeren Lidwinkel an. (In der Zeichnung länger gemacht, um die Eingriffe an dem Knorpelteil darstellen zu können.) Senkrechter Einschnitt durch den Knorpel des unteren Lides. Aus dem Knorpel des oberen Lides ist ein dreieckiges Stück ausgeschnitten.

des Knorpels durch einige Nähte leicht vereinigt werden, aber der so geschaffene neue Lidrand hat keine Lidhaare; daher soll der Eingriff nur in den Fällen vorgenommen werden, wo voraussichtlich, z. B. bei manchen Facialislähmungen, keine Heilung zu erwarten ist. Unangenehme Folgen des Eingriffes können durch eine ungleiche Länge des intermarginalen Schnittes am oberen und unteren Lide verursacht werden. Wurde z. B. vom oberen Lide ein Hautstück ausgeschnitten, das länger ist als der Lappen des Unterlides, so zieht dieser schief nach innen hinauf und bildet eine häßliche, an eine Blepharophimosis erinnernde Falte. Dadurch können auch die Lidhaare des angrenzenden Teiles des unteren Lides in eine schiefe Richtung gegen die Hornhaut gebracht werden.

**Verfahren nach ELSCHNIG.** Um die Lidhaare nicht zu opfern, hat ELSCHNIG das Verfahren von FUCHS in der Weise abgeändert, daß er aus dem *hinteren* Blatt des Oberlides ein Stück ausschneidet und in diesen Defekt ein Läppchen aus dem *hinteren* Blatt des Unterlides einnäht, während er die Haut der Lider und die Cilienreihe unversehrt läßt. Der Eingriff gestaltet sich folgendermaßen: Örtliche Betäubung, wie früher beschrieben.

**Die Schnitte.** Zuerst wird im unteren Lide in der festgesetzten Strecke der Schnitt im intermarginalen Saum gemacht. Im medialen Ende dieses Schnittes wird die hintere Lidplatte vom Lidrande aus 3—4 mm weit senkrecht nach unten eingeschnitten und auf diese Weise aus der hinteren Lidplatte ein Lappchen gebildet (Abb. 92). Die beiden Lidplatten werden gründlich voneinander losgelöst und ihre freien Ränder angefrischt, wobei die Lidhaare geschont werden. Darauf wird ein entsprechender intermarginaler Schnitt auch im oberen Lide angelegt und in gleicher Weise in dem medialen Ende dieses Schnittes vom Lidrande aus ein 3—4 mm langer senkrechter Schnitt durch die hintere Lidplatte geführt. Der dadurch geschaffene freie Zipfel des inneren Oberlidblattes wird nun mit einer Hakenpinzette gefaßt und durch diese Lidplatte mit der Schere ein Schnitt geführt,




Abb. 93. Naht durch das Knorpellappchen des unteren Lides durchgeführt. Ein kurzes Fadenstück (punktiert gezeichnet) kommt auf der Bindehautseite zu liegen. Beide Fadenenden von hinten her durch die Haut des oberen Lides einige Millimeter über dem Lidrande herausgeleitet. Der Ausschnitt im Knorpel des oberen Lides durch punktierte Linien angezeigt.

der vom oberen Rande des senkrechten Schnittes ausgeht, zuerst parallel zum Lidrande verläuft und dann zum Canthus externus oder etwas darunter abbiegt. Auf diese Weise wird ein dreieckiges Stück der Tarsus-Bindehautplatte aus dem Oberlide entfernt. Die Basis dieses Dreieckes entspricht dem senkrechten Schnitte, die Spitze liegt im Canthus externus. Schließlich wird der Lidrand der äußeren Lidplatte des oberen Lides angefrischt, die Cilien werden dabei verschont.

**Nähte.** Zur Naht wird ein doppelt benadelter Faden verwendet. Beide Nadeln werden 2 mm vom Rande des Tarsus-Bindehautlappchens des unteren Lides von der Bindehaut aus nach vorne durchgeführt und dann etwa 4 mm oberhalb der Wimpern des Oberlides von hinten her an die Hautoberfläche durchgestochen (Abb. 93). Die Fadenenden werden über einem Bäuschchen geknüpft. Durch diese Naht wird das




Abb. 94. Aussehen der Lidspalte nach Knüpfen des Haltefadens. Zwei Hautnähte

innere Blatt des Unterlides in den im inneren Blatte des Oberlides gesetzten Defekt hineingezogen, wo es anheilt. Die beiden äußeren Lidblätter werden durch 2—3 Nähte mit feiner Seide vereinigt. Verband für 2—3 Tage. Entfernung der Hautnähte nach 3—4 Tagen, der Halte-naht nach 5—6 Tagen.

**Ergebnisse.** Zu dem Vorteile der flächenhaften Verklebung der Lider, wodurch der Eingriff auch bei großer Spannung der Lider seinen Zweck erfüllt, kommt der gute kosmetische Erfolg, der dadurch gegeben ist, daß die Wimpernreihen in normaler Stellung in der Verlängerung der Lidspalte die Gegend der

Verlötung der Lidspalte decken (Abb. 94). Dazu kommt noch ein 2. Vorteil, der darin besteht, daß in dem Falle, als es je wieder angängig ist, die Verbindung der Lider zu lösen, die von dem Eingriffe betroffenen Lidrandteile ihre regelrechte Cilienreihe haben.

### Innere Tarsorrhaphie.

Hat der Eingriff im inneren Lidwinkel ausgeführt zu werden, Tarsorrhaphia interna, so ist auf zweierlei zu achten: Der innere Lidwinkel darf in die Vernähung nicht einbezogen und die Tränenröhrchen dürfen nicht verletzt werden. Der intermarginale Einschnitt hat demgemäß von der auf die früher angegebene Weise gefundenen Stelle bis zum Ende des Lidknorpels, d. h. bis zum Tränenpünktchen zu reichen. Dringt die Lanze genau im intermarginalen Saum zwischen den beiden Platten des Lides ein, so besteht um so weniger Gefahr, das Tränen-

röhrchen zu verletzen, als dieses erst in der Fortsetzung des Knorpels im Schenkel des Lidbändchens, also medialwärts von dem Schnittende gelegen ist. Dasselbe gilt für das obere Lid. Im übrigen ist kein Unterschied von dem Vorgehen am äußeren Lidwinkel. Der hufeisenförmige Ausschnitt bleibt dabei erhalten und als Grübchen sichtbar. Auf diese Weise kommt, wenn je wieder die Lidspalte geöffnet werden könnte, der richtig gebildete innere Lidwinkel zum Vorschein.




Abb. 95. Tarsorrhaphie nach ARLT. Hufeisenförmiger Ausschnitt aus der Haut des oberen und unteren Lides entlang dem inneren Lidwinkel.

Bei den höchsten Graden des Exophthalmus muß der äußere und

der innere Lidwinkel gleichzeitig vernäht und die Lidspalte in eine kurze zentrale Lücke verwandelt werden, um die Hornhaut genügend zu decken.

Die mediale Tarsorrhaphie kann auch in der Weise ausgeführt werden (v. ARLT), daß nahe dem inneren Lidwinkel vom oberen und unteren Lid ein Streifen Haut mit Pinzette und Schere ausgeschnitten wird, so daß die Wunden nach innen vom inneren Augenwinkel in einem spitzen Winkel zusammenstoßen (Abb. 95). Drei senkrecht gelegte Nähte vereinigen die Wunden und schließen die Lidspalte von der inneren Seite her. Dieses Verfahren hat den Vorzug, daß dabei die Wurzeln der Lidhaare nicht verletzt werden und die Lidränder unversehrt zum Vorschein kommen, wenn später einmal die Lidspalte wieder eröffnet werden kann.

In seltenen Fällen muß die Lidspalte gänzlich vernäht werden. Wenn z. B. die Haut des Ober- und Unterlides in großer Ausdehnung und schwer verätzt worden ist, so wird das sonst unausbleibliche Entstehen eines Narbenektropiums in der Weise hintangehalten, daß die Lidspalte vollständig vernäht wird.

Um nicht sämtliche Lidhaare dabei zu zerstören, werden die Lidränder hinter den Haaren mit der Lanze angefrischt, oder es wird von der Haut des

oberen und unteren Lides nahe dem Lidrande ein schmaler Streifen ausgeschnitten; die Wundflächen werden durch Nähte miteinander vereinigt.

Ist aber das Lid *vollständig* zerstört worden, so wird das Auge durch eine feuchte Kammer so lange geschützt, bis der Vernarbungsvorgang abgelaufen und eine plastische Operation, wie beim Narbenektropium beschrieben, möglich ist.

Wird die Tarsorrhaphie bei starkem Exophthalmus gemacht, so wird nach ihrer Beendigung der Rest der Lidspalte durch einige Nähte ohne Anfrischung der Lidränder vorübergehend verschlossen, damit der Lappen gut anheilen kann und die Nähte nicht etwa durch die starke Spannung frühzeitig ausreißen.

Bei einer Tarsorrhaphie zur Beseitigung eines Lähmungsektropiums kann in ähnlicher Weise wie beim Altersektropium nach Art des SZYMANOWSKISCHEN Eingriffes eine dreieckige Hautfalte ausgeschnitten werden. Dadurch wird das etwas verlängerte Lid verkürzt und inniger an das Auge angelegt.

## Siebentes Kapitel.

### Ptosis.

So manchen Eingriff gegen Ptosis kann man sich durch Verordnung einer Ptosisbrille ersparen. Ein von der Brillenfassung aus nach hinten gerichteter Bügel wird an das obere Lid so angesetzt, daß er das Lid unter ganz leichtem Drucke gehoben hält. Dabei entsteht eine Hautfalte nach Art der Deckfalte, in welcher der Bügel so verschwindet, daß auch ein aufmerksamer Beobachter an der Brille nichts Auffälliges findet. Auch ein Einglas mit solchem Bügel an der Fassung kann vorzügliche Dienste leisten.

Zur wundärztlichen Behandlung eignen sich besonders die Fälle von angeborener Ptosis. Dabei ist manchmal auch der obere Gerade mangelhaft entwickelt und schwach oder er fehlt ganz.

Die verschiedenen Erkrankungen, die zur Lähmung des Lidhebers führen, geben nur dann Veranlassung zum Einschreiten, wenn jede Aussicht auf anderweitige Heilung des Zustandes geschwunden ist. Wurde die erworbene Ptosis nicht durch eine unmittelbare Schädigung des Hebers verursacht, so sind häufig andere vom Okulomotorius versorgte Muskeln des Auges in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch wurde aber das beidäugige Sehen unmöglich und oft eine entstellende Ablenkung des Auges: Lähmungsschielen hervorgerufen. Diese beiden Umstände können geradezu eine Anzeige gegen die Vornahme eines Eingriffes abgeben, da nach Beseitigung der Ptosis die Störung durch die Doppelbilder ein Nachteil sein könnte gegenüber dem ursprünglichen Zustand. Nur bei Ptosis beider Oberlider wäre in solchen Fällen ein einseitiger Eingriff an dem sehtüchtigeren und beweglicheren Auge vorzunehmen.

Von den zur Heilung der Ptosis ersonnenen Verfahren sind nur die von Wert, die an Stelle der verlorengegangenen Muskelwirkung eine neue Muskelkraft zu setzen versuchen. Ist der Lidheber nicht vollkommen gelähmt, so stellt eine Verkürzung und Vornähung des Muskels seine ursprüngliche Kraft wieder her (Verfahren von EVERBUSCH und damit verwandte). Ist er aber wegen völliger Gebrauchsunfähigkeit nicht mehr herbeizuziehen, so wird Ersatz gesucht in dem Stirnmuskel, der durch seine Zusammenziehung die Haut des Lides zu heben vermag (Verfahren nach PAGENSTECHER, HESS u. a.). Dieses Muskels bedienen sich viele Kranke unwillkürlich, indem sie die Haut der Stirne in Falten legen und auf diese Weise verkürzen, so daß die Augenbraue weit über ihren richtigen Sitz, den oberen Augenhöhlenrand, hinaufgezogen und damit mittelbar auch das Lid gehoben wird. Da der Stirnmuskel gewöhnlich doppelseitig zusammengezogen wird, entsteht im Falle einer einseitigen Ptosis eine ungewöhnliche Erweiterung der Lidspalte der gesunden Seite. Dieser Umstand macht sich auch nach dem Eingriffe, wenn der Stirnmuskel zum Ersatz herangezogen wurde, in

gleicher Weise geltend und beeinträchtigt oft genug den Schönheitserfolg des Eingriffes.

Ein anderer Muskel, der zur Hebung des Lides verwendet werden kann, ist der obere gerade Augenmuskel. Mit dem Blicke wird nämlich auch das Lid gehoben. Oberer gerader Augenmuskel und Lidheber wirken in dieser Hinsicht miteinander und eine Vertretung des gelähmten Hebers durch den oberen geraden Augenmuskel ist von diesem Standpunkte ein sehr ansprechendes Verfahren (MOTAIS). Ist die Ptosis durch Vermittlung des Stirnmuskels verbessert worden, so wird der Ausfall des Hebers, d. h. die Ptosis sofort wieder sichtbar, wenn der Blick gehoben wird. Diesem Übelstande ist vorgebeugt, wenn ein Teil des oberen Geraden als Lidheber verwendet wird.

Andererseits wird aber durch diesen Eingriff ein mechanischer Zusammenhang zwischen Oberlid und Augapfel geschaffen, der im physiologischen Zustande nicht besteht und die Bewegungen des Oberlides unter allen Umständen von der Innervation des oberen Geraden abhängig macht. Wird eine Zunge dieses Muskels an den Lidknorpel genäht, so muß schon aus mechanischen Gründen das Oberlid zurückgezogen und gehoben werden, da der sagittale Abstand zwischen dem Augapfelansatz des oberen Geraden und dem Lidknorpel ziemlich bedeutend ist. Da sich nun physiologischerweise Lidheber und oberer Gerader gelegentlich auch in entgegengesetztem Innervationszustand befinden, können durch einen solchen Eingriff unerwünschte Nebenerscheinungen in der Lidstellung ausgelöst werden.

Natürlich kann jedes Lid, auch ohne Muskelkraft herbeizuziehen, nach Belieben gehoben werden, wenn man es kürzer macht. So manche Abänderungen der soeben genannten Verfahren, denen eine ungleich größere Wirkung als dem ursprünglichen Verfahren zugeschrieben wird, erzielen die besseren Erfolge auf diese Weise. Aber alle Verkürzungsverfahren (mit Ausnahme der Verkürzung des Muskels) haben den großen Nachteil, daß das Lid ausnahmslos zu kurz wird und Lagophthalmus mit seinen Gefahren für die Hornhaut zustande kommt.

Gewiß kann man es nicht immer und unter allen Umständen vermeiden, von der Kürzung Gebrauch zu machen, um das Lid genügend zu heben. Dies ist z. B. der Fall, wenn der zum Ersatze herbeigezogene Muskel allein nicht genügt. Aber es geht nicht an, einem Verfahren, das mit Kürzung arbeitet, deswegen eine grundsätzliche Überlegenheit über das ursprüngliche Verfahren, von dem es ausgegangen ist, zuzuschreiben. So kann z. B. das Lid trotz vollständiger Lähmung des Levators durch die Vorlagerung dieses Muskels, die für sich allein gar keine Wirkung hätte, genügend gehoben werden, wenn man dabei auch den Tarsus in seiner ganzen Höhe fast bis zum Lidrande ausschneidet. Dann wirkt der Eingriff eben nur durch Gewebeverkürzung und hat auch alle Nachteile dieser. Dazu ist aber nicht ein eigenes Verfahren notwendig, sondern man schneidet bei der gewöhnlichen Levatorvorlagerung, wie sie hier beschrieben wird, den Tarsus mit aus.

#### **Verfahren nach EVERSBUSCH.**

(Vorlagerung des Lidhebers.)

**Anzeige.** Die Vorlagerung des Lidhebers eignet sich nicht für alle Fälle von Ptosis; sie ist nur verwendbar, wenn der Heber nicht vollständig gelähmt

ist. Um dies zu erkennen, wird der Kranke aufgefordert, beide Augen wie zum Schlafen zu schließen, so daß der Augenbrauenbogen an die richtige Stelle gerade vor dem oberen Augenhöhlenrande zu liegen kommt. Die Haut der Augenbrauenbogen wird in dieser Stellung auf beiden Seiten durch einen kräftigen Daumendruck festgehalten. Vermag nun der Untersuchte auf Aufforderung das Auge, wenn auch nur in bescheidenem Umfange zu öffnen, so kann dies nur




Abb. 96. Sagittalschnitt durch die Lider und den vorderen Abschnitt der Augenhöhle. *R* oberer Rand der Augenhöhle; *F* Fascia tarso-orbitalis. Sie ist an der Beinhaut des Knochens befestigt, hängt nach unten und geht in den Lidknorpel (*K*) über. Der Lidheber (*Lh.*) zieht oberhalb des oberen Geraden (*o. G.*) nach vorne und geht hier in eine fächerartige Sehne über, die sich, mit der Fascia tarso-orbitalis verschmolzen, am oberen Knorpelrande ansetzt. Die hintere Seite des Knorpels und der Hebersehne ist von Bindehaut (*B*) überzogen; vor dem Knorpel liegt der Schließmuskel (*M*); *u. L.* Durchschnitt durch das untere Lid.

wie ein Vorhang nach unten hängt und sich unten zum Lidknorpel (*K*) verdickt; vor ihr die Fasern des Schließmuskels (*M*) und die Haut mit den Lidhaaren am freien Lidrande; hinter ihr am Dache der Augenhöhle nach vorne ziehend der Lidheber (*Lh.*), der sich am Ausgange der Augenhöhle fächerförmig ausbreitet und mit seiner fascienähnlichen Sehne in die Fascia tarso-orbitalis übergeht, so daß unmittelbar ober dem oberen Knorpelrande nur noch *eine* Membran sichtbar ist: die mit der Sehne des Lidhebers vereinigte Fascia tarso-orbitalis.

**Örtliche Betäubung.** Um durch die Gewebeschwellung in der Beurteilung des Erfolges während des Eingriffes nicht gestört zu sein, soll man mit möglichst geringen Mengen von Lösung auszukommen suchen. Außerdem sehen manche Ärzte sogar vom Einträufeln einer Cocainlösung in den Bindehautsack ab, weil

durch den Heber bewirkt worden sein. Damit wurde der Beweis erbracht, daß der Muskel nicht völlig gelähmt ist. In solchen Fällen darf von der Vorlagerung nach EVERSBUSCH ein guter Erfolg erwartet werden. Der schwächer gewordene Muskel wird bei diesem Verfahren in der Weise wieder kräftig gemacht, daß er verkürzt und sein Ansatzpunkt weiter nach vorne verlegt wird. Unternimmt man aber diesen Eingriff doch, obwohl der Levator ganz gelähmt ist, z. B. weil auch die anderen Muskeleingriffe keinen Erfolg versprechen, so muß man das Lid gleichzeitig entsprechend verkürzen.

**Anatomie.** Zum Verständnis des Eingriffes mögen die topographischen Verhältnisse dieser Gegend mit wenigen Worten ins Gedächtnis zurückgerufen werden. Ein sagittaler Durchschnitt durch die Mitte der Augenhöhle zeigt folgendes Bild (Abb. 96). Augenhöhlenrand (*R*), daran befestigt die Fascia tarso-orbitalis (*F*), die

diese die Lidspalte zu erweitern geeignet ist. Es wird also zum Eintropfen ein anderes unempfindlich machendes Mittel (Pantocain, Percain od. dgl.) verwendet und zum Einspritzen eine starke Novocainlösung (4%ig). Zunächst wird unter die Haut des Lides eingespritzt und dann die Nadel entlang dem Lidheber nach rückwärts vorgeschoben und die Lösung auf die ganze Breite des Muskels verteilt.

Der **Eingriff** beginnt mit einem Schnitte, der in der Mitte zwischen Augenbrauenbogen und Lidrand in der Länge des Lides durch die Haut und den Schließmuskel geführt wird. Das Auge ist durch die unter das Lid gelegte Hornplatte geschützt. Nach geringer Unterminierung beider Wundränder kommt unten der obere Rand des Knorpels, oben die dünne Fascia tarso-orbitalis zum Vorschein. Diese wird 5—6 mm ober dem Knorpel durchgeschnitten, worauf die Muskelbündel des Lidhebers frei vorliegen und sich nach oben in den geschlossenen Körper des Muskels verfolgen lassen (Abb. 97).

Wird die Fascie zu weit unten, d. h. zu nahe dem oberen Knorpelrande durchgeschnitten, so wird die Bindehaut der Übergangsfalte bloßgelegt, aber nicht der Muskel, dessen Fasern sich schon weiter oben mit der Fascie vereinigt hatten. Wird aber der Schnitt durch die Fascie zu hoch oben gemacht, so tritt das Fettgewebe der Augenhöhle hervor, bedeckt das Eingriffsfeld und stört das Auffinden des Muskels sehr. Um die richtige Stelle zu finden, wo die Fascie durchgeschnitten werden soll, wird sie etwas oberhalb des oberen Knorpelrandes mit einer Pinzette aufgehoben und von der Unterlage abgezogen.

Knapp oberhalb der Stelle, wo sie anfängt, sich von dem unterliegenden Gewebe abheben zu lassen, wird sie mit dem Skalpell gespalten. In der Öffnung erscheinen sofort die roten Muskelfasern, die sich hier fächerförmig ausbreiten. Der Muskel wird je nach der Länge des auszuschneidenden Stückes entsprechend weit nach oben freigelegt. Je stärker der Eingriff wirken soll, um so höher müssen die Nähte angelegt und um so mehr vom Muskel ausgeschnitten werden.

**Nähte.** Drei Nähte werden in derselben Weise wie bei der Vorlagerung der geraden Augenmuskeln durch den Muskel gelegt: die erste durch seine Mitte. Diese wird so hoch oben als möglich mit der Pinzette gefaßt und in der ganzen Dicke (die Hornplatte bleibt unterlegt) mit der ziemlich stark gekrümmten Nadel 2mal nacheinander durchstochen. Dadurch wird eine Schlinge gebildet, in der die Fasern des mittleren Drittels des Muskels beim Zusammenziehen eingeschnürt werden. Eine 2. Schlinge wird medial davon angelegt, eine 3. lateral, beide in der gleichen Höhe (Abb. 98). 2 mm unterhalb der Fäden wird der Muskel quer




Abb. 97. Der in der Mitte zwischen Augenbraue und Lidrand angelegte Schnitt durch die Haut (*H*) und den Schließmuskel (*M*) wird durch eingelegte Haken offen gehalten. Die Fascia tarso-orbitalis, die bei *i'* durchtrennt worden ist, wurde so nach unten geschlagen (*F*), daß die Linie *i*, wo sie mit der Sehne des Lidhebers verschmilzt, frei sichtbar ist.




Abb. 98. Der mittlere Faden ist schon eingelegt. Es wird eben die zweite Naht angelegt. Der seitliche Teil des Muskels ist mit einer Pinzette in Form einer Falte aufgehoben und die Nadel wird in der ganzen Dicke des Gewebes durchgeführt.




Abb. 99. Nach Ausschneidung eines 5 mm breiten Streifens aus Muskel (und Bindehaut) wird zuerst das mittlere Fadenpaar an die vordere Fläche des Knorpels (K) angenäht. Dadurch wird beim Knüpfen der Fäden das Ende des durchschnittenen Lidhebers auf die vordere Fläche des Knorpels gezogen, wo es in der Nähe des Lidrandes anheilt.

durchtrennt und aus ihm ein 8—15 mm langes Stück, das nach unten bis an den oberen Rand des Knorpels reicht oder auch noch ein schmales Stück von diesem enthält, ausgeschnitten. Die Bindehaut kann bei einiger Vorsicht geschont werden. Nur wenn ein Streifen aus dem Knorpel ausgeschnitten wird, muß auch die Bindehaut mitgenommen werden, da sie an ihn angewachsen ist. Nur wenn der Muskel ganz arbeitsunfähig ist, so daß das Lid nur durch Verkürzung seines Gewebes in die richtige Stellung gebracht werden kann, muß der größte Teil des Tarsus geopfert werden. Er wird alsdann 2—3 mm oberhalb des Lidrandes ausgeschnitten. Die klaffende Wunde wird in der Weise

geschlossen, daß die 6 Enden der Seidenfäden zwischen Knorpel und Schließmuskel durch den intermarginalen Saum herausgeleitet und über Stückchen von Kautschukdrainröhrchen geknüpft werden.

Zu diesem Zwecke wird der periphere Lidteil mit der Pinzette an den Fäden hinaufgeschoben, bis er den zentralen Muskelteil, d. h. die Fadenschlingen berührt. Es genügt dann ein zartes Anziehen beim Knüpfen der Fäden, um das Lid in der richtigen Stellung zu erhalten. Werden die Fäden straff geknüpft, so kann das unterlegte Material, auch wenn es aus Kautschuk besteht, einen Eindruck im Lidrande erzeugen und die Lidhaare zum Ausfall bringen. Es hängt nur vom richtigen Vorgehen ab, daß der intermarginale Saum durch diese Nähte keinen Schaden nimmt.

Wird Catgut verwendet, so werden die Fadenenden möglichst weit unten an der vorderen Fläche des Knorpels angenäht, wodurch das obere Schnittende des Muskels über den Wundrand des Knorpels auf dessen vordere Fläche gezogen

wird und dort in der Nähe des Lidrandes anheilt (Abb. 99). Diese Art der Naht hat den Vorteil, daß der Lidrand in keine Mitleidenschaft gezogen wird. Über dem vorgelagerten Muskel wird die Hautwunde durch mehrere Nähte geschlossen (Abb. 100).

**Ergebnisse.** Dieser Eingriff wirkt zumeist sehr gut. Es kann aber nicht in Millimetern angegeben werden, wieviel vom Muskel ausgeschnitten werden muß, um das Lid um ein gewisses Maß zu heben. Es besteht keine Gefahr, durch zu starkes Kürzen des Muskels einen Lagophthalmus zu erzeugen, denn die Haut bleibt unverkürzt. Nur wenn der größte Teil des Tarsus ausgeschnitten wird, ist ein Lagophthalmus unvermeidlich.

### Das Verfahren nach HESS.

**Anzeige.** Das Verfahren ist nur für die Fälle von Wert, wo der Stirnmuskel zur Verbesserung der Ptosis ausgiebig verwendet wird. Dies ist bei den meisten Kranken mit Ptosis der Fall: die Stirne ist in Falten gelegt und die Haut der Augenbraue weit über den oberen Augenhöhlenrand, der ihrer gewöhnlichen Lage entspricht, hinaufgezogen. Wo kein Versuch gemacht wird, den Stirnmuskel zusammenzuziehen, um die Ptosis zu verbessern, verspricht der Eingriff von vornherein wenig Erfolg.

**Örtliche Betäubung.** Der Eingriff wird in örtlicher Betäubung ausgeführt. 1 ccm einer 1%igen Cocainlösung genügt zur Einspritzung unter die Haut der Augenbraue und Lidhaut, und vor dem Durchstechen der Fäden oben wird eine gleiche Menge der Lösung nahe der Beinhaut in der Gegend der oberen Durchstichstelle einverleibt.

**Verfahren.** Vor dem Eingriffe wird die Augenbraue geschoren. An dieser Stelle wird die Haut in der Länge der Lidspalte waagrecht eingeschnitten. Die Narbe wird daher später von der Augenbraue bedeckt und dadurch unsichtbar. Der Schnitt durchsetzt nur die Haut. Beim tieferen Einschneiden werden größere Gefäße verletzt und durch die Blutung wird der weitere Verlauf des Eingriffes gestört. Nach Ausführung des Schnittes wird mit dem Messer die Haut nach abwärts bis unter den oberen Rand des Knorpels, d. h. bis nahe zum Lidrand unterminiert. Der Anfang der Ablösung ist dadurch erschwert, daß sich hier zahlreiche Muskelfasern in der Haut ansetzen. Weiter unten aber ist das Unterhautzellgewebe sehr locker und wird mit dem Messer




Abb. 100. Aussehen des Lides nach Beendigung der Vorlagerung des Hebers. Die Hautwunde ist durch mehrere Nähte verschlossen. Der Lidrand blieb unberührt.




Abb. 101. Verfahren nach HESS. Ablösung der Haut vom Schnitte *S* aus. Die Pinzette faßt die Haut so weit unten, als der Fortschritt der Unterminierung erlaubt. Das steil gehaltene Messer dringt hinter der Haut nach unten, während es von vorne durch die Haut hindurch beobachtet wird.

leicht durchtrennt. Auch eine geringe Blutung stört wegen der Ansammlung des Blutes in der Tasche, in der das Messer vorzuschieben ist. Die Lage und das Fortschreiten des Messers wird daher von vorne durch die Haut überwacht: es wird in senkrechter Haltung parallel zur Haut nach unten vorgeschoben und die Haut mit der Pinzette so weit unten als jeweilig möglich festgehalten (Abb. 101). Auf diese Weise kann mit wenigen Messerzügen die Haut in der ganzen Länge des Schnittes bis zum Lidknorpel hinunter abgelöst werden. Bei dieser Art des Vorgehens besteht auch weniger Gefahr, die Haut zu fenstern, die Haut zu ungenügenden Einblickes in die




Abb. 102. Anlegen der Nähte. Die Pinzette, von der sich ein Arm vorne, der andere rückwärts in der Tasche befindet, faßt die Haut dort, wo die Nadel eingestochen wird. Das eine Fadenende ist bereits durchgeführt, die am anderen Ende angebrachte Nadel wird eben eingestochen.

Tasche versucht wird, unter unmittelbarer Beobachtung die Hinterfläche der Haut mit dem Messer von dem unterliegenden Gewebe abzutrennen.

**Nähte.** Nach vollendeter Ablösung der Haut werden 3 Nähte angelegt, die 1. in der Mitte des Lides, die beiden anderen zur Seite. Die kräftigen Seidenfäden sind mit langen und flachen Nadeln doppelt versehen. Die beiden Nadeln des 1. Fadens werden 3 mm voneinander entfernt in der Richtung von vorne nach hinten in einem Abstände von 4—8 mm vom Lidrande durch die Haut geführt. Diese wird mit der Pinzette gerade an der Stelle des Durchstiches festgehalten, indem ein Arm in der Tasche, der andere außen auf der Haut angesetzt wird (Abb. 102). Dadurch wird ein Nachgeben der lockeren Haut verhindert

und der Faden an der gewünschten Stelle angebracht. Die Nadeln mit den Fäden werden aus der Schnittwunde herausgeleitet und nach oben gelegt. In gleicher Weise werden die äußere und innere Naht ungefähr je 1 cm von der mittleren entfernt eingesetzt. Darauf werden zunächst die beiden Enden des mittleren Fadens hinter den oberen Wundrand nahe der Beinhaut, also hinter dem Muskel nach oben geführt und in einer Entfernung von ungefähr  $1\frac{1}{2}$ —2 cm vom Einschnitt durch die Haut knapp nebeneinander ausgestochen. In gleicher Weise wird das äußere Fadenpaar nach oben geführt. Die beiden Enden des inneren Fadens sollen nicht senkrecht nach oben angelegt, sondern etwas nach innen gegen die Mittellinie zu abgelenkt werden.

Die 3 Fäden werden schließlich über Gazebäuschchen geknüpft. Dadurch wird das Lid gehoben und gleichzeitig entsprechend der Einstichstelle der Fäden eine Falte der Haut, ähnlich der Deckfalte gebildet. Die früher auf 4—8 mm angegebene Entfernung der Einstichstelle der Fäden vom Lidrande muß je nach der Lage der Deckfalte im anderen Lide bemessen werden. Eine zu

hoch oben gelegene Deckfalte ist ebenso entstellend, wie eine zu nahe dem Lidrand gelegene.

Schon beim leisen Anziehen der Fäden wird das Lid gehoben, so daß die Lidspalte alsbald die natürliche Größe erreicht. Es müssen aber die Fäden beim Knüpfen soweit angezogen werden, daß das Lid wesentlich höher steigt, als seine richtige Lage war. Zur Erreichung dieser Überberichtigung ist aber ein sehr starkes Zusammenziehen der Fäden zu unterlassen, weil dadurch das Lid nicht




Abb. 103. Anlegung der feuchten Kammer. Die Hautwunde durch mehrere Nähte verschlossen. Die drei Hebenähte, deren innere etwas medialwärts abweicht, über Bäumchen geknüpft. Das Lid stark gehoben, vom Auge etwas abstehend. Neue Deckfalte entsprechend den Durchstichpunkten der Fäden. Zum Schutze des Auges, das nun durch das obere Lid nicht bedeckt werden kann, ist eine Zelluloidkapsel darübergelegt, die mit Paraplaststreifen (P) ringsum angeklebt ist.

wesentlich mehr gehoben würde, als es bei mäßig stark angezogenen Fäden schon gehoben war und diese außerdem zu rasch durchschneiden würden.

Die Hautwunde wird mit mehreren Seidennähten geschlossen.

**Verband.** Nach dem Knüpfen der Fäden besteht ein vollständiger Lagophthalmus. Das Auge wird daher mit einer Celluloidschale so bedeckt, daß ein ziemlich luftdichter Abschluß zustande kommt. Es genügt, die Schale entlang ihrem Rande mit Paraplaststreifen anzukleben und dort, wo größere Spalten zwischen Schale und Unterlage bestehen, diese mit Watte auszufüllen. Schon in wenigen Minuten ist die Innenwand der Schale feucht. Unter diesem Verband (Abb. 103) vermag das Auge wochenlang ohne Reizerscheinung zu bleiben.

Der Verband braucht nicht jeden Tag gewechselt zu werden. Da die Schale zur Überwachung der Hornhaut genügenden Einblick gestattet, wird er nur dann erneuert, wenn eine Absonderung die Reinigung des Auges erfordert.

**Nachbehandlung.** Die Hautnähte der Schnittwunde werden in 3—4 Tagen herausgenommen. Die anderen aber haben so lange als möglich liegen zu bleiben, womöglich 14 Tage; wenn sie bis dahin nicht locker geworden sind, noch länger: 3 Wochen. Nach dieser Zeit sind sie gewöhnlich so locker, daß sie keinen Halt mehr haben, und nach Durchschneidung leicht herausgezogen werden können. Durch das lange Belassen der Fäden bilden sich entlang den Stichkanälen Narbenstränge, die das Lid mit dem Stirnmuskel in Verbindung bringen, da die Fäden oben durch diesen durchgeführt worden sind. Sie sollen gleichsam als Sehnen dienen, mit denen der Stirnmuskel das Lid zu heben instand gesetzt wird.

Es ist unumgänglich notwendig, die Fäden sofort bis zu starker Überberichtigung zusammenzuziehen. Wird zunächst — unter Anlegen von Fadenschlingen ohne zu knüpfen — das Lid nur bis zu seiner richtigen Stellung gehoben, so treten Verklebungen der Haut mit dem unterliegenden Gewebe ein, wodurch ein späteres Nachziehen der Schlingen zwecklos gemacht wird. Es wird nämlich dann durch den Zug des Fadens nicht mehr — wie es unmittelbar beim Eingriff der Fall ist — die Haut des Lides über die Unterlage hinaufgeschoben und in dieser erhöhten Lage zum Anheilen gebracht, worin die eigentliche Grundlage für den Erfolg des Eingriffes liegt, sondern es wird alsdann das ganze Lid mit dem Faden in die Höhe gezogen, um natürlich sofort wieder herunterzufallen, wenn der Faden herausgezogen wird. Darin scheint mir der Grund zu liegen, warum manche Ärzte mit ihren Erfolgen mit diesem Verfahren unzufrieden waren und sie abändern zu müssen glaubten.

Dauernder Lagophthalmus ist bei diesem Verfahren unter keinen Umständen zu befürchten.

Diesem großen Vorzuge des Verfahrens steht der Umstand als Nachteil gegenüber, daß der endgültige Einfluß des Eingriffes nicht von vornherein bemessen werden kann. Aber ermöglicht uns das überhaupt einer der vielen Eingriffe, die bis jetzt gegen Ptosis empfohlen worden sind? Es gibt kein Verfahren, womit die Lidspalte mit Sicherheit genau auf die Weite der Lidspalte der gesunden Seite gebracht werden könnte.

**Ergebnis.** Der Erfolg des HESSSchen Verfahrens ist in den meisten Fällen ausgezeichnet, nur selten ungenügend; nie braucht dauernde Überberichtigung befürchtet werden. Besonders empfehlenswert ist es bei beiderseitiger Ptosis. Der Erfolg genügt auch den Ansprüchen der Schönheit: die Narbe der Einschnittsstelle ist später von der Augenbraue bedeckt, und durch die richtig eingesetzten Nähte wird eine gute Lage der Deckfalte verbürgt.

Gelegentlich scheint nach Ausführung dieses Eingriffes der Kranke nach wie vor die Ptosis zu haben. Erst in dem Augenblicke, wo das gesunde Auge geschlossen wird, hebt sich das obere Lid bis zur richtigen Breite der Lidspalte. Die Erklärung ist darin zu suchen, daß hier erst nach Verschuß des gesunden Auges der Stirnmuskel zur Hebung des Lides herangezogen wird. Eine einseitige Tätigkeit des Stirnmuskels bei geöffnetem 2. Auge war dem Betroffenen nicht möglich, auf die beiderseitige aber hatte er verzichtet. Andere haben nach dem auf einer Seite ausgeführten HESSSchen Eingriff nunmehr diese Lidspalte zwar richtig weit, aber die gesunde Lidspalte durch die Zusammenziehung des Stirnmuskels zu weit offen. Die beiderseitige Innervation des Stirnmuskels hat bei diesen eine übermäßig Erweiterung der Lidspalte am gesunden Auge,

auf der kranken Seite aber die richtige Breite herbeigeführt. Die besten Erfolge gibt daher das HESSsche Verfahren bei beiderseitiger Ptosis.

Als nicht für das Verfahren geeignet sind außer den Fällen von mangelnder Tätigkeit des Stirnmuskels die anzusehen, wo außer dem Lidheber auch der obere gerade Augenmuskel gelähmt ist oder eine totale Ophthalmoplegie vorliegt. Wenn sich das Auge auch während des Schlafens nicht nach oben hinter das obere Lid drehen kann, so besteht immerhin die Gefahr einer Erkrankung der Hornhaut; dazu kann aber auch dadurch Veranlassung gegeben werden, daß sich die Haut des oberen Lides, die manchmal nach dem Eingriff durch Suffusion oder Ödem geschwollen ist, über den Lidrand nach unten vorwölbt und die Hornhaut berührt, wodurch sich Erosionen und Geschwüre bilden.

**PAGENSTECHERS Naht.** Die Nähte bei dem Verfahren von HESS sind im Wesen die von PAGENSTECHER gegen Ptosis empfohlenen. Die größere Wirksamkeit des HESSschen Eingriffes erklärt sich in erster Linie durch die infolge der Nähte bewirkte Flächenverschiebung der vorderen Lidplatte. Die PAGENSTECHERSche Naht möge nur gegen die leichtesten Fälle von Ptosis versucht werden. Die Nähte sind lange Zeit liegen zu lassen. Anstatt Seide kann dazu ein Draht verwendet werden, der durch Zusammendrehen der beiden oberen Enden entsprechend verkürzt wird, bis das Lid genügend gehoben ist. Um eine Narbenbildung in der Haut zu vermeiden, wird die Naht unter ihr (subcutan) angelegt. Von dem Einstichpunkte *a* wird das eine Fadenende ober der Augenbraue durch *c* herausgeführt, darauf mit dem 2. Fadenende von *a* aus subcutan 2 mm nach außen gegangen und in *b* ausgestochen. Durch denselben Punkt *b* wird die Nadel wieder eingeführt und oben entweder in *c* oder in *d* ausgestochen. Knüpfung über Gazebüschchen. Die eine Naht wird im inneren Drittel, die zweite im äußeren Drittel des Lides angelegt (Abb. 104).




Abb. 104. PAGENSTECHERSche Nähte. In der Strecke *a b c d* liegt der Faden unter der Haut.

**Verfahren von MOTAIS.** Bei diesem Verfahren wird der gelähmte Lidheber durch eine schmale, aus der Mitte des oberen geraden Augenmuskels geformte Zunge ersetzt, die an den Knorpel angenäht wird. Ermöglicht wird diese Verwendung durch den Umstand, daß der Lidheber und der obere gerade Augenmuskel insofern zusammen in Tätigkeit treten, als beim Blick nach oben auch das Lid gehoben wird.

**Örtliche Betäubung.** Nach gründlichem Cocainisieren des Bindehautsackes durch Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung Einspritzung von  $\frac{1}{2}$  ccm einer 1%igen Cocainlösung unter die Bindehaut der Übergangsfalte.

**Ausführung.** 1. Das obere Lid wird umgestülpt und der gewölbte Knorpelrand mit einem Doppelhaken nach oben gezogen, während das Auge durch einen in der Bindehaut nahe dem oberen Limbus befestigten Faden stark nach unten gedreht wird. Auf diese Weise ist die Übergangsfalte bloßgelegt und entfaltet. Das Eingriffsgebiet wird nun durch die angegebene Einspritzung unempfindlich gemacht.

2. Freilegung des oberen Geraden in gleicher Weise wie bei der Vorlagerung der Augenmuskeln beschrieben: Einschnitt in die Bindehaut des Augapfels mit




Abb. 105. Das obere Lid ist umgestülpt und der gewölbte Knorpelrand durch einen Doppelhaken hinaufgezogen. Die Übergangsfalte ist dadurch bloßgelegt. Die waagrechte und die senkrechte Linie bezeichnen die Stelle der Einschnitte in die Bindehaut. Das Auge wird durch einen am oberen Limbus eingesetzten Faden nach unten gezogen.




Abb. 106. Der Ansatz des oberen Geraden ist bloßgelegt und ein gerader Schielhaken darunter geschoben.

der kleinen gekrümmten Schere 6 mm hinter dem Limbus parallel dazu, 8 mm lang. Von der Mitte des Schnittes

ein langer Bindehautschnitt nach oben durch das Gebiet der Übergangsfalte hindurch bis zum gewölbten Rande des Knorpels (Abb. 105). Der




Abb. 107. Durch das mittlere Drittel des Muskels ist nahe dem Ansätze eine Fadenschlinge gelegt.




Abb. 108. Die Schere, die durch ein Knopfloch der Fascia orbitalis an die vordere Knorpelfläche gelangt ist, dringt entlang dieser mit kleinen Schlägen bis an den Lidrand vor.

gerade Schielhaken wird von innen unter die Sehne des Muskels geschoben und damit vom Gehilfen das Auge nach unten gezogen (Abb. 106).

3. Mit der Pinzette wird der mittlere Teil der Sehne aufgefaßt, mit der geschlossenen Schere das zugehörige Faserbündel nach rückwärts von den an-

grenzenden Muskelfasern freigemacht und ein krummer Schielhaken darunter eingeführt. Nachdem unmittelbar hinter dem Muskelansatz die Nadeln eines doppelt bewaffneten Fadens von hinten nach vorne durch diesen Muskelteil durchgestochen worden sind, durchtrennt ihn ein Scherenschlag von seinem Ansatz. Auf diese Weise ist eine Muskelzunge des oberen Geraden mit einer Fadenschlinge versehen (Abb. 107).

4. Am gewölbten Knorpelrande werden von dem Bindehautschnitte aus 2 kleine seitliche Einschnitte der Bindehaut angelegt und der dahinter gelegene Lidheber eingeschnitten. Durch dieses Knopfloch wird die Schere eingeführt und mit kleinen Schlägen entlang der vorderen Fläche des Lidknorpels bis in die Nähe des freien Lidrandes vorgeschoben (Abb. 108).

5. Beide Nadeln des Fadens werden durch das Knopfloch ober dem Knorpel eingeführt, zwischen Haut und vorderer Knorpelfläche hinuntergeleitet und 2 mm oberhalb des Lidrandes durch die Haut ausgestochen. Die Durchstichpunkte sind ungefähr 4 mm voneinander entfernt. Werden beim Knüpfen die beiden Fadenenden gleichmäßig angezogen, so wird dadurch die Muskelzunge zwischen Knorpel und Haut lidwärts gezogen, bis ihr Ende nahe der Mitte des Lidrandes zu liegen kommt (Abb. 109). Die Fäden werden über einer Perle oder über einem Gazebäuschchen geknüpft (Abb. 110). Die Bindehautwunde wird durch einige Catgutnähte sorgfältig verschlossen. In der Übergangsfalte wird die Bindehaut ziemlich tief aufgefaßt, um einem Vorfall des Gewebes dieser Gegend vorzubeugen. Beide Augen werden verbunden. Der Verband wird täglich erneuert. Nach 8 Tagen werden die Nähte entfernt.

Der Eingriff hat den Vorteil, daß er keine sichtbare Narbe hinterläßt und die regelrechte Beziehung zwischen Auge und Oberlid in der Hebung wieder herstellt, so daß auch bei Hebung des Auges das Lid nicht mehr herunterhängt. Die Ergebnisse sind durchschnittlich gut. Aber auch dieses Verfahren läßt manchmal im Stiche.




Abb. 109. Das eine Fadenende ist bereits durch die Lidhaut über den Lidhaaren durchgeführt, die Nadel des anderen Endes wird eben durchgestochen. Die Muskelzunge erscheint schon gegen das Lid hinaufgezogen.




Abb. 110. Der Faden ist über einer Perle geknüpft. Das Lid ausgiebig gehoben.

### Zwischenfälle und Nachteile.

1. Hernienartige Vorwölbung des Augenhöhlenfettes in die Bindehautwunde. Diese muß daher durch mehrere Catgutnähte sorgfältig verschlossen werden.

2. Das in dem ursprünglichen Verfahren angegebene Ausstechen und Knüpfen des Fadens auf der Bindehautseite des Lides birgt die große Gefahr von Hornhautschädigungen (Geschwürbildung). Diese Hornhauterkrankungen können vielleicht auch durch den Lagophthalmus bedingt sein, der wenigstens in der ersten Zeit nach dem Eingriffe besteht, da ein Anziehen des Fadens bis zur Überberichtigung notwendig ist, um ein genügendes Dauerergebnis zu erreichen. Anlegen eines Verbandes wie bei dem Verfahren von HESS wird am besten davor schützen.

3. Der Lagophthalmus macht sich besonders beim Schlafen geltend. Im gesunden Zustande sinkt beim Schlafen das obere Lid herunter (Erschlaffung des Lidhebers), während sich das Auge nach oben dreht (Wirkung des oberen Geraden). Ist durch diesen Eingriff der obere Gerade in dauernde Verbindung mit dem Lide gebracht, so kann dieser Umstand zu einem ungenügenden Lid-schlusse führen. Dieser Nachteil des Eingriffes ist eben dadurch gegeben, daß die Hebung des Auges nicht immer mit der des Lides vergesellschaftet ist. Beim Blinzeln senkt sich das obere Lid, während das Auge fast unbeweglich bleibt. Ähnlich wie beim Schlafen ist es beim freiwilligen festen Verschuß der Lidspalte. Wird nun durch den Eingriff die Bewegung des oberen Lides lediglich abhängig gemacht von dem oberen Geraden, so muß es zu solchen regelwidrigen Erscheinungen kommen. Der obere Gerade ist demnach nicht in uneingeschränkter Weise geeignet, einen vollwertigen Ersatz für den gelähmten Heber zu schaffen.

4. Störungen der Augenbewegungen im Sinne einer Schwäche des oberen Geraden (Doppeltsehen) werden unmittelbar nach dem Eingriffe oft beobachtet. Meist verschwinden die Beschwerden nach einiger Zeit.

## Achtes Kapitel.

### Die Eingriffe gegen das Schielen.

**Einleitung.** Die Zahl der gegen das Schielen ersonnenen wundärztlichen Verfahren ist sehr groß, man braucht nur einen Blick in die Handbücher zu machen. Viele von ihnen haben gewiß gleichen Wert. Um aber immer gute Erfolge zu erzielen, ist es unbedingt notwendig, sich in einem und demselben Verfahren eine große persönliche Erfahrung anzueignen. Man muß sich einmal ganz klar darüber werden, wieviel man *selber* mit einem bestimmten Verfahren erreicht, nicht was der erreicht, der es erfunden hat. Jeder Arzt soll sich daher auf ein bestimmtes Verfahren einstellen; besonders der, der nicht Gelegenheit hat, viele Schiel-  
eingriffe zu machen. Er soll nicht immer wieder ein neues Verfahren anfangen, wenn er mit dem einen (nach wenigen Versuchen) nicht zufrieden war.

#### Die Sehnenablösung (Tenotomie).

**Örtliche Betäubung.** Nach wiederholtem Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung in den Bindehautsack Aufdrücken eines mit 10%iger Cocainlösung getränkten kleinen Stielwattetupfers auf die Bindehaut in der Gegend des Sehnenansatzes. Bei sehr empfindlichen Leuten Einspritzung von  $\frac{1}{3}$  ccm 1%iger Cocainlösung unter die Bindehaut am Sehnenansatz, aber auf keinen Fall entlang dem Muskel nach rückwärts. Auf den Vorteil der Vermeidung einer Einspritzung unter die Bindehaut siehe S. 152.

Zur **Ausführung** der Tenotomie des *inneren* Geraden wird mit der in der linken Hand gehaltenen Hakenpinzette 3 mm vom Limbus entfernt eine Falte der Bindehaut des Auges aufgehoben und mit einer kleinen, gekrümmten Schere ein ungefähr 5—7 mm langer, senkrechter Einschnitt gemacht. Der nasale Wundrand wird mit der Pinzette etwas emporgehoben und das subconjunctivale Gewebe mit kleinen Scherenschlägen durchschnitten und unterminiert. Darauf wird die geschlossene Pinzette hart an der Lederhaut waagrecht in die Wunde bis zum Muskelansatz (5 mm vom Limbus) eingeführt, wobei der Gehilfe den nasalen Wundrand der Bindehaut etwas emporhebt. Am Muskelansatz angelangt, wird die Pinzette geöffnet und an die Lederhaut angedrückt. Durch das Schließen der Pinzette wird die Sehne gefaßt. Die Pinzette wird darauf senkrecht zur Oberfläche des Augapfels aufgestellt, wodurch die in der TENONschen Kapsel eingehüllte Sehne von ihm abgehoben wird. Der Sehnenansatz schimmert durch die Kapsel genügend deutlich durch. Die in der rechten Hand bereitgehaltene Schere macht nun zunächst am unteren Rande des Sehnenansatzes einen kurzen Einschnitt in diesen. Damit wird auch die TENONsche Kapsel eröffnet. Durch diese Lücke wird das eine Blatt der Schere unter die Sehne geschoben, das

andere Blatt wird knapp vor dem Ansatz angelegt. Die Wölbung der Scherenblätter ist gegen die Lederhaut gerichtet, so daß die Spitzen vom Augapfel abgewendet sind. Damit ist ein Anstechen der Lederhaut ausgeschlossen. Wird nun der Ansatz abgetrennt (Abb. 111), so bleibt nichts von der Sehne an der Lederhaut haften. Der Schnitt erstreckt sich ausschließlich auf die Länge des Sehnenansatzes und läßt den Ansatz der TENON'schen Kapsel jenseits davon unberührt. Nach der Ablösung bleibt nur eine zarte Leiste zurück, der Ansatz-




Abb. 111. Tenotomie des inneren Geraden. Um zu zeigen, wie die Scherenblätter liegen und wie die Sehne hart an ihrem Ansatz von der Lederhaut abgelöst wird, mußte der Muskel freigelegt gezeichnet werden. Beim Eingriffe aber bleiben Sehne und Muskel von der TENON'schen Kapsel bedeckt und ihre Ränder sind daher nicht so sichtbar, wie hier in der Zeichnung. Die Kapsel wird weder von der Sehne, noch von ihrem Ansatz an der Lederhaut abgelöst. Das Auge ist nach außen gedreht. Die Bindehaut (B) ist eingeschnitten. Die Pinzette ist senkrecht aufgestellt, nachdem sie die Sehne (S) aufgefaßt hat. Das eine Blatt der Schere ist knapp hinter dem Ansätze unter die Sehne geführt, das andere liegt davor.

stelle der Sehne entsprechend. Der Muskel wird sofort losgelassen, weil Zer- rung daran schmerzhaft ist. An Stelle der Pinzette über- nimmt die linke Hand einen gekrümmten Schielhaken; er wird knapp an der Leder- haut in die Wunde einge- führt und nach oben und unten bewegt, um zu prüfen, ob alle Fasern der Sehne durchschnitten wurden. Undurchschnittene Fasern leisten dem vorgezogenen Haken einen unverkenn- baren Widerstand. Auch diese Fasern werden knapp am Auge abgetrennt. Ver- fängt sich der Haken in der TENON'schen Kapsel, so zieht er eine zarte mem- branöse Falte vor; diese darf nicht mit Fasern der Sehne verwechselt werden. Denn Einscheiden der TENON'schen Kapsel jen-

seits des Sehnenbereiches führt eine unerwünschte Steigerung des Erfolges herbei. Sind alle Fasern durchtrennt, so wird die Wunde mit 1 oder 2 Catgutnähten in der Richtung von oben nach unten geschlossen. Beim Durchstoßen der Nadel durch die Bindehaut soll diese mit der Hakenpinzette fest- und der Nadel ent- gegengehalten werden, weil Zerrn an der Bindehaut dem Kranken unnötige Schmerzen bereitet.

Die Haltung der Instrumente ist dieselbe, ob die Tenotomie am rechten oder linken Auge ausgeführt wird. Nach dem Eingriffe wird ein leichter Verband angelegt, der in 1—2 Tagen weggelassen werden kann. Siehe darüber auch S. 157.

Für die Tenotomie des *äußeren* Geraden wird der Einschnitt durch die Bindehaut etwas weiter vom Limbus entfernt angelegt, da sich die Sehne dieses Muskels weiter vom Limbus entfernt ansetzt (7 mm gegenüber 5 mm). Im übrigen ist der Vorgang gleich.

Als unangenehme Folgen einer Tenotomie des inneren Geraden stellen sich manchmal ein:

Hervortreten des Auges, Erweiterung der Lidspalte und Einsinken der Carunkel. Diese Einziehung zeigt sich bisweilen schon unmittelbar nach der Ablösung der Sehne, indem durch den Rückzug des Muskels Fasern, die von ihm zur Carunkel ausstrahlen, angespannt werden und sie nach hinten ziehen. Durch Unterminieren der Bindehaut gegen die Carunkel mit kleinen Scherenschlägen werden diese Fasern durchtrennt und dadurch die Einsenkung beseitigt. Dies kann auch längere Zeit nach der Tenotomie von einer frisch gesetzten Bindehautwunde aus vorgenommen werden.

Das Hervortreten des Auges und eine starke Erweiterung der Lidspalte sind meistens Folgen ausgiebigen Einschneidens in den Ansatz der TENONSchen Kapsel und daher auch fast immer mit Überberichtigung des Schielens verbunden, d. h. mit Schielen des Auges nach auswärts. Sie verschwinden daher auch alle zusammen, wenn der zu weit nach rückwärts gegleitene Muskel regelrecht vorgelagert wird.

Ist aber mit diesen Erscheinungen kein Auswärtsschiel verbunden, so können sie durch eine Tarsorrhaphie behoben werden.

### Vorlagerung.

**Örtliche Betäubung.** Nach vorheriger Cocainisierung des Bindehautsackes Einspritzung von  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  ccm einer 1%igen Cocainlösung unter die Bindehaut. Über der Sehne des Muskel wird eine Falte der Bindehaut aufgehoben und die in der Richtung des Muskel gegen den Lidwinkel gekehrte Spitze der Nadel knapp an der Lederhaut unter die Bindehaut eingestochen. Während der Einspritzung wird die Nadel etwas vorgeschoben, um auch die weiter rückwärts gelegenen Teile unempfindlich zu machen. Die sich emporwölbende Blase wird durch leichte Massage verteilt.

**Ausführung.** Um zur Vorlagerung genügenden Raum zu bekommen, wird auf die Mitte eines kurzen lotrechten, vom Limbus 3 mm entfernten Einschnittes in die Bindehaut ein langer, waagrechter gegen den Lidwinkel zu angelegt. Kleine Scherenschläge durchsetzen das infolge der Einspritzung gequollene subconjunctivale Gewebe bis zur Lederhaut und unterminieren die Wunde. Darauf wird mit der Pinzette der Sehnenansatz gefaßt und das Auge in die der Muskelwirkung entgegengesetzte Richtung gedreht. Indem die Spitze der geschlossenen Schere durch das Gewebe entlang dem oberen und unteren Rande des Muskel geführt wird, wird dieser mit einigen Zügen freigelegt. Ein gerader Schielhaken wird unter den Muskel gebracht, gleichgültig ob zuerst von oben oder unten, und damit weiterhin an Stelle der Pinzette der Muskel festgehalten. Ist die Spitze des Schielhakens noch von der Bindehaut oder der TENONSchen Kapsel bedeckt, so wird sie durch kleine Schnitte freigemacht und darauf der 2. Schielhaken in derselben oder entgegengesetzten Richtung unter den Muskel geführt, wobei häufig Fasern des Muskels aufgeladen werden, die dem 1. Schielhaken entgangen waren. Um den Muskel rein zu präparieren, wird das aufliegende Gewebe mit der Schere abgelöst, wobei die Schnitte immer in der Richtung des Muskel geführt werden. Bei einer Schnittrichtung senkrecht auf die Richtung seiner Fasern besteht die Gefahr, den Muskel unversehens zu durchschneiden. So wird ein über 1 cm langes Stück des Muskels freigelegt.

**Nähte.** Während der Naht spannt der Gehilfe den Muskel an, d. h. er zieht mit dem vorderen Schielhaken das Auge in der der Muskelwirkung entgegengesetzten Richtung, während der andere Schielhaken in der der Muskelwirkung gleichen Richtung bewegt wird. Dies hat nicht andauernd, sondern nur beim Durchziehen der Fäden zu geschehen, weil das Anspannen des Muskels Schmerzen verursacht. Zu Nähten werden verwendet 2 nicht zu dünne Fäden aus Seide, auf deren Güte sicherer Verlaß ist, versehen mit je einer dünnen, stark gekrümmten Nadel. Knapp am rückwärtigen Schielhaken wird der eine Faden durch den Muskel hindurch von seiner hinteren Fläche aus ungefähr in der Mitte seiner Breite nach vorne geführt, der Faden zur Hälfte durchgezogen und durch




Abb. 112. Vorlagerung des äußeren Geraden. Auge nach einwärts gekehrt. Der Muskel ist auf zwei Schielhaken aufgespannt. Der obere Faden ist schon durchgezogen; der untere wird eben angelegt.

Wiederholung des Durchstiches knapp daneben mit derselben Nadel eine Schlinge erzeugt, worin die eine Hälfte des Muskels — gleichgültig ob zuerst die obere oder untere — durch Anziehen an beiden Fadenenden eingeschnürt wird. Die andere Hälfte des Muskels wird in demselben Abstände vom Sehnenansatz in gleicher Weise in eine Fadenschlinge aufgenommen und eingeschnürt (Abb. 112). Die beiden Fadenenden der die obere Hälfte des Muskels enthaltenden Schlinge werden nach oben, die der unteren Schlinge nach unten gelegt, oder es wird ein weißer und ein schwarzer Faden verwendet, um nicht später falsche Enden der Fäden zu knüpfen. Nach Anlegen der Nähte wird der Muskel mit einem Scherenschlage durchschnitten, nicht zu nahe den Schlingen (ungefähr 2 mm davon entfernt), um ein Entschlüpfen zu verhindern. Der am Auge haftende Stumpf des Muskels wird nun knapp an der Lederhaut abgetragen und nur an dem einen Ende des Ansatzes ein kurzes Stück stehengelassen, um daran das Auge mit der Pinzette halten zu können. Der Muskel wird also bei diesem Eingriffe um ein gewisses Stück verkürzt. Darauf wird er am Auge wieder

befestigt, und zwar so, daß sich sein Einfluß stärker geltend machen kann, d. h. sein Ansatz wird näher an den Limbus verlegt, woher der Name **Vorlagerung**.

Zu diesem Behufe wird die Nadel jedes Fadens durch die oberflächlichen Lagen der Lederhaut knapp am Limbus durchgeführt, wobei der Faden der oberen Schlinge mit seiner Lage der oberen Hälfte des ursprünglichen Ansatzes entspricht und umgekehrt. Die Lederhaut wird zwischen ursprünglichem Ansatz und Limbus durch Ablösen der Bindehaut bloßgelegt, um dem Muskel eine Wundfläche zur Anheilung zu bieten. Manche skarifizieren auch die Lederhaut nahe dem Limbus mit einer Lanze und machen außerdem den Muskel




Abb. 113. Der Muskel ist durchschnitten, ein Stück davon ausgeschnitten. Das Auge wird mit der Pinzette an einem zurückgelassenen Teil des Sehnenstumpfes festgehalten. Der obere Faden ist bereits durch die Lederhaut nahe am Limbus durchgezogen und unter der Bindehaut eine Strecke weit (punktierte Linie) bis zum Ausstich fortgeführt. Der untere Faden wird eben an der Lederhaut befestigt. Die flach an die Lederhaut angelegte Nadel ist von der Mitte aus in die oberflächlichen Schichten eingedrungen.

an seiner Innenfläche hinter den Nähten mit einem scharfen Löffel etwas wund, um eine schnellere Verklebung beider Flächen zu erzielen. Dünne Nadeln mit flachem ovalen Querschnitt sind für diesen Zweck den gewöhnlichen dreikantigen überlegen, da diese ziemlich tief eingeführt werden müssen, um nicht durchzuschneiden.

Die Gefahr einer Durchbohrung liegt bei gewöhnlicher Dicke der Lederhaut nicht vor, wofern nur die Nadel richtig, d. h. nicht etwa senkrecht auf sie aufgesetzt, sondern fast parallel an ihre Oberfläche angelegt wird, so daß eben nur die oberflächlichen Schichten der Lederhaut damit aufgefaßt werden. Bleibt dabei die Nadel zu oberflächlich, so daß sie durchschneidet, so wird knapp daneben der Versuch wiederholt. Schon einige wenige Fasern der Lederhaut genügen zur sicheren Verankerung des Fadens. Die Fäden sollen zwar nahe dem Limbus durchgezogen werden, aber doch mindestens 1 mm von ihm entfernt bleiben, damit nicht durch den Druck des Knotens die Hornhaut geschädigt wird. Daher werden die Nadeln parallel zum Limbus, d. h. senkrecht auf die

Muskelrichtung durch die Lederhaut durchgeführt (Abb. 113), die Nadel des oberen Fadens von dem waagrechten Meridian aus nach oben, die des unteren Fadens von demselben Punkte nach unten. Diese Nahrichtung hat außerdem den Vorteil, senkrecht zur Faserrichtung der Lederhaut gelegen zu sein.

Nach Befestigung in der Lederhaut werden die Fäden noch nach oben und nach unten durch die Bindehaut geführt. Dadurch wird ihnen für den Fall, als der Halt in der Lederhaut nicht genügen sollte, eine neue Stütze verliehen, gleichzeitig aber auch mit dieser Naht die Bindehautwunde geschlossen. Es wird nur je 1 Fadenende durch die Lederhaut durchgeführt. Oberer und unterer Faden werden dann in eine chirurgische Schlinge gelegt. Während nun der




Abb. 114. Knüpfen der Fäden. Das Auge wird mit der innen angesetzten Pinzette nach außen gedreht. Der untere Faden ist schon geknüpft. Der obere muß noch zusammengezogen werden. Die Bindehaut deckt von selbst die Wunde.

Gehilfe das Auge mit der Pinzette, die am entgegengesetzten Limbus angelegt worden ist, in die Richtung des vorgelagerten Muskels dreht, werden die Schlingen kräftig zusammengezogen und sogleich der 2. Knopf darüber gemacht (Abb. 114). Die Fäden müssen kräftig zusammengezogen werden, damit der Muskel bis an den Limbus vorrückt. Bleiben die Fäden locker, so folgt dem Eingriffe anstatt einer Stärkung eine Schwächung des Muskels. Wird beim Anlegen der Muskelnaht auch etwas subconjunctivales Gewebe und TENONSche Kapsel mitgefaßt, so wird beim Knüpfen der Fäden die Bindehautwunde dadurch allein schon geschlossen. Ist dies aber nicht der Fall, so wird eine waagrechte Naht durch die Bindehaut angelegt. Die Fäden werden kurz abgeschnitten, so daß sie die Hornhaut nicht berühren. Nach dem Eingriffe werden beide Augen verbunden, um durch Ausschluß von Augenbewegungen den frisch genähten Muskel in seiner Stellung zu bewahren und seine Verwachsung am Limbus zu sichern. Das in den ersten Stunden nach der Vorlagerung oft häufige Erbrechen wird durch Nautisan-Zäpfchen verhindert oder zumindestens sehr gemildert.

Das Verfahren ist für den inneren und äußeren Geraden dasselbe.

**Nachbehandlung.** Beide Augen werden durchschnittlich für 4 Tage geschlossen gehalten (siehe darüber auch S. 157). Der Verband wird aber schon am Tage nach dem Eingriffe gewechselt, um die Hornhaut zu überwachen.

Die Nähte werden erst nach 8—10 Tagen herausgezogen oder noch später. Man möge abwarten, bis sie vollkommen frei liegen, so daß sie ohne Schwierigkeit herausgezogen werden können. Nur ausnahmsweise ist die Bindehaut in den ersten Tagen stark geschwollen. Meist wird sie durch den Eingriff nur wenig gereizt, auch das Auge bleibt reiz- und schmerzlos, und in kurzer Zeit verrät nur noch eine leichte Verdickung der Bindehaut über dem Muskel die Stelle des Eingriffes. In seltenen Fällen bleibt der vorgelagerte Muskel dauernd durch die dünne Bindehaut als rote Vorwölbung sichtbar und verursacht dadurch eine gewisse Entstellung.

Ist es unmöglich, dem Kranken das andere Auge zu verbinden (bei ambulatorischen Eingriffen, wenn der Kranke allein nach Hause gehen muß), so wird der vorgelagerte Muskel durch eine Naht ruhiggestellt, die, auf der Seite des vorgelagerten Muskels in der Bindehaut nahe dem Limbus eingesetzt, durch den Lidwinkel zur äußeren Haut geführt und hier geknüpft wird. Auf diese Weise ist es dem Auge unmöglich gemacht, nach der dem vorgelagerten Muskel entgegengesetzten Seite zu blicken.

*Befestigung des Muskels in der Bindehaut.* Nach der vorgebrachten Darstellung wird der Muskel unmittelbar an die Lederhaut angenäht, indem der Faden durch ihre oberflächlichsten Schichten geführt wird. Ein anderes Verfahren besteht darin, das eine Fadenende des oberen Fadens unter der Bindehaut entlang dem Limbus nach oben bis zum senkrechten Meridian und in gleicher Weise das eine Fadenende des unteren Fadens unter der Bindehaut bis zum unteren Ende desselben Meridians zu führen. Auf diese Weise wird dem Muskel eine genügende Stütze in der Bindehaut verschafft. Werden die Fäden geknüpft, so wird der Muskel an den Limbus vorgezogen, wobei er sich spalten muß. Andererseits gibt aber auch die Bindehaut des Auges dem Zuge nach und spannt sich in der Richtung der Sehne schräg über die Hornhaut. Abgesehen davon, daß diese Befestigung bei zerreißlicher Bindehaut nicht ganz verläßlich ist, hat dieses Verfahren den großen Nachteil, daß sich die Bindehaut von oben und unten in Form einer straff gespannten Falte über die Hornhaut legt; dabei kann der Faden, namentlich wenn er nicht genügend angezogen wurde, auf die Hornhaut zu liegen kommen, ohne daß es bemerkt wird, da der Knoten von der Bindehaut bedeckt ist. Druckgeschwüre, die dadurch auf der Hornhaut zustande kommen, geben eine schlechte Vorhersage; sie heilen nur langsam und hinterlassen eine dichte Narbe. Die drückenden Nähte müssen sofort entfernt werden. Dabei geht meist der ganze Erfolg der Vorlagerung verloren. Das unmittelbare Annähen an die Lederhaut ist daher unbedingt vorzuziehen. Nur eine Verdünnung der Lederhaut (Ektasie) wäre als Gegenanzeige anzuerkennen.

#### **Abänderung des Verfahrens nach v. LIEBERMANN.**

v. LIEBERMANN legt noch ein zweites Schlingenpaar 3 mm hinter dem ersten in gleicher Weise an und verankert die Fäden knapp nach oben und unten von den 1. am Limbus in der Lederhaut. Dieses 2. Fadenpaar entlastet das 1., so

daß dieses ohne Zerrung zur sicheren Anheilung kommen kann. Daher gibt bei diesem Verfahren der unmittelbare Erfolg der Vorlagerung nicht so viel nach als sonst, und es können daher auch hohe Grade von Einwärtsschielen durch Vorlagerung allein ohne Zuhilfenahme einer Tenotomie beseitigt werden.

### Die Verkürzung eines Augenmuskels nach R. O'CONNOR.

Von den vielen Verfahren, die Schielstellung eines Auges durch bloße Verkürzung des in Betracht kommenden Muskels zu beseitigen, ohne die Ansatzstelle des Muskels an der Sklera zu verändern, hat sich das Verfahren von R. O'CONNOR, in Amerika unter dem Namen Cinchoperation bekannt, uns als wirksam erwiesen.

Nach gründlicher Anästhesie, wie zur Vorlagerung eines Muskels, wird entsprechend dem Sehnenansatze ein vertikaler Schnitt durch die Bindehaut ge-




Abb. 115.

führt und der Muskel freigelegt. Unter die Sehne schiebt man einen Schielhaken, der etwas länger und flacher ist als die gewöhnlichen und die Sehne sehr gut ausbreitet. Die Sehne wird von anhaftendem Bindegewebe mit Schere und Pinzette gereinigt, bis sie völlig frei und glänzend vorliegt. Diese Präparation hat mit großer Sorgfalt durchgeführt zu werden, da Reste von Bindegewebe bei den folgenden Maßnahmen sehr stören. Es wird dann unter die Sehne ein scharfes Häkchen geführt

und ungefähr in ihrer Mitte nahe dem Ansätze nach vorne durchgestochen. Das Häkchen wird nach rückwärts gezogen und die Sehne so der Länge nach in 2 gleichgroße Teile geteilt. Während dieser Maßnahme übt man einen mäßigen Gegenzug mit dem Schielhaken aus, um die Spaltung der Sehne so schonend als möglich zu gestalten. In der gleichen Weise wird jetzt jede Hälfte gespalten, so daß die Sehne in 4 gleich große Stränge zerlegt wird. Das Häkchen wird jedesmal bis zum Übergang der Sehne in die Muskelfasern geführt. Der Muskelbauch soll dabei nicht gespalten werden, da dies zu unangenehmen Blutungen Anlaß geben kann. Um die separierten Sehnenstränge wird jetzt ein Fadenbündel geschlungen, das aus 6—8 Fäden besteht. Das Fadenbündel wird durch eine stumpfe, leicht gekrümmte dicke Nadel gezogen und knapp am Ohr der Nadel und am Ende der ungefähr 25 cm langen Fäden durch dünne Seide zusammengeknotet. Den Knoten nahe dem Nadelende lege man in der Richtung der Seite der Nadel, damit er beim Durchführen der Nadel nicht stört. Die Fäden sollen aus einem kochbaren Material bestehen, das auch nach längerem Liegen im Gewebe keine Änderung erfährt. (Ein blaugefärbter, synthetischer Faden „Dermol“ hat sich bis jetzt am besten bewährt.

Die Fäden und die stumpfe Nadel sind bei der Firma Reiner, Wien, IX, van Swietengasse Nr. 10, erhältlich.) Das Fadenbündel wird zuerst um das oberste Sehnenbündel geschlungen (Abb. 115). Man führt die Nadel von oben und vorne her kommend um den unteren Rand des Sehnenbündels herum und zieht sie dann entlang der rückwärtigen Fläche des obersten Sehnenbündels wieder nach oben. In der gleichen Weise umschlingt man ein 2. Mal das Bündel und legt die 2. Schlinge hinter die 1. Vom oberen Rand der Sehne geht man jetzt mit der stumpfen Nadel um den unteren Rand des 2. Sehnenbündels und umschlingt nun ebenfalls von vorne und oben kommend seinen unteren Rand. Die Nadel zieht man dann entlang der hinteren Fläche des 2. Sehnenbündels zu seinem oberen Rande und führt das Instrument hier in der Spalte zwischen 1. und 2. Sehnenbündel nach vorne. Auch dieses Bündel wird wie jedes folgende 2mal umschlungen. Die 2. Schlinge wird diesmal vor die 1. gelegt. Auch das 3. und 4. Sehnenbündel wird in gleicher Weise von vorne und unten unterfahren und 2mal umschlungen (Abb. 115). Dabei reicht die 1. Schlinge für das 3. Sehnenbündel vom oberen Rande des 2. Sehnenbündels und die 1. Schlinge für das 4. Sehnenbündel vom oberen Rande des 3. Sehnenbündels bis zum unteren Rande des jeweils umschlungenen Bündels. Die 2. Fadenschlinge wird nur um das betreffende Bündel allein geführt, und zwar so, daß sie beim 3. Bündel hinter die 1. und beim 4. Bündel vor die 1. gelegt wird. Es wird also immer die 2. Schlinge vor die




Abb. 116.

1. gelegt, wenn sie im höher gelegenen Bündel hinter die 1. gelegt worden war und umgekehrt. Wenn alle Bündel der Sehne mit den Fäden in dieser Weise umschlungen sind, wird mit der Straffung des Fadenbündels begonnen. Die Fäden werden zuerst nach abwärts und zugleich durch die Arme einer gekrümmten glatten Pinzette gezogen, die gegen den unteren Rand der Sehne gepreßt wird, um die Zugwirkung auf die Fäden zu beschränken und gleichzeitig ein schmerzhaftes Ziehen am Muskel zu vermeiden. Man strafft so das Fadenbündel etwas und zieht dann in gleicher Weise das Fadenbündel nach oben, indem man jetzt die Pinzette gegen den oberen Rand der Sehne nach unten zu drückt. Man zieht nun abwechselnd das Fadenbündel ein Stück nach oben und dann wieder nach unten und streckt es so allmählich. Um das sich straffende Fadenbündel schlingen sich während dieses Vorgehens die isolierten Sehnenstränge und bilden dann zum Schluß einen Wulst (Abb. 116) um die gestreckten Dermofäden. Wenn diese völlig gestreckt sind, dann können sie ohne großen Widerstand leicht in der von den gedrehten Sehnenfasern gebildeten Röhre auf- und abbewegt werden. Hat man die Sehne nicht vorher sauber von anhaftendem Bindegewebe gereinigt, so klemmen sich Bindegewebefasern zwischen Sehnenfasern und Fäden ein und erschweren so ungemein das Strecken der

Fäden; ja es kann dadurch unmöglich werden, die Fäden zu straffen. Die Bindehaut muß vom Gehilfen abgehalten werden, damit sie nicht in die Sehnenbündel hineingezogen wird. Das gestreckte Fadenbündel und die es wulstförmig umschlingenden Sehneteile werden nun mit einem Catgutfaden zusammengebunden (Abb. 116). Dann wird am unteren Ende der Bindehautwunde die Conjunctiva bis zur unteren Übergangsfalte unterminiert und hier das Fadenbündel durch eine kleine Öffnung in den Bindehautsack geleitet. Die Öffnung lege man ungefähr in den vertikalen Meridian. Das Fadenbündel schneide man 3—4 mm von der Öffnung entfernt ab, so daß die Enden frei in die Übergangsfalte zu liegen kommen. Knapp am oberen Rande des Sehnenwulstes wird das andere Ende des Fadenbündels abgetragen und die Bindehautwunde durch Seidennähte exakt verschlossen.

Die muskelverkürzende Wirkung dieses Eingriffes wird gesteigert, wenn man die Sehnenbündel 3mal statt 2mal umschlingt, oder die Sehne in mehr als 4 Bündel teilt. Auch wirkt ein Fadenbündel mit mehr Fäden als oben angegeben stärker verkürzend. In gleicher Weise ist eine nur 1malige Umschlingung des Sehnenbündels, eine geringere Anzahl von Fäden oder eine nur 3fache Unterteilung der Sehne von schwächerer Wirkung. Wenn die Verkürzung des Muskels unmittelbar nach der Streckung der Fäden zu ausgiebig war, so kann man daher sofort durch Ausziehen einzelner Dermofäden die Wirkung der Operation merklich verringern. Es ist nur hervorzuheben, daß ein 3faches Umschlingen der Sehnenstränge die Streckung der Fadenbündel ungemein erschwert. Man soll daher trachten, mit einer doppelten Umschlingung der Sehnenstränge sein Auslangen zu finden.

**Nachbehandlung.** Es genügt, das operierte Auge allein zu verbinden. Der Verbandwechsel soll täglich erfolgen; der Verband kann nach 3—4 Tagen ganz entfernt werden. Falls der Erfolg des Eingriffes zu ausgiebig war, so kann man noch bis zum 4. Tag durch Entfernen einzelner Dermofäden seine Wirkung beliebig abschwächen. Die Seidennähte fallen nach 8 Tagen in der Regel von selbst heraus. Die Dermofäden sollen nach 3 Wochen entfernt werden. Nach Anästhesie des Bindehautsackes durch Eintropfen einer Cocain- oder Pantocainlösung mit etwas Adrenalinzusatz zieht man die im unteren Fornix freiliegenden Fäden mit einer anatomischen Pinzette einzeln heraus, wobei man mit einer zweiten geschlossenen Pinzette von unten her gegen den unteren Rand der Sehne drückt. Die Fäden sind wegen ihrer blauen Farbe ohne weiteres zu finden; sie folgen leicht dem Zuge des Instrumentes. Die Operationsstelle bleibt noch durch weitere 3—4 Wochen hindurch als ein leicht geröteter kleiner Wulst sichtbar. Die Rötung verschwindet nach 3—4 Wochen völlig. Eine geringe Verdickung an der Operationsstelle kann noch etwas länger bestehen bleiben. Gelegentlich kommt es in den ersten Tagen nach der Operation zum Auftreten einer Chemosi conjunctivae mit geringem Lidödem. Derartige Erscheinungen gehen in der Regel unter kühlen Umschlägen in wenigen Tagen zurück.

Da die Operation keinen beiderseitigen Verband erfordert, so ist es möglich, sie in der Sprechstunde durchzuführen, und der Patient kann nach der Operation nach Hause gehen. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber den Verkürzungsoperationen, bei denen der Muskel durchschnitten und nach Entfernung eines Teiles seiner Sehne frisch an die Sklera verankert werden muß, da letztere Eingriffe einen beiderseitigen Verband notwendig machen.

Die Wirkung der O'CONNORSchen Operation beträgt im allgemeinen 15 bis 20 Grade. Sie kann jedoch in der oben angegebenen Weise gesteigert oder verringert werden. Auch bei dieser Operation ist ein geringes Nachlassen des unmittelbar nach dem Eingriffe vorhandenen Erfolges zu beobachten. Ungefähr 5—8 Tage nach der Operation tritt dies in Erscheinung. Es muß also auch bei diesem Vorgehen, wenn es ohne Tenotomie des Antagonisten angewandt wird, eine Überkorrektur angestrebt werden, wie bei den anderen muskelverkürzenden Operationen.

Die Operation kann auch mit einer Tenotomie des Antagonisten verbunden und ihre Wirkung so gesteigert werden. Die Tenotomie soll aber immer erst nach dieser Verkürzungsoperation gemacht werden, ganz gleichgültig, ob man ein Einwärts- oder ein Auswärtsschielen behandelt. Auch empfiehlt es sich, die Tenotomie immer mit einer sichernden Naht durchzuführen, um eine zu starke Wirkung der Tenotomie korrigieren zu können. Das Nachlassen der Verkürzung durch die Operation findet ja erst 6—7 Tage nach der Operation statt; bis dahin kann der Zug des verkürzten Muskels zu einem zu starken Nachrückwärtsgleiten des tenotomierten Muskels geführt haben.

Die Operation wird in gleicher Weise am Rectus superior und am Rectus inferior ausgeführt, wenn eine Indikation zur Verkürzung eines dieser Muskel gegeben ist. Sie liefert eine Verkürzung des Muskels, ohne Veränderung seines Ansatzpunktes, und ist daher in all den Fällen nicht am Platze, wo der Ansatzpunkt eines Muskels verändert werden soll, wie es zum Beispiel Monate oder Jahre nach zu ausgiebiger Tenotomie notwendig werden kann. Sie ist aber vorzüglich geeignet, geringe Grade von Schielablenkung zu beseitigen und hat den großen Vorteil, daß sie infolge des einseitigen Verbandes keinen Spitalsaufenthalt notwendig macht. Das Verfahren kann vor allem empfohlen werden, latentes Schielen damit zu beheben, da man mit ihm die Wirkung eines Muskels wesentlich verstärken kann, ohne seinen Ansatzpunkt zu ändern und gleichzeitig der Erfolg ein dauernder ist im Gegensatz zu vielen anderen Faltungsmethoden.

Auch bei dieser Operation kann die Wirkung im Einzelfalle nicht in Millimetern oder Graden angegeben werden. Ihre Dosierung erfordert ebenfalls in erster Linie persönliche Erfahrung, wie jede Schieloperationsmethode, und der Erfolg hängt im Einzelfalle nicht nur von der Zahl der gelegten Schlingen und der Dicke des Fadenbündels ab, sondern auch vom Tonus der Muskeln, der Lage ihrer Ansatzpunkte, der Größe der Orbita und vieler anderer Faktoren. Es ist daher auch bei dieser Operation nötig, eine gewisse Erfahrung gesammelt zu haben, bevor man ihre Wirkung mit Sicherheit abschätzen kann.

### Über die Eingriffe an den anderen Augenmuskeln.

Die Tenotomie des oberen und des unteren Geraden sind nur ganz selten angezeigt. So kann z. B. in einem Auge, dessen Hornhaut bis auf den obersten Randteil vernarbt ist, der durchsichtige Hornhautteil, der sonst von dem oberen Lid bedeckt wäre, durch eine Tenotomie des Rectus superior in den Bereich der Lidspalte gebracht werden. Solches kann selbstverständlich nur getan werden, wenn es sich um das einzige Auge handelt.

Die Tenotomie des unteren Geraden kann bei alter Lähmung des Obl. sup. des anderen Auges dazu dienen, die beiden Augen gleich hoch zu stellen.

Die Eingriffe werden in derselben Weise ausgeführt wie die Tenotomie der seitlichen Geraden. Durch die Ablösung des Rect. inf. von der Lederhaut kann das untere Lid etwas nach rückwärts gezogen werden. Das Durchtrennen von Strängen, die von der TENONSchen Kapsel zur Fascia tarso-orbitalis ziehen, vermag das Lid wieder in seine richtige Stellung zurückzubringen.

Die Tenotomie der schiefen Augenmuskel gestaltet sich etwas schwieriger.

Um den Zugang zum Ansatz des Obl. sup. an der Lederhaut freizulegen, empfiehlt es sich, die Sehne des Rect. sup. vorerst vorübergehend abzutrennen, worauf es leicht gelingt, einen Schielhaken unter den Ansatz des Obl. sup. zu führen. Er wird knapp an der Lederhaut abgetrennt. Der Rect. sup. wird darauf an seinen Ansatz wieder angenäht. Es ist aber auch möglich, durch Abziehen des Rect. sup. mit einem Schielhaken nach außen den Zugang zur Sehne des Obl. sup. zu erreichen, der unter dem Rect. sup. an das Auge herantritt.

Der Obl. inf. wird von seinem Ansatz auf dem Boden der Augenhöhle abgeschnitten. Sein Ansatz liegt innen knapp hinter dem knöchernen Orbitalrand unmittelbar nach außen vom Eingange in den Ductus nasolacrymalis. Nach Einspritzung einer Novocainlösung unter die Haut in dieser Gegend wird das Lid am inneren unteren Orbitalrande  $1\frac{1}{2}$  cm lang eingeschnitten, die Wundränder auseinandergezogen und ein Schielhaken durch die Wunde am Knochen vorgeschoben. Durch seitliche Bewegungen gelingt es unschwer, den Muskel aufzuladen, was man daraus erkennt, daß sich beim Anziehen des Hakens das Auge nach oben bewegt. Nun wird der Muskel hart am Knochen durchtrennt. Will man sicher sein, den Muskel auf die Dauer gänzlich ausgeschaltet zu haben, so soll man ein kurzes Stück des Muskels ausschneiden.

Die Tenotomie der beiden Schiefen kann angezeigt sein bei Höhenunterschied in der Stellung der beiden Augen infolge alter Lähmung des entsprechenden Geraden des *anderen* Auges (Obl. sup. — Rect. inf., Obl. inf. — Rect. sup.).

Der Obl. sup. kann auch durch Ablösung der Trochlea geschwächt werden, und umgekehrt können in Fällen, wo durch eine Verletzung die Erscheinungen einer Lähmung des Obl. sup. infolge Ablösung der Trochlea von ihrem Ansatz oder Zerschmetterung der Trochlea eingetreten sind, durch Hervorholen des Muskels nach Einschnitt durch die Haut innen oben und Annähen der Trochlea an ihren ursprünglichen Sitz die Erscheinungen der Lähmung beseitigt werden. Nach Stirnhöhleingriffen ist eine Parese des Obl. sup. nicht selten, aber die Doppelbilder verschwinden in kurzer Zeit meist deswegen, weil der Muskel wieder seine Tätigkeit aufnimmt. Ist aber dies nicht der Fall, wie insbesondere auch nach größeren Verletzungen (Skiverletzungen), wo der Muskel dauernd gelähmt bleibt, so soll der Versuch gemacht werden, dem Muskel wieder seinen physiologischen Ansatzpunkt zu verschaffen und ihn in der Gegend der Trochlea zu fixieren. WEGNER empfiehlt dazu als Faden das von BRAUN-MELSUNGEN hergestellte Synthafil. In erster Linie gilt es von einem Einschnitte aus, der durch die Haut und die tieferen Gewebe in der Gegend der Trochlea gemacht wird, mit einem Schielhaken den zurückgesunkenen Obl. sup. aufzufinden, und dann wird um seine Sehne herum aus dem angegebenen Stoff eine Schlinge gebildet, die beiderseits der Sehne an der richtigen Stelle der Trochlea in der Beinhaut fest verankert wird. Die Hautwunde wird vernäht.

Die Tenotomie der beiden Obliqui wurde auch schon wiederholt empfohlen, um bei hoher Kurzsichtigkeit Veränderungen im Augenhintergrunde hintanzuhalten. So wenig möglich ein solcher Einfluß von vornherein erscheint, so haben doch die neuen Forschungen über den Glaskörper und die Netzhautrisse einen gewissen schädlichen Einfluß der Obliquikontraktionen auf das kurzsichtige Auge wahrscheinlich gemacht (siehe S. 361).

Auch Vorlagerungen des oberen und unteren Rect. kommen gelegentlich in Betracht. Die Stellung des Auges wird dadurch aber nicht sehr stark geändert.

### Maßregeln vor Eingriffen.

Bei rechtzeitigem ärztlichen Einschreiten kann in den meisten Fällen die Entwicklung des Dauerschielens, besonders des Einwärtsschielens verhindert werden. Zunächst stellt sich das Schielen nur für wenige Minuten ein, wenn das Kind im Alter von 2—3 Jahren anfängt, mit zunehmender geistiger Regsamkeit feinere Gegenstände in der Nähe genau zu fixieren. Fast immer bestehen Fehler des Brechungszustandes: Hypermetropie und Astigmatismus. Sie haben unter vollständiger Ausschaltung der Akkommodation durch Atropin mit Hilfe der Schattenprobe bestimmt zu werden. Beständiges Tragen der genau berichtenden Gläser lassen dieses zeitweise auftretende Schielen meist gar nicht mehr zustande kommen. In je früherem Lebensalter der Brechungsfehler ausgeglichen wird, um so wirksamer sind die Brillen. Schon 2jährige Kinder können mit einer Brille versehen werden. Treten diese Maßregeln zu einer Zeit in Tätigkeit, wo sich das Schielen erst nur gelegentlich gezeigt hatte und noch nicht zum Dauerschielen geworden war, so wirken sie so gut wie immer sicher, allen Theorien zum Trotz, die diesen innigen Zusammenhang zwischen Refraktionsanomalie und Schielen in Abrede stellen wollen.

Ist das Schielen schon aus dem Stadium des nur gelegentlich eintretenden Schielens — ein Stadium, das im allgemeinen nur recht kurz dauert — in das Stadium des Dauerschielens getreten, so haben diese Maßregeln oft nur noch einen unsicheren Einfluß auf die Schielstellung. Wohl findet man auch Fälle, wo unter der Brille das Schielen spurlos verschwunden ist, aber meist wird der Schielwinkel durch das Tragen der Brille zwar verringert, aber nicht beseitigt.

Indem nun durch die berichtende Brille das Schielen nicht mehr verschwindet, treten an die Behandlung zwei wichtige Aufgaben heran: dem Schielauge eine gute Sehschärfe zu erhalten oder zu verschaffen und das Fusionsvermögen nach Möglichkeit zu erwecken. Durchaus aussichtsreich ist die Vorsorge für die Erhaltung oder Schaffung einer guten Sehschärfe des Schielauges. Die gute Sehschärfe ist das Ergebnis der beständigen und ununterbrochenen Übung während der ersten Lebensjahre. Das Auge des Neugeborenen ist amblyopisch, wenn wir uns so ausdrücken wollen. Richtiger wäre gesagt, daß die Netzhautbilder, auch wenn sie infolge normaler anatomischer und optischer Verhältnisse tadellos sind, in den Gehirnzentren nicht verwertet werden können. Das Kind muß das Sehen, d. h. die geistige Verwertung der Seheindrücke erst erlernen. Die Fähigkeit des Sehenlernens, d. h. also in die gewöhnliche augenärztliche Ausdrucksweise übersetzt, die Fähigkeit, das Auge aus dem angeborenen amblyopen Zustande zu dem Auge mit guter Sehschärfe zu überführen, ist am größten in den allerersten Lebensjahren. Sie erlischt aber während des ganzen

Lebens nicht. Jeder erfahrene Augenarzt hat Fälle beobachten können, wo ein von Geburt amblyopes Auge zu einem sehtüchtigen mit guter Sehschärfe wird, wenn es infolge des Unterganges des anderen gesunden Auges, z. B. durch Verletzung oder Entzündung oder durch Enucleation wegen eines Tumors, rücksichtslos gezwungen wird, nunmehr allein die Seheindrücke aufzunehmen und verwerten zu lernen. Es ist überraschend, wie innerhalb eines halben bis eines Jahres auch bei älteren Leuten solche Augen, die das ganze Leben gebrauchsunfähig waren, sehen lernen, von einer Sehschärfe unter  $\frac{6}{60}$  auf halbe Sehschärfe und höher kommen, so daß der Betreffende, der in der ersten Zeit nach Verlust des gesunden Auges in einer verzweifelten Lage gewesen war, nunmehr wieder seinem Berufe nachgehen, tadellos lesen kann usw. Nur eine Bedingung ist notwendig: daß der Augenhintergrund im Bereiche der Macula und der Sehnerv normal ist. Wenn in der Macula pathologische Veränderungen vorhanden sind, dann ist keine Besserung zu gewärtigen. In solchen Fällen war die Amblyopie nicht ein Mangel an Ausbildung der Sehfähigkeit, sondern die unmittelbare Folge der ungenügenden Bildentwicklung. Es ist daher auch durchaus verständlich, daß man durch ganz radikales vollständiges Ausschalten des gesunden Auges nach dem Vorgange von SATTLER durch einen Mastisoldauerverband in der Verbesserung der Sehschärfe des schwachen Auges bei Kindern sehr gute Erfolge erzielen kann.

Ist nun auch die Fähigkeit des Sehenlernens in den ersten Jahren des Kindes am größten, so gehört auf der anderen Seite doch auch wieder längere Zeit dazu, bis diese Fähigkeit der guten Verwertung der Netzhautbilder — die gute Sehschärfe — dauernd und unzerstörbar verankert ist. Beim Erwachsenen kann ein sehfähiges Auge durch Jahre und Jahrzehnte vom Sehakte ausgeschlossen sein, z. B. durch einen Star, und es wird doch sofort wieder gut sehen, wenn das Sehhindernis beseitigt wird. Es scheint auch da Ausnahmen zu geben. Manchmal ist die Sehschärfe bei der ersten Sehprobe nach einer Staroperation trotz guter optischer Verhältnisse ganz ungenügend, bessert sich dann aber rasch in wenigen Wochen des Gläsertragens.

Das gute Sehen des kindlichen Auges verliert sich infolge der noch ungenügenden Verankerung schnell, wenn es frühzeitig durch irgendwelchen Umstand vom Sehakte ausgeschaltet wird; so wie sich jede andere erlernte Kunstfertigkeit wieder verliert, wenn sie durch lange Zeit nicht geübt wird. Eine solche Ausschaltung aus dem Sehakte kommt durch das Schielen zustande. Die Sehschärfe, die eben in den ersten Lebensjahren des Kindes in Entwicklung und zunehmender Ausbildung begriffen war, vermindert sich in dem durch das Schielen ausgeschalteten Auge häufig sogar auf recht geringe Reste. Nur wenn abwechselnd geschielt wird, bleiben beide Augen in Übung und entwickeln ihre Sehschärfe weiter bis zur normalen.

Die hauptsächlichste Aufgabe bei der Behandlung des Schielens hat sich daher mit aller Sorgfalt darauf zu richten, die Sehschärfe des in Schielstellung geratenen Auges nicht verkümmern zu lassen, sondern durch beständige Übung des Auges sie zu weiterer Entwicklung zu veranlassen. Das einfachste Verfahren besteht in dem seit altersher geübten Verdecken des gewöhnlich fixierenden Auges. Am besten eignet sich dazu eine Brille, wo das fixierende Auge durch eine gut an die Augenhöhle anschließende, undurchsichtige Kapsel ausgeschaltet

ist, während dem anderen Auge das voll berichtigende Glas geboten wird. Die Brille hat mehrere Stunden täglich getragen zu werden. Dieses Vorgehen ist bequemer als das zeitweilige Verbinden des fixierenden Auges. Es wurde auch zu dem Zwecke, um das Schielauge wenigstens zum Nahesehen heranzuziehen und das Auge beständig zu üben, das fixierende Auge andauernd unter dem Einfluß von Atropin gehalten. Ich ziehe die erwähnte Übungsbrille vor. Es ist überraschend, wie die meisten solcher Augen im Verlaufe mehrerer Jahre bis zur normalen Sehschärfe in stetigem langsamen Fortschritte herangezogen werden können. Daß durch zu lange fortgesetzten Dauerverband ein gut sehendes Auge schwach-sichtig werden kann, wie SATTLER es berichtet, ist nur ein Beweis für das früher Gesagte. Diese Verbesserung der Sehschärfe und Erziehung zu einer guten Sehschärfe ist nur möglich, wenn die Brechungsanomalie ganz genau berichtigt ist, um dem Auge Netzhautbilder von bester Qualität zu verschaffen, denn ohne solche kann sich eine gute Sehschärfe nicht entwickeln. Es ist eine bekannte Tatsache, daß z. B. astigmatische Augen, deren Fehler nie berichtigt worden war, eine ganz ungenügende Sehschärfe haben und im späteren Alter auch durch die berichtigenden Gläser kaum wesentlich in ihrer Sehschärfe gehoben werden können. Dagegen vermag die frühzeitig schon in den ersten Lebensjahren einsetzende genaue Berichtigung die Sehschärfe bis zur normalen innerhalb weniger Jahre aufsteigen zu lassen.

Gelingt es auf diese Weise, dem Schielauge gute Sehschärfe zu verschaffen, so ist damit das Wichtigste getan, denn die falsche Stellung kann später durch den Eingriff beseitigt werden; nicht aber kann ein vernachlässigtes und schwach-sichtig gebliebenes Auge später noch sehtüchtig gemacht werden. In diesem Falle hat der Schielende das Auge so gut wie verloren.

Eine weitere Aufgabe besteht nun darin, trotz des Schielens, wenn dieses durch die früher genannten Maßregeln schon nicht beseitigt werden konnte, ein beidäugiges Sehen wieder herzustellen, das Fusionsvermögen zu stärken, wenn es nur unterentwickelt, aber doch vorhanden ist, oder erst zu schaffen, wenn es noch nicht ausgebildet ist. Denn auch das Fusionsvermögen ist erworben, es hat sich erst entwickelt, allerdings noch früher als die gute Sehschärfe. Nach den ersten unkoordinierten Augenbewegungen des Neugeborenen bildet sich innerhalb weniger Monate die binokulare Einstellung der Augen, die beidäugige Fixation mit der Macula aus. Aber auch hier ist die Verankerung anfänglich eine lockere und kann rasch wieder verlorengehen. Zur Wiederherstellung und weiteren Ausbildung des binokularen Sehaktes dienen stereoskopische Übungen. Dazu ist ein Stereoskop mit verschiebbaren Objektträgern notwendig, um die Entfernung der Bilder bequem ändern zu können, und ferner eigene zu diesen Übungszwecken angelegte Bilder (DAHLFELDSches, HAUSMANNsches und ganz besonders das SATTLERsche Bilderbuch). Es wurden dazu besonders bei hohen Schielgraden eigene Vorrichtungen angegeben, die auf der Basis des HERINGSchen Haploskops es möglich machen, daß auch bei starker Ablenkung der Augen jedes Bild auf der Macula des entsprechenden Auges zur Abbildung kommt: Amblyoskop von WORTH und Synoptophor der Fa. Clarke. Auch das Cheiro-skop von MADDOX ist zur Übung sehr empfehlenswert. Stereoskopische Übungen haben nur einen Erfolg, wenn die Mutter oder Pflegerin des Kindes über die Art und Weise des Vorgehens und Übens dabei recht genau unterrichtet worden

sind und sich auch in liebevoller Hingabe mit dem Kinde beschäftigen. SATTLER berichtet über den günstigen Einfluß durch das Tragen von entsprechenden Prismengläsern (bis zu  $20^\circ$  auf jeder Seite) auf die Wiederherstellung des binokularen Sehaktes. Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß weiter keine tägliche eingehende Beschäftigung zu Übungen mit dem Kinde beansprucht wird.

Im Laufe der Jahre hat der Grad der Schielablenkung und die Beweglichkeit der Augen, sowie deren Funktion wiederholt geprüft und vermerkt zu werden, weil ihr Ausmaß und jede Veränderung darin für die Wahl des Eingriffes von großer Bedeutung sind.

**Örtliche Betäubung.** Da diese vollständig ausreicht, wird von der Allgemeinbetäubung um so mehr Abstand genommen, als sie die Mithilfe des Schielenden ausschließt. Dies ist aber zur Beobachtung des Erfolges, der Beweglichkeit der Augen nach dem Eingriffe usw. von unschätzbarem Werte. Daher soll dazu bei Kindern erst geschritten werden, wenn sie den nötigen Verstand erlangt haben, sich bei dem nur wenig schmerzhaften Eingriffe ruhig zu verhalten und den verschiedenen Aufforderungen nachzukommen. Schieleingriffe werden daher frühestens bei Kindern mit 12 Jahren, meistens erst später vorgenommen. Sehr vorteilhaft für ein ruhiges Benehmen während des Eingriffes ist es, wenn in dem Schielenden selbst schon der Wunsch rege geworden ist, von dem Übel befreit zu werden. Entscheidend für diese späte Vornahme des Eingriffes ist aber die Tatsache, daß sich im Laufe des Wachstums sehr häufig der Grad des Schielens ändert, insbesondere die Konvergenz abnimmt. Zu frühes Einschreiten könnte daher später zu einem Übererfolg führen.

Nur bei hohen Graden von Schielen ist gegen einen Eingriff in Allgemeinbetäubung bei Kindern nichts einzuwenden, da dadurch zunächst nur eine wesentliche Abnahme des Schielwinkels bezweckt wird, teils aus kosmetischen Gründen, teils um die folgende Behandlung mit Gläsern und Übungen erfolgreicher zu gestalten.

### I. Einwärtsschielen.

Es hängt namentlich von dem Grade der Schielablenkung und der Sehschärfe der beiden Augen ab, welche Eingriffe in Betracht kommen. Entweder haben beide Augen fast gleiche Sehschärfe, so daß abwechselnd mit dem einen oder dem anderen Auge fixiert wird (alternierendes Schielen), oder aber das eine Auge ist infolge Schwachsichtigkeit zum Fixieren unbrauchbar, so daß immer nur das eine Auge fixiert, das andere schielt (monokulares Schielen).

**Anzeigen für die Eingriffe bei Einwärtsschielen.** Ist das Schielauge schwachsichtig (Sehvermögen  $< \frac{6}{60}$ ), so wird an ihm in erster Linie der Eingriff vorgenommen, soweit die Rücksichtnahme auf seine Bewegungsfähigkeit es gestattet. Doch ist für gewöhnlich auch ein Eingriff am anderen Auge durchaus erlaubt.

Bei Einwärtsschielen *geringen* Grades (Höchstmaß  $15^\circ$ ) kommt zunächst die Tenotomie des inneren Geraden des Schielauges in Betracht, wenn ein Überschuß an Adduktionskraft besteht. Die unmittelbar nach der Sehnenablösung vorgenommene Untersuchung der neuen Augenstellung wird darüber aufklären, ob der erzielte Erfolg geändert zu werden hat. — Ist durch die Tenotomie schon eine bedeutende Schwächung in der Leistungsfähigkeit des inneren Geraden eingetreten, so muß trotz noch bestehenden Einwärtsschielens *zunächst* von einem weiteren Eingriff Abstand genommen werden.

Die Vorlagerung des äußeren Geraden an einem oder an beiden Augen wird ausgeführt: 1. Wenn die Abduktionsfähigkeit des Schielauges wesentlich eingeschränkt ist, 2. wenn das Schielauge eine Sehschärfe von mehr als  $\frac{6}{60}$  hat. Bei mäßigen Schielgraden wird die Vorlagerung nur an einem Auge vorgenommen. Bei Schielen über  $15^\circ$  kann die Vorlagerung an beiden Augen in einer Sitzung gemacht werden. Die Vorlagerung des äußeren Geraden auf beiden Seiten bewährt sich besonders beim alternierenden Einwärtsschielen, da dabei die Abduktion oft beiderseits mangelhaft ist. Die Dosierung der zweiten Vorlagerung hängt von dem übriggebliebenen Grade des Einwärtsschielens nach der ersten Vorlagerung ab. Eine dauernde Überberichtigung ist nicht zu befürchten, selbst wenn unmittelbar nach dem Eingriff Auswärtsschielen besteht.

Bei Schielen *hohen* Grades mit Schwachsichtigkeit des Schielauges hat die Vorlagerung und Tenotomie gleichzeitig ausgeführt zu werden. Über das dabei zu verwendende Verfahren siehe S. 155. Auch unter den dort angegebenen Vorsichtsmaßregeln besteht aber immer eine gewisse Gefahr einer dauernden Überberichtigung. Gibt daher der Schielende seine Zustimmung zu einem zweizeitigen Eingriffe, so ist es vorzuziehen, zuerst durch eine Tenotomie, allenfalls mit unterstützender Naht, das Schielen nach Möglichkeit zu verringern. Unter Gebrauch von Gläsern, die den Brechungsfehler vollständig ausgleichen, wird nach Verlauf mehrerer Monate die endgültige Wirkung des Eingriffes sicher erkannt. Durch eine Vorlagerung, die je nach dem Grade des noch vorhandenen Schielens entsprechend abgestuft wird, kann dann der Rest des Schielens beseitigt werden.

**Wirkung der Tenotomie.** Man nimmt allgemein an, daß die Tenotomie des inneren Geraden die Stellung des Auges um durchschnittlich  $15^\circ$  ändere. Aber oft ist das Endergebnis geringer, manchmal sogar um vieles. Und während sich gelegentlich nach einer Tenotomie nach Ablauf einer gewissen Zeit der Schielwinkel kaum verändert hat, gestaltet sich in anderen Fällen die Wirkung unerwartet hoch, so daß das angegebene Maß weit überschritten wird. Diese Bemerkungen beziehen sich auf eine regelrecht ausgeführte Tenotomie. Denn es wäre nicht zu verwundern, wenn bei ausgiebigem Einschneiden in die Bindehaut, das subkonjunktivale Gewebe und besonders in die TENONsche Kapsel der Eingriff eine gewaltige Stellungsänderung des Auges herbeiführte, oder aber, wenn bei Schonung einzelner Muskelfasern der Erfolg vollständig ausbliebe. Es mögen aber auch bei tadelloser Ausführung des Eingriffes nicht nur physiologische Verschiedenheiten in der Entfernung des Muskelansatzes vom Limbus, in der Stärke des Muskels, in den Verhältnissen der TENONschen Kapsel usw. einen entscheidenden Einfluß auf die Wirkung des Eingriffes nehmen, sondern auch die dabei innerhalb gewisser, wenn auch kleiner Grenzen sich bewegenden Schwankungen im Grade der durch den Eingriff gesetzten Durchtrennungen des subkonjunktivalen Gewebes, der TENONschen Kapsel usw. von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein. In dieser Beziehung schont das Aufsuchen des Muskels mit dem Schielhaken vor der Durchtrennung der Sehne die TENONsche Kapsel weniger, als das beschriebene Verfahren des Auffassens der Sehne mit der Pinzette; denn der Haken kann nur unter Zerreißung der einschneidenden TENONschen Kapsel unter den Muskel eingeführt werden.

Nicht zu vergessen ist ferner der uns in seiner Stärke vollkommen unbekannt und bei den verschiedenen Menschen ganz verschieden große Faktor des indi-

viduellen Muskeltonus. Setzen wir bei zwei Patienten durchaus gleiche Einzelheiten in den anatomischen Verhältnissen und im Eingriffe selbst voraus, so wird der Erfolg einer Tenotomie des Rectus internus ungleich größer sein, wenn der Muskeltonus hoch ist, weil dadurch nunmehr der Rectus externus einen wesentlich größeren Einfluß auf die Stellung des Auges gewinnen muß als bei niedrigem Muskeltonus. Es ist daher für die Begutachtung des unmittelbaren Einflusses einer Tenotomie von großem Vorteil, durch die Anästhesierung den Tonus des durchzuschneidenden Muskels nicht zu schwächen. Ganz unvermeidlich ist eine gewisse Schwächung des Tonus durch das Trauma der Operation selbst. Wenn der Kranke nicht zu empfindlich ist, führe man daher die Tenotomie ohne Einspritzungen unter die Bindehaut durch. Durch Aufdrücken eines mit einer starken (10%igen) Cocainlösung getränkten Tupfers auf die Bindehaut entsprechend der Ansatzstelle des Muskels kann die Sehne genügend unempfindlich gemacht und der Eingriff in Ruhe durchgeführt werden, wenn der Patient nur halbwegs vernünftig ist. Durch die Einspritzung unter die Bindehaut wird nämlich, namentlich wenn die Flüssigkeit entlang dem Muskel etwas nach rückwärts vordringt, der Tonus des Muskels so sehr geschwächt, daß der unmittelbare Einfluß der Tenotomie viel größer erscheint, als er wirklich ist. Am Tage nach dem Eingriffe, wo die Wirkung des Anästhetikums wieder verschwunden ist, erscheint dann die Wirkung der Tenotomie überraschend geringer. Dieser Umstand ist wahrscheinlich eine der häufigsten Ursachen, warum so oft der unmittelbare Erfolg nicht gleich ist dem bleibenden, dem Dauererfolge. Freilich kann sich auch das entgegengesetzte Verhalten zeigen, nämlich daß der unmittelbare Erfolg schon in den ersten Tagen nach dem Eingriffe wesentlich zunimmt. Dies ist meistens dann der Fall, wenn der Muskel in seinen anatomischen Verhältnissen zu sehr geschädigt worden ist.

**Regelung der Wirkung der Tenotomie.** Wie dem auch immer sei, in Wirklichkeit steht das eine fest: es kann von vornherein nicht mit Sicherheit der Grad der Stellungsänderung vorausgesagt werden.

Aber selbst, wenn die Wirkung einer Tenotomie ganz bestimmt und im voraus bekannt wäre, so würden uns dadurch nicht geringe Verlegenheiten erwachsen. Es wird natürlich eine Seltenheit sein, daß der Grad der Stellungsänderung, den die Sehnenablösung herbeiführt, genau gleich ist dem Grade des Schielens. Es stellte sich daher schon sehr bald das Bedürfnis heraus, den Erfolg in beliebiger Weise verändern zu können. Ist man dies imstande, so kann füglichweise darauf verzichtet werden, von vornherein auf das genaueste zu wissen, wie groß die Wirkung der Sehnenablösung sein wird.

Die Mittel, den Erfolg einer Tenotomie zu verändern, sind Nähte, die als unterstützende und als gegenwirkende Naht bezeichnet werden.

**Unterstützende Naht.** Mit einer kleinen, mäßig stark gekrümmten Nadel wird ein Seidenfaden in der Bindehaut außen knapp am Limbus im waagrechten Meridian befestigt. Dort ist die Bindehaut fest mit den Augenhäuten verwachsen. Wird der Faden weiter außen angelegt, so kann damit nur eine Falte der Bindehaut vorgezogen, aber kein wesentlicher Einfluß auf die Stellung des Auges ausgeübt werden. Wird die Befestigung ober- oder unterhalb des waagrechten Meridians vorgenommen, so bewirkt das Anziehen des Fadens eine unerwünschte Drehung des Auges um andere Achsen als die senkrechte, die hier

einzig in Betracht kommt. Zur sicheren Befestigung des Fadens kann die Nadel zweimal durchgeführt werden, das erste Mal knapp ober dem waagrechten Meridian, das zweite Mal knapp unterhalb davon. Ist die Bindehaut leicht zerreiblich, so wird mit der Nadel etwas tiefer eingestochen und der Faden in das episklerale Gewebe versenkt. Beide Fadenenden werden unter den äußeren Augenwinkel im waagrechten Meridian zur äußeren Haut durchgeführt, indem die Nadel rasch durch den Lidwinkel durchgestochen wird. Zu diesem Behufe wird der äußere Augenwinkel mit zwei Fingern angespannt. Indem die beiden Fadenenden über einem Bäuschchen Gaze geknüpft werden, kann das Auge beliebig weit nach außen gerollt werden.

Die Fragen, die sich nun von selbst aufdrängen, sind folgende: Wie weit darf das Auge nach außen gerollt werden, wie groß ist der Einfluß dieser Naht und wann darf sie angewendet werden? Die Anwendung der Naht ist auf die Fälle beschränkt, wo nach Ausführung der Tenotomie noch Einwärtsschielen besteht, dabei aber der eben von seinem Ansatz abgelöste Muskel in seiner Wirksamkeit noch nicht zu sehr beschränkt ist. Daraus ergibt sich von selbst, daß — eine Hauptregel bei jedem Schieleingriffe — unmittelbar nach Ausführung der Sehnendurchschneidung die Stellung der Augen überprüft werden muß. Der auf dem Tisch liegende Kranke wird aufgefordert, einen Punkt auf der Decke des Zimmers zu fixieren, während beide Augen geöffnet sind. So ist leicht zu erkennen, wieviel der Eingriff an Verbesserung der Stellung herbeigeführt hat. Durch Fixation des in der Mittellinie angenäherten Fingers wird die Konvergenzfähigkeit der Augen geprüft und durch seitlich ausgeführte Augenbewegungen die Adduktionsfähigkeit des eben durchschnittenen Muskels. Die Naht hat zu unterbleiben, wenn trotz noch vorhandener Schielstellung der Muskel schon bedeutend geschwächt erscheint. Dadurch, daß die Naht das Auge nach auswärts dreht, kommt der Muskelansatz noch entfernter vom Limbus zu liegen, als die Tenotomie allein es bewirkt hatte, und damit verliert der Muskel noch mehr an Wirksamkeit. Eine zu starke Schwächung des Muskels aber hat eine baldige Entwicklung von Auswärtsschielen zur Folge, veranlaßt durch das Übergewicht des ungeschwächt gebliebenen äußeren Geraden.

Entsprechend unserem Grundsatz, es bei der Sehnenablösung gegen Einwärtsschielen immer bei einer leichten **Unterberichtigung zu lassen**, darf das Auge durch die Naht nicht in höchstem Maße nach auswärts gedreht werden, obwohl es nach Entfernung der Naht eine Rückrollung nach einwärts macht. Die Naht darf also höchstens so stark angezogen werden, daß eine leichte Divergenzstellung zustande kommt. Es genügt, die Naht 24 Stunden liegen zu lassen. Über den endgültigen Einfluß der Naht können nicht bestimmte Angaben in Graden gemacht werden. Für gewöhnlich geht, wie oben erwähnt, das Auge wieder etwas nach einwärts zurück. Der Einfluß der unterstützenden Naht hängt innig zusammen mit der Größe des Einschnittes in die TENONsche Kapsel. Seitliche Einschnitte in sie, die auch zur Erhöhung der Wirkung empfohlen werden, werden ja in geringerem Maße bei Ausführung jeder Sehnenablösung sicher gemacht.

Einen großen Vorteil bedeutet der Umstand, daß es möglich ist, diese Naht noch 1, 2, ja 3 Tage nach der Tenotomie anzulegen. Es kommt gelegentlich vor, daß die durch die Sehnenablösung hervorgerufene Stellungsverbesserung un-

mittelbar nachher ganz zufriedenstellend ist, während in den nächsten Tagen der Einfluß wieder bedeutend zurückgeht und dementsprechend der Grad des Schielens wieder wächst. Die Naht ist alsdann das sicherste Mittel, das ursprüngliche Ergebnis wieder herzustellen. Nach Cocainisierung und Eröffnung der Bindehautwunde werden mit einem Schielhaken die jungen Verklebungen, die sich seit dem Eingriffe schon gebildet hatten, gelöst, worauf die Naht gewöhnlich mit bestem Erfolge angelegt wird.

**Die gegenwirkende Naht.** Knapp am inneren Limbus wird in der Bindehaut — wenn nötig in den oberflächlichen Lederhautschichten — ein Faden verankert, in derselben Weise, wie früher bei der unterstützenden Naht am äußeren Limbus beschrieben. Der Gehilfe hebt darauf den inneren Rand der Bindehautwunde empor, um den Weg für die Hakenpinzette freizumachen, die entlang der inneren Fläche des aufgehobenen Bindehautlappens bis zum Muskel geführt wird. Auf diese Weise gelingt es, den Muskel selbst vorzuziehen und beide Enden des doppelt armierten Fadens durch ihn durchzuführen; die stark gekrümmten Nadeln werden dabei so stark gedreht, daß sie durch den inneren Wundrand der Bindehaut herauskommen. Die beiden Enden werden geknüpft. Das Auge wird dadurch nach einwärts gerollt, so daß der eben früher abgelöste Muskel mit seinem Sehnenansatze wieder näher an den Limbus rückt und dadurch an Einfluß gewinnt.

Die gegenwirkende Naht muß unbedingt angelegt werden, wenn durch die Tenotomie eine Überberichtigung entstanden ist. — Wenn schon unmittelbar nach der Sehnenablösung das Auge Neigung zeigt, in Auswärtsstellung zu geraten, wenn die Adduktions- und Konvergenzfähigkeit des Auges durch den Eingriff schwer beeinträchtigt wurde, würde die Unterlassung dieser Naht ein schwerer Fehler sein. Die höchsten Grade von Divergenzschielen schließen sich an solche verunglückte Tenotomien an. Wie die unterstützende, kann auch diese Naht 1—3 Tage nach der Tenotomie angelegt werden. Es sind nur vorerst die entstandenen Verklebungen mit dem Schielhaken zu lösen. Die Naht wird kräftig genug angezogen, so daß sie eine deutliche Konvergenzstellung des Auges erzeugt. Die Naht soll mehrere Tage liegen bleiben.

**Wirkung der Vorlagerung des äußeren Geraden.** Der Grad der Stellungsänderung, der durch die Vorlagerung des äußeren Geraden erreicht wird, kann noch weniger genau von vornherein angegeben werden als bei der Sehnenablösung. Es wäre ein Irrtum zu glauben, daß jedem Millimeter ausgeschnittenen Muskelstückes in jedem Falle derselbe Grad an Stellungsänderung zukäme, daß somit ein bestimmter Schielgrad nach festgesetzter Liste durch Ausschneidung einer bestimmten Zahl von Millimeter Muskel beseitigt werden könnte. Die Beurteilung wird insbesondere dadurch erschwert, daß der unmittelbare Erfolg der Vorlagerung im Laufe der Heilung ganz beträchtlich zurückgeht. Eine Stellungsänderung von  $30^\circ$  dürfte das höchste Ausmaß des durch eine Vorlagerung erreichbaren Erfolges sein, durchschnittlich dürfte man mit der Annahme von  $15\text{--}20^\circ$  das Richtige treffen. Die Ergebnisse hängen nicht bloß von der Ausgiebigkeit der Muskelausschneidung ab, sondern insbesondere auch von der Vor nähung des Ansatzes vor den ursprünglichen Ansatzpunkt. Dieser Umstand hat gewiß einen größeren Einfluß als die Ausschneidung. Wird der Eingriff nur auf die Ausschneidung eines Muskelstückes beschränkt und der Muskel wieder an

den ursprünglichen Sehnenansatz angenäht, so bleibt der Erfolg stets gering. Von entscheidender Bedeutung ist die Annäherung des neuen Ansatzpunktes des Muskels an den Limbus.

In den beiden genannten Mitteln stehen uns also 2 Möglichkeiten zur Verfügung, die Wirkung einer Vorlagerung verschieden stark zu gestalten.

Erleichtert wird die Stellungnahme wesentlich dadurch, daß bei alleiniger Ausführung einer Vorlagerung keine dauernde Überberichtigung zu befürchten ist, selbst bei geringem Einwärtsschielen von nicht mehr als 15°. Der unmittelbar nach der Vorlagerung sichtbare Erfolg stellt das Höchstmaß der erreichten Wirkung dar — wie schon erwähnt — und geht fast ausnahmslos in den nächsten Tagen bedeutend zurück. Darin liegt ein wichtiger Gegensatz zur Wirkung der Tenotomie. Während bei dieser eine Überberichtigung strengstens zu vermeiden ist, da ein zunehmender Grad von Auswärtsschielen die unausbleibliche Folge wäre, ist die durch eine Vorlagerung erzeugte harmlos. Es ist nicht nur keine Zunahme der Divergenz zu erwarten, sondern im Gegenteil ein Rückgang gewiß.

**Wirkung der gleichzeitigen Ausführung von Vorlagerung des äußeren Geraden und Sehnenablösung des inneren Geraden.**

Wird eine Vorlagerung des äußeren Geraden unmittelbar an die Sehnenablösung des inneren Geraden angeschlossen, so ist die Wirkung meistens von unerwünschter Größe. Selbst wenn nach der Sehnenablösung des inneren Geraden noch ein bedeutender Grad von Einwärtsschielen bei guter Adduktionsfähigkeit des Auges besteht, ist die sofortige Vorlagerung des äußeren Geraden ein gewagter Eingriff. Die erzielte Wirkung ist oft überraschend groß und ein hoher Grad von Auswärtsschielen die unmittelbare Folge. Wegen der vorausgeschickten Sehnenablösung bewirkt nämlich die Vorlagerung außer den die Augenstellung beeinflussenden Veränderungen im Bereiche des äußeren Geraden auch noch eine weitere Schwächung des inneren. Durch die Vorlagerung des äußeren Geraden wird das Auge nach außen gedreht, und zwar, weil der Widerstand des inneren Geraden fehlt, mehr als sonst. Die Folge muß dieselbe sein, wie wenn eine (die Tenotomie) unterstützende Naht angelegt worden wäre. Der innere Gerade kommt weiter von seinem ursprünglichen Ansatzpunkt weg gegen den Äquator des Auges zu liegen und verliert dementsprechend an Einfluß.

Die gleichzeitige Ausführung der Tenotomie und Vorlagerung kann daher nur für die hohen Grade des Einwärtsschielens zugestanden werden und auch dann soll die Vorlagerung auf eine Verkürzung des Muskels beschränkt bleiben und dieser wieder an der ursprünglichen Ansatzstelle angenäht werden. Sollte trotzdem eine Überberichtigung erzeugt worden sein, so darf sie auf keinen Fall geduldet werden, da das erzeugte Auswärtsschielen rasch zunehmen würde. Eine gegenwirkende Naht, die am inneren Limbus kräftig in den oberflächlichen Lederhautschichten zu verankern ist, um ein baldiges Ausreißen der Fäden zu verhindern, ist sofort anzulegen. Würde dies nicht genügen, so müßten die Nähte der Vorlagerung gelöst und der Muskel weiter rückwärts befestigt werden. Das Herausnehmen der Nähte erst 2—3 Tage nach dem Eingriffe hat gewöhnlich keinen Einfluß mehr.

Um eine Überberichtigung bei gleichzeitiger Ausführung von Vorlagerung und Sehnenablösung zu vermeiden, empfahl BIELSCHOWSKY folgendes Vor-

gehen. Zuerst wird die Vorlagerung des äußeren Geraden durchgeführt, ohne daß zunächst die Nähte zusammengezogen werden. Nun wird die Bindehaut über dem inneren Geraden eingeschnitten, die abzulösende Sehne mit ihrer Fascienumhüllung mit der Pinzette gefaßt und ein feiner Seidenfaden nahe dem Ansatz durch die Sehne und die darüberliegende Bindehaut hinter der Stelle des Einschnittes geführt. Unter Anspannung des Fadens wird die Sehne mit der Schere von der Lederhaut sorgfältig unter Schonung der Fascienverbindungen zwischen Muskel, Lederhaut und Bindehaut abgetrennt. Der Seidenfaden wird dann noch durch den hornhautwärts gelegenen Wundrand der Bindehaut geführt, eine lose Schlinge gemacht und nach Vollendung der Vorlagerung nach Bedarf unter Beobachtung der Augenstellung zusammengezogen, bis der gewünschte Erfolg nach den vorher gegebenen Regeln erreicht ist.

**Überlegenheit** der Vorlagerung an **physiologischem Werte** gegenüber der Tenotomie. Vom physiologischen Standpunkte aus gebührt der Vorlagerung unbedingt der Vorzug. Sie erhöht die Beweglichkeit des Auges, während durch die Tenotomie der Einfluß des Muskels geschwächt wird. Denn seine Sehne wächst erst weiter rückwärts in größerer Entfernung vom Limbus an die Lederhaut an. Auch eine regelrecht ausgeführte Ablösung der Sehne ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine künstlich erzeugte Parese leichten Grades. Daraus ergeben sich die 2 Grundregeln, die bei Ausführung einer Tenotomie zu beachten sind: Ein Muskel darf nur dann dem Eingriffe unterzogen werden, wenn die Beweglichkeit des Augapfels in dem Bereiche dieses Muskels über die Norm gesteigert ist. Sie ist dagegen zu unterlassen, wenn der Muskel nur normale und ganz besonders, wenn er eine verminderte Leistungsfähigkeit zeigt. Die Beweglichkeit des Auges ist also unbedingt zu untersuchen, bevor die Entscheidung getroffen wird, ob eine Tenotomie gemacht werden soll oder nicht.

Bei normaler Leistungsfähigkeit des inneren Geraden gelangt das adduzierte Auge mit seinem medialen Pupillarrande bis zur Verbindungslinie der Tränenpunkte. Unter normalen Verhältnissen kann ferner der äußere Hornhautrand bei stärkster Abduktion eben noch die Lidkommissur erreichen, so daß durchschnittlich der äußere Lidwinkel als der Grenzpunkt der Abduktion genommen werden kann. Die gesamte seitliche Bewegungsbahn ist beim Schielen gewöhnlich etwas verrückt, und zwar stets nach der Richtung, nach der geschielt wird. Ist die Adduktionsfähigkeit des Schielauges um denselben Grad erhöht, als die Abduktionsfähigkeit vermindert ist, so kann von einer normalen Beweglichkeit des Schielauges gesprochen werden. Eine Schwächung des inneren Geraden durch eine Tenotomie ist dann nicht erlaubt. Besteht beim Einwärtsschielen ein Überschuß an Adduktionsfähigkeit, so ist gegen eine Tenotomie nichts einzuwenden, vorausgesetzt, daß die Muskelleistung dadurch nicht unter das normale Mindestmaß herabgesetzt wird. Daher die 2. Grundregel für die Tenotomie des inneren Geraden: Nicht überberichtigen. Damit ist nicht bloß gemeint, ein offenes Auswärtsschielen zu vermeiden, sondern insbesondere die Leistungsfähigkeit des Muskels nicht unter die Norm zu bringen. Selbst für den Fall, als nach der Tenotomie trotz der Beseitigung des Überschusses an Beweglichkeit im Bereiche des Muskels das Schielen noch nicht genügend verringert wurde, darf nichts weiter zur Steigerung des Erfolges der Tenotomie unternommen werden.

Ist bei Einwärtsschielen der Ausfall der Abduktion größer als der Zuwachs an Adduktion, so ist damit eine Hauptanzeige für die Vorlagerung gegeben.

Nach diesen Betrachtungen bedarf es keiner weiteren Begründung, daß im Falle von Auswärtsschielen, das durch eine zu ausgiebige Tenotomie des inneren Geraden bei Einwärtsschielen entstanden war, nur die Vorlagerung dieses Muskels auszuführen ist, nicht aber die Tenotomie des äußeren Geraden. Denn durch die Schwächung des einen Muskels wird die Leistungsfähigkeit des Antagonisten nicht erhöht.

Es erhellt daraus auch, daß die Sehnenablösung — von seltenen Ausnahmen abgesehen — nicht wiederholt werden soll.

Wenn wir nun auch die physiologische Höherwertigkeit der Vorlagerung ausdrücklich betonen, so soll damit nicht gesagt sein, daß die Vorlagerung unter allen Umständen ausgeführt werden müßte; ja es ist nicht zu leugnen, daß die Tenotomie in vielen Fällen ein nicht zu entbehrender Eingriff ist.

**Blickübungen nach dem Eingriffe.** Von besonderer Wichtigkeit für die richtige Einstellung des operierten Auges ist die Bewegungsübung, die schon in den ersten Tagen, gelegentlich schon am Tage nach dem Eingriffe einzusetzen hat und nach bestimmten Grundsätzen durchgeführt werden muß. Die Frage, wie lange ein Auge nach einer Schieloperation verbunden zu werden hat, hängt wesentlich davon ab, ob es angezeigt ist, mit solchen Übungen zu beginnen oder nicht.

Finden wir z. B. nach einer einfachen Tenotomie des Rectus internus, welche am Operationstische zunächst sichtlich genügend gewirkt hat, am Tage darauf das Auge wieder in deutlicher Konvergenzstellung und dabei die Wirksamkeit des Rectus internus genügend groß, so daß eine weitere Schwächung des Muskels erlaubt ist, so wird das Auge sofort offen gelassen und der Patient angewiesen, untertags mit beiden Augen nicht nur sehr oft in die der Muskelwirkung entgegengesetzte Richtung zu blicken, also nach einer Tenotomie des Rectus internus des linken Auges nach links, nach einer solchen des rechten Auges nach rechts, sondern auch in dieser extremen Blickrichtung immer lang zu verharren. Da an diesem Tage die frisch geformten Adhäsionen, durch welche das durchschnittene Ende der Sehne wieder an die Sklera angelötet wird, noch ganz zart sind, werden sie gedehnt oder gar gelöst, die Sehne gleitet weiter nach rückwärts und der Erfolg der Operation wird dadurch vergrößert. Sollte das Auge noch empfindlich sein und nicht gut geöffnet werden, so wird eine 3%ige Cocainsalbe eingestrichen, wodurch diese subjektiven Beschwerden genügend verringert werden, um dem Patienten sofort die Blickübungen zu ermöglichen.

Es hängt von dem Einfluß dieser ganztägigen Übung ab, ob wir sie in den nächsten Tagen fortsetzen lassen oder nicht. Ihr Einfluß ist meist ausgezeichnet, da wir es jederzeit in der Hand haben, die Übung zu unterbrechen und das Auge auf diese Weise in der uns richtig erscheinenden Stellung zu erhalten.

Das gleiche gilt aber auch für die Vorlagerung des Rectus externus, selbstverständlich nur wenn sie gleichzeitig mit der Tenotomie des Rectus internus gemacht worden ist. Ist nach einem solchen Eingriffe das operierte Auge gerade in der gewünschten Stellung bei genügend guter Funktion des Rectus internus, so wird, wie erwähnt, der Verband über beiden Augen durch mindestens 4 Tage belassen, um die Stellung nach Möglichkeit zu erhalten. Sollte aber der Erfolg

nicht genügend sein, der Rectus internus zu sehr an Kraft wieder gewonnen haben und das Auge wieder in Strabismus convergens geraten sein, so werden spätestens schon am 2. Tage nach der Operation beide Augen offen gelassen, um mit den Übungen zu beginnen. Diese bestehen darin, die Augen in die Richtung des vorgelagerten Muskels oft und lange blicken zu lassen, um eine Schwächung des tenotomierten Rectus internus herbeizuführen. Man besorge nicht, daß dadurch die Nähte des vorgelagerten Muskels Schaden nehmen. Sind die Nähte genügend gut in dem skleralen Gewebe verankert worden, so halten sie der Blickbewegung stand und der günstige Einfluß dieser macht sich sehr rasch geltend.

Bei Überkorrektion nach kombinierter Operation eines Strabismus convergens sollen Blickübungen in der Richtung des tenotomierten Rectus internus, also entgegengesetzt der Wirkung des vorgelagerten Muskels die Nähte der Vorlagerung zum Nachgeben bringen, um auf diese Weise den Erfolg zu verringern. In diesem Falle haben aber solche Übungen nur dann einen Zweck, wenn der Rectus internus nicht etwa durch fehlerhafte Durchtrennung oder durch zu starke Ablösung der seitlichen Bänder zu sehr geschwächt worden ist.

Noch besser und genauer also als durch die früher erwähnten chirurgischen Mittel kann durch diese Blickübungen der Erfolg der Schieloperation in der gewünschten Weise dosiert werden. Diese Übungen müssen aber schon in den ersten Tagen nach der Operation einsetzen, weil sie später nach Erstarkung der frischen Adhäsionen keinen Einfluß mehr haben.

## II. Auswärtsschielen.

Für die Eingriffe bei Auswärtsschielen gilt als *Hauptregel*, eine *Überberichtigung* zu erzeugen. Diese wird aber nicht leicht erreicht. Denn der einzige Eingriff, der bei Auswärtsschielen von wesentlichem Einflusse ist, ist die Vorlagerung des inneren Geraden. Aber an und für sich hat eine Vorlagerung dieses Muskels nicht die gleiche Höhe des Einflusses auf die Stellung des Auges, wie die Vorlagerung des äußeren Geraden. Daran sind 2 Umstände schuld. Es ist infolge der örtlichen Behinderung nicht möglich, ein gleich langes Stück des Muskels freizulegen und die Nähte so weit rückwärts anzulegen, wie beim äußeren Geraden; und andererseits gibt die Vornähung des Muskels weniger aus, da sich der Sehnenansatz ohnehin schon nahe am Limbus befindet und nicht um so vieles näher an ihn herangebracht werden kann. In ähnlicher Weise beeinflusst die Sehnenablösung des äußeren Geraden die Stellung des Auges weniger als die des inneren Geraden. Die Verschiebung des ohnehin schon weiter vom Limbus entfernten Sehnenansatzes des äußeren Geraden durch die Ablösung bedeutet verhältnismäßig weniger Verlust an Einfluß des Muskels auf die Beweglichkeit als beim inneren Geraden. Die Wertigkeit der Ansatzstelle wächst eben mit der Annäherung an den Limbus in rasch steigender Progression.

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, daß selbst bei geringen Graden von Auswärtsschielen gewöhnlich beide Eingriffe gleichzeitig auszuführen sind, um eine leichte Überberichtigung, einen geringen Grad von Einwärtsschielen unmittelbar nachher zu erzielen, da erfahrungsgemäß immer die Neigung zur Rückkehr der Auswärtsstellung besteht. Die alleinige Ausführung der Sehnenablösung des äußeren Geraden hat kaum einen Einfluß. Bei höheren Graden

von Auswärtsschielen genügt nicht einmal die gleichzeitige Ausführung beider Eingriffe.

In solchen Fällen kann eine unterstützende Naht angelegt werden, ähnlich der bei der Sehnenablösung des inneren Geraden als gegenwirkende Naht beschriebenen. Oder es wird eine Naht außen in der Bindehaut des Auges, nicht zu knapp am Limbus oder noch besser im Sehnenstumpf des äußeren Augenmuskels eingesetzt, deren beide Fäden aus der Lidspalte heraus medialwärts geleitet werden, der eine nach oben zur Mittellinie auf der Stirne, der andere über den Nasenrücken auf die andere Seite der Nase. An den betreffenden Stellen werden beide mit mehreren Pflasterstreifen befestigt, nachdem sie so stark angezogen wurden, daß sich das Auge in starker Einwärtsstellung befindet. Um ein Einschneiden des Fadens am Nasenrücken zu verhindern, wird etwas Watte unterlegt. Da das Auge nicht ganz geschlossen werden kann, wird es mit einem befetteten Guttaperchapapier bedeckt. Die Naht kann 4—5 Tage belassen werden. Die Hornhaut wird durch den Faden, da er nach vorne zieht, nicht beschädigt, besonders wenn er, außen vom Limbus eingesetzt, eine kleine Falte der Bindehaut vorgezogen hat.

Ist trotz der unterstützenden Naht die Auswärtsstellung noch immer nicht beseitigt, so müssen später dieselben Eingriffe am anderen Auge vorgenommen werden.

**Auswärtsschielen nach Sehnenablösung des inneren Geraden.** Ist das Auswärtsschielen nach einer gegen Einwärtsschielen ausgeführten Sehnenablösung des inneren Geraden eingetreten, so gibt die Vorlagerung dieses Muskels gewöhnlich einen sehr guten Erfolg. Es ist nur seine Freilegung etwas schwieriger, da er oft erstaunlich weit rückwärts vom Limbus angeheilt ist. Es gelingt daher kaum, ein Stück davon auszuschneiden, da eben nur Platz vorhanden ist, die Fäden durchzulegen. Trotzdem ist der Erfolg sehr ausgiebig, da der Ansatzpunkt um eine große Strecke nach vorne verlegt werden kann. War die Sehnenablösung des inneren Geraden mit dem übermäßigen Erfolge erst vor wenigen Tagen gemacht worden, so wird, wie schon früher beschrieben, das Auswärtsschielen durch die gegenwirkende Naht beseitigt, da der Muskel in dem durchbluteten und geschwellenen Gewebe zu einer regelrechten Vorlagerung nicht geeignet ist. Hatte aber die Naht nicht den erwünschten Erfolg, so ist es besser, zu warten, bis das Auge abgeblaßt ist, und den Muskel erst nach einigen Wochen vorzulagern. Ein mißglückter vorzeitiger Versuch einer Vorlagerung könnte den Zustand eher noch verschlechtern.

#### **Latentes Auswärtsschielen (Exophorie).**

Die Vorlagerung des inneren Geraden hat auch in den Fällen von Exophorie vorgenommen zu werden, wo Beschwerden (Ermüdung, Doppeltsehen) schon beim Blick in die Ferne bestehen, ohne daß sie durch Anwendung prismatischer Gläser beseitigt werden könnten. Da eine möglichst ausgiebig angelegte Vorlagerung des inneren Geraden ungefähr auf 12 Winkelgrade zu bewerten ist, wird die Ausführung des Eingriffes entsprechend dem Grade der Exophorie abgestuft. Bei geringen Graden beschränkt sich das Verfahren auf die einfache Vornähung ohne Ausschneidung oder mit Ausschneidung eines nur sehr kurzen Muskelstückes. Unmittelbar nachher ist beim Blick in die Ferne ein geringes

Einwärtsschielen erwünscht. Dieses verschwindet bei vorher bestandenem binokularem Sehen sehr bald unter Einfluß der Fusionstendenz. Sind die Beschwerden der Exophorie durch die sorgfältig ausgeführte Vorlagerung noch immer nicht behoben, so wird nach Ablauf einiger Wochen auch der innere Gerade des anderen Auges vorgelagert.

Sehnenablösung des äußeren Geraden kommt nur in den seltenen Fällen von Exophorie in Betracht, die auf einem Überschuß an Divergenzkraft beruhen.

#### **Lähmungsschielen.**

Bei Lähmungsschielen darf nur zu einem Eingriffe geschritten werden, wenn die Lähmung voraussichtlich nicht mehr vergehen wird, und mindestens schon  $\frac{3}{4}$  Jahre bis 1 Jahr alt ist. Nur wenn die Lähmung des Muskels nicht vollständig ist, kann von der Vorlagerung ein Erfolg erwartet werden, was Beweglichkeit des Auges anbelangt. Sonst kann kein Einfluß auf die Beweglichkeit erzielt werden, der Eingriff hat vielmehr nur den Zweck, das gelähmte Auge in die Primärstellung zurückzuführen.

## Neuntes Kapitel.

### **Die Ausschälung des Augapfels (Enucleatio bulbi). Neurotomia optico-ciliaris. Die Ausweidung der Augenhöhle (Exenteratio orbitae). Eingriffe in der Augenhöhle.**

#### **Die Ausschälung des Augapfels (Enucleatio bulbi).**

**Anzeigen.** Die häufigste Anzeige zu diesem Eingriffe ist damit gegeben, daß ein Auge, dessen Sehvermögen *unwiederbringlich* verloren ist, dem Kranken *Schmerzen* bereitet oder das andere Auge durch eine *sympathische* Erkrankung bedroht.

*Schende* Augen dürfen nur wegen einer *bösartigen Neubildung* in ihrem Inneren zur Ausschälung bestimmt werden. Auch bei der Entfernung von bösartigen Neubildungen aus der Umgebung des Auges, besonders der Augenhöhle, kann es geschehen, daß ein sehtüchtiges Auge nicht erhalten werden kann.

Wird im Verlaufe einer *Iridocyclitis* nach *durchbohrender Verletzung* der Ausbruch einer sympathischen Entzündung befürchtet, so kann doch die Entfernung des Auges solange nicht verfügt werden, als es noch gute Lichtempfindung in 6 m und richtige Projektion hat. Erst wenn diese schlecht geworden sind, darf mit dem Eingriffe nicht länger gezögert werden. Bei frischen Verletzungen darf er vorgenommen werden, wenn der Untergang des Auges über jeden Zweifel steht. Ausgedehnte Spaltungen der Hornhaut und Lederhaut mit Vorfall der Regenbogenhaut, des Strahlenkörpers und des Glaskörpers berechtigen zur sofortigen Ausschälung. Der Verletzte wird dadurch vor wochen- und monatelangem Krankenlager bewahrt. Berstungen der Lederhaut geben viel seltener dazu die Anzeige. Wenn auch dabei das Sehvermögen gewöhnlich entweder ganz verloren ist oder sich nur in geringem Maße (Fingerzählen) wieder herstellt, so können diese Augen später doch zur Ruhe kommen und erscheinen häufig nicht wesentlich verunstaltet. Erst wenn infolge der Lederhautberstung das Auge unter Entzündungserscheinungen schrumpft, darf die Ausschälung nicht weiter aufgeschoben werden. Daraus aber, daß unmittelbar nach einem Trauma die Lichtempfindung eines Auges vollständig erloschen ist, darf nicht die Berechtigung zur Entfernung des Auges abgeleitet werden. Nicht so selten ist, besonders nach einer stumpfen Verletzung, die Lichtempfindung vollständig erloschen und hebt sich innerhalb von Tagen allmählich wieder auf normale Lichtempfindung und Projektion; ja es gibt Augen, die nach vollständiger Amaurose (Lederhautberstung mit Blutungen in den Glaskörper, schwere Prelungen) wieder eine, wenn auch geringe Sehschärfe bekommen.

Weitere Anzeigen für die Entfernung des Auges sind gegeben:

durch starke *Ausdehnung* (Staphyloma corneae totale, Skleralstaphylome), da diese Augen durch ihre Größe entstellen und der Gefahr unterliegen, zu zerplatzen und schwere Blutungen zu veranlassen;

durch Eintritt einer *Panophthalmitis*; wenn z. B. nach einer Verletzung, die zunächst noch nicht zur Ausschälung Veranlassung gegeben hätte, eine Infektion eintritt, die rasch fortschreitet und durch ihre Heftigkeit eine Panophthalmitis wahrscheinlich macht, kann der Vorgang durch Ausschälung des Auges noch rechtzeitig abgeschnitten werden. Das gleiche gilt für die Fälle, wo es nach Eingriffen, z. B. Starausziehung, zu einer schweren Infektion des Auges gekommen ist. Auch bei vollentwickeltem Bilde der Panophthalmitis (Exophthalmus, starkes Ödem der Lider, Bewegungseinschränkung des Bulbus, Chemosis) kann ohne Gefahr einer Meningitis das Auge herausgenommen werden, wenn bei geschlossener Augenkapsel kein Austritt des Eiters in die Gewebe der Augenhöhle zu befürchten ist. Sonst soll nur durch Eröffnung des vorderen Augapfelabschnittes zur Erleichterung des Zustandes dem Eiter freier Abfluß verschafft werden. Erst nach mehreren Monaten, wenn die akuten eitrigen Vorgänge vollkommen abgeschlossen sind, darf der phthisische Stumpf ausgeschält werden. Wird dieser Eingriff zu früh vorgenommen, so droht die Gefahr einer Meningitis.

**Örtliche und allgemeine Betäubung.** Die Ausschälung wird fast immer in örtlicher Betäubung vorgenommen. Für die allgemeine Betäubung verbleiben, abgesehen von den Eingriffen bei Kindern und unvernünftigen Menschen, nur schwierige Ausschälungen zerschmetterter oder entzündeter Augen, insbesondere bei Mitbeteiligung des Gewebes der Augenhöhle an der Verletzung. Das Auge und seine Umgebung wird nach dem SIEGRISTschen Verfahren unempfindlich gemacht. Dies wird durch Einspritzungen von 2%iger Novocainlösung, der etwas Suprareninlösung beigesetzt ist, erreicht, die in das Gewebe um den hinteren Augenpol und Sehnerveneintritt einverleibt werden. Man verwendet dazu eine gewöhnliche PRAVAZsche Spritze, die mit einem gebogenen Ansatz versehen ist. Nach gründlicher Cocainisierung des Bindehautsackes mit einer Mischung einer 3%igen Cocainlösung mit Suprareninlösung und Einspritzung von 1 ccm der Novocainlösung unter die Bindehaut wird die Bindehaut des Augapfels samt der Kapsel nacheinander an 4 Stellen aufgefaßt, oben und unten, außen und innen, und etwas vorgezogen, und die gebogene Nadel, mit ihrer Höhlung gegen den Augapfel gerichtet, eingestochen und bis an den hinteren Augenpol zur Eintrittsstelle des Sehnerven und der Ciliarnerven eingeführt. Die Nadel wird neben den Augenmuskeln nach rückwärts geleitet, weil das Durchführen der Nadel durch diese und die damit verbundene Zerrung daran sehr schmerzhaft empfunden wird. Es werden je 0,75 ccm der bezeichneten Lösung eingespritzt. Die Empfindungslosigkeit tritt schnell ein, so daß der Eingriff, auch bei entzündeten und vorher schmerzempfindlichen Augen schon nach wenigen Minuten begonnen und meist ganz schmerzlos durchgeführt werden kann. Die angegebene Menge der eingespritzten Flüssigkeit wird ohne schädliche Folgen vertragen.

Ein anderes Verfahren der örtlichen Betäubung ist die von LÖWENSTEIN aus der Klinik ELSCHNIG bekanntgemachte *Ganglionanästhesie*.

**Ganglionanästhesie.** Das Ganglion ciliare liegt rückwärts in der Augenhöhle in dem Winkel zwischen dem Sehnerven und dem äußeren geraden Augenmuskel. In seiner Nähe sind alle das Auge versorgenden Empfindungsnerveknapp aneinander gelagert. Eine Einspritzung in der Nähe des Ganglions ist daher geeignet, alle sensiblen Augennerven zu beeinflussen. Zur Einspritzung dient eine gewöhnliche, mit einer 1%igen Cocainlösung gefüllte PRAVAZsche Spritze (1 ccm), die einen 5 cm langen und entsprechend dicken Ansatz hat. Nach Cocainisierung der Bindehaut durch Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung wird der äußere Lidwinkel schläfenwärts angespannt und die Nadel knapp am äußeren Augenhöhlenrande, etwas unterhalb seiner Mitte, d. h. entlang dem unteren Rande des äußeren Geraden eingestoßen. Auf diese Weise wird die schmerzhafteste Verletzung dieses Muskels vermieden. Da die äußere Augenhöhlenwand nicht sagittal verläuft, sondern von vorn nach hinten in schräger Richtung gegen die Mittellinie, so ist die Nadel dementsprechend mit der Spitze nach einwärts gerichtet zu halten. Wird die Nadel sagittal nach rückwärts eingeführt, so gerät sie alsbald auf den Knochen der äußeren Augenhöhlenwand und kann nicht weiter vordringen. Ist sie aber in richtiger Stellung, so kann sie ohne Widerstand vorgeschoben werden, bis nur noch  $\frac{1}{2}$  Zentimeter ihres Ansatzes sichtbar bleibt (Abb. 117). Nun wird die Spritze etwas nach außen gedrückt, so daß sich die Spitze der Nadel vom Knochen abhebelt. In dieser Lage wird zunächst die Hälfte der Lösung langsam eingespritzt. Ist die Nadel

wirklich an die richtige Stelle gelangt, so macht sich bei empfindlichen Augen alsbald ein Nachlassen des Schmerzes und insbesondere eine auffallend geringe Schmerzhaftigkeit bei unsanfter Berührung des Augapfels mit der Pinzette geltend. Ist diese Erscheinung eingetreten, so wird der Rest der Lösung eingespritzt. Nach wenigen Minuten ist das Auge vollständig unempfindlich geworden. Die Gegend des Strahlenkörpers mag mit der Pinzette kräftig angefaßt werden und doch empfindet der Kranke keine Schmerzen, selbst wenn das Auge früher sehr empfindlich gewesen war.

Die Nadel darf nicht zu weit vorgeschoben werden, da sie sonst in den Sehnerven hineingerät und die Einspritzung dadurch ihren Zweck verfehlt. Durch die hebelnde Bewegung kann man sich davon überzeugen, ob die Nadelspitze wirklich frei und nicht etwa im Sehnerven oder in einem größeren Gefäße gefangen ist.

War das Auge durch lange Zeit hindurch entzündet, so empfiehlt es sich, vor dem Durchschneiden der Bindehaut noch  $\frac{1}{2}$  ccm einer 1%igen Cocainlösung unter die Bindehaut rings um den Limbus einzuspritzen, da die Ablösung der Bindehaut sonst noch schmerzen könnte.




Abb. 117. Waagrechter Schnitt durch die Augenhöhle. *Sn* Sehnerv, *G* Ganglion ciliare. Nadel bis an das Ganglion eingeführt.

Sollte nach Einverleibung der ersten Hälfte der Lösung die Empfindlichkeit des Auges noch nicht abgenommen haben, so ist die Nadel etwas zurückzuziehen und in leicht geänderter Richtung vorzuschieben, um das Ganglion zu erreichen.

Bei furchtsamen und aufgeregten Kranken leistet eine vor dem Eingriffe verabreichte subkutane Pantopon-Atropin-Einspritzung wertvolle Dienste.

Rasche Vortreibung des Auges unter starken Schmerzen unmittelbar nach der Einspritzung ist wahrscheinlich durch Verletzung eines größeren Blutgefäßes verursacht. Trotz der Seltenheit dieses Ereignisses wird dadurch wie auch durch die Möglichkeit der Verletzung des Sehnerven durch die Nadel dieses sonst sehr empfehlenswerte Verfahren auf die Ausschälung beschränkt und kann für keine anderen Eingriffe am Auge, auch nicht, wenn dieses blind ist, angewendet werden.

Die Nadel kann auch durch die äußere Haut knapp unter dem äußeren Lidwinkel nach gehöriger Reinigung dieser Stelle (Bepinseln mit Jodtinktur) eingestochen werden. Wird an dieser Stelle vorher etwas von der Lösung mit feinsten Nadel unter die Haut eingespritzt, so verursacht das Einführen der kräftigen Nadel für die tiefe Einspritzung keine Schmerzen. Bei dieser Art des Vorgehens berührt die Nadel den Bindehautsack nicht. Dies ist in Fällen von Vorteil, wo ansteckende Stoffe im Bindehautsack die Einspritzung von hier aus in die Tiefe wegen der Gefahr der Übertragung von Keimen und Ansteckung des Augenhöhlengewebes nicht rätlich erscheinen lassen.

Ausnahmsweise wird das Ganglion nicht getroffen, so daß auf den Eintritt der Empfindungslosigkeit vergeblich gewartet wird. Es können dann zur Erreichung der Unempfindlichkeit nach dem Vorschlage von LIEBERMANN noch 2 andere Einspritzungen durch die Haut der Lider hindurch gemacht werden, und zwar innen oben dicht unter dem oberen Augenhöhlenrande, fingerbreit über dem inneren Augenwinkel durch die Haut des Oberlides, wobei nach einem ungefähr 2 cm weiten Vordringen in sagittaler Richtung die Nadel etwas mehr nach unten und schläfenwärts geneigt wird bis zu einer Tiefe von 4 cm; und die 3. Einspritzung unten innen ungefähr an der Grenze des mittleren und inneren Drittels des unteren Augenhöhlenrandes durch die Haut des unteren Lides, in der Richtung wenig nach oben und temporal. Werden mit jeder Einspritzung 2 ccm der Novocainlösung verwendet, so ist durch diese 3 Einspritzungen ein kegelförmiger Abschnitt des Augenhöhlengewebes hinreichend infiltriert. Innerhalb dieses Gebietes müssen die in Betracht kommenden Nerven von der Lösung erreicht werden.

Für die seltenen Fälle, wo vorne der Eingang in die Augenhöhle durch Geschwülste gesperrt ist oder wo bei starker Entzündung des Gewebes um den Augapfel mit der Ausschälung ausnahmsweise nicht so lange zugewartet werden kann, bis die Entzündung abgeklungen ist, wie wir es sonst tun, wird die von SEIDEL erdachte *hintere Augenhöhleneinspritzung* vorgenommen. Die Nadel, die zu diesem Zwecke 8 cm lang sein muß, wird von der Wange aus — die Einstichstelle liegt fingerbreit unter dem vorderen Teil des unteren Jochbeinrandes — steil nach oben und etwas nach innen gerichtet hinter dem Jochbein vorgeschoben.

Als Zielpunkt empfiehlt SEIDEL einen Punkt, der auf der Kranznaht gelegen ist, und zwar daumenbreit nach außen auf der anderen Seite, von ihrem Schnitt-

punkt mit der Pfeilnaht, d. h. also nach rechts von der Mittellinie bei Einspritzung in die linke Augenhöhle. Man setzt dort den Zeigefinger der freien Hand auf (Abb. 118). Um am Kranken diesen Punkt zu finden, lege man ein Bandmaß vom vorderen Rande des Warzenfortsatzes der einen Seite dicht hinter dem Gehörgange senkrecht über den Scheitel bis zum Warzenfortsatze der anderen Seite. Einen Daumen breit nach außen von dem Schnittpunkte der Medianen mit dieser Linie liegt der Zielpunkt.

So gelangt die Nadel durch die Fissura orbitalis inferior in den hinteren Teil der Augenhöhle (Abb. 118). Nachdem dort 1 ccm einer 2—4%igen Novocain-Adrenalin-Lösung langsam eingespritzt worden ist, wird sie unter weiterer Verwendung von 1 ccm dieser Lösung so weit vorgeschoben, bis sie dicht vor dem Foramen nervi optici das Augenhöhlendach erreicht hat. Unter langsamem Zurückziehen durch die Augenhöhle werden nun weitere 4 ccm in ihr Gewebe eingespritzt, so daß also für die Augenhöhle bis zu 6 ccm verwendet werden. Um das Einstechen der Nadel durch die Haut und in das Gewebe der Fossa pterygopalatina schmerzlos zu machen, werden zuerst unter oberflächlicher Infiltration der Haut der Einstichstelle mit einer feinen ungefähr 4 cm langen Nadel 6 ccm der Lösung an die hintere Fläche des Oberkiefers in die erwähnte Grube eingespritzt.

Nach einer Wartezeit von 20 Minuten kann der Augapfel ausgeschält, ja selbst die Augenhöhle ausgeweidet werden, ohne daß der Kranke Schmerzen leidet.

**Eingriff. Abtrennung der Bindehaut vom Augapfel.** Mit der Hakenpinzette wird eine Falte der Bindehaut des Auges im waagrechten Meridian nahe dem Limbus aufgehoben und ein kleiner Einschnitt gemacht, von dem aus die Bindehaut knapp am Limbus abgelöst wird. Kein Streifen Bindehaut soll am Auge zurückbleiben. Jeder Millimeter der Bindehaut ist für das Tragen eines Kunstauges von größter Wichtigkeit. Die Ablösung der Bindehaut wird in der Weise vorgenommen (Abb. 119), daß das eine Blatt der kleinen, etwas gekrümmten Schere von der gesetzten Lücke aus unter der Bindehaut nahe dem Limbus vorgeschoben wird, während das andere Blatt vor der Hornhaut gleitet. Die Blätter werden dabei parallel zum Limbus gehalten. Durch Schließen der



Abb. 118. Hintere Augenhöhleinspritzung nach SEIDEL. Zeigefinger der freien Hand auf dem Zielpunkte aufgesetzt. Die Spitze der Nadel hat dicht vor dem Foramen opticum das Augenhöhlendach erreicht.

Schere wird die Bindehaut von ihrem Ansatz am Limbus abgetrennt. Darauf wird die Schere in gleicher Weise, wie eben beschrieben, vorgeschoben, indem die Pinzette die Bindehaut am Ende des eben gemachten Schnittes emporhebt, und der Vorgang wiederholt, bis die Bindehaut ringsum abgetrennt ist. Da man mit der rechten Hand schneidend von rechts nach links arbeitet, empfiehlt es sich, am rechten Auge innen am Limbus mit der Ablösung der Bindehaut zu beginnen, am linken Auge außen. Ist die Bindehaut ringsum durchschnitten, so wird mit der geschlossenen Schere die Bindehaut allseitig unterminiert, um sie vollständig vom Augapfel freizumachen.




Abb. 119. Ausschälung des rechten Augapfels. Durchtrennung der Bindehaut bereits bis zum senkrechten Meridian vorgeschritten. Man beachte die Haltung der Schere: das eine Blatt wird unter der Bindehaut vorgeschoben, während die Pinzette den Rand der Bindehautwunde aufhebt; das andere Blatt der geöffneten Schere liegt so vor der Hornhaut, daß beim Schließen der Schere die Bindehaut knapp am Limbus abgetrennt wird.

**Durchtrennung der geraden Augenmuskeln.** Am rechten Auge wird zuerst der innere Gerade, am linken der äußere Gerade durchschnitten. Während zu diesem Behufe der Gehilfe die Bindehaut über dem Muskel emporhebt, wird die in der linken Hand gehaltene, geschlossene Pinzette parallel zur Lederhaut hart an ihr an den Ansatz des Muskels geschoben, hier geöffnet und unter mäßigem Drucke gegen den Augapfel geschlossen. Der auf diese Weise mit der Pinzette aufgefaßte Muskel wird auf der von der Hornhaut abgewendeten Seite der Pinzette quer durchschnitten, nachdem das eine Blatt der Schere von unten her unter den Muskel geschoben worden ist (Abb. 120). So bleibt am Auge ein kurzes Muskelstück haften, das zum Festhalten und Lenken des Auges während des Eingriffes dient. Durch die Durchschneidung des Muskels ist auch die TENONsche Kapsel eröffnet und die Lederhaut freigelegt worden. An Stelle der kleinen gekrümmten Schere, die bisher zur Durchschneidung der Bindehaut und des Muskels verwendet wurde, tritt nun eine größere gerade oder schwach gekrümmte kräftigere Schere, die Enucleationsschere, deren beide Blätter stumpf sind.

Während die Pinzette das Auge waagrecht nach der dem durchgeschnittenen Muskel entgegengesetzten Seite rollt, d. h. das rechte Auge nach auswärts, das

linke Auge nach einwärts, wird das eine Blatt der geöffneten Schere, von der Wunde in der TENONSchen Kapsel aus, unter diese, und zwar zunächst nach




Abb. 120. Die Pinzette hat die Sehne des inneren Geraden an ihrem Ansatz gefaßt und dreht das Auge nach außen; das eine Blatt der Schere wird auf der von der Hornhaut abgewendeten Seite der Pinzette unter den Muskel geschoben, um ihn senkrecht auf seine Faserrichtung zu durchtrennen.

oben vorgeschoben. Den Weg unter die TENONSche Kapsel findet die Schere, indem sie hart an die bloßliegende Lederhaut an der Stelle des durchschnittenen Muskels angelegt und von hier nach aufwärts geschoben wird. So gelangt die




Abb. 121. Das eine Blatt der Schere wurde von innen her unter die TENONSche Kapsel bis unter die Sehne des oberen Geraden geschoben. Diese wird knapp an ihrem Ansatz abgetrennt.

Scherenklinge unter die Sehne des oberen Geraden. Durch den kräftigeren Widerstand, den die Sehne der Schere bietet, ist die richtige Lage dieser sofort zu erkennen. Das Auge wird mit der Schere nach vorwärts und unten gedrückt, so daß die Sehne des Muskels deutlich sichtbar wird (Abb. 121). Sie wird mit

einem Schlage knapp an ihrem Ansatz durchschnitten. Die Sehne des unteren Geraden wird unter gleichem Vorgehen durchschnitten, nur muß jetzt die die Schere führende Hand stark gebeugt werden. In gleicher Weise wie früher gleitet die Klinge der Schere unter die TENONSche Kapsel, läßt die Sehne des unteren Geraden auf und durchschneidet sie. Die Durchschneidung des 4. geraden Augenmuskels braucht zunächst noch nicht vorgenommen zu werden; es folgt die

**Durchschneidung des Sehnerven.** Während das Auge nach rechts gedreht gehalten wird, wird die geschlossene Schere knapp an der Lederhaut langsam an den hinteren Pol des Auges geführt. Da am rechten Auge der Sehnerv von der inneren Seite her angegangen wird, ist er hier leichter zu erreichen als am linken Auge, bei dem die Schere von der äußeren Seite her eingeführt wird




Abb. 122. Das Auge, das immer noch an derselben Stelle gehalten wird, ist um den senkrechten Meridian stark nach außen gedreht. Die geöffnete Schere faßt den Sehnerven zwischen ihre Blätter, um ihn zu durchschneiden.

und daher um den hinteren Pol hinüber an die nasale Seite des Auges vorgeschoben werden muß. Dem Anfänger wird es oft schwer, den Sehnerven zu finden, meist infolge einer schlechten Haltung der Schere, indem sie fälschlich in sagittaler Richtung nach hinten in die Augenhöhle vorgeschoben wird. Sie muß vielmehr in einer fast frontalen Richtung ungefähr senkrecht zum Verlaufe des Sehnerven hart an der Lederhaut im waagrechten Meridian an den hinteren Pol des Auges gebracht werden. Wird das Auge genau um die senkrechte Achse nach rechts gedreht, so läßt sich der Sehnerv als ein straff gespannter Strang tasten, wenn die geschlossene Schere von oben nach unten bewegt wird. Der Sehnerv wird leichter aufgefunden, wenn er durch geringes Vorziehen des Auges angespannt wird. Er wird gewöhnlich knapp am Auge durchschnitten. Zu diesem Behufe wird die Schere, nachdem man sich von der Lage des Nerven vergewissert hat, geöffnet, der Nerv zwischen die beiden Blätter gefaßt (Abb. 122) und mit einem Schlage durchtrennt. Unmittelbar darauf wird das haltlos gewordene Auge mit der geschlossenen Schere nach vorwärts gedrückt und aus der Augenhöhle luxiert; der Gehilfe stillt sofort mit einem Tampon trockener Gaze die Blutung. Dadurch wird eine Durchblutung der Gewebe verhindert.

Das Auge wird schließlich von den übrigen Gebilden gelöst. Knapp am Auge durchschneidet die Schere die Verbindungen, die noch durch die Sehne der beiden Schiefen und des letzten Geraden gebildet werden. Bei regelrecht ausgeführtem Eingriffe hängen an dem Auge keine größeren Gewebefetzen mit Ausnahme des Muskelstumpfes, mit dem das Auge gehalten wurde.

**Verschuß der Bindehautwunde.** Die Wunde in der Bindehaut wird entweder durch eine Tabaksbeutelnaht oder mit mehreren senkrecht angelegten Fäden geschlossen. Die Fäden haben knapp neben dem Wundrand durchgezogen zu werden. Sonst wird der Bindehautsack verkürzt, indem in der Mitte der Rand der Bindehaut als Wulst nach innen vorspringt. Aber auch ohne Nähte — besonders bei geschrumpftem Bindehautsack empfehlenswert — heilt die Wunde gut, wobei sich die Bindehaut von selbst in die richtige Stellung legt. Allerdings wächst dann nicht selten aus der Wunde ein kleiner Granulationsknopf hervor, was gewöhnlich mit einer stärkeren Absonderung aus dem Bindehautsack einhergeht. Der Knopf wird mit einem Scherenschlag abgetragen und die winzige wunde Stelle mit einem Lapisstift berührt und zur Vernarbung gebracht. Nach dem Eingriffe soll der Verband unter mäßigem Drucke angelegt werden, um eine Nachblutung zu verhindern. Am Tage darauf wird der Verband gewechselt und nun durch mehrere Tage noch ein leichter Verband getragen. Der Bindehautsack wird mit physiologischer Kochsalzlösung ausgewaschen.

**Zwischenfälle.** Nach lange dauernden Entzündungen des Auges sind Binde- und Lederhaut oft miteinander verwachsen. Dann kann die Bindehaut nur schwer abgelöst werden. Dies ist auch nach wiederholten Einspritzungen von Sublimat- oder Kochsalzlösungen unter die Bindehaut der Fall oder wenn Verletzungen zur narbigen Verwachsung zwischen beiden geführt haben. Unmöglich kann die Losschälung der Bindehaut nach Verätzungen werden, wo an ihrer Stelle oft nur eine dünne Narbenschicht liegt, die leicht durchlöchert wird.

Aber auch für diese Fälle gilt als erstes Gesetz, so viel als möglich von der Bindehaut zu schonen und sie nicht durch unnützes Anfassen mit der Hakenpinzette zu zerreißen. Der Anfänger findet die Muskelansätze leichter, wenn er sie mit dem Schielhaken aufsucht; die beschriebene Weise, die Schere unter die TENONSche Kapsel zu schieben, besitzt den Vorzug großer Schnelligkeit; bei Durchtrennung des oberen und des unteren Geraden ist zu achten, nicht etwa durch einen Scherenschlag das Lid zu verletzen. Die Lider werden während des Eingriffes durch einen Lidsperrer auseinandergehalten.

Wenn der Muskelstumpf, der zum Festhalten des Auges dient, abreißt, oder beim wiederholten Anfassen zerreißt, so wird das Auge an der Sehnenleiste eines anderen Muskels oder es wird bei weichem Auge eine Falte der Lederhaut aufgefaßt. Sind aber alle Sehnen schon abgeschnitten worden, so muß das Auge mit dem Zeige- und Mittelfinger der linken Hand in die gewünschte Stellung gerollt werden, damit der Nerv durchschnitten werden kann. Je knapper an der Sehne das Auge gefaßt, je weniger oft die Pinzette von neuem angesetzt wird, um so besser wird die Sehne halten.

Vor der Durchschneidung des Nerven ist durch langsames Tasten mit der geschlossenen Schere eine richtige Vorstellung seiner Lage zu gewinnen, damit er nicht verfehlt wird. Wird aber das Auge in eine schräge Richtung verdreht und hastig irgendwo rückwärts ein Schnitt in das Gewebe der Augenhöhle

gemacht, so gelingt es nicht, den Nerven zu durchtrennen. Durch die Verletzung des Augenhöhlengewebes fängt es stark zu bluten an. Da das Auge das Einführen eines Tampons verhindert, wird das Gewebe der Augenhöhle tumorartig vorgetrieben. Darüber vergehen Wochen, bis sich das Blut allmählich wieder aufsaugt. Der Sehnerv soll daher auf den ersten Schnitt getroffen werden. Nach der Durchschneidung ist das Auge sofort nach vorne zu luxieren, um dem Gehilfen die Tamponade zu ermöglichen. Besonders bei weichem Auge z. B. nach schweren Verletzungen, wobei das Auge schon vor Beginn des Eingriffes ganz zusammengefallen war, oder beim Durchschneiden der Muskeln ausgepreßt wurde, kann es geschehen, daß an Stelle des Nerven das Auge selbst rückwärts eingeschnitten wird. Dann muß der Nerv mit dem Stumpf des Auges aufgesucht und ausgeschnitten werden. Da das umliegende Gewebe infolge der Durchblutung sofort stark anschwillt, gelingt es oft nur sehr schwer, den Nerven freizulegen und weiter rückwärts zu durchschneiden. Denn es fehlt jeder Anhaltspunkt über seine Lage und die starke Blutung verhindert einen deutlichen Überblick.

Zur leichteren Ausführung des Eingriffes bei ausgedehnten Verletzungen wird die klaffende Wunde zuerst durch Nähte vereinigt und dadurch ein Ausquetschen des Inhaltes verhindert.

Der Lidheber kann nur bei ganz schlechter Haltung der Schere und Schnittführung verletzt werden; doch sind Fälle von totaler Ptosis nach Ausschälung schon beobachtet worden.

Wenn sich nach Herausnahme eines Auges wegen einer bösartigen Geschwulst der Stumpf des Sehnerven, der in solchen Fällen genau besichtigt werden muß, von der Neubildung durchsetzt findet, muß der Nerv weiter rückwärts ausgeschnitten werden. Sicherer dürfte es sein, statt den zurückgebliebenen Nerven auszuschneiden, die Augenhöhle auszuweiden. In solchen Fällen soll daher der Nerv von vornherein so weit rückwärts vom Auge als möglich durchschnitten werden. Auch in Fällen von Iridocyclitis nach Verletzungen, wo der Ausbruch einer sympathischen Entzündung befürchtet wird, pflegte man früher, den damaligen Anschauungen entsprechend, den Nerv so weit rückwärts als möglich vom Auge zu durchtrennen. In seltenen Fällen kommt es nach der Durchschneidung des Sehnerven zu einer schweren, kaum stillbaren Blutung (Arteriosklerose, Hämophilie); wenn sehr kräftiger Druck nicht genügt, müssen die blutenden Gefäße umstochen, im Notfalle die Gewebe mit dem Glüheisen verschorft werden.

**Die Ausweidung des Augapfels** (Evisceratio bulbi). Die Ausräumung des Inhaltes der Lederhautkapsel, allein oder mit Einnähung von Glas- oder Goldkugeln (*Verfahren von MULES*) ausgeführt, kann nicht befürwortet werden. Fälle von sympathischer Entzündung wurden nach diesem Eingriffe wiederholt beobachtet. Die eingenähten Kugeln stoßen sich selbst noch nach Jahren unter Entzündungserscheinungen aus. Manchmal müssen die Kugeln herausgenommen, ja sogar die Stümpfe noch nachträglich ausgeschält werden, um dem Kranken Ruhe zu verschaffen.

**Die Ausschälung des Auges mit Einpflanzung einer Kugel in den TENONschen Raum.** Das ursprüngliche Verfahren, das von FROST-LANG angegeben worden war, nach Ausschälung des Augapfels eine Glas- oder Goldkugel in den leeren Raum der TENONschen Kapsel einzunähen, hatte den Nachteil, daß die ein-

genähten Kugeln nicht selten unter Entzündungserscheinungen ausgestoßen wurden. MAGITOT empfahl daher an Stelle unorganischer Körper organisches Gewebe, und zwar Knorpel zu verwenden.

#### **Verfahren von MAGITOT. Einpflanzung einer Knorpelkugel in den TENONschen Raum.**

**Vorbereitung.** Die Kugeln werden in der Weise vorbereitet, daß aus dem knorpeligen Teil der Rippen eines großen Kalbes Stücke herausgeschnitten werden, die einen Durchmesser von ungefähr 20 mm in Dicke und Länge haben. Das Perichondrium hat erhalten zu bleiben, denn dieses allein ist geeignet, die organische Verbindung mit den umgebenden Geweben einzu-gehen. Das frisch gewonnene Knorpelstück wird durch ungefähr 8—10 Tage in einer 20%igen Formalinlösung fixiert. Darauf wird die Kugel in steriles Wasser gebracht, in welchem sie mindestens 2 Wochen liegen muß, damit die konzentrierte Formollösung aus dem Stücke ausgelaugt wird.

Die stark verdünnte Lösung von Formalin, die durch das Liegen der Kugel im Wasser entsteht, reicht hin, um das Stück auf die Dauer in tadellosem gebrauchsfertigen Zustande zu erhalten. Wir haben in der Klinik eine Reihe von Knorpelstücken in solcher Weise fertig vorbereitet, um sie jederzeit zur Verfügung zu haben.

**Verfahren.** Nach der Enucleation des Auges und vollständiger Stillung der Blutung wird die Kugel, nachdem sie vorher gründlich mit einer großen Menge sterilen Wassers abgespült worden war — man wirft sie am besten für kurze Zeit in das siedende Wasser des Instrumentenkochers —, in den leeren TENONschen Raum eingelegt, und zwar so, daß die beiden Schnittflächen durch den Knorpel seitlich zu liegen kommen, das Perichondrium aber nach vorne und hinten zu gekehrt ist. Nur wenn Perichondrium nach vorne gerichtet ist, heilen die Muskeln an, welche über die Kugel genäht werden. Es ist deshalb zweckmäßig, unmittelbar vor dem Einpflanzen des Knorpels etwa vorstehende unregelmäßige Zacken der Kugel mit einem kleinen sterilen Skalpell zu glätten und das Knorpelstück dabei so zuzuschneiden, daß das Perichondrium etwas über den Rand vorsteht. Um das Aufsuchen der Muskeln zu vermeiden, können diese vor der Enucleation, bevor sie durchschnitten werden, zusammen mit der Bindehaut in Nahtschlingen gefaßt werden. Man führt nach dem Freilegen der Ansätze der geraden Augenmuskeln je einen doppelt armierten Seidenfaden durch die Bindehaut und einen Muskel und dann auf der gegenüberliegenden Seite wieder durch einen Muskel und die Bindehaut. Die Fäden müssen dann nach Entfernung des Auges mit einem Schielhaken sorgfältig zur Seite geschoben werden, um die Knorpelkugel in der richtigen Stellung mit dem Perichondrium nach vorne einführen zu können. Nach Einlegen der Kugel in richtiger Stellung werden die durch den oberen und unteren Geraden gelegten Fäden miteinander verknüpft, und darüber die Fäden der beiden seitlichen Muskeln. Um dies ohne Spannung durchführen zu können, wird die Kugel tief in das Orbitalgewebe hineingedrückt. Nach Vollendung der Muskelnähte wird die Bindehaut in der gewöhnlichen Weise darüber vernäht. Mäßiger Druckverband.

**Verlauf.** Die Heilung erfolgt gewöhnlich ohne wesentliche Zwischenfälle. Es ist zweckmäßig, einen Tag hindurch beide Augen verbunden zu halten. Von da an genügt es, nur die operierte Seite zu verbinden. Der Verband wird jeden

2. Tag gewechselt. Manchmal tritt eine starke Reizung mit Chemosis der Bindehaut und Ödem der Lider ein. (Formolwirkung bei ungenügender Auswässerung des Knorpels?) Sie pflegt gewöhnlich innerhalb weniger Tage unter Umschlägen mit 3%iger Borlösung zu verschwinden.

Die Kugel heilt in der Regel ein, vorausgesetzt, daß darauf geachtet worden ist, sie so zu stellen, daß das Perichondrium nach vorne gerichtet ist und mit den hinübergewässerten Muskeln in Berührung kommt. Aber sie bleibt nicht immer so liegen, wie sie eingelegt wurde. Um sie in der gewünschten Stellung zu erhalten, möge man die Kugel in der Mitte ihres von Perichondrium freien Teiles durchbohren und einen Seidenfaden durchziehen. Wird nun nach Einlegen der Kugel in den TENONSchen Raum dieser Faden durch die TENONSche Kapsel, Muskel und Bindehaut nach vorne geleitet, so ist damit eine gewisse Gewähr gegeben, daß sich die Kugel nicht nachträglich in eine unerwünschte Stellung begeben kann. Kugeln, die in dieser Art (mit 2 durchgezogenen Fäden) in keimfreier Lösung vorbereitet sind, bekommt man nach den Angaben von A. LÖWENSTEIN bei der Firma Pfrimmer & Co. in Nürnberg. Bei gutem Heilungsverlaufe soll man längere Zeit — ungefähr 6—8 Wochen — warten, bevor man das Kunstauge tragen läßt. Denn die Verwachsungen der Kugel mit dem umliegenden Gewebe sollen bereits vorher recht fest geworden sein. Die Seidennähte sind während dieser Zeit entweder bereits von selbst herausgefallen oder sie werden wenige Tage vor dem Einlegen des Glasauges entfernt.

Ist die Knorpelschnittfläche nach vorne gerichtet, so heilen die Muskeln nicht an, sondern rutschen in wenigen Tagen zurück, die Bindehautwunde beginnt auch zu klaffen, und es zeigt sich in ihr der nackte Knorpel als ein kleiner, weißer Fleck. Man wartet vergeblich auf den Verschuß dieser Wunde durch Bildung eines Granulationsgewebes. Wochenlang besteht eine starke Sekretion, und erst nach Entfernung der Kugel tritt Ruhe ein. Ein solcher Zwischenfall kann sich auch einstellen, wie eben zuvor erwähnt, trotzdem die Kugel in richtiger Weise in den TENONSchen Raum gebracht worden war, und zwar dadurch, daß sie sich nach Einlegen in die glatte TENONSche Kapsel unbemerkt gedreht hat. Das Herausnehmen einer solchen falsch eingeheilten Kugel erfordert manchmal den Gebrauch des Skalpells, indem die seitlich gerichteten Perichondriumflächen innige bindegewebige Verwachsungen mit der TENONSchen Kapsel eingegangen waren. Aber im allgemeinen gelingt die Entfernung leicht im Gegensatz zu den ausgeglühten Knochenkugeln, die von anderen als Ersatz empfohlen worden waren. Wenn diese nicht einheilen, so ist ihre Ausschälung eine recht mühsame Sache, da sich das umliegende Gewebe in die Poren der Kugel geradezu eingesaugt hat.

#### **Ausschälung des Auges mit Einpflanzung von Fett in den TENONSchen Raum (Verfahren von BARRAQUER).**

Bei der Ausschälung werden alle 4 Geraden wie bei einer Tenotomie durchtrennt. Durch jeden Muskel wird eine doppelt armierte Catgutnaht durchgestochen. Nach Beendigung der Ausschälung wird durch einen gegen die Wundfläche gedrückten Tampon die Blutung gestillt. Gleichzeitig wird aus dem Unterhaut-Fettgewebe der Bauchdecke ein Stück ausgeschnitten, genügend groß, um den Raum der TENONSchen Kapsel bequem auszufüllen. LAUBER

empfiehlt zu diesem Zwecke einen rechtwinkligen Schnitt in der Abdominalhaut, dessen einer Schenkel in der Linea alba verläuft, da bei einem geradlinigen Schnitt die Blutstillung erschwert ist. Diese muß zur Vermeidung von Hämatomem durch Gefäßunterbindungen genau durchgeführt werden. Das Fettstück wird nun in die TENONsche Kapsel eingeführt und die Geraden kreuzweise darüber vereinigt. Sodann wird die TENONsche Kapsel mit Catgut und darüber die Bindehaut mit Seide vernäht. Sich vordrängende Fettläppchen müssen sorgfältig abgeschnitten werden. Die Wunde in der Bindehaut wird vernäht. Nach 8—10 Tagen werden die Nähte entfernt. 2—3 Wochen später kann das Kunstauge eingelegt werden. Das eingepflanzte Fett nimmt im Verlaufe der Zeit mäßig an Masse ab, bildet aber noch immer eine genügende Stütze für das künstliche Auge.

Das Verfahren ist durch die Einpflanzung von Knorpelkugeln ganz in den Hintergrund gedrängt worden. Denn diese sind jederzeit gebrauchsfertig vorhanden und ihre Anwendung erspart das mühsame Ausschälen des Fettstückes.

### Neurotomia optico-ciliaris.

**Anzeigen.** Erblindung eines Auges an Glaukom, verbunden mit Schmerzhaftigkeit, bildet die Hauptanzeige für diesen Eingriff. Da nämlich ein Auge in diesem Zustande meist nicht entstellt ist, ist es für den Besitzer angenehmer, es zu behalten, als sich das Auge herausnehmen und durch ein Kunstauge ersetzen zu lassen, da dessen Gebrauch so manche Unannehmlichkeiten im Gefolge hat. Es ist zu widerraten, an Augen, die an einer spontanen Iridocyclitis erblindet sind und Schmerzen verursachen, eine Neurotomia optico-ciliaris vorzunehmen. Denn wenn sie auch nach der gangbaren Schulanschauung als nicht-verletzte Augen keine Gefahr einer sympathischen Entzündung bedeuten, so können sie doch die Quelle neuer Aussaat von Keimen in das Blut und auf diese Weise die Ursache für eine gleiche Entzündung des anderen Auges werden: mag man diese nun sympathische Entzündung nennen oder nicht. Bei einer vorausgegangenen Verletzung darf nur die Ausschälung vorgenommen werden, da die Neurotomia optico-ciliaris das Entstehen einer sympathischen Entzündung nicht verhindert. Daß Ausschälung unabweisbar ist, wenn auch nur ein leiser Verdacht einer bösartigen Neubildung im Augennern besteht, bedarf keiner weiteren Erklärung.

**Betäubung.** Der Eingriff wird besonders bei starker Empfindlichkeit des Auges meist in allgemeiner Betäubung durchgeführt. Doch kann auch der Pantopon-Atropin-Dämmerschlaf genügen, wenn durch tiefe Einspritzungen einer genügenden Menge von Novocain-Adrenalin in die Gegend der Spitze der Augenhöhle eine hinreichende örtliche Betäubung erreicht wird. Während diese Einspritzung auf der einen Seite den Vorteil hat, die Blutung beim Durchschneiden der Gefäße geringer zu gestalten, so darf nicht vergessen werden, daß gerade im Anschlusse an die Einspritzung ein rasch wachsender Exophthalmus eintreten kann.

**Ausführung.** Der innere Gerade wird freigelegt wie zu einer Vorlagerung. Ein Faden, der in einem Abstände von ungefähr  $\frac{1}{2}$  cm von seinem Ansatz durch den Muskel durchgelegt und geknüpft wird, wird dem Gehilfen übergeben,

nachdem der Muskel zwischen seinem Ansatz und dem Knopfe durchtrennt worden ist. Der Gehilfe zieht mit dem Faden den Muskel vom Auge ab. Während das Auge an dem zurückbleibenden Stumpf mit der Pinzette gehalten wird, wird wie bei der Ausschälung die Schere langsam an der Lederhaut nach rückwärts geführt und der Sehnerv aufgesucht und zwischen die beiden Blätter der Schere genommen; diese gleitet an ihm entlang etwas nach rückwärts und durchtrennt ihn mit einem kräftigen Schnitte. Sofort wird die Schere herausgezogen und durch die geschlossenen Lider auf den Augapfel durch 5 Minuten ein kräftiger Druck ausgeübt, damit es in das Gewebe der Augenhöhle nicht bluten kann. Wird dieser Druck unterlassen, so kann entweder schon während des Eingriffes das jetzt locker gewordene Auge durch eine Blutung vor die Lidspalte getrieben und, da ein Zurückdrängen des Auges nicht möglich ist, die Ausschälung erforderlich werden oder es stellt sich dieser Zustand in den nächsten Stunden ein. Da mit dem einen Schnitte gewiß nicht alle Ciliarnerven, die Vermittler des Schmerzes, durchschnitten wurden, muß die ganze rückwärtige Fläche des Augapfels, die ganze Umgebung des Sehnerven von dem anhaftenden Gewebe gesäubert werden. Zu diesem Zwecke wird das Auge so um seine senkrechte Achse gedreht, daß der abgeschnittene Sehnerv in der Lidspalte frei liegt. So können die die Lederhaut in der Umgebung des Sehnerven durchbohrenden Ciliarnerven durchtrennt werden. Sie sind übrigens schon durch diese Drehung des Auges größtenteils zerrissen worden.

AXENFELD empfiehlt außerdem die oberflächliche Galvanokaustik der Eintrittsöffnungen der Ciliarnerven in dem den Sehnerven umgebenden Lederhautgebiete. Denn da sich von den zentralen Stümpfen aus die Nervenfasern lebhaft neu bilden und durch die skleralen Durchlässe wieder ihren Weg in das Augeninnere finden, wodurch solche Augen später wieder empfindlich werden können, erscheint ein fester Verschuß dieser Öffnungen in der Lederhaut empfehlenswert.

Blieb ein langes Stück des Sehnerven am Auge, so kann ein Teil davon ausgeschnitten werden (Neurectomie). Erst jetzt wird das Auge in seine richtige Lage gebracht und der Muskel mit dem Faden an den Stumpf sorgfältig angenäht, um dem Auge seine Beweglichkeit wieder zu geben; die Bindehaut darüber wird mit einer Naht verschlossen und darauf bei geschlossenen Lidern ein kräftiger Druckverband angelegt. Die Heilung erfolgt gewöhnlich ohne Zwischenfall. Der geringe Exophthalmus, der nach dem Eingriffe infolge der Blutung vorhanden ist, verschwindet in kurzer Zeit.

Bei Kranken mit Arteriosklerosis kann es zu schweren Blutungen kommen, gewöhnlich handelt es sich ja um alte Leute, an denen dieser Eingriff vorgenommen wird. So kann wohl auch einmal beim Verbandwechsel das Auge vor der Lidspalte gefunden und die Ausschälung nachträglich nötig werden. Nach regelrechtem Vorgehen ist die Hornhaut vollständig empfindungslos, das Auge schmerzfrei. Die Empfindlichkeit der Hornhaut kehrt langsam wieder zurück. Keratitis neuroparalytica ist nicht zu befürchten. Im Augenhintergrunde verlaufen die Blutgefäße völlig leer als weiße Streifen, die Papille ist reinweiß. Die Spannung des Auges ist normal, ja selbst häufig noch höher als normal. Eine Schrumpfung des Auges tritt nicht ein.

### Die Ausweidung der Augenhöhle (Exenteratio orbitae).

Die Ausschälung des gesamten Inhaltes der Augenhöhle zur Entfernung bösartiger Neubildungen, sei es der Augenhöhle selbst oder des Auges, nachdem sie die Lederhaut durchbrochen haben, wird in folgender Weise durchgeführt:

Soll der Eingriff mit Schonung der Lider vorgenommen werden, so wird zunächst die Lidspalte durch einen waagrechten Schnitt nach außen verlängert und der äußere Augenhöhlenrand bloßgelegt. Nun wird mit einem Messer die Bindehaut der unteren Übergangsfalte bis auf den knöchernen unteren Augenhöhlenrand durchschnitten und dieser vollkommen freigelegt. Der Gehilfe zieht mit stumpfen Haken das Lid ab. In gleicher Weise wird die obere Übergangsfalte entlang dem oberen Augenhöhlenrande bis zum Knochen durchtrennt; innen treffen beide Schnitte entlang der vorderen Tränenleiste zusammen.

Die Bindehaut kann, wenn sie in ganzer Ausdehnung gesund ist, vollständig erhalten werden, indem sie zuerst vom Agapfel abgelöst und dahinter die Augenhöhle ausgeweitet wird (*subkonjunktivales Verfahren von AXENFELD*). Die beiden Lider können nun mit Haken leicht auseinandergehalten werden, so daß der ganze Augenhöhlenrand frei zu sehen ist. Ihm entlang wird darauf die Beinhaut durchschnitten. Mit einem Elevatorium oder einer geschlossenen, etwas gekrümmten Schere wird zwischen Knochen und Beinhaut der ganze Augenhöhleninhalt allseitig losgeschält und bis zum hinteren Ende der Augenhöhle abgelöst. Nur in der Fissura orbitalis inferior und an der Crista lacrymalis posterior muß von der Schere Gebrauch gemacht werden, um die Fascienstränge zu durchschneiden. Bei entsprechender Vorsicht wird eine Beschädigung der dünnen Knochenwand leicht vermieden. Schließlich wird die ganze Gewebemasse soweit rückwärts als möglich durchtrennt, wozu mehrere Scherenschläge erforderlich sind. Eine kräftige Tamponade verhindert eine starke Blutung, zu deren Stillung nur selten das Glüheisen verwendet werden muß. Die Augenhöhle wird dann mit Gaze ausgefüllt, nachdem über ihre Wände ein Gaze-schleier ausgebreitet worden ist, der einen Beutel zur Aufnahme der den Hohlraum ausfüllenden Gaze bildet. Die Lidspalte bleibt offen und die Gaze wird aus ihr herausgeleitet. Auch unter die Lider wird reichlich Gaze eingelegt, um sie am Einsinken zu verhindern. Zur Aufsaugung des Wundsekretes wird dann noch außen reichlich Gaze hinzugefügt und der Rollbindenverband angelegt.

Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt außer von dem Allgemeinbefinden (regelmäßiges Messen der Körperwärme) auch von der Stärke der Absonderung ab. Um beim Verbandwechsel die Gaze leicht herauszubringen, wird sie zuerst mit einer antiseptischen Flüssigkeit gründlich durchnäßt und erweicht. Allmählich bedecken sich die Wundflächen mit Granulationen. Erst nach mehreren Wochen ist die ganze Höhle damit ausgefüllt.

Die Lider werden schließlich doch immer durch das Narbengewebe weit nach rückwärts gezogen und das Tragen eines Kunstauges ist nach diesem Eingriffe nicht möglich. Die vorhandene Lidbindehaut kann dem Kranken durch ihre Absonderung sogar lästig werden. Viele ziehen es daher vor, die Bindehaut, auch wenn sie gesund ist, samt dem Wimpernboden abzutragen. Nach Ablauf der Vernarbung ist die Gegend der Augenhöhle von einer mit Epithel bedeckten grubigen Vertiefung eingenommen. Das Aussehen ist auch nach Überpflanzung von Hautlappen zur Deckung der Wundfläche nicht viel besser.

Die Entstellung wird durch das Tragen einer HENNINGSchen Prothese behoben.

## Eingriffe in der Augenhöhle.

**Anzeigen.** Akute oder chronische Entzündungen, Fremdkörper und Geschwülste.

**Allgemeine Bemerkungen.** Ist der vordere Abschnitt der Augenhöhle anzugehen, ohne daß der hintere Abschnitt in den Bereich des Eingriffes gezogen zu werden hat, so kann der Zugang in der Richtung von vorne geschaffen werden entweder durch einen Einschnitt in den Lidern am Rande der knöchernen Augenhöhle oder durch einen Einschnitt in den Übergangsteil der Bindehaut der Lider. Das Eindringen durch die Übergangsfalte hat den Vorteil, die an die Lider herantretenden, den Schließmuskel der Lider versorgenden Ästchen des Nervus facialis zu schonen und äußerlich sichtbare Narben zu vermeiden. Aber dieses Verfahren vermag nur geringen Raum zu schaffen, auch wenn vorübergehend Muskelablösungen damit verbunden werden.

Der Weg durch die obere Übergangsfalte verbietet sich aber, wenn gegen die obere Augenhöhlenwand selbst vorgedrungen werden soll; denn dabei müßte der Lidheber verletzt werden. Es bleiben daher für dieses Vorgehen oben nur die am meisten medial gelegenen Teile frei, wo zwischen oberem und innerem Geraden der Weg gebahnt werden kann; unten dagegen steht die ganz Ausdehnung der unteren Übergangsfalte zur Verfügung. Der beim Eingehen durch diese erzielte Raum kann bedeutend erweitert werden, wenn eine Canthotomia externa hinzugefügt und dadurch das Abziehen des ganzen Lides in voller Breite ermöglicht wird.

Ist der vordere Teil der Augenhöhle oberhalb des Augapfels freizulegen und dort ein Eingriff vorzunehmen, so wird der Schnitt durch die Haut und die darunter liegenden Weichteile entlang dem oberen Augenhöhlenrande geführt. Entlang diesem wird die Beinhaut durchschnitten. Der Levator palpebrae kommt dadurch nicht in Gefahr. Womöglich ist der Schnitt nicht so weit nach innen auszudehnen, daß dadurch der Nervus supraorbitalis und frontalis verletzt wird. Sollte aber der Schnitt in dieser Gegend nicht zu vermeiden sein, so sind die Nerven aufzusuchen und durch stumpfe Haken beiseitezuziehen.

Ist in der Gegend der Trochlea vorzugehen, so wird diese im Zusammenhange mit einer dünnen Knochenplatte abgelöst, jedenfalls aber ihre Verbindung mit der Beinhaut sorgfältig geschont, um den oberen schiefen Augenmuskel nicht dauernd zu schwächen. In ähnlicher Weise muß bei Eingriffen am Boden der Augenhöhle der Ansatz des unteren schiefen Augenmuskels schonend behandelt werden; das gleiche gilt für den Nervus infraorbitalis. Er hat durch Aufmeißlung seines Knochenkanales freigelegt und beiseitegezogen zu werden.

Das innere Lidbändchen darf, wenn es die Umstände erfordern, von seinem Ansätze abgelöst und allenfalls mit dem ganzen aus seiner Grube freigemachten Tränensack in dem Lidlappen von der Augenhöhlenwand abgezogen werden, wenn sich dort nach dem vorliegenden Befunde der passendste Eintritt in die Augenhöhle befindet. Wenn der Lappen wieder in seine richtige Stellung zurückgebracht und durch Nähte festgemacht wurde, ist der innere Lidwinkel durch diesen Eingriff nicht entstellt. Nur wenn ein größerer Teil des Lidbändchens weggeschnitten wird, besteht die Gefahr, den inneren Lidwinkel für immer verunstaltet zu haben.

Von den Eingriffen, die die Tiefe der Augenhöhle bloßzulegen imstande sind, sei der wichtigste und für unser Fach am meisten in Betracht kommende, die Aufklappung der äußeren Augenhöhlenwand, im folgenden beschrieben.

### Die Aufklappung der äußeren Wand der Augenhöhle nach KRÖNLEIN.

**Anzeigen.** 1. In erster Linie geben Geschwülste, die in der Augenhöhle hinter dem Augapfel sitzen, die Anzeige zu diesem Eingriffe. Denn durch ihn gewinnt man freien Zugang zu den tiefen Gebilden der Augenhöhle. Geschwülste der Augenhöhle selbst, sei es, daß sie von der Beinhaut dieser oder von anderen Gewebeteilen ihren Ursprung nehmen, ob sie nun außerhalb oder innerhalb des Muskeltrichters wachsen, zwingen am häufigsten, die äußere Wand der Augenhöhle aufzuklappen, wenn der Eingriff mit Erhaltung des Augapfels durchgeführt werden soll (Knochengeschwülste, Cysten u. a.). Gelegentlich dient der Eingriff nur dazu, die Frage zu entscheiden, ob die Geschwulst mit Schonung des übrigen Inhaltes der Augenhöhle und insbesondere des Augapfels entfernt werden kann. Zeigt sich infolge bösartiger Infiltration des Augenhöhlengewebes die Unmöglichkeit erhaltender Behandlung, dann tritt die Ausweidung der Augenhöhle an deren Stelle.

2. Auch Eingriffe in den hinteren äußeren Abschnitten des Augapfels, z. B. die Ausziehung einer Cysticercusblase aus dem Augeninneren, werden durch die Aufklappung der äußeren Augenhöhlenwand entweder erst ermöglicht oder doch wesentlich erleichtert.

**Betäubung.** In den meisten Fällen dürfte es sich empfehlen, allgemeine Betäubung anzuwenden. Doch kann der Eingriff nach dem Vorgange von SEIDEL auch bei örtlicher Betäubung vorgenommen werden. Dazu muß zuerst das Eingriffsgebiet im Bereiche der äußeren Haut durch Einspritzung von 6 ccm 1%iger Novocain-Adrenalin-Lösung infiltriert werden. Es muß dann das auszuschneidende Knochenstück von der Lösung umspült werden. Die Nadel der Spritze wird also am äußeren oberen Augenhöhlenwinkel eingestochen und schräg nach innen und unten vorgeschoben, nacheinander nach dem vorderen, mittleren und hinteren Drittel der unteren Augenhöhlenspalte (Abb. 123). Dazu werden 5 ccm einer 4%igen Novocain-Adrenalin-Lösung verwendet.

Um die äußere Fläche des Knochenstückes mit der Flüssigkeit zu erreichen, wird der hintere Rand des senkrechten Processus frontalis des Jochbeines durch Tasten aufgesucht. Fingerbreit nach außen vom oberen lateralen Orbitalwinkel




Abb. 123. Die drei Pfeile an der äußeren Augenhöhlenwand bezeichnen die Richtung, in welcher die am äußeren oberen Augenhöhlenrande eingestochene Nadel nacheinander gegen die untere Augenhöhlenspalte zu vorgeschoben wird. Der senkrechte Pfeil nach außen von der Augenhöhle bezeichnet die Lage und Richtung der Nadel, um die Lösung an die äußere Fläche des auszuschneidenden Knochenstückes zu bringen. Die eingezeichnete Nadel ist entlang der unteren Augenhöhlenspalte in der Richtung gegen das Foramen rotundum (*F. r.*) vorgeschoben.

wird die Nadel senkrecht nach unten in die Fossa pterygopalatina eingestochen und auf diese Weise die Gegend der hinteren Fläche des Processus frontosphenoidalis des Jochbeines erreicht. 6 ccm einer 1%igen Novocain-Adrenalin-Lösung werden hier eingespritzt.

Schließlich werden noch 3 ccm einer 2%igen Novocain-Adrenalin-Lösung verwendet, während die Nadel am äußeren unteren Augenhöhlenwinkel längs der Fissura orbitalis inferior 3—4 ccm tief vorgeschoben wird.

10 Minuten nach Beendigung der Einspritzung kann der Eingriff begonnen werden. Nach vollendeter Aufklappung, und nachdem der Sehnerv aufgesucht worden ist, müssen noch 2 ccm einer 2%igen Lösung von Novocain-Adrenalin um den Sehnerven nahe der Spitze der Augenhöhle eingespritzt werden, um die Gebilde innerhalb des Muskeltrichters unempfindlich zu machen. Auch darauf muß noch 10 Minuten lang gewartet werden, bis der Eingriff fortgesetzt werden kann. Vorzügliche Blutleere lohnt die Mühe der Vorbereitung.

### Ausführung.

**1. Der Weichteilschnitt.** Beginnend ungefähr 1 cm oberhalb und 2 cm nach außen von dem äußeren Ende der Augenbraue führt das Messer durch die Haut und die darunter liegenden Weichteile einen Schnitt, der sich in flachem, nach




Abb. 124. Weichteilschnitt für die Aufklappung der äußeren Augenhöhlenwand nach KRÖNLEIN.

vorne konvexem Bogen nach unten gegen den äußeren Augenhöhlenrand erstreckt, diesen ungefähr in der Höhe der Lidspalte erreicht und dann im Bogen nach rückwärts waagrecht gegen den Jochbogen abbiegt, wo er senkrecht unter seinem Ausgangspunkt ungefähr in der Mitte zwischen äußerem Lidwinkel und Tragus endet (Abb. 124). Der Schnitt durchsetzt die Weichteile bis auf die

dahinter liegende Fascie und hat insbesondere im Bereiche des Augenhöhlenrandes bis auf den Knochen geführt zu werden. Durch einige Messerzüge werden von diesem Einschnitte aus die Weichteile von der fasciösen Unterlage abgeschält und der Lappen nach außen umgelegt. Dadurch wird das Gebiet der nun folgenden Schnitte freigelegt.

**2. Einschnitt** mit dem Messer durch die Beinhaut entlang dem äußeren Augenhöhlenrande, ferner waagrecht durch die Beinhaut an dem Ursprung des Processus frontalis des Jochbeines und von hier noch ungefähr 1 cm weiter nach rückwärts entlang dem Jochbogen. Mit dem Elevatorium wird darauf die Beinhaut im Bereiche der ganzen äußeren Augenhöhlenwand abgehoben, nach oben bis an die Basis des Processus zygomaticus des Os frontale, nach unten bis zum Boden der Augenhöhle, in der Tiefe, bis die Fissura orbitalis inferior erreicht ist. Diese ist durch den elastischen Widerstand der sie ausfüllenden Fascie leicht fühlbar.

Der gesamte Augenhöhleninhalt bleibt daher zunächst von der Beinhaut bedeckt. Er wird mit einem breiten Spatel nach innen zu abgedrängt. Auf diese Weise wird das auszuschneidende Knochengebiet freigehalten (Abb. 125).




Abb. 125. Der Weichteillappen ist zurückgeschlagen. Die Beinhaut der äußeren Augenhöhlenwand wird mit dem Elevatorium abgelöst. Der Processus frontalis des Jochbeins und der Beginn des knöchernen Jochbogens schimmert durch die Fascie durch.

**3. Die Knochenschnitte.** Der zu bildende Knochenlappen hat folgende Grenzlinien: Unten durchsetzt der Knochenschnitt den Ursprung des Processus frontalis des Os zygomaticum und mündet in das vordere Ende der Fissura orbitalis inferior. Oben wird etwas oberhalb der Sutura zygomatico-frontalis der Processus zygomaticus des Stirnbeines durchtrennt und von da der Schnitt, indem er die äußere Augenhöhlenwand durchsetzt, bis 1 cm hinter das vordere Ende der Fissura orbitalis inferior fortgesetzt (Abb. 126). Wegen der Härte der zu durchtrennenden Knochen des Augenhöhlenrandes sollen Hammer und Meißel an diesen Stellen nicht verwendet werden. Wird der Augenhöhlenrand zersplittert, so bleibt eine dauernde Entstellung zurück. Schnell und glatt durchtrennt die Kreissäge den Processus frontalis. Wenn diese nicht zur Verfügung steht, kann nach dem Vorschlage von MAGITOT von der Fossa temporalis aus durch die Fissura orbitalis inferior eine Drahtsäge einführen und durch die Augenhöhle herausleiten und den Schnitt in der Richtung von der Fissur gegen die Oberfläche führen (Abb. 127). Zu diesem Zwecke muß zuerst die Fossa temporalis etwas




Abb. 126. Die Knochenschnitte sind durch die schwarz ausgezogenen Linien angegeben. *O. i.* Os frontale, *S. z. f.* Sutura zygomatico-frontalis, *P. f.* Processus frontalis des Os zygomaticum, *F. i.* Fissura orbitalis inferior, *O. z.* Os zygomaticum.

freigemacht werden. Mit einer Hohlsonde wird der richtige Weg am ehesten gefunden, wenn man, von dem Winkel zwischen Jochbeinkörper und Processus frontalis des Jochbeins ausgehend, entlang der äußeren Fläche dieses Fortsatzes die Sonde waagrecht, nur wenig von der Frontalen nach rückwärts abweichend vorschiebt und dabei namentlich den Fehler vermeidet, sie zu weit oben zu suchen. Während die Muskeln der Grube zur Seite zu schieben sind, darf die Beinhaut nicht abgelöst werden, da sie für die Ernährung des Knochens von größter Bedeutung ist. Ist einmal der Weg gefunden, so ist es ein leichtes, mit einer zarten gekrümmten Kornzange die Drahtsäge durchzuführen. Die Drahtsäge ermöglicht einen glatten Knochenschnitt, ohne Splitterung.




Abb. 127. Augenhöhlengewebe durch den Spatel zurückgedrängt. Drahtsäge von der Fossa temporalis aus durch die Fissura orbitalis inferior in die Augenhöhle eingeführt. Beginn des oberen Knochenschnittes mit der Säge.

Der Processus frontalis des Os zygomaticum wird dadurch an seinem Ursprunge von der Fissura orbitalis inferior aus abgetrennt.

Der obere Knochenschnitt wird etwas ober der Sutura zygomatico-frontalis mit einer feinen Säge begonnen und bis zu einer Tiefe von ungefähr 5 mm fortgesetzt. Das innere Ende dieses Schnittes hat etwas nach unten geneigt zu sein, sonst gerät der Schnitt zu weit in den oberen Augenhöhlenrand hinein. Der Rest des Schnittes wird mit Hammer und zartem Meißel, dessen Schneide schräg zur Längsachse verläuft, durchgeführt und mündet in die Fissura orbitalis inferior ungefähr 1 cm hinter ihrem vorderen Ende. Feine Knochensplitter sind sorgfältig zu entfernen.

**4. Die Aufklappung.** Das auf diese Weise von seiner Umgebung losgelöste und nur noch mit den Weichteilen der Fossa temporalis im Zusammenhange stehende dreieckige Knochenstück wird nun etwas vorgezogen und dann nach außen und hinten umgeklappt und durch Haken in dieser Stellung festgehalten (Abb. 128). Der Zugang der Augenhöhle ist nun ausgiebig eröffnet. Geschwülste,

die außerhalb des Muskeltrichters im äußeren Abschnitte der Augenhöhle sitzen, sind dem Eingriffe frei zugänglich, nachdem die Beinhaut durchschnitten worden ist. Diese wird am besten in der Längsrichtung von vorne nach hinten durchtrennt.

Für einen Eingriff innerhalb des Muskeltrichters haben die Augenmuskeln mit stumpfen Haken zur Seite gezogen zu werden. Wenn nicht anders möglich, muß der äußere Gerade durchtrennt werden, um den Weg frei zu bekommen. Beide Schnittenden des Muskels sind mit Faden zu versehen, um sie nach Beendigung des Eingriffes wieder vereinigen zu können.

5. Der Knochenlappen wird in seine richtige Stellung zurückgebracht. Naht der Weichteile.

Nachdem der Eingriff in der Augenhöhle beendet worden ist, wird das Knochenstück wieder nach innen gedreht, etwas vorgezogen und dann in den Ausschnitt eingepaßt.

Wurde der Augenhöhlenrand ohne Splitterung durchtrennt, so fügt sich der Lappen tadellos ein und es bleiben keine Unebenheiten an ihm zurück. Die Beinhautwunde wird durch Catgutnähte verschlossen. Ist nach Ausschälung einer größeren Geschwulst oder nach Entfernung eines größeren Fremdkörpers (Kugel) ein Hohlraum in der Augenhöhle zurückgeblieben, so ist durch ein Gummidrain




Abb. 128. Das ausgeschnittene Knochenstück nach außen umgeklappt und durch einen Haken festgehalten. Der Zugang zur Augenhöhle freigelegt.

oder einen Gazestreifen ein kleiner Abzug offen zu halten. Die Hautwunde wird mit Seidennähten geschlossen. Besondere Sorgfalt muß beim Anlegen des Verbandes dem Auge zugewendet werden, damit nicht die Hornhaut Schaden nehme, wenn sie infolge Vortretens des Auges nicht genügend bedeckt ist. Zum mindesten wird eine dicke Lage von Borsalbe in den Bindehautsack gestrichen und die Lidspalte mit Guttaperchapapier bedeckt; wenn nötig, wird eine feuchte Kammer angelegt oder eine provisorische Tarsorrhaphie ausgeführt. Die Nähte werden nach 5—6 Tagen entfernt.

**Üble Folgen.** Auf die durch Splitterung des Knochens entstehende dauernde Entstellung wurde bereits hingewiesen und betont, wie diese zu vermeiden ist. Noch schwerer wird die Entstellung, wenn das ganze Knochenstück abstirbt oder wenn durch zurückgelassene Splitter eine Eiterung hervorgerufen wird, die die glatte Vernarbung des Schnittes verhindert. Auch die Gefahren, die der Hornhaut durch einen nach dem Eingriff bestehenden Exophthalmus drohen, wurden bereits angeführt. Als eine besonders unangenehme Folge des Eingriffes ist noch eine dauernde Lähmung des äußeren Geraden zu erwähnen. Sie bleibt trotz genauer Muskelnäht gelegentlich zurück und beeinträchtigt durch das störende Doppeltsehen und das Schielen den Erfolg auf das Unangenehmste.

## Zehntes Kapitel.

### Die Ausziehung des Greisenstares (*Extractio cataractae*).

#### Vorbereitungen zur Starausziehung.

**Allgemeine Vorbemerkungen.** Hohes Alter an sich und die damit einhergehenden Allgemeinveränderungen sind keine Anzeige gegen die Vornahme einer Starausziehung. Es wird im Gegenteil bei sehr alten Leuten durch die Wiederherstellung des Sehvermögens der beste Einfluß auf die Erhaltung der geistigen Kräfte ausgeübt. Auch Krankheiten dürfen nicht von der Starausziehung abhalten, wenn sie nicht solcher Art sind, daß sie in absehbarer Zeit zum Tode führen. Eine Aufnahme des Gesundheitszustandes vor dem Eingriffe ist unerläßlich, um Übelstände, die den Verlauf des Eingriffes stören könnten, nach Möglichkeit zu beheben oder ihrem Einfluß durch entsprechende Maßregeln vorzubeugen, das Verfahren in seinen Einzelheiten darnach einzurichten und die Vorschriften der Nachbehandlung darnach zu bestimmen. Durch zweckmäßige Behandlung ist der Kranke vor dem Eingriffe in einen möglichst günstigen Allgemeinzustand zu versetzen. Die Urinuntersuchung darf auf keinen Fall vernachlässigt werden. Bei Befund von Zucker werden durch entsprechende Diät und medikamentöse Behandlung (Insulin) völlige Zuckerfreiheit des Urins und normale Blutzuckerwerte zu erreichen gesucht, oder doch mindestens Herabsetzung des Zuckers, soweit es eben möglich ist. Während der Nachbehandlung sind täglich zu verabreichende höhere Gaben von Natrium bicarbonicum geeignet, das Entstehen eines Coma diabeticum hintanzuhalten.

Die Zähne, besonders bei schwer vernachlässigtem Zustande, vor dem Eingriffe in Ordnung zu bringen, ist gewiß sehr empfehlenswert, freilich in großen Betrieben und bei beschränkter Zeit der oft zugereisten Kranken nicht immer durchführbar.

War der Kranke nicht schon seit dem Beginne des Stares unter der Beobachtung des Arztes gestanden, dem der Eingriff anvertraut wird, so hat eine

---

Die beigegebenen Zeichnungen dienen in erster Linie dazu, die Stellung der Hände des Arztes und seines Gehilfen während der verschiedenen Eingriffe deutlich wiederzugeben. Dies vermag eine Zeichnung besser als eine lange Beschreibung. Soweit es möglich war, ist in derselben Zeichnung auch der Eingriff am Auge selbst genügend gut ersichtlich gemacht worden. Wo es aber nötig erschien, wurde in beigegebenen Umrißzeichnungen der Eingriff am Auge allein dargestellt. Zum leichteren Verständnis sind die Hände des Arztes mit A, die des Gehilfen mit G bezeichnet. Bei sämtlichen Eingriffen sitzt der Arzt zur Rechten des Kranken, der Gehilfe steht zur Linken. Man beachte die Haltung der Hände und Finger des Arztes und des Gehilfen; man ersehe aus den Zeichnungen, wie sich die Hände aufstützen, wie sie die Instrumente halten, wie die Lider auseinandergezogen werden usw.

Untersuchung im Dunkelzimmer mit einer Kerzenflamme die gute Lichtempfindung in 6 m und die richtige Projektion festzustellen.

Um Gewähr für einen entzündungsfreien Heilverlauf zu haben, müssen 2 Bedingungen erfüllt sein: Die Reinheit des Bindehautsackes und die aseptische Vornahme des Eingriffes. Wenn nun auch der Bindehautsack nicht unbedingt keimfrei gemacht werden kann, so ist es doch Tatsache, daß bei klinisch gesundem Bindehautsack ein aseptisch durchgeführter Eingriff fast immer ohne Infektion verläuft. Es braucht daher nicht in jedem einzelnen Falle durch bakteriologische Untersuchung des Bindehautsackes, durch Anlegen von Kulturen aus einem keimfrei in den Bindehautsack gebrachten Serum die Abwesenheit entzündungserregender Keime sichergestellt zu werden. Bei einem großen Betriebe ist dies nicht möglich, und die kulturell bakteriologische Untersuchung muß dabei auf die Fälle beschränkt werden, wo die Bindehaut nicht völlig normal ist, sei es, daß sie hyperämisch oder leicht verdickt ist oder eine, wenn auch nur geringe Absonderung besteht. Besonderes Augenmerk ist auf den Tränensack zu richten. Läßt sich auch nur die geringste Menge einer, wenn auch klaren Flüssigkeit aus ihm ausdrücken, so ist der Sack vor der Starauszziehung herauszunehmen. Aber auch in Fällen, wo nur geringe Anzeichen für eine Erkrankung bestehen (Tränenfluß, einseitiger Katarrh u. dgl.), muß der Sack und der Tränengang genau untersucht werden. Mit der ANELschen Spritze wird die Flüssigkeit durch die mit der konischen Sonde erweiterten Tränenröhrchen eingespritzt. Ist der Gang gesund, so gelangt die Flüssigkeit rasch und rein in die Nase; ist er verengt, so kommt die Flüssigkeit nur langsam, in Tropfen oder gar nicht hinunter. Um aber eine Verengung mit Sicherheit auszuschließen, muß eine Sonde durch den Tränennasengang eingeführt werden. Für ganz besonders wichtig halte ich bei sonst fehlenden Erscheinungen einer Tränensackerkrankung das Betasten der Schleimhaut des Sackes mit der Spitze der durch das untere Tränenröhrchen eingeführten konischen Sonde. Während die normale Tränensackschleimhaut so zart ist, daß man dahinter die harte Knochenwand unmittelbar spürt, vermittelt die Schleimhaut des Sackes ein ganz eigentümliches Polstergefühl, auch wenn sie nur einigermaßen verdickt ist. In solchen Fällen ist auch bei Mangel jeglicher Sekretion mit der Ausschälung des Sackes vorzugehen. Natürlich bilden die geringsten offenkundigen Anzeichen einer Tränensack- oder Tränengangserkrankung eine unbedingte Anzeige für die Ausschälung des Sackes, wonach noch durch eine Verschorfung der Tränenröhrchen jeder Zusammenhang der Sackgegend mit der Bindehaut vernichtet wird. Planmäßig in Zwischenräumen von 8 zu 8 Tagen durchgeführte bakteriologische Untersuchungen geben dann Aufschluß über den Befund von Krankheitskeimen in dem Bindehautsack. Der Eingriff darf erst gemacht werden, bis die Keime, in erster Linie die Strepto- und Pneumokokken, endgültig verschwunden sind. Das Vorhandensein von Xerosebakterien und wenigen Staphylokokken bildet keine Anzeige gegen die Vornahme des Eingriffes. Gleichzeitig durchgeführte medikamentöse Behandlung hilft dieses Ziel schneller erreichen. Man träufle eine  $\frac{1}{2}$ —1%ige Lösung von Zincum sulfuricum täglich 1—2mal oder Elektrargol 3mal täglich ein oder tuschiere bei stärkerer Absonderung die Bindehaut mit 2%iger Lapislösung. Auch Oxycyanatlösungen, Optochin, gelbe Salbe und mehrere andere Medikamente wurden empfohlen.

Aber gar nicht selten ist jede Behandlung auf den Keimgehalt des Bindehautsackes ganz ohne Einfluß. Dann muß der Eingriff endlich gewagt werden. Die Heilung verläuft erfahrungsgemäß fast immer ohne Zwischenfälle.

Bei Beobachtungen dieser Vorsichtsmaßregeln sind andere Maßnahmen überflüssig, viele davon nicht einmal empfehlenswert, wie Probeverband, Ausziehen sämtlicher Lidhaare u. dgl.

**Über den Zeitpunkt des Eingriffes.** Entwickelt sich in beiden Augen gleichzeitig grauer Star, so wird das Auge mit der mehr vorgeschrittenen Linsen-trübung dem Eingriffe unterzogen, sobald die Sehstörung so weit gediehen ist, daß der Kranke seiner Beschäftigung nicht mehr nachgehen kann, gleichgültig, ob der Star reif ist oder nicht. Die Ausziehung eines unreifen Stares bietet in keiner Weise ungünstigere Bedingungen für den Eingriff als die eines reifen. Die Wahrscheinlichkeit, noch ungetrübte Linsenreste bei der Ausziehung eines unreifen Stares im Auge zurückzulassen, ist nicht viel größer als durchschnittlich bei vollendeter Reife des Stares. Die klinische Feststellung der Reife eines Stares betrifft nämlich nur den Zustand der vorderen Rindenschicht. Die hintere Rinde kann noch durchsichtig sein und bei der Ausziehung unbemerkt bleiben, zumal da sie wegen ihres festen Zusammenhanges mit der hinteren Linsenkapsel nicht sofort aus dem Auge herausgestreift wird. Dagegen ist bei den Starformen, die in der hinteren Rinde weiter vorgeschritten sind, durch den Zerfall der Linsenfasern der innige Zusammenhang zwischen hinterer Kapsel und trüber Linsenmasse gelöst, so daß diese leicht durch Herausstreifen aus dem Auge entweicht. Die vordere Rinde aber wird durch das Herausreißen eines großen Kapselstückes unmittelbar von dem Zusammenhang mit der Kapsel getrennt und damit ihr Austritt ermöglicht. Aber selbst wenn größere Mengen von Linsenresten im Auge zurückbleiben, so werden sie rasch aufgesaugt, wenn der Kapselsack durch die Entfernung eines ausgiebigen Stückes der vorderen Linsenkapsel dauernd geöffnet bleibt. Es braucht daher auch keine *vorbereitende Ausschneidung der Regenbogenhaut* in Augen mit unreifem Star vorgenommen werden. Diese könnte nur in Betracht kommen, wo bei Entwicklung einer gut umschriebenen Linsentrübung in der Mitte der Pupille die Sehstörung durch die infolge der Iriassausschneidung eintretende Erweiterung der Pupille behoben oder zum mindesten sehr gebessert werden könnte.

Es braucht nach dem Vorgebrachten auch nicht weiter erläutert zu werden, warum von Eingriffen zur *künstlichen Reifung* des Stares völlig abgesehen werden kann.

**Einseitiger grauer Star.** Entwickelt sich der Star nur in einem Auge, während das andere Auge gut sieht, so wird mit dem Eingriffe bis zur Reife gewartet, dann aber — auch bei tadelloser Sehschärfe des anderen Auges — der Star ausgezogen. Denn durch das Überreifwerden eines Stares treten gelegentlich ernste Folgen wie Drucksteigerung oder Linsenverschiebung ein, die den Bestand des Auges gefährden, auf jeden Fall aber Veränderungen der Linse wie Kapselverdickung, Ablagerung von Kalk im Kapselsack, Linsenschlottern, Schwund der Zonula, Verflüssigung des Glaskörpers, die den Eingriff erschweren und die Aussicht auf Heilung bedeutend verschlechtern.

Das ungleiche Sehen mit beiden Augen, das gegen die einseitige Ausziehung ins Feld geführt wird, wird nur von ganz wenigen, gewöhnlich von hochgradig

nervösen Kranken, und meist nur vorübergehend störend empfunden und dieser eine Nachteil reichlich aufgewogen durch den Gewinn an Gesichtsfeld und das Bewußtsein, ein Ersatzauge zu haben, das jederzeit herangezogen werden kann, sollte je das andere Auge erkranken.

Zu den einseitigen Staren zählt auch die *Cataracta* im helleren Auge bei *Heterochromia iridis*. Auch sie wird aus den eben angeführten Gründen, wenn sich die Linse vollständig getrübt hat, ausgezogen. Der Verlauf des Eingriffes, die Heilung und der optische Erfolg sind fast immer tadellos. Nur ausnahmsweise beeinträchtigen dichte Glaskörpertrübungen den Erfolg.

Besondere Vorsicht erfordert die Ausziehung der trüben Linse in dem Auge, das eine sympathische Ophthalmie mitgemacht hat. Je länger gewartet wird, nachdem alle klinischen Erscheinungen endgültig verschwunden sind und sich nicht doch noch immer wieder, wenn auch nur leichte Entzündungsnachschübe einstellen, um so besser ist die Aussicht, durch den Eingriff nicht wieder schwere Nachschübe der sympathischen Ophthalmie auszulösen, die das Auge vielleicht sogar endgültig zugrunde richten. Man hat daher meist mehrere Jahre zuzuwarten, bevor man sich zu diesem Schritte entschließt. Es ist empfehlenswert, zuerst eine möglichst breite Iridektomie anzulegen und die Linse erst auszuziehen, wenn auch dieser vorbereitende Eingriff keine neue Reizung hervorgerufen hat.

**Vorbereitung des Kranken.** Der Kranke wird schon tags vorher über das während des Eingriffes und während der Nachbehandlung notwendige Benehmen unterrichtet. Das Einüben des Hinunterschauens entfällt mit Rücksicht auf die Verwendung der Zügelnaht. Das Niesen kann durch kräftiges Drücken der Daumenkuppe gegen den harten Gaumen in der Gegend des *Foramen incisivum* unterdrückt werden. Nervösen Leuten wird Brom verabreicht, Hustenden Codein. Für eine reichliche Stuhlentleerung am Tage vor dem Eingriffe wird regelmäßig Vorsorge getroffen, ebenso wie während der Nachbehandlung nie Verstopfung geduldet werden darf. Eine einfache, leicht verdauliche Kost wird verabreicht. Ist der Blutdruck höher als normal, so wird unmittelbar vor dem Eingriffe ausgiebig zur Ader gelassen.

**Vorbereitung des Auges.** Das Auge wird durch wiederholtes Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung während 10 Minuten bis zu einer Viertelstunde unempfindlich gemacht. Die beginnende Erweiterung der Pupille beweist, daß das Cocain auch schon auf die Regenbogenhaut zu wirken begonnen hat.

Die Haut der geschlossenen Lider und deren Umgebung wird mit Benzin entfettet und dann mit einer flüssigen neutralen Augenseife (*GUDE*) sorgfältig gereinigt. Die Seife wird mit einer schwachen Sublimatlösung (1 : 2000) abgespült. Bei Leuten, die zu Ekzem neigen, wird von dem Gebrauch der Sublimatlösung abgesehen. Darauf wird der Bindehautsack mit physiologischer Kochsalzlösung ausgewaschen, indem die umgestülpten Lider mit feuchten Wattetupfern kräftig abgerieben und dann mit einem Irrigator auch die beiden Übergangsfalten und die Buchten in der Gegend des inneren Lidwinkels gründlich ausgespült werden. Die ganze Umgebung des Auges wird schließlich mit einer mehrfachen Lage keimfreier feuchter Gaze bedeckt, um die Berührung dieser Teile hintanzuhalten. Das andere Auge wird während des Eingriffes verbunden.

Die örtliche Betäubung durch Einträufeln von Cocain genügt fast ausschließlich.

### Akinese.

Um das manchen Kranken eigentümliche, sehr lästige, ja gefährliche Zwicken während des Eingriffes auszuschalten, wird der Schließmuskel der Lider nach dem *Verfahren von VAN LINT-ROCHAT* vorübergehend gelähmt.

**Verfahren.** Als die wirksamste Menge und günstigste Konzentration zur Erzielung einer unmittelbaren und ausgiebigen Wirkung erwiesen sich je 2 ccm einer 4%igen Lösung von Novocain ohne Adrenalin. Wir vermeiden Adrenalin, um nicht den glatten Lidheber zur Zusammenziehung zu veranlassen, denn dadurch würde das Oberlid soweit hinaufgezogen, daß man nach der Operation Schwierigkeiten hat, das obere Lid genügend herunterzuziehen, um die Hornhaut zu decken und den Verband anlegen zu können. Nach *ROCHAT* wird die Nadel 1 cm nach außen (hinten) von dem Punkte eingestoßen, wo sich die im äußeren Augenhöhlenrand errichtete Tangente mit der durch den unteren Augenhöhlenrand gelegten Tangente schneidet. An dieser Stelle wird zuerst mit einer feinen Nadel unter den üblichen aseptischen Kautelen eine geringe Menge der Lösung subkutan injiziert, um den Einstich der starken Nadel schmerzlos zu machen. Dies ist wichtig, um den Kranken nicht etwa ängstlich zu machen, wenn ihm schon die Injektionen Schmerzen bereiten. Die starke Nadel wird durch den Muskel hindurch bis auf den Knochen gestoßen und zunächst nach oben und etwas nach innen entlang dem äußeren und oberen Orbitalrand hinaufgeführt, bis die Nadel ungefähr bis zur Mitte des oberen Augenhöhlenrandes vorgedrungen ist. Schon beim Verschieben wird immer etwas Lösung injiziert und der Rest der 2 ccm beim Zurückziehen der Nadel verwendet. Ist die Lösung richtig eingelagert, so springt entlang der äußeren Hälfte des oberen Orbitalrandes ein Wulst von starrer Beschaffenheit flach vor. Ohne die Nadel herauszuziehen, um einen 2. Einstich zu vermeiden, wird sie in der Richtung nach unten gedreht und entlang dem unteren Orbitalrand bis zum mittleren Drittel entlang dem Knochen vorgeschoben. Schon beim Verschieben wird etwas Lösung eingespritzt und der Rest beim langsamen Herausziehen der Nadel abgelagert. Auch für diese 2. Injektion werden 2 ccm einer 4%igen Novocainlösung (ohne Adrenalin) verwendet. Ein gleicher Wulst wie oben wölbt sich auch hier vor. Schon aus diesem klinischen Bilde kann man erkennen, ob die Einspritzung an richtiger Stelle gemacht worden ist. Die Wirkung der Einspritzung hat schon in wenigen Minuten ihren Höhepunkt erreicht. Die Lähmung der Lider ist meist eine vollständige, so daß kein Lidschluß mehr erfolgen kann und durch den unversehrt gebliebenen *Levator palpebrae sup.* das obere Lid beständig hochsteht. Es ist daher Sorge zu tragen, das Auge nach Bedarf durch entsprechendes Zusammenschieben der Lider geschlossen zu halten. Die Anforderung an den Patienten, die Lider zu schließen, hat keinen Zweck, da er es nicht zu tun vermag. Auch nach dem Eingriffe besteht meist noch vollständiger Lagophthalmus. Daher muß der Verband unter ganz besonderer Sorgfalt angelegt werden, indem zuerst das obere Lid an den Cilien nach unten gezogen wird, um das Auge vollständig zu bedecken, und nun erst auf die geschlossenen Lider die zu unserem Verbande wie gewöhnlich verwendete Augenkompressen (S. 202) aufgelegt wird, durch welche die Lider geschlossen gehalten werden. Der Patient darf auch das andere Auge nicht öffnen, um nicht eine Innervation des *Levators* der operierten Seite zu veranlassen. Beim Verbandwechsel am

nächsten Tage ist der Lagophthalmus ohne Ausnahme spurlos verschwunden und wir haben bis heute nie eine schlechte Wirkung aus diesem Zustande beobachtet.

**Fehler bei der Einspritzung.** Wird die Nadel nicht tief genug, d. h. nicht bis an die Oberfläche des Knochens eingestochen, sondern die Einspritzung oberflächlich gemacht, sei es subkutan oder intramuskulär, so bleibt die Wirkung aus. Die Lösung verteilt sich alsdann so diffus im Gewebe, daß die früher beschriebenen Wülste nicht zustande kommen. Wird die Nadel zu weit augenwärts vorgeschoben, so wird das Lager nicht entlang den Orbitalrändern angelegt, sondern die Flüssigkeit gelangt unter die Bindehaut. Es bleibt infolgedessen nicht nur der Erfolg auf den Musculus orbicularis aus, sondern die durch die große Menge von Flüssigkeit eingetretene Abhebung der Bindehaut von der Sklera, insbesondere die Chemosis am Limbus, kann die Operation wesentlich behindern. Die Nadel soll daher immer mindestens 1 cm peripherwärts vom Orbitalrand geführt werden.

Nach vielen Versuchen, bei denen wir nur ungenügende Wirkung erzielen, sind wir zu der verhältnismäßig großen Menge von je 2 ccm und zu der verhältnismäßig starken Lösung von 4% Novocain übergegangen, wobei jedoch, wie schon erwähnt, ein Adrenalinzusatz vermieden wird. Bei schwächerer Lösung und geringeren Mengen ist der Erfolg der Einspritzung unsicher, namentlich auch der Eintritt der Lähmung verzögert (es mag darüber eine Viertelstunde vergehen) und die Dauer der Wirkung verkürzt, so daß sich dadurch in einem Betriebe, wo oft eine größere Anzahl von Patienten nacheinander zur Operation kommen, arge Mißstände einstellen: entweder ist die Wirkung noch nicht eingetreten, wenn der Patient vorkommt, oder sie ist bereits wieder im Abnehmen begriffen zu dem Zeitpunkte, wo der betreffende Patient an die Reihe kommt. Besonders die Periode des Verschwindens der Wirkung stört bei der Operation sehr, weil dann häufig feine fibrilläre Zuckungen des Schließmuskels einsetzen.

Bei der nunmehr gebräuchlichen Menge und Konzentration wird die Einspritzung nach der Cocainisierung des Auges gemacht, unmittelbar bevor der Kranke in den Operationssaal gebracht wird, so daß nach der Vorbereitung des Auges: Waschen der Lider und Reinigen des Bindehautsackes, der Eingriff sofort beginnen kann. Es ist eine große Seltenheit, daß der Erfolg zu wünschen übrig läßt. Nachinjektionen geringer Mengen vermögen ihn fast immer zu vervollständigen.

#### Akinese nach O'BRIEN.

Die Fasern des Nervus facialis, welche den Musculus orbicularis und die anderen akzessorischen Lidschließmuskeln versorgen, werden durch eine Einspritzung an einem Punkte nahe dem vorderen Rande des Plexus parotideus leicht erreicht. Der Punkt, wo eingespritzt zu werden hat, liegt gerade vor dem Tragus des Ohres, unter der hinteren Portion des Processus zygomaticus des Os temporale und unmittelbar auf der Außenfläche des Processus condyloideus des Unterkiefers. Eine kurze Nadel wird senkrecht eingestoßen und erreicht in einer Tiefe von ungefähr 1 cm den Knochen. Sobald die Nadel den Knochen berührt, wird die Einspritzung begonnen. Es werden dazu 1—2 ccm einer 2%igen Lösung von Novocain verwendet. Während des Einspritzens wird die Nadel

langsam zurückgezogen. Noch innerhalb einer Minute beginnt das Lid gelähmt zu werden und nach wenigen Minuten ist die Lähmung so vollständig, daß der Patient das Lid nicht mehr schließen kann und die Lidspalte weit offen steht.

Dieses Verfahren hat den Vorteil der raschen Wirksamkeit und des Mangels jeglicher Schwellung der Gewebe.

**Anwendung.** Die Lähmung des Lidmuskels bietet so große Vorteile, daß keine Staroperation mehr ohne Akinese vorgenommen wird. Es ist ja bekannt, wie oft es vorkommt, daß Patienten, die anfänglich ganz ruhig zu sein schienen, mitten während der Operation plötzlich zu zwicken beginnen und dadurch das Auge in höchste Gefahr bringen können. Vorfälle des Glaskörpers, durch Unruhe des Patienten veranlaßt, ist seit Anwendung der Akinese gänzlich verschwunden.

Die Akinese wird daher auch bei Glaukomoperationsmethoden verwendet, wo das Auge breit eröffnet wird (Iridektomie usw.).

Nicht beeinflußt wird durch diese Einspritzungen das Pressen mit den Augenmuskeln selbst, das in seltenen Fällen bei schwer nervösen Kranken in einem solchen Maße sich geltend macht, daß dadurch das Auge in höchste Gefahr gerät.

Auch der obere gerade Augenmuskel, dessen Tätigkeit das Auge während des Eingriffes bei manchen Kranken beständig nach oben gedreht hält, kann durch die Einspritzung von 0,5 ccm Novocain-Adrenalinlösung vorübergehend gelähmt werden. Wichtig ist, die Lösung genügend weit hinten unter den Muskel zu spritzen, damit sich nicht die Flüssigkeit oben am Limbus unter der Bindehaut dort ansammelt, wo der Starschnitt angelegt werden soll. Es wird daher die Sehne des Muskels mit der Pinzette gefaßt, die Nadel unter den Muskel geführt und über 2 cm weit vorgeschoben, bevor die Lösung eingespritzt wird. Die Schwächung des oberen Geraden ist durch die Leichtigkeit, mit welcher es gelingt, mit der Haltezange das Auge nach unten zu ziehen, sehr auffallend, und die reflektorische Drehung des Auges nach oben ist verschwunden. Doch kann der Kranke auf Aufforderung das Auge mit Hilfe des unteren Schiefen noch genügend heben.

Dieses Verfahren ist besonders für die Glaukomiridektomie zu empfehlen und der gleich zu beschreibenden Zügelnaht vorzuziehen, vorausgesetzt, daß man es dabei nicht mit einem ganz unvernünftigen und ungebärdigen Kranken zu tun hat.

**Zügelnaht.** Noch besser bewährt sich eine durch den Sehnenansatz des oberen geraden Augenmuskels angelegte Zügelnaht, da mit ihr das Auge in beliebigem Grade nach abwärts gezogen werden kann. Auf diese Weise ist man von der Geschicklichkeit des Kranken, nach unten zu blicken, unabhängig.

**Verfahren.** Bevor man mit der Pinzette die Sehne auffaßt, wird ein mit 10%iger Cocainlösung getränkter Stieltupfer auf die Bindehaut über der Sehne durch einige Minuten angedrückt. Vielen Patienten bereitet nämlich das Auffassen der Sehne mit der Pinzette etwas Schmerzen und macht sie ängstlich. Durch die starke Cocainlösung wird die Sehne durch die Bindehaut hindurch genügend unempfindlich gemacht. Um die Sehne des Muskels zu fassen, muß der Kranke kräftig nach unten sehen oder, wenn er dies nicht tut, wird das Auge mit der am unteren Limbus an der Bindehaut angelegten Haltezange

stark nach unten gezogen. Die Hakenpinzette wird in der richtigen Entfernung vom Limbus, also etwa 8 mm hinter diesem, in senkrechter Richtung auf die Sklera aufgesetzt. Die Sehne muß unmittelbar an ihrem Ansätze aufgefaßt und ebenda der kräftige Seidenfaden durchgezogen werden. Wird die Pinzette näher dem Limbus angelegt, so wird nur eine lockere Falte der Bindehaut aufgehoben. Ist sie zu weit vom Limbus entfernt, so wird eine Falte des Muskels vorgezogen. Wird die Naht durch eine solche Muskelfalte gelegt, so ist das Auge keineswegs sicher fixiert, sondern kann sich noch immer frei bewegen.

Die Pinzette soll beim Auffassen der Sehne nur wenig geöffnet werden, damit nicht eine breite Falte der Bindehaut mitgefaßt wird. Denn da diese der Sklera nur locker anhaftet, so bilden sich Falten der Bindehaut, welche gerade die Gegend der Hornhaut bedecken, wo der Ein- und Ausstich bei der Anlegung des Starschnittes vorzunehmen ist.

Mit dieser Naht, welche der Assistent übernimmt, kann nun das Auge beliebig weit nach unten gezogen werden. Meist genügt schon die Anlegung der Naht, um das fortwährende Hinaufschauen nicht mehr aufkommen zu lassen. Nur selten ist man gezwungen, den Faden schräg nach vorne gerichtet anzuspannen, um das Auge nach unten zu drehen. Der Zug, welcher auf diese Weise auf die Sklera ausgeübt wird, erfolgt in der Richtung der Wunde, ein Umstand, der geeignet ist, der Neigung des Klaffens der Wunde entgegenzuwirken. Andererseits wird beim Anziehen des Fadens die Wunde geradezu zum Klaffen gebracht, indem der sklerale Wundrand etwas gehoben wird. Diese Hebung macht sich namentlich bei der Anlegung der peripheren Irislücke fühlbar, indem man die Spitze der Irispinzette tiefer nach rückwärts einführen muß, um die Irisperipherie auffassen zu können. Es gelingt daher auch nicht so leicht, eine *winzige* Lücke in der Iris zu machen als sonst. Sehr häufig wird durch das tiefere Eindringen der Pinzette ein größeres Stück der Irisperipherie aufgefaßt und demgemäß das periphere Kolobom größer.

Einen so großen Vorteil die Zügelnaht dadurch bietet, daß alle Gefahren, die durch ein unvermutetes, rasches Aufwärtsblicken entstehen können, ausgeschaltet sind, so erschwert sie doch den Eingriff in anderer Beziehung und läßt alle Vornehmheit der Bewegungen der Hände des Arztes, wie sie bei freiem Lide so offenkundig zum Ausdrucke kommt und die der Arbeit des Arztes wahre künstlerische Schönheit verleiht, verschwinden.

Nach Anlegen der Zügelnaht muß das obere Lid mit einem Löffel emporgehalten und vom Auge abgezogen werden. Jeder Druck mit dem Löffel auf das Auge ist strengstens zu vermeiden. Der Gehilfe übernimmt zusammen mit dem Faden den Löffel mit der einen Hand, während er mit der andern Hand das untere Lid nach unten zieht (Abb. 129). Indem dadurch der Gehilfe beide Hände vergeben hat, braucht man einen zweiten zum Austupfen des Blutes und der Tränenflüssigkeit aus dem Bindehautsacke. Ein weiterer Nachteil ist, daß der Lidlöffel beim Eingehen mit den Instrumenten durch die Wunde hinderlich ist. Der Gehilfe muß daher bei Bedarf den Lidlöffel nach Möglichkeit zur Seite schieben, ohne daß es je gelingt, das Hindernis dadurch ganz zu beseitigen. Auch die verschiedensten Abänderungen der Form des Lidlöffels, die man zu diesem Zwecke empfohlen hat, sind nicht besser.

Auch kann durch das fortwährende Geöffnethalten der Lidspalte, wenn ein Kranker mit den Augenmuskeln preßt, die Wunde plötzlich zum Klaffen gebracht und der Glaskörper ganz unerwartet herausgedrückt werden.

Daß die meisten Ärzte die Zügelnaht vorziehen, begreift man. Denn sie werden unabhängig von dem Benehmen des Kranken. Manchmal nämlich schaut der Kranke vor dem Eingriffe über Aufforderung tadellos hinunter, so daß eine Zügelnaht überflüssig erscheint. Während des Eingriffes aber benimmt er sich höchst ungeschickt und schaut ohne Unterlaß hinauf. Ist aber einmal der Schnitt gemacht, dann kann die Zügelnaht nicht mehr angelegt werden, weil man beim Anfassen der Sehne mit der Pinzette zu stark auf das Auge drücken muß.

Bei wirklich tadellosem Herabschauen des Kranken ist der Eingriff ohne Zügelnaht zweifellos leichter und schöner durchzuführen, ist auch in mancher




Abb. 129. Beginn des Starschnittes am linken Auge. Das Auge wird vom Gehilfen, wie S. 189 beschrieben, offen gehalten. Während der Kranke nach unten schaut, wird das Auge mit der in der linken Hand gehaltenen Pinzette unten knapp am Limbus genau im senkrechten Meridian festgehalten. Das in der rechten Hand gehaltene Messer, dessen Schneide nach oben gerichtet ist, wird knapp hinter dem Limbus angesetzt, ist waagrecht und parallel zur Ebene des Limbus gehalten.

Beziehung schonender, weil zwischen den einzelnen Teileingriffen die Lidspalte immer wieder geschlossen gehalten werden kann; auch genügt dabei ein Gehilfe, ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Da durch die Akinese das Pressen der Lider ausgeschaltet ist, kann auch ein Lidsperrerr eingelegt werden, und es sind verschiedene Modelle angegeben worden zu dem Zwecke, die Zügelnaht gleichzeitig damit zu versorgen.

Gelegentlich trifft die Nadel beim Durchführen durch die Sehne die kleine Muskelarterie, und eine manchmal recht heftige Blutung nach außen oder unter die Bindehaut ist die Folge. Die Blutung wird durch Kompression mit in Adrenalin getränkten Tupfern gestillt.

Bei geistig geschädigten oder in ganz besonderem Grade ungebärdigen Kranken leistet die innere Verabreichung von Luminal vorzügliche Dienste.

Pupillenverändernde Mittel werden vor dem Eingriffe nicht eingeträufelt, weder Mydriatica noch Miotica.

**Vorbereitung der Ärzte und Entkeimung der Instrumente.** Nach gründlicher Reinigung und kräftigem Bürsten der Hände unter Waschen mit Seife und Wasser und folgendem Abbürsten entweder in Sublimat- oder Lysoformlösung und Trocknen mit keimfreien Handtüchern legen Arzt und Gehilfe eine Mundmaske an, um eine bei dem unvermeidlichen Sprechen immerhin mögliche Tröpfcheninfektion der Wunde zu vermeiden, und bedecken den Kopf mit einer keimfreien Kappe. Die Instrumente werden ohne Ausnahme durch 3 Minuten in einer 1%igen Sodalösung gekocht. Dieses ist die sicherste Art der Entkeimung, insbesondere auch für die rasche Wiederreinigung der Instrumente während des Eingriffes. Die Schneide der Messer leidet, falls der verwendete Stahl richtig gehärtet war, nur ausnahmsweise. Wir haben oft mit *einem* Messer eine große Anzahl von Starausziehungen gemacht, ohne daß es durch das häufige Kochen Schaden genommen hätte. Aus dem kochenden Wasser werden die auf dem Roste befindlichen Instrumente in eine große flache leere Tasse gehoben. Sie kühlen an der Luft so rasch ab, daß sie nach wenigen Sekunden verwendet werden können. Nie wird ein Instrument ein zweitesmal in Berührung mit dem Auge gebracht, bevor es nicht wieder in das kochende Wasser eingelegt worden ist. Der Kochkessel hat daher knapp neben dem Arzte zu seiner Linken bereitzustehen, und von den Instrumenten, die regelmäßig wiederholt gebraucht werden (DAVIELScher Löffel und Spatel) sollen 2 Stücke vorrätig sein. Zur seitlichen Beleuchtung dient die HESSsche Hammerlampe.

Auch während des Eingriffes kann zur gelegentlich notwendigen Verstärkung der örtlichen Betäubung eine keimfreie 3%ige Cocainlösung eingetropt werden.

Zum Reinigen des Auges von Blut während des Eingriffes werden kleine Tupfer verwendet, die aus keimfreier Watte gebildet, in keimfreier physiologischer Kochsalzlösung liegen.

**Der Eingriff.** Zuerst werden die einzelnen Schritte des Eingriffes und dann die Zwischenfälle besprochen werden, die bei jedem von ihnen eintreten können.

1. Festhalten des Auges (Abb. 129 und 130).

Wir pflegen während des Eingriffes zur Rechten des auf dem Tische liegenden Kranken zu sitzen. Der Schnitt wird von der Schläfenseite aus vollführt und muß daher am rechten Auge mit der linken Hand, am linken Auge mit der rechten Hand gemacht werden, während die andere Hand das Auge festhält. Dazu dient eine gewöhnliche dreizählige Hakenpinzette, die zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten wird. Die Zähne sollen nicht scharf sein, damit sie die Bindehaut nicht durchschneiden, sondern nur genügend festklemmen. Die Pinzette hat unten knapp am Limbus senkrecht auf die Lederhaut aufgesetzt zu werden, um eine straffe Falte der Bindehaut genau im senkrechten Meridian aufzufassen. Schon in geringer Entfernung vom Limbus ist eine Falte der Bindehaut so lose, daß das Auge dadurch nicht genügend festgehalten wird. Die Arme der Pinzette müssen daher *enlang* dem Limbus gleiten, nicht senkrecht auf ihn. Während des Schließens der Pinzette soll ein mäßiger Druck ausgeübt werden, um das unter der Bindehaut liegende Bindegewebe mitzufassen und ein Ausreißen der Gewebefalte zu vermeiden. Ist aber die Pinzette geschlossen, so muß anstatt des Druckes ein Zug einsetzen, der das Auge aus der Augenhöhle etwas vortreten macht. In der erwähnten Stellung des Arztes bereitet das Festhalten beim rechten Auge keine Schwierigkeiten, da sich die die Pinzette führende rechte Hand gerade dem rechten Auge

gegenüber befindet. Dagegen muß für das Festhalten des linken Auges bei der erwähnten Stellung des Arztes der linke Oberarm, bei starker Beugstellung im Ellbogen, an die Brust gedrückt werden, während die Hand, dorsalwärts abgebogen, die Pinzette senkrecht gegen den unteren Limbus führt, wo die Falte aufgehoben wird. Durch diese ungewohnte Stellung des Armes verfällt der Anfänger sehr leicht in den Fehler, auf das Auge zu drücken, statt es hervorzuziehen: ein Vorkommnis, das häufig die Ursache von unangenehmen Zwischenfällen ist. Die Falte der Bindehaut muß genau im senkrechten Meridian aufgehoben werden. Wird der Eingriff mit Iridektomie ausgeführt, so ist es geboten, den Schnitt genau




Abb. 130. Beginn des Starschnittes am rechten Auge, bei gleicher Stellung des Arztes und Gehilfen. Das Auge wird mit der rechten Hand festgehalten, das Messer mit der linken Hand geführt.

nach oben anzulegen, um entsprechend der Mitte des Schnittes ein genau nach oben gerichtetes Kolobom zu erzeugen, das durch das obere Lid vollständig bedeckt wird. Wird das Auge irgendwo an der Seite, z. B. am Ende des waagrechtens Meridians aufgefaßt, so ist eine Rollung unvermeidlich, da es gleichzeitig nach unten gezogen werden muß, damit der obere Hornhautrand zur Schnittführung freigelegt wird. Infolge dieser Rollung gerät der Schnitt in eine schiefe, nicht erwünschte Stellung und mit ihm folgerichtig auch das Kolobom. Wird aber das Auge genau im lotrechten Meridian festgehalten, so erfolgt beim Nachabwärtsziehen des Auges keine Rollung und kann über die Lage des anzulegenden Schnittes keine Täuschung obwalten. Wohl mag sich nach Ansetzen des Messers das Auge etwas aus seiner Stellung herausrollen, dadurch kann aber der Schnitt in keiner Weise mehr verlagert werden. Es ist daher das Festhalten im senkrechten Meridian dem an irgendeinem anderen Platze vorzuziehen.

Mit der Falte wird das Auge nicht bloß nach unten, sondern auch etwas nach vorne gezogen. Der Kranke muß während des Schnittes gut nach unten blicken. Mit der Zügelnaht ist die Abwärtsdrehung aber auch für den Fall gewährleistet, daß der Kranke nicht von selbst nach unten blickt.

## 2. Der Schnitt. (Abb. 129—134.)

Es sei hier nur nebenbei im Vorhinein bemerkt, daß alle die vielen Vorschläge, die in fast nicht übersehbarer Reihenfolge, für das Anlegen des Starschnittes als angeblich vorteilhafte Abänderungen gemacht worden sind, wie vorheriges

Anlegen einer Naht, Schnittführung von außen nach innen, Anlegen einer Naht nach Rinnenbildung entsprechend dem Schnitte, Schnittführung mit der Lanze usw. von uns insgesamt abgelehnt werden.

Der Schnitt ist der schwierigste Teil des Eingriffes. Er wird mit dem schmalen GRAEFESchen Starmesser nach oben angelegt, soll ungefähr ein Drittel des Hornhautumfangs einnehmen und in seiner ganzen Länge am Limbus oder ganz knapp dahinter verlaufen. Das Messer wird in der Weise in der Hand gehalten, daß das Endglied des Daumens auf der einen Seite, die Endglieder des Zeige- und Mittelfingers auf der anderen Seite des Griffes nahe der Klinge zu liegen kommen.

Der 4. Finger mag mit seinem Endglied wie der 2. und 3. gelagert sein oder aber dem Rücken des Griffes zur Stütze dienen. Der 5. Finger hat frei zu sein und wird zum Aufstützen der Hand an dem Kopf des Kranken in der Jochbein- oder Wangengegend verwendet, wo er eben am bequemsten zu ruhen kommt. Das Aufstützen soll aber nur mit der Spitze des kleinen Fingers erfolgen, denn nur so bewahrt sich die Hand die nötige Bewegungsfreiheit im Handgelenk. Das Aufstützen der Hand ist bei allen Eingriffen am Auge notwendig, damit eine unerwartete Kopfbewegung des Kranken keine Überraschung bereitet.

Die Spitze des Messers, dessen Schneide nach oben und dessen Klinge parallel zur Ebene des Limbus gerichtet ist, durchsticht die Hornhaut unmittelbar hinter dem Limbus, 1 mm oberhalb des waagrechten Meridians und wird ohne Aufenthalt durch die vordere Kammer geführt, um innen am Limbus an symmetrischer Stelle die Gegenöffnung zu machen. Die Hauptbedingung für das Gelingen des Schnittes ist jegliche Vermeidung des Stillstandes oder einer Rückbewegung.

Beim Starschnitte die richtige Ausstichstelle zu finden, ist die schwierigste Aufgabe für den Anfänger. Zu seinem Erstaunen erscheint das Messer weit nach hinten vom Limbus in der Lederhaut. Die Ursache dieses Fehlers wird durch die anatomischen Verhältnisse der vorderen Kammer verständlich gemacht (Abb. 188). Der Limbus reicht nämlich ( $1\frac{1}{2}$  mm) weiter nach vorne als



Abb. 131. Die Messerspitze zielt auf einen 1 mm innerhalb des Limbus in der Hornhaut gelegenen Punkt, um den Ausstich zu beginnen.



Abb. 132. Die Messerspitze ist unmittelbar hinter dem Limbus durchgedrungen.




Abb. 133. Das Messer erscheint nach dem Ausstich noch immer in derselben Richtung weiter vorgedrungen, wurde aber gleichzeitig so weit nach oben geschoben, daß ein guter Teil des Schnittes damit ausgeführt ist. Auf diese Weise wurde ein großer Teil der Messerschneide verwendet.

der Lage des Kammerwinkels entspricht. Wird das Messer bis in den Winkel der vorderen Kammer geführt, so ist die fehlerhafte Gegenöffnung weit nach hinten vom Limbus die unausbleibliche Folge. Soll das Messer wieder genau im Limbus oder ganz knapp hinter ihm herauskommen, so muß der Gegenstich schon an einem Punkte begonnen werden, wo, von vorne gesehen, noch durchsichtige Hornhaut vorhanden ist (ungefähr 1 mm hornhautwärts vom Limbus), so daß der Eindruck erweckt wird, als müßte das Messer noch in der durchsichtigen Hornhaut an die Oberfläche kommen. Die Messerspitze erscheint ja auch wegen der Brechung durch die Hornhaut etwas weiter hornhautwärts gelegen, als ihrer wirklichen Lage entspricht. Um den richtigen Ausstichpunkt




Abb. 134. Der Schnitt ist so weit gediehen, daß die äußere Augenhaut bereits durchtrennt ist und sich das Messer unter der Bindehaut befindet. Um den Lappen kurz abzuschneiden, wurde das Messer so gedreht, daß die Schneide nach vorwärts sieht. Das Messer wird nun aufgestellt. Man beachte die Veränderung der Handstellung des Arztes im Vergleich mit Abb. 129.

zu finden, möge es sich daher der Anfänger zur Regel machen, mit der Spitze des Messers auf einen ungefähr 1 mm nach einwärts vom Limbus in der Hornhaut gelegenen Punkt loszusteuern (Abb. 131).

Nach vollzogener Gegenöffnung (Abb. 132) muß das Messer — ohne eine Pause in der Bewegung — noch weiter in derselben Richtung vorgeschoben, dabei aber gleichzeitig nach oben, parallel zum Limbus geführt werden, so daß ein guter Teil des Schnittes bei dieser *einen* Schnittrichtung erzeugt wird (Abb. 133). Nur so gelingt es, einen frühzeitigen Abfluß des Kammerwassers zu verhindern und die Schneide des Messers über den Pupillarrand zu bringen, bevor die Regenbogenhaut in den Weg des Messers fallen kann. Ein je größerer Teil der Schneide des Messers zum Schnitte verwendet wird, um so besser ist die Schnittführung und um so glatter sind die Schnittländer. In je kürzeren sägenden Schnitten das Messer geführt wird, um so unregelmäßiger wird die Wunde. Ist einmal die Schneide des Messers über den Pupillarrand gelangt, so ist die Gefahr, die Regenbogenhaut zu verletzen, nicht mehr groß. Erst nachdem der größte Teil seiner Schneide ausgenützt worden ist, wird das Messer

in entgegengesetzter Richtung geführt, um den Schnitt fortzusetzen oder ihn schon damit zu vollenden, was sicherlich zum mindesten bei dem nächsten Vorschieben des Messers der Fall sein sollte.

Es sei schon hier ausdrücklich auf einen Fehler des weniger Erfahrenen aufmerksam gemacht, der zur Folge hat, daß die Regenbogenhaut ins Messer fällt: unmittelbar nach Anlegen der Gegenöffnung, kaum daß die Messerspitze aus der Lederhaut hervorkommt, wird der eigentliche Schnitt in der Weise



Abb. 135. WECKERS Scherenzange.

begonnen, daß das Messer sofort in entgegengesetzter Richtung hinaufgeführt wird. Da durch das Zurückziehen des Messers die der Spitze nahe gelegenen dünneren Teile des Messers die Wundöffnung nicht mehr gehörig verschließen können, beginnt das Kammerwasser sofort abzufließen. Außerdem steht aber bei dieser Schnittführung kein langer Teil der Messerschneide zur Verfügung, so daß sofort mit kurzen sägenden Bewegungen des Messers eingesetzt werden muß. Es kann sogar geschehen, daß bei dieser Art des Schneidens mit dem Endteil des Messers die Spitze wieder in die Kammer zurückgerät.

Ein weiterer Grund, warum der Anfänger sehr häufig mit dem Schneiden nicht vorwärts kommt, trotzdem er viele kurze Sägebewegungen macht, liegt gewöhnlich darin, daß er das Messer, anstatt es nach oben zu *schieben*, nach rückwärts gegen die Lederhaut *drückt*.

Während des Schnittes hat das Messer genau in der Ebene des Limbus zu bleiben; eine Drehung der Schneide nach vorne oder rückwärts hätte ein Abweichen des Schnittes in die Hornhaut oder in die Lederhaut zur Folge. Erst wenn nach Durchschneidung der äußeren Augenhaut das Messer unter der Bindehaut sichtbar ist, wird es um 90° gedreht (Abb. 134), so daß die Schneide nach vorne gerichtet ist. Dadurch wird der Bindehautlappen kürzer abgeschnitten, als wenn das Messer in der anfänglichen Haltung weiterschnitt. Denn ein zu langer Bindehautlappen ist für Eingriffe in der vorderen Kammer ein Hindernis. Nach vollendetem Schnitte wird die Pinzette geöffnet und *im weiteren Verlaufe des Eingriffes auf das Festhalten des Auges verzichtet*. Dies kann um so eher getan werden, als die Zügelnaht jederzeit die gewünschte Stellung des Auges herbeizuführen vermag.



Abb. 136. ARLTS Iriszange.

### 3. Die Ausschneidung der Regenbogenhaut (Abb. 135—140).

Dazu dienen die Scherenzange WECKERS (Abb. 135) und die Iriszange ARLTS (Abb. 136). Diese wird in der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten und, während das Auge nach unten gerichtet ist, geschlossen mit nach vorne gerichteter Höhlung durch die Wunde entlang der Oberfläche der Regenbogenhaut bis an den Pupillarrand eingeführt. Hier wird sie etwas geöffnet und mit ihr wird eine schmale Falte der Regenbogenhaut aufgefaßt und vorgezogen (Abb. 137—140). Die in der rechten Hand gehaltene Schere schneidet

die vorgezogene Falte rasch ab. Um die Pinzette genau von oben einführen zu können, hat sich die Hand in starke Beugstellung zu begeben. Sollte der Bindehautlappen dem Einführen im Wege sein, so wird er mit der in der anderen Hand gehaltenen geschlossenen Scherenzange nach unten auf die Hornhaut hinübergelegt, um die Wunde freizumachen, während die Iriszange die lederhautseitige Wundlippe etwas niederdrückt. Die Arme der Scherenzange sind beim Abschneiden am besten nach oben gerichtet (Abb. 137), da durch diese




Abb. 137. Iridektomie. Das Auge wird nicht mehr festgehalten. Der Gehilfe hat den Lidlöffel so zur Seite geschoben, daß der Arzt nicht behindert ist, die geschlossene Irispinzette genau von oben durch die Wunde bis nahe an den Pupillarrand einzuführen, während die in der rechten Hand gehaltene geöffnete Schere knapp daneben wartet, um die vorgezogene Regenbogenhaut schnell abzuschneiden. Der Deutlichkeit wegen wurde in dieser und den folgenden Zeichnungen der Bindehautlappen nicht eingezeichnet.

Schnittführung am ehesten ein schmales spitzbogenförmiges Kolobom zustande kommt. Es ist aber kein Fehler, den Schnitt mit parallel zum Limbus gehaltener Schere zu machen.

#### 4. Eröffnung der vorderen Linsenkapsel (Abb. 141—145).

a) Bei Gebrauch der Kapselpinzette (Abb. 141, 142). Die Kapselzange wird in der rechten Hand zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten, geschlossen senkrecht von oben (daher eine gleiche Handhaltung wie bei der Iridausschneidung) in die vordere Kammer eingeführt (Abb. 143) und soweit vorgeschoben, daß sich der gezähnte Teil der Arme in der unteren Hälfte der Pupille befindet, während ihr rückwärtiger Teil im Kolobome liegt.

Die Pinzette hat so gehalten zu werden, daß beim Öffnen beide Arme auf der vorderen Linsenkapsel gleiten (Abb. 144). Ein ganz gewöhnlicher Fehler

besteht darin, sie schräg zu halten, so daß nur der eine Arm auf der Kapsel aufliegt, während sich der andere beim Öffnen von der Kapsel weg nach vorne bewegt. Nach richtigem Aufsetzen auf die Kapsel wird die Zange soweit geöffnet, als die Größe der Pupille beträgt, sie kann aber auch noch weiter geöffnet werden, da durch die aus-



Abb. 138<sup>1</sup>. Die bis nahe an den Pupillarrand geführten Arme der Irispinzette wurden soeben geöffnet.



Abb. 139. Die Arme wurden geschlossen und haben eine Falte der Regenbogenhaut gefaßt.



Abb. 140. Die vorgezogene Regenbogenhaut wird mit der von unten hergeführten Schere abgeschnitten.

einandergehenden Arme, die sich bis zu 1 cm voneinander entfernen können, der Pupillarrand zurückgeschoben wird. Dies soll sogar geschehen, wenn die Pupille eng ist und dadurch die Kapsel nur in kleinem Bezirke herausgeholt werden könnte (siehe S. 205. Starausziehung bei runder Pupille). Unter einem geringen, gegen die Linse ausgeübten Drucke wird die Pinzette geschlossen, wobei die nach innen gerichteten Zähne eine Falte der Kapsel aufgreifen (Abb. 145). Diese Falte wird durch hauptsächlich seitlich und im Kreise ausgeführte Bewegungen der Zange von der Umgebung losgerissen. Die Kapseleröffnung hat langsam ausgeführt zu werden. Namentlich hat das Herausziehen des losgetrennten Kapselstückes aus dem Auge langsam zu geschehen. Sonst reißt die Falte aus und es bleibt ein Kapselstück nach oben geschlagen in der Wunde liegen. Nach Herausziehen der Pinzette aus dem



Abb. 141. Kapselpinzette offen (Seitenansicht).



Abb. 142. Kapselpinzette geschlossen (von hinten), um zu zeigen, daß sich nur die gezähnten Abschnitte der Arme berühren.

Auge möge nachgesehen werden, ob sich das Kapselstück wirklich in ihr befindet und nicht etwa in der Wunde liegen blieb. Es hat meist die Größe der Pupille, ist aber manchmal viel größer. Der zum Aufheben einer Falte der Kapsel notwendige Druck ist gering. Aber auch bei Anwendung stärkeren Druckes besteht keine Gefahr, die Linse in den Glaskörper hineinzudrücken, da die weiche Rinden-

<sup>1</sup> Die Abb. 138—140 zeigen in natürlicher Größe die Vorgänge beim Fassen und Abschneiden der Regenbogenhaut.

substanz hinter der Kapsel dem Drucke nachgibt und seitlich ausweicht. Dagegen kommen freilich geringfügige seitliche Verschiebungen der Linse bei herabgesetztem Widerstande der Zonula gelegentlich vor.

Ein Mitfassen der Regenbogenhaut wird in der Weise verhütet, daß sich die hinteren Abschnitte der Arme durch eine Haltvorrichtung nicht bis zur Berührung




Abb. 143. Kapseleröffnung. Das Auge blickt nach unten. Der Arzt führt mit der rechten Hand die geschlossene Kapselpinzette ein, die beiden Zangenarme parallel zur Kapselenebene, und zieht mit der linken Hand das untere Lid vom Auge ab, um die Hornhaut freizulegen.

einander nähern können. Außerdem soll die Pinzette beim Aufheben der Kapsel-falte so aufgestellt werden, daß nur der gezähnte Teil der Arme aufliegt, während sich die rückwärtigen Teile frei in der Kammer befinden. Nach vorhergegangener




Abb. 144. Die beiden Arme der Kapselpinzette, auf der vorderen Kapsel gleitend, weit geöffnet.

Irisausschneidung kommt dieser Umstand nicht in Betracht, da die hinteren Teile der Arme im Bereiche des Kolo-boms liegen. Dagegen ist es bei runder Pupille von Wichtigkeit, durch diese Vorsichtsmaßregeln ein Einklemmen der Regenbogenhaut zu verhüten.

b) Einfacher ist die Eröffnung der vorderen Kapsel mit dem spitzen Häkchen oder dem Cystotom. Das Häkchen wird, damit es sich nirgends verfange, an



Abb. 145. Die Arme wurden geschlossen und haben eine Falte der Kapsel aufgefaßt; diese wird nun herausgezogen.

die hintere Hornhautfläche angelegt, in die vordere Kammer eingeführt. Im Bereiche der Pupille wird es um  $90^\circ$  so gedreht, daß die Spitze nach rückwärts gerichtet ist. So wird es auf die vordere Linsenkapsel aufgesetzt. In diese werden mehrere oberflächliche Einschnitte in verschiedenen Richtungen gemacht. Bei diesem Vorgange darf kein Druck ausgeübt werden. Das Häkchen wird in der gleichen Weise aus dem Auge herausgezogen, wie es eingeführt worden war, d. h. seine Krümmung parallel zur hinteren Hornhautfläche.

Der Vorteil, der in der Verwendung der Kapselpinzette liegt und der den Nachteil der etwas schwierigeren Handhabung bedeutend überwiegt, besteht darin, daß wegen der großen, in der vorderen Kapsel, und zwar gerade im Pupillargebiet gesetzten Öffnung später durch die Kapsel selbst keine optischen Störungen mehr hervorgerufen werden können, und daß sich die im Kapselsacke zurückbleibenden Reste rasch und vollständig aufsaugen, weil sie der Einwirkung des Kammerwassers dauernd ausgesetzt sind.

Dadurch wird ferner auch die *Ausspülung der vorderen Kammer* zur Entfernung von Linsenresten überflüssig gemacht, ein Verfahren, das nach unserer



Abb. 146. Das Herausdrücken der Linse. Der Zeigefinger der rechten Hand übt durch das untere Lid einen Druck auf die untere Hornhauthälfte aus. Dadurch kommt die Wunde zum Klaffen und der Linsenrand stellt sich darin ein. Ist die Linse mit ihrer oberen Hälfte ausgetreten, so wird sie mit dem Löffel vollends aus dem Auge herausgerollt.

Meinung eher Schaden anrichtet, als Nutzen stiftet. Es birgt in sich die Gefahr einer Infektion, einer iritischen Reizung und einer Schädigung des Hornhautendothels mit folgender Dauertrübung der Hornhaut.

##### 5. Das Herausdrücken des Stares (Abb. 146, 147).

Die Handgriffe zur Entbindung der Linse aus dem Auge bestehen aus zwei verschiedenen Teilhandlungen: der Zeigefinger der rechten Hand beginnt durch das untere Lid einen von vorne nach hinten wirkenden Druck auf die Gegend des unteren Hornhautrandes auszuüben (Abb. 146). Die unmittelbare Folge ist, daß die Linse eine Drehung um eine horizontal-frontale Achse in der Weise macht, daß sich der obere Linsenrand (d. h. der obere Rand des Linsenkernelnes) nach vorne dreht und in der Wunde einstellt, wodurch diese zu klaffen beginnt. Der Druck muß mit großer Vorsicht und mit nur allmählich steigender Stärke vorgenommen werden, um nicht eine Berstung der Membrana hyaloidea zu veranlassen. Von dem Augenblicke an, wo sich der Linsenrand in die Wunde ein-

gestellt hat, muß der Druck in der Richtung von unten nach oben ausgeübt werden, da eine weitere Fortsetzung des Druckes nach rückwärts den Glaskörper in die Wunde vortreibt. Die Linse wird nunmehr nach oben und aus dem Auge



Abb. 147. Der Löffel ist im Begriffe, an den seitlichen Rand der zur Hälfte ausgetretenen Linse angesetzt zu werden, um sie herauszurollen.

herausgebracht, indem unter leichtem Drucke gegen das Auge das untere Lid an der Hornhaut hinaufgeschoben wird. Es darf aber dabei nicht über die Hornhautmitte hinaufgestrichen werden, weil sonst der Druck die Wunde verschließt und die Linse wieder in das Auge zurückbefördert. Sobald der Linsenrand bis zur Hälfte in der Wunde erschienen ist, wird die Linse, indem ein Spatel an ihren Rand angesetzt wird, aus dem Auge herausgerollt (Abb. 147). Gleichzeitig wird mit dem Drucke aufgehört. Die Einstellung des Linsenrandes in die Wunde kann durch ein leichtes Niederdrücken des

lederhautseitigen Wundrandes mit dem DAVIELSchen Löffel erleichtert werden. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn sich der Linsenaustritt schwierig gestaltet.

Anstatt mit dem Zeigefinger durch das Lid hindurch einen Druck auszuüben, kann auch mit dem Spatel der Druck unmittelbar an der unteren Hornhauthälfte ausgeübt werden, um die gewünschte Rollung der Linse zu erzielen, während der in der anderen Hand gehaltene Spatel durch Niederdrücken des Lederhautwundrandes den Austritt der Linse erleichtert und beschleunigt (Abb. 148).




Abb. 148.

Viele Augenärzte ziehen den Gebrauch des Spatels zum Ausdrücken der Linse aus Gründen der Aseptik dem vorher beschriebenen Verfahren vor.

Durch ähnliche streichende und massierende Bewegungen — sei es mit dem Spatel oder

aber mit dem Finger durch das an das Auge angedrückte untere Lid hindurch — sind dann auch noch die zurückgebliebenen Rindenreste aus der Wunde herauszubefördern. Je genauer dies geschieht, um so weniger Nachstar bleibt zurück. Manchmal bringt die Massage Linsenreste, die unten hinter der Regenbogenhaut waren, hervor, und die anfänglich schwarz erschienene Pupille wird wieder grau, bis die Reste sie durchschritten haben und in der Wunde erscheinen. Zähne Reste werden leichter mit dem DAVIELSchen Löffel aus der vorderen Kammer gebracht.

Doch soll in dem Bestreben, die Pupille so rein als möglich zu bekommen, nicht zu weit gegangen werden. Sobald die Wunde Neigung zum Klaffen zeigt oder der Glaskörper vordrängt und vorzufallen droht, ist es besser, auf die Entfernung der Reste zu verzichten und den Eingriff zu beenden. Andererseits scheint manchmal die Pupille frei von Resten, während sie am Tage nachher mit gequollenen Linsenmassen ausgefüllt ist. Es war durchsichtige Rindensubstanz, die während des Eingriffes nicht wahrgenommen werden konnte.

### 6. Toilette des Auges (Abb. 149—151).

Ihr wichtigster Teil ist die Zurechtlagerung der Regenbogenhaut. Es ist oft während des Eingriffes nicht leicht zu beurteilen, ob diese wirklich richtig liegt.




Abb. 149. Zurückstreichen des inneren Kolobomschenkels. Das Auge blickt nach unten. Die rechte Hand führt den Spatel von der Oberfläche des Auges her schräg in den inneren Wundwinkel, um von hier die Regenbogenhaut hinunterzustrreifen. Das untere Lid wird etwas abgezogen.

Nicht immer springen die Sphinkterecken scharf vor. Gelegentlich wurde sie so ausgeschnitten, daß der eine Winkel des Koloboms stumpf ist. Ausschlaggebend ist nur die Lage des Sphinkters. Sie ist nur dann

leicht zu beurteilen, wenn die Farbe des Sphinkterteiles von der der übrigen Regenbogenhaut deutlich verschieden ist. Außerdem kann Blut auf der Regenbogenhaut die Beobachtung sehr stören.



Abb. 150. Umrißzeichnung, darstellend Auge und Spatel in natürlicher Größe. Der Spatel wird zwischen Hornhaut und Regenbogenhaut in die Wunddecke von der Oberfläche des Augapfels her eingeführt.

Die Regenbogenhaut wird mit dem Spatel zurechtgelagert (Abb. 149). Er wird vorsichtig zwischen den Wundrändern in die Ecke der Wunde geschoben (Abb. 150), wobei seine Fläche parallel zur Ebene der Regenbogenhaut zu liegen hat. Nach Einführung in die vordere Kammer wird der Spatel um seine



Abb. 151. Um das Zurückstreichen leichter zu bewerkstelligen, wurde der Spatel um seine Längsachse um wenige Grade gedreht (kantwärts gestellt) und durch eine entsprechende Bewegung die Sphinkterecke nach abwärts gebracht.

Längsachse ganz wenig gedreht, so daß die eine Kante nach rückwärts gerichtet ist (Abb. 151). Wird nun der Spatel unter zartem Drucke auf die Regenbogenhaut gegen den Mittelpunkt des Sehloches bewegt, so wird diese in die richtige Lage gestrichen.

Der Spatel hat parallel zur Ebene der Regenbogenhaut gehalten zu werden, da ein steiles Aufstellen des Spatels mit nach rückwärts gerichtetem Ende eine Verletzung der Membrana hyaloidea mit Vorfall des Glaskörpers zur Folge hat. Es ist gleichgültig, welche Hand bei diesem Vorgehen gebraucht wird; am besten abwechselnd die rechte und linke für die gleichnamige Wunddecke. In vielen Fällen kann die Regenbogenhaut unmittelbar von oben nach unten zurechtgestrichen werden, indem der Spatel in senkrechter Richtung eingeführt wird.

Es kommt vor, daß die Regenbogenhaut dem Spatel nicht folgt, sei es, daß sie selbst ganz schlaff ist und ihr Gewebe nicht mitwirkt oder daß das Auge sehr weich ist und die Regenbogenhaut daher dem Drucke des Spatels mangels einer Unterlage ausweicht. In diesen Fällen darf es sich der Erfahrene erlauben,




Abb. 152. SNELLENSche Schale, mit Pflasterstreifen befestigt.

den Spatel hinter die Regenbogenhaut zu führen, diese an die hintere Fläche der Hornhaut anzudrücken und sie ihr entlang in die richtige Stellung zu schleifen.

Schließlich muß der Bindehautlappen mit dem Spatel sorgfältig in die richtige Lage gebracht werden. Gelegentlich ist er in die Wunde eingeschlagen, wodurch die Wundheilung wesentlich gestört würde.

Der Bindehautsack wird schließlich noch von Blut und namentlich von Linsenresten sorgfältig gereinigt, da gerade diese als besonders gute Nährböden für Keime den Eintritt einer Infektion begünstigen können. Nun werden mehrere Tropfen einer 20%igen frisch bereiteten Argyrollösung eingetropfet und ein Tropfen auch über die frische Wunde gleiten gelassen. Diese dicke, sirupartige Lösung wird vom Auge einschließlich der frischen Wunde ohne jede Reizung vertragen. Aber auch sie kann eine Infektion nicht verhindern. Nun wird das Auge geschlossen und verbunden.

#### **Verband und Nachbehandlung.**

Nach Vollendung des Eingriffes werden die Lider des leise geschlossen gehaltenen Auges mit einer aus einem Gazestückchen und etwas Watte bestehenden Augenkompressen bedeckt. Darüber kommt zum Schutze gegen Berührung

eine SNELENSche Schale (Abb. 152) aus durchlocthem Aluminium, die mit schräg von innen oben nach außen unten angelegten Heftpflasterstreifen an Stirne und Wange befestigt wird. Die Schale wird unter den verschiedenen Verbandsarten am wenigsten lästig empfunden. Wenn aber das Pflaster an der bebarteten Haut der Männer nicht hält, wird das FUCHSSche Gitter verwendet, dessen Anlegung aus der beiliegenden Abbildung (Abb. 153) ersichtlich ist. Auch das andere Auge wird an diesem Tage durch einen leichten Verband geschlossen gehalten. Der Kranke wird zu Bette gebracht. Sehr alte Leute, namentlich wenn sie an Bronchitis leiden, bleiben nach dem Eingriffe in einem bequemen Lehnstuhl sitzen. Dadurch wird am ehesten die Entstehung einer hypostatischen Pneumonie verhindert. Aufgeregten ängstlichen Leuten, bei denen das Verbinden




Abb. 153. FUCHSSches Gitter, angelegt.

beider Augen eine Psychose auslösen könnte, wird das gesunde Auge frei gelassen. Das bloße Weglassen des Verbandes an diesem Auge genügt meistens, die Ängstlichkeit zu beseitigen, und die Leute lassen dann meistens von selbst die Lider dieses Auges geschlossen. Trinkern wird eine ausgiebige, ihren Bedürfnissen entsprechende Menge Alkohol zugestanden und dadurch der Ausbruch eines Delirium tremens vermieden. Die Zeit der Starausziehung soll nicht zur Durchführung der Entwöhnung von diesem Gifte benutzt werden. Raucher dürfen von dem dem Eingriffe folgenden Tage an wieder rauchen. Vor dem Eingriffe nimmt der Kranke eine mäßige Menge einer leichten Nahrung (etwas Suppe, gebratenes Kalbfleisch u. dgl.) zu sich, um nicht kurze Zeit nachher durch Hunger beunruhigt zu werden. Die Nahrung wird am Tage des Eingriffes auf flüssige Kost beschränkt (Milch, Kaffee, Suppe mit Ei u. dgl.). Diabetiker bekommen außer der ihnen entsprechenden Kost innerlich 2 g Natrium bicarbonicum täglich.

#### Verbandwechsel.

Der erste Verbandwechsel erfolgt ausnahmslos am Morgen nach dem Eingriffe, während der Kranke noch zu Bette liegt. Der Kranke wird aufgefordert, seine Augen zunächst ruhig, wie beim Schläfe geschlossen zu halten. Nach

sorgfältiger Entfernung des Verbandes von beiden Augen werden die Lider mit physiologischer Kochsalzlösung von Blut und Sekret zart gereinigt. Ein leichtes Öffnen der Lider durch den Kranken genügt, den Zustand des Auges beurteilen zu können, zu sehen, ob und wie weit die Kammer hergestellt ist, ob die Pupille rund oder verzogen, die Lage der Kolobomschenkel richtig ist, ob Reste zurückgeblieben sind, ob das Auge gereizt ist usw. Eine unmittelbare Besichtigung der Wunde, die nur durch Heben des oberen Lides und Nachuntersblicken zu Gesichte gefördert werden könnte, erweist sich nur in Ausnahmefällen als notwendig. Fachgemäß ausgeführt, birgt der Verbandwechsel am Tage nach dem Eingriffe keine Gefahren und es erscheint uns nicht zweckmäßig, den ersten Verbandwechsel erst nach Ablauf mehrerer Tage vorzunehmen.

Der Grad der Injektion des Auges sowie die Menge der vorhandenen Starreste entscheiden über den Gebrauch von Atropin. Ist das Auge fast nicht gereizt, Pupille und Kolobom schwarz, so braucht kein Atropin angewendet zu werden. Dagegen hat die Pupille erweitert zu werden bei starker Injektion zur Vermeidung von hinteren Synechien und beim Vorhandensein vieler Starreste, da nur dadurch die durch die Kapselpinzette erzeugte Lücke in voller Ausdehnung offengehalten wird und auf diese Weise die Aufsaugung ihren regelrechten Verlauf nehmen kann. Die Starreste erregen keine Entzündung, wenn sie auf die vordere Kammer beschränkt sind; wenn sie aber durch Zwischenfälle im Verlaufe des Eingriffes mit dem Glaskörper in Berührung kommen, rufen sie nicht selten Reizungen des Auges hervor.

Waren die Lider beim ersten Verbandwechsel durch Sekret verklebt, so wird Borsalbe auf den Verband gegeben, um die Lider beim Verbandwechsel leichter reinigen zu können. Argyrollösung wird noch in den ersten Tagen nach dem Eingriffe eingetropt. Je weniger die Lider berührt werden, um so weniger besteht die Gefahr einer Wundsprengrung.

Das gesunde Auge wird am Tage nach dem Eingriffe nur in Ausnahmefällen noch verbunden, wenn z. B. die Augen wegen starken Klaffens der Wunde nicht bewegt werden dürfen. Das Starauge wird wie nach dem Eingriffe verbunden. Der Kranke wird angekleidet und darf den ganzen Tag außerhalb des Bettes im Lehnstuhl verbringen. Einige Stunden Schlafes nach Mittag sind sehr empfehlenswert. Die Kost beschränkt sich auf weiche Speisen, haschiertes Fleisch, Gemüse, weiche Mehlspeisen u. dgl. Jegliche Anstrengung des gesunden Auges durch Lesen u. dgl. ist während der ganzen Dauer der Nachbehandlung zu untersagen.

In gleicher Weise vollzieht sich die Behandlung in den nächsten Tagen. Nach Ablauf einer Woche wird bei sonst regelrechtem Verlauf der Wundheilung der Verband über Tag weggelassen und eine dunkelrauchgraue Brille zum Schutze gegen Licht getragen. Nur über Nacht wird die Schale oder das Gitter ohne weiteren Verband angelegt.

Nach Ablauf von 2 Wochen verläßt der Kranke — ein glatter Heilungsverlauf vorausgesetzt — das Krankenhaus. Die Wunde ist dann so sicher vernarbt, daß keine besondere Vorsicht mehr geboten erscheint. Doch ist es ratsam, Kranke, deren Beschäftigung eine schwere körperliche Arbeit erfordert, noch einige Wochen davon zu befreien oder sie nur zu leichterem Dienste zu verwenden. Bei guten häuslichen Verhältnissen und bei verlässlichen Kranken kann die Entlassung auch schon früher (am 10. Tage) erfolgen.

### Starausziehung bei runder Papille.

Die Ausziehung des Stares ohne Bildung eines Koloboms bedeutet für das Auge einen großen optischen Vorteil. Ein guter Teil der Blendungserscheinungen wird durch die Fähigkeit der Pupille, sich wie im gesunden Auge bei Belichtung zusammenzuziehen, ausgeschaltet, zumal da die unverletzte Pupille alter Leute meist ziemlich eng ist. Aus diesem Grunde ist auch das Sehvermögen ohne Glas verhältnismäßig besser.

Der Schnitt wird an derselben Stelle und in gleicher Weise angelegt wie bei der Ausziehung des Stares mit Irisausschneidung. Die Eröffnung der vorderen Kapsel geschieht auch mit der Pinzette. Obwohl die Pupille vor dem Eingriff nicht erweitert wird, bietet das Aufsetzen der Pinzette und das Auffassen einer Kapsel falte mit ihr keine besonderen Schwierigkeiten. Bei enger Pupille wird, um ein größeres Kapselstück herausziehen zu können, der Pupillarrand durch die sich öffnenden Arme der Pinzette zur Seite geschoben. Gegen das Einklemmen von Regenbogenhaut mit dem hinteren Teil der Pinzettenarme schützt der früher beschriebene Hemmzapfen und ein leichtes Aufstellen der Pinzette während des Auffassens der Falte, so daß wirklich nur der gezähnte Teil der Arme in Wirksamkeit tritt.

Beim Ausdrücken findet der Linsenkern nicht selten einen Widerstand durch den steifen Ring der Pupille. Der Sphinkter und namentlich das Gewebe um ihn herum ist bei alten Leuten nicht selten von besonders starrer Beschaffenheit und daher schwer dehnbar.

Spannt sich der obere Pupillarrand über den vordrängenden Linsenkern, so kann der Gehilfe den Austritt in der Weise erleichtern, daß er mit dem Spatel den Pupillarrand über den Rand der Linse hinüberschiebt. Gelegentlich kommt es beim Durchdrücken der Linse durch die Pupille zu Einrissen des Sphinkters. Der Druck darf nicht zu kräftig sein, da sonst Vorfall des Glaskörpers zu gewärtigen ist.

Die Ausziehung ist nicht unbedingt mit runder Pupille zu erzwingen, sondern bei zu großem Widerstande ist die Regenbogenhaut auszuschneiden.

Kommt Glaskörper aus der Wunde, so wird die Regenbogenhaut ausgeschnitten, wenn sie durch ihn in die Wunde geschwemmt wurde. Meist wird sie aber dadurch gegen den Strahlenkörper zurückgeschlagen, so daß ein breites Kolobom nach oben eintritt. Durch dieses wird die Sehlinge oder das Doppelhäkchen in das Augennere eingeführt, um die Linse herauszuziehen.

Die Entfernung der Starreste geschieht durch die beschriebenen streichenden Bewegungen. Ist nach dem Ausdrücken des Linsenkernes die Pupille nach oben verzogen, so wird der durch diese Lagerung der Regenbogenhaut entstandene freie Weg zur Wunde nach oben sogleich zum Herausstreichen der Linsenreste benützt.

Die Regenbogenhaut wird schließlich mit dem Spatel in gleicher Weise zurückgestreift wie nach der Ausschneidung. Auch kann der Spatel gerade von oben durch die Mitte der Wunde in senkrechter oder schräger Richtung eingeführt werden, um von hier den Pupillarrand nach unten zu schieben.

Die Neigung der Regenbogenhaut, in die Wunde vorzufallen — ein Umstand, der in früheren Jahren die Starausziehung mit runder Pupille nur auf wenige auserlesene Fälle beschränkte —, wird durch eine schmale Ausschneidung an

ihrer Wurzel, durch eine winzige periphere Iridektomie beseitigt. Die allgemeine Einführung dieses von PFLÜGER in Bern und CHANDLER in Boston schon vor Jahren geübten Verfahrens ist HESS zu verdanken.

Nach Entbindung der Linse und Zurechtstreichen der Regenbogenhaut wird die Irispinzette, die zu diesem Zwecke in etwas kleinerer Form hergestellt wird, steil in die Wunde in der Richtung zur Iriswurzel eingeführt, mit ihr ein kleinstes Randstückchen gefaßt und dieses hart an der Pinzette abgeschnitten.



Abb. 154. Regenbogenhaut mit einer kleinen Lücke in der Peripherie.

Es entsteht eine winzige Öffnung, die oft durch den Limbus so verdeckt wird, daß sie erst beim Blick nach oben zu sehen ist (Abb. 154). Fällt sie einmal größer aus, so wird dadurch kein Schaden verursacht.

v. HESS hat für das Auffassen der Irisperipherie eine eigene Form von Iriszange angegeben (Abb. 155). Indem der Endteil ihrer Arme nach rückwärts abgelenkt ist, fällt es leicht, eine winzige Falte aufzuheben und vorzuziehen.

Nicht selten wird beim Ausschneiden dieses peripheren Irisstückchens nur das Parenchym der Iris abgetragen und das Pigmentblatt bleibt in Form eines schwarzen, nach außen umgeschlagenen Fädchens in der Wunde liegen. Dieses Pigmentfädchen soll mit dem Spatel entweder in die Kammer zurückgestreift oder gänzlich entfernt werden, denn es vermag die Wundheilung zu stören und kann später einmal eine Eingangspforte für Entzündungskeime schaffen.

Wichtig ist, daß die Linse zuerst entbunden und darauf erst die Regenbogenhaut ausgeschnitten wird. Sonst stellt sich der Linsenrand in die Lücke ein und, indem der Durchtritt des Kernes durch diese bewerkstelligt wird, ist die Gefahr eines seitlichen Einreißen der Iriswurzel gegeben. Um unmittelbar nach dem Eingriffe die Pupille durch den Tonus des Schließmuskels eng zu erhalten, wird vorher kein Atropin angewendet. Es wird aber auch auf den Gebrauch von Miotica nachher verzichtet, weil sich sonst zu oft Verlötungen des Pupillarrandes mit der Linsenkapsel einstellen und dann auch durch ausgiebige Atropinisierung die Pupille oft nicht mehr weit zu bekommen ist.



Abb. 155. Regenbogenhautzange nach v. HESS. (Nat. Größe.)

Die Vorteile dieses Verfahrens sind ganz hervorragend. Vorfälle der Regenbogenhaut tritt nur ausnahmsweise, nicht einmal in 1% der Fälle auf, selbst dann nicht, wenn sich während des Heilungsverlaufes die Wunde öffnet und das Kammerwasser abfließt. Leichte Verschiebungen des Pupillarrandes nach oben und leichte Verlötung der Irisperipherie mit der Narbengegend sind allerdings nicht gar so selten. Ein weiterer Vorteil besteht in der leichteren Entfernung der Linsenreste. Während sich diese bei unversehrter Regenbogenhaut, durch die Streichbewegungen nach oben verschoben, hinter ihr ansammeln, können sie nunmehr durch die Randlücke entweichen. Auch glaukomatöse Zustände sind in diesen Augen seltener als nach Ausziehung ohne Randausschneidung.

Es können daher nach diesem Verfahren ungleich mehr Augen mit runder Pupille von dem Stare befreit werden als früher. Trotzdem soll dieses Verfahren

aber nicht auf alle Augen mit Altersstar wahllos angewendet werden. Komplizierte Stare, Stare bei sehr schlecht haltenden, stark zwickenden und unruhigen Kranken, bei sehr alten Leuten u. dgl. werden immer am besten mit Ausschneidung aus der ganzen Breite der Regenbogenhaut ausgezogen werden.

Aber die Randausschneidung gestattet uns, zahlreichen Augen eine runde Pupille zu erhalten, wo dies zu versuchen früher durch verschiedene Umstände (z. B. Schlaffheit der Regenbogenhaut mit Neigung zu Vorfall) nicht angezeigt gewesen wäre, oder wo nach dem Eingriffe mit runder Pupille die Regenbogenhaut nachträglich wegen Vorfalles ausgeschnitten werden mußte.

In der Nachbehandlung hat bei wiederhergestellter Kammer schon am Tage nach dem Eingriffe mit dem Einträufeln von Atropin begonnen zu werden, um die Bildung von hinteren Synechien zu verhindern und die Kapselöffnung für die Aufsaugung der Linsenreste frei zu erhalten. Kräftiger als die Lösung wirkt das Einstreichen einer 1—3%igen Atropinsalbe in den Bindehautsack.

### Zwischenfälle und Fehler bei der Starausziehung.

Sie sollen beschrieben und eingeteilt werden nach den einzelnen Teilhandlungen, bei denen sie vorkommen.

#### 1. Festhalten des Auges.

Die Bindehaut alter Leute ist oft sehr zerreilich, so da die Pinzette unmittelbar nach dem Anfassen ausreißt. Wurde ohne vorherige Anlegung der Zgelnaht der Schnitt schon begonnen, so mu, wenn die Bindehaut beim Anfassen an einer anderen Stelle auch zerreißt, ein Muskelansatz mit der Pinzette gefat werden, entweder der Ansatz des unteren oder des oberen Geraden; es sei denn, da der Kranke von selbst nach unten schaut, so da der Schnitt ohne weiteres Festhalten vollendet werden kann. Auf keinen Fall darf das Messer in der Vorderkammer zum Stillstand kommen, da sonst das Kammerwasser abfließt und die Regenbogenhaut in das Messer fllt. Reißt die Pinzette aus, bevor der Schnitt begonnen wurde, so hat das Festhalten an einem Muskelansatz den Nachteil, da sich beim Einstiche mit dem Messer das Auge stark rollt. Unter diesen Umstnden ist es daher besser, das Auge mit der spitzzahnigen Hakenpinzette nach ELSCHNIG festzuhalten. Indem die scharfen Zhne dieser Zange in das Gewebe der Lederhaut hineingedrckt werden, ist das Festhalten des Auges unabhngig von der Bindehaut mit Sicherheit gewhrleistet.

Es ist einer der grten Vorzge der Zgelnaht, da die Pinzette an der Bindehaut keinen Zug mehr auszuben braucht, da durch die Naht allein schon das Auge nach unten gedreht wird. Infolgedessen kommt es fast nicht mehr zum Zerreien der Bindehaut, und wenn sie zerreißt, kann man den Schnitt zu Ende zu fhren, ohne da man an anderer Stelle eine Fixation zu finden sucht.

#### 2. Der Schnitt.

Die Fehler beim Schnitte knnen betreffen:

- A. die Lage,
- B. die Lnge,
- C. die Art, wie er ausgefhrt wird.

A. Die wesentlichsten Fehler, die die Lage des Schnittes betreffen, lassen 4 Hauptformen erkennen: die ersten beiden kommen durch eine falsche Lage der Stelle des Ausstiches zustande, indem dieser entweder vom Limbus zu weit ab in der Lederhaut (häufigster Fehler) oder vor ihm in der durchsichtigen Hornhaut angelegt wird; die beiden anderen aber sind die Folge der Führung des Messers in einer falschen Ebene während des Schnittes, indem es von der Ebene des Limbus herausgedreht wurde, entweder nach rückwärts (lederhautwärts, häufigster Fehler) oder nach vorwärts (hornhautwärts). Diese beiden letzten Fehlerarten sind demgemäß grundsätzlich unabhängig von der Lage der Ein- und Ausstichstelle und finden sich nicht selten auch bei richtiger Lage beider. Begreiflicherweise aber finden sich Fehler der ersten Art in der Lage der Ausstichstelle nicht selten vergemeinschaftet mit solchen der zweiten. Die folgenden Skizzen (Abb. 156—159) zeigen die Fehler in übersichtlicher Weise, wobei  $e$  die Einstichstelle,  $a$  die Ausstichstelle und die ausgezogenen Linien den fehlerhaften Schnitt darstellen.

Fehler im Anlegen der Einstichöffnung kommen im Gegensatz zum Ausstiche nur ausnahmsweise vor. Es fallen eben die Umstände weg, die, wie schon kurz erwähnt, beim Ausstiche störend eingreifen und den wenig Geübten irreführen. Wer weiß, daß der Einstich knapp hinter dem Limbus vorgenommen zu werden hat, wird dies auch an richtiger Stelle treffen, zumal da genug Zeit zur Verfügung steht, den richtigen Ort auszusuchen. Der Anfänger ist nur geneigt, den Einstich etwas zu hoch (d. h. zu weit entfernt vom waagrechten Meridian) anzulegen. Dadurch wird der Schnitt im ganzen zu kurz. Die Entfernung der Einstichstelle vom waagrechten Meridian soll daher im allgemeinen nicht über  $1\frac{1}{2}$  mm betragen und darf nur in Ausnahmefällen (geringeres Alter des Kranken, kleinerer Linsenkern) höher verlegt werden.

Bevor auf die einzelnen oben angedeuteten Fehlerarten genauer eingegangen wird, sollen noch jene Fehler kurz besprochen werden, die sich nicht selten schon beim Durchführen des Messers durch die vordere Kammer einstellen und zu unangenehmen Verwicklungen Veranlassung geben. Sie sind teilweise schon früher erwähnt worden. Jedes Einhalten, „Stehenbleiben“ mit dem Messer führt zum Aussickern von Kammerwasser und damit zum Vorrücken der Regenbogenhaut, die alsbald unter die Schneide des Messers gerät. Noch schneller muß dieses Ereignis eintreten, wenn das Messer etwas zurückgezogen wird. Dazu sieht sich der Anfänger meist durch den Umstand veranlaßt, daß sich die Spitze des Messers in einige vorstehende Fasern des Irisgewebes verfangen hat. Es sei hier also nochmals die ausdrückliche Anweisung gegeben, das Messer trotz eines solchen Ereignisses unbeirrt weiterzuführen, selbst wenn seine Spitze schon Irisgewebe aufgefaßt hat. Waren nur einige Fasern aufgespießt worden, so werden sie beim weiteren Vorschieben des Messers alsbald zerschnitten. So wird die Regenbogenhaut meist frei, ohne eine Folge der Verletzung zu zeigen. Drang aber das Messer schon durch die ganze Dicke der Regenbogenhaut, so ist damit allerdings das Ausschneiden des Irisstückes mit dem Messer beim weiteren Fortschritt des Schnittes unvermeidlich geworden und damit die Bildung eines meist unerwünscht großen Koloboms. Würde aber das Messer zurückgezogen, so würde die Lage dadurch nur verschlechtert und bei neuem Versuche, das Messer vorzuschieben, die Regenbogenhaut in noch größerer Ausdehnung verletzt werden.

Ein vollständiges Herausziehen des Messers aus der Kammer und damit ein Aufgeben der Starausziehung am selben Tage ist nur angezeigt in dem Falle, daß die aufgespießten Irisfasern beim Vordringen des Messers nicht durchschnitten werden. Denn dadurch wird mit ihnen die ganze Regenbogenhaut von ihrem Ansatz weggezerrt und schließlich abgerissen. Die schlimmen Folgen einer ausgedehnten Iridodialyse berechtigen die Unterbrechung des Eingriffes zur Vermeidung dieser Verwicklung.

Zwei Umstände sind es, die beim Anfänger nicht selten das Aufspießen der Regenbogenhaut beim Einführen des Messers veranlassen, während der Geübte nur selten — wenn z. B. ein Star im Zustande der Quellung und bei seichter Kammer auszuziehen ist — davon betroffen wird. Der Grund liegt teils in einer fehlerhaften Haltung des Messers, indem es mit seiner Spitze beim Einstich zu weit nach rückwärts gerichtet wird und daher beim Eintritt in die Kammer in das Irisgewebe eindringen muß, teils in einer nicht genügenden Schnelligkeit der Schnittführung, wodurch das Kammerwasser Zeit findet zu entweichen, bevor das Messer durch die Kammer hindurch und genügend weit nach oben geglitten ist.

Über die Fehlerart Ia.

Wie der fehlerhafte Ausstich nach dieser Grundform zustande kommt, wurde schon in der Beschreibung des richtigen Ausstiches dargestellt. Desgleichen wie der Fehler vermieden wird. Die Außenöffnung des Ausstiches kann sogar bis über 3 mm hinter dem Limbus verlagert sein. Der ganze Schnitt bekommt dadurch eine abweichende Lage. Der eine Teil kommt in die Lederhaut zu liegen, der andere Teil dagegen meist in die durchsichtige Hornhaut (Abb. 156), da häufig der natürlich nutzlose Versuch gemacht wird, durch eine Drehung der Messerschneide nach vorne den Schnitt in die richtige Lage zu bringen, d. h. in den Limbus zu verlegen.

Eine Reihe schwerer Nachteile entspringen diesem Fehler: 1. Die Blutung ist infolge der Verletzung von ciliaren Gefäßzweigen meist sehr beträchtlich, wodurch der so wichtige Einblick in die vordere Kammer bei den folgenden Schritten des Eingriffes unmöglich gemacht wird. 2. Fast immer fällt die Regenbogenhaut in das Messer; oft wird auch die Linsenkapsel dabei verletzt. Während nämlich das Messer — bei richtiger Anlage des Ein- und Ausstiches knapp hinter dem Limbus — in genügender sagittaler Entfernung von der Regenbogenhaut bleibt, kommt es bei peripherem Schnitt so nahe an sie heran, daß schon ein geringes Abfließen von Kammerwasser sie in die Schneide des Messers schwemmen muß. 3. Die Verletzung der Regenbogenhaut sowie das Durchschneiden von in der Lederhaut gelegenen ciliaren Nervenstämmchen, die dem Einfluß des Cocains nicht mehr zugänglich waren, lösen Schmerzempfindungen aus, die den Kranken unruhig machen. Das Kammerwasser entweicht vorzeitig, und damit wird eine Verletzung der Regenbogenhaut und Linse begünstigt.

Wird dann außerdem noch der Fehler begangen, mit der Haltezange auf das Auge zu drücken, so wird schon während des Schnittes oder unmittelbar darnach außer der Linse auch der Glaskörper hervorgepreßt und damit die Starausziehung unerwünscht schnell beendet.

Ist die Messerspitze beim Vorschieben schon zu weit gegen den Kammerwinkel gelangt, ohne den Ausstich an richtiger Stelle begonnen zu haben, so



Abb. 156. Fehlerhafter Ausstich in der Lederhaut (Ia).

wird durch Senken des Messergriffes gegen die Schläfe die Messerspitze senkrecht gegen die Lederhaut aufgestellt und in dieser Richtung der Ausstich vorgenommen. Durch diese Richtungsänderung des Messers, die einen senkrechten Verlauf des Durchstiches bewirkt, wird die Außenöffnung näher an den Limbus herangebracht.

Viele nehmen den Ausstich grundsätzlich in dieser Weise vor, daß sie die Messerspitze bis hinter den Limbus führen und dann steil von innen nach außen durchstechen. Soll diese Änderung in der Richtung der Messerstellung trotz des dabei eintretenden Klaffens der Einstichöffnung ohne Verlust von Kammerwasser vor sich gehen, so muß sie rasch vorgenommen werden. Dieses Verfahren ist daher für den Anfänger weniger empfehlenswert als das eingangs beschriebene.

Über den Fehler Form Ib: Der Ausstich in der durchsichtigen Hornhaut (Abb. 157).

Nicht selten ist er die Folge des Bestrebens, den eben geschilderten Fehler zu vermeiden. Gelegentlich kommt er dadurch zustande, daß das Hornhautspiegelbild durch zufällige Lage an dieser Stelle einen hindert, die Messerspitze in Sicht zu halten, ein Umstand, auf den schon vor Beginn des Schnittes Rücksicht zu nehmen ist, indem das Auge in eine solche Stellung gebracht wird, daß das Hornhautspiegelbild nicht stört.




Abb. 157. Fehlerhafter Ausstich in der Hornhaut (I b).

Eine geringe Entfernung des Ausstiches vom Limbus richtet keinen Schaden an. Bei stärkerer Verlagerung aber stellen sich schwere Nachteile ein.

1. Je weiter entfernt vom Limbus in der Hornhaut der Ausstich gelegen ist, um so kürzer wird der Schnitt und um so schwieriger damit die Entbindung des Linsenkernes.

2. Die rein corneale Lage des Schnittes hat eine Reihe von Störungen in der Heilung der Wunde zur Folge; es fehlt der deckende, die Wunde rasch abschließende Bindehautlappen; die Verklebung der Wundränder ist wegen des Mangels einer Blutung ungenügend, zumal da häufig das Oberflächenepithel sehr rasch über die Wundränder hinüberwächst. Die Heilung wird durch diese Vorgänge verzögert, die vordere Kammer bleibt nicht selten längere Zeit aufgehoben oder hebt sich unter leisen Traumen, wie Öffnen der Lider, sei es von selbst oder beim Reinigen und Einträufeln des Auges geschehen, wieder auf, selbst noch nach Wochen. Ein leichtes Klaffen, besonders der oberflächlichen Lagen der Wunde, läßt oft noch lange Zeit eine Furche an der Stelle des Schnittes erkennen, die wegen des Epithelüberzuges glänzt.

3. Der Randbezirk der Regenbogenhaut (zwischen Wurzel und Hornhautwunde) bleibt bei der Bildung des Koloboms im Auge zurück und legt sich, namentlich bei Verzögerung der Wiederherstellung der vorderen Kammer, an die hintere Hornhautfläche an. So kann der Boden für die Entwicklung eines Sekundärglaukoms geschaffen werden. Durch das lange Aufgehobensein der vorderen Kammer kann es auch zur Anlagerung eines oder beider Kolobomschenkel an die hintere Hornhautwand in der Gegend des Schnittes kommen.

4. Auf die Möglichkeit der Einwanderung des Epithels in die vordere Kammer mit seinen üblen Folgen sei zum Schluß kurz hingewiesen.

### Über den Fehler Form IIc:

Von der in unserer Beschreibung als einzig richtig bezeichneten Lage, die einem Kreisbogen entspricht, der parallel zum Limbus, knapp hinter ihm, verläuft, weicht der Schnitt des Anfängers fast ausnahmslos nach rückwärts, lederhautwärts ab. Dieser Fehler kommt, wie schon einleitend erwähnt, dadurch zustande, daß das Messer, anstatt in einer dem Limbus parallelen Ebene nach oben geführt zu werden, mit der Schneide nach rückwärts aus dieser Ebene herausgedreht wird. So kann, auch wenn Ein- und Ausstich in richtiger Entfernung knapp hinter dem Limbus angelegt wurden, der oberste Teil des Schnittes mehrere Millimeter hinter dem Limbus zu liegen kommen (Abb. 158). Fleißiges Üben am Schweinsauge ist das beste Mittel, das Messer parallel zur Ebene des Limbus führen zu lernen. Alle beim Fehler Form Ia besprochenen Nachteile des zu weit in der Lederhaut angelegten Schnittes haften auch diesem an. Er ist deswegen unbedingt zu vermeiden.




Abb. 158. Fehlerhafte Lage des Schnittes in der Lederhaut (IIc).

### Über den Fehler Form II d:

Wird das Messer mit seiner Schneide zu weit nach vorne gedreht, so kommt der Schnitt gänzlich in die Hornhaut zu liegen, und zwar um so mehr, je größer der Winkel der Drehung war (Abb. 159). Die Nachteile eines solchen Schnittes wurden schon bei Fehler Form Ib besprochen. Der Schnitt gerät bei dieser Lage zu kurz. Außer durch die Kürze des Schnittes wird die Linsenentbindung dabei ferner noch dadurch erschwert, daß der obere Linsenrand bei dem Herausdrücken erst nach einer größeren Drehung die Hornhautwunde erreicht. Demgemäß muß ein stärkerer Druck angewendet werden, womit die Gefahr des Auspressens von Glaskörper wächst.




Abb. 159. Fehlerhafte Lage des Schnittes in der Hornhaut (II d).

B. Die Neigung des Anfängers, den Schnitt zu kurz anzulegen, wurde schon bei Besprechung des Einstiches (siehe S. 208) angeführt. Nach zu hoch vorgenommenem Einstiche könnte der Fehler wenigstens etwas noch verbessert werden durch Senken der Messerspitze während des Durchschiebens des Messers durch die vordere Kammer, so daß der Ausstich etwas weiter nach unten, näher dem waagrechten Meridian zu liegen kommt. Der Schnitt würde dadurch zwar etwas nasal verlagert werden, aus welchem Umstände aber keinerlei Nachteile erwachsen, insbesondere dann nicht, wenn der Eingriff ohne Ausschneidung der Regenbogenhaut vorgenommen wird.

Die durch die korneale Lage des Ausstiches oder des gesamten Schnittes hervorgerufene Verkürzung wurde schon besprochen, ebenso wie die Umstände, wo es erlaubt ist, den Schnitt kürzer als durchschnittlich anzulegen. Zur Beurteilung der notwendigen Länge des Schnittes muß auch der Hornhautdurchmesser des Auges in Betracht gezogen werden. Bei ungewöhnlich kleiner Hornhaut wird der Schnitt näher dem waagrechten Meridian beginnen müssen, um genügend lang zu werden.

C. Auf die Fehler in der Art, wie der Schnitt gemacht wird, mußte schon bei der Beschreibung, wie der Schnitt in richtiger Weise vorgenommen zu werden hat, wiederholt hingewiesen werden. An erster Stelle ist die *mangelhafte Ausnützung der Gesamtlänge* der Messerschneide anzuführen, d. h. der Fehler der Verwendung

eines nur kurzen Stückes der Schneide, wodurch kurz sägende Bewegungen entstehen. Das Messer muß dann wiederholt hin- und hergeführt werden, bis der Schnitt vollendet ist. Der Fehler setzt, wie schon vorher beschrieben, gewöhnlich schon unmittelbar nach dem Ausstiche ein, wenn nämlich darnach das Messer nicht, wie es sein sollte, in derselben Richtung vor- und gleichzeitig nach oben dringend, mit dieser einen Bewegung einen großen Teil des Schnittes ausführt und auf jeden Fall so weit nach oben gelangt, daß seine Schneide den oberen Pupillarrand überschritten hat; wenn vielmehr das Messer, kaum daß seine Spitze zum Vorschein gekommen ist, den Schnitt in entgegengesetzter Richtung einleitet, indem es zurückgezogen wird. Da aber dabei fast nichts von der Schneide zur Verfügung steht, muß das Messer sofort wieder vorgestoßen werden, der Fehler wiederholt sich immer wieder von neuem und das Ergebnis ist ein kümmerliches Sägen anstatt eines glatten Schnittes. Vorzeitiger Verlust des Kammerwassers und damit Verletzung der Regenbogenhaut ist die nächste Folge dieses Fehlers.

Diese beiden Zwischenfälle werden auch *durch einen fehlerhaften Druck* begünstigt, der mit dem Messer *nach rückwärts* gegen die Lederhaut ausgeübt wird, indem der Anfänger die Schwere seiner Hand auf dem Messer lasten läßt. Denn dadurch muß die Wunde zum Klaffen gebracht werden.

Der Fortschritt im Schneiden kann auch deswegen ungenügend sein und dadurch ein oftmaliges Hin- und Herziehen des Messers nötig werden, weil die nach *oben wirkende* Komponente der Kraft in *nicht genügender* Stärke angewendet wurde.

Alle diese Fehler rufen in ihrer Wirkung in einem in der Beurteilung wenig geübten Zuschauer den falschen Eindruck hervor, als ob ein stumpfes Messer in Verwendung stünde, und auch der unerfahrene Führer des Schnittes unterliegt dieser Täuschung, anstatt sich selbst anzuklagen.

Vorzeitiges Abfließen des Kammerwassers und damit Verletzung der Regenbogenhaut kann auch durch heftiges Kneifen des Kranken während des Schnittes hervorgerufen werden, wenn der Eingriff ohne Akinese gemacht wird.

Der Geübte kann sich gelegentlich erlauben, von den angegebenen Regeln über die Messerbewegung abzugehen; z. B. bei zu weit in die Hornhaut geratendem Ausstiche das Messer zurückzuziehen und an die richtige Stelle vorzuführen. Aber auch er wird dabei nicht selten die angeführten Zwischenfälle eintreten sehen.

Als seltene Ereignisse beim Starschnitt mögen noch erwähnt werden:

*Einführen des Messers mit nach unten gerichteter Schneide.* Der Übelstand wird meist erst nach dem Ausstiche entdeckt, wenn die Unmöglichkeit des Schneidens zutage tritt. Aber selbst wenn nur der Einstich in dieser Messerstellung gemacht worden ist, hat auch der Ausstich noch in dieser Lage des Messers vorgenommen zu werden, worauf mit großer Schnelligkeit das Messer um seine Längsachse um  $180^\circ$  gedreht werden muß, und zwar so, daß die Schneide des Messers die Richtung nach vorne, gegen die Hornhaut einschlägt. Unmittelbar nach vollzogener Drehung des Messers muß der Schnitt rasch fortgesetzt werden. Das Ereignis ist für die Hornhaut von keinerlei Folgen begleitet und bei genügend schnellem Vorgehen kann sogar Kammerwasserabfluß und daraus folgende Verletzung der Regenbogenhaut vermieden werden.

*Intralamellärer Schnitt.* Sowohl bei dem Ein- und Ausstich kann es, besonders bei seichter Kammer, geschehen, daß das Messer, wenn dessen Spitze zu sehr

nach vorne gerichtet war, eine Strecke weit zwischen den Lamellen der Hornhaut dahingleitet. Die Schnittöffnung wird dadurch entsprechend verkürzt. Wird das Vorschieben auf falschem Wege bemerkt, noch ehe die Spitze des Messers in die Kammer eingedrungen ist, so darf das Messer zurückgezogen und der Einstich an richtiger Stelle vorgenommen werden. Sonst ist der Eingriff weiterzuführen und der Schnitt mit Scherenschlägen zu erweitern, wenn er wegen seiner Kürze den Austritt des Linsenkernes nicht gestatten sollte.

*Aufstellen des Messers, bevor die Lederhaut durchtrennt ist.* Wird das Messer, noch bevor es unter der Bindehaut erscheint, aufgestellt, so wird dadurch der Schnitt in dem betreffenden Bereiche vom Bogen zur Sehne abgeflacht und dadurch in unerwünschter Weise unregelmäßig und hornhautwärts verlagert. Da das Aufstellen des Messers nur den Zweck hat, den Bindehautlappen nicht zu lang geraten zu lassen, hat es erst nach Durchtrennung sämtlicher Schichten der Lederhaut vorgenommen zu werden.

Unangenehme Zwischenfälle können durch eine *zu große Biegsamkeit des Messers* verursacht sein. Wer schmale und feine GRAEFESCHE Messer den breiten und kräftigen vorzieht, wird solchen Zufälligkeiten gelegentlich begegnen. Besonders beim Ausstiche kann die Lederhaut der eindringenden Messerspitze einen solchen Widerstand entgegensetzen, daß eine Krümmung des Messers innerhalb der Kammer — meist mit der Konvexität nach vorne — zustande kommt. Dadurch dringt die Spitze des Messers bei weiterem Vorschieben in geänderter Richtung vor und kann mehrere Millimeter hinter dem Limbus zum Vorschein kommen. Auch ein Verbiegen (oder Abbrechen) der Spitze eines feinen Messers während des Einstiches kann zu einem unberechenbaren schrägen Vordringen des Messers während des Ausstiches Veranlassung geben.

Zum Schlusse seien noch der Frage einige Worte gewidmet, mit welcher Hand der Schnitt geführt werden soll. Der Schnitt mit der linken Hand bietet dem, der nicht von Natur Linkshänder ist, durchaus nicht so große Schwierigkeiten, als gemeinhin angenommen wird. Dem Anfänger sei geraten, von vornherein beide Hände zu üben. Wer nur die rechte Hand verwenden will, muß sich zur Ausführung des Schnittes am rechten Auge hinter den Kranken stellen. Viele nehmen bei allen Eingriffen diese Stellung ein und müssen daher auch abwechselnd die rechte und linke Hand benutzen. Dabei muß sich der Arzt über den Kranken beugen: ein Umstand, der trotz Verwendung von Kappe und Gesichtsmaske für die Asepsis der Wunde nicht gerade am günstigsten ist.

Da sich bei jeder Starausziehung die Notwendigkeit einstellen kann, Regenbogenhaut auszuschneiden, wird der Schnitt fast immer nach oben angelegt, um das Kolobom durch das obere Lid zur Deckung zu bringen. Anzeigen für den Starschnitt nach unten sind gegeben durch eine Ptosis (meist Ptosis amyotrophica alter Leute), wenn sie soweit vorgeschritten ist, daß die Pupille durch das Lid bereits verdeckt wird. Eine schmale Iridektomie nach unten vermag die Pupille wieder in das Lidspaltengebiet zu verlagern.

### 3. Die Ausschneidung der Regenbogenhaut.

Die Ausschneidung wird gewöhnlich nicht besonders schmerzhaft empfunden, da das in den Bindehautsack eingeträufelte Cocain in nicht entzündeten Augen auch auf die Regenbogenhaut genügend wirkt.

Wird durch eine Blutung aus dem Schnitt in die vordere Kammer der Einblick verdeckt, so muß die Regenbogenhaut aufgefaßt werden, ohne sichtbar zu sein.

Durch die Anwendung der Zügelnaht sind jetzt auch alle Schwierigkeiten beseitigt, die sich bei der Ausschneidung der Regenbogenhaut früher oft dadurch ergaben, daß ungeschickte Kranke nicht nach unten oder daß sie planlos herumblickten; denn dann gelang es nur mit Mühe, die Regenbogenhaut mit einem stumpfen Häkchen hervorzuholen, nachdem es in passender Weise gebogen worden war. Es ist durch die Zügelnaht auch überflüssig geworden, bei solchen unruhigen Leuten das Auge mit der Zange zu halten, um die Regenbogenhaut ausschneiden zu können. Das Auffassen mit der Zange bringt die Wunde zum Klaffen und ist daher nach Möglichkeit zu vermeiden.

Bewegt der Kranke nach dem Auffassen der Regenbogenhaut mit der Pinzette plötzlich das Auge oder den Kopf, so wird sie an ihrem ciliaren Ansatz abgerissen, wenn sie nicht rasch genug durch Öffnen der Pinzette freigegeben worden ist. Der Zwischenfall ist regelmäßig von einer starken Blutung gefolgt, die die weiteren Eingriffe sehr erschwert. Die Pinzette muß daher raschestens geöffnet und die Regenbogenhaut losgelassen werden, sobald der Kranke das Auge zu bewegen beginnt.

Ist sie beim Schnitte ins Messer gefallen, so wird gewöhnlich ein breites Stück ausgeschnitten, das entweder gleich in die Wunde vorfällt und von dort nur mit der Pinzette weggehoben zu werden braucht, oder aber erst aus der vorderen Kammer hervorgeholt werden muß. Nur wenn es an einer Stelle noch mit der übrigen Regenbogenhaut zusammenhängt, muß es dort abgeschnitten werden.

Hatte sich nur der Randbezirk der Regenbogenhaut ins Messer gelegt, so braucht die stehengebliebene Sphinkterbrücke nicht hervorgeholt und ausgeschnitten zu werden. Das Hervorziehen der Brücke zur Ausschneidung gelingt am leichtesten mit dem stumpfen Häkchen, indem dieses hinter der Brücke bis in die Pupille vorgeschoben wird. Wird die Brücke belassen, so tritt bei der Entbindung der Linse der Kern meist durch das Kolobom aus, wobei die Brücke nicht selten einreißt.

**Starausziehung nach WENZEL.** Ist nach einer schweren Iridocyclitis die Regenbogenhaut durch eine Schwarte flächenhaft mit der getrübten Linse verwachsen, so kann der Star nach dem Verfahren von WENZEL ausgezogen werden.

Das Messer wird beim Einstich sofort hinter die Regenbogenhaut geführt, so daß sie beim Ausstich des Messers von hinten nach vorne durchstoßen wird. Mit dem Schnitte durch die äußeren Hüllen des Auges wird daher auch ein bogenförmiger Schnitt durch die Regenbogenhaut angelegt und auch die vordere Linsenkapsel eröffnet.

Darauf wird die Linse in der gewöhnlichen Weise entbunden. Mit der WECKERschen Schere werden nun 2 konvergierende radiäre Schnitte durch das ganze Diaphragma (Regenbogenhaut, Schwarte und Linsenkapsel) geführt, die sich in der Pupille treffen. Das spitze Blatt der Schere bleibt in der vorderen Kammer, das stumpfe wird hinter das Diaphragma gebracht. Das so umschnittenen Stück der Membran wird dann mit einer feinen Irispinzette gefaßt und herausgezogen. Auf diese Weise wird ein breites Kolobom erzielt.

Dieses Verfahren wird heute kaum mehr verwendet, vielleicht auch deswegen, weil seltener so schwer veränderte Augen zur Starausziehung kommen. Es gelingt fast immer auch in solchen Augen die Linse in der gewöhnlichen, also in viel weniger eingreifender Weise zu entbinden. Fast immer ist schon früher Regenbogenhaut ausgeschnitten worden. Auch ist es fast immer möglich, die Linsenkapsel im Bereiche der Pupille und des Koloboms mit der Zange herauszuziehen. Natürlich hat sich dann später noch der Eingriff gegen den Nachstar anzuschließen.

#### 4. Die Kapseleröffnung.

Wir ziehen trotz der etwas schwierigeren Handhabung die Kapselpinzette dem Cystotom vor und machen nur in bestimmten Ausnahmefällen von diesem oder von dem scharfen Häkchen Gebrauch. Da die vordere Kapsel im Bereiche der Pupille auf jeden Fall ein optisches Hindernis ist, hat sie entfernt zu werden. Auf die weitgehende Aufsaugung von Linsenresten beim Vorhandensein einer großen Öffnung in der Kapsel wurde schon oben hingewiesen. Die Umstände, die die Anwendung der Pinzette für den Anfänger nicht rätlich erscheinen lassen, sind folgende: Mangelnder Überblick infolge Verdeckung der Regenbogenhaut und Pupille durch Blut: die Pinzette könnte alsdann eine Falte der Regenbogenhaut auffassen und herausziehen. Auch bei unruhigen Kranken ist von dem noch wenig Geübten das Häkchen vorzuziehen; desgleichen, wenn die Pupille bei Ausführung des Eingriffes ohne Ausschneidung von Regenbogenhaut sehr eng ist, damit nicht etwa die Regenbogenhaut mit in die Pinzette eingeklemmt werde. Ist ferner die Linse stark gebläht und dadurch die Kapsel gespannt, so kann sie der Kapselpinzette einen für den erlaubten Druck zu großen Widerstand bereiten. Läßt sich nicht bei leisem Drucke eine Falte zwischen die Zähne der Pinzette einklemmen, so soll die Eröffnung mit dem Häkchen geschehen, da durch einen zu starken Druck ein Vorfall des Glaskörpers herbeigeführt werden könnte.

Auch bei verdickter Kapsel erfordert die Anwendung der Pinzette Vorsicht. Es ist aus optischen Gründen gewiß vorteilhaft, die verdickte vordere Kapsel aus dem Pupillargebiet zu entfernen. Wenn nun dem Zuge der Kapselpinzette die verdickte Kapsel mehr Widerstand bietet, als die in solchen Fällen häufig schadhafte Zonula Zinnii, so reißen deren Fasern und die ganze Linse in ihrem Sacke wird aus dem Auge herausgezogen. Der Austritt der Linse wird durch Niederdrücken des Lederhautwundrandes mit einem Spatel erleichtert. Denn sonst reißt durch den sich hier entgegenstellenden Widerstand die Kapsel schließlich doch ein, während die halbluxierte Linse im Auge zurückbleibt. Bei ruhigem Verhalten des Kranken und gesunder Beschaffenheit des Glaskörpers ist eine solche Ausziehung der Linse in der Kapsel nicht von einem Vorfall des Glaskörpers gefolgt. Freilich ist er häufig nicht zu vermeiden. Gelingt die Ausziehung mit der Kapsel, so ist das Endergebnis ausgezeichnet, weil die Pupille frei von allen Resten ist.

#### 5. Die Entbindung der Linse.

Wird der Druck durch das untere Lid zu hoch ausgeübt, etwa gegen die Mitte der Hornhaut, so wird aus Gründen, die selbstverständlich sind, umsonst auf das Erscheinen der Linse in der Wunde gewartet werden. Nun kann es

aber geschehen, daß sich der Linsenkern trotz eines in richtiger Weise und in richtiger Stärke ausgeübten Druckes nicht in die Wunde einstellt. Die Ursachen können gelegen sein in nicht genügender Länge der Wunde, in dem Widerstand des Sphinkters, in der Nichteröffnung der vorderen Kapsel, in einer Subluxation der Linse, in verringerter Größe des Linsenkernes.

Ist die Wunde zu klein, so stemmt sich bei dem Versuche des Herausdrückens der Linsenkern zwar gegen die Wunde, kann aber nicht durch sie hindurchgleiten. Gelingt die Entbindung unter vorsichtiger Steigerung des angewendeten Druckes nicht, so muß der Schnitt mit einer kleinen gekrümmten Schere entweder an einem oder an beiden Enden verlängert werden, wobei das eine stumpfe Blatt der Schere vorsichtig zwischen Hornhaut und Regenbogenhaut in den Kammerwinkel vorgeschoben wird, während das andere außerhalb des Auges bleibt. War wirklich die Kürze des Schnittes die Ursache der Behinderung des Linsenaustrittes, so schlüpft nach der Einschneidung der Kern leicht aus dem Auge.

Es kann auch sein, daß der Schnitt zwar an sich genügend lang, der Linsenkern aber ausnahmsweise groß ist. Daher soll in Fällen von *Cataracta nigra* der Schnitt von vornherein größer angelegt werden. Bei den Schnitten, die wegen ihrer Lage in der durchsichtigen Hornhaut nicht genügend lang wurden, hilft noch ein anderer Umstand mit, den Linsenaustritt zu erschweren. Je weiter nämlich der Schnitt vom Limbus in die Hornhaut hineinrückt, um so mehr muß sich der Linsenrand, um sich in die Wunde einzustellen, nach vorne drehen, d. h. ein um so stärkerer Druck auf das Auge beim Herausdrücken ist erforderlich und um so größer ist infolgedessen die Gefahr des Glaskörpervorfalles. Auch hier muß zur Erleichterung des Linsenaustrittes durch seitliche Einschnitte entlang dem Limbus der Schnitt verlängert werden.

Gleiches gilt für einen durch intralamellären Verlauf zu kurzen Schnitt.

Der Einfluß des Widerstandes des Sphinkters auf den Austritt der Linse wurde bei Besprechung der Starauszziehung ohne Iriassausschneidung eingehend gewürdigt.

Wurde die vordere Linsenkapsel nicht eröffnet, so kann der Linsenkern nicht die erwartete Drehung machen. Der Anfänger sollte es sich zur Regel machen, bei der Kapseleröffnung die mit der Pinzette aufgehobene Falte zu beobachten und sich beim Herausziehen der Pinzette aus dem Auge von dem Vorhandensein eines Kapselstückes zwischen den Armen der Pinzette zu überzeugen. Besteht aber nicht volle Sicherheit, die Kapsel genügend eröffnet zu haben, so soll die Pinzette wieder eingeführt oder das Cystotom angewendet werden.

Verschiebung der Linse, und zwar gewöhnlich eine leichte Subluxation nach oben, mag gelegentlich durch das Ziehen an der Kapsel mit der Pinzette zustande kommen, vielleicht auch durch die Zerrung der Augenhüllen beim Schnitte, oder auch durch einen in falscher Richtung ausgeübten anfänglichen Druck, der die Linse nach oben verschob, anstatt sie um ihre waagrechte Achse zu drehen. Bei dieser Lage der Linse hat der mit dem Finger ausgeübte Druck keinen Einfluß mehr auf ihre Stellung, er wirkt vielmehr nur auf den Glaskörper. Die Linse dreht sich nicht mit ihrem oberen Rande in die Wunde und eine Verstärkung des Druckes würde den Glaskörper in die Wunde pressen und die

Linse vollends in den Glaskörper luxieren. Die Entbindung der Linse kann nur dadurch bewerkstelligt werden, daß sie in ihre ursprüngliche Lage zurückgebracht wird. Zu diesem Behufe wird ein Spatel durch die Wunde in die vordere Kammer eingeführt, auf die vordere Linsenfläche aufgesetzt und die Linse nach abwärts in ihre richtige Lage geschoben. Nach diesem Eingriffe hat der erneute Druckversuch sofort den gewünschten Erfolg, besonders wenn durch gleichzeitiges Niederdrücken des Lederhautwundrandes mit dem Spatel die Linse verhindert wird, von neuem in die falsche Stellung zu gleiten.

Bei Subluxationen der Linse in andere Richtungen als nach oben, z. B. nach außen oder innen, bleibt meist nichts anderes übrig, als Herausholen der Linse mit Schlinge oder Doppelhäkchen.

Der Austritt des Linsenkernes gestaltet sich auch dann bedeutend schwieriger, wenn er beträchtlich verkleinert ist, wie es bei kompliziertem Star häufig und bei der Cataracta Morgagni immer der Fall ist. Man begreift, daß das Druckverfahren zwecklos ist, wenn der Kern nicht seine richtige Lage und Größe hat. Wenn die Rinde verflüssigt ist und sich nach Eröffnung der vorderen Linsenkapsel nach außen ergossen hat, sinkt der kleine Kern entweder hinunter auf den Grund des Kapselsackes oder er wurde von der hervorstürzenden Rindenflüssigkeit nach aufwärts hinter die Regenbogenhaut geführt. In keinem der beiden Fälle würde durch das regelrechte Druckverfahren ein Einfluß auf seine Lage ausgeübt werden. Daher ist von einem Drucke abzusehen. Liegt der Kern ganz unten, so wird er durch zarte streichende Bewegungen allmählich nach oben geschoben, wobei er schließlich mit dem DAVIELSchen Löffel aus der Wunde herausbefördert wird. Ist er aber nach oben hinter die Regenbogenhaut verschoben, so muß er zunächst mit dem Löffel nach unten in die Pupille gestreift und dann von hier durch leichte Streichbewegungen gegen die Wunde nach oben geleitet werden.

Einige der hier erwähnten Umstände führen gelegentlich auch zur Entbindung der Linse unter Drehung um ihre frontale Achse um  $180^\circ$ , so daß sie mit dem unteren Rande zuerst in der Wunde erscheint. Dies wird sich besonders dann ereignen können, wenn sich die Linse etwas nach oben verschoben hat und auf diese Weise ihr oberer Rand durch die Lederhaut verhindert wird, sich nach vorne zu drehen. Gewahrt der Arzt diesen Umstand nicht und erhöht den Druck auf das Auge, so wird durch den erhöhten Glaskörperdruck der untere Linsenrand nach vorne gedrängt und beginnt die Wunde aufzustellen, und wenn nun, wie oben als Regel beschrieben, die Druckrichtung geändert, d. h. mehr nach oben verlegt wird, so stürzt sich die Linse vollends und verläßt nach einer Drehung um  $180^\circ$  mit dem unteren Rande zuerst die Wunde. Auch wenn wegen Kleinheit des Kernes sein unterer Rand zu hoch steht, kann dasselbe eintreten. Das Ereignis ist immerhin selten, weil unter den angeführten Umständen meist der Glaskörper früher erscheint und zu einer anderen Art der Linsenentbindung zwingt.

*Vorfall des Glaskörpers* tritt meist erst bei der Entbindung der Linse auf, kann sich aber auch schon in jeder anderen Phase des Eingriffes einstellen. Dieses Ereignis ist weniger bedeutungsvoll, wenn es *nach* Entfernung der Linse aus dem Auge erfolgt. An dem Auge hat dann nichts weiter getan, als Sorge getragen zu werden, daß der Hornhautlappen in seiner richtigen Lage bleibt und

durch den vordrängenden Glaskörper nicht nach vorne umgebogen wird. Die Regenbogenhaut zurechtzustreichen, ist zu widerraten, da dadurch nur zu weiterem Austritte von Glaskörper Veranlassung gegeben würde. Da der Aus-



Abb. 160. WEBERSche Schlinge.

tritt des Glaskörpers gewöhnlich Schmerzen verursacht, beginnt der Kranke — wenn keine Akinese angewendet worden ist — zu zwicken,

wodurch noch mehr Glaskörper aus dem Auge herausgepreßt wird. Dabei besteht die Gefahr, daß das obere Lid in die aufgestellte Wunde gerät und den Lappen nach vorne kehrt. Es ist also sofort nach Erscheinen des Glaskörpers das



Abb. 161. REISINGERSches Doppelhäkchen.

zu schließen, indem das obere Lid sorgfältig, wenn notwendig mit dem darunter gehaltenen DAVIELSchen Löffel, über den Lappen herunter-

geleitet wird. Erst dann möge das obere Lid sorgfältig mit dem Lidlöffel etwas gehoben werden, während der Gehilfe das untere Lid vom Auge abzieht. So kann hinter dem oberen Lide die Lage des Lappens beobachtet und dieser, wenn unrichtig gelagert, mit einem Spatel zurechtgestreift werden. Bei Anwendung der Zügelnaht hat das obere Lid, da es mit dem DESMARESSchen Lidlöffel emporgehalten wird, mit diesem langsam heruntergeleitet zu werden.



Abb. 162. Einführen der WEBERSchen Schlinge. Die Schlinge wird, steil nach rückwärts gerichtet, durch die klaffende Wunde hinter die Linse in den Glaskörperraum gebracht. Mit der linken Hand zieht der Arzt das untere Lid vom Auge ab.

Der Kranke darf darauf das Auge von selbst nicht mehr öffnen, weswegen auch das andere Auge durch einen Verband sofort geschlossen zu werden hat.

Erscheint der Glaskörper schon nach dem Schnitte, so kann die Regenbogenhaut nur in den Fällen ausgeschnitten werden, wo sie durch den Glaskörper in die Wunde geschwemmt wurde, so daß sie mit der Pinzette gefaßt werden kann. Ist sie aber nicht vorgefallen, so ist jeder Versuch, sie mit der Pinzette zu fassen,




Abb. 163. Zweiter Schritt der Ausziehung mit der Schlinge. Die Schlinge ist so steil aufgestellt worden, daß dadurch die Linse an die hintere Hornhautwand gedrückt wurde, entlang der sie aus dem Auge herausgezogen wird.

als aussichtslos von vornherein aufzugeben, da sie durch den Glaskörper nach rückwärts gegen den Strahlenkörper gedrückt wurde, wodurch sich ein breites




Abb. 164. Umrißzeichnung. Die Schlinge ist beim Einführen schräg nach hinten gerichtet.

Kolobom nach oben einstellte. Das Ausdrücken der Linse ist nach Erscheinen des Glaskörpers zu unterlassen. Jeder Druck auf das Auge gibt zu weiterem Austreten des Glaskörpers Veranlassung. Die Linse muß vielmehr entweder mit der Schlinge (WEBERSche Schlinge, Abb. 160) oder mit dem REISINGERSchen Doppelhäkchen (Abb. 161) herausgezogen werden. Der Gebrauch der Schlinge ist für den Anfänger leichter. Die Schlinge wird *schräg nach hinten gerichtet* (Abb. 162, 164) durch die Wunde so eingeführt, daß sie in den Glaskörperaum ungefähr dem hinteren Pol der Linse gegenüber zu liegen kommt.




Abb. 165. Umrißzeichnung. Die Schlinge ist aufgestellt und die Linse an die hintere Hornhautwand gedrückt.

Darauf wird sie nach vorne bewegt (Abb. 163, 165), so daß die Linse an die hintere Hornhautwand gedrückt wird; entlang dieser wird sie aus dem Auge herausgezogen.

Das REISINGERSche Doppelhäkchen wird geschlossen in ähnlicher Weise in den Glaskörperaum eingeführt wie die Schlinge; damit sich die Spitzen der Häkchen nicht an den Wundrändern verfangen, hat dabei die Krümmungs-

ebene der Häkchen parallel der Wunde, also frontal zu liegen. Erst hinter der Mitte der Linse wird die Hakenpinzette um ihre Längsachse um etwa  $90^\circ$  gedreht, so daß die Häkchen nach vorne gerichtet sind. Darauf wird sie geöffnet und mit den Häkchen in die hintere Linsenfläche eingesenkt. Die Linse wird gegen die hintere Hornhautwand gedrückt und so aus dem Auge herausgezogen. Das Doppelhäkchen kann daher nur bei Vorhandensein eines festen Linsenkernes angewendet werden. Weiche Kerne können nur mit der Schlinge herausbefördert werden, denn in ihnen würde das Häkchen nicht genügend Halt finden, vielmehr durch die weiche Masse durchschneiden, ohne sie mit herauszunehmen.

Die beiden Instrumente haben, schräg nach hinten gerichtet, in den Glaskörper eingeführt zu werden, da sie, senkrecht gehalten, gegen den Linsenrand stoßen und eine Luxation der Linse in den Glaskörper herbeiführen würden. Während des ganzen Vorganges müssen die Lider so vom Auge abgezogen sein, daß sie keinen Druck darauf ausüben können, wobei das obere Lid mit dem DESMARRESSchen Löffel gehoben wird. Bei jeder Starausziehung sollen Schlinge und Doppelhäkchen gebrauchsfertig vorbereitet liegen, da ein Glaskörpervorfall gelegentlich ganz unerwartet eintritt.

Der Vorfall *gesunden* Glaskörpers ist durch die Akinese zu einem seltenen Ereignis geworden, denn es war früher daran doch nicht so selten der Kranke selber schuld durch starkes Pressen mit den Lidern. Diese Möglichkeit ist nun durch die Akinese vollständig ausgeschaltet. Schuld tragen kann freilich auch der Arzt: durch Drücken mit der Pinzette auf das Auge beim Schneiden, durch zu starkes Drücken bei der Entbindung der Linse, beim Ausstreifen der Linsenreste usw. Unvermeidlich ist der Vorfall häufig bei komplizierten Staren, wenn die Zonula zerstört ist, wenn der Glaskörper verflüssigt ist u. dgl.

Bei der ersten Bedeutung des Glaskörpervorfalles ist es geboten, rechtzeitig zu erkennen, ob ein Vorfall bevorsteht, um ihn, wenn möglich, noch zu verhüten.

1. Das Vordringen des Glaskörpers bei noch ungeplatzter Hyaloidea durch die Pupille und das Kolobom nach vorne.

Wenn nach Entbindung des Linsenkernes die grauen Reste, die die Pupille und das Kolobom erfüllen, plötzlich an einer Stelle auseinandergedrängt werden und die Pupille an dieser Stelle tiefschwarz wird, so ist dies das erste Zeichen des noch innerhalb der unversehrten Hyaloidea nach vorne drängenden Glaskörpers. Nur der Unerfahrene wird sich alsdann noch weiter mit dem Herausstreifen der Linsenreste beschäftigen wollen. Das Platzen der Hyaloidea wäre das Ereignis des nächsten Augenblickes. Man begnüge sich, die Regenbogenhaut sachte zurechtzustreifen. Und selbst das ist nur möglich, wenn sich der Kranke entsprechend ruhig verhält. Oft genug drängt sie der Glaskörper wieder gegen die Wunde hin.

2. Das Vordrängen des Glaskörpers in der unversehrten Hyaloidea kann sich auch durch ein plötzliches Tiefwerden der vorderen Kammer kundtun. Durch die Pupille drängt eine Glaskörperhernie in die vordere Kammer, füllt sie aus und drückt die Regenbogenhaut nach rückwärts.

3. Die vordere Kammer kann auch tief werden durch das freie Einströmen von Glaskörper nach Berstung der Hyaloidea. Der Austritt des Glaskörpers aus der Wunde erfolgt unmittelbar darauf. Beim Einfließen von Glaskörper

in die vordere Kammer machen sich gelegentlich an dem in ihr befindlichen Blute eigentümliche Gerinnungsvorgänge bemerkbar, die eine Veränderung der Farbe ins Hellere bewirken.

Das Tiefwerden der vorderen Kammer während der Starausziehung kann auch durch Eintritt von Luft verursacht sein. Da die Luftblase deutlich zu sehen ist, ist eine Verwechslung mit dem eben beschriebenen Tiefwerden infolge Glaskörpereintrittes nicht möglich. Die Luft ist an und für sich nicht schädlich, stört aber gelegentlich in der Beobachtung der Verhältnisse in der vorderen Kammer (Lage der Irissenkel usw.). Sie wird durch Massage aus dem Auge entfernt; doch wird sie häufig wieder angesaugt.

4. Meist verrät sich die Neigung zum Glaskörpervorfall durch Aufstellung der Wundränder und Klaffen der Wunde. Als Ursache kommt manchmal das Einhalten des Atems oder Pressen des Kranken in Betracht; in anderen Fällen ist dafür kein Grund zu finden und der Vorfall des Glaskörpers stellt sich manchmal ganz unvermutet ein. Besonders bei peripheren Schnitten kann die Hyaloidea im Bereiche der Wunde platzen und durch die nun weit klaffende Wunde der Glaskörper austreten, ohne daß vorher an der vorderen Kammer irgendwelche Erscheinungen hätten beobachtet werden können.

5. Ist der Glaskörper vollkommen flüssig, so sickert er gleich nach dem Schnitte fortwährend aus dem Auge heraus, ohne daß die Wunde klafft. Der große Verlust an Flüssigkeit zeigt sich nur durch den Kollaps des Auges. Da hierdurch die Entbindung der Linse durch Druck unmöglich wird, muß auch hier die Schlinge oder das Häkchen zur Verwendung kommen. Übrigens wird im allgemeinen gerade der Verlust vollständig verflüssigten Glaskörpers besser vertragen als der eines gesunden: in wenigen Stunden schon ist er durch neue Flüssigkeit ersetzt und das Auge zur richtigen Spannung gebracht. Die Wunde heilt glatt, während nach Verlust von gesundem Glaskörper die Narbe durch lange Zeit ausgedehnt bleibt.

Wenn in seltenen Fällen der Hornhautlappen durch den vordrängenden Glaskörper immer wieder nach vorne umgestülpt und durch Zurückstreichen mit dem Spatel nicht in der richtigen Lage erhalten werden kann, muß er durch eine oder mehrere Seidennähte an die Bindehaut der Lederhaut befestigt werden. Das, wenn auch seltene Vorkommen solcher Fälle von Glaskörpervorfall mit Umstülpen des Hornhautlappens ist es, das manche Ärzte veranlaßt, grundsätzlich eine Naht schon zu Beginn des Eingriffes zu machen (siehe darüber auch das intrakapsuläre Verfahren S. 235). KALT macht die Naht noch vor Beginn des Schnittes, indem er eine feine, mit einem dünnen Seidenfaden versehene Nadel im senkrechten Meridian knapp unter dem Limbus in die Hornhaut einsticht und am Rande des Limbus wieder aussticht, ohne die Hornhaut zu durchbohren. Darauf wird die Nadel 1 mm oberhalb des Limbus durch Bindehaut und episklerales Gewebe gestochen. Der Faden wird zwischen den beiden Stichen in Form einer lockeren Schleife nach innen gegen die Nase zu gelegt, so daß er durch das Messer bei dem nun folgenden Starschnitt nicht verletzt wird. Der Schnitt muß zwischen die beiden Stichöffnungen zu liegen kommen. Unmittelbar nach Beendigung des Eingriffes wird der Faden geknüpft. Das Verfahren ist zwar nicht geeignet, bei Starausziehungen mit runder Pupille mit Sicherheit einen Vorfall der Regenbogenhaut zu verhindern, bietet aber

große Vorteile, wenn durch Vordrängen oder Hervorstürzen des Glaskörpers die Wunde stark zum Klaffen gebracht wurde. Wenn nämlich erst nach Eintritt dieses Ereignisses eine Naht angelegt werden muß, wozu sich Frauenhaar besonders eignet, so ist weiterer Verlust von Glaskörper infolge des Drückens mit den Instrumenten nicht zu vermeiden. In Fällen, wo Glaskörperverlust von vornherein zu erwarten ist, ist das KALTSche Verfahren zu empfehlen.

Der Glaskörpervorfall ist für alle Fälle ein ernstes Ereignis. Die Regenbogenhaut kann nicht zurechtgestrichen werden und Einheilung der Irisschenkel ist daher eine ganz gewöhnliche Folge. Cystische Narben, Glaukom, iridocyclitische Reizerscheinungen treten oft im Anschlusse daran auf. Durch Blutungen in den offenen Glaskörperraum kommt es zu dichten Trübungen des Glaskörpers, die später als Membranen frei flottieren oder von der Narbe aus in den Glaskörper hineinhängen. Netzhautablösung tritt nur nach sehr starkem Verluste des Glaskörpers ein, abgesehen von Augen, die dazu veranlagt sind: bei Kurzsichtigkeit u. dgl. Ein geringer Austritt von Glaskörper am Ende des Eingriffes ist dagegen sonst in dieser Beziehung von keiner Bedeutung.

Zum Schlusse sei noch einiger anderer Vorkommnisse bei der Starausziehung Erwähnung getan.

*Luxation der Linse in den Glaskörperraum.* Sollte die Linse von selbst oder durch ungeschicktes Vorgehen gänzlich in den Glaskörperraum luxiert worden und verschwunden sein, so ist ein Versuch, sie von dort herauszubringen, wenig aussichtsreich und hat meist nur eine weitere Schädigung des Auges zur Folge. Da gelegentlich die in den Glaskörper zurückgefallenen Linsen sehr bald wieder im Pupillarbereiche auftauchen, möge man einige Zeit, bis zu  $\frac{1}{2}$  Stunde, warten, ob dies der Fall ist, denn dann wäre es möglich, die Linse mit dem Doppelhäkchen oder mit der Schlinge herauszuziehen. Dieser Versuch könnte auch noch in den nächsten Tagen unternommen werden, wenn die Linse im Pupillarbereiche erscheinen sollte. Bleibt die Linse im Glaskörperraume, so geht das Auge später meist durch eine Iridocyclitis zugrunde.

Der *Kollaps der Hornhaut*, der gelegentlich während der Starausziehung, besonders nach Entbindung der Linse auftritt, hat keine Bedeutung. Da sich die starre Lederhaut der Augen alter Leute auf die Verminderung des Augeninhaltes nicht genügend zusammenzieht, entsteht ein negativer Druck im Augennern. Infolgedessen wird durch den Luftdruck die Hornhaut grubenförmig gegen das Augennere gestülpt.

Bei dem schon zuvor erwähnten *Collapsus bulbi* fällt während des Eingriffes das ganze Auge mehr und mehr zusammen, so daß es zu einem fast leeren Sacke wird. Es sickert der in solchen Augen vollständig verflüssigte Glaskörper meist schon unmittelbar nach dem Schnitt und ganz unauffällig fortwährend heraus, ohne daß die Wunde klafft. Nur der Umstand, daß sich der Bindehautsack immer wieder mit Flüssigkeit anfüllt, trotzdem beständig ausgetupft wird, macht auf den Flüssigkeitsverlust aus dem Augennern aufmerksam. Meist ist nur ein Teil des Glaskörpers verflüssigt, so daß das Auge immerhin noch so weit in seiner Form erhalten bleibt, daß die Linse mit dem Löffel oder der Schlinge herausgeholt werden kann, denn von einem Herausdrücken ist bei so zusammengeworfenen Augen keine Rede. Das Einführen der Schlinge erfordert große Geschicklichkeit, da die Wunde nicht klafft und daher der Weg für das

Instrument nicht frei ist. Niederdrücken des skleralen Wundrandes erleichtert den Akt. Die verschiedenen Teileingriffe, insbesondere das Zurückstreifen der Regenbogenhaut in die richtige Lage, können manchmal nur ausgeführt werden, wenn man den Augapfel etwas anspannt, indem man durch einen unten an die Sklera angelegten DAVIELSchen Löffel einen entsprechenden Druck ausübt. Auf die richtige Lagerung des Bindehautlappens ist besondere Sorgfalt zu verwenden, da er große Neigung zeigt, sich einzuschlagen. Ja selbst der Hornhautlappen muß gelegentlich zurechtgestrichen werden, damit die beiden Wundränder glatt verheilen können, denn der Rand des Hornhautlappens ist manchmal stufenförmig eingesunken.

Der Eintritt eines Collapsus bulbi kann nicht vorhergesehen werden, aber bei der Staroperation sehr alter Leute muß man immer darauf gefaßt sein. Über den Collapsus bulbi bei der Extraktion komplizierter Stare jugendlicher Individuen siehe beim Abschnitte: Lineare Extraktion.

Ein glücklicherweise außerordentlich seltener Zwischenfall ist die *expulsive Blutung*. Sie kann schon während des Eingriffes eintreten, gelegentlich aber stellt sie sich nach mehreren Stunden plötzlich ein, und zwar nicht nur nach Ausziehungen, die mit Glaskörperverlust verbunden waren, sondern auch nach ganz regelrecht verlaufenen. Sie ist durch eine schwere Blutung unter die Aderhaut verursacht, die so massig ist, daß der Glaskörper, die Netzhaut und die Aderhaut durch die Wunde nach außen vorgetrieben werden. Sofortige Ausschälung des Augapfels erspart dem Betroffenen ein langes Krankenlager. Wenn es sich nicht um Starausziehungen handelt, wo bei dem Eingriffe fast der gesamte Glaskörper verlorengegangen oder wo ein Glaukom übersehen und die Blutung durch die plötzliche starke Druckverminderung im Auge hervorgerufen worden ist, so ist die expulsive Blutung ein Ereignis, das fast nur bei Leuten mit erhöhtem Blutdruck zu befürchten ist. Sie kommt auch fast nicht mehr zur Beobachtung, seitdem bei jedem an Star zu Operierenden der Blutdruck gemessen und bei auch nur halbwegs in Betracht kommender Blutdrucksteigerung *unmittelbar* vor der Operation ausgiebig zur Ader gelassen wird.

Um auch die psychische Blutdrucksteigerung nach Möglichkeit auszuschalten, wird nach dem Vorschlage von E. FUCHS bei aufgeregten Kranken vor dem Eingriffe ausgiebig Brom intern verabreicht.

### Störungen im Heilungsverlauf.

#### 1. Verzögerung der Herstellung der vorderen Kammer.

In den meisten Augen ist schon beim ersten Verbandwechsel nach 24 Stunden eine tiefe vordere Kammer vorhanden. Gelegentlich aber dauert es einen oder mehrere Tage, in Ausnahmefällen sogar Wochen, bis sie sich wieder herstellt. Die Ursachen davon können verschieden sein, ohne daß sie sich in dem einzelnen Falle immer mit Sicherheit angeben ließen. Die wichtigsten sind die folgenden:

a) In der durchsichtigen Hornhaut gelegene Schnitte neigen im allgemeinen mehr zu schlechtem Wundverschlusse als hinter dem Limbus gelegene, mit einem Bindehautlappen bedeckte. Das gefäßhaltige Gewebe hinter dem Limbus verschließt die Wunde sofort durch ein Fibringerinnsel; Wunden in der Hornhaut aber entbehren dieses Schutzmittels. Bei Heilung von Hornhautwunden pflegt sich das Epithel entlang beiden Wundrändern in die Tiefe zu senken, wodurch

der Wundverschluß für längere Zeit verhindert wird, da mit Epithel bedeckte Flächen nicht zusammenheilen. Solche Wundflächen sind nur lose miteinander verklebt und öffnen sich bei geringster Berührung wieder. Klinisch zeigt sich entlang dem Einschnitte eine glänzende Rinne.

b) Einlagerung fremden Gewebes zwischen die Wundränder, wie Linsenreste, Regenbogenhaut, insbesondere aber Kapselstücke.

Während Linsenreste allmählich aufgesaugt werden und damit das Hindernis der Wundheilung verschwindet, bleibt die Linsenkapsel unverändert liegen und führt dauernde schwere Störungen im Heilungsverlauf herbei (cystische Narbe, Drucksteigerung, Spätinfektion). Bei Eröffnung der Linsenkapsel mit der Pinzette muß daher Sorge getragen werden, das gefaßte Kapselstück allseitig loszureißen, bevor die Pinzette aus der Wunde gezogen wird, um ein Hinaufschlagen des oberen Kapselwundrandes in den Schnitt zu verhindern.

c) Unruhiges Benehmen des Kranken nach dem Eingriffe (kräftiges Husten, unvorsichtige Bewegungen des Körpers und Kopfes u. dgl.) können die Wiederherstellung der Kammer dadurch verzögern, daß das Kammerwasser immer wieder aus der Wunde gedrängt wird.

d) Vordrängen des Glaskörpers. Dabei ist die Wunde gewöhnlich etwas aufgestellt und klaffend.

Für Augen, wo der Schnitt stark klafft und keine Neigung zur glatten Verheilung zeigt, ist *die Deckung mit einem Bindehautlappen nach KUHNT* ein wertvolles Verfahren. Die Bindehaut wird knapp an ihrem Ansatz am Limbus in der oberen Hälfte des Auges mit der kleinen gekrümmten Schere abgelöst und nach oben zu etwas unterhöhlt. Durch einen etwas höher oben durch die Bindehaut gelegten, bogenförmigen, dem Limbus gleichgerichteten, aber etwas kürzeren Schnitt wird ein doppelt gestielter Bindehautlappen begrenzt. Indem nun 2 Nähte in der Nähe der beiden Stiele durch den unteren Rand des Lappens durchgeführt werden, die weiter unten an der Bindehaut des Auges befestigt werden, gelingt es leicht, den Lappen über die Starschnittwunde zu schieben. Die Wundlippen werden durch den vorgezogenen Lappen aneinandergedrückt und die Wunde ist durch die Bindehaut vollständig gedeckt. Der Lappen, der anfänglich den ganzen oberen Teil der Hornhaut verdeckt, zieht sich in mehreren Tagen von selbst zurück.

Der 2. höher oben gelegene Einschnitt ist übrigens nicht einmal notwendig, so daß die am Limbus abgelöste Bindehaut in Form einer Schürze über die Wunde heruntergezogen werden kann. In Fällen, wo man mit Recht einen verwickelten Verlauf des Eingriffes und der Heilung erwartet (schlecht haltende Kranke, Glotzaugen, komplizierte Stare u. dgl.), wird der Lappen noch vor dem Starschnitte gebildet.

e) Nicht selten bleibt die Ursache aber in Dunkel gehüllt. Ein Mittel, die Wiederherstellung der Kammer zu beschleunigen, kennen wir nicht. Wenn ein zwischengelagertes Kapselstück entdeckt wird, müßte die Ausziehung versucht werden. Nur in besonders hartnäckigen Fällen ist man gezwungen, zum Thermokauter zu greifen, um die Wunde zu verschließen. Wenn trotz aller Vorsicht, Bettruhe usw. der Fluorescinsversuch beständiges Ausfließen von Kammerwasser beweist, so wird die lockere Stelle mit dem rotglühenden Kauter verschorft. Gewöhnlich stellt sich dann die Kammer sehr rasch her. Nicht

selten folgt alsdann eine Drucksteigerung. Dies ist teils darin begründet, daß die intraoculare Sekretion, die so lange Zeit außerordentlich erhöht war, sich nicht rasch genug auf den geringen Bedarf umstellen kann, teils hat sie mechanische Ursachen, indem es während des Aufgehobenseins der vorderen Kammer zu einer Verklebung des Randwulstes der Regenbogenhaut mit der hinteren Hornhautwand und damit zu einem Verschuß der Kammerbucht gekommen ist. Während die erste Form dieses Sekundärglaukoms gewöhnlich innerhalb weniger Tage unter Behandlung mit Miotica und Eisumschlägen verschwindet, ist die letzte Form hartnäckig und macht einen Eingriff (Cyclodialyse) notwendig.

**Über die Aderhautabhebung nach Starausziehung.** Wenn aus irgendwelchen der angeführten Umstände das Kammerwasser durch längere Zeit aus der Wunde sickert, kann es zu einer Abhebung der Aderhaut kommen. Die Spiegeluntersuchung, die von dem Geübten ohne Schaden für das Auge schon in den ersten Tagen nach dem Eingriffe vorgenommen werden kann, zeigt das eigenartige Bild in Form von braunen Buckeln in den Randgebieten des Augenhintergrundes. Die Abhebung der Aderhaut ist gelegentlich auch schon in den ersten Tagen nach dem Eingriffe zu beobachten. Sie kommt dadurch zustande, daß infolge des Abfließens des Kammerwassers das Iris-Linsen-Diaphragma vorrückt, der Glaskörperraum dadurch vergrößert wird und ein negativer Druck in ihm entsteht. Ist nun bei alten Leuten die Lederhaut starr, so daß sie sich nicht entsprechend zusammenzieht, und ist die Verbindung zwischen Ader- und Netzhaut normal, so gibt die Ader-Netzhaut zusammen dieser Druckverminderung im Augeninnern nach und hebt sich von der Lederhaut ab. Der Raum wird durch ein Transsudat ausgefüllt, welches aus den Gefäßen des Strahlenkörpers und der Aderhaut stammt. Indem sich aber die vordere Kammer rasch wieder verschließt und tief wird, rückt das Iris-Linsen-Diaphragma nach rückwärts, der negative Druck im Glaskörperraum verschwindet, und damit ist dem Bestande der Aderhautabhebung der Boden entzogen. Sie verschwindet in wenigen Tagen.

Bleibt aber die vordere Kammer durch lange Zeit offen und aufgehoben und rieselt beständig Flüssigkeit aus ihr heraus, was durch den Fluorescinvorsuch leicht nachzuweisen ist, so sind die Bedingungen für einen längeren Bestand der Aderhautabhebung gegeben. Die Symptome, die ein solches Auge bietet und die für die Aderhautabhebung als kennzeichnend angesprochen worden sind — Aufgehobensein der vorderen Kammer und Weichheit des Auges —, sind demgemäß nicht Folgen der Abhebung, sondern die Bedingungen zur Entstehung der Abhebung. Das Auge ist nicht weich, weil eine Aderhautabhebung besteht, sondern es ist weich, weil die vordere Kammer leck ist und das Kammerwasser beständig absickert. Die Aderhautabhebung ist infolge der Weichheit des Auges und des Vorrückens des Iris-Linsen-Diaphragmas eingetreten, und sie besteht so lange, als das Auge weich bleibt. Es ist erstaunlich zu sehen, was für große Mengen von Flüssigkeit aus solchen lecken Stellen der Kammer ununterbrochen ausströmen können: Ein Zeichen der infolge der herabgesetzten Spannung bewirkten Sekretionsvermehrung des Strahlenkörpers. Wird dann die Öffnung in der Kammer geschlossen, so kann keine Flüssigkeit mehr entströmen, das Iris-Linsen-Diaphragma rückt mit dem Tieferwerden der Kammer nach rückwärts und bei Wiederherstellung des normalen Binnendruckes kann die Abhebung nicht weiter bestehen. Sie verschwindet in kurzer Zeit.

## 2. Unrichtige Lagerung der Regenbogenhaut.

Über deren Vorfall nach Starausziehung ohne Irißausschneidung wurde schon an anderer Stelle gesprochen. Es kann aber auch bei Ausschneidung der Regenbogenhaut geschehen, daß entweder einer oder beide Kolobomschenkel in die Wunde vorgefallen sind, oder aber doch höher stehen, als sie sollten. Vordrängen des Glaskörpers macht gelegentlich schon während des Eingriffes das Zurechtstreichen unmöglich und bringt die Regenbogenhaut immer wieder gegen die Wunde hin. Sie kann aber auch nach sorgfältiger Zurückschiebung schon beim ersten Verbandwechsel vorgefallen gefunden werden. Häufig ist Wundsprennung durch vorschriftswidriges Benehmen des Kranken die Ursache. Das herausstürzende Kammerwasser schwemmt die Regenbogenhaut in die Wunde. Liegt sie in der Wunde bloß, so hat sie ausgeschnitten zu werden. Ist sie aber nicht bis in die Wunde hinein verlagert, so pflegt man von einem Eingriffe abzusehen. Eserin ist nicht imstande, die Sphinkterecken in ihre richtige Lage zurückzubringen.

3. In seltenen Fällen wird der *Hornhautlappen* beim Verbandwechsel am Tage nach dem Eingriffe nach *unten umgeschlagen* gefunden. Dies tritt ein, wenn der Kranke bei klaffender Wunde unter dem Verbands das Auge geöffnet hatte, so daß das obere Lid beim Lidschlusse in die Wunde gelangte. Nach Einträufeln von Cocain ist der Lappen sorgfältig nach oben zu streichen und in seine richtige Lage zu bringen. Tritt keine Infektion ein, wozu allerdings reichlich Gelegenheit gegeben ist, so kann der Zwischenfall noch gut ablaufen. Durch lange Zeit besteht in der Hornhaut eine waagrechte weiße Linie als Zeichen der bestandenen Knickung und hochgradiger irregulärer Astigmatismus.

## 4. Zurückgebliebene Linsenmassen.

Es wurde schon früher auf die besonderen Vorteile hingewiesen, die die breite Eröffnung der Linsenkapsel mit Hilfe der Kapselpinzette auf die Aufsaugung der Linsenreste hat. Selbst wenn große Massen von Linsensubstanz im Auge zurückgelassen worden sind, entweder dadurch, daß noch ungetrübe Linsensubstanz vorhanden war, die bei der Operation selbst nicht gesehen worden war oder aber daß man wegen anderer Umstände auf eine sorgfältige Entfernung der Linsenreste verzichten mußte, geht deren Aufsaugung doch gewöhnlich glatt vor sich.

War kein Glaskörperverlust bei dem Eingriffe eingetreten, so erzeugen diese Starreste gewöhnlich auch keine entzündlichen Erscheinungen. Es genügt zur Behandlung, die Pupille durch Atropin nach Möglichkeit erweitert zu halten. Auch Dionin und heiße Umschläge sind namentlich dann empfehlenswert, wenn die Aufsaugung sichtlich nur langsam vonstatten geht. In der Mehrzahl dieser Fälle hat sich auch schon zur Zeit der Entlassung des Patienten aus der Klinik (14 Tage nach dem Eingriffe) eine freie Lücke gebildet, die ein genügendes Sehvermögen erlaubt. Ausnahmsweise vergehen allerdings mehrere Wochen oder Monate, bis die Aufsaugung vollendet und die Pupille ganz schwarz geworden ist.

Nur wenn kein breites Kapselstück entfernt worden oder die Kapsel nur eingeschnitten worden war, bleiben dichte Starreste in der Linsenkapsel eingeschlossen zurück, welche später eine Diszission notwendig machen.

### 5. Blut in der vorderen Kammer.

Die Blutung während des Eingriffes ist sehr verschieden stark. Sie hängt in erster Linie von der Lage des Schnittes ab, indem weiter in der Lederhaut vom Limbus entfernt gelegene Schnitte stärker bluten; ferner auch von der Größe des Bindehautlappens, sowie von der Füllung der Gefäße und dem Zustande ihrer Wandungen. Nicht selten ist das Einhalten des Atems schuld an der Überfüllung der Gefäße. So kann es auch bei regelrechtem Schnitte zu einer störenden Blutung kommen. Das Blut wird durch Massage aus dem Auge entfernt, um den für die einzelnen Eingriffe nötigen Einblick zu bekommen, insbesondere um am Schluß das Zurückstreichen der Regenbogenhaut überwachen zu können. Oft sind aber diese Versuche umsonst, weil das Blut immer wieder von der Wunde ins Augeninnere hineinfließt oder angesaugt wird, oder weil es in der vorderen Kammer gerinnt und eine dünne zähe Schicht bildet, die nicht mehr aus dem Auge herausgebracht werden kann. Die Regenbogenhaut muß alsdann trotz mangelndem Einblicke in die Kammer zurückgestrichen werden.

In den meisten Fällen ist am Tage nach dem Eingriffe von dem Blut nicht mehr viel vorhanden, denn es wird durch die gesunde Regenbogenhaut sehr schnell aufgesaugt; auch konnte sich während des Eingriffes keine große Menge Blutes zwischen Hornhaut und Regenbogenhaut ansammeln, da keine Kammer vorhanden war. Wird nun die Kammer tief, so bildet das Blut ein unscheinbares Hyphäma oder eine dünne, die Regenbogenhaut und Pupille bedeckende Schicht. Nur selten ist das Hyphäma durch eine Fortdauer der durch den Eingriff erzeugten Blutung zu einer Zeit, wo die Kammer schon im Entstehen war, hoch geworden. Außer Einträufeln von Atropin hat sonst nichts dagegen unternommen zu werden. Häufiger hat es erst zu bluten begonnen, weil unter dem Verbande die Wunde gesprengt wurde. Diese erscheint dann blutunterlaufen.

Iridocyclitis und Drucksteigerung sind in späterer Zeit zwei andere Ursachen von Blutungen in die vordere Kammer. Diese können sich wiederholen, und da die Fähigkeit solcher Augen, das Blut aufzusaugen, oft herabgesetzt ist, bildet sich schließlich eine Membran.

### 6. Trübung der Hornhaut.

Eine aus senkrechten Streifen bestehende Trübung in der oberen Hornhauthälfte ist ein gewöhnlicher Befund in den ersten Tagen nach dem Eingriffe. In seltenen Fällen ist die Trübung sehr dicht und kann auch die ganze Hornhaut in Form von großen grauen, mehreckigen Feldern einnehmen, zwischen denen durchsichtige Streifen in verschiedenen Richtungen verlaufen. Je schwerer die Entbindung des Linsenkernes war, wegen der Größe des Kernes oder der Kürze des Schnittes, um so stärker ist durchschnittlich die Trübung. Sie verschwindet ohne weitere Folgen meistens im Verlaufe der ersten beiden Wochen nach dem Eingriffe. Selten dauert sie länger; ausnahmsweise wird sie der Ausgangspunkt einer degenerativen Hornhautveränderung. Andererseits gibt es auch degenerative Hornhauttrübungen, welche sich erst nach längerer Zeit entwickeln, besonders in Augen, bei welchen es zum Glaskörpervorfall gekommen ist und wo der Glaskörper die vordere Kammer erfüllt. Sie mögen in manchen Fällen mit der dabei

häufig vorkommenden sekundären Drucksteigerung in Zusammenhang stehen, gewiß sind sie aber in manchen Fällen unabhängig davon (Endothelveränderungen, Epithelveränderungen, rezidivierende Blasenbildung, diffuse Trübungen mit schließlichem Ausgang in Sklerose der Hornhaut).

#### 7. Schmerzen.

Dieses Zeichen verdient eine besondere Erwähnung, weil es für den Kranken die unangenehmste Beigabe des Eingriffes ist, der Arzt aber wissen muß, welche Bedeutung er ihm beizumessen hat. Der Schmerz während der Starausziehung ist bei gründlicher örtlicher Betäubung gering. Eine beginnende Erweiterung der Pupille läßt den Eintritt der Wirkung des Cocains auf die Regenbogenhaut erkennen. Der Eingriff an ihr wird dann meistens nur als unbedeutender Schmerz angegeben. Doch kann in einzelnen Fällen die Regenbogenhaut sehr empfindlich bleiben. Daher wurde wiederholt empfohlen, vor dem Starschnitte unter die Bindehaut oben etwas Cocainlösung einzuspritzen, denn dadurch wird die Regenbogenhaut gänzlich unempfindlich. Diesem Verfahren kommt aber der Nachteil zu, daß durch die Schwellung der Bindehaut und des unter ihr liegenden Gewebes der Starschnitt erschwert wird, selbst wenn man sich vor Beginn des Schnittes bemüht, mit einem Spatel die Flüssigkeit in dem subkonjunktivalen Gewebe vom Limbus an wegzustreifen. Auch gibt es Kranke, besonders Frauen, die einige Stunden nach einer Cocaineinspritzung wiederholt und heftig erbrechen, ein Ereignis, das für das Auge von schlimmen Folgen begleitet sein kann.

Nach Beendigung des Eingriffes tritt mit dem Verschwinden der Cocainwirkung regelmäßig das Gefühl von Brennen im Auge ein, das bald als gering, bald als stark angegeben wird. Es dauert meistens nur wenige Stunden. Man möge den Kranken schon vor dem Eingriffe darauf aufmerksam machen, damit er durch den Wundschmerz nicht beunruhigt wird. Durch Einstreichen einer 3%igen Cocainsalbe in den Bindehautsack unmittelbar nach dem Eingriff kann dieser postoperative Wundschmerz fast ganz vermieden werden. Es darf natürlich gegen die durch das Cocain erfolgende Erweiterung der Pupille kein Einwand bestehen. Besonders starke Schmerzen treten nach dem Eingriffe ein, wenn das Hornhautepithel durch zu langen Gebrauch von Cocain oder durch Offenlassen der Lidspalte während des Cocainisierens eingetrocknet war und sich abgestoßen hatte oder wenn durch einen Lidkrampf die Tränen im Bindehautsack zurückgehalten werden. Nur bei starken Schmerzen soll sich der Arzt herbeilassen, noch am Tage des Eingriffes den Verband vorsichtig zu öffnen, um nach der Ursache zu sehen.

Am Tage darauf ist bei regelrechtem Verlaufe das Auge fast immer schmerzfrei. Treten Schmerzen erst einige Tage später auf, so sind sie entweder durch eine Wundsprennung hervorgerufen oder sie sind die ersten Anzeichen einer beginnenden Iridocyclitis. Sie treten gelegentlich zu einer Zeit ein, wo klinisch noch keine Erscheinungen einer Iridocyclitis zu erheben sind. Sie werden oft nicht nur in das Auge, sondern auch in die Stirne der betreffenden Seite verlegt. Oft ist eine starke ciliare Injektion das einzige sachliche Kennzeichen. Man gebe in diesen Fällen innerlich Aspirin und träufle Atropin in das Auge, namentlich wenn die Pupille nicht genügend erweitert ist.

### 8. Wundsprennung.

Je vorsichtiger das Verhalten des Kranken, je besser seine Wartung ist, um so seltener wird sich dieser unliebsame Zwischenfall einstellen. Daher ist die Wundsprennung bei den Kranken der Einzelpflege ungleich seltener, als in großen klinischen Betrieben, wo der einzelne mehr oder weniger sich selbst überlassen ist. Doch kommt es manchmal auch bei größter Vorsicht zur Wundsprennung. Blutung in die Kammer oder Aufgehobensein der Kammer, Blutaustritt in die Wunde sind die Kennzeichen. Von unangenehmen Folgen ist die Wundsprennung dann begleitet, wenn durch sie die Regenbogenhaut aus ihrer richtigen Lage oder sogar zum Vorfalle in die Wunde gebracht wurde. Selbst der Glaskörper kann bei groben mechanischen Schädigungen in der Wunde zum Vorschein kommen. Nur ein Vorfall der Regenbogenhaut erfordert einen Eingriff nämlich die Abtragung. Sonst genügt Ruhelage des Kranken, Verband, Atropin.

Sicherlich gibt es aber auch spontane Nachblutungen, die das Bild einer Wundsprennung erzeugen, ohne daß irgendein mechanisches Moment dabei wirksam gewesen wäre. Die Blutungen können teils aus den neugebildeten Gefäßchen der frischen Narbe, teils aus den bei der Iridektomie durchschnittenen Gefäßen erfolgen. Die Kammer ist dabei nicht aufgehoben, dagegen oft ein großer Teil von ihr mit Blut erfüllt. Gerade weil sich die Kammer nicht aufgehoben hatte, war es möglich, daß sich eine viel größere Blutmenge ansammelt. Daher dauert es in diesem Falle oft lange, bis sich das Blut aufsaugt, und entzündliche Zwischenfälle sind dabei nichts Seltenes.

9. Durchaus *ernst ist der Eintritt jedweder Erscheinung entzündlicher Natur*. In bezug auf die Injektion nach einer Starausziehung verhalten sich die Augen bei günstigem Verlaufe des Eingriffes und der Heilung sehr verschieden. Während manche Augen fast ganz blaß bleiben, tritt bei der Mehrzahl eine mäßige ciliare Injektion auf. Andere hinwiederum werden stark konjunktival und ciliar injiziert, ohne daß sich durch eine Erkrankung der Bindehaut (Katarrh) oder Entzündung der Regenbogenhaut die beiden Injektionsarten erklären ließen. Blasse anämische Leute haben meist blasse Augen nach Eingriffen, vollblütige Leute mit erweiterten Gefäßen im Gesichte neigen auch zu Hyperämie der Augen.

Die Entzündungen sind folgender Art:

a) Die akute eitrige Infektion, entstanden entweder durch Einwanderung von Keimen aus dem Bindehautsack in die Wunde oder durch Gebrauch eines verunreinigten Instrumentes. Das Anfangsbild ist verschieden. Geht die Infektion von der Bindehaut aus, so kündigt sich dies schon beim Verbandwechsel durch eitriges Sekretion an. Der Verbandstoff ist von einem gelben Exsudatstreifen bedeckt, zwischen den geschwellenen Lidern liegt eitriges Exsudat; dieses hat sich auch in Form von gelben trüben Flocken im unteren Bindehautsack angesammelt. Die Wunde ist grau oder gelb belegt. Dabei kann das Augeninnere, Regenbogenhaut und Pupille noch gesund sein: ein Zeichen, daß die Infektion noch nicht so weit vorgedrungen ist. Aber schon in wenigen Stunden hat sich das Bild weiter verändert. Von der Wunde setzt sich die eitriges Infiltration in die angrenzenden Hornhautlamellen fort, oder das Exsudat reicht in trüben Fäden in die vordere Kammer hinein und es entstehen nun mit unheimlicher Schnellig-

keit alle Zeichen einer eitrigen Iritis und Endophthalmitis, die je nach dem Grade der Virulenz der Keime verläuft und sich bis zur Panophthalmitis steigern kann. Die Hornhaut ist dabei besonders in den an die Wunde angrenzenden Teilen eitrig infiltriert oder beteiligt sich in Form eines Ringabszesses.

Geht die Infektion von der Kammer aus, so bleiben die Bindehaut und die Wunde zunächst gesund und die Erkrankung setzt mit den Zeichen einer eitrigen Iritis ein (starke Verfärbung der Regenbogenhaut, Trübung des Kammerwassers, Hypopyon, gelbes eitriges Exsudat in Pupille und Kolobom). Auch hier ist der Grad der Erkrankung sehr verschieden, je nach der Virulenz der sie hervorrufenden Krankheitskeime. Die akute eitrige Infektion der Wunde tritt fast immer in den ersten 2—3 Tagen nach dem Eingriffe auf. Ausnahmsweise kann aber eine Infektion auch noch nach einer Woche einsetzen. Von den sogenannten Spätinfektionen (Infektion durch eine cystische Narbe u. dgl.) ist hier nicht die Rede.

Die Behandlung vermag fast nichts gegen eine schwere Infektion. Ist die Erkrankung im ersten Anfang auf die Wunde beschränkt, so hält eine sofortige gründliche Kauterisation der Wundränder mit dem Thermokauter ausnahmsweise den Vorgang noch auf. Wiederholte Einspritzungen von Sublimat (1 : 1000,0) oder Oxycyanatlösungen (1 : 5000,0) unter die Bindehaut scheinen auch in manchen Fällen von Kammerinfektion einen sichtlich günstigen Einfluß auszuüben. Von Serumeinspritzungen ist nichts zu erwarten. Auch die Eröffnung und Ausspülung der vorderen Kammer mit physiologischer Kochsalzlösung ist meist fruchtlos.

Nicht zu verabsäumen sind intramuskuläre Einspritzungen von sterilisierter Milch (6—10 ccm). Sie können durch mehrere Tage wiederholt werden. Die heftige Temperatursteigerung, die durch sie hervorgerufen wird, bietet keine Anzeige gegen diese Einspritzungen bei alten Leuten, sofern nur deren Herz durch Altersveränderungen nicht zu sehr geschädigt ist. Ein günstiger Einfluß auf den Verlauf der Entzündung ist nicht zu leugnen, doch scheint eine wirkliche Heilung eine seltene Ausnahme zu sein. Der akute Entzündungsprozeß wird meist sehr gedämpft, flackert aber bald wieder auf. Immerhin mag es aber doch gelingen, gelegentlich Augen auf diese Weise zu retten, die sonst verloren gewesen wären. Je früher die Milch eingespritzt wird, um so eher darf ein günstiger Einfluß erwartet werden. Es sollte dies also schon bei den allerersten Entzündungserscheinungen geschehen.

Außerdem wird die bei jeder Iritis übliche Behandlung eingeschlagen: gründliche Erweiterung der Pupille durch gleichzeitige Anwendung von Cocain mit trockenem Atropin, Dionin in Pulverform, andauernd heiße Umschläge, innerlich Urotropin.

Solange noch Lichtempfindung und gute Projektion besteht, darf die Sache nicht verloren gegeben werden. Erst wenn die Projektion falsch wird und die Lichtempfindung zugrunde geht, bleibt keine Hoffnung mehr auf Wiederherstellung des Sehvermögens. Erscheint der Ausbruch einer Panophthalmitis unvermeidlich, so soll ihr durch sofortige Ausschälung des Auges zuvorgekommen werden.

Die akute eitrige Infektion verläuft aber nicht immer so schwer und ungünstig. Eine gewisse Anzahl von Fällen kommt nach kürzerer oder längerer Dauer

der Entzündung allmählich zur Ruhe. Die Pupille und das Kolobom wurden inzwischen meist durch eine derbe Schwarte verschlossen.

b) Die langsam einsetzende Iridocyclitis.

Auch sie kommt wahrscheinlich durch eine Ansteckung mit Keimen zustande. Das klinische Bild ist in kurzen Umrissen das folgende:

Nicht selten erst einige Tage, eine Woche oder mehr nach dem Eingriffe verrät sich der Beginn der Erkrankung durch das Auftreten von Schmerzen. Sie werden in das Auge oder in die Stirne der betreffenden Seite verlegt, sind von verschiedener Heftigkeit und erscheinen manchmal schon zu einer Zeit, wo das Auge außer ciliarer Injektion noch keine anderen Zeichen einer beginnenden Iridocyclitis bietet. Aber diese lassen nicht lange auf sich warten. Die früher glänzende Hornhaut wird etwas gestichelt, zart getrübt, die Regenbogenhaut verfärbt sich, die Pupille wird eng und durch Trübung des Kammerwassers verlieren Pupille und Kolobom die früher tiefschwarze Farbe. Bei der Untersuchung mit der Lupe entdeckt man Präzipitate. Das Auge ist auf Druck sehr empfindlich.

Ist einmal eine Iridocyclitis nach einem Eingriff ausgebrochen, so ist im einzelnen Falle nie mehr mit Sicherheit der weitere Verlauf vorauszusagen. Gewiß geht ein großer Teil der Fälle gut aus. Oft tritt schon nach mehreren Tagen ein Umschwung ein, die Schmerzen lassen nach, das Auge wird blässer, das Kammerwasser klarer und in kurzer Zeit kann das Auge geheilt sein. Nicht selten aber nehmen nach einem oft ganz unscheinbaren Anfang die Entzündungserscheinungen entweder stetig oder in Form von Nachlässen und Rückfällen an Stärke zu, es entwickelt sich das Bild einer chronischen Iridocyclitis, wobei der Kranke durch Wochen und Monate von heftigen Schmerzen gequält sein kann. Es bilden sich allmählich gefäßhaltige Schwarten in Pupille und Kolobom sowie auf der Regenbogenhaut; diese hat eine grünliche Farbe angenommen und ist von neugebildeten Gefäßen in Form von roten Streifen durchzogen. Auch in diesem Zustande kann das Auge noch langsam zur Ruhe kommen. Wurde aber auch der Strahlenkörper von der Entzündung schwer in Mitleidenschaft gezogen, so führen die auf seiner Oberfläche und im Glaskörperraum gebildeten Schwarten durch Schrumpfung zur Netzhautabhebung, wodurch die Lichtempfindung und Projektion allmählich schlecht werden, und schließlich zur Atrophia bulbi.

Diese Form der Iridocyclitis nach einem Eingriffe ist deswegen so gefürchtet, weil sie zu einer sympathischen Ophthalmie Veranlassung geben kann. Da es bis nun nicht gelungen ist, in dem erkrankten Auge die „sympathisierende“ Entzündung, d. h. die eigenartige Form der Entzündung, zu der sich in kurzer Zeit eine Erkrankung des anderen Auges hinzugesellt, zu erkennen, darf nicht länger an eine Erhaltung des Auges gedacht werden, als eine tadellose Lichtempfindung und Projektion noch immer die Hoffnung auf Erhaltung des Sehvermögens zuläßt. Ist aber Lichtempfindung und Projektion schlecht geworden, so muß der Sachverhalt dem Kranken aufgeklärt und auf die Entfernung des nicht bloß unbrauchbaren, sondern sogar gefährlich gewordenen Auges gedrängt werden.

Die Behandlung ist leider auch gegen diese Form der Entzündung ziemlich machtlos. Hohe Gaben von Aspirin (bis 10 g täglich), Urotropin, Schwitzkuren,

Quecksilbereinreibungen, intramuskuläre Milcheinspritzungen haben manchmal einen günstigen Einfluß. Auch intramuskuläre Einspritzungen von Protinal sind sehr empfehlenswert. Örtlich werden Atropin, Dionin, heiße Umschläge und Kurzwellenbestrahlungen angewendet.

Ist in günstigen Fällen die Entzündung endlich gewichen, das Sehvermögen jedoch durch eine derbe, Pupille und Kolobom ausfüllende Schwarte, meist bis auf Lichtempfindung, herabgesetzt, so darf ein Eingriff (Durchtrennung der Schwarte) nicht zu bald vorgenommen werden. Die Entzündung würde dadurch neuerlich angefaßt. Auch gibt ein frühzeitiger Eingriff wegen der Blutung aus den erweiterten Gefäßen wenig Aussicht auf Erfolg. Die Lücke würde durch das Blut und durch ein sich von den Schnitträndern der Schwarte aus rasch entwickelndes Granulationsgewebe wieder verschlossen werden. Solange sich das Auge noch leicht injiziert, solange der Kranke noch gelegentlich Schmerzen und vielleicht auch vorübergehende entzündliche Anfälle, wenn auch leichter Natur hat, solange muß die Durchschneidung der Schwarten hinausgeschoben werden. 4—6 Monate nach Abklingen der Entzündung stellen wohl die kürzeste Zeit dar, bevor ein Eingriff empfohlen werden kann.

c) Spätinfektion.

Bleibt durch Iris- oder Kapsleinheilung eine cystische Narbe nach dem Eingriffe zurück, so kann auf diesem Wege noch nach Jahren eine Infektion des Augennerns zustande kommen, von einer leichten Iritis angefangen bis zu einer stürmisch verlaufenden Panophthalmitis.

#### 10. Drucksteigerung.

In ganz seltenen Fällen tritt ein akuter Glaukomanfall schon in den ersten Tagen nach der Starausziehung ein. Die heftigen Schmerzen, die Schwellung der Lider, Chemosis, Mattigkeit und Trübung der Hornhaut und das dadurch zustandegekommene trübe Aussehen des Kammerwassers lassen fälschlich an eine beginnende Infektion denken, zumal da der Druck mit Rücksicht auf die frische Wunde mit dem Finger nur sehr vorsichtig geprüft werden kann und seine Beurteilung durch die Schwellung der Lider außerordentlich gestört wird. Die Ursache dieser Drucksteigerung nach einer regelrecht verlaufenen Starausziehung ist rätselhaft. Denn sie tritt auch bei reiner Pupille ein, so daß nicht Starreste der Auslösung der Drucksteigerung beschuldigt werden können.

Nicht sehr selten folgt eine Drucksteigerung einer Starausziehung, bei der der vollständig verflüssigte Glaskörper in großer Menge aus der Wunde geflossen ist. In diesen Augen ist manchmal schon am Tage nach dem Eingriffe die Spannung erhöht, was sich durch die leichte Mattigkeit der Hornhaut und Schmerzen verschiedener Stärke kundgibt. Miotika beseitigen meist in einigen Tagen die Druckerhöhung. Von einer Punktion wird womöglich Abstand genommen, da durch reichlichen Abfluß von Augenflüssigkeit wieder eine Drucksteigerung ausgelöst werden kann.

Eine längere Zeit nach der Starausziehung eintretende Drucksteigerung ist meist durch Einheilung der Regenbogenhaut oder eines Kapselstückes in die Wunde hervorgerufen. Aber es gibt auch Drucksteigerungen bei regelrechtem Kolobom sowohl als bei runder Pupille. Sie betreffen meistens Augen, wo sich die vordere Kammer nach der Starausziehung durch längere Zeit nicht wieder-

hergestellt hatte und während dieser Zeit die Peripherie der Regenbogenhaut mit der hinteren Hornhautwand verlötet und dadurch die Kammerbucht verlegt worden war. Diese Spätformen der Drucksteigerung haben meist einen schleichen Verlauf, so daß die Kranken erst bei weit vorgeschrittenen Veränderungen zur Behandlung kommen. Eingehelte Regenbogenhaut muß ausgeschnitten werden; bei Drucksteigerung in Augen mit runder Pupille leistet die Cyclodialyse wertvolle Dienste.

In seltenen Fällen ist die Ursache einer hartnäckigen, durch nichts zu beseitigenden Drucksteigerung Einwanderung von Epithel durch die Wunde in die vordere Kammer, die schließlich damit ganz ausgekleidet wird. Dieser Zustand kann klinisch nur erkannt werden, wenn sich die Epithelauskleidung auf einen Teil der Kammer beschränkt, indem ein feinstes Häutchen, an eine Cyste erinnernd, dort in der vorderen Kammer wahrgenommen wird, wo sie von der Hinterwand der Hornhaut auf die Oberfläche der Regenbogenhaut abbiegt. Dagegen kann ein gleichmäßiger Überzug der Kammerwand mit Epithel nur vermutet, nicht mit Sicherheit festgestellt werden.

Auch entzündliche Erkrankungen (Iridocyclitis) können nach der Starausziehung zu Drucksteigerung führen.

### 11. Netzhautabhebung.

In Augen mit richtigem Brechungszustand führt Glaskörperverlust bei der Starausziehung nur sehr selten zur Netzhautabhebung; dagegen erkranken hochgradig kurzsichtige Augen darnach nicht selten.

### Ausziehung des Altersstars in der Kapsel.

**Einleitende Bemerkungen.** Die Entfernung der ganzen getrübbten Linse samt ihrer Kapsel war seit jeher das ersehnte Ziel einer Starausziehung. Zwei ganz verschiedene Verfahren suchten dieses Ziel zu erreichen. Das eine Verfahren verwendete einzig den Druck auf das Auge: die Linse in der Kapsel wurde aus dem Auge herausgedrückt. Es war besonders SMITH, der dieses Verfahren ausbildete und in einer ungeheuren Zahl von Staren in Indien durchführte. In unseren Ländern wurde es aber wegen des hohen Hundertsatzes von Glaskörperverlusten allgemein abgelehnt. Der Druck, der nötig ist, die Zonulaverbindungen der Linse zu sprengen, übersteigt zu oft die Widerstandskraft der Glaskörpergrenzhaut.

Das 2. Verfahren verzichtete, um diese Gefahr zu vermeiden, auf den Druck und ersetzt ihn durch Zug. Besonders bekannt wurde das Verfahren von BARRAQUER, der mit einer eigens gebauten Vorrichtung, dem Linsensauger, Erisiphaken, den Star aus dem Auge herauszog. In breiten Kreisen hat auch dieses Verfahren nicht Fuß gefaßt.

Ein 3. Verfahren besteht darin, beide Kräfte, Zug *und* Druck, anzuwenden, und zwar getrennt in zeitlicher Aufeinanderfolge. Es ist das besondere Verdienst von A. KNAPP und von STANCULEANU dieses Verfahren — unabhängig voneinander — ausgearbeitet zu haben. KNAPP setzt eine zahnlose Kapselpinzette auf die vordere Linsenkapsel in ihrem unteren Drittel und zerreißt mit Hilfe einer aufgehobenen Falte durch seitliche Bewegungen das Aufhängeband in seiner unteren Hälfte, auf diese Weise die Linse etwas verschiebend. Dann erst

wird durch geeigneten Druck mit 2 Spateln die Linse gestürzt entbunden. In einer Reihe von Berichten über Hunderte von Fällen bewies KNAPP den Wert seines Vorgehens.

TÖRÖK änderte dieses Verfahren in vorteilhafter Weise dahin ab, daß er beide Kräfte gleichzeitig wirken ließ, gewiß ein geeigneter Weg, durch richtiges Abwägen und Ansetzen der Kräfte, den Star in möglichst schonender Weise zu entbinden. TÖRÖK faßte die Kapsel in ihrer oberen Hälfte, verschob die Linse in diesem Gebiete, und während er nunmehr unten einen Druck auf die Linse ausübte, zog er sie in ihrer richtigen Lage, also nicht sie stürzend, aus dem Auge heraus.

In späteren Jahren haben sich dann ELSCHNIG, ARRUGA u. a. m. warm für das intrakapsuläre Verfahren durch gleichzeitige Anwendung von Druck und Zug eingesetzt und durch zunehmende Erfahrung zahlreiche Verbesserungen hinzugefügt.

#### **Ausziehung des Stares durch gleichzeitige Anwendung von Zug und Druck.**

**Anzeigen.** Hauptanzeigen sind die Cat. inc. und die Cat. nucl. Auch bei reifen Staren ist dagegen nichts einzuwenden und sie kann auch bei überreifen Staren versucht werden. Starke Kapselverdickungen verhindern gelegentlich das Auffassen einer Falte mit der zahnlosen Pinzette. Nicht geeignet ist der Altersstar im Zustande der Schwellung; wenig geeignet ein Star mit großem harten braunen Kern, wenigstens wenn beabsichtigt ist, mit runder Pupille vorzugehen, obwohl auch hier, wenn der Pupillarrand nicht zu starr ist, die Entbindung nicht selten überraschend leicht gelingt.

Bei Leuten unter 50 ist die Linse häufig noch so fest an dem Glaskörper befestigt und die Zonula noch so widerstandsfähig, daß die intrakapsuläre Extraktion öfter als sonst mißlingt und die Kapsel einreißt. Freilich bei ausgesprochen komplizierten Staren, wozu auch die Katarakta nuclearis zu rechnen ist, ist die Zonula oft so geschädigt und die Verbindung der Linse mit dem Glaskörper so locker geworden, daß sich die Linse überraschend leicht ausziehen läßt.

Im jugendlichen Alter mißlingt sie ungleich häufiger. Ich kann mich daher den Vorschlägen einiger begeisterter Anhänger der intrakapsulären Extraktion, diese auf jeden Fall doch wenigstens zu versuchen, z. B. bei Schichtstar junger Leute oder zur Entfernung der Linse bei hochgradiger Myopie junger Leute, nicht anschließen. Es kann durch einen solchen Versuch dem Auge ein Schaden zugefügt werden, der gewiß nicht eingetreten wäre, wenn man das vorsichtigeres Verfahren früherer Jahre angewendet hätte.

**Vorbereitung.** a) Erweiterung der Pupille durch Homotropinlösung (1%ig). Schon am Tage vor der Operation wird einmal eingeträufelt, um sich von der Erweiterungsfähigkeit der Pupille zu überzeugen und den Sphinkter nachgiebig zu machen. Ist die Pupille am nächsten Tage, dem Tage des Eingriffes, nicht mehr weit, so wird 2 Stunden vor dem Eingriff nochmals Homotropin eingeträufelt. Sollte sich die Pupille besonders widerstandsfähig erweisen und sich nicht genügend erweitern lassen, so wird im allgemeinen von der intrakapsulären Ausziehung Abstand genommen, außer man macht eine totale Iridektomie.

b) Akinese und Zügelnaht werden verwendet wie bei der gewöhnlichen Ausziehung.

c) Retrobulbäre Injektion von 1 ccm einer 2%igen Lösung von Novocain-Adrenalin, um den Druck im Auge zu verringern. Während der Patient nach innen unten schaut, wird die Nadel der PRAVAZschen Spritze durch die Übergangsfalte außen oben eingestochen und in das Orbitalgewebe hart am Auge genügend tief vorgeschoben, um die Flüssigkeit unmittelbar hinter dem Auge abzulagern. Bevor man einspritzt, saugt man leicht an, um nicht etwa in ein Blutgefäß zu spritzen. Es kann aber auch von jeder anderen Seite aus eingespritzt werden. Unmittelbar nachher wird durch die geschlossenen Lider das Auge 1 Minute nach rückwärts gedrückt. Wirksamer als Novocain scheint eine 1%ige Cocainlösung (1 ccm) mit Adrenalinzusatz ( $\frac{1}{10}$  ccm) den Druck herabzusetzen.

Die Augen verhalten sich diesen Einspritzungen gegenüber sehr verschieden. Während man bei manchen Augen vergeblich darauf wartet, das Auge weich zu bekommen, erniedrigt sich bei anderen der Druck sehr rasch bis zur völligen Weichheit. Da der Schnitt und namentlich das Auffassen der Linsenkapsel in einem ganz weichen Auge sehr schwierig sind, soll man daher den Schnitt alsbald nach der Einspritzung vornehmen. Freilich verliert man dadurch die Gewißheit, ob während der Ausziehung der Glaskörperdruck wirklich in wünschenswerter Weise herabgesetzt ist.

**Schnitt.** Der Schnitt soll etwas länger sein als bei der Ausziehung des Stares aus der Kapsel, um für den Austritt der Linse in ihrer Gänze genügend Raum zu schaffen. Er darf ferner nicht rein limbal oder gar in der Hornhaut gelegen sein, da ein Bindehautlappen gebildet werden muß, um eine Naht anlegen zu können. Zu diesem Zwecke soll der Bindehautlappen nicht zu klein geschnitten sein. Freilich breite Bindehautlappen, wie wiederholt empfohlen, sind zu wider-raten. Wenn es gewiß auch leichter ist, durch sie eine oder mehrere Nähte anzulegen, so blutet es doch aus den Gefäßen des Lappens fast immer so stark, daß man dadurch außerordentlich gestört ist. Das von oben her kommende Blut wird durch die Wunde in die vordere Kammer geradezu eingesaugt und verdeckt das Arbeitsfeld.

**Anlegen der Bindehautnaht.** Mit feiner Nadel und feinem schwarzen Seidenfaden wird eine Naht durch die Bindehautwunde gezogen, lose geschlungen und die Schlinge mit einem Schielhaken so zur Seite gelegt, daß sie während der folgenden Akte nicht hinderlich ist. Da die Bindehaut am Limbus bei alten Leuten häufig sehr dünn und zerreißlich ist, bedarf es besonderer Vorsichtsmaßregeln, um ein Durchschneiden der Nadel und des Fadens am Limbus hintanzuhalten. Das Auffassen geschieht mit feiner Hakenpinzette. Der limbale Bindehautlappen darf nicht gezerrt werden, die Nadel wird hart hinter dem Limbus eingestochen, aber nicht zur Gänze durchgeführt, sondern die Nadelspitze ist vielmehr sofort in dem genau gegenüberliegenden Punkte des oberen Bindehautwundrandes einzustecken und dieser obere Bindehautlappen mit der Pinzette nunmehr nach unten und über die Nadel zu schieben, so daß dabei auch der limbale Bindehautlappen durch die Nadel gleitet, ohne daß er im geringsten gezerrt wird. Sonst ist ein Durchschneiden und Zerreißen des limbalen Bindehautlappens häufig nicht zu vermeiden. Ganz besonders empfehlenswert sind für die Anlegung der Naht die öhrlosen Nadeln nach MERSON (Edinburg), da die sonst unvermeidliche Zerrung des Bindehautlappens beim Durchtreten des Nadelöhres dabei wegfällt.



Abb. 166a, b.

**Auffassen der Linsenkapsel und Ausziehen der Linse nach dem Verfahren von ARRUGA.** Zum Auffassen der vorderen Linsenkapsel dient eine der zahnlosen Kapselpinzetten. Die Modelle der Pinzetten nach den Angaben von ELSCHNIG



Abb. 167a.




Abb. 167b.




Abb. 168a.




Abb. 168b.

und die von ARRUGA sind am meisten verwendet. Die Pinzette von ARRUGA, Abb. 166a, 166b, hat an der Innenseite ihrer Branchen eine Einkerbung. Dadurch soll das Auffassen einer Falte in den Fällen erreicht werden, wo die Kapsel



Abb. 169a.




Abb. 169b.



Abb. 170a.




Abb. 170b.

stark gespannt ist und wo nur eine schmale Falte gefaßt werden konnte. Durch eine Sperrvorrichtung ist ein übermäßiges Zusammendrücken der Branchen unmöglich gemacht. Wichtig ist, daß die beiden Enden der Pinzette vollkommen aufeinanderpassen. Die Ränder dürfen weder scharf sein, noch auch zu sehr abgerundet. Die Kapselpinzette wird geschlossen in die vordere Kammer einge-

führt. Wer schon vorher die kleine periphere Irislücke angelegt hat, muß die Kapselpinzette von der Seite her einführen, damit sie nicht durch die Lücke hinter die Iris gerate. Die geschlossene Pinzette wird zunächst im Zentrum der Pupille an die vordere Linsenkapsel angesetzt (Abb. 167a, 167b). Dann wird




Abb. 171a.




Abb. 171b.




Abb. 172a.




Abb. 172b.

der Griff der Pinzette steil fast bis zur Vertikalen (im Verhältnis zur horizontalen Lage des Kranken) aufgestellt und gleichzeitig ein leichter Druck auf die Linse ausgeübt. Dadurch entfernt sich deren untere Hälfte von dem Pupillarrand in der Richtung nach rückwärts (Abb. 168a, 168b). So gelingt es leicht, die noch immer geschlossene Pinzette entlang der Oberfläche der Kapsel hinter die Iris nach unten zu schieben, nahe an den unteren Linsenrand heran (Abb. 169a, 169b). Unter Beibehaltung dieses Druckes nach rückwärts wird die Pinzette bis auf 4 mm geöffnet (Abb. 170a, 170b) und eine Falte der Kapsel aufgehoben. Daß dabei darauf zu achten ist, daß beim Öffnen der Pinzette die beiden Branchen auf der vorderen Linsenkapsel gleiten, wurde schon bei dem Gebrauch der Kapselpinzette beim extrakapsulären Verfahren besonders hervorgehoben. Würde die Pinzette schräg gehalten werden, so könnte sie keine Falte der Kapsel auffassen. In dieser Beziehung also gilt das gleiche wie für den Gebrauch der




Abb. 173a.



Abb. 173b.

Kapselpinzette bei der gewöhnlichen extrakapsulären Ausziehung. Ein wesentlicher Unterschied besteht aber darin, daß hier die Kapselpinzette nur wenig (bis höchstens 4 mm) geöffnet und daß somit nicht eine breite, sondern eine schmale Kapselfalte aufgefaßt zu werden hat. Wird die Pinzette zu weit geöffnet, so gleitet sie entweder ab, ohne eine Falte aufzufassen, oder aber es reißt die Kapsel ein, da durch das Auffassen einer breiten Falte die Spannung in der Kapsel zu groß geworden ist. Über den Druck, der nötig ist, um eine Falte zu bekommen, gilt dasselbe wie das auf S. 197 Gesagte. Im allgemeinen erfordert das Auffassen mit der zahnlosen Pinzette einen entschieden stärkeren Druck

als bei der gezahnten, um so mehr als in dem weichen Auge die Linse große Neigung hat, nach hinten nachzugeben. Außerdem hat die Pinzette größere Neigung abzurutschen, besonders wenn die Kapsel stärker gespannt ist (bei geschwollener Katarakt), verdickt ist (bei hypermaturer Katarakt oder Kapselverdünnung) oder wenn sich, wie so




Abb. 174a.



Abb. 174b.

häufig, Blut auf der Kapsel ansammelt, da dieses die Oberfläche der Kapsel rutschig macht. Ist schon das Auffassen der Kapsel mit der gezahnten Pinzette bei der extrakapsulären Ausziehung für den Anfänger nicht leicht, so erfordert die zahnlose Pinzette noch bedeutend mehr Geschicklichkeit und Erfahrung. Man muß es in der Hand fühlen, daß die Linse durch die Falte nun in der Gewalt der Pinzette ist.

Nach Aufheben der Falte wird die geschlossene Pinzette leicht nach oben gezogen, so daß deren Spitze mit der aufgehobenen Linsenkapsel am unteren Pupillarrande sichtbar wird (Abb. 171a, 171b). Schon durch diese Aufwärtsbewegung wird die Zonula am unteren Pol der Linse abgerissen. Es schließt sich das Losreißen der Linse von den seitlichen Teilen des Aufhängebandes an. Dies wird durch seitliche Bewegungen bewirkt, wie die Abb. 172a, 172b sie zeigen.




Abb. 175a.




Abb. 175b.

Geschicktes Drücken mit dem Ende des gekrümmten Hakens (Abb. 173a, 173b) am Limbus jeweilig entgegengesetzt der seitlichen Bewegung der Pinzette hilft wesentlich zum Zerreißen der Zonula mit. ARRUGA legt auch Wert darauf, während der lateralen Bewegungen die Pinzette um ihre Längsachse etwas zu drehen. Das Freiwerden der Linse ist in vielen Fällen ganz deutlich zu verspüren und ferner daraus zu erkennen, daß die seitlichen Bewegungen immer leichter werden und größeren Umfang annehmen. Diese seitlichen Bewegungen — meist genügen 2—3 an Zahl — sollen gleichzeitig aber auch mit einem leichten Zug in der Richtung nach oben gegen den Schnitt zu verbunden sein. Jetzt ist der Augenblick gekommen, wo zur Mithilfe auch der Druck auf das Auge ein-

gesetzt werden muß. Der gekrümmte Haken wird — wenn er nicht schon früher angesetzt worden war — an den unteren Limbus angelegt. Er hat einen mäßigen Druck nach hinten und etwas nach unten auszuüben, um die Linse zu stürzen (Abb. 174a, 174b). Die seitlichen Bewegungen der Pinzette in Zickzackform werden umfangreicher und mehr und mehr mit einem Zuge in der Richtung gegen die Wunde vergesellschaftet (Abb. 175a, 175b). Gleichzeitig mit dem Nachobenrücken der Linse gleitet der Haken, einen je nach Bedürfnis entsprechend starken Druck ausübend, entlang der Hornhaut weiter nach oben, bis die Linse in der Wunde völlig erschienen ist (Abb. 176a, 176b) und schließlich endgültig aus der Wunde vorgezogen wird (Abb. 177a, 177b). Schon unmittelbar vorher hat der Druck mit dem Haken aufzuhören. In äußerst lehrreicher Weise stellte ARRUGA die Bewegungen, die die Spitze der Pinzette zu machen hat, in einer Umrißzeichnung dar (Abb. 178). Die unterbrochene Linie bedeutet die Richtung, in welcher die Pinzette eingeführt wird, bis sie nahe dem unteren Rande der Linse ange-




Abb. 176a.

Abb. 176b.

kommen ist, die ausgezogene Linie zeigt die Bewegungen, die die Pinzette mit der aufgehobenen Falte der Linsenkapsel ausführt, bis die Linse entbunden ist.




Abb. 177a.

Abb. 177b.

Abb. 178.

kommen ist, die ausgezogene Linie zeigt die Bewegungen, die die Pinzette mit der aufgehobenen Falte der Linsenkapsel ausführt, bis die Linse entbunden ist.

**Knüpfen der Naht.** Unmittelbar nach Entbindung der Linse wird die Nahtschlinge zugezogen und ein 2. Knopf darüber gelegt. Die Wunde wird dadurch sicher verschlossen.

**Zurückstreifen der Iris und Anlegung der peripheren Irislücke.** Meist zieht sich die Pupille nach der Entbindung der Linse überraschend gut zurück, so daß

oft nicht der geringste Repositionsversuch gemacht zu werden braucht. Ist die Pupille nicht rund, so genügen meist leichte Massagebewegungen mit dem Spatel an der Sklera entlang dem Schnitte, die Regenbogenhaut zum Zurückziehen zu bewegen; nur selten muß der Spatel durch die Wunde eingeführt werden. Große Sorgfalt ist darauf zu verwenden, die Glaskörpergrenzmembran nicht zu verletzen. Daher muß das Pupillargebiet unberührt gelassen werden. Ist nicht schon zu Beginn des Eingriffes die Lücke in der Iris peripher angelegt worden, so muß nunmehr neben der Naht die HESSsche Pinzette eingeführt und aus der Peripherie ein kleines Stückchen ausgeschnitten werden.

**Verband und Nachbehandlung.** Die Zügelnaht wird entfernt. Eine 1%ige Eserinsalbe wird in den Bindehautsack gestrichen, eine 20%ige Argyrollösung eingeträufelt und das Auge verbunden, wie beim extrakapsulären Verfahren beschrieben. Das nichtoperierte Auge soll nicht mehr geöffnet werden und bleibt verbunden. Der Patient legt den Weg vom Operationssaal in sein Zimmer zu Fuß zurück. Wir haben daraus nie einen Nachteil erwachsen sehen. Erster Verbandwechsel am Tage nach dem Eingriffe. In glatten Fällen ist die Kammer sehr tief, die Pupille stecknadelkopfgroß, rund. Starkes Schlottern der Regenbogenhaut, denn sie hat jeden Halt verloren. Das Auge fast nicht gereizt. Ein Tropfen Cocainlösung oder Homatropin beseitigt den Sphinkterkrampf. Das nichtoperierte Auge bleibt offen. Patient wird aufgesetzt. Auch in den nächsten Tagen wird gelegentlich Homatropin verabreicht. Der Verband wird nach 8 Tagen weggelassen, die Naht meist am 10.—12. Tage entfernt, worauf der Patient aus dem Spital entlassen werden kann.

**Zwischenfälle und Fehler bei der Ausziehung des Stares in der Kapsel.** Es sollen hier nur die Zwischenfälle besprochen werden, die dem Verfahren als solchem anhaften, da ja über die Zwischenfälle bei der Ausziehung des Stares an sich schon bei dem extrakapsulären Verfahren berichtet worden ist. Dasselbe gilt für die Fehler.

1. Bei der retrobulbären Injektion. Man hat dafür Sorge zu tragen, die Flüssigkeit nicht in den TENONSchen Raum abzusetzen. Der Fehler fällt sofort auf, indem die Flüssigkeit entsprechend dem Ansatz der TENONSchen Kapsel vorne an der Sklera die Bindehaut vorwölbt. Der Zweck der Einspritzung wird dadurch nicht erreicht.

*Blutung in das Orbitalgewebe durch Verletzen eines Gefäßes.* Ein rasch auftretender Exophthalmus läßt es rätlich erscheinen, von der Operation Abstand zu nehmen und durch einen Druckverband die Blutung aufzuhalten. Ist aber der Schnitt schon gemacht worden, so bleibt nichts übrig, als den Eingriff nach dem extrakapsulären Verfahren zu Ende zu führen. Die Gefahr eines Glaskörpervorfalles ist groß.

Die Blutung wird vermieden, wenn man sich bei der Einspritzung hart an das Auge hält und nicht tief in das Orbitalgewebe einspritzt. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, unmittelbar nach der Einspritzung das Auge durch die geschlossenen Lider mit einem Tupfer kurze Zeit kräftig nach rückwärts zu drücken. Ferner soll man sich durch leichtes Ansaugen der Spritze, bevor man die Flüssigkeit einspritzt, sicherstellen, daß sich die Nadelspitze nicht im Inneren eines Blutgefäßes befindet, um die Flüssigkeit nicht in die Blutbahn zu spritzen.

2. Wird ein großer Bindehautlappen geschnitten, so blutet es aus ihm viel reichlicher als beim gewöhnlichen Verfahren. Besonders in der Pupille sammelt sich gerne eine Blutschicht an, welche die Einsicht erschwert. Es besteht die Gefahr des Auffassens von Iris mit der Pinzette usw. Die Versuche, das Blut aus dem Auge durch Massage zu entfernen, machen viel zu schaffen, und der Gehilfe hat dabei rege mitzutun. Oft genug gelingt es nicht, das Pupillargebiet davon freizumachen.

Man soll sich daher — wie schon früher bemerkt — mit einem schmalen Lappen begnügen, eben groß genug, um eine Naht anlegen zu können.

3. Die Weichheit des Auges, durch die Wirkung der retrobulbären Einspritzung hervorgerufen, hat gewisse Nachteile:

a) Es wurde erwähnt, daß der Schnitt sehr bald nach der Einspritzung ausgeführt zu werden hat. Sonst wird das Auge so weich, daß man mit dem Schritte ernste Schwierigkeiten haben kann. Bei Augen, deren Spannung schon an sich gering ist, ferner bei Augen, welche tiefe Kammern haben und tief in der Orbita liegen, wie es bei sehr alten Leuten nicht selten der Fall ist, wo von vornherein mit einem Collapsus corneae oder des Auges gerechnet werden muß, wird von der retrobulbären Einspritzung abgesehen.

b) Auch das Auffassen der Kapselfalte kann unmöglich werden, wenn das Auge zu weich ist, denn die Linse hat nun keinen Halt und weicht nach rückwärts aus.

c) Einsaugen des Blutes in die vordere Kammer. Durch den herabgesetzten Druck im Augeninneren wird das aus der Wunde strömende Blut in die vordere Kammer geradezu eingesaugt.

d) Auf den ganz großen Nachteil der Weichheit des Auges, der sich in dem Augenblick offenbart, wo die Ausziehung in der unversehrten Kapsel nicht gelungen ist und wo nunmehr der Eingriff extrakapsulär durchgeführt werden muß, wird noch weiter unten eingegangen werden.

4. Wird der *Schnitt zu kurz* gemacht, so ist das Mißlingen gewiß. Die kurze Wunde leistet dem großen Linsengebilde einen zu starken Widerstand, als daß die Kapselfalte nicht ausreißen würde. Auch bei jüngeren Patienten, wo der Schnitt bei dem extrakapsulären Verfahren wesentlich kürzer angelegt werden darf, muß der Schnitt lang sein. Doch braucht er nicht wesentlich länger angelegt zu werden als beim extrakapsulären Verfahren.

5. Beim *Anlegen der Naht*. Das leichte Durchschneiden der Nadel und des Fadens durch die bei alten Leuten fast immer leicht zerreißliche Bindehaut am Limbus wurde schon erwähnt, ebenso wie man es zu machen hat, um diesen Zwischenfall zu verhüten. Der Gehilfe hat dafür Sorge zu tragen, daß der Faden nicht auf die Haut der Lider und Umgebung zu schleifen kommt. Ein böser Nachteil kann daraus erwachsen, daß der Faden nicht an den einander entsprechenden Stellen der Bindehautwundränder durchgeführt worden ist. Dadurch werden beim Knüpfen der Naht am Schlusse des Eingriffes die Wundlippen schief verzogen und es wird die glatte Heilung der Wunde gestört.

6. Beim *Auffassen der Linsenkapsel*. Trotz Erweiterung der Pupille vor dem Eingriffe wird diese meist eng, sobald das Kammerwasser abgeflossen ist. Die Enge der Pupille erschwert aber bei diesem Verfahren, wo die Kapselzange hinter die Iris nach unten geführt wird, das Aufheben der Kapselfalte nicht, im Gegen-

sätze zum extrakapsulären Verfahren, wo die Falte aus dem Pupillargebiet entnommen zu werden hat. Die Pupille wird hauptsächlich zu dem Zwecke vor dem Eingriffe erweitert, um die Widerstandskraft des Sphinkters zu schwächen und die Linse leichter aus der Pupille entbinden zu können. Dies würde freilich Atropin gründlicher besorgen. Es ist aber deswegen davon abzuraten, weil nach dem Eingriffe die Pupille sofort durch Eserin verengt zu werden hat, um das Vordringen des Glaskörpers zu verhindern, das sich sofort einstellt, wenn der Augendruck wieder normal geworden ist.

a) Die Pinzette gleitet auf der Kapsel, ohne eine Falte aufzuheben, obwohl sie genügend stark angedrückt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn man versucht, eine *Cataracta intumescens* in der Kapsel auszuziehen. Es ist fast immer vergeblich, und man sollte davon von vornherein Abstand nehmen. Die Kapsel ist infolge Quellung der Linse zu stark gespannt. Drückt man die Pinzette noch mehr gegen die Linse, so wird entweder die Kapsel verletzt und die Pinzette in die Linsensubstanz hineingestoßen, oder aber es wird der Glaskörper aus der Wunde gedrückt.

Lagert sich Blut auf die vordere Linsenkapsel, so hat die Pinzette auch große Neigung abzugleiten, ohne eine Falte aufzuheben.

Auch von einer starren Kapsel, bei Kapsel epithelwucherungen, nicht selten auch bei *Cataracta hypermatura*, kann mit der zahnlosen Pinzette keine Falte aufgehoben werden. Dies sind die Fälle, wo schon bei dem gewöhnlichen Verfahren der Starauszienung die gezähnte Kapselpinzette eine so derbe Falte der Linsenkapsel auffaßt, daß die ganze Linse in ihrer Kapsel herausgezogen werden kann (siehe S. 215).

Es gelingt auch nicht, eine Falte aufzuheben, wenn das Auge zu weich ist und die Linse nachgibt und beim Aufsetzen der Pinzette nach rückwärts ausweicht. Auch hier darf der Druck über ein gewisses Maß nicht gesteigert werden, sonst wird die Kapsel verletzt oder Glaskörper erscheint in der Wunde.

b) *Die Kapsel reißt ein.* Dies ist in ungefähr 20—25% der Fall. Das Einreißen der Kapsel kann zu verschiedenen Zeitpunkten eintreten; entweder sofort, nachdem die Falte aufgehoben worden war, also ein Vorgang gleich dem bei dem Gebrauche der gezähnten Kapselpinzette bei der gewöhnlichen Ausziehung. Namentlich wenn eine breite Falte aufgefaßt worden war, gerät die Kapsel beim Schließen der Pinzette in eine so große Spannung, daß sie zerreißt. Oder die Kapsel zerreißt während des Versuches, die Linse von der Zonula freizumachen. Dies ereignet sich auch bei vorsichtiger und einwandfreier Ausführung der Bewegungen mit der Pinzette, wenn die Kapsel schwächer ist als die Zonula Zinnii und das Ligamentum capsulo-hyaloideum. Auch wenn die Linse nach vorne zu ziehen versucht wird, bevor noch ihre Verbindungen gelöst sind, reißt die Kapsel ein. Auch der Widerstand eines starren Pupillarrandes kann das Einreißen der Kapsel verursachen, ebenso der sklerale Wundrand in Fällen von nicht gestürzter Linse. Schließlich ist an dem Einreißen der Kapsel im letzten Augenblick, wenn schon die Linse auf dem Wege nach außen ist, gelegentlich der Zug der Zonulafasern der oberen Linsenhälfte schuld, da sie bis dahin nicht durchrissen worden waren. Die Zonula ist um so kräftiger, je jünger der Patient ist. Die Ausziehung der Linse bei Leuten unter 50 Jahren gelingt daher seltener als bei alten Leuten.

Zerreit die Kapsel, bevor noch die Linse durch die Pupille nach vorne luxiert worden ist, so hat das Verfahren extrakapsulr fortgesetzt und dabei vorgegangen zu werden, wie es auf S. 217 beschrieben worden ist. Meist ist nmlich durch den vorhergegangenen Loslsungsversuch die Linse etwas subluxiert worden und sie mu daher gelegentlich mit dem Spatel zuerst in die richtige Stellung gebracht werden, um das typische Expressionsmanver vornehmen zu knnen.

Es ist oft eine recht mhselige und rgerliche Arbeit, die Linse nunmehr zu entbinden, weil das Auge durch die retrobulbre Einspritzung ganz auerordentlich weich geworden ist. Gelingt es nicht, die Linse durch Druck zu entbinden, so mu die Schlinge eingefhrt werden, um sie dieser entlang aus dem Auge herausgleiten zu lassen; das geht manchmal nicht ohne Glaskrperverlust ab. Von einem Herausmassieren der weichen, zurckbleibenden Linsenreste ist dabei keine Rede.

Die Behauptung, da man bei Milingen der Ausziehung in der Kapsel den Eingriff nun als gewhnliche Ausziehung auerhalb der Kapsel zu Ende fhrt, ist also dahin zu ergnzen, da dies freilich immer mglich ist und zu geschehen hat, da es aber nicht selten ein mhseliges Herumarbeiten an dem Auge bedeutet, wobei oft viel mehr Linsenreste zurckbleiben mssen, als es bei regelrechtem, von vornherein als extrakapsulre Ausziehung angelegten Eingriffe der Fall gewesen wre.

Ist die Kapsel erst im letzten Augenblick gerissen, wenn schon die Linse im Austreten war, so bleibt nicht selten der leere Kapselsack zum Teil in der Wunde, zum Teil noch im Augeninnern liegen, oft sehr schwer als zartes Hutchen wahrnehmbar. Mit groer Sorgfalt mu die Kapsel mit feiner Iriszange aufgefat und langsam aus der Wunde herausgeleitet werden. Jede Berhrung der Glaskrpergrenzhaut ist dabei zu vermeiden, da sonst der Glaskrper selbst vorfllt.

7. *Beim Anlegen der peripheren Irislcke.* Am bequemsten ist es und wird auch von verschiedenen Seiten empfohlen, die periphere Irislcke gleich nach dem Schnitte anzulegen, bevor noch die Naht durchgefhrt worden ist. Dann aber kann es bei der Entbindung der Linse geschehen, besonders wenn sie nicht gestrzt entbunden wird, da sie sich in die Lcke einstellt, besonders wenn diese etwas grer ausgefallen ist, und die Iris unregelmig zerrissen wird. Ganz besonders ist dies der Fall, wenn die Ausziehung extrakapsulr vollendet zu werden hat.

Da nach Entbindung der Linse die Naht sofort geknpft und die Wunde dadurch verschlossen wird, ist gewi die nachtrgliche Anlegung der peripheren Irislcke erschwert. Da auerdem die Regenbogenhaut jegliche Sttze verloren hat, gibt sie der Pinzette mehr nach als sonst und es bedarf eines tieferen Einfhrens der Pinzettenspitze, um Iris aufzufassen. Dadurch besteht eine gewisse Gefahr des Glaskrperaustrittes, da dieser vorgerckt ist und unmittelbar hinter der Regenbogenhaut liegt. Der Umstand, da die Lcke nicht gerade im vertikalen Meridian anzulegen ist, wenn nmlich die Naht geknpft ist, sondern etwas seitlich davon, ist insofern vorteilhaft, da sich die Regenbogenhaut gerade seitlich von der Naht nachtrglich nicht selten gegen die Wunde zu verlagert.

Was die Frage betrifft, ob bei der Ausziehung in der Kapsel der Pupillarrand erhalten oder lieber ein Kolobom angelegt werden soll, so gilt dasselbe wie bei

der gewöhnlichen extrakapsulären Starausziehung. Wenn möglich, trachten wir den Eingriff mit runder Pupille auszuführen. Selbst Linsen mit großem Kern, auch braune Linsen lassen sich durch die runde Pupille oft gut entbinden, da der Pupillarrand durch das Homotropin in seiner Widerstandskraft doch ziemlich ausgiebig geschwächt worden ist. Daß aber durch diesen Widerstand die Kapsel einreißen und dadurch die intrakapsuläre Ausziehung mißlingen kann, wurde schon erwähnt. Wir erhalten die Regenbogenhaut in der oberen Hälfte auch deswegen gerne unversehrt, weil sie wesentlich dazu beiträgt, den Glaskörper zurückzuhalten. Nach Ausführung einer kompletten Iridektomie liegt dieser mit seiner Grenzschicht hinter der Einschnittwunde unmittelbar frei.

Auf keinen Fall darf aber die Entbindung der Linse durch die runde Pupille mit Gewalt zu erreichen getrachtet werden. Es ist besser im Falle eines zu großen Widerstandes der Pupille, die Regenbogenhaut sauber auszuschneiden, als sie beim Durchpressen der Linse unregelmäßig zu zerreißen.

Während sich die Iris nach Ausziehung der Linse — besonders wenn vor dem Eingriffe eine retrobulbäre Einspritzung gemacht worden war — von selbst in die richtige Lage zurückbegibt oder es nur geringer Massage an der Lederhaut mit dem Spatel bedarf, um die Pupille rund zu machen, drängt doch gelegentlich der Glaskörper die Iris oben gegen die Wunde, vereitelt jeden Erfolg des Zurückstreichens der Regenbogenhaut und zwingt auf diese Weise zur kompletten Iridektomie.

8. *Vorfall des Glaskörpers.* Es ist nicht zu leugnen, daß Glaskörpervorfall besonders dann nicht gerade selten ist, wenn vor dem Eingriffe keine retrobulbäre Einspritzung gemacht worden war. Der Druck, der die von der Zonula losgelöste Linse zu stürzen und sie aus dem Auge herausgleiten zu machen hat, trägt gewiß nicht selten zum Glaskörperaustritt bei. Aber auch der *Zug* selbst, ohne jeglichen Druck, führt zu Glaskörpervorfall, wenn die Verbindungen der Linse mit dem Glaskörper zu innige gewesen sind. Bei dem extrakapsulären Verfahren der Starausziehung ist der Glaskörpervorfall, besonders seit Einführung der Akinese, eine große Seltenheit geworden, wenn das Auge sonst gesund war und der Wundarzt eine genügende Übung und Erfahrung hatte. Hier schützt auch große Erfahrung nicht vor diesem Ereignis. Natürlich wird auch hier der in dem Verfahren Geübte seltener Glaskörpervorfall zu beklagen haben als der Ungeschickte. Aber es erscheint auch bei tadellosem Vorgehen gelegentlich Glaskörper in Augen, wo man ihn bei extrakapsulären Verfahren gewiß nicht zu Gesicht bekommen hätte.

Deswegen bestehen ja auch alle Anhänger der intrakapsulären Starausziehung auf der retrobulbären Injektion. Denn durch diese wird das Einreißen der Glaskörpergrenzmembran infolge der starken Herabsetzung des Druckes im Glaskörperraum wenigstens während des Eingriffes nicht sichtbar und auch für den aufmerksamen Beobachter der Eindruck erweckt, daß der Eingriff ohne Glaskörperschädigung durchgeführt worden ist. Ohne Einspritzung hinter das Auge würde nämlich der Glaskörper schon während des Eingriffes ungleich häufiger aus der Wunde treten.

Deswegen ja auch die dringende Forderung, gleich nach dem Schnitte eine Naht anzulegen, eine Forderung, die aus der Erkenntnis entstanden ist, daß bei diesem Verfahren jederzeit mit Glaskörperaustritt gerechnet werden muß.

Die Höhe des Druckes, die notwendig ist und die auch der Geübte erreichen muß, um die Linse zu drehen und aus dem Auge zu schieben, übersteigt in manchen Fällen die — uns im einzelnen Falle ja unbekannte — Widerstandskraft der vorderen Glaskörperschichten. Bei dem extrakapsulären Verfahren braucht ein Druck von solcher Höhe nie ausgeübt zu werden. Bei dem extrakapsulären Verfahren wird ferner auch nicht der innige Zusammenhang der Linsenkapsel mit der Zonula und den Grenzlagen des Glaskörpers zerrissen. Ist dieser Zusammenhang ein sehr inniger, so muß sein Zerreißen zu einem Vordringen des Glaskörpers führen. Während der Geübte bei dem extrakapsulären Verfahren Glaskörper nur in Fällen zu sehen bekommt, wo dieser degeneriert, mehr oder weniger flüssig ist, ist es hier gerade Glaskörper von normaler Konsistenz, der in der Wunde zum Vorschein kommt, mit allen den Nachteilen, die daraus folgen, insbesondere Klaffen der Wunde. Wenn auch die Naht sofort verschlossen wird, so kann er doch zu beiden Seiten der Wunde vordringen und dort die Wunde zum Klaffen bringen und einheilen. Dadurch wird die Pupille verzogen und die Iris entweder nach rückwärts umgeschlagen oder gegen die Wunde verdrängt.

Der sich vorwölbende Glaskörper muß abgetragen, die vorgefallene Iris, falls sie mit der Pinzette gefaßt werden kann, ausgeschnitten werden. Oft aber kann die Pinzette sie nicht erreichen. Ist der Bindehautlappen genügend groß, so kann der Versuch gemacht werden, durch eine 2. Naht die klaffende Wunde zum Verschuß zu bringen. Besonders unangenehm wird die Lage, wenn die Linse wegen vorzeitigen Reißens der Kapsel nicht entbunden werden konnte, da nun die Linse nach den früher gegebenen Regeln (siehe S. 219) mit der Schlinge oder dem Doppelhäkchen herausgeholt werden muß.

Nicht immer tritt der Glaskörper in die Wunde, sondern wölbt sich nur in die vordere Kammer vor, in Form einer Hernie. Daß der Glaskörper auch später noch eine große Neigung zeigt gegen die Wunde vorzudringen, wird weiter unten besprochen werden.

### Störungen im Heilverlauf.

*1. Verzögerung in der Wiederherstellung der vorderen Kammer.* Diese Störung kommt entschieden häufiger vor als bei dem extrakapsulären Verfahren. Oft ist durch mehrere Tage und über 1 Woche hinaus die vordere Kammer sehr seicht. Häufig trägt wie beim extrakapsulären Verfahren ein ungenügender Wundverschluß die Schuld daran: Leichtes Klaffen der Wundecken, Einklemmtsein der Irisperipherie, eingelagertsein eines losgerissenen Kapselstückes oder von Fasern der abgerissenen Zonula Zinnii; gewiß ist aber häufig die Veranlassung dazu die Neigung des Glaskörpers vorzudringen, da er des aus der hinteren Kapsel und der Zonula bestehenden Diaphragmas beraubt worden ist, das ihn sonst zurückhält. Daß die Seichtheit der vorderen Kammer mit einer Aderhautabhebung einhergehen kann, bedarf keiner weiteren Begründung. Denn wegen des beständigen Abfließens des Kammerwassers ist das Auge andauernd weich. Sobald in der vorderen Kammer durch Wundverschluß normale Verhältnisse wiederkehren und die Kammer tief wird, verschwindet die Abhebung.

Der Umstand, daß die vordere Kammer gelegentlich bis zu einer Woche und länger aufgehoben bleibt, kann noch eine andere böse Folge zeitigen. Indem

sich nämlich die während dieser Zeit der hinteren Hornhautwand anliegende Irisperipherie mit dieser verlötet, bildet sich eine periphere vordere Synechie, womit die Grundlage für ein späteres Sekundärglaukom geschaffen ist.

2. *Nachträgliche Verziehung der beim Eingriff selbst rund erhaltenen Pupille.* Es ist im Gegensatz zum extrakapsulären Verfahren kein seltenes Ereignis, daß sich die bei dem Eingriffe selbst rund erhaltene Pupille trotz der peripheren Lücke mehr und mehr nach oben verzieht, insbesondere in den Fällen, wo sich die Herstellung der vorderen Kammer verzögert hatte. Die Iris kann soweit nach oben verlagert werden, daß sie dort ganz verschwindet und ein Kolobom vorzuliegen scheint. Ist sie in die Wunde hinein zu liegen gekommen, so soll sie ausgeschnitten werden, um den bekannten Nachteilen der Iriseinheilung vorzubeugen.

Es gelingt fast nie, die Iris auszuschneiden, ohne daß Glaskörper austritt und man ist gezwungen, unter den ungünstigsten Umständen eine oder mehrere Nähte anzulegen, um die klaffende Wunde zu verschließen.

Wird aber in solchen Fällen die Iris belassen, so wölbt sie sich mit der Zeit mehr und mehr vor, meist ohne von einem Narbengewebe überzogen zu werden. Es bilden sich schließlich mächtige schwarze Buckel, echte Staphylome der Iris. Die Hornhaut wird dadurch aufgestellt, selbst bis zu einer frontalen Ebene und ein solches Auge ist begreiflicherweise so gut wie verloren. Zumindest kommt es für ein brauchbares Sehvermögen kaum mehr in Betracht.

Die Regenbogenhaut kann selbst noch im Laufe von Wochen nach dem Eingriffe nach oben verdrängt werden, trotzdem sie unmittelbar nach der Ausziehung der Linse gar keine Neigung dazu gezeigt hatte. Dieses Ereignis, das von der Übung, Erfahrung und Geschicklichkeit des Wundarztes gewiß ganz unabhängig ist, ist ein schönes Beispiel für die bei diesem Verfahren gesetzte Schädigung des Glaskörpers und seiner Umgebung.

3. *Wundsprenzung und Blutungen* in die vordere Kammer sind nicht häufiger als bei der extrakapsulären Ausziehung. Die Blutungen pflegen sich rasch aufzusaugen. Das Fehlen von Linsenresten ist dabei ein günstiger Umstand, denn bei Vorhandensein von Linsenresten verpacken sich die Blutgerinnsel mit diesen, leisten der Aufsaugung langen Widerstand und wandeln sich nicht selten in Membranen um.

4. *Iridocyclitis* ist nach *glattem* Verlaufe der intrakapsulären Ausziehung entschieden seltener als nach der extrakapsulären, aber sie kommt trotzdem auch vor. Auch hintere Synechien können entstehen, Verklebungen des Pupillarrandes mit der Oberfläche der Glaskörpermasse, die sich bis zu einer ringförmigen Synechie entwickeln und zu den Erscheinungen einer buckelförmig vorgewölbten Iris mit Sekundärglaukom führen können. Bei Eintritt einer, wenn auch noch so geschwächten Form von Iritis ist daher Atropin zu verabreichen und eine ausgiebige Erweiterung der Pupille anzustreben. Kurzwellenstrahlung übt manchmal einen günstigen Einfluß aus. Der schleichende Verlauf der Entzündung führt den Patienten manchmal erst zu spät zurück ins Spital, nachdem das Auge anfänglich glatt geheilt schien.

Die akute Infektion nach dem Eingriffe scheint weniger leicht einzutreten, auch wenn der Bindehautsack nicht rein zu bekommen war. Das Fehlen von Linsen-substanz, die ein guter Nährboden für die Keime ist, dürfte die Erklärung dafür

abgeben. Daher bestimmen wir gerade solche Augen mit nicht zu beeinflussender Bindehautabsonderung und häßlichem Katarrh zur intrakapsulären Ausziehung. Die meisten dieser Augen sind nach glattem Verlaufe der intrakapsulären Ausziehung sogar auffallend wenig gereizt.

Auch bei Diabetes verwenden wir das intrakapsuläre Verfahren, wenn es sonst der Beschaffenheit des Stares nach angezeigt ist, und haben durch den reizlosen und nicht durch Iritis gestörten Verlauf der Heilung damit gute Erfahrung gemacht.

5. *Sekundärglaukom* kann sich, wie zuvor erwähnt, als Folge einer Iridocyclitis einstellen, kann aber auch ohne diese nach Glaskörpervorfall durch Einheilung des Glaskörpers zustande kommen. Diese Form der Drucksteigerung ist sehr hartnäckig und kann trotz aller therapeutischer Bemühungen erhaltender und wundärztlicher Art zum Untergang des Auges führen.

Auch solche Fälle von Sekundärglaukom haben wir beobachtet, wo die Drucksteigerung durch eine Hernie des Glaskörpers in die Pupille zustande kam. Es war nämlich dadurch die hintere von der vorderen Kammer abgeschlossen also eine *seclusio pupillae* hervorgerufen worden.

Die Drucksteigerung infolge einer peripheren vorderen Synechie nach längerem Aufgehobensein der vorderen Kammer nach dem Eingriffe wurde schon früher besprochen.

Es gibt aber auch echte akute sehr schmerzhaftige Glaukomanfälle schon in den ersten Tagen nach diesem Eingriffe.

6. *Netzhautabhebungen* sind beobachtet worden auch nach glatt verlaufenem Eingriffe. Ob sie häufiger sind als nach dem extrakapsulären Verfahren, wie manche behaupten, ist noch nicht sichergestellt.

7. *Glaskörperveränderungen*. Auch Veränderungen des Glaskörpers selbst, besonders in seinen vorderen Schichten, scheinen sich manchmal nach dem Eingriffe einzustellen und sind vielleicht die Ursache, warum in den meisten bisher gebrachten Aufstellungen über die Sehschärfe keine so überragende Sehleistung, auch nicht der Zahl nach, wie man sie hätte erwarten sollen, gegenüber unseren Ergebnissen des extrakapsulären Verfahrens festzustellen ist.

Gelegentlich verdichten sich die vorderen Glaskörperschichten zu deutlich sichtbaren Membranen. Diese sind nicht selten mit abgestoßenen Pigmentkörnchen bedeckt. Das heftige Schlottern der Iris nach der Entfernung der Linse in der Kapsel mag zur Abstoßung von Pigmentkörnchen aus dem Pigmentepithel Veranlassung geben.

#### **Allgemeine Bemerkungen.**

Verläuft die Ausziehung des Stares in der Kapsel in jeder Beziehung glatt, so ist das Ergebnis gewiß als ideal zu bezeichnen. Die gesamte trübe Masse ist entfernt, es sind weder augenblicklich Linsenreste vorhanden, noch kann sich ein Linsennachstar bilden. War im anderen Auge eine Ausziehung aus der Kapsel gleichfalls mit dem besten Erfolge gemacht worden, so ist doch das Sehen mit dem Auge, dessen Star in der Kapsel ausgezogen worden war, noch immer besser, reiner, die verschiedenen optischen Erscheinungen, die die Reste der vorderen Linsenkapsel und auch selbst die zarte, nicht verdickte, hintere Linsenkapsel hervorrufen können (Strahlen um das Licht u. dgl.), fehlen. Es ist auch

richtig, daß man in der Mehrzahl der Fälle dieses ideale Ergebnis erreicht, aber es wäre ein Fehler, in Abrede zu stellen, daß bei diesem Verfahren doch häufiger Komplikationen vorkommen als bei dem gewöhnlichen extrakapsulären. Die durch dieses Verfahren erreichten Spitzenleistungen einer gewissen Anzahl von Augen erkauft man sich mit einem komplizierten Heilverlauf und gelegentlich auch einer endgültigen Minderleistung einer anderen, wenn auch gewiß nur geringen Zahl von Augen. Die Ausziehung in der Kapsel soll nur unternommen werden von einem erfahrenen, die Technik des Operierens vollständig beherrschenden Arzte und selbst dieser muß sich erst die nötige Technik dazu erwerben und die Erfahrung sammeln, die in allen unseren Eingriffen für den Erfolg erst entscheidend ist. Sie ist kein Verfahren für den Anfänger, ja auch nicht für den weniger Geübten und auch nicht für den, der nicht Gelegenheit hat, regelmäßig und viel zu operieren. Sie ist aber auch in der Hand des auf der Höhe der operativen Kunst Stehenden kein Verfahren, das als unbedingt sicher und verläßlich angesprochen werden kann. Es kommt immer wieder vor, daß sich die beabsichtigte Ausziehung in der Kapsel während des Eingriffes selbst als unausführbar erweist aus Ursachen, die weder vorher erkannt werden konnten, noch auch durch die Geschicklichkeit des Operateurs überwunden werden können, oder aber daß sich Komplikationen einstellen, die nicht auf Rechnung ungenügender Technik zu setzen sind und die bei dem gewöhnlichen Verfahren der Ausziehung aus der Kapsel gewiß nicht eingetreten wären. Die Möglichkeit der Ausziehung in der Kapsel hängt von Einzelheiten ab, die wir derzeit durch die Untersuchung des Auges vor dem Eingriffe nicht erkennen können. Man kann in dem einzelnen Falle weder eine Aussage über die Widerstandskraft der vorderen Linsenkapsel noch über die der Zonula Zinii und der Grenzmembran des Glaskörpers machen, insbesondere aber nicht über die Festigkeit, mit der die beiden zusammenhängen. Von dem Verhältnis dieser Umstände untereinander hängt aber in erster Linie die Möglichkeit eines glatten Verlaufes ab. Ist die Kapsel zart und leicht zerreißlich, so wird sie eher zerreißen, als die Zonula nachgibt. Übersteigt der zur Entlastung der Kapsel angesetzte Druck die Widerstandskraft der Glaskörpermembran, so tritt Glaskörper vor. So leicht es für den halbwegs erfahrenen Operateur ist, zu erkennen, wie stark der Druck ist, den er auf ein Auge ausübt, wenn es halbwegs normal gespannt ist (wie bei der gewöhnlichen extrakapsulären Ausziehung), so unmöglich ist es, ihn abzuschätzen, wenn man an einem ganz weichen Auge operiert. Zug und Druck müssen sich in jedem Falle in passender Weise ergänzen, soll der Eingriff glatt ablaufen. Wurde eine retrobuläre Einspritzung gemacht, so ist man ja gegen den Glaskörpervorfall während des Eingriffes so ziemlich gesichert; aber die Vollendung wird eine sehr mühselige Angelegenheit, wenn die Kapsel vorzeitig reißt und die Linse nun aus dem ganz spannungslosen Auge entbunden werden soll. Von einem genügenden Herausmassieren der Reste ist dann keine Rede. Als weitere Folge kommt dann noch, daß dabei gewöhnlich kein großes Kapselstück mit herausgezogen wird, die Kapsel sehr häufig nur eingerissen worden ist und im ganzen, meist sogar etwas seitlich verschoben im Auge zurückbleibt und sich die Reste nur ganz ungenügend aufsaugen. Es geht daher nicht an die durch einen solchen der Not entstammenden Eingriff erzielten Ergebnisse des Sehvermögens unmittelbar mit denen zu vergleichen, wo die Linse in der Kapsel glatt ausgezogen worden war.

Durch die seitliche Verschiebung der Nachstarmembran gestaltet sich dann nicht selten auch ihre Entfernung schwierig. Sehr mühsam und wegen Verletzung des Glaskörpers gefährlich ist die Entfernung der in der Kammer, auf der Iris oder in der Wunde liegen gebliebenen Linsenkapsel, wenn sie im letzten Momente gerissen war. Sie muß mit der Irispinzette sorgfältig aufgefaßt und herausgezogen werden.

Ganz und gar unabhängig von der Kunst des Operateurs ist ferner das Verhalten des Auges nach dem Eingriffe. Wenn auch der Glaskörper, wie eben erwähnt, während des Eingriffes durch die Erweichung des Auges jede Neigung vermissen ließ, sich vorzuwölben, und sich die Pupille von selbst in ihre normale Lage zurückbegab, so kann doch die Neigung des Glaskörpers vorzudringen noch während des Heilverlaufes sich einstellen und die Regenbogenhaut mehr und mehr nach oben verschieben. Ein anderer, erst nach längerer Zeit, wenn auch selten sich einstellender Nachteil ist — wie erwähnt — eine Trübung der vorderen, in der Pupille bloß liegenden Glaskörperschichten, die auch eine Sehstörung ähnlich einem Nachstar herbeiführen können.

Wer mit seinem tausendfach erprobten extrakapsulären und fast immer glatt verlaufenden Verfahren gewohnt war, auch bei ganz unreifen Staren entweder sofort eine runde schwarze Pupille zu erzielen oder, wenn schon Reste zurückblieben, sie in kurzer Zeit verschwinden zu sehen und fast immer die beste Sehschärfe zu erreichen, die in dem einzelnen Falle möglich war, wer bei seinem extrakapsulären Verfahren nur selten zu einer Diszission eines Nachstares gezwungen war, der zeigt begreiflicherweise nur geringe Neigung, ein so sicheres Verfahren gegen ein sichtlich gewagteres Verfahren aufzugeben, auch wenn man die unleugbaren Vorteile dieses Verfahrens gewiß nicht unterschätzt. Es gilt auch hier der Satz, daß das Bessere manchmal der Feind des Guten ist.

## Elftes Kapitel.

### Die Diszission. Die Linearextraktion.

#### Die Diszission.

Mit diesem Namen werden 2 in ihrem Wesen und in ihrer Bedeutung ganz verschiedene Eingriffe bezeichnet, nämlich 1. das Einschneiden der vorderen Linsenkapsel und 2. das Zerschneiden eines Nachstares.

#### A. Das Einschneiden der vorderen Linsenkapsel.

Die vordere Linsenkapsel wird eingeschnitten, entweder um eine trübe Linse im jugendlichen Auge oder eine durchsichtige Linse bei hoher Kurzsichtigkeit zu entfernen.




Abb. 179. Diszission durch die Hornhaut. Umrißzeichnung zur Darstellung, wie der senkrechte Schnitt durch die Linsenkapsel gemacht wird. Die Diszissionsnadel wird in der Stellung *a* in das Auge durch den Limbus eingeführt und ihre Spitze an den oberen Pupillarrand herangebracht. Die Längsachse des Instrumentes ist nicht senkrecht gegen die Ebene der vorderen Linsenkapsel aufgestellt, sondern bildet mit ihr einen Winkel von  $45^\circ$ . Der Durchstichpunkt in der äußeren Augenkapsel wird als Drehpunkt benützt und das Instrument aus der Stellung (*a*) in die Stellung (*b*) geführt. Dadurch macht die Spitze einen senkrechten Schnitt in die Kapsel und vorderen Linsenschichten, der vom oberen bis zum unteren Pupillarrand reicht.

Zur Ausführung des Eingriffes dient die *Diszissionsnadel*, ein kleines Messerchen, dessen Ende mit doppelter Schneide (gewölbt und gehöhlt) versehen ist. Die Nadel wird gewöhnlich durch die vordere Kammer eingeführt: *Diszission durch die Hornhaut*. Um einen Nachstar zu zerschneiden, kann die Nadel auch durch die Lederhaut hinter dem Strahlenkörper eingesenkt werden: *Diszission durch die Lederhaut*.

**Die Diszission durch die Hornhaut** (Abb. 179, 180). Die Pupille ist durch Atropin erweitert. Unter Festhalten mit der Pinzette wird *außen nahe dem Limbus* ungefähr im waagrechten Meridian die Hornhaut des Auges durchstoßen. Sitzt der Arzt zur Rechten des Kranken, so wird der Eingriff am rechten Auge mit der linken Hand, am linken Auge mit der rechten Hand ausgeführt. Die Erweiterung der Pupille hat den Zweck, das Eingriffsgebiet, die vordere

Linsenkapsel, möglichst freizulegen und die Regenbogenhaut vor einer Verletzung zu schützen. Das Messerchen wird zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten und sein Stiel liegt auf dem Grundgliede des Zeigefingers auf. Nach der Durchbohrung wird es in die vordere Kammer so weit vor- und nach oben geschoben, daß seine Spitze nahe dem oberen Pupillarrande zu liegen kommt

(Abb. 179). Indem die Einstichstelle als Drehpunkt benutzt wird, wird der Stiel des Messerchens, dessen Längsachse ungefähr  $45^\circ$  zur Ebene der Linsenkapsel geneigt sein soll, um ungefähr  $90^\circ$  von unten nach oben bewegt. Dadurch macht die Spitze des Messers in die Kapsel und die vorderen Linsenschichten einen Einschnitt von oben nach unten. Der Griff wird darauf gesenkt, in die Ausgangsstellung zurückgebracht und die Spitze in der vorderen Kammer an den *inneren* Rand der Pupille geleitet (Abb. 180). Wird dann von der ungefähr waagrechten Haltung aus der Stiel um ungefähr  $45^\circ$  gehoben, wobei wieder die Einstichstelle als Drehpunkt dient, so erzeugt die Spitze des Messerchens einen waagrechten Einschnitt in die vordere Linsenkapsel. Um es nicht zu tief einzusenken und die hintere Linsenkapsel nicht zu verletzen, wird es noch während dieses Schnittes



Abb. 180. L. A. Diszision durch die Hornhaut. Beginn des waagrechten Schnittes. Die Spitze der Nadel wurde dazu an den inneren Pupillarrand geleitet. Das Auge wird mit der Pinzette unten am Limbus festgehalten.

etwas aus dem Auge zurückgezogen. Darauf wird es in die Ausgangslage zurückgebracht und schnell aus dem Auge herausgezogen, um den Abfluß von Kammerwasser zu vermeiden.

Wichtig ist, die hintere Linsenkapsel nicht zu verletzen. Dies tritt ein, wenn die Nadel zu tief eingeführt oder zu steil aufgestellt wird. Daher muß sie während des senkrechten Schnittes schräg durch die Linsensubstanz gleiten und während des Horizontalschnittes ein wenig zurückgezogen werden. Wird sie bis zur sagittalen Richtung aufgestellt, so durchbohrt die Spitze die hintere Linsenkapsel.

Der Einstich kann in der Hornhaut, am Limbus oder hinter diesem in der Lederhaut gemacht werden. Beim Einstich durch die Lederhaut wird die Nadel unter der Bindehaut des Auges zuerst etwas vorgeschoben, ehe der Durchstich vollzogen wird. Damit ist ein sofortiger Verschluß der Einstichöffnung gewährleistet, da die Wunden in der Bindehaut und Lederhaut an verschiedenen Stellen liegen. Doch kann der Einstich durch die Hornhaut in Fällen angezeigt sein, wo bei seichter Kammer und bei trotz Atropin eng gebliebener Pupille eine Verletzung der Regenbogenhaut bei peripherem Einstiche zu befürchten wäre.

Der Kreuzschnitt bietet den Vorteil einer dauernden Eröffnung der vorderen Linsenkapsel. Die 4 Lappenenden ziehen sich zurück, so daß sich die Kapselwunde nicht mehr schließen kann. Bei Anlegen eines einzigen Schnittes dagegen verheilt der Schnitt bald unter Bildung einer Kapselnarbe. Andererseits sind mehr als die beiden Schnitte überflüssig.

Durch den beschriebenen Eingriff wird vor allem der angeborene Vollstar und der Star im kindlichen Auge beseitigt. Die Diszission ist bei Kindern der Linearextraktion vorzuziehen, da sie keine weiteren Vorsichtsmaßregeln erfordert und bei Kranken dieses Alters genug Zeit zur Verfügung steht, abzuwarten, bis sich nach dem Eingriffe die Linse von selbst gänzlich aufgesaugt hat. Dies vollzieht sich bei kleinen Kindern gewöhnlich in wenigen Wochen. Ausnahmsweise muß der Eingriff noch ein 2. oder 3. Mal gemacht werden, wenn wegen Verschuß der Kapselwunde die Aufsaugung keine Fortschritte mehr macht. Das Hervorquellen von Flocken von Linsensubstanz in die Kammer ist ein Zeichen, daß die Kapselwunde noch offen ist und daher der Eingriff noch nicht wiederholt zu werden braucht.

War der Star schon geschrumpft, was bei angeborenem Star der Kinder nicht gar so selten ist, so ist schon durch die Diszission nach Spaltung der Membran die Pupille frei. Die Operation ist alsdann wesensgleich mit einer Diszission eines Nachstares.

Nicht so selten tritt nach der Diszission, auch wenn der Star schon geschrumpft war, Drucksteigerung ein, die indes in den meisten Fällen unter Gebrauch von Eserin und kalten Umschlägen nach wenigen Tagen verschwindet. Nur im Notfalle wäre eine Punktion der Hornhaut vorzunehmen, die sich auf einen höchstens 2 mm langen Einschnitt beschränken soll, um die Gefahr eines Vorfalles der Regenbogenhaut zu vermeiden.

#### **Über den Zeitpunkt der Starausziehung bei Kindern.**

Haben beide Augen einen angeborenen Star, so soll mit der Operation nicht sehr lange zugewartet und die Operation schon nach wenigen Monaten ausgeführt werden, um den Augen die Möglichkeit der Entwicklung einer guten Sehschärfe zu geben. Wir pflegen daher in solchen Fällen schon im 3. bis 4. Lebensmonate die Diszission vorzunehmen.

Ist aber der Star nur in *einem* Auge vorhanden und das andere Auge davon frei, so beeilen wir uns nicht, da das Starauge auch nachher zum Sehakt nicht herangezogen wird. Der Eingriff wird daher bei einseitigem Star erst später, wenn das Kind größer geworden ist, gewöhnlich nach Vollendung des 1. oder 2. Lebensjahres ausgeführt. Freilich muß man oft dem Drängen der Eltern nachgeben, die das Kind vom Star sobald als möglich befreit haben wollen.

#### **Der Eingriff zur Beseitigung der hochgradigen Kurzsichtigkeit.**

Bei hochgradiger Kurzsichtigkeit wird die *durchsichtige* Linse diszindiert, um sie zur Aufsaugung zu bringen. Als unmittelbare Folge des Eingriffes trübt sich die Linse. Die Schnelligkeit dieses Vorganges hängt in erster Linie von der Größe der Kapselwunde ab. Wurde nur ein einzelner Einschnitt ausgeführt, so bleibt nicht selten die Trübung auf dessen nächste Umgebung beschränkt, da sich die Kapselwunde schließt. Macht also nach einigen Tagen die Trübung

keine Fortschritte mehr, so ist der Eingriff zu wiederholen und die Linsenkapsel ausgiebig einzuschneiden. Bei ausgedehnter Eröffnung der vorderen Linsenkapsel durch den Kreuzschnitt wird die Linse rasch trüb und ihre quellenden Massen füllen alsbald die vordere Kammer aus. Da deren Aufsaugung bei Erwachsenen langsamer vor sich geht als bei Kindern und viele Wochen in Anspruch nimmt, werden nach ungefähr 14 Tagen, nachdem die ganze Linse trüb und weich geworden ist, durch einen Einschnitt mit dem Lanzennmesser am Hornhautrande die Linsenmassen aus dem Auge entfernt. Ist man sicher, die hintere Linsenkapsel bei der Diszission nicht verletzt zu haben, so ist gegen den Einschnitt am unteren Hornhautrande, der wegen der Neigung der meisten Kranken nach oben zu blicken, frei vorliegt, nichts einzuwenden. Sonst ist aber — wenn notwendig unter Anlegen einer Zügelnaht — der obere Hornhautrand dazu zu wählen, um im Falle eines Glaskörpervorfalles und der Notwendigkeit, die Regenbogenhaut auszuschneiden, das Kolobom durch das Oberlid verdeckt zu haben. Bei sehr rascher Quellung der Linse ist die Entfernung der Linsenmassen schon wenige Tage nach der Diszission ratsam. Wenn bei der Diszission die hintere Linsenkapsel nicht verletzt worden ist, geht dieser unbedeutende Eingriff ohne Zwischenfälle vonstatten. Ein 5 mm langer Einschnitt ist genügend groß.

Die Anzeigen zu diesem Eingriffe bei hochgradiger Kurzsichtigkeit sind folgende: 1. Der Grad der Kurzsichtigkeit — unter Atropin skioskopisch bestimmt — muß 16 Dioptrien mindestens übersteigen, sonst ist der Brechungszustand des linsenlosen Auges hypermetrop und der Kranke bedarf nach dem Eingriffe schon zum Sehen in die Ferne konvexer Gläser und für die Nähe noch stärkerer Konvexbrillen. Der durch die Entfernung der Linse erzeugte Brechungsunterschied beträgt etwa 20 Dioptrien durchschnittlich gegenüber 10 bis 11 Dioptrien im normalen Auge. 2. Die Sehschärfe des kurzsichtigen Auges darf durch Veränderungen des Augenhintergrundes (zentrale Chorioiditis) noch nicht zu sehr gelitten haben; sie soll zum mindesten ein Zehntel bis ein Sechstel der normalen betragen und durch kein zentrales Skotom gestört sein. 3. Das andere Auge muß noch brauchbar sein, also nicht durch Netzhautabhebung, Veränderungen in der Macula oder andere Krankheiten gelitten haben. 4. Der Eingriff wird auf Leute unter 40 Jahre beschränkt.

Bei diesen eng gesteckten Grenzen der Anzeigen des Eingriffes sind die Erfolge durchschnittlich gut; ja es gibt kaum einen Eingriff am Auge, der die Kranken — wenigstens anfänglich — so außerordentlich befriedigt, wie dieser. Es ist dies begreiflich, wenn man bedenkt, daß der Betreffende nunmehr das erste Mal in seinem Leben in der Ferne — oft sogar ohne Glas — gut sieht, ja besser sieht, als je zuvor mit den dicken Konkavgläsern, die er obendrein oft genug, auf die Dauer nicht zu ertragen vermochte. Es sind gerade diese Kranken, die zum gleichen Eingriff im anderen Auge drängen, wozu wir uns nur ungern entschließen. Von besonderer Wichtigkeit ist es bei diesem Vorgehen, den Glaskörper zu schonen, da dieser gerade bei kurzsichtigen Augen sehr zu Erkrankungen neigt. Doch ist es oft nicht möglich, ihn dauernd unberührt zu lassen. Während er bei der richtig ausgeführten Diszission der Linse nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, können Eingriffe, die später gegen den sich einstellenden Nachstar ausgeführt werden müssen, nicht ohne Verletzung des Glaskörpers

vollzogen werden. Nachstar aber bildet sich in diesen Augen nach längerer Zeit fast immer. Nachdem die Operierten durch Monate und selbst über 1 Jahr hinaus ein gutes Sehvermögen hatten, wird dieses durch eine allmähliche Umwandlung der hinteren Linsenkapsel in eine dichte wellige Membran mehr und mehr gestört, so daß eine Diszission nicht weiter aufgeschoben werden kann. Daß dieser Eingriff nunmehr nicht ohne Verletzung des Glaskörpers durchgeführt werden kann, ist selbstverständlich. Darin liegt die Gefahr der gesamten operativen Myopiebehandlung.

Auch bei der unmittelbaren linearen Ausziehung der durchsichtigen Linse, wie sie von HESS-SATTLER empfohlen worden ist, bildet sich in der Regel ein Nachstar, der zerschnitten werden muß.

Wenn man einen Nachstar unter allen Umständen verhindern will, so bleibt nichts anderes übrig als die durchsichtige Linse in der Kapsel auszuziehen. Aber es gelingt nur in der Minderzahl der Fälle, die Linse unversehrt in ihrer Kapsel zu entbinden. Der Eingriff hat mit großem Lappenschnitt gemacht zu werden, wie jede Ausziehung in der Kapsel. Erweichung des Auges durch Einspritzung hinter das Auge, um Glaskörpervorfall zu verhindern, ist besonders wichtig, ebenso vollständige Akinese. — Kanthotomie schafft bei besonders großen und vorstehenden Augen leichteren Zutritt. Gelingt es nicht die Linse in der Kapsel herauszubekommen, so bleiben gewöhnlich massenhaft Linsenteile zurück, so daß sie später durch Punktion entbunden werden müssen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die dem Eingriffe unterzogenen kurzsichtigen Augen häufiger an Ablösung der Netzhaut erkranken als die unberührt gebliebenen. Der Kurzsichtige ist vor dem Eingriffe auf die verschiedenen Gefahren aufmerksam zu machen, insbesondere auch darauf, daß die Entfernung der Linse keinen Schutz gewährt gegen das weitere Fortschreiten der Kurzsichtigkeit und gegen Veränderungen im Augenhintergrunde, die gewöhnlich als Folge dieses Leidens früher oder später auftreten.

Man begreift, daß bei solchem Vorgehen die Operation gegen hochgradige Kurzsichtigkeit recht selten geworden ist, um so mehr als es doch bei einer Anzahl von Leuten möglich ist, durch Haftgläser das störende und entstellende Tragen der dicken Brillen auszuschalten.

#### **Zwischenfälle bei der Diszission und Störungen im Heilungsverlaufe.**

**Abfluß des Kammerwassers.** Dem Abfluß des Kammerwassers wird dadurch vorgebeugt, daß sich die Nadel gegen den Stiel allmählich verdickt, so daß die Einstichöffnung stetig geschlossen bleibt, und daß der Eingriff entsprechend schnell ausgeführt wird. Wenn die Regenbogenhaut nach Abfluß des Kammerwassers mit der Stichstelle verklebt, bildet sich eine vordere Synechie. Der Einstich der Nadel hinter dem Limbus verhütet das Entweichen des Kammerwassers und verringert auch die Möglichkeit einer Infektion, die bei dem offen bleibenden Wundkanal eines in der Hornhaut gelegenen Stiches eher möglich ist.

**Drucksteigerung.** Sie tritt gelegentlich im Verlaufe der raschen Linsenquellung nach ausgiebiger Einschneidung der Kapsel auf. Ist die Pupille nicht genügend erweitert, so soll versucht werden, dies durch gute Cocainisierung des Auges und Einlegen von Atropin in Substanz in den Bindehautsack zu erreichen. Eisumschläge auf die geschlossenen Lider üben meist einen günstigen Einfluß

aus. Ist aber die Pupille zur Zeit der Drucksteigerung genügend erweitert, so darf man nicht erwarten, durch das Einträufeln von Miotica die Spannung herabzusetzen. Ist die Drucksteigerung beträchtlich und verschwindet sie nicht innerhalb 24 Stunden, so wird die vordere Kammer mit der Lanze eröffnet, und die geschwollenen Linsenmassen werden herausgelassen.

**Vorfall von Glaskörper.** Die hintere Linsenkapsel darf bei der Diszission sowohl der durchsichtigen als der trüben Linse nicht verletzt werden. Wenn nämlich im Verlaufe der Behandlung die vordere Kammer eröffnet zu werden hat, um den gequollenen Linsenmassen Austritt zu verschaffen, so stellt sich bei eröffneter hinterer Linsenkapsel sofort Glaskörper in die Wunde ein. Die weichen Linsenmassen können alsdann nicht mehr aus dem Auge herausgestreift werden, da bei dem Versuche, dies zu tun, nur noch mehr Glaskörper herausgedrückt würde. Die Regenbogenhaut wird ferner durch den Glaskörper aus ihrer richtigen Lage verdrängt und bleibt dauernd verzogen. Die Verletzung der hinteren Linsenkapsel wird durch schräges Einführen der Nadel vermieden, so daß sie nicht zu tief gerät.

#### **Verbindung der Diszission mit gleich angeschlossener linearer (Lanzen-) Extraktion nach dem Verfahren von A. FABRITIUS (Kronstadt).**

**Anzeige.** Reichliches Auftreten von weichen Starmassen in der vorderen Kammer gleich nach der Diszission bei jugendlichen Staren.

**Eingriff.** Nach Einschneidung der vorderen Linsenkapsel mit der Diszissionsnadel werden die Starmassen selbst mit der Nadel im selben Akte aufgerührt, so daß sie durch die Kapselöffnung in großer Menge in die vordere Kammer eintreten. Nun wird sogleich die lineare Extraktion durch Einstich mit der Lanze außen unten ausgeführt. Eine leichte Depression der peripheren Wundlippe mit der Lanze während des Herausziehens dieser trägt zum leichten Entweichen der Starmassen wesentlich bei. Dieses kann ferner noch durch Streichen auf der Hornhaut mit dem DAVIELSchen Löffel gefördert werden.

**Vorteile.** Vermeidung der Drucksteigerung, wie sie nach Diszissionen nicht so selten eintritt, denn durch die Entleerung des größten Teiles der Linse wird die Kammer sofort tief. Wesentliche Verkürzung der Heilungsdauer.

#### **B. Zerschneidung des Nachstares.**

*Die Diszission durch die Hornhaut* dient ferner dazu, den Nachstar zu zerschneiden. Da dieser die einzige Scheidewand zwischen der vorderen Kammer und dem Glaskörperraum bildet, kann der Eingriff nicht ohne Verletzung des Glaskörpers ausgeführt werden; diese muß daher auf das geringste Maß beschränkt werden. Der Eingriff wird in derselben Weise, wie oben beschrieben, vorgenommen; die Pupille muß durch Atropin gründlich erweitert sein. Gute seitliche Beleuchtung (Fokallampe nach VOGT) ist besonders bei glasigen Membranen, wo mitunter die Pupille ganz schwarz erscheint, unerläßlich. Entsteht schon durch den 1. Schnitt eine freie Lücke, so wird die Nadel herausgezogen. Nur wenn der 1. Schnitt erfolglos blieb, muß ein 2. oder 3. in anderer Richtung angelegt werden, wobei so wenig tief als möglich in den Glaskörper eingegangen werden soll. Man achte besonders darauf, die Lücke in der unteren Pupillenhälfte zu erzeugen, da gerade diese beim Sehen in der Nähe frei sein muß.

### Über den Zeitpunkt der Ausführung der Nachstaroperation.

Bei richtiger Verwendung der Kapselpinzette wird das Sehvermögen später so selten durch einen Nachstar gestört, daß wir nicht häufig Gelegenheit haben, dagegen einschreiten zu müssen. Immer wieder kann man die Beobachtung machen, daß ein Nachstar von einer Dichte und Ausdehnung, daß eine Diszission zur Erlangung guter Sehschärfe angezeigt erscheint, nur in *den* Fällen zustande kommt, wo man aus irgendeinem Grunde entweder die Kapselpinzette gar nicht verwenden konnte oder wo nur ein ungenügend großes Stück damit oder ein Stück in ungünstiger Lage (obere Hälfte der Pupille) entfernt worden ist. Eine Ausnahme davon bilden nur Augen, bei welchen auch die hintere Linsenkapsel mit Epithel überzogen ist, wie bei hoher Myopie, bei Glaskörperverflüssigung, nach Iridocyclitis u. dgl., wo also die hintere Linsenkapsel, die *sonst* weder unmittelbar nach der Staroperation ein optisches Hindernis ist, noch auch dazu werden kann, infolge Wucherung dieses Epithelbelages zu einer dicken Membran wird, die das Sehvermögen schädigt. Freie Linsenreste selbst aber, die bei der Starausziehung zurückgeblieben sind, haben nach ausgiebiger Eröffnung der vorderen Linsenkapsel mit der Kapselzange kaum Gelegenheit, zu einem dauernden Nachstar zusammenzubacken, denn sie werden innerhalb weniger Wochen von selbst (wenn nötig unter Mithilfe von heißen Umschlägen, Dionin u. dgl.) so vollständig aufgesaugt, daß selbst Patienten, die in der ersten Zeit nach der Operation die ganze Pupille damit noch erfüllt hatten, nach Ablauf von wenigen Wochen frei von den Resten sind und gutes Sehvermögen erlangt haben. Dieser Vorteil ist nicht hoch genug einzuschätzen. Es kann nicht genug betont werden, daß eine Nachstardiszission, so leicht und einfach sie zu sein scheint, kein gleichgültiger Eingriff ist. Iridocyclitis (Beschläge an der hinteren Hornhautwand, Glaskörpertrübungen) und Drucksteigerung sind nachher gar nicht selten. Insbesondere die Frühdiszissionen neigen zu solchen Zwischenfällen, wenn sie zu einer Zeit ausgeführt werden, wo das Auge nach der Starausziehung noch etwas gereizt ist. Die Frühdiszissionen sind daher abzulehnen; denn eine Nachstaroperation ist bei der oben geschilderten Ausführung der Eröffnung der vorderen Linsenkapsel bei der Starausziehung so selten notwendig, daß es ganz unberechtigt ist, alle staroperierten Augen überflüssigerweise einem 2. Eingriffe zu unterziehen. Insbesondere ist die Frühdiszission bei freiem Rindenstar zu widerraten; denn während dieser von den meisten Augen unter Atropinbehandlung reizlos vertragen und schließlich aufgesaugt wird, stellt sich gerade bei der Vermengung von Linsenmassen und Glaskörpersubstanz, wie sie durch die Diszission geschaffen wird, eine starke ciliare Reizung und nicht selten selbst eine Entzündung der Iris ein.

**Zwischenfälle.** Kann die Pupille wegen hinterer Synechien durch Atropin nicht erweitert werden, so ist die Regenbogenhaut in Gefahr, durch die Nadel verletzt zu werden, besonders wenn ausnahmsweise die vordere Kammer nicht so tief ist wie sonst. Ist der Nachstar am Pupillenrande angewachsen und von zäher Beschaffenheit, so weicht er der Nadel aus und rückt unter starker Zerrung der Regenbogenhaut nach hinten, wobei es sogar zu Einrissen in die Iriswurzel (Iridodialyse) kommen kann; oder es entweicht die zähe Membran dem Messerchen, indem sie sich an einer Stelle von dem Pupillarrand loslöst und wie ein Deckel nach rückwärts gedrückt wird, um im nächsten Augenblicke, wenn die

Nadel nach vorne bewegt wird, wieder an ihre ursprüngliche Stelle in der Pupille zu rücken. Damit ist aber der Erfolg des Eingriffes vereitelt.

**Diszission mit 2 Nadeln (BOWMAN).** Wenn vorauszusehen ist, daß sich das Häutchen nach dem gewöhnlichen Verfahren nicht wird durchtrennen lassen, so wird die Diszission mit 2 Nadeln nach BOWMAN gemacht. Die eine Nadel wird von der Schläfenseite, die andere von der Nasenseite durch die Hornhaut eingeführt. Die Spitzen der Nadeln werden nahe aneinander durch die Mitte der Membran durchgestoßen. Durch Aufstellung der Griffe bewegen sich die Nadeln in entgegengesetzter Richtung und zerreißen das Häutchen.

**Vorteil.** Ein Vorteil der Diszission mit 2 Nadeln ist besonders dadurch gegeben, daß auch derbe und mit dem Pupillarrand verwachsene Häutchen auf diese Weise zerschnitten werden können, ohne daß die Regenbogenhaut oder der Strahlenkörper gezerrt werden, denn die Kraft wirkt in der Richtung gegen den Pupillarrand und Strahlenkörper zu.

**Nachteil.** Ein Nachteil aber liegt darin, daß fast immer nur die eine, temporal angesetzte Nadel hinter dem Limbus in die vordere Kammer eingeführt werden kann, während die andere Nadel von der Nasenseite her, da sie nicht genügend schräg an das Auge herangebracht werden kann, innerhalb des Limbus die durchsichtige Hornhaut durchbohren muß. Infolgedessen kann es geschehen, daß an dieser Stelle beim Herausziehen der Nadel ein Glaskörperfaden mit herausgezogen wird, der in der Stichstelle eingeklemmt bleibt oder selbst aus ihr heraushängt. Damit ist die Gefahr einer Infektion gegeben. Sie kann früher oder später eintreten. Sie wird am sichersten verhütet durch gründliche Verschorfung der Stichstelle mit dem Thermokauter, um eine feste Narbe zu erzeugen. Auch Sekundärglaukom kann durch diese Glaskörper Einklemmung hervorgerufen werden, desgleichen ist eine schleichende Iridocyclitis mit Präcipitaten keine ganz ungewöhnliche Folgeerscheinung.

Auch ein zusammengesetztes Verfahren, indem die eine Nadel durch die Hornhaut, die andere durch die Lederhaut von rückwärts eingestochen wird, kann von Vorteil sein.

**Die Diszission durch die Lederhaut (Abb. 181).** Dieses Verfahren eignet sich *nur* für Nachstare. Die Diszissionsnadel soll dazu etwas kräftiger sein, als sie zur Diszission durch die Hornhaut gewöhnlich verwendet wird. Der Eingriff durch die Lederhaut erlaubt, die Membran mit einer größeren Kraft zu durchschneiden als beim Einstiche von vorne durch die Hornhaut. Zur Vermeidung verschiedener Zwischenfälle sind dabei folgende Punkte zu beachten: Der Einstich hat hinter dem Strahlenkörper zu geschehen, d. i. in einer Entfernung von mindestens 6 mm vom Limbus und nicht im waagrechten Meridian, um nicht die hintere lange Ciliararterie zu verletzen. Am leichtesten ist es, von außen unten einzugehen, während der Kranke nach innen oben schaut, wobei das Auge mit einer Pinzette festgehalten wird. Die Nadel ist beim Einstich nach vorne gegen die Pupille gerichtet und wird von hinten durch den Nachstar durchgestoßen, so daß ihre Spitze in der vorderen Kammer erscheint (Abb. 181). Indem nun der Griff gehoben wird, zerschneidet die Nadel das Häutchen. Um den Glaskörper nicht unnötig zu verletzen, werden so wenig Schnitte als möglich gemacht. Kommt also schon nach der 1. Schnittbewegung eine schwarze Lücke in der Membran zum Vorschein, so wird die Nadel rasch aus dem Auge heraus-

gezogen. Wenn aber der 1. Schnitt keine freie Lücke hervorbrachte oder die Membran zurückdrückte und sich diese in die Pupille zurückbegibt, muß ein 2. oder selbst 3. Versuch gemacht werden, sie zu zerschneiden. Der Glaskörper wird bei diesem Verfahren nicht wesentlich mehr verletzt als beim Einstiche von der Hornhaut aus. Dagegen bietet der Einstich durch die Lederhaut den Vorteil, die Nadel in einem größeren Bogen zu führen, als wenn sie von der Hornhaut aus durch die tiefe Kammer hindurch schon in steiler Haltung eingebracht werden muß. Denn in solcher Stellung bleibt für den Schnitt nicht viel Bewegungsfreiheit übrig.




Abb. 181. Diszission durch die Lederhaut im linken Auge. Die Diszissionsnadel wurde außen unten hinter dem Strahlenkörper durch die Lederhaut eingestochen und ihre Spitze von hinten durch den Nachstar in die vordere Kammer gebracht. Durch Hebung des Griffes zerschneidet die Nadel das Häutchen.

Nach der Diszission des Nachstares treten — gleichgültig, welches Verfahren dabei angewendet wurde — gelegentlich Drucksteigerung und Cyclitis auf. Die Drucksteigerung verschwindet fast immer nach einigen Tagen auf Gebrauch von Eserin und kalten Umschlägen. Auch die Cyclitis ist eine meist rasch vorübergehende Erscheinung.

Der Eingriff mit der Nadel eignet sich nur für die Membranen, die aus Linsenkapsel und Linsenresten bestehen. Ist aber an der Bildung des Nachstares im Gefolge einer Iridocyclitis nach der Starausziehung eine *Bindegewebsschicht* beteiligt, so ist die Nadel nicht stark genug, die Schwarte ausgiebig zu durchtrennen und muß durch das GRAEFESCHE Messer ersetzt werden. Dieser Eingriff führt den Namen *Kapsulotomie* oder, wenn dabei gleichzeitig auch Regenbogenhaut mitgeschnitten werden muß, *Iridotomie*.

**Iridotomie.** Tritt nach einer Starausziehung mit Glaskörperverlust eine Iridocyclitis ein, so wird die Pupille durch Exsudat, dem mehr oder weniger

Linsenreste beigemengt sind, verschlossen und häufig durch die Schrumpfung der aus dem Exsudat hervorgehenden Bindegewebsmembran nach oben in die Gegend der dichten Narbe verzogen.




Abb. 182. Die Pupille ist gegen die von dem Starschnitt herrührende Narbe nach oben verzogen und durch eine Schwarte verschlossen. Das Auge blickt nach oben, die Haltezange ist seitlich angesetzt. Das GRAEFESCHE Messer wird schräg nach oben gerichtet, durch die Hornhaut im senkrechten Meridian ziemlich nahe dem unteren Limbus eingestochen. Seine Schneide ist nach hinten gerichtet.

Bevor ein Eingriff unternommen wird, muß die Entzündung des Auges vollständig geschwunden sein. Selbst vorübergehende Reizungen, die sich in einer leicht auftretenden ciliaren Injektion kundgeben, sollen nicht mehr vorkommen. Lichtempfindung und Projektion müssen als richtig befunden werden. Der Eingriff hat 2 Zwecke zu erfüllen: nämlich die Pupille rein zu machen und sie, wenn nach oben gegen die Narbe verzogen, so zu verlagern, daß sie hinter die Mitte der Hornhaut zu liegen kommt. Es genügt daher in diesen Fällen nicht, das Häutchen in der Pupille zu zerschneiden, der Schnitt muß vielmehr auch durch die Regenbogenhaut und die hinter ihr liegende Schwarte fortgesetzt werden. Zu diesem Behufe wird unten durch die Hornhaut ein feines GRAEFESCHES Messer eingestochen, dessen Schneide nach hinten, dessen Spitze nach aufwärts gegen die Pupille gerichtet ist (Abb. 182). Das Messer wird beim Einstich so flach angesetzt, daß seine Spitze beim Vorschieben durch die Kammer nach oben in die gegen den Limbus zu verzogene Pupille gelangt, wo sie mit schnellem Ruck durch die Membran durchgestoßen wird, so daß nunmehr die Schneide des Messers in der Membran selbst schon eingesetzt ist. Ein senkrechter Schnitt von oben nach unten durch die Schwarte in der Pupille und durch die Regenbogenhaut erzeugt eine senkrechte Spalte, die bis unter die Mitte der Hornhaut reicht (Abb. 183). Das Messer muß dazu von seiner flachen, zur Ebene der Regenbogenhaut nur wenig geneigten Lage, in der es eingeführt wurde, bis zu




Abb. 183. Lage und Richtung des durch die Iridotomie erzeugten Einschnittes.

einer auf die Ebene der Regenbogenhaut senkrechten Richtung um den Durchstichpunkt gedreht, d. h. aufgestellt werden. Sonst entwickelt es nicht genug Kraft, die Membran zu durchschneiden. Dabei muß ein leichter Druck in der Richtung gegen den Messerrücken zu ausgeübt werden, weil sonst die Schneide des Messers einen Einschnitt in der Hornhaut in der Richtung nach unten macht. Die in der Hornhaut durch den Eingriff erzeugte Öffnung soll aber nicht länger sein, als es eben die Breite des Messers erfordert.

Unmittelbar nach dem Schnitte ziehen sich die Schnittränder zurück und lassen eine breite, oft dreieckig geformte Öffnung in dem Diaphragma zum Vorschein kommen. Nur ein sehr scharfes Messer vermag die Membran glatt zu durchschneiden, ohne die Regenbogenhaut zu zerren. Entweicht diese mit der daran haftenden Membran dem Messer, so wird sie im ganzen nach hinten gedrückt und schließlich von ihrem Ansatz am Strahlenkörper abgerissen. Häufig wird zwar die Schwarte leicht durchtrennt, aber das weiche Gewebe der Regenbogenhaut weicht dem Messer aus, so daß es nicht gelingt, sie einzuschneiden. Unmittelbar nach dem Schnitte wird das Messer aus dem Auge gezogen. Durch die geschlossenen Lider wird mit dem Finger auf das Auge sofort ein entsprechender *Druck* ausgeübt und ein *Druckverband* angelegt. Dieses Vorgehen hat für den Ausgang die *allergrößte Bedeutung*. Durch den Druck wird die Blutung aus den durchschnittenen Gefäßen der Regenbogenhaut und der Schwarte hintangehalten. Eine Blutung würde den Erfolg des Eingriffes in Frage stellen, ja in den meisten Fällen zunichte machen. Es ist bekannt, wie schwer sich ein Bluterguß in die vordere Kammer in Augen, die an einer chronischen Iridocyclitis leiden, aufsaugt. Und wenn endlich nach Wochen das Blut allmählich verschwindet, so findet sich gewöhnlich die durch den Einschnitt erzeugte Lücke aufs neue durch eine Schwarte verschlossen, die aus dem Bluterguß durch Organisation hervorgegangen ist. Der Druckverband kann nach ungefähr 6—8 Stunden abgenommen und durch einen gewöhnlichen Schutzverband ersetzt werden. Nach dieser Zeit ist es zu einem genügenden Verschlusse der verletzten Gefäße gekommen und eine Nachblutung nicht mehr zu befürchten. So mancher schlechte Ausgang der beschriebenen Iridotomie ist entweder auf zu frühzeitiges Eingreifen oder darauf zurückzuführen, daß die Blutung nicht verhindert wurde. Die vordere Kammer hebt sich bei diesem Eingriffe nicht auf, ein Vorfall des Glaskörpers ist ausgeschlossen; der Umstand aber, daß beim Herausziehen des Messers ein Faden von Glaskörper aus der Öffnung der Hornhaut mit hervorgezogen werden kann, fordert zu strenger Aufsicht der Nachbehandlung und Reinhaltung des Bindehautsackes auf. Berühren der Einstichstelle mit dem Thermokauter in dem Falle, daß ein Glaskörperfaden vorgezogen wurde, ist das beste Mittel, eine glatte Vernarbung zu erzielen. Das Auge wird durch einige Tage verbunden gehalten, Bettruhe ist nur am Tage des Eingriffes angezeigt. Durchschnittlich wird ein gutes Sehvermögen erzielt. Bei Erkrankungen des Augeninneren (dichte Glaskörpertrübungen, retinohoroiditische Herde u. dgl.) darf natürlich der ungenügende Erfolg nicht dem Verfahren zugeschrieben werden.

Ein senkrechter Schnitt hat den Vorteil, annähernd parallel zur Faserung der Regenbogenhaut zu verlaufen und daher fast keine Gefäße zu verletzen. Der Nachteil dieses Verhältnisses der Schnittrichtung zur Faserrichtung der

Regenbogenhaut liegt nur darin, daß die Wunde in der Regenbogenhaut bei starker Atrophie dieser nicht klafft und daher der feine, durch den Einschnitt erzeugte Spalt alsbald wieder vollständig geschlossen ist, indem sich die Schnitt- ränder aneinanderlegten. Ein waagrechter, zur Faserrichtung der Regenbogen- haut quer verlaufender Schnitt führt eher zu einer breiten Spalte, weil sich deren Gewebe in dieser Richtung zurückziehen kann. Er muß in richtiger Höhe, d. h. hinter der Mitte der Hornhaut, angelegt werden. Da bei dieser Schnittrichtung Irisgefäße in größerer Zahl durchtrennt werden, hat der Druckverband besonders schnell auf den Schnitt zu folgen. Durch die Atrophie des Gewebes der Regenbogenhaut sind übrigens viele Gefäße verödet und ihre Verletzung ist daher von keiner Bedeutung.

Bei ungenügendem Erfolge ist nichts dagegen einzuwenden, den Eingriff bald zu wiederholen — vorausgesetzt, daß das Auge nicht gereizt ist.

Ist die durch die Schwarte verschlossene Pupille zentral gelegen, so genügt meist ein Einschnitt in die Schwarte selbst, um eine genügend große Lücke zu erzeugen. Die Pupille bleibt alsdann rund erhalten.

Die Irido- oder Kapsulotomie hat gegenüber den verschiedenen anderen empfohlenen Eingriffen, die mit Lanzenschnitt in der Kammer beginnen, den Vorteil, daß die vordere Kammer nicht breit eröffnet wird und kein Glaskörper- verlust eintritt. Ein anderer Vorzug liegt in der Schnelligkeit des Verfahrens, in der schonenden Behandlung der Regenbogenhaut und in dem fast immer befriedigenden Erfolg — wenn ein solcher noch möglich ist.

#### Die Ausziehung des membranösen Nachstares.

**Anzeigen.** In erster Linie dichte Nachstarmembranen, die von vornherein wenig Aussicht geben, durch die Nadeln zerschnitten werden zu können oder welche schon ohne Erfolg angegangen worden sind. Ferner auch an Stelle der Iridotomieverfahren bei angewachsenen Schwarten, oder wenn eine Iridotomie keinen genügend großen Spalt erzeugt hat.

**Ausführung.** Nach Anästhesie des Auges durch Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung Einspritzung von 1 ccm einer 2%igen Novocainlösung mit Adrenalinzusatz hinter das Auge.

Beim ersten Beginn des Weichwerdens des Auges Lanzenschnitt von höchstens 4 mm Länge. Seine Lage hängt von der Richtung ab, in welcher man die Membran herausziehen beabsichtigt. Diese Richtung ist aber hinwiederum gegeben durch die Stelle geringster Dicke der Membran, durch die Lage der in diesen Augen meist verzogenen Pupille, durch den Umstand, von wo aus man die Membran oder wenigstens einen Teil von ihr voraussichtlich am leichtesten an die Oberfläche wird bringen können u. a. m. Ein genaues Durchsuchen der Verhältnisse der Schwarte und der Iris ist unerlässlich, soll das Vorgehen schonend sein und namentlich der Ciliarkörper nicht wesentlich gezerrt und traumatische Schäden verhütet werden.

Zum Einschnitte dient eine schmale, spitze Lanze. Äußerste Schärfe der Spitze namentlich ist Grundbedingung. Auf ungefähr halbem Wege zwischen Zentrum der Hornhaut und Limbus wird die Lanze sehr schräg in der durch die Untersuchung als am günstigsten befundenen Stelle — meist unten, außen unten oder innen unten — eingestochen. Nach Eintritt der Spitze in die vordere

Kammer wird die Lanze etwas vorgeschoben und dann steil aufgestellt, d. h. ihre Spitze nach hinten gegen die Membran oder bei entsprechend verzogener Pupille gegen die Iris gerichtet und mit raschem Vorschieben die Spitze dort durchgestoßen, wo man den einen Rand der neuen Pupille gelagert haben will, während der entgegengesetzte Rand der Stelle des Lanzenschnittes entsprechen soll. Zum Durchstechen eignet sich besonders die Stelle, wo die Membran am dünnsten ist. Langsam wird nun die Lanze herausgezogen. Durch dieses Vorgehen wurde in dem Diaphragma eine kleine Lücke geschaffen. In diese Lücke wird ein stumpfes Häkchen eingesetzt und nun mit größter Vorsicht zu ziehen begonnen, um die Membran gegen die Hornhautwunde zu bringen. Jedes bruske Vorgehen ist strengstens zu vermeiden. In manchem Falle folgt die ganze Membran leicht und schnell dem Zuge des Häkchens, in anderen ist der Widerstand unerwartet groß. Man versucht, die Membran in ihrer Gänze durch die Hornhautwunde herauszuziehen. Sollte sich dies aber als unmöglich herausstellen, so begnüge man sich, einen Teil von ihr vor die Wunde zu bringen und mit der hier bereitgehaltenen WECKERSchen Schere an der Hornhaut, diese selbst mit der Schere während des Schneidens etwas niederdrückend, abzukappen.

War es nicht gelungen, mit der Lanzenspitze eine Lücke in die Membran zu stechen oder findet das stumpfe Häkchen aus anderen Gründen keinen genügenden Halt, so daß es immer wieder abrutscht, so greife man zum spitzen Häkchen, mit dem man fast ohne Ausnahme den Zweck erreicht.

Der Einschnitt durch die Hornhaut war so schief und so kurz angelegt worden, um ein Klaffen der Wunde und das Vortreten von Glaskörper nach Möglichkeit hintanzuhalten. Die Kürze des Einschnittes hat nur den Nachteil, daß in den ganz seltenen Ausnahmefällen, wo man mit dem Häkchen die Membran nicht vorzuziehen imstande ist, das Einführen der Pinzette etwas schwierig ist. Mit der Pinzette kann man mehr Kraft entfalten und ist nicht nur auf Zug in *einer* Richtung beschränkt, sondern kann auch durch seitliche Bewegungen die Verwachsungen lösen. Es eignet sich dazu am besten die Irispinzette wegen ihrer zarten Branchen. Ist ein Loch in der Membran durch die Lanze gemacht worden, so kann eine Branche der Zange hinter die Membran geführt werden, um sie sicherer zu fassen. Wird ein Stückchen Irisgewebe mit der Membran vor die Hornhaut gezogen, so wird es ausgeschnitten. Meist zieht sich die Iris darauf selbst in die richtige Lage zurück. Sollte ein Glaskörperfaden in der Wunde eingeklemmt sein oder aus ihr heraushängen, so wird er abgekappt und die Wunde mit dem Thermokauter zart berührt. Einträufeln von Argyrol beschließt den Eingriff.

**Zwischenfälle, Fehler und Verwicklungen.** Die Ausziehung einer Nachstar-membran erfordert ganz besondere operative Vorsicht und Geschicklichkeit, sonst kann schwerster Schaden angerichtet werden. Die Schwierigkeiten sind durch die Verwachsungen der Membran mit dem Pupillarrand der Iris und in weiterer Entfernung von der Pupille mit dem Ciliarkörper hervorgerufen. Überraschend leicht lösen sich meist die Verlötungen mit dem Pupillarrand. Bei Flächenverlötungen der Membran mit der Iris ist dagegen ein Vorziehen der Membran vor die Wunde ganz unmöglich. Wenn man sieht, daß bei dem Zuge mit der Pinzette die Iris gedehnt wird, daß vielleicht schon Blutungen aus ihr auftreten und die Gefahr einer Iridodialyse eintritt, ist jedes weitere Ziehen zu unter-

lassen. Für solche Fälle ist daher das Verfahren nicht anwendbar und von vornherein davon Abstand zu nehmen. Hier ist vielmehr die Iridokapsulotomie der richtige Eingriff.

Ist der Kapselsack in der Gegend des Äquators nicht mehr bindegewebig verlötet, so löst er sich gewöhnlich leicht schon bei mäßigem Zuge ab, da in diesen Fällen die Zonula Zinnii nicht selten geschädigt und geschwächt ist. Reicht aber die bindegewebige Verschwartung der Nachstarmembran bis an den Ciliarkörper heran, ist also die Schwarte mit diesem verwachsen, so ist größte Vorsicht bei dem Versuche des Herausziehens der Membran geboten. Schon die Schmerzäußerungen des Patienten machen auf den Zug aufmerksam, der auf den Ciliarkörper ausgeübt wird, und nicht selten beweist eine beginnende Formveränderung des Auges — das Eingezogenwerden der Sklera entspricht dem ausgeübten Zug —, daß man an die Höchstgrenze der erlaubten Gewaltanwendung gekommen ist, soll nicht der Ciliarkörper auf das Schwerste verletzt werden. Von einer Entfernung der gesamten Membran ist alsdann Abstand zu nehmen.

Hat man aber dabei die Membran schon bis in die Nähe der Wunde gezogen, so kann der Versuch gemacht werden, den erreichbaren Teil mit einer WECKERschen Schere abzukappen, um wenigstens einen Teil der Membran ausgeschnitten zu haben. Das optische Ergebnis ist nichtsdestoweniger tadellos, wenn der ausgeschnittene Teil im Pupillarbereiche gelegen war. Die retrobulbäre Injektion verhindert durch die Erweichung des Auges den Glaskörpervorfall, wirkt aber anderseits wieder ungünstig, indem die Membran aus dem weichen Auge mit der nachgiebigen Sklera schwerer zu entfernen ist als aus einem gut gespannten Auge. Aber da immer mit Vortreten von Glaskörper zu rechnen ist, darf sie nicht verabsäumt werden.

**Ergebnisse.** Die Ergebnisse sind meist ganz ausgezeichnet. Nicht selten ist man erstaunt, wie schön rund die neue Pupille geworden ist. Ihre völlige Reinheit gestattet ein gutes Sehvermögen, insoweit es die Verhältnisse der Hornhaut und die im hinteren Augapfelabschnitt gestatten. Ein neuer Nachstar kann sich nicht mehr bilden.

#### **Zonulotomie nach KUHNT-STOCK.**

Ist durch die Schrumpfung der an dem Ciliarkörper fixierten Schwarte der Nachstar stark nach einer Seite hin verschoben, so gelingt es manchmal nach Ausführung einer Iridektomie an der entgegengesetzten Seite eine weitere Verlagerung der Membran dadurch zu erzielen, daß man die in dem Kolobom freiliegenden gedehnten Zonulafasern mit einem Messerchen zerschneidet. So kann der Pupillarbereich frei werden.

#### **Die Ausziehung des weichen Stares durch Linearextraktion.**

Die Bezeichnung weicher Star stimmt sehr häufig nicht, indem auch schon in den frühesten Lebensjahren ein kleiner, manchmal sogar recht harter Kern vorhanden ist. Insbesondere bei dem Schichtstar ist der zentrale Teil der Linse schon bei kleinen Kindern oft ein hartes Gebilde, dessen Entfernung durch die kleine Einschnittwunde am Limbus große Schwierigkeiten bereiten kann.

**Anzeigen.** Das 35. Lebensjahr ist ungefähr die oberste Altersgrenze für die Anwendung dieses Verfahrens, da sich in späteren Jahren die Anwesenheit

eines Linsenkernes dabei sehr störend geltend macht. Bei Kindern wird die Linearextraktion ungefähr vom 12. Lebensjahre an vorgenommen, wo sie schon genügend geistig entwickelt sind, sich während des Eingriffes, der in örtlicher Betäubung durchgeführt wird und schmerzlos ist, und nachher ruhig zu verhalten. Sonst wird bei Kindern zur Entfernung des Stares die Diszission mit nachgeschickter Punktion der vorderen Kammer vorgezogen, da sie beide in allgemeiner Betäubung gemacht werden können.

**Gegenanzeigen.** Wir raten nachdrücklich ab, bei ganz kleinen Kindern im Alter von wenigen Monaten und Jahren, die Linearextraktion vorzunehmen,




Abb. 184. Linearextraktion im rechten Auge. Aufsetzen der Lanze. Die linke Hand des Arztes hält das Auge mit der Pinzette oben am Limbus, die rechte Hand setzt die Lanze unten am Limbus ziemlich steil auf. Die Pupille ist erweitert.

denn da ein solcher Eingriff in diesem Alter nur in allgemeiner Narkose ausgeführt werden kann, ist die Gefahr eines Irisvorfalles durch die Unruhe des Kindes nach der Operation zu groß. Wir verwerfen es ganz, die Entfernung eines angeborenen oder jugendlichen Stares mit einer Irisausscheidung zu erkaufen. Die runde Pupille ist von solchem Vorteil für die weitere Zukunft des Patienten und seines Sehvermögens, daß alles daran zu setzen ist, den Star zu beseitigen, ohne Iris zu opfern.

**Ausführung.** Da die Regenbogenhaut nicht ausgeschnitten wird, kann das Auge an einer beliebigen Stelle festgehalten werden. Die Pupille wird durch Homatropin gründlich erweitert. Der Einschnitt wird mit dem Lanzenmesser gemacht.

**Der Schnitt.** Der Gebrauch der Lanze erlaubt dem zur Rechten des Kranken sitzenden Arzte am rechten Auge sowohl wie am linken den Schnitt mit der rechten Hand zu führen. Über die Art, die Lanze zu halten, gelten dieselben

Regeln, die beim Iridektomieschnitte beschrieben sind. Einzelheiten über die Lage des Schnittes siehe S. 272. Die unten am Limbus ziemlich steil auf das Auge aufgesetzte Lanze (Abb. 184) wird, nachdem ihre Spitze den Limbus durchbohrt hat, parallel zur Regenbogenhaut umgelegt und, ohne Druck nach vorne oder hinten, vorgeschoben, bis der Schnitt die gewünschte Länge (6 bis 8 mm) erreicht hat (Abb. 185). Ist die Regenbogenhaut gut zurückgezogen, so besteht für sie keine Gefahr, verletzt zu werden. Wie bei allen Schnitten, die die vordere Kammer eröffnen, darf auch hier während des Einführens der Lanze nicht eingehalten werden, da sonst durch Abfluß des Kammerwassers der Schnitt nicht weiter verlängert werden kann. Die Lanze wird langsam aus dem




Abb. 185. Linearextraktion. Zweiter Teil der Schnittführung. Die Lanze ist umgelegt und nach oben vorgedrungen. Der Schnitt liegt genau im Limbus.

Auge herausgezogen, damit das Kammerwasser nur allmählich abfließt. Sehr häufig wird die Pupille in dem Augenblicke, wo sich die vordere Kammer aufhebt, ziemlich eng. In anderen Fällen wird die Regenbogenhaut durch das Kammerwasser in die Wunde geschwemmt.

**Eröffnung der vorderen Linsenkapsel.** Die Kapselpinzette wird dazu aus den schon seinerzeit angegebenen Gründen vorgezogen. Ist die geschlossene Pinzette in der Pupille angelangt, so wird sie etwas aufgestellt, so daß die hinteren, nicht gezähnten Armteile die Regenbogenhaut nicht mitfassen können. Kann bei kurzem Schnitte und enger Pupille die Pinzette nicht eingeführt oder nicht geöffnet werden, so wird die Kapsel mit dem spitzen Häkchen einige Male eingeschnitten. Dieses wird ohne Druck aufgesetzt, um die Linse nicht zu verschieben.

Es ist auch von Vorteil, das Häkchen durch die Linsensubstanz selbst in verschiedenen Richtungen hin und her zu führen, um sie zu zerstückeln, wenn

namentlich die zentralen Teile schon etwas härter geworden sein sollten, wie es gelegentlich schon bei kindlichen Staren und bei Schichtstar vorkommt.




Abb. 186. Linearextraktion. Ausdrücken der Linsenmassen aus dem Auge. Der in der rechten Hand gehaltene Löffel drückt die lederhautseitige Wundlippe etwas nieder und bringt die Wunde dadurch zum Klaffen. Der in der linken Hand gehaltene Löffel führt streichende Bewegungen auf der Hornhaut in der Richtung von oben nach unten aus.

**Entfernung der Linse.** Bei völliger Weichheit des Stares braucht nur die lederhautseitige Wundlippe mit dem Löffel niedergedrückt zu werden, um ihn durch die klaffende Wunde zu entbinden. Streicht zu gleicher Zeit ein anderer Löffel auf der Hornhaut von oben nach unten unter geringem Drucke (Abb. 186, 187), so entweicht die Masse noch leichter. Gelegentlich erscheinen in der Pupille, nachdem sie schon schwarz war, durch das Massieren neue getrübte Linsenteile, die sich oben hinter der Regenbogenhaut befunden hatten, und müssen nun von hier erst durch die Wunde nach außen gebracht werden. Zähle Linsenteile werden mit dem DAVIELSchen Löffel herausbefördert.



Abb. 187. Umrißzeichnung. Stellung der beiden Löffel zur Ausdrückung der Linsenmassen bei der Linearextraktion.

Am Schlusse des Eingriffes wird die Regenbogenhaut zurückgestrichen, ein Verband über beide Augen für 1 Tag angelegt, sowie Bettruhe angeordnet. Bei glattem Heilungsverlaufe kann der Verband nach 6 Tagen weggelassen werden.

**Zwischenfälle.** Enthält der Star ausnahmsweise einen größeren Kern, so stemmt sich dieser gegen die Wundränder und kann wegen der Kürze des Schnittes nicht entbunden werden. Da zu starker Druck Vorfall des Glaskörpers erzeugt, wird mit der Schere an der einen oder an beiden Wundecken der Schnitt verlängert, worauf der Kern leicht entweicht.

**Vorfall der Regenbogenhaut** stellt sich gelegentlich beim Herausdrücken der Linsenmassen ein. Er wird zurückgestrichen.

Besondere Aufmerksamkeit erheischt die Behandlung der Regenbogenhaut. Sie darf weder beim Schlitze noch bei Eröffnung der Linsenkapsel verletzt, noch auch beim Herausstreifen des Stares durch den Löffel oder beim Zurückstreichen mit dem Spatel zu viel beleidigt werden. Eine zerrissene Regenbogenhaut läßt sich nicht sauber zurücklegen und gibt durch Schrumpfung oder durch Anwachsung an die Hornhautnarbe zu unangenehmen Folgen Veranlassung. Sie soll bei einer erheblichen Verletzung ausgeschnitten werden. Das in der Lidspalte freiliegende Kolobom stört aber das Sehvermögen. Für einen solchen Fall wäre es besser, den Schnitt oben angelegt zu haben. Da aber der Eingriff fast immer glatt verläuft, so wird die Gelegenheit, den Schnitt unten anzulegen, wegen der Neigung der Augen, bei Berührung nach oben zu blicken, von den meisten Ärzten gerne benutzt. Seit Einführung der Zügelnaht durch den Rectus superior fällt dieser Umstand weg und ich pflege daher den Schnitt bei fast allen Linearextraktionen nach oben anzulegen, ganz besonders bei der Operation komplizierter jugendlicher Stare, wo von vornherein mit verschiedenen Verwicklungen und der Möglichkeit zu rechnen ist, die Regenbogenhaut ausschneiden zu müssen. Bei Staren an der angegebenen Altersgrenze soll auf jeden Fall der Schnitt oben angelegt werden, um ihn bei Vorhandensein eines größeren Kernes ohne Schaden verlängern und die Regenbogenhaut ausschneiden zu können, wenn sie vorkommen sollte.

**Ausziehung der Linse in der Kapsel.** Wegen der Verdickung der Linsenkapsel bei manchen komplizierten Staren folgt gelegentlich dem Zuge der Kapselpinzette die Linse samt dem Kapselsack. Der Austritt der Linse in der Kapsel wird durch Niederdrücken der peripheren Wundlippe mit dem Spatel erleichtert. Die Gefahr des Glaskörpervorfalles ist dabei nicht hoch einzuschätzen. Da nämlich in diesen Augen der Glaskörper meist flüssig und die Spannung herabgesetzt ist, so hat die Wunde keine Neigung zum Klaffen und die Pupille bleibt meist in ihrer richtigen Stellung.

**Vorfall des Glaskörpers.** Von ernsterer Bedeutung ist der Vorfall gesunden Glaskörpers, da dann die weichen Linsenmassen nicht weiter entfernt werden können und die Regenbogenhaut nicht mehr zurückgestreift werden kann, so daß die Pupille dauernd verzogen bleibt. Außerdem klafft die Wunde und — wenn am unteren Limbus angelegt — wird ihre Heilung überdies durch das untere Lid gestört, weil sich dieses bei Blickbewegungen immer wieder gegen die Wunde anstemmt. Es kann in solchen Fällen unerläßlich werden, eine Naht anzulegen, um die Wundränder gut anzupassen.

Sichert der vollständig verflüssigte Glaskörper unmittelbar nach dem Schlitze andauernd aus dem Auge, so daß dieses ganz weich wird und zusammensinkt, so beschränkt sich der weitere Eingriff mit Rücksicht auf die Unmöglichkeit, Linsenmassen aus dem spannungslosen Auge herauszustreifen, auf die Eröffnung der vorderen Linsenkapsel mit dem spitzen Häkchen. Durch Atropin wird in den folgenden Wochen die Pupille weit erhalten, um dem Kammerwasser den Eintritt in den Kapselsack zur Aufsaugung der Linse offen zu halten. Wenn notwendig, wird eine Diszission des zurückbleibenden Kapselsackes nachgeschickt.

Eine im Verlaufe der Aufsaugung auftretende Drucksteigerung wird, wenn nötig, durch wiederholte Punktion der Vorderkammer mit winzigem Einschnitte bekämpft.

Ist es aber nicht gelungen, die vordere Kapsel einzuschneiden, so bleibt nichts übrig, als die Heilung der Wunde abzuwarten, denn es ist nicht empfehlenswert, den Versuch zu machen, die Linse aus dem zusammengefallenen Auge mit der Schlinge herauszuholen. Erstens ist es technisch sehr schwierig, durch die kurze und nicht klaffende Wunde das Instrument durchzupressen. Es kann nur mit einer gewissen Gewalt geschehen und dabei mag gelegentlich auch der Ciliarkörper beschädigt werden. Außerdem aber wird sehr häufig mit der Schlinge die weiche Linse zerdrückt, so daß man nur unbedeutende Mengen von Linsensubstanz entbindet und daher trotz dem schweren Eingriffe doch erst wieder auf die spontane Aufsaugung warten muß, und drittens reagieren nach diesem Eingriffe solche Augen später nicht selten mit einer Abhebung der Netzhaut.

Nach Heilung der Wunde, welche gewöhnlich sehr rasch erfolgt, wird die Ausziehung des Stares nach einem Verfahren vorgenommen, wie es von FABRIUS (Kronstadt) zu anderem Zwecke (siehe S. 255) vorgeschlagen und angewendet worden ist.

Nach gründlicher Erweiterung der Pupille durch Homatropin wird nach schrägem Einstich der Diszissionsnadel durch die Sklera hinter dem Limbus in die vordere Kammer nicht nur die vordere Linsenkapsel eingeschnitten, sondern durch entsprechende Hebelbewegungen, nachdem die Spitze der Nadel um den Rand des Linsenkernes herum in den hinteren Teil der Linse vorgeschoben worden ist, der Linsenkern in die vordere Kammer luxiert. Durch das schräge Einstechen der Diszissionsnadel hinter dem Limbus im Gebiete der Sklera beugt man dem Abfließen des Kammerwassers vor. So ist man nun in der Lage, durch eine Punktion, deren Einschnitt möglichst klein und eben nur so groß gewählt wird, daß der meist kleine Kern herauschlüpfen kann, die weichen Linsenmassen und den Kern durch leichten Druck auf den skleralen Wundrand mit einem Löffel aus der Kammer zu entbinden. Gelegentlich ist es von Vorteil, den Löffel in die vordere Kammer hinter den Kern einzuführen, damit dieser entlang dem Löffel herausgleiten kann. Wird mit einem Spatel eine entsprechend gerichtete Massagebewegung mit leichtem Druck auf die Hornhaut ausgeübt, so geht das Entweichen der Massen gewöhnlich leicht vor sich. Die Kürze der Wunde verhindert einen Vorfall der Iris um so eher, als wegen des in die vordere Kammer übergehenden flüssigen Glaskörpers die Kammer bei diesem Eingriffe gewöhnlich tief bleibt. Eserin nach der Operation trägt gleichfalls dazu bei, die Pupille rund zu erhalten. Am Tage nachher findet man die vordere Kammer tief, die Pupille rund und behandelt nun, wenn noch Reste zurückgeblieben sind, in der gewöhnlichen Weise mit Atropin nach. Ich habe in mehreren Fällen, wo anderen Ärzten der Versuch einer Extraktion solcher Stare jugendlicher Leute mit verflüssigtem Glaskörper wegen vollständigen Kollapses des Auges mißlungen war, das FABRIUSSCHE Verfahren mit vollem Erfolge ausgeführt.

## Zwölftes Kapitel.

### Die Eingriffe gegen Drucksteigerung.

**Einleitung.** Trotz aller Bemühungen, für das Glaukom die friedliche Behandlung durchzusetzen, steht auch heute noch die wundärztliche Behandlung an erster Stelle. Der Unterschied gegenüber früheren Jahren besteht nur darin, daß wir heute mit der Diagnose Glaukom nicht schon die unbedingte Anzeige zu einem sofortigen Eingriffe für gegeben erachten. Ein Eingriff wird nur vorgenommen, wenn sich die medikamentöse Behandlung der Krankheit als erfolglos erweist oder wenn, wie bei akuten Anfällen, die Notwendigkeit sofortiger Beseitigung des das Sehvermögen auf das Schwerste gefährdenden Zustandes dringend geboten ist. In allen anderen Fällen geht zuerst eine eingehende Beobachtung des Kranken der Entscheidung, ob ein Eingriff gemacht werden soll, voraus. Wiederholte Aufnahmen des Sehvermögens und des Gesichtsfeldes, insbesondere seiner Einzelheiten nach dem Verfahren von BJERRUM, also Beobachtung des blinden Fleckes und seiner Veränderungen, der peripheren Gesichtsfeldstörungen usw., Anlegung der Druckkurve, Beobachtung des Einflusses der verschiedenen Medikamente auf den intraokularen Druck und den Verlauf der Kurve, Durchführung der verschiedenen Verfahren zur Prüfung der Beeinflussbarkeit der Druckwerte (Dunkelversuch, künstliche Erweiterung der Pupille u. a.) werden in allen Fällen zuerst durchgeführt, wo nicht ein dringendes Eingreifen erforderlich ist. Auch auf die Behandlung des Allgemeinzustandes wird Sorgfalt verwendet, ohne daß man aus den verschiedenen Maßregeln (Aderlaß u. dgl.) einen entscheidenden Einfluß auf die Augenkrankheit erwarten darf.

Die Behandlung mit Tropfen (Pilocarpin, Eserin, Adrenalin, Glaukosan, Histamin) darf nur solange fortgesetzt werden, als der Fortschritt der Krankheit damit aufgehalten werden kann. Es darf nicht geduldet werden, daß sich unter der Tropfenbehandlung Veränderungen des Auges einstellen, die als eine dauernde Schädigung des Auges und seiner Leistung zu bewerten sind: Vorrücken der Gesichtsfeldgrenzen gegen das Zentrum und Größerwerden des parazentralen Skotoms in bedenklichem Maße, insbesondere aber Herabsetzung der Sehschärfe, Ausbildung einer totalen Exkavation u. a. Wie lange man einen Glaukomkranken mit der Tropfenbehandlung ohne Eingriff hinhalten kann, ist ganz verschieden und im einzelnen Falle nicht von vornherein zu erkennen. Man weiß ja doch auch nicht, wie rasch die Erkrankung bei dem einzelnen ohne jede Behandlung fortschreitet. Man soll daher mit der Einschätzung des Wertes der Tropfenbehandlung vorsichtig sein, auf keinen Fall aber ihr einen „heilenden“ Einfluß auf das Glaukom beimessen. Das einzige was man über den Erfolg der verschiedenen Medikamente aussagen kann, ist, daß sie imstande sind, vor-

übergehend den Druck mehr oder weniger herabzusetzen und daß die neuen Mittel, wie Glaukosan, dies nicht selten auch noch bei Augen zu erreichen vermögen, bei welchen die bekannten Miotika nicht mehr gewirkt haben. Aber nach einer gewissen Zeit versagt die friedliche Behandlung fast immer und die wundärztliche muß an ihre Stelle treten. Günstige Berichte über einzelne Fälle oder auch Gruppen von Fällen haben gar keinen Wert. Nur an einer großen Klinik kann man sich über den heutigen Stand und Wert der friedlichen Behandlung ein wahres Bild machen und da muß man bekennen, daß fast alle in friedliche Behandlung übernommenen Kranken, soweit sie nicht mit der Zeit aus der Beobachtung kommen, schließlich operiert werden müssen, um weiteren Schäden vorzubeugen, da diese trotz der Tropfenbehandlung mehr und mehr zutage treten. Gleichzeitig aber kommt man an einer solchen Stätte des Wirkens auch zur Überzeugung, daß man mit den Eingriffen doch die größte Zahl der Glaukome beherrscht und daß es im Verhältnis zur Zahl der dadurch geheilten immer doch nur eine kleine Gruppe von Fällen ist, die trotz dem Eingriffe noch weiter zur Behandlung in die Klinik kommen müssen; daß es doch nur Ausnahmefälle sind, wo man wiederholt operieren muß und wo trotz aller Bemühungen das Sehvermögen schließlich zugrunde geht, und daß es nur ganz selten vorkommt, daß Augen durch den Eingriff selbst schlecht beeinflußt werden. Mit diesen Worten sollen die so lobenswerten Bestrebungen der für die friedliche Behandlung eintretenden Ärzte nicht etwa in unbilliger Weise herabgesetzt werden. Ich halte es aber für notwendig, den heutigen Stand unserer Kunst mit diesen Worten deutlich zu kennzeichnen, um nicht falsche Hoffnungen darüber aufkommen zu lassen, was wir heute mit der friedlichen Behandlung des Glaukoms zu leisten imstande sind. Nie lasse man von allem Anfange an bei dem Kranken die falsche Hoffnung aufkommen, er werde mit den Tropfen sicher „geheilt“ werden. Von vornherein soll die friedliche Behandlung nur als ein *Versuch* dargestellt werden, den weiteren Fortschritt der Krankheit aufzuhalten, und dem Kranken klargemacht sein, daß sie im Falle des Mißlingens ohne weitere Debatte durch die operative Behandlung abgelöst zu werden hat. Sonst wird in der Vorstellung des Kranken der Grund gelegt zu einer falschen Einschätzung des Wertes der friedlichen Behandlung im Verhältnis zum Eingriffe, die ihn mit Recht gegen den Eingriff einnehmen und ihn schließlich verabscheuen läßt, und es besteht die Gefahr, daß die kostbarste Zeit für den Eingriff versäumt wird. Auch heute gilt noch die Regel, daß jeder Eingriff am Glaukomaug — von Ausnahmefällen abgesehen — um so bessere Erfolge erzielt, je früher er vorgenommen wird. Mit dem Fortschreiten der Krankheit stellen sich solche anatomische Veränderungen ein, daß der spät durchgeführte Eingriff sehr häufig versagen muß. Damit besteht die Gefahr, daß er in Mißkredit kommt, während an dem Fehlschlage in Wirklichkeit die zu lange Dauer der friedlichen Behandlung schuld gewesen ist.

Wie oft hatte ich als Vorstand einer großen Krankenanstalt die schwere Aufgabe, Kranke, die von anderen Ärzten durch lange Zeit mit Tropfen behandelt worden waren, nunmehr infolge eines akuten Glaukomanfalles, da die Tropfen dabei völlig versagten, unter den allerungünstigsten Umständen operieren zu müssen, bei so weit vorgeschrittenen glaukomatösen Veränderungen des Auges, daß auch ein gelungener Eingriff nur noch ein ärmliches Ergebnis für die Sehleistung haben konnte. Wie leicht wäre in den meisten dieser Augen ein Ein-

griff in früherer Zeit gewesen und wie gut hätte damals nach dem Eingriffe das Auge noch sehen können. Daß sich viele praktische Ärzte dem frühzeitigen Eingriffe gegenüber recht zurückhaltend benehmen, ist freilich begreiflich, wenn man bedenkt, daß jeder Eingriff bei Glaukom mit einer gewissen Gefahr für das Auge verbunden ist und daß in allerdings sehr seltenen Fällen ein noch gut sehendes Auge dabei sogar zugrunde gehen kann, ohne daß man vorher eine solche böse Folge des Eingriffes erkennen konnte.

Immer wird es als besonderer Vorteil der friedlichen Behandlung gerühmt, daß es mit ihr gelinge, den Eingriff auf Monate, in manchen Fällen auf Jahre hinauszuschieben. Da muß man sich aber doch fragen, ob darin wirklich gar ein so großer Vorteil gelegen ist. Für viele Menschen ist das Bewußtsein, an einer Krankheit zu leiden, die jeden Augenblick zu einem schweren, gefährlichen Anfall führen kann und zu deren Heilung sie sich voraussichtlich schließlich doch einem Eingriffe unterziehen müssen, eine schwere Last, die sie in einen nervösen Reizzustand versetzt, der selbst wieder einen schlechten Einfluß auf die Krankheit nehmen kann, und ich erinnere mich an eine Reihe von Fällen, die nach glücklich verlaufenem Eingriffe und Entlassung aus der monatelang dauernden und ihnen schon unerträglich gewordenen „friedlichen“ Behandlung förmlich neu aufgelebt sind.

## **A. Eingriffe gegen das primäre Glaukom.**

Im Gegensatz zu den anderen wundärztlich zu behandelnden Augenkrankheiten, bei denen man meist mit einer ganz geringen Anzahl von Verfahren vollkommen sein Auslangen findet und die zahllosen Abänderungen und Vorschläge anderer Art als ganz überflüssig empfindet, ist beim Glaukom die Kenntnis einer großen Anzahl verschiedener Verfahren unabweislich. Denn es gibt immer wieder Fälle, bei denen die gebräuchlichen Verfahren versagen und man andere seltener geübte heranziehen muß. Dies ist der Grund, warum gerade bei diesem Abschnitt des Glaukoms eine ganze Anzahl von verschiedenen Verfahren an der Klinik im Gebrauche stehen.

### **I. Die Ausschneidung der Regenbogenhaut (Glaukomiridektomie).**

**Anzeigen.** Die Hauptanzeige für die Iridektomie ist der akute Glaukomanfall sowie das chronisch sichtlich entzündliche Glaukom, also jene Fälle, wo die Krankengeschichte und Beobachtung ergibt, daß sich zeitweise der Druck mehr oder weniger stark erhöht und sich die bekannten subjektiven und objektiven Erscheinungen der Druckerhöhung am Auge einstellen. Das soll nicht besagen, daß die Iridektomie bei ganz schleichend verlaufendem chronischen Glaukom wirkungslos sei. Wir wissen aus früheren Jahren, daß auch solche Fälle, besonders im Frühstadium, durch eine Iridektomie auf die Dauer gut beeinflußt werden können. Heute freilich sind für diese Fälle andere Verfahren getreten.

#### **Vorbereitungen.**

**Verengung der Pupille.** Vor jedem Eingriff gegen Glaukom wird die Pupille durch häufigen Gebrauch von Pilocarpin oder Eserin so klein als möglich gemacht. Starke Drucksteigerung und vorgeschrittener Schwund des Gewebes der Regenbogenhaut vereiteln nicht selten den Erfolg der Tropfen.

**Örtliche und allgemeine Betäubung.** Auch bei stark entzündeten und schmerzhaften Augen ist es fast immer möglich, die Schmerzen beim Eingriff durch örtliche Betäubung erträglich zu gestalten. Nur in Ausnahmefällen wird zur allgemeiner Betäubung leichter Art geschritten, z. B. durch subkutane Pantoponeinspritzungen (0,02). Auch Luminal 0,2 intern 1 Stunde vor dem Eingriffe ist sehr zu empfehlen. Die Cocainisierung mit 5%iger Lösung wird unter Mithilfe von Suprarenin gründlich durchgeführt und die Gegend des Einschnittes durch einen unmittelbar vorher aufgelegten 10%igen Cocaintupfer noch besonders unempfindlich gemacht.

Wenn sich der Kranke nur halbwegs vernünftig benimmt und im Hinunterschaun nicht ganz versagt, ziehen wir die S. 188 beschriebene Einspritzung von Novocain-Adrenalin unter den Rectus superior, zur Erleichterung des Hinunterschauens, der Zügelnaht vor. Freilich bei ganz widerspenstigen Kranken ist auch hier die Zügelnaht nicht zu vermeiden. Sie beseitigt alle die vielen Schwierigkeiten, die sich vorher auch bei größter Geschicklichkeit des Arztes einstellen mußten, wenn die Kranken nicht dazu zu bringen waren, von selbst nach unten zu sehen. Aber wir verwenden sie heute bei der Glaucomiridektomie doch nur ausnahmsweise. Nicht die Naht als solche hat Nachteile an sich, sondern die Notwendigkeit, nach Anlegen der Naht den Lidlöffel einlegen zu müssen. Dieser verhindert nämlich sowohl beim Eingehen mit der Pinzette zum Hervorholen der Iris als auch namentlich bei Eingehen mit dem Spatel zum Zurückstreifen der Iris die richtige Lage der Instrumente. Man kann sie nicht flach genug an das Auge annähern und durch die Wunde vorschieben, sondern man muß sie zu steil halten, und dadurch ist die Gefahr einer Linsenverletzung außerordentlich groß. Wenn schon Zügelnaht unvermeidbar, so wird der Löffel nur während dem Schnitte eingelegt, dann aber sofort herausgenommen und das Lid ohne




Abb. 188.

ihn mit dem Finger emporgehalten, während mit der Naht das Auge nach unten gezogen wird.

Unter allen Umständen ist der Blutdruck des Kranken zu messen. Ist er erhöht, so wird unmittelbar vor dem Eingriffe ausgiebig zur Ader gelassen.

**1. Der Schnitt.** Der Schnitt für die Ausschneidung der Regenbogenhaut bei Glaucom wird oben in der Lederhaut angelegt,  $1\frac{1}{2}$  mm hinter dem Limbus, entweder mit der Lanze oder dem GRAEFESCHEN Messer.

**Der Schnitt mit der Lanze.** Zu einem Lanzenschnitt eignen sich nur Augen, deren vordere Kammer nicht sehr seicht, insbesondere deren Kammerwinkel nicht etwa durch eine periphere vordere Synechie verschlossen ist und deren Pupillen gut verengert sind.

Der zur Rechten des Kranken sitzende Arzt hält das Auge unten im senkrechten Meridian mit der Pinzette. Die Lanze wird in der rechten Hand gehalten zwischen Daumen auf der einen und Zeige- und Mittelfinger auf der anderen Seite des Griffes, während sich der kleine Finger auf den Kopf des Kranken




Abb. 189. Glaukomiridektomie. Beginn des Schnittes mit der Lanze. Der Gehilfe hebt das obere Lid mit dem Lidlöffel und hält die Zügelnaht. Die Lanze wird in einem Abstand von gut 1 mm vom Limbus steil auf die Lederhaut aufgesetzt.

stützt. Das Auge ist nach unten gedreht. Die Spitze der Lanze wird  $1\frac{1}{2}$  mm hinter dem Limbus auf die Lederhaut aufgesetzt, und zwar nicht senkrecht, sondern ungefähr in einem Winkel von  $45^\circ$ .




Abb. 190. Die Lanze ist in die Ebene der Regenbogenhaut umgelegt und wird so gehalten, daß sich der Schnitt in seiner ganzen Länge in gleichem Abstände vom Limbus befindet. Die Lanze dringt noch weiter nach unten als hier in der Zeichnung dargestellt. (Siehe Abb. 191.)

In der Abb. 188 stellt die Linie *c d* die Richtung des Eindringens der Lanzen-  
spitze dar, wenn die Lanze senkrecht auf die Lederhaut aufgesetzt würde. Es  
ist aus der Zeichnung ohne weiteres ersichtlich, daß bei dieser Einstichrichtung

eine Verletzung der Regenbogenhaut unvermeidlich wäre, wenn die Kammer seicht oder die Iriswurzel an der hinteren Hornhautwand angelagert ist. Da dabei außerdem die Drehung, die mit der Lanze auszuführen wäre, um sie in die Ebene der Regenbogenhaut zu bringen, sehr stark sein müßte, soll die Lanze nicht zu steil auf die Lederhaut zum Einstich aufgesetzt werden, sondern schon in halber Neigung eindringen (Abb. 189). Unter leisem Druck durchschneidet die Spitze die äußere Augenhaut. Sobald sie im Kammerwinkel angelangt ist, muß die Lanze so umgelegt werden, daß sie zur Regenbogenhaut parallel liegt (Abb. 190). Ohne Unterbrechung in der Bewegung wird nun die Lanze soweit vorgeschoben, bis der Schnitt die gewünschte Länge erreicht hat. Die Spitze der Lanze gelangt dabei meist über den unteren Pupillarrand hinaus (Abb. 191). Das Zurückziehen des Messers hat langsam zu geschehen und die Spitze der



Abb. 191. Umrißzeichnung. Die Lanze ist weit nach unten eingeführt. Die ausgezogene Linie *ab* bezeichnet den Schnitt.

Lanze leicht gegen die hintere Hornhautwand bewegt zu werden, um beim Ausströmen des Kammerwassers die Linsenkapsel nicht zu verletzen.

Der richtige Zeitpunkt des Umlegens der Lanze von der schrägen zur irisparallelen Stellung kann nur durch das Gefühl erkannt werden, indem nach vollendetem Durchbohren der Widerstand der Augenhüllen verschwindet. Zu frühes Umlegen der Lanze macht den Schnitt unregelmäßig und verlegt die innere Öffnung zu weit nach vorne in die Hornhaut. Beim Umlegen und nachher darf die Lanze nicht im Schneiden einhalten, da vorzeitiger Abfluß des Kammerwassers die Fortsetzung des Schnittes unmöglich macht. Um dem Schnitte genügende Länge zu geben, muß von der Lanzenspitze das

Gebiet der Pupille und der untere Pupillarrand meist überschritten werden. Dadurch nähert sich die Spitze unten der Hinterfläche der Hornhaut.

Die Lanze hat beim Schnitte ohne Druck nach vorne oder nach hinten vorgeschoben zu werden. Bei Gebrauch einer tadellosen Klinge ist der fühlbare Widerstand gering. Wird mit der Lanze nach rückwärts gegen die Lederhaut gedrückt, so wird die Wunde zum Klaffen gebracht und durch Ausfluß des Kammerwassers die Weiterführung des Schnittes unmöglich, da Regenbogenhaut und Linse verletzt würden.

Aus dem gleichen Grunde ist wie bei allen die vordere Kammer eröffnenden Schnitten auch hier ein Zurückziehen der Klinge während des Schnittes unbedingt zu unterlassen. Auch beim Herausziehen des Messers nach Vollendung des Schnittes ist ein rasches Ausfließen des Kammerwassers nach Möglichkeit zu vermeiden. Daher wird das Messer langsam und ohne Druck zurückgezogen. Mit ihm sickert das Kammerwasser langsam aus und die Pupille bleibt rund. Schneller Abfluß oder Zwicken des Kranken drängt die Regenbogenhaut nicht selten in die Wunde vor.

Der Schnitt muß parallel zum Limbus liegen. Dazu ist erforderlich, die Lanze parallel zum Limbus zu halten. Ist die eine Kante der Lanze z. B. nach vorwärts gedreht, so wird der Schnitt auf dieser Seite nicht in dem Abstände vom Limbus bleiben, den die Spitze der Lanze beim Aufsetzen hatte, sondern nach vorne gegen oder sogar in die Hornhaut abweichen. Darin liegt eben die Schwierigkeit beim Lanzenschnitte, daß gleichzeitig die Spitze der mehr und

mehr nach unten vordringenden Lanze und die Schnittführung oben am Limbus beaufsichtigt werden müssen. Die Spitze der Lanze darf nie nach rückwärts gerichtet werden, da sonst beim Durchschreiten der Pupille die Linsenkapsel verletzt wird. Beim Herausziehen wird die Lanzenspitze durch eine leichte Seitwärtsdrehung aus dem Pupillargebiet entfernt und vor der Regenbogenhaut nach oben geführt. Auch kann der Schnitt dabei weiter verlängert werden, indem die Lanze entlang dem Limbus nach einer Seite hin bewegt wird.




Abb. 192.

#### Der Schnitt mit dem GRAEFESCHEN Messer.

Der Schnitt wird mit dem Messer gemacht:

1. bei *sehr* seichter vorderer Kammer;
2. bei weiter Pupille;
3. bei starker Hornhauttrübung, wenn dadurch der Einblick in die Kammer erschwert ist;
4. bei unruhigen Kranken.

Für das Festhalten des Auges, die Stellung des Arztes und die Verwendung der rechten oder linken Hand gelten dieselben Regeln wie für den Starschnitt. Bei sehr seichter Kammer des rechten Auges hat die Ausführung des Eingriffes von rückwärts den Vorteil, daß die rechte Hand besser auf den Kopf des Kranken aufgestützt werden kann als die linke beim Eingriff von vorne.

Die Länge des Schnittes soll dieselbe sein wie beim Lanzenschnitte, d. i. ungefähr 8 mm. Dementsprechend hat der Einstich höher oben, d. h. in größerer

Entfernung vom waagrechtan Meridian vorgenommen zu werden als beim Star-schnitte. Um eine genügend periphere Lage zu bekommen, wird das Messer in einer Entfernung von  $1\frac{1}{2}$  mm vom Limbus in der Lederhaut eingestochen (Abb. 192). Es wird parallel zur Fläche des Limbus gehalten, da bei steilerem Ansetzen (Spitze nach rückwärts) die Regenbogenhaut und selbst die Linse verletzt werden. Nach Auftauchen der Spitze in der Kammer wird das Messer bei möglichster Vermeidung des Pupillargebietes bis in den Kammerwinkel der anderen Seite vorgeschoben und die Gegenöffnung gemacht, die dementsprechend in einem Abstand von über 1—2 mm vom Limbus in die Lederhaut zu liegen kommt. Ohne eine Unterbrechung eintreten zu lassen, wird das Messer in langsam sägenden Zügen nach oben geführt, parallel zur Fläche des Limbus, so daß der Schnitt in seiner ganzen Länge die gleiche Entfernung von der Hornhaut einhält wie Ein- und Ausstich. Erst nach Anlangen des Messers unter der Bindehaut wird die Schneide nach vorne gedreht, um den Bindehautlappen kurz abzuschneiden.

**Vorteile und Nachteile der beiden Messer.** Die Ränder des Lanzenschnittes sind glatt, legen sich tadellos aneinander und verkleben schnell, so daß nach wenigen Tagen die Heilung abgeschlossen ist.

Der Schnitt mit dem GRAEFESCHEN Messer hat mehr Neigung zum Klaffen und schließt sich wegen seiner unregelmäßigen Ränder weniger schnell. Freilich könnte dieser Umstand in Augen mit Drucksteigerung sogar als nutzbringend in Betracht kommen, insofern als durch eine sich weniger gut schließende Wunde leichter und länger eine Filtration von Flüssigkeit stattfindet als bei raschem und festem Wundverschlusse.

Die Klinge einer Lanze ist außerordentlich empfindlich. Schon durch eine leichte Berührung beim Vorbereiten oder durch das Auskochen kann die früher tadellose Spitze geschädigt werden. Eine gut schneidende Spitze gleitet leicht und ohne merklichen Widerstand durch die Lederhaut. Ist aber die Spitze etwas verbogen oder nicht genügend scharf, so wäre es fehlerhaft, den Einstich durch Gewaltanwendung herbeiführen zu wollen. Denn in dem Augenblicke, wo die schlechte Spitze durchgedrungen ist und nun die gut schneidenden Seitenteile der Lanze in Wirksamkeit treten, gleitet die Klinge auf einmal schnell vorwärts und eine Verletzung der Regenbogenhaut und Linse wäre kaum zu vermeiden. Dieser Zwischenfall kann sich beim Lanzenschnitte aber auch ereignen, wenn ein ängstlicher Kranker plötzlich das Auge oder den Kopf kräftig bewegt.

Der Schnitt mit dem Messer ist zweifellos als ungefährlicher, besonders für den weniger Geübten, vorzuziehen. Auch ist damit leichter eine mehr periphere Lage zu erzielen, als bei Gebrauch der Lanze. Daher sind für den Schnitt mit der Lanze nur Fälle von nicht zu seichter Kammer und von enger Pupille vorzubehalten, wenn ein ruhiges Verhalten des Kranken wahrscheinlich ist.

Während die Verwendung des Messers zum Schnitte die Gefahr einer Verletzung der Regenbogenhaut und Linse durch zu rasches und tiefes Einstechen verringert, führt sie gelegentlich zu dem entgegengesetzten Fehler: dem intralamellären Schnitte. Die falsche Lage des Messers läßt sich aus dem andauernden Widerstande erkennen, der sonst nach Eindringen der Spitze in die vordere Kammer sofort verschwindet. Auch zeigt sich eine Einziehung in der Hornhaut an der Stelle des Messers, wenn versucht wird, es nach rückwärts zu drücken. Wie schon anderwärts ausgeführt, kann der Schnitt sofort an richtiger Stelle

wiederholt werden, wenn noch keine Eröffnung der vorderen Kammer stattgefunden hat; ist aber das Kammerwasser schon abgeflossen, dann muß der Eingriff auf den nächsten Tag verschoben werden.

**2. Die Ausschneidung der Regenbogenhaut.** Sie geschieht mit den schon bei der Starausziehung beschriebenen Instrumenten: der Iriszange und der Pinzettenschere von WECKER. Die Iriszange wird in der linken Hand gehalten, geschlossen entlang der Oberfläche der Regenbogenhaut durch die Wunde bis nahe an den oberen Pupillarrand eingeführt und dort weit geöffnet, um eine Falte der Regenbogenhaut aufzuheben. Diese wird aus der Wunde hervorgezogen. Die bereitgehaltene WECKERSche Schere vollführt sofort den Schnitt (Abb. 193). Dieser aber unterscheidet sich wesentlich von dem bei der Starausziehung. Hier wird nämlich beabsichtigt, die Regenbogenhaut ganz nahe ihrer Wurzel und soviel wie möglich von ihr zu entfernen. Daher durchtrennt die Schere, die hart an der Lederhaut und parallel zur Wunde gehalten wird, während sie deren Ränder leicht niederdrückt, zuerst nur die rechte Hälfte der vorgezogenen Falte und, nachdem deren übriggebliebener Teil mit der Pinzette noch weiter gegen den anderen Wundwinkel geleitet und dadurch noch mehr Gewebe aus dem Auge hervorgezogen worden ist, mit einem 2. Schnitte die linke Hälfte. Da die Regenbogenhaut gewöhnlich sehr empfindlich ist, muß sie so schnell wie möglich vorgezogen und abgeschnitten werden. Die Schere hat daher schon während des Fassens der Regenbogenhaut knapp neben der Wunde schnittbereit gehalten zu werden. Die Empfindlichkeit der Regenbogenhaut wird beträchtlich herabgesetzt, wenn nach dem Schnitte einige Tropfen einer 10%igen Cocainlösung auf die Wunde aufgeträufelt werden, nachdem diese durch einen leichten Druck des Spatels auf den skleralen Wundrand zum geringen Klaffen gebracht worden ist.

**3. Das Zurechtstreichen.** Es geschieht in der gleichen Weise wie bei der Starausziehung, ist aber meist dadurch erschwert, daß die Kolobomschenkel durch den hohen Druck in die Wundwinkel eingezwängt werden und die Regenbogenhaut wegen Atrophie wenig Neigung zeigt, von selbst in ihre richtige Lage zurückzukehren. Es ist aber unerlässlich, sie genau zurechtzulagern, da sie sonst in die Wunde einheilt, wodurch Rückfälle der Drucksteigerung verursacht werden. Da durch den Spatel die Linsenkapsel verletzt werden kann, soll er mit ihr nur wenig in Berührung kommen. Nur wenn er vom Kammerwinkel aus die Sphinkterecke in die richtige Lage hinuntergestreift hat, muß er, um sie nicht wieder nach oben zurückzudrängen, im Bereiche des Koloboms aus dem Auge herausgeführt werden. Dabei darf nicht durch schräge Haltung die eine Kante des Spatels gegen die Linsenkapsel gerichtet sein, da diese dadurch geritzt werden könnte, sondern die Fläche des Spatels hat zur Fläche der Linsenkapsel parallel zu liegen.

So sehr die richtige Lage der Sphinkterecken erwünscht ist, so können doch verschiedene Umstände es rätlich erscheinen lassen, von weiteren Versuchen,



Abb. 193. Umrißzeichnung. Eine Falte der Regenbogenhaut wurde mit der Pinzette aus dem Auge hervorgeholt. Die Blätter der Schere sind gleichgerichtet zum Limbus und werden an der Wurzel angelegt. Zunächst wird eine Hälfte der Falte durchtrennt.

sie zurückzuschieben, Abstand zu nehmen, z. B. beim Klaffen der Wunde. Die Schwierigkeiten bei unruhigen Kranken, wenn sie nicht veranlaßt werden konnten, nach unten zu blicken, sind heute durch die Zügelnaht vollständig behoben. Daher ist es auch nicht mehr notwendig, in solchen Fällen das Auge mit der Pinzette anzufassen und festzuhalten. Denn dies hat den Nachteil, die Wunde zum Klaffen zu bringen und die Gefahr einer Linsenkapselverletzung zu erhöhen, zumal da sich der Rand der Linse unter dem Einflusse des Druckes im Augeninnern nicht selten gegen die Wunde zu dreht.

Wird trotz gelungenem Zurechtschieben die Kolobomecke immer wieder gegen die Wunde getrieben, so ist dies ein Zeichen, daß der Augenhalt vordrängt. Es werden daher weitere Versuche unterlassen, um den Eingriff nicht mit Linsenausritt oder Glaskörpervorfall zu beenden.

Bleiben aber vom Anfang an die Versuche, die Regenbogenhaut zurechtzulagern, erfolglos, weil sie in die Wunde eingeklemmt ist, so wird sie dort aufgefaßt und ausgeschnitten, worauf sich der Kolobomschenkel nicht selten von selbst in die richtige Lage zurückbegibt.

Wurde der Schnitt mit dem GRAEFESchen Messer gemacht, so muß schließlich für eine richtige Lage des Bindehautlappens Sorge getragen werden, bevor der Verband angelegt wird.

**Zwischenfälle beim Schnitte.** Die meisten sind schon bei der Starausziehung besprochen worden und werden daher hier nur kurz erwähnt:

1. *Ausreißen der Bindehaut beim Anfassen mit der Pinzette.* Kommt bei Verwendung der Zügelnaht kaum noch vor und hat keine Bedeutung.

2. *Intralamellärer Schnitt.*

3. *Anspießen der Regenbogenhaut* mit dem GRAEFESchen Messer.

Bei der seichten Kammer gerät die Messerspitze leicht in einen der Vorsprünge der Oberfläche der Regenbogenhaut. Diese Fasern werden aber meist beim Vorschieben des Messers durchtrennt, so daß sich die Regenbogenhaut, frei geworden, wieder in ihre richtige Lage zurückzieht. Wie bei allen die Kammer eröffnenden Schnitten gilt auch hier als Hauptregel, das Messer nicht zurückzuziehen, da durch das Ausfließen des Kammerwassers der Schnitt nicht mehr fortgesetzt werden könnte. Das Messer müßte nur zurückgezogen werden, wenn es beim Einstich hinter die Regenbogenhaut geraten wäre, weil bei Fortführung dieses fehlerhaften Schnittes diese und die Linse noch mehr verletzt würden, als wenn das Messer sofort herausgezogen wird.

Da der Schnitt kürzer ist als der Starschnitt und für gewöhnlich oberhalb des Pupillargebietes zu liegen kommt, fällt die Regenbogenhaut trotz der seichten Kammer selten ins Messer.

4. *Erzeugung einer Iridodialyse beim Lanzenschnitt.* Wenn sich die Lanzenspitze in der Regenbogenhaut verfängt, so wird diese beim Vorschieben der Lanze nach unten gezerrt und schließlich von ihrem Ansatz abgerissen. Es folgt meist eine heftige Blutung, die weiterhin den Eingriff wesentlich behindert. Da die Pinzette beim Versuche, die abgelöste Regenbogenhaut vorzuziehen, durch die Lücke hinter sie gleitet und die bloßliegende Linsenkapsel gefährdet, wird an ihrer Stelle das stumpfe Häkchen dazu verwendet.

5. *Verletzung der Hornhaut von hinten her durch die Lanzenspitze.* Je weiter die Lanze in die Kammer vorgeschoben wird, um so mehr nähert sich ihre

Spitze der hinteren Hornhautwand unten und kann, wenn es nicht rechtzeitig bemerkt wird, in das Hornhautgewebe selbst eindringen. Eine strichförmige Trübung bleibt an dieser Stelle für immer zurück.

6. *Schlechte Lage des Schnittes* ist die Folge einer unrichtigen Haltung des Messers (Drehung der Schneide nach vorne) oder einer falschen Lage des Einstiches. Ist der Schnitt stark gegen die Hornhaut vorgerückt, so kann die Regenbogenhaut nicht an der Wurzel abgeschnitten werden. Besonders zu warnen ist vor einem zu langen Schnitt, der bei Gebrauch des Messers durch einen zu weit unten gelegenen Einstich erzeugt werden könnte. Durch den hohen intraokulären Druck würde die Wunde zu klaffen anfangen und sich die Linse in ihr einstellen.

7. *Eine starke Blutung* aus erweiterten Bindehaut- oder vorderen Ciliargefäßen tritt gelegentlich schon während des Schnittes auf. Die vordere Kammer füllt sich mit Blut, die Regenbogenhaut wird unsichtbar. Man versuche zunächst, das Blut unter leichtem Niederdrücken der peripheren Wundlippe aus dem Auge herauszustreifen. Doch sammelt es sich meist schnell wieder an. Hat es sich aber in Form eines Gerinnsels an die Wände der vorderen Kammer angelegt, so gelingt es nicht mehr, die Kammer davon freizubekommen. Da die Pupille unsichtbar wurde, ist die Linsenkapsel beim Hervorholen der Regenbogenhaut gefährdet. Auch die Kolobomschenkel müssen unter diesen Umständen ohne Einblick in die Kammer zurechtgestreift werden.

**Zwischenfälle beim Ausschneiden der Regenbogenhaut.** Das Ausschneiden der Regenbogenhaut ist bei Glaukom durchschnittlich viel schmerzhafter als bei der Starausziehung, die Anästhetika wirken wegen der Blutüberfüllung des Auges und vielleicht auch wegen Änderung der Diffusionsverhältnisse weniger. Die Regenbogenhaut kann beim Anfassen mit der Pinzette durch eine plötzliche Ruckbewegung des Kranken von ihrem Ansatz abgerissen, ja es kann selbst ein großes Stück von ihr ausgerissen werden. Daher werden nach dem Schnitte einige Tropfen einer keimfreien 10%igen Cocainlösung auf die Wunde geträufelt. Indem die Lösung unmittelbar auf die Regenbogenhaut einwirkt, wird deren Empfindlichkeit sehr herabgesetzt.

Gegen eine Einspritzung einer Cocainlösung unter die Bindehaut vor Beginn des Schnittes, wodurch die Regenbogenhaut ganz unempfindlich gemacht werden kann, ist einzuwenden erstens, daß dadurch die Anlage des Schnittes wegen der Auflockerung der Bindehaut und wegen der starken Verschmälerung der Regenbogenhaut erschwert und durch diesen letzten Umstand die Linse beim Schnitte und beim Auffassen der Regenbogenhaut mit der Pinzette gefährdet wird, namentlich aber zweitens, daß die Regenbogenhaut nur schwer zurechtgestreift werden kann, da die Lage der Schenkel wegen ihrer Kürze nicht begutachtet werden kann und die Membran vollständig erschlafft ist und keine Neigung zeigt, von selbst in die richtige Lage zurückzugehen oder beim Zurechtstreifen durch Zusammenziehen ihres Gewebes mitzuhelfen.

Bei vorgeschrittenem Glaukom ist die Regenbogenhaut infolge starken Gewebeschwundes manchmal so zerreißlich, daß die Pinzette beim Versuche, sie zu fassen, ausreißt. Dadurch wird es unmöglich, sie regelrecht auszuschneiden. Wenn die Regenbogenhaut bei vorgeschrittenem Glaukom in ihrer oberen Hälfte so schmal geworden ist, daß sie hinter dem Limbus verschwindet, wird das

Kolobom nach unten angelegt, wo sie gewöhnlich noch etwas breiter blieb. Da diese Augen durch das Glaukom bereits sehr schwer beeinträchtigt sind, kommt eine Störung des Sehvermögens durch das unverdeckte Kolobom nicht in Betracht.

Je früher die Iridektomie bei Glaukom vorgenommen wird, um so leichter ist sie. Solange die vordere Kammer nicht zu seicht und die Regenbogenhaut noch fast normal ist, erzielt der Eingriff ein breites Kolobom, das wegen der peripheren Lage des Schnittes bis zur Wurzel reicht. Wenn aber der Kammerwinkel einmal durch die Anlagerung der Wurzel verödet ist, kann dem Schnitte nicht die gewünschte periphere Lage gegeben werden. Damit verringert sich auch der Einfluß des Eingriffes.

**Verletzungen der Linsenkapsel** können durch die Lanze oder das Messer, durch die Irispinzette oder durch den Spatel erzeugt werden und sind von einer Linsentrübung gefolgt. Da die Verletzung das Gebiet der vorderen Kapsel betrifft, kann später bei der Untersuchung in seitlicher Beleuchtung die Kapselwunde, von wo der Star ausgegangen ist, nachgewiesen werden. Der Star wird nicht immer vollständig, sondern beschränkt sich häufig auf eine Trübung in der Umgebung der Kapselwunde oder auf eine sternförmige Trübung in der vorderen oder hinteren Rindenschicht.

Besonders häufig wird die Kapsel durch die Irispinzette verletzt. Diese soll durch die Wunde parallel zur Regenbogenhaut in das Auge eingeführt und nur bis nahe an den Pupillarrand vorgeschoben, nicht aber in den Bereich der Pupille selbst gebracht werden. Ist die Regenbogenhaut schon in die Wunde vorgeschwemmt, so hat die Pinzette überhaupt nicht in das Augeninnere einzudringen, sondern hebt die bloßliegende Haut auf, die nach Zurücklegen des Bindehautlappens auf die Hornhaut leicht sichtbar ist. Die Zügelnaht beseitigt alle die Gefahren, die der Linsenkapsel dadurch drohen, daß der Kranke nicht gut nach unten oder unstät herumschaut oder beim Einführen der Pinzette plötzlich nach oben blickt. Es ist daher kaum je mehr notwendig, an Stelle der Irispinzette mit dem stumpfen Häkchen die Regenbogenhaut hervorzuholen. Man vermeidet dies um so lieber, als es dabei oft nur gelingt, ein kleines Stück auszuschneiden, so daß auf ein größeres Kolobom verzichtet werden muß. Daß bei Verwendung der Zügelnaht der Lidlöffel nach dem Schnitte nicht weiter bleiben darf, wurde schon eingangs ausgeführt. Denn er verhindert die richtige Stellung der Pinzette und des Spatels und wird dadurch geradezu die Ursache einer häufigen Verletzung der Linse. Das Lid ist während dieser Akte von dem Gehilfen mit dem Finger gehoben zu halten. Die Zügelnaht als solche bringt dann keine Gefahr mehr mit sich.

**Spontane Berstung der Linsenkapsel.** Es kann schließlich bei Glaukomiridektomien die Linsenkapsel im Bereiche des Äquators auch *spontan* bersten, wenn nach Eröffnung des Auges die Linse durch den hohen Glaskörperdruck oder durch Steigerung des Druckes im Anschlusse an eine Blutung unter die Aderhaut nach vorne gedrängt und mit ihrem Rande in die Wunde eingestellt wird. Die dem Drucke ausweichende Linsenmasse bringt alsdann die Kapsel am Äquator zum Bersten. Daher kann die Reißstelle bei seitlicher Beleuchtung nicht entdeckt werden; die Trübung nimmt darauf meistens in der hinteren Rinde ihren Anfang. In schweren Fällen wird die Linsenkapsel in großer Aus-

dehnung eröffnet, worauf der Linsinhalt samt dem Kern aus der klaffenden Wunde ausgetrieben wird. Zu solchen Vorkommnissen neigen Augen mit langdauernder Drucksteigerung, wenn der Druck besonders hoch, die vordere Kammer fast aufgehoben, die Regenbogenhaut atrophisch und das Auge sehr schmerzhaft ist.

**Subluxation der Linse.** Durch die Eröffnung der vorderen Kammer und den Abfluß des Kammerwassers vollzieht sich eine Lageveränderung der Linse, die sich bis zu einer Subluxation steigern kann. Die Linse rückt im ganzen nach vorne und dreht sich infolge des geringeren Widerstandes der Augenhüllen im Bereiche der Wunde mit ihrem oberen Rande nach vorne. Eine Subluxation der Linse gestaltet die Vorhersage für das spätere Verhalten des Auges schlecht. Die vordere Kammer stellt sich lange nicht her, der Druck erhöht sich wieder, und solche Augen sind trotz verschiedenen Eingriffen, die vorgenommen werden, um den Druck herabzusetzen, gewöhnlich verloren.

Da alle Instrumente, die in das Auge eingeführt werden, für die Linsenkapsel gefährlich werden können, hat, wie schon eine Zahl von Augenärzten (insbesondere ELSCHNIG, ZIRM u. a.) vor ihm, zuletzt SALZMANN ein Verfahren für die Iridektomie empfohlen, das er *Iridectomy ab externo* nennt und dem er nachrühmt, daß der Eingriff ausgeführt werden kann, ohne daß mit einem einzigen Instrument in die vordere Kammer eingegangen zu werden braucht.

**Verfahren.** Bildung eines Bindehautlappens wie beim ELLIOTSchen Eingriff. Der Lappen wird auf die Hornhaut nach unten geschlagen. Mit der Spitze der senkrecht aufgesetzten Lanze werden im Sulcus sclerae externus, also etwa 1 mm entfernt vom Hornhautrand und diesem konzentrisch in der Länge von 7 mm die oberflächlichen Lamellen der Lederhaut eingeritzt. In der gleichen Weise dringt die Lanze Schichte für Schichte durchtrennend weiter gegen die Tiefe vor. Bei dieser Schnittführung gerät der Schnitt in den tiefen Schichten in das Hornhautgewebe. Gewöhnlich wird die Kammer zuerst an einer kleinen Stelle eröffnet. Dies verrät sich durch Abfluß einer kleinen Menge von Kammerwasser und Auftreten eines kleinen Vorfalles der Regenbogenhaut. Von da an wird nur noch dort geritzt, wo die Regenbogenhaut noch nicht vorgefallen ist, bis der Vorfall endlich in der ganzen Länge bloßliegt. Nun wird der Vorfall mit der WECKERSchen Schere an der Außenfläche der Lederhaut abgetragen. Da infolge der rechtwinkeligen Kanten der inneren Wunde die Regenbogenhaut nicht eingeklemmt wird, zieht sie sich gewöhnlich von selbst an ihre richtige Stelle zurück, oder es gelingt dies durch leichte Massage an der Wunde. Es kann daher auch das Eingehen mit dem Spatel in die Wunde vermieden und somit der ganze Eingriff ausgeführt werden, ohne daß auch nur ein Instrument in die vordere Kammer gebracht wird.

Die Gefahr einer Linsenkapselverletzung ist also damit umgangen. Glaskörper scheint nach SALZMANN öfters auszutreten als bei der gewöhnlichen Iridektomie. Nichtsdestoweniger kommen auch hier Linsentrübungen im Anschluß an den Eingriff vor.

Der Einschnitt von außen erfordert nicht jenen Grad von Geschicklichkeit wie der Schnitt mit dem GRAEFESchen Messer und wird daher Anfängern und weniger geübten Wundärzten willkommen sein. Er hat übrigens auch den Vorteil, daß das Kammerwasser nicht so plötzlich abfließt wie sonst und daher

auch die Linse nur langsam vorrückt und sich in ihrer Form der neuen Lage anpassen kann. Dadurch könnte die Gefahr einer spontanen Berstung der Linsenkapsel vermieden werden, aufgehoben ist sie aber gewiß auch nicht.

**Vorfall von Glaskörper.** Zu Vorfall von Glaskörper kommt es nicht selten bei Eingriffen an Augen mit absolutem Glaukom, besonders wenn sich die Lederhaut schon ausgedehnt hatte. Durch den Vorfall wird es meist unmöglich, die Regenbogenhaut auszuschneiden. Auch lassen sich die Kolobomschenkel nicht mehr zurückstreichen, sobald Glaskörper erschienen ist. Durch die Einlagerung des Glaskörpers bleibt die Wunde klaffend, die Heilung wird verzögert und schließlich muß die Heilung mit einer vorgewölbten Narbe noch als ein guter Ausgang hingenommen werden, wenn das Auge von weiterer Drucksteigerung verschont bleibt. Meistens aber setzen erneute Anfälle von Drucksteigerung ein, die wegen der Schmerzen, die sie verursachen, schließlich zur Ausschälung des Auges führen.

Man nimmt daher mit Recht bei weit vorgeschrittenem oder absolutem Glaukom von der Iridektomie Abstand und verwendet an ihrer Stelle andere Eingriffe, welche das Auge weniger breit eröffnen. Damit wird auch die Gefahr der expulsiven Blutung vermieden.

**Expulsive Blutung.** Gelegentlich wird durch den Glaskörpervorfall ein noch schlimmeres Ereignis eingeleitet: die expulsive Blutung. Dadurch, daß bei Eröffnung des Auges der Druck plötzlich und in hohem Maße herabgesetzt wurde, beginnt es unter die Aderhaut heftig zu bluten, wodurch diese samt der Netzhaut nach vorne gedrängt und durch die Wunde aus dem Auge herausgepreßt wird. Gerade bei dem Eingriff an Augen mit absolutem Glaukom tritt dieses Ereignis keineswegs selten ein, auch ohne daß Glaskörperverlust vorhergegangen wäre. Ausnahmsweise kann eine expulsive Blutung auch bei einer Iridektomie eintreten, die im Frühstadium des Glaukoms in noch gut sehendem Auge ausgeführt worden ist. Die Bedingungen dafür sind durch eine besonders starke Erhöhung des intraokularen Druckes und durch eine Steigerung des Blutdruckes gegeben. Die erstere wird durch eine Punktion der Lederhaut beseitigt, die unmittelbar vor der Iridektomie gemacht wird, der hohe Blutdruck aber, wie schon zuvor erwähnt, durch einen ausgiebigen Aderlaß. Die Blutung wird durch Anlegen eines kräftigen Druckverbandes gestillt. Da diese Augen in der Folge unter schmerzhaften Entzündungen allmählich schrumpfen, werden sie gleich, nachdem der Augeninhalt ausgestoßen worden ist, herausgenommen.

Hoher intraokularer Druck und hoher Blutdruck veranlassen uns daher heute von einer Iridektomie Abstand zu nehmen und andere weniger gefährliche Verfahren zu wählen. Freilich wurde expulsive Blutung auch nach der ELLIOTSchen Trepanation beobachtet.

### **Basale Iridektomie.**

Um bei Fällen von entzündlichem Glaukom die Gefahren, die bei Kranken mit starker Blutdrucksteigerung und starker Erhöhung des Augendruckes mit der breiten Eröffnung der Lederhaut bei der gewöhnlichen Iridektomie verbunden sind, zu vermeiden, wurde das Verfahren der basalen Iridektomie von neuem empfohlen. Nach Ablösung der Bindehaut durch einen Einschnitt mit der Schere von oben her (wie zum ELLIOTSchen Eingriff) wird die Lanze, die

etwa 2 mm ober dem Limbus angesetzt wird, schräg in die Kammer eingeführt bis zu einer Schnittlänge von etwa 3 mm. Die Lanze wird langsam zurückgezogen. Die Irisperipherie fällt in die kleine Wunde und wird ausgeschnitten. Wenn sich der Sphinkterteil nicht von selbst zurückzieht, wird er durch eine leichte Massage an der Oberfläche des Auges gewöhnlich an die richtige Stelle zurückgebracht. Da der Bindehautlappen den Einblick in die Kammer stört, muß er vom Gehilfen während des Eingriffes entsprechend abgezogen werden. Nachträglich wird er in seine richtige Lage zurückgebracht. Nähte sind nicht notwendig.

Auch optische Gründe können für die Wahl dieses Verfahrens maßgebend sein, um die Pupille rund zu erhalten. Nach dem Eingriff ist die Pupille durch Homatropin weit zu halten, um das Entstehen von hinteren Synechien zu verhindern.

### **Wiederkehr der Drucksteigerung wegen Einheilung der Regenbogenhaut in die Schnittwunde.**

Steigert sich im Anschlusse an die Einheilung eines oder beider Kolobom-schenkel in die Wunde von neuem der Druck, so muß der eingeheilte Schenkel freigemacht werden. Nach Einstich auf der einen Seite des Narbenwinkels wird das GRAEFESCHE Messer durch die vordere Kammer bis jenseits der Einheilungsstelle geführt und dort sehr peripher ausgestochen. Der Schnitt wird darauf in sägenden Zügen vollendet. Häufig trennt das Messer dabei schon die Regenbogenhaut von der Narbe ab und der Sphinkter zieht sich unmittelbar nach dem Schnitte in seine richtige Lage zurück. Ist dies aber nicht der Fall, so muß die Regenbogenhaut mit der Pinzette aus der Wunde hervorgeholt und so breit als möglich ausgeschnitten werden. Darauf folgt das Zurechtstreichen des Schenkels. Der bei dem Reizzustande des Auges oft schwierig durchzuführende Eingriff lohnt sich meist durch einen günstigen Erfolg: die früher vorgewölbte und schwärzlich durchscheinende Narbe heilt bald flach aus und der Druck erhöht sich nicht wieder.

Dieser Eingriff ist auch in den Fällen am Platze, wo die Regenbogenhaut nach Starausziehung eingehilt war und sich im Anschluß daran der Druck erhöht hatte. Um ein Klaffen der Wunde und Vorfall des Glaskörpers zu verhindern, wird — nachdem vorerst hinter das Auge Novocain-Adrenalin eingespritzt worden war — eine Bindehautbrücke stehengelassen und unter ihr die Regenbogenhaut hervorgeholt. Auch cystische Narben nach Starausziehung werden in gleicher Weise beseitigt.

### **Über das Glaucoma malignum.**

Das Glaucoma malignum ist nicht eine besondere klinische Form des Glaukoms an sich, sondern wir reihen unter diesem Namen die Fälle von Glaukom ein, welche auf irgendeinen Eingriff, der gegen die Drucksteigerung unternommen worden ist, ausgesprochen schlecht und mit erneuter schwerer Drucksteigerung antworten und trotz aller Bemühungen an der Drucksteigerung erblinden. Meist sind es Fälle von ausgesprochen chronischem Verlauf ohne alle Reizerscheinungen. Augen, die, wenn auch nur angedeutet, dem Typus des chronischen entzündlichen Glaukoms angehören, zeigen fast nie einen solchen postoperativen Verlauf. Fast immer sind es Augen, die sich zur Zeit des Ein-

griffes schon in einem vorgeschrittenen Stadium des Leidens befinden: totale Exkavation und starke Einengung des Gesichtsfeldes, während die Sehschärfe oft noch normal ist. Gerade letzterer Umstand macht den unglücklichen postoperativen Verlauf zu einem so tragischeren Ereignis. Dazu kommt noch, daß sich der maligne Verlauf fast ohne Ausnahme auch bei einem Eingriff am 2. Auge einstellt.

Die vordere Kammer solcher Augen ist immer sehr seicht, der Druck gewöhnlich stark erhöht, die Augen bereiten aber meist keine besonderen subjektiven Beschwerden, so daß der Kranke keine Ahnung von dem Ernst der Lage hat. Die Reaktion des Auges auf den Eingriff ist ausgesprochen bösartig: Das vorher blasse Auge ist stark injiziert, die früher glänzende Hornhaut wird matt und trübe, die vor dem Eingriffe seichte Kammer stellt sich nicht mehr her, die Regenbogenhaut wird verfärbt, sehr schnell atrophisch, durch Miotica nicht mehr beeinflussbar, das Auge wird steinhart und gewöhnlich bestehen heftige Schmerzen. Es kann durch den Eingriff geradezu ein schwerer Glaukomanfall ausgelöst werden und dieser jeder weiteren Behandlung trotzen. So werden die Augen gewöhnlich in kurzer Zeit unheilbar blind und müssen nicht selten wegen andauernder Schmerzen schließlich herausgenommen werden.

Es ist leider nicht möglich, den postoperativen malignen Verlauf vorherzusagen, so daß man daraus die Folgen ziehen könnte, den Eingriff zu unterlassen. Nur größere Erfahrung erlaubt gelegentlich die Vermutung auszusprechen, daß das Auge auf den Eingriff bösartig reagieren könne. Am meisten scheint die Iridektomie, vielleicht besonders wenn der Einschnitt mit dem GRAEFESchen Messer lang und sehr peripher gemacht wird, einen malignen Verlauf auslösen zu können.

Aber wir haben Glaucoma malignum auch nach Cyclodialyse beobachtet. Ganz sicher kommt sie auch nach Sklerektomie vor, auch bei anscheinend offener Lücke. Dies erweckt die Überzeugung, daß diese bösartige Drucksteigerung wenigstens nicht unmittelbar mit dem Freisein der Abflußwege etwas zu tun hat, sondern auf einer Volumzunahme des Glaskörpers beruht, vielleicht auf einer Quellung seines Gewebes, auf einer Wasseranspeicherung bei Verlust der Möglichkeit, es abzugeben. Dadurch wird das Iris-Linsendiaphragma nach vorne gedrückt, an die hintere Hornhautwand angepreßt, und damit ist jede Regulierung durch einen verstärkten Abfluß ganz unmöglich geworden.

Tatsache ist, daß beim malignen Glaukom alle Eingriffe, die irgendwie den Kammerwinkel betreffen, ohne jeden Einfluß sind, ja die Reizung des Auges nur noch erhöhen. Der einzige Eingriff, der kein malignes Glaukom auszulösen scheint, ist die hintere Sklerotomie. Freilich wird sie als erster Eingriff fast nie versucht, denn sie vermag die Drucksteigerung auf die Dauer fast gar nicht zu beeinflussen. Nach Eintritt des malignen Verlaufes vermag sie aber die Drucksteigerung auch nicht vorübergehend zu beseitigen.

Eher kann noch die Trepanation der Lederhaut in der Voräquatorgegend mit Eröffnung des Glaskörperaumes (siehe S. 305) den Druck erniedrigen, freilich auch meist nur für Tage, höchstens für einige Wochen.

Ist das eine Auge an malignem Glaukom zugrunde gegangen, so pflege ich den Eingriff am 2. Auge abzulehnen und ziehe es vor, alle friedlichen Mittel auszunützen, wozu bei gesteigertem Grundumsatz die Röntgenbestrah-

lung der Schilddrüse, bei herabgemindertem Grundumsatz die Hautbestrahlung mit Buckystrahlen gehört. Freilich tritt auch dabei schließlich die Erblindung meist innerhalb weniger Jahre ein. Der einzige Eingriff, der gewagt werden könnte, ist die hintere Sklerotomie. Im Falle, daß sie gut vertragen wird, könnte sie auch öfters wiederholt werden. Auch die eben erwähnte hintere Skleral-trepanation könnte versucht werden.

## II. Der vordere Lederhautschnitt (Sclerotomia anterior nach WECKER).

**Anzeigen.** Die vordere Sklerotomie wird heute nur noch selten ausgeführt. Ihre Hauptanzeigen waren Augen, wo sich nach Eingriffen, die schon vorher gegen die Drucksteigerung ausgeführt worden sind, diese wieder eingestellt hat,



Abb. 194. Vordere Sklerotomie am linken Auge nach unten. Beginn des Schnittes. Die linke Hand hält mit der Pinzette das Auge oben. Die Schneide des Messers ist nach unten gerichtet. Der Einstich liegt gut 1 mm vom Limbus entfernt in der Lederhaut. Das untere Lid wird vom Gehilfen weit nach unten geschoben.

insbesondere wenn sich nach GRAEFEScher Iridektomie der Druck nach längerer Zeit wieder erhöht. Beim Hydrophthalmus, wo der vordere Lederhautschnitt wegen seiner gegenüber der Iridektomie geringeren Gefährlichkeit von vielen Ärzten geübt worden ist, ist er durch die wirksamere Trepanation verdrängt worden.

**Der Schnitt.** Die vordere Sklerotomie wird mit dem GRAEFESchen Star-messer ausgeführt. Der Schnitt ist einigermaßen dem zur Ausziehung des Altersstares ähnlich, unterscheidet sich aber von ihm durch seine *periphere Lage*. Er kann nach oben oder unten angelegt werden. Mit der Pinzette ist das Auge an einer solchen Stelle zu fassen, daß es dem Messer nicht den Weg verlegt. Der Eingriff bezweckt, den Kammerwinkel einzuschneiden. Daher müssen der Einstich und der Ausstich mindestens 1—1½ mm vom Limbus entfernt in der Lederhaut liegen. Da nur von außen her das Messer in die richtige Stellung gebracht werden kann, gilt für die Verwendung der rechten und linken Hand



Abb. 195. Umrißzeichnung. Lage des Messers im Auge nach vollendetem Ausstiche. Ein- und Ausstich liegen gut 1 mm vom Limbus entfernt in der Lederhaut.

dasselbe, was schon bei der Starausziehung gesagt worden ist. Das Messer wird in 2—3 mm hohem Abstand vom äußeren Ende des waagrechteten Meridians und parallel zur Ebene des Limbus durch die Lederhaut in die vordere Kammer eingeführt (Abb. 194), langsam zwischen Hornhaut und Regenbogenhaut bis in den Kammerwinkel der anderen Seite vorgeschoben, von wo aus die Gegenöffnung angelegt wird, so daß die Spitze in dem angegebenen Abstände vom




Abb. 196. Vordere Sklerotomie. Beendigung des Schnittes. Um im Bereiche der stehengelassenen Lederhautbrücke (punktierte Linie) doch die inneren Lagen der Lederhaut zu durchtrennen, wird das Messer durch die Hebung seines Griffes so gedreht, daß seine Spitze den Kammerwinkel in gewünschter Weise einschneidet. Man beachte die Verschiedenheit in der Stellung der messerführenden Hand beim Einstechen (Abb. 194) und beim Herausziehen des Messers (in Abb. 196).

Limbus erscheint (Abb. 195). In sägenden Zügen wird nunmehr der Schnitt fortgeführt nach denselben Regeln wie beim Starschnitte, aber *nicht vollendet*, indem das Messer *vor* der Durchtrennung der restlichen Lederhautbrücke aus dem Auge herausgezogen wird (Abb. 196). Da jedoch auch in diesem Bereiche der Kammerwinkel eingeschnitten werden soll, muß der Griff des Messers während des Herausziehens eine solche Richtungsänderung (Hebung beim Schnitt nach unten, Senkung beim Schnitt nach oben) vornehmen (Abb. 197), daß die Spitze den Kammerwinkel in der Ausdehnung der Brücke von innen her einschneidet. Die Länge des Schnittes ist etwas geringer als die des Starschnittes. Die Regenbogenhaut bleibt nach Vollendung des Schnittes meist in ihrer richtigen Lage, besonders bei ruhigem Verhalten des Kranken.



Abb. 197. Umrißzeichnung. Die ausgezogene Linie bedeutet den durchbohrenden Teil des Schnittes, die punktierte Linie dagegen den, wo nur die inneren Lagen der Lederhaut durchtrennt worden sind.

her einschneidet. Die Länge des Schnittes ist etwas geringer als die des Starschnittes. Die Regenbogenhaut bleibt nach Vollendung des Schnittes meist in ihrer richtigen Lage, besonders bei ruhigem Verhalten des Kranken.

Sollte sie aber verlagert oder gar vorgefallen sein, so wird sie zurückgestrichen. Wird sie am Tage nach dem Eingriffe beim Verbandwechsel verlagert gefunden, so wird der Vorfall ausgeschnitten.

### Zwischenfälle und Fehler.

**Intralamellärer Schnitt.** Ist das Messer beim Einstich nach vorne gerichtet, anstatt parallel zur Ebene des Limbus, so dringt es zwischen die Lamellen der Hornhaut ein. Der Geübte merkt den Fehler durch das Andauern des Widerstandes, der sich dem Vorschieben des Messers entgegensetzt. Wird der Fehler erkannt, bevor noch die vordere Kammer eröffnet wurde, so wird das Messer zurückgezogen und der Schnitt von neuem begonnen. Ist jedoch das Kammerwasser schon abgeflossen, so muß der Eingriff unterbrochen werden, da sonst die Regenbogenhaut verletzt wird. Die auf die intralamelläre Schnittführung gelegentlich folgende traumatische Hornhauttrübung ist von keiner ernstern Bedeutung, da sie binnen kurzem vollständig verschwindet.

**Nicht genügend periphere Lage des Schnittes.** Da nur dann ein Erfolg des Schnittes erwartet werden kann, wenn er den Kammerwinkel durchsetzt, so darf er weder am Limbus noch in der Hornhaut angelegt werden. Ein Fehler in dieser Hinsicht wird aber erklärlich, wenn der Kammerwinkel durch die Anlötung der Iriswurzel an die hintere Hornhautwand weiter nach vorne verlegt wurde, so daß bei einem Einstiche jenseits des Limbus die Gefahr bestünde, das Messer hinter die Regenbogenhaut zu führen.

**Verletzung der Regenbogenhaut.** Wird die Spitze des Messers zu steil durch die Lederhaut geführt, so wird die Regenbogenhaut durchbohrt und die Linse verletzt. Verlegt ihre Wurzel den Kammerwinkel, so wird durch das eindringende Messer die Regenbogenhaut von ihrem Ansatz abgetrennt oder auf eine größere Strecke abgerissen. Die Iridodialyse ist meist von einer starken Blutung gefolgt.

**Dauererfolge** werden durch die vordere Sklerotomie beim Glaukom hauptsächlich dann erzielt, wenn sie für die Fälle verwendet wird, wo sich nach einer regelrechten Iridektomie von neuem der Druck erhöht hat. Eine zweite Iridektomie wird nach Möglichkeit vermieden, da sie, besonders wenn sie unten ausgeführt wird, das Sehvermögen beträchtlich stört. Die Sklerotomie kann auch mehrere Male an demselben Auge, wenn nötig, wiederholt werden, da der Schnitt nach unten oder oben, oder an einer sonst günstig gelegenen Seite angelegt werden kann.

Besteht schon ein Kolobom nach oben, so wird der Schnitt nach unten vorgezogen, weil dabei das Messer durch die Regenbogenhaut von der Linse getrennt ist und dadurch einer Verletzung der Linsenkapsel vorgebeugt wird. Wie vor jedem Eingriff bei Glaukom wird auch hier die Pupille durch wiederholtes Einträufeln von Miotika so eng als möglich gemacht.

Die vordere Sklerotomie vermag aber auch nach anderen Glaukomoperationen den wieder hoch gewordenen Druck herabzusetzen. Sie ist zu Unrecht fast ganz außer Übung gekommen. Sie ist durch die neuen Eingriffe verdrängt worden. Aber noch immer hat man Gelegenheit, ihre Wirksamkeit selbst auch in Augen zu beobachten, wo die neuen Eingriffe umsonst ausgeführt worden sind.

### III. Die Ausschneidung der Lederhaut.

#### a) Verfahren nach LAGRANGE.

WECKER beabsichtigte durch den vorderen Lederhautschnitt eine Narbe zu erzeugen, die für die Augenflüssigkeit durchgängig wäre (Filtrationsnarbe), so daß sich durch den beständigen Abfluß von Kammerwasser der Augendruck nicht mehr erhöhen könnte. Eine solche Filtrationsnarbe kommt aber bei diesem Eingriffe in Wirklichkeit nicht zustande. Die Wundränder liegen so dicht an-



Abb. 198. Lederhautausschneidung nach LAGRANGE. Beginn des Schnittes. Ein- und Ausstich in derselben Lage wie bei der gewöhnlichen Glaukomiridektomie.




Abb. 199. Fortsetzung des Schnittes. Messerschneide nach rückwärts gedreht. Der Schnitt beginnt dadurch vom Limbus nach rückwärts abzuweichen.




Abb. 200. Beendigung des Schnittes. Messerschneide nach vorne gedreht, um den Bindehautlappen zu schneiden. Hinter diesem ist der Lederhautschnitt sichtbar.

einander, daß sie unmittelbar miteinander verwachsen. Ein bloßer *Einschnitt* in die Lederhaut genügt nicht. Erst durch die *Ausschneidung* eines Stückchens der Lederhaut, wie sie LAGRANGE als erster angegeben hat, wird in der Augenkapsel eine dauernde Öffnung gesetzt, die von der vorderen Augenkammer in den Raum unter der Bindehaut führt. Dieser Eingriff heißt Sklerektomie und wird meist ausgeführt in Verbindung mit einer Ausschneidung der Regenbogenhaut als Sklerekto-Iridektomie.

**Verfahren.** Nach Akinese und Anlegung der Zügelnaht **1. Einschnitt.** Der Schnitt wird mit dem GRAEFESchen Messer nach oben angelegt. Ein- und Aus-




Abb. 201. Sklerektomie. Senkrechter Schnitt durch das Auge. *H* Hornhaut; *L* Limbus; *Le* Lederhaut, *A* Ausschchnitt aus der Lederhaut.

stich werden in derselben Weise vorgenommen wie bei der gewöhnlichen Iridektomie (Abb. 198): 1 mm hinter dem Limbus, 4 mm oberhalb des waagrechten Meridians. Der Schnitt verläuft anfänglich so wie bei einer gewöhnlichen Iridektomie parallel zum Limbus, indem die Ebene des Messers parallel dazu gehalten wird. Dann wird



Abb. 202. Sklerektomie. Ausschneidung des Lederhautläppchens. Der Bindehautlappen ist nach unten über die Hornhaut geschlagen.

aber die Schneide des Messers etwas nach rückwärts gedreht (Abb. 199) und in dieser Lage der Schnitt vollendet. Dadurch weicht die Schnittlinie vom Limbus nach rückwärts ab. Während der Ein- und Ausstich 1 mm vom Limbus entfernt waren, ist der Schnitt in der Mitte seiner Länge ungefähr 2 mm davon entfernt. Nachdem das Messer die Lederhaut durchgeschnitten hat, wird die Schneide nach vorne gedreht (Abb. 200), um den Bindehautlappen nicht störend groß zu machen. Durch diesen Schnitt bleibt ein je nach dem Grade der Drehung des Messers größerer oder kleinerer Lappen der Lederhaut an dem Hornhautlappen hängen (Abb. 201).

**2. Ausschneidung des Lederhautlappens.** Der Bindehautlappen wird über die Hornhautoberfläche hinübergelegt. Der Lederhautlappen wird mit einer feinen Pinzette gefaßt und knapp am Ansatz der Bindehaut abgetrennt (Abb. 202). Dazu dient entweder eine gewöhnliche, flach gekrümmte Schere oder WECKERS Irisschere. Die WECKERSche Schere muß zu diesem Zwecke größer und stärker sein als die gewöhnliche, da diese für die harte Lederhaut nicht hinreicht.

**3. Ausschneidung der Regenbogenhaut.** Dies gehört nicht zum Wesen des Eingriffes, wird aber angeschlossen, um einen Vorfall der Regenbogenhaut zu vermeiden. Es wird nur ein kleines Kolobom oder gar nur an der Wurzel der Regenbogenhaut eine kleine Lücke angelegt, so daß die runde Pupille erhalten bleibt. Nur bei Augen mit unbedeutender Drucksteigerung (Glaucoma simplex) könnte die Regenbogenhaut unberührt gelassen werden, weil kein Vorfall zu erwarten ist. Da aber die periphere Ausschneidung in keinerlei Weise störend wirkt, ist sie auf jeden Fall zu empfehlen.

**4. Zurechtschieben der Regenbogenhaut und des Bindehautlappens** beschließen den Eingriff. Eine hinter dem Lappen sichtbare dunkle Stelle entspricht der Öffnung in der Lederhaut (Abb. 203, 204). Unmittelbar nach dem Eingriffe ist manchmal der Bindehautlappen über dieser Stelle etwas eingesunken.



Abb. 203. Iridosklerektomie. Aussehen der Wunde unmittelbar nach dem Eingriffe. Vollständige Iridektomie.



Abb. 204. Iridosklerektomie. Periphere Iridektomie.

**Nachbehandlung.** Noch vor Anlegung des Verbandes wird Homatropin eingeträufelt und auch in den nächsten Tagen für eine ausgiebige Erweiterung der Pupille Sorge getragen, wenn nötig selbst unter Verwendung von Atropin. Sonst entstehen Verklebungen des Pupillarrandes mit der

Linsenkapsel, häufig verbunden mit Ausstreuung des Pigmentes in die Pupille.

**Zwischenfälle. 1. Ausreißen der Bindehaut beim Festhalten des Auges** macht es gelegentlich unmöglich, das Messer zu drehen, um den Schnitt in der gewünschten Weise nach rückwärts zu verlegen. Es kann alsdann nur eine gewöhnliche Iridektomie vorgenommen werden. Durch die Zügelnaht ist dieser Übelstand fast ganz beseitigt.

**2. a) Verletzung der Wurzel der Regenbogenhaut mit dem Messer,** besonders wenn eine periphere vordere Synechie besteht. Ist dies geschehen, so hat die Regenbogenhaut zur Ausschneidung mit dem stumpfen Hähchen hervorgeholt zu werden anstatt mit der Irispinzette, um die Linsenkapsel nicht zu verletzen.

**b) Verletzung der Wurzel der Regenbogenhaut bei Ausschneidung des Lederhautlappens.** Dies ereignet sich nicht selten, da sich die Regenbogenhaut häufig mit ihrem Außenrande kugelförmig in die Wunde vorwölbt.

**3. Starke Blutung.** Im allgemeinen ist die Blutung bei diesem Eingriffe stärker und störender als bei der gewöhnlichen Iridektomie.

**4. Schwierigkeit in der Ausschneidung des Lederhautlappens wegen Verwachsung der Bindehaut mit der Lederhaut.** Eine Verwachsung findet sich nur nach vorausgegangenen Entzündungen und Eingriffen, da sonst die Bindehaut mit der Lederhaut locker verbunden ist.

**5. Vorfall des Strahlenkörpers.** Dieser gefährliche Zwischenfall wird besonders durch eine zu periphere Lage des Schnittes hervorgerufen oder kommt dadurch

zustande, daß der hohe Druck den Strahlenkörper in die Wunde hineinpreßt. Bei Augen mit sehr hoher Drucksteigerung wird daher auf eine Sklerektomie verzichtet. Eine Einheilung des Strahlenkörpers mit häßlicher Ausdehnung der Wunde oder mit Schrumpfung des Auges durch eine schleichende Entzündung ist die unvermeidliche Folge.

**6. Vorfall der Linse und des Glaskörpers** treten in gleicher Weise wie bei der gewöhnlichen Iridektomie ein und sind etwas häufiger, besonders wenn der Druck im Auge vor dem Eingriffe stark erhöht war. Auch hier kann als Regel aufgestellt werden, daß der Eingriff um so gefährlicher ist, bei je höherem Drucke er vorgenommen wird. Daher wird bei sehr starker Drucksteigerung von dem Eingriffe Abstand genommen.

**Verhalten des Auges nach dem Eingriffe.** Die Kammer stellt sich häufig etwas langsamer her als nach der gewöhnlichen Iridektomie. An der Stelle des Schnittes zeigt sich am Tage nach dem Eingriffe hinter dem Bindehautlappen eine dunkel




Abb. 205. Filtrationsnarbe nach der Lederhautausschneidung.

durchscheinende Stelle. Nicht selten ist der Lappen etwas geschwollen. Manchmal sind die Augen mehr gereizt als nach einer gewöhnlichen Iridektomie. Die große Neigung des Pupillarrandes zu Verklebungen mit der Linsenkapsel wurde schon erwähnt und erfordert bis zur Heilung Gebrauch von Mydriatika.

Die aus diesem Eingriffe hervorgehende Narbe kann von verschiedener Beschaffenheit sein:

1. Der Bindehautlappen erscheint gequollen, von glasigem Aussehen und springt deutlich vor. Hinter ihm erscheint als schwarze Stelle die Öffnung der Lederhaut. Die Ränder der Lücke befinden sich in richtiger Stellung. Diese für die Sklerektomie vorbildliche Form der Narbe (ampullenförmige Narbe, Polsternarbe) bildet sich in etwas mehr als einem Drittel der Fälle (Abb. 205).

2. Die Narbe ist nur durch eine dunkle Stelle in der Lederhaut gekennzeichnet, ein Zeichen der Verdünnung. Aber die Narbe ist dabei flach. Diese Form entwickelt sich in gleicher Häufigkeit wie 1.

3. An der Stelle ist hinter dem kaum veränderten Bindehautlappen eine runde oder eiförmige Öffnung in der Lederhaut sichtbar, eine subkonjunktivale Fistel.

4. Die Narbe ist schwarz, ausgedehnt und vorgewölbt. Die Ränder der Öffnung sind aufgestellt. Der Bindehautlappen zeigt keine Veränderung. Diese Form der Narbe ist die ungünstigste. Die Drucksteigerung verschwindet dabei gewöhnlich nicht, die vordere Kammer stellt sich nicht wieder her. Die meisten dieser Augen bleiben schmerzhaft und müssen schließlich ausgeschält werden.

**Wirkung des Eingriffes.** Die Sklerektomie hat einen sehr bedeutenden Einfluß auf die Drucksteigerung und vermag die Spannung tiefer herabzusetzen als es je bei einer gewöhnlichen Iridektomie vorkommt. Ihre Überlegenheit beweist sie insbesondere in den Fällen, wo die gewöhnliche Iridektomie versagt, wie bei Glaucoma simplex und in vielen Fällen von schleichendem, durch keine Medikamente zu beeinflussendem Glaukom. Nicht selten wird der Druck ganz ausgiebig herabgesetzt, weit unter die Norm und bleibt dauernd tief.

### Gefahren und Nachteile des Eingriffes.

Wenn die Anzeige auf Augen beschränkt wird, deren Druck nicht so hoch ist, etwa 50 nicht übersteigt, so sind die Gefahren nicht größer als bei der gewöhnlichen Iridektomie. Auch sind sie um so kleiner, je weniger breit der Sklerallappen angelegt wird. Besonders die Gefahren der Linsenverletzung und des Glaskörperverschlusses werden dadurch fast ganz ausgeschaltet. Auch schwere Entzündungen der Regenbogenhaut werden nicht beobachtet, wenn der Schnitt nicht sehr peripher geführt oder ein sehr breiter Lederhautlappen ausgeschnitten wird. Bei sehr peripherem Schnitt gerät der Strahlenkörper zu leicht in die Wunde, was die Veranlassung zur Iridocyclitis gibt. Leichte Entzündungen der Regenbogenhaut aber und Neigung zur Bildung von hinteren Synechien bestehen, wie schon erwähnt, nach jeder Art von Sklerektomie und müssen durch Einträufeln von Atropin vom 1. Tage an bekämpft werden.

Der schwerste Nachteil des Eingriffes — und dies gilt für jede Art von Sklerektomie — ist das gelegentliche Eintreten einer Spätinfektion durch die Öffnung in der Augenkapsel, selbst noch Jahre nachher. Diese Gefahr veranlaßte uns, die **Anzeigen** für jede Art von Sklerektomie in engen Grenzen zu halten.

1. Glaucoma simplex, worunter wir Fälle von fehlender — oder wenigstens nicht nachweisbarer — oder nur geringer Drucksteigerung verstehen, bei denen die glaukomatösen Veränderungen des Sehnerven beständig fortschreiten (glaukomatöses Sehnervenleiden nach SCHNABEL), da bei dieser Erkrankung die GRAEFESche Iridektomie erfahrungsgemäß keinen Einfluß auf den Verlauf der Erkrankung nimmt.

2. Bei Drucksteigerung in Augen, wo bereits andere Eingriffe ohne Erfolg vorgenommen worden waren. Die Sklerektomie hat in diesen Fällen den Vorzug gegenüber einer 2. Iridektomie, daß dadurch das Kolobom nicht vergrößert zu werden braucht. Wird sie nach oben ausgeführt, so besteht keine Gefahr eines Vorfalles der Regenbogenhaut. Gegenüber dem WECKERSchen vorderen Lederhautschnitt hat der Eingriff nach LAGRANGE den Vorteil, daß er mit größerer Sicherheit und für längere Zeit wirksam ist.

3. Fälle von Sekundärglaukom verschiedenen Ursprunges, z. B. bei vorderer Synechie oder wenn andere Eingriffe vorher ohne Erfolg ausgeführt worden waren; ferner in Augen, wo die Regenbogenhaut nach Möglichkeit nicht berührt werden soll, wie z. B. bei sympathischer Entzündung.

#### b) Verfahren der Lederhautausschneidung nach ELLIOT (Trepanation).

ELLIOT schneidet unmittelbar hinter dem Limbus ein Stück der Lederhaut mit dem Trepan aus.

**Verfahren. 1. Schaffung des Bindehautlappens.** Bei örtlicher Betäubung durch wiederholtes Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung in den Bindehautsack und Auflegen eines mit 10%iger Cocainlösung getränkten kleinen Wattetupfers auf die Bindehaut oberhalb des Limbus wird oben in der Bindehaut 8 mm vom Limbus entfernt und zu ihm parallel mit einer kleinen gekrümmten Schere ein ungefähr  $1\frac{1}{2}$  cm langer Einschnitt gemacht (Abb. 206). Das Gewebe

unter der Bindehaut wird bis auf die Oberfläche der Lederhaut durchtrennt, so daß soviel Gewebe als möglich an der Bindehaut haften bleibt und die Binde-




Abb. 206. Bindehautschnitt (*E*) für die ELLIOTSche Trepanation. Das Auge blickt stark nach unten.

**2. Durchbohrung der Lederhaut (Trepanation).** Unmittelbar hinter dem Ansatz der Bindehaut, der in der Weise sehr deutlich sichtbar gemacht wird, daß der Bindehautlappen von einem Gehilfen mit feiner Pinzette senkrecht zur Lederhaut emporgehoben wird, wird ein Handtrepan von  $1\frac{1}{2}$  mm Durchmesser senkrecht aufgesetzt und zunächst durch




Abb. 207. ELLIOTSche Trepanation. Der Bindehautlappen (*Bl*) wurde bis auf die Hornhaut von der Unterlage abgelöst und nach unten geschlagen. Aus der Hornhaut-Lederhautgrenze wurde ein rundes Lättchen mit dem Handtrepan ausgeschnitten.

haut nach unten bis zum Limbus mit der Schere abgelöst. In der Nähe des Limbus, wo die Bindehaut etwas fester angewachsen ist, wird sie mit einer Lanze, die senkrecht gegen die Lederhaut geführt wird, abgeschält. ELLIOT spaltet sogar bis in die oberflächlichen Hornhautschichten hinein. Der Bindehautlappen wird nach unten geschlagen (Abb. 207) oder wenigstens von der Lederhaut genügend abgezogen gehalten, so daß sein Ansatz an der Hornhaut freiliegt.

recht aufgesetzt und zunächst durch einen leisen Druck die Stelle nur bezeichnet, wo man durchzubohren gedenkt. Auf diese Weise kann man sich nach Rückschlagen des Lappens, da die gezogene Furche durch die Bindehaut durchschimmert, überzeugen, ob man den Trepan an der richtigen Stelle, d. h. wirklich unmittelbar hinter dem Limbus, und nicht etwa zu weit rückwärts, angesetzt hat. Nun erst wird mit mäßigem Drucke der Trepan unter Drehbewegungen eingebohrt. Ist das Instrument tadellos scharf, so genügen meist einige Umdrehungen, um durchzubohren. In diesem Augenblicke verschwindet der Wider-

stand, das Kammerwasser fließt ab und der Kranke gibt Zeichen von leichtem Schmerz. Sofort wird der Trepan zurückgezogen. Das ausgebohrte Lederhautlättchen steckt meist in der Trepanöffnung, manchmal wird es in die Kammer hineingestoßen, nicht selten hängt es noch an einer Stelle mit der Umgebung zusammen. Es ist der Hornhaut-Lederhaut-Grenze entnommen (Abb. 207), auf der es reitet. Da die Hornhaut dicker ist als die Lederhaut, wird beim Durchbohren auf der Hornhautseite ein größerer Druck angewendet, um schneller in die Tiefe zu kommen.

Die freie Trepanationsöffnung wird meist von der Regenbogenhaut ausgefüllt, da diese durch das abfließende Kammerwasser hineingeschwemmt wurde. Hängt das Lämpchen noch mit einigen Fasern fest, so wird es mit einer Pinzette aufgehoben und die Fasern werden mit einer Schere durchtrennt. Je schärfer der Trepan, um so leichter ist die Ausbohrung und um so glatter sind die Ränder der Öffnung; auch hat diese um so weniger Neigung, sich später wieder zu verschließen, während durch Quetschung der Wundränder und Hinterlassen von Gewebsresten die Narbenbildung angeregt wird, wodurch die Öffnung später verödet.

**3. Behandlung der Regenbogenhaut.** Die vorgefallene Regenbogenhaut wird entweder ganz ausgeschnitten und ein Kolobom angelegt, meist aber wird in ihr Wurzelgebiet nur eine kleine Lücke geschnitten (Knopflochiridektomie). Die Regenbogenhaut zieht sich meist von selbst in die richtige Lage zurück, da sie nicht so wie bei einem Lederhautschnitte zwischen die Wundlippen eingeklemmt werden kann. Durchschnittlich gelingt es, durch leichte Knetung der Lederhaut knapp oberhalb der Öffnung, die Regenbogenhaut zum Zurückziehen zu veranlassen. Mit Spateln einzugehen, wozu wegen der Kleinheit der Öffnung nur sehr schmale verwendbar wären, ist wegen der Gefahr, die Linse zu verletzen, zu widerraten.

**4. Zurechtlagern des Bindehautlappens.** Der Bindehautlappen wird mit dem Spatel sorgfältig nach oben gestrichen. Meist liegt er so tadellos, daß keine Nähte angelegt zu werden brauchen. Hat er Neigung, sich nach unten zu drehen, so wird er mit einer Catgutnaht festgehalten.

**Nachbehandlung.** Bettruhe ist nicht unbedingt notwendig, höchstens für 1 Tag, wovon aber auch bei älteren Leuten abgesehen werden kann. Verband durch 8 Tage bei täglichem Wechsel. Schon unmittelbar nach dem Eingriffe muß zur Erweiterung der Pupille Atropin eingeträufelt werden, da sich sonst immer zahlreiche hintere Synechien bilden. Die Pupille wird weit gehalten, bis das Auge völlig blaß geworden und die Wunde geheilt ist.

**Zwischenfälle und Fehler. Sonstige Bemerkungen. 1. Durchlöcherung des Bindehautlappens.** Besonders in der Nähe des Limbus, wo die Bindehaut fest mit ihrer Unterlage verwachsen ist, besteht die Gefahr der Durchlöcherung, meist erzeugt durch die Lanze, die, anstatt senkrecht auf die Lederhaut aufgesetzt, mehr parallel zur Oberfläche des Auges geführt wurde, manchmal auch durch eine Beschädigung mit dem Trepan. Kommen die Löcher der Bindehaut und Lederhaut übereinander zu liegen, so ist der Bindehautlappen durch Nähte in geeigneter Richtung schräg zu verziehen, um die Lederhautöffnung mit unversehrter Bindehaut zu decken. Sonst bildet sich eine derbe Narbe oder durch Einwachsen von Epithel eine Fistel.

**2. Hineingeraten des Lämpchens in die vordere Kammer.** Meist kann es durch leichtes Kneten in die Öffnung zurückgebracht und von dort mit der Pinzette weggeschoben werden. Oder es wird mit einem stumpfen Häkchen aus der Kammer hervorgeholt. Es ist zweckmäßig, das Lämpchen zu entfernen, da es sich sonst manchmal später von innen her vor die Öffnung legt und sie verstopft. Außerdem bildet sich Bindegewebe um ein in der Kammer zurückgelassenes Lämpchen.

**3. Die Regenbogenhaut** wird nur bei ausgedehnter peripherer vorderer Synechie verletzt. Bei Verlötung der Regenbogenhaut mit dem Lämpchen

werden beide zusammen vorgezogen und gleichzeitig abgekappt. Sollte die Iris nach der Durchbohrung der Lederhaut nicht vorfallen, so wird sie durch leichten Druck auf die Hornhaut zum Vorschein gebracht. Wenn aber bei ungenügend scharfem Trepan in der Öffnung zurückgebliebene Gewebereste, insbesondere die stehengebliebene DESCEMETSche Membran, die Regenbogenhaut am Austritt verhindern, so ist es angezeigt, nichts weiteres zu unternehmen, um den Austritt zu erreichen. Denn alle Versuche mit der Pinzette oder dem Häkchen die Lücke frei zu machen, gefährden die Linse im höchsten Grade.

**4. Eine Verletzung der Linse** ist fehlerhaftem Vorstoßen des Trepens in das Augennere zuzuschreiben. Sie scheint die Bedingung zu sein für eine Wundinfektion, die — in ganz seltenen Fällen — schon am Tage nach dem Eingriffe in voller Entwicklung ist und zur Panophthalmitis führt.

**5. Verletzung des Strahlenkörpers.** Da das Läppchen unmittelbar vor dem Ansätze des Strahlenkörpers ausgebohrt wird, wird dieser verletzt, wenn der Trepan nicht weit genug vorne angesetzt wurde. Im menschlichen Auge beträgt die Entfernung zwischen Limbus und Ansatz des Strahlenkörpers  $1\frac{1}{2}$  mm. Diesem Abstände entsprechend wählten wir daher die Größe des Trepens. Für einen Trepan von 2 mm, wie ihn ELLIOT empfiehlt, muß durch Vordringen zwischen die Hornhautlamellen Platz geschaffen werden, wenn der Strahlenkörper nicht verletzt werden soll.

**6. Vorfall des Glaskörpers.** Wenn von den Fällen abgesehen wird, wo der Glaskörperraum in offener Verbindung mit der vorderen Kammer steht (Glaskörperververflüssigung, Verrenkung der Linse in den Glaskörperraum), kommt der Vorfall des Glaskörpers dadurch zustande, daß die Trepanationsöffnung zu weit rückwärts angelegt wurde. Er ist daher fast immer mit der Verletzung des Strahlenkörpers vergesellschaftet.

**7. Expulsive Blutung** wurde nur in äußerst seltenen Fällen beobachtet.

Die *Formen der Narbe* nach diesem Eingriffe sind die gleichen wie bei dem Verfahren nach LAGRANGE. Selbst ektatische Narben von schwarzer Farbe können sich bilden. Häufig wird die Narbe blasig geschwollen; nicht selten aber, besonders in Augen, die an langdauernden Entzündungen gelitten haben (Kerato-Skleritis), so flach und die Öffnung so verschlossen, daß die Stelle der Trepanation nach längerer Zeit kaum entdeckt werden kann.

Die *Wirkung* der Trepanation ist gleich der des Verfahrens von LAGRANGE.

**Zwischenfälle nach dem Eingriffe. 1. Schleichende Regenbogenhautentzündung.** Ohne wesentliche Reizung des Auges bilden sich schon in den ersten Tagen nach dem Eingriffe hintere Synechien. Dadurch, daß sich das Pigment über das ganze Gebiet der Pupille schiebt, können Sehstörungen verursacht werden. Die Pupille ist daher vom Tage des Eingriffes an durch Atropin erweitert zu halten.

Schwere Formen von Iridocyclitis schleichender Art folgen der Verletzung des Strahlenkörpers und verlaufen ungünstig.

**2. Einheilung der Regenbogenhaut.** Diese zeigt große Neigung, sich nachträglich gegen die Öffnung zu verschieben, während sie sich beim Eingriffe meist von selbst in die richtige Lage zurückbegibt.

**3. Herabsetzung des Druckes unter das richtige Maß.** So wie bei dem Verfahren nach LAGRANGE kommt es auch hier gelegentlich zu einer andauernden

Weichheit des Auges. Es ist nicht zu empfehlen, die fistulierende Narbe auszuschneiden, weil nach Verschuß der Öffnung die Drucksteigerung mit großer Wahrscheinlichkeit wiederkehrt.

**4. Wiederkehr der Drucksteigerung.** Sie ist nicht selten und tritt besonders in Augen ein, wo die Regenbogenhaut nicht ausgeschnitten wurde. Zur Beseitigung kann die Trepanation an anderer Stelle wiederholt werden, oder es muß ein anderes Verfahren (z. B. Cyclodialyse) angeschlossen werden. Auch vorbildliche Polsternarben schützen nicht vor Wiederkehr der Drucksteigerung.

**5. Spätinfektion.** Daß die Gefahr der Spätinfektion jedem Verfahren zukommen muß, durch das eine dauernde Lücke in dem Augapfel gesetzt wird, war zu erwarten; daß die Infektionen aber in so erschreckender Häufigkeit auftreten werden, wie es tatsächlich der Fall ist, konnte nicht vorausgesehen werden. Erst der Nachweis der offenen Fistulisierung in den Bindehautsack hinein brachte die Erklärung. Die schweren Veränderungen, die die Bindehaut in der Öffnung durch die dauernde Berührung mit dem Kammerwasser eingeht und die auch die deckende Epithelschicht betreffen, insbesondere aber die offene Fistel, gestatten den im Bindehautsack vorhandenen Keimen den Eintritt in das Augenninnere. Es kommt zur Lappeneiterung, zur eitrigen Regenbogenhautentzündung und nicht selten zur blitzartig einsetzenden Gesamtvereiterung des Augapfels (Panophthalmitis). Häufig sind die Augen völlig verloren oder zum mindesten durch dichte Glaskörpertrübungen und Schwarten fast erblindet. Selten kommt ein Auge mit brauchbarer Sehschärfe durch. Die Gefahr der Spätinfektion besteht für das ganze Leben des Kranken. Ein Mittel, ihr vorzubeugen, gibt es nicht und bei ausgebrochener Infektion versagt meist jede Behandlung.

Die **Anzeigen** für das ELLIOTSche Verfahren, das wegen seiner leichten Ausführbarkeit und wegen seiner augenblicklichen Gefahrlosigkeit für kurze Zeit alle anderen Eingriffe gegen Drucksteigerung verdrängt hatte, wurden durch die Erkenntnis der dadurch über das Auge verhängten schweren Dauergefahr wesentlich eingeengt. Es ist nur noch als berechtigt anzuerkennen in Fällen von Glaukom, wo die GRAEFESche Iridektomie erfahrungsgemäß mit schweren augenblicklichen Gefahren für das Auge verbunden ist (schwerste Drucksteigerung, aufgehobene Kammer, weit vorgeschrittenes Stadium des Glaukoms, sonstige ungünstige Verhältnisse, wie hohes Alter, schwere Allgemeinleiden u. dgl.) und wo andere Eingriffe zur Herabsetzung des Druckes (Sklerotomie, Cyclodialyse) nicht ausgeführt werden können oder schon ohne Erfolg angewendet worden sind. Wenn es sich also darum handelt, noch einen Versuch zu machen, das Auge aus der Gefahr der Erblindung durch Drucksteigerung zu retten, nachdem andere schon vergeblich gewesen waren, darf noch zur ELLIOTSchen Trepanation gegriffen werden. Dagegen sei insbesondere davor gewarnt, die „gefahrlose“ Trepanation vorzunehmen, wenn der Kranke nur noch ein Auge hat.

Bei Hydrophthalmus ist die Trepanation weniger gefährlich als die Iridektomie. Denn da bei dieser das Auge durch den Schnitt in größerer Ausdehnung eröffnet wird, stellt sich nicht selten Glaskörper in der Wunde ein. Die Trepanation ist daher der Iridektomie vorzuziehen. Sehr häufig entwickelt sich eine feste Narbe, ohne daß dadurch der günstige Einfluß auf die Drucksteigerung verschwindet. Darin liegt ein großer Vorteil, weil dadurch die Gefahr

einer Spätinfektion nur auf die selteneren Fälle beschränkt bleibt, wo eine cystische Narbe zustande kam. In Augen, die schon früher an Entzündungen, wie Keratitis parenchymatosa, Skleritis, Iridocyclitis gelitten und durch die Drucksteigerung ein hydrophthalmisches Aussehen angenommen haben, wird die Lücke regelmäßig durch Narbengewebe verschlossen. Allerdings kehrt dann in diesen Augen die Drucksteigerung fast immer wieder.

Zahlreiche Abänderungen des Verfahrens sind empfohlen worden. Sie konnten uns alle nicht befriedigen oder zeigten zum mindesten keinen Vorteil gegenüber dem ursprünglichen Vorgehen ELLIOTS.

### Über die durch die Ausschneidung der Lederhaut erzielte Fistulisierung der Augen.

Mit der Ausschneidung des Skleralstückchens verfolgte LAGRANGE ursprünglich die Absicht, einen freien Abfluß des Kammerwassers *unter* die Bindehaut zu ermöglichen. Insbesondere wurde die ampullenförmige Narbe als ein Zeichen dieses Abflusses angesehen. Gewiß kommt die blasenförmige Beschaffenheit einer solchen Polsternarbe dadurch zustande, daß das Kammerwasser, aus der Skleralöffnung heraussickernd, auf das subkonjunktivale Gewebe und die Bindehaut selbst dauernd einwirkt. Aber damit ist noch nicht gesagt, daß von dieser Stelle aus das Kammerwasser nun tatsächlich auch weiter unter die Bindehaut vordringt und damit ein sicherer dauernder Abfluß gewährleistet ist. Nur ganz ausnahmsweise entsteht auf größere Strecken unter der Bindehaut ein leichtes Ödem, welches als ein Zeichen einer subkonjunktivalen Fortleitung des ausgesickerten Kammerwassers aufgefaßt werden kann. Freilich, ob nicht doch öfters das Kammerwasser langsam unter die Bindehaut sickert, ohne daß es sich klinisch irgendwie bemerkbar machen würde, wissen wir nicht. Einige Umstände sprechen dafür. Es ist nur nicht sehr wahrscheinlich. Die pathologisch-anatomische Untersuchung läßt eher vermuten, daß das Gewebe einer Polsternarbe eine Kappe über der Öffnung der Lederhaut bildet, die geradezu einen Abschluß gegen den angrenzenden subkonjunktivalen Raum schafft, so daß sich die Flüssigkeit über ihre Grenzen nicht hinausbewegen kann. Eine große Überraschung brachte in der Frage der Fistulisierung der SEIDELSche Fluorescinvorsuch. Er zeigte nämlich, daß eine Fistulisierung in der Tat sehr häufig geschaffen wurde, aber nicht unter die Bindehaut, sondern frei in den Bindehautsack. Wird nämlich eine 2%ige Fluorescin-Kaliumlösung, die eine rotbraune Farbe hat, auf die Narbe getropft, so zeigt sich alsbald an der Stelle, wo Flüssigkeit aus dem Auginnenraum an die Oberfläche tritt, durch Verdünnung der Fluorescinslösung eine grüne Färbung und bei weiterer Verdünnung ein Farbloswerden und meist kann man den Faden der die Verdünnung bewirkenden Flüssigkeit, besonders bei Tageslicht, ganz leicht erkennen.

Es entleert sich demgemäß das Kammerwasser aus der vorderen Kammer unmittelbar in den Bindehautsack, und zwar in einer Anzahl von Fällen ganz von selbst, in anderen Fällen erst dann, wenn auf das Auge gedrückt wird. Nicht alle diese Augen aber sind von der Drucksteigerung befreit. Andererseits aber haben die Augen, bei denen der Fluorescinvorsuch negativ ausfiel, nicht etwa alle einen erhöhten Druck. Dies ist nur ein Beweis dafür, daß die Sklerektomieeingriffe nicht immer dadurch wirken, daß sie eine offene Fistulisierung zeigen, sondern daß zur Druckherabsetzung noch andere Umstände mitwirken. Auch

zeigte es sich, daß das klinische Aussehen der Narbe allein nicht erkennen läßt, ob sie fistelt oder nicht. So gibt es polsterförmige Narben, die nicht fisteln, und flache Narben, die ausgiebig fisteln. Bedeutsam ist die Tatsache des Fistelns auf Druck. Die Narbe dient in solchen Augen als Sicherheitsventil, durch welches bei entsprechender Erhöhung des Druckes im Auginneren Flüssigkeit durchtreten kann. Dieses war die Grundidee von LAGRANGE, als er die Sklerektomie ersann.

Die Tatsache der frei in den Bindehautsack erfolgenden Fistulisierung erklärt die Häufigkeit der Spätinfektionen nach diesen Eingriffen. Die Möglichkeit dazu ist durch die freie Verbindung zwischen dem keimhaltigen Bindehautsack und der vorderen Kammer geschaffen und begünstigt wird die Infektion durch die Entartung der Bindehaut im Bereiche der Polsternarbe, da hier, wie die weiße Farbe zeigt, sämtliche Gefäße verodet sind und das die Narbe überziehende Epithel infolge seiner Degeneration besonders leicht der Ansiedlungsort pathogener Keime wird.

#### IV. Die Iridenkleisis antiglaucomatosa.

Von

Professor Dr. A. PILLAT, Graz.

Die Iriseinklemmung (Iridenkleisis) bezweckt eine fistulierende Narbe und sucht dies mit Hilfe des in das Lederhautgewebe eingeklemmten Irisgewebes zu erreichen. Zum Unterschiede von den Narben nach der ELLIOTSchen Trepanation sind die Narben nach diesem Eingriffe nicht so kissenförmig und weisen keine „freie“, sondern nur „Druckfistulierung“ auf. Man ist daher berechtigt, von „Filtrationsnarben“ zu sprechen.

Der hier mitgeteilte Eingriff stellt eine Abänderung der ursprünglichen, von HOLTZ 1906 veröffentlichten Methode dar und unterscheidet sich von dieser durch die Art des Bindehautlappens, die Lage des Lederhautschnittes und durch die Art der Iriseinklemmung.

**Anzeige.** 1. Das chronische, nicht entzündliche und entzündliche Glaukom in all seinen Entwicklungsstufen.

2. Als Nachoperation bei Augen, bei denen vorher ergebnislos eine Cyclodialyse, eine ELLIOTSche Trepanation oder eine Iridektomie vorgenommen worden war. In letzterem Falle genügt meist die Einklemmung eines Kolobomschenkels.

3. Gewisse Formen von Sekundärglaukom bei Linsenverschiebung nach Verletzung, die anderen Operationsmethoden trotzen und keine schwere Beteiligung der Regenbogenhaut aufweisen.

**Gegenanzeige.** 1. Alle Formen des primären und sekundären Glaukoms, welche mit einer entzündlichen Erkrankung der Regenbogenhaut einhergehen. 2. Schwere akute, entzündliche Glaukome, weil bei diesen die Regenbogenhaut oft sehr dünn und zerreißlich ist und die Lederhautwunde daher nicht dauernd offen zu halten imstande ist.

**Vorbereitung.** Die Pupille des Kranken soll durch genügende Gaben von Pilokarpin und Eserin (Physostol) während der dem Eingriffe vorausgehenden Tage so weit als möglich verengt werden. Das Auge erhält auf dem Tische zuerst in Abständen von 1 Minute 3mal eine Lösung von 1%igem Pilokarpin mit 2%igem

Alypin eingetropt. Das Alypin hat keine tiefreichende betäubende Wirkung auf die Bindehaut, erweitert aber weniger als Cocain die Pupille. Hierauf wird innerhalb 1 Minute 2mal eine Lösung von 10%igem Cocain und Adrenalin in die obere Hälfte des Bindehautsackes eingetropt und dann sofort oberhalb des Limbus, zwischen diesem und dem Ansatz des oberen geraden Augenmuskels 0,2 ccm einer 1%igen Cocain-Adrenalinlösung unter die Bindehaut gespritzt. Hernach retrobulbäre Injektion eines halben Kubikzentimeters derselben Lösung.

Sodann breitet der Gehilfe mit Hilfe des Oberlides die Cocainlösung unter der Bindehaut und im Gewebe der Augenhöhle durch leichten Druck aus. Es empfiehlt sich nicht, länger als 2 Minuten nach der Einspritzung in die Augenhöhle mit dem Eingriffe zu warten, da sonst die Pupille durch das Cocain erweitert werden könnte.

### Der Eingriff.

**1. Schaffung des Bindehautlappens.** Mit krummer Schere und Pinzette wird 7—8 mm oberhalb des Hornhautrandes parallel zu diesem am Ansatz der Sehne des oberen geraden Augenmuskels ähnlich wie bei der ELLIOTSchen Trepanation in die Bindehaut des Augapfels ein 10—12 mm langer Schnitt bis auf die Lederhaut angelegt und der Bindehautlappen bis an den Hornhautrand teils scharf, teils stumpf abgelöst, aber immer darauf geachtet, daß möglichst alles episklerale Gewebe am Bindehautlappen verbleibt. Die dabei manchmal auftretenden hartnäckigen Blutungen aus den größeren vorderen Ciliargefäßen müssen, wenn nötig, mit dem Thermokauter oder mit der Diathermie-Kugelelektrode gestillt werden. Es genügt, den Bindehautlappen bis zum Hornhautrande abzulösen. Es ist nicht notwendig, den Limbus selbst noch mit Hilfe einer Lanze zu spalten, wie es bei der ELLIOTSchen Trepanation gefordert wird.




Abb. 208. Nach Schaffung des Bindehautlappens Lederhautschnitt mit der Lanze, 2 mm oberhalb des Hornhautrandes beginnend. Die Lanzenspitze wird bis zum oberen Pupillarrande in die Vorderkammer eingeführt.

**2. Der Lederhautschnitt mit der Lanze.** Der Augapfel wird in der Gegend von 6 mit einer in die Lederhaut eindringenden Pinzette festgehalten und bei mäßigem Blicke nach unten 2 mm oberhalb des oberen Hornhautrandes die Lanzenspitze schief durch die Lederhaut gegen den Kammerwinkel hin angesetzt, während der Gehilfe zuerst den Bindehautlappen leicht nach unten zieht. So-

bald aber die Lanzenspitze die Stelle des Einstiches bestimmt hat, legt der Gehilfe den Bindehautlappen nach oben, auf die Lanze, damit dieser nicht den Einblick in den oberen Kammerwinkel hindert. Die Lanzenspitze zielt gegen den Kammerwinkel. Es muß dieser etwas schwierige Teil des Eingriffes dem „anatomischen Gefühl“ des Ausführenden überlassen bleiben. Die Lanze wird in der Vorderkammer bis zum oberen Pupillarrande (Abb. 208) bzw. bis zum Beginn des mittleren Hornhautdrittels vorgeschoben und dann wieder langsam unter Heben der Lanzenspitze gegen die Hornhauthinterfläche zurückgezogen. Der Lederhautschnitt soll außen höchstens eine Länge von 5 mm, an der Innenseite

der Lederhaut von 3,5—4 mm haben. Daher darf die Lanze an ihrer Grundlinie nicht breiter als 6 mm sein. Die Zurückziehung der Lanze soll langsam erfolgen, damit ein Abstürzen des Kammerwassers und ein jähes Vorrücken des Linsen-Irismiaphragmas vermieden werde. Kommt bei hohem Augeninnendruck ein Vorfall der Regenbogenhaut zustande, so empfiehlt es sich, diese mit einem Spatel zuerst wieder in die Vorderkammer in ihre normale Lage zurückzuschieben, bevor sie mit der Irispinzette gefaßt und ausgeschnitten wird.

**3. Vorziehen, Einschneiden und Einklemmen der Regenbogenhaut.** Der Gehilfe zieht den Bindehautlappen etwas nach unten, wodurch die Lederhautwunde leicht zum Klaffen gebracht wird. Mit einer geschlossenen gebogenen Irispinzette geht man in die Vorderkammer bis in die Gegend der Iriskrause, öffnet die Pinzette auf höchstens 2 mm, faßt eine steile Falte der Iris in der Gegend der Iriskrause, zieht die Iris vor die Lederhautwunde und macht in diesen zeltförmigen Iriszipfel mit der bereitgehaltenen WECKER-Schere




Abb. 209. Die zeltförmig vor die Lederhautwunde vorgezogene Regenbogenhaut wird mittels der WECKER-Schere meridional bis gegen die Iriswurzel hin eingeschnitten. Der Gehilfe hält den Bindehautlappen nach unten.

eine meridionale Iridotomie (Abb. 209), die durch die mittleren zwei Drittel der Iris, nicht aber durch die Iriswurzel reichen soll. Dann klemmt man den Teil der Regenbogenhaut, der nach der Iridotomie in der Irispinzette bleibt, durch Verziehen nach der Seite in den gleichseitigen Winkel der Lederhautwunde ein. Erst dann wird die Iris losgelassen. War der Lederhautschnitt einerseits nicht zu groß und andererseits schief genug, dann bleibt auch der andere Teil der Iris in der Lederhautwunde liegen.

Diese Methode hat sich mir als viel sicherer erwiesen als die ursprünglich von HOLTH ausgeübte, welcher nach der meridionalen Iridotomie die Iris in der Mitte der Lederhautwunde liegen ließ. Hierbei ist es nicht selten vorgekommen, daß noch nach 24 Stunden die eingeklemmte Regenbogenhaut in die Vorderkammer zurückgeschlüpft ist. Zieht man aber die eine mit der Irispinzette gefaßte Hälfte der Regenbogenhaut in den Winkel der Lederhautwunde, so bleibt dieser Iriszipfel fest eingeklemmt. Der andere Teil der Iris schlüpft manchmal in die Vorder-




Abb. 210. Nach der meridionalen Iridotomie wird der von der Irispinzette festgehaltene Teil der Regenbogenhaut in den gleichseitigen Wundwinkel durch seitliche Verziehung eingeklemmt. Der andere Iriszipfel ist zum Teil in die Vorderkammer zurückgeschlüpft.

kammer zurück, so daß sich ein unregelmäßiges Kolobom der Iris ergibt (Abb. 210). Bleiben beide Teile der Regenbogenhaut in der Lederhautwunde eingeklemmt, so entsteht ein „birnförmiges“ Kolobom nach oben (Abb. 211). Es ist unbedingt erforderlich, daß die vorgezogene Iris vor der Lederhautwunde im übersichtlichen Operationsfelde eingeschnitten wird und daß nicht etwa eine

oder beide Arme der WECKER-Schere in die Lederhautwunde eingeführt werden, oder daß die Iris bei starker Blutung, also im Dunklen eingeschnitten wird. Eine Verletzung von umgeschlagenen Ciliarkörperfortsätzen, schwere Blutungen oder Linsenverletzungen könnten die Folge sein.

Wichtig ist, daß die Regenbogenhaut nicht zu breit gefaßt wird und daß die Iridotomie nicht bis zur Iriswurzel reicht. Im ersteren Falle würde die Regen-




Abb. 211. Der Bindehautlappen ist ohne Naht über die Lederhaut-Iriswunde zurückgelegt. Die eingeklemmte Iris scheint etwas seitlich von der Kolobomachse durch die Bindehaut schwärzlich durch. Birnförmiges Kolobom der Iris.

bogenhaut bei der Vorziehung vor die Lederhautwunde zu stark gedehnt und die Pupille würde nach oben verlagert, im 2. Falle würde man sich des Vorteiles begeben, daß die Iriswurzel in ganzer Ausdehnung der Lederhautwunde in diese eingeklemmt bleibt.

**4. Zurücklegen des Bindehautlappens.** Nach Loslassen des Iriszipfels wird mit einem Spatel der Bindehautlappen über die Lederhautwunde und die eingeklemmte Iris zurückgelegt und möglichst glatt gestrichen. Man achte darauf, daß die Iris unter allen Umständen von Bindehaut vollständig bedeckt ist. Wenn der Lidhalter entfernt wurde, überzeuge man sich noch einmal, daß der Bindehautlappen nicht verschoben wurde, tropfe 2 Tropfen 20%iges Argyrol auf die obere Hälfte des Augapfels und verhöte beim Schließen der Lider, daß der Bindehautlappen durch das

Oberlid zusammengeschoben oder verlagert werde. Das geschieht am leichtesten dadurch, daß man einen DAVIELSchen Löffel unter das Oberlid schiebt und dann erst die Lider schließen läßt.

Die Bindehautwunde soll nur dann durch 1—2 Haarnähte (Frauenhaar) verschlossen werden, wenn sich der Lappen während des Eingriffes stark eingerollt hat und geschrumpft ist, oder wenn er gefensterter wurde. Eine lockere Filtrationsnarbe bildet sich leichter aus, wenn nicht genäht wurde, d. h. wenn mit der Bindehaut kein Druck auf die in die Lederhaut eingeklemmte Iris ausgeübt wird.

Unmittelbar nach dem Eingriffe scheint die eingeklemmte Iris als dunkles Gewebe durch die Bindehaut hindurch, und zwar liegt bei meiner Methode das uveale Gewebe nicht in der Fortsetzung des Koloboms, sondern etwas nach der Seite verlagert (Abb. 211) und entspricht dem Ende der Lederhautwunde. Watte. Gitterschale. Verband beider Augen für 24 Stunden. Bettruhe.

**Nachbehandlung.** Verband des operierten Auges durch 6—7 Tage bei täglichem Wechsel und Einträufeln von 20%igem Argyrol in den Bindehautsack. Kein Pilokarpin. Kein Atropin. Am 8. oder 9. Tage kann der Kranke entlassen werden. Es empfiehlt sich bis zum Blaßwerden des Auges eine Bor- oder Oxy-cyanatlösung eintropfen zu lassen. Ist das Auge am 4. oder 5. Tage nach dem Eingriffe für den Finger hart, empfiehlt sich eine täglich 2malige Druckmassage mit den beiden Zeigefingern, um die Fistel offen zu halten. Auch kann vom 5. Tage an, wenn nötig, Pilokarpin eingetropt werden. Doch muß man sich immer gegenwärtig halten, daß die Erniedrigung des Druckes auch bei normalem

Verlaufe sich manchmal erst nach 2—3 Wochen einstellt. Hier sei betont, daß bei braunen, d. h. anatomisch dickeren Regenbogenhäuten die Filtration eher und ausgiebiger einsetzt als bei blauen, d. h. dünneren Regenbogenhäuten.

### Zwischenfälle und Fehler.

**1. Durchlöcherung des Bindehautlappens.** Obwohl die Gefahr der „Fensterung“ des Bindehautlappens geringer als bei der ELLIOTSchen Trepanation ist, so kommt sie bei sehr starker Altersverdünnung des Gewebes doch vor, wenn der Lappen nicht von vornherein bis auf die Lederhaut abgelöst wurde. Kommt das Bindehautfenster vor die Lederhautwunde oder die eingeklemmte Iris zu liegen, so ist die Bindehaut sorgfältig an dieser Stelle durch eine Haarnaht zu schließen. Ein Freiliegen des Irisgewebes ist unter allen Umständen zu vermeiden.

**2. Zu kleiner Bindehautlappen.** Da jede Bindehaut etwas schrumpft, bedeckt ein zu klein gebildeter Lappen die eingeklemmte Iris nicht. Man ist dann gezwungen, die Bindehaut zu nähen, wodurch auf die Iris ein Druck ausgeübt und durch die straff anliegende Bindehaut die Ausbildung eines lockeren Sickerkissens erschwert wird.

**3. Starke Blutung aus den episkleralen Gefäßen.** Da die Forderung erhoben werden muß, daß der Bindehautlappen bis auf die Sklera abgelöst werde, kommt es nicht selten zu Blutungen aus den episkleralen Gefäßen oder zur Verletzung einer größeren gestauten Vene oder gar eines Arterienastes. Alle Blutungen sind vor dem Lederhautschnitt sorgfältig zu stillen, die größeren am besten durch Betupfen des Gefäßes mit der LARSONSchen Kugelelektrode (diathermisch) oder mit der GlühSchlinge. In die Vorderkammer eingesickertes Blut ist vor dem Auffassen der Regenbogenhaut durch Massage von außen oder durch Absaugen zu entfernen.

**4. Zu langer Lederhautschnitt.** Wurde der Schnitt mit zu großer Lanze gemacht oder eine mittlere Lanze zu tief in die Vorderkammer angeführt, so klappt die Lederhaut zu sehr und kann die Regenbogenhaut nicht festhalten, so daß sie sich leicht nach dem Eingriff in die Kammer wieder zurückzieht. Ein zweiter Nachteil eines zu großen Schnittes liegt darin, daß die Iris zu weit seitlich verzogen werden muß, um in den Winkel der Lederhautwunde eingeklemmt werden zu können. Die dadurch manchmal eintretende Dehnungsatrophie der Iris gewährleistet nicht das dauernde Offenbleiben der Fistel. Auch können leichtere oder schwerere Entzündungen der Regenbogenhaut die Folge sein.

**5. Lederhautschnitt zu nahe dem Hornhautrande.** Durchsetzt der Schnitt die Lederhaut zu nahe dem Limbus in steiler Richtung, dann ist der Erfolg des Eingriffes in vielen Fällen in Frage gestellt. Einmal ist ein Durchsickern der Vorderkammerflüssigkeit unter die hier straff anliegende Bindehaut schwer möglich. Weiters wirkt die Spannung der Bindehaut einer subkonjunktivalen Dauerfistel entgegen. Ferner wird die Regenbogenhaut von den kurzen und steilen Wundlippen der Lederhaut nicht festgehalten und kann sich leicht wieder zur Gänze in die Vorderkammer zurückziehen. Auch kann es bei Einklemmung der Iris in zu großer Nähe des Limbus zur mechanischen Verlegung des Kammerwinkels kommen.

**6. Lederhautschnitt zu peripher.** Dadurch wird der Lanzenschnitt, der ja dem „Gefühl nach“ gegen den Kammerwinkel zu geführt werden muß, be-

sonders bei seichter Vorderkammer sehr schwierig: die Lanzenspitze kann nach vorn abweichen und in die Hornhautlamellen eindringen, oder sie kann nach hinten abweichen und den Ciliarkörper verletzen. Blutungen oder spätere Reizzustände (Iridocyclitis) können die Folge sein. Ein weiterer Nachteil des zu peripheren Schnittes ist der zu lange Wundkanal, welcher es notwendig macht, die Iris beim Vorziehen stark zu dehnen und im stark gedehnten Zustande einzuklemmen. Schmerzen nach dem Eingriffe, Bildung hinterer Synechien, iritische Reizzustände und oft eine Dehnung der unteren Irishälfte mit Verlagerung der Pupille nach oben sind die Folgen.

**7. Verletzungen der Linse** können bei fehlerhafter Einführung der Lanze in die Vorderkammer oder beim Auffassen der Regenbogenhaut durch die Irispinzette erfolgen, wenn diese zu stark auf die Linse drückt. Auch kommt es vor, daß bei Fällen mit sehr ausgedehnter vorderer Synechie die Lanze die Iriswurzel von hinten durchbohrt oder daß die Lanzenspitze die an die Hornhaut angewachsene Iriswurzel ein Stück vor sich her schiebt und eine kleine Iridodialyse verursacht. In diesen Fällen schiebt auch die durch den Wundkanal eingeführte Irispinzette die Regenbogenhaut ein Stück vor sich her. Läßt man die Pinzette an der Hornhauthinterfläche in die Vorderkammer gleiten, so kann man eine Verletzung der Linsenkapsel mit Sicherheit vermeiden.

**8. Zerreißen des Irisgewebes.** Bei zu peripherem Schnitt oder bei schwerem Schwund des Irisgewebes kann die Iris beim Vorziehen vor die Lederhautwunde zerreißen und den Erfolg des Eingriffes in Frage stellen. Es sind daher Fälle mit stark atrophischer Regenbogenhaut und Fälle mit Glaukoma acutum inflammatorium, bei denen es meist zu einer Iritis glaucomatosa kommt, sowie alle Fälle von Sekundärglaukom mit Irisatrophie von diesem Eingriffe auszuschließen.

**9. Blutungen in die Vorderkammer, Iridodialyse, Verschiebungen der Linse und explosive Blutung** können wie bei allen anderen eingreifenden Glaukomoperationen auch nach der Iridenkleisis vorkommen, lassen sich aber bei richtiger Technik leichter als bei anderen Glaukomoperationen vermeiden. Blutungen in die Vorderkammer und Iridodialyse sind meist die Folgen unruhigen Verhaltens der Kranken. Sie können durch eine vollkommene örtliche Betäubung (retrobulbäre Injektion!) auf einen sehr kleinen Hundertsatz herabgedrückt werden. Verschiebungen und Ausstülpungen von Linsensubstanz gegen die Lederhautwunde hin (Phakokele) können verhindert werden, wenn nach dem Lederhautschnitt die Kammerflüssigkeit ganz langsam abgelassen wird. Explosive Blutungen sind nicht dem Eingriffe, sondern dem Zustand der Gefäße und der langen Dauer des Glaukoms zur Last zu legen und vermögen nach der Iridenkleisis selten den Augeninhalt auszutreiben, weil die Lederhautwunde klein ist und die langen, schief verlaufenden Wundlippen der Lederhaut durch das Blut vom Auginneren her aneinandergedrückt und so geschlossen werden.

#### Vorkommnisse während des Heilungsverlaufes.

**1. Nachträgliche Verschiebung des Bindehautlappens.** Bei sehr unruhigen Kranken oder bei zu klein gewähltem Bindehautlappen kann es beim Verbandwechsel am 1. oder 2. Tage nach dem Eingriffe noch zu einer Verschiebung des Bindehautlappens und dadurch zur Bloßlegung der eingeklemmten Regen-

bogenhaut kommen. Vorsichtiges Öffnen der Lider, besonders Abheben des Oberlides beim Verbandwechsel lassen dieses Vorkommnis vermeiden. Kann man durch Zurückstreifen des Bindehautlappens mit einem Spatel die Iris nicht decken, so ist nachträglich eine Haarnaht anzulegen.

**2. Längere Aufhebung der Vorderkammer, Aderhautabhebung.** Kommt es sofort nach dem Eingriffe zu einem ausgiebigen Leckwerden des Augapfels, dann kann die Vorderkammer wenige Tage bis zu einer Woche und länger aufgehoben sein und eine Aderhautabhebung auftreten. Augen mit normaler Hornhaut tragen keinen Schaden davon, hingegen kann es bei den degenerativen Krankheitsbildern der Cornea guttata und Cornea farinata ebenso wie nach anderen gegen das Glaukom gerichteten Eingriffen zu kürzerer oder dauernder umschriebener Anheftung der Hornhaut an die Regenbogenhaut (vordere Synechien) kommen.

**3. Wechselnde Schmerzen im Auge** vom 2.—6. Tage nach dem Eingriffe beunruhigen manchmal den Kranken. Sie haben ihre Ursache in dem zeitweisen Durchtritt von Vorderkammerflüssigkeit durch die frische Iris-Lederhautwunde (Ventilfistel). Hat die überschüssige Kammerflüssigkeit den Augapfel verlassen, dann tritt wieder Schmerzlosigkeit ein. Mit Bildung dauernder Porengänge im Narbenbereich verschwinden die Schmerzen.

### Spätfolgen.

**1. Regenbogenhautentzündung.** Manchmal beschlägt sich die Iris und die vordere Linsenkapsel Wochen oder Monate nach dem Eingriffe mit braunem Pigmentstaub; auch zarte Verwachsungen zwischen Regenbogenhaut und Linse können sich ausbilden. Während die geringen Formen der Pigmentausschwemmung das Sehvermögen nicht stören, kann in seltenen Fällen eine leichte Herabsetzung des Sehvermögens durch Pigmentausschwemmung in den Pupillarbereich eintreten. Doch kommt dies bei weitem seltener als nach der ELLIOTSchen Trepanation vor. Schwere Formen von schleicher Regenbogenhautentzündung sind selten.

2. Die Möglichkeit des Auftretens einer *sympathischen Ophthalmie* ist wie nach allen Eingriffen am Auge vorhanden und bisher einige Male nach Iridenkleisis beobachtet worden. Ausscheidung aller Fälle mit Reizung oder Entzündung der Regenbogenhaut von diesem Eingriffe wird diese Spätfolge noch seltener machen.

**3. Spätinfektionen des Auges** liegen ebenfalls im Bereiche der Möglichkeit, sind aber viel seltener als nach der ELLIOTSchen Trepanation, weil es nach der Iridenkleisis nicht zur „freien“, sondern meist nur zur „Druckfistulierung“ kommt und weil die Bindehautnarbe selten überdehnt und atrophisch ist.

**4. Wiederkehr der Drucksteigerung.** Sie kommt dann vor, wenn die Regenbogenhaut mit der Lederhaut fest verwächst und keine fistulierende (filtrierende) Narbe zustande kommt, ferner wenn durch einen zu limbusnahen Schnitt der Kammerwinkel und der SCHLEMMsche Kanal verlegt wird, und wenn es zur Ektasie der Narbe kommt. Eine solche Wiederkehr der Drucksteigerung ist meist leicht durch eine Cyclodialyse zu beseitigen.

**5. Ektatische Lederhautnarbe.** Bei einem sehr kleinen Teil der Fälle buckelt sich die Iris-Lederhautnarbe nachträglich vor und führt zu einer staphyloartigen Vorwölbung oberhalb des Hornhautrandes. In diesen Fällen besteht keine Fistulierung, und der Augendruck ist meist erhöht. Zu dieser unangenehmen

Spätfolge kommt es bei fehlerhaftem, zu peripherem Lederhautsnitte, der mit Iriszerrung einhergeht, und dann, wenn Fälle mit Regenbogenhautentzündung diesem Eingriffe unterworfen werden. Die Ursache hierzu ist in einer schleichen- den Iridocyclitis zu suchen, die zur Verwachsung zwischen Iris und Lederhaut und somit zur Undurchgängigkeit der Narbe Veranlassung gibt.

**6. Herabsetzung des Druckes unter das gewöhnliche Maß** ist nach der Iriden- kleisis selten, weil die eingeklemmte Regenbogenhaut den ungehemmten Austritt von Flüssigkeit aus dem Auge verhindert. Eine anfängliche Hypotension bessert sich meist nach einigen Monaten von selbst. Ist dies nicht der Fall, kann eine vorsichtige Teilverödung der Kissennarbe durch Kauterisation vorgenommen werden.

#### V. Der hintere Lederhautschnitt (Sclerotomia posterior).

Bei der hinteren Sklerotomie wird der Glaskörperraum durch einen Einschnitt in die Lederhaut mit dem GRAEFESchen Messer eröffnet und Glaskörperflüssig- keit abgelassen.

**Anzeigen.** Sie wird gegen das Glaukom fast nur als Voreingriff verwendet, wenn bei den hohen Graden der Drucksteigerung eine Iridektomie zu gefährlich



Abb. 212. Hinterer Lederhautschnitt (Sclerotomia posterior). Das stark nach innen oben gerichtete Auge wird mit der Pinzette am Limbus festgehalten; das GRAEFESche Messer wird außen unten in meridionaler Richtung, die Schneide nach rückwärts, die Spitze gegen den Mittelpunkt des Augapfels, durch die Lederhaut in den Glaskörperraum eingeführt. Der Gehilfe schiebt das untere Lid weit nach unten.

oder durch den Mangel der vorderen Kammer unausführbar ist. Schon wenige Minuten später wird die Iridektomie angeschlossen, nachdem unter Massage Glaskörper aus der Öffnung ausgetreten und das Auge dadurch weicher geworden ist und sich die vordere Kammer dabei entweder hergestellt hat oder wenigstens etwas tiefer geworden ist.

Die hintere Sklerotomie kommt bei Glaukom als selbständige Operation wenig in Betracht, weil die dadurch bewirkte Druckherabsetzung gewöhnlich sehr bald, oft schon nach Stunden verschwindet, selbst wenn die Wunde noch

nicht verschlossen ist. Überdies heilen die Wundränder so glatt zusammen, daß sich keine Filtration von Augenflüssigkeit nach außen entwickeln kann.

**Die Eröffnung der Lederhautkapsel.** Der Einstich in die Lederhaut hat hinter dem Strahlenkörper, also zum mindesten 6—7 mm hinter dem Limbus durch die Bindehaut hindurch zu erfolgen, und zwar am besten außen unten zwischen dem äußeren und unteren Geraden, während der Kranke nach innen oben blickt (Abb. 212). Das Auge wird mit der Pinzette festgehalten. Die Schneide des Messers ist bei der hinteren Sklerotomie nach *rückwärts* gerichtet, vom Strahlenkörper abgewendet, so daß er nicht verletzt werden kann. Der Schnitt wird in meridionaler Richtung angelegt, entsprechend dem Verlaufe der Fasern der Lederhaut und der Blutgefäße in der Aderhaut. Ein äquatorialer, parallel zum Limbus verlaufender Schnitt würde eine Reihe von Blutgefäßen in der Aderhaut durchschneiden. Der waagrechte Meridian ist zu vermeiden, da in ihm die hintere lange Ciliararterie verläuft, deren Verletzung zu einer heftigen Blutung in den Glaskörper führen würde. Die Spitze des Messers ist gegen den Mittelpunkt der Augenkugel gerichtet; bei schräger Richtung nach vorne würde sie nämlich in die hintere Linsenfläche eindringen. Die Länge des Schnittes entspricht der Breite des Messers, da dieses nur eingeführt wird. Doch darf der Schnitt auch etwas länger gemacht werden. Um durch Austritt von etwas Glaskörpermasse die Spannung des Auges herabzusetzen, wird das Messer nach dem Eindringen aus der meridionalen Richtung in die äquatoriale gedreht, wodurch die Wunde zum Klaffen kommt (Abb. 213). In der ursprünglichen meridionalen Richtung wird schließlich das Messer aus dem Auge herausgezogen.




Abb. 213. Umrißzeichnung. Hintere Sklerotomie. Das eingedrungene Messer wurde in die äquatoriale Richtung gedreht, so daß die Wunde klafft und Glaskörper austreten kann.

**Zwischenfälle.** Kleine Blutaustritte in die Netzhaut in der Umgebung der Punktionsstelle sind häufig. In seltenen Fällen kommt es namentlich bei kongestionierten Augen zu stärkeren Glaskörperblutungen. Diese saugen sich nach längerer Zeit — es können darüber Monate vergehen — von selbst auf, so daß meist kein dauernder Schaden dadurch erwächst. Immerhin veranlaßt dieser Umstand von der hinteren Sklerotomie doch nur sparsam Gebrauch zu machen.

Über den hinteren Lederhautschnitt, der aus anderen Gründen (z. B. Ausziehung von Fremdkörpern aus dem Glaskörper) vorgenommen wird, siehe die betreffenden Abschnitte.

### Über die hintere Sklerotomie mit Eröffnung der Lederhaut durch den Trepan.

Anstatt zum Einschnitte das GRAEFESCHE Messer zu verwenden, hatten wir schon vor Jahren wiederholt versucht, in verzweifelten Fällen von Drucksteigerung durch Ausstanzen eines Stückchens der Lederhaut mit dem Trepan an gleicher Stelle, wo man den Schnitt zu machen pflegt, einen größeren Einfluß zu gewinnen. Dauererfolg war in keinem Falle eingetreten. Der Druck wird meist nur auf wenige Tage herabgesetzt, nur selten für einige Wochen. Der Glaskörper ist in diesen an hartnäckigem Glaukom leidenden Augen, vorausgesetzt daß noch kein den Glaskörper berührender Eingriff gemacht worden

ist, meist so hart, daß er in der Wunde entweder gar nicht erscheint oder daß erst durch kräftige Massage des Auges eine Glaskörperperle hervortritt. Nur in manchen Augen mit Sekundärglaukom oder wenn der Glaskörper vorher schon einmal verletzt worden war, mag er zum großen Teile flüssig sein, so daß er zum großen Teil ausrinnen kann. Um so schneller kehrt die Drucksteigerung wieder. Neuerdings hat LINDNER, von eigenen Vorstellungen über das Glaskörpergewebe ausgehend, die Eröffnung des Glaskörperraumes mit dem Trepan gegen Drucksteigerung empfohlen.

#### Verfahren von K. LINDNER.

**Anzeigen.** Fälle von Glaukom mit ungewöhnlich hohem Druck bei fast fehlender Vorderkammer; Fälle, wo sich nach irgendeinem anderen Eingriffe gegen Drucksteigerung die Vorderkammer längere Zeit nicht herstellt, namentlich wenn der Druck andauernd hoch bleibt; ferner in den seltenen Fällen von intrakapsulärer Starausziehung, wo die Kammer durch über 2 Wochen aufgehoben bleibt.

**Örtliche Betäubung.** Einige Teilstriche einer 3%igen Cocainlösung unter die Bindehaut im äußeren unteren Quadranten, außerdem aber auch ringsherum um den Limbus eine Novocain-Adrenalinlösung, um den Ciliarkörper in ganzer Ausdehnung unempfindlich zu machen.

**Der Eingriff.** Es wird außen unten ein Bindehautlappen gebildet mit der Spitze gegen die Hornhaut zu. Einlegen eines Haltefadens durch die Lederhaut. Festhalten des Auges mit der ELSCHNIGSchen Zahnpinzette. Der Haltefaden dreht das Auge nach innen oben, der Bindehautlappen wird durch eine Hängepinzette an einem Faden nach außen unten umgedreht.

In einer Entfernung von 10 mm hinter dem Limbus wird außen unten aus ungefähr der Hälfte der Dicke der Lederhaut mit einem 2-mm-Trepan ein Scheibchen herausgestanzt. Dieses vertiefte Gebiet wird mit Hilfe der LARSONSchen Kugel bis an den Rand der Mulde elektrokoaguliert, wobei auch Netzhaut und Aderhaut an dieser Stelle mitbetroffen werden. Nun erst wird mit einem etwas kleineren Trepan von 1 $\frac{1}{2}$  mm Durchmesser die koagulierte Sklera ganz herausgestanzt. Sollten noch Reste von Lederhautgewebe im Trepanationsloch zurückgeblieben sein, so werden sie mit einer Schere, deren Spitze vorsichtig zwischen Aderhaut und Lederhautgewebereste geschoben wird, entfernt. Nun wird die vollständig freigelegte Aderhaut mit einer Diszissionsnadel durchstochen.

Wie uns aus der Sclerotomia posterior seit Jahren bekannt, erscheint auch hier im Loche nur eine Perle von Glaskörper und selbst diese manchmal erst nach kräftigem Druck auf das Auge. Sie wird abgekappt und der Vorgang von neuem wiederholt, bis endlich etwas mehr Glaskörper erscheint. Der Eingriff wird mit der Bindehautnaht beendet, wozu der anfangs eingelegte Faden verwendet wird.

**Nachteile und Verwicklungen.** Gegenüber der einfachen Sclerotomia posterior hat der Eingriff den Vorteil, daß er es ermöglicht, eine größere Menge von Glaskörper zum Austritt bringen zu können und damit unmittelbar den Druck in stärkerem Maße zu erniedrigen, dagegen den Nachteil der größeren Schädigung von Aderhaut und Netzhaut. Wird auch durch die Elektrokoagulation eine Blutung in den Glaskörper verhindert, so kann es doch zu einer Netzhaut-

Aderhautabhebung kommen. Die erwartete Wiederherstellung der vorderen Kammer bleibt oft aus. Daß sich keine Dauerfistel bilden kann, war ja von vornherein klar.

## VI. Die Ablösung des Strahlenkörpers (Cyclodialyse, Verfahren von HEINE).

**Anzeigen.** Die Cyclodialyse ist angezeigt:

1. In den Anfangsstadien von Glaukom. Da dieser Eingriff gerade beim ersten Beginn der Krankheit am sichersten zu wirken scheint, kann der Versuch gemacht werden, der Krankheit durch ihn Einhalt zu tun, ohne daß dem Auge die bekannten Nachteile einer Iridektomie, wie Blendung durch Erweiterung der Pupille, Entstellung des Auges, erwachsen.

2. Bei primärem entzündlichen Glaukom, wenn die Iridektomie sehr schwierig und gefährlich ist, sei es, daß die vordere Kammer aufgehoben, die Regenbogenhaut atrophisch, die Pupille aufs äußerste erweitert, der Druck sehr gesteigert ist oder die Krankheit sich in einer weit vorgeschrittenen Entwicklungsstufe befindet, wo die Iridektomie fast immer zu schweren Verwicklungen führt. Die Cyclodialyse kann auch ausgeführt werden, wenn keine vordere Kammer vorhanden ist.

Auch wenn der Eingriff den Druck nur vorübergehend herabsetzt, ist er vom Werte, da ihm eine gefahrlose Iridektomie folgen kann, sobald nur der Druck vorerst verringert wurde.

3. Bei allen Fällen von chronischem Glaukom.

4. Bei Kranken, die das eine Auge durch ein bösartiges Glaukom oder durch eine schwere Blutung nach einer Iridektomie verloren haben und ferner bei alten, gebrechlichen, hustenden und unruhigen Leuten, da Bettruhe nachher nicht erforderlich ist.

5. In manchen Fällen von Sekundärglaukom: a) bei vorderer Synechie, wenn trotz einer Iridektomie der Druck gesteigert ist; b) bei Luxation der Linse in den Glaskörper, wo bei einer Iridektomie Glaskörperverlust unvermeidlich wäre; c) nach Starausziehung, vorausgesetzt, daß die Kolobomschenkel richtig liegen. Ist aber ein oder sind beide Kolobomschenkel in die Starschnittnarbe eingeeilt, so besteht das einzig richtige Verfahren darin, sie freizumachen.

Wegen der Unsicherheit ihrer Wirkung kann die Cyclodialyse der Iridektomie nicht als gleichwertig zur Seite gestellt oder gar dieser vorgezogen werden. Sie soll nicht ohne Unterschied an Stelle der Iridektomie verwendet werden, sie ist aber ein wertvolles Hilfsverfahren, wenn die Iridektomie versagt hat oder nicht angezeigt ist.

**Örtliche Betäubung.** Da der Eingriff gelegentlich sehr schmerzhaft ist, wird 5 Minuten vorher  $\frac{1}{2}$  ccm einer 3%igen Cocainlösung außen unten unter die Bindehaut hinter dem Limbus eingespritzt und nach entsprechendem Vorschieben der Nadel die ganze äußere Hälfte des Augapfels damit beschickt. Der Strahlenkörper und die Regenbogenhaut werden dadurch unempfindlich. Dieser Umstand hat nur den einen Nachteil, daß man beim Schneiden nicht durch eine Schmerzäußerung des Kranken aufmerksam gemacht wird, wenn man die Lederhaut durchbohrt hat und die Oberfläche des Strahlenkörpers mit der Lanze berührt.

**Der Eingriff.** Während das Auge beim Blick nach innen oben mit der Pinzette gehalten wird, wird außen unten in einer Entfernung von ungefähr 5 mm vom Limbus mit der Schere die Bindehaut eingeschnitten und die Lederhaut durch Unterminierung der Bindehaut bloßgelegt. Nun wird in einer Entfernung von 5 mm vom Limbus und parallel zu ihm ein 3—4 mm langer Einschnitt mit der Lanze *senkrecht* durch die Lederhaut vorgenommen (Abb. 214). Bei zerreißlicher oder sehr schlaffer Bindehaut wird während des Schnittes das Auge mit der spitzzahnigen Hakenpinzette festgehalten, indem deren Zähne in das Gewebe der Lederhaut eingesenkt werden. Um den unmittelbar darunterliegenden Strahlenkörper mit der Lanze nicht zu verletzen, wird die Lanze nur unter




Abb. 214. Cyclodialyse. Beginn des Einschnittes in die Lederhaut. Die Lanze schneidet mit ihrer seitlichen Kante, nicht mit der Spitze. Der Schnitt wird außen unten, ungefähr 5 mm vom Limbus entfernt und parallel dazu angelegt.

zartem Drucke hin- und hergeführt. Den Augenblick, wo die Lederhautschichten durchtrennt sind, kann man nur durch das Gefühl erkennen, indem der Widerstand verschwindet. Die Lanze soll nicht mit ihrer Spitze vordringen, sondern mit ihrer seitlichen Schneide verwendet werden, so daß die Wunde in ihrer ganzen Länge in gleicher Tiefe zu liegen kommt.

Ein Spatel, der sich von dem zum Zurückstreichen der Regenbogenhaut verwendeten nur dadurch unterscheidet, daß er winkelig abgknickt ist und nicht ganz stumpfe Kanten hat, wird durch die Wunde zwischen der Lederhaut und dem Strahlenkörper nach vorne geschoben, mit seiner Fläche parallel zu beiden. Sind sämtliche Fasern der Lederhaut durchtrennt worden, so kann dies ohne jeden Widerstand geschehen. Wenn die in der Lederhaut knapp hornhautwärts von dem Schnitte festgehakten spitzen Zähne der Pinzette den Wundrand dieser Seite etwas emporheben, findet der Spatel auch bei dicker Lederhaut leicht den richtigen Weg. Sind noch einige Fasern der Lederhaut stehengeblieben und leisten sie dem Spatel Widerstand, so werden sie mit der Lanze durchschnitten. Das Einführen des Spatels soll ohne Gewalt geschehen.

Nur ein steil nach einwärts vorspringender Skleralsporn vermag dem Spatel vor seinem Eindringen in die Kammer gelegentlich ein stärkeres Hindernis entgegenzusetzen.

Als bald erscheint die Spitze des Spatels außen unten im Kammerwinkel (Abb. 215). Nun wird der Strahlenkörper ausgiebig unterminiert, indem der




Abb. 215. Cyclodialyse. Der durch die Wunde zwischen Lederhaut und Strahlenkörper eingeführte und vorgeschobene Spatel erscheint mit seiner Spitze im Kammerwinkel.

Spatel zwischen Lederhaut und Strahlenkörper seitlich und insbesondere soweit nach rückwärts bewegt wird, daß dadurch der Strahlenkörper in seiner ganzen Breite betroffen wird (Abb. 216). Dies geschieht zum mindesten im äußeren unteren Quadranten, d. h. von dem unteren Rande des vertikalen Meridians bis zum horizontalen Meridian, wird aber meist auf einen größeren Abschnitt, ja häufig auf die ganze äußere Hälfte des Augapfels ausgedehnt, indem der Spatel nach oben vorgeschoben wird. Nach vollendeter Unterminierung wird der Spatel in die Ausgangsstellung gebracht und aus der Wunde herausgezogen. Bindehautnaht ist meist überflüssig. Verband nur über das eine Auge. Er wird mit Druck angelegt, damit es nicht in die Kammer blutet.

Das Kammerwasser fließt bei dem Eingriffe nicht aus, außer wenn der Spatel mit der einen Kante nach vorne gedreht wird, so daß die Wunde zum Klaffen kommt. Zur Entlastung des Auges von dem hohen Druck wird es aber gewöhnlich abgelassen.

**Zwischenfälle während des Eingriffes.** Werden die vorderen Ciliarvenen, die in glaukomatösen Augen oft erweitert sind, verletzt, so stört die Blutung die Schnittführung und das Blut wird überdies beim Vorschieben des Spatels in die vordere Kammer eingesaugt. Die Blutung aus den kleinen Lederhautgefäßen während des Schnittes wird durch wiederholtes Aufträufeln von Suprareninlösung auf die Wunde genügend eingeschränkt. Stark blutende, an ihrer Austrittsstelle aus der Lederhaut verletzte Ciliarvenen werden mit dem Thermokauter oder mit der erhitzten Knopfsonde berührt und dadurch zum Verschlusse gebracht.




Abb. 216. Umrisszeichnung zeigt die beiden Endstellungen des Spatels, die dieser bei den seitlichen Bewegungen erreicht, die zur Loslösung des Strahlenkörpers ausgeführt werden.

Wird der Schnitt zu tief geführt, so wird die Uvea verletzt und der Glaskörper stellt sich in der Wunde ein.

Der Spatel muß hart an der Hinterwand der Lederhaut vorgeschoben werden, sonst gerät er leicht hinter die Regenbogenhaut. Durch das Eindringen des Spatels in die vordere Kammer wird das Ligamentum pectinatum durchtrennt, der Kammerwinkel eröffnet und der Strahlenkörper von seinem Ansatz an dem Skleralsporn abgelöst.

Gelegentlich wird die DESCHEMETSche *Membran abgelöst*. Durch einen stumpfen Spatel werden nämlich die Lamellen des Ligamentum pectinatum nicht durchtrennt, sondern der Spatel gleitet entlang den Lamellen bis zu ihrem Ursprung und gerät zwischen Hornhautparenchym und DESCHEMETSche Membran, so daß diese durch die folgenden seitlichen Bewegungen des Spatels von der Hornhaut abgelöst wird. Die fehlerhafte Lage des Spatels wird durch den merklichen Widerstand erkannt, der sich dem weiteren Vorschieben entgegensetzt. Durch leichtes Zurückziehen wird der Spatel freigemacht und die Unterminierung nach seinem Eintritt in die Kammer an richtiger Stelle fortgesetzt. Die auf die Ablösung der DESCHEMETSchen Membran folgende Hornhauttrübung verschwindet ausnahmslos in kurzer Zeit. Auch wenn die Wurzel der Regenbogenhaut mit der hinteren Hornhautfläche verlötet ist (periphere vordere Synechie), findet der Spatel den richtigen Weg, so daß selbst unter diesen Umständen die Regenbogenhaut nicht verletzt wird.

Eine Iridodialyse ist ein seltenes Ereignis, von dem kein Schaden zu befürchten ist; der SCHLEMMsche Kanal ist durch den Skleralsporn ausreichend geschützt. Die Loslösung des Strahlenkörpers von der Lederhaut wird gelegentlich während des Eingriffes unmittelbar beobachtet, indem die Kammerbucht schwarz wird, ähnlich wie bei einer Iridodialyse. Aber nach Herausziehen des Spatels kehrt der Strahlenkörper wieder an seine ursprüngliche Stelle zurück und der Kammerwinkel bietet weiter keine Veränderungen. Sollte es während des Eingriffes zu einer Blutung in die vordere Kammer kommen, so wird sofort ein Druckverband angelegt, dadurch die weitere Ansammlung von Blut verhindert und meist auch ein Teil davon sogleich aus dem Auge entfernt.

**Verhalten des Auges nach dem Eingriffe.** Ist der Druck des Auges in den ersten Tagen nach dem Eingriffe noch stark erhöht und die Pupille weit, so wird Pilocarpin verabreicht. Dadurch wird der Druck nicht nur unmittelbar beeinflußt, sondern auch die Wirkung des Eingriffes unterstützt, indem durch die Verengerung der Pupille die Regenbogenhaut mit dem Strahlenkörper auf dem Gebiete der Unterminierung von der Lederhaut abgezogen wird. Ist aber das Auge, wie es besonders nach ausgiebiger Unterminierung häufig vorkommt, weich geworden und stark ciliar gereizt, so muß frühzeitig Homatropin und, wenn dieses nicht genügt, Atropin eingeträufelt werden, damit der Pupillarrand nicht durch zahlreiche hintere Synechien mit der Linsenkapsel verklebt. Ist doch selbst über ringförmige hintere Synechien mit buckelförmiger Vortreibung der Regenbogenhaut berichtet worden! Nicht selten kommt es im Verlaufe dieser schleichenden Iritis zu einer Ausstreuung von Pigment über die ganze Pupille, wodurch das Sehvermögen schwer beeinträchtigt werden kann.

Einer der größten Nachteile der Cyclodialyse, der sich besonders nach ausgiebiger Unterminierung einstellt, ist eine langsame Trübung des Linsenkerns. Die erste Erscheinung der beginnenden Linsentrübung ist eine zunehmende Kurzsichtigkeit, die sich anfänglich durch Gläser noch beheben läßt; später aber mit der zunehmenden Kerntrübung versagen die Gläser, das Sehvermögen für die Ferne sinkt bis auf Fingerzählen in wenigen Metern und nur in nächster Nähe vermag das Auge noch feinen Druck zu erkennen. Solche Augen sind gewöhnlich ganz weich.

**Wirkung des Eingriffes.** Die Cyclodialyse hat einen unmittelbaren Einfluß auf den Augendruck nur dann, wenn das Kammerwasser dabei abgelassen wird. In dieser Hinsicht wirkt sie nicht anders als eine Punktion der vorderen Kammer und die dadurch hervorgerufene Druckherabsetzung ist wie bei dieser nur vorübergehend. Die eigentliche Wirkung der Cyclodialyse entwickelt sich nur allmählich und beginnt sich meist erst nach einigen Tagen zu zeigen, indem die Spannung des Auges sichtlich abnimmt und die Erscheinungen der Drucksteigerung mehr und mehr verschwinden. Die vorher matte und getrübbte Hornhaut wird glänzend und durchsichtig, die vordere Kammer bleibt seicht oder ist nur an der Stelle der Unterminierung etwas tiefer als vorher, die Pupille fängt an, dem Einflusse der Miotika zu folgen, soweit es der Zustand des Gewebes der Regenbogenhaut erlaubt. In den musterbildlichen Fällen sinkt der Druck bis unter die richtige Höhe und in diesem Zustande verbleibt nun das Auge bei dem Grade von Sehleistung, der durch die vorangegangene Drucksteigerung geschaffen wurde. Auch bei großer Erfahrung ist es nicht möglich, mit Sicherheit anzugeben, in welchem Hundertsatz der Fälle der Druck dauernd herabgesetzt bleibt, selbst wenn man die Angaben auf das primäre Glaukom beschränken will. Es hängt die Wirkung des Eingriffes ja auch zu sehr von dem Zustande ab, in welchen das Auge durch die Drucksteigerung bis zur Zeit des Eingriffes bereits gebracht worden ist. Zahlenaufstellungen über Fälle, die weniger als 4 Jahre beobachtet worden sind, geben über die Dauerwirkung des Eingriffes keine Auskunft. Denn selbst nach so langer und noch viel längerer Zeit kann der Druck aus unbekanntem Gründen plötzlich wieder hoch werden. Je jüngeren Datums die Drucksteigerung ist, je ausgiebiger unterminiert wurde, um so größeren Einfluß hat der Eingriff. In der Mehrzahl der Fälle kehrt aber nach einer kürzeren oder längeren Pause selbst in Fällen, wo das Auge durch lange Zeit — selbst 10 Jahre lang — einen Druck unter der Norm hatte, die Drucksteigerung in früherer Stärke wieder und in einer geringen Gruppe von Fällen, besonders bei absolutem Glaukom, stellt sich auch kein vorübergehender Erfolg ein. Nach neuen Angaben scheint doch für die Herabsetzung des Druckes der Umstand Ausschlag zu geben, daß der Kammerwinkel frei bleibt, sich nicht wieder verschließt und das Kammerwasser dauernd einen Abfluß in den suprachorioidealen Raum findet. Freilich ist damit nicht geklärt, warum bei gelungenem Eingriffe die Augen ganz weich sind. Ein wirklich normaler Druck, wie in einem gesunden Auge, ist doch eine Seltenheit nach Cyclodialyse.

Man muß daher daran denken, daß auch andere Folgen des Eingriffes in Betracht zu ziehen sind, wie traumatische Schädigungen des Ciliarkörpers und seiner ihn versorgenden Nerven. Aber warum schnellt dann gelegentlich nach Jahren der Weichheit der Druck plötzlich wieder in die Höhe?

### Verfahren der Cyclodialyse nach MAUKSCH.

MAUKSCH empfiehlt die Cyclodialyse in Verbindung mit Einlagerung der Iris zwischen Lederhaut und Ciliarkörper (Iridenkleisis subcleralis Raeder).

**Anzeigen.** Dieselben wie für die gewöhnliche Cyclodialyse, insbesondere als 2. Eingriff, wenn die 1. Cyclodialyse versagt hat.

**Örtliche Betäubung.** Wie bei der Cyclodialyse, und zwar im äußeren oberen Abschnitt.

**Verfahren.** Nach Einschnitt in die Bindehaut außen oben und Bloßlegen der Lederhaut, wird oben etwas nach außen vom senkrechten Meridian der Schnitt durch die Lederhaut wie bei der Cyclodialyse gemacht, aber etwas länger: 5—6 mm. Unter Fixation des Auges mit der ELSCHNIGSchen Pinzette wird der Ciliarkörper wie bei der Cyclodialyse abgelöst, und zwar in einem Viertel seines Umfangs. Nunmehr wird durch die Lederhautwunde eine zarte, schwach gebogene Irispinzette vorgeschoben bis nahe an den Pupillarrand, die Regenbogenhaut dort schmal gefaßt und in die Tasche zwischen Lederhaut und Ciliarkörper zart hineingezogen, doch nur so weit, daß sie in der Lederhautwunde nicht zum Vorschein kommt. Damit ist der Eingriff beendet. Zurechtstreichen der Bindehaut. Atropin, Verband. Durch das Vorziehen der Iris entsteht das Bild eines schmalen Koloboms in der Richtung gegen den Schnitt. Das Einträufeln von Atropin hat hauptsächlich den Zweck, ein Zurückschlüpfen der Regenbogenhaut zu verhindern. Das wird noch sicherer erreicht, wenn man die Iris etwas vor die Wunde zieht und den Pupillarrand einschneidet. Die Iris darf aber zwischen den Wundrändern nicht belassen werden.

Der Heilverlauf unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der gewöhnlichen Cyclodialyse.

**Fehler, Gefahren und Verwicklungen.** Das Herausholen der Iris mit der Pinzette verlangt einen längeren Einschnitt als bei der gewöhnlichen Cyclodialyse und gestaltet sich oft recht schwierig. Ein stumpfes Häkchen an den Pupillarrand herangeführt, vermag leichter die Regenbogenhaut hervorzuziehen und es wird dadurch auch die Gefahr vermieden, die Iris an ihrer Wurzel abzureißen. Durch den Zug der Iris und durch die infolge der Ablösung von seinem Lederhautansatz erfolgte Lageveränderung des Ciliarkörpers können Ciliarkörperfortsätze nach außen gedreht und zwischen Lederhaut und eigentlichem Ciliarkörper eingeklemmt werden, ein Zustand, der zu entzündlichen Erscheinungen Anlaß geben kann.

Iritische Reizung verlangt Gebrauch von Mydriatica.

Der Druck wird oft erst allmählich zur richtigen Höhe zurückgebracht.

Ein Nachteil des Verfahrens besteht darin, daß unmittelbar nach dem Unterminieren des Ciliarkörpers nicht sofort der Druckverband wie bei der gewöhnlichen Cyclodialyse angelegt werden und es daher in die Vorderkammer hinein bluten kann.

**Wirkung des Eingriffes.** Eine Fistulisierung nach außen kommt dabei nicht zustande. Es entsteht auch keine Polsternarbe. Die Flüssigkeit der Vorderkammer wird vielmehr in den Suprachorioidealraum abgeleitet. Durch die Umstülpung der Iris kommt das Pigmentepithel auf die Innenfläche der Lederhaut zu liegen, ein Umstand, der dazu beitragen soll, den Weg von der Kammerbucht in den suprachorioidealen Raum freizuhalten.

### Abänderung der Cyclodialyse nach SALLMANN. Die Trepanationescyclodialyse.

**Anzeigen.** Dieselbe wie die der Cyclodialyse. Besonders bei Wiederkehr der Drucksteigerung nach Cyclodialyse oder einem anderen Glaukomverfahren.

**Örtliche Betäubung.** Dieselbe wie bei der Cyclodialyse.

**Verfahren.** Es wird ein zungenförmiger Bindehautlappen gebildet gegen den Augenäquator breit gestielt, der vordere gewölbte Rand in einer Entfernung von ungefähr 4 mm vom Limbus. Zwei feine Bindehautnähte werden durch die Ränder der Bindehautwunde vorgelegt und ein Haltefaden im Bereiche der freigelegten Lederhaut eingesetzt.

8 mm vom Limbus Trepanation der Lederhaut mit 1,5—1,7 mm Trepan mit sorgfältiger Schonung der Uvea. Unterminierung des Ciliarkörpers mit dem Spatel von der Öffnung aus wie bei der gewöhnlichen Cyclodialyse, aber nur auf einen Quadranten beschränkt. Nach Abfließen des Kammerwassers Entfernung der Haltefäden und rasches Knüpfen der vorgelegten Fäden. Leichter Druckverband.

**Heilverlauf.** Druckherabsetzung unter normale Werte schon vom nächsten Tage an bis zu Wochen. Das in den ersten Tagen nach dem Eingriffe vorhanden gewesene Sickerkissen verschwindet gewöhnlich nach 3—8 Tagen. Der Druckherabsetzung folgt manchmal eine rasche Druckerhöhung, die durch Miotica beherrscht werden kann.

Nach einigen Wochen ist die Stelle der Trepanation nur noch als grauer Fleck oder gar nicht mehr zu sehen. Die iritische Reizung ist etwas häufiger als bei der Cyclodialyse. Die Dauerwirkung des Eingriffes scheint dem ursprünglichen HEINESchen Verfahren gleich zu sein.

## VII. Die Einschneidung des Kammerwinkels (Verfahren von DE VINCENTIIS).

**Anzeigen.** 1. Wiederkehr einer Drucksteigerung, nachdem schon andere Eingriffe dagegen versucht worden waren.

2. Glaucoma haemorrhagicum, insbesondere wenn das erste Auge durch eine schwere Blutung nach Iridektomie verlorengegangen ist.

3. Glaucoma secundarium bei Cyclitis.

4. Hydrophthalmus.

**Der Eingriff** wird mit dem von DE VINCENTIIS angegebenen, leicht gekrümmten Nadelmesserchen ausgeführt, das mit einer kleinen, spitz auslaufenden,




Abb. 217. Nadelmesserchen nach DE VINCENTIIS.

an ihrem gewölbten Rande scharfen Sichel endigt (Abb. 217). Der Schaft verdickt sich allmählich gegen den Griff, so daß das durch den Einstich erzeugte Loch verschlossen wird und das Kammerwasser nicht abfließen kann. Nach Einträufeln von Cocain und nach möglichst starker Verengerung der Pupille durch Eserin wird die Nadel, unter Festhalten des Auges mit der Pinzette, außen ungefähr 1 mm hinter dem Hornhautrande, ein wenig unter dem waagrechteten Meridian schräg durch die Lederhaut gestochen und ungefähr parallel zur Oberfläche der Regenbogenhaut mit der gewölbten Schneide nach abwärts

gerichtet, durch die Kammer vorgeschoben, bis die Spitze im Kammerwinkel innen — an einer Stelle, die etwas tiefer als der Einstich liegt — verschwindet und hier ungefähr 1 mm tief in das Gewebe der Kammerbucht eindringt (Abb. 218).



Abb. 218. Einschneidung des Kammerwinkels nach DE VINCENTIIS. Das Messerchen ist durch den Limbus von außen eingeführt und seine Spitze innen im Kammerwinkel eingesetzt. In den Abb. 218 und 219 wurde der Teil der Messerspitze punktiert gezeichnet, der während des Eingriffes nicht sichtbar ist, weil er hinter den Limbus in die Kammerbucht vorgedrungen ist.

Die Nadel wird nun unter allmählichem Zurückziehen so geführt, daß sie aus der ungefähr waagrechten Lage fast bis in die lotrechte kommt (Abb. 219), wobei die gewölbte Schneide den ganzen unteren Umkreis der Kammerbucht samt den inneren Lederhautschichten einschneidet bis nahe zum Einstich hin. Je seichter die Kammer, um so schwieriger läßt sich der Schnitt ausführen.

Das Verfahren hat den Vorteil, daß das Auge nur in einem Punkte und nicht breit eröffnet wird, wodurch die bei der Iridektomie gefürchteten Zwischenfälle vermieden werden. Tritt eine Blutung in die vordere Kammer ein, so wird ihr durch schleunige Anlegung eines Druckverbandes Einhalt getan. Besteht eine periphere vordere Synechie, so schneidet die Nadel in die Regenbogenhaut ein und trennt sie von ihrem Ansatz. Diesem Umstande kommt keine ernstere Bedeutung zu.

Der Eingriff hat in vielen Fällen einen günstigen Einfluß, doch läßt er nicht selten im Stiche.



Abb. 219. Ein Teil des Schnittes ausgeführt. Dementsprechend der Griff des Messerchens aufgestellt. Die dunkle Linie zeigt den Verlauf des Schnittes in der Kammerbucht an.

## B. Eingriffe gegen das Sekundärglaukom.

**Anzeigen.** Das Verfahren hängt in erster Linie davon ab, ob die Drucksteigerung nur eine *vorübergehende* Erscheinung ist oder *dauernd* sein wird.

**Punktion der Hornhaut.** Sie ist angezeigt bei vorübergehender Drucksteigerung, z. B. bei Verletzungsstar mit rascher Quellung der Linse, bei akuter Regenbogenhautentzündung, wobei die vordere Kammer gewöhnlich vertieft ist. Die Punktion kommt erst in Betracht, wenn die

gewöhnliche örtliche Behandlung mit Eisumschlägen und Anwendung von Atropin bei verengter Pupille versagt hat.

**Der Eingriff.** Das cocainisierte Auge wird mit der Pinzette seitlich am Limbus gefaßt. Die Lanze wird steil auf den Limbus aufgesetzt und durch die Hornhaut durchgeführt. Nach Eintritt der Spitze in die vordere Kammer wird die Klinge in die Ebene der Regenbogenhaut umgelegt und vorgeschoben, bis der Schnitt eine Länge von 3 mm erreicht hat. Vorher darf die Lanze nicht zurückgezogen werden, damit das Kammerwasser nicht vorzeitig abfließe. Im übrigen gelten für die Handhabung der Lanze alle Vorschriften, die dafür bei der Glaukomiridektomie gegeben worden sind. Beim Zurückziehen der Lanze soll die Wunde nicht ins Klaffen kommen und das Kammerwasser nicht abfließen. Dieses wird erst nachträglich und in beliebiger Menge herausgelassen, indem durch einen leichten Druck des Spatels auf die lederhautseitige Wundlippe die Wunde etwas gelüftet wird. Das rasche Abfließen des Kammerwassers ist

schmerzhaft und kann durch die plötzliche Druckherabsetzung Vorfälle der Regenbogenhaut und Blutungen in die Kammer und selbst in die Netzhaut zur Folge haben. Ist der Druck sehr stark erhöht, so wird nicht das ganze Kammerwasser herausgelassen, sondern nur soviel als notwendig ist, um den Druck auf die richtige Höhe oder ein wenig darunter zu bringen. Auf diese Weise werden am ehesten Blutungen vermieden. Wurde die Regenbogenhaut durch plötzliches Abfließen des Kammerwassers vorgeschwemmt, so ist sie mit dem Spatel genauestens zurückzuschieben. Geriet der Schnitt zu lang und fällt sie immer wieder vor, so muß sie ausgeschnitten werden.

Die Punktion der Hornhaut kann beliebig oft wiederholt werden. Ist z. B. im Verlaufe einer akuten Iritis am Tage nach der Punktion der Druck wieder erhöht, so wird im cocainisierten Auge mit einem Spatel die lederhautseitige Wundlippe niedergedrückt oder bei schon etwas festerer Verklebung der Spatel zwischen die Wundlippen vorgeschoben, die Wunde dadurch geöffnet und dem Kammerwasser aufs neue der Austritt erlaubt. Durch einige Tage bleibt die Wunde zart genug, um auf die beschriebene Weise leicht wieder geöffnet werden zu können. Wird die Punktion der Hornhaut bei Drucksteigerung infolge Quellung der Linse ausgeführt, so wird der Schnitt *etwas länger* gemacht (5 mm), um auch einen Teil der Linsenmasse durch Massage herausbefördern zu können wie bei der Ausziehung des weichen Stares beschrieben.

Die Punktion der Hornhaut wird auch gegen fortschreitende Hornhautgeschwüre angewendet und häufig verbunden mit der Kauterisation des Geschwüres. Die Punktion ist ferner bei Hornhautgeschwüren von Vorteil, wo ein Durchbruch unmittelbar bevorsteht, weil dadurch die Nachteile eines plötzlichen Geschwürdurchbruches, insbesondere ein Vorfall der Regenbogenhaut, beseitigt werden. Gelegentlich hat die Punktion in Fällen von chronischen Entzündungen der Hornhaut (Keratitis profunda) einen günstigen Einfluß auf den Krankheitsverlauf. Sie fördert schließlich auch die Aufsaugung von Glaskörpertrübungen.

**Iridektomie und andere Eingriffe.** Die Fälle von Sekundärglaukom, wo die Drucksteigerung nicht vorübergehender Natur ist, erfordern eine Iridektomie oder andere von den Eingriffen, die gegen das primäre Glaukom angewendet werden. So sei hier nur die Drucksteigerung durch Anwachsung der Regenbogenhaut an die Hornhaut, durch Lageverschiebung der Linse, bei Seclusio pupillae, nach Starauszziehung u. dgl. erwähnt.

Strenge Anzeigen für das eine oder andere Verfahren können nicht aufgestellt werden. Oft genug müssen mehrere Eingriffe an demselben Auge nacheinander ausgeführt werden, um die Drucksteigerung dauernd zu beseitigen. Im allgemeinen hat auch hier die Iridektomie als der einflußreichste Eingriff zu gelten und die anderen Verfahren, wie Cyclodialyse oder Trepanation, haben als Ersatz dafür herbeigezogen zu werden, wenn die Iridektomie versagte oder wenn sie wegen der besonderen Verhältnisse des Auges zu gefährlich erscheint.

Die Ausschneidung der Regenbogenhaut bei Sekundärglaukom kann durch die anderen krankhaften Veränderungen des Auges sehr erschwert werden. So kann die durch die chronische Entzündung atrophisch gewordene Regenbogenhaut häufig nicht mit der Pinzette vorgezogen werden, da sie schon bei der leisesten Berührung zerreißt, und der Eingriff muß sich darauf beschränken, einzelne Teile von ihr mit der Pinzette herauszubringen, anstatt ein Stück von

ihr auszuschneiden. Oder bei Verwachsung ihrer ganzen Hinterfläche an die Linsenkapsel mag es zwar gelingen, sie vorzuziehen und auszuschneiden, aber das Pigmentblatt bleibt auf der Linsenkapsel kleben, so daß der erhoffte optische Erfolg des Eingriffes ausbleibt.

Bei Verschiebung der Linse oder Ausdehnung der Lederhaut bringt der Vorfall des Glaskörpers schwere Verwicklungen mit sich. Bei Luxation oder Subluxation der Linse (ausgenommen die Luxation in die vordere Kammer) wird kein Eingriff vorgenommen, bevor er nicht durch das Auftreten einer Drucksteigerung unabweisbar wird. Erfahrungsgemäß vertragen manche Augen durch lange Zeit eine Verschiebung der Linse, ohne darauf mit Drucksteigerung zu antworten. Da die Zonula zerrissen ist, stellt sich schon unmittelbar nach dem Schnitte Glaskörper in die Wunde ein; wurde dabei die Regenbogenhaut vorgeschwemmt, so kann sie leicht gefaßt und ausgeschnitten werden; ist sie aber durch den Glaskörper nach rückwärts gedrängt worden, so ist jeder Versuch, sie mit der Pinzette herauszubekommen, von vornherein als aussichtslos aufzugeben; gelegentlich gelingt es, sie mit dem stumpfen Häkchen zu erreichen und vorzuziehen. Schlägt auch dieser Versuch fehl, so muß von der Ausschneidung Abstand genommen und der Eingriff unterbrochen werden.

Die Trepanation nach ELLIOT ist bei Drucksteigerung nach Luxation der Linse in den Glaskörper zwar ein leichter Eingriff als die Iridektomie, jedoch ist ihr Einfluß weniger sicher. Außerdem gefährdet sie gerade diese Augen, wo durch die freie Verbindung des Glaskörperaumes mit der vorderen Kammer der Glaskörper bis zur Trepanationsöffnung reicht, durch den bösen Verlauf einer Spätinfektion.

Dagegen bewährt sich die Cyclodialyse in den meisten Fällen dieser Art von Drucksteigerung ganz vorzüglich, indem sie den Druck auf die Dauer herabsetzt. Sie hat daher bei Luxation der Linse in erster Linie herangezogen zu werden, um die Drucksteigerung zu beseitigen.

Weniger empfehlenswert ist die Cyclodialyse in Augen, deren Lederhaut schon ausgedehnt ist, denn der Schnitt gerät durch die verdünnten Augenhäute allzuleicht in den Glaskörperaume hinein. Ektatisch gewordene Augen lasse man am besten in Ruhe. Bei jungen Leuten können freilich solche Augen noch immer ein halbwegs brauchbares Sehvermögen haben. Aber jeder Eingriff kann nur als Versuch gelten, denn sehr häufig, besonders wenn gleichzeitig Linsenlosigkeit besteht und der Glaskörper vollständig verflüssigt ist, erzielt man gar keinen Erfolg. Gerade in solchen Augen kann man gelegentlich in der Weise den Druck wieder auf längere Zeit herabsetzen, daß man durch eine ektatische Skleralstelle (z. B. im Bereiche eines Äquatorialstaphyloms) eine Elektrokoagulationsnadel in den Glaskörperaume einsticht. Dies hat subkonjunktival zu geschehen, indem man seitlich von der beabsichtigten Durchbohrungsstelle durch einen Einschnitt in die Aderhaut die Lederhaut bloßlegt und die Nadel unter der Bindehaut an den gewünschten Punkt der Durchbohrung heranbringt. Es sickert der flüssige Glaskörper unter die Bindehaut. Die Einschnittswunde in der Bindehaut wird durch eine Naht verschlossen.

Ist die Linse in die vordere Kammer luxiert, so muß *sofort* ein Eingriff unternommen werden, da Drucksteigerung regelmäßig in kürzester Zeit folgt. Um ein Entweichen der Linse nach rückwärts in den Glaskörperaume zu verhindern,

wird zunächst die Pupille durch Eserin verengt. Durch einen Schnitt mit dem GRAEFESCHEN Messer wird darauf die vordere Kammer eröffnet und die Linse mit der Schlinge hervorgeholt. Da in diesen Augen Glaskörperraum und vordere Kammer in offener Verbindung stehen, ist ein Erscheinen des Glaskörpers in der Wunde meist nicht zu vermeiden. Daher soll vor dem Eingriffe eine Novocain-Adrenalin-Lösung hinter das Auge eingespritzt werden; denn dadurch wird das Auge weich und damit die Neigung des Glaskörpers auszutreten, sehr vermindert.

**Transfixion** (Verfahren von E. FUCHS). Dieser Eingriff ist bei der buckelförmigen Vortreibung der Regenbogenhaut infolge ringförmiger hinterer Synechie (*Selclusio pupillae*) angezeigt. Eine regelrechte Iridektomie ist bei diesem Zustande kaum möglich, da die Wurzel der Regenbogenhaut oft in breiter Ausdehnung an die hintere Hornhautwand angelagert ist.

Die Transfixion wird mit dem GRAEFESCHEN Messer ausgeführt, das, parallel zur Ebene des Limbus und waagrecht gehalten, 1 mm nach innen vom äußeren Hornhautrande durch die Hornhaut in das Auge eingeführt und an der spiegelgleich gelegenen Stelle innen in der Hornhaut ausgestochen wird (Abb. 220). Sollte es nicht möglich sein, das Messer ganz durchzuführen, so genügt auch das Einstechen durch Hornhaut und anliegende Iris auf der *einen* Seite. Das Messer wird darauf in der gleichen Haltung aus dem Auge gezogen. Ein- und Ausstichpunkt liegen im waagrechten Meridian der Hornhaut. Das Messer dringt dabei durch die vorgewölbte Regenbogenhaut und erzeugt in ihr 4 Löcher (Abb. 221), wodurch eine neue Verbindung der hinteren mit der vorderen Kammer hergestellt wird. Dadurch ver-

schwindet die Drucksteigerung und die Regenbogenhaut kehrt in ihre richtige Lage zurück. Kommt die Entzündung der Regenbogenhaut nicht wieder, so daß die Öffnungen nicht durch Exsudat verschlossen werden, so hat dieser Eingriff dauernden Erfolg; ist aber ein neuerlicher Ausbruch der Iritis zu gewärtigen, so wird einige Tage später bei richtiger Tiefe der Kammer eine regelrechte Iridektomie vorgenommen, um ein Wiederkehren der Drucksteigerung zu verhindern.

Im übrigen wurde bei der Besprechung der einzelnen Verfahren im Abschnitte Glaukom auf ihre Anzeige und ihre Verwendbarkeit bei bestimmten Formen von Sekundärglaukom hingewiesen.

Wurde durch eine *Iris cyste* der Druck erhöht, so genügt nicht die Iridektomie allein, sondern es muß versucht werden, durch einen entsprechend angelegten Schnitt die ganze Blase aus dem Auge zu entfernen. Dies gelingt freilich infolge




Abb. 220. Transfixion nach E. FUCHS.




Abb. 221. Umrißzeichnung. Lage des Messers bei Transfixion. Buckelförmige Vortreibung der Regenbogenhaut.

der leichten Zerreißlichkeit der Cystenwand meist nicht. Da uns heute aber ein ziemlich sicheres Verfahren zur Verfügung steht, die Cyste zur Verödung zu bringen, wird nicht erst gewartet, bis sich der Druck erhöht, sondern die Cyste schon frühzeitig angegangen. Diese Behandlung besteht in der *Elektrokoagulation der Cystenwand* mit dem Hochfrequenzstrom.

#### Verfahren von ŠAFÁŘ.

**Anzeigen.** Iriscysten aller Art, insbesondere nach durchbohrenden Verletzungen oder Eingriffen. Auch bei den nicht so seltenen Fällen von Epithelwanderung in die vordere Kammer, besonders nach Starausziehungen, die unbehandelt mit Sicherheit zum Untergang des Auges führen. Linsenlose Augen eignen sich ganz besonders für diese Behandlung, weil die Gefahr einer Linsen-trübung durch die Hitzewirkung entfällt.

**Örtliche Betäubung.** Außer Einträufeln von 3%iger Cocainlösung in den Bindehautsack Einspritzen von 1%iger Cocainlösung unter die Bindehaut entsprechend der Lage der Blase.

**Vorbereitung des Kranken.** Anlegen der inaktiven Bleiplattenelektrode am Gesäß.

**Verfahren.** Kurzer Einschnitt mit der Lanze durch Hornhaut und Blasen-vorderwand, ohne die vordere Kammer selbst zu eröffnen. Beim Herausziehen der Lanze fließt der Inhalt der Blase aus und ihre Wand sinkt zusammen. Durch die Wunde wird eine kleine LARSONSche Kugelelektrode in das Innere der Blase geführt. Der Stiel hat durch Lacküberzug isoliert zu sein. Beschickung der als aktive Elektrode dienenden Kugel mit Hochfrequenzstrom (ungefähr 50 MA) in der Dauer von wenigen Sekunden.

Die Weißfärbung des von dem Strome getroffenen Gebietes, einschließlich der Hornhaut im Bereiche der Blase, zeigt die koagulierende Wirkung an und gibt Veranlassung, den Strom sofort zu unterbrechen. Es ist genau zu beachten, ob das ganze Cystengebiet von der Wirkung betroffen worden ist, und wenn nicht, muß man die Lage der Kugel ändern.

**Nachbehandlung.** Atropin, Verband.

**Verlauf.** Die Reizerscheinungen sind nur gering; gelegentlich leichte Iritis mit fibrösem Exsudat, in wenigen Tagen unter der üblichen Behandlung ablaufend. Auch die Hornhaut ist im Bereiche des koagulierten Gebietes weißlich verfärbt und bleibt dauernd getrübt. Von besonderer Wichtigkeit ist, den Wundrand der Hornhaut durch den Strom nicht zu schädigen, weil sonst durch den dadurch hervorgerufenen Gewebetod ein Gewebeverlust entsteht, der nur langsam und mit starker Schwartenbildung ausheilt und dadurch das Auge schwer schädigt.

#### Der Druckmesser von SCHIÖTZ.

Die Vorrichtung (Abb. 222) wird an den beiden Armen *a* einer Hülse zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten. In dieser Hülse *b* gleitet mit größter Leichtigkeit die Hülse *c*, die sich an ihrem unteren Ende zu einem Fußstück erweitert. Dieses bildet an seiner unteren Seite eine gehöhlte Fläche von 9 mm Durchmesser und 15 mm Krümmungshalbmesser. Oben ist an dieser Hülse ein Bügel *d* befestigt, der die Einteilung und einen kleinen Stift *f* als Drehungsachse für der

ungleicharmigen Hebel  $g$  trägt. In dem Inneren der Hülse  $c$  steckt ein langer Zapfen  $h$  (3 mm im Durchmesser), der in dem Hohlraum der Hülse sehr leicht auf- und abgleiten kann. Das untere Ende dieses Zapfens, das bei der Untersuchung auf die Hornhaut zu liegen kommt, ist gehöhlt mit demselben Krümmungshalbmesser wie das Fußstück (15 mm), das obere Ende ist zugespitzt. Auf dieses obere Ende des Zapfens können, um verschiedene Belastung zu erzeugen, Gewichte  $e$  von verschiedener Größe aufgesetzt werden. Diese werden in der Weise befestigt, daß im Gewichte an einer Stelle der mittleren Öffnung eine Furche angebracht ist, der Zapfen aber etwas unterhalb seiner Spitze einen kleinen Vorsprung hat. Durch eine kleine Drehung wird das Herausfallen des Zapfens aus dem Gewichte und damit mittelbar des Zapfens aus der Hülse unmöglich gemacht. Der Vorrichtung sind 4 Gewichte von verschiedener Größe beigegeben, die mit den Nummern 5,5, 7,5, 10, 15 versehen sind, womit in Gramm das Gesamtgewicht gemeint ist, das in dem betreffenden Falle Zapfen, Hebel und Lot zusammen haben.

Der lange Arm des Hebels wird von dem geraden Zeiger  $g$  gebildet, der an der Einteilung entlang gleitet. Der kurze Arm des Hebels  $g_1$  ist bogenförmig. Bei senkrechter Stellung der Vorrichtung fällt der Zeiger, sich selbst überlassen, entsprechend der Schwere des kurzen Hebelarmes gegen das rechte Ende der Einteilung (Abb. 222), wo er durch einen vorspringenden Stift an der Weiterbewegung verhindert wird. Ist aber die Vorrichtung in Gebrauch, so berührt die obere Spitze des Zapfens den kurzen Hebelarm, schiebt ihn nach aufwärts und der Zeiger wird dementsprechend nach links verschoben. Wird die Vorrichtung mit dem Fußstück auf eine harte Fläche gestellt, deren Krümmung dem des Fußstückes entspricht (ein solcher Prüfkörper ist der Vorrichtung beigegeben), so befindet sich die Zapfenspitze in einer solchen Höhe, daß der kurze Hebelarm dadurch gehoben wird, infolgedessen der Zeiger auf den linken Anfang der Einteilung zu liegen kommt, der hiermit den Nullpunkt darstellt. Dieser Prüfkörper dient daher zur Probe, ob die Vorrichtung richtig eingestellt ist.

Vermag dagegen der Zapfen durch die Schwere der Vorrichtung einen Eindruck in die Unterlage zu erzeugen, so kommt seine Spitze tiefer zu liegen, und indem sich der kurze Hebelarm, seiner Schwere folgend, ebenfalls nach unten dreht, soweit es die Stellung der Zapfenspitze erlaubt, gleitet der Zeiger nunmehr der Einteilung entlang um so weiter, je stärker der Zapfen einsinkt.




Abb. 222. Druckmesser nach SCHIÖTZ.

Die Vorrichtung wird in folgender Weise angewendet (Abb. 223): Die Augen werden zunächst durch Einträufeln einer 1%igen Pantocainlösung unempfindlich gemacht. Der Kranke liegt flach mit nach oben gerichtetem Blicke. Der Untersucher zieht die Lider mit der einen Hand auseinander, ohne auf das Auge einen Druck auszuüben. In der anderen Hand hält er den Druckmesser, der das Gewicht  $l$  trägt. Dieser wird nun mit seinem Fußstück senkrecht auf die Hornhaut aufgesetzt, worauf die äußere Hülse  $b$  soweit nach unten geschoben wird, bis




Abb. 223. Der Druckmesser auf die Hornhaut des zu untersuchenden Auges aufgesetzt.

sie sich ungefähr in der Mitte der Hülse  $c$  befindet. Auf diese Weise steht nun der Druckmesser frei, wobei die äußere Hülse nur dazu dient, ihn am Umfallen zu verhindern, und drückt mit seiner Schwere auf das Auge. Ist das Auge so hart, daß der Zapfen keinen Eindruck auf die Wölbung der Hornhaut zu machen vermag, so drückt das obere Ende des Zapfens den kurzen Hebelarm soweit nach oben, daß der Zeiger auf den Anfangspunkt der Einteilung zu liegen kommt, wie bei dem Versuch mit dem Prüfkörper. Es muß dann die Vorrichtung mit einem schwereren Lote belastet werden, bis ein Ausschlag des Zeigers eintritt. Je weicher dagegen das Auge ist, um so tiefer ist der Eindruck, den der Zapfen in die Oberfläche der Hornhaut macht. Indem der kurze Hebelarm der sinkenden Spitze des Zapfens folgt, dreht sich der lange Hebelarm an der Einteilung nach rechts und zeigt einen bestimmten Ausschlag.

Der Druckmesser soll nur für einige Augenblicke aufgesetzt und der Ausschlag sofort abgelesen werden. Man soll 3 Messungen machen und die Durchschnittszahl nehmen. Bei richtiger Stellung der Vorrichtung zeigt sich oft eine pulsatorische Bewegung des Zeigers in der Ausdehnung eines Teilstriches.

Auf einem der Vorrichtung beigegebenen Diagramm kann nun sofort abgelesen werden, wieviel Millimeter Hg-Druck dem gefundenen Ausschlag des Zeigers entsprechen. Auf der Abszisse des Diagrammes ist der Ausschlag verzeichnet, der von der Einteilung abgelesen wird, die Ordinaten enthalten den in Millimeter Hg ausgedrückten Augendruck, die 4 Kurven entsprechen der Belastung der Vorrichtung mit den 4 verschiedenen Gewichten.

Bei vorsichtiger Handhabung leidet die Hornhaut durch die Untersuchung mit dem Druckmesser in keinerlei Weise. Nach dem Gebrauche sind Zapfen und Fußstück mit Äther zu reinigen und trocken abzureiben.

Mit dem Druckmesser hat SCHÖTZ den Augenärzten eine Vorrichtung von hervorragendem Werte gegeben. Sie kann heute als unentbehrlich bezeichnet

werden. Dem weniger Geübten, der sich der mangelnden Sicherheit in der Schätzung des Augendruckes durch seine Finger bewußt ist, verleiht der Druckmesser Klarheit in der Beurteilung des Krankheitsbildes und erleichtert ihm die Entscheidung über das einzuschlagende Vorgehen. Aber auch der erfahrene Augenarzt möchte ihn nicht mehr missen: in zweifelhaften Fällen wird auch er dessen Angaben berücksichtigen und zur Begutachtung des Druckes eines Auges zu verschiedenen Zeiten die zahlenmäßigen Aufzeichnungen heranziehen.

Die Untersuchung des Augendruckes mit dem Finger gestaltete sich noch am sichersten in Fällen, wo das eine Auge normal war, das andere einen davon verschiedenen Druck hatte. Schwieriger war schon die Entscheidung, wenn der Druck beider Augen gleich war und angegeben werden sollte, ob der Druck die Norm überschreite oder nicht. Daß man einen Vergleich des Druckes zu verschiedenen Zeiten nicht vornehmen konnte, war am meisten zu bedauern. Gerade diesem Übelstande hilft der Druckmesser am besten ab. Denn selbst für den Fall, als ihm gewisse Fehler anhaften, könnte dadurch keine Störung in dem Vergleiche der einzelnen Messungen untereinander hervorgerufen werden. Es ist aber Tatsache, daß die Angaben des Druckmessers durchschnittlich sehr verläßlich sind. Ihnen gegenüber erscheinen die Ergebnisse mit dem Fingerdruck oft unsicher und unrichtig. Gelegentlich ergibt sich sogar ein auffallender Unterschied zwischen Druckmesser und Fingerdruckbefund. Dicke und Starrheit der Augenhüllen können zweifellos den Ausschlag des Druckmessers beeinflussen, was auch SCHIÖTZ schon selbst angegeben hat, indem er als wesentlichsten Unterschied zwischen auf der Lederhaut und auf der Hornhaut ausgeführten Messungen bei dieser trotz gleicher Druckhöhe viel größere Ausschläge bekam als auf der Lederhaut. „Dieser Unterschied in der Größe des Ausschlages muß auf der größeren Rigidität der Sklera beruhen.“ Es ist daher sehr begreiflich, daß die auf der verdünnten Hornhaut eines hydrophthalmischen kindlichen Auges ausgeführten Messungen höhere Ausschläge ergeben und daher den Druck niedriger erscheinen lassen, als er in Wirklichkeit ist, und umgekehrt, die größere Starrheit der Hornhaut mancher, namentlich älterer Leute, den Druck höher. Doch sind das nur Ausnahmen, die kaum zu einem klinischen Irrtum führen können.

Der normale Augendruck schwankt nach den Angaben des Messers zwischen 15 und 30 mm Hg. Daraus ergibt sich die Tatsache, daß es an Glaukom erkrankte Augen geben kann, die einen noch innerhalb der normalen Grenze gelegenen Druck haben, wenn sie vorher in gesundem Zustande einen an der unteren Grenze der Norm gelegenen Druck gehabt hatten. Auch dies hat nur als seltene Ausnahme betrachtet zu werden. Augen, deren Spannung sich an der unteren Grenze der Norm bewegt (z. B. manche Augen mit höhergradiger Kurzsichtigkeit), haben keine besondere Neigung zur Drucksteigerung. Wenn sich eine solche einstellt, so bleibt sie innerhalb sehr bescheidener Grenzen, so daß sie nur mit Hilfe des Druckmessers erkannt werden kann: Glaucoma simplex, fast die einzige Glaukomform, die wir in Augen mit hoher Kurzsichtigkeit begegnen.

Bemerkt sei auch, daß durch wiederholtes Aufsetzen des Druckmessers die Ausschläge allmählich größer werden, d. h. das Auge weicher wird. Dieses kann besonders leicht eintreten, wenn eine filtrierende Narbe Durchtritt von Flüssigkeit gestattet. Der Unterschied ist aber sehr gering (1—3 mm) und nur aus-

nahmsweise etwas größer. Immerhin sollen daher zur Sicherheit die ersten Messungen verwendet werden. Auffallende Krümmungsveränderungen der Hornhaut machen begreiflicherweise eine richtige Angabe der Vorrichtung unmöglich (Keratokonus, Applanatio corneae usw.).

Die Untersuchung mit dem Druckmesser ergibt auch sichere Aufschlüsse über die Beeinflussung des Druckes durch verschiedene Heilmittel. Die gebräuchlichsten Miotica und Mydriatica vermögen in einem gesunden Auge den Druck nur wenig zu verändern. Dagegen ist der Einfluß beider in Augen, die entweder zu Glaukom veranlagt oder daran erkrankt sind, sehr mächtig. In solchen Augen können Miotica den krankhaft gesteigerten Druck sehr stark herabsetzen, während Mydriatica eine Drucksteigerung hervorrufen können.

In gesunden Augen scheint der Druck im Laufe des Tages nicht wesentlich zu schwanken. Dagegen sind starke Druckschwankungen von der Norm nach abwärts gewiß häufiger als angenommen wird, z. B. in Augen, die an Iridocyclitis, an Glaskörperveränderungen, an spontanen Blutungen ins Augennere leiden u. dgl. In solchen Augen vermag das Atropin die Spannung wesentlich zu heben.

Sehr starke Druckschwankungen nach oben bietet das Glaukom oft innerhalb weniger Stunden, so daß während eines Anfalles der Druck bis zur Steinhärte emporschnellt. Nach Ablauf des Anfalles kann das Auge ungewöhnlich weich gefunden werden, um aber bald wieder auf einen Druck zu kommen, der durchschnittlich höher ist als der normale.

Augen mit Glaucoma simplex, von denen man bei Untersuchung des Auges mit dem Finger den Eindruck hatte, ihr Druck sei andauernd normal, zeigen tonometrisch fast immer, wenn auch nur vorübergehend, eine leichte Erhöhung des Druckes.

Was die Verwendung des Druckmessers betrifft, so pflegen wir in allen Fällen von Glaukom oder auf Drucksteigerung verdächtigen Augen seine Angaben zu vermerken. Es ist aber trotz der Wertschätzung der Vorrichtung nicht unsere Meinung, nunmehr alles therapeutische Vorgehen von dem Ergebnisse dieser Untersuchung abhängig zu machen und die klinischen Symptome außer acht zu lassen. Diese bleiben immer noch entscheidend. Man vergesse nicht, daß die Begriffe Glaukom und Drucksteigerung nicht gleichbedeutend sind, daß die Drucksteigerung vielmehr nur ein allerdings sehr wichtiges und für das Auge gefährliches Symptom der Krankheit Glaukom darstellt. So sehr immer daher unser Bestreben sein wird, die Drucksteigerung zu beseitigen, so werden wir doch nicht allein auf Grund des Befundes eines etwas erhöhten Druckes das Auge den Gefahren eines Eingriffes aussetzen, wenn die klinische Untersuchung keine Abnahme der Sehschärfe, keine Verengung des Gesichtsfeldes, kein Fortschreiten der Sehnervenaushöhlung dartut. Derselbe Druck würde uns dagegen zu einem Eingriff veranlassen, wenn die klinische Untersuchung den schlechten Einfluß der Drucksteigerung unzweifelhaft erkennen läßt.

Dagegen kommt bei *Verdacht* auf Glaukom den Angaben des Druckmessers wichtige Bedeutung zu. Die Anlegung einer Druckkurve wurde erst durch den Druckmesser möglich; man wird nicht erst abwarten, bis durch die Ausbildung einer Aushöhlung des Sehnerveneintrittes oder durch eine beträchtliche Störung des Gesichtsfeldes die klinische Diagnose über alle Zweifel erhaben ist, wenn das

Ergebnis des Fingerdruckbefundes bis dahin ein unsicheres war. Wer den Grundsatz befolgt, bei Glaukom so frühzeitig als möglich einzugreifen, d. h. sobald die Krankheit Glaukom sichergestellt ist, wird ihm daher durch den Befund des Druckmessers mit viel besserem Gewissen treu bleiben, als zur Zeit, da man sich nur auf die Fingerprüfung des Druckes verlassen konnte. Aber auch für den, der Anhänger der medikamentösen Behandlung des Glaukoms ist und den Eingriff nur als letztes Hilfsmittel verwendet, wird der Druckmesser ein wertvoller Anzeiger sein. Bleibt trotz Gebrauches von Miotica der Druck andauernd höher als normal, so wird sich auch er zum Eingriffe entschließen müssen, namentlich wenn durch kürzere oder längere Zeit vorher die Miotica einen punctlichen Einfluß gezeigt hatten und nun plötzlich anfangen, im Stiche zu lassen und sich Dauerschädigungen am Auge einzustellen beginnen.

Daß wir trotz ausgiebiger Herabsetzung des Druckes in manchen Fällen doch dem weiteren Fortschreiten des glaukomatösen Prozesses nicht Einhalt gebieten können, lehrt uns freilich auch der Druckmesser. Dies ist besonders bei vorgeschrittenem Glaukom der Fall, wo trotz erreichter Normalisierung der Spannung das Sehvermögen weiter verfällt und schließlich ganz zugrunde geht.

## Dreizehntes Kapitel.

# Die optische Iridektomie. Abtragung des Vorfalles der Regenbogenhaut. Bindehautpfropfung. Eingriffe bei vorderer Synechie. Überpflanzung von Hornhaut aus optischen Gründen.

### Die optische Iridektomie.

**Anzeigen.** Die Anzeigen für die optische Iridektomie sind:

1. zentrale Linsentrübungen, 2. zentrale Hornhautnarben und 3. Pupillenschluß durch Bindegewebemembranen nach Regenbogenhautentzündung.

**1. Zentrale Linsentrübungen.** Bei Schichtstar junger Leute muß die Frage entschieden werden, ob ein Eingriff vorgenommen werden soll und welcher. Wird das Sehvermögen durch die Linsentrübung nur mäßig beeinträchtigt, so wird von einem Eingriffe abgesehen. Bei stärkerer Sehstörung entscheidet das Verhalten der Sehschärfe bei gewöhnlich weiter Pupille und bei künstlicher Erweiterung über die Frage, ob eine optische Iridektomie oder die Entfernung der Linse durch Diszission vorgenommen zu werden hat. Ist die Scheibe der Trübung von geringem Durchmesser und kann durch die Erweiterung der Pupille die Sehkraft so weit gehoben werden, daß sie für die Bedürfnisse des Betreffenden ausreicht, also durchschnittlich ein Drittel der richtigen erlangt, so kann durch eine optische Iridektomie dieses genügende Sehvermögen dauernd erreicht werden. Der Kranke hat dabei den Vorteil, im Besitze seiner Linse und damit der Akkommodationskraft zu bleiben. Das Kolobom wird am besten nach innen unten angelegt. Wird aber durch die Pupillenerweiterung die Sehschärfe nicht genügend verbessert, so ist die Diszission der Linse angezeigt. Damit wird die Trübung vollständig entfernt und das Sehvermögen auf die richtige Größe gebracht: aber der Kranke ist dann auf den fortwährenden Gebrauch von starken Sammellinsen angewiesen. In den meisten Fällen von Schichtstar kommt die Diszission in Betracht, nur in einer geringen Zahl die Iridektomie. Der gegen die Iridektomie gemachte Einwurf, daß ihr Erfolg durch ein allmähliches Fortschreiten der Linsentrübung zunichte gemacht werde, ist nicht berechtigt, da der Schichtstar keinen weiteren Veränderungen unterliegt.

Auch große zentrale Kapselstare, die das ganze Pupillargebiet einnehmen, machen eine optische Iridektomie nötig. Tritt ein beginnender *Altersstar* in Form einer Kerntrübung auf — besonders bei höherer Kurzsichtigkeit, Glaskörperverflüssigung und Aderhauterkrankungen —, so wird durch eine Iridektomie gelegentlich eine wesentliche Besserung der Sehschärfe auf lange Zeit erzielt. Dieser Eingriff käme in Betracht, wenn etwa der Allgemeinzustand des

Kranken einen möglichst geringfügigen Eingriff wünschenswert erscheinen ließe. Die Regenbogenhaut wird nach oben ausgeschnitten mit Rücksicht auf die möglicherweise später vorzunehmende Ausziehung der Linse.

Für gewöhnlich aber, da sich dieser Zustand meist schon bei jüngeren Leuten (um die 40 und 50) entwickelt, ziehen wir es vor, den Star auszuziehen mit Erhaltung der runden Pupille, um auf diese Weise das Sehvermögen in *einem* Akte wiederherzustellen. Daß für solche Starformen besonders das intrakapsuläre Verfahren in Betracht kommt, wurde schon früher angegeben.

2. Die häufigsten Anzeigen für eine optische Iridektomie geben zentrale, das Pupillargebiet verdeckende Hornhautnarben. Um nicht zu sehr und zu oft von dem wirklichen Erfolge des Eingriffes enttäuscht zu werden, ist eine genaue Untersuchung des Zustandes der Hornhaut — mit der Lupe und der Spaltlampe — im sogenannten durchsichtigen Teile dringend geboten. Dabei werden oft zarte Trübungen in den Teilen entdeckt, die bei der Untersuchung mit dem freien Auge als vollkommen durchsichtig gegolten haben. Erst nach Ausschneidung der Regenbogenhaut fällt dann auf dem schwarzen Grunde die Trübung der Hornhaut auf, und sie kann nun sogar dicht erscheinen, während sie dem wenig aufmerksamen Beobachter vorher vollständig entgangen war.

Bei Lupenbetrachtung sind die Teile der Hornhaut aufzusuchen, die bei möglichst zentraler Lage am durchsichtigsten sind und wo sich die Trübung am schärfsten von der durchsichtigen Umgebung absetzt. Je schärfer der Rand der Trübung, je dichter diese und je breiter der durchsichtig gebliebene Randteil, um so besser ist die Aussicht auf Erfolg.

Es sei davor gewarnt, mit der Ausschneidung bei Hornhauttrübungen zu eilen. Narben nach Verletzungen, Trübungen nach tiefer Hornhautentzündung hellen sich namentlich bei jungen Leuten oft noch nach vielen Monaten beträchtlich auf. Nur von der Aufhellung von Narben nach tiefen Geschwüren bei erwachsenen Leuten, besonders nach *Ulcus serpens*, ist nicht viel zu erwarten. Im allgemeinen eignen sich die Fälle am besten, wo die Trübung durch einen wohlumschriebenen Krankheitsherd erzeugt wurde, also in erster Linie durch *Ulcus serpens* oder infizierte Wunden, und die übrige Hornhaut gesund blieb. Weniger günstig liegen die Verhältnisse bei Trübungen nach tiefen Hornhautentzündungen, weil dabei fast immer die ganze Hornhaut befallen worden war, so daß sie überall von zarten, unscharf begrenzten grauen Fleckchen durchsetzt ist. In solchen Fällen bessert die optische Iridektomie, auch wenn das Pupillargebiet der Hornhaut von einer ziemlich dichten Trübung eingenommen war, das Sehvermögen nicht, da die diffuse Trübung der Randteile außerordentlich störend wirkt.

Vor dem Eingriffe muß die Sehschärfe mit peinlichster Berichtigung des Brechungszustandes bestimmt werden. Auch soll ermittelt werden, inwieweit sie durch stenopäische Spalte oder Lücke verbessert werden kann. Die besten Dienste leistet bei dieser Bestimmung eine bewegliche stenopäische Spalte, die nicht nur durch Drehung leicht in den verschiedenen Meridianen eingestellt werden kann, sondern sich auch in senkrechter und waagrechter Richtung verschieben läßt. Sie hat in einem Rahmen untergebracht zu sein, der an jeder Brille bequem angebracht werden kann. Da der Kranke sehr häufig nur bei einer ganz bestimmten Lage der Spalte einen wesentlichen Vorteil davon beim

Sehen hat, ist die Untersuchung mit dem Gestelle des Brillenkastens nutzlos, sondern soll an der von dem Kranken beständig zu tragenden Brille selbst vorgenommen werden. Zu diesem Zwecke wird zunächst das Glas bestimmt, das dem Kranken die beste Sehschärfe verschafft. Erst an der fertigen Brille wird nun die Lage der stenopäischen Spalte ermittelt, indem der Rahmen mit der beweglichen Spalte an der Brille angebracht wird, wodurch es ein leichtes ist, dem Brillenmacher die Stelle anzugeben, die die Spalte im Glase einzunehmen hat. Dieses genaue Vorgehen ist besonders für Kranke von größter Wichtigkeit, die nur noch auf ein Auge angewiesen sind. Die Verbesserungen durch die stenopäische Spalte oder Lücke sind gelegentlich ganz hervorragend, und es ist nicht so selten, ein Sehvermögen von Fingerzählen in wenigen Metern auf 6/24 oder 6/18 zu heben und dadurch dem Kranken die Möglichkeit des Lesens und Schreibens wieder zu verschaffen. Wertvolle Dienste leisten dabei auch die von der Firma *Zeiß* hergestellten Brillengläser für Schwachsichtige, die eine Vergrößerung der Bilder auf 1,8, 3 oder 6 herbeiführen.

Kommt nun die Frage einer optischen Iridektomie in Betracht (ganz allgemein gehalten also bei dichten zentralen, sich ziemlich scharf gegen eine gesunde Umgebung absetzenden Hornhauttrübungen, die das Pupillargebiet der Hornhaut vollständig einnehmen), so hat zunächst die Pupille durch Atropin erweitert zu werden. Es kann zwar das Sehen bei künstlich erweiterter Pupille nicht ganz dem nach der optischen Iridektomie gleichgesetzt werden, denn das Atropin hat meistens eine gleichmäßige Erweiterung der Pupille zur Folge. Aber es kann doch soweit von der Untersuchung Gebrauch gemacht werden, daß bei vollständigem Fehlen einer Verbesserung trotz der Verlagerung eines Teiles der Pupille hinter einen weniger getrühten Hornhautteil die optische Iridektomie keinen Erfolg erwarten läßt. Etwas näher kommt man den wirklichen Verhältnissen, wenn man durch eine Einspritzung einer 1/1000igen Adrenalinlösung (0,1 ccm) unter die Bindehaut an der Stelle, wo man die Regenbogenhaut auszuschneiden beabsichtigt, diese nur ebenda zum Zurückziehen bringt. Ist der Kranke nach der Erweiterung der Pupille noch mehr geblendet als vorher, so würde er durch Ausschneidung von Regenbogenhaut dauernd geschädigt werden, da in solchen Fällen die Sehschärfe im wesentlichen durch die unregelmäßige Zerstreuung des Lichtes herabgesetzt ist. Viele Leute mit diffusen Hornhauttrübungen sehen eben bei enger Pupille, die einer stenopäischen Lücke vergleichbar ist, besser als bei erweiterter.

Häufig hat auch die Entscheidung getroffen zu werden, ob durch eine Tätowierung der Hornhautnarbe ohne oder mit nachfolgender Iridektomie die Sehschärfe verbessert werden kann. Für solche Fälle empfiehlt es sich, die Hornhautnarbe gleichsam vorübergehend zu tätowieren, indem sie mit einem genau zugeschnittenen Stückchen vollständig schwarzen feinen Seidenpapieres bedeckt wird. Das Papier haftet gut und ermöglicht die Vornahme einer Sehprobe zum Vergleiche gegenüber früher. Um das Papierblättchen auf die Hornhaut legen zu können, wird sie durch Eintropfen einer Aल्पinlösung unempfindlich gemacht. Da dadurch auf die Pupille kein Einfluß ausgeübt wird, wird die Beurteilung nicht so gestört, wie es bei Anwendung von Cocain als Anästhetikum durch die eintretende Pupillenerweiterung der Fall wäre.

**Ergebnisse.** Im allgemeinen sind die Erfolge der optischen Iridektomie bei Hornhauttrübungen recht mäßig und die Fälle, die sich dazu eignen, verhältnismäßig wenige. Ärzte mit geringer Erfahrung pflegen nicht nur zu frühzeitig, sondern auch viel zu häufig eine optische Iridektomie vorzunehmen. Dasselbe gilt übrigens auch für die Tätowierung. Daher hat man nicht selten Gelegenheit, Kranke zu sehen, die durch eine übereilte optische Iridektomie für alle Zukunft an Blendungserscheinungen zu leiden haben. Besonders die Hornhauttrübungen nach Keratitis parenchymatosa verleiten Unerfahrene zu einer überflüssigen, ja oft sogar schädlich wirkenden optischen Iridektomie, weil die Trübungen in der Hornhautmitte vor der schwarzen Pupille viel dichter zu sein scheinen als in der Peripherie der Hornhaut. Die narbenaufhellende Wirkung, die man der Iridektomie zugeschrieben hat, beruht wohl nur auf einer Täuschung, veranlaßt durch Fälle, wo der Eingriff unternommen wurde, bevor der Heilungsvorgang abgeschlossen war.

Viel günstigere Erfolge sind bei zentralen Linsentrübungen, großem zentralen Kapselstar und besonders bei dichtem Schichtstar zu verzeichnen, wenn die Trübung scharf begrenzt ist und einen kleinen Durchmesser hat.

3. Auch Verdeckung der Pupille durch Exsudate, durch Bindegewebsmembranen nach Iritis, kann für eine optische Iridektomie eine Anzeige bilden. Mit Rücksicht auf die dabei gewöhnlich bestehende Verwachsung der Regenbogenhaut mit der Linsenkapsel soll eine breitere Falte aufgefaßt und ausgeschnitten werden. Der optische Erfolg bleibt bisweilen dadurch aus, daß das mit der Linsenkapsel verwachsene Pigmentblatt haften blieb und das Kolobom verdeckt.

**Der Eingriff** unterscheidet sich von der Iridektomie gegen Glaukom durch die Lage des Schnittes und die zu entfernenden Teile der Regenbogenhaut. Entsprechend dem Zwecke der optischen Iridektomie, die Pupille etwas zu verlagern, werden nur die an den Pupillarrand grenzenden Teile allein ausgeschnitten — wenn dies genügt — und aus optischen Gründen die Randteile der Regenbogenhaut geschont. Daher wird der Einschnitt in den Limbus oder etwas nach einwärts davon in die Hornhaut verlegt. Ist aber nur der äußerste Randteil der Hornhaut durchsichtig geblieben, so muß der Schnitt entsprechend peripher in der Lederhaut angelegt und die Iriswurzel hervorgeholt und ausgeschnitten werden, um eine Lücke zu schaffen. Sonst gelten im wesentlichen dieselben Regeln wie für den Schnitt bei der Glaukomiridektomie. Der Schnitt wird (wenn nicht eine zu seichte Kammer, z. B. infolge einer vorderen Synechie, die Anwendung des Messers erforderlich macht) mit der Lanze vorgenommen. Wenn möglich, wird das Kolobom nach innen unten angelegt, da dabei erfahrungsgemäß die besten optischen Ergebnisse erzielt werden. Bei Hornhauttrübungen müssen aber oft andere Stellen der Hornhaut gewählt werden, die durch ihren höheren Grad von Durchsichtigkeit besseren Erfolg versprechen. Dabei ist darauf zu achten, daß das Kolobom durch das obere Lid nicht ganz verdeckt wird. Ist bei einem Einäugigen nur der obere von dem oberen Lid bedeckte Hornhautteil allein durchsichtig geblieben, so daß an dieser Stelle die optische Iridektomie ausgeführt werden muß, so kann durch eine Sehnenablösung des oberen Geraden das Auge nach abwärts gedreht werden, wodurch das Kolobom in der Lidspalte frei zu liegen kommt.

Das Hervorholen der Regenbogenhaut mit der Pinzette geschieht in gleicher Weise, wie früher beschrieben; es wird aber nur eine kleine Falte vorgezogen und mit den senkrecht zur Richtung des Hornhautschnittes gehaltenen Blättern der WECKERSchen Schere abgekappt. So kommt ein schmales und nur auf die pupillaren Teile der Regenbogenhaut beschränktes Kolobom zustande. Nicht selten wird es über Erwarten groß, da sich die Ränder des durchschnittenen Schließmuskels zurückziehen.

Während der ersten Wochen nach dem Eingriffe ist die Narbentrübung der Hornhaut wieder stärker, als sie unmittelbar zuvor war, und die Gefäße der Narbe sind wieder breiter und stärker gefüllt. Allmählich aber kehrt die Hornhaut in ihren früheren Zustand zurück und nun erst kann beurteilt werden, wieviel der Eingriff genützt hat.

Die **präkorneale Iridotomie** versucht noch ein kleineres Kolobom zu erzielen. Die Regenbogenhaut wird aus der Wunde vorgezogen und, nachdem in ihren Pupillarrand ein kurzer radiärer Einschnitt gemacht worden ist, in die Kammer zurückgeschoben und zurechtgelagert. Die beiden Enden des durchschnittenen Schließmuskels ziehen sich zurück und bilden die Begrenzung eines kleinen spitzbogen- oder spaltförmigen Koloboms. Das Verfahren wird selten angewendet, da das geschaffene Kolobom häufig doch nicht kleiner ist als nach regelrechter Ausschneidung und gegen das Zurückschieben der im Bindehautsack frei gelegenen Regenbogenhaut aus begrifflichen Gründen Einspruch erhoben wird.

### **Abtragung des Vorfalles der Regenbogenhaut.**

Wird eine Öffnung im Bereiche der vorderen Kammer gesetzt, so wird die Regenbogenhaut durch das vorstürzende Kammerwasser in sie hineingedrängt; es kommt zum Vorfalle. Die häufigsten Ursachen sind der Durchbruch eines Geschwüres und Verletzungen. Bei reinen Verletzungen, die zu einem kleinen Vorfall der pupillaren Teile der Regenbogenhaut oder zu einer Einklemmung in die Wunde geführt haben, kann versucht werden, die Iris durch Einspritzung von Adrenalin (0,1 ccm der Lösung von 1:1000) unter die Bindehaut in so hohem Maße zum Zurückziehen zu veranlassen, daß sie sich auch aus der Wunde in die Kammer zurückzieht. Die vorgefallene Regenbogenhaut an ihre richtige Stelle zurückzustreichen, ist nutzlos, da sie fast immer wieder vorfällt. Außerdem besteht dabei die Gefahr, entzündungserregende Keime in das Auge einzubringen. Es gilt daher als Regel, jeden Vorfall der Regenbogenhaut auszuschneiden, wenn die Öffnung, aus der er ausgetreten war, nicht zu groß ist.

**Das Verfahren.** Die Regenbogenhaut wird, soweit sie in der Öffnung vorliegt, ausgeschnitten, nachdem ihr Zusammenhang mit den Rändern der Öffnung sorgfältig gelöst worden war, so daß keine Verklebung zurückbleibt. Dadurch wird das Entstehen einer vorderen Synechie mit allen ihren Folgen vermieden. Der Vorfall bedeckt sich sehr bald mit einer Fibrinkappe, die seine Grenzen undeutlich macht. Dieses Exsudat wird mit einer Pinzette abgezogen, worauf der Vorfall als schwarzer Punkt oder Wulst erscheint. Eine konische Sonde wird darauf entlang den Rändern der Öffnung geführt und der Vorfall ringsherum von den Verklebungen mit ihnen freigemacht. Die Sonde wird entlang dem ganzen Umkreise der Öffnung zwischen Vorfall und der hinteren Hornhautwand

vorgeschoben, so daß dieser allseitig losgelöst wird. Das Kammerwasser fließt dabei allmählich ab. Die bei aufgehobener Kammer an der hinteren Hornhautwand anliegende Linsenkapsel darf nicht verletzt werden. Darauf wird der Vorfall mit der Irispinzette knapp an der Öffnung gefaßt, etwas vorgezogen und mit der WECKERSCHEN Schere knapp an dem Öffnungsrande abgetragen. Häufig zieht sich darauf die Regenbogenhaut von selbst in die vordere Kammer zurück, so daß sich an Stelle des Vorfalles ein regelrechtes Kolobom findet. Sollten die Schenkel aber noch nicht richtig liegen, so wird durch die Öffnung, wenn es deren Größe erlaubt, ein Spatel eingeführt und die Regenbogenhaut zurechtgestrichen. Bei kleinen Öffnungen wird der Vorfall etwas kräftiger vorgezogen und genügend viel ausgeschnitten, damit sich die Regenbogenhaut von selbst in die richtige Lage zurückziehe. Ist dies aber nicht gelungen, so muß der Versuch gemacht werden, ein stumpfes Häkchen durch die Wunde in die vordere Kammer zu schieben und das Häkchen zwischen Regenbogenhaut und hinterer Hornhautwand aus der Wunde herauszuführen, um auf diese Weise die Regenbogenhaut vorzuziehen und abzuschneiden. Nach Beendigung des Eingriffes wird Atropin in das Auge geträufelt, um die Regenbogenhaut so stark wie möglich aus der Gegend der Wunde wegzuziehen und eine Verklebung mit den Wundrändern hintanzuhalten.

Der Umstand, daß der Vorfall durch den Durchbruch eines Geschwüres hervorgegangen ist, ist kein Grund, ihn nicht sofort auszuschneiden. Das Auge wird durch den Eingriff nicht in die Gefahr einer Infektion gebracht. Wenn eine Neigung zur Infektion bestünde, gäbe vielmehr der Vorfall den besten Weg für das Eindringen der Keime in das Auge ab.

Das Auge wird vor dem Eingriffe durch wiederholtes Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung nach Möglichkeit unempfindlich gemacht. Da diese Augen gewöhnlich stark gereizt und gerötet sind, wird gleichzeitig Suprareninlösung verwendet, denn das Cocain entfaltet erst bei blassem Auge seine Wirksamkeit. Trotzdem bleibt die Regenbogenhaut oft sehr empfindlich. Wird aber in der Gegend des Vorfalles  $\frac{1}{2}$  ccm einer 3%igen Cocainlösung unter die Bindehaut gespritzt, so wird die Regenbogenhaut in einigen Minuten fast unempfindlich. Außerdem wird noch nach Abziehen der Fibrinkappe von der Oberfläche des Vorfalles auf die nun freiliegende Regenbogenhaut 5%ige Cocainlösung unmitttelbar aufgetropft.

Das Auge wird während des Eingriffes mit einer Pinzette festgehalten, da die Regenbogenhaut besonders in dem Augenblicke, wo sie vorgezogen und ausgeschnitten wird, durch eine unerwartete Bewegung des Kranken schwer verletzt und insbesondere von ihrem Ansatz abgerissen werden könnte. Bei Kindern wird der Eingriff in allgemeiner Betäubung vorgenommen. Diese wird auch bei Erwachsenen vorgezogen, wenn sie sich unruhig und ängstlich benehmen. Um die Linsenkapsel nicht zu verletzen, muß das Einführen der Sonde, des Häkchens und Spatels mit großer Vorsicht geschehen. Die Kapsel kommt aber auch durch unruhiges Benehmen des Kranken in Gefahr, besonders wenn der Vorfall mit der spitzen konischen Sonde freigemacht wird.

Die nach Ausschneidung des Vorfalles vorhandene freie Lücke der Hornhaut pflegt sich, wenn sie klein ist, sehr bald zu schließen. Häufig ist schon am folgenden Tage die Kammer wieder hergestellt. Je kleiner die Öffnung, um so

sicherer und rascher tritt ihr Verschluß ein. Weniger günstig für die Heilung sind große Löcher, zu deren Deckung Bindehaut verwendet werden muß (siehe S. 331).

Nimmt die Öffnung, durch die der Vorfall eintrat, ungefähr ein Viertel der Hornhaut oder mehr ein, so wird von der Ausschneidung Abstand genommen. Es ist aber von vornherein nicht leicht, die Größe der Öffnung zu beurteilen. Einem großen Vorfall entspricht manchmal eine kleine Öffnung, wenn die vorgefallene Regenbogenhaut, pilzförmig angeschwollen, das an die Öffnung angrenzende Hornhautgebiet überlagert. Wer vor Eintritt des Vorfalles den Kranken gesehen hat, unterliegt dieser Täuschung nicht. In Fällen aber, die mit ausgebildetem Vorfall zur ersten Untersuchung kommen, werden erst beim Versuche der Unterminierung die wirklichen Verhältnisse aufgeklärt. Ist ein Viertel der Hornhaut oder mehr verloren gegangen, so kommt durch die Ausschneidung der Regenbogenhaut die Linsenkapsel in dieser ganzen Ausdehnung in die Wunde zu liegen. Da die Narbenbildung von den Wundrändern in der Hornhaut aus keine so mächtige ist, wie in anderen Geweben, bleibt die Öffnung lange Zeit unverschlossen. Das Auge ist während dieser Zeit der Gefahr einer Infektion ausgesetzt. Die bloßliegende Linsenkapsel hält gelegentlich dem Augendrucke nicht stand, wölbt sich schließlich vor und durch ihr Platzen kommt es schließlich zum Austritt der Linsensubstanz. Später stellt sich die Membrana hyaloidea ein, die, noch weniger widerstandsfähig, leicht birst, so daß der Glaskörper vorfällt. Solche schwere Ausgänge sind allerdings nur bei sehr großen Vorfällen zu befürchten, wie sie z. B. bei Zerstörung der Hornhaut durch akute Blennorrhöe oder Ulcus serpens eintreten. Aber auch bei mittelgroßen Öffnungen wäre flache Vernarbung mit Einheilung der Linsenkapsel und umschriebener oder gänzlicher Trübung der Linse noch ein verhältnismäßig günstiger Ausgang zu nennen. Sehr häufig enden solche Fälle mit einer sich langsam entwickelnden Atrophie des Auges. Deswegen ist es besser, in solchen Fällen den Vorfall nicht auszuschneiden. Er ist der natürliche Verschluß der großen Wunde. Das Bemühen der Behandlung sei vielmehr nur, eine flache Vernarbung herbeizuführen. Der Druck des Auges hat daher genau beobachtet und noch vor Eintritt einer Steigerung die *Iridektomie* vorgenommen zu werden.

*Ist eine ausgedehnte Einheilung der Regenbogenhaut eingetreten, so hat noch vor Entlassung des Kranken aus dem Spital eine Iridektomie ausgeführt zu werden, um die Gefahr der Drucksteigerung und Staphylombildung hintanzuhalten. Ein durch längere Zeit fortgesetzter Druckverband hilft wesentlich mit, eine flache Narbe zu erzielen. Ein ganz typisches Bild zeigen die Kranken, die an einem weit vorgeschrittenen Ulcus serpens gelitten haben. Die Regenbogenhaut ist, sei es von selbst oder nach dem Schnitte nach SAEMISCH, ausgedehnt eingehellt. Ein Randteil der Hornhaut ist durchsichtig geblieben. Zunächst ist die Spannung unter der Norm und wird schließlich normal. Der Vorfall beginnt flach zu vernarben. Plötzlich tritt Drucksteigerung ein, gewöhnlich unter heftigen Schmerzen und sofort ist die noch weich gewesene Narbe, in der es sehr häufig zu Blutungen kommt, buckelförmig vorgewölbt. In diesem Zustande kann die Iridektomie kaum ausgeführt werden, da die vordere Kammer aufgehoben, die Regenbogenhaut atrophisch und das Auge schmerzhaft ist. Diesem fast regelmäßig eintretenden Zwischenfalle muß durch eine breite Iridektomie vorgebeugt werden,*

die noch vor Entstehung der Drucksteigerung, sobald sich während des Verheilens des Vorfalles die vordere Kammer hergestellt hat, an der noch erhaltenen Stelle der Hornhaut angelegt wird.

### Bindehautpfropfung.

Ein bedeutender Fortschritt in der Behandlung der großen Vorfälle ist die Überpflanzung gestielter Bindehautlappen, die insbesondere durch KUHNTE gefördert worden ist. Bei diesem Vorgehen kann auch ein großer Vorfall ausgeschnitten, dadurch das Auge vor der Gefahr einer ausgedehnten Einheilung der Regenbogenhaut bewahrt und die Öffnung durch ein widerstandsfähiges Gewebe zum Verschuß gebracht werden.

Das Verfahren findet auch bei frischen Hornhautwunden mit oder ohne Vorfall der Regenbogenhaut Verwendung; ferner bei Hornhauttrepanationen, um das Lämpchen in der richtigen Stellung zu erhalten; bei Klaffen der Wunde nach Starausziehung oder Glaukomiridektomie; schließlich bei manchen Formen von Hornhautgeschwüren.

**Lappen nach Ausschneidung eines Vorfalles der Regenbogenhaut bei Geschwüren.** Nach Ausschneidung des Vorfalles liegt das Geschwür und die Durchbruchstelle bloß. Sind die Ränder der Öffnung flach, bieten sie also zur Anheilung des Bindehautlappens eine größere Fläche, so werden sie mit dem scharfen Löffel abgekratzt, um das hinübergewucherte Epithel zu entfernen. Ist die Öffnung steilrandig, so sind die Aussichten für die Anheilung des Lappens weniger günstig. Der Lappen wird aus der Bindehaut des Augapfels in der Weise gebildet, daß die Bindehaut am Limbus, entsprechend dem Geschwür, mit der Schere abgelöst und in einer Entfernung, die fast 2mal größer ist als die Breite des Geschwüres, gleichlaufend mit dem ersten ein zweiter Schnitt geführt wird, der sich im Bogen mit dem ersten vereinigt (Abb. 224). Der Lappen wird unterminiert und seine Basis soweit zurückverlegt, daß er leicht beweglich wird. Liegt das Geschwür am Rande der Hornhaut, so wird der Lappen dem angrenzenden Limbus entnommen. Ist aber der Gewebeverlust in der Mitte gelegen, so wird er durch einen waagrechten oder senkrecht über die Hornhaut gelegten Lappen gedeckt. Für einen senkrechten Lappen wird die Bindehaut vom Limbus außen oder innen losgelöst und die Basis des Lappens unten oder oben angelegt; für waagrechte Lappen wird die Bindehaut oben oder unten losgelöst und die Basis des Lappens nach außen oder innen verlegt. Ein waagrechter Lappen ist vorzuziehen, da wegen des reichlichen Vorhandenseins von Bindehaut in der oberen Falte ein Lappen hier leichter gebildet wird als innen und außen, wo die Gefahr besteht, durch eine zu starke Verkürzung das Auge in seiner Beweglichkeit einzuschränken. Nachdem der Lappen in die richtige Stellung gedreht worden ist, so daß er den Gewebeverlust gut deckt, wird seine Spitze durch einige feine Seidennähte in der Bindehaut des Augapfels an der der Basis des Lappens entgegengesetzten Seite befestigt (Abb. 225). Wenn sich




Abb. 224.

Umrißzeichnung. Bindehautplastik nach Ausschneidung eines Vorfalles der Regenbogenhaut. *G* Hornhautgeschwür. Die Regenbogenhaut wurde ausgeschnitten, wodurch ein regelrechtes Kolobom nach unten zustande kam. Um den Gewebeverlust zu decken, ist unten aus der Bindehaut des Augapfels ein Lappen (*L*) umschnitten worden.




Abb. 225. Der Bindehautlappen (*L*) wurde über die Hornhaut geschoben und seine Spitze durch mehrere Nähte so in der Bindehaut des Augapfels befestigt, daß er das Geschwür vollkommen deckt.

die Bindehaut einrollt, werden auch durch den seitlichen Rand des Lappens eine oder mehrere Nähte angelegt, um den Lappen gut gespannt zu erhalten. Die Wunde in der Bindehaut des Augapfels, die durch das Ausschneiden des Lappens erzeugt wurde, wird entweder der Selbstverheilung überlassen, namentlich wenn es nicht angeht, sie durch Heranziehen der umliegenden Bindehaut zu decken, oder die Bindehaut wird mit Hilfe von Entspannungsschnitten wenigstens teilweise über die Wunde vereinigt.

**Nachbehandlung.** Nach dem Eingriffe werden beide Augen verbunden, um durch den Ausschluß von Augenbewegungen die richtige Lage des Lappens zu sichern. Vor Anlegen des Verbandes ist nachzusehen, ob der Lappen bei der während des Schlusses der Augen auftretenden Aufwärtsrollung seine richtige Stellung beibehält. Verschiebt er sich dabei, so wird noch eine Naht angelegt, die dies verhindert. Der Verband wird schon am folgenden Tage gewechselt, da es sich sehr häufig um Augen handelt, deren Bindehaut stärker absondert. Der Verband wird über beide Augen durch mindestens 3 Tage fortgesetzt. In der ersten Zeit erscheint der Lappen stark geschwollen und es vergeht längere Zeit, bis er allmählich wieder dünner wird und das Aussehen einer unveränderten Bindehaut annimmt. Die Nähte stoßen sich meist in einigen Tagen von selbst ab; sonst werden sie herausgenommen. War der Gewebeverlust in der Mitte der Hornhaut gelegen, so wird (wenn das Auge vollständig blaß geworden und der Heilungsprozeß abgelaufen ist) der Lappen von seiner Basis abgetrennt.

Die Erfolge der Bindehautüberpflanzung sind oft ausgezeichnet. Doch kommt es auch gelegentlich vor, daß trotz Deckung des Gewebeverlustes das Auge schließlich schrumpft. Diese schlechten Ausgänge dürfen aber nicht dem Verfahren zum Vorwurfe gemacht werden, da sie durch die ursprünglichen schweren Veränderungen verursacht sind.




Abb. 226. Umrißzeichnung. Doppeltgestielter Bindehautlappen nach KUHNT zur Deckung einer peripheren Hornhautwunde. a) Die punktierten Linien bezeichnen die Schnitte durch die Bindehaut zur Bildung des Lappens, die ausgezogene Linie in der Hornhaut bezeichnet die Wunde. b) Der Bindehautlappen ist über die Wunde gezogen und durch eine Naht beiderseits in dieser Stellung festgehalten.

**Bindehautlappen zur Deckung von Hornhautwunden.** Bei peripher gelegenen Wunden leistet ein doppelt gestielter Bindehautlappen vorzügliche Dienste. Dieses Verfahren der Bindehautüberpflanzung wurde schon bei der Starausziehung (siehe S. 224) beschrieben und ist in Abb. 226 in Umrißlinien dargestellt. Zwei bogenförmige Einschnitte in die Bindehaut, von denen der eine am Limbus, der andere in geringer Entfernung davon und gleichgerichtet damit geführt wird,

bilden einen Lappen, der über die Hornhautwunde gezogen und durch Nähte nahe seiner Anheftungsstelle in der Bindehaut des Augapfels befestigt wird. Nach wenigen Tagen zieht sich die Bindehautbrücke in ihre ursprüngliche Stellung zurück.

Die am Limbus losgelöste Bindehaut kann auch schürzenförmig über den angrenzenden Teil der Hornhaut gezogen und durch entsprechende Nähte festgehalten werden (Abb. 227).

Auch DE WECKERS Verfahren, die Bindehaut allseitig am Limbus bis zu den Ansätzen der geraden Augenmuskeln zu unterminieren, beweglich zu machen und durch mehrere Nähte tabaksbeutelartig über die Hornhaut hinüberzuziehen,

wodurch diese vollständig überdeckt wird, kann besonders bei schweren Verletzungen von Vorteil sein. Die Wundfläche der Bindehaut schließt die Öffnung und verheilt mit den Wundrändern. Nach Ablauf des Vernarbungsprozesses wird die Bindehaut wieder losgelöst, worauf sie sich überall an ihre richtige Stelle zurückzieht mit Ausnahme der Anwachsungsstelle.

Die Bindehaut braucht aber nicht immer ringsherum abgelöst zu werden; oft genügt es, sie an umschriebener Stelle am Limbus loszulösen, um sie über die Hornhaut hinüberzuziehen und am gegenüberliegenden Limbus befestigen zu können und auf diese Weise die Wunde zu decken.

**Deckung großer Lederhautwunden.** Die bis jetzt besprochenen Fälle betrafen den Vorfall der Regenbogenhaut aus einer *Hornhautwunde* oder einer Wunde am *Limbus*. Bei Verletzungen der Lederhaut mit Vorfall von Teilen des Strahlenkörpers oder der Aderhaut wird im allgemeinen dieselbe Regel eingehalten wie beim Vorfall der Regenbogenhaut, wenn die Verletzung nicht allzuschwer ist, so daß noch Hoffnung besteht, das Auge zu erhalten. Der vorgefallene Teil wird, soweit er in der *Wunde* *bloßliegt*, ausgeschnitten und der vorliegende Glaskörper abgekappt. Aus begrifflichen Gründen muß vermieden werden, mit der Pinzette Uvealgewebe vorzuziehen. Die Wunde wird durch Naht der Bindehaut bei gleichzeitigem Mitauffassen des episkleralen Gewebes geschlossen. Bei der vorbildlichen Form der Lederhautberstung entlang dem Limbus vermeiden wir jegliches operative Vorgehen; denn die zerfetzte Bindehaut kann nicht gut genäht werden und jedes Anfassen und Zerren des vorliegenden Uvealgewebes, welches in diesen Fällen meist Strahlenkörpergewebe enthält, erhöht nur die Gefahr des Zustandes.

Die Naht der Lederhaut kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht: Bei größeren Wunden und, wenn festgestellt werden kann, daß eine Vereinigung der Bindehautwundränder die Lederhautwundränder nicht zur Anpassung bringt. Um eine beim Klaffen der Wundränder erfolgende breite Narbenentwicklung zu vermeiden, die unfehlbar zur Netzhautabhebung führen müßte, ist die Lederhautwunde selbst zu vernähen. Wenn möglich, wird der Faden nur in den oberflächlichen Schichten der Lederhaut befestigt, damit die Nadel beim Durchbohren die tiefen Teile nicht von neuem verletzt. Durch den überraschend starken Widerstand, den das Lederhautgewebe der Nadel entgegensetzt, ist man gezwungen, einen kräftigen Druck auszuüben, und es bedarf großer Geschicklichkeit des Arztes, dadurch nicht zu neuem Austritt von Glaskörper Veranlassung zu geben. Mißlingt es, die Nadel in den oberflächlichen Schichten der Lederhaut zu verankern, so muß sie durch die ganze Dicke der Lederhaut geführt werden. Man verwendet stark gekrümmte, scharfe und feine Nadeln, der Faden an beiden Enden bewaffnet. Die Nadeln werden von der Aderhautseite gegen die Oberfläche zu durchgestoßen. ELSCHNIGS scharfzahnige Lederhautzange leistet zum Festhalten der Wundränder gute Dienste. Die einzinkige Spitze wird aderhautwärts eingesetzt, während die 2 Zinken in die Lederhaut von außen eindringen. Schlecht angelegte Nähte, welche anstatt die Wund-




Abb. 227. Umrißzeichnung.  
a) Die punktierte Linie bezeichnet die Stelle der Ablösung der Bindehaut vom Limbus, die ausgezogene Linie die Wunde.  
b) Die Bindehaut schürzenförmig nach unten gezogen, so daß sie die Wunde bedeckt, und durch Nähte festgehalten.

ränder aneinander zu passen, diese in falsche Richtung ziehen, verbiegen oder einstülpen, bedeuten eine schwere Schädigung des Auges.

Wenn möglich, soll der Eingriff in örtlicher Betäubung durchgeführt werden, um den Schaden, der durch die Unruhe des aus der Narkose erwachenden Kranken, besonders durch Erbrechen, hervorgerufen werden kann, zu vermeiden. Entsprechende örtliche Betäubung des Auges, wenn nötig durch tiefe Einspritzungen, macht den Eingriff fast immer glatt durchführbar.

Ist ein großer Teil des Strahlenkörpers oder der Aderhaut vorgefallen, dann ist es besser, das Auge sofort herauszunehmen. Dadurch wird der Verletzte vor einem langen Krankenlager bewahrt, wonach doch nur ein geschrumpftes Auge zurückbliebe, das ihm immer wieder Schmerzen bereiten und das außerdem die Dauergefahr einer sympathischen Ophthalmie in sich bergen würde.

### Eingriffe bei vorderer Synechie.

#### A. Während des Vernarbungsvorganges.

Der Vorfall der Regenbogenhaut geht unter Vernarbungsvorgängen allmählich in den Dauerzustand über, der als vordere Synechie bezeichnet wird. Während des Überganges in die vordere Synechie hat der Vorfall der Regenbogenhaut nach folgenden Grundsätzen behandelt zu werden:

Der Vorfall kann mit der konischen Sonde nur freigemacht werden, solange er mit den Rändern der Öffnung nur locker verbunden ist. Ist die Vernarbung schon zu weit vorgeschritten, so vermag die Sonde nicht mehr durchzudringen. Eine bestimmte Zeit läßt sich dafür nicht aufstellen. Doch ist manchmal noch nach 2—3 Wochen der Vorfall mit den Wundrändern so zart verwachsen, daß das verbindende Gewebe mit der Sonde noch durchtrennt werden kann. Hat aber die Vernarbung bereits zu einer innigen Verbindung geführt, so hängt die Art des Eingriffes wesentlich von der Größe des Vorfalles ab. Das einfachste Verfahren besteht darin, unter Verzicht, die Regenbogenhaut von der Hornhautnarbe freizumachen, durch eine *breite* Iridektomie hinter dem erhalten gebliebenen Teile der Hornhaut den Druck herabzusetzen und die Narbe durch Druckverband abzuflachen. Dieses Verfahren führt oft zum Ziele, läßt aber doch in manchen Fällen im Stiche, insofern, als manchmal auch nach der Iridektomie die Narbe vorgewölbt bleibt oder das Auge durch erneute Drucksteigerung schließlich zugrunde geht.

#### B. Bei dem fertigen Zustande der vorderen Synechie.

Ektatische Narben sind wegen der Gefahr der Drucksteigerung und der Spätinfektion unbedingt zu beseitigen. Aber die Drucksteigerung kann auch eintreten bei vorderen Synechien, wo die Hornhautnarbe flach und dicht ist, namentlich dann, wenn nicht ein schmaler Zipfel, sondern ein größerer Teil der Regenbogenhaut eingewachsen ist. Für vordere Synechien mit flacher Narbe ist eine allgemein gültige Regel über ein Einschreiten nicht zu geben. Es braucht gewiß nicht jede vordere Synechie bei flacher dichter Narbe angegangen zu werden.

**Anzeigen.** Die Anzeigen dafür können in folgende Punkte zusammengefaßt werden:

1. wenn die Einheilung ausgedehnt ist, so daß ein großer Teil des Pupillarandes mit der Narbe verwachsen ist;

2. wenn sich Zeichen von wenn auch nur zeitweise vorhandener Drucksteigerung einstellen;

3. wenn die Narbe, obwohl anfänglich flach, dem Augendrucke nachzugeben droht (beginnende Vorwölbung);

4. wenn das Sehvermögen schlecht ist, weil die Regenbogenhaut verzerrt und die Pupille dadurch verlagert ist: wenn also bei einer peripheren Einheilung der Regenbogenhaut die Pupille so verzogen ist, daß nur der unregelmäßig brechende Randteil der Hornhaut zum Sehen verwendet werden kann, während der mittlere gesunde Hornhautteil ausgeschaltet ist; oder wenn eine Narbe in der Mitte der Hornhaut die Pupille völlig bedeckt. Bei der Gruppe 4 sind es also im wesentlichen optische Gründe, die den Eingriff veranlassen.

Ist nur ein feiner Faden der Regenbogenhaut eingehilt, der z. B. von der Vorderfläche der Regenbogenhaut zu einer dichten Hornhautnarbe zieht, so braucht dieser gewiß nicht durchschnitten zu werden. Ebenso ist kein Eingriff angezeigt, wenn bei einwandfreiem Zustande der Narbe nur ein kleiner Teil des Pupillarrandes an der Hornhaut angelötet ist. Das sind die Fälle, wo mit der Diszissionsnadel oder dem GRAEFESCHEN Messer die vordere Synechie durchschnitten werden kann, ohne daß jedoch eine Notwendigkeit dazu vorliegt.

**Eingriffe.** Für das zu erstrebende Ziel, die *Regenbogenhaut* von der Hornhaut *loszulösen*, sind verschiedene Verfahren erdacht worden.

a) Ist die Narbe klein, der Vorfall fliegenkopfförmig oder nur wenig größer, so wird mit einer flach an die Hornhaut angelegten Lanze die vorgewölbte Narbe abgekappt. Da die Öffnung in der Hornhaut zum Einführen der Irispinzette nicht genügend groß ist, wird die Regenbogenhaut mit einem stumpfen Häkchen vorgezogen. Diese zieht sich nach der Ausschneidung entweder von selbst in die richtige Lage zurück oder sie wird mit dem stumpfen Häkchen dorthin zurückgeschoben, da auch der Spatel durch die kleine Öffnung meist nicht eingebracht werden kann. Die kleine Wunde vernarbt in kürzester Zeit, die vordere Kammer ist gewöhnlich schon am nächsten Tage hergestellt.

b) Ist die ektatische Narbe aber größer, so wird sie mit der flach angelegten Lanze abgetragen und die Regenbogenhaut mit Pinzette und Schere ausgeschnitten. Die freiliegende Öffnung wird nach den oben beschriebenen Regeln mit einem Bindehautlappen gedeckt.

c) **Aufklappung der Narbe nach SACHS.** Die Krone (2—3 mm) des Hornhauttrepans wird schräg auf die Narbe aufgesetzt, so daß das durch ihre Umdrehung umgrenzte Lättchen nur in  $\frac{3}{4}$  seines Umfanges durchschnitten wird. Während der Gehilfe das Lättchen mit einem spitzen Häkchen wie einen Deckel emporhebt, wird durch die Öffnung die Pinzette oder nach Bedarf das Häkchen in die vordere Kammer eingeführt, die Regenbogenhaut vorsichtig von allen Seiten vorgezogen und ausgeschnitten. Die Basis des Lättchens wird dort angelegt, wo durch die beim Aufklappen entstehende Öffnung die Regenbogenhaut am leichtesten zugänglich ist. In den meisten Fällen wird also die Basis des Lättchens zentralwärts, d. h. pupillarwärts zu liegen kommen. Nachdem die Regenbogenhaut freigemacht worden ist, wird das Lättchen wieder in seine ursprüngliche Lage gebracht, in der es schon durch den Druck des oberen Lides bei geschlossenen Augen festgehalten wird. Ein leichter Druckverband wirkt dabei noch unterstützend mit. Durch Atropin wird die Regenbogenhaut soweit als

möglich von ihrer früheren Anwachsungsstelle weggezogen. Die Kammer ist schon tags darauf hergestellt; das Auge wird durch mindestens 1 Woche verbunden gehalten. Häufig wird nach diesem Verfahren eine Hornhautnarbe, die schon angefangen hatte, sich vorzuwölben, flach und dicht. Von der Narbe freigemacht, zieht sich die Regenbogenhaut in ihre richtige Lage zurück, so daß sich die Pupille nach Beseitigung einer peripheren Synechie wieder hinter der Mitte der Hornhaut befindet. Auf diese Weise wurde also auch den optischen Verhältnissen Rechnung getragen. Nachdem das Auge ganz reizlos geworden und die Heilung vollendet ist, kann eine Tätowierung der Narbe vorgenommen werden.

d) Ein anderes Verfahren besteht in der Entfernung und dem Ersatze einer ektatischen Narbe durch gesundes Hornhautgewebe: *Überpflanzung von Hornhaut*. E. FUCHS empfahl als erster, fistulierende oder ektatische Narben mit dem Trepan auszuscheiden, die Regenbogenhaut freizumachen und das Loch durch ein Hornhautstück zu decken, das von einem eben herausgenommenen Auge mit dem Trepan gewonnen wird. Der Eingriff wird in örtlicher Betäubung mit dem Trepan von v. HIPPEL ausgeführt.

Dieser Trepan besteht aus einer Trommel an seinem oberen Ende, in der sich ein Uhrwerk befindet. Auf dem Deckel der Trommel ist ein Knopf angebracht; wird mit dem Finger auf ihn gedrückt, so wird die Trepankrone in rasche Umdrehung versetzt.

Das Instrument wird in der Weise gehandhabt, daß bei festgehaltenem Auge die Schneide der Krone, deren Größe entsprechend gewählt wurde, senkrecht auf die auszuschneidende Stelle der Hornhaut des flach liegenden Kranken aufgesetzt wird, worauf der Gehilfe durch Druck auf den Knopf der Trommel die Krone in Bewegung versetzt, bis Gegenauftrag gegeben wird. Die Schneide der Krone muß entsprechend der Dicke des auszuschneidenden Stückchens in dem betreffenden Falle entsprechend hoch eingestellt werden. Bei dünnen Narben wird die Schneide nur wenig vorstehen gelassen, bei dicken Narben wird mehr davon eingestellt. Während sich die Krone dreht, wird auf die Hornhaut ein leichter Druck ausgeübt.

Der Trepan wird schon nach wenigen Umdrehungen abgehoben, um zu beobachten, wie tief er eingeschnitten hat und ob er vielleicht schon durchgedrungen ist. Dünne Narben werden oft wider Erwarten rasch durchtrennt. Im Augenblicke, wo die Hornhaut durchbohrt ist und das Kammerwasser abfließt, wird der Trepan sofort zurückgezogen, um die tieferen Teile nicht zu verletzen. Auch bei tadellosem Aufsetzen der Krone wird das Lämpchen nicht immer im ganzen Umkreise durchtrennt, was namentlich bei den an verschiedenen Stellen oft verschieden dicken Narben nicht wundernehmen kann. Das Hornhautstückchen wird dann mit einer feinen Pinzette aufgefaßt und mit einer flach angesetzten Lanze vollständig losgetrennt. Dies gelingt leicht, da auf jeden Fall schon eine ziemlich tiefgehende Furche vorgezeichnet ist. An der hinteren Wand des ausgeschnittenen Stückes haften die Reste des Pigmentepithels entsprechend der Anheilung der Regenbogenhaut an die Hornhaut oder weil die ausgeschnittene Narbe nichts anderes ist als narbig veränderte Regenbogenhaut. Unter Schonung der in der Öffnung bloßliegenden Linsenkapsel wird nun die Regenbogenhaut mit der Pinzette von allen Seiten zart vorgezogen und mit der WECKERSCHEN Schere ausgeschnitten. Dabei besteht eine gewisse Gefahr, eine Iridodialyse zu

erzeugen. Besonders wenn die Regenbogenhaut auf einer Seite sehr kurz ist, könnte sie leicht von ihrem Ansatz abgerissen werden, wenn sie mit der Pinzette schnell und ausgiebig vorgezogen würde. Oft werden mit einem stumpfen Häkchen die Verbindungen schonender gelöst und die Regenbogenhaut freigemacht, worauf sie sich von selbst von der Narbe zurückzieht oder mit dem Spatel weggeschoben wird. Nun wird ein gleich großes Stück Hornhaut, das mit demselben Trepan aus einem eben herausgenommenen menschlichen Auge ausgeschnitten wurde, auf die Öffnung gelegt. Wenn die Linse nicht vordrängt, genügt es, das Plättchen einzusetzen, ohne es weiter festzumachen. Man vergesse nicht, sich zu merken, welche Seite der Oberfläche entspricht, d. h. vom Epithel überzogen ist. Ist das Lämpchen in die richtige Lage gebracht, so wird das obere Lid über das Auge heruntergezogen und über beide Augen ein Verband angelegt, der erst nach 2 Tagen erneuert wird. Dabei kann das Lämpchen abgestoßen im Bindehautsack aufgefunden werden, obwohl es anfänglich ganz gut gelegen war. Aber fast immer bleibt es an Ort und Stelle. Zeigt das Lämpchen schon während des Eingriffes keine Neigung, über der Öffnung liegen zu bleiben, was namentlich der Fall ist, wenn die Linse oder wenn bei Fehlen der Linse die Membrana hyaloidea vordrängt, so muß das Lämpchen durch einen Bindehautlappen festgehalten werden, der die Aufgabe hat, in den ersten Tagen das Lämpchen auf seine Unterlage zu drücken. Dieser Lappen darf nicht zu schmal genommen werden. Sonst kann er nicht genügend ausgespannt werden, und da er auf der gewölbten Hornhaut die Neigung hat, abzurutschen, kann er sogar das Lämpchen verschieben. Da sich ferner die Bindehaut beim Durchschneiden zusammenzieht, muß ein gut 2mal so breiter Bindehautstreifen zur Bildung des Lappens umgrenzt werden, als der Durchmesser des Lämpchens ist. Da der Bindehautlappen auf einer vom Epithel vollständig bekleideten Fläche aufzuliegen kommt, heilt er nicht an. Er wird nach mehreren Tagen, wenn die Nähte einstweilen nicht schon von selbst durchgeschnitten haben, losgelöst und wieder an seine Stelle gebracht oder ausgeschnitten.

Auch ein schon von SCHÖLLER geübtes Verfahren der Verwendung eines Bindehautlappens kam jetzt wieder zu Ehren. Der Lappen wird so angelegt, daß er umgedreht, also mit seiner Epithelseite auf der Hornhaut zu liegen kommt. NIZETIČ empfiehlt, den Lappen noch vor der Trepanation zu bilden, und zwar in einer Breite von 6—10 mm und in einer Höhe von 10—11 mm vom oberen Limbus an nach oben und möglichst viel subkonjunktivales Gewebe an ihm zu belassen. Umgedreht wird er dann an eine Bindehautwunde am unteren Limbus angenäht, wobei Sorge zu tragen ist, daß er über die Hornhaut mit dem eingepflanzten Lappen fest angespannt ist. Die epitheliale Seite der Bindehaut verursacht keinen solchen Reiz, wie es bei Nähten der Fall ist, die man über die Hornhaut zu spannen empfohlen hat. Nach einigen Tagen wird der Lappen in seine Ausgangsstellung zurückgedreht und angenäht oder einfach abgeschnitten. Beide Augen müssen für mindestens 4 Tage verbunden gehalten werden. Der Kranke hat Bettruhe einzuhalten. Das überpflanzte Lämpchen trübt sich nach einiger Zeit, so daß der Eingriff für die Verbesserung des Sehens ohne Wert ist, aber es behält seine Festigkeit. Durch dieses Verfahren wird also die gefährliche, nachgiebige und durchlässige Narbe entfernt, durch widerstandsfähiges Gewebe ersetzt und die Regenbogenhaut freigemacht.

Dieser Eingriff kann nur bei Narben kleineren Umfanges (bis zu 4 mm Durchmesser) zur Anwendung gebracht werden. Werden größere Stücke aus der Hornhaut herausgeschnitten, so halten die aufgelegten überpflanzten Lläppchen nicht und die große Öffnung muß nachträglich durch einen Bindehautlappen verschlossen werden. Für ganz große vorgewölbte Narben bleibt daher auch jetzt noch das ursprüngliche einfache Verfahren übrig, die Narbe durch eine breite Iridektomie und folgenden Druckverband abzuflachen.

Bei der Hornhautreparation kann die Linse verletzt werden, wenn nämlich ihre Kapsel in die Narbe eingehilt ist, da beide gleichzeitig durchschnitten werden. Der Zwischenfall hat deswegen wenig Bedeutung, da die Linse bei Einheilung der Kapsel in die Narbe schon getrübt und, da es sich um jugendliche Kranke handelt, meist schon geschrumpft war. Wird aber eine durchsichtige Linse verletzt, so besteht große Gefahr einer Infektion mit Ausgang in Endophthalmitis. Stellt sich nach Austritt der Linsensubstanz das zarte Häutchen der Membrana hyaloidea in die Wunde ein, so kann durch ihr Platzen ein Vorfall des Glaskörpers eintreten, wodurch die weitere Fortsetzung des Eingriffes unmöglich gemacht wird. Die Öffnung muß vielmehr durch einen gestielten Bindehautlappen gedeckt werden.

**Einheilung der Regenbogenhaut in eine Eingriffnarbe.** Wenn nach Einheilung der Regenbogenhaut in eine Eingriffswunde keine Drucksteigerung eintritt, die Narbe flach bleibt und höchstens ihre dunkle Farbe auf die Einheilung der Regenbogenhaut hinweist, so besteht kein Grund, dagegen einzuschreiten. Tritt aber Drucksteigerung auf, so muß die Regenbogenhaut freigemacht werden. Handelt es sich um eine Einheilung nach Glaukomiridektomie, so wäre es gefehlt, sofort eine zweite Iridektomie zu machen, die, besonders wenn sie nach unten angelegt wird, auf das Sehvermögen einen sehr ungünstigen Einfluß ausübt. Hier muß vielmehr in erster Linie die Einheilung der Regenbogenhaut beseitigt werden.

Der Eingriff kann in zweierlei Weise vorgenommen werden. Entweder wird entsprechend dem eingehilteten Kolobomschenkel ein Einschnitt mit dem Lanzennmesser gemacht, und zwar möglichst peripher. Dann wird mit der Irispinzette die Regenbogenhaut hervorgezogen und ausgeschnitten, worauf sie sich entweder von selbst in die richtige Stellung begibt, oder aber mit dem Spatel zurückgestrichen wird.

Sicherer aber als durch dieses Verfahren, namentlich wegen einer Verletzung der Linse, ist es, im Bereiche der Einheilung einen Schnitt ähnlich einer vorderen Sklerotomie zu machen. Indem das GRAEFESCHE Messer auf der einen Seite der Einheilungsstelle eingestochen und jenseits davon aus der vorderen Kammer herausgeführt wird, kommt ein peripherer Lederhautschnitt zustande, durch den die Regenbogenhaut von der Stelle der Einheilung abgeschnitten wird. Der Schnitt braucht nicht ganz vollendet zu werden, namentlich wo ein Vorfall des Glaskörpers zu befürchten ist. Durch die Gewebebrücke wird nämlich das Klaffen der Wunde verhindert. Eine Einspritzung hinter das Auge schützt am besten gegen den Vorfall des Glaskörpers. Zieht sich die Regenbogenhaut nicht von selbst zurück, nachdem sie durch den Schnitt aus der Einheilung befreit worden ist, so wird sie mit dem Häkchen oder der Pinzette hervorgeholt, abgeschnitten und in die richtige Lage gebracht.

Über das Vorgehen bei cystischen Narben nach Glaukomiridektomie sind die Ansichten geteilt. Während von vielen solche Narben wegen ihrer Filtrationsfähigkeit als ein für das glaukomatöse Auge sehr günstiges Ergebnis des Eingriffes aufgefaßt und durch eigene Verfahren zum Entstehen gebracht werden, stehen die anderen auf dem Standpunkte, die Regenbogenhaut freizumachen, dadurch eine flache Vernarbung zu erzielen und das Auge vor der drohenden Gefahr der Spätinfektion zu beschützen, die bei cystischen Narben nicht selten eintritt.

### **Überpflanzung der Hornhaut aus optischen Gründen.**

Hatte das zuvor beschriebene Vorgehen tektonische Zwecke, so kann dasselbe Verfahren auch für optische Zwecke verwendet werden: optische Keratoplastik. Diese wird eine oberflächliche genannt, wenn aus der Hornhaut ein Lämpchen ausgeschnitten wird, das nicht ihre ganze Dicke durchsetzt, so daß die tiefsten Schichten noch erhalten bleiben. Es eignet sich nur für Fälle, wo die getrübte Schicht, die durch ein durchsichtiges Stück ersetzt werden soll, nicht die ganze Dicke der Hornhaut einnimmt, wie z. B. bei den Hornhautdystrophien. Nachdem mit dem Trepan, dessen Krone für diesen Eingriff 4 mm nicht überschreiten soll, eine Furche in die entsprechende Tiefe eingeschnitten worden ist, wird mit Pinzette und flach aufgesetzter Lanze das Lämpchen ausgeschnitten. In der Vertiefung liegt nun die durchsichtige hintere Schicht der Hornhaut frei. Darauf wird aus einem geeigneten eben herausgenommenen menschlichen Auge ein gleich großes Stück Hornhaut mit dem Trepan ausgeschnitten. Die Dicke ist je nach der Tiefe der in der Narbe entstandenen Mulde zu gestalten, häufig kann die ganze Dicke der Hornhaut des Spenders verwendet werden. Das Lämpchen soll nach Möglichkeit wenig berührt werden und wird mit einem Spatel auf die trepanierte Stelle übertragen. Wenn es gut sitzt, nimmt man am besten von allen Befestigungsversuchen und Nähten Abstand. Beide Augen werden geschlossen und verbunden. Der erste Verbandwechsel soll erst nach 3 Tagen stattfinden. Nach 9 Tagen kann der Verband weggelassen werden. Das Lämpchen heilt meist ohne Zwischenfälle ein. Aber nur selten bleibt es wirklich durchsichtig. Es wird nicht immer sofort trübe, sondern die Trübung setzt, nachdem man sich schon den besten Hoffnungen hingegeben hatte, manchmal erst nach einigen Wochen plötzlich ein.

Bei der durchdringenden Keratoplastik wird das Lämpchen aus der ganzen Dicke der Hornhaut ausgeschnitten, wie vorher beschrieben. Schwierigkeiten in der Anpassung des Lämpchens ergeben sich nicht selten durch die verschiedene Dicke der beiden Hornhäute. Auch kann es geschehen, daß trotz der Verwendung des gleichen Trepens der Durchmesser des Loches mit dem des Lämpchens nicht stimmt, indem sich das Narbengewebe nach der Trepanation gegen die Öffnung vorschiebt und diese verkleinert. Als Spender eignen sich besonders kindliche Augen. Es wurden auch Hornhäute von frisch Verstorbenen zur Entnahme der Lämpchen empfohlen. Ja es wurde sogar behauptet, daß Hornhäute, spätestens 6 Stunden nach dem Tode der Leiche entnommen, größere Aussicht hätten, durchsichtig zu bleiben. Auch bei sogenannt durchsichtig gebliebenen Lämpchen sind gewöhnlich zarte Trübungen und Unregelmäßigkeiten der Hornhautoberfläche vorhanden, so daß dabei das Sehvermögen oft nur recht bescheiden ge-

bessert wird. Fälle von tadellos durchsichtig gebliebenen Lämpchen und wirklich ausgezeichneter Verbesserung der Sehschärfe (von Handbewegung oder Fingerzählen vor dem Auge auf mindestens 6/12) sind trotz allen Bemühungen auch heute noch große Seltenheiten.

Anzeigen zu durchdringenden Keratoplastiken findet man in unseren Ländern, selbst an einer großen Klinik, verhältnismäßig selten. Anders ist es in Ländern, wo die Augengonorrhöe und andere Krankheiten der Bindehaut und Hornhaut noch verheerend auftreten. Hat *ein* Auge gute Sehschärfe, so ist es ein überflüssiger Eingriff, im anderen Auge wegen des zentralen Leukoms Hornhaut zu überpflanzen. Anzeigen geben also nur Kranke, deren Sehvermögen beider Augen durch dichte Hornhautnarben auf das schwerste geschädigt ist. Die besten Erfolge werden nach Ablauf von Keratitis parenchymatosa gemeldet, wo die Hornhaut — wie es ganz selten einmal vorkommt — in ihrer ganzen Ausdehnung dauernd dicht weiß getrübt ist; von der oberflächlichen Keratoplastik wird über gute Erfolge berichtet bei den verschiedenen Formen von Hornhautdystrophie, wo die tieferen Hornhautlamellen an der Erkrankung nicht teilgenommen haben. Nur wenn das Sehvermögen ganz schwer geschädigt ist (Handbewegung oder Fingerzählen vor dem Auge), ist man zur Hornhautüberpflanzung berechtigt. Da man nie weiß, ob der überpflanzte Lappen nicht vollständig trüb wird, halte ich es für unangebracht, Augen, die etwa noch 6/36 sehen, zur Überpflanzung zu bestimmen, denn der Eingriff setzt das Auge der Gefahr aus, auch dieses geringe Sehvermögen, sei es durch Mißlingen der Einheilung oder durch Trübung des Lämpchens, vollständig zu verlieren.

Von Überpflanzungen einer ganzen Hornhaut als Ersatz der zugrunde gegangenen Hornhaut bei totalem Staphylom kann sich wohl nur jemand einen Erfolg erwarten, der über die Anatomie des Staphyloma corneae totale nicht genügend unterrichtet ist.

## Vierzehntes Kapitel.

# Über die wundärztliche Behandlung der Netzhautabhebung.

## Die elektro-chirurgische Behandlung der Netzhautabhebung.

Von

Dr. J. Böck, Wien.

### Einleitung.

Die heutigen Eingriffe gegen Netzhautabhebung fußen auf der von GONIN vertretenen Ansicht, daß diese Erkrankung durch einen Riß oder ein Loch in der Netzhaut verursacht werde und daß durch den Verschluß dieser Öffnung die Abhebung wieder verschwinde. GONIN verwendete zum Verschluß den Thermokauter. Dieses Verfahren ist durch ein weniger gefährliches und mit größerer Sicherheit wirkendes Verfahren ersetzt worden. Man erzeugt mit Hilfe des Hochfrequenzstromes (LARSON, ŠAFÁŘ, WEVE) im Rißgebiete Koagulationsherde und bringt den Riß dadurch entweder unmittelbar zum Verschluß oder riegelt ihn durch Verwachsungsherde von der Umgebung ab. Auch der in früheren Jahren schon versuchte galvanische Strom wurde nun wieder zu demselben Zwecke herangezogen (IMRE, v. SZILY und MACHEMER, VOGT u. a.).

Soll man den Riß verschließen, so muß man ihn zuerst finden und dann seine Lage bestimmen.

**Auffinden der Risse.** Auch der im Augenspiegeln vorzüglich bewanderte Arzt muß sich erst durch lange Übung eigens dazu ausbilden, auch kleine Risse und Lücken in der Netzhaut zu entdecken und sie nicht zu übersehen. Viel Zeit und Geduld ist erforderlich, um sich mit jedem einzelnen Falle so ganz und gar vertraut zu machen, um alle Risse oder Löcher nicht nur zu entdecken, sondern sie — was dann für den Eingriff besonders wichtig ist — auch immer wieder gleich zu finden, auch am liegenden Kranken. Beide Untersuchungsarten — im aufrechten sowohl wie im verkehrten Bilde — sind heranzuziehen. Elektrische Spiegel, deren Lichtstärke nach Belieben verändert werden kann, sind sehr empfehlenswert. Bei Trübungen der Medien ermöglichen die starken Lampen von LAUBER oder WEVE manchmal noch genügend Einblick zu diesem Zwecke. In seltenen Fällen muß man zur Klarstellung lochverdächtiger Stellen im hinteren Teile des Augenhintergrundes das abgewinkelte Mikroskop von LINDNER mit Spaltlampe und Haftglas verwenden.

Maximale Erweiterung der Pupille ist Grundbedingung. Außer Atropin-einträufelungen und Glaukosan muß daher gelegentlich auch eine kleine Menge von Adrenalin unter die Bindehaut eingespritzt werden, und zwar nicht zu knapp am Limbus, um störende Dellen zu vermeiden. Die Einstichstelle wird

durch Berühren mit einem in 10%iger Cocainlösung befeuchteten Stieltupfer unempfindlich gemacht, um zu vermeiden, daß durch Einträufelungen von Cocain die Durchsichtigkeit der Hornhaut leide, da dadurch die Spiegeluntersuchung erschwert wird. Skizzen auf dem Schema von AMSLER und DUBOIS ersparen langatmige Beschreibungen und verschaffen einem eine klare Übersicht (Abb. 228).

Wenn Risse zu peripher liegen oder durch Falten der Netzhaut versteckt sind, können sie nicht gefunden werden. Solche Kranke müssen einige Tage Bettruhe einhalten, die Augen mit der LINDNERSCHEN Lochbrille versehen. Flacht sich unter diesen Maßregeln die Abhebung ab, so kann nunmehr manchmal der Riß entdeckt werden. Die Angabe des Kranken, von welcher Seite her die Gesichtsfeldstörung eintrat, erleichtert oft das Auffinden des Risses.

### Lagebestimmung der Risse.

#### 1. Vor dem Eingriffe.

**a) Abschätzung des Meridians und der Entfernung des Risses von der Papille.** Das einfachste Verfahren besteht in der Abschätzung der Entfernung des Risses von der Papille oder der Ora serrata nach Papillendurchmessern und in der Abschätzung des Meridians. Eine solche nur mit Hilfe des Augenspiegels bewerkstelligte Ortsbestimmung des Risses, wie sie an der Klinik von GONIN geübt wurde und welche, wie versichert wird, hinlänglich genaue Ergebnisse hat, wurde von AMSLER genauer beschrieben. AMSLER hat zu diesem Zwecke genaue Skizzen angelegt, die er auf die scheinbare Größe der Papille im umgekehrten Bilde aufgebaut hat. Er wählte wegen der 3fachen Vergrößerung einen Durchmesser von 5 mm, so daß in das Schema alle Details in der Größe eingezeichnet werden können, in der sie beim Spiegeln im umgekehrten Bilde erscheinen. Um die scheinbare Größe der Papille in dem gegebenen Falle immer vor Augen zu haben, hält sich der Untersuchende die HAABSCHESKE Pupillenskala senkrecht neben das Auge und es wird zunächst festgestellt, wie groß dem Untersucher die Papille erscheint. Die größte Ausdehnung des dem Spiegeln zugänglichen Hintergrundgebietes schätzt AMSLER auf ungefähr 33 P. D. Das ist für das Schema 16,5 cm. Er gab also seinem Schema einen Durchmesser von 16,5 cm, und der Kreis dieses Durchmessers wird als der Ora serrata entsprechend angenommen (Abb. 228). Freilich, die wirkliche Ora serrata wird beim Spiegeln meist nicht erreicht. 4 Papillendurchmesser von dieser angenommenen Ora serrata ist daher in das Schema ein 2. Kreis konzentrisch zum 1. eingezeichnet, der Äquator, dessen Durchmesser also nur 12,5 cm groß ist. In Wirklichkeit entspricht der Orakreis einer Distanz von 8 mm vom Limbus, der Äquatorkreis einer Entfernung von 6 mm von der Ora, also 14 mm vom Limbus. In das Schema sind schließlich noch die 12 Hauptmeridiane des Auges eingetragen, den Nummern des Zifferblattes entsprechend. Wichtig ist namentlich, die Papillendurchmesser zu zählen, die man noch jenseits des Risses beobachten kann.

Es wird also unter wiederholtem und äußerst sorgfältigem Einzeichnen des Augenhintergrundes, der Papille, der Gefäße und der Falten der Netzhaut schließlich die Stelle des Risses nach der abgeschätzten Lage des Meridians und nach seiner Entfernung von der Ora oder dem Äquator bezeichnet, also z. B. der Riß liegt innen oben im Meridian 11<sup>h</sup> 12 mm vom Limbus entfernt.

Trotz der schweren theoretischen Bedenken, die gegen die Art der Anlegung eines solchen Schemas einzuwenden sind, genügt es nach den Berichten aus der GONINSchen Klinik seinem Zwecke durchaus, so daß die Risse meist gut getroffen werden. Das Verfahren hat gewiß den Vorteil, daß jeder Augenarzt die Ortsbestimmung vornehmen kann, auch wenn ihm keine anderen Instrumente als der Augenspiegel zur Verfügung stehen.




Abb. 228. Schema nach AMSLER. ( $\frac{1}{2}$  nat. Größe.)

**b) GRAEFES Verfahren mit dem Perimeter.** Während das eben geschilderte Verfahren rein auf Schätzung ruht, liefert die Zuhilfenahme des Perimeterbogens nach dem alten Verfahren von ALFRED GRAEFE genauere Anhaltspunkte für die Ortsbestimmung des Risses. Es hat sich am besten bewährt, nach dem Vorschlage LINDNERS, an dem GULLSTRANDSchen Ophthalmoskop einen um das Beobachtungrohr drehbaren Perimeterbogen anbringen zu lassen, mit einem Krümmungsradius von 33 cm in einer Entfernung von 32 cm von der Hornhaut des Untersuchten, so daß der Krümmungsmittelpunkt mit dem mittleren Knotenpunkt des Auges ungefähr zusammenfällt. Die jeweilige Stellung des Bogens kann in einer Gradeinteilung abgelesen werden. An dem Perimeterbogen ist eine Lichtquelle verschieblich angebracht. Sie wird als Fixationsobjekt verwendet. Der Kopf des Untersuchten muß in unveränderlicher Stellung festgehalten werden, am besten mit Hilfe eines Beißbrettchens. Die Frontalebene des Kopfes hat senkrecht zum Ophthalmoskop zu stehen. Es wird zunächst die

Fovea des Patienten genau eingestellt. Dazu leistet ein im Okular des Ophthalmoskopes angebrachtes Fadenkreuz wertvolle Dienste.

Der Vorgang zur Aufsuchung des Risses ist nun der, daß der Perimeterbogen in die entsprechende Lage gebracht und die Lichtquelle, die das zu untersuchende Auge zu fixieren hat, am Bogen so lange verschoben wird, bis der Riß genau in der Mitte des ophthalmoskopischen Bildes eingestellt erscheint. Nun wird der Winkel, den die Blicklinie des Untersuchten, die nach der Lichtquelle gerichtet ist, mit der Richtungslinie der gesuchten Netzhautstelle einschließt, unmittelbar am Perimeterbogen abgelesen. Aus diesem Winkel kann nun die Entfernung des Netzhautrisses vom Hornhautrand berechnet werden.

Tabelle der den Knotenpunkts winkeln entsprechenden Bogen- und Sehnenlängen, beide gemessen vom Limbus, für Kammertiefen von 3,6 und 7 mm.

Knotenpunkts- winkel	Kammertiefe 3,6 mm		Kammertiefe 7 mm	
	Bogenlänge Millimeter	Sehnenlänge Millimeter	Bogenlänge Millimeter	Sehnenlänge Millimeter
30°	20,5	18,0	20,9	18,3
35°	19,1	17,1	19,6	17,5
40°	17,7	16,2	18,3	16,6
45°	16,4	15,2	16,9	15,7
50°	15,1	14,2	15,7	14,8
55°	13,8	13,1	14,5	13,8
60°	12,5	12,0	13,2	12,7

Die Werte sind auf der Grundlage der GULLSTRANDSchen Konstanten gerechnet und beziehen sich auf das Niveau der Netzhaut; bei Annahme einer Durchschnittsdicke von Sklera und Chorioidea von 0,75 mm vergrößert sich die Bogenlänge auf der Oberfläche der Sklera für jeden Grad um 0,013 mm.

Mit diesem Verfahren ist also der Meridian, in welchem der Riß gelegen ist, unmittelbar durch die Stellung des Perimeterbogens und die Entfernung des Risses vom Limbus durch Rechnung gefunden worden.

**e) Verfahren von DUPUYS-DUTEMPS mit dem Perimeter.** Der Riß kann auch noch in anderer Weise mit Hilfe des Perimeterbogens aufgefunden werden. Das untersuchte Auge bleibt unbeweglich auf den zentralen Fixationspunkt eingestellt, während sich das untersuchende Auge in die entsprechende Stellung entlang dem Perimeterbogen begibt, bis der Riß in die Mitte des ophthalmoskopischen Gesichtsfeldes zu liegen kommt. Die Stellung des untersuchenden Auges, abzulesen am Bogen des Perimeters, ergibt den Winkel, den die Blicklinie des Untersuchten mit der Richtungslinie des Risses einschließt. Diese ist also jetzt durch die Stellung des Augenspiegels des Untersuchers gekennzeichnet, während die Blicklinie des Untersuchten auf den Fixationspunkt des Perimeters gerichtet ist. Das Verfahren ist einfach und jeder Augenarzt kann es mit Erfolg benützen.

**Allgemeine Bemerkungen zu diesen messenden Verfahren.** Eine Fehlerquelle kommt allen zu. Die Lage des Risses in der Netzhaut ist nicht identisch mit der Stelle der Lederhaut, wo eingestochen werden muß, um die Rißränder zu treffen. Außerdem kann man nicht im vorhinein wissen, an welche Stelle sich der Riß begeben wird, wenn die subretinale Flüssigkeit ab-

fließt. Da nun bei der Verwendung der Hochfrequenznadel an zahlreichen Stellen Koagulationsherde angelegt werden können, ist eine so genaue Ortsbestimmung vor dem Eingriffe nicht mehr so ausschlaggebend, um den Riß zu treffen, wie bei dem ursprünglichen GONINSchen Verfahren, wo alles davon abhing, mit dem eindringenden Thermokauter sofort den Riß zu erreichen, oder der Eingriff mißlungen war.

Die Ortsbestimmung des Risses ist bei dem heutigen Verfahren vielmehr hauptsächlich verlegt in die Zeit:

## 2. Während des Eingriffes.

a) Man braucht nur mit Hilfe des Augenspiegels die Lage der ersten Stichstellen, welche auf Grund des messenden Verfahrens angelegt worden sind, mit der Lage des Risses zu vergleichen, um die späteren Stichelungen genau an die Rißgegend heranzubringen, falls die erste Stelle nicht richtig gelegen war.

Dazu kommt noch ein anderes Verfahren der Ortsbestimmung während des Eingriffes:

b) Ortsbestimmung mit dem Verfahren der Durchleuchtung nach LINDNER und WEVE. Die Untersuchung beruht auf der Tatsache, daß das Licht des Augenspiegels auf der Außenfläche der bloßgelegten Lederhaut sichtbar ist. Hat man nun das Loch genau eingestellt, so gibt die Lage des Lichtpunktes noch den besten Anhaltspunkt, das Loch zu treffen, wenn die Stichstelle dort gesetzt wird; diese Stelle wird daher vom Gehilfen mit einem Farbstoff (Gentianaviolett oder Tusche) bezeichnet (Abb. 229).

Bei diesem Verfahren zeigt sich erst besonders der Wert des genauen Spiegels im aufrechten und im um-

gekehrten Bild vor dem Eingriffe, auch das vorherige Spiegeln des liegenden Kranken, daß man nun während des Eingriffes den Riß rasch entdeckt.

c) Ein anderes Verfahren, den Riß zu erreichen, und zwar *gleichzeitig* mit der Beobachtung und Ausführung der Stichelung, beruht in der Verwendung des Zielophthalmoskopes (siehe S. 359).




Abb. 229. Schema der Lagebestimmung des Risses mit Hilfe der Durchleuchtung.

## A. Der Eingriff mit dem Hochfrequenzstrom.

**Allgemeine Vorbemerkungen.** Bei Verwendung des Hochfrequenzstromes soll das Gewebe koagulierte, aber nicht verbrannt werden. Es wird also an Stelle des Brandherdes, den das Glüheisen setzt, das Gewebe zum Gerinnen gebracht. Bei den meisten derzeit verwendeten Apparaten wird die hohe Frequenz des Stromes durch eine sogenannte Löschfunkenstrecke zustande gebracht. Von der Distanz der Funkenstreckenelektroden hängt bei sonst gleichen Voraussetzungen die Frequenz des erzeugten Stromes und seine

Spannung ab. Diese beiden Umstände bestimmen in erster Linie die Größe und Art des Gerinnungsherde. Die optimale Länge der Funkenstrecke muß heute noch für jeden Apparat empirisch gefunden werden; zu diesem Zwecke führt man am besten an der Hornhaut eines frisch herausgenommenen Schweinsauges Koagulationen durch. Es soll die Nadel stromlos an die Hornhaut herangebracht, dann in diese hineingedrückt und gleichzeitig der Strom geschlossen werden. Der Druck, mit dem man die Nadel während des Versuches gegen die Hornhaut oder Lederhaut drückt, sei so schwach, daß ohne Stromschluß ein Eindringen der Nadel nicht erfolgt. Erst wenn der Strom geschlossen ist, soll das Zusammenwirken von Strom und Fingerdruck das Eindringen der Elektrode ermöglichen. Man läßt den Strom ungefähr 1 Sekunde einwirken, unterbricht ihn dann und zieht die jetzt stromlos gewordene Nadel heraus. Es soll dabei ohne Blasenentwicklung ein annähernd 2 mm im Durchmesser haltender weißer Fleck entstehen. Sind die Funkenstreckenelektroden zu weit voneinander entfernt, so bildet sich ein mehr gelblichweißes bis bräunliches Koagulat um die Nadel, welches häufig einen kleineren Durchmesser als 2 mm hat. Denn der geänderte Strom erzeugt eine Art Schorf, der Gewebeeränderungen in einem größeren Umfange verhindert. Auch kann dann im Bereiche dieser Koagulate eine deutliche Prominenz entstehen mit aufgeworfenen Rändern, da es bei dieser Stromart zu unerwünschter Funkenbildung kommen kann. Ja, es können dabei auch Blasen im Gewebe entstehen. Ist die Entfernung der Funkenstreckenelektroden zu kurz, so bleibt die Trübung der Hornhaut an der Stichstelle sehr klein. Die Distanz der Funkenstreckenelektroden muß so lang variiert werden, bis bei Verwendung eines Stromes von ungefähr 40 Milliampere der eben geschilderte Erfolg eintritt: d. h. ein gleichmäßig bläulichweißer Fleck in der Hornhaut des Schweinsauges entsteht.

Bei längerem Gebrauch des Apparates ändert sich infolge Abbrand die Distanz der Funkenstreckenelektroden und damit die Erzeugung eines optimal wirkenden Stromes. Man erkennt dies an der Änderung der Größe und auch des Aussehens der mit diesem Strom erzeugten Herde. Es ist dann notwendig, die Funkenstrecke neu einzustellen. An Stelle von Apparaten, die mit Funkenstrecken arbeiten, kann man auch Röhrenapparate verwenden. Sie arbeiten wesentlich gleichmäßiger und liefern, solange die Röhre funktioniert, immer dieselbe Stromqualität, weil die Fehlerquellen der Löschfunkenstrecke wegfallen.

An den aktiven Pol des Apparates wird ein aus auskochbarem Material bestehender isolierter Handgriff angeschlossen, der eine für den Finger zu betätigende Auslösevorrichtung trägt. Als nichtaktive Elektrode wird, wenn man nicht einpolige Apparate gebraucht, eine Bleiplatte verwendet, die an dem Kranken in der Gegend des Kreuzbeines oder am Schenkel befestigt wird, nachdem dort die Haut mit etwas flüssiger Seife befeuchtet wurde.

### Der Eingriff.

**Anzeigen.** Frische, sogenannte idiopathische Abhebungen der Netzhaut, besonders bei Myopie, Glaskörpererkrankungen aus anderen Gründen, oder infolge spontaner Lückenbildung der Netzhaut. Je älter die Abhebung, um so schlechter die Aussicht auf ihre Beeinflussung durch den Eingriff.

**Gegenanzeigen.** Abhebungen bei exsudativer Chorioiditis, bei Neuroretinitis albuminurica, bei ausgedehnter Retinitis proliferans; hohes Alter, besonders wenn allgemeine Zirkulationsstörungen oder andere schwere Erkrankungen (Nieren-, Herzleiden, dekompensierter hoher Blutdruck u. dgl.) bestehen.

#### *Vorbereitung des Kranken zum Eingriff.*

**1. Vorbereitung allgemeiner Natur.** Digitalis bei kreislaufgeschwächten Leuten, Expectorantien bei chronischer Erkrankung der Atemwege, mögliche Entzuckerung bei Diabetes. Anlegen eines Zinkleimverbandes bei Varicen.

Schon vor dem Eingriffe soll durch 24 Stunden die Haltung im Bett eingenommen werden, wie sie nach dem Eingriff zu sein hat. Auch die Lochbrille wird schon vor dem Eingriff getragen.

**2. Vorbereitungen am Auge.** Die Lider und die angrenzende Lidhaut werden zuerst mit Benzin gereinigt und dann mit neutraler Augenseife gewaschen. Der Conjunctivalsack wird mit steriler Kochsalzlösung ausgespült und hierauf die Haut der Lider getrocknet. Das Abschneiden der Wimpern oder Rasieren der Augenbrauen ist überflüssig. Das Gesicht wird mit einem trockenen sterilen Tuch bedeckt, das den Augen entsprechend ausgeschnitten ist und unter das ein Drahtgestell geschoben wird, so daß eine freie Atmung durch Mund und Nase möglich bleibt. Die Ränder der Tuchöffnung werden mit Mastisol an die Haut geklebt, so zwar, daß der Mastisolstrich vom Nasenrücken über den Nasenflügel und die Wange ungefähr 1 cm temporal vom Canthus externus knapp über der Augenbraue zur Nasenwurzel geführt wird.

**3. Örtliche Betäubung.** Bei Verwendung von Cocain zum Einträufeln ist Feuchthaltung der Hornhaut mit physiologischer Kochsalzlösung zur Vermeidung von Hornhauttrübungen strengstens zu beobachten. Zu den Einspritzungen wird 2%ige Novocainlösung verwendet mit Adrenalin- oder Corbasilzusatz, letzteres besonders bei Kreislaufkranken und auch bei älteren Kranken empfehlenswert. Die Lösung wird unter die Bindehaut und insbesondere entlang den das Eingriffsgebiet begrenzenden Muskeln nach rückwärts eingespritzt. Bei Rissen in der unteren Hälfte leistet die Einspritzung um das Ganglion ciliare wertvolle Dienste. Vor der Kanthotomie wird die Lösung vom Bindehautsack aus in die Gegend des äußeren Lidwinkels eingespritzt. Die Blutung wird durch je 1 Klemme für das obere und untere Lid zum Stehen gebracht.

#### *Vorbereitung des Eingriffsgebietes.*

1. Nur bei kleinen, weit vorne gelegenen Rissen kann von einer Kanthotomie Abstand genommen und mit einer Akinese das Auslangen gefunden werden. Meist ist eine Kanthotomie nicht zu umgehen.

2. Der Meridian des Risses wird an der Hornhaut gekennzeichnet, indem mit der Elektrokoagulationsnadel am Limbus ein kleiner weißer Schorf erzeugt wird; er heilt in wenigen Tagen ab.

3. Bloßlegen der Lederhaut. Durchtrennung der Bindehaut ungefähr 8 mm vom Limbus entfernt, diesem parallel. Bei Eingriffen in der inneren Augenhälfte Durchtrennung der Bindehaut ungefähr 1—2 mm limbuswärts von der halbmondförmigen Falte. Nach Ablösung der Bindehaut wird die TENONsche Kapsel zwischen 2 geraden Augenmuskeln durchtrennt und damit die Lederhaut bloßgelegt. Durch die Ansatzstellen der beiden Augenmuskeln, die mit Schielhaken aufgesucht worden sind, wird je 1 Haltefaden gelegt, mit denen man das Auge leicht nach allen gewünschten Richtungen wenden kann. Jede dieser Zügelnähte wird an einer Klemme befestigt. Auch die freigemachte Bindehaut mit der TENONschen Kapsel wird in Nahtschlingen gefaßt und an die Klemmen gehängt, um so alles Gewebe zur Seite und das Eingriffsgebiet entblößt zu halten.

4. Über die Durchschneidung von Muskeln. Muß ein Muskel durchtrennt werden, um das Eingriffsgebiet genügend freizulegen, so muß früher eine Naht

durch ihn gelegt werden. Es wird dabei das umliegende Gewebe mitgefaßt. Dadurch ist die Naht fester verankert, und das Gewebe wird mit ihr leichter abgehalten. Der Faden wird von rückwärts nahe dem Rand durch den Muskel durchgeführt und in einiger Entfernung von dieser Stelle nahe dem anderen Muskelrande von vorne nach hinten. Die Nahtschlinge wird in eine Klemme gefaßt. Der Muskel wird an seinem Ansatz durchtrennt. Durch den Ansatz des Muskels führt man nun eine 2. Naht in der Weise, daß man von rückwärts her die Nadel in der Richtung der durchtrennten Muskelfasern an der Ansatzleiste des Muskels durch die oberflächlichen Skleraschichten sticht und dann von vorne her etwas näher dem anderen Ende des Muskelansatzes die Naht in der entgegengesetzten Richtung durch die Sklera führt (Abb. 234). Nach Beendigung der Operation wird die Naht durch den Muskel und die durch seinen Ansatzpunkt gelegte miteinander verknüpft und so der Muskel wieder mit seinem Ansatzpunkte vereinigt. Die Naht durch den Ansatz hat den Vorteil, daß die Wiedervereinigung des Muskels mit der Sklera ohne Verkürzung des Muskels erfolgt, wodurch Doppeltsehen nach dem Eingriffe vermieden wird. Man trachte jedoch, wenn möglich, ohne Durchtrennung eines Muskels auszukommen. Der Heilungsverlauf ist dann viel reizloser. Sehr häufig ist dies zu erreichen, indem man den Muskel, anstatt ihn zu durchtrennen, von der Lederhaut so weit abhebt, daß unter ihm operiert werden kann. Man führt zu diesem Zwecke eine Fadenschlinge unter den Muskel nahe seinem Ansatzpunkte und hebt den Muskel mit Hilfe des Fadens und eines isolierten Hakens aus Elfenbein oder Glas genügend weit von der Lederhaut ab (Abb. 237). Niemals sollen 2 benachbarte gerade Augenmuskeln gleichzeitig durchschnitten werden, da dabei die die Arteriae ciliares anteriores versorgenden Muskeläste im Bereiche des halben Augapfelumfangs zum Opfer fallen. Dadurch kann die Ernährung der Hornhaut schweren Schaden nehmen. In Fällen, wo so ausgedehnte Eingriffe notwendig sind, durchschneide man den Muskel, dessen Ablösung das Eingriffsgebiet am besten freilegt.

Es ist niemals nötig, den Ansatz eines der schrägen Augenmuskeln gänzlich zu durchtrennen, aber manchmal vorteilhaft, die Sehne am Ansatz teilweise einzuschneiden. Dies kann getan werden, ohne daß dadurch Doppelbilder auftreten.

5. Achtung auf die Vortexvenen. Die Lederhaut wird von anhaftenden Bindegewebefasern gereinigt. Dabei ist auf Vortexvenen besonders zu achten. Werden sie verletzt, so gibt es heftige und störende Blutungen. Durch Gazetupfer muß das Blut vom Eingriffsgebiete abgehalten werden. Verschorfung zur Stillung der Blutung ist zu widerraten, weil es dadurch in das Augeninnere hinein bluten könnte. Nur kleine Gefäßchen dürfen mit der Hochfrequenznadel oder einer heißen Knopfsonde verschlossen werden.

6. Ortsbestimmung der Reißstellen an der Außenfläche der Lederhaut mit dem Augenspiegel, wie früher beschrieben.

Für das Spiegeln im umgekehrten Bilde verwende man einen auskochbaren Spiegel und eine ausgekochte + 16 bis + 20 Dioptrien starke Linse. Man bringt den Reiß in die Mitte des Gesichtsfeldes, und der Gehilfe vermerkt die Stelle des Lichtdurchtrittes mit Gentravianviolett oder chinesischer Tusche. Es ist zweckmäßig, die Bindehaut und TENONsche Kapsel dabei durch einen Metallspatel oder

den Metallöffel nach ARRUGA abhalten zu lassen, da die spiegelnden Flächen des Metalls das Auffinden des Lichtreflexes erleichtern. In einem Teile der Fälle kann der Riß leichter im aufrechten Bilde bestimmt werden. Der elektrische Spiegel soll dazu besonders lichtstark sein.

Ist diese Art der Ortsbestimmung aus irgendwelchem Grunde nicht möglich, so tritt das messende Verfahren an seine Stelle. Mit dem Zirkel und einem kleinen Maßstab wird die zum Knotenpunktswinkel gehörende Sehnenlänge abgemessen. Der Winkel muß schon vor dem Eingriffe bestimmt worden sein. Dadurch ergibt sich die Lage des Risses im entsprechenden Meridian. Daher wurde dieser auch schon vor dem Eingriffe angezeichnet. Die Stelle wird mit der Diathermienadel unter ganz schwachem Strom bezeichnet. Es entsteht ein bräunliches Fleckchen.

#### 7. Stichelung der Lederhaut mit Hilfe der Hochfrequenznadel.

##### a) Mit der Einzelnadel.

Aus rostfreiem Stahle verfertigt, sitzt die Nadel als kurzer Dorn rechtwinklig einem allseits isolierten Schaft auf. Auch die Basis, wo der Dorn sitzt, muß gut isoliert sein (Abb. 230, *a*, *b*, *c*). Die Nadeln sind in verschiedenen Längen von 0,5 mm




Abb. 230. *a* dornförmig aufsitzende Nadel; *b* gerade und *c* gekrümmte Nadel für Diathermie und Elektrolyse; *d* und *e* zwei- bzw. einzinkige Steckeletrode nach SAFAR; *f* isolierte Pinzette.

bis zu 2,5 mm und einer Dicke von ungefähr 0,05—0,1 mm vorrätig und werden am besten trocken sterilisiert. Nach mehrmaligem Eingehen in das Augennere haften nicht selten koagulierte Gewebeteile an der Nadel. Sie können leicht mit einer Hakenpinzette entfernt werden. Die Nadeln werden nach der Operation mit Wasser und Alkohol gewaschen, getrocknet und dann trocken sterilisiert. Sie werden bis zum nächsten Eingriff vorrätig gehalten. Die Nadel für die erste Punktion ist 1,5 mm lang. Sie soll stromlos an der dem Netzhautriß entsprechenden Stelle der Lederhaut aufgesetzt werden (Abb. 231), dann erst wird der Strom geschlossen und die Nadel zart ins Auge gedrückt. Der Druck sei so schwach, daß ohne Stromschluß ein Eindringen der Nadel in die Lederhaut nicht erfolgt. Erst Strom und Fingerdruck zusammen sollen der Nadel das Eindringen ermöglichen. Die Nadel bleibt mit geschlossenem Strom ungefähr 1 Sekunde im Augennern, dann wird der Strom unterbrochen und die Nadel stromlos herausgezogen. In der Regel fließt jetzt nur wenig subretinale Flüssigkeit ab. Nach der Punktion wird mit dem Augenspiegel untersucht, in welchem Verhältnisse

der erzeugte Herd zum Riß liegt. Die Punktionsstelle ist ein leicht unscharf begrenzter, annähernd  $\frac{1}{3}$  Papillendurchmesser großer, runder, weißlicher Herd, in dessen Mitte gelegentlich ein kleiner rötlichbrauner Punkt erscheint. War der Riß fehlerlos bestimmt worden, so liegt der Herd am Risse oder in seiner nächsten Nähe. Nicht selten ist aber in der näheren Umgebung des Risses kein Koagulat zu sehen; dann ist entweder die Punktion weit entfernt vom Risse gesetzt worden, oder aber die Punktionsstelle ist mit dem Augenspiegel nicht erkennbar. Ist also keine Koagulationsstelle in der Umgebung des Risses zu sehen, so ist zuerst der ganze Quadrant des Augenhintergrundes genauestens zu untersuchen, da möglicherweise die Ortsbestimmung aus irgendeinem der




Abb. 231. Durchbohrende Stichelung mit der Einzelnadel. Die Rißstelle ist durch einen Tuschpunkt markiert, ebenso der Meridian des Risses am Limbus kenntlich gemacht.

mäßig ist es, sich diese jedem Augenarzt geläufigen Verhältnisse im gegebenen Augenblicke ins Gedächtnis zu rufen, da man während des Eingriffes nicht selten im Zweifel über die Richtung ist, in der man die Nadel wandern lassen soll. Verwendet man das aufrechte Bild, so hat die Verlagerung der Punktion in derselben Richtung zu geschehen, wie es der Spiegel zeigt.

Wenn die hochabgehobene Netzhaut durchsichtig ist, kann man die Verfärbung durch die Elektrode nur am Pigmentepithel sehen, ohne daß die Netzhaut verändert wurde. Man ist sich auch dann über die Lagebeziehung der Punktion zum Risse im klaren und kann die nächsten Punktionen in gleicher Weise rißwärts verlegen.

Es gibt nun Fälle, bei denen trotz guter Koagulation, was aus dem Ausschlage des Amperemeters und der leichten Verfärbung der Sklera an der Stichstelle erkannt werden kann, und trotz einwandfreier Rißbestimmung ein Koagulat weder in der Nähe des Risses noch sonst im Augenhintergrunde zu entdecken ist, weil es durch die trübe, hochabgehobene Netzhaut nicht gesehen werden kann. Meist sickert durch die 1. Stichstelle genügend subretinale Flüssigkeit ab, so daß dann die 2. Punktion bei flacher gewordener Abhebung einen sichtbaren Herd erzeugt. War dies aber nicht der Fall, so versuche man durch mehrere

vorher auseinandergesetzten Gründe falsch war. Ist das Koagulat sehr weit vom Risse entfernt, so verlagert man die Stelle der 2. Punktion entsprechend dem ophthalmoskopischen Befunde in der Weise rißwärts, daß man die Distanz zwischen Koagulat und Riß in Papillendurchmessern abschätzt und für den Papillendurchmesser ungefähr  $1\frac{1}{2}$  mm rechnet. Meist gelingt es dabei, schon mit der nächsten Punktion in unmittelbare Nähe des Risses zu gelangen.

Man vergesse dabei niemals, daß ein im umgekehrten Bilde peripher vom Rißrand erscheinendes Koagulat in Wirklichkeit zentral vom Rißrand liegt und umgekehrt. So banal diese Bemerkung klingen mag, so zweck-

kurz dauernde Durchbohrungen der Lederhaut mit der Nadel mehr subretinale Flüssigkeit zum Abfließen zu bringen, um eine bessere Abflachung der Netzhaut zu erzielen. Gelegentlich versagt auch dies; dann muß man sich entschließen, eine längere Nadel bis zu 2,5 mm Länge zu verwenden, mit der meist die Netzhaut erreicht wird.

Ist damit ein sichtbarer Herd erzielt worden, so greife man für die weiteren Stichelungen wieder zu kürzeren Nadeln. Denn nunmehr ist die Lage genügend gekennzeichnet, und weitere Herde werden infolge Verlustes subretinaler Flüssigkeit schon bei Verwendung kürzerer Nadeln sichtbar. Die Netzhaut soll ja nur erreicht, aber nicht durchbohrt werden. In seltenen Fällen, besonders bei sehr trüber, hochabgehobener Netzhaut sind auch jetzt keine Koagulate zu sehen. Dann muß die Stelle des Risses und ihre Umgebung mit Stichelungen besät werden, ohne daß man mit dem Augenspiegel den unmittelbaren Erfolg überprüfen kann.

Ist der Netzhautriß sichtbar, so wird er unter ständiger Überprüfung mit dem Augenspiegel mit Koagulaten umgrenzt (Abb. 233). Besonders wichtig ist es dabei, den Teil des Rißrandes, der bei bogen- und hufeisenförmigen Defekten meist deckelförmig gegen den Glaskörper zu gerichtet ist, gut und ausgiebig mit Koagulaten zu versehen. Wenn nur *ein* Riß vorhanden war, so genügt es, ihn zu umgrenzen. Sind mehrere Risse zu verschließen, so kann man mit den dünnen und scharfen Nadeln, trotz des Abflusses der subretinalen Flüssigkeit, leicht auch diese umgrenzen.

Finden sich mehrere Risse in einem grauweißlich verfärbten Netzhautareal, das gelegentlich von weißen Linien netzförmig durchzogen sein kann (schleißiger Zustand der Netzhaut) oder kleine an Vakuolen erinnernde Gebilde erkennen läßt, so muß das ganze veränderte Gebiet durch zahlreiche Einstiche mit kleinen runden Herden besät werden. Diese

Koagulationszonen sind bis zur Ora serrata zu führen, da derartige Entartungszonen in der Regel bis zur Ora serrata reichen. Diese kann im allgemeinen 8 mm hinter dem Limbus angenommen werden. Sie ist nasal entsprechend dem hier kürzeren Ciliarkörper näher dem Limbus als an der temporalen Seite. Da hinter dem Ansätze der Augenmuskeln die Sklera bis auf 0,3 mm verdünnt sein kann, muß man für diese Stellen die Nadellänge auf 0,5—1 mm verkürzen.

Große Abrisse der Netzhaut an der Ora serrata werden in ganz gleicher Weise operiert, indem man sich zuerst den Rand der abgerissenen Netzhaut, dann das



Abb. 232. Riß vor der Operation.



Abb. 233. Netzhautriß unmittelbar nach guter Umgrenzung durch Punktionen.

obere und untere bzw. temporale oder nasale Ende des Abrisses an die Außenfläche der Lederhaut projiziert und hierauf die erste Punktion am hinteren Reißrand anzubringen trachtet. Hat man ihn getroffen, was mit dem Augenspiegel feststellbar ist, so wird von dort beginnend, der ganze Rand der abgerissenen Netzhaut bis zu den Enden des Risses mit kleinen runden Koagulaten besät. Außerdem soll noch von dieser Zone bis zur Ora serrata das ganze durch die erste Punktion nicht abgegrenzte Gebiet bis zur Höhe der Ora serrata mit durchbohrenden Einzelpunktionen bedeckt werden.

Nachdem man sich mit dem Augenspiegel vergewissert hat, daß die Reißgegend, ganz gleichgültig bei welcher Art von Rissen, gut mit Herden umgrenzt ist, kann man die Sklera noch an ihrer Außenfläche koagulieren: dies ist besonders wichtig in Fällen mit großen Rissen oder dort, wo ausgedehnte Gebiete der Netzhaut degeneriert sind. Auch an der Stelle, die dem aufgestellten oft weit in den Glaskörperaum hineinragenden Rand eines großen Risses entspricht, soll die Lederhaut noch allein koaguliert werden. In Fällen mit einem oder auch mehreren nahe beieinander liegenden Löchern bei flach abgehobener Netzhaut genügt die durchbohrende Koagulation.

Die Koagulation der Sklera wird in der Weise durchgeführt, daß man eine kurze, ungefähr 1 mm lange Nadel schräg in die Sklera und nur in diese in Abständen von 2—3 mm einbohrt und den Strom 1—2 Sekunden einwirken läßt. Auch hier genügt es, wenn der Ausschlag am Amperemeter nicht mehr als 40 Milliampere beträgt. Man sieht an der so behandelten Stelle eine leichte Schrumpfung der Lederhaut, so daß benachbarte Punktionsstellen einander genähert werden. Da dies im ganzen Bereich des Eingriffes durchgeführt wird, so erscheint dann dort die Sklera leicht eingezogen. Das Durchsickern subretinaler Flüssigkeit wird dadurch etwas verringert, aber nicht ganz unterbrochen. Schließlich wird mit dem Augenspiegel der Erfolg des Eingriffes überprüft.

**Wundversorgung.** Die Nähte der durchschnittenen Muskel werden geknüpft und die Bindehautwunde sorgfältig mit dünnen Seidennähten verschlossen. Die Muskelnähte lasse man zwischen zwei Knopfnähten durch die Bindehaut vorragen, da diese Maßnahme die Entfernung der Muskelnähte sehr erleichtert, falls man nicht Catgutfäden verwendet. Will man eine fortlaufende Naht anlegen, so beginne man mit ihr nahe dem Ansätze des durchschnittenen Muskels, damit die Muskelnähte, wenn sie aus Seide sind, nicht versenkt werden müssen. Auch die Kanthotomiewunde wird durch eine Naht verschlossen. In den Bindehautsack wird eine 1%ige Atropinsalbe eingestrichen und das Auge mit Gaze, Watte und einer SNELLENSCHEN Schale verbunden. Auch das andere Auge wird mit Gaze, Watte und einer SNELLENSCHEN Schale verschlossen.

#### b) Mit Stecke Elektroden.

Ausgehend von der Befürchtung, die unmittelbare Berührung der Netzhaut mit der Diathermienadel könnte, besonders wenn sie zu lange ist, die zarte Membran zerstören und in ihr ein Loch erzeugen, wodurch nicht nur die Heilung der Krankheit verhindert, sondern noch neue Ursachen für das Entstehen einer Ablösung hinzugefügt würden, hat ŠAFÁŘ ein Verfahren angegeben, welches eine Koagulation der Netzhaut selbst nach Tunlichkeit vermeiden soll. Es wird angestrebt, in der Aderhaut allein die Herde der künstlich erzeugten Chorioiditis

hervorzurufen. Auf diese Weise verklebt nach Abfluß der subretinalen Flüssigkeit die Netzhaut mit ihrer Unterlage und der Riß wird dadurch verschlossen.

**Verfahren.** Nach Freilegung der Lederhaut wird die Lage der Rißstelle an der Außenfläche der Lederhaut bestimmt. Hierauf durchsticht man dort die Lederhaut mit Elektroden, die in ihr stecken gelassen werden. Diese „Steckelektroden“ sind 0,1—0,2 mm dicke, 1,8 mm lange Nadeln, die dornförmig einzeln oder zu zweit auf einer mit einem Kunstharzplättchen isolierten kleinen Metallplatte aufsitzen. Die Metallplatte selbst ist ebenfalls allseits mit Isolierlack überzogen und trägt auf der den Nadeln gegenüberliegenden Fläche einen blanken, vierkantigen kurzen Metallstift (Abb. 230 *d, e*). Die Elektroden werden mit einer von ŠAFÁŘ angegebenen Pinzette (Abb. 230 *f*) gefaßt, die so isoliert ist, daß der Strom nur am Kreuzungspunkte ihrer Branchen, sowie an ihrem oberen Ende eintreten kann. Das Ende der Pinzette, mit dem die Kontaktstifte der Elektroden gefaßt werden, ist blank; hier kann der Strom wieder austreten. Die Steckelektroden hat man trocken sterilisiert in einer sterilen Korkscheibe stecken. Die aktive Elektrode des Hochfrequenzapparates hat ein kugelförmiges Ende. Man faßt nun mit der isolierten Pinzette die Steckelektrode am Kontaktstift, setzt sie auf die Lederhaut und führt mit der anderen Hand die aktive Elektrode des Hochfrequenzapparates an einen blanken Teil der Pinzette oder an den Kontaktstift selbst. Dann schließt




Abb. 234. Setzen von Steckelektroden. Auch hier ist die Rißstelle in der Sklera durch einen Tuschpunkt kenntlich gemacht, ebenso der Rißmeridian am Limbus.

man den Strom mittels des im Handgriff befindlichen Knopfes und drückt zart die Elektrode mit der Pinzette bei geschlossenem Strom in die Sklera (Abb. 234). Nach Öffnen des Stromes entfernt man die Kugelelektrode und die Pinzette. Die Steckelektrode beläßt man in der Sklera; ihre Nadeln sollen zur Gänze in der Lederhaut stecken. Der Druck, mit der man sie in die Sklera einsticht, soll ebenfalls so gering sein, daß er allein ohne Strom nicht genügt, die Nadeln in die Lederhaut einzubohren. Es soll auch hier Strom und Druck zusammen das Eindringen der Elektroden ermöglichen. Werden einzinkige Steckelektroden verwendet, so soll das Amperemeter wie bei Verwendung einer einzinkigen Nadel höchstens einen Ausschlag von 30—40 Milliampere zeigen. Bei zweizinkigen Elektroden kann man die Stromstärke auf 50—60 Milliampere steigern. Mit diesen Steckelektroden umgrenzt man nun die Gegend des Risses und trachtet auch innerhalb des so umgrenzten Gebietes seiner Größe entsprechend ein- oder zweizinkige Elektroden in die Sklera zu stecken. Hat man ein großes Gebiet zu umgrenzen, das an der Ora serrata beginnt und bogenförmig umgrenzt zur Ora serrata an einer anderen Stelle reicht, so setze man zuerst an der bogen-

förmigen Grenze des zu behandelnden Gebietes eine Elektrode neben der anderen so, daß sie die ganze zu behandelnde Stelle umsäumen. Man trachte dabei, die Elektroden hinter den rückwärtigen Rißrand zu setzen; innerhalb des so umgrenzten Gebietes werden jetzt ebenfalls Steckeletroden gesetzt. Ist dann die Rißgegend oder das zu behandelnde Gebiet mit Steckeletroden bedeckt, so werden sie einzeln mit der Pinzette herausgezogen, wobei man mit den obensitzenden beginnen soll. Es fließt in der Regel mit der Entfernung der Steckeletroden reichlich subretinale Flüssigkeit ab. Jetzt überprüfe man mit dem Augenspiegel das Ergebnis des Eingriffes. Ist der Sitz der Koagulate gut und sind sie in entsprechender Menge vorhanden, so schließe man noch eine Koagulation der Sklera an. Sind zu wenige Koagulate gesetzt oder gar die Koagulate nicht im Rißgebiete, was wegen der mangelnden Spiegelkontrolle während des Einbringens der Steckeletroden möglich ist, so muß man jetzt an den betreffenden Stellen mit einer einzinkigen Nadel nachhelfen. Man nehme dazu eine 1,5 mm lange, scharfe Nadel. Es ist nun nicht selten, daß die jetzt mit der Nadel gesetzten Stichelungen keine ophthalmoskopisch sichtbaren Herde erzeugen, da im Bereiche der Herde, die durch die Steckeletroden erzeugt werden, die Sklera aufgequollen sein kann und dann die Nadel nicht tief genug eindringt. Man muß dann zu längeren, 1,8 mm bis 2 mm langen Nadeln greifen, mit deren Hilfe man dann das gewünschte Ergebnis erzielen kann. Sind genügend Herde gesetzt, so wird jetzt ebenfalls eine 1 mm lange Nadel im Operationsgebiet mehrmals schräg in die Sklera gebohrt und der Strom 1—2 Sekunden einwirken gelassen. Obwohl allem Anscheine nach bei dem jetzt beschriebenen Vorgehen eine Durchtrennung eines Augenmuskels öfters nötig wird als bei Verwendung einer einzinkigen Nadel, so gelingt doch in einer großen Anzahl der Fälle bei entsprechender Erfahrung durch zur Seitenschieben der Muskeln mit Haltefäden und isolierten Schielhaken nicht selten an den Stellen der Lederhaut Steckeletroden anzubringen, die sonst vom Muskel bedeckt sind.

Das Setzen der Steckeletroden kann im rückwärtigen Abschnitt bei tiefer Lage des Eingriffsgebietes unmöglich werden. Gelegentlich fallen sie auch vorzeitig aus der Lederhaut. Der Eingriff wird dann mit der Einzelnadel zu Ende geführt.

Eine durch den durchtrennten Muskel gelegte Nahtschlinge wird hierauf geknüpft und die Bindehautwunde durch Nähte verschlossen.

**Nachbehandlung.** Der Kranke wird so ins Bett gelegt, daß das Eingriffsgebiet nach Tunlichkeit die tiefste Stelle des Auges wird. Es wird also bei Eingriffen in der unteren Hälfte des Auges der Kopf mit einer Rückenlehne etwas gehoben gehalten, bei Eingriffen in der linken Hälfte liegt der Kranke auf der linken Seite, bei solchen in der rechten Hälfte auf der rechten Seite und bei Eingriffen in der oberen Hälfte hält er den Kopf gerade und die Fußenden des Bettes werden erhöht. Am nächsten Tag wird der Verband gewechselt und Atropinsalbe in das Auge gestrichen, und zwar auch weiterhin, da die Pupille dauernd erweitert gehalten zu werden hat. Gegen den Wundschmerz, der in der Regel zwar nur wenige Stunden dauert, aber ziemlich heftig werden kann, sowie gegen den Brechreiz, der sich besonders nach Muskeldurchschneidungen einstellt, werden die dafür auch sonst in Verwendung stehenden Medikamente, und zwar am besten in Zäpfchenform verwendet. Für die 1. Nacht Schlafmittel, wenn nicht aus inneren Gründen zu vermeiden. Bleibt wie gewöhnlich

die Absonderung gering, so genügt Verbandwechsel an jedem 2. Tage. Sonst täglich, um einem Hautekzem vorzubeugen. Wurde nahe der Ora serrata gestichelt, so ist die Iris manchmal stark gereizt. Der Augenhintergrund wird 3—4 Tage nach dem Eingriffe das erstmal untersucht, wobei man sich begnügt festzustellen, ob man von allen Seiten rotes Licht erhält und der Glaskörper nicht etwa sehr trüb geworden ist. Die Kanthotomiennähte werden 2—3 Tage nach dem Eingriffe entfernt. Die Bindehautnähte können nach 8 Tagen leicht herausgezogen werden, die Muskelnähte nach 2—3 Wochen. Damit schwindet auch die letzte Absonderung, die durch Borwasserumschläge und Einträufeln von Zinklösung gut beeinflußt werden kann. 12—14 Tage nach dem Eingriffe wird der Verband durch eine Lochbrille ersetzt. Nach 3 Wochen wird durch Unterschieben von Pölstern der Kranke im Bette allmählich zum Sitzen gebracht, bis er schließlich in einen Lehnstuhl gesetzt wird. Allmählich darf er dann auch herumgehen, so daß er 4 Wochen nach dem Eingriffe das Krankenhaus verlassen kann. Diese Zeiten können bei glattem Wundverlaufe, besonders wenn der Riß unten gelegen war, kürzer gestaltet werden, so daß der Kranke schon nach 2 Wochen aufstehen kann. Daß man bei älteren Leuten durch wiederholtes tiefes Atmenlassen für bessere Durchlüftung der Lunge zu sorgen hat, ist selbstverständlich. Wir haben übrigens von dem Umstande, daß der Kranke wegen drohender Lungenentzündung manchmal schon am 2. Tage nach dem Eingriffe aufstehen und im Zimmer herumgeführt werden mußte, nicht mit Sicherheit einen Schaden erwachsen sehen. Heraufziehen der Beine an den Bauch und Wiederausrecken, Bewegungen im Sprunggelenk, Krümmen der Zehen usw. sollen Thrombosen in den Venen der unteren Gliedmaßen verhüten. Der Körper kann mit lauwarmem Wasser und Franzbranntwein täglich abgerieben werden.

**Verwicklungen während des Eingriffes.** Während kleine Blutaustritte nicht selten sind, gehören stärkere Blutungen zu den Ausnahmen (Zuckerkrankte, erhöhter Druck). Daß dadurch der Eingriff wegen der Schwierigkeit des Augenspiegels außerordentlich gestört wird, ist selbstverständlich. Wie wichtig es ist, die Vortexvenen nicht zu verletzen, wurde schon früher erwähnt. Andere Zwischenfälle kommen während dieses Eingriffes nicht vor.

**Störungen im Heilverlaufe.** a) So häufig leichte Reizzustände der Iris sind, so selten sind schwere Formen von Iritis. Aber besonders bei ausgedehnten Eingriffen, die die Hälfte oder drei Viertel des Augapfelumfanges betreffen, kommt es wohl manchmal zu Iritis mit gelatinösem Exsudat in der vorderen Kammer. Unter Atropin und parenteralen Eiweißgaben heilt sie in wenigen Tagen. Die Ursache dürfte darin liegen, daß bei den Stichelungen der flache Teil des Ciliarkörpers mitbetroffen worden ist.

b) Eine echte postoperative Iridocyclitis — wie sie nach Eingriffen im vorderen Augenabschnitt gar nicht so selten ist — haben wir bisher nicht beobachtet, ebensowenig eine sympathische Ophthalmie.

c) Akute Hypotonie kommt gelegentlich vor: Starke Reizung des Auges, sehr tiefe Kammer, Linsenschlottern. Sie ist eine ungünstige Erscheinung, teilweise hervorgerufen durch zu starke Fistulation; sie kann aber auch der Ausdruck einer Iritis sein. Im letzten Falle helfen Eiweißspritzungen, Wärme und Atropin, gelegentlich schlagartig.

Über den Befund im Augenhintergrunde nach dem Eingriffe. Die Stichelherde werden allmählich schärfer umschrieben, Blutungen sind oft noch durch einige Wochen zu sehen, die Abhebung flacht sich allmählich ab. Pigmentflecke treten von ungefähr dem 10. Tage



Abb. 235. Umschriebene Narbe nach diathermischer Operation.

nach dem Eingriffe auf. 3—4 Wochen später sind die Stichelherde scharf begrenzt, mit leicht gelbem Farbton und zahlreichen scharf begrenzten Pigmentflecken in ihrer Umgebung. Waren die Stichelstellen sehr nahe beisammen, so entsteht im Gebiete des Eingriffes eine flächenhafte, gelblichweiße schwarz gefleckte Narbe: ein sehr vorteilhafter Zustand (Abb. 235). Starke Glaskörpertrübungen unmittelbar nach dem Eingriffe verringern die Heilungsaussichten, aber trotzdem kann sich die Netzhaut anlegen und nach Aufsaugung der Trübungen klarer Einblick möglich sein.

**Erfolglosigkeit des Eingriffes.** Ist nach 10 Tagen die Netzhaut noch deutlich abgehoben und sind in ihr gar noch Risse sichtbar, so ist an dem Mißlingen nicht mehr zu zweifeln. Doch ist zu bemerken, daß nicht selten die Netzhaut im Eingriffsgebiete noch lange Zeit etwas ödematös bleibt und daher grau getrübt und etwas vorgewölbt erscheint, ein Zustand, der einer flachen Abhebung sehr ähnlich sieht.

## B. Der Eingriff unter Verwendung des galvanischen Stromes (Katholyse).

**Allgemeine Vorbemerkungen.** Verwendet wird die Kathode. Die Anode wird in Form eines feuchten Tuches um eine biegsame Metallplatte gelegt und unter den Nacken des Patienten geschoben. Die Kathodennadeln sind entweder rechtwinkelig abgebogen oder sie sitzen dornförmig dem Schaft auf. Man hat Nadeln von  $1\frac{1}{2}$ —2 mm Länge und 0,2 mm Dicke. Wenn sie rechtwinkelig abgebogen sind, sollen sie an der Umbiegungsstelle  $\frac{1}{2}$  mm dick sein, damit sie nicht etwa abbrechen (Abb. 230 a, b, c). Sie haben isoliert zu sein, wie bei der Hochfrequenznadel beschrieben und werden ebenfalls trocken sterilisiert. Die Nadel wird an der Kathode mit einem Handgriff befestigt, der einen Knopf zum Schließen des Stromes trägt. Es wird ein Strom von 1—3 Milliampere durch 1—2 Sekunden einwirken gelassen, dann wird der Strom unterbrochen und die nun stromlos gewordene Nadel herausgezogen. Die Stellen der Nadelstiche müssen, da sie keine Spuren hinterlassen, jedesmal mit Farbstoff kenntlich gemacht werden, um sie nach Beobachtung des Augenhintergrundes mit dem Spiegel wieder finden zu können.

**Vorbereitung und örtliche Betäubung des Kranken.** Dieselbe wie früher.

### Der Eingriff.

**Anzeigen.** Kleine Löcher, besonders bei Entartungsvorgängen, bei flacher Abhebung. Bei Lochbildung in der Macula und ihrer Umgebung.

**Gegenanzeigen.** Sehr große Löcher mit aufgestellten Rändern bei hohen blasigen Abhebungen.

**Verfahren.** Bloßlegung der Lederhaut und Rißbestimmung wie vorher beschrieben. Nach der ersten Stichelung wird die Lage der Stichelstelle im Verhältnis zum Riß mit dem Augenspiegel festgestellt. Wird die Netzhaut von der Nadel erreicht, so wird sie etwas getrübt. Die Stelle selbst ist meist nicht sichtbar, denn Gasbläschen bedecken die Stelle des Eingriffes (Abb. 236). Wie im früheren Verfahren wird nunmehr weitergestichelt, bis der Rißrand erreicht ist. Jede Punktion ist an der Lederhaut anzumerken. Ist der Rißrand erreicht, so wird er mit Stichelungen umgrenzt. Dabei kann man den Strom auf 3—4 Milliampere steigern und auch die Nadel bis zu 2 Sekunden im Auge belassen. Auch bei Verwendung des galvanischen Stromes kann die Punktionsstelle unsichtbar bleiben, was vielleicht häufiger der Fall ist, wie bei Verwendung des Hochfrequenzstromes. Ist die Netzhaut nämlich hoch abgehoben und wird sie daher von der Nadel nicht erreicht, so ist, falls man nicht gerade die Stelle des Netzhautloches getroffen hat, der Bläschenschaum bei leicht getrübtter Netzhaut nicht sichtbar. Sehr oft gelingt es durch einige Punktionen mit der Nadel etwas subretinale Flüssigkeit abfließen zu lassen. Hat dies aber zu keinem Erfolg geführt, so versuche man mit langen (bis zu 4 mm) Nadeln die Netzhaut zu erreichen. Ist dies gelungen, so soll man die weiteren Punktionen wieder mit kurzen Nadeln durchführen, um die Möglichkeit einer artifiziellen Lochbildung in der Netzhaut zu vermeiden. Ist es nicht möglich gewesen, den Bläschenschaum aus den oben angeführten Gründen zu sehen, so verwende man zur Fortsetzung des Eingriffes den Hochfrequenzstrom.



Abb. 236. Wasserstoffbläschenschaum infolge Wirkung der Katholysennadel.

**Wundversorgung und Nachbehandlung.** Wie im früheren Verfahren.

**Ergebnisse. Vorteile und Nachteile des Verfahrens.** Die Narben sind zarter als die mit Hochfrequenzstrom erzeugten, die Schädigung der Netzhaut ist daher viel geringer. Die Nachteile bestehen gelegentlich in starken Blutungen aus durchstochenen Aderhautgefäßen und wegen der Zartheit der Narben in der Häufigkeit der Rückfälle. Die Zartheit der Narben ist besonders bei Verschuß von Löchern in der Maculagegend erwünscht. Die Heilungsziffern sind aber geringer als die des Hochfrequenzverfahrens.

### C. Verbindung von Elektrolyse und Hochfrequenzverfahren.

Sie wird benutzt, um den Bläschenschaum zur Ortung des Risses zu verwenden, während dieser selbst mit der Diathermienadel umgrenzt und verschlossen wird. Besonders bei Löchern in der Macula ist diese Verbindung beider Verfahren von großem Vorteil.

#### Das Vorgehen bei Löchern in der Macula und ihrer nächsten Umgebung.

Zur sicheren Diagnose kann das rotfreie Licht und, wie schon erwähnt, in erster Linie die Spaltlampe herbeigezogen werden. Wird dabei eine dünne

Membran entdeckt, welche den Defekt überbrückt, braucht die Stelle nicht angegangen zu werden. Besteht gleichzeitig auch ein peripheres Loch, so kann der Verschluß dieses genügen, um die Abhebung zum Verschwinden zu bringen, obwohl das Maculaloch offen blieb. Nur wenn der Verschluß des peripheren Loches keinen Erfolg hatte oder wenn das Loch in der Macula die einzige Öffnung in der Netzhaut ist, muß es durch den Eingriff verschlossen werden. Maculaloch und periphere Risse können in derselben Sitzung angegangen werden, das Maculaloch zuerst.

**Vorbereitung des Kranken und örtliche Betäubung.** Dieselbe wie bei den anderen Verfahren; außerdem Ganglionanästhesie.

### Der Eingriff.

Die ganze äußere Augenhälfte muß freigelegt werden. Zu diesem Zwecke wird nach Einschneidung des äußeren Lidwinkels der äußere Gerade von seinem Ansatz abgetrennt und durch den oberen und unteren Geraden wird nahe ihrem Ansatz eine Zügelnahht gelegt. Bindehaut und TENONSche Kapsel werden durch tieffassende Nähte an Klemmen befestigt, zur Seite gespannt und helfen durch ihre Straffung mit, den hinteren Augenabschnitt freizulegen. Da rückwärts die TENONSche Kapsel sehr dünn ist, ist besondere Vorsicht notwendig, sie nicht zu verletzen, da sonst das vorquellende Augenhöhlenfett stört. Das Auge wird mit Hilfe der Fäden nasenwärts gewendet und mit Scheere und Pinzette die Lederhaut vorsichtig bis zum hinteren Pol freigelegt. Der vordere Teil des Ansatzes des unteren schrägen Muskels muß meist von der Lederhaut abgelöst werden. Mit Hilfe des gekrümmten rinnenförmigen Löffels von ARRUGA ist es jetzt möglich, den rückwärtigen Augenpol darzustellen. Manchmal kann dabei der Gehilfe das Licht des Augenspiegels auf der Außenfläche der Lederhaut wahrnehmen, während der Arzt die Macula spiegelt. Meist aber ist dies nicht durchführbar. Auch wenn der Gehilfe das Licht sehen kann, so ist die dabei mögliche Auffindung der Rißstelle noch so ungenau, daß damit das in der Regel kleine Loch mit der Diathermienadel nicht sicher getroffen werden kann. Es empfiehlt sich vielmehr mit der Katholysennadel und dem durch sie erzeugten Wasserstoffbläschenschaum den Ort des Risses zu bestimmen und ihn dann mit der Diathermienadel zu verschließen. Wenn man, was ja die Regel ist, den Riß mit dem Augenspiegel nicht lokalisieren kann, so steche man 2 mm nasal vom medialen Ende des Ansatzes des Obliquus inferior die Katholysennadel ein. Dazu wird eine 1,8 mm lange Nadel verwendet und 1 Sekunde im Augennern belassen, nachdem man vorher die Punktionsstelle mit Tusche oder Gentionviolett bezeichnet hat. Dann wird mit dem Spiegel nachgesehen, in welcher Lage zum Rißrand sich die Bläschen befinden (Abb. 236). Es wird nun, falls nicht der erste Stich den Riß selbst oder seinen Rand getroffen hat, solange entsprechend der Lage der Bläschen zum Riß die Stelle der Stiche verlagert, bis der Riß oder sein Rand getroffen ist. An dieser Stelle wird mit einer 1 mm langen Diathermienadel 1 Sekunde perforierend koaguliert, wobei der Strom nur 20 Milliampere betragen soll. Genügt diese Stromstärke nicht, ein sichtbares kleines Koagulat zu erzeugen, so führe man eine zweite Punktion an derselben Stelle durch und belasse die Nadel etwas länger, bis zu 2 Sekunden im Augennern. Ist damit der kleine Riß getroffen, so genügt ein Herd; wenn

aber nur der Rand des Risses getroffen ist, so muß ein zweites Herdchen gesetzt werden, das jetzt meist die Reißmitte treffen wird. Die Ortsbestimmung des Risses durch die Elektrolysenadel an Stelle der Diathermienadel ist deshalb vorzuziehen, weil die elektrolytischen Herde viel zarter sind und daher die Netzhaut weniger schädigen. Das Loch selbst wird mit dem Hochfrequenzstrom verschlossen, da dieser festere Narben liefert und dadurch mit größerer Sicherheit einen dauernden Erfolg verbürgt. Man trachte auch nach Möglichkeit, einen zweiten Eingriff zu vermeiden. Die zarten Verklebungen bei Verwendung der Elektrolyse geben allzuleicht nach.

Recht brauchbar für diese Fälle ist das Zielophthalmoskop, von ŠAFÁŘ für den Hochfrequenzstrom umgearbeitet. Mit ihm ist es möglich, gelegentlich schon mit dem ersten Koagulat das Loch zu verschließen. Das Wesen der Vorrichtung besteht darin, daß das Ende eines starren bogenförmigen Metallrohres in die optische Achse eines Handophthalmoskopes verlegt wird. In diesem allseits isolierten Rohr verläuft nun beweglich eine zugeschärfte Elektrode, die durch einen ebenfalls am Spiegel angebrachten Handgriff aus der Röhre in die optische Achse des Ophthalmoskopes hineingeschoben werden kann. Indem man nun mit Hilfe des Ophthalmoskopes den Riß einstellt, wird die am Ende des Augenspiegels fix angebrachte Führungsröhre nach Bloßlegung der Lederhaut entlang dieser in den TENONschen Raum eingeführt; so kommt das Ende der Röhre genau an die Stelle, die der Richtung des Netzhautrisses entspricht, da ja das Ende der Röhre in der Blickrichtung des Untersuchers liegt. (Diese Stelle ist freilich nicht immer identisch mit der Lage des Risses.) Während man also mit dem Ophthalmoskop den Netzhautriß fixiert, kann man nach Einschaltung des Stromes die nadelförmige Elektrode mit Hilfe des am Ophthalmoskop angebrachten Handgriffes durch die Lederhaut in das Augeninnere eindringen lassen. Man sieht dann in der Verlängerung der optischen Achse des Instrumentes den Brandherd entstehen. Die Vorrichtung eignet sich besonders für Risse, die sehr weit rückwärts gelegen sind; also besonders Löcher in der Macula und ihrer Umgebung. Diese bieten bekanntlich nicht nur der Ortsbestimmung, sondern namentlich auch der Auffindung der richtigen Lederhautstelle große Schwierigkeiten dar. Ein Nachteil besteht darin, daß das Umgehen mit dem verhältnismäßig großen hakenförmig gekrümmten Instrument im Finstern (man sieht ja nicht, wo das Ende des Führungsrohres im TENONschen Raum ist, während man spiegelt) nicht einfach und vielleicht auch nicht ganz gefahrlos ist und zweifellos große Übung erfordert.

Nach dem Verschluß des Maculaloches müssen, falls noch periphere Löcher vorhanden sind, diese verschlossen werden. Man kann sie nur mit der Einzel-nadel verschließen, da das Auge durch die Stichelung in seinem rückwärtigen Abschnitt bereits weich geworden ist. Der Verschluß erfolgt nach den bereits besprochenen Regeln. Hierauf wird der äußere Gerade wieder angenäht und die Bindehautwunde genau verschlossen. Beide Augen werden verbunden.

**Nachbehandlung.** Der Patient soll flach am Rücken im Bette liegen. Die übrige Nachbehandlung ist genau so wie bei den übrigen Reißfällen.

**Ergebnis.** Es liegt in der Natur der Erkrankung, daß durch den Eingriff das zentrale Sehen herabgesetzt ist. Immerhin ist es aber oft erstaunlich, wie gut die Lesefähigkeit von Augen ist, in denen ein Maculaloch durch eine Hochfrequenz-

stromkoagulation verschlossen wurde. Es ist daher auch berechtigt, den Versuch zu wagen. Gelingt es nicht, durch die erste Operation den Riß zu verschließen, so kann ein zweiter Eingriff durchgeführt werden. Zu einem dritten Versuch konnten wir uns noch nie entschließen.

### Das Vorgehen bei Fällen ohne nachweisbaren Riß.

Die Risse werden nicht entdeckt, wenn sie zu peripher oder in einer Falte versteckt liegen, oder wenn trübe Medien keinen genauen Einblick gestatten. Aber auch hier ist frühzeitiger Eingriff angezeigt. Bei faltenreicher Abhebung gelingt es manchmal den Riß sichtbar zu machen, indem man mit einer etwas stärkeren (0,1—0,2 mm dicken) und ungefähr 1,8 mm langen Diathermienadel an Stelle der höchsten Abhebung die Lederhaut nach Bloßlegung durchbohrt. Oft sind mehrere solche Stichelungen notwendig, um eine genügende Menge subretinaler Flüssigkeit zum Abflusse zu bringen. Entweder wird der Riß nun sofort entdeckt oder aber den folgenden Tag, worauf sofort der regelrechte Eingriff wie früher beschrieben gemacht wird. Es ist zu widerraten, die Punction der Lederhaut mit dem GRAEFESchen Messer zu machen, da dabei Blutungen eintreten können, die den folgenden Eingriff stören.

Hat man keinen Riß gefunden, so muß man sich entschließen, blind zu operieren, d. h. die Stellen, wo in der Regel die Risse gefunden werden, mit zahlreichen, dichtstehenden Stichelungen abzuriegeln. Die meisten Risse finden sich nun im temporal oberen Quadranten. Den nächstgrößeren Prozentsatz liefert der nasal obere und der temporal untere Quadrant in gleicher Weise. Am seltensten finden sich Risse nasal unten. Es ist daher die Wahrscheinlichkeit, daß bei Abriegelung der temporalen Hälfte ein Riß getroffen wird, wenn die obere Hälfte des Augapfelumfanges mitgenommen wird, viel größer als bei Abriegelung der temporalen allein.

**Örtliche Betäubung.** Einspritzung der Novocainlösung unter die Bindehaut von nasal oben über die äußere Hälfte bis zum nasal unteren Quadranten, ferner entlang dem oberen, äußeren und unteren Geraden. Außerdem Ganglionanästhesie. Ferner Einspritzung im äußeren Lidwinkel.

### Der Eingriff.

Nach Kanthotomie wird die Bindehaut ungefähr 8 mm vom Limbus entfernt durchtrennt; der Schnitt reicht von nasal oben über die ganze temporale Hälfte bis nasal unten. Die in diesem Bereiche gelegenen drei geraden Augenmuskeln werden freigelegt und unter jeden eine Fadenschlinge gezogen. Die Sklera wird bis 16 mm hinter dem Limbus freigelegt und die Bindehaut sowie die TENONsche Kapsel mit Haltefäden und Klemmen zur Seite gehalten. Der Ansatz des Obliquus superior wird aufgesucht und dargestellt. Es wird dann in einer Distanz von 15 mm hinter dem Limbus bis nach vorne zur Ora serrata ein bandförmiges Areal von nasal oben bis nasal unten durch durchbohrende Koagulationen mit einer 1,5 mm langen 0,1—0,05 mm dicken Nadel abgeriegelt. Man setzt eine Stichelstelle neben die andere in einem Abstand von ungefähr 2 mm voneinander, so daß das ganze Gebiet mit 3—4 Reihen davon bedeckt wird (Abb. 237). Die geraden Augenmuskeln können sehr leicht mit Hilfe der Fadenschlinge und eines Schielhakens aus nicht leitendem Stoff so zur Seite geschoben werden,

daß unter ihnen die Stichelreihe ununterbrochen fortgeführt werden kann. Sehr wichtig erscheint es, die Gegend des Ansatzes des Obliquus superior mit Stichelungen zu umgrenzen.

Ein überraschend hoher Hundertsatz von Löchern liegt nämlich im äußeren oberen Quadranten in der Nähe des Ansatzes des Obliquus superior und ein nicht geringer Teil der unten gelegenen Löcher in der Nähe des Ansatzes des Obliquus inferior. Man bekommt den Eindruck, als würde die Tätigkeit dieser Muskeln die Entstehung von Rissen in der Netzhaut begünstigen. Das wäre geradezu eine Stütze für die Theorie, daß der Obliquus superior durch seinen Druck auf das Auge die Zunahme der Kurzsichtigkeit und das Entstehen ihrer Folgezustände fördere, und daß es daher für das kurzsichtige Auge von bestem Einfluß sei, die Sehne des Obliquus superior zu durchschneiden (siehe S. 147).

Es wird also nach gründlicher Umgrenzung des Ansatzes des Obliquus superior das Band der dichtgesäten Koagulate entlang der temporalen Bulbushälfte unter dem Rectus inferior nach nasal unten geführt. Ist der Ansatz des Obliquus inferior, wie das nicht so selten der Fall zu sein pflegt, verhältnismäßig weit vorne und ragt er bis in die behandelte Zone hinein, so wird auch seine Ansatzstelle wenigstens in ihrem temporalen Anteil ausgiebig durch Stichelungen umgrenzt, wobei die Sehne am Ansatz durch einen Schielhaken ab-




Abb. 237. Abriegelungsoperation mit der Einzelnadel. Gleichzeitiges Abheben des Muskels mit Schielhaken und Zügelnaht.

gehoben wird. Mit den Stichelungen soll man oben beginnen und sie allmählich nach unten führen, da in der Regel aus den oberen Stichelstellen weniger subretinale Flüssigkeit austritt als aus den unten gelegenen. Während der Stichelung der oberen Hälfte, die zweckmäßig bis 10 Grade an den horizontalen Meridian herangeführt wird, ist das Auge mit Hilfe der Haltefäden nach abwärts gewendet, bei den nachfolgenden Stichelungen im Bereiche der temporalen Hälfte wende man es nasenwärts und zu den anschließenden Eingriffen in der unteren Hälfte wird das Auge nach oben gedreht. Die Stichelungen unten führe man noch unter dem Rectus inferior etwas nach nasal. Sie sollen aber nicht mehr wie 10 Grade über den vertikalen Meridian hinausreichen. Es wird dann im ganzen Eingriffsbereiche die Nadel an gleichmäßig verteilten Stellen schräg in die Sklera eingebohrt und der Strom 1—2 Sekunden einwirken gelassen. In der Lederhaut werden also in gleicher Weise wie bei den Reißfällen im ganzen Operationsbereiche Koagulationsherde erzeugt, die eine Zusammenziehung des Lederhautgewebes mit leichter Einziehung der Sklera an der so behandelten Stelle zur Folge haben. Diese skleralen Koagulationen setze man in einem Abstände von 3—4 mm zueinander. Die Bindehaut wird hierauf genau verschlossen und die Kanthotomiewunde versorgt. Beide Augen werden verbunden.

Dieses Vorgehen führe man bei Netzhautablösungen ohne nachweisbaren Riß dann durch, wenn entweder die gesamte Netzhaut des Augenhintergrundes abgehoben ist oder aber die temporale Hälfte. Betrifft die Abhebung ohne sichtbaren Riß nur die obere Hälfte des Augenhintergrundes, wird das Vorgehen auf die obere Sklerahälfte beschränkt, indem der Rectus superior freigelegt wird und der Rectus internus und externus mit Nahtschlingen gefaßt werden. Die Stichelreihe erstreckt sich dann nur von der Höhe des inneren bis zur Höhe des äußeren Geraden. In gleicher Weise kann man die Abriegelungszone auf die nasale, bzw. auf die untere Hälfte beschränken, wenn nur die nasale, bzw. untere Hälfte abgehoben ist. Freilich verlagern sich ältere Abhebungen, die durch einen in der oberen Fundushälfte gelegenen kleinen Riß hervorgerufen sind, mit der Zeit nach unten und springen da oft blasig vor, während in der oberen Fundushälfte die Netzhaut weitgehend abgeflacht ist und bei trüben Medien gut angelegt zu sein scheint. Dann muß natürlich ein Eingriff in der unteren Fundushälfte erfolglos sein. Daher soll man in allen Fällen, wo es nicht sicher ist, daß die Abhebung nur auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt und auch dort entstanden ist, mehr als die Hälfte des Augapfelumfangs abriegeln.

Weniger empfehlenswert ist es, zu ausgedehnten Abriegelungen Steckeletroden zu verwenden, da man sie schwer unter die Muskeln bringt, so daß meist ein Muskel durchtrennt werden muß. Außerdem ist dabei immer eine Nachstichelung mit der einzinkigen Nadel notwendig, um alle größeren Zwischenräume auszufüllen.

**Nachbehandlung.** Wie früher beschrieben. Ebenso die Lagerung des Kranken.

Bei Erfolglosigkeit kann in der 4. Woche nach dem Eingriffe der restliche Teil des Augenhintergrundes abgeriegelt werden. Vorher ist wieder genau nach Rissen zu suchen. Durch das Flacherwerden der Abhebung gelingt es nunmehr, manchmal einen Riß zu finden. Hat die Abriegelung der gesamten Fundusperipherie in zwei Sitzungen keinen Erfolg gehabt und findet man auch bei weiteren Fundusuntersuchungen keinen Riß in der Netzhaut, so ist der Fall als aussichtslos zu bezeichnen.

#### **Allgemeine Bemerkungen über die Heilungsaussichten einer Netzhautabhebung.**

Von einer Zahlenangabe über den Hundertsatz von Heilungen sehen wir ab, da solche Zahlen zu sehr von der Auswahl der Fälle abhängen. Wer alle Fälle von Abhebungen ohne Unterschied angeht, also alle die schon von vornherein schlechte Vorhersage geben, wie Abhebungen, die seit Monaten und Jahren bestehen, Abhebungen mit Schrumpfungerscheinungen der Netzhaut, mit starken Glaskörpertrübungen u. dgl., muß natürlich weniger gute Zahlen bekommen, als der, der sich die Fälle sorgsam aussucht und nur solche dem Eingriff unterzieht, die von vornherein gute Aussicht auf Heilung geben.

Der jetzt schon alte Satz, die Heilung einer Netzhautabhebung ist um so leichter und wahrscheinlicher, je jünger die Abhebung ist, besteht voll und ganz zu Recht. Trotzdem soll der Eingriff nicht übereilt, sondern erst nach gründlicher Voruntersuchung der Augen durchgeführt werden. Bei frischen Fällen mit einem oder nur wenigen nicht zu großen, nahe beieinanderliegenden Rissen und flacher Abhebung kann man fast mit Sicherheit auf Heilung rechnen. Auch bei hochblasiger Abhebung ist, wenn ein nicht zu großer Riß vorliegt, die Prognose

unbedingt günstig zu stellen, besonders wenn die Abhebung unter Bettruhe und Tragen der Lochbrille flacher wurde. Auch mehrere Risse, wenn sie im selben Quadranten, ja sogar nur in derselben Fundushälfte liegen, geben sowohl bei flacher als auch bei hoher Abhebung ein günstiges Resultat, wenn man sorgfältig und mit viel Geduld spiegelt und operiert. Wer Zeit und Mühe nicht scheut und immer wieder von neuem eine Punktion setzt und ihr Ergebnis mit dem Spiegel prüft, bis er sicher ist, alle Defekte sauber umgrenzt zu haben, der wird in diesen Fällen die besten Erfolge haben. Wesentlich ungünstiger sind Fälle mit sehr großen Rissen. Günstig sind nur Orarisse, selbst wenn sie über ein Viertel des Augenumfanges reichen. Wenn man die Enden des Orarisses nicht sicher wahrnehmen konnte, sollen die Punktionen über die sichtbare Grenze des Risses hinaus gemacht werden. Eine Schädigung des Sehens ist davon nicht zu befürchten, da ja die Narbenherde ganz peripher liegen. Wesentlich ungünstiger sind große Risse, die nicht in der Ora liegen, namentlich wenn die Abhebung nicht mehr ganz frisch ist; denn die Netzhaut breitet sich bei über 6 Papillendurchmesser großen Rissen oftmals nicht gut aus und bildet Falten, auch wenn der Riß allseits sauber umgrenzt wurde. Wenig Heilungserfolg versprechen Fälle, die mehrere Risse weit voneinander entfernt in verschiedenen oft entgegengesetzt liegenden Stellen aufweisen. Schon der Eingriff selbst ist erschwert, wenn nach Umgrenzung des einen Risses oder Rißgebietes und der nachfolgenden Erweichung des Bulbus jetzt der 2. Riß geschlossen werden muß. Auch das Spiegeln des weichen Auges ist nicht selten sehr schwierig, da die Hornhaut nicht mehr so klar ist; auch ist häufig durch den Abfluß der subretinalen Flüssigkeit das Bild des Augenhintergrundes weitgehend verändert. Blasige Falten sind flacher geworden, oftmals sind sie sogar verschwunden, die Lage des 2. Risses kann dadurch weitgehend verändert erscheinen; durch diese Änderung des Fundusbildes ist dann das Wiederfinden des Netzhautloches sehr schwierig.

Die schlechteste Vorhersage mit verschwindend kleinen Heilungsaussichten geben Fälle mit Zeichen einer Netzhautschrumpfung. Diese kann schon kurze Zeit, wenige Wochen nach Beginn der Abhebung einsetzen, meist zeigt sie sich allerdings erst nach mehreren Monaten, nicht so selten erst nach einem Eingriff, wodurch der erwartete Erfolg zerstört wird. Die Möglichkeit der Entwicklung derartiger Schrumpfungsvorgänge in der Netzhaut nach einem regelrecht und sorgfältig ausgeführten Eingriff auch bei Fällen, die nach unseren Erfahrungen einen guten Heilerfolg erwarten lassen, macht daher eine genaue Vorhersage unmöglich. Wir kennen kein Mittel, ihr vorzubeugen. Diese Schrumpfungsherde können in der Umgebung der Eingriffsstelle, aber auch weit entfernt ohne örtlichen Zusammenhang mit ihr entstehen. Starre Falten, meist wirbel- oder sternförmig, ziehen zu einem rundlich oder eckig begrenzten weißlichen Fleck in der Netzhaut. In ihrem Bereiche sind die Netzhautgefäße sehr stark geschlängelt und nahe beieinander. Durch die schrumpfende Wirkung des Herdes kann, auch wenn der Riß verschlossen wurde, die Netzhaut mit der Aderhaut nicht verkleben. Sie wird vielmehr dadurch von ihrer Unterlage abgehoben.

Etwas günstiger stehen die Aussichten bei Fällen ohne nachweisbaren Riß. Es ist eigentlich ein Zufallstreffer, der die Heilung bringt. Man kann daher niemals vor dem Eingriffe mit Sicherheit sagen, wie sein Ergebnis sein wird.

Der Eingriff in linsenlosen Augen mit Netzhautabhebung gilt immer schon als prognostisch besonders ungünstig. Aber auch solche Augen werden nicht selten geheilt. Dasselbe gilt für Augen mit Nystagmus und ausgedehnten Fundusveränderungen. Das Spiegeln ist oft durch die bestehende Nachstarmembran und durch die nicht immer maximal zu erweiternde Pupille sehr erschwert. Daher wird oft kein Riß gefunden und dies mag mit ein Grund sein, warum die Vorhersage so ungünstig wird. Denn zur Aphakie gesellt sich noch die Unsicherheit eines Eingriffes ohne nachweisbaren Riß. Daneben dürfte aber auch der verringerte Halt, den der Glaskörper vorne findet, eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Es scheinen nach unseren Erfahrungen die günstigsten Heilungsaussichten zu bestehen für die Augen nach glatter Entbindung der Linse aus der Kapsel bei noch unversehrter hinterer Linsenkapsel und fast ebenso günstig nach glatter Ausziehung der Linse in der Kapsel ohne Verletzung der Membrana hyaloidea. Die schlechteste Prognose geben Augen nach Durchschneidung der Nachstarmembran oder Ausziehung der Linse mit Austreten von Glaskörper in die vordere Augenkammer. Die Veränderungen, die dabei der Glaskörper erleidet, sind für die ungünstige Prognose mitbestimmend. Ist in einem linsenlosen Auge ein Riß nachweisbar, so ist das Verfahren dasselbe wie an Augen mit Linsen. Es ist empfehlenswert, etwas ausgiebiger zu koagulieren, indem man den Strom, auch in der Lederhaut, etwas länger einwirken läßt. Wurde aber kein Riß entdeckt, so ist das Auge wie ein nichtaphakisches ohne nachweisbaren Riß zu behandeln.

#### Wiederholung des Eingriffes bei Erfolglosigkeit des ersten.

Der Eingriff muß wiederholt werden, wenn der erste erfolglos war, oder aber wenn sich die Netzhaut früher oder später wieder abhebt. Schon 3—4 Wochen nach dem 1. Eingriffe kann an der Erfolglosigkeit nicht gezweifelt werden, wenn die Netzhaut noch abgehoben ist, und der 2. Eingriff braucht nicht weiter aufgeschoben zu werden, besonders wenn nun wieder ein Loch in der Netzhaut entdeckt werden kann. Bei Rückfällen bestimmt der Zeitpunkt des Eintrittes der neuerlichen Abhebung den des 2. Eingriffes. Auch hier darf keine Zeit versäumt werden.

Hat der 1. Eingriff trotz guter Umgrenzung des Netzhautloches keine Heilung gebracht, so hat man von neuem sorgfältig und genau die Netzhaut nach weiteren Löchern abzusuchen. Ist ein Loch gefunden worden, so ist es nach den oben ausgeführten Regeln zu verschließen. War man nicht imstande, ein weiteres Netzhautloch zu finden, so ist es besser, noch zuzuwarten, da man gelegentlich Spätheilungen sehen kann. Man verabsäume dabei jedoch niemals durch häufiges und sorgfältiges Untersuchen des Augenhintergrundes doch das Loch zu finden, das den Erfolg des 1. Eingriffes verhindert hat. Ist 6—8 Wochen nach dem 1. Eingriffe die Netzhaut noch immer abgehoben und war das Suchen nach Rissen erfolglos, so ist es jetzt erlaubt, den Eingriff vorzunehmen, wie für die Fälle ohne nachweisbaren Riß beschrieben. Ist das Fehlschlagen eines sorgfältig und richtig ausgeführten Eingriffes in dem Auftreten von Schrumpferden in der Netzhaut gelegen, so kann der Versuch gemacht werden, deren Lage zu bestimmen und das ganze Gebiet in breitem Ausmaße durch dichtstehende diathermische Stichelungen zu veröden. Die Nadel wird länger im

Auge belassen wie sonst und auch die Stromstärke kann bis zu 80 Milliampere für die Einzelnadel gesteigert werden. Hierauf wird noch die Lederhaut ausgiebig koaguliert. Viel Erfolg ist davon nicht zu erwarten, obwohl es gelegentlich dadurch gelingt, die Stelle der Schrumpfung in eine breite Narbenfläche zu verwandeln und die Netzhaut so zur Wiederanlegung zu bringen. Meist schlägt der Versuch fehl und der Eingriff bringt keine Besserung.

### **Der wiederholte Eingriff.**

Er ist so wie der erste durchzuführen, besonders wenn er an einer Stelle ausgeführt wird, wo nicht vorher operiert worden war.

Ist aber der Eingriff im Bereiche des früheren durchzuführen, so sei man besonders sorgfältig darauf bedacht, eine gute Anästhesie zu erzielen. Es ist meist nicht leicht, die Lederhaut freizulegen, da sie breit und derb mit dem Narbengewebe verwachsen sein kann. Nur sorgfältiges und vorsichtiges Vorgehen führt zum Ziele und vermeidet die Gefahr das Auge anzuschneiden. Das weitere Vorgehen ist durch die bereits ausgeführten Regeln bestimmt. Wurde das Auge mit der Schere oder dem Messer eröffnet, so koaguliere man mit einer kurzen Nadel bis zu 1 mm Länge mit einer Stromstärke bis zu 40 Milliampere in der Umgebung des Loches die Lederhaut. Durch die Aufquellung der Sklera infolge der Stromwirkung wird das Loch wesentlich kleiner und die Gefahr eines Prolapses der Uvea verringert. Durch das aufgequollene Lederhautgewebe kann ein kleines Loch fast völlig verschlossen werden. Bei sehr großen Löchern muß man entweder die Sklera selbst nähen oder ihr anhaftendes Gewebe über dem Loch vernähen. Ist das Loch versorgt, so umgrenze man es noch mit durchbohrenden Punktionen. Dann erst soll der Riß in der Netzhaut verschlossen werden, was in der gewöhnlichen Weise erfolgt. Man kann sich dabei wegen der Weichheit des Auges nur der Einzelnadel bedienen.

**Nachbehandlung.** Wie nach dem 1. Eingriff.

Eine Eröffnung des Auges während des 2. Eingriffes kann eine große gelbweiße Narbe an der entsprechenden Stelle im Augenhintergrund hinterlassen, ohne die Heilung zu beeinträchtigen; es kann aber auch eine schrumpfende Narbe entstehen, die die Netzhaut zusammenzieht und an Narben erinnert, wie man sie nach erfolglosem Eingriffe mit dem Paquelin sehen kann. Weitere Eingriffe in diesen Augen sind erfolglos.

Es ist natürlich noch möglich, weitere Eingriffe gegen die Netzhautablösung durchzuführen, wenn 2 Operationen erfolglos waren. Sie sind nur dann erfolgreich, wenn das Loch, das die Heilung verhindert hat, gefunden und geschlossen werden kann. Wenn aber kein Riß in der Netzhaut zu finden ist, so sind weitere Eingriffe meist fruchtlos.

## **Die Unterminierungsmethode K. LINDNERS.**

Von

Privatdozent Dr. L. SALLMANN, Wien

**Anzeigen.** Die ursprünglichen Operationen bei Netzhautabhebung, die den Rißverschluß erstrebten, konnten in Fällen mit Maculalöchern nicht angewendet werden, da sie die Gefahr schwerster Schädigung von Nerven und Gefäßen in

der Augenhöhle, sowie auch für die Muskulatur des Augapfels mit sich brachten. Für derartige Netzhautdefekte in der Gegend des hinteren Augenpoles hat LINDNER ein operatives Vorgehen ausgearbeitet, das er „Unterminierungsmethode“ nannte. Späterhin zeigte sich, daß auch Abhebungen mit peripheren Rissen ein sehr geeignetes Anwendungsgebiet für diese Art wundärztlichen Eingreifens darstellen. Die Erzeugung entzündlicher Verklebungen zwischen Aderhaut und abgehobener Netzhaut werden hierbei auf chemischem Wege angestrebt. LINDNER verwendet hierzu verdünnte Lösungen von Kalilauge, die in geringer Menge zwischen Lederhaut und Aderhaut in der Gegend des Netzhauttrisses eingebracht werden. Dem Leitgedanken LINDNERS folgend, wird zu diesem Zwecke ein zusammenhängendes Abriegelungsband um den den Riß tragenden Netzhautteil hergestellt. Besonders bei flachen Abhebungen, sowie bei solchen mit ausgedehnten Lochbildungen degenerativen Ursprunges hat sich die Unterminierungsmethode überaus gut bewährt. Dazu kommen ferner Abhebungsfälle mit weit hinten gelegenen, schwer mit der Diathermie- oder Katholysennadel erreichbaren Löchern.

**Vorbereitung des Kranken.** Wie bei den übrigen neuen Eingriffen bei Netzhautabhebung wird die Operation möglichst frühzeitig vorgenommen; nur in Fällen, wo wegen hochblasiger Abhebung oder tiefen Faltenbildungen Netzhautrisse nicht wahrgenommen werden können, Glaskörpertrübungen den Einblick allzusehr stören oder sich sichere Zeichen von Glaskörperzug nachweisen lassen, wird mit dem Eingriff gewartet. Unter Tragen der Lochbrille LINDNERS — bei blasigen Abhebungen in der oberen Fundushälfte überdies unter Bettruhe bei flacher Lagerung des Kranken — kommt es nicht selten zu einer weitgehenden Abflachung, wodurch die Aussichten der Operation sich wesentlich bessern. Die im vorangehenden Abschnitte von J. BÖCK ausführlich gegebene Schilderung der Untersuchung auf Netzhautrisse, die örtliche Bestimmung derselben, sowie die durch den Allgemeinzustand des Kranken erforderlichen Maßnahmen gelten in gleicher Weise hinsichtlich der Vorbereitung zur Unterminierungsoperation.

**Örtliche Betäubung.** Da LINDNER zur Sicherung völliger Schmerzlosigkeit des Eingriffes Cocain vorzieht, wird am Tage vor der Operation die Cocainempfindlichkeit des Kranken mittels subcutaner Beibringung von 1 ccm 1%iger Cocainlösung geprüft. Bei Verwendung von Cocain — oder Pantocain-einträufelungen in den Bindehautsack tritt in der Regel eine leichte Trübung des Hornhautepithels ein, welche die auch bei der Unterminierungsmethode unbedingt erforderliche Spiegelkontrolle außerordentlich erschweren oder unmöglich machen kann. Diesem Übelstand läßt sich bis zu einem gewissen Grade durch Unterlassung des Eintropfens und durch bloßes Einspritzen des Anaestheticums begegnen, wobei die Bindehaut vor dem Einstechen an der Injektionsstelle durch Betupfen mit 20%igem Cocain unempfindlich gemacht wird. Von einer etwa in der Äquatorgegend des Augapfels gelegenen Stelle aus werden 2—4 ccm einer aus 3%iger Cocain- und 2%iger Novocainlösung bestehenden Mischung in den Operationsbereich, sowie zwecks Anschlingung der benachbart gelegenen Augenmuskeln darüber hinaus unter die Bindehaut eingespritzt. Trotz dieses Vorgehens trübt sich manchmal die Hornhaut älterer Leute während des Eingriffes, und zwar auch dann, wenn ein 2. Operationsgehilfe das Auge fast dauernd mit körperwarmer, physiologischer Kochsalzlösung bespült. Das von WEVE an-

gegebene Hornhauthaftglas schützt gleichfalls nicht vor dem Auftreten der Trübung, vielmehr erscheint die unter dem Glas sich absetzende Blutschicht auf die Durchsichtigkeit der Hornhaut ungünstig einzuwirken. Weder die Anwendung anderer Anaesthetica noch sonstige Vorsichtsmaßnahmen sind demnach imstande, die durch die Hornhauttrübung hervorgerufene Erschwerung der Augenspiegeluntersuchung im Verlaufe des Eingriffes in jedem Falle zu verhindern. Der äußere Augenwinkel wird mittels Einspritzung einer kleinen Menge 1%iger Cocainlösung unempfindlich gemacht.

**Instrumentarium.** Außer den im allgemeinen bei Abhebungsoperationen notwendigen, im voranstehenden Kapitel geschilderten Instrumenten sind für die Unterminierungsmethode erforderlich:

1. Eine  $\frac{1}{4}$  ccm fassende, in hundertstel Kubikzentimeter geteilte, den Tuberkulinspritzen nachgebildete Injektionsspritze aus Glas. Um die injizierte Menge leicht ablesen zu können, soll der Stempel aus dunklem Glas angefertigt sein. Letzterer muß ohne stärkere Gewaltanwendung vorgeschoben werden können, darf aber nicht zu leicht gleiten, was durch eine am hinteren Spritzenende befindliche Metallklammer erreicht wird.

2. Silberkanülen, deren Spitzen nicht scharf, sondern abgerundet und abgeflacht sind. Die Öffnung der Kanüle befindet sich nicht am äußersten Ende, sie ist in dessen Nähe seitlich angebracht. Die Kanülen besitzen einen gewissen Grad von Biegsamkeit, so daß sie zu bestimmten Zwecken vom Operateur zu recht gebogen werden können.

3. Als Injektionsflüssigkeit wird für Eingriffe am hinteren Augenpol eine 3%ige Lösung von Kalilauge, für Fälle mit peripheren Rissen eine 4%ige Lösung bereitgestellt.

4. Scharf geschliffene Trepane von 1,7 mm Durchmesser. Bei ungenügender Schärfe des Trepanns ist die Durchführung der Operation wesentlich schwieriger und nimmt erheblich mehr Zeit in Anspruch.

5. Ein mit physiologischer Kochsalzlösung gefüllter Gummiballon zum Abspülen überschüssiger Kalilauge.

6. Eine kleine scharfe Lanze, sowie eine mit feinsten scharfen Hähchen versehene Pinzette.

#### **Der Eingriff bei Netzhautrissen, die nicht am hinteren Augenpol gelegen sind.**

In fast allen Fällen erweist sich eine gerade Kanthotomie als notwendig oder empfehlenswert. Die hierbei auftretende Blutung kann leicht mittels heißer Knopfsonde gestillt werden. Bei schwer zugänglichem Operationsgebiet wird zur Verstärkung der Wirkung der Lidwinkeleinschneidung und zur völligen Entspannung der Lider das temporale Lidbändchen von der Kanthotomiestelle aus nach oben oder nach unten durch kleine Scherenschläge knapp am äußeren Orbitalrande abgetrennt. In Ausnahmefällen wird das Lidbändchen zur Gänze an seinem Ansatz am Knochen durchschnitten. Nach Einlegen des mit kleinen Widerhähchen versehenen Lidsperrers wird die Lederhaut in der gewöhnlichen Weise durch einen bogenförmigen Bindehautschnitt zirka 10 mm vom Limbus freigelegt und der Ansatz des dem Operationsbereiche zunächst gelegenen geraden Muskels dargestellt. Gelegentlich ist es zweckmäßig, dem Bogenschnitte einen im waagrechten Meridian gelegenen Radiärschnitt anzuschließen. Eine 2mal

durch die ganze Muskelbreite geführte Catgutschlinge in der Nähe des Ansatzes wird in einer Schieberpinzette gefaßt, worauf die mittleren Teile der Muskelsehne am Ansatz losgetrennt werden. Mittels einer scharfgeschliffenen Nadel wird nun in der Mitte der skleralen Muskelleiste ein feiner Seidenfaden eingelegt, der bei genügend tiefer Verankerung mit einer Hängepinzette belastet werden kann. Bei oberflächlicher Lage soll er jedoch nur locker geknüpft werden, um später anzuzeigen, an welcher Stelle der Muskel wieder anzunähen ist. In diesem Falle ist ein zweiter tiefergreifender Faden als Haltfaden anzubringen. 2 Scherenschläge trennen schließlich die stehengebliebenen seitlichen Muskelzüge und die benachbarte TENONsche Kapsel von der Lederhaut ab. Bindehaut und TENONsche Kapsel werden nun breit an ihren peripheren Wundrändern in mit Hängepinzetten belastete Seidenschlingen gelegt, um den Operationsbereich in übersichtlicher Weise zur Ansicht zu bringen. Blutungen aus oberflächlichen Lederhautgefäßen können leicht durch Berührung mit einer heißen Knopfsonde gestillt werden. Hierauf erfolgt die Lokalisation des Risses oder der Risse, im aufrechten Bilde (Technik siehe S. 345), wobei der an der Lederhautoberfläche sichtbare Leuchtfleck mittels gekrümmter dünner Sonde oder einer Leuchtsonde, deren Ende in konzentrierte alkoholische Gentianalösung getaucht war, gekennzeichnet wird. Statt der Farbsonden kann auch das WALKERSche Häkchen benutzt werden. Es ist kein Zweifel, daß bei weit hinten gelegenen Rissen, namentlich innen, oben und unten, die richtige Bezeichnung wegen der schlechten Sichtbarkeit des Leuchtfleckes sehr schwierig ist und nur gelingt, wenn das umgebende Gewebe durch den ARRUGA-Löffel oder ähnliche Instrumente kräftig abgedrängt wird.

Wenige Millimeter von der kenntlich gemachten Stelle entfernt müssen nun im Kreise oder Halbkreise Trepanationsstellen angelegt werden, die zunächst nur die äußeren Schichten der Lederhaut durchsetzen und sich in einem seitlichen Abstand von ungefähr 5 mm voneinander befinden. Hierbei ist den Vortexvenen sorgfältig auszuweichen. Die vordersten Trepanationsstellen sollen gleichfalls in einer Entfernung von ungefähr 5 mm hinter der Ora serrata liegen. Bei der Verwendung der scharfen Trepane ist daran zu erinnern, daß die Lederhaut von Fall zu Fall, ferner je nach dem Alter des Kranken und allfälligen Brechungsfehlern (hohe Kurzsichtigkeit), je nach der Spannung des Auges und schließlich auch an verschiedenen Stellen der Augenoberfläche verschieden dick ist und verschiedenen Widerstand entgegengesetzt. Es ist daher beim Durchschneiden mit dem Trepan vorsichtig schichtweise vorzugehen, wobei sich der Operateur durch Hochheben der oberflächlichen Lederhautschichten mit Hilfe einer feinsten Hakenpinzette von der Tiefe der Schnittführung überzeugen soll. Die Trepanierung wird an allen Stellen soweit durchgeführt, daß noch eine dünne Schicht Lederhaut die grau durchschimmernde Aderhaut deckt. Hierauf wird an einer Trepanationsstelle entweder mit dem Trepan oder besser unter Lupenvergrößerung mittels kleiner scharfer Lanze die letzte der Aderhaut aufliegende Lederhautschicht durchschnitten (Abb. 238). Bei Verwendung der Lanze geschieht die Freilegung der Aderhaut nur in einem Bogenabschnitte des Trepanloches. Falls die durchgreifende Öffnung an der Trepanationsstelle zu klein ist, kann sie mit einer feinen Schere ohne Gefahr für die darunterliegende Aderhaut vergrößert werden. Von dieser meist sichelförmigen Öffnung aus wird

ein schmaler Spatel, der etwas breiter als ein Cyclodialysespatel ist, zwischen Lederhaut und Aderhaut vorgeschoben, und zwar wird er in der Richtung gegen die benachbarte Trepanationsstelle soweit vorgeführt, daß er mit seinem Ende hinter die stehen gebliebene dünne Lederhautlage der genannten Trepanationsstellen zu liegen kommt. Durch Vordrücken des Spatelendes und kleine seitliche Bewegungen gelingt es, die letzte Skleralschicht von innen her zu durchbrechen (Abb. 239). Bei diesem Vorgange ist es vorteilhaft, durch Fassen der dünnen Lederhautmembran mit der feinen Hakenpinzette von außen das Durchstoßen mit dem Spatel zu erleichtern. Von den so gewonnenen Öffnungen aus wird der gleiche Vorgang an den restlichen Trepanationsstellen wiederholt, so daß




Abb. 238.

im Bereiche einer breiten Ringzone in der Umgebung des Risses das etwaige Vorhandensein eines Hindernisses (durchtretende Nerven oder Gefäße, bzw. Verlötnungen zwischen Aderhaut und Lederhaut) ausgeschlossen werden kann. Auch gegen den hinteren Bulbuspol zu kann der Spatel vorgeschoben werden, wenn es zweckmäßig erscheint, die Abriegelung in dieser Richtung ausgiebiger zu gestalten. Von den beiden am weitesten vorne gelegenen Trepanationsstellen dringt der Spatel bis in die Gegend der Ora serrata vor, so daß das Unterminierungsband bis zum peripheren Netzhautrande reicht.

Der nächstfolgende Schritt besteht in dem Einbringen der Kalilaugenlösung auf dem durch den Spatel vorgezeichneten Wege. Dazu wird die Silberkanüle an




Abb. 239.

der eingangs beschriebenen, mit Kalilauge gefüllten Spritze fest aufgesetzt und in den Perichorioidealraum eingeführt, in derselben Weise, wie es mit dem Spatel geschehen war. Hierbei soll der Operateur sich bemühen, das Ende der Kanüle während des Vorschiebens gegen die Lederhaut anzudrücken, bis ihr

Ende in der benachbarten Trepanationsöffnung sichtbar wird. Unter langsamem Zurückziehen der Spritze läßt der Operateur eine kleine Menge der Kalilauge einfließen. Auf der Strecke zwischen 2 Trepanlöchern werden ungefähr 0,02 ccm KOH-Lösung verwendet. Unmittelbar nach dem völligen Herausziehen des Instrumentes muß der Assistent überschüssige, aus den Trepanationsöffnungen aussickernde Lauge mit physiologischer Kochsalzlösung wegspülen. Es ist zweckmäßig, den Riegel in dem Bereiche zuerst fertigzustellen, der in unmittelbarer Umgebung des Risses und nach hinten von demselben gelegen ist, damit die Wirksamkeit der Operation durch später vielleicht eintretende Zwischenfälle nicht zu sehr gestört wird. Es soll daher Spatelunterminierung und Einbringung der KOH-Lösung in diesem Bereiche bereits abgeschlossen sein, bevor der Riegel nach vorne geführt wird. Das Verschieben des Spatels sowie der Kanüle muß leicht vonstatten gehen. Stößt das Instrument auf Widerstände, so dürfen dieselben nicht durch Kraftanwendung überwunden werden, sondern sie sind durch leichte Richtungsänderungen zu umgehen. In der Nähe der Einmündungsstellen von Vortexvenen ist besondere Vorsicht geboten, wobei es bei dieser Methode leichter als bei jeder anderen gelingt, in der Nachbarschaft der Durchtrittsstellen der Vortexvenen ein durchlaufendes Abriegelungsband zu erzeugen. In der Gegend der langen Ciliarnerven ist zur Vermeidung schwerer und länger dauernder Leitungsunterbrechungen eine kleinere Menge der Ätzflüssigkeit zu verwenden. Bei dünner Lederhaut wird die Ätzwirkung an der Oberfläche kurze Zeit nach der Einspritzung in Form eines graugrünlich gefärbten Bandes sichtbar. Die Verfärbung verschwindet gewöhnlich nach kurzer Zeit. Mit dem Augenspiegel läßt sich meist das Operationsgebiet an einer grauen Verfärbung des Augenhintergrundes erkennen, falls die Netzhaut nicht undurchsichtig ist.

Bis zu diesem Zeitpunkte wurde die Aderhaut an keiner Stelle verletzt oder gar durchbrochen. Um ein Absickern der subretinalen Flüssigkeit zu erreichen, bediente sich LINDNER ursprünglich einer Diszissionsnadel, mit welcher er an 1 oder 2 Trepanationsstellen durch die Aderhaut in den subretinalen Raum einging. Hierbei ist mit aller Sorgfalt die Verletzung eines stärkeren Aderhautgefäßes zu vermeiden, wobei Lupenvergrößerung und intensive seitliche Beleuchtung gute Dienste leisten. Bei nicht allzudicht pigmentierter Aderhaut sind die Gefäße deutlich zu erkennen. Um die Gefahr der Verletzung eines Aderhautgefäßes und damit einer Blutung ins Augeninnere noch weiter zu verringern, wie auch um das Absickern der subretinalen Flüssigkeit einzuschränken, zieht LINDNER jetzt häufig bei flachen Abhebungen vor, mittels Katholysestichelung hornhautwärts vom Unterminierungsriegel den subretinalen Raum zu eröffnen. Dabei ist darauf zu achten, daß an den Trepanationsstellen die Aderhaut nur in kleinen schlitzförmigen Öffnungen bloßliegt; bei vollständigem Durchtrepanieren der Lederhaut und Freiliegen der Aderhaut im ganzen Bereiche der Trepanationsstelle kann es sonst durch das Andrücken der Katholysestichelung zum Bersten der Aderhaut kommen. Diese Katholysestellen mögen außerdem zum Nachweise der richtigen Lagebestimmung des Netzhautdefektes dienen, falls die durch die Lauge bewirkte Verfärbung des Augenhintergrundes für den Augenspiegel nicht erkennbar geworden ist.

Der restliche Teil der Operation gleicht dem Vorgehen bei anderen Abhebungsoperationen. Der abgetrennte Muskel wird mittels des in ihm verankerten

Catgutfadens an die durch den Markierfaden gekennzeichnete Stelle zurückgelagert. Die Bindehalthaltfäden werden entfernt. Hierauf folgt der Verschluß der Bindehautwunde mit fortlaufender Naht, sowie Vernähung der Kanthotomiestelle mittels Knopfnah. Auf die geschlossenen Lider wird eine Schichte sterilen Vaselins gestrichen und diese mit sterilisiertem Guttaperchapapier bedeckt. Dann folgt die in Gaze gehüllte Wattelage, sowie die Snellenschale, Salbe und Guttaperchapapier haben den Zweck, bei unvollständigem Lidschlusse mechanische Hornhautschädigungen zu vermeiden.

#### **Der Eingriff bei Netzhautlöchern in der Gegend des hinteren Augenpols.**

Nach ausgiebiger Kanthotomie, Bindehautschnitt, Anschlingen und Abtrennen des äußeren Seitenwenders, sowie Anlegen des Haltfadens in der Lederhaut und von Halteschlingen durch den oberen und unteren geraden Augenmuskel wird der Augapfel soweit als möglich nasenwärts gedreht und die Lederhaut in ausgedehnter Weise bloßgelegt. Ähnlich wie bei der Cyclodialyseoperation wird hierauf die Lederhaut durch einen kurzen Lanzenschnitt durchtrennt, und zwar geschieht dies soweit hinten, als es die räumlichen Verhältnisse nur gestatten, d. h. ungefähr 20—24 mm hinter dem Limbus. Dieser zirka 2—3 mm lange Lanzenschnitt wird zur Vermeidung einer Verletzung des langen Ciliarnerven, bzw. der ihn begleitenden Gefäße nicht im waagrechten Hauptkreise, sondern etwas darüber ausgeführt. Vorteilhafterweise soll der Schnitt in schräger Richtung nach hinten die Lederhaut durchsetzen. Von ihm aus wird ein Spatel, an dem eine Millimeteerteilung eingeritzt ist, mit aller Vorsicht zwischen Ader- und Lederhaut gegen den hinteren Augenpol zu vorgeschoben. Vorher hat der Operateur den Spatel in einer Weise zurechtgebogen, die eine Verletzung der inneren Augenhäute nahezu ausschließt, falls nicht feste Verwachsungen zwischen denselben und der Lederhaut bestehen. Bei Einführung des Spatels muß das Auge mittels Pinzette verläßlich fixiert sein, um sicheres und gefahrloses Arbeiten zu gewährleisten. Ist es auf Grund der Länge des eingeschobenen Spatelstückes wahrscheinlich, daß sich dasselbe an der gewünschten Stelle befindet, hat sich der Assistent mit Hilfe des Augenspiegels im umgekehrten Bilde von der tatsächlichen Lage des Instrumentes zu überzeugen. Dies gelingt bei wenig getrüübter Netzhaut und nicht allzu dicht pigmentierten inneren Augenhäuten ohne Schwierigkeiten. Bei sehr dunklem Augenhintergrunde und hoch abgehobener, grauer Netzhaut kann die Beurteilung der Spatellage manchmal nicht mit voller Sicherheit erfolgen. Nach Entfernung des Spatels wird die der Bulbuswand entsprechend gekrümmte an der Injektionsspritze angebrachte Kanüle eingeführt, worauf neuerdings die Lage des Instrumentes in Bezug auf die Macula mit dem Augenspiegel untersucht wird. Bei unrichtiger Lage der Kanüle versucht der Operateur dieselbe langsam zurückzuziehen und neuerdings in etwas geänderter Richtung einzuführen, bis sie in die richtige Stellung gebracht ist. Darnach werden 0,02 ccm einer 3%igen Kalilaugenlösung einfließen gelassen. Damit ist der eigentliche Eingriff zum Verschlusse des Maculaloche beendigt. Die in der großen Mehrzahl der Fälle neben dem Maculaloche vorhandenen peripheren Netzhautrisse werden hierauf auf dem Wege der erstbeschriebenen Operation abgeriegelt. Der weitere Operationsverlauf entspricht der oben gegebenen Schilderung.

**Nachbehandlung und postoperativer Verlauf.** Bei der Lagerung des Kranken im Bett sind im allgemeinen die alten Vorschriften GONINS zu befolgen, d. h. Körper- und Kopfstellung sind so zu wählen, daß der Riß möglichst tief zu liegen kommt. Einigemale im Tage ist der Kranke anzuhalten, durch tiefes Atemholen hypostatischen Zuständen in der Lunge vorzubeugen. Vorsichtige Lageveränderung der Beine haben den Zweck, der Gefahr von Thrombosierungen zu begegnen. Der Kranke darf ungefähr 8 Tage das Bett nicht verlassen und soll während dieser Zeit die angeordnete Körperlage nicht verändern. Der beide Augen verschließende Verband wird nach 48 Stunden zum ersten Male gewechselt, wobei auf entzündliche Erscheinungen an Lidern und Bindehaut sowie auf Veränderungen im vorderen Augenabschnitte zu achten ist. Später erfolgt der Verbandwechsel jeden Tag. Die örtliche Behandlung beschränkt sich auf Atropineinträufelung. Durch wenigstens 8 Tage bleiben beide Augen verschlossen. Stärkere ödematöse Schwellung der Lider sowie eine solche der Bindehaut ist nicht selten. Sie pflegt innerhalb 1 Woche abzuklingen. Geschieht dies nicht, kann mit vorsichtiger Massage nachgeholfen werden. Bei stärkerer Chemose kommt es gelegentlich zu kleinen oberflächlichen Geschwürchen in der Nähe des Limbus, meist unter dem horizontalen Hauptkreis schläfenwärts. Dieselben heilen bei Behandlung mit Kollargolsalbe in kurzer Zeit schadlos ab.

Die 1. Augenspiegeluntersuchung findet in der Regel 8 Tage nach dem Eingriffe statt, wobei der Kranke das Auge nicht viel bewegen soll.

In diesem Zeitpunkte weist der Augenhintergrund frische chorioiditische Herde auf, welche durch die mehr oder minder getrübe Netzhaut durchschimmern. Kleinere Blutungen in deren Umgebung sind nicht selten. Später grenzen sich die Aderhautherde ab, werden pigmentiert, wobei vielfach das Bild einer oberflächlichen Aderhautatrophie entsteht. Die Ausbildung dieser Aderhautveränderungen sowie der Pigmentverschiebungen im Pigmentepithel der Netzhaut ist gelegentlich eine überraschend geringe, manchmal weisen nur kleine gelbliche Entfärbungsherde und Pigmentfleckchen auf den vorgenommenen Eingriff hin. In anderen Fällen entstehen ausgedehntere, weiße chorioideal-atrophische Zonen mit mehr oder minder reichlicher Pigmentierung.

Ein voller Erfolg der Operation kann nicht ausgeschlossen werden, wenn bei der Untersuchung in einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkte die Netzhaut nicht überall anliegend gefunden wird. Es kommt vielmehr in manchen Fällen erst nach mehreren Wochen zur völligen Wiederanlegung. Bei der Beurteilung des Erfolges der Operation ist ferner darauf Rücksicht zu nehmen, daß am Anfang die durch die Ätzbehandlung hervorgerufene Trübung der Netzhaut unter Umständen mit einem Abhebungsrest verwechselt werden kann. Glaskörpertrübungen in geringer Zahl sind nicht selten, stellen aber, falls sie nicht durch größere Blutungen veranlaßt sind (siehe Störungen im Heilungsverlaufe), ein harmloses Vorkommnis dar. Nach Weglassen des Verbandes, d. i. 8—12 Tage nach der Operation, wird die Atropinbehandlung fortgesetzt und für die nächsten Wochen das Tragen einer Lochbrille verordnet. Die Nähte sind nach ungefähr 2 Wochen zu entfernen.

**Zwischenfälle während des Eingriffes.** 1. Der ernsteste Zwischenfall ist das Durchschneiden der Aderhaut bei der Trepanation, sowie das Durchbrechen derselben mit dem Spatel oder der Kanüle. Eine Verletzung mit dem Spatel ist nach den bisherigen Erfahrungen äußerst selten, eine solche mit der Kanüle ist

unseres Wissens noch nicht vorgekommen. In einem solchen Falle könnte die Unterminierungstechnik nicht weiter Anwendung finden, sondern es muß der Versuch gemacht werden, den Eingriff mittels Diathermie- oder Katholysestichelung zu beenden. Die Trepanationsstelle, an welcher die Aderhautstelle durchbohrt wurde, soll zuerst mit einem Catgutfaden (0000) geschlossen werden, damit das Auge beim Anpressen der Elektrode nicht zuviel Glaskörper verliert. Eine Fortführung der Unterminierungsoperation bei frühzeitiger Eröffnung der Aderhaut hätte mit dem Eintreten von Lauge in den Glaskörper eine schwere Schädigung des Auges, wenn nicht sogar den Verlust des Auges zur Folge.

2. Blutungen in das Augeninnere durch Verletzung eines Aderhautgefäßes sind in ihrer Tragweite nicht abzuschätzen. Da es nicht in der Hand des Operateurs liegt, eine derartige Blutung zu stillen, muß durch genaueste Beachtung der Lage der Vortexvenen an der Lederhautoberfläche und durch Lupenbetrachtung der freiliegenden Aderhaut vor der Durchbrechung mit der Diszissionsnadel dieser Zwischenfall möglichst vermieden werden. Blutungen aus Lederhautgefäßen, die leicht durch Berühren mit heißer Knopfsonde zum Stillstand kommen, sind von geringer Bedeutung. Dasselbe gilt für Blutungen aus den Aderhautgefäßen, insoferne sie subchorioideal gelegen sind. In der Umgebung der blutenden Stellen darf naturgemäß die Aderhaut nicht durchbrochen werden. Ein Teil dieser Gefahren wird durch Verwendung der Katholysestichelung zur Eröffnung des subretinalen Raumes ausgeschaltet.

3. Das Weichwerden des Augapfels ohne Verletzung der Aderhaut, das manchmal ohne erkennbaren Grund auftritt, erschwert das Setzen der Trepanationsstellen in hohem Maße. Durch Verwendung von schärfsten Trepanen und Erhöhung der Augenspannung mittels vorsichtigen Andrückens eines breiten Elfenbeinspatels kann diesem Übel bis zu einem gewissen Grade entgegengearbeitet werden.

**Störungen im Wundverlauf.** 1. Blutungen ins Augeninnere können in sehr seltenen Fällen auch nach der Operation erfolgen. Sie sind manchmal von Blutaustritten in die Vorderkammer begleitet. Letztere stellen an sich kein unbedingt ungünstiges Vorkommnis dar. Ist die Blutung in den Glaskörperraum in so ausgiebigem Maße eingetreten, daß mit dem elektrischen Augenspiegel kein rotes Licht vom Augenhintergrunde zu erhalten ist, so sinkt die Aussicht auf den günstigen Ausgang der erfolgten Operation sowie jedes weiteren Eingriffes. Die Versuche, derartige Glaskörperblutungen durch Absaugen von Glaskörper und Einspritzen von Kochsalzlösung günstig zu beeinflussen, verlaufen gewöhnlich ergebnislos.

2. Gelegentlich zeigt sich beim 1. Verbandwechsel das Bild einer akut tiefen Vorderkammer, mit den bekannten entzündlichen Erscheinungen von Seiten der Iris. Diese Veränderung bildet sich meist im Verlaufe einer Woche zurück, braucht nicht als unheilvolles Zeichen für den Ausgang der Operation angesehen werden und bedarf keiner besonderen Behandlung.

3. Ähnlich wie bei anderen Eingriffen bei Netzhautabhebung kann es in Ausnahmefällen auch bei dieser Operation zu Nahteiterungen und Bindehautinfektionen kommen, die auf das unterliegende Gewebe überzugreifen vermögen. Behandlung mit Argyrollösung, Kollargolsalben und mit Wärmeanwendung, bzw. wenn es der Zustand erlaubt, mit Kurzwellenbestrahlung führten in den bisher beobachteten, vereinzelt Fällen zum Ziele.

**Gegenanzeigen.** Abgesehen von den Fällen, bei denen jeglicher Eingriff als völlig aussichtslos bezeichnet werden muß (Windenblütenform der abgehobenen Netzhaut, völlig zerrissene Netzhaut, viele Jahre langer Bestand der Netzhautabhebung usw.), ist von der Unterminierungsoperation abzuraten, wenn chorioiditische Herde in dem Operationsbereiche liegen. Bei Abhebungen mit peripheren Rissen kann allerdings durch Verlagerung des Riegels hinter die chorioiditischen Herde ein Erfolg erreicht werden, im allgemeinen ist aber der Eingriff in unmittelbarer Umgebung der Risse vorzuziehen. Bei Netzhautlochbildungen in der Maculagegend sind zentrale oder parazentral schläfenwärts gelegene chorioiditische Herde eine Gegenanzeige für die Unterminierungsoperation. Das Gesagte gilt auch für die chorioiditischen Herde, welche durch vorangegangene Netzhautoperationen erzeugt wurden.

An dieser Stelle darf erwähnt werden, daß systematische Gesichtsfelduntersuchungen nach Unterminierungsoperationen keine schweren Funktionsausfälle im peripheren Sehen aufdeckten, wie das bei der Ausdehnung der Aderhautveränderungen zu erwarten gewesen wäre. Auch die Grenzen des Farbengesichtsfeldes erholen sich meist völlig oder weitgehend. Der chemisch erzeugte chorioiditische Riegel bewirkt also keine Leitungsunterbrechung, die sich im Gesichtsfelde ausdrückt. Es besteht daher in dieser Hinsicht keine Gegenanzeige gegen den Eingriff. Auch das zentrale Sehvermögen leidet bei den nach der geschilderten Methode operierten Fällen mit Löchern in der Maculagegend wenig, so daß die Diathermie- und Katholyseoperation darin keinen Vorrang haben. Schließlich ist in diesem Zusammenhang noch darauf hinzuweisen, daß die durch den Eingriff hervorgerufenen Empfindlichkeitsstörungen in der Hornhaut nur vorübergehend sind und bei der Frage der Gegenanzeige nicht berücksichtigt werden brauchen.

## Fünfzehntes Kapitel.

### Ausziehung von Fremdkörpern aus dem Augeninnern.

Die Ausziehung von Fremdkörpern aus dem Augeninnern gehört zu den heikelsten Eingriffen unseres Faches, denn es gibt dafür kein vorbildliches einheitliches Verfahren, wonach sich der weniger Geübte richten könnte, und ferner gehören häufig gerade die wichtigsten Teile des Auges (Glaskörper, Netzhaut) dem Eingriffsgebiete an, wo mangelhafte Fertigkeit leicht mehr schadet als nützt. Zum Verständnis der Grundzüge unseres Handelns müssen einige Worte über die Diagnose vorausgeschickt werden.

Die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, die Anwesenheit eines Fremdkörpers im Augeninnern zu erkennen, setzen sich zusammen aus der äußeren Besichtigung, der Spiegeluntersuchung, dem Gebrauche des Eisenspähers (Sideroskops) und der RÖNTGENschen Strahlen.

**Äußere Untersuchung.** So leicht es in vielen Fällen ist, auf den ersten Blick die Durchbohrung der Augenhüllen durch einen Fremdkörper und dessen Anwesenheit im Augeninnern zu erkennen, so schwierig kann es in anderen Fällen werden, die Stelle des Eintrittes des Fremdkörpers in das Augeninnere zu sehen oder den Fremdkörper selbst zu entdecken. Kommt es ja doch auch vor, daß ein Kranker für die Abnahme des Sehvermögens keine Ursache anzugeben weiß und auf Befragen eine Verletzung mit Sicherheit in Abrede stellt, während das kundige Auge des Arztes, durch den Befund einer einseitigen umschriebenen oder vollständigen Linsentrübung aufmerksam gemacht, mit der Lupe eine feine strichförmige Narbe in der Hornhaut als sicheres Zeichen der Verletzung entdeckt. Gestattet dann noch die Durchsichtigkeit der Medien, das Auge mit dem Spiegel zu untersuchen, so gelingt es — freilich auch dem Geübten oft erst nach langem Bemühen — im Glaskörper oder in der Netzhaut den Splitter aufzufinden. Aber wie häufig geschieht es, daß man nach einer Narbe vergeblich sucht! Ein feiner schmaler Splitter, der mit seinen scharfen Rändern am Limbus oder durch die Bindehaut des Augapfels und die Lederhaut eindrang, hinterläßt nicht die geringste Spur einer sichtbaren Narbe. Im allgemeinen deuten *kleine* durchbohrende Wunden nach Anfliegen von Fremdkörpern auf die Wahrscheinlichkeit eines Fremdkörpers im Augeninnern hin, während große Wunden Verletzungen mit größeren Stücken anzeigen, die wieder abgeprallt und nicht im Auge verblieben sind. Wenn z. B. im Falle einer frischen Verletzung der Hornhaut in Form einer kleinen durchbohrenden Wunde die Krankengeschichte ergibt, daß ein kleiner Splitter gegen das Auge geflogen ist, wird dieser Umstand von vornherein für das Vorhandensein eines Fremdkörpers im Augeninnern sprechen. Wenn er nicht etwa in der vorderen Kammer liegen geblieben ist, wird die Suche nach der Stelle des Durchschlagens in der Regen-

bogenhaut, Linsenkapsel usw. nicht vergeblich sein. Freilich könnte auch ein größeres Stück mit einer feinen Spitze gegen das Auge geflogen sein, die Hornhaut, Regenbogenhaut und Linsenkapsel verletzt haben und dann wieder heruntergefallen sein. In einem solchen Falle ist dann gerade die Angabe des Verletzten über die Größe des Splitters von Wichtigkeit. Begreiflicherweise versagen bei Kriegsverletzten häufig die Berichte über den Vorgang der Verletzung, besonders wenn diese bei Einwirkung schwerer Artillerie oder im heftigen Nahkampf (Handgranatenkampf) erfolgt ist. Daher wird die Anwesenheit von Fremdkörpern oft nicht sicher erkannt. Unmöglich kann dies durch die äußere Untersuchung allein werden, wenn der Fremdkörper, wie es bei Kriegsverletzten nicht selten der Fall ist, aus der Umgebung der Augenhöhle durch den hinteren Augenabschnitt eindrang, da dann bei der äußeren Untersuchung alle Erscheinungen einer Verletzung fehlen.

**Augenspiegeluntersuchung.** Sind die Medien genügend rein, so kann mit dem Augenspiegel ein im Glaskörper oder in der Netzhaut sitzender Fremdkörper leicht entdeckt werden. Eine weit vorgeschrittene Linsentrübung oder eine Blutung in den Glaskörper gestattet aber nicht mehr, den Augenhintergrund zu erleuchten und den Fremdkörper aufzufinden. In anderen Fällen wiederum ist die Linse trotz einer durchbohrenden Verletzung durchsichtig geblieben, besonders wenn die Eintrittsstelle in der Lederhaut gelegen ist. Später entziehen dichte Glaskörpertrübungen, die sich um den Fremdkörper ansammeln, oder eine Netzhautabhebung den Fremdkörper der unmittelbaren Beobachtung. Je früher der Verletzte zur Untersuchung kommt, um so leichter kann der Fremdkörper im Augeninnern nachgewiesen werden. Selbst wenn die Linse durchschlagen wurde, gelingt es in frischen Fällen häufig noch, trotz der beginnenden Trübung den Splitter mit dem Augenspiegel im Glaskörperaume oder in der Netzhaut zu entdecken. *Die Stelle des Sitzes entspricht nicht immer der Richtung, die durch die Hornhautwunde und die in der Linse sichtbare Durchschlagtrübung gegeben ist.* Häufig hat der Splitter durch den Widerstand der Hornhaut und der Linse seine Kraft verloren und fällt, im Glaskörperaume angelangt, nach unten; oder er war an die Netzhaut angefliegen, ohne sich einzubohren, und von der Stelle des Anpralles hinuntergesunken. Dann zeigt der Augenhintergrund in der Richtung der Hornhaut-Linsenwunde eine Wunde in der Netz- und Aderhaut als einen glänzend weißen Fleck — die bloßliegende Lederhaut —, der sogar die Form des Fremdkörpers zeigen kann, oder es beweist zum mindesten eine Blutung an der betreffenden Stelle, daß dort der Fremdkörper angeprallt war. In den meisten Friedensverletzungen handelt es sich um Metallsplitter. Diese fallen durch ihren Glanz auf, da ihre Oberfläche Licht stark zurückwirft. Bei den Kriegsverletzungen sind Metallsplitter in der Minderzahl, nur nach Handgranatenverletzungen sind Eisensplitter nicht selten. Im Hochgebirgskriege sind dagegen fast alle eingedrungenen Fremdkörper Steinsplitter. Bei frischen Fällen schwimmen nicht selten Luftblasen im Glaskörper herum oder liegen dem Fremdkörper an. Lagern dichte Glaskörpertrübungen davor, so verrät sich die Stelle des Fremdkörpers durch einen auffallend weißlichen Schein.

**Der Eisenspäher.** Für die Erkennung von Eisensplittern im Augeninnern leistet der Eisenspäher wertvolle Dienste. Denn er vermag in seinen besonders empfindlichen Abarten (nach HERTEL, nach ASMUS) feinste Splitter anzuzeigen

und erlaubt auch ihre Lage ungefähr zu bestimmen, entsprechend dem stärksten Ausschlage der Magnetnadel bei Annäherung der betreffenden Stelle. Ein verneinendes Ergebnis der Untersuchung mit dem Eisenspäher besonders bei mittlerer Empfindlichkeit der Magnetnadel schließt aber Eisen im Auge nicht mit Sicherheit aus. (Kleinste Splitter bei Sitz am hinteren Augenpol wegen zu großer Entfernung von der Nadel.) Der Wert der Vorrichtung wird besonders in großen Städten durch den Umstand herabgesetzt, daß dort die Magnetnadel andauernd in einem Zustande von Unruhe ist. Andererseits beweist der Ausschlag der Magnetnadel noch nicht das Vorhandensein eines Splitters im Augeninnern. Eisensplitter unter der Haut in der Umgebung des Auges oder in der Augenhöhle ohne Eröffnung oder nach doppelter Durchbohrung des Augapfels können die Ablenkung der Nadel verursachen. Als Beispiel sei folgender Fall angeführt: Vor 2 Monaten Verletzung beim Hämmern auf Eisen durch einen Splitter, der 8 mm unter dem Rande des Unterlides eindrang. Erst nach längerer Zeit wurde das Sehvermögen des Auges dieser Seite ohne Entzündung allmählich schlechter. Bei der ersten Untersuchung fand sich eine zarte Narbe in der Haut des unteren Lides von 3 mm Länge. Am Auge aber war bei der sorgfältigsten Untersuchung keine Narbe zu entdecken, das Sehvermögen auf ein Viertel herabgesunken. Augenspiegelbefund: Flottierende Glaskörpertrübungen, die *nach unten* zu befestigt waren, nach oben sich frei bewegten. Papille und deren Umgebung gesund. Beim Blick nach unten verlor sich wegen zunehmender dichter Trübungen das rote Licht ganz. Da das Gesichtsfeld nach oben stark eingeschränkt war, erschien eine Netzhautabhebung in diesem Bezirke sehr wahrscheinlich. Vom Splitter nichts zu sehen. Der Verletzte wurde vor den Eisenspäher gesetzt. Beim Annähern wurde die Nadel sofort angezogen und zeigte einen starken Ausschlag. Er trat bei allen Stellungen des Auges fast mit der gleichen Stärke ein, war aber am größten, wenn das Auge nach oben gerichtet war. Mit dem Riesensplinter konnte aber selbst bei Anwendung der vollen Stromstärke kein Splitter herausgezogen werden und der Verletzte verspürte dabei auch keinen Schmerz. Dies war um so auffälliger, als aus der Größe der Lidnarbe und dem Ausschlage der Magnetnadel ein großer Splitter vermutet werden mußte. Erst die Untersuchung mit den RÖNTGENSchen Strahlen brachte die Erklärung. Ein Eisensplitter von 5 mm Länge saß in der Augenhöhle außerhalb des Augapfels. Auf seinem Wege in die Augenhöhle hatte der Splitter entweder die Lederhaut zweimal durchbohrt, oder er hatte unten die Augenhüllen aufgeschlitzt und auf diese Weise die Veränderungen im Augeninnern hervorgerufen.

Schließlich sei auch daran erinnert, daß manche Eisensorten nicht magnetisch sind und daß daher bei ihnen der Eisenspäher versagen muß.

**Die RÖNTGENSchen Strahlen.** Sie sind das vorzüglichste Mittel zur Erkennung von Fremdkörpern im Augeninnern geworden. Die Vervollkommnung der zur Aufnahme dienlichen Vorrichtungen gestattet heute die genaueste Bestimmung der Form und des Sitzes des Fremdkörpers. Besonders wertvoll ist die von SWEET ersonnene Einrichtung, womit eine genaue Ortbestimmung in kürzester Zeit ermöglicht wird. Auch das COMBERGsche Verfahren ermöglicht eine genaue Ortung des Fremdkörpers. Die Strahlen sind anwendbar zum Nachweis von Metallen jeglicher Art, Stein und Glas, letzteres nach seinem Bleigehalte verschieden leicht zu entdecken.

**Der Riesenmagnet.** Die Bedeutung des Eisenspähers zur Erkennung von Eisensplittern im Augeninnern wurde durch die Lichtbildaufnahme mit den RÖNTGENSchen Strahlen wesentlich herabgesetzt. Die Ortsbestimmung mit dem Eisenspäher war oft genug unsicher; durch die Lichtbildaufnahme wird aber außer der Lage auch die Größe und Form des Splitters genau bekannt. Aber selbst für den, dem diese Vorrichtungen nicht zur Verfügung stehen, ist der Eisenspäher ein fast entbehrliches Werkzeug geworden. Die äußere und die Spiegeluntersuchung, die genaue Aufnahme des Vorganges bei der Verletzung und eine eingehende Erhebung des vorliegenden Augenzustandes vermögen häufig hinreichend genaue Aufklärung zu geben, daß bei frischen Verletzungen sofort an den Versuch geschritten werden kann, den eingedrungenen Fremdkörper mit dem großen Magneten auszuziehen. Indem alles für den Eingriff vorbereitet ist, um beim Auftreten einer Schmerzempfindung den Splitter unverweilt auszuziehen, dient das Annähern an den Riesenmagneten, mit aller noch zu beschreibenden Vorsicht ausgeführt, gleichzeitig als ein hervorragend wertvolles und für die vorliegenden Bedürfnisse genügend ausreichendes diagnostisches Hilfsmittel, das darüber entscheidet, ob der eingedrungene Fremdkörper aus Eisen besteht und ob es möglich ist, ihn herauszubekommen. Da bei frischen und bei nicht zu alten Verletzungen ein Eisensplitter dem Zuge des Riesenmagneten fast ausnahmslos folgt, spricht das verneinende Ergebnis der Annäherung an den Riesenmagneten und das Fehlen jeder Schmerzempfindung sehr dafür, daß kein Eisensplitter im Auge enthalten ist und damit ein weiterer Eingriff im allgemeinen nicht zu unternehmen ist (siehe darüber den Abschnitt: Nichtmagnetische Fremdkörper).

Damit soll nicht etwa behauptet werden, daß die Verwendung des Eisenspähers und die Aufnahme eines Lichtbildes überflüssige Untersuchungsverfahren seien. In so manchen Fällen (siehe S. 377) werden erst sie die vollkommene Klarheit über alle Einzelfragen bringen und das Verfahren des Eingriffes entscheiden. Aber bei ihrem Fehlen wird durch den so schnell als möglich nach der Verletzung vorgenommenen Magnetversuch zunächst die für das Auge wertvollste Aufgabe erfüllt, nämlich die Frage entschieden, ob ein Fremdkörper aus Eisen eingedrungen ist, und mit ihrer Bejahung auch schon die dadurch vorgeschriebene Behandlung, die Ausziehung des Splitters, durchgeführt.

### Magnetische Fremdkörper.

Eisensplitter sind aus dem Auge sobald wie möglich nach der Verletzung zu entfernen. Sonst geht auch ohne die Mitwirkung von Keimen das Auge allmählich durch Verrostung zugrunde (Siderosis). Auch darf nicht vergessen werden, daß Eisensplitter, die schon monatelang abgekapselt vom Auge getragen wurden, plötzlich heftige Entzündungserscheinungen veranlassen können. Die früher aufgeschobene Ausziehung des Splitters muß alsdann unter besonders ungünstigen Umständen vorgenommen werden.

Zur Ausziehung magnetischer Fremdkörper aus dem Augeninnern stehen 2 verschiedene Grundformen von Magneten zur Verfügung: der Handmagnet nach HIRSCHBERG und der Riesenmagnet nach HAAB. Von diesen beiden Grundformen gibt es verschiedene Abarten.

Die *Eisensplitter im Bereiche der vorderen Kammer und Linse* werden bei noch offener Wunde durch diese nach außen geleitet, wozu die Wunde, wenn nötig, verlängert wird. Dies darf nur geschehen, wenn der anzulegende Schnitt außerhalb des Pupillargebietes bleibt; sonst ist es sogar im kammerlosen Auge vorzuziehen, mit der Lanze einen Einstich am Limbus zu machen, was ohne Verletzung der Regenbogenhaut getan werden kann. Meist ist aber bei den kleinen Wunden die Verklebung so rasch eingetreten, daß sich schon wenige Stunden nach der Verletzung die vordere Kammer wieder hergestellt hat und die Lanze am Limbus ohne Schwierigkeit eingeführt werden kann.

Ist die Wunde zu klein, um den Ansatz des Handmagneten einzubringen und ist dieser nicht kräftig genug, von außen durch die Hornhaut den Splitter anzuziehen, so tritt der Riesenmagnet an seine Stelle. Ist die Wunde schon verheilt, so wird ein Lanzenschnitt am Limbus angelegt, der Ansatz des kleinen Magneten durch die Öffnung in die Kammer an den Splitter herangebracht und, wenn dieser angezogen wurde, aus der Wunde herausgeführt. Liegt der Splitter so, daß er mit einer Pinzette gefaßt werden kann, oder wurde er durch den Magneten in eine solche Lage gebracht, so kann er unter Verzicht auf den weiteren Gebrauch des Magneten mit der Pinzette aus dem Auge gezogen werden.

Das eigentliche Wirkungsgebiet für den Magneten ist der Glaskörperraum.

#### **Ausziehung der Eisensplitter aus dem Glaskörperraum.**

Je eher der Splitter nach der Verletzung aus dem Auge entfernt wird, um so günstiger die Zukunft des Auges. Die Eingriffe werden bei möglichst gut erweiterter Pupille fast immer in örtlicher Betäubung vorgenommen. Es sei davor gewarnt, dem Verletzten unter die Bindehaut eine Cocainlösung einzuspritzen, bevor er an den großen Magneten gesetzt wird. Denn indem der Strahlenkörper dadurch unempfindlich wird, geht uns das für die Anwesenheit eines Splitters im Augeninnern so wichtige Zeichen der Schmerzäußerung des Kranken verloren, wenn der Splitter dem Zuge des Magneten zu folgen beginnt. Es ist aber nichts dagegen einzuwenden, diese wirksame Art der örtlichen Betäubung durchzuführen, nachdem die Anwesenheit eines magnetischen Splitters durch die Schmerzäußerung bereits sichergestellt ist. Die tieferen Teile des Auges (Regenbogenhaut und Strahlenkörper) werden durch diese Einspritzung so unempfindlich gemacht, daß der Eingriff auch bei entzündeten Augen und empfindlichen Kranken ohne allgemeine Betäubung zu Ende geführt werden kann.

**A. Verfahren bei frischer Verletzung (offener Wunde).** Wunde im Bereiche der vorderen Kammer. Linse durchgeschlagen.

**a) Kleiner Splitter.** Der Splitter wird mit dem großen Magneten zunächst in die vordere Kammer geleitet und von hier aus dem Auge gezogen.

Um durch die gewaltige Zugkraft des Magneten dem Auge nicht zu schaden, muß sehr vorsichtig zu Werke gegangen werden. Es stehen 2 Mittel zur Verfügung, den Einfluß des großen Magneten auf den Splitter abzuschwächen. Durch Verwendung geringer Strommengen wird dem Eisenkern zu Anfang nur geringe magnetische Kraft verliehen und dadurch, daß das Auge in einiger Entfernung vom Pol des Magneten gehalten wird, wird die Wirkung noch weiter

abgeschwächt. Unsere Absicht ist es, bei möglichst schwacher Kraft des Magneten den Splitter sachte um den Rand der Linse herum zunächst hinter die Regenbogenhaut und von hier durch die Pupille in die vordere Kammer zu bringen.

#### **Vorziehen des Splitters in die vordere Kammer.**

Die Mitte der Hornhaut des verletzten Auges wird dem Pol des Magneten gegenüber gebracht und bei halber Stromstärke langsam aus größerer Entfernung ihm genähert. Gute seitliche Beleuchtung ermöglicht eine genaue Beobachtung, um im Augenblicke, wo der Fremdkörper hinter der Regenbogenhaut erscheint, den Strom abzustellen, bevor sich noch der Splitter in diese einbohren konnte. Es ist Tatsache, daß hierbei der Splitter den Weg meist um die Linse herum nimmt. Reicht die verwendete Stromstärke nicht aus, so wird unter Wiederholung desselben Vorganges zur vollen Stromstärke übergegangen. Bei frischen Verletzungen folgt der Splitter dem Magneten fast immer sogleich. Empfindet der Verletzte schon in einiger Entfernung vom Pol des Magneten und bei geringer Strommenge Schmerz, so ist das ein Zeichen, daß der Splitter schon dem Zuge folgt, vielleicht schon den Strahlenkörper auf seinem Wege berührt, und es wird dann um so vorsichtiger vorgegangen werden müssen.

Der Splitter, der hinter die Regenbogenhaut vorgerückt ist, hat nun durch die Pupille in die vordere Kammer gebracht zu werden. Der Verletzte hat das Auge nach der Seite zu drehen, wo sich der Splitter befindet. Hat sich die Regenbogenhaut z. B. unten vorgewölbt, so wird das Auge bei starkem Blicke nach unten, wie früher wieder allmählich dem Pol des Magneten, dessen Strom wieder eingeschaltet wurde, genähert, und zwar so, daß der entgegengesetzte Limbus, also in unserem Falle der obere, mit ihm in Berührung kommt. Dadurch wird der Splitter hinter dem Pupillarrande in die vordere Kammer gezogen.

#### **Ausziehung des Fremdkörpers aus der vorderen Kammer.**

Über die Ausziehung aus der Eintrittsstelle wurde schon früher kurz berichtet. Meist ist sie so klein, daß sie nicht in Betracht kommt, zumal da eine Verlängerung aus optischen Gründen oft abgelehnt werden muß. Was daher die Ausziehung des Splitters aus der vorderen Kammer anbelangt, verhalten sich die frischen Verletzungen nicht wesentlich verschieden von denen älterer Herkunft.

Durch die Kraft des Magneten wird der Splitter so an die hintere Hornhautwand gezogen, daß er daran hängen bleibt, oder er fällt nach Aufhören der magnetischen Wirkung auf die Regenbogenhaut oder in den Kammerwinkel, wo er, wenn er entsprechend klein ist, vollständig verschwindet. Zu seiner Entfernung aus der vorderen Kammer wird ein ausgiebiger Einschnitt mit der Lanze meistens unten abgelegt. Der Schnitt darf nicht zu klein sein, damit die Pinzette oder der Ansatz des kleinen Magneten leicht in das Auge eingeführt werden können, ohne die Hornhaut oder Regenbogenhaut zu quetschen. Es ist eines Versuches wert, Schnitt und Ausziehung des Fremdkörpers in *einem* Schritte durchzuführen, indem der Gehilfe, während die Lanze eingeführt wird, durch Anlegen des kleinen Magneten an die Hornhautoberfläche den Splitter an der hinteren Hornhautwand ungefähr in der Mitte der Hornhaut festhält.

Während nun die Lanze aus dem Auge herausgezogen wird, bewegt der Gehilfe den Magnet an der Oberfläche der Hornhaut in gleicher Richtung, so daß der Splitter entlang der Oberfläche der Lanze gleichzeitig mit ihr aus der Wunde hervorkommt. Leider ist der Handmagnet häufig nicht stark genug, den Splitter durch die Hornhaut hindurch genügend kräftig anzuziehen und nach Belieben zu lenken. Ist der eben beschriebene Versuch nicht gelungen, so wird der Splitter aus der vorderen Kammer durch die Wunde mit dem Handmagneten herausgeholt, indem dessen Ansatz durch die Wunde in die vordere Kammer eingeführt und nahe an den Fremdkörper herangebracht wird, damit seine Kraft genug zur Geltung kommt, den Splitter anzuziehen. Da die verschiedenen Ansätze des Magneten doch alle ziemlich dick sind, ist es schonender, den Fremdkörper mit einer Pinzette zu fassen und herauszuziehen. Manchmal gelingt es mit dem DAVIELSchen Löffel, indem er unter den Fremdkörper geschoben wird, den Splitter an die hintere Hornhautwand zu drücken und ihn in der von dem Löffel dargestellten Rinne aus dem Auge herausgleiten zu machen. Bei allen diesen Eingriffen muß dafür Sorge getragen werden, daß der Splitter nicht hinter der Regenbogenhaut verschwindet, sei es, daß er nach unten fällt oder durch ein Instrument nach oben hinter die Pupille geschoben wird. Um ihn wieder sichtbar zu machen, muß bei Versagen des Handmagneten wieder der große Magnet herangezogen werden, insbesondere, wenn ein winziger Splitter unten im Kammerfalze verschwunden ist.

Die Regenbogenhaut darf nur ausgeschnitten werden, wenn sie durch die Verletzung selbst arg beschädigt wurde oder aber ausnahmsweise bei der Ausziehung stark gelitten hat. Wenn nach Durchbohrung der Linse die Kapselwunde durch die Regenbogenhaut verschlossen wird, so kann die Linsentrübung gering und umschrieben bleiben. In einem solchen Falle soll bei der Ausziehung die die Kapsel bedeckende Regenbogenhaut auf alle Fälle geschont werden.

Gelingt es nicht, den hinter der Regenbogenhaut liegenden Fremdkörper durch die Pupille nach vorne zu bringen oder besteht die Gefahr, durch die Kraft des Magneten dabei die Regenbogenhaut einzureißen oder von ihrem Ansätze abzureißen, so wird auf die Mitwirkung des Magneten verzichtet, der Einschnitt mit der Lanze am Limbus, der Lage des Fremdkörpers entsprechend gemacht und die Regenbogenhaut, wenn sie nicht von selbst in die Wunde vorfällt, mit dem am Pupillarrande eingesetzten stumpfen Häkchen so aus der Wunde vorgezogen, daß ihre hintere Seite nach vorne gerichtet ist. Dadurch wird der Splitter bloßgelegt und kann mit der Pinzette weggehoben oder mit dem Handmagneten weggezogen werden. Die Regenbogenhaut wird darauf sorgfältig zurückgestrichen.

**b) Großer Splitter, besonders wenn er scharfe Zacken hat und unregelmäßig gebogen ist.** Ein großer Splitter wird wegen der Gefahren, die den inneren Augenhäuten drohen, wenn er, durch den großen Magneten mächtig angezogen, plötzlich nach vorne schnell, durch einen Einschnitt in die Lederhaut mit dem Handmagneten herausgezogen; denn dieser wirkt auf die größere Eisenmasse des Splitters sicher genügend stark, daß er ihn anzieht, auch wenn er nicht bis in seine nächste Nähe gebracht wurde.

*Ausziehung eines Eisensplitters aus dem Glaskörperaume durch einen meridionalen Schnitt der Lederhaut nach HIRSCHBERG.*

Die örtliche Betäubung erleichtert den Eingriff wesentlich und genügt, außer es handelt sich um unvernünftige nervöse Leute oder stark gereizte Augen, besonders bei beginnender Entzündung.

Einspritzen einer 1%igen Cocainlösung mit Adrenalinzusatz hinter das Auge setzt den Glaskörperdruck herab und wirkt dem Vortreten des Glaskörpers durch die Lederhautwunde entgegen.

Bei allgemeiner Betäubung muß das Auge durch einen Leitfaden, der am Limbus in dem Meridian angelegt wird, wo nach der Lage des Fremdkörpers der Einschnitt in die Lederhaut zu machen ist, in der gewünschten Stellung festgehalten werden. War der Fremdkörper mit dem Augenspiegel sichtbar gewesen, so wurde seine Lage vorerst nach den bei den Netzhauttrissen angegebenen Regeln bestimmt; sonst hat der Röntgenbefund Auskunft über seine Lage zu geben. Die Bindehaut wird eingeschnitten und die Lederhaut bloßgelegt. Ein GRAEFE'sches Messer vollführt nach den bei der hinteren Sklerotomie angegebenen Regeln einen meridionalen Einschnitt von mindestens 5 mm Länge. Die Lage des Schnittes hängt von der des Fremdkörpers ab. Je näher der Schnitt, der auch den Glaskörper scharf durchtrennt, wenn der Splitter inmitten dieses Raumes gelegen sein sollte, dem Splitter zu liegen kommt, um so sicherer wirkt der Magnet auf ihn ein, und um so weniger wird durch das Herumführen des Ansatzes im Glaskörper dieser zertrümmert werden. Hilfreich greift nicht selten der Umstand ein, daß unmittelbar nach dem Einschneiden der Splitter durch eine gegen die Wunde gerichtete Flüssigkeitsströmung in diese hineingeschwemmt wird und sich in ihr einstellt.

Die Wundränder werden mit feinen nicht magnetischen Doppelhäkchen vom Gehilfen auseinandergehalten. Jeder Druck auf das Auge ist dabei zu vermeiden, um den Glaskörper nicht hervorquellen zu machen. Einer der starken Ansätze des Handmagneten wird zunächst nur an die Wunde gebracht. Das Anschlagen des Fremdkörpers kann deutlich gehört werden. Erscheint er nicht, so wird mit einem der längeren geraden oder gekrümmten Ansätze in die vermutete Richtung des Fremdkörpers eingegangen. Längeres Einwirkenlassen des Magneten und Zuwarten ist nicht selten geboten, bis der Splitter Folge leistet. Beim Durchziehen des Splitters durch die Lederhautwunde ist Vorsicht zu üben, um den Splitter nicht daran abzustreifen. Nötigenfalls kann er, da hier bereits frei sichtbar, mit einer nicht magnetischen feinen Pinzette gefaßt und völlig aus dem Auge herausgezogen werden. Die Bindehaut wird über der Wunde vernäht. Der Kranke bleibt mehrere Tage zu Bette. Die Bindehautnähte werden nach 5—6 Tagen entfernt. Bei reizlosem Verlaufe kann der Kranke nach ungefähr 2 Wochen aus der Anstalt entlassen werden.

B. Eintrittspforte im Grenzgebiete der vorderen Kammer und in der Gegend des Strahlenkörpers; Linse unverletzt.

Mit Rücksicht auf die Linse wird der Splitter durch einen meridionalen Lederhautschnitt herausgezogen. Die Wunde in der Gegend des Strahlenkörpers wird nicht als Ausgangspforte verwendet, da sie nicht erweitert werden darf und wegen des Strahlenkörpers gar nicht berührt werden sollte.

C. Wunde im Bereiche des Glaskörperaumes; Linse nicht verletzt.

Da besonders zackige und windschief gebogene Splitter bei dem Versuche, sie in die vordere Kammer zu ziehen, auf dem Wege um die Linse diese ver-

letzen könnten, werden sie durch die Lederhaut ausgezogen. Es wird zuerst ein Versuch mit dem Handmagneten gemacht, indem dessen Ansatz zwischen die Wundränder gebracht, aber nicht in den Glaskörperraum eingeführt wird. Reicht aber seine Kraft nicht aus, den Splitter vorzuziehen, ohne daß er näher an ihn herangebracht wird, so tritt der große Magnet in seine Rechte. Da bei werden dieselben Vorsichtsmaßregeln, die früher beschrieben worden sind, eingehalten. Die Wunde wird durch Einschneiden der Bindehaut bloßgelegt und, wenn notwendig, entsprechend vergrößert, wenn ihre Lage dies gestattet. Um für den Splitter genügenden Raum zu schaffen, werden die Wundränder mit nicht magnetischen Doppelhäkchen (Neusilber) auseinandergehalten. Nach vollendetem Eingriffe wird die Bindehautwunde durch eine Naht verschlossen.

### Verfahren bei alten Verletzungen.

Die Augen, die zur Ausziehung eines Eisensplitters erst längere Zeit nach der Verletzung kommen, beherbergen fast ausschließlich nur einen kleinen Splitter in sich. Denn die Anwesenheit eines großen Eisensplitters im Auge erzeugt alsbald so schwere Veränderungen, daß das Sehvermögen gänzlich erlischt, das Auge unter mehr oder weniger heftigen Entzündungserscheinungen schrumpft und nur noch zur Ausschälung bestimmt werden kann.

Entscheidend für die Wahl des Verfahrens ist auch hier wieder der Zustand der Linse.

A. Verfahren bei trüber Linse, gleichgültig, wo die Eingangspforte gelegen war.

Vorziehen des Splitters mit dem Riesenmagneten in die vordere Kammer nach den früher beschriebenen Grundsätzen.

Häufig läßt der Splitter auf sich warten, da er durch Verwachsungen in seinem Bette festgehalten wird. Man lasse den Strom bei hart an den Pol angelegtem Auge längere Zeit einwirken, wiederholt unterbrechen und wieder in der ganzen Stärke einschalten, um ihn durch die plötzlich einsetzende Zugkraft freizumachen: ein Vorgehen, das nie beim ersten Ausziehungsversuch gestattet ist, weil ein dem Zuge sofort nachgebender, namentlich größerer Fremdkörper die inneren Augenhäute mit sich reißen könnte.

Oft tritt der gewünschte Erfolg erst nach wiederholten, länger dauernden Sitzungen ein. Die Schwierigkeiten können besonders groß werden, wenn der Splitter sehr klein ist und sich teilweise schon chemisch verändert hat.

Erscheint der Splitter nicht hinter der Regenbogenhaut, so kann der Versuch gemacht werden, ihn durch Anlegen der Magnetspitze weit rückwärts in der Gegend des Äquators durch einen Zug in der Richtung nach rückwärts aus seinen Verbindungen freizumachen. Unbedingt muß vermieden werden, ihn in den Strahlenkörper hineinzutreiben, weil er von dort kaum mehr und nur unter schweren Schädigungen dieses empfindlichen Gebildes entfernt werden kann. Die Überleitung von der Hinterfläche der Regenbogenhaut in die vordere Kammer und die Ausziehung aus dieser geschieht wie früher beschrieben.

Versagt der große Magnet, so hat auch ein Versuch, den Splitter mit dem Handmagneten durch die Lederhaut herauszuziehen, fast keine Aussicht auf Erfolg. Er käme aber bei fortschreitender Verrostung oder Entzündungserscheinungen trotzdem in Betracht.

Der Eingriff kann aber nur dann ohne Gefahr, dem Auge schweren Schaden zuzufügen, ausgeführt werden, wenn eine genaue Lagen- und Größenbestimmung des Splitters vorhergegangen ist. Hier tritt die Untersuchung mit den Röntgenstrahlen in ihre vollen Rechte und ohne sie sollte kein derartiger Eingriff unternommen werden.

B. Bei durchsichtiger Linse wird der Splitter mit dem Handmagneten nach HIRSCHBERG durch die Lederhaut herausgezogen, wenn er nicht sehr klein ist und der Mangel einer glatten Oberfläche eine Verletzung der Linse beim Vorziehen in die vordere Kammer befürchten läßt. Sonst wird auch hier der Riesemagnet vorgezogen. Bei durchsichtiger Linse wird der Eingriff auch ohne Lichtbildaufnahme insofern auf eine sichere Basis gestellt, als in die Lage des Splitters unmittelbar mit dem Augenspiegel Einblick genommen werden kann.

Der Handmagnet versagt bei kleinen, schon teilweise verrosteten und durch Bindegewebe zu stark festgehaltenen Splittern. Seine Kraft reicht dazu nicht aus. Es darf dann der Versuch nicht vernachlässigt werden, die Spitze des großen Magneten an die Lederhautwunde anzulegen, was bei örtlicher Betäubung durch die Mithilfe des Verletzten ein leichtes ist. Aber auch selbst die Kraft des Riesemagneten ist in seltenen Fällen nicht imstande, den Splitter aus dem Auge zu befördern, so daß davon endgültig Abstand genommen werden muß.

#### **Allgemeine Bemerkungen über den späteren Verlauf.**

Sind bei einer frischen Verletzung durch Eisensplitter schon Anzeichen einer eitrigen Infektion vorhanden, so hat die Ausziehung des Fremdkörpers nur noch in Ausnahmefällen einen günstigen Einfluß auf den weiteren Verlauf der Entzündung. Die Eiterkeime werden begreiflicherweise mit dem Splitter nicht mehr vollzählig entfernt, da sie sich bereits in dem guten Nährboden des Glaskörpers verbreitet und reichlich vermehrt haben. Die Eiterung geht daher meist ihren Weg weiter. Nur selten gelingt es den natürlichen Schutzkräften des Auges, ihrer Herr zu werden. Unsere Behandlung vermag dagegen auch nur wenig auszurichten. (Atropin, Dionin, heiße Umschläge, Einspritzungen von Sublimat- oder Oxycyanatlösungen unter die Bindehaut, intramuskuläre Milch-, intravenöse Cytotropineinspritzungen, Kurzwellenbestrahlungen.)

Aber auch ohne Eintritt einer akuten Infektion und trotz fachgerechter Ausziehung des Splitters drohen diesen Augen noch ernste Gefahren. Je größer der eingedrungene Splitter war, um so schwerer sind die durch ihn gesetzten anatomischen Schädigungen und Zerstörungen, deren Heilung durch Entwicklung von Narbengewebe selbst bei völlig entzündungsfreiem Verlaufe zu Folgen führt, die das Auge zugrunde richten. Durch die Schrumpfung des Narbengewebes wird die Netzhaut schließlich abgehoben und damit die Sehleistung des Auges vernichtet. Besonders gefährlich werden schleichend verlaufende Entzündungen (Iridocyclitis), die manchmal erst nach Wochen beginnen, häufig zur Erblindung des Auges führen und das andere Auge durch sympathische Ophthalmie bedrohen. Jedes Auge, das eine durchbohrende Verletzung erlitten hat, sollte daher durch lange Zeit unter Beobachtung bleiben.

Eisensplitter, die in der vorderen Kammer, in der Regenbogenhaut oder Linse gelegen sind, lassen einen besseren Heilverlauf erwarten als die, die in den hinteren Augenabschnitt eingedrungen waren. Je kleiner der Splitter,

um so günstiger ist voraussichtlich die spätere Leistungsfähigkeit des Auges. Die Zukunft des Auges hängt ferner besonders davon ab, wie lange der Splitter im Auge verblieben ist. Ist lange Zeit seit der Verletzung verstrichen, so ist er meist in eine Schwarte eingebettet und dann stellt sich oft auch trotz gut verlaufener Ausziehung später eine Netzhautabhebung oder eine schleichende Entzündung ein, die zur Ausschälung des Auges zwingt.

### **Nicht magnetische Fremdkörper.**

Durchbohrende Verletzungen des Augapfels werden nicht selten durch Kupferstückchen erzeugt (Explosion von Kupferkapseln), durch Vogeldunst, durch Schrotkörner, durch Steinsplitter (besonders häufige Kriegsverletzung durch Aufschlagen schwerer Geschosse auf Felsen und durch Minenexplosionen), seltener durch feine Holzstückchen, da diese dazu nicht genügend hart sind.

### **Fremdkörper im vorderen Augenabschnitte.**

Die Wunde, die der Fremdkörper in der Hornhaut erzeugt hat, soll zur Ausziehung nur ausnahmsweise mit der Schere erweitert werden. Dazu eignen sich nur periphere Wunden. Die aus dem Einschneiden von Wunden, die nahe der Hornhautmitte gelegen sind, hervorgehende Narbe würde zu einer Verschlechterung des Sehvermögens beitragen. Daher ist ein Lanzenschnitt von genügender Größe, um eine Pinzette bequem einführen zu können, vorzuziehen. Dieser Schnitt kann auch dann ausgeführt werden, wenn die vom Fremdkörper erzeugte Wunde nur zart verklebt war und das Kammerwasser schon während des Waschens des Auges oder beim Anfassen mit der Pinzette entwich und sich die vordere Kammer aufhob. Es kann auch im kammerlosen Auge Lanze oder GRAEFESCHES Messer, ohne die Regenbogenhaut zu verletzen, langsam zwischen dieser und der Hornhaut zum Schnitte vorgeschoben werden. Ist der Splitter in der vorderen Kammer groß und windschief verbogen, so muß beim Herausziehen besondere Sorgfalt verwendet werden, um nicht die Regenbogenhaut oder gar die Linsenkapsel zu beschädigen.

Die vordere Kammer wird meist unten oder außen eingeschnitten, da sie von hier am leichtesten zugänglich ist.

### **Fremdkörper im hinteren Augenabschnitt.**

Vor der Verwendung der RÖNTGENSchen Strahlen konnte ein im hinteren Augenabschnitt befindlicher Fremdkörper dieser Art nur in den seltenen Fällen mit Aussicht auf Erfolg angegangen werden, wo die Augenspiegeluntersuchung noch möglich war, so daß der Sitz des Fremdkörpers bestimmt werden konnte. Sonst blieb ein Eingriff meist ohne Erfolg; es war nur ein Zufall, wenn der Splitter gefunden wurde und die meisten Augen waren der Ausschälung verfallen. Durch die genaue Ortsbestimmung der Fremdkörper mit den RÖNTGENSchen Strahlen wurde der Eingriff bedeutend aussichtsreicher gestaltet. Abgesehen von frischen Eisensplitterverletzungen sollte kein Versuch einer Fremdkörperausziehung aus dem Augeninnern unternommen werden, bevor nicht durch eine sachgemäße Lichtbildaufnahme mit den RÖNTGENSchen Strahlen Größe, Form und Sitz des Fremdkörpers genau bestimmt worden ist. Aber selbst trotz aller dieser Fortschritte gelingt der Versuch der Ausziehung solcher

Fremdkörper noch immer nicht in allen Fällen und ist meist nur von Erfolg begleitet, wenn er innerhalb kurzer Zeit nach der Verletzung unternommen wurde.

Die meisten Fremdkörper (Kupfersplitter, Schrotkörner) fallen wegen ihrer Schwere in den unteren Teil des Glaskörpertraumes, wo sie alsbald von Exsudat eingeschlossen werden. Am leichtesten sind sie zu erreichen, wenn sie außen unten liegen. Der Vorgang bei dem Eingriffe gestaltet sich folgendermaßen:

Örtliche Betäubung bei ruhigen Leuten und nicht gereiztem Auge. Sonst allgemeine Betäubung. Einspritzen von 1%iger Cocainlösung mit Adrenalin-zusatz hinter das Auge zur Herabsetzung des Glaskörperdruckes. Nach ausgiebigem Einschneiden der Bindehaut und Bloßlegen der Lederhaut wird in der Gegend des Fremdkörpers ein meridionaler, mindestens 6—8 mm langer Einschnitt durch die Lederhaut in den Glaskörper gemacht. Mit Doppelhäkchen hält der Gehilfe die Wundränder empor und zieht sie auseinander, damit ein Einblick in das Augennere ermöglicht wird. Verlust von Glaskörper kann dabei vermieden werden, wenn er nicht verflüssigt ist. Wurde die Stelle des Fremdkörpers durch den Einschnitt gerade getroffen, so erscheint er in der Wunde und kann aus ihr mit der Pinzette herausgezogen werden. Ist aber der Fremdkörper nicht gleich in der Wunde sichtbar, so gestaltet sich der Versuch, ihn in dem Glaskörpertraume zu finden, wenig aussichtsreich. Es wird mit einer Irispinzette vorsichtig die nächste Umgebung der Wunde abgetastet, um hier auf ihn zu stoßen. Die Suche wird gelegentlich durch Verwendung der SACHS-schen Lampe erleichtert. Wenn deren Ansatz von einem Gehilfen, ohne Druck auf das Auge auszuüben, seitlich z. B. auf die Hornhaut aufgesetzt wird, so leuchtet die offengehaltene Schnittwunde hellrot auf und in glücklichen Fällen kann der Fremdkörper als schwarzes Gebilde erkannt, mit der Pinzette gefaßt und herausgezogen werden. Nach Beendigung des Eingriffes wird bei klaffender Wunde eine Naht durch die oberflächlichen Schichten der Lederhaut angelegt; für gewöhnlich genügt der Verschuß der Bindehaut allein durch eine oder mehrere Nähte. Der Kranke hat durch mehrere Tage zu Bette zu bleiben.

Ist der Splitter mit dem Augenspiegel sichtbar, so ist es möglich, unter Beobachtung des Vorganges mit dem Augenspiegel im aufrechten Bilde die mit der anderen Hand durch die Lederhautwunde eingeführte Zange an den Fremdkörper heranzubringen und ihn aus dem Auge ohne Zwischenfall zu entbinden. Die Vorhersage ist auch in gelungenen Fällen häufig schlecht wegen der sich später einstellenden Netzhautabhebung. Daher sollte auf jeden Fall der Versuch gemacht werden, mit Hilfe der LARSONSchen Kugel auf endothermischem Wege in der Umgebung des Lederhautschnittes eine flächenhafte Verlötung zwischen Aderhaut und Netzhaut herbeizuführen, um einer späteren Netzhautabhebung vorzubeugen.

**Mißlungene Ausziehung.** Ist es nicht gelungen, den Fremdkörper zu finden, so wird, besonders wenn durch wiederholtes Einführen der Pinzette der Glaskörper oder die inneren Augenhäute sehr gelitten haben, die Ausschälung des Augapfels angeschlossen. Die Einwilligung des Verletzten soll dazu immer vorher erwirkt werden mit dem Hinweisse darauf, daß es eben nur ein Versuch sei, das Auge durch Aufsuchen und Ausziehen des Fremdkörpers zu retten.

**Zuwartendes Verhalten.** Das Vorhandensein eines Fremdkörpers im Augennern (hinteren Abschnitt des Augapfels) erfordert aber nicht in allen Fällen

einen Eingriff. Splitter, die aus einem Stoff bestehen, der erfahrungsgemäß vom Auge nie vertragen wird, wie Eisen oder Kupfer, müssen sobald wie möglich herausgezogen werden, gleichgültig, ob die Verletzung ganz frisch ist oder nicht. Da Eisensplitter auf die Dauer nicht vertragen werden, sondern durch das Auftreten einer schleichenden Entzündung und durch Verrostung das Auge zugrunde richten und da auch in alten Fällen die Anwendung des Magneten gewöhnlich zum erwünschten Ziele, der Entfernung des Splitters, führt, wird in diesen Fällen stets, gleichgültig, wie lange es seit der Verletzung her ist, der Eingriff vorgenommen, um so mehr, wenn schon Erscheinungen eines verderblichen Einflusses des Fremdkörpers nachzuweisen sind. Anders liegt die Sache, wenn Fremdkörper anderer Zusammensetzung im hinteren Augenabschnitt liegen. Von diesen werden Kupfersplitter am wenigsten vertragen und der Versuch der Ausziehung ist auf alle Fälle angezeigt. Wird ein Fremdkörper anderen Stoffes aber in solcher Lage vom Auge ohne Erscheinungen von Reizung oder Entzündung vertragen (Steinsplitter), so wird mit Rücksicht auf die geringe Aussicht auf Erfolg von einem Eingriffe Abstand genommen, da dieser für das Auge gefährlicher ist als die Anwesenheit des chemisch gleichgültigen Fremdkörpers. Die große Erfahrung an den Steinsplittersverletzungen des Auges im Kriege hat uns gelehrt, daß sie vom Auge meist anstandslos vertragen werden, wenn sie nicht Träger von Entzündungskeimen waren. Eine bestimmte Anzahl dieser Augen ist demgemäß von vornherein dem Untergang durch eitrige Entzündung verfallen und kein Eingriff könnte sie davor bewahren. Mit dem Hineingelangen der Keime in den Glaskörperraum ist das Schicksal des Auges besiegelt und bei genügender Virulenz geht das Auge in wenigen Tagen oder Wochen an einer eitrigen Endophthalmitis zugrunde. Größere Steinsplitter richten solche anatomische Verheerungen an, daß die unmittelbare Ausschälung des Auges angezeigt ist. Feine Steinsplitter aber werden, selbst wenn sie auf der empfindlichen Regenbogenhaut liegen, ohne verderbliche Entzündungserscheinungen geduldet und haben nicht angegangen zu werden, zumal, da sie meist in größerer Zahl ins Auge eingedrungen sind und oft frei im Glaskörper herumschwimmen. Nur Splitter, die der Oberfläche des Strahlenkörpers anliegen, sind geeignet, eine schleichende Entzündung mit Schwartenbildung hervorzurufen, die schließlich zur Schrumpfung des Auges führt. Hier wäre ein Versuch der Ausziehung gewiß angezeigt, obwohl der Eingriff als solcher wegen der dabei nicht zu umgehenden Verletzungen des Strahlenkörpers von den verderblichsten Folgen für das Auge begleitet sein kann.

## Sechzehntes Kapitel.

# Verschiedene Eingriffe an der Hornhaut und Bindehaut, an den Lidern und am Glaskörper. Die Tätigkeit des Gehilfen. Die Betäubung.

## Eingriffe an der Hornhaut.

### 1. Die Abrasio corneae.

#### *a) Mit der Lanze oder dem schmalen Messer.*

**Anzeigen.** Gürtelförmige Hornhauttrübung bei sehfähigem Auge, Epithelschwielen bei chronischen Traumen (z. B. Trichiasis) oder über alten Hornhautflecken, Kalkeinlagerungen u. dgl.

**Verfahren.** Nach gründlicher Cocainisierung wird mit der flach an die Oberfläche angesetzten Lanze das krankhafte Gewebe oder die Einlagerung abgetragen, wobei es auch gestattet ist, getrübte oberflächliche Hornhautschichten mitzunehmen. Einzelne Reste können noch mit schabenden Bewegungen des Instrumentes entfernt werden.

#### *b) Mit dem scharfen Löffel.*

**Anzeigen.** 1. Die rezidivierende Blasenbildung, die rezidivierende Erosion.

**Verfahren.** Nach gründlicher Cocainisierung wird das Epithel der Hornhaut in dem erkrankten Bereiche mit dem scharfen Löffel gründlich abgeschabt und die bloßliegende BOWMANSche Membran mit reiner Jodtinktur mittels eines Wattestieltopfers eingerieben. Man hat dabei Sorge zu tragen, daß die Jodtinktur auf die benachbarten Teile der Hornhaut nicht überläuft oder auch über die Bindehaut rinnt. Die durch die Jodtinktur erzeugte Braunfärbung verschwindet in wenigen Stunden. Die Heilung des Epithels erfolgt gewöhnlich in einigen Tagen, während welcher Zeit Verband getragen zu werden hat. Dem Eintritt von lebhaften Schmerzen nach dem Eingriffe kann durch Einstreichen einer 3%igen Cocain- oder Orthoformsalbe vorgebeugt werden.

Die konservative Behandlung bei rezidivierender Blasenbildung und Erosion hat durch die Behandlung mit Buckystrahlen eine so bedeutende Verbesserung erfahren, daß die operative Behandlung bei den genannten Leiden wesentlich eingeschränkt worden ist.

2. Progressive Geschwüre. Es kommen hierbei in erster Linie skrofulöse und ferner andere besonders torpide Geschwüre der Hornhaut in Betracht, wenn sie sich durch die gewöhnliche konservative Behandlung nicht beeinflussen lassen. Mit dem scharfen Löffel wird das erweichte und infiltrierte Hornhautgewebe entfernt und der bloßliegende reine Grund ausgiebig mit unverdünnter

Jodtinktur eingerieben. Bei *Ulcus serpens* versagt diese Behandlung. Hier kommt nur die Kauterisation mit dem Thermokauter in Betracht.

Für torpide Hornhautgeschwüre und für *Ulcus serpens* im Beginne, erweisen sich Bestrahlungen mit Blaulicht nach BIRCH-HIRSCHFELD als wirksam, so daß die chirurgische Behandlung dadurch zurückgedrängt worden ist.

## 2. Die Abtragung von Hornhautgeschwülsten (Dermoid, Epitheliom, Melanosarkom).

Da die Veränderung beim Dermoid bis in die tiefen Hornhautschichten hineinreicht, muß man sich begnügen, den vorspringenden Teil des Knotens mit der Lanze abzukappen und den zurückbleibenden weißen Fleck später einmal durch Tätowierung weniger auffallend zu machen.

Epitheliom und Sarkom erfordern ein radikales Vorgehen. Die Abtragung hat nicht unmittelbar am klinisch sichtbaren Rand der Neubildung zu erfolgen, sondern etwas entfernt davon, sonst bleiben zu leicht Reste der Neubildung zurück, die alsbald zu neuen Wucherungen Veranlassung geben. Besonders im Bereiche der Bindehaut müssen die Geschwülste in einer Entfernung von mehreren Millimetern von ihrem sichtbaren Rande ausgeschnitten werden. Im allgemeinen lassen sich diese Geschwülste von der Hornhaut mit scharfem Lanzenmesser leicht wegschneiden. In der dadurch geschaffenen Wundfläche müssen gesunde Hornhautlamellen bloßliegen. Um sicher zu sein, winzige Reste der Neubildung, die noch im Gewebe versteckt sein mögen und selbst mit der Lupe nicht gesehen werden können, nicht zurückzulassen, wird die Hornhaut- und bloßliegende Sklerafläche ganz gründlich mit dem rotglühenden Thermokauter verschorft. Es ist bemerkenswert, mit wie geringen Reizerscheinungen diese Augen auf die Verbrennung antworten, selbst wenn die Lederhaut bis in ihre tiefen Schichten zerstört worden ist, so daß schon das Dunkle der Uvea durchscheint. Die Wunde der Bindehaut kann durch Nähte passend verkleinert werden. Einstreichen von 1%iger Cocainsalbe mildert die dem Eingriff folgenden Schmerzen. Verband bis zur vollständigen Epithelisierung der Hornhaut. Während Sarkome auch heute noch sobald als möglich operativ beseitigt zu werden haben, wirkt die Radiumbestrahlung bei Epitheliomen so ausgezeichnet, daß selbst Augen, bei welchen der größte Teil der Hornhaut mit dem Tumorgewebe schon bedeckt ist und welche früher der Ausschälung verfallen waren, nicht nur erhalten werden können, sondern sogar noch brauchbares Sehvermögen bekommen können. Ist aber das Epitheliom noch genügend klein, durch den Eingriff mit Sicherheit gründlich entfernt werden zu können, so ist der Eingriff der Bestrahlung vorzuziehen. Nur wenn die Neubildung schon in das Innere des Auges durchgebrochen ist, ist das Auge verloren; ebenso wird in den Fällen, wo das Epitheliom schon in die Tiefe der Orbita vorgedrungen ist, die Entfernung des Auges bei der radikalen Exstirpation der Geschwulst nicht zu umgehen sein.

## 3. Die Verschorfung von Hornhautgeschwüren mit dem Glühstift.

Färbung mit Fluorescein erleichtert es dem weniger geübten Beobachter, das erkrankte Gebiet zu erkennen. Die Verschorfung wird an dem Außenende des Herdes zuerst durchgeführt, um ihn deutlich abzugrenzen, worauf der

eigentliche Geschwürsgrund angegangen wird. Die Schlinge wird in Weißglut gehalten. Sie wird entlang dem infiltrierten Rande geführt und dringt allmählich ziemlich tief in das Gewebe ein. Wegen der bedeutenden Schwellung des Hornhautgewebes im Bereiche des Krankheitsherdes ist eine unerwartet schnelle Durchbohrung nicht zu befürchten. Im allgemeinen ist der Anfänger zu zaghaft und begnügt sich mit einer zu oberflächlichen Verschorfung, so daß in der Tiefe noch Krankheitskeime zurückbleiben. Gegen eine punktförmige Durchbohrung in der Mitte des Herdes ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Eine Punktion mit der Lanze im Limbus erfüllt aber auch den Zweck, den Druck herabzusetzen und das Hornhautgewebe zu entspannen und erlaubt ebenso den Kammereiter zu entfernen. Sie ist daher im allgemeinen vorzuziehen. Sollten in den folgenden Tagen neue Infiltrationsherde sichtbar werden, so ist die Verschorfung zu wiederholen.

Dem Dampfkauter nach WESSELY wird nachgerühmt, daß das Verfahren für das Gewebe schonender sei und daß die Narben weniger dicht seien und mehr zur Aufhellung neigen. Aber er wirkt nicht so unbedingt zuverlässig wie die GlühSchlinge.

#### *Über die wundärztliche Behandlung des Ulcus serpens.*

Bei der Behandlung eines Ulcus serpens betrifft die erste Fürsorge den Tränensack, der im Falle einer Erkrankung sofort entfernt werden muß.

Außer der medikamentösen Behandlung des Ulcus serpens kommen bei Beginn der Krankheit in erster Linie Blaulichtbestrahlungen nach BIRCH-HIRSCHFELD in Betracht. Auch Einspritzungen einer 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub>igen Sublimatlösung unter die Bindehaut in der Menge von  $\frac{1}{10}$ — $\frac{2}{10}$  ccm sind empfehlenswert. Schreitet von da an das Geschwür nicht weiter, so wird diese Behandlung fortgesetzt. Sonst muß ungesäumt die Verschorfung des Geschwüres mit dem Glühstift oder dem Dampfkauter vorgenommen werden. Besonders die gelb infiltrierten Randteile sind tief zu verbrennen. Eine gleichzeitig ausgeführte Punktion der vorderen Kammer übt einen günstigen Einfluß auf den weiteren Verlauf der Erkrankung aus und sollte daher mit Rücksicht auf die Unbedeutendheit des Eingriffes nicht versäumt werden. Das Hypopyon wird dabei gewöhnlich aus dem Auge entfernt. Hat das Ulcus serpens sehr tief gegriffen, so wird die vordere Kammer nach gründlicher Verschorfung des ganzen Geschwüres an einer punktförmigen Stelle, wenn möglich im Bereiche der Pupille mit dem Glühstift eröffnet, so daß das Kammerwasser langsam heraussickert. Die winzige Öffnung ist sehr bald geschlossen und eine Anlotung der Regenbogenhaut nicht zu befürchten.

Die SONDERMANNsche *Trepanation* (Ausstanzen eines 1 mm großen Hornhautscheibchens aus der Mitte des Ulcus serpens mit Hilfe des Handtrepans) hat zwar meist einen sehr guten Einfluß und hat auch den Vorteil, daß die Narbe viel zarter wird als nach der Verbrennung des Geschwüres mit dem Glühstift, hat aber den großen Nachteil, daß sie gelegentlich, infolge Verletzung der vorderen Linsenkapsel durch den eindringenden Trepan zu einer intraokularen Infektion führt, die mit Panophthalmitis endet.

Hat das Ulcus serpens schon mehr als ein Drittel der Hornhaut ergriffen, so kann die Verschorfung nicht mehr zu Ende geführt werden, da wegen der

Zerstörung der Hornhaut in ihrer ganzen Dicke noch vorher die Kammer eröffnet wird und das Wasser abfließt. Für diese vorgeschrittenen Fälle ist die Spaltung der Hornhaut nach SAEMISCH (Abb. 240) angezeigt. Das cocainisierte Auge wird mit der Pinzette unten festgehalten und die Hornhaut im Bereiche des *Ulcus serpens* mit einem GRAEFESCHEN Messer gespalten. Mit der Schneide nach vorne gerichtet, wird das Messer knapp an dem einen Rande des Geschwürs noch im gesunden Teile der Hornhaut in die Kammer ein- und an dem anderen Rande herausgestochen. Das Messer muß ziemlich parallel zur Hornhaut gehalten werden, weil bei etwas steilerer Haltung durch die nach rückwärts gerichtete Spitze die Linse verletzt werden könnte. In langsam sägenden Zügen wird darauf die Hornhaut im Bereiche des Geschwürs von hinten nach vorne gespalten. Der Schnitt wird am besten so angelegt, daß er durch den fortschreitenden gelb infiltrierten Teil des Randes geht. Das Kammerwasser fließt während des Schnittes schnell ab und häufig wird das Hypopyon in die Wunde getrieben. Von hier wird es mit einer Pinzette als zähe Masse herausgezogen. Die vordere Kammer hat daraufhin einige Tage hintereinander durch Niederdrücken der einen Wundlippe mit einem Spatel immer wieder eröffnet zu werden, bis sich das Geschwür gereinigt hat und zu heilen beginnt. Die Spaltung hat nicht immer den gewünschten Einfluß, oft schreitet trotzdem das *Ulcus serpens* weiter und zerstört die ganze Hornhaut. In vielen Fällen jedoch ist der günstige Erfolg




Abb. 240.

nicht zu verkennen. Immerhin hat der Eingriff stets den großen Nachteil, daß dadurch die Regenbogenhaut in großem Ausmaße in die Narbe einheilt. Dies ist aber in den vorgeschrittenen Fällen, wo die Spaltung angezeigt ist, auf keinen Fall zu vermeiden. Um das Eintreten einer Drucksteigerung hintanzuhalten, muß rechtzeitig eine *breite Iridektomie* hinter dem durchsichtig gebliebenen Teil der Hornhaut angelegt werden. Die Drucksteigerung setzt plötzlich ein, gewöhnlich schon wenige Tage nach der Wiederherstellung der vorderen Kammer, nachdem diese nach der Spaltung 1 oder 2 Wochen lang bei noch durchlässiger Narbe und weichem Auge aufgehoben war. Die Drucksteigerung geht mit heftigen Schmerzen einher und führt zu einem Blutaustritt in die junge Narbe. Die vordere Kammer wird aufgehoben und die Narbe staphyloamatös vorgewölbt. In diesem Zustande kann die Regenbogenhaut nicht mehr fachgerecht ausgeschnitten werden. Dies darf daher nicht erst bis zum Eintritt der Drucksteigerung aufgeschoben werden.

#### 4. Die Peritomie.

**Anzeigen.** Hartnäckige, der gewöhnlichen Behandlung trotzen, schmerzhaftes Hornhautgeschwüre, gleichgültig welcher Herkunft, bei denen die Zeichen des Fortschreitens und reichlicher Gefäßbildung miteinander vergesellschaftet sind.

**Örtliche Betäubung.** Durch Einträufeln von 3%iger Cocainlösung mit Adrenalin.

**Der Eingriff.** Knapp am Rande des Limbus entlang dem Teil des Hornhautumfanges, von dem die neugebildeten Gefäße ausgehen und darüber hinaus, wird die Bindehaut mit der Pinzette aufgehoben und mit einer Schere vom Limbus

abgetrennt, der periphere Wundrand mit der Schere ausgiebig unterminiert und das subkonjunktivale Gewebe nach Möglichkeit ausgeschnitten. Auch ein ungefähr 3 mm breiter Bindehautstreifen kann weggeschnitten werden.

**Heilungsverlauf.** Die Wunde bedeckt sich alsbald mit Fibrin und heilt schließlich unter Hinterlassung eines feinen Narbenstreifens.

**Ergebnisse.** Rasche Beeinflussung der Schmerzen, Besserung im Zustande des Geschwüres, gewöhnlich schon am Tage nach dem Eingriff, Verschwinden der Lichtscheu und oft unerwartet schnelle Heilung nach hartnäckigem Bestande der Krankheit vor dem Eingriffe.

Wenn die Peritomie gegen durch alle Verfahren unbeeinflussten Pannus wirken soll, so muß nicht nur ein mehrere Millimeter breiter Streifen der Bindehaut ausgeschnitten, sondern auch die Episklera ausgiebig skarifiziert werden. Auf den Vorschlag von DENIG, in solchen Fällen die Bindehaut um den Limbus im Bereiche des Pannus auszuschneiden und auf die bloßliegende Lederhaut Lippenschleimhaut zu überpflanzen, wurde schon S. 89 hingewiesen.

### 5. Abtragung des Hornhautstaphyloms.

Ein totales Hornhautstaphylom wird nach dem Verfahren von BEER-DE WECKER abgetragen.

Die Bindehaut wird rings um den Limbus wie zur Ausschälung des Auges losgelöst und gut unterminiert und eine Tabaksbeutelnaht angelegt, die zunächst ganz locker gelassen wird. Das Epithel am Limbus und am Rande des Staphyloms wird sorgfältig abgekratzt und dadurch eine Wundfläche geschaffen, wo die am Schlusse des Eingriffes hinübergezogene Bindehaut anheilen kann. Daraufhin wird das Staphylom in der Weise abgetragen, daß seine untere Hälfte zunächst nach Art eines Starschnittes mit dem GRAEFESchen Messer eingeschnitten wird. Der so gebildete Lappen wird mit der Pinzette gefaßt und mit der Schere die obere Hälfte des Staphyloms entlang dem Limbus abgeschnitten. Oben und unten wird ein schmaler Randsaum zurückgelassen, durch den die Nähte gelegt werden. Diese werden zwar sofort durchgeführt, aber nur lose verschlungen. Erst nachdem durch Eröffnung der Linsenkapsel die Linse aus dem Auge entbunden worden ist, werden die Fäden rasch zusammengezogen, um einem Glaskörperverlust vorzubeugen. Schließlich wird die Wunde in der Bindehaut durch Zusammenziehen der Tabaksbeutelnaht geschlossen.

In ganz jungen, noch dünnwandigen Staphylomen kann der Versuch gemacht werden, durch eine einfache Spaltung die Narbe schließlich flach zu bekommen. Ein bogenförmiger Schnitt nach Art eines Starschnittes wird so geführt, daß aus der Wand des Staphyloms ein Lappen gebildet wird. Da sich der Lappen zurückzieht, beginnt die Wunde zu klaffen; dies kann noch durch Ausschneiden eines schmalen Saumes des Lappens vermehrt werden. Die Linse wird durch Einreißen der vorderen Kapsel entfernt. Druckverband während der Verheilung sucht die Narbe flach zu gestalten.

Die Abtragung des Staphyloms hat vor der Ausschälung des Auges nur den einen Vorteil, daß ein beweglicher Stumpf zurückbleibt, der dem Kunstauge eine gute Unterlage bietet. Dagegen wird durch den Eingriff keine unbedingte Sicherheit vor sympathischer Ophthalmie geschaffen. Es soll daher dem Kranken die Ausschälung des Auges empfohlen und die Staphylomabtragung nur bei

Ablehnung dieser vorgenommen werden, nachdem er darüber aufgeklärt worden ist, wie verderblich die Folgen seiner Weigerung möglicherweise werden können. Unverständlich sind die Versuche, das totale Hornhautstaphylokom durch die ganze Hornhaut eines anderen Auges zu ersetzen.

### 6. Über die Tätowierung der Hornhaut.

Zur Tätowierung eignen sich nur derbe, flache Narben der Hornhaut. Neigen sie zur Ausdehnung oder sind sie verdünnt, so ist davor entschieden zu warnen. Vorsicht ist bei Augen geboten, welche an schwerer Iridocyclitis gelitten haben. Denn diese könnte durch den traumatischen Reiz von neuem angefaßt werden.

#### *Über den Zeitpunkt der Tätowierung.*

Zur Tätowierung hat erst geschritten zu werden, wenn jede Aussicht auf eine weitere Aufhellung einer Hornhautnarbe geschwunden ist. Dies kann teilweise aus der unmittelbaren Beobachtung der narbigen Stelle erkannt werden, teils aber nur aus dem Umstand erschlossen werden, daß keine weitere Verbesserung des Sehvermögens mehr auftritt. Eine bestimmte Zeitgrenze aber, wie lange sich nach der Entzündung die Narbe noch immer weiter aufhellen kann, kann nicht angegeben werden. Daß sich die Aufhellung von Hornhautnarben nur sehr langsam vollzieht, ist bekannt. Je jünger der Patient, um so rascher pflegt sie vor sich zu gehen, je älter der Patient um so langsamer. Aber wie lange noch immer die Narbe weniger dicht und mehr durchsichtig werden kann, kann auch nicht annähernd im Einzelfalle vorher bestimmt werden. Insbesondere nach Keratitis parenchymatosa ist die Aufhellung nicht nur langsam, sondern erstreckt sich namentlich auch auf einen außerordentlich langen Zeitraum, besonders bei älteren Leuten. Die Lage ist um so schwieriger zu beurteilen, da es sich ja gar nicht darum handelt, daß sich zur weiteren Verbesserung des Sehvermögens die ganze Narbe mehr oder weniger aufhellen muß, sondern sehr häufig hängt die Frage der Verbesserung, manchmal sogar wesentlichen Verbesserung des Sehvermögens von der Aufhellung der weniger getrübbten Randteile der Narbe ab. Wenn wir also auch sicher sein können, daß sich die nach einem Ulcus serpens zurückgebliebene, zentral gelegene Narbe nicht mehr aufhellen wird, so ist doch damit noch nicht die Frage der Tätowierung gelöst; denn es mögen sich die weniger getrübbten Randteile der Narbe im Laufe von Monaten noch aufhellen und auf diese Weise ein Teil der Pupille frei und das Sehvermögen wesentlich gebessert werden. Das gleiche gilt natürlich für die peripher sitzenden Narben, die mit ihrem Randteil die Pupille erreichen und dadurch das Sehvermögen stören.

Daraus folgt, daß man sich mit der Tätowierung nicht zu beeilen hat, sondern besser viele *Monate* (nicht Wochen!) darüber vergehen lassen und daß eine Tätowierung erst nach sorgfältiger Erwägung und Beobachtung des Falles durchgeführt werden soll.

Es darf auch nicht vergessen werden, daß aus den jugendlichen Narben, welche noch zahlreiche Gefäße enthalten und einem lebhafteren Stoffwechsel ausgesetzt sind, die eingebrachten Farbstoffe viel rascher ausgeschwemmt werden als aus alten Narben, deren Blutgefäße verodet sind und deren Stoffwechsel ein äußerst träger ist.

**Zweck der Tätowierung.** 1. Kosmetische Verbesserung. Der entstellende weiße Fleck soll weniger auffallend gemacht werden. Diese Anzeige gilt also für die ganz dichten weißen Narben, für die Leukome, wie sie nach großen Geschwüren, insbesondere *Ulcus serpens* zurückbleiben. Um den richtigen Schönheitserfolg zu erzeugen, ist auf die Dosierung der Tätowierung große Sorgfalt zu verwenden. Ein intensiv schwarzer großer Fleck kann ebenso entstellen wie vorher der weiße. Nur das Pupillargebiet darf intensiv schwarz gefärbt werden, die Randteile müssen den Farbstoff spärlich enthalten, um einen helleren Eindruck zu erzielen. Zarte *Maculae* sind oft weniger entstellend als dichte schwarze, durch die Tätowierung erzeugte Flecken. Man vergesse ferner nicht, daß bei Helläugigen der schwarze Fleck mehr entstellen kann als eine verhältnismäßig zarte Narbe.

Aus kosmetischen Gründen kann auch die Tätowierung einer durchsichtigen Hornhaut in ihrer Mitte gemacht werden, um eine weiße Schwarte in der Pupille oder eine dichte weiße Katarakta zu verdecken, wenn eine Ausziehung des Stares für das Auge als gefährlich gelten würde.

2. Optische Verbesserung. Diese 2. Anzeige macht die Frage der Tätowierung unabhängig von der Dichte der Narbe. Denn es kann sein, daß eine dichte Narbe, welche den Durchtritt der Lichtstrahlen völlig verhindert, weniger stört als eine zarte Narbe, welche die durchtretenden Strahlen unregelmäßig bricht und zerstreut. So kann es wünschenswert erscheinen, eine Narbe zu tätowieren nicht aus kosmetischen Gründen, sondern aus rein optischen. Es ist auf S. 326 beschrieben worden, wie die Narbe versuchsweise tätowiert werden kann, um den optischen Erfolg im vorhinein zu erkennen.

**Verfahren. 1. Die Tuschetätowierung.** a) *Mit Nadeln.* Die zur Tätowierung verwendete chinesische Tusche (auch Kerzenruß wurde verwendet) wird mit einer Büschelnadel durch Stichelungen in die Narbe hineingebracht, oder mit der zur Aufnahme des Farbstoffes mit einer Rinne versehenen Nadel einverleibt. Es ist vorteilhaft, vorher das Epithel in dem zu färbenden Bezirke mit einer Lanze abzuschaben. Um eine genügende Färbung zu erzielen, müssen nicht selten mehrere Sitzungen vorgenommen werden. Das Auge wird durch wiederholtes Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung unempfindlich gemacht. Die Bindehaut wird zum Festhalten des Auges mit einer breiten, zart geriffelten, mit Kautschuk überzogenen Pinzette (nicht Hakenpinzette) angefaßt, da an den Stellen von Einrissen der Farbstoff haften bliebe.

Die Büschelnadel ist der Rinnennadel vorzuziehen. Nur für die genaue Ausarbeitung des Randes eignet sich die Rinnennadel besser. Die Büschelnadel wird senkrecht aufgesetzt und erzeugt eine Reihe von knapp nebeneinander liegenden Punkten gleichzeitig, erlaubt also ziemlich schnelles Arbeiten. Dabei besteht weniger Gefahr, die Hornhaut zu durchbohren als bei Anwendung der Rinnennadel. Diese hat in schräger Richtung eingestochen zu werden. Sollte ausnahmsweise einmal die Narbe durchbohrt werden und der Farbstoff in die Kammer eingetreten sein, so müßte diese mit einem Lanzenschnitte eröffnet und ausgewaschen werden.

b) *Nach FRÖHLICH.* Ein ausgezeichnetes Verfahren, eine runde schwarze Pupille nachzuahmen, wurde von FRÖHLICH angegeben. Es ist bei großen und dicken flachen Narben empfehlenswert. Der Lage und der Größe der Pupille

des anderen Auges entsprechend, wird in die Narbe mit einem HIPPELSchen Trepan eine oberflächliche Furche eingeschnitten, und mit der flach angesetzten Lanze werden die obersten Schichten der Narbe — enthaltend Epithel und einige Lamellen — in Form eines Scheibchens abgetragen. Der bloßliegende Grund wird mit der Schneide der Lanze in den verschiedensten Richtungen zart eingeschnitten und die Tusche gut eingerieben. Auf diese Weise entsteht ein gesättigt gleichmäßig schwarzer runder Fleck, der eine Pupille außerordentlich gut nachahmt. Die Umgebung wird dann mit der Büschelnadel gestichelt, bis sie entsprechend dunkel gefärbt ist.

Meist ist die Tätowierung nur von einer geringen Reizung des Auges gefolgt.

Es ist aber nicht richtig, daß alle Hornhautnarben die Einlagerung von Farbstoffen vertragen. Manche reagieren schon sofort mit einer heftigen Entzündung, die selbst zur Infiltration und Abstoßung der tätowierten Hornhautlamellen führen kann, ohne daß man ein Recht hätte, von einer operativen Infektion zu sprechen; andere können nach Jahren Reizerscheinungen (Blasenbildung, starke Injektion, heftige Schmerzen usw.) zeigen, die immer wiederkehren und erst verschwinden, wenn man die Narbe gründlich auskratzt und den Farbstoff entfernt.

Selbstverständlich muß bei der Tätowierung volle Asepsis gewahrt werden, dazu gehört außer der Keimfreiheit des Bindehautsackes die Keimfreiheit der Tusche, welche am besten durch Sterilisierung im Trockensterilisator ( $160^{\circ}$   $\frac{1}{2}$  Stunde lang) und Anreiben mit keimfreiem Wasser erreicht wird. Sonst kann eine schwere Infektion zustande kommen, die selbst zur Einschmelzung der Hornhaut führen kann.

Die Tätowierung — richtige Anzeigen vorausgesetzt — ist ein recht seltener Eingriff. Unter ungefähr 1000 Operationen meiner Klinik während eines Jahres wurden im Jahre 1936 6 Tätowierungen, im Jahre 1937 unter 1400 Eingriffen nur 2 Tätowierungen, vorgenommen.

**2. Die farbige Tätowierung.** Indem man das Schwarz der Tusche in verschiedener Dichtigkeit in das Gewebe bringt, kann das tiefe Schwarz der Pupille einerseits und die hellere Farbe der peripheren Teile, welche die Iris nachahmen sollen, recht gut nachgemacht werden. Man muß sich nur bemühen, das Weiß des Narbengewebes und Schwarz der Tusche durch die Stichelungen mit den Tuschenadeln in richtigem Maße zu verteilen, um den gewünschten kosmetischen Erfolg zu erzielen. Die Täuschung ist für den Laien meist gut genug. Um die Farbe der Regenbogenhaut besser nachzuahmen, wurden verschiedene Farbstoffe empfohlen. Wir verwendeten gelegentlich aus der Farbenfabrik von Günther und Wagner (Hannover-Wien) stammende Farben: Zölinblau, Zinnober, Graphitgrau und Elfenbeinschwarz. Aber die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend.

**3. Die Tätowierung auf chemischem Wege.** Eine 2%ige Lösung von Goldchlorid wird 3—4 Minuten auf die des Epithels entblößte Stelle einwirken gelassen (Verfahren von P. KNAPP). Auch die Tätowierung auf chemischem Wege (mit Gold- oder Platinchlorid) haben wir wieder verlassen. Die Ergebnisse sind nicht nur unsicher, was die erzielte Farbe selbst und ihre Haltbarkeit betrifft, sondern es sind auch unmittelbare und spätere Zwischenfälle bekanntgeworden, die das Tätowieren auf chemischem Wege nicht ratsam erscheinen lassen. Un-

mittelbar nach der Tätowierung stellt sich besonders bei Vorhandensein einer Verlötung der Iris mit der Narbe gelegentlich Iritis mit Hypopyon ein. Auch die Hornhaut selbst reagiert gelegentlich in der Umgebung mit tiefer Infiltration, die schließlich zu einer intensiv weißen Narbe, auch zu keloidartiger Narbe führt unter Verschwinden der Farbe selbst. Auch Veränderungen der Farbe, z. B. Umwandlung in leuchtendes Rot, sind beschrieben worden.

Die Farbe verschwindet im allgemeinen mit der Zeit wieder, auch aus der durchsichtigen Hornhaut. Diese färbt sich besser als die leukomatöse und anfänglich scheint das Ergebnis sehr gut zu sein. Bei Leukom färbt sich hauptsächlich der nicht so dicht vernarbte Randteil, so daß nicht selten ein schwarzer Ring mit hellem, grauem bis weißem Zentrum erscheint.

### 7. Wundärztliche Behandlung des Keratokonus.

Durch die Vervollkommnung der Haftgläser, die bekanntlich von FICK schon im Jahre 1888 verwendet worden sind, hat die wundärztliche Behandlung des Hornhautkegels eine wesentliche Einschränkung erfahren. Sie stellte auch wegen der umständlichen und lange dauernden Nachbehandlung an die Geduld des Kranken große Anforderungen. Überdies gelingt es nie durch einen Eingriff eine so bedeutende Verbesserung des Sehvermögens zu erzielen als mit den Haftgläsern in einfacher Weise in *einer* Sitzung. Denn nach jedem Eingriff bleibt infolge der zentralen Hornhautnarbe, die zur Abflachung des Kegels erzeugt worden ist, ein starker irregulärer Astigmatismus zurück, der erst wieder der Korrektur mit komplizierten Gläsern bedarf und dem Auge meist doch nur eine recht mäßige Sehschärfe (6/24—6/18) wiedergibt. Das Haftglas dagegen vermag die Sehschärfe sehr häufig bis zur normalen Höhe zu heben. Es ist noch eine Frage, ob das Tragen des Haftglases nicht auch einen günstigen Einfluß auf die Krankheit selbst ausübt, insofern als sich der Hornhautkegel durch die ihm dargebotene Gegenstütze nicht weiter ausdehnt. Besonders der neue, von der Firma Zeiß in den Handel gebrachte Satz von Haftgläsern macht es leicht, das passende Aufsatzglas zu finden, das dem Kranken zur normalen Sehschärfe verhilft. Die Gläser werden von den meisten Kranken getragen. Es empfiehlt sich, die Kranken allmählich an das Tragen des Glases zu gewöhnen, bis sie es durch viele Stunden täglich ohne Beschwerden verwenden können. So manche haben durch dieses einfache Verfahren ihre vollkommene Arbeitsfähigkeit wieder erlangt. Die in den letzten Jahren verbreitete Kunde, daß man solche Haftgläser auch zum Ersatze der Brille bei starker Ametropie verwenden kann, hat die grundsätzliche Abneigung vieler Kranker gegen eine solche Art des Tragens des Glases zum Verschwinden gebracht.

Die wundärztliche Behandlung des Hornhautkegels kommt demgemäß nur noch für die Fälle in Betracht, wo das Haftglas nicht getragen wird, also insbesondere bei schon weit vorgeschrittener Erkrankung, wo der Kegel zu spitz vorspringt.

**1. Trepanation der Kegelspitze.** Es wird genau in der Spitze der konischen Vorwölbung mit dem HIPPELSchen Trepan ein Scheibchen von 1 mm Durchmesser aus der ganzen Dicke der Hornhaut ausgeschnitten. Die Pupille ist vor dem Eingriff durch Atropin aufs äußerste zu erweitern und muß nachher dauernd weit erhalten werden, damit sich der Pupillarrand nicht an die Wunde anlöte.

Die den käuflichen Trepanen beigegebenen Kronen sind alle größer als 1 mm. Die 1-mm-Krone muß daher eigens verfertigt werden. Vor größeren Trepankronen sei ausdrücklich gewarnt.

Da die Kegelspitze verdünnt ist, genügen zum Durchbohren einige wenige Drehungen der Krone. Im Augenblicke der Eröffnung der Kammer muß das Instrument zurückgezogen werden, um nicht die vorrückende Linse zu verletzen. Das Kammerwasser stürzt aus der Öffnung rasch heraus, die Pupille wird gleichzeitig bedeutend enger. Die Hornhaut sinkt zusammen und bildet um die Öffnung zahlreiche kleine, radiär gestellte Falten. Dadurch wird die winzige Öffnung noch kleiner gemacht. Beide Augen werden verbunden und der Kranke wird zu Bette gebracht. Schon 5—6 Stunden nach dem Eingriffe wird der Verband gelüftet und Atropin eingeträufelt, um die Pupille, die bei aufgehobener Vorderkammer immer die Neigung hat, enger zu werden, stark erweitert zu halten. Sollte der Pupillarrand bedenklich weit in die Nähe der Wunde gerückt sein, so ist Atropin in trockener Substanz zu verabreichen. Diese Vorsichtsmaßregel hat durchgeführt zu werden, bis sich die vordere Kammer wieder hergestellt hat. Es kann notwendig werden, 3—4mal und öfters täglich Atropin anzuwenden, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Eine Vernachlässigung dieser Vorsichtsmaßregel kann sich schwer rächen. Hat sich einmal der Pupillarrand an die Öffnung angelegt, so gelingt es nur noch ganz ausnahmsweise, ihn durch ausgiebiges Atropinisieren davon freizumachen. Wie leicht aber die Einheilung des Pupillarrandes zu Drucksteigerung und anderen bösen Folgen Veranlassung gibt, ist nur zu bekannt. Bis zur Wiederherstellung der Kammer dauert es in manchen Fällen nur 3—4 Tage, meistens aber länger, 1—2 Wochen. Bis dahin soll Bettruhe eingehalten werden. Auch bleiben beide Augen verbunden. Ist einmal die vordere Kammer hergestellt, so darf das Bett verlassen werden, das gesunde Auge bleibt offen und gleichzeitig wird mit Druckverbänden begonnen, um die Narbe möglichst flach zu machen. Der in den ersten Tagen ausgeübte Druck sei zart, um nicht die Wunde zu sprengen und die vordere Kammer aufs neue zum Verschwinden zu bringen. Er wird aber in den nächsten Tagen so weit gesteigert, als es möglich ist, ohne Schmerzen zu verursachen. Die weitere Anwendung von Atropin richtet sich nur nach dem Grade der Rötung des Auges. Der Druckverband soll durch einige Monate fortgesetzt werden, in den ersten Wochen womöglich ununterbrochen, später aber, wenn die Vernarbung schon weiter vorgeschritten ist, bloß über Nacht durch Anlegen und entsprechendes Zusammenziehen einer elastischen Binde.

Die Narbe, die sich nach diesem Verfahren bildet, ist nicht ganz gleichmäßig rund, wie man sie entsprechend dem Gewebeverluste hätte erwarten sollen, sondern leicht zackig, im übrigen oft so wenig auffallend, daß sie nicht tätowiert zu werden braucht.

Die durch diesen Eingriff gewonnenen Erfolge übertreffen die aller anderen Verfahren weitaus. Die Kleinheit der Narbe macht eine spätere optische Iridektomie überflüssig, die Abflachung der Hornhaut genügt, unter Zuhilfenahme von Gläsern eine hinreichende Sehschärfe wiederherzustellen, und ist in der Mehrzahl der Fälle auch von Dauer. Gegen die Vornahme einer 2. Trepanation bei ungenügender Abflachung neben der Stelle der 1. Trepanation wäre nichts einzuwenden.

Das Ausschneiden der Kegelspitze mit dem Trepan überragt an Sicherheit die anderen Verfahren, die durch Ausschneiden der vorgewölbten Teile die Hornhaut abzuflachen suchen. Das schon von BOWMAN geübte Verfahren der Trepanation der Kegelspitze scheint deswegen in Verruf gekommen zu sein, weil durch Ausschneiden zu großer Stücke schwerste verderbliche Folgezustände hervorgerufen worden sind.

**2. Verschorfung der Kegelspitze mit dem Glühstift.** Das derzeit gangbarste Verfahren, den Keratokonus zu beseitigen, ist die Verschorfung der Kegelspitze mit dem Galvanokauter. Es wird genau die Spitze des Kegels mit der rotglühenden Spitze einer feinen GlühSchlinge betupft. Wer eine ausgiebige Wirkung durch das einmalige Kauterisieren bekommen will, muß sich auch hier entschließen, die Kammer zu eröffnen. Manche ziehen die oberflächliche Kauterisation der Kegelspitze im Vereine mit Eröffnung der vorderen Kammer durch Lanzenschnitt im Limbus vor. Die Narben nach der Kauterisation sind durchschnittlich größer und weniger scharf begrenzt als die nach der Trepanation und erfordern daher Tätowierung und fast immer eine optische Iridektomie. Die optischen Ergebnisse sind daher auch weniger gut als bei der Trepanation.

## 8. Die Hornhautnaht.

**Anzeigen.** Frische reine Hornhautwunden, deren Ränder voneinander abstehen. Dies ist namentlich bei geradlinigen Wunden der Fall, wenn sie länger sind, ferner bei winkligen und bei Lappenwunden.

**Verfahren.** Zum Ruhigstellen der Hornhaut empfiehlt sich die KUHNtsche Pinzette mit hufeisenförmigem Ansatz, die Nadel muß fein und stark gekrümmt sein, als Nahtmaterial wird feinste Seide oder Frauenhaar verwendet. Die, wenn notwendig, vorher mit der Schere geglätteten Hornhautränder werden mit der Nadel in einer Entfernung von 1 mm vom Wundrande entweder in ihrer ganzen Dicke durchstoßen (KUHNt) oder es wird nach CZERMAK die Nadel nur durch die vordere Hälfte der Hornhautdicke durchgeführt, um das Eindringen des Fadens in die vordere Kammer zu vermeiden, was für die weitere Heilung, besonders bei Bindehäuten, welche nach Verletzung des Auges nicht selten sezernieren, gewisse Vorteile hat. Das Knüpfen erfolgt unter genügender Anspannung des Fadens, bis die Wundränder zur Berührung gebracht sind. Die Nähte werden nach 5—6 Tagen entfernt, bis zu welcher Zeit beide Augen verbunden gehalten werden.

**Bemerkungen.** Das Anlegen der Nähte ist schwierig, weil der große Widerstand der Hornhaut einen sehr kräftigen Druck verlangt, um die Nadel hindurchzubringen. Dadurch entsteht eine gewisse Gefahr für den Augenhalt, ausgedrückt zu werden, für die Linse auch dadurch verletzt zu werden, daß die Nadel unter dem kräftigen Drucke nach Durchbohrung der Hornhaut plötzlich rasch vorrückt. In Fällen, wo die Linse verletzt ist und durch den Druck aus der Wunde hervortritt, kann schließlich auch die zarte Hyaloidea einreißen und sich Glaskörper in der Wunde einstellen, ein Ereignis, das für das Auge häufig die ernstesten Folgen hat. Es wird infolgedessen die Hornhautnaht nach Möglichkeit vermieden und es ist vorzuziehen, durch eine Bindehautlappenplastik die Hornhautwunde zu verschließen und die Hornhautwundränder aneinanderzudrücken.

### 9. Die Abtragung des Flügelfelles.

Ein einfaches und zuverlässiges Verfahren ist die *Rücklagerung* des Flügelfelles (Verfahren nach CZERMAK). Die Bindehaut wird durch Einträufeln von 3%iger Cocainlösung unempfindlich gemacht und die Lidspalte mit dem Sperrer geöffnet. Nachdem das Auge nach der dem Flügelfelle entgegengesetzten Seite gewendet worden ist, wird der Hals des Flügelfelles mit einer Hakenpinzette gefaßt und angespannt. Die flach auf die Hornhaut aufgelegte Lanze löst den Kopf (*a*) (Abb. 241) gründlich von dem Hornhautgewebe ab, mit dem er innig verbunden ist. Hier ist die Losschälung vorsichtig vorzunehmen, um nichts von dem fortschreitenden Teile des Flügelfelles an der Hornhaut zurückzulassen. Ist der Kopf einmal frei, so ist der übrige Teil, da er nur locker an die Hornhaut angelötet ist, leicht bis an den Hornhautrand abzuschälen, worauf auch in geringer Ausdehnung die Bindehaut von der Lederhaut abgelöst wird. Der an der Spitze befindliche Randsaum des Flügelfelles wird mit der Schere ausgeschnitten. Darauf wird das Flügelfell um 180° (um den Limbus *b c* als Achse) gedreht, so daß seine wunde Fläche nach vorne gerichtet ist. Seine beiden Ränder (*a b, c a*) verlaufen alsdann gegen die Hornhaut zu voneinander (Abb. 242). Diese werden durch 2—3 passend angelegte Nähte vereinigt, wobei Sorge zu tragen ist, daß keine Wunde am Limbus zurückbleibt. Die 1. Naht wird in senkrechter Richtung in der Nähe des Limbus gesetzt. Es ist empfehlenswert, zwischen den beiden Rändern der Bindehaut mit der Nadel einige oberflächliche Fasern der Lederhaut mitzufassen. Der durch diesen Eingriff erzeugte Vorsprung, den nun das rückgelagerte Flügelfell auf der Bindehaut bildet, verschwindet in kurzer Zeit vollständig.




Abb. 241.




Abb. 242.

Vielfach geübt wird auch zur *Abtragung* des Flügelfelles das Verfahren von ARLT. Das Flügelfell wird mit einer Hakenpinzette an seinem Hals gefaßt, wo es schon von seiner Unterlage abgehoben werden kann, und, wie früher beschrieben, losgeschält. Von seinem sulzigen Kopfe (*a*) darf auf der Hornhaut nichts zurückbleiben. Es dürfen aber auch nicht durch zu tiefes Eindringen mit der Lanze unnötigerweise gesunde Hornhautschichten weggenommen werden, weil die zurückbleibende Narbe dadurch noch dichter wird. Nach Ablösung des Flügelfelles werden durch seinen Körper 2 konvergente Schnitte (*c b* und *b d*) gemacht (Abb. 243). Dadurch wird ein rhombisches Stück ausgeschnitten, das den Kopf und einen Teil des Körpers enthält. Die Wunde in der Bindehaut des Auges wird durch 2 in senkrechter Richtung angelegte Nähte genau gedeckt. Die Wunde in der Hornhaut heilt durch Vernarbung. Daher bleibt für immer eine Trübung zurück.




Abb. 243.

Die vollständige und genaue Deckung der Wunde in der Bindehaut ist von großer Wichtigkeit, weil diese sonst durch das Narbengewebe von neuem auf die Hornhaut hinübergezogen wird.

Zur *Verhütung der Wiederkehr* des Flügelfelles, über die Ärzte in Ländern zu klagen hatten, wo Flügelfelle, häufig in Form von dicken, fleischigen Wülsten, in großer Zahl vorkommen, ist das Verfahren von EDESCUTY zu empfehlen:

Nach dem Ablösen des Flügelfelles bis an den Limbus nach den allgemein gültigen Regeln, wird die Bindehaut je 2 mm nach oben und unten vom Flügelfell entlang dem Limbus mit je 1 Scherenschlag abgetrennt. Vom Endpunkte jedes dieser Schnitte je 1 Scherenschnitt parallel zum Rande des Flügelfelles, ungefähr 12 mm lang. Nunmehr faßt der Gehilfe das Flügelfell bei seiner Spitze und schlägt es um, so daß die Lederhautfläche nach vorne zu liegen kommt. Mit Pinzette und Schere werden alle anhaftenden Bindegewebereste davon abgetragen. Besonders wichtig ist in gleicher Weise das ganze episklerale Bindegewebe vom Limbus an bis in die Gegend des Ansatzes des betreffenden Rectus mit Pinzette und Schere von der Lederhaut loszuschälen und auszuschneiden. Nach Abtragung des glasigen Kopfes des Felles werden die Schnittländer oben und unten durch je 1—2 Nähte verschlossen. Demgemäß bleibt die Bindehaut unverändert in ihrer richtigen Lage. Nachbehandlung wie sonst.

Diese Vorsichtsmaßregeln machen plastische Verlagerungen des Flügelfelles überflüssig.

Alle diese oft recht verwickelten Verfahren wurden ja nur zu dem Zwecke ersonnen, eine Wiederkehr des Felles zu verhindern, indem sie die abgelöste Bindehaut fernab von ihrer richtigen Lage zur Einheilung brachten. Nicht selten blieben nach diesen Eingriffen unschöne rote Wülste dauernd zurück. Nach dem eben beschriebenen Verfahren verschwinden binnen kurzem alle Spuren des Felles und die Lederhaut schimmert weiß durch die zarte Bindehaut hindurch.

## **Eingriffe an den Lidern.**

### **1. Eingriff gegen Blepharochalasis.**

Es wird zuerst bemessen, wieviel von der erschlafften Haut ausgeschnitten werden darf, ohne daß das Lid zu kurz wird. Auch muß noch eine Deckfalte gebildet werden können. Wird die Fascia tarsoorbitalis beim Ausschneiden der Haut mitverletzt, so daß Fett der Augenhöhle vorquillt, so wird dieses mit ausgeschnitten und die Öffnung in der Fascia tarsoorbitalis durch Catgutnähte verschlossen. Beim Verschuß der Hautwunde muß die Haut an den oberen Tarsusrand angenäht werden. Es wird also die Nadel zuerst durch den oberen Wundrand der Haut gestochen, dann an den oberen Tarsusrand verankert und dann erst durch den unteren Hautwundrand geführt. Auf diese Weise wird verhindert, daß die schlaffe Haut zu weit nach unten sinkt.

### **2. Eingriff gegen die Fetthernie (im Volke genannt: Tränensäcke) der Unterlider.**

**Anzeigen.** Aus Schönheitsgründen gegen die entstehenden Vorwölbungen der Unterlider, die namentlich bei älteren Leuten infolge Vordrängens eines Fettwulstes nicht selten auftreten.

**Verfahren nach ELSCHNIG.** Noch vor der Einspritzung zur örtlichen Betäubung ist die Linie des Hautschnittes sorgfältig anzuzeichnen. Der Schnitt hat entlang dem *oberen* Rande des Fettwulstes angelegt zu werden.

**Örtliche Betäubung** durch oberflächliche und tiefe Einspritzungen von Novocain-Adrenalin im ganzen Bereiche des Unterlides.

**Der Eingriff.** Entlang der bezeichneten Linie ein ungefähr 2 cm langer bogenförmiger Hautschnitt, Ablösen der Haut von dem Schließmuskel bis zum

unteren Rande des Fettwulstes. Dort wird der Muskel-Fascienschnitt vorgenommen, entlang und parallel dem Rande der Augenhöhle. Die beiden Schnitte fallen also nicht zusammen.

Der nun freiliegende und sich vorwölbende Fettwulst wird abgetragen. Sorgfältige Blutstillung, womöglich ohne Unterbindung. 1—2 tiefe Nähte durch die Wundränder des Fascienblattes. Sorgfältige Hautnaht mit Frauenhaar oder feinsten Seide. Leichter Druckverband durch 2—3 Tage. Entfernung der Nähte spätestens am 4. Tage.

### 3. Eingriff gegen den Epikanthus nach AMMON-KUHNT.

Die Methode von AMMON, die den inneren Lidwinkel überbrückenden Hautfalten zum Verschwinden zu bringen, indem man auf der Höhe des Nasenrückens



Abb. 244.

ein Hautstückchen in Form einer lotrecht stehenden Ellipse ausschneidet, wurde von KUHNT in folgender Weise verbessert.

Zunächst wird die Breite und Höhe des auszuschneidenden Stückes bestimmt, indem man die Haut des Nasenrückens mit den Fingern oder der Pinzette zu einer Falte zusammenschiebt, welche hinlänglich groß ist, um die den inneren Canthus überdeckenden Hautfalten auszugleichen. Mit einigen Tuschefpunkten bezeichnet man die Grenzen dieses Gebietes. Das obere Ende der Ellipse kommt ungefähr in das Niveau des oberen Randes der Augenbraue zu liegen, erstreckt sich also auf die Haut der Stirne (Abb. 244). Nach subkutaner Injektion zur Anästhesierung wird das abgegrenzte Gebiet mit einem Skalpell bis auf das Periost durchschnitten und die Haut an den Seitenteilen der Nase von dem Periost abpräpariert, von den temporalen Schnitträndern an bis nahe an die Crista lacrymalis anterior. Das umschnittene Hautstück wird aber nicht ausgeschnitten, sondern mit einem bauchigen Skalpell nur angefrischt durch Abtragung der Epidermis und des Stratum Malpighi. Die unterminierte Haut wird dann von beiden Seiten über die Wundfläche gezogen und die Wunde durch mehrere Nähte zu einer senkrechten Linie verschlossen. Zur Naht werden sehr

kräftige Seidenfäden verwendet und diese werden ungefähr 3 mm vom Wundrand angelegt, damit sie einen sicheren Halt haben. Bei aseptischem Vorgehen erfolgt die Heilung per primam.

Waren die Nähte nicht genügend verankert, so daß sie vor Verheilung der Wunde durchschneiden, so ist nicht nur der Erfolg des Eingriffes vereitelt, sondern es bleibt auch eine entstellende Narbe zurück.

**Vorteile des Verfahrens.** Dadurch, daß die Haut — der Epithellage entblößt — auf dem Nasenrücken belassen wird, erzeugen die darüber gelagerten Hautlappen einen höheren Nasenrücken. Dies bedeutet eine wesentliche Verbesserung des kosmetischen Erfolges, da der Nasenrücken dieser Patienten gewöhnlich zu niedrig ist.

Auch die Ptosis, die mit dem Epicanthus sehr oft gleichzeitig vorkommt, wird durch den Eingriff gut beeinflußt.

#### 4. Wundärztliche Behandlung des essentiellen Blepharospasmus.

Bei so manchen Kranken kann der Zustand durch das Tragen der von KREIBIG angegebenen Blepharospasmusbrille ganz erträglich gestaltet werden. Die Brille ist nach Art der Ptosisbrille gebaut. Die an der Fassung der Brille angebrachten, nach rückwärts vorstehenden Bügel, aus Kunstharz bestehend, werden unter leichtem Drucke so an das obere und untere Lid angesetzt, daß diese dadurch genügend auseinandergehalten werden. Auf diese Weise kann durch den Lidkrampf die Lidspalte nicht mehr ganz geschlossen werden.

a) Verfahren nach FUMAGALLI-VAN LINT mit Injektionen von 80%igen Alkohol. Vorher Einspritzung von je 2 ccm 4%ige Novocainlösung, ganz wie es bei der Akinesie beschrieben ist. Darauf in gleicher Weise Injektion von je 2 ccm 80%igen Alkohol. Auf die Tiefenlagerung der Flüssigkeit ist genau so zu achten wie bei der Akinesie, sonst ist die Injektion wirkungslos. Es folgt durch einige Minuten ziemlich heftiges Brennen und ein mehr oder weniger starkes, einige Tage anhaltendes Lidödem. Die Injektionen können auf beiden Seiten gleichzeitig vorgenommen werden. Der unmittelbare Einfluß betrifft natürlich nur die Fasern des Facialis, die zum Musculus orbicularis ziehen, ist häufig gut, verliert sich später aber fast immer wieder. Spätere Einspritzungen haben viel geringeren Einfluß. Es scheinen die Nervenfasern durch die Entwicklung einer bindegewebigen Hülle dem Einflusse des Alkohols weniger zugänglich geworden zu sein.

Vollständige Heilungen scheinen nur ausnahmsweise vorzukommen, aber gelegentlich bedeutende und selbst länger anhaltende Besserungen, so daß bei der Harmlosigkeit des Eingriffes der Versuch jedenfalls gerechtfertigt ist. Die Alkoholinjektionen können auch zur Beseitigung eines Entropium spasticum verwendet werden.

b) Elektrochirurgische Behandlung nach ŠAFÁŘ, besonders für schwere auf andere Weise nicht beeinflussbare Fälle von Lidkrampf.

Zur Ausführung dient eine Nadel mit guter Isolierung des Schaftes. Ihr blankes Ende ist lanzettförmig mit scharfer Spitze und schneidenden seitlichen Kanten. Die gute Isolierung des Schaftes ist notwendig, um Hautnekrosen zu vermeiden.

**Verfahren.** Anlegen der inaktiven Bleiplattenelektrode am Gesäß. Einspritzung von 1%igen Novocain (2—3 ccm) in die Grube, fingerbreit vor dem Ohr, unterhalb des Jochbeins, vor dem Processus condyloideus des Unterkiefers. Die im Handgriffe steckende Lanzettnadel wird an dieser Stelle eingestochen, ohne Strom, die Fläche der Lanze vertikal. Abtasten der Stelle, wo bei schwächster faradischer Reizung die stärkste Kontraktion des Lidschließmuskels erfolgt. (Feuchte Plattenelektrode an der Stirne, anderer Kontakt durch Anhalten an das blanke Ansatzstück der eingestochenen Lanzettnadel.) Nach Auffindung der Stelle stärkster Kontraktion wird der faradische Kontakt unterbrochen und der Hochfrequenzstrom eingeschaltet und unter Strom die vertikal schneidende Nadel von oben und unten vorgeschoben, um unter Strom die getasteten Nervenäste durchzuschneiden. Stellung des für chirurgische Diathermie geeigneten Hochfrequenzapparates auf mittlere Koagulation, bzw. bei Apparaten mit Einstellung auf „Koagulation“ oder „Kaustik“ Alleineinstellung auf Kaustik, um zu starke Koagulation zu vermeiden. Ist noch keine genügende Wirkung erzielt, wird nochmals mit faradischem Strom die Umgebung abgetastet, ob sich der *Musc. orb. oculi* noch stark zusammenzieht und diese nochmals diathermiert, bis genügend Entspannung eingetreten ist, so daß das Auge eben noch geschlossen werden kann. Nach genügender Entspannung Herausziehen der Nadel ohne Strom, um Hautnekrosen zu vermeiden. Verband über der Einstichstelle. Glatte Heilung.

Die Wirkung hält zwar länger an als die der Alkoholinjektion, geht aber auch hier meist wieder im Laufe der Monate verloren. Gegen eine Wiederholung ist nichts einzuwenden.

c) Auch die von FRIEDE vorgeschlagene Ausschneidung eines Streifens von subcutanem Gewebe und Muskelgewebe bis auf das Periost in einem Bezirke, das auch ungefähr dem der Akinese entspricht, hat keinen größeren Einfluß. Man ist überrascht, wie selbst nach ausgiebiger Ausschneidung der Krampf oft kaum vermindert ist.

**Verfahren.** Ungefähr 2 cm vom äußeren knöchernen Augenhöhlenrand und parallel zu ihm 5 cm langer, bogenförmiger Hautschnitt. Unterminierung der Haut 1 cm weit nach beiden Seiten. Das gesamte subcutane und Muskelgewebe wird zu beiden Seiten der Unterminierung bis auf die Beinhaut durchgeschnitten und der ganze breite Gewebestreifen mit der Schere ausgeschnitten. Es liegt Beinhaut des Knochens und Fascie bloß.

Der Eingriff kann in örtlicher Betäubung beiderseits zur selben Zeit unternommen werden. Die Wunde wird mit Seidennähten verschlossen. Man ist erstaunt über den meist sehr geringen Einfluß. Er erklärt sich aber dadurch, daß noch jenseits des Eingriffgebietes Nervenfasern am oberen und unteren Rand in den Schließmuskel einstrahlen. Der Erfolg hängt von der Verteilung der Nervenfasern ab, die nicht in jedem Falle gleich ist. Liegt die Mehrzahl der Fasern in dem durch den Eingriff getroffenen Gebiete, so wird der Erfolg besser sein, als wenn die Mehrzahl der Fasern darunter oder darüber verläuft.

d) Ausschneidung der zum Schließmuskel ziehenden Stämmchen des *Facialis* in der Gegend vor dem Ohre (GURDJIAN und WILLIAMS). Ein Schnitt von ungefähr 4 cm Länge vor dem Ohre durch die Haut und oberflächliche Fascie vom oberen Ansatz der Ohrmuschel schief nach vorne unten reichend. Bloß-

legung des vorderen oberen Randes der Parotis, Ausschneidung der austretenden Facialisnerven mit umhüllendem Gewebe. Gefahr der Verletzung eines größeren Parotisganges oder des Ductus parotideus (Parotististel).

Auch durch Alkoholeinspritzungen an dieser Stelle suchte man des Blepharospasmus Herr zu werden. Auch dieses Verfahren scheint meist nur vorübergehenden Einfluß zu haben.

Die Schädigung des Facialisstammes durch Alkoholeinspritzung am Foramen stylomastoideum (Verfahren nach SCHLÖSSER) ist wegen der dabei bestehenden Gefahr einer dauernden totalen Facialislähmung nicht ratsam.

e) Verfahren von M. SACHS. Die Idee des Eingriffes besteht in einer Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen *Musc. levat. palp.* und *Musc. orbicularis* zugunsten des Levator.

**Verfahren.** Cocainisierung des Bindehautsackes, Injektion von Novocain-Adrenalin unter die Haut des Oberlides. Einlegen der JÄGERSchen Lidplatte unter das Oberlid. Horizontaler Schnitt durch die Haut des Oberlides in seiner ganzen Länge, etwa 4 mm vom Lidrande entfernt. Ablösen der Haut von der Lidportion des *Musc. orbicularis*. Durchtrennung dieses Muskels in der Mitte des Lides durch einen vertikalen Scherenschnitt. Abdrängen der beiden Muskelstücke von den Schnittträgern aus nach rechts und links. Vertikaler Scherenschnitt nach oben zur Durchtrennung der orbitalen Portion des *Musc. orbicularis*. Freilegung des oberen Randes des Tarsus: 2 mm darüber wird ein Seidenfaden horizontal durch die Sehne des *Lev. palp. sup.* geführt. Der Faden wird geknüpft und unterhalb des Knotens die Ansatzstelle der Sehne durchtrennt. Durch zwei weitere nach oben ein wenig divergierende Schnitte wird die im Faden gefaßte Portion des Lidhebers mobilisiert. Sie wird in die Lücke des *Musc. orb.* genäht, indem die Fäden unmittelbar über dem oberen Lidrand von innen her durch die Haut geführt und über einer Perle geknüpft werden.

In schweren Fällen können noch 2 weitere Abschnitte des Levators, je einer rechts und einer links von der mittleren Portion vorgelagert werden. Die Hautwundränder liegen gewöhnlich so gut aneinander, daß eine Hautnaht meist überflüssig ist. Nur Schalenverband, so daß der Patient das Auge sofort offen halten kann. Der anfänglich bestehende geringfügige Lagophthalmus verschwindet gewöhnlich nach einigen Tagen.

Der Einfluß des Eingriffes ist meist sehr gut und bringt dem Kranken zumindest eine so wesentliche Erleichterung des Zustandes, daß er durch den Lidkrampf nicht weiter besonders gestört ist.

## 5. Eingriffe gegen die Körnerkrankheit.

### a) Abschabung der Schleimhaut nach PETERS.

**Anzeigen.** Frische trachomatöse Infiltration und grobe papilläre Hypertrophie der Bindehaut.

**Verfahren.** Nach Anästhesieren der Bindehaut durch Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung wird mit einer Art geraden Lanze, die vorne abgerundet und nirgends scharf geschliffen ist, die Bindehaut der nach auswärts gedrehten Lider abgeschabt, indem die Lanze senkrecht zur Schleimhautfläche und zum Tarsusrand angesetzt und unter nicht zu starkem Drucke über die Bindehaut

geführt wird. Die Bindehaut wird sowohl in der Übergangsfalte als im Bereiche des Tarsus in gleicher Weise abgeschabt. Aus der sulzigen Masse entleeren sich unter Umständen komedoartige Pfröpfe. Die meisten Granulationen bleiben aber bestehen. Es ist nämlich gar nicht beabsichtigt, die Körner auf diese Weise zu entfernen, sondern vielmehr nur das Epithel der Bindehaut abzuschaben.

Nach TERTSCH ist es aber auch von Vorteil, mit scharfem Messer alle Erhabenheiten, Trachomkörner und grobe Papillen der hypertrophischen Schleimhaut wegzuschneiden.

**Vorteile des Verfahrens.** Nachlassen der Reizerscheinungen, raschere Rückbildung der pathologischen Veränderungen. Keine Narbenbildung.

Es empfiehlt sich, das Verfahren nach mehreren Tagen zu wiederholen.

**Verlauf.** Die Reaktion der Bindehaut auf die Abschabung ist geringfügig. Umschriebene fibrinöse Membranen verschwinden in wenigen Tagen. Hornhautkomplikationen werden meist günstig beeinflußt.

Das Verfahren von PETERS hat gelegentlich auch bei besonders widerspenstigen chronischen Katarrhen der Bindehaut, die jeder medikamentösen Behandlung trotzen, guten Einfluß.

#### *b) Die Ausquetschung der Trachomkörner*

aus der Bindehaut wird unter örtlicher Betäubung vorgenommen. Diese wird durch wiederholtes Einträufeln von 3%iger Cocainlösung in den Bindehautsack und Einspritzungen einer 1%igen Cocainlösung unter die Bindehaut erreicht. Um zur oberen Übergangsfalte bequem Zutritt zu haben, wird das obere Lid umgestülpt. Durch die Einspritzung wölbt sie sich als ein großer Wulst vor. Mit einem GRAEFESchen Messer wird die Bindehaut über den Körnern oberflächlich geritzt, so daß diese aus den Einschnitten leicht hervorspringen können. Die Körner werden mit der Rollpinzette nach KNAPP oder dem Ausdrücker nach KUHNT ausgedrückt.

Mit der Rollpinzette wird die Bindehaut der Übergangsfalte breit gefaßt, indem der eine Arm der Rollzange zwischen Bindehaut des Augapfels und des Lides nach oben eingeführt, der andere auf die nach vorne gerichtete Fläche des Lidknorpels gelegt wird. Unter mäßig kräftigem Zusammendrücken und langsamen Ziehen an der Bindehaut rollen die geriffelten Teile der Arme darüber und pressen die Körner aus. Das Anziehen hat in zarter Weise zu geschehen, weil sonst die Bindehaut verletzt, zerrissen wird und dadurch Narben entstehen. Je vorsichtiger der Eingriff, um so schonender ist er für die Bindehaut und um so besser der Erfolg. Die ziemlich starke Blutung wird durch fleißiges Tupfen mit in schwacher Sublimatlösung getränkten Tupfern bekämpft.

In ähnlicher Weise wird auch die untere Übergangsfalte von ihren Körnern befreit. Da bei der Behandlung der halbmondförmigen Falte mit den KNAPPschen Rollern, insbesondere wenn nur einzelne Körner aus ihr auszudrücken sind, die umgebende Bindehaut mitgefaßt wird, ist zu diesem Zwecke eine gewöhnliche anatomische Pinzette vorzuziehen.

Eine Gruppe Körner, die an einer kleinen, scharf umschriebenen Stelle der Bindehaut eingelagert sind, wird durch Ausschneiden der erkrankten Bindehaut beseitigt. Dagegen ist die Ausquetschung trotz wohlumschriebener Grenzen des erkrankten Gebietes vorzuziehen, wenn dieses die ganze Länge der Über-

gangsfalte einnimmt. Um die Körner aus der Bindehaut des Lidknorpels herauszubringen, muß dieser selbst zwischen die Arme der Rollzange gefaßt werden.

**KUHNTS Ausdrücker.** Der KUHNTsche Ausdrücker ist zangenartig und läuft in 2 Platten aus, die von mehreren kleinen Öffnungen durchbrochen sind. Diese sind so angebracht, daß beim Schließen der Arme die Löcher der einen Platte nicht auf die der anderen, sondern auf die metallenen Zwischenräume treffen. Die Bindehaut wird zwischen die Arme gefaßt und die Körner werden aus ihr ausgedrückt, ohne daß dabei ein Zug ausgeübt wird. Darin liegt ein großer Vorteil, da dadurch die infolge der Zerrung an der Bindehaut bei Gebrauch der Roller gelegentlich auftretenden Verletzungen vermieden werden. KUHNT empfiehlt dieses Verfahren besonders für die Fälle von schwerem sulzigen Trachom, da in diesen Fällen die Bindehaut der Übergangsfalten wegen ihrer Starrheit bei der Rollung eingerissen wird und in der Folge stark schrumpft. Mit dem Ausdrücker KUHNTS wird die Bindehaut, deren Körner mitesserartig aus ihrem Bette herausgedrückt werden, weder gezerrt noch zerrissen.

**Nachbehandlung.** Nach dem Eingriffe werden durch mehrere Stunden kalte Überschläge auf die geschlossenen Lider gemacht. Erst nach ungefähr 2 Tagen beginnt die weitere medikamentöse Behandlung der Bindehauterkrankung.

*c) Ausschneidung der oberen Übergangsfalte (KUHNT).*

Ist die Körnerkrankheit der Bindehaut streng auf die obere Übergangsfalte beschränkt, so kann, namentlich wenn die Krankheit der medikamentösen Behandlung trotz, der Krankheitsherd durch Ausschneiden der Falte beseitigt werden. Nach Cocainisierung des Bindehautsackes und Einspritzung einer 1%igen Cocainlösung unter die Bindehaut wird das Lid mit dem Löffel umgestülpt, so daß die Übergangsfalte ausgebreitet vorliegt. Der Kranke blickt stark nach unten. Die Grenze der kranken und durch die Einlagerung der Körner verdickten Übergangsfalte gegen die gesunde Bindehaut ist häufig scharf. Unmittelbar neben dieser Grenze wird noch im gesunden Gebiete ein Schnitt durch die Bindehaut in der ganzen Länge von innen nach außen geführt. Darauf zieht sich die Augapfelbindehaut zurück, so daß der Schnitt klafft, und wird etwas unterminiert. Es werden sofort Nähte knapp in dem Schnitttrande der Augapfelbindehaut angelegt. Der 2. Schnitt wird an der Grenze der kranken gegen die gesunde Bindehaut in der Nähe des oberen Knorpelrandes geführt. Die so umschnitene Partie wird mit einer Schere sorgfältig ausgeschnitten, ohne das unterliegende Gewebe (den MÜLLERSchen Muskel) zu verletzen. Die Fäden werden an den entsprechenden Stellen des Lidknorpels durchgeführt. Die Wunde ist in wenigen Tagen verheilt.

*d) Ausschneidung des Lidknorpels.*

In Fällen, wo die Bindehaut schon narbig verändert und der Lidknorpel verdickt und kahnförmig verkrümmt ist, besonders bei hartnäckigem Pannus, bei Entropium und Trichiasis, bei Ptosis trachomatosa, ist die Ausschälung des Lidknorpels unter Schonung der Bindehaut ein sehr empfehlenswertes Verfahren. Es wird nach KUHNT in folgender Weise ausgeführt: Das Lid wird umgestülpt, der Lidrand mit einer kräftigen Hakenpinzette gefaßt und unter die Hautfläche des Lides eine JÄGERSche Hornplatte geschoben, wodurch der Knorpel

gespannt wird. In einer Entfernung von ungefähr  $2\frac{1}{2}$  mm vom freien Lidrande wird darauf ein mit diesem gleichgerichteter Schnitt durch die Bindehaut und den Knorpel geführt, ohne das Bindegewebe vor dem Knorpel und den Lidmuskel zu verletzen. Da bei der vorgeschrittenen trachomatösen Erkrankung die Bindehaut mit dem Knorpel nicht mehr innig verbunden ist, zieht sie sich sofort von der Schnittfläche zurück. Es kann daher der Lidknorpel an seinem Schnitttrande mit der Pinzette gefaßt und zunächst seine vordere Fläche mit einem Messer von dem vor ihm gelegenen Bindegewebe bis zu seinem oberen oder unteren Rande losgeschält werden. Dann wird die Bindehaut mit kleinen Messerzügen von dem Lidknorpel abgelöst. Wird dabei die Schneide des Messers gegen den Knorpel gerichtet, so besteht keine Gefahr, die Bindehaut zu fenstern. Während KUHN<sup>1</sup> nun im oberen Lide den ganzen Lidknorpel mit der Schere von der Levatorsehne abschneidet, wird nach dem Vorschlage LYRITZAS oben ein schmaler Streifen des Knorpels zurückgelassen, um jede Möglichkeit einer Ptosis auszuschießen. Die Wunde wird mit feinen Seidenfäden vernäht. Bei stark geschrumpfter Bindehaut wird die Ausschälung mit der Überpflanzung von Lippen-schleimhaut auf die Wundfläche verbunden.

Durch die Knorpelausschneidung wird das Entropium und die Trichiasis ausgiebig bekämpft und oft auch ein ausgezeichneter Einfluß auf das trachomatöse Hornhautleiden genommen. Auch die Ptosis wird meist sehr günstig beeinflußt. Um auf diese eine besonders sichere Wirkung auszuüben, werden doppelt armierte Fäden oben durch die Bindehaut und Sehne des Lidhebers gelegt, an der Vorderfläche des stehengelassenen unteren Knorpelrandes nach unten geleitet und knapp ober den Lidhaaren durch die Haut geführt, wo sie über einer Perle geknüpft werden.

## 6. Eröffnung und Auskratzung des Hagelkornes (CHALAZION).

**Örtliche Betäubung.** Nach wiederholtem Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung in den Bindehautsack, Einspritzung einiger Tropfen einer 1%igen Cocainlösung mit Beimischung einer Suprareninlösung von der Bindehautseite aus in die Höhle der Geschwulst, nachdem man etwas von dem Inhalte hat entweichen lassen, da sonst durch die erhöhte Spannung heftige Schmerzen verursacht werden, oder durch die Haut des Lides in die Umgebung des Knotens.

**Verfahren.** Das obere Lid wird umgestülpt und der Knorpel zwischen Daumen und Zeigefinger gefaßt. Sitzt der Knoten im unteren Lide, so wird dieses vom Auge abgezogen, während der Augapfel nach oben gerichtet ist. Verschiedene Formen von Faßzangen wurden angegeben, um das Lid für den Eingriff festzuhalten. Sie sind durchwegs entbehrlich. Das Anlegen der Zange und das Einklemmen des Lides ist für den Kranken schmerzhafter als der Eingriff selbst.

Die Höhle wird durch einen Schnitt mit einem kleinen spitzen Messer eröffnet. Ist der Knorpel auf der Bindehautseite an Stelle der Geschwulst nur wenig verändert, so wird der Schnitt parallel den MEIBOMschen Drüsen, d. h. in senkrechter Richtung vorgenommen.

Wölbt sich aber der Inhalt durch den erweichten und verdünnten Lidknorpel bereits vor, so wird der Schnitt quer angelegt. Diese lidrandparallele Schnitt-richtung hat den Vorteil, daß auch bei unvermuteter Ruckbewegung nervöser

Kranker das Messer nicht in den Lidrand hinein vordringen kann. Ist der Inhalt schwer auszuräumen, so wird durch einen Kreuzschnitt freier Zugang geschaffen.

Der Inhalt wird dann mit dem Finger ausgedrückt. Die der Innenwand der Kapsel anhaftenden Reste werden mit einem kleinen scharfen Löffel ausgekratzt. Kalte Überschläge bis zum Aufhören der Blutung. Kein Verband.

### 7. Einspritzungen unter die Bindehaut.

**Anzeigen.** 1. Für die Kochsalzeinspritzungen: a) Glaskörpertrübungen, einerlei ob entzündlicher Natur oder durch Blutungen entstanden. Je frischer sie sind, um so günstiger ist im allgemeinen der Einfluß. Dieser ist manchmal überraschend gut, in anderen Fällen wieder bleibt er vollkommen aus. b) Verschiedene Erkrankungen des Augennern, wie Aderhautentzündung, besonders im kurzsichtigen Auge, Netzhautblutungen u. dgl. c) Zur Beförderung der Aufsaugung von rückgängigen Hornhauttrübungen nach tiefer Entzündung. Alte Hornhauttrübungen werden dadurch nicht beeinflußt.

2. Für die Sublimat- und Oxyzyanateinspritzungen: a) Rasch fortschreitende, eitrig zerfallende Hornhautinfiltrate und Geschwüre, insbesondere skrophulöse Hornhautgeschwüre, infizierte Hornhautwunden, beginnendes Ulcus serpens. b) Beginnende Infektionen des Augennern, nach zufälligen Verletzungen oder nach Eingriffen, wie Starausziehung, Spätinfektion des Augennern durch eine Narbe usw.

**Verfahren.** Die Bindehaut wird durch wiederholtes Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung unempfindlich gemacht. Im Falle starker Rötung empfiehlt sich, auch Suprareninlösung einzutropfen, um die Blutgefäße zur Zusammenziehung zu bringen und sie beim Einstechen der Nadel nicht zu verletzen, da eine stärkere Blutung unter die Bindehaut unliebsam stört. Die Einspritzung wird mit der PRAVAZschen Spritze ohne Festhalten des Auges vorgenommen. Mit der einen Hand wird das untere Lid vom Auge abgezogen, während dieses nach oben sieht und die in der anderen Hand gehaltene Spritze mit ihrer Nadel ungefähr waagrecht gleichgerichtet mit der Oberfläche der Lederhaut an das Auge angelegt. Durch ein geringes Verschieben dringt die Nadelspitze unter die Bindehaut. Die Einspritzung wird ungefähr in der Mitte zwischen Limbus und unterer Übergangsfalte gemacht. Wird die Flüssigkeit knapp neben dem Limbus, wo die Bindehaut mit der Lederhaut innig verbunden ist, eingespritzt, so werden durch die gewaltsame Ablösung der Bindehaut heftige Schmerzen erzeugt und gelegentlich auch durch Kreislaufstörungen Veränderungen in der Hornhaut in Form von Dellen hervorgerufen.

Im übrigen kann die Lösung an jeder beliebigen Stelle der Bindehaut, auch oben oder innen, eingespritzt werden. Durch langsames Drücken des Stempels wird die gewünschte Menge einverleibt. Die Schmerzen werden bei beiden Arten von Lösungen von den Kranken sehr verschieden angegeben. Lang andauernde und starke Schmerzen gehören aber bei richtigem Vorgehen gewiß zu einer Ausnahme.

Die Flüssigkeit ist entweder 5—10% Kochsalz- oder eine 1/100ige Sublimat- oder Oxycyanatlösung (1:5000,0), sämtliche mit einem 1%igen Zusatz von Cocain. Von der Kochsalzlösung wird 1 ccm, d. h. der ganze Inhalt einer PRAVAZschen Spritze verwendet. Durch eine solche Menge Flüssigkeit wird die Bindehaut

zunächst blasenförmig emporgewölbt. Eine leichte Massage beschleunigt die raschere Verteilung der Flüssigkeit im lockeren Gewebe unter der Bindehaut.

Die erlaubte Menge der Quecksilberlösung beträgt 1—2 Teilstriche der Spritze, d. h.  $\frac{1}{10}$ — $\frac{2}{10}$  ccm. Vor Verwendung einer größeren Menge sei ausdrücklich gewarnt, weil dadurch die Bindehaut verätzt und durch die folgende Nekrose und den Untergang der Gefäße in dem betreffenden Teile der Bindehaut die angrenzenden Teile der Hornhaut in ihrer Ernährung gestört würden. Die Krankheit würde dadurch im ungünstigsten Sinne beeinflusst werden. Geringe Mengen aber beschränken ihre Wirkung auf eine starke Reizung der Bindehaut, wodurch diese und das Gewebe unter ihr serös durchtränkt werden. Dadurch wird ein lebhafter Flüssigkeitswechsel zwischen Hornhautgewebe und Umgebung hervorgerufen. In diesem Sinne ist die Wirkung der stark reizenden Einspritzungen aufzufassen und nicht auf einen unmittelbaren antiseptischen Einfluß der winzigen Sublimatmenge zu beziehen. Von dem hervorgerufenen Reizzustande der Bindehaut hängt daher auch die Entscheidung ab, ob tags darauf die Lösung wieder eingespritzt wird, vorausgesetzt, daß sich nicht schon deutliche Zeichnung einer Besserung des Krankheitszustandes in der Zwischenzeit geltend gemacht haben.

Besteht also noch starke Chemosis, so wird davon Abstand genommen. Ist dagegen die Reizung sehr zurückgegangen, so wird eine 2. Einspritzung vorgenommen, am besten an einer anderen Stelle der Bindehaut, gleichgültig, ob diese Stelle von dem Hornhautinfiltrate weiter entfernt ist als die erste oder nicht. So können 4—5 Einspritzungen nacheinander verabreicht werden.

Ihr Einfluß ist besonders bei skrofulösen Geschwüren häufig ausgezeichnet, nur bei *Ulcus serpens* oft ungenügend, besonders wenn das Geschwür schon über die Anfangsstufe hinaus ist.

Unangenehme Zwischenfälle werden fast nicht beobachtet. Wird einmal ein größeres Gefäß verletzt, so blutet es unter die Bindehaut. Das ausgetretene Blut wird aber aufgesaugt und verschwindet nach einiger Zeit, ohne einen Schaden für das Auge zu hinterlassen. Rasch vorübergehendes Doppeltsehen und ein leichter Grad von Exophthalmus treten bei tiefer Einspritzung der Flüssigkeit in den TENONSchen Raum ein.

## 8. Über das Umstülpen des oberen Lides mit dem Lidlöffel (GRÖNHOLM).

Der einem DESMARRESSchen nachgebildete Löffel von GRÖNHOLM erlaubt, das obere Lid mit *einer* Hand in einer solchen Weise umgestülpt zu halten, daß dabei die obere Übergangsfalte ausgebreitet erscheint. Das Verfahren ist folgendes:

Der zu Untersuchende blickt nach unten und eine Hand erfaßt die Cilien wie sonst zum Umstülpen des Lides. Der Löffel wird so an das obere Lid angelegt (Abb. 245), daß seine Höhlung nach unten gerichtet ist, der Rand somit nach unten schaut und in die Gegend des oberen Knorpelrandes zu liegen kommt. Nun wird das obere Lid über den Löffel gestülpt, während dieser nach unten gedrückt wird. Indem sein Stiel nach rückwärts gegen die Stirne bewegt wird, spannt sich das Lid über dem Löffel aus und bleibt am Rande des Löffels so haften, daß die Lidhaare nicht mehr festgehalten zu werden brauchen. Nun ist die ganze innere Knorpelfläche des oberen Lides und die Übergangsfalte

über dem Löffel gespannt und ausgebreitet (Abb. 246). Der Rand des Löffels liegt gegenüber dem oberen Rand des Lidknorpels auf der Hautseite; dieser ist über der oberen (gehöhlten), die Übergangsfalte über der unteren (gewölbten) Fläche des Löffels ausgebreitet.

Für verschieden große Lider eignen sich verschieden große und verschieden geformte Löffel. Sonst wird das Lid zu sehr gespannt und das Umstülpen dadurch schmerzhaft. Der Rand des Löffels soll gerade und nicht scharf sein und die Flächen nur sehr wenig gekrümmt, fast ganz eben.




Abb. 245.




Abb. 246.

Sollte das Lid vom Löffel abgleiten, so kann es, indem dieser zwischen Zeige- und Mittelfinger gehalten wird, mit dem Daumen derselben Hand an ihn angedrückt gehalten werden.

Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß eine Hand für Eingriffe frei bleibt, die Übergangsfalte zur Besichtigung freigelegt ist und infolge der Spannung alle ihre Buchten und Falten ausgeglichen und auf diese Weise einer unmittelbaren Behandlung zugänglich sind.

### ZUR NEDDENS Verfahren der Glaskörperabsaugung gegen Glaskörpertrübungen.

**Anzeigen.** Das Verfahren kommt nur bei Glaskörpertrübungen in Betracht, wo alle sonstigen Mittel (Schwitzen, Einspritzungen unter die Bindehaut, Jod, Quecksilber usw.) versagt haben und eine weitere Besserung des Sehvermögens nicht mehr zu erzielen ist. Im besonderen sind dazu geeignet:

1. Trübungen des Glaskörpers, die nach Verletzungen infolge von Blutungen zurückgeblieben sind.

2. Trübungen des Glaskörpers, die durch Entzündungen besonders der Uvea entstanden sind. Doch muß die Entzündung vollständig abgelaufen sein, da sie durch einen Eingriff von neuem angefacht werden könnte. Das Auge muß reizlos sein. Besonders Fälle von chronischer Entzündung eignen sich dazu.

**Instrumentarium.** Da es nicht leicht ist, die Lederhaut mit einer Nadel zu durchbohren, müssen ganz besonders spitze und scharfe, schräg zugeschliffene Kanülen dazu verwendet werden. Größte Sorgfalt muß der Schonung der Spitzen gewidmet werden. Die dünnste Kanüle soll einen Durchmesser von 0,4 mm, die dickste von 0,9 mm haben, 1,5 cm von der Spitze entfernt ist eine ringförmige Verdickung angebracht, so daß die Nadel nicht tiefer in das Auge eindringen kann (Abb. 247).

Da nach der Absaugung der Flüssigkeit das Auge weich ist, würden beim Herausziehen der Nadel die Augenmembranen gezerrt. Dies wird verhindert durch einen eigenen Spatel, der tellerförmig (Abb. 248) ausgehöhlt und mit einem Schlitz versehen ist. Er wird vor dem Herausziehen der Nadel über die Durchbohrungsstelle geschoben. Die dünnsten Kanülen werden bei Glaskörpertrübungen infolge von Entzündungen verwendet. Der in diesen Augen stark verflüssigte Glaskörper kann durch das dünne Lumen leicht ausgesaugt werden. Bei den anderen Trübungen kommen die dickeren Sonden, gewöhnlich 0,6—0,7 in Verwendung. Als Spritze dient die gewöhnliche Rekordspritze. Das ganze Instrumentarium, 12 Kanülen, je 2 von 0,4—0,9 mm Lumen samt Metallgestell zum Fixieren der Nadel beim Kochen und samt Spatel liefert die Firma Windler in Berlin, Friedrichstraße 133a.



Abb. 247.

**Verfahren.** Nach Anästhesie des Auges durch wiederholtes Einträufeln einer 3%igen Cocainlösung Einstich ungefähr 7—8 mm vom Limbus entfernt außen unten in radiärer Richtung, während das Auge mit der Pinzette festgehalten wird. Bei stärkerem Widerstande der Sklera ist die Fixation des Auges



Abb. 248.

mit der ELSCHNIGSchen Hakenpinzette sehr vorteilhaft. Das Auge wird dabei mit der Pinzette gegen die Nadel vorgezogen. Dadurch, daß sich schon bei der Fixation des Auges die Bindehaut etwas verschiebt, wird der Einstichpunkt nach Freilassen des Auges immer von der Bindehaut bedeckt. Nach Durchdringen der Spitze durch die Lederhaut wird die Nadel zunächst nicht weiter vorgeschoben, sondern langsam der Glaskörper angesaugt. Bei verflüssigtem Glaskörper geht dies leicht von statten. Bei negativem Ergebnis ist die Nadel tiefer, gegebenenfalls bis an den Ring einzuführen. Denn die zentralen Teile des Glaskörpers sind gelegentlich mehr verflüssigt als die peripheren. Normal konsistenter Glaskörper läßt sich nur schwer absaugen. Nach Absaugung der gewünschten Menge wird der Spatel an das Auge angelegt, so daß die Nadel in den Schlitz zu liegen kommt und leicht an die Lederhaut angedrückt, während die Nadel herausgezogen wird. Dadurch wird verhindert, daß die Wandungen des durch die Absaugung weich gewordenen Auges dem Zuge der Nadel folgen und die Gestalt des Auges verändert wird.

**Menge der abgesaugten Flüssigkeit.** Bei der ersten Absaugung 0,5 ccm. Die Absaugungen müssen meistens öfter wiederholt werden und dabei kann bis auf 1 ccm Absaugungsflüssigkeit gestiegen werden, i. e. ein Drittel der gesamten

Glaskörperflüssigkeit. Bei Entzündungen der Uvea und Netzhaut nicht über 0,6 ccm.

**Nachbehandlung.** Verband für einige Tage. Bettruhe ist nicht erforderlich. In allen Fällen ciliarer Reizung Atropin.

**Wiederholung der Absaugungen.** Die Absaugungen werden in Zwischenräumen von 3 Wochen wiederholt. Mit der Einstichstelle kann gewechselt werden.

**Allgemeine Bemerkungen.** Leichte ciliare Reizung, besonders bei Fällen von entzündlichen Glaskörpertrübungen, verlangt Behandlung mit Atropin. Ergeben sich Schwierigkeiten beim Einstechen bei nicht genügend scharfer Nadel oder geringer Spannung des Auges, so kann Fixation des Auges mit 2 Pinzetten alsdann den Einstich erleichtern. Gefahr der Netzhautabhebung besteht nicht. Die Runzeln in der Hornhaut, die infolge der Weichheit des Auges nach der Absaugung entstehen, verschwinden in einigen Tagen. Die Spannung des Auges bleibt durch mehrere Tage mehr oder weniger herabgesetzt.

**Gegenanzeigen.** 1. Bei Gefäßerkrankungen der Netzhaut und Gefahr von Blutungen aus ihnen. Diese Gegenanzeige braucht nicht absolut genommen zu werden. Sie gilt nur für die ersten Wochen und Monate, nachdem die Blutung eingetreten war. Sind aber inzwischen alle Mittel zur Aufsaugung der Blutung erschöpft worden, ohne daß das Ziel erreicht worden wäre, so kann zur Absaugung als letztem Mittel noch Zuflucht genommen werden, insbesondere wenn die Zwischenzeit durch eine entsprechende Allgemeinbehandlung mit Tuberkulin zur Heilung der Grundkrankheit ausgenutzt worden ist, so daß eine Heilung der Gefäßwunderkrankung vorausgesetzt werden darf. Solange noch immer neue Nachschübe von Blutungen eintreten, gilt aber die Gegenanzeige, denn es könnte durch die starke Herabsetzung des intraokularen Druckes infolge der Absaugung eine neue schwere Blutung zustande kommen.

2. Noch aktive Entzündungen der Uvea, da durch den Eingriff ein neuer Entzündungsanfall ausgelöst werden kann.

**Wirkung der Absaugung.** 1. Mechanische Entfernung von Glaskörpertrübungen. 2. Besserung der Ernährung der Uvea.

**Erfolge.** Der günstige Einfluß der Glaskörperabsaugung tritt nicht immer, ja selbst nicht in der Mehrzahl der Fälle ein. Sehr häufig ist er ferner nur ganz geringfügig. Gewiß ist aber gelegentlich die Verbesserung des Sehvermögens in Augen, wo man keine Hoffnung mehr auf Aufhellung des Glaskörpers gehabt hatte, da alle bekannten Behandlungen bis dahin nutzlos waren und auch die jahrelange Dauer keine Wahrscheinlichkeit einer Besserung mehr geboten hatte, eine ganz überraschend große. Wir sahen Fälle, wo man den Augenhintergrund infolge der dichten Glaskörpertrübungen nicht ausnehmen konnte und das Sehvermögen auf Fingerzählen in kurzer Entfernung vor dem Auge beschränkt war, bei welchen durch die einmalige oder wiederholte Absaugung das Sehvermögen auf  $\frac{6}{18}$ , auf  $\frac{6}{24}$  stieg und dauernd blieb. Da man im vorhinein nicht weiß, wie die Absaugung wirken wird, so bleibt einem nichts übrig, als das Verfahren zu versuchen. Man kann sich dazu um so leichter entschließen, als sich ernste Folgen dabei so gut wie nie zeigen, vorausgesetzt, daß die Indikationen streng eingehalten worden sind und namentlich nicht der Eingriff in Augen gemacht wird, die noch an einer aktiven Iridocyclitis leiden.

## Über die Tätigkeit des Gehilfen.

Die Tätigkeit des Gehilfen bei den Eingriffen am Augapfel ist durch die Akinese und die Zügelnaht wesentlich vereinfacht worden. Früher war es ratsam, sich des Lidsperrers nur bei solchen Eingriffen zu bedienen, wo das Auge nicht oder nur in kleiner Ausdehnung eröffnet zu werden hatte, also bei den Schieloperationen, bei der Flügelfellabtragung, der Diszission, Punktion der vorderen Kammer usw. Heutzutage ist aber bei gründlicher Akinese gegen die Verwendung des Lidsperrers auch bei der Glaukomiridektomie und Starausziehung nichts einzuwenden. Der Gehilfe braucht nur die Zügelnaht zu übernehmen und dafür Sorge zu tragen, daß der Lidsperrer das Auge nicht drückt. Es sind übrigens auch Formen von Lidsperrer angegeben worden, welche die Befestigung der Zügelnaht erlauben, so daß man vom Gehilfen ganz unabhängig sein kann.

Wir ziehen es allerdings vor, bei der Starausziehung das obere Lid durch den Gehilfen mit dem Lidlöffel abhalten zu lassen, indem er mit der rechten Hand gleichzeitig die Zügelnaht übernimmt (Abb. 129); seine linke Hand zieht das untere Lid nach unten. Dies hat freilich den Nachteil, daß beide Hände des Gehilfen in Verwendung stehen und ein 2. Gehilfe sehr wünschenswert ist, der das Austupfen der Flüssigkeit aus dem Bindehautsack übernimmt und wenn nötig — wie bei den intrakapsulären Ausziehungen — auch die Wunde zur Blutstillung mit Adrenalinlösung mit Hilfe des Tropfröhrchens berieselt.

Lidsperrer und Löffel haben den Nachteil, daß sie das Einführen von Instrumenten von oben her in das Auge etwas behindern. Der Gehilfe muß den Weg durch seitliche Verschiebungen des Lidlöffels soviel als möglich freimachen. Die Zügelnaht macht das beständige Offenhalten der Lidspalte während des Eingriffes notwendig, da die Naht sonst beim Schließen der Lider an die Wunde streifen würde. Es ist daher die Verwendung eines Instrumentes zur Hebung des Lides, sei es Sperrer oder Löffel, nicht zu umgehen.

Bei den Eingriffen, wo keine Zügelnaht verwendet wird, besteht die Tätigkeit des Gehilfen darin, die Lidspalte durch Auseinanderziehen der Lider offen zu halten, und zwar nur während der kurzen Zeit, wo am Auge etwas getan wird. In der Zwischenzeit, beim Wechseln der Instrumente, während des Austupfens usw. werden die Lider losgelassen, so daß sie das Auge bedecken. Die Lidspalte wird in der Weise geöffnet (Abb. 180), daß der Gehilfe mit dem an den Lidrand angelegten Daumen der rechten Hand das obere Lid hinaufzieht, während er mit einem an den Lidrand angelegten Finger der linken Hand das untere Lid herunter schiebt. Das obere Lid wird dabei vom Auge etwas abgezogen, so daß der Lidrand beim plötzlichen Aufwärtsrollen des Auges oder beim plötzlichen Ausgleiten des Lides nicht in die Wunde hineingelangt. Das untere Lid wird so hinuntergeschoben, daß es sich dabei nicht nach außen rollt. Die Weite, bis zu der die Lider geöffnet werden, hängt von dem jeweiligen Eingriffe ab. Wurde keine Akinese angewendet, so darf das untere Lid nie freigelassen werden, solange das obere Lid gehoben ist. Sonst wird es durch den Lidmuskel gegen das Auge gedrückt und dadurch die Wunde zum Klaffen gebracht.

Dem Gehilfen kommt ferner das Austupfen des Blutes aus dem Bindehautsack zu. Der in keimfreier physiologischer Kochsalzlösung gelegene, gut ausgedrückte Wattetupfer wird mit einem spitz zugeprägten Ende in den inneren Augenwinkel eingesetzt, so daß er von hier aus das Blut ansaugt, oder er wird

vom inneren Lidwinkel aus entlang der unteren Übergangsfalte nach außen geführt, wobei er das Blut mitnimmt. Das unmittelbare Betupfen der Wunde des Auges ist soviel als möglich zu vermeiden. Bei starken Blutungen in die vordere Kammer soll der Gehilfe, während der Arzt die Instrumente schon bereit hält, das Blut austreifen, so daß bei nun klarem Einblicke in die vordere Kammer der Eingriff, z. B. die Ausschneidung der Regenbogenhaut oder die Kapseleröffnung, sofort vorgenommen werden kann.

### Die Betäubung.

**Über die örtliche Betäubung.** Bei sämtlichen Eingriffen am Auge bedeutet die örtliche Betäubung einen großen Vorteil. Wir bedienen uns ihrer in ausgedehntestem Maßstabe und suchen damit, wenn irgendwie möglich, an Stelle einer allgemeinen Betäubung auszukommen. Allgemeine Betäubungen sind zur Seltenheit geworden.

Bei den meisten Eingriffen am Augapfel selbst wird nämlich durch die Mithilfe des Kranken, der das Auge auf Aufforderung in die gewünschte Stellung bringt, das Vorgehen um vieles erleichtert, das gefährliche Anfassen und Festhalten des eröffneten Auges überflüssig usw. Die allgemeine Betäubung beraubt uns dieses für eine tadellose Ausführung vieler Eingriffe hochwichtigen Umstandes und hat auch eine Reihe anderer Schädlichkeiten im Gefolge, die gerade hier schwer ins Gewicht fallen: das getrübe Sensorium und die Unruhe des Kranken nach dem Erwachen, das oft starke Erbrechen usw.

Die **Allgemeinbetäubung** wird daher nur noch verwendet bei Kindern, die noch nicht entsprechend geistig entwickelt sind, sich ruhig zu verhalten und vernünftig zu gebärden, ferner bei dementen, Widerstand leistenden Kranken und bei großen Eingriffen in der Augenhöhle, z. B. Ausweidung oder wenn durch entzündliche Zustände große Schmerzhaftigkeit besteht, z. B. Einschneidung bei Phlegmone des Augenhöhlengewebes.

Wie selbst noch in manchen solcher Fälle durch Einspritzungen an Ort und Stelle oder im Bereiche der die Gegend versorgenden Nerven örtliche Betäubung erzielt werden kann, wurde bei den einzelnen Verfahren schon im besonderen beschrieben.

Von den verschiedenen empfindungslos machenden Mitteln übertrifft für die Eingriffe am Auge das *Cocain* alle anderen. Wir bedienen uns einer durch Kochen keimfrei gemachten 3%igen Cocainlösung. Sie wird während 10 Minuten einige Male in das Auge eingeträufelt. Dieses hat vom Beginne der Cocainisierung an *geschlossen* gehalten zu werden. Das Cocain erzeugt bei Offenstehen der Lidspalte Austrocknung der Hornhaut und Epithelveränderungen, die während des Eingriffes durch die damit verbundene Hornhauttrübung stören und nach Aufhören der Wirkung dem Kranken heftige Schmerzen verursachen.

Ist das Auge gerötet, so wird auch Suprareninlösung (1 : 1000,0) in das Auge wiederholt eingetroppt, das letzte Mal knapp vor Beginn des Eingriffes, da die dadurch erzeugte Verengerung der Gefäße bald schwindet und einer Erschlafung Platz macht, wodurch während des Eingriffes eine starke Blutung hervorgerufen würde.

Das Cocain ist allen Ersatzmitteln vorzuziehen. Sein gefäßverengernder Einfluß ist eine ausgezeichnete Eigenschaft, die unter allen Umständen von

großem Wert ist. Die durch den Gebrauch von Cocain auftretende Pupillenerweiterung könnte sich nur bei den Eingriffen gegen Drucksteigerung unangenehm geltend machen, wird jedoch durch vorheriges Einträufeln von Eserin verhindert. Sonst kann an Stelle des Cocains eine 3%ige Lösung von Alypin oder Novocain verwendet werden. Da diesen die gefäßverengernde Wirkung fehlt, müssen sie mit Suprareninlösung versetzt werden. Auch zur Sondierung, zur Entfernung von Fremdkörpern aus der Oberfläche der Hornhaut usw. ist das Alypin oder Novocain vorzuziehen, da beide die Pupille nicht beeinflussen.

Um auch die tieferen Teile des Auges empfindungslos zu machen, wird die Cocainlösung nach Ausführung des Schnittes in die Gegend der mit dem Spatel offengehaltenen Wunde aufgetropft, wozu wir auch stärkere (10%ige) keimfreie Cocainlösungen verwenden, wenn voraussichtlich die Berührung der Regenbogenhaut schmerzhaft ist (entzündete Augen).

Durch Einspritzen von 3%iger Cocainlösung unter die Bindehaut des Augapfels kann die Empfindlichkeit der Regenbogenhaut stark herabgesetzt werden und wir machen davon beim Ausschneiden von Vorfällen der Regenbogenhaut, beim Ausziehen von Fremdkörpern aus dem Augennern, bei der Cyclodialyse und ähnlichen Gelegenheiten gerne Gebrauch. Dieses Verfahren wurde auch für die Schnitte bei Eingriffen gegen Star und bei der Glaukomiridektomie empfohlen. Doch kann das durch die Lösung erzeugte Ödem der Bindehaut verhindern, den Schnitt richtig anzulegen, namentlich wenn dieser im Bereiche der Lederhaut ausgeführt zu werden hat.

**Einspritzung von Cocain- und Suprareninlösungen.** Zu den Eingriffen an den Lidern und Augenmuskeln genügt durchschnittlich eine Einspritzung einer 1%igen Cocainlösung. Ein Zusatz von  $\frac{1}{10}$ — $\frac{2}{10}$  ccm Suprareninlösung (1 : 1000,0) setzt die Blutung auf das Mindestmaß herab. Die Flüssigkeit muß passend in dem Gebiete des Eingriffes verteilt werden. Die genaueren Vorschriften wurden bei den einzelnen Verfahren mitgeteilt, um mit geringen Mengen die beste Wirkung zu erzielen. Planloses Einspritzen an einer Stelle mit Vernachlässigung anderer Teile des Gebietes führt nicht zu dem gewünschten Erfolge. Die bei den meisten Eingriffen verwendete Dosis Cocain ist eine so geringe (1 ccm 1%ige Lösung = 0,01 Cocain), daß auch bei dafür empfindlichen Personen keine Vergiftung zu befürchten ist. Wegen der starken Wirkung des Cocains genügt die Einspritzung kleiner Flüssigkeitsmengen, so daß dadurch die Übersicht in den Geweben nicht gestört wird. Besonders bei der Tränensackausschälung ist dieser Umstand vorteilhaft. Wo die Übersichtlichkeit nicht in Betracht kommt, wie z. B. bei plastischen Eingriffen, ist gegen die Einspritzung größerer Flüssigkeitsmengen nichts einzuwenden. Daher werden dabei die Novocaineinspritzungen verwendet, ebenso wie bei der Ausschälung des Auges, die sie durch den infolge der Flüssigkeitsansammlung hinter dem Auge eintretenden Exophthalmus sogar erleichtern, und bei verschiedenen anderen Eingriffen. Gewöhnlich wird 2%ige Novocainlösung verordnet. Müssen aber wie bei Gesichtsplastiken große Gebiete unempfindlich gemacht und daher große Mengen von Lösungen verwendet werden, so wird 1%ige Novocainlösung eingespritzt. Geringer Zusatz von Adrenalinlösung macht das Gewebe weniger bluten. An Stelle dieses verwenden wir gerne Corbasil, da dieses auf das Herz weniger wirkt und den Blutdruck nicht so stark erhöht.

Bei empfindlichen und aufgeregten Kranken empfiehlt sich die interne Anwendung von *Brom* in größeren Mengen. Viel wirksamer ist die interne Verabreichung von *Luminal* in der Dosis von 0,2—0,3, 1 Stunde vor dem Eingriff. Der Kranke versinkt in einen Halbschlummer, antwortet aber immer noch genügend gut auf den Anruf, um die gewünschten Augenbewegungen durchzuführen. Auch der Umstand, daß die Kranken nach dem Eingriffe noch einige Stunden weiter schlafen, ist von Vorteil, da der Wundschmerz dadurch leichter erträglich gemacht wird.

Ist Allgemeinbetäubung von vornherein beschlossen (mit Chloroform oder Äther), so wird  $\frac{1}{2}$  Stunde vor Narkosebeginn je eine Ampulle von Pantopon 0,02 und Atropin. sulfur. 0,001 unter die Haut des Oberarmes eingespritzt. Der Atropinzusatz hat den Zweck, das Erbrechen bei Beginn der Narkose und nach deren Beendigung zu vermeiden. Auch wird die Absonderung von Speichel verringert.

Bei kleinen Kindern verwenden wir *Hedonal* in Form von Klysmen.

**Verfahren.** Nach einmaligem, besser nach zweimaligem Reinigungsklyisma wird 1 Stunde vor dem Eingriffe das Hedonalklyisma verabreicht. Dieses wird in der Weise bereitet, daß ein Eßlöffel Haferflocken 5 Minuten lang mit 150 g Wasser gekocht und dann passiert werden. 50 g des Filtrates werden mit Hedonal gut vermengt zuerst eingespritzt, weitere 80 g reiner Haferschleim nachgeschickt. Die Menge des Hedonals richtet sich nach dem Alter und Körpergewicht des Kindes, pro Kilo 0,15 Hedonal. Es sollen aber 2 g nicht überschritten werden.

**Wirkung.** Bei schwächlichen Kindern ist die Wirkung genügend, um kleinere Eingriffe nach Einträufeln des Auges mit Cocain durchführen zu können, z. B. eine Diszission. Bei Kindern von kräftigerer Konstitution hat die Behandlung den Vorteil, daß der Verbrauch an Narkoticum (Äther) zur Erzielung vollständiger Betäubung beträchtlich vermindert wird.

## Sachverzeichnis.

- Abduktionskraft bei Einwärtsschielen 151, 156, 157.
- Abfluß des Kammerwassers — Verhinderung beim Starschnitt 194.
- des Kammerwassers — Verhinderung bei der Diszission 254.
- Ablösung der Bindehaut bei Ausschälung des Auges 165.
- der DESCEMETSchen Membran bei Zyklodialyse 310.
- Abrasio corneae 388.
- Abschabung der Schleimhaut nach PETERS 404.
- TERTSCH 405.
- Abtragung des Hornhautstaphyloms 392.
- Adduktionskraft bei Einwärtsschielen 150, 156.
- nach Ablösung des inneren Geraden 153, 154.
- Aderhautablösung nach Starausziehung 225.
- Aderlaß 185, 223, 269, 272, 282.
- Akinese nach VAN LINT-ROCHAT 186.
- nach O'BRIEN 187.
- Akuter Glaukomanfall nach Starausziehung 232.
- Alkoholinjektionen gegen Blepharospasmus 402.
- Alternierendes Schielen 150.
- Altersektropium 51.
- Altersveränderungen des Lides 51.
- Alypin 415.
- Amaurose nach Verletzungen 161.
- Amblyoskop von WORTH 149.
- Ampullenförmige Narbe 290.
- AMSLERS Schema 342.
- Anatomie, topographische, der Orbita 124.
- ANELSche Spritze 2, 5, 8, 11.
- Angeborene Kürze der Lider 116.
- Ankyloblepharon 114.
- Argyrollösung 20% 202, 204.
- ARLTS Verfahren der Flügelfellabtragung 399.
- — für innere Tarsorrhaphie 120.
- ARRUGAS Verfahren der Ausziehung der Linse in der Kapsel 236.
- Arteriosklerose 170, 174.
- ASMUSSESches Sideroskop 376.
- Atropin zur Gläserbestimmung bei Schielen 147.
- nach Starausziehung 204.
- Aufhellung von Hornhautnarben 325.
- Aufklappung von Hornhautnarben nach SACHS 335.
- der äußeren Wand der Augenhöhle nach KRÖNLEIN 177.
- Aufsaugung der Starreste 199.
- Augenbraue — Bildung durch Lappen der Kopfhaut 80, 81.
- Augenhöhle-Anatomie 10.
- Eingriffe 176.
- Geschwülste 177.
- Infektion 28.
- Augenhöhleneinspritzung, hintere, nach SEIDEL 164.
- Augenhöhlenrand-Ersatz durch Knorpelspangen nach LEXER 87.
- Augenhöhlenspatel 179.
- Augenseife, neutrale (GUDE) 185.
- Ausdehnung des Auges 162.
- Ausdrücken der Trachomkörner 405.
- Auskratzen der Tränensackschleimhaut 27.
- Ausschälung des Augapfels 161, 165, 230.
- des Lidknorpels nach KUHNT 99, 109.
- des Tränensackes 10.
- Ausschneidung der Regenbogenhaut bei Glaukom 277.
- der Regenbogenhaut bei LAGRANGE 289.
- der Regenbogenhaut bei Starausziehung 195.
- der Regenbogenhaut, periphere, bei Starausziehung 206.
- der Lederhaut 289.
- des Lidknorpels (KUHNT) 406.
- der oberen Übergangsfalte (KUHNT) 406.
- des Narbengewebes aus dem Tarsus bei Trachom 103.
- des Narbengewebes bei Lidplastik 63, 67.
- der Fasern des Schließmuskels 103.
- eines queren Hautstückes aus dem Lid 100.

- Äußere Tarsorrhaphie nach FUCHS 116.  
 — nach ELSCHNIG 118.  
 Ausspülung der vorderen Kammer 199.  
 Ausstichstelle beim Starschnitt 193.  
 Auswärtsdrehung des Lides, Behandlung bei Beginn 4, 58.  
 Auswärtsschielen 158.  
 — latentes 159.  
 — nach Sehnenablösung des inneren Geraden 154, 157, 159.  
 Ausweidung des Augapfels 170.  
 — der Augenhöhle 175.  
 Ausziehung der Linse in der Kapsel 215, 233, 267.  
 — des Greisenstares 182.  
 — in der Kapsel 233.  
 — des weichen Stares 263.  
 — eines Eisensplitters nach HIRSCHBERG 381.  
 — von Fremdkörpern aus dem Augeninnern 375.  
 Automarginoplastik nach KUHNT 85.  
 AXENFELDS Verfahren der Ausschneidung der unteren Tränendrüse 47.  
 — Verfahren der Ausweidung der Augenhöhle 175.  
 — Galvanokaustik der Ziliarnerven 174.  
 Bakteriologische Untersuchung des Bindehautsackes 183.  
 BARRAQUERS Verfahren (Einpflanzung von Fett in die TENONsche Kapsel) 172.  
 BASEDOWSche Krankheit 116.  
 Beeinflussung des Schielens durch Gläser 147.  
 BEER-DE-WECKERSches Verfahren gegen Hornhautstaphylo 392.  
 Behandlung der Drucksteigerung, friedliche 269.  
 Berstung der Linsenkapsel, spontane 61, 162, 280.  
 Betäubung, allgemeine 113, 177, 272, 329, 414.  
 — örtliche 414.  
 — bei Tränensackausschälung 11.  
 — bei Tränendrüsenausschälung 47.  
 — beim Sondieren der Tränenwege 3.  
 — bei Altersektropium 53.  
 — bei Narbenektropium 61.  
 — beim Verfahren von HOTZ-ANAGNOSTAKIS 102.  
 — bei Kanthotomie und Kanthoplastik 113, 114.  
 — bei Tarsorrhaphie 116.  
 — bei Vorlagerung des Lidhebers 124.  
 — bei Ptosiseingriff von HESS 127.  
 — bei Ptosiseingriff von MOTAIS 131.  
 — bei Schieleingriffen 135, 137, 150, 152.  
 — bei Ausschälung des Augapfels 162.  
 — nach LIEBERMANN 164.  
 — nach SEIDEL, bei Ausschälung des Augapfels 164.  
 — nach SEIDEL, bei KRÖNLEINS Eingriff 177.  
 — bei Starausziehung 185.  
 — bei Glaukomiridektomie 272, 279.  
 Betäubung bei Ausziehung von Fremdkörpern 382.  
 Biagsamkeit des Starmesers zu groß 213.  
 BIELSCHOWSKYS Verfahren bei gleichzeitiger Ausführung von Sehnenablösung und Vorlagerung 155.  
 Bindehautentzündung, trachomatöse 98.  
 Bindehaut-Knorpelplatte — Ausschneidung 54.  
 Bindehautlappen, gestielte, bei Symblepharon 90.  
 — ungestielte, bei Symblepharon 90.  
 — Bildung des — beim Starschnitt 195.  
 Bindehautlappen, Bildung nach KUHNT bei Starausziehung 224.  
 — Bildung zur Deckung von Hornhautwunden 332.  
 Bindehautpflanzung nach KUHNT 331.  
 Bindehautsack — Wiederherstellung 91, 97.  
 Blepharochalasis, Eingriff gegen 400.  
 Blepharophimose 114.  
 Blepharospasmus-Brille nach KREIBIG 402.  
 — wundärztliche Behandlung 402.  
 Blickübungen nach Schiel eingriffen 157.  
 Blut in der vorderen Kammer nach Starausziehung 227.  
 Blutung in Hornhautnarben 391.  
 Blutung bei Glaukomiridektomie 279.  
 — bei Sklerektomie (LAGRANGE) 289.  
 — explosive, bei ELLIOT 294.  
 — explosive, bei Glaukomiridektomie 282.  
 — explosive, bei Starausziehung 223.  
 — schwere bei Durchschneidung des Sehnerven 170.  
 — während der Starausziehung 209.  
 — bei Tränensackausschälung 12, 23, 25, 45.  
 — bei Electr. coag. 348.  
 BOWMANSche Sonden 6.  
 — Nachstarzerschneidung 257.  
 Brechungszustand, Fehler und Berichtigung des — beim Schielen 147.  
 Brom vor Starausziehung 185, 223.  
 Brückenlappen 73.  
 BRUHNSche Vorrichtungen 94.  
 BUCKYS Grenzstrahlen 388.  
 BÜDINGERS Verfahren der Ohrknorpelplastik 77.

- Büschelnadel zur Hornhauttätowierung 394.  
 BUROWS Verfahren der Lappenbildung 68.
- Caries des Augenhöhlenrandes 62, 116.  
 Cataracta Morgagni-Ausziehung 217.  
 — nigra-Ausziehung 216.  
 CELSUS' Verfahren der Lappenbildung 69.  
 Chalazionbehandlung 407.  
 Cheiroskop von MADDOX 149.  
 Cinchoperation nach O'CONNOR 142.  
 Crista lacrymalis anterior 10.  
 — — posterior 11, 175.  
 Codein bei Starausziehung 185.  
 Cyclodialyse, Verfahren von HEINE 307.  
 — Verfahren nach MAUKSCH 312.  
 — Verfahren nach SALLMANN 313.  
 Cysticercusblase, Ausziehung aus dem Augennern 177.  
 Cystische Narbe durch Kapselheilung 232.  
 — nach Starausziehung 283.  
 Cystotom 198.  
 CZERMAKS Verfahren der Flügelfellabtragung 399.  
 CZSAPODY von — Verfahren der Höhlenplastik 94.
- DAHLFELDSches Bilderbuch 149.  
 Dakryocystitis, akute — Behandlung 28.  
 Dakryocysto-Rhinostomie nach TOTI 29.  
 — nach WEST-KOFLER 32.  
 Dampfkauter nach WESSELY 390.  
 Dauertrübung der Hornhaut nach Ausspülung der Kammer 199.  
 Delirium tremens 203.  
 DENIGS Verfahren bei Verätzungen der Bindehaut 87.
- DENIGS Verfahren bei Panus 89.  
 Dermol 142.  
 DESMARRESScher Löffel 189.  
 DIEFFENBACHS Verfahren der Lappenbildung 77.  
 Dionin 230, 232, 384.  
 Diszission durch die Hornhaut 250.  
 — durch die Lederhaut 257.  
 — mit 2 Nadeln 257.  
 Doppelbilder nach Behebung der Ptosis 122.  
 Doppelhäkchen nach REISINGER 219.  
 Doppeltsehen bei Exophorie 159.  
 — bei Symblepharon 89.  
 — nach Verfahren von MOTAIS 134.  
 — nach Verfahren von KRÖNLEIN 181.  
 Drahtsäge 179.  
 Drehlappen 68.  
 Druckmesser nach SCHIÖTZ 318.  
 Drucksteigerung — Eingriffe gegen 269.  
 — nach Diszission 252, 257, 258.  
 — nach Starausziehung 232.  
 Druckverband nach Iridotomie 260.  
 — nach Zyklodialyse 309.  
 — nach Iridektomie bei ektatischen Narben 338.  
 — nach Einschnidung des Kammerwinkels 314.  
 — nach Aufklappung einer Narbe 335.  
 Durchlöcherung des Bindehautlappens bei Trepanation 293.  
 Durchschneidung des Sehnerven bei Ausschälung des Augapfels 168.  
 Durchtrennung der Augenmuskeln bei Ausschälung des Auges 166.
- Ectropium cicatriceum 60.  
 — des Unterlides nach Tränensackausschälung 27.  
 — paralyticum 59, 116.
- Ectropium, senile 51.  
 — spasticum 50.  
 EDESKUTYS Verfahren zur Verhütung der Wiederkkehr des Flügelfelles 399.  
 Einheilung der Regenbogenhaut nach Trepanation 294.  
 — der Regenbogenhaut in eine Eingriffsnarbe 283, 338.  
 Einpflanzung einer Kugel in die TENONSche Kapsel 170.  
 — von Fett in die TENONSche Kapsel 172.  
 Einreißen der Iriswurzel bei Starausziehung 206.  
 Einreißen der Kapsel bei intracapsularer Ausziehung 242.  
 Einrisse im Sphinkter 205.  
 Einschnidung des Lidwinkels 113.  
 — der vorderen Linsenkapsel 198.  
 — des Kammerwinkels nach DE VINCENTIIS 313.  
 Einseitige Atropinisierung bei Schielen 149.  
 Einseitiger grauer Star 184.  
 Einsinken der Carunkel nach Tenotomie 137.  
 Einspritzungen unter die Bindehaut bei Infektion nach Starausziehung 230.  
 — unter die Bindehaut 390, 408,  
 — retrobulbäre 162, 235, 240.  
 — in die Augenhöhle nach v. LIEBERMANN 164.  
 Einwärtskehrung des Lides 98.  
 — der Lidhaare 99.  
 Einwärtsschielen 150.  
 Einwanderung von Epithel in die vordere Kammer 210, 233.  
 Eisenspäher 376.  
 Elektrargol 183.  
 Endophthalmitis nach Starausziehung 229.  
 Entbindung der Linse 199.

- Entkeimung der Instrumente 191.  
 Entropium 98.  
 — senile 98, 100.  
 — spasticum 98, 100, 402.  
 Entzündung durch Starreste 204.  
 Entzündungen nach Starausziehung 229.  
 Epikanthusverfahren von AMMON-KUHNT 401.  
 Epilation, elektrolytische 99, 111.  
 Ergebnisse der optischen Iridektomie 327.  
 Ergebnisse der Tränendrüsenausschneidung 49.  
 — der Tränensackausschälung 25.  
 — der Überpflanzung stielloser Hautlappen 65.  
 — des Verfahrens von FUCHS bei Tarsorrhaphie 118.  
 — des Verfahrens von ELSCHNIG bei Tarsorrhaphie 119.  
 — des Verfahrens von HESS gegen Ptosis 130.  
 — des Verfahrens von HOTZ 105.  
 — des Verfahrens von PANAS 108.  
 — der Vorlagerung des Lidhebers 127.  
 Eröffnung der vorderen Linsenkapsel bei Linearextraktion 265.  
 — der vorderen Linsenkapsel bei Starausziehung 196.  
 — des vorderen Augapfelabschnittes bei Panophthalmitis 162.  
 Erosion der Hornhaut, rezidivierend 388.  
 Ersatz der Augenbrauen und Wimpern 80.  
 — der Lider 66.  
 — des Oberlides 80.  
 — des Unterlides 77.  
 Erweiterung der Lidspalte nach Tenotomie 137.  
 EVERSBUSCHS Verfahren für Ptosis 122, 123.  
 Evisceratio bulbi 170.  
 Exenteratio orbitae 175.  
 Exophorie 159.  
 Exophthalmus 116, 121, 174, 181, 240.  
 Expulsive Blutung bei Starausziehung 223.  
 Extractio cataractae 182.  
 FABRITIUS' Verfahren, Diszission und Lanzenextraktion 255, 268.  
 Facialislähmung 116.  
 Falscher Weg, beim Sondieren — Ursache 6.  
 Fascia tarso-orbitalis 124.  
 Fascie, oberflächliche 14.  
 — tiefe 15.  
 — tiefe, Durchschneidung 16.  
 Fehler bei der Akinese 187.  
 — bei der Trepanation (ELLIOT) 294.  
 — bei der Starausziehung 207.  
 — bei der Starausziehung in der Kapsel 240.  
 — beim Ausstich (Starschnitt) 207.  
 — beim Sondieren 8.  
 — beim Verfahren von PANAS 108.  
 — beim vorderen Lederhautschnitt 287.  
 — bei Tränendrüsenausschneidung 48.  
 — bei Tränensackausschälung 25.  
 Feldertrübung der Hornhaut nach Starausziehung 227.  
 Festhalten des Auges 207.  
 — des Auges an einem Muskelansatz 169.  
 Fetteinpflanzung in die TENONSche Kapsel 172.  
 Fetthermie der Unterlider 400.  
 Feuchte Kammer 61, 121, 129.  
 Filtrationsnarbe 290.  
 Fissura orbitalis inferior 175, 179.  
 Fistulisierung der Augen 296.  
 FLARERS Verfahren gegen Trichiasis 99, 109.  
 Flügelfell, Abtragung 399.  
 Flügelfell, Verhütung der Wiederkehr durch Verfahren nach EDESKUTY 399.  
 Folgen des Glaskörpervorfalles 222.  
 — unangenehme, bei Ganglionanästhesie 164.  
 — unangenehme, einer Tenotomie 137.  
 Fossa pterygopalatina 178.  
 — temporalis 179.  
 FRICKES Verfahren der Lappenbildung 74.  
 — Abänderung nach KREIBIG 74.  
 FRICKERS Verfahren der Ausschneidung der unteren Tränendrüse 49.  
 FRIEDES Verfahren gegen Blepharospasmus 403.  
 FRÖHLICHS Verfahren der Hornhauttätowierung 394.  
 FROST-LANGS Verfahren (Einpflanzung einer Kugel in den TENONSchen Raum) 170.  
 Frühplastik 61.  
 — der Bindehaut nach DENIG 87.  
 Frühtransplantation 87.  
 FUCHSSches Gitter 203.  
 FUCHS' Verfahren für Tarsorrhaphie 116.  
 Fusionstendenz, Anregung der — beim Schielen 149.  
 — Überwindung der Doppelbilder durch — 160.  
 GAILLARDS Naht 98, 101.  
 Galvanokaustik der Ziliarnerven nach AXENFELD 174.  
 Ganglionanästhesie 163.  
 Gegenanzeigen gegen Dakryocysto-Rhinostomie 33.  
 — gegen Gebrauch der Kapselzange 215.  
 — gegen Glaskörperabsaugung 412.  
 — gegen Sondieren 7.  
 — gegen Tränensackausschälung 28.

- Gegenwirkende Naht 154, 155.  
 Gehilfe, Tätigkeit des 413.  
 Geschwülste der Augenhöhle 176.  
 Geschwür der Hornhaut durch Fadendruck 141.  
 Gitter nach FUCHS 203.  
 Glaskörper für Plastiken — von MÜLLER 93.  
 — flüssig 220, 221.  
 Glaskörpertrübungen, Kochsalzeinspritzung bei 408.  
 — Absaugung nach ZUR NEDDEN 410.  
 Glaskörpervorfall bei Starausziehung 217.  
 — bei Starausziehung — Ursachen 220.  
 — nach Diszission 255.  
 Glaucoma malignum 283.  
 Glaukom, akutes, nach Starausziehung 232.  
 — friedliche Behandlung 269.  
 Glaukomiridektomie 271.  
 Gleichzeitige Ausführung von Vorlagerung und Sehnenablösung 155.  
 Gleitlappen 69.  
 GONINS Verfahren gegen Netzhautabhebung 341.  
 GRAEFES Verfahren gegen Krampfentropium 98, 101.  
 Grenzstrahlen 285, 388.  
 GRÖNHOLMScher Lidlöffel 409.
- Haarzwiebelboden-Abtragung 99, 109.  
 Häkchen, spitzes 198.  
 — stumpfes 214.  
 Hämatom bei Neurotomia optico-ciliaris 174.  
 — des Orbitalgewebes bei Ausschälung des Augapfels 170.  
 Hämophilie 170.  
 HAITZSches Verfahren bei Symblepharon 92.  
 Hakenpinzette 191.  
 — nach ELSCHNIG 207.  
 Handmagnet nach HIRSCHBERG 378.
- HAUSMANNSches Bilderbuch 149.  
 Hautbestrahlung mit Grenzstrahlen 285.  
 Hautlappen aus dem Oberarm 64.  
 — gestielte 65.  
 Hautüberpflanzung auf den Lidrand 110.  
 Hedonal 416.  
 HEINES Verfahren (Cyklo-dialyse) 307.  
 Herabsetzung des Druckes nach Trepanation 294.  
 Herausdrücken des Stares 199.  
 HERTELS Sideroskop 376.  
 Hervortreten des Auges nach Tenotomie 137.  
 HESS' Verfahren für Ptosis 122, 127.  
 Heterochromia iridis 185.  
 HIRSCHBERGS Verfahren zum Ersatz der Wimpern 80.  
 Hohlsonden 7.  
 Hornhauterosion nach Kokainisieren 228, 414.  
 Hornhaut-Geschwülste, Abtragung 389.  
 Hornhautnaht 398.  
 Hornhautnarben, zentrale 324.  
 Hornhauttrepan nach v. HIPPEL 336.  
 Hornhautverletzung durch die Lanzenspitze 278.  
 Hornplatte 52, 406.  
 HOTZ-ANAGNOSTAKIS' Verfahren bei Entropium 99, 102.  
 Hydrophthalmus 285, 295, 313.
- IMRES Plastik mit Gleitlappen 70.  
 Infektion nach Starausziehung 229.  
 Instrumente für Dakryocystorhinostomie 33.  
 Intermarginaler Saum — Einschnitt beim Verfahren von HOTZ 105.  
 — Saum — Spaltung 52.  
 Intralamellärer Schnitt 212, 276, 278.  
 Iridectomia ab externo 281.
- Iridektomie, basale 282.  
 — bei Sekundärglaukom 315.  
 — gegen das primäre Glaukom 271.  
 — nach Ulcus serpens 391.  
 — nach unten 280.  
 — optische 324.  
 Iridenkleisis antiglaucomatosa 297.  
 Iridocyclitis nach durchbohrender Verletzung 161.  
 — nach Starausziehung 231, 246.  
 Iridodialyse beim Ausschneiden der Iris 214.  
 — beim Lanzenschnitt 278.  
 — beim Starschnitt 209.  
 — bei Nachstarzerschneidung 256.  
 Iridotomie 258.  
 — waagrechter Schnitt 261.  
 — präkorneale 328.  
 Iriscyste, Eingriffe bei 317.  
 Iriszange ARLTS 195.  
 Italienisches Verfahren für gestielte Lappen 66.
- JAESCHE-ARLTS Verfahren gegen Trichiasis 99, 109.  
 Jodtinktur 388.
- KALTS Verfahren (Naht bei Starausziehung) 221.  
 Kammer, feuchte 61, 121, 129.  
 Kaninchen Schleimhaut, Propfung mit 90.  
 Kanthoplastik 114.  
 Kanthotomie 113.  
 Kapselzange 196.  
 Kapsulotomie 258.  
 Karies des Augenhöhlenrandes 62, 116.  
 Karlsbader Nadeln 64.  
 Katarrh der Bindehaut nach Tränendrüsenausschälung 49.  
 Katholyse 356.  
 Kauterisation der Wunde bei Infektion nach Starausziehung 230.  
 Keratitis profunda, Punction bei 315.

- Keratokonius, wundärztliche Behandlung 396.
- Keratoplastik, durchdringende 339.
- oberflächliche 339.
- Kernstar 324.
- KNAPPS Verfahren der Ausziehung des Altersstars in der Kapsel 233.
- Verfahren der Lappenbildung 69.
- KNAPPSche Rollpinzette 405.
- Knochenschnitte bei KRÖNLEINS Verfahren 179.
- Knopflochiridektomie bei Ausziehung des Altersstars 206.
- bei Sklerotomie 289, 293.
- KOFLERS Verfahren der endonasalen Dakryocystorhinostomie 32.
- Kokain, Vorzug vor den Ersatzmitteln 414.
- Einspritzungen 415.
- KÖLLNERS Verfahren zum Lidersatz 86.
- Kollaps der Hornhaut bei Starausziehung 222.
- des Auges bei Starausziehung 222.
- Kolobom der Lider — Deckung nach WICKERKIEWICZ 72.
- der Lider — Naht 81.
- der Lider — alt 83.
- der Lider — frisch 81.
- Konische Sonde zur Tränenröhrenverweiterung 3.
- Körnerkrankheit, Eingriff gegen 404.
- Kost nach Starausziehung 204.
- Kampf des Schließmuskels der Lider 98.
- Krampfektropium 50.
- Krampfentropium 98, 100.
- KREIBIGS Abänderung des Verfahrens von FRICKE 74.
- Blepharospasmusbrille 402.
- Kreissäge 179.
- Kreuzschnitt bei Diszission 252.
- Kriegsverletzungen der Lider 84, 93.
- KRÖNLEINS Verfahren der Aufklappung der äußeren Wand der Augenhöhle 177.
- KUHNTS Verfahren der Ausschneidung der oberen Übergangsfalte 406.
- Verfahren der Ausschneidung des Lidknorpels 406.
- Verfahren der Bildung eines Brückenlappens 80.
- Verfahren bei Lidkolobomen 83.
- Verfahren für Kanthoplastik 115.
- Verfahren zur Ausschälung des Lidknorpels 99, 109.
- Verfahren der Bindehautpfropfung 331.
- KUHNT-SZYMANOWSKIS Verfahren gegen Altersektropium 52.
- KUHNTS Ausdrücker 406.
- Kürze der Lider, angeboren 116.
- des Starschnittes 208, 210, 213, 241.
- Kurzsichtigkeit, hochgradige, Eingriffe gegen 252.
- Lähmungsektropium 59, 116, 121.
- Lähmungsschielen 160.
- Lage des Starschnittes, falsche 208,
- Lagophthalmus 109, 116, 130, 134.
- LAGRANGES Verfahren (Sklerotomie) 288.
- LANDOLTS Verfahren der Bildung eines Brückenlappens 73.
- Verfahren zur Deckung eines Gewebeerlustes im Lide 80.
- Lapislösung  $\frac{1}{4}\%$  zur Behandlung der Tränensackschleimhaut 1.
- $2\%$ , zur Behandlung der Bindehaut vor Starausziehung 183.
- Lappen aus dem Oberarm 64.
- stiellose 63, 64.
- Lappenumklappung 68.
- Lappenbildung nach DIEFFENBACH 69, 77.
- nach FRICKE 68, 74.
- nach ROGMAN 68, 91.
- Lederhautausschneidung nach ELLIOT 291.
- nach LAGRANGE 288.
- Lederhautschnitt, vorderer 285.
- hinterer 304.
- Lederhautwunden, Deckung großer 333.
- Lidabreißung vom Ansatz 84.
- Lidbändchen 10, 15, 16.
- Durchtrennung 16.
- Lidersatz 69, 73, 77, 80.
- durch Helix 79.
- nach KÖLLNER 86.
- nach KNAPP 79.
- nach KUHNT 80.
- Lidhaare-Ausrottung 99.
- Lidhaare-Mißwuchs 99.
- Lidheber-Verletzung bei Ausschälung des Augapfels 170.
- Lidheber-Vorlagerung 123.
- Lidknorpelausschälung nach KUHNT 99, 109.
- Lidknorpelveränderung bei Trachom 98.
- Lidlöffel nach GRÖNHOLM 409.
- Lidplatte, hintere (Bindehaut-Knorpelplatte) 52.
- vordere (Haut-Muskelplatte) 52.
- Lidrandplastik nach KUHNT 85.
- bei Trichiasis 99.
- Lidspalte, Verschluß der 120.
- zu weit nach Schieleingriffen 137.
- Lidwinkelplastik 114.
- LIEBERMANN'S Verfahren der Vorlagerung 141.
- Ligamentum canthi internum 15.
- LINDNERS Probe der Cocainempfindlichkeit 366.

- LINDNERS Unterminierungsmethode bei Netzhautabhebung 365.  
 — Verfahren der hinteren Sklerotomie mit dem Trepan 306.  
 Linearextraktion 263.  
 Linke Hand, Gebrauch der 213.  
 Linse-Subluxation bei Glaukomiridektomie 281.  
 Linse, Vorfall der — bei Sklerektomie (LAGRANGE) 290.  
 Linsenkapsel-Einheilung in den Starschnitt 224.  
 — spontane Berstung bei Iridektomie 280.  
 — Verletzung bei Iridektomie 280.  
 Linsenkern, groß 216.  
 — klein 208, 217.  
 Linsentrübungen, zentrale, Eingriffe bei 324.  
 Lippenklemme nach LÖWENSTEIN 87.  
 Lippenschleimhaut, Plastik mit — bei Symblepharon 90, 92.  
 — Überpflanzung bei Trichiasis 111.  
 Liquor Burowi 28.  
 LÖWENSTEINS Verfahren für Ganglionanästhesie 162.  
 Luft in der vorderen Kammer 221.  
 Luminal 272, 416.  
 Luxation der Linse in den Glaskörper bei Starausziehung 222.  
 LYRITZAS Verfahren der Ausschneidung des Lidknorpels 407.  
 Mängel des Verfahrens von HOTZ 105.  
 MAGITOTS Verfahren — Einpflanzung einer Knorpelkugel 171.  
 Magnetische Fremdkörper 378.  
 Massage von Lidnarben 61.  
 Maßregeln vor Schieleingriffen 147.  
 Mastisoldauerverband nach SATTLER 148.  
 MAUKSCHS Verfahren der Cyclodialyse 312.  
 Meningitis, Gefahr der — bei Ausschälung des Augapfels 162.  
 Messerchen nach WEBER 4.  
 Messerschneide nach unten beim Starschnitt 212.  
 Milcheinspritzungen, intramuskulär 230, 232.  
 v. MILLINGENS Verfahren 99, 111.  
 Mißlungene Ausziehung eines Fremdkörpers 386.  
 Mißwuchs der Lidhaare 99.  
 Monokulares Schielen 150.  
 MOTAIS' Verfahren für Pto-sis 123, 131.  
 MÜLLERS Tränensackspiegel 14.  
 — Verfahren der Bildung eines Wanderlappens 73.  
 — Verfahren gegen Alters-ektropium 52, 58.  
 — Verfahren gegen Entropium 102.  
 MULES' Verfahren (Ausweidung des Augapfels 170.  
 Musculus orbicularis 14.  
 Muskel, oberer gerader, Lähmung durch Einspritzung 188.  
 Nachbehandlung bei zurückgelassenen Schleimhautresten 26.  
 — nach Starausziehung 202.  
 — nach Tränensackausschälung 24.  
 — nach Überpflanzung stielloser Lappen 65.  
 — nach Verfahren von HESS gegen Pto-sis 130.  
 — nach Vorlagerung eines Augenmuskels 141.  
 Nachstar, Ausziehung des membranösen 261.  
 Nachstaroperation, Zeitpunkt der Ausführung 256.  
 Nachstarzerschneidung 255.  
 Nachteile des Verfahrens nach PANAS 108.  
 Nachteile des Verfahrens von MOTAIS 134.  
 — des skleralen Ausstiches beim Starschnitt 209.  
 — des kornealen Ausstiches beim Starschnitt 210, 223.  
 — der Sklerektomie von LAGRANGE 291.  
 Nadelmesserchen nach DE VINCENTIIS 313.  
 Nadeln, öhrlose 235.  
 Naht bei Narbenektropium 62.  
 — bei Tarsorrhaphie 117, 119.  
 — bei Tränensackausschälung 24.  
 — beim Verfahren von HESS gegen Pto-sis 128.  
 — bei Vorlagerung des Lidhebers 125.  
 — bei Vorlagerung eines Augenmuskels 138, 141.  
 — beim Verfahren von KUHN-T-SZYMANOWSKI 55.  
 — der Tränenröhrchen 8.  
 — nach GAILLARD 98, 101.  
 — nach HOTZ 104.  
 — nach KALT bei Starausziehung 221.  
 — nach SNELLEN 50.  
 — primäre bei Lidverletzungen 60.  
 Narbenektropium 60, 116.  
 — des oberen Lides, Beseitigung durch Brückenlappen 80.  
 Narbenform nach Sklerektomie (LAGRANGE) 290.  
 — nach Trepanation 294.  
 Narbengewebe-Ausschneidung 63, 67.  
 Natrium bicarbonicum bei Diabetes 203.  
 Nekrose überpflanzter (stielloser Lappen) 65.  
 Nervus infraorbitalis 176.  
 — supraorbitalis 176.  
 Netzhautabhebung nach Starausziehung 233, 247.  
 Netzhautrisse, Auffinden 341.  
 — Lagebestimmung 342 bis 345.

- Neubildung, bösartige, im Auge 161.  
 — des Lidrandes 85.  
 — in der Augenhöhle 175.  
 Neurectomie 174.  
 Neurotomia optico-ciliaris 173.  
 Nichtmagnetische Fremdkörper 385.  
 Niesen, Unterdrückung des 185.  
 Novokain 415.
- Oberkiefer-Stirnfortsatz** 10.  
**Oberlidersatz** 74, 80.  
**O'CONNORS** Verfahren der Verkürzung eines Augenmuskels 142.  
**Ohrknorpelplastik** nach **BÜDINGER** 77.  
 — Abänderung nach **KNAPP** 79.  
 — bei Symblypharon 80.  
**Ophthalmoplegie, totale** 131.  
**Optochin** 183.  
**Orthoformsalbe** 388.  
**Oxycyanatlösung** bei Infektion nach Starausziehung 230.
- PAGENSTECHERS** Verfahren gegen Ptosis 131.  
**PANAS'** Verfahren gegen Trichiasis 99, 107.  
**Pannus, Transplantation** nach **DENIG** 89.  
**Panophthalmitis** 162.  
 — nach Starausziehung 230.  
**Pantopon** 272.  
 — Atropineinspritzungen 416.  
**PÉAN VON AXENFELD** für Tränendrüsenausschneidung 49.  
**PFALZSche** Frühtransplantation bei Verbrennungen 87.  
**PFLÜGERSches** Verfahren (**CHANDLER-HESS**) Starausziehung mit peripherer Iridektomie 206.  
**PFLUGKSches** Verfahren bei Lidkolobomen 83.
- Phlegmone der Orbita** nach Tränensackausschälung 28.  
**PILLATS** Verfahren der Iridenkleisis antiglaucomatosa 297.  
**Pilzmassen** im Tränenröhrchen 4.  
**Plastik** mit gestielten Hautlappen 65.  
 — mit ungestielten Hautlappen 63.  
 — zur Wiederherstellung des Tränenröhrchens 9.  
**Pneumonie, hypostatische, nach Starausziehung** 203.  
**PRAVAZSche** Spritze 12.  
**Prismengläser** bei Schielen 150.  
**Probeverband** 184.  
**Processus fronto-sphenoidalis** 178.  
 — zygomaticus des Stirnbeines 179.  
**Prothesen** nach **MÜLLER** (Wiesbaden) 93.  
**Protinal** 232.  
**Prüfung der Lichtempfindung und Projektion** 161, 183.  
**Psychose** nach Starausziehung 203.  
**Ptosis** 122, 402.  
 — amyotrophica 213.  
 — nach Tränendrüsenausschälung 48, 49.  
 — trachomatosa 105.  
**Punktion der Hornhaut** 314.
- Quecksilbereinreibungen** 232.
- Radiumbehandlung** bei Tränensacktuberkulose 28.  
**Regeln** für die Bildung gestielter Lappen 67.  
**Regelung der Wirkung der Sehnenablösung** 152.  
**Regenbogenhautentzündung** nach Sklerektomie 291.  
 — nach Trepanation 294.  
**Regenbogenhautzange** nach **HESS** 206.
- Reifung des Stares, künstliche** 184.  
**Reinigen der Pupille** von den Starresten 200.  
**REISINGERS** Doppelhäkchen 219.  
**Riesenmagnet** nach **HAAB** 378.  
**Ringabszeß** nach Starausziehung 230.  
**Rinnennadel** zur Hornhauttätowierung 394.  
**ROCHATS** Verfahren zur Lähmung des Schließmuskels der Lider 186.  
**Röntgenbestrahlung** der Tränendrüse 49.  
**RÖNTGENSche** Strahlen 377.  
**ROGMANSches** Verfahren bei Symblypharon 91.  
**Rollung des Auges** bei seitlicher Fixation 192.
- ŠAFÁŘ-Steckelektroden** 352.  
 — -Zielophthalmoskop 359.  
 — -Pinzette 353.  
 — elektrochirurgische Behandlung des essentiellen Blepharospasmus 402.
- SALLMANN'S** Verfahren der Cyclodialyse 313.  
**SATTLERSches** Bilderbuch 149.  
**Sehnenablösung** gegen Schielen 135.  
 — Regelung der Wirkung 152.  
 — Wiederholung 157.  
**Sekretstauung** nach Tränensackausschälung 12.  
**Sekundärglaukom, Eingriffe** gegen 314.  
 — nach Glaskörpervorfall 222.  
 — nach Starausziehung 224, 232, 247.  
**Septum orbitale** 15.  
**Siderosis bulbi** 378.  
**Sideroskop** 376.  
**SIEGRISTSches** Verfahren für örtliche Betäubung bei Ausschälung des Auges 162.  
**Skleralstaphylom** 162.

- Sklerektomie nach LA-GRANGE 288.
- Sklerotomie  
— hintere 304.  
— vordere 285.
- Skrophulöse Hornhautgeschwüre, Sublimat einspritzungen bei 408.
- SMITHS Verfahren der Ausziehung des Altersstars in der Kapsel 233.
- SNELLENSche Naht 50.  
— Schale 202.
- SNELLENSches Verfahren gegen Trichiasis 99, 106.
- Sonde, konische 2.  
— BOWMANSche 2, 6.
- Sondierung des Tränen-  
nasenganges 5, 23.  
— des Tränen-  
nasenganges,  
Gegenanzeige 7.  
— durch das obere Tränen-  
röhrchen 7.
- Spätinfektion 232.  
— nach Sklerektomie 291.  
— nach Trepanation 295.
- Spaltung des Lides im  
intermarginalen Saum  
52.  
— SAEMISCH 391.
- SPENCER-WATSONSches  
Verfahren gegen En-  
tropium 99, 110.
- Sphinkter, Starrheit 205.  
— Einrisse 205.
- Spritze, ANELsche 5, 8, 11.  
— PRAVAZsche 12.
- Subkutane Naht nach  
PAGENSTECHER 131.
- Sublimat einspritzung unter  
die Bindehaut 408.  
— unter die Bindehaut bei  
Infektion nach Starausz-  
ziehung 230.  
— bei Ulcus serpens 390.
- Subluxation der Linse  
durch Ziehen mit der  
Kapselpinzette 216.
- Suprarenin 415.
- Sutura zygomatico-frontalis 179.
- Symblepharon, Eingriffe  
gegen 87.  
— Ohrknorpelplastik bei  
80.  
— Verfahren nach KÖLL-  
NER 86.
- Symblepharon, Verfahren  
nach HAITZ 92.
- Sympathische Erkrankung  
161, 185, 231, 291, 334.  
— Erkrankung nach Star-  
ausziehung 231.
- Synechie, vordere, Ein-  
griffe bei 334.
- Schale, SNELLENSche 202.
- Scheidenschleimhaut,  
Plastik mit — bei Sym-  
blepharon 90.
- Scherenzange, WECKER-  
sche 195.
- Schichtstar, Eingriffe bei  
324.
- Schielen, alternierendes  
150.  
— Eingriffe gegen 135.  
— monokulares 150.
- Schielhaken, gekrümmter  
136.  
— gerader 137.
- Schielopoperation bei Kin-  
dern 150.
- Schilddrüse-Röntgenbe-  
strahlung 285.
- Schleimhautreste, zurück-  
gelassen bei Tränen-  
sackausschälung 26.
- Schleimhautüberpflanzung  
90, 111.
- Schließmuskel der Lider  
14, 124.
- Schlinge, WEBERSche 218,  
219.
- Schmerzen nach Starausz-  
ziehung 228.
- Schnitt bei Sklerektomie  
nach LAGRANGE 288.  
— mit dem GRAEFESchen  
Messer bei Glaukom-  
iridektomie 275.  
— mit der Lanze bei Glau-  
komiridektomie 272.
- Schwankungen des Augen-  
druckes 321.
- Schwitzkuren 231.
- STANCULEANUS Verfahren  
der Ausziehung des Al-  
tersstars in der Kapsel  
233.
- Staphyloma corneae, totale  
392.
- Star, einseitiger 184.  
— im helleren Auge 185.  
— überreifer 184.
- Starauszziehung, Vorberei-  
tungen 185.  
— bei Kindern 252.  
— bei runder Pupille 205.  
— nach sympathischer  
Ophthalmie 185.
- Starreste 226.
- Starrheit des Sphinkters  
205.
- Starschnitt 193.  
— nach unten 213.
- Steinsplitter im Augenin-  
nern 385, 387.
- STELLWAGSches Verfahren  
gegen Trichiasis 99,  
109.
- Stenopäische Spalte, Ver-  
wendung der 325.
- Stereoskopische Übungen  
bei Schielen 149.
- Stieltupfer 188.
- Störungen im Heilungsver-  
laufe nach Starausz-  
ziehung 223, 245.
- Streckung des Tarsus 99,  
104.
- Streifentrübung der Horn-  
haut nach Starausz-  
ziehung 227.
- Stryphnongaze 12.
- Stürzen der Linse bei der  
Ausziehung 217.
- Tabakbeutelnaht der Bin-  
dehaut 169.
- Tätowierung der Hornhaut  
393.
- Tarsoplastik 99, 106.
- Tarsorrhaphie, äußere,  
nach FUCHS 116.  
— nach ELSCHNIG 118.  
— innere 120.  
— gegen üble Folgen einer  
Sehnenablösung 116.  
— bei Verätzungen 120.
- Tarsus, Veränderungen bei  
Trachom 98, 103.
- Tenotomie des äußeren Ge-  
raden 136.  
— des inneren Geraden  
135.  
— des oberen und unteren  
Geraden 145.  
— der schiefen Augenmus-  
keln 146.  
— gegen hohe Kurzsich-  
tigkeit 147.

- THIERSCH, Deckung der Wunde nach 74, 87.  
 Toilette des Auges nach Starausziehung 201.  
 TÖRÖKS Verfahren der Ausziehung des Altersstars in der Kapsel 234.  
 TOTIS Dakryocysto-Rhinostomie 29, 45.  
 Tränenableitung 7.  
 Tränendrüse, untere, Ausschneidung 47.  
 Tränenleiste, vordere 10.  
 — hintere 11.  
 Tränennasengang, Sondierung 5.  
 — Verschuß bei Neugeborenen 8.  
 Tränenröhrchen, Anzeige zur Schlitzung 4.  
 — Durchschneidung 20.  
 — Erweiterung 2.  
 — Naht 8.  
 — Verlauf 2.  
 — Verschorfung 24.  
 Tränensack, Abszeßeröffnung 28.  
 — Anatomie 10.  
 — Auffindung 25.  
 — Ausschälung 10, 18.  
 — Bloßlegung 16.  
 — Ektasie 27.  
 — Entzündung, akute 28.  
 — Fistel 27.  
 — Tuberkulose 7, 28.  
 — Untersuchung bei Starausziehung 183.  
 — Verletzung 25.  
 — Wand, laterale 18.  
 — Wand, mediale 18.  
 Tränensackblennorrhoe, chronische 10.  
 Tränensackgrube 11, 23.  
 Tränensackkuppe 22.  
 Tränensackspiegel 14.  
 Tränenträufeln 2, 7, 25, 47, 49.  
 Tränenwege, Sondieren der 1.  
 — Verengerung der 1.  
 Transfixion 317.  
 Trepan nach v. HIPPEL 336.  
 Trepanation nach ELLIOT 291.  
 — bei Keratokonus 396.  
 Trepanation nach SONDERMANN gegen Ulcus serpens 390.  
 Trepanationscyclodialyse nach SALLMANN 313.  
 Trichiasis 98, 99.  
 Trochlea 176.  
 Tröpfcheninfektion 191.  
 Tuberkulose der Bindehaut; Ohrknorpelplastik bei 80.  
 Überberichtigung bei Plastik mit ungestielten Lappen 63.  
 — beim Verfahren von HOTZ gegen Entropium 104.  
 — beim Verfahren von HESS gegen Ptosis 129, 130.  
 — des Schielens 137, 151, 155, 156, 158.  
 Überlegenheit der Vorlagerung 156.  
 Überpflanzung stielloser Lappen 63.  
 — von Hornhaut 336, 339.  
 — von Schleimhaut 87, 88, 89, 90, 91, 111.  
 Überreifer grauer Star 184.  
 Übungsbrille bei Schielen 149.  
 Ulcus serpens, wundärztliche Behandlung 390.  
 Umdrehung des Lides, doppelte 47.  
 Umklappung des Lappens 68.  
 Umstülpung des oberen Lides nach GRÖNHOLM 409.  
 Umstülpung des Hornhautlappens bei Starausziehung 221.  
 Ungleiches Sehen nach einseitiger Starausziehung 184.  
 Unreifer Star, Ausziehung 184.  
 Unterberichtigung bei Ablösung des inneren Geraden 153.  
 Unterlid, Ersatz 77.  
 Unterstützende Naht bei Einwärtsschielen 152.  
 Unterstützende Naht bei Auswärtsschielen 159.  
 Urotropin bei Infektion nach Starausziehung 230, 231.  
 Verätzung der Lider 86.  
 Verband nach Eingriff gegen Altersektropium 57.  
 — nach Naht von Lidkolobomen 81.  
 — nach Starausziehung 202.  
 — nach Überpflanzung eines stiellosen Hautlappens 65.  
 — nach Tränensackaushälung 24.  
 — nach dem Verfahren von HESS gegen Ptosis 129.  
 — nach dem Verfahren von HOTZ 105.  
 Verbrennung der Lider 86.  
 Verengerung der Tränenwege, Erkennung 1.  
 Verfahren der Plastik mit gestielten Lappen 65.  
 — der Plastik mit ungestielten Lappen 63.  
 italienisches 66.  
 Vergrößerung des Augapfels, einseitig 116.  
 Verkürzung des Lides durch das Verfahren von PANAS 108.  
 Verlängerung des Starschnittes mit der Schere 213.  
 Verletzung des Glaskörpers bei der Diszission des Nachstares 255, 257.  
 — der Linsenkapsel bei Glaukomiridektomie 280.  
 — der hinteren Linsenkapsel bei Diszission 251, 255.  
 — der Linse bei Trepanation 294.  
 — der Regenbogenhaut beim Schnitt für Glaukomiridektomie 278.  
 — der Linse bei vorderem Lederhautschnitt 287.  
 — der Linse bei der Sklerektomie nach LAGRANGE 291.

- Verletzung der Linse bei der Sklerektomie nach ELLIOT 294.
- der Linse beim Starschnitt 209.
- des Strahlenkörpers bei Trepanation 294.
- Vernähung der Lidspalte 121.
- Verrostung des Auges 378.
- Verschiebung der Linse, Eingriffe bei 316.
- Verschuß des Tränen-Nasenganges bei Neugeborenen 8.
- Verschorfung von Hornhautgeschwüren mit dem Glühstift 389.
- der Kegelspitze bei Keratokonus 396.
- Verziehung der Pupille, nachträgliche 246.
- Verzögerung der Herstellung der vorderen Kammer nach Starausziehung 223, 245.
- Vollberichtigung der Fehler des Brechungszustandes bei Schielen 147.
- Vorbereitende Ausschneidung der Regenbogenhaut 184.
- Vorbereitung zur Starausziehung 185.
- Vordere Synechie, Eingriffe bei 334.
- Vorfall des Augenhaltendes aus Wunden 161.
- des Glaskörpers bei Glaukomiridektomie 282.
- des Glaskörpers bei Linearextraktion 267.
- des Glaskörpers bei Sklerektomie nach LAGRANGE 290.
- des Glaskörpers bei Starausziehung 217, 244.
- des Glaskörpers bei Trepanation 294.
- des Glaskörpers bei Cyclodialyse 310.
- der Regenbogenhaut — Behandlung 328.
- der Regenbogenhaut bei Linearextraktion 267.
- Vorfall der Regenbogenhaut nach Starausziehung 226.
- des Strahlenkörpers bei Sklerektomie nach LAGRANGE 289.
- Vorlagerung beider äußeren Geraden 151.
- des äußeren Geraden, Wirkung der 154.
- des inneren Geraden bei Auswärtsschielen 158.
- des inneren Geraden bei Exophorie 159.
- des Lidhebers 123.
- eines Augenmuskels 137.
- Vorteile der Diszission durch die Lederhaut 258.
- der Iridotomie 261.
- der Starausziehung mit — peripherer Irisausschneidung 206.
- der Starausziehung mit runder Pupille 205.
- der Verwendung der Kapselzange 199.
- V-Y-Eingriff 62.
- Wanderlappen nach v. HACKER 73.
- Wasserstoffsperoxyd 26.
- WEBERSches Messerchen 4.
- WEBERSche Schlinge 219.
- WECKERS Verfahren der Ausschneidung der unteren Tränendrüse 47.
- WECKERS Verfahren zur Deckung von Hornhautwunden 332.
- WEGNERS Verfahren gegen Lähmung des Obl. sup. 146.
- Weichheit der Augen nach Cyclodialyse 311.
- WENZELS Verfahren der Starausziehung 214.
- WESSELYS Dampfkauter 390.
- WEST-KOFLERS Verfahren der Dakryocysto-Rhinostomie 32.
- WEVES Rißbestimmung 345.
- WICHERKIEWICZS Verfahren der Lappenbildung 72.
- Wiederherstellung des zu weit gespaltenen unteren Tränenröhrchens 9.
- Wiederholung der Iridotomie 261.
- der Punktion der Hornhaut 315.
- der Glaskörperabsaugung 412.
- Wiederkehr der Drucksteigerung nach Iridektomie 283, 285.
- der Drucksteigerung nach Trepanation 315.
- Wimpern, Ersatz nach HIRSCHBERG 80.
- LEXER 81.
- Wirkung der gleichzeitigen Ausführung von Sehnenablösung und Vorlagerung 150, 155.
- der Sehnenablösung des äußeren Geraden 158.
- der Sehnenablösung des inneren Geraden 151.
- der Vorlagerung des äußeren Geraden 154.
- der Vorlagerung des inneren Geraden 158.
- der Cyclodialyse 311.
- Wundsprennung nach Starausziehung 229, 246.
- Z** siehe auch unter C.
- ZEISSsche Gläser für Schwachsichtige 326.
- Zeitpunkt der Starausziehung 184.
- — Tätowierung 393.
- Zerschneidung des Nachstares 255.
- des Nachstares nach BOWMAN 257.
- Zielophthalmoskop 359.
- Zincum sulfuricum 183.
- Zonulotomie nach KUHNSTOCK 263.
- Zügelnaht 188.
- Zurechtlagerung der Regenbogenhaut bei Glaukomiridektomie 277.
- bei Sklerektomie 289.
- bei Starausziehung 201.

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Zurechtlagerung bei ELLIOTScher Trepanation 293.</p> <p>Zuwartendes Verhalten bei Fremdkörpern im Augeninnern 386.</p> <p>Zweizeitiger Eingriff bei Schielen 151.</p> <p>Zwischenfälle bei Ausschälung des Augapfels 169.</p> <p>— bei Ausschälung des Tränensackes 25.</p> | <p>Zwischenfälle beim Ausschneiden der Regenbogenhaut (Glaukom) 279.</p> <p>— bei Cyclodialyse 309.</p> <p>— bei Diszission 254.</p> <p>— Iridektomie-Sklerektomie (LAGRANGE) 289.</p> <p>— beim vorderen Lederhautschnitt 287.</p> <p>— bei Linearextraktion 266.</p> | <p>Zwischenfälle bei Nachstarserschneidung 256.</p> <p>— bei der Starausziehung 207.</p> <p>— bei der Starausziehung in der Kapsel 240.</p> <p>— bei der Trepanation (ELLIOT) 293, 294.</p> <p>— beim Verfahren von MOTAIS gegen Ptosis 134.</p> |
|--|--|--|

**Augenärztliche Operationslehre.** (Graefe-Saemisch, „Handbuch der gesamten Augenheilkunde“, 3. neubearbeitete Auflage). Herausgegeben von **A. Elschmig**. Zweite und dritte Auflage. Mit 1142 Textfiguren. XIV, 2241 Seiten. 1922. In zwei Bänden. RM 72.—; gebunden RM 75.60

---

**Die intrakapsulare Starextraktion.** Von **A. Elschmig**, Prag. (Fortsetzung der „Augenärztlichen Operationslehre“ in Graefe-Saemisch, „Handbuch der gesamten Augenheilkunde“, zweite und dritte neubearbeitete Auflage.) Mit 26 Abbildungen. VI, 71 Seiten. 1932. RM 6.90

---

**Röntgendiagnostik des Schädels bei Erkrankungen des Auges und seiner Nachbarorgane.** Von **Dr. Rudolf Thiel**, a. o. Professor der Augenheilkunde an der Universität Berlin, Assistent der Universitäts-Augenklinik Berlin. In zwei Teilen. Text: 4 Abbildungen, VII, 87 Seiten. 411 Abbildungen auf 153 Seiten. 1932. RM 48.—; gebunden RM 54.—

---

**Grundriß der Augenheilkunde** für Studierende. Von Professor **Dr. F. Schieck**, Geheimer Medizinalrat, Vorstand der Universitäts-Augenklinik in Würzburg. Sechste Auflage. Mit 133 Abbildungen. V, 161 Seiten. 1936. Gebunden RM 8.80

---

**Die augenärztliche Therapie.** Ein Leitfaden für Studierende und Ärzte. Von **Dr. Ernst Franke**, fr. a. o. Professor der Augenheilkunde und Leiter der 2. Augenklinik an der Universität Hamburg, Augenarzt in Kolberg. VI, 139 Seiten. 1924. RM 4.32

---

**Die Augenerkrankungen im Kindesalter.** Ein Buch für Studierende und Ärzte. Von Professor **Dr. W. Gilbert**, Hamburg. Mit 26 Tafeln und 34 Textabbildungen. X, 238 Seiten. 1927. RM 35.10; gebunden RM 39.60

---

**Die Funktionsprüfung des Auges** unter besonderer Berücksichtigung der **Störungen des Farbensinnes.** Ein Leitfaden für Sanitätsoffiziere, Schiffs- und Bahnärzte, Amtsärzte Studierende und als Vorbereitung für die augenärztliche Ausbildung. Von Professor **Dr. Oloff**, Marine-Generalarzt a. D. in Kiel, und **Dr. Podestà**, Marine-Generalarzt a. D. in Torgau. Zugleich zweite, stark erweiterte Auflage von **Stargardt-Oloff: Diagnostik der Farbensinnesstörungen.** VI, 199 Seiten. 1937. Kart. RM 7.50

---

**Die Radiumbehandlung in der Augenheilkunde.** Von **Dr. Leo Kumer**, o. ö. Universitäts-Professor, Innsbruck, gew. Assistent der Universitätsklinik für Dermatologie und Syphilidologie in Wien, und **Dr. L. Sallmann**, Assistent der II. Universitäts-Augenklinik in Wien. Mit 65 Textabbildungen. VII, 198 Seiten. 1929. RM 14.40

---

**Kurzes Handbuch der Ophthalmologie.** Bearbeitet von zahlreichen Fachgelehrten. Herausgegeben von Geheimrat Professor Dr. **F. Schieck**, Direktor der Universitäts-Augenklinik in Würzburg, und Professor Dr. **A. Brückner**, Direktor der Universitäts-Augenklinik in Basel.

In 7 Bänden. Jeder Band ist einzeln käuflich.

Erster Band: **Anatomie, Entwicklung, Mißbildungen, Vererbung.** Mit 423 zum Teil farbigen Abbildungen. XVI, 882 Seiten. 1930. RM 178.—; gebunden RM 183.—

Zweiter Band: **Physiologie, Optik, Untersuchungsmethoden, Bakteriologie.** Mit 630 zum Teil farbigen Abbildungen. XIV, 1079 Seiten. 1932.

RM 188.—; gebunden RM 193.—

Dritter Band: **Orbita, Nebenhöhlen, Lider, Tränenorgane, Augenmuskeln, Auge und Ohr.** Mit 454 zum Teil farbigen Abbildungen. XV, 745 Seiten. 1930.

RM 166.—; gebunden RM 171.—

Vierter Band: **Conjunctiva, Cornea, Sclera, Verletzungen, Berufskrankheiten, Sympathische Erkrankung, Augendruck, Glaukom.** Mit 463 zum großen Teil farbigen Abbildungen. XII, 874 Seiten. 1931. RM 189.—; gebunden RM 194.—

Fünfter Band: **Gefäßhaut, Linse, Glaskörper, Netzhaut, Papille und Opticus.** Mit 466 meist farbigen Abbildungen. XIV, 774 Seiten. 1930.

RM 293.—; gebunden RM 298.—

Sechster Band: **Auge und Nervensystem.** Mit 277 zum Teil farbigen Abbildungen. XV, 878 Seiten. 1931.

RM 178.—; gebunden RM 183.—

Siebenter Band: **Auge und Allgemeinleiden, Therapie, Hygiene.** Mit 263 zum Teil farbigen Abbildungen. XIV, 978 Seiten. 1932. RM 184.—; gebunden RM 189.—

---

**Hirnnerven. Pupille.** (Allgemeine Neurologie IV. Allgemeine Symptomatologie einschl. Untersuchungsmethoden II.) („Handbuch der Neurologie“, herausgegeben von **O. Bumke**, München, und **O. Foerster**, Breslau, 4. Band.) Mit 173 zum Teil farbigen Abbildungen. VIII, 701 Seiten. 1936. RM 135.—; gebunden RM 140.—

Symptomatologie der Erkrankungen des Riechnerven. — Symptomatologie der Erkrankungen der Riechrinde. — Symptomatologie der Erkrankungen des Nervus opticus (einschl. Stauungspapille). — Untersuchungsmethoden der optischen Funktionen. — Symptomatologie der Störungen im Augenbewegungsapparat. — Pupille. — Symptomatologie der Erkrankungen des V., VII., IX., XI. und XII. Hirnnerven. — Symptomatologie der Erkrankungen des N. VIII einschl. Leitung im Hirnstamm. — Namen- und Sachverzeichnis.

---

**Lehrbuch und Atlas der Spaltlampenmikroskopie des lebenden Auges.**

Mit Anleitung zur Technik und Methodik der Untersuchung. Von Dr. **Alfred Vogt**, o. ö. Professor und Direktor der Universitäts-Augenklinik Zürich. Zugleich zweite Auflage des „Atlas der Spaltlampenmikroskopie“.

Erster Teil: **Technik und Methodik. Hornhaut und Vorderkammer.** Mit 692 zum größten Teil farbigen Abbildungen auf 83 Tafeln. XIII, 313 Seiten. 1930.

Gebunden RM 160.20

Zweiter Teil: **Linse und Zonula.** Mit 815 zum größten Teil farbigen Abbildungen auf 163 Tafeln. IX, 455 Seiten. 1931.

Gebunden RM 298.—