

**GRUNDRISS**  
DER  
**INNEREN MEDIZIN**  
VON  
**DR. A. VON DOMARUS**

# GRUNDRISS DER INNEREN MEDIZIN

VON

**DR. A. VON DOMARUS**

DIREKTOR DER INNEREN ABTEILUNG DES  
AUGUSTE VICTORIA-KRANKENHAUSES BERLIN-WEISSENSEE

MIT 58 ABBILDUNGEN



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 1923

ISBN 978-3-662-36079-8      ISBN 978-3-662-36909-8 (eBook)  
DOI 10.1007/978-3-662-36909-8

Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1923

ALLE RECHTE,  
INSBESONDERE DAS DER ÜBERSETZUNG IN FREMDE SPRACHEN, VORBEHALTEN.

Copyright 1923 by Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Ursprünglich erschienen bei Julius Springer in Berlin 1923.

Dem Auguste Victoria-Krankenhaus  
in Berlin-Weißensee  
gewidmet.

## Vorwort.

Der vorliegende Grundriß stellt sich zur Aufgabe, den Medizinstudierenden und den jungen Arzt in das weitschichtige Gebiet der inneren Medizin einzuführen und ihm insbesondere bei den Vorlesungen und in den praktischen Kursen am Krankenbett als Wegweiser und Ratgeber zu dienen. Bei der verwirrenden Fülle der namentlich in den ersten klinischen Semestern auf den Studenten tagtäglich einströmenden neuen Eindrücke ist es notwendig, daß der junge Mediziner zunächst einmal das Wesentliche auf theoretischem und praktischem Gebiet lernt und zu diesem Zwecke ein Buch zur Hand hat, das ihn rasch seinem Auffassungsvermögen und seinen Vorkenntnissen entsprechend über die Grundbegriffe orientiert und so das Fundament seiner klinischen Kenntnisse aufbauen hilft. Das Buch soll somit eine Art Leitfaden sein, der zum Studium der ausführlichen Lehrbücher vorbereitet.

Eine knappe klare Form der Darstellung, schlichte und elementare Ausdrucksweise unter Vermeidung entbehrlicher Fachausdrücke sowie Verzicht auf alle für das Verständnis nicht unerläßlichen theoretischen Erörterungen sind die Forderungen, die man billigerweise an einen derartigen Leitfaden stellen darf.

Nach diesen Gesichtspunkten einen Grundriß der inneren Medizin zu verfassen, war ein schwieriges Unternehmen. Sollte dieser doch das gesamte Gebiet unserer Disziplin als abgeschlossenes Ganzes darstellen, auch dort, wo mancherlei Fragen sich noch im Fluß der Forschung befinden. Auch mußte die den meisten Kapiteln vorausgeschickte anatomisch-physiologische Einleitung bei Wahrung des elementaren Charakters des Buches doch in einer für das Verständnis erforderlichen Ausführlichkeit behandelt werden, ohne daß andererseits der von vornherein vorgezeichnete Rahmen des Buches überschritten werden durfte.

Bei der Darstellung, die wie begreiflich, vielfach der Schule meines verehrten klinischen Lehrers Friedrich Müller entspricht, habe ich neben den Eindrücken aus meiner eigenen Assistentenzeit vor allem die Erfahrungen verwertet, die ich in meiner langjährigen Tätigkeit als Krankenhausleiter, einerseits in ständiger Berührung mit Assistenten,

Medizinalpraktikanten, Famuli usw., andererseits in Ärztekursen zu sammeln in der Lage war. Nicht zuletzt waren es die hier gemachten Erfahrungen, die den Entschluß in mir reiften, einen Grundriß der inneren Medizin zu verfassen.

Das Buch ist in einer Zeit schwerster wirtschaftlicher Not unseres Vaterlandes entstanden, wo uns der Gedanke an die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses mit banger Sorge erfüllt. So mußte denn vor allem auch der rein praktische Gesichtspunkt, den Grundriß in einer für die heutigen Verhältnisse nicht allzu kostspieligen Form erscheinen zu lassen, Berücksichtigung finden.

Berlin, im Herbst 1923.

**Der Verfasser.**

## Inhaltsverzeichnis.

	Seite
<b>Infektionskrankheiten</b> . . . . .	<b>1</b>
<b>Einleitung</b> . . . . .	<b>1</b>
<b>Akute Exantheme</b> . . . . .	<b>13</b>
Scharlach . . . . .	13
Masern . . . . .	17
Rubeolen (Röteln) . . . . .	20
Rubeola scarlatinosa (Vierte Krankheit, Filatow - Dukesehe Krankheit) . . . . .	20
Pocken . . . . .	21
Varicellen . . . . .	25
Fleckfieber . . . . .	26
Erysipel . . . . .	28
Typhus abdominalis . . . . .	30
Paratyphus-Erkrankungen . . . . .	42
Cholera asiatica . . . . .	44
Ruhr (Dysenterie) . . . . .	45
Keuchhusten . . . . .	48
Grippe (Influenza) . . . . .	50
Croupöse Pneumonie . . . . .	54
Parotitis epidemica (Mumps) . . . . .	59
Angina . . . . .	60
Chronische Angina und Folgezustände der Anginen . . . . .	64
Diphtherie . . . . .	66
Serumkrankheit . . . . .	73
Tetanus . . . . .	74
Lyssa (Tollwut) . . . . .	76
Epidemische Kinderlähmung (Poliomyelitis acuta) . . . . .	78
Encephalitis epidemica s. lethargica . . . . .	82
Meningitis cerebrospinalis epidemica . . . . .	83
Gelenkrheumatismus (Polyarthrits acuta) . . . . .	86
Dengue . . . . .	90
Sepsis . . . . .	91
Pest . . . . .	97
Miliartuberkulose . . . . .	99
Maltafieber . . . . .	102
Malaria . . . . .	103
Febris recurrens (Rückfallfieber) . . . . .	109
Fünftagefieber (Wolhynisches Fieber, Febris quintana) . . . . .	111
Icterus infectiosus (Weilsche Krankheit) . . . . .	112
Gelbfieber . . . . .	113
Schlafkrankheit . . . . .	114
Kala-azar (tropische Splenomegalie) . . . . .	116
Pappataciefieber . . . . .	117
Lepra (Aussatz) . . . . .	117
Milzbrand (Anthrax) . . . . .	119

	Seite
Rotz (Malleus) . . . . .	120
Stomatitis epidemica (Aphthen-Seuche, Maul- und Klauenseuche) . . . . .	121
Aktinomykose . . . . .	122
Trichinose . . . . .	124
<b>Krankheiten des Zirkulationsapparates . . . . .</b>	<b>126</b>
Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen . . . . .	126
Die klinische Untersuchung des Zirkulationsapparates . . . . .	131
Untersuchung der Gefäße . . . . .	140
<b>Organische Herzkrankheiten . . . . .</b>	<b>148</b>
Allgemeines . . . . .	148
Störungen des Rhythmus und der Frequenz der Herzaktion . . . . .	153
Funktionsdiagnostik . . . . .	156
<b>Krankheiten des Herzmuskels . . . . .</b>	<b>158</b>
Akute Myocarditis . . . . .	158
Chronische Myocarditis . . . . .	160
Herzluës . . . . .	160
Das sog. Fettherz . . . . .	161
Krankheiten der Coronargefäße . . . . .	161
<b>Krankheiten des Endokards . . . . .</b>	<b>163</b>
Endocarditis . . . . .	163
Herzklappenfehler . . . . .	166
Therapie der Herz- und Kreislaufschwäche . . . . .	174
<b>Nervöse Herzleiden (Cor nervosum, Herzneurose) . . . . .</b>	<b>177</b>
<b>Erkrankungen des Herzbeutels:</b>	
Pericarditis . . . . .	178
Herzbeutelobliteration (Pericarditis adhaesiva) . . . . .	180
<b>Erkrankungen der Gefäße:</b>	
Arteriosclerose . . . . .	180
Arterienluës . . . . .	183
Aneurysma aortae . . . . .	184
Periarteriitis nodosa . . . . .	186
Essentielle Hypertonie . . . . .	186
Venenthrombose . . . . .	186
Embolie . . . . .	187
Gefäßneurosen . . . . .	187
<b>Krankheiten des Respirationsapparates.</b>	
<b>Krankheiten der Nase . . . . .</b>	<b>188</b>
Rhinitis (Schnupfen, Coryza) . . . . .	189
Rhinitis chronica . . . . .	190
Nasenbluten (Epistaxis) . . . . .	191
<b>Krankheiten des Kehlkopfs . . . . .</b>	<b>191</b>
Kehlkopfkatarrh . . . . .	192
Kehlkopflähmungen . . . . .	193
Laryngospasmus (Spasmus glottidis) . . . . .	195
Perichondritis laryngea. Glottisödem . . . . .	196
Kehlkopftuberkulose . . . . .	197
Kehlkopflues . . . . .	198
Tumoren des Larynx . . . . .	198
<b>Krankheiten der Luftröhre und der Bronchien:</b>	
Vorbemerkungen . . . . .	199
Untersuchung des Thorax und der Lunge . . . . .	201



	Seite
<b>Krankheiten der Bronchien:</b>	
Akute Bronchitis (Tracheobronchitis) . . . . .	207
Chronische Bronchitis . . . . .	208
Capillarbronchitis (Bronchiolitis) . . . . .	210
Bronchitis fibrinosa resp. pseudomembranacea . . . . .	210
Therapie der akuten und chronischen Bronchitis und Bronchiolitis . . . . .	211
Bronchiektasien . . . . .	212
Asthma bronchiale . . . . .	214
<b>Krankheiten der Lungen:</b>	
Emphysem . . . . .	216
Pneumonie . . . . .	218
Chronische Pneumonie (Karnifikation der Lunge) . . . . .	220
Lungentuberkulose . . . . .	221
Lungenembolie, Lungeninfarkt . . . . .	233
Lungenabsceß . . . . .	234
Lungengangrän . . . . .	235
Lungenlues . . . . .	236
Lungentumoren . . . . .	237
Echinococcus der Lunge . . . . .	238
Distomum pulmonale . . . . .	239
Stauungslunge . . . . .	239
Lungenödem . . . . .	239
Pneumonokoniosen (Staubinhalationskrankheiten) . . . . .	240
<b>Krankheiten der Pleura:</b>	
Pleuritis . . . . .	241
Hydrothorax und Hämatothorax . . . . .	245
Pneumothorax . . . . .	246
<b>Krankheiten des Mediastinums . . . . .</b>	
Mediastinaltumoren . . . . .	248
Entzündung des Mediastinums . . . . .	249
<b>Blutkrankheiten . . . . .</b>	
<b>Die Anämien . . . . .</b>	
Die sekundären Anämien . . . . .	252
Chlorose . . . . .	255
Perniziöse Anämie . . . . .	257
Hämolytischer Icterus . . . . .	260
Anämien im Kindesalter . . . . .	260
<b>Die Polycythämien (Polyglobulien) . . . . .</b>	
<b>Die Leukämien (Leukosen). . . . .</b>	
Chronische myeloide Leukämie . . . . .	263
Chronische lymphatische Leukämie . . . . .	265
Die akuten Leukämien . . . . .	266
<b>Die Aleukämien (Pseudoleukämien) . . . . .</b>	
<b>Granulomatöse Pseudoleukämien . . . . .</b>	
<b>Multiple Myelome (Kahlersche Krankheit) . . . . .</b>	
<b>Bantische Krankheit. . . . .</b>	
<b>Paroxysmale Hämoglobinurie . . . . .</b>	
<b>Hämorrhagische Diathesen:</b>	
Hämophilie. . . . .	271
Purpura-Erkrankungen . . . . .	272
Skorbut . . . . .	273
Möller - Barlowsche Krankheit . . . . .	275

	Seite
<b>Krankheiten des Verdauungsapparates.</b>	
<b>Krankheiten der Mundhöhle:</b>	
Stomatitis . . . . .	275
Noma . . . . .	276
Aphthen und Soor . . . . .	277
Krankheiten der Zunge . . . . .	278
Krankheiten der Speicheldrüsen . . . . .	279
<b>Krankheiten des Rachens . . . . .</b>	<b>280</b>
Pharyngitis. . . . .	280
Retropharyngealabsceß . . . . .	281
<b>Krankheiten des Ösophagus:</b>	
Vorbemerkungen . . . . .	281
Entzündungen und Ulceration des Ösophagus . . . . .	282
Erweiterungen des Ösophagus . . . . .	283
Verengerungen des Ösophagus . . . . .	284
Ösophaguscarcinom . . . . .	286
<b>Erkrankungen des Magens und Zwölffingerdarms:</b>	
Vorbemerkungen . . . . .	286
Gastritis (Magenkatarrh). . . . .	290
Hyperacidität und Hypersekretion . . . . .	293
Ulcus ventriculi . . . . .	295
Magencarcinom . . . . .	301
Gastroptose . . . . .	304
Atonie, Gastrektasie, Pylorusstenose . . . . .	305
Magenneurosen . . . . .	307
<b>Krankheiten des Darms:</b>	
Vorbemerkungen . . . . .	309
Ulcus duodeni . . . . .	313
Ulcus jejuni pepticum . . . . .	316
Enteritis, Enterocolitis (Darmkatarrh) . . . . .	316
Gärungs- und Fäulnisdyspepsie. . . . .	321
Therapie der Darmkatarrhe und Darmsdypepsien . . . . .	323
Appendicitis (Perityphlitis). . . . .	324
Neoplasmen des Darms . . . . .	329
Darmtuberkulose . . . . .	331
Syphilis des Darmes . . . . .	332
Darmverengung und Darmverschluß (Ileus) . . . . .	333
Embolie und Thrombose der Mesenterialgefäße . . . . .	338
Die chronische habituelle Obstipation . . . . .	339
Hämorrhoiden . . . . .	341
Nervöse Darmkrankheiten . . . . .	342
Colica mucosa (Myxoneurosis intestinalis) . . . . .	343
Enteroptose . . . . .	344
Darmparasiten . . . . .	345
<b>Krankheiten des Peritoneums:</b>	
Akute Peritonitis . . . . .	350
Chronische Peritonitis (Peritonealtuberkulose) . . . . .	356
Carcinosis peritonei . . . . .	358
Ascites. . . . .	358
<b>Krankheiten der Leber . . . . .</b>	<b>360</b>
Vorbemerkungen . . . . .	360
Icterus. . . . .	362
Cholämie . . . . .	363
Akute gelbe Leberatrophie . . . . .	364
Lebercirrhose . . . . .	365
Cholelithiasis und Cholecystitis . . . . .	367
Neoplasmen der Leber und der Gallenwege . . . . .	371

	Seite
Leberechinococcus . . . . .	373
Leberlues . . . . .	374
Stauungsleber . . . . .	375
Amyloidleber und Fettleber, Schnürleber, Lebersenkung . . . . .	376
Leberabsceß . . . . .	376
Pylephlebitis suppurativa . . . . .	378
Verschuß und Thrombose der Pfortader . . . . .	379
<b>Erkrankungen des Pankreas . . . . .</b>	<b>379</b>
Pankreascarcinom . . . . .	380
Akute hämorrhagische Pankreatitis . . . . .	380
Chronische indurierende Pankreatitis . . . . .	381
Achyilia pancreatica . . . . .	382
Pankreascysten . . . . .	382
Pankreasfisteln . . . . .	382
Pankreaskonkremente . . . . .	382
<b>Erkrankungen des Harnapparates . . . . .</b>	<b>383</b>
Bemerkungen über Anatomie und Funktion der Niere . . . . .	383
Allgemeine Symptomatologie der doppelseitigen Nierenkrankheiten . . . . .	387
Die akute Nierenentzündung . . . . .	397
Die akute Nierenentzündung (Nephritis und Nephrose) . . . . .	397
Besondere Verlaufsformen der akuten Nierenentzündungen . . . . .	400
Die subchronischen und chronischen Nephropathien . . . . .	402
Die Schrumpfnieren . . . . .	404
Therapie der Nephritiden und Schrumpfnieren incl. der Urämie . . . . .	407
Orthostatische (cyclische) Albuminurie . . . . .	407
Stauungsniere . . . . .	409
Niereninfarkt (Nierenembolie) . . . . .	410
Neoplasmen der Niere . . . . .	411
Ren mobilis (Wanderniere) . . . . .	413
Die Sackniere (Hydro- und Pyonephrose) . . . . .	414
Parasiten der Niere . . . . .	416
<b>Krankheiten der harnableitenden Wege (Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase) . . . . .</b>	<b>416</b>
Pyelitis . . . . .	416
Nephrolithiasis . . . . .	420
Die Tuberkulose der Niere und der harnableitenden Organe . . . . .	428
Der paranephritische Absceß . . . . .	425
Krankheiten der Harnblase . . . . .	426
Physiologische Vorbemerkungen . . . . .	426
Cystitis . . . . .	427
Blasengeschwülste . . . . .	431
Blasensteine . . . . .	431
Parasitäre Erkrankungen der Harnwege . . . . .	433
Phosphaturie und Calciuriurie . . . . .	433
Funktionelle Blasenkrankheiten . . . . .	434
Konstitutionelle Blasenschwäche . . . . .	434
Enuresis nocturna . . . . .	434
<b>Erkrankungen der Drüsen mit innerer Sekretion . . . . .</b>	<b>435</b>
Einleitung . . . . .	435
<b>Die Schilddrüsen - Erkrankungen . . . . .</b>	<b>435</b>
Hypothyreose (Kretinismus) . . . . .	436
Myxödem . . . . .	437
Basedowsche Krankheit . . . . .	438
<b>Erkrankung der Glandula parathyreoidea . . . . .</b>	<b>442</b>
Tetanie . . . . .	443
<b>Die Krankheiten der Nebennieren . . . . .</b>	<b>445</b>
Addison'sche Krankheit . . . . .	445

	Seite
Die Krankheiten der Hypophyse . . . . .	446
Akromegalie . . . . .	447
Riesenwuchs . . . . .	448
Dystrophia adiposo-genitalis . . . . .	448
Die Krankheiten der Keimdrüsen . . . . .	449
Eunuchoidismus . . . . .	450
Pankreas und Thymus als innersekretorische Drüsen . . . . .	451
Erkrankungen der Zirbeldrüse . . . . .	451
Die pluriglanduläre Insuffizienz (multiple Blutdrüsensklerose) . . . . .	451
<b>Stoffwechselkrankheiten</b> . . . . .	452
Einleitung . . . . .	452
Stoffwechsel im Hunger und bei Fieber . . . . .	461
Diabetes mellitus . . . . .	462
Pentosurie . . . . .	473
Lävulosurie . . . . .	474
Gicht . . . . .	474
Fettsucht . . . . .	480
Erkrankungen des intermediären Stoffwechsels (Alkaptonurie, Cystinurie, Diaminurie) . . . . .	485
Diabetes insipidus . . . . .	486
Krankheiten, die auf ungenügender Ernährung beruhen . . . . .	487
Avitaminosen . . . . .	488
<b>Krankheiten des Bewegungsapparates</b> . . . . .	488
Krankheiten der Muskeln . . . . .	488
Muskelrheumatismus . . . . .	488
Polymyositis . . . . .	491
Chronische Gelenkkrankheiten . . . . .	491
Polyarthritis chron. deformans . . . . .	491
Arthritis (Osteoarthritis) deformans . . . . .	493
Spondylitis und Spondylarthritis deformans . . . . .	495
Krankheiten der Knochen . . . . .	497
Osteomalacie . . . . .	497
Rachitis . . . . .	499
Zwergwuchs . . . . .	502
<b>Krankheiten des Nervensystems</b> . . . . .	502
Krankheiten der peripherischen Nerven . . . . .	503
Lähmungen der peripherischen Nerven . . . . .	503
Lähmungen der Gehirnnerven . . . . .	505
Lähmungen der Rückenmarksnerven . . . . .	514
Neuralgien . . . . .	518
Neuritis und Polyneuritis . . . . .	523
Lokale Krämpfe . . . . .	526
Das vegetative Nervensystem . . . . .	528
Krankheiten des Rückenmarks . . . . .	531
Einleitung . . . . .	531
Herdförmige Erkrankungen des Rückenmarks . . . . .	539
Akute Myelitis . . . . .	539
Kompressionsmyelitis (Spondylitis tuberculosa und Wirbelcarcinom) . . . . .	542
Syringomyelie . . . . .	545
Hämatomyelie . . . . .	547
Rückenmarksverletzungen . . . . .	547
Rückenmarkstumoren . . . . .	548
Systemerkrankungen des Rückenmarks . . . . .	550
Tabes dorsalis . . . . .	550
Friedreichsche Krankheit . . . . .	556
Spastische Spinalparalyse . . . . .	557
Amyotrophische Lateralsklerose . . . . .	557
Spinale progressive Muskelatrophie . . . . .	557

	Seite
Neurotische progressive Muskelatrophie . . . . .	558
Dystrophia muscularis progressiva . . . . .	558
Myotonia congenita . . . . .	559
Myasthenia gravis pseudoparalytica . . . . .	560
Bulbärerkrankungen . . . . .	560
Progressive Bulbärparalyse . . . . .	560
Krankheiten des Großhirns . . . . .	562
Einleitung . . . . .	562
Gehirnblutung — Embolie — Thrombose . . . . .	570
Diffuse Arteriosklerose des Gehirns . . . . .	575
Gehirnabsceß . . . . .	576
Nichteitrige Encephalitis . . . . .	578
Cerebrale Kinderlähmung . . . . .	579
Little'sche Krankheit . . . . .	580
Polioencephalitis acuta haemorrhagica superior . . . . .	580
Gehirntumor . . . . .	580
Multiple Sklerose . . . . .	585
Lues cerebrospinalis . . . . .	587
Epilepsie . . . . .	591
Krankheiten des extrapyramidalen Systems . . . . .	597
Paralysis agitans . . . . .	597
Chorea (minor, Huntington; Wilson'sche Krankheit) . . . . .	599
Hydrocephalus . . . . .	601
Hirnsinusthrombose . . . . .	602
Meningitis purulenta . . . . .	603
Pachymeningitis hämorrhagica interna . . . . .	605
Migräne . . . . .	606
Kopfschmerz . . . . .	607
Menièr'scher Symptomenkomplex . . . . .	609
Psychoneurosen . . . . .	610
Neurasthenie . . . . .	610
Hysterie . . . . .	616
Die sogenannten traumatischen Neurosen . . . . .	621
Sachverzeichnis . . . . .	623

# Infektionskrankheiten.

## Einleitung.

Unter Infektionskrankheiten versteht man akut oder chronisch verlaufende Krankheiten, deren Ursache auf die Anwesenheit bestimmter belebter Erreger in dem Organismus zurückzuführen ist. Diese sind teils wie die Bakterien (Spaltpilze) pflanzlichen, teils wie die Protozoen (Malariaplasmodien, Spirochäten, Trypanosomen usw.) tierischen Ursprungs. Unter den zahllosen auf der Erde vorhandenen Bakterien bilden die krankheitserzeugenden Keime nur einen kleinen Teil derselben. Diese sog. pathogenen Keime dringen in der Regel von außen durch bestimmte natürliche Eintrittspforten bzw. Wunden in den Körper ein. Doch gibt es hiervon Ausnahmen, indem gelegentlich auch Keime, die bis dahin in bestimmten Organen als harmlose Saprophyten ein sozusagen physiologisches Dasein führten, durch Übergreifen auf andere Gebiete zu pathogenen Keimen werden können. Ein Beispiel für eine derartige „Selbstinfektion“ bildet das im Darm des Gesunden regelmäßig vegetierende *Bact. coli*, das nach Verlassen seines normalen Aufenthaltsortes zu einem typischen Krankheitserreger (Pyelitis, Colicsepsis) werden kann.

Bei verschiedenen Krankheiten infektiöser Art ist der Erreger zur Zeit noch nicht bekannt; bei einzelnen stellt er ein unter der Grenze der Sichtbarkeit liegendes durch Berkefeld-Tonkerzenfilter filtrierbares Virus dar.

Die Erreger der Infektionskrankheiten zeigen bestimmte, nur ihnen zukommende Eigenschaften, die ihnen und dadurch den durch sie hervorgerufenen krankhaften Veränderungen ein besonderes Gepräge geben. Dies erklärt die Tatsache, daß bei aller Verschiedenheit der einzelnen Infektionskrankheiten untereinander und der verschiedenen Verlaufsarten ein- und derselben Krankheit bei verschiedenen Individuen dennoch sämtlichen Infektionskrankheiten gewisse grundsätzliche Eigentümlichkeiten gemeinsam sind. Zu diesen Eigenschaften der Bakterien gehören ihre Vermehrungsfähigkeit und die Erzeugung von Giften. Hierin ist der prinzipielle Gegensatz gegenüber allen jenen Krankheitsursachen begründet, die nicht belebter Art sind.

Bei einer gewissen Menge eines chemischen Giftes, z. B. von Arsen, wird die in den Körper einverleibte Dosis, falls sie unterhalb einer gewissen Grenze liegt, bei noch so langem Aufenthalt im Körper keine krankhaften Veränderungen hervorrufen können. Anders verhält es sich beim Eindringen von lebenden Bakterien, die zunächst infolge ihrer geringen Zahl keine Veränderungen in Form einer Allgemeinerkrankung bewirken, wohl aber unter Bedingungen, die ihre Vermehrung begünstigen, sich nach Ablauf einer bestimmten Zeit, in der ihre Zahl sich im Körper vervielfacht hat, schwere Störungen im Organismus zu bewirken vermögen.

Die Bakterien gehen bei manchen Krankheiten von der Eintrittspforte in den Körper über und zirkulieren im Blut (z. B. Typhus), in anderen Fällen wie bei Diphtherie und Tetanus bleiben sie an der Eintrittspforte liegen und senden von dort ihre löslichen Gifte in den Körper. Mittels dieser Bakterientoxine lassen sich im Tierversuch die gleichen Krankheitserscheinungen hervorrufen, die im menschlichen Körper die pathogenen Keime bewirken. Angriffspunkt der Giftwirkung im Organismus ist stets die Zelle.

Das Eindringen pathogener Keime in den Körper ist noch nicht ohne weiteres gleichbedeutend mit dem Ausbruch einer Infektionskrankheit. Vielmehr sind hier mehrere Möglichkeiten denkbar. Erstens kann dank einer genügenden Widerstandsfähigkeit des Organismus der eingedrungene Krankheitserreger vollständig vernichtet werden und aus dem Körper wieder verschwinden.

Es beruht das zum Teil auf dem Vorhandensein gewisser in jedem normalen Blutserum enthaltenen **Schutzstoffe**, der sog. *Alexine*, die unspezifisch, d. h. gegenüber den verschiedensten Bakterien wirksam sind und durch Erhitzen auf 56° zerstört werden. Sie sind identisch mit dem Komplement von Ehrlich.

Zweitens kann der Erreger im Organismus Fuß fassen, sich in ihm vermehren und den Abwehrmaßnahmen des Körpers trotzen, ohne daß es aber zu einer Erkrankung kommt. Dieser Fall ist beim sog. Keimträger gegeben, der die Keime als harmlose Saprophyten ohne jede erkennbare Störung bei sich beherbergt; erst die Übertragung des Erregers auf andere Individuen gibt durch deren Erkrankung seinen wahren Charakter zu erkennen (Diphtheriebacillen, Meningococcen usw.).

Die dritte Möglichkeit ist die durch den Erreger verursachte Erkrankung. Hierbei ist scharf zu unterscheiden zwischen der auf örtliche Gewebsschädigung sich beschränkenden infektiösen Lokalerkrankung und der sich hieran eventuell anschließenden oder von vornherein als solcher verlaufenden Allgemeinerkrankung, an der der Gesamtorganismus beteiligt ist (z. B. lokale Streptococcenphlegmone einerseits, allgemeine Streptococcensepsis andererseits). Nur diese letzte Form, die infektiöse Allgemeinerkrankung, gehört zum Begriff der Infektionskrankheit.

Für das Schicksal des Kranken spielt vor allem die sog. **Virulenz** des Krankheitserregers eine ausschlaggebende Rolle. Man versteht darunter den Grad der Wachstumsenergie und vor allem der Gifterzeugung der Bakterien. Die Virulenz ist eine variable Größe. So kann die Übertragung eines Krankheitserregers auf einen anderen Organismus, beispielsweise vorübergehende Tierpassage, die Virulenz in positivem oder negativem Sinne verändern. Gewöhnung an besondere Existenzbedingungen der Keime wie Züchtung auf speziellen Nährböden oder im Tierkörper unter dem Einfluß bestimmter Medikamente kann, soweit diese Einwirkung nicht auf eine Vernichtung der Bakterien hinausläuft, einen modifizierenden Einfluß auf den Charakter derselben, insbesondere ihre Widerstandsfähigkeit ausüben, sie eventuell steigern, wie das u. a. das Beispiel der unter der Einwirkung kleiner Arsen- oder Chinindosen entstehenden sog. giftfesten Stämme zeigt.

Das Wesen einer Infektionskrankheit ist nun keineswegs mit der Tatsache des Eindringens der Krankheitserreger in den Körper und der Entfaltung von Giftwirkungen derselben erschöpft. Vielmehr löst die Anwesenheit pathogener Keime im Organismus sofort eine Reihe komplizierter Prozesse aus, die in ihrer Gesamtheit darauf abzielen, die eingedrungenen Keime unschädlich zu machen (**Immunitätsreaktionen**). Hierzu gehört die Erzeugung von Substanzen, die die Bakterien auflösen, wie die Bakteriolyse, ferner Bakteriengegengifte, die sog. Antitoxine, weiter Agglutinine, die die Bakterien zusammenballen, Opsonine, die die Phagozytose der Keime durch Leukocyten anregen usw. Diese Stoffe kann man durch Injektion des Bluteserums auf andere Individuen übertragen und diese dadurch vorübergehend immunisieren (passive Immunisierung).

Im Gegensatz zu den unspezifischen Alexinen des Normalserums (s. oben) sind die spezifischen, bei der Immunisierung entstehenden Bakteriolyse von komplizierterem Bau. Da ein bakteriolytisches Serum durch Erhitzung auf 56° zwar „inaktiviert“, d. h. den Bakterien gegenüber unwirksam wird, durch nachträglichen Zusatz von Normalserum sich aber wieder reaktivieren läßt, so handelt es sich offenbar um zwei verschiedene zusammenwirkende Substanzen, 1. das thermolabile nicht spezifische Alexin oder Komplement, das in jedem Normalserum enthalten ist und 2. den thermostabilen spezifischen Immunkörper. Letzteren hat man sich nach der sog. Seitenkettentheorie Ehrlichs als mit zwei bindenden („haptophoren“) Gruppen ausgestattet zu denken, von denen die eine sich mit dem Bacterium, die andere mit dem Komplement verbindet, weshalb der Serumkörper auch die Bezeichnung Ambozeptor erhalten hat.

Der Mechanismus dieser Gegenmaßregeln des lebenden Körpers hat nun eine allgemeinere Bedeutung, als es zunächst bei ausschließlicher Betrachtung der Infektionskrankheiten den Anschein hat. Das Verhalten des Organismus eingedrungenen Bakterien gegenüber stellt nämlich, wie die neuere Forschung gelehrt hat, nur einen Spezialfall des allgemeinen Gesetzes einer biologischen Reaktion gegenüber allen denjenigen Agentien dar, die man als Antigene bezeichnet, das heißt einer Gruppe von Körpern, die im Organismus die Bildung von Reaktionskörpern der bezeichneten Art („Antikörper“) auszulösen vermag. Dies ist aber auch der Fall nach Einverleibung artfremder Eiweißkörper wie z. B. von Pferdeserum beim Menschen. Auch hier werden vom Körper wie bei einer Infektionskrankheit Antikörper erzeugt, die das körperfremde Agens unschädlich machen, und es erklären sich hieraus eine Reihe von Symptomen, die mit denen bei einer Infektionskrankheit übereinstimmen (Serumkrankheit).

Mit der Feststellung der Antigennatur der Bakterien ist ihre dritte Haupteigenschaft, die ihnen eine Sonderstellung unter den Krankheitsursachen zuweist, gekennzeichnet.

Der Vorgang der „Absättigung“ von Antigen und Antikörper zeigt zum Teil eine Analogie mit der chemischen Reaktion der Neutralisierung zweier entgegengesetzt wirkender Stoffe. Mischt man z. B. in vitro eine für ein Tier tödliche Menge Tetanustoxin mit einem entsprechenden Quantum Tetanusantitoxin im Reagenzglas, so verhält sich das Gemisch im Tierkörper völlig neutral und unwirksam, während



nach Trennung der beiden Komponenten und Entfernung des Antitoxins das Toxin wieder seine frühere Giftigkeit zeigt.

Erst das Zusammenwirken des den Organismus angreifenden Virus mit den verschiedenen Abwehrmaßnahmen des Körpers erzeugt das Gesamtbild, das eine voll entwickelte Infektionskrankheit darbietet. Zum Teil erklärt sich auch daraus, warum ihr Ausbruch erst nach Ablauf einer gewissen Zeit nach Eindringen der Erreger, der sog. **Inkubationszeit**, erfolgt, innerhalb der der Prozeß zwischen dem Krankheitsvirus und den reaktiven Vorgängen im Körper erst ein gewisses Stadium erlangt haben muß, bis klinisch wahrnehmbare Erscheinungen eintreten. Die Inkubationszeit, die oft völlig symptomlos verläuft, ist übrigens bei jeder einzelnen Krankheit von einer für diese charakteristischen konstanten Dauer; dies ist für die Diagnose und Prophylaxe der einzelnen Infektionskrankheiten von größter Bedeutung.

Der Krankheitserreger kann zwar unter bestimmten Bedingungen direkt als solcher schwere Störungen hervorrufen, seltener z. B. mechanisch infolge von Verstopfung von Capillaren durch große Mengen von Mikroben, häufiger bei großer Virulenz auch durch direkte Giftwirkung. Für die Beurteilung des Wesens der Infektionskrankheiten ist aber die Tatsache wichtig, daß Bakteriengifte zum großen Teil erst im Körper dadurch entstehen, daß dieser im Kampf gegen sie Stoffe mobil macht, die die Bakterien einer Art von Verdauungsprozeß unterwerfen, wodurch aus der Leibessubstanz der Keime hochwirksame giftige Körper frei werden. So erklärt sich auch die scheinbar paradoxe Tatsache, daß ein mit starken Reaktionskräften ausgestatteter Organismus das Eindringen von Infektionserregern unter Umständen mit viel schwereren Erscheinungen beantwortet als ein weniger lebhaft sich zur Wehr setzender Körper.

Auf Grund dieser Erkenntnis wird es auch verständlich, warum die bei der klinischen Untersuchung greifbaren, vom Organismus erzeugten **Reaktionssubstanzen** wie die Agglutinine, Opsonine usw. zwar für die Erkennung der Infektionskrankheit bzw. der Art der Erreger großen diagnostischen Wert haben, es aber nicht zugänglich ist, aus ihrer Menge auf den Ausgang des Kampfes prognostische Schlüsse zu ziehen. Gegenüber einer Überschätzung der serologischen Ergebnisse, vor der zu warnen ist, ist daher auf den Wert des klinischen Gesamtbildes, mit anderen Worten die Beobachtung am Krankenbett mit Nachdruck hinzuweisen, deren Gewicht für die Prognose eines Krankheitsfalles nicht hoch genug angeschlagen werden kann.

Die Bedeutung der genannten humoralen Vorgänge für das endgültige Schicksal eines Infektionskranken erklärt u. a. die zunächst schwer verständliche Tatsache, warum z. B. bei einer Pneumonie die kritische Entfieberung die Überwindung des Infektionsprozesses schon zu einer Zeit anzeigt, wo der lokale Prozeß, die Infiltration der Lungen, noch in vollem Umfang vorhanden ist. Die Entscheidung spielt sich eben auf einem anderen Schauplatz als an dem einen örtlichen Herde ab. Auch brauchen die Krankheitserreger noch nicht sofort aus dem Körper zu verschwinden, nur sind sie jetzt wirkungslos geworden.

Die einzelnen Infektionskrankheiten zeigen innerhalb eines gewissen Rahmens von Fall zu Fall individuelle Unterschiede im klinischen Verhalten; auch beobachtet man bisweilen Rassenunterschiede<sup>1)</sup>. Bei den epidemisch auftretenden Krankheiten wechselt oft das Bild von Epidemie zu Epidemie. Mehrere Faktoren spielen hier eine Rolle, vor allem die Virulenz des Erregers und die Widerstandsfähigkeit des Individuums. Ein Punkt, der vorläufig noch manches Dunkle enthält, sind die Spontanschwankungen im Charakter mancher Infektionskrankheiten nach Schwere und Verlaufsart. Z. B. zog die bis dahin als harmlos geltende Grippe vor kurzem aus unbekanntem Gründen plötzlich als bösartige Seuche durch viele Länder, ähnliches beobachtete man bei der Genickstarre, bei der epidemischen Kinderlähmung usw. (sog. Genius epidemicus). Andere Krankheiten, wie beispielsweise der englische Schweiß, sind aus nicht ersichtlichen Ursachen vom Erdboden zur Zeit fast verschwunden. In Nordamerika tritt das Fleckfieber in milder Form als Brillische Krankheit auf. Gewisse Infektionskrankheiten sind sog. Saisonkrankheiten (Ruhr, Cholera, Typhus usw.), ohne daß aber die Kenntnis gewisser, in der Jahreszeit begründeter begünstigender Faktoren dies Verhalten, besonders hinsichtlich des Verbleibs der Bakterien in der übrigen Zeit bisher genügend geklärt hätte. Bei manchen Infektionskrankheiten, die endemisch an bestimmte Örtlichkeiten gebunden sind, genügt, wie beispielsweise bei der Ruhr, der Ortswechsel einer befallenen Bevölkerungsgruppe, um die Krankheit prompt zum Erlöschen zu bringen.

In zahlreichen Fällen hat die zielbewußte Seuchenbekämpfung zum Verschwinden von Infektionskrankheiten in manchen Erdteilen geführt, so bei Cholera, Pest, Pocken, Lepra, Rekurrens usw., und es ist nicht zu bezweifeln, daß mit dem weiteren Fortschreiten unserer Kenntnisse und der Verbreitung der Hygiene auch andere Seuchen aus zivilisierten Ländern allmählich weichen werden.

Verschiedenheiten in der Widerstandsfähigkeit des Körpers gegenüber den Erkrankungen sind mit den Begriffen **Disposition** und **Immunität** verknüpft. Allgemeine Schwächung des Körpers durch Unterernährung sowie durch Gifte wie Alkohol oder konsumierende Krankheiten, z. B. Diabetes und Carcinom, setzen die individuelle Resistenz herab und erhöhen die Empfänglichkeit (erworbene Disposition). Dieselbe kann auch angeboren bzw. ererbt sein, zum Teil in Form gewisser, die Entwicklung der Krankheit fördernder anatomischer Faktoren, wie der paralytische Thorax bei der Tuberkulose, oder bestimmter konstitutioneller Eigentümlichkeiten wie die Fettsucht oder die lymphatische Diathese. Auf der anderen Seite spielt die natürliche Immunisierung gegen eine Infektionskrankheit eine bedeutsame Rolle sowohl für das einzelne Individuum wie mitunter für ganze Völker. In einem Volk, bei dem z. B. wie bei uns die Masern endemisch sind, verlaufen sie in der Regel als leichte

<sup>1)</sup> So erkranken z. B. Angehörige wilder unzivilisierter Völker seltener an septischen Erkrankungen; das Fleckfieber erzeugt ferner bei Naturvölkern seltener die schweren nervösen Störungen als beim Zivilisationsmenschen mit seinem differenzierteren, empfindlicheren Nervensystem u. a. m.

Krankheit, nicht so, wenn sie in ein bis dahin masernfreies Land verschleppt werden, wie das Beispiel der Faröer Inseln zeigte. So herrschte auch zunächst die Syphilis kurz nach ihrer Einschleppung nach Europa in der Form einer mörderischen Seuche. Die Empfänglichkeit der verschiedenen Tierklassen gegenüber Infektionserregern ist sehr verschieden, wie das Beispiel der Tuberkelbacillen zeigt (Typus human., bovin., Kaltblüter-Tb.). Auch Rassenunterschiede in der Empfänglichkeit sind bekannt, wofür namentlich auch die Erfahrungen im Tierreich vielfache Bestätigung bilden und entsprechend von den Tierzüchtern praktisch verwertet werden.

Das Überstehen einer Infektionskrankheit verleiht in vielen Fällen dem Individuum Schutz gegen spätere Neuerkrankung. Bemerkenswert ist dabei, daß eine ganz leichte Erkrankung den gleichen Schutz wie eine schwere hinterläßt. Die praktische Nutzanwendung hiervon ist die Anwendung der prophylaktischen Vaccination, die darauf abzielt, durch künstliche Erzeugung einer leichten Erkrankung mittels des betreffenden abgeschwächten bzw. ungefährlich gemachten Erregers „Impfschutz“ (aktive Immunisierung) zu erzielen, wofür die Pockenimpfung ein klassisches Beispiel ist. Im Gegensatz hierzu hinterlassen einzelne Infektionskrankheiten wie Erysipel, Gelenkrheumatismus und die Pneumonie im Gegenteil eine gesteigerte Empfänglichkeit, so daß die einmal befallenen Individuen oft später erneut und wiederholt erkranken.

Es gibt ansteckende (**kontagiöse**) und **nichtkontagiöse** Infektionskrankheiten; die Unterscheidung ist für ihre Bekämpfung von der größten Bedeutung. Bei den ansteckenden Krankheiten erfolgt die Übertragung teils direkt von Mensch zu Mensch in Form der sog. Kontaktinfektion, z. B. durch einfache Berührung oder durch Verunreinigung mit den Ausscheidungen des Kranken, die die virulenten Erreger enthalten, teils auf mehr indirektem Wege. Verschiedene infektiöse Erkrankungen des Respirationsapparates werden häufig durch Versprühung des Auswurfs beim Husten, Niesen und Sprechen von Individuum zu Individuum übertragen, sog. Tröpfcheninfektion (Tuberkulose, Diphtherie usw.), zum Teil durch Verschleppung des virushaltigen Auswurfs durch Gegenstände, Staub usw., wie bei der Tuberkulose. Bei den Darmerkrankungen wie Typhus, Ruhr und Cholera sind es vor allem die Fäkalien, zum Teil der Harn, durch die die Verbreitung der Krankheit erfolgt, und zwar seltener durch direkte Beschmutzung mit denselben als durch Verunreinigung der Lebensmittel einschließlich des Wassers, denen überhaupt bei der Ausbreitung vieler Infektionskrankheiten eine bedeutsame Rolle zukommt, zumal hier mitunter durch eine einzige Infektionsquelle auf einmal eine größere Anzahl Menschen infiziert werden können, was bei dem sog. explosionsartigen Auftreten einer Epidemie durch verseuchtes Trinkwasser besonders drastisch zum Ausdruck kommt. Verhängnisvoll bei der Übertragung durch Lebensmittel ist übrigens, daß diese durch die Gegenwart der Bakterien keine durch die Sinne wahrnehmbaren Änderungen ihrer Beschaffenheit anzunehmen brauchen (Milch bei Typhus; Fleisch- und Wurstvergiftung usw.).

Die Gefahr der Weiterverschleppung eines Virus ist c. p. um so größer, je bedeutender seine Widerstandsfähigkeit ist. Letztere ist am größten bei den sporenbildenden Bakterien, wie z. B. bei Milzbrand, auch beim Tetanus, ferner bei Bakterien, deren Leib infolge seiner chemischen Konstitution besonders resistent gegen äußere Einflüsse ist, beispielsweise wie die Wachshülle der Tuberkelbacillen, die Kapselbildung mancher Bakterien. Aber auch so flüchtige Erreger wie das Scharlachvirus können an Gegenständen haftend viele Monate lang ihre Virulenz behalten.

Von fundamentaler epidemiologischer Bedeutung für die Übertragung ist das Vorkommen der oben genannten Keimträger, die, ohne selbst zu erkranken, virulente Keime bei sich beherbergen und ausscheiden und dadurch, zum Teil unerkannt, ihrer Umgebung gefährlich werden. Nicht minder gefährlich sind die sog. **Dauerausscheider**, bei denen nach Überstehen der Krankheit die Keime nicht aus dem Körper verschwinden, sondern weiter ausgeschieden werden (Diphtherie, Typhus, Cholera usw.).

Bei verschiedenen Infektionskrankheiten erfolgt die **Übertragung der Keime** durch Vermittlung von Tieren, insbesondere Insekten und Ungeziefer. Es handelt sich dabei zum Teil um rein mechanische Verschleppung von Ansteckungsstoffen, z. B. durch Fliegen, die mit infektiösem Material in Berührung kommen und dasselbe auf Lebensmittel übertragen (Typhus, Ruhr usw.). Wichtig ist ferner die Tatsache, daß blutsaugende Insekten wie die Moskitos, die Läuse u w. bestimmte Keime, die sie durch Stechen eines Kranken mit dessen Blut in sich aufnehmen, als „Zwischenwirt“ beherbergen und dieselben in virulentem Zustand durch ihren Stich auf gesunde Individuen übertragen. Es hat sich gezeigt, daß diese Erreger, die einen doppelten Entwicklungszyklus zeigen, in der Regel sich im Menschen ungeschlechtlich vermehren, während die geschlechtliche Fortpflanzung im Zwischenwirt erfolgt (Malaria). Auch Haustiere spielen bei der Verbreitung von Infektionskrankheiten eine Rolle, so überträgt die Milch der Kuh die Tuberkulose, diejenige der Ziege das Maltafieber; auch andere Tierkrankheiten werden auf den Menschen mitunter übertragen beispielsweise die Tollwut des Hundes. Einer besonderen Form des Wirtswechsels begegnen wir schließlich bei der durch Genuß des Fleisches trichinöser Tiere entstehenden Erkrankung.

Entsprechend dem gemeinsamen Grundcharakter aller Infektionskrankheiten sind gewisse gemeinsame klinische Erscheinungen für dieselben charakteristisch. Eines der konstantesten Symptome ist das Fieber, die charakteristische Erhöhung der Körpertemperatur, die auf Störung im Wärmehaushalt des Organismus beruht; die Wärmebildung ist erhöht, die Wärmeabgabe teils durch Kontraktion der Hautgefäße, teils durch Verminderung der Schweißbildung herabgesetzt. Hand in Hand hiermit geht eine Steigerung des Stoffwechsels mit vermehrtem Eiweißzerfall und Einschmelzung von Fett neben der der Kohlehydrate. Eine weitere durch die Bakterientoxine bedingte Alteration des Körpers verrät sich einmal durch Störungen im Bereich

des Zentralnervensystems in Form von Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, Benommenheit, Delirien, Krämpfen; ferner durch Störungen seitens des Verdauungsapparates wie Erbrechen, Appetitlosigkeit, belegte Zunge, Verstopfung, Durchfälle. Sehr häufig ist der Zirkulationsapparat in Mitleidenschaft gezogen, teils durch toxische Schädigung des Herzmuskels, deren leichteste und häufigste Form, die Pulsbeschleunigung fast jede Infektionskrankheit begleitet, teils durch die gefährliche Herabsetzung des Vasomotorentonus auf dem Umweg über das Nervensystem. Letztere tritt besonders auf dem Höhepunkte der Krankheit, erstere auch in der Rekonvaleszenz in die Erscheinung.

Mit großer Regelmäßigkeit beteiligt sich die Milz an dem Krankheitsbild, ihre Vergrößerung ist bisweilen neben dem Fieber zunächst das einzig greifbare Symptom. Vielfach findet sich in der Milz der Krankheitserreger in besonders reichlicher Menge (Malaria, Kala-azar usw.), was man sich mitunter diagnostisch unter Zuhilfenahme der Milzpunktion zunutze macht. Auch dürfte die Milz an der Produktion von Immunkörpern hervorragenden Anteil haben.

An den Lungen beobachtet man bei den verschiedensten Infektionskrankheiten eine Bronchitis, an die sich in schweren Fällen oft pneumonische Prozesse anschließen.

An der Haut spielen sich bei zahlreichen Infektionskrankheiten sehr markante Veränderungen ab, die bei den als akute Exantheme bezeichneten Krankheiten im Vordergrund des klinischen Bildes stehen: Scharlach, Masern, Röteln, Pocken, Windpocken, ferner Fleckfieber. Auch bei anderen Infektionskrankheiten zeigen sich bisweilen Hauteffloreszenzen makulöser, papulöser oder petechialer Art wie besonders bei Typhus, oft bei Sepsis, mitunter bei epidemischer Meningitis, Paratyphus, Miliartuberkulose, Weilscher Krankheit, Trichinose.

Im Blut verdienen vor allem die Veränderungen an den Leukocyten, meist in Form der Leukocytose, in anderen Fällen als Leukopenie Beachtung. Auch qualitative Veränderungen der Leukocytenformel, das Verhalten der Eosinophilen usw. bilden zusammen mit der Leukocytenzahl oft ein für die Erkennung der Krankheit wichtiges und bisweilen sehr charakteristisches Symptom. Manche Infektionserreger wirken stark anämisierend; bei Sepsis, Malaria usw. gehört die Anämie zu regelmäßigen Begleiterscheinungen.

Die Nieren als wichtiges Ausscheidungsorgan der Bakterientoxine sind überaus häufig in Mitleidenschaft gezogen, die leichteste Form einer Nierenreizung, die febrile Albuminurie mit geringer Zylindrurie, ist bei jeder schwereren Erkrankung nachweisbar, doch sind auch eigentliche Nephritiden kein seltenes Ereignis. In manchen Fällen wie beim Typhus wird der Erreger noch lange Zeit nach der Krankheit durch die Nieren ausgeschieden.

Die **Diagnose** einer Infektionskrankheit ist häufig mit großer Wahrscheinlichkeit schon aus dem Vorhandensein bestimmter charakteristischer Kombinationen der einzelnen Symptome zu stellen. Bisweilen genügt hierfür sogar bereits allein der typische Verlauf der Fieberkurve, wie bei Malaria, Recurrens u. a., oder der Befund eines einzigen

Symptoms bei vorhandenem Fieber, wie z. B. der Hautausschlag bei den akuten Exanthenen. Mit derartigen Indizienbeweisen wird man sich in unklaren Fällen insbesondere bei den Krankheiten begegnen müssen, wo der Erreger bisher unbekannt ist (Scharlach, Masern, Windpocken und viele andere).

In anderen Fällen kann erst der Nachweis des Virus den Anspruch auf volle Beweiskraft erheben<sup>1)</sup>. Dank der fortschreitenden Verfeinerung der bakteriologischen Technik, begonnen mit der Herstellung fester Nährböden durch Robert Koch, ist es heute ein leichtes, im Blute und den verschiedenen Exkreten den Erreger nachzuweisen. Daß dieser Nachweis oft schon in den Anfangsstadien der Krankheit gelingt, hat wesentliche Bedeutung auch für die Bekämpfung der kontagiösen Krankheiten.

Seit Robert Koch gilt für die Identifizierung eines Krankheitserregers die Erfüllung dreier Bedingungen als notwendig: seine Reinzüchtung, sein konstantes Vorkommen und die Erzeugung spezifischer Krankheitsveränderungen durch ihn im Tierversuch. Die Grundlage hierfür bildet das sog. **Spezifizitätsgesetz**, nach welchem die einzelnen Bakterien wohlcharakterisierte und feststehende, nicht ineinander übergehende Typen darstellen. Praktisch kompliziert sich häufig die Frage am Krankenbett durch das gleichzeitige Vorhandensein anderer Bakterien, die zunächst oft nur die Rolle harmloser Saprophyten spielen, im Verlauf der Krankheit aber mehr und mehr zu dominierender Stellung gelangen (Streptococcen bei Scharlachdiphtherie). Man bezeichnet diesen Zustand als **Mischinfektion**.

In einzelnen Fällen handelt es sich von vornherein um gemeinschaftlichen Parasitismus zweier Erreger, der für ihre Existenz wahrscheinlich notwendig ist. Ein Beispiel ist die Angina Vincenti, bei der fusiforme Bacillen stets in Gemeinschaft mit Spirochäten auftreten. Manche Bakterien, wie z. B. die Influenzabacillen, bedürfen augenscheinlich für ihre Existenz der Gegenwart anderer Bakterien. Man nennt dieselben Ammenbakterien.

Nächst der Isolierung der spezifischen Erreger stellt für die Diagnose der Nachweis der durch die Keime hervorgerufenen Reaktionsprodukte des Körpers, d. h. der verschiedenen Immunkörper im Blutserum, ein besonderes feines Reagens dar. Hierher gehören praktisch in erster Linie die Bakteriolyse, die Antitoxine, die Agglutinine usw. Ein Beispiel für den diagnostischen Wert der Bakteriolyse ist der Pfeiffer'sche Versuch zur Identifizierung der Choleravibrionen (vgl. S. 44). Es ist indessen darauf hinzuweisen, daß die diagnostische Bewertung gewisser Immunitätsreaktionen hinsichtlich der absoluten Spezifität praktisch in manchen Fällen einer Einschränkung bedarf. Diese liegt in der Bedeutung der sog. Gruppenreaktionen, die in der nahen Verwandtschaft mancher Bakterien untereinander begründet sind.

So erklärt sich, daß bei Erkrankungen, die durch das dem Typhusbacillus nahestehende *B. coli* hervorgerufen sind, Antikörper beobachtet werden, die auch

<sup>1)</sup> Jedoch ist dabei nicht zu vergessen, daß selbst der Nachweis eines Erregers nur dann diagnostischen Wert beanspruchen kann, wenn gleichzeitig das ganze Krankheitsbild dabei genügende Berücksichtigung findet. Man denke z. B. an den Fall, daß ein Typhusbacillendauerausscheider an Diphtherie erkrankt. Hier sind die Typhusbacillen für das Krankheitsbild völlig bedeutungslos.

Typhusbacillen, eventuell auch Paratyphus agglutinieren (Cholecystitis, Pyelitis). Aus dem gleichen Grunde wird es verständlich, warum z. B. die serologische Unterscheidung der verschiedenen Ruhrbacillenarten oft auf Schwierigkeiten stößt. Dazu kommt noch gelegentlich das Phänomen der sog. heterologen Agglutination, bei der z. B. der Gärtnerbacillus von Typhusserum und umgekehrt agglutiniert wird.

Das Spezifitätsgesetz darf eben, da es sich um biologische Dinge handelt, nicht als starres Schema betrachtet werden, wie überhaupt diese ganze Betrachtung lehrt, daß bei der Beurteilung des Zustandes eines kranken Menschen stets nur das Gesamtbild, das wir vor allem am Krankenbett studieren sollen und aus den Ergebnissen des Laboratoriums ergänzen, maßgebend für unsere Schlußfolgerungen sein darf, wobei dem Ausfall einer einzelnen Reaktion immer nur die Bedeutung eines, wenn auch häufig sehr wichtigen Wegweisers zukommt.

Die aktive Immunisierung, die ein Organismus infolge von Erkrankung oder Vaccination erfährt und die ihn infolge des spezifischen, durch die Bakteriengifte auf seine Zellen ausgeübten Reizes zur Bildung von Antikörpern befähigt, versetzt den Körper zugleich gegenüber einer erneuten Einwirkung des gleichen spezifischen Reizes in einen eigentümlichen Zustand veränderter Reaktionsfähigkeit, den man als Allergie bezeichnet. Dieselbe kann — als Endresultat der Immunisierung — in einer erhöhten Widerstandsfähigkeit bestehen, andererseits aber zunächst auch ein Stadium stark gesteigerter Empfindlichkeit bedeuten. Diese Überempfindlichkeit oder Anaphylaxie (= Schutzmangel), die also ein Spezialfall der Allergie ist, hat diagnostisch und klinisch große Bedeutung.

Eine allergische Reaktion ist z. B. das Reagieren Tuberkulöser mit Fieber und Herderscheinungen auf die Injektion von Tuberkulin, gegenüber welchem tuberkulosefreie Individuen sich völlig indifferent verhalten. Aus dem früher Gesagten wird verständlich, daß nicht nur Bakteriengifte, sondern auch Eiweißkörper, soweit sie Antigene sind, Allergie zu erzeugen vermögen. Die Anaphylaxie hat bei Tieren, besonders Meerschweinchen, sehr charakteristische und schwere Erscheinungen zur Folge, wie Temperatursturz, Hautjucken, Krämpfe und Lungenödem. Sie wird oft diagnostisch verwertet (z. B. forensisch zur Unterscheidung verschiedener Fleischarten oder auch zur Differenzierung verschiedener Bakterientoxine). Die beim Menschen beobachteten anaphylaktischen Symptome sind weniger stürmisch und in der Regel ungefährlich. Ein Beispiel ist die Serumkrankheit.

Die **Therapie** der Infektionskrankheiten bewegt sich, soweit allgemeine Gesichtspunkte in Frage kommen, in drei Richtungen. An erster Stelle steht die spezifische, d. h. ätiologische Therapie, die darauf abzielt, den Krankheitserreger selbst auf direktem Wege unschädlich zu machen. Hierzu sind z. B. gewisse chemische Verbindungen geeignet (Chemotherapie). Ein klassisches Beispiel ist die Anwendung des Salvarsans bei Syphilis, des Chinins bei Malaria. Derartige chemotherapeutische Agenzien sollen bei möglichst geringer Giftigkeit für den Organismus eine möglichst stark bactericide Wirkung den Krankheitserregern gegenüber entfalten; teilweise erreicht man auf diesem Wege sogar eine völlige Vernichtung des Virus, wie z. B. bei Recurrens mittels des Salvarsans (Therapia magna sterilisans von Ehrlich).

Auch die Immunotherapie gehört zur spezifischen Behandlung. Sie besteht teils in der Anwendung bakteriolytischer Sera, die die Bakterienleiber zerstören (Cholera, Typhus), teils und häufiger in der Form antitoxischer Sera, die die Bakteriengifte neutralisieren wie bei Diphtherie, Tetanus usw. Die Aussicht auf Erfolg ist um so größer, je früher die Therapie einsetzt und je rationeller die Verabreichungsart des Heilmittels ist (z. B. intravenöse Applikation oder Injektion nahe der Eintrittspforte, wie z. B. bei Tetanus). Die Serumtherapie setzt im allgemeinen die Kenntnis des Erregers voraus, doch gibt es Ausnahmen, wie beispielsweise die erfolgreiche Anwendung von Rekonvaleszenten-serum bei Scharlach. Vorläufig ist die Zahl der einer spezifischen Therapie zugänglichen Infektionskrankheiten noch recht gering.

Zweitens hat jede Behandlung die Erhaltung bzw. Steigerung der Widerstandsfähigkeit des Organismus anzustreben. Wegen der ungünstigen Wirkung der Bakteriengifte auf den Stoffwechsel (s. oben) ist bei der Pflege Infektionskranker auf zweckmäßige Ernährung, d. h. leichtbekömmliche und calorienreiche Nahrung besonderer Wert zu legen. Häufig wird dies allerdings durch völligen Appetitmangel erschwert. Ernährung durch den Mastdarm (Nährklysmen), zu der man in schwierigen Fällen auch bei Infektionskrankheiten gezwungen ist, stellt vorläufig nur einen sehr mangelhaften Ersatz dar. Die Ernährungstherapie spielt namentlich bei langdauernden (Typhus) oder chronisch verlaufenden Infektionskrankheiten (Tuberkulose) eine oft entscheidende Rolle, während bei kurzer Krankheitsdauer die Befriedigung des physiologisch gesteigerten Nahrungsbedürfnisses in der Rekonvaleszenz das erlittene Defizit bald wieder auszugleichen pflegt.

Der dritte Punkt der Therapie betrifft die Verhütung von Komplikationen bzw. deren Behandlung. Abgesehen von den eben genannten ernährungstherapeutischen Maßnahmen gehören hierher u. a. sorgfältige Hautpflege, zweckmäßige Lagerung des Kranken, Bäderbehandlung, Anregung der Atmung und Expektoration, wofür eine Reihe spezieller Hilfsmittel wie hydrotherapeutische Maßnahmen sowie die Anwendung von verschiedenartigsten Medikamenten dient. Domäne der Arzneibehandlung sind namentlich auch die häufigen Herz- und Kreislaufstörungen, die wegen ihres ernsten Charakters von der Pflege besondere Aufmerksamkeit verlangen. Sorgfältige Überwachung und Regelung der Darmtätigkeit ist äußerst wichtig. Die Bekämpfung des Fiebers gilt heute im allgemeinen nur bei extrem hohen Temperaturen als indiziert, und zwar namentlich zur Beseitigung der Benommenheit; aus letzterem Grunde ist man auch mit der Anwendung narkotischer Mittel in diesen Fällen möglichst sparsam.

Die **Prophylaxe** hat bei keiner anderen Krankheitsgruppe auch nur annähernd so bedeutende Erfolge zu verzeichnen und ist von so großer Tragweite für die Volksgesundheit wie bei den Infektionskrankheiten, soweit es sich um kontagiöse Formen handelt. Besteht doch überhaupt die Stärke der modernen Seuchenbekämpfung vornehmlich in vorbeugenden Maßregeln. Dieselben sind je nach der Art der Krankheit und ihrer Erreger sehr verschieden.



Ganz allgemein gelten für die Prophylaxe, abgesehen von der Hebung der allgemeinen Hygiene (Sauberkeit, Körperpflege, Luft, Licht, Beseitigung der Abfallstoffe) und der Besserung der sozialen Verhältnisse folgende Gesichtspunkte als maßgebend: Isolierung der Kranken, Beseitigung bzw. Sterilisierung aller Ansteckungsstoffe und -Quellen wie der Ausscheidungen der Kranken und aller Gegenstände, die mit ihnen in Berührung kommen (Desinfektion), Kontrolle der Genesenen auf etwa noch bestehende Infektiosität (Schuppung bei den akuten Exanthemen; Dauerausscheider), Vernichtung von tierischen Zwischenwirten wie Ungeziefer und Insekten bzw. Zerstörung ihrer Brutstätten sowie Schutzmaßregeln (Moskitonetze; Gesichtsmasken bei Pflege Pestkranker usw.).

Äußerst wirksame Schutzmittel schenkte uns die Immunitätslehre in der aktiven bzw. passiven prophylaktischen Immunisierung wie besonders bei Pocken und Typhus bzw. bei Diphtherie, Tetanus, usw.

Eine nicht zu unterschätzende Vorbeugungsmaßregel ist weiter die Hebung der allgemeinen Widerstandsfähigkeit des Individuums durch Besserung seines Ernährungszustandes bzw. durch Beseitigung disponierender Faktoren wie z. B. durch Ausheilung von Katarrhen der oberen Luftwege oder von Magendarmstörungen, Hautwunden usw. Nicht zuletzt von großem Wert für die Prophylaxe ist die Verbreitung der Kenntnis vom Wesen der Infektionskrankheiten in den breiten Volksschichten.

In allen zivilisierten Ländern hat der Staat durch **gesetzliche Vorschriften** die Prophylaxe und Bekämpfung ansteckender Krankheiten in gewissem Umfang geregelt. Dazu gehört die Anzeigepflicht, die sich bei besonders gefährlichen Krankheiten auch auf den bloßen Verdacht erstreckt, ferner die Absonderung der Kranken bzw. Quarantäne Krankheitsverdächtiger sowie die sog. Verkehrsbeschränkung des Pflegepersonals, die Regelung der Desinfektionsmaßnahmen, endlich die Grenzkontrolle gegenüber verseuchten Nachbarländern.

In Deutschland gilt für die sog. gemeingefährlichen Infektionskrankheiten das Reichsseuchengesetz, nach welchem bei Aussatz, Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest und Pocken nicht nur die Kranken, sondern auch die Krankheits- und auch die Ansteckungsverdächtigen meldepflichtig und, eventuell zwangsweise (die beiden letzten Kategorien für die Dauer der Inkubationszeit) zu isolieren sind. Außerdem bestehen für andere ansteckende Krankheiten bundesstaatliche Verordnungen. So ist in Preußen laut „Gesetz betr. die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten“ meldepflichtig sowohl der Ausbruch der Krankheit wie der Tod bei Diphtherie, Genickstarre, Kindbettfieber, Trachom, Rückfallfieber, Ruhr, Scharlach, Typhus, Milzbrand, Rotz, Tollwut, Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung, Trichinose, ferner unter gewissen Voraussetzungen bei Lungen- und Kehlkopftuberkulose (Todesfälle), Syphilis, Gonorrhöe und Ulcus molle, schließlich zeitweise auch bei epidemischer Kinderlähmung<sup>1)</sup>. Nicht meldepflichtig sind Masern, Röteln, Windpocken, Keuchhusten, Erysipel, Grippe, Pneumonie. Auch das Desinfektionsverfahren ist gesetzlich geregelt.

Eine rationelle **Einteilung** der Infektionskrankheiten in ein natürliches System ist zur Zeit noch nicht möglich, zum Teil deshalb, weil

<sup>1)</sup> Gegen Keimträger bzw. Dauerausscheider besteht eine gesetzliche Handhabe also nur bei den „Reichsseuchen“, nicht aber bei den gewöhnlichen übertragbaren Krankheiten.

vielfach der Erreger nicht bekannt ist, sodann weil in manchen Fällen bestimmten einander biologisch nahe verwandten Erregern vollständig verschiedene Krankheitsbilder entsprechen und es für die Lehre von den Infektionskrankheiten nicht angängig ist, einem Schema zu Liebe eine Einordnung derselben in ein Bakteriensystem vorzunehmen, das den Beobachtungen am Krankenbett nicht Rechnung trägt. Schon die Einteilung der Erreger in pathogene Parasiten und saprophytische nicht pathogene Keime stößt infolge unscharfer Grenze auf Schwierigkeiten, da gelegentlich pathogene Parasiten vorübergehend als unschädliche Saprophyten im Körper vegetieren und umgekehrt Saprophyten zu fakultativ pathogenen Keimen werden können. So erklärt es sich, daß die bisher üblichen Einteilungen mehr oder weniger äußerlicher Art sind.

Bei der Beschreibung der Infektionskrankheiten in den folgenden Kapiteln wurde versucht, als Einteilungsprinzip die bei der klinischen Beobachtung in den Vordergrund tretende Beteiligung einzelner Organsysteme zugrunde zu legen, obwohl auch bei dieser Gruppierungsmethode gewisse Inkonsequenzen unvermeidbar sind.

### **Akute Exantheme.**

Zu den sog. akuten Exanthenen gehört eine Reihe akuter Infektionskrankheiten, die als gemeinsame Eigentümlichkeit gewisse Hautauschläge zeigen, deren Aussehen und Verlauf sich je nach der Krankheit voneinander unterscheiden, für die einzelne Krankheit aber in hohem Maße charakteristisch sind, so daß die Diagnose in der Regel schon aus der Art des Exanthems sich stellen läßt. Hierher gehören Scharlach, Masern, Röteln, Vierte Krankheit, Pocken sowie Windpocken. Die Mehrzahl unter ihnen sind Kinderkrankheiten. Von keinem der akuten Exantheme ist bisher der Erreger bekannt. Die Ansteckung dürfte in der Regel durch Aufnahme des flüchtigen Virus von den Luftwegen bzw. den Rachenorganen erfolgen. Sämtliche akuten Exantheme gehören zu den ansteckenden Infektionskrankheiten, und zwar ist meist der kranke Mensch selbst die Ansteckungsquelle. In einzelnen Fällen wie bei Scharlach und Pocken spielt jedoch auch die Übertragung durch Gegenstände eine wichtige Rolle. Eine Vermehrung des Krankheitserregers außerhalb des menschlichen Körpers kommt nicht in Betracht. Charakteristisch für die akuten Exantheme ist schließlich, daß sie fast immer eine langdauernde, wenn auch nicht immer lebenslängliche Immunität hinterlassen.

### **Scharlach.**

Der Scharlach ist eine endemische, hauptsächlich das Kindesalter befallende Krankheit, die gelegentlich auch epidemieartig auftritt. Es gibt Epidemien mit schwerem und solche mit leichtem Verlauf.

Der Erreger ist unbekannt. Das flüchtige Virus findet sich namentlich in den Schuppen der Haut. Die Übertragung erfolgt durch den kranken Menschen, ferner durch Gegenstände, an denen das Virus mit

großer Zähigkeit monatelang haftet (z. B. Spielsachen), auf diesem Wege auch durch gesunde Menschen, sowie durch Nahrungsmittel (Milch). Die häufig in späteren Krankheitsstadien nachweisbaren Streptococcen beruhen auf Mischinfektion und haben keine ätiologische Bedeutung für den Scharlach.

Die allgemeine Disposition ist im Vergleich zu Masern weniger verbreitet (etwa 40 : 95), die Empfänglichkeit am stärksten zwischen dem 3. bis 10. Jahr. Die Erkrankung hinterläßt fast stets dauernden Schutz; nochmalige Infektion ist äußerst selten.

**Krankheitsbild:** Inkubation meist 4—7 (3—5) Tage, selten weniger. Während derselben beobachtet man keinerlei Erscheinungen. Das Prodromalstadium beginnt brüsk mit steilem Temperaturanstieg und Schüttelfrost sowie Erbrechen, bei kleineren Kindern oft mit Konvulsionen. Unter schwerem allgemeinen Krankheitsgefühl treten nach einigen Stunden Schluckbeschwerden und Halsschmerzen auf; ihnen entspricht eine fleckige, düsterrote Färbung des weichen Gaumens mit scharfer Abgrenzung gegen den harten Gaumen sowie Rötung und Schwellung der Tonsillen; letztere zeigen zum Teil die gelben Flecken der folliculären Angina.

Der Ausbruch des Exanthems erfolgt am Ende des 1. oder bei Beginn des 2. Tages, zunächst am Rumpf und Hals und erst dann an den Extremitäten; das Gesicht bleibt in der Umgebung des Mundes stets frei, so daß ein scharfer Kontrast zwischen der Fieberröte der Wangen und der weißen Mund- und Kinnpartie besteht.

Der Ausschlag ist kleinfleckig und besteht anfangs aus zart-, später flammendroten spritzerartigen Fleckchen, die dicht nebeneinander stehen, höchstens stecknadelkopfgroß sind und später bei voller Entwicklung des Exanthems namentlich am Rücken den Eindruck des Konfluierens erwecken. Charakteristisch ist bei Wegdrücken der Röte durch einen Glasspatel die gelbliche Färbung der Haut. Besonders stark pflegt der Ausschlag in der Achsel- und Leistenbeuge ausgebildet zu sein. Außerdem entwickelt sich, namentlich an der Streckseite der Extremitäten deutliche Follikelschwellung, die beim Befühlen an Chagrinleder erinnert und nicht selten mit Bläschenbildung kombiniert ist, sog. *Scarlatina miliaris* oder Scharlachfriesel (meist leichte Fälle). Das gelegentliche Vorkommen vereinzelter kleiner Hämorrhagien in der Ellenbogen- und Schenkelbeuge ist harmlos und nicht zu verwechseln mit den Petechien des septischen Scharlachs.

Papulöse und urticarielle Exantheme (3.—4. Tag) bisweilen mit Juckreiz sind oft Vorboten eines schwereren Verlaufs, sie ähneln gelegentlich dem Masernausschlag (*Scarlatina variegata*). Schon vor dem völligen Ablassen des Exanthems beginnt Ende der 1. Woche Schuppung der Haut, meist zuerst am Hals, dann am Rumpf, zuletzt an den Extremitäten, wo sie in großen Lamellen erfolgt und an den Handtellern und Fußsohlen am längsten, oft wochenlang andauert. Die Intensität der Schuppung braucht derjenigen des Exanthems nicht parallel zu gehen.

Die anfangs häufig sehr hohe Fiebertemperatur (bis 41°) ist prognostisch nicht ungünstig, sie geht dem Verlauf des Exanthems parallel

und fällt gegen Ende der Woche lytisch zur Norm ab. Der Puls ist stets sehr hoch, höher als der Temperatur entspricht, ohne deshalb die Prognose zu trüben.

Die Zunge ist nur anfangs belegt, sie zeigt vom 4.—5. Tag eine starke Schwellung der Papillen, und es entwickelt sich die für Scharlach charakteristische Himbeerzunge. Gleichzeitig nehmen die Rachenveränderungen an Intensität zu, etwaige Beläge der Tonsillen dehnen sich aus, so daß dann oft ein diphtherieähnliches Bild entsteht, dementsprechend schmerzhafte Schwellung der Kieferwinkel- und Halsdrüsen.

Eine Herzdilatation mäßigen Grades ist oft vorhanden, desgleichen eine geringe Milzvergrößerung. Im Blut besteht neben einer lange bis in die Rekonvaleszenz hinein andauernden starken Leukocytose etwa vom 5. Tage ab Vermehrung bzw. fehlende Verminderung der Eosinophilen als charakteristisches Symptom. Oft findet man ferner im Protoplasma der Leukocyten eigentümliche längliche oder spiralig gedrehte mit Kernfarbstoffen sich färbende Einschlüsse (Döhlesche Körperchen). Diagnostisch wichtig ist auch die oft auf der Höhe der Krankheit positive Aldehydprobe im Harn.

Die **Rekonvaleszenz** beginnt bei Fehlen von Komplikationen und Nachkrankheiten Mitte der 2. Woche. Letztere können sich indessen auch bei leichtestem Verlauf einstellen.

**Komplikationen und Nachkrankheiten:** Die meisten Komplikationen beruhen auf Mischinfektion mit Streptococcen, so das am 4.—5. Tage einsetzende „Scharlachdiphtheroid“, eine mit Nekrosenbildung und eventuell ausgedehnter Gewebszerstörung an Tonsillen, Uvula und Gaumen einhergehende schwere Angina (keine Diphtheriebacillen!) mit gleichzeitiger sehr starker Drüsenschwellung am Halse, die oft zu eitriger Einschmelzung der Drüsen oder gar phlegmonösen Prozessen im Halsbindegewebe führt. Eventuell schließt sich in besonders schweren Fällen eine Mediastinalphlegmone mit tödlicher Sepsis an.

Die recht häufige Otitis media (etwa 25% der Fälle) ist infolge der Streptococcen viel ernster als die Pneumococcen-Otitis bei Masern, sie neigt zum Übergreifen auf Antrum und Warzenfortsatz auch bei gutem Abfluß des Eiters durch das Trommelfell und führt oft bei nicht rechtzeitiger Operation schnell zu Sinusthrombose und Meningitis.

Gelenkschwellungen kommen einmal als harmloses, flüchtiges „Scharlachrheumatoid“ namentlich an den Handgelenken im Verlauf der ersten Woche vor. Später tritt bisweilen eine schwere eitrig multiple Gelenkaffektion bei septischem Verlauf auf.

Herzstörungen (Myokarditis) mit Dilatation und systolischen Geräuschen sind in der 1. Woche nicht häufig, sie verraten sich bisweilen durch plötzliches Abblassen des Ausschlages; sie sind prognostisch günstig und sind nicht zu verwechseln mit den schweren Erscheinungen bei Scharlach-Sepsis (ulceröse Endokarditis, Perikarditis) sowie bei Nephritis (s. u.).

Mitunter beobachtet man eine akute Appendicitis.

Eine kritische Zeit auch für die leichtesten Fälle ist die 3. Woche, in der sich außer einer Wiederholung des Temperatur-Anstieges (Nach-

fieber), ferner der Rachenerscheinungen, der Drüsen- sowie Gelenkschwellungen oder eines dieser Zeichen vor allem eine hämorrhagische Nephritis etwa in 10% aller Fälle einstellt (19. Tag!). Appetitmangel, Mattigkeit, Kopfschmerzen, objektiv blutiger Harn, dessen Menge sinkt, Ödeme (Augenlider, Vollmondgesicht!) und Blutdrucksteigerung sind je nach der Schwere des Falles verschieden stark ausgeprägt, schwinden nach kurzer Zeit wieder oder führen durch Anurie und Urämie mit oder ohne Herzinsuffizienz zum Tode. Ein kleiner Teil der Nephritisfälle (ca. 20%) wird chronisch und führt bisweilen zur Schrumpfniere.

**Besondere Verlaufsformen:** In ganz leichten Fällen besteht ein wenig charakteristisches hellrosa Exanthem, eventuell nur an einzelnen Körperstellen, dort wo Hautflächen aufeinanderliegen (Oberschenkel, Kniekehlen usw.); Angina und Fieber sind hier ebenfalls wenig ausgeprägt; alle Erscheinungen gehen nach wenigen Tagen vorüber. Eine Scharlach-Angina ohne Exanthem kommt mitunter bei Erwachsenen vor, ihr wahrer Charakter verrät sich durch spätere Schuppung. Diese abortiven Formen sind epidemiologisch wichtig, da sie oft nicht erkannt, die Krankheit weiterverbreiten.

Die schwerste, aber sehr seltene Form, Scarlat. fulminans oder toxischer Scharlach kennzeichnet sich durch sofortiges Einsetzen schwerer Cerebralerscheinungen (maniakalische Delirien, Koma), sehr hohes Fieber, häufig atypisches Exanthem, Herzschwäche, sowie Diazoreaktion des Harns und endet nach wenigen Tagen letal. Während bei dieser Form Streptococcen vermißt werden, spielen sie eine Hauptrolle bei der Scharlachsepsis, die ihren Ausgang von einer gangränisierenden Angina zu nehmen pflegt (s. o.). Sie zeigt zahlreiche Komplikationen (s. o.) und endet oft tödlich. Gutartig ist meist das seltene sog. Scharlachtyphoid, charakterisiert durch länger anhaltendes remittierendes Fieber ohne erkennbare Ursache (stets ist trotzdem auf Komplikationen zu fahnden!), sowie Leibschmerzen und Diarrhöen.

Die Scharlachdiagnose ist in den typischen Fällen leicht, in den atypischen oft sehr schwierig. Jede Angina soll man auf Exantheme untersuchen! Scharlachähnliche Ausschläge kommen vor bei Sepsis (namentlich der puerperalen), Meningitis, bei Beginn der Pocken und Fleckfieber, bei Trichinose, nach zahlreichen Medikamenten (Quecksilber, Salvarsan), sowie Injektion von artfremdem Serum. Im letzteren Fall beobachtet man mitunter sogar fieberhafte Angina sowie Hautschuppung. In fraglichen Fällen spricht die auf intracutane Injektion von Normalserum an der Injektionsstelle nach einigen Stunden auftretende lokale Abblassung des Ausschlages für Sch. (Schultz'sches Phänomen). Ein wichtiges Kriterium ist der Blutbefund und die Aldehydprobe. Das Diphtheroid ist nicht mit Diphtherie zu verwechseln. Der Beginn der Nephritis ist bisweilen subjektiv unmerklich, daher ist sorgfältige Harnkontrolle notwendig. Die Nierenerkrankung verrät sich übrigens meist ebenso wie die Lymphadenitis durch erneuten Temperatur-Anstieg.

**Therapie:** Bettruhe auch bei den leichtesten Fällen während vier Wochen notwendig. Gegen die Angina gurgeln mit 3% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, eventuell Pyocyanaespray; bei Gangrän Ichthyolspülungen (5%), bei hohem

Fieber kühle Packungen (12—15°). Bei Zirkulationsschwäche Campher, Coffein, Strychnin (vgl. S. 174). Eine Vorbeugung der Nephritis ist therapeutisch nicht möglich, bei Ausbruch derselben Nierendiät (vgl. Abschnitt Nierenkrankheiten), bei drohender Urämie Aderlaß mit folgender NaCl-Infusion, Schröpfköpfe in die Nierengegend, eventuell Lumbalpunktionen und bei Anurie als ultimo ratio operative Dekapsulation. Bei Lymphadenitis warme Breiumschläge; Incision nicht vor Eintritt von Fluktuation. Bezüglich rechtzeitiger chirurgischer Behandlung der Otitis vgl. oben.

Auch bei leichtem Verlauf beträgt die Gesamtdauer der Isolierung 6 Wochen, von wo ab die Schuppung und damit die Infektiosität als beendet gelten darf. Desinfektion des Kranken erfolgt durch Vollbad; sehr gründliche Zimmerdesinfektion notwendig.

### Masern (Morbillen).

Die Masern befallen hauptsächlich das Kindesalter. Der Erreger ist unbekannt; er ist flüchtig und wird außerhalb des Körpers schnell unwirksam. Die Weiterverbreitung erfolgt im Gegensatz zu Scharlach nicht durch Gesunde, sondern nur durch den Kranken selbst, dessen Infektiosität schon vor Ausbruch des Exanthems beginnt und vor Rückbildung desselben wieder schwindet. Infolge großer Empfänglichkeit — natürliche Immunität ist äußerst selten — erkrankt fast jeder schon in der Kindheit, woraus sich die Seltenheit der Krankheit bei Erwachsenen erklärt, da die Masererkrankung absolute Immunität hinterläßt. Die Masern gelten als gutartige Krankheit. Eine Ausnahme von dieser Regel bildet die Krankheit der Kleinkinder sowie der Kinder aus Proletarierkreisen.

**Krankheitsbild:** Inkubation 11 Tage; innerhalb derselben kommen eventuell leichte Temperatur-Steigerungen vor. Die Krankheit selbst zerfällt in zwei Abschnitte: 1. katarrhalisches Prodromalstadium mit initialem Fieber, 2. exanthematisches Stadium. Das katarrhalische Stadium als solches ist uncharakteristisch: Es bestehen Schnupfen, Husten, Conjunctivitis mit Lichtscheu. Diagnostisch sehr wichtig sind die Koplikschen Flecke, d. h. kalkspritzerartige, nicht durch Wischen entfernbare weiße Tüpfelchen an der Wangenschleimhaut gegenüber der Zahnreihe, an der Lippenschleimhaut und der Übergangsfalte zum Zahnfleisch, sie schwinden bald wieder nach Auftreten des Ausschlages. Dem Ausbruch des Exanthems kurz vorher geht eine fleckige, rasch wieder schwindende düstere Rötung des Gaumens und Rachens oft mit punktförmiger Follikelschwellung (Enanthem).

Das Exanthem (Beginn 3.—4. Tag) besteht zunächst aus scharf begrenzten hellroten, rundlichen, nicht erhabenen kleinfleckigen Effloreszenzen, die sich bald in unregelmäßig, zum Teil zackig konturierte düsterrote größere Flecke verwandeln, die teils glatt, teils leicht erhaben sind; der Gesamteindruck ist äußerst buntscheckig. Der Ausschlag beginnt am Kopf hinter den Ohren, das Gesicht ist stark befallen, speziell auch die Umgebung des Mundes (Gegensatz zu Scharlach!), ferner die behaarte Kopfhaut. Die weitere Ausbreitung erfolgt in

bestimmter Reihenfolge: oberer Rumpf, Oberarme, unterer Rumpf, Oberschenkel, Vorderarme, Hände, Unterschenkel, Füße; die volle Entwicklung des Ausschlages wird am 3. Tage erreicht. Eine Abweichung von diesem Schema entspricht oft auch sonst einem atypischen Verlauf. Blutaustritte in die Efflorescenzen — hämorrhagische Masern — bewirken bunte Verfärbungen und länger dauernde Pigmentierung, sie sind prognostisch ohne Bedeutung. Miliaria ist selten.

Die Gesamterkrankung geht der Exanthementwicklung zunächst parallel. Die Temperatur zeigt am 2. Tage des Prodromalstadiums eine tiefe Remission, bleibt bis zum Exantheausbruch meist mäßig erhöht, steigt dann als Eruptionsfieber bis  $40^{\circ}$ — $41^{\circ}$ , fällt aber sehr bald wieder, oft kritisch zur Norm, sobald der Ausschlag voll entwickelt ist (Gegensatz zu Scharlach). Die Fieberkurve ist daher meist zweigipflig. Die katarrhalischen Symptome steigern sich bei Beginn des Eruptionsfiebers: heftiger trockener, nicht selten bellender Husten; starke, oft eitrig Rhinitis, eitrig Conjunctivitis und Blepharitis, mitunter mit Verschwellung der Augenlider. Die Zunge ist belegt; es bestehen Obstipation, aber auch bisweilen heftige Diarrhöen, starkes Krankheitsgefühl mit Apathie. Geringe Milzvergrößerung sowie multiple bezw. auf die Halsdrüsen beschränkte Drüsenschwellungen werden mitunter beobachtet. Der Harn zeigt oft positive Diazoreaktion. Die Dauer dieser Erscheinungen beträgt etwa  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  Tage; dann erfolgt unter Temperatur-Abfall ein kritisches Schwinden der Beschwerden und es beginnt die Abheilungsperiode mit kleienförmiger Abschuppung (d. h. kleine Schuppen, größere bisweilen im Gesicht), unter Abklingen der Bronchitis.

**Atypischer Verlauf und Komplikationen:** Hierher gehören eine besondere Schwere der katarrhalischen Erscheinungen wie hochgradige blennorrhische, bisweilen diphtherieartige Conjunctivitis, schwere Rhinitis mit Verschwellung der Nase, sowie starke, vor allem subglottische Schleimhautschwellung des Kehlkopfs mit „Pseudocroup“, d. h. Atemnot, rauher Husten sowie Heiserkeit bis zur Aphonie.

Das Exanthem kann flüchtig sein oder selten ganz fehlen. Bei sehr jungen Kindern bilden die „malignen Masern“ eine seltene, stets letale Verlaufsart mit schwerem cerebralen Syndrom (Benommenheit, Konvulsionen) und typhusartigem Sektionsbefund, d. h. starker Schwellung der Darmfollikel und Peyerschen Plaques sowie Milztumor.

Bei einer anderen schweren Verlaufsform bei jungen Kindern, den „nach innen geschlagenen Masern“, bleibt das Exanthem in der Entwicklung stecken, blaßt ab oder wird cyanotisch, und unter Herzschwäche und rapidem Kräfteverfall, eventuell mit Diarrhöen erfolgt oft tödlicher Ausgang (8.—10. Tag); prognostisch sind sie etwas weniger infaust als die malignen Masern.

In einzelnen Epidemien besteht eine 3. ungünstige Verlaufsart in der Entwicklung einer nekrotisierenden Pneumonie.

Die Abheilungsperiode ist die Zeit der lokalen Komplikationen, namentlich bei geschwächten, skrofulösen und rachitischen Kindern, sie verraten sich meist durch Ausbleiben der Entfieberung: Otitis media

(Pneumococcen) ist häufig, sie wird oft chronisch; ferner Capillarbronchitis mit oder ohne anschließende Bronchopneumonie, bei debilen Patienten beides oft letal; schwere Conjunctivitis eventuell mit konsekutiver Ophthalmie; Stomatitis aphthosa, bisweilen mit Geschwüsterbildung verbunden, führt in seltenen Fällen zu Noma mit schwerster ausgedehnter Gangrän. Vorübergehende blutig-schleimige Diarrhöen zur Zeit der Krise sind nicht selten und harmlos, ausnahmsweise entwickelt sich ein schweres typhöses Syndrom. Nephritis ist sehr selten. Desgleichen primäre Herzaffektionen. Sehr ernste Komplikationen namentlich bei jungen elenden Kindern sind: Diphtherie, Keuchhusten und Tuberkulose infolge der, für Masern charakteristischen verminderten Widerstandsfähigkeit.

Diphtherie tritt oft als primärer Kehlkopfgroup unter Überspringung des Rachens auf, wird deshalb leicht übersehen (!). Pertussis begünstigt Komplikationen des Respirationsapparates. Der Tuberkulose gegenüber besteht oft sehr geringer Widerstand (die Pirquetsche Cutanreaktion auf Tuberkulin wird während der Masern negativ!), so daß es oft zu Miliartuberkulose kommt.

**Diagnose:** Das uncharakteristische katarrhalische Stadium wird oft verkannt. Die Koplikschen Flecken werden 1—2 Tage, das Exanthem 1 Tag vor dem Exanthem beobachtet. Nach Ausbruch des charakteristischen Ausschlages ist die Diagnose in der Regel leicht. Masernähnliche Exantheme kommen nach Medikamenten (Veronal, Aspirin u. a.) und Serum sowie bei anderen Infektionskrankheiten, so als Initial-exanthem bei Fleckfieber und Pocken, ferner bei Trichinose, Paratyphus, epidemischer Meningitis vor<sup>1</sup>). Diagnostisch sehr wichtig ist das Blutbild:

Neutrophile Leukocytose mit Vermehrung der Eos. während der Inkubation, gegen deren Ende eine Leukopenie beginnt mit Max. am 2. Tage des Exanthems sowie Verminderung bzw. Fehlen der Eos., oft einzelne Myelocyten; Leukocytose bei Komplikationen; in der Rekonvaleszenz normale Leukocytenwerte mit postinfektiöser Eosinophilie.

**Therapie:** Schutz vor Erkältung auch während der Abheilungsperiode (!); Zimmertemperatur 18°. Feuchthalten der Luft durch feuchte Tücher, Bronchitiskessel, Spray. Die Conjunctivitis erfordert Dämpfung des Tageslichtes. Bettruhe 2—3 Wochen; das Abheilungsstadium ist erst mit Schwinden der Bronchitis beendet; Verlassen des Zimmers nicht vor 3—4 Wochen erlaubt. Bei heftigem Husten 3—4mal täglich 1 Teelöffel von 0,005—0,02 Codein phosphor. auf 50,0 Ipecacuanhasyrup. Strenge Abspernung gegen Diphtherie, Keuchhusten und Tuberkulose, gegen letztere noch  $\frac{1}{4}$  Jahr nach der Krankheit.

Bei schwerer Conjunctivitis Augenlider einreiben mit Hydrarg. oxydat. flav. 1:25 Ugt. paraffin., eventuell Pinseln mit 0,5—1% Höllensteinlösung. Bei heftiger Rhinitis ist ein Pulver von Menthol 0,5, Zinc. sozodol. 1,0—2,0, Sach. lact. ad 20,0 dreimal täglich einzublasen. Bei Otitis Carbolglycerin, Paracentese, Zuziehung eines Otologen wegen Operation. Bei schwerer Laryngitis Breiumschläge, Jodpinselung, Senfpflaster, Blutegel. Bei Capillarbronchitis und Pneumonie: 3—4mal täglich Prießnitz und Schwitzen (Fliedertee, Brusttee), bei schweren Zuständen

<sup>1</sup>) Bei Erwachsenen kann bisweilen die erste Maserneruption im Gesicht durch ihre Knötchenform an Pocken erinnern.



vor allem Senfpackungen und kalte Übergießungen in Halbbad von 34°. Bei Herzschwäche Campher, Coffein. Bei bloßem Diphtherieverdacht sind sofort 3000—5000 I. E. Diphtherieheils Serum zu injizieren.

Eine Verhütung der Ausbreitung der Krankheit (Schulen, Internate) ist meist unmöglich. Die Isolierung ist notwendig, dagegen ist strenge Quarantäne sowie Desinfektion und Schutzkleidung überflüssig. Das Krankenzimmer ist unmittelbar, nachdem es der Patient verlassen hat, nicht mehr infektiös.

### Rubeolen (Röteln).

Rubeolen sind eine von den Masern verschiedene Infektionskrankheit. In der Regel werden Kinder zwischen 2 und 10 Jahren befallen. Die Krankheit ist stets sehr leicht und immer gutartig, sie wird daher oft außer Bett überstanden und zeigt niemals Komplikationen oder Nachkrankheiten.

**Krankheitsbild:** Inkubation 15 bis 20 Tage, meist 17 bis 18 Tage. Das Exanthem tritt am ersten Tage auf und ist masernähnlich, es besteht aus einzelnen in der Regel blaßroten, meist nicht konfluierenden Efflorescenzen, die im Gegensatz zu Masern kleinfleckiger und nicht so zackig begrenzt sind; sie treten am Kopf (das Kinn bleibt nicht frei!), Rumpf und Extremitäten auf und verschwinden wieder nach 2—4 Tagen. Leichte Temperatursteigerung besteht für 1—2 Tage, sie fehlt bisweilen ganz und erreicht nur selten 39°.

Geringe Lichtscheu, Schnupfen und Husten (Laryngitis) kommen vor; dagegen sind Kopliksche Flecken nicht vorhanden. Die Diazoreaktion fehlt fast stets, ebenso eine stärkere Abschuppung.

Charakteristisch sind die Schwellung der Occipital-, Nuchal-, Auricular- und Cubitallymphdrüsen sowie ferner das Blutbild: die Eosinophilen sind im Gegensatz zu Masern nicht vermindert, außerdem besteht während des Ablassens des Exanthems eine Plasmazellenlymphocytose. Die Leukocytenzahl ist wechselnd, teils vermindert, teils vermehrt.

Die Milz ist bisweilen etwas vergrößert; gelegentlich kommt Herpes facialis vor.

**Diagnose:** Abgesehen von den oben genannten charakteristischen Zeichen ist es für die Diagnose von Bedeutung, ob das Kind Masern bereits überstanden hat. Das Exanthem, das am ersten Krankheitstage (bei Scharlach am zweiten, bei Masern erst am dritten bis vierten) auftritt, kann sowohl scharlach- wie masernartig sein, gelegentlich ist es punktförmig, selten treten kleine Bläschen auf.

### Rubeola scarlatinosa (Vierte Krankheit, Filatow-Dukesche Krankheit).

Während die Röteln durch ein masernartiges Exanthem ausgezeichnet sind, wurde als „Vierte Krankheit“ ein den Röteln ähnliches Krankheitsbild beschrieben, das von einem scharlachartigen Ausschlag begleitet ist. Die Inkubationsdauer beträgt 9—20 Tage. Prodromalsymptome fehlen. Die Allgemeinerscheinungen und das Fieber sind

gering. Das Exanthem, das sich schnell über den ganzen Körper ausdehnt, ist blasser als bei Scharlach, besteht aber wie bei diesem aus kleinen Stippchen, auch läßt es ebenfalls die Mundpartie frei. Katarrhalische Angina, Bindehautkatarrh und bisweilen eine universelle Lymphdrüenschwellung kommen vor. Der Ausschlag, der höchstens drei Tage besteht, hinterläßt eine geringe kleienförmige Schuppung. Komplikationen sind nicht bekannt. Die Verschiedenheit der Krankheit vom Scharlach wird aus dem Fehlen eines Schutzes gegen eine spätere Scharlacherkrankung gefolgert. Trotzdem wird zur Zeit die Selbständigkeit der Vierten Krankheit von mancher Seite in Zweifel gezogen.

### Pocken (Variola, Blattern).

Die Pocken sind eine sehr ansteckende Krankheit und gehören zu den gefährlichsten Seuchen, die in früheren Zeiten sehr zahlreiche Opfer auch in Europa forderten, während sie heute aus den zivilisierten Ländern fast ganz verschwunden sind. Die gelegentlich in Westeuropa vorkommenden sporadischen Fälle beruhen ausnahmslos auf Einschleppung aus anderen Ländern, in Deutschland meist aus dem Osten und dem Balkan. Der Ausbruch von Epidemien fällt meist in die Winterzeit.

Der Erreger ist unbekannt; er ist flüchtig und stellt ein filtrierbares Virus dar, das sich ähnlich dem Scharlachvirus durch sehr große Tenazität auszeichnet. Durch die Fähigkeit, an Gegenständen (Kleidern usw.) haftend lange Zeit virulent zu bleiben, erklärt sich zum Teil der hochgradig kontagiöse Charakter der Pocken. Die Übertragung erfolgt durch den Kontakt von Mensch zu Mensch, ferner durch die Luft sowie durch Gegenstände. Das Virus ist auf Tiere übertragbar (Kuhpocken s. unten). Die Disposition zur Krankheit ist eine sehr große, kein Lebensalter ist gegen Pocken geschützt. Überstehen der Krankheit hinterläßt dauernde Immunität.

**Krankheitsbild:** Inkubation 13 Tage. Prodromalerscheinungen fehlen. Die Krankheit beginnt plötzlich mit Schüttelfrost, schwerem Krankheitsgefühl, Glieder- und namentlich auffallend starken Kreuzschmerzen, Erbrechen sowie hohem Fieber. Gleichzeitig, häufiger am zweiten Tage zeigt sich ein Ausschlag (sog. **Initialexanthem** oder Rash), der vom eigentlichen Pockenexanthem verschieden meist scharlach- oder masernähnlich (oft beides kombiniert), bisweilen petechial ist und mit Vorliebe die Außenseite der Unterschenkel, die Innenfläche der Oberschenkel, namentlich das Schenkeldreieck, ferner die seitlichen Bauch- und Brustpartien, die Umgebung der Achselhöhlen und die Streckseiten der Arme befällt. Der Puls ist stark beschleunigt. Oft besteht eine Angina ohne Beläge, ferner Bronchitis sowie meist Milzvergrößerung. Das Exanthem verschwindet wieder schnell innerhalb 24 Stunden (ausgenommen der petechiale Ausschlag). Am dritten Tage sinkt das Fieber rasch unter gleichzeitigem Nachlassen der allgemeinen Beschwerden.

Nun beginnt die **zweite Krankheitsperiode** mit dem Ausbruch des spezifischen Pockenausschlages. Er beginnt fast stets am Kopf (Stirn, behaarte Kopfhaut) in Form kleiner Flecken, die sich bald in etwas prominente Knötchen verwandeln und sich auf den Rumpf, die Arme und schließlich die Beine ausbreiten. Am dichtesten sind sie im Gesicht und an den Handrücken. Während dieses papulösen Stadiums erinnert der Ausschlag an ein Masernexanthem. Bald verwandeln sich die Papeln in Bläschen, deren Inhalt sich eitrig trübt; am 9. Krankheitstage sind die eitrigen Pockenpusteln voll entwickelt. Bei der *Variola discreta* bleiben die Pusteln voneinander isoliert.

Die einzelne Pocke zeigt eine zentrale Delle, den sog. Pockennabel, und einen roten, infiltrierten Hof; sie ist mehrkammerig, so daß beim Anstechen nur ein Teil des Inhaltes ausläuft. Auch die Schleimhäute werden von den Eruptionen befallen, die hier alsbald zu Geschwürsbildung führen, so in Mund, Nase, Rachen, Speiseröhre, Kehlkopf, Trachea, Bronchien sowie an den Genitalien.

Mit dem Beginn der Vereiterung steigt das Fieber von neuem stark an (Suppurationsfieber), es bestehen oft heftige Delirien und der Allgemeinzustand ist überaus schwer. Der Kopf und ausgedehnte Teile des übrigen Körpers sind mit Pusteln übersät, am dichtesten sind sie im Gesicht und an den Händen; die Augen sind geschwollen; bisweilen kommt es auf der Bindehaut der Augen zu Pustelbildung. Die Haut verursacht schmerzhaftes Brennen, das Schlucken ist erschwert, oft ist Heiserkeit sowie die Gefahr des Glottisödems vorhanden. Manchmal entwickelt sich eine Perichondritis laryngea. Bei Konfluieren der Pusteln (*Variola confluens*) entstehen mitunter große eitrig-flächenartige Abscesse, an die sich phlegmonöse Prozesse, Gangrän, Erysipel infolge von Mischinfektionen anschließen, die ihrerseits zu einer Sepsis führen können. Oft entwickelt sich schwerer Decubitus. Heftige Durchfälle sind nicht selten. Ferner wird Perikarditis, seltener Endokarditis beobachtet. Auch Pneumonien kommen vor, oft ferner eine Otitis media. Albuminurien mäßigen Grades sind häufig vorhanden, seltener eine Nephritis.

Im Blut besteht eine Leukocytose mit charakteristischer relativer Vermehrung der Mononucleären, auch beobachtet man oft Myelocyten, Reizungsformen und Normoblasten.

Das **dritte Stadium** ist das der *Exsiccation*, die Pusteln trocknen unter Borkenbildung gegen den 12. Tag, zuerst im Gesicht ein, Schmerzen und Fieber lassen nach und es entsteht starker Juckreiz.

Während der bei Fehlen von Komplikationen etwa 3–4 Wochen dauernden Rekonvaleszenz kommt es langsam zur Abstoßung der Borken, die zurückbleibenden Pigmentflecke verschwinden nach einigen Monaten, während die durch die Eiterung bedingten charakteristischen Pockennarben dauernd bestehen bleiben. Oft erfolgt starker Haarausfall.

**Besondere Verlaufsformen:** Die sog. *Variolois* ist eine abgeschwächte Form, unter der die Pocken häufig namentlich in Ländern auftreten, wo die Schutzimpfung (s. unten) Anwendung findet. Während das Initialstadium auch hier oft ebenso schwer wie bei *Variola vera* ist, ist

der weitere Verlauf nach Intensität und Dauer leichter, die Zahl der Eruptionen ist wesentlich geringer, auch kommt es oft nicht zur Eiterung, und das Fieber sowie die Allgemeinerscheinungen sind milder, die Exsiccation beginnt oft schon nach ca. einer Woche. — Besonders bössartig sind die sog. hämorrhagischen Pocken (schwarze Blattern), bei denen die einzelnen Pusteln Blutungen zeigen (*Variola haemorrhagica pustulosa*). Ganz infaust ist jene Form, bei der sich schon im Initialstadium zahlreiche, sich rasch ausdehnende Hauthämmorrhagien zeigen, zu denen sich Blutungen in die Schleimhäute und die inneren Organe als Zeichen einer allgemeinen hämorrhagischen Diathese hinzugesellen. Diese *Purpura variolosa* endet, bevor es überhaupt zur Pockenbildung kommt, ausnahmslos vor Ablauf der ersten Woche tödlich.

Die Mortalität der Pocken beträgt 15—30%.

**Diagnose:** Die *Variola vera* mit voll ausgebildetem Bläschenauschlag bietet ein nicht zu verkennendes charakteristisches Bild dar. Diagnostische Schwierigkeiten kommen dagegen im Initialstadium der Pocken sowie bei Variolois in Betracht. Eine verhängnisvolle Verwechslung des Initialerxanthems mit Scharlach oder Masern kommt bisweilen vor. Sie läßt sich vermeiden bei Berücksichtigung der Lokalisation des Ausschlages, eventuell seiner Kombination aus mehreren Exanthemformen, ferner auf Grund des Fehlens der charakteristischen Begleiterscheinungen bei Scharlach und Masern (Scharlach-Angina; bei Masern Kopliksche Flecken, Katarrh der oberen Luftwege, Leukopenie usw., vgl. S. 17); andererseits sprechen die viel schwereren Allgemeinerscheinungen, namentlich die sehr heftigen Kreuzschmerzen für Pocken. Die zunächst eventuell schwierige Unterscheidung von Fleckfieber ist praktisch deshalb nicht von so großer Bedeutung, weil in diesen Fällen schon ohnehin sofort eine strenge Isolierung des Kranken zu erfolgen hat und die weitere Beobachtung den Fall bald aufklärt. Für das pustulöse Stadium der Pocken ist bezeichnend, daß sämtliche Efflorescenzen das gleiche Entwicklungsstadium zeigen. Variolois ähnelt oft den Variellen. Ihre Unterscheidung s. S. 26. Die Efflorescenzen bei *Impetigo contagiosa* haben nur eine entfernte Ähnlichkeit mit den Pocken. Dagegen ist die Abgrenzung gegenüber manchen luetischen Exanthemen (vesiculöse und pustulöse) in ernstere Erwägung zu ziehen. Abgesehen von der Wassermannschen Reaktion ist hier vor allem das Nebeneinandervorkommen verschiedener Stadien der Efflorescenzen charakteristisch.

Von großer diagnostischer Bedeutung ist der Nachweis der sog. Guarnierischen Körperchen in dem Epithel einer Pockenpustel. Es sind dies rundliche, mit Kernfarbstoffen sich färbende Zelleinschlüsse in der Nachbarschaft des Kerns, die früher als die Variolaerreger angesehen, jetzt als bloße Reaktionsprodukte der Zelle gelten.

Sie finden sich auch in den durch künstliche Übertragung von Pockenpustelinhalt auf die Cornea von Kaninchen erzeugten Epithelwucherungen der Hornhaut, die dieselben bei Fixation der Cornea in Sublimatalkohol schon 24 Stunden nach der Impfung als makroskopisch sichtbare Trübungen erkennen läßt

(Paulsches Verfahren). Jedoch beobachtet man mitunter Versager. Es genügt übrigens, zur Ausführung der Probe Objektträger, die mit reichlichem frischen Pustelinhalt eines Kranken beschickt und getrocknet sind (keine Fixation durch Hitze oder chemische Mittel!), an das nächste Untersuchungsinstitut zu senden.

Schließlich ist in Ländern, in denen die Schutzpockenimpfung geübt wird und daher Pockenfälle zu den Seltenheiten gehören, bei verdächtigen Krankheitsfällen zu eruieren, ob die Möglichkeit einer Ansteckung bestand bzw. ob ein Zusammenhang mit auswärtigen Infektionsquellen nachweisbar ist (z. B. auch in Form von Postsendungen aus verseuchten Gebieten).

**Therapie:** Die rein symptomatische Behandlung besteht namentlich bei den schwereren Fällen in Milderung der Beschwerden seitens der Haut durch feuchte Umschläge bzw. Einfetten der Haut mit Borvaseline; zweckmäßig sind oft auch warme Dauerbäder. Sehr sorgfältig ist auf Komplikationen der Augen, sowie auf Vorbeugung von Decubitus zu achten. Bei heftigem Kopfschmerz sind eine Eisblase auf den Kopf, sowie Sedativa (Brom, Pantopon), bei Kreislaufschwäche frühzeitig Campher und Coffein anzuwenden. Neuerdings wurde günstiger Einfluß auf den Hautprozeß durch Anwendung von Rotlicht, sowie durch Pinseln der Haut mit Kaliumpermanganat beobachtet. Gegen das Kratzen der Haut infolge des heftigen Juckreizes sind die Hände einzuwickeln bzw. bei Kindern die Arme anzubinden. Der Rekonvaleszent darf erst nach völliger Abstoßung der Schorfe und darauffolgendem Reinigungsbad als nicht kontagiös gelten.

Die **Prophylaxe** besteht vornehmlich in der Anwendung der durch Jenner inaugurierten Schutzpockenimpfung. Sie beruht auf der Tatsache, daß das Pockenvirus sich auch auf Tiere, z. B. die Kuh (= vacca, daher „Vaccination“) übertragen läßt und dadurch eine dauernde Abschwächung erfährt, ohne seine immunisierende Fähigkeit zu verlieren. Übertragung der Flüssigkeit aus den Bläschen der Kuhpocken (sog. Pockenlymphe) auf den Menschen erzeugt nur eine leichte lokale Erkrankung, die sog. Impfpocken, die ihrerseits aber einen wirksamen Schutz gegen die echten Pocken bewirken. In Deutschland ist der Impfwang durch das Reichsimpfgesetz eingeführt.

Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist jedes Kind zum 1. Male vor Ablauf des auf sein Geburtsjahr folgenden Kalenderjahres, zum 2. Male jeder Zögling einer öffentlichen Lehranstalt oder Privatschule im Laufe des 12. Lebensjahres zu impfen, wofern nicht infolge Überstehens der Pocken oder wegen Erkrankung des Kindes (Skrofulose, Ekzeme usw.) vom Arzt Dispens erteilt wird. Die Impfung, die nur von einem Arzt ausgeführt werden darf, geschieht unter aseptischen Kautelen nach Säuberung der Haut mit Wasser und Seife (kein Desinfektionsmittel!) mit Hilfe einer sterilisierten Impflanzette, die mit etwas Kuhpockenlymphe beschickt wird. Letztere wird in einer Impfanstalt von Kälbern gewonnen. Es werden an dem einen Oberarm, bei der ersten Impfung am rechten, bei der zweiten am linken in einer Längsrichtung vier ganz oberflächliche, nicht blutende Schnitte von höchstens 1 cm Länge und mindestens 2 cm voneinander entfernt angelegt. Nach 2—3 Tagen zeigen die Impfstellen Rötung und Infiltration, sowie bald darauf Entwicklung von Bläschen, die sich am 7.—8. Tage in die typischen Pockenpusteln verwandeln. Während der Vereiterung besteht oft geringe Lymphdrüenschwellung sowie bisweilen etwas Fieber. Zwischen dem 10.—12. Tag erfolgt die Eintrocknung. Bei der vom Arzt am 8. Tage vorzunehmenden „Nachschau“

gilt eine Erstimpfung als erfolgreich bei voller Entwicklung von mindestens einer Impfpustel, bei der Wiederimpfung genügt hierfür schon die Entwicklung von Knötchen oder Bläschen an den Impfstellen. Bei erfolgloser Impfung ist dieselbe spätestens im nächsten Jahre und bei erneuter Erfolglosigkeit im dritten Jahre zu wiederholen. Bei Pockengefahr ist eine erneute Impfung vorzunehmen, da die Dauer des Impfschutzes sich nur auf etwa 10 Jahre erstreckt. Daraus erklärt sich ferner, daß bei gegebener Infektionsmöglichkeit vor allem ältere Individuen erkranken. Auch hier aber tritt die Nachwirkung der Schutzimpfung meist noch durch den milderen Verlauf der Erkrankung zutage.

Die von den Impfgegnern geltend gemachten Einwände bezüglich der Gefahren der Pockenimpfung sind gegenstandslos geworden seit ausschließlicher Verwendung von Tierlymphe und Abschaffung der Verwendung menschlicher Lymphe, durch welche gelegentlich Krankheiten, vor allem Syphilis übertragen wurden. Die selten beobachteten Erysipele lassen sich durch peinlich aseptische Methodik beim Impfen und sorgfältiges Sauberhalten der Impfstellen vermeiden (Impferysipel s. S. 29). Kinder mit Hautkrankheiten usw. (s. oben) sind von der Impfung auszuschließen, da es hier zu einer generalisierten Aussaat der Vaccine kommen kann, die mit schweren Krankheitserscheinungen einhergeht. Der eklatante Rückgang der Pockenerkrankungen in allen die Pockenimpfung ausübenden Staaten sowie das schnelle Erlöschen von Pockenerkrankungen nach Einschleppung aus anderen Ländern ist ein unwiderleglicher Beweis für den glänzenden Erfolg der Impfung.

### Varicellen (Schafblattern, Wind- oder Spitzpocken).

Von Varicellen werden in erster Linie Kinder bis zu 10 Jahren befallen. Erwachsene erkranken nur sehr selten, da sie meist als Kinder die Krankheit überstanden haben. Der Erreger ist unbekannt. Er ist sicher vom Pockenerreger verschieden.

**Krankheitsbild:** Inkubationsdauer 14—21 Tage. Prodromalerscheinungen fehlen. Die Krankheit beginnt mit einem Ausschlag, der bisweilen unter starkem Juckreiz sich schnell über den ganzen Körper ausbreitet, in den ersten Stunden aus kleinen bis zu linsengroßen, zum Teil etwas erhabenen, roten Flecken besteht, die sich sehr schnell in kleine Bläschen umwandeln. Es besteht geringes Fieber, das aber auch fehlen kann. Nach Ablauf eines Tages erfolgt Rückbildung und Eintrocknung der Bläschen, welche Narben nicht hinterlassen. In den nächsten Tagen kommt es meist schubweise zum Aufschließen neuer Papeln und Bläschen, so daß um diese Zeit gleichzeitig frische Bläschen neben abheilenden Efflorescenzen vorhanden sind. Auch auf den Schleimhäuten (Mund, Kehlkopf, Auge, Vulva) können sich Bläschen entwickeln. Selten kommt eine Roseola ohne Bläschen vor.

Das Blut zeigt bei Varicellen keine charakteristischen Veränderungen.

Der Krankheitsverlauf ist fast immer leicht; schwerer ist die gangränöse Form, die bei dekrepiden Kindern mitunter beobachtet wird; gefährlich sind die seltenen hämorrhagischen Varicellen. Als Komplikation kommt hämorrhagische Nephritis vor, die sich bis 14 Tage nach Beginn des Exanthems einstellen kann und meist gutartig verläuft.

Eine bestehende Tuberkulose wird oft sehr ungünstig beeinflusst, weshalb solche Kinder vor Windpockeninfektion zu schützen sind.

**Diagnose:** Sehr wichtig ist die Unterscheidung von Variola bzw. Variolois. Von Bedeutung ist das Alter des Patienten, die Berücksichtigung der letzten Pockenimpfung sowie die Tatsache einer Varicellen-erkrankung in der Kindheit (erneute Erkrankung ist äußerst selten). Bei Pocken sind regelmäßig Prodromalerscheinungen vorhanden (bei Varicellen nur ganz ausnahmsweise scarlatinöser Rash), ferner zeigen die Efflorescenzen im Gegensatz zu Windpocken sämtlich das gleiche Stadium. Guarnierische Körperchen sowie zurückbleibende Narben werden bei Varicellen nicht beobachtet (allerdings können bei letzteren einzelne Bläschen, wenn sie vereitern, Narben hinterlassen). Wichtig ist schließlich auch die kurze Dauer der flüchtigen Windpockenefflorescenzen sowie das Fehlen von Blutveränderungen.

**Therapie:** Betruhe bis zur völligen Abheilung der Efflorescenzen (Kontrolle des Urins!) und Hautpflege (Zinkpuder, essigsaurer Tonerde, eventuell gegen Juckreiz Ichthyolsalbe); Verhütung von Sekundärinfektionen namentlich auch an den Genitalien.

### Fleckfieber (Exanthematischer Typhus).

Das Fleckfieber ist eine akute, epidemisch (vor allem im Winter) auftretende, sehr gefährliche Infektionskrankheit, die sich unter ungünstigen hygienischen und sozialen Bedingungen entwickelt und verbreitet (Krieg, Landstreicher, Asylisten). Der Erreger ist noch unbekannt, doch ist die obligate Rolle der Kleiderlaus für die Übertragung sichergestellt. Die völlige Beseitigung der Läuse bringt jede Epidemie mit Sicherheit zum Erlöschen.

**Krankheitsbild:** Inkubation 12 Tage (bis 3 Wochen). Der Beginn erfolgt plötzlich mit Schüttelfrost, hohem Fieber und schweren Störungen des Allgemeinbefindens, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen. Bei einem Teil der Kranken besteht eine sehr charakteristische Rötung und Gedunsenheit des Gesichtes mit Conjunctivitis und Lichtscheu, oft ferner Angina sowie Laryngitis mit Heiserkeit; sehr häufig ist Bronchitis, bisweilen mit stärkerer Dyspnoe vorhanden. Milzvergrößerung besteht schon in den ersten Tagen, zuweilen ferner Herpes.

Unter weiterem Ansteigen der Temperatur tritt zwischen dem 3. und 5. Tage ein Exanthem auf, das sich innerhalb von 2 Tagen über den ganzen Körper — das Gesicht ausgenommen — ausdehnt, insbesondere auch Handteller und Fußsohlen zum Unterschied von Typhus nicht verschont, ferner keine Nachschübe zeigt. Es sind kleine, nicht erhabene, blaßrote, später bräunliche Flecke, die in den folgenden Tagen oft kleine Blutungen im Zentrum aufweisen und sich jetzt nicht mehr wegdrücken lassen. Außerdem treten oft noch daneben Petechien oder größere Hämorrhagien auf. Unter Weiterbestehen der Continua mit frequentem weichen Puls nimmt die Schwere des Allgemeinzustandes unter stärkerem Hervortreten namentlich der nervösen Erscheinungen

zu: lebhaft motorische Unruhe und Bewegungsdrang, Delirien und Wahnvorstellungen, hochgradige Agrypnie, in leichteren Fällen quälende Unruhe. Unter Ausbreitung der Bronchitis entstehen oft Pneumonien, ferner kann sich eine Perichondritis am Kehlkopf entwickeln. Blut: Meist mäßige Leukocytose mit Vermehrung der Polynucleären, letzteres auch bei Verminderung der Leukocytenzahl, Fehlen der Eosinophilen. Ende der 1. Woche agglutiniert das Serum bestimmte Proteusbacillen (Weil-Felixsche Reaktion).

Gefahren in der 2. Woche sind Kreislaufschwäche, ferner Zunahme der nervösen Erscheinungen bis zum Koma sowie Pneumonien. Eine günstige Wendung erfolgt in der Regel gegen Ende der 2. Woche (12. Tag) mit lytischer Entfieberung in wenigen Tagen. Doch bleiben oft noch eine gewisse Benommenheit, mitunter sogar Wahnvorstellungen eine Zeit lang zurück. Eine feine zum Teil kleienartige Schuppung ist oft vorhanden. Nicht selten besteht zentrale Schwerhörigkeit. Neurasthenische Symptome, abnorm starke Ermüdbarkeit, Zittern, Schwächegefühl, Steigerung der Patellarreflexe und vor allem Unfähigkeit zu geistiger Konzentration bleiben auffallend lange, oft viele Monate bestehen.

**Besondere Verlaufsarten:** Der Verlauf des Fleckfiebers ist bei Kindern meist ganz leicht und nimmt in der Regel mit zunehmendem Alter entsprechend der damit verbundenen stärkeren Reaktionsfähigkeit des Großhirns, dem Hauptangriffspunkt für das Virus, an Schwere zu. Epidemiologisch sehr wichtig sind abortive Fälle mit flüchtigem bzw. rudimentärem Exanthem. Die feudroyante, schnell tödlich verlaufende Form ist durch das Auftreten zahlreicher Hämorrhagien schon in den ersten Tagen gekennzeichnet.

In Nordamerika kommt eine leichte Form des Fleckfiebers als sog. Brillsche Krankheit vor.

**Komplikationen:** Thrombosen, Gangrän an den Füßen sowie der Nasenspitze, zentrale und periphere Lähmungen (Babinski usw.), Meningismus.

**Pathologisch-anatomisch** sind knötchenförmige Infiltrate an den kleinsten Arterien der verschiedensten Organe mit partieller Wandnekrose und Verlegung des Lumens charakteristisch.

**Diagnose:** Bezeichnend ist der akute Beginn, das Aussehen des Gesichtes („Kaninchenaugen“), das frühe Auftreten des Exanthems (bei Typhus erst vom 9. Tage), das Vorhandensein von Effloreszenzen an Handtellern und Fußsohlen, das Fehlen von Nachschüben des Exanthems sowie der Blutbefund (s. oben). Die Weil-Felixsche Reaktion ist vom Anfang der 2. Woche verwertbar. Bei ausnahmsweise großfleckigem Exanthem hat man sich vor Verwechslung mit Masern, Paratyphus und eventuell dem Initial-Rash der Pocken zu hüten.

Die **Prophylaxe** gelingt in geradezu idealer Weise durch Bekämpfung der Läuseplage. Im Gegensatz zur ungefährlichen Inkubationszeit und der ersten Krankheitswoche kommt für die Übertragung der Krankheit durch Läuse hauptsächlich erst die 2. Woche in Betracht.



Die Laus vermag erst 5 Tage nach dem Saugen von Fleckfieberblut die Krankheit zu übertragen; auch die junge Brut von infizierten Läusen ist infektionstüchtig. Bei der Bekämpfung der Kleiderlaus ist zu berücksichtigen, daß die Laus, die zum Leben menschliches Blut braucht, ohne dasselbe in 5 bis 6 Tagen stirbt; da die junge Brut aus den Nissen nach ca. 5 Tagen ausschlüpft, so genügt zur Vernichtung der Läuse in Kleidern das Aufbewahren derselben in geschlossenen Räumen in der Wärme 14 Tage lang. Außerdem tötet strömender Wasserdampf innerhalb  $\frac{1}{2}$  Stunde die Tiere. Entlausung des menschlichen Körpers: Sabadillesig- bzw. Perubalsam-Kappe für den Kopf, Hg-Salbe für Achsel- und Schamhaare; Haare kurz schneiden und rasieren.

Sicher entlauste Fleckfieber-Kranke können ohne jede Gefahr mit anderen Kranken in demselben Raum gepflegt werden. Nach dem Reichsseuchengesetz ist bei Fleckfieber schon der Verdacht meldepflichtig.

Die **Prognose** hängt vor allem vom Alter des Patienten bzw. vom Zustand seines Nervensystems ab. Differenziertere und abgebrauchte Gehirne führen zu schwereren Krankheitsbildern als solche von jugendlichen oder geistig weniger entwickelten Individuen (Kinder, Naturvölker). Mortalität 2,5–30%. Sehr ausgedehnte, ferner stark hämorrhagische Exantheme sowie stärkeres Koma trüben die Prognose.

Die **Therapie** ist im wesentlichen die gleiche wie bei anderen schweren Erkrankungen ähnlicher Art (vgl. Typhus S. 39). Spezifische Heilmittel gibt es nicht. Sehr wichtig ist die dauernde Überwachung der Kranken mit Rücksicht auf ihre geistige Verwirrung.

### Erysipel (Wundrose).

Das Erysipel ist eine durch Streptococcen verursachte akute Infektionskrankheit, die sich in einer scharf umgrenzten, zum Fortschreiten neigenden flächenhaften Entzündung der Haut bzw. der Schleimhäute äußert und nach der Abheilung in der Regel keine Residuen hinterläßt.

Notwendige Voraussetzung für die Erkrankung ist eine Kontinuitätstrennung der Haut, z. B. Rhagaden, Operationswunden, ferner die Nabelwunde usw. Auch das „idiopathische Erysipel“ ist tatsächlich demnach traumatischen Ursprungs.

Der Erysipelstreptococcus vermag auf andere Individuen übertragen Phlegmonen usw. zu erzeugen und umgekehrt. Die Erkrankung setzt eine individuelle Disposition voraus und hinterläßt keine Immunität, sondern erhöhte Disposition mit der Neigung zu Rezidiven bzw. „habituellem Erysipel“. Jugendliche Personen, ferner geschwächte und marastische Individuen (Carcinome, Ödemkranke, Ulcus cruris) werden mit Vorliebe befallen.

**Histologisch** besteht eine mit kleinzelliger Infiltration einhergehende Entzündung des Coriums mit zahlreichen, hauptsächlich in den Lymphspalten, weniger in den Blutcapillaren nachweisbaren Streptococcen.

**Krankheitsbild:** Inkubation einige Stunden bis 3 Tage. Die Krankheit beginnt mit Schüttelfrost, hoher Temperatur bis 41°, oft mit gleichzeitigem Schweißausbruch sowie Erbrechen und umschriebener Rötung, Schwellung und Spannung eines Hautbezirkes. Am häufigsten

ist das Erysipel des Gesichtes (Rhagaden infolge von Rhinitis, Blepharitis, Ekzeme) und des Kopfes (Kratzeffekte bei Ungeziefer). Die Grenze der geröteten Partie ist meist etwas erhaben und greift mit zungenförmigen Ausläufern, den „Fackeln“, ins Gesunde über. Subjektiv besteht Spannungsgefühl, Brennen und Schmerz. Die Ausbreitung der Entzündung erfolgt oft im Verlauf von Stunden und schreitet besonders in locker gewebten Hautbezirken vorwärts, umgeht dagegen straffere, wie z. B. die Nasolabialfalte, die Leistenbeuge, die Tibiakante usw. Stets ist eine Schwellung der regionären Lymphdrüsen vorhanden. Oft beobachtet man eine Entwicklung von Bläschen, gelegentlich auch von Eiterpusteln oder großen Blasen (E. vesiculosum, pustulosum, bullosum). Eine Neigung zu Gangrän, die vor allem bei Säuglingen und Greisen vorkommt, ist besonders gefährlich bei Lokalisation an den Augenlidern.

Die Temperatur ist im weiteren Verlauf stark remittierend, sie geht der Entwicklung der Hautentzündung parallel, fällt bei Stillstand derselben kritisch oder lytisch und dauert nicht selten nur 3 Tage. Starkes Krankheitsgefühl besteht oft nur in den ersten Tagen. Herpes facialis ist oft vorhanden; die Milz ist meist etwas vergrößert. Albuminurie ist fast stets vorhanden, gelegentlich tritt leichter Ikterus auf. Blut: Stets besteht eine Leukocytose, sie geht parallel der Intensität der Erkrankung; anfangs fehlen die Eosinophilen. Die Haut zeigt nach Abheilung starke Abschuppung; die häufig eintretende Alopecie ist nur vorübergehend. Wiederholte Erkrankungen hinterlassen bisweilen chronisches Ödem der Haut, z. B. am Nasenrücken und den Augenlidern oder sogar elephantiastische Veränderungen, so bei Ulcus cruris.

Beachtenswert ist der wiederholt beobachtete günstige Einfluß des Erysipels auf andere Erkrankungen wie Tumoren, chronische Entzündungen, Stoffwechsel- und Geisteskrankheiten.

**Besondere Lokalisation:** Die erysipelatöse Angina mit Rötung, Schwellung der Gaumen- und Rachenschleimhaut und Schluckschmerz tritt gelegentlich als Vorläufer der Gesichtsrose oder im Anschluß an diese auf und wird leicht übersehen; sie kann durch Hinabsteigen zum gefährlichen Glottisödem führen. Bei dem seltenen primären Kehlkopferysipel besteht Schleimhautschwellung und bisweilen eine lackartig blutrote Färbung der Epiglottis. Das Erysipel der Vulva und Vagina zeigt starke Schwellung und Schmerzen an den Genitalien, eventuell mit Erschwerung des Harnlassens. Das Erysipel am Penis neigt zu Blasen- und Nekrosenbildung.

**Verlaufseigentümlichkeiten und Komplikationen:** Bei wiederholten Erkrankungen pflegt der Verlauf milder, die Temperatur niedriger zu werden, sogar fieberloser Verlauf ist möglich (jedoch stets Rectalmessung vornehmen!). Sehr ernst ist das bei geschwächten Individuen vorkommende, große Bezirke des Körpers der Reihe nach befallende Wandererysipel von wochenlanger Dauer. Prognostisch sehr übel ist das Erysipel im Anschluß an Decubitus (besonders bei Typhus). Bei Kindern kommt das Impferysipel als Früherysipel 2—3 Tage, als Späterysipel 5—10 Tage nach der Schutzpockenimpfung vor. Komplikationen seitens

des Herzens (Endokarditis, Perikarditis) sind selten. Die bei schwerem Erysipel nicht häufig auftretende Pneumonie ist besonders als Wanderpneumonie sehr gefährlich. Akute hämorrhagische Nephritis kommt nicht selten vor, sie ist fast stets von guter Prognose. Delirien sind häufig, besonders bei Potatoren. Die gelegentlich vorkommenden Psychosen haben günstige Prognose.

Die **Prognose** ist bei normalem Verlauf fast stets gut, ungünstig dagegen bei sekundärem Erysipel (Carcinom, Marasmus, Decubitus), bei Potatoren und bei Wander-Erysipel. Mortalität 5—12%.

Die **Diagnose** ist in typischen Fällen leicht. Bei anämischen sowie ödematösen Patienten ist die Hautrötung weniger intensiv, sie wird daher leichter übersehen, desgleichen das Erysipel der behaarten Kopfhaut. Das vom Erysipel verschiedene, ihm ähnliche Erysipeloid an den Händen mit Jucken, Brennen und bläulichroten Flecken verläuft ohne Fieber und Drüsenschwellung, findet sich bei Personen, die mit Fleisch, Fisch, Wild und Krebsen viel in Berührung kommen. Milzbrand im Gesicht sowie Rotz können vorübergehend erysipelähnliche Zustände erzeugen.

**Prophylaxe:** Die früher in Hospitälern, Kasernen usw. häufigen Endemien sind seit Einführung der modernen Hygiene und Asepsis verschwunden. Die strenge Isolierung Rosekranker von Patienten mit offenen Wunden, speziell auch Wöchnerinnen, Neugeborenen ist unerlässlich. Im übrigen ist die Infektiosität des Erysipels nicht sehr groß. Notwendig ist eine scharfe Kontrolle des Pflegepersonals einschließlich der Hebammen, durch die bisweilen eine Übertragung erfolgt. Die Behandlung der Eingangspforten des Erysipels (Ekzeme, Rhagaden, Katarrhe) ist oft die beste Prophylaxe.

**Therapie:** Lokal indifferente Salben, ferner Alkoholumschläge, 50%ige Ichthyolsalbe, Jodtinktur, bei starken Schmerzen 10%ige Anästhesin-salbe. Heftpflasterstreifen möglichst straff auf der gesunden Haut in einiger Entfernung vom Rande des Erysipels sind bisweilen von Erfolg, desgleichen Biersche Stauung. Eventuell wiederholt Collargol intravenös (2% 5 ccm). Serumtherapie war bisher erfolglos. Bei Wander-Erysipel permanentes Wasserbad. Bei dekrepiden Individuen ist beizzeiten Digitalis und Coffein anzuwenden.

### **Typhus abdominalis (Unterleibstyphus).**

Der Typhus ist eine epidemisch auftretende Infektionskrankheit, deren Häufigkeit in zivilisierten Ländern unter günstigen hygienischen Verhältnissen heutzutage erheblich abgenommen hat.

Der Erreger, der Eberth-Gaffkysche Bacillus, ist ein plumpes, vermöge zahlreicher Geißeln stark bewegliches, gramnegatives Stäbchen, das von Typhus-Kranken in großer Menge mit Stuhl und Harn ausgeschieden wird. Seine Färbung geschieht am besten mit Löfflerschem Methylenblau. Indessen unterscheidet er sich weder morphologisch noch beim Züchten auf gewöhnlichen Nährböden von den ihm verwandten Vertretern der sog. Typhus-Coligruppe. Eine sichere Unterscheidung zwischen Typhus-, Colibacillen und den biologisch in der Mitte stehenden

Paratyphusbacillen ist nur unter Berücksichtigung folgender Eigenschaften derselben möglich:

	Typhus	Paratyphus	Coli
Vergärung von Zuckeragar mit Säurebildung . . . . .	0	+	+
daher Wachstum auf Lackmus-Milchzuckeragar nach Drigalski-Conradi . . . . .	blau farblos	rot farblos	rot rot
auf Endos Fuchsin-Milchzucker-Agar	unverändert	Fluorescenz u. Gasbildung	Fluorescenz u. Gasbildung
auf Neutralrottraubenzuckeragar . .			
Indolbildung in Bouillon . . . . .	0	0	+
Milchgerinnung . . . . .	0	0	+

Zusatz der genannten Farbstoffe zu dem Nährboden ermöglicht demnach eine scharfe Unterscheidung. Besonders zweckmäßig zum Anreichern der Typhusbacillen in der Praxis sind Gallebouillonröhrchen (Firma Merck), die fertig im Handel zu haben sind. Das steril aus der Vene entnommene Blut wird in ein Galleröhrchen gebracht und dieses eventuell dem nächsten Untersuchungsamt eingesendet. — Gegen Austrocknen ist der Bacillus sehr empfindlich, dagegen hält er sich lange im Feuchten, auch in Eis.

Die Ansteckung erfolgt stets durch Aufnahme von Typhusbacillen in den Verdauungskanal, meist durch infizierte Nahrungsmittel bzw. Wasser oder durch Kontaktinfektion. Am häufigsten tritt der Typhus im Spätsommer und Herbst auf. Überstehen der Krankheit hinterläßt Immunität, wiederholte Erkrankung gehört zu den größten Seltenheiten.

Das Wesen der Typhuserkrankung besteht in einer mit Bakteriämie einhergehenden Erkrankung des lymphatischen Apparates des Verdauungstractus, speziell der Solitärfollikel und der Peyerschen Plaques des Dünndarms sowie der Mesenterialdrüsen (vereinzelt auch der Mediastinaldrüsen). Eine klinisch latent bleibende Lymphombildung in verschiedenen Organen wie Leber, Knochenmark, Nieren usw. ist regelmäßig vorhanden. Die entzündliche Schwellung führt im Darm, seltener in den Drüsen zu Nekrose, die unter Narbenbildung heilt. Die durch das Blut über den ganzen Körper verbreiteten Typhusbacillen werden durch die Galle in den Darm ausgeschieden, zum Teil entleeren sie sich auch aus den Darmgeschwüren in denselben.

**Verlauf der Krankheit:** Inkubation 1—3 Wochen. Während des etwa 1 Woche dauernden Prodromalstadiums machen sich bereits gewisse Störungen des Allgemeinbefindens geltend wie zunehmende Mattigkeit, Kopfdruck, Appetitmangel, Gliederschmerzen, Stuhlverstopfung, bisweilen Nasenbluten, das gelegentlich recht heftig ist. Der Beginn der Krankheit selbst verrät sich durch Temperaturanstieg mit Frösteln und Hitzegefühl; Schüttelfrost ist außerordentlich selten. Das damit eingeleitete „Stadium incrementi“, das meist etwas weniger als eine Woche dauert, ist durch ein langsam von Tag zu Tag fortschreitendes Ansteigen der Temperatur gekennzeichnet, wobei die Störungen des Allgemeinbefindens ebenfalls an Intensität zunehmen. Heftiger Kopfschmerz, Hitzegefühl mit Frösteln sowie starkes Krankheitsgefühl machen die Patienten bald bettlägerig. Objektiv besteht eine dickbelegte, nur an den Rändern und vorn an der Spitze von Belag freie Zunge,

ferner eine Vergrößerung der Milz und ein nur mäßig beschleunigter, oft schon deutlich dikroter Puls.

Diagnostisch sehr wichtig ist der bereits in der ersten Woche zu führende Nachweis von Typhusbacillen im Blut (5 ccm steril mit der Spritze aus der Vene entnommen werden in ca. 10 ccm Gallebouillon gebracht oder als Galleblutagar zu Platten gegossen); die Bakteriämie nimmt im weiteren Verlauf rapid an Intensität ab. — Pathologisch-anatomisch entspricht diesem Stadium eine Schwellung der Solitär-follikel und der Peyerschen Plaques im unteren Dünndarm (Ileum).

Oft treten die Kranken erst am Ende des Initialstadiums beim Übergang in das Höhestadium der Krankheit in ärztliche Beobachtung. Die Temperatur bewegt sich nun als „Continua“ zwischen 39 und 40°. Als neues charakteristisches Symptom tritt um die Mitte der zweiten Woche (9. Tag) auf der Haut des Rumpfes, vor allem des Bauches die Roseola auf, kleine runde, bisweilen etwas erhabene rosenrote, auf Druck mit dem Glasspatel wieder verschwindende Fleckchen, die bei sehr reichlichem Vorhandensein in geringer Zahl auch auf den Extremitäten auftreten können; die einzelnen Efflorescenzen sind flüchtig, sie treten schubweise auf, so daß ältere und neue nebeneinander zu bestehen pflegen. Mitunter hinterlassen sie eine geringe bräunliche Pigmentierung. Infolge wiederholter neuer Schübe kann die Roseola insgesamt bis zu 14 Tage bestehen.

Im Harn ist die Diazoreaktion von der ersten Woche ab positiv (Schüttelschaum rot!), ebenso die Weißsche Reaktion; bei leichten Fällen kann der Diazo fehlen.

Die Kranken sind jetzt meist somnolent oder vollkommen benommen, delirieren und leiden an hartnäckiger Schlaflosigkeit. Das Gesicht zeigt eine diffuse Rötung, bisweilen mit einer Spur Cyanose. Es besteht keinerlei Verlangen nach Nahrung, zum Teil eine Folge der Benommenheit. Die Nase wird infolge von Schleimhautschwellung sehr oft unwegsam, so daß der Mund dauernd offen steht und die Mundhöhle sowie der Rachen austrocknen. Die Lippen und besonders die Zunge zeigen in schweren Fällen, namentlich bei ungenügender Pflege bald bräunliche Verfärbung von lederartigem Aussehen, den sog. fuliginösen Belag. Mitunter findet man kleine Ulcerationen ohne Belag an den Tonsillen und am Gaumen, denen eine Follikelschwellung vorausgeht. Regelmäßig läßt über den Lungen Giemen und Pfeifen eine Bronchitis erkennen, an die sich leicht bei schweren Fällen bronchopneumonische Prozesse in den Unterlappen anschließen, weshalb die Lungen täglich zu untersuchen sind. Der Puls ist stark dikrot und bleibt, namentlich bei kräftigen Individuen hinter der Temperatur zurück, indem er trotz 40° oft 90—100 nicht übersteigt.

Der Leib ist meist aufgetrieben; starken Meteorismus beobachtet man besonders bei schweren Fällen; doch kann er auch vollkommen fehlen. In vielen Fällen — keineswegs in allen — sind jetzt die Stühle diarrhöisch, etwa bis zu 4 täglich, ihr charakteristisches Aussehen, die hellgelbe Farbe und die Schichtung mit krümeligem Bodensatz erinnert an Erbsensuppe. Andere Fälle sind dauernd obstipiert. Stärkere Koliken

pflügen zu fehlen. Anatomisch besteht in der 2. Woche eine Nekrotisierung der geschwollenen Dünndarmfollikel und Plaques.

Eine Milzvergrößerung mäßigen Umfanges ist regelmäßig vorhanden, ihr Nachweis indessen bzw. eine genaue Größenbestimmung bei Meteorismus schwierig oder sogar unmöglich; es spricht dann schon der Nachweis einer Milzdämpfung überhaupt für Vergrößerung. Albuminurie geringen Grades mit einigen hyalinen Zylindern ist sehr häufig; Zeichen von Nephritis mit viel Eiweiß, granulierten Zylindern und Erythrocyten (sog. „Nephrotyphus“) ist selten und prognostisch ungünstig.

Von der zweiten Woche ab zeigt ferner das Serum des Kranken ein diagnostisch wichtiges Verhalten, indem es im Gegensatz zu Normalserum selbst in starken Verdünnungen (1 : 100—1000 und mehr) Typhusbacillen zu Haufen zusammenballt (Agglutinationsreaktion nach Gruber-Widal), was sich sowohl mikroskopisch wie makroskopisch (Fickers Diagnosticum) nachweisen läßt. Besonders wichtig ist dabei das Ansteigen des Agglutinintiters im weiteren Verlauf der Krankheit. Agglutinine sind später oft noch weit über die Rekonvaleszenz hinaus, etwa  $\frac{1}{2}$  Jahr lang nachweisbar.

Sehr charakteristisch ist das Blutbild: nach kurzer Leukocytenvermehrung in den allerersten Tagen kommt es zu ausgeprägter Leukopenie mit zunehmender Verminderung der absoluten Zahl der Neutrophilen, die absolute Lymphocytenzahl sinkt anfangs ebenfalls, um aber gegen Ende des 2. Stadiums progredient zu steigen; die Eosinophilen fehlen.

Die dritte Woche ist die kritische Zeit im Verlauf der Krankheit sowohl wegen der jetzt oft beginnenden Wendung zum Bessern als wegen der häufig eintretenden Komplikationen. Das bis dahin kontinuierliche Fieber beginnt stärkere morgendliche Remissionen zu zeigen; durch Zunahme der Tagesschwankungen entwickelt sich das Bild der „steilen Kurven“, das von der 2. Hälfte der 3. Woche ab voll entwickelt ist und das sog. amphibole Stadium darstellt. Die Besserung verrät sich durch Schwinden der Benommenheit, Reinigung der Zunge, Ablassen der Roseolen, Kleinerwerden der Milz, Zurückgehen des Meteorismus und der Diarrhöen sowie der Bronchitis und Schwächerwerden der Diazo-reaktion. Bei leichteren Fällen können Mitte oder Ende der 3. Woche im Blut Eosinophile vereinzelt wiedererscheinen.

Die Möglichkeit der Komplikationen ist zum Teil in den in dieser Krankheitsphase sich abspielenden anatomischen Vorgänge im Darm begründet, indem es jetzt zur Abstoßung der nekrotisch gewordenen Teile der Follikel und Plaques im Dünndarm und damit zur Bildung von Geschwüren kommt, deren Reinigung gegen Ende der 3. Woche zu erfolgen pflügt. Darmblutungen (3. Woche) durch Arrosion eines Gefäßes in einem Geschwür verraten sich durch Entleerung größerer Mengen dunklen Blutes oder teerartiger Stühle unter den Zeichen akut einsetzender Anämie mit Kleinwerden des Pulses, verfallenem Aussehen,

kühlen Extremitäten. Vorübergehendes Sinken des Fiebers, Anschwellen des Milztumors und Aufhellung des Bewußtseins ist eine häufige Begleiterscheinung; unmittelbar zum Tode führt eine Blutung nur selten.

Auch die Gefahr einer Perforation eines Darmgeschwürs mit Austritt von Darminhalt in die Bauchhöhle und schnell eintretender eitriger bzw. jauchiger Peritonitis besteht um diese Zeit. Bei schwer benommenen Patienten kann der Perforationsschmerz fehlen, nur der plötzlich zunehmende Meteorismus sowie Kollapserscheinungen mit Sinken der Temperatur, Hinaufschnellen des Pulses und die sonstigen Zeichen der Peritonitis (s. diese) verraten die Katastrophe, die eine sofortige, wenn auch nur selten erfolgreiche Operation notwendig macht.

Bei schweren Fällen kann ferner ein Versagen des Zirkulationsapparates um diese Zeit den Kranken in Gefahr bringen, selten infolge stärkerer Schädigung des Herzmuskels selbst in Form einer Myokarditis mit Dilatation<sup>1)</sup>, häufiger infolge einer bakteriotoxisch bedingten Lähmung der Vasomotoren mit Kleinwerden und Aussetzen des Pulses, Kollapserscheinungen wie plötzlichliches Sinken der Temperatur usw., die zum Tode führen können.

Mit dem Übergang in die 4. Woche, bei leichteren Fällen schon in der 3. Woche tritt die Krankheit bei Fehlen von Komplikationen in das 4. Stadium, das der sog. Defervescenz, in welchem es unter allmählichem staffelförmigen Absinken der Temperatur zu langsamer Entfieberung kommt („Lysis“), deren Dauer durchschnittlich ca. 1 Woche beträgt. Die Besserung verrät sich objektiv durch Wiedererwachen des Appetites, Schwinden der Bronchitis und der Darmerscheinungen, Reinigung der Zunge und Zurückgehen der Milzvergrößerung, negativer Diazoaktion und Ansteigen der Zahl der Eosinophilen im Blut. Die sich hieran anschließende, sich auf mehrere Wochen erstreckende Rekonvaleszenz ist durch ein sehr stark gesteigertes Nahrungsbedürfnis gekennzeichnet, dem nach der vorausgegangenen, bei schwereren Fällen ganz enormen Einschmelzung von Fett- und Muskelgewebe bei entsprechender Ernährung ein rapider Gewichtsanstieg entspricht. Regelmäßige, auch jetzt noch fortzusetzende Temperatur-Messung hat einen völlig fieberlosen Verlauf sicherzustellen, andernfalls man auf versteckte Komplikationen fahnden muß.

In einer Reihe von Fällen ist die Krankheit damit noch nicht beendet. Erneuter Temperatur-Anstieg, Aufschießen von neuen Roseolen, Wiederauftreten eines Milztumors und der Diazoaktion, erneutes Verschwinden der Eosinophilen kündigt ein Wiederaufflackern der Krankheit an, das entweder als sog. „Nachschub“ oder „Rekrudescenz“, wenn keine vollständige Entfieberung erfolgte, oder in Form des „Recidivs“ in die Erscheinung tritt, das nach fieberfreiem Intervall von einigen bis zu 17 Tagen erfolgt. Derartige Rückfälle, die häufiger bei leichtem Typhus beobachtet werden, kündigen sich bisweilen durch das nicht völlige

<sup>1)</sup> Bei starkem Meteorismus, der eine Querlagerung des Herzens bewirkt und dadurch eine Verbreiterung der Herzdämpfung vortäuschen kann, sei man auf diese Fehlerquelle bei der Diagnose Dilatation bedacht.

Verschwanden gewisser Symptome wie der Milzschwellung, des Diazo usw., trotz Entfieberung im voraus an. Sie stellen nach Fieberverlauf und den übrigen Symptomen eine stark abgekürzte Wiederholung des Hauptkrankheitsbildes dar, der Verlauf ist meist, wenigstens bezüglich der subjektiven Erscheinungen, leichter als letzteres, die Prognose wesentlich günstiger als bei den Nachschüben. Wiederholungen der Rezidive kommen vor. Die als Ursache der Rezidive früher angeschuldigten Diätfehler, seelischen Erregungen usw. dürften nur ein auslösendes Moment sein, während die dem Prozeß zugrunde liegenden Vorgänge in mangelhafter Immunkörperbildung zu suchen sind.

**Komplikationen:** Die regelmäßig vorhandene Schwellung der Nasenschleimhaut mit dadurch bedingter Mundatmung führt namentlich bei mangelhafter Pflege zu fortschreitender gefährlicher Austrocknung der Mundhöhle, des Rachens und schließlich des Kehlkopfs. Die hierdurch bewirkte Schädigung der Schleimhaut im Verein mit der Ansiedlung pathogener Keime ermöglicht leicht, namentlich im Bereich des Kehlkopfs Ulcerationen sowohl an der Epiglottis und der Hinterfläche des Kehlkopfs als vor allem als sehr ernster Komplikation im Innern desselben, besonders in der Gegend der Aryknorpel, was nicht selten eine konsekutive Perichondritis und Nekrose der Knorpel nach sich zieht. Infolge der Benommenheit der Kranken, die keine Beschwerden äußern, ist die Komplikation um so gefährlicher als mit der Möglichkeit der Absceßbildung mit Glottisödem oder dem Hinabsteigen der Eiterung in die Tiefe bis ins Mediastinum zu rechnen ist. Frühzeitige wiederholte Laryngoskopie ist daher bei allen schweren Fällen unbedingt notwendig. — Die in allen ernsteren Fällen vorhandene Bronchitis führt leicht zur Entwicklung bronchopneumonischer Herde namentlich in den Unterlappen, was durch die mangelhafte Expektoration von Schleim und die langdauernde Rückenlage gefördert wird. Tägliche Kontrolle des Lungenbefundes ist daher unerlässlich. Auf Pneumonie verdächtig ist zunehmende Beschleunigung der Atmung. Höheres Alter, Emphysem, Fettsucht, Herzmuskelschwäche disponieren im besonderen Maß zu Lungenkomplikationen. Ein Übergang der Pneumonie in Gangrän wird mitunter beobachtet. Aktivierung einer bis dahin latenten Lungentuberkulose ist im Verlauf des Typhus nicht selten.

Seitens des Zirkulationsapparates ist eine häufige Komplikation in der 2. Hälfte der Krankheit und in der Rekonvaleszenz eine Venenthrombose, namentlich im Bereich der Schenkelvenen und der Venen der Waden, die sich auch bei jugendlichen Individuen mit intaktem Herzen ereignet und sich durch Schmerzen und Schwellung des betreffenden Beines verrät. Sie bedeutet eine erhebliche Verzögerung der Rekonvaleszenz. Die Gefahr der Lungenembolie ist nur gering, sie kann sich aber bei unvorsichtiger vorzeitiger Bewegung des Beines ereignen.

Bei Schwerkranken entsteht bisweilen außer der oben genannten Stomatitis Schwellung und Lockerung des Zahnfleisches; bei mangelhafter Pflege entwickelt sich der Soorpilz in der Mundhöhle und bildet weiße Rasen. Entzündung einer oder beider Parotisdrüsen mit



Schmerz und Schwellung ist in der 3. Woche nicht ganz selten, oft vereitert die Drüse und macht eine Incision notwendig, andernfalls erfolgt ein Spontandurchbruch nach außen oder in den Gehörgang. Auch eine Otitis media, hervorgerufen durch Übertritt von Eitererregern aus der Mundhöhle durch die Tube in das Mittelohr ist bei schwererem Verlauf eine häufige und wichtige Komplikation, zumal infolge der Benommenheit der Kranken Schmerz und Schwerhörigkeit sich leicht der Wahrnehmung entziehen und oft erst Ausfluß von Eiter aus dem Ohr nach der Perforation des Trommelfells auf die Komplikation aufmerksam macht (cave otogene Meningitis!). Wiederholte häufige Untersuchung mit dem Ohrenspiegel ist daher bei Schwerkranken unerlässlich. In einzelnen Fällen beruhen übrigens die Gehörstörungen auf zentralen Störungen, sie zeigen dann keinen otoskopischen Befund. — Plötzlich auftretende Schmerzen in der Milzgegend sowie mit dem Stethoskop wahrnehmbares perisplenitisches Reiben zeigt einen Milzinfarkt an; mitunter abscediert derselbe.

Bei schwerem Krankheitsverlauf und mangelhafter Pflege treten namentlich bei mageren Patienten leicht Hautschädigungen an den Stellen auf, die starkem Druck ausgesetzt sind (Decubitus), so namentlich in der Kreuzsteißgegend, an den Schulterblättern und den Fersen. An die Rötung der Haut mit Substanzverlusten schließt sich bei schwereren Fällen eventuell eine in die Tiefe greifende Ulceration an, die um so mehr zu fürchten ist, als hier meist schon frühzeitig die in der Tiefe befindliche Muskulatur noch vor der Hautschädigung einer ischämischen Nekrose anheimfällt, die dann von der Haut her infiziert wird und nun rasch geschwürig zerfällt. Sepsis mit tödlichem Ausgang kann die Folge von Decubitus sein. Gehäuftes Auftreten von Furunkeln wird oft in der zweiten Hälfte der Krankheit und in der Rekonvaleszenz beobachtet.

**Seltenere Lokalisationen des Typhusbacillus:** Gelegentlich treten Symptome von Meningismus (Nackenstarre, Kernig, heftiger Kopfschmerz) stärker in die Erscheinung; Drucksteigerung, Eiweißgehalt der Spinalflüssigkeit, auch das Vorhandensein von Typhus-Bacillen werden mitunter beobachtet (Meningitis typhosa). Entzündliche Veränderungen an den Knochen beruhen zum Teil ebenfalls auf der Wirkung der Typhus-Bacillen. So gibt es eine Wirbelerkrankung (Spondylitis typhosa), ferner periostitische Prozesse mit Typhusbacillen im Eiter; auch Entzündungen der Schilddrüse sowie der Hoden kommen als typhöse Erkrankungen gelegentlich zur Beobachtung. Reichlichere Ansiedlung von Typhusbacillen im Nierenbecken infolge von oft massenhafter Ausscheidung von Bakterien kann die Entwicklung einer Pyelitis zur Folge haben (nicht zu verwechseln mit einer nach unsauberem Katheterismus entstandenen ascendierenden Cystopyelitis!), die die Rekonvaleszenz oft erheblich in die Länge zieht.

Praktisch sehr wichtig ist die Rolle der Gallenwege bei Typhus, zumal die Ausscheidung der Bacillen aus dem Blut regelmäßig durch die Galle in den Darm erfolgt und die Bacillen wegen des ihnen zusagenden Mediums sich in der Gallenblase mit besonderer Vorliebe lange Zeit halten und daselbst, speziell bei den Dauerausscheidern, ein Depot

bilden, von wo aus sie, bisweilen sogar jahrelang mit dem Kot nach außen befördert werden. Trotzdem gehören Erkrankungen der Gallenwege, wie Cholangitis und Ikterus zu den Seltenheiten.

**Besondere Verlaufsformen.** Typhus levissimus: Häufig beobachtet man namentlich bei Epidemien vereinzelte sehr leicht verlaufende Typhen mit niedrigem, stark remittierenden oder sogar vorübergehend fehlendem Fieber und nur geringer Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens. Trotzdem sind die charakteristischen objektiven Symptome wie Durchfälle, Roseola, Milztumor, Diazo, Bradykardie sowie geringe Bronchitis meist sämtlich oder teilweise vorhanden und weisen auf die Diagnose hin. Die subjektiven Beschwerden können so gering sein, daß die Patienten nicht bettlägerig werden (Typhus ambulatorius) bzw. sich nur etwas indisponiert fühlen. Zweierlei Gefahren drohen bei derartig leichtem Verlauf, einmal die Möglichkeit unerwarteter plötzlicher Verschlimmerung mit Darmblutung, Perforation sowie dem Eintritt eines schweren Rezidivs, und zweitens in epidemiologischer Beziehung die infolge häufiger Verkennung derartiger Fälle (sog. gastrisches Fieber) oft übersehene Möglichkeit der Ausstreuung von Typhusbacillen in der Umgebung derartiger Kranker. Viel seltener sind Fälle, die unter dem Bilde eines schweren Typhus beginnen, nach kurzer Zeit aber bereits, zum Teil fast kritisch entfiebern und schnell genesen (Abortivform). Das Alter der Patienten hat nicht selten Einfluß auf den Krankheitsverlauf. Der Typhus der Kinder ist in der Regel leichter, oft von kürzerer Dauer und prognostisch günstiger als bei Erwachsenen, trotz hohen Fiebers und starker Somnolenz; die Darmveränderungen sind geringer, häufig fehlen Ulcerationen. Komplikationen sind viel seltener. Manche Kinder stoßen ohne erkennbare Ursache dauernd lebhaft Schreie aus, andere verlieren vorübergehend die Sprache. Der Typhus des höheren Alters zeigt oft atypischen Verlauf, niedrigeres Fieber, eine nur rudimentäre Ausbildung der charakteristischen Symptome — er bietet daher oft der Diagnose Schwierigkeiten — andererseits große Neigung zu Herzschwäche und Lungenkomplikationen.

Die neuerdings vielfach angewendete Vaccination gegen Typhus hat oft auf den Verlauf eines trotzdem später ausbrechenden Typhus Einfluß. Zum Teil ist der Verlauf wesentlich milder, oft nach Art der Abortivformen, zum Teil entbehrt das Bild bezüglich Fieverlauf und anderer Symptome des charakteristischen Gepräges der Krankheit der Nichtgeimpften; nicht selten läuft die Erkrankung in eigentümlich wellenförmigen Schwankungen ab. Vaccination während der Inkubation des Typhus hat mitunter einen besonders schweren und stürmischen Verlauf der Krankheit zur Folge.

Abgesehen von den genannten Abweichungen des Verlaufs von der Norm zeigen auch verschiedene Epidemien oft hinsichtlich der Schwere der Symptome und der Komplikationen charakteristische Eigentümlichkeiten. Auch beobachtet man Unterschiede je nach der individuellen physischen wie psychischen Konstitution des Patienten. So tritt bei nervösen Individuen oder nach heftiger seelischer Erregung nicht selten die Beteiligung des Zentralnervensystems in Form tiefster

Benommenheit, anhaltender Delirien, nicht selten sogar ausgesprochener Psychosen mit Verwirrtheit oder Depressionszuständen stark in den Vordergrund (daher die frühere Bezeichnung „Nervenfieber“).

Anatomisch wurde neuerdings im Gehirn eine Alteration der Ganglienzellen mit Gliawucherung als Folge der Toxinwirkung festgestellt.

Als recht seltene Verlaufsform ist schließlich der foudroyant verlaufende Typhus zu nennen, der unter Temperaturen von  $41^{\circ}$  und mehr bereits im Laufe einer Woche zum Tode führt.

**Diagnose:** Das langsame staffelförmige Ansteigen der Temperatur, die Continua, die relative Pulsverlangsamung, der Milztumor, die Roseolen, die Bronchitis, die Diazoreaktion, die Leukopenie, im weiteren Verlaufe die relative Lymphocytose, das Fehlen der Eosinophilen machen in ihrer Gesamtheit das Vorhandensein eines Typhus höchst wahrscheinlich; sichergestellt wird die Diagnose durch Züchtung der Typhus-Bacillen bei Beginn der Krankheit aus dem Blut, später aus Stuhl und Harn, ferner durch den Widal, aber nur — und zwar gegenüber dem Verhalten bei Typhus-Vaccinierten — bei Ansteigen des Agglutinititers während der Erkrankung. Wegen der häufig vorhandenen Obstipation ist das Fehlen der Diarrhöen nicht gegen Typhus zu verwerten. Das gleiche gilt für den Diazo, der in leichteren Fällen negativ sein kann. Auch bleibt ausnahmsweise der Widal dauernd negativ. Mit Rücksicht auf atypische Fälle ist bei längerem unklaren Fieber und fehlendem Organbefund stets an Typhus zu denken. Recht schwierig kann die Erkrankung des Typhus levissimus und ambulatorius sein.

Differentialdiagnostisch kommen in Frage Miliartuberkulose, Trichinose, tuberkulöse Meningitis, Fleckfieber sowie manche Formen von Sepsis. Bei Miliartuberkulose und Trichinose ist der Diazo positiv, bei Trichinose kommt außerdem gelegentlich ein roseolartiges Exanthem sowie ein positiver Widal vor. Eine sichere Abgrenzung gestattet das Blutbild, und zwar bei Trichinose die Eosinophilenvermehrung, andererseits gegenüber der Miliartuberkulose das Vorhandensein einer relativen Lymphocytose bei Typhus (die Leukopenie ist beiden gemeinsam). Die Roseola wird bei Fleckfieber bereits in den ersten Tagen, bei Typhus erst auf der Höhe der Krankheit sichtbar. Auch hier ist das Blutbild verwertbar, indem bei Fleckfieber, das übrigens nur selten Leukopenie zeigt, die Polynucleären und nicht die Lymphocyten relativ vermehrt sind. Herpes ist bei Typhus so selten, daß er dagegen spricht (häufiger bei Paratyphus). Die diagnostisch sehr wichtige relative Bradykardie bei Typhus wird bisweilen vermißt bei Kindern, Frauen und alten Leuten und kommt andererseits vor bei Meningitis (Vagusreizung), nicht selten bei Grippe, gelegentlich bei Fleckfieber. Bei Sepsis fehlt stets die Bradykardie, in der Regel besteht Leukocytose mit relativer Polynucleose oder wenigstens die letztere allein.

Gelegentlich kommen wegen stärkerer Beschwerden in der Ileocöcalgegend Verwechslungen mit Appendicitis vor, die zur Operation verleiten. Sorgfältiges Fühlen auf die klassischen Typhus-Symptome sowie meist das Fehlen einer Bauchdeckenspannung bei Typhus schützt

vor Irrtum. Schwierig kann oft die Abgrenzung gegen das Hodgkinsche Granulom sein (vgl. S. 268), und zwar die seltene rein abdominale Form mit Milztumor, Diazo, Leukopenie, kontinuierlichem Fieber sowie rezidiv-ähnlichen Rückfällen und Fehlen von Drüsenanschwellung. Verdacht muß hier das nicht völlige Schwinden der Eosinophilen erwecken.

Bezüglich des Nachweises von Typhus-Bacillen in Stuhl und Harn ist schließlich die immerhin denkbare Möglichkeit eines an einer anderen fieberhaften Krankheit leidenden Dauerausscheiders in Betracht zu ziehen, der früher einmal einen Typhus überstanden hat.

Die **Prognose** richtet sich einmal nach der Schwere der Krankheitserscheinungen als solcher, sodann nach dem Vorhandensein von Komplikationen. Wegen der Möglichkeit der Entwicklung letzterer auch bei leichtem Verlauf ist bei der Beurteilung eines jeden Falles größte Zurückhaltung zu beobachten. Der allgemeine Kräftezustand sowie das Alter des Patienten spielen eine wichtige Rolle; so ist der Kindertyphus prognostisch günstig, umgekehrt der Typhus im höheren Alter trotz niedriger Temperatur stets sehr ernst. Bei jüngeren Individuen ist dagegen niederes Fieber ein günstiges Zeichen. Besonders gefährdet sind Tuberkulöse wegen des nicht seltenen Aufflackerns alter Lungenherde, ferner Fettleibige und Potatoren. Die nach stärkerer Darmblutung vorübergehend auftretende Senkung der Temperatur mit Aufhellung des Sensoriums darf nicht zu optimistischer Beurteilung verleiten. Besonders bedeutsam ist das Verhalten des Pulses. Relative Bradykardie bei vollem regelmäßigen Puls ist ein Zeichen regulären Verlaufs, wie umgekehrt das Ansteigen desselben stets eine ernste Bedeutung hat. Eine trockene fuliginöse Zunge ist ein schlechtes Zeichen, beweist vor allem schlechte Pflege. Zunahme der Bronchitis und erst recht Verdichtungserscheinungen über der Lunge trüben die Prognose, desgleichen gewisse Zeichen schwerer Intoxikation des Zentralnervensystems, speziell Sehnenhüpfen sowie Zähneknirschen, weiter eine stärkere Beteiligung der Nieren. Die Prognose der Typhus-Psychosen ist günstig. Schließlich ist frühzeitiger Eintritt von Decubitus ein ernstes Symptom. Wertvolle prognostische Hinweise bietet die Diazoreaktion, deren frühzeitiges Schwinden günstig ist, während ihr Wiederauftreten eventuell ein Rezidiv ankündigt; das gleiche gilt vom Milztumor, der bei bevorstehendem Rezidiv nicht abschwilt. Sehr niedrige Leukocytenzahl zeigt einen schweren Fall an, ferner ist der plötzliche Sturz der Lymphocyten ein ungünstiges Zeichen. Eine zuverlässige Handhabe für die Beurteilung des Decursus sind endlich die Eosinophilen im Blut, deren Wiedererscheinen — zunächst in wenigen Exemplaren — ein zuverlässiges Zeichen günstiger Wendung ist. Bei ganz leichtem Verlauf verschwinden sie nicht vollständig aus dem Blut.

**Therapie:** Eine spezifische, also kausale Therapie ist zur Zeit noch nicht möglich. Wegen der langen Krankheitsdauer spielt die sachgemäße Pflege beim Typhuskranken eine besonders große Rolle, sein Schicksal hängt zu einem großen Teil von der Beherrschung der Krankenpflege-technik seitens des Arztes und Pflegepersonals ab. Von besonders großer Bedeutung ist die Ernährung, da der Kranke infolge der Benommenheit,

zum Teil auch wegen Inappetenz nicht nach Nahrung verlangt und dies auf die Dauer zu gefährlicher Inanition führt.

Die Diät muß während des Fiebers flüssig oder breiig, leicht verdaulich und nahrhaft sein: Milch eventuell mit Ei oder Zusatz von Sahne, Hygiama, Kakao, sowie von Kognak oder Kaffee zur Geschmacksverbesserung; ferner Suppen von Reis, Sago, Hafermehl, Tapioka (alles durch das Sieb), deren Geschmack durch Fleischextrakt zu verbessern ist; Fleischbrühe mit Zusatz von Tropon, Plasmon usw., weiter Fleischgallerte, namentlich aus Kalbsfüßen. Nahrungszufuhr am besten alle 2 Stunden in kleinen Portionen. Zur Kontrolle der Ernährung berechne man die Calorienzahl, die mindestens 1500—2000 pro Tag beim Erwachsenen betragen soll <sup>1)</sup>. Als Getränk Wasser mit Citronensaft oder kühler Tee, keine CO<sub>2</sub>-haltigen Mineralwasser. Bei schwerer Benommenheit versuche man Fütterung mit der Nasensonde. Kann der Kranke kauen, so gebe man zur Reinigung der Mundhöhle zwischendurch Biskuit oder Zwieback.

Bei Mundatmung ist durch täglich mehrmals wiederholte Anwendung eines Nasensprays mit lauwarmer NaCl-Lösung zu versuchen, die Nase wieder durchgängig zu machen; als Zeichen des Erfolges schließt der Patient alsbald oft spontan den Mund. Regelmäßige sorgfältige Mundpflege ist unerlässlich, eventuell Befeuchten der Lippen und Einreiben mit Glycerin. Bronchitiskessel mit Terpentin oder Latschenöl dient zum Anfeuchten der Luft. Dringend notwendig zur Vorbeugung gegen Lungenkomplikationen wie gegen Decubitus ist häufiger Lagewechsel; bei Beginn pneumonischer Erscheinungen Brustprießnitz. Zur Vorbeugung des Decubitus Luftring, besser Wasserkissen unter dem Laken; für die Fersen Wattekränze, sorgfältige Reinigung der Gesäßgegend, namentlich nach Stuhlentleerung, regelmäßig Abreiben derselben mit spirituösen Lösungen wie Fränzbranntwein oder Kampferwein und nachheriges Pudern (Salicylpuder); bei beginnendem Decubitus Hg-Pflaster, Dermatol; auf phlegmonöse Prozesse ist zu achten. Bei Benommenheit ist die Harnblase regelmäßig auf prompte Entleerung zu kontrollieren.

Hohes Fieber und starke Benommenheit indizieren die Anwendung kühler Bäder, täglich bis zu zwei.

Der Patient wird aus dem Bett in ein Vollbad von 32° gehoben und darin 5—10 Minuten unter Unterstützung des Rückens gehalten, eventuell unter langsamer Abkühlung des Wassers, am Schluß kühle Übergießungen des Nackens und der Brust. Die nächsten Bäder können kühler sein, aber nicht unter 25°. Aus dem Bade wird der Patient behutsam ins Bett gehoben und in ein Laken gewickelt, kräftig frottiert und nach Entfernung des Lakens warm zugedeckt, sodann ihm heißes Getränk gereicht. In Ermangelung der Bäder kann man den Patienten eine halbe Stunde in nasse Laken packen und warm zudecken. Die Vorteile der Hydrotherapie sind vorübergehend Herabdrücken des Fiebers, Aufhellung des Sensoriums, Anregung der Atmung und der Expektion.

Kontraindikationen der Hydrotherapie: höheres Alter, Herzschwäche, stärkere Blutarmut, Fettsucht, Otitis med., Thrombophlebitis, Nephritis und vor allem Neigung zu Darmblutungen (Kontrolle des Stuhles auf okkultes Blut als Vorläufer von Blutungen!) sowie Zeichen von Peritonitis. Anwendung antipyretischer Medikamente (z. B. 4—5 mal täglich 0,25 Pyramidon) in der Regel nicht erwünscht. Bei drohender Kreislaufschwäche Alkohol in Form von Portwein, Sekt, Eierkognak sowie starker Kaffee, ferner subcutan Coffein. natr.-benzoic. 5<sup>0</sup>/<sub>10</sub>ig

<sup>1)</sup> Zirka 35 Cal. pro Kilogramm Körpergewicht.

1—4mal täglich 1 ccm sowie 10%ig Ol. camphor. 2stündlich 1 ccm, eventuell beides abwechselnd, weiter Suprarenin  $\frac{1}{2}$ —1 ccm der Stamm-  
lösung subcutan oder 1 Ampulle Hypophysin bzw. Coluitrin, Digitalis  
z. B. als Digi-purat 3mal täglich 1 ccm intramuskulär oder Strophanthin  
 $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  mg intravenös alle 24 Stunden. Bei schwer toxischen Erschei-  
nungen subcutan oder intravenös NaCl-Infusion, eventuell mit Coluitrin-  
zusatz. Stärkerer Meteorismus ist durch Einlegen eines Darmrohrs  
während mehrerer Stunden zu bekämpfen. Durchfälle sind nur bei  
sehr reichlichem Auftreten medikamentös zu behandeln, z. B. durch  
3mal täglich 0,01 Opium mit 0,5 Tannin, Verstopfung mit Einläufen  
und Ricinusöl. Bei Darmblutung Eisblase auf den Leib (an Reifen-  
bahre aufgehängt), Ruhigstellung des Darms durch Opium, z. B. Tct.  
opii 15—20 Tropfen bis 3mal täglich oder Pantopon subcutan 2—3mal  
0,02, die nach Aufhören der Blutung noch eine Woche lang in fallender  
Menge zu geben sind; ferner Secalepräparate, z. B. 3mal täglich 0,2 Er-  
gotin oder 0,01 Styptizin intramuskulär sowie Extr. hydrast. fluid.  
3—4mal täglich 20 Tropfen, Gelatine subcutan als Gelatina sterilis.  
pro inject. (10% Mörck, Darmstadt), 40—60 ccm oder per os 30,0—50,0  
in lauwarmem Getränk gelöst; sehr wirksam ist mitunter Blutserum  
subcutan, z. B. 10 ccm Diphtherieheilsrum. Gegen den Durst Eisstück-  
chen. Bei beginnender Peritonitis die gleichen Narkotica wie bei Blu-  
tung, im übrigen so früh wie möglich Hinzuziehung eines Chirurgen.  
Sonst sei man bei Typhus mit Narkotica möglichst sparsam, um die  
Benommenheit nicht noch zu vertiefen. Bei Meningismus bzw. sehr  
heftigen Kopfschmerzen Lumbalpunktion. Bei Venenthrombose Ruhig-  
stellung des hochgelagerten, mit essigsaurer Tonerde (1 : 4)-Verband  
versorgten Beines in Volkmann-Schiene. Delirierende, aber auch nur  
schwer benommene Patienten erfordern wegen oft plötzlich eintretender  
Verwirrungszustände mit Fluchtversuchen usw. größte Wachsamkeit  
des Pflegepersonals, eventuell Bromkali.

Auch die Zeit unmittelbar nach Entfieberung bedarf noch sorg-  
fältiger Pflege, vor allem in diätetischer Beziehung, zumal der Heiß-  
hunger der Rekonvaleszenten leicht zu Diätfehlern verleitet. Fortsetzung  
der Breikost noch eine Woche lang nach Aufhören des Fiebers, dann  
langsamer Übergang zu fester Kost (Huhn, Taube, Kalbsmilch, alles  
in passiertem Zustand). Von der 3. Woche ab fein geschnittenes Fleisch  
mit Kartoffelpüree, fein zerkleinerte leichte Gemüse, alles in kleinen  
Portionen und häufigen Mahlzeiten. Gewöhnliche Kost ist in der Regel  
erst 1 Monat nach Entfieberung erlaubt. Vollständige Bettruhe ist bei  
mittelschweren und schweren Fällen 3—4 Wochen, bei leichten Fällen  
2 Wochen vom Beginn der Rekonvaleszenz zu beobachten, dann ver-  
sucht man vorsichtig das Aufstehen für  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Stunden täglich mit  
langsamer Steigerung. Völlige Herstellung und Arbeitsfähigkeit ist meist  
nicht vor 2 Monaten vom Beginn der Rekonvaleszenz zu erwarten.

Die Prophylaxe ist unter geordneten Verhältnissen in zivilisierten  
Ländern leicht. In erster Linie notwendig ist die Isolierung der Typhus-  
Kranken sowie, wegen der Verbreitung der Krankheit ausschließlich durch  
die Ausscheidungen, das gewissenhafte Unschädlichmachen von Stuhl und

Harn, ferner von Blut, Auswurf, Absceßteiler usw., die sofort sämtlich durch Vermischen mit gleichen Teilen Kalkmilch zu desinfizieren sind (sog. „fortlaufende Desinfektion am Krankenbett“), Desinfektion der Wäsche mit 5% Kresolseifenlösung; peinliche Sauberkeit der Hände aller mit dem Kranken in Berührung kommenden Personen, namentlich vor der Nahrungsaufnahme. Unbedingt notwendig ist eine wiederholte bakteriologische Untersuchung von Stuhl und Harn nach Genesung des Patienten, der nach den gesetzlichen Vorschriften erst nach mindestens 2 mal negativem Befund im Abstand von 1 Woche als nicht kontagiös zu erachten ist. Schwierig ist die Ermittlung und Ausmerzung von gesunden Dauerausscheidern, deren verhängnisvolle Rolle insbesondere in Nahrungsmittelbetrieben (Küchen, Meiereien, Lebensmittelgeschäften) sich oft erst durch dauernde Neuerkrankungen in der Umgebung derselben nach geraumer Zeit kundtut. Zwangsmäßige Isolierung von Dauerausscheidern ist zur Zeit nicht möglich<sup>1)</sup>. Als wirksame prophylaktische Maßregel gegen den Typhus ist die Vaccination mit abgetöteten Typhus-Bakterien zu empfehlen.

### Paratyphus-Erkrankungen.

Die Bezeichnung Paratyphus-Erkrankung ist ein Sammelname für eine Reihe verschiedener Krankheitsbilder, deren gemeinsame Ursache der Paratyphusbacillus ist.

Zur sog. Typhus-Colibacillengruppe gehörig steht der Paratyphus in der Mitte zwischen beiden. Er ist morphologisch und kulturell dem Typhus-Bacillus sehr ähnlich und ist noch beweglicher als dieser; Milchgerinnung und Indolbildung fehlt wie bei Typhus, dagegen vergärt er Traubenzuckerbouillon und bringt Neutralrotagar zur Fluorescenz. Zur Züchtung sind die Typhus-Nährböden (S. 31) geeignet. Im Gegensatz zum Typhus ist er tierpathogen (Meerschweinchen, weiße Mäuse); er ist identisch mit dem Mäusetyphusbacillus. Vorkommen: Er ist sehr verbreitet, findet sich im Darm vieler gesunder und kranker Haustiere (Schwein, Katze, Rindvieh usw.), im Fleisch geschlachteter Tiere sowie in Wurstwaren, ohne daß diese durch Geruch oder Geschmack verdächtig erscheinen; in Muscheln und Austern, im Stuhl kranker, aber auch gesunder Menschen. Das Toxin des Bacillus ist gegen Hitze beständig.

Es gibt 2 Arten: Typ A (Brion-Kayser), der dem Typhus näher steht und wie dieser auf Kartoffeln als grauer Schleier wächst; er fand sich bisher besonders in südlichen Ländern, ist neuerdings auch bei uns weniger selten. Typ B (Schottmüller), dem Bact. coli näherstehend, bildet auf Kartoffeln wie Coli dicken gelbbraunen Belag; er kommt viel häufiger als Typ A als Krankheitserreger in Frage. Die sicherste Unterscheidung der beiden Typen untereinander und gegenüber dem Typhus ist das serologische Verhalten: das Serum der Kranken agglutiniert den entsprechenden Typ in starker Verdünnung, die übrigen einschließlich des Typhus in schwacher Verdünnung (sog. Gruppenagglutination)<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Man muß sich darauf beschränken, sie über die von ihnen ausgehende Gefahr aufzuklären und sie auf die Notwendigkeit größter Sauberkeit namentlich der Hände sowie der Desinfektion der Ausscheidungen hinzuweisen. Es empfiehlt sich übrigens mit Rücksicht auf das Vorkommen von Bacillenträgern, die niemals erkrankt sind, die Personen in der Umgebung Typhuskranker auf das etwaige Vorhandensein von Typhusbacillen in ihren Ausscheidungen zu untersuchen.

<sup>2)</sup> In Fällen, wo verschiedene Typen bei der gleichen Serum-Konzentration agglutiniert werden, kann die verschiedene Geschwindigkeit, mit der die Agglutination erfolgt, zur Unterscheidung herangezogen werden,

Unter den durch Paratyphus-Bacillen erzeugten Krankheitsbildern sind 2 Gruppen zu unterscheiden: 1. Allgemeininfektionen nach Art des Typhus abdominalis, eigentlicher „Paratyphus“ (meist Typ A); 2. Lokalerkrankungen, am häufigsten unter dem Bilde akuter Magendarmkatarrhe.

**Paratyphus abdominalis:** Die unter dem Bilde des Typhus abdominalis verlaufende Paratyphus-Erkrankung zeigt klinisch und anatomisch weitgehende Übereinstimmung mit dieser Krankheit. Immerhin finden sich gewisse Eigentümlichkeiten, die bei der Differentialdiagnose verwertbar sind: Der Beginn ist oft brüsker, gelegentlich mit Schüttelfrost und steilem Temperatur-Anstieg sowie Erbrechen, ferner Herpes. Die Temperaturkurve ist weniger typisch, zeigt oft mehr Remissionen. Diarrhöen sind, wenn vorhanden, nicht so charakteristisch, die Stühle oft fäkulent, mitunter übelriechend und schleimig. Milztumor, Blutbild und Roseolen verhalten sich wie bei Typhus, doch kann das Exanthem auch atypisch, z. B. urticariell oder masernähnlich sein. Der Diazo ist oft negativ. Die Blutkultur ergibt oft Paratyphus-Bacillen, für die auch der Widal<sup>1)</sup> positiv ist. Mitunter beobachtet man eine hämorrhagische Nephritis, die eine günstige Prognose hat. Die Störung des Allgemeinbefindens ist nicht so schwer wie bei Typhus. Der Krankheitsverlauf ist im ganzen weniger charakteristisch, von kürzerer Dauer und zeigt viel seltener Komplikationen als der Typhus. Prognose in der Regel gut. Therapie die gleiche wie bei Typhus.

**Paratyphöse Lokalerkrankungen:** Die Gastroenteritis paratyphosa gehört zur Gruppe der Fleischvergiftungen. Ursache ist entweder die Aufnahme der in infizierter Nahrung vorhandenen Paratyphus-Bacillen oder der hitzebeständigen Toxine derselben in gekochten, vorher infizierten Lebensmitteln. Verlauf unter dem klinischen Bilde des akuten Brechdurchfalls, bisweilen choleraähnlich (Cholera nostras) oder auch in Form einer ruhrartigen Kolitis. Beginn akut mit stürmischen Magen- und Darmerscheinungen, Erbrechen, Fieber, nicht selten Herpes, Milzvergrößerung sowie gelegentlich Ikterus. Bei choleraähnlichem Verlauf sind profuse, schließlich reiswasserähnliche Stühle vorhanden, die unter rapidem Kräfteverfall, Wadenkrämpfen und tonloser Stimme rasch zu einem Bilde führen, das sich nur durch den Nachweis von Paratyphus-Bacillen in den Stühlen bzw. bei reiner Toxinwirkung durch das Fehlen von Komma-Bacillen gegen Cholera asiatica abgrenzen läßt. Stets ist das Serum auf Agglutination zu prüfen (s. oben). Die Prognose ist bei schwerem Verlauf nicht immer günstig.

Bei vorwiegender Beteiligung des Kolons beobachtet man heftige Koliken und dysenterieartige Entleerungen.

**Therapie:** Ricinusöl, ausgiebige Magen- und Darmspülungen, Tierkohle Merck mehrmals täglich 1 Eßlöffel in Wasser, subcutan und intravenös NaCl-Infusionen, Analeptica (Coffein, Campher), Belladonna-Subpositorien (0,02).

<sup>1)</sup> Eventuell mit Fickers Paratyphusdiagnosticum, Merck-Darmstadt (abgetötete Bacillen).



**Anderweitige Lokalisation der Paratyphus-Bacillen:** Häufig, speziell beim Weibe sind Erkrankungen des Harnapparates in Form von Pyelitis und Cystitis (saure Harnreaktion), die klinisch keine Besonderheiten zeigen, sich oft aber nach Schwinden der Symptome durch hartnäckige Bakteriurie auszeichnen. Auch bei Cholecystitis, Endometritis, Otitis und Perityphlitis wird bisweilen statt anderer Erreger der Paratyphus-Bacillus als Eitererreger gefunden, ohne daß ihm besondere Eigentümlichkeiten im Krankheitsbilde zukommen.

### Cholera asiatica.

Die asiatische Cholera ist eine akute, im Orient (Indien) endemische, äußerst gefährliche Infektionskrankheit, die gelegentlich auch epidemisch auftritt; in Europa wird sie selten beobachtet.

Erreger ist ein kommaförmiger stark beweglicher gramnegativer *Vibrio* (R. Koch), der in großen Mengen mit den Darmentleerungen der Kranken ausgeschieden wird. Seine Färbung erfolgt am besten mit verdünntem Carbofuchsin. In Stuhlpräparaten erscheint er oft fast in Reinkultur (fischzugartig angeordnet). Er wächst bei Zimmertemperatur auf Gelatine, die verflüssigt wird, sowie in 1%iger Peptonlösung, die zur Anreicherung dient. Zusatz von Schwefelsäure zu Peptonkulturen bewirkt charakteristische Purpurfärbung: sogen. Cholerarotreaktion. Er ist wenig widerstandsfähig gegen Austrocknen sowie gegen Desinfektionsmittel. Zur Identifizierung ist der mikroskopische Nachweis ungenügend, da es zahlreiche harmlose, morphologisch sehr ähnliche Vibrionen gibt. Geeignester Nährboden zur elektiven Züchtung: Dieudonné's Blutalkaliagar. Diagnostisch wichtig ist der Pfeiffersche Versuch: Echte Cholerabacillen mit durch Hitze inaktiviertem Immuserum vermischt und in die Bauchhöhle eines gesunden Meerschweinchens injiziert, werden dortselbst nach kurzer Zeit aufgelöst. Andere Vibrionen bleiben unverändert. Diese spezifischen Bakteriolyse finden sich auch im Blut beim Menschen nach überstandener Cholera. Auch spezifische Agglutinine wie bei Typhus sind im Serum nachweisbar.

**Krankheitsbild:** Inkubation 1—4 Tage. Nach mehreren „prämonitorischen“ Diarrhöen beginnt das charakteristische Bild mit äußerst zahlreichen, sehr bald nicht mehr fäkulenten, reiswasser- oder mehlsuppenartigen wässrigen Entleerungen unter gleichzeitigem heftigsten Erbrechen sowie quälenden Wadenkrämpfen. Es bestehen keine Koliken, kein Milztumor. Infolge der hochgradigen Wasserverarmung, vor allem aber unter der Einwirkung der Choleratoxine entwickelt sich innerhalb weniger Stunden ein überaus schweres Bild (*Stad. algidum*): eingesunkene halonierte Augen, Spitzwerden der Nase, kühle, cyanotische, welke Haut mit Runzelbildung („Waschfrauenhände“) sowie eine heisere Stimme (*Vox choleric*). Es besteht subnormale Temperatur bei Achselmessung trotz oft erhöhter Mastdarm-Temperatur. Der Puls ist klein, fadenförmig, später nicht fühlbar, die Harnsekretion versiegt und unter zunehmender Schwäche erfolgt Trübung des Sensoriums. Der Tod tritt im sog. *Stadium asphycticum* nach 24—48 Stunden oder noch früher ein, eventuell bereits nach wenigen Stunden (*Cholera siderans*), bevor es zu Diarrhöen kommt (*Cholera sicca*). In anderen Fällen schließt sich hieran unter Nachlassen der Durchfälle und des Erbrechens sowie Wiederkehr der Harnsekretion das sog. *Cholera typhoid* mit Benommenheit, Fieber an. Die Stühle werden wieder fäkulent. Häufig besteht schwere

Nephritis mit viel Eiweiß und Zylindern, nicht selten entwickelt sich eine Urämie. Bisweilen beobachtet man am Hals und Rumpf ein fleckiges oder diffuses Exanthem.

**Besondere Verlaufsarten:** Bei manchen Fällen besteht infolge des Auftretens von blutigen Stühlen und Tenesmus eine Ähnlichkeit mit Ruhr. Diagnostisch schwierig und darum epidemiologisch äußerst wichtig sind leichte, uncharakteristische, zum Teil ganz leichte Fälle (Cholera-diarrhöe und Cholérine) mit dem Bilde einer einfachen Gastroenteritis. Die hier gelegentlich bei ganz spärlichen Diarrhöen trotzdem auftretenden Wadenkrämpfe sprechen für deren toxische Entstehung.

Die Mortalität beträgt in den typischen Fällen 40—50%.

**Anatomisch** ist der Hauptsitz der Veränderungen der Dünndarm (Ileum): Mucosa stark gerötet und geschwollen, pflirsichfarben, Epithel in Fetzen abgestoßen, Blutungen in die Follikel. Beim Cholera-typhoid findet man diphtherische (ruhrartige) Schleimhautnekrosen, besonders nahe der Ileocöcalklappe. Cholera-bacillen sind nur im Darminhalt und der Darmwand, nicht im übrigen Körper nachweisbar.

Differentialdiagnostisch kommen die Cholera nostras (Paratyphus, Bac. Gärtner) und die akute Arsenvergiftung in Betracht.

Epidemiologisch bedeutsam sind bei Cholera-epidemien gesunde Bacillenträger, während Dauerausscheider im Gegensatz zu Typhus nur eine untergeordnete Rolle spielen. Verbreitung erfolgt teils durch Kontakt, teils durch Wasser (in Flußwasser halten sich die Vibrionen lange), teils verunreinigte Nahrungsmittel. Die Bekämpfung gelingt bei frühzeitiger Erkennung leicht. Günstig ist die geringe Widerstandsfähigkeit gegen Austrocknen sowie gegen Säure (Magensaft!). Meldepflichtig und zu isolieren sind nicht nur Kranke, sondern auch Krankheitsverdächtige. Quarantänezeit 5 Tage. Die Erkrankung hinterläßt nur kurze Immunität.

**Therapie:** Bekämpfung des Wasserverlustes durch reichliche heiße Getränke, subcutane und intravenöse Infusionen von 0,9% NaCl- oder Ringerlösung auf 40° erwärmt, eventuell mit Suprareninzusatz (1 ccm auf 500); gegen die Abkühlung heiße Bäder. Keine Abführmittel. Darmspülungen mit warmer  $\frac{1}{2}$ —1%iger Tanninlösung. Kaliumpermanganat  $\frac{1}{2}$ ‰ stündlich 2 Eßlöffel sowie Carbo anim. Merck stündlich 1 Eßlöffel in warmem Wasser zur Toxinabsorption. Gegen Erbrechen Chloroformwasser, eventuell Atropin. sulf. subc.  $\frac{1}{2}$ —1 mg. Opium und Morphinum ist zu vermeiden. Frühzeitig Coffein und Campher subcutan.

**Prophylaktisch** hat sich die Haffkine-Kollesche Schutzimpfung mit durch Hitze abgetöteten Cholera-bacillen bewährt.

## Ruhr (Dysenterie).

Die Ruhr ist eine sowohl epidemisch wie sporadisch auftretende, in jedem Lebensalter vorkommende akute Infektionskrankheit, die durch eine heftige, oft ulceröse Entzündung der Dickdarmschleimhaut ausgezeichnet ist. Ätiologisch und klinisch ist streng zu unterscheiden zwischen der bacillären und der Amöben-Ruhr.

**Bacilläre Ruhr:** Die Ruhrbacillen sind plumpe, unbewegliche, gramnegative, der Typhusgruppe verwandte Stäbchen. Geeignete Nährböden sind Lackmusagar

mit Mannit- bzw. Maltosezusatz. Man unterscheidet verschiedene Bakterienarten: am häufigsten sind die Kruse-Shiga-Bacillen, sie produzieren starke Gifte, bilden keine Säure und wachsen wie Typhusbacillen blau. Die „Pseudodysenteriebacillen“: Typus Flexner, Strong und Y bilden keine Gifte, dagegen Säure (rote Kolonien). Diese Unterscheidung gilt hauptsächlich für frisch aus dem Körper gezüchtete Bacillen. Eine Differenzierung außer durch Nährböden ist auch durch spezifische Agglutination (künstliches Immuneserum von Tieren bzw. Krankenserum) möglich.

Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch, ferner durch Wasser und Nahrungsmittel, die mit Ruhrstuhl verunreinigt sind (der Harn enthält keine Bacillen), gelegentlich auch durch Fliegen.

Epidemien entstehen hauptsächlich im Spätsommer und Herbst, mit Vorliebe an Orten größerer Menschenansammlungen unter ungünstigen hygienischen Bedingungen (Gefängnisse, Irrenanstalten, Truppenübungsplätze usw.). Die Verbreitung erfolgt außer durch kranke Menschen auch durch Dauerausscheider sowie gesunde Bacillenträger. Auffallend ist das Erlöschen der Epidemien nach Ortswechsel der befallenen Menschenmasse. — Mortalität bei Shiga-Ruhr bis 20 und 35%, bei Pseudodysenterie sehr viel geringer.

**Anatomisch** beginnt der Dickdarmprozeß mit katarrhalischer Entzündung der Schleimhaut, die zu Epithelnekrose und weiter zu Ulcerationen und diphtherischen Veränderungen namentlich an den beiden Flexuren, ferner am Coecum und an der Ampulle führt.

**Krankheitsbild:** Inkubation 2—7 Tage. Der Beginn erfolgt unter Störung des Allgemeinbefindens und mäßigen Leibscherzen, denen nach wenigen Stunden die ersten diarrhoischen Entleerungen mit heftigen Koliken und quälendem Stuhl drang auch nach dem Stuhlgang folgen. Unter schneller Zunahme der Stuhlgänge verlieren diese bald den fäkulenten Charakter und bestehen am 2. Tage jedesmal nur noch aus kleinen Mengen von reinem glasigen Schleim, dem steigende Mengen Blut beigemischt sind („rote Ruhr“), eventuell am Ende jeder Entleerung reines Blut; in anderen Fällen finden eitrig-eitrige Entleerungen statt („weiße Ruhr“). Infolge der zahllosen Stühle, die den quälenden Tenismus nicht lindern, und der heftigen Koliken zeigen die Kranken bald eine erhebliche Erschöpfung und Apathie. Die Temperatur ist oft nur wenig gesteigert, uncharakteristisch. Es besteht kein Milztumor. Der Leib ist eingezogen, die Druckempfindlichkeit entspricht dem Verlauf des Kolons, das insbesondere am Sigma oft als kontrahierter Strang fühlbar ist. Der Leibsmerz ist nicht kontinuierlich, sondern der Peristaltik entsprechend anfallsweise. Bei schwerer Ruhr besteht mitunter heftiger Singultus. Die Diazoreaktion im Harn ist bisweilen positiv. Die Darmentleerungen sind alkalisch, von spermaähnlichem Geruch, stinkend nur in Fällen von Gangrän. In abortiven Fällen kommt es nur zu sauren Gärungsstühlen und Schleimbeimengungen. Der Höhepunkt der Krankheit ist meist in 3—4 Tagen erreicht. Am 4. und 5. Tage beginnen die Stühle oft wieder fäkulent zu werden. Bei den schweren und tödlich verlaufenden Fällen (Shiga-Kruse-Ruhr) besteht ein toxisches Bild mit Benommenheit, Kollapstemperaturen, verfallenem Aussehen, Inkontinenz, Herzlähmung. Peritonitische Erscheinungen sind selten.

Die Krankheitsdauer beträgt in der Mehrzahl der Fälle wenige Wochen bis 1 Monat; geringe Schleimbeimengungen im Stuhl pflegen noch längere Zeit zu bestehen. Nach Diätfehlern ereignen sich oft leichte Rückfälle

mit schleimigen Entleerungen. Übergänge in chronische Ruhr, eventuell mit Kachexie und letalem Ausgang sind bei der bacillären Form selten, viel häufiger bei der Amöbenruhr (s. u.), doch können Komplikationen jeden Fall stark in die Länge ziehen. Bisweilen ergibt bei protrahiertem Verlauf die Rektoskopie trotz geringfügiger Beschwerden das Bestehen atonischer Geschwüre.

**Komplikationen** (hauptsächlich bei Shiga-Ruhr) sind toxisch bedingte Erkrankungen der großen Gelenke, besonders der Knie mit Schmerzen und Schwellung, sog. Ruhrreumatismus, ferner Neuritiden (Ataxie), die eine günstige Prognose haben, seltener Conjunctivitis, Iridocyclitis und Harnröhrenkatarrhe. Perforationsperitonitis ist im Gegensatz zu Typhus sehr selten, häufiger sind abgesackte Eiterungen (perityphlitische bzw. periproktitische Abscesse). Häufigere spätere Folgen: Oft bleibt Neigung zu schmerzhaften Kolonspasmen namentlich nach Diätfehlern zurück; in anderen Fällen bestehen dyspeptische Beschwerden infolge Subacidität des Magens oder Gärungsstühle. Adhäsionsbeschwerden nach lokaler Peritonitis sind nicht selten, eventuell kommt es sogar zu Ileus.

Diagnose und Therapie s. unten.

**Amöbenruhr:** Erreger ist die *Entamoeba histolytica* (Loesch, Schaudinn) und *tetragena* (Viereck). Endemisches Vorkommen beobachtet man hauptsächlich in den Tropen, Ägypten, Ostasien. Sporadische Fälle bei uns stammen in der Regel aus den Tropen.

Die in körperwarm (heizbarer Objektisch!) untersuchtem Stuhl nachweisbaren Amöben von etwa doppelter Größe eines Leukocyten erkennt man an der charakteristischen Leibesstruktur, d. h. dem ungekörnten hyalinen, stark lichtbrechenden Ektoplasma und dem um den Kern gelegenen wabigen und gekörnten Endoplasma, das oft phagocytierte Erythrocyten enthält. Bei der harmlosen *Entamoeba coli* fehlt im Ruhezustand die scharfe Trennung von Ekto- und Entoplasma. Bei Ausheilung des Darmprozesses wandeln sich die Ruhramöben in kleine Dauercysten um, durch welche eine Weiterverbreitung der R. möglich ist. Junge Katzen, denen Ruhrstuhl per Klysmata in den Darm gebracht wird, erkranken an typischer Ruhr.

Die Amöbenruhr ist ein exquisit chronisches Leiden, nicht selten von jahrelanger Dauer und schleichendem Verlauf mit großer Neigung zu Rezidiven; sie führt oft zu schwerer Kachexie. Die Ulcerationen im Darm greifen im Gegensatz zur bacillären Ruhr von vornherein in die Tiefe der Schleimhaut. Häufige Komplikation sind große, meist solitäre Leberabscesse.

**Diagnose der bakteriellen und Amöben-Ruhr:** Für den Bakterien-nachweis sind möglichst frische Stühle zu verwenden, am geeignetsten sind Schleimflocken (eventuell Entnahme mit Rektoskop). Die Agglutination, die erst vom Ende der 1. Woche ab nachweisbar ist, ist hauptsächlich bei Shiga-Kruse-Ruhr von Wert. Bei Pseudodysenterie sind Verdünnungen erst über 1 : 100 von Bedeutung, jedoch ist bei Typhus-Geimpften die Gruppenagglutination zu berücksichtigen. Ruhrähnliche Zustände kommen bei Paratyphus und Gärtnerbacilleninfektion, ferner bei Cholera (leichte Form) vor, doch ist hier der Tenesmus geringer, andererseits sind das Erbrechen sowie der Allgemeinzustand von vornherein schwerer. Milztumor sowie starke Kopfschmerzen sprechen gegen Ruhr. Ruhrähnliche Kolitiden kommen ferner bei Urämie, Hg-Vergiftung,

Tuberkulose und Sepsis, Mastdarmgonorrhöe und bei Balantidieninfektion des Dickdarms vor. In letzterem Falle sowie bei Amöbenruhr entscheidet der Befund der Erreger.

**Therapie:** Bei Beginn 1—2 Eßlöffel Ricinusöl, nach mehreren Tagen wiederholen, ebenso bei späteren Rückfällen. Stets auch bei leichten Erkrankungen Bettruhe und strenges Vermeiden von Abkühlungen; Thermophor bzw. feuchtwarme Packungen auf den Leib. Schleimkost, Kakao, Rotwein; flüssige Diät bis zum Wiederauftreten fäkulenter Stühle. Tierkohle Merck 4mal täglich 1 Eßlöffel. Antitoxisches Serum bei Shiga-Krusefällen 100 ccm subcutan, eventuell wiederholen (eventuell starke Serumkrankheit!). Gegen Koliken und Tenesmus Belladonna-Supposit. 0,02, ferner Papaverin. hydrochlor. subc. 0,04, sowie Atropin sulf.  $\frac{1}{2}$ —1 mg. Opium ist zu meiden. Später Klysmabehandlung: Rp. Dermatol 3,0, Mucilag. gumm. arab. 60,0, Tct. Opii simpl. gtt. 15, mit Darmrohr einführen, oder Spülung mit  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  0/0 körperwarmer Tanninlösung. Bei starken Blutungen eventuell 15 Tropfen Suprareninlösung 1 : 1000 per Klysm. Bettruhe bis zum Auftreten normaler Stühle. In der Rekonvaleszenz Vermeiden von Erkältung (Leibbinde) sowie von Verstopfung, leichte Kost. Verboten: Schwarzbrot, grobe Gemüse und Kohlarten, rohes Obst, Weißwein, stark gesüßte Speisen; statt Zucker Saccharin. Oft ist Salzsäure (3mal täglich 10—15 Tropfen in Wasser während des Essens) von Vorteil. — Bei der Amöben-Ruhr die gleiche Therapie, außerdem das gegen die Amöben spezifisch wirkende Emetin hydrochlor. 6 Tage hintereinander 0,1 subcutan unter gleichzeitiger Verabreichung von Karlsbader Salz.

### Keuchhusten (Pertussis).

Der Keuchhusten ist eine vor allem die ersten Lebensjahre befallende akute infektiöse Erkrankung der oberen Luftwege von sehr langer Dauer. Bei Erwachsenen ist die Erkrankung selten, ihr Verlauf weniger charakteristisch, eventuell nur rudimentär. Neuropathische Kinder sind besonders disponiert. Das Virus ist sehr kontagiös. Die Übertragung erfolgt direkt ohne Zwischenträger durch Tröpfcheninfektion. Als Erreger wurden verschiedene sehr kleine gramnegative, auf Blutagar wachsende Stäbchen beschrieben.

**Krankheitsbild:** Inkubation im Mittel 8 Tage (1—11 Tage). Der Gesamtverlauf zerfällt in 3 Abschnitte: das katarrhalische, das konvulsivische und das zweite katarrhalische Stadium. Die Krankheit beginnt akut als wenig charakteristischer fieberhafter Katarrh der oberen Luftwege mit Schnupfen, Husten, bisweilen Heiserkeit, Rötung der Rachenwand und der Kehlkopfschleimhaut, besonders der Regio interarytaenoidea sowie Störung des Allgemeinbefindens wie Appetitlosigkeit und Verstimmung. Der Husten ist trocken, uncharakteristisch, auscultatorisch bestehen bronchitische Geräusche. Dauer des 1. Stadiums etwa 14 Tage, gelegentlich viel kürzer. Die Übertragung der Krankheit erfolgt wahrscheinlich hauptsächlich in diesem Stadium.

Das konvulsivische Stadium beginnt mit Abfall der Fieber-Temperatur und dem Auftreten der charakteristischen Hustenanfälle. Bezeichnend ist die auf die wiederholten Exspirationsstöße folgende, weithin hörbare laut krähende oder juchzende Inspiration bei enger Glottis; oft treten im Anschluß an den Hauptanfall wiederholt schwächere Attacken auf („Reprise“). Während des Hustens macht sich häufig starke Cyanose bemerkbar. Die Anfälle können sehr zahlreich, bis zu 50 und mehr, in 24 Stunden sein, sie enden meist mit Expektoration von zähem Schleim, oft auch mit Erbrechen. Objektiv besteht eine katarrhalische Rötung am hinteren Teil der Stimmritze sowie der Bifurkation der Trachea<sup>1)</sup>. Der Lungenbefund ist entweder völlig negativ oder es ist eine geringe Bronchitis nachweisbar. Zwischen den Anfällen besteht völlige Euphorie. Stärkere Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens beobachtet man nur bei sehr jungen Kindern und sehr zahlreichen Attacken infolge der Inanition und Schlafstörung. Bei Vorhandensein der unteren Schneidezähne entwickelt sich häufig infolge krankhaften Herausstreckens der Zunge ein kleines Dekubitalgeschwür am Zungenbändchen (diagnostisch verwertbar!). Infolge der heftigen venösen Stauung bei den Hustenparoxysmen entstehen eine auch in der Zwischenzeit vorhandene charakteristische Gedunsenheit des Gesichtes in der Umgebung der Augen, ferner kleine harmlose Blutungen in den Konjunktiven und in der Haut, gelegentlich eine Dilatation des rechten Ventrikels sowie infolge des starken Pressens Mastdarmprolapse. Blut: Leukocytose mit starker relativer Lymphocytose.

Die Dauer des konvulsivischen Stadiums beträgt viele Wochen oder sogar Monate. Hierauf erfolgt eine allmähliche Abnahme der Zahl und Heftigkeit der Anfälle mit Übergang in das zweite katarrhalische Stadium mit gewöhnlichem Husten; jedoch besteht auch jetzt eine Neigung zu Rückfällen.

**Verlaufseigentümlichkeiten und Komplikationen:** Unterschiede im Verlauf betreffen die sehr variable Dauer der 3 Stadien sowie die Intensität und Zahl der Hustenattacken, die bei neuropathischen Kindern besonders heftig zu sein pflegen<sup>2)</sup>. Ernste Komplikationen sind Gehirnerscheinungen (Konvulsionen, besonders bei kleinen Kindern, Sopor, Halbseitenlähmungen usw.), die teils als Folge von Stauung vorübergehende, teils durch Blutungen bzw. Encephalitis bedingt, dauernde sind; ferner Bronchiolitis und Bronchopneumonie, die sich oft sehr in die Länge zieht, nicht selten mit anschließenden Bronchiektasien sowie Schrumpfungsprozessen, ferner Mobilisierung einer latenten Tuberkulose (Miliartuberkulose), endlich Otitis media. Die Komplikation mit Masern ist sehr ernst.

Die Prognose richtet sich vor allem nach dem Alter des Kindes (Mortalität bis 25% im 1. Lebensjahr, dagegen nur 1,1% zwischen 6.—15. Jahr), seiner Konstitution (Rachitis, exsudat. Diathese!), sowie nach etwaigen Komplikationen.

<sup>1)</sup> D. h. den beiden Hustenreflexstellen.

<sup>2)</sup> Die Heftigkeit der Anfälle ist somit nicht Ausdruck der Schwere der Infektion, als vielmehr ein Maß für den Grad der nervösen Erregbarkeit der Patienten.

**Diagnose:** Das katarrhalische Stadium sowie rudimentäre Fälle ohne typische Hustenanfälle und Reprise sind nicht diagnostizierbar. Spasmodie mit Laryngospasmus bei kleinen Kindern ist durch Prüfung auf das Facialisphänomen und das Verhalten der elektrischen Erregbarkeit abzugrenzen. Pertussisähnliche Anfälle, aber ohne laute Inspiration kommen vor bei Bronchialdrüsen-Tuberkulose, sowie Mediastinaltumoren bei Erwachsenen, gelegentlich auch bei Hysterie. Fieber im Stadium convulsivum deutet auf Komplikationen.

**Therapie:** Aufenthalt in frischer Luft, eventuell auf dem Land; der Vorteil des Milieuwechsels liegt in erster Linie auf psychischem Gebiet. Medikamente bei leichteren Fällen entbehrlich, bei schwereren Brom (z. B. Bromkali 10 : 150,0 3mal täglich 1 Teelöffel; Bromoform 3mal täglich 1—3 Tropfen in Milch) und eventuell Chloralhydrat 0,1—0,5, je nach dem Alter; ferner Echinin 3mal täglich soviel 0,1 als den Jahren entspricht, sowie das Thymianpräparat Pertussin 3mal täglich 1 Teelöffel. Bei häufigem Erbrechen ist die konsequente Zufuhr von Nahrung unmittelbar nach dem Anfall unter Bevorzugung von den Magen schnell passierenden Speisen sehr wichtig. Bei eklampthischen Zuständen Lumbalpunktion. Kontakt mit Tuberkulose ist sorgfältig zu meiden. Bei Lungenkomplikationen die übliche Therapie (vgl. S. 58 und 211).

### Grippe (Influenza).

Die Grippe zeigt ein ausgesprochenes epidemisches Auftreten. Sie verlief zeitweise in Form gewaltiger, ganze Länder heimsuchender Pandemien, so zuletzt in den Jahren 1889 und 1918 (sog. spanische Grippe). Die Übertragung erfolgt hauptsächlich von Mensch zu Mensch, wodurch sich bei Epidemien die Ausbreitung der Grippe längs der großen Verkehrswege erklärt. Daneben spielt ihr sporadisches Vorkommen nur eine untergeordnete Rolle.

Der Pfeiffersche Influenzabacillus ist ein sehr kleines, feines Stäbchen, das im Sputum bei Grippe in den ersten Tagen oft in Reinkultur vorkommt und dortselbst nicht selten fischzugartige Anordnung zeigt. Als hämoglobinophiles Bakterium läßt es sich nur auf Blutagar (am besten Levinthalscher Nährboden) aerob züchten und bildet bei 27—42° sehr kleine, glasartig durchscheinende Kolonien. Die Bacillen sind unbeweglich, ohne Kapsel, gramnegativ und lassen sich am besten mit stark verdünntem Carbofuchsin färben. Oft liegen sie nach Art von Diplococcen zu zwei hintereinander. Im weiteren Verlauf der Krankheit trifft man sie häufig intracellulär in den Leukocyten. Gegen Austrocknung sind sie sehr empfindlich.

Influenzabacillen werden gelegentlich auch bei nichtgrippösen Erkrankungen der Atemwege (Tuberkulose, Bronchitis, Bronchiektasen, Keuchhusten, Masern usw.) beobachtet. Umgekehrt wurden sie bei der letzten Grippeepidemie in zahlreichen Fällen vermißt und statt dessen Pneumococcen und Streptococcen gefunden. Die Frage des Grippeerregers ist daher vorläufig nicht völlig geklärt.

Das Krankheitsbild ist recht vielgestaltig. Am häufigsten ist die mit Erkrankung des Respirationsapparates einhergehende und von dieser beherrschte Form. Nach einer Inkubationszeit von 2—3 Tagen

setzt ziemlich plötzlich unter heftigem Stirnkopfschmerz, Glieder- und Kreuzschmerzen, großer Abgeschlagenheit, bisweilen Schüttelfrost ein schnell ansteigendes Fieber ein. Charakteristisch ist die sofort vorhandene große Hinfälligkeit der Patienten sowie ferner eigentümliche Schmerzen in den Augenhöhlen. Schnupfen, Bindehaut- und vor allem Rachenkatarrh sind regelmäßige Begleiterscheinungen, an die sich oft ein Katarrh der oberen Luftwege, Luftröhrenkatarrh, Heiserkeit und Husten und eine trockene Bronchitis anschließen. Manchmal besteht Herpes, während eine stärkere Angina nicht zum Krankheitsbilde gehört. Es besteht Appetitlosigkeit, die Zunge ist belegt. Geringe Milzvergrößerung kommt öfters vor. Fieber und Puls zeigen ein wechselndes Verhalten. In einem Teil der Fälle fällt die Temperatur nach kurzdauerndem hohen Fieber rasch zum Teil kritisch, in anderen Fällen zeigt sie das Bild des remittierenden Fiebers oder einer Continua. An Stelle einer Pulsbeschleunigung, die oft vorhanden ist, sah man in der letzten Epidemie häufig eine relative Bradykardie, die bei remittierendem Fieber ein Bild ähnlich wie Typhus erzeugt. Im Blut besteht oft statt einer Leukocytose eine Leukopenie mit relativer Polynukleose, der bei Besserung sehr bald eine postinfektiöse Lymphocytose folgt. Im Harn ist häufig die Urobilin- und Urobilinogenreaktion positiv. Dauer der leichteren und unkomplizierten Fälle ca. 3—7 Tage.

Sehr häufig sind Komplikationen, so eine Otitis media, Nebenhöhlenentzündungen, vor allem aber Bronchopneumonien. Sie entwickeln sich im Anschluß an die Bronchitis und treten oft am dritten oder vierten Tage oder im späteren Verlauf der Krankheit auf oder sie leiten unter schweren Allgemeinerscheinungen das Krankheitsbild ein. Bezeichnend ist die häufige hämorrhagische Beschaffenheit des Sputums sowie die Neigung zu eitriger Einschmelzung von Lungenparenchym mit den Symptomen eines Lungenabscesses. Bei älteren Individuen kommt es frühzeitig zu Herzschwäche im Verein mit Vasomotorenlähmung. Letztere ist oft aber auch bei jugendlichen Patienten mit schwerer Grippe die Ursache für eine schnelle ungünstige Wendung. Ferner sind Pleuraempyeme eine häufige Begleiterscheinung. Zum Teil entwickeln sie sich auffallend rasch und haben dann oft einen recht bösartigen Charakter (Streptococcen).

Bei der letzten Epidemie spielte in vielen Fällen ein besonders schwerer Trachealkatarrh, der häufig von einer heftigen Laryngitis eingeleitet wurde, eine große Rolle. Zeichen von Larynxstenose mit starker Schleimhautschwellung und Stridor, quälendem Hustenreiz sowie Abhusten von nekrotischen Schleimhautfetzen können dabei zunächst den Verdacht einer Diphtherie erwecken; der bellende, anfallsweise auftretende Husten erinnert mitunter an Keuchhusten. Sehr häufig schloß sich an diese Form auffallend rasch unter zunehmender Cyanose und Dyspnoe eine schwere, oft letal verlaufende Pneumonie an. Die Schwangerschaft disponiert in besonderem Maße zu schweren Pneumonien.

Neben den lokalen Erscheinungen spielen im Krankheitsbilde der Grippe stets die Zeichen allgemeiner Intoxikation eine bedeutende



Rolle. Das schwere allgemeine Krankheitsgefühl, die Prostration, starke rheumatische Schmerzen und vor allem die oft frühzeitig sich einstellende Kreislaufschwäche stehen nicht selten in einem gewissen Mißverhältnis zu den lokalen Veränderungen und erklären namentlich den in der letzten Epidemie oft beobachteten überraschend schnellen ungünstigen Verlauf.

Es ist bemerkenswert, daß bei der Epidemie 1918 namentlich kräftige Individuen jugendlichen Alters ein besonders großes Kontingent zu dieser bisweilen fast foudroyant verlaufenden Form der Grippe mit schwersten Pneumonien und raschem Versagen des Zirkulationsapparates stellten, während schwächliche oder durch andere Krankheiten mitgenommene Individuen, Tuberkulose usw. trotz des Kontaktes mit Grippekranken nur leicht erkrankten oder völlig verschont blieben (vgl. das S. 4 Gesagte).

Selten ist die sog. gastrointestinale Grippe. Hier gesellen sich zu den gleichen Allgemeinerscheinungen Magen-Darmbeschwerden, Erbrechen, Koliken sowie Durchfälle hinzu.

In einzelnen Fällen beobachtet man Krankheitsbilder, die von vornherein als Sepsis verlaufen und im Blut wie in den verschiedensten Organen Pfeiffersche Bacillen zeigen.

Das Grippevirus zeigt oft eine besondere Affinität zum Zentralnervensystem. So wurden schon in früheren Epidemien öfters Encephaliden mit punktförmigen Blutungen (sog. Flohstichencephalitis) beobachtet. Bei der letzten Epidemie trat häufig eine besondere Form der Encephalitis, die Encephalitis epidemica s. lethargica (s. S. 82) auf, und zwar teils im Verlauf einer Grippe bzw. als Nachkrankheit, teils als selbständige Erkrankung zur Zeit der Grippeepidemie.

Die Krankheitsdauer der Grippe ist naturgemäß je nach dem Charakter der Krankheit und der Art etwaiger Komplikationen sehr verschieden, sie schwankt zwischen wenigen Tagen und vielen Wochen. Bezeichnend ist die auch bei leichtester Erkrankung lange andauernde Rekonvaleszenz, die sich aus der Hartnäckigkeit und Langwierigkeit verschiedener Störungen (Neuralgien, Lungen- und Herzbeschwerden) und der lange zurückbleibenden allgemeinen Hinfälligkeit der Patienten erklärt. Unter den Neuralgien spielen hauptsächlich diejenigen der Supraorbitalnerven, seltener anderer Nerven wie des Ischiadicus eine Rolle. Neuropathische Individuen zeigen oft eine Verschlimmerung ihrer Beschwerden. Ferner ist das oft überaus langsame Schwinden der Residuen der Lungenerkrankungen zu betonen. Feuchte Rasselgeräusche bleiben oft viele Wochen in bestimmten Lungenbezirken unverändert bestehen, wodurch im Verein mit gleichzeitig vorhandenen, ebenfalls lange bestehenden herdförmigen Trübungen im Röntgenbild und hartnäckigen subfebrilen Temperaturen oft eine Tuberkulose vorgetauscht wird.

Die Diagnose Grippe ist während einer Epidemie bei Vorhandensein der katarrhalischen Erscheinungen leicht zu stellen. Bei Bestehen einer Continua sowie Bradykardie kann namentlich bei gleichzeitigem Vorhandensein von stärkerer Benommenheit sowie Leukopenie der Verdacht auf Typhus entstehen. Hier muß die starke Beteiligung der oberen Luftwege im Beginn der Krankheit Zweifel erwecken, auch

ist die Diazoreaktion bei Grippe stets negativ. Die Fälle mit schweren Pneumonien und hämorrhagischem Sputum haben bei der letzten Epidemie gelegentlich zu der irrigen Annahme einer Lungenpest veranlaßt. Letztere läßt sich ohne weiteres aus dem Fehlen der bei Pest massenhaft vorhandenen Pestbacillen im Sputum ausschließen. Bei Grippe ist, wie oben gesagt, das bakteriologische Ergebnis oft negativ bzw. uncharakteristisch (Pneumococcen, Streptococcen), umgekehrt finden sich Pfeiffersche Stäbchen auch bei sicher nichtgrippösen Krankheiten. So erklärt sich, daß die Diagnose bei sporadischen Fällen besonders bei weniger ausgeprägten Symptomen sehr schwierig, wenn nicht bisweilen unmöglich ist. Wenn trotzdem in zahlreichen Fällen bei Vorhandensein von Katarrh der oberen Luftwege, geringem Fieber und rheumatischen Beschwerden mit der Bezeichnung „Influenza“ oft sehr freigebig verfahren wird, so ist vor derartigen nicht genügend fundierten Diagnosen zu warnen.

**Therapie:** Auch bei leichtem Verlauf ist Bettruhe notwendig. Bei Ausbruch der Krankheit ist kräftige Diaphoresis (Lindenblütentee, Aspirin) empfehlenswert. Bei Heiserkeit und Husten Hals- bzw. Brustprießnitz, Inhalieren mit Emser Salz, Brusttee; Mixt. solvens, Decoct. Altheae; Codein. phosphor. 0,01—0,05 bis 3 mal täglich. Bei stärkerer Dyspnoe Senf-Brustwickel. Bei Pneumonie ist außerdem zweckmäßig das Inhalieren von Suprarenin (am besten als Glycirenan, das mit dem Spießschen Vernebler mittels Sauerstoffapparates versprüht wird); es wirkt zugleich günstig bei Neigung zu Vasomotorenkollaps, der bei der Behandlung besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Frühzeitige Verabreichung von Coffein (10<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Coffein. natr. benzoic. 2—3 stündlich 1 cem subkutan), Strychnin. nitric. 3 stündlich je 0,0005 subkutan, Ol. camphor. 2—3 stündlich 1 cem intramuskulär; eventuell Digitalis bzw. Tinct. strophanthi, besser Strophanthin 0,5 mg intravenös.

Die bei Grippe empfohlene Serumtherapie (Grippeserum der Sächsischen Serumwerke, Pneumococcen- und Streptococcenserum) ist teils unsicher in der Wirkung, teils nicht genügend erprobt. — Symptomatisch wirkt ausgezeichnet gegen das Fieber und vor allem gegen die allgemeinen rheumatischen Beschwerden das Antipyrin bis zu 6 mal täglich 0,5, eventuell in Kombination mit Chinin (Chinolysin).

Bei allen Eiterungen (Nebenhöhle, Pleura usw.) ist möglichst frühzeitig für Entleerung des Eiters zu sorgen. Bei dem Empyem im Gefolge von schweren Pneumonien empfiehlt es sich, sich zunächst auf die Aspiration des Eiters durch Punktion (weite Kanülen!) zu beschränken oder die Methode von Forstbach (Eingehen mit scherenförmigem Instrument durch die Intercostalmuskeln und Erweiterung der Öffnung) anzuwenden, da die Schwere des Allgemeinzustandes oft eine Rippenresektion im Augenblick nicht zuläßt.

Während der langdauernden Rekonvaleszenz hat der Patient größte Schonung zu beobachten. Bettruhe ist bis zur völligen Entfieberung notwendig. Gegen die neuralgischen Beschwerden ist oft eine Chininarsenkur wirksam (z. B. Rp. Chinin. hydrochlor. 5,0, Acid. arsenicos. 0,2, Mass. pil. q. s. ut f. pil. Nr. 100, 3 mal täglich 1 Pille, oder Kom-

prethen M. B. K. Ferrum cum acid. arsenicos. compos. 2—3 mal täglich 1—3 Stück).

Bei zurückbleibenden Herzmuskelstörungen (Herzklopfen, Atemnot, Pulsbeschleunigung beim Gehen und Steigen) ist der Rekonvaleszent behutsam an langsam gesteigerte körperliche Anstrengungen unter Einschaltung längerer Ruhepausen zu gewöhnen. Klimatische Nachkuren (Mittelgebirge) sind empfehlenswert.

### Genuine croupöse Pneumonie.

Unter Pneumonie versteht man die unter der Einwirkung verschiedener Infektionserreger erfolgende Entwicklung eines fibrinhaltigen gerinnenden Exsudates in kleineren oder größeren Bezirken der Lunge und zwar in den Alveolen und den kleinen Bronchien, wodurch dieselben in luftleere, von der Atmung ausgeschaltete Teile umgewandelt werden. Während sich pneumonische Prozesse zum großen Teil sekundär im Verlauf anderer Erkrankungen entwickeln und klinisch wie anatomisch ein wechselndes Verhalten zeigen, stellt die genuine oder croupöse Pneumonie ein ätiologisch, klinisch und anatomisch selbständiges und wohl charakterisiertes Krankheitsbild dar.

Der Erreger der genuine Pneumonie, der *Pneumococcus Fraenkel-Weichselbaum*, ist ein grampositiver lanzettförmiger Doppelcoccus, der im Tierkörper von einer schleimigen Hülle umgeben ist und sich in großer Menge im Sputum findet (Färbung mit verdünntem Carbofuchsin).<sup>\*</sup> Hier bildet er bisweilen Ketten wie Streptococci. Auf Blutagar wächst er in grünen Kolonien ohne hellen Hof ähnlich dem *Streptoc. viridans*. Zu seiner Identifizierung dienen folgende Merkmale: 1. Im Gegensatz zu Staphylo- und Streptococci wird er durch 0,01%<sub>00</sub> Optochin. hydrochlor. in Ascitesbouillon abgetötet. 2. Zum Unterschied von Streptococci wird er durch Galle aufgelöst (Zusatz von 10%<sub>0</sub> Natr. taurochol. Merck zur Kultur). 3. Er vergärt Inulin. 4. Er ist stark pathogen für Mäuse, die nach subcutaner Infektion (Sputumflocke, die in steriler Schale mit sterilem Wasser vorher gründlich abgespült wird) nach 3 Tagen eingehen und massenhaft Pneumococci im Blut zeigen. Zur Züchtung aus dem Blut der Kranken eignet sich am meisten 10%<sub>ige</sub> Peptonbouillon, 400 ccm vermischt mit 20 ccm Blut. Zuckerzusatz zu den Nährböden ist wegen Herabsetzung der Virulenz der Keime ungeeignet.

Nach neueren Forschungen sind 4 verschiedene Pneumococcentypen als Pneumonieerreger zu unterscheiden, die zwar morphologisch und in der Kultur sich gleich verhalten, dagegen charakteristische Unterschiede gegenüber den verschiedenen Immunsera bezüglich Agglutination und Schutzwirkung der letzteren zeigen; hierdurch lassen sie sich differenzieren.

Der *Pneumococcus mucosus* (Typ III der obigen Einteilung) wegen seiner Neigung zur Kettenbildung als *Streptococcus mucosus* bezeichnet, zeigt die gleichen biologischen Kriterien wie die übrigen Pneumococci. Doch weisen seine Kolonien eine schleimige Beschaffenheit auf. Durch ihn erzeugte Pneumonien sind besonders bösartig.

Die croupöse Pneumonie tritt am häufigsten im Winter und Frühjahr auf, was die Rolle von Witterungsschädlichkeiten als Hilfsursachen beleuchtet. Männer werden häufiger befallen. Die Infektion erfolgt wahrscheinlich durch die Einatmung, zumal sich auch im Staube von Wohnräumen oft Pneumococci nachweisen lassen. Eine Infektiosität im Sinne der direkten Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch besteht in der Regel nicht, so daß man Pneumonieerkrankte nicht zu isolieren braucht. Doch wird mitunter ein epidemieartiges Auftreten in Kasernen, Bergwerken, Schulen usw. beobachtet.

Der Pneumococcus ist gelegentlich auch der Erreger von Meningitis, Peri- und Endokarditis, Peritonitis, Gehirnbräuse. Pneumococcensepsis (vgl. S. 91).

In einem gewissen Prozentsatz sind die Pneumobacillen-Friedländer Erreger der croupösen Pneumonie, zu zweien angeordnete ovale Stäbchen, die auch von einer Schleimkapsel umgeben, aber gramnegativ sind und sich biologisch anders als die Pneumococci verhalten. Friedländer-Pneumonien sind sehr bösartig.

**Krankheitsbild:** Die Krankheit beginnt meist ohne jede Vorboten akut mit Schüttelfrost und gleichzeitigem Einsetzen schweren allgemeinen Krankheitsgefühls mit Erbrechen, Kopfschmerz und hochgradiger Mattigkeit. Sofort oder im Verlauf der nächsten Stunden treten Brustbeschwerden, namentlich Seitenstechen und Atemnot sowie Husten ein. Stets ist mehr oder minder hohes Fieber vorhanden, dessen weiterer Verlauf sehr charakteristisch ist. Bei Ausbruch der Krankheit steigt es sofort bis gegen  $40^{\circ}$  und bleibt in den nächsten Tagen als Continua eventuell mit geringen Remissionen hoch. Herpes facialis ist sehr häufig (3. Tag). Vom 2. Tage ab kommt es zur Expektoration eines charakteristischen zähen glasigen Sputums, das infolge seines Blutgehalts teils rost-, teils pflaumenbrühsfarbig, in anderen Fällen hellrot gefärbt ist. Es enthält massenhaft rote Blutkörperchen und Pneumococci und zum Teil Fibrinabgüsse der feineren Bronchien. Bei Betrachtung des Brustkorbes fällt ein Nachschleppen der erkrankten Seite bei der Atmung auf. Die Atmung ist angestrengt und stark beschleunigt. Die physikalische Untersuchung ergibt selten schon am 1., meist erst am 2. oder 3. Tage über der erkrankten Lunge, und zwar häufiger über dem Unterlappen zunächst tympanitischen Schall, der aber bald einer Dämpfung mit etwas tympanitischem Beiklang weicht. Auskultatorisch besteht zunächst das sehr charakteristische Knisterrasseln, die sog. crepitatio indurata. Später ist lautes Bronchialatmen, zum Teil mit klingenden Rasselgeräuschen hörbar. Der Pectoralfremitus ist verstärkt. Auf der Höhe der Erkrankung nimmt der Prozeß die Ausdehnung eines ganzen Lungenlappens ein („lobäre“ Pneumonie). Das Nähere über den physikalischen Befund siehe S. 218. In manchen Fällen, wo trotz des typischen Krankheitsbildes der physikalische Befund zunächst auf sich warten läßt oder überhaupt nicht zu voller Ausbildung kommt, zeigt die Röntgenuntersuchung in der Hilusgegend pneumonische Herde, die nicht bis an die Peripherie der Lunge reichen (sogenannte zentrale Pneumonie). Auch bei normalem Verlauf nimmt der Prozeß seinen Ausgang von dem Lungenhilus. Die rechte Lunge wird öfter als die linke befallen.

Stets ist der Puls beschleunigt, etwa bis 120, seine Qualität und Frequenz bietet sehr wichtige Handhaben zur Beurteilung des Gesamtzustandes des Kranken.

Häufig bestehen heftiger Kopfschmerz, ferner Benommenheit, sowie oft Delirien, die namentlich bei Potatoren eine große Rolle spielen. Meist ist Stuhlverstopfung vorhanden, doch beobachtet man auch Diarrhöen. Bei schwerem Verlauf entwickelt sich nicht selten ein stärkerer, toxisch bedingter Meteorismus. Auch treten mitunter Schmerzen

in der Ileocöcalgegend auf, die im Verein mit dem initialen Erbrechen eventuell eine Appendicitis vortäuschen. Mäßige Milzvergrößerung ist oft nachweisbar.

Stets ist von Anfang an eine starke Leukocytose mit Verminderung der Eosinophilen vorhanden, die bei schweren Fällen oft vollständig fehlen. In zahlreichen Fällen lassen sich ferner in dem durch Venenpunktion gewonnenen Blut in der Kultur (s. oben) Pneumococcen züchten. Sehr zahlreiche Kolonien deuten auf einen schweren Fall. Der Harn ist stets hochgestellt, enthält in der Regel Spuren Eiweiß und gibt meist eine starke Urobilinogenreaktion (Benzaldehydprobe). Charakteristisch ist sein geringer NaCl-Gehalt (AgNO<sub>3</sub>-Lösung gibt bei Gegenwart von HNO<sub>3</sub> nur geringe Trübung), was auf die NaCl-Retention durch das Exsudat zu beziehen ist. Hämorrhagische Nephritis ist selten.

Die Dauer der Krankheit beträgt in den typischen Fällen ohne Komplikationen etwa eine Woche. Nicht selten gehen eine oder mehrere vorübergehende tiefe Senkungen der Temperatur voraus, die sich durch Hochbleiben des Pulses und der Atemfrequenz als sogenannte Pseudokrisen kennzeichnen; meist am 5. oder 7. Tag kommt es dann unter Schweißausbruch zu einem kritischen Absinken der Temperatur zur Norm, bisweilen auf subnormale Werte, woran sich sofort die Rekonvaleszenz anschließt. In anderen Fällen verteilt sich die Entfieberung auf mehrere Stunden oder erfolgt lytisch. Physikalisch ist die Lösung der Pneumonie an dem Verschwinden des Bronchialatmens und dem reichlichen Auftreten von feuchten Rasselgeräuschen sowie vor allem an dem Wiedererscheinen des Knisterrasselns, der „Crepitatio redux“ und der Aufhellung der Dämpfung zu erkennen. Jedoch ist zu betonen, daß der physikalische Befund oft erst später nach erfolgter Krise diese Veränderungen zeigt. Das Sputum wird schleimig eitrig, um bald ganz zu schwinden. Protrahierter Verlauf deutet in der Regel auf Komplikationen hin, doch kann die Heilung auch bei Fehlen derselben sich gelegentlich erheblich in die Länge ziehen.

Anatomisch lassen sich 3 Stadien in der Entwicklung der Pneumonie unterscheiden: im Stadium der „Anschoppung“ (1.—2. Tag) zeigt die stark hyperämische Lunge bereits verminderten Luftgehalt, die Alveolen enthalten flüssiges, hämorrhagisches, noch nicht geronnenes Exsudat. Im Stadium der „roten Hepatisation“ ist das Exsudat geronnen, die Schnittfläche des Organs ist rot, erinnert in der Konsistenz an Leber und zeigt eine körnige Beschaffenheit entsprechend den Fibrinpfropfen der Alveolen. Dieses 2. Stadium geht allmählich in das 3. Stadium der „grauen oder gelben Hepatisation“ über, welches durch geringeren Blutgehalt, sowie regressive Metamorphose des Alveolarinhaltes (Verfettung und Zerfall der Leukocyten) ausgezeichnet ist. Die „Resolution“ der Pneumonie erfolgt durch Auflösung des Exsudates unter der Einwirkung autolytischer Fermente, wobei die Hauptmasse resorbiert, ein kleinerer Teil expektoriert wird. In der Regel ist ein ganzer Lungenlappen in den Prozeß einbezogen.

**Von der Regel abweichende Verlaufsformen:** Das Vorkommen der sogenannten zentralen Pneumonie wurde schon erwähnt. Fortschreiten des pneumonischen Prozesses von einem Lappen zum anderen, die sogenannte Wanderpneumonie verrät sich, abgesehen von dem Ergriffenwerden neuer Bezirke, durch das Nebeneinanderbestehen verschiedener Stadien des physikalischen Befundes; diese Verlaufsart ist meist lang-

wierig und von ernster Prognose. Die Greisenpneumonie läßt meist die stürmischen Erscheinungen des Verlaufs bei jugendlichen Individuen vermissen. Der Beginn ist oft milder, das Fieber weniger hoch oder sogar fehlend, die Gefahr der Herzschwäche sehr groß. Auch als interkurrierende Erkrankung bei bestehenden anderen Krankheiten wie Herzleiden, Emphysem, Nierenleiden, Fettsucht usw. verläuft die Pneumonie mit weniger typischen Symptomen, namentlich pflegt bei konsumierenden Krankheiten das Fieber niedriger zu sein und frühzeitig die Neigung zu Herzschwäche einzutreten. Sehr schwer verläuft die Pneumonie in der Regel bei Potatoren. Während hier der Husten und die übrigen Brustbeschwerden meist sehr gering sind oder völlig fehlen, beherrschen das Bild heftige Delirien, oft unter den typischen Zeichen des *Delirium tremens*: Zittern der Hände, eine oft euphorische Gemütsstimmung sowie Halluzinationen, die sowohl die berufliche Tätigkeit des Patienten zum Gegenstand haben, als auch durch das Sehen von kleinen Tieren sowie wunderlichen Gestalten sich in charakteristischer Weise kennzeichnen. Das scheinbar gute subjektive Befinden darf hier über die Schwere des Zustandes nicht hinwegtäuschen, zumal ein großer Teil dieser Fälle tödlich verläuft (Lungenödem, Herzschwäche). Croupöse Pneumonie bei Kindern verläuft ebenfalls häufig unter heftigen Delirien sowie Konvulsionen, der Ausgang ist aber in der Regel günstig, Jüngere Kinder expectorieren kein Sputum.

Die sogenannte asthenische Pneumonie ist durch eine besonders schwere Verlaufsart charakterisiert. Häufig ist sie im Oberlappen lokalisiert; sie zeigt von vornherein eine auffallend starke Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens, hochgradige Prostration, Trockenheit der Lippen und Zunge, Muskelzittern und Benommenheit. Das Fieber ist sehr hoch, der initiale Schüttelfrost fehlt oft, desgleichen mitunter der Husten, auch ist das Sputum oft nicht typisch rostfarben. Erbrechen, Durchfälle, starker Meteorismus, Milztumor und stärkere Albuminurie vervollständigen das Bild, das einen typhösen Charakter annehmen kann. Während geringe ikterische Verfärbung, speziell bei Pneumonie des rechten Unterlappens eine häufige und belanglose Erscheinung ist, ist der bei manchen asthenischen Pneumonien vorkommende starke Ikterus ein Zeichen für die Schwere der Infektion (sogenannte biliöse Pneumonie).<sup>4</sup> Das Sputum ist bisweilen grasgrün. Asthenische Pneumonien treten mitunter in kleinen Epidemien auf.

**Komplikationen:** Während trockene Pleuritis mit dem charakteristischen Reibegeräusch eine sehr häufige Begleiterscheinung der Pneumonie ist und mit der Lösung der Pneumonie schwindet, ist die eitrig-eitrige Pleuritis, das sogenannte metapneumonische Empyem der Pleura eine wichtige, die Heilung verzögernde Komplikation. Sie fällt meist in die Zeit der Resolution und verrät sich zunächst durch Wiederanstiegen oder Hochbleiben der Temperatur, die bisweilen stärkere Intermissionen zeigt. Symptome: Zunehmende Härte der Dämpfung mit Abschwächung des Atemgeräusches sowie des Pectoralfremitus, bei größerer Ausdehnung der Flüssigkeit der Nachweis von Veränderungserscheinungen am Herzen und dem Traubeschen Raum (vgl. S. 243). Unerlässlich ist eine

Probepunktion, die Eiter meist mit Pneumococcen ergibt. Erfolgt keine künstliche Entleerung des Eiters, so kommt es nach weiterer Zunahme des Exsudates zum Spontandurchbruch nach außen oder in die Lunge. Vom metapneumonischen Empyem ist das parapneumonische Exsudat zu unterscheiden, das im Höhestadium der Pneumonie sich entwickelt und infolge seiner Neigung zu Spontanheilung und Resorption wesentlich gutartiger ist. Weitere Komplikationen sind die Entwicklung von Lungengangrän (s. S. 235) sowie eines Lungenabscesses (s. S. 234). Beide befallen hauptsächlich wenig widerstandsfähige, dekrepite Individuen. Seitens des Herzens wird seltener Endokarditis, häufiger Perikarditis namentlich bei linksseitiger Pneumonie beobachtet. Zeichen einer Herzmuskelschädigung gehören nicht zum Bilde der Pneumonie. Ihr Vorhandensein ist meist auf vorausgegangene andere Erkrankungen oder Intoxikationen (Potatorium) zurückzuführen. Praktisch sehr wichtig ist die schnell auftretende kollapsartige Zirkulationsschwäche mit Klein- und Frequentwerden des Pulses, Absinken der Temperatur und kühlen zyanotischen Extremitäten. Sie beruht auf der durch die Bakterientoxine bedingten Lähmung des Vasomotorenzentrums. Mitunter stellen sich meningitische Symptome ein, bei denen zu unterscheiden ist zwischen harmlosem Meningismus (klarer Liquor), der oft besonders bei Kindern das Krankheitsbild einleitet und flüchtig ist, und der schweren eitrigen Pneumokokkenmeningitis.

Die Prognose richtet sich zunächst nach dem Lebensalter und dem Kräftezustand des Patienten. Bei jugendlichen Individuen ohne vorhergehende konsumierende Erkrankung verläuft die Pneumonie in der Regel günstig. Hohes Fieber ist in diesen Fällen kein schlechtes Zeichen. Höheres Alter, Herzleiden, Emphysem, Kyphoskoliose, Diabetes, Fettsucht, Nephritis, Potatorium trüben die Prognose, desgleichen die Gravidität. Lokalisation im Oberlappen sowie sehr große Ausdehnung des Processes, ferner Wanderpneumonien, vor allem asthenische Pneumonien sowie stärkerer Ikterus, endlich heftige Delirien sind prognostisch ungünstig. Von der größten Bedeutung ist die Beschaffenheit des Pulses, dem daher dauernd besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. Ansteigen des Pulses über 120 sowie Abnahme der Spannung und Sinken des Blutdrucks desselben ist ein ernstes Symptom. Dünnes, sanguinolentes Sputum von dem Aussehen einer Pflaumenbrühe kündigt als Zeichen von Lungenödem Schwäche des linken Herzens an. Sämtliche der oben genannten Komplikationen beeinträchtigen die Prognose, am schwersten die fast stets tödliche eitrige Meningitis.

**Therapie:** Zahlreiche Fälle heilen ohne besondere therapeutische Maßnahmen. Die Therapie zerfällt in spezifische gegen die Erreger gerichtete Mittel und symptomatische, die Beschwerden lindernde Eingriffe.

Als spezifisch-chemotherapeutisches Medikament gegen die Pneumococcen kommt das Optochin, ein Derivat des Chinins in Betracht, und zwar als Optochin. basic. 6 mal 0,2—0,25, d. h. alle 4 Stunden eine Dosis, auch nachts, wobei stets gleichzeitig etwas Milch zu reichen

ist (niemals auf nüchternen Magen!). Erfolgreich ist es namentlich bei Anwendung in den ersten Tagen der Erkrankung. Wegen der gelegentlich auftretenden toxischen Nebenwirkungen ist das Verhalten der Augen (Flimmern, Sehstörungen) durch Kontrolle des Augenhintergrundes und des Gesichtsfeldes dauernd zu überwachen sowie auf Ohrensausen zu achten.

Die Anwendung von Immunserum (Neufeld-Händel) und zwar in großen Dosen bis zu 150 ccm ist bei frühzeitiger Anwendung in manchen Fällen (nur gegenüber den Pneumococcen Typ I) von Erfolg.

Symptomatische Behandlung: Prießnitzsche Brustwickel; bei schweren Fällen mit starken Brustbeschwerden ist ein Senfbrustwickel besonders zu empfehlen, bei Seitenstechen Senfpflaster bzw. Schröpfköpfe. Bei heftigem Hustenreiz im Anfang der Krankheit sowie bei starker Unruhe  $\frac{1}{2}$ –1 cg Morphinum subcut. Später Expektorantien wie Infus. Ipecacuanh. Liquor Ammon. anis.; reichliche Flüssigkeitszufuhr. Antipyretica sind zu vermeiden, dagegen ist empfehlenswert bei schwereren Fällen die Anwendung lauer Bäder von 25–30° (unter Vermeidung jeder Anstrengung für den Patienten) oder nasser Einwicklungen.

Sehr wichtig ist die möglichst frühzeitige Behandlung der Kreislaufschwäche, wobei vor allem die den Vasomotorentonus hebenden Medikamente, eventuell schon prophylaktisch, anzuwenden sind: Coffein, Strychnin, Campher, Adrenalin. Digitalis sowie Strophanthin (intravenös) sind bei älteren Herzmuskelleiden bzw. Klappenfehlern anzuwenden. Näheres vgl. S. 174. Bei Zeichen von Lungenödem Aderlaß von 300–500 ccm. Bei der Pneumonie der Potatoren Alkohol (Wein) sowie laue Bäder mit kühlen Übergießungen. Metapneumonische Empyeme erfordern stets chirurgische Behandlung, die eventuell auch bei Lungenabsceß und Gangrän in Frage kommt. Bei Pneumococccenmeningitis häufige Lumbalpunktionen sowie eventuell Optochin intralumbal injiziert (20–40 ccm  $\frac{1}{2}$  ‰ ige Lösung von Optochin. hydrochlor. in Aqua dest. nach Entleerung von reichlichen Liquormengen).

### Parotitis epidemica (Mumps, Ziegenpeter).

Die Parotitis epidemica ist eine zwar ansteckende, aber harmlose Krankheit, die vor allem Kinder und jugendliche Individuen (hauptsächlich ♂) befällt. Sie tritt teils sporadisch, teils epidemisch in Schulen, Kasernen auf. Der Erreger ist unbekannt. Die Übertragung erfolgt vor allem durch den kranken Menschen, doch kommt auch eine Verbreitung durch gesunde Individuen vor.

**Krankheitsbild:** Inkubationsdauer 18–22 Tage. Unter Temperaturanstieg, mäßiger Störung des Allgemeinbefindens und bisweilen vorhandener leichter Angina entwickelt sich eine schmerzhaft Schwellung der einen (oft der linken) Parotis, worauf oft alsbald die Erkrankung auf die andere Seite übergeht. Die geschwollene Drüse hebt das Ohr läppchen etwas ab, ist von weicher, teigiger Konsistenz und etwas druckempfindlich; die ganze Gesichtshälfte erscheint mäßig gedunsen,



die Haut darüber aber nicht gerötet. Das Öffnen des Mundes und das Kauen ist erschwert. Zur Vereiterung kommt es nicht. Bisweilen erkranken auch die anderen Speicheldrüsen. Die Speichelabsonderung braucht nicht gestört zu sein, doch klagen manche Patienten über Trockenheit im Munde. Der Blutbefund ist nicht charakteristisch. Mitunter besteht eine leichte Milzvergrößerung.

Eine sehr häufige Komplikation bei jungen Männern ist eine mit Schwellung und heftigen Schmerzen einhergehende Hodenentzündung, die meist einseitig (häufiger rechts) auftritt und gelegentlich von Epididymitis begleitet ist; in zahlreichen Fällen führt die Orchitis zu Hodenatrophie.

Seltenere Komplikationen sind eine Otitis media, Beteiligung des Pankreas mit Druckempfindlichkeit und Koliken in der oberen Bauchgegend, Endokarditis sowie Meningismus.

Die Dauer der Krankheit beträgt 1—2 Wochen.

Die **Diagnose** der epidemischen Parotitis ist ohne weiteres bei akuter doppelseitiger Erkrankung zu stellen. Ist sie einseitig, so kommt auch eine sekundäre Parotitis in Frage, die sich im Verlauf verschiedener anderer schwerer Krankheiten (Typhus, Krebskachexie usw.), ferner bei Otitis media einstellt. Sie ist dann oft eitrig, zeigt meist starke Rötung der Haut und führt oft zu Abszeßbildung. Bei chronischer doppelseitiger Parotisschwellung kommt die auf zellige Infiltration der Drüse beruhende Mikuliczsche Krankheit in Betracht, bei der oft in gleicher Weise die Tränendrüsen eine chronische Schwellung zeigen.

**Therapie:** Während des Fiebers Bettruhe; Einfetten der Haut zur Verminderung des Spannungsgefühls, gründliche Spülung des Mundes mit  $H_2O_2$ , eventuell Eisblase. Bei Orchitis Hochlagerung der Hoden und Anlegen eines Suspensoriums.

## Angina.

Unter Angina versteht man eine in der Regel akut verlaufende Entzündung der Gaumenmandeln und des weichen Gaumens. Sie ist eine überaus häufige Krankheit, die hauptsächlich das jugendliche Alter befällt. Unter den Ursachen kommen als disponierende Faktoren Witterungsschädlichkeiten, vor allem Erkältungen in Betracht, gelegentlich chemische Schädlichkeiten, reizende Dämpfe, Verätzungen usw.; in erster Linie aber spielen Infektionserreger eine Hauptrolle, am häufigsten Streptococcen und Staphylococcen. Gehäuftes Auftreten beobachtet man während der schlechten Jahreszeit. Doch sieht man öfter Epidemien auch während des Sommers. In manchen Häusern wie Kasernen, Krankenhäusern usw. ist die Angina endemisch. Viele Menschen zeigen eine ausgesprochene Disposition für Anginen, vor allem Individuen mit lymphatischer Konstitution mit großen Tonsillen und Wucherung der Adenoiden. Auch unmittelbar nach Operationen an der Nase treten oft Anginen auf. Es gibt verschiedene Formen von Angina.

Die **katarrhalische Angina** beginnt mit leichtem Krankheitsgefühl, Schluckschmerz mit Stechen und Kitzeln im Halse und geringer

Temperatursteigerung, die unter Frösteln, Kopfschmerz, Abgeschlagenheit im Laufe der nächsten Stunden höhere Grade erreichen kann. Es besteht eine Schwellung und Rötung der Gaumenmandeln, sowie Rötung des weichen Gaumens und der Gaumenbögen. Mitunter ist auch die Rachentonsille in der gleichen Weise erkrankt (Rhinoscopia posterior!), bei stärkerer Schwellung derselben kann es zur Erschwerung der Nasenatmung kommen. Gelegentlich ist auch die Zungentonsille beteiligt. Die Dauer der Erkrankung beträgt in der Regel nur wenige Tage. Diese Form der Angina stellt die leichteste Form dar.

Bei **Angina lacunaris s. follicularis**, die in der Regel auf Streptococceninfektion beruht, pflegen die allgemeinen Krankheitserscheinungen schwerer zu sein. Sie beginnt fast immer plötzlich mit hohem Fieber bis zu 40°, oft mit Schüttelfrost und zeigt die Allgemeinerscheinungen einer akuten Infektionskrankheit. Die geröteten und geschwellenen Tonsillen meist beider Seiten sehen wie gespickt aus, weil ihre Lacunen gelbliche Pfröpfe enthalten. Diese lassen sich zum Teil mit einem Spatel auspressen und erweisen sich bei mikroskopischer Untersuchung als bestehend aus Leukocyten, Fettsäurenadeln, Leptothrixfäden und reichlich Bakterien enthaltenem Detritus. Die gleichen Veränderungen zeigen bisweilen die Rachentonsille, sowie gelegentlich auch die Zungenbalgdrüsen (Kehlkopfspiegel!). Stets besteht eine mäßige Schwellung und Druckempfindlichkeit der regionären Halslymphdrüsen am Kieferwinkel. Da auch der Scharlach oft mit einer folliculären Angina beginnt, so ist bei jeder Angina nicht nur der Rachen zu inspizieren, sondern stets auch auf den Ausbruch eines Exanthems zu fahnden. Bei Scharlachangina fällt oft die gleichzeitig vorhandene intensive Rötung der gesamten Rachenschleimhaut auf.

Beachtenswert ist ferner die Tatsache, daß eine folliculäre Angina mitunter auch bei nicht vergrößerten Tonsillen auftritt und dann leicht übersehen wird. Bei Verdacht auf Angina versäume man daher nicht, die Tonsille durch Seitwärtsdrängung der vorderen Gaumenbögen mittels Spatels oder Pablerschen Hakens dem Auge sichtbar zu machen.

Bei reichlichem Vorhandensein von Pfröpfen können diese zusammenfließen, so daß der Anschein zusammenhängender membranöser Beläge wie bei Diphtherie erweckt wird. Zum Unterschiede von diesen lassen sich jedoch daneben in der Regel einzelne charakteristische Pfröpfe finden, auch gelingt es oft mittels Tupfers einen Teil der Beläge zwischen den Pfröpfen wegzuwischen. Niemals entwickeln sich im Gegensatz zu Diphtherie bei Angina auf den Gaumenbögen und der Uvula Pfröpfe bzw. Beläge. Andererseits kann echte Diphtherie gelegentlich unter den Erscheinungen einer gewöhnlichen folliculären Angina beginnen. Praktisch ist stets mit dieser Möglichkeit zu rechnen, namentlich wenn kein hohes Fieber besteht.

Bei der sog. **Keratose** der Tonsillen, die bei oberflächlicher Betrachtung mit der folliculären Angina leicht verwechselt wird, handelt es sich um einen fieberlosen stationären Zustand, der auf partieller Verhornung der Schleimhaut beruht. Die weißlichen Flecken lassen sich daher nicht durch Spateldruck entfernen.

Die katarrhalischen Erscheinungen sowie die allgemeinen Krankheitssymptome schwinden bei Angina im Laufe weniger Tage (Entfieberung meist am dritten Tage), desgleichen, wenn auch oft etwas später die Pfröpfe. Die anfangs vorhandene Leukocytose geht (im Gegensatz zu Scharlach) schnell zurück. In anderen Fällen bleiben die Pfröpfe teilweise bestehen, es erfolgt dann eine Eindickung und nicht selten schließlich eine Verkalkung derselben („Mandelsteine“). Für die Rezidive der Angina sowie für die chronische Angina haben sie große Bedeutung.

Aus einer follikulären Angina entwickelt sich häufig als lokale Komplikation ein sog. **Tonsillarabsceß** (Peritonsillarabsceß, Angina parenchymatosa s. phlegmonosa). Er ist meist einseitig und entsteht durch Eiterretention in der Tiefe einer verstopften Lacune, am häufigsten am oberen Pol der Tonsille, weniger häufig in den hinteren oder zentralen Bezirken, am seltensten im unteren Teil (hier nicht zu verwechseln mit den von cariösen Zähnen ausgehenden dentalen Abscessen). Infolge von Infiltration und Ödem der Nachbarschaft entsteht eine enorme Schwellung der Tonsille und der angrenzenden Teile des weichen Gaumens, wodurch das Zäpfchen nach der gesunden Seite herübergedrängt wird. Das Fieber ist in der Regel nicht sehr hoch. Dagegen bestehen äußerst heftige lokale Beschwerden, namentlich ein stechender Schmerz, der beim Schlucken bis in die Ohren ausstrahlt, so daß die Patienten sehr unter dem Zustande zu leiden haben. Die Erkrankung ist meist schon an der kloßigen bzw. näselnden Sprache zu erkennen. Die Nahrungsaufnahme ist äußerst erschwert und muß sich auf flüssige Nahrung beschränken. Der Mund wird infolge entzündlicher Schwellung in der Nachbarschaft des Kiefergelenks nur mit Mühe geöffnet, so daß eine genaue Inspektion der Mundhöhle auf Schwierigkeiten stößt. Es besteht starker Foetor ex ore, die Zunge ist dick belegt. Bald ist an einer Stelle der Tonsille, häufiger des vorderen Gaumenbogens eine Vorwölbung zu erkennen, die bei Palpation mit dem Finger Fluktuation erkennen läßt. Sich selbst überlassen bricht der Absceß in der Regel nach einer Reihe von Tagen spontan durch, es kommt zu reichlicher Eiterentleerung, worauf unter Abschwellung der Tonsille Heilung erfolgt. Mitunter beginnt dann der gleiche Prozeß auf der anderen Seite. Nicht häufig treten ernstere Komplikationen ein, wenn die Eröffnung des Abscesses nicht frühzeitig erfolgt. So beobachtet man z. B. Fortkriechen der Eiterung in die Nachbarschaft mit konsekutiver Mundbodenphlegmone (Angina Ludovici), eventuell sogar Fortleitung ins Mediastinum. Selten ist die durch die Eiterung bewirkte Arrosion größerer Arterien mit gefährlichen Blutungen. Endlich kommt bei Spontandurchbruch im Schlaf durch Aspiration größerer Eitermengen Erstickungsgefahr in Betracht. Der Tonsillarabsceß hat eine ausgesprochene Neigung zu Rezidiven.

Die **Angina ulcero-membranacea** (Plaut-Vincent) ist eine besondere, nicht seltene Form von Angina. Sie beginnt unter den gleichen Erscheinungen wie die gewöhnlichen Anginen, meist mit niedrigem Fieber, das mitunter auch vollkommen fehlt. Die Tonsillen (meist

einseitig) sowie gelegentlich auch die Uvula zeigen einen grauweißen schmierigen Belag, der oft an Diphtherie erinnert. Bald entwickelt sich ein unregelmäßiges, mit schmierigem gelblichgrauem Belag überzogenes Geschwür, das mitunter auf den Gaumenbogen übergreift. Die regionären Halslymphdrüsen sind mäßig geschwollen und druckempfindlich. In einzelnen Fällen beobachtet man gleichartige Uleerationen an der Wangen- sowie der Lippenschleimhaut. Mitunter nimmt die Angina Vincenti ihren Ausgang von einer einfachen akuten Angina. Auch mit den Zähnen im Zusammenhang stehende Infektionen, eitrige Gingivitis usw. gehen nicht selten voraus.

Die Diagnose darf sich niemals allein auf den klinischen Befund stützen. Abgesehen von der Ähnlichkeit mit Diphtherie ist vor allem eine Verwechslung mit der sehr ähnlichen luetischen Angina möglich, die mitunter auch mit geringem Fieber einhergeht. Beide werden günstig durch Salvarsan beeinflusst (s. unten). Auch bei Quecksilbervergiftung beobachtet man gelegentlich ähnliche Bilder. Ausschlaggebend ist ausschließlich der bakteriologische an Abstrichpräparaten erhobene Befund, d. h. der Nachweis von gleichzeitigem (symbiotischen) Vorhandensein von spindelförmigen Bakterien, *Bac. fusiformes* und zahlreichen Spirillen (Giemsa-Färbung bzw. Tuscheverfahren). Der *Bac. fusiformis* ist gramnegativ und zeigt mehrere Vakuolen bzw. bei Giemsa-Färbung einzelne Innenkörper in seinem Leibe. Die Spirillen sind grampositiv. Der diagnostische Wert der fusospirillären Symbiose wird allerdings durch die Tatsache etwas eingeschränkt, daß sich dieselbe auch sonst oft im Munde, namentlich an den Zähnen und am Zahnfleischrand nachweisen läßt.

Der Verlauf ist fast immer günstig, die Abheilung erfolgt in der Regel innerhalb weniger Tage; nicht häufig ist eine längere Krankheitsdauer.

**Therapie der Anginen:** Bei katarrhalischer Angina beschränkt sie sich auf Bettruhe, Prießnitzsche Halswickel und Gurgeln mit Wasserstoffsuperoxyd. Bei follikulärer Angina werden teils heiße Halswickel, teils Eiskravatten angenehm empfunden, eventuell Schlucken von Eisstückchen. Bei höherem Fieber und Kopfschmerzen Aspirin (3 mal 0,5), Phenacetin (2 mal 0,25) oder Antipyrin (2 mal 0,5). Bei Tonsillarabscess zunächst Eiskravatte sowie fleißiges Spülen mit möglichst heißem Kamillente, wodurch der Verlauf der Krankheit wesentlich abgekürzt wird und die Beschwerden meist eine erhebliche Linderung erfahren. Oft kann man auf Narkotica nicht verzichten (Morphium, Pantopon). Nicht selten bewirkt oberflächliche Stichelung der geschwollenen Tonsille Verminderung der Schmerzen. Sobald Fluktuation nachweisbar ist, empfiehlt sich Eröffnung des Abscesses mit dem Messer.

Nach Cocainanästhesie inzidiert man mit einem schmalen Skalpell, das man vorsichtshalber 2 cm hinter der Spitze mit Heftpflaster umwickelt. Als Incisionsstelle dient der Mittelpunkt einer Verbindungslinie zwischen dem letzten Molaren und der Basis der Uvula; man schneidet sagittal, also parallel der Zahnreihe etwa 1–2 cm tief ein. Bei dieser Schnittführung ist die Verletzung größerer Gefäße nicht zu befürchten. Daran anschließend eventuell Erweiterung der Wunde mit einer Kornzange sowie gründliches Spülen mit  $H_2O_2$  oder warmem Kamillente. Am

darauffolgenden Tage führt man zur Verhütung von Verklebungen eine stumpfe Sonde ein. Auch wenn die Incision keine Entleerung von Eiter bewirkt, hat sie meist ein Zurückgehen der Beschwerden zur Folge.

Die Therapie der Angina Vincenti ist die gleiche wie bei den gewöhnlichen Anginen, doch wird die Heilung wesentlich durch eine intravenöse Salvarsandosierung bzw. lokale Applikation von Salvarsan (Neosalvarsan in Pulver 2 mal 0,25) beschleunigt.

Hypertrophische Tonsillen sowie Tonsillen mit Pfröpfen sind bei der meist vorhandenen Neigung zu wiederholten Anginen und Tonsillarabscessen, auch wenn sie nicht vergrößert sind, am besten operativ zu entfernen, aber nur, nachdem alle akuten Entzündungserscheinungen abgeklungen sind. Die Tonsillektomie wird am besten mittels sichel-förmigen Knopfmessers und breiter Hakenpinzette ausgeführt. Diese Methode hat namentlich bei verwachsenen Tonsillen Vorzüge vor der Tonsillotomie mittels Ringmessertonsillotoms, das meist nur eine Kappung der Mandeln unter Hinterlassung von Resten derselben bewirkt. Es ist übrigens zu beachten, daß die Wunde nach Tonsillotomien normalerweise für kurze Zeit grauweiße Beläge aufweist, die man nicht mit Diphtherie verwechseln darf. In vielen Fällen hat schon die Schlitzung der Lacunen sowie die Aussaugung der Tonsillen bzw. ihre Ausquetschung erheblichen Erfolg.

### Chronische Angina und Folgezustände der Anginen.

In zahlreichen Fällen bildet sich eine Angina nach Schwinden der akuten Allgemeinerscheinungen nicht vollständig zurück. Das Zurückbleiben von Pfröpfen wurde schon erwähnt. Es ist besonders zu betonen, daß bei einfacher Inspektion des Rachens die Pfröpfe nicht selten übersehen werden. In zweifelhaften Fällen soll man sich dieselben sichtbar machen, indem man die Mandeln ausdrückt bzw. aussaugt. Häufig ist, namentlich bei von vornherein hypertrophischen Tonsillen die chronische superfizielle Tonsillitis, die in besonders hohem Maße zu Rezidiven neigt. Der chronische Entzündungszustand wird bei großen Tonsillen weniger leicht übersehen als bei kleinen, zum Teil hinter den Gaumenbögen versteckt liegenden Mandeln. In beiden Fällen können subjektive Beschwerden vollständig fehlen. In anderen Fällen klagen die Patienten über einen chronischen Reizzustand oder ein Fremdkörpergefühl im Hals, auch leiden sie an starkem Fötör infolge der Zersetzung der Pfröpfe. Mitunter besteht durch Fortleitung ein hartnäckiger Katarrh der Tuba Eustachii mit lästigem Spannungsgefühl im Ohr bzw. Schwerhörigkeit. Das einzige sichere objektive Zeichen der chronischen Entzündung ist der Nachweis von gelblichem oder bräunlichem Inhalt in den Lacunen der Tonsillen. Ein weiteres Symptom ist das Vorhandensein von geringerer oder stärkerer Schwellung der regionären Halsdrüsen, wofür sich diese nicht auf andere Ursachen zurückführen läßt.

Die außerordentlich große Bedeutung der Anginen liegt darin, daß es oft nicht bei der bloßen lokalen Erkrankung mit Neigung zu

Rezidiven bleibt, sondern daß in zahlreichen Fällen die Angina, die akute wie namentlich die chronische rezidivierende Form zum Ausgangspunkt verschiedener schwerer infektiöser Allgemeinerkrankungen wird. Die Erklärung hierfür ergibt sich aus den anatomisch-physiologischen Verhältnissen.

Die Gaumentonsillen bilden zusammen mit der Rachenmandel, den Follikeln der hinteren Wand des Pharynx und den in dessen Seitenwänden hinter den hinteren Gaumenbögen gelegenen sog. Seitensträngen sowie den Zungenbalgdrüsen einen großen Komplex von lymphatischem Gewebe, den sog. Waldeyerschen Schlundring. Derselbe dient normalerweise als wichtiges Filterorgan, das die zahlreichen durch die Einatmung sowie die Nahrungsaufnahme eindringenden pathogenen Keime zurückhält. Andererseits ist infolge dieser Funktion der lymphatische Schlundapparat selbst in besonders hohem Maße infektiösen Erkrankungen ausgesetzt und bildet dann seinerseits die Eintrittspforte für zahlreiche bakterielle Krankheitserreger (Diphtherie, Scharlach, Typhus usw.).

Häufige auf diesem Wege entstehende Allgemeinerkrankungen als Folgeerscheinungen von Anginen sind der akute und chronische infektiöse Gelenkrheumatismus (nicht die Arthritis deformans), ferner die akute hämorrhagische Nephritis, sowie die Sepsis. Die am häufigsten dabei in Frage kommenden Bakterien sind Streptococci, nächst dem Pneumococci, ferner Staphylococci u. a. Dieser praktisch überaus wichtige Zusammenhang ist um so mehr zu beachten, als nicht selten, wie oben angedeutet, die subjektiven Beschwerden der chronischen Angina sehr gering sind oder von den Patienten infolge von Gewöhnung allmählich völlig ignoriert werden. Der Beweis der ursächlichen Bedeutung der Tonsillen für die genannten Krankheiten liegt in der Tatsache, daß nach Beseitigung der Eintrittspforte durch Entfernung der Tonsillen — oft genügt schon die Schlitzung oder das Ausdrücken der Mandellakunen — die genannten Nachkrankheiten nicht selten prompt verschwinden.

Andere Erkrankungen, die gelegentlich ursächlich mit Anginen im Zusammenhang stehen, sind Appendicitis, ferner Iritis sowie neuralgische Erkrankungen usw. Dagegen sind Lähmungen speziell des Gaumensegels und der Akkommodation nach Anginen so gut wie stets ein Zeichen dafür, daß die vorangegangene „Angina“ eine verkannte Diphtherie war.

Die einzig wirksame **Therapie** der chronischen Angina und ihrer Folgezustände ist daher die oben genannte Methode der Ausschaltung dieser Infektionspforte; bei jüngeren Individuen und vor allem bei Kindern soll man sich durch die Rhinoscopia posterior gleichzeitig von dem Zustand der Rachenmandel überzeugen, wenn auch diese wesentlich seltener eine ähnliche Rolle wie die Gaumentonsillen spielt. Unmittelbar nach der Tonsillektomie kommt es gelegentlich zu einer kurz dauernden Exazerbation des vorhandenen Leidens, z. B. einer Verstärkung der Gelenksbeschwerden, Zunahme der Albuminurie usw. Diese Erscheinung ist jedoch bedeutungslos.

## Diphtherie.

Die Diphtherie ist eine endemische, hauptsächlich das Kindesalter bis etwa zum 10. Jahre befallende Infektionskrankheit.

Der Löfflersche Bacillus wird durch Diphtherie-Kranke, aber auch durch gesunde Bacillenträger (s. u.) verbreitet. Außerhalb des Körpers hält er sich besonders in dunkler feuchter Umgebung monatelang virulent; er haftet auch an Gebrauchsgegenständen. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch Anhusten oder durch infizierte Gegenstände.

Der Diphtheriebacillus ist ein grampositives, unbewegliches, plumpes, oft etwas gekrümmtes Stäbchen von der Länge eines Tuberkelbacillus mit keulenartiger Auftreibung der Enden und bei Löfflerfärbung sichtbarer körniger Leibesstruktur. Die Bakterien finden sich hauptsächlich in den Membranen und liegen dort oft nesterartig wie die Finger einer Hand zusammen. Zur Identifizierung dient vor allem die Neissersche Doppelfärbung (essigsäures Methylenblau und Vesuvin) zur Darstellung der charakteristischen Polkörper. Die Züchtung erfolgt bei Körpertemperatur am besten auf Löfflerschem Blutserum. Zum Unterschiede von den morphologisch sehr ähnlichen Pseudodiphtheriebacillen bildet der Diphtheriebacillus in Dextrose-Lackmusnährböden Säure. Das einzige absolut sichere Kriterium ist indessen der Tierversuch: Meerschweinchen zeigen an der Injektionsstelle ein blutiges Ödem und sterben bei großen Dosen nach 2—4 Tagen; besonders charakteristisch ist eine starke Schwellung und Rötung der Nebennieren.

Der Diphtheriebacillus bleibt an der Eintrittspforte liegen und geht nicht in die Blutbahn über; die Krankheitserscheinungen beruhen auf dem von ihm produzierten heftigen Gift, das die charakteristischen Schleimhautveränderungen erzeugt und sich durch seine Affinität zu verschiedenen Organen, speziell dem Nervensystem, auszeichnet. Die diphtherische Schleimhautrekrankung beginnt mit einer Entzündung, die mit der Abscheidung eines sofort gerinnenden fibrinösen Exsudates („Membranen“) einhergeht und zu einer im einzelnen Falle verschieden tief greifenden Nekrose der Schleimhaut und des Exsudates führt. Die Membranen enthalten demnach Teile der abgestorbenen Schleimhaut.

**Krankheitsbild:** Inkubation 2—7 Tage. Die Krankheit beginnt in der Regel mit einer akut einsetzenden Störung des Allgemeinbefindens mit Mattigkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen, bei Kindern häufig mit Leibschmerzen. Die Haut ist meist auffallend blaß trotz bereits bestehenden Fiebers. Halsbeschwerden sind anfangs überhaupt nicht vorhanden oder sehr geringfügig. Trotzdem ergibt bereits die Untersuchung des Rachens eine mäßige Schwellung und Rötung der Rachenschleimhaut und der Tonsillen und auf diesen streifen- und punktförmige grauweiße Fleckchen, die sich nicht wegwischen lassen und bis zum nächsten Tage an Ausdehnung erheblich zunehmen, so daß sich in Kürze die Tonsillen in großer Ausdehnung mit grauweißen oder grünlichweißen zusammenhängenden Membranen überziehen, die weiter oft auch auf die Gaumenbögen und das Zäpfchen übergreifen. Jetzt bestehen starke Schluckbeschwerden, eine schmerzhaft Schwellung der Kieferwinkeldrüsen, beschleunigter Puls, der höher ist, als der Temperatur entspricht, und starkes allgemeines Krankheitsgefühl. Oft ist eine mäßige Milzvergrößerung nachweisbar sowie geringe Albuminurie. Im Blut ist stets eine Leukocytose mit relativer Vermehrung der Polynukleären und Verminderung oder Fehlen der Eosinophilen vorhanden.

In vielen Fällen kommt auch ohne Behandlung die Erkrankung nach einigen Tagen zum Stehen, indem der Belag nicht weiter fortschreitet, schärfer begrenzt erscheint und sich schließlich abstößt, wobei eine normale Schleimhaut zum Vorschein kommt.

Bei schwerem und ungünstigem Verlauf dehnen sich die Membranen weiter aus, einmal in die Nasenhöhle (serös-blutiger oder eitriger Ausfluß aus der Nase und Behinderung der Nasenatmung); vor allem aber kommt es zu dem gefährlichen Hinabsteigen des Prozesses in den Kehlkopf und die Luftröhre. Heiserkeit, Hustenreiz und namentlich der charakteristische bellende sog. Croup Husten kündigen dies Ereignis an, das sich zugleich durch Unruhe und zunehmende Ängstlichkeit des Kindes verriät. Infolge der Enge des kindlichen Kehlkopfes kommt es rasch zur Stenosierung, die Stimme wird tonlos, die Atemzüge werden laut hörbar, sägend und pfeifend, die Atmung geschieht unter stärkster Anspannung aller Hilfsmuskeln, wobei die Kinder aufrecht sitzend den Kopf rückwärts beugen. Zugleich zeigen die inspiratorisch auftretenden Einziehungen im Epigastrium, im Jugulum und seitlich am Thorax sowie die Cyanose die Erschwerung der Luftzufuhr zu den Lungen an.

Nur ganz ausnahmsweise kommt es in diesem Stadium durch Ausstoßung der Membranen nach Hustenstößen oder Erbrechen zu einer spontanen Besserung. Vielmehr tritt in der Regel sehr bald bei nicht rechtzeitiger Tracheotomie (s. unten) die Krankheit in die letzte Phase unter dem Bilde der fortschreitenden Kohlensäurevergiftung; die Erstickungsanfälle werden seltener, der Patient wird ruhiger, bis schließlich im tiefsten Koma der Tod erfolgt. Das gleiche geschieht bei zu spät angewendeter Tracheotomie, wenn die Membranen bereits in den Bronchialbaum hinabgestiegen sind.

Während bei dieser schweren Form der Diphtherie die mechanische Verlegung der Luftwege die Hauptrolle spielt, ist in anderen Fällen die Schwere der Infektion, d. h. die Intensität der Giftwirkung bzw. die Widerstandslosigkeit des Organismus dieser gegenüber die Ursache für den ungünstigen Verlauf.

Bei der „malignen“ oder toxischen Diphtherie besteht meist von vornherein in schweres Krankheitsbild mit starker Prostration und Apathie sowie anfangs oft hohem Fieber. Unter heftigem Erbrechen und häufigem Nasenbluten wird der frequente Puls sehr bald weich und klein, die Zunge trocken, fuliginös, und es besteht eine leichenartige Hautblässe. Trotz der geringfügigen Klagen über den Hals zeigen die Rachengebilde meist schon in den ersten Tagen die schwersten Veränderungen: In rasch wachsender Ausdehnung überziehen sich die Tonsillen, das Gaumensegel und die stark geschwollene Uvula mit Membranen, die sich bald mit Blutungen durchsetzen, eine schwärzlich-grünliche Färbung annehmen und eine rasch fortschreitende faulige Zersetzung mit ausgedehnter Geschwürsbildung und äußerst widerlichem Gangrängeruch erkennen lassen. Das Übergreifen des Prozesses auf die Nase mit Blutungen und Entleerung übelriechender Flüssigkeit aus derselben sowie auf die Augenbindehaut mit heftigem Lidödem ist nicht selten. Frühzeitige sehr starke und schmerzhafte Schwellung



der Halsdrüsen mit ausgedehntem periglandulärem entzündlichen Ödem, ferner das Auftreten von Hautblutungen, namentlich auch im Anschluß an Injektionen, schwere Nephritis sowie eine rasch sich entwickelnde Herzdilatation lassen die meist unfehlbar zum Tode führende Wirkung des Diphtheriegiftes schon in den ersten Tagen erkennen. Unter schnell zunehmender Kreislaufschwäche, bei der die Lähmung der Vasomotoren (vgl. S. 152) eine entscheidende Rolle spielt, unter höchstgradiger Kraftlosigkeit und Kollapstemperaturen erlischt schließlich bei bis zuletzt erhaltenem Bewußtsein das Leben. Nur in ganz vereinzelt Fällen kommt es schließlich trotzdem zu einer Heilung, das Fieber bleibt dann noch wochenlang bestehen, allmählich erfolgt Abstoßung der Beläge und Reinigung der Geschwüre, bisweilen unter Hinterlassung von Narben-Komplikationen (s. u.) seitens des Ohres, Drüsenvereiterung, Lähmungen können die Rekonvaleszenz noch erheblich in die Länge ziehen.

**Komplikationen:** Leichte Nierenreizung mit geringer Albuminurie ist bei Diphtherie sehr häufig und bedeutungslos. Schwere Nierenschädigungen mit viel Eiweiß und Zylindern finden sich regelmäßig bei den schweren Formen, speziell der malignen Diphtherie in Form einer Nephrose ohne Blutdrucksteigerung und ohne Hämaturie, aber auch ohne deutliche Ödembereitschaft.

Sehr wichtig sind die Störungen von seiten des Zirkulationsapparates. Bei der malignen Diphtherie erfolgt das Ende stets unter dem Bilde der allmählich fortschreitenden Herzlähmung. Aber auch in anderen Fällen ist dem Verhalten des Zirkulationsapparates ganz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Das Diphtheriegift kann in schweren Fällen sowohl eine Lähmung der Vasomotoren wie schwere Schädigungen des Herzmuskels selbst in Form einer Myokarditis mit Verfettung und Zerfall der Muskelfasern sowie entzündlichen interstitiellen Herden und eventuell daran anschließender Narbenbildung bewirken.

Die frühzeitig, d. h. auf dem Höhepunkte der Krankheit eintretenden Störungen beruhen meist vorwiegend auf zentraler Vasomotorenlähmung. Die schwere, oft tödliche Herzmuskelerkrankung hingegen kommt meist erst später zur Ausbildung, am häufigsten zwischen dem 10. und 17. Tag, aber gelegentlich auch mehrere Wochen später, mitunter weit in der Rekonvaleszenz. Stets handelt es sich dabei um schwere Diphtherien oder wenigstens um Fälle mit lange haftenden Belägen. Eine sorgfältige Beobachtung läßt meist schon einige Tage vorher, selbst wenn noch keinerlei Störungen des subjektiven Befindens bestehen, gewisse die Katastrophe ankündigende Zeichen erkennen, wie zunehmende Blässe, leichte Temperatursteigerungen, Vergrößerung der Leber, eventuell herabgehende Pulsfrequenz, Sinken des Blutdrucks, bald auch deutliche Verbreiterung der Herzdämpfung. In anderen Fällen sind plötzlich eintretendes Erbrechen, ferner Klagen über Leibschmerzen, Apathie sowie Unruhe ominöse Symptome; gelegentlich besteht am Herzen Galopprrhythmus. Der Tod („Diphtheriespätod“) erfolgt blitzartig plötzlich und kann bei Übersehen der genannten

Warnungszeichen völlig überraschend kommen. Bei Kindern ist der tödliche Ausgang häufiger als bei Erwachsenen. Bei Überstehen der Herzerkrankung verzögert sich die Rekonvaleszenz monatelang. Wegen des tückischen Charakters der Herzkomplicationen ist vor der Entlassung der Genesenen, besonders nach schwerer Diphtherie eine genaue Herzuntersuchung, wenn möglich mit Röntgenkontrolle unerlässlich.

Eine häufige weitere Komplikation sind Lähmungen, die sich aus dem neurotrophen Verhalten des Diphtherie-Giftes erklären, das wie das Tetanusgift nicht durch die Blutbahn, sondern durch Wanderung entlang den Nervenstämmen dem Zentral-Nervensystem zugeführt wird, doch kommt es außerdem zum Teil primär zu degenerativen Muskelveränderungen ähnlich den Befunden am Herzmuskel. Analog den Störungen am Zirkulationsapparat unterscheidet man Früh- und Spätlähmungen. Die in den ersten Tagen auftretende Gaumensegellähmung (näselnde Sprache besonders deutlich beim Vokal i sowie Herausfließen des Getrunkenen aus der Nase) tritt nur bei schwerer Diphtherie ein. Unter den Spätlähmungen, die meist gegen Ende der 2. und in der 3. Woche, gelegentlich aber auch bedeutend später sich einstellen, ist am häufigsten ebenfalls die Gaumensegellähmung; nächst dem beobachtet man eine Akkommodationslähmung (Lesen in der Nähe unmöglich), Abducensparese, Schlucklähmung, die sich mitunter durch Husten während des Schlafes infolge von Aspiration von Schleim ankündigt, Lähmung der Rückenmuskeln sowie Extremitätenparese, die besonders spät auftreten und prognostisch günstig sind, ferner Sensibilitätsstörungen sowie Ataxie wie bei Tabes; gelegentlich kommt es nur zum Schwinden der Patellar- und Achillesreflexe. Sehr gefährlich ist die Beteiligung des Phrenicus wegen der Gefahr der Atemlähmung. Zu beachten ist, daß die Lähmungen mitunter auch nach leichter Diphtherie auftreten. In der Rekonvaleszenz ist daher stets auf diese Komplikation zu fahnden (Kontrolle der Reflexe!). Otitis media wird mitunter bei schwereren Fällen beobachtet.

**Besondere Verlaufsformen:** Häufig bei Säuglingen, sehr selten bei Erwachsenen ist die primäre Nasen-Diphtherie, die mit Membranbildung oder nur — z. B. bei Säuglingen — mit eitrigem oder sanguinolentem Ausfluß einhergeht und daher mitunter übersehen wird. Die Gefahr, speziell bei jungen Kindern liegt in dem nicht seltenen direkten Überspringen der Diphtherie auf den Kehlkopf, daher ist bei diesen Fällen stets frühzeitig zu laryngoskopieren. Bei sehr schweren Formen entwickeln sich besonders bei marastischen Kindern diphtherische Membranen an der Vulva, an den Conjunctiven und auf Wundflächen (Nabel-diphtherie).

Sehr leichte Fälle, die sich nur durch die bakteriologische Untersuchung identifizieren lassen, verlaufen bisweilen unter dem Bilde einer harmlosen katarrhalischen Angina, deren wahrer Charakter teils durch Übertragung auf andere Individuen, teils durch das spätere Auftreten von Lähmungen offenkundig wird.

Sowohl bei schweren wie bei leichten Fällen können nach der Abheilung des Rachenprozesses eventuell monatelang infektionstüchtige Bacillen zurückbleiben (Dauerausscheider), gegen die bisher ein

absolut wirksames Mittel vergeblich gesucht wurde. Schließlich ist das Vorkommen von Diphtheriebacillen in dem Rachen gesunder Personen zu erwähnen, die sich wie vor allem das Pflegepersonal in der Umgebung Diphtherie-Krankter aufhalten (Keimträger). Sie haben naturgemäß eine große epidemiologische Bedeutung.

Die Kombination der Diphtherie mit anderen akuten Infektionskrankheiten, namentlich Masern, Scharlach, Keuchhusten bedeutet stets eine sehr ernste Komplikation, die häufig zu einem letalen Ausgang führt.

**Diagnose:** Die ausgebildete Rachendiphtherie mit ihren weißen Belägen macht, namentlich wenn sie auf die Umgebung der Tonsillen und die Uvula übergreifen, keine diagnostischen Schwierigkeiten, wohl aber die Fälle mit nicht typischem Rachenbefund. So kommen Fälle mit einem von der gewöhnlichen Angina follicularis nicht zu unterscheidenden Rachenbefund vor. Im allgemeinen spricht brüsker Beginn der Krankheit mit hoher Temperatur und Schüttelfrost mehr für Angina (bzw. Scharlach); hoher Puls bei verhältnismäßig niedriger Temperatur ist bezeichnend für Diphtherie. Jedenfalls versäume man nie, in allen derartigen Fällen namentlich bei Kindern den Rachen genau zu inspizieren. Unverzüglich ist ein Abstrich zur bakteriologischen Untersuchung vorzunehmen (transportfertige Tupferröhren sind in jeder Apotheke zu haben. Man vermeide die Entnahme unmittelbar nach Applikation eines Antisepticums).

Gewisse Erkrankungen können der Diphtherie sehr ähneln. Zu beachten ist, daß die Wundfläche nach Tonsillotomie sich regelmäßig für kurze Zeit mit einem grauweißen Belag überzieht, der der Diphtherie täuschend ähnlich sein kann. Die Plaut-Vincentische Angina ulceromembranacea (vgl. S. 62) mit graugelben Belägen bzw. Membranen, die auf die Uvula übergreifen können, zeigt nur geringes Fieber und oft stark protrahierten Verlauf. Von der ihr sehr ähnlichen Diphtherie unterscheidet sie sich durch den charakteristischen Befund der Spirochäten und des *Bac. fusiformis* (Färbung des Abstrichpräparates mit verdünntem Carbofuchsin). Die ulceröse Angina bei Lues II, die beiden Affektionen sehr ähnlich sein kann, läßt sich aus dem gleichzeitigen Bestehen anderer spezifischer Veränderungen (Roseola, Kondylome usw.) und der Wa.-Reaktion erkennen. Bei kleinen Kindern ist bei Bestehen von eitrigem Ausfluß aus der Nase dieser stets auf Diphtherie-Bacillen zu untersuchen.

**Prognose:** Abgesehen von der Schwere der Infektion und dem etwaigen Vorhandensein von Komplikationen ist ausschlaggebend der Zeitpunkt des Beginnes der Behandlung, d. h. der Serumtherapie. Und zwar ist, wenn man von der sehr oft letal verlaufenden malignen Diphtherie absieht, die Prognose um so günstiger, je früher die Serumbehandlung einsetzt. Insbesondere vermag sie bei rechtzeitiger Anwendung die nachträgliche Entwicklung des Kehlkopferoups zu verhindern. Immerhin ist zu berücksichtigen, daß die einzelnen Epidemien einen verschieden schweren Charakter zeigen, daß aber auch zweifellos die schweren Erkrankungen früherer Zeiten zum größten Teil in die Vor-

serumepoche fallen. Im einzelnen Fall spricht neben dem Allgemeinbefinden eine erheblichere Drüsenschwellung sowie stärkere Albuminurie für eine schwere Erkrankung.

**Therapie:** Das souveräne Mittel, auf das in keinem Fall verzichtet werden darf, ist das von Behring eingeführte Diphtherieheilserum, das durch aktive Immunisierung von Pferden mit Diphtherie-Bacillen gewonnen wird<sup>1)</sup>. Es wird in zugeschmolzenen Ampullen abgegeben und ist mit 0,5% Phenol zwecks Konservierung versetzt. Seine Anwendung hat bereits bei bloßem Diphtherie-Verdacht unverzüglich zu erfolgen, so daß man nicht erst das Resultat der bakteriologischen Untersuchung abwarten darf. Man injiziert unter aseptischen Kautelen subcutan unter die Bauchhaut oder in die Oberschenkel oder besser intramuskulär in die Glutäen je nach dem Alter des Patienten und der Schwere des Falles 1500—3000 Immunitätseinheiten (I.-E.). Bei besonders schweren Fällen werden mit Erfolg noch größere Dosen (20000 I. E. und mehr), eventuell intravenös verabreicht. Eine Wiederholung der Seruminjektion in den darauffolgenden Tagen ist geboten bei den schweren Fällen und dort, wo das Schwinden der Membranen nicht prompt bereits nach der 1. Injektion in Gang kommt. Auch die lokale Applikation von Serum neben den Injektionen hat sich bei schweren Prozessen bewährt (z. B. bei Augen-Diphtherie Einträufeln in den Conjunctivalsack und Auflegen von serumgetränkten Tupfern). Anaphylaktischen Erscheinungen (s. u.) kann man dadurch begegnen, daß man bei den auf die erste folgenden Injektionen Serum in kleinen Portionen zu je  $\frac{1}{2}$ , 1 und 2 ccm in Abständen von 15 Minuten subcutan 5 Stunden vor der Volldosis injiziert (wodurch Antianaphylaxie erzeugt wird<sup>2)</sup>). Das Heilserum wirkt nur antitoxisch, nicht bakteriolytisch, die Bakterien selbst werden daher durch dasselbe nicht zum Schwinden gebracht, woher sich auch seine Unwirksamkeit gegen Dauerausscheider erklärt. Gegen die Entwicklung der Herzkomplicationen und der Lähmungen ist die Serumtherapie machtlos. Zur Lokalbehandlung des Halsprozesses, die heute von untergeordneter Bedeutung ist, beschränkt man sich im allgemeinen auf Gurgelungen mit  $H_2O_2$  oder essigsaurer Tonerde. Bei schwereren Fällen kann man einen Versuch mit Pyocyanase machen, die man mit einem kleinen Sprayapparat im Rachen versprüht. Bei Übergreifen der Diphtherie auf den Kehlkopf bildet das Auftreten von Stenosenzeichen (Einziehen, Nasenflügelatmung, Cyanose) die Indikation zur Tracheotomie. Dieselbe hat nach chirurgischen Grundsätzen zu erfolgen. Die Eröffnung der Luftröhre bringt sofort alle Suffokationserscheinungen zum Schwinden.

<sup>1)</sup> Die Frage der Wirksamkeit gewöhnlichen „leeren“ Pferdeserums im Sinne der sog. Proteinkörpertherapie ist zur Zeit noch nicht abgeschlossen.

<sup>2)</sup> Da die Ursache der Serumkrankheit (vgl. S. 73) nicht auf dem Antitoxingehalt des Serums, sondern lediglich auf seinen artfremden Eiweißkörpern beruht, so bevorzugt man Serum, das in der Volumeneinheit möglichst viel Immunitätseinheiten enthält. Bei schweren Fällen wird man daher statt des gewöhnlichen 400fachen (1 ccm enthält 400 I. E.) das wenn auch teurere „hochwertige“, d. h. 500- bzw. 1000fache Serum anwenden. Die Beschaffenheit der Sera untersteht in Deutschland staatlicher Kontrolle. Trübes Serum ist zurückzuweisen.

Während des Liegens der Kanüle ist für ausgiebige Anfeuchtung der Atmungs-luft mittels eines Inhalierapparates zu sorgen, das Kind wird dabei zum Schutz gegen Durchnässung mit Billrothbattist bedeckt. Größte Aufmerksamkeit ist einer etwaigen Verstopfung der Kanüle durch Schleim oder Membranen zu widmen. Die zur Reinigung dienende herausnehmbare Innenkanüle wird von Zeit zu Zeit mit einer Federfahne und Lysollösung gesäubert. Die Kanüle darf nicht länger als unbedingt notwendig liegen bleiben, da sonst leicht Decubitalgeschwüre an der Trachealschleimhaut entstehen. Wenn keine Membranen mehr ausgehustet werden und das Sekret schleimig-katarrhalisch wird, ist die Kanüle zu entfernen, was oft schon am 2. Tage möglich ist. Vorher überzeugt man sich von der Wegsamkeit der Luftröhre dadurch, daß man bei Anwendung von Fensterkanülen nach Entfernung der Innenkanüle und Verschließen der Außenkanüle mit dem Finger oder einem Stöpsel kontrolliert, ob die Atmung unbehindert ist. Das sog. „erschwerete Décanulement“ beruht mitunter auf Entwicklung von Granulationsgeschwülsten in der Luftröhre, die zu entfernen sind, bisweilen ferner auf zu kleinem Tracheotomieschnitt, sie kann aber auch rein psychisch bedingt sein.

Neuerdings wird von vielen Seiten an Stelle der Tracheotomie der unblutigen Intubation nach O'Dwyer der Vorzug gegeben. Sie besteht in der Einführung eines konischen durchbohrten Metalltubus vom Munde her in den Kehlkopf mit Hilfe eines Intubator genannten, mit einem Handgriff versehenen Einführungsinstrumentes. Der Tubus, der mittels Seidenfadens außerhalb des Mundes an der Wange befestigt wird, macht den Kehlkopf für die Atmung wegsam. Die Intubation, die große Übung in der Technik voraussetzt, erfordert überdies sehr sorgfältige weitere Beobachtung wegen eventueller Zwischenfälle und verlangt daher im allgemeinen klinische Beobachtung. Nutzlos ist die Tracheotomie wie die Intubation in den Fällen, wo die Membranbildung bereits tiefer in die Trachea oder gar bis in die Bronchien hinabgestiegen ist. Bezüglich der Komplikationen ist mit größtem Nachdruck auf eine rechtzeitige therapeutische Berücksichtigung der Zirkulationsschwäche hinzuweisen. Bei allen schwereren Formen ist bei den ersten Anzeichen derselben Coffein sowie auch Campher (vgl. S. 174) in regelmäßigen 1—2stündlichen Abständen anzuwenden, eventuell ferner Strychnin nitric. sowie bei drohendem Kollaps Suprarenin subcutan mehrmals täglich  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  ccm Stammlösung. Digitalis ist in diesen Fällen meist nicht wirksam. Bei Gaumensegel- und Schlucklähmung ist Sondenfütterung mittels Nasensonde sorgfältig durchzuführen zur Vermeidung von Schluckpneumonien. Lähmungen werden mit kleinen Strychningaben und durch Elektrisieren günstig beeinflusst.

**Prophylaxe:** Diphtherie-Kranke sind so lange streng zu isolieren, als Bacillen nachgewiesen werden, wenn dies auch bei Dauerausscheidern praktisch oft auf Schwierigkeiten stößt. Ausgehustete Membranen, Auswurf, gebrauchte Spatel usw. sind mit 5%iger Kresolseifenlösung zu desinfizieren, Tupfer usw. werden verbrannt; Zimmerdesinfektion mit Formalin. Jeder Fall von Diphtherie unterliegt der polizeilichen Meldepflicht. Die Personen der Umgebung kann man durch eine prophylaktische Seruminjektion von 500—1000 I.-E. schützen, der Schutz hält aber nur etwa 3 Wochen an. Gegen Keimträger ist das Serum unwirksam. Überstehen der Krankheit hinterläßt keine Immunität.

## Serumkrankheit.

Die therapeutische parenterale Einverleibung von artfremdem Serum (Diphtherie, Ruhr, Tetanus usw.) bewirkt im Tierkörper bisweilen gewisse Reaktionserscheinungen, die man als Serumkrankheit bezeichnet<sup>1)</sup>. Sie ist nicht an die Anwesenheit von Immunkörpern im Serum gebunden, ihr Auftreten und der Grad der Reaktion hängt von einer bestimmten individuellen Disposition ab, doch verhalten sich auch die verschiedenen Sera etwas verschieden. Ferner spielt die Menge des verwendeten Serums eine gewisse Rolle. Zu unterscheiden sind das Krankheitsbild nach erstmaliger Seruminjektion und dasjenige nach Reinjektion.

Bei dazu disponierten Individuen beginnt als erstes Symptom 7 bis 8 Tage nach der ersten Injektion eine zunehmende Schwellung und Druckempfindlichkeit der der Injektionsstelle benachbarten Lymphdrüsen, vereinzelt kommt es zu allgemeiner Drüenschwellung, die mitunter das einzige Symptom der Serumkrankheit bildet. Andere Erscheinungen, die erst nach einer Inkubation von 7—14 Tagen, am häufigsten nach 10 Tagen eintreten, sind vor allem Fieber und Exantheme sowie Albuminurie. Die Exantheme sind urticariell, scharlach- oder masernartig; sie beginnen meist lokal an der Injektionsstelle und können in rudimentären Fällen hierauf beschränkt bleiben. Die allgemeinen Exantheme sind meist urticariell mit starkem Juckreiz. Andere seltenere Formen können dem Scharlach so ähneln, daß eine Unterscheidung sehr schwierig ist, zumal auch Schuppung nach Serumexanthenen beobachtet wird (die Aldehydreaktion im Harn ist jedoch negativ). Zuweilen treten Ödeme im Gesicht, speziell an den Lidern auf, selten ist Glottisödem mit Stenosensymptomen, die jedoch in der Regel schnell wieder abklingen. Mitunter beobachtet man schmerzhafte Gelenkschwellungen speziell an den Finger-, Hand- und Kniegelenken, die sich durch ihr refraktäres Verhalten gegenüber Salicyl auszeichnen. Selten sind Durchfälle. Bezeichnend für die Serumkrankheit ist, wenigstens in den leichten Fällen, die oft geringe Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens. Die Dauer der Erscheinungen beträgt wenige Tage.

Im Gegensatz zur Reaktion nach erstmaliger Seruminjektion treten die Erscheinungen von „Überempfindlichkeit“ nach Reinjektion von Serum entweder schon innerhalb 24 Stunden, also ohne Inkubation, als „sofortige Reaktion“ oder als „beschleunigte Reaktion“ mit verkürzter Inkubation nach 4—6 Tagen ein. Zur Auslösung der Überempfindlichkeit genügen minimale Serummengen. Die Erscheinungen sind im allgemeinen die gleichen wie die oben beschriebenen. Das Exanthem beginnt gleichzeitig an der Injektionsstelle und am übrigen Körper. Es entwickelt sich oft eine ziemlich heftige Störung des Allgemeinbefindens mit Übelkeit und Brechreiz. Es kann ferner nach Abklingen dieser Erscheinungen 5—7 Tage später zu einer kurzen Wiederholung derselben

<sup>1)</sup> Das gleiche gilt natürlich außer für die Heilserumtherapie auch für die in jüngster Zeit vielfach empfohlene Proteinkörpertherapie (Milch, Caseinpräparate usw.).

kommen. In anderen Fällen tritt, wie schon gesagt, nur das letztere ohne die sofortige Reaktion ein. Das Bild der Serumkrankheit beruht im wesentlichen auf vasomotorischen Störungen; es sind daher Menschen mit labilen Vasomotoren in dieser Hinsicht besonders empfindlich.

Gegenüber der vielfach überschätzten Bedeutung der Serumkrankheit beim Menschen (im Gegensatz zum Meerschweinchen, wo der anaphylaktische Schock tödlich sein kann) ist mit Nachdruck zu betonen, daß schwere lebensbedrohende Störungen zu den allergrößten Seltenheiten gehören, die die segensreiche Bedeutung der Serumtherapie in keiner Weise herabzusetzen vermögen. In der Regel handelt es sich um reinjizierte Individuen. Es empfiehlt sich zur Prophylaxe eine Reinjektion möglichst vor dem 10. Tage vorzunehmen, ferner bei schon früher vorbehandelten Personen das Serum zur Erzielung von Antianaphylaxie fraktioniert zu verabreichen (vgl. Diphtherie S. 71), bei Reinjektion die intravenöse Verabreichung zu vermeiden und wenn möglich, Serum einer anderen Tierart zu verwenden (z. B. Rinder- statt Pferdeserum). Auch werden neuerdings Sera hergestellt, die besonders arm an spezifischen Anaphylaxie erzeugenden Stoffen (Anatoxine) sind. Bei Ausbruch der Serumkrankheit ist die subcutane Injektion von Suprarenin ( $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  ccm der Stammlösung) sowie von 1 mg Atropin von Erfolg.

### Tetanus (Starrkrampf).

Der Starrkrampf ist eine sehr gefährliche, fast immer akut verlaufende Wundinfektionskrankheit. Der Tetanusbacillus kommt besonders in Gartenerde, Pferdemist, Straßenschmutz, ferner in den Filzpfropfen der Patronen, gelegentlich in nicht sterilisierten Medikamenten, z. B. Gelatine vor. Am häufigsten erkranken Gärtner, Pferdedwärter, Kutscher, Verunglückte mit „Straßenwunden“, ferner Puerperae (krimin. Abort!) sowie Neugeborene (Nabelwunde). Trotz häufigen Vorkommens der Bacillen in der Umgebung des Menschen ist die Krankheit selten.

Der Tetanusbacillus ist ein anaerobes, geißeltragendes Stäbchen mit äußerst widerstandsfähigen Sporen (Stecknadelform), die sich in der Trockenheit jahrelang halten. Er ist grampositiv. Für die Entwicklung der Krankheit ist die Symbiose der Tetanusbacillen mit anderen (Eiter-) Bakterien, wie z. B. in verschmutzten Wunden erforderlich, dann ist wahrscheinlich auch aerobes Wachstum möglich. Die Bakterien bleiben an der Eingangspforte liegen, wogegen die sehr giftigen Toxine entlang den Nervenbahnen (Achsenylinder) zum Zentralnervensystem aufsteigen. Der bakteriologische Nachweis geschieht am besten durch Verimpfung des Wundsekrets oder excidiierter Gewebsstücke mit einem Holzsplitter in einer Hauttasche an weiße Mäuse oder Meerschweinchen, die typisch an Tetanus erkranken.

**Krankheitsbild:** Inkubation 4—14 Tage, selten mehrere Wochen. Prodrome sind meist nicht oder nur unbedeutend in Form von Steifigkeit und Ziehen im Bereich der Wunde vorhanden. Das erste und sehr charakteristische Symptom ist eine zunehmende Spannung und Steifigkeit der Masseteren mit Unfähigkeit, den Mund zu öffnen, sog. Trismus, ferner infolge Übergreifens der Starre auf die Gesichtsmuskeln der Risus sardonicus, d. h. ein grinsender bzw. weinerlicher Gesichtsausdruck.

ausdruck mit in die Breite gezogenem Mund und gerunzelter Stirn, der die Diagnose auf den ersten Blick ermöglicht. Durch Übergehen der Starre auf die Nacken- und Rückenmuskeln (Tet. descendens) entsteht bald eine Zwangsstellung des Patienten mit Hohlliegen des Rückens: Opisthotonus. Die Beine befinden sich in Streck- und Adduktionsstellung, die Thoraxmuskeln in Inspirationsstellung, die Bauchmuskeln sind bretthart.

Außer dieser dauernden Muskelstarre ist das zweite Hauptphänomen des Tetanus die infolge gesteigerter Reflexerregbarkeit auftretenden kurzdauernden, sehr schmerzhaften stoßartigen Krampfparoxysmen mit Verstärkung des Opisthotonus, sowie Krämpfen der Schlundmuskulatur, des Zwerchfells und der Glottis mit Erstickungsgefahr. Die Auslösung der Krämpfe erfolgt durch geringste Reize wie Licht, Luftzug usw., ihre Zahl und Intensität wechselt in den einzelnen Fällen. Die Sensibilität ist vollkommen normal. Die Lumbalpunktion ergibt oft erhöhten Druck.

Die Temperatur ist oft nur wenig erhöht, in anderen Fällen besteht hohes Fieber. Stets ist eine auffallend starke Schweißbildung vorhanden. Der Zirkulationsapparat bleibt oft vollkommen intakt; Der Blutdruck ist nicht verändert. Bei gehäuften Anfällen kommen Kollapse vor. Stuhl- und Harnentleerung ist infolge Bauchpressenkrampf erschwert. Blut: Regelmäßig findet sich eine Leukocytose. Die Harnmenge ist vermindert, Albuminurie meist vorhanden. Infolge des ungetrübten Sensoriums und dauernder Agrypnie ist der Tetanus ein äußerst qualvolles Leiden. Der Tod erfolgt durch Erstickung, oft durch Pneumonie, bisweilen durch Herzlähmung. Die Totenstarre pflegt sehr rasch einzutreten, mitunter beobachtet man eine postmortale Temperatursteigerung. Der Tetanus neonat. (meist in der 2. Woche) verrät sich durch die Unfähigkeit zu saugen und die oft rüsselartige Form des Mundes. Spezifisch anatomisch-histologische Veränderungen fehlen bei Tetanus.

**Komplikationen:** Am häufigsten Pneumonie, die übrigens gelegentlich auf die Krampfanfälle mildernd wirkt, ferner Muskelhämatome, Neuritiden, Gehirnblutungen.

Die Krankheitsdauer beträgt in den foudroyanten Fällen wenige Stunden oder Tage, meist mehrere Wochen, selten einige Monate. Nach der Heilung bleiben bei langdauernden Fällen oft Muskelverkürzungen, Wirbelsäulenverkrümmungen, Kieferklemme und Gelenkversteifungen, bisweilen jahrelang zurück. Gelegentlich kommt es zu Rezidiven nach mehrwöchentlicher Pause.

**Atypische Formen:** Die seltene abortive Form zeigt nur Muskelstarre ohne Krämpfe, so daß der Aufenthalt außer Bett möglich ist. Bei dem ausschließlich nach Kopfverletzungen auftretenden Tet. facialis kommt es zu Lähmungen einzelner motorischer Hirnnerven derselben Seite, besonders des Facialis, eventuell mit Schlundmuskelerkrämpfen. Bei dem lokalen Tetanus besteht mitunter nur Muskelstarre in der Nachbarschaft der Wunde, eventuell mit daran anschließender aufsteigender Starre (Tet. ascendens). Der Narbentetanus wird auf die durch Trauma oder Erkältung (Tet. rheumaticus) erfolgte Mobilisierung latenter in der Narbe zurückgebliebener Keime zurückgeführt. Auch die Aufnahme von Tetanus-Bacillen durch die katarrhalisch veränderte Respirationsschleimhaut



sowie seitens des pathologisch veränderten Darmes (z. B. Typhus) ist möglich (idiopathischer Tetanus).

Die **Diagnose** ist in den voll ausgebildeten typischen Fällen leicht. Die sehr ähnliche Strychninvergiftung unterscheidet sich durch stärkeres Befallensein der Extremitäten, speziell der Hände, Blutdrucksteigerung sowie Fehlen der Muskelstarre in den anfallsfreien Pausen. Letzteres gilt auch für die Lyssa, bei der der Trismus fehlt. Meningitis mit Nackenstarre ist durch die Lumbalpunktion, Trichinose mit ähnlichem Syndrom durch das Blutbild (Eosinophilie) zu unterscheiden. Bei Hysterie fehlt die Reflexsteigerung. Bei isolierter Kiefersperre ist auf lokale Prozesse in der Mundhöhle, Tonsillarabsceß, Kiefergelenksentzündung usw. zu fahnden.

Die **Prognose** richtet sich u. a. nach der Länge der Inkubationszeit; ferner ist eine lange Krankheitsdauer prognostisch günstig. Der Kopftetanus ist meist leicht, die puerperale Form fast stets letal, desgleichen oft die Fälle mit hohem Fieber sowie dauernder Tachykardie. Die Mortalität beträgt im allgemeinen bis zu 80%.

**Therapie:** Sofortige Beseitigung der Eintrittspforte durch Excision der Wunde, eventuell Amputation des Gliedes, zum mindesten breite Eröffnung zur Förderung des Sekretabflusses; keine Kauterisation, da Schorfbildung zu Retention führt. Möglichst frühzeitige Anwendung des Behringschen (antitoxischen) Heilserums, und zwar wiederholt 100 Antitoxineinheiten (A. E.) intramuskulär in die Nachbarschaft der Wunde, sowie unter die Brusthaut, sehr wirksam ist die intravenöse und intralumbale Einverleibung; eventuell als Trockenpräparat<sup>1)</sup> in die Wunde zu streuen. Unerlässlich sind ferner Narkotica: Morphium 0,02 mehrmals täglich, Pantopon, und vor allem Chloralhydrat mehrmals täglich 2,0 per os, oder 5,0 per Klysma (mit Aqua und Mucil. amyl. trit.  $\bar{a}\bar{a}$  50,0). Empfehlenswert ist die intralumbale Anwendung des narkotisch wirkenden Magnesiumsulfats (15%<sub>ig</sub>), das nach Ablassen von 2—10 ccm Spinalflüssigkeit in der gleichen Menge langsam injiziert wird; die Lähmungsgefahr (Atemzentrum!) ist durch gleichzeitige intravenöse Injektion von 2 ccm 5%<sub>iges</sub> Calciumchlorid zu bekämpfen, sowie eventuell Tracheotomie und Sauerstoffatmung. Ernährung durch Nasenschlauch und Klysma. Fernhalten von allen stärkeren Reizen (Vermeiden von Geräuschen und grellem Licht), Wasserkissen, gute Polsterung, eventuell protrahierte warme Bäder. Oft ist Katheterismus notwendig.

**Prophylaktisch** ist stets bei verschmutzten Wunden, auch Schußverletzungen möglichst frühzeitig 20 A. E. Tetanus-Serum zu injizieren.

### Lyssa (Tollwut).

Die Erkrankung entsteht durch den Biß an Tollwut leidender Tiere (meist Hunde, außerdem in absteigender Häufigkeit Rinder, Pferde,

<sup>1)</sup> Aus Trockenserum (100 A. E., Höchster Farbwerke), das unbegrenzt haltbar ist, läßt sich jederzeit durch Auflösen in steriler physiologischer NaCl-Lösung eine dem flüssigen Serum gleichwertige Lösung herstellen. Trockenserum eignet sich daher besonders dort, wo nur selten Serum gebraucht wird.

Schweine, Katzen, Schafe, Ziegen, Wölfe), in deren Speichel sich das bisher noch unbekannte Lyssavirus findet.

Dasselbe hat eine besondere Affinität zum Zentralnervensystem, speziell zum verlängerten Mark; es muß sehr klein sein, da es Porzellanfilter passiert, und ist gegen Fäulnis wie gegen Kälte sehr resistent. Unter den von tollwütigen Tieren gebissenen Menschen erkrankt nur eine geringe Zahl, ca. 15%.

Die Bekämpfung der Tollwut erfordert genaue Kenntnis der Tier-Lyssa: Nach mehrwöchiger Inkubation (vom 8. Tage ab infektiös!) zeigen die Hunde eine Veränderung ihres Wesens, Launenhaftigkeit, verminderte Freßlust, später Neigung zum Verschlingen unverdaulicher Gegenstände, sowie zu planlosem Umherstreifen, ferner Heiserkeit, zunehmende Reizbarkeit, die sich schließlich zu Wutanfällen steigert, in denen sie Menschen und Tiere beißen und infizieren. Unter zunehmender Erschöpfung, Abmagerung, Struppigwerden der Haare und Lähmungserscheinungen verenden die Tiere nach etwa 1 Woche. Bei der „stillen“ Wut fehlen die Reizbarkeit und die Wutanfälle.

**Krankheitsbild:** Inkubation 2 Wochen bis 2 Monate, selten länger, eventuell sogar 1—2 Jahre. Das verschieden lange Prodromalstadium („Stadium melancholicum“) ist vor allem durch psychische Alteration und Charakteränderung wie Verstimmung, Depression, Furcht, Beklemmungszustände, beängstigende Träume, ferner Schmerzen in der Narbe der Bißwunde und Parästhesien gekennzeichnet. Auch sind bereits Störungen seitens der Atmung, der Schlingmuskulatur und der Stimmbildung angedeutet.

Diese Störungen steigern sich in dem anschließenden Erregungsstadium, das  $1\frac{1}{2}$  bis 3 Tage dauert. Die Atmung wird unregelmäßig, „schnappend“; ferner treten heftige Schlingmuskelkrämpfe auf, die schon beim Schlucken von Flüssigkeit oder beim bloßen Anblick derselben ausgelöst werden (Hydrophobie), Speichelfluß, ferner klonische Krämpfe der Extremitäten und Rumpfmuskeln und Steigerung der psychischen Erregbarkeit zu schweren, mit heftiger Angst verbundenen Wutanfällen: „rasende Wut“. Die Auslösung dieser Paroxysmen erfolgt durch geringste Reize wie Berührung, Licht, Geräusche. Ausnahmsweise verläuft auch beim Menschen dieses Stadium als „stille Wut“ ohne stärkere Reizerscheinungen.

In dem kurz dauernden „paralytischen Stadium“ entwickeln sich unter Zurücktreten der Reizerscheinungen und Fortschreiten der Erschöpfung Lähmungen im Bereich der Extremitäten und der Hirnnerven. Unter Lähmung der gesamten Körpermuskulatur erfolgt der Tod im Verlauf von Stunden.

Außer diesem typischen, stets letalen Bilde kommen abortive Formen mit Ausgang in Heilung vor.

Histologisch finden sich regelmäßig bei Mensch und Tier in verschiedenen Gehirnteilen, namentlich im Ammonshorn, die diagnostisch wichtigen intrazellulären Negrischen Körperchen.

**Diagnose:** Feststellung einer Bißverletzung; Beginn der ersten Symptome frühestens 2 Wochen nach derselben zum Unterschiede von der bald nach dem Biß beginnenden hysterischen Lyssophobie. Unterscheidung von Tetanus (Schlingkrämpfe ähnlich wie bei L.): Bei Lyssa fehlt der Trismus, bei Tetanus, aber auch bei der stillen Wut fehlen die

Wutanfälle. Erregungszustände bei Psychosen, speziell Delirium tremens lassen die Bulbärsymptome der Lyssa vermissen.

Die einzig wirksame **Therapie** ist die möglichst frühzeitige, d. h. während der Inkubation beginnende aktive Schutzimpfung nach Pasteur in Form wiederholter Injektion von in der Virulenz abgeschwächter Rückenmarkssubstanz mit Lyssa infizierter Kaninchen. Daher hat bei bloßem Verdacht auf Lyssa nach Hundebiß schleunigst die Einweisung des Patienten in ein Wutschutzinstitut (Berlin, Breslau, Paris, Jassy) zu erfolgen.

Das zunächst vom Rückenmark eines an spontaner Wut verendeten Hundes stammende „Straßenvirus“ wird durch wiederholte Kaninchenpassagen in seiner Wirksamkeit im Sinne einer konstanten Inkubationszeit modifiziert. Das so erhaltene „Virus fixe“ wird durch Trocknen oder Verdünnung abgeschwächt und zur Impfung verwendet. Die Impfbehandlung dauert 21 Tage. Gelegentlich werden dabei Lähmungen (Paraplegie, Blasen-Mastdarmlähmung) beobachtet, sog. n. „Impfwut“. Impfschutz nicht absolut sicher, immerhin beträgt die Mortalität nach Impfung nur 0,86% gegenüber 20—50% bei Nichtgeimpften.

Die symptomatische Behandlung beschränkt sich auf die Anwendung von Narkotica, Morphium und Chloral.

### **Epidemische Kinderlähmung (Poliomyelitis acuta, Heine-Medinsche Krankheit).**

Die epidemische Kinderlähmung gehört zu den akuten Infektionskrankheiten. Sie befällt das Kindesalter, vor allem die ersten Lebensjahre; Erwachsene erkranken nur selten. Man beobachtet sie sowohl sporadisch als namentlich in Form von zum Teil ausgedehnten Epidemien. Sie tritt hauptsächlich im Sommer und im Herbst auf. Die Krankheit ist übertragbar. Das Virus ist noch unbekannt, doch ist es sicher sehr klein, da es durch Berkefeldfilter filtrierbar ist. Nach Verimpfung von Rückenmarkssubstanz von an Poliomyelitis Verstorbenen auf Affen erkranken diese ebenfalls an typischen spinalen Lähmungen. Als Eintrittspforte für den Erreger gilt u. a. die Rachentonsille. Gesunde Keimträger dürften bei der Krankheitsübertragung eine große Rolle spielen, während Kontaktinfektionen durch kranke Menschen wahrscheinlich von geringerer Bedeutung sind.

**Krankheitsbild.** Inkubation ungefähr eine Woche. Die Krankheit beginnt plötzlich aus voller Gesundheit mit hohem Fieber, heftigem Kopfschmerz, Gliederziehen und starker Abgeschlagenheit sowie Benommenheit; ferner treten oft Erbrechen und bisweilen Durchfälle sowie eine Angina ohne Beläge auf. Mitunter besteht eine auffallend hohe Pulsfrequenz. In manchen Fällen gesellt sich ein meningitisähnliches Syndrom mit Nackensteifigkeit, Rückenschmerzen sowie dem Kernignischen Zeichen dazu. Auch andere Reizerscheinungen wie einzelne Zuckungen, allgemeine Krämpfe, Zähneknirschen werden mitunter beobachtet. Charakteristisch ist ferner die Neigung zu starken Schweißen sowie eine oft vorhandene außerordentlich starke allgemeine Hyperästhesie bei jeder Berührung oder Bewegung, so daß der Kranke schon beim bloßen Herantreten einer Person an das Bett aufschreit. Auch spontane

Schmerzen im Rücken und in den später gelähmten Extremitäten sowie starke Druckempfindlichkeit der Nerven und Muskeln wurde beobachtet. Milztumor ist meist nicht vorhanden. Dagegen besteht eine Leukopenie mit relativer Lymphocytose. Die Lumbalpunktion ergibt zwar Druckerhöhung, aber klaren Liquor, im Sediment keine stärkere Zellvermehrung, nur einzelne Lymphocyten. Oft ist jetzt schon eine auffallende Tonusverminderung einer oder mehrerer Extremitäten zu konstatieren.

Dieses fieberhafte **Initialstadium** besteht in der Regel nur wenige Tage, ausnahmsweise einige Wochen, dann fällt das Fieber kritisch oder lytisch ab. Gelegentlich kommen in der Folgezeit noch kleinere Temperatursteigerungen vorübergehend vor. Selten sind die Allgemeinerscheinungen des Initialstadiums nur wenig ausgeprägt. In einzelnen Fällen erwachen die Kinder nach vollem Wohlbefinden am Vortage mit einer Lähmung am anderen Morgen (sog. „Morgenlähmung“).

Auf das Initialstadium folgt das **Stadium der Lähmungen**. Diese treten zum Teil schon während des Fiebers (am häufigsten zwischen dem 1. und 5. Krankheitstag), und zwar plötzlich oder nach und nach, zum Teil unmittelbar nach der Fieberperiode, selten noch später ein. Die Paresen, die stets spinalen Charakter haben, also schlaffe Lähmungen sind (s. unten), betreffen in der Regel anfangs mehrere Extremitäten, in erster Linie die Beine, z. B. am häufigsten beide Beine oder ein Bein und einen Arm, und zwar gleichseitig oder gekreuzt. Später gehen sie auf die Extremität zurück, die dauernd gelähmt bleibt. Häufig lassen sich anfangs auch an den Rumpfmuskeln Lähmungen konstatieren, es besteht z. B. eine Parese der Hals- und Nackenmuskeln, so daß der Kopf des Kindes beim Aufsetzen nach der Seite oder hintenüber fällt. Bei Befallensein der Rückenmuskeln sinkt das Kind, wenn es auf den Arm genommen wird, in sich zusammen. Die oft vorhandene Beteiligung der Bauchmuskeln, die man beim Betasten an der auffallenden Hypotonie derselben erkennen kann, führt zu Meteorismus, auch fehlen oft die Bauchdeckenreflexe. Gelegentlich ist die Bauchmuskelparese zunächst das einzige Lähmungssymptom, weshalb stets sorgfältig auf dieses Zeichen zu achten ist. Erschwerung der Blasen- und Mastdarm-entleerung wird anfangs oft gefunden, während sie später fehlt. Oft scheidet übrigens zunächst eine gründlichere Untersuchung an der starken Hyperästhesie.

Die Extremitätenlähmungen zeigen im allgemeinen eine gewisse Vorliebe für die proximalen Muskelgruppen. Diese pflegen frühzeitiger und intensiver zu erkranken. Am Bein werden vor allem der Quadriceps femoris, distal häufig die Peroneusmuskeln befallen, an der oberen Extremität erkranken mit Vorliebe die Muskeln der Schulter, vor allem der Deltamuskel, später selten eventuell auch die Vorderarm- und Handmuskeln. Auch eine partielle Parese der Atmungsmuskeln, speziell der Intercostalmuskeln wird nicht selten beobachtet, in schweren Fällen kann sie namentlich bei Übergreifen auf das Zwerchfell zu einer schweren Gefahr für das Leben werden. Vorübergehende flüchtige

Sensibilitätsstörungen lassen sich anfangs, wenn eine genaue Untersuchung möglich ist, oft finden. Später fehlen sie stets. Das Babinski'sche Großzehenphänomen ist manchmal positiv. Die Sehnenreflexe sind an der gelähmten Extremität erloschen. Bei abortiven Fällen ohne eigentliche Lähmung ist das Schwinden der Reflexe oft das einzige objektive Symptom, das der Lähmung gleichwertig ist.

In den nächsten Wochen nach der Entfieberung entwickelt sich an den gelähmten Muskeln eine zunehmende hochgradige Atrophie sowie typische elektrische Entartungsreaktion entsprechend der Zerstörung der trophischen Zentren im Rückenmark (s. unten). Die normale faradische Erregbarkeit schwindet innerhalb der nächsten Wochen vollkommen, während bei galvanischer Reizung träge Zuckungen sowie Dominieren der Anodenschließungszuckung beobachtet werden. Die Haut- und Sehnenreflexe der gelähmten Extremität sind infolge der Unterbrechung des Reflexbogens im Rückenmark erloschen. Einige Wochen nach Ablauf der beschriebenen Erscheinungen erreicht das Leiden insofern einen stationären Zustand, als nach Schwinden der akuten Symptome eine dauernde Lähmung für das weitere Leben zurückbleibt. Nur selten bilden sich die entstandenen Lähmungen und dann nur in der unmittelbar auf die Krankheit folgenden Zeit vollkommen zurück (sog. temporäre spinale Kinderlähmung). Im allgemeinen bleiben die Lähmungen, die nicht innerhalb eines halben, höchstens eines Jahres zurückgehen, dauernd bestehen.

Das Knochenwachstum des gelähmten Gliedes ist ebenfalls schwer geschädigt bzw. völlig gehemmt, wodurch zugleich infolge des hochgradigen Muskelschwunds in späteren Jahren oft der groteske Eindruck entsteht, als wenn der Erwachsene einen Kinderarm besäße. Die Haut des gelähmten Gliedes ist spröde und trocken, bisweilen cyanotisch, sie fühlt sich oft kühl an. Infolge Erschlaffung der Gelenkbänder und der Gelenkkapsel entstehen oft Schlottergelenke. Ferner beobachtet man nicht selten als Folge der Lähmungen abnorme Wirkungen der Antagonisten der gelähmten Muskeln, z. B. Contractur der Wadenmuskeln mit Spitzfußstellung; auch Klumpfußbildung wird oft beobachtet. Ebenso erklären sich Wirbelsäulenverbiegungen bei einseitiger Lähmung der Rumpfmuskeln.

Die Mortalität schwankt erheblich bei den verschiedenen Epidemien. Sie beträgt im Mittel etwa 13<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

**Pathologisch-anatomisch** besteht in frischen Fällen eine akute herdförmige Entzündung des Rückenmarks und zwar vornehmlich der grauen Substanz<sup>1)</sup> der Vorderhörner (d. h. im Gebiet der vorderen Spinalarterie), wobei besonders häufig je nach der Lokalisation der Lähmung der Lumbal- bzw. Cervicalteil befallen ist. Mikroskopisch findet man neben ödematöser Durchtränkung des Gewebes und praller Füllung der Blutcapillaren sowie kleinen Blutungen reichlich Zellinfiltrate mit Lymphocyten, Leukocyten und großen, die Ganglienzellen phagocytierenden „Neuronophagen“ sowie schwere Degenerationserscheinungen an den Vorderhornganglienzellen, später sog. Körnchenzellen, die den Abtransport des zerstörten Gewebes bewerkstelligen. Im Gegensatz zum klinischen Bilde deckt die histologische Untersuchung oft eine viel ausgedehntere Ausbreitung des Entzündungsprozesses im Rückenmark auf. Nach Ablauf des akuten Entzündungsprozesses

<sup>1)</sup> Daher die Bezeichnung „Poliomyelitis“ (polios griechisch = grau).

entsteht eine narbige Atrophie mit Entstehung von zellarmem derben faserigen Gliagewebe. Die erkrankte Vorderhorngegend erscheint dementsprechend später auf Schnitten schon makroskopisch stark verschmälert und geschrumpft.

**Seltenere Verlaufsarten:** Mitunter beobachtet man im Verlauf von Poliomyelitis epidemica Krankheitsbilder, bei denen unter den gleichen Allgemeinerscheinungen anstatt Lähmungen der Extremitäten solche der Hirnnerven, am häufigsten des Facialis, ferner der Augenmuskelnerven usw. auftreten (sog. pontine und bulbäre Form). Auch können sich zu den gewöhnlichen Extremitätenlähmungen bulbäre Paresen hinzugesellen. Neuritis optica kommt dagegen nicht vor. Die Hirnnervenlähmungen sind in der Regel nicht schwer und meist flüchtig. Ferner kann sich das Krankheitsbild der Landry'schen Paralyse (s. diese) mit rasch aufsteigenden Extremitäten- und Stammuskellähmungen entwickeln, zu denen dann eventuell bulbäre Lähmungen hinzutreten. Schließlich kommt selten eine cerebrale Form vor, die klinisch dem Bilde einer akuten Encephalitis entspricht.

Die **Diagnose** auch der weniger typischen Verlaufsformen der akuten Poliomyelitis ist beim Vorhandensein von Epidemien nicht schwer. Der akute Beginn mit Fieber, plötzlichen schlaffen Lähmungen, starken Schweißen, hochgradiger Hyperästhesie, fehlender Leukocytose sowie die bald zu konstatierende Einseitigkeit der Lähmungen führt in der Regel schnell auf die richtige Fährte. Die Abgrenzung gegen Meningitis ergibt sich aus dem Fehlen stärkerer Veränderungen der Lumbalflüssigkeit. Gegen Polyneuritis, mit der die Krankheit anfangs oft die starken Schmerzen sowie die Druckempfindlichkeit der Nerven gemein hat, spricht vor allem der Verlauf der Lähmungen, die bei Polyneuritis im Gegensatz zur Poliomyelitis erst im Laufe von Tagen oder Wochen ihr Maximum erreichen, ferner bei beiderseitiger Erkrankung die stets vorhandene Asymmetrie der Lähmungen, sowie die Bevorzugung proximaler Muskelgruppen gegenüber dem distalen Typus bei Polyneuritis, endlich das Fehlen der bei letzterer häufigen Ödeme. Praktisch ist die Unterscheidung wegen der bei Polyneuritis wesentlich günstigeren Prognose der Lähmungen wichtig. Die bei Erkrankung von Arm und Bein der gleichen Seite entstehende spinale Hemiplegie unterscheidet sich von der gewöhnlichen cerebralen Hemiplegie durch die Schlaffheit der Lähmungen, das Fehlen der Sehnenreflexe und die Atrophien. Bei sporadischem Auftreten ist an das Vorkommen der oben genannten abortiven Formen (Fehlen der Reflexe, Hypotonie) zu denken.

Die **Therapie** ist zur Zeit rein symptomatisch. Während des akuten Stadiums strenge Bettruhe. Eventuell Schröpfköpfe oder Senfpflaster längs der Wirbelsäule. Bei Erregungszuständen: Eisblase auf den Kopf. Eventuell Urotropin per os, das in der Spinalflüssigkeit Formaldehyd abspalten soll. Nach Ablauf der akuten Erscheinungen ist der Behandlung der Lähmungen durch Elektrisieren (galvan. und farad.) und Massage sowie in Form orthopädischer Maßnahmen (Stützapparate, Sehnenplastiken) zur Korrektur und Prophylaxe der Contracturen besondere Sorgfalt zu widmen. Die Elektrotherapie und Massagebehandlung soll nicht vor Ablauf der ersten 2—3 Wochen begonnen und

dann etwa ein Jahr lang durchgeführt werden. Unterstützt wird diese Behandlung durch Strychnininjektionen (täglich etwa  $\frac{1}{2}$  mg subkutan).

### Encephalitis epidemica s. lethargica.

Die Encephalitis lethargica ist eine eigenartige Form der akuten Encephalitis, die infolge ihres epidemischen Auftretens (namentlich im Jahr 1920) und gewisser klinischer Eigentümlichkeiten eine Sonderstellung beansprucht. Ihr zeitliches Zusammentreffen mit der Grippe ist bemerkenswert, der Zusammenhang zwischen beiden Erkrankungen jedoch bisher nicht völlig geklärt. Es erkranken vor allem jugendliche Individuen und zwar mehr Frauen als Männer.

**Krankheitsbild:** Die Erkrankung beginnt plötzlich mit zunehmender Mattigkeit, Schwindel, zuweilen Erbrechen, während Kopfschmerzen keine besondere Rolle spielen. Schüttelfrost kommt nicht vor. Sofort oder spätestens am 2. Tage stellen sich cerebrale Symptome in Form von großer Unruhe sowie Delirien ein. Häufig sind ferner motorische Augenstörungen mit Augenmuskellähmungen, Ptose, Strabismus, Doppelsehen, Nystagmus sowie Störungen der Pupillenreaktion. Die übrigen Hirnnerven werden in der Regel nicht befallen; mitunter entwickelt sich eine Neuritis optica. Zum Teil besteht Schlaflosigkeit, in zahlreichen Fällen hingegen eine für die Krankheit besonders charakteristische Lethargie, d. h. ein eigentümlicher Schlafzustand ohne Bewusstlosigkeit, aus dem die Kranken jederzeit erweckbar sind. Sie reagieren auf Fragen, nehmen Nahrung zu sich usw., verfallen aber unmittelbar hinterher wieder in Schlaf. Zugleich fällt bei manchen Fällen eine eigenartige maskenartige Starre der Gesichtsmuskeln auf, die keinerlei Mienenspiel verraten. Auch die Extremitätenmuskeln zeigen eine gewisse Starre und Gehemmtheit. Sonstige Störungen seitens des Nervensystems fehlen, sämtliche Reflexe verhalten sich normal. Die Intelligenz ist nicht gestört. Oft besteht ein mäßig hohes nicht charakteristisches Fieber, doch kann es auch fehlen. Obstipation und Harnretention sind oft vorhanden und verlangen Beachtung bei der Pflege. Der geschilderte Zustand kann Wochen bis Monate andauern.

Andere Verlaufsformen sind durch das Auftreten teils choreatischer, teils myoklonischer Störungen ausgezeichnet. Hierher gehört auch das Auftreten eines quälenden Singultus, der in einzelnen Fällen das Krankheitsbild sogar beherrscht. Auch beobachtet man bisweilen Starre der Gesichtsmuskulatur und Bewegungsarmut sowie Steifigkeit der Extremitätenmuskeln ohne Lethargie. Niemals kommt es zu eigentlichen Lähmungen. Bei Vorhandensein bulbärer Symptome kommt allerdings Schlucklähmung vor, die infolge der sich anschließenden Pneumonie gefährlich ist.

Die Lumbalpunktion ergibt oft Vermehrung der Globuline und der Zellzahl im Liquor, in anderen Fällen völlig normale Verhältnisse.

**Anatomisch** handelt es sich um einen encephalitischen Prozeß in Mittelhirn und Oblongata (speziell Linsenkern, Thalamus opticus, Vierhügel und Augenmuskelkerne). Im Gegensatz zu der hämorrhagischen Influenzaencephalitis ist der makroskopische Befund hier negativ.

Im weiteren Verlauf der Krankheit pflegen die nucleären Symptome zurückzugehen, dagegen bleiben die Starre und Bewegungsarmut der Muskeln, desgleichen ein stumpfes teilnahmloses Wesen lange bestehen, ohne daß aber ein Defekt der Intelligenz besteht.

An **Folgezuständen** sind zu nennen Verminderung der geistigen Spannkraft, Gedächtnisstörungen, Interesselosigkeit und mangelnde Initiative sowie Pupillenstörungen wie Lichtstarre sowie Anisokorie.

Die **Prognose** ist im allgemeinen quoad vitam nicht sehr ungünstig, quoad sanationem zweifelhaft. Beachtenswert ist die Neigung zu Rückfällen sowie der oft schubweise Verlauf.

### Meningitis cerebrospinalis epidemica.

Die epidemische Meningitis ist eine akute teils sporadisch, teils in kleinen Epidemien auftretende übertragbare Krankheit, die in eitriger Entzündung der weichen Hirn- und Rückenmarkshäute besteht. Sie befällt vor allem Kinder und jugendliche Individuen (mehr Männer wie Frauen) und tritt mit Vorliebe zwischen Herbst und Frühjahr auf.

Der Erreger ist der Meningococcus oder Diplococcus intracellularis (Weichselbaum), ein dem Gonococcus sehr ähnlicher gramnegativer Doppelcoccus von Semmelform, der häufig intrazellulär in den Leukocyten liegt und sich leicht mit Löfflers Methylenblau färbt. Er ist sehr empfindlich besonders gegen Abkühlung und Licht. Zum Nachweis in der Lumbalflüssigkeit (am besten zwischen dem 1. und 5. Krankheitstag) empfiehlt sich wegen der oft geringen Zahl der Coccen ihre Anreicherung: 3—5 ccm des frischen, körperwarm <sup>1)</sup> gehaltenen und lichtgeschützten Liquor werden mit der gleichen Menge 2—5%iger Traubenzuckerbouillon oder Ascites-Bouillon 12 Stunden bebrütet, das Sediment enthält dann reichlich den Erreger. Er wächst nur auf Nährböden, die menschliches Eiweiß enthalten. Auf Blutagar bildet er rötliche tautropfenartige Kulturen. Die Tierpathogenität ist sehr gering. Bei Kranken und Rekonvalescenten ist er auch in dem Nasenrachensekret nachweisbar, wo aber die Verwechslung mit mikroskopisch sehr ähnlichen Coccen möglich ist, z. B. mit dem ebenfalls intracellulären, gramnegativen Micrococcus catarrhalis, der jedoch auf allen Nährböden leicht wächst. Der ebenfalls von den Meningococcen schwer unterscheidbare Diplococcus crassus ist teils grampositiv, teils negativ, wächst aber auf gewöhnlichem Agar bei 20°. Zur Unterscheidung der Meningococcen dient das Wachstum auf Blutagar sowie die Agglutination.

**Krankheitsbild:** Inkubation 1—4 Tage. Beginn plötzlich ohne Prodromalerscheinungen mit schnell ansteigendem Fieber, Frost, Erbrechen, heftigem Kopfschmerz, namentlich im Hinterkopf, schwerem allgemeinen Krankheitsgefühl, Benommenheit sowie oft Herpes. Die Krankheit erreicht meist schon in den ersten Tagen ihren Höhepunkt. Ein großer Teil der Symptome erklärt sich aus der eine Reizung der motorischen und sensiblen Nervenwurzeln bewirkenden eitrigen Entzündung der Meningen: Alle Bewegungen des rückwärts gebogenen Kopfes, vor allem nach vorn sind sehr erschwert und schmerzhaft oder unmöglich: Nackenstarre. Ebenso führt die Contractur der Rückenmuskeln zu Steifheit der Wirbelsäule, die opisthotonisch gekrümmt und druckempfindlich ist. Die Patienten liegen daher oft hohl.

<sup>1)</sup> Bei Versendung von Material zur bakteriologischen Untersuchung empfiehlt sich die Anwendung von Thermosflaschen.



Die Anspannung und Einziehung der Bauchmuskeln bewirkt einen „Kahnbauch“ sowie Erschwerung der Harn- und Stuhlentleerung. Die Beine werden angezogen gehalten, die Streckung der Kniegelenke ist nur bei Streckung in der Hüfte, dagegen nicht bei Beugung möglich: Kernigs Symptom. Infolge der starken Hyperästhesie der Haut und der Muskeln ist jede Berührung sowie Druck, ganz besonders der Wadenmuskeln den Patienten sehr unangenehm, ebenso grelles Licht und Geräusche. Steigerung der Sehnen- und Hautreflexe ist fast immer vorhanden.

Etwas seltener sind Symptome seitens der Hirnnerven wie Entzündung des Sehnerven (Augenspiegel!), vorübergehende Augenmuskellähmungen, Schwerhörigkeit infolge Schädigung des Hörnerven sowie Krampf der Kaumuskeln, der oft lautes Zähneknirschen bewirkt.

Die Lumbalpunktion ergibt stark erhöhten Druck sowie meist rein eitrige Flüssigkeit mit viel Eiweiß, Leukocyten und Meningococcen; gelegentlich ist sie nur wenig getrübt, in späteren Stadien, in denen man oft statt der Leukocyten Lymphocyten findet, kann sie fast klar sein, bei perakutem Verlauf ist sie mitunter infolge von Meningealblutungen hämorrhagisch.

Das teils remittierende, teils intermittierende Fieber zeigt kein charakteristisches Verhalten, bei ganz schweren Formen kann es fehlen, andererseits aber auch kurz vor dem Tode sehr hohe Grade, über 41° erreichen. Der Puls ist meist beschleunigt; anatomisch besteht oft eine Myocarditis. Manchmal beobachtet man profuse Schweiße. Stets ist eine erhebliche Leukocytose mit Verminderung oder Fehlen der Eosinophilen vorhanden. Geringe Milzvergrößerung ist häufig. Die Diazo-reaktion ist negativ. Manche Fälle zeigen Gelenkschwellungen. Auffallend ist namentlich bei Kindern die sich rasch entwickelnde ganz enorme Abmagerung.

Hautausschläge sind besonders bei manchen Epidemien häufig, teils als scharlach-, masern- oder roseolaartige Exantheme, teils besonders bei schwerem Verlauf in Form von purpuraartigen Petechien.

Die Dauer der Krankheit erstreckt sich in der Regel auf mehrere (2—4) Wochen. In besonders bösartigen Fällen erfolgt der Tod bisweilen schon nach wenigen Tagen oder sogar Stunden (M. „siderans“). Bei längerer Dauer ist der Verlauf oft eigentümlich intermittierend, die Symptome zeigen einen auffallenden Wechsel der Intensität. Vorübergehendes Nachlassen der Beschwerden und des Fiebers berechtigt daher noch nicht ohne weiteres zur Stellung einer günstigen Prognose. Manchmal beobachtet man einen auffallend schleppenden Verlauf von vielen Wochen mit allmählichem langsamen Sinken des Fiebers. Ferner kommen auch Abortivformen vor mit schwerem Beginn und bereits nach einigen Tagen einsetzender Besserung. Die Todesursache ist häufig Pneumonie.

Die Bösartigkeit der Krankheit offenbart sich auch in den häufigen schweren Nachkrankheiten, insbesondere Schädigungen des Hör- und Sehnerven. Taubstummheit ist oft auf eine in der Jugend über-

standene Meningitis zurückzuführen. Die zurückbleibende Neigung zu anfallsweise auftretenden Kopfschmerzen, Bewußtlosigkeit und Konvulsionen beruht auf einem nach Meningitis häufigen chronischen Hydrocephalus. Die Mortalität der Meningitis schwankt zwischen 20—70%.

Für die **Diagnose** ist zunächst erforderlich die Abgrenzung zwischen sog. „Meningismus“ bei anderen akuten Infektionskrankheiten und echter Meningitis, sodann bezüglich der letzteren ihre bakteriologische Identifizierung als Meningococcenerkrankung. Meningismus, der ebenfalls wenn auch weniger intensiv, mit Kopfschmerzen, cerebralem Erbrechen, Nackenstarre, Kernig, Hyperästhesie der Haut und der Waden usw. einhergeht und als Begleiterscheinung bei den verschiedensten fieberhaften Krankheiten wie Typhus, besonders Pneumonie, bei Grippe usw., sowie Intoxikationen (Blei, Helminthiasis usw.) vorkommt, zeigt bei der Lumbalpunktion außer Druckerhöhung keine oder nur geringe Steigerung des Eiweiß- und Zellgehaltes und keine Bacillen. Fließende Übergänge führen von diesen auch als Meningitis serosa bezeichneten Zuständen zu der echten eitrigen Meningitis verschiedener Ätiologie (Pneumococcen, Streptococcen, Typhus-, Influenzabacillen usw.), die sich im Verlauf von Pneumonie, Typhus, Grippe usw. entwickelt oder sich sekundär an einen lokalen Infektionsherd namentlich im Bereich des Kopfes anschließt, z. B. nach Otitis media, Kopfersypel, Gesichtsfurunkel usw. Die tuberkulöse Meningitis unterscheidet sich in charakteristischer Weise durch den schleichenden Beginn, das Hervortreten der Hirnbasis-symptome wie Augenmuskellähmungen, langsamen Vaguspuls usw. (bei der epidemischen Meningitis ist mehr die Hirnkonvexität befallen), sowie das Vorhandensein anderer Tuberkuloseherde bzw. einer Miliartuberkulose, endlich durch das Fehlen eines Herpes. Sichergestellt wird die Diagnose durch den Befund von Meningococcen sowohl im Liquor — die Lumbalpunktion ist beim ersten Verdacht vorzunehmen — als auch bisweilen in der Blutkultur (Meningococcensepsis vgl. S. 96). Oft genügt der mikroskopische Befund intracellulärer Coccen, im übrigen ist die Identifizierung durch Kultur und Agglutination zu verlangen.

**Therapie:** An erster Stelle steht die Druckentlastung des Gehirns durch häufige, zunächst eventuell tägliche Lumbalpunktionen, die vorübergehend die Beschwerden, den Kopfschmerz und die Benommenheit bessern. Bei sehr dickem Exsudat ist Spülung mit steriler Ringerlösung zu versuchen. Neuerdings wurde zur Entlastung der Hirnventrikel mit Erfolg der Balkenstich angewandt. Sehr wirksam ist weiter die möglichst frühzeitig anzuwendende spezifische Therapie in Form des durch Immunisierung von Pferden gewonnenen Meningococcenserums — Merck <sup>1)</sup>. Nach Entleerung von 30—40 ccm Spinalflüssigkeit wird bei tiefgelagertem Kopf vorsichtig und langsam die gleiche Menge körperwarmen Serums zunächst täglich, dann seltener injiziert. Symptomatische Mittel: Anwendung der Eisblase auf den Kopf und längs

<sup>1)</sup> Nächste der Serumtherapie bei Diphtherie hat diejenige bei Meningococccen-Meningitis die größten Erfolge zu verzeichnen.

des Rückens, ableitende Mittel wie Schröpfköpfe und Senfpflaster am Nacken, reichlich Narkotica (Morphium, Pantopon, Brom usw.), warme Bäder (35—38°). Sorgfältig zu achten ist auf Bekämpfung der hartnäckigen Obstipation, auf die Entleerung der Blase sowie die Verhütung von Decubitus (Wasserkissen) wegen der starken Abmagerung.

Die **Prophylaxe** hat die Tatsache zu berücksichtigen, daß erfahrungsgemäß in der Umgebung Meningitiskrankter sich oft zahlreiche gesunde Keimträger befinden, die ebenso wie die Kranken und Rekonvaleszenten im Nasenrachenraum Meningococcen beherbergen. Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch (Tröpfcheninfektion). Die Empfänglichkeit ist im allgemeinen nicht sehr groß. Günstig ist der Umstand, daß die Meningococcen in der Außenwelt infolge ihrer sehr geringen Widerstandsfähigkeit gegen Austrocknung, Belichtung und Abkühlung schnell absterben. Eine Übertragung durch Gegenstände spielt daher nur eine untergeordnete Rolle. Da die Eintrittspforte für die Meningococcen wahrscheinlich die hypertrophische Rachenmandel ist, so empfiehlt sich deren Entfernung. Isolierung der Kranken sowie gründliche Desinfektion, namentlich auch der Wäsche (Taschentücher!) ist unerlässlich.

### Gelenkrheumatismus (Polyarthritus acuta).

Der akute Gelenkrheumatismus ist eine häufig vorkommende, durch schmerzhafte Entzündung und Schwellung mehrerer Gelenke sowie fieberhaften Verlauf charakterisierte, nicht übertragbare Krankheit, die hauptsächlich das 2.—4. Dezennium befällt. Der Erreger ist unbekannt. Den äußeren Anlaß geben meist die sog. rheumatischen Schädlichkeiten wie Durchnässung, Zugluft, feuchte Wohnungen, ferner Überanstrengungen, bisweilen Traumen.

**Krankheitsbild:** Als häufige Prodromalerscheinungen werden außer Störung des Allgemeinbefindens, Müdigkeit, Steifigkeit der Glieder, namentlich Schleimhautkatarrhe beobachtet, vor allem Anginen und zwar einfache katarrhalische und follikuläre Formen, ferner Laryngitis, Conjunctivitis usw. Oft sind bei Ausbruch der Erkrankung die Vorboten bereits wieder geschwunden, nicht selten werden sie dem Kranken überhaupt nicht bewußt.

Im Vordergrund des Krankheitsbildes steht die Erkrankung der Gelenke, im wesentlichen eine seröse Entzündung der Synovia und Gelenkkapsel, die zunächst die großen Gelenke wie Knie-, Fuß-, Ellbogen- und Handgelenk, im weiteren Verlauf auch die kleinen Gelenke befällt; im allgemeinen erkranken die mechanisch (beruflich) am stärksten in Anspruch genommenen Gelenke zuerst. Rötung, Schwellung, Hitze und Schmerz sind die typischen Gelenksymptome, unter denen der äußerst heftige Schmerz dominiert. Der Patient hält die befallenen Gelenke leicht gebeugt und vermeidet jede Bewegung, was eine Versteifung vortäuscht. Hauptsitz der Schmerzen sind die Insertionsstellen der Gelenkkapsel am Knochen. Meist besteht auch ein leichtes periartikuläres Ödem, besonders am Hand- und Fußgelenk sowie oft eine Beteiligung der Sehnenscheiden. Fluktuation zeigt oft das Kniegelenk.

Die Haut über den Gelenken ist nicht selten fleckig gerötet. Beachtenswert ist die Schnelligkeit, mit der sich die Erkrankung eines Gelenkes entwickelt bzw. wieder schwindet, um auf ein anderes Gelenk überzuspringen. Dies kann sich innerhalb weniger Stunden vollziehen. Von den kleinen Gelenken werden meist die Hand- und Fußwurzel- sowie die Interphalangealgelenke, ferner bisweilen die Halswirbelgelenke, seltener die Kiefer- und Kehlkopfgelenke befallen. Charakteristisch ist zwar die polyartikuläre Erkrankung sowie die Flüchtigkeit des Gelenkprozesses, doch kommen gelegentlich auch Fälle vor, bei denen die Erkrankung eines Gelenkes längere Zeit im Vordergrund steht.

Das regelmäßig vorhandene Fieber, das meist nicht sehr hoch, selten über  $39,5^{\circ}$ , und unregelmäßig remittierend ist, pflegt zunächst dem Gange der Gelenkerkrankung parallel zu gehen; dem Befallenwerden neuer Gelenke entspricht ein erneuter Temperatur-Anstieg. Schüttelfrost sowie Herpes gehört nicht zum typischen Bilde. Eine sehr charakteristische Begleiterscheinung ist dagegen die reichliche Absonderung von säuerlich riechendem Schweiß auch bei leichtem Verlauf und im Gegensatz zu anderen Erkrankungen unabhängig vom Fieber.

Das Verhalten des Zirkulationsapparates, der sehr oft in Mitleidenschaft gezogen wird, verdient besondere Beachtung. Der Puls geht bei ungestörtem Verlauf der Temperatur annähernd parallel; er ist regelmäßig, oft dikrot und bewegt sich während des Fiebers in der Regel um 100—120. Mit der Entfieberung soll er bei Bettruhe auf 80 (oft 60 und weniger) sinken. Hochbleiben des Pulses ist verdächtig auf Schädigung des Herzens auch bei Fehlen von Beschwerden. Meist liegt eine Endocarditis sowie Myokarditis, weniger häufig eine Perikarditis (zusammen als „Pankarditis“ bezeichnet) vor. Die Herzerkrankung, die auch bei leichtestem Verlauf der Krankheit auftreten kann, erklärt sich als eine den Gelenkerscheinungen koordinierte Wirkung des gleichen Krankheitsvirus, steht daher bezüglich Pathogenese auf derselben Stufe wie diese. Die rheumatische Endokarditis, die anatomisch stets die benigne verruköse Form darstellt, befällt am häufigsten die Mitrals, nächst dem besonders bei jungen Männern die Aortenklappen. Eine Mitralsuffizienz und -Stenose bzw. Aorteninsuffizienz ist eine häufige Folge. Die rheumatische Myokarditis zeigt anatomisch eine bei anderen Krankheiten nicht vorkommende Bildung von zellreichen Knötchen im interstitiellen Gewebe des Herzmuskels.

Oft ist die auffallend hoch bleibende Pulsfrequenz das einzige Zeichen einer Herzaffektion. Die häufigen systolischen Geräusche an der Mitrals sind oft akzidentell, daher nur mit großer Vorsicht zu verwerten. Außerdem kommen als Symptome in Betracht das Wiederansteigen der Temperatur ohne neue Gelenkbeschwerden sowie die S. 164 beschriebenen subjektiven Beschwerden. Folgeerscheinungen der Herzerkrankung sind die genannten Klappenfehler, gelegentlich blande Embolien (Hemiplegie, Milzinfarkte usw.), ferner bisweilen Aortenaneurysmen sowie nach Perikarditis eine *Syncretio pericardii* (s. S. 180). Nicht selten bleibt die Beteiligung des Herzens während der Krankheit völlig latent, so daß sich ihre Folgen erst später beim Aufstehen des Patienten oder gar erst bei

Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit in Form von Herzinsuffizienzerscheinungen wie Atemnot, Herzklopfen usw. zeigen. Auch kommen bisweilen erst längere Zeit später die physikalischen Zeichen der Klappenfehler zur Geltung. In der Regel sind aber letztere insofern gutartig, als sie zunächst fast immer kompensiert zu sein pflegen.

Die Neigung zur Erkrankung der serösen Häute (Polyserositis) zeigt sich in dem häufigen Vorkommen einer serösen Pleuritis, die sich namentlich links oft an eine Perikarditis anschließt. Seröse Peritonitis ist selten, auch Pneumonien sind nicht häufig. Die Milz ist nicht wesentlich vergrößert (zum Unterschiede von polyarthrit<sup>is</sup>ähnlichen Bildern bei Sepsis), die Diazoreaktion des Harns mitunter positiv. Nephritis ist sehr selten.

Der fast stets vorhandenen auffallenden Blässe der Haut der Kranken entspricht nur in einem Teil der Fälle eine stärkere Anämie. Die Leucocyten sind mäßig, in der Regel nicht über 15000 vermehrt. Infolge der starken Schweißbildung entwickelt sich oft auf der Haut eine Miliaria crystallina, die aus stecknadelkopfgroßen wasserklaren Bläschen besteht. Eine für Polyarthrit<sup>is</sup> charakteristische Hautaffektion ist ferner das besonders bei protrahiertem Verlauf vorkommende Erythema nodosum, das als schmerzhafte blaurote Knoten besonders die Unterschenkel befällt, einige Wochen besteht und unter Farbenänderung nach Art einer Kontusion langsam abheilt. Bisweilen entwickelt sich eine Iritis.

Schwerere nervöse Erscheinungen wie heftiger Kopfschmerz, Benommenheit, Delirien gehören nicht zum gewöhnlichen Bilde des Gelenkrheumatismus. Dagegen spielen sie eine besondere Rolle bei einer seltenen Verlaufsart, die man als Cerebralarthritis bezeichnet, wegen der meist dabei beobachteten extrem hohen Temperaturen (bis 43°) auch hyperpyretische Form genannt. Sie verläuft oft tödlich, ohne einen wesentlichen anatomischen Befund zu zeigen.

Eine häufige nervöse Komplikation namentlich im Kindesalter ist die Chorea minor, die sich hauptsächlich bei den mit Endokarditis einhergehenden Formen einstellt. Sie verläuft oft ohne Temperatursteigerung.

Der **Krankheitsverlauf** bei Gelenkrheumatismus ist ein recht wechselvoller, seine Dauer schwankt zwischen wenigen Tagen und Monaten, wenn auch heute unter dem Einfluß der Salizylbehandlung eine kürzere Dauer häufiger als früher beobachtet wird. Vielfach verläuft die Krankheit in Schüben entsprechend dem Übergreifen auf neue Gelenke bzw. den Rückfällen in alten Gelenken. Der Zahl der befallenen Gelenke geht meist auch die Krankheitsdauer parallel. Erkrankung des Herzens kann sie erheblich in die Länge ziehen. Der schließliche Ausgang ist in der Regel, von seltenen Ausnahmen abgesehen (s. oben), quoad vitam günstig, oft auch quoad sanationem. Bestimmend für die Prognose ist vor allem das Verhalten des Herzens. Zurückbleibende Herzfehler, Gelenkversteifungen und Muskelatrophien führen nicht selten schließlich zu Invalidität. Dazu kommt die exquisite Neigung des Gelenkrheumatismus

zu späterer Wiederholung, so daß manche Kranke eine ganze Reihe von Neuerkrankungen im Laufe des Lebens durchmachen.

**Diagnose:** Charakteristisch ist neben dem Befallensein mehrfacher Gelenke die Flüchtigkeit der einzelnen Gelenkaffektion sowie das prompte Reagieren auf Salicyl. Die Abgrenzung gegenüber der ebenfalls durch Salicyl günstig beeinflussten akut beginnenden Form der Arthritis deformans liegt in der Prädilektion der letzteren für die kleineren Gelenke sowie das Fehlen der Herzerkrankung. Die dem Gelenkrheumatismus eventuell sehr ähnlichen „Rheumatoide“ bei Scharlach (2. Woche), Meningitis, Pneumonie und Ruhr („Polyarthrit. enterica“) sowie im Verlauf der Serumkrankheit lassen sich unter Berücksichtigung des Grundleidens leicht richtig deuten, desgleichen die multiplen Gelenkerkrankungen im Verlauf von Sepsis (Schüttelfröste, Milztumor, starke Leukocytose, hämorrhagische Nephritis); die eitrigen Metastasen bei Sepsis beschränken sich auf ein oder wenige Gelenke, hier fehlt auch der sprunghafte Wechsel. Das gleiche gilt für die akute Osteomyelitis in der Nachbarschaft eines Gelenks. Die im Verlauf der Lues II gelegentlich vorkommenden Gelenkerkrankungen reagieren prompt auf Jod, sind aber gegen Salicyl refraktär; letzteres gilt auch für die gonorrhöischen, gichtischen und tuberkulösen Gelenkaffektionen, die überdies in der Regel monartikulär auftreten. Die gonorrhöische, hauptsächlich Knie- und Handgelenk befallende Arthritis zeichnet sich durch ihre Hartnäckigkeit, die Neigung zur Kapselschrumpfung und hochgradige Muskelatrophie aus (Untersuchung auf Gonorrhö!). Bezüglich der Gicht siehe diese. Gelenk-Tuberkulose beginnt schleichend ohne oder mit geringem Fieber. Die bei Lungentuberkulose gelegentlich vorkommenden Poncetschen Rheumatoide sind flüchtig, werden aber durch Salicyl nicht beeinflusst. Bei Dengue (s. S. 90) schützt, abgesehen von der Prädilektion der Hüftgelenke, das ganze übrige Krankheitsbild vor Verwechslung.

**Therapie:** Das spezifische Mittel ist die Salicylsäure<sup>1)</sup>, von der als Natr. salicyl. oder Acetyl-Salicylsäure (Aspirin) per os 4—8,0 (höchstens 10,0) pro die bei Erwachsenen, bei schwächlichen Personen und Kindern entsprechend weniger gegeben werden und zwar in einzelnen Dosen von je 1,0 in Oblaten, abends am besten auf einmal 2,0—3,0; bei empfindlichem Magen eventuell in Klysmen 6,0—8,0 pro die in 2 Dosen verteilt. Nebenwirkungen größerer Dosen sind vor allem Ohrensausen und Schwindel, seltener Schwerhörigkeit, ferner sehr starke Schweiß, bisweilen Übelkeit und Erbrechen. Ernstere Symptome sind eine eigentümliche als Salicyldyspnoe bezeichnete Vertiefung und Beschleunigung der Atmung sowie Cyanose, ferner rauschartige Zustände, auch Nierenreizung. Gegen die häufigen Magenbeschwerden hat sich Natr. bic. 3,0—5,0 pro die bewährt. In der Regel erzielt die Behandlung mit großen Dosen bald eine Wirkung auf den Schmerz und die Schwellung der Gelenke sowie das Fieber, so daß man schon in den folgenden Tagen

<sup>1)</sup> Die Salicylsäure zeigt dabei ein sog. organotropes Verhalten; chemische Analysen der verschiedenen Organe ergeben nämlich eine Speicherung des Medikaments in den erkrankten Gelenken.

die Dosis meist auf 2—3mal täglich 1,0 herabsetzen kann. Die lokale äußerliche Applikation von Salicylpräparaten an den Gelenken in Form von Einreibungen mit Mesotan (ää mit Olivenöl) oder Rheumasan usw. ist lange nicht so wirksam, da nur geringe Mengen resorbiert werden. Bei den ersten Zeichen eines Rezidivs ist unverzüglich die gleiche Dosierung wie beim ersten Anfall anzuwenden. Gegen die Komplikationen des Gelenkrheumatismus seitens des Herzens usw. ist Salicyl wirkungslos, auch ist eine Prophylaxe damit nicht möglich. Nächst dem Salicyl hat sich die Phenylchinolinkarbonsäure (Atophan und Novatophan in Tabletten) 3—4mal täglich 1,0 mehrere Tage hintereinander bewährt, es ist besonders dort am Platz, wo Salicyl schlecht vertragen wird. Energische Schwitzprozeduren mittels heißen Getränks (Fliedertee) und Ganzpackungen sind bei intaktem Herzen ebenfalls günstig. Die erkrankten Gelenke sind mit dicken Wattepackungen zu umgeben (kein Schienenverband!). Nach Ablauf der stürmischen Erscheinungen der ersten Tage sind bei hartnäckigeren Gelenkbeschwerden weiter Alkoholverbände, die Biersche Stauung, Diathermie sowie die sehr wohltuende Heißluftapplikation empfehlerenswert. Die starke Schweißabsonderung erfordert sorgfältige Hautpflege. Die Patienten sind sorgfältig gegen Zugluft und Erkältungen zu schützen, gegen die sie sehr empfindlich sind. In der Rekonvaleszenz bedürfen etwaige Gelenkversteifungen und Muskelatrophien sorgfältiger Lokalbehandlung mit Fangopackungen, Diathermie sowie Massage. Die Schmerzhaftigkeit der passiven Bewegungen läßt sich durch ein vorangehendes warmes halbstündiges Teilbad verringern. Systematische Gymnastik sowie Thermal- und Moorbadekuren (Wiesbaden, Polzin, Teplitz, Battaglia usw.) sind bei hartnäckigen Fällen zu empfehlen. Stets ist hierbei das Verhalten des Herzens im Auge zu behalten. Als prophylaktische Maßregel empfiehlt sich bei vergrößerten Tonsillen und Neigung zu Anginen die operative Entfernung der Mandeln. Auch nach völliger Ausheilung der Krankheit hat der Patient sich noch jahrelang vor Erkältungen und Witterungsschädlichkeiten zu schützen.

### Dengue.

Dengue ist eine akute gutartige Infektionskrankheit der warmen Länder (Tropen, Subtropen, Mittelmeerländer), wo sie in der heißen Jahreszeit zum Teil endemisch auftritt; zeitweise beobachtet man Epidemien. Der unbekannte Erreger ist filtrierbar und wird durch Stechmücken (*Culex fatigans*) übertragen.

**Krankheitsbild:** Inkubation 3—6 Tage. Beginn plötzlich, oft blitzartig mit steilem Temperatur-Anstieg und sehr heftigen Schmerzen in den großen Gelenken, namentlich in Knie- und Hüftgelenk. Schweres Krankheitsgefühl, starke Kopfschmerzen, belegte Zunge und Appetitlosigkeit sind stets vorhanden, das Gesicht ist kongestioniert. Die befallenen Gelenke zeigen mitunter Schwellung und Rötung, auch sind oft in ihrer Nachbarschaft die Ansätze der Muskeln und Sehnen an den Knochen schmerzhaft. Das Fieber hält 1—3 Tage an, fällt dann

kritisch ab. Zugleich wird zwischen dem 3.—5. Tag ein charakteristisches Exanthem an Gesicht, Händen und Unterarmen sichtbar, das meist masernähnlich, bisweilen urtikariell ist und nur selten sich über den übrigen Körper ausbreitet. Sehr heftiger Juckreiz sowie die Flüchtigkeit des Ausschlages sind bezeichnend. Zwischen dem 4.—6. Tag kann es nochmals zu einer kurz dauernden Temperatursteigerung kommen. Regelmäßig sind Leukopenie und Lymphocytose vorhanden. Oft beobachtet man Schwellung und Druckempfindlichkeit der Lymphdrüsen während des Exanthems. Nach Abblassen desselben findet eine feine Hautschuppung statt. Komplikationen von seiten der inneren Organe werden in der Regel nicht beobachtet. Während der oft lange dauernden Rekonvaleszenz besteht erhebliche Schwäche sowie seelische Depression.

**Diagnostisch** wichtig sind in erster Linie der akute Beginn und die Gelenkschmerzen, deren Heftigkeit an den Schmerz bei Knochenbrüchen erinnert („breakbone fever“). Von Masern unterscheidet sich Dengue abgesehen von den Gelenkerscheinungen durch das zeitliche Auftreten des Exanthems nach dem ersten Fieberanfall. Im Gegensatz zur Polyarthritits ist Dengue gegen Salicyl refraktär. Eine Verwechslung mit Grippe läßt sich durch das Fehlen katarrhalischer Erscheinungen vermeiden.

Die Mortalität bei Dengue ist sehr gering, dagegen kann die Krankheitsziffer bei Epidemien sehr hoch sein. Die Krankheit hinterläßt keine Immunität.

## Sepsis.

Die Bezeichnung Sepsis ist ein Sammelname für eine große Gruppe recht verschiedenartiger schwerer bakterieller Allgemeininfektionen, die dadurch ausgezeichnet sind, daß der Krankheitsprozeß seinen Ausgang von einer primären infektiösen Herderkrankung nimmt, die dauernd oder schubweise pathogene Keime in den Blutkreislauf sendet, im übrigen aber im klinischen Bild oft ganz in den Hintergrund tritt, bisweilen sogar bei Lebzeiten nur schwer oder nicht aufzufinden ist („kryptogenetische Sepsis“); oft ist sie zugleich der Ausgangspunkt zahlreicher metastatischer Herde in den verschiedensten Organen. Derartige Fälle werden auch als Septikopyämie (bzw. Pyämie) bezeichnet.

Nach dieser Definition ist also das bloße Zirkulieren von Bakterien im Blut noch nicht identisch mit Sepsis, denn „Bakteriämie“ wird auch regelmäßig bei Typhus, häufig auch bei Pneumonie, ja sogar vorübergehend bei gewöhnlichem fieberhaften Abort sowie Anginen beobachtet, ohne daß eine Sepsis besteht.

Häufige Ausgangspunkte als Primärherde sind abgesehen von infizierten Wunden Furunkel, Anginen, besonders die nekrotisierende Form, cariöse Zähne, Nebenhöhleneiterungen, Mittelohreiterungen, Pneumonien, weiter eitrige Cholecystitis, Cholangitis, Pylephlebitis, Appendicitis, ferner Cystopyelitis, Prostataabscesse sowie periurethrale Eiterungen nach mißlungenem Katheterismus (Urogenitalsepsis), ferner der infizierte Uterus (Aborte<sup>1)</sup>, puerperale Sepsis, vereiterte Hämor-

<sup>1)</sup> Besonders häufig kriminelle Aborte.



rholden, Decubitus, jauchende Carcinome, endlich bei Säuglingen die infizierte Nabelwunde.

Häufigste Erreger: Streptococcen, Staphylococcen, Pneumococcen, Kolibacillen, Gonococcen, seltener Tetragenus, Milzbrand, Gasbacillen, Pyocyaneus usw.

Das **Krankheitsbild** wird von der Wirkung der Bakteriengifte beherrscht, zu der oft noch Zeichen der oben genannten Organmetastasen hinzutreten. Das Bild der Sepsis ist äußerst vielgestaltig, die einzelnen Symptome sind jedes für sich allein fast nie absolut spezifisch; erst in ihrer Gesamtheit ergeben sie im Verein mit der Art des Krankheitsverlaufs oft ein charakteristisches Bild.

Der **Verlauf** ist meist akut, mitunter sogar foudroyant, nicht selten schleichend, bisweilen kommen Remissionen vor; die Krankheitsdauer dementsprechend wechselnd zwischen einigen Tagen, ja sogar Stunden und vielen Monaten. Der Ausgang ist in der Mehrzahl der Fälle tödlich, doch kommen mitunter auch Heilungen vor.

Fast immer besteht Fieber, das jedoch von Fall zu Fall recht verschieden und nicht für die einzelnen Formen der Krankheit oder ihre Erreger ohne weiteres charakteristisch ist. Immerhin ist eine Kurve mit stark intermittierendem Fieber und zahlreichen Schüttelfrösten am meisten auf Sepsis verdächtig. Daneben kommen mehr kontinuierliche, schließlich auch ganz unregelmäßige Fieber vor. Bei Coli- und Gonococcensepsis werden oft besonders steile Temperaturschwankungen beobachtet.

Die Gesichtsfarbe ist bei den mildereren Formen gerötet, oft mit einem Stich ins gelbliche, bei den schnell fortschreitenden toxischen Formen livid bzw. blaßzyanotisch. Die Stimmung der Kranken ist häufig trotz der Schwere ihres Zustandes merkwürdig gut und optimistisch.

Wichtige klinische Symptome zeigen am häufigsten die Milz, der Zirkulationsapparat, die Haut, die Augen, die Nieren und die Gelenke.

Der stets vorhandene Milztumor läßt sich immer perkutorisch, seltener auch palpatorisch feststellen. In manchen Fällen nimmt er sehr erhebliche Dimensionen an. Häufig kommen Infarkte vor, die bisweilen Schmerzen verursachen und sich objektiv durch perisplenitisches Reiben verraten.

Sehr wichtig ist das Verhalten des Pulses, der stets, auch bei niedriger Temperatur oder Fehlen des Fiebers stark beschleunigt ist (120—140), er ist immer weich und dikrot, mitunter arhythmisch. Am Herzen entwickelt sich häufig eine maligne ulceröse Endokarditis, deren Sitz mit Vorliebe die Mitrals, nächst dem die Aortenklappen sind. Bei Lebzeiten läßt sie sich oft nur vermuten, ein sicheres Zeichen ist das Auftreten diastolischer Geräusche bzw. einer Verdoppelung der 2. Töne, ein indirektes die Entstehung embolischer Herde in anderen Organen. Noch unsicherer ist die Diagnose der eben so häufigen Myokarditis, zumal deutliche Herzdilatation selten ist. Auch Perikarditis kommt oft vor. Bei allen septischen Kreislaufstörungen

ist ferner stets an die häufige toxische Lähmung der Vasomotoren zu denken (vgl. S. 152), die sich durch kleinen frequenten Puls, kühle Extremitäten und blasse verfallene Gesichtszüge verrät; sie führt oft schnell zu schweren Kollapsen.

Die septischen Hauterscheinungen sind recht vielgestaltig. Sie sind häufig hämorrhagisch, bisweilen pustulös, nicht selten erythematös nach Art der akuten Exantheme. Die hämorrhagischen Formen bestehen teils aus zahlreichen purpuraartigen Petechien (Verwechslung mit Fleckfieber!), teils aus größeren Blutungen bisweilen in Form von Blasen, die mitunter in runde Geschwüre übergehen, was namentlich bei *Pyocyaneusepsis* beobachtet wird. Frühzeitig auftretende Hämorrhagien sind teils toxischen, teils embolischen Ursprungs, im späteren Verlauf können sie besonders bei schwerer Anämie auch eine allgemeine hämorrhagische Diathese anzeigen. Bei *Staphylococcensepsis* beobachtet man oft Eruptionen von kleinen oder größeren, manchmal pockenähnlichen Pusteln. Differentialdiagnostisch besonders wichtig sind ferner die häufigen scharlachähnlichen Ausschläge, besonders bei puerperaler Sepsis<sup>1)</sup>, ferner masernartige und urticarielle Exantheme. In ihrem Aussehen und ihrer Flüchtigkeit ähneln sie oft den Exanthenen bei Serumkrankheit. Auch größere subcutane Blutungen, die blauschwarz durch die Haut durchscheinen und oft zu tiefen Nekrosen führen, kommen vor (*Staphylococcen*). Ferner beobachtet man Efflorescenzen nach Art des Erythema nodosum sowie endlich eine erysipelähnliche Rötung ausgedehnter Hautbezirke, mitunter mit anschließender Zellgewebsentzündung.

Die Augen zeigen als Sitz septischer Metastasen häufig multiple kleine ophthalmoskopisch wahrnehmbare Netzhautherde, die teils aus hämorrhagischen, teils aus weißen Flecken bestehen; sie treten auch bei benignen Formen auf und können dann wieder verschwinden. Bei der septischen Ophthalmie kommt es zu Vereiterung und Zerstörung des ganzen Bulbus.

Die Nieren sind regelmäßig beteiligt, anfangs in Form einer einfachen Albuminurie, später teils unter dem Bilde einer Nephrose mit viel Eiweiß ohne Blut, häufiger aber als hämorrhagische Glomerulonephritis (anatomisch zum Teil auch als embolische Herdnephritis) mit Hämaturie, die sich in Spuren mikroskopisch oft schon frühzeitig im Sediment nachweisen läßt. Diagnostisch verwertbar ist die häufig stattfindende Ausscheidung der Erreger mit dem Harn. Blutdrucksteigerung wird bei septischen Nierenaffektionen regelmäßig vermißt. Bei schwertoxischen Formen beobachtet man mitunter Hämoglobinurie (*Pneumococcen*, *Streptococcen*, *Gasbacillen*).

Sehr oft sind Gelenkschwellungen teils seröser, teils eitriger Art vorhanden, die oft polyartikulär auftreten und dann bei Beginn der Krankheit eine Polyarthritis vortäuschen können, von der sie sich aber durch ihre Nichtbeeinflussbarkeit durch Salicyl unterscheiden; mitunter sind sie monartikulär, so häufig bei *Gonococcen-* und *Pneumococcensepsis*. Auch periartikuläre Schwellungen kommen vor. Manche

<sup>1)</sup> Der sog. Scharlach im Wochenbett ist sehr häufig eine Sepsis mit skarlatiniformem Exanthem.

Gelenkschwellungen erklären sich aus der Nachbarschaft metastatischer Eiterherde im Knochen. Derartige osteomyelitische Herde (Staphylococccen) bevorzugen die unteren Extremitäten.

Auch die Lungen sind häufig Sitz metastatischer Herde, die aber nicht selten keine charakteristischen Symptome hervorrufen. Und zwar sind es Infarkte, Abscesse und bisweilen Gangränherde (anaerobe Bacillen!). Bei Lokalisation nahe der Pleura bewirken sie Pleuritis, die dann oft erst auf die Lungenkomplikation hinweist.

Von seiten des Verdauungsapparates werden zwei Veränderungen sehr oft beobachtet, vor allem eine trockene fuliginös belegte Zunge, sowie ferner toxisch bedingte Diarrhöen. Die Beschaffenheit der Zunge bietet namentlich bei allen akut verlaufenden septischen Zuständen einen wichtigen Anhaltspunkt in prognostischer Hinsicht; wird sie wieder feucht, so ist dies ein gutes Zeichen. Embolisch entstandene Magendarmblutungen sind seltener.

Im Gehirn entstehen mitunter, besonders bei otogener Sepsis embolische Abscesse oder Erweichungsherde mit entsprechenden Ausfallserscheinungen wie Hemiplegie, Aphasie usw. Ferner beobachtet man namentlich bei Pneumococccen- und Meningococccensepsis eine metastatische eitrige Meningitis.

Blut: Regelmäßig und zwar meist erheblich vermehrt sind die neutrophilen Leukocyten, vermindert die Lymphocyten und die Eosinophilen — letztere können bei schwerer Sepsis völlig fehlen — gelegentlich treten vereinzelt Myelocyten auf. Die Blutplättchen sind stets vermehrt. Bei besonders schwerem Verlauf, namentlich bei den hochtoxischen Formen fehlt die Leukocytose oder es besteht sogar eine prognostisch besonders ungünstige Leukopenie mit relativer Polynukleose. Bei schleichender chronischer Sepsis sind die Leukocytenzahlen oft annähernd normal, die Polynukleären sind jedoch auch hier relativ vermehrt, die Eosinophilen vermindert. Stets entwickelt sich im Verlauf der Krankheit eine progrediente sekundäre Anämie mit starker Verminderung des Hb. (niedriger Färbeindex, vgl. S. 251), Polychromasie und bisweilen vereinzelt Erythroblasten. Ausnahmsweise kann ein perniziösanämieähnliches Bild entstehen (*Streptoc. viridans*). Bei foudroyanter Sepsis (*Streptococccen*, *Pneumococccen*, *Gasbacillen*) tritt manchmal Hämoglobinämie mit Rotfärbung des Serums ein.

Den einzelnen Erregern entsprechen zwar nicht absolut spezifische Krankheitsbilder, immerhin lassen sich praktisch gewisse **klinische Typen** unterscheiden.

Der gewöhnliche hämolytische *Streptococcus* (*Str. pyogenes* seu *erysipelat.*), der häufigste Sepsiserreger, erzeugt das Erysipel, zahlreiche Wundinfektionskrankheiten sowie in der Mehrzahl der Fälle die puerperale Sepsis. Er wächst auf Blutagar mit hellem hämolytischen Hof, gedeiht im Gegensatz zu *Staphylococccen* auf *Drigalskiagar* und ist tierpathogen.

*Streptococccensepsis* (ca.  $\frac{3}{4}$  aller Sepsisfälle): Relativ charakteristisch sind das remittierende Fieber, die häufigen Hautblutungen, sowie Gelenkaffektionen, ferner die Seltenheit von Metastasen. Die Eintrittspforte zeigt oft nur geringfügige oder keine Veränderungen (*kryptogenetische Sepsis*). Die otogene und puerperale Form schließt sich mit Vorliebe an eine Thrombophlebitis an.

Eine besondere chronische Streptococcen-Sepsis ist die sog. Endocarditis lenta, hervorgerufen durch den nicht hämolytischen *Strept. viridans*, der auf Blutagar dunkelgrüne Kolonien bildet, wenig virulent und für Tiere nicht pathogen ist. Alte Herzklappenfehler (Polyarthrit) disponieren zu der Erkrankung. Charakteristisch sind der allmähliche Beginn meist ohne klare Eintrittspforte, der schleichende protrahierte Verlauf mit nicht sehr hohen Temperaturen, selten Fröste, der große Milztumor sowie nicht selten Lebervergrößerung, Trommelschlägelfinger, mäßige Leukocytose (mitunter Leukopenie), erhebliche Anämie, embolische Herdnephritis oft mit Hämaturie. Klinische Herzerscheinungen können vollständig fehlen, doch sind Aortenfehler häufig. Schmerzhaftes Embolien beobachtet man an der Milz und den Nieren. Niemals vereitern die Infarkte. Die Krankheit dauert oft viele Monate und wird wegen der wenig alarmierenden Symptome oft nicht als Sepsis erkannt; sie endet stets letal.

Der anaerobe *Streptococcus putridus*, der nicht hämolytisch ist und in Blutagar Gas bildet, ist ein häufiger Erreger der thrombophlebitischen Puerperal-sepsis. Er bewirkt steile Fieberkurven mit zahlreichen Schüttelfrösten, stinkenden Ausfluß, sowie Metastasen, vor allem Lungengangrän.

Der *Streptococcus mucosus* (eigentlich zu den Pneumococcen gehörig) ist ein seltener Sepsiserreger.

Die Staphylococcen sind nebst den Streptococcen die häufigsten Sepsiserreger (ca. 10% aller Fälle), vor allem der *Staph. aureus*. Er bildet auf festen Nährböden goldgelbes Pigment, bewirkt auf Gelatine Verflüssigung, auf Blutagar Hämolyse und ist für Tiere wenig pathogen. Auf Drigalskiagar wachsen Staphylococcen nicht. Eintrittspforten bei Sepsis sind vor allem die Haut (Furunkel usw.), ferner die Schleimhäute, der Harnapparat (unsauberer Katheterismus). Charakteristisch sind das intermittierende Fieber mit zahlreichen Schüttelfrösten sowie multiple eitrige Metastasen. Häufig ist ulceröse Endokarditis. Als häufige Metastasen kommen vor die oben genannten charakteristischen Hautveränderungen, ferner Nieren-, Lungen-, Leber- und Muskelabscesse.

Eine besondere Rolle spielen namentlich im Anschluß an oft längst abgeheilte Furunkel die paranephritischen Abszesse einerseits, die osteomyelitischen Herde andererseits, weil in diesen Fällen diese vereinzelt bleibenden Metastasen als Primärherde imponieren und bisweilen das Krankheitsbild beherrschen. Die Sepsis im Anschluß an Furunkel der Oberlippe und des Gesichts geht meist mit einer Thrombophlebitis der Vena facial., ophthalmica und des Sinus cavernos., eventuell mit eitriger Meningitis einher. Staphylococcen-Sepsis verläuft zu 90% der Fälle tödlich.

Der *Staphylococcus albus*, der weiße Kulturen bildet, ist ein weniger häufiger Sepsiserreger, noch seltener der gelbe *Staphyl. citreus*.

Pneumococcen (vergl. S. 54) sind kein häufiger, nur in 9% aller Fälle vorkommender Sepsiserreger. Nächste der Pneumonie, die im allgemeinen aber recht selten zur Sepsis führt, kommen hauptsächlich die Otitis media sowie Anginen als Ursache in Frage, selten Gallenblasenerkrankungen und ganz vereinzelt Puerperalinfektionen. Ulceröse Endokarditis, bisweilen auch am rechten Herzen lokalisiert, ferner eitrige Meningitis, monartikuläre Arthritis namentlich des Schultergelenks, bisweilen Peritonitis sowie Schilddrüsenmetastasen werden beobachtet. Mortalität ca. 50%.

Der Friedländersche *Pneumobacillus* ist ein gramnegatives kapseltragendes Stäbchen, das nur selten Erreger von (besonders schweren) Pneumonien ist. Er wird in einzelnen Fällen auch bei Sepsis im Anschluß an Pneumonie sowie an Otitis gefunden. Das Fieber verläuft in steilen Kurven.

Der *Colibacillus* (biologisches Verhalten vgl. S. 31) verursacht in etwa 4% aller Sepsisfälle eine hauptsächlich von den Harnorganen, nächst dem von Darm und Gallenblase ausgehende Sepsis. Kranke mit Nephrolithiasis, Pyelitis, Prostatahypertrophie, Blaseninkontinenz bei Rückenmarksleiden usw., Harnröhrenstrikturen (nichtseptischer Katheterismus!) erliegen oft einer Colisepsis. Vom Darm aus entsteht bisweilen Colisepsis nach Appendicitis und Ileus, bei ersterer oft auf dem Wege einer Pylephlebitis, die auch bei der von den Gallenwegen, speziell von eitriger Cholangitis ausgehenden Sepsis häufig beobachtet wird. Charakteristisch sind ein stark intermittierendes Fieber mit Schüttelfrösten, häufig

Herpes sowie mäßige Leukocytose. Endokarditis und Metastasen sind selten. Bisweilen wird positiver Typhus-Widal im Serum beobachtet. Mortalität relativ gering, ca. 40%.

Die seltene Gonococcensepsis, die stets von den Genitalien ausgeht, zeigt steil intermittierendes Fieber, oft Endokarditis sowie besonders charakteristische monartikuläre Arthritiden der großen Gelenke, die oft eine starke periartikuläre Schwellung zeigen, ferner nicht selten Hautblutungen, Milztumor und Nephritis. Ausgang meist letal.

Die bei kleinen Kindern weniger selten als bei Erwachsenen vorkommende Pyocyaneussepsis (Bacillus des blauen Eiters) ist durch die oben genannten Hautveränderungen charakterisiert.

Schließlich sind noch jene seltenen Fälle von Typhusbacillen-, Meningococcen- und Tuberkelbacillensepsis zu erwähnen, bei denen im Gegensatz zu dem gewöhnlichen Verlauf, d. h. anstatt eines Typhus abdominalis, einer Meningitis bzw. Milartuberkulose die spezifischen Organveränderungen vermißt werden und klinisch wie anatomisch lediglich das Bild der gewöhnlichen Sepsis mit großen Mengen der betreffenden Bakterien im Blut, eventuell auch im Liquor gefunden werden.

Für die **Diagnose** Sepsis ist der einmalige bakteriologische Nachweis eines pathogenen Keimes im Blut nicht ausreichend, da vorübergehende Bakteriämie bei den verschiedensten fieberhaften Krankheiten vorkommt (vgl. oben). Größeren Wert hat der wiederholte Bakteriennachweis. Zur Untersuchung kommt nicht nur die Blutaussaat in Betracht, sondern in Ergänzung hierzu wegen der häufigen Ausscheidung der Bakterien durch die Nieren auch die Verimpfung des mit Katheter steril entnommenen Harns, eventuell seines Sedimentes, auf Ascitesbouillon, in manchen Fällen ferner die Untersuchung der Spinalflüssigkeit (zweckmäßig mit 10%iger Dextroselösung  $\bar{a}\bar{a}$  vermischt und 24 Stunden lang im Brutschrank gehalten), endlich die Verimpfung von Exsudaten, Abscessen usw. Bakteriologische Leichenuntersuchungen haben nur sehr beschränkten Wert. Serologische Methoden bei Sepsis haben bisher, weil teils zu kompliziert, teils im Ergebnis zu unsicher, noch keine praktische Bedeutung gewonnen. Von entscheidendem Wert für die Diagnose ist stets das klinische Gesamtbild mit seinen oben beschriebenen Eigentümlichkeiten wie der Endokarditis, den Metastasen, Embolien usw.

**Therapie:** Als ätiologische Behandlung kommt vor allem die operative Beseitigung der Eintrittspforte der Keime in Frage, so bei chronischer Angina die Entfernung der Tonsillen (dagegen nicht bei akuter nekrotisierender Angina!), weiter bei dentaler Sepsis Beseitigung von cariösen Zähnen bzw. von Alveolareiterungen, ferner frühzeitige Eröffnung primärer Eiterherde wie Nebenhöhleiteirungen, Ohreiteirungen, Osteomyelitis, Eiterungen im Bereich der Gallenwege, des Nierenbeckens, der Appendix usw., rechtzeitige ausgiebige Spaltung infizierter Wunden zur Verhütung von Sekretretention, Spaltung von Furunkeln, Ausräumung des Uterus nach infiziertem Abort. Auch sonst kommen chirurgische Eingriffe bei allen zugänglichen Infektions- und Eiterherden in Frage. Bei den thrombophlebitischen Formen gelingt bisweilen eine Coupierung der Sepsis durch frühzeitige Venenunterbindung vor Auftreten von Metastasen, so vor allem bei otogener, mitunter auch bei puerperaler, selten bei pylephlebitischer Sepsis <sup>1)</sup>. Bei der urinogenen

<sup>1)</sup> Näheres in den Lehrbüchern der Chirurgie und Gynäkologie.

Sepsis sind Beseitigung der Harnstauung mittels Dauerkatheters, medikamentöse Desinfektion des Harns durch Urotropin, Salol usw., gründliche Spülungen und gleichzeitige reichliche Zufuhr von Flüssigkeit (Wildunger Wasser) wirksam.

Chemotherapeutische Agenzien: Intravenöse Anwendung von kolloidalen Silberpräparaten und zwar z. B. Collargol oder Fulmargin, Dispargen usw. (etwa je 2—5 ccm alle 2 Tage eventuell täglich); oder als Methylenblausilber (Argochrom) jeden 2. Tag 0,2 intravenös. Den Injektionen folgt oft ein Schüttelfrost.

Bei Pneumococcen- und Meningococcensepsis hat sich unter den spezifisch wirkenden Chininderivaten das Optochin bewährt und zwar als Optoch. basic. dreistündlich 0,2—0,25 mit Milch; in 24 Stunden nicht mehr als 1,5 und niemals bei nüchternem Magen zu geben. Ferner Optochinsalicylester 6mal 0,4 bis 0,5 in 24 Stunden. Zur Vermeidung von Intoxikationen ist bei den ersten Zeichen von Augenflimmern, Ohrensausen und Schwerhörigkeit das Optoch. abzusetzen. Bei Meningitis ist die Injektion von 20—40 ccm  $\frac{1}{2}\%$ iger Optoch. hydrochlor.-Lösung in den Spinalkanal nach Entleerung größerer Mengen Liquor zu versuchen. Bisweilen hat die gleichzeitige Anwendung von Optochin und Pneumococenserum (Römer bzw. Neufeld-Händel) Erfolg.

Im übrigen ist die Wirkung der Serumtherapie bei Sepsis bisher unsicher. Bei Streptococcensepsis wirkt bisweilen das mittels mehrerer verschiedener Streptococcenstämme gewonnene („polyvalente“) Antistreptococenserum von Aronson sowie Meyer-Ruppel (Höchster Farbwerke) günstig, das mehrere Tage hintereinander zu 50—100 ccm subcutan injiziert wird (eventuell heftige Serumkrankheit!).

Die übrige Therapie beschränkt sich auf die auch sonst üblichen symptomatischen Maßregeln. Bei Zirkulationsschwäche sind zur Anregung des Vasomotorentonus frühzeitig Coffein, Campher, Suprarenin, Hypophysin sowie Strychnin anzuwenden (Dosierung vgl. S. 174). Digitalis versagt in der Regel. Empfehlenswert sind reichliche Flüssigkeitszufuhr sowie wiederholte subcutane und intravenöse NaCl-Infusionen zur Förderung der Toxinausschwemmung. In zahlreichen Fällen bewährt sich die Verabreichung größerer Mengen von Alkohol als Kognak, Portwein, die auch von schwächlichen Kranken bei Sepsis oft merkwürdig gut vertragen werden. Großen Wert hat man besonders bei der chronischen Sepsis auf die Ernährung zu legen. Unter den antipyretischen Maßnahmen ist einer milden Hydrotherapie in Form lauer Bäder und kalter Packungen vor der medikamentösen Behandlung der Vorzug zu geben.

## Pest.

Die Pest ist eine äußerst gefährliche, epidemisch bzw. endemisch auftretende Seuche. In Indien, in der Mongolei, Südchina, Afrika, Brasilien bestehen seit langem Endemieherde, welche Zentren für Epidemien bilden. Durch den Schiffsverkehr erklärt sich das gelegentlich sporadische Vorkommen der Pest in europäischen Hafenstädten.

Der Pestbacillus (Kitasato, Yersin) ist ein kleinesumpfes, an den Enden abgerundetes, ovoides Stäbchen, das unbeweglich ist; es bildet keine Sporen, ist gramnegativ und färbt sich mit basischen Anilinfarbstoffen an den Polen stärker als in der Mitte (charakteristische Polfärbung). Der Pestbacillus gehört zur Gruppe der Erreger der bei Tieren häufigen hämorrhagischen Septicämie. In feuchten Medien hält er sich längere Zeit, nicht dagegen in trockenem Staube. Auf Agar und

Gelatine bildet er bei 22° nach 2—3mal 24 Stunden Kolonien mit dunklem Zentrum und charakteristischer heller Randzone. Klatschpräparate der Kulturen zeigen eine typische Drahtknäuelform.

Ansteckungsquellen sind der pestkranke Mensch und die pestinfizierte Ratte, daneben auch andere Nagetiere (z. B. Murmeltiere, Mäuse usw.), wobei für die Übertragung auf den Menschen der Rattenfloh eine große Rolle spielt. Verschleppung in überseeische Länder geschieht häufig durch Schiffsratten. Die Ansteckung des Menschen erfolgt durch eine Hautwunde, mitunter aber auch durch die unverletzte Haut, ferner durch den Respirationsapparat.

**Krankheitsbild:** Inkubation 2—5 (10) Tage. Zu unterscheiden sind die Drüsenpest und die Lungenpest, ferner die Hautpest.

Drüsen-, Bubonen- oder Beulenpest: Nach Eindringen des Erregers durch die Haut folgt unter steilem Temperatur-Anstieg und Schüttelfrost sowie schwerem allgemeinen Krankheitsgefühl gleichzeitig oder kurz danach ohne vorhergehende Lymphangitis Schwellung der regionären Lymphdrüsen, am häufigsten der Inguinaldrüsen, die bis zu Gänseeigröße anschwellen und sehr schmerzhaft sind. Rasch zunehmende Schwäche, lallende schwere Sprache, taumelnder Gang und verfallenes Aussehen sowie frühzeitig eintretende Herzschwäche kennzeichnen den weiteren Verlauf. Durch Übergreifen der Erkrankung von den Bubonen auf andere Drüsen kommt es zu allgemeiner Lymphdrüsenanschwellung. Die Bubonen können vereitern, aufbrechen und geschwürig zerfallen.

Verschleppung der Erreger von den Drüsen auf dem Lymphwege in die Haut bewirkt die Eruption blauroter hämorrhagischer Hautflecken, zum Teil in Form von Infiltraten mit Pustelbildung (Pestblasen), zum Teil als dem Milzbrandkarbunkel ähnliche „Pestkarbunkel“ mit Zerfall und Geschwürsbildung. Stark remittierendes Fieber, das später lytisch abfällt, schwere Delirien, Milztumor und Nephritis sind regelmäßige Begleiterscheinungen; Herpes wird nicht beobachtet. Ausgang oft tödlich. Die Drüsenpest bildet etwa 90% aller Pestfälle.

Bei der Lungenpest entwickelt sich unter den gleichen schweren Allgemeinerscheinungen einige Tage später das Bild einer schweren, oft doppelseitigen Pneumonie von bronchopneumonischem oder lobärem Charakter. Frühzeitige starke Cyanose und Dyspnoe sowie hämorrhagisches Sputum mit massenhaft Pestbacillen sind regelmäßig vorhanden. Diese gefährlichste Verlaufsart, die fast stets tödlich endet, ist die seltenste Form der Pest (ca. 1% aller Fälle).

Einzelne Fälle verlaufen von vornherein unter dem Bilde der Sepsis und führen sehr schnell zum Tode (Pestis siderans), aber auch sonst treten bei tödlichem Verlauf gegen Ende der Krankheit die Bacillen ins Blut über.

Die **Diagnose** ist wegen des sehr charakteristischen Krankheitsbildes nicht schwierig. Die sehr wichtige Frühdiagnose ist aus dem Vorhandensein schmerzhafter Bubonen und den gleichzeitigen schweren Allgemeinerscheinungen — die Kranken erinnern oft an das Verhalten Betrunkener — zu stellen. Der Befund zahlreicher charakteristischer ovoider Bacillen in dem Drüsenpunktat (Fixierung mit Alcohol abs.,

Carbolmethylenblaufärbung) sichert die Diagnose<sup>1)</sup>, ebenso die massenhaft im Sputum vorhandenen Bacillen bei Lungenpest. Das Blutserum Kranker agglutiniert Pestbacillen. Meerschweinchen und Ratten erkranken nach Impfung typisch an Bubonenpest.

**Therapeutisch** wird die Anwendung von Pestheilserum (von immunisierten Pferden gewonnen) empfohlen, das jedoch nur wenig antitoxisch wirkt, während bei der Pest gerade die Wirkung der Toxine die Hauptrolle spielt.

**Epidemiologie und Prophylaxe:** Die wirksame Bekämpfung der Pest erfordert strengste Isolierung der Kranken, der Krankheitsverdächtigen und Ansteckungsverdächtigen (Quarantäne 10 Tage), sowie Vernichtung der Ratten. Am leichtesten wird die Lungenpest infolge von Tröpfcheninfektion durch den Husten übertragen, am wenigsten gefährlich ist die Drüsenpest. Auch Rekonvaleszenten scheiden noch eine Zeitlang Bacillen aus. Überstehen der Krankheit hinterläßt eine gewisse Immunität. Mortalität 60—90%. In Gegenden mit endemischer Pest geht meist dem Ausbruch einer Epidemie ein massenhaftes Sterben von Ratten voraus, eine Art Warnungssignal für die Bevölkerung. Lungenpest wird hauptsächlich im Winter, Beulenpest im Sommer beobachtet, bei der ersteren spielt im Gegensatz zur Beulenpest die Übertragung von Mensch zu Mensch eine Hauptrolle. In den Seehäfen wird jetzt die Vernichtung der Ratten in den Schiffen systematisch betrieben. Prophylaktisch empfiehlt sich die aktive Impfung mit abgetöteten Pest-Bacillen, zum Teil gemischt mit Pestimmunserum; der Schutz des letzteren allein dauert nur 14 Tage, tritt aber sofort ein.

## Miliartuberkulose.

Unter Miliartuberkulose versteht man die auf dem Blutwege erfolgende akute Aussaat zahlreicher Tuberkelbacillen in den verschiedensten Organen, ausgehend von einem bereits im Körper vorhandenen älteren tuberkulösen Herd. Die Ansiedelung der Tuberkelbacillen bewirkt die Entstehung kleinster als Miliartuberkel<sup>2)</sup> bezeichneter Wucherungen von Granulationsgeschwülste (vgl. S. 222).

Der **Tuberkelbacillus** (vgl. auch S. 221) ist ein schlankes, oft etwas gebogenes Stäbchen mit abgerundeten Enden; seine Länge beträgt  $\frac{1}{4}$ — $\frac{4}{5}$  eines Erythrocytendurchmessers. Er gehört zur Gruppe der sogenannten säurefesten Bakterien, die die Eigentümlichkeit haben, die von ihnen aufgenommenen Anilinfarbstoffe trotz Einwirkung von Säuren und Alkohol nicht wieder abzugeben (ähnlich verhalten sich die Smegmabacillen und andere „Pseudotuberkelbacillen“). Hierauf beruht ihre spezifische Färbung (Ziehlsches Carbofuchsin in der Wärme, Entfärbung mit salzsaurem Alkohol). Zur Züchtung bei 37° eignen sich Glycerinagar sowie Glycerinkartoffeln. Doch erfolgt das Wachstum sehr langsam. Für eine absolut sichere Identifizierung und Unterscheidung von Pseudotuberkulose ist ausschließlich der Tierversuch entscheidend: Verimpfung verdächtigen Materials in eine Hauttasche beim Meerschweinchen bzw. in die Iris des Kaninchenauges.

<sup>1)</sup> Aus vereiterten Drüsen können allerdings die Pestbacillen fast vollständig verschwinden.

<sup>2)</sup> Milium latein. Hirsekorn.



Der Einbruch tuberkulösen Materials in die Blutbahn erfolgt meist in die Venen, mitunter auch durch Vermittlung der Lymphwege, speziell des Ductus thoracicus. Der häufigste Ausgangspunkt der Überschwemmung des Körpers mit Tuberkelbacillen sind verkäste Lymphdrüsen, insbesondere Bronchialdrüsen, gelegentlich auch Tb-Herde in den Lungen, tuberkulöse Pleuritiden, ferner Tuberkulose der Knochen und Gelenke sowie des Urogenitalapparates, seltener Tuberkulose der Intestinalorgane. Fortgeschrittene Lungentuberkulose führt bemerkenswerterweise selten zu Miliartuberkulose.

Die Miliartuberkulose befällt vor allem jugendliche Individuen. Mitunter erfolgt der Ausbruch der Krankheit im Gefolge anderer akuter Erkrankungen.

**Krankheitsbild:** Es lassen sich drei verschiedene Verlaufsarten unterscheiden: die typhöse, die meningitische und die pulmonale Form; doch werden oft auch Mischformen beobachtet. Während die Ansiedlung von Miliartuberkeln in zahlreichen Organen klinisch überhaupt keine Symptome verursacht, bewirkt dieselbe im Gehirn und in der Lunge charakteristische Krankheitsbilder.

Der Beginn der Krankheit erfolgt aus scheinbar voller Gesundheit oder im Verlauf einer bereits bestehenden tuberkulösen Erkrankung. Die typhöse Form zeigt das Bild einer schweren Allgemeininfektion mit zunehmendem schweren Krankheitsgefühl, Mattigkeit, Kopfschmerzen, jedoch ohne ausgeprägte Lokalsymptome. Das langsam ansteigende Fieber bzw. eine Continua erinnert an die Temperaturkurve bei Typhus, in anderen Fällen ist es remittierend oder völlig unregelmäßig. Stets ist Pulsbeschleunigung vorhanden. Ein Milztumor ist nicht konstant. Dagegen beobachtet man schon frühzeitig neben ausgesprochener Hautblässe eine deutliche, wenn auch anfangs geringe Cyanose, die um so auffälliger ist, als sie sich aus dem negativen physikalischen Herz- und Lungenbefund nicht erklären läßt. Die Diazoreaktion des Harns ist positiv. Auch besteht oft Leukopenie mit Verminderung bzw. Fehlen der Eosinophilen, doch sind die Neutrophilen relativ vermehrt. Schließlich wird mitunter ein roseolaartiger Ausschlag beobachtet. Im Endstadium entwickelt sich oft ein meningitisches Syndrom.

Bei der pulmonalen Form, der man häufig bei alten sowie dekrepiden Individuen begegnet, lassen sich frühzeitig Symptome konstatieren, die auf die Beteiligung der Lunge hinweisen. Der Beginn ist teils akut unter dem Bilde einer Pneumonie, bisweilen eingeleitet von einem Schüttelfrost, oder auch hier schleichend. Frühzeitig macht sich eine auffallende Beschleunigung der Atmung bemerkbar, zu der bald wachsende Dyspnoe hinzutritt, die sehr hohe Grade erreichen kann, ferner trockener Husten. Der physikalische Lungenbefund ist anfangs, abgesehen von etwaigen älteren Herden, völlig negativ, später wird der Klopfeschall oft etwas tympanitisch bisweilen unter gleichzeitiger Entwicklung einer mäßigen Lungenblähung. Schließlich kommt es mitunter auch zu kleineren Dämpfungsbezirken. Auskultatorisch ist anfangs nur ein rauhes verschärftes Atemgeräusch, später spärlich Knisterrasseln sowie

gelegentlich weiches pleuritisches Reiben, daneben eventuell auch Giemen infolge der begleitenden Bronchitis zu hören. Sputum fehlt oder ist nur spärlich, es ist schleimig, seltener hämorrhagisch. Diagnostisch sehr wichtig ist der durch die Röntgenuntersuchung (Momentaufnahme) zu führende Nachweis kleinster Lungenherde, die in Form von hirse-korn- und stecknadelkopfgroßen, zum Teil miteinander konfluierenden zarten Flecken eine marmorierte Zeichnung bewirken und oft schon im Initialstadium der Krankheit, mehrere Wochen vor dem Tode konstatierbar sind. Das Sensorium pflegt bei dieser Form lange Zeit erhalten zu sein. Der Tod erfolgt unter den Erscheinungen des Lungenödems.

Bei der meningealen Form, die namentlich bei jugendlichen Individuen, vor allem Kindern beobachtet wird, beherrschen die Zeichen der Meningitis das Bild. Nach unbestimmten Prodromalerscheinungen wie Mattigkeit, Verstimmung, Appetitmangel setzen als erste Symptome Kopfschmerzen mit wachsender Intensität ein, zu denen sich Nackensteifigkeit, Trübung des Bewußtseins mit Delirien und vor allem die für die an der Hirnbasis sich lokalisierenden tuberkulöse Meningitis charakteristischen Hirnnervenlähmungen mit Ptose, Strabismus, Facialislähmung hinzugesellen. Letztere können vorübergehend wieder verschwinden. Das Fieber ist oft nicht besonders hoch und von unregelmäßigem Verlauf; nicht selten besteht Pulsverlangsamung. Bald pflegt sich das bei der epidemischen Meningitis genauer geschilderte charakteristische volle Krankheitsbild mit Kernischem Zeichen, Kahnbauch, Neuritis optica, Hyperästhesie der unteren Extremitäten, Lähmung der Harnblase usw. zu entwickeln (vgl. S. 83). Die Lumbalpunktion ergibt oft einen völlig klaren oder nur wenig getrübbten Liquor, im Sediment dominieren meist die Lymphocyten. In dem sich bisweilen beim Stehen abscheidenden Fibrinnetz sind oft Tuberkelbacillen nachweisbar.

Auch im weiteren Verlauf pflegen bei der tuberkulösen Meningitis die übrigen Erscheinungen der Miliartuberkulose völlig im Hintergrunde zu bleiben, in manchen Fällen jedoch kann sich neben dem cerebralen Bilde das oben beschriebene pulmonale Syndrom mit Dyspnoe und Cyanose entwickeln. Die Krankheitsdauer der Meningealtuberkulose beträgt etwa 2—3 Wochen.

Von klinisch wahrnehmbaren Veränderungen an anderen Organen ist im Verlauf der verschiedenen Formen der Miliartuberkulose die Entwicklung von ophthalmoskopisch am Augenhintergrund feststellbaren Chorioidaltuberkeln hervorzuheben, kleinen gelbweißen etwas erhabenen Knötchen, die sich hauptsächlich an der Peripherie des Bulbus entwickeln. Ihre Feststellung ist von größter diagnostischer Bedeutung.

**Anatomischer Befund:** In jedem Fall von Miliartuberkulose läßt sich ein wenn auch kleiner älterer Tuberkuloseherd als Ausgangspunkt der Erkrankung nachweisen. Miliartuberkel finden sich in fast allen Organen, am reichlichsten in den Lungen, nächst dem in Leber, Milz, Nieren, Meningen, Schilddrüse usw. Bei längerer Dauer der Krankheit zeigen sie bisweilen ungleiche Größe und können bis zu Erbsgröße anwachsen, so daß sie makroskopisch sichtbar werden.

Bei der **Diagnose** der Miliartuberkulose hat man anamnestische Daten über frühere Tuberkuloseerkrankungen sowie Drüsen- und Knochen-

narben, ferner das Bestehen einer floriden Tuberkulose (Lunge usw.) zu berücksichtigen. Das Anfangsstadium, das oft keinerlei alarmierende Zeichen darbietet und weder eine charakteristische Fieberkurve noch markante Organsymptome zeigt, wird oft verkannt. Der Nachweis der Beteiligung der Lunge im Röntgenbild als Frühsymptom (s. oben) bei allen Formen der Erkrankung ist von hohem diagnostischen Wert, während die Entwicklung der Aderhauttuberkel in der Regel erst in die späteren Stadien der Krankheit fällt. Bei der typhösen Form hat man sich bezüglich des allgemeinen Krankheitsbildes, der positiven Diazo-reaktion und der bisweilen vorhandenen Leukopenie vor einer Verwechslung mit Abdominaltyphus zu hüten. Der Nachweis von Tuberkelbacillen im zirkulierenden Blut hat keinen diagnostischen Wert, da er auch bei anderen tuberkulösen Erkrankungen oft gelingt.

Die **Prognose** der Miliartuberkulose ist absolut infaust. Ihre Dauer kann sich insgesamt auf mehrere Monate erstrecken, beträgt in der Regel jedoch nur 1—3 Wochen, in einzelnen Fällen nur wenige Stunden.

### Maltafieber.

Das Maltafieber, auch Mittelmeer-, Gibraltar- oder neapolitanisches Fieber genannt, wird in den Küstengebieten des Mittelmeers, aber auch anderer subtropischer Länder (Amerika, Westindien) beobachtet.

Der Erreger ist der sehr kleine, etwas elliptische *Micrococcus melitensis* (Bruce). Er färbt sich leicht mit Anilinfarbstoffen, ist gramnegativ, wenig resistent gegen Sonnenlicht und Wärme, verträgt dagegen längere Zeit Austrocknung. Eine Übertragung gelingt leicht subcutan und intravenös bei Affen sowie durch Fütterung bei Ziegen, die ohne selbst zu erkranken, den Erreger mit der Milch ausscheiden. Züchtung auf Ascitesagar liefert kleine zarte Kolonien; rasches Wachstum erfolgt in Lackmus-Ziegenmilch.

**Krankheitsverlauf:** Inkubation 6—21 Tage. Prodromalerscheinungen: Kopfschmerz. Appetitmangel, Schlaflosigkeit. Das Fieber, das in der Regel allmählich ansteigt und nur selten mit Schüttelfrost akut beginnt, zeigt starke morgendliche Remissionen, welche charakteristischerweise von sehr heftigen Schweißausbrüchen begleitet sind. Es bestehen regelmäßig Milztumor sowie Vergrößerung der Leber, oft schmerzhaft Gelenkschwellungen ähnlich der Polyarthritiden, sowie heftiger Kopfschmerz, mitunter ferner eine subikterische Hautfarbe. Im weiteren Verlauf treten häufig Neuralgien, namentlich des Ischiadicus, nicht selten auch Hodenschmerzen infolge von Orchitis auf. Der Puls bleibt hinter der Temperatur zurück. Diazo im Harn negativ. Es besteht Leukopenie mit relativer Lymphocytose und starker Vermehrung der Mononucleären.

Die erste Fieberperiode dauert mehrere Wochen, worauf nach kurzer Zeit unter erneutem Temperatur-Anstieg eine weitere meist kürzere Fieberperiode einsetzt, die mitunter an Malaria quotid. oder tropica erinnert und von einer dritten Periode usw. gefolgt wird, so daß die Fieberkurve mit den vielen Rezidiven das sehr charakteristische Bild zahlreicher Wellen darbietet („undulant fever“). Schließlich erfolgt langsame Entfieberung. Dauer meist viele Monate. Eine Anämie erheblichen Grades

und starke Entkräftung sind regelmäßige Begleiterscheinungen. Einzelne Fälle (ca. 2%) enden schließlich tödlich, doch ist günstiger Verlauf die Regel. Gelegentlich werden Abortivformen von wenigen Tagen Dauer beobachtet.

Die **Diagnose** ist infolge der wenig charakteristischen Symptome oft nicht leicht. Beweisend ist die Züchtung des Erregers aus dem Blut, eventuell aus dem Harn. Bei der Agglutination desselben durch stark verdünntes Serum (1 : 200—400) hat man mit dem Vorkommen von Normalagglutininen zu rechnen. Vor der Punktion der Milz, die reichlich Maltafieber-Coccen enthält, ist wegen der Gefährlichkeit des Eingriffs zu warnen. Die Provenienz der Kranken aus verseuchten Gegenden kann bei unklarem Bilde als Fährte dienen. Differentialdiagnostisch kommen Typhus, Paratyphus, Sepsis, Malaria, Polyarthritis, Tuberkulose und Dengue in Betracht. Chinin ist unwirksam, desgleichen Salicyl gegenüber den Gelenkerscheinungen (Unterscheidung von Polyarthritis!); die relative Bradykardie spricht wie bei Typhus gegen Sepsis. Die frühzeitig sich entwickelnde Anämie ist diagnostisch verwertbar.

Epidemiologisch kommt für die Verbreitung des Maltafiebers fast ausschließlich die Ziege und zwar der Genuß von roher Ziegenmilch bzw. Ziegenkäse in Frage. Vermeidung dieser Infektionsquellen in verseuchten Gegenden führt prompt zum Erlöschen der Krankheit. Übertragung von Mensch zu Mensch kommt praktisch nicht in Frage. Dagegen werden mitunter schwere Laboratoriumsinfektionen beobachtet, weshalb sich für die Ausführung der Agglutination das Arbeiten mit formalinisierten Kulturen empfiehlt.

## Malaria.

Malaria, Sumpf- oder Wechselfieber, ist eine sowohl in den Tropen wie im südlichen Europa vorkommende Protozoenkrankheit, deren Erreger die sog. Malariaplasmodien sind. Diese werden ausschließlich durch den Stich von Moskitos auf den Menschen übertragen. Es gibt verschiedene Arten von Malaria-Parasiten, denen verschiedene charakteristische Krankheitsbilder entsprechen. Man unterscheidet *Malaria tertiana*, *quartana* und *tropica*.

Der **Malariaerreger** ist ein einzelliger Parasit, aus Kern und Protoplasma bestehend, der wie zahlreiche andere Blutschmarotzer in den Leib der Erythrocyten eindringt und sie zerstört. Im Menschen findet die ungeschlechtliche Vermehrung (Schizogonie) in der Weise statt, daß die durch den Moskitostich in das Blut gelangten ersten Parasiten, die länglich zugespitzten Sporoziten, in den Erythrocyten sich zunächst in rundliche Körperchen („Schizonten“, wie sämtliche Parasiten der ungeschlechtlichen Generation heißen) verwandeln, die amöboide Protoplasmafortsätze zeigen und infolge einer zentralen Vakuole und des exzentrisch gelegenen Kerns zunächst kleine Ringe bilden; unter Aufzehrung des Hb und Ausscheidung von dunklem Pigment vergrößern sie sich zu „halberwachsenen“ Parasiten. Nach Konzentrierung des gesamten Pigmentes in der Mitte erfolgt die Teilung in eine bestimmte Zahl junger „Merozoiten“, worauf der Erythrocyt zerfällt. Hierdurch werden die jungen Parasiten frei, dringen alsbald in neue Erythrocyten ein, worauf die Reifung und Teilung sich von neuem abspielt. Das beim Zerfall der Blutkörperchen frei werdende Pigment wird von den Leukocyten aufgenommen und namentlich in die Milz und die Leber transportiert.

Neben dieser parthenogenetisch entstandenen Generation der Schizonten kommen bei längerer Krankheitsdauer vereinzelt auch geschlechtlich differenzierte Formen, „Gameten“ im Blute vor. Sie unterscheiden sich von den Schizonten durch das Fehlen der Vakuole und der Protoplasmafortsätze, durch einen

großen Kern und grobes stäbchenförmiges Pigment. Im menschlichen Körper bleiben sie unverändert und bilden der Behandlung gegenüber sehr resistente Dauerformen. Vor allem vermitteln sie die geschlechtliche Fortpflanzung (Sporogonie) im Körper




Abb. 1. Schematische Darstellung der verschiedenen Stadien der Malaria-Plasmodien, die in den Fieberperioden angetroffen werden. (Nach Kollé-Hetsch.)

der Mücke, die beim Blutsaugen in ihren Magen die Gameten aufnimmt (die ungeschlechtlichen Formen gehen zugrunde), aus denen schließlich nach erfolgter Befruchtung sichelartige Keime „Sporoziten“ entstehen, die aus der Leibeshöhle

der Mücke in deren Speicheldrüse wandern und von hier durch einen neuen Stich auf den Menschen übertragen werden. Mit diesem „Generationswechsel“ ist dann der Entwicklungskreis des Parasiten geschlossen. Die geschlechtliche Entwicklung dauert 10—20 Tage und ist an höhere Temperaturen über 15° gebunden. Sehr wichtig ist noch eine 3. Entwicklungsmöglichkeit: Die Rückbildung der im Blute befindlichen weiblichen Gameten in ungeschlechtliche Formen, die wie die Schizonten von neuem in Erythrocyten eindringen, so daß trotz Vernichtung aller aus dem 1. Zyklus stammenden ungeschlechtlichen Formen ein eine Neuerkrankung vortäuschendes Rezidiv ohne neue exogene Infektion entstehen kann.

Nur eine bestimmte Mückenart, die Anopheles, und zwar deren Weibchen, übertragen die Malaria. Von der sehr ähnlichen gewöhnlichen Stechmücke, Culex, unterscheidet sie sich dadurch, daß sie nur abends fliegt und sticht, schwarz gefleckte Flügel hat, beim Sitzen an einer Mauer den Körper, der nicht gekrümmt, sondern gerade gestreckt ist, in einem Winkel zur Wand hält; bei Anopheles (♀) sind Taster und Stechrüssel gleich lang, bei Culex sind die Taster kürzer. Die Anopheleslarve liegt im Wasser parallel zur Oberfläche, Culex dagegen bildet einen Winkel zum Wasserspiegel. Brutstätten sind stehende Gewässer, wie Sümpfe, Pfützen, ferner Zisternen usw.

Die Eigenart des Krankheitsbildes der Malaria erklärt sich aus dem biologischen Verhalten der Parasiten, insbesondere aus ihrem Entwicklungszyklus. Das hervorstechendste Symptom, das „Wechselfieber“ geht der Entwicklung der Plasmodien in der Weise parallel, daß jeder neue ungeschlechtliche Teilungsprozeß von einer Fieberattacke mit Schüttelfrost begleitet wird, die mit dem Freiwerden junger Merozoiten beginnt. Es entsteht dadurch ein sehr charakteristisches zyklisches Krankheitsbild. Entsprechend den Unterschieden im zeitlichen Ablauf der Teilung der verschiedenen Parasiten unterscheidet man klinisch 3 verschiedene Formen der Malaria.

Die **Malaria tertiana** ist die häufigste Form: Der Erreger heißt Plasmodium vivax, weil er im ungefärbten Blutpräparat eine lebhaft amöboide Bewegung zeigt. Die jüngsten Formen auf der Höhe des Fieberanfalls bilden in den Erythrocyten kleine Ringe von der Größe eines  $\frac{1}{4}$ -Durchmessers der Blutkörperchen („kleine Tertianaringe“). Der Ring färbt sich mit Giemsa hellblau und hat an der einen Seite ein leuchtend rotes Chromatinkorn (Siegelringform), kein Pigment; dies zeigt sich erst nach ca. 18 Stunden. Innerhalb von 24 Stunden wächst er zu einem großen „Tertianaring“ aus ( $\frac{3}{4}$ -Erythrocyten-Durchmesser). Der Erythrocyt, der etwas an Größe zunimmt und abblaßt, zeigt bei Giemsafärbung bald eine für Tertiana charakteristische, aus hellroten Punkten bestehende Tüpfelung. Nach ca. 36 Stunden hört die amöboide Beweglichkeit unter Schwinden der Vakuole des Parasiten auf, das Pigment sammelt sich in der Mitte des Parasitenleibes, der Kern zerfällt in 15—25 unregelmäßig um das Pigment gruppierte Teile, die Kernstücke rücken auseinander und das Protoplasma teilt sich durch radiäre Furchen in so viele Teile, als Kerne vorhanden sind. Nach 46—48 Stunden ist die Teilung vollendet, so daß eine Maulbeerform (Morula) entsteht. Im Anfall zerfällt der Erythrocyt, die jungen Merozoiten werden frei und das Pigment wird als sog. Restkörper von den Leukocyten aufgenommen. Von den bei längerer Krankheitsdauer stets vorhandenen spärlichen Gameten (s. oben) haben die männlichen einen großen Kern und rosa Protoplasma, die weiblichen einen kleinen Kern und blaues Protoplasma.

Die Inkubation bei Tertianfieber ist 10—14 Tage. Nach unbestimmten Prodromalerscheinungen wie Mattigkeit, Gliederschmerzen usw. erfolgt plötzlich heftiger Schüttelfrost, dem im Blute reife Teilungsformen entsprechen und auf den nach  $\frac{1}{4}$ —2 Stunden hohes Fieber, bis  $41^{\circ}$ , mit kleinen Ringformen in den Erythrocyten folgt. Dauer des Fiebers 4—8 Stunden, worauf unter starkem Schweiß rasche Entfieberung erfolgt. Stets ist ein Milztumor vorhanden, der sich zunächst wieder zurückbildet, desgleichen eine geringe Lebervergrößerung. Während des Schüttelfrostes besteht Verminderung der Gesamtleukocytenzahl, ferner sog. Lymphocytensturz und Verminderung der Eosinophilen sowie eine mit der Zahl der Anfälle zunehmende sekundäre Anämie; nach dem Anfall besteht relative Lymphocytose und eine charakteristische starke Vermehrung der Mononucleären. Die Aldehydreaktion im Harn ist während des Anfalls positiv, die Diazoreaktion negativ. Das Hautkolorit ist anämisch und leicht ikterisch (subikterisch); oft ist Herpes vorhanden.

Nach dem Anfall erholen sich die Patienten meist auffallend schnell schon in den nächsten Stunden. Der nächste Anfall erfolgt genau um die gleiche Zeit nach 48 Stunden, d. h. am 3. Tage, wenn man den ersten Fiebertag mitrechnet. Bei fehlender Therapie wiederholt sich dies noch eine Reihe von Malen, bis die Anfälle allmählich an Intensität und Regelmäßigkeit abnehmen; das Blut enthält dabei reichlich Parasiten. Schließlich entwickelt sich unter schwerer fortschreitender Anämie und Ausbildung eines großen harten Milztumors sowie Lebervergrößerung eine chronische Malariakachexie. Bei diesen Fällen ist die Urobilin- und Urobilinogenreaktion dauernd positiv. In zivilisierten Ländern ist diese Form seltener, zumal die Tertiana der Therapie leicht zugänglich und leichter heilbar als die Quartana und Tropica ist. Doch neigt sie sehr zu Rückfällen. Tertiana ist die in unseren Breiten am häufigsten vorkommende Malaria.

In Fällen, wo eine Doppelinfektion besteht und der Patient an 2 aufeinanderfolgenden Tagen infiziert wird (Tertiana duplex), verrät sich dies durch tägliche Fieberanfälle und im Blut durch die gleichzeitige Anwesenheit junger und alter Parasiten.

Therapie s. unten.

**Malaria quartana** ist die seltenste Form, die meist nur auf kleine Herde beschränkt ist. Sie wird vor allem in den Tropen, vereinzelt auch in Deutschland beobachtet. Erreger ist das Plasmodium malariae.

Inkubation 10—20 Tage. Entwicklungsdauer der Parasiten 72 Stunden. Die Fieberanfälle erfolgen jeden 4. Tag. Die Entwicklung des Parasiten, der oft nur in geringer Anzahl im Blut zu finden ist, entspricht in den ersten 24 Stunden mit seinen Ringformen vollständig jenen der Tertiana. Im Nativpräparate ist er auffallend porzellanweiß. An den Erythrocyten findet im Gegensatz zu der Tertiana keine Veränderung statt. Nach 24 Stunden beginnt sich der Parasit in die Länge zu ziehen, nimmt oft dabei eine charakteristische Bandform an (48 Stunden), die am Rande Pigment enthält; das Band nimmt an Breite und an Pigment zu. Letzteres ist gelblicher und gröber als bei Tertiana und Tropica. Die Teilung, die nach demselben Modus wie bei der Tertiana geschieht, ergibt eine

regelmäßige Figur, die aus 6—10, im Mittel 8 Teilstücken besteht (Gänseblümchenform). Die Gameten der Quartana verhalten sich wie die der Tertiana, nur haben sie kleinere Dimensionen.

Klinischer Verlauf derselbe wie bei Tertiana.

**Malaria tropica s. perniciosa** (Aestivoautumnalfieber): Inkubation 5 bis 10 Tage. Der Parasit (*Plasmodium immaculatum*) braucht bis zur Reifung 24—28 Stunden. Die jüngsten Formen bilden außerordentlich kleine und feine Ringe von der Größe von  $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{8}$  Durchmesser der Erythrocyten; in den späteren Stadien wachsen die Ringformen zur Größe der Tertiana- und Quartanaringe heran (24 Stunden). Nicht selten beherbergt ein Erythrocyt mehrere Ringe. Die die Parasiten enthaltenden Erythrocyten zeigen zuweilen eine Verkleinerung und erscheinen stärker gefärbt. Bei intensiver Giemsa-Färbung zeigen sie eigentümliche violettrote, ungleich große, verschieden gestaltete Flecke, die ausschließlich bei Tropica vorkommen und für diese charakteristisch sind („Perniziosaflecke“ nach Maurer). Die Tropicaringe haben nur sehr wenig feinkörniges Pigment.

Da die weitere Entwicklung der Parasiten bis zur Teilung sich im Gegensatz zu den beiden anderen Formen ausschließlich in den Organen (vor allem in Milz und Knochenmark) abspielt, bekommt man bei der Tropica von den ungeschlechtlichen Formen in den Blutpräparaten ausschließlich Ringformen zu sehen. Damit hängt ferner zusammen, daß man kurz vor einem Anfall nur sehr spärlich Parasiten im Blute findet.

Im ersten Anfall können auch die Ringformen im Blute fehlen. Die Diagnose muß dann bis zum nächsten Anfall in suspenso bleiben.

Die Gameten der Tropica treten erst auf, nachdem mehrere Fieberanfalle vorausgegangen sind; sie bilden Halbmond- oder Wurstformen, in deren Konkavität oft noch der Rest des Erythrocyten als Schatten liegt. Von den Erythrocyten befreit bilden sie die sog. „Sphären“. Der Unterschied zwischen den männlichen und weiblichen Gameten ist bezüglich ihres Kerns derselbe wie bei den übrigen Formen (vgl. S. 105).

Während des Fieberanstieges sind nur kleine Ringe, auf der Höhe desselben mittelgroße, während des Absinkens des Fiebers große Ringe zu finden.

Der Fieverlauf der Tropica ist häufig im Gegensatz zu den beiden anderen Malariaformen der einer Continua, wenn sich auch in gewissen Fällen bei häufig vorgenommener Messung doch ein an den Tertianatypus erinnernder Fieverlauf feststellen läßt („Tertiana maligna“). Zum Teil dürfte das „Quotidianfieber“ bei Tropica auf Infektion mit 2 Parasitengenerationen beruhen. Aus dem Verhalten der Temperatur erklärt sich, daß Schüttelfröste oft vollständig fehlen.

Das Krankheitsbild bei Tropica ist oft sehr schwer, namentlich infolge ernster Störungen seitens des Zirkulationsapparates, vor allem von Herzschwäche, weiter bestehen oft schwere Komplikationen seitens des Zentralnervensystems und des Darms. Benommenheit bis zum tiefen Koma, bisweilen Delirien sowie psychotische Zustände („Tropenkoller“) kommen nicht selten vor, desgleichen heftiges Erbrechen sowie Durchfälle, die einen ruhrartigen Charakter annehmen können, sog. Malaria-ruhr. Die Entleerungen enthalten bisweilen reichlich Plasmodien.



Ein besonderer Folgezustand der *Tropica*, sehr selten der *Tertiana*, ist das **Schwarzwasserfieber**. Ähnlich wie bei der paroxysmalen Hämoglobinurie entsteht hier plötzlich eine Auflösung zahlreicher Erythrocyten in der Blutbahn unter hohem Fieber, Schüttelfrost, Erbrechen, Kopfschmerzen und Ausscheidung von Blutfarbstoff durch die Nieren; gleichzeitig sinkt rasch die Erythrocytenzahl und das Hb., auch die Leukocyten sind vermindert. Einige Stunden später tritt starker Ikterus ein. Infolge Verstopfung der Nieren durch das gelöste Hb. sinkt die Harnmenge bis zu Anurie, so daß es oft zur Urämie kommt. Hierin sowie in der drohenden Herzschwäche liegt die Hauptgefahr; viele Fälle enden daher tödlich. Die Prognose ergibt sich aus dem Verhalten des Harns. Die auslösende Ursache ist das Chinin. Daher soll man bei den ersten Anzeichen von Ikterus sowie stärkerer Albuminurie usw. im Laufe einer Malariabehandlung das Chinin sofort weglassen.

**Malariarezidive** werden bei allen 3 Formen beobachtet. Sie kommen nicht selten erst geraume Zeit nach scheinbarer Heilung zur Beobachtung („latente Malaria“), bei *Tertiana* hauptsächlich im Frühjahr, bei *Tropica* im Winter. Zum Teil spielen äußere Anlässe wie Infektionskrankheiten, Traumen, Klimawechsel eine Rolle. Wegen der Rezidive ist die Frage der völligen Ausheilung einer Malaria stets mit Vorsicht zu behandeln. Bei chronischer Malaria fehlt Fieber entweder völlig oder ist nur angedeutet; verdächtig sind u. a. auch hartnäckige Neuralgien, namentlich wenn sie einen intermittierenden bzw. periodischen Charakter haben.

**Diagnose:** Der typische Fieverlauf des Tertian- und Quartanfiebers gestattet bei mehrtägiger Beobachtung meist schon die Ablesung der Diagnose von der Temperaturkurve. Entscheidend ist der beschriebene Blutbefund, der im groben schon aus dem ungefärbten Blutpräparat erhoben werden kann. Viel schwieriger kann die Diagnose der *Tropica* sein, die mit ihrem uncharakteristischen Fieber häufig zunächst andere Krankheiten, z. B. Typhus, Sepsis oder Meningitis vortäuscht. Bei verschleppten chronischen Fällen, mitunter auch bei *Tropica*, gelingt der Parasiten-Nachweis im gewöhnlichen Blutaussstrich oft nicht ohne weiteres.

Hier ist das Verfahren des „dicken Tropfens“ anzuwenden, das auch u. a. das Auffinden der Tropicahalbmonde erleichtert. Neuerdings hat man bei latenter Malaria zur Ausschwemmung der Parasiten aus der Milz die Faradisierung derselben, Höhensonnenbestrahlung sowie Adrenalininjektionen angewendet und damit sogar regelrechte Anfälle ausgelöst. Die Punktion der Milz ist nicht ungefährlich.

Im übrigen ist chronischer Milztumor, dauernde Urobilinogenurie sowie das Bestehen einer starken relativen Mononucleose und Vermehrung der Eosinophilen im Blut auf Malaria verdächtig. Nicht selten ist bei Malaria anfangs die Wassermannsche Reaktion positiv, später ist sie negativ.

**Therapie:** Das wirksamste Medikament ist wegen seiner spezifischen Wirkung auf die Plasmodien das Chinin, das am energischsten auf die jungen, im zirkulierenden Blute vorhandenen Parasiten einwirkt. Die Wahl des Zeitpunktes der Verabreichung muß auf Grund der Blutunter-

suchung getroffen werden. Gegen die Gameten und die in den inneren Organen befindlichen Parasiten ist das Chinin wirkungslos. Auch sonst gibt es vereinzelte (auch Tertian-) Fälle, die sich gegen Chinin resistent verhalten.

Am besten ist die Verteilung mehrerer Chinindosen über den ganzen Tag, z. B. nach dem Nochtschen Schema: Man gibt von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags alle 2 Stunden je 0,2 Chinin. hydrochlor. (= 1,0). Die Parasiten pflegen nach 1—2 mal 24 Stunden, bei Tropica nach einigen (3—4) Tagen zu schwinden. Um eine völlige Vernichtung der Parasiten zu erreichen, setzt man die Chininmedikation noch längere Zeit fort und zwar während des Fiebers und der weiteren 8 Tage täglich 5 mal 0,2, dann 2 Tage Pause, hierauf 3 Chinintage mit derselben Dosierung, 3 Tage Pause, 2—3 Chinintage, 4 Tage Pause, 2—3 Chinintage, 5 Tage Pause, 2 Chinintage, 5 Tage Pause, 2 Chinintage usw. mindestens 6 Wochen jeden 6. und 7. Tag je 1,0 Chinin. Man legt sich am besten einen „Chininkalender“ an.

Für intramuskuläre und intravenöse Verabreichung, die speziell bei schwerster Malaria anzuwenden ist, eignet sich am besten das Chininurethan in Ampullen steril zu 1,0 (Kade-Berlin). Ist bei Gefahr von Schwarzwasserfieber nach einem Anfall wegen des Vorhandenseins von Parasiten eine Fortsetzung der Chininkur notwendig, so beginnt man mit ganz kleinen „einschleichenden“ Dosen, indem man mit etwa 0,01 Chinin pro Tag anfängt und im Lauf einer Woche täglich steigend bis zu 1,0 pro Tag gibt.

Das Methylenblau officinale 0,1 pro dos. bis 1,0 pro die ist weniger wirksam als Chinin, schützt auch nicht vor Schwarzwasserfieber. Das Salvarsan wird mit Erfolg bei Malaria dort angewendet, wo es sich um chininresistente Formen handelt. Wirksam ist es vor allem bei Tertian.

Die **Prophylaxe** erzielt bei der Malaria große Erfolge. Da die Übertragung ausschließlich durch die Moskitos erfolgt, so besteht die Prophylaxe in erster Linie in Beseitigung der Anophelen<sup>1)</sup> und ihrer Brutstätten (Austrocknen von Sümpfen, Tümpeln usw., Vernichtung der überwinternden Mücken durch Ausräuchern usw.), zweitens in dem Schutz der Mücken gegen den Kontakt mit Malariakranken durch Moskitonetze sowie nicht zuletzt durch gründliche Behandlung und Sterilisierung aller Malariakranker als Träger der Plasmodien. Erschwert wird letzteres, namentlich in den Tropen durch das Vorkommen von anscheinend gesunden Parasitenträgern unter den Eingeborenen, an denen sich die Moskitos immer wieder von neuem infizieren. Für alle eine Malariagegend betretenden Gesunden ist eine konsequent durchgeführte Chininprophylaxe unerlässlich. Hier empfiehlt es sich z. B. jeden 6. und 7. Tag je 1,0 Chinin, und zwar 5 mal 0,2 pro die zu nehmen.

### Febris recurrens (Rückfallfieber).

Das Rückfallfieber ist eine akute durch die Recurrens-Spirochäte hervorgerufene Infektionskrankheit, die heute nur in wenig zivilisierten Ländern und unter besonders unhygienischen Verhältnissen teils endemisch, teils epidemisch vorkommt.

Die Recurrensspirochäten finden sich beim Menschen während des Fieberanfalls massenhaft im Blut (nicht in den Se- und Exkreten) und sind schon im

<sup>1)</sup> Anophelesmücken wurden auch in verschiedenen Gegenden Deutschlands beobachtet.

frischen ungefärbten Blutpräparat als sehr lebhaft bewegliche Spiralen von der mehrfachen Größe eines Erythrocytendurchmessers leicht zu erkennen, u. a. daran, daß sie die Blutkörperchen in ihrer Nähe stoßweise in Bewegung versetzen; zum Teil kleben sie zu mehreren zusammen. Sie lassen sich durch Impfung auf Affen übertragen. Entsprechend den in verschiedenen Ländern untereinander etwas verschiedenen Recurrensformen unterscheidet man verschiedene Varietäten der Spirochäten: in Europa Spir. Obermeieri, in Afrika Spir. Duttoni und berbera („Afrikanisches Zeckenfieber“), in Indien Spir. Carteri, in Amerika Spir. Novyi. Übertragung erfolgt durch Ungeziefer, vor allem Kleiderläuse, in Afrika zum Teil durch blutsaugende Zecken (*Ornithodoros moubata*), die übrigens die Spirochäten durch die Eier auf die junge Brut übertragen. Die Zecken, die die Feuchtigkeit meiden, finden sich namentlich in dunklen Schlupfwinkeln der Eingeborenenhütten und Karawanen-Lagerplätze. In unseren Breiten bilden die schmutzigen Wohnstätten der armen Bevölkerung, die Herbergen, Asyle usw. den Ausgangspunkt der Erkrankung. Bei der Übertragung auf den Menschen spielt teils der Biß der Tiere, teils die Beschmutzung von Kratzwunden mit dem zerdrückten Ungeziefer bzw. ihren Faeces eine Rolle.

**Krankheitsverlauf:** Inkubation 5—7 (9) Tage. Keine Prodromalerscheinungen. Beginn mit Schüttelfrost und schnell ansteigendem Fieber, das oft  $41^{\circ}$  und mehr erreicht. Schweres Krankheitsgefühl, Erbrechen, sehr heftige Kreuzschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie eine sehr starke Druckempfindlichkeit der Wadenmuskulatur sind regelmäßig vorhanden. Die Zunge ist stark belegt. Oft besteht heftiges Nasenbluten. Herpes ist häufig. Der Puls ist stark beschleunigt. Die Milz ist stets von den ersten Tagen ab erheblich vergrößert, sie reicht meist über den Rippenbogen hervor und verursacht häufig Schmerzen. Auch besteht meist mäßige Lebervergrößerung. Bronchitis ist häufig. Die Haut zeigt in der Regel ein schmutzig-gelbliches für Rückfallfieber bezeichnendes Kolorit. Stets ist eine Leukocytose vorhanden. Das Sensorium bleibt trotz der Schwere des Zustandes in der Regel klar.

Das meist 5—7 Tage andauernde sehr hohe Fieber zeigt oft einzelne Remissionen, die zum Teil wie Pseudokrisen aussehen, bis schließlich unter starkem Schweißausbruch eine kritische Entfieberung erfolgt, an die sich unter Schwinden des Milztumors eine auffallend rasche Erholung mit Aufhören aller Beschwerden anschließt. Während der Apyrexie besteht Pulsverlangsamung.

In der Regel tritt indessen nach einer fieberfreien Periode von 5—7 (bis zu 14) Tagen ein Rückfall, „Relaps“, mit Schüttelfrost und hohem Fieber ein, der in seinem Verlauf und im kritischen Temperatur-Abfall meist eine abgekürzte Kopie des ersten Anfalls darstellt. Bei manchen Epidemien folgen noch weitere Anfälle in immer größeren Abständen und von abnehmender Dauer, wobei auch das Fieber immer niedriger wird. Nur bei einzelnen tropischen Formen, speziell in Indien, besteht ein vollständig unregelmäßiger Fieverlauf.

Die Mortalität ist trotz der schweren Erscheinungen — das hohe Fieber ist prognostisch bedeutungslos — sehr gering (2—4%). Komplikationen, die eventuell einen ungünstigen Ausgang herbeiführen, sind Bronchopneumonien, Vereiterung von Milzinfarkten mit konsekutiver Peritonitis sowie Milzruptur. Gelegentlich beobachtet man eine Conjunctivitis oder Iritis. Störungen seitens des Zirkulationsapparates sind selten. Bezüglich der Schwere der Krankheit besteht im Gegensatz

zu Fleckfieber kein Unterschied zwischen den verschiedenen Altersperioden.

Das von dem gewöhnlichen Verlauf vollkommen abweichende von Griesinger als „biliöses Typhoid“ bezeichnete schwere Krankheitsbild in südlichen Ländern, namentlich Ägypten, das mit starker Benommenheit, Lebervergrößerung, Ikterus, hämorrhagischer Diathese und Diarrhöen einhergeht und bisher als besondere Form der Recurrens galt, wird jetzt als zur Weilschen Krankheit (s. S. 112) gehörig angesehen.

**Diagnose:** Der plötzliche Beginn mit Schüttelfrost, das Fehlen eines Exanthems, die sehr bezeichnende Fieberkurve mit den Relapsen und die Leukocytenvermehrung sind charakteristisch. Beweisend ist der schon in den ersten Fiebertagen zu führende Nachweis der Spirillen im Blut, die kurz vor der Entfieberung wieder aus dem Blut verschwinden (bei spärlichem Vorhandensein sind dicke Tropfenpräparate mit Giemsa-färbung anzufertigen). Auch die Agglutination von Recurrens-Spirochäten durch Zusatz von Serum eines Krankheitsverdächtigen spricht für die spezifische Erkrankung des letzteren. Gegenüber atypischer tropischer Malaria entscheidet ausschließlich der Parasitenbefund im Blut.

**Therapeutisch** wirkt prompt Salvarsan (0,45—0,6 Neosalvarsan oder Salvarsannatrium), das in den ersten Fiebertagen intravenös zu injizieren ist. Kontraindiziert ist es nur bei sehr dekrepiden und geschwächten Individuen.

Die Prophylaxe ist einfach; sie besteht im Schutz gegen Ungeziefer und in der Beobachtung körperlicher Reinlichkeit. Übertragung von Mensch zu Mensch kommt nicht in Betracht, wohl aber eine placentare Übertragung von der Mutter auf die Frucht. Die Krankheit hinterläßt nur eine vorübergehende Immunität.

### **Fünftagefieber (Wolhynisches Fieber, Febris quintana).**

Das Fünftagefieber, eine bis vor kurzem unbekannte Krankheit, wurde auf verschiedenen Schauplätzen des Weltkrieges, zuerst in Wolhynien beobachtet. Der Erreger, der bisher nicht bekannt ist, findet sich im Blut und wird durch den Biß der Kleiderlaus übertragen.

Nach einer Inkubation von mehreren Wochen erfolgt plötzlich der Ausbruch der Krankheit unter Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, starker Abgeschlagenheit und raschem Temperaturanstieg. Bezeichnend für die Krankheit sind vor allem die sehr heftigen Schienbeinschmerzen, die namentlich im Laufe des Nachmittags und während der Nacht an Intensität zunehmen, sowie reißende Schmerzen an den Sehnen und Muskelansätzen anderer Knochen. Herpes, Durchfälle, sowie mäßige Milzvergrößerung sind häufig. Die Diazoreaktion ist negativ. Meist besteht eine Leukocytose. Während des Fiebers wird oft eine relative Pulsverlangsamung beobachtet. Mitunter kommen flüchtige Exantheme wie bei Scharlach oder auch Roseolen vor. Das Fieber dauert 1—2 Tage an, um dann wieder mit dem Schwinden der Beschwerden zur Norm abzufallen. Ein erneuter Fieberanfall erfolgt nach 5 (4—6) Tagen unter den gleichen Allgemeinerscheinungen, was sich noch bis zu 6 Malen

wiederholen kann. So entsteht eine charakteristische Temperaturkurve, deren Gipfel je ca. 5 Tage voneinander entfernt sind. Doch kommt auch ein weniger typischer Verlauf mit unregelmäßiger oder typhusartiger Temperaturkurve vor. Der Ausgang der Krankheit ist stets günstig.

**Diagnose:** Bei typischem zyklischen Fieberverlauf läßt sich eine Verwechslung mit Malaria bzw. Recurrens durch das Fehlen der Parasiten im Blut vermeiden. Bei atypischen Fällen ist die Abgrenzung gegenüber Typhus sowie Grippe zunächst oft schwierig. Doch erleichtert auch hier u. a. das Vorhandensein der heftigen Tibiaschmerzen die Entscheidung.

Die **Therapie** ist rein symptomatisch.

### Icterus infectiosus (Weilsche Krankheit).

Der infektiöse Ikterus ist eine akute, teils sporadisch, teils in kleinen Epidemien auftretende einheimische Infektionskrankheit der warmen Jahreszeit. Sie ist nicht häufig und befällt hauptsächlich jüngere Männer. Der Erreger ist eine Spirochäte.

Die Spirochaeta ictero haemorrhagiae (Hübner und Reiter, Uhlenhuth und Fromme) zeigt im Gegensatz zu der Syphilis- bzw. Recurrens-Spirochäte keine regelmäßigen feinen Windungen, sondern ist unregelmäßig schwach gekrümmt und zeigt oft Schleifen- und Ringformen sowie knopfförmige Verdickungen, daher auch Spir. nodosa genannt; sie führt nicht sehr energische Bewegungen aus. Ihre Länge übertrifft meist einen Erythrocytendurchmesser. Ihre Darstellung gelingt am besten durch mehrstündige Giemsa-Färbung. Ihre Kenntnis datiert seit der gelungenen Übertragung auf Meerschweinchen, die die Spirochäten vom dritten Tage ab in der Leber aufweisen und der Infektion bald erliegen. Auch die Züchtung der Spirochäte ist gelungen sowie im Zusammenhang damit die Immunisierung von Tieren. Die Fähigkeit der Spirochäten, sich längere Zeit in reinem Wasser zu halten, erklärt die Tatsache der Übertragung der Krankheit durch Bäder. Im übrigen dürften auch hier Zwischenwirte als Überträger eine Rolle spielen.

**Krankheitsbild:** Beginn akut mit rasch ansteigendem Fieber und schweren Allgemeinerscheinungen. Bisweilen sind Schüttelfrost sowie nicht selten Diarrhöen, in schweren Fällen Benommenheit und Delirien vorhanden. Glieder- und Kreuzschmerzen und vor allem sehr heftige Wadenschmerzen bilden charakteristische Symptome. Zwischen dem 3.—5. Tag entwickelt sich Ikterus. Auch besteht schon frühzeitig ein Milztumor sowie oft eine Vergrößerung der Leber, weiter regelmäßig eine Nephritis mit Verminderung der Harnmenge; nicht selten hat sie hämorrhagischen Charakter. Auch im übrigen bestehen oft Zeichen einer hämorrhagischen Diathese wie vor allem Nasenbluten, ferner Blutbrechen, sowie petechiale Exantheme. Doch kommen auch scarlatiniforme und masernartige Ausschläge vor. Mitunter entwickelt sich ein Herpes facialis. Die Lungen werden nur selten in Mitleidenschaft gezogen, desgleichen das Herz. Die Faeces bleiben trotz des Ikterus gallehaltig. Es besteht eine neutrophile Leukocytose, in schweren Fällen findet man Myelocyten und kernhaltige Rote. Die Temperatur verläuft zunächst als hohe Continua, welche Anfang der 2. Woche lytisch abfällt. Frühzeitig setzt eine prognostisch günstige postinfektiöse Lymphocytose ein.

In zahlreichen Fällen kommt es vor völliger Entfieberung zu fieberhaften Nachschüben oder es entwickelt sich nach einer fieberfreien Pause von etwa einer Woche von neuem ein langsam ansteigendes Fieber, das mitunter mehrere Wochen andauert. Eine Verstärkung des Ikterus pflegt dabei nicht einzutreten. Die Krankheit hinterläßt große Schwäche, die Rekonvaleszenz zieht sich oft in die Länge. Mortalität ca. 10%.

Der **anatomische** Befund entspricht dem einer Sepsis mit starker hämorrhagischer Diathese.

**Diagnose:** Bezeichnend sind der akute fieberhafte Beginn, ferner das erst einige Tage später erfolgende Auftreten des Ikterus, der heftige Wadenschmerz, der Blutbefund sowie vor allem die (im Menschen direkt bisher noch nicht beobachteten) Spirochäten, deren Nachweis durch intraperitoneale oder besser intrakardiale Verimpfung von 5 ccm Patientenblut (eventuell auch Harn) an Meerschweinchen, aber nur in den ersten Krankheitstagen gelingt. Bei fehlendem Spirochätennachweis kann die Unterscheidung, namentlich gegenüber paratyphösen Darmerkrankungen mit Ikterus schwierig sein. Auch das epidemische Auftreten ist hier nicht ohne weiteres diagnostisch verwertbar, da dies bei beiden Erkrankungen vorkommt. Entscheidend ist einerseits der Nachweis der Paratyphusbacillen bzw. andererseits bei Weilscher Krankheit der noch lange Zeit später mögliche Nachweis von Immunkörpern gegenüber den Spirochäten.

**Therapie:** Die Magendarmstörungen erfordern diätetische Behandlung, d. h. in erster Linie fettarme, leichte Kost wie bei katarrhalischem Ikterus, im Gegensatz zu diesem ist aber Karlsbader Salz zu vermeiden; warme Packungen gegen die Muskelschmerzen, eventuell NaCl-Infusionen bei Oligurie. Neuerdings hat man mit Injektion von Rekonvaleszentenserum Erfolge erzielt.

## Gelbfieber.

Gelbfieber ist eine in den Tropen, insbesondere in Mittel- und Südamerika und an der Westküste Afrikas endemisch, zeitweise epidemisch auftretende Seuche, die wiederholt auch nach Südeuropa verschleppt wurde und namentlich in der heißen Jahreszeit beobachtet wird.

Erreger ist die *Leptospira icteroides* (Noguchi), eine Spirochäte, die der *Spiroch. icterohaemorrhagiae* ähnlich, nur kürzer als diese ist. Neuerdings ist ihre Züchtung sowie die Übertragung auf Meerschweinchen gelungen.

**Krankheitsbild:** Inkubation 3—6 Tage. Beginn plötzlich mit hohem Fieber, Schüttelfrost sowie schwerem allgemeinen Krankheitsgefühl. Es bestehen heftiger Kopfschmerz, Lendenschmerz, Erbrechen, Schlaflosigkeit, Abgeschlagenheit sowie Rötung der Bindehaut des Auges, ferner Schwellung des Zahnfleisches mit Neigungen zu Blutungen und Albuminurie. Dieser Zustand hält 4—5 Tage an, dann erfolgt Abfall des Fiebers und scheinbare Besserung (erste Krankheitsperiode). In dem nun beginnenden kritischen zweiten Abschnitt der Krankheit erfolgt erneuter Temperatur-Anstieg mit zunehmendem Ikterus; es bestehen ferner sehr heftige Schmerzen in der Oberbauchgegend,

anhaltendes Erbrechen dunkler Blutmassen („Vomito negro“) und Blutstühle. Hautblutungen werden beobachtet. Der Harn enthält Blut und Gallenfarbstoff. Milzvergrößerung fehlt. Der anfangs beschleunigte Puls sinkt im weiteren Verlauf. Unter zunehmender Benommenheit und bisweilen völligem Versiegen der Harnsekretion erfolgt in zahlreichen Fällen (bis über 80%) der Tod am 5.—7. Tag im Koma unter dem Bilde der Urämie und Cholämie. Bei günstigem Verlauf entfiebert der Kranke lytisch, der Ikterus sowie die Nephritis kann sich indessen noch wochenlang hinziehen. Im allgemeinen entscheiden die ersten 14 Tage über den weiteren Verlauf.

**Pathologisch-anatomisch** besteht kein für Gelbfieber spezifischer Befund, sondern lediglich schwere hämorrhagische Diathese mit Blutungen in die Serosae und die parenchymatösen Organe, Nekrosen in der Leber (vor allem in der Intermediärzone der Leberläppchen) sowie schwere hämorrhagische Nephritis.

**Diagnose:** Der Spirochätennachweis im Blut eines Gelbfieber-Kranken ist wegen ihres spärlichen Vorhandenseins schwierig (Dunkelfeld, Giemsa-Färbung). Wichtig ist die durch Impfung mit Gelbfieber-Blut erfolgende Übertragung auf Meerschweinchen, die die Leptospiren vom 5. Tag ab im Blut zeigen. Klinisch unterscheidet sich das Gelbfieber von der ihm ähnlichen Weilschen Krankheit (S. 112) durch die Remission am 3. bis 5. Tag, das spätere Auftreten des Ikterus, die relative Bradykardie und das Fehlen eines Milztumors. Auch das Schwarzwasserfieber (S. 108) kommt differentialdiagnostisch in Frage.

**Epidemiologie und Prophylaxe:** Das Auftreten des Gelbfiebers ist an das Vorhandensein der *Stegomyia calopus* s. *fasciata*, einer Stechmücke von bräunlicher Färbung mit gestreiften Beinen, gebunden. Dieselbe, nur das Weibchen infiziert sich durch Saugen des Blutes Gelbfieber-Kranker, das aber nur während der ersten 3 Tage infektiös ist. Erst nach Ablauf von 13 Tagen, d. h. nach vollendeter Entwicklung des Erregers im Moskito wird die Krankheit durch einen Stich weiter übertragen. Bekämpfung des Gelbfiebers erfordert gründliche Isolierung der Kranken unter sorgfältigem Schutz gegen Moskitos und Vernichtung der letzteren und ihrer Brutstätten. Für die Verbreitung spielen auch rudimentäre Erkrankungen, speziell der Eingeborenen und namentlich der Kinder eine Rolle.

Die **Therapie** ist zur Zeit rein symptomatisch (vgl. Cholämie, Schwarzwasserfieber und Urämie)

### Schlafkrankheit.

Die Schlafkrankheit ist eine chronische Protozoenerkrankung, die nur in Afrika vorkommt und dort vor allem die Eingeborenen befällt. Der Erreger gehört zur Gattung der Trypanosomen, einer Flagellatenart. Die Übertragung geschieht durch bestimmte Stechfliegen, die *Glossina palpalis*. Eine Infektion von Mensch zu Mensch kann durch den Geschlechtsverkehr erfolgen.

Das im Blut und in den Gewebssäften vorhandene *Trypanosoma hominis* (*gambiense* und *rhodesiense*) ist doppelt bis dreimal so groß wie ein Erythrocyt, von länglicher, spindelartiger Form und läßt bei Giemsa-Färbung in der Mitte einen großen Kern, an dem hinteren stumpfen Ende einen kleinen Nebenkern und von diesem ausgehend einen den Körper entlang laufenden Faden erkennen. Das graublaue Protoplasma bildet an der einen Seite eine zarte wellige, „undulierende“ Membran. Pigment ist nicht vorhanden. Die Trypanosomen sind lebhaft beweglich und versetzen in frischen Präparaten die benachbarten Erythrocyten in

stoßende Bewegung. Ihre pathogene Wirkung wird auf gewisse von ihnen erzeugte, bisher aber nicht bekannte Gifte zurückgeführt.

**Krankheitsbild:** Inkubation 20–30 Tage. Die Krankheit verläuft in mehreren Abschnitten. Sie beginnt schleichend und uncharakteristisch mit Schwächegefühl, Kopfschmerzen sowie mit remittierendem Fieber, das zunächst nur kurze Zeit dauert und oft eine Malaria vor-täuscht. Nach einem darauffolgenden fieberfreien Intervall von Tagen oder Wochen erfolgt ein neuer Fieberanfall. Objektiv wahrnehmbare Frühsymptome sind indolente Drüsenschwellungen namentlich am Halse, sowie bei Weißen häufig flüchtige urticarielle Exantheme mit heftigem Juckreiz. Ferner werden frühzeitig eine auffallende Hyperästhesie der tiefen Muskeln sowie Erlöschen der sexuellen Potenz beobachtet. Vorübergehende Ödeme, besonders im Gesicht sind häufig.

An dieses wenig charakteristische Anfangsstadium („Stadium des Trypanosomenfiebers“) schließt sich ein zweites Krankheitsstadium an, das durch schwere Erkrankung des Zentralnervensystems gekennzeichnet ist. Neben heftigen Kopfschmerzen zeigen die Patienten vor allem psychische Veränderungen, sie werden verstimmt, teils maniakalisch erregbar mit Wahnvorstellungen, durch die sie ihrer Umgebung gefährlich werden können, teils stumpf und teilnahmslos. Die Sprache wird schleppend, der Gang unsicher, die Zunge zeigt Tremor, die Ernährung leidet und es entwickelt sich zunehmende Abmagerung. Allmählich tritt auch das Kardinalsymptom der Krankheit, die zunehmende Schlafsucht mehr und mehr in den Vordergrund. Die Kranken schlafen bei ihrer Beschäftigung, während des Essens usw. ein, sind aber zunächst noch zu wecken, während in späteren Stadien tiefe Somnolenz eintritt. Unter extremer Abmagerung, Decubitus, nicht selten Sepsis, Pneumonie usw. gehen die Kranken schließlich im Koma zugrunde. Spontanheilungen sind nicht bekannt.

**Pathologisch-anatomisch** finden sich außer einer ausgedehnten Entzündung der Hirnhäute eine charakteristische mantelartige Zellinfiltration um die Gefäße der Hirnrinde.

Für die **Diagnose** ist der Nachweis der Trypanosomen notwendig. Da dieselben im Blut nur spärlich vorhanden zu sein pflegen, empfiehlt sich die Blutuntersuchung statt am gewöhnlichen Blutausschlag am dicken Tropfen. Ein sichereres Ergebnis hat im Initialstadium die Punktion der geschwellenen Cervicaldrüsen. Später ist bei ausgebildeten Störungen des Nervensystems auch die Lumbalpunktion diagnostisch zu verwerten. Der Liquor enthält außer Eiweiß und Zellen auch Trypanosomen. Schließlich ist auch der Tierversuch, die Impfung von Affen mit Blut bzw. Spinalpunktat der Patienten heranzuziehen.

**Epidemiologisch** ist die Tatsache von größter Bedeutung, daß die Krankheit sich nur dort findet, wo Glossinen vorhanden sind, so daß die Übersiedlung von Kranken in von Stechfliegen freie Gegenden dort keine Weiterverbreitung der Krankheit zur Folge hat. Zur Ausrottung der Krankheit gehört demnach vor allem die Beseitigung der Stechfliegen und ihrer Brutstätten. Die Verhältnisse sind also denjenigen bei Malaria analog. Als Zwischenwirt hat man gewisse Wildarten, speziell Antilopen ermittelt. Affen erkranken nach Infektion durch Fliegenstich in charakteristischer Form an Schlafkrankheit.



**Therapeutisch** haben sich organische Arsenpräparate bewährt, jedoch wurden Heilungen nur in den Frühstadien vor Eintritt schwerer Erscheinungen seitens des Nervensystems beobachtet.

Neben dem Atoxyl und dem Arsenophenylglycin wurden von dem Salvarsan und dem Salvarsankupfer stark trypanozide Eigenschaften gesehen. Auch bei rasch eintretender günstiger Wirkung sind die Patienten viele Monate lang zu kontrollieren, da die Trypanosomen sich in diesen Fällen oft lange Zeit latent in den inneren Organen halten und später Rückfälle verursachen.

### Kala-azar (Tropische Splenomegalie).

Kala-azar ist eine chronisch verlaufende Protozoenerkrankung, die hauptsächlich in Indien und anderen tropischen Ländern beobachtet wird. Die Krankheit befällt hauptsächlich jugendliche Individuen. Der zu den Flagellaten gehörige Erreger ist die *Leishmania Donovanii*.

Er kommt in großer Zahl in den inneren Organen, vor allem in Milz, Knochenmark und Leber, und zwar hauptsächlich im Innern von Zellen, namentlich in Endothelien vor. Er ist von ovoider Form und zeigt neben einem rundlichen Hauptkern einen zweiten kleinen, strichförmigen Kern (Binucleat). Bei der künstlichen Züchtung in Novyschem Kaninchenblutagar oder 10%igem Natr. citric. verwandelt er sich in typische Flagellaten mit einer Geißel. Auch bei Haustieren wie Hunden und Katzen wurde die *Leishmania* gefunden. Die Übertragung der Krankheit erfolgt wahrscheinlich durch Ungeziefer (Wanzen, Flöhe). Nicht selten werden Hausendemien beobachtet.

Die Krankheit beginnt mit mehrere Wochen anhaltendem Fieber, das oft täglich mehrere starke Remissionen zeigt (I. Stadium). Neben allgemeinen Krankheitserscheinungen besteht eine Vergrößerung der Leber und Milz sowie eine zunehmende Anämie. Während das Fieber und die übrigen Symptome nach einigen Wochen wieder schwinden, nimmt die Milz- und Lebervergrößerung sowie die Anämie stetig zu.

Die Fieberperioden wiederholen sich öfters und die fieberlosen Zwischenräume werden im Laufe von Monaten kürzer (II. Stadium). Der Milztumor nimmt allmählich riesenhafte Dimensionen an und reicht nicht selten ähnlich einer leukämischen Milz bis ins kleine Becken. Neben der Anämie entwickelt sich eine fortschreitende Kachexie und Abmagerung, die in den extremen Graden des III. Stadiums im Verein mit der starken Auftreibung des Leibes und der meist eigentümlich erdfarbenen schmutzigen Hautfärbung (Kala-azar = schwarze Krankheit) den Kranken ein sehr charakteristisches Bild verleiht. Im Blut besteht eine oft sehr hochgradige Leukopenie. Nicht selten gesellen sich dysenterieartige Erscheinungen hinzu (Leishmanien im Stuhl!) sowie verschiedenartige, zum Teil ulceröse Hautveränderungen mit Leishmanien in den Geschwüren, ferner Symptome der hämorrhagischen Diathese mit Blutungen in den verschiedensten Organen. Eine Trübung des Sensoriums pflegt während der ganzen Krankheitsdauer zu fehlen, desgleichen Störungen seitens des Zirkulationsapparates. Der Tod erfolgt nach  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ jähriger Dauer an Kachexie oder häufiger an Komplikationen (Tuberkulose, Sepsis, Pneumonie usw.). Vereinzelt wurde Spontanheilung beobachtet.

Bei der Stellung der **Diagnose** hat man zunächst das Bestehen einer leukämischen Erkrankung, sodann die chronische Malaria auszuschließen. Beweisend ist der Nachweis der Leishman-Donovanschen Parasiten, die sich aber im zirkulierenden Blut in nur sehr geringer Menge finden. Schneller gelingt ihr Nachweis in der Leber und vor allem in der Milz, die zu diesem Zweck zu punktieren ist.

Die keineswegs ungefährliche Milzpunktion wird nach vorheriger Feststellung einer normalen Blutgerinnung mit einer ca. 6 cm langen, nicht zu dünnen Hohl- nadel bei absolutem Atemstillstand (zur Vermeidung einer Zerreiung der Milz- kapsel und dadurch bedingten tödlichen Blutung) ausgeführt.

**Therapeutisch** wurden gewisse Erfolge mit Chinin sowie Atoxyl beobachtet.

In den Mittelmeerländern (Süditalien, Griechenland usw.) kommt häufig die sog. **Leishmania infantum** vor, eine chronische Krankheit, die ebenfalls wie Kala-azar mit großem Milztumor, Anämie und Kachexie verläuft und daher auch als infantile Kala-azar bezeichnet wird. Sie wird durch Leishmanien hervorgerufen, die der Leishmania Donovanii sehr ähnlich, wenn nicht mit ihr identisch sind. Die Übertragung erfolgt durch Flöhe. Auch bei Hunden und Katzen wurde der Erreger gefunden. Die Diagnose stützt sich auf die gleichen Momente wie bei Kala-azar.

### Pappataciefieber.

Im südlichen Klima, namentlich in den Mittelmeerländern, Ostasien und Amerika verbreitete gutartige Infektionskrankheit der warmen Jahreszeit. Der unbekannte Erreger ist ein filtrierbares Virus. Die Infektion erfolgt durch eine sehr kleine Stechmücke, die sog. Sand- fliege (*Phlebotomus pappatasii*), deren Weibchen erst 7 Tage nach dem Saugen infektiösen Blutes die Krankheit zu übertragen vermag.

Inkubation 3—8 Tage. Beginn akut mit hohem Fieber, starker Ab- geschlagenheit, heftigen Rücken- und Gliederschmerzen; die Bindehaut ist streifig gerötet. Oft bestehen Lichtscheu, Herpes sowie Magendarm- störungen wie Erbrechen, Appetitmangel, mitunter Durchfälle. Ein Milztumor fehlt. Bezeichnend ist die Schmerzhaftigkeit und Druck- empfindlichkeit der Muskeln, während Gelenkschwellungen nicht be- obachtet werden. Es besteht Leukopenie. Das Fieber fällt nach einer Dauer von 1—5 Tagen lytisch ab. Ausgang stets günstig. Rekonvaleszenz oft von längerer Dauer infolge großer Hinfälligkeit und nervöser Schwäche.

Ein mechanischer Schutz gegen die Sandfliege durch Moskitonetze ist schwierig wegen der Kleinheit der Insekten (Größe 2 mm). Wirksamer ist die Beseitigung der Schlupfwinkel der Fliegen und ihrer Larven. Überstehen der Krankheit hinter- läßt nicht sicher Immunität.

### Lepra (Aussatz).

Die Lepra hat in Europa als Seuche seit Jahrhunderten vollständig an Bedeutung verloren und ist in zivilisierten Ländern nur noch in ganz vereinzelt kleinsten Herden vorhanden (in Deutschland Kreis Memel);

in Afrika und vor allem in Asien dagegen ist sie endemisch und fordert dort viele Opfer.

Die Leprabacillen finden sich in großer Menge im leprös veränderten Gewebe, und zwar zum großen Teil intracellulär („Leprazellen“); sie haben morphologisch sehr große Ähnlichkeit mit den Tuberkelbacillen, sie sind etwas kürzer und wie diese (nur in etwas geringerem Grade) säurefest. Anilinfarbstoffe nehmen sie rascher als diese auf. Nach außen entleert werden sie aus ulcerierten Knoten, ferner durch die Faeces und vor allem mit dem Nasenschleim. Züchtung und Übertragung auf Tiere gelang bisher nicht.

**Krankheitsbild:** Inkubationsdauer sehr beträchtlich, bis zu 12 Jahren. Zu unterscheiden sind drei Formen: die knotige oder tuberöse Form, die maculoanästhetische Form und die gemischte Form.

Die tuberöse Form (Knoten-Lepra) beginnt an verschiedenen Körperstellen mit dem Auftreten von roten, später braunroten Flecken, denen Infiltrationen und später Knotenbildung folgt. Frühsymptome sind Ausfallen der Augenbrauen sowie schmetterlingsflügelartige Ausbreitung der Flecken bzw. Knoten zu beiden Seiten der Nase, ferner ein trockener, bisweilen mit häufigem Nasenbluten einhergehender Schnupfen, bei dem die Nasenspiegeluntersuchung oft schon frühzeitig Geschwüre mit positivem Bacillenbefund aufdeckt. Das Gesicht und die Extremitäten bilden einen Prädilektionsort für die Leprome, ersteres erhält in späteren Stadien oft infolge der derben wulstigen Infiltrate ein einem Löwenantlitz ähnliches, durch seine maskenartige Starre groteskes Aussehen (Facies leonina, Leontiasis); die ebenfalls befallenen Ohren sind oft erheblich vergrößert. Später kommt es öfter infolge Zerstörung des Knorpelseptums<sup>1)</sup> zum Einsinken der Nase ähnlich wie bei Syphilis. An den Extremitäten entwickeln sich häufig Hyperkeratosen. Bei dunkelfarbigen Menschenrassen entsteht fleckweise Pigmentverlust der Haut, die dadurch ein scheckiges Aussehen erhält. Im weiteren Verlauf werden Zunge, Augen, Kehlkopf, Genitalien sowie die Eingeweide von Lepromen befallen; die Krankheit führt unter zunehmender Anämie und Kachexie oft erst im Laufe vieler Jahre zum Tode.

Die maculoanästhetische Form (Nervenlepra) ist außer durch das Vorhandensein von Flecken ähnlich der Knotenlepra durch ausge dehnte Wucherung lepröser Neubildungen namentlich an den peripheren Nerven ausgezeichnet, wodurch klinisch sehr charakteristische Ausfallserscheinungen an Rumpf und Extremitäten entstehen: Außer Lähmungen und Muskelatrophien vor allem Anästhesien und trophische Störungen, die namentlich an den Extremitäten zu schwersten Verletzungen und Verstümmelungen unter Beteiligung der Knochen führen (Abstoßung ganzer Fingerglieder ähnlich wie bei Syringomyelie). Anästhesie der Flecken sowie an den Extremitäten pemphigusähnliche Blasen werden oft frühzeitig beobachtet. Zum Teil bestehen äußerst heftige Reizerscheinungen in Form von Neuralgien oder lanzinierenden Schmerzen, die bisweilen auch das Krankheitsbild einleiten.

Bei der gemischten Form handelt es sich um Kombination der tuberösen mit der Nervenlepra.

<sup>1)</sup> Im Gegensatz zu Syphilis, bei der der knöcherne Teil der Nase zerstört wird.

Der **Verlauf** der Lepra ist in der Regel sehr langwierig, gelegentlich kommt es zu hochfieberhaften Exazerbationen; spontaner Stillstand, ja sogar vereinzelt Spontanheilung wurde beobachtet.

Die **Diagnose** ist in ausgebildeten Fällen aus dem bloßen Anblick der Kranken zu stellen. Für die Anfangsstadien wird auf das oben Gesagte verwiesen (frühzeitige rhinoskopische Untersuchung unerlässlich; eventuell Anreichern des Nasensekrets mit Antiformin). Das Vorhandensein anästhetischer Flecken ist stets sehr verdächtig. Die Wassermann-Reaktion kann positiv sein.

**Therapie** symptomatisch (Jod; Exkochleation und Kauterisation der Leprome). Neuerdings wurde mit dem Nastin von Deycke-Much, einer Fettsubstanz, die aus einer aus Lepromen gezüchteten säurefesten Streptotrichee hergestellt ist, Erfolg erzielt.

**Prophylaxe:** Die Infektiosität der Lepra ist bei Beobachtung peinlicher Sauberkeit und sonstiger hygienischer Grundsätze entgegen früherer Auffassung nicht sehr groß; Ärzte und Pflegepersonal werden nur selten infiziert. Zur Absonderung der Kranken in Lepraherden dienen sog. Leprosorien (z. B. in Memel). Zu den gemeingefährlichen Seuchen gehörig ist nicht nur die Krankheit selbst, sondern der bloße Verdacht auf Ansteckung meldepflichtig<sup>1)</sup>.

### Milzbrand (Anthrax).

Milzbrand ist eine bei Tieren, besonders bei Rindern und Schafen vorkommende Infektionskrankheit, die gelegentlich auf den Menschen übertragen wird. Besonders gefährdete Berufe: Landwirte, Viehknechte, Abdecker, Gerber, Bürsten- und Pinselmacher, Kürschner, Lumpensammler.

Die Milzbrandbacillen sind große, unbewegliche, grampositive Stäbchen, ihre Enden sind scharfkantig und oft etwas verdickt (Bambusform), zwischen je 2 Stäbchen besteht eine charakteristische Lücke; Kapselbildung findet nur im Tierkörper statt. Aerobes Wachstum erfolgt bei 15–23° auf gewöhnlichen Nährböden. Gelatine wird verflüssigt; die Kultur bildet Locken- oder Mähnenform. Die Entwicklung der außerordentlich resistenten Dauerform (Sporen) erfolgt nicht im lebenden Körper, sondern nur bei Luftzutritt, z. B. an der Oberfläche von Kadavern. Der Milzbrand der Tiere hat in Deutschland sehr abgenommen, hält sich zur Zeit noch in gewissen Distrikten (Oberbayern, Posen, Schlesien, Niederrhein usw.). Er äußert sich in Form von Magendarmaffektionen oder Karbunkel der Rachen- und Kehlkopfschleimhaut oder Apoplexie. Harn, Darmentleerungen und Auswurf der Tiere sind infektiös; Hunde und Katzen infizieren sich durch Fressen von Fleisch kranker Tiere.

Beim Menschen entsteht je nach der Eintrittspforte 1. Haut-, 2. Lungen-, 3. Darmmilzbrand.

Der Hautmilzbrand entsteht als „Pustula maligna“ (Milzbrandkarbunkel) nach Hautverletzung oder Insektenstich; am häufigsten werden befallen die Hände und Vorderarme, Gesicht, Hals. Inkubation einige Stunden bis 3 Tage. Die Erkrankung beginnt mit Jucken und Brennen als rote Papel mit schwarzem Zentrum, auf dem sich ein

<sup>1)</sup> Ansteckungsverdächtige sind 5 Jahre lang vom Zeitpunkt der letzten Ansteckungsmöglichkeit an zu beobachten.

Bläschen mit seröser, später sanguinolenter Flüssigkeit entwickelt, das nach Eintrocknen sich in einen dunklen Brandschorf verwandelt, der charakteristischerweise unempfindlich ist und sich unter Eruption eines Kranzes neuer Bläschen und starker wallartiger Schwellung und Rötung der Nachbarschaft weiter ausdehnt. Bei Lokalisation im Gesicht entsteht eine besonders hochgradige Schwellung und Ödembildung (Augenlider und Mund), mitunter ein erysipelartiges Bild. Bei gutartigem Verlauf bleibt die Krankheit eine reine Lokalaffectation ohne Störung des Allgemeinbefindens und ohne Fieber. Heilung erfolgt durch Abstoßung des Schorfes und Entwicklung eines granulierenden Geschwürs. Bei Fortschreiten des Prozesses erfolgt Ausdehnung der Schwellung und des Brandschorfes unter Hervortreten der Lymphgefäße als rote harte Stränge, Schwellung der Lymphdrüsen, Auftreten neuer Herde als sanguinolente Bläschen in der Nachbarschaft. Als Zeichen der Allgemeininfektion treten dabei Fieber, Schüttelfrost, Brechreiz, Koliken und Diarrhöen, starke Schweiß, bisweilen Hautblutungen, Milztumor, Kräfteverfall und Herzschwäche auf. Die aus dem Blut angelegten Kulturen ergeben oft Milzbrandbacillen (Milzbrandsepsis). Gelegentlich beobachtet man Meningismus mit Bacillen in der Spinalflüssigkeit.

Der Lungenmilzbrand („Haderkrankheit“) entsteht durch Einatmung von sporenhaltigem Staub und verläuft als schwere atypische Bronchopneumonie. Sie beginnt mit Schüttelfrost und hohem Fieber, das aber infolge schnell eintretender Herzschwäche rasch wieder sinkt; es bestehen heftige Dyspnoe und Cyanose, oft blutiger Auswurf sowie doppelseitige Pleuritis exsudativa; Verlauf meist in wenigen Tagen letal.

Der durch Genuß von infiziertem Fleisch entstehende seltene Darmmilzbrand verläuft als schwere Gastroenteritis mit Bluterbrechen und blutigen, eventuell ruhrartigen Durchfällen, heftigem Oppressionsgefühl und frühzeitiger Herzschwäche in der Regel tödlich; doch kommen auch leichtere Formen mit Ausgang in Heilung vor.

**Diagnose:** Meist handelt es sich um eine Berufskrankheit. Bei Hautmilzbrand ist die Einzahl des Karbunkels und der schwarze Schorf charakteristisch. Bakteriennachweis in Blut, Wundsekret, Sputum und Stuhl ist durch Kultur und Tierimpfung (weiße Mäuse und Meerschweinchen gehen nach 1—2 Tagen ein) zu erbringen.

**Therapie:** Bei Karbunkel ist keinerlei operativer Eingriff, sondern absolute Ruhigstellung (Suspension bei Lokalisation an den Extremitäten) und Borsalbenverband anzuwenden. Sobernheimsches Milzbrandserum (E. Merck) 30—40 ccm intravenös; Salvarsan.

### Rotz (Malleus).

Der Rotz ist eine seltene, sehr ansteckende Erkrankung, die durch Übertragung durch rotzkranken Pferde (Esel, Maultiere) entsteht und daher hauptsächlich bei Berufen beobachtet wird, die mit Pferden viel in Berührung kommen (Kutscher, Abdecker, Tierärzte). Gelegentlich kommen Laboratoriumsinfektionen vor.

Der Löffler-Schützsche Rotzbacillus ist ein gramnegatives dem Tuberkelbacillus ähnliches Stäbchen, das oft Polfärbung und Körnung wie der Diphtherie-

Bacillus zeigt. Er färbt sich gut mit Löfflers Methylenblau, wächst gut auf Pferdeserum und Kartoffeln, auf diesen in honigartiger Schicht, ist gegen Eintrocknen in Schleim und Eiter ziemlich resistent. Er findet sich im eitrigen Nasensekret der Pferde und in großer Menge in den Rotzknoten; diese sind tuberkelähnliche Granulationsgeschwülste, die massenhaft Bacillen enthalten und später eitrig einschmelzen. Das männliche Meerschweinchen erkrankt nach intraperitonealer Rotzinfektion an einer diagnostisch verwertbaren (jedoch nicht absolut spezifischen) Hodenschwellung: sog. Straußsche Reaktion. Beim Pferde verläuft der Rotz in der Regel als chronische, bisweilen okkulte Krankheit, nicht selten von mehrtägiger Dauer. Eintrittspforten beim Menschen sind kleine Wunden der Haut bzw. der Schleimhäute, ohne daß aber daselbst spezifische Veränderungen zu entstehen brauchen. Der etwa vorhandene Primäraffekt mit Schwellung, Rötung und Ulceration sowie heftiger Lymphangitis erinnert bisweilen an Erysipel oder Milzbrand.

Der Verlauf beim Menschen ist in der Regel akut als letale Allgemeininfektion, ausnahmsweise chronisch in Form lokal bleibender Rotzerkrankung der Haut oder der Nase.

Bei akutem Rotz entwickelt sich nach einer Inkubation von mehreren Tagen ein schweres Krankheitsbild oft zunächst von unbestimmtem Charakter, bisweilen mit typhusartigem Fieberverlauf, flohstichartigen roten Hautflecken, die in Pusteln (ohne Dellenbildung) und hierauf in scharfrandige Geschwüre übergehen. Weitere Veränderungen sind indolente Rotzknoten in den Muskeln mit konsekutiver Erweichung und eventuell Durchbruch nach außen, ferner schmerzhaftes Gelenkschwellungen wie bei Polyarthritiden sowie sehr häufig Herde in der besonders disponierten Lunge als Bronchopneumonien oder Abscesse, desgleichen Geschwüre im Kehlkopf. Nasenrotz beim Menschen ist nicht so häufig wie beim Tier; er bewirkt serös-eitriges Ausfluß sowie eine erysipelähnliche Schwellung und Rötung der Nasenwurzel und führt oft zu schweren Zerstörungsprozessen in der Tiefe. Der weitere Verlauf erfolgt in Form einer Sepsis mit tödlichem Ausgang in spätestens 3—4 Wochen.

Chronischer Rotz verläuft oft sehr milde und fieberlos, zeigt mitunter nur lokale Erscheinungen, besonders an der Haut, eventuell nur einer Extremität, ferner Muskelknoten. Dauer oft viele Jahre. Bisweilen beobachtet man Spontanheilung, doch ist auch ein Übergang in tödliche Allgemeinerkrankung möglich.

**Diagnose:** Von großer Bedeutung ist die Anamnese (Kontakt mit Pferden!). Für den Nachweis der Bakterien sind nach Möglichkeit geschlossene Eiterherde (Vermeiden von Begleitbakterien!) zu wählen; Straußsche Reaktion (s. oben). Bei lokalem Rotz der Haut und der Muskeln ist Tuberkulose und Lues auszuschließen. Das dem Tuberkulin analoge aus Rotzkulturen hergestellte Mallein, das subcutan injiziert wird, ist bisher nur bei Pferden diagnostisch erprobt.

**Therapie** bisher nur bei lokalem Rotz in Form chirurgischer Entfernung der Herde von Erfolg.

### Stomatitis epidemica (Aphthen-Seuche, Maul- und Klauenseuche).

Die als Maul- und Klauenseuche beim Vieh (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen) vorkommende Infektionskrankheit wird gelegentlich auch auf den Menschen übertragen.

Die Erkrankung der Tiere äußert sich in Blasenbildung an der Schleimhaut des Maules, zwischen den Zehen und bisweilen am Euter. Die Blasen platzen und gehen in Geschwüre über. Der bisher unbekannte Erreger wird durch Erhitzen auf 80° schnell angetötet. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt meist durch rohe Milch infizierter Tiere (Butter, Käse) bzw. durch direkte Kontaktinfektion bei Viehpflägern, Melkern. Die Krankheit befällt vor allem Kinder nach dem Genuß von roher Milch.

**Krankheitsbild:** Nach einer Inkubation von ca. 8 Tagen beginnt zunächst ein fieberhaftes Initialstadium mit Mattigkeit, Gliederschmerzen und Trockenheit im Munde. Nach einigen Tagen entwickeln sich auf der stark geröteten und geschwollenen Schleimhaut namentlich an den Lippen, der Zunge und den Wangen Bläschen, die alsbald in kleine Geschwüre übergehen und lebhaften Schmerz verursachen, so daß die Nahrungsaufnahme stark beeinträchtigt ist. Zuweilen treten Diarrhöen auf. Mitunter entwickeln sich Bläschen auch in der Umgebung des Mundes und im Naseneingang, was für die Krankheit besonders charakteristisch ist, ebenso wie die mitunter zu beobachtende Eruption von Bläschen an den Fingern (speziell bei Melkern).

Die **Krankheitsdauer** beträgt mehrere Wochen; der Verlauf ist in der Regel günstig; kleinen Kindern kann die Aphthenseuche gefährlich werden.

Die Unterscheidung der Krankheit gegenüber den ihr ähnlichen gewöhnlichen Stomatitiden, speziell der Stomatitis aphthosa stützt sich auf die Feststellung des fieberhaften Initialstadiums, das etwaige Vorhandensein von Bläschen auf der äußeren Haut bzw. an den Händen und daneben auf das gleichzeitige Bestehen der Seuche beim Vieh.

Die **Prophylaxe** besteht im Vermeiden des Genusses von roher Milch, sorgfältiger Händedesinfektion aller mit erkranktem Vieh in Berührung kommenden Personen, strenger Isolierung verseuchter Ställe (Viehseuchengesetz) und Anwendung des Löffler-Uhlenhuthschen Schutzimpfverfahrens beim Vieh.

## Aktinomykose.

Die Aktinomykose ist eine beim Menschen seltene, bei verschiedenen Haustieren, namentlich beim Rind häufigere Krankheit. Sie entsteht durch den Strahlenpilz (Aktinomyces), der zu den Streptotricheen gehört und als solcher eine Mittelstellung zwischen Schimmel- und Spaltpilzen einnimmt.

Der Erreger findet sich im Eiter und bisweilen auch in anderen Ausscheidungen der Kranken wie Sputum, Faeces in Form kleinster eben sichtbarer gelbfärbter Körnchen, die an Jodoformkörner erinnern. Mikroskopisch erscheinen diese schon im ungefärbten Zustande als drusige Gebilde, die sich aus zahllosen radiär angeordneten Pilzfäden zusammensetzen, die in glänzende birn- oder keulenförmige Enden auslaufen. Im ungefärbten Präparat hüte man sich vor Verwechslung mit ähnlich aussehenden aus Fett bestehenden Drusen. Wichtig ist der Nachweis zahlreicher verzweigter Fäden<sup>1)</sup>. Stets sind gefärbte Präparate (Gramfärbung) zu untersuchen. Bei der Züchtung in Kulturen ergeben sich verschiedene, teil aerob, teils anaerob wachsende Arten.

<sup>1)</sup> Jedoch beobachtet man derartige Verzweigungen gelegentlich auch bei Tuberkelbacillen, Diphtheriebacillen u. a.

Der Strahlenpilz erzeugt eine Wucherung von Granulationsgewebe, das zum Teil erweicht und alsdann von Höhlenbildungen durchsetzt wird. Zum Teil erfolgt eine derbe Bindegewebswucherung, die bisweilen eine Abkapselung des Herdes gegen die Nachbarschaft bewirkt.

Die Erkrankung beim Rindvieh bewirkt Geschwulstbildung an der Zunge, in der Mundhöhle und vor allem am Kiefer mit Auftreibung des Knochens, den sogenannten Kieferwurm. Die Aktinomykose des Menschen entsteht durch Eindringen von Fremdkörpern als Infektionsträgern, auf denen der Pilz saprophytisch vegetiert, speziell Getreidegrannen, namentlich Gerste, ferner Stroh, Gräsern u. ä. Eintrittspforten sind meist die Gebilde der Mundhöhle, häufig cariöse Zähne, gelegentlich die Atmungsorgane, in vereinzelt Fällen der Magendarmtractus sowie die Haut.

**Krankheitsbild:** Bei der häufigsten Form, der Erkrankung der Mundhöhle entstehen derbe Schwellungen am Kiefer ähnlich einer Periostitis sowie eine entzündliche Schwellung des Mundbodens mit bretharter Infiltration der darüber befindlichen geröteten oder bläulichroten Haut, namentlich in der Gegend der Kieferwinkel. Bei Erweichung des Infiltrates kommt es zur Bildung von Fisteln, aus denen sich Eiter mit den oben beschriebenen gelben Körnchen entleert. Bisweilen schließen sich Senkungsabscesse an, die ins Mediastinum hinabsteigen und eventuell auf die Lunge übergreifen.

Die primäre Aktinomykose der Lunge entwickelt sich meist in den Unterlappen unter Erscheinungen eines chronischen, schleichend verlaufenden bronchopneumonischen Prozesses. Unter mäßigem Fieber, das aber auch fehlen kann, Brustschmerzen, Husten und Auswurf, der gelegentlich etwas Blut enthält, entwickelt sich ein Bild, das in den Anfangsstadien einer Lungentuberkulose gleicht, zumal infolge von Gewebseinschmelzung auch hier mitunter Kavernen vorkommen. Im Sputum finden sich Aktinomycesdrusen. Sehr charakteristisch ist im weiteren Verlauf das Übergreifen des Prozesses auf die Pleura, das subpleurale Gewebe und die äußere Brustwand, wobei äußerst derbe Infiltrate entstehen, die zum Teil von Fistelgängen durchsetzt sind, die nach außen einen dünnflüssigen Eiter mit gelblichen Pilzkörnern entleeren. Beim Fehlen von Fisteln gelingt es oft durch eine Probepunktion, charakteristischen Eiter zutage zu fördern. Oft besteht eine Mischinfektion mit Eiterbakterien. Während Heilung selten ist, verläuft die Mehrzahl der Fälle unter chronischem, bisweilen auf mehrere Jahre sich erstreckenden Siechtum tödlich. Mitunter greift der Prozeß auf die Wirbel und die Rippen über, die arrodirt und zerstört werden, ferner auf das Perikard, auch kommt es zum Fortkriechen in das retroperitoneale Gewebe mit ausgedehnten Eiterungen, Thrombosen usw. Amyloidose ist eine häufige Folgeerscheinung.

Die intestinale Aktinomykose lokalisiert sich mit Vorliebe am Coecum und Wurmfortsatz und erzeugt dort derbe, höckerige, schmerzhaft Tumoren ähnlich einer chronischen Appendicitis, wobei aber die Neigung zu bald eintretender Verlötung mit den Bauchdecken und Infiltration derselben diagnostisch bedeutsam ist. Bei Erkrankung des



Sigmas und Rectums treten ruhrartige Erscheinungen, ferner Darmstenosen, umschriebene Exsudate usw. auf. Auch die Darmaktinomykose hat oft einen sehr chronischen Charakter und wird mitunter erst durch plötzliche Exacerbationen, z. B. peritonitische Reizung entdeckt.

In einzelnen Fällen kommt es von einem lokalen Herde aus infolge von Durchbruch in die Gefäße zu einer metastatischen Verschleppung des Strahlenpilzes in die verschiedensten Organe, u. a. auch in die Haut.

Die **Prognose** richtet sich vor allem nach der Art der Lokalisation, am günstigsten ist sie bei Aktinomykose der Haut und des Gesichtes. Auch sonst besteht eine gewisse Neigung zur Spontanheilung. Bei fortgeschrittenen Fällen mit starker Eiterung und ausgedehnten Zerstörungsprozessen ist die Prognose ungünstig.

**Therapeutisch** kommt bei kleineren und leicht zugänglichen Herden in erster Linie die operative Beseitigung derselben in Frage. In den anderen Fällen hat energische Jodbehandlung (2,0—6,0 Jodkali täglich) bisweilen Erfolg.

### Trichinose.

Die Trichinose ist eine bei uns seltene, schwere Erkrankung, die auf den Genuß von trichinösem Schweinefleisch zurückzuführen ist.

Die *Trichinella spiralis* ist ein kleiner Wurm, dessen Larve (Dauerform) als „Muskeltrichine“ in den Muskeln des Schweines eingekapselt lebt und als solche gegen äußere Einflüsse wie Räuchern, kurze Erhitzung, Kälte usw. sehr widerstandsfähig ist. Das Schwein infiziert sich von der Ratte, dem Wirt der Trichine. In den Magen des Menschen gelangt, werden die Trichinen infolge der Verdauung der Hülle frei und entwickeln sich in 2—3 Tagen zu geschlechtsreifen „Darmtrichinen“, fadenförmigen 1,5 (♂)—3,0 (♀) mm langen Würmern, die sich begatten und während ihres Aufenthaltes im Dünndarm (ca. 5 Wochen) vom 5.—7. Tage ab eine sehr zahlreiche junge Brut hervorbringen. Die Darmtrichinen bohren sich in die Darmschleimhaut und setzen ihre 0,15 mm langen Embryonen in den Chylusgefäßen ab, von wo sie auf dem Lymphwege dem Blute zugeführt werden. Sie wandern in die quergestreiften Muskeln und zwar in deren Primitivbündel ein, wo die Parasiten unter Entzündungs- und Zerfallserscheinungen des Muskels sich spiralförmig einrollen und vom 6. Monat ab sich mit einer Kalkhülle umgeben. Die spindelförmigen Kapseln sind als grauweiße Punkte mit bloßem Auge eben erkennbar.




Abb. 2.  
*Trichina spiralis*.  
(Nach Claus.)  
a Männchen, b Weibchen, c Embryo,  
d Muskeltrichine.

**Krankheitsbild:** Die ersten Krankheitserscheinungen, die auf die Anwesenheit der Darmtrichinen zurückzuführen sind und 3—4 Tage nach Genuß von trichinösem Fleisch beginnen, sind Übelkeit, Erbrechen, Koliken, Durchfälle, bisweilen Verstopfung, auch Meteorismus, Fieber mit Frösteln oder sogar Schüttelfröste, mitunter auch bereits ein auffallendes Ermüdungsgefühl in den Muskeln und Steifigkeit. Charakteristisch ist das nach einigen Tagen eintretende Ödem

des Gesichts, speziell der Lider. Der Nachweis der Darmtrichinen im Stuhl gelingt nur sehr selten. Das erste Stadium dauert 1 Woche.

Die in der 2. Woche (vom 9. Tag ab) unter weiterem Fieberanstieg einsetzenden, auf der Invasion der Trichinellen in die Muskeln beruhenden Symptome bestehen in äußerst heftigen Schmerzen der befallenen Muskeln, namentlich bei Bewegung sowie Schwellung derselben. Es sind hauptsächlich die Beuger der Extremitäten, die Augen-, Intercostal-, Bauch-, Nacken- und Kehlkopfmuskeln sowie das Zwerchfell. Der Herzmuskel wird niemals befallen. Das bisweilen sehr hohe Fieber (bis 41°!) ist teils eine Continua, teils remittierend. Die Kranken sind oft benommen. Der Puls ist meist beschleunigt, der Blutdruck niedrig. Herpes kommt vor. Oft werden heftige Schweiße, ferner Roseolen oder auch urticarielle Exantheme beobachtet. Milztumor ist selten. Der Harn zeigt in der Regel die Diazoreaktion. Neben einer mäßig starken Leukocytose besteht stets eine sehr starke Eosinophilie (bis zu 60%!), die schon in der ersten Woche nachweisbar, am stärksten in der 2. wird und in geringerem Grade noch Monate später besteht. Infolge der Beteiligung der Atemmuskeln entwickeln sich häufig Bronchitis sowie Pneumonien, bisweilen kommt es infolge Befallenseins der Kehlkopfmuskeln zu Glottisödem. Beachtenswert ist ferner das häufige Schwinden der Patellar- und Achillesreflexe, mitunter ist das Babinski'sche Zeichen vorhanden sowie manchmal bei galvanischer Reizung eine träge Zuckung der Muskeln. Gleichzeitige Mischinfektionen mit Bakterien, die von den Trichinen aus dem Darm mitgeführt werden dürften, sind nicht selten; sie komplizieren das Bild.

Die Schwere der Krankheitserscheinungen ist in den einzelnen Fällen sehr verschieden. Es gibt auch leichte Fälle mit nur geringen Muskelbeschwerden, die fälschlich für Rheumatismus gehalten werden. Die Krankheitsdauer ist bei mittelschweren Fällen etwa 3 Wochen, bei schwerem Verlauf bis zu 2 Monaten und länger. Der tödliche Ausgang (bis zu 30% aller Fälle) erfolgt meist in der 4.—6. Woche, oft infolge von Pneumonie.

Die **Diagnose** ist bei völlig ausgebildetem Krankheitsbild, vor allem auch unter Berücksichtigung der meist gehäuft auftretenden Erkrankungen, aus dem Syndrom von Gastroenteritis, Lidödem, heftigen Muskelschmerzen, Diazoreaktion und namentlich der starken Eosinophilie zu stellen, die nur in ganz schweren Fällen fehlt. In der 1. Woche gelingt der Trichinellen-Nachweis im Blut (1 ccm Venenblut mit 3 ccm 3%iger Essigsäure vermischt wird zentrifugiert, das Sediment mit Methylalkohol fixiert und mit Giemsa gefärbt). Von der 2. Woche ab findet man in Zupfpräparaten von exzidierten Muskelstücken (Biceps) die Trichinen. Später gelingt auch der Röntgennachweis an den Muskeln. Atypische Krankheitsbilder können besonders bei sporadischen Fällen Schwierigkeiten bereiten und zur Verwechslung führen namentlich mit Typhus (bei beiden Krankheiten Somnolenz, Roseolen, Diazo, bisweilen Bradykardie) oder mit Meningitis infolge der Starre der erkrankten Nackenmuskeln, zumal Meningismus vorkommt. Befallensein der Masseteren kann Trismus wie bei Tetanus hervorrufen. Vor Verwechslung

mit der eventuell sehr ähnlichen Polymyositis schützt genaue Untersuchung; die hier bisweilen vorhandene leichte Eosinophilie erreicht nie die hohen Grade wie bei Trichinose, auch besteht meist ein derbes Ödem der Haut.

Unter den prophylaktischen Maßnahmen, die bei der Trichinose von größter Bedeutung sind, ist die wirksamste die in Deutschland bestehende amtliche Trichinenschau, namentlich bezüglich der importierten ausländischen Schweine. Erhitzen des Schweinefleisches auf 70° wie beim Kochprozeß bewirkt sichere Abtötung der Trichinen<sup>1)</sup>; oberflächliches Räuchern dagegen ist ungenügend. Am häufigsten erfolgen Ansteckungen nach Genuß von rohem Schweinefleisch, Schinken und Wurst.

**Therapie:** Eine spezifische Therapie gibt es vorläufig nicht. Durch reichliche Abführmittel (Ricinus, Kalomel) ist möglichst frühzeitig für gründliche Entleerung des Darmes zu sorgen, in welchem sich die Trichinellen wochenlang aufhalten. Gewisse Erfolge wurden bei innerlicher Anwendung von Benzol 4,0—8,0 pro die in Gelatine kapseln sowie von Thymol 3mal täglich 1,0 in Oblaten beobachtet. Im übrigen ist die Behandlung symptomatisch.

## Krankheiten des Zirkulationsapparates.

### Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Der Zirkulationsapparat besteht aus zwei funktionell miteinander eng verbundenen Teilen, dem Herzen und den Blutgefäßen. Beide sind wenn auch in verschiedenem Maße an der Blutbewegung beteiligt.

Die Funktion des Herzens als Druckpumpe hängt mit der eigentümlichen Fähigkeit des Herzmuskels zu rhythmischer Tätigkeit zusammen. Einmal nämlich entstehen die die Kontraktion des Herzmuskels bewirkenden Reize (unter anderem die durch die Zelltätigkeit entstehende Kohlensäure) nicht kontinuierlich, sondern periodisch. Außerdem verliert der Herzmuskel selbst nach erfolgter Reizung vorübergehend seine Reizbarkeit, um erst nach einer kurzen Pause, der sog. refraktären Phase, von neuem auf den Kontraktionsreiz anzusprechen.

Der Entstehungsort der normalen Reize liegt am sog. Venensinus, d. h. in dem rechten Vorhof zwischen der Mündungsstelle der Vena cav. sup. und dem rechten Herzohr (Abb. 3) und wird vom Keith-Flackschen Sinusknoten (primäres Zentrum) gebildet. Von hier aus werden die Kontraktionsreize den Herzmuskelfasern zugeführt. Das sog. Reizleitungssystem beginnt mit dem Aschoff-Tawaraschen Atrioventrikularknoten (A.-V.-Knoten) als sekundärem Zentrum in dem Vorhofseptum nahe der Einmündung des Sinus coronar, und findet seine Fortsetzung in dem Hisschen Bündel, ein von der übrigen Muskulatur durch eine bindegewebige Scheide isoliertes, strukturell verschiedenes Muskelbündel, das an der rechten oberen Grenze der Kammerscheidewand sich in zwei Schenkel teilt, einen stärkeren für die linke, einen schwächeren für die rechte Herzkammer. Unter dem Endokard weiter nach unten laufend verzweigen sich die

<sup>1)</sup> Bei größeren Fleischstücken besteht die Gefahr, daß deren Inneres bei nicht sehr langem Kochen diese Temperatur nicht erreicht, was man an dem Erhaltenbleiben der roten Fleischfarbe dieser Teile erkennt. Nur das durch Kochen grau verfärbte Fleisch (Zersetzung des Hämoglobins bei ca. 70°) ist ungefährlich (vgl. auch das über Fleischvergiftung durch Paratyphusgift Gesagte (S. 42).

Reizleitungsfasern und treten mit den Papillarmuskeln und den Purkinjeschen Fasern in Verbindung, um sich schließlich mit der Kammernuskulatur zu vereinigen. Unter pathologischen Bedingungen treten neben den genannten primären und sekundären Zentren auch gewisse im Ventrikel selbst gelegene tertiäre Zentren als Reizursprungsstellen für die Herzmuskeltätigkeit in Aktion.

Normalerweise beginnen demnach die Erregungsimpulse für die rhythmische Herz­­tätigkeit an den Hohlvenen und werden den Vorhöfen und durch das Reizleitungssystem der Muskulatur der Kammern, dem sog. Treibwerk, zugeführt. Der Rhythmus ihrer Kontraktionen wird daher durch den Rhythmus des Sinusknotens vorge­­schrieben, der sozusagen ihr Schrittmacher ist. Dieser Rhythmus ist die normale Herzschlagfrequenz (60–80 in der Minute). Versagt unter pathologischen Bedingungen die Erregungs­­stelle des Sinusknotens oder ist sie durch Leitungsunterbrechung vom Herzen abgeschnitten, so übernimmt dann in gleicher Weise der A.-V.-Knoten die rhythmische Führung, und ist auch dieser bzw. das Hissche Bündel durch pathologische Prozesse ausgeschaltet, so kommt es nicht zum Stillstand des Ventrikels, sondern dieser schlägt nun unter der Führung seiner eigenen normalerweise latent bleibenden tertiären Zentren unabhängig von dem Rhythmus der Vorhöfe. Dieser Kammerrhythmus ist wesentlich langsamer als der normale Sinusrhythmus und beträgt ca. 30 in der Minute.




Abb. 3. Schematische Darstellung der Reizursprungsorte des Herzens sowie des Verlaufs des Hisschen Bündels (nach Leu).

Während das embryonale Herz bereits rhythmisch schlägt, lange bevor Nervenfasern und Ganglienzellen in das Myokard hineingewachsen sind, sind solche später in großer Zahl vorhanden und beeinflussen weitgehend die Herztätigkeit. Außer intrakardialen Nerven mit den namentlich in der Vorhofscheidewand reichlich enthaltenen Ganglien spielen vor allem die extrakardialen Nerven eine wichtige Rolle, und zwar der N. vagus und der Sympathicus (N. accelerans).

Beide wirken auf den Sinus- und A.-V.-Knoten sowie das Hissche Bündel ein, und zwar stehen sie zueinander in einem antagonistischen Verhältnis, indem der Vagus die rhythmische Tätigkeit der genannten Zentren bremst, der Sympathicus sie verstärkt. Das Zusammenspiel beider Nerven stellt daher eine überaus wichtige Steuerungsvorrichtung für die Herztätigkeit dar und ist eine der Ursachen für die große Anpassungsfähigkeit des Herzens gegenüber wechselnden Anforderungen.

Die normale Funktion des Herzens als Druckpumpe ist an die intakte Beschaffenheit seiner Klappen gebunden, die nach Art von Ventilen die normale Fortbewegung des Blutes innerhalb des Herzens in der Richtung von den Vorhöfen zu den Kammern und von diesen zu den Arterien gewährleisten und ein Zurückfluten des Blutes in entgegengesetzter Richtung verhindern.

Die Zusammenziehung der Vorhöfe geht derjenigen der Ventrikel kurze Zeit, etwa 0,1–0,18" voraus. Gleichzeitig mit der Zusammenziehung der Ventrikel, also bei Beginn der Systole erfolgt die Schließung der Mitral- und Tricuspidalklappen. Der dabei auscultatorisch wahrnehmbare 1. Herzton entsteht sowohl durch die Anspannung der Klappen wie durch die Kontraktion des Herzmuskels. Die durch die Systole bewirkte Druckzunahme in den Herzkammern muß erst eine gewisse Höhe erreichen, bis sie den in den Arterien vorhandenen Druck zu überwinden vermag und die Aorten- bzw. Pulmonalklappen sich öffnen. Nachdem alsdann ein gewisses Quantum Blut, das sog. **Schlagvolumen** (im Mittel 50–70 ccm, bei höchster Leistung bis 300 ccm) in die Arterien geworfen ist, sinkt der Druck in den Kammern und die beiden Semilunarklappen schlagen zu, wodurch der 2. Herzton entsteht. Die Systole ist also die Zeit vom 1. bis zum 2. Ton, der erste Teil derselben bis zur Öffnung der Semilunarklappen heißt **Anspannungs- oder Verschlusszeit**. Der Zeitabschnitt vom 2. Herzton bis zum nächsten 1. Ton umfaßt die Diastole. Die Kontraktion der Vorhöfe, die in den letzten Teil der Kammerdiastole fällt, ist auscultatorisch normalerweise nicht wahrnehmbar, bisweilen dagegen unter pathologischen Verhältnissen als ein dem 1. Ton kurz vorausgehender Auftakt (s. Galopprrhythmus S. 155). Verlangsamung bzw. Beschleunigung der Schlagfolge beruht im wesentlichen auf Änderung der Dauer der Diastole, während die Dauer der Systole nur geringe Schwankungen zeigt. Das ist praktisch wichtig, da ja die Diastole die Zeit der Erholung des Herzmuskels darstellt.

Der Grad der Füllung des Herzens hängt vom Druck und der Menge des ihm aus den Venen zuströmenden Blutes ab, dem gegenüber das diastolisch erschlaffte Herz nur einen sehr geringen Widerstand leistet. Der dabei erreichte Füllungsgrad ist seinerseits maßgebend für die Kraft der darauf folgenden systolischen Zusammenziehung, deren Größe in der Norm mit der Größe der diastolischen Füllung wächst. Die systolische Kraft, mit der das Herz das Blut in die Gefäße wirft, hängt aber zugleich von dem Druck ab, der in den Arterien herrscht und der für das sich entleerende Herz einen von ihm zu überwindenden Widerstand darstellt. Die **Herzarbeit** ist daher das Produkt aus Schlagvolumen, Blutdruck und Frequenz der Kontraktionen.

Die Tätigkeit des Herzens wird in hohem Maße von dem Verhalten des Gefäßsystems beeinflusst, vor allem von seinem Füllungszustand bzw. der Wandspannung oder Tonus der Gefäße.

Die Bedeutung der Gefäße für den Kreislauf liegt vor allem in der Regulierung der Geschwindigkeit und Gleichförmigkeit der Blutströmung, ihre Hauptaufgabe ist die Regelung des Blutdruckes sowie der wechselnden lokalen Blutzufuhr je nach dem augenblicklichen Bedarf eines Organs. Dieser Wechsel erklärt sich in der Hauptsache aus den physiologisch sich vollziehenden Änderungen in der Weite und im Tonus der Arterien. Der Gefäßtonus wird größtenteils durch das Nervensystem, die sog. Vasomotoren reguliert, sowohl vom Gehirn (Zwischenhirn) wie von den Rückenmarkszentren aus, ferner durch die direkte Erregbarkeit der Gefäßmuskulatur. Der Gefäßtonus wird ferner durch die Sekrete verschiedener Drüsen mit innerer Sekretion wie der Nebennieren (Adrenalin) und der Hypophyse beeinflusst, die tonussteigernd auf die Gefäßwand wirken. Das Cho.in wirkt umgekehrt depressorisch. Bei den Venen spielt der Einfluß der Nerven auf die Wandspannung eine nur untergeordnete Rolle, dagegen wird dieselbe durch den Kohlensäuregehalt des Blutes wesentlich beeinflusst; sinkt dieser, so erschlaffen die Venen und dem Herzen wird weniger Blut zugeführt.

Von großer praktischer Bedeutung ist weiter die Tatsache, daß gewisse Gefäßprovinzen hinsichtlich der von ihnen gefaßten Blutmenge sich gegensätzlich zueinander verhalten.

Im Bereich des großen Kreislaufs lassen sich zwei derartige Hauptgebiete unterscheiden, und zwar einerseits das Gebiet der von den Nn. splanchnici versorgten Eingeweidegefäße, das zugleich das größte Gefäßgebiet des gesamten Körperkreislaufs darstellt, auf der anderen Seite die Blutgefäße der Haut, der Muskeln und des Gehirns. Eine Erweiterung der Gefäße erfolgt physiologisch bei Funktionssteigerung des entsprechenden Organs und dadurch erhöhtem Blutbedarf desselben, also im Splanchnicusgebiet während der Verdauung, in den Muskeln bei Körperarbeit usw. Bei Verengung der Gefäße der einen der genannten Hauptgruppen erweitern sich die der andern in entsprechender Weise, so daß gewaltige Verschiebungen der Gesamtblutmenge sich im großen Kreislauf vollziehen können, ohne daß es normalerweise zu einer Änderung des Blutdrucks im Arteriensystem kommt. Eine Blutdrucksteigerung erfolgt erst dann, wenn es gleichzeitig in zahlreichen Gebieten zu einer Gefäßkontraktion kommt, wie das z. B. unter der Wirkung des Adrenalins sich ereignet. Namentlich sind es die kleineren Gefäße der Organe, die sog. Arteriolen, deren Kontraktion erhebliche Steigerungen des Blutdruckes zu bewirken vermag.

Die für die Ernährung des Herzmuskels außerordentlich wichtigen Coronargefäße zeigen gegenüber den übrigen Gefäßen des großen Kreislaufs eine gewisse Sonderstellung, sie erweitern sich z. B. unter der Einwirkung des Sympathicus sowie durch Adrenalin. Auch die Gefäße des Lungenkreislaufs zeigen ein von dem Körperkreislauf abweichendes Verhalten.

Die **Capillaren** endlich bilden funktionell eine besondere Gruppe im Gefäßsystem.

Ihre Hauptbedeutung liegt einmal darin, daß vermöge der besonderen Beschaffenheit ihrer Wand nur sie überhaupt einen Austausch zwischen Blut und Geweben ermöglichen. Infolge ihrer großen Zahl bildet ihre Gesamtsumme in jedem Organ einen gewaltigen Querschnitt des durch sie hindurchfließenden Blutstromes. Man kann dies Verhalten der Capillaren gegenüber dem zufließenden Strom der Arterien und dem Abfluß in die Venen mit der hydrodynamischen Wirkung eines in einen Strom eingeschalteten Sees vergleichen, woraus sich u. a. die Tatsache erklärt, daß die in den Arterien sich vollziehenden Drucksteigerungen normalerweise an der Grenze der Capillaren Halt machen und nicht auf die Venen übergreifen. So ist der Druck in diesen von dem in den Arterien in weitem Umfange unabhängig.

Die **Strömungsgeschwindigkeit**, mit der das Blut in den Gefäßen vorwärts getrieben wird, hängt abgesehen von der Funktion des Herzens in erster Linie von der Weite der Gefäße ab, in erheblich geringerem Maße von dem in ihnen herrschenden Druck. Namentlich auch bei den Capillaren ist in erster Linie ihre Weite für die Blutbewegung von ausschlaggebender Bedeutung. Ein wichtiger Faktor, der die Strömungsgeschwindigkeit beeinflusst, ist ferner die physikalische Beschaffenheit des Blutes, speziell seine Viscosität. Dünnflüssiges Blut leistet gegenüber den bewegungsfördernden Momenten einen geringeren Widerstand als Blut mit gesteigerter Viscosität.

Ferner sind die außerordentlich wichtigen Korrelationen zwischen dem Zirkulationsapparat und anderen Organsystemen des Körpers zu berücksichtigen. Diese Beziehungen sind zum Teil rein mechanischer Art. Vor allem ist der sehr wichtigen Wechselwirkungen zwischen **Zirkulation und Atmung** zu gedenken.

Die bei der Inspiration erfolgende Druckverminderung im Thorax pflanzt sich auch auf die großen ins Herz mündenden Venen fort, die infolge ihrer Dünnwandigkeit mechanischen Einwirkungen von außen mehr als die Arterien zugänglich

sind, und fördert die Bewegung des Blutstromes in ihnen zum Herzen hin, während umgekehrt während der Expiration die Strömung in den Venen eine Hemmung erfährt. Die Arterien werden hierdurch nicht beeinflusst. Die Atemmechanik stellt also einen wichtigen Hilfsmotor für die Zirkulation dar, insbesondere wird die diastolische Füllung der Vorhöfe zu einem beträchtlichen Teil durch die Inspiration unterstützt. Noch auf einem anderen Wege erfährt die Blutbewegung in den großen Venen durch die Atmung eine Förderung. Bei der während der Inspiration erfolgenden Senkung des Zwerchfells übt dieses einen Druck auf die Leber aus. Diese wird dadurch gegen das Widerlager des Darmpolsters gedrückt und dadurch bis zu einem gewissen Grade von Blut ausgepreßt, so daß der Abfluß aus der Leber in die Hohlvene eine Verstärkung erfährt. Eine Förderung in gleichem Sinne bewirkt die Bauchpresse, die im Verein mit dem Zwerchfell den Inhalt der Bauchhöhle vorübergehend unter erhöhten Druck setzt und dadurch dem aus den Bauchorganen der Vena cava inf. zufließenden Blut eine Beschleunigung erteilt.

Diese Verhältnisse sind von größter praktischer Bedeutung am Krankenbett.

Alle Momente, die zu einer Einschränkung der Atemexkursionen führen, wie Pneumonien, Exsudate, Emphysem, Starre des Thorax, Pneumothorax, Pleuraschwarten müssen wegen der angedeuteten Zusammenhänge zu einer Beeinträchtigung der Zirkulation führen wie umgekehrt eine Beseitigung dieser Prozesse nicht nur dem Atmungsapparat, sondern auch der Blutbewegung zugute kommt.

Auch der Zustand der Abdominalorgane, speziell der Gasgehalt der Därme wie die Funktionstüchtigkeit der Bauchpresse kann nicht gleichgültig für die Zirkulation sein. Der infolge von starkem Meteorismus hervorgerufene Hochstand des Zwerchfells und die Beeinträchtigung seiner Bewegungen werden bei einem funktionsschwachen Herzen sich in ihren Folgen auch an diesem bemerkbar machen und erfordern daher auch im Interesse der Zirkulation Abhilfe. Das gleiche gilt von einer Erschlaffung der Bauchdecken.

In den Extremitäten ist die Muskulatur für die Blutzirkulation, namentlich in den Venen von Bedeutung, indem jede Muskelkontraktion eine vorübergehende Auspressung der in den Muskel eingebetteten Gefäße bewirkt. Aktive bzw. passive Bewegung der Muskeln trägt daher zur Unterstützung der Zirkulation bei.

Schließlich sind auch für die Capillaren die mechanischen Verhältnisse der Nachbarschaft namentlich unter krankhaften Verhältnissen in Rechnung zu ziehen. Nimmt der Gewebsdruck in einem Organ infolge von Ödem zu und vermag sich das Organ wie beispielsweise die Niere infolge seiner Kapsel nicht entsprechend auszudehnen, so ist die Folge eine Verengerung der Capillaren und eine konsekutive Ischämie des Gewebes. Hier werden diejenigen Maßregeln mehr Aussicht auf Besserung der Zirkulation haben, die zunächst eine mechanische Entspannung des Gewebes durch Entleerung der Ödeme bewirken, als Mittel, die direkt die Triebkraft des Zirkulationsapparates heben.

Auch auf **reflektorisch-nervösem Wege** kommen mannigfache Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Teilen des Zirkulationsapparates wie zwischen diesem und anderen Organen zustande.

So erfolgt bei Zunahme des arteriellen Blutdrucks Reizung des in der Aortenwurzel entspringenden zentripetalen N. depressor sowie des Vaguszentrums; die dadurch bewirkte Gefäßerweiterung bzw. die Verlangsamung der Herzaktion verhindert ein weiteres Ansteigen des Blutdrucks. Auch von den Atmungsorganen können reflektorische Veränderungen der Pulsfrequenz hervorgerufen werden. Hierzu gehört auch die durch Reizung der Nasenschleimhaut gelegentlich ausgelöste reflektorische Herzarhythmie.

Eine große Bedeutung haben auch die von den Abdominalorganen ausgehenden, auf das Herz einwirkenden nervösen Reflexe. So führt Aufblähung

des Magens mitunter zu Rhythmusstörungen des Herzens. Ferner kann analog dem Goltzschens Klopfversuch beim Frosch auch beim Menschen die Einwirkung von Schlägen auf das Abdomen oder Bauchverletzungen zu schweren Störungen der Zirkulation mit Kollaps führen (Vaguswirkung).

Erwähnt sei die Beeinflussbarkeit der Herztätigkeit und die Pulsfrequenz durch die Psyche. Hier ist auch an die verhängnisvolle Einwirkung heftiger Affekte auf das Herz zu erinnern, sie erklärt sich in der für derartige Fälle festgestellten kombinierten Vagus- und Acceleransreizung. Daß ferner auch die Vasomotoren in weitem Umfange psychischen Einflüssen unterworfen sind, wird durch die alltägliche Erscheinung des Erröten und Erblässens bei seelischen Emotionen bewiesen.

Auch die verschiedenen **Hormone** greifen in die Zirkulation in wechselndem Maße ein und dürften zu einem beträchtlichen Teil der Regulierung der normalen Zirkulationstätigkeit dienen. Auf die Blutdrucksteigerung durch die Nebennieren- und Hypophysenhormone wurde schon hingewiesen. Zu erwähnen ist hier ferner das Schilddrüsenhormon, das durch Sympathicusreizung Beschleunigung der Herztätigkeit bewirkt.

### Die klinische Untersuchung des Zirkulationsapparates.

Bei **Besichtigung** der Herzgegend sind normalerweise Pulsationen bisweilen in der Spitzenstoßgegend (s. unten) sichtbar; bei Herzkranken mit verstärkter Herztätigkeit, namentlich in den Fällen, wo infolge von gleichzeitiger Lungenschwemmung ein größerer Teil des Herzens der Brustwand anliegt, sind sie oft in ausgedehnterem Maß wahrnehmbar.

Bei mageren Individuen kann man bei erregter Herzaktion speziell bei Mitralklappenfehlern Pulsationen in dem 2. und 3. Intercostalraum links dicht neben dem Sternum wahrnehmen. Weiter beobachtet man bei sehr starker Hypertrophie und Dilatation des linken Herzens, speziell bei Aorteninsuffizienz mit jeder Systole eine ruckartige Erschütterung des ganzen Thorax nach der linken Seite. Bei Zwerchfelltieftand, kurzem Sternum und lebhafter Tätigkeit des rechten Ventrikels läßt auch das Epigastrium Pulsationen erkennen. Schließlich kann man bisweilen bei Individuen, bei denen sich schon im jugendlichen Alter eine erhebliche Hypertrophie und Dilatation entwickelt, eine Vorwölbung der Brustwand, Herzbuckel (Voussure) genannt, erkennen. Die bei Aneurysma aortae durch die Inspektion wahrnehmbaren Veränderungen sind mehr umschriebene pulsierende Vorwölbungen im oberen Brustteil rechts oder links vom Sternum.

Sehr wichtig ist neben der Inspektion der Befund der **Palpation** der Herzgegend, den man durch Auflegen der flachen rechten Hand auf die Herzgegend erhebt. Am häufigsten nimmt man dabei den sog. **Herzspitzenstoß** wahr. Man versteht darunter den am weitesten nach links und unten gelegenen Teil der durch die Palpation wahrnehmbaren Herztätigkeit, die oft auch beim Gesunden als circumscriphte Pulsation nachweisbar ist und hier dem linken Ventrikel entspricht.

Der Spitzenstoß liegt beim normalen Mann im 5. Intercostalraum, etwas innerhalb der Mamillarlinie<sup>1)</sup>, bei Frauen und Kindern oft im 4. Intercostalraum und etwas mehr nach außen. Bei stärkerer Füllung des Abdomens (Meteorismus, Ascites, Gravidität usw.) wird er nach oben gedrängt, bei Zwerchfelltieftand tritt er tiefer. Er ist auch beim Gesunden nicht immer nachweisbar und fehlt u. a. bei stärkerem Fettpolster, starker Muskulatur sowie bei Frauen mit stärkeren

<sup>1)</sup> Bezüglich der Unzulänglichkeit der Mamillarlinie als Marke zur Bestimmung der Herzgrenze vgl. das S. 134 Gesagte.



straffen Brüsten. Sind letztere schlaff, so kann man ihn eventuell nach Hochheben der Brust unter derselben fühlen. Sein Fehlen ist nicht ohne weiteres pathologisch. Schwinden des Spitzenstoßes während einer Krankheit kann auf Entstehung von Flüssigkeit im Herzbeutel, die den Spitzenstoß von der Wand abdrängt, beruhen; die gleiche Wirkung hat die emphysematöse Blähung der Lunge.

Änderungen der Lage und der Beschaffenheit des Spitzenstoßes haben große praktische Bedeutung. Verstärkung des Spitzenstoßes kann in zwei verschiedenen Formen auftreten. Er ist entweder nur „erschütternd“, d. h. die Herzspitze wird nur für einen Moment lebhaft der Brustwand genähert, um sich sofort wieder von ihr zu entfernen. Dies beobachtet man unter den verschiedensten Bedingungen, die zu einer stürmischen Herzaktion führen, wie starke körperliche Anstrengung, seelische Erregung, ferner im Fieber, bei nervösen Herzen sowie bei Basedowscher Krankheit. Oder er ist „hebend“, d. h. er wird nicht nur mit verstärkter Energie, sondern mit einem gewissen Nachdruck, oft nicht beschleunigt, sondern eher langsam (im Gegensatz zu dem erschütternden Spitzenstoß) gegen die Brustwand gepreßt, so daß der palpierende Finger an dieser Stelle für kurze Zeit einen erheblichen Widerstand empfindet, den er nicht zu überwinden vermag.

Hebender Spitzenstoß zeigt stets eine Erschwerung der Entleerung der Ventrikel an, die meist mit Hypertrophie des Herzmuskels verbunden ist. Je nach Beteiligung des linken oder rechten Ventrikels besteht ein verschiedenes Verhalten des Spitzenstoßes. Bei Hypertrophie der linken Kammer bildet der Spitzenstoß eine circumscribte, scharf begrenzte Stelle am äußersten Rand der linken Herzgrenze, er ist dabei etwas nach außen und oft nach unten in den 6. Intercostalraum verlagert. Im Gegensatz hierzu beschränkt sich bei Hypertrophie des rechten Ventrikels die verstärkte Pulsation nicht auf eine scharf umschriebene Stelle, sondern ist in weiterer Ausdehnung im Bereich der rechten Kammer nachweisbar, also links neben dem Sternum (Conus arterios.), was man bei kräftigem Aufdrücken der flachen Hand auf diese Gegend wahrnimmt; ferner ist bei tiefer Inspiration namentlich bei kurzem Sternum dicht unter seinem unteren Ende und am Rande des linken Rippenbogens in der gleichen Weise ein verstärkter pulsatorischer Widerstand zu fühlen. In diesen Fällen kann man nicht selten Pulsationen im Epigastrium auch mit dem Auge wahrnehmen. Wird der Spitzenstoß bei fehlender Hypertrophie der linken Kammer ausschließlich von der hypertrophischen rechten Kammer gebildet, so ist er breiter als bei linksseitigem Spitzenstoß und geht in das Gebiet der übrigen Kammerpulsation ohne scharfe Grenze über. Weiter beobachtet man bei erheblichen Dilatationen des rechten Vorhofes Pulsationen rechts vom Brustbein. Schließlich ist im Bereich der Herzbasis rechts bzw. links vom Sternum der Schluß der Aorten- bzw. Pulmonalklappen zu fühlen, wenn derselbe unter erhöhtem Druck erfolgt. Liegt infolge von Schrumpfung der Lunge ein abnorm großer Teil des Herzens der Brustwand an, so kann auch dieser Umstand bereits zu besonderen sicht- und fühlbaren Pulsationen in der Herzgegend führen.

Veränderungen der Lage des Spitzenstoßes haben großen diagnostischen Wert. Einmal können sie zustande kommen durch Verschiebung des Herzens in toto unter dem Einfluß der Nachbarorgane. Ein Pleuraexsudat oder Pneumothorax der rechten Seite bewirkt eine Verlagerung nach links, der gleiche Prozeß der linken Seite eine solche nach rechts. Eine geschrumpfte Lunge zieht das Herz nach der erkrankten Seite herüber. Formänderungen des knöchernen Thorax, speziell Kyphoskoliosen sind eine weitere Veranlassung für eine abnorme Lage von Herz und Spitzenstoß. Vor allem bewirken auch Veränderungen des Herzens selbst Verlagerungen des Spitzenstoßes, so nach links bei Hypertrophie und Dilatation des Herzens sowie bei Flüssigkeitsansammlung im Herzbeutel. Bei erheblicher Linksverschiebung des Spitzenstoßes ist dieser infolge des schrägen Verlaufs der Rippen im 6. oder 8. Intercostalraum zu fühlen.

Schließlich ist als pathologischer, der Inspektion und Palpation zugänglicher Befund noch das systolische Einsinken der Spitzenstoßgegend zu nennen, das man bei Verwachsung der beiden Blätter des Herzbeutels beobachtet. Hierbei zeigen aber auch die benachbarten Intercostalräume, bei jugendlichen Individuen auch die Rippen, eine systolische Einziehung. In besonderen Fällen, wo außer

der Verwachsung der Perikardialblätter unter sich auch eine solche mit der Brustwand besteht, beobachtet man bisweilen das diagnostisch wichtige sog. diastolische Thoraxschleudern, das in einem kräftigen diastolischen Rückstoß der vorher systolisch eingezogenen Brustwand besteht.

Die Bestimmung der **Herzgröße** geschieht durch Perkussion und die Röntgenuntersuchung.

Die Größe des Herzens ist keine durch eine fixe Zahl ein für allemal definierbare Größe, sie schwankt vielmehr schon beim normalen Menschen innerhalb gewisser individueller Grenzen und auch beim einzelnen gesunden Individuum kommen gewisse noch als physiologisch anzusehende Schwankungen der Herzgröße vor. Maßgebend ist, abgesehen von der Körpergröße und dem Körpergewicht, vor allem die Form und Breite des Thorax. Die bei einem gesunden Individuum mit breitem Brustkorb gefundenen Herzmaße können beispielsweise bei einem Menschen mit schmalen Thorax bereits pathologisch sein und umgekehrt. Beim Weibe sind die Herzmaße c. p. etwas kleiner als beim Mann, desgleichen beim noch nicht ausgewachsenen Individuum. Ferner ist der Zwerchfellstand von der allergrößten Bedeutung: Bei Zwerchfelltiefstand hängt das Herz steil herab, so daß sein Querdurchmesser kleiner wird, das gleiche findet bei tiefer Inspiration statt. Umgekehrt erfolgt bei Zwerchfelloberstand bzw. starker Expiration eine Querlagerung des Herzens mit entsprechender Verbreiterung seines queren Durchmessers (vergl. Abb. 4). Gravidität, Meteorismus, Ascites, Abdominaltumoren täuschen daher leicht eine Verbreiterung des Herzens vor. Bei jeder Herzuntersuchung ist somit die Feststellung des Zwerchfellstandes sowie die Untersuchung des Abdomens unerlässlich; sie hat mit der Konstatierung der rechten unteren Lungengrenze in der Mamillarlinie entsprechend dem Stande des Zwerchfells zu beginnen. Normalerweise liegt sie am unteren Rand der 6. oder am oberen Rand der 7. Rippe.

Bei der **perkutorischen Feststellung der Herzgröße** ist zu unterscheiden die absolute und die relative Dämpfung.

Erstere durch leise Perkussion dargestellt, ergibt denjenigen Teil der Vorderfläche des Herzens, der der Brustwand direkt anliegt, d. h. von der Lunge nicht bedeckt ist. Sie liefert daher kein sicheres Maß für die Herzgröße, ist dagegen zur Beurteilung mancher Veränderungen der Lunge brauchbar.

So ist sie z. B. bei Lungenblähung und Emphysem, unabhängig von der wirklichen Herzgröße, verkleinert; ferner fehlt ihre normalerweise bei Inspiration auftretende vorübergehende Verkleinerung bei pleuritischen nahe dem Herzen gelegenen Adhäsionen.




Abb. 4. Einfluß der Atmung auf die Lage des Herzens (nach Groedel).  
Inspiration schwarz; Expiration rot.

Bei Erwachsenen liegt die obere Grenze der absoluten Herzdämpfung am unteren Rand der linken 4. Rippe oder etwas tiefer, die rechte Grenze wird durch den linken Sternalrand gebildet, die linke läuft in einem nach links konvexen Bogen vom 4. Rippenknorpel herab bis zum Spitzenstoß, den sie jedoch nicht immer erreicht, oft liegt sie 2—3 cm einwärts von ihm. Die untere Grenze ist in der Regel perkutorisch nicht zu bestimmen, da hier an die Herzdämpfung meist die den gleichen Klopfeschall gebende Leber anstößt; nur ausnahmsweise erlaubt der tympanitische Magen- oder Darmschall eine Abgrenzung der Herzdämpfung nach unten.

Die **relative Herzdämpfung**, die als Ausdruck der wirklichen Herzgröße für die Herzdiagnostik das Hauptinteresse beansprucht, beginnt oben links vom Sternum zwischen der 3. und 4. Rippe; ihre linke Grenzlinie zieht von da wiederum im Bogen nach unten bis zum Spitzenstoß. Die rechte Grenzlinie, die individuell verschieden ist, kann normal ein wenig den rechten Sternalrand überragen und bis zu 3—4,5 cm von der Medianlinie reichen, doch liegt sie oft bereits direkt am rechten oder linken Sternalrand. Am deutlichsten gelingt die Darstellung der relativen Herzdämpfung bei tiefer Expiration. Da wie bei der Perkussion der Lunge so auch bei der des Herzens stets der knöcherne Thorax mitperkutiert wird, so hängt das Ergebnis der Perkussion zu einem nicht unbedeutlichen Teil auch von dessen physikalischer Beschaffenheit, speziell von seiner Elastizität ab. Verminderung derselben wie bei Emphysem sowie bei älteren Leuten beeinträchtigt die Genauigkeit der Perkussion, und zwar fällt hier die relative Dämpfung meist kleiner aus, ohne daß deshalb ein Schluß auf die wirkliche Herzgröße erlaubt ist.

Als Richtlinien für die Herzdämpfungsfigur am Brustkorb pflegt man die Mamillar-, die Sternal-, die Parasternal- und die Axillarlinie anzuwenden. Von ihnen ist die Mamillarlinie nicht zuverlässig und in manchen Fällen, namentlich bei Frauen, sogar völlig unbrauchbar. Zuverlässig sind nur exakte Maßangaben in Zentimetern<sup>1)</sup>, und zwar mißt man den Abstand von der auf dem Sternum liegenden Medianlinie.

Bei der Feststellung der linken Herzgrenze ist noch folgender Umstand zu berücksichtigen. Die Herzdämpfung stellt die Projektionsfläche des Herzens auf die vordere Brustwand dar. Bei schmalem und vor allem bei seitlich stark abfallendem Thorax ebenso wie bei sehr großen Herzen besteht nun die Gefahr, daß man bei der Perkussion sich nicht auf die Vorderwand des Thorax beschränkt, sondern im Bereich der vorderen Axillarlinie bereits seitliche Bezirke der Thoraxwand perkutiert. Die mit dem Bandmaß festgestellten Entfernungen fallen alsdann zu groß aus, weil sie über einer gekrümmten Fläche gemessen werden. Speziell für diese Fälle, aber auch sonst empfiehlt sich daher ganz allgemein statt des Meßbandes die Anwendung des in der Gynäkologie gebräuchlichen großen Tasterzirkels. Im übrigen bietet das Röntgenverfahren die beste Kontrolle.

Die folgenden Zahlen stellen die normalen Grenzwerte dar, innerhalb der je nach der Körperlänge und dem Körpergewicht die individuellen Maße für die Herzdämpfung schwanken; beim Weibe sind sie bei gleicher Länge und Gewicht um etwa 0,5 cm kleiner. Gemessen wird der größte Abstand der relativen Herzdämpfung von der Medianlinie (M) nach rechts bzw. links:  $M_r = 3 - 4,5$  cm;  $M_l = 8 - 11$  cm.

Da zwischen den Herzmaßen und der Breite des Thorax (nicht zu verwechseln mit dem Brustumfang) normalerweise konstante Beziehungen bestehen, so soll man neben der Feststellung der Herzmaße stets auch die Thoraxbreite messen,

<sup>1)</sup> Die früher und auch jetzt noch vielfach benutzte Angabe nach Quertingerbreiten bei der Perkussion von Organen ist unzulässig, da dieselbe begrifflicher Weise je nach dem Untersucher außerordentlichen Schwankungen unterliegt. Die Angaben müssen stets so beschaffen sein, daß sie vergleichbare, von anderer Seite exakt nachprüfbare Werte liefern. Dies ist nur in Form der oben genannten Maßangabe möglich. Da ferner die Größe der Herzdämpfung je nach der Körperlage verschieden ausfällt, ist jedesmal zu vermerken, ob die Angaben für den stehenden oder liegenden Menschen gelten.

indem man mit einem Winkelmesser die Entfernung derjenigen symmetrischen Punkte seitlich an der rechten und linken Thoraxhälfte, und zwar in den Inter-costalräumen mißt, die in der Höhe der Herzdämpfung voneinander am weitesten entfernt sind. Es verhält sich nämlich  $Mr + MI : \text{Thoraxbreite} = 1 : 1,92$ .

Die Röntgenuntersuchung in der gewöhnlichen Form als Durchleuchtung und Photographie ist zwar zur Konstatierung beträchtlicher Abweichungen von der normalen Größe des Herzens sowie namentlich zur Feststellung der Herzform ausreichend. Für die exakte Feststellung der Herzgröße ist sie jedoch ungeeignet.

Die von der Röntgenröhre ausgehenden divergierenden Strahlen bilden nämlich einen Kegel, so daß das in demselben liegende schattengebende Objekt, das Herz je nach der Distanz von dem Röhrenfokus in verschiedener Größe, stets aber größer erscheinen wird, als es tatsächlich ist. Diesem Übelstand hilft ab 1. die Orthodiagraphie nach Moritz und 2. die Fernphotographie nach Köhler.

Mit Hilfe des Orthodiagraph genannten Apparates werden bei der Durchleuchtung sämtliche von der Röhre ausgehenden divergierenden Strahlen abgeblendet und nur das schmale Bündel der sog. Zentralstrahlen, die senkrecht von der Röhre auf den Durchleuchtungsschirm fallen, verwendet, indem man dieselben mittels eines besonderen Mechanismus an dem Rande der Herzsilhouette des fixierten Patienten entlang führt und die verschiedenen Punkte markiert.

Bei der Telephotographie wird die durch die Divergenz der Strahlen bewirkte Verzerrung des Herzbildes dadurch vermieden, daß der mit der Brust an die photographische Platte angepreßte Patient in eine so große Entfernung (2 Meter) von der genau zentrierten Röntgenröhre gebracht wird, daß die von ihr ausgehenden Strahlen praktisch als parallel angesehen werden können, zumal die wirkliche Abweichung nur wenige Millimeter beträgt. Die Herzsilhouette der auf diese Weise gewonnenen Photographie entspricht daher der wirklichen Herzgröße.

Außer den oben genannten Größen  $Mr$  und  $MI$  stellt man hier außerdem die Summe  $Mr + MI = Tr$  (Transversaldurchmesser) sowie  $L =$  Längsdurchmesser des Herzens, d. h. die Entfernung zwischen dem Winkel von Vorhof und Ven. cav. sup. und der Herzspitze fest.  $L$  ist aber nur dann exakt zu bestimmen, wenn die Herzspitze sich deutlich vom Zwerchfell abhebt, was indessen nur selten der Fall ist, da sie meist in den keilförmigen Raum eintaucht, der zwischen der nach vorn abfallenden Partie des Zwerchfells und der Brustwand liegt.

Für den gesunden erwachsenen Mann ergeben sich unter Berücksichtigung der Körperlänge und des Körpergewichtes folgende orthodiagraphisch bzw. durch Fernaufnahme festzustellende Maße:

Körperlänge 145—154, mittleres Gewicht 47 kg :  $Mr$ . 3,7;  $MI$ . 8,5;  $Tr$ . 12,2;

$L$ . 13,4 cm;

Körperlänge 175—187, mittleres Gewicht 71 kg :  $Mr$ . 3,7;  $MI$ . 9,3;  $Tr$ . 13,8;

$L$ . 14,9 cm.

Bei jeder Herzgrößenbestimmung ist demnach stets die Körperlänge, das Körpergewicht, die Körperlage sowie die während der Untersuchung bestehende Atmungsphase mit zu berücksichtigen.

Abgesehen von der Größenbestimmung des Herzens ist die Röntgenuntersuchung auch für die Feststellung der Herzform sowie die Untersuchung der großen Gefäße („Gefäßband“) von großem Wert. Die einzelnen Teile, die die Form der normalen Herzsilhouette bei dorsoventraler Richtung der Strahlen bilden, sind aus Abb. 5 ersichtlich. Sie zeigt, daß der rechte Kontur des Herzens sich aus zwei Bögen, dem oberen Gefäßbogen und dem unteren Vorhofsbogen, der linke aus drei Bögen und zwar I.: Aortenbogen, II.: Pulmonal- + Vorhofsbogen, III.: Ventrikelbogen zusammensetzt.

Es empfiehlt sich in jedem Fall, wo nicht eine Photographie angefertigt wird, wenigstens eine Zeichenpause herzustellen. Neben der dorsoventralen Durchleuchtung in sagittaler Richtung ist es oft zweckmäßig, den Pat. in Schrägstellung (r. Schulter vorn) sowie ferner auch in querer Richtung, und zwar von rechts nach links zu durchleuchten. Hierdurch wird einmal die Übersicht über die Aorta,

ferner die Feststellung des Tiefendurchmessers und des Neigungswinkels des Herzens sowie ein Überblick über den zwischen Sternum und Herz befindlichen Retrosternalraum ermöglicht.

Unter krankhaften Verhältnissen kann die Herzsilhouette dadurch eine andere Form annehmen, daß einzelne Teile derselben bzw. des Gefäßbandes sich vergrößern und stärker vorspringen, oder es findet eine Verlagerung des Herzschattens in toto statt. Bei pathologischen Veränderungen der Aorta (Aneurysma) ist die Konstatierung von Pulsationen oft diagnostisch wichtig zur Unterscheidung von Schatten, die anderen Gebilden des Mediastinums angehören. Neben der Photographie ist daher möglichst stets auch eine Schirmdurchleuchtung vorzunehmen.

Eine perkutorisch bzw. im Röntgenbilde nachweisbare **Vergrößerung des Herzens** beruht auf Dilatation, wogegen die Zunahme an Muskulatur, die Hypertrophie allein keine Vergrößerung bewirkt. Praktisch ist oft beides miteinander kombiniert.

Dilatation des linken Ventrikels bewirkt perkutorisch Verbreiterung der Herzdämpfung nach links, im Röntgenbild Zunahme des Breitendurchmessers nach links sowie eine stärkere Querlagerung des Herzens in toto. Dilatation des rechten Ventrikels führt zu einer Verbreiterung der Herzdämpfung nach oben, dagegen nur wenig nach rechts (was aus der Abb. 5 verständlich wird); Röntgenbild: Zunahme des Höhendurchmessers des Herzschattens, der Kugelform zeigt. Dilatation des rechten Vorhofs bewirkt Verbreiterung des Herzens nach rechts bei der Perkussion und im Röntgenbild.




Abb. 5. Anteil der verschiedenen Herz- und Gefäßabschnitte an der Herzsilhouette bei sagittaler Durchleuchtung (nach Groedel).

Bei Verbreiterung des linken Vorhofs, die sich dem perkutorischen Nachweis entzieht, ist ein starkes Vorspringen des II. linken Bogen, verbunden mit stärkerer Pulsation desselben zu finden.

Vergrößerung der Herzdämpfung und der Röntgensilhouette findet sich ferner bei Flüssigkeitsansammlung im Herzbeutel. Die Dämpfungsfurur ist dabei nach allen Dimensionen verbreitert und hat die Form eines gleichschenkligen Dreiecks, dessen Spitze oben im 2. oder 1. Interostalraum liegt. Charakteristisch ist ferner, daß hierbei die linke Grenze der Herzfigur mehr nach außen als der Spitzenstoß liegt, der übrigens bei einem größeren Exsudat zu schwinden pflegt. Die rechte Grenze pflegt sehr weit nach rechts vorgeschoben zu sein. Der Beginn einer Flüssigkeitsansammlung verrät sich mitunter dadurch, daß der von der rechten Herzgrenze mit dem oberen Leberrand gebildete normalerweise spitze Winkel sich in einen stumpfen Winkel verwandelt.

Die **Auscultation des Herzens** setzt die Kenntnis der anatomischen Lage der 4 Herzklappen bzw. ihrer Hörstellen am Lebenden voraus (vgl. Abb. 6).

Die Pulmonalklappe liegt am Sternalende des 2. linken Intercostalraumes und wird hier auscultiert; die Aortenklappe liegt hinter dem Sternum in der Höhe des 2. Intercostalraums, ihre Hörstelle im 2. linken Intercostalraum neben dem Sternum; die Mitralklappe befindet sich hinter dem Sternalende der 3. linken




Abb. 6. Herz und große Gefäße in ihrer Lage zur vorderen Brustwand mit Projektion der Herzostien auf dieselbe (halbschematisch nach Corning).

Rippe, Hörstelle ist die Herzspitze; die Tricuspidalklappe erstreckt sich vom Sternalrand der 3. linken Rippe bis zum Sternalrand der 5. rechten Rippe, sie wird auscultiert am rechten Sternalrand über dem 6. Rippenknorpel.

Die Tatsache, daß die Auscultationsstellen der Herzklappen nicht immer mit deren anatomischen Lage übereinstimmen, erklärt sich daraus, daß die Herztöne an den Orten ihrer Entstehung zum Teil voneinander akustisch nicht zu trennen

sind, wohl aber an anderen Stellen infolge Fortleitung des Schalles sich deutlich voneinander unterscheiden lassen.

Über allen Teilen des Herzens sind zwei Töne hörbar. Über der Mitralis und Tricuspidalis ist der 1. Ton lauter als der 2., über der Aorta und Pulmonalis umgekehrt der 2. Ton lauter als der 1. Der 1. Ton über den venösen Klappen entsteht durch deren Schließung sowie durch die Muskelkontraktion der Ventrikel. Die 2. Töne über den venösen und den arteriellen Klappen sind auf den Schluß der letzteren zurückzuführen. Der 2. Pulmonalton ist beim Erwachsenen in der Norm ebenso laut wie der 2. Aortenton, gelegentlich etwas lauter, da die A. pulm. der Brustwand näher liegt. Bei Kindern und jugendlichen Individuen bis zum 18. Jahr ist er dagegen schon normal etwas accentuiert.

Accentuation des 2. Aortentones zeigt eine Drucksteigerung in der Aorta an, Verstärkung des 2. Pulmonaltones beweist (aber nur beim Erwachsenen) eine Erschwerung der Zirkulation bzw. Stauung im kleinen Kreislauf, die Accentuation fehlt bei Erlahmen des rechten Ventrikels sowie bei Insuffizienz der Tricuspidalklappe. Der 1. Ton an der Herzspitze ist verstärkt bei lebhafter Herzaktion wie bei körperlicher Arbeit und im Fieber, ferner bei nervösem Herzklopfen, Basedowscher Krankheit und bei Mitralstenose; Abschwächung des 1. Tones kommt bisweilen vor bei Fällen von Herzmuskelerkrankung, bei Ohnmachtsanfällen, bei Aortenstenose und mitunter bei Mitralinsuffizienz. Abschwächung sämtlicher Herztöne findet sich bei Herzschwäche, bei Erguß von Flüssigkeit in den Herzbeutel sowie bei Emphysem.

Fehlt der Unterschied in der Stärke des 1. und 2. Tones, so kann man beide Töne nur auf Grund des längeren diastolischen Zeitintervalles zwischen dem 2. und dem nächsten 1. Ton identifizieren. Bei beschleunigter Herzaktion fällt auch dieser zeitliche Unterschied fort, so daß der gleiche akustische Eindruck resultiert wie beim Herzschlag des Foetus, die sog. Embryokardie. Aber auch ohne Frequenzsteigerung kann es zur gleichen Rhythmusänderung kommen, indem beide Töne gleich laut und in gleichem Abstand voneinander erfolgen, sog. Pendelrhythmus. Der 1. Ton läßt sich hier an dem zeitlichen Zusammentreffen mit dem Spitzenstoß bzw. dem nur unwesentlich verspäteten Carotispuls erkennen<sup>1)</sup>. Pendelrhythmus kommt bei Herzschwäche vor.

Spaltung bzw. Verdoppelung der Herztöne ist zum Teil ohne besondere Bedeutung, so z. B. die Spaltung des 1. Tones. Häufig ist sie auch bei gewissen Herzklappenfehlern, so z. B. bei Mitralstenose Verdoppelung des 1. Tones an der Herzspitze, ferner bei Mitralinsuffizienz und Stenose Verdoppelung des 2. Tones über der Aorten- und Pulmonalklappe.

Änderung der Klangfarbe der Herztöne hat mitunter diagnostische Bedeutung, so z. B. das Metallischklingen des 2. Aortentones bei Arteriosklerose und der laut paukende Charakter des 1. Tones an der Herzspitze bei Mitralstenose.

**Herzgeräusche**, die zu den Herztönen sich hinzugesellen oder sie ersetzen, entstehen teils im Innern des Herzens (endokardiale), teils auf seiner Oberfläche (perikardiale) oder in seiner Nachbarschaft (pleuroperikardiale Geräusche). Im Vergleich zu den Herztönen haben sie einen anderen akustischen Charakter, sind meist von längerer Dauer als erstere und klingen langsamer ab als diese.

**Endokardiale Geräusche** entstehen an den Stellen, wo der Blutstrom eine Verengung seiner Bahn zu passieren hat. Steigerung der Strömungsgeschwindigkeit fördert ihre Entstehung. Man unterscheidet organische, auf anatomischen Veränderungen beruhende Geräusche und accidentelle Geräusche ohne anatomischen Befund. Während die Verschiedenheiten des Schallcharakters der

<sup>1)</sup> Der Puls an der Radialis zeigt dagegen gegenüber dem Spitzenstoß eine erhebliche Verspätung.

Geräusche (blasend, kratzend, rollend, gießend, musikalisch usw.) diagnostisch belanglos sind, ist der Zeitpunkt ihres Auftretens im Laufe einer Herzrevolution sowie der Ort ihrer Entstehung von großer Bedeutung. Es gibt systolische und diastolische Geräusche. Systolische Geräusche liegen zwischen dem 1. und 2. Ton, diastolische zwischen dem 2. und dem nächsten 1. Ton. Bisweilen sind sie von so kurzer Dauer, daß sie nur einen Teil der Systole bzw. Diastole einnehmen. Bei den diastolischen Geräuschen dieser Art unterscheidet man daher protodiastolische und präsysstolische Geräusche, je nachdem sie in den ersten oder letzten Teil der Diastole fallen. In Fällen, wo das Geräusch den 1. Ton übertönt oder derselbe fehlt, dient zur Feststellung des Beginns der Systole die Palpation des Spitzenstoßes. Bei sehr leisen Geräuschen kann man versuchen, dieselben durch Steigerung der Strömungsgeschwindigkeit, d. h. durch verstärkte Herzaktion deutlicher zu machen, indem man den Patienten (wenn es sein Zustand erlaubt!) einige Kniebeugen oder ähnliches machen läßt oder hintereinander im Liegen und Stehen untersucht.

Wichtig ist auch die Tatsache, daß die Geräusche in der Richtung des sie erzeugenden Blutstromes akustisch weitergeleitet werden, so daß sie auch an anderen Punkten als nur an dem Orte ihrer Entstehung zu hören sind. Dies ist oft diagnostisch von Wert. So erklärt sich auch, daß man bisweilen gewisse leise Geräusche sogar besser an anderen Stellen als direkt über der Herzklappe, an der sie entstehen, wahrnimmt.

Sind an verschiedenen Stellen des Herzens zwei Geräusche gleichzeitig in derselben Herzphase zu hören, z. B. je ein systolisches Geräusch an der Herzspitze und in der Gegend der Herzbasis, so ist zu entscheiden, ob es sich um zwei verschiedene oder nur um ein einziges fortgeleitetes Geräusch handelt. Ersterer Fall liegt vor, wenn ein deutlicher Unterschied im Schallcharakter beider Geräusche besteht (z. B. das eine gießend, das andere kratzend), bzw. wenn an den beiden verschiedenen Stellen die Stärke der Geräusche ihr Maximum hat und zwischen denselben schrittweise an Intensität abnimmt.

Im allgemeinen nimmt die Intensität der Geräusche mit dem Grade der Verengung der Strombahn zu, sie sind daher vor allem bei den Klappenstenosen (Mitralklappenstenose, Aortenstenose usw.) besonders laut, und zwar um so lauter, je stärker die Stenose ist. Das Umgekehrte gilt für die Klappeninsuffizienzen; hier wird das Geräusch um so leiser, je ausgeprägter die Insuffizienz ist, schließlich kann es daher unhörbar werden. Leiser werden der Geräusche beobachtet man ferner bei Erlahmen der Herzkraft. Im allgemeinen haben diastolische Geräusche eine größere diagnostische Bedeutung als systolische, da letztere auch accidentell sein können.

**Accidentelle Herzgeräusche** sind fast ausnahmslos systolisch. Am häufigsten beobachtet man ein systolisches Geräusch im 2. linken Intercostalraum bei gesunden jugendlichen Individuen mit flachem Thorax. Charakteristisch ist seine während der Ausatmung sowie durch Druck mit dem Stethoskop erfolgende Verstärkung sowie der Wechsel in seiner Intensität. Accidentelle systolische Geräusche finden sich ferner vor allem bei anämischen Zuständen, bei hohem Fieber und bei Basedowscher Krankheit endlich über der Aorta bei Erweiterung derselben. Zum Teil dürften die Geräusche auf relativer Klappeninsuffizienz infolge von Dilatation der Ventrikel und Erweiterung des Klappenansatzringes beruhen. Vielfach läßt sich der Charakter der Geräusche aus ihrem raschen Schwinden nach Aufhören des Grundleidens nachträglich schließen. Jedenfalls bestehen niemals die bei den echten Klappenerkrankungen vorhandenen sonstigen Symptome. Oft ist die Unterscheidung sehr schwierig.

**Perikardiale Geräusche** entstehen dadurch, daß die beiden entzündeten Blätter des Herzbeutels sich infolge der Bewegungen des Herzmuskels aneinander reiben. Näheres S. 178. Pleuroperikardiale oder extraperikardiale Geräusche sind pleuritische Reibegeräusche, die bei Lokalisation einer trocknen Pleuritis in der Nachbarschaft des Herzens entstehen. Sie sind nicht nur von der Atmung, sondern auch von den Herzbewegungen abhängig und hören daher im Gegensatz zu den gewöhnlichen pleuritischen Geräuschen bei Atemstillstand nicht vollkommen auf.



Das **Elektrokardiogramm (Ekg.)** erhält man durch graphische Registrierung der bei der Herztätigkeit entstehenden elektrischen Aktionsströme.

In jedem lebenden Gewebe, so auch im Muskel, verhalten sich die erregten Teile elektrisch negativ gegenüber den in Ruhe befindlichen Teilen. Der dadurch entstehende Aktionsstrom, der nur von äußerst geringer Intensität ist, läßt sich mit sehr empfindlichen Galvanometern nachweisen. Die bei der Herztätigkeit regelmäßig auftretenden Aktionsströme werden von den Extremitäten abgeleitet (z. B. rechter Arm und linkes Bein oder beide Arme) und mit dem Saitegalvanometer von Einthoven registriert. Bei diesem Instrument ist ein sehr feiner von dem Aktionsstrom durchflossener Faden aus Platin oder versilbertem Quarz zwischen den Polen eines starken Elektromagneten ausgespannt. Die Registrierung der infolge des Aktionsstroms erfolgenden Ablenkung der Saite in dem Magnetfeld geschieht durch Photographie auf einen durch Uhrwerk bewegten Filmstreifen.

Das Ekg. des normalen Menschen zeigt eine typische Form, die ein Abbild der Art und der Zeitverhältnisse des Erregungsablaufs in




Abb. 7. Schema des normalen Ekg. I nach Einthoven, II nach Kraus-Nicolai.

- A = P Vorhofsacke.  
I = R Initialzacke.  
F = T Finalschwankung.

den einzelnen Teilen des Herzens darstellt. In manchen Fällen gibt es auch über eine Reizerzeugung an pathologischen Stellen Auskunft.

Es zeigt drei charakteristische, aufwärts gerichtete Zacken, die mit Buchstaben bezeichnet werden (die Bezeichnung von Einthoven ist verschieden von der nach Kraus-Nicolai, vgl. Abb. 7). Da die Vorhofselle P (A) und die Ventrikelsacke R (I) die der Kontraktion des Vorhofs bzw. Ventrikels vorausgehende Erregung, dagegen nicht die Kontraktion selbst anzeigen, so eilt ihr Erscheinen zeitlich den letzteren ein wenig voraus.

Im normalen Ekg. sind die 3 Hauptwellen monophasisch, d. h. bei der gewöhnlichen Art der Ableitung nach oben gerichtet, unter pathologischen Bedingungen kommen auch diphasische Zacken mit Schwankungen nach oben und unten vor, z. B. bei Extrasystolen. Weitere pathologische Abweichungen des Ekg. sind z. B. das Fehlen der P(A)-Zacke sowie der T(F)-Schwankung, ferner unregelmäßige Abstände zwischen den Ventrikelsackchen, Aufspaltung der Zacken usw.

Das Ekg. ermöglicht eine genaue Analyse der Arrhythmien, dagegen ist es vorläufig nicht möglich, aus der Gestalt oder der Höhe der Zacken auf die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels sichere Schlüsse zu ziehen.

## Untersuchung der Gefäße.

**Die Arterien.** An erster Stelle steht die palpatorische Prüfung des **Arterienpulses**. Normal läßt sich nur die Pulswelle, aber nicht das Arterienrohr tasten. In Betracht kommen hierfür alle oberflächlich gelegenen Arterien wie die A. radialis, carotis, temporalis, dorsal. pedis usw.

Die der Systole des Herzens entsprechenden Pulsationen der Gefäße zeigen je nach ihrer Entfernung vom Herzen eine verschieden starke Verspätung, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle in den Arterien beträgt 5–6 m in der Sekunde. Die Entstehung eines Gefäßpulses setzt eine gewisse Kraft der einzelnen Herzkontraktion voraus; ist dieselbe so gering, daß es nicht zur Öffnung

der Aortenklappen kommt, wie bei manchen Störungen der Herzmuskeltätigkeit, so wird eine solche Kontraktion zwar am Spitzenstoß, nicht aber am Arterienpuls wahrnehmbar sein: sog. „frustrane“ Ventrikelkontraktionen. In allen Fällen von unregelmäßiger Herztätigkeit ist daher zur Vermeidung von Fehlern das Verhalten des Arterienpulses durch gleichzeitige Palpation des Spitzenstoßes zu kontrollieren. Zu beachten ist ferner die Tatsache, daß in vereinzelt Fällen die Radialarterie der einen Seite wegen abweichender anatomischer Lage nicht zu fühlen ist, was natürlich keinen Schluß auf die Funktion des Herzens erlaubt; man prüfe daher in zweifelhaften Fällen den Puls beider Seiten.

Bei der palpatorischen Pulsuntersuchung lassen sich in jedem Fall folgende 5 Eigenschaften des Pulses unterscheiden (vgl. auch Abb. 8).

1. Die Zahl der Pulsschläge in der Minute oder Pulsfrequenz beträgt bei einem gesunden Erwachsenen 60—80, bei Kindern bis 140, bei Greisen 70—90.

Pulsbeschleunigung (Pulsus frequens, Tachykardie) ist physiologisch bei Muskularbeit, nach reichlicher Nahrungsaufnahme sowie bei psychischer Erregung. Besonders ausgeprägt sind diese Arten von Pulsbeschleunigung bei Rekonvaleszenten sowie bei Schwächeständen. Unter krankhaften Verhältnissen ist am häufigsten Fieber Ursache des Pulsus frequens, und zwar entspricht einer Temperatursteigerung um 1° eine Frequenzsteigerung von 6—8 Schlägen. Weitere Ursachen: Myokarditis, Endokarditis, Perikarditis, ferner Herzmuskelschwäche und Dekompensation eines Klappenfehlers, Vasomotorenlähmung (Kollaps), Herzneurosen, Basedowsche Krankheit und thyreotoxische Zustände, Sympathicusreizung (Coffein) sowie Vaguslähmung (Atropin bzw. Belladonna; Endstadium des Hirndrucks bei Meningitis). Anfallsweise auftretende Pulsbeschleunigung kommt bei der paroxysmalen Tachykardie vor (vgl. S. 156).

Pulsverlangsamung (Bradykardie, Pulsus rarus) kommt vor im Beginn der Rekonvaleszenz nach Infektionskrankheiten, im Puerperium und bei Sportleuten, ferner unter pathologischen Verhältnissen bei Vagusreizung, z. B. durch Druck von Tumoren auf den peripheren Nerven oder durch Erhöhung des Gehirndrucks wie bei Meningitis und Hirntumor; weiter unter der Wirkung der Gallensäuren (Ikterus) sowie von Digitalis; unter den Herzklappenfehlern ausschließlich bei Aortenstenose, endlich bei Störungen der Reizleitung im Herzen wie bei Herzblock (vgl. S. 154).

2. Der Rhythmus des Pulses. Die normalen Pulsschläge folgen in gleichen Intervallen und in gleicher Stärke aufeinander. Störungen des regelmäßigen Rhythmus heißen Arrhythmien (vgl. S. 153). Rhythmischer Puls gestattet noch keinen Schluß auf intakte Beschaffenheit des Herzens.

3. Die Größe des Pulses stellt ein Maß der Druckschwankung im Arterienrohr zwischen dem Druckzuwachs bei der systolischen Füllung und dem Absinken des Druckes während der diastolischen Entleerung des Arterienrohres dar.

Sie ist also die Amplitude zwischen dem höchsten und niedrigsten Stand der pulsierenden Wand des Gefäßrohres. Ihre Größe hängt im wesentlichen von zwei Faktoren ab, dem Schlagvolumen der linken Kammer und der Elastizität bzw. dem Tonus der Arterienwand; sie nimmt daher zu bei Steigerung des Schlagvolumens sowie bei Erschlaffung der Gefäßwand.

Die Höhe der Pulswelle läßt sich gut durch die Palpation mit dem Finger feststellen. Sehr deutlich veranschaulicht wird sie bei Pulsschreibung mit dem Sphygmographen (s. u.). Ein zahlenmäßiger Ausdruck für die Pulsgröße bietet bei der Blutdruckmessung die Größe des sog. Pulsdruckes (s. u.).

Pulsus magnus findet sich im Fieber sowie bei Aorteninsuffizienz, Pulsus parvus im Fieberfrost, bei Aortenstenose, Mitralstenose und vor allem bei Herzschwäche (fadenförmiger Puls).

Ungleich große Amplituden der einzelnen Pulse kennzeichnen den Pulsus inaequalis. Pulsus alternans ist ein inäqualer Puls, bei dem regelmäßig auf einen großen Pulsschlag ein kleiner in gleichem Abstand oder etwas verspätet folgt. Bei dem sog. Pulsus paradoxus wird der Puls während der Einatmung kleiner oder sogar unfühlbar, bei der Ausatmung wieder größer. Man beobachtet ihn bei schwieriger Mediastinitis und bei Mediastinaltumoren, bisweilen bei Perikarditis.

4. Die **Spannung oder Härte des Pulses** wird bei der Palpation nach dem Widerstand beurteilt, den der Puls dem Versuch, ihn zu unterdrücken, entgegensetzt.

Dementsprechend unterscheidet man harten und weichen Puls. Ein exaktes Maß für die Härte des Pulses ist die Höhe des Blutdrucks (s. u.). Pulsus durus findet sich bei hohem Widerstand in den Gefäßen und entsprechender Herzkraft. Er wird beobachtet vor allem bei Hypertonie, Schrumpfniere, ferner bei Bleivergiftung. Bei sehr hochgradiger Härte des Pulses spricht man von drahtförmigem Puls. Pulsus mollis besteht bei Herzschwäche, Fieber sowie den verschiedensten Infektionskrankheiten (Wirkung der Bakterientoxine) und Addisonscher Krankheit.

Streng zu unterscheiden von dem harten Puls ist die Verhärtung der Arterienwand durch arteriosklerotische Prozesse. Hier ist das Gefäßrohr infolge von Veränderungen wie Kalkablagerung usw. hauptsächlich in der Media unregelmäßig verdickt, oft stärker geschlängelt und zeigt eine höckerige Oberfläche, so daß die Arterie an das Verhalten einer Gänsegurgel erinnert. Man kann derartige Arterien unter den Fingern rollen.

5. Die **Geschwindigkeit des Anstieges des Pulses** (nicht zu verwechseln mit der Pulsfrequenz!) gibt das Tempo an, in dem der palpierende Finger durch jeden einzelnen Puls gehoben wird und ist bedingt durch die Art des Druckanstieges in den Arterien.

Beim „schnellenden“ Puls (Pulsus celer) spürt der palpierende Finger nur für einen kurzen Augenblick den Anschlag der Pulswelle, die gleichzeitig in der Regel kräftig ist. Mit dem Sphygmographen aufgeschrieben liefert er steil ansteigende und steil abfallende Wellen. Der Pulsdruck (s. S. 144) ist erhöht. Pulsus celer kommt vor vor allem bei Aorteninsuffizienz, bei Aortitis, ferner infolge von erregter Herzaktion bei kräftigem linken Ventrikel, so z. B. mitunter bei Basedowscher Krankheit. Pulsus tardus oder träger Puls verrät den langsamen Druckanstieg; er ist meist zugleich ein Pulsus parvus und findet sich bei Aortenstenose sowie bei Arteriosklerose und im Greisenalter.

Gleichzeitige Kontrolle des Pulses der korrespondierenden Arterien beider Seiten ergibt bisweilen Differenzen, die von diagnostischem Wert sind, so Ungleichheit oder Verspätung des Radialpulses der einen Seite bei Aneurysmen, ferner Verschwinden des Pulses bei embolischem oder arteriosklerotischem Gefäßverschluß.

**Auscultation der Arterien.** Beim Gesunden hört man über der Carotis (Hörstelle: Insertion des Sternocleidio an der Clavicula bzw. Innenrand des Sternocleidio in der Höhe des Schildknorpels) und über der Arteria subclavia (Hörstelle: Mohrenheimische Grube bzw. lateraler Teil der Fossa supraclav.) mit bloßem Ohre oder mit ganz leise ohne Druck aufgesetztem Stethoskop zwei sog. Spontanöne, von denen der 1. durch herzsystolische Anspannung der Gefäßwand, der 2. durch Fortleitung des 2. Aortenklappentons erzeugt wird. Über den übrigen Arterien sind normalerweise Spontanöne nicht zu hören. Übt man dagegen bei der Auscultation einen Druck mit dem Stethoskop aus, so treten über vielen Arterien, auch den entfernteren wie der Brachialis und Femoralis bei leichtem Druck ein Druckgeräusch, bei stärkerem Druck ein Druckton auf, die der Systole des Herzens, also der Diastole der Gefäße entsprechen. Pathologische Bedingungen führen teils zu einem Schwinden der normalen Töne, teils zum Auftreten von Tönen und Geräuschen an entfernten Gefäßen. Bei Aorteninsuffizienz fehlt häufig der 2. Spontanon über Carotis und Subclavia. Bei manchen Krankheiten wie bei Aorteninsuffizienz, Cor nervosum, Bleivergiftung hört man nicht selten über der Brachialis, Femoralis und den Arterien der Hohlhand einen dumpfen Spontanon oder den

sog. Traubesehen Doppelton und bei leisem Stethoskopdruck das Doppelgeräusch von Duroziez; das gleiche beobachtet man mitunter in der Gravidität, bei anämischen Zuständen, bei Fieber sowie bei Basedowscher Krankheit und Mitralstenose. Endlich besteht über der Carotis ein mit der Systole synchrones Geräusch konstant bei Aortenstenose (hier fehlt der 1. Ton), mitunter auch bei Aorten- und Mitralinsuffizienz.

Die **Röntgenuntersuchung der Arterien** kommt sowohl für die Aorta wie gelegentlich auch für die peripheren Arterien in Frage. An der Aorta lassen sich aneurysmatische Erweiterungen auch in den Fällen, in denen sie sich dem perkutorischen Nachweis entziehen, beobachten (vgl. S. 185). Die Arterien der Extremitäten, die normalerweise auf dem Röntgenbild nicht sichtbar sind, erscheinen bei stärkeren arteriosklerotischen Veränderungen mitunter als dunkle Stränge.

**Die Venen.** Diagnostisch wichtige Veränderungen an den Venen sind ihre abnorm starke Füllung, gewisse pulsatorische Bewegungen, auscultatorisch wahrnehmbare Geräusche sowie endlich palpatorisch feststellbare Stromhindernisse (Thrombosen).

Bei der abnorm starken Füllung der Venen kommen in Betracht:

1 Lokale Stromhindernisse wie Mediastinaltumoren, Pfortaderthrombose, Abdominaltumoren, Thrombose des Sinus longitud. usw. Der lokale Charakter der Venenstauung ergibt sich aus der auf das geschädigte Stromgebiet beschränkten Störung. Lokale Störungen sind z. B. auch die als Krampfadern bezeichneten Venenerweiterungen der unteren Extremitäten.

2. Auf Herzschwäche, speziell des rechten Ventrikels beruhende Venenstauung ist aus der allgemeinen venösen Stauung (Cyanose) zu erkennen. Ferner ist vor allem die pralle Füllung der V. jug. extern. zu nennen, die schräg über den Sternocleido verlaufend besonders bei Seitwärtsdrehung des Kopfes eine abnorme Füllung erkennen läßt. Die Füllung wird stärker, auch beim Gesunden, bei starkem expiratorischen Pressen unter gleichzeitigem Glottisschluß (Valsalva'scher Versuch), so auch beim Husten. Stärkere Füllung der V. jug. intern. bei hochgradiger Stauung bewirkt Vorwölbung des Sternocleido, und der Bulbus derselben kann einen starken Wulst bilden. Die bei starker Stauung vorhandene Erweiterung der V. cav. sup. verrät sich perkutorisch durch eine Dämpfung rechts neben und auf dem Manubrium sterni. Endlich ist an den Armvenen das Ausbleiben des normalen Kollabierens derselben beim Erheben des Arms über die Höhe des Herzens ein Zeichen für den erschwerten Abfluß zum Herzen.

Pulsationen an der Jugularvene lassen sich mit Sicherheit nur bei graphischer Registrierung des Venenpulses analysieren. Vgl. S. 147.

Venengeräusche hört man unter pathologischen Bedingungen über der Jugularvene, besonders rechts bei leisem Aufsetzen des Stethoskops auf den Winkel zwischen Clavicular- und Sternalportion des Sternocleido. Dortselbst ist bei aufrechter Körperhaltung und Wendung des Kopfes nach der anderen Seite, speziell bei Anämie und Chlorose ein kontinuierliches Säusen hörbar, das als Nonnensausen bezeichnet wird (Nonne = Brummer, Kinderspielzeug).

Bei Thrombosen der oberflächlichen Venen verwandeln sich diese in derbe palpatorisch fühlbare Stränge.

Die Kenntnis des **Blutdrucks** in den peripheren Arterien ist von großer praktischer Bedeutung. In sehr unvollkommener Form läßt er sich aus der Beschaffenheit des Pulses beurteilen. Jedoch ist dieses Verfahren ungenau und unzuverlässig. Weicher Puls entspricht niedrigem, harter Puls hohem Blutdruck.

Eine exakte Messung wird mit dem Blutdruckmesser nach Riva-Rocci bzw. Recklinghausen ausgeführt, bei welchem eine um den Oberarm gelegte Gummimanschette mittels Gebläses so lange mit Luft aufgeblasen wird,

bis der Radialpuls verschwindet. Der am Manometer abgelesene Druck entspricht dem maximalen herzsystolischen Druck in den Arterien, während bei langsamem Sinken des Manschettendrucks der Moment des Wiederkehrens des Pulses in seiner ursprünglichen Größe den minimalen während der Herzdiastole in den Arterien herrschenden Druck anzeigt.

Empfehlenswerter ist es, zur Feststellung beider Werte sich statt der Palpation des Radialpulses der Auscultation der Arterie in der Ellenbeuge zu bedienen. Man treibt den Druck zunächst so hoch, daß der Puls vollständig verschwindet und die Arterie stumm wird; dann läßt man den Druck langsam sinken. Der maximale oder systolische Druck entspricht demjenigen Manschettendruck, bei dem mit dem Stethoskop eben ein leiser Ton hörbar wird. Bei weiterem Sinken des Druckes wird der Ton immer lauter, bis er plötzlich wieder leiser wird; der diesem Punkt entsprechende Druck ist der diastolische oder minimale Druck.

Der Blutdruck ist beim Gesunden eine konstante Größe, die mit dem Alter physiologisch etwas ansteigt. Der systolische Druck beträgt zwischen 15—20 Jahren 120 mm, zwischen 20—30 Jahren 125, zwischen 30—40 Jahren 130, zwischen 40—50 Jahren 135, zwischen 50—60 Jahren 140—150 mm. Der diastolische Druck liegt zwischen 60—80 mm. Das als Blutdruckamplitude (Pulsdruck) bezeichnete Intervall zwischen systolischem und diastolischem Druck beträgt normal etwa 50—60 mm.

Die Höhe des Blutdrucks ist von mehreren Faktoren gleichzeitig abhängig und zwar von der Größe der Herzarbeit, d. h. dem Schlagvolumen, von der Wandspannung der Gefäße und dem Widerstand im Capillargebiet. Der gefundene Wert stellt demnach die Resultante aus diesen verschiedenen Faktoren dar, ohne über die einzelnen Größen direkt Aufschluß zu geben. Aus der Größe der Blutdruckamplitude kann man auf die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes schließen. Der Anteil der genannten Faktoren an der Höhe des Blutdrucks erklärt, daß sowohl Körperarbeit vorübergehend zu Blutdrucksteigerung führt, wie auch psychische Erregung durch Erhöhung des Gefäßtonus eine Steigerung zu bewirken vermag. Bei jeder Blutdruckmessung ist daher körperliche und seelische Ruhe des Patienten eine wichtige Vorbedingung.

Bei nervösen Individuen ist aus diesem Grunde das Resultat der ersten Blutdruckmessung, wenn erhöhte Werte gefunden werden, nur mit Vorbehalt zu verwenden und durch weitere Messungen zu kontrollieren, zumal hier oft schon die Furcht vor dem in Laienkreisen berüchtigten hohen Blutdruck genügt, denselben während der Untersuchung in die Höhe zu treiben. Beruhigt man alsdann den Patienten durch den Hinweis auf das normale Verhalten seines Blutdrucks, so kann man nicht selten bereits nach wenigen Minuten tatsächlich normale Werte konstatieren. Zugleich ist dieses labile Verhalten des Blutdrucks als Zeichen starker vasomotorischer Erregbarkeit diagnostisch verwertbar.

Blutdrucksteigerung findet man vor allem bei vielen Nierenerkrankungen, bei Bleivergiftung, Arteriosklerose der kleinen Gefäße, bisweilen bei Fettsucht, bei manchen vasomotorischen Neurasthenikern, im Klimakterium, bei Polycythämie, bei manchen Fällen von dekompensierten Herzleiden („Hochdruckstauung“). Erniedrigung des Blutdrucks findet sich im Fieber und unter der Einwirkung von Bakterientoxinen. Hier ist zunächst vor allem der diastolische Druck herabgesetzt, und zwar infolge von Vasomotorenlähmung, die auch bei Kollaps und Schock die Blutdrucksenkung erklärt. Abnahme der Herzkraft verrät sich durch Sinken des systolischen Druckes. Hochgradige Blutdruckerniedrigung besteht ferner bei Morbus Addison. Auch bei gewissen Neurasthenikern mit vasomotorischen Beschwerden beobachtet man abnorm niedrige Blutdruckwerte.

Die **graphische Registrierung** der Herztätigkeit und der Gefäßpulsationen stellt eine wichtige Ergänzung der bisher beschriebenen Untersuchungsmethoden dar, zumal sie die Beobachtung gewisser auf andere Weise nicht kontrollierbarer Vorgänge ermöglicht.

Die mechanische Registrierung der Herzstoßkurve wird in der Weise vorgenommen, daß man die Erschütterungen des Spitzenstoßes an der Brustwand mit einem kleinen Glastrichter auffängt, der durch einen Gummischlauch mit einer Mareyschen Schreibkapsel verbunden ist; ihre Bewegungen werden durch einen Hebel auf einen vorbeibewegten berußten Papierstreifen übertragen. Diagnostisch wichtige Formänderungen des Kardiogramms werden bei Verwachsungen des Herzbeutels (Synechie) beobachtet, wo statt der systolischen Erhebung eine Einziehung stattfindet.

Eine weitere Anwendung der Kardiographie ist ihre Kombination mit der Pulsschreibung, wobei das Kardiogramm dazu dient, über die Zugehörigkeit der einzelnen Teile des Gefäßpulses zu den Phasen der Herzaktion zu orientieren.


Die Pulsschreibung (Sphygmographie) läßt sich sowohl an den Arterien wie den Venen ausführen. Der Arterienpuls wird am besten mit dem Apparat von Jaquet oder Frank-Petter registriert (Abb. 8). Je nach der Entfernung der betreffenden Arterie vom Herzen (A. subclav. und Carotis resp. Radialis) ist die Pulsform verschieden: Sogen. zentraler bzw. peripherischer Puls.

Der zentrale Puls beginnt mit der kleinen Vorhofswelle, an die sich eine durch die Anspannungszeit bedingte sog. Vorschwingung anschließt. Der durch die Öffnung der Aortenklappen erfolgende plötzliche Druckanstieg wird durch den steil ansteigenden sog. anakroten Schenkel dargestellt, dem eine flachere systolische Nebenwelle folgt. Infolge der Abnahme des Druckes gegen Ende der Systole erfolgt der Übergang des anakroten in den absteigenden sog. katakroten Schenkel, dessen oberster Teil noch in die Systole fällt. Der Schluß der Aortenklappen verrißt sich durch eine Incisur des katakroten Schenkels (auch Rückstoßelevation genannt). Die Austreibungszeit des Ventrikels umfaßt somit an der Pulskurve den anakroten Schenkel und den oberen Teil des katakroten Schenkels. Dann sinkt der letztere langsam weiter, worauf der nächste Puls wieder mit der Vorhofswelle beginnt.


Die Form der Pulskurve hängt nicht nur von den Schwankungen des Blutdrucks ab, sondern auch von den Eigenschwingungen der Gefäßwand und der Interferenz der zentrifugalen mit den von der Peripherie reflektierten Wellen. Dies erklärt das veränderte Aussehen der Pulskurve an peripheren Gefäßen (Radialis). An diesen sind die dem anakroten Schenkel vorausgehenden Vorschwingungen verschwunden; auch ist die systolische Nebenwelle meist weniger deutlich oder bei niedrigem Blutdruck überhaupt nicht vorhanden. Dafür ist in der Regel in der Gegend der Klappenschlußzacke des zentralen Pulses die als „dikrotische Welle“ oder Rückstoßelevation bezeichnete Erhebung deutlich ausgeprägt, namentlich in den Fällen, in denen niedriger Blutdruck besteht; hier wird diese Welle höher und rückt tiefer am absteigenden Schenkel herab. Man kann dann die dikrote Welle auch mit dem Finger eventl. als zweiten Schlag wahrnehmen.

Im Fieber, wo die Dikrotie oft besonders stark ausgeprägt ist, erscheint die dikrote Welle erst, nachdem der katakrote Schenkel den Fußpunkt der Kurve erreicht hat, so daß er wie eine zweite kleinere Pulsquelle erscheint (vgl. Abb. 8 b); beim sog. überdikroten Puls fällt die dikrote Welle in den aufsteigenden Schenkel des nächsten Pulses (Abb. 8 c). Bei Aorteninsuffizienz entspricht dem Pulsus celer eine spitze Kurve mit steilem anakroten und katakroten Schenkel (Abb. 8 e). Umgekehrt ist der gespannte Puls bei erhöhtem Blutdruck gekennzeichnet durch einen stumpfen Gipfel sowie stärkere Ausprägung der systolischen Nebenwelle, die sogar höher sein kann als die erste systolische Welle. Der Puls bei Aortenstenose endlich ist ausgezeichnet durch eine langsam ansteigende und langsam absteigende Pulsquelle, die nur eine geringe Höhe zeigt (Abb. 8 f).


Sehr deutlich kommen Arrhythmien im Pulsbilde zum Ausdruck. Abgesehen von den Extrasystolen (s. u.) reicht aber für ihre genauere Analyse die Pulskurve allein nicht aus, es bedarf dazu vielmehr der gleichzeitigen Registrierung von Kardiogramm und Venenpuls.




a) Normaler Puls.




b) Dikroter Puls.




c) Überdikroter Puls.



d) Gespannter Puls.



e) Puls bei Aorteninsuffizienz.



f) Puls bei Aortenstenose.

Abb. 8. Pulskurven aufgenommen mit einem Sphygmographen (nach Edens).

Der **Venenpuls** entsteht dadurch, daß der zum Vorhof fließende Blutstrom infolge der Systole und Diastole von Vorhof und Ventrikel diskontinuierlich ist und abwechselnd eine Hemmung bzw. Beschleunigung erfährt. Er wird an der Ven. jug. ext. bzw. am Venenbulbus ebenso registriert wie der Arterienpuls. Er läßt normal drei kleine Wellen erkennen (Abb. 9).

Die a-Welle, die der Carotiswelle vorausgeht, verdankt der Vorhofssystole ihre Entstehung. Die kurz darauf folgende c-Welle, die mit dem Carotispuls synchron ist, ist in der Hauptsache eine fortgeleitete Carotispulsation. Eine dritte im normalen Phlebogramm vorkommende Welle ist die v-Welle. Sie fällt in den ersten Beginn der Diastole der Kammer und ist auf die zunehmende Füllung des Vorhofs zu beziehen. Normalerweise befindet sich zwischen c und v entsprechend der Systole der Kammer der systolische Kollaps x. Man nennt diesen normalen Venenpuls den diastolischen oder im Gegensatz zum Arterienpuls negativen Venenpuls. Derselbe läßt sich übrigens auch an der vergrößerten Leber nachweisen. Hier fehlt die c-Welle.

Unter pathologischen Bedingungen erhält der Venenpuls ein verändertes Aussehen. So schwindet z. B. die a-Welle bei Fehlen der Vorhofssystole. Bei zunehmender Stauung und Überfüllung im Vorhof beginnt um so früher die v-Welle, und die x-Senkung wird immer flacher, bis letztere sich schließlich in eine positive Welle, die sog. Stauungswelle verwandelt (Abb. 10). Besonders deutlich ist die Stauungswelle bei Trikuspidalinsuffizienz. Man nennt diesen Venenpuls den positiven oder ventrikulären Venenpuls. Man kann auch durch bloße Inspektion den physiologischen negativen vom positiven Venenpuls mitunter dadurch unterscheiden, daß bei ersterem, wenn man die Jugularis an einer Stelle höher oben mit dem Finger komprimiert, das zentrale Stück derselben kollabiert, was bei positivem Venenpuls nicht der Fall ist.

Speziell für das Studium des Venenpulses empfiehlt es sich, gleichzeitig mit ihm den Spitzenstoß und den Puls einer Arterie (Carotis) aufzuzeichnen, um die Zeitverhältnisse der einzelnen Kurventeile zueinander genau festlegen zu können. Sehr geeignet für dieses Verfahren ist der Polygraph von Jaquet.

Die beschriebenen Methoden der mechanischen Übertragung des Herzstoßes und der Gefäßpulse zur graphischen Registrierung leiden sämtlich an dem prinzipiellen Fehler, daß infolge der Trägheit des zur Übertragung dienenden Hebelsystems eine gewisse Entstellung der aufgezeichneten Kurven unvermeidlich ist. Diesen Übelstand umgeht das Verfahren von Frank, bei welchem die Bewegungen der Membran der Mareyschen Kapseln nicht durch einen Hebel, sondern durch den masselosen Lichtstrahl übertragen werden, der von einem kleinen auf der Kapsel befindlichen Spiegel auf einen rotierenden Film projiziert wird.




Abb 9. Normaler Venenpuls mit Carotispuls (nach Mackenzie).




Abb. 10. Schema nach Sahli (Klinische Untersuchungsmethoden), welches zeigt, wie der physiologische Vorhofsvenenpuls I durch zunehmende Lähmung des rechten Vorhofs infolge des allmählichen Verschwindens der a-Welle durch die Zwischenform II in einen mit der Ventrikelsystole synchronen (ventrikulären) Venenpuls III ohne Bestehen einer Trikuspidalinsuffizienz übergehen kann.



## Organische Herzkrankheiten.

### Allgemeines.

**Hypertrophie und Dilatation des Herzens:** Länger dauernde vermehrte Inanspruchnahme des ganzen Herzens oder einer seiner Abschnitte führt zu einer Zunahme der Herzmuskulatur (Verdickung der einzelnen Muskelfasern). Da physiologisch ein Parallelismus zwischen der Masse der Skelettmuskeln und derjenigen des Herzmuskels besteht, so bewirkt normal die Zunahme der ersteren infolge stärkerer körperlicher Arbeit nach einiger Zeit auch eine Zunahme des letzteren. Ihre Ursache liegt im wesentlichen in der durch die vermehrte körperliche Arbeit bewirkten Zunahme des Schlagvolumens (s. S. 128) des Herzens, indem innerhalb gewisser Grenzen die Arbeitsleistung des Herzmuskels mit der Zunahme seiner Wandspannung, d. h. der Füllung der Ventrikel wächst. Die damit zum Ausdruck kommende Akkommodationsfähigkeit des Herzmuskels gegenüber vermehrten Anforderungen, die sich aus dem Vorhandensein der sogenannten Reservekraft erklärt, wird in stark erhöhtem Maße unter pathologischen Bedingungen in Anspruch genommen, wo der Herzmuskel oft lange Zeit infolge seiner Hypertrophie ein Vielfaches seiner normalen Arbeit zu leisten vermag.

Bei der pathologischen Herzhypertrophie handelt es sich im Gegensatz zu den im Bereich des Physiologischen liegenden Vorgängen stets um eine Zunahme des Herzmuskels im Mißverhältnis zur Körpermuskulatur. Die die Hypertrophie bewirkenden unmittelbaren Ursachen sind hier innerhalb des Kreislaufs selbst zu suchen, die einerseits vermehrte Widerstände sind, gegen die einzelne Herzabschnitte zu arbeiten haben, wie erhöhter Blutdruck und bestimmte den Durchtritt des Blutes erschwerende Verengerungen der Herzklappen bei Herzklappenfehlern (Stenosen) sowie andererseits dauernde Vermehrung des Schlagvolumens infolge von Schlußunfähigkeit (Insuffizienz) einer Herzklappe, infolge deren dauernd abnorm große Blutmengen in der Systole vom Herzen auszutreiben sind. Die hierbei entstehende Hypertrophie ermöglicht für lange Zeit eine Kompensation der durch die Stromhindernisse bewirkten Störungen.

Hypertrophie des linken Ventrikels beobachtet man bei Aortenklappenfehlern und Mitralinsuffizienz sowie Blutdrucksteigerung (Hypertonie, Nephritis, Schrumpfnieren, gewisse Fälle von Arteriosklerose), Hypertrophie des rechten Ventrikels bei Mitralklappenfehlern, Schrumpfungsprozessen der Lunge, Pleuraschwarten, Emphysem, chronischer Bronchitis, Kyphoskoliose.

Idiopathische Herzhypertrophie nennt man eine solche, für die eine Ursache nicht zu ermitteln ist.

Es ist besonders hervorzuheben, daß reine Hypertrophie des Herzens ohne gleichzeitige Dilatation sich nicht durch die Perkussion feststellen läßt, da die Dickenzunahme der Ventrikelwand zu geringfügig ist, um eine Vergrößerung der Dämpfungsfurche zu bewirken. Nachweis der Hypertrophie vgl. S. 132<sup>1)</sup>. In praxi ist aber meist gleichzeitig eine Dilatation vorhanden.

<sup>1)</sup> Accentuation des 2. Aorten- bzw. Pulmonaltons ist nur mit Vorsicht im Sinne einer Hypertrophie des linken bzw. rechten Ventrikels zu verwerthen.

**Das kleine Herz.** Kleinheit der Herzdämpfungsfigur gestattet niemals einen Schluß auf die tatsächliche Größe des Herzens. Dagegen ergibt in einzelnen Fällen die Röntgenuntersuchung ein auffallend schmales, steil gestelltes Herz, das an dem oft besonders langen Gefäßband wie ein Tropfen hängt, sog. Tropfenherz. Häufig sind es asthenische Individuen mit langem flachen Thorax und körperlich wie geistig zurückgebliebener Entwicklung. Mitunter besteht zugleich allgemeine Enteroptose (Stillerscher Habitus). Doch kann auch abnormer Tiefstand des Zwerchfells ein Tropfenherz vortäuschen. In der funktionellen Bewertung des kleinen Herzens sei man zurückhaltend. Allein entscheidend für die Diagnose eines hypoplastischen Herzens ist die verminderte Leistungsfähigkeit gegenüber körperlicher Arbeit.

**Herzdilatation:** Erweiterung einer Herzhöhle kommt unter zwei verschiedenen Bedingungen zustande. Einmal entwickelt sie sich regelmäßig, wenn die Blutmenge in der Diastole zunimmt, wenn also z. B. infolge eines Klappenfehlers wie bei der Aorteninsuffizienz abnorm große Blutvolumina während der Diastole in die Kammer einströmen. An diese als akkommodative oder tonogene bezeichnete Dilatation schließt sich alsbald eine Hypertrophie des entsprechenden Herzmuskelabschnittes als Folge des vermehrten Schlagvolumens an. Beides zusammen ermöglicht für lange Zeit eine ungestörte Bewältigung erhöhter Anforderungen des Herzens und ist die Erklärung für die „Kompensation“ der vorhandenen Kreislaufhindernisse.

Eine andere Art von Dilatation ist die sogenannte Erschlaffungsdilatation, auch myogene Dilatation genannt. Diese entwickelt sich dann, wenn der Herzmuskel selbst erkrankt bzw. schwer geschädigt ist, so z. B. bei der Diphtherie, bei schweren Anämien, bei Vergiftungen, ohne daß hier eine Hypertrophie vorausgegangen ist. Häufiger beobachtet man diese Art von Dilatation in der Form der sogenannten Stauungsdilatation bei Herzen, die aus einem der früher genannten Gründe vorher hypertrophisch geworden waren und nach einiger Zeit erlahmen, so daß die systolische Entleerung eine unvollkommene wird. Das infolgedessen während jeder Systole in dem betreffenden Herzabschnitt zurückbleibende Restblut führt alsdann zu einer Dehnung des Herzmuskels, womit das Versagen des Herzens gegenüber seinen Anforderungen zum Ausdruck kommt. Dieser Zustand kann vorübergehend sein, wenn er einer Rückbildung fähig ist, z. B. nach akuter Überanstrengung (Sport!), oder er ist dauernd und zeigt dann einen progredienten Charakter. Bei Herzklappenfehlern ist er die Erklärung für ihre „Dekompensation“.

Die Herzgröße ist also abhängig sowohl vom Füllungszustand des Herzens als auch vom Zustande seiner Muskulatur.

Genauere Untersuchungen (Röntgen) haben ferner gelehrt, daß starke körperliche Arbeit infolge Beschleunigung der Herztätigkeit und erhöhten Zuströmens von Blut zu den Skelettmuskeln bzw. Sinkens des Vasomotorentonus vorübergehend durch Abnahme der Füllung des Herzens eine Verkleinerung desselben bewirken kann. Sodann wurde auch ein wesentlicher Einfluß der Blutmenge auf die Größe des Herzens festgestellt, woraus sich erklärt, daß Verringerung der Blutmenge (z. B. Blutverlust) c. p. zu einer Verkleinerung des Herzens führt.

**Das Syndrom der Herzschwäche (Herzinsuffizienz)** liegt vor, wenn subjektive und objektive Zeichen eines Versagens des Herzens gegenüber den normalen Anforderungen bestehen. Infolge des engen funktionellen

Zusammenhangs zwischen Herz und Gefäßsystem werden indessen Störungen im Bereich des Zirkulationsapparates oft auch dann sich geltend machen, wenn primär nicht das Herz selbst, sondern andere Teile des Kreislaufs insuffizient werden — das gilt namentlich für akute Störungen —, und umgekehrt bleibt bei Störungen des Herzmotors eine Rückwirkung auf das Gefäßsystem nicht aus. Praktisch-klinisch empfiehlt es sich daher, das Krankheitsbild der Herzinsuffizienz unter dem allgemeineren Gesichtspunkt der „**Kreislaufinsuffizienz**“ zu betrachten, was sowohl diagnostisch wie für die Therapie von Vorteil ist.

In der großen Mehrzahl der Fälle, vor allem denen mit chronischem Verlauf handelt es sich allerdings um primär im Herzen lokalisierte krankhafte Vorgänge. Die hauptsächlichsten Ursachen sind: Erkrankung des Herzmuskels (Myokarditis, Arteriosklerose, Lues), dekompensierte Klappenfehler, chronische Blutdruckerhöhung (Hypertonie, Nephritis), perikardiale Verwachsungen, chronische Überanstrengung usw.

Wenn auch schwerere Insuffizienzerscheinungen am Zirkulationsapparat oft mit anatomisch nachweisbaren Veränderungen einhergehen, so sind letztere keineswegs eine unerläßliche Bedingung für das Zustandekommen der ersteren, da Störungen der Funktion eines Organs nicht notwendigerweise mit morphologisch greifbaren Alterationen desselben einherzugehen brauchen.

Man hat daher bei der Prüfung der Frage nach dem Vorhandensein einer Insuffizienz des Kreislaufs das Hauptgewicht auf das Verhalten seiner Funktion zu legen<sup>1)</sup>. Funktionsstörungen des Kreislaufs äußern sich teils durch subjektive Beschwerden, teils durch objektiv nachweisbare Veränderungen. Zu den subjektiven Beschwerden gehören peinliche Empfindungen in der Herzgegend wie Druckgefühl, Schmerzen, Herzklopfen sowie Atemnot und gesteigerte Ermüdbarkeit. Doch kommen diese Zeichen in gleicher Weise auch bei rein nervösen Zuständen vor. Zum Unterschiede von letzteren zeigen sie aber eine Verstärkung durch körperliche Anstrengung, auch schwinden sie nicht bei Ablenkung der Aufmerksamkeit. Man unterscheidet eine relative und eine absolute Insuffizienz. Erstere, die sich im Initialstadium zeigt, kommt nur bei erhöhter Inanspruchnahme des Kreislaufs zur Geltung, letztere als höherer Grad auch schon bei völliger Ruhe.

Objektiv äußert sich die Zirkulationsschwäche in ihren ersten Anfängen oft zunächst durch Störungen in der Funktion anderer Organe, die für Zirkulationsstörungen besonders empfindlich sind. Hierher gehören in erster Linie die Lungen, sodann die Nieren, ferner die Leber. Eines der ersten auch objektiv wahrnehmbaren Symptome ist Atemnot nach stärkeren Anstrengungen, z. B. Treppensteigen, seelischen Erregungen, nach dem Essen usw.; bisweilen ist dabei die Dyspnoe dem Pat. subjektiv nicht bewußt. Verminderung der Harnmenge, namentlich wenn dieselbe zugleich mit sogenannter Nykturie auftritt, d. h., wenn der Pat. tagsüber nur wenig Harn läßt, dagegen nachts, wo das Herz sich ausruht, gezwungen ist, größere Harnmengen zu lassen, ist ein wichtiges Frühsymptom. Verräterisch ferner ist bläuliche Färbung (Cyanose) der Lippen, Wangen, Fingernägel usw. Auch sie ist zunächst nur nach körperlicher Anstrengung zu konstatieren.

<sup>1)</sup> Vgl. auch den Abschnitt über Funktionsprüfung S. 156.

Nimmt die Herzmuskelschwäche zu, so setzt die Dyspnoe bereits bei der gewohnten leichten Tätigkeit ein und verläßt schließlich den Pat. auch bei vollständiger Ruhe nicht mehr; bei extremen Graden muß der Kranke aufrecht im Bett sitzen, da in liegender Stellung ein unerträglicher Lufthunger eintritt (Orthopnoe). Stauungskatarrh in den Lungen erzeugt eine hartnäckige Bronchitis, die häufig, namentlich bei Herzklappenfehlern die diagnostisch wichtigen Herzfehlerzellen im Sputum aufweist (vgl. Stauungslunge); oft treten asthmaartige Attacken von Atemnot auf (Asthma cardiale), die bisweilen nachts den Pat. plötzlich im Schlafe überfallen. Plötzlich eintretende Herzschwäche erzeugt Lungenödem (vgl. S. 239). Stauungserscheinungen machen sich frühzeitig auch an der Leber bemerkbar, die sowohl an Volumen wie an Konsistenz zunimmt und infolge der Anspannung ihrer Kapsel Druckgefühl in der Magengrube und im rechten Hypochondrium, bei akuten Fällen sogar heftige Schmerzen verursacht (Stauungsleber); die Urobilinogenreaktion im Harn wird frühzeitig positiv, das Urobilin ist vermehrt. Oft zeigen die Skleren eine Spur Gelbfärbung, desgleichen mitunter die Haut. Auch das Auftreten von Ödemen infolge von Behinderung des venösen Blutabflusses bildet ein Frühsymptom. Kardiale Ödeme treten stets zunächst an den abhängigen Körperteilen auf, bei herumgehenden Patienten an den Knöcheln, bei Bettlägerigen in der Kreuzgegend. Bei höheren Graden der Herzschwäche entwickeln sich allgemeines Anasarka sowie Höhlenhydrops (Ascites, Hydrothorax, Hydroperikard). Oft ist schon frühzeitig zunächst rechts ein Pleuraerguß zu finden. Der Urin zeigt die Merkmale des Stauungsharns, nimmt stark an Menge ab, ist hochgestellt und enthält mäßige Eiweißmengen (Stauungsniere). Der Schlaf ist oft gestört. Mitunter treten kleinere oder größere Stauungsblutungen an verschiedenen Organen auf (Konjunktivalblutungen, Nasenbluten, Uterusblutungen).

Erhöhung des Blutdrucks wird bei unkomplizierter Herzinsuffizienz nicht beobachtet, wohl aber in besonderen Fällen, wo Stauung mit einem Nierenleiden kombiniert ist. Diese sog. Hochdruckstauung geht mit Besserung der Herzinsuffizienz zurück.

Die Untersuchung des Herzens selbst kann in den ersten Stadien der Herzinsuffizienz einen völlig negativen Befund ergeben. In andern Fällen bestehen von früherher Veränderungen wie Klappenfehler mit Geräuschen, Dilatation, Arrhythmien. Doch bilden diese Symptome an sich noch keinen Beweis für eine Herzinsuffizienz. Sichere Zeichen sind dagegen eine in kurzer Zeit sich entwickelnde Dilatation<sup>1)</sup>, Leiserwerden der Herztöne, Galopprrhythmus (vgl. S. 155) und kleiner, weicher und frequenter Puls. Derartige unter den Augen des Arztes sich vollziehende Veränderungen treten indessen in der Regel nur bei der akut sich entwickelnden Herzschwäche auf, dagegen fehlen sie häufig in den ersten Stadien der schleichend sich entwickelnden chronischen Insuffizienz.

<sup>1)</sup> Nicht zu verwechseln mit einfacher Querlagerung des Herzens infolge des bei diesen Zuständen häufigen Zwerchfellhochstandes, wodurch eine Dilatation vorgetäuscht wird.

Veränderungen am Elektrokardiogramm, die auf eine schwerere Herzmuskelschädigung schließen lassen, sind das Fehlen und vor allem das Negativwerden der Finalzacke T; doch kann mitunter dies Symptom auch vermißt werden.

Bei beginnender Herzmuskelschwäche überwiegt nicht selten anfänglich die Insuffizienz der einen der beiden Kammern, und es kann einige Zeit vergehen, bis auch die andere Kammer stärker insuffizient wird, da zunächst die zwischen beiden Kammern liegenden Stromgebiete als Sammelbecken wirken und die Wirkung auf die andere Kammer dadurch abschwächen. Daraus ergeben sich gewisse charakteristische Unterschiede im klinischen Bilde. Versagen der rechten Kammer ist durch frühzeitige Stauung in den Körpervenen und Cyanose ausgezeichnet, während stärkere Dyspnoe sich nur bei Vorhandensein bestimmter Hindernisse im Lungenkreislauf (Schrumpfungsprozesse, Emphysem, Kyphoskoliose usw.) frühzeitig bemerkbar macht. Insuffizienz des linken Herzens bewirkt verminderte Füllung der Körperarterien, Verschlechterung des Pulses und vor allem Lungenstauung mit frühzeitiger starker Dyspnoe, während die Stauung der Körperven fehlt. Starke Dyspnoe verbunden mit Stauung der Körperven und Verschlechterung des Pulses spricht für Schwäche des gesamten Herzens.

Abgesehen von diesen von dem Entstehungsmodus der Insuffizienz abhängigen Unterschieden bedingen aber auch das Tempo, mit der sich die Herzinsuffizienz entwickelt, sowie die Lebensweise der Kranken gewisse Verschiedenheiten in den einzelnen Zügen des Krankheitsbildes. Bei akuter Entwicklung der Herzschwäche steht die Dyspnoe und das kardiale Asthma im Vordergrund, desgleichen klagen diejenigen Patienten frühzeitig über Atembeschwerden, die sich körperlich stark betätigen, während bei Individuen, die sich schonen, eine langsam sich entwickelnde Herzinsuffizienz sich oft zuerst ausschließlich durch Zeichen abdominaler Stauung, Leberschwellung und Verdauungsbeschwerden verrät.

**Die Kreislaufinsuffizienz durch Vasomotorenchwäche** pflegt hauptsächlich akut aufzutreten. In harmloser Art zeigt sie sich bei der Ohnmacht. In lebensbedrohender Form stellt sie sich am häufigsten im Verlauf akuter Infektionskrankheiten ein (speziell bei Typhus, Pneumonie, Grippe, Fleckfieber), bei denen die Bakterientoxine das Vasomotorenzentrum der Oblongata lähmen, sowie bei Wundchock (2. Stadium).

Infolge des Nachlassens des Gefäßtonus sammelt sich das Blut hauptsächlich im Gebiet des Splanchnicus, während die Haut und die Muskeln blutleer werden und zum Herzen nur geringe Blutmengen zufließen. Der Effekt für die Zirkulation ist demnach der gleiche wie der einer profusen Blutung nach außen. Die Folge ist eine starke Blutdrucksenkung, eine Verminderung der Stömungsgeschwindigkeit des Blutes und bei ungünstigem Ausgang alsbald ein Aufhören der Zirkulation. Die hier als Todesursache eintretende „Herzschwäche“ hat demnach einen rein sekundären Charakter.

Charakteristisch ist abgesehen von den ursächlichen Faktoren und dem akuten Eintreten die Blässe der Haut, der frequente, fadenförmige Puls, starke Leberschwellung sowie hochgradiges Schwächegefühl, während Cyanose, Dyspnoe und Ödeme fehlen. Bei reiner Vasomotorenchwäche ist also das Bild ein wesentlich anderes als bei der primärkardialen Insuffizienz. Praktisch besteht allerdings, speziell bei der Kreislaufschwäche bei akuten Infektionskrankheiten oft beides nebeneinander. Diesem Umstande hat man für die Therapie Rechnung zu tragen. Dem reinen Bilde der Gefäßlähmung begegnet man bei manchen Vergiftungen (Chloroform, Chloralhydrat). Medikamente, die den Vasomotorentonus wirksam heben, sind vor allem Koffein, Kampfer sowie die Nebennieren- und Hypophysenpräparate.

## Störungen des Rhythmus und der Frequenz der Herzaktion.

Unter den Störungen der rhythmischen Tätigkeit des Herzens, den Arrhythmien, lassen sich eine Reihe verschiedener Typen unterscheiden, die klinisch eine sehr verschiedene Wertigkeit besitzen.

Die Analyse der Arrhythmien ist nur in beschränktem Maße durch die bloße Auskultation des Herzens und die Inspektion bzw. Palpation der Gefäße möglich, während für alle genaueren Untersuchungen die graphische Registrierung des Spitzenstoßes und des Venenpulses bzw. die Elektrokardiographie herangezogen werden muß.

**Die respiratorische Arrhythmie** (*Pulsus irregularis respiratorius*) besteht in einer Beschleunigung der Pulsfrequenz während der Einatmung und Verlangsamung während der Ausatmung; sie beruht auf unregelmäßiger Reizbildung im Sinusknoten (*Sinusarrhythmie*). Man beobachtet sie hauptsächlich bei jugendlichen Individuen namentlich bei Ablenkung der Aufmerksamkeit. Sie hat keine pathologische Bedeutung.

**Die extrasystolische Arrhythmie**, die häufigste Form der Arrhythmien, entsteht, wenn außer den physiologischen regelmäßigen Reizen im Herzmuskel Extrareize auftreten, die die Einschaltung von Contractionen in den normalen Rhythmus bewirken.

Je nach dem Entstehungsort des Extrareizes unterscheidet man verschiedene Arten von Extrasystolen. Ursache für die Entstehung der Extrareize ist teils eine pathologische Reizbarkeit des Herzmuskels, teils die Bildung von Reizen an abnormen Stellen (vgl. S. 127). Die Unterscheidung der verschiedenen Extrasystolien ist nur durch graphische Methoden und durch die Elektrokardiographie möglich.

Die häufig vorkommende **Kammerextrasystolie** ist fast stets durch das Vorhandensein der sogenannten kompensatorischen Pause ausgezeichnet. Man versteht darunter das abnorm lange Intervall zwischen der pathologisch vorzeitigen Extrasystole und der nächsten regulären Contraction; dieses erklärt sich daraus, daß der auf die Extrasystole unmittelbar folgende normale Reiz auf einen durch die erstere vorübergehend unerregbar gewordenen Herzmuskel („refraktäre Phase“ vgl. S. 126) trifft, so daß erst der nächstfolgende reguläre Reiz eine normale Contraction auszulösen vermag. Bei Vorhandensein der kompensatorischen Pause ist das Zeitintervall zwischen der der Extrasystole vorausgehenden und der ihr folgenden normalen Contraction genau so groß wie auch sonst zwischen zwei normalen Contractionen. Infolge der Entstehung in der Kammer fehlt bei den ventrikulären Extrasystolen eine diesen entsprechende Vorhofscontraction im Venenpuls bzw. Elektrokardiogramm. Fällt eine ventrikuläre Extrasystole mit einer Vorhofscontraction zeitlich zusammen, so entsteht dadurch eine abnorm hohe Vorhofswelle (sogenannte Vorhofspfröpfung). Ein typisches Beispiel der ventrikulären Extrasystolie ist der sogenannte *Bigeminus*, bei dem jedesmal auf eine normale Contraction eine Extrasystole folgt. Ist die der Extrasystole entsprechende Contraction sehr gering, so kommt es zu keinem peripherischen Gefäßpuls (sogenannte *frustrane Contraction*). Bei Häufung derartiger Extrasystolen wird dann durch den Puls eine Bradykardie vorgetäuscht, während die wirkliche Herzfrequenz sich nur durch Auskultation des Herzens bzw. Palpation des Spitzenstoßes feststellen läßt. Subjektiv werden ventrikuläre Extrasystolen oft als ein unangenehmes Gefühl von Stolpern in der Herzgegend empfunden.

Die Entstehung von Extrasystolen in den Vorhöfen erkennt man an den im Venenpuls und im Elektrokardiogramm vorhandenen, den Extrasystolen entsprechenden Vorhofsacken. Ferner ist im Gegensatz zu den ventrikulären bei den Vorhofsextrasystolen die auf dieselbe folgende Pause keine kompensatorische.

Extrasystolen kommen sowohl bei organischen Herzerkrankungen wie bei nervösen Individuen vor, so daß ihr Vorhandensein keineswegs zur Annahme einer Herzmuskelerkrankung berechtigt. Vorübergehend werden sie z. B. nach Tabaksabusus oder bei gastrointestinalen Störungen u. a. beobachtet, ferner bei

raschem Ansteigen des Blutdrucks. Subjektive Beschwerden finden sich hauptsächlich bei nervöser Extrasystolie. Schwinden Extrasystolen unter Digitalis, so spricht das für ihren organischen Charakter.

Die *Arhythmia perpetua* (Pulsus irregular. perpet.) ist durch eine Rhythmusstörung gekennzeichnet, bei der das Herz völlig regellos schlägt („Delirium cordis“). Sie besteht in einer Störung der Tätigkeit der Vorhöfe, die an Stelle normaler Contractionen äußerst zahlreiche feine Flimmerbewegungen ausführen, durch die die Blutbewegung keine Förderung erfährt, so daß der Zustand in seiner Wirkung einer Vorhofslähmung gleichkommt<sup>1)</sup>.

Im Elektrokardiogramm fehlt die P-Zacke, an deren Stelle die Kurve in eine Reihe feiner Zacken aufgesplittert ist. Der Ventrikel, dem vom Vorhof aus völlig unregelmäßig Reize zufließen, zeigt dementsprechend eine vollständig regellose Tätigkeit. Statt des Vorhofflimmerns kommt bisweilen auch sogenanntes Vorhofsfaltern vor, bei dem die Frequenz der Vorhofsbewegungen geringer als bei ersterem ist. Der rechte Vorhof ist bei Arhythm. perpet. meist stark gestaut. Oft beobachtet man positiven ventrikulären Venenpuls. Die Arhythm. perpet. findet sich bei schweren organischen Herzaffectationen, ohne aber im einzelnen einen Schluß auf die Art der Störung zu ermöglichen. Am häufigsten wird sie bei dekompensierten Mitralfehlern beobachtet und ist hier dann meist dauernd vorhanden. Jedoch kann sie auch vorübergehend auftreten. Man unterscheidet eine langsame und eine schnelle Form der Arhythm. perpet. Bemerkenswert ist schließlich, daß in manchen Fällen die funktionelle Leistungsfähigkeit des Herzens durch sie so wenig beeinträchtigt wird, daß die Patienten sogar längere Zeit schwere körperliche Arbeit zu leisten vermögen.

Die sogenannten **Überleitungsstörungen** des Herzens beruhen auf Erschwerung bzw. Aufhebung der Erregungsleitung zwischen Vorhof und Kammer, haben also ihren Sitz im Hisschen Bündel.

Sie lassen sich nur durch graphische Registrierung und das Elektrokardiogramm feststellen und sind im Venenpuls durch eine Verlängerung des a—c-Intervalles bzw. des Abstandes zwischen P und R im Elektrokardiogramm gekennzeichnet. Durch Zunahme des Intervalles zwischen Vorhofs- und Kammercontractionen kommt es schließlich zum Ausfall einer Ventrikelcontraction, so daß erst die nächste Vorhoffssystole von einer Kammerystole gefolgt wird, d. h. die Zahl der Vorhofscontractionen ist größer als die der Kammercontractionen, und zwar ist oft das Frequenzverhältnis 2 : 1. Findet eine vollständige Unterbrechung der Erregungsleitung statt, z. B. durch einen luetisch-gummösen oder myokarditischen Herd im Hisschen Bündel, so daß überhaupt kein Erregungsimpuls des Vorhofs die Kammer erreicht, so schlägt diese im Tempo ihrer eigenen Zentren, deren Frequenz etwa 30 oder noch weniger beträgt. Diese sogenannte Ventrikelautomatie wird auch als totaler Herzblock bezeichnet. Bei vollständiger Dissoziation ist die Bradykardie sehr ausgeprägt und es kann infolge von Gehirnanämie vorübergehend zu Schwindel- und Ohnmachtsanfällen sowie epileptiformen Krämpfen kommen (Adams-Stokesche Krankheit). Leichtere Grade von Überleitungsstörungen beobachtet man bisweilen bei akuten Infektionskrankheiten sowie mitunter unter Digitaliswirkung.

Der nodale Rhythmus ist dadurch ausgezeichnet, daß die Contractionen der Vorhöfe und Kammern nahezu gleichzeitig erfolgen, da hier an Stelle der normalen Reizbildung im Sinus dieselbe vom Atrioventrikularknoten ausgeht, von welchem Impulse gleichzeitig dem Vorhof und dem Ventrikel zugeführt werden. Auch hier besteht wie bei der Trikuspidalinsuffizienz ein positiver Venenpuls. Eine sichere Erkennung des nodalen Rhythmus ist nur durch das Elektrokardiogramm möglich. Infolge der gleichzeitigen Contraction von Vorhof und Kammer kommt es hierbei zu schweren Zirkulationsstörungen.

<sup>1)</sup> Herzkammerflimmern, falls nicht von ganz kurzer Dauer, ist stets tödlich; es wird für den sog. Sekundenherztod verantwortlich gemacht.

Bei dem Pulsus alternans folgt regelmäßig auf eine kräftige eine schwächere Ventrikelcontraction, und zwar in annähernd gleichem Intervall zum Unterschiede vor dem häufigeren Pseudoalternans, der auf Extrasystolen beruht (Bigeminie s. oben) und sich von ersterer dadurch unterscheidet, daß der kleinere Puls verfrüht erscheint. Pulsus alternans ist auf eine Störung der Contractilität des Herzmuskels zurückzuführen und findet sich bisweilen bei Herzschwäche.

Der sogenannte Galopprrhythmus ist durch das Hinzutreten eines 3. Tones zwischen dem normalen 2. und darauffolgendem 1. Ton charakterisiert. Der prä-systolische Galopprrhythmus, bei dem der 3. Ton unmittelbar dem 1. vorausgeht (über der Herzspitze etwa: tatatám) findet sich besonders bei Mitralstenose und beruht auf Hypertrophie des Vorhofs. Der protodiastolische Galopprrhythmus bei dem der 3. Ton unmittelbar dem 2. folgt (tatáta) wird u. a. bei Myokarditis sowie bei Schrumpfniere beobachtet und ist ein Zeichen von Herzschwäche.

**Anomalien der Frequenz der Herzaktion:** Eine Bradykardie, d. h. ein Puls unter 60<sup>1)</sup> kann physiologisch sein, sie ist aber häufiger als ein pathologisches Phänomen zu deuten. In der Regel ist der Puls gleichzeitig gespannt. Bradykardie kann extrakardial durch Vagus-Reizung oder durch Veränderungen des Herzens selbst verursacht sein.

Zu den physiologischen Bradykardien gehören diejenige im Puerperium, ferner die bei Sportsleuten mitunter beobachtete Pulsverlangsamung, endlich die bisweilen familiär vorkommende von Kindheit an bestehende Bradykardie. Zur Unterscheidung zwischen Vagus- und kardialer Bradykardie kann das Verhalten gegenüber 1 mg Atropin subcutan verwertet werden. Bleibt sie danach weiter bestehen, so ist sie kardial bedingt und eine Vaguswirkung auszuschließen (aber nicht umgekehrt!).

Steigerung des Hirndruckes (Meningitis, Hirntumor) bewirkt Vagusbradykardie; das gleiche gilt von der seltenen dem Adams-Stokesschen Krankheitsbild (Bradykardie, Schwindel- und Krampfanfälle) ähnlichen, aber zentral durch Erkrankung der Oblongata verursachten sogenannten Morgagnischen Form der Adams-Stokesschen Krankheit.

Eine Vagusbradykardie beobachtet man auch öfters bei Patienten mit Vagotonie (Hyperacidität, spastische Obstipation); sie tritt hier mitunter nur zeitweise auf. Langsamer Puls kommt auch nach Erbrechen vor.

Im Herzen selbst begründete Pulsverlangsamung findet man vor allem bei den Überleitungsstörungen, bei denen im Gegensatz zu der Vagusbradykardie an der Verlangsamung nicht das gesamte Herz, sondern nur die Ventrikel beteiligt sind. Verlangsamung auf 40 und weniger läßt in der Regel mit Sicherheit auf Überleitungsstörungen schließen. Näheres s. S. 154. Kardiale Bradykardien finden sich öfters im Verlauf von akuten Infektionskrankheiten, ferner bei Aortenstenose, bei schnell entstehender Blutdrucksteigerung im Verlauf einer akuten Nephritis, bei Coronarsklerose und zwar vor allem derjenigen bei Fettsucht. Auch die Gallensäuren bewirken Bradykardie, wie die Beobachtung bei Ikterus zeigt. Die auf Digitalis erfolgende Bradykardie beruht teils auf Vaguswirkung, teils ist sie kardialen Ursprungs, bei größeren Dosen kann sie durch Überleitungsstörungen hervorgerufen werden.

Tachykardie, d. h. eine starke Beschleunigung der Herz Tätigkeit findet sich physiologisch bei starker körperlicher Arbeit, und zwar in erhöhtem Maße bei Rekonvaleszenten sowie bei debilen Individuen, ferner nach der Nahrungsaufnahme. Unter pathologischen Verhältnissen beobachtet man sie vor allem beim Fieber, wo jedem Grad Temperaturerhöhung eine Pulssteigerung um etwa 8—10 in der Minute entspricht, ferner bei den thyreotoxischen Zuständen, besonders beim Basedow, aber auch bei Herzneurosen, weiter bei Herzschwäche, wo

<sup>1)</sup> Wegen der Möglichkeit frustraner Contractionen ist in diesen Fällen die Schlagzahl stets durch Auskultation am Herzen zu kontrollieren.



das Ansteigen der Pulsfrequenz oft eins der ersten Zeichen des Versagens des Herzmuskels ist, ebenso im Kollaps. Schließlich findet man auch Pulsbeschleunigung bei Prozessen, die den Hirndruck erhöhen, kurz ante exitum nach vorhergehender Bradykardie durch Vagusreizung und terminaler Vaguslähmung (Basilar meningitis).

Die **paroxysmale Tachykardie**, das anfallsweise auftretende Herzjagen ist eine nicht häufige Erscheinung, die man sowohl bei im übrigen intaktem Herzen als auch im Verlauf verschiedener Herzerkrankungen beobachtet. Sie kommt in allen Lebensaltern, bisweilen schon in der Kindheit vor und besteht in Anfällen hochgradiger Tachykardie bis zu 300 Schlägen in der Minute; sie beginnt plötzlich, dauert einige Minuten bis zu mehreren Tagen und hört in der Regel plötzlich, seltener allmählich auf. Im Anfall sind die Patienten blaß, klagen über quälendes Herzklopfen und Oppressionsgefühl, zuweilen besteht auch das Bild der Angina pectoris. Am Herzen hört man die Herztöne in Form der Embryokardie (S. 138), dabei aber regelmäßigen Rhythmus. Im Röntgenbild verkleinert sich bisweilen der Herzschatten infolge der mangelhaften Füllung des Herzens. Der Radialpuls wird fadenförmig und ist oft nicht zählbar. Der Blutdruck ist erniedrigt. Bei längerem Bestehen des Anfalls können sich Insuffizienzerscheinungen entwickeln: Verbreiterung der Herzdämpfung nach rechts, Cyanose und Dyspnoe, Stauungsleber und mäßige Ödeme, was aber nach Aufhören des Anfalls prompt wieder schwindet. Bei Steigerung der Herzfrequenz über 180 fallen die Vorhofssystolen eventuell mit den Ventrikelsystolen zusammen, wodurch es zur Vorhofspfröpfung mit starker Füllung der Halsvenen und starken systolischen Venenpulsen kommt. Häufig ist die Harnmenge während des Anfalls vermindert, nach Aufhören desselben erfolgt reichliche Entleerung von hellem dünnen Harn. Die Dauer der Zwischenräume zwischen den einzelnen Anfällen ist sehr wechselnd und beträgt teils nur wenige Tage, teils Jahre. In der Zwischenzeit besteht ein völlig normales Verhalten.

Die eigentliche Ursache des Herzjagens ist unbekannt. Man beobachtet es bei nervösen Individuen, häufig bei Arteriosklerose, speziell Coronarsklerose, ferner bei Thyreotoxikosen (Basedow), gelegentlich bei Epilepsie sowie Migräne, wo die Herzanfalle ein Äquivalent dieser Erkrankungen bilden. Auslösend wirken bei vorhandener Disposition Magendarmstörungen, körperliche Überanstrengung sowie seelische Erregungen.

Die Therapie steht dem Anfall meist machtlos gegenüber. In manchen Fällen vermag Druck auf den Halsvagus den Anfall zu beenden, während alle übrigen Mittel, Morphinum usw. in der Regel versagen. Sehr wichtig ist in der Zwischenzeit die Behandlung der Nerven (Brom), Vermeiden von Alkohol- und Tabaksabusus, und auch sonst Beobachtung einer geregelten und hygienischen Lebensweise.

### Funktionsdiagnostik.

Während die ausgesprochene Kreislaufinsuffizienz so charakteristische Zeichen darbietet, daß ihre Erkennung und Deutung auf keine Schwierigkeiten stößt, kann die Diagnose der beginnenden Insuffizienz recht schwierig sein. Insbesondere ist oft die Abgrenzung gegenüber rein nervösen Zuständen, die prognostisch und therapeutisch völlig anders zu bewerten sind, nicht leicht. Hier entscheidet das Resultat der Funktionsprüfung.

Die Leistungsfähigkeit des Herzens und des gesamten Kreislaufs ist individuell sehr verschieden und hängt normalerweise von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Bestimmend ist u. a. die Gesamtkonstitution des Individuums, sein Lebensalter, seine Lebensgewohnheiten und sein Beruf. Übung in körperlicher Arbeit steigert die Leistungsfähigkeit des Herzens. Ermüdung, schlechte Ernährung, seelische Erregung,

Mangel an Schlaf, die Rekonvaleszenz von schweren Krankheiten, beim Weibe die Menstruation u. a. können vorübergehend die Funktionsfähigkeit des Zirkulationsapparates herabsetzen, ohne daß man daraus auf ein pathologisches Verhalten schließen darf. Krankhafte Herabsetzung der Leistungsfähigkeit wird man erst annehmen dürfen, wenn Insuffizienzerscheinungen auch nach Ausschaltung der genannten vorübergehenden Faktoren bestehen bleiben und namentlich, wenn sie gegenüber Aufgaben zutage treten, denen das Individuum bisher gewachsen war.

Von den die Herzarbeit (vergl. S. 128) bestimmenden Faktoren ist die Ermittlung des wichtigsten Faktors, des Schlagvolumens, zu kompliziert und in seinen Resultaten zur Zeit nicht eindeutig genug, um am Krankenbett Verwendung zu finden. Der Widerstand, gegen den das Herz arbeitet, läßt sich dagegen leicht durch Messung des arteriellen Blutdrucks bestimmen, desgleichen die Frequenz des Herzens durch Zählen des Pulses.

Zur Ausführung der Funktionsprüfung läßt man den Patienten ein dosiertes Maß von körperlicher Arbeit leisten, die innerhalb der Anforderungen des täglichen Lebens liegt, z. B. Treppensteigen oder das Ausführen von 10 Kniebeugen innerhalb von 20 Sekunden, und bestimmt die Pulsfrequenz und den Blutdruck vorher und unmittelbar hinterher. Bei Gesunden geht der Puls nach vorübergehender Zunahme um höchstens 36 Schläge in der Minute, spätestens  $1\frac{1}{2}$  Minuten nachher wieder zur Norm zurück. Eine wichtige Fehlerquelle bildet jedoch hierbei psychische Erregung, die ebenfalls zu erheblicher Pulsbeschleunigung führen kann. Der Blutdruck steigt normal bei körperlicher Arbeit; Sinken desselben ist ein Zeichen für Insuffizienz des Kreislaufs. Doch kann dies Phänomen ausbleiben, wenn nur eine geringe Herzinsuffizienz besteht, da die Blutdrucksenkung erst bei erheblicheren Graden von Kreislaufschwäche einzutreten pflegt. Auch spielen bei dieser Reaktion daneben andere extrakardiale, im Verhalten des Gefäßsystems beruhende Faktoren eine Rolle.

Der Wert der plethysmographischen Methode, die auf der Tatsache der normalerweise auf Körperarbeit erfolgenden Zunahme des Volumens des Armes beruht, die unter pathologischen Verhältnissen sich abweichend verhält, ist für die Funktionsprüfung praktisch noch nicht genügend erprobt.

An Veränderungen am Herzen selbst sind hier, abgesehen von den groben Symptomen, die früher erwähnt wurden und die bei schwererer Insuffizienz beobachtet werden, zu nennen: 1. der Ausfall des Vagusdruckversuches: die durch Fingerdruck auf den Halsvagus bewirkte starke Pulsverlangsamung macht eine Schädigung der Herzfunktion wahrscheinlich, wenn der Effekt bereits bei geringem Druck erfolgt. Ausbleiben der Reaktion schließt letztere indessen nicht aus. 2. Vergleicht man auskultatorisch die Intensität des 2. Aortentons mit der des 2. Pulmonaltons in der Ruhe und findet nach Arbeit (z. B. Kniebeugen) eine Abnahme der Stärke von  $A_2$  bzw. eine Zunahme von  $P_2$ , so deutet dies auf eine Insuffizienz des linken Ventrikels.

Die zuverlässigste und einfachste von allen Proben ist jedoch die Kontrolle des Verhaltens der Atmung nach körperlicher Arbeit. Stärkere Beschleunigung der Atmung nach geringer körperlicher Tätigkeit wie Kniebeugen oder langsamem Treppensteigen ist ein sicherer Beweis für eine gestörte Kreislauffunktion, zumal diese Methode psychischen Einflüssen nicht wesentlich unterworfen ist.

Am besten verfährt man folgendermaßen: Man läßt den Patienten vor der Arbeit und unmittelbar nachher hintereinander laut zählen, indem er etwa jede Sekunde eine Zahl ausspricht, ohne von neuem Atem zu holen, und stellt die Zahl fest, bis zu der er in einem Atemzug zu zählen vermag. In der Ruhe und bei suffizientem Kreislauf ergibt sich so die Zahl von mindestens 10, während bei krankem Zirkulationsapparat sich eine erhebliche Verminderung nach Arbeit feststellen läßt. Weiter kann man auch die Zeit, während der die Atembeschleunigung nach der Arbeit anhält, zur ungefähren Schätzung des Grades der Insuffizienz verwerten.

Schließlich hat man sich bezüglich des Wertes der Funktionsprüfung der Zirkulationsapparate stets zu vergegenwärtigen, daß es im allgemeinen wesentlich leichter ist, zu konstatieren, daß ein Herz krank ist, als die Frage zu beantworten, ob dasselbe vollkommen gesund ist.

## Krankheiten des Herzmuskels.

Erkrankungen des Myokards sind anatomisch teils entzündlicher, teils degenerativer Art. In zahlreichen Fällen ist die Myokardaffektion nur Begleiterscheinung einer gleichzeitig bestehenden Endo- oder Perikarditis. Da die klinischen Erscheinungen der letzteren einen wesentlich ausgesprocheneren Charakter haben und ihre Symptome das Krankheitsbild oft beherrschen, so wird die gleichzeitig bestehende Herzmuskelerkrankung nicht selten erst auf dem Sektionstisch festgestellt.

### Die akute Myokarditis

tritt teils im Gefolge von Entzündungen des Endo- bzw. Perikards auf, wobei oft alle drei Affektionen gleichzeitig vorhanden sind — sog. Pankarditis —, teils bildet sie eine selbständige Affektion.

Anatomisch besteht teils eine diffuse, teils herdförmige zellige Infiltration des interstitiellen Gewebes des Herzmuskels, zu der in wechselndem Maße degenerative Veränderungen der Muskelfasern (Verfettungen, wachartige und vakuoläre Degeneration usw.) hinzukommen. Letztere können zu erheblichem Muskelfaserschwund führen. Nach Ausheilung bleiben die aus derbem Bindegewebe bestehenden Myokardschwien zurück. Beide Komponenten, die interstitielle Entzündung und die degenerativen Muskelveränderungen zeigen bei den verschiedenen Krankheitsfällen eine ziemlich weitgehende Unabhängigkeit voneinander, indem einmal die eine, das andere Mal die andere Form der Schädigung überwiegt.

Krankheitsbild: Die anatomischen Veränderungen erklären eine Reihe von klinischen Funktionsstörungen, die die Diagnose am Krankenbett ermöglichen: Herabsetzung der Kraft des Herzmuskels, Schädigung des Herzmuskeltonus mit konsekutiver Dilatation, Schädigung der rhythmischen Tätigkeit sowie bei Lokalisation des Prozesses im Hischen Bündel Beeinträchtigung der Reizleitung.

Die akute Myokarditis tritt in der Regel nicht selbständig, sondern im Gefolge von akuten Infektionskrankheiten unter der Einwirkung von Bakterientoxinen auf. Besonders charakteristisch und durch schwerste anatomische Veränderungen ausgezeichnet ist die Myokarditis bei Diphtherie.

Die klinischen Symptome sind teils subjektiver, teils objektiver Art.

Die subjektiven Symptome, die aber nur in einem Teil der Fälle vorhanden sind und anfangs vollkommen fehlen können, sind zunehmende Mattigkeit

und Apathie, in anderen Fällen ängstliche Erregtheit, weiter Übelkeit, bisweilen heftiges Erbrechen. Unmittelbar auf die Herzerkrankung hinweisende Zeichen sind mitunter Oppressionsgefühl, d. h. Druck auf der Brust sowie gelegentlich Zeichen von Angina pectoris (vgl. S. 162). Bei sehr schnell sich entwickelnder Stauung in der Leber kann ein dortselbst lokalisierter heftiger Schmerz durch Anspannung der Leberkapsel eintreten.

Objektiv findet man regelmäßig eine auffallend blasse Gesichtsfarbe, oft Unruhe und vor allem frühzeitig Veränderungen am Pulse, der weich, klein und frequent wird. Jede Bewegung steigert seine Frequenz, oft ist er außerdem unregelmäßig, teils inäqual, teils bestehen Extrasystolen, Arrhythmia perpetua sowie gelegentlich Überleitungsstörungen mit erheblicher Bradykardie, die aber auch ohne Bündelläsion vorkommt. Herzdilatation ist meist erst im weiteren Verlauf nachweisbar; sie kann sehr erhebliche Grade erreichen und sowohl das rechte wie das linke Herz (dieses häufiger) betreffen; doch kann sie auch fehlen. Die Herztöne sind oft leise und dumpf, nicht selten ist ein systolisches Geräusch über der Spitze oder nahe der Herzbasis zu hören, ohne daß eine Endokarditis zu bestehen braucht.

Die übrigen Symptome erklären sich als Folgeerscheinungen der Herzschwäche, so die erwähnte perkutorisch nachweisbare Stauung der Leber, die damit zusammenhängende oft positive Urobilin- bzw. Urobilinogenreaktion des Harns, die Abnahme der Harnmenge im Verein mit Albuminurie und Ansteigen des spezifischen Gewichts (Stauungsharn).

In der Regel besteht neben der Myokarditis als weitere Wirkung der Bakteriengifte eine Lähmung der Vasomotoren, speziell im Gebiet der Splanchnici, mit Ansammlung größerer Blutmengen in den Bauchorganen (vgl. S. 152). Daraus wird zugleich das Fehlen der Cyanose, der Dyspnoe sowie peripherischer Ödeme bei diesen Fällen verständlich. Der Blutdruck ist auffallend niedrig. Differentialdiagnostisch ist es nicht immer möglich, die einzelnen Symptome nach ihrer Zugehörigkeit zum Herzen bzw. zu den großen Gefäßen scharf zu trennen. Plötzliche Kollapszustände im Verlaufe der Krankheit sind hauptsächlich auf Rechnung der Vasomotorenschwäche zu setzen.

Der Verlauf der akuten Myokarditis ist in den einzelnen Fällen verschieden, wobei die Art der Grundkrankheit von großer Bedeutung ist. Ihre Dauer kann sich auf eine Reihe von Wochen erstrecken; schließlich kommt es zu völliger Heilung, in anderen Fällen erfolgt der Tod schon nach wenigen Tagen oder nach längerer Erkrankung. Besonders ungünstig ist die Myokarditis bei Diphtherie (2.—3. Woche), da sie in etwa  $\frac{1}{3}$  der Fälle letal verläuft. In manchen Fällen beobachtet man einen Übergang in chronische Myokarditis. Als Residuum der überstandenen Krankheit bestehen dann mäßige Dilatation, leichte subjektive Beschwerden nach Anstrengungen usw.

Therapie: In erster Linie strenge Bettruhe, solange Herzstörungen bestehen; bei schweren Fällen ist zunächst nicht einmal das Aufsetzen erlaubt. Eisblase auf die Herzgegend, Sedativa bei Erregungszuständen (Brom, Baldrian). Kardiotonika, speziell Digitalis haben bei den schweren Fällen keinen Erfolg. Sehr wichtig ist die Hebung des Vasomotorentonus durch Coffein (10%ige Lösung von Coff. natr.-salicyl. 1—2stündl. 1 ccm subcutan bzw. 10,0 : 150,0 eßlöffelweise per os) sowie Campher und Strychnin; eventuell Alkohol (Portwein, Champagner). In der Rekonvaleszenz Kohlensäurebäder sowie vorsichtig dosierte Gymnastik.

Eine Prophylaxe gegenüber der akuten Myokarditis ist nicht möglich.

## Chronische Myokarditis.

Die chronische Myokarditis ist entweder die Fortsetzung einer akuten Myokarditis oder sie verläuft von vornherein als chronisches schleichendes Leiden. Als Ursache kommt auch hier nicht selten eine vorausgegangene Infektionskrankheit in Frage, u. a. der rezidivierende Gelenkrheumatismus. Auch im Gefolge von Endokarderkrankungen sowie von Perikardialverwachsungen kommt chronische Myokarditis vor. In anderen zahlreichen Fällen läßt sich ein ätiologischer Faktor nicht eruieren.

Anatomisch sind teils die oben (S. 158) beschriebenen zelligen Infiltrate im interstitiellen Gewebe sowie degenerative Veränderungen an den Muskelfasern, teils als Endprodukt der interstitiellen Entzündung und des Muskelschwundes die bindegewebigen Myokardschwien vorhanden, deren Prädilektionsort die Herzspitze und die Hinterwand der linken Kammer sind. Die Coronararterien und ihre Äste bleiben unbeteiligt.

Die klinischen Erscheinungen decken sich nur zum Teil mit denen der akuten Myokarditis, sie sind im allgemeinen viel weniger scharf ausgeprägt und entsprechen häufig lediglich den Symptomen einer fortschreitenden Herzmuskelschwäche mit Atemnot, Druck auf der Brust und Beklemmungsgefühl, wogegen stenokardische Symptome fehlen.

Der objektive Befund am Herzen ist oft sehr gering, Verbreiterung der Herzdämpfung kann fehlen, in anderen Fällen besteht Dilatation teils der linken, teils der rechten, teils beider Kammern. Die Pulsfrequenz ist oft nicht verändert, doch beobachtet man nicht selten Pulsbeschleunigung mit oder ohne Rhythmusstörungen, letztere teils in Form von Extrasystolen, teils als perpetuelle Arrhythmie. Stärkere Bradykardie ist verdächtig auf Lokalisation des Prozesses im Überleitungsbandel. Systolische Geräusche über der Mitralis kommen auch hier ohne organische Klappenerkrankungen vor. Temperatursteigerungen werden mitunter, namentlich während einer Verschlimmerung des Prozesses beobachtet.

Die Diagnose muß oft per exclusionem gestellt werden, da sich mit Sicherheit oft nur die Herzmuskelsuffizienz diagnostizieren läßt. Bei älteren Individuen hat man das Bestehen einer Coronarsklerose sowie die arteriosklerotische Natur des Prozesses auszuschließen. Stets ist an die Möglichkeit einerluetischen Myokarderkrankung zu denken, zumal diese einer spezifischen Therapie zugänglich ist. Am sichersten läßt sich die Diagnose bei jugendlichen Individuen stellen, bei denen die übrigen ursächlichen Momente einer Herzmuskelsuffizienz (Arteriosklerose usw.) nicht in Frage kommen. In zahlreichen Fällen kommt man aber auch hier über Vermutungen nicht hinaus und muß sich alsdann mit der Diagnose „Myodegeneratio cordis“ begnügen. Die Therapie deckt sich mit derjenigen der chronischen Herzmuskelsuffizienz (vgl. S. 174).

## Herzlues.

Sowohl die kongenitale wie die erworbene Lues kann zu spezifischer Erkrankung des Herzens führen. Die tertiäre Herzlues ist keine seltene Erkrankung; sie tritt in der Regel erst nach einer längeren Reihe von Jahren nach der Infektion auf.

Anatomisch handelt es sich teils um circumscriphte gummöse Prozesse im Myokard, teils um eine diffuse interstitielle Myokarditis, teils um Erkrankung der

CoronargefäÙe (s. unten). Auch Endokard und Perikard sind bisweilen beteiligt. Prädilektionsort der Gummien ist das Hissche Bündel.

Die Krankheit verläuft oft unter dem Bilde der gewöhnlichen Herzmuskelinsuffizienz ohne besondere charakteristischen Symptome. Die Anamnese, die Wassermann-Reaktion im Blut sowie der Nachweis auf Lues verdächtiger Symptome anderer Organe ist hier von großem Wert. In anderen Fällen besteht das S. 162 beschriebene Bild der Coronärerkrankung. Überleitungsstörungen (vgl. S. 154) bilden ein für Herzluës besonders charakteristisches Symptom, namentlich in der Form des dauernden vollkommenen Herzblocks. Die Prognose richtet sich vor allem nach dem Zeitpunkt des Beginns der spezifischen Behandlung.

Therapie: Bei bestehender Herzmuskelinsuffizienz ist zuerst diese zu behandeln (vgl. S. 174). Erst nach Besserung derselben Einleitung der spezifischen Therapie:

Hg-Kur als 6wöchige Schmierkur mit täglich 3,0, später 4,0–5,0 Unguent. einer. (30 Einreibungen); oder Injektionen von Hydrargyr. salicyl. 1:10 in die Glutäalmuskeln, beginnend mit  $\frac{1}{2}$ , steigend auf  $\frac{1}{4}$  com ein- bis zweimal wöchentlich, im ganzen 15 Spritzen. Außerdem 2,0–3,0 Jodkali täglich; eventuell Neosalvarsan 1–2 mal wöchentlich je 0,3–0,4 (1. Dosis 0,15) bis zu 4,0 Gesamtdosis.

### Das sogenannte Fettherz.

Die bei Fettsucht häufigen Herzbeschwerden hat man früher irrigerweise als Folge einer stärkeren Durchwachsung des Myokards mit Fettgewebe und dadurch bedingter Schädigung des Herzmuskels erklärt. Der Einfluß einer derartigen Fettanhäufung am Herzen auf dessen Funktion ist indessen nicht sichergestellt; sie ist überdies mit den klinischen Untersuchungsmethoden nicht diagnostizierbar, die Diagnose „Fettherz“ in diesem Sinne daher unzulässig. Die richtiger als „Herzbeschwerden bei Fettleibigkeit“ zu bezeichnenden Zustände haben vielmehr andere Gründe: vor allem das der schwach entwickelten Muskulatur Fettleibiger entsprechende muskelschwache Herz, welches bei dem Mißverhältnis zu dem abnorm großen Körpergewicht leicht insuffizient wird; ferner die bei Fettsucht häufige Coronarsklerose, weiter allgemeine Arteriosklerose sowie Hypertonie. Dementsprechend sind die Symptome teils die einer einfachen Herzmuskelinsuffizienz, teils die der Angina pectoris usw.

Auch der infolge großer Fettmassen im Abdomen bewirkte Zwerchfellhochstand fördert seinerseits die Herzbeschwerden. — Mitunter besteht insofern ein Circulus vitiosus, als Herzkranke infolge der durch ihren Zustand bedingten Einschränkung körperlicher Bewegung fettstüchtig werden, wodurch wiederum ihre Herzbeschwerden sich verstärken.

Therapeutisch ist durch diätetische Maßnahmen eine vorsichtige Entfettung anzustreben, vor allem aber die Herzinsuffizienz zu behandeln (vgl. S. 174). Rücksicht auf letztere muß auch bei der Entfettung wie bei der Übungstherapie zur Kräftigung der Muskulatur entscheidend mitsprechen.

### Krankheiten der CoronargefäÙe des Herzens.

Erkrankung der CoronargefäÙe bedeutet stets eine schwere Schädigung des Herzmuskels infolge der dadurch bedingten Ernährungsstörung

desselben. Sie wird nur selten vor dem 40. Jahr beobachtet. Ursache ist teils Arteriosklerose, teils Lues. Klinisch sind häufig lediglich die Zeichen der Herzmuskelschwäche vorhanden, so daß die Coronarerkrankung oft erst bei der Sektion gefunden wird. In anderen Fällen ist das Krankheitsbild durch zwei charakteristische Symptome gekennzeichnet: Die Angina pectoris und das Asthma cardiale; sie treten meist neben anderen Zeichen einer organischen Herzerkrankung wie Dilatation, Klappenfehler usw. auf. Doch gibt es auch Fälle ohne Symptome von Insuffizienz und ohne Dilatation.

Die Angina pectoris besteht in „stenokardischen“ Anfällen d. h. heftigen Schmerzen, Beklemmung und hochgradigem Angstgefühl in der Herzgegend.

Die Intensität und Dauer der Anfälle ist sehr verschieden, sie wechselt von leichtem Oppressionsgefühl bis zu furchtbarer Todesangst und Vernichtungsgefühl und dauert oft nur wenige Minuten, bisweilen aber auch viele Stunden. Der hinter dem Brustbein, selten in der Gegend der Herzspitze lokalisierte, teils bohrende, teils krampfende Schmerz strahlt oft in den linken Arm und die ulnare Hälfte der linken Hand aus, seltener in die rechte Seite und in den Kopf. Bisweilen beginnt er statt in der Herzgegend an anderen Stellen, z. B. im Abdomen. Der Patient sieht in einem schweren Anfall blaß, verfallen und schwer leidend aus; er vermeidet jede Bewegung, muß beim Gehen stehen bleiben, vermeidet zu sprechen, zeigt gelegentlich Anwandlungen von Ohnmacht, auch Brechreiz, bisweilen Speichelfluß. Objektiv wird mitunter vorübergehend eine Herzdilatation, Blutdrucksteigerung sowie schwacher Puls, nicht selten Bradykardie beobachtet. Die Anfälle können häufig oder in großen Zwischenräumen auftreten. Sie werden oft durch Aufregungen, körperliche Anstrengung, Hautreize, Rauchen ausgelöst, treten aber auch nachts im Schlaf auf. Im Anfall kann der Tod eintreten. Das Leiden befällt hauptsächlich Männer.

Ähnlich, aber harmlos ist das Bild der nervösen Pseudoangina (vgl. S. 177). Auch die chronische Nicotinvergiftung, speziell der Zigarettenraucher, kann anginaartige Anfälle mit retrosternalem Schmerz bewirken, sog. Tabakangina.

Therapie: Behandlung des Grundleidens, d. h. der Arteriosklerose (S. 183) bzw. der Lues (S. 161). Im Anfall selbst wirken Nitrite günstig:

Z. B. Nitroglycerin (1%ige alkoholische Nitroglycerin-Lösung 10—15 Tropfen), ferner Amyl. nitros. (Amylnitrit) 3—5 Tropfen (z. B. in Glasröhrchen eingeschmolzen) auf ein Tuch tropfen und einatmen; Natr. nitros. 0,01 subkutan. Die genannten Mittel sollen möglichst bei den ersten Zeichen des herannahenden Anfalles gegeben werden. Morphium und seine Derivate meist wirkungslos, oft schädlich; dagegen Papaverin. hydrochlor. 0,04 subcutan (Ampullen) oft von Erfolg. In der anfallsfreien Zeit zwecks Erweiterung der Coronargefäße die S. 177 genannten Purinkörper, vor allem Theobromin (Knoll-Tabletten 3 mal täglich 0,15), Diuretin-Tabletten 5 mal täglich 0,5, ferner Perichol (Kombination von Campher mit Papaverin-Boehringer), 3 mal täglich 1 Tablette. Digitalis nur bei Herzmuskelinsuffizienz angezeigt; Strophanthin intravenös ist kontraindiziert.

Prophylaxe: Aufregungen, körperliche Anstrengungen, kopflose Mahlzeiten, Rauchen (speziell Zigaretten), kalte und moussierende Getränke, blähende Speisen, sexuelle Betätigung sind zu meiden; Regelung der Darmtätigkeit.

Das nicht so häufige Asthma cardiale, das man bei sehr ausgedehnter Coronarerkrankung beobachtet, besteht in Anfällen heftigster Atemnot mit Erstickungsgefühl, Cyanose sowie bei längerer Dauer in Symptomen von Lungenödem (vgl. S. 239).

Die Verschieblichkeit der Lungengrenzen ist dabei auffallend gering. In der Regel besteht Insuffizienz des linken Ventrikels bei relativ intaktem rechten Ventrikel. Oft tritt der Anfall nachts während des Schlafes auf; er dauert bis zu einer

Stunde und hinterläßt große Schwäche. Nicht selten endet der Anfall letal. Kardiales Asthma und Angina pectoris können zusammen vorkommen. Im Anfall selbst ist eine Verwechslung mit renalem Asthma bei Hypertonie (vgl. Nierenerkrankheiten) möglich. Bronchialasthma ist durch die Eosinophilie in Blut und Sputum zu unterscheiden.

Lues der Coronargefäße ist bei gleichzeitig anderweitigerluetischer Erkrankung (Aorteninsuffizienz, Aortitis luetica, Aneurysma) sowie positiver Wa.-R. anzunehmen; sie führt häufiger zu Angina pectoris als Arteriosklerose und kommt durchschnittlich bei jüngeren Individuen zur Beobachtung als letztere.

Anatomische Folgezustände für den Herzmuskel bei stärkerer Coronarerkrankung bzw. Verschuß einzelner Äste sind ischämische Nekrosen und bindegewebige Schwielen des Myokards analog den Residuen einer Myokarditis und in einzelnen Fällen Verdünnung resp. abnorme Nachgiebigkeit der geschädigten Stellen mit konsekutivem Herzaneurysma (Prädilektionsort Herzspitze) bzw. die unmittelbar tödliche Herzruptur.

## Krankheiten des Endokards.

### Endokarditis.

Entzündungen des Endokards lokalisieren sich in der Hauptsache an den Herzklappen und zwar mit besonderer Vorliebe an denjenigen der Mitralis und Aorta, während die Tricuspidal- und Pulmonalklappen viel seltener befallen werden. Häufig sind Mitralis und Aortenklappen gleichzeitig erkrankt. Man unterscheidet anatomisch Endocarditis simplex s. verrucosa und Endocarditis septica s. ulcerosa, die auch klinisch voneinander zu trennen sind.

Der **anatomische** Befund bei frischer Endocarditis verrucosa besteht in kleinen warzenartigen Auflagerungen von grauweißer Farbe, die sich anfangs abwischen lassen; sie finden sich hauptsächlich am Schließungsrand der Klappen und bestehen aus Blutplättchen, Leukocyten, Erythrocyten und geringen Mengen von Fibrin; sie sitzen dem an diesen Stellen vom Endothel beraubten Klappengewebe auf. Bei längerem Bestehen werden sie bindegewebig organisiert, wodurch Verdickungen und Schrumpfungen der Klappen sowie Verwachsungen derselben untereinander zustande kommen. Die Folge ist eine Störung der Ventilfunktion der Klappe. Während in einem Teil der Fälle der Prozeß damit sein Ende erreicht und unter Hinterlassung der Klappenveränderungen ausheilt, kommt es in anderen Fällen zu neuen Schüben, indem sich auf den von früher her veränderten Klappen neue Wärzchen niederschlagen, die in der gleichen Weise organisiert werden und zu einer weiteren Deformierung und Erstarrung der Klappensegel führen: Rekurrierende Endokarditis. Bisweilen lösen sich Teile der Auflagerungen von den Klappen ab, werden vom Blutstrom fortgerissen und in andere Organe geschwemmt, so daß Embolien entstehen.

Bei der ulcerösen Endokarditis kennzeichnet sich die Bösartigkeit des Prozesses durch sein schnelles Eindringen in die Tiefe des Klappengewebes und die in kurzer Zeit sich entwickelnden schweren Zerstörungen mit Geschwürsbildung. Gleichzeitig entwickeln sich die gleichen thrombotischen Auflagerungen wie bei der Endocarditis simplex, nur daß sie oft eine viel größere Mächtigkeit besitzen. In den erkrankten Teilen findet man im Gegensatz zu ersterer massenhaft Bakterien. In viel höherem Grade besteht hier die Neigung zur Loslösung und embolischen Verschleppung von nekrotischem und thrombotischem Material, wodurch massenhaft Keime über den ganzen Körper ausgestreut werden. Embolische miliare Abscesse und eitrige Infarkte sind eine häufige Folgeerscheinung.



Beiden Formen der Endokarditis liegt eine bakterielle Infektion als Ursache zugrunde mit dem Unterschiede, daß bei der Endocarditis ulcerosa die Massenhaftigkeit und hohe Virulenz der Keime im Vergleich zur benignen Endocarditis verrucosa dem Prozeß von vornherein einen bösartigen Charakter verleiht. Immerhin bestehen zwischen beiden nur graduelle Unterschiede. Häufig ist die Endokarditis mit Myokarditis und Perikarditis vergesellschaftet, so daß eine sog. Pankarditis besteht.

**Endocarditis simplex:** Sie tritt als akute Erkrankung vor allem im Verlauf des Gelenkrheumatismus (10–20% aller Fälle) und zwar mit Vorliebe in der 2. Woche, ferner bei Chorea minor, Pneumonie, Scharlach (Anfang der 3. Woche), Pocken, Masern, Gonorrhöe sowie im Anschluß an Anginen auf. Nicht selten finden sich ferner endokarditische Veränderungen als zufälliger Sektionsbefund, ohne klinisch in die Erscheinung getreten zu sein, so insbesondere bei Phthisikern, Carcinomkranken.

**Krankheitsbild:** Zu den Allgemeinerscheinungen, die den Eintritt einer Endokarditis anzeigen, gehört vor allem Fieber, namentlich wenn wie z. B. bei Polyarthrit oder Scharlach vorher bereits Entfieberung eingetreten war. Das Fieber ist nie sehr hoch, auch kann es vollkommen fehlen. Im übrigen beschränkt sich das Bild in der Hauptsache auf subjektive und objektive Symptome seitens des Herzens: vor allem Herzklopfen, nicht so häufig Druckgefühl und Schmerzen in der Herzgegend. Die objektiven Zeichen können sehr spärlich sein und sind oft nicht eindeutig. Die Herztätigkeit ist erregt, der Puls beschleunigt, weich, meist regelmäßig oder zeitweise infolge einzelner Extrasystolen unregelmäßig. Bei Lokalisation an der Mitralis wird der 1. Ton an der Spitze bzw. an der Pulmonalis unrein, woran sich die Entwicklung eines systolischen Geräusches dortselbst anzuschließen pflegt. Bedeutung erhält dasselbe namentlich, wenn sich weiter auch eine Accentuation des 2. Pulmonaltons herausbildet. Gleichzeitig ist oft eine mäßige Herzdilatation nach links, bisweilen auch nach rechts zu konstatieren.

Während diese Symptome der Mitralendokarditis, namentlich anfangs wenig charakteristisch sind und systolische Geräusche insbesondere an der Spitze und der Mitralis bei den verschiedensten fieberhaften Erkrankungen ohne Endokarditis vorkommen, ist die seltenere Erkrankung der Aortenklappen an dem frühzeitig auftretenden charakteristischen diastolischen Geräusch der Aorteninsuffizienz (s. u.) mit größerer Sicherheit zu erkennen. Dilatation des Herzens wird auch hier beobachtet. Der für diesen Klappenfehler bezeichnende Pulsus celer pflegt erst später in die Erscheinung zu treten. Lokalisation der Endokarditis an der Tricuspidalis und Pulmonalis, vor allem der letzteren, ist sehr selten. Auf eine Tricuspidalerkrankung weist unter Umständen ein rasch auftretender positiver Venenpuls hin.

Die Deutung des Krankheitsbildes der Endokarditis ist namentlich im Anfang oft deshalb schwierig, weil die eine Endokarditis erzeugenden Noxen ebenso oft eine Schädigung des Herzmuskels bewirken und diese infolge von Herzdilatation ebenfalls nicht selten zum Auftreten von systolischen Geräuschen als Ausdruck eines muskulären Klappeninsuffizienz führt (vgl. Klappenfehler). Auch sind die im Verlauf einer Endokarditis frühzeitig eintretende Herzverbreiterung, ferner Überleitungsstörungen bzw. Herzblock mit starker Bradykardie (namentlich bei Gelenkrheumatismus) nicht auf die Endokarditis, sondern die daneben bestehende Herzmuskelerkrankung zu beziehen. In vielen Fällen wird man die Endokarditis mit Sicherheit erst retrospektiv einige Wochen nach ihrem Beginn diagnostizieren können, wenn es zur vollen Entwicklung eines Klappenfehlers gekommen ist.

Zu den nicht häufigen Folgeerscheinungen der Endocarditis simplex gehört die embolische Verschleppung von thrombotischem Material der Herzklappen speziell in Nieren, Milz, Gehirn, Darm usw. mit entsprechenden klinischen Erscheinungen.

Die Prognose der Endocarditis simplex ist quoad vitam in der Regel günstig, während hinsichtlich der restlosen Ausheilung bzw. der Größe des hinterbleibenden Klappendefektes sich im einzelnen Fall nichts Sicheres voraussagen läßt. Relativ am günstigsten sind die Fälle von Endokarditis nach Chorea im Kindesalter. Auch bezüglich des späteren Rekurrerens einer Endokarditis ist die Prognose völlig unsicher.

Die Therapie ist die gleiche wie bei akuter Myokarditis. Solange Fieber und beschleunigter und weicher Puls vorhanden ist, ist strenge Bettruhe notwendig. Digitalis ist zwecklos und bei Bradykardie (Überleitungsstörungen!) sowie bei Auftreten von Embolien streng kontraindiziert. Dagegen ist rechtzeitige Anwendung von Coffein, Campher, Strychnin bei drohender Vasomotorenschwäche auch hier von großer Bedeutung. Salicyl vermag bei Polyarthritis die Herzkomplikation nicht zu beeinflussen. Später sind mit größter Vorsicht und schrittweise Übungsversuche zu machen, von denen man sich durch das Vorhandensein von Herzgeräuschen nicht abhalten zu lassen braucht, da dieselben ja nur den zurückgebliebenen Klappenfehler anzeigen.

Die Endocarditis septica stellt eine Teilerscheinung einer allgemeinen Sepsis dar, bei der sie in etwa 20% aller Fälle beobachtet wird. Die häufigsten Erreger sind Streptococcen, Staphylococcen, Pneumococcen u. a. In der Regel gelingt es, aus dem Blute die entsprechenden Erreger zu züchten.

Das Krankheitsbild entspricht dem im Abschnitt Sepsis (S. 91) geschilderten Verhalten. Es sei daher auf dies Kapitel verwiesen. Auch hier ist das linke Herz und zwar vor allem die Mitralis wesentlich häufiger als das rechte befallen. Die klinischen Erscheinungen seitens des Herzens sind die gleichen wie die bei der Endocarditis simplex. Nicht selten treten jedoch die Symptome der Endokarditis bei der Schwere der übrigen Krankheitssymptome der Sepsis in den Hintergrund.

Da wie auch bei anderen hochfieberhaften Zuständen bei Sepsis sehr häufig systolische Herzgeräusche auftreten ohne den anatomischen Befund einer Endokarditis, so ist bei der Diagnose Vorsicht zu üben. Auch hier hat vor allem das Auftreten diastolischer Geräusche besonderen diagnostischen Wert. Beweisend für eine septische Endokarditis ist ferner das Auftreten multipler Embolien in der Haut sowie unter Umständen gewisse Retinaveränderungen. Die Hautembolien bestehen aus linsen- bis pfennigstückgroßen Hämorrhagien, die zum Teil im Zentrum nekrotisch werden und sich mitunter in Eiterpusteln verwandeln, die zu Geschwürsbildung führen. Auch die Netzhautveränderungen bestehen aus kleinen hämorrhagischen Herden (vgl. Sepsis). Doch haben sie nur dann diagnostischen Wert, wenn nicht gleichzeitig eine schwerere Anämie besteht, bei der ganz ähnliche Netzhautblutungen auftreten. Mitunter schließt sich eine eitrige Ophthalmie an, die die Diagnose sichert. Embolien in anderen Organen bewirken in der Regel keine so charakteristischen Erscheinungen, daß sie sich von den gewöhnlichen blanden Embolien unterscheiden lassen.

Die chronische Endocarditis lenta bei Viridanssepsis vgl. S. 95.

Die Prognose der septischen Endokarditis ist mit verschwindenden Ausnahmen absolut infaust.

## Herzklappenfehler (Vitium cordis).

Klappenfehler sind anatomisch begründete und daher dauernde Störungen in der Ventilfunktion einer Herzklappe. Dieselben können erstens auf Schlußunfähigkeit (Insuffizienz) einer Klappe beruhen, die zur Folge hat, daß der Blutstrom das Ostium zu einem Zeitpunkt passiert, wo dasselbe normal verschlossen ist. Die Stromrichtung ist dabei der Norm entgegengesetzt. Eine zweite Art von Klappenfehlern entsteht, wenn die Klappensegel untereinander narbig verwachsen (vgl. Endokarditis S. 163) und dadurch in ihrer vollen Entfaltung behindert sind und das Ostium in dem Moment, in dem es sich normal für den Blutstrom weit öffnen soll, verengert bleibt: Klappenstenose. Da die Verengung oft mit gleichzeitiger Erstarrung der erkrankten Klappensegel verbunden ist, so erklärt sich die häufige Kombination der Stenosen mit einer Insuffizienz, aber auch das Umgekehrte kommt vor, wie überhaupt kombinierte Klappenfehler recht häufig sind. Es gibt erworbene und angeborene Herzklappenfehler. Die sog. relative Insuffizienz siehe weiter unten. Ursachen der erworbenen Klappenfehler sind in erster Linie Endokarditis, ferner Arteriosklerose und Lues, in seltenen Fällen Traumen. Die Heredität spielt eine gewisse Rolle. Bezüglich der Herzgeräusche sei auch auf S. 138 verwiesen.

Die **Mitralinsuffizienz** ist der häufigste aller Klappenfehler.

Während der Systole flutet hier ein Teil des Blutes aus dem linken Ventrikel durch die insuffiziente Mitralklappe in den linken Vorhof zurück, so daß dieser und der ganze Lungenkreislauf mit Blut überfüllt ist und die dadurch bewirkte Stauung sich bis in den rechten Ventrikel fortsetzt. Die unmittelbaren Folgen der Schlußunfähigkeit der Mitralis sind: 1. Dilatation des linken Vorhofs, der von zwei Richtungen Blut erhält, von den Venen und durch die insuffiziente Klappe von der linken Kammer. 2. Die aus dem linken Vorhof während der Diastole in die linke Kammer fließende vermehrte Blutmenge bewirkt eine Dilatation der linken Kammer, die zugleich hypertrophiert, da sie ein größeres Blutvolumen systolisch auszutreiben hat. 3. Auch die rechte Kammer hypertrophiert, da sie die Stauung im kleinen Kreislauf zu überwinden hat. Solange sie dieser Aufgabe gerecht wird, macht die Kreislaufstörung an der rechten Kammer Halt, ohne auf den rechten Vorhof überzugreifen.

Symptome: Der verstärkte, d. h. hebende Spitzenstoß befindet sich an normaler Stelle oder ist etwas nach links und eventuell unten (6. Ikr.) verlagert und zugleich ein wenig nach rechts verbreitert. Bei jugendlichen Individuen ist die Herzgegend bei längerem Bestehen des Vitiums etwas vorgewölbt (voussure). Besonders bei kurzem Sternum sowie nach tiefer Inspiration ist die Hypertrophie der rechten Kammer an der verstärkten epigastrischen Pulsation mit dem Auge und palpatrisch wahrzunehmen. Mit der aufgelegten Hand spürt man mitunter in der Gegend der Herzspitze ein mit der Systole synchrones Schnurren („Katzenschnurren“). Die Dämpfungsfigur ist entweder vollkommen normal oder nach links und meist auch etwas nach oben verbreitert, so daß eine etwa viereckige Form resultiert. Auscultatorisch besteht ein systolisches Geräusch über der linken Kammer, das einen scharfen oder blasenden Charakter hat und nicht selten den ersten Ton verdeckt. Am lautesten ist es über der Herzspitze und pflanzt sich von da nament-

lich nach der Gegend der Pulmonalis bzw. des linken Herzhofs (Richtung des regurgitierenden Blutstroms!) fort. Der 2. Pulmonalton ist deutlich accentuiert, auch kann man mit der Hand den verstärkten diastolischen Stoß der Pulmonalklappen deutlich tasten. Der Radialpuls verhält sich ungefähr normal.

Dekompensation der Mitralsuffizienz verrät sich durch Erweiterung des rechten Vorhofs mit Verbreiterung der Dämpfung nach rechts, eventuell Verringerung der Accentuation des 2. Pulmonaltons, ferner durch Cyanose wechselnden Grades und die übrigen Stauungserscheinungen als Zeichen der Herzinsuffizienz.

Im Röntgenbild zeigt das „Mitrallerz“ eine rundliche, kugelförmige Gestalt. Bisweilen ist der 2. linke Bogen (vgl. S. 135) stärker vorgewölbt; doch wird er oft bei stärkerer Dilatation der linken Kammer infolge von Ausdehnung derselben nach oben von dieser überlagert (Abb. 11).

Die Diagnose der Mitralsuffizienz ist oft schwierig; nicht selten ist sie bei einmaliger Untersuchung nicht mit Sicherheit zu stellen, was vor allem daran liegt, daß systolische Geräusche über dem linken Herzen auch ohne Klappenerkrankung sehr häufig sind. Vgl. auch S. 139. Über der Pulmonalis ist ein lautes systolisches Geräusch bei älteren Kindern bis zum 14. Jahre ungemein häufig, es findet sich besonders bei flachem Thorax und ist völlig bedeutungslos. Fast jede Anämie stärkeren Grades geht mit einem systolischen Geräusch einher. Schließlich kommt im Verlauf von akuten fieberhaften Erkrankungen



Abb. 11. Mitrallerz.

sehr häufig an der Herzspitze ein systolisches Geräusch vor, das man durch die unter der Einwirkung der Erkrankung zustande kommende mangelhafte Kontraktion des Herzmuskels und speziell der Papillarmuskeln erklärt; es kommt dann auch bei intakten Klappen zu einer Schlußunfähigkeit derselben, demnach zu dem gleichen Effekt wie bei echter Mitralsuffizienz. Man spricht hier von muskulärer oder relativer Mitralsuffizienz und nennt die Geräusche accidentelle oder muskuläre. Nach Ablauf der Grundkrankheit schwinden auch die Geräusche wieder; ferner werden sie oft leiser bei stärkerer Tätigkeit des Herzens, nach Bewegung oder unter Digitalis, so daß der Wechsel der Intensität des Geräusches sich mit Vorsicht im Sinne des accidentellen Charakters des Geräusches verwerten läßt. Hingegen sind die akustischen Eigenschaften des Geräusches für die Diagnose nicht verwertbar, wenn auch ein sehr lautes Geräusch mehr für einen organischen Klappenfehler spricht. Entscheidend für letzteren ist vor allem der Nachweis der Herzhypertrophie durch den Spitzenstoß, wenn dieselbe keine andere Erklärung findet, sowie in Verbindung damit der klappende 2. Pulmonalton, während letzterer allein auch bei manchen debilen, besonders jugendlichen Personen ohne Vitium gefunden wird.

Bei der **Mitralstenose** ist der Abfluß des Blutes aus dem Vorhof in die linke Kammer während der Diastole erschwert, die Kammer erhält zu wenig Blut und entleert in die Aorta weniger Blut als in der Norm.

Infolge der Blutüberfüllung im linken Vorhof kommt es zu Dilatation und Hypertrophie desselben, ferner zu Stauung im Lungenkreislauf wie bei Mitralsuffizienz und zu vermehrter Inanspruchnahme des rechten Ventrikels mit konsekutiver Hypertrophie und später sich daran anschließender Dilatation, wenn er erlahmt. Der linke Ventrikel kann infolge des Klappenfehlers atrophieren.

Starke diffuse Pulsation in der Herzgegend zwischen dem linken Sternalrand und der linken Herzgrenze sowie im Epigastrium zeigt die Hypertrophie der rechten Kammer an, die mitunter die linke Kammer von der Brustwand wegdrängt. Der hauptsächlich von der rechten Kammer gebildete Spitzenstoß befindet sich an normaler Stelle oder ist etwas nach links verlagert und nach rechts verbreitert. Die Herzdämpfung ist bei reiner Stenose nicht nach links, wohl aber infolge der Dilatation des linken Vorhofs oft nach oben verbreitert, so daß auch hier eine annähernd viereckige Figur entsteht.

Im Röntgenbild ist starkes Vorspringen des linken Vorhofs (II. linker Bogen) sehr charakteristisch, zumal hier der Ventrikelbogen nicht wie bei Mitralinsuffizienz stark vorspringt. Auscultatorisch ist ein diastolisches Geräusch über der Herzspitze oder etwas links und oberhalb derselben charakteristisch, das nach den übrigen Herzabschnitten nur schwach fortgeleitet wird und über Aorta und Pulmonalis nicht gehört wird. Ihm entspricht ein meist sehr deutliches diastolisches Schwirren an der Herzspitze. Sehr bezeichnend ist ferner der oft sehr laute paukende 1. Ton über der Spitze sowie ferner starke Accentuation des 2. Pulmonaltons.

Das diastolische Geräusch kann in verschiedener Form auftreten. Am häufigsten erfüllt es die ganze Diastole, beginnt also unmittelbar nach dem 2. Ton und nimmt an Intensität bis zum folgenden 1. Ton zu: Crescendogeräusch; oder es beschränkt sich häufig als prä systolisches Geräusch auf den letzten Teil der Diastole. In anderen Fällen fehlt jedes Geräusch, statt dessen hört man einen 3. Ton kurz nach dem normalen 2. Ton, den sog. Wachtelschlag, der über dem ganzen Herzen wahrnehmbar, aber über der Spitze am deutlichsten ist. Das diastolische Geräusch wird bisweilen nach Körperbewegung deutlicher. — Das Vorhandensein eines prä systolischen Geräusches bei regelmäßiger Herzaktion ist übrigens für die Bewertung der Vorhofstätigkeit insofern ein günstiges Zeichen, als es sich nur dann findet, solange der linke Vorhof nicht überdehnt ist und somit die Stenose zu kompensieren vermag.

Der Radialpuls ist oft klein und weich. Mitunter bewirkt die starke Dilatation des linken Vorhofs eine Recurrenslähmung links (Kehlkopfspiegel!).

Viel häufiger als eine reine Mitralstenose ist eine Kombination derselben mit Mitralinsuffizienz, die aus dem gleichzeitig vorhandenen systolischen Geräusch, der Hypertrophie der linken Kammer und dem stärker ausgebildeten linken Ventrikelbogen im Röntgenbild zu erkennen ist. Der 1. Ton ist hier oft nicht so laut wie bei reiner Stenose. Das diastolische Geräusch fällt oft in den 1. Teil der Diastole, ist also protodiastolisch; in manchen Fällen fehlt es ganz, dagegen ist auch dann das charakteristische diastolische Schwirren zu tasten. Ist klinisch nur eine Stenose und keine Insuffizienz nachweisbar, so spricht das für eine hochgradige Verengung der Klappe. Die Stärke der Hypertrophie der rechten Kammer läßt keinen Schluß auf den Grad der Stenose zu.

Bei dekompensierter Mitralstenose entsteht wie bei Mitralinsuffizienz Dilatation des rechten Ventrikels und rechten Vorhofs mit Verbreiterung der Dämpfung nach rechts, eventuell auch etwas nach links, da der erweiterte rechte Ventrikel den linken nach links verschiebt.

Die Mitralstenose ist im allgemeinen ernster als die Mitralinsuffizienz zu bewerten, wenn auch die Kranken bei Vermeidung höherer Anforderungen jahrelang sich leidlich halten können. Doch verursacht das Vitium öfter subjektive Beschwerden. Die Kranken geraten leicht in Atemnot und zeigen oft Zeichen der Lungenstauung mit Herzfehlerzellen im Sputum (s. Stauungslunge S. 239). Stärkere Anstrengungen

vertragen sie sehr schlecht (Gravidität!), doch läßt sich dem Erlahmen des rechten Ventrikels oft längere Zeit therapeutisch durch Digitalis gut entgegenwirken.

Bei Mitralfehlern, namentlich Mitralstenosen, kommen oft Arrhythmien vor und zwar vor allem Arrhythmia perpetua sowie Extrasystolen, besonders in der Form der Bigeminie.

Die **Aorteninsuffizienz** entsteht bei Aortenlues (vgl. S. 183), weiter durch Endokarditis mit Schrumpfung oder Zerstörung der Aortenklappen, ferner durch eine arteriosklerotische Erkrankung, ganz selten durch traumatische Abreißung der Klappen, außerdem als relative Insuffizienz bei normalen Klappen infolge von Erweiterung der Aortenwurzel bei Arteriosklerose und Aneurysmen. Die häufigste Ursache ist die Lues. Die Insuffizienz bewirkt, daß während der Diastole mit dem normal aus dem Vorhof in den Ventrikel strömenden Blut gleichzeitig Blut aus der Aorta in die Kammer regurgitiert. Die linke Kammer, in die somit diastolisch dauernd ein vermehrtes Blutvolumen einströmt, muß vermehrte systolische Arbeit leisten. Die Folge ist Dilatation und Hypertrophie der linken Kammer, während die übrigen Abschnitte des Herzens zunächst unverändert bleiben.

Der Spitzenstoß ist nach außen und unten verlagert (6. Ikr.) und deutlich hebend; mitunter reicht er bis an die vordere Axillarlinie. Die Herzdämpfung ist beträchtlich, und zwar in ihrem Längsdurchmesser vergrößert, die linke Grenze stark nach außen, dagegen nicht nach oben gerückt. Die rechte Grenze ist entweder normal oder infolge starker Vergrößerung des linken Ventrikels nach rechts verlagert. Charakteristisch ist ein rauschendes oder gießendes diastolisches Geräusch über der Aorta im 2. rechten Ikr., das jedoch oft am lautesten an dem Sternalende der 3. linken Rippe ist und entsprechend der Richtung des regurgitierenden Blutstroms auch an der Herzspitze wahrnehmbar ist. Man kann es manchmal schon bei einiger Entfernung ohne Aufsetzen des Stethoskops hören. Mitunter wird es beim Liegen deutlicher oder dann erst überhaupt hörbar. Im Gegensatz zur Mitralstenose beginnt es unmittelbar nach dem 2. Ton. Über der Aorta (2. und 3. Ikr.) ist oft diastolisches Schwirren zu tasten. Der 1. Aortenton kann vollkommen fehlen, oft ist er von einem systolischen Geräusch begleitet, das wohl durch die vermehrte Strömungsgeschwindigkeit des Blutes zu erklären ist. Fast stets besteht ferner ein accidentelles systolisches Geräusch über der Mitralis, das indessen keine Erkrankung derselben zu beweisen braucht.

Das Röntgenbild zeigt in ausgebildeten Fällen eine charakteristische Ei- oder Walzenform („Entenform“) des Herzens; infolge Zunahme des Breitendurchmessers kommt es zu einer Querlagerung des Herzens, während seine Höhe unverändert bleibt; der Aortenbogen ist links stärker vorgebuchtet (Abb. 12).

Auch das Verhalten des Blutdrucks ist sehr bezeichnend, indem infolge des durch den Klappendefekt bewirkten diastolischen Zurückflutens des Blutes der Minimaldruck auf 50–25 mm sinkt. Da gleichzeitig der systolische Druck häufig auf 170–200 erhöht ist, resultiert eine abnorm große Pulsdruckamplitude von 80–100 gegenüber 30–40 in der Norm. Die Größe des Pulsdrucks läßt einen gewissen Schluß auf die Größe des Klappendefektes zu. Man findet dies Verhalten bisweilen bereits bei initialen Fällen, wo es namentlich dort von Wert ist, wo das

diastolische Geräusch noch vermißt wird. Eine Folge der Pulsdruckerhöhung ist ein ausgesprochen schneller Puls (*P. celer*) mit steilem hohen Anstieg und jähem Abfall der Pulswelle (vgl. Abb. 8 e).

Der hüpfende Puls ist an zahlreichen peripherischen Arterien mit dem Auge zu erkennen, so an der Temporalis, der Carotis, der Cruralarterie usw. und auch an den Retinaarterien im Augenspiegel. Bisweilen beobachtet man auch am Kopf rhythmische, mit der Pulswelle synchrone Nickbewegungen. Auch tastbare pulsatorische Volumschwankungen größerer Organe, wie z. B. der Leber, sind oft vorhanden, ferner Pulsieren der Rachenorgane. Charakteristisch ist ferner das Auftreten von Capillarpuls in Form von abwechselnder Rötung und Erblässen von Hautstellen, die man durch Reiben rötet, ferner das Pulsieren des Gaumensegels; das gleiche beobachtet man am Nagelbett der Finger, wenn man auf den

Nagelrand einen Druck ausübt. Die Pulswelle macht bei diesem Vitium nicht wie in der Norm an der Grenze des Capillargebietes Halt, sondern pflanzt sich in dieses fort. Bezüglich der Auscultationserscheinungen über den Gefäßen, insbesondere den Traubeschen Doppelton, das Duroziezsche Doppelgeräusch sei auf S. 143 verwiesen.




Abb. 12. Aortenherz.

Die Aorteninsuffizienz macht von allen Klappenfehlern oft lange Zeit die geringsten Beschwerden, so daß die Patienten mitunter von ihrem Vitium nichts wissen und viele Jahre arbeitsfähig bleiben können. In anderen Fällen bestehen lästiges Herzklopfen oder gelegentlich

auch Klagen über quälende Ohrgeräusche von rhythmischem Charakter sowie Neigung zu Ohnmachten. Ein Teil der Herzbeschwerden beruht oft auf gleichzeitig bestehender Coronarsklerose, Aneurysmen usw. Auf erstere ist das bei diesem Vitium häufige Auftreten von Asthma cardiale sowie Angina pectoris (vgl. S. 162) zu beziehen. Die luetische Aorteninsuffizienz ist oft durch eine spezifische Herzmuskelerkrankung kompliziert. Die Patienten zeigen meist eine starke Hautblässe ohne Cyanose. Es besteht eine Neigung zu Blutungen, starkem Nasenbluten, Gehirn- und Netzhauthämorrhagien. Die Herzaktion ist in der Regel beschleunigt; die Verkürzung der Dauer der Diastole hat hier gegenüber dem diastolischen Zurückfluten des Blutes einen kompensatorischen Charakter. Aus diesem Grund ist auch die die Diastole verlängernde Digitalismedikation nur mit Vorsicht anzuwenden. Gelegentlich kommen Anfälle von Tachykardie vor.

Im Gegensatz zu dem nach Endokarditis entstandenen Vitium hat die arteriosklerotische (eventuell auch die luetische) Aorteninsuffizienz progredienten Charakter. — Nach Eintritt von Kompensationsstörungen (Cyanose, Dyspnoe, Ödeme) kommt es bei Aorteninsuffizienz seltener als bei den Mitralfehlern wieder zu einer Erholung des Herzmuskels, meist schreitet dann die Zirkulationsstörung unaufhaltsam vorwärts.

Die **Aortenstenose** ist in reiner Form ein seltener Klappenfehler; häufiger findet sie sich kombiniert mit Aorteninsuffizienz. Sie ist bisweilen angeboren und kommt bei Männern häufiger als bei Weibern vor. In einzelnen Fällen wurde

eine Verengerung des linken Ventrikels als sog. „wahre Herzstenose“ beobachtet. Der gegen den vermehrten Widerstand arbeitende linke Ventrikel hypertrophiert zunächst ohne Dilatation. Die Herzdämpfung ist etwas nach links verbreitert, der Spitzenstoß wenig nach außen verlagert und mitunter hebend. Die Röntgen-silhouette zeigt wie bei Aorteninsuffizienz liegende Eiform des Herzens. Sehr charakteristisch ist ein ungemein lautes, langgezogenes systolisches Geräusch über der Aorta, das auch über den Halsgefäßen und in geringerem Maße auch über den übrigen Herzteilen wahrnehmbar ist; oft überdeckt es die übrigen Herztöne. Das Geräusch ist so laut, daß man es bisweilen sogar an der Lehne des Stuhles, auf dem der Patient sitzt, hören kann. Der 2. Aortenton ist sehr leise oder unhörbar. Der Radialpuls ist klein, langgezogen und träge (P. tardus Abb. 8 f.), also das Gegenteil des Pulses bei Aorteninsuffizienz, seine Frequenz oft herabgesetzt. Infolge der mangelhaften Blutversorgung des Gehirns kommt es oft zu Anfällen von Bewußtlosigkeit und Krämpfen. Besteht das Vitium seit der frühen Jugend, so bleibt die körperliche und geistige Entwicklung mitunter stark zurück.

Die **Tricuspidalinsuffizienz** kommt in der Regel kombiniert mit Mitralfehlern vor und zwar als relative Insuffizienz infolge von Erweiterung des Ansatzringes der Klappen. Durch das insuffiziente Ostium regurgitiert mit jeder Systole Blut in den rechten Vorhof und von dort in die Venen. Die Dilatation des rechten Vorhofs bewirkt Erweiterung der Herzdämpfung nach rechts, auch findet sich oft Pulsation rechts vom rechten Sternalrand. Über der Hörstelle der Tricuspidalis besteht ein systolisches Geräusch, das sich jedoch oft nicht sicher von dem gleichzeitig bestehenden Geräusch des Mitralfehlers abgrenzen läßt. Eine diagnostisch wichtige Folge der Tricuspidalinsuffizienz ist ein positiver Venenpuls (vgl. S. 147), der durch die mit jeder Systole der Kammer synchronen rückläufigen Bewegung des Blutes in die Venen zustande kommt. Er fällt zeitlich mit seiner Hauptwelle mit dem Carotispuls zusammen; der systolische Kollaps des normalen Venenpulses fehlt. Die Leber zeigt infolge des rhythmischen Zurückflutens des Blutes in ihre Venen einen tastbaren Lebervenenpuls, den man durch bimanuelle Palpation von einer fortgeleiteten Pulsation unterscheiden kann. Eine weitere Folge des Vitiums ist die Herabsetzung der zu den Lungen fließenden Blutmenge, was sich bei vorher infolge des Mitralfehlers bestehender Accentuation des 2. Pulmonaltons durch Abschwächung derselben verrät. Im Röntgenbild ist starke Vorbuchtung des rechten Vorhofbogens und eventuell Pulsieren des rechten Randes des Gefäßbandes (Ven. cav. sup.) charakteristisch. Das Auftreten einer Tricuspidalinsuffizienz im Gefolge anderer Klappenfehler hat stets eine ernste Prognose, da es das Erlahmen des Herzmuskels anzeigt. Im Gegensatz zu der bei Mitralfehlern eintretenden kompensatorischen Hypertrophie des rechten Ventrikels kommt hier eine entsprechende Hypertrophie des linken Ventrikels nicht in Betracht, da zwischen diesem und dem rechten Ventrikel das weite Capillargebiet eingeschaltet ist, das eine Stauungswirkung auf den linken Ventrikel nicht zustande kommen läßt.

Klappenfehler der Pulmonalis sind sehr selten. Bei Pulmonalstenose, die teils angeboren vorkommt, teils durch Kompression von außen durch Tumoren, Aneurysmen usw. entsteht, beobachtet man starke Hypertrophie der rechten Kammer, ein sehr lautes systolisches Geräusch über der Pulmonalis mit systolischem Schwirren im 2. linken Ikr., bisweilen einen leisen 2. Pulmonalton und kleinen Puls. Die Kranken neigen zu tuberkulöser Erkrankung der Lunge.

Bei der sehr seltenen Pulmonalinsuffizienz finden sich starke Dilatation und Hypertrophie des rechten Ventrikels, Verbreiterung der Herzdämpfung nach rechts, über der Pulmonalis ein lautes diastolisches Geräusch, das den 2. Pulmonalton verdeckt oder neben ihm hörbar ist sowie starke Pulsation im Bereich des rechten Ventrikels. Das Vitium ist sehr selten, kommt auch angeboren vor (s. unten).

**Angeborene Herzfehler.** Angeborene Vitien sind oft gleichzeitig mit Mißbildungen des Herzens vergesellschaftet. Letztere sind hauptsächlich Defekte in der Scheidewand von Vorhof oder Kammer bzw. Offenbleiben des Ductus Botalli.

Der häufigste von allen angeborenen Klappenfehlern ist die Pulmonalstenose (s. oben). Von der Geburt an besteht intensive Cyanose, der sog. Morbus



coeruleus, der oft *prima vista* die Diagnose des Vitiums gestattet; auch entwickelt sich eine kolbige Auftreibung der Endphalangen der Finger und Zehen mit Krümmung der Nägel, sog. Trommelschlägelfinger. Im Blut besteht Vermehrung der Erythrocyten. Die Entwicklung der Kinder bleibt stark zurück, sie sterben vor Erreichen der Pubertät. Das Vitium ist oft mit anderen Entwicklungsfehlern des Herzens kombiniert.

Die Aortenstenose kommt auch als angeborener Herzfehler vor. Näheres s. oben.

Offenbleiben des Foramen ovale, d. h. Persistieren eines in der Fötalzeit physiologischen Zustandes ist die häufigste Mißbildung; sie kann völlig symptomlos bleiben. Bei gleichzeitigem Vorhandensein eines Mitralvitiums beobachtet man eine auffallend starke Cyanose infolge Übertretens von venösem Blut aus dem linken in den rechten Vorhof. Defekte im Foramen ovale sind auch die Erklärung für gekreuzte oder paradoxe Emboli, die aus dem rechten Herzen und den Körpervenen stammend, in diesem Fall in das linke Herz übertreten und in die Arterien des großen Kreislaufs verschleppt werden können.

Bei Offenbleiben des Ductus Botalli strömt beständig Blut aus der Aorta in die Arteria pulmonalis, was zu einer Ausbuchtung der letzteren und zu Hypertrophie des rechten Ventrikels führt. Diagnostisch wichtig ist ein schornsteinförmiger Aufsatz auf die Herzdämpfungsfigur links neben dem Sternum, ferner ein lautes, von Schwirren begleitetes systolisches Geräusch im 2. linken Ikr. sowie Accentuation des 2. Pulmonaltons und im Röntgenbild starke Vorbuchtung des Pulmonalbogens. Bisweilen ist starke Cyanose vorhanden.

Die sonst vorkommenden angeborenen Fehler und Bildungsanomalien des Herzens sind so selten und im Leben kaum diagnostizierbar, daß an dieser Stelle auf ihre Erwähnung verzichtet werden kann.

**Verlauf und Prognose der erworbenen Klappenfehler:** Da wirkliche Ausheilungen von Klappenfehlern zu den Seltenheiten gehören, so ist praktisch, nachdem einmal ein Vitium im Gefolge von Endokarditis oder Lues usw. entstanden ist, stets mit dem Weiterbestehen desselben auch nach Abheilung des ursächlichen Krankheitsprozesses zu rechnen, ganz abgesehen von der Möglichkeit eines erneuten Aufflackerns desselben in Form rekurrierender Klappenerkrankungen. Sieht man von dem Hinzutreten neuer Klappenfehler zu einem alten Vitium bzw. vom Fortschreiten anatomischer Veränderungen einer Klappe wie bei Arteriosklerose, Lues ab, so ist für den weiteren Verlauf und die Prognose eines Falles hauptsächlich entscheidend das Verhalten des Herzmuskels; von ihm hängt der Zeitpunkt ab, wann das bis dahin kompensierte Vitium in den Zustand der Dekompensation übergeht. Eine gleichzeitig bestehende Myokarditis oder ihre Residuen wie Herzschwelen bzw. diffuse Sklerose des Myokards müssen daher von vornherein die Prognose eines Vitiums ungünstiger gestalten als bei intaktem Herzmuskel. Das gleiche gilt von der das Vitium begleitenden Erkrankung der Coronargefäße. Es sind dies u. a. die Gründe für die schlechte Prognose arteriosklerotischer,luetischer, aber auch mancher akut-infektiöser Klappenerkrankungen, wie z. B. bisweilen bei Polyarthrit. Ist dagegen der Herzmuskel intakt, so kann unter sonst günstigen Bedingungen ein Klappenfehler lange Zeit, bisweilen Jahrzehnte lang gut kompensiert bleiben. Die Dauer eines Klappenfehlers schwankt zwischen einigen Monaten und vielen Jahren. Als Durchschnittsdauer ergaben sich bei größeren Statistiken etwa 10 Jahre.

Von den einzelnen objektiven Zeichen am Herzen darf der Wechsel im Verhalten der Herzgeräusche, etwa ihr Leiserwerden oder Schwin-

den zur Bewertung des jeweiligen Zustandes des Herzens nicht verwertet werden. Das gleiche gilt für die Arrhythmien, speziell Extrasystolen und die Arrhythmia perpetua, wenn auch bei ihrem dauernden Bestehen eine Minderleistung des Zirkulationsapparats und dadurch wiederum eine vermehrte Inanspruchnahme des Herzens eine häufige Folge ist. Viel wichtiger ist das Verhalten des Pulses bezüglich Frequenz und Grad der Füllung. Frequent- und Kleinerwerden desselben ist stets als ungünstiges Zeichen zu deuten.

Auch die Dilatation ist nur mit Reserve für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Herzmuskels zu bewerten. Denn wenn einerseits bei manchen Herzfehlern die Dilatation keine notwendige Begleiterscheinung ist, so wird sie andererseits als akkommodative Dilatation doch ungemein häufig angetroffen, ohne daß die Leistungsfähigkeit des Herzens deshalb beeinträchtigt ist; dilatierte Klappenfehlerherzen können bei gleichzeitiger Hypertrophie sogar jahrelang Erstaunliches an körperlicher Arbeit leisten. Wohl ist dagegen eine schnell zunehmende Dilatation (Stauungsdilatation) stets ein ungünstiges Zeichen, was namentlich von derjenigen des rechten Vorhofs gilt. Doch können andererseits hochgradigste, schnell entstandene Dilatationen unter rationeller Therapie wieder zurückgehen und sich damit zugleich als Stauungsdilatation kennzeichnen. Es kann dann bei mittlerer Beanspruchung des Herzens die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit wieder für eine Zeitlang eine relativ gute werden. Bisweilen tritt das dem Kranken bis dahin unbewußte, weil gut kompensierte Vitium erst dann plötzlich in die Erscheinung, wenn er seinem Herzen eine für seine Verhältnisse zu große Leistung körperlicher oder seelischer Art zumutet oder eine interkurrierende Erkrankung, z. B. eine Pneumonie erheblich vermehrte Ansprüche an den Zirkulationsapparat stellt. Zu erwähnen ist hier auch die mitunter plötzlich eintretende ungünstige Wendung, wenn nach Besserung der Dekompensation infolge Hebung der Herzkraft es dadurch zur Mobilisierung von Thromben und Embolien im Gehirn oder in der Lunge kommt. In der Mehrzahl der Fälle allerdings entwickelt sich langsam fortschreitend das Bild der Dekompensation, wobei die Aussicht auf die Wiederherstellung der Kompensation, abgesehen von der besonderen Art des Klappenfehlers (vgl. oben den Unterschied zwischen Mitralfehlern und Aorteninsuffizienz) auch von der allgemeinen Konstitution und den übrigen somatischen Verhältnissen des Individuums abhängig ist. Arteriosklerose, Alkoholismus, Fettleibigkeit, Kyphoskoliose, chronische Bronchitis, Emphysem, Obliteration des Herzbeutels, Schrumpfniere usw. trüben als Komplikation die Prognose jedes Vitiums. Die Gravidität bewirkt als solche meist keine wesentliche Verschlimmerung eines Vitiums, um so mehr die Entbindung, die namentlich für die Mitralfehler eine schwere Gefahr bedeutet und schon bei nur geringer Störung der Kompensation in der Regel schwerste lebensbedrohende Dekompensation unmittelbar nach sich zieht. Das gleiche gilt von der Frühgeburt. In diesen Fällen ist daher vor Konzeption zu warnen bzw. die Gravidität in den ersten Monaten zu unterbrechen.

Das Syndrom der Dekompensation zeigt je nach der Art des Klappenfehlers und dem dabei hauptsächlich beteiligten Herzabschnitt in seinen einzelnen Zügen gewisse Unterschiede, die sich aus dem früher Gesagten erklären.

Bei der Dekompensation von Aortenfehlern dominiert in der Regel, namentlich wenn sie sich schnell entwickelt, das Versagen der linken Kammer mit starker Atemnot, schlecht gefülltem Puls und starker Hautblässe, während Cyanose fehlt und Ödeme und Stauungsleber nur angedeutet sind. Auch bei der Mitralinsuffizienz steht meist im Beginn der Kompensation, oft aber auch im weiteren Verlauf die Schwäche des linken Ventrikels ebenfalls im Vordergrund, wozu aber hier auch Erscheinungen der Insuffizienz der rechten Kammer hinzutreten. Man beobachtet daher zuerst Dyspnoe, dann bald Ödeme, Cyanose, Stauungsleber eventuell mit Ikterus. Bei der Mitralstenose pflegt die Cyanose und die allgemeine venöse Stauung früh einzutreten, wogegen die Atemnot dauernd und in stärkerem Maße sich erst später bemerkbar zu machen pflegt.

Im übrigen sei hier auf das im Abschnitt über die Herzmuskelschwäche S. 149 Gesagte verwiesen.

Therapie vgl. Therapie der Herzmuskelschwäche.

### Therapie der Herz- und Kreislaufschwäche.

Die Therapie der akuten Herzschwäche hat für Anregung der Herz- und Gefäßtätigkeit sowie in manchen Fällen für eine Entlastung des Herzens Sorge zu tragen.

Letzterer dient ein kräftiger Aderlaß von ca. 5 ccm pro Kilogramm Körpergewicht, der bei Überfüllung der rechten Kammer ausgezeichnet wirkt; wichtig ist hierbei, daß das Blut im Strahl und nicht tropfenweise entleert wird. Ferner Senfpackungen für den Brustkorb, die namentlich bei Stauungskatarrh der Lunge, heftiger Atemnot und Lungenödem Hervorragendes leisten. An Medikamenten ist, besonders bei starker Dyspnoe, zunächst Morphinum  $\frac{1}{2}$ —1 cg subcutan anzuwenden (Vorsicht bei Angina pectoris!). Zur Kräftigung des Herzens ist anstatt Digitalis, das zu langsam wirkt, Strophanthin intravenös  $\frac{1}{4}$  bis höchstens  $\frac{3}{4}$  mg zu verabreichen; ferner starker Kaffee, starker Wein, Kognak, dagegen nicht Sekt, der den Magen aufbläht. Die bei der akuten Herzschwäche gleichzeitig bestehende oder sogar dominierende Vasomotorenlähmung (s. oben) indiziert ferner die Anwendung von gefäßkontrahierenden und den Blutdruck steigernden Medikamenten, so das Vasomotorenzentrum anregende Coffein am besten als 5—10%ige Lösung von Coffein. natriobenzoic. bis zu 2stündlich 1 ccm, Ol. camphorat. (10%ig oder forte 25%ig) bis zu 1,0 Campher in 24 Stunden, beides nicht subcutan, sondern intramuskulär, ferner das peripherisch wirkende Adrenalin als SuprareninstammLösung bis 0,3 ccm auf einmal subcutan; es kann, wenn gut vertragen, infolge seiner flüchtigen Wirkung mehrmals am Tage gegeben werden, auch als Zusatz zu NaCl-Infusionen bei Vasomotorenschwäche infolge starker Blutverluste. In letzterem Fall ist auch das Einwickeln der Extremitäten mit elastischen Binden anzuwenden. Langsamer aber nachhaltiger als Adrenalin wirken Hypophysenpräparate, so das Coluitrin in Ampullen 2mal täglich  $\frac{1}{2}$ —1 ccm; auch das Strychnin. nitric. ist zu versuchen (1—3 mal täglich 1 mg subcutan).

Bei starker Dyspnoe ist der Oberkörper hoch zu lagern, dabei aber jede Beugung des Abdomens wegen der Atmung zu vermeiden. Stets ist möglichst rasch für ausgiebige Entleerung von Stuhl und Gasen durch Einlauf, Glycerinspritze, Darmrohr zu sorgen.

Bei der Therapie der chronischen Herzmuskelschwäche hat nur in einer kleinen Zahl von Fällen das Bestreben, die eigentliche Ursache des Herzleidens zu beseitigen Aussicht auf Erfolg. Spezifische Behandlung bei Lues, Besserung eines chronischen Lungenleidens wie Bronchitis,

Emphysem usw., Behandlung der Arteriosklerose, chirurgische Therapie bei Herzbeutelobliteration, Thorakolyse bei ausgedehnten Schrumpfungsprozessen der Lunge, Behandlung der Fettsucht können, wenn es sich um für die Herzschwäche ursächliche Prozesse handelt, sehr wirkungsvoll die Herzbeschwerden lindern. Stets hat jedoch daneben die Herzbehandlung selbst ausgedehnte Berücksichtigung zu finden; in schweren Fällen ist die Einleitung einer ätiologischen Therapie erst erlaubt, wenn die Herzschwäche gebessert ist.

Die Therapie der chronischen Herzmuskelschwäche hat die Schonung, Kräftigung und Übung des Herzmuskels zum Ziel. Man erreicht dieses durch medikamentöse und physikalisch-diätetische Maßnahmen.

In erster Linie bedarf jeder Herzkranker körperlicher und seelischer Ruhe. Bei stärkerer Herzinsuffizienz, so bei dekompensierten, schon in der Ruhe dyspnoischen Vitiern ist Aufenthalt im Bett oder Lehnstuhl notwendig. Bei stärkerer nervöser Erregbarkeit sind Brompräparate, z. B. mehrmals täglich 1,0 Bromkali sowie Baldrian anzuwenden, während Morphinum in diesen Fällen nicht am Platze ist. Sehr wichtig ist, für den Schlaf Herzkranker zu sorgen, z. B. durch Medinal, Bromural, Bromkali, Adalin sowie durch Vermeiden größerer Mahlzeiten vor dem Schlafen. Oft wirken hier die Herzmittel Digitalis und Strophanthus (s. unten) durch Verbesserung der Zirkulation gleichzeitig als Schlafmittel. Zur Schonungstherapie gehört auch die Regelung der Darmtätigkeit bzw. Beseitigung der häufigen chronischen Obstipation einschließlich des sehr schädlichen Meteorismus durch Sagradapräparate, Istizin, Brustpulver, Einläufe, wogegen salinische Abführmittel kontraindiziert sind, ferner durch diätetische Regelung: viel Obst sowie Fette, Vermeiden von Kakao und groben Kohlarten. Starkes Pressen bei der Stuhlentleerung ist für den Herzkranken gefährlich und kann sowohl durch Blutdrucksteigerung wie durch Mobilisierung von Thromben lebensgefährlich wirken. Die Nahrungsaufnahme soll in kleinen Portionen in etwa fünf Mahlzeiten erfolgen. Bei plethorischen Individuen und bei gutem Ernährungszustand empfiehlt sich bisweilen die Anwendung der Karellschen Milchkur, täglich 4 mal je 200 ccm Milch, außerdem nur etwas Cakes. Schonung des Herzens erfordert auch Verminderung größerer Flüssigkeitsaufnahme, im Stadium der Kompensation nicht mehr als insgesamt 2–3 Liter in 24 Stunden, bei dekompensierten Fällen, namentlich mit Neigung zu Ödemen höchstens 1–1½ Liter Flüssigkeit, wenn möglich noch weniger. Im Zusammenhang hiermit ist NaCl-arme, vorwiegend lactovegetabilische Kost namentlich bei den zu Wasserretention neigenden Fällen am Platz. Gewürze sind stets zu vermeiden. Sexuelle Betätigung ist bei dekompensierten Fällen zu verbieten, bei leichterer Erkrankung ist vor Übermaß zu warnen, das gleiche gilt vom Rauchen.

Die Kräftigung des Herzmuskels erreicht man in sehr wirksamer Weise durch medikamentöse Therapie, vor allem durch **Digitalisbehandlung** (Digitalis, Strophanthus usw.). Die Folia digital. titrata<sup>1)</sup> in Einzeldosen von 0,05–0,1 bewirken bei insuffizientem Herzen (nicht beim normalen) Zunahme der systolischen Kraft des Herzmuskels durch Erhöhung der Anfangsspannung, d. h. Vergrößerung des Schlagvolumens sowie Vermehrung der diastolischen Füllung, ferner Verlangsamung der Schlagfrequenz (vgl. Bradykardie S. 155), weiter Erschwerung der Überleitung vom Vorhof zur Kammer; von den reizerzeugenden Zentren werden die tertiären, in der Ventrikelwand gelegenen (vgl. S. 127) in ihrer Erregbarkeit gesteigert. Eine Hauptdomäne der Digitalis ist die Insuffizienz des hypertrophischen Herzmuskels. Die Wirkung auf die Gefäße ist beim Menschen nur gering. Indikation für die Digitalis ist das Vorhandensein von Herzmuskelschwäche aller Grade, soweit sie objektiv nachweisbar ist, wogegen bloße

<sup>1)</sup> Nur die titrierten Blätter sind wegen ihres genau bekannten Wirkungsgrades anzuwenden. Die Titration erfolgt am Froschherzen.

Tachykardie, Herzklopfen, im allgemeinen auch Arrhythmien allein keine Indikation bilden. Die therapeutische Wirkung erkennt man an der besseren Füllung des Pulses, dessen Amplitude wächst, an dem Zurückgehen der Herzdilatation<sup>1)</sup>, Abschwellen der Stauungsleber, Rückkehr des Blutdrucks zu normaler Höhe, Zunahme der Diurese und Schwinden der Ödeme, Abnahme der Bronchitis, der Dyspnoe und des Stauungshustens und an der Besserung des allgemeinen subjektiven Befindens der Patienten. Meist wird der Puls gleichzeitig langsamer, oft schwinden Arrhythmien, speziell manche Extrasystolen oder werden wenigstens seltener. Die Erschwerung der Überleitung kommt besonders den Fällen mit Arrhythmia perpetua, namentlich der schnellen Form zugute, indem hierbei der Kammer weniger Reize vom Vorhof zufließen, was für erstere eine Erholung bedeutet. Maßgebend für die Beurteilung einer Digitaliswirkung soll stets das gesamte Krankheitsbild sein, zumal oft die eine oder andere der genannten Wirkungen ausbleibt. Erfolgreich ist die Digitalis vor allem bei insuffizientem und gleichzeitig hypertrophischem Herzmuskel speziell bei dekompensierten Klappenfehlern, bei kardial dekompensierten Nierenleiden, bei Herzinsuffizienz infolge Arteriosklerose, Hypertonie, Hindernissen im kleinen Kreislauf. Voraussetzung ist, daß der Herzmuskel noch über genügende Reservekräfte verfügt, die die Digitalis aus ihm herauszuholen vermag. Schlecht wirksam ist sie dagegen bei akuter Herzmuskelerkrankung, z. B. der Myokarditis bei Infektionskrankheiten, bei Insuffizienz infolge Herzbeutelobliteration, beim Herz der Fettleibigen sowie bei manchen vorwiegend sich auf den einen Ventrikel beschränkenden Fälle von Debilitas cordis, wie z. B. bei Aorteninsuffizienz. Angina pectoris ist an sich keine Indikation für Digitalis, wohl aber bei gleichzeitig bestehender Herzmuskelschwäche. Die Wirkung auf den Blutdruck ist verschieden. Blutdrucksteigerung in Form der sog. Hochdruckstauung (s. S. 151) wird oft durch Digitalis gebessert, bildet also keine Gegenanzeige, die dagegen durch Neigung zu Embolie und Apoplexie gegeben ist. Bei Auftreten von Überleitungsstörungen sowie von Bigeminie (Erregung tertiärer Zentren, s. oben) während der Behandlung mit Digitalis ist diese abzusetzen; vorher bestehende Bigeminie kann dagegen durch Digitalis schwinden.

Man gibt die Digitalis als Pulv. fol. digit. titr. oder als Pillen (besser wie das Infus) 2—4 mal täglich 0,1 auf vollen Magen mehrere Tage hintereinander; der Erfolg muß spätestens am Ende einer Woche bemerkbar werden. Empfehlenswert sind ferner in Tablettenform Digipurat (Knoll), Digifolin (Ciba) und Verodigen (Boehringer); jede Tablette entspricht 0,1 Fol. digital. Bei starker Pfortaderstauung (Leberschwellung), die die Resorption erschwert, 1—3 mal täglich 1 cem Digipurat- oder Digifolinlösung intramuskulär oder per Clyisma, da hierbei die Resorption durch die Hämorrhoidalvenen unter Umgehung des Pfortaderkreislaufs erfolgt. Nach eingetretener Wirkung ist das Mittel versuchsweise abzusetzen; in anderen Fällen empfiehlt sich kontinuierliche Digitalisierung mit kleineren Dosen, 1—3 mal täglich 0,05. Schnelle Wirkung erreicht man mit Strophanthus: Tinct. strophanth. titr. 2—3 mal täglich bis zu 5 Tropfen; es macht oft Magenbeschwerden und bisweilen Durchfälle; sehr prompt wirkt Strophanthin intravenös (1 mg-Ampullen Boehringer), das erste Mal 0,25 mg, eventuell nach 24 Stunden wiederholen; höchste zulässige Dosis 0,75 mg. Bei vorheriger Digitalismedikation ist wegen Kumulationsgefahr mindestens 3 Tage zu warten; die Injektion ist sehr langsam auszuführen. Wirksam auch als Clyisma: Tct. strophanthi und Digipurat aa 10 Tropfen 3 mal täglich. Fortsetzung der Therapie eventuell mit Digitalis. Oft ist auch bei chronischer Herzinsuffizienz der Campher wirksam, namentlich auch dort, wo Digitalisbehandlung versagt (Ol. camphorat. als Injektion s. oben oder per os Cadecholttabletten Boehringer zu 0,1, 3 mal täglich 1 Tablette). Bei Arrhythmia perpetua bewirkt mitunter Chinidin sulfur. per os Regularisierung der Schlagfolge. Erst nach vorhergehender Digitalisbehandlung und erfolgter Besserung der Insuffizienz beginnt man nach Aussetzen der Digitalis mit 1 mal 0,2, dann die nächsten Tage langsam steigend bis zu 3 mal 0,4, im ganzen nicht länger als 1 Woche; bei Auftreten von Kopfschmerz und Schwindel ist es sofort abzusetzen.

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu die Bemerkung über die Bedeutung des Zwerchfellstandes. S. 133.

Von großem Nutzen ist ferner die Anwendung der **Purinkörper** (Coffein und Theobromin und ihrer Derivate). Neben ihrer den Gefäßtonus hebenden Eigenschaft üben sie eine günstige Wirkung auf den Herzmuskel durch Erweiterung der Coronargefäße aus. Daneben bewirkt ihr diuretischer Effekt oft auch in den Fällen günstige Entwässerung, die keine sichtbaren Ödeme erkennen lassen.

Coffein 1—3mal täglich 0,1 oder als Coffein. natriobenzoic. (S. 174), Theobromin 3—5mal täglich 0,2—0,3. Stärker diuretisch wirken das Theobromin. natriosalicyl. (Diuretin) 2,0—4,0 pro die in Tabletten zu 0,5 sowie das Theazylon (Tabletten zu 0,5) in derselben Dosierung, am stärksten das Theocin (2—3mal täglich 0,1 in Kapseln), das aber leicht Magenbeschwerden und Übelkeit verursacht, sowie das Euphyllin 2mal täglich 0,25 per os oder als Suppos. zu 0,36, besonders energisch intravenös (in Ampullen zu 2 ccm = 0,48), wobei die Hälfte einer Ampulle zu injizieren ist. Bei Fehlen von Nephritis und Enteritis hat sich das Novasurol (Ampullen zu 2 ccm) als starkes Diureticum bewährt: versuchsweise zunächst 1 ccm, dann eventuell 2mal wöchentlich je 2 ccm intramuskulär. Bei starkem Anasarca Hautdrainage mit Curschmannschen Trokaren. Bei Schwitzprozeduren Vorsicht wegen Herzschwäche. — Linderung des starken Herzklopfens durch Eisblase, Herzflasche, Senfpflaster auf die Herzgegend sowie leichte Rückenklöpfung. Therapie der Angina pectoris s. S. 162.

Die Behandlung mit **Kohlensäurebädern** (natürliche in Nauheim, Kissingen, Oeynhausien, Salzflun, Kudowa, Altheide, Marienbad, Franzensbad usw. sowie künstliche) eignet sich nur für leichte Insuffizienzfälle; sie ist stets unter ärztlicher Kontrolle auszuführen. Ihre Wirkung steigt mit dem CO<sub>2</sub>-Gehalt und dem Sinken der Temperatur der Bäder.

Der Erfolg der Bäder, der sich aus Reizwirkungen auf das Gefäßsystem, Beinflussung des Blutdrucks u. a. erklärt, hängt von der sorgfältigen individuellen Abstufung der Bäder ab. Stets müssen sie auch subjektiv Besserung herbeiführen. Kontraindikation auch bei leichter Insuffizienz: starke Blutdrucksteigerung, Aneurysmen, starke Arteriosklerose, Schrumpfnieren, Apoplexie, Netzhautblutung und höheres Alter.

Bei leichter Herzmuskelschwäche ist ferner für die Nachbehandlung vorsichtig dosierte Gymnastik sowie Massage von Vorteil.

Beide verbessern die peripherische Zirkulation und bewirken überdies durch Übung der Muskulatur eine Kräftigung des Herzmuskels (vgl. S. 148); sie sind daher vor allem bei muskelschwachen und fettleibigen Personen indiziert und haben hier auch prophylaktische Bedeutung. Beginn mit passiven Bewegungen, die man langsam steigert, z. B. schwedische Gymnastik oder Zander-Apparate; sorgfältige Kontrolle des subjektiven und objektiven Befindens ist unerlässlich. Zu warnen ist vor selbständigen Übungen der Patienten ohne ärztliche Kontrolle; Vorsicht bei der Oertelschen Terrainkur.

## Nervöse Herzleiden (Cor nervosum, Herzneurose).

Ein nervöses Herzleiden ist charakterisiert durch eine Reihe verschiedener auf das Herz hinweisender Beschwerden ähnlich denen bei organischen Herzleiden, aber ohne anatomische Grundlage. Sie treten teils als Teilerscheinungen allgemeiner Nervosität (Cor nervosum) auf, teils als mehr selbständiges Leiden bei im übrigen Nervengesunden als sog. Herzneurose.

Die Beschwerden sind in erster Linie Herzklopfen<sup>1)</sup>, ferner Gefühl von Aussetzen der Herzaktion, Druck auf der Brust, Beklemmung, Atemnot, Angstgefühl, Schmerzen und Stiche in der Herzgegend. Oft treten sie anfallsweise auf und können dann gelegentlich an Angina pectoris („Pseudoangina“) erinnern. Daneben bestehen oft Klagen über

<sup>1)</sup> Über Herzklopfen klagen häufiger Kranke mit nervösem Herzen als mit organischen Herzleiden.

kalte Hände und Füße, sowie Wallungen zum Kopf. Objektiv finden sich in einem Teil der Fälle Pulsbeschleunigung, oft sicht- und fühlbare verstärkte Herzaktion mit „erschütterndem“ (niemals hebendem!) Spitzenstoß, nicht selten ventrikuläre Extrasystolen, während andere Arten von Arrhythmien nicht zum Bilde gehören. Bei manchen Patienten besteht starke Labilität des Blutdrucks, der z. B. bei der ersten ärztlichen Untersuchung in die Höhe schnell, um alsbald wieder zur Norm zurückzukehren.

Zu den Ursachen gehören abgesehen von der disponierenden neuropathischen Konstitution bzw. erworbenen Neurasthenie, als auslösende Faktoren vor allem psychische Erregungen, geistige Überanstrengung, aber auch körperliche Übermüdung, z. B. übertriebener Sport, Verdauungsstörungen namentlich in der Form des sog. gastrokardialen Symptomenkomplexes (Zwerchfellhochstand infolge von Meteorismus resp. großer Magenblase, besonders bei ♂), sehr häufig Anomalien im Geschlechtsleben wie Masturbation, Coitus interruptus, ferner Kaffee- und Nicotinabusus.

Diagnose: Entscheidend ist neben dem allgemeinen nervösen Habitus (Steigerung der Reflexe, Tremor) vor allem das Fehlen objektiver organischer Symptome.

Es fehlen Herzdilatation, Cyanose, Ödeme und alle sonstigen Zeichen von Herzinsuffizienz; Beschaffenheit des Harns an Menge, Farbe und spezifischem Gewicht normal. Bezeichnend ist die oft vorhandene Labilität der Symptome, die wie namentlich die Tachykardie nicht selten unter den Augen des Arztes bei abgelenkter Aufmerksamkeit schwindet. Charakteristisch ist oft im Gegensatz zu organischer Herzkrankheit die Redseligkeit, mit der der Patient z. B. während des Treppensteigens oder der Ausführung von Kniebeugen sein „Herzleiden“ beschreibt. Das gleiche gilt für die Pseudoangina pectoris, bei der die nervöse Unruhe gegenüber dem Stillhalten des Kranken mit echter Angina auffallend absteht.

Therapie: Beseitigung der schädlichen Ursachen; körperliche und seelische Ruhe; Regelung der Darmtätigkeit, Vermeiden von blähenden Speisen und CO<sub>2</sub>-haltigen Getränken sowie von Kaffee und Tabak. Brom (z. B. Sedobrol, Mixt. nervina, Bromural), eventuell leichte Schlafmittel wie Adalin oder Medinal (niemals Morphinium!). Milde Hydrotherapie. Digitalis und Jod sind kontraindiziert. Sehr wichtig ist Psychotherapie: man überzeuge den Kranken davon, daß er nicht „herzleidend“ ist, daß sein Leiden harmlos sei usw. Herzneurosen gehören nicht in Herzheilbäder wie Nauheim usw.

## Erkrankungen des Herzbeutels.

### Perikarditis.

Die Entzündung des Perikards kommt vor sowohl als Pericarditis sicca mit Abscheidung von Fibrin auf den beiden Perikardblättern, als auch als exsudative Form mit einem entzündlichen, meist hämorrhagischen Erguß; in selteneren Fällen ist dieser rein eitrig oder jauchig. Oft ist gleichzeitig Endokarditis und Myokarditis vorhanden.

In der Regel ist die Perikarditis Begleiterscheinung einer anderen Grundkrankheit, am häufigsten der Polyarthritis, nächstdem der Tuberkulose; sie kommt ferner vor bei Sepsis, Scharlach und anderen Infektionskrankheiten (hämato-gen), weiter bei Nephritis (Schrumpfniere), endlich durch Übergreifen eines Krankheitsprozesses von der Nachbarschaft auf das Perikard, so bei Pneumonie und Pleuritis, sowie speziell

als eitrige und jauchige Perikarditis im Anschluß an verjauchte und perforierte Oesophaguscarcinome, Pyopneumothorax und andere infektiöse Prozesse in der Brusthöhle. Die sogenannte idiopathische Perikarditis beruht in der Regel auf Tuberkulose.

Objektiver Herzbefund bei Pericarditis sicca: Charakteristisch ist das über dem Herzen hörbare Reibegeräusch, das durch die Rauigkeiten des Perikards zustande kommt.

Dasselbe ist oft zuerst nur an der Herzbasis im Bereich des Conus arteriosus, später oft auch an anderen Stellen zu hören. Es ist rau, schabend, dem Ohre naheklingend, oft mehrteilig als sog. Lokomotivgeräusch und palpatorisch wahrnehmbar. Zum Unterschiede von endokardialen Geräuschen wird es durch Druck mit dem Stethoskop verstärkt, ist ferner oft auf einzelne umschriebene Stellen beschränkt, wird nicht fortgeleitet gehört und wird durch Lagewechsel stark beeinflusst. Oft ist es nur von ganz kurzer Dauer. Pleuroperikardiale Geräusche s. S. 139.

Befund bei Pericarditis exsudativa: Die Flüssigkeitsansammlung im Herzbeutel bewirkt eine charakteristisch gestaltete Vergrößerung der Herzdämpfungsfigur.

Die Flüssigkeit sammelt sich zunächst zwischen rechtem Vorhof und Leber in dem sog. Herzleberwinkel, später am linken Herzrande. Das Übergehen des normal rechtwinkligen Herzleberwinkels in einen stumpfen Winkel bildet daher eines der ersten Symptome. Bei größeren Exsudaten zeigt die Herzdämpfung schließlich die Form eines gleichschenkligen Dreiecks mit der Spitze nach oben, wobei der Spitzenstoß<sup>1)</sup> ein beträchtliches Stück innerhalb der linken Herzgrenze liegt. Als weitere Unterscheidung von Herzdilatation dient die schnelle Zunahme der Dämpfung sowie der geringe Abstand zwischen absoluter und relativer Dämpfung. Partielle Obliteration des Perikards kann völlig atypische physikalische Befunde bewirken. Große Exsudate komprimieren den linken unteren Lungensappen, der eventuell atelektatisch wird. Gelegentlich beobachtet man links Recurrenslähmung.

Die wenig charakteristischen subjektiven Beschwerden bei Perikarditis bestehen mitunter nur in Druckgefühl sowie schmerzhaften Empfindungen in der Herzgegend, gelegentlich in stenokardischen Beschwerden, oft aber lediglich in Zeichen allgemeiner Kreislaufschwäche; der Puls wird klein, weich, frequent. Große Exsudate können durch Behinderung der diastolischen Ausdehnung des Herzens unmittelbar lebensgefährlich werden. Gelegentlich kommt bei ihnen Pulsus paradoxus vor. Fieber kann fehlen. Im übrigen wird der Allgemeinzustand wesentlich durch das Grundleiden bestimmt.

Die Prognose richtet sich vor allem nach dem Grundleiden. Viele Fälle heilen; am günstigsten ist die Prognose bei Polyarthritiden. Eitrige Perikarditis ist in der Regel tödlich. Von der größten Bedeutung für die Prognose ist der Zustand des Herzmuskels. Zahlreiche Fälle führen zu Obliteration des Perikards, namentlich die Perikarditis im Kindesalter.

Therapie: Strenge Bettruhe, Eisblase aufs Herz (Herzflasche), Sedativa wie Morphium, Baldrian; eventuell Excitantien: Coffein, Campher; bei Herzschwäche Digitalis und Strophanthus. Bei exsudativer Perikarditis Diuretica: Diuretin viermal täglich 0,5, Euphyllinsuppositorien zweimal täglich 1. Bei großem Exsudat ist Entleerung durch Punktion erforderlich:

<sup>1)</sup> Er wird deutlicher, wenn sich der Patient vornüber beugt.



Nach vorheriger Probepunktion punktiert man mit einer Curschmannschen Nadel unter Äthylchloridanästhesie (keine Narkose!) in oder außerhalb der Mamillarlinie im 5. oder 6. Intercostalraum. Eitrige Exsudate erfordern die operative Eröffnung des Perikards.

**Hydroperikard** (Herzbeutelwassersucht) findet sich oft bei allgemeiner Wassersucht. Der physikalische Befund ist der gleiche wie bei Pericarditis exsudativa; das gleiche gilt für das **Hämoperikard** d. h. Blutung in den Herzbeutel bei Perforation von Aneurysmen, Herzruptur usw. Bei **Pneumoperikard** (Luft im Herzbeutel) nach penetrierenden Verletzungen oder jauchiger Zersetzung eines Exsudates mit Gasbildung tritt an die Stelle der Herzdämpfung lauter tympanitischer Klang.

### Herzbeutelobliteration (Syncretio pericardii).

Obliteration des Perikards ist stets die Folge einer Perikarditis, wenn auch letztere bisweilen anamnestisch nicht zu eruieren ist, was speziell für die tuberkulöse Form gilt. Oft wird die Obliteration erst bei der Autopsie entdeckt.

In schweren Fällen ist das Herz vollkommen in derbes Bindegewebe eingebettet. Auch das mediastinale Bindegewebe kann schwierig verändert sein und die großen Gefäße fixieren (schwierige Mediastino-Perikarditis); in solchen Fällen ist dann das Herz am Sternum, evtl. auch an der Wirbelsäule fixiert und wird dadurch mechanisch schwer beeinträchtigt. Häufig ist auch gleichzeitig eine Pleuritis adhaesiva vorhanden.

Die nur in einem Teil der Fälle am Lebenden mögliche Diagnose stützt sich auf den Nachweis einer systolischen Einziehung der Spitzenstoßegend bzw. der ganzen Herzregion (Vergleich mit dem Carotispuls!), sowie des Vorschleuderns derselben während der Diastole. Öfter ist Pulsus paradoxus (vgl. S. 142) nachweisbar. Auch beobachtet man mitunter diastolischen Venenkollaps, ferner bei der Inspiration anstatt der normalen Hebung des unteren Brustbeinendes eine Einziehung desselben. Schließlich wird auch das Oliver-Cardarellische Symptom, rhythmische Abwärtsbewegung des Kehlkopfs bei Inspirationsstellung des Thorax beobachtet.

Das Krankheitsbild entspricht dem einer zunehmenden Herzmuskelinsuffizienz. Nicht selten ist gleichzeitig eine Polyserositis, d. h. Pleuritis, chronische Peritonitis, Zuckergußeber (Pseudolebercirrhose) mit Erschwerung des Pfortaderkreislaufs und Ascites vorhanden; sie kann sogar das Bild beherrschen.

Therapie: Digitalis ist meist unwirksam, da das Herz an einer kräftigeren Aktion mechanisch gehindert wird. Erfolgreich ist bei noch nicht völlig insuffizientem Herzmuskel die operative Entlastung des Herzens durch Resektion der dasselbe bedeckenden Rippenabschnitte (Kardiolyse).

## Erkrankungen der Gefäße.

### Arteriosklerose (Atherosklerose).

Die Arteriosklerose ist eine außerordentlich häufige Abnutzungs-krankheit der Arterien, die mit zunehmendem Alter fast physiologisch, unter pathologischen Bedingungen auch in jüngeren Jahren und in ausgedehnterem Maße sich entwickelt. Sie ist bei Männern häufiger als bei Frauen und bildet eine der häufigsten Krankheits- und Todesursachen jenseits des 40. Jahres. Anatomisch handelt es sich um teils produktive, teils degenerative Veränderungen in der Arterienwand. Sie sind streng von denjenigen der Aortitis luetica zu unterscheiden.

**Histologisch** beginnt der Prozeß mit einer hyperplastischen Verdickung der Gefäßintima und zwar einer Vermehrung und Aufspaltung der elastischen Elemente, zwischen die Bindegewebe hineinwächst; hinzugesellen sich degenerative Veränderungen wie Verfettung (Cholesterin) und schleimige Entartung in der Tiefe der elastisch-muskulösen Schicht der Intima. Dieselben fallen aber nicht immer örtlich mit der Hyperplasie zusammen. Die Degenerationserscheinungen können schließlich namentlich an den großen Gefäßen (Aorta) hohe Grade erreichen, die entstandenen Erweichungshöhlen zu Durchbruch in das Gefäßlumen mit Geschwürsbildung (Atherom) führen. Auch die Media zeigt Veränderungen und zwar in Form von Verkalkung, deren Sitz wiederum die elastischen Elemente sind. Sie findet sich hauptsächlich an den Arterien mit stark muskulöser Media, d. h. den der Extremitäten. Bei diesen spielt sie im Gegensatz zu den Arterien, deren Media hauptsächlich elastische Elemente enthält wie die Aorta und Carotis, eine größere Rolle als die Intimasklerose. Verschieden ist von Fall zu Fall der Anteil der produktiven bzw. degenerativen Prozesse, ebenso wechselnd ist die Beteiligung der verschiedenen Gefäßgebiete an der Erkrankung, die bald vorwiegend die Aorta, bald die peripherischen Gefäße oder einzelne Bezirke wie die Hirngefäße oder die Coronarien befällt. Die kleinen Gefäße erkranken an der sog. Endarteriitis obliterans, bei der die Verengung des Lumens oft schließlich zum Verschuß desselben führt. Je nach der Ausdehnung des Prozesses unterscheidet man eine *circumscripte* oder *nodöse* Form wie an den großen und mittleren Arterien (Aorta, Carotis, Gehirn- und Coronararterien), und die *diffuse* Form an den Extremitäten- und Splanchnicusarterien. Prädispositionsorte für die Veränderungen sind Stellen funktionell gesteigerter Inanspruchnahme der Gefäße. So erklärt sich die starke Erkrankung der Extremitätenarterien bei schwerer körperlicher Arbeit (auch bei Sportsleuten), weiter z. B. diejenige der Arteria pulmonalis bei Hypertrophie des rechten Ventrikels (Mitralklappenstenose); ferner erkranken Arterien, die stark an die Umgebung fixiert sind, so am stärksten die Beckenarterien, nächst dem die Aorta. Der Beginn der Arteriosklerose läßt sich anatomisch bis in die Kindheit zurückverfolgen. Die ersten Anfänge (gelbe Flecke in der Aortenintima) sind regelmäßig vom 8. Jahr ab zu konstatieren.

**Ursachen** der Arteriosklerose sind vor allem funktionelle Überanstrengung der Gefäße, namentlich infolge von Steigerung und starken Schwankungen des Blutdrucks, sodann Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit der Gefäßwand durch Infektionskrankheiten und Intoxikationen (Kachexie, Blei), Stoffwechselkrankheiten, speziell Fettsucht, Diabetes. Häufige seelische Erregungen, Überarbeitung, Labilität der Vasomotoren, Mißbrauch von Tabak, Kaffee, Tee (Alkohol?) sind wichtige Faktoren. Auch die Heredität spielt eine bedeutsame Rolle.

Die Folge der Erkrankung der Gefäßwand ist Abnahme ihrer Elastizität, infolgedessen Einbuße der normalen, die Gleichmäßigkeit des Blutstromes gewährleistenden Windkesselfunktion der Gefäße, demnach Erschwerung der Zirkulation sowie Verminderung der normalen Anpassungsfähigkeit des Gefäßkalibers an wechselnde Ansprüche der Organe. Die Endarteriitis der kleinen Gefäße bewirkt schwere Störungen in der Blutversorgung, z. B. Gangrän der Extremitäten, ferner Faseruntergang im Myokard mit Schwielenbildung, Erweichungen im Gehirn usw. Die Brüchigkeit der degenerierten Gefäßwand ermöglicht Rupturen (Blutungen). Die Folgen sind demnach sowohl allgemeiner wie lokaler Art.

**Krankheitsbild:** Je nach der Beteiligung der Gefäße unterscheidet man die Aortensklerose, ferner die kardiale, die renale, die abdominelle, die cerebrale und die peripherische Form<sup>1)</sup>. Ganz allgemein zeigen Patienten mit stärkerer zentraler oder Organsklerose

<sup>1)</sup> Im allgemeinen gilt die Regel, daß diejenigen Gefäßbezirke, die funktionell am meisten in Anspruch genommen werden, am frühesten und stärksten erkranken.

Zeichen vorzeitigen Alterns und machen oft einen auffallend verbrauchten Eindruck.

Die Aortensklerose ist häufig; sie kann sich schon in jüngeren Jahren entwickeln. Oft bleibt sie klinisch symptomlos. Anatomisch besteht mäßige Erweiterung sowie stärkere Krümmung der Aorta. Subjektive Beschwerden sind in der Regel nicht vorhanden. Oft besteht gleichzeitig Coronarsklerose (vgl. S. 161). Objektive Zeichen: Dauernde Accentuation sowie Klingen des zweiten Aortentons bei fehlender Blutdrucksteigerung, eventuell systolisches Geräusch über der Aortenklappe; im Röntgenbild mäßige Verbreiterung der Aorta ascendens (I. schräger Durchmesser) sowie knopfförmiges Vorspringen des




Abb. 13 (nach Munk).

Röntgenbild (dorsoventral) I bei Aortensklerose. II bei Aortenlues.

linken oberen Randbogens (vgl. Abb. 13 I). Der Blutdruck ist nicht gesteigert, Herzhypertrophie fehlt. Bisweilen ist Aorteninsuffizienz vorhanden (vgl. S. 169). Sternale Dämpfung sowie Differenz zwischen dem rechten und linken Puls (vgl. Aneurysma S. 185) sind selten. Wichtig ist die Unterscheidung von Aortenlues (S. 183). Sklerose der Aorta descendens und abdominalis läßt sich in der Regel nicht diagnostizieren.

Kardiale Form s. Coronarsklerose S. 161.

Die renale Form ist die der arteriosklerotischen Schrumpfniere (s. diese); sie ist durch Blutdrucksteigerung charakterisiert, führt zu starker Herzhypertrophie und später oft zu Herzinsuffizienz.

Die nicht häufige abdominelle Form beruht auf Sklerose der Splanchnicusgefäße, speziell der Art. mesenterica sup.

Sie verursacht mitunter die sehr charakteristische Dyspraxia intermittens intestinalis angiosclerotica: Schmerzanfälle in der Oberbauchgegend in der Nachbarschaft des Nabels mit vorübergehendem starken Meteorismus des Colon ascendens und transversum, also ein ileusartiges Bild, wobei aber sichtbare Peristaltik, Bauchdeckenspannung und Druckempfindlichkeit fehlen; mitunter stinkende Stühle. Bei der abdominellen Form wird Blutdrucksteigerung beobachtet.

Die cerebrale Form tritt klinisch unter sehr verschiedenen Bildern auf, teils als schwere organische, herdförmige Störung (Blutungen, einzelne oder multiple Erweichungen), teils in Form seelischer und intellektueller Störungen (Näheres vgl. unter Arteriosclerosis cerebri). Es gibt auch arteriosklerotische Netzhautveränderungen, speziell Blutungen.

Die periphere Form an den Extremitäten macht häufig keine Beschwerden, trotzdem oft deutliche objektive Veränderungen bestehen, die auf die starken Mediaveränderungen (s. oben) zu beziehen sind. Das Gefäßrohr ist verhärtet<sup>1)</sup> („Gänsegurgelpuls“) und geschlängelt

<sup>1)</sup> Doch besteht zwischen dem Tastbefund und dem anatomischen Verhalten nicht immer Übereinstimmung, zumal man palpatorisch zwischen vermehrter Spannung der Gefäßwand und arteriosklerotischen Veränderungen nicht immer sicher zu unterscheiden vermag.

(z. B. die Temporalis); im Röntgenbilde wird es oft als Strang sichtbar. Unter den schweren Folgeerscheinungen ist relativ häufig, speziell im Alter und bei Diabetes die durch Gefäßverschluß bewirkte Gangrän der Extremitäten (Zehen, Fuß und Unterschenkel).

**Symptome:** Das Glied wird blaß und kühl, später schwarzblau, es ist gefühllos oder es bestehen sehr schmerzhaft Parästhesien. Die Arterien (Art. tib. post. hinter dem Malleol. intern. und die Art. dorsal. pedis) sind pulslos. Die brandige Partie ist entweder trocken und schrumpft (Mumifikation), häufiger ist sie bei Hinzutreten von Infektionen feucht. Bei nicht rechtzeitiger Amputation schließt sich oft eine Sepsis an. Äußerer Anlaß zur Gangrän sind meist kleine Verletzungen, Stiefeldruck, Hühneraugen usw. Therapie s. unten.

Sonstige Störungen bei peripherischer Sklerose sind die Claudicatio intermittens und die Raynaudsche Gangrän. Vgl. S. 188.

**Therapie der Arteriosklerose:** In erster Linie Vermeiden aller S. 181 genannten den Kreislauf überanstrengenden Faktoren; in schweren Fällen völlige Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit, im übrigen genügend Ruhepausen, eventuell leichte Schlafmittel: Adalin, Aspirin, Brom, Bromural, Medinal. Diät: Einschränkung des Fleischgenusses, der Gewürze sowie übermäßiger Flüssigkeits- und Salzaufnahme (Kalksalze der Nahrung bedeutungslos!), desgleichen des Alkohols. Verboten starker Kaffee, starke Zigarren, besonders Importen und Zigaretten. Sehr wichtig ist Regelung der Darmtätigkeit und Bekämpfung der Obstipation. Klimatische Kuren oft nützlich: Mittelgebirge, Riviera; mittlere Fälle auch mit Hypertonie bessern sich oft im Hochgebirge. Milde Hydrotherapie. CO<sub>2</sub>-Bäder (Nauheim) bei schwereren Fällen kontraindiziert. Medikamentös Jod, am besten intermittierend, z. B. jeden zweiten Monat täglich bis zu 5 × 0,1 Jodkali oder in Tabletten Sajodin, Jodival, Alival (dreimal täglich 1); Jodismus vermeidet man durch Einschleichen mit kleinen Dosen, Vermeiden von sauren Speisen und Getränken und gleichzeitiger Verabreichung von Natr. bicarb.; eventuell Trinkkur in Bad Tölz-Krankenheil. Jod ist kontraindiziert bei thyreotoxischen Zuständen (Unruhe, Nervosität, Gewichtsabnahme). Die weitverbreitete Angst vor „Verkalkung“ erfordert oft zunächst energische Psychotherapie, die den Patienten von dem seelischen Druck befreit.

Therapie bei renaler Arteriosklerose vgl. Nierenkrankheiten, bei kardialer Arteriosklerose vgl. S. 162.

Therapie der Gangrän: Lokale Wärmeapplikation (Thermophor, Lichtbogen), starke Hitzgrade kontraindiziert, Alkoholumschläge. Frühzeitige Amputation.

## Die Arterienlues

befällt hauptsächlich drei Gefäßgebiete: die Aorta, die Coronargefäße und die Hirnarterien.

Die Aortitis luetica ist eine häufige Erkrankung, die meist zwischen dem 35. und 50. Jahr, im allgemeinen früher als die Arteriosklerose auftritt. Meist entwickelt sie sich erst Jahrzehnte nach der Infektion.

Anatomisch handelt es sich hauptsächlich um Erkrankung der Media („Mes-aortitis“), in der sich kleinzellige Infiltrate und Bindegewebswucherung, zum Teil typisch gummöses Gewebe entwickeln, die zu Zerstörung der elastischen Elemente und Narbenbildung oft mit starker Verdünnung der Wand führen. Auch die Adventitia beteiligt sich unter Erkrankung der Vasa vasorum daran. Die Intima zeigt über den erkrankten Partien eine entsprechende Proliferation. Makroskopisch zeigt die Innenoberfläche der Arterie häufig Furchen und strahlige Narben, die stellenweise wie gepunzt aussehen, wodurch namentlich bei Fehlen von Verkalkungen häufig schon makroskopisch eine Unterscheidung von Arteriosklerose möglich ist. Doch kommt auch Kombination mit Arteriosklerose vor. Im Gegensatz zu letzterer finden sich erstens die stärksten Veränderungen an der Aorta ascendens, speziell der Aortenwurzel am Klappenring; auch beschränkt sich der Prozeß

auf die Brustaorta. Eine regelmäßige Folge der Erkrankung ist Erschlaffung, Erweiterung und Verlängerung der Aorta, nicht selten ferner eine aneurysmatische Ausbuchtung.

Je nach dem Sitz der Erkrankung unterscheidet man eine Aortitis supracoronaria, coronaria, valvularis und aneurysmatica, die einzeln verschiedene Symptome machen, oft aber miteinander kombiniert sind.

**Krankheitsbild:** Das Leiden ist schleichend und progredient, bleibt lange Zeit symptomlos. Subjektive Zeichen sind Beklemmungsgefühl sowie Brennen oder Schmerz hinter dem oberen Teil des Brustbeins, Dyspnoe, sowie ähnlich der Angina pectoris in die linke Schulter und den linken Arm ausstrahlende Schmerzen, teils in der Ruhe, teils erst nach Bewegung. Objektiv findet sich ein verstärkter und klingender zweiter Aortenton, trotzdem der Blutdruck nicht erhöht zu sein pflegt, mitunter auch ein systolisches Aortengeräusch. Ganz besonders wichtig ist der Röntgenbefund: Verbreiterung der Aorta (vgl. Abb. 13 II), die, wie Durchleuchtung im I. schrägen Durchmesser ergibt, sich meist auf die Aorta ascendens bezieht, sowie eventuell vermehrte Krümmung und Verlängerung der Aorta. Herzhypertrophie fehlt. Sternale Dämpfung sowie Pulsationen an der vorderen Brustwand sind inkonstant. Die Wassermannreaktion ist positiv (aber keineswegs immer!). Außerdem kommen eventuell je nach dem Sitz der Erkrankung Symptome der Aorteninsuffizienz (S. 169), der Coronarsklerose (S. 161) oder eines Aneurysmas hinzu. Sehr oft finden sich gleichzeitig Symptome einer Nervenlues (Pupillenstarre usw.).

Von größter Bedeutung ist eine möglichst frühzeitige Diagnose, um in den Anfangsstadien den Prozeß therapeutisch aufzuhalten. Die antiluetische Therapie (Hg, Neosalvarsan, Jod) ist die gleiche wie die S. 161 beschriebene.

Lues der Coronargefäße vgl. S. 162, Lues der Gehirngefäße vgl. Gehirn.

### Aneurysma aortae.

Das Aortenaneurysma ist eine hauptsächlich bei Männern vorkommende Folgeerscheinung der Aortenlues; es wird im gleichen Lebensalter wie diese beobachtet. In der Regel handelt es sich um eine circumscripte, sackförmige Ausstülpung der Arterienwand, viel seltener um eine spindelförmige Erweiterung derselben.

Ursache ist die durch die S. 183 beschriebenen pathologischen Veränderungen bedingte abnorme Nachgiebigkeit der Gefäßwand, speziell der Media, die dem Blutdruck nicht standzuhalten vermag. Traumen können die Entstehung wesentlich fördern. Der Aneurysmensack, der schließlich bis zu Kopfgröße erreichen kann, steht mit der Aorta oft nur durch einen schmalen Hals in Verbindung; er ist im Innern mit geschichteten Thromben ausgefüllt. Zu unterscheiden ist das Aneurysma der Aorta ascendens, des Arcus aortae und der Aorta descendens, von denen das letztere die seltenste Form ist.

**Krankheitsbild:** Die ersten Symptome sind die gleichen wie die der Aortenlues (s. oben), doch zeigen die Schmerzen meist bald eine größere Intensität. Nicht selten ist eine fühlbare Pulsation im Jugulum, die aber auch bei der gewöhnlichen Aortensklerose vorkommt. Häufig ist ferner schon früh eine Dämpfung im 1. und 2. Intercostalraum rechts

bei Aneurysmen der Ascendens, links bei Aneurysmen des Arcus bzw. der Descendens, desgleichen über dem Manubrium sterni nachweisbar. Der gedämpfte Bezirk kann pulsieren. Accentuation sowie Klingen bei des zweiten Aortentones, ferner ein systolisches Aortengeräusch ist bei Aneurysma der Ascendens häufig, bei letzterer findet sich mitunter auch daneben eine Aorteninsuffizienz mit diastolischem Geräusch. In diesen Fällen besteht auch eine sonst bei Aneurysma fehlende Hypertrophie des linken Ventrikels. Der Puls ist beschleunigt, weich, celer (auch ohne Klappeninsuffizienz). Digitalis hat keine Wirkung. Außerordentlich wichtig und für die Frühdiagnose unerlässlich ist die Röntgenuntersuchung (sowohl dorsoventral wie im ersten schrägen Durchmesser), durch die überhaupt erst viele Aneurysmen entdeckt werden.

Der Röntgenbefund ergibt eine rundliche, scharf begrenzte, mit dem Mittelschatten zusammenhängende Prominenz, deren Kontur bei kleinen Aneurysmen oft, bei größeren selten pulsatorische Expansionsbewegungen nach mehreren Richtungen zeigt (Verwechslung mit von der Aorta fortgeleiteter Pulsation z. B. bei Tumoren möglich, die übrigens beim Schluckakt im Gegensatz zu Aneurysmen unbeweglich zu bleiben pflegen).

Aneurysmen des Arcus zeigen mitunter infolge von Verziehung oder Verlegung der Abgangsstellen der Carotiden und der Arterien erhebliche Unterschiede sowie Verspätungen der Pulse dieser Gefäße an symmetrischen Stellen. Da der Aortenbogen auf dem linken Bronchus reitet, so bewirken Aneurysmen häufig pulsatorisch-rhythmische, mit der Herzaktion synchrone Abwärtsbewegungen des Kehlkopfs, die man bei rückwärts gebeugtem Kopf fühlen kann (Oliver-Cardarelli). Verschiedene Symptome erklären sich durch den wachsenden Druck des Aneurysmas auf die Nachbarschaft. Diagnostisch sehr wichtig ist die bisweilen als Frühsymptom auftretende linke, seltener rechte Recurrenlähmung, ohne daß die Stimme alteriert zu sein braucht, desgleichen Störung des Sympathicus (Pupillendifferenz). Es kommt ferner Kompression eines Bronchus vor, desgleichen eine solche des Oesophagus mit Schluckstörungen, namentlich bei Aneurysma des Arcus und der Descendens. Stärkere Entwicklung der Hautvenen fehlt bei den Aneurysmen im Gegensatz zu malignen Tumoren des Mediastinums bzw. Sternums. Oft usuriert das Aneurysma auch die benachbarten Knochen (Rippen, Sternum, Wirbel) und dringt bis unter die Haut als große, pralle, rundliche, pulsierende Geschwulst im Bereich der vorderen oberen Brustwand, seltener (Descendens) hinten zwischen Wirbelsäule und linkem Schulterblatt vor. Wie bei Arterienlues sind auch hier oft Zeichen von Nervenlues (Tabes usw.) vorhanden.

Der Verlauf ist fast stets letal; immerhin kann man hoffen, bei sehr frühzeitiger Diagnose durch energische spezifische Behandlung den Prozeß aufzuhalten. Dauer wenige Monate bis etwa  $1\frac{1}{2}$  Jahr, selten mehrere Jahre. Mitunter kommt es vorübergehend zu kleinen Blutungen. Viele Fälle enden durch Verbluten, andere durch Pneumonie.

**Therapie:** Völlige körperliche und geistige Ruhe (am besten Bettruhe). Spezifische Kur (vgl. S. 161. Alle den Blutdruck steigernden Momente (vgl. S. 144) sind zu vermeiden, u. a. auch erschwerte Stuhlentleerung. Lokale Kälteapplikation, Eisbeutel, Herzflasche. Gelatine zur Steigerung der Gerinnungsfähigkeit

des Blutes als *Gelatina sterilis*. Merck 1—3 mal wöchentlich je 50 ccm subcutan oder 30—40 g Gelatine täglich in Speisen und Getränken. Injektionen in den Aneurysmensack sind gefährlich.

### Die Periarteriitis nodosa

ist eine seltene, mit multipler knotenförmiger Verdickung der Wand der Arterien einhergehende fieberhafte Erkrankung, deren Symptome heftiger Schmerz im Epigastrium, neuritische Erscheinungen an den Extremitäten, Leukocytose und progressive Anämie, hämorrhagische Nephritis und gelegentlich scharlachartige oder Purpura-Exantheme sind. Sie verläuft schubweise, meist letal. Nur in einem Teil der Fälle ließen sich am Lebenden erbsen- bis nußgroße Knötchen durch die Haut palpieren. Ätiologie unbekannt.

### Die essentielle Hypertonie (Hypertension).

Während in der Regel länger dauernde Blutdrucksteigerung Begleiterscheinung einer Nierenerkrankung ist, ist bei der essentiellen Hypertonie eine solche Ursache nicht zu finden<sup>1)</sup>. Die Kranken stehen im 6. und 7. Jahrzehnt und klagen über Unruhe und Erregbarkeit, Kopfschmerz, schlechten Schlaf, Beklemmungen und geringe Atemnot, gelegentlich über Epistaxis. Frauen äußern meist klimakterische Beschwerden, vor allem Klagen über starke Wallungen, haben oft Myome.

Es handelt sich meist um gut genährte Individuen von gedrungenem Körperbau mit emphysematösem Thorax und aufgetriebenem Bauch (Schlemmertypus). Herz ohne Befund oder etwas linkshypertrophisch, im Röntgenbild entsprechend dem Zwerchfellhochstand quergestellt, die Aorta oft etwas verbreitert. Der Puls ist meist etwas beschleunigt, der Blutdruck zwischen 150 und 200, und zwar teils dauernd, teils periodenweise erhöht, wobei oft seine starke Labilität auffällt. Die Erythrocyten sind oft etwas vermehrt. Der Harn ist völlig normal, die Nierenfunktionsproben fallen normal aus.

Therapie: Mäßigkeit im Essen und Trinken. NaCl-arme Kost, Einschränkung von Kaffee, Alkohol und Tabak; Regelung der Lebensweise, Vermeiden von Aufregungen; wiederholte Aderlässe (300—500 ccm); heiße Fußbäder sowie heiße Abreibungen; eventuell Aufenthalt im Hochgebirge von Nutzen.

### Die Venenthrombose.

Verlangsamung des Venenblutstromes sowie Veränderungen der Venenwand begünstigen die Gerinnsel- und Pfropfbildung in den Venen. Die Entstehung dieser sog. marantischen Thromben wird durch Zirkulationsschwäche sowie durch Alteration des Blutes gefördert; höheres Alter und alle Zustände mit allgemeiner Schwäche des Organismus disponieren zur Thrombose. Sie kommt vor bei Herzleiden, Kachexie, verschiedenen Blutkrankheiten, speziell Chlorose (dagegen nicht bei perniz. Anämie), in der Rekonvaleszenz und überhaupt bei längerem Krankenlager. Die Venen der Beine sowie die des Plexus prostaticus und der Adnexe des Uterus sind Prädilektionsorte. Verkalkung der Thromben erzeugt hierselbst die röntgenologisch sichtbaren Phlebolithen.

<sup>1)</sup> Doch wird zur Zeit von manchen Seiten die Berechtigung, in der Hypertonie ein selbständiges Krankheitsbild zu sehen, bestritten.

Entzündliche Prozesse in der Nachbarschaft einer Vene können ebenfalls zu Thrombosierung führen: Thrombophlebitis. Wird der Thrombus infiziert und eitrig erweicht, so kann er durch embolische Verschleppung Sepsis herbeiführen (vgl. S. 91).

Symptom der Thrombose der Extremitäten- wie der Mesenterialvenen ist zunächst intensiver Schmerz, der aber bei Thrombosierung in anderen Gebieten fehlt. Bei ungenügender Ausbildung von Kollateralen kommt es infolge von Stauung zu regionärem Ödem. Letzteres ist bei Thrombophlebitis stärker als bei einfacher Thrombose.

Therapeutisch ist in erster Linie absolute Ruhe für mindestens 21 Tage zur Vermeidung der Mobilisierung des Thrombus notwendig (eventuell Brom, bei starken Schmerzen Morphinum); Hochlagerung bzw. Schienung der befallenen Extremität, bei Thrombophlebitis Umschläge (Prießnitz, eventuell essigsaurer Tonerde). Bäder und Massage kontraindiziert.

### Embolie.

Die embolische Verschleppung von Gerinnseln bzw. Thrombusmaterial in eine Arterie hat ihren Ursprung meist im Herzen oder in den Venen, seltener in den Arterien. Die septische Endokarditis sowie unter den Herzfehlern die Mitralstenose (Gerinnselbildung in den Herzohren) geben den häufigsten Anlaß zur Embolie, nächst dem die Venenthrombosen. Gelegentlich können auch Gerinnsel in einem Aortenaneurysma Embolien verursachen.

Nach der Häufigkeit der befallenen Organe sind in absteigender Reihenfolge zu nennen: Lunge, Niere, Milz, Gehirn, Darm, Myokard, Extremitäten, Schilddrüse, Auge. Die Embolien bei septischer Endokarditis verursachen embolische Abscesse (vgl. S. 91); blande Embolien machen je nach den anatomischen Verhältnissen des befallenen Organs teils Infarkte, teils Erweichungen, teils fehlen bisweilen stärkere mechanische Folgen. Lungenembolie kann unmittelbar tödlich sein.

Emboli aus dem rechten Herzen und den Körpervenolen gelangen durch die Arteria pulmonalis in die Lunge, Emboli aus dem linken Herzen, der Aorta und den Lungenvenen gelangen in die Arterien des großen Kreislaufs. Bei offenem Foramen ovale kann es zu paradoxer Embolie kommen (vgl. S. 172).

Venenthrombosen verursachen in etwa der Hälfte der Fälle Embolien. Praktisch sehr wichtig ist die Emboliegefahr nach Operationen, vor allem Laparotomien bei Appendicitis, Myomen usw. (6.—20. Tag post operationem), wo die Thrombosen hauptsächlich im Quellgebiet der unteren Hohlvene (Beinvenen) als Ursache in Frage kommen. Häufig werden namentlich Individuen mit kräftigem, intaktem Herzen befallen.

Eine besondere Form der Embolie, die Luftembolie, kommt bei operativen Eingriffen namentlich an der Lunge (therapeutischer Pneumothorax!) vor; die in die Lungenvenen eindringende Luft gelangt durch das linke Herz ins Gehirn und bewirkt Bewußtlosigkeit, Krämpfe und eventuell Halbseitensymptome wie Lähmungen, Parästhesien. Der Anfall geht meist vorüber, kann aber auch tödlich verlaufen.

### Gefäßneurosen.

Disposition zu Gefäßneurosen, die in der Regel vasokonstriktorischem Charakter haben, findet sich bei neuropathischer Konstitution; auch die Arteriosklerose fördert ihr Auftreten.



Das **intermittierende Hinken** (Claudicatio oder Dysbasia intermittens) ist eine nicht häufige, namentlich bei älteren Männern vorkommende Störung, die in der Regel sich nur beim Gehen einstellt und in Parästhesien, Vertaubungsgefühl und mitunter lebhaften Schmerzen im einen Unterschenkel und Fuß besteht, die nach kurzem Gehen zu einer Ruhepause zwingen, worauf die Beschwerden alsbald wieder schwinden, um bei erneutem Gehen wieder aufzutreten. Der Fuß ist kühl und blaß oder cyanotisch. Oft fehlen die Fußpulse. Die Röntgenuntersuchung ergibt oft Sklerose der Art. tibialis. Dem Leiden liegt ein Gefäßspasmus zugrunde, der auf dem Boden der gleichzeitig bestehenden sklerotischen Gefäßverengung zu vorübergehender Ischämie führt. Ätiologisch kommt vor allem Nicotinabusus, ferner Kältewirkung in Betracht. Selten können auch die Arme eine ähnliche intermittierende Bewegungsstörung (Dyskinesie) zeigen.

Therapie: Ruhe, Nicotinverbot; Aspirin, Chinin, sulfur. (dreimal täglich 0,1—0,2); Natr. nitros. tägl. 0,01 subcut., 20 Injekt.; warme (nicht heiße) Fußbäder sowie galvanische Doppelfußbäder.

Die **Raynaudsche Gangrän** beruht ebenfalls auf Gefäßkrampf, der meist symmetrisch an Händen oder Füßen, speziell den Fingern und Zehen, und zwar meist an den Endphalangen zunächst Parästhesien und Schmerzen verursacht, wobei die betroffene Partie kalt und anfangs blaß, später unter heftigen Schmerzen blau wird (Asphyxie). Schließlich kann sich Gangrän mit Mumifikation bzw. Abstoßung einzelner Teile einstellen.

Als vasokonstriktorische Neurose sind auch die als **Akroparästhesien** bezeichneten Anfälle von quälendem Ameisenlaufen und Kälte der Fingerspitzen nach Beschäftigung aufzufassen.

Auch das **Quinckesche akute circumscribte Ödem** gehört zu den vasomotorischen Neurosen. Es besteht in einer umschriebenen schnell entstehenden, flüchtigen serösen Durchtränkung des Gewebes, die mit Spannungsgefühl, bisweilen auch mit Schmerz einhergeht und sich meist in der Haut der Extremitäten, namentlich nahe den Gelenken, selten in den Schleimhäuten lokalisiert (Glottisödem!). Fingerdruck hinterläßt keine Delle.

## Krankheiten des Respirationsapparates.

### Krankheiten der Nase.

**Physiologische Vorbemerkungen.** Normal erfolgt die Ein- und Ausatmung durch die Nase bei geschlossenem Mund. Der Luftstrom streicht bei der Inspiration über die infolge der Muscheln sehr ausgedehnten Fläche der Nasenschleimhaut, wird dabei erwärmt und angefeuchtet und infolge des klebrigen Schleimüberzuges der Mucosa von Verunreinigungen wie Staub und Bakterien zum größten Teil befreit. Die Innervation der Schleimhaut mit dem N. olfactorius gestattet zugleich die Prüfung der eingeatmeten Luft auf riechende Bestandteile. Werden die Choanen, die die Verbindung zwischen Nasen- und Rachenhöhle bilden, durch krankhafte Prozesse, am häufigsten Wucherungen des lymphatischen Gewebes, die sogenannten adenoiden Vegetationen verstopft, so ist die Nasenatmung unmöglich; der Patient hält dann dauernd auch im Schlaf den Mund offen, was bei Kindern oft fälschlich als Unart ausgelegt wird. Mundatmung infolge von Schleimhautschwellung beobachtet man auch bei Rhinitis (s. u.) sowie bei manchen schweren Infektionskrankheiten (vgl. Typhus S. 35). Eine Folge der Mundatmung ist die Ausschaltung der genannten Schutzvorrichtungen und die dadurch bedingte Austrocknung und Reizung der Rachen-, Kehlkopf- und Luftröhrenschleimhaut. Die sensible Innervation der Nasenschleimhaut geschieht durch den N. trigeminus (N. ethmoidalis), der auch verschiedene Reflexe, z. B. den Nießreflex vermittelt. Über den nervösen Konnex zwischen Nase und Lunge vgl. Asthma S. 214. Klinisch wichtig sind ferner die Beziehungen der Nasenhöhle zu den Nebenhöhlen (Kiefer- oder Highmorshöhle, Stirn-, Keilbeinhöhle und Siebbeinzellen), auf die öfter infektiöse Erkrankungen der Nase übergreifen; gleiches gilt von der benachbarten Tuba Eustachii.

## Rhinitis (Schnupfen, Coryza).

Die akute Rhinitis ist ein oberflächlicher Katarrh der Nasenschleimhaut mit Schleim- und Eitersekretion. Sie ist eine typische Erkältungskrankheit, bei der aber auch infektiöse Momente (Erreger unbekannt) eine große Rolle spielen, zumal sie sehr leicht auf andere übertragen wird.

**Symptome und Verlauf:** Beginn meist im Rachen mit lästigem Brennen und Kratzen, Schwellung der Tonsilla pharyngea sowie oft mit leichter Rötung der Rachenschleimhaut. Kitzelgefühl in der Nase mit starkem Nießreiz (sternutatio) sowie lebhaftes Sekretion von zunächst rein wäßrig-serösem, in den folgenden Tagen schleimig-eitrigem Sekret sind von zunehmender Verstopfung eines oder beider Nasengänge begleitet, so daß die Nasenatmung aufgehoben ist und die Stimme den charakteristischen nasalen Klang („gestopfte Nasenstimme“)<sup>1)</sup> annimmt. Das Geruchsvermögen, zum Teil auch der Geschmack, ist herabgesetzt oder ganz aufgehoben. Oft leidet für kurze Zeit auch das Allgemeinbefinden: Mattigkeit, Gliederziehen, leichte Temperatursteigerung. Doch ist in der Regel die Erkrankung nach wenigen Tagen abgelaufen, oft jedoch leitet sie eine Laryngitis und Tracheitis ein. Höheres Fieber sowie sehr heftiger Kopfschmerz spricht für komplizierende Nebenhöhlenerkrankungen; starker Stirnkopfschmerz wird bei Stirnhöhlen-, dumpfer Druck und Schmerz im Oberkiefer bei Kieferhöhlenerkrankung beobachtet. In der Regel schwinden diese Symptome mit dem Abklingen der Rhinitis. Mitunter greift der Katarrh auf die Tube mit Schwellung des Torus tubarius über: Spannungsgefühl im Ohr sowie Schwerhörigkeit, Einziehung des Trommelfelles, eventuell daran anschließende Otitis media.

In anderen Fällen kommt es zu Eiterungen (Empyem) der Nebenhöhlen, für die u. a. einseitiger Eiterabfluß aus der Nase spricht. Die Rhinoscopia anter. ergibt bei Eiterung der Stirn- und Kieferhöhle und der vorderen Siebbeinzellen Hervorquellen von Eiter vorn am unteren Rand der mittleren Muschel, bei derjenigen der hinteren Siebbeinzellen und der Keilbeinhöhle das gleiche hinten oberhalb der mittleren Muschel und in der Rima olfactoria.

Masern, Pertussis sowie oft Influenza beginnen mit einer Rhinitis.

Auch chemische Reize können eine Rhinitis bewirken, so erzeugt z. B. der innerliche Gebrauch von Jod oft Schnupfen, Tränenträufeln und Stirnkopfschmerz (Vermeidung des Jodismus vgl. S. 183), sowie bei dazu disponierten Individuen eine große Reihe von Stoffen, deren Wirkung auf anaphylaktische Vorgänge im Körper bezogen wird, und die oft zugleich Asthma bronchiale erzeugen. Ein typisches Beispiel ist der Heuschnupfen (s. unten).

**Therapie der Coryza:** Energische Schwitzprozedur (heiße Lindenblüten- oder Fliedertee, heiße Packung im Bett, Aspirin), eventuell lokal Schnupfpulver bestehend aus Menthol 1,0 und Acid. boric. 30,0 oder als Sozomentholpulver (Natr. sozojodol. + Menthol); Formanwatte in die Nase.

<sup>1)</sup> Im Gegensatz zur „offenen Nasenstimme“ bei Gaumensegellähmung.

**Heuschnupfen** (Catarrhus aestivus, Heufieber, Rhinitis anaphylactica) ist eine zur Zeit der Gräserblüte (Mai-Juli) bei dazu disponierten (meist ♂) Individuen mittleren Alters auftretende intensive Schwellung und Sekretion der Nasenschleimhaut, die von starkem Jucken in der Nase und Nießreiz sowie oft gleichzeitig von heftiger Conjunctivitis mit Brennen in den Augen und Lichtscheu sowie Ödem der Lider begleitet ist. Gelegentlich gesellen sich auch asthmatische Anfälle dazu. Ursache ist die Reizwirkung der Pollenkörner mancher Gramineen. Zur Auslösung der Beschwerden genügt bei vorhandener Idiosynkrasie die Nähe einer blühenden Wiese. Viele Patienten erkranken regelmäßig jedes Frühjahr. Die Beschwerden können wochenlang anhalten.

Therapie: Vermeiden der Gräserblüte, Aufenthalt im Frühjahr z. B. an der See, speziell auf Helgoland („Heufieberbund“) oder im Hochgebirge, Verstopfen der Nase mit Watte, lokale Anwendung des Pollantins (als Lösung oder Schnupfpulver), das ein durch Immunisierung von Pferden mit Pollentoxin gewonnenes Antitoxin ist, dessen Wirkung aber inkonstant ist; ferner das von Pflanzenfressern zur Zeit der Grasblüte gewonnene, als Graminol (Fa. Ruete-Enoch) bezeichnete Serum, das Schutzstoffe gegen das Pollengift enthalten soll. Symptomatisch günstig wirkt Suprarenin (1 : 5000) oder 1%ige Cocainlösung mit Spray oder Tampon appliziert. Empfehlenswert ist ferner längerer Gebrauch von Kalk: 2,0—5,0 Calc. lactic. resp. 6 Kalzantabletten pro die oder Afenil 1 Amp. intravenös.

### Die Rhinitis chronica

kommt als hypertrophische und atrophische Form vor. Die **hypertrophische** Rhinitis (Stockschnupfen) entsteht bisweilen nach wiederholter akuter Rhinitis, ist meist jedoch eine selbständige Krankheit, die aber öfter akute Exazerbationen mit dem Bilde der akuten Rhinitis zeigt. Zum Teil ist sie konstitutionell begründet (Skrofulose, Blutarmut, Neuropathie), teils liegen dauernde berufliche Schädigungen wie Einwirkung von Dämpfen, Rauch usw. vor. Die Rhinoscop. ant. und post. ergibt starke Schwellung der meist dunkelrot verfärbten unteren und mittleren Muschel zum Teil mit Polypenbildung; oft ist gleichzeitig die Rachenmandel hyperplastisch. Symptome sind schleimig-eitrige Sekretion, Behinderung der Nasenatmung, nasale Sprache, bisweilen Neigung zu Nasenbluten. Mitunter leiden die Patienten gleichzeitig an Asthma, ferner häufig an nächtlichem Alpdrücken. Das Leiden ist hartnäckig.

Therapie: Nasendusche mit körperwarmer 1%iger NaCl- oder Borsäurelösung, galvanokaustische Entfernung eines Teiles der Muscheln sowie der Polypen, Kur in Reichenhall, Ems oder an der See, Hebung des Allgemeinbefindens (Arsen, z. B. als Astonininjektionen).

Die **atrophische Rhinitis** ist meist ein selbständiges Leiden, das in langsam fortschreitender Atrophie der Schleimhaut und des Knochengerüsts der Nasenhöhle mit Verschmächtigung der Muscheln und Umwandlung des Flimmerepithels in Pflasterepithel besteht und zu starker Erweiterung der Nasenhöhle führt. Es entsteht bisweilen nach Nebenhöhleneiterungen. In manchen Fällen zeigen die bräunlich-grünlichen Sekretborken, die die Schleimhaut bedecken, fötide Zersetzung: Rhinitis atrophic. foetida oder **Ozaena**; dieselbe ist durch einen widerwärtigen Geruch ausgezeichnet, der den Patienten infolge des Verlustes des Geruchsvermögens (Anosmie) meist unbewußt ist. Subjektiv besteht oft nur Trockenheit in der Nase oder auch im Rachen, da der Prozeß häufig auch auf den Nasenrachen, eventuell auch auf den Kehlkopf über-

greift. Die Krankheit beginnt meist im jugendlichen Alter (meist ♀), zum Teil besteht gleichzeitig Skrofulose oder Anämie, teils sind es äußerlich vollkommen gesunde Individuen. Häufig fällt an den Kranken die Breite des Nasenrückens auf. Völlige Heilung kommt nicht vor, doch schwindet im höheren Alter die Neigung zu Krustenbildung sowie der üble Geruch. Die Therapie bezweckt die Beseitigung der Sekretborken durch Spülungen mit lauwarmer NaCl-Lösung, 0,3‰ Kaliumpermanganat (Nasendusche, Spray oder Irrigator), außerdem dreimal täglich Einlegen von Wattetampons mit Jodglycerin (Mannsche Lösung: Jodi pur. 0,1, Kal. jodat. 0,5, Glycerin 30,0), roborierende Therapie (Eisen, Arsen, Chinin).

Auch die tertiäre Lues, speziell die hereditäre Form, kann Ozaena bewirken; sie geht oft mit schweren Zerstörungen des Knochengewebes der Nase, speziell des Vomer einher und führt zu schweren Entstellungen in Form der sog. Sattelnase.

Nasendiphtherie vgl. S. 69.

### Nasenbluten (Epistaxis)

ist in vielen Fällen traumatischen Ursprunges. Das sog. „habituelle Nasenbluten“, das oft schon nach starkem Schnauben, stärkeren Anstrengungen, aber auch konstitutionell (so z. B. bisweilen als Vorläufer der Gicht) auftritt, hat oft als Prädilektionsort eine an Capillaren besonders reiche Stelle vorn am Septum, den sog. Locus Kiesselbachii. Nasenbluten beobachtet man ferner als Begleiterscheinung von Allgemeinerkrankungen. Bisweilen ist es das erste auf die Krankheit hinweisende Symptom. Häufig ist es z. B. bei Blutkrankheiten und speziell bei hämorrhagischen Diathesen: Leukämie, Polycythämie, schweren Anämien, Hämophilie, Morbus Werlhof, Skorbut, Cholämie, ferner bei Schrumpfnieren, Herzfehlern, Arteriosklerose, schließlich bei manchen Infektionskrankheiten (Variola, Typhus, Fleckfieber, Scharlach). Starkes Nasenbluten ohne ersichtlichen Grund verdient daher stets die Aufmerksamkeit des Arztes.

Therapie: Ruhe und Vermeiden des Schnuzens genügt oft; Kälteapplikation (Eisblase) in den Nacken; bei hartnäckigen Blutungen Tamponade mittels mit Jodoformgaze, Eisenchloridwatte oder mit Suprarenin (1‰) getränkter Tampons (höchstens 12 Stunden liegen lassen); bei Hämophilie Tampon mit Diphtherieserum (vgl. S. 69); eventuell hintere Tamponade mit Bellocq'scher Röhre; intravenös 5 ccm einer 10‰igen sterilen NaCl-Lösung.

### Krankheiten des Kehlkopfs.

**Vorbemerkungen.** Der Kehlkopf ist ein Schutzorgan für die tieferen Luftwege; er wacht darüber, daß an der Kreuzungsstelle von Schluck- und Atemstraße keine Fremdkörper in die Luftröhre eindringen. Während des Schluckens wird der Kehlkopf gehoben und sein Eingang geschlossen, und zwar normal sowohl durch die Epiglottis als durch Zusammenrücken der Plicae aryepiglottic. und die falschen und wahren Stimmbänder. Dieser Verschluss kommt auch noch nach Zerstörung der Epiglottis zustande. Voraussetzung ist die normale Funktion der Kehlkopferven. Diese stammen sämtlich aus dem N. vagus. Der N. laryng. sup. ist der sensible Nerv der Kehlkopfschleimhaut; motorisch versorgt er nur den

Musc. cricothy. und die Epiglottis. Der N. laryng. infer. oder Recurrens vagi zweigt sich rechts in der Höhe der oberen Thoraxöffnung ab und steigt zwischen der Pleura der Lungenspitze und der Art. subclavia nach oben; links zweigt er sich erst in der Brusthöhle ab und schlingt sich um den Arcus aortae; beide laufen zwischen Trachea und Oesophagus nach oben. Der Recurrens ist ein rein motorischer Nerv und innerviert sämtliche Kehlkopfmuskeln außer Cricothy. und der Epiglottis. Reizung der Kehlkopfschleimhaut durch Fremdkörper, reizende Dämpfe usw. erzeugt reflektorisch Verschluss der Glottis; eine gleiche Schutzmaßregel ist der Husten, der in einem reflektorisch ausgelösten kräftigen Expirationsstrom unter Sprengung des Glottisverschlusses mit entsprechendem Geräusch besteht und ein Herausschleudern von Fremdkörpern oder Schleim bewirkt.

Auslösung des Hustenreflexes (Zentrum in der Oblongata) erfolgt in erster Linie von der hinteren Kehlkopfwand (Regio interarytaenoid.), der unteren Hälfte der Stimmbänder sowie der Luftröhre (Bifurkation) und der Bronchien, wogegen Reizung des Lungenparenchyms keinen Husten auslöst. Aber auch andere sensible Reize, z. B. der Haut und mancher anderen Organe, können Husten hervorrufen. Zerstörung oder Lähmung der Stimmbänder, Störung der Sensibilität des Kehlkopfes sowie Benommenheit läßt Husten nicht zustande kommen, wodurch schwere Gefahren entstehen (vgl. Schluckpneumonie S. 219). Der Kehlkopf dient weiter zur Erzeugung der Stimme und Sprache, wobei die als sogenanntes Ansatzrohr funktionierende Mund-, Rachen- und Nasenhöhle wichtige Resonatoren bildet, die den einzelnen Lauten erst ihren besonderen akustischen Charakter verleihen. Krankhafte Prozesse in diesen wie an dem Kehlkopf selbst beeinflussen daher auch die Lautbildung der Sprache und Singstimme (vgl. S. 69 und 189), was diagnostisch von Wert sein kann. Willkürliche Erweiterung der Glottis ist nicht möglich; bei der Atmung erfolgt sie unwillkürlich.

### Kehlkopfkatarrh (Laryngitis).

Die **Laryngitis acuta** tritt oft als Teilerscheinung eines allgemeinen absteigenden Katarrhs der oberen Luftwege (Schnupfen-, Rachen- und Luftröhrenkatarrh, Angina), namentlich nach Erkältungen auf, gelegentlich auch selbständig nach starker Reizung durch schädliche Dämpfe wie Osmiumsäure, Ammoniak sowie Einatmung von Staub, endlich mitunter nach starker Inanspruchnahme der Stimme durch Reden, Singen oder Schreien. Subjektiv besteht Heiserkeit bis zu völliger Aphonie, Gefühl von Kratzen, Husten, aber keine Atemnot. Die Laryngoskopie ergibt stärkere Rötung und Schwellung der Kehlkopfschleimhaut; beide Stimmbänder sind gleichmäßig oder fleckig gerötet, zeigen bisweilen kleine Hämorrhagien sowie oberflächliche Erosionen und erscheinen oft infolge Schwellung der Taschenbänder verschmälert. Die Glottis zeigt oft bei der Phonation einen feinen ovalen Spalt (Spannerlähmung (vgl. Abb. 16, S. 194)).

Schwellung der Schleimhaut unterhalb der Glottis (**Laryngitis subglottica**), im Kehlkopfspiegel als roter, unter dem freien Rand der Stimmbänder vorspringender Wulst erkennbar, ist seltener bei Erwachsenen, häufiger bei Kindern und verursacht hier, namentlich nachts, Anfälle von Stridor sowie rauhen bellenden Husten; er erinnert an den Croup Husten bei Diphtherie („Pseudocroup“). Vgl. Masern S. 18. Die Anfälle sind meist nur von kurzer Dauer und sind harmloser als sie aussehen. Manche Kinder zeigen eine besondere Disposition dazu, die auch familiär vorkommt. Niemals finden sich bei Pseudocroup diphtherische weiße Beläge im Larynx.

Therapie der akuten Laryngitis: Schonung der Stimme; am besten ist das Zimmer zu hüten, Vermeiden des Aufenthaltes in kalter sowie staubiger und rauchiger Luft. Heiße Getränke, z. B. heiße Milch mit Emser Salz. Inhalieren von 1%iger

NaCl-Lösung oder Emser Wasser; heiße Kompressen um den Hals; bei starkem Hustenreiz Codein, phosphor. oder Paracodin je 0,01—0,03. Wichtig ist Prophylaxe durch Abhärtung (kalte Waschungen).

Die **Laryngitis chronica** tritt im Anschluß an akute Laryngitis sowie häufiger im Gefolge der chronischen Katarrhe der Nase und des Rachens auf, vor allem als Begleiterscheinung der Verlegung der Nasengänge (siehe oben), ferner bei Berufsrednern und Sängern usw., bei anhaltendem Einatmen von Staub sowie häufig bei Säufern, hier zusammen mit chronischer Pharyngitis. Symptome sind hartnäckiges Belegtsein der Stimme bzw. Heiserkeit bis zur Aphonie, Hustenreiz mit spärlichem Sekret, Räuspern sowie Kratzen und Trockenheit im Halse. Laryngoskopisch besteht Schwellung und Rötung der Kehlkopfschleimhaut, wobei Stimmbänder (stets beide!), Taschenfalten und Epiglottis in wechselndem Maße beteiligt sind, sowie häufig Adductorenschwäche (s. unten). Die Farbe der Schleimhaut ist oft ein schmutziges Graurot.

Oft zeigt die Regio interarytaenoid. die stärkste Veränderung; an den Stimmbändern kommt es mitunter zu Epithelverdickung und Entstehung kleiner grauweißlicher Flecke, bisweilen mit Zacken- und Furchenbildung sowie schalenförmigen Wülsten an den Proc. vocales. Diese sogenannte **Pachydermie** des Kehlkopfes wird besonders bei Potatoren beobachtet; mitunter gibt sie Anlaß zu Verwechslung mit Carcinom (das aber in dieser Gegend kaum vorkommt) und mit Tuberkulose. Einseitigkeit des Befundes ist allerdings stets verdächtig auf Neoplasmen resp. Tuberkulose. Bei jedem Fall von chronischer Heiserkeit ist die Laryngoskopie unerlässlich. Stets ist auch die Nase zu untersuchen.

Therapie: Schonungsbehandlung wie bei akuter Laryngitis. Lokalbehandlung: Einpinseln mit Mannscher Lösung oder 10%igem Tanninglycerin oder 1—5%iger Protargollösung. Inhalieren (siehe oben). Badeorte: Ems, Reichenhall, Soden i. T., Salzungen; eventuell Schwefelbäder: Eilsen, Nenndorf.

## Kehlkopflähmungen.

**Vorbemerkungen.** Die Kehlkopfmuskeln bilden folgende Gruppen: 1. Stimmbandspanner: M. cricothy. anticus (N. laryng. sup.) und M. thyreoarytaen. (N. recurrens). 2. Glottisöffner oder Abductoren: M. cricoarytaen. post. oder „Posticus“ (N. recurrens). 3. Glottisschließer oder Adductoren: M. cricoarytaen. later. und arytaen. transvers. (N. recurrens). Die Innervation der Kehlkopfmuskeln erfolgt vom Gehirn aus bilateral, d. h. von beiden Großhirnhemisphären; einseitige Lähmung spricht daher stets für peripherischen Sitz derselben. Bei Recurrenslähmungen gilt das Semon-Rosenbachsche Gesetz: die Nerven der Glottisöffner erlahmen schneller als die der Schließer.

**Lähmung des N. laryng. sup.** bewirkt Anästhesie des gesamten Kehlkopfes sowie der Epiglottis, ferner motorische Lähmung des M. cricothy. („Anticuslähmung“). Die Stimmbänder sind schlaff und etwas geschlängelt (Abb. 22), die Stimme heiser, die Epiglottis ist unbeweglich und steht aufrecht. Die Lähmung ist gefährlich infolge der Gefahr des Fehlschluckens. Sie wird nach Diphtherie beobachtet.

Die **Lähmung des N. recurrens** (Abb. 19—21) ist häufig, namentlich links; sie kommt vor vor allem als Drucklähmung bei Aneurysmen des Arcus aortae (links), Strumen, Tumoren im Mediastinum, Oesophaguscarcinom (links), ferner durch den Druck des dilatierten linken Vorhofes sowie bei großen perikarditischen Exsudaten, rechts bei pleuritischen Schwarten bzw. Schrumpfung der Lungenspitze, seltener nach

Diphtherie, sowie ferner bei Läsion des Vaguskerneln in der Oblongata, bei Siringomyelie, multipler Sklerose, Bulbärparalyse, Tabes. Solange es sich nicht um eine totale Lähmung handelt, besteht nur Adductorenparese (siehe oben), d. h. eine Posticuslähmung, indem das



Normaler Kehlkopf.

Abb. 14. Phonation.

Abb. 15. Respiration.




Abb. 16.  
Spannerlähmung.Abb. 17.  
Transversuslähmung.Abb. 18. Spanner- und  
Transversuslähmung.

Abb. 19. Phonation.

Linksseitige Recurrenslähmung.






Abb. 20. Respiration.

Abb. 21. Kadaverstellung  
bei beiderseitiger  
Recurrenslähmung.

Stimmband bei der Atmung und Phonation nahe der Mittellinie stehen bleibt. Die Stimme braucht dabei nicht alteriert zu sein, Heiserkeit kann fehlen, Atemnot ist nicht vorhanden. Beiderseitige Posticuslähmung dagegen bewirkt hochgradige Atemnot mit Stridor bei erhaltener Stimmbildung.

Abb. 22.  
Anticuslähmung.

Vollständige Lähmung des einen Recurrens, die hauptsächlich als Drucklähmung (siehe oben) sowie gelegentlich nach Kropfoperationen (Durchschneidung bzw. Quetschung) beobachtet wird, ist gekennzeichnet durch völliges Stillstehen des Stimmbandes, das eine Mittelstellung zwischen Respirations- und Phonationsstellung zeigt (sog. Kadaverstellung, Abb. 21), wobei bei der Phonation das Stimmband die gesunde Seite überschreitet und sich dem gelähmten Stimmband so weit nähert, daß Stimmbildung zustande kommt (Abb. 19). Die Glottis steht dann schief, der Aryknorpel der kranken Seite liegt etwas vor dem der gesunden. Oft wird die Lähmung erst durch die Laryngoskopie entdeckt. Selten ist beiderseitige totale Recurrenslähmung (z. B. bei großen Tumoren der Schilddrüse), beide Stimmbänder

bänder stehen dauernd unbeweglich in Mittelstellung, Atemnot fehlt, Phonation und Husten sind unmöglich.

Doppelseitige Parese der Mm. vocales (thyreoarytaen.), die sog. Internusparese oder **Spannerlähmung** (Abb. 16) ist die häufigste Lähmung und Begleiterscheinung einer Laryngitis, wo sie die Ursache der Heiserkeit ist. Die Glottis bildet bei der Phonation ein schmales Oval, der Rand der Stimmbänder ist exkaviert; es bestehen Heiserkeit oder Aphonie, aber keine Dyspnoe.

Mit ihr kombiniert oder selbständig kommt ferner beiderseitige **Lähmung der Mm. interarytaen.** (Transversuslähmung) vor, deren Symptom starke Heiserkeit ohne Dyspnoe ist. Bei Phonation schließt der vordere Teil der Glottis, während der hintere, die Glottis cartilaginea, einen dreieckigen offenen Spalt zeigt (Abb. 17). Bei gleichzeitiger Thyreoarytaenoidlähmung bleibt auch vorn die Glottis respiratoria offen; charakteristisch ist dabei das Vorspringen der Proc. vocales in die Glottis: sog. Sanduhrform (Abb. 18). Sie kommt hauptsächlich bei Laryngitis vor.

Die **hysterischen Lähmungen** sind vor allem durch so hochgradige Aphonie ausgezeichnet, wie sie bei organischen Lähmungen kaum vorkommt. Charakteristisch ist ihr plötzlicher Eintritt, namentlich nach psychischen Erregungen. Im Gegensatz zur tonlosen Stimme (Flüsterstimme) ist der Husten klangvoll. Laryngoskopisch ergibt sich bei dem Versuch der Phonation ein unvollkommener Schluß der Glottis, die ein Dreieck bildet. Niemals zeigt dieselbe einseitige Bewegungsstörung. Letztere beweist stets eine organische Lähmung. Hysterische Lähmungen beobachtet man bei neuropathisch-hysterischen Personen, u. a. bisweilen auch im Anschluß an akute Laryngitis.

Die **Therapie** hat nur bei den katarrhalisch, toxisch bzw. ohne erkennbare Ursache entstandenen Lähmungen Erfolg: Elektrisieren (farad. und galvan.), Strychnin, nitric. 0,005—0,01 p. die subc., Behandlung eines vorhandenen Katarrhs. Bei beiderseitiger Posticuslähmung Intubation bzw. Tracheotomie eventuell mit Ventilkanüle, die nur die Inspiration gestattet. Bei hysterischen Lähmungen genügt oft die während der Laryngoskopie an die Patienten gerichtete Aufforderung a zu sagen, eventuell unter gleichzeitiger Anwendung des elektrischen Stromes.

## Laryngospasmus (Spasmus glottidis).

Stimmritzenkrampf befällt vor allem Säuglinge, insbesondere solche mit Zeichen allgemeiner erhöhter Erregbarkeit der motorischen Nerven, wie sie bei der Spasmodie besteht (Steigerung der galvanischen Erregbarkeit, Chvostek'sches Symptom, vgl. Tetanie). Auch leiden die Kinder häufig an Rachitis. Mitunter beobachtet man familiäre Disposition. Es handelt sich um anfallsweise auftretenden krampfhaften Glottisverschluß von kurzer Dauer, während dessen die Atmung vollkommen unterbrochen ist. Der Anfall tritt meist ohne besondere Vorboten ein, mitunter nach starkem Schreien oder Schreck. Er beginnt mit einigen tönenden (wie bei Pertussis) oder schnappenden Inspirationen, denen völlige Apnoe folgt; der Kopf sinkt zurück, das Gesicht wird blaß livid und cyanotisch, bisweilen schwindet das Bewußtsein, die Daumen werden eingeschlagen, auch kommen tonisch-klonische Krämpfe vor. Der Anfall schwindet nach wenigen Sekunden, worauf das Kind sich bald wieder erholt. Doch kann im Anfall der Tod erfolgen. Oft treten die Anfälle äußerst zahlreich auf.



Selten werden Erwachsene von Laryngospasmus befallen, gelegentlich nach lokaler Applikation von Medikamenten im Kehlkopf (Einblasen von Pulvern oder Pinseln des Larynx), ferner bei Einklemmung von Stimmbandpolypen in die Glottis, schließlich ohne äußeren Anlaß bei Epilepsie, Lyssa, Tetanus sowie mitunter bei Tabes (sogenannte Larynxkrisen).

Therapie: Bei Säuglingen Phosphorlebertran sowie Kalk per os (Chlorcalcium 0,1–0,3 pro die), Regelung der Diät (vgl. Lehrbücher der Kinderheilkunde). Im Anfall Besprengung oder Übergießen des Kindes mit kühlem Wasser, Senfblätter auf Brust und Rücken, Campherinjektionen, eventuell Einatmung von Chloroform.

### Perichondritis laryngea. Glottisödem.

Entzündung der Knorpelhaut des Kehlkopfes schließt sich in der Regel als sekundäre Infektion an Entzündungsprozesse im Kehlkopf an, namentlich wenn dieselben in die Tiefe fortschreiten.

Sie wird vor allem bei Tuberkulose, Lues und malignen Neoplasmen des Larynx sowie bei manchen akuten Infektionskrankheiten, speziell bei schwerem Typhus, Fleckfieber, Pocken beobachtet. Infolge eitriger Zerstörung des Perichondriums kommt es zu Nekrose des Knorpels, eventuell mit Absceßbildung. Der Knorpel-sequester wird bisweilen ausgehustet unter Hinterlassung eines eiterigen Geschwürs, oder es bildet sich eine Fistel.

Am häufigsten lokalisiert sich die Perichondritis am Aryknorpel, speziell bei Tuberkulose (siehe unten). Laryngoskopisch zeigt diese Gegend Rötung und Schwellung von Kugel- oder Birnform sowie Unbeweglichkeit, die auch am entsprechenden Stimmband auffällt. Subjektiv bestehen heftige, in das Ohr ausstrahlende Schmerzen. Mitunter wird auch der Ringknorpel von Perichondritis befallen (Typhus, Fleckfieber, Pocken), was hier bei größerer Ausdehnung zu schweren Zerstörungsprozessen des ganzen Kehlkopferüstes führen kann und nicht selten eine narbige Larynxstenose mit völliger Aphonie nach sich zieht, so daß eventuell die Tracheotomie notwendig wird. Auch eine Perichondritis der Epiglottis kommt vor.

Eine häufige und gefährliche Komplikation der Perichondritis ist das **Glottisödem**, das in einer Schwellung der aryepiglottischen Falten sowie der Epiglottis, der Arygegend und eventuell der Taschenfalten besteht.

Nächst der Perichondritis (speziell bei Tuberkulose) als der häufigsten Ursache — hier ist das Ödem eventuell einseitig — wird Glottisödem nach Einatmung ätzender Dämpfe, z. B. von Osmiumsäure, ferner bei allgemeinem Hydrops wie bei Nephritis sowie als kollaterales Ödem bei Entzündungen der Nachbarschaft (Tonsillen usw.), bei Stauung infolge von Geschwülsten an der oberen Thoraxapertur, bei Fremdkörpern im Larynx sowie selten als neurotisches Ödem, z. B. bei Urticaria sowie bei Quinckeschem Ödem (S. 188), endlich selten nach Jodmedikation beobachtet. Entzündliches Ödem findet sich bei Erysipel bzw. Phlegmonen der Kehlkopfschleimhaut.

Glottisödem kann sich sehr schnell entwickeln und führt zu Dyspnoe und Erstickungsgefahr. Laryngoskopisch beobachtet man eine intensive wurstförmige Schwellung der Epiglottis und der Plicae aryepiglott. Therapie: Scarification bzw. Incision der vorher mit Cocain anästhesierten geschwellenen Teile, eventuell Tracheotomie.

## Kehlkopftuberkulose (Kehlkopfschwindsucht).

Wenn auch in seltenen Fällen Larynxtuberkulose primär vorkommt, so entsteht sie doch in der Regel sekundär im Verlauf einer Lungentuberkulose und ist bei dieser in vorgerückteren Stadien eine häufige Begleiterscheinung ( $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$  aller Fälle); Männer werden erheblich häufiger als Frauen befallen.

Histologisch handelt es sich zunächst um subepithelial entstehende miliare Knötchen, die teils diffuse Infiltrate, teils einen umschriebenen Tumor bilden und mitunter pachydermische Epithelverdickungen hervorrufen; sehr bald kommt es zu Verkäsung und geschwürigem Zerfall, gelegentlich mit anschließender Perichondritis (siehe oben).

Subjektive Beschwerden sind im Anfang lediglich hartnäckige Heiserkeit; bei bestehendem Husten wird derselbe oft auffallend rauh und heiser, bisweilen bestehen jedoch zunächst überhaupt keine Symptome. Später bewirken die Geschwüre oft heftigen Schmerz, besonders beim Schlucken, der namentlich bei Lokalisation an den Aryknorpeln und den aryepiglottischen Falten in das Ohr ausstrahlt. Der intensivste Schluckschmerz entsteht bei Ulcerationen an der Epiglottis und an der vorderen Pharynxwand sowie bei Perichondritis. Bei stärkerer Ulceration der Stimmbänder wird die Stimme fast oder ganz aphonisch.

Der laryngoskopische Befund bietet verschiedene Bilder. Prä-dilektionsort sind die Stimmbänder und die hintere Kehlkopfswand. Einseitige Chorditis mit Rötung, Schwellung und Walzenform des Stimmbandes ist ein stets sehr verdächtiges Frühsymptom, desgleichen Schwellung der Schleimhaut der Reg. interarytaen., wo sich auch frühzeitig Geschwüre zeigen. Im weiteren Verlauf beobachtet man Infiltrate, die an allen Stellen der Kehlkopfschleimhaut auftreten können, gelegentlich Tumoren bilden (z. B. an den Taschenbändern) und häufig von Geschwürsbildung begleitet sind. Die Ulcera zeigen einen eitrigen Grund, scharf gezackte wallartige Ränder und können sehr ausgedehnt sein. Ulcerierte Stimmbänder sehen wie angenagt aus.

Glottisödem ist eine häufige Begleiterscheinung. Diagnostisch ist der Befund von TB im Sputum bei gleichzeitiger Lungen-Tb. bedeutungslos. Sehr wichtig ist die Unterscheidung eines tuberkulösen Tumors vom Carcinom (siehe S. 199). Unterscheidung von Larynxlues siehe unten. Wenn auch vereinzelt Heilung der Larynxtuberkulose vorkommt, so ist doch die Prognose in der großen Mehrzahl der Fälle schon wegen des gleichzeitigen schweren Lungenleidens infaust.

Therapie: Schonung des Larynx, eventuell Sprechverbot, Vermeiden von Staub, Rauch, Kälte. In initialen Fällen mit oberflächlicher Ulceration sowie bei geringem Lungenbefund kann die lokale Behandlung, eventuell in Verbindung mit Tuberkulin Erfolge erzielen: Pinselungen zweimal wöchentlich mit 10—20% Mentholöl oder 25—80% Milchsäurelösung sowie Auskratzung mit scharfem Löffel; vorher Anästhesieren mit Cocain. Umschriebene Infiltrate sowie Tumoren werden mit Curette, schneidender Zange oder galvanokaustisch entfernt, eventuell die ganze Epiglottis bzw. ein Stimmband usw. extirpiert. Bei stärkerem Ödem Scarification. In manchen Fällen wirkt die Tracheotomie (Lokalanästhesie) wegen Ruhigstellung des Kehlkopfes günstig; notwendig wird sie bei stärkeren Stenosen.

Über andere chirurgische Eingriffe wie Laryngofissur usw. bei Initialfällen vergleiche die Spezialwerke. Der Wert der Heliotherapie ist noch umstritten. Kurorte: Reichenhall, Davos, Meran, Gardone, Madeira. — Bei progressen Fällen Behandlung rein symptomatisch: Linderung der Schmerzen durch Pinseln mit 10%igem Cocain bzw. Einblasen von Orthoform- oder Anästhesinpulver.

### Kehlkopflues.

Zu unterscheiden sind Frühformen im sekundären Stadium, die teils in einer wenig charakteristischen Form der nicht spezifischen, katarrhalischen Laryngitis ähneln, teils als grauweiße Papeln mit oberflächlichen Ulcerationen auftreten, namentlich an der oberen Fläche und dem Rande der Epiglottis sowie an den Stimmbändern. Häufiger sind die im tertiären Stadium bzw. bei hereditärer Lues vorkommenden circumscribten oder diffusen gummösen Infiltrate mit starker Neigung zu Zerfall und tiefen Ulcerationen, die einen scharfen Rand und speckigen Grund zeigen. Von Tuberkulose sind sie nicht immer sicher zu unterscheiden; sie haben besondere Neigung zur Bildung strahliger Narben. Schweren Zerstörungen fällt vor allem oft die Epiglottis anheim. Nach Ausheilung bleiben mitunter hochgradige Larynxstenosen zurück, die oft Tracheotomie sowie dauerndes Tragen einer Kanüle notwendig machen. Differentialdiagnose: Fehlen einer Lungentuberkulose sowie von TB. im Sputum; Wassermannreaktion und rascher Erfolg einer spezifischen Therapie.

### Tumoren des Larynx.

Die benignen Geschwülste sind stets scharf gegen die Umgebung begrenzt. Sie sind beim Manne häufiger als beim Weibe. Die **Papillome** sind warzige oder himbeerartige, gelegentlich multiple Geschwülstchen mit breiter Basis, die meist vorn an den Stimmbändern sitzen; sie kommen oft bei Kindern vor, bewirken Heiserkeit, mitunter auch Atemnot und zeigen nach Exstirpation Neigung zu Rezidiven.

Die **Kehlkopfpolypen**, die häufigste gutartige Geschwulst, sind gestielte, in der Regel verschiebliche, meist den Stimmbändern aufsitzende kleine Fibrome von rötlicher oder roter Farbe und bis zu Erbsengröße. Sie können die gleichen Beschwerden wie die Papillome machen und sind ebenfalls operativ zu entfernen.

Auch die sog. **Kinder- oder Sängerknötchen**, kleine Exkreszenzen an den Schwingungsknoten der Stimmbänder sind harmlose Neubildungen (Laryngitis nodosa).

Von den malignen Neoplasmen kommt hauptsächlich das **Kehlkopfcarcinom** (Plattenepithelkrebs) in Betracht. Sein Prädilektionssitz sind vor allem die Stimmbänder, seltener die Taschenbänder bzw. der Morgagnische Ventrikel. Es bildet entweder eine mehr umschriebene Geschwulst oder eine diffuse Infiltration. Frühsymptom ist eine chronische Heiserkeit sowie laryngoskopisch bisweilen Beschränkung der Beweglichkeit des befallenen Stimmbandes. Der Tumor sieht teils wie ein Knötchen, das oft kreidigweiß gefärbt ist, teils wie ein gutartiges

Papillom aus. Husten pflegt zu fehlen. Im weiteren Verlauf stellen sich Störungen des Allgemeinbefindens, Schwäche und Abmagerung, gelegentlich Drüsenmetastasen am Halse (*Glandula praelaryngea*), Schluckschmerzen, Atemnot, bisweilen Perichondritis, ferner Blutungen sowie schließlich mitunter Aphonie ein. Die Ulceration des Tumors bewirkt oft sehr starken fötiden Geruch und Auswurf. Die Kranken gehen an Kachexie oder oft an Schluckpneumonie zugrunde.

Diagnostisch wichtig ist die Tatsache, daß anfangs bis auf geringe Heiserkeit das Leiden völlig latent bleiben kann und die Patienten sich oft des besten Wohlbefindens erfreuen. Da aber der Kehlkopfkrebs, insbesondere der der Stimmbänder, oft lange Zeit eine rein lokale Erkrankung bleibt, so ist für die Therapie die möglichst frühzeitige Erkennung besonders wichtig. In allen zweifelhaften Fällen sind sofort (eventuell wiederholt) endolaryngeal Probeexcisionen zwecks Untersuchung vorzunehmen. Bei Tuberkulose oder Lues ist das Infiltrat im Gegensatz zum Carcinom stets von heftigen Entzündungserscheinungen umgeben, während bei letzterem nur ein chronischer Katarrh besteht.

Die Therapie ist die möglichst frühzeitige Entfernung des Tumors (endolaryngeal, Laryngofissur bzw. partielle oder totale Exstirpation des Larynx). Später ist die Behandlung rein symptomatisch, eventuell Tracheotomie.

## Krankheiten der Luftröhre, der Bronchien und der Lungen.

**Vorbemerkungen:** Die Trachea reicht vom 6. Halswirbel bis zur Bifurkation, die in der Höhe des 4.—5. Brustwirbels liegt. In der Brusthöhle verläuft sie etwas rechts vor dem Oesophagus, so daß dieser später den linken Bronchus kreuzt. Dem untersten Teil der Luftröhre liegt dicht über der Bifurkation der Arcus aortae auf. Beim Kinde befindet sich der Thymus vor der Trachea. Gegen Kompression ist die Luftröhre durch Knorpelringe geschützt. Die Schleimhaut besitzt Flimmerepithel.

Von den beiden Hauptbronchien ist der rechte weiter als der linke, auch verläuft er steiler abwärts als links. Die großen Bronchien tragen ebenfalls Knorpelspangen in der Wand, die in den feinen Ästen bei einer Weite von 1 mm aufhören. Die zirkuläre Wandmuskelschicht reicht bis zu den sog. Bronchioli respiratorii. Hier beginnt bei einer Weite von ca. 0,5 mm die respiratorische Funktion der feinen Bronchialäste. Charakteristisch ist für dieselbe das reichlich sie umspinnende Capillarnetz, sowie die Umwandlung des Flimmerepithels in respiratorisches Epithel, das teils aus kubischen Zellen, teils aus kernlosen Platten besteht. Hier finden sich bereits einzelne Ausstülpungen der Wand, die Alveolen, die in den sog. Alveolargängen an Zahl zunehmen. Die terminalen Luftsäckchen sind dicht mit Alveolen besetzt. Ungefähr je 25 Luftsäckchen mit ihren Bronchioli bilden ein von Bindegewebe umgebenes Lungenläppchen (Lobuli); letztere bedingen das gefelderte Aussehen der Lungenoberfläche. Die Nerven der Bronchien und der Lunge stammen vom Vagus; im Plexus pulmonalis sind aber auch Sympathicusfasern enthalten. Das Zwerchfell wird vom N. phrenicus (3. und 4. Cervicalsegment) innerviert.

Die Lunge ist luftdicht im Thorax eingeschlossen, ihre Bewegung während der Atmung ist rein passiv, indem sie, solange die Brusthöhle nicht eröffnet ist, den Bewegungen des Thorax folgt, da die elastischen Kräfte der Rippen bzw. Intercostalmuskeln einerseits und diejenigen der Lunge andererseits sich das Gleichgewicht halten. Der hohe Grad von Elastizität der Lunge erhellt aus dem vollkommenen Zusammenschnurren derselben bei Entstehung eines Pneumothorax. Zwischen Pleura pulmonalis und costalis besteht normal nur ein feiner capillärer

Spalt. Ein negativer Druck kommt hier erst zur Geltung, wenn Gas oder Flüssigkeit zwischen die beiden Pleurablätter eindringt, z. B. wenn ein Pneumothorax angelegt wird. Das für die Atmung außerordentlich wichtige Zwerchfell ist seinerseits wesentlich vom intraabdominellen Druck, dem Gasgehalt der Därme sowie dem Zustand der Bauchpresse abhängig. Beim ♂ spielt das Tiefertreten des Zwerchfells, beim ♀ die Hebung der Rippen (Mm. intercostal. extern.) die Hauptrolle bei der inspiratorischen Erweiterung des Brustkorbes (costoabdominaler resp. costaler Atemtypus). Bei angestrenzter Einatmung wirken als Hilfsmuskeln mit: 1. die Mm. scaleni, sternocleidom., serrat. post. sup.; 2. die Heber des Schultergürtels: Mm. trapez., rhomboid., levatores ang. scapul.; 3. bei festgestelltem Schultergürtel der M. serrat. anter. und die beiden Mm. pectoral. Stark dyspnoische Kranke nehmen daher zur Fixierung des Schultergürtels eine sitzende Stellung mit aufgestützten Armen ein (Orthopnoe). Die Expiration erfolgt normal hauptsächlich infolge der Elastizität der Lunge und des Brustkorbes. Bei forciertem Expiration treten neben der stärkeren Aktion der Mm. intercostal. intern. vor allem die Muskeln der Bauchwand (Bauchpresse) in Tätigkeit.

Die mit dem Spirometer von Hutchinson gemessene Luftmenge, die nach tiefster Inspiration durch tiefste Expiration entleert wird (Vitalkapazität), beträgt normal beim ♂ 3—5000, beim ♀ 2—3000 ccm; sie ist geringer bei Kindern und alten Leuten, sowie bei Erkrankungen der Atmungsorgane. Der trotz stärkster Ausatmung in den Atmungswegen noch zurückbleibende Luftrest (Residualluft) beträgt 1000—1500 ccm<sup>1)</sup>, die bei mittlerer, nicht angestrenzter Atmung ein- und ausgeatmete Luftmenge (Atem- oder Respirationluft) ca. 500 ccm; die Luftmenge, die nach ruhiger Atmung noch durch forcierte tiefste Inspiration eingeatmet werden kann (Komplementärluft) und desgleichen diejenige, die nach ruhiger Atmung noch maximal ausgeatmet wird (Reserveluft) beträgt ca. 1500—2500 ccm. Die Vitalkapazität ist demnach die Summe aus Respirationluft + Komplementär- + Reserveluft. Die Mittelkapazität ist das Luftvolumen, das bei ruhiger Atmung in der Mittellage zwischen Inspiration und Expiration in der Lunge vorhanden ist, d. h. = Residualluft + Reserveluft +  $\frac{1}{2}$  Respirationluft. Bei der gewöhnlichen Atmung wird also nur ein kleiner Teil, ca.  $\frac{1}{7}$ , des möglichen Volumens Luft hin- und herbewegt. Bei Arbeit wird die Mittelkapazität größer; Atemnot sowie Emphysem bewirkt Vermehrung der Residualluft und Verminderung der Vitalkapazität. Die atmosphärische Luft, die eingeatmet wird, besteht im Durchschnitt aus 78% N, 20,9% O<sub>2</sub>, 1% Argon und 0,04% CO<sub>2</sub>; die ausgeatmete Luft enthält 15—17% O und 2,5—4,6% CO<sub>2</sub> und ist stets mit Wasserdampf gesättigt. Abnahme des O-Gehaltes der Luft bis auf ca. 11% bewirkt noch keine Schädigung.

Die Atmung vollzieht sich automatisch. Normal beträgt die Zahl der Atemzüge in der Ruhe 16—20, beim neugeborenen Kinde 44 in der Minute. (Verhältnis von Atmungs- zu Pulsfrequenz normal etwa 1 : 4.) Die Innervation und Regulierung der Atmung erfolgt durch das in der Oblongata in der Nähe des Vaguskerne gelegene Atemzentrum. Maßgebend für die Tätigkeit desselben ist die chemische Beschaffenheit des Blutes, indem sowohl Zunahme der Venosität, d. h. der CO<sub>2</sub>, wie Abnahme des O, zum Teil durch Steigerung der Acidität des Blutes anregend wirken und eine Zunahme und Vertiefung der Atemzüge hervorrufen, während im umgekehrten Fall bei Überventilation der Lungen vorübergehend Atemstillstand erfolgt. Eine weitere Beeinflussung des Atemzentrums geschieht durch die zentripetalen Äste des Lungenvagus infolge ihrer mechanischen Erregung durch die inspiratorische Dehnung bzw. den expiratorischen Kollaps der Lunge (sog. Selbststeuerung nach Hering-Breuer). Außerdem kommen reflektorisch, z. B. von der Haut aus (Kältereize) Impulse für das Atemzentrum in Betracht.

Die wichtigen Beziehungen zwischen Atmung und Zirkulation sind S. 129 besprochen.

<sup>1)</sup> Das Kollabieren der Lunge wie beim Pneumothorax treibt nur einen Teil der Residualluft, die sog. Kollapsluft aus; der zurückbleibende Rest, die „Minimalluft“, wird erst bei völliger Atelektase ausgetrieben. Daher Residualluft = Kollapsluft + Minimalluft; ferner ist Totalkapazität = Vitalkapazität + Residualluft.

Trotz der früher beschriebenen Schutzwirkung der oberen Luftwege gegenüber Verunreinigungen der Atmungsluft dringen dennoch feinste Staubteilchen sowie Bakterien zum Teil in die Tiefe der Lungen ein. Die Bakterien werden unter normalen Verhältnissen durch die Schleimhaut alsbald abgetötet, so daß man das normale Lungengewebe praktisch als steril ansehen kann. Einen außerordentlich wichtigen Anteil an der Rückbeförderung der Verunreinigungen nach außen hat normal das Flimmerepithel, dessen Wirkung eventuell durch Husten unterstützt wird. Im übrigen erfolgt die Reinigung durch den Lymphapparat der Bronchien und Lunge. Die Lymphgefäße begleiten die Bronchien, die von kleinen „peribronchialen“ Lymphdrüsen umgeben sind. Die Lymphgefäße der Lunge und des untersten Teiles der Trachea führen zu den hauptsächlich in den Verzweigungswinkeln von Trachea und Bronchien liegenden Lymphoglandulae tracheobronchial, sup. und inf. an der Bifurkation, sowie den Lymphoglandulae bronchopulmonales. Die Bronchialdrüsen spielen praktisch-diagnostisch eine große Rolle, da ihre Erkrankung oft den ersten Hinweis auf einen Prozeß in der Lunge bildet.

## Untersuchung des Thorax und der Lunge.

Bei der **Inspektion** hat man zunächst auf die Form des Thorax sowie auf etwaige Asymmetrien zu achten. Höhe, Tiefe und Wölbung des Brustkorbs, Beschaffenheit der Zwischenrippenräume bzw. Verlauf der Rippen, Größe des Rippenwinkels (normal ca. 90°), Ausbildung der Atemmuskeln, Beschaffenheit der Supraclaviculargruben, Bau der Wirbelsäule unter Berücksichtigung von Verbiegungen (Kyphose, Skoliose, Gibbus), sowie das Verhalten der Schulterblätter sind dabei zu prüfen.

Bei der Besichtigung hat man ferner festzustellen, ob beide Brusthälften sich gleichmäßig bei der Atmung heben und senken. Nachschleppen einer Seite findet man bei verschiedenen Prozessen der Lungen bzw. Pleuren wie bei Pneumonie, pleuritischen Exsudaten, Tumoren, Schrumpfungsprozessen, auch bei Halbseitenlähmung (Hemiplegie). Verengung einer Thoraxhälfte deutet auf Schrumpfungsprozesse hin; in geringerem Maß kommt dies durch Unterschiede in der Weite der Intercostalräume der beiden Seiten zur Geltung. Erweiterung findet sich bei Exsudaten, wo bisweilen, speziell bei Empyem, gleichzeitig teigige Schwellung der Haut vorhanden ist.

**Pathologisch wichtige Thoraxformen:** Der paralytische Thorax ist lang, schmal und flach, zeigt weite Intercostalräume und steil abfallende Rippen sowie spitzen Rippenwinkel, schwächliche Atemmuskeln, oft flügelartiges Abstehen der Schulterblätter und bisweilen tiefe Supraclaviculargruben. Er findet sich oft bei Tuberkulose. Der Thorax pyriformis zeigt eine tailenartige Verengung seines unteren Teils, während der obere Teil relativ gut gebaut ist (daher Form einer umgekehrten Birne); er findet sich oft bei allgemeinem Habitus asthenicus mit Enteroptose. Der emphysematöse Thorax ist kurz und faßförmig, d. h. breit und tief mit engen Intercostalräumen, horizontal verlaufenden Rippen und weitem Rippenwinkel, er erscheint in Inspirationsstellung fixiert; der Hals ist kurz. Der rachitische Thorax zeigt oft das als Hühnerbrust oder Pectus carinatum bezeichnete kielförmige Vorspringen des Sternums mit Abflachung der seitlichen Thoraxpartien und bisweilen Auftreibung der Rippen an der Knorpelknochengrenze (rachitischer „Rosenkranz“); oft ist gleichzeitig Kyphose bzw. Kyphoskoliose der Brust- und Lordose der Lendenwirbelsäule vorhanden. Bei der sog. Schusterbrust besteht eine Umbiegung des Schwertfortsatzes und des unteren Teils des Brustbeins nach innen; sie wird beruflich bei manchen Handwerkern erworben, kommt aber auch als Trichterbrust angeboren vor. Bei manchen Individuen besteht ein winkliger Vorsprung zwischen Manubrium und Corpus sterni in der Höhe des Ansatzes der 2. Rippe, der sog. Angulus Ludovici.

Die Bestimmung des Brustumfanges ist besonders bei der Frage der Militärdiensttauglichkeit von Bedeutung. Man führt das metallene Meßband hinten dicht unter den Schulterblättern, vorn dicht unter den Brustwarzen herum und mißt bei maximaler Ein- resp. Ausatmung (Differenz = Atemweite). Bei Körperlänge zwischen 1,54—1,57 beträgt normal der Brustumfang 1—2 cm mehr

als  $\frac{1}{2}$ -Körperlänge, die Atemweite mindestens 5 cm. Bei zunehmender Körperlänge nimmt die Atemweite zu, während der Brustumfang hinter der halben Körperlänge zurückbleibt.

Bei Emphysem besteht großer Brustumfang bei geringer Atemweite. Kleiner Brustumfang bei großer Atemweite ist ohne klinische Bedeutung.

Körperlänge	Brustumfang	Körperlänge	Brustumfang
1,90	90—98 cm	1,66	83—89 cm
1,85	89—96 „	1,63	82—87 „
1,80	88—95 „	1,60	81—86 „
1,75	86—93 „	1,57	80—85 „
1,70	84—91 „	1,54	79—84 „

Die Messung beider Thoraxhälften ist wertvoll zur Kontrolle des Verhaltens von Pleuraexsudaten, über deren Zunahme bzw. Zurückgehen die Messung oft bessere Auskunft als die Perkussion gibt. Das gleiche gilt vom Pneumothorax. Man mißt den Umfang rechts und links sowohl in der Höhe des oberen Brustbeinendes wie in der Höhe des Schwertfortsatzes. Doch ist die physiologisch bei Rechtshändern vorhandene Differenz von 0,5—1,5 cm zugunsten der rechten Seite, bei Linkshändern eine entsprechende etwas geringere Differenz zu berücksichtigen. Zu beachten ist ferner, daß bei großen Mengen von Exsudat oder Luft in der Pleura auch der Umfang der gesunden Seite wegen der vikariierenden Ausdehnung der normalen Lunge zunimmt. Der mit dem Tasterzirkel gemessene Abstand zwischen Sternum und Wirbelsäule beträgt in der Höhe des Manubriums ca. 16, in der Höhe des unteren Endes des Sternums 19 cm beim ♂, etwas weniger beim ♀; der Breitendurchmesser des Thorax (Tasterzirkel) in der Höhe der Brustwarze ca. 26 cm beim ♂, weniger beim ♀.

Die **Betastung** des Brustkorbs ergibt, abgesehen von größeren Befunden wie Formänderungen des Skeletts, bisweilen diagnostisch wichtige Aufschlüsse über abnorme Rigidität der Muskeln. Druckempfindlichkeit eines Intercostalraumes findet man außer bei Intercostal neuralgie auch bei Pleuritis. Die Palpation ist schließlich diagnostisch sehr wichtig bei der Feststellung des Pectoralfremitus, den man durch Auflegen der flachen Hand prüft, während der Patient mit möglichst tiefer Stimme zählt. Er ist verstärkt bei Infiltration des Lungengewebes, wenn die Bronchien nicht verstopft sind, und abgeschwächt bei Pleuraexsudaten und Pneumothorax.

Das **Verhalten der Atmung** zeigt oft sowohl bezüglich der Frequenz wie der Tiefe der Atemzüge Abweichungen von der Norm. Zunahme des  $\text{CO}_2$ -Gehaltes des Blutes bewirkt zunächst Vertiefung, alsdann auch Vermehrung der Atemzüge. Physiologisch ist dies bei körperlicher Arbeit. Pathologisch besteht Atemnot bei vielen Herz- und Lungenleiden, bei denen die O-Zufuhr beeinträchtigt ist. Hier handelt es sich demnach um einen Kompensationsvorgang. Unter Dyspnoe versteht man eine teils vermehrte, teils vertiefte, aber stets deutlich angestrengte Atmung unter Zuhilfenahme der Hilfsmuskeln. Vielfach ist die objektiv vorhandene Dyspnoe subjektiv dem Patienten nicht bewußt. Zum Teil ist nur die eine Phase der Respiration an der Dyspnoe beteiligt. So beobachtet man inspiratorische Dyspnoe bei Stenosen des Kehlkopfs, z. B. bei Diphtherie, wo besonders bei Kindern die charakteristischen Einziehungen im Jugulum, ferner an den Schlüsselbeinrücken, den Intercostalräumen, den unteren Rippen und der Gegend des Schwertfortsatzes beobachtet werden. Der Kehlkopf steigt dabei inspiratorisch herab (bei der Trachealstenose fehlt dies Symptom), die Atmung ist verlangsamt. Erschwerung der Einatmung kommt auch bei Pneumonie sowie bei Pneumothorax vor. Vorwiegend expiratorische Dyspnoe beobachtet man bei Bronchialasthma sowie Emphysem. Besondere Formen der Dyspnoe entstehen bei chemischer Änderung der Blutzusammensetzung, wie die Fieberdyspnoe, die Dyspnoe bei Urämie, sowie die sog. Kußmaulsche große Atmung im diabetischen Koma. Auch der Rhythmus der Atmung kann verändert sein. Bei dem von Cheyne und Stokes beschriebenen Phänomen werden die Atemzüge periodenweise immer flacher, hören schließlich für kurze Zeit auf, um alsbald wieder langsam an Tiefe zuzunehmen und so fort;

die Erscheinung beruht auf verminderter Empfindlichkeit des Atemzentrums und findet sich bei manchen Gehirn- und Herzleiden sowie Intoxikationen (Urämie, Morphinum usw.), doch beobachtet man auch beim normalen Menschen im Schlaf ein periodisches Tiefer- und Flacherwerden der Atemzüge, eventuell sogar mit kurzen Atempausen. Die Biotsche Atmung besteht in einer von längeren Atempausen unterbrochenen stoßweisen Atmung (Gehirnleiden, Meningitis). Rein subjektive Dyspnoe findet man mitunter bei nervösen Individuen, desgleichen Klagen der Patienten darüber, daß sie nicht ordentlich durchatmen können. Hochgradige Tachypnoe bis 60 und mehr Atemzügen zeigen manche Hysterische. Diese psychogene Dyspnoe wird durch körperliche Anstrengungen nicht gesteigert.




Abb. 23. Lungengrenze, Grenze der Lungenlappen, Pleuragrenzen, Komplementär-raum der Pleura. Ansicht von vorne. (Nach Külbs.)

Verlangsamung der Atmung kommt bisweilen bei organischen Gehirnleiden, z. B. Hirntumoren vor.

Die **Perkussion** der Lungen vermag schon frühzeitig krankhafte Prozesse der Lunge aufzudecken, sofern man die Leistungsfähigkeit der Methode und ihre Fehlerquellen genau berücksichtigt. Sie darf stets nur vergleichend angewendet werden, d. h. es sollen immer symmetrische Stellen beider Thoraxhälften miteinander verglichen werden, wobei sich der Untersucher einer absolut gleichmäßigen Technik der Perkussion zu befleißigen hat, um nicht Unterschiede zu erhalten, die lediglich auf seine wechselnde Methodik zurückzuführen sind. Ferner ist stets vorher festzustellen, ob der Thorax etwa Asymmetrien zeigt. Die Perkussion der normalen Lunge ergibt einen lauten, nicht tympanitischen Schall, der sich aus dem Schall der Lunge selbst und dem des knöchernen Thorax zusammensetzt.

Die Lunge reicht oben vorn (Lungenspitze) 3–4 cm über den oberen Rand des Schlüsselbeins, hinten bis zum Dornfortsatz des 7. Halswirbels. Die untere Lungengrenze liegt hinten in der Höhe des Dornfortsatzes des 11. Brustwirbels,



in der Schulterblattlinie an der 9. Rippe, in der vorderen Axillarlinie am unteren Rand der 7., in der rechten Mamillarlinie am unteren Rand der 6. oder am oberen Rand der 7. Rippe, am rechten Sternalrand auf der 6. Rippe. Links vorn geht der Lungenschall in die Herzdämpfung über. Vorn unten läßt sich die Lunge gegen den tympanitischen Magenschall nicht scharf abgrenzen. Die topographische Abgrenzung der einzelnen Lungenlappen ergibt sich aus den Abb. 23 und 24. Zu beachten ist noch, daß die Lungenspitzen nur ganz wenig das Niveau der 1. Rippe überragen. Praktisch überaus wichtig ist ihre genaue Abgrenzung (hinsichtlich etwaiger Schrumpfung). Man perkutiert die Lungenspitzen am besten am sitzenden Patienten, wobei er den Kopf vornüber neigt und die Schultermuskeln vollkommen entspannt. Fehlerquellen, welche Dämpfungen im Bereich




Abb. 24. Grenzen der Lungenlappen, Komplementärraum der Pleura. Ansicht von hinten. (Nach Külbs.)

der Lungenspitzen hervorrufen können, sind u. a. einseitig stärker entwickelte Muskulatur des Schultergürtels (bei Rechtshändern rechts), ferner die nicht seltene Skoliose der Hals- und oberen Brustwirbelsäule. Nach Krönig stellt man leise perkutierend die Linien fest, in denen die Tangentialflächen der Lungenspitze die Haut schneiden. Das so erhaltene Krönigsche Schallfeld von der Form eines hosenträgerartigen Bandes ist unter pathologischen Verhältnissen mitunter verschmälert oder unscharf abgegrenzt. Bei Ausführung der Goldscheiderschen Perkussion mit Griffplessimeter oder steil gestelltem Finger erhält man in der Fossa supraclavic. über der Ansatzstelle des Sternocleido an Schlüsselbein und Brustbein eine andere Perkussionsfigur, die ebenfalls Schrumpfungsprozesse gut erkennen läßt (vgl. Abb. 26). Die Verschiebung der unteren Lungengrenze ist bei ruhiger Atmung nicht beträchtlich; bei tiefer Einatmung beträgt sie in der Mamillarlinie 3–5 cm und in der Axillarlinie bei Seitenlage sogar bis zu 10 cm. Auch die Lage des Körpers ist auf den Stand der unteren Lungengrenze von Bedeutung; bei Rückenlage rückt der vordere untere Rand ca. 2 cm tiefer als bei

aufrechter Haltung. Viel genauere Auskunft über die Verschieblichkeit der Lungengrenzen, das Verhalten des Zwerchfellrippenwinkels bzw. die Beweglichkeit des Zwerchfells ergibt die Röntgendurchleuchtung (s. unten).

Bei der **Auscultation** ist sowohl die Qualität des Atemgeräusches (vesiculär, bronchial bzw. unbestimmt) wie seine Intensität zu unterscheiden. Zu beachten ist, daß das in den Bronchien entstehende hauchende („ch“<sup>h</sup>.)Atemgeräusch normal vom lufthaltigen Lungengewebe nicht fortgeleitet, sondern von ihm ausgelöscht wird, so daß nur das weiche schlürferde Vesiculäratmen hörbar ist. Bedingung für reines Vesiculäratmen ist u. a., daß der Patient mit offenem Mund möglichst geräuschlos, d. h. ohne Schnaufen oder Schnarchen atmet.

Ein dem Bronchialatmen sehr ähnliches, aber weniger scharfes Atemgeräusch ist in der Norm über der Luftröhre zu hören, ferner ist das Atemgeräusch in der nächsten Nachbarschaft der obersten Brustwirbel sowie über dem Manubrium sterni eine Mischung von Vesiculär- und Bronchialatmen. Verschärftes Vesiculäratmen über der ganzen Lunge namentlich im Expirium findet sich als sog. pueriles Atmen bei Kindern gelegentlich bis zur Pubertät. Über der rechten Lungenspitze ist



Abb. 25.



Abb. 26.

Perkussion der Lungenspitzen nach Krönig (schwarz) bzw. Goldscheider (rot) [nach Mohr - Stähelin].

ein verschärftes und verlängertes Expirium oft physiologisch vorhanden, was mit dem besonderen Verlauf des rechten Spitzenbronchus zusammenhängt. Bronchialatmen findet sich pathologisch überall dort, wo Lungengewebe seinen lufthaltigen schaumigen Charakter verloren hat, d. h. verdichtet ist, sei es, daß es infiltriert ist wie bei Pneumonie, Tuberkulose oder Tumoren und unter Umständen bei Kavernen, sei es, daß die Lunge von außen komprimiert ist wie bei Exsudaten. Bei unsicheren Befunden kann man das Bronchialatmen dadurch deutlicher machen, daß man den Patienten während der Auscultation das Wort „achtundsechzig“ aussprechen läßt. Das sog. unbestimmte Atemgeräusch, ein Mittelding zwischen Vesiculär- und Bronchialatmen wird einmal dort gehört, wo die Lunge nur teilweise infiltriert ist, wo z. B. wie bei beginnender Tuberkulose lufthaltiges neben infiltriertem Lungengewebe sich findet, ferner dort, wo das Atemgeräusch infolge von Abschwächung durch Exsudate oder Überdeckung durch Rasselgeräusche abnorm leise und in seinem Klangcharakter undeutlich geworden ist.

Der Nachweis von Rasselgeräuschen (Rg.) hat diagnostisch großen Wert und zwar sowohl direkt, weil sie das Vorhandensein von Sekret bzw. Eiter, Blut, Ödemflüssigkeit in den Luftwegen anzeigen, indirekt, weil gleichzeitig aus dem akustischen Charakter der Rasselgeräusche zum Teil Schlüsse auf den Zustand des Lungengewebes gezogen werden können. Es sind nämlich klingende Rasselgeräusche

diagnostisch gleichbedeutend mit Bronchialatmen, da sie unter den gleichen Umständen entstehen; metallisch klingende Rasselgeräusche hört man über großen Kavernen bzw. Pneumothorax. Da die Rasselgeräusche speziell über den Spitzen oft spärlich sind, ihr Nachweis aber gerade hier von großer Bedeutung ist, so versäume man nicht, in Zweifelsfällen das Auftreten der Rasselgeräusche durch Hustenlassen zu provozieren und den ersten Atemzug nach einem Hustenstoß zu auscultieren. Bezüglich des Knisterrassels, das nur inspiratorisch hörbar ist, sei daran erinnert, daß dasselbe in den hinteren unteren Lungenabschnitten oft bei bettlägerigen Patienten ohne Lungenerkrankung während der ersten tiefen Atemzüge gehört wird, wogegen es nach einigen tiefen Atemzügen wieder verschwindet (sog. Entfaltungsrasseln).

Das pleuritische Reibegeräusch, das wie das perikarditische Reiben durch fibrinöse Auflagerungen der Pleuren und zwar während der Respiration entsteht, ist mitunter von trockenen Rasselgeräuschen schwer zu unterscheiden. Charakteristisch ist, daß es dem Ohre nahe klingt, nur während der Atmung zu hören ist und durch Druck mit dem Stethoskop mitunter verstärkt wird; auch hört man es mit letzterem deutlicher als mit bloßem Ohr. Bisweilen überdauert es eine Atemphase. Im Gegensatz zu den Rasselgeräuschen wird es durch Husten nicht beeinflusst. Nicht selten ist es an der Brustwand deutlich hörbar, doch kann der gleiche Eindruck durch Rasselgeräusche hervorgerufen werden. Reibegeräusche können bei Vorhandensein von Flüssigkeit oder Verwachsungen nicht zustande kommen.

Die Auscultation der Sprechstimme läßt normal nur ein undeutliches Summen erkennen, wogegen infiltrierte oder komprimierte Lungengewebe die Stimme gut leitet, so daß sie an der Brustwand deutlich hörbar wird: Bronchophonie. Diese ist diagnostisch dem Bronchialatmen gleichzuachten und dadurch in den Fällen wertvoll, wo ersteres nicht nachweisbar ist.

Der Pectoralfremitus, das fühlbare Mitschwingen der Brustwand während des Ertönsens der Stimme erfolgt normal hauptsächlich dann, wenn die Tonhöhe der Stimme dem Eigentum von Lunge und Thorax entspricht, was bei tiefem Baß in weit stärkerem Grade der Fall ist als bei hohen Tonlagen. Er kommt daher bei ♂ mehr zur Geltung als bei ♀. Wegen der größeren Weite des rechten Bronchus ist der Stimmfremitus rechts etwas stärker als links. Unter pathologischen Verhältnissen ist Voraussetzung für sein Zustandekommen, daß die entsprechenden Bronchien nicht verstopft sind. Verstärkter Pectoralfremitus kommt vor bei Verdichtung des Lungengewebes (Infiltrate bzw. Kavernen); Verminderung resp. Fehlen desselben findet sich bei Flüssigkeit im Pleuraraum, bei Pneumothorax und bei Verlegung der großen Bronchien. Diagnostisch verwertbar ist jedoch die Abschwächung im allgemeinen nur, wenn sie einseitig besteht. Auf beiden Seiten ist das Stimmeschwirren schwach bei Frauen (s. oben), bei kraftlosen Individuen und solchen mit dickem Fettpolster.

**Röntgenuntersuchung (Abb. 27):** Man unterlasse nie, vor der Photographie auch eine Durchleuchtung (sowohl dorsoventral wie ventrodorsal) vorzunehmen. Die beiden Lungenfelder, die von den Rippenschatten durchzogen sind und median an den Mittelschatten (Herz + Gefäßband) angrenzen, zeigen eine feine netzartige bzw. marmorierte Zeichnung (Anwendung weicher Röhren!). Im Bereich der Lungenwurzel sieht man ferner beiderseits eine den sog. Hilusschatten bildende baumartige Verzweigung, die rechts in größerem Umfang als links sichtbar ist und sich nach oben und vor allem nach unten reiserbesenartig ausbreitet. Normal wird der Hilusschatten mit seinen radiären Ausläufern von den Bronchien und den Lungengefäßen gebildet. Erstere erkennt man zum Teil als helle doppelkonturierte Stränge bzw. auf dem Querschnitt als Kreise oder Ovale mit hellem Zentrum. Infolge der Überkreuzung der genannten Gebilde sieht man außerdem an einzelnen Stellen circumscribede Schattenbildung ohne pathologische Bedeutung. Die Darstellung der normalen Hilusdrüsen ist in der Regel nicht möglich. Doch findet man bei gesunden Erwachsenen häufig umschriebene, infolge von Anthrakose bzw. Verkalkung sichtbare Drüsen Schatten ohne pathologische Bedeutung. Sehr wichtig sind die auf dem Schirm wahrnehmbaren normalen Veränderungen bei der Atmung. Bei der Einatmung sieht man neben der Erweiterung der Intercostalräume eine Aufhellung der Lungenfelder, am stärksten in den basalen Abschnitten. Hustenstöße

bewirken Aufhellung auch der Spitzenfelder, wobei man auf Unterschiede beider Seiten zu achten hat. Man beobachtet ferner die Form des Zwerchfells, speziell den Stand beider Hälften, von denen die rechte normal etwas höher als die linke steht. Bei emphysematösem Thorax verläuft das Zwerchfell mehr horizontal, bei asthenischem Habitus fällt es steil nach beiden Seiten ab. Stark entwickelte Brüste können Schattenbildung der unteren Lungenabschnitte vortäuschen; man hebt daher bei der Durchleuchtung die Mamma in die Höhe. Während der Atmung kontrolliert man, ob beim Tiefer-treten beide Hälften des Zwerchfells sich gleichmäßig verhalten, oder ob die eine bei der Atmung zurückbleibt, ferner ob beiderseits eine ausgiebige Entfaltung der Komplementäräume erfolgt. Bei pleuritischen Adhäsionen kann tiefe Inspiration mitunter eine zeltförmige Zipfelbildung der einen Zwerchfellkuppel bewirken. Abnorme Trübung der Lungenfelder in toto beobachtet man bei Stauung im kleinen Kreislauf, umgekehrt Aufhellung bei Emphysem. Die einzelnen Befunde bei Erkrankung der Lungen s. in den betreffenden Abschnitten.




Abb. 27. Normales Röntgenbild der Lunge (nach Hofbauer).

umgekehrt Aufhellung bei Emphysem. Die einzelnen Befunde bei Erkrankung der Lungen s. in den betreffenden Abschnitten.

## Krankheiten der Bronchien.

### Akute Bronchitis (Tracheobronchitis).

Der akute Bronchialkatarrh ist ein häufiges Leiden. Er entwickelt sich in der Regel im Anschluß an Katarrh der oberen Luftwege und ist dann meist von katarrhalischer Tracheitis begleitet (Tracheobronchitis). Ursächliche Momente sind in erster Linie Witterungsschädlichkeiten, speziell Erkältungen; daneben dürften infektiöse Ursachen eine wichtige Rolle spielen. Auch chemische Reize (Dämpfe von Chlor, Brom, salpetrige Säure, Äthernarkose usw.), ferner Einatmung von Staub kommen gelegentlich als Ursachen in Betracht. Sekundär entwickelt sich Bronchitis oft im Gefolge anderer Infektionskrankheiten (Masern, Typhus, Grippe, Keuchhusten). Endlich kann akute Bronchitis als Exazerbation eines chronischen Bronchialkatarrhs auftreten.

Die Beschwerden sind abgesehen von allgemeiner Abgeschlagenheit und Mattigkeit und den Zeichen eines eventuell vorhandenen Katarrhs der oberen Luftwege mit Schnupfen, Heiserkeit usw. ein trockener Reizhusten, der bei gleichzeitiger Tracheitis von einem bisweilen sehr quälenden Gefühl von Kratzen und Wundsein im Bereich der Luftröhre, d. h. unterhalb des Kehlkopfs und im Jugulum bis hinter das Sternum begleitet ist. Der quälende Husten ist bei stärkerem Katarrh sehr anstrengend; er wird durch kalte Luft, Rauch und Staub verstärkt. Leichte Temperaturerhöhung ist oft vorhanden. Stärkere Dyspnoe fehlt. Während der ersten Tage besteht kein Auswurf oder

nur Spuren eines zähen schleimigen Sputums. Vom dritten Tage ab pflegt der Auswurf reichlicher zu werden und eine schleimig-eittrige Beschaffenheit zu zeigen.

Der objektive Befund an den Lungen kann völlig negativ sein, insbesondere fehlt stets Änderung des Perkussionsschalles und des Atemgeräusches. Bei Beschränkung des Katarrhs auf die großen Bronchien vermißt man auch Rg. Bei Beteiligung der mittleren und feineren Bronchialäste hört man bei spärlichem und zähem Sekret Schnurren, Pfeifen und Giemen (Rhonchi sibilantes) und zwar hauptsächlich expiratorisch. Bei reichlicherem Sekret finden sich feuchte, nicht klingende Rasselgeräusche. Dieselben sind groß- resp. mittelblasig bei Katarrh der gröberen, feinblasig bei Beteiligung der feineren Bronchien. Charakteristisch ist bei der unkomplizierten Bronchitis, daß der Befund sowohl über beiden Lungen wie über den einzelnen Teilen derselben ungefähr der gleiche ist.

Finden sich die genannten katarrhalischen Erscheinungen nur über einer umschriebenen Stelle, so handelt es sich nicht um einfache Bronchitis, sondern einen anderen Prozeß (Lungenspitzenkatarrh, Bronchiektasen etc. vergl. unten). Zu dieser Annahme berechtigt namentlich längeres Bestehen der Veränderungen.

Der Verlauf der Krankheit richtet sich nach der Konstitution des Patienten und hängt ferner davon ab, ob die Lunge im übrigen intakt ist. Sieht man von besonderen Fällen, wie z. B. der oft schwer verlaufenden Influenzabronchitis ab, so überwinden kräftige und sonst gesunde Individuen den Katarrh oft in einer Reihe von Tagen bis zu einigen Wochen. Bei geschwächten Personen, im Greisenalter, bei Herzleiden sowie Kyphoskoliose ist es eine ernste Erkrankung, desgleichen bei schon vorher bestehenden anderweitigen Lungenerkrankungen. Die Gefahr besteht in dem Übergreifen auf die Bronchiolen und in der Entstehung von Bronchopneumonien.

Therapie s. S. 211.

### Chronische Bronchitis.

Chronischer Bronchialkatarrh kann sich aus einer akuten Bronchitis entwickeln, namentlich wenn dieselbe öfter rezidiviert. Häufiger entwickelt sie sich von vornherein schleichend. Ursachen sind teils die dauernde Einwirkung der oben genannten chemischen bzw. mechanischen Reize (Berufskrankheit bei Gewerben, die mit Staubbildung einhergehen: Müller, Bäcker, Kohlen-, Woll- und Steinbrucharbeiter, Schleifer), ferner Stauungszustände im kleinen Kreislauf — hier ist die Bronchitis oft das erste Zeichen beginnender Herzinsuffizienz —, chronische Nierenleiden, Potatorium, weiter Kyphoskoliose sowie andere mechanische, die normale Ventilation der Lungen hindernde Momente (Pleuritis adhaesiva usw.). Bezüglich des Zusammenhangs der Bronchitis mit Emphysem vgl. S. 216. Bisweilen stellt das Leiden das Residuum einer Erkrankung im Kindesalter, speziell von Keuchhusten oder Masern dar.

Anatomisch besteht Hyperämie der Bronchialschleimhaut teils mit Schwellung, teils mit Atrophie derselben, d. h. Veränderungen, die im Gegensatz zur

akuten Bronchitis nur teilweise rückbildungsfähig sind. In den unteren Lungenabschnitten entwickeln sich oft Bronchiektasen (s. unten).

Die Beschwerden, Husten, Auswurf, Atemnot treten hauptsächlich während der schlechten Jahreszeit in Erscheinung und können im Winter so weit exazerbieren, daß der Patient ans Bett oder wenigstens ans Zimmer gefesselt ist, während sie im Sommer sich verringern oder vorübergehend sogar schwinden. So kann es viele Jahre gehen, bis der Kranke einer Bronchopneumonie oder infolge von fortschreitendem Emphysem und konsekutiver Überanstrengung des rechten Ventrikels an Herzinsuffizienz erliegt.

Die chronische Bronchitis verläuft oft völlig fieberlos; nicht selten sind jedoch zeitweise leichte Temperatursteigerungen vorhanden, namentlich bei Sekretstauung. Der physikalische Befund verhält sich im allgemeinen wie der bei akuter Bronchitis beschriebene. Dämpfungen fehlen, dagegen kann der Klopfeschall über den hinteren unteren Partien geringe Tympanie zeigen, auch stehen nicht selten die unteren Grenzen etwas tiefer. Das Atemgeräusch ist stets vesiculär, oft aber etwas abgeschwächt. Die Rasselgeräusche sind teils trocken, teils feucht und zwar groß- und mittelblasig, jedoch wie bei der akuten Bronchitis niemals klingend.

Es gibt verschiedene Formen der chronischen Bronchitis:

Der sog. trockene Katarrh ist ausgezeichnet durch trockenen Husten und Exspektoration von geringen Mengen zähen Schleims hauptsächlich morgens; derselbe enthält oft sagokornartige Klümpchen, mikroskopisch häufig Kohlepigment, sowie Myelintropfen und nur wenig Leukozyten. Oft besteht Atemnot, bisweilen in asthmaartigen Anfällen. Über beiden Lungen hört man lautes Giemen und Pfeifen, dagegen keine feuchten Rasselgeräusche. Emphysem sowie Herzinsuffizienz sind häufige Folgeerscheinungen.

Die mukopurulente Form, deren Prädilektionsort die unteren Lungenabschnitte sind, zeigt reichlicheren Auswurf, weniger Atemnot. Auskultatorisch finden sich reichlich grob- und mittelblasige, nicht klingende Rasselgeräusche namentlich hinten unten beiderseits. Diese Form kann sich aus dem trockenen Katarrh entwickeln.

Der sog. Bronchoblennorrhöe liegt eine Schleimhautatrophie der Bronchien, oft mit Erweiterung derselben zugrunde. Es wird massenhaft dünnflüssiges, fast rein eitriges, nicht fötides Sputum entleert, das in der Spuckschale konfluiert und in größeren Mengen oft Dreischichtung zeigt. Das in der Regel sehr chronische Leiden bewirkt oft schließlich eine allgemeine Schädigung des Körpers mit Hinfälligkeit, Anämie und Kachexie.

Bei der seltenen Bronchitis pituitosa werden große Mengen eines dünnen schaumigen Sputums entleert, das demjenigen bei Lungenödem (vgl. S. 239) gleicht, sich von diesem aber durch den geringen Eiweißgehalt unterscheidet (Ferrocyankaliumprobe am Filtrat des mit Essigsäure gefällten Sputums). Oft tritt der Husten sowie die Atemnot anfallsweise, zum Teil unter dem Bilde des Asthmas auf, sog. Asthma humidum. Auch können Patienten mit echtem Asthma diesen Zustand zeigen. In einzelnen Fällen dürften nervöse Einflüsse (N. vagus) eine Rolle spielen.

Die Prophylaxe der chronischen Bronchitis besteht vor allem im Schutz vor Staub, Rauch, Witterungsschädlichkeiten, sowie körperlicher Überanstrengung, daneben in vorsichtig durchgeführter Abhärtung.

**Therapie s. S. 211.**

### Kapillarbronchitis (Bronchiolitis).

Das Hinabsteigen eines Bronchialkatarrhs bis in die feinsten Bronchien kommt häufig bei kleinen Kindern vor, bei Erwachsenen dagegen nur unter besonderen Umständen, so im Greisenalter, bei konsumierenden Krankheiten wie Typhus, Sepsis usw. und mitunter bei Grippe. Es besteht heftiger Husten und infolge von Verlegung zahlreicher feinsten Bronchialäste hochgradige Atemnot (Zuhilfenahme der Auxiliarmuskeln, bei Kindern Nasenflügelatmen sowie inspiratorische Einziehungen am Thorax). Infolge der erschwerten Expiration entwickelt sich bald Lungenblähung mit tympanitischem Klopfeschall (Schachtelton), Tiefstand der Grenzen, sowie speziell bei Kindern Erweiterung des Brustkorbes. Neben Giemen und Schnurren hört man reichlich feuchte, kleinblasige Rasselgeräusche. Bei völligem Verschuß der Bronchiolen ist das Atmungsgeräusch aufgehoben; auch kommt es namentlich in der kindlichen Lunge zur Entwicklung von Atelektasen, d. h. Herden, in denen die Luft vollkommen resorbiert ist. Der nicht reichliche Auswurf ist schleimig-eitrig. Meist besteht hohes Fieber. Nicht selten schließen sich Bronchopneumonien an.

Die seltene **akute Bronchiolitis obliterans** entwickelt sich mitunter nach Einatmung ätzender Dämpfe (Kampfgase usw.) und verläuft unter Fieber, stärkerer Dyspnoe und Cyanose meist letal. Der Auswurf ist oft hämorrhagisch. Der Lungenbefund ergibt zunächst reichliche Rasselgeräusche. Das Röntgenbild erinnert an das der Miliartuberkulose. Wird das akute Stadium überwunden, so kommt es zu ausgedehntem narbigen Verschuß der Bronchiolen.

Therapie s. unten.

### Bronchitis fibrinosa resp. pseudomembranacea.

Ausscheidung von Fibrin in die Bronchien mit Bildung von Pseudomembranen kommt sekundär bei schwerer Diphtherie sowie bei Pneumonie vor. Die selbständige primäre fibrinöse Bronchitis ist eine seltene Erkrankung, die in zwei Formen auftritt.

Bei der akuten Form stellt sich unter Fieber (bisweilen Schüttelfrost) hochgradige Atemnot mit Erstickungsgefühl, sowie krampfartiger Husten ein, der im Gegensatz zu der nach Larynxdiphtherie deszendierenden fibrinösen Bronchitis nicht heiser ist und, eventuell erst nach mehreren Tagen, mit Expektorations der charakteristischen Bronchialgerinnsel einhergeht. Diese stellen derbe, verzweigte, zum Teil röhrenförmige Bronchialabgüsse aus Fibrin dar. Zugleich wird ein zum Teil hämorrhagisches, später schleimig-eitriges Sputum entleert. Der objektive Lungenbefund kann völlig negativ sein oder abgeschwächtes Vesikuläratmen zeigen. Die Ätiologie (wohl infektiöser Art) ist unbekannt.

Von der akuten Form prinzipiell verschieden ist die chronisch-rezidivierende Form. Man findet sie bei Individuen mit exsudativer Diathese in der Anamnese und Neigung zu chronischen Reizzuständen der Haut. Sie verläuft in anfallsweise ohne Fieber auftretenden asthmaähnlichen Zuständen, bei welchen aus Schleim (nicht aus Fibrin) bestehende Bronchialabgüsse entleert werden, die oft Charcot-Leydensche Krystalle enthalten. Im Blut sind die Eosinophilen vermehrt. Die Krankheit kann sich über viele Jahre erstrecken.

Therapie s. unten.

## Therapie der akuten und chronischen Bronchitis und Bronchiolitis.

Bei akutem Katarrh Bettruhe sowie Schwitzprozeduren, z. B. mittels heißer Getränke (heiße Milch mit Emser Salz, Species pector., Glühwein,) sowie Aspirin 0,5. Sehr wirksam ist die Applikation feuchter Brustwickel nach Prießnitz, dreimal täglich je zwei Stunden (nasses Handtuch um Brust und Rücken, darüber Flanell, eventuell Billrothbatist dazwischen); sie sind fest anzulegen und dürfen sich nicht lockern; bisweilen ist Zusatz von Spiritus zum Wasser von Vorteil. Bei stärkerer Atemnot haben Senfpflaster oder bei schwereren Zuständen Senfwickel wohltuende Wirkung: 0,5 kg frisches Senfmehl wird in einer Waschsüssel mit 1 Liter warmem Wasser (unter 70°!) bis zur Entwicklung von starkem Senfgeruch zu einem Brei verrührt, der auf ein Handtuch aufgestrichen und mit einer Mullschicht bedeckt wird. Man läßt den Wickel so lange liegen (einige Minuten), bis starkes Brennen und Rötung der Haut, aber noch keine Blasenbildung entsteht, reinigt die Haut von etwa anhaftenden Senfkörnern und kann hinterher eventuell noch einen gewöhnlichen Prießnitz anlegen. Die Wirkung zeigt sich sofort in der freieren Atmung und im Schwinden des Oppressionsgefühls. Bei Kindern mit Bronchiolitis empfehlen sich Senfbäder (200 g Senfmehl werden in einem Beutel in die Badewanne gehängt, oder 50,0 Senfspiritus dem Bade zugesetzt). Bei gleichzeitigem Katarrh der oberen Luftwege Inhalation mit 0,5–1%iger NaCl-Lösung oder Emser Wasser (bzw. 1 Messerspitze Salz auf 100,0). In allen Fällen ist für Anfeuchtung der Luft zu sorgen, am besten durch den sog. Bronchitiskessel, eventuell mit Zusatz von Ol. terebinth. Bei mangelhafter Expektoratation und vorhandenem Sekret sind Expektorantien erforderlich: z. B. Mixt. solvens (Ammon. chlorat., Liq. ammon. anisat., Succ. liquirit.) 2stündlich 1 Eßlöffel oder Infus. Ipecac. 0,5 : 150,0, Sirup. simpl. 20,0 3stündlich 1 Teelöffel; ferner Decoct. rad. Senegae 10,0 : 150,0, Sir. simpl. 20,0 2stündlich 1 Eßlöffel. Bei quälendem Reizhusten ohne Sekret (trockene Rasselgeräusche) Codein. phosphor. 0,02 1–2 mal täglich, oder Parakodintabletten oder Pulv. Ipecac. opiat. 0,2, sach. lact. 0,3 (Dowersches Pulver) 1–2 mal täglich 1 Pulver, oder Morph. hydrochlor. 0,01 abends.

Bei der chronischen Bronchitis ist die Behandlung etwaiger Nasen- bzw. Rachenaffektionen erforderlich; ferner vorsichtige Abhärtung, sowie Vermeiden der bekannten Schädlichkeiten, u. a. auch des Rauchens. Brustwickel (s. oben) sind zur Schonung der Haut mit Unterbrechungen anzuwenden; empfehlenswert sind elektrische Lichtbäder. Die medikamentöse Therapie ist verschieden je nach dem Verhalten der Sekretion. Bei trockenem Katarrh eventuell Jodkalium 3 mal täglich 0,1–0,25, sowie Ipecac. (s. oben), oder Mixt. solv. Bei profuser Sekretion sind die Balsamica indiziert: Ol. terebinth. 3 mal täglich 15 Tropfen in Milch oder Terpinhydrat 3 mal täglich 2 Pillen zu 0,1, oder Creosot. carbon. in Gelatinekapseln 2,0–6,0 pro die. Sehr zweckmäßig ist auch die Inhalation von balsamischen Mitteln (Eukalyptus), die jedoch nur in Form sehr fein verteilter Nebel in die tieferen Luftwege einzudringen vermögen (z. B. durch den Spießschen Vernebler). Die Balsamica sind besonders auch bei fötider Bronchitis empfehlenswert. Bei kräftigen Individuen empfiehlt sich zur Einschränkung der Sekretion der Versuch einer starken Verminderung der Flüssigkeitszufuhr (Durstkur). Brunnen- und Inhalierkuren in Reichenhall, Ems, Soden i. T., Kösen, Salzbrunn; Schwefelquellen: Nenndorf, Bentheim, Heustrich; klimatische Kuren: Wiesbaden, Baden-Baden, Oberitalien, Riviera, Nordafrika (Wüstenklima). Wichtig ist auch die Regelung der Darmtätigkeit, insbesondere Bekämpfung der Obstipation, ferner speziell bei älteren Leuten sowie bei Kyphoskoliose etc., dauernde Kontrolle des Herzens, eventuell kleine Digitalisdosen. Bei alten Leuten ist längere Bettruhe gefährlich wegen Neigung zu hypostatischer Pneumonie, sie sind daher frühzeitig aus dem Bett in einen Lehnstuhl zu setzen. Anwendung der Narkose ist bei Bronchitis gefährlich (Äther streng kontraindiziert); wenn möglich ist vor einer Operation zuerst die Bronchitis zu beseitigen. Bei sekundärer Bronchitis (Herzfehler, Nierenleiden) richtet sich die Therapie gegen das Grundleiden.



Bei Bronchitis fibrinosa versuche man Inhalationen von Aqua calcis, sowie bei kräftigem Herzen die Anwendung von Brechmitteln (z. B. Apomorphin. hydrochlor. 0,005—0,01 subkutan). Bei chronischer Bronchitis pseudomembr. kann Arsenbehandlung (z. B. Liquor arsenic. Fowleri, Aq. amygd. amar. aa, langsam steigend bis  $3 \times 10$  Tropfen) von Vorteil sein.

### Bronchiectasien (Erweiterung der Bronchien).

Erweiterung der Bronchien ist stets, von den seltenen Fällen angeborener Bronchiectasien abgesehen, Folgezustand eines anderen Grundleidens der Bronchien bzw. Lungen. Anatomisch sind zu unterscheiden zylindrische oder diffuse und sackförmige oder circumscripte Bronchiectasien.

Die zylindrischen Bronchialerweiterungen pflegen über größere Abschnitte beider Lungen ausgebreitet zu sein. Sie befallen die mittleren und feineren Bronchien und gehen mit Atrophie der Schleimhaut einher, sie finden sich bei der bronchoblennorrhöischen Form der Bronchitis (s. oben). Klinisch kann man ihr Vorhandensein bei Bronchoblennorrhöe höchstens vermuten.

Die sackförmigen Bronchiectasien, die sich auf einen bestimmten Lungenabschnitt beschränken, sind wesentlich häufiger. Die Erweiterung der Bronchien entsteht hier dadurch, daß das benachbarte Lungengewebe einer Schrumpfung verfällt, wobei es einen allseitigen Zug auf die Wand der Bronchien ausübt. Das ist der Fall bei chronischen Entzündungsprozessen der Lunge mit Ausgang in Karnifikation, sowie bei denjenigen schweren Fällen von Pleuritis adhaesiva, die mit bindegewebiger Verödung des benachbarten Lungengewebes einhergehen. Die Wand der Bronchiectasien zeigt hochgradige Atrophie der Schleimhaut (Umwandlung des Zylinder- in Pflasterepithel), der elastischen Elemente, sowie des Knorpels, so daß ein schlaffer, dünnwandiger Sack resultiert; oft sind die Blutgefäße stark erweitert; in anderen Fällen ist die Wand hypertrophisch. Nicht selten finden sich schließlich auch Ulzerationen der Schleimhaut. Meist ist die Erkrankung einseitig, sie befällt mit Vorliebe die unteren Lungenlappen.

Die Beschwerden der Patienten lassen sich nicht selten bis in die Jugend zurückverfolgen, indem nach einer Pneumonie (Masern, Keuchhusten, Grippe) bzw. Pleuritis der Husten nicht mehr völlig geschwunden ist und die Kranken angeben, daß im Laufe der Jahre der Auswurf an Menge zugenommen hat. Charakteristisch für Bronchiectasien sind die besonders morgens auftretenden heftigen Hustenanfälle, die mit Entleerung großer Massen eines rein eitrigen Sputums einhergehen. Diese sog. „maulvolle“ Expektoration erfolgt bezeichnenderweise besonders bei bestimmten von der Lokalisation der Br. abhängigen Lagen des Oberkörpers, die der Patient im Laufe der Zeit einzunehmen lernt, um sich von dem Auswurf zu befreien.

Das fade-süßlich riechende Sputum zeigt im Glase Dreischichtung, zu oberst eine schaumig-schleimige Schicht, in der Mitte trübe Flüssigkeit und als Bodensatz Eiter. Infolge der Anwesenheit von Fäulnisregnern ist der Auswurf häufig faulig zersetzt, so daß dann der Atem und das Sputum einen widerlichen Gestank verbreiten. Der Bodensatz des Sputums enthält oft sog. Dittrichsche Pfröpfe,

weißlichgelbe, stechnadelkopf- bis erbsengroße stinkende Bröckel, die beim Zerreiben mikroskopisch Bakterien, Fettsäurenadeln (die im Gegensatz zu den elastischen Fasern in der Wärme schmelzen), sowie mit Jod sich violett färbende Leptothrixfäden zeigen. Nicht selten sind Blutbeimengungen im Sputum.

Häufig kommt es auch zu stärkerer Hämoptoe, die eine Tuberkulose vortäuschen kann. Der objektive Lungenbefund zeigt starken Wechsel der Erscheinungen je nach der Sekretfüllung der Bronchien. Bezeichnend für die Bronchiektase ist das dauernde Vorhandensein von feuchten Rasselgeräuschen an einer circumscribten Stelle (meist Unterleppen). Dieselben können bei Infiltration des benachbarten Lungengewebes klingelnd sein, wobei oft gleichzeitig Bronchialatmen sowie mitunter Dämpfung mit Tympanie bestehen kann. Je nach dem Füllungszustand der Bronchien wechselt auch der Auskultationsbefund, namentlich bezüglich der Intensität des Atmungs- und der Rasselgeräusche. Kavernensymptome (S. 228) fehlen. Im Röntgenbild ist die befallene Partie meist verschattet.

Fieber kann bei Br. vollkommen fehlen; bei Sekretverhaltung sind jedoch oft Temperatursteigerungen vorhanden. Höhere Temperaturen deuten auf häufig vorkommende bronchopneumonische Prozesse in der Nachbarschaft der Br. mit oder ohne gleichzeitige Pleuritis. Oft beobachtet man, namentlich in Fällen, die sich in jugendliche Jahre zurückverfolgen lassen, kolbige Auftreibung der Endphalangen der Finger und Zehen mit entsprechender starker Krümmung der Nägel (Trommelschlegelfinger), gelegentlich auch Epiphysenverdickung an den Knochen der Extremitäten, sowie Schwellung und Schmerzhaftigkeit der Gelenke (sog. Ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique von P. Marie). Wirkliche Heilung von Br. kommt nur selten vor. Bei jahrelangem Bestehen der Erkrankung kann die dauernde Eiterung allgemeine Amyloidose (Nieren, Leber, Darm), Anämie und Kachexie bewirken; auch führt die Stauung im kleinen Kreislauf infolge von Verödung ausgedehnter Lungencapillarbezirke oft zu Insuffizienz des rechten Ventrikels. Gelegentlich beobachtet man bei Br. metastatische Hirnabszesse sowie eitrige Meningitis.

Die **Diagnose** hat sich u. a. auf die oft charakteristische Anamnese zu stützen. Der physikalische Befund kann bei zentral gelegener Br. im Stiche lassen, hier hilft eventuell die Röntgenuntersuchung (Vergleich der Bilder vor und nach gründlicher Entleerung der Bronchiektasen). Die Differentialdiagnose gegenüber der Lungentuberkulose (Lungenblutungen!) wird durch den guten allgemeinen Ernährungszustand, das dauernde Fehlen von TB. im Sputum sowie von elastischen Fasern entschieden. Ebenso fehlen stets im Gegensatz zur Gangrän Lungenparenchymfetzen. Diagnostisch sehr wichtig ist die Wirkung bestimmter Lagerung des Oberkörpers bzw. der sog. Quinckeschen Schief- oder Hängelage auf die Expektoration: bei Tief- oder Seitenlagerung des Oberkörpers entleert der Patient große Mengen Sputum.

**Therapie:** Bei Fieber Bettruhe. Stets ist für ausgiebige Entleerung des Sekrets zu sorgen (am besten durch mehrmals täglich wiederholte entsprechende Lagerung, s. oben). Morphium ist zu meiden. Eventuell ist Durstkur zu versuchen (vgl. Bronchitis). Zur Verringerung der Sekretion und der Neigung zur fötiden Zersetzung Anwendung von Kreosotpräparaten (Guajakol), ferner Inhalation von Terpentin (mit 2% Menthol) resp. Eukalyptus- oder Latschenöl. Sorgfältiges Vermeiden schädlicher Einflüsse wie Staub, Rauch und Erkältungen; eventuell klimatische Kuren im Süden. Bei veralteten Fällen kommen eventuell chirurgische

Eingriffe wie Thorakoplastik usw. in Frage. Bei beginnendem Erlahmen des Herzens gebe man frühzeitig Digitalis.

### Asthma bronchiale (Bronchialasthma).

Unter Bronchialasthma versteht man ein in Anfällen von hochgradiger Atemnot verlaufendes Leiden, das auf vorübergehender spastischer Kontraktion der feinen Bronchialäste sowie Schwellung und Sekretion der Schleimhaut derselben beruht.

Vieles spricht dafür, daß das Asthma auf abnormen Erregbarkeitsverhältnissen im Bereich des N. vagus beruht, die einen Bronchospasmus verursachen, wie denn auch vaguslähmende Pharmaka (Atropin) den Asthmaanfall zu beseitigen vermögen. In demselben Sinne ließe sich auch die besondere Art der Sekretion (s. unten) deuten, die in ähnlicher Form auch bei anderen Neurosen (Colica mucosa) vorkommt.

Konstitutionelle Momente spielen bei Asthma, wie die Anamnese fast in jedem Fall zeigt, eine große Rolle. Asthmatiker stammen aus Familien, in denen Neuro- und Psychopathie, Epilepsie, Migräne, Gicht, Heuschnupfen, Hautleiden (chronische Ekzeme, Urticaria, Quinckesches Ödem) bzw. exsudative Diathese vorkommen und an denen die Patienten zum Teil selbst leiden bzw. in der Kindheit daran litten. Sehr häufig lassen sich auch Pneumonien sowie andere akute infektiöse Erkrankungen des Atmungsapparates eruieren, an die sich der erste Anfall anschloß. Zahlreiche Asthmatiker haben eine auffallend schmale, schlecht durchgängige Nase. Oft besteht Schleimhautschwellung bzw. Hypertrophie der Muscheln. Häufig ist gleichzeitig Tuberkulose vorhanden.

Streng zu trennen ist das Bronchialasthma als selbständiges Leiden von den sekundären asthmaartigen Zuständen bei Herzinsuffizienz, Urämie usw.

**Krankheitsbild:** Das Leiden beginnt mitunter schon in der Kindheit, in zahlreichen Fällen jedoch erst später. Zum Teil sind die Patienten typische Astheniker mit zartem Knochenbau und mangelhaftem Fettpolster; sehr häufig sind Zeichen nervöser Erregbarkeit vorhanden. In anderen Fällen besteht emphysematischer bzw. apoplektischer Habitus. Zahlreiche Patienten erscheinen in der Zeit zwischen den Anfällen völlig normal. Der Anfall selbst tritt oft völlig unerwartet, in anderen Fällen mit gewissen Vorboten, wie Reizzuständen in der Nase, im Kehlkopf, Beklemmungsgefühl usw. ein, mit Vorliebe des Nachts. Der Patient erwacht plötzlich mit starkem Beklemmungs- und Angstgefühl sowie hochgradiger Atemnot, die ihn zwingt, aufrecht im Bett zu sitzen (Orthopnoe) bzw. dasselbe zu verlassen. Lautes expiratorisches Keuchen sowie giemende und pfeifende Geräusche während der Atmung machen den Anfall weithin kenntlich. Die Atmung ist deutlich verlangsamt und geschieht unter Zuhilfenahme der Atemhilfsmuskeln, es besteht Cyanose sowie starke Schweißabsonderung. Der Thorax ist erweitert, die Lungen sind gebläht, die Grenzen stehen tief, der Klopfeschall zeigt Schachtelton (Tympanie), die absolute Herzdämpfung ist verkleinert. Über beiden Lungen hört man verlängertes Expirium, das oft von den zahlreichen pfeifenden und schnurrenden Rasselgeräuschen vollkommen überdeckt ist. Die Dauer eines Anfalles schwankt zwischen

$\frac{1}{2}$  Stunde und mehreren Tagen (eventuell noch länger). Gegen Ende des Anfalls tritt Husten und Expektoration von zähem glasigen Schleim ein, der für Asthma charakteristische Bestandteile zu enthalten pflegt:

1. Die Curschmannschen Spiralen, d. h. mit bloßem Auge (besonders auf schwarzem Grunde) erkennbare spiralig gewundene Schleimfäden, die mikroskopisch oft einen helleren Zentralfaden erkennen lassen; 2. reichlich eosinophile Leukocyten; 3. Charcot-Leydensche Krystalle, d. h. spitze Oktaeder, die sich zum Teil haufenweise hauptsächlich in gelblichen Fäden bzw. hirsekornartigen Pfröpfen im Sputum finden. Die Krystalle sieht man gelegentlich auch im Sputum in der Zeit zwischen den Anfällen.

Fieber gehört nicht zum unkomplizierten Asthma. Der Puls ist im Anfall frequent und klein. Diagnostisch sehr wichtig ist eine Vermehrung der Eosinophilen im Blut oft schon in der anfallsfreien Zeit, vor allem aber in hohem Grade gegen Ende eines Anfalls, wogegen sie im Beginn desselben in der Regel vermindert sind.

Die Häufigkeit sowie die Intensität der Anfälle ist individuell, aber auch im einzelnen Falle sehr verschieden. Während viele Patienten in der Zwischenzeit völlig beschwerdefrei und leistungsfähig sind, leiden andere auch in dem Intervall an mäßigem Beklemmungsgefühl mit etwas Giemen und Pfeifen. Bei längerem Bestehen entwickelt sich regelmäßig Emphysem sowie schließlich Hypertrophie des rechten Herzens.

Eine große Rolle spielt bei einem Teil der Patienten ihre neuropathische Konstitution, in ständiger Erwartung neuer Anfälle werden sie oft auch in der Zwischenzeit ihres Lebens nicht froh und konzentrieren ihre Gedanken darauf, den verschiedenen (zum Teil imaginären) Ursachen aus dem Wege zu gehen. Auslösende Ursachen sind u. a. verschiedene Gerüche (Blumen, speziell Veilchen, Ipecac., Heu, Pferdestall), sowie vereinzelte Speisen (Erdbeeren, Eier). In manchen Fällen leiden die Asthmatiker gleichzeitig an Heuschnupfen (vgl. S. 190) und bekommen ihre Anfälle unter den gleichen Umständen wie diesen.

Bemerkenswert ist, daß bei manchen Menschen tatsächlich durch Einverleibung bestimmter Eiweißkörper tierischer oder pflanzlicher Herkunft regelrechte Asthmaanfälle entstehen, die hier auf anaphylaktischen Zuständen beruhen dürften.

Die **Prognose** ist bei dem in der Kindheit entstandenen Asthma günstiger, da es oft in späteren Jahren allmählich schwindet. Aber auch bei den später einsetzenden Formen pflegt im höheren Alter eine Abschwächung des Leidens einzutreten.

**Diagnostisch** ist vor allem der typische Sputumbefund sowie die Bluteosinophilie von Bedeutung. Die Atemnot bei Hysterie ist u. a. durch Tachypnoe (bei Asthma Atmung verlangsamt!) und Vertiefung der Inspiration (bei Asthma expiratorische Dyspnoe) gekennzeichnet.

**Therapie:** Im Anfall Vorsicht mit Narkotica, speziell mit Morphin wegen der Gefahr der Gewöhnung. Sehr wirksam sind Atropin. sulfur.  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  mg subcutan, sowie Suprarenin  $\frac{1}{2}$ —1 ccm Stammlösung 1 : 1000 subkutan (cave Blutdrucksteigerung bei älteren Leuten!), ferner Hypophysenpräparate, am besten als Asthmolyminjektion (Suprarenin + Hypophysin in Ampullen, Fa. Kade). Inhalationen, z. B. als Stäubliche Lösung bestehend aus I. Atrop. sulfur. 0,1, Cocain. muriat. 0,25, Aq. dest. 10,0, II. Adrenalin-Stammlösung; 2 Tropfen der Lösung I + 18 Tropfen von II werden in dem Stäublichen Inhalator zerstäubt. Ähnlich ist das Tuckersche Mittel. Wirksam sind auch die Nitrite, z. B. Nitroglyzerin (vgl. S. 162) oder auch in Form von Räucherpräparaten, z. B. als Charta nitrata

oder als Räucherpulver, das zugleich Narkotica wie Fol. stramonii, Opium, Belladonna oder Lobelia enthält; z. B. Fol. stramon., Kal. nitric. aa 30,0, mf. pulv. subtiliss., davon 1 Teelöffel auf 1 Teller verbrennen und Rauch einatmen. Ähnlich zusammengesetzt sind die sog. Asthmazigaretten. Auch die systematische Disziplinierung der Atmung ist oft von Vorteil, so läßt man z. B. den Patienten mit geschlossenem Munde einen bestimmten Ton summen, um die Expiration zu verlängern und die Inspiration abzukürzen („Summübungen“). In der Zeit zwischen den Anfällen medikamentös Kalk, z. B. Calc. chlorat. 10,0, Sir. simpl. 20,0, Aq. ad. 200,0, 2stündlich 1 Eßlöffel, oder 3 mal tgl. 2 Kalzantabletten, ferner Jodkali 1,5 pro die, sowie Arsen z. B. als Fowlersche Lösung (S. 212); Atemgymnastik. Gegenüber klimatischen Einwirkungen verhalten sich die Patienten sehr verschieden, einzelne fühlen sich sogar am wohlsten in der Stadt. Häufig wirkt Hochgebirge bzw. die See günstig. Bei Heuasthma ist Gräserblüte zu vermeiden. In allen Fällen kontrolliere man die Nase auf Durchgängigkeit bzw. Reflexpunkte, deren Reizung eventuell einen Asthmaanfall auslöst. Cocainisierung bzw. Durchschneidung des N. ethmoidal. oder Beseitigung von Wucherungen in der Nase kann in manchen — keineswegs in allen — Fällen günstig wirken.

## Erkrankungen der Lungen.

### Emphysem.

Unter Emphysem versteht man einen Zustand dauernder Erweiterung der Lungenalveolen, der mit Atrophie der elastischen Elemente und dadurch bedingtem Elastizitätsverlust der Lunge einhergeht.

Je nachdem forcierte Inspiration oder erschwerte Expiration ursächlich in Frage kommen, unterscheidet man inspiratorisches bzw. expiratorisches Emphysem; ersteres entsteht bei länger dauernder Atemnot und lokalisiert sich an den unteren und seitlichen, letzteres in den oberen Lungenabschnitten. In der Regel handelt es sich meist um sog. gemischtes Emphysem.

Ursachen des Emphysems sind hauptsächlich chronische Bronchitis, speziell die trockene Form resp. alle dieselbe fördernden Momente (Staub, Tabaksabusus, Potatorium), chronischer Husten und Bronchialasthma. Die Bedeutung mancher Berufe wie das Blasen von Musikinstrumenten oder das Glasblasen für die Entstehung des Emphysems darf nicht überschätzt werden. Das Leiden kommt meist erst nach dem 40. Jahr zur Geltung.

Die anatomischen Veränderungen sind sehr charakteristisch. Im Gegensatz zur normalen Lunge sinkt bei Eröffnung der Brusthöhle die emphysematöse Lunge nicht zurück, sondern bleibt wie ein Luftkissen stehen und überlagert den Herzbeutel; die freien Lungenränder sind abgerundet und zeigen ebenso wie die Lungenspitzen zum Teil blasenartige Auftreibungen. Mikroskopisch findet man Vergrößerung der Alveolen, von denen mehrere infolge der Atrophie der Wände zu größeren gemeinsamen Hohlräumen verschmolzen sind. Mit der Atrophie der Alveolarwände ist gleichzeitig eine ausgedehnte Verödung von Kapillaren verbunden, was eine erhebliche Erschwerung des kleinen Kreislaufs bedeutet und Hypertrophie des rechten Ventrikels bedingt.

Die Beschwerden bei Emphysem sind vor allem Atemnot bei jeder körperlichen Anstrengung. Infolge Verminderung der Elastizität der Lunge ist die Expirationskraft stark herabgesetzt; u. a. ist charakteristisch, daß der Emphysematiker ein Licht nicht auszublasen vermag.

Der objektive Befund gestattet meist schon bei der Inspektion die Feststellung des Leidens: Ein dauernd in Inspirationsstellung erweiterter, stark gewölbter Brustkorb mit gehobenen Rippen, stumpfem epigastrischen Winkel und Vergrößerung des Sternovertebraldurchmessers; starkes Hervortreten der Auxiliärmuskeln, speziell des Sternocleido und der Scaleni, polsterartige Auftreibung der Supraclaviculargruben.

Der Klopfeschall ist auffallend laut und tief (Schachtelton); Tiefstand der Lungengrenzen bis zum ersten Lendenwirbel bzw. r. v. u. dicht bis an den Rippenbogen, Herabsetzung der Verschieblichkeit der Lungengrenzen. Auscultatorisch bestehen abgeschwächtes Vesiculäratmen und bisweilen verlängertes Expirium, daneben fast stets trockene oder feuchte Rasselgeräusche infolge der Bronchitis. Röntgenbefund: Auffallend helle Lungenfelder, flaches, wenig ausgiebig bewegliches Zwerchfell, sowie oft in großer Ausdehnung verknöcherte Rippenknorpel. Charakteristisch für Emphysem ist die Herabsetzung der Vitalkapazität sowie Vermehrung der Residualluft und Erhöhung der Mittelkapazität. — Emphysematiker machen meist einen vorzeitig gealterten Eindruck und leiden oft an starker Arteriosklerose. Die Herzdämpfung ist verkleinert, die Herztöne leise,  $P_2$  oft akzentuiert; epigastrische Pulsation ist infolge des Zwerchfelltiefstandes oft vorhanden.

Der Verlauf der Krankheit ist vor allem von dem Verhalten der Bronchitis und der Leistungsfähigkeit des Herzens abhängig. In der Regel bekommt man das Leiden erst in vorgerückteren Stadien zu Gesicht. Emphysem mäßigen Grades ist eine häufige Begleiterscheinung des Alters. Die Krankheit pflegt sich auf viele Jahre zu erstrecken. Höhere Grade von Emphysem machen den Patienten arbeitsunfähig, doch kann auch bei vorgerückteren Stadien bei Besserung der Bronchitis, insbesondere während der guten Jahreszeit vorübergehend ein leidlicher Zustand bestehen. Als Folge des chronischen Hustens sind Leistenbrüche auffallend häufig. Viele Kranke erliegen schließlich der zunehmenden Herzinsuffizienz; immerhin erreichen zahlreiche Patienten ein relativ hohes Alter.

Die **Therapie** richtet sich sowohl gegen die ursächlichen Momente, die chronische Bronchitis, das Asthma als gegen die Lungenblähung selbst. Gegen letztere ist empfehlenswert die manuelle rhythmische Kompression der seitlichen und unteren Teile des Thorax durch einen Assistenten während der Expiration; ähnlich wirken mechanisch komprimierend der vom Patienten selbst bediente Roßbachsche Atemstuhl bzw. der Apparat von Boghean mit elektrisch betriebenen Kompressionspelotten. Auch wurde die Einatmung von komprimierter Luft in pneumatischen Kammern empfohlen (cave stärkere Arteriosklerose!); umgekehrt bezweckt die Einatmung von Luft unter vermindertem Druck, z. B. mit dem Brunnschen Unterdruckapparat Erleichterung der Zirkulation im Lungenkreislauf. Auch die rhythmische Kompression des Bauches zwecks Hebung des Zwerchfells kann von Erfolg sein, z. B. durch Atemübungen im Bade (Druck des Wassers auf das Abdomen), durch rhythmische manuelle Kompression des Abdomens oder auf maschinellern Wege durch den Hofbauerschen Expirator. Bisweilen hat auch die operative Durchschneidung der Rippenknorpel zwecks Mobilisierung des starr dilatierten Brustkorbes einen Erfolg, wenn sie rechtzeitig, insbesondere vor Eintritt schwererer Herzinsuffizienz ausgeführt wird. Sehr wirksam ist die klimatische Behandlung (vgl. Therapie der Bronchitis S. 211), namentlich wenn sie konsequent jedes Jahr wiederholt wird.

Von dem substantiellen alveolären Emphysem streng zu unterscheiden ist das sog. **interstitielle Emphysem**, welches dadurch entsteht, daß nach Verletzung der Lunge Luft aus den Alveolen in das interstitielle Lungengewebe und die der Lunge benachbarten Gewebe wie das perikardiale, subpleurale und das mediastinale Bindegewebe durch die Atmung in Form kleiner Luftbläschen hineingepreßt wird. Außer Traumen der Lunge (z. B. auch der künstliche Pneumothorax) können heftige Hustenstöße sowie sehr starkes Pressen, z. B. beim Heben von Lasten, beides jedoch nur bei bereits pathologisch verändertem Lungengewebe infolge der Zerreißen von Alveolen diesen Zustand herbeiführen. Symptome sind Verschwinden der Herzdämpfung, bisweilen herzsystolisches Knistern, sowie bei stärkerer Ausbreitung der Luftinfiltration kissenartige Auftreibung der Haut der Supraklavikulargruben, am Hals und an der Brust mit palpatorisch und auskultatorisch wahrnehmbarem Knistern. In der Regel wird in wenigen Tagen die Luft wieder resorbiert. Ausnahmsweise kann jedoch starkes Mediastinalemphysem durch Kompression der Luftwege bzw. der großen Venen einen lebensgefährlichen Zustand herbeiführen.

### Pneumonie (Lungenentzündung).

Die Pneumonie (Definition vgl. S. 54) tritt in zwei prinzipiell verschiedenen Formen auf: als genuine croupöse Pneumonie sowie als bronchopneumonische Form. Croupöse Pneumonie s. S. 54. Die **Bronchopneumonie** (lobuläre oder katarrhalische Pneumonie) entwickelt sich im Anschluß an eine akute oder chronische Bronchitis durch Übergreifen der Entzündung auf die benachbarten Alveolen; der einzelne Entzündungsherd ist meist nicht größer als etwa von Nußgröße, oft aber auch kleiner. Nicht selten handelt es sich um disseminierte bzw. multiple Herde, die zum Teil konfluieren. Vorliebe zur Erkrankung zeigen die abhängigen Lungenpartien, also die hinteren und unteren Teile, deren Ventilation beim Liegen mangelhaft ist.

Mikroskopisch enthalten die entzündeten Alveolen eine eiweißreiche Flüssigkeit, desquamierte Alveolarepithelien, Leukocyten, Erythrocyten, dagegen im Gegensatz zur genuinen Pneumonie nur wenig oder kein Fibrin, in späteren Stadien reichlich Leukocyten, die zusammen mit Schleim in großer Menge auch die zugehörigen Bronchiolen erfüllen. Die bronchopneumonischen Herde bei Masern und Diphtherie pflegen etwas mehr Fibrin zu enthalten.

**Krankheitsbild und Verlauf:** Das Leiden entwickelt sich einmal im Anschluß an eine primäre Bronchitis und Bronchiolitis, namentlich im Kindes- und Greisenalter, sowie bei bettlägerigen dekrepiden Individuen, ferner als Komplikation anderer Krankheiten, vor allem im Verlauf akuter Infektionskrankheiten (Typhus, Grippe usw., und besonders bei Masern und Pertussis), wo aber ebenfalls eine Bronchitis vorangeht.

Der Beginn der Erkrankung prägt sich im Gegensatz zur croupösen Pneumonie oft nicht scharf aus, besonders wenn bereits eine fieberhafte Bronchitis besteht. Ansteigen des Fiebers über 38°, Frösteln und Verschlechterung des Allgemeinbefindens, und vor allem Beschleunigung der Atmung sowie zunehmende Dyspnoe sind bei Bestehen einer Bronchitis wichtige Symptome, die auf Bronchopneumonie hinweisen, desgleichen Zunahme der Pulsfrequenz. Schüttelfrost und Herpes fehlen in der Regel. Der Husten wird quälender und ist oft schmerzhaft. Der Auswurf ist uncharakteristisch schleimigetrig, mitunter etwas blutartig, jedoch nie rostfarben wie bei croupöser Pneumonie. Bakterio-

logisch enthält der Auswurf in der Regel eine gemischte Flora, meistens Pneumococcen, Staphylococcen und Streptococcen, gelegentlich auch *Mikrococcus catarrhalis*, Influenzabacillen usw.

Der physikalische Nachweis der bronchopneumonischen Herde ist abhängig von ihrer Lage und Größe. In vielen Fällen, wo es sich um kleine in der Tiefe gelegene Herde handelt, bestehen weder Dämpfung noch Bronchialatmen, sondern nur die Zeichen der Bronchitis, trockene und feuchte Rasselgeräusche. Wenn letztere an einer Stelle klingenden Charakter zeigen, so ist dies ein sicherer (und oft der einzige) Beweis für die Infiltration; eventuell ist an dieser Stelle auch die Bronchophonie deutlich. Oft ist der Klopfeschall der befallenen Lunge etwas tympanitisch; das Atemgeräusch ist entweder normal vesiculär oder unbestimmt. Erst größere Herde von über Fünfmärkstückgröße bewirken, wenn dieselben oberflächlich liegen, mäßige Dämpfung, Bronchialatmen sowie verstärkten Pectoralfremitus. Bisweilen hört man an der entsprechenden Stelle pleuritische Reiben.

Auch die Röntgenuntersuchung ergibt nur bei größeren Herden eine diagnostisch verwertbare Schattenbildung, wobei aber Verwechslungen mit älteren, bereits abgeheilten und vernarbten Prozessen nicht immer sicher auszuschließen ist; bezeichnend ist oft die verschiedene Größe der einzelnen Schatten. Kleine Herde entziehen sich dem Nachweis.

Der Krankheitsverlauf ist im Vergleich zur croupösen Pneumonie wenig typisch, die Fieberkurve uncharakteristisch. Als Komplikation anderer Grundleiden bilden die Bronchopneumonien oft die Todesursache.

Eine besondere Form der Bronchopneumonie ist die **Schluck- oder Aspirationspneumonie**, die durch Eindringen von Speisepartikeln in die Luftwege beim Fehlschlucken (Benommene bzw. Narkotisierte, Gelähmte), bei Aspiration von erweichtem und verjauchtem Geschwulstmaterial bei Tumoren der oberen Luftwege, der Mundhöhle und Speiseröhre, ferner beim Neugeborenen durch Aspiration von Fruchtwasser bzw. Vaginalschleim entsteht. Prädilektionsort sind die Unterlappen. Auch das bei einer Hämoptoe in den Bronchialbaum hinabfließende Blut führt oft zu Aspirationspneumonien.

Eine andere Form ist die **hypostatische Pneumonie**. Bei bettlägerigen Kranken, namentlich mit Zirkulationsstörungen, kommt es häufig in den hinteren unteren Lungenabschnitten zur Blutanschoppung sowie infolge von mangelhafter Ventilation dieser Teile zur Resorption von Luft aus den Alveolen, die teilweise kollabieren (**Atelektase**). Anfangs kann man durch regelmäßiges Aufsetzen der Kranken, welche zu tiefer Atmung zu veranlassen sind, diese Teile wieder zur normalen Entfaltung bringen, wobei man während der ersten Atemzüge das sog. Entfaltungsrasseln, d. h. Knisterrasseln hört. Bei längerem Bestehen dieses Zustandes tritt ein flüssiges, mäßig zellreiches Exsudat in die Alveolen; die Konsistenz dieser „hypostatischen“ Teile wird milzartig („Splenisation“). Schließlich entwickeln sich im Bereich der Hypostase einzelne derbere pneumonische Herde von etwa Nußgröße.

Die Hypostase, die sich mit Vorliebe bei marantischen und dekrepiden Individuen, bei Gelähmten, speziell bei Hemiplegie, ferner nach Operationen, vor allem Laparotomien einstellt, verrät sich durch Beschleunigung der Atmung und Cyanose, Dämpfung der hinteren unteren Lungenabschnitte, Bronchialatmen und klingende Rasselgeräusche. Husten ist oft nicht vorhanden, ebenso fehlt Fieber bei der einfachen Hypostase. Zunahme der Symptome sowie Temperatursteigerungen zeigt die hypostatische Pneumonie an, doch kann das Fieber bei geschwächten Personen auch dann fehlen. Sputum wird häufig infolge der bestehenden Schwäche nicht expektoriert.



Einer besonderen Form von hypostatischer Pneumonie begegnet man bei kleinen Kindern, wo die hinteren Partien des Ober- und Unterlappens im Bereich eines Streifens längs der Wirbelsäule pneumonisch infiltriert sind, sog. Streifenpneumonie.

Die Therapie der Bronchopneumonie deckt sich namentlich bezüglich der symptomatischen Behandlung im allgemeinen mit dem S. 58 und 211 Gesagten; spezifische Therapie ist hier aussichtslos. Prophylaktisch ist bei allen bettlägerigen Kranken systematisch Aufsetzen mit Atemübungen zur Vorbeugung der Hypostase durchzuführen; ältere Individuen sind täglich für kurze Zeit aus dem Bett in den Lehnstuhl zu setzen; bei frisch Operierten kann man prophylaktisch Optochin (vgl. S. 58) geben.

### Chronische Pneumonie (Karnifikation der Lunge).

Während in der Regel bei der Ausheilung einer croupösen oder Bronchopneumonie das Exsudat in den Alveolen und Bronchien resorbiert wird und die erkrankten Gebiete wieder vollkommen normal und lufthaltig werden, kann ausnahmsweise die Resorption des Exsudats ausbleiben; in diesen Fällen sproßt junges Bindegewebe von den Alveolen und dem peribronchialen Gewebe in das Exsudat. Die befallene Partie nimmt dann eine fleischartige Farbe und Konsistenz an, sog. Karnifikation der Lunge.

Später bewirkt Schrumpfung (Induration) des Bindegewebes Verkleinerung des Herdes und oft außerdem infolge von Zugwirkung an den benachbarten Bronchien bronchiektatische Erweiterungen derselben. Jede Form von Pneumonie kann gelegentlich zu chronischer Induration führen; besonders häufig sind es die Bronchopneumonien bei Masern und Keuchhusten. Auch jenseits von Bronchostenosen pflegen sich chronische Schrumpfungsherde zu entwickeln.

**Krankheitsbild:** Charakteristisch ist, daß nach der akuten pneumonischen Erkrankung die Aufhellung der Dämpfung und das Schwinden des Bronchialatmens sowie der Rasselgeräusche ausbleibt und das Fieber nur ganz allmählich im Laufe von vielen Wochen schwindet. Husten bleibt oft weiter bestehen (bei Entwicklung von Bronchiektasen nimmt er später an Heftigkeit zu). Im Laufe einiger Wochen stellen sich alsbald die Symptome der Schrumpfung ein: Bei der Atmung deutliches Zurückbleiben der befallenen Thoraxseite, deren Umfang meßbar abnimmt, Verengerung der Intercostalräume, infolge der Schrumpfung Heranziehung der Herzdämpfung und Zwerchfellhochstand auf der kranken Seite, sowie bei Kindern oft eine nach der gesunden Seite konvexe Skoliose. Der befallene Bezirk zeigt Dämpfung mit Tympanie, Bronchialatmen, oft klingende Rasselgeräusche, Verstärkung des Pektoralfremitus und Bronchophonie. Die ausgedehnte Verödung von Kapillaren im Schrumpfungsbereich führt zu Hypertrophie des rechten Ventrikels mit Accentuation des zweiten Pulmonaltons. Bisweilen finden sich Trommelschlegelfinger. Röntgenbefund: Verschattung der indurierten Teile und Heranziehung von Herz, Mediastinum und Luftrohre nach der kranken Seite sowie Zwerchfellhochstand auf der kranken Seite.

Die subjektiven Beschwerden können lange Zeit gering sein und nur in mäßiger Atemnot nach Anstrengungen sowie mitunter in Husten bestehen. Später entwickelt sich oft das Bild der Herzinsuffi-

zienz wie bei Mitralfehlern; in anderen Fällen beherrschen die Bronchiektasen das Krankheitsbild.

Diagnostisch ist von der größten Bedeutung die Anamnese (s. oben), da ein ähnlicher Lungenbefund sich auch bei chronischer indurierender Tuberkulose (Sputumuntersuchung!), hier allerdings selten im Unterlappen, bei Lungenlues, abgekapselter Pleuritis, speziell der interlobären Form (Probepunktion!) findet.

Die **Therapie** ist eine rein symptomatische: Fernhalten von Schädlichkeiten und klimatische Kuren wie bei Bronchitis und Bronchiektasen (vgl. S. 211). In frühen Stadien der Erkrankung konsequente Atemübungen (tiefe Atemzüge bei Liegen auf der gesunden Seite mit über den Kopf erhobenem Arm der anderen Seite); bei Zeichen von Herzinsuffizienz frühzeitig Digitalis.

### Lungentuberkulose.

Die Lungentuberkulose ist ein außerordentlich verbreitetes Leiden, das dauernd überaus zahlreiche Opfer, in den Kulturländern etwa  $\frac{1}{7}$  aller Menschen fordert. Sie ist daher eine der wichtigsten Volkskrankheiten. Statistiken an Obduktionsmaterial ergeben ferner, daß sich bei der großen Mehrzahl Erwachsener (80% und mehr), die nicht an Tb. sterben, Befunde ausgeheilter bzw. klinisch latent gebliebener Tb. erheben lassen. Lebensalter, Beruf sowie soziale Lage spielen eine große Rolle. Die ersten Lebensjahre sowie das Alter zwischen 18 und 30 Jahren sind besonders gefährdet, von den Berufen diejenigen, die unter ungünstigen hygienischen Bedingungen, in staubhaltiger Luft, in geschlossenen, schlecht ventilierten Räumen usw. sich abspielen (Feilhauer, Steinmetze, Tabakarbeiter, Bäcker, Schneider, Fabrikarbeiter). Dichtbevölkerte Bezirke, die ungünstigen Wohnungsverhältnisse der Proletarier, schlechte Ernährung, sowie Schwächung des Körpers durch erschöpfende Krankheiten, der Diabetes, Gravidität und Puerperium, Infektionskrankheiten wie speziell Masern, Keuchhusten, Grippe, Typhus, Lues, ferner Alkoholismus, Hyperthyreose sind wichtige, die Entstehung bzw. das Fortschreiten der Krankheit fördernde Faktoren.

Unter den Tuberkelbacillen (vgl. S. 99), die beim Menschen Tuberkulose erzeugen, sind zwei kulturell und morphologisch verschiedene Typen zu unterscheiden, die sich auch in pathogener Hinsicht verschieden verhalten, der Typus humanus und der Typ. bovinus. Ersterer wird ausschließlich beim Menschen gefunden, letzterer ist der Erreger der Tb. des Rindviehs (Perlsucht der Kühe usw.), er ist plumper als der humane, wächst auf Nährböden spärlicher und verursacht beim Rindvieh nach der Impfung allgemeine Tb., während der Typ. human. hier eine lokale Reaktion bewirkt. Für das Meerschweinchen ist auch letzterer hochpathogen. Beim Menschen können beide Arten Bacillen tuberkulöse Erkrankungen hervorrufen; der Typ. bovin. spielt hauptsächlich bei der kindlichen Tb. eine wichtige Rolle. Der Tb.-Bacillus (TB) ist sehr widerstandsfähig gegen Austrocknen und hält sich im Staube lange Zeit virulent; durch Sonnenlicht wird er dagegen bald unschädlich gemacht; diese beiden Tatsachen sind von größter epidemiologischer Bedeutung.

Die Lungen-Tb. ist eine ansteckende Krankheit. Die Infektion erfolgt in der Regel aerogen, d. h. durch Inhalation und zwar sowohl durch die sog. Tröpfcheninfektion (vgl. S. 6), d. h. durch Anhusten, also direkt von Mensch zu Mensch, als auch durch Einatmung des ein-

getrockneten verstäubten Sputums Tuberkulöser. Während beim Erwachsenen die Aufnahme der TB. durch den Magendarmkanal keine Rolle spielt, ist sie für den Säugling bedeutsam, indem hier durch die Milch tuberkulöser Kühe der Erreger (Typ. bovin.) in den Darm und die dazugehörigen Lymphdrüsen gelangt, von wo aus eine weitere Ver-  
schleppung erfolgen kann.

Die Erfahrung scheint dafür zu sprechen, daß sowohl hereditären Faktoren wie gewissen somatischen Eigentümlichkeiten des Individuums die Bedeutung einer spezifischen Disposition für Tb. zukommt. Anamnestisch ergibt sich für überaus zahlreiche Kranke ein gehäuftes Vorkommen von Tb. unter ihren nächsten Angehörigen (Großeltern, Eltern, Geschwister), woraus man auf eine vererbte familiäre Disposition geschlossen hat. Wenn auch die Vererbung verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber der Tb. theoretisch denkbar ist, so ist andererseits in derartigen Fällen gehäuften Vorkommens der Tb. in einer Familie vor allem mit der direkten Übertragung der Bacillen, z. B. von der tuberkulösen Umgebung auf die Kinder in den ersten Lebensjahren zu rechnen. Kongenitale Tb. durch placentare Infektion — Placenta-Tb. wird mitunter beobachtet — kommt wegen ihrer Seltenheit praktisch nicht in Betracht. Die Bedeutung des individuell-konstitutionellen Momentes hat man aus dem häufigen Zusammentreffen der Lungentuberkulose mit einem gewissen physischen Körperbau, dem *Habitus phthisicus* bzw. *asthenicus* gefolgert. Zu diesem Bilde gehören paralytischer flacher Thorax, Enge der oberen Brustapertur, Verknöcherung des ersten Rippenknorpels, die *Costa X. fluctuans*, zarter Knochenbau, geringes Fettpolster sowie Muskelschwäche, desgleichen bisweilen Zeichen zurückgebliebener körperlicher, speziell sexueller Entwicklung im Sinne des *Infantilismus*. Doch ist die Zahl derjenigen Tuberkulösen, die diesen Bedingungen nicht entsprechen, sondern körperlich gut entwickelt sind, keineswegs gering, so daß mit der Möglichkeit zu rechnen ist, daß die als disponierend geltende Körperbeschaffenheit in Wirklichkeit umgekehrt erst eine Folgeerscheinung einer in der Kindheit erfolgten Tb.-Infektion und dadurch bedingten Schädigung der Entwicklung darstellt. Eine erworbene Disposition kommt zweifellos in Form von Erkrankungen des Respirationsapparates wie Bronchialkatarrhe, ferner durch verschiedene Krankheiten wie Masern, Diabetes usw. (s. oben) vor.

Die für Tb. charakteristische Gewebsveränderung ist ein Entzündungsprodukt, der Tuberkel, d. h. ein Knötchen aus Granulationsgewebe, das sich aus Epitheloidzellen, die von Bindegewebszellen und Gefäßendothelien abstammen, aufbaut, zu denen sich Lymphocyten und Plasmazellen hinzugesellen. Durch Färbung lassen sich stets TB nachweisen. In der Mitte des Tuberkels finden sich meist einige Riesenzellen. Bezeichnend ist das Fehlen von Blutgefäßen, was im Verein mit der Giftwirkung der Bacillen eine für Tb. charakteristische Art der Nekrose des Zentrums des Tuberkels zur Folge hat, die sog. Verkäsung, d. h. die Umwandlung in eine gelblichweiße krümelige Masse, die histologisch keine Struktur erkennen läßt. Durch Ausdehnung des Granulationsgewebes an der Randzone vergrößert sich der ursprünglich hirsekorngroße Tuberkel, der außerdem später mit Tuberkeln der Nachbarschaft konfluert. Verflüssigung des Käseherdes sowie Durchbruch desselben in die Nachbarschaft führt oft zur Bildung von Höhlen, die durch Zusammenfließen beträchtlichen Umfang annehmen können. In der Nachbarschaft der Tuberkel beobachtet man stets Exsudations-

prozesse, so in den Alveolen der Lungen neben dem Tuberkel ein entzündliches Exsudat wie bei Pneumonie, das aber hier unter der Wirkung der Toxine ebenfalls zur Verkäsung neigt. Der Anteil der proliferativen und exsudativen Veränderungen ist von Fall zu Fall verschieden. Das Vorherrschende reiner Tuberkelbildung in der Lunge findet sich bei der Miliar-Tb. (S. 99); vorwiegend exsudativen Charakter hat die käsige Pneumonie (s. unten). Zwischen beiden Extremen finden sich die verschiedensten Übergangsstadien. Der weitere Verlauf der Erkrankung hängt davon ab, ob der Prozeß fortschreitet und zu weiterer Verkäsung führt oder lokalisiert bleibt und zum Stehen kommt bzw. ausheilt. In diesem Fall wird der Herd durch einen Wall von Bindegewebe abgekapselt bzw. erfährt selbst eine fibröse Umwandlung, so daß als Residuum des Prozesses schließlich eine Narbe oft mit Kalkablagerung zurückbleibt, die keine Krankheitserscheinungen mehr verursacht, obwohl in ihr sehr oft virulente TB (Tierversuch!) erhalten bleiben.

Von größter Bedeutung ist die Eigentümlichkeit der Tb., daß jede primäre Organinfektion von einer tuberkulösen Erkrankung der regionären Lymphdrüsen begleitet ist, die histologisch die gleichen charakteristischen Merkmale zeigt. Verkäsung, Fibrose und Verkalkung der tracheobronchialen bzw. bronchopulmonalen Drüsen sind daher eine konstante Begleiterscheinung der primären Lungen-Tb. Häufig heilt der primäre Lungenherd, der oft klinisch unbemerkt bleibt, bis auf so geringe Spuren aus, daß nur die zurückgebliebenen Drüsenschwellungen den Hinweis auf die frühere Lungenerkrankung bilden (Bronchialdrüsentb.).

Die Weiterverbreitung der Tb. von einem primären Herde aus kann gelegentlich auf dem Lymphwege sowie hauptsächlich durch die Blutbahn erfolgen; letzterer Weg bewirkt bei reichlicher Überschwemmung des Körpers mit TB Miliartuberkulose, bei spärlicher Aussaat Ansiedlung einzelner Tuberkel in verschiedenen Organen. Außer dieser Art von Verbreitung spielt die Verschleppung des aus den erweichten Herden stammenden infektiösen Materials durch die natürlichen Kanäle des befallenen Organs eine sehr große Rolle, so z. B. das Hinabfließen von bacillenhaltigem Eiter in die Bronchien der unteren Lungenabschnitte, die Entwicklung der Tb. im Kehlkopf und im Darm durch Kontakt mit dem Sputum sowie die Tb.-Erkrankung der verschiedenen Ausscheidungsorgane speziell der Nieren, der Blase usw. Häufig, namentlich bei den mit der Außenwelt in Verbindung stehenden Tb.-Herden, d. h. der sog. „offenen“ Tuberkulose, siedeln sich in ihnen andere Bakterien wie Streptococcen, Influenzabacillen usw. an. Diese sog. Misch- oder Sekundärinfektion ist eine für den Krankheitsverlauf sehr ungünstige Komplikation.

Von großer Bedeutung für die Entwicklung und den Verlauf der Lungen-Tb. des Erwachsenen ist die in der Regel vorausgegangene erste Infektion in der Kindheit, indem hier immunisatorische Vorgänge im Sinne einer Umstimmung des Organismus sicher eine wichtige Rolle spielen. Während sich zwar in manchen Fällen an die Erstinfektion, speziell wenn sie in den ersten Lebensjahren erfolgt, unmittelbar eine weitere Ausbreitung der Tb. in bösartiger Form mit fortschreitender Verkäsung sowie Miliar-Tb. anschließt, beobachtet man in zahlreichen Fällen, insbesondere bei älteren Kindern eine Ausheilung der primären Lungen-Tb., während die oben beschriebenen Bronchialdrüsenveränderungen als einziges klinisch greifbares Residuum zurückbleiben. Wenn nun später bei erneuter Tb.-Erkrankung durch Aufflackern des ersten Herdes oder durch Neuinfektion die Krankheit oft einen weniger bösartigen und milderen Charakter erkennen läßt, der in der Neigung zu chronischem Verlauf und vor allem ohne stärkere Generalisierung, also im Bilde der gewöhnlichen Lungentuberkulose des Erwachsenen zum Ausdruck kommt, so läßt sich das so deuten, daß die erste Infektion zwar keinen absoluten Schutz, aber häufig eine relative Immunität hinterläßt. Damit stimmt auch die Beobachtung überein, daß bei einem schon vorher infizierten Meerschweinchen eine zweite Tb.-Infektion mit geringen Bacillenmengen nicht angeht bzw. ohne regionäre Drüsenerkrankung bald wieder abheilt. Hierfür spricht ferner die Beobachtung über den Verlauf der Tb. bei solchen Erwachsenen, die wie z. B. gewisse unzivilisierte Völker keine Gelegenheit zu einer Kindheitsinfektion hatten und später nach erfolgter erster Infektion der bösartigen Verlaufsart der Säuglings-Tb. erliegen. Daß auch sonst nicht immer ein gewisser Schutz trotz früherer Infektion besteht, beweist

der gelegentliche maligne Verlauf der Tb. Erwachsener, z. B. als käsige Pneumonie. Den Beweis für die zurückbleibende spezifische Umstimmung des Organismus durch die erfolgte Tb.-Infektion bietet auch die allergische i. e. anaphylaktische Reaktion (vgl. S. 10 u. 73) gegenüber dem spezifischen Gift der TB, dem Tuberkulin. Während das von Tb. vollständig freie Individuum Tuberkulin vollkommen reaktionslos verträgt, belehrt uns der positive Ausfall der Tuberkulinprobe darüber, daß die größte Mehrzahl der gesunden Erwachsenen eine, wenn auch latent gebliebene Kindheitsinfektion durchmachten.

Die Reinfektion des Erwachsenen ist denkbar sowohl als endogene, d. h. von dem eigenen früheren Herde ausgehend, als auch exogene Infektion, letztere in der Hauptsache als Inhalationsinfektion.

**Krankheitsverlauf:** Die Lungen-Tb. kann unter sehr verschiedenen Bildern verlaufen. Abgesehen von der miliaren Form, die nur eine Teilerscheinung allgemeiner Miliar-Tb. ist und an anderer Stelle (S. 99) besprochen wird, sind vor allem zu unterscheiden die chronische Lungentuberkulose in ihren verschiedenen Graden und Stadien, sowie die akute Form, speciell die käsige Pneumonie. Zwischen diesen Verlaufsformen gibt es zahlreiche Übergänge.

Die **beginnende Lungentuberkulose** hat eine Neigung zur Lokalisation in den kranialen Abschnitten. Erkrankung der Lungenspitzen ist dabei die häufigste initiale Form.

Mangelhafte Ventilation der apikalen Lungenteile infolge ihrer geringeren Atemexkursionen sowie weniger günstige Blutversorgung (die auch bei der Miliar-Tb. eine stärkere Beteiligung dieser Abschnitte erklärt) dürften die Hauptgründe hierfür sein.

Die ersten **Symptome** sind oft allgemeiner Art: Mattigkeit und starke Ermüdbarkeit, angegriffenes Aussehen, Blässe, Appetitmangel, Herzklopfen und vor allem auffallende Gewichtsabnahme, bei Frauen Störungen der Menstruation. Außerdem bestehen in der Regel Zeichen eines Katarrhs der Luftwege, der oft von den Pat. auf Erkältung zurückgeführt wird, geringer Reizhusten sowie oft, evtl. nur morgens etwas schleimiger oder schleimigeitriger Auswurf. Als lokale Beschwerden werden oft ziehende „rheumatische“ Schmerzen zwischen den Schulterblättern, gelegentlich Druck auf der Brust, auch geringe Kurzatmigkeit angegeben. Sehr charakteristisch ist auch die dem Pat. auffallende Neigung zu starkem Schwitzen nachts, besonders gegen Morgen. In anderen Fällen fehlen alle diese Symptome bzw. werden vom Pat. übersehen, bis ein plötzlich auftretender Bluthusten auf das Lungenleiden aufmerksam macht.

Der blutige Auswurf bei Hämoptoe, der stets mit Husten entleert wird, ist hellrot, schaumig und geruchlos (der von Hysterischen bisweilen durch Saugen am Zahnfleisch erzeugte sanguinolente Speichel hingegen dünnflüssig, von fade-süßlichem Geruch und reich an Pflasterepithelien aus der Mundhöhle). Mitunter enthält der Auswurf nur Spuren vom Blut in Form von roten Streifen.

Bei der Untersuchung achte man, abgesehen vom allgemeinen Habitus (s. oben), zunächst auf das Verhalten beider Thoraxhälften bei der Atmung, Nachschleppen der einen Seite, etwaige Einziehungen der Brustwand sowie auf Asymmetrien der Supraclaviculargruben (Eingesunkensein der einen Seite), ferner auf Ungleichheit der Pupillen (Erweiterung auf der erkrankten Seite durch Sympathicusreizung). Lungentb.-Kranke leiden oft infolge der Schweiße an Pityriasis versicolor

am Rumpf. Die Palpation ergibt häufig im Bereich des oberen Trapeziusrandes der erkrankten Seite starke Druckempfindlichkeit. Perkutorisch zeigt die beginnende Spitzenaffektion oft keine Änderung, in anderen Fällen geringe Schallverkürzung mit oder ohne Tympanie.

Da nur Schalldifferenzen zwischen symmetrischen Punkten beider Seiten zu verwerthen sind, sei man bei geringen Unterschieden in der Beurteilung vorsichtig und achte insbesondere auf etwaige Differenzen im Muskelpolster speziell des *M. supraspinatus* (bei Rechtshändern oft r. stärker entwickelt) sowie auf wenn auch nur geringfügige Verbiegungen der Hals- und Brustwirbelsäule, welche Schallunterschiede hervorrufen können. Das Krönigsche Schallfeld (s. oben) ist bei Schrumpfung der Spitze auf der kranken Seite oft medial eingengt.

Auskultatorisch findet man (der Pat. soll leise und tief mit offenem Mund atmen) in den ersten Stadien des Spitzenkatarrhs zunächst eine Änderung des Exspiriums, das verlängert und verschärft ist. Später verändert sich auch das Inspirium, das teils einen schärferen rauhen Charakter annimmt, teils abgeschwächt ist, während das Exspirium nun rein bronchial klingt. Bei vollständiger Infiltration wird auch das Inspirium bronchial. Über den übrigen Lungenabschnitten kann der Befund vollkommen normal sein.

Dämpfung und Veränderung des Atemgeräusches über einer Spitze beweisen mit Sicherheit nur das Bestehen einer Verdichtung, die aber ebensowohl einen frischen Prozeß wie eine ausgeheilte Narbe bedeuten kann. Erst der gleichzeitige Nachweis von Rasselgeräuschen (Rg.), die man evtl. erst durch Hustenlassen provoziert, weisen auf das Bestehen eines floriden Katarrhs hin, falls sie auf die betreffende Lungenspitze beschränkt sind.

Fehlerquellen bei der Deutung der physikalischen Befunde sind: Die physiologische Verlängerung des Exspiriums r. h. o. infolge größerer Weite des r. Bronchus; Vortäuschung von Rg. durch Muskelgeräusche; ferner die den beschriebenen ähnlichen nicht tuberkulösen Befunde bei behinderter Nasenatmung (man kontrolliere stets die Nase!), desgleichen Residuen eines nicht spezifischen akuten Katarrhs der Luftwege, schließlich Dämpfung und Änderung des Atemgeräusches über der linken Spitze bei starker Vorhofserweiterung infolge von Stauung bei Mitralfehlern.

Großen diagnostischen Wert hat die Untersuchung des Auswurfs auf TB, die aber in zahlreichen initialen Fällen zunächst vermißt werden. In negativen Fällen versuche man die Anreicherung des 24stündigen Sputums mit Antiformin bzw. den Tierversuch, d. h. Impfung eines Meerschweinchens.

Eine mit steriler physiol. NaCl-Lösung gründlich abgespülte eitrige Sputumflocke wird in steriler NaCl-Lösung aufgeschwemmt, einem Tier unter die Haut nahe der Leistengegend injiziert, nachdem man die Drüsen dortselbst in der aufgehobenen Hautfalte zwischen den Fingern gequetscht hat, um die Erkrankung zu beschleunigen. Nach 8–12 Tagen lassen sich in den Drüsen mit der Antiforminmethode TB nachweisen.

Einen besonders großen diagnostischen Wert bei der initialen Tb. hat weiter das Verhalten der Körpertemperatur, da genaue Messungen (am besten rektal) in der Mehrzahl der Fälle geringe subfebrile Steigerungen, namentlich im Laufe des Nachmittags oder Abends ergeben.

Dieselben sind oft den Pat. subjektiv nicht bewußt. Bei Frauen werden sie namentlich zur Zeit der Menstruation beobachtet. Diagnostisch verwertbar ist

ferner die starke Labilität der Temperatur, die bereits nach geringen Anstrengungen z. B. nach einem Spaziergang etwas erhöht ist. Man mißt  $\frac{1}{2}$  Std., nachdem der Pat. sich wieder hingelegt hat.

Auch die Überempfindlichkeit gegenüber Tuberkulin (siehe oben) kann diagnostisch von Bedeutung sein.

Bei der Kutanimpfung nach Pirquet werden auf der Haut des Vorderarms mit einem Impfböhrer oder einem stumpfen Messer an zwei verschiedenen Stellen ganz oberflächliche, nicht blutende Erosionen wie bei der Pockenimpfung gesetzt und auf die eine ein Tropfen Alttuberkulin, auf die andere zum Vergleich sterile NaCl-Lösung gebracht. Bei positiver Reaktion tritt an der Impfstelle im Lauf von 24—48 Std. eine rote Quaddel von etwa 1 cm Durchmesser auf; bloße Rötung ohne Infiltration bzw. das Fehlen jeder Rötung bedeutet einen negativen Ausfall. Da bei ca. 90% aller Erwachsenen infolge alter latenter Herde (s. oben) die Probe positiv ausfällt, so ist hier nur der negative Ausfall verwertbar (Ausnahme: fortgeschrittene Tb.); dagegen hat bei Kindern auch die positive Probe diagnostische Bedeutung (bei Masern wird sie vorübergehend negativ). — Bei der subcutanen Tuberkulinprobe nach R. Koch werden kleinste Mengen Alttuberkulin unter die Haut des Arms oder Rückens injiziert. Voraussetzung für die Probe ist eine absolut normale Temperatur an den 3 vorausgehenden Tagen. Während der Beobachtung Betruhe. Anfangsdosis 0,0002; bei negativem Ausfall steigert man, evtl. wiederholt, in Abständen von 2—3 mal 24 Std. die Dosen: 0,001, 3. Dos. 0,005, Grenzdosis 0,01; bei Kindern die Hälfte der Dosis. Positiver Ausfall wird angezeigt 1. durch Allgemeinreaktion, d. h. Temperatursteigerung von mindestens 0,5° verbunden mit Störung des Allgemeinbefindens, Kopfschmerz, Abgeschlagenheit; 2. durch die Herdreaktion, d. h. Verstärkung der Dämpfung und vor allem Auftreten oder Vermehrung der Rg. über dem Lungenherd sowie vermehrtes Sputum, gelegentlich mit Erscheinen von TB. Abgesehen von progredienter Tb., die negativ reagiert, ist auch hier der negative Ausfall beweisender als der positive. Wegen der gelegentlich beobachteten Aktivierung bzw. Verschlimmerung einer Tb. durch die Injektion beschränke man ihre Anwendung auf das notwendigste Maß. Kontraindikationen: Fieber, Hämoptoe, Verdacht auf Miliar-Tb. sowie sämtliche schweren Organ- und Stoffwechselkrankheiten.

Die Röntgenuntersuchung bildet häufig eine wertvolle Ergänzung des physikalischen Befundes, besonders in Form der Photographie, die in der Tiefe der Lungen gelegene, der Perkussion und Auskultation nicht zugängliche Veränderungen aufzudecken vermag.

Die Veränderungen des Lungengewebes bewirken bei hinreichender Größe Schatten, deren Intensität von der Dichte des Herdes, aber auch von der Durchlässigkeit des umgebenden Gewebes abhängig ist. Fibröse und verkalkte Herde sind daher wesentlich deutlicher als frische Infiltrate; andererseits kann selbst ein Kalkherd unsichtbar bleiben, wenn daselbst z. B. die Pleura stark schwierig verdickt ist. Da das Rö.-Verfahren gerade die Veränderungen, die größtenteils lediglich als Residuen abgeheilter Prozesse für den augenblicklichen Status klinisch oft belanglos sind, deutlicher darstellt als frische Veränderungen, so kann bei der Bewertung der Befunde nur viel Übung und Kritik vor falschen Schlüssen schützen. Zu warnen ist insbesondere auch vor der Verwertung geringer Unterschiede beim Vergleich mehrerer von einem Patienten zu verschiedenen Zeiten vorgenommenen Aufnahmen, da hierbei nicht zu vermeidende, in der Aufnahmetechnik begründete Differenzen Anlaß zu fehlerhafter Beurteilung geben können.

Bei der beginnenden Lungen-Tb. sind Trübungen einer Spitze, namentlich in Form zarter rundlicher Flecken und wolkiger Schatten für frischere Veränderungen charakteristisch, während stärkere diffuse Trübungen bzw. scharf umschriebene Flecke häufiger obsolete Veränderungen anzeigen. Mitunter deckt die Photographie auch gewisse subapikale, unmittelbar unter dem Schlüsselbein in der Tiefe gelegene Herde auf, sowie ferner strangartige Züge, die zum Hilus führen. Letzterer zeigt sehr oft scharf sich abzeichnende Schatten von verkalkten bzw. fibrösen Drüsen. Nicht selten erscheint die ganze Hilusgegend der kranken Seite diffus getrübt,

Auch die Deutung dieser Befunde erfordert große Vorsicht, zumal ein Teil der Zeichnung von den Hilusgefäßen gebildet wird, die z. B. auch bei Stauungszuständen im kleinen Kreislauf an Deutlichkeit zunehmen. Bei der Durchleuchtung achtet man auch auf etwaige Unterschiede in der Bewegung beider Zwerchfelhälfen, die besonders bei Pleuraadhäsionen gefunden werden.

**Verlauf der Lungentuberkulose.** Viele inzipte Fälle heilen nach einiger Zeit teils spontan, teils unter der Behandlung aus. Fieber, Husten, Auswurf sowie die Rg. werden geringer und schwinden schließlich unter entsprechender Besserung des Allgemeinbefindens, wobei vor allem auch die Zunahme des Körpergewichtes eine Gewähr für die Besserung bietet. Schließlich sind objektiv nur noch die oben genannten Zeichen der Vernarbung des Lungenherdes nachweisbar. Derartige Fälle können nach erneuter Schädigung infolge von Erkältung oder sonstigen ungünstigen Einflüssen (s. oben) gelegentlich wieder aufflackern, um bisweilen nach einiger Zeit wieder zur Ruhe zu kommen.

In anderen Fällen hat das Leiden von vornherein Neigung zum Fortschreiten. Das Fieber bleibt weiter bestehen, wird meistens sogar höher, die Gewichtsabnahme dauert an und der lokale Lungenbefund breitet sich aus. Vor allem werden die feuchten Rg. über größeren Bezirken hörbar, nicht nur über der Spitze, sondern auch über tiefer gelegenen Teilen, zugleich nimmt oft auch die Dämpfung zu. Die Pat. bekommen das als hektisch bezeichnete Aussehen, d. h. eine fleckige Rötung der Wangen, oft mit einer Spur Cyanose sowie glänzende Augen. Die Brustbeschwerden, die Stiche beim Atmen, die Rückenschmerzen, werden stärker. Das Sputum wird reichlicher und ist schleimig-eitrig; es konfluert nicht im Speiglas im Gegensatz zu Bronchitis und Bronchiektasen, sondern besteht aus einzelnen Ballen (Sputum globosum oder nummosum); meist sind jetzt TB nachweisbar sowie bei progredienter Gewebseinschmelzung elastische Fasern, deren Vorhandensein stets von übler Bedeutung ist. Oft besteht heftiger Husten, in andern Fällen ist er gering, wobei der Auswurf dann mitunter nur durch einfaches Räuspern herausgebracht wird.

Nicht selten tritt erneut eine Hämoptyse ein, die oft infolge des Hinabfließens von Blut in die Bronchien eine Aussaat der Tb. in den Unterlappen zur Folge hat, was aus dem Ansteigen des Fiebers und dem reichlichen Auftreten feuchter Rg. über den Unterlappen zu erkennen ist. Dämpfungen pflegen hier zu fehlen, bisweilen tritt Tympanie auf.

Anatomisch handelt es sich hier um die Ausbreitung einer käsigen Bronchitis und Peribronchitis, die schon makroskopisch an den kleeblattförmigen und rosettenartig gruppierten („nodös-azinösen“) Herden zu erkennen ist. Im Röntgenbilde erscheinen dieselben ebenso wie bei miliarer Aussaat als kleine zarte oder auch größere Flecke.

Eine derartige Dissemination erfolgt oft auch ohne ersichtlichen äußeren Grund und geschieht nicht selten schubweise. Sie bedeutet stets eine ernste Verschlimmerung des Zustandes. Das Fieber hat jetzt typisch hektischen Charakter, es ist intermittierend, steigt im späteren Nachmittag bzw. abends erheblich an, um gegen Morgen unter starker Schweißbildung zur Norm abzufallen. Seltener ist der umgekehrte sog Typus inversus mit hohen morgendlichen Temperaturen.



Auch in diesem Stadium kann es gelegentlich zum Stillstand oder sogar zur Heilung kommen, indem ausgedehnte Bindegewebswucherungen den Herd abkapseln und klinisch bald deutliche Schrumpfungerscheinungen (s. oben) sich bemerkbar machen. Bisweilen erlischt der Krankheitsprozeß dabei zwar nicht vollständig, zeigt jedoch einen relativ benignen chronischen Charakter mit nur geringen oder zeitweise völlig fehlenden Temperatursteigerungen, Verminderung des Auswurfs, aus dem die TB schwinden können, und leidliches Allgemeinbefinden (fibröse Phthise). In anderen Fällen geht die Krankheit in das Bild der fortgeschrittenen Phthise über, die durch den progredienten Charakter der Zerstörungsprozesse der Lunge und den fortschreitenden allgemeinen Körperversfall ausgezeichnet ist. Charakteristische Symptome sind der Nachweis von Kavernen (amphorisches Atmen und großblasige metallische Rg., ferner häufig Wintrichscher und Gerhardttscher Schallwechsel sowie das Geräusch des gesprungenen Topfs; im Röntgenbild evtl. größere helle rundliche Flecke mit scharfer Umrandung; Konfluieren des bis dahin geballten Sputums) sowie von größeren Dämpfungen, Ausbreitung von reichlichen feuchten Rg. über beiden Lungen, zahlreiche elastische Fasern im Auswurf. Die rapide Gewichtsabnahme wird in diesem Stadium durch die oft gleichzeitig vorhandene Kehlkopf-Tb. (vgl. S. 197) sowie Darm-Tb. gefördert, so daß die Pat. bald in einen Zustand extremer Abmagerung und hochgradigen Kräfteverfalls geraten, gegen den nicht selten ihre auffallend optimistische Gemütsstimmung merkwürdig kontrastiert. Die Diazoreaktion im Harn ist positiv (oft vorher schon die Weißsche Probe). In besonders bösartigen Fällen kommt es bei der weiteren Ausbreitung des Prozesses nicht zur Entwicklung größerer Infiltrate mit Dämpfung und Bronchialatmen, sondern zur Disseminierung zahlreicher kleiner Herde, die sich nur durch die weit ausgebreiteten ominösen feuchten Rg. verraten. Diese Form der sog. galoppierenden Schwindsucht, die oft unter hohem kontinuierlichem Fieber verläuft und hauptsächlich jugendliche Individuen befällt, endet meist in wenigen Monaten letal. Endlich wird ein beschleunigter Verlauf beobachtet, wenn eine käsige Pneumonie sich im Verlauf der Phthise entwickelt.

Die sog. pneumonische Form der Lungen-Tb. (käsige Pneumonie) kann sowohl als selbständiges Krankheitsbild wie im Anschluß an eine bereits klinisch manifeste Lungen-Tb. auftreten. Im ersteren Fall ähnelt der akute Beginn mit hohem Fieber, ausgedehnter Dämpfung mit Bronchialatmen sowie rostfarbenem Sputum vollständig dem Bilde der croupösen Pneumonie. Sie befällt häufiger den Unter- als den Oberlappen. Die Diagnose wird meist erst im weiteren Verlauf gestellt, wenn eine Entfieberung wie bei genuiner Pneumonie nicht eintritt, das Sputum stark eitrig wird und schließlich TB in demselben nachgewiesen werden. Später kommt es auch zu klinisch nachweisbaren Erweichungerscheinungen mit zahlreichen klingenden Rg., reichlich Bacillen sowie elastischen Fasern. Die Diazoreaktion ist stets positiv. Eine echte croupöse Pneumonie geht niemals nachträglich in Verkäsung über. In zahlreichen Fällen entwickelt sich die käsige Pneumonie nach Aspiration von Tb.

Material in die Unterlappen, z. B. nach Hämoptyse. Stets bedeutet sie ein rasches Fortschreiten der Lungenerkrankung, die meist innerhalb von Wochen oder wenigen Monaten zum Tode führt. Immerhin kommen Fälle vor, wo größere Infiltrate mit pneumonischen Erscheinungen nach einiger Zeit wieder zurückgehen. Hier dürfte es sich um nicht spezifische Begleiterscheinungen eines tuberkulösen Herdes handeln. Auch käsige Bronchopneumonien kommen vor; es sind das namentlich die Fälle, die sich im Anschluß an Masern, Pertussis, Grippe sowie Typhus entwickeln und unter dem Bilde von nicht zur Lösung kommenden bronchopneumonischen Herden verlaufen.

Von den **Komplikationen** der Lungen-Tb. ist, abgesehen von den schon oben erwähnten, vor allem die Pleuritis zu nennen. Auf trockene Pleuritis bzw. Adhäsionen sind die sehr häufigen Klagen über Brustschmerzen und Seitenstechen usw. zu beziehen. Mitunter findet sich trockene Pleuritis mit einem dem Pat. selbst palpatorisch wahrnehmbaren Knarren ohne jeglichen Schmerz. Einseitige seröse Exsudate sind ein häufiges Frühsymptom, an das sich später evtl. eine weitere Entwicklung der Lungenerkrankung anschließt. Empyeme (vgl. S. 244) kommen bei fortgeschrittenen Fällen namentlich dort vor, wo rapider Zerfall von Lungengewebe stattfindet, ferner im Anschluß an gleichzeitige Rippenarier sowie namentlich in Verbindung mit Pneumothorax (vgl. S. 246). Derselbe entsteht spontan dort, wo dicht unter der Pleura ein intensiver Gewebszerfall sich abspielt bzw. eine Kaverne, z. B. nach starkem Husten, einreißt. Häufig entwickelt sich gleichzeitig alsbald ein seröses oder eitriges Pleuraexsudat. Während in zahlreichen Fällen der Pneumothorax eine weitere Verschlimmerung des Leidens bedeutet, beobachtet man in einzelnen Fällen eine Besserung (vgl. Therapie). Häufig leiden die Kranken bereits im Initialstadium an Anfisteln. Rheumatische Beschwerden, speziell der Gelenke, die nicht auf spezifischen Tb.-Veränderungen beruhen, treten nicht selten auf, teils in Form multipler flüchtiger Gelenkschwellungen, teils auch mit chronischen Veränderungen, ähnlich einer chronischen Polyarthritis (Poncetsches Rheumatoid), zum Teil führen sie zu Versteifung; gegen Salicyl sind sie refraktär. Neuritiden sind nicht selten, namentlich Ischias. Vorgeschrittelte Fälle zeigen häufig Symptome von Amyloidose verschiedener Organe, was sich u. a. durch Schwellung und vermehrte Konsistenz von Leber und Milz, Beteiligung des Darms sowie der Nieren verrät. Mitunter entwickelt sich auch eine Tb. des Harnapparates.

**Diagnose.** Während die Diagnose der progressiven Phthise in der Regel leicht ist, ist die sichere Feststellung der inzipienten Tb. oft recht schwierig.

Auf Fehlerquellen des physikalischen und Röntgenbefundes wurde schon hingewiesen. Man kontrolliere sorgfältig die oberen Luftwege, um etwaige Katarrhe, ferner Nebenhöhlenerkrankungen, chronische Otitiden ausschließen zu können. Menstruelle und prämenstruelle Temperatursteigerungen beobachtet man auch bei Genitalaffektionen sowie nicht selten bei Pyelitis. Häufig wird ferner beim Weibe die Chlorose mit einem beginnenden Lungenleiden verwechselt, da beiden gewisse Eigentümlichkeiten, namentlich die starke Ermüdbarkeit gemeinsam sind, doch

fehlt der Chlorose die progrediente Gewichtsabnahme, während andererseits eine Hb.-Verminderung nicht zum Bilde der Tb. incip. gehört (vgl. auch Chlorose S. 255). Noch schwieriger kann die Unterscheidung gegenüber gewissen Formen von Hyperthyreose junger Mädchen sein, zumal erstens auch hier leichte Temperatursteigerung, starke Gewichtsabnahme und die gleichen subjektiven Beschwerden vorkommen und zweitens sichere Tuberkulosen mitunter gleichzeitig Zeichen von Hyperthyreose aufweisen. In derartigen und vielen anderen Fällen vermag eine einmalige Untersuchung die Diagnose nicht zu entscheiden, die vielmehr nur durch stationäre Beobachtung geklärt werden kann.

Die **Prognose** der Lungen-Tb. richtet sich sowohl nach dem Charakter und der Ausdehnung des Lungenprozesses wie nach dem allgemeinen Kräfte- und Ernährungszustand.

Die im Anschluß an akute Infektionskrankheiten (s. oben), im Verlauf von Diabetes, ferner auf dem Boden chronischer Lungenerkrankungen (Steinhauerlunge usw. vgl. S. 241) entstehende Tb. hat eine schlechte Prognose. Fälle aus stark mit Tb. belasteten Familien verlaufen oft ungünstig. Dauerndes Fieber, Zunahme des Auswurfs und vor allem das Erscheinen elastischer Fasern in demselben sind ungünstige Zeichen. Die Bedeutung einer Hämoptoe wird von Laien oft überschätzt. Nicht selten gibt erst sie dem Pat. den Anlaß, seinem Leiden größere Aufmerksamkeit als bisher zu widmen und sich einer Behandlung zu unterziehen, die oft zur Ausheilung führt. Die Prognose der Alters-Tb. ist relativ günstig, da es sich meist um indurative Formen handelt.

Man hat die Lungen-Tb. zur prognostischen Kennzeichnung des einzelnen Falles in verschiedene Stadien geteilt. Zunächst ist zu unterscheiden zwischen geschlossener Form ohne und offener mit TB im Auswurf. Diese Unterscheidung ist vor allem in hygienischer Hinsicht von größter Bedeutung im Hinblick auf die Weiterverbreitung der Krankheit. Für die Prognose ist der Befund und die Zahl der TB im Sputum nur mit Vorsicht zu verwerten, da zahlreiche initiale offene Tb.-Fälle nicht schlechter oder langsamer als geschlossene Fälle heilen.

Das Einteilungsschema nach Gerhardt-Turban unterscheidet 3 Stadien und zwar I: Leichte, auf kleine Bezirke eines Lappens beschränkte Erkrankung, die z. B. an den Lungenspitzen bei Doppelseitigkeit des Falles nicht über die Schulterblattgräte und das Schlüsselbein, bei Einseitigkeit vorn nicht über die zweite Rippe hinunterreichen darf. II: Leichte, weiter als I, aber höchstens auf das Volumen eines Lappens, oder schwere, höchstens auf den Raum eines halben Lappens ausgedehnte Erkrankung. III: Alle über II hinausgehende Erkrankungen und alle mit erheblicher Höhlenbildung. — Unter leichter Erkrankung sind zu verstehen disseminierte Herde, die sich durch leichte Dämpfung, unreines, rauhes, abgeschwächt vesiculäres, vesicobronchiales bis bronchovesiculäres Atmen und feinblasiges bis mittelblasiges Rasseln kundgeben. Unter schwerer Erkrankung sind Infiltrate zu verstehen, welche an starker Dämpfung, stark abgeschwächtem („unbestimmten“) bronchovesiculärem bis bronchialem Atmen mit und ohne Rasseln zu erkennen sind. Erhebliche Höhenbildungen, die sich durch tympanitischen Schall, amphorisches Atmen, ausgebreitetes, gröberes, klingendes Rasseln usw. kennzeichnen, entfallen unter Stadium III. Pleuritische Dämpfungen bleiben hierbei, wenn sie nur einige Zentimeter hoch sind, außer Betracht; sind sie erheblich, so soll die Pleuritis unter den tuberkulösen Komplikationen besonders genannt werden.

Dieses Schema ist unzureichend, da es weder dem anatomischen Charakter noch dem klinischen Verlauf Rechnung trägt.

In den meisten Fällen ist es demgegenüber möglich, die prognostisch wichtige Einteilung in broncho-pneumonische und lobärpneumonische bzw. fibrös-indurative Formen vorzunehmen. für deren Feststellung oft schon allein der physikalische Befund ausreicht, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß praktisch viele Fälle gleichzeitig verschiedenartige Veränderungen nebeneinander aufweisen. Als ausschlaggebend für die Prognose kann indessen allein

nur der gesamte klinische Verlauf (Temperatur, Körpergewicht, Allgemeinbefinden) angesehen werden, auf Grund dessen der Arzt unbeirrt durch den physikalischen und Röntgenbefund sich ein Urteil über die Bewertung des Falles bilden soll. Selbst in progressen Stadien kann es gelegentlich zum Stillstand des Leidens kommen; in seltenen Fällen heilen sogar Kavernen aus.

Die **Prophylaxe** spielt bei der Tb. eine ganz außerordentlich große Rolle. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle bildet der kranke Mensch mit offener Tb. die Infektionsquelle.

Eine Isolierung desselben in Krankenhäusern oder Heilstätten findet aber oft nur in fortgeschrittenen Fällen und nicht selten auch dann nicht statt, so daß dauernd Gelegenheit zur Übertragung auf die Umgebung vorhanden ist. Da Kinder in den ersten Lebensjahren ganz besonders gefährdet sind, so müssen in erster Linie diese dem Bereich des Kranken entzogen werden (Untersuchung der Amme auf Tb.!). Der Kranke selbst ist anzuhalten, bei Husten stets den Kopf abzuwenden und die Hand vor den Mund zu halten, ferner größte Vorsicht in der Behandlung seines Sputums zu beobachten, dasselbe insbesondere stets nur in mit etwas Wasser gefüllte Spuckschalen bzw. Taschenspuckflaschen zu entleeren, damit Eintrocknung des Auswurfs und Verschleppung der TB verhütet wird, ferner sich überhaupt größter Reinlichkeit zu befleißigen. Die Wäsche des Kranken ist vor dem Waschen zu desinfizieren (2 Std. in 5%iger Kresolseifenlösung), der Fußboden ist stets nur feucht aufzuwischen, jede Staubeentwicklung zu vermeiden; nach dem Tode des Pat. ist für gründliche Desinfektion des Zimmers sowie aller Gegenstände zu sorgen.

Individuen, die hereditär bzw. durch ihre Konstitution für Tb. besonders disponiert erscheinen, d. h. die sog. Prophylaktiker, sollen durch Hebung ihres Ernährungszustandes und Wahl günstiger Lebensbedingungen (viel frische Luft, sonnige Wohnräume usw.) sowie durch Vermeiden schädlicher Berufe (u. a. Fabrikarbeit) und anderer körperlicher Schädigungen wie Alkoholismus, Ausschweifungen, Geschlechtskrankheiten, ferner durch frühzeitige Behandlung von Katarrhen der oberen Luftwege, von Bronchitiden usw. auf die Vorbeugung der Tb. bedacht sein. Die Infektion durch infizierte Nahrung, speziell Milch perlsüchtiger Kühe und Butter hat für den Erwachsenen keine Bedeutung, wohl aber für das junge Kind. Die Milch ist daher stets nur in gekochtem Zustande zu verabfolgen (kurzes Aufkochen; längeres Kochen schädigt die Milch). Das Eingehen der Ehe ist bei fortgeschrittener bzw. offener Tb. wegen der Gefahr für den andern Ehepartner zu verbieten. Bei leichteren bzw. scheinbar ausgeheilten Fällen muß nach Schwinden der manifesten Krankheitssymptome wie Fieber, Auswurf, Rg. usw. etwa 1 Jahr in voller körperlicher Leistungsfähigkeit vergangen sein, bis die Eheschließung statthaft ist. Bei eingetretener Konzeption einer tuberkulösen Frau ist die Gravidität in den ersten Monaten zu unterbrechen.

Da die Tb. wenigstens in den Anfangsstadien sich oft als heilbares Leiden erweist, so ist die **Therapie** der beginnenden Tb. als durchaus aussichtsreich zu bezeichnen.

Schonung in körperlicher und seelischer Hinsicht, Kräftigung des Organismus und zweckmäßige Ernährung sind die Hauptfaktoren. Bewährt haben sich vor allem konsequent während vieler Wochen durchgeführte Liegekuren unter strenger ärztlicher Kontrolle in Sanatorien und Heilstätten, namentlich unter günstigen klimatischen Verhältnissen, d. h. Schutz gegen rauhe Winde und Nebel sowie unter möglichst günstigen Besonnungsverhältnissen, wie sie am besten im Hochgebirge (Engadin), zum Teil auch schon im Mittelgebirge (Schwarzwald, Südharz, Algäu usw.) zu finden sind. Sehr große Bedeutung hat die diätetische Behandlung der Tuberkulösen, obenan steht die Ernährung in Form einer fett- und eiweißreichen Kost (viel Milch, Butter, Mehlsuppen usw.; sehr zweckmäßig ist auch Lebertran). Alkohol in geringen Mengen als Bier oder Wein ist erlaubt, da er oft die Stimmung und den Appetit der Pat. hebt. Anstaltsbehandlung ist u. a. schon wegen der im Charakter des Tuberkulösen begründeten, zu einem gewissen Leichtsinne neigenden optimistischen Auffassung seines Zustandes, sodann auch

zur Belehrung der Pat. über gewisse hygienische Grundsätze (Behandlung ihres Auswurfs, Durchführung der Liegekur usw.) erwünscht. Bestrahlungen mit Höhensonne wirken oft günstig. Gleiches wurde von der Röntgenbestrahlung initialer Fälle berichtet.

Ein spezifisches Heilmittel gegen Tb. gibt es nicht. Doch haben mitunter bei initialen Fällen vorsichtig durchgeführte Tuberkulinkuren (Alttuberkulin<sup>1)</sup>, Bacillenemulsion und andere Tuberkuline) Erfolg. Das Prinzip derselben ist die Einverleibung (meist subcutan, bei anderen Methoden percutan durch Einreibungen) kleinster Dosen von etwa  $\frac{1}{100}$ — $\frac{1}{1000}$  mg, die kein Fieber erzeugen dürfen; man steigert vorsichtig unter genauester Kontrolle der Temperatur alle paar Tage zunächst um den Betrag der Anfangsdosis, später um höhere Dosen; bei Ausbleiben stärkerer Reaktion kann man bis etwa 0,01 oder sogar 0,1 gehen. Kontraindikationen sind die gleichen wie bei der diagnostischen Tuberkulininjektion. Zu warnen ist vor einem schematischen Verfahren, da nur streng auf den Einzelfall eingestellte Kuren Aussicht auf Erfolg haben.

In manchen Fällen hat die Ruhigstellung des erkrankten Lungenabschnittes, i. e. ihre Ausschaltung von der Atmung einen therapeutischen Erfolg: Die Anlegung des künstlichen Pneumothorax durch Einblasen von  $O_2$  bzw. N oder Luft (mehrere 100 ccm bis 1 Liter) mittels Punktionsnadel in den Pleuraraum unter sorgfältiger Kontrolle des Druckes (Manometer!) bewirkt bei Fehlen ausgedehnter Adhäsionen ein Kollabieren der erkrankten Lunge, wodurch nicht selten Infiltrate und Kavernen zur Schrumpfung und Ausheilung gebracht werden. Der Druck darf den Atmosphärendruck nicht wesentlich übersteigen. Wegen der Resorption der Gase muß die Füllung von Zeit zu Zeit erneuert werden. Das Verfahren ist nur dort am Platz, wo die übrige Therapie die Krankheit nicht aufzuhalten vermag, und zwar speziell bei einseitigen schwereren Prozessen, falls die andere Lunge nicht oder nur leicht erkrankt ist (Röntgenkontrolle!), ferner bei schweren, nicht zu stillenden Blutungen, wenn sich die Seite, aus der die Blutung stammt (Kaverne) genau bestimmen läßt. Kontraindikationen sind schwere doppelseitige Prozesse, ferner stärkere Adhäsionen, die das Eindringen des Gases unmöglich machen, sowie schwere Komplikationen anderer Organe. Da ferner jeder Pneumothorax eine Mehrbeanspruchung des Zirkulationsapparates bedeutet, ist auch der Zustand des letzteren stets mit in Rechnung zu ziehen. Die Gefahr der cerebralen Luftembolie durch Eindringen von Luft in Gefäße der Lunge oder der Pleura während des Anlegens bzw. der Nachfüllung des Pn. läßt sich durch vorsichtiges Vorgehen (Manometerkontrolle usw.) stark verringern, jedoch nicht absolut sicher vermeiden. Die beim künstlichen Pn. häufig sich einstellenden serösen Pleuraexsudate, die oft die Wirkung des Pn. unterstützen, sind nur bei schnellem Ansteigen und größerem Umfange abzulassen. — Ruhigstellung der Lunge zwecks Ausschaltung größerer Kavernen, speziell in schrumpfenden Lungenbezirken wird ferner durch chirurgische Thorakoplastik dort mit Erfolg durchgeführt, wo die Pneumothoraxbehandlung an starken Adhäsionen scheitert, andererseits aber der Allgemeinzustand die immerhin eingreifende Operation noch zuläßt. In manchen Fällen kann man sich durch Durchschneidung des N. phrenicus über die Wirksamkeit der Ausschaltung der kranken Lunge vorher orientieren.

Symptomatische Therapie: Kreosotpräparate, die ohne spezifisch zu wirken, die Expektoration günstig beeinflussen, z. B. Kreosoti 6,0, Tct. Gentian. 24,0, MDS. 3 mal tgl. 5—15 Tropf. in Milch; ferner Kreosotderivate wie Guajacol. carbon. oder Thiokoll 3 mal tgl. 1 Messerspitze oder Sirolin 3 mal tgl. 1 Teel. Gegen die Nachtschweißabreibungen mit Franzbranntwein sowie Atropinpillen zu  $\frac{1}{2}$  mg oder Agarizinpillen zu 5 mg oder Agarizin 0,005 mit Pulv. Doveri 0,2, Mf. pulvis, abends 1 Pulv. Bei sehr hartnäckigen Schweißern hilft oft für mehrere Tage eine hypertontische (10%) NaCl- oder Chlorkalziumlösung intravenös 5 ccm. Als Antipyretica Pyramidon mehrmals tgl. 0,25 bzw. Chinin. hydrochlor. 4 mal tgl. 0,25 in capsul. gelodur. — Bei quälendem Husten Codein, Paracodin, Dionin

<sup>1)</sup> Das Alttuberkulin von R. Koch ist ein Glycerinextrakt aus Bouillonkulturen menschlicher TB und enthält sowohl die aus denselben auslaugbaren Bakterienstoffe wie die in die Bouillon übergegangenen Stoffwechselprodukte der TB.

evtl. Morphium. Letzteres ist in vorgerückteren Stadien nicht zu entbehren. — Bei Hämoptoe strenge Bettruhe mit Sprechverbot, Eisblase auf der Brust, Morphium subcut. 0,01 sowie Extr. Hydrast. canad. fluid. oder Extr. secal. cornut. fluid. 3 mal tgl. 15 Tropf.; bei hartnäckiger Blutung 1 Eßl. NaCl in Wasser per os oder hypertonische NaCl- bzw. CaCl<sub>2</sub>-Lösung intravenös evtl. Pneumothorax.

## Lungenembolie, Lungeninfarkt.

Lungenembolie entsteht, wenn losgelöstes Thrombusmaterial aus den Venen des großen Kreislaufs bzw. aus dem rechten Herzen durch die Art. pulmonal. in die Lungen eingeschwenmt wird (Thromboembolie).

Häufigste Ursachen: Thrombose der Schenkelvenen sowie der Beckenvenen, letzteres besonders bei Frauen und zwar namentlich im Puerperium sowie nach gynäkologischen Operationen; ferner Thrombenbildung im Herzen bei Herzschwäche, besonders bei Mitralfehlern, mit Bildung wandständiger Gerinnsel zwischen den Trabekeln bzw. den Musc. pectinati; hier tritt die Embolie mitunter infolge stärkerer Herzaktion nach Digitalis auf. Seltener führt Endokarditis der Pulmonal- oder Trikuspidalklappe zur Emtolie. Zu unterscheiden sind blande und infizierte Emboli.

Das klinische Bild hängt von der Größe des Embolus ab. Große Emboli, die einen Hauptast der Art. pulmon. verstopfen, bewirken infolge der schweren Kreislaufstörung plötzlichen Tod, den sog. Lungenschlag. Verschuß eines mittelgroßen Lungenarterienastes hat einen Anfall von schwerer Dyspnoe, Angstgefühl und Cyanose sowie kleinen, frequenten Puls zur Folge. Nach Vorübergehen der akuten Erscheinungen besteht weiter die Gefahr einer Thrombose der Art. pulmon. im Anschluß an den Embolus, was noch nach einigen Tagen zum Exitus führen kann.

Tritt der Tod nicht ein, speziell bei kleineren Emboli, so entwickelt sich ein hämorrhagischer Lungeninfarkt, d. h. ein keilförmiger, dunkelrot gefärbter Herd in der Lunge, dessen Spitze an der Stelle des Embolus in der Arterie und dessen Basis nahe der Oberfläche der Lunge, d. h. der Pleura liegt. In seinem Bereich ist das Lungengewebe mit Erythrocyten vollgestopft. Er entsteht infolge des Fehlens von Kollateralen an den peripherischen Lungengefäßen, welche sog. Endarterien sind, und wird namentlich bei Stauung im kleinen Kreislauf, insbesondere bei Mitralfehlern mit Drucksteigerung in den Lungenvenen beobachtet. Prädilektionsorte sind die peripherischen Abschnitte beider Unterlappen (häufiger des rechten), sowie des rechten Mittellappens. Größere Infarkte gehen oft mit einem pleuritischen Exsudat einher.

Klinisch schließen sich an die Symptome der Embolie (s. oben), die bei kleinen Embolien auch fehlen können, als Zeichen des Infarktes Atemnot, Seitenstechen (Pleurareizung!) sowie Reizhusten mit hämorrhagischem Sputum an; letzteres ist dunkler als das pneumonische und frei von Fibrinfasern. Für kurze Zeit wird oft Temperatursteigerung beobachtet.

Bisweilen ist Knisterrasseln und Bronchialatmen, desgl. zuweilen trockenes Pleurareiben nachweisbar, schließlich eine Dämpfung in den hinteren unteren Partien, die aber oft durch das gleichzeitig vorhandene pleuritische Exsudat hervorgerufen ist. Mitunter finden sich in der nächsten Zeit Herzfehlerzellen im Sputum.

Das Exsudat schwindet in den nächsten Wochen. Die Röntgen-Untersuchung, die aber erst nach Schwinden der akuten Gefahr erlaubt ist, zeigt, abgesehen vom Bilde der allgemeinen Stauungslunge bisweilen eine herdförmige Trübung.

Bei infiziertem Embolusmaterial (sept. Endokarditis, puerperale Thrombophlebitis) entstehen embolische Lungenabscesse (s. unten) bisweilen als Teilerscheinungen einer Pyämie.

Nach Knochenbrüchen, heftigen Körpererschütterungen sowie Operationen an Fettleibigen kann es zur Fettembolie der Lunge kommen, die bei gleichzeitiger Herzschwäche bzw. Verstopfung sehr zahlreicher Lungengefäße lebensbedrohend werden kann.

Prophylaxe der Lungenembolie: Bei Bestehen von Thrombosen absolute Ruhe (Schienung des erkrankten Beines); Aufrichten des Pat. verboten. Bei den ersten Zeichen des Infarktes (blutiges Sputum) zur Vermeidung eines Rückfalles Rückenlage und Verbot des Aufsetzens, genauere Untersuchung des Pat. ist auf später zu verschieben, evtl. Morphium. Digitalis kontraindiziert. In vereinzelt Fällen gelang es, große Emboli aus der Pulmonalarterie operativ zu entfernen.

## Lungenabsceß.

Der Lungenabsceß stellt eine solitär oder in multiplen Herden auftretende, nicht putride eitrige Einschmelzung von Lungengewebe dar.

Ätiologie: Multiple Abscesse beruhen auf embolischer Verschleppung von infektiösem Thrombusmaterial bei allgemeiner Pyämie (sept. Endokarditis, eitrige Thrombophlebitis usw.); solitäre Abscesse entstehen gelegentlich nach Vereiterung einer Pneumonie, vor allem nach Influenzapneumonie sowie Aspirationspneumonien. Auch nach Brusttraumen, Rippenfrakturen sowie nach Aspiration von Fremdkörpern kommt es bisweilen zu Lungenabsceß, häufiger allerdings zu Lungenangrän (s. nächste Seite). Vereiterung von Infarkten, selten auch von Lungentumoren sowie endlich die Perforation benachbarter Eiterherde, z. B. eines Leberchinchococcus in die Lunge können ebenfalls L.-A. hervorrufen.

**Krankheitsbild.** Die multiplen Lungenabscesse als Teilerscheinung einer Sepsis treten klinisch nicht in Erscheinung. Der solitäre Absceß, der sich an eine andere Grundkrankheit (z. B. Pneumonie) anschließt, verläuft sich durch schwere Störung des Allgemeinbefindens, unregelmäßiges, zum Teil intermittierendes Fieber bisweilen mit Schüttelfrösten, starke Prostration, schlechten Puls. Der physikalische Nachweis des Abscesses richtet sich nach seiner Lage und Größe. Kleinere und zentral gelegene können sich der Erkennung entziehen; in anderen Fällen besteht Dämpfung, evtl. mit Bronchialatmen und klingenden Rg. oder abgeschwächtem Atemgeräusch, gelegentlich pleuritisches Reiben. Kavernensymptome wie amphorisches Atmen sowie großblasige metallische Rg. sind anfangs selten. Häufig erfolgt Durchbruch in einen Bronchus, worauf plötzlich eine kopöse Eitermenge ( $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Liter) expektoriert wird und damit die Diagnose ihre Bestätigung findet. Gelegentlich kommt es bei L.-A. zu Lungenblutungen.

Der nichtputride Eiter zeigt beim Stehen Zweischichtung: eine dünnflüssige grünliche Oberschicht und rein eitriges Bodensatz mit Lungengewebsfetzen; beim metapneumonischen A. ist der Eiter oft bluthaltig und braun gefärbt. Mikroskopisch enthält er außer Leukocyten und massenhaft Bakterien Fettsäurenadeln, Cholesterin, bisweilen Kohlepigment und vor allem elastische Fasern, die indessen in einzelnen Fällen auch fehlen können, sowie die charakteristischen Hämatoidinkristalle als braunrote Nadeln bzw. rhombische Tafeln.

Auf die Eiterentleerung erfolgt meist Temperaturabfall. Physikalisch lassen sich jetzt oft Kavernensymptome nachweisen. Während bei vielen Fällen es nach dem Eiterdurchbruch durch Entleerung der Absceßhöhle zur Heilung kommt, bisweilen mit Schrumpfungsercheinungen des befallenen Lungenabschnittes, entwickelt sich in andern Fällen ein chronischer Abszeß mit dauernder Eitersekretion und zeitweise Retentionsfieber; im Sputum pflegen jetzt die Gewebsetzen zu fehlen.

Die Röntgenuntersuchung versagt oft bei den innerhalb pneumonischer Infiltrate gelegenen Abscessen wegen der allgemeinen Verschattung. In andern Fällen besteht bei größeren Abscessen ein intensiver rundlicher, scharf begrenzter Schatten, der nach Durchbruch des Abscesses das charakteristische Bild der teilweise mit Luft gefüllten Höhle mit beweglichem Flüssigkeitsspiegel darbietet.

Häufig besteht gleichzeitig seröse oder eitrige Pleuritis. Bisweilen erfolgt der Durchbruch des Abscesses in die Pleura mit konsekutivem Empyem bzw. Pyopneumothorax.

Andererseits kann ein in die Lungen durchbrechendes Empyem einen L.-A. vortäuschen; es unterscheidet sich von diesem durch die Massigkeit des Eiters (viele Liter) und das Fehlen der Gewebsetzen und der elastischen Fasern. Die Unterscheidung eines abgesackten und zwar interlobären bzw. an der Lungenbasis sitzenden Empyems vom L.-A. ist oft unmöglich. Die mit Vorsicht ausgeführte Probepunktion (lange Kanüle), die zwar den Eiter nachweist, kann hier ebenfalls differentialdiagnostisch versagen.

Die Prognose ist beim metapneumonischen Abszeß relativ günstig, bei den übrigen Formen ungünstig. Therapeutisch kommt bei den peripherisch gelegenen Solitärabscessen die operative Eröffnung in Frage.

## Lungengangrän.

Lungengangrän ist die in Form einzelner oder multipler Herde auftretende Nekrose von Lungengewebe, die im Gegensatz zum Lungenabsceß auf der Tätigkeit von Fäulnisbakterien beruht.

Als Entstehungsweise der Gangrän ist häufiger die bronchogene, seltener die auf embolische Wege. Im Anschluß an eine fötide Bronchitis, ferner durch putride Zersetzung von Bronchiektaseninhalten können Fäulniserreger auf das Lungparenchym übergreifen. Nicht selten entsteht Gangrän durch Aspiration von infiziertem Material, z. B. durch Hinabfließen von jauchiger Flüssigkeit aus einem zerfallenden Krebs der oberen Luftwege oder der Mundhöhle, eines perforierenden Ösophagus-Ca. oder einer Diphtherie, ferner durch Aspiration von Speisebrei bei Benommenen, von abgebrochenen cariösen Zähnen usw. Die Entstehung des Brandes wird durch allgemeinen Marasmus gefördert. Embolisch entsteht Gangrän durch Metastasierung, z. B. von einer putriden Endometritis, Gangrän eines Beines usw. Es gibt auch eine metapneumonische G., namentlich bei Influenzapneumonie, ferner bei Potatoren sowie Diabetikern; auch hämorrhagische Infarkte können dazu führen.

Anatomisch sind die befallenen Teile der Lunge in eine grau-grünliche morsche, höchst übelriechende Masse verwandelt, durch deren Erweichung mit jauchiger Flüssigkeit gefüllte Höhlen entstehen. Das umgebende Lungengewebe ist pneumonisch infiltriert. Sitz der Herde ist meist der Unterlappen; hier können bis zu faustgroßen Herden entstehen; die embolischen Herde sind klein, häufig dicht unter der Oberfläche gelegen. Sehr oft besteht in der Nachbarschaft eine adhäsive Pleuritis, auch kommt es nicht selten zu einer serösen oder putriden Pleuritis sowie bei Durchbruch eines Gangränherdes zu Pyopneumothorax.



**Krankheitsbild.** Es gibt akut verlaufende Fälle mit sehr stürmischen Erscheinungen und solche von mehr chronischem Verlauf. Stets besteht Fieber, das bei der ersteren Form sehr hoch sein und mit Schüttelfrösten verlaufen kann. Es besteht starker Kräfteverfall und oft ein septischer Habitus, bei längerer Dauer ausgesprochener Marasmus. Im Vordergrund steht quälender Husten, der mit Expektoration eines reichlichen schleimig-eitrigen Sputums mit charakteristisch-fauligem Geruch einhergeht. Sie erfolgt bei Vorhandensein größerer Höhlen anfallsweise („maulvolle Expektoration“).

Das schmutzig-graugrüne Sputum zeigt Dreischichtung, der Bodensatz enthält Dittrichsche Pfröpfe (vgl. S. 212), massenhaft Bakterien, nicht selten Fetzen von Lungengewebe, Kohlepigment, evtl. auch elastische Fasern, die aber im Gegensatz zu Tb. und Lungenabsceß häufig fehlen (weil sie aufgelöst sind). Mitunter findet man säurefeste, den TB ähnliche Stäbchen.

Die physikalische Untersuchung ergibt bei größeren, nicht in der Tiefe liegenden Höhlen (über 6 cm Durchmesser) Kavernensymptome; im übrigen besteht bei ausgedehnteren Prozessen meist Dämpfung, zum Teil mit den gewöhnlichen pneumonischen Symptomen (Bronchialatmen, klingende Rg.); bei größeren Exsudaten bestimmen diese den physikalischen Befund. Trommelschlegelfinger werden bei längerem Bestehen der Krankheit beobachtet.

Besonders schwer pflegen die akut auftretenden Fälle mit rasch fortschreitender Gewebszerstörung zu verlaufen (z. B. multiple Gangrän nach Aspiration); sie enden oft schnell tödlich. Milder sind die chronischen Fälle, z. B. bei fötider Bronchitis oder Bronchiektasen. Es kommt bisweilen Spontanheilung durch Sequestrierung des Gangränherdes vor, z. B. nach Pneumonie. Die Gangrän bei Diabetes ist bisweilen nicht fötid. Komplikationen: Hämoptysen sowie metastatische putride Abscesse in allen möglichen Organen; der Hirnabsceß mit meist rechtsseitiger Hemiplegie macht oft die eklatantesten Symptome.

**Diagnose.** Fötides Sputum ist dann beweisend, wenn es Fetzen von Lungengewebe enthält. Fehlen letztere, so ist der Kavernennachweis von Bedeutung, der jedoch fehlt, wenn die Herde klein sind oder in der Tiefe liegen, oder bei einem größeren Exsudat. In manchen Fällen findet man zunächst nur eine putride Pleuritis. Vorsicht bei Punktion eines Gangränherdes wegen Infektion der Pleura und evtl. Blutung.

**Therapie.** Anregung der Expektoration sowohl durch entsprechende Lagerung des Pat. als durch Medikamente: Myrthol 6—8 mal tgl. 0,15 in Kaps. sowie Inhalieren von Karbolsäure mit Cursch mann'scher Maske; evtl. 0,3—0,4 Neosalvarsan intravenös. Bei peripherischem Sitz hat bisweilen die operative Eröffnung Erfolg.

## Lungenlues.

Die bei Erwachsenen relativ seltene Lues der Lungen entspricht dem tertiären Stadium der Krankheit und tritt meist als „indurative Lungensyphilis“ auf, d. h. als chronisch-infiltrativer Prozeß nach Art der chronischen Pneumonie mit starker Bindegewebswucherung speziell im peribronchialen und interlobären Gewebe, namentlich in der Nähe des Hilus. Diese Form zeigt Neigung zu starker Schrumpfung; auch ist die Pleura oft schwielig verdickt. Seltener sind größere Gummen. Im Gegensatz zur Tb. lokalisiert sich die Lues häufiger in den Unterlappen als in den Spitzen, sowie im r. Mittellappen. Stärkerer Zerfall mit Kavernenbildung ist selten; dagegen kommen infolge der Schrumpfung Bronchiektasen vor.

Das Krankheitsbild ist dem einer chronischen Lungen-Tb. ähnlich, auch bezüglich des physikalischen Befundes (Dämpfung, Bronchialatmen, Rg.). Es besteht Husten, schleimig-eitriger Auswurf sowie Fieber, bisweilen von hektischem Charakter. Lungenblutungen sind nicht selten. Die Kranken werden anämisch und marastisch. Die Unterscheidung von Tb. ist meist recht schwierig (zumal Kombination mit Tb. vorkommt); sie stützt sich auf das dauernde Fehlen von TB im Sputum, ferner auf die Lokalisation, die positive Wa.-R. sowie das häufige gleichzeitige Vorhandenseinluetischer Veränderungen an andern Organen (Pupillenstarre, Aorteninsuffizienz), speziellluetische Ulcera auch am Kehlkopf und der Trachea. Der Röntgenbefund ist teils der der gewöhnlichen chronischen Pneumonie, teils bestehen speziell in der Hilusgegend ausgedehntere Infiltrate mit strahlenartigen Ausläufern; Kalkherde fehlen im Gegensatz zur Tb.

Eine frühzeitig durchgeführte spezifische Therapie (Hg, Salvarsan, Jk) kann zur Ausheilung führen, wenn auch die derberen Bindegewebsmassen einer Behandlung trotzen und die sich anschließenden Schrumpfungsprozesse dadurch nicht aufgehalten werden.

Bei der nicht seltenen angeborenen Lungensyphilis zeigen die Kinder oft das Bild der sog. weißen Pneumonie mit ausgedehnten zelligen Infiltraten der Alveolen und des interstitiellen Gewebes; oft sterben sie kurz nach der Geburt oder werden tot geboren.

## Lungentumoren.

Lungengeschwülste sind nicht selten. Klinisch wichtig sind nur die malignen Tumoren, von denen die primären und die sekundären Geschwülste zu unterscheiden sind. Unter den primären Tumoren spielt die Hauptrolle das Lungencarcinom, das von den Bronchien auszugehen pflegt.

**Krankheitsbild.** Der Beginn ist schleichend, meist ohne markante Symptome. Oft besteht zunächst nur hartnäckiger Reizhusten mit schleimig-eitrigem Sputum. In manchen Fällen ist das erste Symptom ein hämorrhagischer Auswurf, der besonders in der Form eines himbeer-geleeähnlichen Sputums diagnostischen Wert hat. Das Allgemeinbefinden kann längere Zeit gut bleiben, später tritt meist Abnahme der Kräfte, Abmagerung und Anämie ein, wiewohl stärkere Kachexie oft bis zuletzt vermißt wird. Dyspnoe, ziehende Schmerzen zwischen den Schulterblättern, Intercostal- und Plexusneuralgien werden besonders in späteren Stadien beobachtet. Der lokale Befund ist der einer langsam wachsenden Infiltration eines Lungenlappens (häufiger rechts, oft Oberlappen), welche allmählich intensive Dämpfung, die oft unregelmäßig begrenzt ist, häufig Bronchialatmen und erhaltenen Pektoral-fremitus zeigt. Beides kann aber abgeschwächt sein, wenn es wie häufig zur Stenosierung des Bronchus kommt. Oft treten im weiteren Verlauf Halsdrüsenmetastasen, einseitige Rekurrenslähmung sowie Venenstauung und Ödem am Gesicht, Hals und Arm infolge von Druck, ferner Schluckbeschwerden auf, desgleichen exsudative Pleuritis, deren hämorrhagische Beschaffenheit stets auf Tumor verdächtig ist, zumal wenn sich das Exsudat nach der Punktion schnell wieder ergängt. Auch besteht zeitweise Fieber.

Das Sputum ist keineswegs immer hämorrhagisch, oft enthält es mikroskopisch charakteristische Fettkörnchenkugeln.

In manchen Fällen zerfällt später der Tumor zentral unter Höhenbildung und brandiger Infektion (Phthisis carcinomatosa). Ähnliche Bilder wie die Lungen-

carcinome erzeugen die vom Mediastinum in die Lunge hineinwachsenden Sarkome (Lymphosarkome).

Metastasen im Gehirn mit entsprechenden Ausfallserscheinungen werden mitunter beobachtet.

Die bei Verdacht auf Lungentumor unerläßliche Röntgenuntersuchung ergibt in den Anfangsstadien bei vom Hilus ausgehenden Tumoren ein der Hilus-Tuberkulose sehr ähnliches Bild, in vorgeschrittenen Stadien dagegen ausgedehnte, oft einen ganzen Lappen ausfüllende dichte Schatten.

Trotz der absolut infausten Prognose der Lungentumoren (Dauer etwa bis 2 Jahre) versuche man therapeutische Röntgenbestrahlungen.

Unter den sekundären Lungentumoren sind Metastasen von Schilddrüsen-carcinomen, von Chorionepitheliomen sowie Sarkometastasen relativ häufig. Im Röntgenbild präsentieren sie sich meist als kleinere multiple rundliche Schatten; klinisch bewirken sie öfter hämorrhagisches Sputum.

Der **Echinococcus der Lunge** entwickelt sich in der Regel im Anschluß an die gleiche Erkrankung anderer Organe, besonders der Leber; er ist häufig im rechten Unterlappen lokalisiert.




Abb. 28. a) *Taenia echinococcus* des Hundes. b) Haken. c) Membranstück (nach Leuckart).

Der *Echinococcus* ist das Finnenstadium der *Taenia echinococcus*, die im Hundedarm lebt. Aus den in den menschlichen Darm gelangten Eiern der Taenie entstehen junge Embryonen, die nach Durchwanderung der Darmwand in verschiedene Organe verschleppt werden und dort zu bis kindskopfgroßen blasenartigen Gebilden anwachsen. Ihre Wand (Chitin) zeigt parallelstreifige Schichtung; der wasserklare Inhalt enthält kein Eiweiß, aber NaCl und Bernsteinsäure. An der Innenwand sprossen die sog. Skolizes, d. h. die Köpfe der späteren Taenie mit Saugnapfen und einem Kranz von kleinen Haken (vgl. Abb. 28). Oft enthält die große Blase mehrere kleine Tochterblasen. Außer dieser häufigen unilokulären Blasenform kommt seltener die multilokuläre Form des E. vor, die aus zahlreichen kleinen mit Gallerte gefüllten Hohlräumen besteht.

Das erste Symptom ist oft Husten mit schleimigem, bisweilen etwas blutigem Auswurf, der oft eine Tb. vortäuscht, zumal wenn leichtes Fieber besteht. In anderen Fällen tritt unvermittelt ein pneumonisches Bild mit Schüttelfrost, Dyspnoe und Pleurareizung auf, das aber mitunter nach einiger Zeit wieder abklingt. Wächst der E., so macht er charakteristische physikalische Symptome: eine oft scharf begrenzte Dämpfung mit bronchialem oder meist abgeschwächtem Atemgeräusch, Zurückbleiben der Seite, aber keine Verdrängungssymptome. Vereiterung des E. bewirkt Fieber, evtl. Schüttelfrost. Mitunter stirbt der E. ab und hinterläßt einen schrumpfenden bzw. verkalkten Herd. Häufig kommt es zu Durchbruch in den Bronchus mit Expektoration von klarer Flüssigkeit oder Eiter, in welchen Tochterblasen und die charakteristischen Membranfetzen und Haken enthalten sind; Perforation in die Pleura bewirkt unter stürmischen Erscheinungen (Kollaps, Dyspnoe, Seitenstechen) Empyem bzw. Pyopneumothorax. Das Platzen des E. ist oft von Urticaria begleitet.

Diagnostisch wichtig ist u. a. einmal das Röntgenbild, das oft einen auffallend scharf begrenzten, rundlichen intensiven Schatten im Lungenfeld zeigt,

ferner eine öfter vorhandene Eosinophilie des Blutes, endlich die der Wa.-R. ähnliche Komplementbindungsreaktion (Serum des Pat. + E-Flüssigkeit + Komplement). Die Probepunktion ist gefährlich (Intoxikationserscheinungen!). Gleichzeitiges Bestehen eines Leber-E. erleichtert die Diagnose. Sichergestellt wird dieselbe durch die charakteristischen Bestandteile (s. oben) im Sputum bzw. im Empyemeiter. Vereinzelt wird ockergelbe Färbung des Sputums bzw. des Pleura-exsudates beobachtet.

Therapeutisch kommt ausschließlich die chirurgische Behandlung (Pneumotomie) namentlich nach Vereiterung des E. oder Perforation in die Pleura in Frage. Nach Durchbruch in die Bronchien beobachtet man gelegentlich Spontanheilung.

Bei Anwesenheit von *Distomum pulmonale* in der Lunge, einem kleinen in den Tropen vorkommenden Wurm, besteht Reizhusten (meist morgens) mit schleimigem, zum Teil bluthaltigen Sputum, das mikroskopisch reichlich ovale, oft mit einem Deckel versehene *Distomum*-Eier sowie oft Charcot-Leydensche Krystalle enthält.

### Stauungslunge.

Bei Stauung im Lungenkreislauf, speziell bei Mitralfehlern, bei Schwäche des linken Ventrikels, Aorteninsuffizienz, Myodegeneratio cordis sowie Kyphoskoliose zeigt die Lunge charakteristische Veränderungen.

Anatomisch findet sich Konsistenz- und Volumenzunahme der Lunge, die nicht wie in der Norm zusammensinkt (Lungenstarre). Die Kapillaren sind stark erweitert, prall gefüllt und springen knopfförmig in die Alveolen vor. Letztere enthalten desquamiierte Epithelien, in denen sich braunschwarzes eisenhaltiges Blutpigment findet, die sog. Herzfehlerzellen. Bei längerem Bestehen der Stauung kommt es zur Bindegewebsvermehrung und Braunfärbung der Lungen, die sog. braune Induration der Lunge.

Klinisch bestehen Atemnot, Husten und Auswurf, bei der physikalischen Untersuchung Tiefstand der unteren Lungengrenzen mit verminderter Verschieblichkeit, die Zeichen der Bronchitis und häufig hinten unten Knisterrasseln. Das zum Teil spärliche Sputum ist zäh-schleimig und gelblich oder auch bräunlich gefärbt; es enthält die charakteristischen Herzfehlerzellen, welche Eisenreaktion (Berlinerblau) geben. Ihre Anwesenheit selbst in spärlichster Menge hat als sicherstes Symptom der Stauung großen diagnostischen Wert. Röntgenbefund: Diffuse Trübung beider Lungenfelder sowie starke Hiluszeichnung infolge Erweiterung der Lungenwurzelgefäße.

Die Therapie der Stauungslunge richtet sich gegen das Grundleiden, die Herzschwäche (vgl. S. 174). Subjektiv wirken hier bei stärkeren Beschwerden besonders Senfpackungen sowie Sauerstoff-Einatmung erleichternd.

### Lungenödem.

Unter Lungenödem versteht man das Eindringen großer Mengen von seröser eiweißreicher Flüssigkeit aus den Lungenkapillaren in die Alveolen. Ursachen sind hochgradige Stauung im kleinen Kreislauf unter bestimmten Bedingungen (s. unten), sowie vor allem Schädigung der Gefäßwand der Lungenkapillaren; häufig sind beide Momente

miteinander kombiniert vorhanden. Oft beobachtet man Lungenödem als agonale Erscheinung im Verlauf anderer Krankheiten. Hier ist es Folgeerscheinung, bei der ersteren Kategorie der Fälle Ursache des tödlichen Ausganges.

Stauung im Lungenkreislauf führt dann zu Ödem, wenn bei Erlahmen des linken Ventrikels der rechte Ventrikel noch relativ kräftig ist und infolgedessen große Mengen Blut in die Lunge gepumpt werden. Es wird daher oft im Terminalstadium bei Aorteninsuffizienz, bei Mitralfehlern, aber auch bei allgemeiner Herzschwäche beobachtet, zumal auch bei letzterer die linke Kammer früher als die rechte zu versagen pflegt. Abnorme Durchlässigkeit der Kapillaren entsteht auch unter dem Einfluß toxischer bzw. bakterieller Schädigung, wie das Lungenödem bei Nephritis bzw. bei Pneumonie.

Die klinischen Symptome sind zunehmende Atemnot mit Blässe und Cyanose, sowie meist schon in der Entfernung hörbares Rasseln, das „Kochen auf der Brust“. Unter starkem Hustenreiz wird reichlich dünnflüssiger, schaumiger Auswurf entleert, der oft etwas rötlich ist, im Glase geschlagenem Eiweiß gleicht und starke Eiweißreaktion (s. S. 209) zeigt; bei Pneumonie ähnelt der sanguinolente Auswurf einer Pflaumenbrühe. Der Lungenklopfschall ist nicht gedämpft, aber tympanitisch; auskultatorisch hört man massenhaft feuchte, mittel- und kleinblasige Rasselgeräusche über beiden Lungen; bei ungünstigem Ausgang wird schließlich unter dauernder Verschlechterung des Pulses und Benommenheit die Atmung laut röchelnd (Trachealrasseln).

Anatomisch zeigt die Lunge vermehrte Konsistenz; von ihrer Schnittfläche fließt reichlich mit Luftbläschen vermischte Flüssigkeit. Mikroskopisch sind die Alveolen mit einer durch Kochen gerinnenden Flüssigkeit erfüllt, die desquamierte Alveolarepithelien enthält.

Lokal kann in einem Lungenlappen ein akutes Ödem bei zu rascher Entleerung großer Mengen von Pleuraexsudat entstehen; es äußert sich durch die sog. albuminöse Expektoration, d. h. durch vorübergehende Entleerung eines dünnen schaumigen Sputums.

Die Therapie hat nur in den allerersten Stadien des Leidens Aussicht auf Erfolg: Senfwickel, Aderlaß, heiße Hand- und Fußbäder, sowie Analeptika wie Campher, Koffein, starker Kaffee; Sauerstoffeinatmung. Digipurat bzw. Strophanthin (vgl. S. 174), sowie evtl. 5–10 ccm 10% Chlorcalciumlösung intravenös; größte Vorsicht mit Morphinum. Man versuche auch eine energische manuelle seitliche Kompression des Thorax wie bei Emphysem zur mechanischen Entleerung von Ödemflüssigkeit.

## Pneumonokoniosen (Staubinhalationskrankheiten).

Das Eindringen von Staub in die Atmungswege in mäßigen Mengen ist klinisch infolge der beschriebenen Schutzvorrichtungen des Organismus in der Regel bedeutungslos. Die Ablagerung von Kohlenruß in den Lungen ist beim Städter gewissermaßen physiologisch. Größere Mengen von Staub sowie besondere physikalische Eigenschaften desselben (Steinstaub usw.) führen dagegen zu krankhaften Veränderungen der Bronchien und der Lunge. Meist handelt es sich um Berufskrankheiten.

Soweit nicht die Flimmerbewegung der Bronchialschleimhaut und der Husten die Staubpartikel wieder nach außen zu fördern vermögen, werden dieselben von den Alveolen den Lymphbahnen zugeführt, die sie zu den peribronchialen, subpleuralen und endlich nach den Tracheobronchialdrüsen transportieren. Bei Über-

schwemmung mit Staub kommt es zur Ablagerung desselben in den interalveolären Septen, weiter zur Verlegung der Lymphbahnen und zur chronisch-entzündlichen Bindegewebsreizung mit Induration, die zu Knotenbildung und Schrumpfung führt.

Ablagerung von Kohlenstaub (Anthrakose) bewirkt erst bei sehr großen Mengen (Kohlenarbeiter, Heizer, Schornsteinfeger) schwerere Veränderungen und zwar hauptsächlich in den Oberlappen mit sog. schiefriger Induration, teilweise mit Erweichung des mit Ruß überladenen Gewebes. Das schwärzliche Sputum zeigt zahlreiche mit Rußpigment vollgestopfte Alveolarepithelien. Die nicht selten gleichzeitig bestehende Tuberkulose zeigt in der Regel milden Verlauf.

Wesentlich gefährlicher ist Steinstaub (Chalicosis). Die „Steinhauerlunge“ zeigt ausgedehnte Induration der Hilusdrüsen sowie sehr derbe bindegewebige Knoten an den Kreuzungspunkten der Lymphgefäße, die im Röntgenbilde den Flecken bei disseminierter Tb. gleichen, sich von diesen aber durch schärfere Schattenbildung, oft mit zackiger Begrenzung unterscheiden. Es besteht große Neigung zu Tb.-Erkrankung. — Auch Eisenstaub (Siderosis), speziell bei Nadel- und Messerschleifern, ferner Mehlstaub bewirken Pneumonokoniosen. Am gefährlichsten ist der chemisch reizende Staub der Thomasphosphatschlacke sowie der Tabakstaub. Tabaksarbeiter fallen sehr häufig der Tb. zum Opfer.

Während der klinische Befund bei den Pneumonokoniosen meist nur in uncharakteristischen Symptomen wie Husten, Atemnot, Bronchitis besteht, ergibt sich die Diagnose aus der Anamnese (Beruf), dem Röntgenbefund und dem mikroskopischen Verhalten des Sputums. Die Unterscheidung von chronisch indurierender Phthise ist oft um so schwerer, als dieselbe häufig gleichzeitig vorhanden ist.

Sehr wichtig ist die Prophylaxe: Anwendung von Respiratoren, Anfeuchtung des Schleifmaterials, gute Ventilation, Belehrung der Arbeiter.

## Krankheiten der Pleura.

### Pleuritis (Brustfellentzündung).

Entzündungen der Pleura sind überaus häufig. Sie kommen als trockene (fibrinöse) sowie als exsudative (seröse, eitrige, hämorrhagische) Pleuritis vor. Ein primär in der Pleura lokalisierter Entzündungsprozeß ohne anderweitige Erkrankung kommt nur nach Traumen, z. B. Rippenfrakturen vor. In der Regel ist die Pleuritis sekundär, indem sie sich vor allem an Entzündungsprozesse in der Lunge anschließt, wenn auch diese oft klinisch nicht direkt nachweisbar sind, in erster Linie bei Pneumonien und Tb. Die Tb. ist in etwa der Hälfte aller Fälle Ursache der Pleuritis. Auch metastatisch kommt Pl. z. B. bei Anginen sowie Gelenkrheumatismus vor, mitunter als Teilerscheinung einer Polyserositis mit gleichzeitiger Perikarditis und Bauchfellkrankung. Endlich beobachtet man mitunter bei infektiösen Prozessen unterhalb des Zwerchfells eine sog. Durchwanderungspleuritis. Dem Verlauf nach gibt es akute und chronische Pleuritiden.

**Pleuritis sicca.** Die entzündete Pleura verliert anatomisch ihren normalen spiegelnden Glanz und wird stellenweise trübe infolge von feinen oder derberen, zum Teil zottigen Fibrinauflagerungen. Oft verkleben an dieser Stelle beide Pleurablätter, wobei es infolge von bindegewebiger Organisation schließlich zu den häufigen flächenhaften oder bandartigen Adhäsionen kommt. Bakterien sind meist nicht nachweisbar.

Klinisch verrät sich die akute Pl. durch heftiges Seitenstechen und Husten (nur die parietale Pleura ist schmerzempfindlich); es besteht oft mäßiges Fieber, Mattigkeit und infolge des Schmerzes Behinderung der Atmung, so daß der Pat. die Neigung hat, zur Ruhigstellung der kranken Seite sich auf diese zu legen. Meist schleppt bei tiefer Atmung die betroffene Brusthälfte etwas nach. Objektiv hört man als charakteristisches Symptom das S. 206 beschriebene Reibegeräusch, dem mitunter ein palpatorisch wahrnehmbares Knarren entspricht. Der übrige physikalische Befund hängt von dem Vorhandensein oder Fehlen stärkerer Veränderungen der Lunge ab; er ist oft negativ.

Zu beachten ist, daß das Reibegeräusch oft nur an einer ganz umschriebenen kleinen Stelle hörbar ist. Man suche daher auscultatorisch sorgfältig die ganze Lunge auf etwaiges Reiben ab. Dies ist um so wichtiger, als dasselbe oft das einzige auf eine Lungenerkrankung hinweisende Symptom ist! In manchen Fällen ist es nur für sehr kurze Zeit hörbar.

Bei Lokalisation der Pleuritis zwischen Zwerchfell und Lungenbasis (Pleurit. diaphragmatica) besteht außer Brustschmerzen namentlich bei Inspiration intensiver Schmerz im Bereich der unteren Abschnitte des Thorax vorn, seitlich und hinten sowie bisweilen Schmerz beim Schlucken (Durchtritt der Speisen durch den Hiatus oesophagus) und bei Aufstoßen. Reiben ist nicht nachweisbar. Im Röntgenbild zeigt sich mitunter Hochstand des Zwerchfells der kranken Seite. Die Pleurit. diaphragm. schließt sich öfter an abdominelle Prozesse an.

Bezüglich der pleuroprikardialen und extraprikardialen Geräusche sei auf S. 139 verwiesen.

Oft ist die Pleuritis sicca Vorläufer der **Pleuritis exsudativa**, speziell der serösen Form. Hierbei besteht Atemnot namentlich bei jeder Anstrengung, sowie Oppressionsgefühl, während Seitenstechen oft fehlt. Die Dyspnoe pflegt beim Wachsen des Exsudates zuzunehmen. Sehr große Exsudate bedeuten eine ernste Gefahr für die Zirkulation. Objektiver Befund: Nachschleppen der kranken Seite, evtl. Erweiterung derselben mit Verdrängensein der Intercostalräume (bei größeren Exsudaten), ferner als physikalischer Befund, wenn die Exsudatmenge etwa  $\frac{1}{4}$  l überschreitet, eine nach unten an Resistenz zunehmende Dämpfung mit Abschwächung bzw. Aufhebung des Atemgeräusches und des Pectoralfremitus sowie der Bronchophonie.

Die Dämpfung, die zunächst nur hinten unten vorhanden ist und erst bei größeren, bis zur Schulterblattmitte reichenden Exsudaten nach vorn übergreift, ist nach oben nicht horizontal, sondern durch die parabolische Kurve von Damoiseau-Ellis begrenzt, deren höchster Punkt nahe der hinteren Axillarlinie liegt, während sie nach vorn und hinten abfällt. Der dadurch hinten entstehende dreieckige, nicht gedämpfte Raum zwischen der Damoiseauschen Linie und der Wirbelsäule ist das für Exsudate charakteristische Garlandsche Dreieck. Weiter ist bei großen Exsudaten h. u. auf der gesunden Seite neben der Wirbelsäule eine schmale dreieckige Dämpfungsfigur nachweisbar, deren obere Spitze annähernd der Höhe des Exsudates entspricht (Rauchfuß-Groccosches Dreieck).

Der Beginn der Exsudatbildung verrät sich meist zuerst durch Aufhebung der Verschieblichkeit des seitlichen unteren Lungenrandes, dort tritt auch die erste

Dämpfung auf. Bezüglich Messung des Thorax vgl. S. 202. Große Exsudate bewirken Verschiebung des Mediastinums, i. e. der Herzdämpfung nach der gesunden Seite, außerdem rechtseitige Exsudate Tiefertreten der Leberdämpfung, linksseitige sehr große Exsudate Verkleinerung bzw. Ausfüllung d. h. Dämpfung des Traubeschen Raumes zwischen Milz, linkem Leberrand und Rippenbogen. Lagewechsel des Pat. ruft keine Änderung der Dämpfungsfigur hervor. Das vorherige Vorhandensein von Adhäsionen hat atypische Dämpfungsfiguren zur Folge.

Der Lungenklopfschall oberhalb eines Exsudates zeigt infolge der Entspannung der Lunge Tympanie; bei größeren Exsudaten kommt es zur teilweisen Atelektase der Lunge mit Bronchialatmen. Die auscultierte Stimme zeigt in dem oberen Bezirk des Exsudates meckernden Klang, die sog. Ägophonie. Sinkt das Exsudat, so tritt am oberen Rande desselben oft Reiben auf (letzteres beweist stets das Fehlen von Flüssigkeit an der betreffenden Stelle). Das Röntgenbild zeigt bei kleinen Exsudaten Ausfüllung des Zwerchfellrippenwinkels, bei größeren intensive, seitlich ansteigende Beschattung ohne Niveaushiftung bei Lagewechsel. In allen diagnostisch unklaren Fällen versäume man nicht die Probepunktion; man nimmt sie an der Stelle intensivster Dämpfung, aber stets oberhalb des Zwerchfells (Vergleich mit der gesunden Seite!) mittels etwa 10 cm langer, nicht zu dünner Punktionsnadel vor.

Seröses Exsudat, welches Blutserum ähnelt, hat ein spez. Gew. über 1018 (Unterscheidung von Transsudaten), scheidet beim Stehen Fibrin aus und gibt mit 3%iger Essigsäure in der Kälte deutliche Trübung. Mikroskopisch sind insbesondere die Tb-Exsudate reich an Lymphocyten, während die rheumatischen und anderweitig entstehenden akuten Exsudate mehr Leukocyten aufweisen. Bakterien fehlen, speziell Tb. lassen sich meist nur durch Tierimpfung (10 cm Exsudat, Meerschweinchen vgl. S. 225) nachweisen.

In der Regel ist bei serösem Exsudat Fieber vorhanden und zwar während des Ansteigens eine nicht sehr hohe Continua, die, wenn dasselbe zum Stehen kommt, in remittierendes Fieber übergeht; es schwindet, wenn das Exsudat resorbiert wird. Der Harn ist zuerst an Menge vermindert, hochgestellt und NaCl-arm, später erfolgt als erstes Zeichen der Resorption Harnflut. Bei jugendlichen Individuen geschieht die Resorption oft innerhalb weniger Wochen, bei älteren wesentlich langsamer und oft unvollkommen. Sehr große Exsudate können infolge plötzlicher Abknickung der großen Gefäße lebensbedrohend werden, kleinere sind ungefährlich.

Stets aber ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß es bei längerem Bestehen zu bindegewebiger Organisation des Exsudates mit Adhäsionen bzw. Schwartenbildung und nachträglicher Schrumpfung kommt. Auch bleibt später bei längerer Kompression der Lunge ihre Entfaltung aus, zumal wenn sich gleichzeitig pneumonische Prozesse abspielen, wobei es öfter zum Ausgang in chronische Pneumonie (vgl. S. 220) kommt. Stärkere Schrumpfungerscheinungen bewirken bei größerer Ausdehnung Abflachung der Thoraxwand, Schultertiefstand, Heranziehung des Mediastinums und des Zwerchfells nach der kranken Seite, Skoliose der Wirbelsäule, Fehlen der respiratorischen Verschieblichkeit. Pleuraschwarten bewirken Schallverkürzung, Abschwächung des Atemgeräusches und des Pectoralfremitus, im Röntgenbild Trübungen, Minderbeweglichkeit des Zwerchfells, das mitunter zeltartige Zipfelbildung zeigt. Eine häufige Folgeerscheinung sind chronische Bronchitis und Bronchiektasen sowie Zirkulationsstörungen infolge der Mehrbelastung des rechten Ventrikels. Subjektiv machen sich oft ziehende Schmerzen namentlich bei schlechter Witterung, oft auch Atemnot bei Anstrengungen bemerkbar.

Durch besondere Lokalisation ausgezeichnet ist die interlobäre Pleuritis mit abgekapseltem Exsudat zwischen Ober- und Unterlappen bzw. Mittel- und Unterlappen. Sie ist mit Sicherheit nur im Röntgenbild zu erkennen und hinterläßt nach der Resorption oft einen schmalen, der Grenze zwischen beiden Lappen entsprechenden dunklen Streifen vom Hilus zur Peripherie.



Die **eitrige Pleuritis, das Empyem**, entsteht unter der Einwirkung von Eitererregern, vor allem Streptococcen und Pneumococcen, von denen letztere u. a. das metapneumonische Empyem bewirken. Auch speziell im Anschluß an Influenzapneumonien, ferner bei Lungenabsceß, Lungengangrän, Lungentuberkulose, Pneumothorax, im Verlauf von Sepsis, sowie Anginen, bei Aktinomykose und Echinococcus, endlich nach penetrierenden Brustverletzungen werden Empyeme beobachtet.

Das allgemeine Krankheitsbild des Empyems, namentlich der akuten Form ist wesentlich schwerer als das der serösen Pleuritis. Höheres, oft intermittierendes Fieber, häufig im Beginn Schüttelfrost, schnelles Ansteigen des Exsudates sowie nicht selten heftige Schmerzen, ferner starke Prostration mit Schweißen, kleiner weicher Puls weisen auf den eitrigen Charakter der Pleuritis hin. Da der physikalische Befund genau der gleiche wie bei der serösen Pleuritis ist, die Unterscheidung aber praktisch-therapeutisch die größte Bedeutung hat, ist unverzüglich die Probepunktion vorzunehmen, die hier Eiter zutage fördert.

Pneumococceneiter ist dick und von grünlicher Farbe, Streptococceneiter ist dünner, flockig und zeigt oft beim Stehen Schichtung. Putrider dünnflüssiger Eiter kommt öfter bei septischen Prozessen vor. Bakterienfreier Eiter ist stets auf Tb. verdächtig. Bakterienarm ist auch das pneumonische E. (vgl. S. 58). Diagnose des Echinococcus s. S. 238, der Aktinomykose s. S. 122. Interlobäre eitrig-Exsudate kommen öfter nach Pneumonie vor; ohne Röntgenuntersuchung und nachfolgende Probepunktion (IV. Ikr. in der Axillarlinie) werden sie oft übersehen. Akute Empyeme gehen mit starker Leukocytose einher.

Der Verlauf eines Empyems, das nicht künstlich entleert wird, ist viel ungünstiger als bei seröser Pleuritis. Mit der Spontanresorption rein eitrig-Exsudate ist praktisch nicht zu rechnen (ausgenommen die bakterienarmen parapneumonischen Empyeme vgl. S. 58). Bei längerem Bestehen entwickelt sich allmählich Marasmus sowie evtl. Amyloidose; oft kommt es zum Durchbruch in die Bronchien mit Expektoration großer Eitermassen (vgl. Lungenabsceß S. 235) und Zurückbleiben einer dauernd sezernierenden Empyemhöhle oder zur Perforation der Brustwand mit Bildung einer Fistel: sog. Empyema necessitatis. Stets entsteht in diesen Fällen massive Schwartenbildung. Rechtzeitige therapeutische Entleerung hingegen führt in der Regel — die Tb-Empyeme ausgenommen — zur Ausheilung.

**Therapie der Pleuritis.** Bei trockener Pleuritis Bettruhe, Schwitzprozeduren (evtl. Lichtbogen im Bett) sowie feuchte Brustwickel; lokal gegen die Schmerzen heiße Kompressen, Thermophor, Senfpflaster, Schröpfköpfe, Jodvasogeneinreibung, ferner Aspirin oder Salipyrin; zur Ruhigstellung der kranken Seite evtl. Heftpflasterstreifen dem Verlauf der Rippen entsprechend. Bei heftigem Husten Codein, Paracodin, im Notfall 0,01 Morphium. Bei seröser Pleuritis die gleiche Therapie, außerdem Anregung der Diurese zur Förderung der Resorption (4 mal tgl. 0,5 Diuretin oder 1 mal tgl. 1 Euphyllinsuppos.) sowie Reduktion der Trinkmenge. Oft bringt schon allein die Probepunktion von 10 ccm die Aufsaugung in Gang. Bei der rheumatischen Pleuritis 3—5 mal tgl. 0,5 Aspirin oder Natr. salicyl. Bei seröser Pleuritis außerdem evtl. Entleerung der Flüssigkeit.

Indikationen zur Entleerung eines serösen Exsudates (Paracentese): 1. Erhebliche Größe desselben, d. h. wenn es vorn die 4. Rippe, hinten die Mitte des Schulterblattes erreicht, sowie bei stärkeren Verdrängungserscheinungen wegen

der dadurch bedingten Lebensgefahr. 2. Bei kleineren Exsudaten die verzögerte Resorption. In letzterem Falle entleert man nicht vor 3—4 Wochen nach Beginn der Erkrankung. Die Entleerung (stets unmittelbar vorher Probepunktion!) erfolgt unter aseptischen Kautelen mittels Hohnadel, an die zwecks Heberwirkung ein 1 m langer Gummischlauch mit Borlösung oder der Potainsche Aspirationsapparat mit Spritze zum Ansaugen angeschlossen ist. Die Entleerung soll so schonend wie möglich unter Kontrolle des Pulses und des Allgemeinbefindens bewerkstelligt werden. Plötzlicher starker Hustenreiz sowie schaumiges Sputum (vgl. Lungenödem S. 239) gebieten sofortige Unterbrechung der Punktion. Maximum der entleerten Menge  $1\frac{1}{2}$  l. Nachträglich kann man wie beim therapeutischen Pneumothorax zur Vermeidung von Adhäsionsbildung das gleiche Quantum Luft oder O vorsichtig einblasen. Bei der Röntgenuntersuchung ist öfter nur eine partielle Entleerung des Exsudates namentlich in den Fällen zu konstatieren, wo es sich infolge von Adhäsionen um sog. gekammerte Exsudate handelt. Neuerdings wird die sog. offene Pleurapunktion empfohlen, bei der der Pat. in Seitenlage mit der Schulter bzw. dem Gesäß der kranken Seite auf zwei verschiedenen Betten ruht, so daß die Punktionsstelle zwischen beiden ohne Unterstützung freiliegt. Die alsdann an der tiefsten Stelle mittels Trokars ausgeführte Punktion bewirkt einen gefahrlos gründlichen Abfluß des gesamten Exsudates. Dem Verfahren wird Beschleunigung der Heilung sowie Vermeidung von Verwachsungen nachgerühmt.

Beim Empyem ist die operative Eröffnung der Pleura mittels Rippenresektion die Methode der Wahl, weil hier die einfache Paracentese oft nicht zum Ziele führt. Anzustreben ist die vollständige Entleerung der Pleura von Eiter, die baldige vollkommene Entfaltung der Lunge sowie die Vermeidung der Entstehung einer Resthöhle. Die Wiederentfaltung der Lunge wird jetzt durch möglichst frühzeitige künstliche Wiederherstellung des negativen Druckes in der Pleura herbeigeführt. Bei besonders schweren Fällen namentlich mit Zirkulationsschwäche (Gefahr der Narkose!) empfiehlt es sich, sich zunächst mit der einfachen Punktion zu begnügen und erst einige Tage später die Rippenresektion vorzunehmen bzw. durch Heber- oder besser Saugdrainage für dauernden Eiterabfluß zu sorgen. Zur Ausführung letzterer wird unter Lokalanästhesie ein 7 mm weiter Trokar eingestoßen, sein Stilet entfernt, an dessen Stelle ein weicher Katheter eingeführt und alsdann die Hülse des Trokars herausgezogen; den Katheter verbindet man unter Einschaltung einer Druckflasche, die zugleich als Sammelgefäß dient, mit einer Wasserstrahlpumpe oder einem aus zwei großen Flaschen zusammengestellten Flaschenaspirator. Die Saugdrainage bewährt sich am besten bei fibrinarmen, z. B. putriden Exsudaten. Ausreichender Eiterabfluß kommt durch Fieberabfall zum Ausdruck. Andauerndes Fieber macht dagegen die baldige chirurgische Eröffnung notwendig, gleichfalls wenn nicht innerhalb 6 Wochen die Sekretion wesentlich zurückgeht (Abkapselung von Eiterherden wahrscheinlich). Das gleiche gilt für alte, stark geschrumpfte sowie für interlobäre Exsudate. Tb-Empyeme nehmen therapeutisch eine Sonderstellung ein; sie sollen zur Vermeidung von Mischinfektionen sowie von Fistelbildung nach Rippenresektionen konservativ behandelt werden. Nach Entleerung durch Punktion wird das Exsudat evtl. durch Gas (N) ersetzt, um die heilsame Kompression der Lunge nicht zu beseitigen. Bei Mischinfektionen sowie bei putriden Exsudaten empfehlen sich Spülungen mit 3—5 l physiol. NaCl-Lösung. Bei alten verschleppten oder fistelnden Empyemen ist zur definitiven Ausheilung die chirurgische Thorakoplastik nicht zu umgehen.

Ausgedehnte Pleuraadhäsionen und Schwarten sind nach völligem Abklingen aller entzündlichen Erscheinungen (Fieber, Dibegeäusche, Rg.) mit lokaler Wärme, am besten mit Diathermie sowie systematischen Atemübungen zu behandeln.

## Hydrothorax und Hämatothorax.

Der Hydrothorax (Brustwassersucht) ist eine nichtentzündliche Flüssigkeitsansammlung in der Pleura, die sich prinzipiell sowohl bezüglich ihrer Entstehung wie durch die Beschaffenheit der Flüssigkeit von der Pleuritis exsudativa unterscheidet. In der Regel handelt es sich

lediglich um Teilerscheinung eines allgemeinen Hydrops, oft mit gleichzeitiger Transsudation in andere Höhlen (Bauchhöhle, Perikard). Hydrothorax wird hauptsächlich bei kardialer Stauung, bei hydropischen Nierenerkrankungen, Kachexien und schweren Anämien beobachtet.

Er besteht meist doppelseitig, macht physikalisch die gleichen Symptome wie ein Exsudat, von dem er sich aber durch sein niedriges spezifisches Gewicht (unter 1015), den geringen Gehalt an Fibrin und an Zellen sowie das Fehlen der Essigsäuretrübung in der Kälte unterscheidet. Er pflegt zuerst hinten unten nachweisbar zu sein und ist dann anfangs wegen des annähernd gleichen Standes auf beiden Seiten vom einfachen Zwerchfellhochstand schwer zu unterscheiden. Nach Lagewechsel zeigt er im Verlauf einiger Stunden Änderung der Dämpfungsfürge, da entzündliche Verklebungen fehlen. Reiben wird stets vermisst. Einseitiger Hydrothorax kommt bei lokaler Kompression der Venen oder des Duct. thorac. durch Tumoren vor. Die Therapie richtet sich gegen das Grundleiden. In Fällen größerer Flüssigkeitsansammlung kann infolge der Behinderung der Atmung eine Punktion notwendig werden.

**Hämatothorax**, d. h. Blutansammlung in der Pleura kommt hauptsächlich bei penetrierenden Brustwandverletzungen, Lungenschüssen, Ruptur von Aneurysmen, Verletzung einer Intercostalarterie usw. vor. Oft ist er mit Pneumothorax kombiniert. Die physikalischen Symptome sind die gleichen wie bei exsudativer Pleuritis. Das Blut gerinnt nicht in der Pleura. Bei großen Blutungen kann die Punktion notwendig werden. Im Gegensatz zur hämorrhagischen Pleuritis besteht die Flüssigkeit aus reinem Blut.

### Pneumothorax.

Unter Pneumothorax versteht man die Anwesenheit von Luft bzw. Gas in der Pleurahöhle. Ursache des Eindringens von Luft sind penetrierende Verletzungen der Brustwand (z. B. auch die Empyemoperation) und vor allem Risse in der Pleura pulmonalis, letzteres am häufigsten bei dicht unter der Pleura liegenden Lungenkavernen insbesondere bei rasch fortschreitenden Phthisen, seltener bei Lungengangrän. Therapeutischer Pn. s. S. 232. Sehr selten entsteht Pn. durch Gasbildung infolge von putriden Zersetzung von Pleuraexsudaten.

Das Eindringen von Luft in den Pleuraraum bewirkt ein Zusammensinken der Lunge, die sich infolge ihrer Elastizität nach dem Hilus hin zurückzieht (totaler Pn.), falls keine Verwachsungen bestehen. Im letzteren Fall entsteht ein partieller bzw. abgesackter Pn. Bei dem sog. offenen Pn. besteht eine dauernde Verbindung mit der Außenluft, z. B. nach Rippenresektion bei Empyem. In den anderen Fällen handelt es sich in der Regel um geschlossenen Pn., da der den Luftdurchtritt bewirkende Pleuradefekt meist schnell verklebt. In diesen Fällen wie auch beim therapeutischen Pn. wird die Luft (und zwar zuerst der O, viel langsamer der N) wieder resorbiert, worauf sich die Lunge allmählich wieder entfaltet. Beim sog. Ventil-Pn. wird während der Inspiration Luft von der Lunge in die Pleura gepreßt, wogegen während der Expiration die Perforationsstelle sich ventilartig schließt, so daß der in der Pleura herrschende positive Druck allmählich zu gefährlicher Höhe anwächst. Der bei Perforation einer krankhaft veränderten Lunge entstandene Pn. ist infolge des Eindringens von Infektionserregern in die Pleura oft von Exsudatbildung (Seropneumothorax) oder einem Empyem (Pyopneumothorax) begleitet. Letzterer entsteht z. B. auch bei Durchbruch eines Lungenabscesses oder Echinococcus in die Pleura.

Symptome: Die plötzliche Entstehung eines Pn. bewirkt infolge der Ausschaltung der Lunge hochgradige Atemnot mit Blässe und Cyanose, kleinem weichen Puls, Schweißausbruch. Diese Symptome

gehen mit Ausnahme der Atemnot nach einigen Tagen wieder zurück. Physikalisch zeigt die befallene Brusthälfte Erweiterung und Unbeweglichkeit, lauten und abnorm tiefen, in der Regel nicht tympanitischen Schall, der infolge der Verdrängung des Mediastinums und des Zwerchfells die normalen Lungengrenzen in der Mitte und unten überschreitet. Bei rechtsseitigem Pn. ist die Leber nach unten verdrängt. Bei Plessimeterstäbchenperkussion hört man wie bei Kavernen Metallklang; der Stimmfremitus ist abgeschwächt, desgl. das Atemgeräusch, welches amphorischen Charakter hat oder oft vollkommen fehlt. Bei Vorhandensein eines Exsudates ist der untere Abschnitt gedämpft; bei Lageänderung des Pat. findet die für Pn. charakteristische sofortige horizontale Einstellung des Flüssigkeitsspiegels statt (im Gegensatz zu pleuritischen Exsudaten und Hydrothorax). Beim Schütteln des Pat. vernimmt man metallisch-klingendes Plätschern, die sog. Succussio Hippocratis.

Sehr charakteristisch ist das Röntgenbild, das ein abnorm helles Feld im Bereich der Luftansammlung zeigt, während die Lunge (bei totalem Pn.) auf einen kleinen dunklen Schatten nahe der Mittellinie reduziert ist. Flüssigkeit im Pn. ist als intensiver horizontal begrenzter Schatten zu erkennen, der jedem Lagewechsel des Pat. prompt folgt und beim Schütteln sowie infolge der Herzpulsationen Wellenbewegung erkennen läßt. Herz und Mediastinum zeigen eine Verschiebung nach der gesunden Seite und zwar um so mehr, je höher der Druck im Pn. ist. Oft erscheint im Röntgenbild die Lunge nicht vollkommen kollabiert und zwar infolge von Adhäsionen, die speziell bei Lungen-Tb. sich besonders im Bereich des Oberlappens bzw. der Spitze finden. Bei ausgedehnten Verwachsungen kann der abgesackte Pn. zu recht komplizierten Bildern führen. Dies beobachtet man auch öfter beim Anlegen des künstlichen Pn.

Der Verlauf des Pneumothorax richtet sich vor allem danach, ob bei seiner Entstehung gleichzeitig infektiöses Material in die Pleura eingedrungen war oder nicht. Im ersteren Fall bildet der Pn. eine langwierige und ernste Komplikation, zumal es oft zur Bildung eitriger Exsudate kommt und vor allem die Perforationsstelle der Pleura eine nichtheilende Fistel bildet. Ein aseptischer Pn. pflegt sich dagegen im Verlauf von 8 bis 14 Tagen vollkommen zurückzubilden. Beim therapeutischen Pn. zeigt die Pleura, insbesondere bei Anwendung des schwer resorbierbaren N eine im Verlauf der wiederholten Neufüllungen abnehmende Resorptionsfähigkeit, so daß der Pn. sich hier schließlich viele Wochen hindurch unverändert hält.

Therapeutisch ist beim akuten Entstehen des Pn. zunächst die Zirkulationsschwäche und die Atemnot zu bekämpfen (Campher, Coffein, Sauerstoff, Morphium). Im übrigen bildet die Zunahme der Verdrängungserscheinungen sowie der Dyspnoe bzw. Cyanose die Indikation zur Verminderung der Gasansammlung, besonders bei Ventil-Pn. Man entleert mittels Punktion oder besser durch Absaugen mit einem Pneumothoraxapparat. Seröse Ergüsse indizieren die Entleerung nur bei beträchtlicher Größe wegen der Gefahr für den Zirkulationsapparat, eitriges Exsudate erfordern sie in jedem Fall, wobei für die Art der Entleerung die Grundsätze der Empyembehandlung maßgebend sind (S. 245; vgl. Unterschied zwischen Tb.- und Nicht-Tb-Empyemen).

### Krankheiten des Mediastinums.

Das Mediastinum ist der zwischen Brustbein und Wirbelsäule gelegene Raum, der seitlich von der Pleura mediastin., unten vom Zwerchfell begrenzt wird; oben steht er an der oberen Brustapertur ohne schärfere Grenze mit der vorderen Hals-

region in Verbindung. In ihm sind untergebracht das Herz, die großen Gefäße, die Luftröhre und die großen Bronchien, die Bronchialdrüsen, die Speiseröhre, der Vagus, Sympathicus und Phrenicus, der Duct. thorac., endlich in den Lücken lockeres Bindegewebe mit zahlreichen Lymphspalten. Überdies stellt es eine Trennungswand zwischen beiden Lungen dar, die dadurch bezüglich ihrer Druckverhältnisse eine große Unabhängigkeit voneinander erhalten. Infolge der Unterbringung der genannten wichtigen Gebilde in dem engen Raum erklären sich die erheblichen Wirkungen, die oft durch Erkrankungen des Mediastinums hervorgerufen werden. Einblick in die topographischen Verhältnisse gibt beim Lebenden vor allem die Röntgenuntersuchung sowohl in sagittaler und frontaler Durchleuchtung wie vor allem in den schrägen Durchmessern.

Unter den Krankheiten des Mediastinums kommen hauptsächlich Geschwülste sowie Entzündungen des mediastinalen Bindegewebes in Frage.

**Mediastinaltumoren:** Vergrößerung der Schilddrüse bewirkt, wenn diese sich als Struma substernal. unter das Brustbein erstreckt, durch Kompression der Trachea (deren Knorpelringe allmählich erweicht werden), gefährliche Zustände von Atemnot mit Stridor. Röntgenbild: Ein nach oben sich verbreiternder, der Aorta aufgesetzter Mittelschatten mit scharfer Begrenzung (cave Verwechslung mit Aneurysmen!). Thymushyperplasie bei jungen Kindern macht sternale Dämpfung und ruft mitunter schwere Dyspnoe hervor. Maligne Mediastinaltumoren, vor allem Sarkome nehmen von den Lymphdrüsen oder vom Thymusrest ihren Ursprung. Auch beim Hodgkinschen Granulom, bisweilen auch bei Leukämie kommen ausgedehnte lymphomatöse Geschwülste vor.

Die Symptome erklären sich vor allem aus dem mechanischen Druck auf die Nachbarschaft. Der physikalische Befund entspricht oft dem eines Lungentumors, d. h. es besteht eine sternale Dämpfung, die sich lateral ins Bereich der Lunge, oft nach beiden Seiten erstreckt und später oft sehr intensive Resistenz (Schenkelschall) mit Bronchialatmen zeigt. Die Kompressionserscheinungen bestehen anfangs oft nur in neuralgischen Schmerzen in der Brustwand bzw. in den Armen. Weitere Symptome: Recurrenslähmung, Sympathicusläsion mit Hornerischem Syndrom (enge Lidspalte, Zurücksinken des Bulbus, enge Pupille) und mitunter halbseitigem Schwitzen, Vaguslähmung mit Tachykardie. Im weiteren Verlauf beobachtet man oft starke, bisweilen halbseitige Venenstauung mit Cyanose und Ödem des Gesichtes, gelegentlich auch der Arme, ferner Schluckstörung infolge von Druck auf den Oesophagus, sowie vor allem Kompression der Trachea mit Stridor und Atemnot. Letztere wird durch das häufig im weiteren Verlauf sich entwickelnde pleuritische Exsudat (oft hämorrhagisch) verstärkt.

Im Röntgenbild sieht man oft von dem Mittelschatten in die Lungenfelder hineinreichende intensive knollige Schatten, die nicht selten durch Fortleitung von der benachbarten Aorta pulsatorische Bewegungen ähnlich einem Aneurysma zeigen und von diesem bisweilen nur schwer zu unterscheiden sind, namentlich wenn sie scharf begrenzt sind. In anderen Fällen verrät der unscharfe Kontur den Tumor. Der Nachweis von Drüsenmetastasen speziell an Hals und Achsel (evtl. Probeexcision) sowie mitunter gewisse klinische Eigentümlichkeiten beim Granulom (vgl. S. 268) sichern die Diagnose. Man versäume niemals die Blutuntersuchung. Zunahme der Atemnot, der Anämie und Kachexie, mitunter unregel-

mäßiges Fieber sowie bisweilen hämorrhagische Nephritis stellen sich im weiteren Verlauf ein, der schließlich oft mit Erstickung, in anderen Fällen unter allgemeinem Marasmus letal endet.

Die Therapie der gutartigen Tumoren (z. B. Strumen) besteht in ihrer operativen Entfernung. Bei den malignen Formen ist der Versuch mit energischer Röntgenbestrahlung sowie intensiver Arsenbehandlung zu machen (vgl. Hodgkin S. 269); doch ist die Prognose stets infaust.

**Entzündung des Mediastinums:** In akuter Form tritt dieselbe als diffuse eitrige Mediastinitis oder als Mediastinalabsceß auf, hauptsächlich durch Fortleitung von Entzündungen aus der Nachbarschaft, so z. B. nach Retropharyngealabscessen, Vereiterung der Schilddrüse oder des Kehlkopfs, Mundbodenphlegmonen, Durchbruch eines Oesophaguscarcinoms (auch nach Durchbohrung der Speiseröhre durch falsche Sondierung), nach Durchbruch eines Lungenabscesses, einer Gangrän oder eines Empyems, nach Bronchialdrüsenvereiterung, weiter als metastatische Eiterung im Verlauf von Sepsis, Typhus, Erysipel, endlich nach penetrierenden Stichverletzungen von außen. Symptome sind hohes Fieber mit Schüttelfrösten, lebhafter Brustschmerz, namentlich retrosternal sowie mitunter einzelne der oben beschriebenen Drucksymptome. Unter raschem Kräfteverfall endet das Leiden meist in wenigen Tagen letal. Nur bei circumscribten Eiterungen hat die chirurgische Eröffnung Aussicht auf Erfolg.

Die chronische Mediastinitis hat vor allem in ihrer von vornherein schleichend verlaufenden, zur Narbenbildung führenden Form als sog. schwierige Mediastinitis klinisches Interesse. Sie pflegt sich an chronische tuberkulöse oder rheumatische Entzündungen der Pleura oder des Perikards anzuschließen und ist oft Teilerscheinung einer Polyserositis.

Der anatomische Befund besteht in ausgedehnter Umwandlung des lockeren mediastinalen Bindegewebes in derbe Schwarten und Schwielen, in die das Herz und die großen Gefäße eingebettet sind und die diese Gebilde mit dem Brustbein fest verlöten. Adhäsive Pleuritis und Verwachsung der Perikardblätter begleiten in der Regel die Erkrankung.

Infolge der mechanischen Behinderung der Herztätigkeit und der Beeinträchtigung der großen Gefäße stellen sich die S. 180 beschriebenen charakteristischen Symptome ein. Der Pulsus paradoxus (vgl. S. 142) kommt infolge von inspiratorischer Einschnürung der großen Gefäße durch Narbengewebe zustande. Im weiteren Verlauf pflegen sich Erscheinungen zunehmender Herzinsuffizienz zu zeigen. Therapeutisch kommt, soweit es sich um schwerere Zirkulationsstörungen handelt, die chirurgische Thorakolyse bzw. Kardiolyse in Frage.

## Blutkrankheiten.

**Vorbemerkungen.** Unter normalen Verhältnissen zeichnet sich das Blut durch eine außerordentliche Konstanz seiner morphologischen und physikalisch-chemischen Zusammensetzung aus, so daß schon geringe Abweichungen von der Norm auf krankhafte Verhältnisse hinweisen. Da das Blut einen innigen Konnex zwischen allen Organen des Körpers vermittelt, insbesondere auch den Stoffaustausch derselben regelt, so geben seine Zusammensetzung bzw. Änderungen derselben

nicht nur Aufschluß über den Zustand der Blutbildungsorgane, sondern bilden in vielen Fällen einen getreuen Spiegel der auch im übrigen Körper sich abspielenden Krankheitsprozesse. Die hierbei zu beobachtenden Blutveränderungen (insbesondere Änderungen der Zahl und des Hb-Gehaltes der Erythrocyten sowie der Leukocytenzahl) wurden in ihrer symptomatischen Bedeutung bereits wiederholt in den vorangehenden Kapiteln erwähnt. Sie haben für die Erkennung einer großen Reihe von Krankheiten einen hohen diagnostischen Wert. Unter Blutkrankheiten versteht man diejenigen Krankheitsbilder, bei denen die Alteration der hämatopoetischen Organe bzw. des zirkulierenden Blutes eine führende Rolle spielt.

Zu den geformten Bestandteilen des Blutes gehören die roten und weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen. Normal ist ihre Bildungsstätte beim Erwachsenen das Knochenmark; die Lymphocyten werden in der Hauptsache vom Lymphknoten und der Milz erzeugt. Bei krankhaft gesteigerter Hämatopoese können außerdem die Milz, die Leber und das Bindegewebe analog ihrer Funktion in der Fötalzeit bei der Bildung sämtlicher Blutzellen mitwirken. Die Erythrocyten (4,5—5 Mill. in 1 cmm) entstehen normalerweise im roten Knochenmark der platten Knochen und Wirbelknochen, während das gelbe Fettmark der langen Röhrenknochen unbeteiligt bleibt. Bei gesteigerter Erythropoese, z. B. nach Blutverlusten, wandelt sich auch das Fettmark in rotes Zellmark um. Mutterzellen der kernlosen Erythrocyten sind die kernhaltigen Erythroblasten und zwar normalerweise Normoblasten von der gleichen Größe wie die Erythrocyten, unter pathologischen Verhältnissen die erheblich größeren Megaloblasten, die im embryonalen Leben die normalen Vorstufen der Erythrocyten sind; kernhaltige Rote kommen normalerweise im zirkulierenden Blut nicht vor. Die normale Zahl der Leukocyten beträgt 6000—8000 in 1 cmm. Hinsichtlich ihrer Entstehung (Leukopoese) sind die Granulocyten und die Ungranulierten, unter den letzteren die Lymphocyten und die großen Mononucleären bzw. Übergangsformen zu unterscheiden.

Die granulierten polynucleären Leukocyten des zirkulierenden Blutes (75 bis 80% der Gesamtleukocytenzahl) entstehen im Knochenmark aus granulierten Vorstufen, den sog. Myelocyten, die sich von den reifen Leukocyten durch ihre einfache Kernform unterscheiden. Entsprechend den verschiedenen Granulationen der letzteren gibt es neutrophile, eosinophile und basophile Myelocyten. Dieselben lassen sich ihrerseits von ungekörnten Mutterzellen, den sog. Myeloblasten, ableiten, d. h. lymphocytenartigen Zellen mit großem Kern und schmalen granulationsfreiem Protoplasma, in welchem während der Entwicklung zu Myelocyten allmählich Granulationen entstehen. So läßt sich eine lückenlose Reihe der einzelnen Entwicklungsstadien der granulierten Leukocyten aufstellen, angefangen mit dem rundkernigen ungranulierten Myeloblasten über die unvollkommen („Promyelocyten“) bzw. vollständig granulierten Myelocyten zum reifen granulierten Leukocyten mit polymorphem Kern. Das Vorkommen von Myeloblasten und Myelocyten im zirkulierenden Blut ist pathologisch. Von den Granulocyten unabhängig entsteht der Lymphocyt (20 bis 25%) im lymphatischen Gewebe des Körpers und zwar in den Keimzentren der Follikel; seine Mutterzelle ist der große Lymphocyt oder Lymphoblast, der morphologisch mit dem Myeloblasten weitgehend übereinstimmt. Die Blutplättchen entstehen im Knochenmark; auch ihre Zahl zeigt im zirkulierenden Blut eine gewisse Konstanz (ca. 250 000 in cmm).

Die Hauptaufgabe der Erythrocyten beruht auf der Fähigkeit des Hb, als Sauerstoffüberträger zu dienen. Die Lebensdauer der einzelnen Erythrocyten ist beschränkt, so daß eine beständige Blutmauserung stattfindet. Die zugrunde gehenden Erythrocyten werden aus der Zirkulation hauptsächlich von der Milz abgefangen, wobei das bei dem Abbau der Blutkörperchen freiwerdende Hb-Eisen bei der Blutregeneration wieder Verwendung findet. Unter pathologischen Verhältnissen kann die blutkörperchenzerstörende Eigenschaft der Milz erhöhte Bedeutung erlangen. Auch die Blutplättchen gehen in der Milz zugrunde. Den Leukocyten kommt eine vielseitige Rolle im Organismus zu. Ihrer Bedeutung bei der Abwehr pathogener Bakterien wurde schon S. 3 gedacht. Sie beruht teils in der Bildung von Schutzstoffen, teils in der Phagocytose der Mikroben. Die Leukocyten

enthalten ferner zahlreiche Fermente. Die Blutplättchen stehen in wichtiger Beziehung zur Blutgerinnung sowie zur Thrombenbildung. Die Gerinnung des Blutes ist an das Vorhandensein bestimmter im Plasma in Form von Vorstufen anwesender Körper gebunden. Das wahrscheinlich aus den Blutplättchen bzw. den Leukocyten stammende Gerinnungsferment, das z. B. durch Berührung mit Fremdkörpern oder mit der pathologisch veränderten Gefäßwand frei wird, führt bei Gegenwart von Kalksalzen das im Plasma präformiert vorhandene gelöste Fibrinogen in festes Fibrin über. Die Geschwindigkeit der Gerinnung und die Festigkeit des Fibringerinnsels, beides wichtige Momente zum Schutz des Organismus gegen Verblutung, zeigen unter pathologischen Bedingungen erhebliche Abweichungen von der Norm, die oft gleichzeitig mit abnormer Durchlässigkeit des Endothelrohrs der Gefäße für die Erythrocyten einhergehen. Letztere wird durch Anlegen einer Stauungsbinde am Oberarm während 3 Minuten geprüft, wobei die abnorme Gefäßdurchlässigkeit sich durch Auftreten kleiner Hautblutungen verrät (Rumpel-Leedesches Phänomen oder Endothelsymptom).

Die Beurteilung des Blutes auf krankhafte Veränderungen ist nur auf Grund einer exakten Blutuntersuchung möglich. Hierher gehören die Feststellung der Erythrocyten- und Leukocytenzahl in 1 cmm, des Hämoglobingehaltes mittels Hämometers, die Berechnung des als Färbeindex (F.-I.) bezeichneten mittleren Hb-Gehaltes des einzelnen Erythrocyten aus dem Hb-Wert und der Erythrocytenzahl sowie die Herstellung eines gefärbten Blutabstrichpräparates, mittels dessen man u. a. auch die prozentuale Beteiligung der einzelnen Leukocytenformen feststellt.

Die normale prozentuale Zusammensetzung der Leukocyten ist folgende:

Polynucleäre	{	neutrophile L. . . . .	65—75%
		eosinophile L. . . . .	2—4%
		basophile L. (Mastzellen) . . . . .	0,5%
		Lymphocyten . . . . .	20—25%

Große Mononucleäre und Übergangsformen (zusammen „Monocyten“) 5—7%.

Vielfach ist außerdem noch folgendes zu untersuchen: die Viscosität des Blutes (normal 4,2—4,5 verglichen mit dest. Wasser), die Blutgerinnungszeit (normal 5—6 Min.), die sog. Blutungszeit, d. h. die Dauer des Austretens von Blut aus einer Stichwunde, sowie die Farbe des Blutserums (normal hellgelb), in einzelnen Fällen die Resistenz der Erythrocyten gegenüber hypotonischen NaCl-Lösungen sowie die refraktometrische Eiweißbestimmung des Serums (ca. 7—8%) bzw. des Plasmas (ca. 9%), endlich die Feststellung des Volumens der geformten Elemente, das 40—44% gegenüber 60—56% des Plasmavolumens beträgt. Die Bestimmung der Gesamtblutmenge, die etwa  $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{10}$  des Körpergewichtes bildet, ist vorläufig zu umständlich, um am Krankenbett ausgeführt zu werden.

## Die Anämien.

Unter Anämie versteht man eine Verarmung des Blutes an Hämoglobin, die häufig mit einer Herabsetzung der Erythrocytenzahl in der Volumeneinheit einhergeht. Als Oligochromämie bezeichnet man Fälle mit ausschließlicher Blutfarbstoffverminderung, als Oligocythämie solche mit Reduktion der Hb.- und der Erythrocytenwerte. Inwieweit bei der Anämie außerdem eine Verminderung der Gesamtblutmenge besteht, ist eine Frage, deren Lösung am Krankenbette zur Zeit noch auf große Schwierigkeiten stößt. Von den Anämien streng zu trennen sind diejenigen Zustände, bei denen eine blasse Hautfarbe eine Anämie vortäuscht, während tatsächlich der Blutbefund normal ist (sog. Schein- oder Pseudoanämie).

Die Entstehung einer Anämie läßt sich auf zweierlei Weise denken, einmal durch vermehrten Blutverbrauch, z. B. durch Blutverlust (Blutungen)



oder durch gesteigerten Untergang von Erythrocyten innerhalb des Körpers, zweitens durch verminderte Blutbildung und zwar entweder infolge funktionellen Versagens der Hämatopoese (Torpor des Knochenmarks, aplastische Anämie) oder andererseits durch anatomische Zerstörung bzw. Substitution größerer Teile des Knochenmarks durch fremdes Gewebe, z. B. Tumoren. Praktisch ist im einzelnen Fall im Verlauf einer Anämie nicht immer sicher zu entscheiden, welches der genannten Momente dominiert, zumal sicher in manchen Fällen vermehrter Blutverbrauch mit verminderter Blutbildung kombiniert ist.

In der großen Mehrzahl der Fälle ist die Anämie nur Begleiterscheinung bzw. Folge anderer bekannter Krankheiten; diese Art von Anämien werden daher als sog. „sekundäre Anämien“ gewissen anderen Anämien, speziell der Chlorose und der perniziösen Anämie gegenübergestellt. Auch in hämatologischer Beziehung bestehen gewisse Unterschiede, die eine Trennung in verschiedene Arten von Anämie praktisch erfordern.

### Die sekundären Anämien.

Eine sekundäre Anämie stellt sich im Gefolge einer großen Zahl von Krankheiten als häufige Folgeerscheinung derselben ein. Ätiologisch kommen akute und chronische Blutverluste, Intoxikationen, Infektionskrankheiten, Darmparasiten, maligne Tumoren, gewisse Konstitutionskrankheiten, endlich bei jungen Kindern ungenügende Eisenzufuhr bzw. Nährschäden in Betracht.

Chronische Blutverluste spielen bei *Ulcus ventriculi* und *duodeni*, aber auch bei Magendarmcarcinom, ferner häufig im Gefolge von Uterus- und Hämorrhoidalblutungen eine Rolle. Unter den anämisierenden Giften sind zu unterscheiden solche, die unter dem Bilde einer akuten Intoxikation teils eine Auflösung der Erythrocyten bewirken, teils das Hb. chemisch verändern (z. B. in Methämoglobin oder bei der Leuchtgasvergiftung in CO-Hb.), so daß eine größere Menge Blutfarbstoff von seiner normalen Funktion als Sauerstoffüberträger ausgeschaltet ist; ferner solche, die im Gegensatz zur ersten Gruppe langsam und chronisch anämisierend wirken, wobei Angriffspunkte der Giftwirkung sowohl das zirkulierende Blut wie vor allem die hämatopoetischen Organe sein dürften.

Akute Blutgiftanämien kommen vor bei Vergiftung mit hämolytisch wirkenden Giften wie Morcheln, Arsenwasserstoff, *Extr. filic. mar.*, Schlangengift, ferner bei Schwarzwasserfieber, bisweilen nach Transfusionen. Auch bei der paroxysmalen Hämoglobinurie kommt es zur Zerstörung großer Mengen von Erythrocyten in der Blutbahn. Akute Anämie mit Met-Hb-Bildung entsteht durch Vergiftung mit Kal. chloric., ferner durch Anilin und seine Derivate wie Antifebrin, Maretin, Phenacetin, Lactophenin, weiter durch Nitrobenzol sowie Nitrite wie Amylnitrit, Bismut. subnitric., endlich durch Phenole (Lysol usw.). Chronisch schleichend verlaufende Anämien beobachtet man bei manchen gewerblichen Intoxikationen, vor allem bei der Bleivergiftung. Bei den Infektionskrankheiten bewirken die Bakterientoxine die Blutschädigung, so vor allem bei der Sepsis. Postinfektiöse Anämien beobachtet man in der Rekonvaleszenz nach Polyarthrit, Typhus sowie Lues. Bei der Malaria entsteht im Anfall eine Zerstörung zahlreicher Erythrocyten. Darmparasiten bewirken öfter chronische Anämien durch Blutverlust, so in besonders hohem Grad das *Ankylostomum duodenale* (bezgl. des *Bothriocephalus* vgl. perniziöse Anämie). Unter den bösartigen Tumoren spielt das Carcinom, speziell das des Magendarmkanals eine besondere Rolle; man nimmt hier toxische Substanzen des Neoplasmas an, die die Blutschädigung bewirken. Endlich führt bei jungen Kindern eine zu lange nach der Geburt fortgesetzte eisenarme Ernährung (reine Milchnahrung) zur Blutarmut (vgl. S. 260). Beim Erwachsenen hingegen bewirkt weder Unterernährung noch Mangel an Sonnenlicht allein Anämie.

Das Krankheitsbild der sekundären Anämie bedarf hier nur für die Fälle einer besonderen Besprechung, in denen die Anämie im Vordergrund des klinischen Befundes steht und, obgleich eigentlich nur ein Symptom, auch in therapeutischer Beziehung besondere Beachtung verdient.

Die **posthämorrhagische Anämie** tritt in akuter Form nach plötzlichen größeren Blutverlusten ein. Die klinischen Zeichen sind starke Blässe der Haut und der Schleimhäute, große Schwäche, Ohnmachten, Kopfschmerzen, Ohrensausen, Schwindelgefühl, Flimmern vor den Augen, starker Durst, Schläfrigkeit. Der Puls ist klein, weich und beschleunigt sowie sehr labil, die Atmung bei schwerer Anämie beschleunigt.

Blutbefund: Es besteht eine je nach der Größe des Blutverlustes verschieden starke Verminderung des Hb. und der Erythrocyten. Die unmittelbar nach dem Blutverlust einsetzende Regeneration der verschiedenen Bestandteile des Blutes erfolgt stets in bestimmter Reihenfolge, indem zuerst das Wasser, dann die Eiweißkörper des Plasmas, später die Erythrocyten und am langsamsten das Hb. ersetzt werden. Die Hb-Werte sind daher stärker herabgesetzt als die Zahl der Roten, d. h. der Färbeindex ist stets  $< 1,0$ . Dies ist ein wichtiges Charakteristicum jeder sekundären Anämie.

Im Blutabstrichpräparat sind die Erythrocyten blaß, zeigen eine abnorm große Delle sowie Größenverschiedenheiten (Anisocytose) und Abweichungen von der Scheibenform (Poikilocytose). Infolge verstärkter Regenerationstätigkeit des Knochenmarks findet man im zirkulierenden Blut kernhaltige Jugendformen der Erythrocyten und zwar Normoblasten (niemals Megaloblasten), ferner Polychromasie sowie gelegentlich spärlich basophil punktierte Erythrocyten, vorübergehend ferner eine neutrophile Leukocytose. Die Blutplättchen sind vermehrt; die Blutgerinnung ist gesteigert. Die Farbe des Serums ist auffallend hell.

Die Körpertemperatur zeigt häufig geringe subfebrile Steigerungen. Am Herzen bestehen oft laute systolische accidentelle Geräusche (vgl. S. 139). Die Größe des Herzens (Rö.) ist bisweilen vermindert (vgl. S. 149); in manchen Fällen entwickelt sich später Dilatation. Häufig ist Nonnensausen (vgl. S. 143). Geringe Ödeme speziell an den Knöcheln und im Kreuz sind bei stärkeren Anämien nicht selten. Der Harn zeigt stets sehr helle Farbe, oft Spuren von Eiweiß, dagegen niemals positive Benzaldehydreaktion. Meistens besteht Neigung zu Obstipation.

Das Tempo der Blutregeneration und des Ausgleichs der allgemeinen Störungen richtet sich abgesehen von der Größe des Blutverlustes vor allem nach dem gesamten übrigen Gesundheitszustand, dem Alter und dem Ernährungszustand der Kranken.

Der akute Verlust von mehr als der Hälfte der Gesamt-Blutmenge ist meist tödlich. Hierbei spielt neben der Verminderung des Hb und dem dadurch bedingten Sauerstoffmangel vor allem die plötzlich eintretende Flüssigkeitsverminderung im Gefäßsystem eine entscheidende Rolle, die der bei der akuten Vasomotoren-schwäche (vgl. S. 152) ähnlich ist. Größere Blutverluste brauchen im besten Falle mehrere Wochen bis zur völligen Restitutio ad integrum; am schnellsten vollzieht sich dieselbe bei der einfachen traumatisch entstandenen Anämie.

Als anatomischer Befund bei schwereren Anämien besteht außer hochgradiger Blutarmut sämtlicher Organe Fettablagerung im Herzmuskel, Leber und Nieren, sowie nach längerem Bestehen der Anämie rotes zellreiches Knochenmark mit lebhafter Neubildung junger Erythrocyten. Bei Versagen der Knochenmarks-

regeneration, z. B. bei alten Leuten oder sehr geschwächten Individuen findet sich statt dessen zellarmes Fettmark. Leber und Milz zeigen keine verstärkte Eisenablagerung; die Milz ist nicht vergrößert.

Therapie s. unten.

**Die chronische posthämorrhagische Anämie**, die sich nach häufig wiederkehrenden kleineren Blutungen einstellt (Ulcus ventriculi oder duodeni, Uterus- und Hämorrhoidalblutungen usw.), macht klinisch weniger stürmische Erscheinungen, obschon die Anämie schließlich extreme Grade erreichen kann.

Der Blutbefund ist im Prinzip der gleiche wie oben beschrieben: Niedriger F.-L., Leukocytose, Polychromasie, Anisocytose, basophile Punktierung der Erythrocyten, Normoblasten, helles Blutserum. Die Regeneration ist infolge der lange sich hinziehenden erhöhten Inanspruchnahme der Hämatopoese verlangsammt. Auch hier kann es zum Versagen derselben mit aplastischem gelben Knochenmark kommen, insbesondere bei allgemeinem Marasmus oder auch bei sehr lange anhaltenden Blutverlusten.

Sehr wichtig ist auch hier die möglichst frühzeitige Erkennung der Ursache, insbesondere fahnde man stets auf okkultes Blut im Stuhl. Darmparasiten, die hochgradige chronische Anämien durch Blutverlust erzeugen, sind das Ankylostomum duod. und der Necator americanus.

Im Gegensatz zu den posthämorrhagischen Anämien, bei denen der Blutverlust nach außen erfolgt, kommt es bei anderen sekundären Anämien zu einer Zerstörung der Erythrocyten innerhalb des Körpers (Blutgifte, Malaria usw.). Hier ist das klinische Bild sowie der Verlauf meist von der Grundkrankheit beherrscht, so daß die Anämie als solche und ihre Folgeerscheinungen klinisch in den Hintergrund treten.

Ein wichtiger Unterschied gegenüber den Blutungsanämien ist die Tatsache, daß hier der bei der Zerstörung der Erythrocyten freierwerdende Blutfarbstoff bzw. seine Fe-haltigen Derivate (Hämosiderin) dem Körper nicht verloren gehen, sondern in verschiedenen Organen, speziell Milz und Leber abgelagert werden (Hämosiderose) und diese Depots bei der Blutneubildung wieder Verwendung finden, was die Regeneration wesentlich erleichtert. Andererseits ist hier mit einer gleichzeitigen toxischen Schädigung der hämatopoetischen Organe durch das Grundleiden zu rechnen.

Zeichen vermehrter Blutzerstörung ist die Urobilin- bzw. Urobilinogenreaktion im Harn sowie evtl. die Vergrößerung der Milz (falls der Milztumor nicht infektiösen Ursprungs ist). Der Harn pflegt bei dieser Art von Anämien dunkel zu sein, desgl. öfter das Blutserum. Näheres vgl. unter Malaria sowie Vergiftungen.

**Therapie der sekundären Anämien:** Bei der akuten posthämorrhagischen Anämie ist zunächst die Auffüllung des Flüssigkeitsvolumens notwendig: NaCl-Infusion bzw. Ringer-Lösung oder Normosal subcut. resp. intravenös, sowie Analeptica (Campher, Coffein, Wein); evtl. Transfusion von arteigenem Blut, das vorher in vitro auf seine Unschädlichkeit zu prüfen ist (WaR., Fehlen von Agglutininen und Hämolysinen). Nach Abwendung der akuten Gefahr ist die Therapie einmal eine ätiologische gegen das Grundleiden gerichtete, sodann bezweckt sie die Anregung der Blutregeneration auf pharmakologischem Wege (Eisen, Arsen). Fe-Präparate (tägl. 0,1 metall. Fe): Pil. ferr. carbon. Blandii 3 mal tägl. 1—2 oder Tinct. ferr. pomat. 3 mal tägl. 20—30 Tr., ferner Eisenmanganpeptonat. In manchen leichteren Fällen wirkt die Trinkkur von Eisenwässern trotz ihres geringen Fe-Gehaltes günstig (Pyrmont, Cudowa, Franzensbad, Kohlgrub, Val Sinestra, St. Moritz). Die Fe-Therapie ist bei den Anämien, wo genügend

Fe-Depots im Körper zurückbleiben, zwecklos (s. oben). Arsen per os z. B. als Liqu. arsenic. Fowleri (mit Aqu. am. am. ää 3 mal tägl. 1 Trpf. langsam steigend bis auf 20 Tr.) oder Pil. asiatic. anfangs 1 Pille, langsam steigend bis 6 Pillen tägl. oder subcut. als Ziemssensche Lösung (1<sup>0</sup>/<sub>10</sub>iges Natr. arsenicos.; frisch bereiten!), anfangs 0,1 ccm, langsam steigend bis 1—2 ccm tägl.; ferner von organischen As-Präparaten z. B. das Kakodyl (wenig zuverlässig). Solarson, ferner Arsacetin (10<sup>0</sup>/<sub>10</sub>ige Lösung je 1 ccm tägl. unter sorgfältiger Kontrolle der Augen wegen evtl. Schädigung des Opticus); in leichteren Fällen Astonininjektionen (in Amphiolen M.B.K.). Arsenquellen: Levico, Val Sinestra (beide Fe-haltig) sowie die Fe-freie Dürkheimer Maxquelle (Trinkschema wird beigegeben). Oft bewährt sich die kombinierte Fe-As-Therapie z. B. als Compret, ferr. c. acid. arsenicos. comp. M.B.K. 3 mal tägl. 1—2 Tabl. — Bei schwerer Anämie ist strenge Bettruhe notwendig; Aufstehen für kurze Zeit erst bei über 50<sup>0</sup>/<sub>10</sub> Hb erlaubt. Zur Nachkur ist Aufenthalt in Höhenklima oft von Erfolg.

### Chlorose (Bleichsucht).

Die Chlorose ist eine selbständige Krankheit, die von den sekundären Anämien streng zu trennen ist. Sie befällt ausschließlich das weibliche Geschlecht und zwar in jüngerem Alter, und ist durch Verminderung des Hb sowie einer Reihe verschiedener anderer charakteristischer Störungen gekennzeichnet.

Bei Männern wird die Krankheit niemals beobachtet. Wahrscheinlich liegt ihre Ursache in mangelhafter Funktion der Ovarien, deren inneres Sekret als Hormon anregend auf die blutbildenden Organe wirken dürfte. Äußere schädliche Einflüsse sind nur von untergeordneter Bedeutung. Die Krankheit kommt in allen Bevölkerungsklassen ungefähr gleich häufig vor; auf dem Lande ist sie etwas seltener als in der Stadt. In manchen Familien beobachtet man gehäuftes Auftreten.

Krankheitsbild: Die ersten Anzeichen der Krankheit lassen sich in der Regel bis in den Beginn der Pubertät verfolgen. Die Symptome sind starke Blässe der Haut und der Schleimhäute, große Ermüdbarkeit und Mangel an körperlicher Leistungsfähigkeit sowie Teilnahmslosigkeit, Ohnmachten, Ohrensausen, Flimmern vor den Augen. Der Ernährungszustand ist dabei oft auffallend gut, auch zeigen die Mädchen nicht selten kräftigen Körperbau. Der Schlaf ist gut, oft besteht großes Schlafbedürfnis.

Die Hautfarbe zeigt in manchen Fällen einen Stich ins Grünliche (daher die von dem Griechischen abgeleitete Bezeichnung Chlorose). Bei den sog. blühenden Chlorosen täuscht das frische Rot der Wangen über die bestehende Blutarmut. Oft zeigen die Pat. einen pastösen Habitus; das Unterhautzellgewebe ist schwammig, das Gesicht erscheint etwas gedunsen. Für das psychische Verhalten der Bleichsüchtigen ist es bezeichnend, daß sie trotz der vorhandenen Mattigkeit und Apathie bei entsprechender Anregung oft lange Zeit an gesellschaftlicher (Tanzen) oder sportlicher Betätigung Erstaunliches leisten.

Die Körpertemperatur ist stets normal. Oft wird über Herzklopfen geklagt. Die Herzdämpfung ist mitunter etwas verbreitert, was aber zum Teil nur auf Retraktion der Lungenränder beruht. Regelmäßig sind accidentelle systolische Geräusche über der Pulmonalis, der Mitralis und der Herzspitze zu hören, desgl. Nonnensaunen (vgl. S. 143). Die Pulsfrequenz ist nicht erhöht, der Blutdruck normal. Die frühere Hypothese von der Hypoplasie des Herzens sowie der Enge der Aorta als Ursache der Chlorose hat sich als irrig erwiesen. Schwerere Fälle zeigen Neigung zu Thrombosen, speziell der unteren Extremitäten, gelegentlich auch der Hirnsinus.

Blut: In leichteren Fällen besteht eine mäßige Hb.-Verminderung bei im übrigen normalem Blutbefund; bei schweren Fällen findet sich neben stärkerer Reduktion des Hb. eine mäßige Verminderung der Erythrocyten.

Stets ist wie bei den sekundären Anämien der F.-I.  $< 1,0$ . Die Erythrocyten sind daher im Abstrichpräparat auffallend blaß und zeigen eine große Delle, einzelne Erythrocyten sind infolge von Quellung vergrößert. Normoblasten und punktierte Erythrocyten sind nicht häufig. Die Leukocytenzahl ist in der Regel normal, bei sehr schweren Fällen gelegentlich vermindert. Die Blutplättchen sind stets stark vermehrt. Das Serum ist auffallend hell. Symptome einer hämorrhagischen Diathese werden stets vermißt.

Die Atmung ist oft oberflächlich, womit die Retraktion der Lungenränder (s. oben) und der häufige Zwerchfellhochstand in Zusammenhang stehen. In zahlreichen Fällen beherrschen Beschwerden seitens des Verdauungsapparates das Bild: Appetitmangel oft verbunden mit den für Chl. charakteristischen eigentümlichen Geschmacksgelüsten (Verlangen nach sauren Speisen, Essen von Kreide, Kohle usw.), Klagen über Magendruck, Aufstoßen sowie hartnäckige Obstipation. Der Harn ist oft von auffallend heller Farbe, frei von pathologischen Bestandteilen; die Urobilin- und Aldehydprobe ist stets negativ. Bei den pastösen Formen ist die Harnmenge herabgesetzt; die Besserung verrät sich durch Zunahme derselben sowie zugleich durch entsprechende Abnahme des Körpergewichtes. Bisweilen beobachtet man Polydipsie mit vermehrter Harnmenge. Beides schwindet bei Besserung der Krankheit. Mit der Störung des Wasserstoffwechsels hängt auch das bei schweren Formen oft vorhandene Knöchelödem zusammen. Die Genitalien zeigen oft einen etwas infantilen Habitus, die Menstruation ist meist schwach oder bleibt längere Zeit ganz aus. Sehr häufig ist starker Fluor albus.

Verlauf: Die Chlorose ist ein gutartiges Leiden, das einer rationellen Therapie fast stets zugänglich ist. Andererseits zeichnet sie sich durch hartnäckige Neigung zu Rückfällen aus, die mit Vorliebe im Frühjahr und Herbst auftreten. Schwerere Fälle brauchen evtl. Monate bis zur Heilung. Sehr oft hat die Ehe, speziell die Gravidität, einen günstigen Einfluß, so daß aus bleichsüchtigen Mädchen später oft leistungsfähige gesunde Mütter werden.

Für die Diagnose ist der Blutbefund allein nicht ausreichend. Erst die Feststellung des beschriebenen klinischen Gesamtbildes sowie der Ausschluß aller eine Anämie erklärenden Ursachen (insbesondere z. B. okkulten Magendarmblutungen) gestattet die Diagnose, später evtl. auch die prompte Besserung nach Einleitung der Behandlung. Differentialdiagnostisch kommen vor allem die latente bzw. inzipiente Lungen-Tb. sowie gewisse Formen von Hyperthyreoidismus bei jungen Mädchen (Kropfherz) in Frage. Konsequenter durchgeführte Temperaturmessungen, Kontrolle des Pulses, die Rö.-Untersuchung der Lungen, evtl. die Tuberkulinreaktion sind zur Entscheidung heranzuziehen. In einzelnen Fällen kann auch der Hypothyreoidismus ein der Chlorose ähnliches Bild bewirken. Niemals stelle man die Diagnose auf die bloße Hautblässe hin.

Therapeutisch steht die Eisenbehandlung obenan; nicht selten wird allerdings ihre Durchführung durch die bestehenden Magendarmstörungen erschwert (die subcutane Fe-Verabreichung ist in solchen Fällen zwecklos, weil das Fe in jedem Fall durch den Dickdarm ausgeschieden wird). Oft bewährt sich die Kombination mit Arsenpräparaten bzw. die reine Arsentherapie (vgl. S. 254). Dauernde

Bettruhe bei allen schweren Formen (unter 50% Hb.); später Liegekuren. Eiweißreiche, leicht verdauliche Kost; reichlich Obst. Bekämpfung der Obstipation durch milde Abführmittel (Rhabarber, Brustpulver). Bei den pastösen Formen empfehlen sich Schwitzkuren zur Entwässerung. Bei torpiden Formen wurde nach wiederholten kleinen Aderlässen (50 ccm) eine Anregung der Blutbildung beobachtet.

### Progressive perniziöse Anämie (Biermersche Anämie).

Auch die perniziöse Anämie nimmt unter den Anämien in klinischer und anatomischer Beziehung eine Sonderstellung ein. Sie ist relativ häufig und befällt mit Vorliebe das mittlere Lebensalter, Frauen häufiger als Männer. Äußere ursächliche Momente wie starke Blutverluste, Vergiftungen, ungünstige Lebensbedingungen usw. spielen keine Rolle;




Abb. 29. Perniziöse Anämie. (Jenner-May-Färbung.) Megaloblasten, Normoblasten, punktierte Erythrocyten, polychromatophile Erythrocyten, Poikilocytose. Nach Lenhartz-Meyer.

insbesondere hat die Krankheit nichts mit den sekundären Anämien zu tun.

Krankheitsbild: Der Beginn des Leidens ist in der Regel so unmerklich und schleichend, daß die Pat. meist keinen genauen Zeitpunkt anzugeben wissen. Die ersten Beschwerden sind die gleichen wie bei jeder anderen Anämie (vgl. S. 252), auch wird oft über Appetitmangel und mitunter über Diarrhöen geklagt. Ferner besteht nicht selten schon frühzeitig ein Gefühl von Wundsein an der Zungenspitze.

Objektiv fällt die starke Blässe der Haut und der Schleimhäute auf; sie zeigt oft einen Stich ins Strohgelbe (kein Ikterus!). Das gleichzeitig meist vorhandene gute Fettpolster gibt zusammen mit der Hautfarbe den Pat. ein charakteristisches Aussehen (Ähnlichkeit mit Nephritikern), das sich wesentlich von dem der sekundären Anämien unter-

scheidet. Die Temperatur ist während des Fortschreitens des Leidens oft erhöht, bisweilen mit Steigerungen bis  $39^{\circ}$  und mehr; oft wechseln febrile Perioden mit afebrilen ab. Die Herzdämpfung ist nicht selten verbreitert, regelmäßig sind accidentelle systolische Geräusche vorhanden, bisweilen hier auch diastolische Geräusche ohne anatomischen Befund. Der Puls ist dauernd erhöht. Meist besteht Knöchelödem. Thrombosen werden niemals beobachtet. Oft stellen sich im weiteren Verlauf Zeichen der hämorrhagischen Diathese ein, insbesondere Epitaxis, Menorrhagien und Netzhautblutungen. Beschleunigung der Atmung wird bei stärkeren Graden der Anämie bemerkbar. Der Verdauungsapparat zeigt in der Regel Störungen. Die Zunge ist häufig auffallend glatt (Schleimhautatrophie), an der Spitze finden sich öfters Bläschen oder kleine Schleimhautdefekte, die die oben genannten Beschwerden erklären. In der Regel findet sich vollständige Achylie verbunden mit beschleunigter Entleerung des Magens. Geringe Milzvergrößerung ist häufig, dagegen fehlen stets Drüenschwellungen.

Blutbefund (Abb. 29): Schon bei der ersten Untersuchung pflegt eine hochgradige Anämie zu bestehen. Im Gegensatz zu den sekundären Anämien ist hier die Erythrocytenzahl stärker als das Hb herabgesetzt, d. h. der F.-I. ist größer als 1,0; der einzelne Erythrocyt ist also abnorm Hbreich und zeigt daher eine auffallend gute Färbung (daher die Bezeichnung „hyperchrome“ Anämie); charakteristisch ist ferner das Vorhandensein von abnorm großen Erythrocyten, den sog. Megalocyten, die, wenigstens in geringer Zahl, nie vermißt werden; häufig sind auch einzelne Megaloblasten vorhanden. Reichlich pflegen auch Mikrocyten vorzukommen. Die Leukocyten sind stets, zum Teil erheblich vermindert, desgleichen die Blutplättchen. Das Blutserum ist dunkel gefärbt (nicht im Remissionsstadium).

Die übrigen Veränderungen der Erythrocyten wie Anisocytose, Poikilocytose, basophile Punktierung, Cabotsche Ringe sind die gleichen wie bei schweren sekundären Anämien. Die Anisocytose kann sehr hohe Grade erreichen. Öfter treten in größerer Zahl Normoblasten auf. Die Leukopenie entsteht auf Kosten der Granulocyten, daher besteht relative Lymphocytose; die Eosinophilen sind stark vermindert oder fehlen desgl. die Monocyten; Myelocyten kommen in einzelnen Exemplaren vor. Die Blutgerinnung ist nicht verzögert.

Der Harn ist stets dunkel gefärbt, die Urobilin- und Urobilinogenreaktion positiv (nicht im Remissionsstadium); oft findet sich leichte Albuminurie.

Mitunter bestehen Symptome seitens des Zentralnervensystems, die eine spinale Strangdegeneration anzeigen: Babinskis Zehenphänomen, Par- und Anästhesien an den unteren Extremitäten, Ataxie wie bei Tabes, Neuritis optica usw. Die Haut zeigt bisweilen eine an Addison erinnernde Pigmentierung. Häufig findet man starke Druck- und Klopfempfindlichkeit der langen Röhrenknochen und des Brustbeins.

Der Verlauf der Krankheit ist in der Regel chronisch und führt unter stetiger Zunahme der Anämie schließlich zum Tode. Sehr charakteristisch sind die häufig zu beobachtenden vorübergehenden Remissionen mit erheblicher Besserung des Allgemeinbefindens und des Blutbefundes, die spontan eintreten, gelegentlich monatelang anhalten und sogar bis zu zeitweiliger Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit führen. Ausnahmslos folgen aber Rezidive, denen der Pat. schließlich unter den

Zeichen extremer Anämie (Hb. oft unter 10<sup>0</sup>/<sub>100</sub>, Erythr. unter 1 Mill.) erliegt. Die Krankheitsdauer erstreckt sich nur selten über 2 Jahre.

In einzelnen Fällen kann die Besserung ausnahmsweise so beträchtlich sein, daß der Blutbefund fast normal wird. Hier ist dann bisweilen das Vorhandensein einzelner Hb-reicher Megalocyten schließlich das einzige für perniziöse Anämie sprechende Symptom. — Bezeichnend ist übrigens für das Leiden, daß die Pat. oft noch relativ leistungsfähig bei stark verminderten Erythrocytenzahlen sind, bei denen sekundäre Anämien bereits vollkommen bettlägerig sind; dies erklärt sich aus dem hohen Hb-Gehalt des einzelnen Erythrocyten (s. oben).

Pathologische Anatomie: Stets findet sich hochgradige Anämie sämtlicher Organe mit Verfettung der Parenchyme, speziell des Herzmuskels („Tigerung“), Umwandlung des Fettmarks der langen Röhrenknochen in rotes geleeartiges Mark, das reichlich Erythroblasten, vor allem Megaloblasten enthält (sog. embryonaler Blutbildungstypus). Die stets etwas vergrößerte Milz zeigt Verkleinerung der Follikel sowie reichlich Fe-haltiges Blutpigment in der Pulpa, das ebenso in den Sternzellen der Leber massenhaft vorhanden ist (Berlinerblau-Reaktion). Regelmäßig besteht Atrophie der Magenschleimhaut.

Für die Diagnose ist der beschriebene charakteristische allgemeine Habitus, der Blutbefund und das Fehlen einer erkennbaren Ursache der Anämie von Bedeutung, sodann die evtl. vorausgegangenen Remissionen (Anamnese!).

In seltenen Fällen kann bei Sepsis, bei gewissen Intoxikationen (Nitrobenzol, Arsenwasserstoff), ferner bei malignen Tumoren speziell des Magendarmkanals, endlich bei Knochenmarkscarcinose ein der perniziösen Anämie ähnliches Blutbild entstehen. Hier entscheidet abgesehen von dem allgemeinen Krankheitsbild die meist vorhandene Leukocytose die Diagnose.

Die Pathogenese der Biermerschen Anämie ist bisher nicht vollkommen geklärt. Tatsache ist, daß einerseits ein abnorm starker Bluterfall im Körper stattfindet (Hämosiderose!) und andererseits die Blutregeneration nicht nach dem gewöhnlichen Typus der sekundären Anämie, sondern nach dem Vorbilde embryonaler Blutbildung (Megaloblasten, Erhöhung des F.-I.) erfolgt. Die Ursache sucht man in hypothetischen Giften, zumal es Krankheitsbilder mit bekannter toxischer Ursache gibt, deren Blutbild mit dem der Biermerschen Anämie genau übereinstimmt. Hierher gehört die perniziöse Anämie in der Gravidität, die in der zweiten Hälfte derselben Mehrgebärende befällt und bei rechtzeitiger Unterbrechung der Schwangerschaft oft in Heilung übergeht, desgleichen die bisweilen durch den *Bothriocephalus latus* (breiter Bandwurm) hervorgerufene Anämie, die nach Abtreibung des Wurms heilt, falls sie noch nicht zu weit fortgeschritten ist (charakteristisch ist hier neben dem typischen Blutbild der perniziösen Anämie Vermehrung statt Verminderung der Eosinophilen. Man untersuche in allen Fällen von pern. An. den Stuhl!). Schließlich spricht auch das gelegentlich im Anschluß an Lues III beobachtete Vorkommen der perniziösen Anämie und ihrer Heilung durch eine spezifische Kur für die Möglichkeit einer toxischen Genese des Morbus Biermer.

Therapie: Bettruhe bis zum Ansteigen des Hb. auf 60<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. Die ätiologische Therapie bei Gravidität, Darmparasiten bzw. Lues wurde schon erwähnt. Für die übrigen kryptogenen Fälle kommt sie nicht in Frage. Medikamentös ist Eisen nutzlos, da der Körper über genügend Fe-Vorräte verfügt (s. oben). Dagegen hat Arsenbehandlung oft Erfolg. Präparate vgl. S. 255. Besonders zu empfehlen ist die Ziemssensche Lösung und das Arsacetin. Gegen die Achylie mehrmals tägl.



15–20 Tr. Salzsäure während des Essens. Auch von Transfusionen wurden Erfolge gesehen. Bisweilen genügen 5 ccm defibrierten Blutes, welches Quantum wiederholt intravenös injiziert wird. Bei hartnäckigen Diarrhöen längere Zeit Pankreonverabreichung. Die neuerdings empfohlene Exstirpation der Milz zur Hemmung der Erythrocytenzerstörung erzielt nur vorübergehend Besserung. Bezüglich der Erfolge der Therapie bei perniziöser Anämie ist stets an die Möglichkeit einer spontanen Remission zu denken.

Unter **aplastischen Anämien** versteht man schwere letal verlaufende Anämien, die im Gegensatz zu dem oben beschriebenen Bilde sich durch das vollständige Fehlen von Regenerationserscheinungen im Knochenmark auszeichnen. Auch besteht kein gesteigerter Blutzerfall, die Hämosiderose fehlt daher oft. Die meist jugendlichen Fälle entwickeln sich nicht selten im Anschluß an septische Erkrankungen sowie an hämorrhagische Diathesen (Purpura), zum Teil auch spontan und führen unter den Zeichen extremer Anämie relativ schnell zum Tode. Im Blutbild fehlen die Erythroblasten sowie die punktierten und polychromatischen Erythrocyten. Hb, Erythrocyten, Leukocyten und Blutplättchen sind sehr stark vermindert. Es fehlt die Klopfempfindlichkeit der Knochen. Anatomisch zeigen die langen Röhrenknochen Fett- oder Gallertmark, die spongiösen Knochen ebenfalls zellarmes, regenerationsloses Mark.

### Hämolytischer Ikterus.

Der hämolytische Ikterus ist ein selteneres Krankheitsbild, das ebenfalls mit einer Anämie infolge von erhöhtem Blutzerfall einhergeht. Die Ätiologie ist unbekannt. Es gibt eine kongenitale, meist familiär auftretende und seltener eine erworbene Form. Das Krankheitsbild besteht in Ikterus, einem großen Milztumor und Anämie. Der Ikterus verläuft ohne Acholie der Stühle sowie ohne Hautjucken und Bradykardie (im Gegensatz zum katarrhalischen Ikterus), der Harn enthält meist kein Bilirubin, dagegen viel Urobilin bzw. Urobilinogen. Der F.-I. ist mitunter wie bei perniziöser Anämie  $> 1,0$ , die Leukocytenzahl dagegen oft erhöht. Charakteristisch ist die Herabsetzung der Resistenz der Erythrocyten gegen hypotonische NaCl-Lösung. Die Hämolyse beginnt oft schon bei 0,6% NaCl.

Die Krankheit verläuft außerordentlich chronisch. Die Pat. fühlen sich oft nicht eigentlich leidend und sind mitunter „mehr ikterisch als krank“. In anderen Fällen ist das Allgemeinbefinden dauernd oder zeitweise beeinträchtigt. Bezeichnend sind die anfallsweise unter Temperatursteigerung auftretenden „Krisen“ mit Zunahme des Ikterus und der Anämie sowie heftigen Schmerzen in der Oberbauchgegend, die von dem Milztumor herrühren und oft irrtümlich auf Gallensteine bezogen werden. Die Anfälle sind von kurzer Dauer. Anatomisch zeigt die Milz enormen Blutreichtum, viel Blutpigment, Verkleinerung der Follikel und oft Entwicklung von Myeloidgewebe, die Leber starke Hämosiderose; das Knochenmark ist zellreiches, rotes Regenerationsmark. Therapeutisch bewirkt die Milzexstirpation in vielen Fällen, namentlich bei der erworbenen Form Heilung.

### Anämien im Kindesalter.

Anämien in den ersten Lebensjahren können verschiedene Ursachen haben. Echte perniziöse Anämie wurde beim Kind nicht beobachtet, dagegen sind Anämien infolge von fehlerhafter Ernährung nicht selten. Zu lange durchgeführte einseitige

Milchnahrung führt infolge von Eisenmangel zu Blutarmut (s. oben); aber auch bei Mehlährschaden gegen Ende des 1. Jahres kommt es bisweilen zu Anämie. Meist handelt es sich um Kinder mit Konstitutionsanomalien wie exsudativer Diathese, Rachitis bzw. Neuropathie. Das Blutbild zeigt eine sekundäre Anämie, oft reichlich kernhaltige Erythrocyten, sowie Leukocytose mit Myelocysten. Der alimentäre Charakter der Anämie wird durch den Erfolg einer diätetischen Therapie (gemischte Kost, Fruchtsäfte, Gemüse) bestätigt.

Unter den infektiösen Ursachen der Anämien spielt die Lues eine wichtige Rolle, seltener andere Infektionen. Die luetische Anämie pflegt in den ersten Monaten aufzutreten und ist in der Regel mit anderen Zeichen der Lues vergesellschaftet (WaR. usw.). Die diagnostische Bedeutung des Milztumors bei den Anämien des Kindesalters ist keine entscheidende, da derselbe bei allen möglichen Erkrankungen häufig vorhanden ist.

Auch im Verlauf der Barlow'schen Krankheit (s. unten) entwickeln sich anämische Zustände, die teils als posthämorrhagisch (infolge der Blutungen), teils als alimentär bedingt aufzufassen sind.

### Die Polycythämien (Polyglobulien).

Im Gegensatz zu den Anämien handelt es sich hier um Krankheitsbilder, die durch Vermehrung der Erythrocyten und des Hb über die Norm ausgezeichnet sind.

Hierbei sind zu unterscheiden Fälle, bei denen infolge von Bluteindickung durch Austritt von Plasma aus den Blutgefäßen die Erythrocyten eine nur relative Zunahme erfahren, und solche, welche ohne Konzentrationszunahme des Plasmas eine absolute Vermehrung der Erythrocyten aufweisen. Letzteres entspricht etwa der sog. Plethora vera mit Zunahme der Gesamtblutmenge. Oft läßt sich die Polyglobulie auf bekannte Ursachen zurückführen.

Diese sog. sekundären Polyglobulien oder Erythrocytosen (Wortbildung analog der Leukocytose) entstehen physiologisch unter Einwirkung verminderter Sauerstoffspannung der Luft, die einen Reiz für die Blutbildung darstellt, z. B. im Höhenklima sowie bei Anwendung der Kuhnschen Saugmaske, pathologisch aus dem gleichen Grunde bei chronischer Atemnot wie bei dekompensierten Herzfehlern (besonders den angeborenen), Emphysem usw., hier zugleich mit Cyanose, ferner bei verschiedenen Intoxikationen (Kohlenoxyd, Phosphor, Arsen, Benzin, Antifebrin usw.). Auch bei chronischer Tuberkulose, bei Milztuberkulose, gelegentlich bei Trichinose sowie mitunter bei Malaria wird Vermehrung der Erythrocyten beobachtet. Relative Erythrocytose durch Bluteindickung kommt nach großen Wasserverlusten des Körpers, z. B. nach starkem Schwitzen sowie heftigen Diarrhöen (besonders bei Cholera), nach reichlichem Erbrechen (Gastrektasie) sowie mitunter bei Diabetes insipidus bei ungenügender Wasserversorgung vor.

Die pathologische Vermehrung der Erythrocyten kann aber auch als selbständiges Leiden ohne erkennbare Ursache auftreten.

Diese Art von Polycythämie, auch **Erythrämie** genannt, ist ein chronisches Leiden, das im Alter zwischen dem 35.—55. Jahr auftritt. Hereditäre Momente spielen keine Rolle.

Die Pat. klagen über lästiges Hitzegefühl, Schwindelanfälle, Kopfschmerzen bzw. Migräne, Ohrensausen, bisweilen Druckgefühl im linken Hypochondrium. Die Beschwerden pflegen sich in der warmen Jahreszeit und in geschlossenen geheizten Räumen zu steigern.

Die Kranken zeigen meist eine eigentümliche rote Gesichtsfarbe, als wenn sie stark echauffiert wären; auch die Schleimhäute sind düster rot gefärbt. Die Färbung ist von Cyanose verschieden. Zum Teil zeigen die Pat. den bei Hypertonie (S. 186) beschriebenen Habitus. Das Blut

ist von erheblich gesteigerter Viscosität und besitzt erhöhtes Gerinnungsvermögen. Die Erythrocytenzahl ist beträchtlich vermehrt (evtl. bis 10 Mill. und mehr), das Hb. in geringerem Maße gesteigert, der F.-I. ist demnach auch hier  $< 1,0$ ; es finden sich polychromatische sowie einzelne kernhaltige Erythrocyten, die Leukocytenzahl ist teils normal, teils vermehrt; die Blutplättchen sind zahlreich.

Man unterscheidet zwei Formen der Polycythämie und zwar den Vaquez-Oslerschen Typus mit Milzvergrößerung und normalem Blutdruck (megalosplenische Polycythämie) und den Gaisböckschen Typus mit erhöhtem Blutdruck und Fehlen eines Milztumors (hypertonische Polycythämie).

Oft besteht mäßige Herzhypertrophie, besonders bei vorhandener Blutdrucksteigerung. Mitunter kommt es zu spontanen Blutungen seitens der Haut, des Zahnfleisches, des Uterus, sowie Nasenbluten, wonach die Pat. meist vorübergehend Erleichterung ihrer Beschwerden empfinden. Auch der Augenhintergrund läßt oft durch die Schlängelung und Verbreiterung der Venen die Blutkrankheit erkennen. Thrombosen der Schenkelvenen werden öfters beobachtet.

Die Leber ist oft etwas vergrößert, Ikterus wird nicht beobachtet. Die bei der megalosplenischen Form vorhandene Milzvergrößerung pflegt sich in mäßigen Grenzen zu halten und bleibt stets hinter den Dimensionen der leukämischen Milztumoren zurück. Im Harn sind geringe Mengen Albumen sowie spärliche Zylinder häufig vorhanden, die Urobilin- und Urobilinogenreaktion ist oft positiv. In manchen Fällen entwickelt sich eine arteriosklerotische Schrumpfniere. Seitens des Nervensystems ist die wiederholt beobachtete Steigerung des Liquordrucks bei der Lumbalpunktion als Ursache der heftigen Kopfschmerzen zu erwähnen, desgleichen die Neigung zu Hirnblutungen.

Die Krankheit verläuft chronisch mit Perioden der Besserung und Verschlechterung und erstreckt sich oft über viele Jahre. Die Leistungsfähigkeit der Pat. ist zwar herabgesetzt, braucht aber nicht völlig aufgehoben zu sein. Schließlich führen Apoplexien, in selteneren Fällen profuse Magendarmblutungen den Tod herbei.

Anatomisch wurde stets ein in lebhafter Erythropoese befindliches rotes Knochenmark gefunden. Die Ursache dieser gesteigerten Tätigkeit ist nicht geklärt.

Therapeutisch wirken vorübergehend große Aderlässe günstig auf die Beschwerden. Neuerdings wurden Erfolge bei Röntgenbestrahlungen der langen Röhrenknochen bzw. der Milz gesehen. Die auf Zerstörung der Erythrocyten abzielende medikamentöse Therapie (Benzol, Phenylhydrazin) ist wegen der Möglichkeit einer Intoxikation nicht unbedenklich; dagegen wirken bisweilen größere Arsendosen sowie Jodkali günstig. Die Kranken sollen, namentlich im Sommer, eingeschlossene Orte meiden; Höhenklima bessert oft die subjektiven Beschwerden. Diätetisch bewährt sich eine salzarme, reizlose Kost (lacto-vegetabilisches Régime).

### Die Leukämien (Leukosen).

Die Leukämien stellen eine Systemerkrankung des gesamten hämatopoetischen Gewebes des Körpers dar, das in krankhaft gesteigertem Maße große Mengen weißer Blutzellen produziert und das zirkulierende Blut in der Regel mit ihnen überschwemmt. An dieser pathologischen

Hyperplasie beteiligen sich nicht nur die normalerweise im extrauterinen Leben tätigen Blutbildungsstätten wie das Knochenmark, sondern alle Organe bzw. Gewebe, die im fötalen Leben bei der Leukopoese eine Rolle spielen, Milz, Leber, Lymphdrüsen und das übrige Lymphadenoidgewebe, Thymus und das gesamte Bindegewebe des Körpers. Entsprechend den beiden Bestandteilen des leukopoetischen Gewebes (vgl. Vorbemerkungen), der myeloiden die Granulocyten produzierenden und der lymphatischen, die Lymphocyten erzeugenden Komponente gibt es auch zwei verschiedene Arten von Leukämie, die myeloide Form (Myelose) und die lymphatische Form (Lymphadenose). Es gehört ferner zum Wesen der Leukämie, daß im Gegensatz zur einfachen Leukocytose die vermehrte Zellbildung sich nicht nur auf reife Leukocyten beschränkt, sondern daß infolge überstürzter Leukopoese massenhaft unreife Vorstufen der Leukocyten, also Myelocyten, Myeloblasten, große Lymphocyten produziert werden und als solche in die Blutbahn gelangen.

Wenn auch somit die hochgradige Vermehrung der Leukocyten bzw. ihrer Mutterzellen im zirkulierenden Blut eine wichtige Begleiterscheinung ist, so ist dennoch zu betonen, daß dieselbe lediglich symptomatische Bedeutung hat und daher gelegentlich weniger stark ausgeprägt ist bzw. in einzelnen Fällen vorübergehend oder dauernd und zwar spontan oder unter äußerer Einwirkung (Therapie) fehlen kann, obschon auch hier anatomisch genau die gleiche hochgradige leukopoetische Hyperplasie besteht. Derartige Bilder, die demnach anatomisch mit den obigen Fällen identisch sind und sich nur durch den fehlenden Blutbefund von ihnen unterscheiden, werden Aleukämien genannt. Jede Leukämie kann zeitweise aleukämisch werden.

Die mit der gesteigerten Leukopoese einhergehende Gewebszunahme führt fast stets zu entsprechender Volumvergrößerung der befallenen Organe: Milztumor, Drüsenschwellungen, Lebervergrößerung. Eine regelmäßige Begleiterscheinung ist ferner eine progrediente Anämie, die sich z. Tl. durch die fortschreitende Substitution des erythropoetischen durch leukopoetisches Gewebe erklärt, vor allem aber durch gewisse, wahrscheinlich von dem leukämischen Gewebe ausgehende toxische Stoffe, die wie bei den malignen Neoplasmen die in späteren Stadien sich entwickelnde Kachexie erklären, desgleichen das häufig vorhandene Fieber. In einzelnen Fällen kommt die Analogie mit den bösartigen Tumoren auch in lokaler geschwulstartiger Wucherung von leukopoetischem Gewebe zum Ausdruck.

Die Leukämien und Aleukämien stellen ein progredientes Leiden dar, das regelmäßig zum Tode führt. Ihre Ätiologie ist nicht bekannt. Nach der Verlaufsart unterscheidet man chronische und akute Leukämien.

Die **chronische myeloide Leukämie (chronische Myelose)** ist die häufigste aller Leukämien. Ihr Beginn ist unmerklich schleichend. Symptome sind anfangs zunehmende Mattigkeit und Blässe, Appetitmangel, Schweiß, gelegentlich Nasenbluten, häufig Druck und Völle-

gefühl in der Oberbauchgegend, das auf Vergrößerung der Milz beruht. Der regelmäßig vorhandene Milztumor kann enorme Dimensionen annehmen und reicht oft bis ins Becken hinab; charakteristisch sind seine harte Konsistenz sowie mehrere fühlbare Kerben an seinem Innenrand. Nicht selten entstehen im Verlauf der Krankheit Infarkte, die sich durch heftige Schmerzen sowie auscultatorisch hörbare Reibegeräusche über der Milz (Perisplenitis) verraten. Oft sind die Knochen, namentlich das Sternum stark klopfempfindlich.

Blutbefund: Die Leukocyten Gesamtzahl ist enorm gesteigert (meist viele Hunderttausend); die der myeloiden Reihe angehörenden granulierten Zellen (neutrophile, eosinophile, Mastzellen) sind sowohl absolut wie relativ an Zahl vermehrt, außerdem finden sich in großer Menge unreife Markzellen, d. h. Myelocyten der drei Granulationsarten.




Abb. 30. Myeloide Leukämie (Nativpräparat). Nach Lenhartz-Meyer.

Wie Abb. 30 zeigt, kann man schon im ungefärbten Nativpräparat die Leukämie an den zahlreichen einkernigen granulierten Zellen erkennen. In den Anfangsstadien überwiegen noch die Polynucleären unter relativer Vermehrung der Eosinophilen und Mastzellen, später nimmt die Zahl der Myelocyten zu, auch pflegen bei Verschlimmerungen Myeloblasten aufzutreten. Im weiteren Verlauf entwickelt sich stets eine sekundäre Anämie. Regelmäßig sind von Anfang an zahlreiche Normoblasten vorhanden.

Die Temperatur ist oft erhöht und zeigt bisweilen hektischen Typus. Die am Zirkulationsapparat auftretenden Erscheinungen entsprechen den bei Anämie beschriebenen Symptomen. Die Leber ist oft erheblich vergrößert. Seitens der Genitalien kommt vereinzelt Priapismus vor, bisweilen als Frühsymptom; er beruht teils auf Gerinnselbildung in den Schwellkörpern, teils auf Kompression der Venen durch

den Milztumor. Der Harn enthält sehr große Harnsäuremengen, die aus den Kernen der massenhaft zerfallenden Blutzellen stammen; ein reichliches Ziegelmehlsediment fällt oft den Pat. selbst als Frühsymptom auf. Der Augenhintergrund zeigt oft streifenartige oder flächenhafte Blutextravasate, bisweilen weiße Flecke. Sonstige Zeichen der hämorrhagischen Diathese (Hautblutungen usw.) werden mitunter in späteren Krankheitsstadien beobachtet. Blutungen nach einfachen Zahnextraktionen können schon bei Beginn des Leidens durch ihre Hartnäckigkeit zu einer Gefahr werden. Lymphdrüenschwellungen fehlen oft bis zuletzt oder sie treten erst in vorgeschrittenen Stadien und zwar als Inguinal-, Achsel- und Halslymphome auf; sie sind weich, indolent, mit der Haut und der Unterlage nicht verwachsen.

Im weiteren Verlauf des Leidens nimmt die Kachexie und Anämie zu, das Blutbild zeigt steigende Mengen Myelocyten und vor allem ungranulierte Myeloblasten. Besserungen unter Einwirkung der Therapie oder interkurrierender fieberhafter Erkrankungen verraten sich durch Hebung des Allgemeinbefindens, Abnahme der Leukocytenzahl und der Anämie, Verminderung der Myelocytenzahl, Zurückgehen des Milztumors und Schwinden des Fiebers.

Anatomischer Befund: Eine über den ganzen Körper ausgedehnte Wucherung von myeloischem Gewebe, namentlich in der Milz, der Leber, den Lymphdrüsen. Das gelbgrüne Knochenmark zeigt oft eine eiterähnliche Beschaffenheit. Mikroskopisch finden sich in großer Menge die gleichen wie die im Blut vorhandenen Zellen.

Therapie s. unten.

Die **chronisch lymphatische Leukämie (chronische Lymphadenose)**, welche seltener als die Myelosen ist, besteht in einer generalisierten Wucherung von lymphatischem Gewebe, wobei in erster Linie die lymphatischen Organe, Milz, Lymphdrüsen, Thymus, Tonsillen usw. befallen sind.

Das Krankheitsbild ist dem der Myelosen sehr ähnlich. Initialsymptome sind hier meist Drüenschwellungen am Hals, in der Achsel und der Leistengegend, der in der Regel vorhandene Milztumor bleibt meist hinter dem myeloischen an Größe erheblich zurück. Die Lymphome sind weich, unter der Haut und auf der Unterlage verschieblich, nicht schmerzhaft und vereitern niemals.

Blutbefund (Abb. 31): Es besteht ebenfalls hochgradige Vermehrung der Leukocyten, an der sich prozentual überwiegend Lymphocyten




Abb. 31. Lymphatische Leukämie.  
(Jenner-May-Färbung.)  
(Aus dem Blutatlas von Erich Meyer  
und H. Rieder.)

beteiligen, während die granulierten Zellen (neutroph., eos., Mastzellen) im Blutbild vollkommen zurücktreten.

Während meist die kleinen Lymphocyten dominieren, sind in manchen Fällen auch große Lymphocyten, zum Teil in größerer Menge vorhanden. Häufig finden sich in Zerfall begriffene Zellen, sog. Gumprechtsche Lymphocytschatten. Anämische Veränderungen fehlen anfangs, sind später aber oft stark ausgeprägt.

Charakteristisch sind die in manchen Fällen vorkommenden knotenförmigen lymphatischen Infiltrate der Haut, speziell des Gesichts, die dasselbe bisweilen stark verunstalten (sog. Facies leontina).

Der Verlauf der chronischen Lymphadenosen entspricht dem der Myelosen. Unter fortschreitender Anämie und Kachexie erfolgt im Laufe von mehreren Jahren der Tod an Erschöpfung.

Histologisch besteht in den genannten Organen eine diffuse Hyperplasie von lymphatischem Gewebe, das die ursprüngliche Organstruktur vollkommen verwischt. Auch in vielen anderen Organen sowie im Bindegewebe trifft man Anhäufungen von lymphatischem Gewebe.

Therapie s. unten.

Die **akuten Leukämien**, die mit Vorliebe jugendliche Individuen, vor allem das Kindesalter befallen, unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht von den chronischen Leukämien. Abgesehen von dem akuten, bisweilen foudroyanten Verlauf besteht oft ein Krankheitsbild, das infolge des bestehenden hohen Fiebers und des schweren Allgemeinzustandes dem einer akuten Infektionskrankheit, insbesondere einer Sepsis gleicht. Auch hämatologisch und histologisch bestehen gewisse Unterschiede. Die Frage einer etwaigen infektiösen Ätiologie ist noch nicht geklärt. Regelmäßige Begleiterscheinung ist eine meist frühzeitig einsetzende hämorrhagische Diathese mit Nasenbluten, Haut-, Zahnfleisch- und Augenhintergrundsblutungen, Menorrhagien usw.). Häufig sind ulceröse Prozesse der Mundschleimhaut, vor allem gangränöse Anginen sowie skorbutartige Stomatitiden. Auch bei den akuten Leukämien ist eine myeloide und eine lymphatische Form zu unterscheiden. Milztumor bzw. Lymphome pflegen im Gegensatze zu den chronischen Leukämien weniger stark ausgeprägt zu sein, Drüsen-schwellungen werden mitunter sogar vollkommen vermißt.

Das Blutbild bei der akuten Myelose entspricht nur selten dem der chronischen Myelose. Die Leukocytenzahl ist oft nur mäßig vermehrt (etwa im Maßstab einer gewöhnlichen Leukocytose), wobei die unreifsten Vorstufen der Granulocyten dominieren, d. h. die Myeloblasten bzw. unvollkommen gekörnte Zwischenstufen zwischen diesen und den Myelocyten; eosinophile und Mast-Myelocyten sind im Gegensatz zu den chronischen Myelosen in nur ganz geringer Zahl oder überhaupt nicht zu finden. Bei manchen besonders bösartigen Formen sind ausschließlich Myeloblasten vorhanden.

Das Blutbild der akuten Lymphadenose ist bisweilen das gleiche wie bei der chronischen Lymphämie mit Vorwiegen der kleinen Lymphocyten; doch ist das reichliche Auftreten großer Lymphocyten für die akute Verlaufsform besonders charakteristisch.

Anatomisch findet man wie bei den chronischen Formen eine Wucherung des myeloiden bzw. lymphatischen Gewebes im Knochenmark und den übrigen Organen.

Die im jugendlichen Alter auftretenden akuten Leukämien zeigen eine Neigung zu tumorartiger Wucherung des leukämischen Gewebes, namentlich im Bereich des Thymus und der Mediastinaldrüsen, so daß mitunter das Bild des Mediastinaltumors (vgl. S. 248) entsteht. Man hat derartige Fälle, soweit sie ein großzelliges Blutbild zeigen, als Leukosarkomatosen bezeichnet.

Eine im Kindesalter vorkommende seltene Form der akuten Myelosen ist ferner das Chlorom, das durch ausgedehnte subperiostale geschwulstartige Wucherungen von leukämischem Gewebe ausgezeichnet ist, die vor allem die platten Schädelknochen befallen und bereits am Lebenden sich als grünlich gefärbte, durch die Haut durchschimmernde Tumoren zu erkennen geben. Oft kommt es zu mechanischer Schädigung einzelner Hirnnerven (Opticus usw.).

Die akuten Leukämien verlaufen stets innerhalb weniger Wochen oder sogar nur Tagen tödlich.

Die Aleukämien gehören zur Gruppe der sog. Pseudoleukämien, einer jetzt verlassenen Bezeichnung, die eine Reihe äußerlich ähnlicher Krankheitsbilder umfaßt. Die ihnen gemeinsamen Eigentümlichkeiten sind verschiedene auch bei den Leukämien vorkommende Symptome wie multiple Drüenschwellungen, Milztumor, progrediente Anämie und Kachexie, wogegen ihnen die starke Leukocytenvermehrung der Leukämien fehlt. Während ein Teil der Pseudoleukämien anatomisch auf Wucherung von entzündlichem Granulationsgewebe beruht (s. granulomatöse Pseudoleukämien), sind die Aleukämien, wie früher erwähnt, histologisch echte Leukämien, denen lediglich die starke Zellvermehrung im Blute fehlt.

Die lymphatische Aleukämie verläuft chronisch oder akut unter dem gleichen Bilde wie die Lymphadenosen, mit Drüsen- und Milzschwellung. Das Blutbild zeigt entweder keine Abweichungen oder häufiger besteht eine relative Lymphocytose bei annähernd normaler Gesamtleukocytenzahl. — Die seltene myeloische Aleukämie zeigt erhebliche Milzvergrößerung sowie zahlreiche Myelocyten im Blut ohne Leukocytenvermehrung.

Wie schon erwähnt, kann jede Aleukämie in Leukämie übergehen; umgekehrt beobachtet man öfter im Verlauf einer Leukämie, namentlich unter einer energischen Therapie vorübergehend ein Zurückgehen der Leukocytenzahl zu normalen Werten, wobei schließlich nur die prozentuale Leukocytenformel pathologisch bleibt (aleukämisches Stadium).

**Therapie der Leukämien und Aleukämien.** Während die akuten Leukämien einer Therapie nicht zugänglich sind, gelingt es in der Regel, chronische Leukämien wenigstens eine Zeit lang therapeutisch zu bessern und die pathologische Leukopoese für Wochen oder Monate in Schach zu halten. Eine Heilung ist nicht möglich. Medikamentös sind besonders wirksam das Arsen, das von den Pat. auch in höheren Dosen auffallend gut vertragen wird z. B. als Fowlersche Lösung per os oder als *Natr. arsenicos subcut.* (Dosierung vgl. S. 254), ferner das Benzol per os *aa* mit *Ol. olivar.* in Gelatinekapseln in Einzeldosen von 0,5 steigend 3,0 bis 5,0 p. die oder bis zu 10 mal tägl. 30 Tr. in Milch oder Sahne. Bedeutend wirksamer ist die Röntgentherapie, der gegenüber das leukämische Gewebe sehr empfindlich ist. Man bestrahlt mit mittelharten Strahlen, bei den Myelosen vor allem die Milz, bei den Lymphadenosen außerdem die Lymphome; die Bestrahlung der Knochen ist zu wenig wirksam. Der Erfolg zeigt sich im Zurückgehen des Milztumors bzw. der Drüenschwellungen, Schwinden des Fiebers, Besserung des Allgemeinbefindens sowie der Anämie, ferner im Sinken der Leukocytenzahl und in Verminderung der pathologischen Zellformen; letzteres zeigt sich besonders bei den Myelosen, die sich gelegentlich bis zu fast normalen Blutbildern zurückbilden,



was bei den Lymphadenosen niemals beobachtet wird. Da stets nach einigen Wochen oder Monaten ein Rückfall eintritt (fortlaufende Kontrolle des Blutes!), sind die Bestrahlungen zu wiederholen, bis schließlich auch die Röntgentherapie das Fortschreiten des Leidens nicht mehr aufzuhalten vermag. Bei zu intensiver Bestrahlung sinken die Leukozyten unter die Norm, auch kommt es bisweilen plötzlich zu einer Überschwemmung des Blutes mit Myeloblasten. — Auch mit Thorium X kann man mitunter ähnliche Erfolge wie mit Röntgenstrahlen erreichen (etwa 500 elektrost. Einh. pro Woche). — Mit allen auch geringfügigen operativen Eingriffen sei man bei Leukämikern wegen der hämorrhagischen Diathese äußerst vorsichtig und warte zum mindesten, wenn zugänglich, eine Remissionsperiode ab.

### Granulomatöse Pseudoleukämien.

Die granulomatösen Ps. sind von den leukämisch-aleukämischen Krankheitsprozessen streng zu trennen (vgl. oben). Gemeinsam ist beiden lediglich die Schwellung der Lymphdrüsen und der Milz. Dagegen handelt es sich hier nicht um eine Systemaffektion, sondern nur um eine, wenn auch häufig sehr ausgebreitete partielle Erkrankung einzelner Bezirke des hämatopoetischen Apparates. Die Erkrankung besteht in Wucherung von entzündlichem Granulationsgewebe, das das spezifische Organewebe in Drüsen, Milz, Knochenmark sukzessive ersetzt. Im Gegensatz zur Hyperplasie des hämatopoetischen Gewebes bei Leukämie kommt es demnach hier umgekehrt zum Schwund desselben. Ätiologisch handelt es sich um infektiöse Prozesse. Zu unterscheiden sind das tuberkulöse, dasluetische und das sog. maligne Granulom.

Das tuberkulöse Granulom zeigt multiple Drüenschwellungen ohne Vereiterung derselben, bisweilen geringe Milzvergrößerung, im übrigen klinisch die Erscheinungen einer milden Tb., im Blutbild normale Verhältnisse, bisweilen relative Verminderung der Lymphocyten. Die Diagnose läßt sich oft nur nach Probeexcision einer Drüse stellen.

Ähnlich verhält sich das gummöse Granulom bei Lues. Hier ergibt außer der positiven Wa-R. im Blut evtl. das Ergebnis der Drüsenpunktion (Spirochäten) eine Handhabe für die Diagnose sowie vor allem das Zurückgehen der Lymphome auf eine antiluetische Kur.

Eine besondere klinische Bedeutung hat das maligne Granulom (Lymphogranulom, Hodgkinsche Krankheit). Es ist eine nicht seltene Erkrankung, die hauptsächlich jüngere Individuen befällt. Der sicher infektiöse Erreger ist bisher nicht bekannt.

Krankheitsbild: Das Leiden beginnt mit Schwellung im Bereich einer Lymphdrüsenengruppe, am häufigsten der Halsdrüsen, die oft bis zu hühnereigroßen Tumoren anwachsen. Sie sind nicht schmerzhaft, derb, unter der Haut und auf der Unterlage verschieblich und vereitern nicht. Mitunter beobachtet man spontane Volumschwankungen. Später werden auch andere Drüsenengruppen, wie Achsel-, Inguinal- und Mediastinal-, ferner Mesenterial- und Retroperitonealdrüsen befallen und wandeln sich in große Geschwulstpakete um, auch treten an solchen Stellen Lymphome auf, an denen normal Drüsen nicht nachweisbar sind. In der Regel besteht ein beträchtlicher, bisweilen höckeriger Milztumor; auch die Leber ist oft vergrößert.

Fieber ist meist schon in den Anfangsstadien zu beobachten, später besteht es ausnahmslos, oft tritt es periodisch auf als sog. chronisches

Rückfallfieber. In den fieberfreien Intervallen bessert sich das Allgemeinbefinden. In manchen Fällen bestehen vollkommen unregelmäßige Temperaturen, zum Teil von hektischem Typus, seltener in Form einer Continua. Die Drüsengeschwülste bewirken oft Drucksymptome wie Venenstauung, lokale Ödeme, Ascites, Ikterus, Neuralgien usw.

Bei vorwiegendem Befallensein der Mediastinaldrüsen entwickelt sich mitunter das Bild des Mediastinaltumors bzw. eines Lungentumors; pleuritische Transsudate sind dabei häufig. In anderen Fällen sind hauptsächlich die abdominalen Drüsen erkrankt, das Krankheitsbild kann dann eine Peritoneal-Tb. vortäuschen.

Das Blutbild zeigt eine gewöhnliche neutrophile Leukocytose, häufig mit absoluter Vermehrung der Eosinophilen; die Lymphocyten sind vermindert, die Mononucleären vermehrt. Seltener ist eine normale oder sogar verminderte Leukocytenzahl. Die Eosinophilen können bei Verschlimmerungen abnehmen oder völlig schwinden. Im Verlauf der Krankheit entwickelt sich eine sekundäre Anämie.

Schwellungen bzw. Infiltrate der Rachengebilde wie bei Leukämie kommen nicht vor, wohl dagegen gelegentlich knotige Infiltrate in der Haut. Pruritus findet sich häufig, bisweilen als Initialsymptom. Im Harn ist häufig die Diazoreaktion stark positiv, desgleichen in späteren Stadien mitunter die Aldehydprobe. In manchen Fällen bestehen hartnäckige Diarrhöen.

Die anatomische Untersuchung ergibt in der Regel eine erheblich stärkere Ausbreitung des Prozesses, als der klinische Befund vermuten läßt. Makroskopisch erinnern die befallenen Teile an Carcinom oder Sarkom. Die stark vergrößerte Milz zeigt häufig ein gesprenkeltes Aussehen infolge eingesprengter Granulomherde (sog. Porphyrmilz) desgl. bisweilen die Leber sowie das Knochenmark. Mikroskopisch findet sich entzündliches Granulationsgewebe bestehend aus Fibroblasten, Plasmazellen, Lymphocyten, Leukocyten sowie oft reichlich Eosinophilen, ferner Riesenzellen sowie fibrillärem Bindegewebe, das in älteren Herden Neigung zu Schrumpfung und Induration zeigt. Das spezifische Organewebe ist in den Granulomherden durch diese ersetzt. Im Gegensatz zu den leukämischen Prozessen finden sich beim Granulom auch bei stärkster Ausbreitung der Krankheit stets einzelne intakte Drüsen. Oft findet man gleichzeitig eine Tb.

Der Krankheitsverlauf ist in der Regel chronisch und erstreckt sich nicht selten über mehrere Jahre. Oft gesellt sich klinisch das Bild der Tuberkulose hinzu.

Die Diagnose ist in den Anfangsstadien mitunter schwierig. Charakteristisch ist das Fortschreiten von Drüsengruppe zu Drüsengruppe, das periodische Fieber, das Blutbild (Leukocytose evtl. mit Eosinophilie), die positive Diazoreaktion, die aber nicht selten fehlt. Die Drüsen sind anfangs weich, später im Gegensatz zu den aleukämischen Lymphomen oft hart, auch verbacken sie öfters miteinander. Charakteristisch sind die spontanen Schwankungen ihrer Größe. In unklaren Fällen kann die Probeexcision entscheiden, die indessen in initialen Fällen gelegentlich auch versagt. Die bei vorwiegend abdominaler Lokalisation des Prozesses vorkommende Continua kann im Verein mit dem Milztumor, der Diazoreaktion und der in diesen Fällen hierbei beobachteten Leukopenie einen Typhus vortäuschen.

Therapeutisch bewährt sich bisweilen die Röntgenbestrahlung der Lymphome und der Milz, namentlich wenn die Bindegewebsentwicklung noch nicht zu ausgedehnt ist, sowie ferner energische Arsenbehandlung, besonders das Arsacetin subcut. tägl. 1 cc (10 % Lösung) oder als Pillen zu 0,05 bis 3 mal tägl.

### Multiple Myelome (Kahlerscher Krankheit).

Die nicht ganz seltene Krankheit besteht in multiplen zahlreichen Tumoren des Knochenmark der verschiedenen Knochen, namentlich der Rippen, Schädelknochen und der Wirbelsäule, die anfangs nur unbestimmte Symptome wie Neuralgien und Druckempfindlichkeit der Knochen bewirken, später zu Auftreibungen und zu Spontanfrakturen derselben führen. Eine frühzeitige Diagnose ist oft durch das Auftreten des sog. Bence - Joneschen Eiweißkörpers im Harn möglich, der beim Erwärmen ausfällt, um beim Kochen wieder in Lösung zu gehen. Das Röntgenbild der Knochen zeigt zahlreiche rundliche Aufhellungen. Die Geschwülste bestehen teils aus Knochenmarkszellen, teils aus Lymphocyten. Das Blutbild zeigt, abgesehen von Anämie keinen typischen Befund. Die Kranken gehen schließlich an allgemeiner Kachexie zugrunde. Die Therapie ist rein symptomatisch.

### Bantische Krankheit.

Die Bantische Krankheit ist ein seltenes Krankheitsbild, das durch Milztumor, Anämie, Lebercirrhose, Ascites und Kachexie ausgezeichnet ist. Das oft über Jahre sich erstreckende Leiden läßt mitunter drei Abschnitte erkennen, und zwar zuerst eine anämische Periode, eine zweite mit Lebervergrößerung und eine dritte mit Entwicklung von Ascites. Das Blutbild zeigt eine progrediente sekundäre Anämie und Leukopenie. Die histologische Untersuchung der Milz ergibt starke Bindegewebsentwicklung mit Schwund der Follikel. Das Endstadium der Krankheit entspricht dem Bild der Lebercirrhose; Magen-Darmblutungen sind dabei häufig. Die Ätiologie der Krankheit ist unklar; in manchen Fällen liegt Lues vor (WaR. +), was bei der Therapie zu berücksichtigen ist. Vereinzelt wurde nach Milzexstirpation Besserung beobachtet.

Zu beachten ist, daß der Bantische Symptomenkomplex einer Reihe anderer seltener Krankheitsbilder ähnlich sein kann, so der chronischen Malaria sowie der chronischen Pfortaderthrombose (frühzeitig Darmblutungen!), bei der ebenfalls Milztumor, Ascites, Anämie und evtl. Leukopenie vorkommen. Auch die isolierte großknotige Milztuberkulose kann diagnostische Schwierigkeiten bereiten, zumal sie ebenfalls sehr chronisch verläuft und mitunter lange Zeit nur wenig Beschwerden verursacht. In einzelnen Fällen wurden dabei erhöhte Erythrocytenwerte beobachtet.

### Paroxysmale Hämoglobinurie.

Die Ausscheidung von gelöstem Hb (also nicht von Erythrocyten) durch die Nieren ist eine Teilerscheinung mancher Intoxikationen mit Blutgiften (vgl. S. 252), sowie ein wichtiges Symptom des Schwarzwasserfiebers (S. 108). Stets geht ihr der Austritt von Hb aus den Erythrocyten in den Gefäßen voraus. Ein anscheinend selbständiges Krankheitsbild ist die als paroxysmale Hämoglobinurie bezeichnete, in einzelnen Anfällen auftretende Erkrankung, die durch Einwirkung von starker Abkühlung sowie intensiven Muskelanstrengungen ausgelöst wird. Unter Schüttelfrost, hohem Fieber, starker Prostration, Erbrechen, Nierenschmerzen wird plötzlich stark bluthaltiger roter oder braunroter Harn ausgeschieden (in welchem höchstens vereinzelte Erythrocyten vorhanden sind). Während des Anfalles besteht starke Verminderung der Lymphocyten und Eosinophilen sowie Blutdrucksteigerung. Die ungefärbten Blutpräparate zeigen auffallend Hb-arme blasse sog. Ponficksche Erythrocyten-Schatten. Der Anfall geht stets schnell wieder vorüber, um sich nach einiger Zeit zu wiederholen. In der Zwischenzeit herrscht völliges Wohlbefinden. In der Regel ist eine Lues vorhanden; die WaR. ist oft positiv.

Lokal läßt sich bei den Pat. auch in der anfallsfreien Zeit Hämolyse künstlich in der Weise hervorrufen, daß man einen abgeschnürten Finger in Eiswasser und hernach in lauwarmes Wasser taucht; das Serum des aus dem Finger entnommenen Blutes enthält dann gelöstes Hb. Eine Erklärung des Wesens der Krankheit ist die Tatsache, daß sich im Serum der Pat. auch in der Zwischenzeit ein komplexes

Hämolysin findet, das sich nur in der Kälte mit den Erythrocyten verbindet, um sie in der Wärme zu lösen. Therapie: Im Anfall Analeptica; im übrigen anti-  
luetische Kur. Prophylaxe: Schutz vor starker Abkühlung und körperlicher Anstrengung.

### Hämorrhagische Diathesen.

Unter hämorrhagischen Diathesen versteht man Krankheitszustände, die durch eine ausgesprochene Neigung zu multiplen Blutungen in die Haut, in die Schleimhäute, die Serosae, die Gelenke, den Augenhintergrund usw. ausgezeichnet sind. Sie umfassen ätiologisch sehr verschiedenartige Krankheitsgruppen und beruhen teils auf fehlerhafter Zusammensetzung des Blutes, teils auf pathologischer Veränderung der Gefäßwände. Die Neigung zu Hämorrhagien ist oft nur ein Symptom anderer schwerer Erkrankungen, so bei Blutkrankheiten wie bei Leukämie, perniziöser Anämie, bei Sepsis, Variola, Scharlach, Typhus, Masern, ferner bei Cholämie und Urämie, wobei es sich teils um toxische Schädigung der Gefäßwand oder wie bei den Leukämien gelegentlich daneben auch um Infiltrate derselben handelt; in anderen Fällen steht die Neigung zu Blutungen im Mittelpunkt des Krankheitsbildes wie bei den hämorrhagischen Diathesen im engeren Sinne. Zu ihnen gehören die Hämophilie, die Purpura haemorrhagica (Morb. Werlhof) einschließlich der Peliosis rheumatica, schließlich Skorbut und Barlowsche Krankheit.

Die **Hämophilie** (Bluterkrankheit) ist eine exquisit erbliche Konstitutionskrankheit bzw. Krankheitsbereitschaft (Diathese), die ausschließlich männliche Individuen befällt, und zwar von den Frauen in Bluterfamilien auf die männliche Nachkommenschaft übertragen wird. Sie pflegt bereits in der Kindheit in die Erscheinung zu treten und zwar in Form von Blutungen in der Haut, in den Schleimhäuten, den Muskeln und Gelenken, in der Regel nach geringfügigen Traumen, seltener spontan. Die Abnabelung, der Zahnwechsel, das Einziehen von Ohr-  
ringen, die Circumcision und vieles andere kann zu äußerst hartnäckigen, tagelang anhaltenden Blutungen Anlaß geben. Namentlich Schleimhautwunden zeigen hochgradige Blutungstendenz. Oft besteht hartnäckiges Nasenbluten. Bisweilen wird die Hämophilie zuerst anläßlich einer Operation entdeckt. Die häufigen blutigen Gelenkergüsse, die das Knie- und Fußgelenk bevorzugen und sich in plötzlicher schmerzhafter Schwellung mit Fieber äußern, können die einzige Manifestation der Hämophilie bilden und dann irrtümlich zu chirurgischen Maßnahmen verleiten. Kommt es nicht zu völliger Resorption des Blutes, so kann das Gelenk besonders nach wiederholter Blutung schließlich ankylosieren.

Krankheitsverlauf: In den schwersten Fällen erliegen die Kranken oft bereits im jugendlichen Alter einer tödlichen Blutung; bei weniger hochgradiger Blutungsdiathese kommt es, namentlich bei sorgfältiger Vermeidung aller schädlichen Momente nur in größeren Abständen und in geringerem Maße zu Blutungen, bis allmählich etwa vom 4.—5. Decennium die Neigung zu Hämorrhagien mehr und mehr abnimmt. Nach nicht allzu schweren Blutungen pflegen sich die Patienten relativ schnell wieder zu erholen.

Der morphologische Blutbefund ist in der Regel normal, mitunter findet sich eine sekundäre Anämie als Folge der Blutungen.

Die Blutplättchen sind nicht vermindert, oft vermehrt. Die Gerinnungsfähigkeit des Blutes ist dagegen stark verzögert, was aus einer Verminderung des Gerinnungsfermentes, der Thrombokinas, bei normalem Fibrinogengehalt des Blutes erklärt wird; unmittelbar nach schweren Blutungen ist die Gerinnung normal. Das Rumpel-Leedesche Phänomen ist negativ.

Therapie: Abgesehen von den gewöhnlichen Mitteln lokaler Blutstillung (Eisenchloridwatte, Tampons mit Gelatine bzw. 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub> Adrenalin, Glühisen) ist vor allem die Applikation von frischem menschlichen Blutserum wirksam, und zwar lokal als Tampon auf die blutende Stelle sowie 10—20 ccm wiederholt subcutan. In Ermangelung von menschlichem Serum evtl. Diphtherieheilerum. Lokal ist schließlich auch das aus Blutplättchen hergestellte Koagulum sowie das Clauden (Lungenpreßsaft) bisweilen von Erfolg. Empfohlen werden auch kleinere Aderlässe, die die Gerinnungsfähigkeit des Blutes steigern. Venenpunktionen sind übrigens bei Hämophilie ungefährlich.

Die Prophylaxe bei der Hämophilie besteht vor allem im Vermeiden aller, auch der geringfügigsten Traumen (bei Kindern Turnverbot), sowie im Zusammenhang damit aller Berufsarten, die stärkere körperliche Betätigung verlangen. Operative Eingriffe auch harmloser Art sind nur bei absoluter Notwendigkeit erlaubt. Eheverbot für Frauen aus Bluterfamilien mit Rücksicht auf die männliche Nachkommenschaft.

Die **Purpuraerkrankungen** sind durch das Auftreten zahlreicher kleiner Blutungen in der Haut, z. T. auch in den Schleimhäuten ausgezeichnet, wobei im Gegensatz zur Hämophilie die Petechien von vornherein multipel auftreten. Bei ausgedehnten Blutungen in der Haut kann diese ein Aussehen wie ein Leopardenfell erhalten. Bei der **Purpura simplex** bilden das hämorrhagische Exanthem sowie eine leichte Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens die einzigen Krankheitserscheinungen, die nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Die Petechien sind oft auf die unteren Extremitäten beschränkt. Der Blutbefund ist normal. Bei jeder Purpura denke man stets an die Möglichkeit einer latenten Blutkrankheit (z. B. Leukämie), versäume daher niemals die Blutuntersuchung; auch ist auf Leberaffektionen sowie ferner auf Sepsis zu fahnden.

In manchen Fällen ist die Purpura mit multiplen Gelenkschwellungen kombiniert, wobei erstere gleichzeitig mit letzteren oder bisweilen schon vorher erscheint. Diese sog. **Purpura oder Peliosis rheumatica** ist von der echten Polyarthrit mit sekundär sich entwickelnder hämorrhagischer Diathese zu unterscheiden. Auch pflegen die Allgemeinerscheinungen, speziell das Fieber, weniger ausgeprägt als bei Polyarthrit zu sein, letzteres kann völlig fehlen.

Bei der als **Henoche'sche Purpura** oder *Purpura abdominalis* bezeichneten schweren Krankheitsform treten außer Hautblutungen und Gelenksbeschwerden stärkere Magen- und Darmblutungen auf, die oft von heftigen Koliken begleitet sind. (Okkultes Blut im Stuhl läßt sich indessen öfter auch bei den anderen Purpuraformen nachweisen.) Auch hämorrhagische Nephritis wird beobachtet. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Formen ist hier der Verlauf oft sehr schwer und führt mitunter zu tödlichem Ausgang.

Während bei den bisher beschriebenen Purpuraerkrankungen der Blutbefund völlig normal ist, zeigt die folgende Krankheitsgruppe ein abweichendes Verhalten.

Die **chronische intermittierende Purpura** (*Morbus maculosus Werlhofii*), die klinisch große Ähnlichkeit mit der Hämophilie zeigt

und sich wie diese durch ihre Neigung zu Haut- und Schleimhautblutungen, Menorrhagien, Nasenbluten, Nierenblutungen auszeichnet, im Gegensatz zur Hämophilie aber auch Frauen befällt, ist durch eine starke Verminderung der Blutplättchen, Verzögerung der Blutungszeit, mangelhafte Retraktion des Blutkuchens, dagegen eine normale Blutgerinnung *in vitro* gekennzeichnet. Sie wurde auch als **Thrombopenie** bezeichnet. Der Verlauf der Krankheit, die sich oft bis in die Kindheit zurückverfolgen läßt, zeigt häufig spontane Schwankungen mit Perioden der Besserung und Verschlimmerung und pflegt sich auf viele Jahre zu erstrecken. Im Stadium der Latenz hat der stark positive Ausfall des Rumpel-Leedeschen Phänomens diagnostische Bedeutung. Oft ist die Milz etwas vergrößert. Einzelne Fälle führen schließlich unter extremer Anämie zum Tode.

Mitunter findet sich starke Verminderung der Blutplättchen auch als Begleiterscheinung anderer Bluterkrankungen, z. B. bei schwerer, speziell perniziöser Anämie usw., wo dann oft, wenn auch nicht immer, Zeichen von hämorrhagischer Diathese bestehen.

Auch die **Purpura fulminans**, eine akut tödlich verlaufende Form der hämorrhagischen Diathese steht der Thrombopenie nahe, wenn es sich auch oft lediglich um ein Symptom einer foudroyanten Sepsis oder einer akuten Leukämie handelt.

**Therapie der Purpuraerkrankungen:** In jedem Fall Betruhe während des Bestehens der Petechien und Blutungen. Medikamentös versuche man Calcium innerlich, z. B. als Calc. chlorat. oder das besser schmeckende Calc. lact. mehrmals täglich 1,0 in Lösung oder Kalzantabletten 6—8 mal tgl.; ferner Seruminjektionen wie bei Hämophilie sowie Gelatina sterilis. pro inject. Merck mehrmals 10 ccm subcut. Vorübergehend blutstillend wirken auch intravenöse Injektionen von 10% NaCl-Lösung (1 ccm) sowie von Euphyllin (1 Ampulle). Bei den Fällen mit Thrombopenie wurde bisweilen Besserung nach Milzextirpation beobachtet.

## Skorbut.

Der Skorbut nimmt unter den hämorrhagischen Diathesen eine Sonderstellung ein, sowohl wegen der Ätiologie wie hinsichtlich seines eigenartigen Krankheitsbildes. Zu den Avitaminosen gehörig entsteht er unter dem Einfluß einseitiger Kost, in welcher die frischen Vegetabilien fehlen; er beruht also auf qualitativer Unterernährung.

Hieraus erklärt sich, daß man gehäuftes Auftreten von Sk. bei Schiffsbesatzungen (Polarexpeditionen), in Gefängnissen usw. beobachtete und auch im vergangenen Weltkrieg Sk. an einzelnen Punkten epidemieartig auftrat. Durch vitaminfreie Ernährung gelang es auch experimentellen Sk. bei Meerschweinchen zu erzeugen. Antiskorbutische Stoffe (sog. Vitamin C) enthalten frische Kartoffeln, frisches Gemüse, namentlich Kopfsalat, Spinat, Löwenzahn, Karotten, auch Weißkohl, Zwiebeln, Knoblauch, Radieschen, ferner Obst (Citronensaft), dagegen nicht die Leguminosen. Längeres Lagern, ferner Trocknen (Dörrgemüse) und Konservieren wie z. B. beim Sauerkohl, zum Teil auch Kochen zerstört die antiskorbutische Wirkung. Hiermit hängt das Auftreten des Sk. im Frühjahr nach vegetabilienarmen Wintern zusammen.

Das Krankheitsbild ist durch Erkrankung des Zahnfleisches, Blutungen in der Haut, im Muskel und bei jugendlichen Individuen durch gewisse Skelettveränderungen charakterisiert. Diesen Symptomen geht meist eine Prodromalperiode voraus, die zum Teil durch Störungen

des Allgemeinbefindens, mitunter Nachtblindheit ausgezeichnet ist, in vielen Fällen aber völlig latent bleibt. Sie kann mehrere Monate dauern.

Die sehr häufigen, aber nicht absolut konstanten Veränderungen des Zahnfleisches bestehen in Schwellung und Auflockerung desselben und erhöhter Vulnerabilität, so daß es leicht zu Blutungen und Ulcerationen kommt; sie finden sich nur dort, wo Zähne vorhanden sind (fehlen bei Zahnlosen) und beginnen häufig in der Gegend der Schneidezähne. Drüenschwellungen fehlen dabei. Nicht immer bildet die Gingivitis das erste Krankheitssymptom.

Die Muskelblutungen befallen mit Vorliebe die unteren Extremitäten, speziell die Wadenmuskeln, seltener die Arm- und Rumpfmuskeln. Die bei größeren Blutungen sichtbaren und als Verhärtungen palpablen Hämatomate verursachen Schmerzen, die oft zunächst einen „Rheumatismus“ vortäuschen; die Haut darüber erscheint gespannt und glänzend, das Gehen ist erschwert und erfolgt bei größeren Blutungen oft mit gebeugten Knien und Spitzfußstellung (Tänzerinnengang).

Die Hautblutungen zeigen auch hier Vorliebe für die unteren Extremitäten, und zwar sind sie hauptsächlich an den Haarbälgen lokalisiert; letztere treten häufig reibeisenartig hervor (Lichen scorbuticus) Stark behaarte Individuen zeigen besonders zahlreiche Haarbalgblutungen; das Gesicht wird nie befallen. Außerdem finden sich gelegentlich, namentlich an den Beugeseiten, größere Suffusionen. Bei der Abheilung zeigen die Hautblutungen die verschiedensten Farbentöne wie blauviolett, grüngelb und schließlich braun. Bisweilen vorhandene Periostblutungen sind meist traumatischen Ursprungs. Das Rumpelleedesche Phänomen ist stark positiv.

Fiebersteigerungen pflegen mit dem Auftreten neuer Blutungen zusammenzufallen. Das Blut zeigt keine wesentliche Abweichung von der Norm, mitunter sekundäre Anämie, ferner relative Lymphocytose, normale Gerinnung. Ein Milztumor fehlt. Ebenso gehören stärkere Blutungen an den inneren Organen nicht zum Krankheitsbilde. Bei jugendlichen Pat. entstehen bisweilen an der Knorpelknochengrenze der unteren Rippen Blutungen mit Infraktionen (Krepitieren), Schwellung und Druckempfindlichkeit sowie Ähnlichkeit mit dem rachitischen Rosenkranz und Auseinanderweichen der unteren Thoraxappertur.

Bei Fortschreiten des Leidens verwandelt sich das Zahnfleisch in dicke bläulichrote blutende Wülste mit schmierig belegten Ulcerationen namentlich in der Nachbarschaft kariöser Zähne. Spirochäten und fusiforme Bacillen finden sich in den Geschwüren (vgl. Plaut-Vincentische Angina, S. 62). Lockerung der Zähne, starker Foeter ex ore und Erschwerung der Nahrungsaufnahme sind regelmäßige Folgeerscheinungen. Die großen Muskelhämatomate werden bindegewebig organisiert und verwandeln sich in brettharte, mit glänzender Haut überspannte Sklerosen, die zu Kontraktur und hochgradiger Muskelatrophie oft mit lokaler Ödembildung führen und insbesondere bei den Beinmuskeln infolge der Gehstörung nicht selten dauernde Invalidität bewirken. Viele Pat. gehen an interkurrenten Infektionskrankheiten, Tuberkulose usw. zugrunde.

Die diätetische Therapie, die bei dem ersten Auftreten der Symptome einzusetzen hat und in der Verabreichung der genannten antiskorbutischen Kost besteht, hat ausnahmslos einen glänzenden Erfolg, der bereits nach wenigen Tagen bemerkbar wird. Die Behandlung der Stomatitis erfordert Pinseln mit Jod und Myrrhentinktur, Spülungen mit  $H_2O_2$ , Entfernung des Zahnsteins sowie bei Ulcerationen lokal Neosalvarsan. Ältere Muskelhämatome werden mit feuchten Katalpasmen und heißer Luft, die Contracturen durch Massage und Übungstherapie behandelt.

## Möller-Barlowsche Krankheit.

Die Barlowsche Krankheit ist eine zu den hämorrhagischen Diathesen gehörende Kinderkrankheit der ersten beiden Lebensjahre. Sie wird ausschließlich bei künstlich ernährten Kindern beobachtet, speziell nach Verabreichung durch längeres Erhitzen sterilisierter Milch, kommt dagegen nie bei Brustkindern vor. Die heilende Wirkung von roher Milch bzw. Muttermilch beweist, daß es sich wie beim Skorbut um eine Avitaminose handelt. Die Krankheit wird daher auch als kindlicher Skorbut bezeichnet<sup>1)</sup>.

Die schleichend beginnende Krankheit äußert sich vornehmlich in schmerzhaften Schwellungen des unteren Teils der Oberschenkel, die bei Bewegungen und schon bei leichtem Druck sehr empfindlich sind; sie zeigen das sog. „Hampelmannphänomen“: Umfassen der distalen Epiphyse unter leichtem Druck bewirkt sofort Spreizen und Anziehen der Beine und Heben der Schultern. Später entwickeln sich ausgedehnte subperiostale Hämatome. Bei Fortschreiten der Krankheit greift dieselbe auf die Epiphysen der oberen Extremitäten, die Knorpelknochengrenze der Rippen sowie schließlich auf die Schädelknochen über; auch kommen Hämatome der Orbita vor. Die Gelenke bleiben frei.

Anatomisch findet sich außer den genannten Periostblutungen eine Umwandlung des normalen Knochenmarks in fasriges, zell- und gefäßarmes sog. Gerüstmark mit mangelhafter Knochenneubildung sowie Infraktions- und Trümmerbildung des brüchigen Knochens an der Knorpelknochengrenze der Epiphyse (sog. Trümmerfeldzone).

Wenn Zähne vorhanden sind, entsteht bisweilen eine Gingivitis wie bei Skorbut. Auch Haut- und Schleimhautblutungen kommen vor. Bei schweren Fällen entwickelt sich eine erhebliche Anämie. Schließlich gehen die Kinder an dauernd sich erneuernden Blutungen bzw. Kachexie zugrunde.

Diagnostisch ist abgesehen von dem anamnesticch zu erhebenden Nährschaden u. a. das Röntgenbild von Bedeutung, das die charakteristische Trümmerfeldzone als dunklen Schattenstreifen zeigt, der sich gegen den Knorpel, oft auch gegen die Diaphyse deutlich abgrenzt, sowie später subperiostale, die Diaphyse mantelartig umgebende Blutergüsse.

Die Therapie besteht in Verabreichung guter roher Milch, ev. in Verbindung mit grünen Gemüsen und Fruchtsaft. Der Heilerfolg bleibt dann niemals aus.

## Krankheiten des Verdauungsapparates.

### Krankheiten der Mundhöhle.

**Stomatitis catarrhalis:** Katarrhalische Entzündung der Mundschleimhaut kann sowohl circumscripht als auch diffus auftreten und kommt teils als akute, teils als chronische Erkrankung vor. Prädilektionsorte sind das Zahnfleisch, die Spitze und der Rand der Zunge und die Innenfläche der Wangen. Zu den Ursachen gehören mechanische Schädigungen wie Durchbruch der Zähne, fehlerhafte künstliche Gebisse,

<sup>1)</sup> Allerdings fallen Skorbutepidemien der Erwachsenen bemerkenswerterweise nicht mit gehäuftem Auftreten der Barlowschen Krankheit zusammen.



längerdauernde Mundatmung infolge von Unwegsamkeit der Nase, zu heiße Speisen, chemische Reize wie Tabak, Schnaps, Verätzungen usw., die Hg-Vergiftung (Stomatitis mercurialis) und vor allem bakterielle Noxen. Letztere spielen bei den Stomatitiden im Verlauf der verschiedensten akuten Infektionskrankheiten eine Rolle, besonders bei mangelhafter Mundpflege, zumal hier oft infolge der Apathie der Pat. die normale mechanische Selbstreinigung der Mundhöhle durch lebhaftes Kauen und Bewegen der Zunge fortfällt. Auch Erkrankungen der Nachbarorgane sind meist von Stomatitis begleitet.

Symptome sind Schwellung, Rötung der Schleimhaut, mitunter Abstoßung des Epithels, Schmerzen und Hitzegefühl sowie Trockenheit, oft auch Speichelfluß, belegte Zunge, pappiger Geschmack sowie Foetor ex ore. Die Schleimhautschwellung ist oft an den Zahnimpressionen der Zungenränder und der Wangenschleimhaut zu erkennen. Bei heftigerem Katarrh besteht schleimig-eitriger Belag. Der Allgemeinzustand pflegt nur bei Kindern infolge der gestörten Nahrungsaufnahme stärker zu leiden. Dauer der akuten Stomatitis 8—14 Tage, bei der chronischen Monate oder Jahre.

Therapie: Spülen der Mundhöhle mit Tinct. Myrrh. oder Ratanhia je 10 bis 15 Tropf. auf 1 Gl. Wasser; 1—4%ige Borsäure; Liq. alumin. acet. 5% 1 Eßl. auf 1 Gl. Wasser; 2% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; 1% Kal. hypermangan. 1 Teel. auf 1 Gl. Wasser. Gegen den Schmerz Spülungen mit warmem Kamillen- oder Salbeitee, ev. Eisstückchen. Bei stärkerem Katarrh ev. Pinseln mit Boraxglycerin (Borax 2,5, Glycerin 25,0). Reizlose, flüssige Kost; Tabaksverbot; Beseitigung etwaiger mechanischer ursächlicher Momente.

Die **Stomatitis ulcerosa**, eine mit Geschwürsbildung einhergehende Entzündung der Mundschleimhaut findet sich gelegentlich als Steigerung der gewöhnlichen katarrhalischen Stomatitis, häufiger infolge von gewerblicher oder medikamentöser Hg-Vergiftung sowie als idiopathische infektiöse Erkrankung (Stomacace oder Mundfäule). Letztere, die hauptsächlich bei Kindern beobachtet wird, entwickelt sich namentlich unter ungünstigen hygienischen Verhältnissen, bisweilen epidemisch. Sie befällt vor allem das Zahnfleisch, wo sie als *Gingivitis marginalis* am Rande der Schneidezähne sowie der hintersten Molaren beginnt und mit Geschwürsbildung und schmierig-eitrigem Belag sowie Auflockerung des graurötlich verfärbten, leicht blutenden Zahnfleisches einhergeht. Heftiger Fötor, Speichelfluß, Drüsenschwellungen am Kieferwinkel und Kinn, ev. Zahnausfall sowie mäßige Temperatursteigerung mit geringer Störung des Allgemeinbefindens sind häufige Begleiterscheinungen. Heilung tritt bei Behandlung nach 1—2 Wochen ein. Die gonorrhöische Stomatitis macht ein ähnliches Bild.

Die Therapie ist die gleiche wie oben. Oft empfehlen sich Ätzungen mit Höllenstein oder Jodtinktur; bei starken Schmerzen Applikation von Anästhesipulver.

Ulceröse Gingivitis bzw. Stomatitis wird auch als Begleiterscheinung im Verlauf von anderen schweren Erkrankungen, speziell bei Skorbut, Leukämie, Typhus und schwerer Nephritis beobachtet.

Eine besondere Form schwerster ulceröser Stomatitis mit Übergang in Gangrän ist die seltene als **Noma** (Wasserkrebs) bezeichnete *Stomatitis gangraenosa*,

die bei Kindern mit stark herabgekommenem Ernährungszustand sowie bisweilen im Verlauf mancher Infektionskrankheiten, speziell Masern vorkommt, und zwar ohne erkennbaren äußeren Anlaß. Das Leiden beginnt als kleines schmerzloses Geschwür der Wangenschleimhaut mit graugrünem Belag meist nahe dem Mundwinkel, dehnt sich sehr schnell auch in die Tiefe aus und führt in Kürze zu ausgedehnten Zerstörungen, ev. mit Durchbruch durch die Wange nach außen. Es besteht ein aashafter Fötor. Hohes Fieber bei anfangs nur wenig gestörtem Allgemeinbefinden, zunehmender Kräfteverfall, Benommenheit sowie Pneumonien bzw. Lungengangrän infolge Verschluckens der herabfließenden Jauche stellen sich im weiteren Verlauf ein, der in der Mehrzahl der Fälle tödlich endet. Therapeutisch versuche man möglichst frühzeitig lokal Neosalvarsan, da wiederholt in den Geschwüren Spirochäten und fusiforme Bacillen (vgl. S. 62) gefunden wurden, sowie ev. Kauterisation mit dem Paquelin. Ausgeheilte Fälle hinterlassen starke Narben.

Die **Stomatitis aphthosa** ist eine hauptsächlich Kinder während der 1. Dentition befallende, stets gutartige Affektion der Mundschleimhaut. Sie besteht in multiplen kleinen graugelben leicht erhabenen Flecken bis zu Linsengröße mit rötlichem Hof und führt nicht zu Ulceration. Prädilektionsort sind der Zungenrand, das Zungenbändchen, die Innenfläche der Lippen, auch die Wange. Gleichzeitig ist meist eine katarrhalische Stomatitis vorhanden. Histologisch bestehen die Aphthen aus Fibrin, das in die Epithelschicht eingelagert ist und kleine Pseudomembranen bildet. Nach Abstoßung derselben überhäuten sich die kleinen Erosionen rasch wieder. Schmerz und Temperatursteigerung, bisweilen Konvulsionen, beeinträchtigen das Allgemeinbefinden; die Nahrungsaufnahme, insbesondere das Saugen ist erschwert. Die Krankheit verläuft oft in mehrfachen Schüben, ihre Dauer beträgt nicht selten mehrere Wochen.

Die bei Erwachsenen vorkommenden Aphthen zeichnen sich als chronisch-rezidivierende Form durch hartnäckige Rückfälle aus und erschweren das Kauen und Sprechen. Differentialdiagnostisch denke man an syphilitische Schleimhautplaques, die aber ein weniger durchscheinendes und mehr flächenhaftes Aussehen zeigen, nicht akut beginnen und mit andern luetischen Symptomen vergesellschaftet sind (Wa-R!).

Die sog. Bednarschen Aphthen des Säuglings sind harmlose kleine weißliche Efflorescenzen am harten Gaumen zu beiden Seiten der Mittellinie, die durch das Saugen mechanisch erzeugt werden.

Die Therapie der Aphthen besteht in Mundspülungen mit Salbeitee, Kaliumpermanganat. (s. oben), Pinseln mit Boraxglycerin bzw. Ätzen mit dem Lapisstift oder mit Chromsäure. Bei starken Schmerzen Einpinseln mit 2% Kokain.

**Soor** ist eine durch den Sporpilz (*Oidium albicans*) hervorgerufene Erkrankung der Mundschleimhaut, die sich bei schlecht gepflegten bzw. unsauber gehaltenen Kindern, aber auch bei Erwachsenen mit chronischen, zu Marasmus führenden Leiden (Phthise, Carcinom) einstellt. Sie beginnt an Zunge, Gaumen oder Wangen in Form kleiner punktförmiger grauweißlicher Beläge, die sich anfangs wegwischen lassen; die Schleimhaut zeigt leichte Schwellung und Rötung, beim Fortschreiten dehnt sich der Prozeß zu größeren zuerst weißen, später gelbbraunlichen Rasen aus. Zugleich besteht Stomatitis. Die Diagnose ist ohne weiteres aus dem mikroskopischen Befund der ohne Verletzung

leicht abhebbaren Auflagerungen zu stellen, die massenhaft verzweigte Pilzfäden sowie stark glänzende, den Hefezellen ähnliche Sporen enthalten. Saure Reaktion des Speichels ist Vorbedingung für die Entwicklung des Pilzes. Mitunter breitet er sich bis zum Kehlkopfengang und in die Speiseröhre aus, während die mit Zylinderepithel versehene Schleimhautabschnitte frei zu bleiben pflegen. Beschwerden fehlen oft vollständig oder sind durch die begleitende Stomatitis verursacht. Bei schwächlichen Säuglingen können sich schwerere Zustände mit Diarrhöen einstellen, während bei gesunden Kindern die Pilzerkrankung ziemlich harmlos ist. Bei Erwachsenen ist sie ein Zeichen des schweren Darniederliegens des Organismus. In seltenen Fällen wurden Soor-metastasen im Gehirn beobachtet.

Die Therapie besteht in sorgfältigem Mundspülen namentlich nach der Nahrungsaufnahme und nach Erbrechen sowie Pinseln der erkrankten Stellen mit Boraxglycerin oder 3—5% Natr. bicarb.-Lösung, bei hartnäckigen Fällen mit 0,1%<sub>00</sub> Sublimat.

### Krankheiten der Zunge.

Zu den häufigsten Veränderungen gehört der **weiße Belag** der Zunge; an den hinteren Abschnitten derselben ist er bedeutungslos, da er dort auch in der Norm vorkommt, während sein Vorhandensein auf der vorderen Zunge pathologisch ist. Er besteht aus abgestoßenen Epithelien, Schleim, Leukocyten, Nahrungsresten und Pilzen und läßt sich in einzelnen Fetzen mit einem stumpfen Spatel abheben. Der pathologische Belag ist dicker und enthält mehr Bakterien. Er findet sich sowohl bei fieberhaften Allgemeinerkrankungen verschiedenster Art, z. B. bei Typhus, wo er sich in schweren Fällen in eine braune lederartige Schicht verwandelt; ferner vor allem bei Erkrankungen der Verdauungsorgane, speziell bei akutem und chronischem Magenkatarrh, wogegen er bei Hyperacidität, Ulcus ventriculi und Carcinom zu fehlen pflegt. Belegte Zunge wird auch bei manchen nervösen Dyspepsien beobachtet.

↘ Eine erhebliche diagnostische Bedeutung hat die Verminderung der Feuchtigkeit der Zunge. Insbesondere bei septischen sowie schweren fieberhaften abdominalen Krankheitsbildern, speziell bei Peritonitis verrät sich meist schon im Beginn der Krankheit bzw. bei einer Verschlimmerung der Ernst des Zustandes durch Trockenwerden der Schleimhaut, und zwar zunächst im Bereich eines mittleren Streifen des Zungenrückens.

Atrophie der Zungenschleimhaut, die an der auffallend glatten Beschaffenheit derselben erkannt wird, findet sich häufig bei perniziöser Anämie sowie bei Lues III, wo sich aber die Atrophie bisweilen auf die Papillae circumvallatae am Zungengrunde beschränkt. (Man versäume daher niemals die Untersuchung dieser Gegend mit dem Kehlkopfspiegel!)

**Akute Glossitis**, eine diffuse oder circumscriphte entzündliche Infiltration der Zunge im Anschluß an Verletzungen, Verätzungen, Insektenstiche usw. kann in schwereren Fällen starke Schwellung mit Erschwerung der Nahrungsaufnahme und sogar der Atmung bewirken

und zur Bildung eines Abscesses führen, der, falls er sich nicht wie häufig spontan öffnet, einen chirurgischen Eingriff erfordert.

Die **Lingua geographica** (*Psoriasis linguae*) beruht auf circumscripter Verdickung des Epithels und teilweiser Abstoßung desselben, so daß glänzend rote und weiße Partien nebeneinanderliegen und eine landkartenartige Zeichnung bedingen, die während langer Zeiträume zu bestehen pflegt und sich namentlich bei Individuen mit exsudativer Diathese findet. Klinisch ist sie bedeutungslos. Ihr nahe steht die **Leukoplakie** der Mundhöhle. Man versteht darunter weiße Schleimhautflecke oft von über Markstückgröße, die scharf begrenzt, von glänzend weißer oder grauweißer Farbe und zum Teil etwas erhaben sind und meist multipel in der Schleimhaut der Wange, der Zunge oder der Lippen, selten am Gaumen vorkommen. Als chronisches Leiden findet sie sich bei Rauchern, bei *Lues inveterata*, sowie chronischen Verdauungsstörungen. Die nicht selten heftigen Beschwerden, die namentlich beim Kauakt auftreten, machen eine Behandlung notwendig, zumal sich mitunter daraus später Carcinome entwickeln: Ätzung mit Milchsäure oder 10% Chromsäure (nicht *Argent. nitric!*), reizlose Kost, sorgfältige Mundpflege, Rauchverbot.

Die **Lingua dissecata** ist eine angeborene Anomalie, die in dem Vorhandensein kreuz- und querverlaufender Furchen und Falten der Zungenoberfläche besteht, die aber meist keine Beschwerden verursachen. Bei besonderer Tiefe der Furchen spricht man von *Lingua scrotalis*. Bisweilen entstehen in den Furchen schmerzhaft Erosionen und kleine Ulcera, die mit dem Lapisstift oder Chromsäure zu ätzen sind.

Bei der seltenen **Melanotrichia** oder **Nigrities linguae** (schwarze Haarzunge) entsteht auf dem Zungenrücken ein allmählich an Größe zunehmender dunkler Fleck, der scheinbar mit schwarzen Haaren, d. h. mit stark verlängerten verhornten und pigmentierten Papillae filiform. besetzt ist und ein harmloses Leiden darstellt. Ätiologie unbekannt. In vereinzelten Fällen fand man mikroskopisch einen schwarzen Pilz (*Mucor niger*). Die geringen Beschwerden bestehen in Trockenheit, üblem Geschmack und Foetor ex ore. Therapie: scharfer Löffel, Ätzung mit Lapisstift oder 10% Sublimat, Pinseln mit 5% Salizyläther.

## Krankheiten der Speicheldrüsen.

**Entzündungen der Speicheldrüsen** befallen vor allem die Parotis (vgl. Parotitis, S. 59). Nicht selten finden sich Konkremente im Ductus parotid., die zeitweise dessen Lumen verlegen und zu Schwellung der Drüse, meist ohne Vereiterung führen. Sie bestehen aus  $\text{CaCO}_3$ . Die Schwellung der Parotis pflegt nach einigen Tagen wieder abzuklingen. Oft bleiben die Konkremente völlig latent; bisweilen kann man sie palpatorisch oder durch Einführung einer Sonde in den Ductus, am sichersten durch Röntgenuntersuchung feststellen. Wegen der Möglichkeit erneuter Entzündung sind die Speichelsteine chirurgisch zu entfernen.

Auch die Submaxillar- und Sublingualdrüsen können, wenn auch erheblich seltener, sich entzünden bzw. vereitern, teils im Anschluß an Stomatitis, teils infolge von Konkrementen.

Eine sehr ernste Folgeerscheinung der Vereiterung der Submaxillar-drüse ist die als **Angina Ludovici** bezeichnete phlegmonöse Entzündung des Mundbodens, die sich durch eine unter hohem Fieber sich ausbreitende, sehr schmerzhaftige Schwellung und Rötung der Gegend zwischen den Unterkieferästen und dem Zungenbein zu erkennen gibt, das Kauen, Schlucken und Sprechen infolge des Druckes der Zunge vom Mundboden gegen den Gaumen stark erschwert und durch Fortschreiten zu Glottisödem mit Atemnot, in manchen Fällen zu Gangrän der Weichteile bzw. Sepsis führt. Mortalität über 50%. Rechtzeitige chirurgische Hilfe ist unerlässlich.

**Anomalien der Speichelsekretion:** Speichelfluß (Ptyalismus, Salivation) tritt als Folge mechanischer Reize, z. B. beim Zahnen, ferner als Symptom verschiedener Intoxikationen wie Jod-, Hg- usw. Vergiftung ein, häufig in der Gravidität sowie bei Hysterie. Der Flüssigkeitsverlust kann so beträchtlich sein, daß es zur Verminderung der Harnmenge kommt. Therapeutisch ist am wirksamsten Atropin 3 mal tgl. 1 Pille zu  $\frac{1}{2}$  mg. Verminderung bzw. Versiegen der Speichelsekretion (Aptyalismus) ist selten, findet sich bei Nervenleiden, auf psychogener Grundlage sowie verursacht durch entzündliche Prozesse. Es besteht lästige Trockenheit im Munde (Xerostomie). Man versuche Faradisieren der Parotis sowie Pilokarpin (subkut. 5 mg, allmählich steigend oder von einer 2% Lösung 2 mal tgl. 5, steigend auf 10 Tropf.).

### Krankheiten des Rachens.

**Vorbemerkungen:** Der Rachen zerfällt anatomisch in den Nasen- und den Mundrachen. Ersterer gehört zum Cavum pharyngo-nasale und besitzt eine mit cylindrischem Flimmerepithel überzogene Schleimhaut, während der Mundrachen mehrschichtiges Pflasterepithel hat, das sich in den Ösophagus fortsetzt. Die Rachenschleimhaut enthält in großer Menge Lymphadenoidgewebe in Form von Lymphknötchen. Im übrigen vgl. S. 65.

**Pharyngitis** (Rachenkatarrh) kommt in akuter und chronischer Form vor. Der akute Katarrh tritt oft als Begleiterscheinung des S. 189 und 192 beschriebenen Katarrhs der oberen Luftwege auf bzw. leitet häufig eine katarrhalische Rhinitis ein. Außerdem stellt er sich nicht selten im Verlauf verschiedener akuter Infektionskrankheiten, ferner bei gewissen Intoxikationen (Jod, Hg) ein, endlich entsteht er infolge von mechanischen und chemischen Reizen. Beschwerden sind vor allem lästiges Kratzen und Trockenheitsgefühl im Hals. Objektiv sind Rötung und Schwellung der Schleimhaut sowie Schleim- und Eitersekretion in wechselndem Maß vorhanden.

Die Notwendigkeit einer Behandlung besteht nur bei heftigen Beschwerden: Gurgeln mit warmem Kamillentee oder Tinct. Ratanhiae (15 Tropf. auf 1 Gl. Wasser), wenn auch der Vorteil des Gurgelns meist überschätzt wird; sowie Inhalieren mit Emser oder NaCl-Lösung oder bei sehr heftigen Beschwerden mit einer anästhesierenden Lösung z. B. Cocain 0,1, Bromnatr. 5,0 auf 200,0 Aqua dest.

Die **chronische Pharyngitis** ist ein sehr häufiges Leiden. Sie entsteht vor allem unter der Einwirkung chronischer Schädlichkeiten, in erster Linie bei Rauchern sowie Schnapstrinkern, weiter als Berufskrankheit bei Lehrern, Sängern, Ausrufnern, fast regelmäßig ferner bei dauernder Mundatmung infolge von Unwegsamkeit der Nase. Häufig ist sie Begleiterscheinung einer chronischen Rhinitis bzw. Laryngitis.

Die Symptome beschränken sich auf lokale Beschwerden, bestehen in Kratzen, Brennen und Trockenheitsgefühl im Hals, häufigem Zwang zum Räuspern und oft trockenem Reizhusten namentlich morgens, mitunter mit spärlichem schleimigem Auswurf. In zahlreichen Fällen bemerkt der Pat. den Katarrh erst bei akuten Verschlimmerungen. Objektiv konstatiert man einen Katarrh der hinteren und seitlichen Pharynxwand mit abnorm starker Rötung der Schleimhaut, erweiterten und geschlängelten Venen, eingetrockneten Schleimborken sowie häufig Foetor ex ore. Oft sind die Seitenstränge geschwollen. Bei der Pharyngitis granularis bewirkt die Schwellung der Follikel zahlreiche kleine graue, etwas prominente Knötchen, die mitunter ulcerieren. Der hypertrophische Katarrh ist bei jugendlichen Pat. oft mit erheblicher Wucherung des lymphatischen Gewebes in Form der adenoiden Vegetation (vgl. S. 64) vergesellschaftet. Der atrophische Katarrh (Pharyngitis sicca) ist durch eine blasse wie lackierte aussehende Schleimhaut charakterisiert. Sie kommt bisweilen zusammen mit atrophischer Rhinitis vor und findet sich u. a. bei Individuen mit chronischen konsumierenden Krankheiten.

Die Therapie der chronischen Pharyngitis besteht im Fernhalten der genannten Schädlichkeiten, Beseitigung eines etwaigen Nasenleidens sowie in lokaler Behandlung: Pinseln mit Mannischer Lösung (vgl. S. 191) oder 10% Argent. nitric., 10—20% Tanninlösung; vor dem Pinseln ist das Sekret stets sorgfältig zu entfernen. Nasenspray sowie Spülungen der Nase mit 1% Borsäure wirken oft günstig. Bei der hypertrophischen Phar. haben oft wiederholte Ätzungen namentlich auch der Seitenstränge mit Chromsäure oder Trichloressigsäure Erfolg. Kuren in Badeorten (Inhalieren, Gradierwerke, Trinkkur) wie Ems, Kreuznach, Soden i. T., Reichenhall, Salzungen usw. wirken namentlich bei wiederholter Anwendung günstig.

Der **Retropharyngealabsceß** ist eine hauptsächlich bei Kindern in den ersten Lebensjahren auftretende eitrige Entzündung zwischen der Wirbelsäule und der hinteren Wand des Pharynx, die sich teils im Anschluß an eine Caries der Halswirbel, teils als idiopathisches Leiden bzw. metastatisch bei akuten Infektionskrankheiten entwickelt, wobei Ausgangspunkt der Entzündung hinter dem Pharynx in der Höhe des 2. und 3. Halswirbels gelegene Lymphdrüsen sind. Symptome sind hohes Fieber, zunehmende Erschwerung des Schluckens sowie Atemnot und Stridor durch Druck auf den Larynx, auch Cyanose. Wie bei der Gaumensegellähmung kommt es öfter zum Regurgitieren von Flüssigkeit durch die Nase sowie zum Fehlschlucken. Sichere Zeichen sind vor allem Vorwölbung der Rachenwand mit palpatorisch wahrnehmbarer Fluktuation, ferner starke Drüsenschwellung am Kieferwinkel und Steifigkeit der Wirbelsäule. Bei nicht rechtzeitiger Entleerung des Abscesses durch Incision (bei hängendem Kopf wegen Aspirationsgefahr) besteht die Möglichkeit einer Mediastinalphlegmone oder bei Spontanaufbruch Erstickungsgefahr durch Eiteraspiration; bei rechtzeitigem Eingriff ist die Prognose günstig. Bei Senkungsabszessen infolge von Wirbelkaries empfiehlt sich mehr die Eröffnung von außen am Hals.

## Krankheiten des Ösophagus.

Vorbemerkungen: Der Ösophagus reicht von der Höhe des 6. Halswirbels hinter dem Ringknorpel bis zum 11. Brustwirbel; er hat eine Länge von ca. 25 cm, von denen 2—3 cm auf den Abschnitt zwischen Zwerchfell und Kardia entfallen. Im Thorax verläuft er im Mediastinum postic., wo er den Aortenbogen und den linken Hauptbronchus kreuzt, ferner mit den Nn. recurrent. bis zur Bifurkation der Trachea, mit dem linken Lungenhilus und dem linken Herzvorhof sowie beiden Pleuren in Berührung kommt. Die Entfernung von der Zahnreihe bis zum Beginn

der Speiseröhre beträgt 15 cm, so daß eine eingeführte Sonde die Kardia in 40—45 cm, die Stelle der Bifurkation in 25 cm Entfernung von den Zähnen erreicht. Das in der Ruhe geschlossene Lumen öffnet sich beim Schlucken bzw. bei Einführung der Sonde; die maximale Weite beträgt etwa 2 cm. Unter den physiologischen Engen des Ösophagus sind praktisch am wichtigsten, weil am stärksten ausgeprägt, diejenige hinter dem Ringknorpel, ferner die in der Höhe der Bifurkation sowie die Stelle des Hiatus oesophageus. Der Schluckakt zerfällt in zwei Phasen, die buccopharyngeale Periode, in welcher der in der Mundhöhle geformte Bissen durch die Zungen- und Zungenbeinmuskulatur (Mylohyoideus und Hyoglossus) in den hinteren Rachenraum und von dort durch die Pharynxmuskulatur in die Speiseröhre befördert wird, und die ösophageale Periode, in der er durch die Peristaltik der Speiseröhre in dieser zur Kardia fortbewegt wird. Die Kardia ist in der Ruhe geschlossen und öffnet sich vorübergehend zum Schlucken. Der Schluckreflex läßt sich besonders von der hinteren Pharynxwand und von der Zungenwurzel auslösen. Der Ösophagus erhält die Impulse für die Peristaltik von den ihm umfließenden Nerven und Ganglien; er steht außerdem unter dem Einfluß des Vagus und Sympathicus. Erregung des Vagus bewirkt Kontraktion der Oes.-Muskulatur und Öffnung der Kardia. Bei Auskultation des Oes. im Epigastrium zwischen Schwertfortsatz und link. Rippenbogen oder hinten neben der Wirbelsäule in der Höhe des 11. Brustwirbels ist kurz nach jedesmaligem Schlucken ein kurzes (bei Flüssigkeiten) plätscherndes sog. Durchspritzgeräusch, sowie häufig nach 5—7 weiteren Sekunden, besonders bei dickflüssigen Speisen, ein etwas länger dauerndes, das sog. Durchpreßgeräusch wahrzunehmen (auch primäres bzw. sekundäres Schluckgeräusch genannt). Verzögerung oder Fehlen des Durchpreßgeräusches deutet auf Stenosierung des Oes. hin. Die beste Methode, um sich über die Lage und Funktion des Oes. ein Urteil zu bilden, ist die Röntgenuntersuchung. Der Pat. schluckt einen „Kontrastbrei“, d. h. Mehlbrei mit Wismutcarbonat oder Bariumsulfat bzw. eine daraus bereitete dünne Emulsion oder einen mit Hg gefüllten Gummischlauch und wird im I. schrägen Durchmesser (vgl. S. 135) in sog. Fechterstellung durchleuchtet. Auf diese Weise kann man das Hinabgleiten der einzelnen Bissen von der Mundhöhle bis in den Magen genau verfolgen. Sondenuntersuchung s. weiter unten. Mit Hilfe des Ösophagoskops vermag man die Schleimhaut der Speiseröhre direkt zu betrachten, doch ist das Verfahren technisch schwierig und für den Pat. sehr unbequem.

### Entzündungen und Ulcerationen des Ösophagus.

Praktisch bedeutungsvoll sind die durch Verschlucken ätzender Substanzen, namentlich von Säuren und Laugen entstehenden Veränderungen, bei denen die Schleimhaut nekrotisch wird und sich in graue oder schwärzliche mit Blut durchsetzte Massen verwandelt (Oesophagitis corrosiva). Bei sehr schwerer Verätzung dringt dieselbe bis in die Muskelschicht und es kann sogar zur Perforation mit konsekutiver eitriger bzw. jauchiger Mediastinitis kommen. In weniger schweren Fällen entstehen oberflächliche Geschwüre oder es stoßen sich die nekrotischen Schleimhautteile in kleineren oder größeren Fetzen ab. Die Beschwerden sind teils gering bzw. treten hinter den übrigen schweren Krankheitserscheinungen zurück, teils bestehen sie in starken Schmerzen, die zum Teil in den Rücken zwischen die Schulterblätter ausstrahlen und namentlich beim Schlucken sich bemerkbar machen, letzteres ist oft völlig unmöglich. Regelmäßig hinterbleiben narbige Verengerungen. Die Therapie besteht anfangs in Narkotica sowie Schlucken von Eisstückchen. Ausschließlich flüssige Kost. Später nach Abklingen der akuten Erscheinungen beginne man rechtzeitig mit Sondierung (s. unten) als Prophylaxe gegen Stenosenbildung.

## Erweiterungen des Ösophagus.

Es gibt diffuse und umschriebene Dilatationen der Speiseröhre. Die **diffuse** Erweiterung kommt vor einmal als Folge einer organischen Verengung der Kardia speziell bei Narbenstenose und bei Kardiocarcinom (s. weiter unten), sodann als funktionelle Störung ohne anatomische Verengung der Kardia, die sog. idiopathische Ösophagusdilatation.

Dieses Leiden, das sich öfters bei Pat. mittleren Alters, häufiger bei Männern findet und oft mit neuropathischer Konstitution vergesellschaftet ist, macht anfangs nur wenig Beschwerden, bisweilen Druckgefühl hinter dem Sternum beim Schlucken; später ist der Schluckakt erheblich gestört, es entsteht das Gefühl des Steckenbleibens des Bissens insbesondere beim Schlucken von festeren Speisen, schließlich regurgitiert Speiseröhreninhalt, da immer nur ein Teil desselben in den Magen gelangt. Charakteristisch ist, daß dies im Gegensatz zu den organischen Stenosen meist nicht sofort, sondern erst einige Zeit bis zu einigen Stunden nach dem Schlucken erfolgt; ferner enthalten die heraufgewürgten Massen keine HCl. Der Grad der Dysphagie zeigt zu verschiedenen Zeiten Schwankungen, die mitunter dem psychischen Verhalten des Pat. parallel gehen. Untersuchung des Oes. mit dicker Sonde ergibt meist eine auffallend leichte Passierbarkeit der oberen Teile, wogegen die Kardia vorübergehend der Öffnung durch die Sonde Widerstand leistet. Sehr charakteristisch ist das Röntgenbild, das eine starke teils spindelförmige, teils sackförmige Erweiterung des Oes. sowie eine nur spärliche Entleerung durch die Kardia zeigt. Das Leiden dürfte teils auf Funktionsstörungen der Oes.-Muskulatur, teils auf nervösen Störungen speziell im Bereich des Vagus beruhen, zumal man bei organischer Schädigung des Vagus, z. B. bei Kompression durch Drüsenpakete mitunter deutliche Motilitätsstörungen am Oes. beobachtet. In vielen Fällen liegt eine abnorme Erregbarkeit des Cardiasphinkter vor (**Kardiospasmus**). Auf die Dauer erfolgt unter dem Einfluß der stagnierenden Massen Reizung und Entzündung der Schleimhaut, die die Dysphagie weiter verschlimmern. Im Verein mit der sich häufig entwickelnden Phobie der Pat. vor weiterer Zunahme der Beschwerden infolge des Essens bewirkt das Leiden auf die Dauer oft gefährliche Grade von Unterernährung.

Therapie: Langsames Schlucken, flüssige und breiige Kost, ev. Sondenfütterung. Bei ausgeprägtem Kardiospasmus Bougierung (z. B. mit der Schreiberschen Dilatationssonde) sowie Nervina wie Brom und psychische Behandlung, ev. Hypnose.

Zu den **circumscripiten** Erweiterungen des Oes. gehören die **Divertikel**, unter denen Traktions- und Pulsionsdivertikel zu unterscheiden sind.

Die **Traktionsdivertikel** sind kleine trichterförmige Ausstülpungen der Wand der Speiseröhre meist vorn, die dadurch entstehen, daß eine mit der letzteren verwachsene Lymphdrüse schrumpft und einen Zug ausübt. Der häufigste Sitz ist die Gegend der Bifurkation. Klinisch machen sie in der Regel keine Erscheinungen, insbesondere ist das Schlucken nicht gestört. Im Röntgenbild präsentieren sie sich als zelt- oder zahnförmige Zipfel. Ausnahmsweise führen sie durch



Perforation zu eitriger Mediastinitis, Pleuritis oder Durchbruch in die Bronchien mit konsekutiver Lungengangrän.

Erheblich seltener sind die **Pulsionsdivertikel**, deren Prädilektionsort die hintere Wand an der Grenze zwischen Pharynx und Ösophagus ist (Zenkersches Divertikel). Sie finden sich vor allem bei älteren Männern und entstehen in der Weise, daß nach Traumen, Steckenbleiben von Fremdkörpern usw. die Oes.-Schleimhaut an umschriebener Stelle sich hernienartig zwischen den Muskelbündeln ausstülpt und schließlich unter dem Druck der vorbeigleitenden und z. T. sich darin fangenden Bissen einen größeren kugel- oder birnförmigen Blindsack bildet, der zwischen Oes. und Wirbelsäule herabhängt. Symptome sind vor allem die mit Zunahme des Divertikels wachsenden Deglutitionsbeschwerden, die darauf beruhen, daß nach der Nahrungsaufnahme es zur Stagnation von Speiseresten im Divertikel kommt, die sofort oder nach einigen Stunden regurgitiert werden (keine HCl nachweisbar!), sowie faulige Zersetzung des Divertikelinhalts mit starkem Fötör entsteht. Außerdem komprimieren große Divertikel, wenn sie stark gefüllt sind, den Oes. von außen und können ihn dadurch für Speisen völlig unwegsam machen. Mitunter bilden sie nach dem Essen vorübergehend einen außen am Halse neben der Luftröhre sichtbaren Tumor. Druck mit der Hand entleert den Inhalt in die Mundhöhle. Bei der Sondierung ist ein wechselndes Verhalten charakteristisch, indem die Sonde einmal alsbald auf Widerstand stößt, weil sie sich im Divertikel fängt, das andere Mal den Oes. glatt passiert. Sehr charakteristisch ist das Röntgenbild, das einen rundlichen, nach unten bogenförmig begrenzten Schatten ergibt. In fortgeschrittenen Fällen kommt es zu hochgradiger Unterernährung, manche Kranke verhungern buchstäblich.

Therapie: Manche Pat. verfügen über eine gewisse Technik, mit Hilfe deren sie wenigstens einen Teil der Nahrung in den Magen gelangen lassen. Wichtig ist die regelmäßige Sondierung des Divertikels, um eine Stagnation zu vermeiden; viele Kranke vermögen sich selbst regelmäßig zu sondieren. Die einzig rationelle Therapie ist die operative Behandlung.

### Verengerungen des Ösophagus

spielen praktisch eine große Rolle. Als Ursachen kommen in Frage am häufigsten Tumoren (Carcinome), ferner narbige Strikturen namentlich nach Verätzungen, im Gefolge luetischer Ulcerationen sowie nach *Ulcus pepticum cardiae*, seltener Kompression des Oes. von außen durch Geschwülste, Drüsenpakete, Aneurysmen, Perikardexsudate sowie Oes.-Divertikel (s. oben), weiter steckengebliebene Fremdkörper sowie endlich Muskelspasmen. Die Stenosen nach Verätzungen lokalisieren sich mit Vorliebe an den physiologischen Engen (s. oben). Druck von außen durch Tumoren usw. pflegt nur eine mäßige, niemals eine vollständige Stenosierung zu bewirken. Die Symptome der Oes.-Stenose sind sehr charakteristisch. Das Schlucken ist in zunehmendem Maße erschwert, was sich zunächst nur durch leichten Druck hinter dem Brustbein während der Deglutition und beim Schlucken gröberer und fester Bissen zeigt, später bleibt auch breiige und schließlich sogar flüssige Nahrung stecken. Oft wird schon frühzeitig ab und zu ein Bissen wieder heraufgewürgt, später gehört das Regurgitieren der genossenen Nahrung zur Regel.

Die entleerten Massen sind unverändert, enthalten keine freie HCl; Milch erscheint ungeronnen wieder. Die Muskulatur des Oes. oberhalb der Stenose pflegt zu hypertrophieren, bisweilen jedoch stellt sich eine Tonusverminderung ein, infolge deren der Oes. sich in einen weiten schlaffen Sack verwandelt, eine Erklärung dafür, daß die Entleerung bisweilen trotz noch nicht vollkommenen Verschlusses fast unmöglich wird.

Im weiteren Krankheitsverlauf stellt sich zunehmende Inanition ein, die Kranken gehen schließlich unter den Zeichen extremer Abmagerung zugrunde. Die Diagnose stützt sich abgesehen von den charakteristischen Beschwerden auf den Befund der Sondierung und vor allem der Röntgenuntersuchung, ev. der Ösophagoskopie.

Die Sondierung erfolgt am besten zunächst mit einer dicken Magensonde oder einer Hg.-Sonde. Geht sie durch, so ist die Annahme einer organischen Stenose widerlegt, im andern Falle versuche man es mit steifen Sonden, am besten mit Fischbeinsonden mit Schlundschwamm. Die Höhe der Stenose ergibt sich aus der Zentimeterlänge des eingeführten Sondenteils (vgl. S. 281). Kardiospasmus wird durch dicke Sonden namentlich unter Morphium und Atropinwirkung überwunden. Steckenbleiben der Sonde hoch oben ist auf Divertikel verdächtig (s. oben). Die Sondierung speziell bei Carzinom ist wegen der Gefahr des falschen Weges und ev. Perforation mit größter Vorsicht auszuführen. Stets schließe man vor der Sondierung Aneurysmen sowie Lebercirrhose wegen der häufig vorhandenen Oes.-Varicen aus. Völlig ungefährlich und oft ergebnisreicher ist die Röntgen-Untersuchung mit Kontrastspise, die nicht nur das Vorhandensein der Stenosen und ihre genaue Lage, sondern mitunter auch ihre Ursache erkennen läßt, indem Narbenstenosen glatte, Carcinome unregelmäßige Umrisse der Kontrastspise im Bereich der Stenose zu zeigen pflegen. Probeexzisionen mit Hilfe des Ösophagoscops gestatten die histologische Diagnose.

Die Therapie der Narbenstenosen besteht in systematischer Sondierung zwecks Dehnung der Narben, z. B. mit Troussseau'scher Olivensonde oder Gottsteinscher durch Wasserdruck ausdehnbarer Sonde usw. Man schreitet von dünnen zu immer dickeren Sonden vor und läßt sie jedesmal 5 Min. liegen. Stärkere Ektasie des Oes. oberhalb der Stenose erfordert regelmäßige Spülungen. Die Nahrung sei möglichst konzentriert (Sahne, Butter, Eier), ev. Nährklysmen. Gelingt die Erweiterung der Stenose nicht (Kontrolle des Körpergewichtes!), so ist die chirurgische Gastrostomie (Magenfistel) erforderlich. Therapie des Carcinoms siehe unten.

**Nährklysmen:** Die Ernährung durch Nährklysmen ist stets eine recht unvollkommene, zumal größere Flüssigkeitsvolumen sowie stärker konzentrierte Lösungen vom Darm alsbald wieder ausgestoßen werden. Relativ gut resorbiert werden Kohlehydrate sowie Alkohol, in geringerem Grade emulgierte Fette und in nur sehr geringem Umfange gelöste genuine Eiweißkörper. Die Dickdarmflora vermag Stärke und Rohrzucker in Dextrose umzuwandeln, von den Eiweißkörpern werden nur die Albumosen und Peptone bakteriell gespalten, die jedoch leicht reizend wirken. Man pflegt daher auf den Zusatz von Eiweißkörpern zu verzichten oder gibt sie in Form von bis zu Aminosäuren abgebauten Nährpräparaten wie Erepton oder Hapan (in Mengen bis 10%) bzw. nach Leube feingehacktes Fleisch mit Pankreonzusatz. Als Kohlehydrate eignen sich anstatt des leicht reizenden Zuckers (höchstens 5%) besser das Dextrin (15–30%) bzw. die dextrinhaltigen Kindermehle (Kufeke, Nestle, Theinhardt). Als Vehikel wird 0,9% NaCl-Lösung verwendet, da diese eine Gewähr für möglichst weites Hinaufgelangen der Klysmen im Darm und gute Resorption bietet. Jedem Klyσμα soll  $\frac{1}{2}$ –1 Std. vorher ein Reinigungseinlauf vorausgehen (einmal im Tage). Das Klyσμα läßt man körperwarm und unter sehr geringem Druck bei rechter Seitenlage oder Beckenhochlagerung einlaufen unter Verwendung eines weichen eingefetteten Darmrohrs, das mindestens 8–10 cm heraufreicht, bei Reizbarkeit des Darms Zusatz von 5 bis 10 Trpf. Tot. Opii. zum Klyσμα. Volumen des Klysmas höchstens 250 ccm, ev. Wiederholung bis zu 3 mal tägl. Sehr zweckmäßig ist statt dessen ein Tropfeinlauf mittels Nelatonkatheters und Schlauchklemme (Irrigator zwecks Warmhaltens mit Tüchern umhüllen), Gesamtmenge bis 1 l innerhalb  $\frac{1}{2}$ –1 Tag. Maximale mittels Nährklysmas pro Tag dem Körper zufühbare Kalorienmenge ca. 800–1000.

Längere Anwendung scheidet oft an steigender Reizbarkeit des Mastdarms. Entzündliche Prozesse des Darms bilden von vornherein Kontraindikation. Beispiele für Nährklysmen: 30 g Kindermehl, 2 Eigelb, 1 Eßl. Rotwein, 200,0 phys. NaCl-Lösung oder 250,0 Milch, 2 Eigelb, 1 Messerspitze NaCl, 1 Eßl. Kraftmehl, 1 Eßl. Wein (Boas).

## Oesophaguscarcinom.

Der Speiseröhrenkrebs ist ein häufiges Leiden, das vor allem Männer in höherem Alter, namentlich Potatoren befällt. Prädilektionsort ist die Höhe der Bifurkation sowie nächst dem das untere Drittel des Oes. bzw. die Cardia.

Es handelt sich stets um ein Plattenepithelcarcinom, und zwar teils um weichen Medullarkrebs, teils um harten Skirrhus; er pflegt in der Höhe von mehreren Zentimetern eine ringförmige Stenose zu bilden, seltener eine flache nicht stenosierende Geschwulst. Ulzeration des Tumors ist die Regel.

Die Symptome sind die der S. 284 beschriebenen Oes.-Stenose, und zwar wird hier das Schluckhindernis außer durch den Tumor durch den häufig begleitenden Krampf der Speiseröhre in der Nachbarschaft desselben gebildet. Nicht selten kann im Verlauf des Leidens infolge geschwürigen Zerfalls der Geschwulst vorübergehend eine Besserung der Schlingbeschwerden eintreten. Häufig sind Blutungen, die sowohl spontan wie insbesondere nach Sondierung auftreten. Letztere ist daher mit größter Vorsicht auszuführen auch wegen der Möglichkeit der Perforation (vgl. Oes.-Stenose). Von größter Bedeutung für die frühzeitige Erkennung ist die Röntgenuntersuchung (vgl. S. 285). Im weiteren Krankheitsverlauf entwickelt sich neben der durch die Stenose bewirkten Inanition zunehmende Kachexie. Metastasen entwickeln sich in den Drüsen im Mediastinum sowie im Verlauf des Duct. thorac., häufig ist eine palpatorisch wahrnehmbare Drüsenmetastase in der linken Supraclaviculargrube, ferner infolge von Druck auf den Recurrens linksseitige Stimmbandparese, gelegentlich auch eine Bronchostenose. Nicht selten vereitert das Carcinom oder perforiert in die Nachbarschaft, es entsteht z. B. eine Ösophagobronchialfistel mit konsekutiver Lungenangrän, ferner jauchige Perikarditis bzw. Pleuritis. Carcinome des unteren Drittels gehen mitunter auf den Magen über. Metastasen in den andern Organen kommen relativ selten vor, Lebermetastasen beobachtet man häufiger bei Krebs des unteren Abschnitts. Oft besteht neben dem Carcinom eine Lungen-Tb. In seltenen Fällen kann der Tumor, wenn es sich um ein flaches nicht stenosierendes Ca. handelt, bei Lebzeiten unerkannt bleiben bzw. erst durch die Folgeerscheinungen (z. B. Lungenkomplikationen) bemerkbar werden. Die Kranken gehen entweder an Marasmus und Inanition oder häufig infolge der erwähnten Komplikationen, oft auch an Schluckpneumonie zugrunde, in der Regel im Laufe eines Jahres nach dem Beginn der ersten Symptome.

Therapie: Mit lokaler Radiumbehandlung wurden mitunter Erfolge beobachtet. Im übrigen rein symptomatische Behandlung; Systematisches mit größter Vorsicht (siehe oben) durchgeführtes Sondieren; Narkotica gegen die komplizierenden Spasmen (z. B.  $\frac{1}{2}$ —1 mg Atropin oder 1—2 mg Eumydrin oder 0,01 Kokain, alles per os oder subcut. 2—3 mal tägl. 10 Min. vor dem Essen)! Gegen die Stagnation evtl. Spülungen oder zur Desinfektion alle Stunde 1 Eßl. 1 $\frac{0}{10}$  H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Flüssige oder breiige kalorienreiche Kost. Evtl. Sondenfütterung. Anlegung einer Magen-fistel nur im äußersten Notfall.

## Erkrankungen des Magens und Zwölffingerdarms.

**Vorbemerkungen:** Die Inspektion des Abdomens ergibt oft auch bezüglich des Magens diagnostische Anhaltspunkte. Man achte auf den Zustand der Bauch-

decken und den Füllungszustand des Abdomens bzw. auf das Vorhandensein von Meteorismus (das Niveau des Abdomens erhebt sich dabei über das des Thorax), sowie auf etwaige sichtbare Teile der Baucheingeweide, insbesondere von Tumoren herrührende Vorwölbungen und an den Bauchdecken sich abzeichnende Teile des Magens. Oft ist das einzige bei der Inspektion wahrnehmbare, auf eine abdominelle Erkrankung hinweisende Zeichen das Verstrichensein des Nabels. Zur Inspektion gehört nicht zuletzt auch die Besichtigung der Zunge sowie des Gebisses. Die Palpation ergibt oft wichtige Befunde, vorausgesetzt, daß es gelingt, den Pat. zu völliger Entspannung der Bauchdecken zu bringen; hierzu dienen verschiedene Kunstgriffe, vor allem Ablenkung der Aufmerksamkeit, z. B. durch ein Gespräch, ferner Anziehen der Beine und tiefes Atmen und endlich die Untersuchung im warmen Bade.

Man verabsäume nicht, auf epigastrische Hernien in der Mittellinie zu fahnden.

Der Magen zerfällt anatomisch in die Pars cardiaca, weiter den unmittelbar unter der Zwerchfellkuppe gelegenen Fundus oder Fornix, dessen Konvexität den höchsten Punkt des Magens bildet, das sich daran anschließende Corpus als Pars media sowie die Pars pylorica (Antrum pyloric.). Feste Punkte des Magens sind die Kardie, durch die er mittels des Ösophagus an dem Zwerchfell, sowie der Pylorus, an welchem er mittels des Lig. hepatoduodenale an der Leber befestigt ist. Die übrigen Teile sind in erheblichem Umfange beweglich und in ihrer Lage und Form von dem jeweiligen Füllungszustand des Magens wie auch von dem Verhalten der Umgebung abhängig. Im Gegensatz zur Leiche zeigt der Magen beim Lebenden im leeren Zustand die Form eines Stierhorns, dessen Spitze dem Pylorus entspricht, in gefülltem Zustand die Form eines schlauchförmigen, mehr oder weniger vertikal herunterhängenden Sackes. Im einzelnen spielen individuelle Unterschiede, der Einfluß der Körperlage, ferner der Kontraktionszustand der Magenmuskulatur sowie der Bauchdecken eine große Rolle.

Genaueren Aufschluß über die Magenform lieferte erst die Röntgenuntersuchung mit einer Kontrastmahlzeit (Brei mit 60–70 g Bismuth. carbon. bzw. 120 g Bariumsulfat puriss. f. Röntgenzwecke, Merck-Darmstadt). Hier zeigt der Magen normal die sog. Angelhakenform (vgl. Abb. 32), d. h. einen längeren absteigenden vertikalen (Fornix + Corpus) und einen kurzen aufsteigenden pylorischen Teil. Der Abstand zwischen dem tiefsten Teil der großen Kurvatur („Magenpol“) und dem Pylorus ist die sog. Hubhöhe. Der Pylorus reicht bis zu etwa 3 cm über die Mittellinie nach r. herüber. Der Magenpol reicht normal bis 3 cm unter den Nabel (Nabelhöhe = 3. Lendenwirbel). Viel seltener ist die gelegentlich beim ♂ vorkommende sog. Stierhornform des Magens, bei der der Pylorus den tiefsten Punkt bildet, so daß eine Hubhöhe fehlt. In Rückenlage geht normal die Angelhakenform in die Stierhornform über.

Die Muskulatur des Magens bildet drei Schichten, die in Längs-, Quer- und schrägen Zügen verlaufen; auf ihnen beruhen die peristaltische Funktion oder der Tonus des Magens, d. h. die Fähigkeit der Wand, sich um den Inhalt zu kontrahieren sowie die als Peristaltik bezeichneten Bewegungsvorgänge. Nach der Stärke der Muskulatur zerfällt der Magen in zwei funktionell verschiedene Abschnitte, den Fundus- und Corpusteil mit relativ schwacher und den Pylorusabschnitt mit stark entwickelter Muskulatur. Ersterer, der sog. Hauptmagen, dient der Verdauung, während der Pylorusmagen die Rolle des Motors spielt.




Abb. 32. Röntgenbild des normalen Magens.

Im einzelnen besteht die motorische Funktion des Magens darin, den ankommenden Speisebrei zunächst in Schichten anzuordnen, derart, daß die zuletzt geschluckten Portionen zentral liegen, alsdann ihn im pylorischen Abschnitt durcheinanderzumischen und schließlich in den Darm auszupressen. Die Rö.-Untersuchung vor dem Leuchtschirm ergibt folgendes: die Kontrastspeise sammelt sich zunächst dicht unter der Kardia in Form eines Keiles an, dessen Spitze mit zunehmender Füllung nach unten fortschreitet, während zugleich im Fornix eine als Magenblase bezeichnete Luftansammlung (normal quergestellt) sichtbar wird, die dauernd vorhanden ist. Bei weiterer Füllung gleitet ein Teil des Breies von der Spitze des Keiles nach unten zum Magenpol. Beide Depots vereinigen sich später unter Zunahme des Längs- und Breitendurchmessers des Magens, der schließlich die oben beschriebene Form zeigt. Eine öfter vorhandene schmale, weniger intensive Schattenschicht zwischen Magenblase und Breischatten beruht auf Ansammlung von Magensaft (sog. Intermediärschicht). Die normale Peristaltik zeigt sich in vom Fornix fortschreitenden zunächst flachen, nach dem Pylorus zu tiefer werdenden Wellen namentlich der großen Kurvatur. Kurz vor dem Pylorus erfolgt vorübergehend eine ringförmige, sphinkterartige Einschnürung der großen und kleinen Kurvatur, so daß es zeitweise zur völligen Abtrennung vom Korpus kommt. In dem zwischen ersterer und dem Pylorus gelegenen Antrum pyloric. erfolgt eine ausgiebige Pendel- resp. Mischbewegung mit fortwährender Formänderung dieses Abschnitts, bis der Pylorus den Inhalt schubweise ins Duodenum entleert. Normal ist der Magen nach 6 Std. völlig leer.

In Ermangelung des Rö.-Verfahrens kann man zur Prüfung der Motilität den Magen nach einer Probemahlzeit (s. unten) mit Zusatz von 1 Teel. Korinthen zum besseren Nachweis nach einigen Stunden ohne Zwischenmahlzeit bzw. am andern Morgen aushebern; unter normalen Verhältnissen werden schon nach 7 Std. keine Speisereste mehr gefunden.

**Sekretorische Funktion des Magens:** Der nüchterne Magen ist leer oder enthält nur geringe Mengen schwach saurer Flüssigkeit. Der Magensaft, der hauptsächlich von den Schleimhautdrüsen des Fundus und Korpus sezerniert wird, enthält HCl, Pepsin und Labferment, letztere beiden (wahrscheinlich miteinander identisch) werden als unwirksame Cymogene erzeugt und erst durch die HCl aktiviert. Die annähernd konstante Konzentration der HCl beträgt 0,3—0,5%. Die Sekretion des Magensaftes erfolgt vor allem bei Anwesenheit von Speisen im Magen, namentlich von Fleisch und extraktivstoffhaltigen Nahrungsmitteln wie Fleischbrühe usw., sowie Gewürzen, ferner unter der Einwirkung der Röstprodukte tierischen und vegetabilischen Ursprungs, aber auch auf psychischem Wege beim Anblick, Geruch oder der bloßen Vorstellung von appetitreizenden Speisen (sog. Appetitsaft), schließlich auch unter der Einwirkung des Kauens. Sie wird gehemmt durch die Anwesenheit von Fetten. Wegen der bedeutsamen Rolle der Psyche für die Saftsekretion ist es bei sensiblen Pat. oft erwünscht, sie mit der Ausheberung des Magens durch die Sonde unvorbereitet zu überraschen.

Zur Prüfung des Chemismus verabreicht man eine Probenahrung von konstanter Zusammensetzung, z. B. das Ewaldsche Probefrühstück (P.-F.): Tasse Tee und 1 Semmel oder besser, weil es den Magensaft stärker lockt, 1 Tasse Fleischbrühe aus 1 Bouillonwürfel oder 5 g Liebigextrakt sowie 1 Semmel, man hebert 30—45 Min. später mit dem Magenschlauch aus, oder eine Riegelsche Probemahlzeit (P.-M.): 1 Teller Fleischbrühe, 150 g Beefsteak oder Fleischpüree, 100 g Kartoffelpüree, 50 g Brot, 1 Gl. Wasser, Ausheberung nach 3 Stdn. Untersuchung des Ausgehberten: Feststellung der Menge sowie des etwaigen Vorhandenseins zahlreicher größerer Brocken (normal feine Verteilung; man vergesse nicht auf die Beschaffenheit der Zähne zu achten!) sowie des Geruchs, der normal nicht unangenehm aromatisch ist. Bei normaler Saftmenge bildet diese etwa die Hälfte des in einem Meßcylinder sich absetzenden Volumens des Ausgehberten (Schichtungsquotient 50%). Aus dem Magen stammender Schleim ist mit dem Inhalt innig vermischt und pflegt sich am Boden des Gefäßes zu sammeln, verschluckter Schleim schwimmt oben. Prüfung mit blauem Lackmuspapier, das sich normal rot färbt. Saure Reaktion wird erzeugt durch freie HCl, ferner durch an Eiweiß und organische Basen gebundene HCl sowie pathologische

organische Säuren (Milch-, Essig- und Buttersäure). Ein spezifisches, absolut sicheres Reagens auf freie HCl ist die Günzburger Probe mit Phlorogluzin-Vanillin (Purpurrotfärbung bei Abrauchen auf Porzellandeckel). Oft genügt die Probe mit Kongorotpapier, das sich bei genügend freier HCl intensiv blau, im andern Fall bräunlich-violett färbt. Stark verdünnte Methylviolettlösung schlägt durch freie HCl in blau um, bei Fehlen freier HCl bleibt sie violett, bei gesteigerter HCl-Konzentration wird sie hellblau bis grünblau. Die quantitative Bestimmung der Acidität durch Titration mit  $\frac{n}{10}$  NaOH (4 g Ätznatron in 1 l Aqua dest.) ge-

schieht am besten für die Gesamtacidität mit Phenolphthalein als Indicator, für die freie HCl mit Günzburg (s. oben) oder mit Töpferschem Reagens (0,5% Dimethylamidoazobenzol), das sich durch freie HCl rot färbt und bei Neutralisierung derselben lachsfarben wird). Bei Fehlen der freien HCl ist es mitunter von Wert, das HCl-Defizit kennen zu lernen, das man durch Titration mit  $\frac{n}{10}$  HCl mit Günzburg

feststellt. Von pathologischen Säuren, die sich bei Fehlen der freien HCl finden, ist diagnostisch die wichtigste die Milchsäure, deren Nachweis aber nur bei Fehlen derselben in der genossenen Nahrung (Brot, saure Milch, Sauerkraut!) von Wert ist, am besten daher am P.-F. geführt wird. Zu ihrer Feststellung dient das Uffelmannsche Reagens (1% Karbolsäure 30 cm<sup>3</sup> + 3 Tropf. offic. Eisenchlorid), das sich bei positivem Ausfall gelbgrün färbt. Einfacher und sicherer ist der mikroskopische Nachweis von Milchsäurestäbchen im Magensaft (s. unten).

Bei Kontraindikation der Anwendung der Magensonde z. B. bei Aneurysma aortae, bei Lebercirrhose (Varicen des Oesophagus!) sowie bei Ulcus und Ulcusverdacht (vorher Stuhluntersuchung auf occultes Blut!) vermag die Sahlische Desmoidprobe über das Verdauungsvermögen des Magens zu orientieren: ein mit Methyleneblau gefülltes Gummibeutelchen, das mit Katgutfäden (d. h. rohes Bindegewebe, s. unten) zugebunden ist, öffnet sich nur dann im Magen, wenn letztere durch den Magensaft verdaut und gelöst werden; normal erfolgt innerhalb von 20 Stdn. Blaugrünfärbung des Harns infolge von Resorption des Farbstoffs.

Die Gesamtazidität beträgt normal auf 100 cm<sup>3</sup> Magensaft nach einem P.-F. 30–60, nach einer P.-M. 50–80, die freie HCl 20–40. Bei Fehlen der freien HCl prüfe man auch auf das Vorhandensein von Pepsin: mehrere scharfkantig zugeschnittene Stückchen von hartgekochtem Hühnerweiß werden mit 10 cm<sup>3</sup> Magensaft + 2 Tropf. offic. HCl im Brutschrank gehalten; nach spätestens 12 Stdn. findet man normal entweder völlige Auflösung der Stückchen oder wenigstens Anverdauung der Kanten.

Von diagnostischer Bedeutung ist schließlich auch die mikroskopische Untersuchung des Magensaftes. Speisereste wie Stärkekörner (Blaufärbung mit Lugolscher Lösung), quergestreifte Muskelfasern, Pflanzenteile usw. im nüchternen Magen sind pathologisch. Die langen Boas-Opplerschen Bacillen weisen auf Milchsäuregärung hin; Sarcinehäufchen (gelbe waarenballenartige Tetraden) sowie Hefezellen sprechen für Stagnation.

Auch die Untersuchung der Faeces liefert oft Anhaltspunkte zur Beurteilung von Erkrankungen des Magens, so insbesondere die Anwesenheit von Blut sowie von größeren Mengen von Bindegewebe (s. später).

Die resorptive Tätigkeit des Magens ist nur unbedeutend; resorbiert werden in geringer Menge aus wäßrigen Lösungen Zucker, Pepton, NaCl, gleichzeitig wird von der Schleimhaut Wasser in den Magen als sog. Verdünnungsssekretion ausgeschieden. Wasser wird nicht resorbiert, dagegen in erheblichem Maße Alkohol.

Die physiologische Bedeutung des Magens besteht einmal darin, daß er ein Reservoir für die Speisen bildet, wodurch die Nahrungszufuhr sich auf wenige Mahlzeiten in 24 Stunden beschränken läßt, und ferner, daß in ihm die Verdauung speziell der Eiweißkörper eingeleitet wird. Letztere werden bis zu den Albumosen und Peptonen (aber nicht weiter) zerlegt; rohes Bindegewebe wird ausschließlich vom Magen, nicht vom Darm verdaut. Voraussetzung für die Eiweißverdauung ist das Vorhandensein von freier HCl. Auch die Lockerung von pflanzlichem Stützgewebe, der sog. Mittellamelle,

ist eine wichtige Aufgabe der Magenverdauung. Das vom Mundspeichel stammende Ptyalin setzt zunächst auch noch im Magen seine Wirkung, d. h. die Verzuckerung der Kohlehydrate fort, soweit es sich in den zentralen, mit HCl noch nicht vermischten Abschnitten des Inhaltes befindet (vgl. oben), zumal immer nur die peripherischen Teile des letzteren mit dem Magensaft in Berührung kommen und durch die Verdauung in Lösung gehen. Der verflüssigte Teil des Inhaltes gelangt in das Antrum pyloric. Bei Anwesenheit größerer Fettmengen kommt es häufig zu einem Rückfluß von Duodenalsaft mit Galle und Trypsin in den Magen. Das gleiche findet bei heftigem Erbrechen statt. Endlich kommt dem Magensaft eine gewisse bakterizide Kraft gegenüber pathogenen Keimen, demnach eine Desinfektionswirkung zu.

Die Entleerung des Magens durch Öffnung des Pylorus erfolgt nicht regellos, sondern nach einem gewissen Rhythmus, der von der Qualität der Nahrung und den Sekretionsverhältnissen des Magens abhängt und vom sog. Pylorusreflex geregelt wird. Übertritt von saurem Mageninhalt sowie Fett in den Darm führt vom Duodenum aus reflektorisch vorübergehend Verschuß des Pylorus herbei, bis der Mageninhalt weiter verdaut ist, so daß eine Überladung des Duodenums vermieden wird. Damit hängt zusammen, daß hohe HCl-Werte bzw. Speisen, die viel HCl anlocken wie z. B. Fleisch eine langsamere Entleerung des Magens bedingen. Das gleiche gilt auch vom Fett sowie von Süßigkeiten. Da nun das sog. Sättigungsgefühl zum großen Teil von der Zeitdauer der Magenfüllung abhängt, wird erklärlich, wie letzteres bei niederen Säurewerten bzw. z. B. bei vegetabilischer Kost mit geringem Gehalt an „Safttreibern“ oder bei fettarmer Kost nur kurze Zeit anhält. Reflektorischer Pylorusverschuß vom Magen aus erfolgt gegenüber festen Bestandteilen des Mageninhaltes, abnorm kalten und heißen Speisen sowie anisotonischen Lösungen gegenüber sowie bei Schmerzreizen.

Unter normalen Sekretionsverhältnissen zeigen die verschiedenen Speisen je nach ihrer Quantität und ihrer chemischen und physikalischen Beschaffenheit eine verschiedene Verweildauer im Magen. So verlassen den Magen innerhalb 1—2 Stdn. z. B. 100—200 g gekochte Milch, 100 g weiche Eier, innerhalb 2—3 Stdn. 200 g Kaffee mit Sahne, 100 g Rührei, 250 g gesottenes Kalbshirn, je 150 g Kartoffelbrei, Salzkartoffeln, Kirschenkompott, 200 g gesottener Schellfisch, 70 g Weißbrot oder Zwieback; innerhalb 3—4 Stdn. 230 g junges gesottenes Huhn, 250 g gesottene Taube, 195 g gebratene Taube, 160 g roher oder gekochter Schinken, 100 g magerer Kalbsbraten, 100 g gebratenes Beefsteak, je 150 g Schwarzbrot, Reis, Spinat; 4—5 Stdn.: 210 g gebratene Taube, 250 g gebratenes Beefsteak, 100 g Rauchfleisch in Scheiben, je 250 g gebratener Hase und Gans, 140 g Linsen als Brei, 200 g Erbsenbrei, 150 g gesottene Schnittbohnen (ausführliche Tabelle nach Penzoldt vgl. Lehrbücher). Geringe Verweildauer der Speisen ist im allgemeinen identisch mit ihrer „Bekömmlichkeit“, was aber nur für den Magen gilt. Im übrigen ist letztere ein relativer Begriff, dessen Fixierung jeweils von der Art des zu behandelnden Leidens abhängt.

### Gastritis (Magenkatarrh).

Die Gastritis stellt einen sowohl in akuter wie chronischer Form auftretenden entzündlichen Reizzustand der Magenschleimhaut dar. Er ist gekennzeichnet durch vermehrte Schleimbildung, Schwellung und Rötung der Schleimhaut; gelegentlich kommen auch kleine Blutungen vor, in ganz schweren Fällen beobachtet man circumscriphte Nekrosen mit Schorfbildung.

Als ursächliche Momente der akuten Gastritis sind für die leichteren Formen Überladung des Magens, Genuß von zu heißen oder zu kalten Speisen, schlecht gekaute Nahrung, mangelhaftes Gebiß, sowie vor allem verdorbene Nahrungsmittel (infektiöse Gastritis) zu nennen. Schwere Gastritis mit Schleimhautnekrosen beobachtet man bei Ver-

giftungen mit ätzenden Substanzen (Säuren, Laugen, Karbol, Sublimat, Phosphor, Arsen).

Der **akute Magenkatarrh**, wie er am häufigsten nach Diätfehlern beobachtet wird („Magenverstimmung“), äußert sich in dyspeptischen Beschwerden wie Druck in der Magengegend, Appetitlosigkeit, Widerwillen gegen Nahrungsaufnahme, der sich bis zu wiederholtem Erbrechen steigern kann, fadem pappigen Geschmack, dick belegter Zunge, sowie meist ziemlich heftigem Foetor ex ore. Das Allgemeinbefinden pflegt stets beeinträchtigt zu sein, Mattigkeit und gemüthliche Verstimmung sind in der Regel vorhanden. Auch die Darmtätigkeit ist oft gleichzeitig gestört, theils in Form von Obstipation, theils von Diarrhöe. Temperatursteigerungen bis 38° kommen vor, höheres Fieber spricht gegen einfache Gastritis, ebenso der Nachweis einer Milzvergrößerung. Herpes beobachtet man mitunter bei fieberhaftem Verlauf.

Bei Untersuchung des Mageninhaltes nach Probefrühstück, die indessen meist überflüssig ist, findet man Fehlen der freien Salzsäure. Bei fieberhaften Fällen ist stets mit der Möglichkeit einer leichten Typhus- bzw. Paratyphusinfektion zu rechnen. Man versäume nicht die entsprechenden Stuhl- und Blutuntersuchungen.

Bei den schweren, auf Verätzung durch Gifte beruhenden Gastritiden weisen zunächst die regelmäßig an der Mund- und Rachenschleimhaut sichtbaren Schorfe auf den Charakter der Erkrankung hin. Blutiges Erbrechen sowie die Ausstoßung von Schleimhautfetzen können auch auf Verätzung der Speiseröhre beruhen, dagegen zeigen eine starke Druckempfindlichkeit und Schmerzen in der Magengegend die schwere Schädigung des Magens an.

Die **chronische Gastritis** ist ein nicht sehr häufiges Leiden. Als Ursachen spielen zum Theil die gleichen Momente wie bei der akuten Gastritis eine Rolle. Unzweckmäßige Beschaffenheit der Speisen infolge mangelhaften Kauens, dauernd zu hastiges Essen, häufiger Genuß zu heißer Speisen (beruflich bei Köchinnen), Tabaksabusus (speziell Kautabak), vor allem aber dauernder Genuß konzentrierter alkoholischer Getränke bilden eine Hauptursache des chronischen Magenkatarrhs. Schließlich ist oft die Gastritis ein Folgezustand einer chronischen Stauung im Bereich der Baueingeweide bei Herz- und Lungenleiden, woraus sich das häufige Vorkommen von Magenbeschwerden bei diesen erklärt.

Anatomisch erscheint die Schleimhaut geschwollen, häufig infolge von Pigmentablagerung schiefergrau verfärbt und mit zähem Schleim überzogen; in einzelnen Fällen besteht hyperplastische Wucherung mit starker Schwellung und lymphocytärer Infiltration, welche umschriebene warzenartige Prominenzen und Wülste hervorruft, sog. *état mamelonné*, in andern Fällen führt der Prozeß schließlich zu Atrophie mit starker Verdünnung der Schleimhaut und teilweise Schwund der Magendrüsen.

**Krankheitsbild:** Die allgemeinen dyspeptischen Symptome sind zum Theil die gleichen wie bei der akuten Gastritis: Belegte Zunge, Appetitmangel, Magendruck nach jeder Nahrungsaufnahme, häufig Sodbrennen<sup>1)</sup> sowie Aufstoßen und speziell beim Säuferkatarrh morgendliches Erbrechen von wäßrigen und schleimigen Massen (Vomitus matutinus). Der Brechreiz wird hier oft durch die gleichzeitig bestehende Pharyngitis ausgelöst. Häufig sind Schädigung des gesamten Ernäh-

<sup>1)</sup> Sodbrennen ist keineswegs immer identisch mit erhöhter Acidität, es findet sich oft auch in Fällen mit herabgesetzten Säurewerten.



rungszustandes mit Gewichtsabnahme und Störung des Allgemeinbefindens mit Klagen über Kopfdruck, Schwindel (sog. Magenschwindel), Herabsetzung der Leistungsfähigkeit, seelische Verstimmung vorhanden.

Ausheberung nach P.-F. oder Probemahlzeit ergibt statt des fein verteilten Speisebreies grobe Brocken, Verminderung, bei schweren Fällen mit Schleimhautatrophie sogar völliges Fehlen der HCl sowie des Pepsins, sowie große Mengen von zähem glasigem Schleim (besonders deutlich beim Übergießen des Magensaftes in ein anderes Gefäß oder beim Umrühren mit einem Glasstab). Bei der Rö.-Untersuchung beobachtet man meist beschleunigte Entleerung als Folge des HCl-Mangels. Doch ergibt in manchen Fällen eine Probemahlzeit leichte Grade von Retention, gelegentlich mit Vorhandensein von Zersetzungsprodukten, speziell von Essigsäure und Buttersäure. Eine Folge des HCl-Mangels ist der häufige Befund von unverdaulichem Bindegewebe im Stuhl (vgl. S. 289). Vereinzelt kommen auch erhöhte HCl-Werte vor (Gastritis acida).

Die Diagnose der akuten Gastritis stößt meist auf keine Schwierigkeiten, diejenige der chronischen Form ist nicht immer leicht zu stellen, da insbesondere der wenig charakteristische objektive Befund auch andern Magenleiden zukommt, speziell dem Carcinom sowie Magen-neurosen, andererseits aber die Differentialdiagnose gerade hier von größter Bedeutung ist.

Maßgebend ist vor allem die Anamnese (Potatorium, schlechtes Gebiß usw.), wogegen der Allgemeindruck wie Ernährungszustand, körperliche Leistungsfähigkeit usw. diagnostisch nicht entscheidend ist, da letztere bei den verschiedensten chronischen Magenleiden schwer in Mitleidenschaft gezogen sind.

Differentialdiagnostisch kommt auch die sog. **Achylie** in Frage, die außer durch den Mangel an HCl durch das Fehlen von Pepsin ausgezeichnet ist und zum Teil wahrscheinlich auf rein funktioneller Minderwertigkeit der Magenschleimhaut beruht. Sie findet sich teils als Begleiterscheinung anderer schwerer Erkrankungen z. B. bei Magencarcinom, bei schwerer, speziell perniziöser Anämie, bei Diabetes, fortgeschrittener Tuberkulose, nach Dysenterie sowie vorübergehend im Verlauf akuter Infektionskrankheiten (sekundäre Achylie), teils als primäre konstitutionelle Achylie, die mitunter keine oder nur geringe subjektive Beschwerden macht und bisweilen nur zufällig entdeckt wird. Sie ist relativ häufig im Alter sowie bei der armen, schlecht genährten Bevölkerung.

Bisweilen beobachtet man im Gefolge der Achylie Darmstörungen, insbesondere Durchfälle als sog. gastrogene Diarrhöen, die auf die mangelhafte Magenverdauung, das Fehlen der desinfizierenden Wirkung der HCl und die beschleunigte Entleerung des Magens zurückzuführen sind, und die auf therapeutische Verabreichung größerer Mengen HCl schwinden. Bezüglich der diagnostisch wichtigen Heteroachylie vgl. S. 308.

Die **Therapie** der akuten Gastritis besteht vor allem in energischer Schonung des Magens, ev. für 1—2 Tage völlige Karenz, höchstens Tee und Zwieback sowie Schleimsuppen, in den nächsten Tagen allmählich Übergang über Fleischbrühe, Geflügel, Reis usw. zu gewöhnlicher Kost; zweckmäßig ist die Verabreichung von Acid. hydrochlor. dilut. 3 mal tägl. 10—15 Tropf. in 1 Gl. Wasser während des Essens. Bei Vorhandensein schädlicher Ingesta im Magen ist für ihre schnelle Entfernung zu sorgen, entweder durch Magenspülung mit lauwarmem Wasser oder durch Applikation von Emetica, am besten Apomorphin. hydrochlor. 0,1 auf Aqua dest. 10,0,  $\frac{1}{2}$ —1 cm<sup>3</sup> subcut., im Anschluß daran Abführmittel, z. B. 2—3 Eßl. Ricinusöl (möglichst heiß, da es dann dünnflüssig ist und mit heißem Kaffee vermischt weniger Widerwillen erregt). In der Rekonvaleszenz bei Appetitmangel HCl-Tropfen sowie Stomachica und Amara, z. B. Tet. Gentian. 10,0, Tet. aromat. 5,0 oder Tet. amar. 10,0, Tet. aromat. 5,0 je 15—20 Tropf. mehrmals täglich.

Die Therapie der chronischen Gastritis ist einmal eine ätiologische durch Beseitigung der ursächlichen Schäden: Gebiß, gründliches Kauen, langsames Essen, Vermeiden von Spirituosen, Gewürzen sowie stark gesalzener, ferner sehr saurer, sehr heißer und sehr kalter Speisen, Einschränkung bzw. Verbot des Rauchens, Bekämpfung der Stauung bei Zirkulationsstörungen. Genaue Diätvorschriften: Verboten sind grobes sowie frisches Brot, zähes Fleisch, grobe Gemüse (von Kohlsorten sind nur Blumen- und Brüsseler Kohl erlaubt), ferner Wild mit stärkerem Hautgout, saure Milch, alle Fette außer Sahne und Butter, auf der Pfanne gebratene Fleischspeisen, Bratkartoffeln, fette Backwaren, fette Saucen und Mayonnaisen, Räucherwaren, desgl. ein Übermaß an gärunsfähigen Kohlehydraten, alle Käsearten, ausgenommen Quark. Anfangs sollen alle Speisen in pürrierter bzw. fein zerkleinerter Form genossen werden. Getränke: dünner Tee, Wasser mit Rotwein, Selters abgebraust; starker Kaffee verboten. Häufige kleine Mahlzeiten; nach der Mittag Mahlzeit Ruhe 1 Std. lang auf dem Divan, am besten mit warmen Kataplasmen (Leinsamen, Grützbrei usw.) oder Prießnitz auf die Magengegend. Häufig sind namentlich bei Zeichen von Stagnation bzw. Gärung regelmäßige Magenspülungen nüchtern mit NaCl- oder Natr. bicarb. (1%) -Lösungen oder bei starker Schleimhautsekretion Kalkwasser (3 Eßl. Aq. calc. pro Liter) von Vorteil. Medikamentös Acid. hydrochlor. dil. (s. oben), Pepsin. german. 0,5 3 mal tgl. nach dem Essen bzw. Pepsinsalzsäure oder Acidolpepsintabletten, bei Achylie ev. außerdem Pankreon oder Pankreatin 3×2 Tabl. ½ Std. nach der Mahlzeit; zur Anregung des Appetites Amara (s. oben), Condurangopräparate, z. B. Vin. condurango eßlöffelweise oder Extr. condurango fluid. 3 mal tägl. 1 Teel.; ferner Tct. Strychni, Tct. chin. comp., Tct. Rhei vinos. aa 10,0, 3 mal tägl. 20 Trpf. sowie Orexin. tannic. Tabl. 0,5, 1—2 Std. vor dem Essen. Gegen Sodbrennen Natr. bicarb. bzw. Magnes. usta messerspitzenweise oder besser schluckweise Milch. Oft bewähren sich Brunnenkuren, z. B. Karlsbader Mühlbrunnen warm ca. 250 ccm nüchtern und vor den Mahlzeiten, ferner bei Anacidität NaCl-Quellen wie Homburg, Kissingen, Wiesbaden; als alkalische Quelle bei normalen oder gesteigerten HCl-Werten besonders Neuenahr. Der Vorteil der Kur in Badeorten besteht u. a. in dem Umstand, daß die Pat. mit größerer Sorgfalt und Gründlichkeit die vorgeschriebene Behandlung zu absolvieren pflegen als zu Hause. Bei seit längerer Zeit bestehender chronischer Gastritis ist die Behandlung oft sehr langwierig, zumal nicht selten die geringsten Diätfehler Rückfälle und Verschlimmerungen bewirken. Das Körpergewicht ist fortlaufend zu kontrollieren.

### Hyperacidität und Hypersekretion.

Unter **Hyperacidität** versteht man krankhafte Zustände, die durch charakteristische Magenbeschwerden sowie abnorm hohe Magensäurewerte ausgezeichnet sind. Die Beschwerden, die 1—2 Stdn. nach dem Essen aufzutreten pflegen, bestehen in Brennen und Druck in der Magengegend, saurem Aufstoßen bzw. heftigem Sodbrennen (Pyrosis), gelegentlich Erbrechen sauren Mageninhaltes und treten besonders nach gewissen Speisen mit Vorliebe auf, insbesondere nach Süßigkeiten, extraktivstoffhaltigen Speisen, Bratensauce, ungenügend zerkleinerten Speisen, Hülsenfrüchten, sauren Weinen, Salaten, Alkoholika. Die Säurewerte überschreiten oft 45 für freie HCl und 70 Gesamtacidität, die höchsten Werte pflegt man nach Verabreichung einer sog. Appetitmahlzeit (bestehend aus freigewählten, dem Pat. besonders zusagenden, am besten pikanten Speisen) zu erhalten. Die Verweildauer der Speisen im Magen ist erheblich verlängert. Infolge der Abscheidung abnorm großer Säuremengen in den Magen ist der Harn oft alkalisch und läßt die Salze der Erdalkalien als weißliche Trübung fallen (Phosphaturie).

Das Syndrom der reinen unkomplizierten Hyperacidität ist der Ausdruck einer Neurose, die oft mit andern Symptomen nervöser Über-

erregbarkeit des vegetativen Nervensystems, insbesondere mit spastischer Obstipation kombiniert ist und dessen Erscheinungen daher in ihrer Intensität je nach der augenblicklichen nervösen Verfassung des Pat. wechseln. Die oben genannten Säurewerte sind daher auch nicht als fixe Zahl anzusehen, da sie ebenfalls Schwankungen unterworfen sind. Oft besteht eine hypochondrische Gemütsverfassung. Hyperacidität kommt aber auch oft als symptomatische Begleiterscheinung organischer Magendarmleiden vor, insbesondere bei *Ulcus ventric. und duodeni* sowie bei Pylorusstenose, ferner mitunter im Verlauf der chronischen Appendicitis. Bei der Diagnose hat man daher zuerst organische Erkrankungen auszuschließen.

Bei der **Hypersekretion** besteht eine Abscheidung abnorm großer Magensaftmengen, die teils dauernd, teils vorübergehend erfolgt. Ein aus trockenem Zwieback ohne Tee bestehendes P.-F., das bei der Ausheberung nach 30 Min. normal als dicker Brei erscheint, wird in diesen Fällen als dünne Flüssigkeit entleert. Bei der Röntgenuntersuchung erkennt man eine auffallende Höhe der Intermediärzone (s. S. 288).

Man unterscheidet den kontinuierlichen Magensaftfluß (Reichmannsche Krankheit, *Gastrosuccorrhöe*), bei dem auch nüchtern saurer Magensaft produziert wird, ferner die alimentäre Form, die nur nach Nahrungsaufnahme erfolgt und die intermittierende Form, die meist gleichzeitig mit heftigen Attacken von Magenschmerz und Erbrechen und den Zeichen des Pylorospasmus einhergeht (*paroxysmale Gastroxyntosis*); sie findet sich u. a. im Verlauf tabischer Krisen sowie mitunter bei Migränekranken.

Therapie: Vermeiden aller als „Safttreiber“ bekannten Speisen (gewürzte und salzige Speisen. Süßigkeiten, Fleischextrakt. Bratensaucen, Essig, pikante Käse, saure Weine, Hülsenfrüchte, rohes Obst, Salate, starker Kaffee, Liköre; auch einzelne Gemüse wie z. B. Spinat sind Saftlocker). Oft wirkt eiweißreiche Kost wegen der Bindung der HCl günstig, am besten als Milch; Fleisch nur in gekochter Form, fein geschnitten, ferner Trinkeier, weißer Käse, sowie Plasmon, Sanatogen. Die Zulässigkeit größerer Mengen Kohlehydrate ist im Einzelfall auszuprobieren (Mondamin, Reis, Kartoffelpüree). Sehr günstig ist oft die Wirkung der Fette, die sekretionshemmend wirken, aber nur als Butter und Sahne bzw. Mandelmilch erlaubt sind oder als sog. Ölkur (z. B. 3 mal tägl. 1 Ebl. Olivenöl), nach dem Essen, die zwar gleichzeitig günstig auf die Obstipation wirkt, oft aber auf Widerwillen stößt. Alkohol ist als Säurelocker in jeder Form verboten. Alle Speisen sollen zur Beschränkung der Saftsekretion möglichst fein zerkleinert sein. Häufige kleine Mahlzeiten. In vielen Fällen, namentlich denen mit Hypersekretion bzw. verzögerter Entleerung, ist Einschränkung der Flüssigkeitsaufnahme von Vorteil. Niemals ist schematisch zu verfahren, sondern streng zu individualisieren. Stets ist außer diätetischen Maßnahmen der psychische Status zu berücksichtigen und durch genügend Ruhe, Fernhalten von Emotionen sowie ev. Sedativa (Brom) die nervöse Erregbarkeit herabzusetzen. Medikamentöse Therapie: Zur Neutralisierung Alkalien, z. B. *Magnesia usta* oder *Magnesiumperhydrol* (Merck) 3 mal tägl.  $\frac{3}{4}$  Std. p. c. 1 gestrich. Teel.; da dieses oft stark abführend wirkt, in diesen Fällen besser *Calc. carbon.* Vorteilhaft besonders bei Schmerzen und zur Hemmung der Sekretion sind ferner *Belladonna*, *Atropin* und seine Derivate, wobei Wechsel der Präparate sich empfiehlt, z. B. Rp. Extr. *Belladonn.* 0,5, *Natr. bicarb.* und *Magnes. ust.*  $\text{aa}$  20,0, mf. pulv. 2—3 mal tägl. 1 gestrich. Teel.; *Atropin* als Pillen 3 mal tägl.  $\frac{1}{2}$ —1 mg oder Rp. Extr. *Belladonn.* 0,5, *Eumydrin* 0,05, *Papaverin. hydrochlor.* 2,0, mf. pil. Nr. 50, 3 mal tägl. 1 Pille. Bei Supersekretion außerdem Magenspülungen nüchtern mit alkalischem Wasser (1% *Natr. bicarb.*

oder 1 Teel. Karlsbader Salz pro Liter). Gegen den Schmerz bei paroxysm. Gastroxynsis, speziell auch gegen den Pyloruskrampf heiÙe Breiumschläge. Zu Brunnenkuren eignen sich Karlsbad, Marienbad, Kissingen, Neuenahr.

### Ulcus ventriculi (Magengeschwür).

Das runde Magengeschwür ist ein häufiges Leiden, das hauptsächlich das jugendliche und mittlere Lebensalter, sowie Frauen öfter als Männer befällt und eine gewisse familiär-hereditäre Disposition zeigt. Sitz der Ulceration ist mit Vorliebe die kleine Krümmung bzw. die hintere Magenwand und die Gegend des Pylorus; andere Lokalisationen sind erheblich seltener. Dementsprechend unterscheidet man pylorusferne und pylorusnahe Geschwüre.

Während Ulcera, die erst kurze Zeit bestehen, einen nur oberflächlichen Schleimhautdefekt bilden (*Ulcus simplex*), dringen ältere Geschwüre häufig unter Zerstörung der Muscularis bis zur Serosa vor, so daß die Gefahr der Perforation entweder in die Bauchhöhle oder in benachbarte Organe gegeben ist (*penetrierendes Ulcus*). Die Form derartiger Geschwüre ist meist die eines schräg verlaufenden Trichters. Frischere Ulcera sind scharfrandig, ältere zeigen oft verdickte Ränder (*Ulcus callosum*). Große Geschwüre hinterlassen bei der Ausheilung ausgedehnte schrumpfende Narben, die am Korpus mitunter ringförmige Stenosen mit Sanduhrform des Magens, am Pylorus Verengerung desselben bewirken.

Ätiologie: Als Ursache des Magengeschwürs wurden eine ganze Reihe von Momenten angeschuldigt. Wie weit die Chlorose dazu disponiert, ist nicht mit Sicherheit entschieden. Sicher ist, daß der vielfach als Ursache angesehenen Hyperacidität eine ausschlaggebende Rolle nicht zukommt, zumal sie nicht selten fehlt. Immerhin dürfte sie zu den fördernden Momenten zu rechnen sein. Vieles spricht für die sog. neurogene oder spasmogene Theorie, wonach es sich um Gefäßkrämpfe in der Magenwand handelt, die infolge der dadurch verursachten umschriebenen Ernährungsstörung der Mucosa zu peptischer Verdauung und Ulceration führen. Eine Stütze hierfür bildet die Tatsache, daß häufig Ulcusträger auch sonst Zeichen erhöhter Erregbarkeit insbesondere im Bereich des vegetativen Nervensystems (*Vagus* und *Sympathicus*) zeigen. Diese sog. Vagotoniker resp. Sympathikotoniker sind u. a. gekennzeichnet durch ein sehr labiles Vasomotorensystem (kalte feuchte Hände und FüÙe, rasches Erblässen und Erröten) und reagieren auf bestimmte Pharmaka wie Pilokarpin, Adrenalin usw. intensiver als der Gesunde. Von diesem Gesichtspunkte betrachtet ist auch die Hyperacidität nicht Ursache, sondern gleichfalls Folge eines allgemeinen konstitutionellen Reizzustandes. Der Erfolg einer gegen letzteren gerichteten Therapie bildet in vielen Fällen eine Bestätigung für die Richtigkeit der neurogenen Theorie. Daneben dürften lokale Verhältnisse des Magens an der kleinen Krümmung und am Pylorus Gründe für die geringe Heilungstendenz eines einmal vorhandenen Ulcus bilden, welches übrigens seinerseits durch den dauernd von ihm ausgehenden Reiz wiederum zu Spasmen Anlaß gibt. In seltenen Fällen ist eine traumatische Entstehung anzunehmen.

Krankheitsbild: Nicht selten bleibt das Magengeschwür lange Zeit völlig symptomlos, bis es eines Tages zu einer heftigen Blutung oder gar zu einer Perforationsperitonitis kommt. In zahlreichen anderen Fällen bestehen längere Zeit hindurch uncharakteristische Magenbeschwerden, z. T. wie bei Hyperacidität (s. oben), Druck- und Völlegefühl nach dem Essen, saures Aufstoßen, Übelkeit, Erbrechen, hartnäckige Obstipation. In wieder anderen Fällen führen die Beschwerden sofort auf die richtige Fährte, vor allem heftige Schmerzen, die im Anschluß an die Nahrungsaufnahme sofort oder im Verlauf der nächsten Stunden und besonders bei größerer Kost auftreten und zu denen sich

die übrigen schon genannten Beschwerden hinzugesellen. Der Appetit ist häufig nicht beeinträchtigt, falls er nicht durch die Furcht vor Schmerz leidet.

Objektiver Befund: Die Pat. zeigen oft erhebliche Grade von Unterernährung, die Zunge ist meist nicht belegt. Lokal besteht mitunter eine Druckempfindlichkeit der ganzen Magengegend, häufiger jedoch vor allem im Bereich der Mittellinie zwischen Schwertfortsatz und Nabel oder nur in der Nachbarschaft des Nabels (Pylorus!), wobei übrigens nach den Erfahrungen der Röntgenuntersuchung die druckempfindlichen Punkte oft nicht exakt mit dem Magen selbst zusammenfallen. Eine zirkumskripte, diagnostisch wertvolle Schmerzhaftigkeit läßt sich nicht selten beim Beklopfen der Magengegend mit dem Perkussionshammer nachweisen. Schließlich besteht bisweilen ein Druckpunkt hinten links neben der Wirbelsäule zwischen dem 10. und 12. Brustwirbel. Eins der wichtigsten objektiven Symptome ist der Nachweis der Blutung. Größere Blutmengen sind als solche sofort zu erkennen. Blut im Erbrochenen ist im Gegensatz zu dem hellroten Lungenblut infolge der Magen-HCl braunschwarz (bisweilen kaffeesatzartig), der Stuhl wird teerfarben. Häufiger handelt es sich um sehr geringe, nicht ohne weiteres erkennbare „okkulte“ Blutungen, die auf chemischem oder spektroskopischem Wege im Stuhl oder im Erbrochenen nachgewiesen werden müssen.

Der Nachweis der Blutung (sofern er exakt geführt wird!) ist von der allergrößten diagnostischen Bedeutung. Voraussetzung für die Verwertung der Blutprobe ist, daß der Kranke mindestens 3 Tage vorher fleisch- und chlorophyllfrei ernährt wird und seit der letzten Fleischnahrung mehrfache Entleerungen gehabt hat. Übrigens ist das Fehlen von okkultem Blut diagnostisch gegen die Annahme eines Ulcus nicht zu verwerten, da sehr häufig die Blutung eine Zeitlang sistiert.

Die Untersuchung des Magensaftes an einem ausgeheberten Probetruhstück ist nur zu einer Zeit erlaubt, wo kein okkultes Blut nachweisbar ist. Oft finden sich abnorm hohe HCl-Werte, ebenso im Erbrochenen. Jedoch wird in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen die Hyperacidität vermißt, oft findet man sogar Subacidität.

Die Röntgenuntersuchung mittelst Kontrastmahlzeit ergibt namentlich bei ausgiebiger Heranziehung der Durchleuchtung vor dem Schirm neben der Photographie oft wertvolle Aufschlüsse. Das gilt allerdings in erster Linie für die Fälle älterer Ulcerationen mit stärkeren anatomischen Veränderungen, während das frische Ulcus simplex häufig keinen positiven Befund ergibt<sup>1)</sup>.

Zum mindesten ist es oft möglich, durch Palpation vor dem Schirm zu entscheiden, ob Druckpunkte dem Magen selbst (meist kl. Kurvatur bzw. Pylorus) angehören oder seiner Nachbarschaft. Oft sind weitere Schlüsse auf indirektem Wege möglich. So ist z. B. ein noch nach 6 Stunden nachweisbarer größerer Rest von Kontrastmahlzeit im Magen als Folge eines abnormen Contractionszustandes des Pylorus auf ein pylorusnahes Ulcus sehr verdächtig; mitunter beobachtet man tiefe spastische Einziehungen an der großen Kurvatur, die häufig gegenüber dem Ulcus der kleinen Kurvatur liegen und auf dieses quasi wie ein Finger hinweisen (Abb. 33), ferner Einrollung des Pylorus infolge von Zug des Omentum minus; beides pflegt nach 0,001 Atropin subc. zu verschwinden. Ein sicheres, aber nicht häufiges Zeichen eines kallösen Geschwürs ist das Vorhanden-

<sup>1)</sup> Es ist bezüglich der Röntgenuntersuchung zu betonen, daß man, um nicht ein Opfer von Täuschungen durch bedeutungslose Zufallsbilder zu werden, bei nicht sehr eklatanten Befunden die Untersuchung, wenn irgend möglich, ein zweites Mal vornehmen soll.

sein einer vorspringenden sog. Haudekschen Nische an der kleinen Kurvatur. Die Nische kann übrigens auch auf lokalem Spasmus infolge des Ulcus beruhen, so daß sie bei Besserung vorübergehend schwindet und evtl. auch bei Operationen vermißt wird. Der organische Sanduhrmagen, der durch Narbenbildung entsteht, ist von der oben genannten spastischen Sanduhrform zu unterscheiden, einmal durch den meist längeren kanalartigen Isthmus mit oft unregelmäßiger Konturierung bei ersterem, sodann durch Schwinden des letzteren auf 1 mg Atropin subcut. In beiden Fällen liegt die Einschnürung meist etwas exzentrisch näher der kl. Kurvatur (im Gegensatz zum Carcinom). Endlich sind die ebenfalls im Röntgenbild nachweisbaren auf Perigastritis beruhenden Verwachsungen hierherzuzählen, die sich bei der Palpation des Magens vor dem Schirm durch mangelhafte Verschieblichkeit einzelner Punkte desselben, teils durch Verlagerungen besonders des Pylorus nach rechts (sog. Rechtsdistanz) verraten. Im letzteren Falle treten häufig nach dem Essen Beschwerden beim Liegen auf der linken Seite infolge Zerrung auf.

Der Verlauf des Magengeschwürs ist wechselnd, meist verläuft es schleichend, nicht selten, wie schon bemerkt, längere Zeit latent. Zu beachten ist, daß oft die Beschwerden eine ausgesprochene Periodizität besitzen, indem sie in Zeiten der Schonung vorübergehend völlig schwinden, so daß eine Heilung des Ulcus vorgetäuscht wird. Nach einiger Zeit pflegen in unbehandelten Fällen die alten Beschwerden von neuem aufzutreten und führen dann allmählich durch die stetig wiederkehrenden Schmerzen bzw. durch die Furcht vor denselben mindestens zu einer fortschreitenden

Unterernährung, häufig mit nicht unbeträchtlicher Anämie. Aber auch hiervon abgesehen drohen jedem Ulcusträger dauernd große Gefahren nicht nur in Form umfangreicher lebensgefährlicher Blutungen, sondern auch durch die Möglichkeit der Perforation des Geschwürs. Letztere kann in die freie Bauchhöhle unter den Erscheinungen der akuten diffusen Peritonitis oder der „gedeckten Perforation“ erfolgen; häufiger ist das langsame Hineinfressen des Geschwürs als sog. penetrierendes Ulcus in solide Nachbarorgane, vor allem in Pankreas oder Leber (Röntgen: Nischenbildung mit Fixation an dieser Stelle). Bisweilen bricht das Geschwür in das Kolon durch. Sind ausgedehnte Verwachsungen vorhanden, so führt die Perforation gelegentlich zu einem subphrenischen Abszeß; mitunter zeigt das Auftreten einer („Durchwanderungs“-)Pleuritis bzw. Empyem links die latente Perforation an.

Diagnose: Die Erkennung des Leidens ist in den typischen Fällen leicht. Obenan steht u. a. der Nachweis der Magenblutung.

Okkultes Blut kann aber auch auf anderen Prozessen im Verdauungskanal beruhen. Abgesehen von verschlucktem Blut nach Nasenbluten oder Zahnfleischblutungen kommen Blutungen vor bei Ösophagusvaricen (Lebercirrhose), bei Magenkarzinom, bei Ulcerationen und Neoplasmen in den oberen Darmabschnitten, bei Darminfarkt, Darminvagination, Appendicitis, bei Arteriosklerose, hämorrhagischer Diathese (Cholämie), sowie Sepsis, während Hämorrhagien im unteren Dickdarm bzw. Mastdarm, beispielsweise bei Hämorrhoiden sich durch dem




Abb 33. Spastischer Sanduhrmagen bei Ulcus der kl. Kurvatur mit Nischenbildung (nach Hirsch-Arnold).

Stuhl aufgelagertes und als solches erkennbares Blut verraten. Es ist übrigens nicht ratsam, sich von dem Bestehen einer Blutung durch die Magensonde zu überzeugen, wie überhaupt deren Anwendung, solange Blut im Stuhl nachgewiesen wird, besser unterbleibt.

Hyperacidität schließt speziell das Magencarcinom mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Dagegen können gastrische Krisen bei Tabes an das Bild des Magengeschwürs erinnern, zumal auch hier gelegentlich stark saurer Magensaft, bisweilen sogar mit geringen Blutbeimengungen erbrochen wird (Nervenstatus!). Der Zeitpunkt des Auftretens der Schmerzen nach der Nahrungsaufnahme erlaubt häufig eine Lokalisation des Ulcus: Schmerzen sofort nach dem Essen sind auf ein Ulcus des Magenkörpers, der sog. Spätschmerz einige Stunden p. c. hingegen auf ein pylorusnahes Geschwür verdächtig (vgl. Ulcus duodeni). Von den Röntgenbefunden sind das Nischen- sowie das Sanduhrphänomen die sichersten Ulcuszeichen, während die übrigen Veränderungen nur bedingt diagnostischen Wert haben, und zwar im Zusammenhang mit den übrigen Symptomen. Die genannten auf Verwachungen hindeutenden Zeichen, insbesondere die Rechtsverziehung des Pylorus kann ebensowohl bei entzündlichen Veränderungen der Gallenblase (Pericholecystitis) vorkommen.

Diagnose der abgesackten Peritonitis und des subphrenischen Abscesses s. S. 354.

Therapie: Sieht man von der akuten abundanten Blutung ab, bei der die allgemeinen Grundsätze der Behandlung akuter Blutverluste gelten sowie von der Perforation, die das sofortige Eingreifen des Chirurgen erheischt, so kommt für die Therapie des Ulcus zunächst sowohl eine diätetische wie eine medikamentöse und schließlich in manchen Fällen eine chirurgische Behandlung in Frage. Solange das Geschwür blutet und in den nächsten darauf folgenden Tagen ist absolute Bettruhe in Rückenlage (Bettschüssel) unter Anwendung einer schwebenden Eisblase sowie Enthaltung jeglicher Nahrung erforderlich; bei großer Erregbarkeit des Pat. oder Neigung zu Erbrechen ein Narkoticum (subkut. oder als Supposit. Papaverin 0,06 oder Belladonna 0,02—0,03 resp. 0,01—0,02 Morphium) indiziert.

Hinsichtlich der Diätbehandlung kann man nach zwei verschiedenen Grundsätzen verfahren. Die Leubeseche Diätkur stellt eine möglichste Schonung des Magens in den Vordergrund: während der ersten 3 Tage nach der Blutung absolute Karenz, höchstens ein Nährklyma (vgl. S. 285); hierauf erfolgt zunächst 10 Tage lang rein flüssige Ernährung, die allmählich von 10 zu 10 Tagen konsistenter wird. Das Schema S. 299 gibt eine von Penzoldt angegebene Modifikation dieser Kur wieder. Außerdem erhält der Patient 4 Wochen lang morgens  $\frac{1}{2}$  Stunde nach dem Frühstück  $\frac{1}{4}$  l lauwarmen Karlsbader Mühlbrunnen. Lenhartz beginnt unmittelbar nach der Blutung mit einer kalorien- und eiweißreichen Ernährung, da er auf diesem Wege eine baldige Kräftigung des durch die Blutungen und die Unterernährung geschwächten Kranken zur schnelleren Ausheilung des Ulcus für wesentlich hält. Schema s. S. 300. Unter Berücksichtigung des Appetits und des Geschmackes des Pat. kann man auch das Leubeseche und Lenhartzsche Diät-schema miteinander kombinieren. Unterschiede im einzelnen Fall ergeben sich u. a. auch aus dem Verhalten der Saftsekretion. Bei Hyperaciden ist die S. 294 beschriebene Diät, die wenig Safttreiber enthält, anzuwenden; auch ist von der sekretionshemmenden Eigenschaft der Fette (Sahne, Butter; 1—2 Eßlöffel Olivenöl nach der Mahlzeit) Gebrauch zu machen.

Zur Schmerzstillung empfiehlt sich in erster Linie nach Aufhören der Blutung die konsequente Anwendung von heißen feuchten Umschlägen. Als Medikamente sind zu empfehlen das Bismuth. subnit. teelöffelweise in warmem Wasser aufgeschwemmt, morgens nüchtern (hinterher  $\frac{1}{2}$  Stde. rechte Seitenlage); sehr wirksam ist weiter das Argent. nitr. 0,1:150,0 dreimal tägl. 1 Eßl. auf leeren

Beispiel eines Tageszettels bei Magengeschwür nach Leube-Penzoldt.

Uhr	1. Dekade	2. Dekade	3. Dekade	4. Dekade
6—7	250,0 lauwarm. Wasser od. Karlsbad. Mühlbrunnen m. 1/3—1 Teel. Karlsb. Salz	Ebenso	Ebenso	250,0 Milch
7—8	250,0 abgekochte Milch, 1 Cakes	250,0 Milch, 2 Cakes	300,0 Milch, 3 Zwieback	500,0 Milch, 1 Milchbrot
9—10	200,0 leere Fleischbrühe od. m. Fleischlösg. 1 Cakes	250,0 Milch, 2 Cakes, etw. geschabt. Rindfl.	Bouillon m. Ei, 1 Milchbrot (50,0) mit 100,0 geschabtem Lachsschink. od. roh. Rindfleischwurst	Bouillon m. Ei, 1 Milchbrot m. 100,0 kalt. Filet oder Kalbsbraten
12—1	Fleischbrühe m. 1 Ei od. Fleischsolution, ev. Kind.-Mehlsuppe, Fleischgelee 1 Cakes	Fleischbrühe m. 100,0 gesott. Kalbshirn, -Bries, Jungghuhn od. Taube m. Ei ohne Fett u. Haut usw.	Bouillon m. Hirn, 100,0 Beefsteak, durchgeschl. Kartoff.-Brei, 1 Milchbrot	Bouillon m. Bries o. Taube, ev. etw. Forelle od. ähnl. Fisch, 100,0 Roastbeef m. Kart.- od. Reisbrei, 1 Gl. Rotwein, Milchbrot
3—4 6—7	250,0 Milch Ebenso od. Fleischbrühe mit Ei, 1 Cakes	250,0 Milch, 2 Cakes Wie Mittag, od. Tapiokabrei (von 30,0)	250,0 Milch, 3 Zwieb. 1 gebrat. Taube od. Jung- huhn, Kartoff.-Brei, 1 Milchbrot	250,0 Milch, 3 Zwieb. 100,0 Beefsteak, Geflügel od. kalt. Braten, Kart.-Brei, Obstmus, 1 Gl. Rotwein, 1 Milchbrot
Nachts	Ev. 250,0 Milch (Während d. Tags heiße Breiumschläge. Nachts: Prießnitz)	250,0 Milch (Ebenso)	250,0 Milch (Tags über: Prießnitz)	250,0 Milch (Leibbinde)
Minimaler Nährwert der Nahrung	Eiweiß . . . . . ca. 45 g Fett . . . . . „ 40 g Kohlehydr. . . . . „ 60 g	Eiweiß . . . . . ca. 75 g Fett . . . . . „ 45 g Kohlehydr. . . . . „ 90 g	Eiweiß . . . . . ca. 100 g Fett . . . . . „ 50 g Kohlehydr. . . . . „ 180 g	Eiweiß . . . . . ca. 150 g Fett . . . . . „ 55 g Kohlehydrate . . . . . „ 200 g
	Verbrennungsw. ca. 800 Cal.	ca. 1080 Cal.	ca. 1600 Cal.	ca. 1900 Cal.



Magen, ferner Anästhesin (Tabl.) zweimal tägl. 0,2 oder 0,5. Bei vagotonischen Individuen mit Hyperacidität wirkt Atropin oft günstig (mehrere Wochen zweimal tägl. 1 mg subc. oder das weniger giftige Eumydrin 2 mg bzw. Extract. Belladonn. 0,02 als Suppos. oder Papaverin zweimal tägl. 0,04); zugleich wird dadurch die häufige spastische Obstipation gebessert. Das Bett darf der Pat. frühestens nach der dritten Woche für 1 Stunde verlassen. Ulcusranke müssen auch nach Aufhören sämtlicher Beschwerden für die Dauer mindestens eines Jahres Schonungsdiät streng beobachten (Latenz des Ulcus!), nach jeder größeren Nahrungsaufnahme mindestens eine Stunde lang Ruhe in Rückenlage beobachten und neben der Liegekur die Anwendung von Breiumschlägen nach dem Essen konsequent durchführen. Jede stärkere Anstrengung und insbesondere Druck auf die Magengegend (Schnüren!) ist vom Übel. Von Zeit zu Zeit soll der Stuhl auf okkultes Blut untersucht werden.

Die chirurgische Behandlung des Ulcus kann (von der Perforation abgesehen) dort notwendig werden, wo die innere Therapie auf die Dauer versagt. Zu diesen Fällen gehören vor allem das kallöse bzw. penetrierende Ulcus, der (organisch bedingte) Sanduhrmagen, ferner dauernder Pylorospasmus sowie ausgedehntere, die Magenmobilität erheblich störende Verwachsungen, schließlich stets trotz interner Kur wiederkehrende Blutungen. Als Operation kommt bei pylorusnahe Ulcus die Gastroenterostomie (jetzt oft mit Verschluss des Pylorus kombiniert) in Frage (Mortal. max. 6%), die namentlich in Fällen mit Superacidität die Kranken nicht selten dauernd beschwerdefrei macht, bei pylorusfernem Ulcus ev. die Resektion, die aber einen wesentlich schwereren Eingriff bildet (Mortal. max. 20%). Nachbehandlung der Gastroenterostomie s. S. 315.

Ulcus-Diätschema nach Lenhartz.

Tage (nach der Magenblutung)	1	2	3	4	5	6	7	
Eier . . . . .	2	3	4	5	6	7	8	1 Ei = 73-Cal.
			eingeschlagen				4 einge-	
Zuckermilch . . . . .	—	300	20	20	30	30	40	1000 g = 3880 „
Milch . . . . .	200	—	400	500	600	700	800	1000 g = 670 „
Roh. Hackfleisch . . . . .	—	—	—	—	—	35	2 × 35	1000 g = 980 „
Milchreis . . . . .	—	—	—	—	—	—	100	1000 g = 2450 „
Zwieback . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1000 g = 3320 „
Roh. Schinken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1000 g = 3790 „
Butter . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1000 g = 7560 „
Calorien . . . . .	280	420	637	777	955	1135	1588	

Fortsetzung.

Tage (nach der Magenblutung)	8	9	10	11	12	13	14—28	
Eier . . . . .	8	8	8	8	8	8	8	1 Ei = 73-Cal.
	schlagen		4 gek.					
Zuckermilch . . . . .	40	50	50	50	50	50	50	1000 g = 3880 „
Milch . . . . .	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000 g = 670 „
Roh. Hackfleisch . . . . .	2 × 35	2 × 35	2 × 35	2 × 35	2 × 35	2 × 35	2 × 35	1000 g = 980 „
Milchreis . . . . .	100	200	200	300	300	300	300	1000 g = 2450 „
Zwieback . . . . .	20=1 Stück	40	40	60	60	80	100	1000 g = 3320 „
Roh. Schinken . . . . .	—	—	50	50	50	50	50	1000 g = 3790 „
Butter . . . . .	—	—	20	40	40	40	40	1000 g = 7560 „
Calorien . . . . .	1721	2138	2478	2941	2941	3007	3073	

## Magencarcinom (Magenkrebs).

Das Magencarcinom zeichnet sich unter den Carcinomen der verschiedenen Organe durch seine besondere Häufigkeit aus. Es befällt mit Vorliebe das 5.—7. Dezennium; nur ganz ausnahmsweise werden jugendliche Individuen, bisweilen sogar schon in den 20er Jahren betroffen. Besondere ätiologische Momente sind unbekannt; eine gewisse familiäre Disposition läßt sich öfter beobachten. Auffallenderweise handelt es sich oft um Individuen, die sich bis dahin eines leistungsfähigen Magens erfreuten.

Anatomisch handelt es sich teils um circumscriphte, und zwar häufig polyöse Tumoren, teils um diffuse Krebsinfiltrate. Lieblingssitz ist die Regio pylorica sowie die kleine Kurvatur, gelegentlich kommen Carzinome an der Kardia vor. Histologisch ein Zylinderepithelcarcinom tritt er häufig in der Form des weichen sog. Medullarkrebses auf, der unter der Einwirkung des Magensaftes Neigung zu geschwürigem Verfall zeigt. Eine andere Form ist der sog. Scirrhus, der zu derber schrumpfender Infiltration der Magenwand führt. Seltener ist das als Gallertkrebs bezeichnete Kolloidcarcinom, das man öfter bei jugendlichen Individuen beobachtet. Die Entwicklung eines Carcinoms auf dem Boden eines alten Magengeschwürs dürfte recht selten sein. Im weiteren Verlauf stellen sich regelmäßig Metastasen namentlich in der Leber und den regionären Lymphdrüsen ein.

Symptome: Die ersten Erscheinungen sind fast stets uncharakteristisch. Ein verdächtiges Zeichen ist hartnäckiger Appetitmangel bei Menschen, die bisher gut aßen, namentlich dann, wenn ein ausgesprochener Widerwillen gegen Fleischspeisen vorhanden ist. Druckgefühl im Magen nach dem Essen, Aufstoßen und Übelkeit sind nicht selten, wogegen Schmerzen in der Magengegend, wenn überhaupt vorhanden, meist erst im späteren Verlauf auftreten und dann im Gegensatz zum Ulcus meist dauernd bestehen. Die Unbestimmtheit der anfänglichen Beschwerden erklärt, daß viele Pat. erst in vorgerückteren Stadien ihres Leidens den Arzt aufsuchen.

Die objektive Untersuchung läßt oft frühzeitig im Gegensatz zu den scheinbar harmlosen Beschwerden eine auffallende Abmagerung bzw. bereits eine Andeutung von Kachexie (gelblich-fahle, welke Haut, schlaffes Unterhautzellgewebe) sowie vor allem einen nicht unerheblichen Grad von Anämie erkennen. In anderen Fällen verrät der äußere Habitus zunächst nicht das Bestehen des gefährlichen Leidens. Die Palpation des Abdomens ergibt anfangs in der Regel keinen positiven Befund, insbesondere vermißt man zunächst fast immer das Vorhandensein einer fühlbaren Geschwulst (cave Verwechslung mit Kotballen oder mit dem gespannten Musc. rectus!). Bedeutsam hingegen ist das bereits frühzeitig zu konstatierende Verhalten des Magensaftes nach Probefrühstück bzw. Probemahlzeit<sup>1)</sup>: Fehlen der freien HCl, niedrige Gesamtzidität, großes HCl-Defizit, häufig Vorhandensein von Milchsäure.

Die Verminderung der Säurewerte beruht sowohl auf gewissen vom Tumor abgegebenen Abbauprodukten des Krebsgewebes, die HCl binden, als auch auf der begleitenden Atrophie der Magenschleimhaut. Normale oder vermehrte HCl-Werte

<sup>1)</sup> Es ist zu beachten, daß infolge der niedrigen Säurewerte der Magen sich schneller entleert. Aus diesem Grunde muß man, um genügend Magensaft zu erhalten, schon nach einer halben Stunde aushebern. Die beschleunigte Entleerung ist auch bei der Röntgenuntersuchung zu berücksichtigen.

finden sich bei Ca. nach *Ulcus ventric.* Mikroskopisch ist besonders der Befund der langen fadenförmigen Milchsäurebacillen von Bedeutung. Sarcine wird in der Regel vermißt; häufig ist reichlich Hefe vorhanden. Die chemische Blutprobe ist am Magensaft oft frühzeitig positiv, dementsprechend enthält auch der Stuhl in sehr zahlreichen Fällen und dann (im Gegensatz zum *Ulc. ventric.*) meistens dauernd okkultes Blut. Sind größere Blutmengen im Magensaft vorhanden, was man in späteren Stadien häufig beobachtet, so zeigt das Erbrochene das charakteristische Aussehen von Kaffeesatz. Mitunter hat das Ausgeheberte einen eigentümlichen Verwesungsgeruch. Ulcerierte Carcinome (aber auch ausgedehnte *Ulceria ventric.*) scheiden Eiweiß ab, worauf die Salomonsche Probe beruht: Nach abendlicher Leerspülung des Magens wird derselbe morgens nüchtern mit 400 cm<sup>3</sup> phys. NaCl-Lösung gespült. Eiweißgehalt der Spülflüssigkeit nach Eßbach von 0,1 bis 0,5% spricht für Ca. Ferner läßt sich die polypeptidspaltende Eigenschaft des Ca. mit dem Neubauer-Fischerschen Fermentdiagnostikum (fertig zu beziehen von Kalle-Biebrich) verwerten, indem hier Glycyltryptophan durch Ca.-Magensaft gespalten wird und das freigewordene Tryptophan bei Zusatz einiger Tropfen Bromwasser oder verdünnter Chlorkalklösung sich durch Rotviolett-färbung verriät. Jedoch überzeuge man sich von dem Fehlen von Blut sowie von Duodenalsaft (Gmelinsche Probe), die beide ebenfalls Spaltung bewirken.

Wichtige Dienste vermag in der Aufklärung des Krankheitsbildes oft die Röntgenuntersuchung (Kontrastmahlzeit) zu leisten, nicht nur mit der Photographie, sondern vor allem mittelst Durchleuchtungen.

Manche Tumoren verraten sich durch eine an der Stelle der Geschwulst wahrnehmbare Aussparung bzw. Aufhellung des Mageninhalts (sog. Füllungsdefekt).




Abb. 34.




Abb. 35.

Füllungsdefekte bei Magencarcinom (nach Hirsch-Arnold).

vgl. Abb. 34 und 35), mitunter auch durch eine Nichtbeteiligung dieses Punktes an der Peristaltik. Bei fortgeschritteneren Fällen, bei denen die Geschwulst in größerem Umfang den Magenkörper umgreift, kann sich eine trichterförmige Einschnürung desselben entwickeln (Ca.-Sanduhrmagen). Der Scirrhus erscheint im Röntgenbild oft als kleiner sog. Schrumpfmagen. Sitzt das Ca. am Pylorus, so erscheint dieser unscharf und verschwommen oder ist ev. zu einem schmalen Isthmus verengt; stärkere Stenosierung erkennt man an dem größeren Residuum nach 6 und mehr Stunden. Diffuse Infiltration des Pylorus verwandelt diesen mitunter in ein starres Rohr, was dauerndes Offenstehen des Pylorus bewirkt. Im Gegensatz zur Narbenstenose des Pylorus pflegt aber bei Ca. infolge der schnellen Entwicklung des Leidens ein höherer Grad von Ektasie zu fehlen. Kardiocarcinome zeigen mitunter Stauung im Ösophagus unter dem Bilde des Kardiospasmus (vgl. S. 283); letzterer kann übrigens außerdem vorhanden sein; in anderen Fällen steht die Kardia infolge von Infiltration mit dem Tumor dauernd offen, so daß die Magenblase fehlt.

Verlauf: Das weitere Fortschreiten des Leidens verrät sich durch Zunahme der Kachexie und Anämie. Letztere kann schließlich so extreme Grade erreichen, daß mitunter das Vorhandensein einer perniziösen Anämie vorgetäuscht wird. Es besteht hochgradige Anorexie, die im Verein mit häufigem, bei Pylorus-Ca. regelmäßig vorhandenem Erbrechen den Verfall beschleunigt. Jetzt sind auch nicht selten stärkere Schmerzen vorhanden, die zum Teil mit dem Übergreifen des Tumors auf die Nachbarorgane zusammenhängen. In diesem Stadium ist der Tumor oft als höckerige Geschwulst in der linken Oberbauchgegend oder nahe der Mittellinie zu palpieren (in  $\frac{1}{5}$  der Fälle ist er bis zuletzt nicht nachweisbar); er ist wie die Lebertumoren mit der Atmung etwas verschieblich, läßt sich jedoch nach tiefster Inspiration fixieren, um nachher von selbst in die Höhe zu steigen. Bisweilen ist jetzt auch die Leber infolge von Metastasen vergrößert, die man nicht selten als knotenförmige Unebenheiten bei der Palpation wahrnehmen kann. Die Milz ist stets klein. Leichte Temperatursteigerungen sind häufig, höheres Fieber beobachtet man öfter beim Ca. jugendlicher Individuen. Oft bestehen hartnäckige Obstipation, in anderen Fällen Diarrhöen. Der Harn ist hochgestellt, enthält oft etwas Eiweiß und gibt bei ausgedehnterer Entwicklung von Lebermetastasen bisweilen, aber nicht immer positive Aldehydreaktion. In späteren Stadien stellt sich öfters Ascites ein.

Der ausnahmslos tödliche Verlauf kann sich verschieden gestalten, je nach dem Vorhandensein oder Fehlen von Komplikationen. In einem Teil der Fälle erlischt schließlich das Leben infolge hochgradiger Inanition und Anämie. In anderen Fällen kommt es zu einem Durchbruch des Tumors in die Nachbarschaft; so entsteht z. B. eine Perforationsperitonitis oder eine Magenkolonfistel, die man aus dem fäkulenten Erbrechen diagnostiziert<sup>1)</sup>. In manchen Fällen, namentlich beim Kolloidkrebs, ist starker Ascites vorhanden, dessen cytologische Untersuchung mitunter charakteristische Tumorzellen ergibt.

Die Dauer des Leidens von dem Beginn charakteristischer Symptome beträgt im Mittel ca. 1 Jahr.

Die Diagnose ist in den typischen Fällen bei voll entwickeltem Krankheitsbild leicht; schwierig kann sie in den Anfangsstadien sein. Ein Tumor kann sich während der ganzen Dauer der Krankheit dem Nachweis entziehen, z. B. beim Sitz nahe der Kardie oder an der hinteren Magenwand. Neben dem Magensaftbefund (Achylie; Milchsäurestäbchen!) ist der wiederholte Nachweis von okkultem Blut im Stuhl von großer diagnostischer Bedeutung. Die schwere Anämie kann zu Verwechslungen mit perniziöser Anämie führen, zumal auch diese mit Achylie einhergeht. Bezüglich Differentialdiagnose sei auf S. 258 verwiesen und hier nur erwähnt, daß das Verhalten des Blutbildes beider Krankheiten bei genauerer Prüfung doch wichtige Unterschiede aufweist. Für den Erfahrenen ist überdies das charakteristische kachektische Aussehen der Krebskranken deutlich von demjenigen des perniziös-anämischen mit seinem oft guten Fettpolster verschieden. Bisweilen

<sup>1)</sup> Im Gegensatz zum Ileus können hier wirkliche Fäkalmassen erbrochen werden.

führt der Nachweis von Metastasen auf die richtige Spur. Hierzu gehört z. B. eine Drüsenmetastase links am Hals, die sog. Virchow-Drüse, die jedoch selten ist, weiter Drüsenschwellung am Nabel, sowie die bei der Untersuchung per rectum oft zu findenden Metastasen im Douglas, ferner gelegentlich Rückenmarkssyndrome infolge von Wirbelmetastasen.

Therapie: Der einzige Weg, der bei frühzeitiger Erkennung des Leidens eine gewisse Aussicht auf Erfolg hat, ist die chirurgische Behandlung (Resektion); tatsächlich kommt dieselbe jedoch wegen der Schwierigkeit der Frühdiagnose in vielen Fällen zu spät, da das Wachstum der Geschwulst bereits zu große Fortschritte gemacht hat und es oft schon bei noch kleinem Primärtumor zu Metastasen gekommen ist. Aus diesem Grunde ist bei einigermaßen begründetem Verdacht so früh wie möglich die Probelaparatomie vorzunehmen. Kommt ein operativer Eingriff nicht in Frage, so muß sich der Arzt mit einer rein symptomatischen Behandlung begnügen. Die Kost soll leicht, am besten breiig oder flüssig sein. Der mangelnden Appetenz sucht man durch Condurangopräparate (Vin. condurango 3 mal täglich 1 Eßlöffel vor dem Essen) sowie durch Acid. hydrochlor. dil. (3 mal tägl. 15—20 Tropf. in Wasser während des Essens) nachzuhelfen (vgl. auch S. 293). Gegen die Schmerzen sind feuchtwarme Umschläge, Anästhesin (mehrmals tägl. 0,2 oder 0,5 als Tabl. oder Pulver per os) und schließlich die üblichen Narkotica (Morphium, Pantopon und Belladonna per os, subcutan oder ev. als Suppositorien) anzuwenden. Bisweilen sind auch Röntgenbestrahlungen wirksam. Besteht heftiger Brechreiz infolge von Stenosierung des Pylorus, so verschaffen täglich vorgenommene Magenspülungen Erleichterung.

### Gastroptose (Magensenkung).

Magensenkung oder Tiefstand des Magens ist ein besonders beim weiblichen Geschlecht sehr häufiges Leiden, das mitunter charakteristische Beschwerden verursacht, in andern Fällen symptomtenlos bleibt. Die Klagen bestehen in lästigem Völlegefühl im Leibe nach dem Essen sowie Spannung und Druck in der Magengegend, namentlich im Epigastrium, die charakteristischerweise beim Liegen zu fehlen pflegen, ferner frühzeitiges Sättigungsgefühl, das nicht selten zu chronischer Unterernährung führt.

Oft weist schon der Befund der Inspektion auf die Diagnose hin: schlaaffe Bauchdecken (insbesondere bei Multiparen) mit Vorwölbung der Unterbauchgegend, Eingesunkensein des Epigastriums mit deutlicher Aortenpulsation, ferner Plätschergeräusche unterhalb des Nabels besonders bei stoßweiser Palpation. Doch kommt die G. auch bei völlig straffen Bauchdecken vor (sog. virginelle Ptose). Mitunter treten die ersten Beschwerden nach rascher Abmagerung auf. Häufig handelt es sich um Teilerscheinung der als Stillerscher Habitus bezeichneten konstitutionellen Asthenie, wie sie lang aufgeschossene schmalbrüstige Individuen mit zartem Skelett, dürftigem Fettpolster, schlechter Muskulatur, beweglicher X. Rippe und häufig neurasthenischen Symptomen darbieten, und ist dann oft mit allgemeiner Enteroptose (und Nephroptose) kombiniert. Für die Diagnose ausschlaggebend ist der Röntgenbefund.

Charakteristisch ist neben einer z. T. sehr stark vermehrten Längsausdehnung des Magens vor allem abnormer Tiefstand nicht nur der großen, sondern auch der kleinen Kurvatur, die unter dem Nabel liegt, zugleich besteht Senkung des Pylorus (Pyloroptose). Dieser ist oft etwas nach links verlagert und zeigt meist abnorm starke Beweglichkeit. Folge der Pyloroptose ist eine auffallend scharfe Krümmung der kleinen Kurvatur und eine fast vertikal aufsteigende Pars

super. duodeni. Der Bulbus duodeni bleibt oft abnorm lange gefüllt. Die unkomplizierte Ptose zeigt normale Peristole, d. h. gleichmäßige Füllung des Magens bis oben mit annähernd parallel verlaufenden gr. und kl. Krümmung und quer gestellter, meist kleiner Magenblase, ferner annähernd normale Motilität ohne stärkere Entleerungsverzögerung. Sehr häufig besteht aber gleichzeitig Atonie mit Flaschenform des Magens und Tiefstand der gr. Krümmung (s. unten) sowie verzögerter Entleerung. Von der gewöhnlichen Ptose prinzipiell verschieden ist die seltene sog. fixierte Gastropiose, die auf Verwachsungen der gr. Krümmung mit den Beckenorganen usw. beruht (Rö.-Untersuchung bei r. Seitenlage bzw. Beckenhochlagerung!) Mit der Gastropiose vergesellschaftet ist oft eine Koloptose (s. S. 344).

Die Therapie soll abgesehen von robrierenden (Arsen, Astonin, Chinin-Strychnin) und den Ernährungszustand hebenden diätetischen Maßnahmen (Mastkur) nur dann lokal eingreifen, wenn der Zusammenhang der Beschwerden mit der Ptose sichergestellt ist und nicht eine durch die Behandlung bewirkte Vertiefung psychogener Beschwerden zu befürchten ist, was praktisch öfter vorkommt. (Man sei deshalb auch mit der Mitteilung der Diagnose „Magensenkung“ psychisch labilen Individuen gegenüber vorsichtig.) Bei schlaffen Bauchdecken geeignete Leibbinden, deren Wirkung vor dem Rö.-Schirm zu kontrollieren ist, ev. vorher provisorischen Heftpflasterverband zur Probe anlegen. Schnüren sowie unzweckmäßige Korsetts sind zu vermeiden. Häufige, nicht voluminöse, dafür aber calorisch konzentrierte Mahlzeiten; nach jeder Mahlzeit Rückenlage. Bei virginaler Ptose ultima ratio chirurgische Gastropexie. Bei fixierter G. operative Lösung der Adhäsionen.

### Atonie, Gastrektasie, Pylorusstenose.

Atonie des Magens liegt vor, wenn derselbe die Fähigkeit verloren hat, den Inhalt fest zu umschließen. Sie beruht auf mangelhaftem Contractionszustand, d. h. Erschlaffung der Magenmuskulatur und findet sich häufig unter den gleichen Bedingungen wie die Gastropiose, mit der sie oft kombiniert ist; nicht selten wird sie bei Frauen mit schlaffen Bauchdecken nach zahlreichen Geburten beobachtet. Die Beschwerden sind denen der Ptose ähnlich. Oft beobachtet man Plätschergeräusche (die jedoch nicht eindeutig sind). Sehr charakteristisch ist der Röntgenbefund:

Anstatt der normalen Keilbildung zu Beginn der Füllung gleiten bereits die ersten Bissen der Kontrastmahlzeit sofort herab und sammeln sich im untersten Teil des Magens. Die Magenblase steht vertikal und ist langgezogen. Bei weiterer Füllung zeigt das Korpus tailenartige bzw. flaschenhalsförmige Einschnürung (Pseudosanduhrform, vgl. Abb. 36). Zu beachten ist, daß bei leichteren Fällen oft zunächst das Füllungsbild ein normales ist und erst nach einigen Minuten der ganze Inhalt in den Magensack unter Tailenbildung herabgleitet. Bei schwereren Graden steht infolge der Wanderschlagung und des Gewichtes des Inhaltes die gr. Krümmung abnorm tief, der Kontrastbrei sammelt sich vollständig als halbmondförmiger, oben horizontaler, unten konvex begrenzter Schatten im Magensack an, letzterer zeigt eine abnorme Querverbreiterung; auch die Pars pylor. ist als höher gelegener Abschnitt nicht mehr vollkommen gefüllt. Verlagerung derselben nach rechts über die Mittellinie fehlt in der Regel. Oft liegen kaudaler Pol und Pylorus sogar ganz in der linken Bauchhälfte. Die Motilität braucht bei einfacher Atonie nicht wesentlich geschädigt zu sein, die Entleerungszeit ist häufig etwas, aber nie über 12 Std. verzögert.




Abb. 36.  
Atonie des Magens  
(nach  
Hirsch-Arnold).

Von der atonischen (funktionellen) Ektasie ist die durch Pylorusverengung bedingte organische **Gastrektasie** oder **Stauungs-dilatation** zu unterscheiden. **Pylorusstenose** kann auf folgenden Ursachen beruhen: Am häufigsten **Ulcus ventric.**, ferner **Magen-carcinom**, **perigastritische Verwachsungen**, **Pericholecystitis**, mitunter **Ulcus duodeni**, **Kompression von außen durch Tumoren**, schließlich angeborene **Stenose** infolge von **Hypertrophie der Pylorusr Muskulatur**. Auch **Pyloruskrampf (Pylorospasmus)**, übrigens oft **Begleiterscheinung** einer organischen Verengung, kann leichtere Grade von **Gastrektasie** bewirken. Die **Symptome** der mechanischen **Gastrektasie** sind in leichten Fällen **Schwere und Völle im Leib** nach dem Essen, **Aufstoßen**, **Übelkeit**, in schweren Fällen **Erbrechen kopiöser Massen**, nicht selten verbunden mit **heftigen Schmerzattacken**.

Das **Erbrochene** ist charakterisiert durch das **Vorhandensein älterer Nahrungsreste**; es enthält bei **benigner Stenose** reichlich **HCl** sowie meist viel **Sarcine** und **Hefe**, die aber auch mitunter bei **Carcinom** vorkommen; für letzteres sind das **Fehlen der HCl** sowie reichlich **Milchsäurebacillen** bezeichnend. Mitunter besteht infolge der bei der **Zersetzung** entstandenen organischen Säuren **ranziger Geruch**.

Die **ersten Anfänge erschwerter Entleerung** lassen sich meist durch die **Probemahlzeit**, der man **Korinthen** oder **Preißelbeeren** zusetzt, erkennen, indem **6—8 Std. p. c.** Nahrungsreste gefunden werden (**motorische Insuff. I. Grades**). Bei höheren Graden (**Insuffizienz 2. Grades**) findet man Reste noch am anderen Morgen. Die **Gastrektasie** kann schließlich sehr hohe Grade erreichen, so daß der Magen bis zu **10 l Inhalt** faßt; in diesen Fällen ermöglicht schon allein das große Volumen der erbrochenen Massen die **Diagnose**. Zum Teil erfolgt übrigens eine weitere Zunahme der Flüssigkeit im Magen durch die auf die **Resorption von Zucker und Pepton** erfolgende **Verdünnungssekretion** seitens der **Magenschleimhaut** (vgl. S. 289).

**Hochgradige Stauungs-ektasie** bewirkt auf die **Dauer** schwere **Beinträchtigung des Allgemeinbefindens**, **starke Abmagerung**, **Schwächegefühl**, **Schwindelanfälle**, **Eindickung des Blutes (Polyglobulie)**, **Verminderung der Harnmenge** und **allgemeine Wasserverarmung des Körpers**, **Trockenheit der Mundhöhle** und der **Zunge**, **starken Durst**. Bei dünnen **Bauchdecken** scheint bisweilen der **ektatische Magen** als **großer**, bis zur **Symphyse herabhängender Sack** hindurch und zeigt **lebhaft peristaltische Unruhe** sowie mitunter eine mit **Schmerz einhergehende sicht- und fühlbare „Magensteifung“**. Gelegentlich kommt bei **Pylorusstenose** **Tetanie** vor.

**Röntgenbefund:** In den ersten Stadien erschwerter Entleerung, welche durch **verstärkte Muskelarbeit** des Magens überwunden wird („**kompensierte**“ **Pylorusstenose**<sup>1)</sup>) besteht sog. **Stenosenperistaltik**, d. h. vom **Fundus** zum **Pylorus** laufende tief einschneidende **peristaltische Wellen** an der **gr. und kl. Kurvatur**, gelegentlich mit **rückläufiger Wellenbewegung** als sog. **Antiperistaltik**. Doch kommt ein der **Stenosenperistaltik** ähnliches Bild auch bei **Neurosen** sowie **Ulcus duodeni** ohne **Stenose** vor. Sehr charakteristisch sind die **Bilder** bei **ausgebildeter Stauungs-dilatation**: wie bei **hochgradiger Atonie** eine **halbmondförmige**, oben **horizontal begrenzte Ansammlung** der **Kontrastmahlzeit** im **Magensack**, welcher **quergedehnt** ist und im **Gegensatz** zur **einfachen Atonie** mit der **Pars pylor.** weit nach rechts herüber reicht (**Rechtsdistanz**); die **Entleerungsverzögerung** beträgt mehr als **7**, oft **12—24 Std.** In schweren Fällen fehlt häufig jede **Peristaltik**.

<sup>1)</sup> Die durch **Arbeitshypertrophie** der **Magenmuskulatur** erfolgende **Überwindung des Hindernisses** stellt ein Analogon zu den Verhältnissen bei den **Klappenstenosen des Herzens** dar.

Eine akut entstehende Magenektasie entsteht mitunter durch plötzliche Lähmung der Magenmuskulatur oder infolge von Strangulation des Duodenums durch die Mesenterialwurzel (sog. arteriomesenterialer Darmverschluß). Sie wird bei Individuen mit herabgekommenem Ernährungszustand sowie im Anschluß an Laparotomien sowie Narkosen beobachtet. Unter Kollapserscheinungen erfolgt ein nicht kotiges galliges Erbrechen. Der Magen wird als stark gedehntes (mit Flüssigkeit gefülltes) Organ unter den Bauchdecken sichtbar. Ikterus fehlt. Die Erkrankung wird gelegentlich bei Typhus, ferner bei Poliomyelitis beobachtet. Der Zustand ist sehr gefährlich (Mortal. 75%). Therapie: Magenaushöhlung und Spülung, man läßt die Sonde liegen; evtl. Operation.

Die Therapie der funktionellen Atonie ist im allgemeinen die gleiche wie bei Gastropse; man vermeide u. a. größere Flüssigkeitszufuhr. Zweckmäßig sind Strychninpräparate z. B. Rp. Tct. Strychni, Tct. chin. comp. ää 10,0, 3 mal tägl. 10—20 Tropf. Elektrisieren und Massieren des Bauches.

Bei Gastrektasie infolge von Pylorusstenose sind vor allem die gestauten und zersetzten Massen durch regelmäßige Spülung des Magens zu entfernen (lauwarmes Wasser, evtl. mit Zusatz von 1 Teel. Acid. boric. pro L.), am besten abends vor dem Schlafengehen oder morgens nüchtern; man spült bis zum Klarwerden der Flüssigkeit. Desinfektion des Mageninhalts ev. mit Bismuth. bisalicyl. (Gastrost.-Tabl.) 3 mal tägl. 0,5—1,0 oder mit H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, z. B. Magnesiumperhydrol, oder auch bei HCl-Mangel mit Salzsäuretropfen. Häufig kleine Mahlzeiten, breiige leichte Kost, Vermeidung aller zu Gärung bzw. Fäulnis neigenden Speisen wie Käse, Wild usw. Bei hochgradiger Stenose unter Umständen Nährklysmen (vgl. S. 285), vor allem gegen Wasserverarmung Einläufe von physiol. NaCl-Lösung. Bei Narbenstenose ist die operative Behandlung (Pylorusresektion) bzw. Gastroenterostomie indiziert, nach welcher der Magen oft wieder seine normale motorische Funktion wieder erlangt. Auch bei organischen Stenosen versuche man übrigens wegen des häufig gleichzeitig vorhandenen Pylorospasmus Atropin (1/2—1 mg 2—3 mal tägl.) oder Papaverin (2—3 mal tägl. 0,04). Stets ist auch die meist bestehende spastische Obstipation zu behandeln.

## Magenneurosen.

Der durch exakte Untersuchungen insbesondere der Pawlowschen Schule festgestellte innige Konnex zwischen Psyche und Magenfunktion erklärt das häufige Vorkommen funktioneller Magenstörungen unter dem Einfluß von Alterationen des seelischen und nervösen Gleichgewichts. Die Magenneurosen sind eine Teilerscheinung der Hysterie und Neurasthenie, woraus sich die häufige Kombination mit Stigmata dieser Erkrankungen sowie anderer Zeichen konstitutioneller Minderwertigkeit (Stillerscher Habitus s. S. 304) erklärt. Die Beschwerden sind an sich von denen bei organischen Magenleiden nicht verschieden. Immerhin lassen sich aus dem äußerst buntscheckigen Gesamtbilde der Magenneurosen eine Reihe charakteristischer Züge herausheben; allen Fällen gemeinsam ist die diagnostisch wie therapeutisch ausschlaggebende Rolle des Nervensystems und der Psyche.

Die nervöse **Dyspepsie (Neurasthenia gastrica)** stellt ein praktisch sehr wichtiges, häufiges Krankheitsbild dar. Die Beschwerden stellen sich vor allem nach jeder Mahlzeit ein und bestehen in Druck und Völlegefühl, Appetitmangel bzw. abnormem Sättigungsgefühl bereits nach wenigen Bissen, ferner Beklemmungen, hartnäckigem z. T. sehr geräuschvollen Aufstoßen, Neigung zu Erbrechen. In manchen Fällen stellt sich der Magendruck bereits morgens nüchtern ein, seltener bleibt er auch



nachts bestehen. Mitunter treten intensive Schmerzanfälle (Gastralgie, Cardialgie) nach dem Essen auf, die an Gallensteinkoliken u. ähnl. erinnern. Bisweilen beobachtet man Heißhunger (Bulimie). Charakteristisch ist einmal die ausgesprochene Abhängigkeit der Beschwerden von seelischen Erregungen wie Ärger, Angst, Schreck, aber auch freudigen Erregungen, ferner die deutliche Unabhängigkeit von der Quantität und Qualität der Nahrung, die es erklärt, daß die Pat. oft schwere Speisen besser als leichte vertragen. Zum Teil findet man die als Hypochondrie bezeichnete Gemütsverstimmung, d. h. häufige Angstzustände, die das körperliche Befinden, u. a. oft Furcht vor Krebs zum Gegenstand haben. Auch sonst sind Zeichen der Neurasthenie (s. diese) häufig, bisweilen finden sich ausgesprochene hysterische Stigmata. Nervöse Dyspepsie wird auch gelegentlich bei Kindern beobachtet, hierzu gehört z. B. die Anorexie bzw. das Erbrechen der Schulkinder morgens infolge von Angst vor der Schule. Der Ernährungszustand ist in manchen Fällen im Mißverhältnis zu den lebhaften Beschwerden auffallend gut, in andern Fällen namentlich bei hartnäckigem Erbrechen kann sich erhebliche Unterernährung einstellen.

Vielfach ergibt die objektive Untersuchung völlig normalen Befund oder eine gleichzeitig bestehende Enteroptose; manche Pat. leiden daneben an Colica mucosa (s. diese). In den Fällen mit heftigem Aufstoßen sieht man bisweilen eine abnorm große Magenblase (Rö.), die sich durch dem Pat. unbewußtes Luftschlucken (Aerophagie) erklärt und in einzelnen Fällen sehr hochgradig werden kann (sog. Pneumatosis des Magens); die hierbei vorhandenen Beschwerden wie Atemnot und Herzklopfen erinnern an den gastrokardialen Symptomenkomplex (S. 178). Bisweilen findet sich Hyperacidität oder Hypersekretion. Bei manchen Fällen kommt ein sprunghafter Wechsel von hyperaciden und subaciden Säurewerten vor (sog. Heterochylie). Auch Steigerung der Magenperistaltik mit tiefer einschneidenden Wellen der großen und kleinen Kurvatur wird beobachtet. Oft besteht spastische Obstipation.

Zur Stellung der Diagnose versäume man niemals eine gründliche Untersuchung des gesamten Körpers, zumal dies beruhigend auf die ängstliche Gemütsverfassung der Pat. wirkt. Vor allem sind organische Erkrankungen des Nervensystems (Tabes!) sowie des Magens, speziell Ulcus, Pylorusstenose usw. (okkultes Blut, Rö.-Untersuchung) sowie bei hartnäckigem Erbrechen Gravidität auszuschließen; die Unterscheidung vom letzteren ist oft schwierig. Auch denke man stets an komplizierende organische Erkrankungen wie Cholelithiasis, abdominelle Adhäsionen; bei Frauen ist stets auf gynäkologische Affektionen zu fahnden. Sehr wichtig für die Diagnose ist die genaue Anamnese, die oft sofort den charakteristischen Zusammenhang mit seelischen Störungen aufdeckt.

Die Therapie ist vor allem eine rein psychische und bezweckt, durch eingehende Belehrung des Pat. über die Gegenstandslosigkeit seiner Besorgnisse in ihm wieder Vertrauen zu seinem Verdauungsapparat zu wecken. Zur Beruhigung der Nerven Baldrian- und Brompräparate, milde Hydrotherapie. Bei stärkerer Unterernährung Mastkur, die indessen oft nur mit Vorsicht durchzuführen ist und für Arzt und Pat. häufig eine erhebliche Geduldprobe bedeutet. In manchen Fällen bildet die Hypnose ein erfolgreiches Heilmittel.

## Krankheiten des Darms.

**Vorbemerkungen:** Der Darm beginnt mit dem Duodenum; die Grenze zwischen Pylorus und Duodenum ist von außen durch die querlaufende Vena pylorica kenntlich. Das Duodenum hat die Form eines nach links oben geöffneten Hufeisens. Die Pars super. enthält unmittelbar oberhalb des Pylorus den sog. Bulbus duodeni, in welchem der aus dem Magen kommende Speisebrei einige Zeit verweilt und der im Rö.-Bild oft als dreieckiger oder haubenförmiger Schatten sichtbar ist; an seiner Spitze findet sich schon normal bisweilen eine kleine Luftblase. Bei starker Gastropse verläuft die Pars super. nicht horizontal, sondern oft fast vertikal nach oben. Die Pars descend. ist an der hinteren Bauchwand fixiert und nur vorn mit Peritoneum bedeckt. An der Grenze zwischen mittlerem und unterem Drittel münden in der Vaterschen Papille die Duct. choledoch. und Wirsungian. Die Pars infer. kreuzt horizontal Vena cava und Aorta. Die Flexura duodenojejuni, die in der Höhe des 2. Lendenwirbels (linker Rand) liegt, wird durch ein Muskelbündel an dem Zwerchfell fixiert. Die sich daran anschließenden Schlingen des Jejunums nehmen den linken oberen, die des Ileums den rechten unteren Abschnitt der Bauchhöhle ein. Die Mündung des Dünndarms in den Dickdarm an der Bauhinschen Klappe erfolgt zwischen Coecum und Colon ascend. Das Coecum ist vollständig mit Peritoneum überzogen und besitzt ein kleines Mesenterium, das ihm mitunter eine gewisse Beweglichkeit verleiht; es liegt in der Fossa iliac. dextr. über der Mitte des Lig. Poupartii. In das Coecum mündet der Proc. vermiform. Das Kolon hat ein fast doppelt so großes Kaliber als der Dünndarm und ist durch das Vorhandensein der 3 Tánien, bandartigen Verstärkungen der Längsmuskulatur, sowie die haustrale Segmentierung gekennzeichnet. Das Colon ascend. hat kein Mesenterium und ist an der hinteren Bauchwand angewachsen, wogegen das Colon transvers. ein ziemlich langes Gekröse, das oberhalb der Pars infer. duoden. angeheftete Mesokolon besitzt und außerdem mit der gr. Krümmung des Magens durch das Lig. gastrocolic. verbunden ist. Die r. Flexur ist bisweilen mit der Unterfläche der Leber bzw. mit der Gallenblase durch eine Peritonealfalte verbunden. Die spitzwinklige linke Flexur ist durch das Lig. phrenicocolic. am Zwerchfell nahe der Milz befestigt; sie steht erheblich höher als die rechte. Das Col. descend. ist an der hinteren Bauchwand angewachsen und geht in der Fossa iliac. sinistr. in das S romanum oder Sigma über, das infolge seines Mesenteriums wiederum beweglich ist. An das Sigma schließt sich unterhalb des Promontoriums (3. Kreuzbeinwirbel) das Rektum an, dessen obere Grenze durch die verstärkte Ringmuskelschicht des Sphincter rectoromanus oder Sphincter tertius kenntlich ist.

Die normale **Motilität** des Darms beruht auf der Funktion des zwischen Ring- und Längsmuskulatur gelegenen Auerbachschen Nervenplexus; sie besitzt einen erheblichen Grad von Selbständigkeit, so daß sie auch bei Ausschaltung von Gehirn, Rückenmark und Sympathicus erhalten bleibt. Normal steht sie jedoch analog den Verhältnissen beim Herzen unter dem steuernden Einfluß des vegetativen Nervensystems, und zwar des Sympathicus und Vagus (parasympathisches System), die sich antagonistisch verhalten, indem der Vagus reizverstärkend, der Sympathicus abschwächend wirkt. Die zum Darm hinziehenden Nerven verlaufen in den vom Grenzstrang des Sympathicus kommenden Nn. splanchnic. sup. und inf., denen sich in den Gangl. coeliac. und mesenter. sup. und inf. bzw. auf dem Wege von diesen zur Darmwand die parasympathischen Fasern hinzugesellen, und zwar im N. splanchn. sup. der Vagus, im N. splanchn. inf. der den Sakralnerven zugehörige N. pelvicius. Der N. splanchn. sup. versorgt Dünndarm und Colon ascend., der N. splanchn. inf. Colon transvers., descend., Sigma und Rectum. Willkürlich wird lediglich der Sphincter externus des Mastdarms aus dem IV. Sakralnerven (Plexus pudend.) innerviert. Ein pharmakologischer Hinweis auf die Rolle des autonomen Nervensystems ergibt sich aus der Wirkung der Sympathicus- bzw. Vaguserreger: Pilokarpin, Physostigmin, Cholin, Muskarin, die den Vagus erregen, verstärken die Darmmotilität, Sympathicusreizmittel wie Adrenalin hemmen sie, ebenso wie das den Vagus lähmende Atropin. Schmerzempfindungen, die von Dünndarm und Colon ascend. ausgehen, werden durch den N. splanchnic. sup., die der unteren Darmabschnitte durch den N. splanchn. infer. vermittelt.

Der Dünndarm zeigt zwei Arten von Bewegungen, und zwar einmal Misch-, Knet- oder Pendelbewegungen, welche Durchmischung des Darminhaltes ohne Ortsverschiebung bezwecken, ferner eigentliche Förderungsperistaltik mit Fortbewegung des Inhaltes nach dem Kolon. Motilität des Kolons s. unten. Physiologische Reize für die Darmbewegung sind mechanischer und vor allem chemischer Natur; sie werden hauptsächlich vom Darminhalt geliefert und sind zum großen Teil Produkte der Verdauung, organische Säuren, Zuckerarten usw. Aber auch die Darmwand selbst produziert anregende Hormone (Cholin, Hormonal).

Die **Röntgen-Untersuchung** ergibt folgendes über die Motilität: Duodenum, abgesehen vom Bulbus duod. (s. oben) und Jejunum werden sehr schnell von der Kontrastmahlzeit passiert, so daß ihre Darstellung meist nur unvollkommen gelingt, während im Ileum der Inhalt meist 2—3 Std. liegen bleibt. Bisweilen ist der Jejunuminhalt in Form zarter schneeflockenartiger oder gefiederter (Kerkringsche Falten!) Schatten lk. oben erkennbar, während das Ileum als derbere, kompakte Schattenbänder r. unten sichtbar zu sein pflegt. Der Übertritt ins Coecum erfolgt um die 3. Stunde. Die vollkommene Entleerung des Dünndarms geschieht nach 6—8 Std. Die Füllung des Colon ascend. erfordert weitere 2—3 Std.; 5—6 Std. später pflegt das Transversum und nach weiteren 10—12 Std. die Ampulla recti gefüllt zu sein. Doch kommen erhebliche individuelle Abweichungen von diesen Zahlen vor. Im allgemeinen soll nach höchstens 48 Std. der Darm von den letzten Resten entleert sein. Der Dickdarm ist im Rö.-Bild abgesehen von dem breiten Kaliber an den regelmäßigen Einkerbungen der Haustren kenntlich, die besonders deutlich am Transversum sind. Durch stark wechselnde Lage und große Beweglichkeit ausgezeichnet sind das Transversum und das Sigma. Ersteres bildet häufig eine girlandenartig herabhängende Schleife, letzteres kann bei beträchtlicher Länge weit nach rechts herüberreichen. Beide Teile lassen sich vor dem Leuchtschirm leicht verschieben. Der der linken Flexur benachbarte Teil des Transversums deckt sich bisweilen mit dem obersten Teil des Descendens, indem beide ein Stück parallel laufen. Eine wichtige Ergänzung der Rö.-Untersuchung nach Kontrastmahlzeit ist diejenige nach einem Kontrasteinlauf (1—2 L. in der Norm).

Bei der gewöhnlichen Betrachtung vor dem Schirm erscheint der Dickdarm vollkommen ruhend. Genauere Untersuchungen haben aber auch hier verschiedene Arten von Motilität festgestellt, und zwar große Colonbewegungen, die unter Verstreichen der Haustren eine starke Vorwärtsbewegung des Inhaltes bewirken und bei der Defäkation eine Rolle spielen, ferner Pendelbewegungen mit Lage- und Formveränderung der Haustren, endlich als Antiperistaltik bezeichneten retrograden Transport des Inhaltes. Die Kolonbewegungen, die übrigens auch während des Schlafes bestehen, werden außer durch die früher erwähnten Reize u. a. durch psychische Erregungen teils verstärkt (Angstdiarrhöen), teils gehemmt; Nahrungsaufnahme fördert vom Magen aus die Peristaltik (dem 1. Frühstück folgt oft Stuhlentleerung), das gleiche gilt von manchen Genußmitteln wie Kaffee und Tabak. Unmittelbar vor der Stuhlentleerung befinden sich die Stuhlmassen im S romanum und in der Ampulle, die sich, oft zusammen mit dem Inhalt des unteren Colon descend., in einmaliger Defäkation zu entleeren pflegen. Die Entleerung erfolgt unter Erschlaffung des Levator ani und Sphincter extern. sowie Anspannung der Bauchpresse. Zur Prüfung der Darmmotilität eignet sich in Ermangelung des Rö.-Verfahrens 0,5 Karmin (in Oblate); Rotfärbung des Stuhles erfolgt normal in 24—48 Std., in pathologischen Fällen unter Umständen erst nach vielen Tagen.

Die untersten Darmabschnitte sind einer direkten Besichtigung mittelst der **Rektoromanoskopie** zugänglich. Dieselbe ist der Röntgenuntersuchung überlegen. Der Untersuchung hat gründliche Entleerung des Darms durch Einläufe (am Abend vorher und morgens 2—3 Std. vor der Untersuchung) voranzugehen, die Harnblase ist vorher zu entleeren. Man untersuche zunächst digital. Bei starkem Tenesmus ev. Kokainisierung des Rektums (4<sup>0</sup>/<sub>100</sub>, Tampon 3 cm tief einführen). Nach vorsichtiger Einführung des Instruments (am besten das Rektoskop von Strauß) bis über den Sphinkter entfernt man den Obturator und entfaltet die Schleimhaut durch vorsichtiges Einblasen von Luft mit dem Gebläse. Wegen der verschiedenen Krümmungen und Schleimhautfalten des Darms darf das Rohr nur unter genauer Kontrolle des Auges vorgeschoben werden. Nach Passieren der

engen, ein wenig nach vorn gerichteten Pars sphincterica oder perinealis recti (Anulus haemorrhoid.) gelangt man in die sehr geräumige Pars ampullar. oder pelvina. Dieselbe enthält meist 3 halbmondförmig vorspringende Schleimhautfalten, und zwar 6—7 cm oberhalb des Anus re. die vor der Mitte des Steißbeins liegende Kohlrauschsche Falte (Plica transvers. recti), darunter oft links etwa 4,5—6 cm vom Anus eine zweite, schließlich oberhalb der mittleren Falte 2,5 cm höher die dritte Falte meist links. Die Grenze zwischen Ampulle und Sigma (11 cm vom Anus) markiert sich durch die Plica rectoromana, entsprechend dem sog. Sphincter tertius. In das Sigma, dessen Schleimhaut ein runzliges Aussehen, aber keine Falten zeigt, läßt sich das Rektoskop bei Aufblähung bis zur Grenze zwischen Rektal- und Kolonschenkel des Sigmas (30—35 cm) einführen. In mittlerer Entfernung erkennt man öfters die Pulsation der Art. iliaca.

Die im Darm sich abspielenden **Verdauungs- und Resorptionsvorgänge** zeigen je nach den einzelnen Darmabschnitten große Verschiedenheiten. Der schubweise von dem Pylorus ins Duodenum beförderte Mageninhalt wird im Duodenum durch den stark alkalischen Pankreassaft (= ca. 0,5% Soda) neutralisiert. Letzterer selbst wird durch HCl, Fettsäuren und Neutralfett angelockt. Die HCl wirkt hauptsächlich durch Umwandlung (Aktivierung) des in der Darmschleimhaut enthaltenen unwirksamen Prosekretins in Sekretin, das nach der Resorption auf dem Blutwege die Pankreassekretion anregt. Ähnlich dem Sekretin wirken manche Nahrungsmittel wie z. B. Spinat und andere animalische und vegetabilische Stoffe in der Nahrung. Von den drei im Pankreassaft enthaltenen Fermenten spaltet das Trypsin, das durch die in der Darmschleimhaut enthaltene Enterokinase erst aktiviert wird, die Eiweißkörper rascher und intensiver als das Pepsin und zerlegt sie bis zu den Polypeptiden und Aminosäuren, ebenso spaltet es Nucleine, während rohes Bindegewebe von ihm nicht angegriffen wird. Das Steapsin zerlegt das Neutralfett sowie das Lecithin in Fettsäuren und Glycerin, die ersteren verbinden sich mit dem Darmalkali zu Seifen, die die Emulgierung des übrigen Fettes bewirken. Das diastatische Ferment setzt die stärkespaltende Tätigkeit des Ptyalins des Mundspeichels fort, die Zerlegung geht bis zur Maltose. Die ins Duodenum sich ergießende Galle fördert die Fettresorption durch Lösung der Fettsäuren und Seifen sowie Einwirkung der Gallensäuren auf die Darmschleimhaut, sie steigert ferner die Wirkung der Pankreasfermente und macht das Pepsin unwirksam. Auch der Saft der Brunnerschen Drüsen des Duodenums besitzt fermentative Eigenschaften. Genauen Aufschluß über die Beschaffenheit des Duodenalsaftes ergibt die Anwendung der Duodenalsonde.

Der in erheblicher Menge abgesonderte Dünndarmsaft entsteht in den Lieberkühnschen Drüsen; seine Produktion wird durch den im Chymus enthaltenen Pankreassaft angeregt. Er enthält verschiedene Fermente, u. a. das Erepsin, das von den genuinen Proteinen nur das Kasein, außerdem analog dem Trypsin die Albumosen, Peptone und Polypeptide spaltet, sowie Fermente, welche Rohrzucker, Milchzucker und Maltose zerlegen.

Eine weitere der Resorption zugute kommende Zersetzung der Chymusbestandteile erfolgt durch die Tätigkeit der **Bakterienflora** des Darms. Die von der Mundhöhle in den Verdauungskanal eindringenden Bakterien werden zum größten Teil von der Magen-HCl vernichtet bzw. gelähmt, so daß normal der obere Dünndarm praktisch keimfrei ist; Bakterientätigkeit kommt erst wieder in den untersten Teilen des Ileums und vor allem im Coecum und Colon ascend. zur Entfaltung. Ihr hoher physiologischer Wert beruht darauf, daß sie die Tätigkeit der Darmfermente ergänzen, indem sie vor allem die diesen nicht zugängliche Verarbeitung vegetabilischen Materials der Nahrung übernehmen, insbesondere die sog. Rohfaser (s. unten) zersetzen und diese dadurch erst resorptionsfähig machen. Aber auch der Abbau von Eiweißkörpern und Stärke wird, soweit er seitens der Verdauungsfermente unvollendet geblieben ist, durch die Darmbakterien vollendet, die in ungeheurer Menge vorhanden sind. (Sie bilden etwa  $\frac{1}{3}$  des Gesamtgewichtes des Trockenkotes, doch ist darin der größte Teil abgestorben.)

Von großer praktischer Bedeutung ist die Tatsache, daß die Bakterien im Darm physiologisch in zwei antagonistischen Gruppen auftreten, und zwar als kohlehydratabbauende Bakterien, welche Säure produzieren (Essig-, Ameisen-,

Butter-, Milchsäure), u. a. das *B. coli*, und ihre Haupttätigkeit normal im unteren Ileum, z. T. im Coecum entfalten (Zelluloseverdauung), und andererseits im Dickdarm die Fäulnisbakterien, die bei alkalischer oder neutraler Reaktion Eiweißkörper und ihre Abbauprodukte weiter zerlegen unter Bildung sowohl der gleichen Substanzen wie bei der Fermentspaltung als auch der für die Fäulnis charakteristischen Körper wie Indol, Skatol, Phenole,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  usw. (Coecum und Col. ascend.). Die Eiweißkörper stammen sowohl von der Nahrung wie auch, was klinisch besonders bedeutsam ist, von den Darmsekreten. Je nach Art der Nahrung prävaliert die eine oder andere Bakteriengruppe, wobei saure Gärung die Existenz der Fäulniserreger erschwert und umgekehrt; auch läßt sich dies bis zu einem gewissen Grade durch Änderung der Kost willkürlich beeinflussen, was therapeutisch bedeutsam ist.

Die Resorption ist hauptsächlich Aufgabe des Dünndarms und betrifft außer Wasser und Salzen die Spaltungsprodukte der Eiweißkörper, der Kohlehydrate und der Fette. Von den Eiweißbausteinen sind es fast ausschließlich die relativ unkompliziert gebauten Aminosäurenkomplexe (Peptide). Die Fette werden hauptsächlich als Fettsäuren, Seifen, Glycerin, vielleicht auch als Neutralfett resorbiert. Lecithin wird ebenfalls gespalten, wogegen Cholesterin und die wichtigen ihm nahestehenden pflanzlichen Phytosterine als solche resorbiert werden. Die Kohlehydrate kommen in der Hauptsache als Monosaccharide, insbesondere als Dextrose zur Aufsaugung, größere Mengen von Disacchariden wie Rohrzucker oder Milchzucker werden zwar ungespalten resorbiert, erscheinen aber unverändert im Harn wieder. Durch Zerlegung der Pflanzenrohlfaser (Cellulose, Hemicellulose, Pentosane) entstehen aus diesen lösliche resorptionsfähige Zucker, speziell Hexosen und Pentosen, auch wird das von der pflanzlichen Zellmembran eingeschlossene Nährmaterial nach Aufschließung der Hülle der Resorption zugänglich. Die Aufsaugung dieser Stoffe, ferner der Produkte bakterieller Eiweißzersetzung sowie großer Mengen von Wasser (Eindickung des Kotes) erfolgt im Coecum und Col. ascend. Von den bei der bakteriellen Zersetzung der Cellulose entstehenden Gasen wird  $\text{CO}_2$  und  $\text{CH}_4$  resorbiert, während  $\text{H}$  mit dem Stuhle ausgeschieden wird. Abfuhrwege für die vom Darm resorbierten Fette sind die Lymphbahnen, für alle übrigen Stoffe die Pfortaderwurzeln.

Der durch die starke Wasserresorption zum Kot gewordene Darminhalt besteht aus 2 Hauptbestandteilen, dem sog. Eigenkot und den Nahrungsresten. Ersterer wird von den Darmsekreten, den Produkten der Schleimhautepithelmauserung und der regelmäßig in den Darm ausgeschiedenen Stoffen wie Kalk, Eisen, Phosphorsäure usw. gebildet, so daß es auch bei völliger Karenz regelmäßig zur Stuhlbildung kommt. Die Menge der Nahrungsreste, der sog. Schlacken, tierischer und pflanzlicher Provenienz ist auch beim Gesunden sehr verschieden und richtet sich nach der Art der Nahrung. Schlackenarme Kost, die fast vollkommen resorbiert wird, ist die animalische Kost sowie eine aus feinem Mehl, Stärke, Zucker usw. bestehende vegetabilische Kost. In der schlackenreichen Kost spielt namentlich die Rohfaser (s. oben) eine Hauptrolle.

**Untersuchung der Fäces:** Zu prüfen ist die Zahl der Entleerungen, die Menge, die Konsistenz, die Farbe, die Reaktion, der Geruch sowie die mikroskopische und ev. die chemische Zusammensetzung. Normaler Kot ist „geformt“, d. h. von Wurstform, braun, von alkalischer Reaktion und zeigt den charakteristischen Fäkalgeruch (weder ranzig noch aashaft), er ist frei von Schleimbeimengungen, Blut und Eiter. Die Menge des Stuhls ist normal von der Beschaffenheit der Nahrung abhängig, sie ist am kleinsten bei reiner Fleischkost, am größten bei Kartoffel- und Schwarzbrotkost. Man begnüge sich grundsätzlich nicht mit der bloßen Angabe der Pat. über regelmäßige Entleerungen; oft lehrt erst die Besichtigung, daß das jedesmalige Quantum unzureichend ist und daß entgegen den Angaben des Pat. eine Verstopfung besteht. Die Farbe schwankt ebenfalls je nach der Nahrung, sie ist bei Milchkost hellgelb, bei Fleischkost dunkel; Eisen, Wismut machen ihn dunkel, Kalomel grün.

Zur Isolierung größerer Beimengungen wie Konkremente, Fremdkörper, Parasiten ist der Stuhl mit Wasser aufzuschwemmen und zu sieben, am besten mit dem Boasschen Stuhlsieb. Im übrigen empfiehlt es sich, eine walnußgroße Stuhlprobe mit Wasser in einem Mörser bis zu Saucenkonsistenz zu verreiben und die erhaltene

Flüssigkeit auf einem schwarzen Porzellanteller auszubreiten, wodurch alle größeren Beimengungen sowie Schleim sichtbar werden.

Die mikroskopische Untersuchung erfolgt an einer mit etwas Wasser versetzten, etwa stecknadelkopfgroßen Stuhlprobe in 3 Präparaten: 1. ohne Zusatz, 2. mit Zusatz von Jod-Jodkaliumlösung<sup>1)</sup> zum Nachweis von Stärkeresten, granulosehaltigen Bakterien und Leptothrix, die sich sämtlich blau färben, 3. mit Zusatz von 30% Essigsäure<sup>2)</sup> und Erwärmen über der Flamme bis zum Kochen zum Nachweis des Fettes, welches in Tropfenform frei wird und zu Schollen erstarrt. Normal enthält der Stuhl nur vereinzelte Muskelreste mit Querstreifung und abgerundeten Enden, Stärke höchstens in Spuren, ferner zahlreiche Pflanzenreste, sowie Fett in Essigsäurepräparat in Schollenform, endlich massenhaft Bakterien, von denen das gramnegative *B. coli* dominiert, während die übrige Flora nach der Art der Kost Verschiedenheiten zeigt. Bei Milch- und Kohlehydratkost finden sich u. a. der sporenbildende *Bac. subtilis* (Heubacillus) und das Buttersäure bildende *Clostridium butyricum*, das ebenfalls plumpe Stäbchen mit Sporen bildet, beide sind grampositiv und färben sich mit Jod blau; bei Fleischkost sind reichlich grampositive Coccen vorhanden.

Sieht man von den extremen Veränderungen der Stuhlzusammensetzung ab, die stets pathologisch sind, so sind geringere Abweichungen von der Norm nur nach Verabreichung einer **Probediät** diagnostisch zu verwerten. Probekost von Sch midt-Straßburger: Morgens  $\frac{1}{2}$  l Milch und 50 g Zwieback. Vorm. Haferschleim aus 40 g Hafergrütze, 10 g Butter, 200 g Milch, 300 g Wasser, 1 Ei und etwas Salz, das Ganze durchgeseiht; mittags 125 g Rohgewicht gehacktes Rindfleisch mit 20 g Butter leicht überbraten (inwendig roh zur Erhaltung des Bindegewebes!), dazu 250 g Kartoffelbrei aus 190 g gemahlene Kartoffeln, 100 g Milch, 10 g Butter und etwas Salz. Nachm. wie morgens, abends wie vormittags. Die Probekost wird 3—5 Tage lang verabreicht.

Der normale Probestuhl ist schwach alkalisch oder ganz schwach sauer, homogen und enthält keine größeren makroskopisch sichtbaren Bestandteile. Mikroskopisch finden sich nur vereinzelte schollige abgerundete Muskelfragmente (Querstreifung) sowie Schollen aus fettsaurem Kalk, keine größeren Bindegewebsfetzen und keine Stärke (Jod). Fett kommt normal nur in Form gelber und weißer Kalkseifenschollen, nicht in Krystallform vor. Über den Grad der Stärkeverdaulichkeit gibt sicheren Aufschluß die Untersuchung des Stuhles auf Nachgärung im Brutschrank mittelst Straßburgers Gärungsröhrchen. Normaler Probestuhl zeigt dabei keine oder nur ganz geringe Gasbildung. Höhere Grade derselben können auf vermehrter Gärung oder Fäulnis beruhen. Bei ersterer entsteht deutlich saure Reaktion und Hellfärbung des Stuhles (durch Reduktion des Stuhlfarbstoffs), bei letzterer alkalische Reaktion ohne Hellfärbung. Die Gärungsprobe zeigt auch noch in den Fällen mangelhafte Kohlehydratverdaulichkeit an, in denen die mikroskopische Untersuchung im Stich läßt. Brauchbare Resultate ergibt die Probediät nur bei den mit Diarrhöen einhergehenden Darmkrankheiten. Weiteres siehe unter Pankreas.

## Ulcus duodeni.

Das Geschwür des Zwölffingerdarms ist ein relativ häufiges Leiden. Es nimmt mit dem Alter an Frequenz zu (Max. zwischen 40.—70. Jahr) und befällt häufiger Männer als Frauen. Prädilektionsort ist die Hinterwand des Duodenums, und zwar vor allem die Pars super. nahe dem Pylorus.

<sup>1)</sup> Jod 1,0, Jodkali 2,0, Aq. dest. 50,0.

<sup>2)</sup> Alkoholische Sudan-III-Lösung färbt Neutralfett leuchtend rot. Konz. wässrige Nilblausulfatlösung mit etwas Stuhl verrührt färbt Neutralfett rot, Fettsäure in Tropfen und Schollen violett. Fettsäurenadeln bleiben bei diesen Methoden ungefärbt.

Anatomisch findet man sehr häufig, oft multipel, Narben im Duodenum als Residuum ausgeheilter Ulcera. Das Häufigkeitsverhältnis von *Ulc. duod.* zu *Ulc. ventric.* ist auf Grund anatomischer Statistiken etwa 1 : 1,4. Sicher ist, daß in zahlreichen Fällen das Geschwür klinisch latent bleibt bzw. unbemerkt ausheilt.

Als ätiologische Momente werden Hyperacidität, Gastropiose (Zerrung des Duodenums), Arteriosklerose, Sepsis, Hautverbrennungen sowie Appendicitis angeschuldigt, vor allem aber auch hier wie bei *Ulc. ventric.* Störungen bzw. abnorme Erregbarkeit im Bereich des vegetativen Nervensystems (*Vagus* und *Sympathicus*), insbesondere auf diesem Wege zustande kommende Spasmen der Gefäße sowie der *Muscularis mucos.*, die zu Schleimhauterosionen mit Ulceration infolge tryptischer Verdauung führen sollen. Doch lassen eine Reihe von Pat. die Zeichen gesteigerter Erregbarkeit des autonomen Nervensystems vermissen.

Das Krankheitsbild ist vor allem durch das periodische Auftreten von heftigen Schmerzen in der Oberbauchgegend gekennzeichnet, die mehrere Stunden nach dem Essen (*Spätschmerz*) sowie bei leerem Magen als sog. Hungerschmerz auftreten und öfter den Pat. auch nachts befallen. Nicht selten schwindet der Schmerz nach Nahrungsaufnahme. Dazwischen liegen oft völlig beschwerdefreie Intervalle von Wochen oder sogar Monaten. Der Appetit und Ernährungszustand sind in der Regel gut, die Zunge nicht belegt, Erbrechen pflegt zu fehlen.

Objektiv besteht während der Schmerzanfälle Druckempfindlichkeit der Oberbauchgegend namentlich etwas rechts oben von der Mittellinie sowie oft ausgesprochene *circumscripte* Empfindlichkeit beim Beklopfen dieser Gegend mit dem Perkussionshammer. Mitunter zeigt der *Musc. rect. abd. rechts* oben vermehrte Rigidität. Kommt es zu stärkeren Blutungen, so wird das Blut meist nur mit dem Stuhl entleert, während Blutbrechen im Gegensatz zum *Ulc. ventr.* relativ selten ist; häufig tritt es auch hier nur in Form okkulten Blutes im Stuhl (vgl. S. 296) auf. Doch fehlt auch dieses in einer nicht ganz geringen Zahl von Fällen. Oft besteht Hyperacidität des Magens, wenn auch dieselbe ebenso wie beim Magengeschwür keine *conditio sine qua non* ist. Die Röntgenuntersuchung ergibt häufig charakteristische Befunde sowohl seitens des Magens wie des Duodenums.

Der Magen zeigt oft erheblich verstärkte Peristaltik mit tief einschneidenden Wellen und auffallend rascher Entleerung (sog. *hyperperistaltischer Typ* des *Ulc. duod.*), die im Widerspruch mit der vorhandenen Hyperacidität steht. Trotz anfänglicher Entleerungsbeschleunigung beobachtet man aber später oft einen 6-Stundenrest. Diese Kombination ist für *Ulc. duod.* charakteristisch. Auch gibt es Fälle, die durch die erhebliche Größe der intermediären Saftschicht vermehrte Sekretion erkennen lassen (sog. *maximalsekretorischer Typ*). Am Duodenum sind abgesehen von *circumscripter* Druckempfindlichkeit vor dem Leuchtschirm die Dauerfüllung sowie Formänderungen des *Bulbus duod.* die wichtigsten Befunde. Bei dem ev. noch 8 Std. p. c. sichtbaren sog. *Dauerbulbus* fällt oft die abnorme Größe desselben auf; Nischen- und Zapfenbildung, welche wichtige Symptome sind, deren technische Darstellung oft aber recht schwierig ist, können sowohl auf Geschwüren bzw. Narben wie auf Spasmen beruhen. Selten ist ferner eine dem penetrierenden *Ulc. ventric.* analoge Nische mit Luftblase, die aber nicht mit der oft normal vorhandenen am Scheitel der *Pars super. duod.* zu verwechseln ist. Endlich ist der *Pylorus* oft nach rechts verlagert (*Rechtsdistanz*) als Folge periduodenitischer Verwachsungen.

Die Diagnose des *Ulc. duod.* ist schwierig; sie stützt sich in hervorragendem Maß auf die charakteristische Schmerzanamnese (*Spätschmerz*, *Periodizität*), wenn diese auch bisweilen im Stich läßt und die

gleiche Anamnese sich in Fällen mit *Ulc. ventric. parapylo-ric.* findet. Überhaupt muß man sich mitunter mit der Diagnose *Ulc. juxtapylo-ric.* bescheiden, die jedoch praktisch für die Therapie meist genügt. Okkultes Blut fehlt in einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Fällen, auch die Rö.-Untersuchung kann versagen.

Andererseits ist ein positiver Rö.-Befund häufig nicht eindeutig genug, besonders wenn nur einzelne der genannten Zeichen vorhanden sind: Hyperperistaltik des Magens findet sich auch bei Magen-neurosen, beschleunigte Entleerung bei Sub-acidität, 8-Stundenrest allein beweist nur Spasmus bzw. Stenose des Pylorus. Dauerbulbus kommt auch bei starker Gastropse vor. Auch wird derselbe wie auch die erwähnten Formänderungen des Duodenum und die Rechtsdistanz ebensogut infolge periduodenaler Adhäsionen, namentlich bei Cholecystitis, aber auch bei andern entzündlichen abdominalen Affektionen beobachtet, so daß hier die Differentialdiagnose zur Unmöglichkeit werden kann, zumal die gleiche Therapie auch hier Erfolge erzielt.

Der Verlauf des *Ulc. duod.* gestaltet sich in den einzelnen Fällen recht verschieden. Zweifellos gibt es eine beträchtliche Zahl von „Ulcusträgern“ ohne deutliche Beschwerden (s. oben). Ferner können analog dem *Ulc. ventric.* auch hier für lange Zeit die Beschwerden völlig schwinden und dennoch trotz scheinbarer Heilung nach Diätfehlern usw. wieder nach längerer Zeit manifest werden. Immerhin ist die Prognose für zahlreiche Fälle bei geeigneter Behandlung günstig. Perforationsgefahr droht hauptsächlich den relativ seltenen Geschwüren der Vorderwand. Starke Blutungen durch Arrosion eines größeren Gefäßes sind seltener als bei *Ulc. ventric.*

Die Therapie deckt sich mit der des Magengeschwürs: Liegekur, flüssig-breijige Schonungsdiät. Bei Hyperacidität ist das Mendelsche Pulver zweckmäßig: *Natr. sulf. pulv. sicc.* und *Natr. phosphor. pulv. sicc.* ää 30,0, *Natr. bicarb. pur.* 40,0, 4 mal tägl. 1 Teel. in 1 Weinglas warm. Wasser vor dem Essen. Bei Nüchternschmerz (auch nachts) sehr wirksam warme Milch. Bei vagotonischen Symptomen sowie spastischer Obstipation Atropin (vgl. S. 300), Papaverin (2 mal tägl. 0,06). Für chirurgische Behandlung ist die Perforation sowie schwere Blutung absolute Indikation; aber auch bei hartnäckigen, der Heilung durch interne Behandlung widerstrebenden Fällen hat die Gastroenterostomie als Entlastungsoperation Erfolge.

Die Nachbehandlung der Gastroenterostomie ist von großer Bedeutung, weil der Darm Zeit braucht, um sich den neuen, unphysiologischen Verhältnissen anzupassen, andernfalls die Gefahr einer Überlastung mit bedenklichen Folgezuständen besteht. Zunächst überzeuge man sich durch die Rö.-Untersuchung von dem Funktionieren der Fistel. Die Wirkung der Operation auf den Darm beruht auf der stark beschleunigten Beförderung von Mageninhalt in denselben, ihre Wirkung kommt daher dem Fehlen der Magenverdauung gleich und zwar bezüglich der Bindegewebsverdauung, der Vorverdauung pflanzlicher Bestandteile und der bakteriziden Wirkung gegenüber eingeschleppten Keimen, sowie ferner ev. in der peptischen Verdauung der Darmschleimhaut besonders bei Hyperacidität (*Ulc. jej. peptic.* s. unten). Die Verdauungsbeschwerden, die oft erst später nach Ablauf der ersten Monate auftreten, haben meist den Charakter der Gärungs-dyspepsie, nur sehr selten den der Fäulnisdyspepsie (vgl. S. 321). Sorgfältiges Kauen, häufige kleine Mahlzeiten sowie Schonungsdiät für die nächsten 2—3 Monate sind erforderlich, am besten ist laktovegetabilische Kost; verboten sind rohes bzw. roh geräuchertes Fleisch wegen seines Gehaltes an rohem Bindegewebe, rohes Obst, rohe sowie gekochte grobe Gemüse, grobes Brot, schwere Fettarten (ausgenommen Butter, Pflanzenöle). Alle Speisen sind in weich gekochtem bzw. fein zerkleinertem Zustand zu verabreichen; alles bakterienhaltige Material, auch rohe Milch, pikante Käse usw. ist zu meiden. Für Fälle mit Supercidität gelten außer-



dem die Vorschriften von S. 294. Neben der Dyspepsie ist das *Ulc. pep. jejuni*, eine relativ häufige Folge (s. unten). Von beiden Folgezuständen abgesehen sind alle wegen *Ulcus Gastroenterostomierten*, vor allem die Fälle ohne Pylorusverschluß zunächst als *Ulcus* weiter zu behandeln, insbesondere auf etwaige erneute okkulte Blutungen zu beobachten, bis die Ausheilung des Geschwürs sichergestellt ist.

### **Ulcus jejuni pepticum.**

Das Jejunalgeschwür entsteht hauptsächlich nach Gastroenterostomien als Folge der peptischen Wirkung des Magensaftes. Es wird besonders bei Verwendung einer zu weit distal gelegenen Jejunumschlinge für die Fistel, ferner bei Verbindung derselben mit pylorusnahen Magenabschnitten (statt mit dem kardialen Teil), sowie öfter bei gleichzeitigem Verschluß des Pylorus beobachtet. Nichtbeachtung diätetischer Vorschriften (s. oben) nach der Operation gehört ebenfalls zu den ursächlichen Momenten. Das *Ulcus* tritt meist innerhalb der ersten Monate nach der Operation, selten später auf und verrät sich durch Beschwerden wie bei *Ulc. duod.*, insbesondere Nüchternschmerz, namentlich in der Gegend des Nabels, ferner besonders in den Rücken ausstrahlende Schmerzen sowie okkultes Blut im Stuhl; mitunter treten Diarrhöen sowie häufig später ausgedehnte Verwachsungen mit der Nachbarschaft, gelegentlich auch Perforationen ins Kolon ein. Therapeutisch kommt nur die Operation in Frage.

Darmgeschwüre im unteren Ileum und oberen Kolon werden ferner im Verlauf der Urämie im Terminalstadium der chronischen Nephritis beobachtet. Ferner macht abgesehen von Typhus und Ruhr gelegentlich auch der Milzbrand (s. S. 119) Darmulcerationen als sogen. Darmmilzbrand unter dem Bilde einer akuten hämorrhagischen Enteritis, die unter Umständen zu Perforationsperitonitis führt.

### **Enteritis, Enterokolitis, Kolitis (Darmkatarrh).**

Unter Darmkatarrh versteht man eine entzündliche Veränderung der Darmschleimhaut, die in vermehrter Schleimproduktion, Hyperämie der Gefäße, Veränderungen des Drüsenparenchyms und des interstitiellen Gewebes besteht und bei schweren Fällen und namentlich bei chronischem Verlauf auch auf die Submucosa und die Muscularis übergreift, hierbei mitunter dauernde Veränderungen hinterlassend. Das klinische Hauptmerkmal des Darmkatarrhs ist die Diarrhöe, die auf beschleunigter Peristaltik des Dickdarms beruht. Doch ist nicht jede Diarrhöe mit entzündlichen Veränderungen des Darms gleichbedeutend, zumal es sowohl rein nervöse wie auch sonstige Zustände beschleunigter Darmbewegung gibt, denen die Kriterien der Entzündung fehlen. Ein Kardinalsymptom des Darmkatarrhs ist die Beimengung von Schleim im Stuhl, bei stärkeren Graden der Erkrankung auch von Eiter und Blut, wobei aber zu betonen ist, daß einerseits nicht unerhebliche Schleimbeimengungen auch bei nicht entzündlichen Prozessen vorkommen und umgekehrt bei manchen sicheren Darmkatarrhen, speziell des Dünndarms der Schleim vermißt wird. Eine Folge der beschleunigten Peristaltik ist die mangelhafte Ausnutzung der Nahrung, was in dem reichlichen Vorhandensein schlecht verdauter Reste derselben im Stuhl (Probekost!) zum Ausdruck kommt.

Anatomisch besteht eine herdartige oder diffuse Rötung und Schwellung der Schleimhaut namentlich auf der Höhe der Falten und Zotten, Schleimbelag sowie seröse Durchtränkung der Mucosa, häufig Schwellung der Solitärfollikel und der Peyerschen Plaques (follikulärer Katarrh), an denen es bisweilen zu oberflächlicher Ulceration kommt (follikuläre Geschwüre). Mikroskopisch finden sich Epithelverlust in größeren Bezirken, Degenerationsveränderungen der Zellen der Lieberkühnschen Drüsen, starke Gefäßfüllung, Ödem bzw. Rundzelleninfiltration des interstiellen Gewebes. Bei chronischem Katarrh ist die Schleimhaut oft verdünnt, ihre Farbe mehr graurot oder braun bzw. schiefrig infolge von Pigmentablagerung; oft besteht Drüsenschwund mit Entwicklung von zellreichem Bindegewebe. In anderen Fällen kommt es zu wulstiger Schleimhauthypertrophie mit Polypenbildung wie speziell im *S. romanum* und Mastdarm.

Ätiologisch spielen bei dem akuten Darmkatarrh in erster Linie bakterielle sowie toxische Schädigungen eine Rolle, unter den Bakterien vor allem der *Paratyphusbacillus B* (*Cholera nostras* S. 43), ferner die Bacillen der Gärtnergruppe, Streptococcen usw. Hierauf beruhen namentlich die in der heißen Jahreszeit häufigen Formen der Enteritis und Gastroenteritis. Hierher gehören auch die mit schweren Darmerscheinungen einhergehenden Krankheitsbilder der Nahrungsmittelvergiftung (*Botulismus* usw.), ferner die Enteritis bei Typhus, Dysenterie, Sepsis, Malaria. Zu den chemischen Giften gehören abgesehen von den ätzenden Säuren und Alkalien u. a. Quecksilber, Arsen, ätherische Öle, Alkohol, *Digitalis*, *Colchicum*, das Urämiegift u. a. m. Jedes Abführmittel vermag bei zu hoher Dosierung Enteritis zu erzeugen. Auch Erkältungen wird eine ursächliche Bedeutung für die Entstehung von Darmkatarrhen beigemessen. Zu beachten ist ferner, daß die Erkrankung eines bestimmten Darmabschnitts in vielen Fällen erst die Folge des pathologischen Verhaltens eines höher oben gelegenen Gebietes des Verdauungstractus ist, so daß z. B. die Ursache mancher Dickdarmkatarrhe im Dünndarm, die Erkrankung des Dünndarms nicht selten in einem Magenleiden zu suchen ist.

Eine praktisch bedeutsame Rolle spielen ferner abnorme Zersetzungen des Darminhaltes, insbesondere die bei gesteigerter Gärung bzw. bei abnormer Darmfäulnis sich abspielenden Prozesse; hier können sowohl die veränderte Bakterienflora wie die chemische Reizung durch die Zersetzungsprodukte auf die Dauer schädigend auf die Darmschleimhaut im Sinne einer katarrhalischen Reizung wirken; praktisch bestehen denn auch zwischen der einfachen dadurch bedingten Verdauungsstörung (*Dyspepsie*) und der echten Enteritis fließende Übergänge.

Das Moment der fauligen Zersetzung von Darminhalt gilt aber nicht nur für die besonderen als Fäulnisdyspepsie (s. S. 321) bezeichneten Zustände; es dürfte bis zu einem gewissen Grade allgemein bei jedem Darmkatarrh von Bedeutung sein, indem hier stets eine starke Transsudation von eiweißreicher Flüssigkeit in das Darmlumen erfolgt, wie der große Flüssigkeitsgehalt der Entleerungen beweist, der die eingeführte Flüssigkeitsmenge oft um ein erhebliches übersteigt. Auch sekundär kann es zu fauliger Zersetzung infolge von Stauung, z. B. bei Stenosierung des Darmes kommen.

Auch durch mechanische Reizung, z. B. durch harte Kotballen sowie infolge lange Zeit hindurch angewendeter Einläufe entstehen katarrhalische Reizzustände speziell des Dickdarms. Besonders häufig

findet man chronische Enteritis bei Zirkulationsstörungen, insbesondere bei Pfortaderstauung. Schließlich ist hervorzuheben, daß die individuelle Empfindlichkeit des Darmes gegenüber Schädigungen innerhalb weiter Grenzen schwankt und daß es zweifellos Individuen gibt, die sich durch eine konstitutionelle Widerstandslosigkeit ihres Darmes schon banalen Schäden gegenüber auszeichnen.

**Krankheitsbild des akuten Darmkatarrhs:** Die Krankheit beginnt plötzlich ohne Vorboten unter Durchfällen, Koliken sowie häufig mit Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens. Bei den schweren infektiösen Fällen kann letzteres schwer darniederliegen, zumal diese Formen mit Fieber bis 39 und 40° einherzugehen pflegen. Dann finden sich auch meist die Zeichen einer Gastritis mit belegter Zunge, völligem Appetitmangel, Übelkeit, Erbrechen (Gastroenteritis), mitunter Herpes facialis. Bei den leichteren Formen ist das subjektive Befinden oft kaum oder überhaupt nicht beeinträchtigt. Leibschmerzen sind häufig, aber nicht konstant, und zwar teils dauernd, häufiger anfallsweise als sog. Koliken. Daneben bestehen oft lästiges Völlegefühl, lautes Kollern und Poltern im Leibe (Borborygmen, Tormina intestini) sowie oft reichlich Blähungen. Der Harn ist hochgestellt, enthält oft viel Indican. Die zahlreichen diarrhoischen Stühle, die oft mit großer Heftigkeit spritzerartig entleert werden, pflegen anfangs stark übelriechend bzw. stinkend zu sein; sie sind von schmutziggelber Farbe. Bei Kohlehydratkost (Schleimsuppen usw.) kann ein Umschwung in hellfarbige schaumige Gärungsstühle erfolgen. Bei sehr heftiger Erkrankung ähneln die Dejektionen schließlich den wässerigen Entleerungen bei Cholera. Hierbei treten wie bei dieser infolge des Wasserverlustes auch Wadenkrämpfe auf.

Stets sind zahlreiche Nahrungsreste (Muskel, Bindegewebe, Stärke usw.) im Stuhl nachweisbar. Der Schleim, der dem Stuhl bald gleichmäßig beigemengt ist, bald in einzelnen Stücken auf der Flüssigkeit schwimmt, ist in der Regel gefärbt, teils durch Hydrobilirubin braun, teils durch Bilirubin gelb; bisweilen enthält er auch Blut.

Zur Unterscheidung beider Farbstoffe eignet sich die Sublimatprobe: 1—2 ccm möglichst frischen Kotes werden mit 15 ccm konz. wässr. Sublimatlösung verrieben und 3—4 Std. im Brutschrank gehalten. Normaler Kot zeigt intensive Rotfärbung (Hydrobilirubin); bilirubinhaltige Partikel färben sich dagegen grün (Biliverdin). Hydrobilirubin (Urobilin) kann man auch durch Verreiben einer Stuhlprobe mit konz. alkohol. Zinkacetatlösung nachweisen; das Filtrat gibt starke Fluoreszenz.

In manchen Fällen gelingt es, die Diagnose Enteritis durch genauere Lokalisation des befallenen Darmabschnittes näher zu präzisieren.

Katarrh des Duodenums (Duodenitis) läßt sich nur bei gleichzeitig bestehendem Ikterus diagnostizieren; auch dürfte er bei Entstehung von Cholangitis sowie ascendierender Pankreatitis eine wesentliche Rolle spielen. Ebenso ist er sicher eine häufige Begleiterscheinung der akuten Gastritis.

Isolierte Enteritis, d. h. Katarrh des Jejunums und Ileums ohne gleichzeitige Kolitis ist selten und überdies schwer diagnostizierbar. Charakteristisch sind das Fehlen dünnflüssiger Stühle, der Nachweis kleinster mit den Faeces gleichmäßig vermischter Schleimbeimengungen, die oft nur mikroskopisch sichtbar sind, sowie unverändertes Bilirubin namentlich in der Form der sog. gelben Schleimkörner, die sich mit

Sublimat intensiv grün färben, endlich reichlicher Gehalt an Nahrungsresten (Voraussetzung: schlackenarme Kost sowie Intaktsein der Magen- und Pankreasfunktion); das Harnindican ist stark vermehrt.

Akute Katarrhe des Dickdarms (Kolitis) sind in der Regel Begleiterscheinung einer Enteritis (zusammen als Enterokolitis bezeichnet). Charakteristisch sind außer den oben beschriebenen Allgemeinbeschwerden (Temperatursteigerung usw.) vor allem die starken kolikartigen Leibscherzen, heftiger Stuhlzwang, der jedoch fehlt, wenn Rectum und unteres Sigma freibleibt, Entleerung von Schleim sowie von Blut, evtl. auch Eiter (Colitis haemorrhagica bzw. suppurativa). In schweren Fällen verlieren die Dejektionen ihre fäkale Beschaffenheit vollständig; es besteht Druckempfindlichkeit des Leibes im Verlauf des Kolons namentlich im Bereich des Sigmas. Das Krankheitsbild ist dem der Dysenterie sehr ähnlich (stets bakteriologische Stuhluntersuchung sowie serologische Blutprobe!). Leichtere Fälle heilen oft innerhalb einiger Tage, schwerere, die mit Ulcerationen einhergehen (Colitis gravis s. ulcerosa), können viele Wochen dauern und erheblichen Kräfteverfall nach sich ziehen. Auch bei Hg-Vergiftung kommt akute hämorrhagische Kolitis vor. Differentialdiagnostisch ist bei unklaren Fällen stets an die Möglichkeit eines versteckten Rectumcarcinoms zu denken.

Häufig ist die Kolitis von heftigen Spasmen begleitet, wie u. a. der Widerstand des Sphincter bei der Digitaluntersuchung des Mastdarms (sowie die Erschwerung der Rectoscopie) beweist. — Die Beimengung von Schleim ist für den Dickdarm besonders dann charakteristisch, wenn er den Faeces aufgelagert ist. Fehlen eines Dünndarmkatarrhs zeigt sich an der guten Ausnutzung der Probekost.

Therapie s. S. 323.

Von der diffusen Kolitis ist der Katarrh umschriebener Dickdarmbezirke zu unterscheiden.

Hierher gehört die relativ seltene Sigmoiditis infiltrativa, die auf diffuser entzündlicher Infiltration namentlich des subserösen Gewebes beruht. Sie kommt bei Frauen etwas öfter als bei Männern vor und äußert sich in Fieber, starker Abgeschlagenheit sowie heftigen Schmerzen in der linken Unterbauchgegend, die mitunter in die Nieren, in die Blase und den Mastdarm ausstrahlen. Es besteht ein derber wurstförmiger Tumor, der von dem infiltrierten Sigma gebildet wird und stark druckempfindlich ist. Die Stuhlentleerung ist entweder erschwert und erfolgt zum Teil in der Form von Bleistiftkot, zeitweise kann sie sogar unmöglich sein, so daß es zu Okklusionserscheinungen mit Blähung und Steifung des Transversums und Ascendens kommt, oder es bestehen Diarrhöen. Blut und Eiter kann namentlich bei gleichzeitig bestehender Colitis suppurativa den Faeces beimischen sein, doch ist dies nicht obligat, Schleim ist vorhanden. Häufig sind die Symptome einer umschriebenen Peritonitis mit Bauchdeckenspannung, Erbrechen und gelegentlich Entwicklung eines abgesackten perikolitischen Abscesses; doch kann auch diffuse Peritonitis entstehen. Stets pflegen starke Spasmen das Krankheitsbild zu begleiten. In der Pathogenese des Leidens spielt das häufige Vorhandensein der sog. falschen Divertikel am Sigma, kleiner hernienartiger, die Muscularis bis zur Serosa durchsetzender Ausstülpungen der Schleimhaut namentlich bei gleichzeitiger Verstopfung eine wichtige Rolle. Die Divertikel lassen sich mitunter durch das Rö.-Verfahren nachweisen. Schwerere Formen der Krankheit stellen ein ernstes Leiden dar. Es hinterläßt oft ausgedehnte Verwachsungen, auch Schrumpfungen mit Stenosenbildung kommen vor. Differentialdiagnostisch kommt vor allem das Carcinom in Frage. Therapie s. S. 323.

Auch der Mastdarm kann isoliert erkranken (Proktitis) und zwar meist infolge lokal einwirkender Schädigung. Mechanische Momente wie harte Kotballen, fehlerhaft verabreichte Klystiere usw. sowie vor allem das durch diese Momente geförderte Eindringen von Infektionserregern sind die häufigste Ursache, nächst dem die gonorrhöische Infektion des Mastdarms vor allem beim Weibe; beim Mann gelegentlich infolge von Päderastie. Analfissuren, Prolapsus ani und Hämorrhoiden erleichtern ebenfalls das Eindringen von Infektionserregern. Symptome sind neben der Entleerung von Schleim und Eiter, die dem Kot aufgelagert sind, vor allem die quälenden Tenesmen; doch können insbesondere bei der gonorrhöischen Proktitis die subjektiven Beschwerden sehr gering sein, sie bestehen oft nur in Brennen und Jucken im After. Therapie s. S. 323.

Eine besondere Form ist die sog. eosinophile Proktitis, eine harmlose, ohne Fieber, aber oft mit heftigen schleimig-blutigen Diarrhöen einhergehende Erkrankung, die sich durch reichliches Vorhandensein eosinophiler Leukocyten im Darmschleim, mitunter mit Charcot-Leydenschens Krystallen auszeichnet. Sie pflegt in kurzer Zeit auszuhellen.

Der **chronische Darmkatarrh** entwickelt sich bisweilen infolge von längerem Bestehen der oben genannten schädlichen Ursachen. Zum Teil handelt es sich um nicht genügend ausgeheilte akute Katarrhe, mitunter um Folgezustände von Typhus, Ruhr u. a. Häufig ist indessen der Verlauf von Anfang an schleichend und ein akuter Beginn nicht feststellbar. Funktionelle Störungen des Magens wie Anacidität und damit verbundene beschleunigte Entleerung des Magens („gastrogene Diarrhöen“) sowie einfache Dyspepsie (s. unten), wie sie vor allem Veränderungen der Darmflora hervorrufen, und die durch unzureichende Kost gefördert wird, sind oft von wesentlicher Bedeutung.

Im Krankheitsbild tritt im Vergleich zu den akuten Katarrhen die Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens zurück. Fieber fehlt, meistens auch heftigere Koliken. Häufig sind dagegen Klagen über Völlegefühl, Unbehagen und Kollern im Leibe namentlich im Anschluß an die Nahrungsaufnahme, ferner meist eine sehr erhebliche Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens mit nervöser Reizbarkeit, Abgespanntheit und Leistungsunfähigkeit sowie psychischer Depression. Das wichtigste Symptom sind dünnflüssige bzw. breiige Entleerungen, die oft mehrmals am Tage und zwar täglich oder unterbrochen von kürzeren Perioden mit normalem Stuhl auftreten. Verstopfung gehört nicht zum Bilde der unbehandelten Fälle. Oft wird über starke Flatulenz geklagt. Die Faeces sind meist dunkelbraun oder mißfarben, oft von fauligem Geruch, alkalischer Reaktion, seltener sind es saure Gärungsstühle. Ein besonders charakteristischer Bestandteil der Faeces ist der meist kleinflockige Schleim; seine Herkunft aus dem Dünndarm läßt sich durch die Grünfärbung bei der Sublimatprobe feststellen; jedoch ist diese Probe nicht häufig positiv. Oft sind Nahrungsreste vorhanden (Probediät); die Gärungsprobe ergibt daher meist abnorme Gasbildung, wobei es sich aber in der Regel um Mischfälle von Gärung und Fäulnis handelt. Reine Gärungsstühle sind auf den Dünndarm zu beziehen, isolierte

Kolitis macht dagegen verstärkte Fäulnis. Motilität und Chemismus des Magens sind häufig völlig normal, in manchen Fällen findet sich Subacidität bzw. Achylie. Die Harnmenge ist normal, das Indican meist vermehrt. Der Einfluß des Leidens auf den Ernährungszustand ist verschieden. Während er in manchen Fällen überhaupt nicht leidet, ist eine gewisse Unterernährung doch häufig, besonders wenn sich die oben genannte nervöse und psychische Alteration hinzugesellt. Die Dauer des chronischen Darmkatarrhs beträgt bald mehrere Monate, bald viele Jahre; es liegt in der Natur des Leidens, daß es besonders häufig zu Verschleppung der Krankheit kommt, bei der die Behandlung schließlich nur eine Besserung, aber keine Heilung mehr zuwege bringt und dauernde Empfindlichkeit des Darms sowie permanenter Schleimgehalt des Stuhls das Fortbestehen des chronischen Reizzustandes anzeigt.

Therapie der chronischen Darmkatarrhe s. S. 323.

Mit den Darmkatarrhen in engem Zusammenhang steht die praktisch außerordentlich wichtige

#### Gärungs- und Fäulnisdyspepsie des Darms.

Unter Gärungsdyspepsie<sup>1)</sup> versteht man eine überaus häufige und praktisch bedeutsame Verdauungsstörung, die dann eintritt, wenn zuviel kohlehydrathaltiges gärungsfähiges Nahrungsmaterial, anstatt in den oberen Abschnitten des Verdauungskanals resorbiert zu werden, in die unteren, speziell in das Coecum gelangt und hier der Zersetzung durch Mikroben anheimfällt (vgl. S. 311). Ursachen pathologischer Kohlehydrat-Gärung können sowohl abnorm große Zufuhr von Kh wie auch beschleunigte Dünndarmpéristaltik sein, ferner bei schlackenreicher Nahrung die Unmöglichkeit für die Darmfermente, zu den in den derben Cellulosehüllen eingeschlossenen Kh vorzudringen; letzteres ist denkbar teils infolge von ungeeigneter derber, vegetabilischer Kost, teils infolge Versagens der Magenvorverdauung. Die Empfindlichkeit gegenüber abnorm großen Kh-Mengen ist individuell sehr verschieden.

Das Krankheitsbild, das in akuter Form besonders häufig im Sommer und zwar in erster Linie nach Genuß von rohem Obst, ferner von verdorbenem Bier, gärendem Most, schlecht ausgebackenem Brot usw. beobachtet wird, beginnt häufig zunächst mit Magenbeschwerden wie Übelkeit, gelegentlich Erbrechen, denen alsbald unter Leibschmerzen und Poltern im Leibe sowie starken Blähungen mehrfache Entleerungen dünner hellgelber Stühle von stechendem Geruch und saurer Reaktion folgen; in schwereren Fällen zeigen sie schaumige Beschaffenheit. Die Pat. fühlen sich oft recht angegriffen. Die Gärungsprobe fällt stets stark positiv aus. Die Sublimatprobe gibt Rotfärbung, mikroskopisch findet sich viel mit Jod sich blaufärbendes Material (Stärke sowie Clostrid. butyr.). In ganz leichten Fällen beschränkt sich die Störung auf leichte

<sup>1)</sup> Mit „Dyspepsie“ bezeichnet man allgemein Verdauungsstörungen, denen eine Änderung im Chemismus der Verdauung bzw. im Verhalten der Darmflora zugrunde liegt, ohne daß wesentliche anatomische Veränderungen vorzuliegen brauchen.

subjektive Beschwerden wie Leibkneifen, starke Flatulenz und Unruhe im Leib ohne Durchfälle.

Bei Behandlung pflegt die Dyspepsie innerhalb weniger Tage abzuklingen; oft besteht jedoch eine bisweilen recht hartnäckige Neigung zu Rückfällen, namentlich nach Diätfehlern. Dieser Zustand kann lange bestehen bleiben, indem Zeiten normaler Stuhlbeschaffenheit mit Perioden stärkerer Gärung abwechseln. Der Ernährungszustand der Pat. ist oft nicht wesentlich beeinträchtigt, zumal der Appetit häufig gut bleibt; in manchen Fällen bestehen Zeichen von Neuropathie. Häufig kommt es auf die Dauer, zweifellos infolge von Gewöhnung, zu erhöhter Toleranz gegenüber schlackenreicher Kost. Andererseits kann die einfache Dyspepsie schließlich zu entzündlichem Darmkatarrh infolge der dauernden Reizung der Schleimhaut durch die sauren Zersetzungsprodukte führen, was sich durch Auftreten von Fieber, Schleimgehalt der Stühle sowie Hartnäckigkeit der Diarrhöen trotz Kostwechsels kundtut. Der Stuhl entspricht dann oft der Mischform von Gärungs- und Fäulnisdyspepsie. Der rein nervösen Diarrhöe kommen Gärungsstühle nicht zu. Therapie s. unten.

Unter **Fäulnisdyspepsie** versteht man dyspeptische Zustände, bei denen es sich im Gegensatz zur abnorm starken Gärung der Kh um gesteigerte Fäulnis eiweißhaltigen Materials handelt.

Dieser Fall kann sich z. B. durch Überladung des Darmes infolge von Genuß übermäßig großer Fleischmengen ereignen, namentlich wenn bei Achylie die Magenverdauung unzureichend ist und daher massenhaft faulfähiges Material in den Dickdarm, die Stätte physiologischer Eiweißfäulnis gelangt (gastrogene Diarrhöe). Weit häufiger ist die Quelle übermäßiger Fäulnis der in abnormer Menge sezernierte eiweißreiche Darmsaft, der den Fäulnisbakterien ein willkommenes Substrat bildet. Alle Momente daher, die vermehrte Darmsekretion bewirken, vermögen unter Umständen auch die Entstehung der Fäulnisdyspepsie zu fördern. Hierzu gehören z. B. die Küchengewürze, ferner viele Abführmittel, speziell die salinischen, weiter Stagnation des Darminhalts wie bei Darmstenosen, aber auch evtl. die einfache Obstipation, ferner gelegentlich die Gärungsdyspepsie infolge des von den Gärungsprodukten ausgeübten Reizes, weiter bakterielle Reize (Paratyphus, Ruhr, Botulismus) sowie geschwürige Prozesse des Darms usw. Besteht erst einmal abnorm gesteigerte Fäulnis, so wird durch die dabei vorhandenen Zersetzungsprodukte der Darm erneut zu verstärkter schädlicher Sekretion angeregt und dadurch der Zustand weiter verschlimmert. Als Begleiterscheinung von Darmkatarrhen findet sich die Fäulnisdyspepsie regelmäßig bei Katarrh des Dickdarms, im Dünndarm dagegen nur bei Ulcerationen.

Die Beschwerden ähneln denen bei Gärungsdyspepsie. Leibschmerzen fehlen oft oder sind nur angedeutet, dagegen wird häufig über Unruhe und Poltern im Leibe sowie über Flatulenz und vor allem über diarrhöische Entleerungen geklagt. Dieselben wechseln mitunter mit Verstopfung ab. In manchen Fällen wird nur einmal täglich, häufig frühmorgens, ein dünner oder breiiger Stuhl abgesetzt. Die Stühle sind auffallend übelriechend, meist dunkelbraun, alkalisch und enthalten häufig reichlich Bindegewebsreste (Probekost!). Mitunter ist auch jodophiles Kh-Material wie bei Gärungsdyspepsie vorhanden. Schleim und Blut fehlen. Im Brutschrank zeigen die Stühle vermehrte Gasbildung. Die Fettresorption ist in der Regel ungestört, was das relativ gute Fettpolster mancher Kranker erklärt. Das Indican im Harn ist

meist erheblich vermehrt. Die gewöhnliche Fäulnisdyspepsie verläuft in Form akuter Anfälle, die nach Ablauf einiger Tage oder Wochen wieder schwinden, aber Neigung zu Rückfällen, speziell nach Diätfehlern haben; sie kann sich in dieser Form über viele Jahre erstrecken, wobei manche Pat. allmählich in ihrem Ernährungszustand leiden, mitunter auch anämisch werden.

Für die Diagnose ist zunächst festzustellen, ob nur einfache Dyspepsie oder echter Darmkatarrh vorliegt. Für letzteren spricht längeres Bestehen des Leidens ohne Unterbrechung sowie stärkerer Schleimgehalt des Stuhls. Man kontrolliere stets den Zustand des Gebisses sowie die Magenfunktion. Auch nervöse Diarrhöen können die Merkmale der Fäulnisdyspepsie tragen (Bindegewebsreste fehlen aber hierbei). Im übrigen sind die oben genannten Quellen, u. a. auch namentlich versteckte Neoplasmen des Dickdarms in Erwägung zu ziehen.

### Therapie der Darmkatarrhe und Darmdyspepsien.

**Therapie der akuten Störungen:** Bei akuter Enterokolitis und speziell bei Verdacht auf Verweilen schädlicher Ingesta im Magen können in den allerersten Stadien Magenspülungen mit lauwarmem Wasser Erleichterung schaffen. Vor allem (trotz Diarrhöe) Abführmittel wie Ricinus 1—2 Eßl. oder Kalomel 2mal 0,3 im Abstand von  $\frac{1}{2}$  Std. zur schleunigen Entfernung der schädlichen Stoffe aus dem Darm. Unerlässlich ist völlige Nahrungsabstinenz für 1—3 Tage (nur Tee in kleinen Portionen ohne Zucker) sowie Bettruhe; feuchtwarme Umschläge auf den Leib. Medikamente: Carbo sanguin. Merck 4mal tgl. 1 Eßl. in 1 Gl. warm, Wasser; Opium als Tct. opii (wenn möglich nicht mehr als) 5mal 5 Trpf. tgl. zur Beruhigung des Darms nach gründlicher Entleerung durch Abführmittel; ferner Dermatol (Bismuth. subgall.) 3mal tgl. 1,0. Bei Tenesmen Extr. Belladonn. 0,05 oder Extr. Opii 0,02 beides als Suppos. evtl. mehrmals tgl. oder Suprareninklistiere (30 Trpf. Stammlösung auf 300 cc Aqua). Vorsicht mit Flüssigkeitszufuhr. Die auf die Karenz folgende Diät soll in flüssiger oder breiiger Form unter Vermeidung allzugroßer Flüssigkeitsmengen erfolgen: Scharf geröstetes Weißbrot, Zwieback, Rotwein, Tee, Schleimsuppen, Breie von Reis, Grieß, Mondamin, weiche Eier; Milch wird oft schlecht wegen des Milchzuckers vertragen. Allmählicher Übergang zur gewöhnlichen Kost zunächst noch unter Vermeidung von Obst und Gemüsen. Bei Appetitmangel HCl-Tropfen und Extr. Condurango. In schweren Fällen beschränke man die Ernährung nach den Fasttagen zunächst auf Rohrzuckergaben (anfangs 100, steigend bis auf 200 g p. die als 10% wäflr. Lösung, z. B. in Tee in 2stdl. Portionen), da der Zucker infolge vollständiger Resorption in den obersten Darmabschnitten ein vorzügliches, dabei reizloses Nährmaterial bildet. Besondere Aufmerksamkeit ist der Bekämpfung der häufig nachträglich einsetzenden Obstipation zu widmen: Rhabarber oder Magnesiumperhydrol abends 0,5—1,0 sowie evtl., aber nur für kurze Zeit Klistiere.

Die **Therapie der chronischen Enterokolitis** ist in erster Linie eine diätetische und soll für die erste Zeit wenn möglich in Form stationärer Behandlung erfolgen<sup>1)</sup>. Man beginnt mit der Feststellung der Art der Verdauungsstörung (ob Gärungs-, Fäulnis-Dyspepsie oder Mischform) mittels Probekost für 3 bis 5 Tage sowie Prüfung des Magenchemismus. Bei Vorwiegen abnorm saurer Gärung Kh-arme Kost ähnlich der strengen Diabetesdiät. Calc. carbon. 4mal tgl. 2,0, evtl. abends 10 Trpf. Tct. opii. Bei gesteigerter Fäulnis Einschränkung aller faulfähigen Substanz; verboten in erster Linie alle rohes und geräuchertes Bindegewebe enthaltenden Nahrungsmittel wie roher Schinken, rohes Schabefleisch usw. Auch sonst Eiweißträger möglichst beschränken, Fleisch zuerst verboten (statt dessen z. B. weißer Käse), ebenso alles den Darmsaft anlockende, schlackenreiche Material wie schlecht zerkleinerte Speisen, grobe Cellulose, vor allem fasrige derbe Gemüse, Kohlsorten, grobes Brot, weiter Gewürze, Fleischextrakt, starker

<sup>1)</sup> Während der ganzen Dauer der Behandlung ist fortlaufend die Beschaffenheit des Stuhles (und zwar mikroskopisch!) zu kontrollieren.



Kaffee, alle kalten Getränke, stark gesalzene, stark geröstete und gebackene Speisen, Bier und Weißwein. Die Toleranz für gute Fettsorten (Butter, Pflanzenöle, Knochenmark) ist im allgemeinen nicht wesentlich herabgesetzt, nur dürfen sie nicht durch starke Erhitzung verändert sein. Milch wird oft gut vertragen, evtl. als saure Milch. Bei Vorhandensein von Mischformen gehe man zuerst gegen die Gärung diätetisch vor. Stets ist übrigens mit der nicht ganz seltenen Möglichkeit eines Umschwungs von Fäulnisdyspepsie in Gärungsdyspepsie speziell infolge einer zu rigorosen Kur zu rechnen; auch das Umgekehrte kommt vor. In diesen Fällen empfiehlt sich die Einschaltung von Fasttagen. Medikamentös wirken günstig Bismuth. salicyl. oder subgall. 3mal tgl. 1,0, ferner Tanninpräparate, z. B. Acid. tannic., Tannigen oder Tannaibin je 3mal tgl. 0,5; ähnlich wirkt alter tanninhaltiger Rotwein bzw. Heidelbeerwein. Bei Neigung zu Darmspasmen Atropin 2mal tgl. 1 mg oder Papaverin 2mal 0,04. Große Vorsicht bei chronischer Enterokolitis mit planloser Anwendung von Abführmitteln, die nicht selten sogar verschlimmernd wirken. Bei hartnäckiger Verstopfung Anwendung der oben genannten Purgantien oder abendliche Ölklistiere (vgl. S. 341). In der Rekonvaleszenz und später ist neben der Schonung in vielen Fällen auch eine gewisse Abhärtung des Darms, insbesondere bei den gärungsdyspeptischen Zuständen erstrebenswert (vorsichtige und systematisch gesteigerte Zugabe von cellulosehaltigem Material). Nachkur in Kissingen, Marienbad, Homburg v. d. H.

**Therapie der Erkrankungen der unteren Darmabschnitte:** Bei isolierter akuter Kolitis zunächst wie bei Enterokolitis Fasten für 1—2 Tage (nur Tee mit Rotwein), evtl. Schleimsuppen sowie Carbo sanguin. 4mal tgl. 25,0 in warmem Wasser. Im Beginn evtl. Ricinusöl, in den folgenden Tagen Vorsicht mit Abführmitteln wegen Darmreizung. Bei starken Tenesmen Suppos. von Extr. Belladonn. 0,03 oder Atropin, oder besser letzteres subcut. 3mal tgl.  $\frac{1}{4}$  mg oder Injektionen von Suprarenin ins Rectum (vgl. S. 323). Die Kost in den nächsten Tagen sowie für die Folgezeit soll, solange Zeichen von Darmreizung bestehen, möglichst schlackenarm sein.

Bei der chronischen Kolitis sorgfältige Vermeidung der Retention von Stuhl: morgens nüchtern Karlsbader Salz ( $\frac{1}{2}$  l 5% Lösung körperwarm) oder regelmäßige Darmspülungen mit 1 l Wasser oder physiol. NaCl-Lösung. Wegen der oft auf Spasmen beruhenden Kotretention Atropin bzw. Papaverin. Vorsicht mit Stopfmitteln wie Opium. Bei ulcerösen Prozessen empfiehlt sich lokale Applikation adstringierender Medikamente als Spülungen, z. B.  $\frac{1}{2}$  oder  $\frac{1}{3}$  % Arg. nitric. oder  $\frac{1}{4}$ —1%ige Tanninlösung oder Dermatol (z. B. 1 Eßl. Dermat. in  $\frac{1}{4}$  l warm. Wasser, 2 Eßl. Mucil. gumm. arabic., 10 Trpf. Tct. opii). Die regelmäßige Anwendung des Rektoskops zum Bepudern der Schleimhaut mit Medikamenten ist bei Ulcerationen nicht unbedenklich. Besonders große Bedeutung hat die Diät: eine schlackenarme, küchentechnisch gut vorbereitete, d. h. gar gekochte und fein zerkleinerte Kost, die möglichst vollständig im Dünndarm resorbiert wird, aber nicht dünnbreiig oder gar flüssig sein soll. Gewissenhafte ärztliche Überwachung ist hier um so mehr notwendig, als die monatelange Dauer des Leidens die Geduld der Pat. häufig erschöpft.

Bei ganz schweren ulcerösen Prozessen kommt als ultima ratio die chirurgische Behandlung und zwar die Appendicostomie oder Coecostomie zwecks wirksamerer Einwirkung des Darmes mit Spülungen durch die Fistel bzw. die Herstellung eines Coecalafters in Frage. Die Sigmoiditis infiltrat. erfordert chirurgisches Eingreifen. Bei der Therapie der Proktitis sind vor allem die lokalen Reizzustände, die Tenesmen zu behandeln (s. oben); warme Sitzbäder, mildes Laxieren, da Obstipation verschlimmernd wirkt; lokale Applikation der oben genannten Adstringenzen.

### Appendicitis (Perityphlitis).

Die Entzündung des Wurmfortsatzes des Coecums ist eine häufige und praktisch außerordentlich wichtige Krankheit.

Der Wurmfortsatz (Appendix oder Process. vermiformis) hat eine Länge von ca. 6—8 cm (bis zu 20 cm!), ist oft etwas gewunden und besitzt einen erheblichen

Grad von Beweglichkeit. Während er oft in der Richtung nach dem kl. Becken herabhängt, ist er in anderen Fällen z. B. hinter das Coecum oder das Ileum verlagert oder noch weiter von seinem gewöhnlichen Ort disloziert. Er ist sehr reich an lymphatischem Gewebe. Seine physiologische Bedeutung ist unbekannt.

Nach Statistiken an Sektionsmaterial zeigen ca. 75% aller Erwachsenen Spuren abgelaufener Appendicitis. Doch macht nur ein kleiner Teil klinisch wahrnehmbare Krankheitserscheinungen. Die Vorbedingungen für die Erkrankung liegen zweifellos in der besonderen anatomischen Beschaffenheit des Wurmfortsatzes, der infolge seines engen Lumens und der Fältelung seiner Schleimhaut mit ihren zahlreichen Buchten Stauung des Inhaltes sowie Sekretretention und damit die Ansiedlung pathogener Keime begünstigt. Kotstauung, Obstipation, ferner das Eindringen von Fremdkörpern aus der Nahrung wie Fischgräten, Emaillesplitter sowie Darmparasiten, speziell Oxyuren, aber auch entzündliche Prozesse der Nachbarschaft (Adnexe) dürften gelegentlich eine fördernde Rolle spielen, desgl. spastische Zustände, die die Entleerung der Appendix erschweren. Mitunter beobachtet man auch im Verlauf von Allgemeininfektionen, speziell von Anginen appendicitische Reizzustände, die für eine hämatogene Entstehung derselben zu sprechen scheinen.

Pathologische Anatomie: Die leichtesten Veränderungen bestehen in einem oberflächlichen Epitheldefekt der Schleimhaut, der von einer keilförmig in die Tiefe bis zur Serosa reichenden Leukocyteninfiltration der Mucosa und Submucosa begleitet ist (sog. Primärinfekt). Multiple derartige Schleimhauterosionen mit eitrigem Exsudat im Lumen, dichter Infiltration und Verdickung der Wand sowie evtl. — zunächst sterilen — Fibrinauflagerungen der Serosa bilden den Befund der sog. Appendicitis simplex s. phlegmonosa nach Ablauf etwa der ersten 12 Stunden; unter weiterer Ausdehnung der Schleimhautgeschwüre und der eitrigen Infiltration kommt es zur Appendicitis phlegmonosa ulcerosa, die ebenfalls keine stärkere Reizung des Peritoneums aufweist (24 Std.). Ohne Eintritt von Komplikationen heilt auch diese Form sehr schnell wieder ab. Residuen der Appendicitis simpl. sind einmal partielle Obliteration bzw. Stenosierung des Lumens, welche Stauung des Inhaltes bewirken und damit späteren Rezidiven Vorschub leisten, sowie ferner peritoneale Verklebungen der Appendixserosa mit der Nachbarschaft (lokale adhäsive Peritonitis), welche zur Bildung eines ileocaecalen Tumors führen können.

Der Appendicitis simpl. steht die Appendicitis destructiva s. complicata gegenüber, die durch schwere, infolge hochvirulenter Keime verursachte Zerstörungsprozesse ausgezeichnet ist und stets mit Beteiligung des Peritoneums einhergeht. Sie verläuft einmal in Form eitriges Einschmelzung unter Bildung von miliaren Wandabscessen, die ins Lumen oder durch das Peritoneum durchbrechen (Appendicitis phlegmon. gravis), andererseits in Form von Infarzierung und Gangrän eines größeren Abschnittes des Wurmfortsatzes, die zur Perforation in die Bauchhöhle führen (Appendicitis gangraenosa perforans). Die Zerstörung der Wand der Appendix kann sich in besonders bösartigen Fällen außerordentlich schnell vollziehen. Der Verlauf einer Appendicitis destructiva hängt u. a. von dem Verhalten der Nachbarschaft der Appendix ab. Bei Bestehen von peritonealen Verklebungen bzw. Adhäsionen mit der Bauchwand oder benachbarten Organen bleibt der Prozeß zunächst trotz Durchbruchs lokalisiert, es entsteht ein abgekapselter periappendicitischer Absceß (Perityphlitis). Fehlen die Verklebungen, so tritt eine diffuse Peritonitis ein. Als Folgezustände der Absceßbildung kommen weiter bei Fortkriechen der Eiterung sowohl subphrenische wie Senkungsabscesse, ferner thrombophlebitische Erkrankungen im Bereich der Pfortader (Pylephlebitis) vor. Ansammlung von eitrigem Exsudat im Lumen distal von einer Obliteration

führt zum Empyem des Wurmfortsatzes, das später unter Umwandlung des eitrigen in wäßrigen Inhalt in den sog. Hydrops übergehen kann.

Da die allererste Erkrankung klinisch symptomlos zu verlaufen pflegt bzw. vom Pat. übersehen wird, so handelt es sich bei dem ausgebildeten Krankheitsbild in der Regel um einen von früher her bereits veränderten Wurmfortsatz, der häufig schon von schützenden Adhäsionen umgeben ist.

**Krankheitsbild:** Die Krankheitssymptome beginnen plötzlich unter Leibschmerz und Übelkeit, Appetitlosigkeit, bisweilen Erbrechen, Fieber, Pulsbeschleunigung, belegter Zunge sowie meist Obstipation, seltener Durchfall. Der Schmerz ist häufig zunächst diffuser Art (oft als „Magenschmerzen“ bezeichnet), sehr bald aber oder auch von vornherein circumscripirt im Bereich der rechten Unterbauchgegend. Gleichzeitig besteht Druckempfindlichkeit dieser Region. Bei der Palpation des Abdomens findet sich sehr häufig reflektorische Bauchdeckenspannung (als Symptom der Beteiligung der Serosa der Appendix) im rechten unteren Quadranten, oft zunächst nur bei oberflächlicher Palpation<sup>1)</sup>. Bei der Atmung bleibt diese Region meist deutlich gegenüber der lk. Seite zurück, auch fehlt häufig der rechte untere Bauchdeckenreflex. Die genaue Lokalisation der Druckempfindlichkeit entspricht dem Mac Burneyschen Punkte, d. h. der Mitte zwischen Nabel und Spina iliac. sup., häufiger dem Lanzschen Punkte, d. h. der Grenze zwischen rechtem und mittlerem Drittel der Linea interspinal. sup. Auch bei vaginaler bzw. rectaler Untersuchung besteht Druckempfindlichkeit der Appendixgegend. Mitunter beobachtet man leichte Beugung des rechten Beins im Hüftgelenk.

In der Regel besteht Fieber (38—40°), ausnahmsweise fehlt es. Man nehme stets die Mastdarmmessung vor. Von größter Bedeutung ist das Verhalten des Pulses. Bei leichten Fällen überschreitet er nicht 90—100 und bleibt dem Verhalten der Temperatur konform; höhere Pulsfrequenz sowie namentlich fortschreitendes Ansteigen desselben hingegen ist ein Alarmsymptom. Im Blut besteht Leukocytose, Verminderung der Eosinophilen und Lymphocyten sowie Linksverschiebung der Leukocytenkerne.

In leichten Fällen klingen die genannten Symptome schnell wieder ab, so daß bereits nach wenigen Tagen der Kranke sich genesen fühlt.

Häufig schließt sich an dieses sog. Frühstadium die Entwicklung eines perityphlitischen Tumors, des sog. Ileocecaltumors (II. oder intermediäres Stadium) an. Derselbe besteht aus der erkrankten Appendix, verklebtem Netz, Darmschlingen usw. und bildet eine rundliche durch die Bauchdecken gut fühlbare Resistenz mit perkutorisch nachweisbarer Dämpfung. Mitunter bildet sich die Geschwulst ebenso wie die Allgemeinerscheinungen in den nächsten Tagen wieder zurück. In andern Fällen, in denen es zur Entwicklung eines perityphlitischen Abscesses kommt, verrät sich dies durch Ansteigen

<sup>1)</sup> In Anbetracht der Wichtigkeit dieses Symptomes gehe man in zweifelhaften Fällen so vor, daß man die Palpation des Abdomens an einer Stelle beginnt, die sicher frei von abnormer Spannung ist, z. B. in der Oberbauchgegend, und schreite dann langsam auf die rechte Unterbauchregion zu. Auf diese Weise lassen sich schon die ersten Anfänge der Bauchdeckenspannung konstatieren.

der Pulsfrequenz sowie meist (nicht immer!) auch der Temperatur. Die schon im Schwinden begriffene peritoneale Reizung, die Druckempfindlichkeit sowie die Bauchdeckenspannung werden wieder stärker, die Leibschmerzen werden diffuser, der Tumor nimmt an Größe zu. Auch jetzt kann der Prozeß infolge von Abkapselung durch derbe Schwartenbildung im Laufe von 2—3 Wochen zur Ruhe kommen, wenn auch der Eiterherd bestehen bleibt. Wird nicht für operative Entleerung des Abscesses gesorgt, so entsteht Spontandurchbruch desselben entweder in die freie Bauchhöhle und konsekutiver Peritonitis oder in ein Nachbarorgan wie den Darm, die Blase usw. oder es kommt zum Fortkriechen der Eiterung mit den oben genannten Folgezuständen. In wieder anderen Fällen klingt der erste Appendicitis-Anfall unter scheinbar völliger Genesung wieder ab, um später in gleicher oder ähnlicher Form, oft mehreremal sich zu wiederholen (sog. chronische oder besser chronisch rezidivierende Appendicitis). Nicht selten bestehen jedoch auch im sog. Intervall gewisse Beschwerden wie Druck, Ziehen in der Blinddarmgegend, in zahlreichen anderen Fällen völlig uncharakteristische Beschwerden, wie hartnäckige Obstipation, eventuell abwechselnd mit Durchfällen, unangenehme Gefühle oder sogar Schmerzen im Epigastrium, Klagen über Auftreibung der Magengegend nach dem Essen, bisweilen vermehrter Harndrang sowie endlich ein Gefühl von Steifigkeit im rechten Bein, eventuell auch Hinken infolge von Spannung in der Unterbauchgegend.

Die schwerste Form der Appendicitis destructiva, die sich bisweilen sogar innerhalb von Stunden entwickelt, ist diejenige, bei der es infolge des schnellen Fortschreitens der gangränösen Zerstörung des Wurmfortsatzes überhaupt nicht zu peritonealen Verklebungen kommt und sich in kürzester Zeit unter septischen Erscheinungen diffuse Perforationsperitonitis entwickelt. Auffallend hohe Frequenz des Pulses, der alsbald weich und klein wird, trockene Zunge sowie lebhafte, zunächst lokale Bauchdeckenspannung, endlich hohe Leukocytenzahlen kennzeichnen den Ernst der Situation. Vielfach bekommt der Arzt derartige Fälle erst bei beginnender Peritonitis zu sehen; hier kann dann oft selbst die sofortige Laparotomie den ungünstigen Verlauf nicht mehr aufhalten. Es ist mit Nachdruck zu betonen, daß die ersten Krankheitserscheinungen bei dieser bösartigsten Form durchaus nicht immer von vornherein einen bedrohlichen Charakter haben, insbesondere kann das relativ gute Allgemeinbefinden und das Fehlen von Schmerzen über die Schwere des Prozesses täuschen. Es kann sogar vorkommen, daß trotz schon vorhandener Gangrän der Pat. infolge seiner geringen Beschwerden nur mit Mühe im Bett zu halten ist. In diesen Fällen bildet vor allem die sehr ausgesprochene Bauchdeckenspannung in der rechten Darmbeingrube, nächstdem der hohe Puls, der aber anfangs fehlen kann, sowie — wenigstens häufig — wiederholtes Erbrechen die Mahnung zu sofortigem Eingreifen.

Die Diagnose der Appendicitis kann vor allem bei Lageanomalien der Appendix erschwert sein, indem diese sowohl von vornherein an abnormer Stelle liegt oder nachträglich durch Adhäsionen verlagert ist. Schmerz und lokale Muskelspannung

können dementsprechend lokalisiert sein und u. a. ein Ulc. ventric. oder duodeni, eine Nephrolithiasis bzw. Uretersteine oder eine Cholecystitis vortäuschen, letzteres zum Ikterus kein ganz seltenes Begleitsymptom der Appendicitis ist. Hier ist die anamnestiche Feststellung früherer Anfälle von Appendicitis von Wichtigkeit. Bei nach hinten geschlagenem bzw. retrocoecal liegender Appendix kann die Bauchdeckenspannung vorne fehlen; man versäume daher nicht, die seitliche und hintere Bauchwand auf abnorme Spannung zu prüfen, die in schwereren Fällen dieser Art nicht vermißt wird, allerdings auch bei paranephritischen Abscessen in gleicher Weise sich findet. Bei beginnender croupöser Pneumonie sowie im Verlauf des Typhus treten bisweilen pseudoappendicitische Symptome auf (Leibschmerzen, ileocoecale Druckempfindlichkeit), die mitunter zu überflüssigen Laparotomien verleiten. Bei Verdacht auf A. denke man daher stets an die Möglichkeit beider Erkrankungen. Die Leukocytose kann fehlen, statt dessen besteht bei schweren Fällen mitunter eine Leukopenie. Relative Vermehrung der Polynuclären (Unterscheidung von Typhus) sowie starke Linksverschiebung klärt hier die Diagnose. Für die oft schwierige Unterscheidung von rechtsseitigen Adnexerkrankungen bzw. gonorrhöischer Pelveoperitonitis ist die gynäkologische Untersuchung unerläßlich. Das gleiche gilt bei der Möglichkeit einer geplatzten Extrauterin gravidität. Der appendicitische Ileocoecaltumor kann durch Tuberkulose (vgl. S. 331) und Aktinomykose (vgl. S. 123) des Coecums vorgetäuscht werden. Auch die Typhlomatie kommt differentialdiagnostisch in Frage (vgl. S. 340) sowie das Coecum mobile (S. 333). Endlich sei bezüglich der diffusen Peritonitis p. append. bemerkt, daß sie nicht immer unter stürmischen Erscheinungen beginnt, namentlich dann nicht, wenn im Anschluß an die Absceßbildung die Eiterung zwischen den einzelnen Darmschlingen langsam vorwärtskriecht. Abgesehen vom Verhalten des Pulses und der Zunge ist hier zunehmende Verkleinerung der Leberdämpfung (zuerst links, dann rechts) ein wichtiges Symptom, während Schmerz und Temperatursteigerung im Stiche lassen können.

Es ist noch zu erwähnen, daß im Verlaufe schwerer Fälle öfter Eiweiß im Harn gefunden wird, sowie daß mitunter eine Hämaturie beobachtet wird, die nach Heilung der Appendicitis, speziell nach der Entfernung des Wurmfortsatzes, zu schwinden pflegt.

Therapie: Die Entscheidung, ob interne oder chirurgische Behandlung am Platze ist, ist bei der A. besonders verantwortungsvoll. Innere Therapie in Form von strenger Betruhe mit Rückenlage (Bettschüssel!), Fasten bzw. flüssiger Ernährung, kein Abführmittel, sowie Eisblase auf den Leib ist erlaubt 1. bei Appendicit. simpl. mit gutem Allgemeinbefinden, niedrigem Puls und Fehlen der Bauchdeckenspannung, 2. im Stadium des Ileocoecaltumors mit geringen Allgemeinerscheinungen, d. h. gutem Puls, fehlendem Erbrechen, feuchter Zunge. Die Anwendung von Opium ist kontraindiziert im Frühstadium, da es die für die weitere Beurteilung des Falles wichtigen Symptome (Schmerz, Bauchdeckenspannung) maskiert; dagegen ist es nach Bildung des Ileocoecaltumors erlaubt, da hier die Ruhigstellung des Darms der Abkapselung des Prozesses förderlich ist. Dosierung: mehrmals tgl. 5—10 Trpf., jedenfalls nur gerade so viel, um den Spontanschmerz zu dämpfen.

Indikationen zur Operation 1. innerhalb der ersten 48 Std. („Operation im Anfall“ oder „Frühoperation“): bei deutlicher Bauchdeckenspannung, bei Puls über 100 (bei Erwachsenen), bei wiederholtem Erbrechen, bei dauerndem lebhaften Schmerz, ferner wenn am 2. Tage die Rectaltemperatur noch über 38° beträgt sowie bei Leukocytose über 15000; 2. im sog. Intermediärstadium (d. h. nach 48 Std.) wird nur ausnahmsweise operiert und zwar bei Vorhandensein der gleichen soeben genannten Symptome, insbesondere bei Absceßbildung, Peritonitis bzw. septischen Erscheinungen, 3. die sog. Intervalloperation wird nach Abklingen aller Entzündungserscheinungen nach 2—8 Wochen vorgenommen, und zwar nach einem oder wiederholten schweren Anfällen, ferner in den ersten Monaten der Gravidität wegen der Möglichkeit gefährlicher späterer Rezidive, endlich bei dauernden Beschwerden und Störung des Allgemeinbefindens.

## Die Neoplasmen des Darms.

Unter den benignen Tumoren des Darms sind die von der Schleimhaut ausgehenden Polypen insofern von Bedeutung, als sie öfter in großer Zahl in Form der sog. Polyposis intestini auftreten und zu Entzündungsprozessen und Ulcerationen Anlaß geben, die oft mit hartnäckigen Blutungen und daran anschließend mitunter mit schwerer Anämie einhergehen. Im Dünndarm können Invaginationen durch sie entstehen. In manchen Fällen bleiben sie symptomlos. Sie kommen nicht selten schon im jugendlichen Alter vor und bevorzugen Rectum und Sigma, wo sie sich rektoskopisch erkennen lassen. Bisweilen finden sich einzelne abgerissene Polypen im Stuhl. Die Unterscheidung von Carcinom ist bisweilen schwierig, zumal sich letzteres manchmal auf dem Boden der Polyposis entwickelt.

Unter den malignen Tumoren steht das **Carcinom** an erster Stelle. Es ist ein relativ häufiges Leiden. Dickdarm und Mastdarm sind sein Hauptgebiet. Bevorzugt wird das Alter zwischen 40—65 Jahren, doch kommen Darmcarcinome nicht selten auch bei wesentlich jüngeren Leuten vor. Männer werden häufiger als Frauen befallen, was besonders vom Mastdarmkrebs gilt.

Histologisch handelt es sich in der Regel um adenomatösen, seltener um medullären oder scirrhösen Cylinderzellenkrebs. Charakteristisch ist seine Neigung zu ringförmiger Ausbreitung, die oft Stenosenbildung veranlaßt, sowie die im weiteren Verlauf eintretende Ulceration. Beides macht klinisch markante Symptome. Die Neigung zur Bildung von Metastasen ist nicht sehr ausgeprägt; speziell beim Mastdarm-Ca. treten sie häufig erst spät auf. Befallen werden zunächst die regionären Drüsen, sodann vor allem die Leber und das Peritoneum.

Die Allgemeinerscheinungen bei Darmkrebs sind im großen und ganzen die gleichen wie bei andern Carcinomen: zunehmende Abmagerung, Kräfteverfall und Kachexie sowie Anämie. Öfter ist kürzer oder länger dauerndes Fieber vorhanden (Verwechslung mit einer Infektionskrankheit!). Andererseits können die Allgemeinerscheinungen gerade hier bisweilen lange auf sich warten lassen, während bereits die Lokalsymptome voll entwickelt sind. Letztere sind Stenosenscheinungen (Ileus), ferner ein palpabler Tumor, Schmerzen sowie Anomalien der Entleerung bzw. der Beschaffenheit des Stuhles.

Das Carcinom des Kolons ist am häufigsten am Sigma, nächst dem am Coecum lokalisiert, befällt aber auch das Ascendens, Transversum sowie vor allem die Flexura lienalis. Ein häufiges Frühsymptom sind Okklusionserscheinungen, die anfangs häufig nur anfallsweise und ohne stürmische Erscheinungen auftreten, so daß ihre Bedeutung zunächst oft verkannt wird (vgl. Ileus S. 335). Ihre scheinbar harmloseste Form ist hartnäckige Obstipation. Stenosensymptome finden sich häufiger bei tiefem Sitz des Carcinoms (Descendens, Sigma) als bei dem des Anfangsteils des Kolons, da bei letzterem die flächenhaften Tumoren häufiger als die strikturierenden sind und außerdem die festere Beschaffenheit des Kotes bei ersterem die Okklusion fördert. Mitunter beobachtet man mit der Obstipation abwechselnd Diarrhöen nach dem Typus der Fäulnisdyspepsie (vgl. S. 321), die sich aus der Zersetzung der über der Stenose stagnierenden Massen sowie den Ulcerationen erklären. Sehr erleichtert wird die Erkennung der Stenose durch das Röntgen-Verfahren (Kontrastmahlzeit und vor allem Kontrasteinlauf), durch welche der Tumor oft frühzeitig als Verengerung, später mitunter

als Füllungsdefekt sichtbar wird (etwaige Spasmen werden durch 1 mg Atropin subcut. beseitigt). Auch läßt sich seine Beweglichkeit bzw. Verwachsung mit der Nachbarschaft vor dem Leuchtschirm feststellen.

Bezüglich der Tastbarkeit verhalten sich die Tumoren je nach ihrem Sitz verschieden. Der Palpation leicht zugänglich sind die Carcinome des Coecums, Ascendens und Transversums, bisweilen auch des Sigmas; nicht palpabel sind die Tumoren der rechten und besonders der linken Flexur. Untersuchung im Bade oder in der Narkose führt oft zur Klärung des Falles. Stets Sorge man vorher für gründliche Entleerung des Darmes (Einläufe, Ricinus) zur Vermeidung der Verwechslung mit Kottumoren. Zur sicheren Lokalisation und Abgrenzung des Tumors von der Nachbarschaft ist oft die vorsichtige Aufblasung des Darmes mit Luft von Nutzen. Weiter wird bei der Stuhluntersuchung das Vorhandensein von Blut, und zwar je nach dem Sitz des Tumors dem Kot aufgelagert oder als okkultes Blut mit ihm vermischt, niemals vermißt. Bei Tumoren unterhalb der linken Flexur prägt sich die Stenose oft auch durch das schmale Kaliber des Kotes aus, der bisweilen Bleistiftform annimmt; häufig ist Schleim aufgelagert. Oft besteht beträchtliche Indicanurie. Tief sitzende Sigmacarcinome sind gelegentlich rektoskopisch wahrnehmbar, wobei sie teils als Ulcerationen, teils in den Anfangsstadien an circumscripter Blässe und Ödem der Schleimhaut zu erkennen sind. Oft hindert der Tumor das weitere Vordringen des Instrumentes. Schmerzen pflegen bei Kolon- und Sigma-Ca. erst später, meist infolge von Ileus aufzutreten.

Das **Mastdarmcarcinom** bildet etwa 80% aller Darmcarcinome. Die ersten Beschwerden bestehen in der Regel in Störungen der Stuhlentleerung, Tenesmus, hartnäckiger Obstipation sowie unmotivierten Diarrhöen, namentlich in Form geringer sog. spritzerartiger Entleerungen; in manchen Fällen beobachtet man Bleistiftkot, oft ist Blut und Schleim beigemischt. Im weiteren Verlauf treten häufig Blasenbeschwerden ähnlich wie bei Cystitis, in die Genitalien ausstrahlende Schmerzen sowie auch Ischias auf als Zeichen des Übergreifens des Tumors auf die Nachbarschaft. Dabei kann der allgemeine Ernährungszustand längere Zeit hindurch ausgezeichnet bleiben und jegliche Kachexie vermissen lassen. Tiefsitzende Geschwülste sind der Digitaluntersuchung zugänglich, höher als 10 cm befindliche Tumoren sind rektoskopisch zu konstatieren. Doch ist die Unterscheidung von benignen Ulcerationen, Tb und Lues bisweilen schwierig. Oft sind zugleich Hämorrhoiden vorhanden, die infolge der ähnlichen Beschwerden nicht selten in verhängnisvoller Weise das Grundleiden verschleiern.

Möglichst frühzeitige Diagnose der Darmcarcinome ist wegen relativ günstiger Prognose eines Teiles derselben (Coecum, Ascendens, Rectum) bei rechtzeitiger Operation von größtem Wert. Jede hartnäckige Obstipation sowie unklare Diarrhöen in höherem Alter, ferner die genannten Stuhlanomalien, Hämorrhoidalbeschwerden usw. sollten stets den Gedanken an Carcinom nahelegen. Unoperiert verlaufen die Fälle stets letal, teils infolge von Ileus, teils durch Sepsis infolge von Verjauchung des Tumors, teils durch Perforationsperitonitis.

**Dünndarmcarcinome** sind selten. Das Ca. des Duodenum (Prädilektionsort die Papille) bewirkt die Symptome der Pylorus- bzw. Duodenalstenose und erzeugt durch Kompression der Papille Ikterus sowie durch Übergreifen auf das

Pankreas oft Glykosurie; es ist kaum jemals tastbar. Die übrigen Dünndarmcarcinome machen meist erst in progredienten Stadien Palpationsbefunde und Stenosensymptome; sie bleiben lange Zeit verschieblich und sind oft schwer von Mesenterialdrüsen- und Netz-Tb zu unterscheiden.

Die **Therapie der Darmcarcinome** besteht in der möglichst frühzeitigen Operation (Resektion), deren Resultate nicht ganz ungünstig sind (Dauerheilung bis zu 20% bei Mastdarm-, bis 10% bei den Kolon-Ca.). Im übrigen Röntgen- und Radiumbehandlung. Schlackenarme Diät (vgl. Fäulnisdyspepsie).

**Darmsarkome** sind selten. Sie zeichnen sich durch besondere Malignität aus und befallen häufiger jüngere Leute. Sie zeigen Vorliebe für den Dünndarm, wo sich vor allem die (häufig multiplen) Lymphosarkome lokalisieren. Das Rectum wird bisweilen von Melanosarkomen befallen. Charakteristisch für die Sarkome sind außer dem raschen Wachstum im Gegensatz zu den Carcinomen die frühzeitig eintretende schwere Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens (Anämie, Kachexie, Ödeme), die meist das Krankheitsbild beherrscht, sowie das Fehlen von Stosenbildung sowie von Ulcerationen; Mastdarmsarkome machen jedoch Stosen. Röntgendiagnostisch ist von Bedeutung, daß bisweilen Erweiterungen des Darmlumens an der Stelle des Tumors beobachtet werden.

## Darmtuberkulose.

Die Darmtuberkulose schließt sich in der Regel sekundär an Lungen-Tb. an, bei der sie in vorgerückteren Stadien eine häufige Begleiterscheinung ist. Die Infektion des Darms kommt durch verschlucktes bacillenhaltiges Sputum zustande. Nach dem Sitz der Erkrankung sind 3 verschiedene Arten von Darm-Tb. zu unterscheiden: die im unteren Ileum lokalisierte Form der gewöhnlichen ulcerösen Darm-Tb., der tuberkulöse Ileocoecaltumor und die Tb. des Rectums.

Anatomisch beginnt der Prozeß in den Solitärfokkeln und den Peyerschen Plaques mit der Entwicklung von verkäsenden Knötchen (Histol. vgl. S. 222), die konfluieren und zerfallen. Die dadurch entstehenden kraterförmigen Ulcera breiten sich meist in der Querrichtung des Darmes aus und bilden charakteristische Gürtel- oder Ringgeschwüre, die am Rand und im Grund oft kleine Tb-Knötchen erkennen lassen. Bei der isolierten Ileocoecal-Tb. herrscht gegenüber den Zerfallsprozessen die geschwulstartige, aus Tb-Granulationsgewebe bestehende Verdickung der Wand des Coecums mit starker Neubildung von fibrösem Gewebe vor, so daß das Bild eines Tumors entsteht, der nicht selten das Darmlumen verengert. Die Mastdarm-Tb. macht Ulcerationen, die häufig Ursache von periproktitischen Abscessen und Fisteln sind. Bei Ausheilung hinterläßt sie bisweilen narbige Strikturen. Umgekehrt kann auch ein primärer periproktitischer Absceß durch Perforation erst sekundär zu Mastdarmgeschwüren führen.

Krankheitsbild der gewöhnlichen Darm-Tb.: Wenn es auch Fälle gibt, die klinisch völlig latent bleiben, so verrät sich doch in der großen Mehrzahl der Fälle das Leiden durch hartnäckige Diarrhöen, die in kurzer Zeit schwere Unterernährung und Kräfteverfall bewirken. Schmerzen werden häufig vermißt. Der Appetit braucht nicht gestört zu sein. Bei manchen Fällen entwickelt sich eine schwere Anämie. Das Harnindican pflegt stark vermehrt zu sein. Stärkere Blutungen sowie Darmperforation sind selten. Vereinzelt können die Geschwüre unter Narbenbildung ausheilen; sie hinterlassen dann mitunter Strikturen.

Nicht alle Diarrhöen bei Phthisikern beweisen eine Darm-Tb., zum Teil beruhen sie lediglich auf Toxinwirkungen und können dann eine vorübergehende Erscheinung



sein. Ferner erlaubt die Stärke der Diarrhöen noch keinen Schluß auf die Ausdehnung des Geschwürprozesses. Okkultes Blut läßt sich oft im Stuhl nachweisen, ebenso TB, deren diagnostischer Wert aber infolge der gleichzeitig vorhandenen Lungen-Tb. gering ist<sup>1)</sup>. Differentialdiagnostisch kommt Darmamyloid als häufige Komplikation fortgeschrittener Tuberkulosen in Frage. Es bewirkt besonders heftige wäßrige Diarrhöen und läßt sich außer durch die gleichzeitige Amyloiderkrankung anderer Organe vor allem durch den dauernden starken Fettgehalt der Stühle wahrscheinlich machen.

Die Ileocoecal-Tb. verläuft unter dem Bilde eines langsam wachsenden derben, länglichen Tumors der rechten Unterbauchgegend, der bei der Palpation wenig schmerzhaft ist; er geht mit unbestimmten Allgemeinbeschwerden wie Abmagerung, Appetitmangel, Völlegefühl, Obstipation abwechselnd mit Diarrhöe und den allmählich sich einstellenden Symptomen der Darmstenose (Koliken, sicht- und fühlbare Darmsteifung) einher.

Im Rö.-Bild fällt bisweilen das Coecum infolge beschleunigter Passage der Kontrastmahlzeit aus. Die Unterscheidung von Carcinom ist ohne Laparotomie oft unmöglich; dauernd okkultes Blut im Stuhl wird häufiger beim letzteren gefunden. Chronische Perityphlitis und Aktinomykose kommen ebenfalls differentialdiagnostisch in Betracht.

Die ulceröse Mastdarm-Tb. bleibt teils latent, teils verrät sie sich durch heftige Tenesmen und Entleerung von schleimig-eitrigem Stuhl. In manchen Fällen entstehen nach Vernarbung Stenosensymptome. Häufig sind Mastdarmpfisteln.

Die Therapie hat bei leichteren Fällen sowohl die Möglichkeit der Heilung der Darm-Tb. als auch das Vorkommen toxischer, eine Darm-Tb. vortäuschender Diarrhöen bei Phthisikern zu berücksichtigen. Milch-Brei-Schleimkost. Warme Kataplasmen. Große Opiumdosen (Tct. opii bis 40 Trpf. tägl.), die gut vertragen werden; Uzara (Liq. Uzara mehrmals tägl. 20 Trpf.); Cortex Coto 0,5; Decoct. rad. Colombo 10:150,0 3mal tgl. 1 Eßl.; desgl. Decoct. ligni campechian. 5,0:150,0; Tannalbin mehrmals tgl. 1,0; Bismuth. subnit. 2mal tgl. 0,3. Bei Ileocoecal-Tb. hat möglichst frühzeitige operative Entfernung des Tumors Aussicht auf Erfolg. Die Rectal-Tb. erfordert lokale Behandlung (Dermatol, Auskratzung). — Prophylaxe: Die Phthisiker sind streng anzuhalten, ihr Sputum nicht zu verschlucken.

### Syphilis des Darmes.

Praktisch spielt die Hauptrolle die tertiäre Lues des Mastdarms (**Proktitis luetica**), die hauptsächlich Weiber befällt. Sie besteht in geschwürig zerfallenden gummösen Prozessen, die bisweilen das ganze Rectum ergreifen und schwere Zerstörungen bewirken, die bemerkenswerterweise in den Anfangsstadien oft auffallend geringe Beschwerden verursachen. Später treten Fieber, Schmerzen, Tenesmen auf; der Stuhl enthält Blut und Schleim. Besonders charakteristisch ist die frühzeitige Neigung zu hochgradigen Narbenstenosen, die oft sehr tief, dicht über dem Sphincter liegen. Als diagnostisch wichtiger Befund bei der Digital-exploration ergibt sich eine trichterförmige Verengung, deren oberer scharfer Rand deutlich fühlbar ist. Oberhalb der Striktur finden sich meist Ulcerationen, die zum Teil auf dem Reiz der stagnierenden Kotmassen beruhen. Hartnäckige diarrhöische, schleimig-eitrig-Entleerungen, Blutungen (Verwechslung mit Hämorrhoiden!), quälender Tenesmus führen allmählich zu zunehmendem Kräfteverfall und Kachexie, nicht selten mit letalem Ende. Die Diagnose stützt sich abgesehen von dem lokalen Befund (Differentialdiagnose: Carcinom bzw. Dysenterie) auf die positive WaR. Therapie: Bougieren, chirurgische Behandlung, spezifisch anti-luetische Kur, schlackenarme Kost, Belladonnasuppositorien.

<sup>1)</sup> Die TB im Stuhle sind nicht zu verwechseln mit anderen ähnlichen normal dortselbst häufigen säurefesten, aber plumperen Stäbchen bzw. ovoiden Sporen.

## Darmverengerung und Darmverschluß (Darmstenose, Ileus).

Unwegsamkeit des Darms bzw. Erschwerung der Darmpassage kann sowohl organische wie funktionelle Gründe haben. Unter den organisch bedingten sind anatomische Ursachen Tumoren, vor allem Carcinome, sowie nächst dem narbige Stenosen, am häufigsten nach Tb., ferner nach Dysenterie (äußerst selten Typhus) sowie Lues, die beiden letzteren vorwiegend am Mastdarm.

Auch können Stenosen nach *Ulc. duod.* sowie am Sigma nach *Perisigmoiditis* (vgl. S. 319) auftreten. Endlich ist hier die angeborene *Atresia ani* bzw. *Stenosis recti* als Folge fehlerhafter Anlage zu nennen.

Auch Verstopfung des Darmlumens (*Obturation* oder *Okklusion*) gehört hierher. Ursachen derselben sind einmal stagnierende eingedickte Kotmassen, sodann größere Gallensteine, seltener zusammengeballte Darmparasiten (*Askariden*) oder verschluckte Fremdkörper, namentlich bei Kindern und Geisteskranken. Der Wirkung obturierenden Darminhaltes kommt die Kompression des Darms von außen durch Geschwülste gleich (*Ovarialcysten*, *Uterustumoren*, *Beckenabscesse*, *Netzcysten*, *Wanderniere*, *Wandermilz*).

Auch scharfe Knickung der *Flexura coli lienal.*, wobei *Transversum* und *Descendens* „doppelflintenartig“ ein Stück weit parallel laufen (*Payrsche Krankheit*), kann ausnahmsweise infolge von Gassperre zu einem Passagehindernis werden.

Eine sehr häufige Ursache des Darmverschlusses ist die als *Incarceration* oder *Strangulation* bezeichnete Einklemmung des Darms. Anlaß zur *Strangulation* geben einmal Bauchfelltaschen in Form der *Hernien*. Hierher gehören die *Hernia inguinal.*, *duodenojejunal.* oder *Treitzsche Hernie*, *omentalis* (*Foramen Winslowii*), *diaphragmatica*, *obturatoria*, *ischiadica*, *pericoecalis* (*Fossa ileocecal.*), *intersigmoidea* (*Recessus intersigmoid.*). Eine weitere, praktisch sehr wichtige Ursache der *Strangulation* ist das Vorhandensein von Narbensträngen oder *Pseudomembranen* in der Bauchhöhle als Residuen einer abgelaufenen lokalen *Peritonitis*, welche Verwachsungen der Baueingeweide teils untereinander, teils mit der inneren Bauchwand hinterläßt. *Appendicitis*, *Cholecystitis*, *Adnexentzündungen*, *Bauchfell-Tb.*, *Darmgeschwüre*, häufig auch *Laparotomien*, namentlich wenn *Tamponade* und *Drainage* angewendet wurde, *Hernienoperationen*, selten endlich ein *Meckelsches Divertikel* (Rest des fötalen *Duct. omphalomesenteric.*) können infolge der Entstehung von *Adhäsionen* Anlaß zu *Strangulation* des Darms geben.

Auch die Drehung eines Darmabschnittes um die Achse des *Mesenteriums* bzw. seine Längsachse, der sog. *Volvulus* (*Darmverschlingung*) bewirkt Darmverschluß. Häufigste Lokalisation des *Volvulus* ist die *Flexura sigmoid.*, namentlich bei Bestehen eines *Megasigmas* sowie eines sehr langen *Mesosigmas* mit schmaler Wurzel, nächst dem der unterste Dünndarm sowie das *Caecum*, namentlich als *Caecum mobile*.

Schließlich ist als Ursache eines organischen Darmverschlusses die sog. *Invagination* oder *Intussuszeption* des Darmes zu nennen, bei der ein Darmstück sich in den anstoßenden, meist tieferen Darm-

abschnitt einstülpt; infolge gleichzeitiger Einstülpung des zugehörigen Mesenteriums kommt es zu schweren Ernährungsstörungen des Intussuszeptums.

Alle die durch die bisher genannten organischen Ursachen bewirkten Arten einer mechanischen Verschiebung bzw. Verengerung des Darmes werden praktisch als mechanischer Ileus zusammengefaßt. Derselbe zerfällt in den Obturations- oder Okklusionsileus sowie den Strangulationsileus. Zwischen beiden letzteren besteht ein wichtiger prinzipieller Unterschied insofern, als bei der Obturation zunächst nur eine einfache Verlegung des Darmlumens vorhanden ist, die an sich kein unmittelbar lebensgefährdendes Ereignis darstellt, während bei der Strangulation infolge der gleichzeitig bestehenden Abklemmung der Mesenterialgefäße von vornherein eine schwere Ernährungsstörung der Darmwand erfolgt. Infolge derselben kommt es rasch zu Gangrän des abgeklemmten Darmteiles, aus welchem alsbald Bakterien in die Bauchhöhle auswandern. Die Folge ist rasch einsetzende diffuse Peritonitis. Die Strangulation ist daher die gefährlichste Form des Darmverschlusses.

Dem mechanischen Ileus steht der funktionelle oder dynamische Ileus gegenüber, der auf Darmlähmung (paralytischer Ileus), seltener auf Darmspasmen (spastischer Ileus) beruht.

**Krankheitsbild der Darmverengerung und des Darmverschlusses:** Die Hauptsymptome sind kolikartige Schmerzen, Störung der Stuhlentleerung sowie gewisse durch die Inspektion bzw. durch die physikalische und Rö.-Untersuchung feststellbare Veränderungen am Abdomen. Der Grad ihrer Ausprägung und die zeitliche Reihenfolge ihres Auftretens verhält sich je nach der Art des Falles verschieden. Akute und langsame chronische Entstehung, ferner intermittierendes Auftreten der Störungen sind zu unterscheiden. Die Unterschiede erklären sich in der Hauptsache aus den anatomischen Verhältnissen.

Darmverschluß bewirkt klinisch das Bild des **Ileus**. Stuhl und Winde gehen nicht ab, oberhalb des Passagehindernisses kommt es zu Stauung des Inhaltes, der sich alsbald zersetzt; dazu kommt eine starke Transsudation und Sekretion von Darmsaft. Die faulige Zersetzung erzeugt einmal starken Meteorismus, zumal die Gasresorption seitens der Darmwand herabgesetzt ist, ferner völlige Anorexie, Übelkeit, später faulig riechende Ructus, daran anschließend Erbrechen zunächst von Mageninhalt, später von einer bräunlichen Flüssigkeit, die kotartig riecht und aussieht, das sog. Miserere; dieses entsteht durch Überlaufen der oberhalb der Stenose sich füllenden Darmteile. Der Meteorismus verhält sich je nach der Art der Stenose und ihrer Lokalisation verschieden. Der sog. Stauungsmeteorismus, der sich bei Obturationsileus einstellt, pflügt sich auf den gesamten Darm oberhalb der Stenose zu erstrecken, während bei Strangulation anfangs ein sog. lokaler Meteorismus sich auf den strangulierten Darmabschnitt beschränkt. Stenosen des unteren Kolons verraten sich durch den sog. Flankenmeteorismus, während Dünndarm- und Ileocecalstenosen zur Aufblähung der mitt-

leren Teile des Abdomens zu führen pflegen. Doch kommen bei Lageänderungen der Darmabschnitte Abweichungen von dieser Regel vor. Der Harn zeigt bei Dünndarmileus starken Indicangehalt.

Für die Röntgenuntersuchung kommt vor allem die Anwendung eines Kontrasteinlaufs in Frage. In vielen Fällen von Ileus genügt indessen die einfache Durchleuchtung bzw. Photographie ohne Einlauf, da hier oft der Befund zahlreicher gasgefüllter Darmschlingen mit deutlichen Flüssigkeitsspiegeln die Diagnose sicherstellt.

Über die spezielle Symptomatologie ist folgendes zu sagen:

Bei der **Okklusion** (Obturation) des Darms, die sich meist aus einer chronischen Stenosierung entwickelt, sind hartnäckige Obstipation sowie periodisch auftretende, kurzdauernde, bisweilen nur leichte Koliken die ersten Zeichen; nächstdem bildet lebhaft gesteigerte Peristaltik des über der Stenose liegenden Darmabschnitts ein markantes Symptom. Sie ist bei nicht ganz fetten Individuen durch die Bauchdecken hindurch sichtbar und tritt anfallsweise für einige Minuten auf. Sie präsentiert sich als eine deutlich fühlbare Steifung einer oder mehrerer Darmschlingen. Lokale Reizung wie Beklopfen mit den Fingern oder mit einem nassen Handtuch genügt meist, einen Anfall von Darmsteifung hervorzurufen. Die Schmerzen pflegen allmählich an Intensität zuzunehmen. Bisweilen gestattet die präzise Angabe über den Ort des Schmerzes eine Lokalisierung der Verengerung. Nach Aufhören des Anfalls hört man oft glucksende Geräusche im Abdomen wie beim Ausgießen einer Flasche. Das Allgemeinbefinden braucht anfangs nicht wesentlich alteriert zu sein. Regelmäßig fehlen die stürmischen Erscheinungen der Strangulation, der Puls ist zunächst normal und kräftig, auch läßt sich kein freies Exsudat in der Bauchhöhle nachweisen. Erbrechen fehlt oft, namentlich bei Sitz des Hindernisses im unteren Dickdarm. Bei Fortbestehen des Zustandes verlaufen die Fälle unter Zunahme des Meteorismus sowie Kollapserscheinungen und Entwicklung einer Peritonitis bei vollem Bewußtsein letal. Doch kann sich das Krankheitsbild im Gegensatz zur Strangulation viele Tage lang hinziehen, ohne daß unmittelbare Lebensgefahr zu bestehen braucht. Okklusionsileus ist ein häufiger Ausgang vieler Darmcarinome. Therapie: Operation (bei Carcinom eventuell Anus praeternaturalis).

Für die Praxis kann nicht genug betont werden, daß die ersten Anfänge einer Obturation des Darmes, z. B. durch einen Tumor oder einer Stenosierung durch eine Adhäsion keineswegs immer alarmierende Symptome bewirken und vor allem, daß die Symptome mitunter zunächst nur für ganz kurze Zeit auftreten, um alsbald wieder spurlos zu schwinden. Oft werden die Erscheinungen wie plötzliches Kollern im Leib, Aufgetriebensein, leichte Koliken, oder das Gefühl, als rolle eine Kugel im Leibe hin und her, vom Pat. auf „versetzte Winde“ bezogen, wobei tatsächlich oft derartige Anfälle mit der Entleerung von Blähungen schwinden. Sofort vorgenommene gründliche Untersuchung des Abdomens ergibt dann nicht selten schon in diesem Stadium den Befund einer deutlichen Darmsteifung, die mitunter bereits während der Untersuchung sich zunächst wieder verliert.

Der durch einfache **Koprostase** verursachte Obturationsileus (Dickdarm, hauptsächlich Ampulle und Sigma) wird mitunter durch die Entleerung kleiner Stuhlmengen bzw. diarrhöischer Entleerungen maskiert; letztere beruhen auf nachträglicher Reizung des Darmes. Bei Verdacht versäume man niemals die Digitaluntersuchung des Rectums, bei der man auf die Kotmassen stößt. Therapeutisch Wasser- und Öleinläufe zur Erweichung des Kottumors; mitunter ist manuelle Ausräumung notwendig, sowie 1—2 mg Atropin gegen die häufig vorhandenen Spasmen, später Abführmittel (die bei allen andern Arten von Ileus streng kontraindiziert sind). — Obturation durch **Gallensteine** erfolgt meist im Dünndarm, oft handelt es sich um unvollständigen Verschuß. Anamnestisch fehlt oft Ikterus, da der Stein meist mittels Gallenblasenfistel in den Darm gelangt. In manchen Fällen besteht sog. wandernder Ileus entsprechend der Fortbewegung der Steine, wobei Koliken, Darmsteifung und Peristaltik ihren Ort wechseln. Der Verlauf ist mitunter relativ milde, evtl. von sehr langer Dauer (bis zu 1 Monat); Heilung erfolgt bei Übertritt des Steins ins Kolon. Therapeutisch ist zunächst Tet. opii stdl. 5—10 Tropf. sowie 1 mg Atropin wegen des auch hier eine Rolle spielenden Darmspasmus zu versuchen, im übrigen ohne Zeitverlust operieren.

Das Bild der **Darmstrangulation** unterscheidet sich sehr wesentlich von der Okklusion durch die Schwere der Krankheitssymptome, die von vornherein häufig durch Erscheinungen von Kollaps (Schock) eingeleitet werden. Heftiger Leibscherz, kleiner frequenter Puls, häufig herabgesetzte Temperatur, verfallener Gesichtsausdruck, spitze Nase, eingesunkene Augen und Wangen (Facies abdomin.), livide kühle Extremitäten, Schweißausbruch, trockene Zunge, sowie matte Stimme kennzeichnen auf den ersten Blick die Gefährlichkeit der Situation. Es bestehen Aufstoßen sowie alsbald eintretendes, zunächst reflektorisches Erbrechen; die intensiven Schmerzen pflegen nicht anfallsweise, sondern dauernd vorhanden zu sein. Bald setzt Miserere ein. Der an Menge verminderte Harn enthält meist Eiweiß und Zylinder sowie bei Dünndarmileus Indican. Sehr charakteristisch kann das Verhalten des Meteorismus sein. Derselbe beschränkt sich zunächst auf die abgeklemmte Darmschlinge infolge Lähmung ihrer Wand. Bezeichnenderweise zeigt sie keine Peristaltik (sog. stehende Schlinge), ein sicheres Symptom der Strangulation (v. Wahlsches Symptom). Später kann der oberhalb der Strangulation liegende Darmabschnitt ebenfalls gebläht sein, ohne aber die starke Peristaltik der chronischen Stenose zu zeigen (sog. Schlangesches Symptom). Mitunter werden trotz des Darmverschlusses wäßrige Stühle entleert, die zu einer falschen Diagnose verleiten können; sie beruhen auf starker Transsudation der unterhalb gelegenen Darmteile. Strangulationsileus befällt mit Vorliebe den Dünndarm.

Wegen der außerordentlichen Bedeutung einer möglichst frühzeitigen Diagnose zwecks rechtzeitiger Operation sei noch folgendes bemerkt: Für die Annahme einer Strangulation sprechen bei Fehlen einer entzündlichen Bauchaffektion (Gallenstein, Appendicitis usw.) heftige Leibscherzen. Fehlen von Stuhl und Winden, Erbrechen sowie Pulsbeschleunigung auch dann, wenn der Leib weich und nicht aufgetrieben ist und keine geblähte Darmschlinge zu fühlen ist. Erleichtert wird die Diagnose oft durch eine gründliche Anamnese (frühere abdominelle Erkrankung bzw. Laparotomie). Stets kontrolliere man die

Patienten auf etwaige äußere Hernien, die bisweilen recht unscheinbar sein können.

Auch der **Volvulus** ist durch starken lokalen Meteorismus ausgezeichnet. Bei Befallensein des Sigmas beobachtet man bisweilen noch nach erfolgter Abklemmung Stuhlentleerung sowie evtl. Abgang von Blut, mitunter auch Tenesmus. Miserere ist selten. Öfter dauert die Erkrankung viele Tage.

Die **Invagination** stellt eine Kombination von Obturations- und Strangulationsileus dar.

In der Hälfte der Fälle werden Kinder unter 10 Jahren davon befallen. Betroffen ist am häufigsten die Ileocöcalgegend, ferner der Dünndarm, Colon transvers. (invaginiert in die Flex. coli sinist.), gelegentlich Sigma (ins Rectum). Die Invagination beim Lebenden ist nicht zu verwechseln mit der bei Sektionen häufig zu findenden erst agonal entstandenen Invagination. Wird das eingestülpte Darmstück gangränös, so kann, falls vorher genügende peritoneale Verwachsungen sich eingestellt hatten und keine Perforationsperitonitis eintritt, nach Ausstoßung des abgestorbenen Darm-Abschnittes eine narbige Striktur zurückbleiben (Symptome s. oben). Ursache der Invagination sind stark gesteigerte Peristaltik (Abführmittel, Darmkatarrh) sowie gelegentlich Darmpolypen infolge der durch ihr Gewicht ausgeübten Zugwirkung.

Sie beginnt mit heftigen Schmerzen, Shockerscheinungen und Erbrechen. Der Schmerz, der zuerst diffusen Charakter hat, lokalisiert sich später an der Stelle der Invagination, z. B. in der Ileocöcalgegend. Meteorismus entsteht meist allmählich. Die Darmentleerungen zeigen ein sehr charakteristisches Verhalten, indem sie nicht plötzlich aufhören, sondern zunächst noch fäkulent bleiben und allmählich in blutig-schleimige Entleerungen übergehen, denen aber oft noch Stuhl beigemischt ist. Bisweilen gehen Fetzen gangränösen Darms mit dem Stuhl ab. Die Invagination selbst ist oft als wurstförmiger Tumor zu fühlen. Bei tief-sitzender Invagination besteht Tenesmus sowie Offenstehen des Afters. Die übrigen Erscheinungen wie Kotbrechen, Kollaps entsprechen denen bei Okklusionsileus, nur pflegen sie infolge der gleichzeitigen Strangulation heftiger zu sein. Therapie: Keine Abführmittel. Bei kleinen Kindern versuche man manuelle Reposition, im übrigen möglichst frühzeitig Laparotomie.

Der **paralytische Ileus** ist eine regelmäßige Begleiterscheinung der akuten diffusen Peritonitis; er findet sich ferner gelegentlich nach langdauernden Laparotomien (Wirkung der Abkühlung), nach Hernienoperationen, bei intra- und retroperitonealen Blutungen, ferner bisweilen — wahrscheinlich reflektorisch bedingt — bei starken Gallen- und Nierensteinkoliken, nach heftigem Stoß gegen die Bauchwand, bei Stieldrehung abdomineller Tumoren, Hodenverletzungen, gelegentlich sogar nach einfacher Ascitespunktion, ferner bei Pankreasnekrose, bei Rückenmarksverletzungen, endlich bei Schädigung der Darmgefäße, speziell bei Embolie und Thrombose der Art. mesaraica (s. unten). Zuständen von vorübergehender Darmparese mit starkem Meteorismus und Stuhlverhaltung ohne eigentlichen Ileus begegnet man auch im Verlauf akuter Infektionskrankheiten, z. B. bei Typhus, Pneumonie, Cholera, Grippe, Erysipel (sog. Peritonismus).

Der paralytische Ileus zeigt im großen und ganzen das gleiche Bild wie der Obturationsileus, zu dem aber alsbald die Zeichen der Peritonitis hinzutreten, so daß die Unterscheidung beider oft schwierig ist; in späteren Stadien ist ferner die Unterscheidung zwischen mechanischem und paralytischem Ileus nicht selten unmöglich. Wichtig ist eine genaue Anamnese. Im Beginn der Erkrankung kann sich die Darmblähung

auf einzelne Darmabschnitte beschränken. Schmerzen gehören nicht zum Bilde der reinen Darmlähmung, sie sind indessen trotzdem häufig infolge des bestehenden Grundleidens bzw. bei hinzutretender Peritonitis vorhanden. Erbrechen, insbesondere Kotbrechen pflegt später als bei Darmokklusion aufzutreten. Im Gegensatz zum mechanischen Ileus fehlen die bei diesem mit dem Stethoskop wahrnehmbaren Darmgeräusche, der Leib verhält sich wie tot. Durch ein eingelegtes Darmrohr gehen daher Stuhl und Winde nur in sehr unbedeutendem Maße ab. Der weitere Verlauf ist der des Okklusionsileus bzw. der Peritonitis (s. diese). Therapie: Heißes Bad von 40°. Physostigmin 0,0005—0,00075 subcut., evtl. Hypophysenpräparate wie Pituglandol bzw. Coluitrin, ferner Hormonal, z. B. 15—40 ccm Neohormonal intravenös und zwar je 1 ccm pro Min.;  $\frac{1}{2}$  Std. später 1—2 Eßl. Ricinusöl. Analeptica (Kampher, Coffein, Strychnin).

Der **spastische Ileus** ist selten. Er wird mitunter nach Laparotomien, ferner bei Bleivergiftung, aber auch bei Hysterischen beobachtet. Voraussetzung dürfte stets eine neuropathische Konstitution (Übererregbarkeit des Vagus) sein. Der Shock sowie das Kotbrechen des Okklusionsileus, dem das Bild im übrigen gleicht, fehlen, auch sind die Schmerzen geringer. Überhaupt pflegt das relativ gute Allgemeinbefinden mit dem Bauchbefund auffallend zu kontrastieren. Anfangs lassen sich gelegentlich die kontrahierten Darmschlingen fühlen. Man fahnde auf die genannten Ursachen (Bradykardie spricht für Vagotonie) und versuche es mit 1—2 mg Atropin subcut. Obschon der spastische Ileus nicht operiert werden soll, wird man in Fällen, wo ein mechanischer Ileus nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, oft vorsichtshalber eine Laparotomie nicht umgehen können.

Unter **Hirschsprungscher Krankheit** versteht man eine hauptsächlich durch hartnäckige Obstipation und hochgradigen Meteorismus charakterisierte permanente Erweiterung des unteren Dickdarmes; derselbe, speziell Sigma und Descendens, ist mit großen Kotmassen gefüllt, über denen starke Gasansammlung stattfindet. Das Leiden kommt sowohl in frühester Kindheit wie bei Erwachsenen vor und beruht zum Teil auf angeborener Stenose des Sigma, teils auf abnormer Länge und Schlingenbildung desselben. Das Rectum wird bei der Untersuchung leer gefunden. Anwendung des Darmrohres bewirkt vorübergehend Erleichterung. In Zweifelfällen liefert die Röntgenuntersuchung mit Kontrasteinlauf Aufschluß. Therapie: Operation.

### Embolie und Thrombose der Mesenterialgefäße.

Die Art. mesenter. sup. versorgt den unteren horizontalen Teil des Duodenums, den ganzen Dünndarm, Coecum, Ascendens und Transversum, die Art. mesent. inf. das Descendens und Sigma.

Meist handelt es sich um embolische Verstopfung und zwar am häufigsten der Art. mesent. sup. Die Folge ist hämorrhagische Infarcierung des Darms, da die Darmgefäße zwar nicht anatomisch, aber funktionell sich wie Endarterien verhalten. Das akut einsetzende Krankheitsbild beginnt mit heftigen Schmerzen zunächst in der Oberbauchgegend, Erbrechen sowie Kollapssymptomen wie bei Darmstrangulation. Im übrigen beherrschen zwei Symptome das Bild: Darmblutungen und die Zeichen des Ileus, die beide miteinander kombiniert oder auch getrennt auftreten können. Von vornherein besteht stets starke Pulsbeschleunigung. Im übrigen entspricht das Krankheitsbild teils dem des akuten Darmverschlusses, teils verläuft es als sog. diarrhoische Form mit blutigen Entleerungen, zum Teil mit Teerstühlen. Mitunter

erfolgt auch blutiges Erbrechen. Anfangs besteht circumscriphte Bauchdeckenspannung im Bereich der infarcierten Darmschlingen. Im weiteren Verlauf stellt sich stets Peritonitis ein, die bei nicht rechtzeitiger Operation stets tödlichen Ausgang nimmt, falls der Tod nicht schon vorher im Kollaps eintritt. Die Diagnose ist stets schwierig, besonders die Abgrenzung gegenüber der Invagination sowie dem gewöhnlichen Ileus. Besonders tückisch sind gewisse vereinzelt vorkommende Fälle mit Diarrhoen ohne Blutabgang und ohne Kolik, die einem akuten Magendarmkatarrh ähneln. Sehr wichtig als Wegweiser ist eine genaue Anamnese zur Ermittlung der Möglichkeit einer Embolie bzw. Thrombose. Die möglichst frühzeitige Operation besteht in Resektion des infarcierten Darmabschnitts.

### Die chronische habituelle Obstipation.

Die chronische Stuhlträgheit stellt eine der häufigsten Krankheiten dar. Man versteht darunter die abnorm lange Verweildauer des Kotes im Dickdarm, sofern dieselbe nur auf funktionellen Störungen und nicht auf organischen Passagehindernissen beruht. Die Ursachen sind mannigfacher Art.

Eine große Rolle spielt unzweckmäßige Ernährung in Form einer zu schlackenarmen Kost (Fleisch, Eier, feine Mehle), die einen zu geringen physiologischen Reiz für die Dickdarm-Peristaltik bildet. U. a. findet man diese Ursache bei der O. mancher Neuropathen, die in steter Sorge um ihren Darm sich auf eigene Faust eine möglichst „leichte Kost“ diktieren. Ferner führt gewohnheitsmäßiges Zurückhalten des Stuhles trotz Stuhldrangs sowie ferner Mißbrauch von Klystieren und Einläufen auf die Dauer zur Herabsetzung der normalen Reflexerregbarkeit des Mastdarms, der sich gegen das Verweilen von Kot abstumpft (vgl. Dyschezie vgl. unten). Abnorme Erregbarkeitsverhältnisse im autonomen Nervensystem (Vagus und Sympathicus) bilden eine weitere sehr häufige Ursache, teils in Form herabgesetzter peristaltischer Tätigkeit, wie sie sich mitunter als konstitutionelle, von Jugend auf bestehende, zum Teil familiär vorkommende Darmträgheit äußert, teils in Form von Spasmen der Kolonmuskulatur als Ausdruck der Vagotonie, die dann oft mit anderen Stigmen der letzteren wie Bradykardie, Hyperacidität usw. einhergeht. In der Regel handelt es sich um Neuropathen. Auch die O. bei Meningitis sowie bei tabischen Krisen gehört hierher. Spasmen kommen auch auf toxischem Wege, speziell durch Nicotin (namentlich Zigaretten) sowie Blei zustande. Sie können aber auch sekundär durch andere organische Leiden, namentlich solche, die Schmerzen verursachen, ausgelöst werden wie Ulc. ventric. und duod., chronische Appendicitis, gynäkologische Affektionen, Fissura ani, Hämorrhoiden; ihre Beseitigung hat oft auch ein Schwinden der Darmspasmen zur Folge. Wichtige Fortschritte in der Kenntnis der verschiedenen Obstipationsformen lieferte die Röntgen-Untersuchung. Sie lehrte vier verschiedene Obstipationstypen kennen, die über den Rahmen der früheren Einteilung in spastische und atonische O. hinausgehen:



1. Der sog. Ascendenstypus: Coecum, Ascendens, oft auch das rechte Drittel des Transversums sind länger als 12 Std. (bis zu mehreren Tagen) stark gefüllt; der übrige Dickdarm ist leer. Ab und zu gehen vom Ascend. kleine Skybala ins Transversum über. Atonie des Coecums wurde auch als Typhltonie bezeichnet. Ascend.-Obstipation ist öfter mit Spasmen des Transversums nahe der rechten Flexur kombiniert.

2. Die Lokalisation der früher als atonisch, jetzt als hypokinetisch bezeichneten Obstipation, der häufigsten Form der O., ist hauptsächlich das Transversum, dessen Inhalt stark verzögert fortbewegt wird. Charakteristisch ist die mangelhafte oder sogar fehlende haustrale Segmentierung des Transvers.; dieses hängt oft tief herab (Koloptose). Das Ascend. zeigt normales Verhalten, während der Kottransport im Descend. ebenfalls oft verlangsamt ist.

3. Umgekehrt ist die dyskinetisch-spastische Form, die das Transvers., Descend. und Sigma befällt, durch auffallend tief einschneidende Haustrenzeichnung charakterisiert, stellenweise bewirkt der Spasmus vorübergehend isthmusartig-fadenförmige Einschnürung des Kontrastkotes. Atropin und Papaverin lösen die Spasmen (diagnostisch wichtig!). Diese Form ist oft mit der hypokinetischen Obstipation kombiniert; auch kommen die verschiedensten Zwischenstufen zwischen beiden vor.

4. Die proktogene Obstipation oder Dyschezie (Torporecti) hat ihren Sitz im Mastdarm, in welchem es zu starker Kotansammlung kommt, während der übrige Dickdarm annähernd normal funktioniert. Tagelang bleibt der Kontrastkot als „Globus pelvici“ im Rectum liegen. Diese Form kommt u. a. bei Erschlaffung der Bauchpresse sowie auch als Teilerscheinung organischer Nervenleiden (Tabes, multiple Sklerose usw.) vor.

**Symptomenbild der chronischen Verstopfung:** Zum Teil bestehen keine wesentlichen Beschwerden, nur Klagen über verzögerte Entleerung; bisweilen Völlegefühl und Schwere im Leib, Eingenommensein des Kopfes und Kongestionen; in anderen, speziell den spastischen Fällen sind die Beschwerden oft stärker: Unruhe im Leibe, Kneifen, Stuhldrang kurz nach der Entleerung. Bei manchen Fällen mit Spasmen sowie solchen mit Proktitis verursachen schon geringe Kotmengen Stuhldrang, es erfolgt dann wiederholte, aber stets ungenügende, sog. fraktionierte Entleerung. Appetit, Körpergewicht, Aussehen werden oft nicht in Mitleidenschaft gezogen. Häufig sind Hämorrhoiden vorhanden. Bei Neuropathen wird die Obstipation bisweilen Gegenstand hypochondrischer Gemütsverfassung (sog. Stuhlhypochonder).

Der Obstipationskot zeigt meist die Form kleinerer oder größerer Knollen. Bei spastischer Obstipation findet sich oft ein besonders kleinkalibriger, sog. Schafkot, der jedoch meist eine weichere Konsistenz hat als bei hypokinetischer O. und oft stark schmiert. Der bei Obstipation häufig vorhandene Schleimüberzug der Skybala verleiht ihnen nach dem Trockenwerden ein lackiertes Aussehen.

Die Diagnose hat zunächst alle organischen Ursachen erschwerter Stuhlentleerung auszuschließen (Carcinome, Narbenstrikturen, Adhäsionen des Kolons, Beckentumoren, Rhagaden und Fissuren des Afters). Digitale, gynäkologische, Rö.-Untersuchung, evtl. Rektoromanoskopie. Stets palpiere man das Kolon, in welchem (Descend. und Sigma) oft harte Skybala fühlbar sind. Bei Spasmen besteht oft deutliche Druckempfindlichkeit des Colons. Man lasse sich die einzelnen Entleerungen zeigen. Auch überzeuge man sich von der Art der Ernährung des Pat. Zu berücksichtigen ist auch, daß trotz täglicher (ungenügender) Entleerung Obstipation bestehen kann. In Zweifelsfällen ist die Carmin-

probe bequem (S. 310). Auch Diarrhöen können bei Kotretention vorkommen, wenn diese zu stärkerer Reizung der Darmschleimhaut führt.

Die **Therapie der Obstipation** ist bei richtiger Erkennung der Art der Störung und genügender Dauer der Behandlung fast stets von Erfolg. Schwieriger ist die Prophylaxe der Rückfälle. Bei zu schlackenarmer Kost (s. oben) ist schlackenreiche gröbere Diät indiziert (aber nicht bei Ascendentypus): Beginn mit Weizenschrotbrot (Graham- und Simonsbrot) mit viel Fett, dicken Leguminosen-Suppen (Linsen, Bohnen, Erbsen), getrockneten Pflaumen, saurer Milch, Yoghurt, evtl. Zusatz von Agar-agar in Speisen verkocht, später Roggenschrotbrot, rohes Obst. Im übrigen die gewöhnliche Kost. Zu schneller Übergang zu größerer Kost hat oft Gärungsdyspepsie zur Folge. Abführmittel sind anfangs oft unvermeidlich, später sind sie nach Möglichkeit zu meiden; indiziert sind sie hauptsächlich bei Ascend.-Typus: Rhabarber sowie Senesblätter (Pulv. Liquir. compos., Tamarinden), Istimintabletten, Ca-cara Sagrada, Magnesiumperhydrol, Leube-Pulver (Rhei pulv. 20,0, Natr. sulfur. 15,0, Natr. bicarb. 7,5, jeden 2. Abend 1 Teelöffel); milde wirken 30—40 g Milchzucker morgens im Tee; schädlich ist chronischer Gebrauch von Ricinus, Kalomel, Phenolphthalein (Nierenreizung!) sowie von salinischen Abführmitteln wie Glauber- und Bittersalz. Bädokuren in Kissingen (Rakoczy), Homburg (Elisabeth), Marienbad, Mergentheim. Nur vorübergehend Klystiere; sehr zweckmäßig ist abends Einlauf von 100—200 cc Öl oder flüssigem Paraffin, das im Darm verbleibt und dem am andern Morgen Wassereinlauf folgt. Bei Spasmen Beruhigung der Nerven durch Brom, evtl. Bettruhe, ferner Versuch mit schlackenarmer Kost; vor allem Atropin 3mal tgl. 0,5 mg, oder 1 mg abends, 0,5 mg morgens, evtl. auch in Form von Belladonna, z. B. Rp. Extr. Bellad. 0,6, Aloe 3,0, m. f. pil. 60, abends 2 Pill.; ferner Eumydrin 2—3 mg oder Papaverin 0,03—0,06. Bauchmassage bewirkt oft Verschlimmerung. Beseitigung anderer die Spasmen auslösender Leiden (vgl. oben). Bei Dyschezie sind zuerst ebenfalls Ursachen etwaiger Reizung am Mastdarm und After zu beseitigen. Größere Kotansammlung durch wiederholte Klystiere, Glycerinspritzen bzw. Öleinläufe beseitigen, evtl. zunächst durch manuelle Ausräumung. Später Klystierbehandlung möglichst vermeiden. Schlackenreiche (und fettreiche) Kost; der Pat. ist zu erziehen, sofort dem ersten Stuhldrang Folge zu geben. Bei schlaffen Bauchdecken (Multiparen) Leibbinde, Massage, Elektrisieren des Leibes.

### Hämorrhoiden.

Unter Hämorrhoiden versteht man die varicöse Erweiterung der Mastdarmvenen, die durch Stauung zustande kommt. Je nach ihrem Sitz außerhalb, innerhalb oder im Bereich des Schließmuskels unterscheidet man äußere, innere und intermediäre Hämorrhoiden. Erstere sind bei der Inspektion des After sichtbar, die beiden letztgenannten nur nach Entfaltung des After bzw. bei rektoskopischer Betrachtung. Sie bestehen aus kleineren oder größeren, durch die Haut bzw. Schleimhaut hindurchschimmernden blauroten Prominenzen, die meist in Mehrzahl vorhanden, den After umgeben.

Männer werden wesentlich häufiger befallen. Ursächliche Faktoren einer venösen Stauung im Plexus haemorrhoid. sind Obstipation (vor allem Dyschezie), abdominelle Zirkulationsstörungen, speziell Lebercirrhose, sitzende Lebensweise (Büroarbeit), Alkoholabusus, Fettsucht, bisweilen Gravidität. Ein wesentliches unterstützendes Moment dürfte die Einwirkung der Schwere des Blutes auf die Wand der Hämorrhoidalvenen sein, zumal diese keine Klappen besitzen.

Gewöhnliche Hämorrhoidalvaricen machen sehr oft überhaupt keine Beschwerden und werden nur zufällig entdeckt oder sie verursachen geringfügiges Spannungsgefühl und Jucken, zeitweise auch leichten Tenesmus. Sie sind zunächst weich; erst nach der häufig eintretenden Thrombosierung verwandeln sie sich in derbe Knoten bis zu Kirschgröße. Öfter kommt es zu Blutungen, die mitunter sehr hartnäckig sind und auf die Dauer zu starker Anämie führen können. Sie treten besonders bei inneren und intermediären H. auf. Sehr häufig, namentlich an den äußeren H. entstehen thrombophlebitische Prozesse, die oft der Reihe nach einen nach dem andern Varix befallen, Schmerzen sowie Tenesmus, starkes

Jucken und Brennen am After verursachen, oft auch mit geringem Fieber einhergehenden. In schwereren Fällen ulcerieren sie. Stets ist gleichzeitig erhebliche Proktitis vorhanden. Tenesmus führt bisweilen bei intermediären H. zu Einklemmung derselben. Auch kommt es öfters zu Mastdarmvorfall. Die Entzündung führt in der Regel zu Verödung der thrombosierten Varicen, die dann kleine läppchenartige, nicht mehr schwellungsfähige Gebilde darstellen. Infolge von Kot- und Sekretretention in ihnen geben diese oft noch nachträglich Anlaß zu nässenden Ekzemen mit Pruritus und erneuter Infektion. In einzelnen Fällen schließt sich eine aufsteigende septische Thrombophlebitis an H. an. Das Vorhandensein von H. bewirkt oft infolge der Beschwerden rückwirkend proktogene Obstipation.

Therapie: Sorgfältiges Vermeiden von Obstipation; peinliche Säuberung des Anus nach jeder Defäkation am besten mit Schwamm oder Watte; körperliche Bewegung (dagegen Reiten und Radfahren verboten). Reizlose, speziell gewürzarme Kost; kein Alkohol. Gegen die lokalen Beschwerden Anusol-, besser Bismolansuppos., evtl. 0,01 Cocainsuppos., warme Sitzbäder oder Dampfsitzbäder. Anpressare sind unzweckmäßig. Bei Thrombophlebitis das gleiche sowie Suppos. mit 1 mg Suprarenin oder 0,03 Extr. Bellad., ferner Einführen des Mastdarmkühlers von Arzberger-Winternitz. Bei schweren Formen Bettruhe. Bei hartnäckigen Blutungen Suprareninsuppos. sowie Extr. Hamamel. fluid. 3mal tgl. 1 Teel., ferner Injektionen von  $\text{CaCl}_2$  20/200 tgl. 1—2mal 20 cc in den After. Bei besonders hartnäckigen Fällen versuche man die Verödung der H. durch Injektion von 20% Carbolsäure, besser von 1%<sup>00</sup> Suprareninlösung (1 cc) oder 2—5 cc 96% Alkohol u. zw. nach Herausaugen der H. mit der Bierschen Saugglocke. Evtl. Operation (Kauterisieren mit dem Paquelin).

Die **Fissura ani** in Rhagaden bzw. kleinen Ulcerationen in den Schleimhautfalten des Anus bestehend, ist trotz ihrer Unscheinbarkeit eine praktisch wichtige Affektion, die sich auf dem Boden von chronischer Proktitis, ferner bei Pruritus, zum Teil infolge von Oxyuren, Hämorrhoiden usw. entwickelt und den Pat. infolge der Schmerzen bei der Stuhlentleerung große Beschwerden bereitet. Auch ist sie eine häufige Ursache von Obstipation, wie auch umgekehrt verhärteter Stuhl die Schleimhautdefekte unterhält. Zur Feststellung des Leidens ist Entfaltung des Anus nach Cocainisierung notwendig. Therapie: Gegen die Beschwerden das gleiche wie bei Hämorrhoiden, außerdem Ätzen mit Argent. nitric. oder Ichthyolbehandlung nach Klempere: Zuerst Reinigung mit 0,5%<sup>00</sup> Sublimat, dann Anästhesieren durch 10% Cocain mittels Wattetupfers, der 3—5 Min. in der Fissur liegen bleibt, hierauf reines Ichthyol; dies Verfahren wird 5—6 Tage lang wiederholt.

## Nervöse Darmkrankheiten.

Unter den nervösen Störungen der Darmtätigkeit sind sowohl funktionelle wie organisch bedingte zu unterscheiden. Hinsichtlich der funktionellen Störungen ist daran zu erinnern, daß sie, wenn auch zum Teil in wenig in den Vordergrund tretender Form ungemein häufige Begleiterscheinungen organischer Darmleiden sind, sowohl als motorische und sensible, wie als sekretorische Störungen. Zu den motorischen Störungen gehört einmal die mit lautem Poltern und Kollern im Leibe einhergehende **peristaltische Unruhe** des Darms ohne beschleunigte Entleerung, die häufiger den Dünndarm als das Kolon befällt und sich bei nervösen Individuen, insbesondere nach seelischen Erregungen für kurze Zeit oder eine Reihe von Stunden einstellt (*Tormina intestinorum*). Die Patienten werden häufig durch sie infolge der Furcht vor organischer Erkrankung beunruhigt, auch genieren sie die lauten Geräusche in Gesellschaft anderer Menschen. Man untersuche übrigens stets sorgfältig auf etwaige latente organische Stenosen. Therapie: Behandlung der Neurasthenie durch Sedativa, Psycho-

therapie; heiße Kompressen, Vermeiden von rohem Obst und gröberen Gemüsen.

Zu den motorischen Störungen gehören ferner manche Formen der Obstipation (vgl. S. 339) sowie gewisse Formen des Ileus (spastischer Ileus, vgl. S. 338), sowie endlich die **nervösen Diarrhöen**, die teils als selbständiges Leiden, teils reflektorisch ausgelöst durch Erkrankungen der Unterleibsorgane (Genitalien, Blase) vorkommen. Die psychogenen Diarrhoen bestehen in plötzlich auftretendem, kategorischen Stuhl drang ohne Kolik mit dünnen, zum Teil wäßrigen Entleerungen im Anschluß an Affekte der verschiedensten Art wie Ärger, Angst, aber auch Freude, bisweilen als Teilsymptom der sog. Erwartungsneurose. Die Diarrhöen beruhen sowohl auf vermehrter Erregbarkeit der motorischen Darmnerven wie auf gesteigerter Darmsekretion. Zum Teil handelt es sich um habituelle Zustände, die trotz ihrer Harmlosigkeit wegen ihrer Unberechenheit den Pat. peinigen, zumal sie ihn in seiner Berufsausübung bisweilen beeinträchtigen. Nicht immer scharf von ihnen zu trennen sind die reflektorisch entstehenden nervösen Durchfälle. Sie verschwinden bei Ausheilung der sie auslösenden organischen Prozesse (gynäkologische Affektionen, Prostataleiden usw.). Schließlich sind die nervösen Diarrhöen nicht mit den Durchfällen bei Basedowscher Krankheit zu verwechseln. Die Therapie richtet sich gegen die Übererregbarkeit; Psychotherapie.

Krampf des Sphincter an<sub>1</sub> beruht meist auf lokalen organischen Prozessen der Mastdarmschleimhaut bzw. des Afters wie Rhagaden, Fissuren, Hämorrhoiden usw., doch wird er gelegentlich auch als selbständiges Leiden speziell bei Sexualneurasthenikern und bei organischen Rückenmarksleiden, mitunter bei Tabes beobachtet. Schwäche des Sphincter kommt bei Päderasten vor. Im übrigen sei bezüglich Sphincter-Spasmus und -Lähmung auf das Kapitel organische Nervenkrankheiten verwiesen. Sensible Reizerscheinungen des Darms, deren Symptome Schmerzen sind, sind meist nur Begleiterscheinungen von Darmspasmen. In besonders prägnanter Form treten dieselben z. B. bei Bleikolik auf. Auch Arteriosklerose kann in der Form der Dyspraxia intestinalis (vgl. S. 182) heftige Schmerzen verursachen. Bezüglich tabischer Krisen des Darms sei auf das Kapitel Tabes verwiesen.

Zu den Sekretionsneurosen des Darmes gehört die *Colica mucosa*.

### **Colica mucosa s. membranacea (Myxoneurosis intestinalis).**

Unter *Colica mucosa* versteht man eine vorwiegend beim weiblichen Geschlecht auftretende Erkrankung, die anfallsweise mit heftigen Koliken einhergeht, an die sich die Entleerung größerer Schleimmengen anschließt, und die in der Regel mit (spastischer) Obstipation vergesellschaftet ist. Das Wesen der Krankheit ist eine Neurose, hauptsächlich im Bereich des parasympathischen Nervensystems (Vagotonie); man hat die Krankheit daher auch als *Myxoneurosis intestin.* bezeichnet. Die Mehrzahl der Kranken sind Neuropathen. Anatomische Veränderungen der Dickdarmschleimhaut können vollkommen fehlen (Rektoromanoskopie!).

Der Schleim wird in Form derber, zum Teil membranartiger Massen entleert, die mitunter irrtümlich vom Pat. als Bandwurm gedeutet werden. Der Anfall dauert meist einige Stunden, bisweilen Tage und kehrt in Abständen von Wochen oder Monaten wieder. Dem Anfall folgen öfter für kurze Zeit Diarrhöen. In einzelnen Fällen wird der Schleim ohne Koliken entleert. Auch fehlt bisweilen die Obstipation. Häufig wird psychische Erregung als auslösendes Moment angegeben. Appendicitis sowie Adnexerkrankungen scheinen ebenfalls eine Rolle zu spielen. Bei der gewöhnlichen Colica muc. fehlen Zeichen einer katarrhalischen Kolitis. Doch kommen Kombinationen mit dieser vor, wie auch andererseits eine echte Kolitis mit schleimigen Entleerungen einhergeht. Die Unterscheidung beider ist auf Grund der Stuhluntersuchung (Blut- und Eiterbeimengung) und der Rektoskopie zu treffen. Gelegentlich beobachtet man nach Tannineinläufen die Ausstoßung von Membranen ähnlich denen bei Col. muc. Auch bei Darmcarcinom werden mitunter ähnlich aussehende Entleerungen beobachtet.

Therapie: Während des Anfalls Betruhe, feuchtwarme Leibumschläge; evtl. Morphium subcut. sowie Belladonnasuppos. Sehr zweckmäßig außerdem Atropin (2mal tgl.  $\frac{1}{2}$ —1 mg subcut.). Stuhlentleerung am besten durch Öleinläufe; keine Abführmittel. In der Zwischenzeit ist die diätetische Behandlung der Obstipation (siehe diese), namentlich mit schlackenreicher Kost sowie die Beseitigung der nervösen Übererregbarkeit (Brom, Calciumpräparate, Psychotherapie, Anstaltsbehandlung) nebst der Hebung des allgemeinen Ernährungszustandes von größter Bedeutung. Oft gelingt es, insbesondere durch Beseitigung der Obstipation, das Leiden selbst zu heilen. Hartnäckiger ist die Form ohne Obstipation.

### Enteroptose (Splanchnoptose, Glénardsche Krankheit).

Die Senkung der Baueingeweide betrifft häufig nicht allein den Magen, sondern geht oft mit Ptose des Kolons einher; mitunter besteht gleichzeitig Senkung der Nieren, der Milz, gelegentlich auch der Leber. Die Enteroptose hat verschiedene Ursachen: Vor allem Erschlaffung der Bauchdecken (Hängebauch), ferner Verminderung des abdominellen Fettpolsters, endlich abnorme Enge des oberen Teils der Bauchhöhle (Schnürleib, Thorax pyriform., Zwerchfelltiefstand). Zum Teil handelt es sich um eine erworbene Bauchmuskeler schlaffung wie bei Multiparen, ferner bei großen Hernien usw., teils um ein konstitutionelles Syndrom, das sich bei dem schon wiederholt erwähnten Habitus asthenicus (S. 304) findet und öfters mit allgemeiner Erschlaffung bzw. abnormer Dehnungsfähigkeit des Binde- und Stützgewebes des Körpers sowie mit einer gewissen Psychasthenie einhergeht (Plattfuß, Varicen usw.). Die letztere Kategorie der Ptose, die sich auch bei straffen Bauchdecken findet, wird bei Frauen als virginelle Ptose bezeichnet.

Die Gastropptose wurde S. 304 besprochen. Die häufig gleichzeitig vorhandene Koloptose besteht in Tiefstand des Transversums, das bisweilen bis ins kleine Becken herabhängt, sowie der Kolonflexuren, vor allem der rechten. Hiervon zu unterscheiden ist die fixierte Koloptose, die analog der fixierten Gastropptose aus Adhäsionen beruht, die einen Zug auf das Kolon bzw. das benachbarte Mesenterium ausüben und es in seiner Beweglichkeit hindern. Hepatoptose sowie Nephroptose siehe später (S. 376 resp. 413).

Die Beschwerden bei Enteroptose sind teilweise lokaler Art; zum großen Teil entsprechen sie denen der Gastropptose. Auch die Koloptose kann gelegentlich stärker in Erscheinung treten, namentlich bei hochgradig spitzwinkliger Knickung der li. Flexur (Obstipation sowie bisweilen

Stenosensymptome). Im übrigen verhalten sich die einzelnen Typen der Enteroptose verschieden. Bei den auf Hängebauch beruhenden Formen leiden die Pat. oft relativ wenig darunter, abgesehen von lokalen Beschwerden wie Schwere im Leib, Obstipation sowie häufig Rückenbeschmerzen, während der Ernährungszustand in der Regel nicht erheblich in Mitleidenschaft gezogen ist. Ganz anders ist oft das Bild der virginellen Ptose, wo neben den lokalen Beschwerden und hartnäckiger Obstipation häufig schwere allgemeine Unterernährung, hochgradige Asthenie und Neuropathie sowie Zeichen zurückgebliebener Entwicklung vorhanden sind.

Die Therapie richtet sich in den Fällen, wo es sich nur um lokale Erschlaffung der Bauchdecken handelt, vor allem gegen diese in Form von Stützapparaten, speziell Leibbinden. Diese sollen einen Druck von unten her gegen das Hypogastrium ausüben. Sie müssen der individuellen Form des Leibes genau angepaßt, d. h. nach Maß angefertigt werden. Strumpfbandbefestigung bzw. Schenkelriemen verhüten ein Hinaufgleiten der Binde. Sie soll in liegender Stellung angelegt werden, wo sich die Organe noch in normaler Lage befinden. Bei der konstitutionell-virginellen Ptose ist vor allem für Besserung des Ernährungszustandes und Hebung des Allgemeinbefindens durch Mast- und Ruhekuren, Fe- und As-Behandlung sowie Bekämpfung der hartnäckigen Obstipation zu sorgen.

## Darmparasiten.

Die Darmparasiten sind weit verbreitet und kommen im menschlichen Darm in mannigfacher Form vor. Es handelt sich im wesentlichen um tierische Parasiten, speziell Eingeweidewürmer (Enthelminthen), sowie um gewisse Protozoen.

Die Eingeweidewürmer spielen praktisch eine große Rolle und sind oft Ursache zumeist harmloser Beschwerden, zum Teil aber auch schwererer Krankheitsbilder. Die Symptome sind teils örtlicher Art, häufig Verdauungsstörungen, zum Teil handelt es sich um die Folgen toxischer Wirkungen oder chronischer Blutverluste. Mitunter bleibt das Vorhandensein der Parasiten völlig latent und wird nur zufällig durch Abgehen von Würmern oder Wurmteilen mit dem Stuhl bzw. durch den Befund von Eiern in diesem entdeckt. Ein Teil der Enthelminthen bewirkt häufig Vermehrung der Eosinophilen im Blut.

Niemals begnüge man sich mit der noch so bestimmten Angabe der Patienten über das Vorhandensein eines Wurms, da häufig Irrtümer vorkommen, sondern stelle die Diagnose stets nur aus dem positiven Befund im Stuhle. Am einfachsten gelingt das Auffinden von Eiern, was aber an das Vorhandensein geschlechtsreifer ♀ Tiere im Darm gebunden ist. Nach Verabreichung eines Abführmittels (Ricinus, Senna) werden entweder Stuhlproben direkt mikroskopiert oder der Stuhl mit einer Mischung von Antiformin und Äther aa (1 Teil Antiformin + 3 Tl. Wasser) angereichert; die Stuhlmischung wird durch ein Haarsieb filtriert und zentrifugiert; die Eier finden sich im Bodensatz.

Die Cestoden oder Bandwürmer sind platte lange Würmer ohne Mund und Darm und haben einen kleinen Kopf (Scolex) mit sog. Saugnäpfen zum Haften, zum Teil auch mit Hakenkränzen. An den Kopf schließt sich eine große Reihe von Gliedern, den sog. Proglottiden an, die aus ihm durch Knospung und Teilung entstehen und von denen die ältesten und größten am weitesten vom Kopf entfernt sind. Von den

jüngsten abgesehen enthält jedes Glied einen zwitterigen Geschlechtsapparat, produziert massenhaft Eier und stellt somit eine Art Einzel-tier dar. Aus den Eiern entwickeln sich, nachdem diese von dem entsprechenden Wirtsorganismus aufgenommen sind, die Embryonen, die nach Durchbohrung der Darmwand mittels des Blutstromes in die verschiedenen Organe verschleppt werden und sich dort zu den blasenartigen sog. Finnen entwickeln (vgl. *Echinococcus* S. 238).




Abb. 37. *Taenia saginata*. *a* natürliche Größe des in verschiedenen Abschnitten dargestellten Wurms, *b* Kopf (mit Pigmentkanälchen), *c* Proglottiden.  
(Z. T. nach Leuckart.)

Die *Taenia saginata* oder *mediocanellata*, der bei uns häufigste Bandwurm (Abb. 37), ist 4—8 m lang, seine Glieder sind 12—14 mm, der Kopf 2 bis 2½ mm breit. Dieser hat 4 Saugnäpfe, aber keine Haken. Die Proglottiden gehen nicht nur mit dem Stuhl, sondern auch aktiv spontan ab. In den älteren Abschnitten des Wurms sind sie mehr lang als breit. Der Uterus ist als feinverästelte Zeichnung sichtbar und zeigt eine seitliche Geschlechtsöffnung. Die Eier (Abb. 38) sind

rund oder oval und besitzen eine radiär gestreifte Schale. Das Finnenstadium findet sich im Muskel des Rindviehs. Übertragung erfolgt durch Genuß von rohem Rindfleisch.

**Taenia solium** ist bis  $3\frac{1}{2}$  m lang und bis 8 mm breit; sie hat einen stecknadelkopfgroßen Kopf mit Saugnäpfen und Hakenkranz. Der Uterus zeigt zum Unterschiede von der *Saginata* auffallend grobe Verästelung; Geschlechtsöffnung ebenfalls seitlich. Die Glieder gehen nur mit dem Stuhlgang, nicht spontan ab. Die Eier haben das gleiche Aussehen wie bei der *T. saginata*. Nach Eindringen in den Darm des Schweins gelangen die aus den Eiern entstehenden Embryonen in das Muskelfleisch und bilden dort erbsengroße Bläschen, *Cysticercus cellulosae* oder Schweinefinne genannt. Zur *Cysticercus*-Entwicklung kann es auch beim Menschen kommen, wenn auf dem Wege der Selbstinfektion Eier der *Taenia* in den Magen gelangen und die Embryonen ebenfalls in den Körper wandern. Prädilektionsorte für die *Cysticercen* sind die Haut, das Auge, der Herzmuskel, das Gehirn. Infolge der Fleischbeschau ist die *T. solium* in Deutschland selten.

Die bei uns sehr seltene *Taenia nana*, der kleinste Bandwurm, wird nur 15 mm lang, kommt oft in zahlreichen Exemplaren im Darm vor und produziert ebenfalls runde Eier. In den Mittelmeerländern ist er häufiger.

Der **Bothriocephalus latus** wird bis 9 m lang und zeigt eine Breite bis 20 mm. Der Kopf ist lanzettförmig und hat 2 seitliche flache Sauggruben. Der Hals ist fadenförmig, der Uterus rosettenartig, die Geschlechtsöffnung liegt in der Mittellinie. Die Proglottiden sind im Gegensatz zu den *Taenien* mehr breit als lang. Die ovalen Eier sind größer als die der *Taenien* und zeigen häufig einen aufgesprungenen Deckel. Zwischenwirt ist der Hecht. Infektion des Menschen erfolgt durch Genuß von rohem bzw. mangelhaft gekochtem oder schlecht geräuchertem Hechtfleisch. Der B. wird hauptsächlich in den baltischen Provinzen, in Holland und in der Nähe großer Binnenseen (Genfer, Züricher See usw.) beobachtet.

Sind bei den genannten Bandwürmern die geschlechtsreifen Glieder abgerissen und durch den Stuhl abgegangen, so vergehen bis zur Bildung neuer geschlechtsreifer Glieder und dem Auftreten von Eiern im Stuhl 2—3 Wochen.

Die **Krankheitserscheinungen**, die von den Bandwürmern verursacht werden, sind teils harmloser Art, teils haben sie, speziell beim *Bothriocephalus* gelegentlich sehr ernsten Charakter. Die häufigsten Symptome sind Kopfschmerzen, Schwindel, Herzklopfen, Abgespanntheit, ferner Übelkeit, Aufstoßen, bisweilen Erbrechen, bitterer Geschmack, Heißhunger abwechselnd mit Appetitlosigkeit, Unruhe im Leibe, mitunter Koliken. Die Beschwerden nehmen öfter nach Genuß stark gewaltiger und pikanter Speisen zu. Bei neuropathischen Personen ist, wenn sie von der Anwesenheit des Parasiten Kenntnis haben, für einen Teil der Symptome der psychogene Charakter nicht immer sicher auszuschließen. Eosinophilie ist häufig, bisweilen findet man Charcot-Leydenschc Krystalle im Stuhl. Anämien infolge von *Taenien* gehören zu den Seltenheiten. Der *Bothriocephalus* dagegen bewirkt mitunter schwerste Anämie nach dem Typus der perniziösen Anämie (vgl. S. 259). Ursache ist eine giftige anämisierend wirkende Substanz im Leib des Parasiten. Nach dem Tod des Wurms erfolgt Zerfall und Resorption desselben, so daß bei der Sektion bisweilen trotz schwerster Anämie kein Parasit mehr gefunden wird.

**Therapie:** Am leichtesten abtreiben lassen sich die ausgewachsenen, wesentlich schwieriger die jungen Exemplare der Bandwürmer. Am Abend vor der Kur Abführmittel (Rhabarber, Ricinus) sowie leichte Kost, am besten nur eine Suppe. Am anderen Morgen  $\frac{1}{2}$  Std. vor dem Wurmmittel 1 Tasse süßen schwarzen Kaffee. Als Anthelminthicum ist am meisten gebräuchlich das Extrakt der Farnwurzel




Abb. 38. Wurmeyer (Übersichtsbild). Eier von *a* *Ascaris*, *b* *Oxyuris*, *c* *Trichocephalus*, *d* *Ankylostomum*, *e* *Bothriocephalus*, *f* *Taenia saginata*, *g* *Taenia solium*. (Nach Leuckart.)



(Extr. filic. mar. aether. in Dosen bis 8,0, höchste Dose bei Erwachsenen 10,0) zusammen mit Ricinusöl, am besten in der Form des Helfenberger Bandwurmmittels (5 weiße Ricinuskapseln am Abend vorher, am anderen Morgen 8 schwarze Kapseln mit je 1,0 Extr. fil. und 2,0 Ol. Ricin., danach 2 weiße Ricinuskapseln). Kindern zwischen 8—12 Jahren gibt man kleinere Kapseln des Helfenberger Mittels entsprechend 2,65 Extr. filic. Die Filixpräparate sind giftig; Intoxikationserscheinungen sind Erbrechen, Ikterus, Nierenreizung, Krämpfe, Neurit. optic. mit dauernder Amaurose, evtl. Koma und Exitus. Ungiftiger Ersatz ist das aus Filix dargestellte Filmaron (als 10%ige Lösung in Ricinusöl), Dosis bei Erwachsenen 10,0, bei Kindern 3—7,0, hinterher Ricinusöl. Andere Wurmpräparate wie Flores Koso, Arekanüsse, Kamala, Granatrinde (Pelletierin) sowie Kürbiskerne sind entbehrlich. Allenfalls sind letztere infolge ihrer Unschädlichkeit bei Kindern anzuwenden: 100 reife Kerne (aber nur die mexikanischen sind wirksam) werden mit Zucker zerstoßen und auf einmal genommen. Die Ausstoßung des Wurms erfolgt am besten in eine Schüssel mit Wasser, um das Abreißen des Wurms zu verhindern. Man überzeuge sich davon, daß der Kopf mit abgegangen ist. Bei geschwächten oder ernster kranken Menschen sowie bei Gravidität nimmt man besser von der recht angreifenden Kur Abstand.

Zu den **Rundwürmern** gehören *Ascaris*, *Trichocephalus*, *Ankylostomum*, *Oxyuris* sowie die *Trichine*.

***Ascaris lumbricoides***, der Spulwurm, ein namentlich bei Kindern und Geisteskranken sehr häufiger Darmparasit ist 20 (♂)—40 (♀) cm lang und bis 5 mm dick. Er erinnert an das Aussehen eines Regenwurms. Er lebt im Dünndarm, zum Teil in sehr zahlreichen Exemplaren, ist sehr muskelkräftig und beweglich. Die Eier sind oval, haben eine doppelt konturierte Schale und eine eigentümlich gebuckelte bräunliche Eiweißhülle; das Innere ist gekörnt (Abb. 38). Sie sind oft massenhaft im Stuhl vorhanden; doch können sie fehlen, wenn nur ♂-Würmer vorhanden sind. Die Infektion erfolgt ohne Zwischenwirt durch Verschlucken der Eier. Die Ascariiden machen oft keine Symptome. In andern Fällen können sie abgesehen von den oben genannten allgemeinen Beschwerden bisweilen okkulte Blutungen hervorrufen, so daß die Unterscheidung von *Ulc. ventric.* oder *duod.* schwierig ist, zumal mitunter dabei auch über Nüchternschmerz geklagt wird. Zuweilen wird auch stärkere Anämie, in anderen Fällen chronische Enteritis beobachtet. Bei sehr großer Anzahl der Würmer können sie zusammengeknäuelte Obturationsileus (Dünndarm) bewirken. Auch spastischer Ileus infolge von Reizwirkung durch den Wurm wird beobachtet. Der Parasit hat die Neigung in enge Kanäle zu kriechen, z. B. in den Choleodochus, was dann Ikterus zur Folge hat; gelegentlich kommen sogar Leberabsesse vor. Bisweilen gelangen die Würmer nach oben in Mund und Nase (Gefahr der Aspiration und Erstickung im Schlaf).

Die Abtreibung der Ascariiden soll nur bei Nachweis von Eiern vorgenommen werden, während der Abgang eines Wurms keinen genügenden Grund für eine Kur bildet, da er der einzige sein könnte. Das wirksamste Mittel ist das Santonin aus den Zittwerblüten (*Flores cinnae*) als *Trochisci Santonini* zu 0,025 resp. 0,05 3 mal tgl. 1 Tabl. nach der Mahlzeit (nicht nüchtern) 3—4 Tage hintereinander, Dosierung abhängig vom Alter und Kräftezustand, hinterher Ricinusöl oder Bittersalz. Evtl. 3—4 malige Wiederholung der Kur mit Intervall von je zwei Wochen. Bei zu hoher Dosierung Intoxikationserscheinungen: Gelbsehen, Abgeschlagenheit, Übelkeit, Erbrechen, Mydriasis, Kollaps, Krämpfe, bei kleinen Kindern mitunter tödlicher Ausgang. Als Ersatz des Santonins hat sich das *Ol. Chenopodii anthelminth.* bewährt. Dosierung: bei Kindern so viel Tropfen, als das Kind Jahre zählt, bei Erwachsenen bis 15 Tropfen auf leeren Magen, am besten wegen des sehr schlechten Geschmacks in Kapseln, evtl. Wiederholung am selben Tage nach 1 Std.; 2 Std. später Ricinusöl oder Bittersalz. Von dem sog. *Wermolin* (*Ol. Chenopod.* + *Ol. Ricin.*) nehmen Erwachsene den Inhalt einer Originalflasche (50,0) in 2 Portionen an einem Tage. *Laxans* meist nicht notwendig.

***Ankylostomum duodenale*** (*Strongylus* oder *Doehmius duod.*, Palisadenwurm). Die Länge des ♂ ist 10, die des ♀ bis 18 mm; die Mundöffnung ist mit kräftigen Haken und Zähnen bewehrt, mit denen der Parasit sich in der Darmschleimhaut festbeißt und dieselbe zerfrißt. Aufenthaltsort ist weniger das Duodenum als der

übrige Dünndarm. Die massenhaft mit dem Stuhl entleerten ovalen Eier (Abb. 38) enthalten zahlreiche Furchungskugeln; sie ähneln bisweilen den Ascarideneiern, haben aber keine doppelte Konturierung. Ihre Weiterentwicklung erfolgt in Wasser und feuchter warmer Erde. Die jungen Larven dringen sowohl per os als durch die unversehrte Haut des Menschen, z. B. beim Barfußgehen ein. Befallen werden Menschen, die beruflich viel mit feuchter Erde u. ä. in Berührung kommen, wie Ziegelei-, Tunnel- und Grubenarbeiter. Der Parasit wird auch in Deutschland beobachtet, speziell in den Grubengebieten. Er bewirkt häufig schwere sekundäre Anämien infolge der Blutverluste (sog. ägyptische Chlorose) bisweilen mit tödlichem Ausgang. Der Stuhl enthält außer den Eiern oft zahlreiche Eosinophile und Charcot-Leydensche Krystalle sowie oft okkultes Blut. Eosinophilie im Blut ist häufig. Die erkrankten Wurmträger leiden an Übelkeit, Sodbrennen, Koliken, Diarrhöen bzw. Obstipation und zeigen häufig gesteigerte Pulsfrequenz sowie oft später Herzdilatation. Dem Ankylostom steht klinisch der in Amerika häufige *Necator americanus* (Hookworm) nahe. Therapie: Extr. filix wie oben; bei schonungsbedürftigen und geschwächten Individuen besser Thymol, und zwar im Laufe eines Vormittags 2 mal 2 g in Abständen von 2 Std., 3 Std. später Ricinus (17 g Ricin. + 3 g Chloroform). Wiederholung nach 3 Tagen usf., bis keine Eier mehr nachweisbar sind.

Der *Trichocephalus dispar* (Peitschenwurm), 4—5 cm lang, zeigt einen fadenförmig dünnen Kopfteil und ein verdicktes Schwanzende, das beim ♂ eingerollt ist (Abb. 39). Die charakteristischen Eier sind an der knopfförmigen Auftreibung der beiden Enden zu erkennen. Sie gelangen mit verunreinigter Nahrung in den Körper und entwickeln sich ohne Zwischenwirt. Die Würmer bohren sich mit dem peitschenartigen vorderen Ende in die Darmschleimhaut ein und leben hauptsächlich im Coecum. Sie kommen häufig vor, ver-




Abb. 39. *Trichocephalus dispar*. (Nach Leuckart.) *a* Männchen, *b* Weibchen in natürlicher und vervielfachter Größe.




Abb. 40. *Oxyuris vermicularis*. *a* Weibchen, *b* Männchen. (Nach Leuckart.) *c* Ei vom *Oxyuris*. (Nach Schürmann.)

ursachen möglicherweise okkulte Blutungen, machen oft aber keine klinischen Erscheinungen. Der Abtreibung setzt der Tr. besonders energischen Widerstand entgegen; außer Thymol bis 5.0 p, die sowie Santonin (s. oben) sind Benzinklistiere zu versuchen (1 Teel. bis 1 EBl. auf 1 l Wasser).

**Oxyuris vermicularis**, Madenwurm oder Pfiemenschwanz genannt, ist ein namentlich bei Kindern ungemein häufiger Parasit; ♂ 4 mm, ♀ 10—12 mm lang; der hintere Körperabschnitt des ♀ ist pfiemenartig fein ausgezogen (Abb. 40). Die Eier sind bohnenförmig. Die Würmer leben im Dickdarm, verlassen aber abends und nachts den After, um in dessen Umgebung die Eier abzulegen, und verursachen heftigen Pruritus ani. Die Eier findet man daher auch seltener im Kote, sondern am besten, wenn man morgens vor dem Stuhlgang mit einem kleinen Spatel die Umgebung des Anus bzw. die Mastdarmschleimhaut dicht über dem Sphincter abstreift und das Material in Wasser aufgeschwemmt untersucht. Durch Eindringen des Parasiten in die Appendix sollen entzündliche Reizzustände eintreten können, evtl. sogar echte Appendicitis. Im übrigen bestehen die Beschwerden vor allem in quälendem Juckreiz am After, evtl. auch an der Vulva, die Schlaflosigkeit und nervöse Reizbarkeit bewirken. Erneute Infektion (Selbstinfektion) erfolgt durch den Mund durch beschmutzte Finger. Therapie: Schutz vor Autoinfektion durch gut schließende Badehose, die das Kratzen am After im Schlaf verhindert, Sauberhalten der Hände, häufiger Wechsel der Bett- und Leibwäsche, ferner Einreiben der Aftergegend mit Unguent. ciner. oder Vermiculinalbe. Von den Wurmmitteln ist Santonin oft nicht genügend wirksam. Zweckmäßig ist die Anwendung des Alumin. subacet.: zuerst Abführmittel, dann 3—5 mal tgl. Gelonida alumin. subacet.-Tabl. (1,0 bei Erwachsenen, 0,5 bei Kindern), außerdem zunächst täglich, später jeden 2. Tag Einlauf von 1—2 Tabl. zu 1,0 bei Erwachsenen resp. 0,5 bei Kindern auf 500,0 Wasser in den leeren Darm; der Einlauf ist möglichst lange zu halten. Die Kur ist mindestens noch eine Woche lang nach Verschwinden der Würmer fortzusetzen. Oft ist Wiederholung der Kur notwendig.

*Trichina spiralis* s. S. 124.

Unter den den Darm bewohnenden pathogenen Protozoen kommen abgesehen von der Dysenterieamöbe (S. 47) verschiedene Infusorien vor, u. a. das *Balantidium coli*, ein elliptisches, mit Flimmerhaaren versehenes, lebhaft bewegliches Tierchen von etwa bis zu 0,1 mm Größe. Es findet sich im Schweinedarm als harmloser Schmarotzer und verursacht beim Menschen (Schweinezüchter) mitunter schwere ruhrartige Krankheitsbilder. Therapie: Chinineinläufe (1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>) sowie Emetin wie bei Amöbenruhr bis 0,1 subcut. pro die.

## Krankheiten des Peritoneums.

### Akute Peritonitis.

Unter Peritonitis versteht man die Entzündung des Bauchfells, an der sich sowohl das parietale wie das viscerele Blatt desselben beteiligt.

Pathologisch-anatomisch zeigt die Peritonitis im Prinzip die gleichen Verhältnisse wie die Entzündungen der übrigen serösen Häute. Am häufigsten ist die fibrinös-eitrige Form mit fleckiger Trübung der Serosa, der der normale spiegelnde Glanz fehlt; es besteht verstärkte Gefäßinjektion mit fleckiger oder diffuser Rötung; stellenweise kann es zu Verklebung der Darmschlingen kommen, ferner ist oft ein trübes flüssiges Exsudat vorhanden, das fibrinös-eitrig, oft auch rein purulent ist. Mitunter sind größere Flüssigkeitsmengen vorhanden, die namentlich bei Perforationsperitonitis infolge des Austritts von Magendarminhalt in die Bauchhöhle jauchigen oder fäkulenten Charakter, mitunter mit Gasbildung zeigen. Geringere Exsudatmengen pflegen sich zunächst in den abhängigen Teilen der Bauchhöhle speziell im Douglas anzusammeln, ferner findet man sie in den seitlichen Nischen der Bauchhöhle, insbesondere zwischen Leber und Zwerchfell sowie in der Nachbarschaft der Milz und der Gallenblase. Besonders reichliche Exsudatbildung beobachtet man bei der puerperalen Streptococcenperitonitis. Gonorrhöische P. zeigt eitrig-fibrinöses Exsudat oft mit starker Neigung zu Verklebungen. Rein hämorrhagische Exsudate gehören nicht zum Bilde der akuten P. und sind stets auf Tb. bzw. Carcinom verdächtig. Der diffusen Peritonitis steht die abgesackte P. gegenüber. Bei dieser bleibt der Prozeß infolge frühzeitig eintretender

Verklebungen oder von früher her bestehender Verwachsungen auf einen kleinen, dem Ausgangspunkt der P. benachbarten Bezirk beschränkt; jedoch kann es nachträglich infolge von Perforation der schützenden Wand dennoch schließlich zu diffuser Peritonitis kommen. Abgesackte eitrige Peritonitis beobachtet man am häufigsten im Verlauf der oben genannten gynäkologischen Affektionen als sog. Pelveoperitonitis, ferner als Perityphlitis (vgl. S. 324) sowie nach Perforation von Magengeschwüren bei vorher entstandenen Verwachsungen (sog. gedeckte Perforation), schließlich als sog. subphrenischer Absceß bei dicht unter der Zwerchfellkuppel gelegener, abgekapselter eitriger Peritonitis.

Das Peritoneum, dessen Flächenausdehnung etwa der der äußeren Haut entspricht, zeichnet sich durch ein erhebliches Resorptionsvermögen aus, so daß in die Bauchhöhle eingebrachte Fremdkörper wie Bakterien, Toxine usw. sehr schnell aufgesogen und teils direkt, teils über die Lymphwege dem Blut zugeführt werden. Außerdem vermag das Peritoneum auf verschiedene Reize mit Bildung nicht unerheblicher Transsudatmengen zu reagieren.

Die akute Peritonitis hat verschiedene Ursachen. In der großen Mehrzahl der Fälle handelt es sich um die Wirkung pathogener Bakterien bzw. ihrer Toxine (Strepto- und Staphylococcen, B. coli, Pneumococcen, Gonococcen, Proteus, Anaerobier usw.). Häufig liegen Mischinfektionen von B. coli mit andern Erregern vor.

Ausgangspunkt der P. ist am häufigsten der Magendarmkanal, und zwar meist in Form von Perforation seiner geschwülig veränderten Wand: Appendicitis, Ulc. ventric. und duod., Typhus, Darm-Tb., ulcerierte Carcinome, Darmdivertikel, Ileus, Darmsyphilis, Fremdkörper im Darm, Decubitalgeschwüre infolge von Kotstauung, selten Dysenterie, ferner traumatische Quetschungen oder Zerreißen im Bereich des Magendarmkanals (z. B. nach Repositionsversuchen bei Hernien).

Den zweithäufigsten Ausgangspunkt bilden die weiblichen Genitalien, und zwar in erster Linie der puerperale Uterus nach Einschleppung von Keimen während oder nach der Geburt, einem Ereignis, das namentlich in früheren Zeiten mit mangelhafter Asepsis sehr häufig war, ferner im Gefolge infizierter Aborte, besonders infolge von krimineller Abtreibung. Der Weg der eindringenden Keime geht dabei häufig über die Parametrien (Parametritis); in manchen Fällen passieren die Bakterien den Uterus und die Adnexe, ohne jede wahrnehmbare Veränderung zu hinterlassen und führen direkt zu Peritonitis. Die Keime können aber auch durch die Tuben ins Peritoneum überwandern, so insbesondere bei Gonorrhöe. Als weitere gynäkologische Erkrankungen kommen Pyosalpinx, eitrige Ovarialerkrankungen, Vereiterung von Ovarialcysten in Frage. Andere Ausgangspunkte infektiöser Peritonitis sind Krankheiten der Leber und der Gallenwege wie eitrige Cholecystitis, Leberabsceß, vereiterte Echinococcen, ferner Pankreasnekrose, vereiterte Milzinfarkte und Milzabscesse, vereiterte Mesenterialdrüsen bei Typhus und Tuberkulose sowie Vereiterung der retroperitonealen Drüsen. Gelegentlich entsteht Peritonitis im Anschluß an eitrige Prozesse im Bereich der Niere, der Blase, der Prostata, der Samenblasen sowie nach Psoasabscessen. Auch Infektion der Bauchwand wie bei Erysipel, weiter die Nabelinfektion der Neugeborenen, ferner penetrierende (Stich- und Schuß-) Bauchwunden sowie gelegentlich die operative Eröffnung der

Bauchhöhle (Laparotomie) bei mangelhafter Asepsis können zu Peritonitis führen. Selten ist die hämatogene Entstehung der Peritonitis, die dann bisweilen als Teilerscheinung einer Sepsis auftritt, z. B. nach Anginen, Osteomyelitis usw. Auch die seltene Peritonitis bei Polyarthrit, ferner die P. bei akuter und chronischer Nephritis entstehen auf dem Blutwege. Schließlich kann sich eine P. auch im Verlauf einer eitrigen Pleuritis und Perikarditis entwickeln, wobei die zahlreichen das Zwerchfell durchsetzenden Lymphbahnen den Transport der Keime vermitteln.

Gegenüber den bakteriellen Ursachen spielen chemische Reize eine nur untergeordnete Rolle. Praktisch kommen sie bisweilen bei Injektion von Medikamenten in den Uterus, wenn letztere durch die Tube in die Bauchhöhle übertreten, zur Beobachtung.

Das Krankheitsbild der akuten diffusen Peritonitis ist sehr charakteristisch, wenn auch je nach dem Entstehungsmodus die einzelnen Fälle gewisse Verschiedenheiten zeigen. Man unterscheidet lokale und allgemeine Symptome. Zu den Lokalsymptomen gehört die frühzeitig bemerkbare Verminderung bzw. Aufhebung der abdominalen Atmung; auch bei tiefster Respiration bleiben die Bauchdecken so gut wie unbeteiligt, die Atmung ist rein costal. Ein wichtiges Frühsymptom ist ferner die zunächst umschriebene Abwehrspannung der Bauchdecken, die sich bei ihrer Betastung konstatieren läßt (vgl. S. 326). Oft kann man bei Beginn der Peritonitis aus der Lokalisation der Abwehrspannung auf den Ursprung der P. schließen. Bei ausgebildeter diffuser P. besteht dagegen eine gleichmäßig über das ganze Abdomen sich erstreckende hochgradige Bauchdeckenspannung, so daß sich der Leib bretthart anfühlt. Schon frühzeitig ist ein Schwinden der Bauchdeckenreflexe zu konstatieren. Ein weiteres wichtiges Lokalsymptom ist äußerst heftiger Leibscherz. Der Schmerz tritt bei Perforationsperitonitis plötzlich, bisweilen wie aus heiterem Himmel auf, so daß in derartigen Fällen der Beginn der Erkrankung oft zeitlich genau festzustellen ist. Hier pflegt er auch zunächst an umschriebener Stelle in der Gegend des Ausgangspunktes der P. sein Maximum zu zeigen (Magen, Appendix usw.). Der Spontanschmerz hat meist einen kontinuierlichen Charakter; er breitet sich bald über den ganzen Leib aus. Meist ist er von hochgradiger Druckempfindlichkeit der Bauchdecken begleitet, infolge deren oft sogar schon das Gewicht der Bettdecke als unerträglich empfunden wird. Auch Nachlassen des auf die Bauchdecken ausgeübten Druckes verursacht heftigen Schmerz (Blumbergs Symptom). Die Schmerzen sind oft so hochgradig, daß der Pat. ängstlich jede Bewegung vermeidet.

Bauchdeckenspannung kann einerseits ausnahmsweise fehlen, z. B. im Rausch sowie bei Shockzuständen, mitunter bei der P. der Nephritiker; auch kann sie in vorgerückteren Stadien der P. wieder schwinden. Andererseits findet man sie gelegentlich ohne Bestehen einer P. bei Reizung von Intercostalnerven, z. B. nach Rippenfrakturen sowie Brustschüssen, ferner bei Meningitis sowie Bleivergiftung, schließlich bei Verletzung bzw. Blutung im Bereich retroperitonealer Organe wie der Nieren und der Wirbelsäule. Der Schmerz kann fehlen im Rausch, im Shock, ferner bei benommenen Kranken (Typhus), bei schwer Tb-Kranken, schließlich bei foudroyanter P. mit besonders virulenten Keimen.

Ein weiteres wichtiges Symptom, das schon im Beginn der Erkrankung eintritt, ist Erbrechen. Es fehlt nur bei großer Magenperforation infolge der Entleerung des Inhaltes in die Bauchhöhle. Auch hartnäckiges Aufstoßen sowie Singultus werden oft bei Peritonitis beobachtet; sie dürften reflektorisch zustande kommen.

Den vorstehend genannten frühzeitig auftretenden Lokalsymptomen entsprechen eine Reihe charakteristischer Allgemeinerscheinungen, die besonders prägnant in den Fällen sind, wo die P. sich plötzlich aus voller Gesundheit entwickelt. Das Verhalten der Temperatur ist nicht besonders bezeichnend. Häufig ist sie nur mäßig erhöht. In manchen Fällen besteht ein Continua (Streptokokken), bisweilen kann Fieber fehlen, z. B. bei Coli-Infektion, oder es bestehen Kollapstemperaturen. Von großer diagnostischer Bedeutung hingegen ist von Anfang an das Verhalten des Pulses, der fast ausnahmslos sofort eine stark erhöhte Frequenz von 100 und mehr zeigt, weich und später oft unregelmäßig ist, ein Hinweis auf die frühzeitige starke Alteration des Zirkulationsapparates.

Bei Austritt von Galle ins Peritoneum („gallige Peritonitis“) wird mitunter analog der Bradykardie bei Icterus die Pulsbeschleunigung vermißt.

Ein charakteristisches Aussehen zeigt oft schon frühzeitig das Gesicht der Pat. in Form der sog. *Facies abdomin. oder hippocratica*: fahle Gesichtsfarbe, eingesunkene halonierte Augen, spitze kühle Nase, ängstlicher Gesichtsausdruck, ferner kalter Schweiß, kühle cyanotische Extremitäten. Es besteht völliger Appetitmangel und starker Durst. Diagnostisch bedeutungsvoll ist auch das Verhalten der Zunge, die regelmäßig stark belegt ist und bei ungünstigem Verlauf trocken wird, evtl. sich mit braunen Borken überzieht. Das Sensorium ist zunächst frei. Der Harn ist vermindert und hochgestellt und gibt eine starke Indicanprobe. Das Gesamtbild ist von vornherein das einer schweren Erkrankung.

Bezüglich der einzelnen Symptome ist noch folgendes hinzuzufügen: Frühzeitig entwickelt sich Meteorismus, der perkutorisch laute Tympanie bewirkt und namentlich bei schlaffen Bauchdecken, so besonders bei der puerperalen Form, im Laufe der Krankheit oft hochgradige Auftreibung des Leibes bewirkt, doch kann er auch vollkommen fehlen, statt dessen kann ein bretthart eingezogener Leib bestehen. Das erste Zeichen des Meteorismus ist das Kleinerwerden der Leberdämpfung, das für das Anfangsstadium der Peritonitis von hohem diagnostischen Wert ist, und zwar lagert sich zunächst das geblähte Colon transvers. vor die Leber, so daß die Dämpfung derselben von links nach rechts zunehmend kleiner wird, später nimmt das gesamte Organ infolge der Nachobendrängung durch das geblähte Darmpolster sog. Kantenstellung an, wodurch schließlich die ganze Leberdämpfung verschwindet. Der Meteorismus ist ein Zeichen der Darmlähmung, die schließlich zum Bilde des paralytischen Ileus (vgl. S. 337) führt. Darmbewegungen und Darmgeräusche sind nicht wahrnehmbar, Blähungen gehen nicht ab. Bisweilen ist anfangs an einzelnen Stellen, namentlich in der Nachbarschaft der Leber und der Milz bei der Atmung Reiben infolge von Fibrinauflagerungen zu hören.

In späteren Stadien kann perkutorisch an abhängigen Teilen Dämpfung infolge von Exsudatbildung nachweisbar sein, doch entzieht sich dieselbe häufig dem Nachweis bei stärkerem Meteorismus. Eine Folge des letzteren ist Zwerchfellhochstand mit oberflächlicher Atmung sowie Verdrängung des Herzens nach oben und Querlagerung. Der Stuhl ist in der Regel angehalten; bei septischer Peritonitis kommen dagegen öfter Durchfälle vor, besonders bei der puerperalen Form. Die Harnentleerung ist oft schmerzhaft infolge Entzündung des Bauchfellüberzuges der Blase. In der Regel besteht starke Leukocytose, bei den ganz schweren Formen Leukopenie, ferner schwinden die Eosinophilen.

Der Verlauf der akuten diffusen Peritonitis ist in der Regel letal. Die Dauer der Erkrankung beträgt meist nur wenige, höchstens 14 Tage. Der Meteorismus nimmt im weiteren Verlauf zu. Das Erbrechen dauert fort; als Zeichen der Darmlähmung wird schließlich eine fäkulente Flüssigkeit, oft gußweise entleert (Miserere). Das Sensorium bleibt häufig bis zuletzt erhalten, oft entwickelt sich schließlich eine gewisse Euphorie. Benommenheit und Delirien beobachtet man bei den septischen Formen. Der Tod erfolgt infolge von Zirkulationsschwäche (Lähmung der Vasomotoren, vgl. S. 152).

**Besondere Verlaufsformen:** Die beim Weibe vorkommende gonorrhöische P. im Anschluß an Erkrankung des Endometriums und der Tuben beginnt oft unter sehr heftigen Erscheinungen akuter peritonealer Reizung; Schmerzen und Bauchdeckenspannung sind namentlich im Bereich der unteren Abdominalregionen nachweisbar; die Erkrankung schließt sich oft an die Menstruation an. Die gynäkologische Untersuchung ergibt häufig eine Adnexerkrankung, das Urethral- bzw. Cervicalsekret enthält evtl. Gonokokken. Erbrechen fehlt oft. Trotz der stürmischen Erscheinungen im Beginn klingen dieselben häufig schnell wieder ab. — Auch die bei Kindern vorkommende Pneumokokkenperitonitis hat relativ günstige Prognose. Das gleiche gilt besonders von der seltenen P. bei Polyarthritiden. Ungünstig verlaufen die Pneumokokkenperitonitiden bei Nephritis, sowie die puerperale P.; die Streptokokken-P. ist fast stets tödlich. Bei der Perforationsperitonitis hängt das Schicksal der Pat. u. a. von dem Zeitpunkt der Operation ab. Infektionskrankheiten (Typhus), ferner Fettsucht, Diabetes, komplizierende Herz- und Nierenleiden trüben die Prognose. Selten kommt es zur Abkapselung oder zu Übergang in chronische Peritonitis.

Die **akute umschriebene Peritonitis**, die am häufigsten von der Appendix (Perityphlitis), nächst dem von den weiblichen Genitalien (Pelveoperitonitis) sowie von der Gallenblase (Pericholecystitis) ausgeht, seltener vom Sigma infolge von Koprostase bzw. Vereiterung von Divertikeln, verursacht die gleichen Lokalsymptome wie die diffuse P.: Schmerzen, Druckempfindlichkeit, Bauchdeckenspannung sowie Tumorbildung, die aber auf den Bezirk der Erkrankung beschränkt bleiben, während die übrigen Teile des Abdomens sich normal verhalten. Die Allgemeinsymptome (Erbrechen, Kollaps, unregelmäßiges Eiterfieber) sind im allgemeinen die gleichen wie oben beschrieben. Sie können ebenfalls recht heftig auftreten, pflegen jedoch häufig nicht die Intensität wie bei der diffusen P. zu erreichen. Bei längerem Bestehen — viele Fälle verlaufen ohne ärztliche Intervention chronisch — entwickeln sich allmählich starke Konsumtion und Marasmus. Der Ausgang besteht entweder in Resorption oder Absceßbildung (perityphlitischer, pericholecystischer, parametritischer Absceß, Douglasabsceß) oder in Peri-

foration. Letztere erfolgt je nach der Lage des Herdes in den Darm, in die Harnblase, die Scheide usw. Ausgedehnte Adhäsionen und Schwartenbildung mit entsprechenden Folgeerscheinungen (vgl. chronische P.) sind eine häufige Folge. Durchbruch in die freie Bauchhöhle zieht akute diffuse Peritonitis nach sich; in anderen Fällen entwickelt sich eine Sepsis.

Eine besondere und praktisch wichtige Form der umschriebenen Peritonitis ist schließlich der **subphrenische Absceß**, eine circumscribte Eiterung dicht unter dem Zwerchfell. Man unterscheidet je nach der Lage zum Ligam. falciforme rechtsseitige zwischen Leber und Zwerchfell, sowie linksseitige zwischen Leber, Magen, Kolon bzw. Milz und Zwerchfell gelegene Abscesse. Der subphrenische A. entsteht stets erst im Gefolge eines anderweitigen Eiterherdes, der meist der Bauchhöhle angehört. Rechtsseitige Abscesse entwickeln sich im Anschluß an Appendicitis, Cholecystitis, Absceß und Echinokokkus der Leber (rechter Leberlappen), Vereiterung der rechten Niere, linksseitige nach Perforation eines Ulc. ventr. und duod., bei Carcinom des Magens (Kardia) sowie des Ösophagus, bei Eiterungen im Bereich des linken Leberlappens, der Milz und des Pankreas. Seltener können auch Pleuraempyeme, eitrige Perikarditis sowie Rippencaries ätiologisch in Frage kommen.

Krankheitsbild: Häufig entwickelt sich der subphrenische A. schlechend als Fortsetzung einer schon bestehenden fieberhaften Erkrankung, durch die er anfangs verschleiert wird; oft macht er erst später markantere Erscheinungen. In anderen Fällen mit akuter Entstehung weisen von vornherein charakteristische Symptome auf die Komplikation hin: Schmerzen in der Oberbauchgegend bzw. im Rücken, hohes Fieber und Schüttelfrost, Druckempfindlichkeit sowie nicht selten Schwellung und Ödem der Haut im Bereich des betr. Rippenbogens vorn, seitlich oder hinten; auch besteht mitunter Erweiterung der unteren Thoraxapertur bzw. der unteren Intercostalräume. Der Absceß ist oft, namentlich links gashaltig, teils infolge Eindringens von Luft aus dem Magen (bei Perforation), teils durch Gasbildung infolge putriden Zersetzung. Entscheidend für die Diagnose ist der physikalische Befund: Die untere Lungengrenze ist bei der Atmung verschieblich. Die vom Absceß herrührende Dämpfung (besonders bei linksseitigem A. deutlich) liegt stets unterhalb des Zwerchfells und bewirkt oft Aufwärtsdrängung des letzteren. Sie ist häufig nach oben konvex begrenzt. Anwesenheit von Gas bewirkt die Symptome des sog. Pyopneumothorax subphrenicus, d. h. die für Pneumothorax charakteristischen physikalischen Phänomene: Succussio Hippocratis sowie Metallklang bei Stäbchenplessimeterperkussion. Schreitet man perkutorisch von oben nach unten fort, so findet man drei charakteristische Zonen: Hellen Lungenschall in der Höhe des Lungenunterlappens, darunter Tympanie (Gas), am tiefsten Dämpfung. Kompliziert wird der physikalische Befund durch die häufig gleichzeitig bestehende exsudative Pleuritis, die alsdann Dämpfung auch oberhalb der tympanitischen Zone bewirkt. Die möglichst frühzeitig auszuführende Probepunktion mit langer, dicker Punktionsnadel klärt stets die Diagnose. Bei der Röntgendurchleuchtung fällt die Minderbeweglichkeit bzw. das Stillstehen der betr. Zwerchfellhälfte auf;



gashaltige Abscesse sind an der Luftblase und dem horizontalen, beweglichen Flüssigkeitsspiegel zu erkennen. Differentialdiagnostisch kommt das Pleuraempyem und der Pyopneumothorax einerseits, der Leberabsceß bzw. -Echinococcus andererseits in Betracht. Die beiden ersteren lassen sich auf Grund genauer physikalischer und Röntgenuntersuchung leicht unterscheiden. Der Verlauf des subphrenischen A. ist ohne Operation fast stets ungünstig, da auf Spontanheilung durch Resorption nicht zu rechnen ist. Bei nicht rechtzeitiger operativer Eröffnung kommt es zur Perforation in die Pleura oder ins Peritoneum mit konsekutivem Empyem resp. eitriger Peritonitis bzw. Sepsis. Durchbruch in die Bronchien oder nach außen mit Spontanheilung ist ein seltenes Ereignis.

**Therapie der akuten Peritonitis:** Bei den diffusen Formen, ausgenommen die gonorrhöische P., möglichst frühzeitige Operation (Laparotomie). Die circumscripten P. sind je nach der Lokalisation und ihrem weiteren Verlauf verschieden zu behandeln. Bei Nachweis von Eiter operative Eröffnung des Herdes. Behandlung der Perityphlitis vgl. S. 328. Bei der Pelveoperitonitis führt oft konservative Behandlung zum Ziel. Interne Therapie der P.: Absolute Betruhe, Eisblase bzw. Applikation von Wärme (heiße Umschläge oder Glühlichtbogen) je nach dem individuellen Verhalten des Pat. Bei stärkerem Meteorismus Darmrohr, als ultima ratio Punktierung des Darms mit feiner Nadel. Gegen das Erbrechen Chloroformwasser oder Tct. Jodi (10 Trpf. auf 1 Gl. Wasser) sowie Magenspülungen, die nur bei Magenperforation kontraindiziert sind. Gegen die Darmlähmung subcut. Atropin sowie Eumydrin 1—3 mg p. dos., ferner Physostigmin sowie Hormonal (vgl. S. 338), Darmspülungen. Abführmittel sind nicht anzuwenden. Gegen die Schmerzen Morph. subcut. 3 mal tgl. 0,01 sowie Opium-Suppos. 2—3 mal tgl. 0,05. Von größter Bedeutung ist die frühzeitige Bekämpfung der Vasomotorenschwäche, von der das Schicksal vieler P.-kranker abhängt: Campher und Coffein 1—2 stdl. subcut. vgl. S. 174). Körperwarme Ringer- oder Normosallösung mit Zusatz von Suprarenin (1 cem auf 1 l) und Hypophysenpräparate (1 cem Coluitrin oder Pituitrin auf 1 l). Am wirksamsten ist ihre Anwendung in der Form der intravenösen Dauertropfinfusion (etwa jede Sek. 1 Trpf.); auch die Applikation als Tropfklysmä ist empfehlenswert.

### Chronische Peritonitis.

Die chronische Peritonitis kann sich aus der akuten P. entwickeln, doch ist dies selten. Von vornherein chronisch verlaufen gewisse Fälle, die sich an ein Trauma anschließen, ferner im Anschluß an lange Zeit bestehenden Ascites, der wiederholt punktiert wurde. Nicht zu verwechseln mit der chronischen P. sind die in Form von Narbensträngen bzw. Adhäsionen vorhandenen Residuen einer akuten P., die zwar klinisch heftige Beschwerden verursachen können, pathologisch-anatomisch aber einen abgelaufenen Prozeß darstellen.

Die Hauptgruppe der chronischen P. wird von der **Peritonealtuberkulose** gebildet.

Sie entsteht sehr selten primär; in der Regel handelt es sich um sekundäre Tb-Entwicklung. Dieselbe ist entweder fortgeleitet von einer Tb. der Nachbarorgane, z. B. des Darms, insbesondere bei Ileocöcal-Tb., bei Tb. der Mesenterial- und Retroperitonealdrüsen, bei Genital-Tb., speziell der Tuben, seltener der Ovarien, ferner bei Tb. der Nieren, der Blase und der Nebennieren, oder sie entsteht hämatogen

bei Lungen-, Drüsen- und Skelett-Tb. Eine besondere Disposition zur Peritoneal-Tb. zeigt die mit Ascites einhergehende Lebercirrhose der Potatoren. Die Peritoneal-Tb. kommt ziemlich häufig vor und bevorzugt jugendliche Individuen.

Anatomisch lassen sich verschiedene Formen unterscheiden: Die häufigste Form ist die exsudativ-seröse Form (etwa  $\frac{2}{3}$  aller Fälle), bei der das Exsudat entweder abgekapselt ist oder freier Ascites besteht, weiter die adhäsiv-fibröse Form oder Peritonitis tuberculosa sicca (etwa  $\frac{1}{3}$  der Fälle), die zu Verwachsungen führt, schließlich am seltensten die käsig-eitrige Form, die mit Bildung von größeren verkästen Konglomeraten bzw. Abscessen einhergeht und oft mit Tb. der Mesenterial- und Retroperitonealdrüsen vergesellschaftet ist.

Krankheitsbild: Der Beginn ist teils akut, teils schleichend. Das Gesamtbild ist verschieden, je nachdem neben der Bauchfellentzündung Zeichen einer manifesten Tb., einer Lebercirrhose usw. bestehen oder sich die Krankheit scheinbar aus voller Gesundheit entwickelt. Meist besteht hektisches Fieber, progredienter Anämie und Kräfteverfall, stets Steigerung der Pulsfrequenz. Leibschmerzen fehlen entweder vollkommen oder pflegen nicht sehr heftig zu sein. Das Abdomen ist häufig aufgetrieben, stets ist der Nabel verstrichen (ein wichtiges Symptom abdomineller Erkrankung!).

Die physikalische Untersuchung ergibt je nach der anatomischen Form der Erkrankung verschiedene Befunde. Größere Mengen freien Exsudates machen das Symptomenbild des Ascites (vgl. S. 358); charakteristisch ist seine häufig hämorrhagische Beschaffenheit sowie der reichliche Gehalt an Lymphocyten. Oft ist statt der freien Flüssigkeit ein abgesackter Ascites vorhanden, wobei die rechte Bauchhälfte durch die Retraktion des Dünndarms nach dieser Seite infolge von Schrumpfung des Mesenteriums Tympanie gibt. Bei der adhäsiv-fibrösen Form findet man oft palpatorisch umschriebene derbe Resistenzen und höckrige Tumoren, die zum Teil von dem aufgerollten und entzündlich verdickten Netz herrühren. Auch gleichzeitig bestehende Drüsenschwellungen können knollige Geschwülste verursachen. Oft ist auch der untere Rand der Leber deutlich fühlbar. Diffuse oder circumscribede Druckempfindlichkeit kann bestehen oder fehlen. Mitunter kann man in der Nähe der Leber auskultatorisch Reibegeräusche wahrnehmen (Fibrin!). Diazo- und Weißsche Reaktion im Harn sind oft positiv. Wegen der häufig gleichzeitig vorhandenen Darm-Tb. sind oft Durchfälle vorhanden, desgl. bestehen nicht selten Symptome von Lungen- bzw. Pleura-Tb. sowie mitunter von Meningitis tuberculosa.

Der Verlauf ist in der Regel chronisch, und zwar meist in Schüben. Die Prognose ist zweifelhaft, sie verhält sich verschieden je nach der Art des anatomischen Prozesses und dem Alter der Pat. Sie ist relativ günstig bei der serösen Form, ferner bei Kindern günstiger als bei Erwachsenen; ungünstig verläuft die käsig-eitrige Form, desgl. die adhäsiv-fibröse Form. Manche Fälle heilen scheinbar aus, bekommen aber später Rückfälle. Die Gefahr der letzteren ist am größten im ersten der „Heilung“ folgenden Jahr. Doch kommen mitunter auch wirkliche Spontanheilungen vor. Ungünstiger Ausgang erfolgt infolge von fortschreitender Inanition, ferner durch Ileus oder Perforationsperitonitis, teils durch Fortschreiten der Tb. in den andern Organen.

**Therapie:** Bei großen Exsudaten Punktion und Ablassen der Flüssigkeit. Im übrigen führt oft die rein konservative Behandlung zum Ziele, vor allem gute Ernährung und Pflege sowie Liegekuren im Freien, evtl. Solbäder. Empfehlenswert ist ferner das Einreiben der Bauchhaut mit Unguent, einer, oder mit Sapo kalin., sowie Glühlichtbügel und Bestrahlungen mit Höhensonne und während der Nacht Prießnitz- oder Alkoholumschläge auf den Leib. Obstipation ist zu vermeiden. Bei der exsudativen Form hat bisweilen die einfache Laparotomie günstige Wirkung. Notwendig wird dieselbe bei Ileus sowie bei Vorhandensein heißer Abscesse.

Eine besondere Form der chronischen Peritonitis tritt als Teilerscheinung der sog. **Polyserositis** auf, bei der Pleura, Peritoneum und Perikard in Form chronischer Entzündung beteiligt sind. Meist besteht Obliteration des Perikards mit starken Zirkulationsstörungen sowie erhebliche Verdickung der Leberkapsel (sog. Zuckergußleber) und Ascites, ein Krankheitsbild ähnlich der Lebercirrhose, das daher als perikarditische Pseudolebercirrhose bezeichnet wird.

In seltenen Fällen beruht chronische Peritonitis auf Lues.

### **Carcinosis peritonei.**

Die Krebserkrankung des Bauchfells schließt sich in der Regel an einen primären Krebs der Bauchorgane (Magen, Gallenblase, Pankreas) an und tritt anatomisch häufig als sog. Miliarcarcinose in Form zahlloser kleiner, den Tuberkeln bei Bauchfell-Tb. ähnlichen Knötchen, in andern Fällen als größere Geschwülste auf. Gleichzeitig kann es zu entzündlicher Reizung des Peritoneums kommen. Klinisch bleibt die Bauchfellerkrankung oft latent bzw. wird von dem Krankheitsbild des Primärtumors überlagert. In andern Fällen bestehen Symptome ähnlich der chronischen Peritonitis bzw. der Peritoneal-Tb. In diesen Fällen sind oft intensive Schmerzen sowie deutlich fühlbare knotenförmige Tumoren und Stränge vorhanden. Stets ist die Untersuchung per rectum und per vaginam auszuführen, die oft schon frühzeitig Geschwulstknoten im Douglaschen Raum aufdeckt. Das Abdomen ist oft ungleichmäßig aufgetrieben. Fast stets ist freies Exsudat, oft in beträchtlicher Menge vorhanden. Es ist entweder serös oder häufig hämorrhagisch und enthält mitunter charakteristische Tumorzellen, z. T. mit großen atypischen Kernen, bisweilen mit Mitosen. Bei starker Verfettung der Zellen zeigt der Ascites milchige Trübung. Fieber besteht nicht. Im Gegensatz zu der Peritoneal-Tb. fällt die Tuberkulinreaktion negativ aus, auch handelt es sich bei der Tb. meist um jüngere, bei der Carcinose um ältere Individuen.

Die Therapie ist rein symptomatisch; stärkere Flüssigkeitsansammlung macht Entleerung durch Punktion notwendig.

### **Ascites (Bauchwassersucht).**

Ascites ist die Ansammlung von freier seröser Flüssigkeit in der Bauchhöhle ohne entzündliche Ursache; es handelt sich demnach um ein Transsudat. Ursache ist Zirkulationsstörung bzw. Stauung und zwar sowohl allgemeine Stauung bei Herz- und Lungenleiden, als auch lokale Stauung durch Behinderung des Pfortaderkreislaufs wie

bei Lebercirrhose, Leberlues, Bantischer Krankheit, Pfortaderthrombose, Tumoren der Leber, des Pankreas und des Netzes. Ferner kommt Ascites bei hydropischer Nephritis vor, wo er bisweilen ein frühzeitiges Symptom des späteren allgemeinen Hydrops ist. Auch schwere Anämien gehen bisweilen mit geringem Ascites einher.

Der Ascites verursacht einen charakteristischen physikalischen Befund, falls seine Menge nicht zu gering ist, d. h. mindestens  $1\frac{1}{2}$  l beträgt. Die Flüssigkeit bewirkt Dämpfung, deren Ort von der Körperhaltung des Pat. abhängig ist; anfangs ist sie stets in den abhängigen Partien nachweisbar. Kleine Flüssigkeitsmengen lassen sich in Knie-Ellenbogenlage durch leise Perkussion feststellen; größere verraten sich schon bei der Inspektion durch die seitliche Verbreiterung des Abdomens bei Rückenlage in Form des sog. Froschbauches mit Abflachung der Nabelgegend. Die dabei vorhandene Dämpfung, hauptsächlich der seitlichen Teile, ist nach oben konkav begrenzt. Stoßweises Beklopfen der Bauchwand im Bereich der Dämpfung bewirkt deutliche Fluktuation in Form einer wellenschlagartigen Erschütterung der gegenüberliegenden Wand. Bei ganz großen Flüssigkeitsmengen — es können sich bis zu 25 l und mehr ansammeln — wird das Abdomen enorm ausgedehnt. Der Nabel ist dann vorgewölbt, die untere Thoraxapertur beträchtlich erweitert; es besteht Zwerchfellhochstand. Die Bauchhaut wird dabei prall und glänzend. Die Pat. klagen über Atemnot und ein lästiges Schweregefühl im Leib.

Die Ascitesflüssigkeit ist meist klar und von gelbgrüner Farbe, das spez. Gewicht ist, wenn es sich um reines Transsudat handelt, unter 1012, sein Eiweißgehalt 1—3%. Doch kommt in manchen Fällen wie bei Lebercirrhose sowie bei Nephritis eine Mischform von Transsudat und Exsudat mit Gewichten über 1015 und höherem Eiweißgehalt vor. Letzteren erkennt man an der positiven Rivalta-schen Reaktion: Ein in angesäuertes Wasser (1 Trpf. Eisessig auf 100 Aqua dest.) fallender Tropfen Ascites bewirkt rauchartige Trübung in demselben. Hämorrhagischer Ascites wird hauptsächlich bei Tb. und Carcinose, gelegentlich bei Lues beobachtet. Bei Icterus kommt Grünfärbung des Ascites vor. Milchiges Aussehen des Ascites kann sowohl auf reichlicher Beimengung verfetteter Zellen (meist Carcinom) wie auf Anwesenheit von echtem Chylus z. B. infolge von Kompression des Ductus thorac. durch Neoplasmen beruhen (Ascites chylosus). In letzterem Fall läßt die mikroskopische Untersuchung infolge der ungemein feinen Verteilung des Fettes Fetttröpfchen vermissen.

Differentialdiagnostisch ist der Ascites abzugrenzen einmal gegenüber den entzündlichen Exsudaten auf Grund der oben genannten physikalischen Eigenschaften, sodann gegenüber cystischen Tumoren, speziell sehr großenschlaffwandigen Ovarialcysten. Bei diesen wie bei sonstigen großen cystischen Tumoren ist bei Frauen ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Ascites das Freibleiben des Douglasschen Raumes; ferner ist der Uterus bei Ascites beweglich, bei Ovarialtumoren fixiert. Weiter verläuft die Dämpfungszone der Cysten nach oben konvex, wogegen Lagewechsel bisweilen die gleiche Veränderung wie beim Ascites bewirkt. Setzt man zu Ascites im Reagenzglas  $\frac{1}{3}$  Vol. NaCl, so entsteht ein flockiger Eiweißniederschlag, der bei Cystenflüssigkeit ausbleibt. Große Hydronephrosensäcke lassen sich durch ihre einseitige Lage vom Ascites unterscheiden. Auch das Lymphangioma cysticum des Netzes ist mitunter schwer von freiem Ascites zu unterscheiden. Ferner kommt freie Flüssigkeit, einen A. vortäuschend, bei Ruptur einer Ovarialcyste vor; die Flüssigkeit ist an ihrer schleimigen Beschaffenheit zu erkennen (Pseudomyxoma peritonei) und durch die oben beschriebene Probe vom Ascites zu unterscheiden. Schließlich hüte man sich vor Verwechslung mit der stark gefüllten Harnblase bzw. dem graviden Uterus.

**Therapie:** Diuretica und Trockenkost, Abführmittel sowie bei leistungsfähigem Zirkulationsapparat Schwitzprozeduren. Bei größerer Flüssigkeitsansammlung ist die Punktion (Paracentese) notwendig: Vorherige Entleerung der Harnblase, Jodierung der Haut; nach Probepunktion punktiert man im Liegen bzw. bei halbsitzender Stellung mit 3 mm dickem oder dickerem Troikar mit Mandrin. Beim Einstich hat man die A. epigastr. am äußeren Rand des M. rect. abdom. zu vermeiden; am zweckmäßigsten ist die Gegend der linken unteren Bauchgegend und zwar das 3. äußere Viertel der Richter-Monroeschen Linie zwischen Nabel und Spin. iliac. ant. sup. Durch ein vor der Punktion um das Abdomen gelegtes Handtuch, das man allmählich anzieht, zum Schluß der Punktion auch durch Druck mit der Hand kann man die vollständige Entleerung fördern. Campher, Coffein und Wein sind bereit zu halten. Bei Schwäche- bzw. Ohnmachtsanwendungen (Gehirnanämie) Kopf tief lagern. Nach Schluß der Punktion Kompression der Einstichstelle mit den Händen, Verschuß mit Verbandgaze und Collodium. Sehr wichtig zum Vermeiden eines starken Meteorismus ist die sofort anzuschließende energische Wickelung des Leibes mit elastischen Binden. Hinterher Diuretica. Oft sickert Flüssigkeit nach, was bedeutungslos ist. Sehr häufig ist Wiederholung der Punktion notwendig. Bei Ascites infolge von Pfortaderstauung kann in den Frühstadien bei fehlenden Komplikationen die Talmasche Operation, d. h. die Anheftung blutreicher Abdominalorgane, meistens des Netzes, an die vordere Bauchwand günstig wirken; sie bezweckt einen Kollateralkreislauf zwischen den Pfortaderästen und den Venen der Bauchwand. Der Erfolg pflegt erst nach einigen Monaten einzutreten (Mortal. ungefähr 20%).

## Krankheiten der Leber.

**Vorbemerkungen:** Perkutorisch gibt die Leber gedämpften Schall. Hierbei fällt ihre obere Grenze mit der unteren der Lunge zusammen; die untere Grenze liegt in der Axillarlinie zwischen 10. und 11. Rippe, in der Mamillarlinie schneidet sie den Rippenbogen, in der Medianlinie liegt sie in der Mitte zwischen Schwertfortsatz und Nabel und zieht dann schräg nach oben zur Gegend der Herzspitze. Genaueren Aufschluß über den von der Lunge überlagerten, in der Zwerchfellkuppel liegenden oberen Teil der Leber ergibt die Röntgenuntersuchung. Letztere läßt bisweilen bei starker Gasfüllung der Därme auch den unteren Rand erkennen. Da das Organ in toto den Zwerchfellbewegungen folgt, so ist bei der Atmung ein geringes Auf- und Absteigen des unteren Leberandes nachweisbar. Ferner ist die Perkussionsfigur der Leber in hohem Maß von dem Gasgehalt der Därme abhängig; starker Meteorismus bewirkt sog. Kantenstellung der Leber, bei der sich das Organ um seine quere Achse nach oben dreht, so daß sich die Dämpfung verkleinert (vgl. Peritonitis S. 353). Das gleiche kommt bei Ascites und Gravidität vor. Die obere Dämpfungsgrenze kann bei Lungenblähung bzw. Emphysem nach unten rücken. Die Verkleinerung der Leberdämpfung hat, falls sie nicht sehr hochgradig ist, somit nur beschränkten diagnostischen Wert; stets sind die genannten Momente einer scheinbaren Verkleinerung auszuschließen. Eindeutiger ist die Vergrößerung der Leberdämpfung. Doch ist diese wiederum zu unterscheiden gegenüber dem einfachen Hinabrücken des Organs z. B. durch den Druck eines großen pleuritischen Exsudates — hier ist die Abgrenzung nach oben unmöglich — bzw. bei rechtsseitigem Pneumothorax. Die normale Leber ist nicht deutlich palpabel. Man hüte sich vor Verwechslungen ihres unteren Randes mit den Inscription. tendin. recti. Man palpiert in Rückenlage bei völliger Entspannung der Bauchdecken (evtl. unter Ablenkung der Aufmerksamkeit) mit angezogenen Beinen und bei tiefer Atmung, wodurch bei vermehrter Konsistenz das unter der flachen Hand hin- und hergleitende Organ deutlich fühlbar wird. Bei unsicherem Ergebnis palpieren man in der gleichen Weise im warmen Bade. Die Gallenblase ist normal weder palpatorisch noch perkutorisch wahrnehmbar. Bei pathologischer Vergrößerung bildet sie einen birnförmigen Tumor am unteren Leberand in der Gegend der Mamillarlinie. Sicheren Einblick in die Größen- und Gestaltsverhältnisse von Leber- und Gallenblase ergibt die Röntgenuntersuchung der künstlich mit Luft (O<sub>2</sub> oder CO<sub>2</sub>) aufgeblähten Bauchhöhle (Pneumoperitoneum).

Die Leber besitzt sehr vielseitige **Funktionen**: Sie ist zunächst infolge ihres Gefäßreichtums für die Zirkulation rein mechanisch ein wichtiges Organ, indem sie enorme Blutmengen als Reservoir aufzunehmen vermag. Die Ernährung der Leber erfolgt durch die Art. hepat., während die Hauptzufuhr des von ihr funktionell zu verarbeitenden Blutes durch die Pfortader geschieht. Als drüsiges Organ bereitet sie die Galle. Diese enthält als wichtige Bestandteile den Gallenfarbstoff (Bilirubin), die Gallensäuren sowie das Cholesterin. Das Bilirubin entsteht durch Verarbeitung des beim Untergang der verbrauchten Erythrocyten freiwerdenden Blutfarbstoffs, wobei die Kupfferschen Sternzellen der Leber im Verein mit der Milz eine wichtige Rolle spielen. Die Gallencapillaren nehmen ihren Anfang als Spalten zwischen den Leberzellen, vereinigen sich zu anastomosierenden Gängen und münden in die interlobulären Gallengänge. Als Sammelbecken dient die Gallenblase, in der die Eindickung der Galle erfolgt; ihre Entleerung in den Darm erfolgt nur zeitweise auf gewisse Reize, speziell die Anwesenheit von Fett und Albumosen im Darm. Aufgabe der Galle bei der Verdauung vgl. S. 311. Eine außerordentlich wichtige Rolle spielt die Leber ferner im Stoffwechsel. Die als Dextrose der Leber vom Darm zugeführten Kohlehydrate werden in der Leber (wie auch im Muskel) in Glykogen umgewandelt und als solches aufgespeichert. Ebenso wird Fett, z. T. in beträchtlicher Menge in der Leber abgelagert. Weiter findet dortselbst aus  $\text{NH}_3$  und  $\text{CO}_2$  die Synthese von Harnstoff als Endprodukt des Eiweißstoffwechsels statt. Schließlich hat die Leber auch eine entgiftende Funktion, indem sie toxische, ihr vom Darmkanal zufließende, teils von außen aufgenommene, teils im Darmkanal entstehende Stoffe zurückhält und sie unschädlich macht. Letzteres erfolgt z. T. durch Paarung mit Schwefelsäure bzw. Glucuronsäure.

Die Zahl der Funktionsprüfungen der Leber ist, soweit sie eindeutig und zuverlässig sind, klein. Es sind im wesentlichen die Toleranzproben für Lävulose sowie Galaktose und der Nachweis von Urobilin und Urobilinogen im Harn. 100 g Lävulose (Fruchtzucker) morgens nüchtern per os genommen, bewirken beim Gesunden nur selten, bei Leberkranken häufig Lävulosurie, die man durch Polarisation des 2stündlich in den nächsten 6 Std. untersuchten Harns bzw. durch die Seliwanoffsche Probe feststellt (kurzes Aufkochen des mit der gleichen Menge offiz. 25% HCl versetzten Harns und einigen Körnchen Resorcin ergibt Rotfärbung, evtl. Niederschlag, der sich in Alkohol mit roter Farbe löst; Kontrolle mit dem gleichen Harn vor der Lävulosegabe notwendig). Die Probe auf Galaktosetoleranz besteht in Verabreichung von 40 g Galaktose und ihrem quantitativen polarimetrischen Nachweis im Harn, welcher normal höchstens 3 g (bei Leberkrankheiten mitunter mehr) in den nächsten 12 Std. enthält (die Teilstriche des Polarimeters sind hier mit 0.7 zu multiplizieren).

Sicherer und einfacher ist der Nachweis vermehrter Mengen von Urobilin und Urobilinogen im Harn. Das Urobilin bzw. seine Vorstufe, das Urobilinogen, entsteht im Darm infolge von Reduktion des Bilirubins durch die Darmbakterien und wird wieder resorbiert, wobei die normale Leber es zum größten Teil wieder an sich reißt, so daß nur sehr geringe Mengen durch die Nieren ausgeschieden werden, während die pathologische Leber es in größeren Mengen ins Blut diffundieren läßt. Auch bei pathologisch gesteigerter Gallebildung infolge vermehrten Blutzerfalls wie bei den hämolytischen Anämien gibt die Leber größere Mengen Urobilin und Urobilinogen ab. Urobilin wird mit dem Schlesingerschen Reagens (10%ige alkoholische Suspension von Zinkacetat) nachgewiesen, mit dem der Harn  $\bar{a}\bar{a}$  vermischt und durch ein doppeltes Faltenfilter filtriert, normal nur in Spuren, unter pathologischen Bedingungen dagegen starke grüne Fluorescenz ergibt. Das Urobilinogen wird durch Zusatz einer 2%igen Lösung von Dimethylparaamidobenzaldehyd in 5% HCl zum frisch (!) gelassenen Harn nachgewiesen. Normal findet Rotfärbung des Harns erst nach Erwärmen statt. Bei pathologischer Vermehrung tritt dieselbe schon in der Kälte auf. Bei vollkommenem Verschuß des Choledochus fehlt die Rotfärbung auch beim Erwärmen. Beim Stehen an der Luft geht das Urobilinogen in Urobilin über. Die Urobilin- und insbesondere die Urobilinogenprobe ist ein ebenso einfaches wie empfindliches Reagens auf Leberschädigungen, selbst wenn sie nur geringfügiger und vorübergehender Art sind.

## Ikterus.

Unter Ikterus (Gelbsucht) versteht man den Übertritt von Gallenbestandteilen (Bilirubin, Gallensäuren) ins Blut und in die Gewebe sowie die damit zusammenhängenden Folgezustände. Im Grunde stellt der Ikterus stets nur ein Symptom einer anderen Grundkrankheit dar. Den sog. katarrhalischen Ikterus pflegt man trotzdem praktisch als Krankheit *sui generis* zu betrachten, da hier die genannte Anomalie das Krankheitsbild beherrscht <sup>1)</sup>.

Ätiologisch nahm man bei dem katarrhalischen Ikterus bisher einen Duodenalkatarrh als Ursache für die Behinderung des Gallenabflusses durch die Vatersehe Papille an. Wahrscheinlich ist oft eine leichte Cholangitis vorhanden; möglicherweise spielen auch akute Entzündungen und Schwellungen am lymphatischen Apparat des Choledochus eine Rolle. Neuerdings hat man auch das Vorhandensein von aus Galle bestehenden Thromben in den feinen Gallengängen als Erklärung herangezogen. Das gelegentlich in Form kleiner Epidemien (Kasernen, Schulen) beobachtete Auftreten von Icterus catarrh. macht hier eine infektiöse Ursache (*B. coli*, Paratyphus) wahrscheinlich.

Die \*Gelbsucht im Anschluß an mechanischen Gallengangverschluss bedarf keiner besonderen Erklärung. Nicht geklärt ist dagegen die Entstehung des sog. pleiochomen Ikterus, der bei starkem Zerfall von Erythrocyten in der Blutbahn ohne Hindernis im Bereich der Gallenwege zustande kommt. Hier wurde bisher die abnorme Dickflüssigkeit der Galle als Ursache für die Resorption derselben in das Blut angesehen. Auch der sog. physiologische Ikterus der Neugeborenen, der bei zahlreichen, namentlich den spät abgenabelten Kindern beobachtet wird, harret noch der Erklärung. Es ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß bei jeder Art von Ikterus die Leber mit im Spiele ist.

Der **katarrhalische Ikterus** befällt mit Vorliebe jugendliche Personen. Initiale leichte Magendarmbeschwerden wie belegte Zunge, Foetor ex ore, Appetitlosigkeit, Magendruck, Völlegefühl, Kollern im Leibe, Obstipation sind oft vorhanden und bleiben in der Regel während der Dauer der Krankheit bestehen. Das Hauptsymptom ist die intensive Gelbfärbung der Haut sowie der *Conjunctiva bulbi*, wobei die Farbe in der Regel ein starkes Citronengelb ist, während dunklere Nuancen bis zum sog. Icterus melas bei den anderen Ikterusformen, vor allem dem Stauungsikterus vorkommen. Mit Sicherheit läßt sich die Hautfärbung nur bei Tageslicht, dagegen nicht bei künstlicher Beleuchtung erkennen. Mattigkeit und psychische Verstimmung bringen neben den dyspeptischen Beschwerden dem Pat. seine Krankheit zu Bewußtsein. Die Temperatur pflegt normal zu bleiben, seltener ist sie etwas erhöht. Die Leber ist oft etwas vergrößert, seltener auch die Milz. Der Harn zeigt infolge reichlichen Gehaltes an Bilirubin eine bierbraune Färbung; der Farbstoff geht in Chloroform über; der beim Schütteln entstehende Schaum ist gelb, die Gmelinsche Probe ist stark positiv. Stets ist der in der Kälte durch Essigsäure fällbare Körper (vgl. S. 388) nachweisbar. Bisweilen ist etwas Eiweiß vorhanden, regelmäßig finden sich einige gelb gefärbte Zylinder, oft auch Oxalatkrystalle. Die Urobilin- und Aldehydprobe ist anfangs negativ. Oft geht von Ikteruskranken ein auffallend unangenehmer Geruch aus.

<sup>1)</sup> Infektiöser Ikterus s. S. 112. Hämolytischer Ikterus s. S. 260.

Infolge des gestörten Zuflusses von Galle zum Darm ist die Fettresorption beeinträchtigt. Bei fetthaltiger Kost enthält daher der Kot viel Fett (mikroskopisch zahlreiche Krystallbüschel aus Kalk- und Magnesiaseifen), was ihm ein helles, tonartiges Aussehen<sup>1)</sup> und oft einen sehr üblen Geruch verleiht. Folgeerscheinungen des Überganges von Gallenbestandteilen in den Körper sind oft ein sehr quälendes Hautjucken, das infolge des Kratzens nicht selten zu zahlreichen Rhagaden und Excoriationen führt, sowie die häufig zu beobachtende Bradykardie. Erscheinungen von hämorrhagischer Diathese mit Hautblutungen, Nasenbluten usw. kommen nur bei schweren Ikterusformen, nicht beim katarrhalischen Ikterus vor. Die Resistenz der Erythrocyten gegenüber NaCl-Lösung pflegt bei katarrhalischem und Stauungsikterus erhöht zu sein.

Die Dauer des katarrhalischen Ikterus beträgt in der Regel einige Wochen, meist etwa 1 Monat. In dem Maße als die Gelbfärbung sowie die andern Erscheinungen allmählich abklingen, wird die Beschaffenheit des Stuhles wieder normal. Die letzten Reste von Gelbfärbung finden sich an der Sclera, die überhaupt das feinste Reagens auf Ikterus am Krankenbett ist. Jetzt wird die Aldehydreaktion und die Urobilinprobe oft stark positiv.

Die Diagnose soll im allgemeinen nur gestellt werden, nachdem alle übrigen Ursachen des Ikterus ausgeschlossen sind. Besonders bei älteren Individuen ist in dieser Beziehung Vorsicht geboten.

Ikterus als Symptom kommt vor bei mechanischer Verlegung der Gallenwege durch Gallensteine oder Parasiten bzw. durch Tumoren der Leber (Magencarcinom!), der Gallenblase und des Pankreas (Kopfteil), bei Lues II, akuter gelber Leberatrophie, Cholangitis, hypertrophischer Lebercirrhose, gelegentlich bei Leberabsceß, selten bei Leberlues, ferner bei einer Reihe von Infektionskrankheiten, die mit starkem Blutzerfall oder schwerer Leberschädigung einhergehen, wie Malaria, Gelbfieber, Weilscher Krankheit, manchen Fällen von Sepsis sowie („biliärer“) Pneumonie, bei Appendicitis und endlich bei gewissen Intoxikationen (Phosphor, Arsen, speziell Salvarsan Pilzvergiftung, Eklampsie) sowie mitunter bei Extrauterinschwangerschaft. Gelegentlich kommen leichteste Grade von Icterus sclerae während der Menstruation vor. Beim hämolytischen Ikterus fehlt Bilirubin im Harn; das gleiche gilt für die ikterusähnlichen Verfärbungen von Haut und Sclera bei Santonin- und Pikrinsäurevergiftung.

Therapie: Kranke mit Gelbsucht gehören ins Bett und erhalten eine Schonungsdiät, die infolge der gestörten Fettresorption möglichst fettarm sein soll. Gegen die Dyspepsie hat sich die Anwendung von Rhabarberpräparaten (Tct. rhei vinosa 3mal tägl. 1 Teelöffel), gegen die Obstipation Karlsbader Salz bewährt. Im übrigen ist die tägliche Verabreichung von Karlsbader Mühlbrunnen (morgens nüchtern 200—300 ccm lauwarm) von Vorteil. Der Juckreiz läßt sich oft durch Einreibungen mit 1—3% Salicyl-, Thymol- oder Mentholspiritus mildern.

**Cholämie:** Bei Fällen mit intensivem und lange andauerndem Ikterus z. B. infolge von Steinverschluß oder Carcinom u. a. entwickelt sich bisweilen ein Krank-

<sup>1)</sup> Diagnostisch von Bedeutung ist der Nachweis von Urobilin im Stuhl, dessen völliges Fehlen nur bei vollkommenem Abschluß des Choledochus, daher nicht bei katarrhalischem Ikterus beobachtet wird.



heitsbild, das dem einer schweren Intoxikation entspricht und vor allem durch rapiden Kräfteverfall, Kopfschmerzen, nervöse Reizzustände, wie Zittern, Krämpfe, Delirien sowie Koma, andererseits durch die Symptome einer hämorrhagischen Diathese ausgezeichnet ist. Man hat früher diesen Zustand als Icterus gravis bezeichnet. Nur zum geringen Teil dürfte indessen die Ursache in einer Überschwemmung des Körpers mit Gallenbestandteilen beruhen, während in der Hauptsache wohl die infolge von ausgedehnter Zerstörung von Lebergewebe entstehende Leberinsuffizienz (Hepa<sup>t</sup>argie, Acholie) und die daraus resultierende Autointoxikation mit den von der Leber normal verarbeiteten Produkten des Stoffwechsels bzw. der Darmfäulnis die Ursache des Krankheitsbildes darstellt, zumal dasselbe auch bei Lebererkrankungen ohne Ikterus beobachtet wird. Auch im Tierexperiment treten bei Ausschaltung der Leber (Ecksche Fistel) bei Fleischfütterung Intoxikationserscheinungen auf, die an die Hepa<sup>t</sup>argie des Menschen erinnern.

### Akute gelbe Leberatrophie.

Die akute gelbe Leberatrophie ist ein seltenes, fast ausnahmslos zum Tode führendes Leiden<sup>1)</sup>. Es tritt in allen Lebensaltern auf, bevorzugt jedoch das dritte Dezennium und befällt häufiger Frauen. Das Wesen der Krankheit besteht in einem unter schweren Allgemeinerscheinungen verlaufenden, rasch fortschreitenden autolytischen Zerfall des Lebergewebes, der sich unter dem Zeichen der Cholämie (s. oben) vollzieht.

Im Krankheitsverlauf lassen sich fast stets zwei Phasen unterscheiden. Die erste, die wenige Tage bis zu etwa 2 Wochen dauert, unterscheidet sich in nichts von dem harmlosen Bild des gewöhnlichen katarrhalischen Ikterus. Erst der Übergang zu den plötzlich auftretenden schweren Intoxikationserscheinungen läßt den Ernst der Situation erkennen. Der Ikterus nimmt an Intensität zu und unter hartnäckigem Erbrechen, Ansteigen der Pulsfrequenz sowie oft unter Auftreten von Temperatursteigerungen pflegen sich schnell schwere nervöse Symptome in Form von Benommenheit, Delirien oft mit wilden Halluzinationen, sowie Zuckungen, Krämpfen einzustellen. Die Leberdämpfung wird dabei zusehends kleiner, bis sie oft fast vollkommen verschwindet. Die Milz ist meist vergrößert. Die Stühle sind entfärbt, der ikterische Harn enthält neben Eiweiß und Bilirubin als charakteristischen Bestandteil Leucin und Tyrosin, deren Nachweis nicht schwierig ist (vgl. Leitfäden der klinischen Untersuchungsmethoden) und die die Produkte der Leberautolyse sind. Gleichzeitig tritt mitunter als weitere Intoxikationserscheinung eine mehr oder minder ausgebreitete hämorrhagische Diathese mit Petechien, Augenhintergrundsblutungen, Nasenbluten, blutigem Stuhl und Uterusblutungen auf. Nach wenigen Tagen erfolgt unter Vertiefung des Komats, häufig unter hoher Temperatursteigerung der Tod.

Anatomisch findet man eine außerordentlich verkleinerte schlaffe Leber, die auf dem Schnitt neben gelben verfetteten, zum Teil gallig gefärbten Bezirken eingesunkene rote Partien erkennen läßt, in denen das Lebergewebe vollkommen atrophisch bzw. geschwunden ist und durch Bindegewebe mit starker Gallengangswucherung sowie Zeldetritus (Leucin, Tyrosin) ersetzt ist. Im übrigen be-

<sup>1)</sup> Der vereinzelt beobachtete Ausgang in Heilung gehört zu den größten Seltenheiten.

stehen abgesehen von dem Ikterus und zahlreichen Blutungen trübe Schwellung und fettige Degeneration der verschiedenen Organe.

Die Ätiologie ist nicht geklärt. Disponierende Momente scheinen besonders die Gravidität sowie das Puerperium zu sein, bisweilen auch gewisse Gifte (Pilze, Salvarsan, Chloroformnarkose!). Ferner kommt wahrscheinlich der Lues bisweilen eine wichtige Rolle zu. Die akute Phosphorvergiftung bewirkt übrigens ein sehr ähnliches Bild, doch pflegen hier die Verkleinerung der Leber sowie der Milztumor und die höheren Temperatursteigerungen zu fehlen, auch ist der Ikterus weniger intensiv, umgekehrt sind die initialen Symptome seitens des Verdauungstraktus stärker ausgeprägt; Leucin und Tyrosin ist im Harn oft nicht vorhanden.

Die Therapie ist rein symptomatisch. Neuerdings war die Anwendung von Salvarsan in einzelnen Fällen von Erfolg.

### Lebercirrhose.

Unter Lebercirrhose versteht man eine unter fortschreitender Atrophie des Parenchyms sich vollziehende entzündliche Wucherung des interstitiellen Bindegewebes der Leber, das bei der häufigsten Form, der atrophischen oder Laënnecschen Cirrhose in späteren Stadien ein ausgesprochene Tendenz zur Schrumpfung zeigt, so daß das Organ eine erhebliche Verminderung seiner Größe erfährt (Schrumpfleber). Die Krankheitserscheinungen erklären sich sowohl aus der Funktionschädigung des Organparenchyms als vor allem durch die mechanischen Folgen der Bindegewebswucherung, speziell deren Wirkung auf den Pfortaderkreislauf.

Ätiologisch spielt bei der atrophischen Cirrhose in erster Linie der Alkohol, vor allem in konzentrierter Form als Schnaps, seltener als Wein eine große Rolle. Daneben werden für manche Fälle chronische Infektionskrankheiten, insbesondere die Tuberkulose, Lues sowie Malaria als Ursache angeschuldigt.

**Pathologische Anatomie:** Die Leber ist stark verkleinert (nur im allerersten Stadium kann sie vergrößert sein), von höckeriger Oberfläche und hellgelber oder gelbbrauner Farbe. Die Konsistenz ist stark vermehrt, das Messer knirscht beim Schneiden des Organs. Mikroskopisch findet sich ausgedehnte Wucherung von schrumpfendem Bindegewebe, das sich nicht auf die periportalnen Bezirke beschränkt, sondern auch in das Innere der Leberläppchen eindringt und dadurch den normalen lobulären Aufbau des Organs verwischt. Die hiermit einhergehende Schädigung der Leberzellen kommt dabei als braune Atrophie, Verfettung derselben usw. zur Geltung. Daneben bestehen meist auch Regenerationserscheinungen unter dem Bilde der Gallengangwucherung; auch findet man häufig vollständig neugebildete auffallend große Lobuli, z. T. mit atypisch liegender Zentralvene. Im übrigen besteht Stauungskatarrh am Magendarmkanal sowie Vergrößerung der Milz, deren histologisches Bild aber von dem der gewöhnlichen Stauungsmilz abweicht.

**Krankheitsbild:** Die atrophische Lebercirrhose befällt hauptsächlich Männer im Alter zwischen 40 und 60 Jahren, vor allem Potatoren. Die ersten Anfänge des Leidens sind oft völlig uncharakteristisch und bestehen in allgemeinem dyspeptischen Beschwerden wie bei chronischer Gastritis, Völlegefühl des Magens, Übelkeit, Appetitlosigkeit, die aber auch sonst bei Säufern häufig sind. Frühsymptome, die Verdacht

erwecken müssen und nicht selten die Krankheit einleiten, sind Blutbrechen, das auf Varicen der Speiseröhre zurückzuführen ist, sowie Hämorrhoidalblutungen, beides Folgen der durch das Leberleiden bewirkten Pfortaderstauung. Häufig hört man die Angabe der Kranken, daß ihnen die Zunahme des Leibesumfanges zuerst ihre Krankheit zum Bewußtsein gebracht habe. Der Leib ist aufgetrieben, der Nabel verstrichen und in der Regel ist bereits Ascites nachweisbar. In diesem Stadium ist es oft unmöglich, sich durch Palpation oder Perkussion über das Verhalten der Leber zu orientieren. Der Harn gibt frühzeitig eine in der Kälte stark positive Aldehydreaktion, die diagnostisch wichtig ist; nach längerem Stehen des Harnes wird auch die Schlesingersche Urobilinprobe stark positiv, während Bilirubin bei der Cirrhose nicht nachweisbar ist, wie auch eine stärkere ikterische Verfärbung der Haut nicht zum Krankheitsbilde gehört, wenn auch die Kranken häufig eine den Leberleiden allgemein eigentümliche fahlgelbliche schmutzige Hautfarbe zeigen. Die Galaktoseprobe (vgl. S. 361) kann positiv sein. Als weiteres charakteristisches Merkmal, das auf die Pfortaderstauung zurückzuführen ist, ist eine auffällige Erweiterung der Bauchdeckenvenen zu erwähnen, die gelegentlich sogar eine Art Kranz um den Nabel, ein sog. Caput medusae bilden. Entwickelt sich schließlich infolge des erschwerten Blutabflusses zu der unteren Hohlvene auch eine Anschwellung der Beine, so entsteht das überaus charakteristische Bild des Ödems der unteren Körperhälfte, das die Stellung der Diagnose meist auf den ersten Blick ermöglicht.

Entleert man den Ascites durch Punktion, so kann man die Leber meistens als verkleinertes, äußerst derbes, oft höckriges Organ unter dem Rippenbogen fühlen. Stets besteht auch eine deutliche Milzvergrößerung. Die Ascitesflüssigkeit ist klar, ihr spez. Gew. meist nicht über 1015. Mit Zunahme des Ascites (fortlaufende Messung des Bauchumfanges in Nabelhöhe!) nimmt der Harn an Menge ab und wird hochgestellt. Die Körpertemperatur ist nicht erhöht. Später entwickelt sich meist eine mäßige sekundäre Anämie.

Im weiteren Verlauf der Krankheit spielen teils die Stauungserscheinungen an den Abdominalorganen, teils die Zeichen der zunehmenden Herzinsuffizienz eine führende Rolle, wobei letztere nicht selten unvermittelt schnell in die Erscheinung treten und zu einer akuten Verschlimmerung des Zustandes führen. In zahlreichen anderen Fällen bewirken interkurrente Erkrankungen eine Beschleunigung des Endes, z. B. Pneumonien, vor allem ferner die Tuberkulose oft als Bauchfell-Tb., noch häufiger als Lungen-Tb. In einer kleinen Anzahl von Fällen entwickelt sich das Bild der auf Leberinsuffizienz beruhenden Hepatargie (vgl. S. 363) mit Konvulsionen und Koma, das in wenigen Tagen tödlich endet. Die durchschnittliche Krankheitsdauer beträgt etwa 1—3 Jahre.

Die Diagnose ist in den typischen Fällen mit dem charakteristischen Ödem der unteren Körperhälfte und dem anamnestisch zu erhebenden Potatorium nicht schwierig. Bei ausgebildetem Ascites ist allerdings zur Beurteilung des Zustandes von Leber und Milz der Ascites vorher abzulassen. Die starke Aldehydreaktion im Harn, das frühzeitige Auftreten von Stauungsblutungen im Magendarmkanal (ev. als okkultes Blut im Stuhl), aber auch Zeichen von hämorrhagischer Diathese

wie Petechien an den Unterschenkeln stützen die Diagnose. Schwierig kann die Abgrenzung gegenüber der Polyserositis (Zuckergußleber) sein, die allerdings häufiger im jüngeren Alter auftritt und durch die meist gleichzeitig vorhandene Pleuritis sowie die adhäsive Perikarditis und die frühzeitig einsetzenden Zirkulationsstörungen (Cyanose, Dyspnoe) sich zu erkennen gibt. Die entzündliche Beschaffenheit des Ascites (höheres spez. Gew.) spricht nicht ohne weiteres gegen Cirrhose, zumal sich zu letzterer nicht selten eine Peritoneal-Tb. hinzugesellt. An letztere muß man beim Bestehen von Fieber und dem Vorhandensein einer Tb. in anderen Organen denken. Der sichere Nachweis wird durch Verimpfung von Ascites auf Meerschweinchen erbracht. Ebenso wie bei der Bauchfell-Tb. ist es bei der ebenfalls differentialdiagnostisch in Betracht kommenden Peritonealcarcinose oft möglich, nach Entleerung des Ascites palpatorisch Tumoren festzustellen, die das Bild klären. In Frühstadien kann die Unterscheidung von Herzschwäche mit Stauungsleber unsicher sein, bei letzterer fehlt jedoch der Milztumor. Selten, aber unter Umständen recht schwierig abzugrenzen ist die Bantische Krankheit (s. S. 270), die sich ev. durch die Blutuntersuchung konstatieren läßt. Ähnliche Schwierigkeiten kann das Syndrom der chronischen Pfortaderthrombose bereiten, auf das man bei häufig auftretenden Hämorrhagien im Bereich der Pfortader fahnden muß (vgl. S. 379).]

In seltenen Fällen ist die Lebereirrhose mit der sog. Wilsonschen Krankheit (progressive Linsenkerndegeneration) kombiniert.

Therapie: Eine kausale Therapie kommt nur bei der auf Lues beruhenden Form der Erkrankung in Frage. Bei der Cirrhose der Potatoren ist das Leiden meist bei der ersten Untersuchung bereits so weit entwickelt, daß die Therapie nur mehr symptomatisch ist. Diätetisch kommt für alle Fälle abgesehen von strenger Alkoholabstinenz das Fernhalten von Gewürzen in Frage; sehr zweckmäßig ist eine längere Zeit durchgeführte lactovegetabile Diät, ev. für einige Zeit auch die Karellkur (4 mal tägl. je 200 ccm Milch, daneben höchstens einige Cakes) sowie sorgfältige Regelung der Darmtätigkeit (Kissingen, Karlsbad, Marienbad). Daneben ist besonders bei zu Fettsucht und Plethora neigenden Leuten körperliche Bewegung sowie Massage zu empfehlen. Bei stärkerer Stauung im Bereich des Magendarmkanals ist die Anwendung von Purgantien zu versuchen (z. B. Kalomel 3 mal 0,2 3 Tage lang; Cremor tartari 10,0—15,0 p. die, Karlsbader Salz usw.), wobei die Mittel öfters zu wechseln sind. Bei Ascites sind frühzeitige und wiederholte Entleerung sowie die S. 360 genannten Maßnahmen am Platze. Bei sehr rascher Neubildung der Bauchwassersucht hat man wiederholt die S. 360 beschriebene Talmasche Operation mit Erfolg angewendet. Herzschwäche und stärkerer Marasmus bilden eine Kontraindikation für die Operation. Bei Versagen des Zirkulationsapparat Cardiotonika.

Die **hypertrophische** oder **Hanotsche Cirrhose** ist ein sehr seltenes Leiden, das daher an dieser Stelle nur kurz genannt werden soll. Im Gegensatz zu der atrophischen Cirrhose bleibt hier die Leber dauernd vergrößert, auch ist regelmäßig stärkerer Ikterus vorhanden, wogegen Ascites fehlt. Der Milztumor pflegt größer als bei der atrophischen Form zu sein.

## Cholelithiasis und Cholecystitis.

Die Cholelithiasis, das Gallensteinleiden beruht auf der Bildung von Konkrementen in den Gallenwegen, speziell in der Gallenblase. Es ist eine recht häufige Krankheit, die namentlich das Alter jenseits des 40. Jahres bevorzugt und Frauen etwa 3—4 mal häufiger als Männer befällt.

Die Steine bestehen aus Bilirubinkalk und Cholesterin und sind meist geschichtet. In der Regel sind sie in Mehrzahl vorhanden und zeigen dann durch Abschleifung Fazettenbildung. Seltener sind reine Cholesterinsteine, die als Solitärsteine vor-

kommen und sich durch ihre Größe auszeichnen. Kleine sehr harte Konkremente, sog. Gallengriß, bestehen aus reinem Bilirubinkalk.

Da nach Sektionsstatistiken bei etwa jedem 10. Menschen Gallensteine gefunden werden, während eine wesentlich kleinere Zahl Menschen bei Lebzeiten Gallensteinbeschwerden zeigt und auf der andern Seite nach den Erfahrungen der Chirurgie Fälle mit typischen Gallensteinbeschwerden vorkommen, bei denen Steine vermißt werden, so dürfte neben der rein mechanischen Wirkung der Konkremente noch ein weiteres Moment eine Rolle bei der Pathogenese des Cholelithiasis spielen, das in den die Cholelithiasis meist begleitenden Entzündungsvorgängen beruht. Die Cholelithiasis ist daher klinisch mit der Cholezystitis eng verknüpft und zahlreiche Züge im Bilde der Gallensteinkrankheit sind in der Hauptsache durch das gleichzeitige Vorhandensein von Entzündungsvorgängen in den Gallenwegen zu erklären. Diese Erkenntnis ist vor allem auch praktisch-therapeutisch wichtig.

**Pathogenese und Ätiologie:** Es wird angenommen, daß Stauung des Gallenblaseninhalts allein zum Ausfallen von Konkrementen genügt. Derartige Steine pflegen aus reinem Cholesterin zu bestehen. Schwangerschaft, Behinderung des Gallenabflusses durch Schnüren usw., sitzende Lebensweise, Obstipation, aber auch wohl gewisse konstitutionelle Faktoren (gehäuftes Auftreten in manchen Familien, Kombination mit Fettsucht) sind dabei disponierende Momente. Die so entstandenen Steine können völlig symptomlos bleiben. Durch Hinzutreten eines Entzündungsprozesses entweder infolge von Hinaufwandern von Darmbakterien oder im Gefolge einer Infektionskrankheit (Angina, Typhus) kommt es, wie man annimmt, zu einer weiteren Zersetzung der Galle, aus der nun vor allem Kalk ausfällt, der zusammen mit Cholesterin und Gallenpigment einen wichtigen Bestandteil der meisten (entzündlichen) Gallensteine bildet. Sind einmal die Konkremente vorhanden, so scheint das weitere Schicksal des Gallensteinträgers meist von dem Verhalten der begleitenden Infektion und ihrer Folgezustände abzuhängen. Für die Auslösung des einzelnen Anfalles kommen als äußere Anlässe Diätfehler, ferner ein den Leib treffendes Trauma, starke Erschütterung des Körpers (z. B. Reiten), angeblich auch starke Gemütsregung in Frage.

**Krankheitsbild:** Im klinischen Bilde der Cholelithiasis hat man zu unterscheiden einmal den typischen akuten Gallensteinanfall, ferner die mit nicht so charakteristischen Symptomen und von vornherein mehr chronisch verlaufende Cholelithiasis, schließlich die im Anschluß an wiederholte Anfälle auftretenden Folgezustände bzw. Komplikationen. Der akute Anfall, die Gallensteinkolik, tritt mit einer gewissen Vorliebe nachts oder in den Abendstunden, häufig ohne die geringsten Vorboten in Form heftigster Schmerzen in der Lebergegend auf. Nicht selten schildern die Kranken die Kolik als Magenkrämpfe, oft wird gleichzeitig über heftigen Schmerz in der rechten Schulter bzw. dem rechten Arm (die aus dem gleichen Rückenmarkssegment innerviert werden wie die Leber) geklagt. Zugleich besteht meist eine erhebliche Störung des Allgemeinbefindens mit Übelkeit und Erbrechen, welches sehr heftig sein kann, ohne bezeichnenderweise dem Pat. Erleichterung zu schaffen. Sehr häufig ist die Temperatur etwas, bisweilen für kurze Zeit beträchtlich erhöht, auch kann der Anfall sogar durch einen Schüttelfrost eingeleitet werden. Der Puls ist klein, oft beschleunigt. Der Kranke macht einen recht schwer leidenden Eindruck. Die Dauer des Anfalles ist verschieden, sie schwankt zwischen weniger als einer Stunde und

mehreren Tagen. In einer großen Anzahl von Fällen kommt es im Gegensatz zu derartigen Kolikattacken nie zu einem typischen akuten schwereren Anfall. Die Krankheit verläuft vielmehr von vornherein unter geringeren subjektiven Beschwerden, ohne daß der Krankheitsprozeß selbst deshalb leichter zu sein braucht; es bestehen oft nur geringer Druck oder ziehende Schmerzen in der Lebergegend und leichte Magenbeschwerden.

Objektiv findet sich während des akuten Kolikanfalles regelmäßig eine deutliche, zum Teil recht heftige Druckempfindlichkeit der Lebergegend sowie bisweilen eine solche circumscrip't rechts hinten neben dem 10.—12. Brustwirbel. Auch findet man nicht selten eine hyperästhetische Hautzone im Bereich der Gallenblasengegend. Bei schwereren Anfällen besteht besonders bei energischer Palpation eine reflektorische Abwehrspannung der rechten Oberbauchgegend, oft mit Fehlen des rechten oberen Bauchdeckenreflexes. Perkutorisch ist die Leber oft etwas vergrößert. Bei zartester Palpation gelingt es in manchen Fällen die prall gefüllte Gallenblase als rundlichen birnförmigen Tumor zu fühlen; ferner kann der der Gallenblase benachbarte Teil der Leber von ersterer als sog. Riedelscher Lappen zungenförmig ausgezogen und als solcher durch die Perkussion nachweisbar sein. Ikterus ist bei einer keineswegs großen Zahl von Fällen vorhanden; er ist daher, was besonders zu betonen ist, durchaus keine obligate Begleiterscheinung.

Die Aldehydreaktion ist oft während des Anfalls positiv. Der Stuhl ist häufig während der Attacke angehalten, eine Entfärbung der Faeces ist in der Regel nicht vorhanden, sie wird nur dann beobachtet, wenn stärkerer Ikterus vorausgegangen ist. In diesem Falle lassen sich unter Umständen bei vorsichtigem Sieben des Stuhles Konkremeute in demselben finden. Mit der Röntgenphotographie lassen sich die Steine in der Regel nicht nachweisen.

Bei den mehr schleichend verlaufenden Fällen können die gleichen objektiven Erscheinungen vorhanden sein, meist zeigen sie indessen eine geringere Intensität, auch pflegt eins oder das andere Symptom zu fehlen. Eine sehr häufige Begleiterscheinung der Cholelithiasis ist Subacidität des Magens.

Der weitere Verlauf kann sehr verschieden sein. In einem großen Teil der Fälle wiederholen sich die geschilderten Anfälle in unregelmäßigen Abständen mit wechselnder Intensität, wobei unter dem Einfluß einer rationellen Behandlung nicht selten größere Pausen zwischen den Anfällen eintreten. In anderen Fällen kommt es nur selten oder überhaupt nicht zu ausgesprochenen akuten Attacken, dagegen sind die Kranken nie ganz beschwerdefrei, sondern klagen fortwährend über Unbehagen in der Oberbauchgegend mitunter ohne eigentliche Schmerzen, sowie über dyspeptische Beschwerden, auch tritt gelegentlich vorübergehend Ikterus auf. Nicht selten entwickelt sich aus diesem relativ harmlosen Zustand allmählich oder unvermittelt ein ernsteres Bild, das sich aus der Beteiligung entzündlich-infektiöser Vorgänge bei der Cholelithiasis erklärt.

Vereitert der Gallenblaseninhalte (Empyem der Gallenblase), so pflegt sehr starke Druckempfindlichkeit mit Tumorbildung der Gallenblase sowie höheres Fieber oft mit Schüttelfrost vorhanden zu sein, wobei

Ikterus fehlt. Selten ist die Perforation der vereiterten Gallenblase in die freie Bauchhöhle mit konsekutiver eitriger Peritonitis, häufiger bleibt es bei einer umschriebenen Bauchfellentzündung (Pericholecystitis), die dann oft zu Verwachsungen mit der Nachbarschaft und zwar speziell mit dem Pylorus resp. Duodenum oder dem Colon und dem Netz führt. Es entstehen dann im Laufe der Zeit die charakteristischen Adhäsionsbeschwerden seitens des Darmes, denen gegenüber allmählich das ursprüngliche Gallenblasenleiden oft völlig in den Hintergrund tritt, und die gelegentlich eines Tages sogar zum Ileus führen können. Bleibt die Eiterung auf die Gallenblase beschränkt, z. B. infolge eines den Cysticus verschließenden Steines, so kann die Entzündung allmählich zurückgehen und die eitrige Gallenblase sich schließlich in den harmlosen sterilen Hydrops umwandeln, der an dem Bestehen eines nicht schmerzhaften Gallenblasentumors ohne Ikterus und ohne Fieber zu erkennen ist. Wandern die Steine aus dem Cysticus in den Choledochus, so kann das sowohl mechanische wie infektiöse Folgezustände nach sich ziehen. Einmal kommt es dann, besonders bei größeren Steinen zur Behinderung des Gallenabflusses mit Ikterus, der wieder schwindet, wenn der Stein in den Darm entleert wird. Diese Entleerung erfolgt durch die Papilla Vateri oder bei größeren Steinen sehr häufig durch eine Choledochoduodenalfistel, wobei es gelegentlich auch einmal zu einem Stein-Ileus kommen kann. Wichtig ist dabei die Rolle der aus der freiwerdenden entzündeten Gallenblase herausgeschwemmten Bakterien bzw. derjenigen Keime, die aus dem Darm ascendieren und die Gallenwege infizieren. Es kommt dann unter Umständen zu einer Cholangitis (eitrigere Entzündung der Gallengänge), einer ernstesten Komplikation, deren charakteristisches Krankheitsbild in mehr oder weniger starkem Ikterus, erheblichem Fieber mit Schüttelfrösten und Lebervergrößerung besteht. Schreitet der Prozeß weiter, so kann durch das Hinzutreten einer Pylephlebitis oder häufiger von Leberabscessen in Kürze das Bild einer Sepsis mit tödlichem Ausgang entstehen.

Diagnose: Der akute Gallensteinanfall ist oft schon allein aus der Schilderung der Beschwerden der Kranken zu diagnostizieren. Schwieriger kann die richtige Deutung der weniger typischen Fälle sein. Hier wird oft ein Magendarmleiden, speziell ein Ulc. ventric. oder duodeni vorgetäuscht. Bei Kolikanfällen denke man auch an tabische Krisen. Bezüglich der Bedeutung des Ikterus ist daran festzuhalten, daß derselbe bei der Cholelithiasis solange fehlt, als die Krankheit auf die Gallenblase beschränkt bleibt. Sein Vorhandensein zeigt entweder den Eintritt eines Steines in den Choledochus an oder er bedeutet, wenn höheres Fieber mit Schüttelfrösten besteht, das Bestehen einer Cholangitis. Auch in den atypischen Fällen besteht außer den subjektiven Beschwerden und der Druckempfindlichkeit in der Gallenblasengegend oft eine der Palpation zugängliche vergrößerte Gallenblase als rundlicher unmittelbar an den unteren Leberrand sich anschließender Tumor, der oberflächlich, d. h. der Bauchwand dicht anliegt. Einen ähnlichen Palpationsbefund kann der Schnürlappen der Leber sowie gelegentlich die großknotige Leberlues liefern. Übrigens kann der im akuten Anfall nachweisbare Tumor auch wieder schwinden. Dauerndes Bestehen desselben findet man beim chronischen Hydrops der Gallenblase sowie beim chronischen Empyem, welches im Gegensatz zu ersterem abgesehen von einer oft mehr höckerigen Oberfläche sich meist durch große Schmerzhaftigkeit sowie das Vorhandensein von Fieber verrät. Ein ähnlicher Palpationsbefund wird bei Gallenblasencarcinom beobachtet, für das u. a. lange bestehender Ikterus ohne Fieber und ohne Schmerz bezeichnend ist. Auf der andern

Seite ist bei Schrumpfung der Gallenblase infolge von chronischer Cholecystitis selbst bei zahlreichen Steinen die Blase nicht zu fühlen. Bei gleichzeitig bestehendem Ikterus ist die Gallenblase bei Cholelithiasis im Gegensatz zu den Fällen von Ikterus infolge von Kompression der Gallenwege in der Regel nicht palpabel. Leichte Temperatursteigerung und einmaliger Schüttelfrost kommt auch bei der gewöhnlichen Gallensteinkolik vor. Höheres Fieber ohne Ikterus mit Vergrößerung der Gallenblase spricht für Empyem. Bei heftigen Schmerzen im linken Hypochondrium, speziell in der Milzgegend im Verein mit Ikterus muß man auch an hämolytischen Ikterus denken. Der Befund größerer Gallensteine in den Faeces (man hüte sich vor Verwechselung mit falschen Konkrementen) spricht für eine Fistel, und zwar bei vorausgehendem Ikterus für eine solche des Duodenums, bei Fehlen desselben für eine Gallenblasenkolonfistel. Bezüglich der Röntgenuntersuchung, die im Gegensatz zur Nephrolithiasis zum direkten Steinnachweis meist nicht zu verwenden ist, spricht eine deutliche Rechtsverziehung des Magens sowie die Fixierung des Pylorus für Adhäsionen, die oft durch Pericholecystitis verursacht sind. Differentialdiagnostisch kommt noch die Nephrolithiasis sowie die Appendicitis mit nach oben geschlagenem Appendix in Frage, letztere kann der Diagnose erhebliche Schwierigkeiten bereiten, abgesehen davon, daß bisweilen Appendicitis und Cholelithiasis gleichzeitig vorkommen. In seltenen Fällen beobachtet man übrigens bei der gewöhnlichen Lebercirrhose steinkolikartige Anfälle. Die Diagnose der Pankreasnekrose s. S. 380.

Therapie: Im akuten Anfall sind außer Bettruhe die Narkotica (20–30 Trpf. Tinct. opii mehrmals tägl.; 0,015–1,02 Morphium<sup>1)</sup> ev. mit  $\frac{1}{2}$ –1 mg Atropin subc., Belladonnasupp. 0,03) sowie die Anwendung von Wärme in Form von Katalpasmen und Trinken von heißem Kamillentee indiziert. Ganz schwere Anfälle können die Verabreichung von Analeptica (Campher, starker Kaffee) notwendig machen. Nach Aufhören der Kolik ist mit der regelmäßigen Applikation heißer Umschläge fortzufahren. Besondere Sorgfalt verdient die Regelung der Darmtätigkeit, ev. unter Anwendung milder Laxantien, am besten in der Form der Karlsbader Trinkkur. Wegen der oft bestehenden Subacidität ist oft Salzsäure (15 Trpf. in Wasser bei jeder Mahlzeit) von Vorteil. Der Erfolg der in großer Zahl angepriesenen, angeblich spezifisch wirkenden oder gar steinauflösenden Medikamente ist problematisch. Wirksam galletreibend ist die Verabreichung zahlreicher kleiner Mahlzeiten (etwa 5 pro Tag). Die Diät soll in leichten Speisen unter Vermeidung von Gewürzen, bei Ikterus auch von Fett, bestehen. Bei Adipösen ist die Fett- und überhaupt die Nahrungszufuhr einzuschränken, nicht dagegen bei Abgemagerten, bei denen der schlechte Ernährungszustand auf das Leiden ungünstig wirkt. Ebenso ist die Körperbewegung zu individualisieren. Stärkere Erschütterungen des Körpers, auch sportlicher Art, sind vom Übel. Jede Beengung des Leibes (Korsett usw.) ist sorgfältig zu vermeiden.

Ein chirurgischer Eingriff kommt für die gewöhnliche Cholelithiasis im allgemeinen nicht in Frage, dagegen ist eine absolute Indikation für die Operation das Empyem der Gallenblase sowie eine sichere Cholangitis, ferner ev. auch länger bestehender Ikterus ohne Fieber (Steineinklemmung im Choledochus) wobei man mit der durch die Cholämie bedingten hämorrhagischen Diathese zu rechnen hat. Eine relative Indikation bilden hartnäckig trotz interner Therapie wiederkehrende schwere Anfälle sowie Adhäsionsbeschwerden, wobei auch die soziale Lage des Pat. zu berücksichtigen ist.

## Neoplasmen der Leber und der Gallenwege.

Unter den Neoplasmen der Leber spielt der Häufigkeit nach in erster Linie das Carcinom eine wichtige Rolle. Während das primäre Leber-

<sup>1)</sup> Doch ist sein Gebrauch auf das eben notwendige Maß zu beschränken, da es eine hartnäckige, für die Cholelithiasis besonders ungünstige Obstipation hervorruft und überdies infolge des chronischen Charakters des Leidens nicht selten zu Morphinismus führt.



carcinom sehr selten ist, sind Krebsmetastasen in der Leber bei Carcinom anderer Organe überaus häufig. Oft tritt auch klinisch die Beteiligung der Leber hierbei in die Erscheinung. Am häufigsten führen Carcinome im Quellgebiet der Pfortader (Magen, Darm, Pankreas usw.) zu Lebermetastasen.

Sieht man von den kleinen, nur anatomisch nachweisbaren Metastasen ab, die sich der klinischen Wahrnehmung entziehen, so sind im allgemeinen zwei Formen von Leberkrebs zu unterscheiden, die häufige knotenförmige und die seltenere diffus-infiltrative Form. In beiden Fällen pflegt eine zum Teil sehr erhebliche Vergrößerung der Leber und, zwar in toto zu bestehen. Außerdem ist das Vorhandensein einzelner größerer Krebsknoten oft bei der Palpation in Form grober Höcker zu konstatieren, wobei besonders charakteristisch der Befund einer zentralen Delle an den einzelnen Knoten entsprechend dem sog. Krebsnabel ist. Bei dünnen fettarmen Bauchdecken kann man nicht selten die Lebertumoren als Prominenzen an der Bauchwand sich abheben sehen. Die Zugehörigkeit derartiger Geschwülste zur Leber erkennt man an der deutlichen Verschiebung derselben mit der Atmung.

Bezüglich der weiteren Symptome ist abgesehen von der allgemeinen Kachexie und Anämie sowie den etwa durch das Primärcarcinom bedingten Erscheinungen das häufige Auftreten von Ikterus sowie bisweilen auch von Ascites zu erwähnen. Der Ikterus kann sehr erhebliche Grade (Icterus melas) erreichen, mitunter kommt es infolge von vollständiger Kompression des Choledochus zu völliger Acholie der Stühle mit völligem Fehlen von Urobilin und Urobilinogen in den Faeces, sowie gelegentlich zum Bilde des Icterus gravis mit hämorrhagischer Diathese. Die Ascitesflüssigkeit zeigt meist die Eigenschaften eines Transsudates (vgl. S. 359). Bei hämorrhagischer oder chylöser Beschaffenheit ist an eine Aussaat des Ca. im Peritoneum zu denken. In manchen Fällen bestehen dumpfe Schmerzen in der Lebergegend, auch sind die Geschwulstknoten nicht selten druckempfindlich.

Die Milz ist bei Lebercarcinom in der Regel nicht vergrößert. Die Aldehydreaktion im Harn pflegt nur ausnahmsweise stark positiv zu sein. Die Galaktoseprobe fällt negativ aus. Fieber kann sich in vorgeschrittenen Stadien der Krankheit einstellen und deutet dann ev. auf eitrige Einschmelzung der Tumoren hin. Zu erwähnen ist noch die gelegentliche Entwicklung einer rechtsseitigen Pleuritis im weiteren Verlauf des Leidens, die auf Durchwanderung des Ca. durch das Zwerchfell beruht.

Das Carcinom der Gallenblase bzw. der großen Gallengänge tritt oft unter dem Bilde des primären Leberkrebs auf. Nicht selten sind, wie die Anamnese ergibt, längere Zeit Gallensteinbeschwerden vorausgegangen, da der Gallenblasenkrebs sich erfahrungsgemäß mit Vorliebe auf dem Boden der Cholelithiasis entwickelt. In diesen Fällen bildet oft der intensive dauernde Ikterus eines der ersten Symptome, wogegen Schmerzen zu fehlen pflegen. Die Gallenblase ist meist der Palpation nicht zugänglich, da sie klein und geschrumpft unter der Leber verdeckt

zu liegen pflegt. In anderen Fällen, namentlich bei Sitz des Ca. am Cysticus kann sich ein Hydrops der Gallenblase entwickeln.

Unter den selten vorkommenden **Sarkomen** der Leber ist das **Melanosarkom** hervorzuheben, das metastatisch nach Chorioidealsarkom des Auges sowie nach Pigmentsarkomen der Haut auftritt. Es bewirkt starke Vergrößerung der Leber. Der Harn enthält dabei entweder Melanin (ist dann dunkel gefärbt) oder ungefärbtes Melanogen; in diesem Fall bewirkt Zusatz von  $\text{FeCl}_3$  oder Bromwasser Schwarzfärbung. Die an dem Harn angestellte Acetonprobe mit Nitroprussidnatrium und KOH ergibt bei Zusatz von konzentrierter Essigsäure intensive Blaufärbung (Reaktion von Thor mälen).

Zu den Geschwülsten der Leber im weiteren Sinne ist auch der praktisch wichtige **Echinococcus** zu rechnen. Nach dem S. 238 Gesagten dringen die aus den Eiern sich entwickelnden Embryonen vom Darm u. a. in die Zweige der Pfortader ein, wobei dann zunächst die Lebercapillaren die erste Etappe bilden, in der die Embryonen festgehalten werden, weshalb die Leber von allen Organen am häufigsten an E. erkrankt.

Die klinischen Erscheinungen des Leberechinococcus hängen in der Hauptsache von der Größe desselben, nächst dem von der speziellen Lokalisation in der Leber selbst ab. Kleine Exemplare bleiben ev. dauernd symptomlos. Größere entwickeln in erster Linie mechanische Wirkungen. Auffallend ist, daß in der Anamnese oft Traumen genannt werden, die den ersten Symptomen des Leidens vorausgehen.

Soweit der E. der Palpation zugänglich ist, imponiert er meist als indolente, in der Regel glattwandige, teilweise prallelastische Geschwulst. In vereinzelten Fällen verursacht er bei Beklopfen sog. Hydatidenschwirren, d. h. ein eigentümliches Vibrationsgefühl in der aufgelegten Hand. Echinococcuscysten an der Leberkonvexität drängen dieselbe kuppelförmig mit dem Zwerchfell in die Höhe, wobei die untere Thoraxapertur sich erweitert. Die Interkostalräume sind nicht verstrichen. Der Zwerchfellhochstand kann dann ev. ein rechtsseitiges Pleuraexsudat vortäuschen, doch ist im Gegensatz zu diesem die Verschieblichkeit der unteren Lungengrenzen in der Regel nicht aufgehoben. Bei großen Tumoren pflegt auch die untere Lebergrenze nach unten zu rücken. Im Röntgenbild präsentiert sich der Echinococcus mitunter als kugelförmiges in den Thoraxraum reichendes Gebilde. Bei Sitz der Cyste an der Leberpforte kann sich Ikterus oder auch Ascites einstellen; bisweilen ist es nicht ganz leicht, in derartigen Fällen den Zusammenhang des Tumors mit der Leber zu konstatieren.

Das Allgemeinbefinden pflegt im Gegensatz zu den malignen Neoplasmen lange Zeit nicht wesentlich beeinträchtigt zu sein, falls nicht Komplikationen (s. u.) eintreten, insbesondere fehlt Kachexie sowie auch stärkere Anämie. Die Milz ist in der Regel nicht vergrößert. Im Blut besteht oft, aber keineswegs immer, eine diagnostisch verwertbare Eosinophilie. Auch lassen sich im Blutserum mittelst Komplementbindung die S. 239 genannten charakteristischen Antikörper nachweisen.

Probepunktionen soll man bei Verdacht auf E. wegen der bestehenden Intoxikationsgefahr (Kollaps, Urticaria) unterlassen. Wird sie trotzdem ausgeführt, so findet man eine wasserklare, eiweißfreie, aber kochsalzreiche Flüssigkeit, in der sich als diagnostisch wichtige Bestandteile die kleinen, von den Hakenkränzen stammenden Häkchen finden.

Häufige Komplikationen sind Vereiterung sowie Perforation des E. in die Nachbarschaft. Erstere ist an dem Eintritt von Schmerzen und Fieber sowie Schüttelfrösten, rapidem Kräfteverfall und stärkerer

Leukocytose sowie den speziellen Symptomen des Leberabscesses zu erkennen. Ein Durchbruch kommt in die verschiedensten der Leber benachbarten Organe, am häufigsten in die rechte Pleura resp. Lunge vor (vgl. S. 238).

Ein vom obigen völlig abweichendes Bild zeigt der sehr seltene, in Süddeutschland öfters vorkommende multiloculäre Leberechinococcus. Hier durchsetzt eine aus kleinen mit Gallerte gefüllten Hohlräumen bestehende derbe höckerige Geschwulst größere Teile der Leber, so daß ein an einen malignen Tumor erinnerndes Bild entsteht. Oft besteht Ikterus sowie eine Vergrößerung der Milz. Die Diagnose kann sehr schwierig sein.

Die Therapie der Lebertumoren ist, soweit es sich um die echten malignen Neoplasmen handelt, machtlos, zumal es sich zumeist, wie gesagt, um Metastasen handelt. Bei Carcinom der Gallenblase kann unter Umständen bei frühzeitiger Diagnose ein chirurgischer Eingriff Erfolg haben. Beim Echinococcus ist die operative Therapie unbedingt indiziert.

### Leberlues.

Die Leberlues verläuft als chronischer Entzündungsprozeß des interstitiellen Bindegewebes der Leber, der bei der hereditären Form einen gleichmäßig diffusen, bei der akquirierten hingegen einen ausgesprochen herdförmigen Charakter hat. Im ersteren Falle pflegt die Leber gleichmäßig befallen zu sein, während sie bei der erworbenen Form eine mehr oder weniger hochgradige Veränderung ihrer äußeren Gestalt zeigt, die anatomisch auf dem Vorhandensein von groben geschrumpften Bindegewebsmassen sowie von Gummen beruht, so daß eine knollige Beschaffenheit des Organs (*Hepar lobatum*) entsteht und es sogar teilweise zu einer Abschnürung größerer Teile der Leber kommen kann; ein Prädilektionsort für Gummen ist das Lig. falciforme und die Porta hepatis.

Die klinischen Erscheinungen der Leberlues der Erwachsenen decken sich zum großen Teil mit denen der gewöhnlichen Cirrhose, zumal beiden gemeinsam die Pfortaderstauung infolge der Bindegewebs-schrumpfung ist. Als Allgemeinerscheinungen beobachtet man auch hier die bei der Lebercirrhose erwähnten dyspeptischen Störungen, ferner frühzeitig mitunter Blutungen im Bereich des Verdauungskanals, während Ascites sich häufig erst bei weiterer Entwicklung des Leidens einstellt. Der objektive Befund an der Leber ergibt bisweilen ein vergrößertes Organ; vor allem aber charakteristisch ist die stark vermehrte Konsistenz der Leber und der Befund größerer Lappen- und Knollenbildung, wobei mitunter die Abschnürung eines Teiles des Organes so weit geht, daß bei der Palpation Zweifel an der Zugehörigkeit dieses Teiles zur Leber entstehen können. Die Milz ist oft vergrößert. Ikterus ist selten. Die Galaktoseprobe kann positiv sein.

Bezüglich des Krankheitsverlaufes ist hervorzuheben, daß im Gegensatz zum Carcinom eine eigentliche Kachexie sich nicht zu entwickeln pflegt. Beachtenswert ist ferner das in manchen Fällen auftretende Fieber, das mitunter intermittierenden Charakter zeigt und bisweilen von Schüttelfrösten begleitet ist. Es kommen auch Schmerz-

attacken ähnlich wie bei Cholelithiasis vor, die charakteristisch sind, namentlich wenn sie sich nachts steigern.

Beides, sowohl das Fieber wie die Schmerzen, schwinden prompt auf eine spezifische Behandlung. Für die Diagnose kommt neben den hier genannten Symptomen, deren jedes einzelne für sich jedoch vieldeutig ist, ausschlaggebend die Wassermannsche Reaktion in Betracht.

Die Therapie besteht in einer gründlichen antiluetischen Kur (Hg, Salvarsan, Jodkali). Nur ganz ausnahmsweise wird man in unklaren Fällen zu einer Laparotomie ev. mit Amputation eines abgeschnürten Leberknotens schreiten.

## Stauungsleber.

Stauungsleber beruht in der Hauptsache stets auf venöser Stauung, die sich bei erschwertem Abfluß des Lebervenenblutes in die V. cava inf. einstellt. Sie wird vor allem bei dekompensierten Herzklappenfehlern, insbesondere der Mitralis und Tricuspidalis, bei Myodegeneratio cordis, bei Zirkulationsstörungen im Bereich der Lunge, sowie anfallsweise bei paroxysmaler Tachycardie beobachtet.

Anatomisch zeigt die Stauungsleber bei kurzem Bestehen nur sehr großen Blutreichtum und dunkelblaurote Färbung sowie auf der Schnittfläche deutliches Hervortreten der stark erweiterten Zentralvenen als dunkelrote Flecke. Bei längerem Bestehen entwickelt sich das Bild der sog. Muskatnußleber mit sehr deutlicher Zeichnung der Leberläppchen, deren Peripherie braun oder hellgelb ist, während das Zentrum dunkelrot und oft etwas eingesunken erscheint. Später werden die Leberbälkchen in den zentralen Partien infolge des Druckes und der schlechten Ernährung atrophisch, die zugehörigen Capillaren erweitern sich, auch kommt es zu einer mäßigen Zunahme des interlobulären Bindegewebes hauptsächlich in der Nachbarschaft der Zentralvenen; das ganze Organ nimmt dabei vermehrte Konsistenz an (Stauungsinduration). Letztere pflegt besonders hochgradig bei den mit schwieriger Perikarditis einhergehenden Fällen von Stauungsleber zu sein, bei denen gleichzeitig auch der seröse Überzug der Leber eine starke fibröse Verdickung zeigt (sog. Zuckergußleber).

Die klinischen Symptome der Stauungsleber sind im wesentlichen Vergrößerung des Organs sowie ferner gewisse durch die Stauung bewirkte Funktionsstörungen. Die Volumenzunahme macht infolge der Dehnung der Leberkapsel subjektive Beschwerden wie Spannungs- und Völlegefühl in der Oberbauchgegend, bei akuter Entstehung sogar heftige Schmerzen, die oft in die rechte Schulter ausstrahlen, bisweilen an Gallensteinkoliken erinnern und entsprechend der auch physiologisch nach jeder Nahrungsaufnahme auftretenden Hyperämie der Leber Exazerbationen zeigen können. Objektiv stellt sich Vergrößerung des Organs ein, die recht beträchtlich sein kann und mit vermehrter Konsistenz einhergeht. Bezeichnend für die Lebervergrößerung infolge von Stauung ist der Wechsel derselben je nach dem Zustand des Zirkulationsapparates (diagnostisch wichtig ist daher die Verkleinerung auf Digitalis). Der untere Leberrand kann bis zu handbreit unter den Rippenbogen herabreichen. Bei Tricuspidalinsuffizienz ist oft der positive Venenpuls als deutliche Leberpulsation zu fühlen; selten pulsiert das Organ bei Aorteninsuffizienz. Die Milz ist nicht vergrößert. Häufig besteht geringer Ikterus oder wenigstens zeigen die Skleren leichte Gelbfärbung. Oft besteht ein aus mäßiger Cyanose und geringem Ikterus

gemischtes Hautkolorit, ein sog. Subikterus. Als Zeichen der gestörten Funktion ist das vermehrte Auftreten von Urobilin bzw. Urobilinogen im Harn zu betrachten. Eine positive Aldehydprobe geht häufig als erstes Symptom allen andern Zeichen von Leberstauung voraus. Mitunter ist bei Stauungsleber gleichzeitig Ascites vorhanden.

Prognostisch hat die Stauungsleber an sich keine Bedeutung, da ihr Verhalten lediglich durch dasjenige des Grundleidens bestimmt wird. Auch läßt ihr Vorhandensein über die Schwere des Falles im einzelnen keine Schlüsse zu, da sich die einzelnen Fälle hinsichtlich des Zeitpunktes ihres Auftretens wie bezüglich der Intensität der Beteiligung der Leber individuell sehr verschieden verhalten, indem Stauungsleber einmal ein Frühsymptom bildet, ein anderes Mal erst in fortgeschrittenen Stadien auftritt.

Die Therapie richtet sich gegen das Grundleiden, d. h. die Ursache der Stauung. Oft gelingt es durch Besserung einer Herzinsuffizienz auch die Stauungsleber wieder vollkommen zum Schwinden zu bringen. Zu vermeiden ist Alkohol sowie Obstipation.

Die **Amyloidleber** kommt stets nur als Teilerscheinung einer allgemeinen Amyloidose und zwar bei chronisch-kachektischen Zuständen, langdauernden Eiterungen besonders der Knochen, Tb., Bronchiektasen, Lues, Malaria vor. Anatomisch ist die Leber vergrößert, von vermehrter Konsistenz, brüchig und zeigt auf der Schnittfläche wachsartigen speckigen Glanz. Histologisch ist die Amyloidsubstanz in die Wand der Capillaren eingelagert. Klinisch ist die Amyloidose der Leber an ihrer Vergrößerung (sie kann bis zur Nabelhöhe reichen), der vermehrten Konsistenz und dem stumpfen unteren Rande des Organs zu erkennen. Die gleichzeitige Amyloiderkrankung anderer Organe (Milztumor, starke Albuminurie, profuse fetthaltige Diarrhöen) sowie der Nachweis der genannten ursächlichen Momente erleichtern die Diagnose. Ikterus und Ascites fehlen bei unkomplizierter Amyloidleber. Die unter ähnlichen Bedingungen (speziell bei Phthisikern) vorkommende **Fettleber** ist ebenfalls vergrößert sowie palpabel, aber von weicher Konsistenz.

Die sog. **Schnürleber** ist eine mitunter bei Weibern infolge starken Schnürens und zwar durch den Druck des Rippenbogens erfolgende partielle Atrophie des Lebergewebes. Sie besteht in einer horizontalen quer über die Oberfläche des rechten Leberlappens hinziehenden Rinne, innerhalb der das Leberparenchym zum Teil in Bindegewebe verwandelt ist. Der unterhalb derselben befindliche Abschnitt der Leber ist mitunter nur durch eine schmale Brücke mit dem oberen verbunden und bildet nicht selten einen zungenförmigen oder kolbig verdickten Lappen, der bei der Palpation das Vorhandensein eines Tumors vortäuschen kann (sog. Riedelscher Lappen). Nicht selten befindet sich unter dem Schnürlappen die Gallenblase.

**Lebersenkung** (Hepatoptose, fälschlich auch Wanderleber genannt) kommt nur selten, und zwar unter den gleichen Bedingungen wie die Enteroptose vor. Die untere Grenze des Organs reicht dabei weiter nach unten als normal, wobei aber auch die obere Grenze im Gegensatz zur Lebervergrößerung tiefer als in der Norm steht. Oft gelingt die manuelle Reposition, falls die Leber nicht durch Adhäsionen in ihrer pathologischen Lage fixiert ist. Die Diagnose wird sichergestellt durch die Röntgenuntersuchung, die das Tiefertreten des Organs erkennen läßt; an Stelle der Leber liegt dicht unter dem Zwerchfell das Kolon. Doch ist zu erwähnen, daß im Röntgenbild gelegentlich auch ohne Senkung der Leber vorübergehend gasgefüllte Kolonteile zwischen Zwerchfell und Leberkonvexität angetroffen werden. Die Beschwerden bestehen in Schulter- und Rückenschmerzen sowie Völlegefühl im Leib. Die Therapie ist die gleiche wie bei Enteroptose.

### Leberabsceß.

Circumscribte Eiterungen in der Leber kommen teils in Form solitärer, teils als multiple Abscesse vor. Stets handelt es sich um die Einschleppung

von Eitererregern aus einem anderen primären Krankheitsherd im Körper, und zwar dringen diese entweder auf dem Blutwege oder per continuitatem aus der Nachbarschaft in die Leber ein. Der erstere Modus kommt am häufigsten bei Eiterherden im Wurzelgebiet der Pfortader, namentlich bei Appendicitis vor; nächst dem spielen Eiterungen im Bereich des Dickdarms und Mastdarms sowie der Beckenorgane eine wichtige Rolle, wobei eine Thrombophlebitis der Pfortaderäste (Pylephlebitis vgl. nächste Seite) vorauszugehen pflegt. Zu den Darmkrankungen, die besonders zur Entwicklung von Leberabscessen neigen, ist vor allem die Ruhr zu rechnen, wobei aber bemerkenswerterweise ausschließlich die Amöbendysenterie in Frage kommt, während die bakterielle Ruhr so gut wie nie von der Leberkomplikation begleitet ist. Hieraus erklärt sich das häufige Vorkommen von Leberabscessen in den Tropen. Weiter führen nicht selten ulcerierte Rektumcarcinome sowie vergrößerte Hämorrhoiden, gelegentlich auch eine eitrige Parametritis zur Entstehung von Leberabscessen. Das gleiche beobachtet man gelegentlich nach Typhus.

Auf dem Wege der Arteria hepatica kann ebenfalls ein Transport von infektiösem Material, z. B. bei septischer Endokarditis, zu embolischen Abscessen in der Leber führen. Ferner kommt es mitunter im Gefolge von eiternden Kopfverletzungen bzw. Gehirnabscessen sowie nach fötider Bronchitis und Lungengangrän, und zwar, wie man annimmt, durch retrograden Transport zu Abscedierungen der Leber. Außer dem thrombophlebitischen bzw. embolischen Wege ist ferner als besonders häufiger Entstehungsmodus das Übergreifen von Eiterungen von der Gallenblase bzw. den Gallenwegen auf die Leber zu erwähnen. Eitrige Cholecystitis und Cholangitis bilden daher sehr oft den Ausgangspunkt für eine Hepatitis suppurativa. In seltenen Fällen bildet schließlich das Eindringen von Parasiten (Askariden) in die Gallengänge die Ursache von Leberabscessen.

Krankheitsbild: Kleine Abscesse machen häufig, auch wenn sie multipel sind, keine klinischen Erscheinungen, zumal wenn im übrigen schwere Krankheitserscheinungen (Sepsis, Cholangitis usw.) das Bild beherrschen. Größere Abscesse verursachen oft ein schmerzhaftes Spannungsgefühl oder Druck in der Lebergegend, mitunter auch Schmerzen in der rechten Schulter.

Objektiv verraten sie sich durch eine zum Teil sehr beträchtliche Volumenzunahme der Leber. Oft kommt es infolgedessen zu Zwerchfellhochstand mit Verminderung der respiratorischen Verschieblichkeit der Lungengrenze. Ebenso kann die Leber nach unten stark vergrößert sein. Bei großen Abscessen besteht mitunter Vorwölbung und Fluktuation, so z. B. bei den hauptsächlich im rechten Leberlappen lokalisierten tropischen Abscessen. Fast stets ist die Milz vergrößert. Ikterus ist nicht häufig. Im Harn ist Urobilin und Urobilinogen meist vermehrt.

Unter den Allgemeinerscheinungen ist abgesehen von der meist bereits durch die Grundkrankheit gegebenen schweren Störung des Allgemeinbefindens noch besonders das intermittierende, oft mit Schüttelfrösten einhergehende Fieber zu erwähnen, das indessen gelegentlich,

namentlich in späteren Stadien auch fehlen kann. Meist ist eine Leukocytose mit Verminderung oder Fehlen der Eosinophilen zu verzeichnen.

Nicht selten bricht ein Leberabsceß in die Nachbarschaft durch; so erklärt sich das Entstehen mancher subphrenischer Abscesse. Hier ist der am Röntgenschirm wahrnehmbare absolute Stillstand der entsprechenden Zwerchfellhälfte diagnostisch wichtig, der beim Leberabsceß allein nicht beobachtet wird. Relativ häufig ist ein Durchbruch in die Pleura mit konsekutivem Empyem. Hiermit ist nicht die gelegentlich zu beobachtende seröse Pleuritis zu verwechseln, die sich auch ohne subphrenischen Absceß an Hepatitis suppurativa anschließt. Im übrigen können die Abscesse gelegentlich in die verschiedensten der Leber benachbarten Organe durchbrechen.

Die Diagnose ist bei deutlichem Vorhandensein der beschriebenen Symptome, namentlich bei den großen Abscessen nicht besonders schwierig. In zahlreichen anderen Fällen versteckt sich der Befund hinter dem Bilde der Grundkrankheit. Sehr wichtig ist für die Erkennung der Erkrankung die Berücksichtigung der Erfahrung, daß nicht selten zwischen der primären Erkrankung, z. B. einer Appendicitis und dem Auftreten der Leberaffektion ein längeres Latenzstadium von mehreren Wochen liegen kann, weshalb auf eine genaue Anamnese großer Wert zu legen ist. Die Probepunktion, die man mit einer etwa 15 cm langen und dicken Kanüle von der Lumbalgegend aus vornimmt, fällt bei kleineren Abscessen häufig negativ aus.

Die Therapie des Leberabscesses ist eine ausschließlich chirurgische. Die multiplen Abscesse bei Pyämie usw. bilden kein Objekt für einen speziellen Eingriff. Bei Amöbenabscessen kommt die S. 48 genannte Emetinbehandlung in Frage.

### **Pylephlebitis suppurativa.**

Die eitrige Entzündung der Pfortader (Pylephlebitis) ist in der Regel auf infektiös-eitrige Prozesse im Quellgebiet bzw. in der Nachbarschaft der Pfortader und ihrer Äste zurückzuführen, indem es dabei entweder zu fortschreitender Thrombosierung oder zu embolischer Verschleppung von infiziertem Material kommt. In der Hauptsache kommen ätiologisch ulzeröse Prozesse am Darm, am häufigsten Appendicitis, außerdem Dysenterie, Magengeschwüre, Typhus, Darmtuberkulose, vereiterte Hämorrhoiden, verjauchte Neoplasmen, Eiterungen der Prostata sowie der weiblichen Genitalien, aber auch innerhalb der Leber selbst gelegene Eiterherde, wie Cholangitis purulenta sowie Leberabscesse, endlich bei Neugeborenen Infektion der Nabelwunde in Frage.

Das Krankheitsbild gestaltet sich je nach dem stets vorher vorhandenen primären Leiden verschieden. In der Regel entwickelt sich alsbald ein septischer bzw. pyämischer Zustand mit unregelmäßigem Fieber mit steilen Intermissionen, Schüttelfrösten, kleinem frequentem Puls, starken Schweißen und Prostration, starker Leukocytose. Meist wird über Schmerz im Epigastrium geklagt. Dazu treten oft die Symptome der Thrombose der Pfortader mit Milztumor sowie bei längerer Krankheitsdauer Entwicklung von Ascites. Bei Leberabsceß vergrößert sich das Organ. Auch wird mitunter Ikterus beobachtet. Häufig werden Diarrhöen beobachtet, die bisweilen bei völligem Verschuß der Pfortader

blutig sind. Gelegentlich schließt sich diffuse Peritonitis an das Leiden an. Differentialdiagnostisch ist die Krankheit nicht immer mit Sicherheit von eitriger Cholangitis sowie von Leberabsceß zu unterscheiden, da auch diesen Affektionen ähnliche lokale Befunde sowie ein pyämisches Gesamtbild zukommt. Die Dauer der Krankheit überschreitet selten 14 Tage. Der Ausgang ist stets letal, die Therapie rein palliativ.

### Verschluß und Thrombose der Pfortader.

Verschluß der Pfortader kann infolge von Kompression von außen durch Tumoren oder Narbengewebe erfolgen; Thrombosierung der Pfortader und ihrer Äste kommt im Verlauf verschiedener Leberkrankheiten, namentlich bei Lebercirrhose und Leberlues, ferner im Anschluß an Traumen vor.

Das Krankheitsbild kann sich akut oder chronisch entwickeln und ist durch die Symptome der Pfortaderstauung gekennzeichnet. Bei akute m Beginn beobachtet man blutige Stühle, bisweilen blutiges Erbrechen, ferner Vergrößerung der Milz sowie Ascites, der nach Entleerung durch Punktion sich schnell wieder zu bilden pflegt. Schmerzen fehlen, Ikterus kann vorhanden sein. Der akute Verschluß des Pfortaderstammes führt innerhalb weniger Tage zum Tode.

Bei der chronischen fortschreitenden Pfortaderthrombose bestehen die gleichen Symptome in milderer Form. Zum Teil decken sie sich hier vollkommen mit dem Bilde der Lebercirrhose, in anderen Fällen besteht das Syndrom der Bantischen Krankheit mit Anämie und Leukopenie (vgl. S. 270). Gelegentlich wird aber auch Vermehrung der Erythrocyten beobachtet. Remissionen können durch Kanalisierung der thrombosierten Venen sowie infolge von ausgiebiger Entwicklung von Collateralen eintreten. Die Dauer der Krankheit erstreckt sich oft auf viele Jahre. Die Diagnose läßt sich häufig nicht mit Sicherheit stellen bzw. nicht gegenüber Leberaffektionen mit ähnlichem Symptomenkomplex (Cirrhose etc.) abgrenzen. Die Therapie ist rein symptomatisch (Punktion des Ascites, Diuretica etc.).

### Erkrankungen des Pankreas.

Einleitung: Die Bauchspeicheldrüse liegt retroperitoneal in der Höhe des ersten Lendenwirbels und erstreckt sich in querer Richtung von der Milz bis zum Duodenum. Sie ist vom Magen bzw. Colon überlagert und verschiebt sich nicht bei der Atmung. Infolge ihrer Lage in der Tiefe des Abdomens ist sie für gewöhnlich der Palpation und Perkussion nicht zugänglich, abgesehen von den Fällen mit sehr beträchtlicher Vergrößerung durch Tumoren bzw. Cysten. Auch in diesen Fällen ist Voraussetzung für die Tastbarkeit des Organs geringes Fettpolster und vollst ändiger Erschlaffung der Bauchdecken. In der Regel muß sich die klinische Diagnostik auf die Prüfung der Funktion des Organs beschränken. Letztere ist eine zweifache und besteht in der Produktion eines äußeren Sekretes, des Pankreassaftes, und in der Funktion als Drüse mit innerer Sekretion. Die physiologische Bedeutung des Pankreassaftes, der an der Vaterschen Papille gemeinsam mit der Galle ins Duodenum fließt, ist S. 311 erörtert. Mitunter ist ein zweiter Ausführungsgang vorhanden (wichtig in Fällen, wo der eine verschlossen ist).

Zur Untersuchung des Pankreassaftes eignen sich verschiedene Methoden: Die Anwendung der Duodenalsonde, ferner ein sog. Ölfrühstück



nach Volhard, das den Rückfluß von Duodenalsaft in den Magen bezweckt (100 cem Olivenöl oder Sahne nüchtern, vorher eine Messerspitze Magnesia usta; Ausheberung des Magens nach einer halben Stunde, Untersuchung des Ausgehberten auf Trypsin). Als weitere Proben kommen in Betracht: der Trypsinnachweis im Stuhl nach E. Müller (das Stuhlfiltrat, mit Glycerin versetzt, wird auf Löfflerserumplatten ausgestrichen; Ausbleiben einer Dellenbildung nach 24 Stunden Bebrütung bei 50–60° beweist das Fehlen von Trypsin); ferner die Schmidtsche Kernprobe, die auf der normalen Auflösung von Zellkernen durch die Nuklease des Pankreassaftes beruht (gefärbte Zellkerne in Kapseln, Merck-Darmstadt, finden sich bei fehlendem Pankreassaft wieder im Stuhl); die Probe ist nicht ganz zuverlässig. In den Fällen, wo der Sekretzufluß der Bauchspeicheldrüse zum Darm vollkommen aufgehoben ist, treten augenfällige und diagnostisch bedeutsame Anomalien der Stuhlbeschaffenheit auf, die sich hauptsächlich auf die Fett- und Fleischverdauung beziehen (Schmidtsche Probekost! vgl. S. 313). Das Fett kann in großen Mengen mit dem Stuhl als flüssige, beim Abkühlen erstarrende Masse ausgeschieden werden, so daß es schon makroskopisch sich als solches erkennen läßt (sog. Butterstühle, Steatorrhöe); mikroskopisch findet sich in großen Mengen ungespaltenes Neutralfett in Tropfenform. Auch das Fleisch erscheint unverdaut in großen Massen im Stuhle wieder (Kreatorrhöe); mikroskopisch sind in großer Menge Muskelfasern mit gut erhaltener Querstreifung, scharfen Kanten und deutlichen Kernen nachweisbar. Dementsprechend ist der Stickstoffverlust durch den Kot beträchtlich (Azotorrhöe). Die Stühle pflegen bei Ausfall der Pankreasverdauung auffallend voluminös zu sein und haben oft einen saftigen Geruch.

Das innere Sekret des Pankreas, das mit der Funktion der Langerhansschen Inseln in Zusammenhang steht, spielt im Kohlehydratstoffwechsel eine wichtige Rolle, die durch die Tatsache beleuchtet wird, daß Ausrottung des Organs beim Tier schweren Diabetes erzeugt. Auch beim Menschen kommt im Verlauf ausgedehnter Erkrankung des Pankreas Zuckerausscheidung vor. Ein Parallelismus zwischen dem Verhalten der äußeren und inneren Sekretion besteht nicht.

Die häufigste Pankreaserkrankung ist das **Pankreascarcinom**, das teils primär entsteht und den Kopfteil der Drüse bevorzugt, teils durch Übergreifen eines Magen- oder Gallenblasencarcinoms zustande kommt. Die ersten Erscheinungen sind oft unbestimmter Art, wie Appetitmangel, Kräfteverfall und starke Abmagerung, Schmerzen in der Oberbauchgegend und namentlich im Rücken. Eine Geschwulst ist oft lange Zeit oder überhaupt nicht zu fühlen. In anderen Fällen ist der Befund von einem Magentumor schwer zu unterscheiden. Doch hat die Untersuchung des Magens selbst (Chemismus, Röntgen) ein normales Ergebnis. Vorhandensein von Ikterus durch Kompression des Choledochus durch den Tumor kann ein Gallenblasencarcinom vortäuschen. In manchen Fällen besteht Ascites. Mitunter kommt Glycosurie vor, die bei dem geschilderten Syndrom eine wichtige Handhabe zur Erkennung der Pankreasaffektion bietet; das gleiche gilt, wenn die übrigen oben beschriebenen Ausfallerscheinungen, insbesondere der charakteristische Stuhlbefund vorhanden sind, die aber nur in einem kleinen Teil der Fälle nachweisbar sind. Die Prognose ist infaust. Die Dauer des Leidens beträgt selten mehr als ein Jahr. Wegen der häufigen Unsicherheit der Diagnose empfiehlt sich frühzeitige Probeparotomie. Die operative Behandlung hat nur in den ersten Stadien und auch dann meistens nur geringe Aussicht auf Erfolg.

Eine praktisch wichtige Erkrankung ist ferner die **akute hämorrhagische Pankreatitis**, die Entzündung des Pankreas, die bei älteren Indivi-

duen zwischen dem 40.—60. Jahre, insbesondere bei Potatoren und Fettleibigen, sowie bei an Gallenstein Leidenden, gelegentlich auch nach Traumen beobachtet wird. Die Entzündung geht mit ausgedehnten Nekrosen und Hämorrhagien einher und ist oft von multiplen kleinen Nekrosen im Fettgewebe des Omentum und Mesenterium begleitet. Die Entstehung des Leidens wird durch Stagnation und Infektion des Sekretes im Pankreasgang erklärt, die eine Aktivierung der Fermente zur Folge haben, wodurch eine Selbstverdauung des Organes erfolgt. Das Krankheitsbild setzt meist akut, oft tödroyant unter schwersten Erscheinungen ein, die oft an das Bild einer Perforationsperitonitis erinnern: Erbrechen, verfallenes Aussehen, Collapserscheinungen, hochgradige Schmerzhaftigkeit und Abwehrspannung in der Oberbauchgegend; die Schmerzen strahlen oft in den Rücken aus. Bei stärkeren Blutungen kann sich alsbald eine starke Anämie entwickeln. Die Leberdämpfung bleibt zum Unterschiede von Peritonitis erhalten, ebenso gehen anfangs noch Stuhl und Flatus ab. Glycosurie, die aber nur in einem Teil der Fälle auftritt, bildet auch hier einen wichtigen diagnostischen Hinweis. Häufig ist Ikterus infolge der zugleich bestehenden Erkrankung der Gallenwege vorhanden. Bei längerer Krankheitsdauer können sich größere Abscesse entwickeln. Auch beobachtet man linksseitige Pleuritis. In ungefähr der Hälfte der Fälle erfolgt der Tod nach wenigen Tagen, bisweilen schon nach Stunden, infolge von Peritonitis bzw. Shok. Die einzig aussichtsreiche Therapie besteht in sofortiger Operation.

Die **chronische indurierende Pankreatitis** (Cirrhose des Pankreas) besteht in einer mit Parenchymatrophie einhergehenden Bindegewebswucherung mit Schrumpfung des Organes. Ursachen sind Alkoholismus, Arteriosklerose sowie Lues, ferner auch Sekretstauung infolge von Pankreassteinen. Auch beim Diabetes findet sich oft Induration des Pankreas. Häufig bestehen keine sicheren klinischen Symptome, so daß die Affektion erst bei der Autopsie festgestellt wird. In anderen Fällen sind deutliche Funktionsstörungen in Form von Steatorrhöe bzw. Kreatorrhoe (s. oben), mitunter von diarrhöischen, meist stark stinkenden Entleerungen vorhanden. Der Ernährungszustand leidet hochgradig infolge der mangelhaften Nahrungsausnützung. Auch Glycosurie kommt vor. In Fällen mit unbestimmten Beschwerden in der Oberbauchgegend, zunehmender Abmagerung und Kräfteverfall soll man daher niemals die Funktionsprüfung des Pankreas versäumen. In vereinzelten Fällen mit schlaffen Bauchdecken und geringem Fettpolster gelingt es, das verhärtete Organ zu palpieren. Therapie: In den Fällen mit deutlicher Funktionsstörung möglichst fettarme Diät; oft haben Pankreaspräparate besonders in Kombination mit Alkalien einen ausgezeichneten Erfolg, z. B. als Pankreon oder Pankreatin (Rhenania) und zwar  $\bar{a}\bar{a}$  mit Calc. carbon. dreimal täglich je 3,0.

Circumscribte chronische Indurationen des Pankreas kommen als Folge aus der Nachbarschaft übergreifender Entzündungsprozesse vor, insbesondere im Anschluß an Gallenblasenleiden sowie bei Ulcus duodeni; sie befallen hauptsächlich den Kopfteil der Drüse, der mitunter tumorartig anschwillt. Durch

Druck kann er Ikterus erzeugen und ist bisweilen als derbe Geschwulst in der Pylorusgegend fühlbar, ohne indessen sich ohne weiteres von andersartigen Tumoren dieser Region unterscheiden zu lassen. Vielfach wird das Leiden erst bei der Operation entdeckt bzw. seiner wahren Natur nach erkannt.

**Funktionsstörungen des Pankreas** im Sinne einer verminderten Produktion eines wirksamen Verdauungssekretes (*Achylia pancreatica*) beobachtet man bisweilen kombiniert mit *Achylia gastrica*, unter anderem im Verlauf der perniziösen Anämie. Hartnäckige Diarrhöen sowie mangelhafte Fleischverdauung bilden ein verdächtiges Symptom (Schmidtsche Probekost sowie Duodenalsonde!). Doch ist in diesen Fällen nicht immer mit Sicherheit der Zusammenhang der Verdauungsstörungen mit der Achylie des Magens im Sinne der gastrogenen Diarrhöen auszuschließen. Andererseits ist die Pankreasachylie keine obligate Folge der Magenachylie. Einen Wahrscheinlichkeitsbeweis für das Vorliegen einer Pankreasfunktionsstörung liefert die häufig prompte therapeutische Wirkung des Pankreons (s. oben).

**Pankreaszysten** entstehen teils durch Sekretstauung infolge von Konkrementen, Narben oder Neubildungen, teils durch Entwicklung cystischer Geschwülste. Sie bilden häufig größere rundliche Tumoren, die als solche dicht unter der Bauchwand fühlbar sind und meist zwischen Magen und Colon zum Vorschein kommen. Mit der Atmung sind sie in der Regel nicht verschieblich; bisweilen zeigen sie Schwankungen ihrer Größe. Viel seltener liegen sie unterhalb des Colons. Größere Cysten verursachen lästiges Druckgefühl, manchmal auch Koliken; auch können sie durch Druck auf die Nachbarschaft Störungen wie Ikterus etc. verursachen. Bisweilen machen sich auch hier die oben beschriebenen Funktionsstörungen bemerkbar. Die Diagnose hat hauptsächlich die Zugehörigkeit der Cyste, die als solche meist leicht infolge der Fluktuation erkennbar ist, zum Pankreas festzustellen (Röntgenuntersuchung, Luftaufblasung des Colons, Palpation vor dem Schirm). Die Punktion der Cyste zum Nachweis der charakteristischen Pankreasfermente ist nicht ratsam, da sie nicht ungefährlich ist. Therapie: Operation.

Anhangsweise sei bezüglich der Behandlung von **Pankreasfisteln** bemerkt, daß (abgesehen von den entsprechenden chirurgischen Maßnahmen) vor allem Einschränkung der Sekretion und zwar durch reine Eiweißfettdiät und durch Verminderung der gesamten Nahrungsmenge anzustreben ist; ferner reichliche Gaben von Alkalien (Natron bic., Magnes. usta).

**Konkremente** in den Ausführungsgängen des Pankreas sind nicht häufig. Sie bestehen aus Calciumcarbonat und -phosphat. Ihre Ätiologie ist nicht völlig geklärt doch dürfte sie wie bei der Cholelithiasis im Zusammenhang mit Sekretstauung stehen. Bisweilen bleiben die Steine latent, in anderen Fällen machen sie Beschwerden, bestehend in Koliken, die mitunter von Gallensteinkoliken nicht zu unterscheiden sind, in einzelnen Fällen aber mehr links als diese lokalisiert werden. Erleichtert wird die Diagnose, wenn gleichzeitig Glycosurie sowie die beschriebenen Pankreasstühle vorhanden sind, was aber inkonstant ist; letzteres gilt auch von dem Befund der Röntgenuntersuchung. Der Nachweis mit den Fäces abgehender Konkremeinte gelingt nur sehr selten. Eine Folge der Steinbildung ist eventuell chronische Induration des Organes mit Atrophie, in anderen Fällen Absceßbildung oder die Entwicklung einer Cyste (s. oben). Die Therapie ist rein symptomatisch; man kann versuchen, durch gewürzreiche Kost bzw. Pilocarpin (zweimal täglich 0,01

sukutan) auf dem Wege vermehrter Saftsekretion die Austreibung der Steine herbeizuführen. Abscedierung erfordert chirurgische Hilfe.

## Erkrankungen des Harnapparates.

Die Nieren liegen zu beiden Seiten der Wirbelsäule zwischen dem 12. Brust- und 3. Lendenwirbel und zwar retroperitoneal; sie werden von der 12. Rippe ungefähr halbiert. Ihr Abstand von der Wirbelsäule beträgt etwa 4–5 cm. Sie sind von einer Hülle von Fettgewebe, der Nierenfettkapsel, umgeben. Diese ist vorn und hinten von einer derben Fascie begrenzt. Die beiden Blätter derselben nähern sich einander unterhalb der Niere und begrenzen den sog. Fettpfropf der Niere, der dieser als Stütze dient. Die rechte Niere grenzt oben an die Leber, medial an das Duodenum, die linke oben an die Milz. Vor den Nieren liegt das Colon ascendens bzw. descendens. Bei bimanueller Palpation in Rücken- oder Seitenlage, bei der man mit der einen Hand das Organ vom Rücken her entgegendrückt und mit der anderen bei völlig erschlafften Bauchdecken dicht unter dem Rippenbogen von vorn palpiert, gelingt es normal nur in einem Teil der Fälle die Niere (das untere Drittel) zwischen die Hände zu bekommen. Bei tiefer Einatmung zeigt sie geringe Abwärtsbewegung. Perkutorisch ist die Niere am Rücken mitunter bei mageren Individuen mit dünner Muskulatur sowie bei leerem Colon abgrenzbar. Sie gibt gedämpften Schall. Die Perkussion erhält größere Bedeutung bei pathologischer Vergrößerung der Niere sowie beim Fehlen einer Niere, z. B. nach Exstirpation derselben.

Die **physiologische Funktion der Niere** beruht in ihrer Eigenschaft als exkretorisches Organ; sie besteht in der Ausscheidung aller im Körper vorhandenen „harnfähigen“ Stoffe, insbesondere von Wasser, Salzen und den Endprodukten des Eiweißstoffwechsels. Dieselben werden den Nieren durch das Blut zugeführt<sup>1)</sup> und es läßt sich als die wesentliche Aufgabe der Nieren definieren, darüber zu wachen, daß die Konstanz der physikalisch-chemischen Zusammensetzung des Blutserums gewährleistet und letzteres insbesondere gegen eine schädliche Anreicherung mit den genannten Körpern geschützt wird. Dies ist nur durch das außerordentlich große funktionelle Anpassungsvermögen der Niere schon gegenüber geringfügigen Änderungen der Blutzusammensetzung möglich. Es ist hinzuzufügen, daß zwar ein Teil der harnfähigen Stoffe, wie insbesondere das Wasser, auch auf anderem Wege den Körper zu verlassen vermag (Haut, Lungen, Darm), daß aber für die übrigen Harnbestandteile, vor allem für die Schlacken des Eiweißstoffwechsels die extrarenale Ausscheidung nicht in Betracht kommt. Dabei ist zu bemerken, daß nach Erfahrungen der Chirurgie der Mensch auch mit einer (gesunden!) Niere alle harnfähigen Stoffe auszuscheiden vermag. Der Sitz der spezifischen Funktion der Niere ist die Nierenrinde.

Die Niere ist eines der gefäßreichsten Organe; sie wird daher mit sehr großen Blutmengen versorgt; dies wird durch die Tatsache erklärt, daß sie einen besonders großen O<sub>2</sub>-Verbrauch aufweist. Die Zweige der in den Nierenhilus eintretenden Art. renal. bilden die an der Grenze zwischen Rinde und Mark laufenden bogenförmigen Art. arciform. Von diesen steigen die Art. rectae und interlobular. in der Rinde empor und geben dabei zahlreiche kleine Äste, die sog. Vasa afferentia ab, die ihrerseits in Capillarnäuel, die sog. Glomeruli, münden und die Blutversorgung der Malpighischen Körperchen bewirken. Die von diesen abführenden Vasa afferentia, die ein kleineres Kaliber als erstere haben, splittern sich in ein die Harnkanälchen umgebendes Capillarnetz auf und münden schließlich in die Venen. Das der Harnbereitung dienende Kanalsystem beginnt mit den Malpighischen Körperchen. Diese bilden eine doppelwandige Kapsel, in die die Capillarnäuel eingestülpt sind. Die äußere Wand der Kapsel ist die sog. Bowmansche

<sup>1)</sup> Eine Ausnahme bildet allein die Hippursäure, die in der Niere selbst durch Synthese von Benzoesäure und Glykokoll entsteht.

Kapsel. Das innere eingestülpte Blatt der Kapsel besteht aus einer kernreichen dünnen Epithelschicht, die die Knäuelschlingen einhüllt, so daß diese nicht frei im Kapselraum liegen. Für die sekretorische Funktion der Glomeruli, speziell die Wasserausscheidung dürfte die Epithelschicht des inneren Blattes von großer Bedeutung sein. An die Malpighischen Körperchen schließen sich die Tubuli contorti I. Ordnung, die sogen. Hauptstücke an; sie sind an ihrem hohen Epithel, dem Stäbchensaum und Bürstenbesatz sowie den oft im Protoplasma vorhandenen Vakuolen kenntlich. Sie gehen in die Henleschen Schleifen über, deren absteigender schmaler Schenkel flaches Epithel zeigt, während der aufsteigende Schenkel mit hohem Epithel dem Bau der gewundenen Harnkanälchen ähnelt. Sie münden ihrerseits in die kürzeren Tub. contorti II. Ordnung, die sog. Schaltstücke. Diese gehen in die zum Mark führenden Sammelröhren über. Durch Vereinigung mehrerer Sammelröhren entstehen die Hauptröhren, die an der Spitze der Nierenpapillen ins Nierenbecken münden. Henlesche Schleifen, Sammelröhren und Hauptröhren liegen in der Marksubstanz der Niere. Die Wasserausscheidung, die normal zum großen Teil durch die Glomeruli erfolgen dürfte, wird zweifellos daneben auch von den Harnkanälchen besorgt, da in Fällen mit ausgedehnter Verödung der Glomeruli die Wasserausscheidung nicht herabgesetzt, häufig sogar gesteigert ist. Im übrigen dürfte der Hauptanteil an der exkretorischen Funktion der Nieren den Harnkanälchen zufallen, und zwar bis zu dem Abschnitt, wo dieselben in die Sammelröhren übergehen.

Die Nierenfunktion steht unter dem Einfluß einer großen Zahl verschiedener Faktoren. Abgesehen von der Zusammensetzung des Blutes spielt die Menge und die Geschwindigkeit des das Organ durchströmenden Blutes eine bedeutsame Rolle; Verengung der Nierengefäße, Sinken des Blutdruckes sowie venöse Stauung haben Verminderung der Harnmenge zur Folge. Ferner übt auch das Nervensystem einen wichtigen Einfluß auf die Nierenfunktion aus. Im Tierversuch hat die Verletzung des Bodens des IV. Ventrikels vermehrte Salzausscheidung zur Folge (sog. Salzstich); mechanische Reizung der Ureteren oder des Nierenbeckens bewirkt Polyurie, umgekehrt kann von denselben Orten aus, z. B. durch einen Harnstein, ferner auch vom Peritoneum aus reflektorisch Anurie zustande kommen. Bei psychischer Erregung, ferner bei Migräne etc. beobachtet man oft Polyurie. Wichtige nervös-reflektorische Beziehungen bestehen auch zwischen Haut und Niere: Die eine Hyperämie der Haut bewirkenden Momente haben eine sekretionsanregende Wirkung auf die Niere und umgekehrt. Hierbei spielen außer den sekretorischen die vasomotorischen Nerven eine Rolle. Weiter kennt man chemische Reize, die spezifisch anregend auf die sekretorische Tätigkeit der Nierenzellen wirken. Derartige diuretische Wirkungen sind u. a. von den Purinkörpern bekannt, die aus diesem Grunde eine wichtige therapeutische Anwendung gefunden haben. Auch den Hormonen der Drüsen mit innerer Sekretion dürfte für die Harnausscheidung eine nicht unwichtige Bedeutung zukommen: Hypophysenextrakt vermindert die Menge und erhöht die Salzkonzentration des Harns, Schilddrüsenpräparate vermögen unter Umständen die Wasserausscheidung zu steigern.

Bei der Feststellung dieser mannigfachen physiologischen Effekte muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß das, was man als Harnsekretion am Krankbett konstatiert, im Grunde die Resultante verschiedener Vorgänge darstellt, von denen sich nur ein, wenn auch großer Teil in der Niere selbst abspielt, während daneben das Verhalten der übrigen Gewebe des Körpers mitbestimmend für die Harnsekretion ist. Hierbei spielt vor allem der Zustand der Capillaren eine wichtige Rolle. Derartige extrarenale Faktoren sind insbesondere für die Retention von Wasser und Salzen bzw. ihre Mobilisierung im Körper von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Werden z. B. die Capillarwände des übrigen Körpers für harnfähige Substanzen abnorm durchlässig und strömen letztere dadurch in vermehrtem Maße in die Gewebe ab, so werden die Nieren infolge verminderten Angebotes dieser Stoffe seitens des Blutes sie auch in geringerem Maße ausscheiden. Auf der anderen Seite läßt sich teilweise eine gewisse funktionelle Zusammengehörigkeit der renalen und extrarenalen Faktoren annehmen, die sich z. B. aus der gleichsinnigen Beeinflussung durch manche pharmakodynamische

Agentien ergibt. So erstreckt sich z. B. die Purinkörperdiurese mitunter auch auf extrarenale bedingte Ödeme.

Die klinisch wichtigste Frage bei der Untersuchung der Nieren ist diejenige ihrer Funktionstüchtigkeit. Dazu gehört die Kenntnis der normalen Arbeitsweise der Niere. Erfolgt durch Konzentrationszunahme eines Stoffes, z. B. von NaCl im Blut ein vermehrtes Angebot dieser Substanz an die Niere, so scheidet sie diese alsbald in Form wässriger Lösung aus, und zwar normal nicht in dem Verdünnungsverhältnis, wie sie im Blut vorhanden ist, sondern wesentlich konzentrierter. In derselben Weise werden auch die übrigen harnfähigen Substanzen wie Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, Indikan, die verschiedenen Salze (Phosphate, Sulfate, Carbonate usw.) ausgeschieden, ein Beweis dafür, daß die Tätigkeit der Niere nicht in einfacher Filtration des Bluteserums besteht, sondern daß die Nieren bei der Harnabsonderung Konzentrationsarbeit leisten. Diese Tatsache kommt u. a. auch zahlenmäßig aus dem Vergleich des Gefrierpunktes von Serum und Harn zum Ausdruck, dessen Größe abhängig ist von der Menge der gelösten kristalloiden Stoffe. Derselbe beträgt im Serum normal nie mehr als  $-0,55$  bis  $-0,57^{\circ}$ , während er im Harn  $-2,5^{\circ}$  erreicht. Die Konzentrierung des Harns, deren prägnantester Ausdruck sein spezifisches Gewicht ist (normal zwischen 1015 bis 1030, pathologisch zwischen 1001 bis 1050), kann von der Niere nur bis zu einer gewissen Grenze gesteigert werden. Bei weiterem Angebot harnfähiger Substanz muß vom Organismus der Niere Wasser als Lösungsmittel zur Verfügung gestellt werden, damit die Ausscheidung erfolgen kann, andernfalls kommt es zu schädlicher Anhäufung von Salzen und Stoffwechselschlacken im Körper. Die von der Niere geleistete Arbeit kommt übrigens nicht allein durch den Konzentrationsunterschied von Harn und Serum zum Ausdruck; denn auch in den Fällen, in denen der Harn den gleichen osmotischen Druck wie das Serum zeigt (isotonisch ist), ist dennoch die Konzentration der einzelnen Harnbestandteile von der des Serums verschieden. Aber auch unter den der Konzentrationsarbeit entgegengesetzten Verhältnissen, d. h. bei erhöhtem Angebot von Wasser seitens der Gewebe, leistet die normale Niere Arbeit, die in diesem Fall in ihrem Verdünnungsvermögen zur Geltung kommt.

**Funktionsprüfung:** Das Konzentrations- und das Verdünnungsvermögen der Nieren bietet einen bequemen und sicheren Weg, sich über die Funktion der Niere ein Urteil zu bilden, der vor allem den Vorzug hat, physiologische Vorgänge zum Gegenstande der Prüfung zu machen. Konzentrationsversuch: Man gibt dem Patienten für 24 Stunden Trockenkost und bestimmt das spezifische Gewicht des Harns der zweistündlich gelassenen Harnportionen. Zahlen von mindestens 1025 aufwärts zeigen gute Konzentrationsfähigkeit an. Vorbedingung ist, daß der Kranke frei von Ödemen ist und auch sonst nicht Wasser retiniert. Unter pathologischen Verhältnissen erweist sich die Niere als unfähig, einen konzentrierten Harn zu liefern, das spezifische Gewicht bleibt auch trotz Durstens niedrig. Man bezeichnet dies als Hypostenurie, Verdünnungsversuch (Wasserversuch): Der Patient trinkt morgens nüchtern im Bett nach Entleerung der Blase  $1\frac{1}{2}$  Liter Wasser oder ganz dünnen Tee und läßt alle halbe Stunden Harn. Von den einzelnen Portionen wird Menge und spezifisches Gewicht bestimmt; der Gesunde scheidet die ganze Wassermenge innerhalb der nächsten vier Stunden unter Absinken des spezifischen Gewichtes auf 1002 bis 1001 aus, indem in der Regel die Hauptmenge bereits in den ersten zwei Stunden erscheint (spitzgipflige Kurve), während in pathologischen Fällen die Ausscheidung verschleppt oder überhaupt nicht erfolgt oder bei ganz geringer Störung in Form einer stumpfgipfligen Kurve geschieht. Besonders charakteristisch für die normale Niere ist das rasche Sinken des spezifischen Gewichtes in den ersten Harnportionen. Auf das Verhalten des letzteren ist mehr Wert als auf den quantitativen Ausfall der Probe zu legen. Sinken des spez. Gew. unter 1005 spricht für ein normales Verhalten. Exakte Bestimmung des Körpergewichtes vor und nach dem Wasserversuch bildet eine Kontrolle der Resultate. Fälle mit Hypostenurie können sich beim Wasserversuch normal verhalten. In Fällen schwerer Niereninsuffizienz zeigt der Harn sowohl beim Dursten wie nach Wasserzufuhr stets annähernd das gleiche niedere spezifische Gewicht etwa zwischen 1008 und 1012 (sog. fixiertes spezifisches Gewicht oder Isothenurie).

Fehlerquellen der Verdünnungsprobe: Starke Wasserverarmung des Körpers (z. B. auch durch den unmittelbar vorausgeschickten Konzentrationsversuch<sup>1)</sup>), ferner Neigung zu Ödembildung, da in diesen Fällen Wasser von den Geweben zurückgehalten wird.

Konzentrations- und Verdünnungsversuch zusammen ergeben bereits einen ungefähren Einblick in die Leistungsfähigkeit der Nieren; sie bieten den großen Vorteil, daß sie ohne Laboratoriumseinrichtung durchgeführt werden können. Eine Verfeinerung des Konzentrations- und Verdünnungsversuches stellt die Anwendung einer sog. Nierenprobemahlzeit nach Hedinger-Schlayer dar, welche der natürlichen Inanspruchnahme der Nieren durch die gewöhnliche Nahrung am nächsten kommt. Normale Verhältnisse werden hier durch eine der Einfuhr entsprechende Harnmenge und starke Schwankungen des spezifischen Gewichtes der einzelnen Harnportionen angezeigt (Näheres s. Lehrbücher).

Die Ausscheidungsfunktion der Nieren ist in Wirklichkeit keine einheitliche Größe, sondern setzt sich aus einer Reihe von Teilfunktionen zusammen, die sich auf die verschiedenen auszuscheidenden Substanzen wie Wasser NaCl, Harnstoff, Kreatinin, Harnsäure erstrecken, und eine weitgehende Unabhängigkeit voneinander zeigen. Diese Tatsache hat man funktionsdiagnostisch in der Weise verwertet, daß man analog dem Wasserversuch Belastungsproben mit den einzelnen körpereigenen Substanzen vornimmt. Zum Beispiel gibt man nach einer mehrtägigen Vorperiode d. h. einer Kost, die etwa 7 g NaCl und etwa 2½ Liter Flüssigkeit enthält und bis zur gleichmäßigen Ausscheidung des NaCl gereicht wird, an einem Tage 10 g NaCl als Zulage, die von Gesunden in höchstens 48 Stunden unter Ansteigen des NaCl-Prozentgehaltes des Harns vollkommen ausgeschieden werden. Unter pathologischen Verhältnissen erfolgt die Ausscheidung des NaCl entweder überhaupt nicht oder verzögert; bei Hypostenurie und Isostenurie wird das Salz unter gleichzeitiger stark vermehrter Wasserausscheidung eliminiert, so daß die Salzkonzentration des Harns im Gegensatz zur Norm nicht wesentlich zunimmt. In gleicher Weise erfolgt die Prüfung der N-Ausscheidung: Mehr-tägige Vorperiode mit etwa 10—15 g N in der Nahrung, bis N-Ausscheidung konstante Werte zeigt, alsdann Zulage von 20 g Harnstoff (= 9,34 Stickstoff) oder 50—100 g Somatose (= 5—10 g N); die entsprechende N-Mehrausscheidung im Harn soll normal innerhalb von spätestens 48 Stunden vollendet sein. Auch das Kreatinin kann zur Belastungsprobe herangezogen werden: 1,5 g Kreatinin („Ilun“ Bayer-Elberfeld) in 150 Zuckerwasser genommen, werden zu 60—90% in den ersten sechs Stunden ausgeschieden; die Bestimmung erfolgt colorimetrisch im Harn<sup>2)</sup>.

Eine wichtige Ergänzung dieser Proben bildet die Untersuchung des Blutserums auf etwaige Retention harnfähiger Substanzen. So geht verzögerte NaCl-Ausscheidung mit Erhöhung des NaCl-Gehaltes des Serums einher. Erhöhung des Salzgehaltes des Serums kommt auch in einer Zunahme der kryoskopisch feststellbaren Gefrierpunktsdepression des Serums ( $\delta$ ) zum Ausdruck. Dabei ist jedoch zu bemerken, daß die Steigerung der Salzkonzentration sehr bald dadurch ihre Grenze findet, daß gleichzeitig mit den Salzen Wasser zurückgehalten wird (vgl. später). Darin besteht ein wesentlicher Unterschied gegenüber der Retention von N-Substanzen. Schädigung des N-Ausscheidungsvermögens zeigt sich im Blut durch Ansteigen des als Reststickstoff (Rest-N) bezeichneten Gehaltes an N-haltiger Substanz, die nach Ausfällung der Eiweißkörper im Serum noch nachweisbar ist und zum größten Teil aus Harnstoff besteht. Der Rest-N übersteigt normal nicht 40 mg in 100 ccm Serum. Eine Erhöhung des Rest-N kommt aber

<sup>1)</sup> Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, die beiden Untersuchungen getrennt an verschiedenen Tagen vorzunehmen.

<sup>2)</sup> Bei allen diesen Proben ist die exakte Aufsammlung des 24stündigen Harns ein unbedingtes Erfordernis. Man sammelt den Harn, nachdem der Patient die Blase unmittelbar vorher entleert hat, z. B. von morgens 8 Uhr bis zum anderen Morgen 8 Uhr usf., wobei der Patient anzuhalten ist, jedesmal kurz vor der Stuhlentleerung Harn zu lassen, damit keine Vermischung mit Stuhl erfolgt. Diarrhöen schließen die Durchführung der Untersuchung aus. Das spezifische Gewicht ist stets erst nach Abkühlung des Harns auf 15° zu bestimmen.

außer bei Niereninsuffizienz auch bei anderen Erkrankungen, z. B. akuten Infektionskrankheiten, Carcinomen usw. vor, wo ein erhöhter Eiweißzerfall im Körper erfolgt. Auch die Bestimmung des Indicangehaltes des Serums läßt sich in gleichem Sinn wie der Rest-N verwerten. Endlich vermag die Blutuntersuchung auch Einblick in den Wasserstoffwechsel zu gewähren, wenn man mittels Refraktometers den Serumweißgehalt (vgl. S. 251) bestimmt, aus dem sich der Wassergehalt ergibt. Auch wiederholte Zählung der Erythrocyten ermöglicht die Feststellung einer Wasserretention im Blut (Hydrämie) bzw. einer Eindickung desselben.

In besonderen Fällen ist zur Funktionsprüfung auch die Einverleibung körperfremder Substanzen und die Kontrolle ihrer Ausscheidung von Wert. So werden z. B. 0,5 Jodkalium per os gegeben normal nach 1—2 Stunden ausgeschieden, die Ausscheidung ist spätestens innerhalb von 60 Stunden beendet. Pathologisch verzögerte Jodausscheidung, die bei Nierenleiden beobachtet wird, bedeutet hier zugleich Mahnung zur Vorsicht gegenüber therapeutischen Jodgaben (Kumulationsgefahr!). Auch die Einverleibung gewisser ungiftiger Farbstoffe und die quantitative Bestimmung ihrer Ausscheidung durch die Nieren kann herangezogen werden. Zum Beispiel wird nach Injektion von Indigocarmin in physiologischer NaCl-Lösung (20 ccm einer 0,4% Lösung) in die Glutäen der Farbstoff von der gesunden Niere schon nach 5—6 Minuten ausgeschieden, bei erkrankter Niere beginnt die Ausscheidung erst später und hält länger an. In ähnlicher Weise wird Phenolsulfophthalein (1 ccm der fertigen Lösung der Firma Hellige-Freiburg) angewendet; der größte Teil des Farbstoffes wird vom Gesunden innerhalb der ersten vier Stunden (mindestens 50% in den ersten zwei Stunden) ausgeschieden. Die Farbstoffmethoden bieten den Vorteil, daß sie erstens sofort ohne vorhergehende Stoffwechseluntersuchung angestellt werden können. Außerdem ist ihre Anwendung speziell bei einseitigen Nierenerkrankungen deshalb von Wert, weil man unter Zuhilfenahme des Cystoskops bzw. des Ureterenkatheterismus infolge der normal schnell erfolgenden Ausscheidung des Farbstoffes einen klaren Einblick in etwaige Funktionsstörungen der einen Niere erhält, vorausgesetzt allerdings, daß dieselben gröberer Art sind. Vor allem haben daher diese Methoden für die Fragestellungen des Chirurgen (namentlich bezüglich der Entfernung einer Niere bei genügender Funktionstüchtigkeit der anderen) große Bedeutung.

Die Funktionsprüfung der Nieren nimmt in der modernen klinischen Betrachtung der Nierenkrankheiten deshalb einen so wichtigen Platz ein, weil sie namentlich in prognostischen und therapeutischen Fragen vielfach wesentlich exaktere Auskunft gibt als die sonstige übliche Harnuntersuchung, die auf den Umfang der vorhandenen Nierenschädigung häufig keine sicheren Schlüsse zu ziehen erlaubt.

**Allgemeine Symptomatologie der Nierenkrankheiten:** Erkrankungen der Nieren, wie sie entweder durch die Wirkung im Blute kreisender Gifte sowie bakterieller Noxen oder durch krankhafte Veränderung der Blutgefäße oder mangelhafte Blutversorgung oder endlich durch das Aufsteigen einer Erkrankung vom Nierenbecken aus entstehen, sind durch eine Reihe charakteristischer klinischer Erscheinungen gekennzeichnet, die teils direkt von den Nieren selbst ausgehen wie Veränderungen des Harns (Eiweißausscheidung, Hämaturie usw.), teils sich aus der Einwirkung der Nierenerkrankung auf andere Organsysteme erklären, wie Störungen des Zirkulationsapparates (Blutdruckerhöhung, Herzhypertrophie), und andere Krankheitssymptome (Ödeme, Augenhintergrundveränderungen); dazu kommen ferner gewisse charakteristische Funktionsstörungen des physiologischen Ausscheidungsvermögens der Nieren. Die Hauptsymptome der Nierenkrankheiten sind folgende:



Die Eiweißausscheidung durch den Harn (**Albuminurie**) bildet eines der konstantesten Symptome einer Nierenerkrankung. Das Eiweiß ist in der Hauptsache identisch mit den Eiweißkörpern des Blutserums (Albumin, Globulin); seine Anwesenheit im Harn beweist, soweit seine Herkunft aus den Nieren sichergestellt ist (vgl. unten), eine pathologische Durchlässigkeit derselben, an der sowohl die Glomeruli als auch die Harnkanälchen beteiligt sein können. Die Albuminurie ist als ein sehr feines Reagens auf Nierenstörungen, insbesondere auch auf geringfügige Störungen der Blutversorgung der Nieren zu betrachten. Beweisend für Nierenerkrankungen ist sie jedoch im allgemeinen nur bei stärkerer Eiweißausscheidung bzw. bei gleichzeitigem Vorhandensein anderer, im gleichen Sinne sprechender Symptome. Die Eiweißmenge schwankt zwischen Spuren und etwa 40‰; der äußerste Gesamteiweißverlust in 24 Stunden dürfte selten 10 g übersteigen. Die Eiweißmenge geht häufig der Schwere der Erkrankung in der Weise parallel, daß Verschlimmerungen mit Zunahme, Besserungen mit Abnahme der Eiweißmenge einhergehen. Doch darf man sich im übrigen nicht wörtlich an diese Regel halten und insbesondere nicht ohne weiteres aus dem Grade der Eiweißausscheidung auf die Intensität des Krankheitsprozesses schließen<sup>1)</sup>. Insbesondere beweist das Fehlen einer Albuminurie noch nicht das Intaktsein der Nieren, wie andererseits große Eiweißmengen keineswegs ohne weiteres gleichbedeutend mit einer schlechten Prognose sein müssen.

Ausscheidung geringer Eiweißmengen wird unter den verschiedensten Umständen beobachtet. So kann starker Druck auf die eine Niere, z. B. bei der palpatorischen Untersuchung, für kurze Zeit leichte Albuminurie bewirken. Die gleiche Wirkung haben vorübergehend mitunter körperliche Anstrengungen sowie kalte Bäder. Die bei fieberhaften Erkrankungen der verschiedensten Art auftretende leichte Albuminurie ist ebenfalls bedeutungslos, desgleichen diejenige nach epileptischen und paralytischen Anfällen sowie die geringen Eiweißmengen, die bei Prozessen in der Narkose der Niere, ferner im Nierenbecken und den Harnleitern (Steine usw.) beobachtet werden. Eiweißausscheidung beobachtet man ferner nach Aufnahme großer Mengen von artfremdem Eiweiß, z. B. von rohen Eiern, dementsprechend auch nach Injektion von größeren Mengen Heilserum, bisweilen ferner unter der Wirkung von Salicylpräparaten. Nicht zu verwechseln mit der echten Albuminurie ist das Auftreten eines bereits in der Kälte durch Essigsäure fällbaren Körpers von globulinartiger Beschaffenheit (Harn aa mit Wasser verdünnt, 3%ige Essigsäure). Er findet sich u. a. bei der orthostatischen Albuminurie (s. unten), bei Icterus usw. Beimengungen von Blut, Eiter oder Sperma zum Harn, ferner von Fluor bei Frauen können eine schwach positive Eiweißprobe bewirken (sog. accidentelle Albuminurie). Doch übersteigt die Menge niemals 1‰ (Trübung bei der Kochprobe). Große Eiweißmengen ohne gleichzeitige Nierenerkrankung werden bei der sog. Bence-Jonesschen Albuminurie ausgeschieden (vgl. S. 270). Für die Untersuchung auf Eiweiß ist am meisten der Tagesharn geeignet, während der Nachharn mitunter frei von pathologischen Bestandteilen ist.

Neben der Albuminurie sind es gewisse geformte Elemente, die bei der mikroskopischen Untersuchung des **Harnsedimentes** auf die Erkrankung der Nieren hinweisen. Hierzu gehören u. a. die Harncylinder, längliche zarte Gebilde, welche Abgüsse der Harnkanälchen

<sup>1)</sup> Die quantitative Eiweißbestimmung im Harn hat daher nur beschränkten Wert, zumal die gebräuchlichen Bestimmungsmethoden (z. B. nach Ebbach) ungenau sind. Im allgemeinen genügt die bloße Schätzung, z. B. bei der Kochprobe.

darstellen, daher ungefähr das gleiche Kaliber wie diese haben; sie sind von wechselnder Länge.

Die hyalinen Zylinder sind zarte durchscheinende Gebilde von annähernd geradem Verlauf; häufig sind ihnen einzelne Zellen oder Kristalle aufgelagert. Man beobachtet sie schon bei geringfügigen Nierenläsionen, z. B. als Begleiter harmloser vorübergehender Albuminurien. Gelegentlich kommen sie auch ohne letztere vor<sup>1)</sup>. Bei Säurezusatz zum Sedimentpräparat werden sie unsichtbar. Die sog. granulierten Zylinder zeigen eine feine Körnung und sind oft etwas dunkler gefärbt. Zum Teil sind sie mit Nierenepithelien oder Erythrocyten besetzt oder scheinen vollkommen aus diesen aufgebaut zu sein (Epithel-, Blutkörperchen-Zylinder); mitunter ist ein größerer Teil der Epithelien verfettet, auch kann der ganze Zylinder mit Fettkügelchen bedeckt sein (Fettkörnchenzylinder). Im Gegensatz zu den hyalinen Zylindern bedeutet das Auftreten der granulierten Zylinder häufig eine ernsthafte Erkrankung der Nieren, was auch aus der Anwesenheit der aufgelagerten Zellen und Erythrocyten hervorgeht. Gelegentlich kommen sie jedoch in geringer Zahl auch bei gesunden Sportsleuten vorübergehend vor. Eine besonders ernste Bedeutung haben schließlich die sog. Wachszylinder. Dies sind lange und ziemlich breite, stark lichtbrechende, oft gelblich glänzende Gebilde von sehr scharfer Konturierung, die im Gegensatz zu den hyalinen Zylindern gegen Säurezusatz resistent sind. Sie sind im allgemeinen selten, kommen nur bei schweren Nierenentzündungen, bei den chronischen häufiger als bei den akuten vor. Bei Ausscheidung von Blutfarbstoff durch die Nieren werden bräunlich gefärbte, fein gekörnte Hämoglobinzylinder beobachtet. Komazylinder s. unter Diabetes.

1) Außer den Zylindern hat die Anwesenheit von Nierenepithelien im Sediment große Bedeutung. Dieselben sind nicht mit der in großer Zahl vorkommenden Epithelien aus den übrigen Harnwegen zu verwechseln. Es sind kleine Zellen, die an ihrer polyedrischen Form und ihrem einfachen runden oder etwas ovalen Kern zu erkennen sind<sup>2)</sup>, durch den sie sich von den oft mit ihnen gleichzeitig vorhandenen Leukocyten unterscheiden. Bisweilen treten sie zu Häufchen aggregiert auf, oft sind sie stark lädiert. Am besten erkennt man sie, wenn sie den Zylindern aufgelagert sind. Häufig sind sie verfettet. Die Untersuchung mit dem Polarisationsmikroskop ergibt, daß es sich, wie auch bei den Fettkörnchenzylindern größtenteils um doppelbrechende (anisotrope) Lipide handelt. Sie sind leicht gegenüber den oft in großer Masse vorhandenen Plattenepithelien zu unterscheiden, die durch Desquamation der obersten Schicht des Epithels von Nierenbecken, Ureter und Blase in den Harn übergehen. Es sind große, eckige, platte Zellen mit großem, scharf konturiertem, häufig granuliertem Kern. Daneben kommen mitunter die aus den tiefen Schichten des Plattenepithels stammenden sog. geschwänzten oder birnförmigen Zellen vor, die bei Reizzuständen des Nierenbeckens, der Ureteren und der Blase auftreten, also ebenfalls mit der Niere selbst nichts zu tun haben (vgl. Abb. 42). Auch das häufige Vorhandensein von Erythrocyten im Sediment, die teils als noch gut gefärbte Blutscheiben, teils als ausgelaugte Blutschatten auftreten, ist nicht ohne weiteres beweisend für eine Erkrankung der Niere, da sie aus einer Blutung der abführenden Harnwege stammen können. Für ihren renalen Ursprung spricht dagegen das gleichzeitige Vorhandensein von echten Nierenelementen (Nierenepithelien und Zylinder) bzw. wenn die Erythrocyten Zylindern aufgelagert sind oder als Erythrocytenzylinder auftreten. Beim Weibe denke man stets an die Menstruation. In allen zweifelhaften Fällen bewahrt die Untersuchung des katheterisierten Harns vor Irrtum. In besonderen Fällen ist der Ureterenkatheterismus notwendig. Auch kann

<sup>1)</sup> In fraglichen Fällen ist das Harnsediment auch dann auf geformte Elemente zu untersuchen, wenn die Eiweißprobe negativ ist. Gelegentlich kommt nämlich Cylindrurie ohne Albuminurie vor.

<sup>2)</sup> Als sichere und leicht zu handhabende Methode zur Erkennung der Kerne im frischen Sedimentpräparat ist die Anwendung einer 1%igen wässrigen Neutralrotlösung zu empfehlen, von der man einen Tropfen zum feuchten Sediment auf dem Objektträger zusetzt.

mitunter die sog. Dreigläserprobe zur Entscheidung der Provenienz des Blutes beitragen: Man läßt den Pat. zunächst in zwei verschiedene Gläser Harn entleeren; der letzte in der Blase befindliche Rest kommt getrennt in ein drittes Glas. Bei Nierenblutungen sind alle drei Proben gleich stark bluthaltig, bei Blasenblutungen enthält oft die letzte Portion am meisten Blut. Bluthaltiger Harn ohne mikroskopisch nachweisbare Erythrocyten ist ein Kennzeichen der Hämoglobinurie (vgl. S. 270). Die Leukocyten endlich haben im allgemeinen für die Erkennung von Nierenkrankheiten keine wesentliche Bedeutung, falls sie nicht ebenfalls an Zylindern haften. Sie sind stets an der Polymorphie ihres Kernes zu erkennen und kommen namentlich bei den verschiedensten Reizzuständen und Katarrhen der abführenden Harnwege vor. Vereinzelt beobachtet man bei Sepsis eine reichliche Ausscheidung von Leukocyten durch die Nieren, ohne daß dies eine eitrige Erkrankung der Niere zu beweisen braucht.

Zusammenfassend ist also bezüglich der morphotischen Befunde des Harnes zu sagen, daß die beiden einzigen Bestandteile, die aus den Nieren und nicht aus den übrigen Teilen des Harnapparates herkommen, die Harnzylinder und die Nierenepithelien sind <sup>1)</sup>.

Eine häufige Begleiterscheinung doppelseitiger Nierenleiden sind bestimmte Veränderungen am Zirkulationsapparat, und zwar die Steigerung des **Blutdruckes** sowie **Herzhypertrophie**. Die Blutdrucksteigerung erreicht häufig sehr beträchtliche Werte (200 mm und mehr) und ist dann an dem drahtartig harten Puls zu erkennen; in anderen Fällen ist sie nur eben angedeutet oder sie ist so unbedeutend, daß sie als solche überhaupt erst nachträglich erkannt wird, wenn bei Besserung des Leidens der Druck weiter heruntergeht. Erhöhung des Blutdruckes findet man hauptsächlich bei jenen akuten Nierenkrankheiten, bei denen die Glomeruli in großer Zahl erkrankt sind, ferner namentlich und zwar besonders hochgradige Steigerungen bei allen chronischen, mit ausgedehnter Schrumpfung des Parenchyms und Bindegewebsentwicklung einhergehenden Nierenleiden (Schrumpfnieren). Auch beim Übergreifen einer doppelseitigen Entzündung des Nierenbeckens (Pyelitis) auf die Nieren wird mitunter Blutdrucksteigerung beobachtet, desgleichen bei Erschwerung des Harnabflusses infolge von doppelseitiger Verengung oder Verlegung der abführenden Harnwege (Hydronephrose, Harnkonkremente, Prostatahypertrophie). Umgekehrt fehlt die Steigerung regelmäßig bei Nierenleiden mit ausschließlicher Erkrankung der Harnkanälchen, falls die Glomeruli frei bleiben (tubuläre Nephritis), ferner bei den Nierenerkrankungen im Verlauf der Sepsis. Für das Zustandekommen der Blutdrucksteigerung ist zunächst ein leistungsfähiger Herzmuskel (linker Ventrikel) eine notwendige Voraussetzung. Hieraus erklärt sich das Fehlen der Blutdruckerhöhung dort, wo zwar die Bedingungen für eine Erhöhung gegeben sind, das Herz aber geschwächt ist wie bei mit Fieber, Tuberkulose, Kachexie oder Herzmuskelerkrankungen komplizierten Nierenleiden.

Die der nephrogenen Blutdruckerhöhung zugrunde liegenden Vorgänge sind anfangs nicht in anatomischen Gefäßveränderungen, sondern in funktionellen Störungen des Zirkulationsapparates zu suchen, die in einer krampfartigen Verengung der kleinsten präcapillaren Arterien (Arteriolen) im Bereich

<sup>1)</sup> Andererseits kommt, was die klinische Dignität der einzelnen morphologischen Nierenbestandteile anlangt, dem Befunde von Erythrocyten die wichtigste Bedeutung zu.

ausgedehnter Bezirke des Körpers bestehen dürften. Dadurch erfolgt eine erhebliche Einengung der Strombahn. Die Ursache der Gefäßkontraktion beruht, wie man annimmt, in der toxischen Wirkung gewisser harnfähiger Substanzen, die von der kranken Niere in nur ungenügender Menge ausgeschieden werden und sich im Körper stauen. Ihre Wirkung auf die Gefäße erfolgt wahrscheinlich auf dem Umweg über das Nervensystem durch zentrale Erregung des Sympathicus. Über die chemische Beschaffenheit der die renale Hypertonie erzeugenden Prinzipien ist Sicheres nicht bekannt. Tatsache ist, daß hauptsächlich diejenigen Nierenleiden zu Blutdrucksteigerung neigen, bei denen die N-Ausscheidung eine mangelhafte ist, die also mit einer Erhöhung des Rest-N (s. oben) einhergehen. Das trifft allerdings nicht für alle Fälle ausnahmslos zu. Auch geht der Grad der Blutdrucksteigerung der Höhe des Rest-N keineswegs genau parallel. Daß die Gefäßverengung anfangs nur eine funktionelle ist, geht u. a. aus der häufig nur kurzen Dauer der Blutdrucksteigerung hervor, sowie ferner aus den erheblichen, dem Verlauf eines Nierenleidens oft parallel gehenden Schwankungen der Blutdruckwerte. Mit der Entstehung des Ödems hat die Blutdruckerhöhung nichts zu tun.

Länger dauernde Blutdrucksteigerung führt indessen auch zu anatomischen Veränderungen am Zirkulationsapparat, und zwar zunächst zu Herzhypertrophie, speziell des linken Ventrikels; dies ist die Folge der gesteigerten Arbeitsleistung gegenüber den erhöhten Widerständen im Gefäßsystem. Alle Fälle von chronischen Nierenleiden, die eine Hypertrophie des linken Ventrikels zeigen, gehen stets gleichzeitig mit Blutdrucksteigerung einher. Die Herzhypertrophie besteht zunächst ohne Dilatation. Dauernde Erhöhung des Blutdruckes führt im weiteren Verlauf auch zu Schädigung des Gefäßsystems, indem dieses eine verstärkte mechanische Inanspruchnahme erfährt und hierauf mit arteriosklerotischen Veränderungen reagiert (vgl. S. 181); außerdem dürfte hierbei die schädigende Einwirkung der genannten toxischen Substanzen auf die Blutgefäße ebenfalls eine Rolle spielen. Der weitere Verlauf der mit Hypertonie einhergehenden Nierenleiden ist somit oft von dem Verhalten des Herzens und der Gefäße in entscheidender Weise abhängig, und nicht wenige Nierenkranke erliegen schließlich einer Herzinsuffizienz (Lungenödem) oder einer Apoplexie bzw. Encephalomalacie. Über die ursächliche Bedeutung der Arteriosklerose für die Entstehung von Nierenleiden s. weiter unten.

Störung der Wasserausscheidung führt zu **Ödemen**, d. h. Wasseransammlung im Unterhautzellgewebe und in den serösen Höhlen. Doch können sich erhebliche Mengen Wasser in den Geweben ansammeln (bis zu sechs Liter), bevor es zu klinisch wahrnehmbaren Schwellungen kommt. Hieraus erklärt sich, daß sogar bei mehrtägiger Anurie sichtbare Ödeme zunächst fehlen können.

Zur Erhaltung des osmotischen Gleichgewichtes hält der Körper das Wasser im allgemeinen stets in gleichem Maße wie NaCl zurück und umgekehrt, so daß es sich bei der Retention im Grunde stets um physiologische NaCl-Lösung handelt und die Salzkonzentration der Gewebe stets die gleiche bleibt. Manches spricht indessen dafür, daß gelegentlich größere Mengen von NaCl in den Geweben ohne entsprechende Wassermengen zurückgehalten werden, und auch das Umgekehrte dürfte vorkommen.

Die ersten Zeichen der beginnenden Wasserretention sind Ansteigen des Körpergewichtes, Sinken der Menge des Harns und Verminderung seines NaCl-Gehaltes, subjektiv starker Durst. Das nephritische Ödem

lokalisiert sich zunächst im Gesicht und beginnt meist mit Schwellung der Lider, dann verteilt es sich gleichmäßig über den gesamten Körper, ohne, wie bei den kardialen Ödemen, die abhängigen Partien zu bevorzugen. Von letzteren unterscheidet es sich ferner durch den niedrigen Eiweißgehalt der Ödemflüssigkeit. Ihr spezifisches Gewicht beträgt 1004 bis 1006, ihr NaCl-Gehalt ist relativ hoch. Das Ödem kann sich sehr schnell entwickeln und hohe Grade erreichen. Dann ist der ganze Körper unförmig geschwollen und zeigt eine Gewichtszunahme von vielen Kilogramm. Die Haut ist blass, glänzend und straff gespannt und kann sogar an einzelnen Stellen platzen. Es sickert dann Ödemflüssigkeit spontan heraus. Das ödematöse Gewebe zeichnet sich durch sehr geringe Widerstandsfähigkeit eindringenden Infektionserregern gegenüber aus. Wassersüchtige Nierenkranke neigen daher zu Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes, speziell zu Erysipel, das u. a. im Anschluß an die Punktion des Ödems nicht selten auftritt. Bemerkenswert ist ferner die geringe Neigung der Kranken zur Wasserabgabe durch die Haut, und es ist oft schwer, ödematöse Nephritiker zum Schwitzen zu bringen. Das Einsetzen stärkerer Diaphoresis ist bisweilen ein Zeichen, daß auch die renale Wasserausscheidung wieder in Gang kommt. Die Ödeme können sehr schnell wieder aufgesogen werden und schwinden bisweilen innerhalb weniger Tage, wobei eine enorme Harnflut mit starker NaCl-Ausscheidung erfolgt. Man kann die Aufsaugung der Ödeme sowohl durch Medikamente, die die Harnsekretion anregen, fördern, als auch ihre Entleerung durch Drainage bzw. Punktion der Gewebe bewerkstelligen. Mitunter beobachtet man, daß erst, nachdem eine gewisse Menge Ödemflüssigkeit auf diese Weise mechanisch entleert ist, die Wasserausscheidung durch die Nieren sich bessert, was sich wohl durch die bessere Durchblutung des von dem Ödemdruck befreiten Organs erklärt (vgl. S. 130). Bei sehr rascher Resorption von Ödemflüssigkeit beobachtet man gelegentlich Intoxikationserscheinungen, die einen urämischen Charakter haben (Urämie s. nächste Seite) und die auf die Mobilisierung und den Übertritt der bis dahin in den Geweben abgelagerten harnfähigen Stoffe ins Blut zurückzuführen sein dürften. Längere Zeit nach Schwinden des Ödems pflegt noch eine gewisse Disposition zu pathologischer Wasserretention weiterzubestehen. Dies zeigt sich u. a., wenn derartige Kranke eine abnorm NaCl-reiche Kost<sup>1)</sup> und viel Flüssigkeit zu sich nehmen, in einem verdächtigen Ansteigen des Körpergewichtes, mitunter auch in der Andeutung von Lidödem usw. Der Verdünnungsversuch (s. oben) fällt in diesen Fällen mangelhaft aus. N-Retention und Ödembildung sind voneinander völlig unabhängig. Ein anatomisch-histologisches Kriterium, an welchem die Störung des Wasserausscheidungsvermögens einer kranken Niere zu erkennen wäre, gibt es nicht. Erfahrungsgemäß gehen oft, aber nicht ausnahmslos vor allem Erkrankungen der Tubuli mit Ödemen einher, zum Teil auch solche der Glomeruli, während andererseits trotz aus-

<sup>1)</sup> Hierbei ist das Na und nicht das Cl für die Störung verantwortlich zu machen, denn auch größere Gaben von Natr. bicarbon. können Ödeme erzeugen.

gedehnter Verödung der Glomeruli die Wasserausscheidung nicht beeinträchtigt ist.

Die Beurteilung der Ursachen der Ödembildung bei Nierenkranken ist in ein neues Stadium getreten, seitdem die Forschung der jüngsten Zeit den Anteil der übrigen Gewebe außer den Nieren, also der sog. extrarenalen Faktoren, speziell die Bedeutung der Capillaren und des lockeren Zellgewebes für die Wasserretention als bedeutsam erkannt hat. Für deren Rolle spricht z. B. die Tatsache, daß manche Fälle von Scharlach in der dritten Woche Ödeme wie bei Nephritis bekommen, ohne aber den Befund einer Nierenentzündung zu bieten, ferner die Beobachtung, daß manche ödematösen Nephritiker nach intravenöser Wasserzufuhr Wasser ausscheiden, dagegen nicht nach Wasserzufuhr per os. Ein Abströmen von Wasser aus den Gefäßen in die Gewebe wird auch durch die Feststellung wahrscheinlich gemacht, daß Nierenkranke, die beim Verdünnungsversuch das Wasser zum Teil retinieren, bisweilen trotzdem Erhöhung der Blutkonzentration zeigen. Es ist daher bezüglich der Entstehung der Ödeme anzunehmen, daß neben der Unfähigkeit der Niere, in genügender Menge Wasser und Salze zu eliminieren, noch eine besondere Anomalie der Gefäßcapillaren, d. h. ihre abnorme Durchlässigkeit bzw. das pathologische Verhalten des übrigen wasserretinierenden Gewebes ursächlich in Frage kommt. Verminderung der Harnmenge kann demnach nicht nur Ursache, sondern auch Folge der Ödembildung sein.

Häufige Begleiterscheinung der Nierenkrankheiten sind ferner gewisse Veränderungen des **Augenhintergrundes**, in erster Linie die sog. **Retinitis albuminurica**.

Dieselbe bietet bei der Ophthalmoskopie ein sehr charakteristisches Bild und besteht sowohl in kleinen weißen, kalkspritzerartigen Fleckchen, die mit Vorliebe die Gegend der Macula lutea strahlenartig umgeben, als auch in unregelmäßigen kleineren oder größeren weißlichen Herden bzw. Blutungen in der Nachbarschaft der Gefäße. Das Sehvermögen braucht dabei nicht immer zu leiden. Untersuchungen mit dem Perimeter ergeben aber oft das Vorhandensein von Skotomen. Gleichzeitig neben der Retinitis oder auch ohne dieselbe findet sich mitunter auch Neuritis optica, die an der unscharfen Begrenzung und Verbreiterung der Papille mit Schwellung und stärkerer Schlingelung der Venen zu erkennen ist. Auch hier können subjektive Klagen über eine Herabsetzung des Visus fehlen. Beide Formen kommen sowohl bei akuten wie namentlich bei chronischen Nierenkrankheiten vor. Sie haben einen großen diagnostischen Wert (der Nachweis von Augenhintergrundveränderungen muß stets zu einer gründlichen Untersuchung der Nieren veranlassen) und bieten zum Teil, wie z. B. die Retinitis alb. auch prognostische Handhaben. Insbesondere bei den chronischen Nephritiden hat letztere eine sehr ungünstige Bedeutung. Hämorrhagien in der Retina und im Glaskörper, die sich mitunter bei Schrumpfnieren finden, sind hier mehr auf Rechnung der allgemeinen Arteriosklerose zu setzen. Die bei akuter Nephritis gelegentlich auftretende kurzdauernde Amaurose bzw. Hemianopsie sind Symptome der Urämie (s. diese); hierbei fehlen objektiv sichtbare Augenhintergrundveränderungen.

**Urämie.** Unter Urämie (Harnvergiftung) versteht man einen Symptomenkomplex, der auf die Retention harnfähiger Substanzen infolge von Niereninsuffizienz zurückzuführen ist und sich häufig im Verlauf schwererer akuter und chronischer Nierenleiden einstellt. Bezüglich der Entstehung der Urämie und der Natur der urämierzeugenden Stoffe ist man bisher noch nicht über Hypothesen hinausgekommen. Nach dem klinischen Bilde lassen sich zwei voneinander prinzipiell verschiedene Formen unterscheiden: 1. die eklamptische oder krampförmige und 2. die asthenisch-kachektische oder krampflose Form der Urämie. Die erstere Form tritt stets akut auf und wird hauptsächlich bei den

hydropischen, viel seltener bei nichthydropischen Nierenkrankheiten beobachtet, bei jugendlichen Individuen häufiger als bei älteren. Einleitende Symptome sind plötzlich eintretender Schwindel, heftiger Kopfschmerz, Atemnot, Erbrechen sowie starkes Ansteigen des Blutdrucks. Hierauf folgt ein Dämmerzustand und alsbald treten in tiefem Koma allgemeine tonische und klonische Krämpfe an den Extremitäten sowie den Gesichts- und Rumpfmuskeln auf. Die Krämpfe sind von denen eines epileptischen bzw. eklamptischen Anfalles nicht zu unterscheiden. Die Pupillen sind weit und reaktionslos. Oft verletzen sich die Pat. im Anfall (Zungenbiß usw.). In manchen Fällen folgt eine ganze Reihe derartiger Anfälle rasch aufeinander. Nach den Anfällen verbleibt der Pat. noch längere Zeit im Koma. Das Zehenphänomen von Babinski ist meist positiv. Nach dem Erwachen besteht völlige Amnesie für den Anfall selbst und die ihm unmittelbar vorangehende Zeit. Bei starker Häufung der Anfälle kann es zum Exitus durch Herzlähmung kommen, doch ist in der Mehrzahl der Fälle die Prognose gut. Der Rest-Stickstoff des Serums ist bei dieser Form nicht erhöht; oft besteht Hydrämie. Bemerkenswert ist, daß die Anfälle nicht selten erst in einem Zeitpunkte einsetzen, wo die Ödeme zu schwinden beginnen. Die während des Anfalls vorgenommene Lumbalpunktion ergibt in der Regel beträchtlich erhöhten Liquordruck. Man hat daher die eklamptische Urämie durch eine akute Steigerung des Hirndrucks infolge von Gehirn-ödem zu erklären versucht.

Mitunter treten an Stelle echter eklamptischer Anfälle sog. Äquivalente derselben auf, z. B. in Form einer akuten Sehstörung (ohne ophthalmoskopischen Befund); dieselbe kann sich auch nach Ablauf einer Krampfurämie einstellen. Die Prognose der Amaurose ist in der Regel günstig. Auch apathische Störungen sowie starke psychische Alterationen wie Depressionen oder maniakalische Zustände werden mitunter als Äquivalente beobachtet.

Für die chronische, kachektische oder stille Urämie ist der schleichende Verlauf, das Fehlen eklamptischer Anfälle sowie die meist nachweisbare Retention von N-haltigen Stoffwechselschlacken (Erhöhung des Rest-N des Serums = Azotämie) charakteristisch. Sie bildet häufig den letzten Akt eines chronischen Nierenleidens, insbesondere der Schrumpfniere, wird aber gelegentlich auch bei akuten Nephritiden beobachtet; regelmäßig stellt sie sich bei den Fällen mit länger anhaltender Anurie infolge vollständiger Verlegung der harnableitenden Wege ein (Tumoren, Nephrolithiasis, Prostatahypertrophie usw.). Zu den Symptomen gehören vor allem dyspeptische Erscheinungen wie hochgradige Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, bisweilen Durchfälle, ferner heftiger Kopfschmerz sowie Schlaflosigkeit. Die Kranken sind in der Regel auffallend blaß. Meist besteht heftiger Durst sowie in der Regel ein zunehmender urinöser Foetor ex ore (der Geruch erinnert an Heringslake). Oft ist gleichzeitig Stomatitis uraemica vorhanden, ferner häufig starkes Hautjucken. Die Haut ist trocken. Gelegentlich kommen auch Hautblutungen vor. Unter zunehmendem Kräfteverfall und Abnahme der geistigen Fähigkeiten entsteht bei chronischem Verlauf eine schwere Kachexie (sog. Nierensiechtum). Oft entwickelt sich eine Entzündung der Pleura, des Perikards oder des Peritoneums, namentlich ist Peri-

karditis häufig. Ferner beobachtet man erhöhte Erregbarkeit der Muskeln z. B. beim Beklopfen, sowie sog. Sehnenhüpfen. Mitunter ist die Atmung beschleunigt und vertieft (sog. Kußmaulsche Atmung). Auch asthmaähnliche Anfälle kommen vor, die zum Teil auf Herzschwäche mit beginnendem Lungenödem, zum Teil auf toxischen Ursachen beruhen dürften (Asthma uraemicum). Die mitunter vorhandenen psychischen Störungen können in Form von Erregungszuständen und Halluzinationen das vollkommene Bild einer Psychose darbieten, so daß das Grundleiden mitunter eine Zeitlang verkannt wird. Schließlich entwickelt sich stets ein tiefes Koma, in welchem der Exitus erfolgt.

Hier sind noch gewisse bei Nierenkranken vorkommende, der Urämie ähnliche Zustände zu nennen, die man als Pseudourämie bezeichnet hat und denen im Gegensatz zur echten Urämie anatomisch greifbare, arteriosklerotische Veränderungen des Gehirns, speziell Erweichungsherde durch Gefäßverschluß bzw. kleine Blutungen zugrunde liegen. Symptome sind schnell vorübergehende oder auch dauernde Lähmung von Halbseiten- oder monoplegischem Typus, Hemianopsie, aphasische Störungen usw. mit oder ohne Bewußtseinsverlust. Hinzukommen bisweilen asthmaartige Anfälle von Dyspnoe sowie endlich den nephritischen ähnliche Augenhintergrundsveränderungen. Sämtliche Erscheinungen sind einer Rückbildung fähig. Die genannten Erscheinungen, die auf eine allgemeine Arteriosklerose zurückzuführen sind, lassen sich oft am Krankenbett nicht ohne weiteres gegen die echte Urämie abgrenzen, wiewohl sie genetisch nichts mit ihr zu tun haben. Echauffiertes Aussehen der Kranken, niedriger RN-Gehalt des Seums, evtl. konzentrierter Harn mit hohem spez. Gew. können, falls sie vorhanden sind, die Unterscheidung ermöglichen.

Praktisch beobachtet man nicht selten Mischformen, die durch Kombination der verschiedenen Urämietypen entstehen und zu denen bei Vorhandensein einer stärkeren Arteriosklerose auch noch pseudourämische Störungen sich hinzugesellen können.

Schließlich gehören zur allgemeinen Symptomatologie die bereits oben beschriebenen, durch die Funktionsprüfung zu konstatierenden **Störungen im Ausscheidungsvermögen** der Nieren. Auf ihren hohen Wert für Diagnose, Prognose und Therapie der Nierenkrankheiten wurde schon hingewiesen.

## Die doppelseitigen hämatogenen Nierenkrankheiten.

Zu den doppelseitigen, auf dem Blutwege entstehenden Nierenkrankheiten gehört in erster Linie die große Gruppe der sog. **Nierenentzündungen**. Dies ist eine Kollektivbezeichnung für verschiedene Nierenaffektionen, denen einerseits gewisse Symptomenkomplexe gemeinsam sind, die aber auf der andern Seite sowohl klinisch wie anatomisch zum Teil wesentliche Unterschiede untereinander aufweisen. Die Forschung der jüngsten Zeit war bemüht, sowohl die prinzipiell wichtigen anatomisch-histologischen Merkmale, die für die einzelnen Nierenaffektionen charakteristisch sind, genauer zu präzisieren als auch vor allem den Zusammenhang von anatomischer Veränderung und klinischer Symptomatologie, insbesondere durch weitgehende Heranziehung der Funktionsprüfungen zu klären.



Die als Nierenentzündung (Nephritis), heute allgemeiner als **Nephropathien** bezeichneten doppelseitigen Nierenleiden lassen sich anatomisch in mehrere große Gruppen teilen, die sich aus der verschiedenen Lokalisation der Schädigung in dem Organ ergeben. Die eine Gruppe ist durch die vorwiegende Erkrankung der Glomeruli charakterisiert, die in großer Zahl entzündliche Veränderungen darbieten: sog. Glomerulonephritis. Eine andere Gruppe von Nephropathien zeichnet sich durch hochgradige Alteration des Epithels der gewundenen Harnkanälchen aus, der gegenüber andere histologische Veränderungen in den Hintergrund treten: Dies ist die sog. tubuläre Nephritis oder Nephrose. Hier haben die Gewebsveränderungen vorwiegend degenerativen, nicht entzündlichen Charakter. Eine weitere Gruppe stellt eine Kombination von glomerulär-entzündlichen und tubulär-degenerativen Prozessen dar, die beide nebeneinander bestehen: sog. glomerulo-tubuläre Erkrankungen. Eine von den bisher genannten Nephropathien scharf zu trennende Gruppe wird von den auf arteriosklerotischen Gefäßveränderungen beruhenden Nierenleiden, den sog. Nierensklerosen gebildet.

Der vorstehend wiedergegebenen, auf den Beobachtungen am Sektionsstisch fußenden Einteilung entsprechen auch klinisch im großen und ganzen prinzipiell verschiedene Krankheitsbilder. Auch ist den verschiedenen, eine Nierenschädigung hervorrufenden bekannten Noxen zum Teil ein gewisses elektives Verhalten eigen, indem die einen mehr den einen anatomischen Typus, die andern andere histologische Typen der Nierenerkrankung zu erzeugen pflegen. Klinisch ist die Glomerulonephritis vor allem durch Hämaturie, mäßig starke Albuminurie, oft außerdem durch Blutdrucksteigerung sowie Ödeme gekennzeichnet; häufig ist die N-Ausscheidung mangelhaft. Für die tubuläre Nephrose sind charakteristisch starke Albuminurie, hochgradige Ödeme, prompte N-Ausscheidung sowie das Fehlen von Blutdrucksteigerung und Augenhintergrundsveränderungen. Den Nierensklerosen ist hochgradige Blutdrucksteigerung bei Fehlen von Hämaturie und Ödemen eigen.

Eine genauere Prüfung des hier geschilderten Einteilungsschemas hat nun allerdings ergeben, daß in der Praxis es nicht immer möglich ist, auf Grund der genannten Kriterien am Krankenbett eine spezielle anatomische Diagnose in dem oben skizzierten Sinne zu stellen. Es liegt das vor allem in der Tatsache begründet, daß viel häufiger Misch- resp. Zwischenformen zwischen den beschriebenen reinen Typen als diese selbst zur Beobachtung kommen. Dies gilt namentlich für die Trennung zwischen Nephrosen und Glomerulonephritiden, was sich u. a. aus dem engen funktionellen Connex zwischen dem Gefäßapparat der Niere und dem sezernierenden Parenchym erklärt. Zum Teil macht sich bei diesen Fragen auch unsere noch lückenhafte Kenntnis der pathologischen Physiologie der Niere, insbesondere auch des kausalen Zusammenhangs der histologischen Alterationen mit den verschiedenen klinischen Symptomen geltend. Sieht man daher von gewissen extremen Fällen ab, so wird man in manchem Fall in vivo auf eine genauere ana-

tomische Diagnose verzichten müssen und sich auf eine eingehende klinische Charakterisierung des Falles unter besonderer Berücksichtigung des funktionellen Verhaltens der Niere, letzteres namentlich in Hinsicht auf die Prognose beschränken.

### **Die akute Nierenentzündung [akute glomeruläre und tubuläre Nephritis, Brightsche Krankheit<sup>1)</sup>].**

Die akute Nierenentzündung tritt anatomisch am häufigsten unter dem Bilde der sog. Glomerulonephritis auf.

Makroskopisch erscheint die Niere, abgesehen von ödematöser Schwellung entweder annähernd normal oder sie läßt bei der sog. hämorrhagischen Form auf der Oberfläche zahlreiche kleine flohstichtartige Blutpunkte erkennen. Mikroskopische Veränderungen finden sich hauptsächlich an den Glomeruli, und zwar Vergrößerung derselben infolge von Blähung der Capillarschlingen, Wucherung des Endothels und Kernvermehrung (Leukocyten) im Bereich der Schlingen; der Kapselraum ist infolgedessen vollkommen ausgefüllt, die Capillarschlingen sind fast sämtlich blutleer. Weiter kommt es oft zur Abscheidung eines Exsudates in den Kapselraum, welches eiweißreich ist und oft desquamierete Epithelien enthält, die mitunter halbmondförmig die Glomeruli umgeben; bei der hämorrhagischen Form enthält der Kapselraum oft Blut. Im letzteren Fall sind in den Harnkanälchen zahlreiche Erythrocyten vorhanden, die sich zum Teil zu Zylindern zusammenballen. In zahlreichen Fällen zeigen daneben auch die gewundenen Harnkanälchen pathologische Veränderungen: Kolloidtropfenbildung und Verfettung der Epithelien sowie teilweise Abstoßung derselben ins Lumen der Kanälchen (glomerulo-tubuläre Form; frühere Bezeichnung: parenchymatöse bzw. diffuse Nephritis). Nicht selten zeigt das interstitielle Gewebe herdförmige kleinzellige Infiltrate sowie an einzelnen Stellen verfettete Zellen. Bei leichtem Verlauf werden mit der Ausheilung der Erkrankung die Glomeruluscapillaren wieder für das Blut durchgängig, auch wird das Kapsellexsudat wieder resorbiert. In schweren Fällen hinterläßt die Krankheit zahlreiche verödete und hyalin umgewandelte Capillarschlingen; auch obliteriert infolge bindegewebiger Organisation des Exsudates der Kapselraum. Eine weitere Folge ist die Verödung der zugehörigen Harnkanälchen. Bezüglich des Überganges in chronische Nephritis s. weiter unten.

Ätiologisch stehen bei der akuten Nierenentzündung hauptsächlich infektiöse Ursachen im Vordergrund. Vor allem sind es Infektionen im Bereich der Tonsillen und des lymphatischen Rachenringes (Anginen) sowie der Nase und der Ohren, ferner der Scharlach (3. Woche), Pneumonie Typhus, Tuberkulose, Malaria, Recurrens sowie die verschiedenen Streptococcenerkrankungen, infektiöse Erkrankungen der Haut (Pyodermien, Scabies), gelegentlich schwere Diphtherie. Hierher gehört auch die im Kriege vielfach beobachtete Schützengrabennephritis wie auch allgemein die Nierenentzündung nach starker Erkältung bzw. Durchnässung. Nicht belebte Gifte spielen nur eine untergeordnete Rolle (Cantharidin, Petroleum, Naphthol).

Weit seltener als die Glomerulonephritis ist die anatomisch hauptsächlich auf die Erkrankung der gewundenen Harnkanälchen sich beschränkende Nephritis tubularis oder Nephrose.

Auch hier ist der makroskopische Befund oft sehr wenig charakteristisch. Mitunter besteht erhebliche Schwellung des Organs mit starker Kapselspannung.

<sup>1)</sup> Unter Brightscher Krankheit verstand man ursprünglich nur den Symptomenkomplex Albuminurie mit Ödemen.

Die Rinde erscheint oft trüb und blaß und hebt sich deutlich von dem blutreichen Mark ab. Mikroskopisch zeigen die Epithelien der Tubuli contorti trübe Schwellung, Vakuolenbildung sowie Verfettung bzw. Lipoidablagerung, ferner Desquamation von Epithelien ins Lumen der Kanälchen, bei den schwersten Formen auch Verlust der Kernfärbung (Nekrose).

Ein Teil der Nephrosen entwickelt sich scheinbar idiopathisch, d. h. ohne erkennbare Ursache. Von bekannten Ursachen sind vor allem verschiedene Gifte zu nennen, in erster Linie die Hg-Salze, ferner Phenole (Lysol), Oxalsäure, Uran, Chrom, Arsen, Terpentin, unter den Infektionskrankheiten vor allem die Cholera, gelegentlich die Diphtherie, ferner die Lues. Auch bei Graviden kommen tubuläre Erkrankungen vor (Schwangerschaftsnier). Die Nephropathien bei progredienten Tuberkulosen stehen häufig mit der amyloiden Degeneration der Nierengefäße in Zusammenhang.

Das Krankheitsbild der akuten Nierenentzündung gestaltet sich verschieden, je nach dem bereits eine andere Grundkrankheit besteht oder es sich um ein sog. genuines bzw. kryptogenes Nierenleiden handelt. Der Beginn ist einmal ein plötzlicher, ein andermal mehr schleichend. Störungen des Allgemeinbefindens wie Müdigkeit, Rückenschmerzen, Brustbeklemmungen, Appetitmangel sowie starker Durst leiten oft die Krankheit ein. Mitunter besteht mäßige Temperatursteigerung auch in den Fällen, wo keine fieberhafte Infektionskrankheit vorausging.

In der Regel wird bald ein Ödem sichtbar. Dieses ist zunächst meist an den Augenlidern lokalisiert. Das Gesicht bekommt ein gedunsenes blasses Aussehen. Am Harn fällt die beträchtliche Abnahme der Menge bis auf einige 100 ccm sowie seine trübe Beschaffenheit auf. Die Harnfarbe verhält sich verschieden. Bei den hämorrhagischen Formen ist sie dunkel, schmutziggelblich oder erinnert an Fleischwasser, bei der nicht hämorrhagischen Form ist sie hell- oder dunkelgelb. Das spez. Gew. bei der hämorrhagischen N. liegt zwischen 1010 und 1015, mitunter höher, bei der nicht hämorrhagischen N. ist es in der Regel hoch, etwa zwischen 1025 und 1030. Auch bezüglich des Eiweißgehaltes zeigen beide Formen wesentliche Unterschiede. Die Glomerulonephritis geht oft mit nur geringer Eiweißausscheidung einher, während der helle Harn der nicht blutigen Nephropathie häufig sehr große Eiweißmengen (bis 20<sup>0</sup>/<sub>100</sub> und mehr) aufweist. Auch das Sediment, das stets reichlich geformte Elemente enthält, zeigt charakteristische Unterschiede (vgl. Abb. 41). Für die hämorrhagische N. ist der reichliche Gehalt an Erythrocyten charakteristisch, die zum Teil auch als Blutkörperchenzylinder auftreten. Daneben findet man ausgelaugte Erythrocyten (Schatten), Leukocyten sowie hyaline, granuliert und Epithelzylinder, ferner auch in wechselnder Menge isolierte Nierenepithelien. Bei der nicht blutigen Nierenentzündung fehlen die Erythrocyten entweder vollkommen oder sind nur in vereinzelt Exemplaren zu finden. Dagegen sind reichlich Epithelien, Zylinder und vor allem stark verfettete Zellen und Fettkörnchen vorhanden; die Lipide zeigen größtenteils Doppelbrechung.

Der NaCl-Gehalt des Harns ist bei den mit Ödembildung einhergehenden Fällen stets stark herabgesetzt. Der Harnstoffgehalt dagegen ist bei der nicht blutigen Form in normaler Menge vorhanden. Häufig zeichnet sich die Tagesharnmenge sowie das Quantum der einzelnen Portionen durch eine auffallende Konstanz ihrer Menge aus, die unabhängig von der Wasserzufuhr oder extrarenalen Wasserverlusten ist. Dieser sog. Sekretionsstarre entsprechend bleiben auch die spez. Gew. der verschiedenen Harnportionen annähernd gleich hoch fixiert.

Blutdrucksteigerung wird vor allem bei der hämorrhagischen N. beobachtet, wenn sie hier auch keineswegs ein absolut konstantes Symptom bildet. Sie tritt teils sofort, teils im Laufe der ersten 14 Tage ein und erreicht etwa 160—180 mm, selten ist sie höher; bei günstigem Verlauf kehrt der Blutdruck in den nächsten Wochen wieder zur Norm zurück.



Abb. 41. Sediment bei Nephritis (nach Lenhartz - Meyer).

Das Verhalten des Blutdrucks ist mindestens so sorgfältig fortlaufend zu kontrollieren wie der Harnbefund, da ersterer über das Fortbestehen der Nierenerkrankung bzw. ihre Ausheilung weit mehr besagt als letzterer. Unter den nicht hämorrhagischen Nephropathien beobachtet man Blutdrucksteigerung nur bei den toxischen Formen (Sublimatniere, s. unten).

Die Untersuchung des Blutes ergibt bei der hämorrhagischen N. häufig Steigerung des Rest-N (meist nicht über 100 mg %) sowie bei den hydropischen Formen eine wenigstens zeitweise nachweisbare Hydrämie (Verminderung der Erythrocyten). Charakteristische morphologische Blutveränderungen fehlen.

Der weitere Verlauf der akuten Nierenentzündung gestaltet sich je nach der Schwere der Erkrankung, nach der Art des Grundleidens und dem anatomischen Charakter des Nierenleidens verschieden. Zahlreiche Fälle von hämorrhagischer Nephritis verlaufen von vornherein ganz leicht und zeigen weder Blutdrucksteigerung noch Ödeme. Die schon anfangs nicht sehr beträchtliche Blutausscheidung geht bei

entsprechender Behandlung im Laufe weniger Wochen zurück; längere Zeit ist dagegen oft noch eine geringe mikroskopische Hämaturie, die sog. Resthämaturie nachweisbar. Mangelnde Schonung, zu frühes Verlassen des Bettes usw. haben Verstärkung der Hämaturie zur Folge.

In schwereren Fällen ist das Bild entweder von vornherein ernster oder es entwickelt sich allmählich nach anfänglich leichten Erscheinungen. Es bestehen stärkere Störung des Allgemeinbefindens, mitunter beträchtliche Schmerzen in der Nierengegend, auch Druckempfindlichkeit derselben, ferner Gliederschmerzen, stark bluthaltiger Harn, deutlich gespannter Puls sowie Atemnot. In manchen Fällen entwickeln sich starke Ödeme mit Hydrops der Körperhöhlen, speziell Hydrothorax; ein Glottisödem kann zu ernstem Atemhindernis werden. Besteht Blutdrucksteigerung, so können sich im Laufe einiger Wochen die Zeichen der Herzhypertrophie (hebender Spitzenstoß) bemerkbar machen. Nicht selten stellt sich namentlich bei der hydropischen Nephritis Urämie ein, die vor allem in eklamptischer Form (vgl. S. 393) auftritt. Dieselbe kann infolge von Herzlähmung tödlich enden; doch wird in zahlreichen Fällen die Gefahr wieder überwunden. In einzelnen Fällen versiegt die Harnsekretion vorübergehend fast vollkommen, doch pflegt sie, von manchen toxischen Nephropathien abgesehen (s. unten), alsbald wieder in Gang zu kommen. Bisweilen treten bei beträchtlicher Blutdrucksteigerung die Symptome der Herzinsuffizienz in den Vordergrund; es besteht dann heftige Atemnot, Bronchitis (Stauungslunge) und die Pat. sterben mitunter unter den Zeichen des Lungenödems infolge Erlahmens des linken Ventrikels. Auch Bronchopneumonien führen bisweilen ein letales Ende herbei. Selbst bei günstigem Verlauf vergehen oft viele Wochen und Monate, bis die Harnbeschaffenheit und das Allgemeinbefinden sich bessern, der Blut- und Eiweißgehalt des Harns sich vermindert, die Ödeme schwinden und der Blutdruck wieder normal wird. Stets ist auch jetzt mit der Gefahr von Rückfällen zu rechnen, die namentlich nach einer Erkältung, einer Angina oder einem Diätfehler entstehen können. Außerdem besteht bei jeder Nephritis, auch bei der leichtesten Form, die Gefahr des Überganges in eine chronische Nephritis bzw. in sekundäre Schrumpfniere (vgl. S. 404). Anhaltend erhöhte Blutdruckwerte sowie mangelhaftes Konzentrierungsvermögen der Niere trotz Besserung des Harnbefundes bilden oft schon einen frühzeitigen Hinweis auf den ungünstigen Ausgang.

Unter den **besonderen Verlaufsformen** der akuten Nephropathien sind folgende zu nennen: Die **Scharlachnephritis** (vgl. auch S. 16) anatomisch eine besonders reine Form der Glomerulonephritis, verläuft nicht selten ohne Ödeme. Krampfurämie kommt namentlich bei der hydropischen Scharlachnephritis vor. Die Krankheitsdauer beträgt in der Regel viele Wochen. — Auch die Nierenentzündung im Verlauf von **Anginen** ist eine (hämorrhagische) Glomerulonephritis. Sie tritt namentlich bei den chronischen bzw. rezidivierenden Anginen auf, findet sich aber auch im Gefolge anderer infektiöser Prozesse im Bereich der Nase, der Mundhöhle, bei Nebenhöhlenentzündungen, Alveolarpyorrhöen sowie nach eitrigen Ohrenaffektionen. Ödeme und Blutdrucksteigerung pflegen zu fehlen, ebenso oft alle subjektiven Beschwerden, so daß die Nierenerkrankung leicht übersehen werden kann. Die Gefahr besteht in der Neigung zu Rückfällen entsprechend den Exazerbationen des Grundleidens, dessen Beseitigung oft eine prompte Heilung der

Nierenerkrankung bewirkt. In einzelnen Fällen hinterlassen die zahlreichen sich wiederholenden Krankheitsschübe eine dauernde Schädigung der Niere mit Ausgang in eine sekundäre Schrumpfniere.

Die sog. **Kriegsnephritis** war eine häufig mit Ödem und Blutdrucksteigerung, bisweilen auch mit Urämie einhergehende hämorrhagische Glomerulonephritis.

Unter den nach Vergiftungen entstehenden Nephropathien spielt die **Sublimatnieren** praktisch die größte Rolle. In der leichtesten Form (medikamentöse Hg-Intoxikation) tritt sie als Albuminurie und Cylindrurie ohne sonstige klinische Symptome auf und heilt binnen kurzem wieder aus. Bei schwerer Intoxikation enthält der Harn massenhaft Eiweiß und Zylinder, dagegen keine Erythrocyten. Als bald tritt zunehmende Oligurie ein, die schließlich in völlige Anurie übergeht; diese kann eine Reihe von Tagen andauern. Ödeme fehlen, Blutdrucksteigerung meist auch. Der Rest-N kann enorme Werte (über 200 mg %) erreichen. Die Krampfform der Urämie ist selten. Neben den Nierenerscheinungen bestehen natürlich auch andere Symptome der Hg-Intoxikation (Stomatitis, Kolitis usw.). Die Krankheit verläuft oft tödlich, doch kann selbst trotz mehrtägiger Anurie schließlich völlige Genesung eintreten. Häufig zeigen die Pat. sub finem eine merkwürdige Euphorie und sterben entweder plötzlich im Kollaps oder in komatösem Zustand. Anatomisch bestehen schwere degenerative Veränderungen an den Tubuli contorti mit Nekrosen (zum Teil mit Kalkablagerung).

Eine besondere Art der Nephropathie ist ferner die sog. **Schwangerschaftsnieren**. Sie befällt die Frauen, wenn überhaupt, dann stets während der ersten Gravidität, und zwar in der zweiten Hälfte derselben; bei späteren Graviditäten rezidiert sie oft. Symptome sind Ödeme der unteren Extremitäten und der äußeren Genitalien sowie eine oft sehr starke Albuminurie. Das Sediment enthält zahlreiche granuliert Zylinder sowie Fettkörnchen, mitunter auch Erythrocyten. Charakteristisch ist das hohe spez. Gewicht. Häufig besteht gutes Konzentrationsvermögen. Subjektive Beschwerden können vollkommen fehlen, in andern Fällen bestehen Kreuzschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit. Der Blutdruck ist fast stets erhöht; mitunter wird Retinitis album. beobachtet. Doch treten nicht selten Sehstörungen auch ohne letztere auf. Ein Teil der Fälle wird von Eklampsie befallen; derselben geht häufig starke Blutdrucksteigerung voraus. Der eklampthische Anfall, der sich klinisch mit der Krampfurämie vollständig deckt, bricht in der Regel bei der Geburt aus. Die Schwangerschaftsnieren pflegt bis zu Ende der Gravidität zu bestehen; mit der Geburt kommt sie prompt zur Heilung. Bei einem Teil der Fälle stirbt die Frucht vorzeitig ab. Die Ursache des Leidens ist nicht mit Sicherheit bekannt, wenn auch an einem Zusammenhang mit der Gravidität nicht zu zweifeln ist. Anatomisch findet man in der Regel eine blasse, verfettete Niere mit starker Lipoiddegeneration der gewundenen Harnkanälchen, jedoch ohne tiefgreifende Alteration der Epithelien, sowie oft gleichzeitig Veränderungen analog der Glomerulonephritis. Von der Schwangerschaftsnieren grundsätzlich zu unterscheiden ist das Vorhandensein einer chronischen Nephritis, die erfahrungsgemäß durch die Gravidität eine Verschlimmerung erfährt und oft eine künstliche Unterbrechung derselben erfordert.

Praktisch bedeutsam ist ferner die im Verlauf von **Lues II** auftretende akute Nephropathie. Charakteristisch sind starke Ödeme und eine besonders hochgradige Albuminurie (bis 40‰). Der trübe schmutzfarbene Harn ist von geringer Menge, hat ein hohes spez. Gew. und enthält zahlreiche Zylinder sowie vor allem massenhaft doppeltbrechende Lipoidsubstanzen in den Zylindern und Epithelien. Die N-Ausscheidung ist normal, der Rest-N nicht erhöht; Blutdrucksteigerung und Herzhypertrophie fehlen, desgl. Urämie und Retinitis. Die Konzentrierfähigkeit für NaCl verhält sich verschieden, in den leichteren Fällen ist sie trotz starker Ödeme erhalten. Die Wassermannsche R. ist stark positiv. Die luetische Nephropathie zeigt oft recht langwierigen Verlauf und erstreckt sich meist auf viele Wochen. Durch eine spezifische Kur kann sie prompt zur Ausheilung kommen; in andern Fällen bleibt trotz Schwindens der Ödeme die Albuminurie bestehen. In selteneren Fällen beobachtet man eine hämorrhagische Nephritis bei Lues.

Therapie der akuten Nephritis s. S. 407.

## Die subchronischen und chronischen Nephropathien.

Nierenleiden von subchronischem bzw. chronischem Verlauf bilden eine größere Gruppe ihrem Wesen nach sowohl in anatomischer wie ätiologischer Beziehung verschiedener Erkrankungen. Dementsprechend zeigen auch die einzelnen Krankheitsbilder untereinander erhebliche Verschiedenheiten. Chronische Nephropathien können sich einmal an akute Nierenerkrankungen anschließen und deren Fortsetzung bilden. In anderen Fällen verlaufen sie von vornherein chronisch-schleichend. Hält man sich zunächst nur an die klinischen Bilder, so ergeben sich im wesentlichen **drei Haupttypen**: 1. die chronische Nephritis, die sich nur durch pathologische Harnbeschaffenheit verrät, aber ohne sonstige klinische Störungen verläuft; 2. die chronische hydropische Nephritis; 3. die chronische Nephritis ohne Ödeme, aber mit starker Blutdrucksteigerung und Herzhypertrophie.

Die erste Gruppe, bei der häufig weder etwas über den Beginn noch über die Ätiologie zu eruieren ist, zeigt mäßig starke Albuminurie, Zylinder, bisweilen Epithelien sowie nicht selten in wechselnder Menge, mitunter nur zeitweise, Erythrocyten, wogegen Lipoidsubstanzen zu fehlen pflegen. Häufig ist eine deutliche Abhängigkeit der Albuminurie und Hämaturie von der Körperhaltung zu beobachten (vgl. orthostatische Albuminurie S. 409). Harnmenge und spez. Gew., Nierenfunktion, Blutdruck sowie Rest-N verhalten sich normal. Das Allgemeinbefinden ist vollkommen befriedigend. Der Zustand kann Monate bis Jahre dauern.

Man fahnde stets bei dem geschilderten Harnbefunde nach latenten Infektionsherden, speziell chronischen Anginen usw.; mitunter gelingt es durch Beseitigung derselben auch die Nierensymptome auszuheilen. In manchen Fällen beobachtet man schubweise auftretende Verschlimmerungen der Albuminurie und Hämaturie entsprechend dem Verlauf des Grundleidens (Angina, chronische Endokarditis usw.). Größte Vorsicht ist bezüglich der Prognose zu beobachten, da es bei nicht genügend langer Beobachtung nicht zu entscheiden ist, ob es sich um definitive Heilung mit Defekt (sog. Restheilung), die als harmlos zu bewerten ist, handelt, oder ob sich dahinter ein schleichend verlaufender fortschreitender Prozeß verbirgt. Auch Nierentuberkulose sowie Tumoren können unter dem gleichen Bilde beginnen. Im Zweifelsfall ist die Cystoskopie bzw. der Ureterenkatheterismus anzuwenden. Fortlaufende Messung des Blutdrucks sowie Kontrolle des spez. Gew. des Harns und zeitweise vorgenommene Funktionsprüfungen sind unbedingt erforderlich.

Die chronische hydropische Nephropathie (chronischer Morbus Brightii) ist ausgezeichnet durch starke Ödeme, Verminderung der Harnmenge, starke Albuminurie. Im einzelnen zeigt diese Form von Fall zu Fall erhebliche Verschiedenheiten. Ein Teil der Fälle geht mit schwerer Niereninsuffizienz, Neigung zu Urämie und Retinitis einher, während bei einer anderen kleineren Gruppe diese Erscheinungen fehlen.

Die einzelnen Symptome entsprechen ungefähr denen bei akuter Nephritis. Die Harnmenge ist zunächst vermindert, das spez. Gew. anfangs hoch, der Eiweißgehalt beträchtlich. Im Sediment finden sich Zylinder der verschiedenen Arten in großer Zahl, zum Teil auch in größerer Menge Erythrocyten, die aber auch zeitweise fehlen können.

Stärkere Hämaturie ist für die sog. chronische hämorrhagische Nephritis charakteristisch. Manche Formen zeichnen sich durch einen besonders starken Gehalt an Fett- resp. Lipoidsubstanzen im Sediment aus. Häufig entwickelt sich im Laufe der Zeit Blutdrucksteigerung mit Herzhypertrophie. Das Allgemeinbefinden verschlechtert sich zunehmend, Appetitmangel, anämische Symptome, Kopfschmerz und Schwindel sind häufig und schließlich treten nicht selten urämische Symptome ein. Die Kranken erliegen teils der Urämie, teils einer Herzschwäche, teils sterben sie an interkurrenter Pneumonie. Auch Peritonitis (Pneumococcen) kann das Ende bilden. Ein Teil der Fälle bietet schließlich das Bild der sekundären Schrumpfniere dar (vgl. nächste Seite). Krankheitsdauer etwa  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  Jahre.

Der anatomische Befund ist der der sog. großen weißen oder gelben Niere: das Organ ist vergrößert, glatt, die Rinde gelbgrau, das Mark dunkel; mikroskopisch finden sich vor allem starke degenerative Veränderungen am Epithel der Hauptstücke, außerdem fast regelmäßig entzündliche Veränderungen an den Glomeruli, ferner im interstitiellen Gewebe kleinzellige Infiltrate sowie Konglomerate von verfettetem Material. Diese Bilder entsprechen der neuerdings als sog. Mischform bezeichneten chronischen Nephritis. In noch weiter vorgeschrittenen Fällen besteht der Befund der sekundären Schrumpfniere (s. unten).

Der chronischen hydropischen Nephritis begegnet man häufig im Gefolge von chronischen Eiterungen, Osteomyelitis, bei schwerer Tb. namentlich der Knochen und Gelenke, bei Phthise sowie manchen septischen Prozessen. Bei Fällen der letzteren Art (Tb., Sepsis) fehlt stets die Blutdrucksteigerung sowie die Herzhypertrophie. Selten kommt sie nach chronischen Anginen vor.

Als besondere Form der chronischen hydropischen Nephropathie ist noch die sog. genuine Nephrose sowie das Nierenamyloid zu nennen.

Die genuine Nephrose wird hauptsächlich im jugendlichen Alter beobachtet. Sie zeigt schleichenden Beginn und häufig sehr langwierigen Verlauf. Sie ist durch hochgradige Ödeme und sehr beträchtliche Albuminurie ausgezeichnet. Der Harn ist oft trübe oder auch klar und dann von auffallend heller Farbe. Das spez. Gew. ist hoch; im Sediment fehlen Erythrocyten. Der NaCl-Gehalt ist herabgesetzt. Die subjektiven Beschwerden bestehen meist nur in Mattigkeit, Appetitmangel. Neigung zu Kopfschmerz. Sehstörungen und Retinitis fehlen, ebenso Blutdrucksteigerung und Erhöhung des Rest-N. Die N-Ausscheidung ist normal. Das Blut ist etwas hydrämisch, das Serum zeigt erhöhte NaCl-Werte. Letzteres gilt auch für die Ödemflüssigkeit. Mitunter kommt es zu eklamptisch-urämischen Anfällen mit Steigerung des Cerebrospinaldrucks. In der Mehrzahl der Fälle ist die Prognose gut, indem nach vielmonatlicher Dauer die Ödeme unter Eintritt einer starken Harnflut zurückgehen und das Allgemeinbefinden sich wesentlich bessert, wogegen die Albuminurie noch lange Zeit weiter bestehen kann. Die Neigung zu Ödemen besteht auch noch später; interkurrente Erkrankungen sowie Diätfehler bringen oft von neuem wassersüchtige Anschwellungen hervor. Die Kranken sind außer vor Diätfehlern vor allem auch vor Hautinfektionen zu schützen, die leicht einen gefährlichen Charakter annehmen können. Ungünstiger Verlauf erfolgt auch bei Hinzutreten von Lungenkomplikationen sowie durch die bei dieser Form relativ häufige Peritonitis.

Ein großer Teil der bei schwerer Tuberkulose, chronischen Eiterungen besonders der Knochen, bei Bronchiektasen und andern kachektischen Zuständen bestehenden Nephrosen beruht auf Nierenamyloid. Die Symptome decken sich mit dem Bilde der genuine Nephrose. Blutdrucksteigerung und Retinitis usw. werden stets vermißt. Die spezielle Diagnose auf Amyloid ist mit Wahrscheinlichkeit nur



bei gleichzeitigem Nachweis der gleichen Erkrankung an andern Organen (derbe Schwellung von Milz und Leber, diarrhöische und Fettstühle) zu stellen.

Die chronische Nephritis mit Herzhypertrophie und Blutdrucksteigerung ohne Ödeme bildet die häufigste Form der chronischen Nierenleiden. Die Krankheit entwickelt sich meist schleichend, eine Ursache ist oft nicht ausfindig zu machen. In manchen Fällen geht sie aus einer akuten Glomerulonephritis hervor. Der in der Regel trübe Harn zeigt meist normale Farbe und normales oder etwas erniedrigtes spez. Gew. Meist besteht erhebliche Albuminurie. Das Sediment enthält reichlich Zylinder, häufig verfettetes Material sowie oft in wechselnder Menge Erythrocyten und Nierenepithelien. Erhöhung des Blutdrucks ist in der Regel vorhanden, die Werte zeigen im Verlauf der Krankheit Schwankungen. Stets entwickelt sich Hypertrophie des linken Ventrikels. Retinitis album. ist häufig, ebenso Erhöhung des Rest-N. Die N-Ausscheidung erfolgt unvollkommen.

Anatomisch findet sich die sog. große rote oder bunte Niere. Die rötlichen Flecke beruhen auf Blutungen, die gelblichen Partien auf Verfettung. Mikroskopisch bestehen stets Veränderungen an den Glomeruli (teilweise Obliteration der Kapsel, Verödung und hyaline Umwandlung einzelner Schlingen), ferner fettige Degeneration des Epithels der Kanälchen, die zum Teil atrophisch sind, sowie Blutungen und kleinzellige Infiltration im interstitiellen Gewebe.

Von dieser Form der chronischen Nephritis führen fließende Übergänge zum klinischen und anatomischen Bilde der sekundären Schrumpfniere.

Therapie der chronischen Nephritis s. S. 407.

### Die Schrumpfnieren (Nephrocirrhosis, Nephrosklerose, Granularatrophie der Nieren).

Die Bezeichnung Schrumpfniere stellt einen Sammelbegriff für diejenigen Nierenveränderungen dar, die infolge des Unterganges eines großen Teiles des Rindenparenchyms und Ersatz desselben durch schrumpfendes Narbengewebe zu einer Reduktion der Größe der Nieren, speziell der Rinde führen. Letztere kann dabei auf eine Dicke von wenigen Millimetern reduziert sein. Die Verödung des sezernierenden Nierengewebes kann einmal die Folge akuter oder subakuter bzw. rezidivierender Nierenentzündungen (Glomerulonephritis) sein, deren Endstadium sie darstellt. Diese Form ist die sog. sekundäre Schrumpfniere<sup>1)</sup>. Dieser steht eine andere Art von Nierenschrumpfung gegenüber, bei welcher ein allmählich fortschreitender Schwund des sezernierenden Parenchyms sich vollzieht, der auf einer progredienten arteriosklerotischen Veränderung der kleinen Nierengefäße (Arteriolo-sklerose) beruht: Genuine bzw. vasculäre (arteriosklerotische) Schrumpfniere. Auch als Endstadium der Hydronephrose kommt Schrumpfniere vor.

Die sekundäre Schrumpfniere, die häufig eine hellere Farbe besitzt (sog. weiße Schrumpfniere), weist meist weniger hohe Schrumpfungsgrade als die genuine Schrumpfniere auf. Letztere zeigt meist eine rötliche Farbe der Rinde (rote Schrumpfniere).

<sup>1)</sup> Die früher angewendete Bezeichnung „interstitielle Nephritis“ für Schrumpfniere ist unzutreffend und daher heute verlassen.

niere). Der Verödungsprozeß in der Rinde spielt sich in der Regel nicht gleichmäßig ab, so daß zwischen den vernarbten und geschrumpften Teilen noch intaktes oder weniger verändertes Gewebe stehen bleibt bzw. es kommt zu vikariierenden Hypertrophie einzelner Harnkanälchen. Daraus erklärt sich die höckrige Beschaffenheit der Oberfläche der Schrumpfnieren. Diese Granulierung pflegt namentlich bei der genuinen Schrumpfniere besonders stark ausgeprägt zu sein. Die Kapsel der Schrumpfnieren ist mit der Rinde verwachsen, so daß man sie nur mit Mühe, oft nur stückweise abzureißen vermag. Histologisch findet sich neben der Verödung der Glomeruli, die zum großen Teil in hyaline Kugeln umgewandelt sind, und Atrophie der Harnkanälchen eine erhebliche Wucherung des interstitiellen Bindegewebes, das zum Teil derben narbigen Charakter zeigt. Stärkere Veränderungen der Blutgefäße, insbesondere mit Wucherung der Intima und Verengung bzw. Verschuß des Lumens finden sich hauptsächlich bei der genuinen Schrumpfniere, hier namentlich an den kleinen Arterien, den Arteriolen und speziell an den Vasa afferentia. Bei manchen Formen der vasculären Schrumpfniere beobachtet man außerdem Zeichen entzündlicher Veränderung sowohl an den Glomeruli mit Zellwucherung an der Kapsel und dem Gefäßknäuel, als auch ausgedehntere Zellinfiltrate im interstitiellen Gewebe. Diese Vereinigung von arteriosklerotischen mit entzündlichen Veränderungen der Nieren hat man als sog. Kombinationsform bezeichnet. Beachtenswert ist schließlich, daß sich bei jeder Art von Schrumpfniere auf die Dauer eine über den ganzen Körper verbreitete Arteriosklerose namentlich der mittleren Arterien entwickelt.

Von der arteriosklerotischen Form ist die arteriosklerotische Schrumpfniere zu unterscheiden, die bei Erkrankung größerer Arterien sich entwickelt und bei der die Schrumpfung zu größerer Lappung der Nierenoberfläche führt. Klinisch macht diese Form keine wesentlichen Erscheinungen, insbesondere keine Niereninsuffizienz.

Ätiologie der Schrumpfniere: Die sekundäre Schrumpfniere stellt das Endstadium vieler akuter bzw. chronischer Nephritiden dar, wobei es sich stets um glomeruläre bzw. glomerulo-tubuläre Erkrankungen handelt<sup>1)</sup>. Als Ursachen der genuinen Schrumpfniere sind vor allem chronische Intoxikationen, in erster Linie Alkoholismus (Bier und Wein), die Gicht, chronische Bleivergiftung sowie ferner die Lues zu nennen. Die genuine Schrumpfniere befällt Männer häufiger als Frauen; sie bevorzugt das 5.—7. Jahrzehnt, doch kommt sie gelegentlich auch schon in jüngeren Jahren vor.

Krankheitsbild der Schrumpfniere: Die erste Entwicklung einer Schrumpfniere verläuft zunächst stets symptomtenlos. Teils handelt es sich um Individuen, die bis dahin anscheinend vollkommen gesund waren; teils ergibt die Anamnese frühere einmalige oder in Schüben aufgetretene akute bzw. subakute Nephritiden. In anderen Fällen geht eine chronische Nephritis allmählich in das Stadium der Schrumpfniere über. Subjektive Symptome können bisweilen jahrelang fehlen. In anderen Fällen bestehen häufig zeitweise auftretende Atemnot, vorübergehendes Knöchelödem, mitunter hartnäckiges, sich öfter wiederholendes Nasenbluten, desgleichen Eingenommensein des Kopfes, Kopfschmerzen sowie Schwindelanfälle und Appetitmangel. Aufmerksamen Patienten fällt ferner auf, daß sie namentlich nachts größere Mengen Harn lassen müssen, der im Vergleich zu früher eine sehr helle Farbe zeigt.

<sup>1)</sup> Ob auch anatomisch rein tubuläre Erkrankungen (Nephrosen) in Schrumpfnieren übergehen können, ist nicht genau bekannt.

Die Untersuchung ergibt charakteristische Veränderungen vor allem seitens des Zirkulationsapparates wie bezüglich der Harnbeschaffenheit. Stets ist eine deutliche Herzhypertrophie speziell des linken Ventrikels mit stark hebendem Spitzenstoß und klappendem 2. Aortenton vorhanden. Regelmäßig findet man eine beträchtliche Blutdrucksteigerung, die zum Teil exzessive Werte bis 200 und 250 mm und darüber erreicht und dann bereits als solche auf das Vorhandensein einer Schrumpfniere verdächtig ist.

Der Harn bei Schrumpfniere zeigt abgesehen von seiner hellen Farbe makroskopisch ein normales Aussehen. Seine Menge in 24 Std. übersteigt die Norm (bis 2—5 l und mehr). Charakteristisch ist das niedrige fixierte spez. Gewicht, das sich in der Regel etwa zwischen 1009 und höchstens 1015 bewegt. Der Eiweißgehalt ist meist nur gering; bei der genuinen Schrumpfniere kann er sogar längere Zeit vollkommen fehlen, bei der sekundären Schrumpfniere ist er häufig etwas größer. Ebenso finden sich Formelemente im Sediment meist nur in sehr geringer Menge. Zylinder können bei der genuinen Schrumpfniere vollkommen fehlen, ebenso vermißt man bei letzterer stets Erythrocyten, die bei der sekundären Schrumpfniere in geringer Anzahl öfter angetroffen werden. Gelegentlich kann es zu stärkeren Nierenblutungen kommen.

Besonderen Wert für die Diagnose hat der Ausfall der Konzentrationsprobe. Beim Durstversuch steigt das spez. Gew. nicht wie beim Gesunden entsprechend an, sondern nimmt nur wenig zu (Hyposthenurie) oder hält sich bei schweren Fällen in den gleichen Grenzen wie vorher, ein Beweis dafür, daß die Niere die Fähigkeit, einen konzentrierten Harn zu liefern, eingebüßt hat. Der Verdünnungsversuch fällt dagegen, solange die Herzkraft nicht zu erlahmen beginnt, annähernd normal aus unter entsprechendem Sinken des spez. Gewicht bis auf etwa 1005, ebenso verhält sich die Ausscheidung von NaCl normal. NaCl-Zulagen zu der Kost werden jedoch unter gleichzeitig vermehrter Wasserausscheidung eliminiert. Ein ähnliches Verhalten zeigen übrigens Cystennieren (vgl. S. 412). In den späteren Stadien, wo auch die Wasserausscheidung mangelhaft wird, kommt es zur Isosthenurie, bei der das spez. Gew. dauernd auf 1010—1011 fixiert bleibt.

Die harnfähigen N-Bestandteile werden von der Schrumpfniere nur unvollkommen ausgeschieden. Daher ist der Rest-N des Serums häufig, namentlich in den späteren Stadien erhöht (ebenso auch der Harnsäuregehalt) und eine Harnstoffzulage zur Kost wird verzögert ausgeschieden. Zunächst vermag sich der Körper bei mäßigen N-Mengen in der Nahrung dadurch der N-Schlacken zu entledigen, daß er dieselben mit Hilfe einer größeren Harnflut ausschwemmt.

Solange die Insuffizienz der Nieren durch die Polyurie kompensiert wird, kann das Allgemeinbefinden vollkommen befriedigend sein. Im weiteren Verlauf stellt sich indessen stets eine Reihe von Zeichen eines zunehmenden Verfalles ein, der zu chronischem Siechtum führt. Die Kranken bekommen ein fahles Aussehen, werden anämisch und magern stark ab. Oft besteht ein deutlicher Exophthalmus. Sehr häufig finden sich die früher beschriebenen charakteristischen Augenhintergrundsveränderungen. Sie sind in manchen Fällen ein Frühsymptom. Schließlich stellen sich in einem Teil der Fälle die Symptome fortschreitender Herzinsuffizienz mit Sinken der Harnmenge, Atemnot, Ödemen, Galopprrhythmus, Dilatation, Anfällen von Lungenödem (bis-

weilen namentlich nachts) ein, denen der Pat. schließlich erliegt. In andern Fällen entwickelt sich das Bild der chronischen stillen Urämie (s. oben), in der der Pat. langsam dem Tode entgegendämmert, oder er wird plötzlich ohne Vorboten von der Urämie ereilt. Eine große Zahl von Schrumpfnierenkranken endlich wird von einer Apoplexie bzw. einem cerebralen Erweichungsherd ereilt und stirbt entweder im ersten apoplektischen Insult oder nach einer Reihe kleinerer Anfälle. Mitunter wird in derartigen Fällen erst bei der Sektion die Schrumpfniere als Ursache der Hirnblutung entdeckt.

### Therapie der Nephritiden und Schrumpfnieren.

Die akute Nephritis erfordert vor allem strenge Bettruhe. Diese ist so lange notwendig, als Eiweiß und Blut in größeren Mengen ausgeschieden werden und solange Ödeme bestehen. An erster Stelle steht die diätetische Behandlung. Die Kost soll reizlos und insbesondere frei von den Stoffen sein, die erfahrungsgemäß die Nieren schädigen. Verboten sind daher alle Gewürze, alkoholische Getränke sowie Speisen mit einem stärkeren Salzgehalt, desgl. die Extraktivstoffe des Fleisches (Fleischbrühe usw.). Fleisch und (gekochte!) Eier sind nur in beschränktem Maß erlaubt, namentlich ist ersteres bei akuter Nephritis zunächst ganz zu meiden; bei chronischen Nierenleiden ist auf geringe Fleischmengen auf die Dauer nicht ganz zu verzichten, da die reine Nierendiät schließlich am Widerwillen und der Inappetenz der Pat. scheitert. Ein Unterschied zwischen dunklem und weißem Fleisch besteht hierbei nicht; dagegen ist gekochtem Fleisch vor geratenem der Vorzug zu geben. Im einzelnen richtet sich weiter die Diät nach der Art der Nierenerkrankung, insbesondere nach der Art der Funktionsstörung. Bei hydropischen Nierenleiden ist die Flüssigkeitszufuhr, aber ebenso auch die Salzzufuhr nach Möglichkeit einzuschränken. Daher sind in solchen Fällen weder Milchkuren noch das Trinken großer Mengen von Mineralwasser am Platz. Man gibt als Getränk höchstens  $\frac{3}{4}$  l Flüssigkeit pro die, zumal die übrigen Speisen reichlich Wasser, die Breispeisen etwa 75%, Obst und Gemüse fast 100% ihres Gewichtes enthalten. Die NaCl-Zufuhr soll 5 g pro die, bei stark hydropischen Fällen 2 g nicht übersteigen (1 l Milch=1,6 NaCl; 100 g Brot=1,0 NaCl). Bei nachgewiesener Retention von N-Schlacken (erhöhter Rest-N) wird man die Eiweißzufuhr auf ein Mindestmaß von etwa 50–30 g pro die herabsetzen (Eier, weißer Käse, Pflanzeneiweiß) und das Nahrungsbedürfnis im übrigen durch N-freie Kost befriedigen. Öfter bewährt sich hier die Einschaltung von Hungertagen (Gemüse usw., kein Eiweißträger). Gelingt es durch bloße Diät und Bettruhe nicht, die Ödeme zum Schwinden zu bringen, so kann man bei intaktem Zirkulationsapparat eine Schwitzprozedur im Bett versuchen (trockene Hitze mittels Heißluftapparates oder Glühlichtbogen, gleichzeitig reichlich heiße Getränke). Oft bleibt trotzdem die Diaphoresis aus. Auch die Anwendung von Diuretica hat nicht immer Erfolg. Bei akuter Nephritis soll man im Interesse der Schonung der Niere besser auf sie verzichten. Bei chronisch hydropischen Nierenleiden versuche man eventuell das Diuretin 3mal tgl. 0,5, das aber hier oft versagt. Mehr Erfolg hat oft der Liqueur Kal. acet. 3–6mal tgl. 1 Teel. (wirksam ist hier das Kalium, das als Antagonist des Natriums die Wasserausscheidung fördert). Bei den hartnäckigen Ödemen der Nephrosen erweist sich mitunter Harnstoff als gutes unschädliches Diureticum: Urea puriss. anfangs 20 g in dem doppelten Quantum Wasser mit Fruchtsaft, später tägl., evtl. wochenlang, 3mal 20–30 g pro die; Voraussetzung ist, daß die Niere den N prompt ausscheidet. Bei der Therapie trotzenden Ödemen denke man stets auch an die Möglichkeit ihres kardialen Ursprungs (Versuch mit Digitalis!). Alle Hg-Präparate als Diuretica, wie Kalomel oder Novasurool, sind streng kontraindiziert. Hochgradige Ödeme, die auf andere Weise nicht weichen, müssen mechanisch entleert werden, entweder durch Einstechen von Curschmannschen Trokars ins Unterhautzellgewebe der

Ober- und Unterschenkel oder durch multiple Scarifikationen der Haut der Unterschenkel. In beiden Fällen ist wegen der nicht unerheblichen Infektionsgefahr für peinliche Asepsis zu sorgen (Jodierung der Haut; empfehlenswert ist Einreiben mit 2% Collargolsalbe 1 Tag vor dem Eingriff). Es können auf diese Weise in 24 Std. viele Liter Ödemflüssigkeit abfließen. Bezüglich Dekapsulation bei Anurie vgl. unten. Die oft bei Ausheilung akuter Nephritiden noch Wochen und Monate weiterbestehende Ausscheidung geringer Eiweißmengen und vereinzelter Erythrocyten ist bei im übrigen gutem Allgemeinbefinden kein Grund für dauernde Bett-ruhe. Dagegen empfiehlt sich eine täglich für mehrere Stunden durchgeführte Liegekur unter Fortsetzung der genannten diätetischen Behandlung und Schutz gegen Erkältung wie Überanstrengungen. Schrumpfnierenkranke sind im allgemeinen nach den gleichen Grundsätzen wie Herzranke zu behandeln. Jedoch ist hier die Flüssigkeitszufuhr reichlicher zu bemessen, im übrigen der Organismus körperlich und geistig zu schonen. Vorsicht mit Jod, das oft schlecht ausgeschieden wird. Gegen die durch die Hypertonie verursachten Beschwerden wirken öfter wiederholte Aderlässe meist günstig, bisweilen auch gelegentlich die sog. Ableitung nach dem Darm in Form von Purgantien (Sennainfus, Bittersalz). Stets hat ferner die Behandlung den ersten Zeichen einer Herzinsuffizienz Rechnung zu tragen (vgl. S. 174). Anfälle von Atemnot bzw. renalem „Asthma“ (Lungenödem) lassen sich oft durch 0,5 mg Strophanthin intravenös rechtzeitig coupieren. Bei Schwangerschaftsnieren bekämpft man zunächst nur die Ödeme. Unterbrechung der Gravidität kommt nur, abgesehen von Eklampsie, bei progredienter Retinitis album. sowie sehr hochgradigem, auf andere Weise nicht einzudämmendem Hydrops in Frage.

Bei den luetischen Nephropathien besteht die äußerst vorsichtig und tastend durchzuführende Therapie in Neosalvarsan, Jodkali 0,5–1,0 pro die (nach vorheriger Untersuchung des Ausscheidungsvermögens für Jod, vgl. S. 387) und Hg-Schmierkur (Beginn mit 2 g). Es ist dies der einzige Fall, wo bei einer Nieren-erkrankung die Hg-Medikation erlaubt ist.

Für klimatische Nachkuren eignet sich für Nierenkranke trockenes sonniges und windstilles Klima (Wüstenklima, sonniges Hochgebirgsklima).

Die Therapie der Urämie richtet sich nach dem Typus derselben. Bei der eklamp- tischen Form prophylaktisch möglichste Einschränkung der Flüssigkeitszufuhr (Trockenkost), evtl. einige Hungertage. Bei Ausbruch der Anfälle Lumbalpunktionen bis zum Sinken des Spinaldrucks auf normale Werte; zur Beruhigung Sedativa, z. B. Morphinum oder Chloralhydrat (2,0 auf Mucil. Salep 60,0, auf einmal als Klysma); evtl. bei starker Häufung der Anfälle Chloroformnarkose. Besondere Aufmerksamkeit erheischt der Zirkulationsapparat (Coffein, Campher, Digitalis, Strophanthin). Bei der azotämischen Urämie sind vor allem große Aderlässe von 300–500 ccm indiziert, denen man eine Infusion von physiol. NaCl-Lösung oder besser einer 4,5% Dextroselösung folgen läßt. Auch hier sind Herzexcitantien notwen- dig. Bei noch leistungsfähigem Zirkulationsapparat empfiehlt sich ferner der Versuch mit einer Schwitzprozedur im Bett unter reichlicher Zufuhr von heißen Getränken, doch versagt dies Verfahren nicht selten. Bei Benommenheit laues Bad mit kalten Übergießungen. Gegen die urämische Dyspepsie verdünnte Salzsäure 3 mal tgl. 15 Trpf. in Wasser. Therapie des Lungenödems vgl. S. 240. Die in Fällen akuter Urämie empfohlene operative Spaltung der Nierenkapsel (Dekapsulation) zur Befreiung des Organs von dem schädlichen, durch seine Schwellung verursachten Druck hat in einzelnen Fällen Erfolg.

Eine eigentliche allgemeine Prophylaxe der Nierenentzündungen gibt es nicht (abgesehen von der durch Alkohol, Lues sowie Blei bewirkten Nierenschädigung). Bei der rezidivierenden hämorrhagischen Nephritis gelingt es mitunter, durch Ent- fernung des ursächlichen Infektionsherdes (Tonsillen, Alveolarpyorrhöe, Heilung impetiginöser Hauterkrankungen usw.) das Leiden zur Ausheilung zu bringen. Im übrigen muß sich die Prophylaxe auf diejenige gegen weitere Verschlimmerungen und zwar auf das Vermeiden von Erkältungen, körperlichen Überanstrengungen, sowie die Schonung der Nieren durch entsprechende Lebensweise beschränken.

## Orthostatische (cyclische) Albuminurie.

In der Pubertät, mitunter auch schon bei jüngeren Kindern, seltener bei Erwachsenen beobachtet man Albuminurien, deren Auftreten von der Körperhaltung abhängig ist. Derartige Individuen zeigen geringen, bisweilen auch stärkeren Eiweißgehalt bereits wenige Minuten, nachdem sie aus der horizontalen in die aufrechte Haltung übergegangen sind, während sie im Liegen eiweißfrei sind. Das Wesentliche dabei ist die bei diesen Fällen im Stehen sich geltend machende starke Lordose der Lendenwirbelsäule, die wahrscheinlich eine venöse Stauung der Niere zur Folge hat. Daher tritt die Albuminurie auch im Liegen auf, wenn dabei künstlich eine Lordose hervorgerufen wird. In der Regel handelt es sich um blasse nervöse, asthenische Individuen mit Tropfenherz, niedrigem Blutdruck, vasomotorischer Erregbarkeit, Neigung zu Ohnmachten. Bisweilen ist eine latente Tuberkulose vorhanden. Der Harn enthält meist auch den schon in der Kälte durch Essigsäure fällbaren Eiweißkörper. Das Sediment zeigt sehr häufig zahlreiche Oxalat-, Phosphat- und Uratkrystalle, mitunter vereinzelt Zylinder, ferner bisweilen in großer Menge desquamierte runde Epithelien. Verschlechterung des Allgemeinbefindens sowie starke körperliche oder geistige Ermüdung bringt mitunter die bis dahin latente Störung erst zum Vorschein. Öfter beobachtet man bei den mit der Anomalie behafteten Individuen einen starken Wechsel der Pulsfrequenz beim Übergang von der horizontalen in die aufrechte Körperstellung.

Die Kenntnis der orthostatischen Albuminurie ist deshalb so wichtig, weil sie zur Verwechslung mit ernststen Nierenleiden führen kann, wiewohl sie völlig harmlos ist. Allerdings können auch echte Nephritiden im Ausheilungsstadium zeitweise eine cyclische Albuminurie zeigen. Hier entscheidet u. a. die Anamnese bzw. der Sedimentbefund (Erythrocyten). In zweifelhaften Fällen nehme man eine genaue Funktionsprüfung vor. Die Prognose der orth. Alb. ist gut, ein Übergang in echte Nephritis kommt nicht vor. Individuen mit orth. Alb. sind nicht als Nierenkranke zu behandeln (keine Liegekur, keine Nierendiät); notwendig ist vor allem Hebung des Allgemeinzustandes, Kräftigung der Muskulatur durch reichliche Betätigung im Freien, Schutz vor Überanstrengung.

## Stauungsniere.

Störungen der Nierenfunktion treten bei Versagen der Herzkraft oft schon frühzeitig auf, da die Nieren gegenüber der infolge der Stauung im großen Kreislauf und der Überfüllung der Venen zur Geltung kommenden Verlangsamung der Blutzirkulation infolge ihres starken O<sub>2</sub>-Bedürfnisses besonders empfindlich sind. Während eine kurzdauernde Stauung sich nur durch vorübergehende Funktionsstörungen verrät, hat eine länger anhaltende Zirkulationsstörung charakteristische anatomische Veränderungen zur Folge.

Die Stauungsniere präsentiert sich als ein etwas vergrößertes derbes, auf der Schnittfläche cyanotisches Organ mit sehr scharfer Abgrenzung von Rinde und Mark. Mikroskopisch findet man abgesehen von praller Füllung der Gefäße intakte Glomeruli und Harnkanälchen, nach länger bestehender Stauung dagegen Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes.

Der leichteste Grad der Zirkulationsstörung der Niere ist die bereits früher (S. 150) erwähnte sog. Nykturie, d. h. eine nächtliche Vermehrung der Harnmenge bei Sinken derselben tagsüber. Bei der ausgeprägten Stauungsniere ist der Harn dunkel, von geringer Menge und hohem spez. Gew. (1030 und darüber). Oft findet sich reichlich Ziegelmehlsediment. Stets ist Eiweiß vorhanden, meist 1—2<sup>0</sup>/<sub>100</sub> (nicht mehr als etwa 3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>), gelegentlich jedoch werden beträchtliche Eiweißmengen

ausgeschieden, ebenso finden sich Zylinder und Erythrocyten wie bei echter Nephritis, jedoch meist nur in geringer Anzahl. Der NaCl-Gehalt des Harns ist vermindert. Der Rest-N im Serum ist, wenn überhaupt, nur wenig erhöht. Mitunter wird über Schmerzen in der Nierengegend geklagt. Die für Nephritis charakteristischen Augenhintergrundsveränderungen fehlen stets. Der Wasserversuch sowie die Belastung mit NaCl werden ungenügend erledigt, Harnstoff wird dagegen normal ausgeschieden. Blutdrucksteigerung kommt durch die Stauungsniere als solche allein nicht zustande.

Die Neigung zur Entwicklung einer Stauungsniere ist individuell verschieden, so daß manche Kranke mit mäßig starker Herzinsuffizienz bereits deutliche Symptome einer Stauungsniere zeigen, die bei andern Pat. trotz stärkerer Zirkulationsstörung vermißt werden. Der Verlauf der Nierenerkrankung hängt von dem Grundeiden, der Herzschwäche ab. Oft ist erstes Zeichen der Besserung derselben Zunahme der Harnmenge mit Sinken des spez. Gew. In den Endstadien der Stauungsniere kann es zu beträchtlicher Retention harnfähiger Substanzen und Erniedrigung des spez. Gew. kommen.

Bei ausgebildetem Krankheitsbild ist es mitunter schwierig zu entscheiden, ob eine primäre Herzschwäche und sekundär Stauungsniere vorliegt oder ob umgekehrt das Grundeiden eine Nephritis mit daran anschließender Herzinsuffizienz ist. Auch die Nephrosen mit ihrem hohen spez. Gew. kommen differentialdiagnostisch in Frage. Hier entscheidet die Anamnese (Herzklappenfehler usw.), ferner das Fehlen stärkerer Rest-N-Erhöhung und der Retinitis, das Verhalten des spez. Gew. des Harns und nicht zuletzt das prompte Reagieren der Stauungsniere auf Digitalis.

Therapie: Cardiotonica (Digitalis, Strophanthus); Beschränkung der Wasser- und Salzzufuhr, evtl. einige Tage Trockenkost. Im Gegensatz zu den Nephritiden sind hier die verschiedenen Diuretica sehr wirksam: Diuretin 4–6 mal tgl. 0,5, Theacylon 3–5 mal tgl. 1,0. Theocin jeden 2. Tag 2–3 mal tgl. 0,3; Euphyllin als Suppos. 0,36 oder intravenös, ferner Novasuril alle 5 Tage je 1–2 ccm intramusk. bzw. intravenös, Harnstoff (vgl. S. 407), schließlich auch Species diuretic. (Rad. levistic., ononid., liquirit, fruct. juniperi aa 1 Eßl. auf 2 Tassen Wasser) 2 mal tgl. 1 Tasse. Mitunter kommt die Digitaliswirkung erst voll zur Geltung, nachdem die Diurese unter dem Einfluß der Diuretica in Gang gekommen ist.

### Niereninfarkt (Nierenembolie).

Anämische Niereninfarkte entstehen durch Verschleppung von blandem embolischem Material aus dem linken Herzen in die Nierenarterien. Diese sind Endarterien.

Der Infarkt hat die Form eines Keils, dessen Spitze in die Tiefe des Organs reicht, während die Basis an der Oberfläche der Niere liegt. Innerhalb des Infarktes entsteht eine Koagulationsnekrose des Parenchyms, an die sich später eine bindegewebige Organisation mit Narbenbildung und hyaliner Verödung der Glomeruli anschließt. Die linke Niere wird häufiger befallen. Oft entstehen multiple Infarkte.

Klinisch kann der Niereninfarkt vollkommen symptomlos verlaufen und erst bei der Autopsie entdeckt werden. In andern Fällen ermöglichen die klinischen Erscheinungen eine Diagnose. Dazu gehören plötzlich auftretender Schmerz in der Nierengegend wie bei Nierensteinen sowie Hämaturie, evtl. Pulsbeschleunigung. Ausstrahlende Schmerzen sowie Schmerzhaftigkeit der Hoden fehlen. Harnmenge und Nierenfunktion

zeigen keine Abweichung von der Norm. Eine spezielle Therapie kommt nicht in Frage.

Bei maligner (septischer) Endokarditis gestaltet sich das Bild der Nierenembolie dadurch anders, daß es sich um infizierte Emboli handelt. Die mit ihnen in die Nieren verschleppten Bakterien bewirken im Parenchym häufig multiple miliare Abscesse, die auf dem Sektions-tisch als stecknadelkopfgroße, von rotem Saum umgebene Herdchen in der Rinde beim Abziehen der Kapsel sichtbar werden. Eine derartige hämatogen entstandene eitrige embolische Nephritis (Nephritis apostematosa) findet sich oft bei Sepsis bzw. Pyämie. Bemerkenswert sei übrigens, daß starker Leukocytengehalt des Harns bei Sepsis kein sicherer Beweis für Nierenabscesse ist, da derselbe auch ohne diese vorkommt.

Werden von den eingeschwemmten Bakterien nur einzelne Gefäßknäuel bzw. einzelne ihrer Gefäßschlingen verstopft und sind die Keime wenig virulent, so entstehen keine Abscesse, sondern kleine multiple Entzündungsherde mit Nekrose einzelner Glomeruli oder nur vereinzelter Capillarschlingen, Hämorrhagien sowie degenerative Veränderungen im Bereich der benachbarten Harnkanälchen. Diese sog. embolische Herdnephritis findet sich besonders häufig bei der Streptococcus-*viridans*-Sepsis, mitunter auch bei Infektionen mit Staphylococci, *B. coli* usw. Bisweilen führt erst die embolische Herdnephritis auf die Diagnose der Sepsis hin. Die klinischen Erscheinungen sind beträchtliche Eiweißausscheidung und Hämaturie, während die übrigen für Nephritis charakteristischen Symptome wie Blutdrucksteigerung, Retinitis, Rest-N-Erhöhung fehlen. Die Nierenfunktion ist infolge der ausgedehnten intakt bleibenden Teile des Nierenparenchyms normal. Die meist vorhandene Verminderung der Harnmenge erklärt sich durch das gleichzeitig bestehende Fieber.

## Neoplasmen der Niere.

Klinische Bedeutung haben nur die malignen Nierengeschwülste. Der Häufigkeit nach spielen die sog. Hypernephrome eine besondere Rolle (etwa 75% aller Nierentumoren bei Erwachsenen).

Es sind dies bis kleinapfelgroße gelbliche Geschwülste (auch Grawitzsche Tumoren genannt). Man hat ihre Entstehung durch Wucherung von in die Nierenrinde versprengten Keimen von Nebennierengewebe, die sich oft in der Niere finden, zu erklären versucht, zumal die histologische Struktur der Geschwülste derjenigen der Nebennierenrinde entspricht. Charakteristisch ist der Reichtum an dünnwandigen Gefäßen mit einer daraus erklärlichen Neigung zu Blutungen sowie die Tendenz der Tumoren, in die benachbarten Venen einzubrechen und evtl. als massive Geschwulstsäule bis hoch hinauf in die V. cava inf., ja bis in den rechten Vorhof hineinzuwachsen.

Andere maligne Nierentumoren sind teils Sarkome, teils Carcinome, teils teratoide Mischgeschwülste, bei denen bemerkenswert ist, daß sie das Kindesalter bevorzugen.

Klinisch sind die Nierentumoren hauptsächlich durch drei Symptome ausgezeichnet: die intermittierende Hämaturie, ferner Schmerzen sowie das Vorhandensein einer palpablen Geschwulst. Oft ist das erste



Zeichen, das dem Pat. auffällt, die Blutung. Dieselbe kann ohne äußere Veranlassung, auch bei völliger Ruhe, ohne jede Beschwerde auftreten und plötzlich wieder verschwinden. Sie wird von Frauen bisweilen mit der menstruellen Blutung verwechselt. Gleichzeitig mit der Hämaturie können Eiweiß und Zylinder auftreten, die später wieder verschwinden. Bei Kindern wird die Hämaturie meist vermißt. Mitunter enthält der Harn auch eigentümliche, dicken Tripperfäden ähnliche oder regenwurm-artige Gerinnsel. Schmerzen können dauernd fehlen; in andern Fällen besteht dumpfer Druck in der Nierengegend oder sogar heftiger neuralgie-artiger Schmerz. Harndrang fehlt in der Regel. Bei genügender Größe ist der Tumor auch stets palpatorisch nachweisbar. Insbesondere bei Kindern kann er sehr beträchtliche Dimensionen annehmen. Die Tumoren der rechten Niere lassen sich oft früher als die der linken fühlen. In unklaren Fällen bediene man sich der Stoßpalpation von hinten her unter gleichzeitiger Palpation von vorn mit der andern Hand. Auch stelle man die Lage des Colon (ascend. bzw. descend.) zur Niere durch Luftaufblähung bzw. Röntgenuntersuchung und Kontrasteinlauf fest; der Darm liegt stets vor dem Tumor. Mitunter bewirken Nierentumoren Fieber. Beachtenswert sind schließlich eigentümliche, speziell bei Hypernephromen bisweilen vorkommende Symptome, nämlich Glykosurie, ferner Blutdrucksteigerung sowie addisonartige Hautpigmentierungen; ziemlich selten ist der Befund großer glykogenhaltiger Tumorzellen im Harnsediment.

Die Hypernephrome können sich lange Zeit wie gutartige Geschwülste verhalten, bis sie plötzlich malignen Charakter mit schrankenlosem Wachstum zeigen. Infolge des oben beschriebenen Einbruchs in die Venen kann sich schnell ein enormer Hydrops der unteren Körperhälfte mit Ascites und praller Füllung der Hautvenen entwickeln. Auch Paraplegien durch Kompression des Rückenmarks und schließlich relativ häufig Metastasen in andern Organen, insbesondere auch in den Knochen (Röntgen!) und in der Lunge (hämorrhagisches Sputum) kommen bei Hypernephrom vor.

Für die Diagnose der Nierentumoren ist wichtig, daß bei der Dreigläserprobe während der Blutung alle 3 Proben den gleichen Blutgehalt zeigen und daß ferner mitunter auch in der blutungsfreien Zeit mikroskopisch vereinzelte Erythrocyten im Sediment zu finden sind. Das Fehlen größerer Leukocytenmengen spricht gegen Nieren-Tb. Infolge von Kompression der V. spermat. wird gelegentlich eine gleichseitige Varicocele beobachtet. In allen zweifelhaften Fällen ist die Cystoskopie bzw. der Ureterenkatheterismus anzuwenden, letzteres vor allem auch zur Entscheidung der Frage der Zulässigkeit der operativen Entfernung der Niere bzw. der Sicherstellung der normalen Funktion der andern Niere.

Auch die angeborene Cystenniere kann das Bild des Nierentumors hervorrufen. Die Palpation ergibt oft eine unebene, gebuckelte Geschwulst. Häufig besteht die Anomalie beiderseitig. Die Harnbeschaffenheit erinnert an die der Schrumpfniere: Polyurie, Herabsetzung des Konzentriervermögens, geringe Albuminurie, kein Sediment, bisweilen Hämaturie, mäßige Blutdrucksteigerung und Herzhypertrophie.

Als Therapie der Nierentumoren kommt (die Cystenniere ausgenommen) ausschließlich die chirurgische Entfernung des erkrankten Organs in Frage, die jedoch nur bei den Hypernephromen gewisse Aussicht auf Dauererfolg hat und auch hier oft infolge nicht rechtzeitiger Diagnosenstellung zu spät kommt.

### Ren mobilis (Nephroptose, Wanderniere).

Bei Erschlaffung des bindegewebigen Aufhängeapparates der Niere sowie infolge von Schwund des die Niere umgebenden Fettpolsters, speziell des sie stützenden Fettgewebsspropfes zwischen den Blättern der tiefen Bauchfascie (vgl. S. 383) wird die Niere abnorm beweglich und gleitet alsdann bei aufrechter Körperhaltung aus ihrem Lager herab. Das wird hauptsächlich bei der rechten Niere beobachtet und kommt namentlich beim weiblichen Geschlecht vor. Wie bei der Enteroptose (S. 344) handelt es sich einmal um einen erworbenen Zustand infolge starker Verringerung der abdominellen Fettmassen (z. B. als Folge einer Entfettungskur) bzw. um Begleiterscheinung einer Erschlaffung der Bauchdecken mit Hängebauch wie z. B. bei Multiparen; auch starkes Schnüren wird als Ursache angeschuldigt. Andererseits kann es als Analogon der virginellen Ptose (S. 344) ein Teilsymptom einer konstitutionellen Anomalie sein, wie sie im sog. Stillerschen Habitus (vgl. S. 304) zum Ausdruck kommt. Daher ist sie oft mit allgemeiner Enteroptose verbunden. Häufig besteht Psychasthenie. Die abnorme Beweglichkeit der Niere ist durch die Palpation festzustellen. Bei bimanueller Untersuchung gelingt es, wenn die Pat. tief atmet, namentlich bei Ausübung eines stärkeren Druckes von hinten her in der Lendengegend, die Niere durch die Bauchdecken als rundliches glattes Organ zu fühlen, das während der Expiration im Gegensatz zur Leber und Gallenblase sich in seiner Stellung fixieren läßt, ohne in die alte Lage zurückzukehren. Läßt man das Organ los, so begibt es sich beim Liegen wieder in seine normale Lage zurück<sup>1)</sup>. Übergang in die aufrechte Haltung, insbesondere auch mehrmaliges Springen läßt die Niere wieder herabgleiten. Linkseitige Ptose wird nur bei gleichzeitig vorhandener Senkung der rechten Niere beobachtet, während letztere auch allein vorkommt. Bei höheren Graden von Wanderniere zeigt das Organ auch erhebliche seitliche Beweglichkeit, die namentlich an Exkursionen des unteren Poles bemerkbar wird, wobei die Niere indessen fast nie die Mittellinie überschreitet.

In vielen Fällen ist den Pat. das Vorhandensein ihrer Wanderniere nicht bewußt; mitunter bestehen leichte Beschwerden von Ziehen oder Druck in der Nierengegend, die z. T. in das Bein ausstrahlen. Durch den Arzt auf die Nierensenkung aufmerksam gemacht, äußern die Pat. dann öfter allerhand Beschwerden, die größtenteils psychogener Natur sind. Bei hochgradiger Beweglichkeit der Niere kann es indessen selten, namentlich nach schwerer körperlicher Arbeit zu ernsten Erscheinungen wie heftigen Koliken, Brechreiz und peritonitisartigen Symptomen (Meteorismus, Bauchdeckenspannung) kommen. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um eine vorübergehende Abknickung des Ureters bzw. eine intermittierende Hydronephrose.

<sup>1)</sup> Es ist zu beachten, daß eine derartige gründliche Palpation der Nieren vorübergehend zu Albuminurie, ja sogar zu mikroskopischer Hämaturie führen kann. Zugleich bietet dies Phänomen nachträglich einen Beweis dafür, daß das getastete Gebilde tatsächlich die Niere war.

Die Therapie erreicht in der Mehrzahl der Fälle meist schon auf rein psychischem Wege Erfolge durch die beruhigende Versicherung, daß es sich um ein harmloses Leiden handele, was besonders dann notwendig ist, wenn vorher ärztlicherseits der Pat. die Diagnose mitgeteilt worden war. Bei starker Erschlaffung der Bauchdecken bzw. bei Fettschwund die gleiche Therapie wie bei Enteroptose (S. 345). Bei sehr hochgradiger Nephroptose kommt evtl. die operative Fixierung der Niere (Nephropexie) in Frage. Zu vermeiden sind starke Erschütterung des Körpers (z. B. Reiten) sowie heftige körperliche Anstrengungen, namentlich schweres Heben.

### Die Sackniere (Hydro- und Pyonephrose).

Der sog. Sackniere liegt eine abnorme Ausdehnung des Nierenbeckens und der Nierenkelche zugrunde. Sie beruht stets auf Harnstauung infolge von Hindernissen im Bereich der harnableitenden Wege. Die häufigsten Hindernisse sind in den Ureteren steckengebliebene Steine, ferner Kompression der Ureteren durch Tumoren im Becken sowie durch den graviden oder retroflektierten Uterus, weiter Knickung des Harnleiters bei Wanderniere, Narbenstenosen nach Ulcerationen des Ureters (Tb., Steindecubitus bzw. Traumen), Verletzung desselben bei gynäkologischen Operationen, selten auch als angeborene Anomalie in Form abnormer Faltenbildung oder abweichenden Ursprungs des Harnleiters aus dem Nierenbecken, insbesondere eines spitzwinkligen Abgangs des ersteren mit ventilartigem Verschuß. Eine andere Art von Hindernissen ist im Bereich der Harnröhre lokalisiert. Dazu gehören die Prostatahypertrophie, die Harnröhrenstrikturen sowie bisweilen die Phimose. Je nach dem Sitz des Hindernisses kommt es zu einseitiger oder doppelseitiger Entwicklung einer Sackniere. Von Bedeutung ist ferner die Tatsache, daß es weniger die plötzliche Absperrung des Harnabflusses, sondern vielmehr die chronische Erschwerung desselben bzw. intermittierender Verschuß der Abflußwege es sind, die zur Erweiterung des Nierenbeckens führen. Enthält letzteres nicht infizierten Harn bzw. die Sekrete des Nierenbeckens, also eine blande wäßrige Flüssigkeit, so spricht man von Hydronephrose, während der Inhalt der Pyonephrose eitrige Beschaffenheit zeigt.

Die anatomischen Veränderungen bestehen in einer zum Teil sehr beträchtlichen Erweiterung des Nierenbeckens, die u. a. mit Abplattung der Papillen einhergeht. Im weiteren Verlauf entwickelt sich nach vorübergehender Erweiterung der Harnkanälchen eine Atrophie derselben, ferner eine Verödung der Glomeruli sowie Bindegewebsentwicklung mit konsekutiver Schrumpfung, die zum Bilde der sog. hydronephrotischen Schrumpfniere führt. Die Oberfläche des Organs zeigt dabei oft eine eigentümliche Buckelung. In extremen Fällen stellt die Niere schließlich einen mit mehreren Litern Flüssigkeit gefüllten Sack dar, dessen bindegewebige derbe Wand nur noch vereinzelte Reste von Nierengewebe erkennen läßt.

Das Krankheitsbild verhält sich wechselnd je nach der Art des der Sackniere zugrunde liegenden Leidens. Auch gestaltet es sich verschieden, je nachdem der Prozeß intermittierend oder dauernd, beiderseitig oder einseitig ist und ob eine Hydro- oder Pyonephrose vorliegt. Hydronephrosen mäßigen Grades bleiben bei Lebzeiten des Pat. oft völlig latent. Auch eine größere Sackniere braucht, wenn sie konstant vorhanden ist, keine Beschwerden zu verursachen. Im übrigen gehört zu den objektiv nachweisbaren Symptomen in erster Linie

das Bestehen eines Tumors, der zunächst nur den Eindruck einer mäßig vergrößerten Niere erweckt, bei stärkerer Ektasie aber die Dimensionen einer bis zu mannskopfgroßen Geschwulst annehmen kann, die sich nach unten bis ins Becken erstreckt, die Mittellinie überschreitet und den Leib vorwölbt. Oft bestehen dann Druck und Völlegefühl, durch die der Pat. auf sein Leiden aufmerksam wird. Verschiebung des Tumors mit der Atmung beobachtet man bei rechter Sackniere, während sie links meist fehlt. Charakteristische Merkmale sind derbe Konsistenz und häufig deutliche Fluktuation. Das Kolon liegt stets vor dem Tumor. Die Harnentleerung braucht bei einseitiger Sackniere nicht beeinträchtigt zu sein, zumal die andere Niere, normale Funktion vorausgesetzt, die kranke Niere vollkommen zu ersetzen vermag. Trotzdem ist auf die Dauer mit einer Überlastung und Schädigung auch der gesunden Niere zu rechnen. Man unterscheidet offene und geschlossene Hydro-nephrosen. Bei letzteren vermag der Ureterenkatheter nicht ins Nierenbecken einzudringen.

Ein besonderes Krankheitsbild entsteht bei der intermittierenden Hydro-nephrose, die sich bei vorübergehender plötzlicher Unwegsamkeit der Harnwege einstellt und nicht selten mit stürmischen Erscheinungen verläuft. Unter Schüttelfrost, Erbrechen sowie häufig anfänglichem Harndrang treten heftige Schmerzen wie bei Nierensteinkoliken auf und alsbald ist der charakteristische Tumor zu fühlen. Das Abklingen des Anfalls ist von einer größeren Harnflut sowie Verschwinden des Nierentumors begleitet. In manchen Fällen, in denen der genannte Symptomenkomplex fehlt, verrät sich die intermittierende Hydronephrose lediglich durch periodisches Vorhandensein des cystischen Tumors, dessen Natur aus seinem plötzlichen Auftreten und ebensolchem Verschwinden zu erkennen ist.

Bei längerem Bestehen einer doppelseitigen Sackniere, mitunter auch bei einseitiger Hydronephrose, kommt es zuweilen zu Blutdrucksteigerung sowie zu Hypertrophie des linken Ventrikels, was sich aus der fortschreitenden Reduktion des Nierenparenchyms und der dadurch verursachten Retention harnfähiger Substanzen erklärt, und zahlreiche Fälle von Prostatahypertrophie oder von Beckentumoren mit beiderseitiger Hydronephrose gehen schließlich an einer Urämie zugrunde. Vollständiger Verschluß der Harnleiter führt innerhalb weniger Tage zum Exitus.

Pyonephrosen sind durch fieberhaften Verlauf, mitunter mit Schüttelfrost gekennzeichnet und zeigen im allgemeinen ein schwereres Bild als nichtinfizierte Hydronephrosen. Sie kommen nicht selten während der Gravidität vor. Charakteristisch für sie ist, daß während des Bestehens der Krankheitserscheinungen der Harn klar ist, während er von dem Augenblick des Abflusses des Eiters und des Nachlassens des Fiebers trübe wird und massenhaft Leukocyten enthält. Bei längerem Bestehen einer Pyonephrose greift der Eiterungsprozeß auch auf das Nierenparenchym über.

Für die Diagnose der nicht infizierten, offenen Hydronephrose kann die Röntgenuntersuchung des mittels Ureterenkatheters mit Kontrastmasse z. B. mit Collargol oder besser Bromkalilösung gefüllten Nierenbeckens herangezogen werden (sog. Pyelographie), die dessen Erweiterung deutlich erkennen läßt. Bei geschlossener Hydronephrose vermißt man bei der cystoskopischen Untersuchung den Austritt des Harns aus dem Ureterostium der kranken Seite (noch deutlicher

wird dies gegenüber der gesunden Seite bei vorheriger Injektion von Indigocarmin (vgl. S. 387). Zur Abgrenzung von Tumoren in der Nachbarschaft (Gallenblase, Milztumor) dient u. a. die Berücksichtigung der Lage zum Kolon (Röntgenuntersuchung, Aufblähung des Darms); speziell bei linker Hydronephrose ist die Flexura soli sin. an normaler Stelle hinter dem Rippenbogen oberhalb der Niere nachweisbar und das Kolon läuft vor der Niere herab. Milztumoren hingegen drängen die Flexur nach unten und medial herab und zeigen außerdem einen scharfen unteren Rand. Die Probepunktion der Sackniere, die nicht ungefährlich ist und stets nur vom Rücken her vorgenommen werden soll, ergibt in der Regel eine wasserklare Flüssigkeit mit spez. Gew. unter 1020 (Unterscheidung von Ovarialcysten); sie enthält häufig Harnstoff sowie Spuren Eiweiß. Auch der Nierenechinococcus (s. unten) kann eine H. vortäuschen. Die Unterscheidung zwischen Hydronephrose und Nephrolithiasis endlich beruht u. a. auf dem Vorhandensein von Hämaturie bei der letzteren, während sie bei ersterer nur ausnahmsweise beobachtet wird.

Therapie: Bei intermittierender H. infolge von Wanderniere gelingt es bisweilen, durch einfache Lagerung des Pat. die Abklemmung des Ureters infolge Zurückgleitens der Niere in die richtige Lage zu beseitigen. In andern Fällen (Steine usw.) bewirkt mitunter der Ureterenkatheterismus die Aufhebung der Harnsperrre, anderenfalls die operative Beseitigung des Hindernisses in Frage kommt. Bei alten Hydronephrosen erübrigt sich ein chirurgischer Eingriff infolge der bereits weit fortgeschrittenen Verödung der Niere. Bei Pyonephrose ist der Ureterenkatheterismus mit Spülung des Nierenbeckens zu versuchen. Bei geschlossener Pyonephrose chirurgische Therapie und zwar die Nephrotomie; die Entfernung der erkrankten Niere (Nephrektomie) ist nur bei normaler Funktion der andern Niere erlaubt. Bei Auftreten in der Schwangerschaft ist diese evtl. zu unterbrechen. Bei den Hydro- und Pyonephrosen im Anschluß an maligne Tumoren beschränkt man sich auf eine rein palliative Therapie.

### Parasiten der Niere.

Unter den parasitären Erkrankungen der Niere ist hier nur der relativ seltene Echinococcus der Niere zu nennen, der eine Geschwulst bilden kann, die bei genügender Größe die S. 411 beschriebenen physikalischen Symptome hervorruft. Bei Durchbruch ins Nierenbecken treten Schmerzen wie bei Nephrolithiasis sowie Hämaturie auf und der Harn enthält oft die S. 238 beschriebenen charakteristischen Bestandteile des Echinococcus. Vereiterung des E., Verlegung der Harnwege, aber auch Ruptur mit Spontanheilung kommen vor. Therapeutisch kommt nur die operative Entfernung der Geschwulst in Frage. Sonstige parasitäre Erkrankungen s. S. 433.

### Krankheiten der harnableitenden Wege (Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase).

#### Pyelitis (Nierenbeckenentzündung).

Die Pyelitis ist eine nicht seltene Erkrankung; sie besteht in einer bakteriellen Entzündung des Nierenbeckens, die eine ascendierende oder descendierende ist. Oft entwickelt sie sich sekundär im Anschluß an infektiöse Erkrankungen der Harnblase bzw. Harnröhre durch Aufsteigen des infektiösen Prozesses in das Nierenbecken. Diese sog. Cystopyelitis kommt in chronischer Form ungemein häufig namentlich bei Prostatikern sowie Pat. mit Harnröhrenstrikturen, gelegentlich auch bei Phimosen, ferner bei verschiedenartigen Erkrankungen des Beckens, namentlich auch gynäkologischen Affektionen, die zu einer Kompression der Harnleiter führen (häufiger ist der rechte betroffen), so auch

relativ häufig bei Gravidität. Eine weitere Ursache bilden im Nierenbecken oder in den Ureteren befindliche Konkremente, die sowohl infolge Erschwerung des Harnabflusses, als auch durch mechanische Läsionen Katarrhe des Nierenbeckens hervorrufen (Pyelitis calculosa). Auch Pat. mit Blasenlähmung infolge von Rückenmarksleiden erkranken häufig an ascendierender Pyelitis. In allen diesen Fällen ist die Harnstauung mit daran anschließender Bakterienwucherung ein Moment, das die Entstehung der Krankheit fördert. Aber auch auf hämatogenem Wege können Pyelitiden infolge der Ausscheidung von Bakterien durch die Niere ins Nierenbecken entstehen. Mitunter besteht dann zugleich eine Erkrankung der Niere (Pylonephritis). Im Verlauf schwerer Infektionskrankheiten insbesondere bei Typhus sowie Pocken wird auch bisweilen eine Pyelitis beobachtet.

Den bisher genannten Formen von Pyelitis stehen gewisse Pyelitiden gegenüber, die sich ohne erkennbare Ursache entwickeln und klinisch ein selbständiges Leiden darstellen. Derartige Formen werden vor allem häufig beim weiblichen Geschlecht, z. T. schon im Kindesalter beobachtet. Sie beruhen fast immer auf Infektion mit dem *B. coli* und scheinen oft mit chronischer Obstipation in Zusammenhang zu stehen. Man hat hier an die Möglichkeit einer direkten Überwanderung der Keime auf dem Lymphwege vom Kolon auf das benachbarte Nierenbecken gedacht. Doch kommt auch die Übertragung der Bakterien vom After auf die Genitalien durch die Schamspalte in Betracht. Das rechte Nierenbecken erkrankt wesentlich häufiger als das linke.

Bei Kindern beobachtet man Pyelitis besonders nach Darmkatarrhen, nach Varicellen sowie Masern.

Der anatomische Befund in den leichten Fällen von Pyelitis ist der einer katarrhalischen Schwellung und Rötung der Schleimhaut des Nierenbeckens, zum Teil mit Blutungen; in den schwereren Fällen findet man eine eitrige Pyelitis und bei Anwesenheit von Steinen nicht selten Nekrosen mit Pseudomembranbildung; auch ist mitunter das mit Eiter gefüllte Nierenbecken stärker erweitert (Pyonephrose). Bei längerem Bestehen einer Pyelitis bleibt auch das Nierenparenchym nicht unbeteiligt und die dortselbst sich abspielenden Entzündungsprozesse können schließlich zum Befunde der sekundären Schrumpfniere führen.

Das Krankheitsbild der Pyelitis zeigt in den einzelnen Fällen erhebliche Verschiedenheiten je nach der Entstehung derselben und der Art des bestehenden Grundleidens. In zahlreichen Fällen von sekundärer ascendierender P. sind die klinischen Symptome wenig markant, zumal wenn der Harn schon vorher infolge einer bereits bestehenden Cystitis die für diese charakteristischen Veränderungen zeigt. In derartigen Fällen weist höherer Temperaturanstieg sowie oft das Auftreten von Schmerz in der Nierengegend auf die Erkrankung des Nierenbeckens hin; andererseits können diese selbst bei schwerster P. fehlen. Häufig ist die Niere druckempfindlich. Sehr oft ist die Erkrankung beiderseitig. Schwere eitrige P. pflegt mit höherem Fieber, evtl. mit Schüttelfrösten einherzugehen. Hier zeigt der Harn oft auch ammoniakalische Zersetzung wie bei Cystitis (*Staphylococci*, *Proteus*) und nicht selten greift der Prozeß auch auf die Niere selbst über: Pylonephritis. Diese bildet häufig

den letzten Akt eines chronischen Harnleidens oder eines Rückenmarkleidens. Der tödliche Ausgang erfolgt hier oft unter den Symptomen der Urämie.

Als besondere Form der Pyelitis, die unter dem Bilde einer selbständigen Erkrankung auftritt und praktisch von großer Bedeutung ist, ist die schon erwähnte vorwiegend beim weiblichen Geschlecht vorkommende Kolipyelitis zu nennen. Sie kann unter den Zeichen einer schweren allgemeinen Infektionskrankheit unter hohem Fieber, initialem Schüttelfrost, Erbrechen, großer Abgeschlagenheit, Kopf- und Kreuzschmerzen beginnen und den Verdacht auf Sepsis oder Typhus erwecken. Der Puls bleibt oft relativ niedrig. Milzvergrößerung pflegt zu fehlen; die Leukocyten



Abb. 42. Sediment bei Pyelitis] mit massenhafter Epitheldesquamation und Blutung nach einem Anfall von Nephrolithiasis. (Nach Lenhartz-Meyer.)

sind mäßig oder nicht vermehrt, die Eosinophilen vermindert. Aufklärung bringt die Untersuchung des Harns. Charakteristisch ist ein dünner heller Harn, der stark getrübt ist. Häufig besteht nachts vermehrte Harnentleerung. Bezeichnend ist, daß die Harnmenge trotz des Fiebers vermehrt und das spez. Gew. erniedrigt ist (1005—1012). Die Reaktion ist sauer. Die Trübung besteht zum großen Teil aus Bakterien (fast immer *B. coli* in Reinkultur). Beim Stehen bildet der Harn einen Bodensatz. Der Eiweißgehalt ist meist nur gering. Das Sediment enthält vor allem sehr zahlreiche Leukocyten, daneben oft in geringer Menge Erythrocyten, während Nierenelemente, speziell Zylinder in der Regel fehlen. Dagegen sind häufig in wechselnder Zahl die S. 389 erwähnten und in Abb. 42 dargestellten sog. geschwänzten Epithelien vorhanden, die indessen weder speziell für die Pyelitis charakteristisch sind, noch konstant bei ihr vorkommen. Charakteristisch ist die anamnestisch häufig zu erhebende Angabe über Reizzustände der Blase wie bei Cystitis, die oft Tage oder sogar Wochen der Erkrankung vorausgehen.

Der fieberhafte Zustand pflegt meist nur eine Reihe von (oft 5—6) Tagen anzuhalten, sodann erfolgt lytische Entfieberung. Meist tritt jedoch nach einigen Tagen ein kürzerer Rückfall ein, der sich evtl. noch ein- oder mehrere Male wiederholt, so daß eine recurrens- oder malaria-ähnliche Temperaturkurve entstehen kann. Die abnorme Harnbeschaffenheit, insbesondere die Trübung, der Leukocyten- und Bakteriengehalt bleibt oft noch viele Wochen ziemlich unverändert. Auch neigen diese Formen dazu, auch später spontan oder nach Erkältungen bzw. im Verlauf hartnäckiger Stuhlverstopfung zu rezidivieren. Die Rezidive können von gleicher Schwere und Dauer wie der erste Anfall sein, in andern Fällen sind sie nur flüchtig und verraten sich bisweilen lediglich durch leichten Temperaturanstieg, Zunahme der Harntrübung und nur geringe Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens. Häufig treten sie zur Zeit der Menstruation oder prämenstruell auf und verleiten beim Versäumen einer genauen Harnuntersuchung zur Fehldiagnose einer latenten Tb. Derartige mit der Menstruation coincidierende Rückfälle können in sehr großer Zahl auftreten und dann ein regelrecht chronisches Leiden bilden. Die bei diesen Formen ständig auch in der anfallsfreien Zeit vorhandene Bakteriurie d. h. die Ausscheidung eines durch massenhaft Bakterien getrübbten Harns zeichnet sich durch große Hartnäckigkeit aus und besteht oft jahrelang.

Die im Verlauf der Gravidität auftretende meist rechtsseitige Pyelitis wird hauptsächlich zwischen dem 3.—5. Monat beobachtet und zeigt die gleichen akut fieberhaften Symptome. Sie hat eine günstige Prognose, neigt aber ebenfalls zu Rezidiven.

Erwähnung verdient noch die praktisch wichtige Tatsache, daß bei einseitiger Pyelitis infolge von Stauung des dicken eitrigen Sekretes es vorübergehend zur Stockung des Harnabflusses kommen kann. Es entsteht dann der bei der Pyonephrose geschilderte scheinbar paradoxe Zustand, daß Verschlimmerung des Krankheitsbildes sowie Ansteigen des Fiebers mit klarem, eiterfreiem Harn einhergeht (der von der gesunden Seite stammt), während das Auftreten von eitrigem Harn infolge der Wiederherstellung des Abflusses mit Abklingen der Krankheitserscheinungen und Entfieberung Hand in Hand geht.

Therapie: Bettruhe, solange Fieber besteht. Reizlose Kost nach Art der Nierendät. Eventuell heiße Kataplasmen bzw. Thermophor in die Nierengegend. Die medikamentöse Verabreichung von harndesinfizierenden Mitteln wie Urotropin (Hexamethylentetramin) 3—4 mal tgl. 1,0 oder Hexal (Urotropin + Salicylsäure), Borovertin (Urotropin + Borsäure), oder Myrmalyd 4 mal 0,5, sowie Fol. uv. ursi als Dekokt (1 Eßl. auf 2 Tassen, 3 mal tgl. 1 Tasse) wird vielfach angewendet, doch ist ihr desinfizierender Effekt oft nur gering. Reichliche Flüssigkeitszufuhr zur Durchspülung des Nierenbeckens mit alkalischen Wässern (Wildungen, Wernarzer, Fachinger) kann namentlich bei starker Eiterabsonderung und der Gefahr der Retention von Vorteil sein. Doch ist man neuerdings dazu übergegangen, umgekehrt durch Verminderung der Trinkmenge (Trockenkost), Zufuhr von Säure und Schwitzprozeduren einen möglichst konzentrierten sauren Harn zu erzielen, um die Bakterienwucherung zu erschweren (3—4 mal tgl. 15—20 Trpf. HCl oder Phosphorlimonade: Acid. phosphoric. 25% und Sir. rub. Id. aa 50,0, Aq. dest. ad 1000,0 oder 4 mal tgl. 1 Recresaltabl.). Bei Graviditätspyelitis Lagerung auf die linke Seite zur Beseitigung der Kompression des rechten Harnleiters. Im übrigen empfiehlt sich auch hier exspektatives Verhalten. Bei Kolipyelitis hat mitunter die Behandlung mit einer aus dem eigenen Kolistamm hergestellten Autovaccine Erfolg. In einzelnen Fällen wirken auch die von urologischer Seite empfohlenen



Nierenbeckenspülungen mit Collargol oder Ag. nitric. mittels Ureterenkatheterismus günstig. Konkreme als Ursache der Pyelitis bei Nephrolithiasis sind am besten operativ zu entfernen; chirurgische Therapie kommt auch bei Prostataaffektionen in Frage.

### Nephrolithiasis (Nierensteine).

Nierensteine entstehen durch Ausfallen der im Harn normalerweise in Lösung befindlichen Substanzen. Je nach der Größe der ausfallenden krystallinischen Massen spricht man von Nierensand, der als feinkörnige pulverartige Masse einen Bodensatz im Harn bildet, von Nierengrieß, wenn die Konkreme in Form größerer Körner bis Stecknadelkopfgröße auftreten und von Nierensteinen, wenn es sich um größere Gebilde handelt. Unter den steinbildenden Bestandteilen des Harns steht an erster Stelle die Harnsäure, nächst dem der phosphorsaure Kalk, an dritter Stelle der oxalsaure Kalk. In ganz vereinzelt Fällen kommt auch das Cystin in Frage. In der Regel ist das Leiden einseitig. Aufenthaltsort der Nierensteine ist das Nierenbecken. Aus diesem gelangen sie bei mäßiger Größe oft in den Ureter, dessen Peristaltik sie dann in die Blase treibt.

Nephrolithiasis ist eine relativ häufige Krankheit, die Männer öfter als Frauen befällt, aber auch schon im Kindesalter beobachtet wird. Oft dürfte eine gewisse konstitutionelle Disposition eine Rolle spielen, wie sowohl das häufige familiäre Auftreten, als auch die Kombination mit Gallensteinen wie andererseits mit Gicht zu beweisen scheint. Man hat diese ganze Gruppe von Erkrankungen als „Arthritismus“ zusammengefaßt.

Die verschiedenen Arten von Konkrementen haben oft ein so charakteristisches Aussehen, daß man ihnen nicht selten ihre Zusammensetzung ansehen kann. Näheren Aufschluß gibt die chemische Untersuchung. Harnsäurekonkremente sind von gelblicher oder gelbrötlicher Farbe, sehr hart, bröckelig; charakteristisch für sie ist die Murexidprobe: Abrauchen mit  $\text{HNO}_3$  gibt Orangefärbung, die durch  $\text{NH}_3$ -Zusatz in Purpur, durch nachherigen  $\text{KOH}$ -Zusatz in Blau übergeht. Beim Glühen auf dem Platinblech verbrennen sie vollkommen. Steine aus Phosphaten (Kalk, Magnesia bzw. Ammoniakmagnesia) sind weiß und weich und lassen sich zwischen den Fingern zerdrücken; sie lösen sich in Essigsäure beim Erwärmen ohne Aufbrausen und verbrennen nicht beim Glühen. Die Oxalatsteine sind sehr hart, von bräunlicher oder dunkler Farbe (Blutfarbstoff) und zeigen meist eine höckrige oder stachelige Oberfläche in Form der sog. Maulbeersteine; sie lösen sich nicht in Essigsäure, dagegen in anorganischen Säuren z. B.  $\text{HCl}$  ohne Aufbrausen. Beim Glühen gehen sie in  $\text{CaCO}_3$  über, das man aus der Gasentwicklung beim Übergießen mit Säuren erkennt. Cystinsteine, die bei der sog. Cystinurie vorkommen, sind gelb, glatt und nicht sehr hart; sie verbrennen ohne Reste. Cystin löst sich in warmem  $\text{NH}_3$  und krystallisiert beim Verdunsten in charakteristischen mikroskopischen sechsseitigen Tafeln aus. Die Harnsteine zeigen ein aus Eiweiß bestehendes Gerüst.

Die Entstehung der Harnkonkremente (Nieren- und Blasensteine) läßt sich nicht, wie man gemeint hat, ohne weiteres immer auf den vermehrten Gehalt des Harnes an dem betreffenden Stoff zurückführen, zumal die absolute ausgeschiedene Menge desselben häufig die Norm nicht übersteigt. Das Wesentliche bei der Steinbildung dürfte vielmehr darin liegen, daß diejenigen Vorgänge, die die lithogenen Substanzen normal im Harn in Lösung halten, eine Störung erfahren. Dazu gehört einmal die Änderung der Reaktion des Harns. Stark saurer Harn macht oft aus den normal im Harn als Mononatriumurat vorhandenen harnsauren

Salzen die Harnsäure frei, die als solche krystallinisch ausfällt. Umgekehrt bewirkt alkalische Reaktion eine Überführung der löslichen sauren phosphorsauren Salze in die unlöslichen basischen Phosphate. Ein weiterer wichtiger Umstand ist die Tatsache, daß der normale Harn gewisse Bestandteile wie z. B. die Harnsäure in höherer Konzentration, als ihrer Wasserlöslichkeit entspricht, in Lösung hält, also eine sog. übersättigte Lösung darstellt. Dies Phänomen erklärt man mit den in den organischen Flüssigkeiten stets gleichzeitig vorhandenen Kolloiden, deren Gegenwart eine derartige Übersättigung ermöglicht (sog. Schutzkolloide). Fehlen dieselben oder werden sie infolge ihrer Präcipitierung unwirksam, so kommt es zur Ausfällung der bis dahin gelösten Konkrementbildner.

Sind erst Konkremeute entstanden, so fördert ihr Vorhandensein auf verschiedene Weise eine weitere Erzeugung von Steinen bzw. deren Vergrößerung. Dazu gehört zunächst die Anwesenheit der Konkremeute selbst, welche Krystallisationszentren bilden, ferner die katarrhalische Entzündung der Schleimhaut, deren Produkte die Niederschlagsbildung fördert, sowie weiter die bakterielle Zersetzung des Harns. Letztere bewirkt durch Alkalischeswerden des Harns ein Ausfallen der Phosphate (Carbonate) der Erdalkalien, die ihrerseits die bereits vorhandenen Steine wie eine Schale umgeben und sie durch Apposition vergrößern. So entstehen dann gemischte Konkremeute, deren Kern häufig aus Harnsäure oder oxalsaurem Kalk besteht. Letzteres kommt allerdings häufiger bei Blasensteinen vor. In einzelnen Fällen beruht das Ausfallen von Alkalien nicht auf bakteriellen Vorgängen, sondern hat andere Gründe, und zwar z. B. die Abscheidung eines von vornherein alkalischen Harns bzw. die Ausscheidung abnorm hoher Kalkmengen durch die Nieren (Phosphaturie und Calcariurie vgl. S. 433).

Ganz große Konkremeute können das Nierenbecken völlig ausfüllen und mit ihren geweihartigen Fortsätzen bis tief in die Nierenkelche hineinreichen (sog. Korallensteine). Sehr häufig handelt es sich um multiple Steine. Die schädlichen Folgen der Steine bestehen analog den Gallensteinen in mechanischer Reizung der Schleimhaut (Entzündung und Blutung usw.), Harnstauung und Förderung der bakteriellen Infektion.

**Krankheitsbild:** Nierensteine können lange Zeit symptomelos bleiben. Das gilt u. a. bisweilen von den großen Steinen und den Konkrementen in den Nierenkelchen. Andererseits verursachen auch ganz kleine Konkremeute wie Nierensand oder Nierengriß oft keine Beschwerden und gehen unbemerkt ab. Beschwerden entstehen vor allem durch mittelgroße bewegliche Steine, die zu Einklemmungserscheinungen am Nierenbeckenausgang oder im Ureter führen. Das hierfür charakteristische Krankheitsbild ist das der Nierensteinkolik. Diese beginnt in der Regel plötzlich, spontan oder nach heftiger Erschütterung des Körpers wie Laufen, Springen, Reiten, Fahren auf holperigem Wege, Kälteeinwirkung usw. und besteht in äußerst heftigen Schmerzen in der Nierengegend, die nach unten dem Verlauf der Harnleiter entsprechend in die Blasen- und Genitalien, die Innenfläche des Oberschenkels ausstrahlen. Oft ist der gleichseitige Hoden druckempfindlich. Die Schmerzen zeigen meist kolikartigen Charakter d. h. An- und Abschwollen ihrer Intensität. Häufig besteht zugleich mäßiges Fieber, Erbrechen, mitunter Schüttelfrost, auch stellt sich meist sehr hartnäckige Stuhlverstopfung, bisweilen mit Verhaltung von Winden ein. Bei sehr heftigen Anfällen kann es zu Kollapserscheinungen mit kleinem frequentem Puls, kaltem Schweiß sowie Ohnmacht kommen. Häufig besteht zugleich Harndrang, wobei aber nur ganz kleine Harnmengen entleert werden. Nicht ganz selten hört gleichzeitig mit dem Anfall die Harnausscheidung völlig auf, so daß beim Katheterismus die Harnblase leer gefunden wird.

Dies kommt auch dann vor, wenn nur die eine Niere steinkrank und die andere frei von Konkrementen ist. Die Hemmung der Harnsekretion dürfte hier auf nervösem Wege als Folge des Schmerzanfalles erfolgen (sog. reflektorische Anurie). Die Anurie kann evtl. tagelang dauern. Wird etwas Harn entleert, so gibt dessen Blutgehalt sofort Aufschluß über die Ursache der Koliken. Mindestens enthält der Harn mikroskopisch Erythrocyten. Der Kolikanfall ist von sehr verschiedener Dauer, oft hält er nur kurze Zeit oder mehrere Stunden an, er kann aber auch tagelang dauern. Das Aufhören des Anfalls ist bisweilen, aber keineswegs immer von Entleerung eines kleinen Konkrementes oder von Gieß durch die Harnröhre begleitet. Das Auftreten neuer Anfälle ist unberechenbar, doch kann es durch unzweckmäßige Lebensweise (körperliche Anstrengung, Verstopfung usw.) gefördert werden. Zwischen den Anfällen fühlen sich viele Pat. völlig beschwerdefrei und leistungsfähig, andere klagen über leichte ziehende Schmerzen in der Nierengegend, über Magendarmbeschwerden sowie über öfter auftretenden Harndrang. Die mikroskopische Untersuchung des Harns ergibt bisweilen auch in der Zwischenzeit zeitweise Hämaturie. Mitunter beträgt der Zwischenraum zwischen zwei Anfällen Jahre.

Zu den Folgeerscheinungen der Nephrolithiasis ist die durch Infektion des Nierenbeckens entstehende Pyelitis bzw. Pyelonephritis (vgl. S. 416) zu nennen, die eine ernste Komplikation darstellt und manchen Steinkranken schließlich zum Opfer einer tödlichen Sepsis werden läßt. Stark leukocytenhaltiger Harn, der in schweren Fällen ammoniakalisch zersetzt ist, hohe Temperaturen mit Schüttelfrösten, Kräfteverfall, starker Durst sind charakteristische Symptome. Eine andere Komplikation ist die dauernde Obturation des Nierenbeckenausgangs bzw. des Ureters durch ein Konkrement. Die Folge ist eine einseitige Hydronephrose. Klinisch kann diese abgesehen von einer Vergrößerung der Niere latent bleiben, wenn die andere Niere die Funktion beider Organe voll übernimmt. Schließlich kann infolge lange andauernder Anurie Urämie eintreten, die jedoch bei Nephrolithiasis auffallend selten beobachtet wird.

Diagnose: Der Kolikanfall kann sowohl mit einer Cholelithiasis wie mit andern akuten Abdominalaffektionen speziell mit Appendicitis sowie Ileus große Ähnlichkeit haben. Ferner kommen in Betracht Wanderniere, Ulc. ventric. und duodeni sowie tabische Krisen. Abgesehen von den anamnestisch zu erhebenden früheren Anfällen sind die in die Blase und den Penis ausstrahlenden Schmerzen, ferner die oft vorhandene Druckempfindlichkeit des gleichseitigen Hodens sowie Schmerz bei Zug am Samenstrang, endlich die Hämaturie wichtige Handhaben. Oft besteht auch Druckempfindlichkeit des Ureters innerhalb vom Psoas (d. h. bei rechtsseitiger Steinriere einwärts vom Mac Burneyschen Punkte). In der Regel enthält das Harnsediment Krystalle der Substanz, aus der die Konkreme bestehen (das gilt namentlich für Harnsäure- und Oxalatkrystalle). In zahlreichen Fällen (über 90%) gelingt es ferner durch die Röntgenphotographie der Nieren (nach gründlicher Entleerung des Darmes) die Steine zur Darstellung zu bringen, und zwar hauptsächlich die Oxalat- und Phosphat-, aber auch die Cystinsteine, während Harnsäure nur schlechte Kontrastbilder liefert. Indessen kann auch die Nieren-Tb. infolge des Kalkgehaltes des verkästen Gewebes zu Röntgen-Fehldiagnosen Anlaß geben, zumal das klinische Bild gelegentlich dem der Steinriere gleicht; ersteres gilt auch von verkalkten Mesenterialdrüsen sowie Phlebolithen.

**Therapie:** Vermeiden starker körperlicher Anstrengung (verboten Reiten, Radfahren), während andererseits mäßige körperliche Betätigung günstig wirkt; Bekämpfung der Obstipation; Vermeiden von kalten Bädern. Die Regelung der Diät richtet sich nach der chemischen Natur der Konkremeute. Bei Harnsäuresteinen Einschränkung der Purinkörper in der Nahrung (verboten Kalbsmilch oder Bries, Leber, Nieren, Milz); viel Obst und Gemüse sowie Zufuhr von Alkalien zur Herabsetzung der Harnacidität: 2 mal tgl. 5,0 Natr. bic. oder Calc. carbon.; alkalische Wässer wie Fachinger, Wildunger Georg Victor, Marienbader Rudolfsquelle (beide calciumhaltig), Neuenahr, Brückenau, Biliner, Vichy Célestins, ferner Lithiumwässer wie Salzschlirf (Bonifazius) oder Aßmannshausen. Bei Oxalurie verboten Tomaten, Spinat, Sauerampfer, Rhabarber; ferner 3 mal tgl. 15 Trpf. offic. HCl in Wasser. Bei Konkrementen aus Erdalkalien Säurezufuhr (HCl oder  $H_3PO_4$ ). Der Kolikanfall selbst erfordert in der Regel Morphium subcut. 0,02 (+ 0,00025 Atropin), ferner Belladonnasuppos. 0,03. Applikation von heißen Kataplasmen oder Thermophor in der Nierengegend; evtl. auch warmes Bad. Bei hartnäckiger Wiederholung der Anfälle sowie häufigen Blutungen evtl. operative Behandlung (Nephrotomie); dieselbe ist absolut indiziert bei Einklemmungserscheinungen mit länger dauernder Anurie.

## Die Tuberkulose der Niere und der harnableitenden Organe.

Abgesehen von der klinisch bedeutungslosen Aussaat von Miliartuberkeln in den Nieren im Verlauf einer Miliartuberkulose kommt eine Nierentuberkulose in der Regel in der Weise zustande, daß bei einer schon bestehenden Tb. eines anderen Organs (Lungen, Drüsen, Knochen usw.) Infektionsmaterial auf dem Blutwege in die Nieren verschleppt wird und dort die charakteristischen Gewebsveränderungen der Tb. erzeugt.

Die Erkrankung beginnt in der Regel in einer Niere, häufiger rechts, und pflegt von einem kleinen Herde in der Marksubstanz ihren Ursprung zu nehmen, wo mit Tuberkelbacillen vollgestopfte Harnkanälchen und die von diesen ausgehende Entzündung und Verkäsung das erste Stadium der Erkrankung bilden (sog. Ausscheidungs-Tb.). Durch Ausdehnung der Verkäsung, Zerfall von Nierengewebe und Durchbruch des Herdes ins Nierenbecken wird aus der geschlossenen Nieren-Tb. eine der fortschreitenden Lungen-Tb. analoge offene Nieren-Tb., bei der die Produkte des Gewebszerfalls einschließlic der Bacillen dem Harn beigemischt werden. Später können größere Teile der Niere der Erkrankung zum Opfer fallen und schließlich ausgedehnte Höhlenbildung aufweisen (Phthisis renalis bzw. Pyonephrosis caseosa). Eine Folge des Durchbruchs des Herdes ins Nierenbecken ist die Tb.-Erkrankung der ableitenden Harnwege (descendierende Tb.), wobei der Ureter, zunächst in seinem unteren Abschnitt unter den gleichen Erscheinungen, ferner auch die Harnblase, und zwar anfangs an der Uretermündung mit Geschwürbildung erkranken. Im weiteren Verlauf kommt es zu ausgedehnter käsiger Infiltration des Ureters, dessen Durchmesser entsprechend zunimmt. Die beschriebenen Veränderungen bewirken häufig Harnstauung sowie im Zusammenhang damit weitere Ausbreitung des Tb.-Prozesses sowohl auf andere Markpapillen der gleichen Niere als auch ein Ascendieren der Erkrankung von der Blase aus nach der gesunden Seite (sekundär ascendierende Tb.). Doch wird die andere Niere bisweilen erst Jahre später ergriffen. Oft erkrankt auch die Blase in ausgedehnterem Maß und zeigt dann namentlich im Bereich des Trigon. Lieut. zahlreiche lenticuläre oder auch zusammenfließende zackig begrenzte Schleimhaut-Ulcerationen mit Tb.-Knötchen am Rand und im Grunde der Geschwüre. Gegenüber dem Descendieren der Tb. entsprechend der Richtung des Harnstromes ist ein primäres Aufsteigen der Erkrankung z. B. von einer Genital-Tb. sehr selten.

Das Leiden befällt in der Regel das mittlere Lebensalter (am häufigsten das 20.—30. Jahr). Als disponierende Momente gelten Traumen sowie u. a. Gonorrhöe. Der primäre Tb.-Herd im Körper kann latent bleiben.

Krankheitsbild: Oft vermißt man längere Zeit charakteristische Beschwerden. In manchen Fällen wird frühzeitig über vermehrten Harn- drang geklagt, der dann oft fälschlich auf einen einfachen Blasenkatarrh bezogen wird. Gleichzeitige leichte Temperatursteigerungen, Beeinträchti- gung des Allgemeinbefindens wie Mattigkeit, Gewichtsabnahme müssen den Verdacht auf eine latente Tb. erwecken. Bisweilen lenken gewisse lokale Beschwerden wie Schmerzen oder Druckempfindlichkeit in der Nierengegend die Aufmerksamkeit auf das Leiden. Doch fehlen sie häufig dauernd. Ein sehr häufiges Symptom ist eine dauernde, wenn auch oft nur geringfügige Hämaturie. Im weiteren Verlauf treten nach Durchbruch des Herdes ins Nierenbecken die Symptome einer Pyelitis auf. Der Harn wird dauernd oder zeitweise trübe, enthält Leukocyten und in wachsender Menge Erythrocyten. Die Harnmenge ist normal oder etwas vermehrt, die Reaktion stets sauer (die Tb. zersetzen den Harnstoff nicht). Bakterien fehlen anfangs häufig bei der mikroskopi- schen Untersuchung sowie beim gewöhnlichen Kulturverfahren. Später finden sich oft TB. namentlich in kleinen käsigen Bröckeln im Sediment, wo sie bisweilen in großen Mengen zopfförmig verflochten auftreten. Mitunter ist der erkrankte Ureter als verdickter Strang durch die Bauch- decken, beim Weibe per vaginam zu tasten. Im weiteren Verlauf pflegen die Erscheinungen allgemeinen Verfalls mit zunehmender Abmagerung, Anämie, Fieber wie bei jeder fortschreitenden Tb. mehr in den Vorder- grund zu treten, während die örtlichen Beschwerden seitens der Nieren oft auch jetzt völlig fehlen oder nur geringfügig sind. Durch das Über- greifen der Krankheit auf die Blase können dagegen sehr qualvolle Zustände mit dauernden schmerzhaften Tenesmen und fortwährendem Harn- drang auch nachts eintreten. Mitunter entwickelt sich ein para- nephritischer Absceß (s. nächste S.). Die Dauer des Leidens erstreckt sich oft über Jahre. Der Tod erfolgt bei doppelseitiger Nieren-Tb. bisweilen durch Urämie, häufig auch unter Erscheinungen von Amyloidose oder allgemeiner miliarer Aussaat. Selten kommt es zu Spontanheilung. In einer Reihe von Fällen kompliziert sich die Tb. der Harnorgane mit einer solchen der Genitalien. Beim Mann werden namentlich die Prostata, die Samenblasen (per rectum als knotig-derbe Gebilde fühlbar) sowie die Nebenhoden ergriffen; letztere verwandeln sich in harte, höckerige, häufig indolente Organe. Beim Weibe erkranken Ovarien, Tuben und Uterus mit daran anschließender Peritoneal-Tb.

Die Frühdiagnose der Nieren-Tb. ist wegen der nur in den Anfangsstadien erfolgreichen chirurgischen Therapie von der größten Bedeutung.

Jeder Fall von hartnäckiger Pyelitis mit saurer Reaktion ohne klare Ätiologie bzw. mit einem bei den gewöhnlichen Untersuchungsmethoden sterilen Harn ist auf Tb. verdächtig, desgleichen jede dauernde Hämaturie, die keine anderweitige Erklärung findet, ferner Pollakisurie sowie endlich akute cystitische Erscheinungen ohne genügend erkennbare Ursache. Der Nachweis anderer Tb.-Herde im Körper ist für die Diagnose bedeutsam. In allen derartigen Fällen fahnde man sorgfältig auf TB. zunächst mikroskopisch (man benutze zur Untersuchung vor allem die kleinen, etwa stecknadelkopfgroßen Fetzen im Bodensatz). Sicherer ist die Tier- impfung, zu der man am besten das Sediment des ganzen 24stündigen Harns verwendet (vgl. S. 225). Stets ist für diese Untersuchung nur durch Katheterismus

gewonnener Harn zu benutzen, um Verwechslungen mit den den TB. sehr ähnlichen Smegma-Bacillen zu vermeiden. Eventuell Ureterenkatheterismus. Stets ist ferner die cystoskopische Untersuchung erforderlich, da oft bereits frühzeitig das Ureterostium der entsprechenden Seite gerötet, geschwollen oder schon von kleinen Ulcerationen umgeben ist. Die diagnostische Anwendung des Tuberkulins (Dosierung vgl. S. 226) führt nur bisweilen zu einem Ergebnis (Verstärkung der Schmerzen und der Hämaturie), ist aber nicht ungefährlich. Im Röntgenbild ergeben **mitunter** die verkästen Massen infolge von Verkalkung den Nierenkonkrementen ähnliche Bilder.

Die einzig wirksame Therapie ist die möglichst frühzeitige operative Entfernung der erkrankten Niere, falls die andere Niere bei genauer Funktionsprüfung sich als völlig gesund erweist, was im Anfangsstadium in einer großen Zahl (etwa 90%) von Fällen zutrifft. Nach der Nephrektomie heilen meist die Tb.-Veränderungen des Ureters und der Blase spontan aus. Bei doppelseitiger Erkrankung konservative Therapie (Mast-, Ruhekur, Klimato- und Heliotherapie), eventuell Tuberkulin (vgl. S. 231). Gegen die spezifischen Blasenveränderungen wirken oft Injektionen von Jodoformemulsionen (5%) 2 mal wöchentlich günstig.

### Der paranephritische Absceß (perirenal Absceß).

Die in dem lockeren Bindegewebe in der Umgebung der Niere, insbesondere in der Nierenfettkapsel auftretenden Entzündungsprozesse können einmal durch Fortleitung von einer erkrankten Niere selbst entstehen. Sie schließen sich u. a. an Pyonephrosen, infizierte Steinnieren, Nieren-Tb., Aktinomykose, Echinococcus der Niere, gelegentlich auch an Traumen, ferner an Erkrankungen des Magendarmkanals, der Leber und Gallenblase an. Praktisch wichtiger sind die metastatisch auftretenden Eiterungen. Sie entwickeln sich mit besonderer Vorliebe nach (oft sehr geringfügigen) infektiösen Hauterkrankungen, in erster Linie Furunkeln, gelegentlich auch nach Panaritien, Ekzemen usw. — die Erreger sind in diesen Fällen stets Staphylococci —, aber auch nach Anginen sowie im Verlauf von Infektionskrankheiten wie Typhus. Die Krankheit hat eine erhebliche praktische Bedeutung.

Das Krankheitsbild beginnt in der Regel mit heftigen Schmerzen in der Nierengegend und Druckempfindlichkeit derselben, Fieber, Schüttelfrost sowie meist erheblichem allgemeinen Krankheitsgefühl. Dieser erste Anfall kann vorübergehen und der Prozeß durch Resorption ausheilen. Viel häufiger jedoch bleiben die Beschwerden und das Fieber bestehen und es entwickelt sich oft eine ödematöse Schwellung der Nierengegend bzw. Vorwölbung derselben, bisweilen mit deutlicher Fluktuation. Häufig wird über in den Oberschenkel der gleichen Seite ausstrahlende Schmerzen geklagt und derselbe etwas angezogen gehalten (Psoascontractur). Findet keine Entleerung des Eiters statt, so zeigt die Eiterung die Neigung zu weiterer Ausbreitung; es kann zu Durchbruch des Eiters kommen, häufiger nach außen unter der 12. Rippe oder über dem Darmbeinkamm (Senkungsabsceß), seltener nach innen in die Pleura, ins Duodenum oder Kolon, ins Peritoneum, Nierenbecken oder in die Vagina. In zahlreichen anderen Fällen entwickelt sich eine Sepsis, die oft tödlich endet.

Die Diagnose stützt sich auf den beschriebenen lokalen Befund in der Nierengegend sowie die in der Regel vorhandene deutliche Spannung der Flankenmuskulatur der befallenen Seite. Man prüft darauf am besten, indem man, während der Patient flach und mit völlig entspannter Rumpfmuskulatur auf dem Rücken liegt, die rechte und linke Hand unter die entsprechende Lendengegend schiebt und dabei leise palpierend den Tonus der beiden Seiten miteinander vergleicht. Ausnahmslos ist alsdann ein Unterschied wahrzunehmen. Stets nehme man eine Probepunktion von hinten her an der Stelle stärkster Druckempfindlichkeit, eventuell wiederholt vor (manche Probepunktion scheidet an der unzweckmäßigen Wahl der Nadel; sie soll mindestens 10 cm lang und nicht zu dünn sein!). Bei der Röntgenuntersuchung kann im Gegensatz zum subphrenischen Absceß die Beweglichkeit des Zwerchfells erhalten bleiben, in anderen Fällen ist sie auf der kranken Seite gehemmt. Sehr wichtig ist auch die Anamnese, die vor allem auf vorausgegangene Furunkel fahnden soll, wenn dieselben auch schon vor Wochen abgeheilt sind und der Patient sie deshalb oft nicht spontan erwähnt. Die am häufigsten vorkommenden Irrtümer sind Verwechslungen mit Lumbago, Spondylitis (Psoas-contractur ist beiden gemeinsam), Myositis, vereiterte Steinnieren, Leberabsceß.

Die Therapie besteht in einer möglichst frühzeitigen operativen Eröffnung des Eiterherdes.

## Krankheiten der Harnblase.

**Vorbemerkungen:** Die Harnblase stellt einen mit Schleimhaut (geschichtetes Pflasterepithel) ausgekleideten Harn-Sammelbehälter dar, dessen dicke Wand aus glatter Muskulatur besteht; diese bildet einen Hohlmuskel, den M. detrusor, welcher aus zirkulären und längs verlaufenden Zügen besteht. Ein Teil derselben umgibt das Orific. intern. der Harnblase, dessen Verschluss sie bilden (sog. Sphincter vesicae, ehemals als selbständiger Schließmuskel angesehen). Die Harnleiter durchbohren in schräger Richtung die Blasenwand und münden an der Basis der Harnblase nahe dem Orificium intern. urethrae; die Mündungen bilden mit diesem ein Dreieck, das sog. Trigon. Lieutaudii, das sich durch stärkere Reizbarkeit der Schleimhaut auszeichnet. Die Harnblase mündet in die Pars posterior urethrae, die im Gegensatz zur Blase von quergestreifter Muskulatur (Ischio- und Bulbocavernosus) umgeben ist. Nur die obere, nicht die vordere Blasenwand ist vom Peritoneum überzogen. Die Blase besitzt eine große Dehnungsfähigkeit. In leerem Zustand ist sie nicht fühlbar und liegt hinter der Symphyse; bei stärkeren Füllungsgraden erhebt sie sich hinter der Bauchwand, gibt gedämpften Klopfeschall und kann in extremen Fällen bis an den Nabel oder darüber hinaufreichen. Sie ist dann bei dünnen Bauchdecken als deutlich sich abhebender kugelförmiger Tumor sicht- und fühlbar.

Für das Verständnis des Mechanismus der Harnentleerung ist zu berücksichtigen, daß der dieselbe bedienende Apparat aus zwei verschiedenen Komponenten besteht, die physiologisch ineinander greifen, und zwar einerseits aus der eigentlichen Blasenmuskulatur, die als unwillkürlicher Muskel dem Willen nicht unterworfen ist, andererseits aus der willkürlich innervierten Muskulatur der hinteren Harnröhre am Ausgange der Blase; hierzu kommt außerdem die Bauchpresse. Der willkürlichen Entleerung der Blase geht normal der Harndrang voraus, der durch Dehnung der Harnblase erfolgt, indem insbesondere ein von der Nachbarschaft des Orific. intern. ausgelöster sensibler Reiz durch die Hinterstränge des Rückenmarks dem Großhirn zugeleitet wird. Das Zentrum für die willkürliche Harnentleerung ist doppelseitig angelegt und liegt im Lobus paracentralis. Von hier gehen die Impulse aus zur willkürlichen Erschlaffung der genannten, am Blasenausgang befindlichen quergestreiften Muskeln zwecks Entleerung des Harns, aber auch zur willkürlichen Unterbrechung der im Gang befindlichen Blasenentleerung. Außer dieser dem Willen unterworfenen Regulierung der Blasenfunktion existiert außerdem eine unbewußte automatisch-reflektorische, vom Sympathicus geregelte Tätigkeit des Blasenmuskels, die physiologisch nur im Säuglingsalter (etwa bis zum 2. Jahr), unter pathologischen Verhältnissen dagegen bei organischen Rückenmarksleiden vorkommt. Beim Säugling tritt ohne Kontrolle des Bewußtseins bei genügender Füllung der Blase in regelmäßigen,

etwa  $\frac{1}{2}$ stündigen oder längeren Abständen die Entleerung der Blase in kräftigem Strahle ein, und auch beim Rückenmarkskranken regelt sich nach einer vorübergehenden Periode der Harnverhaltung die Entleerung in ähnlicher Weise automatisch, indem der Patient, ohne es verhindern zu können, zum Teil auch völlig unbewußt, in kürzeren Intervallen, kleine Harnmengen entleert (Incontinentia vesicae), wobei aber in diesem Falle die Blase trotzdem hochgradig gefüllt bleibt (sog. Ischuria paradoxa).

Die Innervation der Harnblase ist sehr kompliziert. Detrusor und Sphincter vesicae intern. werden nicht von motorischen spinalen, sondern von marklosen sympathischen Nerven innerviert, wogegen die Nerven der willkürlichen Muskeln der hinteren Harnröhre markhaltige Rückenmarksnerven sind. Die vom Rückenmark zum Plexus vesicalis ziehenden Nerven stammen teilweise vom oberen Lumbalmark (Nn. hypogastrici), zum größeren Teil als Nn. pelvici aus dem Sakralmark bzw. dem Conus terminalis und verflechten sich auf dem Wege zur Blase mit zahlreichen Sympathicusfasern. Reizung der Nn. hypogastrici bewirkt Erhöhung des Sphinctertonus und Erschlaffung des Detrusors, umgekehrt macht Reizung der Nn. pelvici starke Kontraktionen des Detrusors unter Erschlaffung des Sphincter. Ausschaltung der willkürlichen Beeinflussung der Harnentleerung sowie des Gefühls der Blasenfüllung erfolgt einmal bei Querschnittsläsionen des Rückenmarks in beliebigen Höhen, sodann auch bei isolierter Schädigung des Sakralmarkes oder des Konus, wobei das Lumbalmark nicht vikariierend für die Aufrechterhaltung der spinalen Blasenregulierung einzutreten vermag. Bei Bewußtlosen sowie bei benommenen Kranken wird der Harn zum Teil unwillkürlich entleert, teils kommt es zu Harnverhaltung mit maximaler Füllung der Blase. Es gehört daher zu den wichtigsten Pflichten der Krankenpflege, bei allen derartigen Zuständen das Verhalten der Harnblase zu kontrollieren bzw. rechtzeitig zu katheterisieren.

Einen Überblick über das Verhalten der Blaseschleimhaut beim Lebenden gestattet die Cystoskopie.

### Cystitis (Blasenkatarrh).

Die katarrhalische Entzündung der Blaseschleimhaut ist ein sehr häufiges Leiden, das in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle auf bakteriellem Wege, gelegentlich auch durch chemische oder mechanische Reize hervorgerufen wird. Erschwerung der Harnentleerung ist ein wichtiges förderndes Moment. Eine Infektion der Blase entsteht am häufigsten ascendierend. Hierher gehört z. B. die oft durch unsauberen Katheterismus erfolgende direkte Verschleppung von Keimen in die Harnblase. Auch spontan können aus der schon vorher katarrhalisch erkrankten Harnröhre wie z. B. bei der Gonorrhöe Infektionserreger in die Harnblase gelangen. Speziell beim weiblichen Geschlecht erleichtert die Kürze der Harnröhre ein Aufsteigen von Bakterien in die Blase, so daß hier auch oft ohne nachweisbare Erkrankung der Urethra Cystitiden auftreten. Auch die Incontinentia urinae bei vielen Nervenkranken sowie Störungen der Blasenentleerung bei benommenen Kranken bewirken, oft auch ohne Mitwirkung des Katheters, Blasenkatarrh. Ferner besteht zweifellos ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Erkältung bzw. starker Durchnässung und Cystitis, ohne daß der kausale Konnex zwischen beiden bisher geklärt ist. Descendierende Cystitis schließt sich häufig an primäre Pyelitis an (B. coli, ferner bei Typhus und Tb.), während umgekehrt ein Aufsteigen der Blasenentzündung ins Nierenbecken in der Regel nicht stattfindet und nur bei den ernstesten Erkrankungen, die mit Hindernissen in der



Blasenentleerung einhergehen, wie bei Prostatahypertrophie, Harnröhrenstrikturen beobachtet wird. Schwere Cystitiden können sich weiter bei Anwesenheit von Konkrementen (Blasensteinen), hier sowohl durch den mechanischen Reiz wie durch das Vorhandensein von Bakterien einstellen, sowie schließlich infolge Übergreifens von Erkrankungen der Nachbarschaft auf die Blase mit oder ohne Perforation in dieselbe z. B. bei perityphlitischen Abscessen sowie infektiösen Erkrankungen speziell der weiblichen Genitalien (Blasenscheidenfistel usw.).

Zu den chemischen Reizen, die Blasenkatarrh zu erzeugen vermögen, gehören das Cantharidin, gelegentlich das Urotropin, ferner die Balsamica (Terpentin usw.), endlich bei manchen Menschen junges Bier, Most sowie Rettiche.

Anatomisch bestehen bei den leichteren Graden von Cystitis Hyperämie, Infiltration und Ödem der Schleimhaut mit Auswanderung von Leukocyten, bei schwererer Cystitis häufig knötchenförmige Infiltrate sowie Hämorrhagien; ganz schwere Formen, wie sie z. B. bei Prostatikern und Blasenlähmung vorkommen, zeigen bisweilen Nekrosen und Ulcerationen der Schleimhaut mit Fibrinauflagerung, die sog. Diphtherie der Blase. Bei chronischem Blasenkatarrh ist die Mucosa verdickt, wulstig, mitunter pigmentiert, zum Teil gekörnt; bisweilen finden sich kleine Cysten, gelegentlich auch inselförmige weißliche, mattglänzende Flecke (Leukoplakie der Blase). Bei ausgedehnter Mitbeteiligung der Muskulatur an der Entzündung kann dieselbe stark schrumpfen. Derartige Schrumpfblassen erfahren eine erhebliche Reduktion ihrer Kapazität. In Fällen erschwerter Entleerung wird die Muskulatur häufig hypertrophisch und springt in Form zahlreicher Kämme und Leisten ins Innere der Blase vor (sog. Balkenblase).

Die einen Blasenkatarrh erzeugenden Bakterien lassen sich in zwei Hauptgruppen teilen, in diejenigen, die den Harnstoff in  $\text{CO}_2$  und  $\text{NH}_3$  zersetzen, und diejenigen, denen diese Fähigkeit abgeht. Ammoniakalische Harnsäuregärung wird am häufigsten durch Proteus, ferner durch die pyogenen Staphylo- und Streptococcen bewirkt. Keine Zersetzung bewirken Koli-, Typhusbacillen, TB, Gonococcen. Praktisch handelt es sich häufig, wie z. B. bei der Cystitis nach Gonorrhöe, um Mischinfektionen mit den gewöhnlichen Eiterregern, deren Ansiedelung in der Blase durch die schon vorher bestehende Erkrankung erleichtert wird.

Krankheitsbild: Bei der akuten Cystitis stehen im Vordergrund plötzlich eintretende mehr oder weniger heftige Miktionsbeschwerden, insbesondere fortwährend eintretender unüberwindlicher Harndrang, Schmerzen und Brennen hinter der Symphyse und in der Harnröhre während der Harnentleerung und hinterher (Strangurie). Bei sehr heftigem Harndrang kann irrtümlich der Eindruck einer Inkontinenz entstehen. Das Allgemeinbefinden ist bei leichter Cystitis nur wenig oder nicht beeinträchtigt, während in schwereren Fällen fieberhafte Temperatursteigerung, Abgeschlagenheit, Störung des Schlafs und stärkere Beeinträchtigung des Befindens durch die bisweilen sehr heftigen lokalen Beschwerden vorhanden sind. Das nach Katheterisieren bisweilen eintretende sog. Katheterfieber beruht auf akuter infektiöser Cystitis.

Bei chronischem Blasenkatarrh pflegen die subjektiven Beschwerden lange nicht so ausgeprägt zu sein. Häufig fehlen sie vollständig und zwar dauernd oder während längerer Perioden, die aber nicht selten durch akute Verschlimmerungen mit Steigerung der Beschwerden unterbrochen werden und mitunter erst dadurch auf das Leiden aufmerksam machen. Störungen des Allgemeinbefindens sind bei chronischer Cystitis oft nicht vorhanden; manche Kranke werden jedoch

durch die dauernde Störung der Nachtruhe infolge des häufigen Harn-dranges stark mitgenommen. Stärkere Beeinträchtigung des allgemeinen Kräftezustandes, höheres Fieber, Abmagerung finden sich in der Regel nur bei gleichzeitig bestehenden Komplikationen (Pyelitis und Pyelonephritis) sowie bei den ganz schweren ulcerösen bzw. diphtherischen Formen der Cystitis, die sich bei Blasenlähmungen und Prostatikern bisweilen einstellen.

Objektiv ist vor allem der Harnbefund charakteristisch. Der Harn ist hellgelb und trübe, die Trübung beruht auf Beimischung von Leukocyten, die bei größerer Menge einen dicken eitrigen Bodensatz im Harn-glas bilden. Außerdem finden sich massenhaft Bakterien sowie runde und häufig geschwänzte Blasenepithelien (vgl. S. 418), ferner bei den akuten Formen nicht selten Erythrocyten. Die Harnmenge ist normal. Die Reaktion ist meist schwach sauer, da in der Mehrzahl der Fälle (ca. 75%) eine Infektion mit *B. coli* vorliegt. Bei saurer Reaktion pflegt der Bodensatz feinflockige Beschaffenheit zu haben. Das Vorhandensein von harnstoffzersetzenden Bakterien, welche alkalische Reaktion bewirken, ist an dem widerlichen ammoniakalischen Geruch des Harns zu erkennen. Die Harnfarbe ist in diesem Fall oft schmutzig-bräunlich, der eitrige Bodensatz zeigt ein schleimig-fadenziehendes Verhalten. Das Sediment enthält zahlreiche Krystalle von phosphorsaurer Ammoniakmagnesia (Sargdeckel) sowie die Stechapfelformen des Ammoniumurates.

Der Eiweißgehalt des cystitischen Harns ist stets nur minimal und entspricht lediglich dem Gehalt an Leukocyten, eventuell an Blut. Zur genaueren bakteriologischen Prüfung eignet sich nur der unter aseptischen Kautelen mittels Katheters entnommene Harn. Fehlen Bakterien bei der gewöhnlichen bakteriologischen Untersuchung trotz des Befundes einer Cystitis, so liegt stets der Verdacht auf Blasen tuberkulose nahe. In derartigen Fällen ist sowohl die S. 424 beschriebene Methode sowie die cystoskopische Untersuchung erforderlich. Bei akuter Cystitis soll man dagegen auf letztere wegen der starken Reizwirkung verzichten.

Bei der Stellung der Diagnose hat man vor allem die Ursache der Cystitis zu eruieren; weiter ist festzustellen, daß die Erkrankung sich auf die Blase beschränkt und nicht gleichzeitig eine Nierenbeckenentzündung (Polyurie, niedriges spez. Gew., vgl. S. 416) besteht. Bei der chronischen Cystitis ist stets die bakteriologische Untersuchung zur Ausschließung einer Tb. vorzunehmen. Differentialdiagnostisch kommen ferner Blasensteine sowie Blasen tumoren in Frage. Hier ist die cystoskopische Untersuchung nicht zu unterlassen. Bei Männern jenseits des 50. Jahres denke man stets an Vergrößerung der Prostata, die für die chronische Cystitis eine außerordentlich wichtige ursächliche Rolle spielt und ungemein häufig ist.

Die Feststellung der Prostatahypertrophie geschieht durch digitale Untersuchung per rectum. Das normal kastaniengroße Organ kann bis zu Apfelgröße erreichen. Entweder sind beide Seitenlappen vergrößert oder, was praktisch für die Erschwerung der Harnentleerung wichtiger ist, es liegt die Entstehung eines sog. mittleren Lappens vor, der normal nicht existiert und der die Harnröhre verengt bzw. ventilartig verschließt. Die Ursache des Leidens ist unbekannt. Gonorrhöe und sexuelle Exzesse spielen keine Rolle. Es stellen sich sowohl vermehrter Harn-drang (besonders nachts) als auch sexuelle Reizerscheinungen (Erektionen) sowie

Erschwerung der Harnentleerung ein, so daß der Patient bei der Miktion stark pressen muß und längere Zeit braucht, bis die Blase entleert ist (sog. I. Stadium). Im II. Stadium erfolgt die Blasenentleerung nur unvollständig; es bleiben dann 50–200 ccm sog. Residualharn zurück. Derselbe stellt wegen der Neigung zu bakterieller Zersetzung eine ständige Gefahr für den Prostatiker dar. Schließlich kann sich der Zustand der Ischuria paradoxa (s. S. 427) entwickeln (III. Stadium). Bei Vorhandensein von Restharn ist die Blase unter aseptischen Kautelen zu katheterisieren, was viele Patienten nach Anleitung durch den Arzt selbst auszuführen lernen und später oft regelmäßig mehrmals täglich tun müssen. Prostatiker zeigen stets die beschriebene Balkenblase. Bei Vorhandensein von Varicen können Blasenblutungen eintreten. Kommt es längere Zeit infolge von mangelhafter Entleerung der Blase zur Überfüllung derselben (gelegentlich, ohne daß es der Patient merkt) und greift die Harnstauung auf das Nierenbecken über, so entsteht die für die Reizung des Nierenbeckens charakteristische Polyurie (vgl. Pyelitis). In der stark gedehnten Blase sammeln sich alsdann große Mengen eines hellen Harns von sehr niedriger spez. Gew. oft unter 1005; zugleich besteht starker Durst. Mitunter entwickelt sich zunehmender Kräfteverfall, gelegentlich regelrechte Kachexie. Durch regelmäßiges Katheterisieren wird die Störung oft wieder beseitigt und auch das Allgemeinbefinden kann sich wieder bessern. Jedoch empfiehlt es sich, hochgradig überdehnte Blasen nicht auf einmal zu entleeren (Blasenblutungen, Nierenstörungen!), sondern im Laufe der nächsten Tage die Entleerung fraktioniert vorzunehmen. Derartige Fälle sind übrigens besonders leicht für Infektionen empfänglich. In anderen Fällen erliegen die Kranken schließlich einer chronischen Urämie (Kontrolle des Blutdrucks!). Zahlreiche andere Prostatiker werden das Opfer einer schweren Cystitis oder einer ascendierenden Cystopyelitis bzw. der davon ausgehenden septischen Allgemeinfektion.

**Therapie der Cystitis:** Bettruhe; feuchtwarme Umschläge bzw. warme Voll- und Sitzbäder zur Milderung der subjektiven Beschwerden. Reizlose Kost; verboten sind Alkoholica, speziell Bier, Most, Weißwein, ferner alle Gewürze, insbesondere Pfeffer, Senf, Paprika, ferner Essig, Rettich sowie Spargel. Obstipation ist sorgfältig zu vermeiden. Bei stärkerem Tenesmus Suppositorien von Extr. Belladonn. 0,02 oder Extr. Opii 0,03 oder Pantopontropfen mehrmals tgl. 10. Reizmildernd wirken auch Injektionen von 5 ccm einer 10<sup>0</sup>/<sub>100</sub>igen Antipyrinlösung in die Blase. In vielen Fällen wirkt reichliche Flüssigkeitszufuhr zwecks Spülung der Blase günstig (z. B. Lindenblütentee oder Mineralwässer, speziell Wildunger, Fachinger, Wernarzer, Vichy). Doch hat sich auch hier wie bei Pyelitis die Einschränkung der Trinkmenge mit gleichzeitiger Verabreichung von Säure und Anwendung von Schwitzprozeduren (vgl. S. 419) zur Konzentrierung des Harns und der dadurch erzielten Erschwerung des Bakterienwachstums bewährt. Eine große Rolle spielt ferner die Anwendung der Harnantiseptica: Fol. uv. ursi 2 Eßlöffel auf  $\frac{1}{2}$  Liter Wasser, 5 Minuten gekocht und in zwei Portionen am Tage getrunken; die Blätter wirken durch Abspaltung von Hydrochinon aus dem in ihnen enthaltenen Glykosid Arbutin; ferner Urotropin, Salol, Cystopurin, Helmitol, Hexal, Borovertin, Amphotropin, Myrmahyd, sämtlich als Tabletten etwa 2–3 g täglich; weiter die Balsamica und zwar Bals. Copaiva oder Kubeben (z. B. Bals. Copaiv. und Extr. Cubeb.  $\bar{a}\bar{a}$  0,6 in caps. gelat., 3 mal tgl. 3 Kaps.) oder Ol. santali 0,3 in Kapseln 3 mal tgl. 2–3 Stück. Bei chronischer Cystitis namentlich bei den Formen mit Residualharn regelmäßige Blasenpülungen mit 37° warmer physiologischer NaCl-Lösung oder 1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>iger Kal. permang. oder 3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>iger Borsäure,  $\frac{1}{10}$ -bis 1<sup>0</sup>/<sub>100</sub> Arg. nitr. oder 0,1–0,2<sup>0</sup>/<sub>100</sub> Hydrarg. oxycyanat. Ferner die gleichen Harnantiseptica (aber keine Borpräparate, die auf die Dauer ungünstig auf den Ernährungszustand wirken). Bei Blasenblutung eventuell Injektion von 100 ccm 1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>iger Arg. nitr. oder Tanninspülung (3–5<sup>0</sup>/<sub>100</sub>). Bei Prostatikern regelmäßig katheterisieren (Komplikation bei häufigem Katheterismus ist oft Hodenentzündung!), eventuell die gleiche Spülbehandlung wie bei chronischer Cystitis. Besonders nach dem ersten Katheterismus empfiehlt sich zur Verhütung einer Infektion die Injektion von 20 ccm 1<sup>0</sup>/<sub>100</sub> Arg. nitr. Bei Neigung zu Retention für eine Zeitlang Dauerkatheter. Oft ist die operative Entfernung der vergrößerten Prostata erforderlich.

## Blasengeschwülste.

Tumoren der Harnblase sind im allgemeinen selten. Sie kommen hauptsächlich zwischen dem 40. und 60. Lebensjahre vor und befallen Männer wesentlich öfter als Frauen. Unter den häufiger vorkommenden Geschwülsten sind gutartige, speziell Papillome, und bösartige Tumoren, meist Carcinome zu unterscheiden.

Die Papillome sitzen in der Regel am Blasengrunde bzw. in der Nähe der Ureteren und bestehen aus zottigen, gestielten, polypösen Wucherungen der Blaseschleimhaut. Häufig sind sie in mehreren Exemplaren vorhanden. Nach ihrer Entfernung besteht Neigung zu Rezidiven. Mitunter gehen sie in Carcinome über. Letztere kommen sowohl als papilläre Tumoren wie in infiltrierender Form vor. Das Blascarcinom wird namentlich bei älteren Männern beobachtet. Merkwürdig ist die Häufigkeit der Blasantumoren bei Anilinarbeitern. Vgl. ferner auch die Bilharziaerkrankung S. 433.

Krankheitsbild: Gutartige Tumoren können jahrelang vorhanden sein, ohne Beschwerden zu verursachen. Im übrigen ist sowohl bei den benignen wie malignen Formen ein Hauptsymptom die Blasenblutung. Sie tritt in der Regel intermittierend auf, bisweilen zunächst mit langen, blutungsfreien Pausen. Die Blutung, die ohne äußeren Anlaß eintritt, erfolgt häufig gegen Ende der Harnentleerung. Namentlich die zarten polypösen Geschwülste, auch wenn sie ganz klein sind, neigen zu heftigen Blutungen, deren häufige Wiederholung schließlich zu schwerem Blutverlust mit hochgradiger Anämie führen kann. Subjektiv verursacht der Eintritt der Blutung mitunter vermehrten Harndrang. Gelegentlich ist, speziell bei den Polypen die Harnentleerung vorübergehend durch Verlegung des Orific. intern. behindert. Beim Carcinom treten, besonders wenn es nahe dem Orificium liegt oder die Blasenwand ausgedehnt infiltriert, Schmerzen auch in der Zwischenzeit zwischen den Entleerungen auf. Auch ist hier die Neigung zur Infektion der Blase und jauchiger Zersetzung des Tumors sehr ausgesprochen. In den späteren Stadien wird ein übelriechender, stark zersetzter bräunlich-schwarzer Harn, meist von alkalischer Reaktion mit zahlreichen Leukocyten und Erythrocyten im Sediment entleert; bisweilen enthält er auch nekrotische Geschwulstfetzen. Nicht selten kommt es durch Verlegung eines Ureterostiums zu Hydronephrose. Metastasen pflegen sich meist nur in den regionären Drüsen zu entwickeln.

Die Diagnose eines Blasantumors ist so frühzeitig wie möglich sowohl zur Verhütung protrahierter und deshalb nicht ungefährlicher Blutungen als auch wegen der Möglichkeit eines Carcinoms zu stellen. Entscheidend ist das Ergebnis der Cystoskopie. Differentialdiagnostisch kommen außer einfacher Cystitis sowie Prostatahypertrophie vor allem Blasensteine und Blasantuberkulose in Frage, selten die Bilharziaerkrankung (s. unten). Die Therapie ist eine rein chirurgische. Auch gutartige Papillome sind stets zu entfernen (da etwa die Hälfte in Carcinom übergeht!). Bei inoperablen Carcinomen Röntgen- bzw. Radiumbestrahlung. Gegen hartnäckige Blutungen sind am wirksamsten Injektionen von steriler Gelatine in die Blase (2% 100 ccm) oder von Argent. nitr. 2% 100 ccm oder 1% 10 ccm. Unter Umständen hilft ein Verweilkatheter.

Die **Blasantuberkulose** wurde im Zusammenhang mit der Nierentuberkulose besprochen. Vgl. auch den Abschnitt Cystitis.

## Blasensteine.

Konkremente in der Blase entstehen in der Regel nicht autochthon, sondern sind meist herabgewanderte Nierensteine, die in der Blase, speziell bei alkalischer Harnzersetzung durch schalenförmige Anlagerung von Calciumphosphat bzw. Ammoniumurat sich vergrößern und

alsdann auf dem Durchschnitt eine entsprechende Schichtung zeigen (vgl. S. 421). Besonders häufig sind Phosphatsteine. Blasensteine kommen einerseits schon im Kindesalter, andererseits bei älteren Individuen zwischen dem 50.—70. Jahr, und zwar häufiger bei Männern vor. Hier bildet die Prostatahypertrophie (Harnstauung) ein disponierendes Moment. In manchen Gegenden, namentlich im Orient kommen Blasensteine endemisch vor. Auch Inkrustation von in der Blase befindlichen Fremdkörpern mit Harnsalzen (abgebrochenen Katheterstücken sowie infolge von Masturbation in die Blase gelangten Gegenständen) sowie von Parasiteneiern speziell von *Distomum* oder *Filaria* gibt zur Bildung von Konkrementen Anlaß. Gleiches gilt auch von der Phosphaturie (s. unten). Blasensteine kommen sowohl solitär als oft in zahlreichen Exemplaren vor. Ihre Dimensionen schwanken zwischen denen des sog. Blasengriß und Hühnereigröße. Häufig finden sich daneben Nierensteine. Die schädliche Wirkung der Blasenkonkremente besteht sowohl in der rein mechanischen Läsion der Schleimhaut wie vor allem in der Begünstigung einer bakteriellen Cystitis.

Krankheitsbild: In einzelnen Fällen bestehen keine subjektiven Beschwerden, namentlich dann, wenn die Konkreme in Divertikeln der Blase fixiert sind. In der Regel verursachen sie jedoch schneidende bzw. kolikartige Schmerzen in der Blasengegend, die bis in den Mastdarm und die Genitalien (Glans penis) ausstrahlen; ferner Störungen bei der Harnentleerung, wobei vor allem die plötzliche Unterbrechung des Harnstrahles während der Miktion charakteristisch ist; auch besteht oft Harndrang. Ein drittes wichtiges Symptom ist die Blasenblutung, hauptsächlich in der Form des gegen Ende der Harnentleerung auftretenden oder sich alsdann verstärkenden Blutabganges. Doch pflegt der Blutverlust im Gegensatz z. B. zu den Blasentumoren nicht besonders groß zu sein. Charakteristisch ist, daß die genannten Symptome vor allem durch Körperbewegung eine Verstärkung erfahren und durch Ruhe wieder schwinden. Der Harn enthält mikroskopisch oft dauernd Blut, dessen Menge nach Körperbewegung, auch ohne Steigerung der subjektiven Beschwerden, häufig zunimmt. Kleine Konkreme gehen mitunter von selbst unter heftigen Schmerzen durch die Harnröhre ab, so daß es dann gelegentlich zur Heilung kommt; bei größeren Steinen ist eine spontane Ausstoßung unmöglich. Oft entwickelt sich im Lauf der Zeit eine stärkere Cystitis, von deren weiterem Verlauf das Schicksal des Patienten nicht selten entscheidend abhängt.

Die Diagnose wird am sichersten cystoskopisch gestellt. Außerdem läßt sich der Konkrementnachweis, wenn auch weniger sicher, durch die Untersuchung mit der sog. Steinsonde führen, die das Aufstoßen auf ein Konkrement fühl- und hörbar macht. In manchen Fällen gelingt auch die Röntgenphotographie der Steine in der mit Luft gefüllten Blase (man hüte sich vor Verwechslung mit Phlebolithen).'

Therapie: Eine Auflösung der Konkreme auf medikamentösem Wege ist nicht möglich. Einzig wirksam ist die chirurgische Therapie (Lithotripsie, d. h. Zertrümmerung des Steins in der Blase bzw. Lithotomie, d. h. Entfernung der Steine nach Eröffnung der Blase).

Die Entleerung trüben Harns kommt außer bei organischen Nieren- und Blasenkrankheiten (durch Beimischung von morphotischen Elementen) sowie bei Bakteriurie und Chylurie auch bei der sog. **Phosphaturie** vor. Hier beruht die Trübung des Harns auf dem bereits in der Blase erfolgenden Ausfällen der Phosphate der Erdalkalien des Harns infolge alkalischer Reaktion desselben, nicht dagegen etwa auf vermehrter Ausscheidung von Phosphaten. Der milchig-trübe Harn, der die Patienten oft beunruhigt, findet sich einmal bei Individuen mit Hyperacidität des Magens (so bisweilen auch bei *Ulcus ventric.*), sodann auch ohne dieselbe als konstitutionelle Anomalie bei manchen Neuropathen, insbesondere Sexualneuroasthenikern. Bisweilen wird über vermehrten Harndrang geklagt. Das Leiden, das an sich völlig harmlos ist, bildet eine Disposition für die Entstehung von Harnkonkrementen. Von der Phosphaturie verschieden, wenn auch die gleichen Erscheinungen verursachend, ist eine als *Calciuriurie* bezeichnete Anomalie, bei der die Harntrübung auf vermehrtem Gehalt an Kalksalzen (Phosphate, Oxalat) beruht, die normal hauptsächlich durch den Darm und nicht durch die Nieren ausgeschieden werden. Oft zeigt der Harn bei Phosphaturie und *Calciuriurie* ein charakteristisches irisierendes Oberflächenhäutchen.

## Parasitäre Erkrankungen der Harnwege.

Erkrankungen der Harnwege und insbesondere der Blase können auch durch verschiedene Parasiten zustande kommen.

Die *Bilharzia* oder *Distomum haematobium* kommt im Orient vor; der Parasit gehört zu den Trematoden oder Saugwürmern. Das 12—14 mm lange ♂ trägt in einer kanalartigen Längsfurche das etwa 20 mm lange fadenartige ♀ mit sich herum. Die Eier haben keinen Deckel und sind an ihrem end- oder seitenständigen stachelartigen Fortsatz zu erkennen. Die Parasiten halten sich in den Zweigen der Pfortader sowie in den die Harnblase und den Mastdarm umgebenden Venenplexus auf. Männer erkranken häufiger als Frauen. Außer einer Erkrankung des Dickdarms mit blutig-schleimigen Diarrhöen (die Stühle enthalten massenhaft Eier) bewirkt die *Bilharzia* vor allem Beschwerden seitens des Harnapparates, speziell Blasenbeschwerden. Das wichtigste Symptom ist Blutharnen („tropische Hämaturie“), an das sich später die Symptome einer chronischen Cystitis anschließen. Die Blasen-schleimhaut zeigt derbe Infiltrate, die massenhaft Parasiteneier enthalten, ferner polypöse Wucherungen, zum Teil auch ausgedehnte Verkalkungen der im Gewebe liegenden Eier sowie Geschwüre. Sehr häufig findet man gleichzeitig Blasensteine. Die Bilharziose führt oft auf die Dauer zu hochgradiger Blutarmut, Kräfteverfall und Kachexie. Sehr häufig entwickeln sich Harnröhrenfisteln, die am Perineum münden. Durch Stenosierung der Ureteren kann sich eine Hydronephrose entwickeln. Die Diagnose stützt sich auf den Nachweis der charakteristischen Eier im Harn. Die Infektion erfolgt durch mit Parasiteneiern verunreinigtem Trinkwasser; ferner soll sie auch durch Baden in durch Ausleerungen Kranker infizierten Gewässern entstehen. Hieraus ergibt sich die Prophylaxe. Die Therapie ist vorläufig rein symptomatisch wie bei Cystitis; ein spezifisches Mittel existiert nicht.

Ein anderer in den Tropen sehr häufiger Parasit ist die *Filaria sanguinis* s. **Bancrofti**. Der 40 (♂) bis 80 (♀) mm lange weiße Wurm von der Dicke eines Haars, welcher lebende Junge hervorbringt, hält sich hauptsächlich in den Lymphgefäßen verschiedener Körperbezirke auf, z. B. in denen der Oberschenkel, des Scrotums und der äußeren weiblichen Genitalien; er bewirkt hochgradige elephantiasische Veränderungen der befallenen Teile. Charakteristische Harnveränderungen finden sich bei der auf Filariose beruhenden häufigen sog. tropischen Hämato-chylurie. Der bluthaltige Harn bleibt nach Sedimentieren der Erythrocyten milchig getrübt infolge der Beimischung von Chylus. Durch Ätherextraktion gelingt es, das die Trübung bewirkende Chylusfett zu beseitigen. Im Sediment findet man zahlreiche die charakteristischen wurmförmigen, etwa 0,2 mm langen Embryonen. Nachts lassen sich dieselben auch im Blute nachweisen (am besten in dicken Tropfen-Präparaten). Oft findet sich im Blute eine Eosinophilie. Der Verlauf ist in der Regel ein äußerst langwieriger. Jedoch leiden die Patienten

oft nur wenig unter ihrer Erkrankung. Mitunter kommt es schließlich zu Zuständen von schwerer Anämie und Kachexie. Die Übertragung erfolgt wie bei Malaria durch Moskitos.

## Funktionelle Blasenkrankheiten.

**Konstitutionelle Blaseschwäche und sog. reizbare Blase.** Es gibt Individuen, die bereits bei geringem Füllungsgrade der Blase von einem unwiderstehlichen Harndrang befallen werden, so daß sie, wenn sie nicht in der Lage sind, demselben sofort Folge zu geben, den Harn in die Kleider entleeren. Sie sind daher gezwungen, sehr häufig zu urinieren (Pollakisurie). Bei manchen Menschen wirkt Aufenthalt in der Kälte oder Nässe verstärkend auf den Harndrang. Diese abnorme Reizbarkeit der Blasenmuskulatur, deren Tonus sich als erhöht erweist, findet sich öfter bei älteren Individuen. In besonders hochgradigen Fällen kommt es zu dauerndem Abtropfen von Harn, so daß im Lauf der Zeit die Haut der Genitalien und ihrer Umgebung maceriert und wund wird. Im Gegensatz zur Enuresis (s. unten) findet während des Schlafs kein unwillkürlicher Urinabgang statt. Man untersuche stets auf das Vorhandensein einer Cystitis, ferner auf Prostatahypertrophie, weiter auf Urethritis post. bei Gonorrhöe sowie auf Fissura ani, die ähnliche Reizzustände zu verursachen vermag. Bei organischen Nervenleiden dagegen wird eine Störung der Harnentleerung in Form des beschriebenen Harträufelns nicht beobachtet. Der bei Frauen, die geboren haben, öfter vorkommende Harnverlust bei körperlichen Anstrengungen, beim Husten usw. beruht in der Regel auf intra partum entstandenen Quetschungen der Harnröhre.

Eine wichtige funktionelle Störung der Harnentleerung ist ferner die **Enuresis nocturna** oder das **Bettnässen**. Dieses Leiden, das hauptsächlich im Kindesalter, nur selten bei Erwachsenen vorkommt, besteht darin, daß der Patient im Schlaf den Harn ins Bett entleert, ohne wie der Normale durch den Harndrang geweckt zu werden, während tagsüber in der Regel kein unwillkürlicher Urinabgang erfolgt. In der großen Mehrzahl der Fälle sind die Patienten neuropathische Individuen, oft mit starker hereditärer Belastung; nicht selten sind es auch Epileptiker und Idioten. Bei einem kleinen Teil der Kranken finden sich anatomische Entwicklungsstörungen am Kreuzbein in Form der Spina bifida (das Fehlen der Wirbelbögen ist durch die Haut zu fühlen; Röntgenphotographie!); auch zeigen derartige Patienten mitunter abnorme Behaarung der Kreuzgegend. Zuweilen tritt das Bettnässen familiär auf. In den meisten Fällen verliert sich die Anomalie im späteren Leben. Individuen, die jenseits des Kindesalters an Enuresis leiden, zeigen in der Regel auch sonst allerlei neuropathische Stigmata und pflegen körperlich und geistig zurückgeblieben zu sein. Man denke hier stets zunächst an ein organisches Nervenleiden. Die Enuresis macht sich meist im Winter stärker als im Sommer geltend.

Der Therapie gegenüber erweist sich das Leiden meist als sehr hartnäckig. Abgesehen von allgemeinen, den Ernährungs- und Kräftezustand hebenden Maßnahmen und der Beseitigung etwa vorhandener lokaler Reizzustände (Balanitis, Phimose, Oxyuren) ist einmal die Behandlung eine diätetische und besteht in Vermeiden einer wasser-(kohlehydrat-)reichen Kost und maximaler Einschränkung der Trinkmenge während des ganzen Tages, nicht nur in den Nachmittagsstunden. Die letzte Mahlzeit ist möglichst früh am Abend zu verabreichen. Vor dem Schlafengehen kalte Waschungen. Das Fußende des Bettes ist hochzustellen. Im übrigen ist die Behandlung eine pädagogische: man weckt das Kind regelmäßig 2–3 mal die Nacht, das erste Mal um 10 Uhr, sorgt dafür, daß es vollkommen wach wird (nasses Handtuch!) und fordert es auf, das Bett zu verlassen und Urin zu ent-

leeren, so daß es diesen Akt mit vollem Bewußtsein ausführt und sich auf diese Weise daran gewöhnt, durch den Harndrang wach zu werden. In einzelnen Fällen können kräftige Faradisierung der Harnröhre und der Gegend über der Symphyse, ferner kleine Atropindosen (0,01 : 10, 3 mal täglich 3—5 Tropfen, je nach dem Alter) sowie Extr. Rhois aromat. fluid. (Rhus aromat.)  $2 \times$  tgl. 5 Tropfen bis zum 2. Jahre,  $2 \times 10$  bis 6 Jahre, darüber bis 10—15 Tropfen günstig wirken.

## Erkrankungen der Drüsen mit innerer Sekretion.

**Einleitung.** Die Drüsen mit innerer Sekretion oder endokrinen Drüsen sind Organe, die entweder überhaupt keinen Ausführungsgang besitzen, wie z. B. die Schilddrüse, die Nebenschilddrüsen, der Thymus, die Hypophyse sowie die Nebennieren und die das in ihnen entstehende spezifische Produkt (Hormon oder Inkret) direkt ans Blut abgeben; oder die Drüsen haben zwar einen Ausführungsgang, durch den ein bestimmtes Drüsenprodukt als sog. äußeres Sekret ausgeschieden wird, außerdem aber geben sie noch ein anderes Sekret an das Blut ab (Pankreas, Keimdrüsen). Außer für die hier genannten Drüsen dürfte die Annahme einer inkretorischen Tätigkeit noch für zahlreiche andere Organe gelten, deren spezifische Produkte bzw. Wirkung jedoch vorläufig nicht genau bekannt sind. Über die ungemein große Bedeutung der endokrinen Drüsen haben vor allem die Ausfallserscheinungen Aufschluß gegeben, die sowohl auf dem Wege des Tierexperiments als auch beim Menschen nach operativer Entfernung der Organe infolge von Erkrankung derselben beobachtet wurden; hierzu kommt die Tatsache, daß es gelingt, diese Störungen teils durch Überpflanzung des entsprechenden Organs, teils durch die sog. Organotherapie in Form der medikamentösen Einverleibung des betreffenden isolierten Hormons oder durch Verfütterung des Organs zu beseitigen. Im wesentlichen beeinflussen die endokrinen Drüsen vor allem den Stoffwechsel, das Nervensystem (speziell das vegetative) und das Wachstum, und zwar teils in förderndem, teils in hemmendem Sinn. Insgesamt ist demnach ein großer Apparat im Organismus vorhanden, der durch Produktion von Hormonen in die verschiedenen Lebensvorgänge, dieselben regulierend, eingreift. Insbesondere wird durch die Drüsen mit innerer Sekretion eine wichtige Korrelation zwischen den verschiedenen Organen und Organsystemen des Körpers auf dem Blutwege hergestellt. Und nicht zuletzt dürfte der Art des Zusammenspiels der einzelnen Komponenten des endokrinen Apparates bis zu einem gewissen Grade auch die konstitutionelle Eigenart des Individuums ihr charakteristisches Gepräge verdanken.

Krankheiten der endokrinen Drüsen bestehen teils in Funktionsherabsetzung bzw. völligem Fehlen der betreffenden Drüse, teils in abnormer Steigerung der Drüsentätigkeit. Oft handelt es sich um die kombinierte Wirkung der Störung mehrerer endokriner Drüsen.

## Erkrankungen der Schilddrüse.

Die Schilddrüse (*Glandula thyreoidea*) besteht aus zwei symmetrischen Lappen, die seitlich der Trachea bzw. dem Kehlkopf anliegen und durch einen mittleren brückenartigen Teil, der quer über die Luftröhre herüberzieht, den sog. Isthmus, miteinander verbunden sind. Die Drüse wird außerordentlich reich mit Blut versorgt. Sowohl Sympathicus- wie Vagusfasern sind in ihr nachweisbar. Beim normalen Menschen ist sie durch die Haut als weiches Organ zu fühlen, ohne den gradlinigen Verlauf der Halskonturen zu unterbrechen. Bei Vergrößerung der Drüse kommt es dagegen zu der als Kropf bezeichneten Schwellung dieser Gegend am Halse, während bei abnormer Verkleinerung die betreffenden Halspartien, namentlich in der nächsten Nachbarschaft der Luftröhre, auffallend mager sind (sog. leerer Hals). Vorübergehend kommt es oft zu leichter Schwellung der Drüse während der Menstruation sowie in der Gravidität. Mikroskopisch besteht



die Thyreoidea aus einer großen Zahl geschlossener, mit Cylinderepithel ausgekleideter Follikel, deren Lumen zum größten Teil mit Kolloid gefüllt ist. Charakteristisch für die Drüse ist der hohe Jodgehalt, der der Kolloidmenge parallel geht. Der jodhaltige Körper wurde in Form des Thyreoglobulins aus der Drüse gewonnen; neuerdings ist es gelungen, das wirksame Princip in dem sog. Thyroxin, einem Verwandten des Tryptophans rein darzustellen. Eine der Hauptwirkungen des Schilddrüsensekretes ist die Steigerung des Stoffwechsels (vermehrter Eiweißzerfall, Erhöhung des Grundumsatzes).

### Athyreose und Hypothyreose.

Entfernung der Schilddrüse bei jungen Tieren bewirkt eine erhebliche Störung des Wachstums, insbesondere Hemmung der Ossification an den Epiphysen. Die Tiere bleiben klein, haben kurze plumpe Knochen, ein struppiges Fell, verkümmerte Klauen und Hörner und zeigen ein apathisches Wesen; sie neigen infolge der Herabsetzung des Stoffwechsels zu starkem Fettansatz; die Genitalien sind mangelhaft entwickelt.

Verminderte Schilddrüsenfunktion (**Hypothyreose**) beim Menschen kann auf verschiedene Weise zustande kommen, einmal durch operative Entfernung der ganzen Drüse, z. B. infolge von Krebserkrankung, sodann in der Form der kropfigen Degeneration des Organs, wie sie bei Kretinismus vorkommt. Die Wirkung des Fehlens bzw. der Minderfunktion der Schilddrüse macht sich in verschiedener Form geltend, je nachdem der Funktionsausfall jugendliche oder erwachsene Individuen befällt. In ersterem Fall entsteht der Kretinismus, im letzteren das Myxödem.

Der (sporadische) **Kretinismus** ist im wesentlichen durch die gleichen Merkmale charakterisiert wie die oben beschriebenen Veränderungen bei Tieren, denen man in der Jugend die Schilddrüse entfernt. Ursache ist teils angeborenes Fehlen der Schilddrüse bzw. frühzeitig vorgenommene operative Entfernung, teils handelt es sich um kryptogene Funktionsstörungen. Hauptmerkmal des Kretinismus sind die starke Hemmung des Wachstums, speziell des Längenwachstums (Zwergwuchs) mit Offenbleiben der Epiphysenfugen (Röntgenphotographie!) sowie der Fontanellen, Herabsetzung des Stoffwechsels (d. h. des Grundumsatzes), eigentümliche Veränderungen der Haut, die teils geschwollen wie bei Myxödem (s. unten), teils atrophisch ist, mangelhafte Entwicklung der Genitalien sowie Idiotie. Der Schädel ist auffallend groß, die Nasenwurzel eingesunken, der Körper plump. Der Beweis für die ursächliche Bedeutung des Schilddrüsenausfalls ergibt sich aus der Tatsache, daß das Krankheitsbild sich sehr wesentlich durch Implantation von normaler Schilddrüse bzw. durch Schilddrüsenpräparate (s. unten) bessern läßt.

Eine besondere Abart stellt der **endemische Kretinismus** dar, der in manchen Gebirgsgegenden, insbesondere in den Alpen gehäuft vorkommt. Ätiologisch hängt er zweifellos mit der aus bisher unbekanntem Gründen schädlichen Beschaffenheit des Trinkwassers dieser Gegenden zusammen; auch ist es gelungen, durch Änderung der Wasserversorgung der Bevölkerung den Kretinismus zum Schwinden zu bringen. In der Regel ist das Leiden mit einer kropfigen Veränderung der Schilddrüse kombiniert. Die Merkmale der Krankheit stimmen im allgemeinen mit dem oben geschilderten Bilde überein. In der Regel besteht Zwergwuchs. Charakteristisch sind das greisenhaft-runzelige Gesicht mit der eingesunkenen Nasenwurzel, wulstigen Lippen und einem mißgestimmten Gesichtsausdruck, ein plumper Rumpf, mangelnde Intelligenz, oft sogar vollkommene Idiotie. Häufig findet man bei endemischem Kretinismus auch Taubstummheit, ferner Herabsetzung oder Fehlen des Geschlechtstriebes. Die Epiphysenfugen schließen

sich spät. Manche Kretinen erreichen ein hohes Alter, die große Mehrzahl stirbt jung. Für die Entstehung des endemischen Kretinismus nimmt man im Gegensatz zum sporadischen Kretinismus an, daß der Schilddrüsenausfall wahrscheinlich seinerseits schon die Folge einer anderen, den ganzen Organismus treffenden primären Noxe ist.

### Myxödem.

Praktisch wichtiger ist das Myxödem, eine Krankheit, die ebenfalls auf Schilddrüsen-Insuffizienz beruht, welche aber im Gegensatz zum Kretinismus in der Regel Erwachsene befällt. Sie wird vor allem nach operativer Entfernung der ganzen Drüse, z. B. wegen Carcinom, ferner in abgeschwächter Form mitunter nach sehr ausgedehnten Kropfoperationen beobachtet, bei denen nur ein sehr kleiner Drüsenrest zurückbleibt bzw. nachträglich degeneriert (*Cachexia thyreo- resp. strumipriva*). Sog. spontanes Myxödem führt man auf degenerative Veränderungen der Schilddrüse durch kryptogene Noxen (Infektionskrankheiten usw.) zurück. Myxödem kommt hauptsächlich bei Frauen vor. Die Krankheit besteht in einer Herabsetzung aller vegetativen Funktionen, Verlangsamung des Stoffwechsels, Abstumpfung des Seelenlebens sowie in gewissen trophischen Störungen. Das auffallendste Symptom ist die Veränderung der Haut, die eine eigentümliche polsterartige Schwellung zeigt, die von dem gewöhnlichen Ödem verschieden ist und bei Fingerdruck keine Dellenbildung aufweist. Die Hautveränderung besitzt eine besondere Vorliebe für das Gesicht, den Nacken sowie Hand- und Fußrücken. Die Lidspalten werden eng, das Mienenspiel träge. Die Gesichtsfarbe ist oft gelb, bisweilen etwas cyanotisch. Die Zunge wird dick und sieht bei schweren Formen zwischen den Zähnen hervor. Die Stimme ist rauh. Die Extremitäten bekommen ein tatzenartiges Aussehen. Die Haut ist auffallend trocken, spröde, kühl; auch die Nägel zeigen trophische Störungen und werden rissig. Der Puls ist verlangsamt; oft besteht Herzdilatation, auch ist eine ausgesprochene Neigung zu Arteriosklerose vorhanden. Schweißsekretion fehlt (auch nach 0,01 Pilocarpin subcutan). Meist findet sich eine sekundäre Anämie mit relativer Lymphocytose. Der Grundumsatz des Stoffwechsels ist beträchtlich herabgesetzt, gelegentlich um mehr als die Hälfte. Diagnostisch verwertbar ist auch die abnorm hohe Toleranz für Traubenzucker, der in Gaben von 100 g und mehr keine Glykosurie bewirkt. Die Körpertemperatur ist meist erniedrigt. Amenorrhöe bzw. Unregelmäßigkeiten in der Menstruation, frühzeitiges Klimakterium sowie Erlöschen der Potenz bzw. der Libido sind häufig. Manche Fälle kommen in der Gravidität oder im Puerperium zum Ausbruch. Oft ist hartnäckige Obstipation vorhanden. Charakteristisch ist ferner die Retention von Wasser in den Geweben. Sehr ausgesprochen ist schließlich die psychische Alteration der Kranken. Sie werden einsilbig, stumpf, willensschwach und gleichgültig, was sich auch in ihrer langsamen, einförmigen Sprache und ihren trägen Bewegungen verrät. Schließlich kann sich hochgradige Geistesschwäche entwickeln. Oft besteht ausgesprochene Schlafsucht. Doch wird bisweilen auch hochgradige Erregtheit beobachtet.

Neben diesen ausgeprägten Typen, deren Erkennung auf den ersten Blick möglich ist, gibt es auch abgeschwächte bzw. rudimentäre Formen (ebenfalls häufig nach Schilddrüsenoperationen). Oft machen sich hier vorwiegend subjektive Beschwerden bemerkbar, die sich in Herabsetzung der Leistungsfähigkeit, Änderungen im seelischen Verhalten, Anomalien der Menstruation, Schlafstörungen äußern. Diese Formen, denen man u. a. bei Frauen kurz vor dem Klimakterium begegnet, sind keineswegs selten und praktisch überaus wichtig, da sie der gleichen Therapie wie das echte Myxödem zugänglich sind. Hierzu gehört auch die später zu besprechende thyreogene Fettsucht.

Die Therapie des Myxödems und seiner abortiven Formen ist ebenso dankbar wie sicher. Sie besteht als sog. Organ- oder Opothérapie in der Verabreichung von Schilddrüsensubstanz per os, ehemals in Form der rohen gehackten Hammelschilddrüse (etwa 3–10 g auf Brot), jetzt in Form der aus dem getrockneten Organ hergestellten Schilddrüsen-tabletten (Thyreoidintabletten Merck-Darmstadt, Thyradentabletten-Knoll oder Thyreoglandoltabletten); Beginn mit  $\frac{1}{2}$ –1 Tablette täglich, langsam steigern auf 3–5 Tabletten. Die Behandlung ist streng zu individualisieren. Die sicherste Kontrolle gegen Überdosierung bietet das Verhalten des Pulses, der 80 nicht überschreiten soll. Der Erfolg tritt sehr bald ein und verrät sich zunächst in Veränderung des Gesichtes und der Psyche. Ein frühes Zeichen der Schilddrüsenwirkung ist auch erhebliche Diurese. Die Therapie ist möglichst bis zum völligen Schwinden der Symptome durchzuführen; später eventuell Fortsetzung mit ganz kleinen Dosen. Auch die Abortivfälle reagieren gut auf die Organtherapie.

Den Zuständen, die auf verminderte oder fehlende Schilddrüsen-tätigkeit zurückzuführen sind, stehen die auf pathologisch gesteigerter Funktion der Thyreoidea beruhenden sog. Hyperthyreosen gegenüber. Hierzu gehört vor allem die Basedowsche Krankheit.

### **Basedowsche Krankheit.**

Der Morbus Basedowii ist die häufigste Krankheit auf dem Gebiete der innersekretorischen Störungen. Sie ist durch eine Reihe charakteristischer Symptome seitens des Zirkulationsapparates, des Nervensystems, des Stoffwechsels sowie der Augen ausgezeichnet, und zwar stellen sich die Störungen zum großen Teil in der Form einer erhöhten Erregbarkeit vornehmlich des vegetativen, aber auch des cerebros spinalen Nervensystems dar. Im Mittelpunkt steht die krankhafte Veränderung der Schilddrüse, insbesondere ihre erhöhte Tätigkeit (Hyperthyreoidismus).

Die Krankheit, die hauptsächlich im jugendlichen und mittleren Alter auftritt, befällt Frauen häufiger als Männer; oft handelt es sich um Individuen, die schon vor Ausbruch des Leidens stets nervös waren bzw. aus neuropathischer Familie stammen. Als auslösende Faktoren lassen sich mitunter seelische oder körperliche Traumen, weiter akute Infektionskrankheiten sowie auch die Gravidität feststellen.

Krankheitsbild: Das Leiden beginnt in zahlreichen Fällen allmählich, bisweilen aber auch akut. Bei der sog. klassischen Form der Basedowschen Krankheit spielen vor allem drei Symptome eine führende Rolle: Tachykardie, Struma und Exophthalmus (sog. Merseburger Trias); hinzu kommt meist noch starker Tremor. Die hochgradige Pulsbeschleunigung (120—160 und mehr), die mit großer Labilität des Pulses einhergeht, ist in der Regel von peinigenden subjektiven Empfindungen wie lebhaften Herzpalpitationen, Beklemmungsgefühl sowie starkem Klopfen der großen Gefäße begleitet. Objektiv bestehen erhebliche Verstärkung der Herzaktion oft mit Erschütterung der gesamten Herzgegend, bisweilen auch verstärkter Spitzenstoß, klappende Herztöne; nicht selten beobachtet man Dilatation, ferner oft ein systolisches Geräusch über der Pulmonalis. Der Blutdruck ist häufig niedrig. Die stets vorhandene Vergrößerung der Schilddrüse hält sich meist in mäßigen Grenzen; in der Regel handelt es sich um eine weiche, beide Schilddrüsenlappen gleichmäßig befallende Struma, deren Gefäßreichtum sich oft durch fühlbare Pulsationen wie durch auscultatorisch feststellbare Gefäßgeräusche verrät. Der in der Regel doppelseitige Exophthalmus mit Erweiterung der Lidspalte (vgl. Abb. 43)



Abb. 43. Ausgesprochener Morbus Basedowii. Sichtbar Struma, Exophthalmus, daneben Tachykardie und nervöse Allgemeinerscheinungen (nach Külb s).

verleiht dem Patienten einen eigentümlich erschreckten starren Blick und gestattet oft, die Diagnose dem Kranken vom Gesicht abzulesen („Glotzaugenkrankheit“).

Weitere charakteristische Augensymptome sind das Graefesche Zeichen, d. h. beim Senken des Blickes nach unten fehlt das entsprechende Mitgehen des oberen Lides, so daß zwischen oberem Cornealrand und Lid ein breiter, von der weißen Sklera gebildeter Saum sichtbar wird (eventuell Frühsymptom); ferner das Möbiussche Zeichen, d. h. beim Fixieren eines nahen Objektes weicht alsbald ein Auge wieder nach außen ab (sog. Insuffizienz der Konvergenz); es ist nicht konstant ebensowenig wie das Stellwagsche Symptom, das in der Seltenheit des Lid Schlagelages besteht. In schweren Fällen kann die Protrusio bulbi enorme Grade erreichen und gelegentlich mit trophischen Hornhautveränderungen einhergehen. Pupillenreaktion und Akkommodation bleiben intakt.

Andere konstante Symptome sind einmal das charakteristische feinschlägige Zittern namentlich der Hände (besonders deutlich beim Spreizen der Finger), aber auch der Augenlider, bisweilen ferner der Zunge und der Beinmuskeln. Stets klagen die Patienten über große Muskelschwäche und hochgradige Ermüdbarkeit. Sodann besteht oft eine enorme seelische Erregbarkeit, die die Kranken nicht selten in einen qualvollen Zustand dauernder Unruhe und Rastlosigkeit versetzt. Jäher Stimmungswechsel zwischen Depression und abnormer Euphorie, krankhafte Reizbarkeit, zänkisches Wesen, Neigung

zu extravaganten Handlungen (oft namentlich auf erotischem Gebiet), hastige Sprache usw. kennzeichnen die Störung des psychischen Gleichgewichtes. Bisweilen kommt es zu regelrechten Psychosen. Häufig besteht Schlaflosigkeit, ferner starke vasomotorische Erregbarkeit mit Neigung zum Erröten. Die Patellarreflexe sind lebhaft.

Eine sehr charakteristische und praktisch wichtige Störung ist weiter die in der Regel vorhandene Änderung des Stoffwechsels, welche in einer beträchtlichen Steigerung der Oxydationen, vermehrtem Eiweißzerfall und Steigerung der Fettzersetzung besteht. Die Erhöhung des Grundumsatzes kann über 60% betragen. Daraus erklärt sich, daß die Kranken trotz einer oft vorhandenen Polyphagie an einer erheblichen und oft rapiden Abmagerung leiden. Diese wird in manchen Fällen noch durch intestinale Störungen verstärkt.

Diarrhöen treten bisweilen anfallsweise auf; sie sind mitunter durch starken Fettgehalt des Stuhles ausgezeichnet. Ferner kann es bei schweren Fällen zu wiederholtem und hartnäckigem Erbrechen kommen.

Häufig klagen die Kranken über starken Haarausfall, gelegentlich über Brüchigwerden der Nägel. Die Haut ist feucht, sehr oft besteht Neigung zu starker Schweißabsonderung. In einzelnen Fällen zeigt die Haut stärkere Pigmentierung. Nicht selten kommen vorübergehend leichte Temperatursteigerungen vor, die ebenfalls auf den Hyperthyreoidismus zurückgeführt werden. Im Blute ist regelmäßig eine relative Lymphocytose, in schweren Fällen eine Verminderung der Leukocytenzahl zu konstatieren, wogegen Anämie nicht zum Krankheitsbild gehört. Auch die Sexualorgane zeigen oft Störungen, beim Mann mitunter Nachlassen der Potenz, beim Weibe Abnahme bzw. Aufhören der Menstrualblutungen. Nach 100 g Dextrose per os kann alimentäre Glykosurie auftreten; auch Erhöhung des Blutzuckerhaltes sowohl alimentär wie nüchtern wird bisweilen beobachtet. In einzelnen Fällen besteht echter Diabetes.

Anatomisch zeigt die Basedow-Schilddrüse die Zeichen erhöhter Tätigkeit, und zwar starken Gefäßreichtum, ferner häufig Verflüssigung des Kolloids, Epithelwucherungen der Follikel sowie Lymphocyteninfiltrate. Mitunter findet sich eine substernale Struma. Außerdem bestehen häufig ein persistierender bzw. hypertrophischer Thymus, ferner oft cystische Veränderungen an der Hypophyse. Der linke Herzventrikel ist nicht selten hypertrophisch.

Pathogenese: Ein großer Teil der Basedowsymptome läßt sich durch abnorme Erregung des vegetativen Nervensystems erklären und deutet insbesondere auf erhöhten Tonus des Sympathicus, in geringerem Grade auch des Vagus hin. Daneben zeigt auch das cerebrospinale System Zeichen erhöhter Erregbarkeit. Gegenüber der hierauf sich gründenden früheren Auffassung, die im Morbus Basedowii eine reine Neurose sah, sucht man heute das Wesen der Krankheit in der Hauptsache in einer pathologisch gesteigerten Schilddrüsentätigkeit. Insbesondere wird die verstärkte Resorption des jodhaltigen Komplexes der Drüse (vgl. oben) für das gesamte Krankheitsbild verantwortlich gemacht und dasselbe als Thyreotoxikose erklärt. Für die dominierende Stellung der Schilddrüse im Krankheitsbild spricht u. a. der prompte Erfolg der operativen Verkleinerung der Drüse bei Basedow. Auch sah man umgekehrt, wenigstens einen Teil der Basedowsymptome nach Schilddrüsenverfütterung sowie bei Kropfkranken nach stärkeren Joddosen auftreten. Auch der klinische Antagonismus zwischen Basedow und Myxödem und das gegensätzliche Verhalten ihres Stoffwechsels läßt sich im gleichen Sinne verwerten. Andererseits spielen außerdem zweifellos noch andere endokrine Drüsen (Hypo-

physe, Nebennieren, Keimdrüsen, Pankreas, Thymus) eine nicht unwichtige Rolle; und endlich spricht u. a. die häufig von vornherein vorhandene neuropathische Konstitution und manches andere dafür, daß die pathologische Erregbarkeit des Nervensystems möglicherweise mehr als eine nur mittelbare Folge der Intoxikation mit Schilddrüsenprodukten ist.

**Verschiedene Verlaufsformen:** Die Krankheit zeigt recht mannigfaltige Bilder sowohl hinsichtlich des Hervortretens der einzelnen Symptome wie in ihrem Verlauf. Sie verläuft in der Regel chronisch. Oft kommt es zu kürzeren oder länger dauernden Remissionen, denen erneute Verschlimmerungen folgen. Schließlich kann das Leiden in ein Stadium hochgradiger Abmagerung und extremen Kräfteverfalls übergehen, wobei oft die Symptome schwerer Herzinsuffizienz mit starker Dilatation, mitunter mit Arhythmia perpetua sowie Stauungserscheinungen und Ödemen das Bild beherrschen und schließlich zum tödlichen Ausgang führen. Namentlich neigen auch die akut einsetzenden Fälle zu einem ungünstigen Verlauf. Doch können sie umgekehrt auch unerwartet wieder ausheilen. Alle derartige gebesserte bzw. geheilte Fälle zeichnen sich durch eine gewisse Neigung zu Rezidiven aus. Abgesehen vom Versagen des Herzens sind namentlich hartnäckige Verdauungsstörungen, speziell Anorexie, Erbrechen und Durchfälle den Verlauf ungünstig beeinflussende Momente. Beachtenswert ist, daß bisweilen Verschlimmerungen mit einer Verkleinerung der Struma einhergehen.

Dies beobachtet man gelegentlich auch nach Röntgenbestrahlung (vermehrte Abgabe von Sekret der Drüse an das Blut) sowie nach unvorsichtiger Jodtherapie (sog. Jodbasedow). Ein Teil der Basedowfälle ist mit Lungen-Tb. kompliziert; letztere bestimmt bisweilen den weiteren Verlauf des Leidens. Ähnliches gilt von einem gleichzeitig vorhandenen Diabetes. In manchen Fällen geht ein bis dahin harmloser Kropf in das Krankheitsbild des Morbus Basedowii über (Struma basedowificata); doch ist der Basedow in Kropfgenden selten. Kommt es zur Ausheilung eines Basedow, so pflegt der Exophthalmus als einziges Residuum nicht ganz zu schwinden.

Eine große praktische Bedeutung haben die rudimentären Formen des Morbus Basedowii (sog. formes frustes, Basedowoid), zumal sie recht häufig sind und gelegentlich differentialdiagnostische Schwierigkeiten bereiten. Im Vordergrund stehen hier subjektive Beschwerden wie Herzklopfen und starke nervöse Erregbarkeit, Abmagerung, Neigung zu Schweißen, abnorme Ermüdbarkeit. Die Schilddrüse ist entweder nur wenig oder überhaupt nicht vergrößert, ebenso pflegt ausgeprägter Exophthalmus zu fehlen. Dagegen fällt häufig der eigentümliche feuchte Glanz der Augen als charakteristisches thyreotoxisches Symptom auf. Oft zeigen diese Fälle auch den beschriebenen feinschlägigen Tremor.

Zu erwähnen ist schließlich noch ein als Kropfherz bezeichneter Zustand, der hauptsächlich in Kropfgenden beobachtet wird und sich durch das Dominieren der kardiovaskulären Störungen, speziell der Herzsymptome, andererseits durch das starke Zurücktreten der übrigen Reizerscheinungen des Morbus Basedowii auszeichnet. Oft ist der Blutdruck gesteigert. Man hat den Zustand für einen Teil der Fälle als Thyreotoxikose, für eine andere Gruppe auf rein mechanischem Wege als Folge der Kompression der Luftröhre durch die Struma und die konsekutiven Zirkulationsstörungen erklärt.

Die Diagnose des ausgeprägten Krankheitsbildes (sog. Vollbasedow) ist so einfach, daß sie oft bereits vom Laien richtig gestellt wird.

Schwieriger kann sie bei den rudimentären Formen sein. Differentialdiagnostisch kommen hauptsächlich die einfache Neurasthenie, ferner die beginnende Lungentuberkulose sowie die Chlorose in Frage. Sie können den leichten thyreotoxischen Störungen ähnliche Bilder zeigen. Genaue Untersuchung der Lunge bzw. des Blutes ermöglicht die Abgrenzung. Diagnostisch bedeutsam ist weiter die Tatsache, daß gegenüber *Digitalis* die Basedow-Herzbeschwerden, speziell die Tachykardie sich vollkommen refraktär verhalten (dies gilt allerdings nicht für die späteren Stadien mit dilatativer Herzschwäche, vgl. oben). Vor einer Verwechslung der thyreotoxischen mit der paroxysmalen Tachykardie (vgl. S. 156) schützt die Berücksichtigung der übrigen Basedow-Merkmale.

Die Therapie hat in erster Linie die nervöse Komponente des Leidens zu berücksichtigen: Ruhe unter Fernhaltung aller seelischen Erregungen und Vermeidung körperlicher Anstrengungen; am besten Entfernung der Patienten aus ihrer Umgebung. Liege-, Mast- und klimatische Kuren (Waldluft, mittlere Höhe; oft wirkt auch Hochgebirge günstig), milde Hydrotherapie (zunächst versuchsweise). Anfangs sind Sedativa, speziell Baldrian und Brom (*Mixt. nervina*, *Bromural* usw.) sowie leichte Hypnotica (*Adalin*, *Medinal*) nicht zu entbehren. Die Kost sei möglichst calorienreich; häufige kleine Mahlzeiten (geringe Fleischmengen). Sehr wichtig ist die fortlaufende Kontrolle des Körpergewichtes. Verboten sind Kaffee, starker Tee sowie Alkohol- und Nicotin-Abusus, Vorsicht mit Abführmitteln. Gegen die Diarrhöen Tanninpräparate oder *Calc. carbon.* (mehrmals täglich 1,0), eventuell mit *Pancreon aa*; sehr wirksam sind oft *Suprareninklysmen* (vgl. S. 323). Gegen das Herzklopfen Eisblase und Baldrianpräparate sowie *Validol* (3mal täglich 5 Tropfen), dagegen kein *Digitalis* oder *Strophanthus*, solange nicht Zeichen organischer Herzinsuffizienz bestehen. Gegen die Struma empfiehlt sich Anwendung einer HalskühlSchlange bzw. Halseisblase. Bisweilen wirken *Natr. phosphor.* (3mal täglich 2–3,0) sowie kleine Dosen von *Natr. salicyl.* und Chinin (3–4mal täglich 0,25) günstig. Man warne jeden Patienten ausdrücklich vor Einreibungen des Halses mit Salben (Gefahr der verstärkten Resorption des Schilddrüsensekretes infolge der Massage), ferner vor eigenmächtiger Jodmedikation sowie vor der ebenso gefährlichen Anwendung von Schilddrüsenpräparaten. Neuerdings hat man mittels Röntgenbestrahlung der Struma in manchen Fällen Besserung erzielt (in einzelnen Verschlimmerung). Beim Versagen der übrigen Therapie kommt die Operation, d. h. die Resektion eines Teiles der Drüse in Frage; sie erzielt oft schöne Erfolge. Kontraindiziert ist der Eingriff in einem bereits zu weit fortgeschrittenen Stadium der Krankheit mit schwererer Herzinsuffizienz bzw. Kachexie.

### Erkrankung der *Glandula parathyreoidea* (Epithelkörperchen, Nebenschilddrüse).

Die Nebenschilddrüse besteht aus je zwei paarig vorhandenen, etwa 3–15 mm langen, rundlichen Gebilden, die den Seitenlappen der Schilddrüse von außen und hinten anliegen. Weder ihre Lage noch ihre Zahl ist ganz konstant. Dieser Umstand sowie die nahe Nachbarschaft der Schilddrüse erklären es, daß bei ausgedehnteren Strumaoperationen die Organe mitunter mitextirpiert oder wenigstens mechanisch lädiert werden. Histologisch bestehen sie großenteils aus zusammenhängenden Epithelmassen; daneben kommen wie bei der Schilddrüse kolloidhaltige Follikel vor. Über die physiologische Bedeutung des Epithelkörpercheninkretes ist nichts Genaueres bekannt. Manches spricht dafür, daß es sich um ein die Erregbarkeit der peripherischen Nerven herabsetzendes Prinzip handelt, sowie daß dabei der Kalkstoffwechsel eine wichtige Rolle spielt, welche jedoch im einzelnen unbekannt ist. Dagegen kennt man genau die Aussfallserscheinungen, die bei Ausschaltung des Organs eintreten. Das dabei entstehende Krankheitsbild ist die

### Tetanie.

Der Zusammenhang der Tetanie mit den Epithelkörperchen wird u. a. auch durch die Tatsache bewiesen, daß auch beim Tier nach experimenteller Ausschaltung derselben der menschlichen Tetanie analoge Krankheitserscheinungen auftreten.

Das Krankheitsbild der Tetanie ist hauptsächlich durch eine dauernde Steigerung der mechanischen und elektrischen Erregbarkeit der peripherischen Nerven ausgezeichnet. Dieselbe äußert sich einmal durch anfallsweise auftretende eigenartige Krampfstände, sodann in der Zwischenzeit zwischen den Anfällen durch gewisse Zeichen, die auf eine latente abnorme Reizbarkeit der motorischen und sensiblen Nerven hinweisen.

Dem tetanischen Krampfanfall gehen bisweilen gewisse Prodromalerscheinungen wie Unbehagen, Gliederziehen, Steifigkeit in den Armen voraus. Der Anfall selbst besteht in einem tonischen Krampf der stets symmetrisch befallenen Extremitäten, deren Muskulatur eine brettharte Spannung zeigt. Zunächst beteiligen sich meist die Arme, später die Beine, wobei vor allem die Beugemuskeln kontrahiert sind. Die Hände nehmen die sehr bezeichnende Haltung wie beim Schreiben an (auch Geburtshelfer- oder Pfötchenstellung genannt), die Handgelenke sind flektiert, die Ellbogen leicht gebeugt, die Oberarme bisweilen an den Rumpf angepreßt; die Füße zeigen Equinovarusstellung, die Zehen sind flektiert. Gelegentlich können schließlich ungefähr sämtliche quergestreiften Muskeln von dem Krampfe befallen werden. Bei Kindern tritt außerdem häufig Laryngospasmus auf, der bei Erwachsenen nur selten beobachtet wird. Bisweilen kommen Parästhesien (Kriebeln) vor. Während des Anfalles ist das Sensorium vollkommen frei, nur selten wird Bewußtlosigkeit beobachtet. Der Krampf ist von lebhaften Schmerzen begleitet, so daß der Zustand ziemlich qualvoll ist. Die Körpertemperatur verhält sich normal oder ist nur wenig gesteigert; das gleiche gilt vom Puls. Auch die inneren Organe sowie die Reflexe pflegen während des Krampfanfalles keine wesentlichen Abweichungen von der Norm zu zeigen. Oft bestehen profuse Schweiße. Die Dauer eines Anfalles schwankt zwischen wenigen Minuten und vielen Stunden, ja sogar Tagen. Er pflegt allmählich nachzulassen. Die Auslösung eines Anfalles kann durch die verschiedensten Momente erfolgen wie seelische Erregung, körperliche Anstrengung, fieberhafte Erkrankung, sowie Injektion von Adrenalin oder Pilocarpin (beiden Pharmaka gegenüber sind die Tetaniekranken sehr empfindlich).

In der anfallsfreien Zwischenzeit läßt sich eine latente Übererregbarkeit der peripherischen Nerven nachweisen.

Das mechanische Beklopfen des Facialis dicht vor dem Ohr mit dem Perkussionshammer bewirkt blitzartige Zuckungen in der Muskulatur des Mundwinkels sowie der Nasenflügel (Chvostek'sches Phänomen); oft genügt schon leises Bestreichen dieser Gegend. Diagnostisch noch wichtiger ist die Feststellung der Steigerung der elektrischen Erregbarkeit der Nerven namentlich gegenüber dem galvanischen Strom (Erbsches Phänomen). Man prüft in der Regel den N. ulnaris. Die Kathodenschließungszuckung tritt bei erheblich geringerer



Stromstärke als in der Norm auf (norm. untere Grenze 0,2 Milliamp.), auch erfolgt schon frühzeitig Kathodenschließungstetanus. Endlich bewirkt Druck auf einen großen Nervenstamm, z. B. den Ulnaris oder Umschnürung des Arms einen tetanischen Krampf der Muskeln desselben (Trousseauisches Phänomen). Nicht selten weisen Tetanikranke auch trophische Störungen auf wie brüchige Nägel, Haarausfall sowie Schmelzdefekte an den Zähnen. Auch kommt nicht selten Katarakt (Schichtstar oder Kapselstar) vor.

Die Tetanie stellt sich unter verschiedenen Bedingungen ein, deren pathogenetische Bedeutung erst zum Teil bekannt ist. Vor allem wird sie als postoperative Ausfallserscheinung, als sog. parathyreoprive Tetanie infolge von Exstirpation oder Läsion (Quetschung, Blutung) der Epithelkörperchen bei der Strumektomie bzw. bei Unterbindung aller vier Art. thyreoid. beobachtet. Zu den sog. idiopathischen Tetanien gehört die Tetanie der kleinen Kinder, die u. a. durch die große Neigung zu Glottiskrämpfen und anderen unter der Bezeichnung spasmophile Diathese zusammengefaßten Symptomen erhöhter nervöser Erregbarkeit ausgezeichnet ist. Man hat sie mit der intra partum erfolgten Schädigung der Epithelkörperchen zu erklären versucht. Sicher dürften hier noch andere Faktoren, u. a. unzureichende Ernährung eine wesentliche, unterstützende Rolle spielen. Oft besteht gleichzeitig Rachitis sowie Zurückbleiben des Wachstums. Die sog. Arbeitertetanie befällt mit Vorliebe gewisse Berufe, insbesondere Schuster und Schneider. Wie die Kindertetanie zeigt diese Form gehäuftes Auftreten im Frühjahr (sog. Frühjahrsgipfel). Ihre Ursache ist unbekannt. Die sog. Maternitätstetanie tritt während der Gravidität, im Wochenbett sowie während des Stillens auf, wie überhaupt beim ♀-Geschlecht zwischen der Tetanie und den Generationsvorgängen ein Zusammenhang besteht. Auch bei Schilddrüsenerkrankungen sowie als Folge von Infektionskrankheiten und Vergiftungen wird Tetanie beobachtet. Schließlich findet man sie bei verschiedenen Erkrankungen des Magens und Darms, insbesondere bei den mit Magenektasie einhergehenden Fällen von Pylorusstenose (gastrische Tetanie). Die Krankheit kann hier durch Beseitigung der Magenstauung heilen.

Der Verlauf des Leidens ist sehr verschieden. Schwere postoperative Fälle können tödlich ausgehen; in zahlreichen Fällen klingen indessen die Erscheinungen, die hier oft überhaupt nur rudimentär auftreten, allmählich wieder ab, um z. B. während einer Gravidität von neuem aufzutreten. Auch die Tetanie der Kinder heilt zwar häufig aus, hinterläßt aber oft eine gewisse Krampfbereitschaft. Die Krampfanfälle der Arbeitertetanie pflegen für eine Reihe von Tagen oder Wochen aufzutreten, um dann wieder zu schwinden; doch treten im Laufe der Jahre häufig Rückfälle, besonders in den Monaten März und April ein, ohne aber die Patienten in ihrem allgemeinen Gesundheitszustand allzu sehr mitzunehmen.

Die Diagnose stützt sich auf die typischen Anfälle sowie vor allem (auch zur Unterscheidung von der Hysterie) auf den Nachweis der mechanischen sowie der elektrischen Übererregbarkeit, namentlich der Kathodenschließungszuckung bei abnorm geringer Stromstärke. Bei Tetanus bleiben die Hände stets frei; auch fehlt das Chvosteksche und Erbsche Phänomen. Zu beachten ist das Vorkommen einer Kombination von Tetanie sowohl mit Hysterie wie mit Epilepsie.

Therapie: Häufig ist die Verabreichung großer Calciumgaben wirksam (Calc. chlorat. 10,0/150,0 3—5 mal täglich 1 Eßlöffel oder 10% als Klysma 20 ccm oder 5% 5—10 ccm intravenös). Bei schweren Fällen außerdem Brom, Chloralhydrat. Bei postoperativer Tetanie hatte die Implantation tierischer Epithelkörperchen wiederholt Erfolg. Bei gastrischer Tetanie Magenspülung bzw. Gastroenterostomie. Die Darstellung der wirksamen Substanz der Epithelkörperchen zwecks oranotherapeutischer Verwendung ist bisher nicht gelungen.

## Die Krankheiten der Nebennieren.

Vorbemerkungen: Die Nebennieren bilden kleine, paarig angelegte Organe, die dem oberen Pol der Nieren kappenartig aufsitzen. Sie bestehen aus zwei morphologisch und entwicklungsgeschichtlich verschiedenen Teilen, der Nebennierenrinde und der Marksubstanz. Erstere besteht aus epithelialen Zellen, die reichlich, zum großen Teil doppelbrechende Lipotide enthalten. Das Markgewebe enthält mit Chromsäure sich braun färbende „chromaffine“ Zellen, ferner zahlreiche Nerven sowie multipolare Ganglienzellen, die genetisch zum Sympathicus gehören. Letzterer Umstand wirft auf die Tatsache Licht, daß auch außerhalb der Nebenniere im Abdomen sich in der Nachbarschaft der Sympathicusganglien chromaffine Zellen finden. Die Gesamtheit der chromaffinen Zellen des Körpers wird als Adrenalsystem bezeichnet. Genaueres bekannt ist bisher nur über die physiologische Funktion der Marksubstanz, aus der man als wirksames Hormon das Adrenalin, ein Derivat des Brenzkatechins dargestellt hat. Nach Feststellung seiner chemischen Konstitution ist es auch gelungen, dasselbe synthetisch herzustellen („Suprarenin“). Das Adrenalin hat eine Reihe sehr charakteristischer biologischer Wirkungen, die in ihrem Effekt mit demjenigen der Reizung des Sympathicus übereinstimmen: Blutdrucksteigerung durch Verengerung der Blutgefäße (ausgenommen sind die Coronargefäße, die sich erweitern), Ansteigen des Blutzuckers sowie Glykosurie infolge von Mobilisierung des Glykogens der Leber, Erhöhung der Pulsfrequenz, ferner Contraction der glatten Muskulatur des Uterus und des Darms, bisweilen auch Erweiterung der Pupillen, dagegen Hemmung der Contraction der Bronchialmuskeln.

## Addison'sche Krankheit.

Auf Hypofunktion der Nebennieren beruht die Addison'sche Krankheit (Broncekrankheit). In der Regel handelt es sich um tuberkulöse Erkrankung der Nebennieren, seltener um Lues, Tumoren oder einfache Atrophie derselben. Die Tb.-Erkrankung als solche kann im übrigen völlig latent bleiben. Die Krankheit ist nicht häufig. Sie befällt hauptsächlich das mittlere Lebensalter. Der Beginn ist schleichend. Die Hauptsymptome sind eine fortschreitende Muskelschwäche (Adynamie), die sich in hochgradiger Ermüdbarkeit äußert. Dazu treten geistige Apathie, Gedächtnisschwäche, ferner Verdauungsstörungen wie Aufstoßen, Übelkeit, Appetitmangel (Achylie), bisweilen Diarrhöen, weiter Kopfschmerzen und vor allem die für die Krankheit besonders charakteristische eigentümliche braune Hautpigmentierung. Prädiaktionsstellen sind die unbedeckten (daher stärker belichteten) Hautpartien wie Gesicht, Hals, Handrücken, ferner Stellen, die stärkerem mechanischen Druck ausgesetzt sind (Taille usw.) sowie vor allem die physiologisch stärker pigmentierten Hautstellen wie die Brustwarzen, die Genitalien, die Umgebung des Afters. Auch die Schleimhaut der

Lippen und des Gaumens sowie die Conjunctiven können braune Pigmentflecke aufweisen. Das Pigment ist eisenfrei und liegt in den tieferen Schichten des Rete Malpighi. Im Laufe der Krankheit nimmt die Intensität und Ausdehnung der Pigmentierung zu, so daß in sehr ausgeprägten Fällen der Patient ein negerartiges Aussehen annimmt; in anderen Fällen bleibt die Pigmentvermehrung auf die genannten Orte beschränkt. Oft entwickelt sich eine progrediente Abmagerung; doch gibt es auch Fälle, bei denen sich längere Zeit ein erhebliches Fettpolster hält. Charakteristisch für die Krankheit ist weiter ein häufig abnorm niedriger Blutzucker sowie die Tatsache, daß bei oraler Zufuhr größerer Mengen von Dextrose (100 g und mehr) die normal eintretende alimentäre Glykosurie ausbleibt. Ferner ist in späteren Stadien der Blutdruck abnorm niedrig; mitunter läßt er sich auch durch Suprareninjektionen nicht steigern. Bei Frauen besteht Amenorrhöe. Zu den subjektiven Beschwerden gehören ferner mitunter heftige Kreuzschmerzen sowie neuraliforme oder rheumatische Schmerzen in den Muskeln und Gelenken. Endlich entwickelt sich meist eine zunehmende sekundäre Anämie.

Der Verlauf der Krankheit, die Monate, aber auch Jahre dauern kann, ist in der Regel der eines schleichenden, unter fortschreitendem Marasmus zum Tode führenden Leidens. Doch gibt es einerseits akute und perakute Verlaufsformen; andererseits sah man in letzter Zeit vereinzelte Fälle, die sich unter Behandlung und Hebung des allgemeinen Kräftezustandes wieder zurückbildeten. Mitunter kommen plötzlich Todesfälle vor, namentlich nach Überanstrengungen.

Die Diagnose beruht in erster Linie auf der Pigmentierung und deren eigenartiger Lokalisation. Doch gibt es seltene Fälle, die die Mehrzahl der genannten Symptome, aber keine Pigmentierung aufweisen, obschon der anatomische Befund auch hier schwere Nebennierenveränderungen aufweist. Differentialdiagnostisch sind verschiedene addisonähnliche Pigmentierungen zu berücksichtigen, so die als Chloasma uterinum bezeichnete, in der Gravidität auftretende Hautpigmentierung, ferner die Dunkelfärbung der Haut infolge von Aufzeifer, speziell bei Vagabunden, weiter die Arsenmelanose nach lange fortgesetztem medikamentösen As-Gebrauch; auch bei Basedow, bei manchen Formen der Lebercirrhose (Cirrhose broncée) sowie bei Pellagra kommen eigentümliche, dem Addison nicht unähnliche Hautpigmentierungen vor.

Die Therapie ist rein symptomatisch. Bei positiver Wa-Reaktion versäume man jedoch nicht den Versuch mit einer antiluetischen Kur.

Über die Symptomatologie einer pathologischen Steigerung der Nebennierenfunktion ist bisher nur sehr wenig bekannt. Bei Wucherungsprozessen der Rindensubstanz (Adenome) treten, wenn sie sich in frühester Jugend einstellen, eigenartige Anomalien auf, die vor allem in einer abnorm beschleunigten Körperentwicklung einschließlich der Genitalien bestehen. Körperlänge, Ossification, die Entwicklung des Gebisses, der Geschlechtsorgane und der sekundären Geschlechtsmerkmale (Stimme, Bartwuchs) eilen um viele Jahre der normalen Entwicklung voraus: sog. Pubertas praecox. Tritt erst später die Hyperfunktion des Organs ein, so kann es zu eigentümlichen Zuständen kommen, die an Zwitter erinnern (bei Mädchen männliche Behaarung und Bartentwicklung).

## Die Krankheiten der Hypophyse.

Vorbemerkungen: Die Hypophyse (Glandula pituitaria) ist ein kleines bohnenförmiges Organ von etwas mehr als 0,5 g Gewicht, das in der Sella turcica

liegt. Es besteht aus zwei entwicklungsgeschichtlich vollkommen verschiedenen Hauptteilen, dem durch Ausstülpung der Mundhöhle entstandenen Vorderlappen und dem nervösen Hinterlappen, der durch das Infundibulum mit dem Boden des dritten Ventrikels (Tuber ciner.) in Verbindung steht. Der Vorderlappen zeigt drüsenartige Struktur und enthält Epithelschläuche mit verschiedenartigen Zellen, darunter zahlreichen Eosinophilen. Der kleinere Hinterlappen enthält Neuroglia, Nervenfasern sowie Ganglienzellen. Außerdem gibt es noch eine kleine, Follikel enthaltende Pars intermedia sowie eine sog. Pars tuberalis. Die Lage des Organs in der engen knöchernen Höhlung des Türkensattels erklärt, daß abnormes Wachstum eines Abschnittes der Hypophyse auch auf die übrigen Teile des Organs mechanisch schädigend wirken muß. Die physiologische Funktion der einzelnen Teile der Hypophyse ist eine verschiedene. Der Vorderlappen steht mit dem Wachstum des Körpers, speziell des Skelettes, aber auch der Weichteile in Zusammenhang (sog. Wachstumsdrüse) und spielt außerdem während der Gravidität eine Rolle, wo er sich vergrößert und eigentümliche, mit Eosin sich stark färbende Zellen, die sog. Schwangerschaftszellen aufweist. Ferner besteht eine Beziehung seitens des Vorderlappens sowie der Pars intermedia zu den Genitalien und deren Entwicklung. Die Pars intermedia übt außerdem einen Einfluß auf den Stoffwechsel aus; ihre Unterfunktion bewirkt abnormen Fettansatz. Der Hinterlappen steht mit den wichtigen nervösen Zentren des Mittelhirns, die das vegetative Nervensystem beeinflussen, in Verbindung. Das aus der Hypophyse hergestellte wirksame Prinzip (Pituitrin, Pituglandol, Coluitrin) entfaltet Wirkungen, die zum Teil denen des Adrenalins gleichen, indem es ebenfalls, aber langsamer und dafür nachhaltiger vasoconstrictorisch und blutdrucksteigernd wirkt, außerdem den graviden Uterus zu Wehen anregt und ferner die Diurese hemmt. Es stammt aus dem Hinterlappen. Um so merkwürdiger ist die Tatsache, daß die experimentelle Ausschaltung des Hinterlappens im Gegensatz zum Vorderlappen keine wesentlichen Ausfallserscheinungen bewirkt. Schließlich ist der lebhafte physiologische Konnex zu erwähnen, der zwischen Hypophyse und Schilddrüse besteht.

### Die Akromegalie.

Pathologisch gesteigerte Hypophysenfunktion (Hyperpituitarismus) kommt beim Erwachsenen in der Hauptsache in der Form der sog. Akromegalie vor. Die Akromegalie ist ein chronisch verlaufendes Leiden, das hauptsächlich durch das eigenartige partielle gesteigerte Wachstum der sog. gipfelnden Körperteile, durch entsprechende hyperplastische Prozesse am Skelett, ferner Hirndrucksymptome sowie Störungen seitens des Genitalapparates ausgezeichnet ist.

Besonders charakteristisch sind die Veränderungen des Gesichtes und der Extremitäten. Nase und Kinn zeigen ein oft bis zum Grotesken gesteigertes Wachstum. Es entwickelt sich ausgesprochene Prognathie (Vorspringen des Unterkiefers); Augenbrauen- und Jochbogen springen ebenfalls stark vor. Die Zwischenräume zwischen den Zähnen, namentlich am Unterkiefer werden größer, die Zunge wird dick, die Lippen wulstig. Schließlich entsteht ein im Vergleich zu früher vollkommen fremdes Aussehen. In ähnlicher Weise findet ein abnormes Wachstum an den Extremitäten speziell der Hände und Füße statt, die an Größe zunehmen und ein auffallend plumpes Aussehen annehmen. An der Vergrößerung sind teils die Knochen durch periostale Wucherung, teils die Weichteile beteiligt. Meist besteht eine cervico-dorsale Kyphose. Eine Reihe weiterer wichtiger Symptome ist eine lokale Folge der Vergrößerung der Hypophyse. Infolge der nahen Nachbarschaft des Chiasma optic.

entwickelt sich häufig eine Druckatrophie des Sehnerven, speziell meist seiner medialen Ränder mit konsekutiver bitemporaler Gesichtsfeldeinschränkung (Hemianopsie). Röntgenologisch lassen sich oft nicht nur eine Erweiterung der Sella turcica, sondern bisweilen auch eine Zerstörung der Proc. clinoides nachweisen. Häufig klagen die Kranken auch über Kopfschmerzen sowie Schwindelgefühl. Oft beobachtet man Symptome seelischer Abstumpfung, Gleichgültigkeit und Apathie. Doch kann die psychische Alteration auch fehlen oder erst in späteren Stadien eintreten. In vielen Fällen besteht Herabsetzung der Toleranz für Zucker (alimentäre Glykosurie), bisweilen echter Diabetes mellitus. Funktionsstörungen der Geschlechtsorgane in Form von Impotenz, Amenorrhöe bzw. Sterilität sind häufig, aber nicht konstant.

Anatomisch findet man bei Akromegalie eine Hyperplasie des Hypophysenvorderlappens, der meist adenomatös verändert ist. In manchen Fällen liegt maligne Degeneration desselben vor. Die Annahme einer Hyperfunktion des Organs als Ursache der Krankheit findet ihre Bestätigung in dem Erfolge der operativen Beseitigung des Hypophysentumors, die ein Zurückgehen der Akromegaliesymptome zur Folge hat. Organotherapeutisch gelingt dagegen in der Regel eine günstige Beeinflussung nicht. Mitunter besteht gleichzeitig eine Erkrankung anderer endokriner Drüsen, speziell der Schilddrüse.

Der Verlauf des Leidens ist häufig sehr chronisch, über Jahrzehnte sich ausdehnend und führt schließlich zu Kachexie und Siechtum. Maligne Hypophysentumoren führen dagegen in Kürze zum tödlichen Ende.

Im Gegensatz zur Akromegalie, die im allgemeinen nur Erwachsene befällt, hat man den sog. **Riesenwuchs** oder Gigantismus auf die Hyperfunktion der Hypophyse im jugendlichen Alter, bevor die Epiphysenfugen verknöchern, zurückgeführt. Tatsächlich zeigen derartige jugendliche Riesen, bei denen das abnorme Wachstum die Extremitäten, dagegen nicht den Rumpf betrifft, häufig eine erweiterte Sella turcica. Man hat daher den Gigantismus als Akromegalie der Jugendlichen bezeichnet. Häufig besteht hier psychischer Infantilismus sowie nicht selten ein Zurückbleiben in der Entwicklung der Genitalien. Doch ist in manchen Fällen die gleichzeitige Erkrankung anderer endokriner Drüsen wahrscheinlich.

### **Dystrophia adiposogenitalis.**

Pathologisch herabgesetzte Funktion der Hypophyse (Vorderlappen bzw. Pars intermedia) oder Hypopituitarismus liegt dem Krankheitsbilde der *Dystrophia adiposogenitalis* zugrunde. Das in der Regel zwischen dem 10.—12. Lebensjahr sich entwickelnde Leiden (häufiger ♂ als ♀) besteht in Fettsucht, Stehenbleiben der sexuellen Entwicklung auf kindlicher Stufe bzw. Rückbildung der sekundären Sexualmerkmale, Hypoplasie der Genitalien. Die Art der Fettverteilung ist charakteristisch; sie bevorzugt hauptsächlich die Hüften, die Mammae, die Nates und den Mons veneris, so daß bei männlichen Individuen weibliche Formen entstehen. Das Körperwachstum bleibt zurück, so daß

Zwergwuchs resultieren kann. Ferner gehören Symptome zum Bilde, die unmittelbar auf einen intrakraniellen Prozeß hinweisen wie Hirndrucksymptome, Kopfschmerzen, Schwindel, Opticusatrophie, psychische Störungen, endlich Veränderungen der Sella turcica im Röntgenbild wie bei Akromegalie. Der Habitus der Kranken ähnelt oft dem der Eunuchoiden (s. unten), bei denen aber die genannten cerebralen Symptome fehlen. Anatomisch handelt es sich in der Regel um Tumoren der Hypophyse.

Bei hochgradiger Atrophie der Hypophyse wurde neuerdings eine eigentümliche Kachexie mit Haarausfall, Verlust der Zähne und Atrophie der inneren Organe beobachtet, ohne daß eine andere Ursache für das Leiden zu finden war (sog. Simmondsche Krankheit).

## Die Krankheiten der Keimdrüsen.

**Vorbemerkungen:** Den Keimdrüsen, Hoden und Ovarien kommt außer ihrer Keimzellen produzierenden Funktion (Spermatogenese und Ovulation) eine außerordentlich wichtige Rolle als endokrine Organe zu. In den Testikeln sind es die im Bindegewebe zwischen den Samenkanälchen liegenden, als Leydigische Zwischenzellen bezeichneten Zellkomplexe, die man als Produzenten des spezifischen Sexualhormons ansieht. Im Ovarium gilt das gleiche für die obliterierten Follikel bzw. die Corpora lutea; sie bilden die sog. interstitielle Eierstocksdrüse. Man hat die endokrine Komponente der Keimdrüsen auch als Pubertätsdrüse bezeichnet. Aufschluß über ihre Bedeutung lieferten vor allem die Beobachtungen nach Exstirpation (Kastration) bzw. Transplantation der Keimdrüsen. Auch wurde die Selbständigkeit des innersekretorischen Anteils der Keimdrüsen u. a. durch Beobachtungen über die Wirkung der Röntgenbestrahlung derselben näher bekannt, da diese zwar die Spermatogenese und Ovulation ausschaltet, dagegen die endokrine Funktion unbeeinflusst läßt. Auch nach Unterbindung des Vas deferens sowie bei Kryptorchismus ist nur die generative, dagegen nicht die hormonale Tätigkeit der Hoden aufgehoben. Die Wirkung der Sexualhormone kommt sowohl im Geschlechtstrieb wie in der Ausprägung der sekundären Geschlechtsmerkmale zur Geltung (Bartwuchs, Schamhaare, Brüste, Form des Beckens und des Kehlkopfs, Art der Fettverteilung und der dadurch bedingten charakteristischen Körperform von Mann und Weib). Zahlreiche für die Pathologie des Menschen wichtige Erfahrungen über die Wirkung der Kastration bei Tieren (Kapaune, Ochsen, Wallache) lehren, daß diese auch hier einen tiefgreifenden Einfluß auf Körperbau, Temperament und Charakter der Tiere ausübt.

Der Ausfall der Keimdrüsenhormone bewirkt beim Menschen charakteristische Störungen, die indessen, je nachdem die Ausschaltung schon in der Kindheit oder erst nach Eintritt der Pubertät stattfindet, einen verschiedenen Charakter haben. Die Entfernung beider Keimdrüsen (Kastration) vor der Pubertät, wie sie z. B. aus religiösen Gründen bei der Sekte der Skopzen geübt wird, außerdem früher zur Erhaltung kindlicher Sopranstimmen für Kirchenchöre angewendet wurde, bewirkt bei männlichen Individuen die Charakteristika des sog. **Eunuchen**. Die äußeren und inneren Genitalien bleiben in ihrer Entwicklung auf kindlicher Stufe stehen, die Stimme bleibt hoch (Fistelstimme). Scham- und Achselbehaarung fehlt, desgleichen der Bartwuchs. Der Rumpf zeigt weibliche Formen, insbesondere ein reichlich entwickeltes Fettpolster namentlich in der Unterbauchgegend sowie am Mons veneris und an den Mammae, ferner finden sich breites Becken, dürrtige Muskulatur; meist besteht ausgesprochener Hochwuchs mit oft sehr beträchtlicher Körperlänge.

Kastration im Stadium der Geschlechtsreife bewirkt beim Mann zwar nicht mehr die geschilderten eingreifenden Veränderungen im gesamten Körperbau; dagegen kommt es auch hier zur Rückbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale, was sich besonders im Ausfallen der Bart-, Scham- und Achselbehaarung bemerkbar macht. Erektionen sowie die Libido schwinden und es tritt Impotenz ein. Zum Teil handelt es sich bei diesen „Spätkastraten“ um traumatische Zerstörungen der Keimdrüsen, zum Teil umluetische oder gonorrhöische Entzündungsprozesse, die eine Verödung der interstitiellen Drüse bewirken.

Der sog. **Eunuchoidismus** ist eine Anomalie, die dem Bilde des echten Eunuchentypus nahe steht (sog. Hypogenitalismus). Sie ist nicht besonders selten. Die Ursache der Anomalie dürfte auf einer Entwicklungsstörung des endokrinen Sexualapparates beruhen, da exogene Faktoren hier nicht in Frage kommen. Äußerlich haben die Eunuchoiden große Ähnlichkeit mit den Eunuchen; sie zeichnen sich meist durch große Körperlänge sowie ebenfalls häufig durch reichliches Fettpolster aus. Die Genitalien sind abnorm klein; auch beobachtet man öfter ein nur unvollkommenes Deszendieren der Testikel. Es besteht Impotentia coeundi und Sterilität. Zum Teil deckt sich der äußere Habitus der Kranken mit demjenigen bei Dystrophia adiposogenitalis (vgl. S. 448).

Beim weiblichen Geschlecht kommen dem Eunuchoidismus des Mannes analoge Störungen im geschlechtsreifen Alter hauptsächlich dort vor, wo eine operative Entfernung beider Ovarien infolge von ausgedehnter Erkrankung der Adnexe vorgenommen wurde. Es treten akut ziemlich stürmische Störungen auf, die mit den physiologisch im Anfang des Klimakteriums oft vorhandenen Beschwerden übereinstimmen und in Angstgefühl, Hitzewallungen und Frostschauern, Ohnmachtsanfällen, heftiger psychischer Erregung sowie unbestimmten ziehenden Schmerzen im Körper bestehen. Die Menstruation hört auf. Es kommt zu Atrophie des Uterus und der Vagina sowie zu Fettansatz, dessen Verteilung dem Typus bei älteren Frauen entspricht. Die Patienten leiden seelisch oft schwer unter ihrem Zustand. Wegen der starken Ausfallserscheinungen vermeidet man bei operativen Eingriffen an den weiblichen Genitalien nach Möglichkeit eine vollkommene Entfernung beider Keimdrüsen und ist bestrebt, in gleicher Weise wie bei Schilddrüsenoperationen einen Rest der Organe zurückzulassen. Die aus anderen Gründen notwendige Kastration, z. B. zur Beseitigung von Myomblutungen wird aus den angeführten Gründen heute mittels Röntgenbestrahlung vorgenommen, welche die interstitielle Drüse schont. — Angeborener, auf Entwicklungshemmung beruhender Eunuchoidismus beim ♀-Geschlecht mit virilem Habitus ist selten; meist dürfte hier die Störung auch anderer endokriner Drüsen mit im Spiele sein.

Die **Therapie** des Keimdrüsenausfalles ist bei den angeborenen Zuständen aussichtslos. Bei den erworbenen Fällen (Spätkastration) hat man beim Mann durch Implantation menschlicher Hoden (die man z. B. von Fällen mit Kryptorchismus gewinnt) eine Wiederkehr der Sexualattribute sowie ein Wiedererwachen von Libido und Erektionen

erzielen können. Beim Weibe hat die organotherapeutische Behandlung mit tierischer Ovarialsubstanz oft sehr guten Erfolg (Ovaradentabl.-Knoll, Ovarintabl.-Merek, Ovoglandolinjektionen)

Das innere Sekret des **Pankreas** ist nicht bekannt. Die hervorragende Bedeutung desselben für den Zuckerstoffwechsel wurde schon S. 380 erwähnt, ebenso die Tatsache, daß die Bildung des Pankreashormons mit der Tätigkeit der Langerhansschen Inseln verknüpft sein dürfte. Diese bilden kleine rundliche Zellkomplexe, die in wechselnder Menge im Drüsenparenchym verteilt sind und in besonders großer Zahl im Schwanzteil der Drüse vorkommen. Bei Kranken mit Pankreasinsuffizienz ist oft die sog. Loewische Reaktion positiv, d. h. die Pupille erweitert sich nach Einträufeln von Suprarenin ins Auge.

Der **Thymus** liegt beim Kinde als plattes Organ hinter dem oberen Ende des Brustbeins und erstreckt sich bis zum Herzen. Er besteht aus Rinde und Marksubstanz und enthält lymphatisches Gewebe sowie epitheloide Zellen. In der Marksubstanz finden sich die charakteristischen als Hassalsche Körperchen bezeichneten konzentrisch geschichteten Epithelkugeln. In der Pubertät kommt es physiologisch zur Involution des Organs unter Umwandlung in den sog. thymischen Fettkörper. Über die hormonale Bedeutung des Thymus beim Menschen bestehen keine sicheren Kenntnisse. Wahrscheinlich hat er einen wichtigen Einfluß auf das Wachstum, speziell des Skelettes. Atrophie des Thymus vor der Pubertät kann Zwergwuchs sowie Brüchigkeit der Knochen bewirken. Kinder mit hyperplastischem Thymus sterben nicht selten plötzlich aus voller Gesundheit, z. B. auch in der Narkose: sog. Thymustod. Thymushyperplasie ist oft mit einer Wucherung des gesamten lymphatischen Gewebes des Körpers (Tonsillen, Zungenfollikel, Solitärfollikel und Peyersche Plaques des Darms) verbunden. Individuen mit diesem sog. Status lymphaticus zeichnen sich u. a. durch verminderte Widerstandsfähigkeit gegenüber Infektionskrankheiten aus. Das Verhalten des Thymus bei Basedow wurde S. 440 besprochen.

**Erkrankungen der Zirbeldrüse:** Die Zirbeldrüse (Epiphyse, Glandula pinealis) ist ein kleines, in der Decke des 3. Hirnventrikels vor den vorderen Vierhügeln gelegenes zapfenförmiges Organ von etwa 0,2 g Gewicht. Nach der Pubertät findet eine gewisse Rückbildung des Organs statt. Seine physiologische Aufgabe ist unbekannt. Vielleicht kommt ihm eine die Tätigkeit der Sexualorgane dämpfende Funktion zu. Pathologische Veränderungen, vor allem Tumoren der Zirbeldrüse verursachen gelegentlich charakteristische Symptome. Abgesehen von den allgemeinen Zeichen des Hirntumors kommen hierbei bei Kindern eigentümliche Bilder von Hypergenitalismus mit starker Entwicklung der Genitalien und der sekundären Geschlechtsmerkmale (Bart, tiefe Stimme), bisweilen auch auffallende geistige Frühreife vor, demnach ein ähnlicher Zustand wie bei Nebennierenrindentumoren. Im Gegensatz dazu bewirken beim Erwachsenen Epiphysentumoren bisweilen Fettsucht, in anderen Fällen Kachexie. Ein aus der Zirbeldrüse hergestelltes Organpräparat ist das Epiglandol.

## Die pluriglanduläre Insuffizienz (Multiple Blutdrüsensklerose).

Beiden vorstehend beschriebenen verschiedenen Krankheitsbildern wurde wiederholt hervorgehoben, daß zwar die Erkrankung einer der endokrinen Drüsen stets im Mittelpunkt steht, daß daneben aber häufig auch andere Hormondrüsen sich als verändert erweisen (z. B. Hypophysenveränderungen bzw. Thymushyperplasie bei Basedow usw.). Diese Mitbeteiligung anderer Drüsen, die sich sekundär an die primäre Erkrankung einer einzelnen endokrinen Drüse anschließt, macht klinisch häufig keine oder nur untergeordnete Symptome. Demgegenüber gibt es einzelne Krankheitsbilder, die klinisch von vornherein oder in kurzer zeitlicher Aufeinanderfolge eine Reihe von Symptomen aufweisen, die sich nur durch den Ausfall mehrerer endokriner Drüsen erklären lassen. Diejenigen Drüsen, die am




häufigsten gemeinsam erkrankten, sind die Schilddrüse, die Keimdrüsen, die Hypophyse sowie die Nebennieren. Die hieraus resultierenden Krankheitsbilder kennzeichnen sich dementsprechend durch eine Mischung von Ausfallssymptomen verschiedener Hormondrüsen, von denen jedes für sich häufig nicht besonders stark ausgeprägt bzw. nur angedeutet ist. So finden sich z. B. nebeneinander Gedunsenheit des Gesichtes, Haarausfall, Nachlassen der psychischen Energie mit Zeichen von Hypogonitalismus ähnlich dem Späteunuchoidismus sowie andererseits die Adynamie und die abnorme Pigmentierung der Addisonschen Krankheit. Ferner können auch Tetanie, weiter hochgradige Adipositas, starke Anämie und Kachexie sowie ein auffallendes Senium praecox sich mit einzelnen der anderen Ausfallserscheinungen in buntem Wechsel kombinieren. Ätiologisch scheinen bisweilen vorausgegangene akute Infektionskrankheiten, ferner die Lues eine Rolle zu spielen. Therapeutisch sind derartige Fälle meist aussichtslos. Man versuche es mit der Verabreichung einer Mischung der verschiedenen Organpräparate (vergl. oben), eventuell mit Injektionen von Hormin (Präparat aus Schilddrüse, Ovar, Nebenniere, Hypophyse und Pankreas; monatelang täglich 1 Ampulle subcutan).

## Stoffwechselkrankheiten.


**Einleitung:** Unter Stoffwechsel versteht man allgemein die Gesamtheit aller derjenigen chemischen Vorgänge im Körper, deren sich der Organismus bedient, um den Ersatz von verbrauchtem Material zu bewerkstelligen (Assimilation), andererseits um aus der Zersetzung höherer chemischer Verbindungen Energie in Form von Wärme und Arbeit zu gewinnen (Dissimilation). Die im Stoffwechsel in Frage kommenden Nahrungsstoffe sind in der Hauptsache Eiweiß, Fett, Kohlehydrate, Salze und Wasser; dazu kommen die Nucleoproteide, ferner die Lipide (Lecithin, Cholesterin) und die Vitamine. Das Schicksal dieser Nahrungsstoffe im Organismus gestaltet sich verschieden. Während z. B. die Salze und das Wasser im Stoffwechsel als solche den Geweben einverleibt werden, müssen andere Nahrungsstoffe erst eingreifende chemische Veränderungen erfahren, um zum Aufbau der Gewebe Verwendung zu finden. Die einzelnen Phasen der sich im Körper hierbei abspielenden komplizierten Vorgänge sind im Gegensatz zu den Endprodukten vorläufig nur teilweise bekannt; sie gehören zum sog. intermediären Stoffwechsel.

Die **Eiweißkörper** sind chemisch hochmolekulare Substanzen, die sich zum größten Teil aus zahlreichen Aminosäuren aufbauen. Man unterscheidet Monoaminosäuren (z. B. Glykokoll, Alanin, Asparaginsäure usw.), ferner die Diaminosäuren Lysin und Arginin, endlich aromatische d. h. Sechser- oder Fünferinge enthaltende („zyklische“) Aminosäuren wie Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan usw.



Die Aminosäuren sind im Eiweiß zu sog. Peptiden bzw. Polypeptiden untereinander gekuppelt. Zahl, Art und Gruppierung der verschiedenen Aminosäuren im Eiweißmolekül zeigen bei den einzelnen Eiweißarten erhebliche Unterschiede und bedingen ihren sog. artspezifischen Charakter. Dieser erklärt es auch, daß die mit der Nahrung aufgenommenen Eiweißkörper tierischer oder pflanzlicher Provenienz nicht ohne weiteres als solche vom Organismus assimiliert werden können und daß sie, wenn sie ohne Vorbereitung ins Blut oder in die Gewebe eingebracht werden, als Fremdkörper schädigend wirken bzw. unverändert wieder ausgeschieden werden. Aufgabe der Verdauung ist es, durch Zerlegung des Eiweißmoleküls in seine Komponenten, also in der Hauptsache in die Aminosäuren, das Eiweiß seines „artfremden“ Charakters zu entkleiden und es dadurch sowohl unschädlich zu machen<sup>1)</sup>, als es auch zur Verwendung im Organismus, d. h. zum Wiederaufbau des Organeiweißes zu befähigen. Daß die bei der Verdauung frei werdenden Bruchstücke des Eiweißmoleküls diesem Ziele dienen, geht daraus hervor, daß es z. B. gelingt, wachsende Tiere statt mit Fleischfütterung mit einem Gemisch verschiedener Aminosäuren in ihrem Eiweißbestand zu erhalten. Die Aminosäuren des Nahrungseiweißes bilden somit die Hauptbausteine bei der Resynthese des Körpereiweißes. Der größere Teil des mit der Nahrung aufgenommenen Eiweißes fällt indessen im allgemeinen der weiteren Zersetzung anheim, indem die Aminosäuren NH<sub>3</sub> abspalten (sog. Desaminierung) und letzteres sich mit der im Organismus stets vorhandenen CO<sub>2</sub> zu Harnstoff vereinigt. Der Harnstoff ist ein Stoffwechsellendprodukt, das durch die Nieren ausgeschieden wird; er bildet daher bis zu einem gewissen Grade einen Maßstab für die Eiweißzerstörung und seine Menge im Harn geht der Menge des Nahrungseiweißes parallel. Außer dem aus der Nahrung stammenden Eiweiß wird dauernd in geringen Mengen körpereigenes Eiweiß zersetzt. Näheres hierüber sowie über die Mengen des ausgeschiedenen N vgl. unten.

Den Eiweißkörpern nahe verwandt sind die aus den Zellkernen stammenden **Nucleoproteide** (Nucleine), welche neben Eiweiß, Phosphorsäure u. a. die sog. Purinbasen wie Adenin (Aminopurin), Guanin (Aminooxypurin), Hypoxanthin



als charakteristischen Bestandteil enthalten. Die Nucleoproteide stammen teils aus der Nahrung, soweit diese animalisch ist (besonders aus den kernreichen Organen wie Leber, Milz, Thymus, Pankreas, Nieren), teils aus dem Untergang von Körperzellen. Bei der Zersetzung derselben werden die Purinkörper durch Oxydation in Harnsäure (= Trioxypurin) übergeführt, welche ebenfalls durch die Nieren ausgeschieden wird. Die Harnsäure (Abkürzung  $\bar{U}$ ), die demnach ebenfalls ein Stoffwechsellendprodukt ist, hat mit dem Eiweißstoffwechsel nichts zu tun, da sie ausschließlich von dem Zerfall der Kernsubstanzen herrührt, dessen Maßstab sie bildet. Auch bei purinfreier Kost werden stets geringe Mengen von sog. endogener Harnsäure, etwa 0,2–0,6 g p. die vom gesunden Erwachsenen ausgeschieden, die von der Zellmauserung des Körpers stammen. Dazu kommen bei purinhaltiger Kost (Fleischkost) wechselnde Mengen von exogener Harnsäure, deren Menge etwa 33% der mit der Nahrung aufgenommenen Nucleinsubstanzen entspricht und ebenfalls etwa 0,2–0,6 beträgt, so daß die Gesamtmenge der  $\bar{U}$  sich zwischen 0,4 und 1,2 bewegt. Erhöhung der  $\bar{U}$ -Werte im Harn tritt bei gesteigertem Zerfall von Zellkernen auf, so insbesondere bei Leukämie und in geringerem Grade bei Pneumonie im Stadium der Lösung.

<sup>1)</sup> Ein Beispiel für die schädliche Wirkung artfremder Eiweißkörper ist die Serumkrankheit (S. 73). Auf das gleiche kommen die gelegentlich nach Genuß von rohen Eiern bei einzelnen Menschen zu beobachtenden Störungen wie Urticaria usw. hinaus.

Während die Eiweißkörper sowie die Nucleoproteide einesteils als Baumaterial des Körpers dienen, andererseits bei der Zersetzung von Körpersubstanz im Stoffwechsel eine Rolle spielen, haben die Fette und Kohlehydrate andere Aufgaben und zwar in erster Linie die Erzeugung von Wärme und Arbeit, sie sind also in der Hauptsache Energiespender (vgl. unten).

Die Fette sind in der Hauptsache Glycerinester höherer Fettsäuren, und zwar vor allem der Palmitinsäure ( $C_{16}H_{32}O_2$ ), Stearinsäure ( $C_{18}H_{36}O_2$ ) und Ölsäure ( $C_{18}H_{34}O_2$ ), wobei sich an jedes der drei Alkoholradikale des Glycerins ein Fettsäurerest anlagert. Demnach sind die Fette Triglyceride. Das Fett des Körpers stammt einmal aus dem Fett der Nahrung, indem der Organismus teils nach Spaltung desselben in Glycerin und die verschiedenen Fettsäuren aus diesen eine Resynthese zu dem entsprechenden arteigenen Fett vornimmt, teils aber auch in geringem Grade artfremdes Fett als solches in seinen Geweben deponiert. Außerdem verfügt der Organismus über die Fähigkeit, aus den Kohlehydraten der Nahrung Fett zu bilden; die früher angenommene Fettbildung aus Eiweiß ist dagegen fraglich.

Die Kohlehydrate (KH) bestehen aus den drei Elementen C, H und O nach der allgemeinen Formel  $C_nH_{2n}O_n$ . Die für den Stoffwechsel wichtigsten KH sind die Monosaccharide, die Disaccharide und die Polysaccharide. Zu den Monosacchariden gehören vor allem die Hexosen  $C_6H_{12}O_6$ , und zwar Traubenzucker (Dextrose oder Glucose), Fruchtzucker (Lävulose), Galaktose, ferner die Pentosen ( $C_5H_{10}O_5$ ). Disaccharide ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ ), die aus 2 Molekül Hexosen bestehen, sind Rohrzucker (Dextrose + Lävulose), Maltose oder Malzucker (2 Dextrose) und Laktose oder Milchzucker (Dextrose + Galaktose). Zu den Polysacchariden, die aus mehreren Zuckermolekülen bestehen, gehören vor allem die aus Hexosen bestehenden Körper ( $C_6H_{10}O_5$ )<sub>n</sub> wie Glykogen sowie Amylum (beides Glucose), ferner Inulin (Lävulose), Hemicellulose (Hexosen + Pentosen) und Cellulose, ferner die Polysaccharide aus Pentosen oder Pentosane ( $C_5H_8O_4$ )<sub>n</sub>. Die Kohlehydrate, die im Stoffwechsel eine Rolle spielen, stammen ebenso wie die Fette in erster Linie aus der Nahrung. Und zwar werden die Disaccharide sowie von den Polysacchariden Stärke und Glykogen durch die Verdauungsenzyme (Speichel, Pankreas- und Darmsaft) in Monosaccharide übergeführt, so daß die KH nur in der Form der letzteren resorbiert werden und als solche in den Stoffwechsel eintreten. Zum großen Teil fallen sie alsbald der Oxydation anheim und dienen so als Kraftquelle, während ein anderer Teil sich durch Polymerisation in das Polysaccharid Glykogen verwandelt, das als Vorratsstoff in der Leber und in den Muskeln deponiert wird, wo es im Bedarfsfall für die Zersetzung zur Verfügung steht. Eine weitere wichtige Quelle der KH-Entstehung im Körper sind aber auch die Eiweißkörper. Es ist nachgewiesen, daß aus den Aminosäuren derselben nach ihrer Desaminierung (vgl. oben) Zucker in beträchtlichem Maße entstehen kann. Dies ist auch die Erklärung für die Tatsache, daß auch bei KH-freier Kost und nach Aufzehrung der Glykogenreserven, also im Hunger, das Blut nicht zuckerfrei wird, sondern wie unter normalen Verhältnissen dauernd einen gewissen Zuckergehalt aufweist.

Die Salze, d. h. die anorganischen Mineralbestandteile spielen im Stoffwechsel eine nicht minder wichtige Rolle. Sie bilden einen konstanten Bestandteil jeder Zelle und bedürfen fortlaufender Ergänzung wegen des dauernden Salzverlustes durch Harn und Stuhl. Die physiologische Bedeutung der Salze ist eine sehr mannigfaltige, indem sie zwar nicht wie die andern Nahrungsstoffe durch chemische Umsetzungen als Energiespender wirken, dagegen bei der Regulierung gewisser physikalisch-chemischer Zustände der Säfte und Gewebe eine Hauptrolle spielen. Gemäß den Gesetzen der physikalischen Chemie treten die Salze nicht nur als gelöste und dissoziierte Moleküle, sondern vor allem auch als dissoziierte Ionen auf (Kationen: Na, K, Ca, Fe usw.; Anionen: Cl,  $HCO_3$ ,  $H_2PO_4$ ), daneben ferner locker an Kolloide gebunden, schließlich in fester Bindung wie z. B. das Fe im Hämoglobin. Eine der Hauptaufgaben der Salze ist die Aufrechterhaltung des normalen osmotischen Druckes, der sog. Isotonie, des Blutes, an der sich quantitativ in erster Linie das NaCl beteiligt und sich durch seine stets fast gleichbleibende Konzentration auszeichnet. Allgemein zeigen vor allem die Kationen große Konstanz ihrer Mengenverhältnisse, wogegen die Anionen (unter pathologischen Verhältnissen) größeren Schwankungen unterworfen sind. Von großer

Wichtigkeit sind ferner die Salze für die Regulierung des Säurebasengleichgewichtes des Organismus. Da nämlich einerseits durch den Stoffwechsel dauernd saure Zersetzungsprodukte wie  $\text{CO}_2$ , Milchsäure, Acetonkörper entstehen, andererseits das Blut mit großer Gleichmäßigkeit an einer schwach alkalischen Reaktion, d. h. einem geringen Überwiegen der OH-Ionen festhält, so muß der Organismus über besondere Regulationsvorrichtungen verfügen. Die Eliminierung der sauren Bestandteile findet auf dreifachem Wege statt, durch die Lungen, d. h. die Ausatmung von  $\text{CO}_2$ , durch die Niere, die aus dem alkalischen Blutsrum einen sauren Harn (primäre Phosphate) produziert und schließlich durch die Leber, die den bei der Desaminierung des Eiweißes freiwerdenden  $\text{NH}_3$ , namentlich in Fällen von pathologisch gesteigerter Säureproduktion (Acidose), der Harnstoffsynthese entzieht und ihn als Säureneutralisator verwendet. Umgekehrt wird ein Überschuß von Alkali durch die stets in großer Menge in den Geweben vorhandene  $\text{CO}_2$  unschädlich gemacht und alsbald durch die Nieren eliminiert. Die Aufgabe eines Ausgleichs der im Verlauf der Stoffwechselprozesse im Blut auftretenden Schwankungen im Säurebasengleichgewicht fällt den Salzen zu, insbesondere den Carbonaten ( $\text{NaHCO}_3 + \text{CO}_2$ ) bzw. den Phosphaten ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4 + \text{Na}_2\text{HPO}_4$ ), welche beide (außer den Eiweißkörpern) die Fähigkeit haben, größere Mengen von Säuren aufzunehmen, ohne daß die Reaktion des Mediums sich wesentlich ändert. Es ist dies die sog. Pufferwirkung der Salze. Die Kationen der Salze haben außerdem noch mannigfache spezifische Wirkungen, die u. a. z. B. in der Beeinflussung der Kontraktibilität der Muskeln sowie der Erregbarkeit der Nerven zur Geltung kommen. Hierbei zeigen die einzelnen Kationen z. T. untereinander ein antagonistisches Verhalten. Endlich stehen auch die Zustandsänderungen der Kolloide, speziell ihr Quellungs- und Auflockerungs- bzw. Verdichtungs- unter dem spezifischen Einfluß der verschiedenen Salze bzw. Ionen.

Auch das Wasser gehört zu den lebensnotwendigen Bestandteilen der Zelle; es ist in beträchtlicher Menge in allen lebenden Geweben enthalten. Ein Mensch von 75 kg enthält etwa 45 l Wasser. Hauptaufgabe des Wassers ist es, als Lösungsmittel und Transportmittel für die Salze und die Produkte des Stoffwechsels zu dienen, die nur in gelöster Form wirksam sind und nur als solche ausgeschieden werden können. Auch die Ionendissoziation der Salze und die Bildung freier H- und OH-Ionen als Ursache der neutralen bzw. alkalischen Reaktion des Blutes sind an die Gegenwart von Wasser gebunden. Da mit dem Harn als auch mit dem Schweiß und der Atemluft dauernd große Wassermengen ausgeschieden werden — sie betragen für Schweiß und Atem in der Ruhe bis 1 l, bei angestrengter Arbeit bis 5 l Wasser pro 24 Std. —, so ist entsprechender Ersatz erforderlich. Dabei kommt außer der direkten Aufnahme von Flüssigkeit und dem zum Teil beträchtlichen Wassergehalt der verschiedenen Nahrungsmittel (ca. 80% der Gesamtkost) auch der Stoffwechsel selbst, insbesondere die Verbrennung der KH als Quelle von Wasser in Betracht. Dieses sog. Oxydationswasser beträgt pro 1000 Kalorien ca. 120 ccm Wasser, im ganzen also in 24 Std. ca. 250—400 ccm.

Schließlich sind als wichtige Gruppe von Nährstoffen die sog. Vitamine (Nutramine) oder akzessorische Nährstoffe zu nennen, deren außerordentliche Bedeutung für Wachstum und Erhaltung des Lebens erst in neuerer Zeit genauer erkannt wurde. Es handelt sich dabei um gewisse, in ganz geringer Menge bereits wirksame organische Substanzen, die von Eiweiß, KH und Fetten verschieden sind, deren genauere chemische Natur aber noch unbekannt ist. Ihre Bedeutung geht einmal daraus hervor, daß eine aus den fünf vorstehend genannten reinsten Nahrungstoffen künstlich zusammengesetzte Nahrung im Tierversuch trotz genügender Menge sich auf die Dauer als unzureichend erweist und daß es andererseits gelang, zwei Krankheiten, Skorbut und Beri-Beri beim Menschen wie auch die experimentell beim Tier erzeugten analogen Krankheitszustände durch Hinzufügen gewisser Vitaminträger zur Nahrung prompt zu heilen. Näheres s. unten.

Unter normalen Verhältnissen nehmen Mensch und Tier bei der Möglichkeit freier Wahl instinktiv eine Kost zu sich, die quantitativ wie qualitativ optimalen gesundheitlichen Verhältnissen zu entsprechen pflegt. Appetit und Geschmack gewährleisten diese unbewußte Regelung des Nahrungsbedürfnisses. Das ändert sich unter krankhaften Verhältnissen sowie unter äußerem Zwang

(Hunger bzw. Massenernährung). Es handelt sich um die Frage, nach welchen Grundsätzen unter solchen Umständen die Ernährung zu regeln ist bzw. welches der Maßstab ist, der der Beurteilung ernährungstherapeutischer Maßnahmen zugrunde zu legen ist. Im Mittelpunkt dieser Frage stehen folgende Überlegungen:

Während das Eiweiß, soweit es als Baumaterial des Körpers dient, unter den verschiedenen Nahrungsstoffen eine Sonderrolle spielt und in der Nahrung daher stets in einem gewissen Quantum vertreten sein muß (vgl. unten), läßt sich im übrigen der Stoffwechsel in (quantitativer Beziehung) von dem sog. **energetischen Standpunkt** aus betrachten, nach welchem der lebende Organismus als eine Maschine anzusehen ist, die für ihre Leistungen, nämlich Wärme und Arbeit, die Zufuhr von chemischer Energie erfordert. Letztere wird durch die im Körper dauernd sich vollziehenden Verbrennungen frei, an denen sowohl die Eiweißkörper wie vor allem die KH und Fette sich beteiligen. Bei absoluter Körperruhe wird die durch den Stoffwechsel produzierte Energie nahezu vollkommen in Wärme umgewandelt, die z. T. zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur dient, im übrigen an die Umgebung abgegeben wird. Die Messung der so produzierten Wärmemengen mittels Calorimeters (**Calorimetrie**) ergibt pro Kilo Körpergewicht und Stunde bei vollkommener Muskelruhe (Betruhe) in nüchternem Zustand 1 Calorie<sup>1)</sup>, also bei 70 kg in 24 Std. 1600—1700 Calorien (sogen. Grundumsatz oder Ruhenüchternwert). Eine Steigerung des Umsatzes erfolgt sowohl durch Muskelarbeit wie durch Nahrungszufuhr. Arbeit kann die Verbrennungen auf das Doppelte steigern. Die einzelnen Nahrungsstoffe verhalten sich in ihrer die Oxydationsprozesse erhöhenden, der sog. spezifisch-dynamischen Wirkung, verschieden. Während reichliche Eiweißzufuhr den Grundumsatz um mehr als die Hälfte zu steigern vermag, üben KH und Fette nur eine geringfügig steigernde Wirkung aus.

Nachdem man im Laboratorium die bei der Verbrennung von Eiweiß resp. Fett und KH erzeugten Wärmemengen in Calorien ermittelt hatte (1 g Eiweiß = 5,5<sup>2)</sup> Cal., 1 g KH = 4,1 Cal., 1 g Fett = 9,3 Cal.), und andererseits die vom Körper gebildeten Wärmemengen bekannt waren, war es nur notwendig, die gefundene Brennwertzahl der verschiedenen Nahrungsstoffe der Berechnung der für den Energiebedarf des Körpers notwendigen Nahrungsmengen zugrunde zu legen. Es zeigte sich, daß die drei genannten Nahrungsstoffe, soweit sie nur als Energiespender in Frage kommen, untereinander gleichwertig oder isodynam sind, sich demnach gegenseitig vertreten können. Insbesondere entsprechen 100 g Fett 211 g Eiweiß resp. 232 Stärke bzw. 234 g Zucker. Bekannt sind andererseits die bei den verschiedenen Arten von Nahrungszufuhr bzw. Arbeitsleistung vom Körper produzierten Wärmemengen. Sie betragen bei Betruhe und Nahrungszufuhr bei 70 kg Körpergewicht in 24 Std. 1800—1900 Cal., bei mäßiger Arbeit und sitzender Lebensweise (geistige Arbeiter) 2300—2500, bei stärkerer körperlicher Arbeit ca. 3000, bei sehr schwerer Arbeit 3500—4000 und mehr Cal. in 24 Std. bei 70 kg Körpergewicht. Kinder zeigen auf das Körpergewicht berechnet einen relativ größeren Umsatz. Auf Grund dieser Zahlen ist es daher im einzelnen Falle nach Berechnung der Calorienzahl der eingeführten Nahrung ein leichtes, zu ermitteln, ob die Kost unter den speziellen Bedingungen eine calorisch ausreichende ist oder nicht. In der Tat hat es sich in der Praxis bewährt, bei Kranken, deren eigenes Urteil für ihre Ernährung fortfällt, wie z. B. bei benommenen Kranken (Typhus) oder bei Verpflegungsfragen größerer Bevölkerungsmassen sich auf Grund einer Calorientabelle (vgl. nächste Seite) wenigstens in groben Zügen über die quantitativen Ernährungsfragen zu orientieren. Daß indessen die rein energetische Betrachtung bei der Festsetzung einer Kostform unzulänglich ist, wird weiter unten erläutert.

<sup>1)</sup> 1 Calorie (große Calorie) ist diejenige Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur von 1 l Wasser um 1° C zu erhöhen. Sie entspricht einer Arbeitsleistung von 427 m/kg.

<sup>2)</sup> Diese Zahl bedeutet den Brennwert des Eiweißes bei seiner vollständigen Verbrennung. Da das Eiweiß jedoch im Gegensatz zu den Fetten und KH im Körper nicht vollständig verbrannt wird, sondern nur bis zum Harnstoff zersetzt wird, so ist der sog. physiologische Brennwert des Eiweißes niedriger (im Mittel 4,1).

## Calorientabelle verschiedener Nahrungsmittel

(berechnet auf 100 g)

	Calorien		Calorien
Rindfleisch, mittelfett . . . . .	160	Margarine . . . . .	790
Kalbfleisch, mager . . . . .	103	Olivenöl . . . . .	930
Kalbshirn . . . . .	119	Camembert . . . . .	340
Kalbsmilch . . . . .	135	Emmentaler Käse . . . . .	404
Schweinefleisch, fett . . . . .	398	Weizenmehl, feinstes . . . . .	344
Zunge . . . . .	230	Weizengriß . . . . .	324
Leber . . . . .	130	Hafermehl . . . . .	341
Gekochtes Rindfleisch . . . . .	176	Reis, geschält . . . . .	330
„ Schweinefleisch . . . . .	180	Maismehl (Mondamin) . . . . .	336
Roastbeef, Lende, Beefsteak . . . . .	120	Kartoffelstärke (-Mehl) . . . . .	316
Rinder- und Schmorbraten . . . . .	160	Malzextrakt . . . . .	286
Kalbsbraten, Schnitzel . . . . .	150	Milchbrötchen, Semmel . . . . .	265
Hammelbraten . . . . .	140	Grahambrod . . . . .	208
Schweinebraten . . . . .	210	Simonsbrod . . . . .	238
Rohes Schinken . . . . .	180	Kommisbrod . . . . .	213
Gänsebraten . . . . .	711	Kartoffeln . . . . .	88
Gans fett (nicht gekocht) . . . . .	478	Erbsen . . . . .	271
Haushuhn, mager (desgl.) . . . . .	111	Linsen . . . . .	272
Taube (desgl.) . . . . .	116	Bohnen . . . . .	318
Reh (desgl.) . . . . .	116	Blumenkohl . . . . .	40
Hase (desgl.) . . . . .	121	Sauerkraut (eingemacht) . . . . .	16
Rehbraten . . . . .	150	Schnittbohnen . . . . .	32
Blutwurst, gute Sorte . . . . .	243	Spinat . . . . .	28
Leberwurst . . . . .	313	Äpfel . . . . .	52
Cornedbeef . . . . .	200	Pflaumen, frisch . . . . .	57
1 Ei (ca. 45 g) . . . . .	75	Pflaumenmarmelade . . . . .	224
Austern . . . . .	52	Kakaopulver . . . . .	420
Hecht . . . . .	91	Rohrzucker . . . . .	380
Hering . . . . .	137	Honig . . . . .	316
Karpfen . . . . .	152	Moselweine . . . . .	63
Schellfisch . . . . .	82	Rotweine, französische . . . . .	65
Scholle . . . . .	90	Portwein . . . . .	149
Kuhmilch . . . . .	67	Kognak . . . . .	298
Rahm . . . . .	244	Münch. Löwenbräu, Berliner	
Buttermilch . . . . .	42	Böhm. Brauhaus . . . . .	36
Kuhbutter . . . . .	800	Porter . . . . .	74

Zur Beurteilung der quantitativen Verhältnisse des Stoffwechsels bieten sich noch andere Wege und zwar in Form der Feststellung der Mengen der ausgeschiedenen Stoffwechselendprodukte. Das Fett der Nahrung wird, soweit es nicht im Körper abgelagert wird, alsbald zu  $\text{CO}_2$  und  $\text{H}_2\text{O}$  oxydiert. Das gleiche gilt von den der Zersetzung anheimfallenden KH. Die Menge der mit der Atmungsluft ausgeschiedenen  $\text{CO}_2$  ist daher ebenfalls ein Maßstab für die stattgefundenen Verbrennung (in 24 Std. bei mittlerer Kost und Ruhe ca. 400 l = 800 g  $\text{CO}_2$ ). Die für die Oxydation der Nahrungsstoffe notwendige mit der Atmung aufgenommene  $\text{O}_2$ -Menge ist im Mittel etwa 500 l = 715 g. Das Verhältnis des Volumens der in 24 Std. ausgeatmeten  $\text{CO}_2$ -Menge zum Volumen der aufgenommenen  $\text{O}_2$ -Menge  $\frac{\text{CO}_2}{\text{O}_2}$  ist der sog. respiratorische Quotient (R.Q.). Seine

Größe schwankt je nach der Art der oxydierten Nahrungsstoffe. Bei vorwiegender KH-Zersetzung ist er etwa = 1,0, d. h. größer als bei Fettkost und als im Hunger, wo er etwa 0,7 beträgt, während er bei gemischter Kost zwischen 0,75 und 0,8 liegt. Werden nämlich ausschließlich KH verbrannt, so ist  $\text{O}_2$  nur zur Oxydation des C im KH-Molekül erforderlich, da das in diesem vorhandene Verhältnis von H und O bereits der vollständigen Oxydation des H entspricht; hier wird also

auf 1 Molekül verbrauchten  $O_2$  1 Molekül  $CO_2$  gebildet, d. h. R.Q. = 1. Eiweiß und Fett enthalten im Verhältnis sehr viel weniger  $O_2$ . Hier muß daher bei der Verbrennung nicht nur für die Oxydation des C zu  $CO_2$ , sondern auch für diejenige von H zu  $H_2O$   $O$  aufgenommen werden; dabei ist der R.Q. < 1. Die Kenntnis der Größe des R.Q. gestattet demnach einen Schluß auf die Art der verbrannten Nahrungsstoffe (Fett oder KH) zu ziehen. Aber auch die absoluten Mengen der ausgeschiedenen  $CO_2$  und des aufgenommenen  $O_2$  bieten wichtige Handhaben zur Beurteilung des Stoffwechsels. Der Grundumsatz oder Ruhenüchternwert (s. oben) beträgt pro kg Körpergewicht und 1 Min. 3 ccm  $CO_2$  und 4 ccm  $O_2$ . Erhöhung der  $CO_2$ - und  $O_2$ -Zahlen bedeutet vermehrte Oxydation. Letztere beobachtet man physiologisch nach der Nahrungsaufnahme, speziell bei reichlicher Eiweißnahrung (vgl. oben), wo die Steigerung etwa 10% beträgt, ferner bei körperlicher Arbeit, die eine Erhöhung bis zu 200% des Grundumsatzes bewirkt.

Der Heizwert der Nahrung in der Höhe der oben genannten Calorienzahlen ist eine notwendige, aber wie aus dem früher Gesagten hervorgeht, nicht zu reichende Bedingung für eine richtige Ernährung<sup>1)</sup>. Hierzu ist weiter eine qualitativ richtige Beschaffenheit der Nahrung erforderlich. Dabei kommt in erster Linie der Eiweißgehalt der Nahrung in Frage, von dem jede Nahrung, um Eiweißverluste des Körpers zu vermeiden, ein gewisses Minimum, das sog. Erhaltungseiweiß enthalten muß. Mit ca. 50–80 g Eiweiß (oder 8–13 g N) hält sich der Körper bei gemischter Kost im N-Gleichgewicht; er erleidet dann also keinen Eiweißverlust.

Eine Kontrolle des **Eiweißstoffwechsels** bietet in einfacher und sicherer Form die fortlaufende Bestimmung des N-Gehaltes des Harns, da der aus dem zersetzten Eiweiß freiwerdende N in der Hauptsache durch den Harn ausgeschieden wird<sup>2)</sup>. Der Kot-N beträgt im Hunger 0,2, bei reichlicher Ernährung ca. 1,0, ist also praktisch eine Konstante. Es bedarf daher nur der Feststellung des Eiweißgehaltes der Nahrung einerseits und der N-Ausfuhr andererseits, um festzustellen, wie sich die N-Bilanz verhält, d. h. ob der Körper einen Eiweißverlust erleidet oder sich im N-Gleichgewicht hält<sup>3)</sup>. Es ist eine Eigentümlichkeit des Eiweißstoffwechsels, daß eine über die Menge des Erhaltungseiweißes hinausgehende Eiweißmenge im Gegensatz zu dem Fett und den KH nicht wie diese im Körper deponiert und etwa in Muskelfleisch verwandelt wird, sondern es wird genau soviel Eiweiß zersetzt, als eingeführt wird, so daß bei reichlicher N-Zufuhr sich alsbald N-Gleichgewicht einstellt. Hieraus geht hervor, daß die alleinige Feststellung des N-Gehaltes des Harns ohne Kenntnis des Nahrungs-N bedeutungslos ist und daß es ferner auch unzulässig ist, die N-Ausscheidung zweier unter verschiedenen Bedingungen befindlicher Individuen miteinander zu vergleichen.

Die Eiweißmenge, die notwendig ist, um den Körper vor Eiweißverlust zu bewahren, hängt aber auch von dem Gehalt der Nahrung an Fett und hauptsächlich an KH ab; denn es gelingt durch reichliche Zufuhr dieser N-freien Nahrungsstoffe N-Verlust des Körpers auch mit wesentlich geringeren Eiweißmengen von etwa 22–30 g oder 3,5–5 g N zu verhüten; damit ist indessen noch nicht gesagt, daß auch für längere Zeit eine Ernährung mit derartig geringen N-Mengen

<sup>1)</sup> Wollte man sich allein mit dem calorischen Wert der Nahrung begnügen, so müßte es gelingen, einen Menschen z. B. ausschließlich mit etwa 2 kg Fleisch oder 400 g Butter oder 3½ kg Kartoffeln zu ernähren, um seinen Energiebedarf zu decken. Selbstverständlich würde eine derartige Ernährungsform schon an dem Widerwillen des Menschen und dem Versagen seines Verdauungsapparates scheitern.

<sup>2)</sup> 1 g N = 6,25 Eiweiß = 29,4 Muskelfleisch.

<sup>3)</sup> Während im allgemeinen der größte Teil des Harn-N aus dem aus der Eiweißzersetzung stammenden Harnstoff herrührt (80–90%) und daher ohne wesentlichen Fehler ausschließlich auf diesen bezogen werden darf, ändert sich dies bei sehr geringem Eiweißumsatz und entsprechend niedrigen N-Zahlen im Harn. Hier müssen auch die anderen Komponenten des Harn-N, speziell die Harnsäure und das Kreatinin getrennt Berücksichtigung finden.

der Nahrung ohne gesundheitliche Schädigung durchführbar ist. Während bei vollständigem Hunger die tägliche N-Ausscheidung etwa 10–13 g beträgt, sinkt die N-Ausscheidung bei reichlicher KH-Fett-Nahrung ohne Eiweißzufuhr dagegen auf geringere Werte, nämlich 2,5–3,5 g N in 24 Std. (= 15–21 g Eiweiß), also unter die Hungerwerte. Dies beweist die eiweißsparende Wirkung der KH und (in wesentlich geringerem Maße) des Fettes. Man hat dies sog. N-Minimum auch als Abnutzungsquote bezeichnet, weil man die Herkunft des N aus gealtertem verbrauchten Zellmaterial (Zellmauserung) herleitete. Doch ist die Berechtigung dieser Deutung neuerdings fraglich geworden. Unter Bedingungen nämlich, unter denen in erhöhtem Maß Zellmaterial zugrunde geht, beispielsweise bei der ausgedehnten Einschmelzung von Gewebe durch therapeutische Röntgenbestrahlungen erscheinen zwar die aus dem Untergange der Zellkerne herrührenden Purinkörper in großer Menge im Harn, wogegen der Eiweißzerfall, d. h. die Steigerung der Harnstoffausscheidung niedrig bleibt. Das gleichzeitig mit dem Zellerfall disponibel werdende Eiweiß wird demnach vom Körper zurückgehalten, der es offenbar anderweitig wieder verwertet. Das gleiche dürfte für das bei der physiologischen Zellmauserung frei werdende Eiweiß gelten, so daß sich das genannte N-Minimum nicht ohne weiteres auf die Abnutzung der Gewebe beziehen läßt. Körperliche Arbeit hat auf die Eiweißzersetzung keinen Einfluß, da der für die Muskelarbeit erforderliche Energiebedarf aus der Verbrennung der KH und Fette gedeckt wird; jedoch liefert natürlich auch das Eiweiß der Nahrung, wenn es in genügend großen Mengen vorhanden ist, durch seine Zersetzung Energie in Form von Wärme und Arbeit. Dagegen ist im allgemeinen die notwendige Eiweißmenge der Nahrung u. a. von dem Muskelbestand des Individuums in dem Sinne abhängig, daß ein muskelkräftiger Mensch, auch wenn er nicht arbeitet, mehr Eiweiß in der Nahrung erfordert als ein muskelschwaches Individuum, um nicht einen N-Verlust zu erleiden. Steigerung der Eiweißzufuhr über die bisherigen Mengen führen, wie auseinandergesetzt wurde, stets zu erhöhter Eiweißzersetzung. Eine Mästung mit Eiweiß wie etwa mit Fett und KH ist daher für gewöhnlich nicht möglich. Eine Ausnahme bilden jugendliche wachsende Individuen, ebenso Rekonvaleszenten nach zehrenden Krankheiten sowie nach Inanition. In diesen Fällen hält der Körper Eiweiß in großen Mengen zum Aufbau von Körpersubstanz bzw. zum Wiedersatz des Verbrauchten zurück. Bei einer Ernährung, die außer Fett und KH Eiweiß in einer über den Minimalbedarf hinausgehenden Menge enthält, wird zuerst stets das Eiweiß zersetzt.

Die Eiweißzersetzung dürfte teilweise analog den bei der sterilen Organautolyse in vitro genau studierten Prozessen ablaufen. Auf der einen Seite führt die an den Aminosäuren sich vollziehende  $\text{NH}_3$ -Abspaltung (s. oben) schließlich zur Bildung von Harnstoff. Andererseits verfallen die desaminierten Aminosäuren (= Fettsäuren) der Oxydation, wobei aber das Tempo der Harnstoffbildung ein wesentlich rascheres als das der Oxydation gemessen an der  $\text{CO}_2$ -Ausscheidung ist. Auch erscheint nicht der gesamte C im Gegensatz zum N in den Ausscheidungen wieder. Die Erklärung hierfür ist die Tatsache, daß die aus den desaminierten Aminosäuren freigewordenen Fettsäuren (wie z. B. Milchsäure, Brenztraubensäure) sich zu KH, d. h. in Zucker umwandeln. Diese Zuckerbildung aus Eiweiß spielt vor allem unter krankhaften Verhältnissen (Diabetes) praktisch eine wichtige Rolle. Durch Oxydation solcher N-frei gewordener Fettsäuren, wie z. B. der Buttersäure, kann u. a. auch Oxybuttersäure entstehen, als deren Quelle zum Teil demnach die Eiweißkörper in Betracht kommen. Das  $\text{NH}_3$  kann, wie man annimmt, zu einem kleinen Teil der Ausscheidung entgehen, um im Verein mit N-freien Säuren der Resynthese von Aminosäuren bzw. echtem Eiweiß zu dienen.

Der aus den KH der Nahrung bzw. aus den Glykogenbeständen des Körpers stammende Zucker (Monosaccharide) verteilt sich infolge seiner großen Diffusionsfähigkeit rasch über alle Gewebe. Im Vergleich zu dem Fett neigen die KH weniger zur Depotbildung und werden rascher verbrannt. Der Zucker bildet in der Form eines  $\text{H}_3\text{PO}_4$ -haltigen Komplexes den Hauptbetriebsstoff der Muskeln, woraus sich zugleich die vermehrte Phosphatausscheidung durch den Harn nach Muskelarbeit erklärt. Eine wichtige Etappe in der Zersetzung der KH ist die Bildung von Milchsäure.



Unter Zugrundelegung vielfacher Erhebungen stellt sich die pro Tag notwendige Menge verdaulicher Nahrungsstoffe für Erwachsene von 70—75 kg etwa wie folgt:

bei vollkommener Ruhe	79 g Eiweiß,	49 g Fett,	396 KH	(2300 Calor.)
bei mittlerer Arbeit	103 g „	61 g „	470 „	(2916 Calor.)
bei schwerer Arbeit	121 g „	94 g „	435 „	(3153 Calor.)

Die rein quantitative Regelung des Nahrungsbedarfs, wie sie derartigen Normen entspricht, ist indessen auf die Dauer ebensowenig ausreichend, wie es unzulässig ist, den Nahrungsbedarf nur nach Wärmewerten der Nahrung zu bemessen. Dies läßt sich u. a. am Beispiel der Eiweißkörper erläutern: Diese werden in Form sehr verschiedenartiger Proteinsubstanzen in der Nahrung dem Körper angeboten. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer chemischen Struktur z. T. recht erheblich voneinander, insbesondere je nach dem Vorhandensein bzw. Fehlen gewisser Aminosäuren. So fehlen verschiedenen pflanzlichen Eiweißkörpern die Aminosäuren Tryptophan, Tyrosin usw. Sie sind daher als unvollständige Eiweißkörper zu betrachten, die selbst in großen Mengen in der Nahrung eine Einschmelzung von Körpereweiß auf die Dauer nicht verhindern können. Das gleiche gilt z. B. auch vom Leim (Gelatine). Der Eiweißkörper des Weizens (Gliadin) vermag z. B. zwar N-Verlust zu verhindern, ist aber für das Wachstum unzureichend, da hierfür die ihm fehlende Diaminosäure Lysin erforderlich ist. Im Vergleich dazu sind die tierischen Proteinträger (Fleisch, Eier, Milch) in dieser Hinsicht als vollwertig anzusehen. Weiter hat die Frage der Ausnutzbarkeit sowie der Bekömmlichkeit der Nahrung eine auch für den Stoffwechsel ungemein wichtige Bedeutung. Es lassen somit die hier angedeuteten Gesichtspunkte bereits zur Genüge erkennen, nach wie mannigfacher Richtung die Frage der Zweckmäßigkeit einer bestimmten Ernährungsart zu prüfen ist und welche Skepsis gegenüber verschiedenen, von mancher Seite vertretenen einseitigen Kostformen (z. B. dem Vegetarianismus) am Platze ist.

Wichtige Faktoren, die den Stoffwechsel beeinflussen, indem sie teils beschleunigend, teils hemmend auf die Oxydationen einwirken, sind sowohl die **Drüsen mit innerer Sekretion** wie das **vegetative Nervensystem**. Das kommt vor allem unter pathologischen Verhältnissen deutlich zum Ausdruck. Vermehrte Schilddrüsentätigkeit sowie Verabreichung von Schilddrüsensubstanz steigert den Grundumsatz und bewirkt erhöhte N-Ausscheidung; das Umgekehrte wird bei Hypothyreosen beobachtet (vgl. Myxödem). Auch der Wasserstoffwechsel steht unter dem Einfluß der Schilddrüse. Die Hypophyse hat Bedeutung für den Fettansatz, wie die Beobachtungen bei Erkrankungen dieses Organs (*Dystrophia adiposogenitalis*) lehren. Die Nebennieren spielen im KH-Stoffwechsel eine bedeutende Rolle, indem sie bei der Verwandlung des Leberglykogens in Zucker einen maßgebenden Einfluß ausüben. Ein inniger Konnex besteht ferner zwischen Stoffwechsel einerseits und dem sympathischen bzw. parasymphathischen Nervensystem andererseits. Insbesondere hat sich gezeigt, daß sich vom Zwischenhirn bzw. vom Boden des 4. Ventrikels aus tierexperimentell eingreifende Änderungen im Stoffwechsel bewirken lassen. Das Zwischenhirn wirkt hemmend auf die Eiweißzersetzung, seine Ausschaltung bewirkt Steigerung des Stoffwechsels. Ähnliches ist auch für den Ansatz bzw. Abbau der Fette anzunehmen, wie insbesondere einzelne Beispiele aus der menschlichen Pathologie (*Lipodystrophie*, *halbseitiges Fettpolster*, vgl. später) lehren. Die Bedeutung des Nervensystems für den KH-Stoffwechsel ist seit langem bekannt. *Circumscripste* Verletzung der *Oblongata* in Form des sog. Zuckerstiches (zwischen den *Acusticus-* und *Vagus*kernen) bewirkt auf dem Wege des *Sympathicus* Abbau des Glykogens der Leber mit Ansteigen des Blutzuckers sowie Glykosurie, wobei das durch die gleichzeitige Nebennierenreizung in vermehrter Menge abgegebene Adrenalin, wie oben gezeigt, mobilisierend auf das Leberglykogen wirkt. Analog dem sog. Zuckerstich hat man mit dem „Salzstich“ in der *Oblongata* (*visceraler Vagus*kern) vermehrte Salzausfuhr durch die Nieren bewirkt. Auch die Regelung des Säurebasengleichgewichtes steht unter dem steuernden Einfluß des vegetativen Nervensystems, indem die, eine vermehrte  $\text{CO}_2$ -Abgabe bewirkende automatische Steigerung der Lungenventilation auf der Reizung des vegetativen Atemzentrums durch vermehrtes Auftreten

saurer H-Ionen im Blut beruht und andererseits auch die Ausfuhr saurer Phosphate durch die Niere nervösen Einflüssen untersteht. Schließlich hat man auch für den Wasserstoffwechsel nervöse Zentren im Zentralnervensystem wahrscheinlich gemacht, indem es gelang, durch Stichverletzung des Mittelhirns Polyurie zu erzeugen, die übrigens auch als Begleiterscheinung des Zucker- und Salzstiches in der *Oblongata* beobachtet wird.

Unter besonderen Bedingungen, die klinisch hervorragendes Interesse besitzen, verläuft der Stoffwechsel im Hunger sowie im Fieber.

Im **Hunger** findet zunächst keine Herabsetzung des Gesamtumsatzes statt, der Organismus lebt von seinen Reserven bzw. von eigener Körpersubstanz. An erster Stelle wird der Glykogenvorrat aufgezehrt. Doch wird auch bei längerer Inanition der Körper nicht völlig glykogenfrei, da dann die früher beschriebene Zuckerbildung aus Eiweiß zur Geltung kommt. Nächst dem Glykogen werden die Fettbestände aufgezehrt; auch kommt es zu fortschreitender Einschmelzung von Eiweiß. Doch ist die Beteiligung der einzelnen Organe hierbei eine sehr verschiedene. Der Eiweißschwund betrifft in besonders hohem Maß die Muskulatur, während z. B. das Herz sowie das Zentralnervensystem so gut wie unbeteiligt bleiben. Das Hämoglobin bleibt lange Zeit hindurch unvermindert, während die übrigen Eiweißkörper des Blutes sich vermindern. Der Organismus verfolgt also ein ökonomisches Prinzip, indem er die lebenswichtigen Organe auf Kosten der übrigen Gewebe vor stärkeren Verlusten zu bewahren sucht; zugleich ist dies ein Beweis für die Fähigkeit des Körpers, innerhalb der verschiedenen Organsysteme umfangreiche Verschiebungen in deren Eiweißbestand vorzunehmen. Entscheidend für den weiteren Verlauf der Inanition ist das Verhalten der Eiweißzersetzung. Die N-Ausscheidung beläuft sich beim Erwachsenen in den ersten Hungertagen auf 10–13 g N (= 65–80 g Eiweiß), vermindert sich dann in den nächsten Wochen auf etwa 6–8 g (= 37 g Eiweiß) und kann bei länger dauernder Inanition noch weiter sinken, um kurz vor dem Tode wieder stärker anzusteigen. Eine charakteristische Begleiterscheinung des Hungers ist die sog. Acidose, d. h. die Ausscheidung von Acetonkörpern mit dem Harn und mit der Atmungsluft (vgl. Diabetes).

**Fieber** geht stets mit einer Steigerung des Gesamtumsatzes (bis zu 50% über die Norm) einher, wobei aber im Gegensatz zur Muskelarbeit auch der Eiweißumsatz erhöht ist. Diese Steigerung ist indessen nicht die Ursache, sondern eine Begleiterscheinung des Fiebers. Der vermehrte Eiweißzerfall im Fieber läßt sich, was grundsätzlich wichtig ist, nicht wie beim Gesunden, der mit geringen Eiweißmengen ernährt wird, durch größere Mengen von KH vollständig verhüten. Der Grad des Eiweißzerfalls geht nicht der Höhe des Fiebers parallel. Bei längerer Dauer des Fiebers kommt es ähnlich wie im Hungerzustand zu einem Sinken der Intensität der Oxydationsprozesse. Die Ursache des für das Fieber charakteristischen eigentümlichen Verhaltens des N-Stoffwechsels sucht man teils in toxisch wirkenden Faktoren, wie Bakterientoxinen, artfremdem Eiweiß usw. (toxogener Eiweißzerfall), teils in Störungen seitens der vom Zentralnervensystem ausgehenden Regulierungsvorgänge (vgl. vorige Seite). Das zu Verlust gehende

Organeiweiß stammt wie beim Hunger vornehmlich aus den Muskeln. Praktisch kommen in vielen Fällen von fieberhafter Erkrankung außerdem einmal Inanition infolge des Appetitmangels, andererseits ferner starke motorische Unruhe (Delirien usw.) in Betracht, die als Ursache der Steigerung der Oxydationsprozesse mit in Rechnung zu setzen ist. Endlich kann in besonderen Fällen, z. B. bei der Pneumonie, vermehrte N-Ausscheidung auch auf Resorption eines eiweißreichen Exsudates zurückzuführen sein.

Auch der Stoffwechsel bei manchen kachektischen Zuständen, z. B. bei Carcinom usw. sowie bei verschiedenen als Intoxikation aufgefaßten Krankheitsbildern wie bei der akuten gelben Leberatrophie, bei Phosphorvergiftung u. a. m. ist in gleicher Weise durch erhöhte Eiweißzersetzung gekennzeichnet.

### Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit).

Der Diabetes mellitus ist als eine Stoffwechselkrankheit zu definieren, die auf einer krankhaften Störung in der Bildung und im Verbrauch des Zuckers im Organismus beruht. Die Folge hiervon ist eine Überschwemmung der Gewebe und des Blutes mit Zucker. Ein Kardinalsymptom der Krankheit ist die dauernd oder während längerer Perioden auftretende Zuckerausscheidung durch den Harn.

Die Zuckerkrankheit ist keine seltene Erkrankung. Sie befällt hauptsächlich das mittlere Lebensalter (mehr ♂ als ♀), kommt aber auch bei älteren sowie jugendlichen Individuen, gelegentlich auch bei Kindern vor. Im Orient (Indien), in Italien sowie bei den Juden ist sie auffallend häufig. Auch bevorzugt sie wohlhabende Bevölkerungsschichten. Bemerkenswert ist einmal ihre Erblichkeit und das gehäufte familiäre Auftreten der Krankheit, sodann die Rolle der Fettsucht, der Gicht sowie der Arteriosklerose, die sich teils mit dem D. kombinieren, teils in der Familie des Kranken zu finden sind. Diese Tatsache weist auf den Charakter des D. als Konstitutionskrankheit hin. Ihr Wesen ist in einer fehlerhaften Anlage, d. h. einer angeborenen Schwäche auf dem Gebiete des KH-Stoffwechsels zu erblicken. Unentschieden ist die Frage, ob es sich dabei um herabgesetzte Oxydation der KH oder, was besonders neuerdings betont wird, um vermehrte Zuckerbildung handelt. Unter den Organen, deren Erkrankung einen D. zu erzeugen vermag, ist in erster Linie das Pankreas zu nennen. Pankreaserkrankungen gehen oft mit D. einher. Beim Tier erzeugt Exstirpation des Pankreas schwersten Diabetes.

Die Rolle des Pankreas im KH-Stoffwechsel ist an die Langerhansschen Inseln gebunden. Diese produzieren ein Hormon, das, wie man annimmt, auf dem Umweg über den Sympathicus dämpfend auf die Bildung von Zucker aus dem Glykogen der Leber wirkt. Das Pankreas wirkt demnach antagonistisch gegenüber den Nebennieren, deren Hormon (Adrenalin) umgekehrt durch Sympathicusreizung die Mobilisierung der KH verstärkt.

Unter anderen Organen wird auch der Hypophyse eine ursächliche Rolle beigemessen, für welche das häufige Zusammentreffen von Akromegalie und Diabetes zu sprechen scheint. Verschiedene exogene Faktoren werden als auslösende Momente angeschuldigt. Dazu gehören Infektionskrankheiten, Traumen, speziell Kopfverletzungen, aber

auch traumatische Schädigung des Abdomens (des Pankreas und der Leber), schwere psychische Emotionen, manche Gehirnkrankheiten (Tumoren, Blutungen usw.), Alkoholismus (speziell Bierpotatorium).

Bei der Beantwortung der praktisch eminent wichtigen Frage der ursächlichen Bedeutung exogener Schäden, speziell von Unfällen für das Auftreten des Diabetes, ist äußerste Skepsis am Platze. Voraussetzung für den Nachweis eines kausalen Zusammenhangs ist vor allem, daß die vollständige Gesundheit, d. h. das Fehlen der Zuckerausscheidung, vor dem Unfall zweifelsfrei durch Untersuchung feststeht, sowie ferner, daß die Zeitspanne zwischen dem vermeintlich ursächlichen Ereignis und dem ersten Auftreten der Krankheit nicht allzu groß ist (nicht mehr als höchstens etwa 1 Jahr) ist. Daß tatsächlich eine traumatische Entstehung des Diabetes ungemein selten ist, lehren die Erfahrungen des Weltkrieges.

**Krankheitsbild:** Die ersten Erscheinungen der Krankheit, die sich allmählich einzustellen pflegen, sind in der Regel wenig charakteristisch und bestehen in Abnahme der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, in Mattigkeit, Depression, Abmagerung, Kopfschmerzen sowie mitunter in neuralgischen Beschwerden. Trotz der fortschreitenden Gewichtsabnahme ist der Appetit meist gut, oft sogar in einer dem Patienten selbst auffallenden Weise gesteigert. Dazu kommt meist erheblicher Durst, der zu einem quälenden Symptom werden kann, das mitunter im Vordergrund der Klagen der Kranken steht. Endlich ist die Harnmenge, wie die Kranken oft selbst angeben, seit der Störung des Allgemeinbefindens stark vermehrt, und die Notwendigkeit, den Harn häufig zu entleeren, stört nicht selten die Nachtruhe. Die genannten Beschwerden müssen in jedem Fall zu einer eingehenden Harnuntersuchung Anlaß geben.

Der Harn ist hellgelb, klar, von saurer Reaktion. Seine Menge in 24 Stunden ist fast immer, häufig sogar beträchtlich vermehrt (3—8000, bisweilen mehr), nur ausnahmsweise fehlt die Steigerung der Harnmenge (sog. *Diabetes decipiens*). Die in 24 Stunden ausgeschiedenen Zuckermengen schwanken zwischen wenigen Gramm und vielen Hundert von Gramm, der Prozentgehalt variiert zwischen Bruchteilen von 1% und etwa 10%.

Charakteristisch ist auch die Erhöhung des spez. Gew. des Harns, die auf seinem Zuckergehalt beruht und der Menge desselben parallel geht, so daß man aus der Höhe des spez. Gew. bei Kenntnis der 24stündigen Harnmenge auf die Zuckermenge annähernd schließen kann. Es entspricht etwa dem spez. Gew. von 1030 bei 1500 ccm Harn in 24 Std. 1—2%, bei 6—8000 ccm eine Zuckermenge über 8%.

Der Zucker im Harn kann mit mehreren Methoden nachgewiesen werden, die auf seinen verschiedenen chemischen bzw. physikalischen Eigenschaften beruhen. Es handelt sich um Dextrose (Glucose); gelegentlich kommt daneben Fruchtzucker (Lävulose) vor. Als zuverlässige Zuckerproben sind zu nennen: die Reduktionsproben wie die Trommersche bzw. Fehlingsche Probe, denen die Reduktion von  $\text{CuSO}_4$  zugrunde liegt, sowie die Nylandersche Probe (Reduktion von Wismuthnitrat), die Gärungsprobe (Entwicklung von  $\text{CO}_2$  durch Hefe), die Polarisationsprobe, die auf der Eigenschaft des Zuckers beruht, die Ebene des polarisierten Lichtes zu drehen (Rechtsdrehung bei Dextrose, Linksdrehung bei Lävulose), endlich die Phenylhydrazinprobe (Phenylhydrazinchlorhydrat bildet mit Dextrose gelbe Krystalle von Phenylglukosazon, dessen Schmelzpunkt für Dextrose charakteristisch ist). Die Trommersche und die Gärungsprobe sind als einfachste und sicherste Methoden am meisten zu empfehlen. Fällt die Zuckerprobe einwandfrei positiv aus, so ist die Menge des ausgeschiedenen

Zuckers zu ermitteln. Mit Nachdruck ist zu betonen, daß es völlig unzureichend ist, sich mit der bloßen Feststellung des Prozentgehaltes einer beliebigen Harnportion zu begnügen.

Vielmehr ist in jedem Fall zu fordern, daß erstens die gesamte 24stündige Harnmenge gemessen wird und daß nach Feststellung des prozentualen Zuckergehaltes derselben (d. h. in einer Probe des Mischharnes) die absolute in 24 Stunden ausgeschiedene Zuckermenge konstatiert wird. Nur auf diese Weise erhält man einen zuverlässigen Einblick in die Größe der Zuckerausscheidung, deren Kenntnis zur Beurteilung des Falles in therapeutischer und prognostischer Hinsicht unerlässlich ist.

Bei leichteren Formen des Diabetes kommt es mitunter vor, daß einzelne Harnportionen, namentlich der nüchtern gelassene Morgenharn, zuckerfrei sind. Bei Verdacht auf Diabetes verschaffe man sich daher den Harn, der 1—2 Stunden nach einer KH-haltigen Nahrung gelassen ist. Ist die nur in einzelnen Harnportionen vorhandene Zuckermenge sehr gering, so fallen die Zuckerproben am 24stündigen Mischharn infolge der Verdünnung unter Umständen negativ aus. Man untersuche daher in solchen Fällen die einzelnen Portionen getrennt. — Für die quantitative Zuckerbestimmung eignet sich am besten die Gärungsprobe mit dem Lohensteinschen Gärungsapparat, an dem sich der Prozentgehalt direkt ablesen läßt (Anstellung der Probe bei 37°; Verwendung von Hefe, die vorher in zwei blinden Versuchen geprüft ist 1. auf ihr Gärungsvermögen gegenüber einer Dextroselösung, 2. auf Abwesenheit gärungsfähiger Verunreinigungen in der Hefe selbst durch Ansetzen einer Hefeprobe mit Wasser). Nächst der Gärungsprobe kommt die Titration des Harns mit Fehlingscher Lösung (bzw. die Benediktsche Methode) sowie endlich das sehr exakte Polarisationsverfahren in Frage, das aber einen außerordentlich teuren Apparat erfordert. Ist Zuckerausscheidung festgestellt, so hat man — zum mindesten für die erste Zeit der Beobachtung — täglich die 24stündige Zuckermenge zu kontrollieren (der Pat. ist anzuhalten, nach Möglichkeit die Harnentleerung getrennt von der Defäkation vorzunehmen.)

Die Acidität des Harns ist oft erhöht, namentlich in den Fällen, die mit Acidose (s. unten) einhergehen. Letztere läßt sich ebenfalls durch charakteristische Harnreaktionen nachweisen. Die beiden am Krankenbett leicht feststellbaren und für die Beurteilung eines Falles sehr wichtigen Körper im Harn sind das Aceton sowie die Acetessigsäure (vgl. unten). Ersteres wird mit der Legalschen Reaktion nachgewiesen: der mit etwas Nitroprussidnatrium versetzte und mit NaOH stark alkalisierte Harn zeigt eine normal alsbald ablassende Rotfärbung; Zusatz von konc. Essigsäure bewirkt normal eine grünliche, bei Acetonurie dagegen stark purpurrote Färbung. Acetessigsäure ist die Muttersubstanz des Acetons (näheres s. unten); sie ist daher stets nur dann vorhanden, wenn gleichzeitig die Acetonprobe positiv ist. Ihr Nachweis (Gerhardtsche Reaktion) am möglichst frisch gelassenen Harn beruht auf der bordeauxroten Verfärbung des Harns bei tropfenweisem Zusatz von 1% iger Eisenchloridlösung (Vortäuschung einer positiven Probe durch manche Medikamente, speziell Salicylsäurepräparate sowie Antipyrin; mehrstündiges Kochen des Harnes beseitigt die Acetessigsäure). Da die Acetonkörper auch mit der Atmung ausgeschieden werden, so beobachtet man bei stärkerer Acidose oft einen von ihnen herrührenden obstartigen Geruch der Atmungsluft, den man bei stärkeren Graden bereits beim Betreten des Zimmers wahrnimmt.

Die Körpertemperatur ist bei unkompliziertem Diabetes normal. Die Zunge ist häufig trocken, nicht selten rissig, oft belegt. Der Speichel reagiert sauer. Sehr häufig zeigt das Zahnfleisch Veränderungen, teils in Form von Auflockerung, teils als Gingivitis mit Neigung zu Blutungen. Die Zähne werden locker, fallen aus bzw. neigen zu Caries. Mancher Diabetes wird zuerst vom Zahnarzt entdeckt. Bei mangel-

hafter Mundpflege entwickelt sich mitunter Soor. Trotz der zum Teil enormen Nahrungsmengen, die die Kranken täglich zu sich nehmen, bestehen häufig keinerlei Verdauungsstörungen, so daß die Patienten ihren Heißhunger beschwerdefrei zu befriedigen vermögen. Durchfälle bzw. Fettstühle gehören zu den Komplikationen (s. unten). Auch der Zirkulationsapparat zeigt bei vielen Diabetikern keine Abweichungen von der Norm, wenn auch, speziell bei älteren Patienten, oft Zeichen stärkerer Arteriosklerose, gelegentlich auch von Coronarsklerose zu finden sind. In schweren Fällen können sich Symptome von Herzschwäche bzw. Vasomotorenlähmung einstellen, die insbesondere beim Ausgang in Koma eine wichtige Rolle spielen. Störungen seitens des Respirationsapparates gehören ebenfalls ins Gebiet der Komplikationen.

Dagegen findet man häufig auch bei unkomplizierten Fällen Anomalien auf dem Gebiete des Urogenitalapparates. Abnahme der sexuellen Potenz bei Männern ist eine häufige und oft frühzeitige Begleiterscheinung des D. Frauen klagen oft über hartnäckigen Pruritus vulvae, der auf der Zersetzung des zuckerhaltigen Harns durch Pilze beruht; eine beim Mann analoge Störung ist die gelegentlich vorkommende Balanitis. Seitens der Haut wird nicht selten über heftigen quälenden Juckreiz geklagt (gelegentlich ebenfalls ein Frühsymptom); die durch das häufige Kratzen entstehenden Excoriationen führen leicht zu Infektionen bzw. Ekzemen. Auch zeigen die Diabetiker eine auffallende Neigung zu Furunkeln und Karbunkeln; manche Patienten werden von ihnen fast ununterbrochen heimgesucht. Die Haut ist im übrigen meist sehr trocken und zeigt nur geringe Neigung zur Schweißbildung. Auch das Auge gehört zu den bei Diabetikern nicht selten erkrankenden Organen, vor allem zeigt es Neigung zu Kataraktbildung (immer beiderseitig); auch kommt es mitunter zur Erschwerung des Sehens infolge von Akkommodationsstörungen. Ferner kommen retinitische Veränderungen sowie gelegentlich Veränderungen am Sehnerven (Neuritis, Atrophie) vor. Die bei Diabetes nicht seltenen Neuralgien lokalisieren sich mit Vorliebe im Trigeminus, den Crural- und Intercostalnerven; ferner ist beiderseitige Ischias nicht selten. Auch echte Neuritiden mit Parästhesien und Sensibilitätsstörungen kommen mitunter vor. Relativ häufig fehlen auch bei leichten Fällen die Patellarreflexe.


Blut: Stärkere Grade von Anämie pflegen zu fehlen, desgleichen charakteristische morphologische Veränderungen. Die Eosinophilen sind bei schweren Fällen vermindert. Eine konstante und praktisch wichtige Veränderung ist die Erhöhung des Zuckergehaltes des Gesamtblutes, der statt der normalen Werte von 0,06—0,12% bis auf 0,5% ansteigen kann. Der Grad dieser Hyperglykämie geht bis zu einem gewissen Maß der Menge des Harnzuckers parallel, doch kann sie auch zu Zeiten bestehen, wo Zucker im Harn nicht nachweisbar ist. Andererseits aber fehlt die Hyperglykämie bisweilen in Frühstadien des Diabetes. Bei manchen besonders schweren Fällen sowie im Koma ist der Gehalt des Blutes an Lipoiden (Lipämie) beträchtlich gesteigert, so daß das Blut im Glase eine Rahmschicht zeigt.

Im Mittelpunkt des Krankheitsbildes steht die Störung des Stoffwechsels. Sie betrifft zwar nicht allein die KH, doch beherrscht deren pathologisches Verhalten das Bild. Das Wesentliche ist eine in der Glykosurie und Hyperglykämie zum Ausdruck kommende mangelhafte Verwertung der KH, was bei gewöhnlicher gemischter Kost gleichbedeutend mit erheblicher Unterernährung ist. Hieraus erklärt sich sowohl das gesteigerte Nahrungsbedürfnis wie die Abnahme des Körpergewichtes. Die Menge des durch den Harn verloren gehenden Zuckers richtet sich in erster Linie nach der Quantität der KH der Nahrung, wobei jedoch sehr große individuelle Unterschiede bestehen. Bei leichteren Fällen spielt ferner auch die Art und die Zubereitungsform der KH eine nicht unwichtige Rolle. Am stärksten glykosurisch wirken die verschiedenen Zuckerarten, in zweiter Linie das Brot, während andere KH-Träger, z. B. die Kartoffeln und andere Amylaceen (Hafermehl usw.) oft in wesentlich geringerem Maß Glykosurie bewirken. Das gilt vor allem für den Fall, wo dieselben ohne gleichzeitige Verabreichung von Fleisch verabreicht werden (vergleiche Therapie).

Der Eiweißumsatz verhält sich in den einzelnen Fällen verschieden. Er ist häufig auch bei schweren Fällen normal, wenn dieselben diätetisch rationell behandelt werden, während in Fällen mit unzureichender Ernährung N-Verlust eintritt. Hiermit ist nicht die Tatsache zu verwechseln, daß Kranke mit freigewählter Kost, die oft enorme Eiweißmengen enthält, dementsprechend sehr große N-Mengen mit dem Harn ausscheiden. Unvermeidlich kommt es zu N-Verlust, sobald infolge von Verdauungsstörungen die Kranken nicht mehr in der Lage sind, ihren calorischen Bedarf in ausreichendem Maße zu decken. Aber auch mit der Glykosurie steht der Eiweißumsatz in einem Zusammenhang insofern, als bei schwerem Diabetes der aus dem Eiweiß entstehende Zucker (vgl. S. 459) zum Teil ebenfalls dem Körper mit dem Harn verloren geht. Hier hat Steigerung der Eiweißzufuhr in der Nahrung vermehrte Zuckerausscheidung zur Folge (sog. eiweißempfindliche Fälle), wobei aber die verschiedenen Arten von Eiweiß sich quantitativ verschieden verhalten. Fleisch und Casein steigern die Glykosurie in wesentlich höherem Maße als Eier- und Pflanzeneiweiß; letzteres verhält sich am günstigsten. Im Gegensatz zu den Eiweißkörpern hat Fett auf die Glykosurie keinen Einfluß. Das Fett spielt daher als Ersatz des verlorengehenden Zuckers als Energiespender beim Diabetiker eine bedeutsame Rolle. Alkohol hat keinen steigernden Einfluß auf die Glykosurie. Muskulararbeit vermag bei leichtem Diabetes vermindern auf die Zuckerausscheidung zu wirken, falls die Muskulatur sich in gutem Zustande befindet und die Arbeit sich in mäßigen Grenzen bewegt. Die Erklärung dürfte in dem mit jeder Muskulararbeit verbundenen erhöhten Zucker-(Glykogen-)bedarf seitens der Muskeln zusammenhängen. Hiervon macht man therapeutisch Gebrauch.

Eine besonders wichtige Stoffwechselanomalie beim Diabetes ist die als Acidosis bezeichnete Anhäufung der sog. Acetonkörper im Organismus und ihre Ausscheidung durch den Harn (Ketonurie), z. Teil auch

durch die Lungen. Und zwar handelt es sich um das Aceton, die Acetessigsäure und deren Muttersubstanz, die  $\beta$ -Oxybuttersäure.



Letztere entsteht durch Oxydation der Buttersäure. Ausgangspunkt der Acetonkörper sind einerseits Fettsäuren, anderseits manche Aminosäuren (z. B. Leucin, Tyrosin usw.); dagegen entstehen sie nicht aus KH. Das Aceton findet sich nicht im Körper, sondern entsteht erst am Orte der Ausscheidung aus der Acetessigsäure, d. h. im Harn bzw. in der Lunge. Im Prinzip ist die Acidose nichts für den Diabetes Spezifisches, da auch beim Gesunden unter besonderen Umständen, bei ausschließlicher Fleisch-Fett-Kost und im Hunger Ketonurie vorkommt. Nur erreicht dieselbe beim Diabetes viel höhere Grade. Unentschieden ist zur Zeit, ob es sich hier neben verminderter Oxydation der Acetonkörper auch um vermehrte Bildung derselben handelt. Ersteres ist für den Diabetes sicher nachgewiesen. Im normalen Organismus werden Oxybuttersäure und Acetessigsäure verbrannt. Die Acetonkörperbildung wird beim Gesunden und bei leichtem Diabetes durch KH verhindert. Die für die Unterdrückung der Ketonurie bei Diabetes notwendige Menge von KH ist individuell sehr verschieden. Plötzliche Entziehung der KH wirkt besonders ungünstig. Außer den KH gehört auch Alkohol zu den „antiketogenen“ Substanzen. Die Gesamtmenge der mit dem Harn ausgeschiedenen Acetonkörper kann bei schwereren Fällen 70—100 und mehr Gramm p. die betragen. Dabei ist außerdem stets noch mit einer gewissen Retention derselben im Körper zu rechnen. Die durch die Acidose verursachte Gefahr liegt in einer lebensgefährdenden Störung des Säurebasengleichgewichtes mit Alkaliverarmung und Abnahme des  $\text{CO}_2$ -Bindungsvermögens des Blutes. Zur Neutralisierung der abnormen Säuremengen stellt der Organismus  $\text{NH}_3$  zur Verfügung, das er der Harnstoffsynthese entzieht. So erklärt sich die bei der Acidose vorhandene Steigerung der  $\text{NH}_3$ -Ausscheidung im Harn, deren Größe der Ketonurie annähernd parallel geht (normal 0,3—1,0; pathologisch bis 6 g p. die).

Auch die Gesamtacidität des Harns (prozentuale Titrationsacidität multipliziert mit der 24stündigen Harnmenge) bildet einen ungefähren Maßstab für die Acidose. Beides gilt aber nur so lange, als nicht therapeutisch Natr. bicarb. gegeben wird. In der Praxis kann man aus der zum Alkalischemachen des Harns erforderlichen Menge des per os in 24 Std. zu verabreichenden Natr. bicarb. den Umfang der Acidose grob schätzen (bei Gesunden genügen 5—10 g).

Störungen im Mineralstoffwechsel bestehen bei schwerem Diabetes in vermehrter Ausscheidung von Kalk und Magnesia, die aus den Knochen stammen. Auch die Wasserausscheidung zeigt mitunter Störungen in Form von Ödemen,



die sich besonders bei reichlicher Natr. bicarb.-Zufuhr sowie auch bei Haferkuren (siehe Therapie) einstellen.

**Die verschiedenen Formen des Diabetes:** Aus therapeutischen und prognostischen Gründen unterscheidet man je nach der Schwere der Erkrankung verschiedene Formen des Diabetes. Maßgebend für die Art des Diabetes ist nicht allgemein die Zuckermenge, die der Kranke bei einer freigewählten Kost ausscheidet, sondern die Frage, ob und bei welcher Diät er sich zuckerfrei machen läßt bzw. welches die KH-Menge in der Nahrung ist, bei der der vorher zuckerfrei gewordene Patient zuckerfrei bleibt. Bezeichnend für die Schwere eines Diabetes ist ferner der Grad der bestehenden Acidosis bzw. ihrer therapeutischen Beeinflussbarkeit.

Der leichte Diabetes, der hauptsächlich in späteren Jahren (sog. Diabetes der älteren Leute) auftritt, ist dadurch gekennzeichnet, daß Glykosurie erst bei KH-Mengen etwa über 60–80 g auftritt und prompt nach einer wenige Tage durchgeführten (in der Regel genügen 3 Tage) strengen, d. h. KH-freien Kost schwindet. Eine Acidose, wenn überhaupt vorhanden, zeigt nur ganz geringe Grade. Viele derartige Kranke halten sich bei entsprechender Diät lange Zeit leistungsfähig und werden subjektiv durch ihr Leiden nicht sonderlich beeinträchtigt. Ein Teil von ihnen geht trotz aller Kautelen später in die schwere Form über. Bemerkenswert und praktisch wichtig ist, daß mancher leichte Diabetes zuerst als vorübergehende Glykosurie auftritt, deren Bedeutung als beginnender Diabetes leicht verkannt wird.

Den mittelschweren Diabetes gelingt es nicht so leicht wie die leichte Form zuckerfrei zu machen. Hier ist in der Regel eine mehrwöchige KH-freie Diät notwendig, um zum Ziele zu gelangen. Zunächst pflegt die Acidose nicht unerheblich zu sein; doch sinkt dieselbe alsbald bei rationeller Behandlung auf Null oder wenigstens auf ganz niedrige Werte. Hier ist längere diätetische Behandlung notwendig, um eine gewisse Stabilität des Zustandes zu erreichen, zumal ein Teil der Fälle sich aus diätetisch vernachlässigten Kranken rekrutiert. Doch glückt es auf die Dauer in der Regel, für einen längeren Zeitabschnitt eine Toleranz von etwa 40–50 g KH zu erreichen. Immerhin ist stets mit dem Übergang in den schweren Diabetes zu rechnen, in den diese Fälle sogar fast regelmäßig schließlich münden, wenn es sich um jüngere Individuen handelt.

Bei der schweren Form des Diabetes wird Zucker auch bei KH-freier Kost ausgeschieden, so daß es trotz strenger Diät selbst nicht vorübergehend gelingt, den Patienten zuckerfrei zu machen. Gleichzeitig besteht starke Acidose. Die Krankheit zeigt fast stets eine Tendenz zum Fortschreiten und hat darum einen durchaus malignen Charakter. Man beobachtet sie hauptsächlich im jugendlichen Alter. Der Diabetes bei Kindern und jungen Leuten gehört fast ausnahmslos zur schweren Form.

Verlauf und Ausgang der verschiedenen Diabetesformen zeigen ein mannigfaltiges Verhalten. Vereinzelt kommen wirkliche Heilungen vor, die übrigens wegen der Möglichkeit von Rückfällen nur bei genügend langer Beobachtungsdauer anzuerkennen sind. Eine nur scheinbare Heilung ist das Verschwinden der Glykosurie, das man u. a. gelegentlich bei Entwicklung einer Schrumpfniere beobachtet. Die große Mehrzahl der Fälle verläuft als chronisches Leiden, das je nach der Form des Diabetes und der Art der Behandlung zeitweise Besserungen bzw. Verschlimmerungen zeigt, um schließlich infolge der genannten Komplikationen oder durch interkurrente Erkrankungen oder endlich im Koma zu sterben. Zahlreiche leichtere Fälle halten sich viele Dezennien hindurch. Der schwere Diabetes im jugendlichen Alter verläuft mitunter akut.

Eine für den Diabetes spezifische tödliche Ausgangsform ist das **Coma diabeticum**. Es ist dies eine von charakteristischen Symptomen begleitete Intoxikation mit den organischen Säuren der diabetischen Acidose (s. S. 466). In manchen Fällen gehen gewisse prämonitorische Symptome wie auffallende Apathie, Übelkeit, Druck auf der Brust, Unruhe, Durchfälle voraus; in anderen Fällen bricht die Katastrophe unvermutet über den Patienten herein. Auslösend wirken mitunter heftige körperliche oder geistige Anstrengungen, starke Emotionen, vor allem bruske Entziehung der KH ohne gleichzeitige Alkalizufuhr. Charakteristisch ist eine starke Dyspnoe; die Atemzüge sind vertieft, oft schnarchend (sog. große Atmung) und zum Teil beschleunigt. Dabei ist der objektive Lungenbefund vollständig negativ. Die Atmungsluft riecht intensiv nach Aceton. Es besteht Apathie bzw. Somnolenz, die alsbald in vollkommene Bewußtlosigkeit übergeht. Krämpfe fehlen. Der Blutdruck sinkt, der Puls ist klein und frequent. Im Harn findet man häufig in großer Zahl die charakteristischen sog. Komazylinder, die hohe diagnostische Bedeutung haben und bisweilen auch schon als Vorboten auftreten. Sie sind kurz, breit und in der Regel granuliert. Der Harn enthält massenhaft Acetonkörper und gibt insbesondere eine intensive Gerhardt'sche Reaktion. Der Tonus der Bulbi nimmt ab. Unter zunehmender Zirkulationsschwäche und Schwinden des Pulses erfolgt der Tod in tiefstem Sopor. Die Dauer des Koma beträgt von den ersten Zeichen der Somnolenz an oft nicht mehr als 24 Stunden, seltener bis zu drei Tagen. Während es mitunter gelingt, beim ersten Auftreten der Symptome des Komas durch die Therapie (s. unten) eine günstige Wendung herbeizuführen, endet jedes ausgebildete Koma letal. Prognostisch verhält sich das plötzlich eintretende Koma günstiger als dasjenige, das sich allmählich entwickelt.

Zu den Komplikationen, die sich im Verlauf der Krankheit einstellen können, ist vor allem die Lungentuberkulose zu rechnen, die einen großen Teil der Diabetiker, vor allem Kranke im jugendlichen Alter befällt und nächst dem Koma die häufigste Todesursache bildet. Ferner besteht eine ausgesprochene Neigung der Diabetiker zu Lungengangrän. Nicht selten und für den weiteren Krankheitsverlauf oft von entscheidender Bedeutung ist bei älteren Patienten, namentlich bei Fettleibigen, die Entwicklung einer Gangrän an den unteren Extremitäten (Brandigwerden einzelner oder mehrerer Zehen oder sogar des ganzen Fußes). Als ursächliches Moment kommt hierfür in erster Linie die Arteriosklerose in Frage, die bei den therapeutisch notwendig werdenden Amputationen sich stets als äußerst hochgradig erweist; auch die Röntgenphotographie ergibt hier in der Regel gut darstellbare, also sklerotische Gefäße. Vereinzelt beobachtet man ferner die S. 382 beschriebenen, auf Pankreasinsuffizienz hinweisenden intestinalen Störungen (Diarrhöen, Fettstühle). Manche Fälle von Diabetes sind mit echter Nephritis (stärkere Albuminurie, Zylinder usw.) kompliziert; auch stellen sich bisweilen im späteren Verlauf des Leidens die Symptome der Schrumpfnieren mit erheblicher Blutdrucksteigerung ein; hier ist oft die Hyperglykämie besonders stark ausgeprägt. Daß dabei der Zucker verschwinden

kann, wurde schon erwähnt. Eine harmlose Albuminurie beobachtet man öfter bei hochgradiger Glykosurie; sie schwindet oft beim Sinken der Zuckermenge. Mancher Kranke geht an einer von einem Furunkel bzw. Karbunkel ausgehenden Sepsis zugrunde.

Der **pathologisch-anatomische** Befund bei unkompliziertem Diabetes ist recht geringfügig. Häufig, aber nicht konstant zeigt das Pankreas Veränderungen und zwar teils in Form einer mit Schrumpfung und Parenchymschwund einhergehenden Granularatrophie, teils in Form von Degeneration bzw. Verminderung der Langerhansschen Inseln. Die Nieren sind oft auffallend groß; charakteristisch für den Diabetes ist die reichliche Infiltration der Epithelien der Henleschen Schleifen mit Glykogen. Der übrige Organbefund kann völlig negativ sein; jedoch finden sich sehr häufig die den beschriebenen Komplikationen zugrunde liegenden anatomischen Veränderungen; oft besteht eine starke Arteriosklerose.

Während die **Diagnose** des Diabetes in ausgeprägten Fällen mit starker und dauernder Zuckerausscheidung leicht ist, liegt der Fall bei geringer bzw. vorübergehender Glykosurie schwieriger.

Eine nichtdiabetische Glykosurie kommt unter verschiedenen Umständen vor. Vorübergehende Zuckerausscheidung geringen Grades findet sich nach Kopfverletzungen, ferner nach epileptischen Anfällen, bei manchen Gehirnerkrankungen wie Tumoren, Meningitis, Lues, weiter bei manchen Intoxikationen (Kohlenoxyd, Morphin), endlich bei Nebennierentumoren sowie Hypophysenerkrankungen. Normal tritt vorübergehend Zucker nach sehr großer Zuckeraufnahme per os auf. Glykosurie, die bereits nach 100 g Dextrose (in Limonade) erfolgt, gilt als pathologisch. Diese sog. alimentäre Glykosurie wird bei Basedowscher Krankheit, gelegentlich bei Leberkrankheiten sowie bei manchen Neurosen (Sympathicus) beobachtet. Schließlich scheiden viele Menschen normal nach  $\frac{1}{2}$ —1 mg Suprarenin subcut. vorübergehend Zucker aus. Hier ist umgekehrt das Ausbleiben der Glykosurie pathologisch (z. B. bei Hypothyreosen und Addisonscher Krankheit). Gegenüber der genannten Glycosuria e saccharo ist für echten Diabetes die Glycosuria ex amylo, d. h. nach Genuß von Amylaceen (Brot usw.) charakteristisch, wobei die Menge des Harnzuckers der Menge der aufgenommenen KH ungefähr entspricht. Auch die Steigerung des Blutzuckers ist im allgemeinen im gleichen Sinne zu werten.

Ist das Vorhandensein eines Diabetes sichergestellt, so bedarf weiter die Frage der Schwere der Krankheit einer Prüfung. Man untersucht zunächst, ob es gelingt, durch strenge, d. h. KH-freie Kost (Eiweiß, Fett, Gemüse) den Patienten zuckerfrei zu machen; alsdann legt man zur bisherigen Kost KH schrittweise in steigenden Mengen, am besten je 10 g Brot so lange hinzu, bis Spuren von Zucker wieder erscheinen. Damit ist die sog. Toleranzgrenze erreicht. Die Höhe der letzteren und das Verhalten der Acetonkörperausscheidung geben zusammen ein klares Bild über die Art der vorliegenden Erkrankung.

Eine besondere Stellung nimmt der sog. renale Diabetes ein, der u. a. in der Gravidität auftritt, mit mäßiger Glykosurie einhergeht und keine Hyperglykämie zeigt (was übrigens anfangs auch bei echtem Diabetes vorkommen kann); die Abhängigkeit der Glykosurie von dem KH-Gehalt der Nahrung ist nicht sehr ausgeprägt; oft besteht sogar vollkommene Unabhängigkeit von letzterem. Gegenüber dem echten Diabetes ist es in der Regel (aber nicht immer!) eine harmlose Anomalie. Experimentell läßt sich vorübergehend renale Glykosurie durch Phlorrizin-Injektionen erreichen.

Die **Therapie** des Diabetes ist in der Hauptsache eine diätetische und zwar allgemein eine Schonungsbehandlung. Leichte Fälle werden zunächst, wie beschrieben, durch strenge Kost zuckerfrei ge-

macht und hierauf eine etwas unterhalb der Toleranzgrenze (etwa  $\frac{2}{3}$ ) liegende KH-Menge verabreicht. Bei einer derartigen Diät hält sich der leichte Diabetese häufig dauernd vollkommen zuckerfrei. Die einzelnen KH-Träger wie Brot, Kartoffeln, Reis usw. können in bestimmten, empirisch festgestellten Mengenverhältnissen untereinander vertauscht werden, wie folgende Tabelle (v. Noorden) ergibt:

100 g Weißbrot sind gleichwertig	
60 g Sago,	200 g Aleuronatbrot, Kakao,
70 g Reis oder Grieß,	200 g frische Erbsen oder Bohnen,
75 g Weizen- oder Roggenmehl, trok-	300 g Kartoffeln (roh oder gekocht)
kene Makkaroni oder Nudeln,	300 g Weintrauben,
70 g Zwieback, Teegebäck, Kekes,	500 g Äpfel, Birnen, Zwetschen,
80 g Gerste, Hafergrütze, Grünkern,	600 g Kirschen, Pfirsiche, Stachelbeeren,
100 g Michbrot, Graubrot, Kaffee-	Ananas, Aprikosen, Hasel- oder
kuchen, Blätterteig	Walnüsse,
100 g getrockn. Erbsen, Linsen, weiße	1000 g Apfelsinen, Erdbeeren, Him-
Bohnen,	beeren, Johannisbeeren,
120 g Schwarzbrot, Kommißbrot,	$\frac{1}{4}$ l Milch oder Bier.
Pumpnickel,	

Als Brotersatz dienen eine Reihe verschiedener „Diabetikergebäcke“ mit geringem KH- und hohem Eiweiß- (Kleber-)Gehalt wie Aleuronat-, Gluten- und Konglutinbrot, Luftbrot usw. (doch sei man gegenüber diesen der Reklame nach angeblich vollkommen, tatsächlich aber oft nicht KH-freien Gebäckarten sehr skeptisch!). Als Süßmittel der Speisen dient das unschädliche Saccharin (Sulfanilbenzoesäure), das aber nicht gekocht werden darf.

Nahrungsmittel, die jedem Diabetiker erlaubt sind, sind folgende:

Von frischem Fleisch alle Muskelteile von Ochs, Kuh, Kalb, Hammel, Schwein, Wildbret, zahmen und wilden Vögeln (gebraten oder gekocht) mit eigener Sauce oder mehlfreier Mayonnaise, ferner Zunge, Herz, Lunge, Gehirn, Thymus, Nieren, Knochenmark, alles mit mehlfreien Saucen, ferner von Fleischkonserven Rauchfleisch, geräucherte und gesalzene Zunge, Schinken, Gänsebrust, Büchsenfleisch, Cornedbeef. Ferner alle frischen Fische gekocht oder am Grill gebraten (ohne Panierung und ohne mehlhaltige Saucen). Von Fischkonserven Salz- und Räucherfische (Kabeljau, Schellfisch, Hering, Flundern, Makrelen, Sardellen, Sprotten), Neunaugen, Aal, Kaviar, Lebertran, ferner Austern, Muscheln, Krebse, Hummer, Langusten, Krabben; alle Eier und Eierspeisen ohne Mehlzusatz. Von frischen Vegetabilien Kopfsalat, Spinat, Gurken, Endivien, Kresse, Zwiebeln, Spargel, Blumenkohl, Rotkohl, Weißkohl, Sauerampfer, alles ohne Mehlzusatz, mit Fleischsauce bzw. Fett. Ferner Sauerkraut, eingemachte Oliven, Salzgurken, grüne Bohnen, Essiggurken, Mixed pickles. Als Suppen sind erlaubt alle Fleischsuppen ohne Mehlzusatz, mit Ei oder Knochenmark oder Fleisch- oder Gemüseeinlagen. Erlaubte Käsearten: Neufchatel, alter Camembert, Gorgonzola und andere fette Rahmkäse. Erlaubte Getränke: Sauerbrunnen, künstl. Selters mit Citronensaft und Saccharin, leichte Mosel- oder Rheinweine, Ahrweine, Bordeaux, Burgunder, Saccharin-Schaumweine in ärztlich verordneten Mengen, Kaffee schwarz oder mit Sahne ohne Zucker (Saccharin); Tee mit Sahne oder Citrone.

Eine große Rolle in der Ernährung des Diabetikers spielen die Fette, zumal sie im allgemeinen gut verwertet werden, keine Zuckerbildner, andererseits aber ausgezeichnete Energiespender sind, die eiweißsparend wirken. Praktisch lassen sie sich hauptsächlich mit Gemüsen in größeren Mengen verabreichen, evtl. gleichzeitig mit Alkoholgaben, ohne Verdauungsstörungen zu erzeugen.

Während bei leichten Fällen die Entzuckerung sich ohne weiteres ambulant durchführen läßt, gehören mittelschwere und ganz schwere

Fälle zunächst in stationäre klinische Beobachtung. Auch hier ist oft rasche Entziehung der KH die wirksamste Maßregel. Inwieweit und in welcher Form diese durchführbar ist, muß in jedem einzelnen Fall geprüft werden, da es hierfür kein allgemeingültiges Schema gibt. Die radikalste Methode der Entzuckerung ist die Karenz in Form von Hungertagen (bei absoluter Bettruhe nur Bouillon, Kaffee oder Tee und 100 g Kognak; evtl. Brompräparate) oder in gemilderter Form als Gemüsetage (z. B. 600 g Spargel oder Spinat, außerdem schwarzer Kaffee, Bouillon oder Tee; evtl. Zulage von 4—5 Eiern; strenge Bettruhe). Oft genügen ein oder zwei Gemüsetage zur Entzuckerung. Zur Prophylaxe des Säurekomas gebe man hier stets gleichzeitig 20,0, in schwereren Fällen 30—40,0 Natr. bicarb. p. die. Nicht selten beobachtet man, speziell bei vernachlässigten Fällen infolge der Karenz ein Zurückgehen oder Schwinden der Ketonurie. Hungertage, die im allgemeinen wöchentlich höchstens ein- bis zweimal angewendet werden dürfen, sind nur bei einigermaßen gutem Kräftezustand erlaubt. Schonender und daher für viele Fälle empfehlenswert ist das langsame Herabgehen der Nahrungsmengen bis schließlich auf etwa den 10. Teil des Calorienbedarfs. An sich ist bei jedem Diabetes, der noch nicht viele Jahre besteht, die völlige Entzuckerung anzustreben; indessen ist es ein Fehler, wahllos dieses Ziel um jeden Preis erreichen zu wollen. Maßgebend für die Behandlung ist neben dem Grade der Acidose das Gesamtbefinden des Patienten, Körpergewicht, Leistungsfähigkeit, Zustand der Verdauungsorgane und das psychische Verhalten. Lassen es die Umstände zu, so ist die KH-Menge möglichst lange unter der Toleranzgrenze zu halten, da letztere erfahrungsgemäß mit der Dauer des zuckerfreien Zustandes ansteigt. Andererseits ist nicht zu vergessen, daß selbst wenn die Entzuckerung nicht vollkommen gelingt, — die ganz schweren Fälle ausgenommen — trotzdem auch von den KH, die die Toleranzgrenze überschreiten, immer noch ein gewisser Teil vom Organismus verwertet wird. Bei ganz schwerem Diabetes, wo selbst monatelang durchgeführte KH-Karenz keine Entzuckerung erzielt, soll man Zulagen bis zu 100 g Brot (bzw. die gleichwertigen anderen KH-Träger) erlauben.

Im einzelnen ist noch folgendes zu bemerken:

Nach Ermittlung der Art des Falles bzw. nach gelungener Entzuckerung ist eine weitere Frage die Festsetzung einer Dauerkost. Letztere hat neben der Schonung des KH-Stoffwechsels vor allem jede Art von Überernährung zu vermeiden, da diese schädlich ist. Das gilt besonders auch für die Zufuhr von Eiweiß, da dieses in größeren Mengen ebenfalls die KH-Toleranz herabdrückt (Fleisch mehr als vegetabilisches Eiweiß). Die tägliche Eiweißmenge soll 1—1,2 g Eiweiß pro kg Körpergewicht nicht übersteigen und der Gesamtcalorienwert der Nahrung darf nicht höher sein, als es für das Wohlbefinden des Patienten und seine Leistungsfähigkeit eben ausreicht. Daneben soll die Kost nach Möglichkeit Abwechslung bieten.

Oft ist es notwendig, im Verlauf der Dauerkost strengere Schonungskuren einzuschalten, entweder in der Form regelrechter Hunger-

oder Gemüsetage (s. oben) oder in milderer Form als sog. Kohlehydratkuren.

Dazu gehört z. B. die Haferkur. Vorauszuschicken sind mehrere Tage strenger Kost bzw. Gemüsetage, es folgen 2—4 Hafertage, dann wieder 1—2 Gemüsetage. Der Hafer wird in Form von 250 g Hafermehl oder -flocken als Suppe oder Brei mit 50—100 g Eiweiß (4—5 Eier oder Pflanzeneiweiß, wie z. B. Roborat usw.) und 200—300 g Butter in etwa fünf Portionen auf den Tag verteilt gereicht; außerdem schwarzer Kaffee bzw. Kognak oder Rotwein in mäßigen Mengen; evtl. lasse man die Eier fort. In manchen Fällen bewährt sich die ein- oder mehrmalige Wiederholung der Haferkur. Erfolge hat die Kur namentlich in schweren Fällen (speziell auch bei jugendlichem Diabetes) insbesondere dort, wo durch die KH-Karenz die Acidose verstärkt wird und das Koma droht, aber auch bei mittelschweren, schwer zu entzuckernden Fällen, ferner bei intestinalen Störungen, speziell bei Diarrhöen. Gelegentlich treten Ödeme im Gefolge der Haferkur auf. Analog in der Wirkung sind andere KH-Kuren (z. B. mit Reis) bzw. deren Kombination mit Obst (Äpfel).

Das ihnen gemeinsame therapeutische Prinzip ist wahrscheinlich vor allem die Abwesenheit von Fleisch in der Kost. Bei schwereren Formen empfiehlt es sich, die KH-Kur in Abständen von 1—2 Monaten zu wiederholen, sowie dazwischen für kurze Zeit eine eiweißreichere Ernährung einzuschalten (während KH-freier Perioden, die länger als etwa 6 Tage dauern, ist mindestens 100—110, bei wenig eiweißempfindlichen Fällen bis zu 150 g Eiweiß pro die zu verabreichen). Im allgemeinen ist es in den meisten Fällen von Vorteil, jedes Jahr ein- bis zweimal Hunger- bzw. Gemüsetage zur Schonung des KH-Stoffwechsels einzuschalten.

Seelische Erregungen, aber auch körperliche Überanstrengungen sind sorgfältig zu vermeiden, dagegen ist mäßige körperliche Bewegung nicht nur erlaubt, sondern von ganz schweren Fällen abgesehen geradezu erwünscht, da sie (vgl. oben) glykosurievermindernd wirkt. Auf sorgfältige Hautpflege ist besonderer Wert zu legen. Badekuren (Karlsbad, Neuenahr, Vichy) haben bei leichten und mittleren Fällen oft Erfolg. — Die Behandlung des Coma diabeticum erfordert hauptsächlich Verabreichung großer Alkalimengen. Bei beginnendem Koma Natr. bic. bis 40 g p. os; im Koma selbst größere Mengen, etwa je 1 Teel. alle  $\frac{1}{2}$ —1 Std. in Milch oder viel wirksamer 4% Natr. bicarbonat (nicht Carbonat!) -Lösung intravenös 1000 ccm; ferner ist Verabreichung größerer Mengen von Alkohol (200 g Kognak oder Mixt. alcohol.) bei beginnendem Koma von Vorteil. — Bei chirurgischen Komplikationen soll man vor dem operativen Eingriff versuchen, den Patienten zu entzuckern oder wenigstens die Glykosurie und die Hyperglykämie zu vermindern. Bei der Zehengangrän ist möglichst frühzeitige und hoch ausgeführte Amputation die Methode der Wahl. — Eine spezifische Kur kommt nur bei Diabetes infolge von syphilitischer Pankreatitis in Frage (Hg, Salvarsan). In einzelnen Fällen wirkt bei Diabetes Opium (Tct. opii bis 50—100 Trpf. p. die) vorübergehend günstig, doch ist die Wirkung rein symptomatisch.

Unter **Pentosurie** versteht man die Ausscheidung von Pentosen, d. h. Zuckern mit 5 C-Atomen (Arabinose) durch den Harn. Sie reduzieren Fehlingsche Lösung, gären aber nicht und sind optisch inaktiv. Die **ausgeschiedenen** Mengen sind

gering (nicht über 20–30 g p. die); auch hat die Anomalie keine Tendenz zum Fortschreiten. Die Nahrung hat keinen Einfluß auf die Pentosurie. Klinisch bestehen entweder überhaupt keine krankhaften Erscheinungen oder es handelt sich um Neuropathen, Morphinisten u. ä. Praktisch wichtig ist die Kenntnis der Pentosurie, weil sie zu Verwechselungen mit diabetischer Glykosurie Anlaß geben kann, mit der sie nichts gemein hat.

In seltenen Fällen kommt eine als **Lävulosurie** bezeichnete Ausscheidung von Fruchtzucker ohne gleichzeitiges Auftreten von Dextrose bei neuropathischen Individuen im Anschluß an den Genuß von Frucht- und Rohrzucker vor. Auch hierbei handelt es sich um eine harmlose Anomalie. Daß Lävulose neben Dextrose auch bei Diabetes ausgeschieden wird, wurde schon früher erwähnt. Der Nachweis der Lävulose stützt sich auf ihr Reduktions- und Gärungsvermögen wie bei Dextrose und im Gegensatz zu dieser auf die optische Linksdrehung bei der Polarisation.

### Die Gicht (Arthritis urica).

Die Gicht ist eine Krankheit, in deren Mittelpunkt eine Anomalie des Harnsäurestoffwechsels steht. Zu ihren charakteristischen Eigentümlichkeiten gehört die Ablagerung von harnsauren Salzen (Mononatriumurat) im Körper, ferner die Erhöhung des Harnsäuregehaltes des Blutes sowie eine zeitweise bestehende Verzögerung der  $\bar{U}$ -Ausscheidung<sup>1)</sup> durch die Nieren. Ein großer Teil der klinischen Symptome, insbesondere die gichtische Gelenkerkrankung läßt sich durch die Aufstapelung von Uraten in den Geweben erklären.

Die Gicht ist ein exquisit erbliches Leiden. In der Familie der Kranken kommen häufig teils die Gicht selbst, teils Fettsucht sowie Diabetes, ferner Nierensteine vor. Außer dieser sehr ausgesprochenen hereditären Veranlagung haben gewisse exogene Faktoren als ursächliche Momente eine hervorragende Bedeutung, an erster Stelle der Alkohol, ferner überreichliche Fleischnahrung, sodann gewisse Gifte, insbesondere das Blei (die sog. Bleigicht war namentlich früher eine häufige Berufskrankheit der Maler). Wegen der Rolle des Alkohols und der üppigen Ernährung gilt die Gicht allgemein, nicht ganz mit Unrecht, als Krankheit der Schlemmer bzw. der wohlhabenden Kreise, wiewohl sie, wie z. B. die Bleigicht auch in der armen Bevölkerung vorkommt. Männer erkranken häufiger als Frauen. Am häufigsten tritt sie zwischen dem 30. und 50. Jahr auf, gelegentlich schon früher. Die geographische Verbreitung des Leidens ist sehr verschieden; am häufigsten kommt es in England, am seltensten im mohammedanischen Orient vor (Alkoholabstinenz!). Der Habitus des Gichtkranken ist in der Regel der des unteretzten vollblütigen Menschentypus, nur selten der des schlecht genährten schwächlichen Asthenikers.

Krankheitsbild: In der Regel tritt die Krankheit zum ersten Male in Form eines akuten Gichtanfalls in die Erscheinung. Dieser besteht in plötzlich (meist nachts) einsetzenden außerordentlich heftigen Schmerzen im Metatarsophalangealgelenk einer der großen Zehen, häufig zuerst der linken; das Gelenk ist geschwollen und heiß, die Haut stark gerötet (sog. Podagra). Die Empfindlichkeit ist so groß, daß der Kranke oft nicht einmal den Druck der Bettdecke verträgt. In den Morgen-

<sup>1)</sup> Abkürzung für Harnsäure =  $\bar{U}$ .

stunden pflegt sich der Schmerz zu mildern, um oft in der nächsten Nacht erneute Heftigkeit zu zeigen. Dies kann sich noch mehrmals wiederholen. Mitunter springt der Anfall auf ein anderes Gelenk, z. B. ein Fuß- oder Fingergelenk über. Mit dem Abnehmen der Schmerzen gehen bald auch die objektiven Gelenkveränderungen zurück; die Haut über dem Gelenk schuppt und juckt. Die Dauer der Anfallsperiode beträgt etwa  $\frac{1}{2}$ —1 Woche. Der Anfall ist in der Regel von Störungen des Allgemeinbefindens begleitet, die übrigens häufig bereits als Vorläufer eines Anfalls auftreten. Dazu gehören dyspeptische Beschwerden wie Appetitmangel, belegte Zunge, Obstipation, ferner psychische Depression, Abgeschlagenheit sowie Gliederziehen, mitunter Bronchitis. Während der Anfälle selbst bestehen oft Temperatursteigerungen bis  $38^{\circ}$  und darüber.

Nach Abklingen des ersten Anfalls kann bis zum nächsten Anfall längere Zeit (bis zu Jahren) vergehen, in anderen Fällen folgen die Anfälle schnell aufeinander. Zeiten gehäuften Auftretens sind vor allem Frühling und Herbst. Von anderen Gelenken, die namentlich in späteren Stadien der Krankheit befallen werden, erkranken mit Vorliebe die Gelenke der unteren Extremitäten, und zwar die Fußwurzel-, Sprung- und Kniegelenke; wesentlich seltener werden die Gelenke der oberen Extremität befallen (Handgelenkgicht = Chiragra). Im allgemeinen beteiligen sich bei der akuten Gicht die kleinen Gelenke mehr als die großen, so daß z. B. Hüft- und Schultergelenke fast immer frei bleiben. Ausnahmsweise werden, und zwar meist erst in späteren Anfällen das Sternoclaviculargelenk, ferner das Arycricoid-, das Kiefergelenk, die Halswirbelgelenke u. a. befallen. Daneben beteiligen sich mitunter manche Sehnscheiden (Achillessehne) sowie die Fascien; auch Schleimbeutel, z. B. der des Olecranon zeigen mitunter Rötung, Schwellung und heftigen Schmerz. Vereiterung gehört nicht zum Bilde der Gicht.

Bleibende anatomische Residuen braucht der akute Anfall an den Gelenken nicht zu hinterlassen. Punktierung akut gichtisch erkrankter Gelenke ergibt regelmäßig die Anwesenheit reichlicher Uratmengen in der Gelenkflüssigkeit.

Ein für die Pathogenese der Gicht wichtiges weiteres Moment ist die Tatsache, daß das Blut in der Regel während der Anfälle abnorm hohe  $\bar{U}$ -Mengen enthält, auch in dem Falle, wo der Patient einige Tage lang vorher sich mit purinfreier Kost ernährte. Während normal der  $\bar{U}$ -Gehalt des Blutserums bei purinfreier Kost 2—3,5 mg % nicht übersteigt, erreicht er bei Gicht 4—6 und mehr mg %. Dies Verhalten, die sog. Urikämie, ist für Gicht charakteristisch (bezüglich anderer mit Urikämie einhergehender Affektionen vgl. die Bemerkungen über die Diagnose). Auch das Verhalten der  $\bar{U}$ -Ausscheidung durch die Nieren ist für Gicht bezeichnend, indem die endogenen  $\bar{U}$ -Werte (vgl. Einleitung S. 453) des Harns häufig dauernd auffallend niedrig sind (0,1—0,2 g p. die); kurz vor dem Gichtanfall sinken sie meist noch weiter, um unmittelbar nach dem Anfall zu höheren Werten anzusteigen (sog. Harnsäureflut). Ferner bewirkt beim Gichtkranken Steigerung der exogen zugeführten  $\bar{U}$ -Menge in Form einer purinreichen Mahlzeit (z. B. von Thymus) oder nach intravenöser  $\bar{U}$ -Injektion, z. B. von 1,0 kristallinischem Mononatriumurat in 200 ccm Aqua dest. nicht wie bei Gesunden ein entsprechendes Ansteigen der  $\bar{U}$  im Harn; besonders deutlich kommt dies bei Kontrolle des  $\bar{U}$ -Prozentgehaltes der einzelnen Harnportionen zum Ausdruck. Die verzögerte Ausscheidung der exogenen  $\bar{U}$  ist ein weiteres wichtiges Merkmal der Gicht.



Bei längerem Bestehen der Erkrankung pflegen im Gegensatz zum akuten Anfall gewisse Veränderungen dauernd zurückzubleiben. Dieselben können in fortgeschrittenen und nicht behandelten Fällen sehr hochgradig sein. Dazu gehören vor allem mehr oder weniger schwere Veränderungen der befallenen Gelenke, Deformierungen, Schwellungen sowie Subluxationen. Zu den stärksten Verunstaltungen kann es namentlich an den Händen kommen. Die Finger werden knollig oder spindelförmig verdickt und neigen zur Palmarflexion der Grundphalangen mit gleichzeitiger ulnarer Abduktion. Die Haut ist an diesen Stellen stark atrophisch und verdünnt. Die Gebrauchsfähigkeit der solchermaßen veränderten Hände ist hochgradig beeinträchtigt. An den Großzehengelenken entwickelt sich Valgusstellung, an den Kniegelenken kommt es oft zu Contracturen.

Anatomisch zeigen derartig veränderte Gelenke in großer Menge kreideartige Ablagerungen von Mononatriumurat nicht nur auf den knorpeligen Gelenkflächen, sondern auch in der Knochensubstanz sowie in der Markhöhle der Knochen, im periartikulären Bindegewebe und in den Muskelansätzen.

Die Röntgenphotographie kann bisweilen schon frühzeitig gichtische Gelenk- und Knochenveränderungen aufdecken. Hierher gehören eigentümliche an den Gelenkenden vorhandene Defekte des Knochens, die scharfrandig wie ausgestanzt aussehen und rundliche bzw. halbkreisförmige Konturen zeigen. Besonders charakteristisch für Gicht (ältere Fälle) sind in der Knochensubstanz, hauptsächlich an den Gelenkenden gelegene helle rundliche Flecken, die von einem dunklen Kontur umsäumt sind und cystenartige Gebilde darstellen, innerhalb der die Kalksalze des Knochens resorbiert sind. Daneben findet man bei schweren Fällen auch sonst hochgradige Zerstörung von Knochensubstanz infolge von Uratablagerung, sowie Exostosenbildung und Verödung der Gelenkspalten.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal der chronischen Gicht sind die als Tophi bezeichneten Uratdepots an verschiedenen Körperstellen. Sie finden sich am häufigsten an den Ohrmuscheln und bilden dort weißliche, durch die Haut durchscheinende Knötchen von Stecknadelkopf- bis Erbsengröße, meist in der Haut, bisweilen auch im Knorpel gelegen; sie sind nicht schmerzhaft und zeigen keine entzündliche Reaktion. Beim Aufstechen mit einer Nadel entleert sich aus ihnen ein Krystallbrei von Uraten, der die Murexidprobe (vgl. S. 420) gibt. Seltener kommen sie auch an anderen Stellen in der Haut vor. Vor allem aber finden sich bei schweren Gichtfällen Tophi in der Nachbarschaft der Gelenke und Schleimbeutel (Olecranon), wo sie derbe höckerige Knollen bilden, die zum Teil spontan aufbrechen; aus den Ulcerationen entleeren sich Urate. Kleinste, eben fühlbare subcutane und auf der Unterlage verschiebliche Uratdepots, die für die Diagnose äußerst wichtig sind, findet man bei sorgfältiger Palpation mitunter nicht nur in der Gegend des Olecranon sondern auch vor der Kniescheibe und in der Gegend der Malleolen.

Außer diesen sehr charakteristischen Befunden zeigen auch die inneren Organe häufig Veränderungen bei der chronischen Gicht. Vor allem pflegen die Nieren auf die Dauer fast immer zu erkranken und zwar in Form einer langsam fortschreitenden Schrumpfniere, die mit Blutdrucksteigerung einhergeht. Letztere kann indessen bei den Fällen fehlen, die mit Coronarsklerose kompliziert sind. Das anatomische

Bild der Gichtniere deckt sich vollkommen mit dem der gewöhnlichen Granularatrophie; mitunter findet man, speziell in der Marksubstanz, kleine kreibig-weiße Einlagerungen von Harnsäure in Streifenform. Eine regelmäßige Folgeerscheinung der Gichtniere ist die Hypertrophie des linken Ventrikels. Das Verhalten des Herzens ist daher für das weitere Schicksal des Gichtkranken von größter Bedeutung; nicht selten bestehen Symptome einer Myodegeneratio cordis. Auch Arteriosklerose ist eine häufige Begleiterscheinung der Gicht. Oft beobachtet man ferner Bronchialkatarrhe; auch kommt nicht selten Bronchialasthma in der Anamnese der Patienten vor. Auffallend oft klagen die Kranken über Verdauungsstörungen, die sich schon in den ersten akuten Anfällen bemerkbar zu machen pflegen. Neigung zu Sodbrennen, hartnäckige Obstipation, Hämorrhoiden sind häufige Beschwerden. Endlich kommen gelegentlich am Urogenitalapparat Störungen vor, die man in ursächlichen Zusammenhang mit der Gicht bringt. Dazu gehören einmal Hoden- und Nebenhodentzündungen, andererseits katarrhalische Entzündungen der Blase und Harnröhre. Das Vorkommen einer Nephrolithiasis wurde schon erwähnt. Nicht selten beobachtet man Zeichen einer gewissen Labilität des vegetativen Nervensystems, insbesondere vagotonische Symptomenkomplexe. Ferner sind Gichtkranke zur Pachymeningitis haemorrhagica cerebialis besonders disponiert. Schließlich erkrankt bei Gichtischen relativ häufig das Auge, namentlich in Form von Iritis sowie Episkleritis, deren günstige Beeinflussung durch eine gegen die Gicht gerichtete Therapie ihren Ursprung erkennen läßt. Mitunter beobachtet man bei demselben Patienten Kombinationen von Gicht mit Diabetes oder Fettsucht.

Verschiedene Verlaufsarten der Gicht: Häufig verläuft die Gicht zunächst in Form akuter, in unregelmäßigen Abständen wiederkehrender Anfälle unter charakteristischer Lokalisation in bestimmten Gelenken und mit beschwerdefreien Intervallen (s. o.). Dies kann sich viele Jahre in der gleichen Weise wiederholen; bei rationeller Therapie ist das Leiden einer weitgehenden Besserung zugänglich. In anderen Fällen nimmt im Laufe der Zeit die Intensität und Zahl der Anfälle zwar ab, wogegen sich allmählich dauernde Residuen der Krankheit einstellen. Sie geht dann bisweilen unmerklich in die chronische oder torpide Gicht über, bei der sich das Leiden durch die beschriebenen schweren Gelenkveränderungen, die Tophi sowie die cardiorenenalen Symptome äußert.

In manchen Fällen kommt es überhaupt nicht zum Auftreten akuter Anfälle und das Leiden verläuft von vornherein chronisch mit deformierenden Gelenkveränderungen und Tophusbildungen; beides bleibt jedoch oft in mäßigen Grenzen, so daß das Krankheitsbild mitunter zunächst als einfache chronische Arthritis deformans imponiert. Andere seltenere Formen verlaufen von vornherein mehr polyartikulär und zwar sowohl akut wie chronisch, wobei dann im Gegensatz zur typischen Gicht bisweilen vor allem die großen Gelenke befallen werden. Der sog. Gelenkgicht steht die vorzugsweise die Schleim-

beutel und Sehnen befallende Gicht gegenüber. Schließlich ist die sog. viscerale und die Nierengicht zu erwähnen, bei denen die beschriebenen Organerkrankungen im Vordergrund stehen, während die typische Gelenkerkrankung entweder vollkommen fehlt oder nur angedeutet ist. Bei der Nierengicht, die sich hauptsächlich bei chronischer Bleivergiftung einstellt, ist die Schrumpfniere das primäre Leiden, das erst zur  $\bar{U}$ -Retention Anlaß gibt. Gegenüber der konstitutionellen Gicht wird diese Form als sekundäre Gicht bezeichnet.

Die Krankheit kann viele Jahre dauern und nicht mit Unrecht erfreuen sich die Gichtiker des Rufes einer gewissen Langlebigkeit. Zweifellos ist in zahlreichen Fällen der relativ günstige Verlauf der Krankheit auf Rechnung der modernen rationellen Therapie zu setzen. Ungünstiger Ausgang droht hauptsächlich den Fällen mit Schrumpfniere; er erfolgt entweder durch Herzinsuffizienz als Folge der lang andauernden Hypertonie bzw. an Apoplexie resp. Encephalomalacie oder durch Urämie, oder der Tod tritt im Verlauf einer anderen interkurrenten Erkrankung infolge der herabgesetzten Widerstandsfähigkeit des Patienten schon vorher ein.

Die Frage der Pathogenese der Gicht befindet sich zur Zeit im Flusse. Zweifellos besteht das Wesen der Gicht in einer pathologischen Retention von Harnsäure im Organismus. Dieselbe dürfte in vielen Fällen mit einer gewohnheitsmäßigen Überlastung des Körpers mit Purinkörpern in Verbindung stehen, wie denn auch übermäßige Purinzufuhr z. B. in der Form einer Thymusmahlzeit geradezu einen akuten Anfall auszulösen vermag. Bei der Ablagerung von Harnsäure in den Geweben spielen der Knorpel, aber auch der Knochen, ferner Sehnscheiden und Schleimbeutel eine besondere Rolle. Sicher beruht die  $\bar{U}$ -Retention nicht auf einer Störung des intermediären Purinstoffwechsels, denn der Gichtiker bildet Harnsäure genau wie der Gesunde, insbesondere erzeugt er dieselbe wie dieser aus ihren Vorstufen, den Nucleotiden. Weiter besteht die Tatsache, daß neben der primären sog. konstitutionellen Gicht eine sekundäre Gicht existiert, die sich als Folge einer chronischen Nierenerkrankung speziell bei Bleischrumpfniere einstellt. Zwei Theorien stehen z. Zt. einander gegenüber: Nach der einen handelt es sich um eine spezifische Gewebeerkrankung, namentlich des Knorpels mit einer pathologischen Neigung zur Retention von Uraten. Die renale Theorie nimmt demgegenüber an, daß das Wesen auch der primären konstitutionellen Gicht in einer vererbten Funktionsschwäche der Niere hinsichtlich des  $\bar{U}$ -Ausscheidungsvermögens beruht, ohne daß eine anatomische Nierenveränderung zu bestehen braucht. Nach dieser Auffassung würde demnach die Gicht nicht zu den Stoffwechselkrankheiten zu zählen sein.

Die Diagnose stützt sich abgesehen von den beschriebenen typischen Gichtanfällen sowie dem Nachweis von Tophi vor allem auf das charakteristische Verhalten der  $\bar{U}$  im Blut und Harn bei purinfreier Kost (!). Erhöhung der Blut- $\bar{U}$  über 4 mg $\%$  und Harn- $\bar{U}$ -Werte unter 50 mg $\%$  (in mehreren Fraktionen bestimmt) in der anfallsfreien Zeit sprechen eindeutig für Gicht. Urikämie allein kommt dagegen auch bei anderen krankhaften Zuständen, insbesondere bei Fieber (Pneumonie), Leukämie sowie bei Nierenleiden mit Erhöhung des Rest-N vor. Mit Nachdruck ist zu betonen, daß das bloße Ausfallen von freier  $\bar{U}$  im Harn im Sediment für die Diagnose Gicht völlig bedeutungslos ist; das gleiche gilt von den Resultaten der vielfach üblichen Harnanalysen auf  $\bar{U}$

ohne vorhergehende, mindestens dreitägige purinfreie Kost. Anamnestic sind exsudative Diathese in der Kindheit, ferner Migräne, Ekzeme namentlich in den Kniekehlen und am Ellbogen verdächtige für Gicht verwertbare Momente; von besonderer Bedeutung ist natürlich das Vorkommen von Gicht bzw. anderen konstitutionellen Erkrankungen in der Familie. Bei Fehlen typischer Gelenkveränderungen denke man stets an die beschriebenen versteckten  $\bar{U}$ -Depots in Schleimbeuteln und Sehenscheiden.

Bezüglich des Röntgenbefundes ist hier noch die sog. Kalkgicht zu erwähnen, die eine von der Gicht völlig verschiedene Anomalie ist und in Ablagerung von Calciumcarbonat und -phosphat in Form krümeliger Konkreme namentlich in der Nachbarschaft der Fingergelenke und am Vorderarm besteht. Die Kalkablagerungen machen im Röntgenbilde sehr distinkte, zum Teil maulbeerförmige Schatten. Bisweilen brechen die Kalkmassen wie die  $\bar{U}$ -Depots der Gicht nach außen auf.

Die sog. Heberdenschen Knoten sind kleine, in der Regel zwischen der 2. und 3. Phalanx an den Gelenkenden seitlich oder oben befindliche Exostosen, die dicht unter der Haut liegen und bis zu erbsengroßen Prominenzen bilden können; sie kommen zwar häufig bei Gicht vor, sind aber nicht für sie pathognomonisch.

Therapie des akuten Gichtanfalls: Betruhe, Ruhigstellung des erkrankten Gliedes, Einhüllung desselben in Watte; evtl. bei sehr starken Schmerzen Morphium bis 0,02 subcutan. Schmerzlindernd wirkt oft auch Aspirin. Wirksamer sind mitunter Colchicum-Präparate, z. B. Tct. Colchici 3—4 mal tgl. 15—30 Tropfen oder Colchicinpillen-Merck (0,001) 2—3 mal tägl. 1 Pille. Ein anderes beliebtes Colchicum-Präparat ist der Liqueur Lavelle. Die nach Colchicum häufig auftretenden Diarrhöen wirken oft erleichternd. Andernfalls Abführmittel bzw. Klyзма. Ein spezifisches Mittel ist das Atophan, eine Phenylchinolincarbonsäure, oder besser sein Äthylmethyl-Derivat, das Novatophan. Sie bewirken eine starke  $\bar{U}$ -Ausschwemmung durch die Nieren mit Verminderung der Urikämie. Dosierung 3—5 mal tgl. 0,5—1,0 in Tabl. Die Diät im akuten Anfall soll eine leichte und vor allem purinfreie (s. u.) Schonungskost sein.

In der Zeit zwischen den Anfällen spielt die diätetische Behandlung die Hauptrolle. Die Kost soll möglichst arm an  $\bar{U}$ -Bildnern sein. Zu letzteren gehören nicht das Eiweiß, dagegen die Purinkörper, die in der Hauptsache sich in den Zellkernen finden. Purinhaltig ist einmal allgemein die Fleischkost; sie ist daher möglichst einzuschränken. In besonders hohem Maße purinhaltig sind vor allem gewisse tierische (kernreiche) Organe, nächst dem gewisse Fische.

Streng verboten sind daher in erster Linie Thymus (Kalbsmilch), Pankreas, Leber, Milz, Nieren, Lunge, ferner Fleischbrühe, das Fleisch der Taube, weiter Hering, Ölsardinen, Sprotten, Sardellen, Anchovis. Dagegen sind die im Kaffee, Tee, Kakao enthaltenen Methylpurine unbedenklich, da sie keine  $\bar{U}$ -Bildner sind.

Die auf die Dauer durchzuführende Diät ist demnach eine vorwiegend lactovegetabilische Kostform, bei der man je nach den individuellen Verhältnissen des Patienten nur in Abständen (etwa zweimal wöchentlich) kleine Fleischzulagen einschieben darf. Jegliche Überernährung ist zu vermeiden. Doch sei man auf genügende Eiweißzufuhr bedacht,

um N-Verluste zu verhüten. Alkohol ist zu verbieten. In manchen Fällen wirkt regelmäßige HCl-Medikation (bis zu 50 Tropfen p. die) günstig. Auch die Anwendung des Radiums als Emanations- bzw. Trinkkur hat mitunter therapeutischen Erfolg. In gleicher Weise wird ein Teil der günstigen Wirkung mancher Badekuren (Münster a. St., Kreuznach usw.) erklärt.

### Fettsucht.

Unter Fettsucht versteht man allgemein eine krankhafte Zunahme des Fettbestandes des Körpers, die eine die Norm übersteigende Vermehrung des Körpergewichtes, Herabsetzung der körperlichen Leistungsfähigkeit sowie verschiedenartige subjektive wie objektive gesundheitliche Störungen zur Folge hat. Von extremen Fällen abgesehen ist es nicht immer leicht, eine scharfe Grenze zwischen sehr gutem, aber noch zweifellos normalem Ernährungszustand mit reichlichem Fettpolster und der ins Pathologische gehörenden eigentlichen Fettsucht zu ziehen. Anstatt an allgemeine zahlenmäßige Normen (etwa des Körpergewichtes<sup>1)</sup>) hält man sich besser einmal an das Vorhandensein klinisch wahrnehmbarer Anomalien, sodann an das Verhalten des Stoffwechsels. Auffallend ist es, daß die große Zahl der normalen Menschen mit einer merkwürdigen Zähigkeit an dem ihnen individuell eigenen Umfange ihres Fettbestandes und ihrem Körpergewicht trotz wechselnder äußerer Verhältnisse festhält.

Die Fettsucht ist in zwei große Gruppen zu teilen, die exogene und die endogene Fettsucht.

Die **exogene Fettsucht** oder **Mastfettsucht** ist die häufigere Form. Sie beruht auf einer während längerer Zeit bestehenden übermäßigen Nahrungszufuhr. Zum Teil kommt in diesen Fällen als weiteres ursächliches Moment Mangel an körperlicher Bewegung hinzu (sog. Faulheitsfettsucht). Zu dieser Art von exogener Fettsucht gehören die namentlich in wohlhabenden Bevölkerungsschichten vorkommenden Fälle, ferner der abnorm starke Fettansatz, der sich bei bis dahin tätigen, plötzlich z. B. an das Bett gefesselten oder am Gehen verhinderten Individuen einstellt. Phlegmatische Menschen neigen unter den genannten Umständen mehr zur Fettsucht als lebhaftere Naturen.

Sog. relative Fettsucht besteht in denjenigen Fällen, wo im Mißverhältnis zum übrigen Gesundheitszustand, z. B. einer vorhandenen Tuberkulose infolge langdauernder Mästung der Ernährungszustand ein auffallend guter ist.

Stoffwechseluntersuchungen bei der Mastfettsucht ergeben, daß der Grundumsatz (vgl. S. 456 u. 458) normal ist, daß aber die Menge an täglich zugeführten Calorien über den normalen Bedarf hinausgeht. In der Hauptsache handelt es sich dabei um abnorm starken Fett- und KH-Konsum; das Eiweiß spielt praktisch keine wesentliche Rolle.

Bei der Anamnese Fettsüchtiger soll man sich nicht durch die immer wiederkehrende stereotype Versicherung der Patienten beirren lassen, daß sie nur wenig

<sup>1)</sup> Als Norm gilt bei Erwachsenen im allgemeinen ein Körpergewicht, das in Kilogramm soviel beträgt, wie die um 100 verminderte Körperlänge in Zentimeter, also z. B. bei 172 cm Körperlänge 72 kg.

essen und trotzdem zunehmen. Denn einmal ist, wie eine eingehende Kontrolle der täglich aufgenommenen Nahrung ergibt (insbesondere auch deren Zubereitung) und namentlich auch der zwischen den Hauptmahlzeiten genossenen Dinge (z. B. oft Süßigkeiten), die Calorienzufuhr häufig tatsächlich größer als dem Nahrungsbedarf entspricht; sodann ist zu berücksichtigen, daß wenn einmal ein gewisses Stadium der Fettsucht erreicht ist, es nur eines sehr geringen täglichen Plus an Nahrung bedarf, um den Fettbestand des Körpers weiter zu vermehren oder ihn wenigstens auf der gleichen Höhe zu halten.

Eine bedeutsame Rolle bei der Entstehung der exogenen Fettsucht spielt auch der Alkohol, namentlich in Form von Bier, das außer den 3—4% Alkohol (1 g Alkohol = 7 Calorien) nicht unerhebliche Mengen von KH enthält. Dazu kommt, daß der Alkoholgenuß träge macht und auch auf diesem Wege Fettansatz begünstigt.

Die **endogene** oder **konstitutionelle Fettsucht** ist relativ selten. Sie beruht auf Störungen der hormonalen Korrelationen des Körpers und wird bei Erkrankungen bestimmter innersekretorischer Drüsen beobachtet. Hierher gehört vor allem die S. 448 beschriebene *Dystrophia adiposogenitalis*, die auf Hypophysenerkrankung beruht. Andere Fälle werden durch Herabsetzung der Schilddrüsentätigkeit erklärt (sog. thyreogene Fettsucht). Diese Formen sind nicht mit dem Myxödem zu verwechseln, das bisweilen eine gewisse Ähnlichkeit mit der Fettsucht haben kann (vgl. S. 437). Auch der Ausfall anderer endokriner Drüsen kann, wie man annimmt, zur Entstehung der endogenen Fettsucht beitragen. Hierher gehören die beim Weibe nach der Entfernung der Ovarien sowie die bei vielen Frauen im Klimakterium auftretende Fettleibigkeit, ferner der abnorme Fettansatz der Eunuchen. Daß schon normal das Fettpolster des Menschen, insbesondere auch die Art seiner Verteilung am Körper unter dem Einfluß der Sexualhormone steht, geht aus der bei beiden Geschlechtern verschiedenen für Mann und Weib charakteristischen Lokalisation des Fettpolsters hervor, die ja bei beiden einen nicht unbeträchtlichen Teil ihres äußeren Habitus ausmacht. Auch Erkrankungen der *Glandula pinealis* können wahrscheinlich zu abnormer Adipositas führen. Zweifellos hat auch das Zentralnervensystem auf den Bestand des Fettgewebes Einfluß, wie das Beispiel der seltenen halbseitigen Zunahme des Fettpolsters zeigt.

Nur für einen Teil der Fälle von endogener Fettsucht (die thyreogene Form) ist nachgewiesen, daß im Gegensatz zur exogenen Fettsucht der Stoffwechsel herabgesetzt, insbesondere der Grundumsatz vermindert ist; in anderen Fällen hat man Herabsetzung der spezifisch-dynamischen Wirkung der Nahrung beobachtet. Manches spricht auch für Störungen im Wasser-Stoffwechsel im Sinne einer Wasser-Retention.

**Krankheitsbild der Fettsucht:** Fettsucht kommt zunächst in der Zunahme des Körpergewichtes zum Ausdruck. Zahlen über 85 kg beim Mann, über 75 kg beim Weib bei mittlerer Größe müssen als pathologisch und für das Bestehen einer Fettsucht charakteristisch angesehen werden (selbstverständlich unter Ausschluß anderer Ursachen der Gewichtszunahme, speziell von Ödemen). Körpergewichte über 100 und 120 kg und weit mehr sind keine Seltenheiten.

Die Inspektion der Kranken mit ausgebildeter Fettsucht läßt abgesehen von den jedem Laien bekannten Merkmalen der Krankheit

wie Doppelkinn, Specknacken, Fettkragen, Fettbauch, starke Entwicklung der Mammae, der Hinterbacken usw. zwei verschiedene Typen erkennen, den Typus der plethorischen Fettsucht, die häufiger beim Mann vorkommt, unter den Berufen vor allem die Gastwirte, Fleischer, Brauknechte usw. betrifft, ein gesundes Hautkolorit mit gut durchbluteten Schleimhäuten zeigt, sowie lange Zeit hindurch der subjektiven Beschwerden entbehrt; andererseits den anämisch-schlaffen Typus, der öfter bei Frauen beobachtet wird und sich durch blasse Hautfarbe, müden Gesichtsausdruck, apathisches Wesen sowie ausgeprägtes Krankheitsgefühl auszeichnet.

Der Fette hat häufig schwach entwickelte Muskulatur und klagt daher oft vor allem über abnorme Ermüdbarkeit. Er gerät leicht außer Atem, was teils auf der infolge seines Körpergewichtes bestehenden dauernden absoluten Mehrbeanspruchung seines noch normalen Herzens beruht, teils aber in den früher bei Besprechung des sog. Fettherzens (S. 161) erwähnten Momenten begründet ist. Eine auffallende Eigentümlichkeit des Fettleibigen ist seine Neigung zum Schwitzen. Diese beruht in der ihm eigenen Erschwerung der Wärmeabgabe infolge des dicken Fettpolsters, während er auf der anderen Seite infolge der abnorm großen Nahrungsmengen, die er zu sich nimmt, größere Wärmemengen als der Normale bildet; das gilt vor allem vom Eiweiß infolge seiner starken spezifisch-dynamischen Wirkung (vgl. S. 456). Es erklärt sich auch die erhebliche Störung des Allgemeinbefindens der Fettsüchtigen bei warmer und namentlich schwüler Witterung (d. h. bei geringem Sättigungsdefizit der Luft).

Die Untersuchung des Zirkulationsapparates ergibt häufig zunächst normale Verhältnisse. Die Herzdämpfung ist in der Regel infolge des starken Fettpolsters perkutorisch nicht genau abgrenzbar. Bezüglich der Röntgenuntersuchung vgl. S. 161. Der plethorische Typ zeigt öfters Blutdrucksteigerung. In diesen Fällen findet man auch Hypertrophie des linken Ventrikels. Arteriosklerose sowie insbesondere Coronarsklerose ist eine häufige Begleiterscheinung der Fettsucht. Seitens des Respirationsapparates ist abgesehen von der schon nach geringfügigen Anlässen eintretenden Dyspnoe der Hochstand des Zwerchfells als Folge des abnormen Fettgehaltes des Abdomens sowie ferner die Neigung der Fettsüchtigen zu Bronchialkatarrhen zu erwähnen; diese dürfte mit der erschwerten Lungenventilation der Patienten in Zusammenhang stehen. Oft ist die Bronchitis allerdings schon ein Zeichen von Stauung, d. h. von beginnender Herzinsuffizienz. Störungen des Verdauungsapparates fehlen häufig vollkommen. Oft zeichnen sich die Fette durch einen besonders guten Magen und vortrefflichen Appetit aus. Häufig besteht Neigung zu Obstipation. Die Haut zeigt in der Regel abnorm starke Hautalgsekretion, die in Verbindung mit der lebhaften Transpiration die Neigung der Kranken zum Wundwerden der Haut, namentlich im Bereich der Hautfalten (Intertrigo) erklärt. Varicen und geringes Knöchelödem sind häufige Erscheinungen. Daß manche Fettsüchtige, wie erwähnt, große Mengen von Wasser in ihren

Gewebe ohne sichtbare Ödeme retinieren, lehrt die bei Besserung des Zustandes mitunter erfolgende Harnflut.

Die Gefahren, denen der an Fettsucht Leidende ausgesetzt ist, drohen in erster Linie von seiten des Herzens, das aus den angeführten Gründen leicht zum Versagen neigt. Eine große Zahl von Fettsüchtigen endet als Herzranke. Außerdem zeichnet sich der Fette durch eine auffallend geringe Widerstandsfähigkeit namentlich Infektionskrankheiten gegenüber aus. Jede derartige Erkrankung hat daher bei ihm eine ernste Prognose. Das mangelhafte Wärmeabgabevermögen erklärt die schädliche Wirkung eines warmen und feuchten Klimas, dem der Fettsüchtige leicht infolge von Wärmestauung (Hitzschlag) erliegt. Häufige Komplikationen der Fettsucht sind abgesehen von der Arteriosklerose Diabetes, Gicht sowie Schrumpfniere.

Die Therapie der Fettsucht ist in der Hauptsache eine diätetische, außerdem in den endokrinen Fällen eine hormonale Behandlung. Die diätetische Behandlung besteht in sog. Entfettungskuren. Ihr gemeinsamer leitender Gedanke ist eine allmähliche (nicht bruske!) Herabsetzung der Nahrungszufuhr unter Schonung des Eiweißbestandes des Körpers. Er besteht also im wesentlichen in Verminderung der KH und der Fette der Nahrung. Gleichzeitig versucht man, soweit der gesundheitliche Zustand der Patienten, insbesondere der Zirkulationsapparat es gestattet, die Zersetzungen im Körper durch dosierte Steigerung der Muskelarbeit und andere Maßnahmen zu vermehren. Der Zweck jeder Entfettungskur ist demnach, den Organismus zur Bestreitung seines Energiebedarfs zum Teil aus seinen eigenen Fettvorräten unter Vermeidung eines N-Verlustes des Körpers zu zwingen. Ein entscheidendes Kriterium für die richtige Handhabung einer Kur ist neben der Abnahme des Körpergewichtes die Tatsache, daß der Patient sich im Verlaufe der Behandlung frischer und leistungsfähiger als vorher fühlt, während das Gegenteil auf eine fehlerhafte Methode schließen läßt und deren Änderung erheischt. Manche von den Patienten auf eigene Faust ohne ärztliche Kontrolle durchgeführte Entfettungskuren ziehen schwere gesundheitliche Schädigungen (namentlich des Herzens) nach sich.

Die zahlreichen verschiedenen Entfettungsmethoden verfolgen, soweit sie rationell sind, das Prinzip, eine sättigende und genügend eiweißenthaltende Kost zu verabreichen. Ersteres wird entweder durch voluminöse, aber calorienarme KH-Träger oder durch Fett erreicht, das bereits in geringen Mengen stark sättigend wirkt. Doch zieht man es neuerdings vor, das Fett in der Kost möglichst zu reduzieren. Der Eiweißgehalt der Kost soll nicht unter 80 g p. die sinken. Im übrigen ist, gleichgültig ob die Entfettung in strenger oder milder Form vorgenommen wird, stets individuell zu verfahren.

Zu voluminösen Nahrungsmitteln, die zum Füllen des Magens geeignet sind, ohne den Fettansatz zu begünstigen, gehören vor allem grobe cellulosereiche Brotsorten wie Roggenschrotbrot, Kommißbrot, Grahambrot, ferner die Gemüse ohne oder nur mit ganz wenig Fett zubereitet, weiter die Kartoffeln, die sogar den Hauptbestandteil mancher Entfettungskuren, z. B. der Rosenfeldschen Kartoffelkur bilden. Auch eignen sich die verschiedenen Obstarten mit



Ausnahme der stark zuckerhaltigen Früchte zu dem gleichen Zweck. Zur Süßung der Speisen, der Kompotts usw. dient Saccharin (das aber nicht gekocht werden darf!).

Bei der dem Patienten verordneten Kostform begnüge man sich nicht mit allgemeinen summarischen Ratschlägen, sondern gebe eingehende, sowohl die Art und Menge als auch die Zubereitungsform der Speisen erläuternde Vorschriften. Bei den sog. milden Entfettungskuren wird der Patient auf  $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{3}$  der auf sein Gewicht berechneten notwendigen Calorienzahl gesetzt. Die früher üblichen Entfettungsmethoden zeichnen sich durch große Einseitigkeit der Kostform aus; ihre Durchführung für längere Zeit stößt auf Schwierigkeiten (Widerwillen, Verdauungsstörungen). Hierzu gehören die Bantingkur (vorwiegende Fleischdiät mit starker Reduktion der Fette und KH) und die Ebsteinsche Kur (Eiweiß-Fettdiät; Ausschluß von Zucker und Kartoffeln; erlaubte Brotmenge 80—100 g). Das Wesentliche der Örtelschen und Schweningerschen Kur besteht in größtmöglicher Einschränkung der Flüssigkeitszufuhr in der Kost (die in Bayern entstandene Kur hatte wohl vor allem den übermäßigen Bierkonsum im Auge); außerdem methodisch angewendete körperliche Bewegung (s. unten). — Hungertage wie bei Diabetes bzw. die ähnlich wirkenden reinen Milchkuren ( $1\frac{1}{2}$ —2 Liter Milch pro Tag) sind immer nur für ganz kurze Perioden von 1—2 Tagen durchführbar. Doch werden sie als Ergänzungen anderer Entfettungskuren bisweilen angewendet. Die rein vegetarischen Entfettungskuren sind unzweckmäßig oder sogar schädlich, da hier die Kost zu eiweißarm ist.

Viel zweckmäßiger sind die modernen Entfettungskuren, die weniger einseitig aufgebaut sind und daher einen weniger forcierten Charakter tragen; sie lassen sich daher wesentlich längere Zeit durchführen, zumal wenn man sie durch vorübergehende Einschaltung von Zulagen modifiziert und sie auf diese Weise in beliebiger Form für kürzere oder längere Perioden mildert. Hierbei wird neben den früher genannten Grundsätzen das Kostmaß genau nach seinem zahlenmäßigen Calorienwert geregelt.

Sehr empfehlenswert ist das von Umber ausgearbeitete sog. Kostgerüst: Morgens 200 ccm Kaffee oder Tee, 20 ccm Milch, 50 g Simons- oder Schrotbrot, 30 g Weißbrot (Semmel); vormittags 100 g Obst (Äpfel); mittags 200 g Fleisch gebraten, 200 g Gemüse in Salzwasser gekocht, 80 g Obst; nachmittags 150 ccm Kaffee, 20 ccm Milch; abends 100 g Fleisch, 100 g Gemüse, 20 g Simonsbrot, 200 ccm Tee; vor dem Schlafen 100 g Obst (insgesamt 881 Calorien). Änderungen bzw. Zulagen kann man nach Maßgabe der Umberschen Calorienäquivalenzzahlen je nach dem Verlauf der Kur bzw. den individuellen Wünschen des Patienten regeln. Es entsprechen 100 Calorien 80 g Rostbeef = 200 g Austern = 40 g Weißbrot, Grauhambrot oder Schwarzbrot = 30 g Zwieback =  $12\frac{1}{2}$  g Butter = 20 g Schweizer- oder Holländer Käse = 25 g Zucker = 100 g Kartoffeln = 30 g Reis, Buchweizen, Linsen oder Bohnen = 20 g Hafermehl oder Weizenmehl = 200 g Äpfel = 150 g Apfelbrei = 500 g Preiselbeeren = 150 g Milch = 150 g Wein = 30 g Kognak oder Kirsch; Flüssigkeitszufuhr  $1-1\frac{1}{4}$  Liter oder weniger. Gewürze und NaCl sind in der Kost zur Verringerung des Durstes einzuschränken. — Zu einem schwierigen Problem kann die Entfettung bei gleichzeitig bestehender Gicht oder bei Diabetes werden.

Vorteilhaft unterstützt wird die diätetische Kur durch den Gebrauch von Mineralwässern, so den  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ -haltigen Quellen von Karlsbad, Marienbad, Kissingen, Mergentheim; Apenta, ferner Homburg (NaCl); die Trinkkuren eignen sich namentlich für die mit Obstipation einhergehenden Fälle. Doch soll auch hier ärztliche Kontrolle den Patienten vor übertriebenen Abführkuren schützen.

Eine große Rolle spielt ferner die physikalische Behandlung in Form methodischer körperlicher Bewegung sowie in geringerem Maße die Bäderbehandlung. Indikation und Dosierung beider Heilfaktoren hat vor allem streng die Leistungsfähigkeit des Zirkulationsapparates zu berücksichtigen. Sie sind hauptsächlich bei dem plethorischen Fettsuchtstypus und der Trägheitsfettsucht am Platz. Körperliche Bewegung in dosiertem Maß kommt in der Form von Gehübungen, zum Teil auf leicht ansteigendem Gelände (Örtels Terrainkur), weiter als leichter Sport sowie als Zimmergymnastik in Betracht; weitere passive Betätigung der Muskeln in erster Linie durch die oft sehr günstig wirkende Massage sowie die

neuen elektrischen Methoden von Bergonié sowie Schnee (Degrassator). Kühle Bäder (Sole- und CO<sub>2</sub>-Solbäder) unter 35° mit Maß angewendet, können ebenfalls zur Entfettung beitragen. Zu warnen ist dagegen vor den in Laienkreisen beliebten Schwitzprozeduren, die eine erhebliche Belastung des Zirkulationsapparates bedeuten.

Die Hormonpräparate, speziell Schilddrüsenpräparate, die bei der Mastfettsucht nicht indiziert sind, erzielen dagegen bei der endogenen Fettsucht ausgezeichnete Erfolge, wobei charakteristischerweise oft trotz reichlicher Nahrungszufuhr Fettabnahme ohne gesundheitliche Schädigung erfolgt. Dosierung der Schilddrüsentabletten (Merck-Darmstadt): pro dos. 0,25—0,3 bei Erwachsenen, 0,1—0,15 bei Kindern; Beginn mit 2 mal tägl. ½ Tabl., steigend bis auf 3—4 Tabl. täglich 4—6 Wochen lang, dann Pause von der gleichen Dauer. Der Erfolg der Thyreoidinbehandlung äußert sich nebenbei häufig in starker Harnflut. Die Schilddrüsen-therapie bedarf fortlaufender ärztlicher Kontrolle. Die Kur ist sofort abbrechen bei stärkerem Ansteigen der Pulsfrequenz sowie bei Auftreten anderer S. 438 genannter Reizerscheinungen. Ein Teil der zur Entfettung angepriesenen Geheimmittel enthält als wirksames Prinzip Schilddrüsenpräparate. Bei hypophysärer und ovarieller Fettsucht haben Hypophysen- bzw. Ovarialpräparate (vgl. S. 477 u. 451) häufig guten Erfolg.

Seltene Anomalien, die in einer pathologischen Verteilung des Fettpolsters bestehen, sind die Derkumsche Krankheit sowie die sog. Lipodystrophie.

Die **Derkumsche Krankheit** oder *Adipositas dolorosa* kommt vor allem bei adipösen Weibern vor und besteht in lokalen lipomartigen Fettgewebswucherungen, die teils auf Druck, teils auch spontan schmerzhaft sind; Gesicht sowie Hände und Füße bleiben frei. Häufig bestehen gleichzeitig hochgradige Asthenie sowie mitunter psychische und nervöse Störungen. Das Leiden beruht höchstwahrscheinlich auf endokrinen Störungen. Therapeutisch bewährt sich oft die Behandlung mit Schilddrüsenpräparaten.

Die **Lipodystrophia progressiva** besteht in einem eigentümlichen, in den Kinderjahren beginnenden außerordentlich hochgradigen Schwund des Fettpolsters der oberen Körperhälfte, speziell des Gesichtes, das schließlich ein totenkopffartiges Aussehen annimmt. Dagegen zeigt die untere Körperhälfte entweder ein normales Fettpolster oder sogar eine adipöse Vermehrung desselben, so daß sich dann ein grotesker Kontrast zwischen dem gespenstisch mageren Gesicht und dem fett-süchtigen Unterkörper ergibt.

### Erkrankungen des intermediären Eiweißstoffwechsels.

Die seltene **Alkaptonurie** beruht auf einer Störung des intermediären Eiweißstoffwechsels. Sie tritt meist familiär auf, besteht während des ganzen Lebens und macht häufig keine subjektiven Krankheitserscheinungen. Sie besteht in der Ausscheidung der sog. Homogentisinsäure durch den Harn, einem N-freien Hydrochinonderivat (Hydrochinonessigsäure), das als normales Abbauprodukt aus Tyrosin und Phenylalanin entsteht, vom gesunden Organismus aber verbrannt wird, wie Fütterungsversuche mit Homogentisinsäure lehren. Die Menge der ausgeschiedenen H. steigt bei Eiweißnahrung an. Durch Verfütterung sehr großer Tyrosinmengen gelingt es, auch beim Gesunden Alkaptonurie zu erzeugen. Beim Stehen des Harns an der Luft sowie vor allem beim Versetzen desselben mit Alkali tritt intensive Dunkelbraunfärbung des Harns auf; auch die Harnflecken der Wäsche nehmen beim Waschen mit (alkalischer) Seife eine Braunfärbung an. Der Harn reduziert Fehlingsche Lösung sowie bereits in der Kälte ammoniakalische AgNO<sub>3</sub>-Lösung im Gegensatz zum Zuckerharn, von dem er sich ferner durch das Fehlen des Gärungsvermögens sowie sein optisch inaktives Verhalten unterscheidet. Bisweilen findet sich ferner eine eigentümliche, mitunter durch die Haut durchschimmernde blauschwarze Verfärbung des Ohrknorpels, die sog. Ochronose. Auch kommen Schwarzfärbung des Cerumens sowie grünlichbraune Verfärbung des Talgdrüsensekretes, namentlich in der Achselhöhle, endlich dunkle Pigmentflecke im temporalen Teil der Sclera bulbi vor. In einzelnen Fällen beobachtet man außerdem chronische Gelenkentzündungen (*Arthritis alkaptonurica*),

die auf die Ablagerung der Homogentisinsäure im Gelenkknorpel zurückgeführt werden.

Die **Cystinurie** ist ebenfalls eine harmlose Stoffwechselanomalie, die gelegentlich auch bei mehreren Mitgliedern derselben Familie auftritt. Das Cystin ist die einzige bekannte schwefelhaltige Aminosäure, die im Eiweißmolekül präformiert vorhanden ist und normal unter Oxydation des S zu Sulfat weiter abgebaut wird. Das schwer lösliche Cystin fällt im Harn in charakteristischen Krystallen aus (Nachweis vgl. S. 420) und bildet mitunter den Anlaß zu Konkrementen. Bei manchen Fällen von Cystinurie hat man gleichzeitig die Ausscheidung anderer Aminosäuren wie Leucin und Tyrosin, sowie verschiedener Diamine wie Putrescin und Cadaverin konstatiert. Diese sog. **Diaminurie** hat lediglich theoretische Bedeutung.

### Diabetes insipidus.

Der Diabetes insipidus stellt eine Anomalie des Wasserstoffwechsels dar. Im wesentlichen äußert sich die Krankheit durch dauernde Entleerung sehr großer Harnmengen sowie durch großen Durst. Der Harn enthält im Gegensatz zum Diabetes mellitus keine pathologischen Bestandteile. An den Nieren fehlen anatomische Veränderungen.

Die Krankheit kommt in den verschiedensten Lebensaltern, am häufigsten zwischen dem 15. und 30. Jahr vor, bei Männern häufiger als bei Frauen. In einzelnen Fällen tritt sie hereditär auf. Mitunter beginnt sie akut. Die Ätiologie ist bisher nicht einheitlich geklärt. Es gibt eine Krankheitsform, die sich scheinbar idiopathisch, d. h. ohne erkennbare äußere Ursache entwickelt. Außerdem kommen Fälle vor, die sich im Anschluß an akute Infektionskrankheiten wie Scharlach, Diphtherie, Polyarthrit, Grippe usw. entwickeln. Schließlich tritt die Krankheit auch im Verlauf von Gehirnleiden wie Meningitis, Hydrocephalus und ferner insbesondere bei Erkrankungen der Hypophyse (Akromegalie, Dystrophia adiposogenitalis) auf, wobei die Lues als ätiologischer Faktor eine nicht unwichtige Rolle spielt.

Im Krankheitsbild steht im Vordergrund die Polyurie. Es werden in 24 Stunden viele Liter (5—10, oft mehr) eines dünnen, fast farblosen Harnes ausgeschieden. Sein spezifisches Gewicht ist stets sehr niedrig, bisweilen überschreitet es nur ganz wenig die Zahl 1000<sup>1)</sup>. Der Gehalt an festen Harnbestandteilen ist außerordentlich gering; die Gefrierpunktsdepression kann bis auf  $-0,2^{\circ}$  sinken. Die Polyurie wird ermöglicht durch eine entsprechend gesteigerte Wasseraufnahme (Polydipsie). Die Polyurie ist nachts oft stärker als tagsüber ausgeprägt. Die Schweißsekretion ist vermindert, desgleichen die Abgabe von Wasserdampf durch die Haut. Die inneren Organe lassen einen pathologischen Befund vermissen; insbesondere fehlt Herzhypertrophie trotz der enormen vom Zirkulationsapparat jahrelang zu bewältigenden Flüssigkeitsmengen, ebenso fehlt Blutdrucksteigerung. Die gelegentlich an den Augen wahrnehmbaren Veränderungen (Hemianopsie) erklären sich aus den oben genannten Hypophysenveränderungen. Die Kranken leiden in der Regel vor allem unter dem Zwang, fortwährend Harn zu lassen und Wasser zu trinken, wodurch u. a. die Nachtruhe dauernd gestört

<sup>1)</sup> Selbstverständlich muß das spez. Gew. stets etwas höher als 1000 sein, da die Niere nicht destilliertes Wasser (= 1000) zu produzieren vermag!

wird. Öfter werden Störungen der Sexualfunktion (Impotenz, Amenorrhöe) beobachtet. In zahlreichen Fällen wird das Krankheitsbild noch von funktionell-psychopathischen Zügen überlagert. Dies kann man u. a. dort mit Wahrscheinlichkeit annehmen, wo die Harnmengen 20 Liter und mehr erreichen (beobachtet wurden bis zu 43 Liter).

Einblick in die Pathogenese des Leidens ergeben Untersuchungen über den Ausscheidungsmodus der harnfähigen Stoffe durch die Niere. Die Ausscheidung der Gesamtmenge derselben in 24 Stunden verhält sich wie beim Normalen. Im Gegensatz zu diesem können jedoch die harnfähigen Stoffe stets nur in sehr geringer Konzentration, d. h. mit einer großen Wassermenge ausgeschieden werden. Es wirken also NaCl und die Eiweißschlacken hier als Diuretica, was beim Gesunden nicht der Fall ist. Der Diabetes insipidus beruht demnach auf der Unfähigkeit der Niere, einen konzentrierten Harn zu produzieren. Damit stimmt die Tatsache überein, daß eine an Salzen und Harnschlacken arme Kost ein Absinken der Harnmenge prompt zur Folge hat und der Durst nachläßt. Zugleich geht daraus hervor, daß beim D. insip. die Polyurie der primäre Vorgang ist, während die Polydipsie erst eine sekundäre Folge der vermehrten Wasserausscheidung darstellt. Entzieht man einem derartigen Kranken die Wasserzufuhr, so treten alsbald ernste Symptome von Bluteindickung mit starkem Ansteigen des Blut-Trockenrückstandes, Unruhe, quälender Durst, Kopfschmerzen usw. ein, die nach Wasserzufuhr wieder schwinden. Manches spricht dafür, daß der primäre Sitz der Diabetes-insipidus-Polyurie, wenigstens in zahlreichen Fällen, in der Hypophyse bzw. in der ihr benachbarten Hirnregion zu suchen ist. Von dem echten D. insip. streng zu unterscheiden ist die auf rein psychopathischer Grundlage beruhende primäre Polydipsie, die man mitunter bei Hysterischen findet. Läßt man derartige Patienten dursten oder gibt man zur Kost eine Zulage von 10 g NaCl, so liefern sie einen konzentrierteren Harn, wozu der Kranke mit Diabetes insipidus unfähig ist. Nephropathien mit Konzentrationsunfähigkeit der Niere verhalten sich ähnlich, jedoch scheiden sie im Gegensatz zum D. insipidus NaCl verzögert aus.

Therapie: In erster Linie versuche man diätetisch, d. h. vor allem durch Einschränkung der Salzzufuhr die Polyurie herabzusetzen (lacto-vegetabilische Kost). Einschränkung der Flüssigkeitszufuhr ist dagegen verfehlt (s. oben). In manchen Fällen hilft die subcutane Verabreichung von Hypophysenpräparaten wie z. B. Pituglandol (vgl. S. 447). Vereinzelt hat Strychnin. nitric. (subcut. pro die bis 0,005, steigend bis 0,01) Erfolge. In den Fällen von hysterischer Polydipsie ist die Einschränkung der Trinkmenge sowie psychische Behandlung, evtl. Hypnose geboten.

### **Auf ungenügender Ernährung beruhende Krankheiten.**

Verminderung der Nahrungszufuhr unter das für das Stoffwechsellgleichgewicht notwendige Minimum führt zu dem bekannten Bilde der allgemeinen Unterernährung, die mit Einschmelzung von Körpergewebe, Gewichtsabnahme, Sinken der physischen und geistigen Leistungsfähigkeit und den für den Hunger charakteristischen Änderungen des Stoffwechsels (vgl. S. 461) einhergeht. Eine besondere Form eines chronischen Hungerzustandes ist die im Weltkriege beobachtete sog. Ödemkrankheit, die außer durch wassersüchtige Schwellungen durch Bradycardie ausgezeichnet war und sich bei calorisch unzureichender wasser- und salzreicher Kost entwickelte.

Daß es aber auch einen qualitativen Hungerzustand gibt, lehrt das Beispiel der

### Avitaminosen.

Unter Avitaminosen versteht man Krankheitszustände, die auf einer qualitativ fehlerhaften Ernährung, insbesondere ungenügender Zufuhr der als Vitamine bezeichneten Stoffe zurückgeführt werden. Vgl. auch S. 455.

Die Forschung der jüngsten Zeit hat mehrere Arten von Vitaminen kennen gelehrt. So unterscheidet man ein Vitamin A, das in Fett löslich ist und einmal in den tierischen Fetten, speziell in Sahne und Butter (dagegen nicht in den Kunstfetten), ferner im Hühnerei und in großen Mengen im Lebertran, andererseits in den grünen Gemüsen, vor allem in Spinat und Salat reichlich vorhanden ist. Die Provenienz des Vitamins A in den animalischen Fetten wird aus der Ernährung der Tiere mit Grünfütter erklärt. Das sog. Vitamin B ist wasserlöslich und findet sich am reichlichsten in der Bierhefe, ferner in den äußeren Hüllen (Kleie) und im Keimling der Körnerfrüchte, in großer Menge weiter in den Leguminosen, in den meisten Gemüsen, in manchen Früchten, speziell in der Tomate, ferner in der Milch, im Hühnerei sowie manchen tierischen Eingeweideorganen, dagegen nicht im Muskelfleisch. Das Vitamin C findet sich in frischem Weißkohl, Löwenzahn, Wasserkresse, frischen Kartoffeln, in zahlreichen Früchten, speziell in Citronen und Apfelsinen, weiter in Getreidekeimlingen, dagegen nicht im gewöhnlichen Getreidesamen, ferner in der Milch, im Hühnerei usw. Auch bei diesem Vitamin besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Gehalt desselben in der zur Tierfütterung dienenden Nahrung und der Vitaminmenge in den tierischen Organen bzw. Produkten (Milch).

Praktisch von großer Bedeutung ist die Tatsache, daß die Vitamine durch längere Erhitzung (Kochen, Konserven), zum Teil auch durch Trocknung der Nahrungsmittel und durch längeres Aufbewahren an Wirksamkeit verlieren bzw. vollständig zerstört werden.

Zu den Avitaminosen, deren Ätiologie zweifelsfrei festgestellt ist, gehören der an anderer Stelle besprochene Skorbut (S. 273) und die Möller-Barlowsche Krankheit (S. 275), ferner die Beri-Beri.

Die **Beri-Beri** oder **Kakke** ist eine Krankheit, die in Ländern beobachtet wird, wo der Reis einen Hauptteil der Nahrung bildet, die aber nur dann auftritt, wenn ausschließlich sog. polierter oder geschälter Reis (d. h. nach Entfernung der das Vitamin B enthaltenden Reiskleie) genossen wird. Die sich hierbei entwickelnde chronische Krankheit ist charakterisiert durch eine fortschreitende Polyneuritis mit Sensibilitätsstörungen, Lähmungen, Atrophien, zum Teil Ödemen und hochgradiger Herzdilatation. Die Therapie besteht in rechtzeitiger Zufuhr von gemischter Kost mit reichlichem frischem Gemüse. Experimentell gelang es bei Hühnern durch Verfütterung von poliertem Reis ebenfalls eine Polyneuritis zu erzeugen.

Noch für eine Anzahl anderer Krankheiten hat man neuerdings den Mangel an bestimmten Vitaminen in der Nahrung verantwortlich gemacht; doch bedürfen diese Fragen noch weiterer Klärung.

## Krankheiten des Bewegungsapparates.

### Krankheiten der Muskeln.

#### Der Muskelrheumatismus.

Der Muskelrheumatismus (*Myalgia rheumatica*) ist ein überaus häufiges Leiden, das sich in Schmerzen in einzelnen Muskeln ohne nach-

weisbaren objektiven Befund äußert. Bezeichnend für seine Entstehung ist u. a. die große Rolle von Witterungsschädlichkeiten, insbesondere der Erkältung, welche sich wenn auch nicht immer als ursächlicher, so doch sehr oft als auslösender Faktor geltend macht.

Die akute Form der Krankheit tritt oft plötzlich und völlig unvermutet unter heftigen Beschwerden auf, um alsbald wieder zu verschwinden. In zahlreichen Fällen besteht eine ausgesprochene, sich häufig über einen großen Teil des Lebens erstreckende Neigung zu Rückfällen, welche in unregelmäßigen Intervallen wiederkehren. Außer der akuten bzw. rezidivierenden Form gibt es ferner einen chronischen Muskelrheumatismus, bei dem viele Jahre lang, bei manchen Kranken dauernd bis zum Lebensende die charakteristischen rheumatischen Beschwerden in wechselndem Grade bestehen.

**Symptomatologie:** Hauptmerkmal der Krankheit ist der Schmerz in einem Muskel oder einer Muskelgruppe. Er wird als ziehend oder reißend bezeichnet und ist meist um so intensiver, je akuter das Leiden auftritt. In der Regel ist die Intensität nicht eine dauernd gleichmäßige, sondern sie zeigt Pausen bzw. Abschwächungen, um namentlich bei Bewegungen der befallenen Muskeln mit erneuter Heftigkeit aufzutreten. Der Kranke ist daher ängstlich bemüht, das erkrankte Muskelgebiet ruhig zu stellen. Druck auf den Muskel, ferner Ermüdung sowie Kälte wirken verschlimmernd, während Wärme in der Regel den Schmerz mildert. Die Haut über dem befallenen Muskel ist an dem Schmerz nicht beteiligt.

Die Lokalisation der Myalgien, speziell des akuten Rheumatismus zeigt gewisse Prädilektionsgebiete. Häufige Lokalisationsformen sind die Omalgie oder der Schulterrheumatismus, bei dem der Muscul. deltoideus Sitz der Erkrankung ist, weiter die Myalgia cervicalis bzw. der Torticollis rheumaticus, wobei Trapezius, Sternocleidio bzw. Splenius befallen sind, der Kopf steif gehalten wird und nach der gesunden Seite gedreht ist; endlich die Lumbago (Hexenschuß) mit heftigen Schmerzen in der Lendenmuskulatur, die den Patienten zu fast jeder Bewegung des Rumpfes, insbesondere aber zum Bücken unfähig machen. Seltener sind andere Lokalisationen; so können auch die Muskeln des Brustkorbes sowie des Bauches befallen werden. Bei genauerer Palpation zeigt sich, daß es häufig weniger die Muskelbäuche als vielmehr die Ansätze der Muskeln an den Knochen, ferner die Fascien und Sehnen sind, die besonders druckempfindlich sind. Von objektiv nachweisbaren Veränderungen am Muskel läßt sich bei akuter Myalgie häufig eine krampfartige Zusammenziehung des Muskels feststellen, die mitunter entsprechende Zwangshaltungen bewirkt, so die Skoliose der Lendenwirbelsäule bei Lumbago.

Das Allgemeinbefinden beim akuten Muskelrheumatismus ist häufig, besonders bei kräftigen Individuen nicht wesentlich beeinträchtigt. In anderen Fällen besteht vorübergehend geringe Temperatursteigerung sowie leichtes Krankheitsgefühl, namentlich in den Fällen, in denen auch sonst die eine „Erkältung“ begleitenden Symptome wie Schnupfen, Gliederziehen, mitunter eine leichte Angina bestehen. In

wenigen Tagen pflegt der Kranke wieder völlig hergestellt zu sein; die Muskeln sind bei Bewegungen und bei Druck wieder völlig schmerzfrei und funktionstüchtig. Zahlreiche akute Myalgien kommen überhaupt nicht in ärztliche Behandlung. Komplikationen des Leidens kommen nicht vor.

Die chronischen Myalgien sind entweder ebenfalls in einer bestimmten Muskelgruppe fixiert oder häufiger handelt es sich um sog. auch bei der akuten Form vorkommende vagierende, von Muskel zu Muskel ziehende Schmerzen (woher der Laienausdruck „Fluß“ = Rheuma stammt). Das von verschiedenen Seiten und namentlich von Masseuren behauptete Vorkommen kleiner, im rheumatisch erkrankten Muskel fühlbarer Knötchen konnte anatomisch nicht bestätigt werden. Wenn überhaupt vorhanden, dürften sie auf vorübergehenden lokalen Kontraktionszuständen der Muskulatur beruhen.

Ätiologie und Pathogenese des Muskelrheumatismus: Eine gewisse individuelle Disposition zu rheumatischen Erkrankungen ist unverkennbar; sie dokumentiert sich u. a. durch ihre Vererbbarkeit als konstitutioneller Faktor. Zu einem nicht geringen Teil sind es Individuen mit kräftig entwickelter Muskulatur, die an Rheumatismus leiden. Sicher ist ferner, daß eine Reihe äußerer Faktoren auf die Erkrankung begünstigend wirkt. Dazu gehören an erster Stelle die Einwirkung von Kälte, Nässe und Zugluft; viele Rheumatiker sind besonders kälteempfindlich. Manche Berufe wie die der Landarbeiter, Förster, Wäscherinnen stellen daher ein besonders großes Kontingent zu der Krankheit. Auch starke mechanische Inanspruchnahme einer Muskelgruppe disponiert in manchen Fällen zu Myalgie; extreme Überanstrengung und Ermüdung einzelner Muskeln führt nicht selten zu Beschwerden, die sich von der rheumatischen Myalgie nicht unterscheiden lassen. Beispiele hierfür sind das sog. Turn- resp. Reitweh. Manche Myalgie entwickelt sich im Anschluß an eine plötzliche heftige Zerrung eines Muskels, so insbesondere die Lumbago (das sog. Verheben). Das eigentliche Wesen der Krankheit ist bisher nicht geklärt. Die anatomischen Untersuchungen ergaben stets einen negativen Befund. Nach der einen Theorie handelt es sich um eine Neuralgie der sensiblen Muskelnerven, nach einer anderen Hypothese um eine unter dem Einfluß der Kälte vorübergehende Änderung des kolloidalen Zustandes der Muskulatur.

Die Diagnose Muskelrheumatismus kann überaus einfach sein, namentlich bei der Lokalisation an den Extremitäten. Doch sei man auch in den scheinbar vollständig klar liegenden Fällen stets darauf bedacht, organische Erkrankungen auszuschließen. In Betracht kommen myositishe Prozesse (vgl. unten), ferner Gelenkaffektionen, Neuralgien und Neuritiden sowie Erkrankungen der Blutgefäße, speziell Thrombosen. Zweifel an der Diagnose muß u. a. die circumscribed Fixation des Schmerzes an einer bestimmten Stelle erwecken. Praktisch außerordentlich wichtig ist die Erfahrung, daß häufig zunächst ein Rheumatismus längere Zeit vortäuscht wird, wo tatsächlich ernstere Krankheitsprozesse in der Tiefe bestehen. Das gilt vor allem z. B. von lumbagoartigen Beschwerden, die durch Reizung der hinteren Rückenmarkswurzeln bei spinalen Leiden hervorgerufen werden. Mancher sog. Brustmusklerheumatismus ist eine Pleurodynie, die auf pleuritischer Erkrankung beruht. Aneurysmen äußern sich bisweilen zunächst durch „rheumatische“ Be-

schwerden in Schulter und Arm. Auch der Herpes zoster bewirkt Schmerzen, die vor der Eruption der Hauteffloreszenzen einem akuten Rheumatismus ähnlich sehen können. Chronische sog. rheumatische Schmerzen in einer Extremität können auf einer schleichenden Osteomyelitis beruhen (Temperaturmessung, Röntgenbild, Blutuntersuchung!). Es ist somit die Zahl der differentialdiagnostischen Möglichkeiten nicht unerheblich.

Therapie des Muskelrheumatismus: Lokale Wärme in Form von Bettwärme, Watteeinpackungen, Thermophor, Heißluftkasten, Schwitzprozeduren (Dampfbad, Glühlichtbad), Schutz vor Abkühlung und Erkältung, namentlich vor Zugluft. Lokale Applikation von hautreizenden Medikamenten wie Campherspiritus, Liniment. saponato-camphorat (Opodeldoc), Senfpflaster, Rheumasan, Mesotan (aa mit Olivenöl, cave Dermatitis). Innerlich Salicylpräparate wie Natr. salicyl., Aspirin, Salipyryn, ferner Atophan und Novatophan (vgl. Gicht), Melubrin (mehrmals tägl. 1,0). Zu Morphinum entschieße man sich nur in besonderen Fällen (evtl. bei Lumbago). Beim chronischen Rheumatismus bewähren sich vor allem sachgemäß angewendete Massage sowie bestimmte Badekuren speziell Moorbäder (Polzin, Schmiedeberg b. Halle), Sandbäder (Köstritz), ferner Gastein sowie Trinkkuren in Baden-Baden, Oeynhausien, Wiesbaden (NaCl), ferner Schwefelbäder wie Aachen, Nenndorf, Wiessee. Diätetisch empfiehlt sich für chronische Rheumatiker, soweit es sich um plethorische Individuen oder Alkoholiker handelt, mäßige Lebensweise. Endlich versuche man durch vorsichtig dosierte Hydrotherapie die Kälteempfindlichkeit der Patienten zu bekämpfen.

### Polymyositis.

Unter Myositis versteht man eine mit anatomischen Veränderungen verlaufende herdartige Entzündung der Muskeln, die in ödematöser Schwellung, kleinzelliger Infiltration sowie Degeneration der Muskelfasern besteht.

Die seltene **Polymyositis** verläuft unter dem Bilde einer schweren fieberhaften Infektionskrankheit, die hauptsächlich jugendliche Individuen befällt. Die Krankheit äußert sich vor allem durch heftige Schmerzen und Druckempfindlichkeit der Muskeln der Extremitäten und des Rumpfes, während charakteristischerweise die Gelenke frei bleiben. Bei der sog. Dermatomyositis besteht gleichzeitig ein ungleichmäßig über den Körper verteiltes Ödem der Haut, das sich aber von dem gewöhnlichen Ödem durch seine derbe Beschaffenheit unterscheidet (Fingerdruck bleibt nicht bestehen); in manchen Fällen ist die Haut empfindlich und gerötet. Die Kranken werden bald hilflos und bettlägerig und leiden erheblich unter den heftigen Schmerzen. Die Dauer der Krankheit erstreckt sich oft auf viele Wochen, bei der chronischen Form sogar auf Monate und endet nicht selten tödlich infolge komplizierender Bronchopneumonien, namentlich bei den Fällen, in denen auch die Atem- und Schlingmuskeln von dem Krankheitsprozeß befallen werden. Die Ätiologie ist unbekannt. Differentialdiagnostisch kommt hauptsächlich die Trichinose in Frage (vgl. S. 124).

## Die chronischen Gelenkkrankheiten.

### Polyarthriti chronica deformans.

Das als chronischer Gelenkrheumatismus bezeichnete Leiden ist eine fortschreitende schleichend verlaufende Krankheit, die multiple Gelenke befällt und auf die Dauer zu schweren Funktionsstörungen derselben führt. Sie ist häufig und kommt nicht nur in höherem Alter, sondern



oft schon in mittleren Jahren, bisweilen bei jungen Leuten, vereinzelt sogar bei Kindern vor. Auch die gonorrhöische Arthritis kann in Form einer chronischen Polyarthritits auftreten. Bei Frauen wird vor allem die Zeit des Klimakteriums von der Krankheit bevorzugt.

Ätiologie: In manchen Fällen läßt sich ein Übergang von der akuten Polyarthritits in die chronische Erkrankung beobachten. Das weibliche Geschlecht erkrankt häufiger. Der das Leiden als Konstitutionskrankheit kennzeichnende Begriff des sog. Arthritismus dürfte nur für einzelne Fälle Gültigkeit haben, weil die dazu gehörigen Attribute wie Asthma, exsudative Diathese, Ekzeme usw. in der Anamnese keineswegs ausnahmslos zu konstatieren sind. Von der chronischen Gicht, der sie bisweilen ähnelt, ist die Krankheit grundsätzlich verschieden. Die Bezeichnung Arthritis pauperum (im Gegensatz zur Gicht) ist, soweit man damit die ursächliche Bedeutung ungünstiger hygienischer Momente ausdrücken wollte, unzutreffend, da die Krankheit in allen Bevölkerungsschichten vorkommt. Möglicherweise kommt u. a. Störungen des Stoffwechsels sowie endokrinen Faktoren eine gewisse Bedeutung zu. Neigung zur Vererbung der Krankheit läßt sich in manchen Fällen mit Sicherheit feststellen.

Anatomisch handelt es sich bei der chronischen Polyarthritits um einen primären Entzündungsprozeß der Synovia, der anfangs oft mit Exsudatbildung einhergeht, später stets zu Schrumpfung der Kapsel sowie oft zu Zerstörungen am Knorpel und Knochen führt. Der Knorpel fasert sich auf und wird atrophisch, der Knochen wird usuriert. Infolge der starken Kapselschrumpfung und durch den Narbenzug kommt es häufig einerseits zu Verödung der Gelenkhöhle mit Versteifung, Ankylose bzw. Synostose der Gelenke, andererseits oft zu pathologischen Luxations- bzw. Subluxationsstellungen der Gelenkenden. Der Knochen zeigt in der Nachbarschaft der befallenen Gelenke stets starke Atrophie. Dagegen fehlen die bei der Arthritis deformans regelmäßig vorhandenen und für diese charakteristischen starken Wucherungsprozesse am Knochen (s. u.); höchstens sind sie angedeutet. Die bei Gicht vorhandenen hellen Entkalkungsherde im Knochen fehlen stets.

Die hier beschriebene sog. chronische Polyarthritits destruens wurde, da sie häufig auch das periartikuläre Gewebe wie die die Gelenkkapsel umgebenden Bänder usw. befällt, auch als Periarthritits chronica destruens bezeichnet.

Das Krankheitsbild ist dadurch charakterisiert, daß zunächst vorzugsweise die kleinen Fingergelenke, zum Teil auch die Handgelenke in mehr minder symmetrischer Form erkranken; dann steigt die Krankheit allmählich von der Peripherie zu den mehr proximalen Gelenken auf. Man kann eine anfangs exsudative und eine von vornherein trockene Form (Arthritis sicca) unterscheiden. Fieber besteht entweder überhaupt nicht oder nur zeitweise in Form geringer subfebriler Steigerungen. Das Herz beteiligt sich bei der von vornherein chronisch verlaufenden Form im Gegensatz zur akuten Polyarthritits nicht; bei den aus der letzteren hervorgehenden Formen ist bisweilen ein Vitium cordis zurückgeblieben. Auch die übrigen inneren Organe zeigen keine Abweichung von der Norm.

Die Hauptbeschwerden der Patienten beziehen sich demnach auf die Gelenke, die in schwankendem Maß meist nicht beträchtliche Schmerzen

verursachen und vor allem zunehmende Versteifung und Störung der Funktion zeigen. Oft besteht ausgesprochene Abhängigkeit vom Wetter; namentlich bringt naßkalte Witterung meist eine Verschlechterung des Zustandes mit sich. Die Deformierung der Gelenke kann schließlich recht hochgradig werden. Die Finger zeigen an den Gelenken spindelförmige Anschwellungen. Bezeichnend ist u. a. die im Laufe der Zeit sich zeigende Neigung zu starker ulnarer Abduktion der Fingerphalangen in den Grundgelenken; auch kommen abnorme Hyperextensionsstellungen in den distalen Gelenken, Bajonettstellungen der Finger usw. vor. Häufig finden sich ziemlich hochgradige Muskelatrophien, namentlich auch an den *Mm. interossei*. Die Haut über den erkrankten Gelenken ist oft auffallend glatt und glänzend wie lackiert. Heberdensche Knoten (vgl. S. 479) werden auch bei dieser Gelenkerkrankung oft beobachtet. Auch sonst kann das ganze Bild große Ähnlichkeit mit den Gelenkveränderungen der chronischen Gicht haben. In selteneren Fällen greift der Prozeß auch auf die Wirbelsäule über (vgl. S. 495), so daß schließlich ein Zustand kläglicher Hilflosigkeit entsteht.

Große diagnostische Bedeutung hat die Röntgenphotographie. Bei den exsudativen Formen ist der Gelenkspalt zunächst erweitert. Bei der *Arthritis sicca* ist die als Folge der Kapselschrumpfung zu beobachtende Verschmälerung der Gelenkspalten charakteristisch; diese können sogar völlig aufgehoben sein. Ferner findet man Verbreiterung der Gelenkenden der Knochen, die aber in der Regel keine stärkere Osteophytenbildung erkennen lassen, sowie in schwereren Fällen die genannten Subluxationen. Stets besteht zugleich eine deutliche Atrophie der Knochensubstanz.

Therapie s. unten.

### Die *Arthritis deformans* (*Osteoarthritis deformans*)

ist ein mit Gelenkdeformationen einhergehendes chronisches Leiden, das primär von einer Erkrankung des Knorpels und Knochens seinen Ursprung nimmt und vor allem einzelne große Gelenke, das Hüft- und Kniegelenk, seltener das Schultergelenk ergreift.

Die Gelenke zeigen einerseits atrophische Veränderungen, andererseits vor allem Wucherungsprozesse am Knorpel und Knochen, wobei die am meisten in Anspruch genommenen Teile des Gelenks am stärksten betroffen werden. So kommt es sowohl zu Zerstörungen an den Gelenkflächen des Knorpels und Knochens, wie andererseits, namentlich am Rande der Gelenkflächen zu Knorpelwucherungen sowie zu Exostosen, die eine Verbreiterung der Gelenkflächen herbeiführen. Mitunter wird der Gelenkkopf regelrecht abgeschliffen, während andererseits die Pfanne durch überhängende gewucherte Massen sich verbreitert bzw. verschoben erscheint (sie „wandert“). Schließlich kommt es auch zur Vergrößerung der Gelenkzotten, die teilweise verknöchern und dann Anlaß zur Bildung freier Gelenkkörper geben können. So entstehen schließlich schwere Verunstaltungen des Gelenkes.

Die Ursachen des Leidens sind nicht genügend geklärt. In zahlreichen Fällen spielen statische Momente, z. B. fehlerhafte oder übermäßige Belastung des Gelenkes, wenn nicht eine ursächliche, so doch eine auslösende Rolle. Bemerkenswert ist u. a. das relativ häufige Vorhandensein von Veränderungen an den Kniegelenken bei stärker ausgeprägtem *Pes planus*. Sicher spielen auch Traumen eine ursächliche

Rolle. Bei der im Greisenalter vorkommenden Arthritis des Hüftgelenkes (*Malum coxae senile*) werden Ernährungsstörungen infolge von Arteriosklerose angenommen. Jedoch kommt die gleiche Coxitis auch in der Jugend vor.

Klinisch macht sich die Arthritis deformans durch mäßige Schmerzen, vor allem zuerst bei extremen, später auch bei geringfügigeren Bewegungen bemerkbar. Immerhin ist auffallend, daß bei der Erkrankung der großen Gelenke die Beweglichkeit in manchen Fällen lange Zeit relativ gut erhalten bleibt; in anderen Fällen kommt allerdings schon frühzeitig eine progrediente Funktionsstörung zur Geltung. Schließlich kann die Bewegungsfähigkeit des Gelenkes vollkommen aufgehoben sein. Schon im Beginn des Leidens läßt sich an derartigen Gelenken mit der aufgelegten Hand bei passiven Bewegungen feines, an das Knirschen von Sand erinnerndes Krepitieren oder grobes Krachen feststellen. Nicht selten entwickelt sich, namentlich im Kniegelenk ein seröses Exsudat, das eine Schwellung des Gelenks bewirkt, die aber im Laufe der Zeit häufig Schwankungen in ihrem Umfang zeigt. Die am meisten befallenen Gelenke sind das Kniegelenk, das Hüftgelenk und das Schultergelenk, während die kleinen Gelenke wesentlich seltener, unter ihnen hauptsächlich die Fußgelenke, speziell die Fußwurzelgelenke erkranken. Symmetrisches Befallenwerden der Gelenke gehört nicht zum Bilde dieser Arthritis, zumal die Krankheit oft monoartikulär auftritt. Die Kniegelenksarthritis tritt allerdings nicht selten beiderseitig auf. Im Laufe der Zeit stellt sich häufig wie bei der chronischen Polyarthritis eine Atrophie der benachbarten Muskulatur, eine Folge der Inaktivität derselben ein, so daß die etwa vorhandene Schwellung des Gelenkes dadurch stärker in die Augen fällt. Eine häufige Begleiterscheinung ist ferner, insbesondere bei der Arthritis der Kniee eine fortschreitende Beugecontractur, die schließlich die Gelenkenden in Winkelstellung fixiert, ohne daß eine Ankylose besteht. Derartige Kranke sind teils dauernd ans Bett gefesselt, teils bewegen sie sich auf Krücken.

Der Verlauf des Leidens ist in der Regel ein äußerst langwieriger; seine Dauer erstreckt sich meist über Jahre und Jahrzehnte. Allgemeinbefinden, Kräfte- und Ernährungszustand können lange Zeit befriedigend bleiben, soweit die Patienten sich ständiger Wartung und Pflege erfreuen. Auch bei dieser Krankheit besteht deutliche Abhängigkeit von der Witterung. Heilungen kommen bei einigermaßen fortgeschrittenen Fällen niemals, bei initialen Fällen recht selten vor.

Die **Therapie der chronischen Gelenkkrankheiten** besteht einmal in sorgfältiger allgemeiner Pflege (Ernährung, Hautpflege, zweckmäßige Lagerung der erkrankten Gelenke). Die sonst bei rheumatischen Erkrankungen wirksamen Medikamente, wie Salicylpräparate, Atophan usw. versagen häufig vollkommen oder bringen nur vorübergehend Linderung der Beschwerden, ohne das Fortschreiten des Leidens aufzuhalten. In einzelnen Fällen bewähren sich milde Arsen- sowie Jodkuren. Das vielfach empfohlene Fibrolysin (2,3 in Ampullen-Merck; jeden 2.—3. Tag eine Injektion, Kur von 20—30 Injektionen)

hat nur selten Erfolg. In vereinzeltten Fällen hat die intramuskuläre Verabreichung von Schwefel (Sulfur. praecipit. 0,2 in Olivenöl), in anderen Fällen die neuerdings eingeführte Proteinkörpertherapie, hier speziell in Form des Yatren-Caseins in vorsichtiger Dosierung günstige Wirkung bezüglich Verminderung der Schmerzen und Besserung der Beweglichkeit der Gelenke. Bei infektiös-gonorrhöischer Arthritis ist mitunter Gonococcenvaccine, speziell das Arthigon (0,5 steigend bis auf 2 ccm intramuskulär in 5—6 Injektionen) von Erfolg. Bei Verdacht auf endokrine Störungen, speziell Schilddrüseninsuffizienz, versuche man vorsichtig die Thyreoditherapie (vgl. S. 438). Sehr wichtig und heilsam ist die frühzeitig begonnene Massage, namentlich zur Verhütung der Muskelatrophien; auch kann eine behutsam durchgeführte Mechanotherapie (passive Bewegungen) die fortschreitende Versteifung günstig beeinflussen. Sehr gute Wirkungen entfalten oft die Anwendung von Heißluft, Sandbäder, Moor- und Fangopackungen und vor allem die Diathermie, in manchen Fällen die Biersche Stauung. Bei Neigung zu Contracturen (speziell der Kniegelenke) frühzeitige vorsichtige Extension. Ein seit alters hochgeschätzter Heilfaktor ist schließlich die Balneotherapie: Wiesbaden, Oeynhausen, Baden-Baden, Warmbrunn, Gastein, Teplitz i. Bö., Wildbad, Ragaz; Schwefelbäder: Aachen, Landeck, Wiessee, Baden (Schweiz), Schinznach, Pistyan, Trenczin-Teplitz (Ungarn); Moorbäder: Polzin, Franzensbad, Elster, Cudowa, Flinsberg, Aibling.

Die bei organischen Nervenleiden, speziell bei Tabes und Syringomyelie auftretenden schweren Gelenkveränderungen werden in den entsprechenden Abschnitten (S. 546 u. 553) besprochen.

### **Spondylitis und Spondylarthritis deformans resp. ankylopoetica (Chronische Wirbelsäulenversteifung oder Strümpell - Pierre - Marie - Bechterewsche Krankheit).**

Die chronische Versteifung der Wirbelsäule ist in mancher Beziehung den vorstehend beschriebenen Krankheitsbildern nicht nur nahe verwandt, vielmehr gehört sie, wie man heute annimmt, wahrscheinlich zu den gleichen Krankheitsgruppen. Es handelt sich um eine meist ohne stärkere Schmerzen verlaufende, langsam fortschreitende Versteifung, die teils die gesamte Wirbelsäule, teils größere Abschnitte derselben befällt; die anderen Gelenke des Körpers bleiben entweder vollkommen frei oder in anderen Fällen werden auch die großen Gelenke mit befallen (sog. Spondylose rhizomélique). Man unterscheidet zwei Formen von Wirbelsäulenversteifung.

Die häufigere und namentlich bei älteren männlichen Individuen auftretende Form ist die **Spondylitis deformans**. Die Krankheit nimmt wahrscheinlich ihren Anfang in den Zwischenwirbelscheiben. Diese erfahren eine Abplattung und quellen an den Wirbelrändern hervor. Im Röntgenbild erscheinen die Zwischenwirbelräume verwischt; weiter kommt es zu Veränderungen der Wirbelkörper, die sich abplatteln und namentlich am Rande exostotische Knochenwucherungen in Sporn- und Spangenform bilden (namentlich rechts), die zum Teil brückenartig zu den

benachbarten Wirbeln hinüberreichen. Die Wirbelkörper nehmen an Höhe ab und zeigen unregelmäßige Konturen. So entsteht allmählich eine hochgradige Formänderung der Wirbelsäule, welche einzelne Abschnitte in stärkerem Maße als andere befällt. Charakteristisch ist, daß bei dieser Form der Erkrankung die Wirbelgelenke in der Regel frei bleiben. Abgesehen von der zunehmenden Steifigkeit klagen die Patienten über Schmerzen, namentlich bei Kompression der Wirbelsäule. Rudimentäre Formen der Krankheit sind keineswegs selten.

Eine oft vollständige Versteifung der Wirbelsäule stellt sich dagegen bei der sog. *Spondylarthritis ankylopoetica* ein. Sie beruht im wesentlichen auf einer Ankylosierung führenden Erkrankung der Wirbelgelenke, die häufig von einer Verknöcherung der die Wirbel verbindenden Bänder, insbesondere des Ligamentum supra- und interspinale sowie von knöcherner Brückenbildung zwischen den Wirbelkörpern begleitet ist; zugleich kommt es zu hochgradiger Atrophie der Knochensubstanz.

Diese Form der Wirbelsäulenerkrankung kommt auch bei jüngeren Individuen vor. Sie ist pathogenetisch höchstwahrscheinlich der oben beschriebenen chronischen Polyarthritis gleich zu setzen, zumal sie mitunter im Anschluß an akuten Gelenkrheumatismus auftritt. Außer rheumatischen Schädlichkeiten werden vor allem Traumen, ferner Lues sowie Heredität als ursächliche Momente genannt.

**Krankheitsbild der chronischen Wirbelsäulenversteifung:** Häufig steigt die Versteifung der Wirbelsäule langsam fortschreitend von unten her auf. In manchen Fällen macht sie in der Lendenwirbelsäule Halt; in anderen Fällen erstreckt sie sich schließlich bis auf die obersten Halswirbel. Doch kann der Prozeß auch in den oberen Abschnitten der Wirbelsäule beginnen. Die Krankheit pflegt sehr langsam Fortschritte zu machen. Schmerzen bestehen spontan oft überhaupt nicht oder nur in geringem Grade bzw. nur auf Druck. Die Beweglichkeit des Rumpfes nimmt progredient ab; schließlich kann sogar die Beweglichkeit des Kopfes eine zunehmende Einschränkung bis zu ihrer völligen Aufhebung erfahren. Schon die Anfangsstadien der Krankheit kann man an der eigentümlichen Art erkennen, wie die Patienten bei Aufforderung, den Rumpf nach vorn zu beugen, anstatt die Wirbelsäule zu krümmen, eine Beugung der Hüftgelenke vornehmen und dabei das Gesäß nach hinten herausstrecken. Beim Stehen nehmen die Kranken eine leicht gebückte Haltung mit etwas gebeugten Knien ein; die normale Lordose der Lendenwirbelsäule fehlt. Die dorsalen Streckmuskeln sind beim Stehen spastisch kontrahiert. Daneben besteht häufig Atrophie der Rumpfmuskeln, insbesondere der Intercostal-, Schulter-, Hals- und Rückenmuskeln. Kommt es daneben zur Beteiligung der großen proximalen Gelenke, z. B. der Hüftgelenke, so wird die Unbeholfenheit der Kranken noch größer. Bisweilen wird auch Ankylosierung der Rippenwirbelgelenke beobachtet, durch die die Beweglichkeit der Rippen ausgeschaltet ist. Die auf diese Weise und infolge der Muskelatrophie bewirkte hochgradige Beeinträchtigung der Atmung, die schließlich nur mit Hilfe des Zwerchfells möglich ist, erklärt die Neigung derartiger Kranker zu Tuberkulose.

*Spondylitis tuberculosa* s. unter Rückenmarkskrankheiten (S. 542).

## Krankheiten der Knochen.

### Osteomalacie.

Osteomalacie ist eine seltene Erkrankung des Skelettes, die im wesentlichen auf Kalkschwund (Halisteresis) und Atrophie der Knochen beruht, die infolgedessen eine abnorm weiche Beschaffenheit annehmen. Die Krankheit befällt vor allem geschlechtsreife Frauen, namentlich im Zusammenhang mit der Gravidität und dem Wochenbett (puerperale Osteomalacie). Nur ganz vereinzelt kommt das Leiden auch bei Männern vor. Auffallend ist die verschiedene geographische Verbreitung der Krankheit; in einzelnen Gegenden (z. B. Rheinprovinz) läßt sich ein geradezu endemisches Auftreten der Osteomalacie konstatieren.

*Pathologische Anatomie:* Die Corticalis der Knochen ist verschmälert und kann in schweren Fällen schließlich bis auf eine dünne Hülle reduziert sein. Neben der Atrophie des Knochens und der Halisterese kommt es zu Neubildung von kalkarmem bzw. kalklosem Knochen, der die Knochenbälkchen in der Form sog. osteoider Säume umrahmt bzw. den normalen Knochen vollkommen ersetzt. Die Markhöhle der langen Röhrenknochen erweitert sich, desgl. der Maschenraum der Spongiosa. Das Knochenmark besteht in der Regel anstatt aus gelbem Fettmark aus rotem Zellmark; bisweilen ist es von Blutungen durchsetzt. Osteomalacische Knochen lassen sich mit dem Messer schneiden. Häufig kommt es zu Infraktionen bzw. Frakturen.

Das Krankheitsbild der Osteomalacie beruht im wesentlichen auf der krankhaften Biegsamkeit der Knochen sowie den daraus entstehenden Formänderungen des Skelettes und ihren Folgezuständen. Die stärksten Veränderungen pflegt, namentlich bei der puerperalen Form das Becken zu zeigen. Der Druck der Wirbelsäule bewirkt infolge des Gewichtes des Rumpfes ein starkes Vorspringen des Promontoriums; ferner wird das Becken infolge der Kompression durch die Oberschenkelköpfe seitlich zusammengedrückt. Der Beckeneingang nimmt Kartenherzform an; die Symphyse springt infolge der Abknickung der Schambeinäste schnabelartig vor. Nächste dem Becken zeigt die Wirbelsäule hochgradige Formänderungen. Die Wirbelkörper werden kürzer und es entwickeln sich in der Regel Kyphosen und Kyphoskoliosen. Die Rippenbögen nähern sich den Darmbeinkämmen. Ferner wird der Winkel zwischen Schenkelhals und -schaft kleiner. Schließlich wird auch der Brustkorb von der Erweichung ergriffen, die Rippen sinken seitlich ein, das Brustbein springt kielartig vor. Die Extremitätenknochen lassen sich in hochgradigen Fällen biegen.

Der Beginn der Erkrankung ist ein allmählicher. Die ersten Krankheitserscheinungen bestehen in Schmerzen in den Knochen des Beckens, im Kreuz und in den Extremitäten; meist sind die Knochen auch druckempfindlich. Außerdem macht sich bald eine zunehmende Muskelschwäche bemerkbar. Letztere sowie die Skelettveränderungen erklären die im weiteren Verlauf alsbald eintretenden Störungen beim Gehen. Der Gang wird unsicher, teils eigentümlich watschelnd, teils hüpfend. Treppensteigen fällt den Kranken frühzeitig schwer und wird bald unmöglich (Schwäche des M. ileopsoas). Das Zusammensinken des Rumpfskeletts, speziell der Wirbelsäule bewirkt, daß die Patienten kleiner

werden. Den Frauen werden die Röcke zu lang; Krücken müssen gekürzt werden. Die Weichteile des Rumpfes zeigen infolge Verkürzung desselben oft charakteristische quer verlaufende Wülste. Ein frühzeitiges Symptom ist ferner Spasmus der Oberschenkeladductoren, so daß die Beine nicht gespreizt werden können. Die Patellarreflexe pflegen lebhaft zu sein, seltener fehlen sie. Eigentliche Lähmungen werden vermißt; sie werden in späteren Stadien mitunter durch die hochgradige Muskelschwäche vorgetäuscht. Die Schädelknochen nehmen an dem Erweichungsprozeß nicht teil. Die gynäkologische Untersuchung ergibt die oben beschriebene hochgradige Deformierung des Beckens mit Verengerung, speziell des queren Durchmessers (die *Conjugata vera* ist nicht verkürzt), so daß eine normale Geburt unmöglich wird. Veränderungen seitens der inneren Organe fehlen in der Regel. Dagegen stellen sich in manchen Fällen in späteren Stadien Abnahme der geistigen Regsamkeit, Gedächtnisschwund, andererseits auch erhöhte Reizbarkeit ein. Die Dauer der Krankheit pflegt sich auf eine Reihe von Jahren auszudehnen. Bei manchen Fällen kommt es vorübergehend oder für längere Zeit zu Stillständen. Umgekehrt bewirken erneute Graviditäten, bisweilen auch schon jede Menstruation weitere Verschlimmerungen. Die Menstruation pflegt bei Osteomalacie nicht gestört zu sein. Frauen mit Osteomalacie concipieren übrigens besonders leicht. Schließlich entwickelt sich ein Zustand hochgradiger Hilflosigkeit sowie Kachexie, in welcher die Kranken im Anschluß an Pneumonien oder Sepsis (*Decubitus*) zugrunde gehen.

Die Diagnose ergibt sich bei ausgebildeten Fällen ohne weiteres aus dem geschilderten Bilde. Bei Verdacht auf O. ist stets auf Schmerzen bei seitlicher Kompression des Beckens und bei Druck auf das Kreuzbein sowie auf Adductorenspasmen zu fahnden. Bedeutsam ist die Anamnese speziell bei Weibern (Verschlimmerungen nach Schwangerschaften). Bei der seltenen männlichen O. können die Beckenveränderungen fehlen; hier gehen die Beschwerden von der Wirbelsäule und dem Brustkorb aus. Das Röntgenbild ergibt bei O. eine verwachsene Knochenzeichnung mit Schwinden der Spongiosastruktur und Aufhellung des ganzen Knochens, oft daneben einzelne oder multiple Infraktionen bzw. Frakturen.

Ätiologisch hat man die puerperale Osteomalacie mit endokrinen Störungen, insbesondere mit einer Hyperfunktion der Ovarien in Verbindung gebracht. Daß aber auch andere Faktoren die gleichen Knochenveränderungen hervorzubringen vermögen, geht aus dem Vorkommen der Erkrankung im Alter sowie auch bei Männern hervor. Man hat hier an eine pluriglanduläre Insuffizienz (vgl. S. 451) gedacht. Beobachtungen über die sog. Hungerosteomalacie, die in den letzten Jahren in Deutschland und Österreich sich im Anschluß an schwere Unterernährung entwickelte, beleuchten schließlich auch die Bedeutung alimentärer Einflüsse.

Therapie: Medikamentös vor allem Phosphor, namentlich als Phosphorlebertran (z. B. tägl. 1 Teelöffel von 0,01, evtl. bis 0,06 Phosphor auf 100,0 Ol. jecor. aselli; evtl. vorsichtig steigern bis auf 0,1 P.); ferner Adrenalin mehrmals wöchentlich  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  ccm Suprarenin-Stammlösung subcutan. Als besonders wirksam bei der puerperalen Form hat sich die Kastration bewährt (zunächst versuche man es mit Röntgenbestrah-

lung der Ovarien). Ovarialpräparate versagen. Sorgfältige Schonung vor Überanstrengung sowie vor Traumen. Unerlässlich ist Verhütung weiterer Schwangerschaften bzw. frühzeitige Unterbrechung derselben. Daneben ist Besserung der hygienischen Verhältnisse (Vermeiden feuchter Wohnungen) anzustreben.

### Rachitis.

Die Rachitis oder englische Krankheit (sie wurde zuerst in England beschrieben) ist ein in der frühesten Kindheit auftretendes Leiden, das ebenfalls in der Hauptsache das Skelett befällt. Das Wesentliche der Krankheit besteht in Anomalien der Knochenbildung, insbesondere in ungenügender Verkalkung der Knochen und übermäßiger Bildung von pathologischem kalklosen Gewebe sowie andererseits in vermehrter Resorption von Knochensubstanz ähnlich wie bei Osteomalacie. Als Folge hiervon entwickeln sich wie bei dieser Deformitäten des Knochens. Daneben bestehen mannigfache andere Krankheitserscheinungen, deren Gesamtheit die Rachitis zu einer konstitutionellen Erkrankung stempelt.

Die Krankheit befällt die Kinder meist in der 2. Hälfte des ersten Jahres, weniger häufig in den darauf folgenden Jahren. Selten beobachtet man sie in den späteren Kinderjahren bzw. im Pubertätsalter als sog. Rachitis tarda. Ungünstige hygienische Verhältnisse, Mangel an Licht und Luft, ferner feuchte Wohnungen üben zweifellos einen begünstigenden Einfluß aus, wenn auch die Krankheit keineswegs nur in Proletariereisen vorkommt. Die Bedeutung des alimentären Faktors geht u. a. aus dem häufigeren Vorkommen der Rachitis bei künstlicher Ernährung hervor. Neuerdings neigt man dazu, auch bei der Rachitis eine qualitativ fehlerhafte Ernährung im Sinne eines Mangels an Vitaminen (speziell des Vitamins A, vgl. S. 488) in den Kreis der ursächlichen Faktoren zu ziehen. Daneben besteht sicher eine gewisse erbliche Veranlagung. Bemerkenswert ist die verschiedene geographische Verteilung der Rachitis, insbesondere einerseits ihr Vorkommen in den Niederungen der gemäßigten Zone, auf der anderen Seite ihr Fehlen in den Tropen, im Hochgebirge usw. Beide Geschlechter werden in gleichem Maße befallen.

Die ziemlich verwickelten anatomischen Veränderungen an den rachitischen Knochen sind dreifacher Art. Die charakteristischsten Störungen bestehen in Anomalien der sog. endochondralen, d. h. vom Knorpel ausgehenden Verknöcherung an den Epiphysengrenzen, also den Stellen des normalen Längenwachstums der Knochen. In der Norm findet sich dortselbst eine gleichmäßige schmale Zone verkalkenden Knorpels, die sich auch makroskopisch gegen die regelmäßig angeordnete Knorpelwucherungszone in einer scharfen Linie abhebt. Bei der R. fehlt die Verkalkungslinie entweder vollkommen oder stellenweise und die Wucherungszone ist stark verbreitert sowie völlig unregelmäßig vascularisiert; die Ossification ist ungleich, die Kalkablagerung zum großen Teil mangelhaft, indem der normalerweise an der Knorpelgrenze in Knochen übergehende Knorpel hier nicht verknöchert, sondern sich als osteoides Gewebe erhält. Zugleich ist die ganze Gegend der Epiphysengrenze knotig aufgetrieben. Zweitens ist auch das vom Periost und Endost ausgehende Wachstum der Knochen gestört, indem in großer Menge kalklose osteoide Substanz gebildet wird, die zu einer Verdickung des Knochens führt. Dies pflegt am stärksten an den Diaphysen der langen Röhrenknochen



nahe den Epiphysen sowie an den platten Schädelknochen ausgeprägt zu sein. Dazu kommt drittens bei schweren Fällen Kalkschwund (Halisterese) des bereits normal gebildeten Knochens. Ähnlich wie bei Osteomalacie kommt demnach auch bei R. sowohl Bildung von Osteoidgewebe wie Halisteresis vor; dagegen fehlt bei ersterer im Gegensatz zur Rachitis die Anomalie der endochondralen Knochenbildung. Die Folge der Halisterese ist eine Erweichung des Knochens, die sich hauptsächlich an den Diaphysen zeigt. Die endochondrale und die periostale sowie endostale Störung und der Kalkschwund gehen nicht immer parallel, sondern sind in den einzelnen Fällen verschieden stark ausgeprägt. Bei Ausheilung der R. bleiben als Residuen oft hyperostotische Prozesse sowie, namentlich bei starker periostaler Wucherung, eine Sklerosierung des Knochens zurück.

Das Krankheitsbild äußert sich klinisch sowohl in fortschreitenden Veränderungen am Knochengüst wie in Störungen des Allgemeinbefindens. Letztere leiten oft das Krankheitsbild ein. Sie bestehen in Appetitmangel, Blässe, Unruhe, Neigung zu starken Schweißen, Bronchialkatarrhen sowie Durchfällen.

Die am Skelett wahrnehmbaren Veränderungen sind zu charakterisieren als Wachstumshemmung und Erweichung der Knochen, Deformierung derselben infolge von Muskelzug, weiter als Verdünnung der Knochen sowie schließlich als Verbreiterung der Epiphysenknorpel. Die Schließung der Fontanellen verzögert sich; der oft auffallend große Schädel nimmt die eigentümlich eckige Form des sog. Caput quadratum mit stark vorspringenden Stirn- und Schläfenbeinen an. Der Knochen am Hinterhaupt wird weich und biegsam (Cranio tabes) und zeigt oft Abplattung. Sehr charakteristisch sind auch die Thoraxveränderungen. Die Knorpelknochengrenze der Rippen ist aufgetrieben und bildet den sog. rachitischen Rosenkranz, der meist schon durch die Haut durchschimmert und fühlbar ist. Die seitlichen Brustkorbpartien sind durch die Wirkung der Inspiration eingezogen. Das Sternum springt dagegen vor (sog. Hühnerbrust, Pectus carinatum). Die Epiphysen der Extremitätenknochen sind verdickt. Speziell an den Vorderarmen und Unterschenkeln führt dies zu eigentümlichen, dicht über dem Hand- bzw. Fußgelenk liegenden Auftreibungen, die sich gegen das Gelenk durch eine schmale Einschnürung absetzen, wodurch der Eindruck des Vorhandenseins zweier Gelenke, des sog. Zwiewuchses entsteht. Stärkere Deformitäten stellen sich häufig ein, wenn das Kind aus dem Bett viel auf den Arm genommen bzw. aufgestellt wird und Gehversuche macht. Rachitische Kinder lernen stets erst sehr spät zu gehen. Besonders hohe Grade von Verbiegung zeigen die Unterschenkel, meist in der Form der nach außen konvexen Krümmung als sog. O-Beine, seltener als Valgusstellung (X-Beine). Der Gang ist watschelnd. Mitunter kommt es zu Infraktionen. Auch die Wirbelsäule zeigt in schwereren Fällen Formänderungen, insbesondere Skoliosen. Häufig beteiligt sich auch das knöcherne Becken, in dem ähnlich wie bei der Osteomalacie das Promontorium nach vorne ins Becken hineingepreßt wird und auch seitlich eine Kompression des Beckenringes erfolgt. Während der Kindheit tritt die Deformierung des Beckens klinisch meist nicht in die Erscheinung. Später bildet das rachitische Becken oft ein schweres Geburtshindernis. Häufig weist die Muskulatur ein krankhaftes Verhalten auf. Die Muskeln zeigen oft verminderten Tonus sowie auch Atrophien und andere anatomische

Veränderungen. Die Gelenke zeichnen sich durch eine abnorm starke Exkursionsfähigkeit aus. Der Turgor der Gewebe ist herabgesetzt. Oft besteht eine Anämie, ferner auch ein bisweilen erheblicher Milztumor sowie mitunter Schwellung verschiedener Lymphdrüsen. Häufig ist Meteorismus vorhanden. Nicht selten beobachtet man Störungen der Dentition. Die Entwicklung der Zähne erfolgt langsam, unregelmäßig, sie zeigen oft Schmelzdefekte, häufig in Form von Querrinnen, sowie Neigung zu Caries. Ernährungszustand und Körpergewicht leiden hauptsächlich in den Fällen, die mit Verdauungsstörungen, insbesondere mit Diarrhöen kompliziert sind. In psychischer Beziehung zeigen die Kinder keine Schädigung, ihre Intelligenz pflegt gesunden Kindern des gleichen Alters nicht nachzustehen.

Verlauf: Die Krankheit dehnt sich in der Regel auf eine Reihe von Monaten aus. Der Grad der Schwere der Krankheitserscheinungen variiert sehr erheblich in den einzelnen Fällen. Maßgebend ist dabei vor allem der Zeitpunkt des Beginnes einer rationellen Therapie. Schwere Fälle sind bisweilen mit Spasmophilie (vgl. S. 444) kompliziert, bei der namentlich auch die Neigung zu Spasmus glottidis (vgl. S. 195) vorhanden ist. Hochgradige Verbiegung der Knochen, starkes Zurückbleiben des Wachstums, elender Allgemeinzustand sowie höhere Grade von Anämie kennzeichnen einen schweren Fall. Bei leichterem Verlauf verrät sich die Krankheit bisweilen lediglich durch verspätetes Gehenlernen, Anomalien der Dentition, blasses Aussehen, verzögerte Schließung der Fontanellen, mäßige Hemmung des Wachstums. Zahlreiche Fälle heilen spontan. Dauernde Residuen sind der rachitische Rosenkranz sowie Verbiegungen der Extremitäten, die bisweilen recht hochgradig sind. Mitunter bleibt eine dauernde Verkürzung derselben zurück, so daß dann Zwergwuchs resultiert (s. u.).

Bei der Diagnose sind in weniger typisch ausgeprägten Fällen klinisch ähnliche Krankheitsbilder auszuschließen, insbesondere die Lues hereditaria (Osteochondritis und Periostitis syphilitica), die aber schon in den allerersten Lebenswochen, also früher als die Rachitis auftritt, sowie die Möller-Barlowsche Krankheit (vgl. S. 275). Näheres hierüber siehe in den Lehrbüchern der Kinderheilkunde.

Therapie: Luft, Sonne und sonstige günstige hygienische Verhältnisse. Eine große Rolle spielt eine zweckmäßige Ernährung unter Vermeidung von Einseitigkeit und Überernährung. Zunächst wenn möglich Brusternährung, später frühzeitige Verabreichung von milchfreien Mahlzeiten (vom 6. Monat ab Gemüse, speziell Saft von rohen Mohrrüben, Spinat als Zusatz zur Milchnahrung, Fleischbrühe mit Grieß, später Fruchtsäfte). Eine außerordentlich günstige Wirkung hat Lebertran (am besten in ungeringer Form) mit oder ohne Phosphor (0,01/100,0). Ferner Solbäder bzw. warme Seebäder. Sorgfalt ist auf die weiche Beschaffenheit des Bettes zu legen. Die Kinder müssen zunächst viel liegen; keine zu frühzeitigen Steh- und Gehversuche. Später ist unter Umständen orthopädischer Rat einzuholen.

## Zwergwuchs.

Zwergwuchs kann auf verschiedenen Ursachen beruhen. Zunächst ist zwischen physiologischem und pathologischem Zwergwuchs zu unterscheiden. Ersterer, der stets durch proportionierten und ebenmäßigen Körperbau ausgezeichnet ist, kommt bei manchen Volksstämmen (z. B. in Afrika) als Rasseeigentümlichkeit vor. Pathologischer Zwergwuchs kann von Geburt an vorhanden sein, während er in anderen Fällen sich erst später entwickelt. Letzterer kann wiederum entweder auf vorzeitiger Verknöcherung der Epiphysenfugen oder umgekehrt auf abnorm langem Offenbleiben derselben beruhen. In letzterem Fall kann der Körper noch in späteren Jahren, wo das Wachstum normal abgeschlossen ist, weiter wachsen. Der rachitische Zwergwuchs ist vor allem durch die für Rachitis charakteristischen Verbiegungen der Extremitäten, namentlich der Unterschenkel gekennzeichnet. Auch endokrine Störungen können Zwergwuchs bewirken. Dazu gehören z. B. manche Formen des Kretinismus (vgl. S. 436). Häufiger ist der auf Hypophyseninsuffizienz beruhende sog. hypophysäre Zwergwuchs. Diese Art von Zwergen wird normal geboren, doch kommt es frühzeitig zum Stillstand des Wachstums mit ungefähr proportionierten Körperformen; die Epiphysenfugen bleiben offen. Intellektuell und seelisch bleiben die hypophysären Zwerge häufig zurück und zeigen oft ein scheues, unselbständiges Wesen. Eine andere Art von Zwergwuchs ist die auf Chondrodystrophie beruhende Form. Hierbei handelt es sich um eine bereits im intrauterinen Leben vorhandene Anomalie der Epiphysenknorpel, die zu einer Störung des Längenwachstums der Extremitäten führt, während Kopf und Rumpf ein normales Verhalten zeigen. Die Chondrodystrophie ist bereits bei der Geburt in charakteristischer Weise ausgeprägt (Unterschied vom rachitischen Zwergwuchs, der sich erst gegen Ende des Säuglingsalters bemerkbar macht). Alle Chondrodystrophiker sehen in ihrem grotesken Äußeren einander ähnlich. Ihr Habitus ist durch einen unverhältnismäßig großen Kopf mit eingesunkener Nasenwurzel (infolge Verkürzung der Schädelbasis) und die viel zu kurzen Extremitäten (Mikromelie) häufig mit auffallend weiter, faltiger Haut gekennzeichnet. Die Muskulatur pflegt bezeichnenderweise sehr kräftig entwickelt zu sein, die Hände sind auffallend kurz und breit, von quadratischer Form, die drei mittleren Finger meist gleich lang. Die Intelligenz ist nicht beeinträchtigt, oft sogar sehr gut entwickelt. Wegen ihres absonderlichen Aussehens betätigen sich diese Zwerge nicht selten als Clowns (früher als Hofzwerge). Der chondrodystrophische Zwergwuchs ist erblich.

## Krankheiten des Nervensystems.

**Einleitung:** Das Nervensystem besteht aus den Ganglienzellen, den Nervenfasern und der als Stützsubstanz dienenden Glia. Von jeder Ganglienzelle gehen eine Reihe von Nervenfasern aus. Eine derselben, die sich durch besondere Länge auszeichnet und in der Regel eine Markscheide trägt, ist der sog. Neurit oder Achsen-cylinderfortsatz. Er gibt auf seinem Verlauf zahlreiche kleine Seitenzweige, die Kollateralen ab. Die übrigen von der Ganglienzelle ausgehenden Nervenfasern, die sog. Dendriten sind kurz und splintern sich alsbald reiserartig auf. Die Ganglienzelle bildet mit dem Neuriten und den Dendriten eine Einheit, das sog. Neuron, dessen funktionelles und trophisches Zentrum die Ganglienzelle ist. Eine Verbindung der verschiedenen Neurone untereinander erfolgt durch die Dendriten und die Kollateralen. Durch Hintereinanderschaltung mehrerer Neurone entstehen die langen Leitungsbahnen, die das Gehirn, das Rückenmark und die peripherischen Nerven durchziehen und die Verbindung der Hirnrinde mit der Peripherie bewirken. Die hauptsächlichsten motorischen Bahnen setzen sich aus zwei Neuronen zusammen, dem zentralen Neuron, das von der Hirnrinde zum Rückenmark zieht, und dem peripherischen Neuron, das im Vorderhorn des Rückenmarks beginnt und in den peripherischen Nerven zu den Muskeln zieht. Die sensiblen Bahnen bestehen aus einem peripherischen Neuron, dessen Ganglienzelle sich im Intervertebralganglion befindet, und einem oder mehreren Neuronen, die sich durch das Rückenmark zum Großhirn begeben. (Näheres s. später.)

## Krankheiten der peripherischen Nerven.

Die große Mehrzahl der peripherischen Nerven enthält sowohl sensible wie motorische Fasern. Daraus erklärt sich, daß bei Schädigung eines peripherischen Nerven es von seiten beider Qualitäten zu Reiz- bzw. Ausfallserscheinungen kommen kann. Störungen der motorischen Funktion können sowohl in Form von Lähmung der zugehörigen Muskeln als auch als Krämpfe derselben, Störungen der sensiblen Funktion als Sensibilitätsdefekt bzw. als Schmerz zum Ausdruck kommen. Schwere Schädigungen eines peripherischen gemischten Nerven, z. B. eine traumatische Kontinuitätstrennung oder eine Neuritis bewirkt gleichzeitig motorische und sensible Störungen, während bei geringgradiger Schädigung die in demselben Nerven enthaltenen verschiedenen Faserarten eine gewisse Unabhängigkeit voneinander zeigen, die sich in einem elektiven Verhalten den verschiedenen Schädigungen gegenüber verrät, so daß in dem einen Fall ausschließlich oder vorwiegend sensible, im andern nur die motorischen Fasern und nur in ganz schweren Fällen beide zugleich erkranken. Zu beachten ist schließlich, daß der Charakter der peripherischen Nervenerkrankung sich gegenüber den zentralen, insbesondere den spinalen Affektionen durch die Art der Ausbreitung und Verteilung der nervösen Störungen kundtut. Für die Sensibilität illustrieren die Abb. 46 und 51 den fundamentalen Unterschied zwischen der Verteilung der peripherischen sensiblen Nerven und der segmentalen oder radikulären, d. h. spinalen Sensibilität. Diese Tatsache erklärt sich aus dem Umstand, daß die aus dem Rückenmark austretenden Nerven sich miteinander zu den sog. Nervenplexus verflechten, so daß ein peripherischer Nerv aus verschiedenen Rückenmarkswurzeln (bzw. -Segmenten) stammende Fasern enthält. Anders verhalten sich die Hirnnerven, weil diese im Gegensatz zu den Rückenmarksnerven bereits bei ihrem Austritt aus dem Hirnstamm einheitliche Gebilde darstellen und als solche (d. h. ohne Plexusbildungen) zu ihren entsprechenden Erfolgsorganen ziehen.

### Die peripherischen Lähmungen.

Unter einer peripherischen motorischen Lähmung versteht man die Aufhebung der willkürlichen Bewegungsfähigkeit eines Muskels oder einer Muskelgruppe, wenn die ursächliche Schädigung in dem dazu gehörigen peripherischen Nerv lokalisiert ist. Bei den Rückenmarksnerven besteht bezüglich der Motilität ebenso wie bei den sensiblen Nerven ein wesentlicher Unterschied in der Verteilung der Lähmungen gegenüber den spinalen bzw. radikulären Erkrankungen, in welchem letzterem Fall die Lähmung sich nach dem segmentalen Typus ausbreitet.

Eines der wichtigsten Symptome der peripherischen Lähmung, das diese indessen mit den auf Läsion der Nervenkerne beruhenden sog. nucleären Lähmungen gemein hat, ist die Entwicklung von Degenerationserscheinungen im Muskel, insbesondere von Muskelatrophien. Dies erklärt sich aus der Tatsache, daß sich die trophischen Zentren der Nerven in den Vorderhornzellen des Rückenmarks befinden und daher eine

Unterbrechung der Verbindung mit diesen zu schweren Ernährungsstörungen führen muß.

In erster Linie gehört hierzu die Atrophie des gelähmten Muskels, der an Volumen abnimmt und schließlich fast völlig schwinden kann. Histologisch findet man Verschmälerung der Muskelfasern, Vermehrung der Muskelkerne und des interstitiellen Bindegewebes. Die peripherischen Lähmungen sind ferner stets sog. schlaffe Lähmungen, d. h. der Tonus oder Spannungszustand, den ein normaler Muskel passiven Bewegungen gegenüber zeigt, ist herabgesetzt. Diese Hypotonie kommt besonders deutlich bei Lähmung von Extremitätenmuskeln zum Ausdruck; hier macht sich die Erschlaffung der Muskeln, namentlich wenn letztere in größerer Zahl gelähmt sind, bei passiver Bewegung in schlotternden Bewegungen im Gelenk bemerkbar.

Eine diagnostisch besonders wichtige Folge der trophischen Störung zeigt sich schließlich im veränderten Verhalten der Erregbarkeit der motorischen Nerven und Muskeln gegenüber dem elektrischen faradischen und galvanischen Strom. Man unterscheidet hierbei eine direkte, d. h. den Muskel selbst treffende, und eine indirekte, vom zugehörigen Nerven ausgehende elektrische Reizung.

Unter normalen Verhältnissen reagieren sämtliche Muskeln und Nerven prompt auf den faradischen und galvanischen Strom, vorausgesetzt, daß seine Intensität eine gewisse empirisch festgelegte untere Grenze übersteigt.

#### Elektrische Erregbarkeit nach Stintzing (Reizelektrode von 3 qcm).

Nerven	Galvanisch in Milliampère Grenzwerte	Faradisch in mm Rollenabstand Grenzwerte
Facialis . . . . .	1,0 — 2,5	132 — 110
Accessorius . . . . .	0,1 — 0,44	145 — 130
Musculocutaneus . . . . .	0,04 — 0,28	145 — 125
Medianus . . . . .	0,3 — 1,5	135 — 110
Ulnaris . . . . .	0,2 — 2,6	140 — 107
Radialis . . . . .	0,9 — 2,7	120 — 90
Femoralis . . . . .	0,4 — 1,7	120 — 103
Peroneus . . . . .	0,2 — 2,0	127 — 103

Im einzelnen tritt bei galvanischer Reizung normal die Kathodenschließungszuckung (KaSZ) stets schon bei einer schwächeren Stromstärke als die Anodenschließungszuckung auf (AnSZ) (die Kathode ist diejenige Elektrode, die beim Eintauchen beider Elektroden in Wasser das Aufsteigen von Gasbläschen erkennen läßt). Auch zeigt der normale Muskel bei direkter Reizung eine schnell verlaufende, sog. blitzartige Zuckung. Für die degenerative Nervenlähmung ist die qualitative Änderung der elektrischen Erregbarkeit in Form der sog. Entartungsreaktion (EaR.) charakteristisch. Die EaR. ist durch vier verschiedene Merkmale gekennzeichnet: das Aufhören der indirekten Erregbarkeit vom Nerven aus, weiter das Schwinden der direkten Erregbarkeit des Muskels durch den faradischen Strom, die Änderung des sog. Zuckungsgesetzes, indem die AnSZ schon bei geringerer Intensität des galvanischen Stroms erfolgt als die KaSZ; endlich eine Änderung der Art der Muskelzuckung, indem an Stelle der blitzartigen eine träge, sog. wurmförmige Zuckung erfolgt. Bei ganz schweren Fällen kann schließlich auch die galvanische Muskeleerregbarkeit völlig erlöschen. Die beschriebene sog. Umkehrung der Zuckungsformel ist nicht ganz so zuverlässig wie die übrigen Zeichen der EaR. Die EaR. tritt nicht sofort nach Erkrankung des Nerven oder der Abtrennung von seinem trophischen Zentrum auf, sondern entwickelt sich immer erst im Laufe

einer Reihe von Tagen oder Wochen. Ferner lassen überhaupt zahlreiche peripherische Lähmungen, soweit sie leicht und von kurzer Dauer sind, die EaR. vermissen.

Eine häufige Begleiterscheinung einer degenerativen Muskelatrophie ist ferner das Auftreten der sog. fibrillären Zuckungen, d. h. von raschen in einzelnen Muskelbündeln ablaufenden Kontraktionen ohne eigentlichen Bewegungseffekt. Doch darf man diese nicht mit den bei nervösen Menschen vorkommenden und belanglosen ähnlichen Zuckungen verwechseln, wie man sie namentlich an den Augenlidern, gelegentlich u. a. unter Einwirkung von Kälte auch an anderen Muskeln beobachtet.

### Lähmungen der Gehirnnerven.

Bezüglich der Topographie der Hirnnervenkerne vgl. Abb. 44.

Im Gegensatz zu den Lähmungen der Rückenmarksnerven ist bei den Hirnnerven aus den früher erwähnten Gründen der Unterschied zwischen peripherischer und zentraler bzw. supranucleärer Lähmung häufig nicht von vornherein so evident, daß die Unterscheidung auf den ersten Blick möglich ist. Aus diesem Grunde sollen bezüglich der Hirnnerven beide Arten von Lähmungen an dieser Stelle besprochen werden.

Der **N. olfactorius** (N. I.) ist der Geruchsnerv. Er spielt in der Klinik der Nervenkrankheiten nur eine untergeordnete Rolle. Man prüft auf Anosmie (Aufhebung des Geruchssinnes) durch Vorhalten von stark riechenden Substanzen wie Baldrian, Rosenöl, Moschus, Teer, dagegen nicht z. B. mit Ammoniak oder Essigsäure, die zugleich die Trigeminusäste der Nasenschleimhaut reizen.

Dem **N. opticus** (N. II.) kommt in der Neurologie eine sehr große praktische Bedeutung zu. Näheres über die Sehbahn vgl. S. 565. Die Untersuchung erfolgt mit dem Augenspiegel sowie durch Bestimmung des Gesichtsfeldes mittels Perimeters. Bei Atrophie des Opticus mit Erblindung kann die Reaktion der Pupille erhalten sein (Näheres s. S. 566).

Die **Augenmuskelnerven** sind die Nn. oculomotorius, abducens und trochlearis.

Der **N. oculomotorius** (N. III.) innerviert von den äußeren Augenmuskeln den Levator palpebr. super., den Rectus sup. und inf., die den Bulbus nach oben bzw. unten drehen, ferner den Rectus intern., der ihn nach innen, und den Obliquus inf., der ihn nach oben und außen dreht. Er versorgt demnach sämtliche Augenmuskeln, ausgenommen den M. rectus externus und den Obliquus superior. Weiter innerviert er durch Vermittlung des Gangl. ciliare den M. ciliaris, dessen Kontraktion stärkere Wölbung der Linse und dadurch Akkommodation für die Nähe bewirkt, ferner den M. sphincter pupillae.

Bei vollständiger Oculomotoriuslähmung besteht folgendes Bild: Ptosis des oberen Lides; der Bulbus ist ständig nach außen und unten gedreht; Erweiterung (Mydriasis) und Reaktionslosigkeit der Pupille (sog. absolute Pupillenstarre) sowie Unfähigkeit zur Akkommodation in die Nähe. Die Kranken leiden infolge des Strabismus an Doppelbildern,

die gekreuzt und nebeneinander stehen. Als eines der ersten Lähmungssymptome pflegt die Ptose einzutreten. Bei Läsion der Nervkerne des N. oculomotorius fehlt im Gegensatz zur peripherischen Lähmung die Mydriasis und die Akkommodationslähmung.

Der N. trochlearis (N. IV.) innerviert ausschließlich den N. obliquus sup. (Antagonist des Obliquus inf.), der den Bulbus nach unten und




Abb. 44. Die Lage der Hirnnervenkerne im Hirnstamm mit Benutzung eines Toldt'schen Schemas von der Seite und von oben (nach Fortnahme des Kleinhirns) gesehen (nach Lewandowsky).

Schwarz die motorischen Kerne, schraffiert die sensiblen. II = Opticus (vorderer Vierhügel). III = Oculomotorius. IV = Trochlearis. V = Trigeminus, bestehend aus zwei motorischen Wurzeln, von denen die eine im Mittelhirn, die andere im Pons entspringt, und der sensiblen, die bis in das Rückenmark hinunterreicht. VI = Abducens. VII = Facialis. VIII = Acusticus. IX + X = Vagoglossopharyngeus. Xa = Nuc. ambiguus vagi (Ursprung der motorischen Kehlkopfnerve). XI = Accessorius mit Zuzug aus dem Rückenmark. XII = Hypoglossus.

außen dreht. Lähmung bewirkt beim Blick nach unten gleichnamige schiefstehende Doppelbilder. Infolge der letzteren ist z. B. das Herabgehen einer Treppe erschwert.

Der N. abducens (N. VI.) innerviert den N. rect. externus. Bei seiner Lähmung besteht die Unmöglichkeit, das Auge über die Mittellinie hinaus nach außen zu bewegen. Die Doppelbilder sind ungekreuzt beim

Blick nach der kranken Seite, während beim Blick nach der gesunden Seite Doppelbilder fehlen. Bei längerem Bestehen der Lähmung zeigt der Bulbus infolge von Kontraktion des Rectus internus eine Drehung des Auges nach innen (Strabismus convergens).

In der speziellen Ätiologie der Augenmuskellähmungen treten rheumatische und toxische Ursachen in den Hintergrund. Dagegen spielen Traumen namentlich in Form von Schädelbrüchen sowie die Kompression der Nerven durch Tumoren und besonders entzündliche Prozesse an der Hirnbasis, vor allem die Lues, ferner die Meningitis tuberculosa praktisch eine große Rolle, seltener Aneurysmen der Art. basilaris. Mitunter kommen Lähmungen auch bei Tabes sowie multipler Sklerose vor.

Isolierte Akkommodationslähmung wird insbesondere nach Diphtherie sowie mitunter bei Diabetes beobachtet. Rheumatische Lähmungen betreffen besonders den Abducens, der übrigens gelegentlich auch nach Lumbalanästhesie vorübergehend paretisch wird. Intermittierende Oculomotoriuslähmung kommt bei Migräne vor.

Unter Ophthalmoplegia externa versteht man eine Lähmung sämtlicher Augenmuskeln mit Ausnahme des Sphincter pupillae und des M. ciliaris; umgekehrt liegt eine Ophthalmoplegia interna bei ausschließlicher Lähmung der Binnenmuskeln des Bulbus vor. Letztere Form findet sich nicht bei nucleären Lähmungen. Bei supranucleären Lähmungen kommen niemals einseitige, sondern stets doppelseitige und zwar conjugierte Augenmuskellähmungen vor, insbesondere in der Form der Déviation conjuguée (vgl. S. 566).

Der N. trigeminus (N. V.) enthält einen sensiblen und einen kleineren motorischen Anteil. Der sensible Teil versorgt mit seinen drei Ästen (Ramus ophthalmicus, maxillaris und mandibularis) die Gesichtshaut bis zum Ohr und den vorderen Teil des behaarten Kopfes (vgl. Abb. 46 a), Cornea, Conjunctiva, die Schleimhaut der Nase, der Stirn- und Kieferhöhle, die Mundschleimhaut, die Zähne sowie die Dura mater der vorderen und mittleren Schädelgrube. Außerdem gehören die aus den vorderen  $\frac{2}{3}$  der Zunge stammenden Geschmacksfasern zum Trigeminus, in dessen dritten Ast (N. lingualis) sie verlaufen, um später in die Chorda tympani überzugehen und mit dieser den N. facialis bis zum Ganglion geniculi zu begleiten, von dem sie sich wieder zum Trigeminus abzweigen.

Bei Trigeminuslähmung bestehen, abgesehen von den entsprechenden Sensibilitätsstörungen und Parästhesien, mitunter auch trophische Störungen wie Herpes zoster sowie gefährliche Entzündungen des Auges evtl. mit Geschwürsbildung (sog. Ophthalmia neuroparalytica) als Folge der Anästhesie.

Die im 3. Ast des Trigeminus enthaltenen motorischen Fasern versorgen die Kaumuskeln, die Mm. masseter, temporalis, mylohyoideus, den vorderen Bauch des M. digastricus, die Mm. pterygoidei sowie Tensor tympani und Tensor veli palatini. Bei einseitiger Lähmung kann der Unterkiefer nur nach der gelähmten Seite verschoben werden, auch fehlt auf dieser die normalerweise mit dem Finger fühlbare Kontraktion von Masseter und Temporalis sowie der Eindruck der Zähne beim Versuch, mit der gelähmten Seite auf einen festen Gegenstand, z. B. Holz zu beißen.



Der *N. facialis* (N. VII.) ist der motorische Gesichtsnerv.

Der Kern des *Facialis* liegt in der *Oblongata* in der Tiefe der Rautengrube, wo seine Fasern in Form einer Schlinge um den *Abducens*kern verlaufen. Der Nerv verläßt die *Oblongata* an der Gehirnbasis am sog. Kleinhirnbrückenwinkel dicht neben dem *Acusticus*. In seinem weiteren Verlauf bildet er eine knieförmige Biegung, das *Geniculum*. Er verläuft durch einen engen, der Paukenhöhle dicht benachbarten Kanal im Felsenbein, den *Canalis facialis*, und spaltet sich beim Verlassen desselben in zahlreiche Zweige (*Pes anserinus*). Den Stamm des *Facialis* begleiten außerdem noch andere Nervenfasern, die funktionell vom *Facialis* zu trennen sind, und zwar 1. Tränensekretionsfasern, die sich vom *Facialis*stamm schon am *Geniculum* trennen, 2. Speichelsekretionsfasern und 3. Geschmacksfasern, die in der *Chorda tympani* verlaufen. Diese durchzieht die Paukenhöhle, schließt sich im *Canalis facialis* dem *Facialis*stamm an, um am *Geniculum* in das *Ganglion geniculi* überzutreten. Alle drei Arten von Nervenfasern gehören zum *N. trigeminus*. Der *Facialis* ist der mimische Gesichtsnerv. Er versorgt motorisch sämtliche Gesichtsmuskeln, mit Ausnahme des *M. levator palpebrae* (N. *oculomotorius*), den *M. stylohyoideus*, den hinteren Bauch des *M. biventer*, das *Platysma* sowie den *M. stapedi*us.

Die *Facialis*lähmung ist eine der häufigsten peripherischen Lähmungen. Ursachen der *Facialis*lähmung sind Erkältung, vor allem Zugluft, ferner Erkrankung des *Os petrosum*, insbesondere *Caries* sowie mitunter Mittelohrerkrankungen, ferner traumatische Schädigungen (u. a. auch Zangengeburt) sowie Erkrankungen der *Parotis*, schließlich häufig Krankheitsprozesse an der Hirnbasis, speziell *Lues* sowie Tumoren. Neben der peripherischen Lähmung des *Facialis* kommt auch eine nucleäre Lähmung bei Erkrankung der *Oblongata* sowie eine supra-nucleäre Lähmung bei Sitz der Erkrankung oberhalb der Kernregion vor.

Die peripherische *Facialis*lähmung ist immer einseitig (*Monoplegia facialis*), wobei stets sowohl die oberen wie die unteren Äste des Nerven betroffen sind; es entsteht dadurch ein sehr charakteristisches Bild, das sich durch das Übergewicht der Gesichtsmuskeln der gesunden Seite erklärt. Der Mund ist nach der gesunden Seite verzogen, der Mundwinkel der gelähmten Seite hängt herab, die Nasolabialfalte ist verstrichen; die Gesichtshaut erscheint auf der Seite der Lähmung auffallend glatt und runzellos. Das untere Augenlid hängt herab, die Lidspalte ist infolgedessen auffallend weit; ferner kann das Auge nicht geschlossen werden (sog. *Lagophthalmus*), eine Folge der Lähmung des *M. orbicul. oculi*. Das Auge trânt und ist auf die Dauer Entzündungsreizen und Infektionen ausgesetzt. Beim Versuch, das Auge zu schließen, erfolgt als normale Mitbewegung die sonst infolge des Lidschlusses nicht wahrnehmbare Rotation des *Bulbus* nach oben, so daß die weiße *Sclera bulbi* sichtbar wird (sog. *Bellsches Phänomen*). Auch das Stirnrunzeln ist auf der gelähmten Seite nicht möglich. Bei nicht sehr ausgeprägter Lähmung kann man dieselbe dadurch deutlicher machen, daß man den Patienten auffordert, die Zähne zu zeigen, zu lachen, den Mund zu spitzen, zu pfeifen usw. Mitunter wird über Gehörstörungen geklagt, teils in Form abnorm gesteigerten Hörvermögens (*Hyperakusis*), teils als Schwerhörigkeit.

Die Beimischung der anderen Nervenfasern zum *Facialis*stamm und ihre frühzeitige Abzweigung ermöglicht bei peripherischen Läsionen deren genauere Lokalisation. Leitungsunterbrechung peripher von dem Abgang der *Chorda* macht ausschließlich Gesichtsmuskellähmung, eine solche zwischen *Chorda*abzweigung

und Ganglion geniculi neben der Lähmung noch Geschmacksstörung der vorderen  $\frac{2}{3}$  der Zunge sowie evtl. Störung der Speichelabsonderung. Sitz der Läsion am Ganglion geniculi bewirkt Gesichtsmuskellähmung, Geschmacksstörung, Herabsetzung der Speichel- und Tränensekretion und Gehörstörungen. Das gleiche Bild, nur ohne Geschmacksstörung besteht bei einer Läsion oberhalb des Ganglion geniculi.

Die peripherische Facialislähmung tritt in drei verschiedenen Graden auf: Die leichte Form (in der Regel als rheumatische Lähmung) ist die harmloseste; hier fehlen außer der Parese der mimischen Muskeln alle anderen Störungen; ebenso fehlt die EaR. Dauer bis zur Heilung 2—3 Wochen. Die sog. Mittelform dauert länger, etwa 4—6 Wochen und zeichnet sich durch das Auftreten einer partiellen EaR. aus (AnSZ > KaSZ, träge Zuckung), die nach etwa 14 Tagen bis 3 Wochen deutlich wird. Bei der schweren Form kommt es neben der vollständigen EaR. zu schwerer Atrophie der Muskeln, zum Teil mit abnormer Reizbarkeit derselben (Tic, Contracturen usw.). Diese Form dauert, soweit überhaupt eine Restitutio ad integrum erfolgt, mehrere Monate.

Lähmungen durch Läsionen im Bereich der Kernregion des Facialis sind mitunter doppelseitig. Die Facialislähmung zentralen Ursprungs (supranucleäre Lähmung), z. B. bei einem Schlaganfall zeigt als wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber der peripherischen Lähmung, abgesehen vom Fehlen der EaR., vor allem das Freibleiben des oberen Facialisastes (Stirn und Lidschließer), da dieser bilateral, d. h. von beiden Hirnhemisphären synergisch innerviert wird.

Der N. acusticus (N. VIII.) besteht aus zwei funktionell verschiedenen Anteilen, denen auch verschiedene Kerne entsprechen, und zwar aus dem eigentlichen Hörnerven, N. cochlearis, und dem die Bogengänge (Labyrinth) versorgenden N. vestibularis, der zum Vestibularis- und zum Deitersschen Kern gehört. Über die Hörbahn sowie die Prüfung des Vestibularis s. S. 565 und 610.

Der N. glossopharyngeus (N. IX.) versorgt das hinterste Zungendrittel mit Geschmacksfasern sowie sensiblen Fasern, die er auch an das Mittelohr, die Tuba Eustachii sowie die Schleimhaut des Nasenrachens abgibt.

Der N. vagus (N. X.) enthält sensible, motorische sowie autonome Nervenfasern (bezüglich der letzteren vgl. S. 528). Die sensiblen Fasern versorgen die Hirnhaut der hinteren Schädelgrube (Ram. meningeus), den hinteren Teil des äußeren Gehörganges, den Schlund, Kehlkopf, Speiseröhre, Magen, Luftröhre, Bronchien, Pleura sowie verschiedene Baucheingeweide. Motorische Fasern innervieren den M. levator veli palatini, die Pharynx- (Schlundsehnürer) sowie die Oesophagmuskulatur und die Kehlkopfmuskeln (N. laryng. sup. und infer. seu Recurrens). Lähmung in der Kernregion, z. B. bei Bulbärparalyse oder Läsion des Nerven in der Gegend der Schädelbasis bewirkt Gaumensegel- und Schlucklähmung, die Sprache wird näseld. Die Kehlkopflähmungen wurden S. 193 besprochen. Tiefersitzende Läsionen bewirken dagegen nur das Bild der Recurrenslähmung. Reizung des Vagus hat Verlangsamung, seine Lähmung Beschleunigung des Pulses und außerdem




Abb. 45 a.

Abb. 45 a-c. Die Muskeln und Nerven des Körpers




Abb. 45 c.




Abb. 45 b.

und ihre elektrischen Reizpunkte nach Kramer.




Abb. 46 a.

Abb. 46 b.

Abb. 46 a-c. Die Gebiete der sensiblen




Abb. 46 c.

Verlangsamung der Atmung zur Folge. Bei Läsion nur eines Vagusstammes bleiben die Herzerscheinungen aus. Endlich steht der Vagus mit dem Brechzentrum in Verbindung.

Der **N. accessorius** (N. XI.) innerviert vollständig den **M. sternocleidomastoideus** sowie teilweise den **M. trapezius**, der außerdem von Cervicalnerven innerviert wird. Einseitige Lähmung des Nerven bewirkt komplette Sternocleidolähmung und partielle Trapeziuslähmung. Der Sternocleido bewirkt Annäherung des Warzenfortsatzes an das Brustbein unter gleichzeitiger Drehung des Kinns nach der anderen Seite. Bei beiderseitiger Lähmung neigt der Kopf zum Nachhinterüberfallen. Der Trapezius bewirkt Heben des Schulterblattes z. B. beim Achselzucken, und vor allem des Acromions. Bei seiner Lähmung findet sich Tiefstand der Schulter; das Schulterblatt zeigt sog. Schaukelstellung, d. h. sein unterer Winkel ist nach innen und oben, sein oberer äußerer Winkel nach unten verschoben; das Heben der Schulter ist erschwert.

Der **N. hypoglossus** (N. XII.) ist der motorische Nerv der Zunge. Einseitige Lähmung kommt als peripherische Lähmung nur selten, meist traumatisch vor; wesentlich häufiger ist die nucleäre und vor allem die supranucleäre Lähmung. Einseitige Hypoglossuslähmung bewirkt Abweichen der herausgestreckten Zunge nach der gelähmten Seite infolge der Zugwirkung des **M. genioglossus**. Halbseitige Atrophie der Zunge mit EaR. und fibrillären Zuckungen beobachtet man sowohl bei den peripherischen wie bei den nucleären Lähmungen.

### Peripherische Lähmungen der Rückenmarksnerven.

Hier sollen nur die wichtigsten Lähmungstypen besprochen werden.

Der 1.—4. **Cervicalnerv** bildet den **Plexus cervicalis**. Die aus diesem stammenden Fasern versorgen motorisch die tiefen Halsmuskeln und die **Mm. scaleni**; der 4. Cervicalnerv liefert den **N. phrenicus** für das Zwerchfell. Die Versorgungsgebiete der sensiblen Äste (**N. occipital. maj. und minor**, **N. auricular. magnus**, **Nn. subcut. colli** sowie **supraclavicular.**) sind die Haut der Hinterhauptgegend, des Nackens, des Halses und der Schultern bis zur Clavicula. Sie sind aus der Abb. 46 ersichtlich.

Lähmung des **N. thoracicus longus** (Cervic. 5—7): Der Nerv innerviert ausschließlich den **N. serrat. antic.**, welcher die Scapula an den Rumpf fixiert und sie dreht sowie das Acromion feststellt. Der **M. serrat.** ermöglicht die Hebung des Arms über die Horizontale (bis zur Horizontale kann er vom **M. deltoideus** gehoben werden). Serratuslähmung verrät sich durch flügelartiges Abstehen des Schulterblattes, besonders seines unteren Winkels, namentlich deutlich beim Nachvorne Strecken des Arms. Ein Erheben des Armes über die Horizontale ist unmöglich. Die Lähmung erfolgt in der Regel auf traumatischem Wege.

Lähmung des **N. suprascapularis** (C. 5—6): Er innerviert die **Mm. supra- und infraspinatus**, die die Rollbewegung des Arms nach außen besorgen; die Muskeln werden durch den **Teres minor** (**N. axillar.**) unterstützt. Bei ihrer Lähmung besteht Behinderung der Armbewegung

namentlich beim Schreiben, Nähen, Säen; ihre Atrophie bewirkt deutliches Hervortreten der knöchernen Konturen des Schulterblattes.

Lähmung des **N. subscapularis** (C. 5—8): Er innerviert den *M. subscapularis* (Einwärtsrollung des Oberarms) sowie die *Mm. teres maj. und latissim. dorsi* (Adduction und Nachhinzuziehung des Oberarms, Senkung und Adduction des Schulterblattes). Lähmung macht es dem Patienten unmöglich, die Hand aufs Kreuz zu legen und die Schulter wie bei der militärischen Haltung zurückzunehmen.

Lähmung des **N. axillaris** (C. 5—6) bewirkt Deltoideuslähmung. Der Patient vermag den Arm weder seitlich noch nach vorn oder hinten zu erheben. Die Schulterwölbung schwindet infolge der Atrophie, die Umrisse von *Aeromion* und *Caput humeri* kommen zum Vorschein. Der *Teres min.* ist ein Synergist des *M. infraspinat.* und bewirkt wie dieser die Innenrotation des Arms. Axillarislähmung kommt nach Verletzungen, bei Schulterluxation sowie u. a. speziell infolge von Krückendruck vor. Die sensiblen Zweige des Nerven ergeben sich aus Abb. 46.

Der **N. musculocutaneus** (C. 5—6) innerviert motorisch vor allem den *M. biceps*, ferner den *M. coraco-brachialis* sowie teilweise den *M. brachialis internus*. Lähmung macht die Beugung des supinierten Vorderarms im Ellbogen fast unmöglich; sie ist nur noch bei Pronation ausführbar. Der sensible Ast versorgt als *N. cutan. antibrachii later.* die Außenfläche des Vorderarms (vgl. Abb. 46).

Der **N. radialis** (Cervic. 5—8, Dors. 1) innerviert in der Hauptsache die Streckmuskeln des Armes (*M. triceps*), der Hand (*M. extensor carpi rad. long. et brevis* und *Extensor carpi ulnar.*), die Strecker der Fingergrundphalangen (*Extensor digitor. commun.*, *Extens. indicis* und *digit. V.*), ferner die *Mm. extens. pollicis long. und brevis* sowie den *Abductor pollic. long.* (außerdem noch den *M. supinator* sowie den *M. brachioradialis*). Die sensiblen Hautäste versorgen die Hinter- und Außenfläche des Oberarms, die dorsale Fläche des Vorderarms und die radiale Hälfte des Handrückens (vgl. Abb. 46).

Die Radialislähmung gehört zu den häufigsten peripherischen Lähmungen. Der dabei im einzelnen resultierende Lähmungskomplex hängt von dem Sitz der Schädigung des Nerven ab. Tricepslähmung (der Ellbogen kann nicht gestreckt werden) ist selten und wird nur bei Läsion des obersten Abschnittes des Nerven beobachtet. Die häufigste Form ist die Lähmung der Strecker der Hand und der Fingergrundphalangen. Die Hand hängt dabei schlaff herab (sog. Fallhand); die Streckung der Finger ist nur in den beiden distalen Gelenken (*N. ulnaris*) möglich; die Extensionschwäche pflegt sich zuerst im 3. und 4. Finger zu zeigen. Es besteht ferner aber auch Herabsetzung der Kraft der Finger bei der Beugung derselben, z. B. bei Händedruck, da hierbei normal die Hand in Extensionsstellung gebracht wird. Nach passiver Streckung des Handgelenks wird die Kraft der Fingerbeuger wieder normal.

Der **N. medianus** (C. 5—8, D. 1) innerviert motorisch von den Handbeugern den *Flexor carpi radialis* und *palmaris longus*, die Pronatoren (*Pronator teres* und *quadrat.*), von den langen Fingerflexoren den



Flexor digitorum superficialis, der die Beugung der 2. Phalanx besorgt, sowie den radialen Teil des die Beugung der 3. Phalanx bewirkenden Flex. digit. profundus, ferner den Flex. pollicis longus und brevis, die Mm. lumbrical. des 2. und 3. Fingers (d. h. die Flexoren der Grund- und die Extensoren der Endphalanx der Finger), den Abductor pollicis brevis sowie Flexor brevis und Opponens pollicis, d. h. die Muskeln des Daumenballens, die den Daumen opponieren und der Handfläche zuwenden, endlich die Muskeln des Kleinfingerballens. Die sensiblen Fasern versorgen die radiale Hälfte der Vola manus und die aus Abb. 46 ersichtlichen distalen Teile der Streckseite der ersten drei Finger.

Symptome der Medianuslähmung: Erschwerung bzw. Aufhebung der Pronation und der Beugung im Handgelenk; der Daumen kann weder gebeugt noch opponiert werden (sog. Affenhand); auch besteht Abflachung des Daumenballens. Übrigens kann ausnahmsweise die Opposition erhalten bleiben, wenn, was gelegentlich vorkommt, die Muskeln des Thenar vom N. ulnaris innerviert werden. Die Beugung der Finger kann nur in den Grundphalangen (Mm. interossei) ausgeführt werden. Am deutlichsten ist die Aufhebung der Beugung beim Zeigefinger. Ergreifen und Festhalten von Gegenständen ist nicht mehr mit den ersten beiden Fingern, sondern nur mit dem 3.—5. Finger möglich; Schreiben und Nähen ist daher unmöglich. Pronation des Vorderarmes wird durch Einwärtsrollung des Vorderarmes ersetzt. Häufiger ist die Lähmung des

**N. ulnaris** (C. 7—8, D. 1). Er innerviert von den Handbeugern den Flex. carpi ulnaris, von den Fingerbeugern den Flex. digit. profundus des 4. und 5. Fingers (Beugung der 3. Phalanx), ferner die Mm. interossei sämtlicher Finger sowie die Mm. lumbrical. des 4. und 5. Fingers, den M. adductor pollicis sowie sämtliche Muskeln des Kleinfingerballens. Die sensiblen Fasern versorgen die ulnare Hälfte der Hand sowohl der Vola wie des Dorsums. Ulnarislähmung bewirkt Abschwächung der Beugung und der Ulnarflexion der Hand und Aufhebung der Bewegung des 5. Fingers sowie der Flexion in den Grundphalangen und der Extension der Endphalangen des 2.—4. Fingers, ferner der Spreizung der Finger. Besteht die Lähmung längere Zeit, so entwickelt sich die sehr charakteristische sog. Krallen- oder Klauenhand (Extension in den Metacarpophalangeal-, Flexion in den Interphalangealgelenken); der Daumen befindet sich in abduzierter Stellung, die Spatia interossea sinken ein, das Hypothenar zeigt deutliche Abflachung. Die Sensibilitätsstörungen mit ihrer charakteristischen Verteilung ergeben sich aus dem oben Gesagten.

Lähmung des **Plexus brachialis** (5.—8. Cervical-, 1. und 2. Dorsalwurzel) bewirkt schlaffes Herabhängen des vollständig gelähmten Armes. Von den Schulterblattmuskeln bleibt nur der Trapezius von der Lähmung verschont. Außer der vollständigen Plexuslähmung gibt es eine obere und eine untere Armplexuslähmung. Bei dem häufigeren oberen Lähmungstyp (Erbsche Lähmung), der nach Traumen in der Gegend des sog. Erbschen Punktes am Hinterrand des Sternocleidio beobachtet wird, besteht die Unmöglichkeit, den Arm zu heben und den

Ellbogen zu beugen (Lähmung des Deltoideus, Biceps, Brachialis intern. und Supinator longus).

Bei der unteren oder Klumpkeschen Plexuslähmung (8. Cervical- und 1. Thorakalnerv) sind meist nur der Daumen- und Kleinfingerballen sowie die Mm. interossei, mitunter außerdem einzelne Unterarmflexoren gelähmt. Ferner beobachtet man hierbei als Folge der Läsion des Ramus communicans des Sympathicus des 1. Brustnerven den sog. Hornerischen Symptomenkomplex, d. h. Verengung der Pupille, Verkleinerung der Lidspalte sowie Zurücksinken des Bulbus.

Die Nn. dorsales innervieren motorisch die Rücken-, Intercostal- und die Bauchmuskeln, sensibel die aus Abb. 46 ersichtlichen Bezirke der Rumpfhaut.

Der Plexus lumbalis umfaßt den 12. Dorsal- und die 1.—4. Lumbalnerven. Die dorsalen Äste innervieren motorisch den M. sacrospinalis (Erector trunci), sensibel die Haut der oberen Gesäßgegend; vordere sensible Äste sind die Nn. iliohypogastric., ilioinguinal., lumbo-inguinal., spermat. extern., cutan. femor. later. Sie innervieren die Haut der Hüfte, des Mons veneris sowie die vordere und Außenseite der oberen Oberschenkelregion (vgl. Abb. 46). Praktisch bedeutsam ist die Lähmung des

**N. femoralis.** Er innerviert motorisch den M. ileopsoas (Hüftbeuger), den M. quadriceps femoris (Kniestrecker) sowie den M. sartorius, sensibel die Vorderfläche des Oberschenkels sowie die Innenfläche des Unterschenkels und Fußes (N. saphenus). Femoralislähmung macht das Aufrichten aus liegender Stellung bzw. die Beugung des Oberschenkels sowie die Streckung des Unterschenkels (z. B. beim Treppensteigen) unmöglich und bewirkt entsprechenden Sensibilitätsausfall.

Der N. obturatorius (Lumb. 2—4) versorgt die Mm. obturator extern., adductor longus und brevis sowie den M. pectinatus. Lähmung macht vor allem die Adduktion der Beine und das Übereinanderschlagen derselben unmöglich. Sensibilität: Innenfläche des Oberschenkels.

Der N. cutaneus femoris later. ist ein rein sensibler Nerv, der die Außenfläche des Oberschenkels innerviert.

Der Plexus sacralis (5. Lumbal- und 1.—5. Sakralnerv) enthält motorische und sensible Fasern. Zu ihm gehören folgende Nerven:

Der rein motorische N. glutaicus sup. innerviert die Mm. glutaici med. und min. (Abduction des Beins sowie Fixierung des Beckens an das Standbein beim Gehen), den M. pyriformis (Drehung des Beines nach außen) und den Tensor fasciae latae (Beugung und Drehung des Oberschenkels nach innen). Lähmung bewirkt Senkung des Beckens nach der gesunden Seite beim Gehen sowie watschelnden Gang.

Der rein motorische N. glutaicus inf. innerviert den M. glutaicus sup. (Streckung des Oberschenkels nach hinten). Lähmung macht das Aufrichten aus gebückter Stellung ohne Zuhilfenahme der Arme sowie das Treppensteigen, Springen usw. unmöglich.

Der rein sensible N. cutaneus femoris poster. versorgt die Haut der Hinterbacken sowie die Hinterfläche des Oberschenkels.

Der N. ischiadicus gibt an den Oberschenkel ausschließlich motorische Fasern ab und zwar an die Gruppe der Auswärtsroller des Oberschenkels (Mm. gemelli, obturator intern., quadratus femor.), ferner an die

Mm. biceps femor., semimembranosus und semitendinosus (Kniebeuger). Der Nerv teilt sich in der Mitte des Oberschenkels in die Nn. peroneus und tibialis.

Der **N. peroneus** innerviert motorisch die Mm. peronei (Heben des Fußes, insbesondere des äußeren Fußrandes), tibialis anticus (Heben des Fußes, besonders des Innenrandes), extensor digit. ped. commun. long. und brev., extensor halluc. long., sensibel die Außen- und Hinterseite des Unterschenkels und des Fußrückens. Für Peroneuslähmung ist charakteristisch das Herabhängen der leicht supinierten Fußspitze (Spitzfußstellung, Pes equinovarus) mit in den Grundphalangen gebeugten Zehen. Beim Gehen schleift die Fußspitze am Boden; die Kranken heben daher, um dies zu vermeiden, den Fuß abnorm hoch (sog Steppergang oder Hahnentritt).

Der **N. tibialis** innerviert motorisch die Wadenmuskeln (Mm. gastrocnemius und soleus), die das Strecken des Fußes durch die Achillessehne bewirken, ferner den M. tibialis post., der den Fuß unter Hebung des inneren Fußrandes adduziert, endlich die Zehenbeuger und die Muskeln der Fußsohle, sensibel die Haut der Fußsohle und den lateralen Fußrand (N. suralis). Tibialislähmung macht die Plantarflexion des Fußes, die Beugung der Zehen sowie das Stehen auf den Fußspitzen und das Springen unmöglich.

Der **N. pudendus** innerviert motorisch die Muskeln des Beckenbodens, den Sphincter ani extern. sowie Bulbo- und Ischio-cavernosus, sensibel Penis, Scrotum, die Labien, Urethra und Vagina, Damm und After, dagegen nicht Testikel und Funiculus spermat., deren Innervation vom 2. Lumbalsegment erfolgt.

### Die Neuralgien.

Die Neuralgie ist eine Reizerscheinung sensibler Nerven, die, wie man annimmt, von keiner anatomischen Veränderung der Nerven begleitet ist. Charakteristisch für die Neuralgie ist der anfallsweise auftretende Schmerz und das Ausbreitungsgebiet desselben, das mit dem Areal eines peripherischen sensiblen Nerven übereinstimmt. Es fehlen motorische sowie gröbere sensible Ausfallserscheinungen.

Zu den Ursachen der Neuralgien zählen vor allem toxisch wirkende Momente sowohl exogener wie endogener Natur. Hierher gehören verschiedene Infektionskrankheiten, in erster Linie Influenza, Malaria, Lues, weiter Alkohol, Nicotin, Arsen, Blei, Quecksilber, ferner auch Stoffwechselkrankheiten, insbesondere Diabetes, Gicht und Fettsucht, auch chronische Obstipation, endlich die Carcinomkachexie und der Morbus Basedowii. Aber auch die mechanische Schädigung eines Nerven, z. B. infolge krankhafter Veränderungen in seiner Nachbarschaft, ein Knochencallus, Narbengewebe, Tumoren, Aneurysmen usw. können durch Kompression oder Zerrung der Nerven Neuralgien erzeugen. Eine große Rolle spielen ferner rheumatische Schädlichkeiten, speziell Erkältungen infolge von Zugluft oder Durchnässung. Weitere spezielle Ursachen s. unten. Disponierende Momente sind schließlich schlechter

allgemeiner Ernährungszustand, Anämie sowie Neurasthenie und Hysterie. Männer erkranken im allgemeinen häufiger an Neuralgien als Frauen.

Der neuralgische Schmerz ist durch sein plötzliches anfallsweises Auftreten, häufig ohne Vorboten, bisweilen mit vorausgehenden Parästhesien (Ameisenlaufen usw.), ferner durch seine sehr große Heftigkeit und seine Ausbreitung genau dem anatomischen Verlauf des Nerven entsprechend ausgezeichnet. Bei sehr intensiven Anfällen kann es zum sog. Irradiieren des Schmerzes, d. h. zum Ausstrahlen in benachbarte Nervengebiete kommen. Der Schmerz, der oft von größter Heftigkeit ist, zeigt meist nicht gleichmäßige Intensität, sondern tritt oft stoßweise in Form von Paroxysmen auf. Er dauert häufig nur Minuten, bisweilen aber auch Stunden. Die Haut im Bereich der Neuralgie ist oft hyperästhetisch, so daß schon geringer Druck, Berührung usw. als unerträglich empfunden wird. Objektiv ist die Haut des erkrankten Gebietes bisweilen gerötet, in anderen Fällen abnorm blaß. Mitunter stellen sich lokale Sekretionserscheinungen wie Schweißbildung, Tränenfluß ein; manchmal kommt es zu unwillkürlichen Muskelzuckungen im erkrankten Gebiet. Ein wichtiges, aber nicht obligates Symptom, das oft auch in dem schmerzfreien Intervall nachweisbar ist, ist die Druckempfindlichkeit einzelner Punkte des erkrankten Nerven, der sog. Valleixschen Druckpunkte, die sich namentlich dort finden, wo der Nerv aus einem Knochenkanal austritt oder auf einer festen Unterlage aufliegt. Die Dauer einer Neuralgie kann sich auf wenige Tage oder Wochen beschränken; in anderen Fällen erstreckt sie sich auf Jahre und bildet dann nicht selten ein die Kräfte, den Ernährungszustand und die seelische Verfassung des Kranken geradezu unterminierendes Leiden.

Die **Trigeminusneuralgie** befällt nur selten alle drei Äste des sensiblen Trigeminus, meist nur zwei oder einen Ast und zwar in der Regel immer nur der einen Seite; nur der III. Ast erkrankt häufiger beiderseitig. Ätiologisch kommen als lokale Ursachen Erkrankungen des Auges (Prüfung der Refraktion!), des Ohres, der Nase sowie der Mundhöhle (Zahnkaries; Ostitis alveolaris bei fehlenden Zähnen), ferner Empyeme der Kiefer- und Stirnhöhle in Betracht, als allgemeine Ursachen die Erkältungen sowie vor allem infektiöse und toxische Ursachen, speziell Influenza und Malaria mit Bevorzugung des I. Astes, Diabetes und Lues mit einer solchen des III. Astes (evtl. beiderseitig). Druckpunkte sind bei Trigeminusneuralgie die Austrittsstellen der Nerven aus den Knochen, insbesondere der Supraorbital- und Infraorbital- sowie der Mentalpunkt am Foramen mentale. Tränenträufeln, Rötung der Haut und Hyperästhesie sind häufig. Bisweilen beobachtet man unwillkürliche Muskelzuckungen als sog. Tic douloureux. In veralteten Fällen kann es zum umschriebenen Ergrauen der Haare sowie zu Haarausfall kommen. Trigeminusneuralgien zeichnen sich häufig durch große Hartnäckigkeit aus.

Die **Occipitalneuralgie** betrifft hauptsächlich den N. occipit. maj. und ist oft doppelseitig. Die Schmerzen erstrecken sich über den Hinterkopf bis zum Scheitel. Ein charakteristischer Druckpunkt findet sich in der Mitte zwischen dem Warzenfortsatz und den obersten Halswirbeln.

Die **Ischias**, die Neuralgie des N. ischiadicus, ist die häufigste Neuralgie. Erkältungen sowie traumatische Schädigung spielen bei ihrer Entstehung eine besonders wichtige Rolle; außerdem sind als häufige Ursache Krankheitsprozesse im Becken, gynäkologische Leiden, Hämorrhoiden, chronische Obstipation, ferner Erkrankungen der Beckenknochen (Tuberkulose, Tumoren), weiter auch der gravide Uterus, schließlich Gicht und Diabetes zu nennen. Männer erkranken öfter an Ischias als Frauen. Auch kommt das Leiden bei der körperlich arbeitenden Bevölkerung häufiger vor. In der Regel ist die Neuralgie einseitig, nur ausnahmsweise (z. B. bei Diabetes) doppelseitig; im übrigen ist beiderseitige „Ischias“ stets auf andere Prozesse, speziell spinale Leiden (Wirbelsäulenerkrankung, Tumoren, Tabes incipiens) verdächtig.

Das Leiden stellt sich nicht selten allmählich ein und erreicht erst nach einiger Zeit seine größte Heftigkeit. Häufig bestehen dauernd Schmerzen, die nur von Zeit zu Zeit spontan oder auf äußere Anlässe exazerbieren, wogegen vollständig beschwerdefreie Intervalle oft fehlen. Die Neuralgie wird im Gesäß, an der Hinterfläche der Oberschenkel, in den Kniekehlen, an der Außenseite des Unterschenkels und des Fußes sowie im Fußrücken lokalisiert, wobei aber die größte Intensität des Schmerzes bald mehr den Oberschenkel, bald den Unterschenkel betrifft, was übrigens auch von Fall zu Fall wechselt. Sitzen auf harter Unterlage, Gehen sowie Abkühlung verstärken den Schmerz, während er beim Stehen und Liegen meist an Heftigkeit abnimmt. Jede, eine Dehnung des Nerven bewirkende Bewegung steigert den Schmerz; daher schont der Patient beim Gehen das kranke Bein, indem er sich auf das gesunde Bein stützt und den Schwerpunkt auf dessen Seite zu verlegen sucht. Eine Folge der Ischias ist häufig eine nach der kranken Seite konkave Skoliose der Wirbelsäule, die bei aufrechter Haltung des Patienten sichtbar ist und sich bei längerem Bestehen des Leidens einzustellen pflegt. Der Kranke sitzt möglichst auf dem Sitzknorren der gesunden Seite und hält Hüft- und Kniegelenk des kranken Beins in leicht gebeugter Stellung. In schweren Fällen ist er ans Bett gefesselt.

Zu den objektiven Symptomen der Ischias gehören einmal das Lasèguesche Symptom (identisch mit dem Kernigschen Phänomen), d. h. lebhafter Schmerz und Widerstand bei Beugung des im Knie gestreckten Beines gegen den Rumpf; ferner verschiedene, aber nicht konstante Druckpunkte: vor allem Druckempfindlichkeit in der Gesäßfalte zwischen Trochanter und Tuber ossis ischii, weiter der sog. Lumbal- und Ileosakralpunkt am Dornfortsatz des 5. Lendenwirbels resp. neben der Spin. iliac. post. sup., weiter der Poplitealpunkt in der Mitte der Kniekehle, der Peronealpunkt in der Gegend hinter dem Capitulum fibulae, der Malleolarpunkt hinter dem Malleol. later., endlich der Fußrücken in der Gegend des ersten Spatium intermetatarsale. Die Patellarreflexe sind häufig lebhaft. Der Achillesreflex dagegen fehlt mitunter auf der kranken Seite, auch ist hier die Achillessehne bisweilen verbreitert bzw. erschlafft. Leichte Hypästhesie im Bereich der Außenseite des Unterschenkels (N. cutan. surae lateral.) ist nicht selten,

während schwerere Sensibilitätsstörungen nicht zum Bilde der gewöhnlichen Ischias gehören. Bei längerem Bestehen des Leidens stellt sich regelmäßige Muskelatrophie am Ober- und Unterschenkel ein, größtenteils wohl als Folge der Inaktivität der Muskeln. Die Ischias pflegt in der Regel mindestens einige Wochen, oft viele Monate anzuhalten und zeigt auch nach Besserung bzw. Heilung eine große Neigung zu Rückfällen.

Schwerere Symptome wie starke Sensibilitätsstörungen, höhere Grade von Muskelatrophie, Entartungsreaktion sowie ununterbrochener intensiver Schmerz müssen den Gedanken an eine echte Neuritis des Nerven nahelegen, die übrigens von mancher Seite für jede Ischias angenommen wird.

Bei der Diagnose ist vor allem das obengenannte symptomatische Vorkommen von Ischias bzw. ischiasähnlichen Schmerzen bei anderen Erkrankungen zu berücksichtigen (Untersuchung des Harns auf Zucker, Digitaluntersuchung per rectum und per vaginam, Röntgenphotogramm des Beckens), ferner die Abgrenzung gegenüber Hüftgelenkerkrankungen (Coxitis und Malum coxae), für die der bei Ischias fehlende Stauchungsschmerz (Stoß gegen den Trochanter) sowie der Schmerz bzw. die Bewegungshemmung des Oberschenkels bei Abduction charakteristisch sind. Differentialdiagnostisch kommen auch Senkungsabscesse (Psoasabsceß) in Betracht. Nicht selten ist ferner eine Verwechslung mit Plattfußbeschwerden. Als objektive Ischiassymptome, die namentlich auch bei Begutachtungsfällen von entscheidendem Wert sind, sind zu nennen das Lasèguesche Symptom, ferner das Fehlen des Achillesreflexes, die Skoliose sowie die Volumabnahme der Muskeln des erkrankten Beines (Bandmaß!).

Therapie s. unten.

**Intercostalneuralgie.** Neuralgien der Intercostalnerven, namentlich der mittleren, sind nicht selten. Sie sind in der Regel einseitig und bevorzugen die linke Seite. Neben den nicht sehr häufigen idiopathischen Fällen ist das Leiden besonders oft die Folge von Erkrankungen der Nachbarschaft der Nerven, speziell von Wirbelcaries, Aneurysmen, Rippenfrakturen, pleuritischen Schwarten, Kyphoskoliosen sowie spinalen Erkrankungen. Oft wird fälschlich eine Neuralgie beim Bestehen einer frischen Pleuritis diagnostiziert, um so mehr als bei beiden Erkrankungen Husten, Niesen, lautes Sprechen die Beschwerden verstärken. Charakteristisch sind drei Schmerzpunkte und zwar einer dicht neben der Wirbelsäule, ein zweiter am Sternum bzw. am M. rectus abdominis nahe der Mittellinie, ein dritter im mittleren Verlauf des Nerven.

In der Form der Intercostalneuralgie kann auch der **Herpes zoster** (Gürtelrose) auftreten. Charakteristisch ist außer dem Schmerz die Eruption kleiner Bläschen in der Haut im Bereich einzelner Intercostalnerven. Die Schmerzen, die häufig sehr heftig und mit Hyperästhesie des betreffenden Hautbezirkes verbunden sind, gehen dem Erscheinen der Bläschen kurze Zeit voraus, desgleichen mitunter mäßiges Fieber mit Störung des Allgemeinbefindens. Öfter sind die regionären Achseldrüsen etwas geschwollen. Die Bläschen zeigen zunächst serösen, später eitrigem Inhalt und trocknen schließlich ein. Vereinzelt kommt es zu Ulceration oder gar zu Gangrän, welche Narbenbildung hinterlassen. Oft überdauert die zurückbleibende Neuralgie noch längere

Zeit den Herpes. Der dem Leiden zugrunde liegende anatomische Prozeß ist eine hämorrhagische (infektiöse?) Entzündung der entsprechenden Spinalganglien. Gelegentlich beobachtet man ein epidemieartiges Auftreten der Erkrankung. Andererseits können auch mechanische Schädigungen, z. B. Frakturen oder Carcinometastasen der Wirbelsäule sowie toxische Agenzien, speziell Arsen und CO das gleiche Bild zur Folge haben. Herpes zoster kann übrigens auch im Bereich des Trigemini (Gangl. Gasseri) auftreten. Die hierbei mitunter auf der Cornea bulbi entstehende Herpeseruption kann eine schwere Gefährdung des Auges bewirken.

Seltenere Formen der Neuralgien sind die Neuralgie der Armnerven oder Brachialgie (nicht zu verwechseln mit den ausstrahlenden Schmerzen bei Angina pectoris oder Aneurysmen), ferner die als Mastodynie bezeichnete Brustdrüsenneuralgie, die nur bei Frauen namentlich in der Gravidität und im Puerperium auftritt und oft mit starker Hauthyperästhesie, speziell der Mamillen einhergeht, die als Meralgia paraesthetica bezeichnete Neuralgie des N. cutan. femoralis lateralis (Außen- und Vorderseite des Oberschenkels), endlich die Neuralgia spermatica, die in einseitigen sehr heftigen Schmerzanfällen im Bereich des Samenstrangs und Hodens besteht und durch starke Hyperästhesie des Hodens und Scrotums ausgezeichnet ist; hier kommen differentialdiagnostisch vor allem Nierensteinkoliken sowie Tabes in Frage.

Die Therapie der Neuralgien besteht einmal in Beseitigung etwaiger ursächlicher Schädlichkeiten (Behandlung eines Diabetes, einer Malaria, Lues usw., eines gynäkologischen Leidens usw.), ferner in Verordnung von körperlicher und geistiger Schonung und Ruhe, wenn möglich zunächst von Bettruhe, sowie Vermeiden von klimatischen und Witterungsschädlichkeiten, insbesondere von Feuchtigkeit, Kälte und Zugluft. Neben Schwitzprozeduren spielt die lokale Applikation von Wärme in Form von Heißluft, Dampfduschen, heißen Bädern, heißen Sandpackungen sowie vor allem als Diathermie eine große Rolle. Nur in manchen akuten Fällen wirkt Kälteapplikation lindernd. Zu den ältesten und vorübergehend oft erfolgreichen Behandlungsarten gehört die „ableitende“ Therapie durch Hautreize, z. B. mittels Senfpflaster, Emplastr. cantharid. ordin. oder perpet., ferner durch trockene oder blutige Schröpfköpfe, Blutegel; bei besonders hartnäckigen Fällen evtl. circumscripse oberflächliche Kauterisierung der Haut mit dem Galvanokauter. Vielfach sehr wirksam sind ferner die als Antineuralgica bezeichneten Medikamente: Aspirin und Natr. salicyl., Pyramidon (2–3 mal tägl. 0,3–0,5), Phenacetin, Antipyrin bzw. deren Mischung, z. B. Antipyrin und Phenacetin aa 0,25, 2 mal tägl. 1 Pulver, ferner Migränin (0,5–1,0).

Bei Trigemineuralgie sind oft Trigemini (Butylchloralhydrat — Pyramidon) 1–3 mal täglich 0,25–0,5, ferner das Chlorlyen (mehrmals täglich Einatmung von 20–30 Tropfen auf das Taschentuch getropft) von Erfolg. Bei hartnäckigen Fällen ist bisweilen Aconit als Tct. aconiti 3–4 mal täglich 5–8 Tropfen bzw. Aconitin 2–4 mal täglich 0,1 mg in Pillen oder Tabl. sowie gleichzeitiges starkes Purgieren wirksam. In chronischen refraktären Fällen Injektionen von 1–2 ccm 80%igen Alkohol in den Nerven, sowie als ultima ratio die chirurgische Excision des erkrankten Nervenastes bzw. beim Versagen dieses Eingriffs die (nicht ungefährliche) Extirpation des Ganglion Gasseri. — Bei Ischias kommt neben der allgemeinen antineuralgischen Therapie die Injektion von physiologischer NaCl-Lösung in den Nerven in Frage (Injektionsstelle Mitte zwischen Trochanter maj. und Tuber ischii, einige Kubikzentimeter in den Nerven selbst, der Rest von etwa

150 ccm und mehr in die Umgebung desselben, eventuell mehrmalige Wiederholung der Injektionen); ferner die sog. epidurale Injektion von 10 ccm physiologischer NaCl-Lösung in die hintere untere Öffnung des Sakralkanals (Hiatus sacral.), deren Lage man durch Palpation der knöchernen Cornua sacral. feststellt; die Nadel ist während der Injektion nach oben gerichtet; die Injektionen sind eventuell alle 2—3 Tage zu wiederholen. In vielen Fällen hilft die behutsam und systematisch durchgeführte Dehnung des Nerven in der Form der Lasègueschen Probe, aber erst nach Übergang der Neuralgie in das chronische Stadium bzw. nach Ablauf der ersten 14 Tage; nicht mehr angewendet wird die blutige, d. h. operative Extension des Nerven. — Bei **Herpes zoster** Pudern mit Zink- oder Lenizetpuder; Anästhesinsalbe (2—5<sup>0</sup>/<sub>10</sub>ig) wirkt schmerzlindernd.

In zahlreichen Fällen von Neuralgie ist nach Ablauf des akuten Stadiums eine sachgemäß und vorsichtig durchgeführte *Massage* von großem Vorteil. Eine gefährliche Klippe für alle chronischen Neuralgiker ist die Gewöhnung an das Morphium. Man sei daher mit diesem Mittel äußerst zurückhaltend, da sonst bei der Hartnäckigkeit zahlreicher Neuralgien später die Gefahr des Morphinismus oft unvermeidlich ist.

## Neuritis und Polyneuritis.

Unter Neuritis versteht man die unter den Zeichen der Leitungsstörung einhergehenden Krankheitsprozesse der peripherischen Nerven, die auf bestimmten anatomischen Veränderungen derselben beruhen. Letztere sind teils entzündlicher, teils rein degenerativer Art und führen zu Zerfallerscheinungen an Achsencylindern und Markscheiden. Im allgemeinen nimmt die Intensität der pathologischen Veränderungen von der Peripherie her zum Zentrum ab. Praktisch sehr wichtig ist ferner der hohe Grad von Regenerationsfähigkeit der peripherischen Nerven, der eine Restitutio ad integrum selbst nach schwerster Neuritis ermöglicht. Im einzelnen unterscheidet man Mononeuritiden, disseminierte Neuritiden (Erkrankung mehrfacher Nerven), endlich Polyneuritiden (symmetrische Erkrankung mehrfacher Nerven in einer bestimmten gesetzmäßigen Anordnung).

Ursachen neuritischer Prozesse sind in erster Linie Erkältungen sowie mechanische bzw. traumatische Schädigungen der Nerven wie Zerrung, Druck usw., sowie ferner Überanstrengung im Bereich des betreffenden Muskelgebietes. Zur letzteren Kategorie gehören die zahlreichen als Berufskrankheit im Bereich der oberen Extremitäten auftretenden Neuritiden, z. B. bei Schlossern, Trommlern, Zigarrenwicklerinnen, Schmieden, Webern usw. Hierbei zeigt sich, daß die professionell besondere Nervengruppen bevorzugenden Neuritiden besonders in den Fällen auftreten, in denen gleichzeitig bestimmte Gifte auf den Körper einwirken, wie überhaupt die Bedeutung toxischer Einflüsse bei der Entstehung der Neuritiden und namentlich der Polyneuritiden eine sehr große ist. Zu diesen „neurotrophen“ Giften gehören in erster Linie Alkohol und Blei, ferner Schwefelkohlenstoff (Gummifabriken), Kohlenoxyd, Quecksilber, Phosphor, Arsen, verschiedene Benzolderivate, Anilin usw. Eine große Rolle spielen weiter Infektionskrankheiten resp. Bakterientoxine, insbesondere die Diphtherie, Typhus, Influenza, Sepsis (namentlich die puerperale Form), Tuberkulose, Lues, Ruhr usw. Autointoxikationen werden bei den Neuritiden im Verlauf von Diabetes, Gicht, Carcinomkachexie sowie bei der Gravidität u. ä. als



Ursache angenommen. Auch der Arteriosklerose kommt mitunter eine ätiologische Bedeutung zu. Endlich gibt es Fälle, die mangels einer bekannten Ätiologie als idiopathische Polyneuritis bezeichnet werden.

Die klinischen Symptome der Neuritis sind in erster Linie, soweit es sich um sensible Nerven handelt, Schmerzen nach Art der Neuralgien, wie denn überhaupt ein Teil der letzteren, z. B. manche Formen von Ischias auf einer Neuritis beruhen dürften. Doch ist der Schmerz keine obligate, wohl aber eine sehr häufige Begleiterscheinung; bei der Neuritis eines rein motorischen Nerven fehlt sie vollkommen. Ferner finden sich Sensibilitätsdefekte (Anästhesien) und Parästhesien, weiter vor allem Lähmungen sowie Muskelatrophien mit EaR., endlich trophische Störungen an Haut und Nägeln sowie lokale Ödeme. Die Beteiligung der verschiedenen Nerven an der Neuritis ist von Fall zu Fall nach Art und Ausdehnung des Prozesses eine sehr verschiedene, indem einmal nur ein Nerv, im anderen Fall zahlreiche Nerven zugleich erkranken. Bezüglich der Sensibilitätsstörungen ist bemerkenswert, daß bei manchen Fällen von Neuritis und Polyneuritis vor allem die Tiefensensibilität alteriert ist, so daß der Lage- und Gelenksinn eine Störung erfährt und Ataxie resultiert. Bei den umschriebenen Neuritiden bestehen häufig ausschließlich motorische Ausfallserscheinungen, Lähmungen und Atrophien, dagegen keine Sensibilitätsstörungen.

**Krankheitsbild der Polyneuritis:** Die Erkrankung beginnt häufig unter dem Bilde einer akuten Infektionskrankheit; bisweilen wird epidemisches Auftreten beobachtet. Vor allem wird das jüngere und mittlere Lebensalter befallen. Häufig bestehen Fieber sowie eine erhebliche Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens mit Kopfschmerzen, Übelkeit, Abgeschlagenheit, mitunter Milzvergrößerung, gelegentlich Delirien. Es stellen sich ferner heftige, oft reiße Scherzen in der Kreuzgegend und vor allem in den Extremitäten in symmetrischer Ausbreitung entsprechend dem Verlauf der Nerven ein, häufig zugleich mit Parästhesien und dem Gefühl von Vertaubung oder Ameisenlaufen.

Als bald treten auch Lähmungen auf, die bei den akuten Formen sich zuweilen zunächst fast über den gesamten Körper erstrecken, so daß der Patient völlig unbeweglich wird. Später geht dann die Lähmung auf einzelne Gebiete, in denen sie sich längere Zeit hält, zurück. In anderen Fällen werden von vornherein nur einzelne Nervengruppen von der Erkrankung ergriffen. Eine Prädilektion zeigen die Nerven der Vorderarme und Hände sowie der Unterschenkel und Füße; namentlich werden hier die Extensoren von der Lähmung betroffen. So entstehen dann paraplegische oder auch tetraplegische Lähmungsbilder. Stets handelt es sich um schlaffe Lähmungen, die charakteristischerweise einen ausgesprochen symmetrischen Charakter zeigen. Die Sehnenreflexe des erkrankten Gebietes fehlen. Blasen- und Mastdarmfunktion sowie die Reaktion der Pupille bleiben bei der Polyneuritis stets intakt. In einzelnen Fällen treten ferner multiple Gelenkschwellungen auf, die an Polyarthritiden erinnern.

Die sensiblen Reizerscheinungen, die bei Beginn der Krankheit oft vorhanden sind, pflegen in der Regel bald an Intensität abzunehmen,

dagegen bleiben oft Druckempfindlichkeit insbesondere der großen Nervenstämme und Schmerzhaftigkeit der gelähmten Teile bei passiven Bewegungen sowie Sensibilitätsdefekte vor allem im Bereich der distalen Bezirke zurück. Frühzeitig stellt sich Ea.R. und bald auch Atrophie der gelähmten Muskeln ein. Pyramidenbahnsymptome, speziell das Babinskische Zehenphänomen werden niemals beobachtet. Auch psychische Störungen können gelegentlich und zwar in der charakteristischen Form der Korsakoffschen Psychose auftreten. Diese kommt hauptsächlich bei der alkoholischen Polyneuritis vor; bezeichnend für sie ist die Störung der Merkfähigkeit für die Erlebnisse der jüngsten Zeit und die Neigung zum Konfabulieren, während die Erinnerung für die ältere Vergangenheit nicht gestört ist. Derartige Fälle pflegen einen sehr langwierigen Verlauf zu nehmen und nur mit Defekten auszuheilen.

Die akut einsetzenden Fälle von Polyneuritis können einen akuten oder sogar foudroyanten, ungünstigen Verlauf nehmen, indem die Lähmungen schnell von den unteren zu den oberen Extremitäten und zu den Bauch- und Atemmuskeln aufsteigen, so daß die Patienten nach kurzer Krankheitsdauer an Atemlähmung sterben (neuritische Form der sog. Landry'schen Paralyse). Ätiologisch handelt es sich hier in der Regel um Infektionen, nächst dem um Alkoholintoxikation. In anderen Fällen geht die Krankheit in ein chronisches Stadium über, das oft Monate dauert, oder sie verläuft von vornherein chronisch.

Bezüglich besonderer Formen der Polyneuritis sind folgende Einzelheiten zu erwähnen.

Die rein motorische Polyneuritis bei Bleivergiftung (Polyneuritis saturnina) ist ausgezeichnet durch beiderseitige Radialislähmung, während Sensibilitätsstörungen und Schmerzen vollkommen zu fehlen pflegen. Ein Beispiel für die gemischte motorisch-sensible Form ist die Alkoholpolyneuritis, die überhaupt die häufigste Polyneuritis ist. Sie erstreckt sich in schweren Fällen auf die oberen und unteren Extremitäten (speziell Radialis- und Peroneuslähmung) und kann auch die Gehirnnerven in die Lähmung einbeziehen (doppelseitige Facialis- und Abducenslähmung) oder sie beginnt sogar ausnahmsweise im Bereich der letzteren. Der N. opticus bleibt übrigens stets verschont. In einzelnen Fällen treten die motorischen Störungen hinter diejenigen der Tiefensensibilität zurück, so daß hochgradige ataktische Störungen speziell der unteren Extremitäten wie bei Tabes mit Verlust der Sehnenreflexe auftreten, während die Oberflächensensibilität für Berührung usw. intakt bleibt (sog. akute heilbare Ataxie der Potatoren). Die Druckempfindlichkeit der großen Nervenstämme kann hier fehlen. Unter dem Bilde einer derartigen sog. Pseudotabes peripherica verläuft besonders häufig auch die postdiphtherische Polyneuritis, für die zugleich die Gaumensegel- und Akkommodationslähmung charakteristisch ist (die Kranken verschlucken sich bei der Nahrungsaufnahme und können in der Nähe nicht deutlich sehen). Die Polyneuritis nach Arsenvergiftung, welche motorische wie sensible Erscheinungen verursacht, zeigt im Gegensatz zur Bleineuritis eine Vorliebe für die unteren Extremitäten. Schwefelkohlenstoffneuritiden befallen in der Regel die Beuger der Hand und die Strecker des Fußes.

Die arteriosklerotische Neuritis im Greisenalter äußert sich bisweilen nur durch den Verlust einzelner Sehnenreflexe. Bei der puerperalen Form werden besonders häufig die Nn. medianus und ulnaris befallen; traumatisch können durch den Partus auch die Nerven der unteren Extremitäten (speziell der N. peroneus) in Mitleidenschaft gezogen werden.

Nach Abheilung neuritischer Prozesse bleibt oft als Residuum der Krankheit trotz Wiederherstellung der Funktion der Nerven noch längere Zeit das Fehlen

der Sehnenreflexe, insbesondere der Patellar- bzw. der Achillessehnenreflexe bestehen.

Therapie der Polyneuritis: Ausschaltung aller ursächlichen Faktoren (z. B. Alkohol, Blei usw.; bei Ruhr Dysenterieserum). Bett-ruhe auch in den leichten Fällen. Sorgfältigste allgemeine Pflege (vor allem Prophylaxe des Decubitus vgl. S. 541), zweckmäßige Lagerung der gelähmten Extremitäten unter Anwendung von Binden und Kissen (Vermeiden der Spitzfußstellung). Alle lokalen Prozeduren sollen anfangs nur mit größter Vorsicht angewendet werden: Kälteapplikation resp. feucht-warme Umschläge, Einreibungen mit Liniment. saponato-camphoratum oder Rheumasan. Gegen die Schmerzen Antineuralgica (vgl. S. 522), eventuell Morphium. Schwitzprozeduren, die oft günstig wirken, sind erst in späteren Stadien erlaubt (Vorsicht bei der postdiphtherischen Polyneuritis wegen des Herzens!), eventuell Pilocarpin täglich 0,005 bis 0,015 subcutan. Oft wirkt Strychnin günstig (Beginn mit täglich 1 mg, langsam steigern bis 8 mg pro die). Später sind ferner Faradisation sowie vor allem milde Massage von großem Wert. Für die Rekonvaleszenz sind Badekuren empfehlenswert; Thermalbäder: Wiesbaden, Baden-Baden, Wildbad, Warmbrunn, Aachen, Teplitz, Gastein; Moorbäder: Polzin, Flinsberg, Elster, Franzensbad, Aibling, Pymont u. a. m.

### Lokale Krämpfe.

Bei den lokalen Krämpfen handelt es sich meist um sog. klonische Krämpfe, d. h. nur kurzdauernde, sich rasch wiederholende unwillkürliche Muskelkontraktionen, welche die befallenen Teile in zuckende Bewegung versetzen; seltener sind es tonische Krämpfe, d. h. länger anhaltende Muskelkontraktionen mit entsprechender Zwangshaltung der von der krampfartig verkürzten Muskulatur versorgten Teile.

Unter den Krämpfen der Hirnnerven ist vor allem der **Facialis-krampf** zu nennen, der überhaupt die häufigste Form lokaler Krämpfe bildet. Meist handelt es sich um klonischen Facialis-krampf (sog. Tic convulsif), der z. B. in der Form eines fortwährenden Blinzeln auftritt. Seltener sind Krämpfe im Bereich des ganzen Facialis, wobei der Patient unwillkürlich eigentümliche Grimassen schneidet. Als tonischer Krampf kommt gelegentlich der Blepharospasmus, d. h. der Krampf des M. orbic. palpebr. (Lidkrampf) vor. Die Ursachen des Facialis-krampfes sind mannigfacher Art. Teils bestehen sie in lokalen Reizzuständen, die direkt oder reflektorisch den Krampf auslösen, dazu gehört u. a. die Trigemimusneuralgie, teils sind sie Symptome der Hysterie. Stets ist auch an die Möglichkeit einer zentralen, auf Erkrankung des Gehirns bzw. der Kernregion in der Oblongata beruhenden Reizung des Nerven zu denken.

Die Krämpfe des motorischen Teils des N. trigeminus treten teils als klonischer Kaumuskelkrampf oder Trismus auf, bei dem die Zähne fest aufeinandergepreßt sind, teils als sog. mastikatorischer Krampf, d. h. in klonischer Form mit rhythmischem Aufeinanderschlagen der Zähne (physiologisch beim Frieren). Als ursächliche Momente des

Trigeminuskampfes sind vor allem örtliche Erkrankungen im Bereich des Trigeminus, speziell in der Mundhöhle und am Kiefer zu nennen, welche reflektorisch die Krämpfe auslösen; außerdem kommt auch eine direkte Reizung des Nerven insbesondere durch Krankheitsprozesse an der Schädelbasis vor.

Unter den Krämpfen in der **Hals- und Nackenmuskulatur** ist u. a. der tonische Krampf des *M. sternocleidomastoideus* (*N. accessorius*) zu nennen, zu dem sich evtl. auch derjenige des Trapezius hinzugesellt. Er bewirkt das sog. *Caput obstipum spasticum* oder *Torticollis spastica* (spastischer Schiefhals). Klonische Krämpfe des Sternocleido, die beiderseitig auftreten, kommen bisweilen bei Kindern in den ersten Lebensjahren vor; sie bestehen in eigentümlichen Nickbewegungen (sog. *Salaamkrämpfe* oder *Spasmus nutans*).

Eine große praktische Bedeutung haben ferner die als Berufskrankheit auftretenden sog. **Beschäftigungskrämpfe**, hauptsächlich im Bereich der oberen Extremitäten wie der Schreib-, Klavierspieler-, Violinspieler-, Schuster-, Telegraphisten-, Melkerkrampf sowie die Ballettänzerinnenkrämpfe der unteren Extremitäten. In allen diesen Fällen beruht das Leiden auf übermäßiger Anstrengung bestimmter, bei der Beschäftigung tätiger und häufig mit unzuweckmäßiger Technik verwendeter Muskelgruppen, wobei nicht selten ebenso wie bei den anderen Krampfformen zugleich die nervöse Konstitution der Patienten eine begünstigende Vorbedingung bildet. Es handelt sich um tonische Krämpfe, die sich häufig mit lähmungsartiger Schwäche der befallenen Muskeln sowie Zittern kombinieren. Psychische Erregung pflegt das Leiden zu verschlimmern. Die Beschäftigungskrämpfe zeichnen sich im allgemeinen durch große Hartnäckigkeit aus und haben deshalb in der Regel keine gute Prognose.

Während die bisher genannten Arten von Krämpfen schmerzlos sind, zeichnen sich die als sog. *Crampi* bezeichneten Krämpfe durch heftige Schmerzen aus. Am häufigsten sind die hierher gehörigen Wadenkrämpfe, die bei zahlreichen Menschen, die eine besondere Disposition hierfür haben, sowohl nach Überanstrengung der Beine, wie aber auch schon bei den geringfügigsten Anlässen wie bei unbequemer Stellung der Beine, starkem Recken derselben im Bett usw. auftreten. Auch Varizen bilden wahrscheinlich ein förderndes Moment („Krampfadern“). Gehäuftes Auftreten wird als *Crampusneurose* bezeichnet.

Die Therapie der lokalen Krämpfe besteht in erster Linie in Ausschaltung der als Ursache erkannten Momente, d. h. in Behandlung bzw. Beseitigung lokaler Reizzustände, auf der anderen Seite in Schonung der etwa überanstrengten Muskelgebiete; dies gilt vor allem für die Beschäftigungskrämpfe. Im übrigen spielt bei der Behandlung zahlreicher Krampfarten, namentlich auch der sog. *Tics* die psychotherapeutische Behandlung durch einen hierin speziell geschulten Arzt eine Hauptrolle, insbesondere in den auf Hysterie beruhenden Fällen. In jedem Fall pflegt die Behandlung eine recht langwierige zu sein. Milde Elektrotherapie sowie die Anwendung von Sedativa, speziell von Brom wirken oft günstig. Bei den Berufskrämpfen ist unter ärztlicher Kontrolle ausgeführte Gymnastik und Massage, ferner bei speziellen Krampfarten, wie z. B. beim Schreibkrampf die Anwendung besonderer technischer Hilfsmittel (besonders konstruierter Federhalter usw.) mitunter von Erfolg. Bei einzelnen besonders hartnäckigen Krampfarten, z. B. beim

Torticollis hat man als radikales Hilfsmittel die Nervendurchschneidung ausgeführt.

### Das vegetative Nervensystem.

Unter dem vegetativen Nervensystem versteht man die Gesamtheit aller Ganglienzellen und Nerven, die unabhängig vom Bewußtsein die sog. vegetativen Vorgänge des Körpers, d. h. die Tätigkeit des Verdauungs- und Zirkulationsapparates, der Drüsen mit äußerer und innerer Sekretion, des Urogenitalapparates, den Stoffwechsel u. a. m. regulieren. Wenn auch das vegetative gegenüber dem cerebrospinalen Nervensystem (das in der Hauptsache der Vermittlung der Sinneseindrücke und der willkürlichen Innervation der quergestreiften Muskulatur dient) eine gewisse Selbständigkeit besitzt, so steht es doch andererseits mit dem Gehirn und Rückenmark sowohl anatomisch wie funktionell in Verbindung, indem es dortselbst seinen Ursprung nimmt und von ihm sowohl fördernde wie hemmende Impulse erhält. Im Gegensatz zu den motorischen cerebrospinalen Nerven ziehen die Nervenfasern des vegetativen Systems niemals direkt vom Zentralnervensystem zu ihrem Erfolgsorgan, sondern sie sind stets durch eine Ganglienzelle in ihrem Verlauf unterbrochen, so daß man zwei Neurone, und zwar eine präganglionäre und eine postganglionäre Faser zu unterscheiden hat. Beispiele für Ganglien, in denen die genannte Umschaltung erfolgt, sind das Ganglion ciliare, die Ganglien des Grenzstrangs des Sympathicus, das Ganglion coeliacum und mesenteric. sup. und infer. Neuerdings rechnet man auch die in die Erfolgsorgane selbst (Darmwand, Drüsen usw.) eingestreuten Ganglien hierher. Die präganglionären Fasern haben eine Markscheide, die postganglionären nicht (graue Fasern). Das vegetative Nervensystem setzt sich aus zwei verschiedenen Nervengruppen zusammen, dem sympathischen und dem parasympathischen oder autonomen Nervensystem (vgl. Abb. 47).

Das **sympathische Nervensystem** entspringt ausschließlich aus dem thorakalen und lumbalen Abschnitt des Rückenmarks. Es besteht aus der vorn an der Wirbelsäule vom Schädel bis herab zum Steißbein laufenden Kette von 20–25 Ganglien, dem sog. Grenzstrang des Sympathicus, und den aus ihm entspringenden, zu den verschiedenen Organen verlaufenden postganglionären marklosen Nervenfasern. Die Rami communicantes albi, die vom ersten Thorakalnerven abwärts bis zum fünften Lumbalnerven vom Rückenmark zum Grenzstrang ziehen, stellen die Verbindung zwischen beiden her. Reizung der Cervical- und der Sakralwurzeln übt keine Wirkung auf den Sympathicus aus. Sympathicusfasern ziehen (zum Teil zusammen mit spinalen Nerven) zu sämtlichen visceralen Organen, die mit glatter Muskulatur versehen sind (Magendarmkanal, Blase, Genitalien, glatte Muskulatur der Orbita), zu den Blutgefäßen (Vasoconstrictoren), zu sämtlichen Drüsen einschließlich der Schweißdrüsen, zum Herzmuskel (N. accelerans aus den Gangl. cervic. inf. und stellatum) und zum Innern des Auges. Ein Teil der Sympathicusfasern tritt als Rami communicantes grisei in die Bahn der Spinalnerven über, um mit ihnen gemeinsam speziell zu den Gebilden der Haut, deren Blutgefäßen, Drüsen und Muskeln zu ziehen.

Das **parasympathische (autonome) System** setzt sich aus einem kranialen und einem sakralen Teil zusammen. Der kraniale Teil, der im Mittelhirn (Gegend des Oculomotoriuskerns im Bereich der vorderen Vierhügel) bzw. in der Oblongata entspringt, enthält Nervenfasern, die im N. oculomotorius verlaufen und nach Umschaltung im Ganglion ciliare zum Sphincter pupillae und dem M. ciliaris ziehen, ferner Speicheldrüsenfasern, die in der Chorda tympani




Abb. 47. Schema vom Aufbau des vegetativen Nervensystems (nach H. H. Meyer und Gottlieb).

verlaufen, sowie die Kopfschleimhaut und deren Blutgefäße innervierende Fasern, die teils den Facialis, teils den Glossopharyngeus und Trigeminus begleiten. Den wichtigsten Teil des parasympathischen Systems aber bilden die aus dem visceralen Vagus kern entspringenden Vagusfasern, die zum Herzen, zu den Bronchien, zum Magen- und Darmkanal und anderen Baueingeweiden ziehen. Der sakrale Teil des autonomen Systems nimmt seinen Ursprung im Sakralmark, verläuft im N. pelvici und innerviert Blase, Uterus, Mastdarm.

Von großer Bedeutung ist einmal die Tatsache, daß sämtliche vom vegetativen Nervensystem versorgten Organe stets doppelt, d. h. sowohl von sympathischen wie von parasympathischen Nerven innerviert werden und daß ferner sympathischer und parasympathischer Teil des vegetativen Nervensystems sich funktionell als Antagonisten verhalten, indem überall dort, wo die eine Gruppe fördernd, die andere hemmend wirkt. Dies kommt auch in der Wirkung bestimmter Pharmaka zum Ausdruck, die teils auf die eine, teils auf die andere Gruppe excitierend bzw. reizherabsetzend wirken. Dieser funktionelle Gegensatz zwischen beiden ist physiologisch außerordentlich wichtig, weil die vegetativen Nerven in das Spiel der automatisch wirkenden Organnerven (z. B. Herzganglien, Auerbachscher Plexus des Darms usw.) eingreifen und dank ihrem antagonistischen Verhalten einen die Tätigkeit der Organe regulierenden bzw. steuernden Einfluß ausüben.

Schließlich ist zur vollen Würdigung der Bedeutung der vegetativen Nerven noch darauf hinzuweisen, daß zwar dieser Teil des Nervensystems dem Bewußtsein und der willkürlichen Beeinflussung entzogen ist, daß er aber trotzdem in weitem Maß abhängig ist von der psychischen Verfassung des Individuums und daß insbesondere Stimmungsschwankungen, Lust- und Unlusteffekte usw. sich sehr deutlich in dem Zustand des vegetativen Nervensystems widerspiegeln (Erblassen, Erröten, Angstschweiß, Tränensekretion, Gänsehaut usw.). Speziell für den Sympathicus enthält der Boden des 3. Ventrikels (Regio subthalamica) wichtige Zentren.

Im einzelnen ist über das funktionelle und pharmakologische Verhalten beider Nervengruppen folgendes zu sagen: Die Pupille verengert sich unter dem Einfluß der autonomen Innervation des Sphincter pupillae (Oculomotorius); die Erweiterung erfolgt durch den Sympathicus (Halsteil). Auf die Herzaktion wirkt der Sympathicus erregend, d. h. beschleunigend, der Vagus verlangsamernd; umgekehrt verhält sich der Darm, dessen Tätigkeit durch den Sympathicus (N. splanchnicus) gehemmt, durch den Vagus erregt wird; die Muskeln der Bronchien erfahren durch den Vagus eine Zusammenziehung, durch den Sympathicus eine Erschlaffung. Auf die Blutgefäße wirkt der Sympathicus verengend. Über die Beeinflussung des Stoffwechsels durch das vegetative Nervensystem vgl. das S. 460 Gesagte.

Unter den verschiedenen Pharmaka, die eine spezifische Wirkung im Bereich des vegetativen Nervensystems entfalten, wirkt Adrenalin allgemein sympathicus-reizend; andererseits wirken Physostigmin, Pilocarpin, Muscarin, Cholin, Histamin u. a. erregend und zwar meist auf einzelne Gebiete des autonomen Systems; umgekehrt wird dieses durch Atropin gelähmt. Ein spezifisches, auf den Sympathicus lähmend wirkendes Mittel ist bisher nicht bekannt. Schließlich ist zu bemerken, daß im allgemeinen diejenigen Pharmaka, die tonussteigernd auf den Sympathicus einwirken, zugleich die Erregbarkeit des autonomen Systems herabsetzen.

Unter Berücksichtigung der vorstehend dargelegten Tatsachen, die die Klinik vor allem der experimentellen Pharmakologie verdankt, hat man versucht, verschiedene Krankheitserscheinungen nervös-funktioneller Art durch Störungen im Bereich des vegetativen Nervensystems zu erklären und dieselben auf einen dauernden abnormen Erregungszustand im Bereich des autonomen Systems bzw. des Sympathicus zurückzuführen. Die entsprechenden Krankheitsbilder wurden als **Vagotonie** und **Sympathicotonie** bezeichnet. Wenn sich auch im weiteren Verlauf der Forschung eine so scharfe Trennung praktisch als meist nicht durch-

fürbar erwiesen hat, zumal es sich bei zahlreichen Fällen gesteigerter Erregbarkeit im vegetativen Nervensystem häufiger um Kombinationen aus Symptomen beider Gruppen handelt, so ist doch die Kenntnis der Stigmata der Vagotonie und Sympathicotonie praktisch wichtig. Es seien hier diejenigen klinischen Merkmale genannt, die für einen erhöhten Tonus der beiden Systeme sprechen.

**Vagotonische Symptome:** Bradycardie, respiratorische Arrhythmie, Pulsverlangsamung bei Druck auf den geschlossenen Augapfel (Aschnerscher Bulbusdruckversuch), Hyperacidität, nervöse Diarrhöe bzw. spastische Obstipation, Asthma bronchiale, Dermographismus (Rötung oder Quaddelbildung der Haut bei mechanischer Reizung derselben), Vermehrung der Eosinophilen und Lymphocyten im Blut, kalte Hände und Füße, erhöhte Erregbarkeit gegenüber Pilocarpin (Speichel- und Schweißsekretion, Durchfälle) sowie für Atropin (Pulsbeschleunigung). Therapeutisch hat hauptsächlich Atropin bzw. Belladonna Erfolg.

**Sympathicotonische Symptome:** Pulsbeschleunigung, Exophthalmus, Erweiterung der Pupillen, Steigerung der vasomotorischen Erregbarkeit, Erhöhung der Empfindlichkeit gegenüber Adrenalin, welches in Dosen von 0,5 (SuprareninstammLösung) subcutan Glykosurie sowie intensive Blutdrucksteigerung bewirkt. Das sympathicotonische Syndrom entspricht zahlreichen Zügen im Bilde der Basedowschen Krankheit.

## Krankheiten des Rückenmarks.

**Einleitung.** Das Rückenmark ist erheblich kürzer als der Wirbelkanal. Sein unteres Ende, der Conus terminalis befindet sich in der Höhe des zweiten Lendenwirbels. Hieraus erklärt sich, daß die Lage der einzelnen Rückenmarkssegmente und dementsprechend der paarig angelegten vorderen und hinteren Rückenmarkswurzeln sich nicht mit der anatomischen Lage der Wirbel und in noch geringerem Grade mit derjenigen der zur Orientierung am Lebenden benutzten Proc. spinosi deckt, wie das aus Abb. 49 hervorgeht. Diese für die Segmentlokalisationsdiagnose sehr wichtige Differenz zwischen der Topographie der Rückenmarkssegmente resp. des Ursprungs der betreffenden Wurzeln und der Wirbel nimmt nach unten in wachsendem Maße zu. Während z. B. das 1. Thorakalsegment dem 6. oder 7. Cervicalwirbel entspricht, liegt das 1. Lumbalsegment hinter den Proc. spinosi des 10. oder 11. Brustwirbels. Das gesamte Lumbal- und Sakralmark liegt zwischen dem 11. Brust- und dem 2. Lendenwirbel. Insgesamt unterscheidet man 8 Cervical-, 12 Dorsal-, 5 Lumbal-, 5 Sakralsegmente und 1 Coccygealsegment.

Auf dem Querschnitt läßt das Rückenmark weiße Substanz sowie die in H-Form angeordnete graue Substanz erkennen (Abb. 48). Erstere enthält nur Leitungsfasern, die das Rückenmark der Länge nach durchziehen, während die graue




Abb. 48. Schema der Verteilung der Bahnen in der weißen Substanz des Rückenmarks (nach Hoerber, Physiologie).

1 = Gollischer Strang. 2 = Burdachscher Strang. 3 = Schultzesches kommaförmiges Bündel. 4 = Flechsigische Kleinhirnseitenstrangbahn. 5 = Gowersches Bündel. 6 = Tractus spino-thalamicus. 7 = Pyramidenseitenstrangbahn. 8 = Pyramidenvorderstrangbahn. 9 = Monakowsches Bündel. 10 = Tractus vestibulospinalis. 11 = ventrales Hinterstrangfeld. 12 = Vorderseitenstranggrundbündel.






Abb. 49. Schematische Darstellung des Verhältnisses der Segmente und Wurzeln zu den Wirbeln (entnommen aus E. Müller, Therapie Bd. 3).

Substanz sowohl Leitungsfasern (und zwar zum großen Teil in querer Richtung verlaufende) als vor allem Ganglienzellen enthält, die hauptsächlich in den Vorder- und Hinterhörnern liegen. In der weißen Substanz befinden sich die Vorder-, Seiten- und Hinterstränge. Ein Teil der Vorderstränge wird im Cervical- und oberen Brustmark von den Pyramidenvordersträngen eingenommen. Die Seitenstränge enthalten die Pyramidenseitenstrangbahn, die Kleinhirnseitenstrangbahn und das Gowersche Anterolateralbündel. Der Rest der Vorder- und Seitenstränge wird von dem sog. Vorderseitenstranggrundbündel eingenommen. Die Hinterstränge enthalten die im Hals- und oberen Brustmark voneinander getrennten medial gelegenen Gollischen Stränge (Funiculi graciles) und die lateral liegenden Burdachschen Stränge (Funiculi cuneati), deren äußerste, dem Hinterhorn medial anliegende Zone die sog. Wurzeleintrittszone ist. Die in den genannten Strängen verlaufenden Leitungsbahnen sind vor allem motorische und sensible Bahnen.

Die motorischen Bahnen verlaufen in der Hauptsache in den Pyramidenseitensträngen, und zwar bilden diese den Teil, der bereits in der Oblongata in der Decussatio pyramidum eine Kreuzung erfährt; ein kleinerer Teil verläuft ungekreuzt in den Pyramidenvordersträngen. Das von der motorischen Hirnrinde kommende und in den Pyramidenbahnen verlaufende zentrale motorische Neuron tritt schließlich in die graue Substanz des Rückenmarks ein, wo sich die Pyramidenseitenstrangfasern zu den Ganglienzellen des Vorderhorns der gleichen Seite, die Pyramidenvorderstrangfasern dagegen zur gekreuzten Seite begeben. Hier beginnt das zweite motorische, d. h. das peripherische Neuron, dessen trophisches Zentrum die Vorderhornganglienzellen bilden. Die Pyramidenbahnen leiten die willkürlichen motorischen Impulse; außerdem sind in ihnen reflexhemmende Bahnen enthalten.

Die sensiblen Bahnen kommen von den Spinalganglien, die ihre trophischen Zentren bilden, und treten durch die hinteren Wurzeln in das Rückenmark ein, wo sie sich auf eine Reihe verschiedener Bahnen verteilen. Ein Teil derselben, die sog. langen Hinterwurzelfasern durchlaufen ungekreuzt das ganze Rückenmark, indem sie unten die Burdachschen, im oberen Teil des

Rückenmarks die Gollischen Stränge bilden; sie enden in den sog. Hinterstrangkernen der Oblongata. Im Cervicalmark entsprechen die Gollischen Stränge der unteren, die Burdach'schen Stränge der oberen Körperhälfte. Andere sensible Bahnen dringen in die Hinterhörner ein, um dann zum großen Teil in den Vorderseitenstranggrundbündeln der gekreuzten Seite (sog. Brown-Séquardsche Bahn), in geringerem Maße der gleichen Seite zur Oblongata aufwärts zu steigen. Eine andere Faserart bildet sog. Kollateralen, die sich zu den Ganglienzellen der Vorderhörner begeben; sie vermitteln u. a. das Zustandekommen der Reflexe. Eine weitere Faserart tritt zu den Clarkeschen Säulen, einer Ganglienzellengruppe im Hinterhorn, von der aufsteigende Fasern in der Kleinhirnseitenstrangbahn der gleichen Seite zum Kleinhirn verlaufen. Diejenigen sensiblen Bahnen, die im Rückenmark ungekreuzt verlaufen, erleiden eine Kreuzung im verlängerten Mark in der sog. Schleife dorsal von der Pyramidenkreuzung (Lemniscus medialis).

Die verschiedenen Qualitäten der Sensibilität werden durch verschiedene Rückenmarksbahnen dem Hirn zugeleitet. Die Berührungsempfindung wird hauptsächlich durch die gekreuzten Vorderseitenstrangbündel, zum geringeren Teil durch die gleichseitigen Hinterstränge geleitet; Schmerz- und Temperaturempfindung wird zunächst durch die graue Substanz der Hinterhörner aufwärts




Abb. 50. Sekundäre aufsteigende und absteigende Degeneration im Rückenmark (nach Hoche).

1 = Aufsteigende Degeneration im Halsmark. 2 = Normales Thorakalmark (zum Vergleich). 3 = Absteigende Degeneration im Lumbalmark.

geleitet, später treten die Fasern ausschließlich in den gekreuzten Vorderseitenstrang über; der sog. Tiefensensibilität (Gelenk- und Muskelsinn, Lage-, Bewegungs- und Druckempfindung) dient der gleichseitige Hinterstrang. Die in der Kleinhirnseitenstrangbahn verlaufenden Fasern stehen mit dem Gleichgewichtssinn und der Koordination der Muskelbewegungen in Beziehung.

Von großer Bedeutung für die Klinik der Rückenmarkskrankheiten ist die Art und Verteilung der Degenerationserscheinungen in den Rückenmarksbahnen, die bei einer Unterbrechung derselben infolge einer Querschnittsläsion des Rückenmarks eintreten (vgl. Abb. 50): es degenerieren unterhalb derselben die Pyramidenseitenstrang- und Vorderstrangbahn, oberhalb derselben die Hinterstränge (namentlich die Gollischen Stränge), die Kleinhirnseitenstrangbahn und das Gowersche Bündel. Die Erklärung für diese sog. sekundäre Degeneration der Rückenmarksbahnen liegt in der Tatsache, daß jedesmal derjenige Teil eines Neuriten degeneriert, der von seinem trophischen Zentrum, d. h. von der zugehörigen Ganglienzelle abgetrennt ist.

Die den einzelnen Rückenmarkssegmenten entsprechende Innervation der Muskeln und die sensible Versorgung der Haut zeigen in ihrer Verteilung gegenüber derjenigen der peripherischen Nerven eine wesentlich andere Anordnung, wie ein Vergleich der Abb. 46 und 51 erkennen läßt. Dies erklärt sich unter anderem aus der Tatsache, daß die peripherischen Nerven sich in den verschiedenen Plexus miteinander verflechten und dadurch das Bild der ursprünglichen segmentären Anordnung verwischen. Die Segmentverteilung der Muskeln und Reflexe sowie der Sensibilität ist aus der Tabelle S. 536—538 ersichtlich<sup>1)</sup>. Die Verteilung der Hautsensibilität

<sup>1)</sup> Die Tabelle ist dem Taschenbuch der medizinisch-klinischen Diagnostik von Seifert-Müller, bearbeitet von F. Müller, 23. Aufl., entnommen.

zeigt am Rumpf eine gürtelförmige Anordnung, an den Extremitäten eine Verteilung in Form von längsverlaufenden Bändern und Streifen (Abb. 51). Ferner ist zu beachten, daß nach dem Sherringtonschen Gesetz jeder Hautbezirk von 2–3 benachbarten Rückenmarkssegmenten innerviert wird, so daß sich die Inner-





Abb. 51. Segmentale Sensibilitäts-

(Entnommen aus Lewandowsky:

vationsbezirke der sensiblen Wurzeln teilweise oben und unten überlagern. Vollständige Anästhesie eines Hautgebietes kommt demzufolge nur dann vor, wenn gleichzeitig das nächsthöhere und nächsttiefere Rückenmarkssegment bzw. die zugehörigen Wurzeln lädiert sind.

**Allgemeine Diagnostik der Rückenmarkskrankheiten.** Krankheiten des Rückenmarks können im allgemeinen dreifacher Art sein. Entweder handelt es sich um

eine den gesamten Querschnitt, also sämtliche Rückenmarksbahnen betreffende diffuse Erkrankung (Querschnittserkrankung) oder um eine nur einzelne Strangsysteme befallende Affektion (System- oder Strangdegeneration) oder endlich um eine vorwiegend oder ausschließlich die Rückenmarkshäute betreffende Erkrankung



verteilung nach E. Flatau.

Praktische Neurologie.)

(Meningitis, Meningomyelitis). Die sog. Systemdegenerationen beschränken sich auf eine einzige Bahn (z. B. eine motorische oder sensible) oder es handelt sich um sog. kombinierte Systemdegenerationen, wobei mehrere Bahnen auf einmal degenerieren. Aus der Art der Symptome läßt sich hier stets erkennen, daß es sich um den systematischen Ausfall einzelner Bahnen handelt. Bei den Querschnittsläsionen, wie sie z. B. auf Entzündungs- oder Erweichungsprozessen

Rückenmarks-Segmente bzw. Wurzeln	Muskeln bzw. Funktionen	Sensibilität	Reflexe
1. Cervical-Segment	Kleine Nackenmuskeln. <i>Drehung und Rückwärtsbeugung des Kopfes.</i>	Nacken und Hinterhaupt.	
2. u. 3. Cervical-S.	Halsmuskeln. Trapezius. <i>Vorwärtsbeugung des Kopfes, Heben der Schultern.</i>	Hinterhaupt, Außenfläche des Halses.	
4. Cervical-S.	Scaleni. Zwerchfell (N. phrenicus). Levator scapulae. Supra- und Infraspinatus. <i>Inspiration, Auswärtsrollung des Oberarms.</i>	Nacken, Schulter u. Brust bis zur II. Rippe und Spina scapulae.	
5. Cervical-S.	Deltoideus. Biceps. Coraco-brachialis. Brachialis internus. Brachioradialis. Supinator. Supra- und Infraspinatus. <i>Erheben des Oberarms, Beugung und Supination des Vorderarms.</i>	Rückseite der Schulter und des Arms, äußere Seite des Oberarms.	Bicepssehnenreflex.
6. Cervical-S.	Pectoralis major und minor. Latissimus dorsi und Teres maj. Subscapularis. Serratus anterior. Pronatoren des Vorderarms. Triceps. <i>Adduction u. Einwärtsrollung des Oberarms, Streckung u. Pronation des Vorderarms.</i>	Außenseite d. Oberarms und Radialseite des Vorderarms.	Tricepssehnenreflex.
7. Cervical-S.	Extensoren des Handgelenks und der Finger. Flexoren des Handgelenks. <i>Flexion u. Extension des Handgelenks.</i>	Außenseite (Radialseite) des Vorderarms u. Daumens.	Sehnenreflexe am Vorderarm und der Hand.
8. Cervical-S.	Lange Extensoren und lange Beuger der Finger. Thenar.	Mitte des Vorderarms, Mitte der Hand an Beuge- u. Streckfläche.	
1. Dorsal-S.	Kleine Muskeln der Hand und der Finger (Interossei, Thenar, Hypothenar). 8. C. u. 1. D.: <i>Bewegung des Daumens und der Finger.</i>	1. und 2. Dorsalsegment: Innenseite (Ulnarseite) des Ober- u. Vorderarms, kleiner Finger.	Erweiterung der Pupille durch d. Sympathicus.

Rückenmarks-Segmente bzw. Wurzeln	Muskeln bzw. Funktionen	Sensibilität	Reflexe
2. bis 12. Dorsal-S.	Rückenmuskeln. Intercostalmuskeln.	2. bis 4. <i>Dorsal-segment</i> : Rückenhaut vom VII. Halswirbel u. der Spina scapulae bis zum V. Brustwirbel. Brusthaut von der II. Rippe bis zur Mamillarhöhe.	
7. bis 12. Dorsal-S.	Rückenmuskeln. Bauchmuskeln.	5. u. 6. <i>Dorsal-segment</i> : Rücken vom V. bis VIII. Brustwirbel. Brusthaut von der Mamilla bis zur VII. Rippe.  7. bis 9. <i>Dorsal-segment</i> : Rückenhaut vom VIII. bis XII. Brustwirbel, Bauchhaut von der VII. Rippe bis zur Nabelhöhe.	Oberer Bauchdeckenreflex zwischen 8. u. 9.D.
		10. bis 12. <i>Dorsal-segment</i> : Lendengegend v. XII. Brustwirbel bis V. Lendenwirbel, Bauchhaut v. Nabel bis zum Poupartschen Band.	Unterer Bauchdeckenreflex vom 10. bis 12.D.
1. Lumbal-S.	Unterste Bauchmuskeln. Quadratus lumborum. Sartorius. Psoas.	Äußere Seite der Glutäalgegend, Inguinalgegend.	
2. Lumbal-S.	Iliopsoas. Cremaster.	Außenseite d. Oberschenkels, Sensibilität des Hodens und Samenstrangs.	1.—3. L.: Cremasterreflex.
3. Lumbal-S.	Iliopsoas. Quadriceps. Adductoren des Oberschenkels. Einwärtsroller des Oberschenkels. 2. u. 3. L.: <i>Beugung, Einwärtsrollung u. Adduction des Oberschenkels.</i>	Vorder- u. Innenseite d. Oberschenkels. Knie.	2.—4. L.: Patellarsehnenreflex.

Rückenmarks-Segmente bzw. Wurzeln	Muskeln bzw. Funktionen	Sensibilität	Reflexe
4. Lumbal-S.	Extensor cruris quadriceps. <i>Streckung des Unterschenkels.</i>	Innenseite d. Unterschenkels u. Fußes, Vorderseite u. Innenseite d. Oberschenkels.	4.—5. L.: Glutäalreflex.
5. Lumbal-S.	Glutaeus medius und minimus. Semimembranosus, Semitendinosus. Biceps femoris. Tensor fasciae latae. Tibialis anterior. <i>Abduction des Oberschenkels, Beugung des Unterschenkels.</i>	Außenseite d. Unterschenkels u. Fußes. Außenseite des Oberschenkels.	
1. Sakral-S.	Glutaeus maximus. L <sub>4</sub> —S <sub>2</sub> . Pyriformis. } Aus- Obturator int. } wärts- Gemelli. } roller des Quadratus femor. } Ober- Extensoren (Dorsalflexoren) des } Fußes: } Tibialis anterior, Peronei. Extensor digitor. comm. <i>Streckung und Auswärtsrollung des Oberschenkels; Dorsalflexion des Fußes und der Zehen.</i>	Hinterseite d. Oberschenkels. Hinterseite der Wade, Fußsohle, äußerer Fußrand, Zehen.	Plantarreflex.
2. Sakral-S.	Große Wadenmuskeln (Gastrocnemius, Soleus). Extensores et Flexores digitor. comm. I. et hallucis I. Tibialis posterior. Kleine Fußmuskeln. <i>Plantarflexion des Fußes, Beugung der Zehen. Erektion.</i>	Gesäß u. Hinterfläche des Oberschenkels (Reithosenanästhesie). Außenseite des Unterschenkels u. äußerer Fußrand, Sensibilität d. Blase und des Mastdarms.	Achillessehnenreflex. Erektion.
3. Sakral-S.	Perinealmuskeln. Quergestreifte Muskulatur der Harnröhre, des Mastdarms u. der Geschlechtsorgane. Sphincteren. <i>Willkürliche Einleitung d. Harn- und Kotentleerung.</i>	Medialer Teil des Gesäßes, Damm, Scrotum, Penis.	Ejaculation. Blase, Mastdarm.
4. u. 5. Sakral- u. Coccygeal-S.	<i>Willkürliche Einleitung d. Harn- und Kotentleerung.</i>	Umgebung d. Afters, Damm, Anus.	Analreflex.

des Rückenmarks oder mechanischer Schädigung desselben von außen beruhen, fehlt der elektive Charakter der für die Systemdegeneration charakteristischen Symptome, vielmehr ist der ganze Querschnitt des Rückenmarks bzw. ein großer Teil desselben an den Krankheitserscheinungen beteiligt. Doch ist zu bemerken, daß bei beginnender Querschnittsläsion, z. B. namentlich bei Kompression des Rückenmarks von außen zunächst oft nur motorische, dagegen noch keine sensiblen Störungen auftreten, da die motorischen Bahnen Schädigungen gegenüber eine größere Empfindlichkeit zeigen als die sensiblen Bahnen. Bleibt die Querschnittsläsion eine unvollständige, so können die motorischen Störungen das Bild dauernd beherrschen; immerhin lassen sich durch genaue Prüfung stets daneben auch Sensibilitätsdefekte nachweisen. Die verschiedene Art der letzteren, aus denen man auf den speziellen Sitz der Läsion bzw. der degenerierten Bahn Schlüsse ziehen darf, werden bei Beschreibung der einzelnen Krankheitsbilder näher besprochen.

Krankheitsprozesse, die ihren Sitz in den grauen Vorderhörnern haben, bewirken schlaffe Lähmungen mit degenerativer Atrophie der entsprechenden Muskelgebiete; sie führen also zum gleichen Bilde wie die Degeneration bzw. Durchtrennung der peripherischen motorischen Nerven, mit dem Unterschiede aber, daß die Verteilung auf die einzelnen Muskelgruppen dem segmentären und nicht dem peripherischen Typus entspricht. Erkrankungen der Pyramidenbahn, also des zentralen Neurons kennzeichnen sich im Gegensatz hierzu durch spastische Lähmungen, ferner durch Erhöhung der Sehnenreflexe, die bis zum Klonus gesteigert sein können (hauptsächlich Fuß- und Patellarklonus), endlich durch das Babinski'sche Großzehenphänomen, d. h. eine pathologische Form des Fußsohlenreflexes; normal besteht derselbe in einer Plantarflexion der Zehen und Fußsohle beim Bestreichen derselben (am besten nahe dem äußeren Fußrande). Für den Babinski ist die Dorsalflexion, vor allem der großen Zehe und zwar in der sog. primären Form charakteristisch, d. h. ohne daß es vorher zu einer Plantarflexion der Zehen kommt; meist erfolgt die Extension der großen Zehe langsam. Das diagnostisch außerordentlich wichtige Phänomen kommt übrigens — aber nur vorübergehend — auch in der Narkose und im Koma (Urämie) sowie für die Dauer einiger Stunden nach epileptischen sowie paralytischen Anfällen vor. Bei Kindern bis zum dritten Jahr hat es keine pathologische Bedeutung.

Völlige Durchtrennung des Rückenmarks hat bemerkenswerterweise keine Erhöhung der Sehnenreflexe, sondern eine Aufhebung derselben in der Höhe der Läsion und abwärts von dieser zur Folge. Schmerzen kommen den Erkrankungen des Rückenmarks, soweit sich diese ausschließlich auf die einzelnen Strangsysteme bzw. den Querschnitt beschränken, nicht zu. Sie werden hauptsächlich beobachtet bei Erkrankung der hinteren Rückenmarkswurzeln sowie bei den hiermit einhergehenden Affektionen der Rückenmarkshäute. Für diese sind außer dem heftigen Schmerz, der sowohl im Rücken wie teilweise auch im Rumpf und in den Extremitäten lokalisiert wird, die Spasmen der Nacken- und Rückenmuskulatur charakteristisch.

## Herdförmige Erkrankungen des Rückenmarks.

### Akute Myelitis.

Unter Myelitis versteht man ein im Anschluß an Infektionen und Intoxikationen akut auftretendes spinale Krankheitsbild. Anatomisch besteht es in nichtsystematischen Entzündungs- bzw. Degenerationsprozessen im Rückenmark, welche dessen Querschnitt vollkommen oder fast vollkommen unterbrechen und klinisch häufig in der Form einer herdförmigen Querschnittserkrankung (Myelitis transversa) verlaufen. Das Leiden ist streng von ähnlichen Krankheitsbildern traumatischen, luetischen sowie tuberkulösen Ursprungs zu trennen. Die Myelitis ist nicht häufig.



Als Ursachen der akuten Myelitis sind in erster Linie Infektionskrankheiten, insbesondere Typhus, Grippe, Gonorrhöe, Erysipel, Angina, Sepsis, Wutschutzimpfung u. a. zu nennen, weiter Erkältungen, Durchnässungen sowie die Gravidität.

Pathologisch-anatomisch besteht oft im Bereich der erkrankten Partien (meist mehrere Segmente) Verbreiterung des Rückenmarks und Verminderung seiner Konsistenz sowie meist Verwischung der Grenze zwischen grauer und weißer Substanz. Mikroskopisch beobachtet man Hyperämie der Gefäße, gelegentlich Hämorrhagien, Leukocyteninfiltration und vor allem Zerfallserscheinungen an Achsencylindern und Markscheiden, Degeneration der Ganglienzellen sowie die dem Abtransport des Zerfallsmateriales dienenden Körnchenzellen. Ausgedehntere Erweichung von nekrotischem Material wird als Myelomalacie bezeichnet.

**Krankheitsbild:** Oft stellen sich zunächst verschiedene Prodromalerscheinungen wie Kreuz- und Rückenschmerzen sowie gürtelförmige Schmerzen, Parästhesien, Vertaubungsgefühl in den unteren Extremitäten, Abgeschlagenheit sowie mäßige Temperatursteigerung ein. Dieses Vorstadium kann wenige Tage, aber auch Wochen dauern, bis sich das eigentliche spinale Krankheitsbild entwickelt. Dieses ist im wesentlichen durch eine Lähmung in Form einer Paraplegie bzw. Paraparese gekennzeichnet.

In der großen Mehrzahl der Fälle ist der Sitz der Myelitis das Dorsalmark. Hierbei entwickelt sich eine anfangs schlaffe Paraplegie der Beine, die später in eine spastische Lähmung übergeht. Ferner pflegen sich im Bereich der Lähmungen alsbald motorische Reizerscheinungen in Form schmerzhafter Muskelzuckungen bemerkbar zu machen, die bereits auf geringfügige Reize wie den Druck der Bettdecke usw. aufzutreten pflegen und oft sehr qualvoll sind. Die Beine befinden sich zunächst in Streckstellung, neigen aber später zu Beuge- und Adductorencontracturen. Patellar- und Achillesreflexe sind lebhaft gesteigert, oft bestehen Klonus, ferner das Babinskische Zehenphänomen sowie das sog. Tibialisphänomen (Dorsalflexion des Fußes bei Anziehen des Beines). Der Bauchdeckenreflex verhält sich verschieden. Bei Sitz der Myelitis in der Höhe des 8.—12. Segments fehlt er, wogegen er bei höherem Sitz erhalten ist. Konstant sind Blasenstörungen, anfangs in Form der Ischuria paradoxa, später stellt sich unwillkürlicher Harnabgang ein (vgl. S. 427). Auch Mastdarmlähmung mit unwillkürlicher Stuhlentleerung ist häufig. Sensibilitätsstörungen sind regelmäßig vorhanden, und zwar zum Teil als Herabsetzung, teils als völlige Aufhebung des Empfindungsvermögens für alle Qualitäten im Bereich der ganzen unteren Körperhälfte. Die obere Grenze der Sensibilitätsstörung entspricht der Höhe des am meisten proximal gelegenen erkrankten Segments. Häufig liegt sie in der Höhe der Halsrumpfgrenze im 2. Inter-costalraum (Grenze zwischen 2. Dorsal- und 4. Cervicalsegment). Sehr häufig und zum Teil außerordentlich rasch stellen sich trophische Störungen, insbesondere Decubitus oft schon nach einem Tage ein. Seine Prädilektionsorte sind die Gesäßgegend (Kreuzbein), die Gegend der Trochanteren, die Fersen und Schulterblätter sowie bei Adductionscontractur die inneren Flächen der Knie.

Cervicale Myelitis ist selten und sehr gefährlich. Je nach dem Sitz des Herdes oberhalb oder innerhalb der Cervicalanschwellung bestehen außer Para-

plegie der Beine auch eine spastische bzw. schlaffe Lähmung der Arme, evtl. bei Erkrankung des 8. Cervical- und 1. Dorsalsegments oculopupilläre Störungen in Form des Hornersehen Symptomenkomplexes mit Verengerung der Pupille und der Lidspalte. Phrenicuslähmung hat, wenn sie doppelseitig ist, den Tod durch Erstickung zur Folge. Myelitis im Lumbalteil bewirkt schlaffe Lähmung der Beine; die Sehnenreflexe sind abgeschwächt oder erloschen.

Der Verlauf der akuten Myelitis gestaltet sich verschieden. Abgesehen von foudroyanten, in wenigen Tagen tödlich verlaufenden Fällen endet die Mehrzahl der schweren Fälle nach 1—4 Wochen letal, meist infolge von Komplikationen (Decubitus, Cystopyelitis, Peritonitis). Zum Teil treten im Verlauf der Krankheit einzelne Schübe auf. Ungünstig verlaufen auch die Fälle von ascendierender Myelitis, bei der der Prozeß progredient nach oben fortschreitet. In einer kleinen Zahl von Fällen kommt es nach mehrmonatlicher Krankheitsdauer zu einem Stillstand unter Zurückbleiben einer spastischen Paraplegie, mit der die Patienten bei sorgfältiger Pflege sich längere Zeit bei leidlichem Wohlbefinden halten können. Eine von vornherein chronisch verlaufende Myelitis gibt es nicht. Differentialdiagnostisch kommt die multiple Sklerose, die Hämatomyelie, der Rückenmarkstumor sowie die spinale Lues in Betracht.

Therapie: Im Beginn der Erkrankung bewährt sich bisweilen die Anwendung von Schwitzkuren sowie starken Abführmitteln. Sehr wichtig ist absolute Ruhe (auch zur Prophylaxe etwaiger Nachschübe); Sedativa, speziell Brom, Veronal; gegen die schmerzhaften Krampfzustände heiße Tücher, evtl. Morphium. Die Komplikationen, insbesondere der Decubitus erfordern sorgfältigste Pflege; das hier Gesagte gilt in gleicher Weise für alle übrigen Krankheitsbilder mit Querschnittsläsionen des Rückenmarks:

Gegenüber der Gefahr des Durchliegens, das durch den Druck der Weichteile sowie durch die Maceration der Haut durch Harn und Stuhl erfolgt, spielt die Prophylaxe in der Pflege eine große Rolle: Wasserkissen, Luftring, häufiger Lagewechsel, evtl. Bauchlage sowie Seitenlage, in der die Patienten durch Kissen zu halten sind; sorgfältiges Vermeiden von drückenden Hemd- oder Lakenfalten. Regelmäßige Waschungen der Haut der zu Decubitus neigenden Stellen mit Campherwein, Sublimatspiritus; Lenicetpuder, gelinde Massage der Weichteile, sowie, wenn es der übrige Zustand des Kranken erlaubt, täglich lauwarme Bäder. Bei vorhandenem Decubitus wirken laue Dauerbäder oft sehr günstig. Im übrigen ist der Decubitus feucht zu behandeln, am besten mit Verbandstofflagen, die mit Sublimat oder essigsaurer Tonerde getränkt sind und mit Heftpflasterstreifen fixiert werden. Abtragung nekrotischer Gewebsetzen und Spaltung etwaiger Wundtaschen. Erfolgt Reinigung, so empfiehlt sich die Anregung der Granulationen mit Ungent. Balsam. peruv. 1 : 30, evtl. mit Argent. nitric. sowie Emplastrum ciner., ferner Scharlachsalbe; später indifferente Salbenverbände (Borvaseline). Große Verbände, die den Decubitus bedecken, sind wegen der raschen Durchnässung durch Urin und Stuhl unzweckmäßig. Die Blasenlähmung erfordert Auffangen des Harns mittels Ente bei Männern (Schutz der Genitalien gegen Druck durch Wattepolsterung, da sonst auch hier Decubitus eintritt). Bei Frauen ist besser ein Dauerkatheter, da die üblichen Urinale eine Beschmutzung meist nicht verhindern. Sorgfältige Reinigung und Trockenlegung der Kranken nach jeder Stuhlentleerung. Prophylaxe und Therapie der Cystitis vgl. S. 430. In späteren Stadien erfordert die Neigung zu Beugecontracturen vorsichtig durchgeführte passive Bewegungen (evtl. im Bade) sowie gelinde Massage.

**Caissonkrankheit:** Als eine unter dem klinischen Bilde der akuten Myelitis verlaufende Erkrankung des Rückenmarks ist hier noch die sog. Caissonkrankheit

der Tunnelarbeiter zu erwähnen, die unter erhöhtem Atmosphärendruck arbeiten; wenn sie sich zu schnell aus dem Caisson wieder unter gewöhnlichen Luftdruck begeben, so wird der vom Gewebe absorbierte Stickstoff in Form von Gasbläschen frei, die zu Embolien und multiplen kleinen Zerstörungsherden im Rückenmark führen.

**Funikuläre Myelitis:** Zur Gruppe der Myelitis gehören endlich auch gewisse im Verlauf von schweren Blutkrankheiten (Anämien und Leukämien), bei Carcinomkachexie und anderen kachektischen Krankheitszuständen auftretende spinale Erkrankungen. Dieselben wurden früher als systematische Strangdegenerationen angesehen, während man sie jetzt als nichtsystematische, ausgedehnte leichte myelitische Veränderungen betrachtet und als disseminierte oder funikuläre Myelitis bezeichnet. Die Symptome, die auf eine kombinierte Erkrankung verschiedener Rückenmarksbahnen hindeuten, sind teils so geringfügig, daß sie erst bei genauer Untersuchung entdeckt werden; teils bestehen umgekehrt erhebliche subjektive Beschwerden, die diejenigen des Grundleidens in den Hintergrund treten lassen. Hauptsymptome sind motorische Schwäche in den Beinen, Parästhesien wie Pelzigsein, Ameisenlaufen usw., die in der Regel zunächst in den Füßen, gelegentlich auch in den Händen beginnen, ferner das Babinskische Zeichen sowie Ataxie wie bei Tabes (sog. Pseudotabes); Spasmen sind in der Regel weniger deutlich ausgeprägt. Die Sehnenreflexe können fehlen. Dagegen gehören Pupillenstarre sowie lanzinierende Schmerzen nicht zum Bilde; wohl aber kommen bisweilen Blasen- und Mastdarmstörungen vor. Decubitus und Cystitis sind seltener als bei der akuten Myelitis. Der Verlauf der Affektion hängt von demjenigen des Grundleidens ab.

Unter **Landryscher Paralyse** versteht man ein nicht häufiges Krankheitsbild, das durch das akute Auftreten motorischer Lähmungen ausgezeichnet ist, die rasch von unten nach oben fortschreiten. Häufig bestehen zugleich Fieber, Milztumor und andere für eine Infektionskrankheit sprechende Symptome. Der Paraparese der Beine folgt eine Lähmung der Rücken- und Bauchmuskeln, sowie eine solche der Arme, mitunter auch Lähmung der Bulbarmuskeln. Schmerzen sowie Sensibilitäts- und Blasen-Mastdarmstörungen fehlen. Die Lumbalpunktion ergibt meist Zellvermehrung sowie positive Eiweißprobe. Nicht selten erfolgt tödlicher Ausgang infolge von Atemlähmung. Das Leiden ist nicht einheitlicher Natur. Teils handelt es sich um spinale Prozesse nach Art der Poliomyelitis, teils beruht es auf Polyneuritis. Die Behandlung ist eine rein symptomatische.

### **Kompressionsmyelitis (Spondylitis tuberculosa und Wirbelcarcinose).**

Die häufigste Ursache für eine Kompression des Rückenmarks von außen ist die tuberkulöse Caries der Wirbelsäule (*Malum Pottii*). Sie kommt in allen Lebensaltern, bei jüngeren Individuen etwas häufiger vor, wird aber gelegentlich auch im Greisenalter beobachtet. Die Erkrankung lokalisiert sich vor allem in den Wirbelkörpern, von denen einer oder mehrere benachbarte von der Caries befallen werden. Prädilektionsort sind die Brustwirbelsäule und zwar vor allem in den Grenzbezirken nahe der Lendenwirbelsäule, seltener die Halswirbelsäule sowie die unteren Abschnitte der Wirbelsäule.

Das in der Spongiosa des Wirbelkörpers sich entwickelnde tuberkulöse Granulationsgewebe bewirkt bei ausgedehnter Zerstörung des Knochens ein Zusammensinken des erkrankten Wirbels. Hierdurch kommt es zu Verschiebung und oft zu spitzwinkliger Knickung der Wirbelsäule (Kyphose) sowie zu einer Einengung des Wirbelkanals, die durch die sich zwischen Wirbel und Dura ansammelnden Massen von käsigem Eiter gefördert wird. Auf das Rückenmark selbst greift der tuberkulöse Prozeß nicht über. Dagegen wird das Rückenmark durch die genannten Veränderungen entweder grob mechanisch komprimiert oder es kommt frühzeitig infolge einer Pachymeningitis tuberculosa mindestens zu einer lokalen

Ischämie sowie zu Lymphstauung im Rückenmark, die bereits genügen, um eine Degeneration des Rückenmarks und seiner Wurzeln hervorzurufen. Bei längerem Bestehen des Prozesses entsteht infolge von Neurogliawucherung eine Sklerosierung des erkrankten Rückenmarksabschnittes.

**Krankheitsbild der Spondylitis tuberculosa:** In einer Reihe von Fällen sind die ersten Zeichen des Leidens nicht spinaler Art, sondern auf die Erkrankung der Wirbelsäule hinweisende Symptome. Die Patienten klagen über Steifigkeit im Rücken, oft verbunden mit dumpfen Schmerzen. Letztere werden häufig durch Bewegungen des Rumpfes verstärkt. Beim Bücken und Aufrichten fällt eine eigentümliche steife Haltung des Rückens auf. Manche Patienten leiden schon frühzeitig an neuralgieartigen Schmerzen, die auf Reizung der hinteren Wurzeln beruhen und je nach dem Sitz der Erkrankung im Dorsal- oder Cervicalmark in die unteren Extremitäten und die Gegend des unteren Randes des Rippenbogens oder in die Arme ausstrahlen. Daneben bestehen oft in den gleichen Gebieten Parästhesien wie Brennen und Ameisenlaufen.

Die objektive Untersuchung ergibt häufig schon frühzeitig eine auf den anatomischen Wirbelveränderungen beruhende Deformität der Wirbelsäule und zwar meist in Form einer deutlichen spitzwinkligen **Kyphose** (sog. Pottscher Buckel), in anderen Fällen ist dieselbe nur angedeutet in Form eines stärkeren Vorspringens eines Dornfortsatzes; in einer nicht ganz kleinen Zahl von Fällen, namentlich bei Erwachsenen, fehlt dagegen jede wahrnehmbare Deformität der Wirbelsäule.

Frühzeitig pflegen auch motorische Störungen aufzutreten und zwar Schwäche und Steifigkeit in den Extremitäten sowie im weiteren Verlauf langsam sich entwickelnde Lähmungen. In einzelnen Fällen treten dieselben auch akut auf. Anfangs können diese Erscheinungen sich zunächst nur einseitig geltend machen. Später kommt es regelmäßig zum Bilde der Paraparese bzw. Paraplegie. Je nach dem Sitz des Herdes ist die Lähmung eine schlaffe oder eine spastische. Spastische Paraparese der Beine mit Steigerung der Patellarreflexe evtl. Patellar- und Fußklonus sowie Babinski finden sich bei Erkrankung der oberen Brust- sowie der Halswirbelsäule. Doch kommt Steigerung der Sehnenreflexe mitunter auch bei schlaffer Lähmung vor. Erkrankung des XI. und XII. Brustwirbels sowie des I. Lumbalwirbels bewirkt schlaffe atrophische Lähmung der Beine, ferner Abschwächung bzw. Fehlen der Patellarreflexe. Caries der unteren Halswirbel macht außer spastischer Paraparese der Beine eine schlaffe Lähmung der oberen Extremitäten mit Atrophie der Hand- und Armmuskeln.

Bei Erkrankung der obersten Halswirbel kann sich Atrophie der Zunge (evtl. einseitig) bzw. Trapeziuslähmung einstellen. Die Patienten stützen hier bei Bewegungen des Oberkörpers den Kopf mit der Hand (Rustsches Symptom).

Störungen seitens der Sensibilität sind gegenüber den motorischen Störungen häufig nur wenig ausgebildet; sie können sogar fast vollkommen fehlen. Relativ häufig sind gürtelförmige hyperästhetische Zonen in der Höhe des erkrankten Segmentes. Blasenstörungen wie bei Myelitis kommen vor, fehlen aber auch oft vollständig; das gleiche

gilt von Mastdarmstörungen. Mitunter treten im weiteren Verlauf der Krankheit durch Hinabkriechen des Eiters von den cariösen Wirbeln sog. Senkungsabscesse auf, die bisweilen sogar erst Aufschluß über den Charakter des Leidens geben. Derartige Abscesse gelangen bei dorsaler Spondylitis mit Vorliebe in der Leistengegend als sog. Psoasabscesse an die Oberfläche; sie verraten sich oft schon vorher durch Psoascontractur. Bei cervicaler Spondylitis sammelt sich der Eiter mitunter zwischen Wirbelsäule und hinterer Rachenwand.

Der Verlauf der tuberkulösen Spondylitis ist ein chronischer. Bezüglich der Prognose ist es von großer praktischer Bedeutung, daß das Leiden heilbar ist und daß bei rechtzeitig einsetzender Therapie auch die spinalen Krankheitserscheinungen sich vollkommen zurückbilden können, selbst wenn die Lähmungen bereits Jahre bestanden. In einer nicht kleinen Zahl von Fällen ist dagegen der Ausgang ein ungünstiger. Gefährlich werden den Kranken vor allem die regelmäßig infolge der Blasenlähmung (Katheterismus) bestehende Cystitis bzw. Cystopyelitis, die häufig diphtherischen Charakter annimmt bzw. auf dem Wege der Pyelonephrose zur Sepsis führt, sowie andererseits der bei schweren Formen sich einstellende Decubitus in der Gesäßgegend, der durch tiefgreifende brandige Zerstörung der Weichteile ebenfalls den Ausgang in Sepsis herbeiführt. In anderen Fällen gehen die Kranken an der Ausbreitung der Tuberkulose zugrunde.

Die frühzeitige Stellung der Diagnose ist wegen der Möglichkeit eines günstigen Ausgangs bei rechtzeitiger Behandlung von der größten Bedeutung. Bei Vorhandensein eines noch so geringfügigen tuberkulösen Herdes im Körper (Lungenspitzenkatarrh, Tb.-Drüsen) müssen eine auffallende Steigerung der Patellarreflexe, das Babinskische Zeichen sowie neuralgiforme Schmerzen Verdacht erwecken, auch wenn keinerlei Befund an der Wirbelsäule zu erheben ist. Man klopfte die einzelnen Wirbel der Reihe nach auf etwaige Schmerzhaftigkeit, lasse ferner den Patienten im Stehen einen Gegenstand vom Boden aufheben und achte dabei auf eine etwaige steife Haltung des Rückens. Wichtig ist auch die Probe auf das Vorhandensein eines sog. Stauchungsschmerzes der Wirbelsäule im Bereich der erkrankten Wirbel, der oft dann eintritt, wenn man bei dem auf einer festen Unterlage sitzenden Patienten mit beiden auf den Scheitel gelegten Händen einen starken plötzlichen Druck von oben her ausführt. In zahlreichen Fällen gelingt es mit der Röntgenphotographie den cariös erkrankten Wirbel bzw. die dadurch hervorgerufene Deformität der Wirbelsäule zur Darstellung zu bringen.

Mitunter ist die Unterscheidung der Wirbelcaries von spinaler Lues, Wirbel-tumor sowie Tumoren der Rückenmarkshäute speziell beim Fehlen einer Wirbel-säulendeformität kaum möglich.

Die Therapie besteht vor allem in absoluter Ruhigstellung der Wirbelsäule, zu mindesten durch konsequent durchgeführte Rückenlage. Mit Vorteil wird oft daneben die Anlegung eines Stützkorsetts (Gipsbett nach Lorenz, Sayresches Gipskorsett) angewendet. In manchen Fällen wirkt auch die vorsichtig ausgeführte Extension der Wirbelsäule zum Zwecke des sog. Redressements durch besondere Apparate (Glissonsche Schwebel, Erhöhung des Kopfendes des Bettes, Zug mit Gewichten bis höchstens 6—7 kg) günstig. Von chirurgischer Behandlung (Laminektomie) soll man nur in Ausnahmefällen Gebrauch machen. Sehr wichtig ist eine allgemeine roborierende Behandlung (Freiluftliegekuren, Sonnenbestrahlung, Ernährung, Arsen usw.). Vorsicht mit Tuberkulin.

Die malignen **Wirbeltumoren** rufen Krankheitsbilder hervor, die denjenigen der Wirbelcaries sehr ähnlich sind. In der Regel handelt es sich um Carcinommetastasen. Sie treten in erster Linie nach einem primären Krebs der Mamma, ferner der Prostata sowie gelegentlich der Ovarien und der Schilddrüse auf. In nicht seltenen Fällen ist von einem primären Tumor überhaupt nichts bekannt oder dieser wird erst nachträglich nach Konstatierung des Rückenmarksleidens gefunden. Beachtenswert ist ferner, daß sich mitunter erst Jahre nach der Radikaloperation eines Mammacarcinoms die Symptome des Wirbeltumors einstellen.

Das Krankheitsbild zeichnet sich außer durch die bei der Wirbelcaries beschriebenen Symptome der Kompressionslähmung vor allem durch Reizerscheinungen seitens der hinteren Wurzeln aus, was sich daraus erklärt, daß die Tumormassen auf dieselben einen mechanischen Druck ausüben. Es kommt daher oft zu äußerst lebhaften Schmerzen sowohl in der Gegend des Tumors wie vor allem auch zum Ausstrahlen derselben nach Art heftigster Neuralgien (sog. Paraplegia dolorosa). Besonders intensiv pflegen die Schmerzen bei Lokalisation des Tumors am unteren Teil der Wirbelsäule durch Übergreifen auf die Cauda equina zu sein. Hier bildet die qualvolle doppelseitige „Ischias“ ein charakteristisches Symptom. Deformationen der Wirbelsäule sind wesentlich seltener als bei Caries. Dagegen liefert oft die Röntgenphotographie der Wirbelsäule Aufklärung über den Sitz des Tumors.

Der Verlauf des Leidens, das von kürzerer Dauer als die tuberkulöse Spondylitis zu sein pflegt, ist ausnahmslos ungünstig und führt unter Marasmus, Cystopyelitis, Decubitus (Sepsis) zum Tode. Therapeutisch kommt bei metastatischen Tumoren operative Hilfe nicht in Frage, wohl dagegen eventuell bei Verdacht auf einen primären Tumor. Röntgenbestrahlung der Geschwulst hat meist keinen wesentlichen Erfolg. Im übrigen rein palliative Behandlung, hauptsächlich mit Narkotica (Morphium usw.).

Multiple Sklerose siehe S. 585.

Rückenmarks-Lues siehe S. 587.

## Syringomyelie.

Unter Syringomyelie versteht man ein spinales Krankheitsbild, das auf der Entstehung pathologischer Höhlenbildung im Rückenmark, speziell seiner zentralen Partien beruht und in entsprechenden klinischen Ausfallerscheinungen besteht. Die Krankheit dürfte, wie angenommen wird, auf einer fehlerhaften kongenitalen Anlage beruhen.

Der pathologisch-anatomische Befund besteht in zum Teil länger ausgedehnten Spaltenbildungen zumeist in der grauen Substanz, die teils als bloße Erweiterung des Zentralkanals imponieren, bei der eigentlichen Syringomyelie jedoch von dieser unabhängig sind. Zum Teil geht das Leiden mit einer Gliawucherung einher. Der Prozeß hat im allgemeinen einen fortschreitenden Charakter. Der häufigste Sitz der Erkrankung ist das Cervicalmark, die Halsanschwellung sowie das obere Dorsalmark. Auch kann sich die Erkrankung bis in die Oblongata ausdehnen, wo sie aber in der Regel den unteren Rand der Brücke nicht überschreitet.

Die Krankheit befällt hauptsächlich das mittlere Lebensalter und zwar vornehmlich Männer der körperlich arbeitenden Volksschichten. Die Erscheinungen sind sehr charakteristisch. Sie bestehen in der Hauptsache in motorischen Lähmungen, ferner in eigentümlichen Sensibilitätsdefekten sowie vasomotorisch-trophischen Störungen. Entsprechend der häufigsten Lokalisation im Halsmark beginnt die Krankheit mit Atrophie und Lähmung der kleinen Handmuskeln (Krallenhand) und Abflachung von Thenar und Hypothenar. An den Vorderarmen atrophieren oft zuerst die Flexoren des Handgelenks. In anderen Fällen beginnt der Prozeß in der Muskulatur des Schultergürtels. Die atrophischen Muskeln zeigen fibrilläre Zuckungen sowie Ea.R. Sehr charakteristisch sind die Sensibilitätsdefekte, die in Verlust der Schmerzempfindung und des Temperatursinns (Analgesie, Thermanästhesie) bestehen, während der Berührungssinn oft erhalten bleibt. Es liegt also eine sog. Dissoziation der Sensibilität vor. Die Ausdehnung der Sensibilitätsstörung pflegt nicht mit derjenigen der Muskelatrophien übereinzustimmen, sondern eine segmentale Anordnung aufzuweisen. Eine regelmäßige Folge der Aufhebung der Schmerz- und Temperaturempfindung sind Verletzungen und Verbrennungen im Bereich der anästhetischen Bezirke sowie schwere trophische Störungen, an denen sich nicht nur die Haut und die Weichteile, sondern auch die Knochen beteiligen, letztere in Form der bei Tabes vorkommenden Arthropathien (im Gegensatz zu diesen jedoch im Bereich der oberen Extremitäten). Schließlich kann es zu schweren Verunstaltungen und Verstümmelungen an Fingern und Händen ähnlich der *Lepa mutilans* kommen. Häufig ist eine Kyphose der Halswirbelsäule. Bei Mitbeteiligung der *Oblongata* treten der Bulbärparalyse ähnliche Erscheinungen, meist halbseitig oder wenigstens asymmetrisch auf, und zwar Zungenatrophie, Trapeziuslähmung, Trigeminusanästhesie, Recurrenslähmung sowie mitunter der Horner'sche Symptomenkomplex (Verengerung der Lidspalte und der Pupille, Zurücksinken des Bulbus als Zeichen der Sympathicuslähmung). Die unteren Extremitäten können lange Zeit unbeteiligt bleiben, so daß die Kranken im Gehen nicht behindert sind.

Der Verlauf der Krankheit ist ausgesprochen chronisch und hat progredienten Charakter. Zeitweise kommt es bisweilen zu Stillständen. Die Kranken erliegen schließlich einer interkurrenten Erkrankung oder nicht selten einer von den häufigen Panaritien bzw. Phlegmonen der anästhetischen Bezirke ausgehenden Sepsis.

Die Erkennung der Krankheit stößt bei dem so ungemein charakteristischen Symptomenkomplex kaum auf Schwierigkeiten. Differentialdiagnostisch kommt die *Lepa* in Frage. Viele Fälle gelangen infolge der Verletzungen zuerst in die Hände des Chirurgen. Es ist übrigens bemerkenswert, daß etwa notwendig werdende chirurgische Eingriffe, sogar Amputationen infolge der Analgesie ohne Narkose ausgeführt werden können. Therapeutisch wurden in jüngster Zeit Erfolge mit Röntgenbestrahlungen des Rückenmarks beobachtet.

## Hämatomyelie.

Die Rückenmarksblutung oder Hämatomyelie hat mit der Syringomyelie klinisch gewisse Züge insofern gemeinsam, als auch hier von den Blutungen hauptsächlich die graue Substanz des Rückenmarks bevorzugt wird. Die Blutung pflegt sich auf größere Strecken in der Längsrichtung des Rückenmarks auszudehnen (sog. Röhrenblutung). Ursache des Leidens sind hauptsächlich heftige Anstrengungen, ferner Traumen der Wirbelsäule.

Das Krankheitsbild ist durch den plötzlichen Beginn der Rückenmarkssymptome gekennzeichnet, die zunächst den Charakter der Querschnittserkrankung haben. Die häufigste Lokalisation der Blutung ist das Halsmark. Im Laufe weniger Stunden nach Beginn der Erkrankung treten Lähmungen der Extremitäten, Sensibilitätsstörungen sowie Blasenlähmung ein, und zwar entsteht oft eine atrophische Lähmung der oberen Extremitäten und eine spastische Paraparese der Beine. Sehr charakteristisch ist ferner die der Dissoziation der Sensibilitätslähmung bei Syringomyelie analoge Sensibilitätsstörung mit Analgesie und Thermanästhesie, die im Verein mit dem akuten Beginn und dem vorausgehenden Trauma die Hauptkennzeichen des Leidens bilden. Trotz des schweren Bildes ist die Prognose der Hämatomyelie in vielen Fällen günstig, da die Lähmungserscheinungen in weitem Umfange rückbildungsfähig sind und bisweilen wieder vollkommen schwinden, so daß die Patienten wieder gehfähig werden. Dagegen pflegt die dissoziierte Empfindungslähmung zurückzubleiben. In besonderen Fällen sind als einzelne Residuen des erlittenen Traumas schließlich nur geringfügige Muskelatrophien zu finden.

## Rückenmarksverletzungen.

Traumatische Läsionen des Rückenmarks können durch Wirbelfrakturen oder -luxationen, weiter durch stumpfe gegen die Wirbelsäule gerichtete Gewalt, ferner durch Hieb- und vor allem durch Schuß- und Stichverletzungen zustande kommen. In der Regel belehrt die Anamnese über die Art des vorausgegangenen Traumas. Dabei ist übrigens zu bemerken, daß eine schwere Wirbelsäulenverletzung nicht in jedem Fall von einer Rückenmarksläsion begleitet sein muß.

Das Krankheitsbild der Rückenmarksverletzung präsentiert sich in der Regel in der Form der Querschnittsläsion (motorische und sensible Paraplegie, Blasen- und Mastdarmlähmung), deren Höhe von dem Orte der Verletzung abhängig ist. Die Sehnenreflexe im Bereich der Verletzung und unterhalb derselben sind zunächst stets erloschen. Im übrigen besteht, soweit es sich um schwere Läsionen bzw. totale Zerstümmung des Rückenmarks handelt, das hier schon beschriebene Bild, das innerhalb weniger Tage oder Wochen unter schwerstem Decubitus, Cystopyelitis, Sepsis usw. zum Tode führt.

Als besondere Form einer traumatischen Rückenmarksläsion wurde schon die Hämatomyelie besprochen. Eine andere Form, wie sie mitunter namentlich nach Stich- und Schußverletzung beobachtet wird, ist



das als Brown-Séquardsche Lähmung bezeichnete Syndrom. Es beruht darauf, daß die motorischen Pyramidenbahnen nach ihrer Kreuzung in der Oblongata im Rückenmark ungekreuzt verlaufen, während von den sensiblen die den Schmerz- und Temperatursinn leitenden Bahnen sich im Rückenmark kreuzen. Kommt es zu einer Läsion der einen Hälfte des Rückenmarkquerschnittes, so entsteht demnach auf der Seite der Verletzung motorische Lähmung sowie seitens der Sensibilität vor allem Störung des Muskelsinnes (Lage- und Bewegungssinn), wogegen auf der gekreuzten Seite keine motorische Lähmung, dagegen Aufhebung bzw. Herabsetzung des Temperatur- und Schmerzsinnes abwärts von der Stelle der Verletzung resultiert. Dagegen zeigt die taktile Sensibilität keine oder nur unwesentliche Störungen. In der Höhe der Läsion besteht oft beiderseits eine schmale hyperästhetische Zone.

Schließlich ist zu erwähnen, daß die Verletzungen des untersten Teils der Wirbelsäule mit Läsion des unteren Sakralmarks eine eigentümliche Art der Sensibilitätsstörung bewirken, die man als Reithosenanästhesie bezeichnet und die in Sensibilitätsdefekten der Haut der Genitalien, des Dammes und Afters besteht.

Die Prognose der Rückenmarksverletzung richtet sich nach der Schwere und der Ausdehnung des Prozesses. Sind unmittelbar nach einer Wirbelsäulenverletzung die Sehnenreflexe auslösbar und fehlt das Babinskische Zeichen, so spricht dies gegen eine ernstere Rückenmarksläsion. Ist das Bild der Paraplegie vorhanden, so entscheiden im allgemeinen die nächsten drei Tage die Prognose. Zeigt innerhalb dieser Zeit die motorische Lähmung keine Neigung zu Rückgang, so ist mit Sicherheit mit dem in kurzer Zeit erfolgenden ungünstigen Ausgang zu rechnen.

Die Behandlung besteht im allgemeinen lediglich in absoluter Ruhigstellung der Wirbelsäule durch entsprechende Lagerung sowie die bei Besprechung der Myelitis genannten allgemeinen pflegerischen Maßnahmen. Bei Wirbelfrakturen ist stets die Zuziehung des Chirurgen erforderlich, zumal es gelegentlich gelingt, durch operative Beseitigung von Knochensplintern, die eine Kompression des Marks bewirken, den Patienten zu retten. Bei allen Wirbelsäulenverletzungen, die zunächst keine Zeichen einer spinalen Läsion erkennen lassen, sind die Kranken so behutsam wie möglich zu behandeln (insbesondere nicht aufzusetzen), da man sonst eine nachträgliche Gefährdung des Rückenmarks riskiert.

### Rückenmarkstumoren.

Die Neoplasmen des Rückenmarks zerfallen in extramedulläre und intramedulläre Tumoren. Die ersteren, die die häufigeren sind, sind von den von der Wirbelsäule ausgehenden Geschwülsten (vgl. S. 545) zu unterscheiden; sie nehmen in der Regel ihren Ausgangspunkt von den Rückenmarkshäuten und zwar handelt es sich meist um intradural sich entwickelnde *circumscribed* Neubildungen, speziell um Fibrome, Psammome, ferner Sarkome; letztere können multipel auftreten und zeigen bisweilen diffuse Ausbreitung. Die Tumoren üben von außen eine langsam wachsende Kompression auf das Rückenmark und seine Wurzeln aus.

Das Krankheitsbild der extramedullären Tumoren ist vor allem durch frühzeitiges Auftreten heftiger sensibler Reizerscheinungen infolge der Kompression der hinteren Wurzeln ausgezeichnet, zu denen die übrigen früher (S. 542) beschriebenen Zeichen der Drucklähmung des Rückenmarks sich hinzugesellen. Häufigster Sitz der Geschwülste ist das Dorsalmark. Das Bild wird in der Regel durch neuralgieartige Schmerzen von ausstrahlendem Charakter eröffnet, die oft zunächst fälschlich als Intercostalneuralgie oder Ischias gedeutet werden. Es folgen Paresen eines Beines, dann eine spastische Paraparese beider Beine mit lebhafter Steigerung der Sehnenreflexe sowie dem Babinskischen Zehenphänomen, schließlich vollkommene Lähmung der Beine. Sensibilitätsstörungen, die im Laufe der Zeit einzutreten pflegen, zeigen im Gegensatz zu den intramedullären Geschwülsten keine Dissoziation, sondern entsprechen dem Typus der Hinterstrangsdegeneration. An der oberen Grenze der Sensibilitätsstörung des Rumpfes findet man häufig eine schmale hyperästhetische Zone, d. h. eine Überempfindlichkeit für bloße Berührung, Nadelstiche usw. Die Grenze, bis zu der die Sensibilitätsstörung heraufreicht, läßt sich sehr exakt bestimmen, wobei übrigens speziell für die extramedullären Tumoren die annähernd unveränderliche Lage der Grenze charakteristisch ist. Im allgemeinen reicht der Sitz der Geschwulst 1—2 Segmente höher hinauf, als der Grenze der Sensibilitätsstörung entspricht (vgl. das Sherringtonsche Gesetz S. 534). Stets sind Blasen- und Mastdarmstörungen vorhanden.

Wegen der Möglichkeit der operativen Heilung des Leidens ist nicht nur die Diagnostizierung der Rückenmarkstumoren, sondern auch ihre exakte Höhenlokalisation von größter praktischer Bedeutung. Die Differentialdiagnose hat vor allem die Abgrenzung gegenüber der Caries der Wirbelsäule sowie den Wirbeltumoren zu klären. Bezüglich der Diagnose dieser beiden Affektionen sei auf S. 542 verwiesen. Praktisch wichtig ist auch die circumscribte Meningitis serosa (Leptomeningitis mit Cystenbildung), die das Bild des Tumors hervorrufen kann und operativ eine sehr gute Prognose hat. Hinsichtlich der Höhendignose ist zu beachten, daß man stets in der Lage ist, die obere Grenze, bis zu der der Tumor sich erstreckt, aus den entsprechenden spinalen Störungen, vor allem den Sensibilitätsdefekten festzustellen. Diese Kenntnis ist aber für die operative Inangriffnahme des Tumors ausreichend. Maßgebend ist dabei das S. 534 wiedergegebene Schema der segmentären Sensibilitätsverteilung sowie die topographische Beziehung zwischen Wirbelsäule und Rückenmarkssegmenten (Abb. 532). Von anderen diagnostisch auszuschließenden Prozessen, die ein ähnliches Bild verursachen, aber keinen chirurgischen Eingriff erheischen, sind zu nennen dieluetischen Meningitiden und vor allem isolierte Gummen, die das Bild des Rückenmarkstumors hervorzurufen vermögen. In allen Fällen von Verdacht auf Rückenmarkstumor ist daher stets auf Lues zu fahnden (WaR. im Blut, Lumbalpunktion usw. vgl. S. 590).

Die intramedullären Tumoren sind in der großen Mehrzahl der Fälle Gliome, d. h. von der Neuroglia ausgehende Neubildungen. Prädektionsort derselben ist das Hals- und obere Brustmark, seltener die

Lendenanschwellung. In manchen Fällen handelt es sich um sog. diffuse Gliomatose. Gelegentlich kommen solitäre Tuberkel im Rückenmark vor.

Krankheitsbild der intramedullären Tumoren: Ihr Hauptmerkmal ist das Syndrom der Querschnittserkrankung, ohne daß sensible Reizerscheinungen in stärkerem Maße vorhanden sind. Das Bild der Querschnittslähmung pflegt sich allmählich zu entwickeln, wobei oft die entsprechenden Symptome zunächst einseitig auftreten, gelegentlich unter dem Bilde des Brown-Séquardschen Syndroms (vgl. S. 548), an das sich erst im weiteren Verlauf die über den gesamten Querschnitt sich ausbreitende Querschnittsläsion anschließt. Atrophische Lähmungen wie bei der spinalen Muskelatrophie (vgl. S. 557) sowie langsam sich entwickelnde Paraplegien der Beine sind häufig. Besonders wichtig sind die daneben vorhandenen Sensibilitätsstörungen, die auch hier infolge des zentralen Sitzes des Tumors wie bei Syringo- und Hämatomyelie häufig den bei diesen beschriebenen dissoziierten Charakter tragen. Nicht selten zeigen die Symptome einen merkwürdigen Wechsel ihrer Intensität, so daß plötzlich Verschlimmerungen wie auch vorübergehend unerwartete Besserungen eintreten können. In manchen Fällen zeigt das spinale Syndrom infolge der Ausdehnung des Tumors nach oben ein charakteristisches Hinaufsteigen der Sensibilitätsstörungen.

In einzelnen Fällen von Rückenmarkstumor, namentlich wenn derselbe den Wirbelkanal vollkommen verlegt, ergibt die Lumbalpunktion sehr eiweißreichen, eventuell spontan gerinnenden Liquor, der leichte Gelbfärbung, die sog. Xanthochromie zeigt, dagegen nur wenig Zellen enthält (Froinsches Syndrom).

Als Therapie kommt, soweit es sich um Geschwülste der Rückenmarkshäute handelt, nur die operative Entfernung des Tumors in Frage. Bei circumscribten Tumoren ist hier die Prognose relativ günstig, das Risiko der Operation verhältnismäßig gering. Bei Sarkomen hat Röntgentherapie mitunter vorübergehend Erfolg.

## Systemerkrankungen des Rückenmarks.

### Tabes dorsalis.

Die Tabes dorsalis (Rückenmarksschwindsucht) ist eine der wichtigsten und häufigsten Rückenmarkserkrankungen. Sie stellt im wesentlichen eine charakteristische auf dem Boden einer syphilitischen Infektion entstehende („metaluetische“) Systemdegeneration der peripherischen sensiblen Neurone dar. Von der gewöhnlichen cerebrospinalen Lues ist sie anatomisch wie klinisch scharf zu unterscheiden.

Die Tabes befällt häufiger das männliche Geschlecht und bevorzugt das mittlere Lebensalter, kommt aber auch gelegentlich in späterem Alter und ganz selten sogar in früher Jugend vor. Wenn auch der syphilogene Charakter der Krankheit heute außer Zweifel steht (genau wie bei der Paralyse), so ist dennoch nicht in allen Fällen eine Lues anamnestisch mit Sicherheit zu eruieren (nur in etwa 70%); in den übrigen Fällen handelt es sich augenscheinlich um abortive Formen der Lues, die wenig sinnfällige Symptome verursachen und daher der Wahrnehmung

der Patienten entgingen. Die Anstellung der Wassermannschen Blutreaktion bestätigt in einer großen Zahl der Fälle (60—70%) durch ihren positiven Ausfall die wahre Ursache des Leidens. Das durchschnittliche zeitliche Intervall zwischen derluetischen Infektion und dem Ausbruch der Krankheit beträgt etwa 10—15 Jahre. Die früher vielfach als Ursachen angeschuldigten Schädigungen wie Ausschweifungen, Alkoholismus sowie körperliche Überanstrengung haben sicher keine ätiologische Bedeutung; immerhin dürften sie eine bereits bestehende Tabes in ihrer Weiterentwicklung fördern.

Das **Krankheitsbild** der Tabes entwickelt sich in der Regel allmählich. Es wird klinisch in verschiedene Stadien eingeteilt. Das Initialstadium ist durch mehrere markante Symptome ausgezeichnet, und zwar erstens Schmerzen, zweitens Schwinden der Patellarreflexe, drittens Lichtstarre der Pupillen. Die tabischen Schmerzen, die oft das Bild eröffnen, treten einmal in der Form der sog. lanzinierenden Schmerzen auf, die einen schießenden oder reißenden Charakter haben und als blitzartig von den Patienten bezeichnet werden. Sie treten in Intervallen auf, bevorzugen die unteren Extremitäten, können aber auch an den verschiedensten anderen Körperstellen erscheinen. Sie werden zunächst häufig als einfacher Rheumatismus, Lumbago oder als Neuralgien bzw. Ischias interpretiert. In einzelnen Fällen können die sensiblen Reizerscheinungen längere Zeit oder auch dauernd fehlen.

Ein weiteres sehr wichtiges Phänomen ist das Schwinden der Sehnenreflexe, insbesondere das Westphalsche Zeichen, d. h. die Patellarreflexe können trotz Anwendung von Kunstgriffen (z. B. des Jendrassik'schen Handgriffs) nicht ausgelöst werden; ebenso häufig ist das Fehlen der Achillessehnenreflexe, das ebenfalls hohe diagnostische Bewertung verdient. Die Hautreflexe sind hingegen erhalten. Besonders bedeutsam ist auch die Pupillenstarre, und zwar in der besonderen Form des Argyll-Robertson'schen Phänomens, d. h. Fehlen der Verengung der Pupille bei Belichtung unter Erhaltung der Pupillenverengung bei der Akkommodation (reflektorische im Gegensatz zur absoluten Pupillenstarre). Die Pupillen des Tabikers sind in der Regel auffallend eng, häufig nicht völlig kreisrund sowie mitunter von ungleicher Weite (Anisokorie). Die drei genannten Symptome, die lanzinierenden Schmerzen, die Pupillenstarre und das Westphalsche Zeichen können längere Zeit und zwar mehrere Monate oder sogar Jahre die einzigen Krankheitserscheinungen bilden.

Die Untersuchung der Cerebrospinalflüssigkeit ergibt in der Regel und zwar schon frühzeitig für die Erkennung der Tabes wichtige Befunde. Es besteht eine erhebliche Erhöhung des normal sehr geringen (5—6 in 1 ccm) Zellgehaltes, insbesondere eine Lymphocytenvermehrung, die sog. Pleocytose, ferner eine Vermehrung des Globulingehaltes nachweisbar in Form der Nonneschen sog. Phase-I-Reaktion (nach Versetzen des Liquors mit gleichen Teilen gesättigter Ammonsulfatlösung erfolgt innerhalb von drei Minuten Trübung). In einem Teil der Fälle ist auch die Wa.-Reaktion am Liquor positiv.

Das sog. zweite Stadium der Krankheit ist durch das Auftreten ataktischer Störungen gekennzeichnet. Die Ataxie verrät

sich in einer zunehmenden Unsicherheit vor allem im Bereich der unteren Extremitäten und beruht auf Störung der Koordination bei Ausführung willkürlicher Bewegungen. Die Beine werden in eigentümlich schleudernder, ausfahrender Form beim Gehen bewegt, sowie bei jedem Schritt auffallend hoch gehoben und stampfend aufgesetzt. Die Unsicherheit des Gehens wird besonders deutlich beim Herabgehen einer Treppe, beim plötzlichen Kehrtmachen sowie beim Gehen im Dunkeln. Auch beim Stehen mit geschlossenen Augen pflegen die Patienten namentlich bei dicht nebeneinander stehenden Füßen deutlich zu schwanken (Rombergsches Phänomen). Läßt man die Kranken im Liegen mit der Ferse des einen Beines das Knie des andern berühren, so erfolgen auch hierbei im Gegensatz zum Normalen ausfahrende, unsichere Bewegungen (sog. Kniehackenversuch). Später pflegen die ataktischen Störungen auch auf die oberen Extremitäten überzugreifen, was man durch Ausführenlassen sog. Zielbewegungen feststellt (man läßt den Patienten bei geschlossenen Augen schnell mit dem Zeigefinger nach der Nasenspitze greifen oder eine Zahl in die Luft zeichnen). Dabei finden ähnliche schwankende zickzackartige Bewegungen wie an den Beinen statt. Feinere Handarbeit, Einfädeln von Nadeln usw. wird unmöglich. Bei höheren Graden der Ataxie der Beine kann schließlich das Gehen fast unmöglich werden, so daß das Bestehen von Lähmungen vorgetäuscht wird. Doch sind diese tatsächlich bei Tabes nicht häufig.

Dagegen ist später regelmäßig, gelegentlich schon als Frühsymptom eine deutliche Abnahme des Muskeltonus der Extremitäten zu konstatieren. Diese sog. Hypotonie ermöglicht es, die Gelenke des Tabikers stärker zu beugen und zu strecken als beim Normalen; auch erkennt man sie an dem eigentümlichen Schlenkern der Gelenke bei Ausführung passiver Bewegungen derselben. Sowohl Ataxie wie Hypotonie finden ihre Erklärung in der Tatsache, daß infolge der Degeneration des peripherischen sensiblen Neurons die für das normale harmonische Zusammenspiel der Muskelagonisten und Antagonisten notwendige Kontrolle seitens der sensiblen Nerven in Fortfall kommt.

Als weitere charakteristische Symptome sind Parästhesien und Sensibilitätsdefekte zu nennen. Zu den sensiblen Reizerscheinungen gehört das oft schon in den Frühstadien der Krankheit auftretende sog. Gürtelgefühl, d. h. in zirkulärer Anordnung am Rumpf auftretende Parästhesien, die das Gefühl einer korsettartigen Umschnürung bewirken (Reizung der unteren Thorakal- und oberen Lumbalwurzeln). Nicht selten beobachtet man am Rumpf auch Zonen mit hochgradiger Hyperästhesie für Kälte. Die Angabe der Kranken, daß sie kalte Bäder nicht mehr vertragen, ist oft ein Frühsymptom.

Im Gebiet der Visceralorgane treten sensible Reizerscheinungen auf, die als sog. Krisen bezeichnet werden und durch motorische sowie sekretorische Störungen ausgezeichnet sind. Am häufigsten sind die gastrischen Krisen, d. h. Anfälle, die mit heftigen Magenschmerzen und quälendem Erbrechen meist stark sauren Magensaftes einhergehen und in der Regel mehrere Tage anhalten, um alsbald wieder plötzlich zu verschwinden. In manchen Fällen bilden die gastrischen

Krisen ein Frühsymptom. Die Anfälle pflegen den Kräftezustand der Patienten sehr mitzunehmen. Zu den Krisen gehören ferner Anfälle von Glottiskrampf (Larynxkrisen), ferner Darmkrisen, Harnröhren- sowie Klitoriskrisen usw.

Sensibilitätsdefekte, die sich mit Vorliebe an den unteren Extremitäten lokalisieren, sind häufig dadurch charakterisiert, daß das Empfindungsvermögen für Schmerz aufgehoben, dasjenige für Berührung erhalten ist (Analgesie). Die nicht selten auch an den verschiedensten Stellen des übrigen Körpers auftretenden fleckförmigen Anästhesien haben oft eine unregelmäßige Begrenzung; ihre Ausbreitung hat teils segmentären, teils peripherischen Charakter. Sehr häufig klagen die Patienten ferner über eigentümliche Parästhesien, z. B. das Gefühl von Vertaubung und Pelzigsein der Fußsohlen und der Beine.

Störungen der Harnblasenentleerung bilden im weiteren Krankheitsverlauf eine fast regelmäßige Erscheinung, die gelegentlich sich auch schon in Frühstadien der Tabes bemerkbar macht, ja bisweilen ein Initialsymptom sein kann. Der Patient wird nicht gewahr, daß seine Blase sich abnorm stark füllt, er entleert sie daher weniger häufig und oft unvollständig und muß bei der Miktion stark pressen. Auch beobachtet man oft nach Beendigung der Entleerung Nachträufeln von Harn. Später macht das Vorhandensein von Residualharn das Katheterisieren notwendig. Cystitis und Cystopyelitis sind eine häufige Folge. Sehr oft ist auch Stuhlverstopfung bei Tabes vorhanden. Schwinden der sexuellen Potenz stellt sich in späteren Stadien der Krankheit regelmäßig ein, ist aber oft schon bei Ausbruch der Krankheit vorhanden.

Motorische Lähmungen pflegen bei der Tabes oft dauernd zu fehlen. Paresen im Gebiet der unteren Extremitäten (Peroneus) kommen mitunter in den letzten Stadien der Krankheit vor. Dagegen beobachtet man häufiger Augenmuskellähmungen, speziell Ptose sowie Doppelsehen, die charakteristischerweise vorübergehender Art sind. Sie werden nicht selten sogar als Frühsymptom der Krankheit beobachtet. Auch Kehlkopf-, speziell Posticuslähmung kommt mitunter vor. — Die Atrophie des N. opticus ist eine weitere bei zahlreichen Tabesfällen eintretende Störung, die bisweilen als Frühsymptom, häufig auch erst im weiteren Verlauf der Krankheit auftritt und sich durch Abnahme des Sehvermögens (Einengung des Gesichtsfeldes speziell für die Farben Rot und Grün) bis zur völligen Erblindung sowie Abblassung der Papille (Ophthalmoskopie) verrät.

Auch die großen Gelenke, speziell der unteren Extremität zeigen oft gewisse charakteristische, als Arthropathien bezeichnete Veränderungen, die am häufigsten das Knie, seltener die Fuß-, Hüft- und Schultergelenke befallen. Sie bestehen in starken Gelenkergüssen, an die sich das Bild der Arthritis deformans mit außerordentlich hochgradigen Zerstörungs- und Deformationsprozessen im Gelenk anschließt. Am Kniegelenk entwickelt sich infolge gleichzeitiger extremer Hyperextension das für Tabes charakteristische Bild des Genu recurvatum (das Knie ist nach hinten abnorm durchgedrückt). Die tabischen

Gelenkveränderungen beruhen sowohl auf trophischen Störungen der Knochen wie auch auf Aufhebung der Gelenksensibilität, so daß die Patienten, da sie nicht wie der Normale im erkrankten Gelenk Schmerzen empfinden, dasselbe durch den weiteren Gebrauch förmlich mißhandeln. Die trophische Störung der Knochen kommt auch in der Neigung der Tabiker zu Spontanfrakturen zur Geltung, die sich die Kranken nach harmlosen Traumen zuziehen (mitunter ein Initialsymptom). Weiter gehört zu den trophischen Störungen u. a. die Neigung zum Ausfallen der Zähne. Bemerkenswert ist schließlich die Neigung der meisten Tabiker zu starker Abmagerung, die sich auch bei bester Ernährung einzustellen pflegt.

Im dritten oder Endstadium der Krankheit nimmt die Ataxie so hochgradige Formen an, daß der Patient sich nicht mehr aufrecht halten kann und dauernd ans Bett gefesselt ist. Die Bezeichnung dieser Krankheitsphase als paralytisches Stadium trifft jedoch nur für diejenigen nicht häufigen Fälle zu, wo sich wirkliche Lähmungen der unteren Extremitäten einstellen. Der Allgemeinzustand der Patienten pflegt in diesem Stadium äußerst jammervoll zu sein. Hochgradiger Marasmus, vollständige Hilflosigkeit, daneben häufig Komplikationen, speziell Cystopyelitis sowie eine schließlich daran anschließende Sepsis pflegen das Bild zu beschließen.

**Pathologische Anatomie.** Querschnitte durch das Rückenmark in verschiedenen Höhen desselben zeigen in fortgeschrittenen Fällen eine Verschmälерung des Markes. Die mikroskopische Untersuchung läßt eine Systemdegeneration erkennen, die sich auf die Hinterstränge beschränkt. Da die Mehrzahl der Fälle als sog. *Tabes lumbalis* beginnt, so zeigt der untere Teil des Rückenmarks, das Lumbalmark in besonders ausgeprägtem Maße eine Degeneration (Atrophie und Sklerose) des gesamten Hinterstranggebietes, wie sich aus dem Fehlen der Markscheidenfärbung dortselbst ergibt. In den höher oben gelegenen Abschnitten, speziell im Cervicalmark pflegen nur die Gollischen Stränge degeneriert zu sein. Die Degeneration geht mit Wucherung von Neuroglia einher. Neben der Hinterstrangklerose finden sich auch Degenerationsprozesse im Bereich der Hinterhörner sowie der hinteren Wurzeln, wie überhaupt anzunehmen ist, daß die Erkrankung primär in letzteren beginnt. Außer diesem proximalen Teil des peripherischen sensiblen Neurons (zwischen Spinalganglion und Rückenmark) findet man aber auch im distalen Teil derselben degenerative Veränderungen. Andere Teile der Rückenmarksbahnen speziell in den Vorder- und Seitensträngen nehmen an der Degeneration bei der gewöhnlichen *Tabes* nicht teil. Die Meningen pflegen im Bereich der degenerierten Teile des Rückenmarks verdickt und zum Teil kleinzellig infiltriert zu sein. Schließlich ist hervorzuheben, daß es wiederholt gelang, Lues-Spirochäten in den hinteren Wurzeln nachzuweisen.

Vom dem geschilderten klassischen Bilde gibt es sowohl in der Symptomatologie wie im Verlauf gelegentlich Abweichungen. So kommen z. B. nicht selten sog. rudimentäre *Tabes*fälle vor, bei denen lediglich die Pupillenstarre und das Westphalsche Phänomen oder auch nur die erstere vorhanden ist, während alle übrigen Symptome fehlen und sich auch in späterer Zeit nicht einstellen; die positive Wa-R. im Blut und vor allem der Liquorbefund beweisen auch hier, daß es sich um eine *Tabes* handelt. Ferner ist in manchen Fällen das initiale Stadium von sehr langer Dauer. In anderen Fällen kommt es nach Entwicklung des regelrechten Krankheitsbildes zu längerdauernden

Stillständen, so daß die Kranken bisweilen, wenn sie bis dahin arbeitsunfähig waren, wieder ihre berufliche Tätigkeit aufzunehmen vermögen.

Bei der seltenen sog. *Tabes superior* treten die ersten Krankheitserscheinungen wie Schmerzen, Parästhesien usw. zuerst in den oberen Extremitäten auf; hier ist der *Tricepssehnenreflex* erloschen, wogegen das *Kniesehnenphänomen* erhalten sein kann. Diese Form der *Tabes* gilt als besonders ungünstig. Die seltene *Tabes* bei Kindern infolge von hereditärer *Lues* hat umgekehrt einen benignen Verlauf.

Was endlich das Verhältnis zwischen der Intensität der verschiedenen Symptome und der Verlaufsart der Krankheit anlangt, so besteht die Regel, daß häufig die mit starken lanzinierenden Schmerzen einhergehenden Fälle nur geringe Grade von *Ataxie* aufweisen; das gleiche gilt von Kranken mit frühzeitig eintretender *Opticusatrophie*. Eine völlige Ausheilung der *Tabes* im Sinne des Schwindens der Pupillenstarre und der Wiederkehr der *Patellarreflexe* kommt nicht vor und die *Prognose* ist in sämtlichen Fällen von vollentwickeltem Krankheitsbild quoad sanationem durchaus ungünstig. In einer Reihe von Fällen schließt sich an die *Tabes* eine progressive *Paralyse* an.

Die **Diagnose** ist bei den typisch ausgebildeten Krankheitsbildern der *Tabes* ohne Schwierigkeit zu stellen. Differentialdiagnostische Erwägungen kommen dagegen bei denjenigen Fällen in Frage, in denen nur einzelne Symptome deutlich ausgeprägt sind, d. h. bei den sog. rudimentären Formen der Krankheit. Diese Fälle sind recht häufig. Eines der wichtigsten Symptome ist hier die reflektorische Pupillenstarre. Fehlen der Sehnenreflexe sowie *Ataxie* kommt auch bei *Polyneuritis*, jedoch ohne Pupillenstarre vor (vgl. S. 524); auch läßt sich hier häufig die im Gegensatz zur *Tabes* vorhandene Druckempfindlichkeit der großen Nervenstämmen bei *Polyneuritis*, andererseits die bei *Tabes* vorhandene Hypotonie und Überstreckbarkeit der Gelenke diagnostisch verwerten. *Tabische Krisen* werden häufig im Beginn als Magen- oder Gallensteinleiden gedeutet (und sogar irrtümlich als solche operiert!). *Tabes superior* kann durch *Syringomyelie* (s. diese) vorgetäuscht werden. Bei Vorhandensein von lanzinierenden Schmerzen ohne die übrigen *Tabessymptome* ist an die Möglichkeit von Geschwülsten der Wirbelsäule bzw. Rückenmarkshäute zu denken. Die Differentialdiagnose gegenüber der multiplen Sklerose und der Friedreichschen Krankheit siehe später. Von ausschlaggebender Bedeutung ist endlich der Ausfall der sog. vier Reaktionen (d. h. *Wa-R.* im Blut und im *Liquor*, *Globulinprobe* und *Pleocytose im Liquor*).

**Therapie:** Spezifisch-antisyphilitische Kuren (*Hg.*, *Salvarsan*) haben bei voll ausgebildeten Fällen in der Regel keinen Erfolg; bisweilen wirken sie hier sogar verschlimmernd. Anders steht es mit den initialen Fällen, namentlich denjenigen, die kurze Zeit nach erfolgter Infektion auftreten und unvollständig oder überhaupt nicht spezifisch behandelt wurden. Auch hier ist die antiluetische Kur nur mit größter Vorsicht durchzuführen, namentlich unter fortlaufender Kontrolle des *N. opticus*, der gegenüber dem *Hg.* oft sehr empfindlich ist (*Inunktionskur* mit kleinen *Hg-Dosen* bzw. *Novasurol*, dagegen keine unlöslichen *Hg-Depots*). Ähnliches gilt von der Anwendung des *Salvarsans*. Es gelingt übrigens nur sehr schwer, die *Wa-R.* negativ zu machen.

Die übrige Behandlung ist eine rein symptomatische. Schonung in körperlicher und geistiger Beziehung, Verhütung vor allem von körperlicher Überanstrengung. Milde *Hydrotherapie* (kurzdauernde Halb- und Vollbäder von 22–28°). *CO<sub>2</sub>-haltige Thermalsolbäder* wie *Oeynhausener*, *Nauheimer*, ferner indifferente *Thermalbäder* wie *Wildbad*, *Ragaz* usw.



Bei beginnender Ataxie hat erheblichen Nutzen die hierfür besonders ausgebildete methodische Übungstherapie unter ärztlicher Kontrolle (z. B. Abschreiten bestimmter Figuren, Zielübungen usw. speziell nach dem System von v. Leyden-Frenkel). Medikamentös haben bisweilen das Argent. nitric. z. B. als Pillen zu 0,01 3—5 mal tägl. 1 Pille mehrere Wochen hintereinander, sowie Arsen, z. B. als Pil. asiat. Erfolg. Gegen die lanzinierenden Schmerzen bewährt sich mitunter milde Elektrotherapie, speziell die Applikation des galvanischen Stroms am Rücken (je eine Elektrode am Nacken und am Kreuz, 8—10 Milliamp. abwechselnd mehrere Minuten in jeder Richtung ohne plötzliche Unterbrechung). Im übrigen Antineuralgica, insbesondere Aspirin, Phenacetin, Trigemini, evtl. Kombination derselben mit Codein (z. B. Antipyrin 0,5, Phenacetin 0,25, Codein phosphor. 0,02—0,04). Gegen die Krisen helfen im allgemeinen nur stärkere Narkotica, hauptsächlich Morphium, an das sich viele Tabiker im Lauf der Zeit unvermeidlich gewöhnen (evtl. stattdessen Dionin oder Heroin); in manchen Fällen hilft  $\frac{1}{2}$ —1 ccm Suprarenin (Stammlösung) subcutan. In besonders hartnäckigen Fällen hat man zur Applikation der sog. Points de feu mit dem Thermokauter nahe der Wirbelsäule, ferner zur operativen Durchschneidung der die betreffenden Gebiete versorgenden hinteren Wurzeln (Förstersche Operation) seine Zuflucht genommen. Die Arthropathien erfordern oft orthopädische Maßnahmen. Endlich ist auf die Prophylaxe bzw. Behandlung einer Cystitis, sobald der Katheterismus notwendig wird, Bedacht zu nehmen.

### Friedreichsche Krankheit (Hereditäre Ataxie).

Die selten vorkommende Krankheit, die ebenfalls zu den Systemdegenerationen gehört, hat mit der Tabes gewisse Züge gemeinsam. Das Leiden zeichnet sich dadurch aus, daß es stets in jugendlichem Alter, meist schon in der Kindheit beginnt, oft mehrere Geschwister befällt und sich in der Hauptsache in hochgradiger Ataxie äußert.

An der Ataxie beteiligt sich vor allem auch der Rumpf, so daß die Patienten beim Gehen und Stehen wie Betrunkene taumeln. Die Sehnenreflexe sind wie bei Tabes erloschen, dagegen fehlen im Gegensatz zu dieser die Pupillenstarre, die Opticusatrophie sowie die sensiblen Reizerscheinungen und Parästhesien. Andererseits finden sich das Babinskische Zehenphänomen, ferner Störungen der Sprache, die einen eigentümlichen teils zögernden, teils skandierenden Charakter erhält, sowie Nystagmus, d. h. rhythmisch zuckende Bewegungen der Bulbi bei seitlicher Blickrichtung. Der Verlauf der Krankheit ist sehr chronisch.

Pathologisch-anatomisch handelt es sich um eine auf hereditärer Anlage entstehende kombinierte Degeneration der Hinterstränge, der Kleinhirnseitenstränge und in geringerem Grade der Pyramidenbahnen. In Fällen mit besonders hochgradiger Ataxie, speziell des Rumpfes hat man eine Atrophie des Kleinhirns gefunden (sog. hereditäre cerebelläre Ataxie).

Außer den vorstehend geschilderten Krankheitsbildern gibt es ferner Systemerkrankungen des Rückenmarks, bei denen ausschließlich die motorischen Bahnen systematisch degenerieren. In der Regel handelt es sich hierbei um rein endogene, ohne erkennbare äußere Ursachen entstehende Affektionen, die eine exquisite Neigung zu familiärem Auftreten und zur Vererbung zeigen. Hierher gehören

die spastische Spinalparalyse, die amyotrophische Lateralsklerose und die spinale progressive Muskelatrophie.

Die **spastische Spinalparalyse** ist ein sehr seltenes Leiden. Sie beruht auf primärer Degeneration der Pyramidenbahnen („primäre Seitenstrangsklerose“), d. h. des zentralen motorischen Neurons, während das periphere intakt bleibt. Die wichtigsten Symptome sind eine zunehmende, mit starken Spasmen einhergehende Schwäche der Muskulatur, ferner die übrigen typischen Zeichen der Pyramidenbahnaffektion, vor allem lebhaftige Steigerung der Sehnenreflexe häufig mit Klonus sowie das Babinskische Zeichen, wogegen Sensibilitätsdefekte, Pupillenstarre, Muskelatrophien sowie Blasen- und Mastdarmstörungen stets vermißt werden.

Die Krankheit beginnt mit spastischer Schwäche in den Beinen, die bald nur mit großer Mühe bewegt und beim Gehen nur wenig vom Boden erhoben werden können. Später geht die spastische Starre auch auf die oberen Extremitäten und den Rumpf über, so daß der Kranke schließlich steif wie ein Stock wird. Wegen der Seltenheit der Krankheit ist bei Vorhandensein des beschriebenen Krankheitsbildes zunächst stets an näherliegende Nervenleiden, die einen ähnlichen Symptomenkomplex hervorrufen, zu denken. Vor allem kommen die multiple Sklerose, die spinale Lues sowie die funikuläre Myelitis in Frage.

Die **amyotrophische Lateralsklerose**, ein weniger seltenes Leiden, ist durch die gleichzeitige Erkrankung der zentralen motorischen Bahn und des peripherischen motorischen Neurons ausgezeichnet. Anatomisch besteht Degeneration der Pyramidenseiten- und vorderstränge, der Ganglienzellen der Vorderhörner und der von diesen ausgehenden peripherischen motorischen Nervenfasern. Außer den spinalen Vorderhörnern wird auch die Kernregion der motorischen Hirnnerven, insbesondere der Hypoglossus und der Vagus und Accessorius in den Degenerationsprozeß miteinbezogen.

Die Krankheit, die in der Regel erst nach dem 30. Jahr auftritt, ist ebenfalls durch rein motorische Störungen gekennzeichnet. Die Hauptsymptome bestehen in einer Kombination von spastischer Lähmung mit einer degenerativen Atrophie der Muskeln. Hochgradige Spasmen im Bereich der unteren und oberen Extremität, bis zum Klonus gesteigerte Sehnenreflexe (Patellar-, Triceps-, Masseterreflex) finden sich neben Muskelatrophien, die in der Regel im Ulnarisgebiet und zwar in den kleinen Handmuskeln beginnen und symmetrisch im Laufe der Zeit auch auf die übrigen Muskeln übergreifen. Später tritt bei Erkrankung der Oblongatakerne das Bild der Bulbärparalyse (siehe S. 560) hinzu, indem in erster Linie der Hypoglossus (Zunge), später der Mundfacialis sowie die Schlingmuskulatur dem Degenerationsprozeß anheimfällt und den Kranken, der unterdessen meist schon bis zum Skelett abgemagert ist, in einen Zustand traurigster Hilflosigkeit versetzt. Es fehlen Sensibilitätsstörungen, Augenmuskellähmungen, Pupillenstarre sowie Störungen der Blasen- und Mastdarmfunktion. Die Dauer der Krankheit beträgt meist mehrere Jahre; das Ende erfolgt in der Regel bei ungetrübtem Bewußtsein infolge einer durch die Bulbärlähmung geförderten Aspirationspneumonie bzw. durch Atemlähmung.

Die **spinale progressive Muskelatrophie** befallt häufiger jugendliche Individuen. Sie besteht anatomisch in einer Degeneration der Vorderhornzellen ohne Veränderung der Pyramidenbahnen. Die Hauptmerkmale der Krankheit sind atrophische, mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit sich ausbreitende Lähmungen, die in den oberen Extremitäten beginnen. Bei dem sog. Typ von Duchenne-Aran treten zuerst Lähmungen im Bereich der kleinen Handmuskeln (Daumen- und Kleinfingerballen, Interossei, Lumbricales) auf und zwar bisweilen zunächst der einen Seite, worauf die der anderen Seite bald zu folgen pflegen. Schon im Anfangsstadium der Krankheit beobachtet man meist fibrilläre Zuckungen an den Muskeln und zwar nicht nur im Gebiete der Lähmungen, sondern an den verschiedensten, zum Teil erst später von der Lähmung befallenen Muskeln. Im Bereich der atrophischen Muskeln ist meist eine partielle Entartungsreaktion nachweisbar. Von den Händen greifen die atrophischen Lähmungen auf den Vorderarm und zwar meist zuerst auf die Extensoren, weiter auf den Oberarm und die Schultermuskulatur über. Schließlich werden auch die Hals- und Nackenmuskeln ergriffen, so daß der Kopf nach vornüber zu fallen neigt und von dem Kranken in charakteristischer Weise

nach hinten im Nacken getragen wird. In anderen Fällen beginnt das Leiden als sog. facio-scapulo-humeraler Typus an der Schulter und im Gesicht. Erst spät pflegen auch die unteren Extremitäten zu erkranken. Im Gegensatz zur Spinalparalyse und der amyotrophischen Lateralsklerose fehlen bei diesem Leiden die Sehnenreflexe im Bereich der erkrankten Muskelgebiete; übereinstimmend mit den vorstehend beschriebenen Krankheitsbildern ist auch für dieses Leiden die Abwesenheit von Pupillenanomalien sowie von Blasen- und Mastdarmstörungen charakteristisch, ebenso fehlen Sensibilitätsstörungen (Unterscheidung gegenüber der Polyneuritis!).

Eine sehr seltene Form der hereditär und familiär auftretenden symmetrischen Muskelatrophien ist die sog. **neurotische progressive Muskelatrophie**. Die meist schon in der Kindheit beginnende Krankheit besteht in atrophischen Lähmungen, die die kleinen Fußmuskeln, das Peronealgebiet und die Wadenmuskeln befällt und später auf die kleinen Handmuskeln und die Vorderarmmuskulatur übergreifen kann, so daß ein Bild wie bei der spinalen Muskelatrophie und bei amyotrophischer Lateralsklerose entsteht. Daneben kommen aber auch leichte Sensibilitätsstörungen sowie Druckempfindlichkeit der großen Nervenstämmen vor. Die Sehnenreflexe sind in dem erkrankten Gebiet herabgesetzt oder erloschen und es besteht ausgesprochene Ea.-Reaktion. Die Krankheit beruht in der Hauptsache wahrscheinlich auf einer Degeneration des peripherischen motorischen Neurons.

Den vorstehend beschriebenen, mit systematischen Muskelatrophien einhergehenden Krankheitsbildern ähnelt klinisch die zur Gruppe der sog. **Myopathien** gehörende

#### **Dystrophia muscularis progressiva,**

die aus diesem Grunde hier besprochen werden soll, obschon der Sitz der Krankheit weder das Rückenmark noch die peripherischen Nerven, sondern die Muskeln selbst sind, die von einem Degenerationsprozeß befallen werden.

Die Krankheit kommt ebenfalls häufig familiär vor und befällt mit Vorliebe mehrere Geschwister. Sie beginnt in der Regel im Kindesalter (infantile Form) oder zur Zeit der Pubertät (juvenile Form). Die Beteiligung der einzelnen Muskelgruppen zeigt eine gewisse Gesetzmäßigkeit insofern, als hier im Gegensatz zur spinalen Muskelatrophie vor allem die proximalen Muskelgebiete herab bis zum Ellenbogen und Knie erkranken, während die distalen Teile frei bleiben. Befallen werden vor allem die Muskeln der Brust, des Schultergürtels, des Rückens, der Oberarme, des Gesäßes, der Oberschenkel und des Gesichtes. Neben Atrophie der genannten Muskelgruppen kommen aber auch Hypertrophien und sog. Pseudohypertrophien vor, die auf der Einlagerung von Fett in den Muskeln beruhen. Es entsteht dadurch eine Volumenzunahme der Muskeln, die man hauptsächlich am Deltamuskel, an den Glutäen und der Wadenmuskulatur beobachtet.

Bei der häufigeren infantilen Form, die in den ersten Lebensjahren beginnt, sind die Hauptmerkmale zunehmende Schwäche der Rumpf-, Becken- und Oberschenkelmuskulatur. Sie äußert sich in charakteristischer Weise in einem watschelnden bzw. wiegenden Gang (Versagen der *Mm. glutaei med.*), weiter in der Erschwerung bzw. Unmöglichkeit, sich aus liegender Stellung ohne Unterstützung der Arme aufzurichten — die Kinder klettern charakteristischerweise gewissermaßen am eigenen

Körper empor — (Atrophie der Glutäen und des Quadriceps); endlich besteht eine auffallend starke Lordose. Weiter werden auch die Gesichtsmuskeln in den Krankheitsprozeß miteinbezogen; die Atrophie befällt die Mm. orbiculares oculi und oris und die Wangenmuskulatur. Die Augen können nicht mehr vollkommen geschlossen werden, das Spitzten des Mundes wird unmöglich. Das Gesicht zeigt schließlich eine eigentümliche maskenartige Bewegungslosigkeit, die zusammen mit der Abmagerung den Typus der sog. myopathischen Facies bewirkt und die Diagnose dem Kranken schon vom Gesicht abzulesen gestattet.

Bei manchen Fällen überwiegt zunächst die beschriebene Pseudohypertrophie der Muskeln, so daß die Kinder einen abnorm muskulösen Eindruck erwecken, der indessen mit der geringen Muskelkraft kontrastiert.

Bei der juvenilen Form der progressiven Dystrophie lokalisiert sich die Krankheit im Gegensatz zur infantilen Form mit Vorliebe im Bereich des Schultergürtels und des Oberarms, wodurch ebenfalls im Lauf der Zeit ein sehr charakteristisches Bild entsteht. Infolge der Atrophien der Schultermuskulatur sinkt die Schulter herab, die Schulterblätter stehen flügel förmig ab, die Brust ist infolge des Schwundes der Pectoralmuskeln eingesunken, die Oberarme sind auffallend dünn. Pseudohypertrophien fehlen bei dieser Form. Später stellen sich auch hier wie bei der infantilen Dystrophie Atrophien am Beckengürtel ein. Fibrilläre Zuckungen der Muskeln sowie EaR fehlen; die Sehnenreflexe erlöschen in Bereich der erkrankten Gebiete. Viele der Kranken mit Dystrophie sterben frühzeitig an einer interkurrenten Erkrankung. Bei manchen Patienten zeigt das Leiden später ein stationäres Verhalten. Man findet sie nicht selten unter den Insassen der Siechenhäuser.

Zu den Myopathien gehört weiter die seltene **Myotonia congenita** oder **Thomsensche Krankheit**. Das meist familiär auftretende Leiden, das das männliche Geschlecht bevorzugt, besteht in der Eigentümlichkeit, daß die Kranken nach einer kräftigen willkürlichen Muskelkontraktion die kontrahierten Muskeln nicht wie der Gesunde sofort wieder prompt zur Erschlaffung zu bringen vermögen, sondern daß der Kontraktionszustand noch einige Zeit bestehen bleibt und nur langsam wieder schwindet. Der Patient vermag daher z. B. die einmal geschlossene Hand nicht sogleich, sondern erst allmählich unter erheblicher Kraftanstrengung zu öffnen. Doch gilt das nur für erstmalig ausgeführte Bewegungen, während bei Wiederholung derselben der Widerstand der Muskeln allmählich nachläßt. So hat der Myotoniker beim Gehen nur während der ersten Schritte große Schwierigkeiten zu überwinden, die mit dem weiteren Gehen immer geringer werden, so daß schließlich der Gang völlig normal ist. Außer den Extremitäten- und Rumpfmuskeln beteiligen sich auch die Gesichts- und Kaumuskeln an der Anomalie. Die Reflexe sind normal.

Dagegen zeigt die mechanische Erregbarkeit der Muskeln beim Beklopfen eine pathologische Steigerung. Ferner beobachtet man bei kräftiger faradischer sowie galvanischer Reizung eine abnorm lange Nachdauer der Muskelkontraktionen, die erst nach Ablauf einiger Sekunden nach Aufhören des Stromes schwinden; außerdem finden sich bei stabiler Galvanisation des Muskels rhythmische wellenförmige Kontraktionen von der Ka zur An; es ist dies die Erbsche sog. myotonische Reaktion. Die Krankheit ist unheilbar, jedoch im allgemeinen ungefährlich. Zu körperlichen Berufen macht sie die Patienten in der Regel ungeeignet.

Eine Abart der Myotonie ist die **Myotonia atrophica** (amyotrophische Myotonie), eine Kombination der Thomsenschen Krankheit mit Atrophien im Gebiet

der Gesichts- und Kaumuskeln sowie der Muskeln der Unterarme, der kleinen Handmuskeln, der Wadenmuskeln usw. Die Sehnenreflexe fehlen häufig. Später kommt es mitunter zu Sprach- und Schluckstörungen. Das Leiden ist oft mit eigentümlichen trophischen Störungen wie Katarakt, Hodenatrophie, Haarausfall, Abmagerung verbunden.

Die *Myasthenia gravis pseudoparalytica* ist ein weiteres zu den Myopathien zu rechnendes Leiden, das ebenfalls anatomische Veränderungen am Nervensystem vermissen läßt. Das Hauptkennzeichen der Krankheit ist eine abnorm rasche Erschöpfbarkeit der willkürlichen Muskeln. Mit Vorliebe werden die Augen-, Gesichts- und Schlundmuskeln von dem Leiden ergriffen. Eine der zuerst bemerkten Störungen ist Ptose sowie Doppelsehen. Doch beteiligen sich in gleicher Weise mitunter auch die Extremitätenmuskeln an dem Leiden. Die Krankheit beginnt allmählich und äußert sich anfangs in der charakteristischen Weise, daß während der Patient morgens nach dem Erwachen seine Muskeln wie ein Gesunder zu gebrauchen vermag, nach einigen Stunden ihm das Heben der Lider, die Bewegungen der Augen, das Kauen, Schlucken, Gehen usw. zunehmend schwerer werden, bis schließlich im Laufe des Tages eine lähmungsartige Schwäche eintritt. Längere Ruhepausen bzw. die Nachtruhe beseitigen anfangs die Störungen. Später pflegt die Muskelschwäche eine dauernde zu sein. Im Verlauf des Leidens kommen sowohl plötzliche Verschlimmerungen als auch gelegentliche Besserungen vor; doch endet die Krankheit stets letal, wobei die Todesursache oft in der Lähmung der Schlundmuskulatur bzw. der Atemmuskeln beruht (der Exitus trat gelegentlich während der Fütterung mit der Schlundsonde ein).

Die Krankheit zeigt eine äußerliche Ähnlichkeit mit der Bulbärparalyse (daher die Bezeichnung „asthenische Bulbärparalyse“), von der sie sich jedoch durch das Fehlen des anatomischen Befundes, ferner den anfangs vorübergehenden Charakter der Paresen sowie durch ihre Verlaufsart unterscheidet. Analog der abnormen Ermüdbarkeit bei der willkürlichen Innervation der Muskeln beobachtet man bei länger fortgesetzter kräftiger faradischer Reizung eine charakteristische Abnahme der elektrischen Erregbarkeit in Form der sog. Jollyschen myasthenischen Reaktion. Die dauernd (auch im Remissionsstadium) in Lebensgefahr befindlichen Kranken sind vor jeder stärkeren Anstrengung sowie auch von beruflicher Betätigung fern zu halten. Therapie: Am besten zunächst Bettruhe sowie Versuch mit tonisierend-robotierenden Medikamenten (Strychnin, Arsen, Chinin). In späteren Stadien ist evtl. die Ernährung mit der Schlundsonde notwendig.

## Bulbäre Erkrankungen.

### Progressive Bulbärparalyse.

Unter progressiver Bulbärparalyse versteht man eine fortschreitende Degeneration im Bereich der motorischen Kernregion der Oblongata. Die Bezeichnung *Paralysis glosso-labio-pharyngea* deutet die Gebiete an, innerhalb deren die Krankheit sich abspielt. Sie befällt die Kerne des Hypoglossus, des Facialis, des Glossopharyngeus, des motorischen Trigeminus und des Vagus-Accessorius. Entzündliche Prozesse fehlen vollkommen. Die Bulbärparalyse stellt demnach ein Analogon der spinalen Muskelatrophie dar.

Die Krankheit tritt in der Regel jenseits der 40er Jahre auf. Hereditäres und familiäres Vorkommen wird nicht beobachtet. Die ersten Krankheitserscheinungen entwickeln sich allmählich und bestehen in Erschwerung der Sprache. Die Artikulation gewisser Laute wird erschwert; zunächst bekommen vor allem die sog. Zungenlaute (D, L, N, R, S) einen eigentümlich verschwommenen Charakter (dysarthrische

Störung). Weiter macht sich auch eine Schwäche des Gaumensegels bei der Artikulation bemerkbar, indem bestimmte Laute wie I, C, K einen eigentümlich näselnden Klang annehmen. Auch im Bereich der Lippenmuskulatur treten Störungen auf. Die Patienten klagen über ein Gefühl von Spannung und Steifigkeit in den Lippen und ebenso zeigt auch die Artikulation der sog. Lippenlaute B, P, F, M, W sowie der Vokale E, O, U eine zunehmende Erschwerung.

Die objektive Untersuchung ergibt, wenn das Leiden eine Zeitlang besteht, vor allem an der Zunge typische Veränderungen. Sie ist verschmächtigt und dünner als normal; bei Bewegungen, speziell beim Herausstrecken der Zunge, wird schon frühzeitig eine gewisse Unbeholfenheit bemerkbar. Deutliche fibrilläre Zuckungen lassen die degenerative Atrophie erkennen (die Zunge erweckt den Eindruck eines mit Würmern gefüllten schlaffen Sackes). Auch die Lippen werden dünner und atrophisch, ihre Haut wird runzelig; Mundspitzen und Pfeifen wird unmöglich. Weiter greift die Atrophie auch auf die sonstigen Gesichtsmuskeln über, wobei sie sich aber stets auf diejenigen der unteren Gesichtshälfte beschränkt. Das Gesicht magert ab und wird faltig, als wenn die Haut zu weit geworden wäre. Es bekommt starre Züge und bei vorgeschrittenen Fällen einen eigentümlichen weinerlichen Gesichtsausdruck; die Mundwinkel hängen herab, der Mund ist in die Breite gezogen und halb geöffnet; beständig fließt Speichel heraus. Beim Lachen bleibt die untere Gesichtshälfte unbeteiligt, während charakteristischerweise Stirn- und Augenmuskeln bis zuletzt beweglich bleiben.

Auch das Schlucken wird zunehmend schwieriger, sowohl infolge der fortschreitenden Atrophie der Zunge, die schließlich schlaff am Boden der Mundhöhle liegt, als auch durch Atrophie der Schlundmuskulatur. Die Bissen bleiben in den Backentaschen liegen, flüssige Speise fließt infolge der Gaumensegellähmung aus der Nase heraus. Berührung der hinteren Rachenwand löst keinen Würgregreflex aus. Die Sprache wird immer mehr lallend und schließlich völlig unverständlich. Auch die Muskeln des Kehlkopfs verfallen der Atrophie. Anfangs verrät sich dies durch Monotonie der Stimme, später durch mangelhaften Glottisschluß (Laryngoskopie!). Die Stimme wird heiser, kräftige Hustenstöße werden unmöglich, so daß in den Larynx geratene Speisereste nicht wie bei Gesunden sofort wieder ausgestoßen werden und die Gefahr der Aspirationspneumonie besteht. Bisweilen kommt es zu starkem Ansteigen der Pulsfrequenz (Vaguslähmung). Sensibilitätsstörungen sowie Beteiligung der oberen Hirnnerven (I—IV) werden stets vermißt. Der Nachweis der elektrischen EaR. mißlingt häufig, weil neben den atrophischen auch intakte Muskelfasern vorhanden sind. Später ist namentlich an der Zunge eine charakteristische träge Zuckung bei galvanischer Reizung nachzuweisen.

Beachtenswert ist, daß sich fast regelmäßig im Verlauf der Bulbärparalyse auch die Symptome der amyotrophischen Lateralsklerose (vgl. S. 557) einstellen, teils in der Form, daß das Leiden mit Bulbärsymptomen beginnt, teils daß umgekehrt sich zuerst die Zeichen der Lateralsklerose entwickeln und erst später die Bulbärparalyse dazu

tritt. Es ist daher anzunehmen, daß beide Affektionen eng miteinander verknüpft sind.

Das qualvolle Leiden dauert in der Regel mehrere Jahre. Die Kranken, die bis zuletzt bei vollem Bewußtsein bleiben, erliegen meist einer Aspirationspneumonie infolge des Fehlschluckens.

Differentialdiagnostisch kommt einmal die S. 560 beschriebene myasthenische Bulbärparalyse sowie ferner die seltene sog. Pseudobulbärparalyse in Frage. Letztere beruht nicht auf einer bulbären Erkrankung, sondern auf doppelseitigen Großhirnläsionen, insbesondere multiplen apoplektischen Insulten. Die Erklärung für das Zustandekommen der Pseudobulbärparalyse liegt darin, daß speziell die Muskeln des Pharynx und Larynx von beiden Hirnhemisphären bilateral innerviert werden, so daß die Innervation dieser Gebiete schon von einer Großhirnhemisphäre aus beiderseitig erfolgt. Als Voraussetzung für eine Parese bulbärer Nerven infolge cerebraler Erkrankung ist es demnach erforderlich, daß Läsionen in beiden Großhirnhälften vorliegen.

## Krankheiten des Großhirns.

**Einleitung.** Das Gehirn besteht aus den beiden Großhirnhemisphären, dem Kleinhirn und dem Hirnstamm. Die Hemisphären des Großhirns setzen sich aus der grauen Rindensubstanz, dem weißen Marklager oder Centrum semiovale und aus den sog. Großhirnganglien, d. h. dem Thalamus opticus, dem Linsenkern und Schweißkern zusammen. Die graue Rinde ist der Sitz des Bewußtseins. Von ihr gehen alle willkürlichen motorischen Impulse aus, wie umgekehrt alle durch die sensiblen Nerven und die Sinnesorgane aus der Außenwelt aufgenommenen Reize und Eindrücke erst in der Hirnrinde zu bewußten Vorstellungen verarbeitet werden. Die Hirnrinde ist weiter als diejenige Stätte anzusehen, in der frühere Sinneseindrücke aufgespeichert werden und so zum Inhalte der Erinnerung werden.

Für die klinische Diagnostik der Gehirnkrankheiten hat die Kenntnis der Lokalisation der einzelnen Hirnfunktionen eine praktisch eminent wichtige Bedeutung. Ihre Kenntnis verdanken wir sowohl den Beobachtungen bei herdförmigen Erkrankungen der einzelnen Hirnteile als auch den Ergebnissen der experimentellen Forschung beim Tier, soweit hier Analogieschlüsse erlaubt sind. Die motorischen resp. sensorischen Beziehungen zwischen den Großhirnhemisphären einerseits und dem Bewegungs- und Gefühlsapparat des Körpers andererseits sind in der Hauptsache gekreuzt, d. h. bei Erkrankung der Hemisphäre der einen Seite resultieren Motilitäts- und Sensibilitätsstörungen der anderen Seite.

Was nun die **Rindenlokalisation** im einzelnen anlangt, so ist zunächst hervorzuheben, daß es eine große Anzahl von Rindenterritorien gibt, deren Funktion zur Zeit nicht genau bekannt ist, zumal deren Läsion keine charakteristischen Ausfallserscheinungen bewirkt (sog. taube oder stumme Stellen der Rinde). Bei Schädigung bzw. Zerstörung anderer Regionen treten Herdsymptome auf, die in Funktionsstörungen auf psychomotorischem bzw. psychosensorischem Gebiet, ferner in Sprachstörungen bestehen.

Die psychomotorische Großhirnregion, d. h. also die Gegend, von der motorische Willensimpulse ausgehen, ist die Rinde der vorderen Zentralwindung bzw. der von dieser auf den hintersten Abschnitt des Frontallappens übergreifende Teil sowie der auf der medialen Seite befindliche Lobus paracentralis. Die einzelnen Zentren sind so angeordnet, daß im oberen Drittel der vorderen Zentralwindung und im Lobus paracentralis die motorischen Zentren für das Bein, im mittleren Drittel diejenigen für die obere Extremität und zwar von oben nach unten je eins für die Schulter, den Arm und die Finger vorhanden sind. Im unteren Drittel befindet sich das Zentrum für Facialis und Hypoglossus. Anstoßend an diese Gegend liegt weiter vorn, d. h. im hintersten Teil oder dem sog. Fuß der dritten untersten Frontalwindung sowie in der Insula Reilii in der linken Hemisphäre das motorische Zentrum für die Sprache (sog. Brocasche Windung).

Die Sensibilität des Körpers ist in der Rindenregion hinter dem Sulcus centralis lokalisiert. Sie beginnt mit der hinteren Zentralwindung und greift zum

Teil auf den Gyrus angularis und supramarginalis über. Genaueres über die den einzelnen Körperbezirken entsprechenden Territorien ist für die Sensibilität nicht bekannt, ebensowenig die Grenze, bis zu der sich die sensible Rindenzone nach hinten erstreckt. Die oberste Temporalwindung der linken Hemisphäre enthält in




Abb. 52. Gyri und Sulci auf der Konvexität der linken menschlichen Großhirnhemisphäre (nach Edinger).

ihrem hinteren Teil das sensorische Sprachzentrum (s. unten). Der Temporalappen enthält Zentren für das Gehör. Die Rinde des Occipitallappens, insbesondere die mediale Fläche stellt die sog. Sehregion dar. Näheres s. unten.

An diagnostisch wichtigen Einzelheiten über die Ausfallerscheinungen, die sich bei herdförmiger Erkrankung der vorstehend beschriebenen psychomoto-




Abb. 53. Gyri und Sulci in der medialen Fläche der rechten menschlichen Großhirnhemisphäre (nach Edinger).

rischen und psychosensorischen Rindenzentren einstellen, ist folgendes hervorzuheben. Bei dem Rechtshänder, also der überwiegenden Mehrzahl der Menschen, kommt der linken Hemisphäre eine ausgesprochene Präponderanz zu. Das gilt vor allem für die Sprache und zwar sowohl für das Sprechvermögen (motorisch) wie das Sprachverständnis (sensorisch) einschließlich des Lesens und Schreibens, zum Teil auch für gewisse kompliziertere Handlungen. Schädigungen der entsprechenden Zentren der linken Hemisphäre vernichten daher diese Funktionen,



ohne daß die rechte Hemisphäre vikariierend einzutreten vermag. Bei Linkshändern verhält sich dies umgekehrt.

Zerstörung der Brocaschen Windung bewirkt sog. motorische Aphasie, die darin besteht, daß der Patient die ihm vorschwebenden Begriffe nicht in Worte umzusetzen vermag. Er bringt nur einzelne unverständliche Laute hervor oder verfügt über einzelne spärliche Sprachreste; in leichteren Fällen werden manche Wörter richtig, dagegen andere fehlerhaft unter Vertauschung von Silben oder Buchstaben ausgesprochen. Nachsprechen und laut lesen gelingt nicht oder nur ganz unvollkommen. In der Regel vermag der Patient auch nicht spontan zu schreiben (Agraphie), wovon man sich bei Lähmung der rechten Hand dadurch




Abb. 54. Ansicht der Hirnbasis (entnommen aus Friedr. Müller: Taschenbuch der medizinisch-klinischen Diagnostik).

überzeugt, daß man ihn mit der linken zu schreiben auffordert. Dagegen versteht er das zu ihm Gesprochene. Das Verständnis für Gedrucktes und Geschriebenes ist ebenfalls erhalten; auch können die Kranken es mitunter kopieren.

Eine andere Form von Sprachstörung ist die sog. sensorische Aphasie, d. h. eine Störung des Sprachverständnisses. Sie entsteht bei Läsion der Rinde des linken Temporallappens, insbesondere der ersten Temporalwindung (sog. Wernickesche Zone). Kranke mit sensorischer Aphasie verlieren nicht die Fähigkeit zu sprechen, hören auch das zu ihnen Gesprochene, verstehen es aber nicht, da sie mit dem Gehörten keine Vorstellung verbinden. Sie verhalten sich demnach einem Normalen ähnlich, der eine fremde, ihm unbekannt Sprache hört. Bisweilen sind Reste des Sprachverständnisses erhalten, so daß der Patient z. B. auf ihm geläufige konventionelle Fragen noch richtig antworten kann (z. B. Frage: „wie geht es?“ Antwort: „gut“), während er im übrigen sinnlose Worte hervorbringt bzw. auf die Aufforderung zu einer bestimmten Handlung, z. B. die Zunge herauszustrecken oder einen in seiner Nähe befindlichen Gegenstand zu zeigen usw.

fehlendes Verständnis zeigt. In der Regel ist mit der sensorischen Aphasie sog. Paraphrasie verbunden, d. h. der Kranke redet unverständlich, indem er teils falsch gewählte Worte, z. B. statt „Kamm“ „Holz“ sagt, teils die Buchstaben der Worte falsch setzt oder verwechselt (z. B. statt „Fischer“ „Filscher“) oder einzelne Silben zu einem unverständlichen Kauderwelsch aneinander reiht. Im Gegensatz zur motorischen Aphasie, bei der die Patienten nicht oder nur wenig sprechen, besteht bei der mit Paraphrasie einhergehenden sensorischen Aphasie eine Neigung zu unaufhörlichem Reden (sog. Logorrhöe). Charakteristisch ist hierbei ferner die sog. Perseveration oder das Haftenbleiben, d. h. das mehrfache Wiederholen einzelner sinnloser Silben oder Worte. Im Gegensatz zum Motorisch-Aphasischen bemerkt der Patient nicht, daß er falsch spricht. Auch vermag er nicht, ihm vorgesprochene Worte richtig nachzusprechen, ebenso pflegt die Fähigkeit, spontan oder nach Diktat richtig zu schreiben, gestört zu sein. Auch das Schriftverständnis ist bei sensorischer Aphasie völlig aufgehoben bzw. gestört (Alexie oder Wortblindheit); doch vermögen die Kranken die für sie unverständlichen Buchstaben in der Regel zu kopieren.

Der sensorischen Aphasie nahe verwandt und ebenfalls im Temporallappen lokalisiert ist die sog. amnestische (verbale) Aphasie. Diese praktisch wichtige Form, die mitunter mit der motorischen Aphasie verwechselt wird und dann irrtümlich in den Frontal- statt in den Temporallappen verlegt wird, äußert sich darin, daß die Patienten die richtigen Bezeichnungen für konkrete Dinge nicht finden, ohne aber falsche Worte zu gebrauchen; auch weisen sie vom Arzt ihnen genannte falsche Bezeichnungen zurück, erkennen die richtigen und vermögen sie nachzusprechen.

Isolierte Läsion des rechten **Temporallappens** verursacht keine charakteristischen Erscheinungen. Dagegen bewirkt beiderseitige Erkrankung der Temporallappen (Rinden-) Taubheit, wogegen Patienten mit linksseitiger Temporalläsion zwar die beschriebenen Ausfallserscheinungen des Sprachverständnisses zeigen, wohl aber noch vermögen ihres rechten Temporallappens hören können und z. B. mitunter Melodien nachzusingen vermögen. Die dem Hörvermögen dienenden Nervenbahnen beginnen in der Schnecke, ziehen als N. cochlearis zu den Kernen der Oblongata, von hier aus als Striae acusticae, Corpus trapezoides und Lemniscus lateralis zum hinteren Vierhügel und Corpus genicul. med. und begeben sich alsdann zur Rinde der Schläfenlappen, speziell zur sog. Heschlischen Windung, die von der obersten Temporalwindung zum hinteren Teil der Insel verläuft.

Erkrankungen des **Occipitallappens** führen zu Sehstörungen, deren Verständnis die Kenntnis der sog. Sehbahn voraussetzt (vgl. Abb. 55). Die im N. opticus verlaufenden Fasern erfahren im Chiasma eine partielle Kreuzung in der Weise,




Abb. 55. Verlauf der Sehbahnen beim Menschen (nach Bing).

daß der aus diesem hervorgehende im rechten Tractus opticus verlaufende Faseranteil die Sehnervfasern der beiden rechten Netzhauthälften, der linke Tractus die der beiden linken Netzhauthälften enthält. Der Tractus opticus führt zu den sog. primären Sehzentren, d. h. zum Corpus genicul. laterale und zum vorderen Vierhügel, von denen aus die Sehbahn sich hinter dem Linsenkern zum Occipitallappen begibt und lateral vom Hinterhorn als sog. Gratioletsche Sehstrahlung zum optischen Rindenfeld im Cuneus und der Fissura calcarina führt. Vom vorderen Vierhügel zweigen sich Fasern zum Oculomotoriuszentrum ab, die die reflektorische Pupillenverengung bei Belichtung vermitteln. Aus dem anatomischen Verlauf der Opticusfasern bzw. der Sehbahn ergeben sich folgende für die Klinik wichtigen Tatsachen:

Eine Läsion des medialen Teils des Chiasmata (z. B. durch Hypophysentumoren), also der aus den nasalen Netzhauthälften stammenden, sich kreuzenden Fasern, verursacht bitemporale oder sog. Scheuklappenhemianopsie, d. h. Ausfall der beiden lateralen Gesichtsfeldhälften (durch die Linse des Auges erfolgt bekanntlich in diesem eine Kreuzung der Lichtstrahlen). Im Gegensatz hierzu bewirken alle Läsionen, die zentral vom Chiasma gelegen sind, sog. homonyme Hemianopsie für die kontralaterale Hälfte des Gesichtsfeldes, d. h. es fallen beide rechte oder beide linke Gesichtshälften aus. Hemianopsie kommt nach dem Gesagten sowohl bei Sitz der Läsion im Tractus opticus wie im Bereich der Sehbahn, im Mark des Occipitallappens wie endlich bei Läsion der Occipital-Rinde im Bereich der Fissura calcarina vor. Bei vollständiger Zerstörung beider Occipitallappen entsteht völlige Erblindung, die als Rindenblindheit bezeichnet wird. Dieselbe ist zu unterscheiden von der sog. Seelenblindheit, bei der zwar das Sehvermögen erhalten ist, ohne daß aber der Patient die gesehenen Objekte erkennt (er kann z. B. das Aussehen eines ihm gezeigten Gegenstandes beschreiben, versteht aber nicht dessen Bedeutung). Dies Phänomen tritt bisweilen bei linksseitiger und beiderseitiger Occipitallappenerkrankung auf. Sowohl bei der Rinden- wie bei der Seelenblindheit ist die Lichtreaktion der Pupille erhalten, da die hierfür dienenden Fasern, wie oben gezeigt, sich schon vorher abzweigen. Die schon früher genannte, bei Läsion des linken Gyrus angularis beobachtete Unfähigkeit zu lesen (Alexie), ist fast regelmäßig mit rechtsseitiger Hemianopsie kombiniert. Außerdem kommt bei der gleichen Läsion sog. optische Aphasie vor, bei der die Kranken die von ihnen gesehenen Objekte nicht richtig benennen können.

Auch Störungen der Augenbewegungen kommen bei cerebralen Erkrankungen vor, jedoch im Gegensatz zu den peripherischen bzw. nucleären Erkrankungen weder in Form einzelner noch einseitiger Augenmuskellähmungen, sondern stets als doppelseitige Lähmung bzw. Bewegungsbeschränkung in sog. konjugierter, d. h. gleichsinniger Form. Die hier hauptsächlich in Frage kommende Bewegungsstörung ist die sog. *Déviation conjuguée*, d. h. die zwangsmäßige Seitwärtsrichtung beider Augen, die nach der anderen Seite nicht über die Mittellinie hinaus bewegt werden können. Man beobachtet dies häufig, allerdings meist nur vorübergehend bei Zerstörung bzw. Reizung sowohl im Bereich des Gyrus angularis wie des Fußes der zweiten Frontalwindung.

Erkrankungen der Rinde des **Parietallappens** gehen häufig mit sog. **Astereognosie** oder **Tastlähmung einher**, d. h. es besteht Unfähigkeit, Gegenstände durch Betasten als solche (z. B. Uhr, Bleistift, Schlüssel) bei geschlossenen Augen zu erkennen, ohne daß etwa die einzelnen Qualitäten der Hautempfindung (Berührung, Unterscheidung von spitz und stumpf) beeinträchtigt sind. Läsion des linken Parietallappens kann aber auch sog. **motorische Apraxie** zur Folge haben. Hierbei ist zwar die Fähigkeit, die Extremitäten zu den verschiedenen Bewegungen zu gebrauchen, vollkommen erhalten, dagegen vermag der Patient diese Bewegungen nicht zu zweckmäßigen Handlungen richtig zu kombinieren. Z. B. auf Aufforderung zu grüßen macht er statt dessen eine Drohbewegung oder er steckt den ihm zum Schreiben dargebotenen Bleistift in den Mund usw. Vor der Untersuchung hat man in diesen Fällen sich zu vergewissern, daß der Kranke das Gesagte versteht und die Gegenstände als solche erkennt. Die bei linksseitiger Parietalläsion resultierende Apraxie ist doppelseitig, betrifft also beide Hände. Hieraus erklärt sich das Vorkommen von linksseitiger Apraxie neben rechtsseitiger Lähmung bei Erkrankung der linken Hemisphäre. Ausschließlich linksseitige Apraxie ohne rechts-

seitige Lähmung wird bei Läsion des vorderen Teils des Balkens beobachtet, da die Commissurenfasern desselben die Kontrolle vermitteln, die von der auch hier funktionell überwertigen linken Hemisphäre gegenüber der rechten ausgeübt wird.

Seitens der übrigen Gehirnteile sind keine speziellen, diagnostisch sicher verwertbaren Ausfallssymptome zu nennen. Den bei Erkrankung der vorderen Teile des Stirnhirns gelegentlich beobachteten eigenartigen psychischen Störungen wie der sog. Witzelsucht, kommt nur ein beschränkter klinischer Wert zu. Dagegen ist ein wichtiges allgemeines Hirnrindensymptom, das nicht bei in der Tiefe gelegenen Prozessen beobachtet wird, das Auftreten der sog. Jackson'schen Epilepsie. Entsprechend der Reizung der Rinde treten hier klonische Krämpfe im Bereich der verschiedenen Muskelgebiete nacheinander in der gleichen




Abb. 56. Horizontalschnitt durch das Großhirn (entnommen aus Friedr. Müller: Taschenbuch der medizinisch-klinischen Diagnostik).

Reihenfolge auf, wie sie anatomisch in den motorischen Rindenzentren nebeneinander angeordnet sind, um entweder in einer bestimmten Muskelgruppe halt zu machen oder schließlich in allgemeine Krämpfe überzugehen (vgl. Epilepsie).

Die **Stammganglien** bestehen aus dem Thalamus opticus, dem Linsenkern und dem Nucleus caudatus.

Der **Thalamus opticus** steht in wichtiger Beziehung zur Sensibilität. Die vom Rückenmark bzw. der Oblongata kommende sensible Schleifenbahn mündet in seinem ventralen und lateralen Kern, erfährt dortselbst eine Umschaltung und begibt sich hierauf vom Thalamus durch den hinteren Teil der inneren Kapsel zur Rinde des Parietallappens. Charakteristische Symptome einer Thalamusaffektion sind 1. halbseitige gekreuzte Sensibilitätsstörungen namentlich bezüglich der Tiefensensibilität; 2. eigentümliche als Chorea bzw. Athetose bezeichnete motorische Reizerscheinungen, die halbseitig auf der Seite der Sensibilitätsstörung auftreten; 3. heftige sog. zentrale Schmerzen im gleichen Gebiet in der Form der sog. Hemianaesthesia dolorosa; 4. Fortfall gewisser unwillkürlicher mimischer



An die Hirnschenkel schließt sich die **Brücke** (Pons) an, in deren ventralem Teil die Pyramidenbahnen verlaufen, während dorsal von ihnen sich die sensible Schleife befindet. Ventral vom Aquaeductus Sylvii liegt der Fasciculus longitudinalis posterior, der die Kerne der Augenmuskelnerven miteinander sowie mit den Kernen des N. vestibularis und dem Kleinhirn verknüpft. Der dorsale Teil der Brücke enthält die Kerne des Trigeminus, Facialis und Abducens. Die aus der Brücke austretenden motorischen Pyramidenbahnen werden in der **Oblongata** und zwar in der Decussatio pyramidum zum größten Teil gekreuzt. Die Oblongata enthält außer zahlreichen Hirnnervenkernen (vgl. Abb. 44 u. 54) das Atemzentrum sowie das Vasomotorenzentrum, deren Verletzung sofortigen Tod zur Folge hat.

Das **Kleinhirn** (Cerebellum) hat klinisch als Zentrum der Koordination der Bewegungen eine große Bedeutung. Mit dem Großhirn ist es sowohl durch die Rückenarme wie durch die Brachia conjunctiva, mit dem Rückenmark bzw. der Oblongata durch die Corpora restiformia verbunden. Die durch die Brückenarme ziehenden Fasern gelangen von der Rinde des Stirnhirns und des Temporallappens teils durch den vorderen Schenkel der inneren Kapsel, teils durch die Regio hypothalamica zu den Pedunculi. Die Brachia conjunctiva stellen eine Verbindung zwischen dem Nucleus dentatus des Kleinhirns und dem Nucleus ruber her. Von außen werden dem Kleinhirn durch die Kleinhirnseitenstrangbahn und das Gowersche Bündel des Rückenmarks Impulse übermittelt. Ferner ziehen zum Kleinhirn Nervenbahnen mit dem N. vestibularis von den Bogengängen des inneren Ohres, also dem Organ, das das Gleichgewicht des Körpers und die Orientierung im Raume ermöglicht. Auch mit den äußeren Augenmuskeln steht das Kleinhirn in Verbindung. Die Hauptaufgabe des Kleinhirns, die Koordination bei der Ausführung komplizierterer Bewegungen beruht in der speziell vom Wurm regulierten sog. Synergie, d. h. dem normalen Zusammenarbeiten der verschiedenen Muskelgruppen speziell beim Stehen und Gehen. Kleinhirnerkrankungen machen oft sehr charakteristische Erscheinungen, die im Gegensatz zu den Großhirnsymptomen auf der gleichen Seite wie die Läsion auftreten. Zu diesen gehören die S. 556 beschriebene cerebellare Ataxie als Symptome der sog. Asynergie, weiter die sog. Adiadochokinesie, d. h. die Unfähigkeit, entgegengesetzte Bewegungen schnell hintereinander auszuführen (z. B. Pro- und Supination oder Beugung und Streckung der Hand), eine Störung, die indessen gelegentlich auch bei anderweitigen Erkrankungen beobachtet wird. Schwindelanfälle sind namentlich dann für Kleinhirnerkrankungen charakteristisch, wenn sie mit einem Fallen nach der Seite (und zwar der erkrankten) einhergehen.




Abb. 58. Hirnschenkelgegend (nach F. Müller: Taschenbuch der medizinisch-klinischen Diagnostik).

Schließlich ist bezüglich der allgemeinen Symptomatologie der Gehirnerkrankungen noch hervorzuheben, daß unter den hierbei auftretenden Lokalsymptomen neben den sog. direkten Herdsymptomen, die auf Läsion der entsprechenden Region beruhen, auch **indirekte Herdsymptome** vorkommen, teils als Lähmungen, teils als Reizerscheinungen. Die indirekten Symptome erklären sich aus der Fernwirkung der Krankheitsherde und beruhen häufig auf Druckwirkung, Ödem usw., die von dem eigentlichen Herde ausgehen. Im Gegensatz zu den direkten Herdsymptomen pflegen sie sich im Laufe der Zeit wieder zurückzubilden.

Neben den Herdsymptomen kommen bei Gehirnkrankheiten noch die sog. **Allgemeinsymptome** für die Diagnose in Frage. Zu diesen gehören namentlich heftiger Kopfschmerz, Übelkeit und Erbrechen, Schwindel, evtl. Pulsverlangsamung und vor allem die diagnostisch besonders bedeutsame Stauungspapille (Ophthalmoskopie!), deren Vorhandensein stets als ein sicheres Zeichen für eine pathologische Steigerung des Hirndrucks aufzufassen ist.

### Gehirnblutung; Embolie und Thrombose der Gehirngefäße.

Die Gehirnblutung oder Apoplexie ist die häufigste unter den akut einsetzenden Gehirnerkrankungen. Sie beruht auf Berstung einer Gehirnarterie und stellt sich in der Mehrzahl der Fälle auf dem Boden einer Arteriosklerose, nächst dem bei syphilitischer Gefäßerkrankung ein. Die Arteriosklerose der Gehirnarterien geht häufig mit der Entstehung multipler kleiner, sog. miliärer Aneurysmen der kleinen Gefäße einher. Außer Arteriosklerose und Lues kommt in einzelnen Fällen als Ursache einer Blutung noch die fettige und hyaline Degeneration der Gefäßwand in Frage, die sich mitunter bei schweren Anämien und hämorrhagischen Diathesen einstellt. Ein praktisch außerordentlich wichtiges Moment, das das Zustandekommen der Blutung fördert, ist die Steigerung des Blutdrucks. Daraus erklärt sich das häufige Vorkommen der Gehirnblutung bei Nierenkrankheiten, insbesondere bei Schrumpfnieren, ferner bei der hypertonen Form der Polycythämie sowie im Anschluß an eine starke körperliche Anstrengung (auch z. B. im Verlauf der Defäkation, bei der Kohabitation usw.), nach seelischen Erregungen, Trinkexzessen usw.

Die Hirnblutung ist in der Regel eine Erkrankung des höheren Alters jenseits des 50. Jahres. Sie befällt Männer häufiger als Frauen. Vor allem werden kräftige und untersetzt gebaute „vollblütige“ Individuen von dem Leiden befallen, namentlich auch solche, die zu üppiger Lebensweise und reichlichem Alkoholkonsum neigen. Auch Fettsüchtige gehören hierher. Endlich läßt sich auch eine gewisse familiäre Disposition zum „Schlaganfall“ nicht verkennen.

Der Sitz der Blutung ist mit Vorliebe das Gebiet der Art. cerebri med. (fossae Sylvii), häufiger links als rechts und zwar vor allem im Bereich der Äste, die die innere Kapsel und die großen Stammganglien versorgen. Daher ist hauptsächlich diese Region Prädilektionsort der Blutung (sog. capsuläre Hämorrhagie). Die Gefäßruptur bewirkt eine Zertrümmerung der Nervensubstanz im Bereich der Blutung, so daß der Herd unmittelbar nach der Hämorrhagie sich als eine breiige, mit dunkelrotem geronnenem Blut und Trümmern von Nervensubstanz durchmischte Masse präsentiert. In einzelnen Fällen bricht die Blutung in die Seitenventrikel durch. Bleibt der Patient am Leben, so kommt es später allmählich zur Resorption des Blutfarbstoffs bzw. zur Umwandlung in Hämatoidin sowie zum Abtransport der zerstörten Nervensubstanz durch zahlreiche Leukozyten (Körnchenzellen); schließlich entsteht eine mit seröser Flüssigkeit gefüllte Cyste oder eine gelblich pigmentierte Narbe.

Das **Krankheitsbild** der Gehirnblutung pflegt sehr charakteristisch zu sein. Häufig erfolgt aus bestem Wohlbefinden oder nach vorausgegangenen Kopfschmerzen oder Schwindel, in manchen Fällen im Anschluß an eine starke körperliche Anstrengung oder einen Alkoholexzess oder nach einer seelischen Erregung (Blutdrucksteigerung!) der apoplektische Insult, der sog. Schlaganfall der Laien. Der Kranke

stürzt plötzlich bewußtlos hin oder er wird innerhalb kurzer Zeit verworren, unbesinnlich, deliriert und ist erst nach einigen Stunden bewußtlos (verzögerter apoplektischer Insult). Der Tod kann bereits im Insult erfolgen; in einer großen Zahl von Fällen tritt dagegen nur ein komatöser Zustand von kürzerer oder mehrtägiger Dauer ein. Das Gesicht ist dabei meist auffallend gerötet, die Atmung geräuschvoll, schnarrend, der Puls meist voll sowie infolge des Hirndrucks nicht selten verlangsamt. Häufig besteht ferner die oben als *Déviation conjuguée* beschriebene Ablenkung beider Augen nach der einen Seite, und zwar oft in der Richtung des Krankheitsherdes („der Patient sieht den Herd an“), wobei nicht selten auch der Kopf eine Zwangshaltung in dem gleichen Sinne zeigt.

Das Vorhandensein von Lähmungen läßt sich häufig nicht sofort nach Eintritt des Insultes feststellen, da infolge des Komas eine völlige Erschlaffung der gesamten Muskulatur besteht. Meist ist jedoch alsbald eine Facialislähmung an dem Herabhängen des einen Mundwinkels sowie an der charakteristischen, bei der Atmung als sog. Tabaksblasen bezeichneten stärkeren Vorwölbung der Backe der gelähmten Seite zu erkennen. Auch der Tonus der Extremitätenmuskeln auf der Seite der Lähmung ist in der Regel stärker herabgesetzt; die Muskulatur des auf der Unterlage aufliegenden Beines erscheint verbreitert, wie „ausgeflossen“. Ferner bestehen auf der Seite der Lähmung zunächst meist Fehlen bzw. Abschwächung der Sehnenreflexe, ferner das Babinskische Zehenphänomen sowie Fehlen der Bauchdeckenreflexe auf der gelähmten Seite. Auch Temperatursteigerung sowie die Ausscheidung von Zucker im Harn können sich vorübergehend als Folge des apoplektischen Insultes einstellen. Die Pupillen zeigen kein gesetzmäßiges Verhalten, oft ist die Lichtreaktion abgeschwächt.

Die Dauer des Insultstadiums schwankt zwischen wenigen Stunden und mehreren Tagen. Auch nach Schwinden der Insulterscheinungen ist innerhalb der nächsten drei Tage noch mit der Gefahr einer Wiederholung der Blutung zu rechnen und auch während der ersten beiden Wochen nach dem Insult bleibt das Schicksal der Kranken noch unentschieden (Pneumonie und andere Komplikationen!). In der Folgezeit entwickelt sich allmählich das charakteristische Bild der cerebralen Hemiplegie (s. unten). Dabei ist jedoch zu bemerken, daß in der ersten Zeit neben den bleibenden sog. direkten Herdsymptomen auch andere, die sog. indirekten Herdsymptome (vgl. S. 569) vorhanden sind, die einer Rückbildung fähig sind. Daraus erklärt sich, daß anfangs die Lähmungen und sonstigen Ausfallserscheinungen eine stärkere Ausdehnung als später zeigen.

Außer der motorischen Halbseitenlähmung kommen ferner bei entsprechender Lokalisation des Herdes (vgl. Einleitung S. 562) Aphasie, Hemianästhesie, Hemi-anopsie usw. vor. Bei Durchbruch der Blutung in die Seitenventrikel kommt es bisweilen im Koma zu allgemeiner tonischer Starre (oft mit starker Verengerung der Pupillen). Bei ganz kleinen Blutungen braucht ein Bewußtseinsverlust überhaupt nicht einzutreten, sondern es stellt sich evtl. nur eine vorübergehende Verwirrung bzw. leichte Bewußtseinstäubung oder Schwindel ein, worauf alsdann die entsprechenden Ausfallssymptome in die Erscheinung treten.



Die **Gehirnembolie** ist wesentlich seltener als die Gehirnblutung. Sie befällt im Gegensatz zur letzteren häufiger jüngere Individuen, unter denen hier das weibliche Geschlecht öfter als bei der Hirnblutung erkrankt. In der Mehrzahl der Fälle stammt das Embolienmaterial aus dem Herzen (Vitium cordis, Endocarditis), in einzelnen Fällen aus den Lungen (Lungengangrän) bzw. aus thrombotischen Herden im Bereich der Venen des großen Kreislaufs (bei offenstehendem Foramen ovale). Prädilektionsort der Embolie ist auch hier die Art. fossae Sylvii (die linke etwas häufiger als die rechte).

Die anatomische Folge des embolischen Verschlusses einer Hirnarterie ist die sog. Encephalomalacie, d. h. eine herdförmige Gehirnerweichung. Da die Hirnarterien Endarterien sind, für die keine ausreichenden Kollateralen vorhanden sind, so bewirkt Gefäßverschluß Absterben der Nervensubstanz, die sich in eine weiche Masse umwandelt. Diese verfällt später evtl. der Resorption.

Die klinischen Erscheinungen der Gehirnembolie decken sich vielfach vollständig mit dem bei der Hirnblutung beschriebenen Bilde des apoplektischen Insultes. Bei genügender Größe des Erweichungsherdens und seiner Lokalisation in der inneren Kapsel entwickelt sich in gleicher Weise eine Halbseitenlähmung. Oft sind allerdings die Symptome des Insultes weniger heftig als bei der Apoplexie; die Bewußtlosigkeit hält nur kürzere Zeit an oder es kommt überhaupt nicht zu vollkommener Aufhebung des Bewußtseins. Öfter als bei Hirnblutung treten dagegen klonische Krämpfe in der Art der Jacksonschen Rindenepilepsie auf. Auch hier pflegt als Residuum der Embolie die cerebrale Hemiplegie zurückzubleiben.

Die **Thrombose** der Gehirnarterien entsteht sowohl bei Arteriosklerose wie hauptsächlich bei luetischer Erkrankung der Gefäße. Der pathologisch-anatomische Befund ist hier ebenso wie bei der Embolie der einer Encephalomalacie und hat wiederum als Prädilektionsgebiet dasjenige der Art. foss. Sylvii. Für das klinische Bild der Thrombose ist es charakteristisch, daß sowohl die Bewußtseinsstörung wie die Herdsymptome sich allmählich zu entwickeln pflegen.

Für die Differentialdiagnose zwischen Hirnblutung, Embolie und Thrombose sind folgende Gesichtspunkte maßgebend: Für Apoplexie sprechen höheres Alter, Blutdrucksteigerung, schwerer Insult von längerer Dauer, Rötung des Gesichts, Pulsverlangsamung, Klopfen der großen Gefäße sowie sanguinolente Beschaffenheit der Cerebrospinalflüssigkeit bei der Lumbalpunktion<sup>1)</sup>. Für Embolie sprechen jugendliches Alter, weiter das Vorhandensein der oben genannten Ursachen der Embolie, ferner evtl. epileptische Krämpfe sowie der mildere Charakter des Insultes. Ähnliches gilt für die Thrombose, die jedoch gelegentlich auch in der Form des apoplektischen Insultes auftritt. In zahlreichen Fällen läßt sich jedoch nicht mit Sicherheit die Art des anatomischen Prozesses aus dem Krankheitsbilde feststellen. Hier muß man sich mit der Konstatierung des cerebralen Symptomenkomplexes begnügen.

Unter dem Bilde eines apoplektischen Insultes, namentlich leichterer Art, können auch Anfälle von progressiver Paralyse sowie von Epilepsie verlaufen. Diese Möglichkeit ist vor allem dann in Erwägung zu ziehen, wenn schon wiederholt ähnliche Anfälle vorhergegangen sind, ohne dauernde Lähmungen zu

<sup>1)</sup> Unmittelbar nach dem Insult ist es jedoch ratsam, auf eine diagnostische Lumbalpunktion wegen der Gefahr einer plötzlichen Änderung des Hirndruckes und einer dadurch bewirkten neuen Blutung zu verzichten.

hinterlassen bzw. wenn, was für Paralyse besonders charakteristisch ist, die Hemiplegie oder andere Herderscheinungen innerhalb kürzester Zeit, z. B. im Laufe eines Tages wieder vollkommen schwinden. Mitunter kommen auch bei multipler Sklerose apoplektische Insulte vor. Auch die Sinusthrombose, ferner die akute Encephalitis können gelegentlich unter den gleichen akuten Erscheinungen einsetzen. Diffuse Arteriosklerose des Gehirns siehe S. 575.

Das Bild der **cerebralen Hemiplegie** ist nicht sofort nach dem Eintritt der Blutung oder des Gefäßverschlusses vorhanden, sondern entwickelt sich erst nach Abklingen der ersten stürmischen Insulterscheinungen. In der weitaus größten Mehrzahl der Fälle stellt sich eine motorische Hemiplegie der gekreuzten Körperseite ein.

An der Lähmung sind beteiligt der untere Facialis (der obere bleibt infolge seiner bilateralen Rindeninnervation verschont), ferner Hypoglossus, obere und untere Extremität, oft auch die Muskulatur des Rumpfes, speziell der Schulter und des Thorax. Das Gesicht zeigt die für die Facialisparesie charakteristische, früher besprochene Asymmetrie der unteren Gesichtshälfte mit Verstrichensein der Nasolabialfalte und Herabhängen des Mundwinkels. Die Zunge weicht beim Herausstrecken nach der gelähmten Seite ab (infolge Überwiegens des M. genioglossus der gesunden Seite). Der Brustkorb schleppt bei der Atmung auf der Seite der Lähmung nach. Die Lähmung der Extremitäten, die oft anfangs eine vollständige ist, geht in der Regel teilweise zurück (infolge Schwindens der indirekten Herdsymptome), so daß eine unvollständige Halbseitenlähmung oder Hemiparesie resultiert. Mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit pflegen hierbei bestimmte Muskelgruppen in höherem Grade als andere betroffen zu sein, so daß sich in der Regel ein für die cerebrale Hemiplegie sehr charakteristisches Bild entwickelt. Die obere Extremität pflegt in höherem Grade dauernd an der Lähmung beteiligt zu sein als die untere. Die Muskelgruppen am Arm, die dauernd gelähmt bleiben, sind die Auswärtsroller und Extensoren, ferner die Heber des Oberarms, die Öffner der Hand sowie die die Opposition des Daumens bewirkenden Muskeln. Dagegen vermögen die Kranken den Arm einwärts zu rollen und die Hand zu schließen bzw. einen ihnen in die Hand gelegten Gegenstand festzuhalten. An den unteren Extremitäten sind vor allem die Unterschenkelbeuger sowie die Auswärtsroller gelähmt, während insbesondere der Ileopectus und der Quadriceps wieder funktionstüchtig werden. Häufig bilden sich im Laufe der Zeit infolge des Übergewichtes der nichtparetischen Muskeln Contracturen heraus, die im Verein mit der Lähmung dem Hemiplegiker einen charakteristischen Habitus verleihen. Der Oberarm wird adduziert gehalten, der Vorderarm verharrt in Beuge- und Pronations-, die Finger in Beugecontractur, ein Zustand, der indessen bei zweckmäßiger Behandlung bis zu einem gewissen Grade verhindert werden kann. Das Bein wird in der Regel zum Gehen wieder tauglich, wobei es der Kranke infolge der Streckcontractur gewissermaßen wie eine Stelze benutzt. Die Gangart des Hemiplegikers ist typisch und als solche auf den ersten Blick zu erkennen. Das Bein wird mit etwas nach außen und unten gerichteter Fußspitze in einem nach außen gerichteten Bogen vorwärtsbewegt (sog. Circumduktion). Häufig treten während des Gehens

Mitbewegungen im Bereich des gelähmten Armes auf. Bei Sitz des Hirnerdes in der linken Hemisphäre werden öfter die verschiedenen Formen von Aphasie sowie Apraxie (vgl. S. 564 u. 566) beobachtet. In ganz leichten Fällen, wo keine Lähmung zurückbleibt, ist bisweilen als einziges dauerndes Residuum auf der befallenen Seite Steigerung der Sehnenreflexe sowie Fehlen der Bauchdeckenreflexe dieser Seite nachzuweisen.

Von Einzelheiten ist noch zu erwähnen, daß nicht häufig Sensibilitätsstörungen als Hemianästhesie und zwar dann vorhanden sind, wenn der Sitz des Herdes sich in den hintersten Teil der inneren Kapsel erstreckt. Selten kommt es in den gelähmten Muskeln zu motorischen Reizerscheinungen in Form von halbseitiger Athetose oder Chorea. Die Athetose besteht in langsamen bizarren Bewegungen hauptsächlich der Finger und Hände, wobei diese unwillkürlich fortwährend abwechselnd in extreme Streck- und Beugestellung gebracht werden. Die Chorea ist im Gegensatz hierzu durch kurzdauernde unwillkürliche einfachere oder kompliziertere Bewegungen charakterisiert (vgl. S. 599). Blasen- und Mastdarmlähmungen werden bei der cerebralen Hemiplegie vermißt, desgleichen Lähmungen seitens der Kehlkopfmuskeln (infolge ihrer bilateralen Innervation). Die Sehnenreflexe sind im Bereich der gelähmten Extremitäten lebhaft gesteigert. Das Babinskische Zeichen und das sog. Tibialisphänomen, d. h. die bei Flexion des Beins in Knie und Hüfte erfolgende Dorsalflexion des Fußes mit Hebung des inneren Fußrandes sind in der Regel positiv. Stärkere Muskelatrophien mit Entartungsreaktion fehlen stets, da die Verbindung der gelähmten Muskeln mit ihrem trophischen Zentrum im Rückenmark nicht aufgehoben ist. Höchstens entwickelt sich im Laufe der Zeit eine gewisse Volumenabnahme der Muskeln infolge von Inaktivitätsatrophie. Sehr oft stellt sich im Laufe der Zeit eine Beeinträchtigung der geistigen Fähigkeiten ein, die sich in Abnahme der Intelligenz, seelischer Stumpfheit, Gedächtnisschwäche, Stimmungsanomalien, Neigung zum Weinen usw. äußert. Häufig beobachtet man vasomotorische Störungen an den gelähmten Gliedern; insbesondere sind die Hände und Füße oft auffallend kühl und cyanotisch.

Eine besondere Form der Hemiplegie ist die **Hemiplegia alternans**. Hier besteht Arm- und Beinlähmung auf der einen, Hirnnervenlähmung auf der anderen Seite. Sie beruht auf Blutung bzw. Gefäßverschluß (oder Tumoren) in dem Pedunculus oder in der Brücke. Bei der pedunkulären Hemiplegie ist auf der Seite des Herdes der N. oculomotorius gelähmt, auf der kontralateralen Seite Facialis und Extremitäten, da die zu beiden letzteren gehörenden Bahnen sich erst weiter unten kreuzen. Bei der pontinen Hemiplegie besteht gleichseitige Facialis-(Abducens- oder Trigemimus-)Lähmung, dagegen Extremitätenlähmung auf der anderen Seite.

Im allgemeinen gilt als Regel, daß diejenigen Ausfallserscheinungen, die sich nicht innerhalb der ersten  $\frac{3}{4}$  Jahre zurückbilden, stationär bleiben. Der Zustand kann sich dann in dieser definitiven Form jahrelang unverändert halten, ohne daß das Leben durch die Hemiplegie als solche (genügende Pflege vorausgesetzt) gefährdet ist. Die Prognose quoad vitam und bezüglich der etwaigen Wiederholung des Insultes hängt im wesentlichen von dem weiteren Verlauf des Grundleidens (Schrumpfnieren, Arteriosklerose, Lues) ab.

**Therapie:** Die Behandlung des Insultes beschränkt sich auf ruhige Lagerung des Kranken mit erhöhtem Oberkörper. Kontrolle der Harnblase wegen der häufig vorhandenen Harnverhaltung (Katheterismus). Bei echauffiertem Aussehen des Patienten ist ein ausgiebiger Aderlaß von 300–500 ccm am Platz, namentlich in den Fällen mit Blutdrucksteigerung. Regelung der Darmentleerung durch Einläufe, Ricinusöl usw. Der Wert der Applikation einer Eisblase auf den Kopf, die vielfach üblich ist, wird verschieden beurteilt. Vorsichtiges auf die Seite Lagern

für kurze Zeit mehrmals täglich zur Verhütung von hypostatischen Pneumonien; Bronchitiskessel, Prießnitzsche Brustwickel. Sorgfältige Hautpflege zum Vermeiden von Decubitus, Luftring, Wasserkissen usw. (vgl. S. 541). Nach Abklingen der Insulterscheinungen besteht die Therapie im wesentlichen in einer Schonungsbehandlung unter Fernhaltung jeglicher körperlichen und psychischen Überanstrengung und gleichzeitiger Behandlung einer etwaigen Arteriosklerose, Lues, Nierenerkrankung usw. Prophylaxe der Contracturen durch systematisch durchgeführte passive Bewegungen, Elektrotherapie und Massagebehandlung der gelähmten Gebiete. Zweckmäßig ist oft eine Badekur in entsprechenden Badeorten wie Oeynhausen, Wiesbaden, Teplitz u. a. unter ärztlicher Kontrolle. Die Kost soll frei von Gewürzstoffen und salzarm sein, am besten in Form der lactovegetabilischen Diät. Selbst nach weitestgehender Restitution ist den Kranken für die Zukunft größte Schonung sowie Maßhalten auf allen Gebieten anzuraten. Zu vermeiden sind vor allem körperliche Anstrengungen, seelische Aufregungen, alle Exzesse in baccho et venere sowie in Tabak, ferner starker Kaffee; sorgfältige Regelung der Darmtätigkeit; heiße Bäder sind zu meiden.

### Die diffuse Arteriosklerose des Gehirns.

Die diffuse Arteriosklerose der Gehirngefäße verursacht häufig ein ziemlich charakteristisches chronisches Krankheitsbild, das im Gegensatz zu den massiven Herderscheinungen der Hirnblutung bzw. der Encephalomalacie weniger markante Symptome zeigt, die trotzdem in ihrer Gesamtheit in der Regel einen sicheren Schluß auf die Natur des Leidens ermöglichen.

Sieht man von den Fällen ab, bei denen sich das Krankheitsbild aus wiederholten aufeinanderfolgenden Apoplexien zusammensetzt, so handelt es sich einmal um intermittierende Störungen in Form von vorübergehenden leichten halbseitigen Lähmungen ohne Bewußtseinsverlust oder mit nur ganz kurzdauernder Bewußtlosigkeit, wie sie mitunter im Greisenalter beobachtet werden. Die Lähmungen gehen in der Regel weder mit Aphasie noch mit Hemianopsie einher und hinterlassen keine Contracturen; auch wird oft Facialislähmung vermißt. Nach Zurückgehen der Lähmung bleibt häufig eine eigentümliche für das Leiden charakteristische Gangstörung zurück, bei der der Patient mit leicht vornübergebeugtem Rumpf und etwas flektierten Knien nur mühsam mit schlurfenden kurzen Schritten die Beine vorwärts zu bewegen vermag, ohne daß diese eine eigentliche Lähmung zeigen. Anatomisch findet man in derartigen Fällen oft multiple kleine bis erbsengroße Erweichungsherde, sog. Lacunen. Ferner kann auch die S. 562 beschriebene Pseudobulbärparalyse als Folge der diffusen cerebralen Arteriosklerose auftreten. Weitere Symptome, die sich häufig einstellen, sind Störungen des Schlafes sowie eine fortschreitende Abnahme der geistigen Fähigkeiten. Die Schlaflosigkeit, über die die Kranken oft klagen, besteht hauptsächlich in erschwertem Einschlafen sowie verfrühtem Erwachen. Ein Teil der Kranken hat die Neigung, tagsüber öfters einzuschlafen.

Die psychische Alteration, die in ihrer vollentwickelten Form als arteriosklerotische Dementia bezeichnet wird, kennzeichnet sich in der Hauptsache durch Abnahme der geistigen Konzentrationsfähigkeit, durch Gedächtnisschwäche, Interesselosigkeit sowie krankhafte Erregbarkeit. Andere Symptome der cerebralen Arteriosklerose sind Schwindelanfälle sowie heftige Kopfschmerzen bzw. Klagen über Eingenommensein des Kopfes. In leichteren Fällen und namentlich bei jüngeren Individuen wird das Leiden, solange es nur mit wenig charakteristischen Symptomen einhergeht, oft fälschlich als einfache Neurasthenie aufgefaßt (sog. arteriosklerotische Pseudoneurasthenie). Der gleichzeitige Nachweis der arteriosklerotischen Erkrankung anderer Organe sowie ein genaueres Studium der Krankheitserscheinungen klären in der Regel die Sachlage. Endlich beruht die erst in späterem Alter auftretende sog. Spät epilepsie zum Teil auf Arteriosklerose.

Die Therapie deckt sich mit der S. 183 angegebenen allgemeinen Behandlung der Arteriosklerose.

### Gehirnabsceß (eitrige Encephalitis).

Umschriebene Eiterherde können sich im Gehirn sowohl durch Fortleitung aus der Nachbarschaft wie auf metastatischem Wege entwickeln.

Die erstere Entstehungsart kommt einmal nach Schädeltraumen vor. Die traumatischen Hirnabscesse entwickeln sich entweder als sog. Frühabscesse im unmittelbaren Anschluß an eine Verletzung des Schädels, z. B. nach infizierten Wunden der Weichteile des Schädels, nach komplizierten Frakturen sowie nach Schußverletzungen. Eine andere Form des traumatischen Hirnabscesses ist der sog. Spätabsceß, der sich erst geraume Zeit nach dem Trauma nach Ablauf von Wochen oder Monaten, ja sogar bisweilen erst nach Jahresfrist klinisch bemerkbar macht. Hier kann die Spur des Traumas bereits wieder vollkommen verschwunden sein, so daß oft nur eine sorgfältig erhobene Anamnese die Ursache des Leidens zu eruieren vermag. Übrigens braucht bei derartigen Fällen keineswegs stets eine Verletzung des knöchernen Schädels vorausgegangen zu sein, sondern die Gehirnerkrankung kann sich auch an eine bloße Weichteilverletzung anschließen. Ein Teil der Spätabscesse tritt nach Schädelanschüssen auf.

Ein weiterer sehr häufiger Ausgangspunkt des Hirnabscesses sind eitrig-ohrerkrankungen, namentlich die chronische Otitis media, gelegentlich auch ihre akute Form. Verhinderung des Sekretabflusses führt hier zu Usurierung der knöchernen Wand des Felsenbeins und zum Übergreifen der Eiterung auf das Gehirn. Viel seltener sind die von der Nase bzw. ihren Nebenhöhlen ausgehenden sog. rhinogenen Abscesse.

Die metastatischen Hirnabscesse entwickeln sich speziell nach endothorakalen Eiterungen, insbesondere nach Empyem, Bronchiektasen, putrider Bronchitis, Lungengangrän; sie werden ferner gelegentlich bei Endocarditis, Appendicitis, Erysipel, Typhus und anderen akuten Infektionskrankheiten beobachtet. Im Gegensatz zu den aus der Nachbar-

schaft übergreifenden Formen tritt der metastatische Hirnabsceß oft multipel auf.

Bezüglich der Lokalisation ist hervorzuheben, daß die traumatischen Abscesse sich immer in der dem Ort des Traumas benachbarten Hirnregion entwickeln. Auch die otitischen Abscesse entstehen stets auf der gleichen Seite wie die Ohrerkrankung und zwar fast ausnahmslos entweder im Temporallappen oder im Kleinhirn, während die seltenen rhinogenen Abscesse das Stirnhirn befallen. Die metastatischen Abscesse zeigen eine Vorliebe für die linke Gehirnhälfte und zwar speziell für das Gebiet der Art. fossae Sylvii.

**Krankheitsbild:** Die verschieden lange Latenzzeit zwischen der primären Erkrankung und der klinischen Manifestation des Hirnabscesses wurde bereits erwähnt. Die Abscesse nach akuter Otitis treten stets erst etwa vom Anfang der vierten Woche nach Beginn der Otitis auf.

Die Symptome des Hirnabscesses zerfallen in Allgemeinerscheinungen und in Lokalsymptome. Zu den ersteren gehören Kopfschmerz, Benommenheit, Erbrechen. In einzelnen Fällen wird das Beklopfen des Schädels schmerzhaft empfunden. Die Patienten zeigen ein zunehmend verfallenes Aussehen und fahle Gesichtsfarbe. Fieber gehört keineswegs zur Regel. Es gibt vielmehr zahlreiche Fälle, die dauernd vollkommen oder fast fieberlos verlaufen und bei denen das Auftreten von Temperatursteigerungen die letzte Phase der Krankheit und den Durchbruch des Abscesses mit Meningitis anzeigt.

Die Lokalsymptome hängen von dem Sitz des Abscesses ab; insbesondere richten sie sich danach, ob die Erkrankung einen stummen Hirnteil oder einen solchen mit charakteristischen Herdsymptomen betrifft. Relativ häufig treten als Symptome der Rindenreizung Jacksonsche epileptische Anfälle auf. Sehr charakteristische Symptome beobachtet man bei den otitischen Abscessen im linken Schläfenlappen in Form von sensorischer Aphasie, Paraphasie und amnestischer Aphasie, wogegen bei Lokalisation im rechten Schläfenlappen spezielle Herdsymptome fehlen. Kleinhirnabscesse verraten sich mitunter durch cerebellare Ataxie, während sie in anderen Fällen, namentlich bei Lokalisation in den seitlichen Markteilen völlig symptomtenlos bleiben können. Das letztere gilt gleichfalls von den rhinogenen Stirnhirnabscessen. Bemerkenswert ist ferner, daß im Gegensatz zum Hirntumor der Gehirnabsceß nur selten mit Stauungspapille einhergeht, ebenso wie die Lumbalpunktion keineswegs immer Druckerhöhung ergibt. Die Cerebrospinalflüssigkeit ist klar und zellfrei oder enthält nur ganz vereinzelte Lymphocyten. Im Blut kann Leukocytose bestehen, in manchen Fällen wird sie jedoch vermißt. Das Krankheitsbild zeigt nicht selten schubweisen Verlauf.

Der Ausgang des Leidens ist, wenn nicht rechtzeitige Hilfe erfolgt, stets ungünstig. Kommt es zu weiterer Ausdehnung des Abscesses, so kann plötzlich der Exitus eintreten oder es kommt schließlich zu Durchbruch des Eiters in die Meningen oder in die Ventrikel.

Die Diagnose des Hirnabscesses hat eine außerordentlich große praktische Bedeutung, da bei frühzeitiger Erkennung des Leidens eine Heilung möglich ist.

Bei Vorhandensein allgemeiner cerebraler Beschwerden ist hier die Erhebung einer sehr genauen Anamnese besonders wichtig, namentlich bezüglich vorausgegangener Traumen resp. hinsichtlich des Bestehens eines für Metastasen in Frage kommenden primären Eiterherdes. Stets sind sorgfältig die Ohren sowie die Nebenhöhlen zu untersuchen. Vorhandensein der beschriebenen Herdsymptome, soweit es sich um charakteristische Reiz- oder Ausfallserscheinungen handelt, erleichtert die Diagnose wesentlich. Man beachte, daß die sensorisch-aphasischen Störungen evtl. nur angedeutet sind und bisweilen lediglich als leichte Paraphasien auftreten; man prüfe auch das Lesen und Schreiben. Fehlen Herderscheinungen, so suche man bei Verdacht auf Absceß nach sonstigen Symptomen einer organischen Gehirnerkrankung wie Hirnnervenlähmungen, Pupillenanomalien, das Babinskische Zeichen usw. Dabei ist jedoch zu beachten, daß Facialis- und Abducenslähmung sowie Gehörsstörungen bei otitischen Prozessen sich evtl. auch schon aus der eitrigen Erkrankung im Felsenbein ohne Vorhandensein eines Hirnabscesses erklären. Bei Hirntumor ist die Stauungspapille die Regel, bei Hirnabsceß die Ausnahme; Erhöhung des Lumbaldrucks wird häufiger bei Tumor beobachtet. Die Unterscheidung von Meningitis ermöglicht die Lumbalpunktion, die bei eitriger Meningitis stets trüben Liquor ergibt. Wesentlich schwieriger ist die Unterscheidung von seröser Meningitis mit erhöhtem Druck, klarem Liquor und evtl. vorhandener Lymphocytose. Weiter kommt die Encephalitis im Verlauf akuter Infektionskrankheiten, ferner die Pachymeningitis haemorrhagica interna bei Alkoholikern bzw. bei Lues differentialdiagnostisch in Frage (hier ist der Liquor hämorrhagisch), ferner speziell bei Otitiden die Sinusthrombose, die indessen mit septischem Fieber und Schüttelfrösten einhergeht. Endlich ist evtl. an traumatische Meningealblutung zu denken. Die Diagnose Hirnabsceß kann durch die Neißersche Hirnpunktion eine Bestätigung erfahren. Doch soll dieser Eingriff nur bei der Möglichkeit sofort daran anschließender Operation ausgeführt werden.

Die Therapie besteht in der möglichst frühzeitig vorgenommenen operativen Eröffnung des Abscesses. Auch metastatische Abscesse sollen operiert werden, falls nicht die Symptome für deren multiples Vorhandensein sprechen. Schwerer Allgemeinzustand bildet keine Kontraindikation gegen die Operation.

### Die nichteitrigte Encephalitis.

Die herdförmige, nichteitrigte Encephalitis ist eine relativ seltene Gehirnerkrankung. Ihre infektiöse Ätiologie steht außer Zweifel, zumal sie sich in der Regel an die verschiedensten akuten Infektionskrankheiten, vor allem an Influenza, ferner an Typhus, Scharlach, Pocken, Pneumonie, Keuchhusten, Masern usw. anschließt. Auch nach eitrigem Otitis sowie nach Traumen beobachtet man sie gelegentlich, desgleichen in einzelnen Fällen als Folge des Hitzschlages. Endlich vermögen auch einzelne Gifte wie Kohlenoxyd sowie das Botulismusgift Encephalitis zu erzeugen. Besondere Formen der Encephalitis sind die S. 82 beschriebene Encephalitis lethargica, ferner die cerebrale Kinderlähmung (s. unten) sowie die im Bereich des Hirnstammes sich abspielende Polioencephalitis (s. unten).

Der pathologisch-anatomische Befund, der im allgemeinen mit demjenigen bei der akuten Myelitis übereinstimmt (vgl. S. 540), zeichnet sich häufig durch den hämorrhagischen Charakter der Entzündung aus. Im übrigen finden sich die gleichen früher beschriebenen Zerfallserscheinungen am Nervengewebe. Nach Resorption des entzündlichen Herdes entstehen teils Cysten, teils eine narbige

Atrophie, die bei Lokalisation in der Hirnrinde infolge der Narbenschumpfung zu Substanzdefekten in der Rinde führt, die man als Porencephalie bezeichnet. Häufig ist der Prozeß, speziell bei der cerebralen Kinderlähmung im Gebiete der motorischen Hirnrinde lokalisiert. Es stellt sich dann eine absteigende sekundäre Degeneration der motorischen Bahnen und zwar des von den Ganglienzellen der Rinde bis zu den Vorderhörnern des Rückenmarks reichenden primären Neurons ein.

**Krankheitsbild:** In der Mehrzahl der Fälle verläuft die nichteitrigre Encephalitis als akute fieberhafte Erkrankung. Zunächst stellen sich häufig schwere cerebrale Allgemeinsymptome wie Kopfschmerz, Erbrechen, Bewußtseinsstörungen und Somnolenz, bei Kindern häufig auch allgemeine Krämpfe ein. Auch beobachtet man in manchen Fällen Nackensteifigkeit. Herdsymptome treten entweder gleichzeitig oder oft erst nach einigen Tagen auf. Je nach dem Sitz des Entzündungsherdes bestehen sie teils in motorischen Lähmungen nach Art der Hemiplegie, Aphasie usw., teils sind Hirnnervenlähmungen vorhanden. Auch Neuritis optica kann sich einstellen. Die Lumbalpunktion ergibt in der Regel erhöhten Druck, mitunter Spuren von Eiweiß sowie leichte Lymphocytose. Mit Ausnahme der Encephalitis der Kinder und der Encephalitis lethargica verlaufen die übrigen Fälle häufig innerhalb weniger Tage oder Wochen tödlich.

Unter den besonderen Formen der Encephalitis seien hier folgende erwähnt:

Die **cerebrale Kinderlähmung**, die mit der Heine-Medinschen Krankheit (vgl. S. 78) epidemiologisch (möglicherweise auch ätiologisch) weitgehende Übereinstimmung zeigt, befällt vor allem das 1.—4. Lebensjahr und beginnt oft mit den gleichen Allgemeinerscheinungen wie die Poliomyelitis. Sitz der Erkrankung ist in der Hauptsache die graue Substanz der motorischen Hirnrinde (Polioencephalitis acuta). Nach Abklingen der akuten Erscheinungen im Laufe von Tagen oder Wochen stellt sich als dauerndes Residuum der Krankheit eine Hemiplegie ein, die im Gegensatz zu der schlaffen Lähmung bei Poliomyelitis einen spastischen Charakter trägt (Hemiplegia spastica infantilis). Die Halbseitenlähmung, die stets sowohl die obere wie die untere Extremität, letztere allerdings in geringerem Grade befällt, verschont bezeichnenderweise den Facialis und die übrigen Hirnnerven im Gegensatz zur Hemiplegie der Erwachsenen.

In seiner definitiven Form ist das Bild der cerebralen Kinderlähmung so charakteristisch, daß man das Leiden schon aus dem bloßen Aspekt der Kranken sofort feststellen kann. Besondere Kennzeichen sind das im Laufe der Zeit sich geltend machende Zurückbleiben des Wachstums sowie die Entwicklung von Contracturen auf der kranken Seite, die eine charakteristische Haltung der gelähmten Extremitäten bewirken. Der Arm befindet sich in Adductions-, Ellbogen- und Handgelenk in Flexionsstellung; es besteht Verkürzung der Achillessehne mit Equinovarusstellung des Fußes sowie Adductorencontractur des Oberschenkels. Im Gegensatz zur Hemiplegie des Erwachsenen beruhen hier die Muskelverkürzungen nicht nur auf Contracturen, sondern es kommt zu bindegewebiger Verödung und Fixation der Muskulatur. Es besteht Steigerung der Sehnenreflexe auf der Seite der Lähmung (im Gegensatz zur Polio-



myelitis), oft auch das Babinskische Symptom. Ferner kommt öfter an den gelähmten Extremitäten, namentlich an der Hand Athetose vor, die bei der Hemiplegie der Erwachsenen eine Rarität bildet. Die Intelligenz der Kinder zeigt in manchen Fällen Defekte, in anderen Fällen verhält sie sich normal.

Die Therapie der spastischen Kinderlähmung ist im akuten Stadium die gleiche rein symptomatische wie bei Poliomyelitis. Später im Stadium der Lähmung kommen ebenso wie bei dieser orthopädische Maßnahmen bzw. operative Eingriffe (Tenotomie, Sehnenüberpflanzungen usw.) in Betracht.

Ähnliche Bilder von Hemiplegia infantilis spastica kommen auch auf dem Boden kongenitaler Defekte sowie im Anschluß an intra partum erlittene Traumen (Meningealblutungen) vor.

Letztere werden auch als Ursache der sog. Diplegia cerebralis spastica infantilis oder **Littleschen Krankheit** angesehen. Diese besteht in einer spastischen Starre sämtlicher oder beider unteren Extremitäten; sie ist von Geburt an vorhanden und pflegt später vor allem in beiden Beinen hochgradig ausgeprägt zu sein. Diese zeigen Adductorencontractur und Innenrotation der Oberschenkel, mäßige Flexion der Knie sowie Equinus- bzw. Equinovarusstellung der Füße. Es besteht starke Rigidität der Muskeln sowie Steigerung der Sehnenreflexe, wogegen Sensibilität und Blasenfunktion normal sind. In den schweren Fällen bleiben die Kranken bettlägerig; in den leichteren können sie sich mit Mühe an Stöcken vorwärts bewegen, wobei der Gang auf den Fußspitzen charakteristisch ist. Nicht selten finden sich Intelligenzdefekte, in manchen Fällen ausgesprochene Idiotie.

Die **Polioencephalitis acuta haemorrhagica superior** ist eine hauptsächlich bei Schnapstrinkern auftretende hämorrhagische Encephalitis in der Nachbarschaft des Aquaeductus Sylvii, und zwar in der Gegend der Augennuskelkerne (Vierhügelgegend). Unter Kopfschmerz, Somnolenz sowie häufig unter Erscheinungen des Delirium tremens entwickeln sich Augenmuskellähmungen, wobei aber stets die Pupille sowie häufig der Levator palpebrae verschont bleiben. Oft bestehen daneben Erscheinungen einer alkoholischen Polyneuritis, Ataxie usw. Schwere Fälle nehmen häufig einen letalen Ausgang.

### Hirntumor (Tumor cerebri).

Unter der Bezeichnung Hirntumor faßt man sämtliche intrakraniellen Geschwulstbildungen zusammen, die eine schädigende, insbesondere raumbengende Wirkung auf das Gehirn ausüben. Es gehören hierher demnach nicht nur die im streng pathologisch-anatomischen Sinne als Neoplasmen der Gehirns substanz geltenden Neubildungen, sondern auch Solitärtuberkel, Echinococcen, Cysticerken, Aneurysmen der Hirnarterien usw. Die häufigste Art der Hirntumoren sind die Gliome bzw. Gliosarkome, die von der Glia der Gehirns substanz ausgehen und sich oft durch erheblichen Gefäßreichtum auszeichnen, ferner die Sarkome, deren Ausgangspunkt meist die Meningen bzw. das Bindegewebe der Hirnnerven sind und die eine Vorliebe für den Sitz an der Hirnbasis zeigen. Die Gehirntuberkel, die oft in der Form von Solitärtuberkeln bis zu Kirschgröße zeigen, lokalisieren sich hauptsächlich in der Gehirnrinde, im Kleinhirn und im Pons. Bezüglich der gummösen Hirnlues, die bis-

weilen ebenfalls das Bild des Hirntumors hervorruft, sei auf S. 587 verwiesen. Seltener Tumoren sind Psammome, d. h. kleine meist von den Hirnhäuten ausgehende Geschwülste mit Einlagerung von Kalkkonkrementen, ferner Fibrome, Dermoideysten, Osteome usw. Metastatisch entstehende Hirntumoren sind in der Regel Carcinome. Im allgemeinen erkranken Männer häufiger an Hirntumor als Frauen. Unter den ätiologischen Momenten des Gehirntumors spielt in einer nicht ganz kleinen Anzahl von Fällen das Trauma eine Rolle. Die Mehrzahl der Kranken befindet sich in mittlerem Alter; doch befallen gewisse Arten von Hirntumor wie die Hirntuberkel, gelegentlich auch die Gliome relativ häufig das Kindesalter.

**Krankheitsbild:** In der Symptomatologie des Hirntumors sind stets zwei große Gruppen von Erscheinungen zu unterscheiden, die Herdsymptome, die von der Lokalisation des Tumors im einzelnen abhängen und die Allgemeinsymptome, die im wesentlichen die Folge der durch die Raumbegung in der Schädelhöhle zustandekommenden Steigerung des Hirndrucks sind. Dazu kommen noch die sog. Nachbarschaftssymptome, d. h. Störungen, die sich aus der Einwirkung der langsam wachsenden Geschwulst auf ihre nächste Umgebung ergeben.

In vielen Fällen wird das Krankheitsbild zunächst durch Allgemeinsymptome eingeleitet, während Lokalsymptome sich erst später geltend machen. Am häufigsten bestehen die ersten Beschwerden in Kopfschmerzen. Diese sind entweder kontinuierlich oder von schwankender Intensität mit heftigen Exacerbationen. Sie können einen sehr hohen Grad erreichen. Während der Schmerz häufig den ganzen Kopf gleichmäßig einnimmt, besteht in manchen Fällen dem Sitz der Geschwulst entsprechend ein gewisser Zusammenhang mit diesem; das gilt namentlich für den Nackenkopfschmerz bei Tumoren in der hinteren Schädelgrube. Doch ist der Kopfschmerz allgemein ein zu vieldeutiges Symptom, um für sich allein weitergehende Schlüsse zu erlauben. Ein frühzeitiges Symptom ist ferner häufig das sog. cerebrale Erbrechen als Hirndrucksymptom, d. h. ein von der Nahrungsaufnahme unabhängiges, ohne Vorboten einsetzendes, oft explosionsartiges Erbrechen. Auch Pulsverlangsamung als Folge der intrakraniellen Drucksteigerung wird bei Hirntumor beobachtet (Vagusreizung). Das gleiche gilt von den gelegentlich als Allgemeinsymptom auftretenden Schwindelanfällen, die indessen häufiger als Herdsymptom aufzufassen sind.

Einen unverhältnismäßig größeren diagnostischen Wert hat die ebenfalls auf Steigerung des Hirndrucks beruhende Augenhintergrundsveränderung, die sog. Stauungspapille, die ophthalmoskopisch ein sehr charakteristisches Bild darbietet.

Die Papille ist verbreitert und vor allem unscharf begrenzt; auch springt sie etwas in das Augeninnere vor; die Venen sind erweitert und stärker geschlängelt. Die Stauungspapille kommt, wie man annimmt, dadurch zustande, daß der in der Scheide des N. opticus befindliche Hohlraum mit dem Cavum subarachnoideale des Schädels kommuniziert, so daß bei wachsendem Druck die Cerebrospinalflüssigkeit den Nerv und seine Blutgefäße komprimiert und den Sehnervenkopf

nach vorn treibt. Die in mehr als  $\frac{3}{4}$  aller Fälle von Hirntumor nachweisbare Stauungspapille braucht zunächst nicht mit Sehstörung einherzugehen, während bei längerem Bestehen Gesichtsfelddefekte, schließlich sogar Erblindung infolge von Atrophie des Sehnerven eintreten. Entlastung des Hirndrucks, z. B. durch eine Trepanation bringt die Stauungspapille prompt zum Schwinden (dagegen nicht mehr die bereits eingetretene Atrophie).

Bei längerem Bestehen des Leidens pflegt das psychische Verhalten der Kranken in der Regel eine gewisse Alteration zu zeigen. Geistige Abstumpfung, Apathie und Somnolenz, ferner bisweilen Gedächtnisschwäche sowie Unbesinnlichkeit werden oft beobachtet. Manche Kranke verfallen in späteren Stadien in einen Zustand von Schlafsucht.

Schließlich können als Allgemeinsymptome epileptische Krämpfe als Folge der Reizung der Hirnrinde auftreten und gelegentlich den übrigen Symptomen lange Zeit vorausgehen; doch sind sie häufiger als Herdsymptom aufzufassen.

Die Feststellung von Herdsymptomen hat deshalb besonders großen diagnostischen Wert, da sich auf ihnen die genauere Lokalisation des Tumors aufbaut und sie dadurch evtl. die operative Inangriffnahme des Leidens ermöglichen. Die Art der Herdsymptome kann sich sehr verschieden gestalten. Charakteristisch sind dieselben nur, wenn der Prozeß an der Hirnkonvexität sich nicht im Bereich stummer Territorien abspielt bzw. wenn der Sitz des Tumors die Hirnbasis, der Hirnstamm oder das Kleinhirn ist.

Die bei Lokalisation in der Hirnrinde auftretenden Ausfallserscheinungen wie motorische Lähmungen, die verschiedenen Arten von Aphasie, Hemianopsie usw. wurden schon S. 563 besprochen. Eine hervorragende diagnostische Bedeutung für Geschwülste im Bereich der motorischen Hirnrinde haben die S. 567 beschriebenen Anfälle von Jacksonscher Epilepsie, d. h. tonisch-klonische Krämpfe eines bestimmten Muskelgebietes, die sich bisweilen schließlich auf die gesamte kontralaterale Körperhälfte ausdehnen. In schweren Fällen kann es schließlich zu allgemeinen epileptischen Krämpfen kommen. Häufig entwickeln sich auch Lähmungen in Form von Monoplegien, die meist als spastische Paresen beginnen und je nach Beteiligung der verschiedenen Gebiete als Monoplegia brachialis resp. faciobrachialis, cruralis usw. auftreten.

Die Tumoren der Hirnbasis sind häufig. Sie zeigen charakteristische Symptome, die vor allem auf der Beteiligung der Hirnnerven beruhen, welche infolge ihrer Lage oft schon frühzeitig durch die Neubildung in Mitleidenschaft gezogen werden. Namentlich sind es der Oculomotorius, Abducens sowie Facialis, die zunächst eine einseitige, später evtl. beiderseitige Parese erkennen lassen. Ferner kommen Hyperästhesien sowie Neuralgien im Gebiet des Trigeminus, weiter Trismus als Reizerscheinung des motorischen Trigeminusastes, endlich Zuckungen im Facialisgebiet vor. Auch einseitige oder doppelseitige Stauungspapille, Gesichtsfeldengung und evtl. Hemianopsie werden beobachtet. Bei Tumoren der Brücke fehlen übrigens öfter Hirndrucksymptome. Bei Lokalisation des Tumors in der Nachbarschaft der Pedunculi können auch Extremitätenlähmungen, ferner das Babinskische Zeichen

usw. vorhanden sein. Tumoren in der Vierhügelgegend rufen, abgesehen von Störungen seitens der Glandula pinealis (vgl. S. 451) Pupillenstarre, Augenmuskellähmung, Nystagmus sowie Schwerhörigkeit hervor, während die von der Hypophyse ausgehenden Geschwülste neben den Symptomen des Hirntumors das Bild der Akromegalie oder der Dystrophia adiposogenitalis zeigen können (vgl. S. 447 u. 448).

Kleinhirntumoren sind oft durch besonders heftige Kopfschmerzen ausgezeichnet, die häufig ihre größte Intensität in der Occipital- und Nackengegend zeigen. Ein sehr wichtiges Lokalsymptom ist die früher beschriebene cerebellare Ataxie. Besonders frühzeitig und regelmäßig tritt hier Stauungspapille ein. Gelegentlich beobachtet man Nackenstarre, ferner die oben als Asynergie erwähnte Koordinationsstörung einschließlich der Adiadochokinesis. Häufig besteht hartnäckiger Schwindel, namentlich in der Form des sog. Drehschwindels, d. h. der Kranke hat das Gefühl, als wenn sich sein Körper bzw. die Umgebung in einer bestimmten Richtung dreht. Mitunter beobachtet man halbseitige Hypotonie der Muskulatur sowie Hemiparese auf der Seite des Tumors, ferner die früher erwähnte Neigung zum Fallen nach der Seite der Erkrankung. Diese Symptome gestatten mitunter die genauere Lokalisation des Tumors. Kleinhirnsymptome werden meist auch beim Cysticercus des vierten Ventrikels beobachtet, wobei gleichzeitig oft Hirnnervensymptome vorhanden sind.

Die Tumoren im sog. Kleinhirnbrückenwinkel, in der Regel Fibrome bzw. Fibrosarkome, die von der bindegewebigen Scheide des Acusticus und Facialis ihren Ausgang nehmen, machen ein charakteristisches Bild, das deshalb praktisch wichtig ist, weil wiederholt eine operative Heilung gelang. Die Hauptsymptome sind nervöse Schwerhörigkeit bzw. Taubheit, einseitige Trigeminalneuralgie und -anästhesie, Fehlen des Cornealreflexes, Blicklähmung, Nystagmus, Abducensparese (sämtlich einseitig auf der Seite des Tumors) sowie evtl. kontralaterale Pyramidenzeichen, ferner Stauungspapille.

Der Verlauf der Hirntumoren ist im allgemeinen der eines langsam fortschreitenden Leidens, wobei man nicht selten Exacerbationen namentlich der Allgemeinsymptome beobachtet, deren Intensität nach einiger Zeit wieder zurückgehen kann. Zum Teil beruhen die plötzlich eintretenden Verschlimmerungen auf Blutungen im Tumor, die speziell bei den Gliomen öfter vorkommen. Die Ausfallserscheinungen, insbesondere die Lähmungen pflegen einen stetig progredienten Charakter zu zeigen, während die lokalen Reizerscheinungen, namentlich die Rindenepilepsie, meist nur anfallsweise auftreten.

Entscheidend für das Tempo des Verlaufs ist abgesehen von der Größe und der Lokalisation des Tumors, sein pathologisch-anatomischer Charakter. Bei den häufigsten Formen des Hirntumors, den Gliomen, Sarkomen und Endotheliomen schwankt die Krankheitsdauer etwa zwischen  $\frac{1}{2}$  und 2 Jahren. Manche Tumoren wachsen außerordentlich langsam (z. B. Fibrome); bei einzelnen Formen, z. B. den Cysten, kann es zum Stillstand der Symptome kommen, und bei den Hirntuberkeln wurde sogar Heilung durch Verkalkung der Geschwulst beobachtet.

Manche Tumoren verursachen dauernd nur wenig ausgeprägte Allgemeinerscheinungen, z. B. Kopfschmerzen, bis plötzlich völlig unerwartet

der Exitus eintritt. Hier findet man dann bisweilen bei der Sektion z. B. ein erbsengroßes Gliom im Bereich des vierten Ventrikels. In anderen Fällen verfallen oft die Patienten allmählich in einen Zustand starker geistiger Abstumpfung verbunden mit Somnolenz, die schließlich in einen komatösen Zustand übergeht, in welchem der Tod erfolgt. In einzelnen Fällen, namentlich bei den Tumoren der hinteren Schädelgrube tritt unter Umständen der Tod ohne Vorboten, wahrscheinlich infolge plötzlicher Steigerung des Hirndrucks und dadurch bedingter Lähmung des Atemzentrums ein. Manche Kranke erliegen einer intermittierenden Erkrankung, z. B. einer hypostatischen Pneumonie.

Für die **Diagnose** des Hirntumors kommt unter den genannten Allgemeinsymptomen an erster Stelle dem Nachweis der Stauungspapille eine besondere Bedeutung als Symptom gesteigerten Hirndrucks zu. In manchen Fällen ist dieses längere Zeit der einzige objektive Hinweis auf das Bestehen einer Hirngeschwulst. Charakteristisch ist ferner die langsam fortschreitende Steigerung der verschiedenen Symptome. Eine genauere Lokalisation ist nur bei Vorhandensein eindeutiger Herdsymptome möglich.

Die Lumbalpunktion findet bei dem Hirntumor nur eine beschränkte Anwendung, da sie infolge der dabei auftretenden Druckschwankung keineswegs ungefährlich ist und wiederholt den Eintritt des Todes unmittelbar hinterher zur Folge hatte. Aus diesem Grunde ist auf die Punktion insbesondere bei Verdacht auf Tumor der hinteren Schädelgrube prinzipiell zu verzichten. Der Lumbaldruck ist stets erhöht; dagegen besteht im Gegensatz zu meningitischen undluetischen Prozessen keine Zellvermehrung. Ein anderes nicht völlig ungefährliches diagnostisches Hilfsmittel, das in manchen Fällen herangezogen wird, ist die sog. Hirnpunktion (d. h. die Punktion des Schädels mittels kleinen Drillbohrers in Lokalanästhesie und histologische Untersuchung des durch Punktion gewonnenen Gehirnmaterials).

Die differentialdiagnostisch in Frage kommenden Krankheitsprozesse sind vor allem die Hirnlues (s. diese), ferner der Gehirnabsceß, der in der Regel weniger Hirndrucksymptome und oft keine Stauungspapille bewirkt, weiter die circumscriphte Meningitis serosa, die das Bild des sog. Pseudotumor cerebri hervorzurufen vermag, endlich der chronische Hydrocephalus (s. diesen).

Als **Therapie**, die evtl. eine Heilung des Leidens bedeutet, kommt nur die operative Entfernung des Tumors in Frage. Diese setzt indessen erstens voraus, daß die Geschwulst abgesehen von ihrer genauen Lokalisierbarkeit sich an erreichbarer Stelle befindet und daß sie, was nur für eine kleine Zahl der Tumoren gilt, sich aus ihrer Umgebung gut herauschälen läßt (hierher gehören z. B. auch die Tuberkel). In den anderen, von vornherein hoffnungslosen Fällen kann auf dem Wege der Trepanation wenigstens eine Entlastung des Hirndrucks und zeitweise Beseitigung der von letzterem abhängigen Symptome herbeigeführt werden (sog. dekompressive Trepanation). Die übrige Therapie beschränkt sich auf Maßnahmen der allgemeinen Krankenpflege sowie die Linderung des heftigen Kopfschmerzes durch Antineuralgica, Pantopon, Morphinum.

## Multiple Sklerose.

Die multiple oder disseminierte Sklerose des Gehirns und Rückenmarks ist eine der häufigsten chronischen organischen Nervenkrankheiten. In der Regel tritt sie in jugendlichen und mittleren Lebensjahren, meist zwischen dem 15. und 35. Jahre auf; in der Kindheit gehört sie zu den größten Seltenheiten, auch nach dem 40. Jahr ist ihr Auftreten ungewöhnlich. Ihre Ätiologie ist unbekannt (die früher angenommene ursächliche Bedeutung vorausgegangener Infektionskrankheiten sowie von Intoxikationen ist mehr als zweifelhaft; die in jüngster Zeit aufgestellte Hypothese von der ätiologischen Rolle gewisser Spirochäten bedarf noch weiterer Nachprüfung). Die Lues hat mit der Krankheit nichts zu tun.

Der pathologisch-anatomische Befund ist durch eine über Gehirn und Rückenmark völlig regellos und in einer von Fall zu Fall wechselnd ausgebreiteten Dissemination zahlreicher sog. sklerotischer Plaques ausgezeichnet. Diese sind oft schon makroskopisch als graue Flecken zu erkennen und bestehen histologisch aus Herden gewucherter Glia, innerhalb der die Markscheiden der Nerven geschwunden sind, wogegen ihre Achsencylinder erhalten bleiben. Wohl im Zusammenhang hiermit kommt es im Gegensatz zu anderen herdförmigen Erkrankungen bei der multiplen Sklerose nicht zu den entsprechenden sekundären Degenerationen. Die Herde finden sich häufiger in der weißen als in der grauen Substanz. Außer dem Gehirn und Rückenmark ist auch der Nervus und Tractus opticus häufig von der Erkrankung befallen.

Das **Krankheitsbild** zeigt trotz der großen Verschiedenartigkeit in der Lokalisation der sklerotischen Herde in den einzelnen Fällen dennoch eine Reihe gemeinsamer sehr bezeichnender Eigentümlichkeiten, deren Gesamtheit in der großen Mehrzahl der Fälle sich zu einem charakteristischen Symptomenbilde zusammenschließt. Zu den klassischen Symptomen der multiplen Sklerose gehören die folgenden:

Es besteht sog. **Intentionstremor**, d. h. eine besondere Art von Zittern in den oberen Extremitäten, das in der Ruhe fehlt, dagegen bei der Ausführung von Bewegungen sich in einem eigenartigen Wackeln der Hand und des Armes geltend macht und während der Ausführung von Zielbewegungen, namentlich kurz vor dem Ziele, z. B. beim Finger-Nasenspitzenversuch oder beim Ergreifen eines Gegenstandes an Intensität zunimmt. Ein häufiges Symptom ist weiter **Nystagmus**, d. h. zuckende Bewegungen der Bulbi; sie treten hauptsächlich in horizontaler Richtung bei seitlicher Blickrichtung auf, seltener sind Raddrehungen der Bulbi. Der Nystagmus erklärt sich aus der Lokalisation sklerotischer Herde in der Kernregion des N. vestibularis. Oft zeigt auch die Sprache eine charakteristische Störung; sie ist skandierend, d. h. der Kranke zerlegt die von ihm ausgesprochenen Worte in eigentümlicher Form in die einzelnen Silben, so daß das Gesprochene merkwürdig zerhackt klingt, wobei außerdem häufig die Stimme auffallend monoton ist und öfter während des Sprechens in eine hohe Fistellage umschlägt. Auch **ataktische Störungen** ähnlich wie bei der Tabes lassen sich nicht selten beobachten. Der Gang wird breitspurig und unsicher; beim Stehen mit geschlossenen Augen und Fußschluß besteht starkes Schwanken des Rumpfes (**Romberg'sches Phänomen**). Auch kann man bisweilen,

insbesondere wenn sich z. B. der Kranke aus der liegenden Stellung aufsetzt, Wackeln des Rumpfes wahrnehmen.

Eine eingehendere Untersuchung fördert fast immer noch eine Reihe weiterer objektiver Zeichen zutage. Dazu gehören die verschiedenen Pyramidenzeichen wie Steigerung der Sehnenreflexe, Fußklonus, Babinskis Zehenphänomen und vor allem das Fehlen der Bauchdeckenreflexe, welches deshalb einen besonders hohen diagnostischen Wert hat, weil es oft schon frühzeitig und bei Fehlen der übrigen klassischen Symptome nachweisbar ist. Stärkere Spasmen in den Beinen bewirken eine spastisch-paretische bzw. spastisch-ataktische Gangart. Oft klagen die Kranken ferner über Kopfschmerzen sowie Schwindel, zum Teil in der Form des Drehschwindels. Weiter kommen häufig Sehstörungen vor, teils in Form vorübergehender Amblyopien, teils vollkommene Erblindungen. Letztere beruhen entweder auf retrobulbärer Neuritis ohne ophthalmoskopischen Befund oder auf beiderseitiger Opticusatrophie, die sich meist schon frühzeitig ophthalmoskopisch durch eine charakteristische Abblassung der temporalen Hälfte der Papille verrät. Augenmuskellähmungen mit Doppelsehen können ein Frühsymptom sein; sie sind meist vorübergehender Art. Ein ungemein charakteristisches, aber nur in manchen Fällen vorhandenes Phänomen ist ferner das sog. Zwangslachen und Zwangswimmen, d. h. plötzlich auftretende Affektbewegungen, die zum Teil auch unvermittelt ineinander übergehen, oft ohne von den entsprechenden Affekten begleitet zu sein. Mitunter sind auch stärkere psychische Störungen sowie Abnahme der Intelligenz bis zur Demenz zu konstatieren.

Sensibilitätsstörungen können vollkommen fehlen, sind jedoch bei genauerer Prüfung häufig, wenn auch stets in nur wenig ausgeprägtem Maße zu finden. In der Regel handelt es sich dabei um fleckförmige anästhetische oder analgetische Zonen, die charakteristischerweise wieder vorübergehen, um evtl. nach einiger Zeit an einer anderen Stelle nachweisbar zu werden. Manchmal klagen die Patienten über Parästhesien in den Händen und Füßen, wogegen Schmerzen nicht zum Bilde der multiplen Sklerose gehören. Ebenso fehlen Pupillenanomalien. Dagegen stellen sich öfter leichte Blasen- und Mastdarmstörungen ein, die aber ebenfalls in der Regel nur flüchtigen Charakter tragen. Zu erwähnen sind endlich noch im Verlauf der Krankheit auftretende Apoplexien mit rasch vorübergehenden Hemiplegien. Gelegentlich treten auch echte epileptische Anfälle auf.

Abweichend von dem geschilderten Verhalten kommen indessen auch andere atypische Formen vor. So verläuft eine keineswegs seltene Form der Krankheit unter dem Bilde einer Paraplegie wie bei einer gewöhnlichen Querschnittsläsion des Rückenmarks. Gelegentlich kann auch der Symptomenkomplex der spastischen Spinalparalyse vorhanden sein. Vereinzelt tritt das Leiden von vornherein als Hemiplegie auf. In allen diesen Fällen sind früher oder später meist doch daneben einzelne der für multiple Sklerose charakteristischen Stigmata zu finden.

Der Verlauf der Krankheit ist (abgesehen von ganz seltenen akuten Formen des Leidens) chronisch und erstreckt sich oft über viele Jahre und Jahrzehnte. Charakteristisch sind einerseits das schubweise Auftreten von Verschlimmerungen, andererseits die nicht selten kürzer oder

länger dauernden Remissionen, die bei unklarer Diagnose sogar eine Heilung des an sich unheilbaren Leidens vortäuschen können. Ausnahmsweise kann eine Periode der Besserung mit fast völligem Schwinden sämtlicher Symptome sogar Jahre anhalten. Andere Fälle zeigen eine mehr kontinuierliche Verlaufsform. Jedenfalls hat im allgemeinen die Krankheit immer einen ausgesprochen progredienten Charakter. Gravidität und Puerperium wirken in der Regel verschlimmernd. Die Störung der Sprache pflegt dauernd zuzunehmen, so daß die Kranken schließlich nur noch schwer zu verstehen sind; es treten Spasmen sowie Paraplegien ein, das Sehvermögen nimmt dauernd ab und meist entwickelt sich eine zunehmende Demenz. Die Kranken gehen an allgemeinem Marasmus oder einer interkurrenten Erkrankung (Decubitus, Pneumonie usw.) zugrunde.

Die Diagnose des klassischen Bildes der Krankheit ist leicht. Dagegen können sowohl die Frühfälle wie die atypischen Formen große diagnostische Schwierigkeiten bereiten. Die Anfangsstadien täuschen mitunter eine einfache Neurasthenie vor. Von großer Bedeutung ist hier eine genaue Anamnese: man forsche nach früher etwa vorgekommener vorübergehender plötzlicher Amaurose oder Doppelsehen oder flüchtigen Blasenstörungen oder transitorische Aphasie usw.; sodann fahnde man auf die auch bei atypischen Fällen meist vorhandenen charakteristischen Symptome. Zu letzteren gehören u. a. vor allem das Fehlen der Bauchdeckenreflexe, das Vorhandensein von Gesichtsfelddefekten sowie die bitemporale Abblassung der Papille, ferner die Abwesenheit grober Sensibilitätsdefekte. Große Ähnlichkeit kann das Krankheitsbild mit der cerebros spinalen Lues mit ihrem ebenfalls äußerst vielgestaltigen und wechselvollen Symptomenkomplex haben. Hier schützt das pathologische Verhalten der Pupillen, die Wassermannsche Reaktion sowie das Ergebnis der Lumbalpunktion vor Irrtum. Gleiches gilt von der Unterscheidung der Fälle von multipler Sklerose mit starker psychischer Alteration gegenüber der progressiven Paralyse (beiden gemeinsam sind die schnell vorübergehenden Lähmungen, Sprachstörungen usw.).

Die Therapie ist im allgemeinen eine rein symptomatische (Elektrotherapie, Hydrotherapie, ferner die bei der Tabes erwähnte Übungstherapie bei Ataxie). Sehr wichtig ist, daß jede Überanstrengung vermieden wird; insbesondere erweisen sich regelrechte Ruhekuren oft als besonders heilsam. Mitunter hat Arsenmedikation (Fowler'sche Lösung, Pilul. asiat.) eine günstige Wirkung. Doch denke man bei allen therapeutischen Erfolgen stets an die Möglichkeit einer spontanen Remission.

### Lues cerebrospinalis.

Die Lues cerebrospinalis ist eine sehr häufige Krankheit. Diese Tatsache sowohl wie die Vielgestaltigkeit ihres klinischen Bildes und ihre weitgehende therapeutische Beeinflußbarkeit machen sie zu einer der wichtigsten organischen Nervenkrankheiten. Wie die Tabes und Paralyse ist sie zu den tertiärluetischen Erkrankungen zu rechnen;



neuerdings ist es gelungen, Luesspirochäten in den erkrankten Geweben nachzuweisen. Sie tritt bisweilen schon wenige Jahre oder noch früher, oft dagegen erst Dezennien nach der Infektion in die Erscheinung.

Pathologisch-anatomischer Befund: Bei der Hirn- und Rückenmarkslues erkranken primär nicht das Nervengewebe, d. h. Ganglienzellen und Nervenfasern, sondern die Gefäße bzw. die Meningen. Hierbei lassen sich im allgemeinen drei verschiedene Erkrankungsformen unterscheiden: 1. die vasculäre Form, 2. die meningitische Form als Meningocephalitis und Meningomyelitis syphilitica, 3. die gummöse Form. Besonders häufig ist die Gefäßerkrankung, deren typische Veränderung die Endarteriitis luetica ist. Sie besteht neben kleinzelliger Infiltration der Adventitia in fortschreitender Verdickung der Intima durch zellreiches entzündliches, zum Teil gummöses Gewebe und führt schließlich zur Obliteration bzw. Thrombosierung des Gefäßlumens. Prädilektionsort sind die Gefäße der Hirnbasis und die Arteria fossae Sylvii. Die Folge des Gefäßverschlusses ist eine im Versorgungsgebiet der Arterie auftretende ischämische Erweichung analog der gewöhnlichen embolischen oder thrombotischen Malacie. Eine andere Form der Gefäßerkrankung ist die Entstehung einzelner Aneurysmen, die im Gegensatz zu den multiplen Aneurysmen der gewöhnlichen Arteriosklerose nicht miliar sind, aber wie diese zu Hirnblutungen führen. Die meningitische Form besteht in einer diffusen kleinzelligen Infiltration der weichen Hirn- und Rückenmarkshäute, die von einem rötlichgrauen, durchscheinenden Granulationsgewebe durchsetzt sind; dieses besitzt Neigung zu herdförmiger speckiger (gummöser) Nekrose und wandelt sich oft stellenweise in derbes, schrumpfendes Schwielen- gewebe um. Am Gehirn wird mit Vorliebe die Gegend der Hirnbasis befallen, so daß speziell die Hirnnerven von dem entzündeten Gewebe umhüllt werden. Doch greift der Prozeß mitunter auch auf die Konvexität über. Luetische Gummiknoten treten entweder in der Form multipler kleiner Geschwülstchen in den weichen Häuten bzw. in der Nachbarschaft der Gefäße oder seltener als größere solitäre Gebilde auf, die dann meist von der Dura ihren Ausgang nehmen und anatomisch wie klinisch sich mit dem Bilde des Gehirn- bzw. Rückenmarkstumors decken. Häufig sind die verschiedenen anatomischen Formen bei demselben Fall nebeneinander vorhanden.

Das Krankheitsbild zeichnet sich durch große Mannigfaltigkeit der Symptome aus und es gibt in der Klinik der organischen Nervenkrankheiten keine Erkrankung, die so symptomereich und wechselvoll in ihren Erscheinungsformen ist wie die Lues cerebrospinalis. Nicht immer ist es möglich, auf Grund des vorhandenen Symptomenkomplexes den speziellen anatomischen Charakter der luetischen Veränderungen mit Sicherheit zu diagnostizieren. Dagegen hat im allgemeinen die Diagnostik der Nervenlues seit der regelmäßigen Anwendung der WaR. sowie der Lumbalpunktion bei allen organischen Nervenleiden eine sehr erhebliche Erweiterung erfahren, so daß manches ehemals anders gedeutete Krankheitsbild heute als zur Lues gehörig erkannt ist.

Die Symptome der luetischen Gefäßerkrankung brauchen an sich nichts für die Lues Charakteristisches zu zeigen, sondern stimmen oft vollständig mit dem Krankheitsbilde bei Thrombose der Gehirngefäße oder bei Hirnblutung infolge von arteriosklerotischer Gefäßerkrankung überein (s. S. 570). Die Erscheinungen decken sich alsdann mit dem Bilde der gewöhnlichen Hemiplegie, Aphasie bzw. andern der früher beschriebenen cerebralen Ausfallserscheinungen. Am Rückenmark kann sich die Erkrankung in der Form der gewöhnlichen Querschnittslähmung wie bei Myelitis äußern.

Ein auf Lues verdächtiges Zeichen ist stets das Auftreten der genannten Erscheinungen in relativ jugendlichen Jahren, etwa vor dem 45. Jahr (insbesondere bei Fehlen einer für embolische Prozesse in Frage kommenden Erkrankung).

Die meningitische Form bewirkt am Gehirn meist die Symptome der basalen Meningitis unter besonderer Beteiligung der Hirnnerven. Unter ihnen sind es hauptsächlich die Augenmuskelnerven, namentlich der Oculomotorius, die schon in Frühstadien der Krankheit und zwar meist einseitig Störungen hauptsächlich in Form von Ptose sowie Doppelsehen zeigen. Seltener sind Trochlearis- und Abducenslähmungen. Bezeichnend ist dabei der rasche Wechsel der Symptome. Häufig wird auch eine Erkrankung des N. opticus und zwar Neuritis optica beobachtet. Auch reflektorische Pupillenstarre kommt vor; doch ist sie keine so konstante Erscheinung wie bei Tabes und Paralyse. Seltener werden die anderen Hirnnerven befallen. So beobachtet man Neuralgien oder trophische Störungen wie Ulcus corneae oder Herpes zoster im Bereich des Trigeminus, ferner Acusticusstörungen wie Ohrensausen, Schwerhörigkeit, Schwindelanfälle. Bei Lokalisation an der Konvexität des Gehirns, speziell in der Gegend der Zentralwindungen können sich die früher erwähnten Reiz- bzw. Ausfallsphänomene geltend machen. Hierzu gehören epileptische Krämpfe nach Art der Jacksonschen Rindenkrämpfe, aber auch in der Form der genuinen Epilepsie, ferner Monoplegien bzw. aphasische Störungen. Eine weniger häufige Form der meningalen Hirnlues ist die Pachymeningitis haemorrhagica (vgl. S. 605), die übrigens häufiger bei Paralyse vorkommt und sich ebenfalls in Jacksonschen Anfällen äußert. Hier ist die Cerebrospinalflüssigkeit oft sanguinolent.

Die Allgemeinsymptome sind bei Hirnlues häufig recht geringfügig, so daß die Kranken oft zunächst z. B. nur ein lokales Augenleiden zu haben vermeinen und erst seitens des Ophthalmologen über den Ernst des Zustandes aufgeklärt werden. In anderen Fällen bestehen heftige Kopfschmerzen, die in der für Lues charakteristischen Form nächtliche Exacerbationen zeigen. In einzelnen Fällen bestehen andere schwerere Hirndrucksymptome, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel. Nicht selten sind leichtere Temperatursteigerungen nachweisbar.

Die spinale Form der luetischen Meningitis kann sich äußern durch Strangdegenerationen und entsprechende Lähmungen (teils halbseitig, teils paraplegisch), sowie durch Spasmen mit Pyramidensymptomen in manchen Fällen entwickelt sich das Bild der syphilitischen spastischen Spinalparalyse. Vor allem aber äußert sich die spinale Lues häufig durch Wurzelsymptome, indem die Umwachsung der sensiblen Wurzeln durch das schrumpfende luetische Narbengewebe starke Reizerscheinungen, Parästhesien und vor allem radikuläre Schmerzen hervorruft.

Eine besondere Form der spinalen Lues ist die sog. Pachymeningitis cervicalis hypertrophica, eine seltene luetische Entzündung der Dura, die mit starker Verdickung derselben in der Gegend des Halsmarks unter gleichzeitiger Beteiligung auch der weichen Hirnhäute einhergeht. Die mit heftigen Schmerzen in Nacken, Hinterhaupt und Armen beginnende Krankheit führt zu atrophischen

Lähmungen in den oberen Extremitäten, namentlich im Gebiet des Ulnaris und Medianus. Die Hände nehmen eine eigentümliche, als Predigerhandstellung bezeichnete Haltung ein. Später kommt es zu spastischer Parese der Beine.

Größere solitäre Gummien des Gehirns verlaufen unter dem gleichen Bilde wie der Hirntumor mit Hirndruckerscheinungen, Stauungspapille, Reiz- und Ausfallserscheinungen der Rinde usw. Sie lassen sich oft nur durch den Ausfall der Blutuntersuchung und das Ergebnis der Lumbalpunktion von andersartigen Gehirngeschwülsten unterscheiden. Gleiches gilt von den seltenen, in Tumorform auftretenden Gummien des Rückenmarks.

Die **Diagnose** fußt abgesehen von der Anamnese und dem häufig charakteristischen Gesamtbilde, für das u. a. die große Labilität der Symptome bezeichnend ist, vor allem auf dem positiven Ausfall der WaR. im Blut (positiv in ungefähr 70–80% der Fälle) und dem Ergebnis der Lumbalpunktion. Der Lumbaldruck ist oft erhöht; die Globulinprobe ist in der Form der Phase-I-Reaktion meist positiv; desgleichen findet sich fast stets eine Pleocytose (vgl. Tabes S. 551). Die WaR. im Liquor ist nach der Originalmethode (d. h. mit 0,2 Liquor) in 20–30% der Fälle, mit höheren Liquormengen fast immer positiv. Reflektorische Pupillenstarre kommt nur beiluetischen Prozessen bzw. bei Tabes und Paralyse vor, während sie bei allen anderen organischen Erkrankungen mit verschwindenden Ausnahmen (hierzu gehört die Encephalitis lethargica) fehlt. Einen wichtigen Hinweis auf die Möglichkeit einer latenten cerebrospinalen Lues bei unbestimmten nervösen Symptomen bildet das gleichzeitige Vorhandenseinluetischer Erkrankungen anderer Organe (Aorteninsuffizienz, Aneurysmen usw.). Manche „Neurasthenie“ wird auf diese Weise als Nervenlues entlarvt.

**Therapie:** Eine besonders wichtige Rolle spielt die möglichst frühzeitige und gründliche spezifische Luesbehandlung. Diese ist zugleich die beste Prophylaxe gegenüber der Nervenlues. In jedem Fall von syphilitischer Infektion ist auch bei Fehlen aller nervösen Symptome während der ganzen nächsten Jahre in regelmäßigen Abständen unter gleichzeitiger Kontrolle der WaR. der Nervenstatus der Kranken zu verfolgen, um bereits bei den allerersten Erscheinungen einer Nervenkrankung (falls es nicht schon vorher geschehen) eine energische Therapie durchzuführen. Dabei ist übrigens zu beachten, daß eine negative WaR. keine unbedingte Gewähr gegen die Entstehung der Lues cerebrospinalis bietet. Bei einem beträchtlichen Teil der Kranken mit Nervenlues war, wie sich meist nachträglich feststellen läßt, die vorausgegangene Kur unzureichend.

An erster Stelle steht in der Behandlung das Quecksilber und zwar als Inunktionskur (bis 6,0 pro die) oder die Injektion von löslichen Salzen (Sublimat bzw. Oxycyanat jeden zweiten Tag 0,01–0,02) oder von unlöslichen Präparaten wie Hg. salicyl. oder Kalomel (näheres s. S. 161); mildere Präparate sind Novasurol und Modenol (15 Spritzen zu je 2 ccm 1–2mal wöchentlich). In zweiter Linie kommt das Salvarsan (Neosalvarsan, Salvarsannatrium) in Betracht, das in vielen Fällen die Hg.-Behandlung wirksam unterstützt und dort, wo letztere kontraindiziert ist, oft (aber

nicht immer!) dem Hg ähnliche Erfolge erzielt. In vielen Fällen bewährt sich eine kombinierte Hg-Salvarsanbehandlung, die in der Weise durchzuführen ist, daß man mit Hg beginnt und erst einige Wochen später Salvarsan gibt, letzteres zunächst in kleinen Dosen von 0,1—0,15 Neosalvarsan und es allmählich steigert bis zur Gesamtdosis von etwa 4,0 (vgl. S. 161). Die Hg- bzw. Salvarsanbehandlung soll durch eine energische Jodbehandlung unterstützt werden. Nach Abschluß der Kur bestimmt, abgesehen von dem Nervenstatus vor allem das Verhalten der WaR. und des Lumbalpunktes die Frage des Zeitpunktes der Wiederholung der Kur. In der Regel ist dieselbe in den nächsten Monaten bzw. Jahren mehrere Male zu wiederholen.

Im Gefolge der Salvarsanbehandlung können zwei verschiedene neurologische Komplikationen auftreten. Einmal kommen namentlich im Beginn der Behandlung sog. **Neurorezidive** vor: Unter Fieber, Kopfschmerzen, Brechreiz u. ä. treten Störungen seitens der Hirnnerven auf, speziell von seiten des Acusticus in Form von Taubheit und Schwindel, gelegentlich auch seitens anderer Hirnnerven. Die Erscheinungen sind nur vorübergehend und im allgemeinen unbedenklich. Sie beruhen, wie man annimmt, auf einer zu niedrigen Dosierung des Salvarsans, da sie bei Steigerung derselben wieder schwinden. Sie sind erst seit Einführung der Salvarsanbehandlung eine häufigere Störung. — Ungleich ernster ist eine andere Salvarsankomplikation, nämlich eine hämorrhagische **Encephalitis**, die in der Regel nach einer Latenzzeit von zweimal 24 Stunden unter den schweren, S. 578 beschriebenen Erscheinungen oft tödlich verläuft und als Arsenvergiftung aufgefaßt wird. Sie ist weder abhängig von der Größe der Dosierung, noch läßt sie sich aus den sonstigen speziellen Umständen eines Falles vorhersehen.

### Epilepsie (Fallsucht, Morbus sacer).

Unter Epilepsie versteht man ein chronisches Nervenleiden, das sich durch Anfälle von Bewußtlosigkeit auszeichnet, die häufig gleichzeitig mit tonischen und klonischen Krämpfen einhergehen, während in der Zeit zwischen den Anfällen oft vollkommenes Wohlbefinden besteht.

Bei der sog. genuinen Epilepsie fehlt jeder anatomische Befund; man faßt sie daher zur Zeit als funktionelle Neurose auf. Außerdem gibt es auch eine symptomatische Epilepsie, die unter den gleichen klinischen Erscheinungen wie die genuine Form verläuft und bei organischen Gehirnkrankheiten bzw. im Gefolge anderer Erkrankungen auftritt. Obwohl beide Arten von Epilepsie in ihrer Manifestation mit einander weitgehend übereinstimmen, sind sie doch prinzipiell voneinander zu trennen.

**Genuine Epilepsie:** Ihre Ursachen sind unbekannt. Häufig handelt es sich um Individuen mit starker neuropathisch-hereditärer Belastung. Eine wichtige Rolle kommt dem Potatorium der Eltern zu, möglicherweise auch der hereditären Lues. Als auslösende Momente werden u. a. akute fieberhafte Erkrankungen, ferner entzündliche Prozesse in Nase und Ohr sowie Verletzungen peripherischer Nerven angeschuldigt, ohne daß indessen für diese Fälle von sog. Reflexepilepsie ein Zusammenhang einwandfrei festgestellt ist. Mitunter wird der erste Anfall durch eine heftige psychische Erregung wie Schreck oder Ärger usw. hervorgerufen.

Die Krankheit beginnt fast immer vor dem 30. Jahre, bisweilen schon in früher Kindheit, mitunter erst in den späteren Jugendjahren. Sie äußert sich vor allem durch die sog. epileptischen Anfälle, deren Charakter und Häufigkeit von Fall zu Fall verschieden ist.

Der sog. große epileptische Anfall in seiner klassischen Form läßt mehrere Stadien erkennen. Vielfach gehen ihm für einige Stunden oder Tage gewisse Prodromalerscheinungen voraus, die in Störungen des Allgemeinbefindens, Verstimmung, Reizbarkeit, Kopfdruck u. a. m. bestehen, oder kurz vor dem Anfall treten eigentümliche als Aura (Hauch) bezeichnete Phänomene auf, die von Fall zu Fall sehr verschiedenartigen Charakter haben, bei dem einzelnen Kranken aber in der Regel stets in der gleichen stereotypen Weise wiederkehren. Man unterscheidet eine sensible, sensorische, motorische, vasomotorische und psychische Aura. Am häufigsten ist die sensible und sensorische Aura. Die Patienten empfinden eigentümliche Parästhesien in den Extremitäten oder am Kopf, leiden an Beklemmungsgefühl, Übelkeit oder haben eigentümliche Gesichts- oder Gehörs wahrnehmungen; sie glauben feurige Zeichen zu sehen, hören Geräusche usw. Zu den motorischen Erscheinungen gehören leichte Zuckungen in den Extremitäten oder im Gesicht, Würgreiz, Stuhl drang. Die vasomotorische Aura äußert sich in plötzlichem Erblassen oder Erröten, Schweißausbruch. Die psychische Aura besteht teils in plötzlichem Stimmungswechsel, Angst anfällen, Unruhe, Erregbarkeit, teils in Bewußtseinsstörungen mit Halluzinationen. Die einzelnen Formen der Aura können miteinander teilweise kombiniert sein. Seltener dauert die Aura etwas längere Zeit, so daß der Kranke, der ihre Bedeutung kennt, noch Zeit findet, sich in Sicherheit zu bringen bzw. sich hinzulegen.

Der eigentliche Anfall setzt plötzlich mit größter Heftigkeit ein. Der Kranke stößt oft einen Schrei aus und stürzt bewußtlos hin, wobei er sich häufig ernstere Verletzungen zuzieht. Sodann verfällt er in einen Zustand allgemeiner tonischer Muskelkrämpfe; die Kiefer sind aufeinandergepreßt, die Fäuste geballt, der Daumen eingeschlagen, der Rücken ist oft opisthotonisch gekrümmt. Die Atmung steht für kurze Zeit still, das Gesicht färbt sich cyanotisch. Nach ungefähr  $\frac{1}{2}$  Minute geht das tonische in das klonische Krampf stadium über, die Extremitäten- und Rumpfmuskeln geraten in ungeordnete zuckende und stoßende Bewegungen, die Gesichtsmuskeln werden fratzenhaft verzerrt, der Kopf schlägt auf die Unterlage auf, die Pupillen sind weit und reaktionslos, die Bulbi machen zuckende Bewegungen und zeigen oft eine Déviation conjugée. Häufig findet spontan Urinabgang, seltener auch Stuhlentleerung sowie bei Männern Samenerguß statt. Die Atmung ist laut schnarrend. Von Verletzungen, die sich während des Krampfanfalls ereignen, sind vor allem die häufigen Bißverletzungen der Zunge zu nennen. Seltener sind Gelenktraumen (Luxationen). Die Dauer des Anfalls beträgt nur einige Minuten.

Hierauf folgt als drittes Stadium das sog. postepileptische Koma mit ruhiger Atmung und Schwinden der Cyanose. Es dauert in manchen Fällen nur wenige Minuten, oft aber auch mehrere Stunden,

worauf die Besinnung langsam wiederkehrt. Meist bleibt jedoch noch für viele Stunden eine erhebliche Störung des Allgemeinbefindens, Zerschlagenheit sowie Eingenommensein des Kopfes zurück. Oft ist jetzt eine leichte transitorische Albuminurie nachweisbar. Gelegentlich kommen auch vorübergehende Paresen eines Armes oder Beines, ferner Hemiplegien oder Aphasie vor, die im Laufe der nächsten Tage wieder vollkommen zurückgehen. Besonders charakteristisch für den epileptischen Anfall ist, daß er eine völlige Amnesie sowohl für den Anfall selbst, als auch mitunter für die Zeit der Aura, in einzelnen Fällen sogar für noch weiter zurückliegende Zeitabschnitte hinterläßt (retrograde Amnesie). In besonders schweren Fällen schließen sich mehrere Anfälle unmittelbar aneinander an, so daß ein sog. Status epilepticus von mehrstündiger Dauer entsteht, der im höchsten Grade lebensgefährlich ist und oft mit einer beträchtlichen Erhöhung der Körpertemperatur einhergeht. Nicht selten endet er tödlich.

Im übrigen verhält sich die Krankheit bezüglich der Häufigkeit der Anfälle außerordentlich verschieden; die einen Kranken werden alle paar Tage, andere nur einige Male im Jahr oder noch seltener von Anfällen heimgesucht. Frauen neigen namentlich zur Zeit der Menstruation zum Auftreten von Anfällen. Praktisch sehr wichtig ist die Tatsache, daß bei manchen Patienten die Anfälle vorzugsweise oder ausschließlich nachts auftreten (Epilepsia nocturna), so daß diese lange Zeit unbemerkt bleiben und bisweilen nur zufällig auf Grund der stattgefundenen Verletzungen oder der heftigen morgendlichen Kopfschmerzen oder infolge der Enuresis nocturna entdeckt werden.

Neben den typischen großen epileptischen Anfällen, für die neben der Bewußtlosigkeit vor allem die Krämpfe charakteristisch sind, gibt es noch andere Manifestationen der Epilepsie. Hierzu gehören die rudimentären Formen oder die Epilepsia minor und die sog. epileptischen Äquivalente.

Die erstere, auch als Petit mal bezeichnete Form besteht in anfallsweise auftretenden Bewußtseinsstörungen. In ihrer leichtesten Form, den sog. Absencen äußert sie sich lediglich durch ein nur wenige Sekunden dauerndes Innehalten in einer Beschäftigung oder im Sprechen, während des Kartenspiels usw., wobei die Augen einen abwesenden starren Ausdruck annehmen, oder der Kranke tut oder redet irgend etwas Sinnloses, um gleich darauf wieder ein völlig normales Gebaren zu zeigen, so daß die Umgebung des Kranken den Zwischenfall oft gar nicht bemerkt. Bisweilen fehlt die Geistesabwesenheit, dagegen hat der Kranke eigentümliche halluzinatorische Eindrücke von seiner Umgebung. Oder es treten Ohnmachten auf, deren wahrer Charakter sich erst bei genauerem Studium des Falles enthüllt. Auch amaartige Zustände können gleichzeitig auftreten, ebenso Schwindelanfälle, evtl. mit unwillkürlichem Harnverlust und leichter Trübung des Bewußtseins. In anderen Fällen versinkt der Patient plötzlich am Tage in tiefen Schlaf, aus dem er zunächst nicht zu erwecken ist und nach einiger Zeit mit benommenem Kopf, ohne von dem Einschlafen zu wissen, erwacht (Narkolepsie).

Die sog. epileptischen Äquivalente haben mit dem epileptischen Anfall als solchem nichts zu tun, sondern bestehen in anfallsweise auftretenden Störungen mannigfacher Art, die sich vor allem durch die dabei vorhandene Trübung des Bewußtseins als epileptische kennzeichnen. Sie kommen bei Epileptikern neben großen oder kleinen Anfällen oder an Stelle derselben vor und sind oft der gleichen Behandlung wie die klassische Epilepsie zugänglich. Im einzelnen zeigen sie eine außerordentlich große Mannigfaltigkeit in ihren Erscheinungsformen. Hierher gehören z. B. anfallsweise wiederkehrende psychische Verstimmungen, in denen die Kranken reizbar und jähzornig sind oder regelrechte Tobsuchtsanfälle zeigen bzw. zu allerlei unüberlegten Handlungen neigen, die sonst nicht zu ihrem Wesen passen. Zu den eigenartigen impulsiven Handlungen, zu denen Epileptiker zuweilen neigen, gehört auch vor allem die sog. Porio manie, der epileptische Wandertrieb, der die Kranken dazu zwingt, plötzlich ihre Tätigkeit abzubrechen und ohne jeden ersichtlichen Grund sich auf die Wanderschaft zu begeben, eine Reise anzutreten und kürzere oder längere Zeit in der Welt herumzuirren. Es ist bezeichnend, daß sie während dieses Zustandes nicht einen verwirrten Eindruck machen, sondern alle hierbei erforderlichen Dinge automatenhaft korrekt erledigen, ohne sich dabei auffällig zu benehmen. Nach Beendigung des Anfalles, der eine Reihe von Tagen oder sogar noch länger dauern kann, hat der Kranke entweder keinerlei Erinnerung oder nur eine undeutliche traumhafte Vorstellung von dem Geschehenen. Diese sog. epileptischen Dämmerzustände haben nicht nur ärztliches, sondern auch forensisches Interesse, da die Kranken während des Dämmerzustandes manchmal eine ausgesprochene Neigung zu verbrecherischen Handlungen wie Diebstahl, Brandstiftung, Sexualverbrechen und schweren Gewalttätigkeiten zeigen. Auch das periodisch wiederkehrende Sichbetrinken bei in der Zwischenzeit nüchternen Personen bedeutet in manchen Fällen nichts anderes als ein epileptisches Äquivalent (Dipsomanie).

Auch in den vorstehend genannten Fällen hat der Kranke, der sich während des Anfalles wie eine planmäßig handelnde Person benimmt, nach Aufhören des Anfalles jedoch in tiefen Schlaf verfällt, beim Erwachen keine Erinnerung an das Vorgefallene hat. Derartige Dämmerzustände können sich übrigens auch an echte epileptische Krampfanfälle anschließen. Endlich gehören zum Teil manche Phänomene wie das Nachtwandeln, das Zähneknirschen im Schlaf, das Bett-nässen sowie der sog. Pavor nocturnus der Kinder zu den epileptischen Äquivalenten, wenn sie auch andererseits bei nichtepileptischen Psychopathen vorkommen.

In der Zwischenzeit zwischen den beschriebenen Anfällen können die Kranken, namentlich wenn sie nur selten von ihnen befallen werden, einen körperlich und psychisch völlig normalen Eindruck machen und z. B. ihren Beruf in korrekter Weise ausfüllen, ja sogar in ihm mitunter Hervorragendes leisten. Hier ermöglicht nur eine eingehende Anamnese, insbesondere auch genaue Information des Arztes seitens der Angehörigen des Kranken die Feststellung des Leidens.

In zahlreichen Fällen ergibt eine eingehende Untersuchung auch das Vorhandensein von körperlichen Anomalien und geistigen Defekten.

So findet man als Degenerationszeichen z. B. Syndaktylie, angewachsene Ohrläppchen, überzählige Finger, spitzbogenartigen Gaumen, Colobom der Iris, starken Astigmatismus, Muskeldefekte usw. Wichtiger sind psychische Anomalien wie abnorme Reizbarkeit, Alkoholintoleranz, allgemeine ethische Minderwertigkeit und Hemmungslosigkeit sowie Urteilsschwäche bis zu schwersten Defekten in intellektueller und moralischer Beziehung. Häufung der Anfälle, namentlich zahlreiche Krampfanfälle führen schließlich in der Regel zu fortschreitender Verblödung, wie sie ein großer Teil der Insassen der Epileptikeranstalten darbietet. Im allgemeinen gilt als Regel, daß die Epilepsie eine Neigung zu ungünstigem Verlauf zeigt. Das gilt auch für die oben beschriebenen leichten Fälle mit nur seltenen rudimentären Anfällen bzw. den hauptsächlich in Äquivalenten sich manifestierenden Formen. Denn jede Epilepsie zeigt die Tendenz zur Progression. Die geschilderte psychische Alteration bleibt auf die Dauer in nur etwa 20% aller Fälle aus.

Die Ätiologie der Epilepsie ist bisher nur in dem Sinne geklärt, daß es sich um den Ausdruck einer Keimschädigung handelt, wie die bereits erwähnte bedeutende Rolle neuropathischer Ascendenz sowie des Alkoholismus der Eltern erkennen läßt. Daneben kommen Intoxikationen verschiedener Art (Blei, Cocain, Alkohol) sowie ferner als sehr wichtiges Moment Kopftraumen ursächlich in Frage.

Anatomisch entbehrt die genuine Epilepsie irgend welcher charakteristischen Befunde; in zahlreichen Fällen besteht allerdings eine Vermehrung der Glia der Hirnrinde (sog. Randgliose) sowie Atrophie ihrer Ganglienzellen. Doch wird diesen Veränderungen nur die Bedeutung sekundärer Befunde beigemessen. Bezüglich der Pathogenese der nach Art von Entladungen auftretenden Anfallsparoxysmen ist unsere Kenntnis bisher über das Stadium der Hypothese nicht hinausgelangt. Mit Sicherheit ist anzunehmen, daß einerseits der Hauptsitz der Krampfanfälle die motorische Hirnrinde ist; dafür spricht das Fortbleiben der Anfälle nach Exstirpation der betreffenden Rindenbezirke. Andererseits dürfte die tonische Komponente des epileptischen Krampfes in den Hirnstamm zu verlegen sein.

Hinsichtlich der **Diagnose** ist vorauszuschicken, daß jeder epileptische Anfall zunächst nur als Symptom aufzufassen ist und daß stets die Frage erörtert werden muß, ob es sich um die genuine Epilepsie oder um eine ein anderes Grundleiden begleitende symptomatische Epilepsie handelt. Die großen epileptischen Anfälle kommen bei den verschiedensten Gehirnleiden sowie bei manchen Intoxikationen vor. Man beobachtet sie bei progressiver Paralyse, bei Urämie, bei Eklampsie der Kinder sowie der Graviden, bei organischen Herdläsionen wie bei Hirntumor, Hirnabsceß, Gehirnmembolie, Meningitis; zu den Vergiftungen gehören die Kohlenoxyd- und die Fleischvergiftung. In der Regel ermöglicht die genauere Untersuchung, insbesondere einerseits der Befund von Herdsymptomen, andererseits der Nachweis einer der genannten Grundkrankheiten die Entscheidung. Schwierig kann sie z. B. bei Gehirnleiden werden, wenn keine Anzeichen eines lokalen Herdes zu konstatieren sind. Epilepsie, die erst nach dem 40. Jahre auftritt, die sog. Spätepilepsie, beruht häufig auf Lues, Alkoholismus, Arteriosklerose oder Bleivergiftung (Encephalopathia saturnina) und ist daher nicht der genuine Epilepsie zuzurechnen.

Andererseits ist zu berücksichtigen, daß auch die Anfälle der genuine Epilepsie bisweilen das Bild der Jacksonschen Epilepsie darbieten. Im Gegensatz



zum großen epileptischen Anfall, der in einer plötzlich über die ganze Hirnrinde sich ausbreitenden Reizung besteht, handelt es sich hier, wie früher beschrieben, um klonische von Muskelgruppe zu Muskelgruppe fortschreitende Zuckungen, die schließlich evtl. aber auch in allgemeine Krämpfe übergehen. Die Jacksonschen Anfälle schließen daher eine genuine Epilepsie nicht mit Sicherheit aus.

Von der größten praktischen Bedeutung ist die Unterscheidung des großen epileptischen Anfalls von ähnlich aussehenden Anfällen bei Hysterie, die bei oberflächlicher Beobachtung mit der Epilepsie öfter verwechselt wird. Sichere Unterscheidungsmerkmale, die für Epilepsie sprechen, sind die im Anfall vorhandene Reaktionslosigkeit der Pupille, der brutale Charakter des epileptischen Anfalls, der sich ohne Rücksicht auf Schutz des Körpers vor Verwundungen abspielt und oft Verletzungen, speziell Zungenbiß zur Folge hat, die bei Hysterikern nicht vorkommen, weiter unwillkürlicher Harn- und Stuhlverlust sowie das Vorkommen von organischen Symptomen wie speziell des Babinski-Phänomens unmittelbar nach dem Anfall. Auch das gesamte Gebaren der Kranken vor dem Anfall und während desselben, das theatralische Benehmen der Hysterischen, die ihre Anfälle möglichst in Gegenwart von Zeugen produzieren, auf der anderen Seite die völlige Amnesie sowie die Benommenheit nach dem echten epileptischen Anfall sind weitere Unterscheidungsmerkmale.

**Therapie der Epilepsie:** Das souveräne Mittel gegen die genuine Epilepsie ist das Brom; mit seiner Hilfe gelingt es bei konsequenter und rationeller Anwendung oft ausgezeichnete Erfolge zu erzielen. Die Wirksamkeit der Bromtherapie wird durch Verabreichung einer NaCl-armen Kost gesteigert. Von den Bromalkalien gilt das Bromkalium als besonders wirksam; man wendet es allein oder zusammen mit Natrium- und Ammoniumbromat, z. B. in der Form des Erlensmeyer'schen Gemisches (KBr und NaBr  $\bar{a}a$  2, NH<sub>4</sub>Br 1 Teil) an. Man beginnt mit 2,0 g Bromsalz pro die, steigert langsam, bis die Anfälle verschwinden (bis etwa 6,0 pro die). Die Notwendigkeit höherer Dosen erfordert Anstaltsbehandlung.

Bei Status epilepticus werden Dosen bis 15,0 pro die gegeben. Wichtig ist die Fortsetzung der Behandlung noch mehrere Monate nach Aufhören der Anfälle in Dosen von 2—3,0 pro die. Bei Epilepsia nocturna wird die ganze Tagesdosis vor dem Schlafengehen verabreicht. Epileptiker zeigen eine auffallende Toleranz gegenüber dem Brom. Ein Nachteil der Bromtherapie ist die namentlich bei NaCl-armer Kost auftretende Bromakne, gegen die sich Kochsalzgaben per os sowie lokale Salzwasserkompressen bewähren.

Günstig wirkt weiter das Luminal (zweimal täglich 0,1—0,15 bei Erwachsenen).

Ferner erzielt bei manchen hartnäckigen Fällen die Kombination von Brom mit Opium in der Form der Flechsigschen Opiumbromkur bei Anstaltsbehandlung Erfolge. Man beginnt z. B. nach Kellner mit dreimal täglich 0,05, steigert jeden zweiten Tag um 0,01, so daß die Kranken am 50. Tag dreimal 0,29 erhalten, und geht dann unter plötzlichem Fortlassen des Opiums zu Brom 4,0 pro die bis auf 9,0 pro die steigend über. Die Kur gilt indessen als nicht ungefährlich.

In allen Fällen sind während der Behandlung Zahl und Art der Anfälle seitens der Umgebung sorgfältig zu registrieren. Im Anfall selbst ist der Kranke nach Möglichkeit vor Verletzungen zu schützen;

zur Verhütung von Bißverletzungen der Zunge schiebe man einen Knebel zwischen die Zähne. Die operative Behandlung der genuinen Epilepsie und zwar sowohl die Trepanation und Anlegung eines sog. druckentlastenden Ventils am Schädel als auch die speziell bei Jacksonschen Anfällen ausgeführte Excision einzelner Teile der Rinde der vorderen Zentralwindung hatte bisher wenig ermutigende Erfolge und nimmt andererseits in der letzteren Form oft erhebliche Motilitätsdefekte in Kauf.

In der Lebensweise der Epileptiker steht striktes Verbot des Alkohols und zwar in jeglicher Form an oberster Stelle. Empfehlenswert ist lactovegetabilische Kost; Schonung in körperlicher und geistiger Beziehung. Schwere Fälle mit Neigung zu kriminellen Handlungen sowie mit Verblödung gehören in dauernde Anstaltsbehandlung. — Die Behandlung der symptomatischen Epilepsie richtet sich gegen das Grundleiden (Lues, Blei usw.). Bei lokal umschriebenen Krankheitsprozessen im Schädel wie bei Meningealadhäsionen nach Traumen sowie bei Exostosen, Tumoren, Cysten usw. kann die operative Entfernung derselben zur definitiven Heilung der Epilepsie führen.

### Die Krankheiten des extrapyramidalen Systems.

Diese zu den sog. Dyskinesien gehörige Krankheitsgruppe, die noch vor kurzem zu den Neurosen ohne bekannte anatomische Grundlage gerechnet wurde, zeigt als gemeinsame Symptome die S. 568 beschriebenen Störungen, bei denen die Funktionen der Pyramidenbahn intakt bleiben, so daß die Ausführbarkeit willkürlicher Muskelkontraktionen erhalten ist. Dagegen ist der Muskeltonus sowie die Koordination der Bewegungen, insbesondere hinsichtlich der Beteiligung der bei jeder Bewegung innervierten Agonisten und Antagonisten gestört. Als anatomischer Sitz des extrapyramidalen Symptomenkomplexes wird das Corpus striatum angesehen, wobei man die verschiedenen hierher gehörenden Krankheitsbilder aus der jeweils vorhandenen Reizung bzw. Ausschaltung bestimmter Teile resp. aus der verschiedenen Lokalisation des Prozesses in den einzelnen Regionen des Striatums erklärt. Zu der Krankheitsgruppe werden vor allem die Paralysis agitans, die Chorea und die sog. Wilsonsche Krankheit gerechnet.

#### Paralysis agitans.

Die Paralysis agitans oder Parkinsonsche Krankheit (Schüttellähmung) ist ein chronisches Leiden, dessen Ätiologie bisher unbekannt ist und das ältere Individuen beiderlei Geschlechts jenseits der 40er Jahre befällt. Unter schleichendem Beginn treten allmählich immer deutlicher gewisse charakteristische Symptome hervor, die vor allem sowohl in einer besonderen Art von Zittern als auch in einer eigentümlichen Steifigkeit der Muskeln bestehen.

Das Zittern, das sich zuerst in den Händen, zunächst meist rechts zeigt, ist ein rhythmischer langsamer Tremor, der auch in der Ruhe

vorhanden ist und an den Fingern der Ausführung komplizierter Bewegungen, wie etwa beim Pillendrehen, Spinnen oder Münzenzählen ähnelt. Oft hört das Zittern in einem Gliede für kurze Zeit auf, um alsbald in einem anderen zu beginnen. Bei Ausführung einer willkürlichen Bewegung kann das Zittern oft für kurze Zeit unterdrückt werden, wogegen seelische Erregungen es verstärken. Im Schlafe hört es auf. Später beteiligen sich auch die Muskeln des Rumpfes, des Gesichtes und der unteren Extremitäten an dem Tremor.

Ein weiteres Merkmal der Krankheit ist die allgemeine Muskelrigidität, die sich schon aus der charakteristischen Haltung der Kranken und der denselben eigentümlichen Physiognomie erkennen läßt. Die grobe Kraft der Muskeln bleibt intakt; dagegen wird die rasche Ausführung aller willkürlichen Bewegungen im Verlaufe der Krankheit infolge der Muskelsteifigkeit immer schwieriger. Das zeigt sich vor allem an den Bewegungen des Rumpfes. Die Kranken halten in der Regel Kopf und Rumpf etwas vornübergebeugt; die in den Ellbogen gebeugten Arme liegen dem Rumpf an, die Finger sind in den Metacarpophalangealgelenken gebeugt, die Daumen oft eingeschlagen, die Knie sind leicht flektiert. Das Gesicht zeigt die früher erwähnte maskenartige Starre sowie im Zusammenhang damit Seltenheit des Lidschlages.

Aus der Muskelrigidität erklärt sich auch die für die Krankheit charakteristische eigentümliche Gangart, bei der die Kranken, wenn sie sich zu gehen anschicken, zunächst die ersten Schritte langsam, quasi feierlich ausführen, sehr bald aber infolge des Vornüberlegens des Rumpfes in ein immer mehr beschleunigtes Tempo mit kleinen trippelnden Schritten geraten, indem sie ihrem Schwerpunkt gewissermaßen nachlaufen, bis sie durch ein ihnen im Wege stehendes Hindernis wieder zum Stehen gebracht werden (Propulsion). Das gleiche beobachtet man beim Rückwärtsgang (Retropulsion). Stürzen solche Kranke hin, so können sie sich oft nicht von selbst aufrichten; im Bette vermögen sie schließlich nicht mehr ohne fremde Hilfe ihre Lage zu verändern, während andererseits nur eine geringe Unterstützung genügt (infolge der erhaltenen Muskelkraft), um ihnen einen Lagewechsel zu ermöglichen. So geraten die Kranken allmählich in einen Zustand völliger Hilflosigkeit.

Intelligenz, Sensibilität, Reflexe, Pupille, Blasen- und Mastdarm-entleerung bleiben völlig normal. Dagegen zeigen die Kranken häufig vasomotorische Störungen, namentlich starkes Hitzegefühl, ferner Tränen- und Speichelfluß sowie meist starke Hyperhidrosis. Beachtenswert ist schließlich, daß es Fälle gibt, in denen nur die Muskelsteifigkeit, nicht aber das Zittern vorhanden ist, sog. *Paralysis agitans sine agitatione*. Bisweilen beginnt das Leiden halbseitig.

Der Verlauf der Krankheit ist äußerst chronisch und erstreckt sich oft über Dezennien. Stets zeigt sie Neigung zur Progression, wobei die Kranken in einen ständiger Wartung und Pflege bedürftigen Zustand geraten, dauernd ans Bett gefesselt sind und schließlich an Marasmus oder einer interkurrenten Erkrankung sterben.

Die Diagnose ist bei typischen Fällen leicht zu stellen. Bei den Fällen ohne Zittern führen die Rigidität der Muskeln und die Starre des

Gesichtes auf die richtige Fährte. Differentialdiagnostisch kann evtl. die Hysterie in Frage kommen, die sich jedoch bei näherer Betrachtung dem Bilde der Parkinsonschen Krankheit als völlig wesensfremd erweist.

Pathologisch-anatomisch wurden Degenerationserscheinungen des Linsenkerns, speziell im Bereich des Putamens festgestellt.

Die Therapie ist eine rein symptomatische. Mitunter gelingt es, mittels des Scopolamin. hydrobrom. (Hyoscin) und zwar zweimal täglich 0,0002—0,0004 oder des Duboisin. sulfur. 0,0006—0,0012 pro die subcutan sowohl die Rigidität wie das Zittern zu bessern; doch lassen sich die Mittel, die sehr starke Gifte sind, immer nur kurze Zeit anwenden. Stets ist sorgfältige Pflege erforderlich, zu der in späteren Stadien speziell auch häufiger Lagewechsel der bettlägerigen Kranken gehört, zumal für sie das Verharren während längerer Zeit in der gleichen Stellung infolge starker Unruhe sehr quälend ist.

### Chorea.

Unter Chorea versteht man allgemein eine besondere Form motorischer Reizerscheinungen, die als symptomatische Begleiterscheinung verschiedener organischer Gehirnleiden auftreten. Sie ist charakterisiert durch eigentümliche unwillkürliche, ungeordnete und nicht rhythmische rasche Bewegungen, die abwechselnd in allen Körperteilen erfolgen, Extremitäten, Rumpf und Gesichtsmuskulatur befallen und einen zwar koordinierten, aber zwecklosen Charakter tragen. So entstehen an den Armen und Beinen bizarre Schlenkerbewegungen, beim Gehen Hüpf- und Tanzbewegungen, im Gesicht fratzenhaftes Grimassieren. Im Schlaf schwinden die Reizerscheinungen, während Affekte sie steigern. Neben dem symptomatischen Vorkommen choreatischer Reizerscheinungen bei organischen Gehirnläsionen z. B. als Hemichorea posthemiplegica kommt die Chorea auch als selbständige Krankheit vor.

Die Chorea minor oder der Veitstanz ist eine der häufigsten infektiösen Erkrankungen des Nervensystems. Sie befällt vor allem das spätere Kindesalter zwischen dem 6. und 15. Lebensjahr, hauptsächlich Mädchen, seltener Erwachsene, unter ihnen vor allem gravide (erstgebärende) Frauen, namentlich in der Zeit des 3.—5. Monats (Chorea gravidarum). Der infektiöse Charakter der Erkrankung ergibt sich aus ihrem häufigen Zusammentreffen mit der akuten Polyarthritis und der akuten (verrukösen) Endocarditis. Möglicherweise handelt es sich um einen allen drei Erkrankungen gemeinsamen Erreger. Anatomisch findet man entzündliche Veränderungen im Corpus striatum (Putamen und Nucleus caudatus).

Das Krankheitsbild wird öfter durch Störungen des Allgemeinbefindens wie Appetitmangel, Abgeschlagenheit, Gliederziehen, Gemütsverstimmung eingeleitet. Die eigentlichen choreatischen Zuckungen entwickeln sich allmählich; sie beginnen meist in den oberen Extremitäten und zeigen oft zunächst halbseitige Lokalisation. Bei schwerem Verlauf werden auch die unteren Extremitäten sowie der Rumpf in die Zuckungen miteinbezogen, sodaß Stehen und Gehen erschwert und

schließlich unmöglich wird. Die Kranken befinden sich in dauernder Unruhe, schneiden Gesichter, schnalzen mit der Zunge, werfen sich umher und zeigen sakkadierte Sprache; in schweren Fällen ist auch die Nahrungsaufnahme und der Schlaf schwer beeinträchtigt. Jegliche psychische Erregung, sogar schon das Gefühl der Kranken, beobachtet zu sein, verstärkt die motorische Unruhe. Psychisch besteht stets erhöhte Reizbarkeit, dagegen verhält sich der Intellekt normal. In der Regel ist auch der Muskeltonus herabgesetzt, so daß die Muskeln einen eigentümlich schlaffen Eindruck machen. Bemerkenswert ist das Fehlen von Ermüdungsgefühl trotz der ständigen Unruhe. Pupillen, Reflexe und Sensibilität verhalten sich normal. Die sog. Chorea mollis zeichnet sich durch besonders stark ausgeprägte Hypotonie der Muskeln aus, so daß fälschlich der Eindruck von Paresen entstehen kann. Fieber braucht nicht vorhanden zu sein, doch kommt es dort vor, wo als Komplikation gleichzeitig eine frische Endocarditis besteht.

Die Dauer der Krankheit beträgt oft viele Wochen; leichtere Fälle gehen oft nach einem Monat in Heilung über, schwere Fälle können ein Jahr und länger dauern. Die Krankheit hat außerdem eine ausgesprochene Neigung zu Rezidiven, die oft nach scheinbar völliger Ausheilung auftreten.

Die Prognose ist in der Mehrzahl der Fälle günstig, was auch für die Graviditäts-Chorea gilt. Schwere Fälle können infolge zunehmender Erschöpfung und Störung der Nahrungsaufnahme bzw. durch Endocarditis letal enden (ca. 3% aller Fälle). Einzelne Fälle behalten trotz Ausheilung während des weiteren Lebens eine Neigung zu Zuckungen, die sich bei psychischer Erregung verstärken.

Differentialdiagnostisch kommt hauptsächlich Hysterie in Frage, bei der jedoch die Bewegungen meist einen etwas mehr systematischen Charakter mit einer gewissen Rhythmik aufweisen oder dem Typus der Ticbewegungen entsprechen. Die symptomatische Chorea bei anderen Gehirnkrankheiten (insbesondere bei cerebraler Kinderlähmung) wird aus den gleichzeitig bestehenden anderen Symptomen, speziell den Lähmungen erkannt. Huntingtonsche Chorea s. unten.

Therapie: Schonung und Ruhe auch bei ganz leichten Fällen (Fernbleiben vom Schulbesuch); bei schweren Fällen mit heftigen Jac-tationen Bettruhe unter Anwendung auch seitlich gut gepolsterter Betten. Bisweilen bewährt sich völlige Verdunkelung des Zimmers. Medikamentös sehr wirksam ist das Arsen, am besten als Fowlersche Lösung (aa mit Aq. menth. pip.). Unterstützend wirkt die Verabreichung von Brom. Salicylpräparate haben dagegen keinen Erfolg. In schweren Fällen Chloralhydrat (0,1—0,3 bei Kindern, 0,5—1,0 bei Erwachsenen), evtl. als Klysmata.

Die **chronische progressive hereditäre** oder **Huntingtonsche Chorea** ist von der Chorea minor prinzipiell verschieden. Sie befällt in der Hauptsache Erwachsene zwischen dem 20. und 60. Jahr und zeichnet sich durch ausgesprochene Vererbbarkeit aus. Das stets ungünstig verlaufende Leiden ist außer durch choreatische Bewegungen ähnlich denen der Chorea minor durch zunehmende geistige Schwäche bis zur Demenz charakterisiert. Die unheilbare Krankheit endet schließlich letal. Eine wirksame Therapie ist bisher nicht bekannt.

Die **Wilsonsche Krankheit** oder progressive familiäre Linsenkerndegeneration befällt jugendliche Individuen, oft Geschwister, und besteht in einer Kombination von Muskelsteifigkeit im Gebiete der gesamten Muskulatur mit einem eigentümlichen Wackeltremor, der durch Bewegungen eine Verstärkung erfährt. Die Rigidität führt teils wie bei Paralysis agitans zu Bewegungsarmut und maskenartiger Starre des Gesichtes, teils zu eigentümlichen Stellungsfixationen der Glieder, welche in der einmal angenommenen Haltung längere Zeit verharren. Auch besteht eine zunehmende Erschwerung des Sprechens und Schluckens. Pyramidensymptome wie Spasmen sowie das Babinskische Zeichen fehlen. Dagegen entwickelt sich häufig eine psychische Alteration und zwar teils abnorme Erregbarkeit, teils Abnahme der geistigen Fähigkeiten. Man findet außerdem regelmäßig bei der Krankheit eine grobhöckerige Lebercirrhose sowie mitunter einen eigentümlichen grünlichen Pigmentring am Auge in den äußeren Bezirken der Hornhaut (Fleischerscher Cornealring). Die beiden letztgenannten Veränderungen bilden einen wertvollen diagnostischen Hinweis für die Erkennung der Krankheit. Das Leiden, das der sog. Westphal-Strümpellschen Pseudosklerose nahesteht bzw. mit ihr übereinstimmt, beruht auf symmetrischer Erkrankung des Linsenkerne und ist unheilbar.

### Hydrocephalus.

Unter Hydrocephalus oder Wasserkopf versteht man die chronische, abnorm vermehrte Ansammlung von Cerebrospinalflüssigkeit im Schädelinnern und die dadurch bewirkte Schädigung des Gehirns.

Findet die Flüssigkeitsansammlung im Subarachnoidealraum statt, so spricht man von Hydrocephalus externus. Er stellt sich mitunter als Hydrocephalus ex vacuo bei Atrophie oder Mißbildung des Gehirns ein und hat keine praktische Bedeutung.

Wichtig ist dagegen der Hydrocephalus internus mit Flüssigkeitsvermehrung in den Seitenventrikeln. Er kann sekundär infolge von Kompression der Vena magna Galeni durch Tumoren oder nach entzündlichen Veränderungen, namentlich im Gefolge von Meningitis auftreten. Dieser sekundäre Hydrocephalus entsteht im allgemeinen akut. Einen chronischen Charakter hat dagegen der idiopathische angeborene Hydrocephalus der kleinen Kinder, der sich nicht selten auf dem Boden der hereditären Lues entwickelt, dessen Entstehungsmechanismus im einzelnen aber nicht geklärt ist. Er bildet evtl. ein Geburtshindernis.

Der infantile Hydrocephalus, der mit einer starken Erweiterung der Gehirnventrikel einhergeht, führt infolge der Nachgiebigkeit der kindlichen Schädelkapsel zu deren oft ganz enormen Ausdehnung, so daß in extremen Fällen der Schädel den Umfang desjenigen eines Erwachsenen erreichen kann, während das Gesicht klein bleibt; hierdurch entsteht ein äußerst groteskes Bild. Unter dem starken Druck atrophiert die Hirnsubstanz und bildet schließlich in manchen Fällen nur noch eine mit Flüssigkeit gefüllte dünnwandige Blase. Häufig zeigt das Leiden progredienten Charakter, indem die Vergrößerung entweder stetig fortschreitet oder schubweise zunimmt; in anderen Fällen wird sie nach einiger Zeit stationär. Die Kinder bleiben von vornherein geistig zurück und zeigen sogar in hochgradigen Fällen ausgesprochene Imbecillität. Häufig bestehen Spasmen mit Erhöhung der Sehnenreflexe, zum Teil zusammen mit Paresen, ferner allgemeine Konvulsionen. Bisweilen ist das Bild der Little'schen Krankheit (vgl.

S. 180) vorhanden. Sensibilitätsstörungen fehlen. Nicht selten sind namentlich auch Anomalien seitens der Augen zu finden. Die Bulbi sind nach unten gedrängt; das obere Lid erscheint verkürzt, so daß die Augen nicht vollkommen geschlossen werden können. Oft bestehen Trägheit oder Reaktionslosigkeit der Pupillen, Stauungspapille, Opticusatrophie, Nystagmus und Strabismus. Bisweilen treten anfallsweise Erbrechen sowie epileptische Anfälle auf, auch dürften, wenn man nach den Schmerzäußerungen der Kinder urteilt, zeitweise heftige Kopfschmerzen bestehen. Oft schreitet das Leiden unaufhaltsam fort und ein großer Teil der Fälle endet letal entweder in den ersten Monaten oder innerhalb der ersten drei Lebensjahre. In vereinzelt Fällen kann Spontanheilung durch Ruptur des Hydrocephalus und Abfließen von Cerebrospinalflüssigkeit insbesondere durch die Nase erfolgen. Leichtere Formen hinterlassen, wenn sie stationär werden, in der Regel eine gewisse geistige Schwäche und Minderwertigkeit; nur ausnahmsweise kommt es zu normaler Entwicklung der Intelligenz.

Der erworbene i. e. entzündliche Hydrocephalus nach Meningitis bewirkt bei kleinen Kindern bis zum zweiten Jahre ebenfalls wachsende Zunahme des Schädelumfanges, die in späteren Jahren infolge der Verknöcherung des Schädels nicht mehr in gleichem Maße zur Geltung kommt. Dagegen treten hier um so heftiger die Symptome des Hirndrucks mit intensiven Kopfschmerzen, Erbrechen, Schwindel, Ohrensausen, Benommenheit, Opticusatrophie, epileptischen Krämpfen sowie Spasmen der unteren Extremitäten auf.

Die Diagnose des kindlichen Hydrocephalus ist in der Regel schon aus dem bloßen Aspekt zu stellen. In weniger ausgeprägten Fällen kommt auch die auf Rachitis beruhende Veränderung der Schädelform in Frage, während andererseits Intelligenzdefekte sowie Spasmen und Paresen auch andere kongenitale Ursachen haben können. In jedem Fall ist die WaR. anzustellen. Der Hydrocephalus des Erwachsenen ist einmal aus der Anamnese (vorausgegangene Meningitis) sowie aus dem Befunde der Lumbalpunktion (seröser nichttrichteriger Liquor, Steigerung des Lumbaldrucks) zu erschließen. Mitunter kann die Differentialdiagnose gegenüber einem Hirntumor außerordentlich schwierig sein.

Therapeutisch kommt vor allem die wiederholte Lumbalpunktion in Frage, die weniger gefährlich als die ebenfalls angewendete Punktion der Hirnventrikel ist, ferner als speziell-chirurgische Maßnahme die sog. Dauerdrainage der Ventrikel, d. h. die Ableitung der Flüssigkeit in einen der großen venösen Hirnblutleiter, sowie ferner der sog. Balkenstich, der einen Abfluß der Ventrikelflüssigkeit in den Subarachnoidealraum bezweckt.

Beim kindlichen Hydrocephalus werden außerdem äußerlich auf den Schädel applizierte Reize als ableitende Maßregeln empfohlen, z. B. Pinseln mit Jodtinktur, Einreibung mit Unguent. cinereum, evtl. sogar mit Unguent. tartari stibiati. Ferner soll in jedem Fall (auch bei negativer WaR.) eine Hg-Kur durchgeführt werden, die man mit Jodkali-Verabreichung kombiniert.

### Hirnsinusthrombose.

Thrombenbildung in den venösen Blutleitern der Dura (Sinus transversus, sagitt. superior, cavernosus und petrosus) kommt einmal autoch-

thon bei dekrepiden Individuen, speziell bei Pädatrie der Säuglinge als marantische Sinusthrombose (hauptsächlich im Sinus sagitt. sup.) sowie bei manchen Blutkrankheiten, namentlich bei schwerer Chlorose (Sinus transvers.), ferner im Verlauf mancher akuter Infektionskrankheiten, insbesondere bei Typhus vor. Im Gegensatz hierzu entwickelt sich die sog. sekundäre oder infektiöse Sinusthrombose im Anschluß an infektiös-eitrige Prozesse in der Nachbarschaft (entzündliche Thrombose). Die häufigste Ursache sind hier eitrige Otitiden bzw. eine von ihnen ausgehende Caries des Felsenbeins. Die Thrombose lokalisiert sich in diesen Fällen hauptsächlich im Sinus sigmoideus, im Bulbus jugularis und Sinus cavernosus. Auch eitrige Erkrankungen im Bereich des Gesichtes und des übrigen Schädels wie Furunkel, Erysipel usw. können gelegentlich durch Fortschreiten einer Thrombophlebitis zu eitriger Sinusthrombose führen. An die letztere schließt sich häufig eitrige Meningitis an.

Das Krankheitsbild der Sinusthrombose gestaltet sich verschieden, je nachdem es sich um eine marantische oder eine entzündliche Thrombose handelt. Abgesehen von Fällen, wo die Gerinnelbildung klinisch latent bleibt und nur als zufälliger Sektionsbefund entdeckt wird, macht die Sinusthrombose in der Regel sowohl allgemeine cerebrale Erscheinungen wie auch häufig charakteristische, durch die Zirkulationsstörung hervorgerufene Lokalsymptome. Zu ersteren gehören heftige Kopfschmerzen, Benommenheit bis zum Koma, Nackensteifigkeit, Strabismus, Nystagmus, Trismus, klonische Krämpfe der Extremitäten. Symptome, die sich aus der lokalen Stauung erklären, sind u. a. Schwellung der äußeren Schädelvenen, Schlingelung der Venen des Augenhintergrundes, Lidödem, Protrusion der Bulbi, Nasenbluten und speziell bei otitischer Sinusthrombose Ödem der Warzenfortsatzgegend. Der infektiöse Charakter der Sinusthrombose verrät sich durch intermittierendes Fieber mit Frösten und die sonstigen Symptome der Pyämie.

Die Therapie kommt in der Hauptsache nur bei den otitischen Sinusthrombosen in Frage und besteht hier in möglichst frühzeitiger operativer Eröffnung des Sinus evtl. mit Unterbindung der Vena jugularis. Die übrigen Fälle verlaufen in der Regel letal.

### Meningitis purulenta.

Akute Entzündungen der Hirnhäute betreffen in der Regel nicht die Dura, sondern die weichen Hirnhäute (Leptomeningitis). Abgesehen von der anscheinend primär entstehenden epidemischen Meningitis cerebrospinalis (vgl. S. 83) ist die überwiegende Mehrzahl der Fälle von eitriger Meningitis eine sekundäre Erkrankung, die sich entweder an infektiöse Prozesse in der Nachbarschaft anschließt, ohne daß es dabei zu einer Kontinuitätstrennung des Schädels oder der Dura zu kommen braucht, oder sie entsteht auf metastatischem Wege. Zu der ersten Gruppe gehören vor allem eitrige Erkrankungen des Ohres bzw. daran anschließend des Felsenbeins und des Warzenfortsatzes, ferner solche der Nase und der Nasennebenhöhlen sowie infizierte



Schädelwunden (auch Schädelbasisbrüche), Erysipel des Gesichtes und der Kopfhaut. Zum Teil erfolgt der Übergang der Infektionserreger auf die Meningen auf dem Wege einer Thrombophlebitis. Auch bei Hirnabsceß stellt sich zum Schluß infolge des Durchbruchs des Eiters oft Meningitis ein. Metastatische Verschleppung von infektiösem Material aus entfernten Krankheitsherden in die Meningen kommt am häufigsten bei Tuberkulose als Symptom der Miliartuberkulose (vgl. S. 101), ferner nach croupöser Pneumonie (Pneumococcen), weiter auch bei Scharlach, Typhus, Pleuraempyem, Endocarditis, Polyarthrits sowie bei Sepsis vor.

Pathologisch-anatomisch ist in der Mehrzahl der Fälle hauptsächlich die Konvexität des Gehirns (Konvexitätsmeningitis) erkrankt im Gegensatz zu der vornehmlich an der Hirnbasis lokalisierten tuberkulösen Meningitis. In wechselndem Maße sind auch die Meningen des Rückenmarks beteiligt. Es besteht Hyperämie der Hirn- und Rückenmarkshäute, und der Subarachnoidealraum enthält eitriges Exsudat. Auch ins Innere der Gehirn- und Rückenmarksubstanz pflegt der Entzündungsprozeß längs der Gefäße einzudringen. Die Gehirnmasse ist ödematös, bisweilen von kleinen Blutungen durchsetzt. Das entzündliche Exsudat übt einen erheblichen Druck auf das Gehirn aus, dessen Windungen abgeplattet sind. Auch kommt es seitens des Plexus chorioideus zu vermehrter Flüssigkeitsabsonderung in die Ventrikel mit konsekutivem Hydrocephalus internus. Die Folge dieser Veränderungen ist eine beträchtliche Erhöhung des intrakraniellen und spinalen Druckes.

Das Krankheitsbild der sekundären Meningitis beginnt im Gegensatz zu der epidemischen Form häufig allmählich und schleichend. Oft verbergen sich die Anfangssymptome hinter denen des bestehenden Grundleidens. Die ersten Zeichen sind meist ein an Heftigkeit zunehmender Kopfschmerz, Erbrechen, alsdann häufig Benommenheit, oft verbunden mit Delirien. Fieber pflegt nur in ganz seltenen Fällen zu fehlen. In der Regel ist es hoch, oft bestehen Frostanfälle. In manchen Fällen von mehr chronischem Charakter zeigt das Fieber einen eigentümlich intermittierenden Verlauf mit fieberfreien Perioden. Der Puls ist bei Meningitis nicht selten im Verhältnis zur Temperatur nur wenig gesteigert (Vagusreizung).

Im übrigen stellen sich vor allem Reizsymptome ein, insbesondere solche, die sich aus der Reizung der Rückenmarkswurzeln erklären, die die entzündeten Meningen passieren. Dazu gehören die reflektorische Nackenstarre, die sich im Widerstande bei passiven Bewegungen des Kopfes nach vorn und seitlich äußert, ferner der als Opisthotonus bezeichnete Krampf der Rückenmuskeln sowie das Kernigsche Phänomen, d. h. Schmerzen und Widerstand bei passiver Streckung des Kniegelenks, wenn das Hüftgelenk gebeugt ist, sowie Beugung der Kniegelenke beim Aufsetzen des Kranken; endlich gehört die kahnförmige Einziehung der Bauchmuskeln hierher. Die aus der Beteiligung der Hirnbasis resultierenden Hirnnervensymptome wurden S. 83 und 101 beschrieben. Am häufigsten tritt zuerst Abducenslähmung ein. Doch werden bei der eitrigen Meningitis die basalen Symptome oft vermißt. Die Beteiligung der Konvexität verrät sich ferner teils durch Reizerscheinungen wie Zuckungen oder epileptiforme Krämpfe, teils später durch Lähmungen in Form von Mono- oder Hemiplegien. Nicht selten

sind auch einzelne Pyramidenzeichen, speziell ist der Babinski zeitweise nachweisbar. Eine in späteren Stadien auftretende Vaguslähmung äußert sich in der auf die anfängliche Bradycardie folgenden Pulsbeschleunigung.

Von größter diagnostischer Bedeutung ist die Untersuchung der Lumbalflüssigkeit. Stets besteht eine zum Teil sehr beträchtliche Erhöhung des Lumbaldrucks; der Liquor ist trübe, oft rein eitrig und enthält zahlreiche Leukocyten sowie meist in größerer Menge die betreffenden Erreger (Staphylococcen, Pneumococcen, Streptococcen, Influenzabacillen, Typhusbacillen).

Der Verlauf der Krankheit ist sehr häufig tödlich. Besonders ungünstig sind die Meningitiden nach Durchbruch von Hirnabscessen, sowie bei Sepsis, weiter im Verlauf der Pneumonie, ferner allgemein alle Formen mit Streptococcen im Lumbalpunktat. Die Krankheitsdauer beträgt oft nur wenige Tage, meist nicht länger als  $1\frac{1}{2}$  Wochen. Nach Ausheilung einer Meningitis können als dauernde Residuen ein Hydrocephalus (vgl. S. 601), psychische Schädigungen sowie Blindheit oder Taubheit zurückbleiben (vgl. S. 83).

Die Diagnose ist aus dem beschriebenen charakteristischen Symptomenkomplex, speziell der Nackenstarre, dem Opisthotonus und dem Kernigschen Zeichen zu stellen. Der Charakter der Krankheit im einzelnen ergibt sich, abgesehen von dem gesamten Krankheitsbild und der Berücksichtigung der Ätiologie vor allem aus dem Befunde der Lumbalpunktion. Diese entscheidet auch, ob es sich um echte eitrige oder tuberkulöse Meningitis oder nur um sog. Meningismus handelt, wie er häufig im Verlauf akuter Infektionskrankheiten vorkommt, oder ob endlich eine sog. Meningitis serosa vorliegt. Näheres hierüber S. 85. Speziell im Gefolge der chronischen Otitis media kann sich eine benigne Meningitis serosa entwickeln, die fieberlos unter den Erscheinungen von Benommenheit, Brechreiz, Stauungspapille, halbseitigen oder allgemeinen epileptiformen Krämpfen verläuft, so daß ein dem Hirntumor ähnliches Bild entsteht, während Nackenstarre und das Kernigsche Phänomen oft weniger deutlich sind. Die Erscheinungen bessern sich meist auf wiederholte Lumbalpunktionen bzw. nach dekompressiver Trepanation.

Die Therapie der Meningitis besteht vor allem zwecks Druckentlastung in täglich oder jeden zweiten Tag wiederholten Lumbalpunktionen, bei denen jedesmal langsam Liquor bis zum normalen Druck von 120 bis 150 mm abgelassen wird. Außerdem sorgfältige allgemeine Pflege. Gegen die heftigen Schmerzen und Aufregungszustände Sedativa wie Brom sowie Morphinum.

### **Pachymeningitis haemorrhagica interna (Hämatom der Dura mater).**

Während Blutungen zwischen Dura und Schädelknochen fast ausschließlich traumatischen Ursprungs sind, wird die Pachymeningitis haemorrhagica interna, d. h. das Auftreten eines abgekapselten Blutergusses an der Innenfläche der Dura auf einen entzündlichen Prozeß der Dura zurückgeführt, an den sich sekundär die Entwicklung eines Hämatoms anschließt. Die Entzündung führt zur Bildung gefäßreicher

Granulationen, die erst ihrerseits Anlaß zu Blutungen geben. Die Erkrankung kommt hauptsächlich bei Alkoholismus sowie ferner bei Lues vor. Als auslösendes Moment kommen auch bisweilen Traumen in Betracht. Als zufälligen Sektionsbefund findet man die Pachymeningitis bei hämorrhagischen Diathesen, bei Nierenleiden, bei Herz- und Lungenleiden sowie bei progressiver Paralyse. Häufiger wird das männliche Geschlecht befallen.

Der anatomische Befund besteht in flächenhaften, membranartigen Auflagerungen an der Innenfläche der Dura, die von Blutgerinnseln durchsetzt sind und zum Teil größere, abgekapselte Hämatome enthalten. Der Prädilektionsort der Erkrankung, die meist doppelseitig auftritt, ist die Gegend des Parietallappens.

**Krankheitsbild:** Abgesehen von den klinisch latenten Fällen ruft die Krankheit ein schweres cerebrales Bild hervor, das jedoch im einzelnen oft wenig typische Merkmale zeigt. Der meist plötzliche Beginn ähnelt häufig demjenigen eines gewöhnlichen apoplektischen Insultes. In manchen Fällen stellen sich zunächst heftige Kopfschmerzen, Erbrechen sowie Schwindelgefühl ein, denen verschiedenartige Herdsymptome folgen wie Hemiplegien, epileptiforme Krampfanfälle, Sprachstörungen, Déviation conjuguée. Meist entwickeln sich alsbald Bewußtseinsstörung bis zum tiefen Koma mit verlangsamtem Puls sowie Stauungspapille als Hirndrucksymptome. In anderen Fällen besteht nur Somnolenz, aus der der Kranke sich erwecken läßt, um bald wieder in tiefen Schlaf zu versinken. Das Lumbalpunktat ist in der Regel hämorrhagisch. Häufig verläuft die Krankheit in Schüben, indem auf Remissionsperioden erneute Verschlimmerungen folgen. Bei größeren Blutungen tritt in der Regel schließlich der Exitus ein.

Die Stellung einer exakten Diagnose ist häufig unmöglich, insbesondere die Unterscheidung gegenüber einer gewöhnlichen Hirnblutung. Auch die Meningitis sowie der Hirntumor sind differentialdiagnostisch in Erwägung zu ziehen. Wichtig ist die Anamnese (Alkohol) sowie die Berücksichtigung anderer Grundkrankheiten (Nierenleiden usw.).

Die Therapie ist die gleiche wie bei der Apoplexie. Neuerdings hat man wiederholt mit Erfolg die Neißersche Schädelpunktion mit daran anschließender Entleerung des Hämatoms angewendet.

### Migräne (Hemikranie).

Die Migräne ist ein selbständiges Leiden, das im wesentlichen durch Anfälle einer besonderen Form von Kopfschmerzen ausgezeichnet ist. Diese werden von verschiedenen charakteristischen Symptomen begleitet. Bezeichnend sind die mehr oder weniger langen, beschwerdefreien Intervalle zwischen den Schmerzanfällen, ferner die häufig vorhandene Halbseitigkeit der Schmerzen sowie die mit ihnen einhergehenden Störungen des Allgemeinbefindens.

Das Leiden zeigt eine gewisse Vorliebe für die höheren Gesellschaftsschichten und befällt das weibliche Geschlecht häufiger als das männliche. Oft ist hereditäre Belastung vorhanden. Der Beginn der Krankheit fällt fast immer in die Jugendjahre, häufig schon in die Pubertätszeit, mitunter sogar in die Kindheit. Nicht immer handelt es sich um nervöse Individuen. Mit dem höheren Alter, etwa um das 50. Jahr pflegt das Leiden zu schwinden.

**Krankheitsbild:** Der sog. Migräneanfall wird oft durch verschiedene äußere Anlässe hervorgerufen. Bei Frauen sind es am häufigsten die Menses; ferner kommen Überanstrengungen, Alkohol- und Tabakabusus, seelische Erregungen, Mangel an Schlaf (in manchen Fällen umgekehrt zu langer Schlaf), Verdauungsstörungen als auslösende Faktoren in Frage. In der Regel wird der Anfall durch gewisse charakteristische Prodromalerscheinungen eingeleitet, die dem Kranken das Herannahen der Migräne ankündigen. Sie bestehen teils in gesteigerter Reizbarkeit, Verstimmung, motorischer Unruhe, teils in Depression, stärkerer Müdigkeit und Abgeschlagenheit mit lebhaftem Gähnen, ferner in Schwindel, Flimmern vor den Augen, Ohrensausen, Harn-drang. Oft kann man den Patienten das Herannahen des Anfalles an ihrem blassen, angegriffenen Aussehen anmerken.

Der Anfall selbst, der häufig Vormittags beginnt, besteht in heftigen Kopfschmerzen, die in der Regel halbseitig (häufiger links) lokalisiert sind und zwar die Stirn-, Augen- und Schläfengegend bevorzugen. Mitunter sind auch beide Seiten des Kopfes befallen oder der Schmerz geht von der einen auf die andere Seite über. Er hat im Gegensatz zu den Neuralgien einen kontinuierlichen, nicht intermittierenden Charakter; seine Intensität schwillt allmählich, oft zu großer Stärke an, er bleibt eine Reihe von Stunden bestehen, um dann langsam wieder abzuklingen. Während des Anfalles besteht Hyperästhesie der Kopfhaut auf der Seite des Schmerzes. Die Intensität der Kopfschmerzen ist von Fall zu Fall verschieden und schwankt häufig auch bei den einzelnen Kranken im Verlauf der verschiedenen Anfälle. Außer den Kopfschmerzen begleiten den Migräneanfall völlige Appetitlosigkeit sowie Brechreiz, das oft zu Erbrechen führt. Dabei wird häufig ein stark saurer Magensaft entleert, wie überhaupt Migränekranken nicht selten gleichzeitig an Hyperacidität leiden. Bei schweren Anfällen machen die Kranken einen schwer leidenden Eindruck, sind zu jeglicher Beschäftigung unfähig, zeigen große Empfindlichkeit gegen grelles Licht und Geräusche und stöhnen oft laut vor Schmerzen.

Der Migräneanfall ist in der Regel von charakteristischen vasomotorischen Phänomenen begleitet. Bei der häufigeren sog. angiospastischen Form ist die befallene Gesichtshälfte auffallend blaß, ihre Haut kühl, die Pupille erweitert, die Art. temporalis der gleichen Seite weniger deutlich fühlbar als auf der gesunden Seite (*Hemicrania spastica*). Bei der angioparalytischen Form bestehen umgekehrt Rötung des Gesichts, Verengung der Pupille, evtl. kleine Blutaustritte sowie Hyperhidrose im Gesicht. Im ersteren Fall nimmt man Reizung, in letzterem Lähmung des Sympathicus an. Doch kommen nicht selten Kombinationsformen vor. Bei der sog. *Hemicrania ophthalmica* treten verschiedene Symptome seitens der Augen auf, so vorübergehende einseitige Ptose (periodische Oculomotoriuslähmung, „ophthalmoplegische“ Migräne), ferner Hemianopsie. Sehr häufig bestehen oft schon im Prodromalstadium sog. Flimmerskotome, d. h. die Patienten sehen eigentümliche leuchtende Figuren häufig mit gezacktem Rand. Auch halbseitige Parästhesien in der einen Hand, sowie selten auch halbseitige Lähmungen, die nach kurzer Zeit vorübergehen, kommen vor.

Die Dauer eines Migräneanfalles beträgt meist mehrere bis etwa 12 Stunden. Gegen Ende des Anfalles erfolgt oft Erbrechen, auch wird nicht selten ein heller Harn mit sehr niedrigem spez. Gewicht (Urina

spastica) entleert. Nach dem Anfall verfällt der Kranke oft in Schlaf, aus dem er beschwerdefrei erwacht.

Die Intervalle zwischen den Anfällen zeigen eine sehr verschiedene Dauer. Häufig kehrt allmonatlich ein Anfall wieder, in anderen Fällen treten die Anfälle öfter oder auch wesentlich seltener auf. Bemerkenswert ist schließlich, daß man bei manchen Kranken in der Zeit zwischen den Anfällen Symptomenkomplexe beobachtet, die ebenfalls anfallsweise auftreten und die man daher als Migräne-äquivalente bezeichnet hat. Dazu gehören Anfälle von Bronchialasthma, ferner von Quinckeschem Ödem, Drehschwindel, nervöser Angina pectoris u. a. m.

Die Pathogenese der Migräne wird zur Zeit mit der Annahme anfallsweise auftretender Gefäßkrämpfe im Gehirn erklärt.

Die Diagnose des ausgebildeten Migräneanfalles ergibt sich in der Regel ohne Schwierigkeit aus dem geschilderten charakteristischen Bilde, weiter dem hereditären Verhalten des Leidens, dem Beginn in der Jugend und der periodischen Wiederkehr der Anfälle. Im übrigen verhalte man sich gegenüber der verbreiteten Neigung, jegliche Art von Kopfschmerz als Migräne zu bezeichnen, skeptisch. Auch ist zu berücksichtigen, daß mitunter migräneähnliche Kopfschmerzen ein Symptom bei organischen Nervenleiden, speziell bei Hirntumor, multipler Sklerose, progressiver Paralyse u. a. sind.

**Therapie:** Während des Anfalls absolute Ruhe in einem verdunkelten und gegen Geräusche geschützten Zimmer. In den Fällen, wo der Kopf kalt ist, heiße Kompressen auf den Kopf; mitunter hilft ein heißes Salz- (oder Senf-) Fußbad. Die medikamentöse Behandlung ist häufig unsicher. Am besten wirken die verschiedenen Antineuralgica, vor allem das Migränin (Coffein-Antipyrin) 1,1 g, Trigemim (Antipyrin-Butylchloralhydrat) 0,25—0,5 bis zu 3 mal pro die, weiter Chinin sowie Pyramidon, Aspirin, Phenacetin, Antipyrin, ferner die coffeinhaltige Pasta Guarana mehrmals täglich 0,5—2,0 g sowie das Extr. Cannabis ind. als Pulver oder Pillen mehrmals täglich 0,03—0,1 g. Endlich hat in manchen Fällen das Amylnitrit sowie das Nitroglycerin (vgl. S. 162) günstige Wirkung. Morphinum wirkt mitunter ungünstig und ist auch wegen der Gefahr der Gewöhnung nach Möglichkeit zu meiden. Im übrigen bewährt sich oft die längere Zeit durchgeführte Anwendung von Brom (4,0—5,0 g pro die mehrere Wochen lang, mehrmals im Jahre wiederholt). In der anfallsfreien Zeit ist die diätetische Behandlung und Regelung der Lebensweise der Kranken von großer Bedeutung. Zu vermeiden sind Überanstrengungen und seelische Erregungen. Einschränkung bzw. Verbot des Alkohols; das gleiche gilt vom Tabak, starkem Kaffee und Tee. Häufig bewährt sich die lacto-vegetabilische Kostform, in manchen Fällen purinarme Ernährung. Sorgfältige Regelung der Darmtätigkeit; Behandlung etwaiger Magen-Darmstörungen. Vielfach wirkt auch sachgemäß durchgeführte Kopfmassage günstig. Hebung des Kräftezustandes und Beseitigung etwa vorhandener Anämie (Eisen, Arsen), klimatische Kuren (Höhenklima, mildes Seeklima).

Der **Kopfschmerz** (Cephalaea, Cephalalgie) ist von der Migräne abgesehen, fast stets nur als Symptom eines anderen Grundleidens aufzufassen. Man soll daher nach dem letzteren forschen, da nur dessen Beseitigung eine wirksame Heilung der Kopfschmerzen verspricht. Die häufigsten Ursachen von Kopfschmerzen sind: Ermüdung, speziell bei Neurasthenie und Hysterie, ferner Intoxikationen (Alkohol, Nicotin, Blei, Kohlenoxyd, Anilin, Schwefelkohlenstoff, Urämie), akute fieberhafte Krankheiten, ferner die Chlorose. Sehr heftige Kopfschmerzen stellen sich bei zahlreichen organischen Gehirnleiden ein, so bei Gehirnluces, Hirntumor, Hirnabsceß, multipler Sklerose, cerebraler Arteriosklerose, Epilepsie, Meningitis, Pachymeningitis, progressiver Paralyse sowie bei verschiedenen anderen Psychosen. Von großer praktischer Bedeutung sind ferner die bei Erkrankungen in der Nachbarschaft des Gehirns auftretenden Kopfschmerzen, speziell bei Affektionen des Ohres, die Kopfschmerzen in den Schläfen bei Zahnerkrankungen, in der Stirn bei

Augenleiden, insbesondere bei Hypermetropie (durch Überanstrengung des Akkommodationsmuskels); auch Erkrankungen der Nase sowie ihrer Nebenhöhlen (latente Katarhe bzw. Empyeme) spielen eine wichtige und häufige Rolle, desgleichen adenoide Vegetationen, der häufigste Anlaß der sog. *Cephalaea adolescentium*. Man erklärt den Kopfschmerz der letztgenannten Arten auf reflektorischem Wege. Gleiches gilt auch für die Kopfschmerzen, die man bei Verdauungsstörungen, chronischer Obstipation sowie bei Enthelminthen beobachtet.

Eine weitere besondere Form bildet der sog. konstitutionelle Kopfschmerz, der dauernd oder mit kurzen Unterbrechungen vorhanden ist und für den eine primäre Ursache sich nicht eruieren läßt. Eine andere eigenartige Form der Kopfschmerzen, die nicht sehr häufig ist, ist der sog. Knötchen- oder Schwielenkopfschmerz (*Cephalaea nodularis*), der zu den rheumatischen Erkrankungen gehört, zumal er nach Erkältungen entsteht; der Schmerz wird hier in der Kopfhaut und den Stirn- und Nackenmuskeln lokalisiert, bei der Palpation lassen sich dortselbst kleine Knötchen, sog. Schwielen feststellen, ohne daß es indessen bisher gelungen ist, entsprechende anatomische Befunde zu erheben.

Die Therapie der Kopfschmerzen muß sich stets die Beseitigung der jeweils vorhandenen Grundkrankheit zum Ziel setzen. Die Behandlung des Kopfschmerzes selbst beschränkt sich auf Anwendung der oben erwähnten Antineuralgica und der bei der Migräne besprochenen Maßnahmen. Gegen den Knötchenkopfschmerz bewährt sich besonders die Massage der Kopfhaut bzw. der schmerzhaften Muskeln.

### Menièrescher Symptomenkomplex.

Unter dem Menièreschen Symptomenkomplex versteht man das Auftreten von Schwindel und Ohrensausen auf dem Boden einer organischen Erkrankung des inneren Ohres, insbesondere der Bogengänge. In der Regel treten die Erscheinungen im Verlauf eines chronischen Ohrenleidens auf, und zwar sowohl bei Labyrinthkrankungen als bei solchen des Mittelohres (hier durch Fernwirkung). In selteneren Fällen kann das Syndrom sich bei bis dahin gesunden Ohren einstellen. Das anatomische Substrat sind teils Blutungen, teils Entzündungen des Labyrinths.

Das Krankheitsbild zeigt in den einzelnen Fällen insofern Verschiedenheiten, als es sich einmal um Zustände mit dauerndem geringen Ohrensausen zum Teil verbunden mit Schwerhörigkeit handelt, zu denen sich anfallsweise Schwindel hinzugesellt; in anderen Fällen dagegen tritt das Syndrom aus scheinbar voller Gesundheit heraus akut auf. Der Schwindel ist oft so heftig, daß der Patient sich nicht aufrecht zu halten vermag. Bei den sog. apoplektiformen Anfällen kommt es vor, daß die Kranken plötzlich zu Boden stürzen und infolge der dabei häufig gleichzeitig vorhandenen Benommenheit einen apoplektischen Insult des Gehirns vortäuschen. Zugleich besteht Erbrechen sowie Erblassen des Gesichtes, oft auch Pulsverlangsamung. Auch beobachtet man Nystagmus sowie Deviation der Bulbi. Nach Abklingen des Anfalls bleibt oft eine gewisse Unsicherheit im Gehen nach Art der cerebellaren Ataxie (taumelnder Gang) zurück; auch treten häufig Anwandlungen von Schwindel auf, der sich namentlich bei stärkerem Bücken, plötzlichen Kopfdrehungen usw. geltend macht. In der Regel wiederholen sich die Anfälle in unregelmäßigen Abständen und hinterlassen, wenn sie nicht schon vorher vorhanden war, Schwerhörigkeit bzw. einseitige Taubheit. Im Laufe der Zeit nehmen die Anfälle an Heftigkeit ab, doch wird völlige Heilung nur recht selten beobachtet.

Diagnose: Schwindelanfälle mit Erbrechen und Ohrensausen kommen auch bei Neurasthenie und Hysterie vor. Für Menière (= Vertigo ab aure laesa) ist der Nachweis der Ohrerkrankung notwendig.

Ein sicheres Symptom für die Labyrinthkrankung ist die Prüfung auf den sog. calorischen Nystagmus nach Baranyi: Nach Ausspritzen des äußeren Gehörgangs mit kaltem Wasser von etwa 25° oder weniger tritt beim Gesunden horizontaler Nystagmus beider Augen beim Blick nach der entgegengesetzten Seite, bei Anwendung von heißem Wasser (45–50°) Nystagmus beim Blick nach der gleichnamigen Seite ein. Auch der nach rascher Rotation des Rumpfes um seine Längsachse auftretende Nystagmus beim Blick in die der Drehung entgegengesetzte Richtung gehört hierher. Fehlen des Nystagmus beweist den Ausfall der Labyrinthfunktion.

Das Ménièresche Syndrom kommt auch als Symptom bei anderen Krankheiten vor, insbesondere bei Tabes, Lues sowie im Verlauf mancher akuter Infektionskrankheiten, z. B. bei Typhus. Stets ist die Wassermannsche Reaktion anzustellen.

Die Therapie besteht vor allem in der Behandlung des vorhandenen Ohrenleidens. Bei Lues spezifische Kur. Symptomatisch ist längerdauernde Chininbehandlung (täglich 0,5–1,0 g auf drei Dosen verteilt), ferner der monatelange Bromgebrauch (3–5,0 pro die) sowie das vorsichtige Galvanisieren des Kopfes (Anode am erkrankten Ohr) zu versuchen.

## Die Psychoneurosen.

Die Psychoneurosen, die insbesondere die Neurasthenie und Hysterie umfassen und die, wie überhaupt alle Neurosen, nach unseren heutigen Kenntnissen der anatomischen Grundlage entbehren, gehören zu den häufigsten Nervenkrankheiten. Sie haben daher eine eminent praktische Bedeutung, um so mehr, als sie einerseits in der Vielgestaltigkeit ihrer Symptomenbilder zahlreiche Züge mit organischen Nervenleiden teilen und deshalb oft bei ungenügender Kenntnis ihrer Äußerungsformen ihre wahre Natur verkannt wird, andererseits sind sie im allgemeinen in weit höherem Maße als erstere therapeutischer Beeinflussung zugänglich. Der Neurasthenie und Hysterie gemeinsam ist sowohl die konstitutionelle pathologische Veranlagung wie die große Bedeutung seelischer Faktoren als auslösender und die Krankheit unterhaltender Momente.

### Die Neurasthenie.

Die Neurasthenie läßt sich als eine funktionelle Krankheit definieren, deren subjektive und objektive Symptome im wesentlichen in einer abnormen psychischen Ermüdbarkeit und Reizbarkeit bestehen und die ihren besonderen Charakter der eigentümlichen Art seelischer Einstellung verdanken, mit der der Kranke auf seine Beschwerden reagiert. Man hat daher, um die führende Rolle der psychischen Komponente im Krankheitsbild zum Ausdruck zu bringen, die Neurasthenie auch als Psychasthenie bezeichnet.

Im Krankheitsbild der Neurasthenie kommt den subjektiven Beschwerden eine entscheidende Bedeutung zu; sie nehmen daher den breitesten Raum in der Schilderung des neurasthenischen Symptomenkomplexes ein. Die Klagen der Kranken beziehen sich teils auf ein abnormes Verhalten ihrer psychischen Verfassung, teils haben sie die verschiedenartigsten subjektiven Organstörungen zum Gegenstand.

Eine der häufigsten Klagen der Neurastheniker ist diejenige über Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit verbunden mit rasch eintretendem Ermüdungsgefühl. Die Kranken vermögen ihre Gedanken nicht zu konzentrieren und können sich nicht in dem für eine jede systematische geistige Arbeit erforderlichen Maße sammeln. Oft wird auch über Abnahme des Gedächtnisses geklagt. Prüft man die intellektuellen Fähigkeiten derartiger Kranker, so ergibt sich, daß das Auffassungsvermögen und die sonstigen geistigen Fähigkeiten, insbesondere auch das Gedächtnis keine wesentlichen Abweichungen von der Norm zeigen, wenn auch eine gewisse Zerfahrenheit und die Eigentümlichkeit, den geistigen Faden im Gespräch zu verlieren, hierbei häufig offenbar wird. Dessenungeachtet beeinträchtigt die abnorme Ermüdbarkeit und der Mangel an Konzentrationsvermögen tatsächlich in hohem Maße die Fähigkeit zu methodischer geistiger Arbeit.

Eine im Symptomenbilde der Neurasthenie stets wiederkehrende Erscheinung sind Anomalien der Gemütsstimmung, insbesondere die von der Norm abweichende gemütliche Reaktionsweise nicht nur gegenüber außergewöhnlichen, sondern auch alltäglichen, in den Augen des Gesunden belanglosen Ereignissen; dies äußert sich vor allem in krankhafter Reizbarkeit. Aber auch freudige Erlebnisse rufen übertriebene seelische Reaktionen hervor, auf die dann alsbald Apathie und Erschlaffung folgt. Im Durchschnitt ist die Stimmung des Neurasthenikers eine depressive bzw. mürrische; sie findet ihre Nahrung in dem Hang der Kranken zu hypochondrischen Gedanken, d. h. ängstlichen Vorstellungen, die das körperliche Befinden zum Gegenstand haben. Ein großer Teil der Patienten kommt zum Arzt mit der bestimmten Angabe, an einem organischen Leiden des Herzens, des Magens, des Rückenmarks, an Krebs, an Syphilis usw. zu leiden, ohne daß objektive Unterlagen hierfür zu finden sind. Bestärkt werden diese Vorstellungen durch die für die Neurasthenie charakteristischen verschiedenen Unlustgefühle, die sich in unberechenbarer Weise einstellen, wie z. B. Eingommensein des Kopfes, Kopfschmerzen, die eine ungemein häufige Klage der Kranken bilden und namentlich im Anschluß an jegliche geistige Anstrengung auftreten, ferner Schwindelgefühl, in manchen Fällen das Gefühl einer herannahenden Ohnmacht. Oft finden sich auch Zeichen einer krankhaften Reizbarkeit von seiten der Sinnesorgane, namentlich seitens der Augen und Ohren; die Kranken vertragen kein grelles Licht, leiden an Augenflimmern, Ohrensausen, empfinden lautes Geräusch als Schmerz usw., während die objektive Untersuchung der Organe einen völlig normalen Befund ergibt. Eine weitere Förderung erhalten die hypochondrischen Vorstellungen der Patienten oft durch die weiter unten erwähnten Organneurosen.

Zu den häufigsten Begleiterscheinungen der Neurasthenie gehören auch Störungen des Schlafes, die sich teils in erschwertem Einschlafen, teils in zu frühem Aufwachen, ferner in jähem Aufschrecken durch beunruhigende Träume und vor allem in mangelnder Schlaf-tiefe äußern, so daß die Kranken meist durch den Schlaf sich nicht erquickert fühlen und tagsüber abgespannt sind. Bezeichnend ist auch



die namentlich in Stunden der Schlaflosigkeit in erhöhtem Maße sich geltend machende, aber auch sonst vorhandene Neigung des Neurasthenikers zu quälendem Grübeln über seinen Zustand, über seine Verhältnisse oder irgendwelche ihm bevorstehenden Aufgaben, wobei ihn bald das Gefühl des eigenen Versagens, bald das Mißtrauen gegen seine Umgebung oder die Überschätzung erlebten Mißgeschickes in bizarre Gedankengänge hineintreibt, die seine trübe Gemütsstimmung vertiefen.

Die Psychopathie des Neurasthenikers äußert sich oft auch in seiner Entschlußunfähigkeit, nicht nur gegenüber schwierigen Situationen des Lebens, sondern auch in den vom Gesunden mühelos erledigten Fragen des Alltags. Für den Neurastheniker bedeuten sie bereits komplizierte Probleme, die er in ängstlicher Unentschlossenheit nach allen möglichen Seiten auf die zu erwartenden Schwierigkeiten oder Unannehmlichkeiten hin beleuchtet, ohne zu einem positiven Entschluß zu gelangen. Dies von der Umgebung der Kranken als Energiemangel gerügte Verhalten ist ein weiteres typisches Symptom der Psychasthenie.

Bei manchen Neurasthenikern spielen die sog. Zwangsvorstellungen und die Zwangshandlungen eine Rolle. Hierher gehören z. B. die sog. Phobien, d. h. unter ganz bestimmten Umständen oder in gewissen Situationen zwangsmäßig sich einstellende Angstgefühle, wie z. B. die Platzangst, die Angst vor dem Eisenbahnfahren, die sog. Situationsangst (z. B. bei Kanzelrednern die Angst vor dem öffentlichen Auftreten), die Angst vor dem Erröten usw.; ferner die sog. Obsessionen, wobei z. B. die Vorstellung den Patienten quält, er müsse in Gesellschaft anderer etwas Anstößiges sagen oder tun oder eine kriminelle Handlung ausführen usw. Charakteristisch ist hierbei zum Unterschiede von den eigentlichen Psychosen, daß der Kranke sich des Widersinnigen seiner Vorstellung voll bewußt ist und daß es tatsächlich auch nicht zur Ausführung der betreffenden Triebhandlung kommt.

Zahlreich sind ferner die körperlichen Beschwerden des Neurasthenikers, die sich auf bestimmte Organe beziehen und zum Teil in der Form der Organneurosen auftreten. Vor allem bilden das Herz, der Verdauungsapparat sowie die Genitalorgane eine Quelle subjektiver Störungen; die die ängstliche bzw. reizbare Gemütsverfassung der Kranken oft dauernd unterhalten. Die als Herzneurose bezeichneten Formen der cardiovasculären Beschwerden wurden bereits S. 177 beschrieben. Oft besteht große Labilität der Vasomotoren mit Neigung zum plötzlichen Erblassen bzw. Erröten. Häufig sind auch die Klagen über kalte Hände und Füße sowie über abnorme Schweißsekretion. Das labile Verhalten des Blutdrucks wurde schon früher S. 144 erwähnt. In anderen Fällen spielen dyspeptische Beschwerden eine vorherrschende Rolle. Näheres vgl. S. 307. Oft leiden die Neurastheniker an Obstipation.

Die häufigste sexuelle Anomalie bei Neurasthenie ist beim Mann die Impotenz, die nicht selten mit gleichzeitiger abnormer sexueller Erregbarkeit vergesellschaftet ist und ihren psychogenen Charakter, wie oft eine eingehende Anamnese ergibt, durch die Angst vor sexuellen Mißerfolgen verrät. Weitere Symptome der sog. Sexualneurasthenie

sind die Ejaculatio praecox sowie die am Tage auftretenden Pollutionen. Die sexuellen Störungen pflegen in besonders starkem Maße die hypochondrische Stimmungslage der Kranken zu verstärken. Beim Weibe kommen bisweilen Störungen der Menstruation (Dysmenorrhöe) als Symptome der Neurasthenie vor.

Die objektive Untersuchung der Kranken ergibt für einen großen Teil derselben die Merkmale des früher beschriebenen Habitus asthenicus. Bei anderen dagegen kontrastieren die zahlreichen Klagen mit dem völlig normalen oder sogar robusten Körperbau. Vielfach bestehen Symptome einer erhöhten Erregbarkeit des neuromusculären Apparates. Diese äußert sich u. a. in Steigerung der Sehnen- und bisweilen der Hautreflexe. Dagegen ist niemals echter Klonus vorhanden. Auch fehlen konstant die für organische Nervenleiden charakteristischen Reflexe wie Babinski, Strümpell usw.; andererseits beweist das Fehlen des Kniesehenreflexes stets ein organisches Leiden. Die Pupillen zeigen immer prompte Lichtreaktion und sind von gleicher Weite. Bisweilen findet man eine erhebliche Steigerung der mechanischen Erregbarkeit der Muskeln, die beim Beklopfen den sog. idiomuskulären Wulst zeigen. Beim Schließen der Augen zeigt die Mehrzahl der Kranken einen deutlichen Tremor palpebrarum. Recht häufig ist auch ein feinschlägiges Zittern der Hände, das sich namentlich beim Spreizen der Finger zeigt, seltener ist Tremor der Zunge. Das Rombergsche Phänomen, d. h. Schwanken des Rumpfes bei Augen- und Fußschluß fehlt stets. Patienten mit starker Vasolabilität zeigen häufig sog. Dermographie, d. h. umschriebenes Erröten, seltener Erblassen der Haut bei mechanischer Reizung derselben. Zahlreiche Neurastheniker zeigen während der ärztlichen Untersuchung u. a. starke Schweißsekretion speziell in der Achselhöhle.

Der neurasthenische Symptomenkomplex findet sich in erster Linie bei jenen nervösen Individuen, die von vornherein eine neuropathische Veranlagung besitzen und meist hereditär belastet sind. Diese Kranken, die zugleich häufig die Symptome allgemeiner körperlicher Asthenie darbieten, lassen oft schon in der Kindheit ihre neuropathische Konstitution erkennen. Neigung zu Krämpfen, Spasmophilie, nächtliches Aufschrecken im Schlaf, Enuresis nocturna und ähnliches gehören hierher. Fehlerhafte Erziehung und ungünstige Milieuverhältnisse tragen zur Weiterentwicklung der reizbaren Schwäche dieser Kinder wesentlich bei. Zum Teil handelt es sich um die typische Charakteristik, wie sie uns oft in prägnanter Form im Bilde des „einzigen Kindes“ entgegentritt, das im späteren Leben ein nicht unbeträchtliches Kontingent zur konstitutionellen Neurasthenie bildet. Derartige Individuen zeichnen sich durch erhebliche Herabsetzung ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber den Ansprüchen, die das Leben an sie stellt, aus. Häufig kommt es dann bei diesen Individuen, die bis dahin nur als sensitive oder etwas verschrobene Naturen galten, unter der Einwirkung einer starken Gemütserschütterung oder intensiver geistiger Anspannung zu einem Zusammenbruch, von dem sich die Kranken

nicht wieder vollkommen erholen, und die nunmehr vorgenommene ärztliche Untersuchung ergibt das vollentwickelte Krankheitsbild der Neurasthenie.

Diesen sog. endogenen Formen der Neurasthenie stehen Krankheitsbilder gegenüber, die man als **exogene Erschöpfungsneurosen** bezeichnet. Hier handelt es sich um Individuen, die bis dahin in ihrem Wesen und ihrer Leistungsfähigkeit etwa der Norm entsprachen oder nur einen geringen Grad gesteigerter nervöser Empfindlichkeit zeigten und die erst unter der Einwirkung einer starken psychischen Überlastung in Form von unlustbetonten Affekten (namentlich wenn diese von längerer Dauer waren) oder auch nach einer überstandenen Infektionskrankheit oder endlich als Folge chronischer Intoxikationen neurasthenische Symptome zeigen. Diese sog. **Erschöpfungsneurasthenie**, deren Ursache sich in der Regel anamnestic feststellen läßt, pflegt sich von der endogenen Neurasthenie dadurch zu unterscheiden, daß die bei letzterer vorhandenen charakterologischen Eigentümlichkeiten sowie insbesondere die für die konstitutionelle Neuropathie bezeichnenden Absonderlichkeiten im Denken und Fühlen zurücktreten gegenüber einförmigeren Krankheitsbildern, in denen die nervösen Organbeschwerden häufig eine führende Rolle spielen. Stets ist aber auch hier die für jede Art von Neurasthenie charakteristische abnorme Ermüdbarkeit und reizbare Schwäche vorhanden. Übrigens ist auch bei der exogenen Neurasthenie häufig eine, wenn auch latente neuropathische Disposition bereits vor dem Wirksamwerden exogener Faktoren vorhanden.

**Verlauf und Prognose** der Neurasthenie gestalten sich verschieden, je nachdem die endogene Form oder die exogene Erschöpfungsneurasthenie vorliegt. Die neuropathische Konstitution eines Individuums bleibt naturgemäß während des ganzen Lebens bestehen; demgemäß sind die auf dem Boden derselben sich entwickelnden Neurasthenieformen einer eigentlichen Heilung nicht zugänglich, wenn auch häufig im Laufe der Zeit Schwankungen bzw. Besserungen auftreten, die sich zum Teil aus Veränderung der äußeren Lebensverhältnisse erklären, zumal selbstverständlich auch die endogene Neuropathie der Beeinflussung durch exogene Faktoren zugänglich ist. Bei manchen Fällen beobachtet man in höherem Alter eine Abschwächung der Krankheitserscheinungen. Kranke mit leichteren Formen von endogener Neurasthenie vermögen ihrer Berufspflicht korrekt nachzukommen und werden nur ihrer näheren Umgebung durch ihren Stimmungswechsel, ihre Reizbarkeit und Entschlußunfähigkeit lästig. Schwerere Formen sind häufig zu einer beruflichen Tätigkeit, die konsequente und methodische Arbeit verlangt, unfähig. Diese Art von Kranken wechseln häufig ihren Beruf und ihr Tätigkeitsfeld, sie bevölkern die Sanatorien, wandern vom Arzt zum Kurpfuscher und beschäftigen sich mit bizarren Betrachtungen über ihr Leiden und die vermeintlichen Ursachen ihrer zahllosen Beschwerden.

Ganz anders ist die Prognose bei der Erschöpfungsneurasthenie zu stellen. Hier gelingt es oft durch genügende Erholung sowie durch Fernhalten der exogenen Schädlichkeiten das Leiden zu heilen, wenn auch

oft eine gewisse nervöse Empfindlichkeit und Schonungsbedürftigkeit zurückbleibt.

Die **Diagnose** der Neurasthenie hat vor allem eine Reihe von Krankheiten mit ähnlichen Beschwerden auszuschließen, bei denen den letzteren nur eine symptomatische Bedeutung neben dem bestehenden Grundleiden zukommt. Vor allem gehören hierher die Anfangsstadien mancher Psychosen, z. B. der *Dementia praecox* sowie der progressiven Paralyse, ferner der multiplen Sklerose und der cerebralen Arteriosklerose. Ferner gehen zahlreiche andere Erkrankungen wie beginnende Tuberkulosen, Hyperthyreosen, Diabetes mellitus sowie chronische Intoxikationen (Alkohol, Nicotin, Morphin, Cocain) mit neurasthenischen Symptomen einher.

Die **Therapie** der Neurasthenie stellt hohe Anforderungen an die Kunst des Arztes, zumal hier wie bei allen Psychoneurosen dem seelischen Einfluß des ärztlichen Beraters besonderes Gewicht beizumessen ist. Die erste Forderung ist eine genaue körperliche Untersuchung des Kranken, da vor allem die Feststellung des Fehlens einer organischen Erkrankung bereits geeignet ist, — oft allerdings nur für kurze Zeit — den Kranken von seelischem Druck zu befreien. Verständnis- und taktvolles Eingehen auf die Beschwerden muß andererseits die Suggestion neuer Krankheitssymptome sorgfältig zu vermeiden wissen, zumal die Kranken in diesem Punkte häufig sehr argwöhnisch und infolge falsch verstandener medizinischer Lektüre oft voreingenommen sind. In jedem Fall ist streng zu individualisieren. Stets ist Schonung und Ruhe in körperlicher und geistiger Beziehung unerlässlich, verboten jeglicher *Abusus* der verschiedenen Genuß- und Reizmittel. Die Dosierung der geistigen Beschäftigung hängt von der Art des Falles ab. Bei Erschöpfungsneurasthenie ist ein längere Zeit durchgeführtes Sistieren jeglicher beruflichen Tätigkeit der wichtigste Teil der Behandlung. Umgekehrt wirkt bei der endogenen Neurasthenie mit ihren hypochondrischen Vorstellungen eine mit Maß und unter ärztlicher Kontrolle durchgeführte leichte Beschäftigung häufig überaus günstig, da sie den Kranken von seinen Gedanken ablenkt und zugleich sein Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit hebt. Zwangsvorstellungen lassen sich mitunter in der Hypnose beseitigen, die jedoch nur von hierin geschulten Fachärzten auszuführen ist. Systematische Körperbewegung, milde Hydrotherapie und Elektrotherapie, bei Unterernährung Mastkuren, Beseitigung etwa vorhandener Anämie erzielen oft schöne Erfolge.

Gegenstand einer medikamentösen Behandlung sind vor allem die erhöhte nervöse Reizbarkeit sowie die Schlaflosigkeit. An erster Stelle stehen hier die Brom- und Baldrianpräparate. Das Brom wird für kurze Zeit in Tagesdosen bis zu 3,0 Bromsalz (z. B. als *Mixt. nervina* 3mal tägl. 1 Eßlöffel) oder als *Sedobrol* (2—3 mal tägl. 1 Würfel) gereicht, Baldrian als *Tct. valerian.*, *Validol* oder besser als kalt bereiteter Baldriantee. Brom und Baldrian sind oft auch ein wirksames Mittel gegen die *Agrypnie*. Letztere verleitet viele Neurastheniker dazu, Schlafmittel nach Gutdünken auf eigene Faust zu nehmen, was auf die Dauer zu Schädigungen führt, abgesehen davon, daß die Kranken schließlich zu

Sklaven dieser Medikamente werden. Zunächst versuche man es bei leichteren Fällen ohne Medikamente, z. B. durch kalte Kompressen auf den Kopf, laue Bäder vor dem Schlafengehen, mildes Paradisieren. Unter den Medikamenten sind nur die leichten Hypnotica anzuwenden, insbesondere das Adalin, das Somnacetin, das stärker wirkende Veronal (0,5—0,75) bzw. das Veronalnatrium (Medinal); in manchen Fällen ist die Combination mit Brom von Vorteil. Chloralhydrat ist nicht am Platz, die Anwendung von Morphinum ein schwerer Kunstfehler. Bei schweren Formen der Neurasthenie ist die Behandlung in entsprechenden Kuranstalten oft nicht zu umgehen. Vielfach genügt es allerdings auch hier schon, die Kranken aus ihrem gewohnten Milieu herauszunehmen bzw. sie in günstigere äußere Verhältnisse zu bringen.

### Hysterie.

Die Hysterie ist die zweite außerordentlich verbreitete Krankheit in der Gruppe der Psychoneurosen. Sie hat mit der Neurasthenie eine Reihe von Zügen gemeinsam, unterscheidet sich aber andererseits von ihr doch in wesentlichen Merkmalen.

Die Hysterie läßt sich definieren als eine konstitutionelle psychische Anomalie, die in erhöhter Suggestionsfähigkeit bzw. Autosuggestibilität, ferner in krankhaft gesteigerter Reaktionsweise auf dem Gebiete der Affekte und schließlich in einer eigentümlichen unbewußten Abspaltung gewisser psychischer Inhalte und deren abnormen Veränderung besteht. Vorstellungsleben, Phantasie und Affekte nehmen bei den Hysterischen einen krankhaft breiten Raum ein und entbehren der Zügelung, die ihnen beim Normalen durch die dauernde kritische Prüfung seitens des Intellektes zuteil wird.

Die Krankheit zeigt Vorliebe für das weibliche Geschlecht; doch kommt sie gelegentlich auch bei Männern vor. Auch bei Kindern wird sie häufig beobachtet. Milieu, soziale Lage und eine gewisse Rassen disposition spielen eine nicht unerhebliche Rolle. Individuen in abhängigen Stellungen oder ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen, andererseits manche Rassen wie die Slawen, Romanen, Juden erkranken häufiger. Die Rolle der Suggestibilität erklärt das gelegentliche epidemische Auftreten hysterischer Krankheitserscheinungen bzw. das Vorkommen von Massenhysterie. Am häufigsten befällt die Hysterie das jugendliche Alter. Sehr oft läßt sich erbliche psychopathische Belastung feststellen. Unter den die Krankheitserscheinungen auslösenden Momenten spielen die Affekte, der Schreck, der Ärger, die moralische Enttäuschung, das Trauma eine Hauptrolle. Die sog. traumatischen Neurosen gehen, soweit sie nicht zur einfachen Neurasthenie gehören, vollständig in dem Bilde der Hysterie auf (vgl. S. 621).

Im Krankheitsbilde der Hysterie, das sich durch eine ganz außerordentliche Buntheit der Symptome auszeichnet, lassen sich zwei Hauptgruppen von Symptomen unterscheiden: dauernd vorhandene Symptome oder Stigmata hysterica und hysterische Anfälle.

Unter den **Dauersymptomen** haben vor allem die sensiblen und sensorischen Störungen eine große Bedeutung. So klagen die Kranken sehr oft über allerhand Schmerzen, vor allem über Kopfschmerzen, die sie charakteristischerweise häufig als das Gefühl, als sei ihnen in den Kopf ein Nagel geschlagen, beschreiben (sog. *Clavus hystericus*). Häufig findet man in verschiedenen Körpergegenden druckempfindliche Stellen, so z. B. Hyperästhesie der Ovarialgegend (sog. *Ovarie*), die mit den Ovarien nichts zu tun hat, zumal sie auch bei Männern vorkommt, ferner Druckempfindlichkeit einzelner Punkte an den *Mammae* und in anderen Gegenden, stets ohne jegliche anatomische Grundlage. Eine besondere Bedeutung haben die hysterischen Hyp- und Anästhesien der Haut und der Schleimhäute. Die Hautanästhesien sind charakterisiert durch das Fehlen einer Übereinstimmung ihrer Ausbreitung mit dem anatomischen Verlauf der Nerven sowie durch die eigentümliche Art ihrer Lokalisation. Sie kommen vor teils als *Hemianästhesie*, die häufiger die linke Körperhälfte befällt, ferner als sog. *geometrische Anästhesien*, bei denen z. B. ein Finger oder ein Arm unempfindlich ist oder es bestehen manschettenförmige oder handschuhförmige Anästhesien und der anästhetische Bezirk ist durch eine scharfe Linie, die sog. *Amputationslinie* abgegrenzt, oder die Anästhesie tritt in völlig unregelmäßigen, über den ganzen Körper verstreuten Inseln auf. In der Regel sind nicht alle Qualitäten der Sensibilität aufgehoben; am häufigsten ist *Thermanästhesie* und *Thermanalgesie* vorhanden. Mitunter ist auch die *Lage- und Bewegungsempfindung* der anästhetischen Bezirke aufgehoben. In manchen Fällen ist die Hautanästhesie mit eigentümlichen vaskulären Anomalien kombiniert. Zum Beispiel bleibt die Blutung nach einem Nadelstich aus oder es bildet sich dort ein umschriebenes Ödem.

Für den hysterischen Charakter der beschriebenen Sensibilitätsstörungen ist bezeichnend, daß einmal die Funktion der anästhetischen Glieder in keiner Weise beeinträchtigt ist und die Kranken mit ihnen die kompliziertesten Bewegungen wie mit normalen Organen ausführen, sowie ferner, daß sie als rein psychogene Störungen dem Einfluß der Suggestion in weitem Maße zugänglich sind, wie das u. a. das Beispiel des sog. *Transfert*, d. h. die Übertragung einer anästhetischen Zone auf die entsprechende Stelle der anderen Körperhälfte beweist. Weiter erklärt sich daraus die praktisch wichtige Tatsache, daß unter Umständen auch die ärztliche Untersuchung durch unvorsichtig gestellte Suggestivfragen bei Prüfung der Sensibilität psychogene Anästhesien hervorgerufen vermag. Die Sehnenreflexe zeigen keine Abweichung von der Norm. Von den Schleimhäuten zeigen hauptsächlich die Mund- und Rachenschleimhaut, ferner die *Conjunctiven* oft Anästhesie. Es fehlt der *Würgreflex*; häufig ist auch *Areflexie* der *Cornea*. Zahlreiche Kranke klagen über das Gefühl, als stecke ihnen ständig eine Kugel im Halse, die trotz Schluckens nicht verschwindet (*Globus hystericus*).

Von seiten der Sinnesorgane sind vor allem Sehstörungen zu nennen, die sich häufig in konzentrischer Einschränkung des Gesichtsfeldes, ferner in Abnahme der Sehschärfe, selten als vollständige Blindheit

äußern. Häufig sind auch Störungen des Geschmacks, seltener des Geruchs. So werden z. B. Chinin, Zucker, Salz, Essig nicht als entsprechend schmeckende Substanzen empfunden (Ageusie) oder es besteht Anästhesie nur für eine dieser Substanzen.

Die motorischen Symptome der Hysterie zeichnen sich ebenfalls durch eine ungeheure Mannigfaltigkeit aus. Hysterische Lähmungen sind überaus häufig. Sie treten in den verschiedensten Formen als Monoplegien, Paraplegien oder Hemiplegien auf. Ihr psychogener Charakter ergibt sich einmal aus ihrer in der Regel plötzlichen Entstehung im Anschluß an irgendwelche Affekte bzw. einen hysterischen Anfall, ferner aus der Art ihrer Lokalisation, die in der Regel in einer psychischen Beziehung zum vorausgegangenen, die Lähmung auslösenden Ereignis steht und schließlich aus dem Fehlen der Symptome, die organische Lähmungen begleiten; Änderungen der Reflexe, Entartungsreaktion, Blasen-Mastdarmstörungen usw. werden stets vermißt; endlich werden die gelähmten Extremitäten im Rausch wie normale Glieder bewegt. Die Lähmungen sind entweder transitorisch oder von längerer Dauer. Im letzteren Fall kann sich Inaktivitätsatrophie der Muskeln und Knochen einstellen, doch kommt es niemals zu der degenerativen Muskelatrophie wie bei organischen Störungen. Eine recht häufige hysterische Lähmung ist die Aphonie (vgl. S. 195).

Sehr häufig sind auch die verschiedenartigsten Gangstörungen der Hysterischen wie Taumeln, Zittern, choreaähnliche Bewegungen. Ein weiteres für Hysterie bezeichnendes Phänomen ist die sog. Astasie-Abasie, d. h. die völlige Unfähigkeit zu stehen und zu gehen, so daß die Kranken auf die Füße gestellt in sich zusammensinken, während im Bett die Bewegungsfähigkeit und grobe Kraft der Beine eine völlig normale ist. Auch Kontrakturen werden mitunter beobachtet. Sie kommen teils zusammen mit Lähmungen oder Sensibilitätsdefekten, teils ohne diese vor, pflegen sich allmählich zu entwickeln und bewirken bisweilen die merkwürdigsten Stellungsanomalien der betroffenen Gliedmaßen. Weiter kommen gelegentlich Spasmen im Bereich von Muskelgruppen zur Beobachtung, die bei organischen Erkrankungen niemals gleichzeitig befallen werden (z. B. der Hemispasmus glosso-labialis). Im Gegensatz zu den Kontrakturen bei organischen Nervenleiden fehlen hier die Pyramidenzeichen wie Reflexsteigerung und Babinski, auch verschwinden die Kontrakturen meist im Schlafe.

Die hysterischen Anfälle äußern sich ebenfalls in sehr verschiedenen Formen. Man unterscheidet große und kleine Anfälle. Die großen Anfälle werden nur selten beobachtet.

In der Regel gehen diesen gewisse Prodromalerscheinungen voraus, die man als hysterische Aura bezeichnet, und die in Angst, Herzklopfen, Schwindel, Nausea, sowie oft in dem Gefühl einer vom Abdomen zum Hals aufsteigenden Kugel bestehen. Das erste oder epileptiforme Stadium des Anfalls beginnt damit, daß die Kranken zu Boden gleiten (nicht wie bei Epilepsie stürzen!) und in allgemeine tonische und klonische Zuckungen verfallen. Hierauf folgt das sog. Stadium der Kontorsionen und großen Bewegungen (sog. Clownismus) mit Verdrehung des Rumpfes, Aufbäumen des Körpers, der oft nur mit dem Hinterhaupt und den Fersen auf der Unterlage aufrüht („arc de cercle“), wetzenden Bewegungen des

Beckens usw. Eine weitere Phase ist die der „leidenschaftlichen Stellungen“, in der die Kranken alle möglichen theatralischen Gebärden, z. B. den Ausdruck der erotischen oder religiösen Verzückung, des Zorns, der Bestürzung usw. darbieten. Nach einer kurzen deliranten Phase, in der hauptsächlich Wortdelirien bestehen, verbleiben die Kranken bisweilen noch kurze Zeit in einem Zustand eigentümlicher Regungslosigkeit, der sog. kataleptischen Starre, worauf der Anfall oft unter Schluchzen und Weinen sein Ende erreicht. Bisweilen hinterläßt er die beschriebenen Kontrakturen bzw. Lähmungen. Bezeichnend ist, daß die Kranken für die Ereignisse während des Anfalls keine Erinnerung besitzen. Während der Anfälle ist es meist leicht, den Patienten die verschiedensten Vorstellungen zu suggerieren, die sie dann alsbald mit dem Inhalte ihrer Halluzinationen verweben. Zum Unterschiede vom epileptischen Anfall kommt es beim hysterischen Anfall so gut wie niemals zu ernsteren Verletzungen, es fehlt die Cyanose und die Lichtreaktion der Pupille bleibt fast immer erhalten. Mitunter lassen sich die Anfälle durch äußere Reize koupieren.

Wesentlich häufiger sind die kleinen hysterischen Anfälle, die sich ebenfalls durch eine ungemein große Mannigfaltigkeit auszeichnen. Hier besteht meist nur ein Prodromalstadium, ein Krampfstadium und die terminale Phase. Unter den verschiedenen Arten von Krämpfen sind die Schreikrämpfe, Lachkrämpfe und Weinkrämpfe, ferner der hysterische Bellhusten sowie eine eigentümliche für die Hysterie charakteristische Beschleunigung der Atmung (Tachypnoë) mit einer Atemfrequenz bis zu 15 und 20 in der Minute zu nennen. Ein weiteres Symptom der Krankheit sind die sog. hysterischen Dämmerzustände, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Dämmerzustand bei Epilepsie zeigen und entweder nur kurze Zeit, bisweilen aber auch Tage, selten sogar wochenlang dauern. Der Inhalt der dabei vorhandenen traumatischen Vorstellungen hat oft ebenfalls den für die Hysterie charakteristischen pathetischen oder romantisches Charakter.

Unter den übrigen zahlreichen Phänomenen, die die Hysterischen gelegentlich darbieten, sind zu erwähnen das von den Kranken produzierte Blutbrechen, welches in der Regel auf artefiziell beigebrachte Zahnfleischblutungen zurückzuführen ist, das Auftreten der verschiedenartigsten Verletzungen, Verbrennungen und Verätzungen der Haut, sämtlich künstlich und oft mit großer Raffiniertheit von den Kranken erzeugt, weiter die häufige Vortäuschung von Fiebertemperaturen durch heimliche Friktion des Thermometers u. a. m. Eine große praktische Bedeutung kann ferner das hysterische Erbrechen dadurch erhalten, daß es längere Zeit andauert und dann mitunter zu schwerer Unterernährung führt. Auch die Fälle von sog. hysterischer Gravidität mit Fortbleiben der Menses, hartnäckigem Erbrechen und Auftreibung des Leibes gehören hierher.

Eine genauere psychologische Analyse der Krankheit, insbesondere der Fälle mit den letztgenannten eigentümlichen Symptomen läßt mit Deutlichkeit die Rolle erkennen, die häufig in den Vorstellungen der Hysterischen der Wunsch spielt, krank zu sein und vor allem es zu scheinen, der sich indessen grundsätzlich von der Simulation von Krankheitserscheinungen unterscheidet. Der überzeugendste Beweis für die Bedeutung der sog. „Flucht in die Krankheit“ für das Zustandekommen einer großen Zahl von Hysterien wird durch die



Beobachtung über die traumatische Rentenhysterie geliefert (siehe unten). Daneben kommt außerdem das den Hysterischen eigentümliche Gefallen an ihrer Märtyrerrolle besonders zur Geltung. In anderen Fällen, wo der sog. Wunschfaktor in den Hintergrund tritt, erklären sich manche Symptome wie Lähmungen, Sensibilitätsstörungen und Anfälle usw. aus dem ausgesprochenen Hang der Hysteriker zur Nachahmung, der seinerseits in der starken Suggestibilität der Kranken seine Erklärung findet. Der Anblick eines organisch Kranken mit irgendwelchen auffallenden die leicht erregbare Phantasie des Hysterischen beschäftigenden Symptomen hat daher oft bei ihm die unbewußte Imitation der gleichen Krankheitserscheinungen zur Folge. Hieraus wird auch das oben erwähnte epidemieartige Auftreten gewisser hysterischer Erkrankungen unter bestimmten Umständen erklärlich. Endlich erklärt das eigenartig hemmungslose Walten der Phantasie im Seelenleben der Kranken die häufig bei Hysterischen zu beobachtende Neigung zum Konfabulieren und zur Lügenhaftigkeit, wobei indessen die Kranken selbst von der Realität des Inhaltes ihrer romantischen Erzählungen überzeugt sind (*Pseudologia phantastica*).

Der Verlauf der Hysterie ist in den einzelnen Fällen ein recht verschiedener. In der großen Mehrzahl der Fälle steht die Krankheit hauptsächlich im jugendlichen Alter in Blüte, während im mittleren und höheren Alter die Krankheitserscheinungen wieder schwinden. Viele hysterischen jungen Mädchen verlieren in der Ehe ihr Leiden. Schwere Fälle hingegen, die oft schon von Kindheit an hysterische Symptome zeigen, bleiben für den größten Teil ihres Lebens mit dem Leiden behaftet. Eine Lebensgefahr bietet die Hysterie an sich niemals. Der gelegentliche unglückliche Ausgang der von manchen Hysterischen theatralisch inszenierten Selbstmordversuche ist eine gewissermaßen unbeabsichtigte zufällige Folge, die nicht zum Wesen der Krankheit selbst gehört.

Die Diagnose der Hysterie ergibt sich einmal aus der Feststellung des Gesamtbildes der psychopathischen Konstitution mit den für die Hysterie charakteristischen psychologischen Merkmalen, wie sie hier skizziert wurden. Die hysterische Natur der einzelnen Symptome ist einmal aus der Art derselben an sich, ferner aus dem Fehlen der für organische Erkrankungen bezeichnenden Begleiterscheinungen, weiter aus ihrer anamnestic zu eruiierenden Entstehung (plötzliches Auftreten nach Schreck usw.) zu schließen. Andererseits ist nachdrücklich zu betonen, daß nicht selten organische Erkrankungen vorkommen, die von hysterischen Symptomen überlagert sind (insbesondere multiple Sklerose, Lues cerebros spinalis, Basedowsche Krankheit). In jedem Fall ist daher zunächst eine genaue Untersuchung notwendig, um etwaige organische Leiden mit Sicherheit ausschließen zu können.

Die Therapie der Hysterie hat sich zuerst mit der Ergründung der im Einzelfall in Frage kommenden auslösenden bzw. die krankhaften Vorstellungen unterhaltenden Momente zu befassen und nach Möglichkeit für deren Ausschaltung zu sorgen. Hierzu kann z. B. die Ausheilung eines gleichzeitig bestehenden organischen Leidens, die Beseitigung

einer Narbe oder Wunde usw. gehören. Vor allem aber muß sich der Arzt in den psychologischen Mechanismus seiner Patienten mit Geduld und Ausdauer vertiefen, um dem oft vorhandenen, mitunter weit in die Vergangenheit zurückreichenden psychischen Trauma auf die Spur zu kommen, welches eine ursächliche Rolle im Krankheitsbilde spielt und dem Kranken selbst entweder im Augenblick nicht mehr bewußt ist oder das er dem Arzt gegenüber zunächst zu verschweigen bestrebt ist. Dieses als Psychoanalyse bezeichnete Verfahren erfordert ebensoviel Erfahrung wie Takt, da einmal die Methode die Gefahr der Suggestion neuer krankhafter Vorstellungskomplexe in sich birgt, andererseits durch Berühren heikler Themen, insbesondere auf sexuellem Gebiete, Gefahr läuft, unerwünschte, wenn nicht sogar schädliche Wirkungen hervorzurufen. Bei richtiger Anwendung vermag jedoch die Psychoanalyse oft glänzende Erfolge zu erzielen, insbesondere wenn es gelingt, dem Kranken den kausalen Zusammenhang zwischen früheren Erlebnissen und seinen Krankheitserscheinungen zu erklären und ihn von gewissen Vorstellungskomplexen zu befreien, die der Krankheit dauernd neue Nahrung liefern. Ein wichtiger Teil der psychotherapeutischen Behandlung besteht übrigens auch darin, die Kranken von ungünstigen seelischen Einflüssen seitens ihrer Umgebung zu befreien. Wesentlich ist es auch, die letztere speziell davon zu überzeugen, daß die Kranken nicht als moralisch minderwertige Individuen zu betrachten sind.

In der Behandlung der einzelnen Symptome kommt der Suggestion eine Hauptdomäne zu. Hierher gehört auch zum großen Teil die Anwendung der Elektrotherapie, ferner die Übungstherapie bei Lähmungen usw. Medikamentös bewähren sich vor allem Baldrianpräparate. Hydrotherapie sowie klimatische Kuren, ferner Hebung des Ernährungszustandes sind oft wirksame Hilfsfaktoren.

Die sog. **traumatischen Neurosen**, d. h. Psychoneurosen, die sich im Anschluß an Traumen im weitesten Sinne des Wortes, hauptsächlich aber nach Unfällen verschiedenster Art einstellen, und die im Kriege als sog. Kriegsneurosen eine große Rolle spielten, stellen pathogenetisch und klinisch keine besondere Krankheitsgruppe dar, sondern gehören zum Gebiete der Hysterie und Neurasthenie, mit denen sie sowohl in der Entstehung wie in den Symptomen vollkommen übereinstimmen. Es ist daher nicht berechtigt, die traumatische Neurose als selbständiges Krankheitsbild aufzustellen. Sämtliche Symptome, die bei der Neurasthenie und Hysterie beschrieben wurden, können auch bei den Unfallsneurosen vorkommen. Auch hier entwickelt sich der psychoneurotische Symptomenkomplex oft auf dem Boden einer bereits vorhandenen psychopathischen Disposition. Andererseits kommt hier in besonders hohem Maße als auslösendes und die Krankheit unterhaltendes Moment der früher erwähnte Wunschfaktor in Frage. Bei den Unfallsneurosen im Frieden sind es die auf Erzielung einer möglichst hohen Rente eingestellten Begehrungsvorstellungen, die die Hartnäckigkeit erklären, mit der die Kranken unbewußt an ihren Beschwerden festhalten bzw., wenn sie auf Mißtrauen zu stoßen glauben, *aggravieren*.

Hier besteht bei längerer Dauer des „Rentenkampfes“ die Gefahr, daß das Leiden so fest in der Psyche der Kranken fixiert wird, daß auch nach Hinwegräumung der eigentlichen Ursache desselben eine vollkommene Heilung nicht mehr eintritt. Ähnlich verhält es sich mit den Kriegsneurosen, die in der gleichen Weise einem bestimmten Wunschfaktor ihre Entstehung verdanken, insbesondere der Hoffnung der Patienten, infolge des Leidens den weiteren Gefahren des Krieges entzückt zu sein. Der bündige Beweis für die ausschlaggebende Rolle des genannten Momentes sowohl bei den Unfalls- wie bei den Kriegsneurosen liefert die Tatsache, daß in den ersteren Fällen dort, wo anstatt der Zahlung einer Dauerrente eine einmalige Kapitalabfindung und zwar bald nach dem Unfall stattfindet, die Unfallneurose in der größten Mehrzahl der Fälle alsbald ausheilt, und daß andererseits bei den Kriegsneurosen vielfach die Erfahrung Bestätigung fand, daß alle Schwerverletzten, aber auch z. B. die Insassen von Gefangenenlagern, also beides Gruppen, denen es an sich an Gründen zu gemüthlicher Depression nicht fehlte, dennoch von den Symptomen der Kriegsneurose frei blieben.

## Sachverzeichnis.

- Aachen 491.  
 Abführmittel 341.  
 Abnutzungsquote 459.  
 Absceß, periproktitischer,  
   bei Ruhr 47.  
 — bei paranephritischer 95,  
   425.  
 — subphrenischer 355.  
 Acetessigsäure 464, 467.  
 Aceton 464, 467.  
 Acetylsalicylsäure 89.  
 Acholie 364.  
 Achylia gastrica 292.  
 — bei perniziöser Anä-  
   mie 258.  
 — pancreatica 382.  
 Acidolpepsin 293.  
 Acidosis bei Diabetes 466.  
 — im Hunger 461.  
 Aconit 522.  
 Adalin 178, 183.  
 Adams-Stokessche Krank-  
   heit 154, 155.  
 Addison'sche Krankheit 445.  
 Adenoide Vegetationen 188.  
 Aderhauttuberkel 102.  
 Aderlaß 174.  
 Adiadochokinesin 569.  
 Adipositas 480.  
 — dolorosa 485.  
 Adrenalin (s. auch Supra-  
   renin) 128, 445.  
 — bei Osteomalacie 498.  
 Adrenalsystem 445.  
 Äquivalente der Migräne  
   608.  
 — der Epilepsie 594.  
 Ästivoautumnalfieber 107.  
 Affenhand 516.  
 Agaricin 232.  
 Ageusie 618.  
 Agglutination 10.  
 — bei Ruhr 47.  
 — bei Typhus 33.  
 Agglutinine 3.
- Ägophonie 243.  
 Agraphie 564.  
 Aibling 495.  
 Akromegalie 447.  
 Akroparästhesien 188.  
 Alanin 452.  
 Albuminurie 388.  
 — orthostatische (cycli-  
   sche) 409.  
 Aldehydprobe 361.  
 Alexie 565, 566.  
 Aleukämie 267.  
 Alexine (Schutzstoffe) 2.  
 Algäu 231.  
 Alival 183.  
 Alkaptonurie 485.  
 Alkohol bei Sepsis 97.  
 — bei Vasomotoren-  
   schwäche 159.  
 Alkoholpolyneuritis 525.  
 Allergie 10.  
 Alt tuberkulin 232.  
 Alumin. subacet. 350.  
 Alveolen 199.  
 Amara 292.  
 Ambozeptor 3.  
 Aminosäuren 452.  
 Ammenbakterien 9.  
 Ammoniak, Ausscheidung  
   b. Diabetes 467.  
 — Rolle im Stoffwechsel  
   459.  
 Ammonshorn, Verände-  
   rungen bei Lyssa 77.  
 Amnesie retrograde 593.  
 Amöbenruhr 47.  
 Amphotropin 430.  
 Amylnitrit 162, 608.  
 — als Blutgift 252.  
 Amyloidleber 376.  
 Amyloidose 229.  
 — bei Bronchiektasen 213.  
 Analfistel 229.  
 Anämien 251.  
 — sekundäre 252.
- Anämie aplastische 260.  
 — hyperchrome 258.  
 — im Kindesalter 260.  
 — perniziöse 257.  
 — posthämorrhagische  
   253.  
 Anaphylaxie 10.  
 — und Rhinitis 189.  
 Anasarka 151.  
 Anästhesien, geometrische  
   617.  
 — hysterische 617.  
 Anästhesin 198, 304, 523.  
 Anatoxine 74.  
 Aneurysma aortae 184.  
 Aneurysmen miliare 570.  
 Angina, chronische 64.  
 — Folgezustände 64, 65.  
 — follicularis 61.  
 — lacunaris 61.  
 — Ludovici 62, 280.  
 — phlegmonosa 62.  
 — ulcerosa-membranacea  
   oder Plaut-Vincent'sche  
   62, 70.  
 — und Polyarthrit 86.  
 — pectoris 162, 170.  
 Angulus Ludovici 201.  
 Anilin als Blutgift 252.  
 Anionen 454.  
 Ankylostomum duodenale  
   348.  
 Anopheles 105.  
 Anosmie 190, 505.  
 Anspannungs- oder Ver-  
   schlußzeit 128.  
 Anthelminthica 347.  
 Anthrakose 241.  
 Antianaphylaxie 71.  
 Antifebrin als Blutgift 252.  
 Antigene 3.  
 Antikörper 3.  
 Antikuslähmung 193.  
 Antineuralgica 522.  
 Antipyrin bei Grippe 53.

- Antiskorbutische Stoffe 273.  
 Antitoxine 3.  
 Anurie, reflektorische 422.  
 Anus praeternaturalis 335.  
 Anusol 342.  
 Aortenaneurysma 87, 184.  
 Aorteninsuffizienz 169.  
 Aortensklerose 182.  
 Aortenstenose 170, 172.  
 Aortitis luetica 183.  
 Apenta 484.  
 Aphasie, motorische 564.  
 — optische 566.  
 — sensorische 564.  
 Aphthen 277.  
 Apomorphin 212, 292.  
 Apoplexie 570.  
 Appendicitis 324.  
 — chronische 327.  
 — Beziehung zu Anginen 65.  
 — bei Pneumonie 56.  
 — bei Scharlach 15.  
 — bei Typhus 38.  
 Appendicostomie bei Colitis gravis 324.  
 Apraxie 566.  
 Aptyalismus 280.  
 Aqua calcis 212.  
 Arbeitertetanie 444.  
 Argent. nitr. 298.  
 Arginin 452.  
 Argochrom 97.  
 Argyll-Robertsonsches Phänomen 551.  
 Arrhythmie 145.  
 — extrasystolische 153.  
 — respiratorische 153.  
 — perpetua 154.  
 Aerophagie 308.  
 Arsacetin 255, 269.  
 Arsenbehandlung 190, 255.  
 Arsenmelanose 446.  
 Arsenquellen 255.  
 Arsenvergiftung 525.  
 — Verwechslung mit Cholera 45.  
 Arterienlues 183.  
 Arterienpuls 140.  
 Arterien, Röntgenuntersuchung 143.  
 Arteriosklerose 180.  
 — Therapie der 183.  
 Arthritis alkaptonorica 485.  
 — deformans 493.  
 — sicca 492.  
 — urica 474.  
 Arthritismus 420, 492.  
 Arthropathien bei Syringomyelie 546.  
 — bei Tabes 553.  
 Ascaris lumbricoides 348.  
 — Ursache von Leberabscessen 377.  
 Aschoff-Tawarascher Atrioventrikularknoten 126.  
 Ascites 358.  
 Ascitespunktion Ursache von Ileus 337.  
 Asparaginsäure 452.  
 Aspirationspneumonie 219.  
 Aspirin 89, 183.  
 Astasie-Abasie 618.  
 Astereognosie 566.  
 Asthma bronchiale 214.  
 — und Anaphylaxie 215.  
 — bei Bronchitis fibrinosa 210.  
 — cardiale 151, 162, 170.  
 — humidum 209.  
 — uraemicum 395.  
 Asthmazigaretten 216.  
 Astmolylin 215.  
 Astonin 190.  
 Aßmannshausen 423.  
 Asynergie 569.  
 Ataxie, cerebellare 556.  
 — hereditäre 556.  
 — bei perniziöser Anämie 258.  
 — bei Tabes 551.  
 Atelektase 210, 219.  
 Atemzentrum 200.  
 Atherosklerose 180.  
 Athetose 574.  
 Athyreose 436.  
 Atmen, pueriles 205.  
 Atmung und Zirkulation 129.  
 Atophan bei Gicht 479.  
 — bei Polyarthrit 90.  
 Atresia ani 333.  
 Atrioventricularknoten 126.  
 Atropin 215, 435, 530.  
 Augendiphtherie 71.  
 Augenmuskellähmungen 507.  
 Augenmuskelnerven 505.  
 Aura 592.  
 — hysterische 618.  
 Auscultation der Arterien 142.  
 — der Lungen 205.  
 — der Stimme 206.  
 — des Oesophagus 282.  
 Auslöschphänomen bei Scharlach 16.  
 Autovaccine bei Pyelitis 419.  
 Avitaminose 273, 275, 488.  
 Azotämie 394.  
 Azotorrhöe 380.  
 Babinskisches Großzehphänomen 539.  
 — — bei Urämie 394.  
 Bacillus fusiformis 63.  
 Baden-Baden 211.  
 Bakteriämie bei Typhus 31, 91.  
 Bakterien, Gruppenreaktionen 9.  
 — Toxine 2.  
 Bakterienflora des Darms 311.  
 Bakterioly sine 3.  
 Bakteriurie 419.  
 Balantidium coli 350.  
 Baldrian 615.  
 Balkenblase 428.  
 Balkenstich 602.  
 Ballettänzerinnenkrämpfe 527.  
 Balsamika 211.  
 Bandwürmer 345.  
 Bantingkur 484.  
 Bantische Krankheit 270.  
 Bärentraubenblätter 430.  
 Basedowsche Krankheit 155, 438.  
 Battaglia 90.  
 Bauchdeckenreflex 586.  
 Bauchdeckenspannung, Vorkommen der 352.  
 Bauchmuskelparese bei Poliomyelitis 79.  
 Bauchpresse, Bedeutung für die Zirkulation 130.  
 Bauchpunktion 360.  
 Bechterewsche Krankheit 495.  
 Bednarsche Aphthen 277.  
 Bekömmlichkeit der Speisen 290.  
 Bellocqsche Röhre 191.  
 Bellsches Phänomen 508.  
 Bence-Jonesscher Eiweißkörper 270.  
 Bentheim 211.  
 Benzaldehydprobe 361.  
 Benzinklistiere 349.  
 Benzol bei Leukämie 267.  
 — bei Polycythämie 262.  
 Beri-Beri 488.

- Berkefeld-Tonkerzenfilter 1.  
 Bernsteinsäure 238.  
 Beschäftigungskrämpfe 527.  
 Biermersche Anämie 257.  
 Bigeminie 155, 176.  
 Bilharzia 433.  
 Bilin 423.  
 Biliöses Typhoid 111.  
 Bilirubin 361.  
 — Nachweis im Stuhl 318.  
 Biotsche Atmung 203.  
 Bismolansuppos. 342.  
 Bismuth. bisalicyl. 307.  
 — subgall. 323.  
 — subnit. 298, 332.  
 — als Blutgift 252.  
 Blase s. auch Harnblase 427.  
 — reizbare 434.  
 Blasengeschwülste 431.  
 Blasenkatarrh 427.  
 Blasenschwäche 434.  
 Blasensteine 431.  
 Blei, Wirkung auf die Gefäße 181.  
 — Vergiftung 252.  
 Bleigicht 474.  
 Bleivergiftung 525, 595.  
 — Ursache der Schrumpfnieren 405.  
 Bleichsucht 255.  
 Blepharospasmus 526.  
 Blumbergs Symptom 352.  
 Blutdruckmessung 143.  
 Blutdrucksteigerung bei Nierenleiden 390.  
 Blutdrüsensklerose, multiple 451.  
 Blutgefäße, Bedeutung 128.  
 Blutgerinnung 251.  
 Blutgiftanämien 252.  
 Blutkrankheiten 249, 271.  
 Blutmenge und Größe des Herzens 149.  
 Blutplättchen 250.  
 Blutstillungsmittel 191.  
 Blutzucker bei Diabetes 465.  
 Boas-Opplersche Bacillen 289.  
 Bogheans Apparat 217.  
 Boraxglycerin 276.  
 Borovetin 419.  
 Bothriocephalus latus 347.  
 — Beziehung zur perniziösen Anämie 259.  
 Brachialgie 522.  
 Bradykardie 141, 155.  
 Brightsche Krankheit 397.  
 Brillische Krankheit 5, 27.  
 Brocasche Windung 562.  
 Brom 178, 183.  
 — bei Epilepsie 596.  
 Bromakne 596.  
 Bromoform 50.  
 Bromural 178, 183.  
 Bronchialatmen 205.  
 Bronchialdrüsen 201.  
 Bronchialdrüsentuberkulose 223.  
 Bronchiektasen 209, 212.  
 Bronchioli respiratorii 199.  
 Bronchiolitis 210.  
 — obliterans 210.  
 Bronchitis, akute 207.  
 — chronische 208.  
 — fibrinosa 210.  
 — pituitosa 209.  
 Bronchitiskessel 40.  
 Bronchoblennorrhöe 209.  
 Bronchopneumie 206.  
 Bronchopneumonie 218.  
 — käsige 229.  
 Bronchostenose 220.  
 Bronzekrankheit 445.  
 Brown-Séquardsche Bahn 533.  
 — Lähmung 548, 550.  
 Brücke 569.  
 Brückenau 423.  
 Brunnersche Drüsen 311.  
 Brunsscher Unterdruckapparat 217.  
 Brustumfang 202.  
 Brustwickel 211.  
 Bulbärparalyse, asthenische 560.  
 — progressive 560.  
 — Pseudo- 562.  
 Bulimie 308.  
 Burdachsche Stränge 532.  
 Buttersäure 467.  
 Butterstühle 380.  
 Cabotsche Ringe 258.  
 Cachexia thyreopriva 437.  
 — strumipriva 437.  
 Cadechol 176.  
 Caissonkrankheit 541.  
 Calcariurie 433.  
 Calc. carbon. 323.  
 Calc. lactic. 190.  
 Calorienäquivalentzahlen 484.  
 Calorientabelle von Nahrungsmitteln 457.  
 Calorimetrie 456.  
 Campher 174, 176.  
 — bei Pneumonie 59.  
 — bei Diphtherie 72.  
 — bei Vasomotorenschwäche 159.  
 Capsula interna 568.  
 Caput medusae 366.  
 — obstipum 527.  
 Carbo sanguin. 323.  
 Cardiospasmus 283, 302.  
 Carnifikation der Lunge 220.  
 Catarhus aestivus 190.  
 Cephalaea 608.  
 Cerebellum 569.  
 Cerebralrheumatismus 88.  
 Cerebrospinalflüssigkeit bei Tabes 551.  
 Cervicalnerven 514.  
 Cestoden 345.  
 Chalicosis 241.  
 Charcot-Leydensche Kryptalle im Sputum 215, 239, 347.  
 — — im Stuhl 320.  
 Charta nitrata 215.  
 Chemotherapie 10.  
 Cheyne-Stokessche Atmung 202.  
 Chinidin 176.  
 Chinin bei Gefäßneurosen 188.  
 — bei Grippe 53.  
 — bei Malaria 108.  
 — bei Menière 610.  
 Chininurethan 109.  
 Chinolysin bei Grippe 53.  
 Chiragra 475.  
 Chloralhydrat 50.  
 — als Gefäßgift 152.  
 Chlorcalcium 232, 240.  
 Chloroform als Gefäßgift 152.  
 Chlorom 267.  
 Chlorose 255.  
 — ägyptische 349.  
 Chlorylen 522.  
 Cholesterin 312.  
 Cholämie 363.  
 Cholangitis 370.  
 Cholecystitis 367.  
 Choledochoduodenalfistel 370.  
 Cholelithiasis 367.  
 Cholera asiatica 44.  
 — nostras 43.  
 Cholerae 45.  
 Cholin 128, 310, 530.  
 Chondrodystrophie 502.  
 Chorda tympani 508.  
 Chorea 599.

- Chorea bei Encephalitis epidemica 82.  
 — minor 88, 164, 599.  
 — posthemiplegische 574.  
 Chorioidealtuberkel 101.  
 Chvostek'sches Phänomen 443.  
 Chylurie, tropische 433.  
 Clauden 272.  
 Claudicatio intermittens 188.  
 Clavus hystericus 617.  
 Clostridium butyricum 313.  
 Clownismus 618.  
 Coagulen 272.  
 Cocain 190.  
 Codein 193, 211, 232.  
 Coecostomie bei Colitis gravis 324.  
 Coffein. natribenzoic. 174, 177.  
 — bei Grippe 53.  
 — bei Pneumonie 59.  
 — bei Vasomotoren-schwäche 159.  
 Colchicin 479.  
 Colchicin 479.  
 Colica mucosa 343.  
 Colivaccin 419.  
 Collargol 97.  
 Coloptose 340, 344.  
 Coluitrin 41, 447.  
 — bei Ileus 338.  
 Coma diabeticum 469.  
 — postepileptisches 592.  
 Comazylinder 469.  
 Condurango 293.  
 Copaiva 430.  
 Corpus striatum 568.  
 Cortex Coto 332.  
 Coryza 189.  
 Cor nervosum 177.  
 Crampi 527.  
 Crampusneurose 527.  
 Craniotabes 500.  
 Cremor tartari 367.  
 Creosot 211.  
 Cubeben 430.  
 Cudowa 495.  
 Culex 105.  
 — fatigans 90.  
 Curschmann'sche Maske 236.  
 — Spiralen 215.  
 Cystenniere 412.  
 Cysticercus cellulosae 347.  
 Cystinsteine 420.  
 Cystinurie 486.  
 Cystitis 427.  
 Cystopurin 430.  
 Cystopyelitis 416, 417.  
 Dämmerzustände 594.  
 — hysterische 619.  
 Damoiseausehe Linie 242.  
 Darm, normales Röntgen-bild 310.  
 Darmamyloid 332.  
 Darmbewegungen, Physiologie der 310.  
 Darmblutung 41.  
 — bei Typhus 33.  
 Darmgeschwüre bei Urämie 316.  
 Darminvagination 337.  
 Darmkatarrh 316.  
 — chronischer 320.  
 Darmkrankheiten 309.  
 — nervöse 342.  
 Darmkrebs 329.  
 Darmkrisen 553.  
 Darmparasiten 345.  
 Darmperforation bei Typhus 34.  
 Darmrohr 41.  
 Darmsarkom 331.  
 Darmtuberkulose 331.  
 Darmverengung 333.  
 Darmverschluß 333.  
 — arteriomesenterialer 307.  
 Dauerausscheider 6.  
 — bei Diphtherie 69.  
 Davos 198.  
 Decoct. Colombo 332.  
 — ligni campechian. 332.  
 Decubitus, Behandlung des 541.  
 Degeneration sekundäre d. Rückenmarksbahnen 533.  
 Degenerationszeichen 595.  
 Degrassator 485.  
 Delirium cordis 154.  
 — tremens 57.  
 Demenz, arteriosklerotische 576.  
 Dendriten 502.  
 Dengue 90.  
 Dentition, Störungen bei Rachitis 501.  
 Derkumsche Krankheit 485.  
 Dermatol 323, 324.  
 Dermatomyositis 491.  
 Desaminierung 453.  
 Desinfektion bei Typhus 42.  
 Desmoidprobe 289.  
 Déviation conjuguée 566, 571.  
 Dextrose 454.  
 Diabetes insipidus 486.  
 — mellitus 462.  
 — renaler 470.  
 Diaminosäuren 452.  
 Diaminurie 486.  
 Diarrhöen, gastrogene 292, 320, 322.  
 — nervöse 323, 343.  
 Disaccharide 454.  
 Diazoreaktion im Harn 18, 228, 269.  
 Dickdarm, Katarrh des 319.  
 Dickes Tropfenpräparat 108.  
 Digifolin 176.  
 Digipurat 176.  
 Digitalis, Wirkung der 175.  
 — Contraindikation 176.  
 Dikrotie 145.  
 Dimethylamidoazoberzol 289.  
 Dionin 232.  
 Diphtherie 66.  
 — bei Masern 19.  
 Diphtheriebacillus 66.  
 Diphtherieheilsrum 71.  
 Diphtheroid bei Scharlach 16.  
 Diplegia cerebri spastica 580.  
 Diplococcus intracellularis 83.  
 — crassus 83.  
 Dipsomanie 594.  
 Dispargen 97.  
 Disposition und Immunität 5.  
 Distomum haematobium 433.  
 — pulmonale 239.  
 Dittrich'sche Pfröpfe 212, 236.  
 Diuretica 407.  
 Diuretin 162, 177, 244.  
 Divertikel des Ösophagus 283.  
 Döhlesche Körperchen 15.  
 Douglas'sche Sonde 355.  
 Dowersches Pulver 211.  
 Druckpuls 581.  
 Drüsen mit innerer Sekretion 435.  
 Drüsenpest 98.  
 Duboisin 599.  
 Ductus Botalli, Offenbleiben des 172.  
 Dünndarmkarzinom 330.  
 Duodenalsonde 379.  
 Duodenitis 318.

- Durchwanderungspleuritis 241.  
 Durstkur 211.  
 Dysarthrie 561.  
 Dyschezie 340.  
 Dyskinesie, intermittierende 188.  
 Dyskinesien 597.  
 Dyspepsie 321.  
 — nervöse 307.  
 Dyspnoe, verschiedene Formen der 202.  
 Dyspraxia intermittens intestinalis 182.  
 Dystrophia adiposogenitalis 448.  
 — muscularis progressiva 558.  
  
 Ebsteinsche Kur 484.  
 Echinococcus der Lunge 238.  
 — der Leber 373.  
 — der Niere 416.  
 Ecksehe Fistel 364.  
 Ehe und Lungentuberkulose 231.  
 Eilsen 193.  
 Eingeweidewürmer 345.  
 Eisenmanganpeptonat 254.  
 Eisenpräparate 254.  
 Eiweissausscheidung, renale 388.  
 Eiweißkörper, Chemie der 452.  
 Eiweißgehalt des Sputums 209.  
 Eiweißstoffwechsel 458.  
 Ejaculatio praecox 613.  
 Elektrokardiogramm 140.  
 — bei Herzschwäche 152.  
 Elster Bad 495.  
 Embolie 87, 187.  
 Embolien, in der Haut 165.  
 Embryokardie 138.  
 Embryonale Blutbildung 259.  
 Emetin 48, 350.  
 Emphysem 216.  
 — interstitielles 218.  
 Empyem der Gallenblase 369.  
 — der Nebenhöhlen 189.  
 — der Pleura 229, 244.  
 — — bei Lungenabszeß 235.  
 — — metapneumonisches 57.  
 Empyema necessitatis 244.  
 — des Wurmfortsatzes 326.  
 Ems 190, 193, 211, 281.  
 Enanthem bei Masern 17.  
 Encephalitis 576.  
 — epidemica s. lethargica 82.  
 — nichteitrig 578.  
 — nach Salvarsan 591.  
 Encephalomalacie 572.  
 Encephalopathia saturnina 595.  
 Enderteriitis luetica 588.  
 — obliterans 181.  
 Endocarditis 163.  
 — Überleitungsstörungen bei 164.  
 — Netzhautveränderungen bei 164.  
 — lenta 95.  
 — nach Pneumonie 58.  
 — bei Gelenkrheumatis- mus 87.  
 Endokrine Drüsen 435.  
 Endos Fuchsin-Milchzuckeragar 31.  
 Endothelsymptom 251.  
 Engadin 231.  
 Entamoeba histolytica 47.  
 Entartungsreaktion 504.  
 Entenform des Herzens 169.  
 Enteritis 316.  
 Enterocolitis 316.  
 Enteroptose 149, 344.  
 Entfaltungsrasseln 206, 219.  
 Entfettungskuren 484.  
 Enthelminthen 345.  
 Enuresis nocturna 434.  
 — bei Epilepsie 593.  
 Epidemie, explosionsartige Auftreten 6.  
 Epididymitis bei Parotitis 60.  
 — bei Gicht 477.  
 Epidurale Injektion 523.  
 Epiglandol 451.  
 Epiglottis 192.  
 Epilepsie 156, 591.  
 Epiphyse 451.  
 Episkleritis bei Gicht 477.  
 Epistaxis 191.  
 Epithelkörperchen 442.  
 Erbsches Phänomen 443.  
 Erbsche Lähmung 516.  
 Erbrechen, cerebrales 581.  
 Erdbeerzunge 15.  
 Erepton 285.  
 Erhaltungseiweiß 458.  
 Erlenmeyersches Bromgemisch 596.  
 Erregbarkeit, elektrische der Nerven 504.  
 Erschöpfungsneurosen 614.  
 Erythema nodosum 88.  
 Erysipel 28.  
 — der Kehlkopfschleimhaut 196.  
 Erythramie 261.  
 Erythropoese 250.  
 Erythrozyten 250.  
 — Resistenz 251.  
 Erythrozytose 261.  
 Euchinin 50.  
 Eukalyptus 211.  
 Eumydrin 300, 341.  
 Eunuchen 449.  
 Eunuchoidismus 450.  
 Euphyllin 177, 244, 410.  
 — als Hämostypticum 273.  
 Exantheme 13.  
 — masernähnliche nach Veronal, Aspirin 19.  
 — bei Serumkrankheit 73.  
 Expektoration, albuminöse 240.  
 — „maulvolle“ 212, 236.  
 Explosionsartiges Auftreten einer Epidemie 6.  
 Extr. Rhois aromat. 435.  
 Extrauterinegravidität 328.  
  
 Fäces Untersuchung 312.  
 — Zusammensetzung der 312.  
 Fachinger Wasser 419.  
 Facialiskrampf 526.  
 Facialislähmung 508.  
 Facies abdominalis oder hippocratica 336, 353.  
 — leontina 266.  
 Fallsucht 591.  
 Färbeindex 251.  
 Farnwurzel 347.  
 Faulheitsfettsucht 480.  
 Fäulnisdyspepsie 322.  
 Febris recurrens 109.  
 — quintana 111.  
 Fettembolie der Lunge 234.  
 Fette 454.  
 Fettherz 161.  
 Fettkörnchenkügelchen im Sputum 237.  
 — im Nervengewebe 540.  
 Fettleber 376.  
 Fettsucht 480.  
 Fettnachweis im Stuhl 313.  
 Fibrolysin 494.



- Fiekers Diagnostikum 33.  
 Fieber 7.  
 — Stoffwechsel im 461.  
 — Wollhynisches 111.  
 Filaria sanguinis 433.  
 Filixpräparate 348.  
 Filmaron 348.  
 Fissura ani 342.  
 Flankenmeteorismus 334.  
 Fleckfieber 26.  
 — Unterscheidung von Typhus 38.  
 Fleischscher Cornealing 601.  
 Fleischvergiftung 43.  
 Fliegen als Überträger und Krankheitserreger 7.  
 Flinsberg 495.  
 Flores cinæ 348.  
 Folia uvæ ursi 419, 430.  
 Foramen ovale, Offenbleiben des 172.  
 Formanwatte 189.  
 Förstersche Operation 556.  
 Fowlersche Lösung 216, 255.  
 Friedrichsche Krankheit 556.  
 Froinsches Syndrom 550.  
 Fruchtzucker 454.  
 Frustrane Kontraktionen 155.  
 Fuchsin-Milchzucker-Agar, Endos 31.  
 Fulmargin 97.  
 Fünftagefieber 111.  
  
 Galaktose 454.  
 Galaktoseprobe 361.  
 Gallenblase, physikalischer Nachweis der 360.  
 Gallenblasencarcinom 370, 372.  
 Gallensteine 367.  
 Gallensteinileus 336.  
 Gallenwege, Rolle der beim Typhus 36.  
 Ganglienzellen 502.  
 Ganglion ciliare 505.  
 — geniculi 508.  
 Gärungsdyspepsie 321.  
 Gärungsprobe am Stuhl 313.  
 — zum Zuckernachweis 464.  
 Galopprrhythmus des Herzens 151, 155.  
 — bei Diphtherie 68.  
 Gameten 103.  
  
 Gangrän der Extremitäten 183.  
 Gardone 198.  
 Garlandsches Dreieck 242.  
 Gärtnerbacillen 47, 317.  
 Gasbacillen 92.  
 Gasembolie 232.  
 Gastein 491.  
 Gastrektasie 305.  
 Gastrisches Fieber 37.  
 Gastritis 290.  
 Gastroenterostomie 300.  
 — Nachbehandlung der 315.  
 Gastropexie 305.  
 Gastroplegie, akute 307.  
 Gastropiose 304.  
 — fixierte 305.  
 Gastrosan 307.  
 Gastrosuccorrhöe 294.  
 Gastroenteritis paratyphosa 43.  
 Gastroxynsis 294.  
 Gaumensegellähmung 69.  
 Gefäßband 135.  
 Gefäßblähmung 152.  
 Gefäßneurosen 187.  
 Gefäßtonus 128.  
 Gefrierpunktdepression des Serums 386.  
 Gehirnabsceß 576.  
 Gehirnarteriosklerose 575.  
 Gehirnblutung 570.  
 Gehirndrucksymptome 581.  
 Gehirneembolie 570, 572.  
 Gehirngefäße, Thrombose 570.  
 Gehirnluës 588.  
 Gehirnpunktion 578, 606.  
 Gehirnsinusthrombose 602.  
 Gehirnthrombose 572.  
 Gehirntuberkel 580.  
 Gehirntumor 580.  
 Gehirnnerven, Lähmungen 505.  
 Gelatine bei Aneurysma 186.  
 — als Hämostypticum 273.  
 — Nährwert der 460.  
 Gelenkkrankheiten, chronische 491.  
 Gelenkrheumatismus 86, 164.  
 — Beziehung zu Anginen 65.  
 Gelenkschwellungen bei Scharlach 15.  
 — bei Ruhr 47.  
 Gelenktuberkulose 89.  
 Gelonida alumin. subacet. 350.  
  
 Genius epidemicus 5.  
 Genu recurvatum 553.  
 Gerhardttsche Reaktion 464, 469.  
 — Schallwechsel 228.  
 Gerhardt-Turbansches Einteilungsschema 230.  
 Gesetz betr. die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 12.  
 Gibraltarfieber 102.  
 Gicht 474.  
 Gigantismus 448.  
 Gifffestigkeit 2.  
 Gingivitis bei Barlowscher Krankheit 275.  
 — marginalis 276.  
 — scorbutica 274.  
 Glandula parathyreoidea 442.  
 — pinealis 451.  
 — pituitaria 446.  
 Glénardsche Krankheit 344.  
 Gliome 580.  
 Globus hystericus 617.  
 Glomerulonephritis 397.  
 Glossitis 278.  
 — bei perniziöser Anämie 258.  
 Glottisödem 196.  
 Glycirenan 53.  
 Glykogen 454.  
 Glykokoll 452.  
 Glykosurie, alimentäre 470.  
 Glyzyltryptophanprobe 302.  
 Gmelinsche Probe 362.  
 Gollsche Stränge 532.  
 Goltzscher Klopfversuch 131.  
 Gonokokkensepsis 96.  
 Gonorrhoe 164.  
 Gonorrhoe des Mundes 276.  
 — des Rectums 230.  
 Gottsteinsche Sonde 285.  
 Gowersches Bündel 532.  
 Graefesches Zeichen 439.  
 Gratioletsche Sehstrahlung 566.  
 Graminol 190.  
 Granularatrophie der Niere 404.  
 Granulom der Lymphdrüsen 268.  
 Grawitzscher Tumor 411.  
 Griffplethysimeter 204.  
 Grippe (Influenza) 50.  
 Großhirnkrankheiten 562.

- Grundumsatz (Ruhennüchternwert) 456, 458.  
 Gruppenagglutination 42.  
 Gruppenreaktionen der Bakterien 9.  
 Gruber-Widal, Agglutinationsreaktion 33.  
 Guajakol 213, 232.  
 Guarnierische Körperchen 23.  
 Günzburger Probe 289.  
 Gurgeln 280.  
 Gymnastik, schwedische 177.  
 Haarzunge 279.  
 Habitus asthenicus 201, 222.  
 Haffkine-Kollesche Schutzimpfung 45.  
 Halisteresis 497, 500.  
 Hamamelis 342.  
 Hämatoidin im Sputum 234.  
 Hämatom der Dura 605.  
 Hämatomyelie 547.  
 Hämatopoese 250.  
 Hämatothorax 246.  
 Hämaturie bei Appendicitis 328.  
 — tropische 433.  
 Hämoglobin 250.  
 Hämoglobinämie bei Sepsis 94.  
 Hämoperikard 180.  
 Hämophilie 271.  
 Hämoptoe bei Bronchiektase 213.  
 — bei Lungenabsceß 234.  
 — bei Lungentuberkulose 224.  
 Hämorrhagische Diathesen 271.  
 Hämorrhoiden 341.  
 Hämosiderose 254.  
 Hämoptica 191.  
 Hampelmannphänomen 275.  
 Haudeksche Nische 297.  
 Hängebauch 345.  
 Hanotsche Cirrhose 367.  
 Hapan 285.  
 Harnacidität 464, 467.  
 Harnapparat, Erkrankungen 383.  
 Harnblase, Konkrement in der 431.  
 — Krankheiten der 426.  
 — Spülungen der 430.  
 — Tuberkulose der 424.  
 Harnblase, Tumoren der 431.  
 Harnzylinder 388.  
 Harnentleerung, Mechanismus der 426.  
 Harnkonkremente, Analyse der 420.  
 Harnröhrenkatarrh bei Ruhr 47.  
 Harnröhrenkrisen 553.  
 Harnsäure 453.  
 — Verhalten der bei Gicht 474.  
 Harnsediment 388.  
 Harnstoff 453.  
 — als Diureticum 407.  
 — Nierenfunktionsprüfung mittels 386.  
 Haustiere als Überträger von Krankheitsserregern 7.  
 Hautpest 98.  
 Hautsensibilität, Verteilung der 533.  
 Heberdensche Knoten 479, 493.  
 Helfenberger Bandwurm-mittel 348.  
 Heine-Medinsche Krankheit 78.  
 Heißhunger 308.  
 Helgoland 190.  
 Helmitol 430.  
 Hemianopsie 566.  
 Hemianästhesie 574.  
 Hemianaesthesia dolorosa 567.  
 Hemikranie 606.  
 Hemiplegia alternans 574.  
 — cerebrale 573.  
 — bei Migräne 607.  
 — spastica infantilis 579.  
 — spinalis 81.  
 Hemispasmus glosso-labialis 618.  
 Hemizellulose 312, 454.  
 Henochsche Purpura 272.  
 Hepar lobatum 374.  
 Hepatargie 364.  
 Hepatitis suppurativa 376, 377.  
 Hepatoptose 376.  
 Herdnephritis, embolische 411.  
 Hernien 333.  
 Herpes facialis bei Erysipel 29.  
 — bei Influenza 51.  
 — bei Pneumonie 55.  
 — bei Paratyphus 43.  
 Herpes facialis bei Typhus 38.  
 — zoster 521.  
 Herz, kleines 149.  
 Herzaneurysma 163.  
 Herzarbeit 128, 157.  
 Herzbeschwerden bei Fettleibigkeit 161.  
 Herzbeutelobliteration 180.  
 Herzbeutelwassersucht 180.  
 Herzbuckel 131.  
 Herzdämpfung 133.  
 Herzdilatation 136, 149.  
 — bei Diphtherie 68.  
 Herzfehlerzellen 239.  
 Herzfunktionsprüfung 157.  
 Herzgeräusche 138.  
 — akzidentelle 139.  
 — perikardiale 139.  
 — diastolische, akzidentelle 258.  
 Herzgröße 149.  
 — Bestimmung der 133.  
 Herzhypertrophie 148.  
 Herzjagen 156.  
 Herzinsuffizienz 149.  
 Herzklappen, Auskultationsstellen der 137.  
 Herzklappenfehler 166.  
 — angeborene 171.  
 Herz- und Kreislaufschwäche, Therapie der 174.  
 Herzleberwinkel 179.  
 Herzlues 160.  
 Herzmuskel, Krankheiten des 158.  
 Herznerven 127.  
 Herzneurose 177.  
 Herzzröntgenbild 136.  
 Herzzraktur 163.  
 Herzschwäche 149.  
 Herzsitzenstoß 131.  
 Herzstenose 171.  
 Herzstoßkurve 145.  
 Herztätigkeit 131.  
 — Registrierung der 144.  
 Herztöne 136.  
 — Verdoppelung der 138.  
 Herzvergrößerung 136.  
 Heschlsche Windung 565.  
 Heterochylie 308.  
 Heuschnupfen 190.  
 Heustrich 211.  
 Hexal 419, 430.  
 Hexamethylentetramin 419.  
 Hexenschuß 489.  
 Highmorshöhle 188.  
 Hilusschatten 206.

- Hippursäure 383.  
 Hirn s. auch Gehirn.  
 Hirschenkel 568.  
 Hirschsprungische Krankheit 338.  
 Hissches Bündel 126.  
 Histamin 530.  
 Hochdruckstauung 144, 151, 176.  
 Hochgebirge 190.  
 Hoden, inneres Sekret 449.  
 Hodenentzündung siehe Orchitis  
 Hodgkinsche Krankheit 268.  
 Hofbauerscher Expirator 217.  
 Höhenklima, Wirkung auf das Blut 261.  
 Höhensonne 232.  
 Homburg 293, 341.  
 Homogentinsäure 485.  
 Hookworm 349.  
 Hörbahnen 565.  
 Hormin 452.  
 Hormonal 338, 356.  
 Hormone 435.  
 — und Zirkulation 131.  
 Hornerscher Symptomenkomplex 541, 546.  
 Hunger, qualitativer 487.  
 — Stoffwechsel im 461.  
 Hungerosteomalacie 498.  
 Hungerschmerz 314.  
 Huntingtonsche Chorea 600.  
 Hustenreflex 192.  
 Hydrämie bei Nephritis 399.  
 Hydrargyrum, Kur 161.  
 Hydrastis 233.  
 Hydrobilirubin, Nachweis im Stuhl 318.  
 Hydrocephalus 85, 601.  
 Hydronephrose 414.  
 — intermittierende 415.  
 Hydroperikard 180.  
 Hydrophobie 77.  
 Hydrothorax 245.  
 Hyperacidität 293.  
 Hyperakusis 508.  
 Hyperästhesie, allgemeine 78.  
 Hypernephrome 411.  
 Hyperpituitarismus 447.  
 Hyperthyreose 438.  
 — bei Lungentuberkulose 230.  
 Hypertonie, essentielle 186.  
 Hypnose 308.  
 Hypochondrie 611.  
 Hypogenitalismus 450.  
 Hypophyse 446.  
 — Bedeutung für Diabetes 462.  
 Hypophysenpräparate 215.  
 — bei Ileus 338.  
 — bei Zirkulationschwäche 174.  
 Hyposthenurie 385, 406.  
 Hypothyreose 436.  
 Hypotonie der Muskeln 504.  
 — — bei Tabes 552.  
 Hysterie 616.  
 Ichthyol 16, 342.  
 Icterus 362.  
 — gravis 364.  
 — hämolytischer 260.  
 — infectiosus 112.  
 — melas 372.  
 Idiosynkrasie bei Heufieber 190  
 Ileoocaltumor bei Appendicitis 326  
 — tuberkulöser 331.  
 Ileus 333.  
 — paralytischer 337.  
 — spastischer 338.  
 Ileum, Katarrh des 318.  
 Immunisierung, aktive (Impfschutz) 6.  
 — natürliche 5.  
 Immunität, Disposition und 5.  
 Immunitätsreaktionen 3.  
 Immunotherapie 11.  
 Impetigo contagiosa, Verwechslung mit Pocken 23.  
 Impfgegner 25.  
 Impferysipel 29.  
 Impfgesetz 24.  
 Impfpocken 24.  
 Impfschutz (aktive Immunisierung) 6.  
 Impfwut 78.  
 Incontinentia vesicae 427.  
 Indigocarmin, Nierenfunktionsprüfung mittels 387.  
 Indolbildung durch Koli-bacillen 31.  
 Infantilismus 222.  
 Influenza 50, 189.  
 Influenzabacillus 50.  
 Influenzapneumonie 235.  
 Inkubationszeit 4.  
 Insekten als Überträger von Krankheitserregern 7.  
 Insuffizienz, pluriglanduläre 451.  
 Insult, apoplektischer 570.  
 Intentionstremor 585.  
 Intercostalneuralgie 202, 521.  
 Intubation bei Diphtherie 72.  
 Intussusception 333.  
 Inulin 454.  
 Invagination 333, 337.  
 Ipecacuanha 211.  
 Iridocyclitis bei Ruhr 47.  
 Iritis 88.  
 — Beziehung zu Anginen 65.  
 — bei Gicht 477.  
 Ischias 229, 520.  
 Ischuria paradoxa 427.  
 Isosthenurie 385, 406.  
 Jacksonsche Epilepsie 567, 582, 595.  
 Jejunum, Katarrh des 318.  
 Jod 183, 184.  
 — als Ursache von Glottis-ödem 196.  
 Jodbasedow 441.  
 Jodglycerin 191.  
 Jodismus 189.  
 Jodival 183.  
 Jodkalium 161, 183, 211, 216.  
 — Nierenfunktionsprüfung mittels 387.  
 Jodoform bei Blasantuberkulose 425.  
 Jodvasogen 244.  
 Kadaverstellung der Stimmbänder 194.  
 Kahlersche Krankheit 270.  
 Kahnbauch 84.  
 Kakke 488.  
 Kalkgicht 479.  
 Kalomel 323.  
 Kalzan 190, 216, 273.  
 Kammerextrasystolie 153.  
 Kapillaren, Funktion der 129.  
 Kapillarbronchitis 210.  
 Kapillarpuls 170.  
 Kardiogramm 145.  
 Karellkur 175, 367.  
 Kardiolyse 180, 249.  
 Karlsbad 295, 367.

- Karlsbader Mühlbrunnen 293, 298.  
 Karminprobe 310.  
 Kartoffelkur 483.  
 Kastration 449.  
 Katalepsie 619.  
 Katheterfieber 428.  
 Kationen 454.  
 Katzenschnurren 166.  
 Kavernen, Nachweis von 228, 235.  
 Kehlkopfcarcinom 198.  
 Kehlkopfkatarrrh s. Laryngitis.  
 Kehlkopfkrankheiten 191.  
 Kehlkopflähmungen 193.  
 Kehlkopflues 198.  
 Kehlkopfmuskeln 193.  
 Kehlkopfnerven 191.  
 Kehlkopfpolypen 198.  
 Kehlkopfstenose 202.  
 Kehlkopftuberkulose 197.  
 Keimdrüsen, Krankheiten der 449.  
 Keimträger 2.  
 — bei Diphtherie 70.  
 — bei Meningitis 86.  
 — bei Poliomyelitis 78.  
 Keith-Flackscher Sinusknoten 126.  
 Keratose der Tonsillen 61.  
 Kernig's Symptom 84, 604.  
 Ketonurie bei Diabetes 466.  
 Keuchhusten 48.  
 Kieferhöhlenkrankung 189.  
 Kieferklemme 75.  
 Kinderlähmung, cerebrale 579.  
 — epidemische 78.  
 Kissingen 293, 295, 341, 367.  
 Klavierspielerkrampf 527.  
 Kleinhirn 569.  
 Kleinhirnbrückenabszess 577.  
 Kleinhirnbrückenwinkeltumoren 583.  
 Kleinhirnseitenstrangbahn 532.  
 Kleinhirntumoren 583.  
 Klimakterium und Hypertonie 186.  
 — vorzeitiges 450.  
 Klitorisrisen 553.  
 Klumkesche Plexuslähmung 517.  
 Klumpfuß nach Poliomyelitis 80.  
 Knötchenkopfschmerz 609.  
 Kohlehydrate 454.  
 Kohlensäurebäder 177.  
 Kolibacillen, Indolbildung 31.  
 Kolipyelitis 418.  
 Kolisepsis 95.  
 Kolitis 316, 319.  
 — ruhrähnliche 47, 48.  
 Kollapsluft 200.  
 Kolutrin 447.  
 Kompensatorische Pause 153.  
 Komplement 2.  
 Komplementärluft 200.  
 Kompressionsmyelitis 542.  
 Konjunktivalblutungen bei Herzschwäche 151.  
 Kontaktinfektion 6.  
 Konzentrationsversuch 385.  
 Kopfschmerz 608.  
 Kopliksche Flecke 17.  
 Koprostase 336.  
 Körnchenzellen 570.  
 Koronargefäße 129.  
 — Erkrankung der 161.  
 Korsakow'sche Psychose 525.  
 Kösen 211.  
 Kostgerüst von Umber 484.  
 Köstritz 491.  
 Kot s. Fäces.  
 Kotbrechen 354.  
 Krämpfe, lokale 526.  
 Kreatinin, Nierenfunktionsprüfung mittels 386.  
 Kretorrhöe 380.  
 Kretinismus 436.  
 Kreislaufinsuffizienz 150.  
 Kreosot 232.  
 Kreuznach 281.  
 Kriegsnephritis 401.  
 Kriegsneurosen 621.  
 Krisen bei Tabes 552.  
 Krönig'sches Schallfeld 204.  
 Kropfherz 441.  
 Krupphusten 67, 192.  
 Kruse-Shiga-Bacillen 46.  
 Kuhnsche Saugmaske 261.  
 Kuhpocken 24.  
 Kußmaul'sche Atmung 202, 395.  
 Kutanimpfung nach Pirquet 226.  
 — — bei Masern 19.  
 Kyphoskoliose 208.  
 Labyrinthfunktionsprüfung 610.  
 Lackmus-Milchzucker-Agar 31.  
 Lacunen im Gehirn 575.  
 Lagophthalmus 508.  
 Lähmungen, peripherische 503.  
 Laktopenin als Blutgift 252.  
 Landeck 495.  
 Landry'sche Paralyse 542.  
 — — Neuritische Form 525.  
 Lanzscher Punkt 326.  
 Laryngitis 192.  
 — chronica 193.  
 — nodosa 198.  
 — subglottica 192.  
 Laryngofissur 199.  
 Laryngospasmus 195.  
 Larynxkrisen 196, 553.  
 Larynxstenose 196, 198.  
 — bei Influenza 51.  
 Lasèguesches Symptom 520.  
 Lateralsklerose amyotrophische 557.  
 Läuse, Vernichtung der 28.  
 Lävulose 454.  
 — Nachweis 474.  
 Lävulosurie 474.  
 Leber, Funktionsprüfungen der 361.  
 — Krankheiten der 360.  
 — Melanosarkom 373.  
 — Neoplasmen der 371.  
 — physikalische Untersuchung 360.  
 Leberabsceß 376.  
 Leberatrophie, akute, gelbe 364.  
 Lebercarcinom 371.  
 Lebercirrhose 365.  
 — mit Hautpigmentierungen 446.  
 Leberechinococcus 373.  
 Leberlues 374.  
 Lebersenkung 376.  
 Lebertran 231, 501.  
 Leibbinden 305, 345.  
 Leim, Nährwert des 460.  
 Lemniscus 533.  
 Lenhartz'sches Diätschema 298.  
 Leptomeningitis 603.  
 Leptothrix 213, 313.  
 Leube-Pulver 341.  
 Leubesche Diätkur 298.  
 Leucin 364.  
 Leukämie 262.  
 — akute 266.  
 — lymphatische 265.  
 — myeloide 263.

- Leukoplakie 279.  
 Leukopoese 250.  
 Leukosarkomatose 267  
 Leukosen 262.  
 Leukozyten 250.  
 Leydigsche Zwischenzellen 449.  
 Lichen scorbuticus 274.  
 Lieberkühnsche Drüsen 311.  
 Lingua geographica 279.  
 Linsenkern 568.  
 Linsenkerndegeneration, familiäre 601.  
 Linsenkernveränderungen bei Encephalitis lethargica 82.  
 Lipämie bei Diabetes 465.  
 Lipodystrophia progressiva 485.  
 Liqueur Laville 479.  
 Liquor cerebrospinalis s. Cerebrospinalflüssigkeit.  
 Liquor Kal. acet. 407.  
 Lithotripsie 432.  
 Little'sche Krankheit 580.  
 Lobelia 216.  
 Locus Kiesselbachii 191.  
 Löfflersches Blutserum 66.  
 Logorrhöe 565.  
 Loewische Reaktion 451.  
 Lues cerebrospinalis 587.  
 Lues III, Therapie der 161.  
 Luftembolie 187, 232.  
 Luftröhre 199.  
 Lumbago 489.  
 Luminal bei Epilepsie 596.  
 Lungenabszeß 234.  
 Lungenblutungen 237.  
 Lungencarcinom 237.  
 Lungenembolie 233.  
 Lungengangrän 235.  
 Lungeninfarkt 233.  
 Lungenkreislauf 129.  
 Lungenlues 236.  
 Lungenödem 239.  
 Lungen, Perkussion der 203.  
 Lungenpest 98.  
 Lungen, Röntgenuntersuchung 206.  
 Lungenschlag 233.  
 Lungenschrumpfung 220.  
 Lungenspitzenkatarrh 224.  
 Lungentuberkulose 221.  
 Lungentumoren 237.  
 Lymphadenose 263.  
 Lymphangiom des Netzes 359.  
 Lymphogranulom 268.  
 Lymphozyten 250.  
 Lymphozytenschatten 266.  
 Lysin 452.  
 Lyssa 76.  
 Lyssophobie 77.  
 Mac Burneyscher Punkt 326.  
 Madeira 198.  
 Madenwurm 350.  
 Magen, Anatomie und Physiologie 287.  
 Magenatonie 305.  
 Magencarcinom 301.  
 Magengeschwür 295.  
 Magenkatarrh 290.  
 Magenkolonfistel 303.  
 Magen neurosen 307.  
 Magen, Pneumatoxis des 308.  
 — Röntgenbild 287.  
 Magensaft 288.  
 Magenstenose 304.  
 Magenstenose 306.  
 Magnesiumperhydrol 294.  
 Magnesiumsulfatbehandlung bei Tetanus 76.  
 Malaria 103.  
 — quartana 106.  
 — -ruhr 107.  
 — tertiana 105.  
 — tropica s. pernicioso 107.  
 Malpighische Körperchen 383.  
 Maltafieber 102.  
 Maltose 454.  
 Malum coxae senile 494.  
 — Pottii 542.  
 Mamillarlinie 131.  
 Mandelsteine 62.  
 Mannsche Lösung 191.  
 Maretin als Blutgift 252.  
 Marienbad 295, 341, 367.  
 Masern 17.  
 — nach Keuchhusten 49.  
 Masernähnliche Exantheme nach Veronal, Aspirin 19.  
 Mastdarm, Katarrh des 320.  
 Mastdarmcarcinom 330.  
 Mastdarmkühler 342.  
 Mastdarmlues 332.  
 Mastdarmtuberkulose 332.  
 Mastfettsucht 480.  
 Mastodynie 522.  
 Maternitätstetanie 444.  
 Mäusetypus bacillus 42.  
 Meckelscher Divertikel 333.  
 Medianuslähmung 516.  
 Mediastinalemphyssem 218.  
 Mediastinalphlegmone bei Scharlach 15.  
 Mediastinaltumoren 248.  
 Mediastinitis 249.  
 Mediastino-Perikarditis 180.  
 Mediastinum, Krankheiten des 247.  
 Medinal 178, 183, 616.  
 Megaloblasten 258.  
 Megalozyten 258.  
 Megasigma 338.  
 Melanogenreaktion 373.  
 Melanotrichia linguae 279.  
 Melkerkrampf 527.  
 Melubrin 491.  
 Mendelsches Pulver 315.  
 Meniärescher Symptomenkomplex 609.  
 Meningealtuberkulose 101.  
 Meningismus 85.  
 — bei Pneumonie 58.  
 Meningitis serosa 85, 549, 584.  
 Meningitis, tuberkulöse 85,  
 — typhosa 36.  
 — epidemische 83.  
 — purulenta 603.  
 — bei Bronchiektase 213.  
 Meningococcensepsis 96.  
 Meningococcenserum 85.  
 Meningococcus 83.  
 Meningoencephalitis syphilitica 588.  
 Meningomyelitis syphilitica 588.  
 Menthol 189.  
 Mentholöl 197.  
 Meralgia paraesthetica 522.  
 Meran 198.  
 Mergentheim 341, 484.  
 Merozoiten 103.  
 Mesaortitis 183.  
 Mesenterialdrüsen, Röntgennachweis 422.  
 Mesenterialgefäße, Embolie und Thrombose 338.  
 Mesotan 90, 491.  
 Meteorismus, Bedeutung für die Zirkulation 130.  
 Methämoglobin 252.  
 Methyleneblau bei Malaria 109.  
 — -silber 97.  
 Micrococcus melitensis 102.  
 Micrococcus catarrhalis 219.  
 Micromelie 502.

- Microzyten 258.  
 Migräne 156, 606.  
 Migränin 522, 608.  
 Mikuliczsche Krankheit 60.  
 Milchsäurenachweis 239.  
 Milchzucker 454.  
 Miliaria 88.  
 Miliartuberkulose 99.  
 — bei Masern 19.  
 — nach Keuchhusten 49.  
 — Unterscheidung von Typhus 38.  
 Milzextirpation bei hämolytischem Ikterus 260.  
 — bei Thrombopenie 273.  
 Milztuberkulose 270.  
 Milz, Verhalten bei Infektionskrankheiten 8.  
 Milzinfarkt 36, 110.  
 Milzruptur bei Recurrens 110.  
 Minimalluft 200.  
 Mischinfektion 9.  
 Miserere 334, 354.  
 Mitralfehler 233.  
 — Vortäuschung von Lungenspitzenkrankung 225.  
 Mitralinsuffizienz 166.  
 Mitralstenose 167.  
 Mittelkapazität der Lunge 200.  
 — bei Emphysem 217.  
 Mixtura nervina 615.  
 — solvens 211.  
 Möbiussches Zeichen 439.  
 Modenol 590.  
 Möller-Barlowsche Krankheit 275.  
 Monakowsches Bündel 568.  
 Monosaccharide 454.  
 Moorbäder 491.  
 Morbillen 17.  
 Morbus sacer 591.  
 Morgenlähmung 79.  
 Mucor niger 279.  
 Multiple Sklerose 585.  
 Mumps 59.  
 Mundatmung 188.  
 Mundhöhle, Krankheiten der 275.  
 Murexidprobe 420.  
 Muscarin 530.  
 Muskatnußleber 375.  
 Muskeln, Krankheiten der 488.  
 Muskelatrophien, degenerative 503.  
 Muskelatrophie, neurotische progressive 558.  
 Muskelatrophie, spinale progressive 557.  
 Muskelregbarkeit, elektrische 504.  
 Muskelrheumatismus 488.  
 Myalgia rheumatica 488.  
 Myasthenia gravis pseudoparalytica 560.  
 Mydriasis 505.  
 Myelin im Sputum 209.  
 Myelitis 539.  
 — funikuläre 542.  
 Myeloblasten 250.  
 Myelomalacie 540.  
 Myelome, multiple 270.  
 Myelose 263.  
 Myelozyten 250.  
 Myokarditis, akute 158.  
 — bei Diphtherie 68, 158.  
 — bei Gelenkrheumatismus 84, 87, 160.  
 — chronische 160.  
 — bei Scharlach 15.  
 Myokardschwielen 158.  
 Myoclonus bei Encephalitis epidemica 82.  
 Myodegeneratio cordis 160.  
 Myopathien 558.  
 Myotonia atrophica 559.  
 — congenita 559.  
 Myrmalyd 419, 430.  
 Myrthol 236.  
 Myxödem 437.  
 Myxoneurosis intestinalis 343.  
 Nabeldiphtherie 69.  
 Nachgärung 313.  
 Nachtblindheit 274.  
 Nachtwandeln 594.  
 Nackenstarre 83.  
 Nährklysmen 285.  
 Nahrungsbedarf 460.  
 Narbentetanus 75.  
 Narkolepsie 593.  
 Nase, Krankheiten der 188.  
 Nasenbluten 191.  
 Nasendiphtherie 69.  
 Nasenlues 191.  
 Nasensonde 72.  
 Nasenspray 40.  
 Nasenstimme 189.  
 Natr. nitros. 162, 188.  
 — salicyl. 89.  
 Nebenhöhlenerkrankungen 189.  
 Nebennieren 445.  
 — Verhalten bei Diphtherie 66.  
 Nebenschilddrüse 442.  
 Negrische Körperchen 77.  
 Neisserische Doppelfärbung 66.  
 Nenndorf 193, 211, 491.  
 Neohormonal 338.  
 Neoplasmen des Darmes 329.  
 — der Niere 411.  
 Neosalvarsan 64, 161.  
 — bei Lungengangrän 236.  
 — bei Noma 277.  
 Nephrektomie 416.  
 Nephritiden, Einteilung der 396.  
 — Therapie 407.  
 Nephritis, acute 397.  
 — apostematosa 411.  
 — chronische 402.  
 — bei Diphtherie 68.  
 — bei Scharlach 16.  
 — Beziehungen zu Anginen 65.  
 — tubularis 397.  
 Nephrolithiasis 420.  
 Nephropathie,luetische 401.  
 Nephropexie 414.  
 Nephroptose 413.  
 Nephrose 397.  
 — bei Diphtherie 68.  
 — genuine 403.  
 Nephrosklerose 404.  
 Nephrotomie 416.  
 Nerven, peripherische Krankheiten 503.  
 Nervenfieber 38.  
 Nervenlues 588.  
 Nervensystem, Krankheiten 502.  
 — sympathisches 528.  
 — vegetatives 528.  
 — — und Stoffwechsel 460.  
 Nerv. abducens 506.  
 — accelerans 127.  
 — accessorius 514.  
 — acusticus 509.  
 — axillaris 515.  
 — cutaneus femoris post. 517.  
 — cutaneus femoris later. 517.  
 — dorsales 517.  
 — ethmoidalis 188.  
 — facialis 508.  
 — femoralis 517.  
 — glossopharyngeus 509.  
 — glutaeus 517.  
 — hypoglossus 514.

- Nerv. ischiadicus 517.  
 — laryng. sup. 191.  
 — medianus 515.  
 — musculo-cutaneus 515.  
 — obturatorius 517.  
 — oculomotorius 505.  
 — olfactorius 188, 505.  
 — opticus 505.  
 — — Atrophie des bei Tabes 553.  
 — pelvicus 530.  
 — peroneus 518.  
 — phrenicus 514.  
 — pudendus 518.  
 — radialis 515.  
 — subscapularis 515.  
 — suprascapularis 514.  
 — thoracicus longus 514.  
 — tibialis 518.  
 — trigeminus 507.  
 — trochlearis 506.  
 — ulnaris 516.  
 — vagus 191, 509.  
 — vestibularis, Funktionsprüfung 610.  
 Netzhautveränderungen, arteriosklerotische 182.  
 — bei hämorrhag. Diathesen 271.  
 — bei Nierenleiden 393  
 — bei Sepsis 93.  
 Neuenahr 293, 295, 423.  
 Neuralgia spermatica 522.  
 Neuralgien 518.  
 — bei Grippe 52.  
 — Beziehungen zu Anginen 65.  
 — bei chronischer Malaria 108.  
 — Therapie 522.  
 Neurasthenie 610.  
 — gastrische 307.  
 Neuritis 523.  
 — optica bei Encephalitis epidemica 82.  
 — — bei Nierenleiden 393.  
 — — bei pernicioser Anämie 258.  
 — — retrobulbäre 586.  
 Neuron 502.  
 Neurorezidive 591.  
 Neurosen, traumatische 621.  
 Neutralrot 389.  
 Nierenamyloid 403.  
 Nierenbeckenentzündung 416.  
 Nierencysten 412.  
 Nierenembolie 410.  
 Nierenentzündungen 395.  
 Nierenfettkapsel 383.  
 Nierenfunktion 383.  
 — Prüfung 385.  
 Niereninfarkt 410.  
 Nierenprobemahlzeit 386.  
 Nierensteine 420.  
 Nierentuberkulose 423.  
 Nigrities linguae 279.  
 Nikotinvergiftung 162.  
 Nilblausulfat 313.  
 Nitrite 215.  
 Nitrobenzol als Blutgift 252.  
 Nitroglycerin 162, 215, 608.  
 Noma 276.  
 — bei Masern 19.  
 Nonnensausen 143, 255.  
 Normosal 254.  
 Novasurol 177.  
 Novatophan 90, 479.  
 Nuklease 380.  
 Nucleine 453.  
 Nucleoproteide 453.  
 Nucleus lentiformis 568.  
 — ruber 568.  
 Nykturie 150.  
 Nystagmus 585.  
 — calorischer 610.  
 Oblongata 569.  
 Obsessionen 612.  
 Obstipation, habituelle 339.  
 Occipitalneuralgie 519.  
 Ochronose 485.  
 Oculomotoriuslähmung, periodische 607.  
 Ödeme bei Nierenleiden 391.  
 Ödemkrankheit 487.  
 Oeynhausens 575.  
 Ohnmacht 152.  
 Oidium albicans 277.  
 Okklusionsileus 334.  
 Okkulte Blutungen 296.  
 Oleum Chenopodii 348.  
 Ölführstück 379.  
 Ölklystiere 341.  
 Ölkur 294.  
 Oligochromämie 251.  
 Oligocythämie 251.  
 Oliver-Cardarellisches Symptom 180, 185.  
 Omalgie 489.  
 Ophthalmie bei Masern 19.  
 — septische 93.  
 — neuroparalytische 507.  
 Ophthalmoplegie 507.  
 Opisthotonus 75.  
 Opiumbromkur 596.  
 Opodeldoc 491.  
 Oponone 3.  
 Optochin 97.  
 Orchitis bei Gicht 477.  
 — bei Maltafieber 102.  
 — bei Parotitis 60.  
 — bei Typhus 36.  
 Orexin 293.  
 Organneurosen 612.  
 Organotherapie 435.  
 Ornithodoros moubata 110.  
 Örtelsche Kur 177, 484.  
 Orthodiagraphie 135.  
 Orthoform 198.  
 Orthopnoe 151, 200, 214.  
 Osmiumsäure als Ursache von Glottisödem 196.  
 Ösophagitis 282.  
 Ösophagobronchialfistel 286.  
 Ösophagoskop 282.  
 Ösophagus, Krankheiten des 281.  
 Ösophaguscarcinom 286.  
 Ösophagusdilatation 283.  
 Ösophagusverengerungen 284.  
 Osteoarthritis deformans 493.  
 Osteoarthropathie hypertrophierende 213.  
 Osteomalacie 497.  
 Osteomyelitis 89, 94, 95.  
 Otitis media 189.  
 — bei Diphtherie 69.  
 — bei Influenza 51.  
 — bei Masern 18, 19.  
 — bei Parotitis 60.  
 — bei Scharlach 15.  
 — bei Typhus 36.  
 — nach Keuchhusten 49.  
 Ovarialcysten 359.  
 Ovarie 617.  
 Ovarien, inneres Sekret 449.  
 Ovarialpräparate 451.  
 Oxalatsteine 420.  
 Oxybuttersäure 467.  
 Oxydationswasser 455.  
 Oxyuris vermicularis 350.  
 Ozaena 190.  
 Pachydermie des Kehlkopfs 193.  
 Pachymeningitis cervicalis 589.  
 — hämorrhagica 605.  
 Palisadenwurm 348.  
 Pankarditis 87, 158, 164.

- Pankreascirrhose 381.  
 — Erkrankungen 379.  
 — Funktionsprüfung des 379.  
 — inneres Sekret 451.  
 Pankreascarcinom 380.  
 Pankreascysten 382.  
 Pankreasfisteln 382.  
 Pankreashormon 462.  
 Pankreaskonkremente 382.  
 Pankreasnekrose 381.  
 Pankreassaft, physiologische Wirkung des 311.  
 Pankreatin 293, 381.  
 Pankreatitis, hämorrhagische 380.  
 Pankreon 293, 381.  
 Papaverin 48, 162, 300, 341.  
 Paracodin 193, 211, 232.  
 Paraffinklistiere 341.  
 Paralysis agitans 597.  
 Paraphasie 565.  
 Paraplegia dolorosa 545.  
 Parasiteneier, Nachweis im Stuhl 345.  
 Paratyphusbacillus 42, 317.  
 Paratyphuserkrankungen 42.  
 Parkinsonsche Krankheit 597.  
 Parotitis 59, 279.  
 — bei Typhus 35.  
 Pässlerscher Haken 61.  
 Pasta guarana 608.  
 Paulsches Verfahren der Pockendiagnose 24.  
 Pavor nocturnus 594.  
 Payrsche Krankheit 333.  
 Pectus carinatum 500.  
 Pedunculi cerebri 568.  
 Peitschenwurm 349.  
 Pektoralreflex 202, 206.  
 Peliosis rheumatica 272.  
 Pelveoperitonitis 328, 351, 354.  
 Pendelrhythmus 138.  
 Pentosane 312, 454.  
 Pentosen 454.  
 Pentosurie 473.  
 Pepsin 289.  
 Pepsinsalzsäure 293.  
 Peptide 453  
 Peptonbouillon 54.  
 Perforationsperitonitis 354.  
 Periarteriitis nodosa 186.  
 Periarthritis chronica 492.  
 Pericarditis 178.  
 — adhaesiva 180.  
 Perichol 162.  
 Pericholecystitis 354, 370.  
 Perichondritis laryngea bei Fleckfieber 196.  
 — — bei Pocken 22.  
 — — bei Typhus 35.  
 Perigastritis 297.  
 Periproktitischer Abszeß bei Ruhr 47.  
 Perisplenitis 264.  
 Peritonealcarcinose 358.  
 Peritonealtuberkulose 356.  
 Peritonismus 337.  
 Perityphlitis 324.  
 Peritonitis, akute 350.  
 — chronische 356.  
 — gallige 353.  
 — bei Nephritis 403.  
 Perlsucht 221.  
 Perniciosaflecke 107.  
 Peroneuslähmung 518.  
 Perseveration 565.  
 Pertussin 50.  
 Pertussis 48  
 — bei Masern 19.  
 Pest 97.  
 Pestbacillus 97.  
 Pestpneumonie 98.  
 Petit mal 593.  
 Pfeifferscher Versuch 9, 44  
 Pfortaderthrombose 270, 379.  
 Pfriemenschwanz 350.  
 Pharyngitis 280.  
 Phase-I-Reaktion 551.  
 Phenacetin 522.  
 — als Blutgift 252.  
 Phenolsulfophthalein, Nierenfunktionsprüfung mittels 387.  
 Phenylalanin 452.  
 Phenylglukosazon 463.  
 Phenylhydracin bei Polycythämie 262.  
 Phlebolithen 186.  
 — Röntgennachweis 422.  
 Phobien 612.  
 Phosphatsteine 420.  
 Phosphaturie 293, 433.  
 Phosphorlebertran 196, 498, 501.  
 Phosphorlimonade 419.  
 Phosphorsäure, Bedeutung für die Muskelarbeit 459.  
 Phosphorvergiftung 365.  
 Phrenicus 199, 514.  
 Phthisis carcinomatosa 237.  
 — der Lungen 228.  
 — renalis 423.  
 Phystostigmin 338, 530.  
 Phytosterine 312.  
 Pikrinsäurevergiftung 363.  
 Pilocarpin 382, 526, 530.  
 Pilzvergiftung 363.  
 Pirquetsche Kutanreaktion 226.  
 — bei Masern 19.  
 Pistyan 495.  
 Pituglandol 447.  
 — bei Diabetes insipidus 487.  
 — bei Neus 338.  
 Pituitrin 447.  
 Pityriasis versicolor bei Lungentuberkulose 224.  
 Plasmodium vivax 105.  
 — immaculatum 107.  
 Plaut-Vincentische Angina 62, 70.  
 Pleocytose 551.  
 Plethysmographie 157.  
 Pleuraempyem s. Empyem.  
 Pleuraexsudat, Brustumfang 202.  
 Pleurapunktion, offene 245.  
 Pleura-Saugdrainage 245.  
 Pleuraschwarten 243.  
 Pleuritis 57, 88, 229, 241.  
 — diaphragmatica 242.  
 — citrige 244.  
 — interlobäre 221, 243.  
 — bei Lebercarcinom 372.  
 — bei Lungenabszeß 234.  
 — bei Lungengangrän 235.  
 — bei Lungeninfarkt 233.  
 Pleuritisches Reibeergäusch 206.  
 Plexus brachialis 516.  
 — cervicalis 514.  
 — lumbalis 517.  
 — sacralis 517.  
 Pluriglanduläre Insuffizienz 451.  
 Pneumatische Kammern 217.  
 Pneumobacillen 55, 95.  
 Pneumococcen 54, 95.  
 — Meningitis bei Pneumonie 58.  
 Pneumococcenserum 97.  
 Pneumococconperitonitis 354.  
 Pneumonie 218.  
 — chronische 220.  
 — hypostatische 219.  
 — käsige 228.  
 — kruppöse 54.  
 — nekrotisierende bei Masern 18.  
 — Wanderpneumonie 56.



- Pneumonie, weiße 237.  
 — zentrale 55.  
 Pneumonokoniosen 240.  
 Pneumoperikard 180.  
 Pneumoperitoneum 360.  
 Pneumothorax 229, 246.  
 — künstlicher 232.  
 Pocken 21, 164.  
 Pockenimpfung, Gefahren der 25.  
 Podagra 475.  
 Polioencephalitis acuta 579.  
 — — haemorrhagica 580.  
 Poliomyelitis acuta 78.  
 Pollakisurie 434.  
 Pollantin 190.  
 Polyarthritus acuta 86.  
 — chronica deformans 491.  
 — enterica 89.  
 — septica 93.  
 Polychromasie 253.  
 Polydipsie 487.  
 — bei Chlorose 256.  
 Polyglobulie 261.  
 Polygraph von Jaquet 147.  
 Polymyositis 491.  
 Polyneuritis 524.  
 — Unterscheidung von Poliomyelitis 81.  
 Polyposis intestini 329.  
 Polyzythämie 261.  
 Polysaccharide 454.  
 Polyserositis 88, 180, 241, 307, 358.  
 Polzin 90, 491.  
 Poncetsches Rheumatoid 229.  
 Pons 569.  
 Porencephalie 579.  
 Poriomanie 594.  
 Porphyrmilz 269.  
 Postikuslähmung 194.  
 Potainscher Aspirationsapparat 245.  
 Priapismus 264.  
 Probefrühstück 288.  
 Probekost von Schmidt 313.  
 Probemahlzeit 288.  
 Proktitis 320.  
 — luetica 332.  
 Promyelocyten 250.  
 Prophylaktiker 231.  
 Prostatahypertrophie 429.  
 Protargol 193.  
 Proteinkörpertherapie 73.  
 Pruritus, Therapie des 363.  
 — bei Urämie 394.  
 Psammome 581.  
 Pseudoalternans 155.  
 Pseudoanämie 251.  
 Pseudoangina, nervöse 162, 178.  
 Pseudobulbärparalyse 562.  
 Pseudodysenteriebacillen 46.  
 Pseudohypertrophie der Muskeln 558.  
 Pseudokrapp 192.  
 — bei Masern 18.  
 Pseudolebercirrhose, perikarditische 358.  
 Pseudoleukämie 267.  
 Pseudologia phantastica 620.  
 Pseudomyxoma peritonei 359.  
 Pseudoneurasthenie 576.  
 Pseudotabes peripherica 525.  
 Pseudotuberkelbacillen 99.  
 Pseudotumor cerebri 584.  
 Pseudourämie 395.  
 Psoasabsceß 544.  
 Psoriasis linguae 279.  
 Psychasthenie 610.  
 Psychoanalyse 621.  
 Psychoneurosen 610.  
 Psychotherapie 178, 183.  
 Ptyalismus 280.  
 Pubertas praecox 446.  
 Pubertätsdrüse 449.  
 Pulmonalinsuffizienz 171.  
 Pulmonalstenose 171.  
 Puls 140.  
 Pulskurve 145.  
 Pulsus alternans 142, 155.  
 — inaequalis 142.  
 — irregular. perpet. 154.  
 — paradoxus 142, 179, 249.  
 Pupillenbahn, zentrale 566.  
 Pupillendifferenz bei Aneurysma 185.  
 Pupillenstarre, absolute 505.  
 — reflektorische 551.  
 Pupillenstörungen nach Encephalitis epidemica 83.  
 Purinbasen 453.  
 Purinkörper, therapeutische Anwendung der 177.  
 Purkinjesche Fasern 127.  
 Purpuraerkrankungen 272.  
 Purpura variolosa 23.  
 Pyämie 91, 234.  
 Pyelitis 416.  
 — bei Typhus 36.  
 Pyelographie 415.  
 Pyelonephritis 417.  
 Pylephlebitis 378.  
 Pylorospasmus 306.  
 Pylorusreflex 290.  
 Pylorusstenose 305.  
 Pyonephrosis 414, 417.  
 — caseosa 423.  
 Pyopneumothorax 246.  
 — bei Echinococcus 238.  
 — bei Lungenabsceß 235.  
 — bei Lungengangrän 235.  
 — subphrenicus 355.  
 Pyocyanase bei Diphtherie 71.  
 — bei Scharlach 16.  
 Pyocyaneussepsis 96.  
 Pyramidenbahnen 532.  
 Pyramidenbahnsymptome 539, 586.  
 Quartanfieber 106.  
 Quinckesche Hängelage 213.  
 — Ödem 188, 196, 608.  
 Quotidianfieber 107.  
 Rachen, Krankheiten des 280.  
 Rachenmandel 65, 78.  
 — Eintrittspforte für Meningococcen 86.  
 Rachitis 499.  
 Radialislähmung 515.  
 Ragaz 495.  
 Rash bei Pocken 21.  
 Rasselgeräusche, Nachweis von 205.  
 Ratanhia 276.  
 Rattenfloh 98.  
 Räucherpräparate 215.  
 Rauchfuß-Groccosches Dreieck 242.  
 Raynaudsche Gangrän 188.  
 Recresal 419.  
 Recurrens 192.  
 Reflexepilepsie 591.  
 Regio hypothalamica 568.  
 Reithosenanästhesie 548.  
 Rekurrenslähmung 193.  
 — bei Aneurysma 185.  
 — bei Lungentumoren 237.  
 Refraktäre Phase 126.  
 Reichenhall 190, 193, 198, 211, 281.  
 Reichmannsche Krankheit 294.  
 Reichsimpfgesetz 24.

- Reichsseuchengesetz 12.  
 Rektoromanoskopie 310.  
 Reizleitungssystem 126.  
 Ren mobilis 413.  
 Rentenhysterie 620.  
 Reservekraft des Herzens 148.  
 Reserveluft 200.  
 Residualluft 200.  
 — bei Emphysem 217.  
 Respirationsluft 200.  
 Respiratorischer Quotient 457.  
 Reststickstoff 386.  
 Retinitis albuminurica 393.  
 — bei Diabetes 465.  
 Retropharyngealabcess 281.  
 Rheumasan 90, 491.  
 Rheumatismus 488.  
 — bei Ruhr 47.  
 Rheumatoide 89.  
 Rhinitis, acuta 189.  
 — chronica 190.  
 Rhinoskopie 189, 190.  
 — posterior 61.  
 Rhus arom. 435.  
 Riedelscher Lappen 369, 376.  
 Riesenwuchs 448.  
 Rindenblindheit 566.  
 Rindenlokalisation im Gehirn 562.  
 Rindentaubheit 565.  
 Risus sardonius 74.  
 Rivaltasche Reaktion 358.  
 Riviera 211.  
 Rohfaser 312.  
 Rohrzucker 454.  
 Rohrzuckerdiät 323.  
 Rombergsches Phänomen 552.  
 Röntgentherapie der Leukämie 267.  
 — der Lungentuberkulose 232.  
 Roßbachscher Atemstuhl 217.  
 Röteln 20.  
 Rotlicht bei Pocken 24.  
 Rubeola 20.  
 — scarlatina 20.  
 Rückenmark, Krankheiten des 531.  
 Rückenmarkserkrankungen, herdförmige 539.  
 Rückenmarksnerven, Lähmungen der 514.  
 Rückenmarkstumoren 548.  
 Rückenmarksverletzungen 547.  
 Rückfallfieber 109.  
 Rückstoßlevation 145.  
 Ruhennüchternwert 456, 458.  
 Ruhr 45.  
 — Malaria- 107.  
 Ruhrähnliche Kolitiden 47, 48.  
 Ruhrserum 48.  
 Rumpel-Leedesches Phänomen 251.  
 Rundwürmer 348.  
 Rustsches Symptom 543.  
 Saccharin 471.  
 Sackniere 414.  
 Safttreiber 294.  
 Saisonkrankheiten 5.  
 Sajodin 183.  
 Salaankrämpfe 527.  
 Salbeitee 276.  
 Salicylsäure s. Aspirin.  
 Salicyldyspnoe 89.  
 Salivation 280.  
 Salol 97.  
 Salomonsche Probe 302.  
 Salvarsan (s. a. Neosalvarsan) 64, 184.  
 — bei Malaria 109.  
 — bei Recurrens 111.  
 Salvarsanschäden 591.  
 Salzbrunn 211.  
 Salze, Bedeutung für den Stoffwechsel 454.  
 Salzschlirf 423.  
 Salzstich 460.  
 Salzungen 193, 281.  
 Sandbäder 491.  
 Sanduhrmagen 297, 302.  
 — Pseudo- 305.  
 Sängerknötchen 198.  
 Santalöl 430.  
 Santonin 348.  
 Santoninvergiftung 363.  
 Saprophyten 1.  
 Sarcine 289, 306.  
 Sattelnase 191.  
 Sättigungsgefühl 290.  
 Schafblättern 25.  
 Scharlach 13.  
 — -angina 61.  
 — Ähnlichkeit mit Serumkrankheit 73.  
 — im Wochenbett 93.  
 — Nephritis nach 400.  
 Scheuklappenhemianopsie 566.  
 Schienbeinschmerzen bei Fünftagefieber 111.  
 Schilddrüse, Erkrankungen 435.  
 Schilddrüsentabletten 485.  
 Schilddrüsenentzündung bei Typhus 36.  
 Schilddrüsenhormon 131.  
 Schinznach 495.  
 Schizonten 103.  
 Schlaflosigkeit, nervöse 611.  
 — bei cerebraler Arteriosklerose 575.  
 Schlaganfall 570.  
 Schlagvolumen des Herzens 128.  
 Schlangesches Symptom 336.  
 Schleifenbahn 533, 568.  
 Schlesingersches Reagens 361.  
 Schlingmuskelkrämpfe 77.  
 Schluckakt 282.  
 Schlucklähmung bei Encephalitis epidemica 82.  
 — bei Bulbärparalyse 561.  
 Schluckpneumonie 219.  
 Schlundring, Waldeyerscher 65.  
 Schmidtsche Kernprobe 380.  
 — Probekost 313.  
 Schmiedeberg 491.  
 Schmierkur (Quecksilber) 161.  
 Schnupfen 189.  
 Schnupfpulver 189.  
 Schnürleber 376.  
 Schreibersche Dilatationssonde 283.  
 Schreibkrampf 527.  
 Schrotbrot 341.  
 Schrumpfleber 365.  
 Schrumpfniere 404.  
 — und Diabetes 468.  
 — bei Gicht 476.  
 — hydronephrotische 414.  
 Schusterkrampf 527.  
 Schüttellähmung 597.  
 Schutzkolloide 421.  
 Schutzpockenimpfung 24.  
 Schutzstoffe (Alexine) 2.  
 Schwangerschaftsniere 401.  
 Schwarzwald 231.  
 Schwarzwasserfieber 108.  
 Schwefel bei Gelenkrankheiten 495.  
 Schwefelbäder 491.

- Schwefelkohlenstoffneuritis 525.  
 Schweningersche Kur 484.  
 Schwielenkopfschmerz 609.  
 Schwindsucht, galoppierende 228.  
 Scopolamin 599.  
 Secale 233.  
 Sedobrol 178.  
 Seelenblindheit 566.  
 Sehbahnen, Verlauf 565.  
 Seitenstränge des Pharynx 65.  
 Seitenstrangsklerose, primäre 557.  
 Sekretin 311.  
 Sekretionsstarre der Nieren 399.  
 Selbstinfektion 1.  
 Seliwanoffsche Probe 361.  
 Semon-Rosenbachsches Gesetz 193.  
 Senega 211.  
 Senfbäder 211.  
 Senfpackungen 174, 211.  
 Senkungsabszesse 544.  
 Sensibilität, radikuläre und segmentale 503.  
 Sepsis 165.  
 — Beziehung zu Anginen 65.  
 — Unterscheidung von Typhus 38, 91.  
 Septikämie, hämorrhagische 97.  
 Seropneumothorax 246.  
 Serratulslähmung 514.  
 Serumkrankheit 3, 73.  
 Serumtherapie 11.  
 — bei Pneumonie 59.  
 — bei Diphtherie 71.  
 — bei Grippe 53.  
 — bei Meningitis 85.  
 — bei Pest 99.  
 Sexualneurasthenie 612.  
 Sherringtonsches Gesetz 534.  
 Siebbeinzellen 188.  
 Sigmoiditis 319.  
 Simmondsche Krankheit 449.  
 Sinusthrombose 603.  
 Sirolin 232.  
 Sklerose, multiple 585.  
 Skoliose nach Poliomyelitis 80.  
 Skorbut 273.  
 — kindlicher 275.  
 Smegmabacillen 99.  
 Sodbrennen 291.  
 Soden i. T. 193, 211, 281.  
 Solarson 255.  
 Somatose, Nierenfunktionsprüfung mittels 386.  
 Somnacetin 616.  
 Sondenfütterung 72.  
 Soor 277.  
 Sozomentholpulver 189.  
 Spannerlähmung 192, 195.  
 Spasmophilie 444, 501.  
 — und Keuchhusten 50.  
 Spasmus glottidis 195.  
 — nutans 527.  
 Spätepilepsie 595.  
 Species diuretic. 410.  
 Speicheldrüsen, Krankheiten der 279.  
 Speichelsteine 279.  
 Speiseröhre s. Ösophagus 281.  
 Spezifitätsgesetz 9.  
 Sphären 107.  
 Spincter ani, Krampf 343.  
 Sphygmographie 145.  
 Spießscher Vernebler 211.  
 Spina bifida 434.  
 Spinalparalyse, spastische 557.  
 Spinat, sekretionsanregende Wirkung 311.  
 Spirillen 63.  
 Spirochaeta icterogenes 112.  
 — pallida 554.  
 — des Rückfallfiebers 110.  
 Spirometer 200.  
 Spitzfuß nach Poliomyelitis 80.  
 Spitzpocken s. Varicellen 25.  
 Splanchnicus 129, 309.  
 Splanchnoptose 344.  
 Spondylarthritis ankylopoetica 496.  
 Spondylitis deformans 495.  
 — tuberculosa 542.  
 — typhosa 36.  
 Spondylose rhizomélique 495.  
 Sporoziten 103.  
 Spulwurm 348.  
 Stabkranz 568.  
 Staphylococcen 95.  
 Status epilepticus 593.  
 — lymphaticus 451.  
 Staubinhalationskrankheiten 240.  
 Staeubliches Asthma-mittel 215.  
 Stauungsleber 375.  
 Stauungslunge 239.  
 Stauungsniere 409.  
 Stauungspapille 581.  
 Steapsin 311.  
 Steatorrhöe 380.  
 Steinhauerlunge 241.  
 Stellwagsches Symptom 439.  
 Steppengang 518.  
 Stillerscher Habitus 149, 304.  
 Stirnritzenkrampf 195.  
 Stinknase 190.  
 Stirnhöhlenerkrankung 189.  
 Stirn-Keilbeinhöhle 188.  
 Stockschnupfen 190.  
 Stoffwechsel im Fieber 461.  
 — im Hunger 461.  
 — bei Infektionskrankheiten 7.  
 — bei Kachexie 462.  
 Stoffwechselkrankheiten 452.  
 Stomacace 276.  
 Stomachica 292.  
 Stomatitis 275.  
 — aphthosa bei Masern 19.  
 — uraemica 394.  
 Stramonium 216.  
 Strangurie 428.  
 Straßenvirus 78.  
 Streifenpneumonie 220.  
 Streptococcus mucosus 95.  
 — putridus 95.  
 Streptococcen bei Erysipel 28.  
 Streptococcendiphtheroid bei Scharlach 15.  
 Streptococcensepsis 94.  
 Streptococcenserum 97.  
 Strophanthin 174, 176.  
 Struma basedowifcata 441.  
 Strümpfellsche Krankheit 495.  
 Strychnin 159, 174, 195, 307, 487, 526.  
 Strychninvergiftung, Unterscheidung von Tetanus 76.  
 Stuhlentleerung, fraktionierte 340.  
 Stuhlhypochonder 340.  
 Stuhlträgheit 339.  
 Sublimatniere 401.  
 Sublimatprobe (Fäces) 318.  
 Succusio Hippocratis 247.  
 Sudanfärbung 313.  
 Summübungen 216.

- Superacidität 293.  
 Suprarenin 41, 74, 174,  
   190, 191, 215, 445.  
 Suprareninklistiere 323.  
 Sympathicus 528.  
 Sympathicotonie 530.  
 Symptomenkomplex  
   amyostatischer 568.  
 — extrapyramidaler 568,  
   597.  
 — gastrokardialer 178.  
 Syncretio pericardii 87.  
 Synergie 569.  
 Syringomyelie 545.
- Tabak 178, 181, 188.  
 Tabakangina 162.  
 Tabes dorsalis 550.  
 — superior 555.  
 Tachykardie 141, 155.  
 — paroxysmale 156.  
 Tachypnoe 203.  
 — bei Hysterie 215, 619.  
 Taenia echinococcus 238.  
 — nana 347.  
 — saginata 345.  
 — solium 347.\*  
 Talmasche Operation 360,  
   367.  
 Tanninglycerin 193.  
 Tanninklistiere 324.  
 Tanninpräparate 324.  
 Tänzerinnengang 274.  
 Tänzerinnenkrampf 527.  
 Tastlähmung 566.  
 Taubstummheit 84.  
 Telegraphistenkrampf 527.  
 Telephotographie 135.  
 Tepłitz 90, 575.  
 Terpinhydrat 211.  
 Terrainkur 484.  
 Tertiana duplex 106.  
 — Tüpfelung 105.  
 Tertianfieber 106.  
 Tetanie 443.  
 Tetanus 74.  
 Tetrageus 92.  
 Thalamus opticus 567.  
 — — Symptome bei Er-  
   krankung des 567.  
 Theacylon 177, 410.  
 Theobromin 162, 177.  
 Theocin 177, 410.  
 Thiokoll 232.  
 Thomasphosphatschlacke  
   241.  
 Thomsensche Krankheit  
   559.  
 Thorakolyse 249.
- Thorakoplastik 214, 232.  
 Thoraxformen 201.  
 Thorax pyriformis 201.  
 Thorium bei Leukämie 268.  
 Thromben, marantische  
   186.  
 Thromboembolie 233.  
 Thrombopenie 273.  
 Thrombophlebitis 187, 234.  
 Thrombosen 143.  
 — bei Chlorose 255.  
 Thymol 349.  
 Thymus 199, 451.  
 Thymustod 451.  
 Thyraden 438.  
 Thyreodin 485.  
 — bei Gelenkrankheiten  
   495.  
 Thyreoglandol 438.  
 Thyreoglobulin 436.  
 Thyreoidin 438.  
 Thyreotoxikosen 156.  
 Thyroxin 436.  
 Tibialislähmung 518.  
 Tibialisphänomen 540, 574.  
 Tic convulsif 526.  
 — douloureux 519.  
 Tierkohle 45, 48.  
 Tierkrankheiten 7.  
 Tierlyssa 77.  
 Tollwut 76.  
 Tonsillarabsceß 62.  
 Tonsillektomie 64, 65.  
 Tonsillotomie, diphtherie-  
   ähnlicher Belag nach 70.  
 Töpfersches Reagens 289.  
 Tophi 476.  
 Tormina intestinorum 342.  
 Torpor recti 340.  
 Torticollis 489.  
 — spastica 527.  
 Trachea 199.  
 Trachealrasseln 240.  
 Trachealstenose 202.  
 Tracheobronchitis 207.  
 Tracheotomie 71, 195 ff.  
 Tractus opticus 566.  
 Transfert 617.  
 Transfusion 260.  
 Transversuslähmung 195.  
 Trapeziuslähmung 514.  
 Traubescher Raum 243.  
 Trepanation, dekompres-  
   sive 584.  
 Trichinose 124.  
 Trichocephalus dispar 349.  
 Trichterbrust 201.  
 Trigemin 522, 608.  
 Trigeminusneuralgie 519.
- Trikuspidalinsuffizienz  
   147, 171.  
 Trismus 74, 526.  
 Tropfenherz 149.  
 Tröpfcheninfektion 6, 48,  
   86, 99, 221.  
 Tropenkoller 107.  
 Trommelschlegelfinger 213,  
   220, 236.  
 Trousseau'sche Sonde 285.  
 Trousseau'sches Phänomen  
   444.  
 Trypsin 311.  
 Tryptophan 452.  
 Tuba Eustachii 188.  
 Tuberkel, Histologie des  
   222.  
 Tuberkelbacillen 99, 221.  
 — Nachweis von 225.  
 — — im Harn 424.  
 Tuberkelbacillensepsis 96.  
 Tuberkelbacillenähnliche  
   Stäbchen bei Lungen-  
   gangrän 236.  
 Tuberkulin 197, 224.  
 — Behandlung mit 232.  
 — diagnostische Probe 226.  
 Tuberkulose, Heredität u.  
   Konstitution bei 222.  
 — bei Masern 19.  
 Tuckersches Mittel 215.  
 Tumor cerebri 580.  
 Typhlatonie 340.  
 Typhoid, biliöses 111.  
 Typhus abdominalis 30.  
 — exanthematicus 26.  
 Typhus-, Koli- und Para-  
   typhusbacillen, Unter-  
   scheidung 30.  
 Tyrosin 364, 452.
- Überempfindlichkeit 73.  
 Überleitungsstörungen  
   154, 159.  
 Uffelmann'sches Reagens  
   289.  
 Ulcus duodeni 313.  
 — jejunum pepticum 316.  
 — ventriculi 295.  
 Ulnarislähmung 516.  
 Unfallsneurosen 621.  
 Unguent. cinereum 161.  
 Urämie 393.  
 — bei Cholera 45.  
 — Therapie 408.  
 Urikämie 475.  
 Urobilin, Nachweis im  
   Harn 361.  
 — — im Stuhl 318.

- Urobilinogen 361.  
 — Nachweis 151.  
 Urotropin 81, 97, 419.  
 Urtikaria bei Echinococcus 238.  
 Uterusblutungen bei Herzschwäche 151.  
 Uzara 332.
- Vagotonie 155, 530.  
 Vagus 509, 530.  
 — Bedeutung des bei Asthma 214.  
 Vagusdruckversuch 157.  
 Vaccination 6, 24.  
 Validol 615.  
 Valleixsche Druckpunkte 519.  
 Valsalvascher Versuch 143.  
 Variolois 22.  
 Varicellen 25.  
 Vasomotorenlähmung 152.  
 — bei Myokarditis 159.  
 Vegetatives Nervensystem 528.  
 — Beziehung zum Darm 309.  
 Venen, Untersuchung der 143.  
 Veitstanz 599.  
 Venenpuls 147.  
 Venenthrombose 186.  
 Ventrikelblutung 571.  
 Vermiculinsalbe 350.  
 Verodigen 176.  
 Vertigo ab aure laesa 610.  
 Vesikuläratmen 205.  
 Vichy 423.  
 Violinspielerkrampf 527.  
 Virchowdrüse 304.  
 Virulenz 2.  
 Virus fixe 78.  
 Viskosität 251.  
 Vitalkapazität 200.  
 — bei Emphysem 217.  
 Vitamine 455, 488.  
 Vitium cordis 166.  
 Volvulus 333, 337.  
 Vomitus matutinus 291.
- Vorhofflimmern 154.  
 Vorhofsvenenpuls 147.  
 Voussure 131, 166.
- Wadenkrämpfe 527.  
 Wahlsches Symptom 336.  
 Waldeyerscher Schlundring 65.  
 Wandererysipel 29.  
 Wanderleber 376.  
 Wanderniere 413.  
 Wanderpneumonie 56.  
 Wandertrieb 594.  
 Wasser, Bedeutung für den Stoffwechsel 454.  
 Wassergehalt der Speisen 407.  
 Wasserkrebs 276.  
 Wassermannsche Reaktion bei Malaria 108.  
 — bei Nervenlues 551, 590.  
 Wasserversuch 385.  
 Wechselfieber 103.  
 Weil-Felixsche Reaktion 27.  
 Weilsche Krankheit 112.  
 Weiße Harnprobe 32, 228.  
 Werlhofsche Krankheit 272.  
 Wermolin 348.  
 Wernarzer Wasser 419.  
 Wernickesche Zone 564.  
 Westphal-Strümpfellsche Pseudosklerose 601.  
 Westphalsches Zeichen 551.  
 Wiesbaden 90, 211, 293, 575.  
 Wiessee 491, 495.  
 Wildunger Wasser 419.  
 Wilsonsche Krankheit 367, 601.  
 Windpocken 25.  
 Wintrichscher Schallwechsel 228.  
 Wirbelcarcinose 542.  
 Wirbelcaries 542.  
 Wirbelsäulenverletzung 547.
- Wirbelsäulenversteifung 495.  
 Wirbelumoren 545.  
 Wolhynisches Fieber 111.  
 Wortblindheit 565.  
 Wundrose 28.  
 Wundshok 152.  
 Wurmmittel 347.  
 Wüstenklima 211.  
 Wutschutzimpfung 78.
- Xanthochromie der Cerebrospinalflüssigkeit 550.  
 Xerostomie 280.
- Yatren-Casein bei Gelenkrankheiten 495.  
 Yoghurt 341.
- Zeckenfieber 110.  
 Zelluloseverdauung 312.  
 Zenkersches Divertikel 284.  
 Ziegenmilch, Übertragung des Maltafiebers durch 103.  
 Ziegenpeter 59.  
 Ziemssensche Lösung 255.  
 Zigarettenraucher 162.  
 Zirbeldrüse 451.  
 Zirkulationsapparat, Krankheiten des 126.  
 Zuckerbildung aus Eiweiß 466.  
 Zuckernachweis im Harn 463.  
 Zuckerstich 460.  
 Zuckergußleber 375.  
 Zuckungen, fibrilläre 505.  
 Zuckungsformel 504.  
 Zunge, Krankheiten der 278.  
 Zwangslachen 586.  
 Zwangsvorstellungen 612.  
 Zwangswainen 586.  
 Zwerchfell 200.  
 — Bedeutung für die Zirkulation 130.  
 Zwergwuchs 502.  
 Zwischenwirt 7.

**Methodik der Blutuntersuchung** mit einem Anhang: Zytdiagnostische Technik. Von Dr. A. von **Domarus**, Direktor der Inneren Abteilung des Auguste Victoria-Krankenhauses, Berlin-Weißensee. (Aus: „Enzyklopädie der klinischen Medizin“, Allgemeiner Teil.) Mit 196 Textabbildungen und 1 Tafel. 1921. 18,60 Goldmark / 4,45 Dollar

Aus den zahlreichen Besprechungen:

Das Buch behandelt in ausgezeichneter und gründlicher Weise alle bewährten Methoden der physikalisch-chemischen und morphologischen Blutuntersuchung und enthält zudem eine Technik der histologischen Bearbeitung der hämatopoetischen Organe. Mit einer eingehenden Beschreibung des Technischen hat sich Verf. aber nicht begnügt, die Verfahren sind auch theoretisch begründet und kritisch besprochen. Das vom Autor angestrebte Ziel, „dem Untersucher zu ermöglichen, sämtliche Fehlermöglichkeiten und alle Ursachen des Versagens einer Reaktion oder Färbung zu übersehen“, ist ihm nach meinem Eindruck durchaus geglückt. Man merkt so an vielen Stellen, daß Verf. über umfangreiche eigene Erfahrung verfügt. Das Buch ist sicher eine wertvolle Bereicherung der schönen Springerschen Enzyklopädie.

„Münchener Medizinische Wochenschrift“

---

**Lehrbuch der Differentialdiagnose innerer Krankheiten.**

Von Geh. Med.-Rat Professor Dr. M. **Matthes**, Direktor der Medizinischen Universitätsklinik in Königsberg i. Pr. Vierte, durchgesehene und vermehrte Auflage. Mit 109 Textabbildungen. 1923.

17 Goldmark; gebunden 20 Goldmark / 4 Dollar; gebunden 4,80 Dollar

---

**Differentialdiagnose**, anhand von 385 genau besprochenen Krankheitsfällen lehrbuchmäßig dargestellt. Von Dr. **Richard C. Cabot**, Professor der klinischen Medizin an der Medizinischen Klinik der Harvard-Universität, Boston. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage nach der 12. Auflage des Originals von Dr. **H. Ziesché**, leitender Arzt der Inn. Abteilung des Josef-Krankenhauses zu Breslau. Erster Band. Mit 199 Textabbildungen. 1922. 16,70 Goldmark; gebunden 20 Goldmark / 4 Dollar; gebunden 4,80 Dollar  
Zweiter Band. Mit Abbildungen im Text. In Vorbereitung

---

**Lehrbuch der Perkussion und Auskultation** mit Einschluß der ergänzenden Untersuchungsverfahren der Inspektion, Palpation und der instrumentellen Methoden. Von Prof. Dr. **E. Edens**, München. Mit 249 Abbildungen. (Aus „Enzyklopädie der klinischen Medizin“, Allgemeiner Teil.) 1920. 16 Goldmark / 4 Dollar

---

**Vorlesungen über klinische Propädeutik.** Von Prof. Dr. **Ernst Magnus-Alsleben**, Vorstand der Medizinischen Poliklinik der Universität Würzburg. Dritte, durchgesehene und vermehrte Auflage. Mit 14 zum Teil farbigen Abbildungen. 1922.

Gebunden 7 Goldmark / Gebunden 1,80 Dollar

---

**Pathologisch-physiologische Propädeutik.** Von Prof. Dr. med. **Max Bürger**, Kiel, Medizinische Klinik. Mit etwa 30 Textabbildungen.

Erscheint Ende 1923

---

**Die konstitutionelle Disposition zu inneren Krankheiten.**

Von Dr. **Julius Bauer**, Privatdozent für innere Medizin an der Wiener Universität. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 63 Textabbildungen. 1921. 20 Goldmark / 4,80 Dollar

**Die Krankheiten des Herzens und der Gefäße.** Ein kurzgefaßtes praktisches Lehrbuch. Von Dr. **Heinrich Hochhaus** †, Geh. Med.-Rat, Professor an der Akademie für praktische Medizin, Direktor des Augusta-Krankenhauses in Köln. Bearbeitet und herausgegeben von Dr. **G. Liebermeister**, leitender Arzt der Inneren Abteilung des Städtischen Krankenhauses Düren. Mit 72 Textabbildungen. 1922.  
8 Goldmark; gebunden 10 Goldmark / 1,95 Dollar; gebunden 2,40 Dollar

**Blutkrankheiten und Blutdiagnostik.** Lehrbuch der klinischen Hämatologie. Von Dr. med. **Otto Naegeli**, o. ö. Prof. der inneren Medizin an der Universität Zürich und Direktor der Medizinischen Universitätsklinik. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 37 Abbildungen im Text und 25 farbigen Tafeln. 1923. Gebunden 31 Goldmark / Gebunden 7,45 Dollar

**Einführung in die allgemeine und spezielle Vererbungs-pathologie des Menschen.** Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Von Dr. **Hermann Werner Siemens**, Privatdozent für Dermatologie an der Universität München. Zweite, umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. Mit 94 Abbildungen und Stammbäumen im Text. 1923.  
12 Goldmark; gebunden 13,50 Goldmark / 2,90 Dollar; gebunden 3,25 Dollar

**Die Krankheiten der endokrinen Drüsen.** Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Von Dr. **Hermann Zondek**, a. o. Professor an der Universität Berlin. Mit 173 Abbildungen. 1923.  
16 Goldmark; gebunden 17,50 Goldmark / 3,85 Dollar; gebunden 4,20 Dollar

**Anatomie des Menschen.** Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Von **Hermann Braus**, o. ö. Professor an der Universität, Direktor der Anatomie Würzburg. In drei Bänden.

Erster Band: **Bewegungsapparat.** Mit 400 zum großen Teil farbigen Abbildungen. 1921. Gebunden 16 Goldmark / Gebunden 3,85 Dollar

Zweiter Band: **Eingeweide.** (Einschließlich periphere Leitungsbahnen, Allgemeiner Teil.) Mit 329 zum großen Teil farbigen Abbildungen. Erscheint Ende 1923.

Dritter (Schluß-)Band.

In Vorbereitung

**Lehrbücher der Geburtshilfe und Gynäkologie.** Von **R. Th. von Jaschke** und **O. Pankow**.

**Lehrbuch der Geburtshilfe.** Von Prof. Dr. **Rud. Th. von Jaschke**, Direktor der Universitätsfrauenklinik in Gießen, und Prof. Dr. **O. Pankow**, Direktor der Frauenklinik an der Akademie für praktische Medizin in Düsseldorf. Zweite und dritte Auflage. (Zugleich 10. und 11. Auflage des *Rungeschen* Lehrbuches der Geburtshilfe.) Mit 501, darunter zahlreichen mehrfarbigen Textabbildungen. 1923. Gebunden 24 Goldmark / Gebunden 5,75 Dollar

**Lehrbuch der Gynäkologie.** Von Prof. Dr. **Rud. Th. von Jaschke**, Direktor der Universitätsfrauenklinik in Gießen, und Prof. Dr. **O. Pankow**, Direktor der Frauenklinik an der Akademie für praktische Medizin in Düsseldorf. Dritte und vierte Auflage. (Zugleich 7. und 8. Auflage des *Rungeschen* Lehrbuches der Gynäkologie.) Mit 317, darunter zahlreichen mehrfarbigen Textabbildungen. 1923. Gebunden 20 Goldmark / Gebunden 4,80 Dollar

**Lehrbuch der Physiologie des Menschen.** Von Dr. med. **Rudolf Höber**, o. ö. Professor der Physiologie und Direktor des Physiologischen Instituts der Universität Kiel. Dritte, neu bearbeitete Auflage. Mit 256 Textabbildungen. 1922. Gebunden 18 Goldmark / Gebunden 4,35 Dollar

**Lenhartz-Meyer, Mikroskopie und Chemie am Krankenbett.** Begründet von **Hermann Lenhartz**, fortgesetzt und umgearbeitet von Prof. Dr. **Erich Meyer**, Direktor der Medizinischen Klinik in Göttingen. Zehnte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 196 Textabbildungen und 1 Tafel. 1922. Gebunden 12 Goldmark / Gebunden 2,90 Dollar